

四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

玖輯·拾壹册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

〔清〕張璐撰

孫真人千金方衍
義三十卷·之一

清嘉慶五年掃葉山房刻本

玖輯 · 拾壹册目錄

孫真人千金方衍義三十卷 · 之一

〔清〕張璐撰

一

〔清〕張璐撰

孫真人千金方衍
義三十卷·之一

清嘉慶五年掃葉山房刻本

孫真人原本

長洲張路玉著

千金方衍義

掃葉山房藏版

孫真人列傳

孫思邈京兆華原人也七歲就學日誦千餘言弱冠善談莊老及百家之說兼好釋典洛州總管獨孤信見而歎曰此聖童也但恨其器大適小難為用也周宣帝時思邈以王室多故乃隱居太白山隋文帝轉政徵為國子博士稱疾不起常謂所親曰過五十年當有聖人出吾方助之以濟人及太宗即位召詣京師嗟其容色甚少謂曰故知有道者誠可尊重義門廣成豈虛言哉將授以爵位固辭不受顯慶四年高宗召見拜諫議大夫又固辭不受上元元年舊疾請歸特賜良馬及鄱陽公主邑司以居焉當時知名之士宋令文孟詵盧照隣等執師資之禮以事焉思邈嘗從幸九成宮照隣留柱其宅時庭前有病梨樹照隣為賦其序曰癸酉之歲余臥疾長安光德公之官舍父老云是鄱陽公主邑司昔公主未嫁而卒故其邑廢時有孫思邈處士居之邈道合今古學殫數術高談正一則古之裝莊子深入不二則今之維摩詰耳其推步甲乙度量乾坤則洛下閔安期先生之傳也照隣有惡疾醫所不能愈乃問思邈名醫愈疾其道何如思邈曰吾門善言天者必質之于人善言人

千金方衍義序

上

者必木之于天有四時五行寒暑迭代其轉運也和而為雨怒而為風凝而為霜雪張而為虹霓此天地之常數也人有四肢五臟一覺一寤呼吸吐納精氣往來流而為榮衛張而為氣色發而為音聲此人之常數也陽用其形陰用其精天地之所同也及其失也蒸則生熱否則生寒結而為癰贅陷而為癰疽奔而為喘乏竭而為焦枯診發乎面變動乎中推此以及天地亦如之故五緯盈縮星辰錯行日月薄蝕字彗飛流天地之危診也寒暑不時天地之蒸否也石立土踊天地之癰疽也山崩土陷天地之癰疽也

千金方衍義序

二

奔風暴雨天地之喘之也川瀆涸竭土地之焦枯也良醫導之以藥石救之以鍼劑聖人和之以至德輔之以人事故形體有可愈之疾天地有可消之災又曰膽欲大而心欲小智欲圓而行欲方詩曰如臨深淵如履薄冰謂小心也赴赴武夫公侯干城謂大膽也不為利回不為義惕行之方也見幾而作不俟終日智之圓也思邈自云開皇己酉歲生至今年九十三矣詢之鄉里咸云數百歲人語周齊間事歷歷如眼見以此參之不啻白歲人矣然猶視聽不衰神采甚茂可謂古之聰明博達不死者也初魏徵等受詔

修齊梁陳周隋五代史訪有遺漏屢詰之思邈口以傳授有如目覩東臺侍郎孫處約將其五子偃儼俊佑佺以謁思邈思邈曰俊當先貴佑當晚達佺最名重禍在執兵後皆如其言太子詹事盧齊卿童幼時請問人倫之事思邈曰汝後五十年位登方伯吾孫當為屬使可自保也後齊卿為齊州刺史思邈孫溥果為徐州蕭縣丞思邈初謂齊卿之時溥猶未生而預知其事凡諸異跡多此類也永淳元年卒遺令溥葬不藏冥器祭祀無牲牢經月餘顏貌不改舉屍就木猶若空衣時人異之自注老子莊子撰千金方三

千金方衍義序

三

十卷行於代又撰福緣論三卷攝生真錄及枕中素書會三教論各一卷子行天授中為鳳閣侍郎生天開皇乃托辭也如果生於隋何周宣帝時便以王室多故隱居太白山耶

真入千金方本序

夫清濁剖判上下攸分三才肇基五行倣落萬物淳
朴無得而稱燧人氏出觀斗極以定方名始有火化
伏羲氏乃因之而畫八卦立庖廚滋味既興疴瘵萌
起大聖神農氏懸黎元之多疾遂嘗百草以救療之
猶未盡善黃帝受命制九鍼與方士岐伯雷公之
倫備論經脈旁通問難詳究義理以為經論故後世
可得依而暢焉春秋之際良醫和緩六國之時則有
扁鵲漢有仲景倉公魏有華陀並皆探蹟索隱窮幽
洞微用藥不過二三灸炷不逾七八而疾無不愈者

千金方衍義序

四

晉宋以來雖復名醫間出然治十不能愈五六良由
今人嗜欲太甚立心不常淫放縱逸有闕攝養所致
耳余竊尋聖人設教欲使家家自學人人自曉君親
有疾不能療之者非忠孝也未俗小人多行詭詐倚
傍聖教而為欺給遂令朝野士庶咸取醫術之名多
教子弟誦短文構小策以求出身之道醫治之術闕
而弗論吁可怪也嗟乎深乖聖賢之本意吾幼遭風
冷屢造醫門湯藥之資罄盡家產所以青衿之歲高
尚並典白首之年未嘗釋卷至於切脈診候採藥合
和服餌節度將息避慎一事長於己者不遠千里伏

膺取決至於弱冠頗覺有悟是以親鄰中外有疾厄
者多所濟益在身之患斷絕醫門故知方藥本神不
可不學吾見諸方部帙浩博忽遇倉卒求檢至難比
得方說疾已不救矣嗚呼痛天枉之多厄借學之
昏愚乃博採羣經刪裁繁重務在簡易以為備急千
金要方一部凡三十卷雖不能究盡病源但使爾意
於斯者亦思過半矣以為人命至重有貴千金一方
濟之德踰於此故以為名也未可傳於士族庶以貶
厥私門張仲景曰當今居世之士曾不畱神醫術精
究方藥上以療君親之疾下以救貧賤之厄中以保

千金方衍義序

五

身長全以養其生而但競逐榮勢企踵權豪孜孜汲
汲惟名利是務崇飾其末而忽棄其本欲華其表而
悴其內皮之不存毛將安附進不能愛人知物退不
能愛躬知已卒遇風邪之氣襲非常之疾患及禍至
而後震慄身居死地蒙蒙昧昧驚若遊魂降志屈節
欽望巫祝告窮歸天束手受取齎百年之壽命將至
貴之重器委付庸醫恣其所措咄嗟暗悔厥身已斃
神明消滅變為異物幽潛重泉徒為一悲痛夫與世
昏迷莫能覺悟自盲若是夫何榮勢之云哉此之謂
也

孫真人千金方序

昔神農備嘗百草以病五苦六辛之味逮伊尹而湯液之劑備黃帝欲剝九鍼以治三陰三陽之疾得岐伯而砭艾之法精雖大聖人有意於拯民之瘼必待賢明博通之臣或為之先或為之後然後聖人之所為得行於永久也醫家之務經是二聖二賢而能事畢矣後之留意於方術者苟知藥而不知灸未足以盡治療之體知灸而不知鍼未足以極表裏之變如能兼是聖賢之蘊者其名醫之良乎有唐真人孫思邈者乃其人也以上智之材抱康時之志當太宗治平之際思所以佐迺后庇民之事以謂上醫之道真聖人之政而王官之一守也而乃祖述農黃之旨發明岐華之學經摛扁鵲之難方採倉公之禁仲景素元化緣岐葛仙翁之必效胡居士之經驗張苗之藥對叔和之脈法皇甫謐之三部陶隱居之百一自餘郭玉范汪僧垣阮炳上極文字之初下訖有隋之世或經或方無不採摭集諸家之所秘要去眾說之所未至成書一部總三十卷目錄一通臟腑之論鍼灸之法脈證之辯食治之宜始婦人而次嬰孺先脚氣而後中風傷寒癰疽消渴水腫七竅之疴五石之

千金方衍義序

六

毒備急之方養性之術總篇二百三十二門合方論五千三百首莫不十全可驗四種兼包厚德過於千金遺法傳於百代使二聖二賢之美不墜於地而世之人得以階近而至遠上識於三皇之奧者孫真人善述之功也然以俗尚險怪我道純正不述割腹易心之異世務徇省我書浩博不可道聽塗說而知是以學寡其人寢以紛靡賢不繼世簡編斷缺不知者以異端見黜好之者以闕疑輟功恭惟我朝以好生為德以廣愛為仁迺詔儒臣正是墜學臣等述謝多遜職專典校於是請內府之祕書探道藏之別錄公私眾本搜訪幾遍得以正其訛謬補其遺佚文之重複者削之事之不倫者緝之編次類聚期月功至綱領雖有所立文義猶或疑阻是用端本以正之如素問九墟靈樞甲乙太素巢源諸家本草前古脈書玉函金匱肘後備急謝士秦剛繁書劉涓子鬼遺論之類事關所出無不研核尚有所闕而又沂流以討源如五藏經千金翼崔氏纂要延年祕錄正元廣利外臺祕要兵部手集夢得傳信之類凡所派別無不考理互相質正反覆稽參然後遺文疑義煥然悉明書雖是舊用之惟新可以濟含靈神明聖好生之治可

千金方衍義序

七

致輯 11-5

以傳不朽副主上廣愛之心非徒爲太平之潤色實
可佐皇極之錫福校讎既成繕寫伊始恭以上進庶
備親覽太子右贊善大夫臣高保衡尚書都官員外
郎臣孫奇尚書司封郎中充祕閣核理臣林億尚書
工部侍郎兼侍講臣錢象先等謹上

千金方衍義序

八

孫真人千金方序

耀州古華原地昔有孫子思邈者古逸民之儔也乃
避亂於周徵召于隋唐間皆不仕但以方藥濟人其
所謂不爲良相則爲良醫者歟乃後道流目之爲真
人醫家宗之爲名醫史家列於唐書方技傳中嗚呼
豈真知孫子者哉觀孫子言天必質之於人言人必
本之於天及以臨深履薄爲小心以不爲利回義坎
爲行方以見幾而作爲智圓方技之學諒不及此至
論聖人和以至德輔以人事則天地之災可消學者
取之以注于虞書水火金木土穀惟修中庸天地位
育之文之下斯精粹不易之言考之漢宋諸儒釋經
率未及是是可以用方技言耶惜當時無中和之主使
贊天地之化育固孫子之不幸亦世道之可悲也孫
子著有千金方三十卷其方首療婦人無子次姙娠
次轉女爲男次生產次活幼次男子老人諸方凡鍼
灸導引養性攝生之方無不備焉余見古今醫方有
序者率不逮是其間每卷有救急單方窮鄉下邑藥
物鮮有之所倉卒用之尤便其以千金名方蓋謂一
方之價抵千金焉耳或謂不然殊不知崇高之人偶
得危疾得是方以全之則中流一壺豈足喻耶孫子

千金方衍義序

九

之徒嘗利是方於華表石士監之鑑山之下漆沮合
流路隅便人覽且抄也今石存而方失州人傳說爲
某醫生所毀後其家遭雷禍方亦不存夫孫子著方
志在濟世仁人之心亦天地好生之心也彼專利之
徒乃毀之其不仁甚矣天譴而雷震之豈非理耶自
夫斯方之毀也世醫所常用者惟袖珍方及東垣李
氏丹溪朱氏方耳孫方之流傳者惟汗吐下三方及
救急單方命曰海上仙方存於他山之石餘方湮晦
所幸道家者流乃錄於道藏書中尚無恙焉余承乏
吏部日嘗抄是方傳之二三友朋一日先妻張氏得

千金衍義序

十

欬嗽吐血疾求醫療之無效乃手檢斯方用之服所
合四分之一頓愈他日至京師遇王生者乃貧交也
忽衣輕策肥訝而詢之曰久科不第得千金方而易
業濟人有奇效故日用稍裕異疇昔耳乃心寶斯方
欲廣傳之未能也今萬石喬氏乃梓而傳之非孫子
勒方華表意耶今而後斯方之傳其廣矣夫喬氏嘗
積穀數萬石歲薄取其息以賑飢人故遠邇歸德以
萬石君稱萬石君長子世寧中嘉靖戊戌進士由南
京戶部郎中陞四川按察司僉事次子世定明農相
萬石君世定嘗患傷寒疾醫診療之六脈已結而絕

將屬纏以待斂矣萬石君暨僉事體闔家之人祈祐
於孫子之前矢以疾愈卽梓傳神方于世祈畢診之
六脈俱應手至數日愈孫子有故居在鑑山畔有洞
在麓今皆爲奉祀所矣俱道士主之先是其瘵瘵人
或杖扶而來或人負而至祈祐于神眠于洞中軋夢
神治療醒卽舍杖而歸釋負而去以故鑑山香火於
關中爲盛雖華嶽吳鉅弗逮焉萬石君因僉事在地
官日抄獲是方至是指三百金刊之而送於神所傳
道士以方藥施人嗟乎萬石君父子用心誠神之心
哉受是刻者誠體厥心懼神之監監雷震者之禍用

千金衍義序

三

掃葉山房

每歲神所祈者報者之財分作四分一分易紙印方
施人一分依方合藥瘵病一分濟之鰥寡孤獨人餘
以奉神自給斯神惠廣布神人胥悅其感應又可勝
言也耶抑又聞之禱疾而愈者悉羊人有過而能改
者神亦佑之夫抱疾而禱者其戒之哉其戒之哉
嘉靖二十三年甲辰秋八月望日錄 田居士三原馬
理序

孫真人千金方衍義序

易云眇能視跛能履明乎非所能而自以為能不自知其才德之兼補也余自慙固陋乏經國濟世之略生遭世變墳尾流離迫永清人定而後章句荒落株守蓬廬惟有軒岐性命之學日尋繹焉而不能時吾里有李瑾懷慈者與余為膠漆契博聞強記潛心醫學君子人也所可議首務博而不知所宗淺涉而未探突與嘗與之究玉函金匱及千金方一書非不有識堪資而求所謂愜心貴當尚有憾焉深歎述古之難如昌黎所云補苴罅漏張皇幽眇前非末學所可

千金方衍義序

三

掃葉山房

幾也夫長沙為醫門之聖其立法誠為百世之師繼長沙而起者惟孫真人千金方可與仲聖諸書頡頏上下也伏讀三十卷中法良意美聖謨洋洋其辯治之條分縷晰製方之反激逆從非神而明之其孰能與於斯乎余自束髮授書以來即畱心是道曩所輯續緒二論及醫通一十六卷付梓行世深歎學識迂疎伴可為後學自邇自卑之一助迄今桑榆在望尚欲作螻蟻不朽亦自愚矣而此書不為之開發將天下後世竟不知有是書深可懼也因不揣愚昧彙取舊刻善本參互考訂逐一發明其中反用激用之法

貫串而昭揭之其于鍼灸一門闕以俟專家補之俾學者開卷了然胸無窒礙昭宋刻本仍隸三十卷倣趙以德敷衍金匱之義又殊倣敷衍成文爰名曰千金方衍義後之君子有以討論修飾授之剞劂亦斯書之幸甚余不學無術老無思索意之所致信筆成書殆所謂眇之能視不足以有明跛之能履不足以與行也

路王序

康熙歲次戊寅十一月既望八十二老人石頑張璐

千金方衍義序

三

掃葉山房

余不知醫而先世家藏祕方頗能活人故凡
 遇醫方之良者必購而藏之藏庚戌新安程
 翁瘦樵以千金方衍義授予曰斯編絕業也
 自唐迄明綿歷千餘載無有能闡發其奧蘊
 者故庸醫袖手咋舌吐棄而不取用賢者用
 之而反為世所詬病其不至泯沒而無傳也
 亦幾矣張子路玉者良工也生平服膺是編
 數十年不輟晚年始有定本未及刊行今觀
 其書于逆從反激之法探賾索隱深究而詳
 說之又援引本經甄權英華之主治以祛世
 俗之惑其于用藥之過于峻利者則又斟酌
 于南牀風氣資稟之強弱而消息之是書之
 作實足以發朦振聵必傳于後無疑也程翁
 精于岐黃者也其言豈欺我哉爰為訂其誰
 補其闕而付之梓

嘉慶庚申桂月之望雨沙席世臣識

千金方衍義



孫真人千金方目錄

卷一 論九首

論大醫習業第一 論太醫橋議第二

論治病略例第三 論診候第四

論處方第五 論用藥第六

論合和第七 論服餌第八

論藥藏第九

卷二 婦人方上 凡九類

求子第一

論六首

七子散

千金方衍義目錄

朴硝盪胞湯 紫石門冬圓

白薇圓 三首 慶雲散

承澤圓 大黃圓

百神圓 秦椒圓

丹參圓 灸法

餘方無名者俱散見本類後倣此

妊娠惡阻第二

論一首 半夏茯苓湯

茯苓圓 青竹茹湯

橘皮湯

養胎第三

論二首

烏雌雞湯

補胎湯

艾葉湯

黃連湯

雄雞湯

茯神湯

菊花湯

調中湯

芎膠湯

安中湯

麥門冬湯

柴胡湯

葱白湯

杏仁湯

芍藥湯

葵子湯

半夏湯

千金方衍義錄

婦科山房

猪腎湯

升安膏

甘艸湯

千金圓

蒸大黃圓

滑胎合易產方

妊娠諸病第四

葱白湯

旋復花湯

竹瀝湯

馬通湯

膠艾湯

鱉爪湯

香豉湯

鯉魚湯

灸法

產難第五

論一首

羚羊角散

鍼法

子死腹中第六

論一首

真珠湯

逆生第七

論一首

方皆無名不錄後做此

胞胎不出第八

牛膝湯

下乳第九

鍾乳湯

漏蘆湯

千金方衍義錄

婦科山房

漏蘆散

石膏湯

麥門冬散二方

鬼箭湯

甘艸散

鯉魚湯

卷三 婦人方中 凡入類

虛損第十

論二條

四順理中圓

桃仁煎

石斛地黃煎

地黃羊脂煎

地黃酒

羊肉黃芪湯

鹿肉湯

麋骨湯

當歸芍藥湯

杏仁湯	乳蜜湯
五石湯	三石湯
內補黃芪湯	吳茱萸湯
豬膏煎	鯉魚湯
桂枝附子湯	
虛煩第十一	
薤白湯	竹根湯
人參當歸湯	甘竹茹湯
知母湯	竹葉湯
淡竹茹湯	赤小豆散
蒲黃散	蜀漆湯
芍藥湯	
中風第十二	附虛心驚悸
論一首	大豆紫湯
獨活紫湯	小獨活湯
甘艸湯	獨活湯
雞糞湯	竹葉湯
防風湯	鹿肉湯
獨活湯	大豆湯
五石湯	四石湯

小柴胡湯	三物黃芩湯
甘艸湯	羊肉湯
葛根湯	防風湯
木防已膏	浴湯
茯苓湯	遠志湯
茯苓湯	安心湯
甘艸圓	人參圓
大遠志圓	
心腹痛第十三	
蜀椒湯	大巖蜜湯
乾地黃湯	芍藥湯
當歸湯	桃仁芍藥湯
羊肉湯	羊肉當歸湯
羊肉杜仲湯	羊肉生地黃湯
內補當歸建中湯	內補芍藥湯
大補中當歸湯	桂心酒
生牛膝酒	吳茱萸湯
蒲黃湯	敗醬湯
芎藭湯	獨活湯
芍藥黃芪湯	

惡露第十四

乾地黃湯

桃仁湯

澤蘭湯

甘艸湯

大黃湯

柴胡湯

蒲黃湯

銅鏡鼻湯

小銅鏡鼻湯

梔子湯

生地黃湯

大黃乾漆湯

麻子酒

升麻湯

下痢第十五

膠蠟湯

桂蜜湯

千金方衍義目錄

六

婦人方

常歸湯

白頭翁湯

驚甲湯

龍骨圓

阿膠圓

澤蘭湯

乾地黃湯

生地黃湯

藍青圓

赤石脂圓

赤散

黑散

黃散

龍骨散

淋濁第十六

栝樓湯二方

雞臍脰湯

石葶湯

葵根湯

茅根湯

滑石散

竹葉湯

雜治第十七

破積烏頭圓

竹茹湯

厚朴湯

溫經湯

半夏厚朴湯

昆布圓

五加酒

黃芩散

硫黃散

當歸散

當歸湯

陰瘡膏

白玉湯

桑根白皮湯

千金方衍義目錄

七

灸法九條

卷四 婦人方下 凡四類

補益第十八

論一首

柏子仁丸

大五石澤蘭圓

小五石澤蘭圓

增損澤蘭圓

大稍益當歸圓

白芷圓

紫石英柏子仁圓

鍾乳澤蘭圓

大澤蘭圓

小澤蘭圓

紫石英天門冬圓

三石澤蘭圓

大平胃澤蘭圓

澤蘭散

月水不通第十九 附瘕瘕

乾薑圓

桃仁湯 二方

艾硝湯

硝石湯

乾棗湯

前胡牡丹湯

黃芩牡丹湯

牡丹圓

乾地黃當歸圓

乾棗圓

當歸圓

鱉甲圓 二方

禹餘糧圓

牡蒙圓

大蠱蟲圓

桂心酒

千金方衍義錄

八

虎杖煎 二方

桃仁煎

五京圓

雞鳴紫圓

遼東都尉所上圓

牡蠣圓

赤白帶下崩中漏下第二十

論二首

白堊圓

赤石脂圓

白石脂圓

小牛角膠散

龍骨散

白馬蹄圓

白馬駝散 大豆紫湯方見前三卷中

雲母芎藭散

慎火艸散

禹餘糧圓

增損禹餘糧圓

當歸湯

伏龍肝湯

大牛角中人散

生地黄湯

丹參酒

牡丹皮湯

白堊圓

鹿茸散

芎藭湯

馬通湯

牛蹄屑湯

馬蹄圓

慎火艸散

蒲黃散

灸法 八條

月水不調第二十一

白堊圓

桃仁湯

千金方衍義錄

九

杏仁湯

大黃朴硝湯

茱萸蠶蟲湯

抵當湯

七熬圓

桃仁散

牡丹大黃湯

陽起石湯

牛膝圓

灸法 一條

卷五上 少小嬰孺方凡五類

序例第一

論三首

紫圓

黑散

擇乳母法

初生出腹第二

論 三首 凡上二事 相兒壽天法

驚癩第三

論 三首

候癩法

龍膽湯

大黃湯

白羊鮮湯

增損續命湯

石膏湯

二物石膏湯

二物鹽毛湯

茵芋湯圓

鎮心圓

丹參赤膏

五物甘艸生摩膏

灸法 二十六條

客忤第四

千金方衍義目錄

十

掃葉山房

論 二首

一物猪蹄散

一物馬迴浴湯

一物猪通浴湯

白鮮皮湯

龍角圓

芎藭散

一物前胡圓

千金湯

灸法 一條

傷寒第五 小兒

論 一首

麥門冬湯

芍藥四物解肌湯

麻黃湯

五味子湯

莽艸浴湯

雷丸浴湯

李葉浴湯

柳枝浴湯

青木香浴湯

十二物寒水石散

李根湯

升麻湯

大黃湯 二方

蜀漆湯

竹葉湯 二方

調中湯

生地黄湯

二物通汗散

二物茯苓粉散

三物黃連粉散

犀角飲子

恆山湯

卷五下 少小嬰孺方 凡四類

欬嗽第六

千金方衍義目錄

十一

掃葉山房

竹瀝湯

紫苑湯

五味子湯

射干湯

杏仁圓

八味生薑煎

四物款冬圓

菖蒲圓

桂枝湯

麻黃湯

癖結脹滿第七 附霍亂

雙紫圓

牛黃圓

芫硝紫圓

牛黃雙圓

牛黃驚甲圓

芫花圓

真珠圓

驚甲圓

蟹頭圓 桂心橋皮湯

地黃圓 馬通聚圓

當歸圓 馬齒攀圓

半夏圓 藿香湯

灸法 一條

癰疽瘰癧第八

論一首 漏蘆湯

五香連翹湯 連翹圓

麻黃湯 揚湯

五香枳實湯 水銀膏

千金方衍義目錄

十一

補藥山房

苦參湯 枳實圓

澤蘭湯 藜蘆膏

苦參圓 灸法 一條

雜病第九

白石脂散 雀尿圓

升麻湯 半夏熨湯

五等湯 蟹頭圓

除熱結腸圓 地膚子湯

蒲黃湯 灸法 十三條

卷六上 七竅病上 凡五類

目病第一

論一首 證三條

神麴圓 瓜子散

補肝圓 二方 補肝散 二方

補肝蕪菁子散 補肝散 二方

梔子仁煎 瀉肝湯

洗肝乾藍煎 大棗煎

洗眼湯 蕩風散

洗眼湯 乳汁煎

真珠散 灸法 二十八條

千金方衍義目錄

十二

補藥山房

鼻病第二

論一首 香膏 二方

通艸散 羊肺散

生地黃湯 三方 灸法 六條

目病第三

論一首 升麻煎

薔薇圓 甘艸圓

五香圓 含香圓

灸法 二條

舌病第四

升麻煎

唇病第五

潤脾膏

甲煎唇脂

甲煎口脂

灸法二條

卷六下 七歲病下 凡四類

齒病第六

論一首

含嗽湯

嗽湯

灸法二條

喉病第七

證一條

烏髮膏

千金方衍義目錄

十四

掃葉山房

母薑酒

鍼灸法二條

耳病第八

赤膏

面藥第九

五香散

而脂二方

面膏

玉屑面膏

玉屑面脂

鍊脂法

治外膏

猪蹄湯

猪蹄漿

鹿角散

鉛丹散

白楊皮散

桃花圓

白瓜子圓

白膏

梔子圓

卷七 風毒脚氣 凡五類

論風毒狀第一

論十六首

湯液第二

竹瀝湯三方

麻黃湯

獨活湯

兼補厚朴湯

風引獨活湯

防風湯

獨活湯

越脾湯

千金方衍義目錄

十五

掃葉山房

風引湯

大驚甲湯

小驚甲湯

風緩湯

犀角旋復花湯

大犀角湯

犀角麻黃湯

茱萸湯

小風引湯

四物附子湯

增損腎瀝湯

石膏湯

半夏湯

烏頭湯

追毒湯

風緩湯

紫蘇子湯

附子湯

防風湯

甘州湯

恆山甘艸湯 丹參牛膝煮散

諸散第三

例一條 八風散

大八風散 內補石斛秦朮散

秦朮散 石斛萬病散

茱萸散

酒醴第四

例一條 石斛酒

烏麻酒 鍾乳酒

枸杞菖蒲酒 虎骨酒

千金方衍義錄

麥酒 小黃芪酒

黃芪酒 茵芋酒

大金牙酒 鍾乳酒

秦朮酒 木膏酒

松葉酒 側子酒

諸膏第五

例一條 神明白膏

衛侯青膏 神明青膏

太傅白膏 曲魚膠

野葛膏 陳元膏

裴公入毒膏

卷八 諸風門 凡八類

論雜風狀第一

論二十五首

諸風第二

小續命湯 三方

西州續命湯

續命煮散

大八風湯

小八風湯

千金方衍義錄

菜耳散

大防風湯

金牙散

蠻夷酒

獨活酒

賊風第三

論一首

乾薑附子湯

荆瀝湯

依源麻黃湯

桂枝酒

芎藭湯

白朮湯

半夏湯

大續命湯 二方

大續命散

排風湯

八風散

烏頭湯

地黃煎

大戟洗湯

馬薤酒

魯王酒 二方

灸法 三十六條

當歸圓 依源麻黃續命湯

八風防風湯 温中生薑湯

腎瀝湯 乾地黄湯

大巖蜜湯 小巖蜜湯

排風湯 烏頭湯

防風湯 羌活湯

防已湯 大棗湯

犀角湯 石膏湯

松脂湯 松節酒

松膏湯 松葉酒

千金方衍義錄 六

灸法 六條

偏風第四

防風湯 葛根湯

麻子湯 三黃湯

白斂薏苡湯 獨活寄生湯

菊花酒 杜仲酒

鍼灸法 五條

風痲第五

論 三首 竹瀝湯 四方

荆瀝湯 馬活煮散

五補圓 灸法 一條

風懿第六

論 三首 獨活湯

石南湯 桂湯

附子散 甘艸湯

枳茹酒 鍼灸法

角弓反張第七

會公當歸湯 秦朮散

吳秦朮散

風痺第八

千金方衍義錄 五

論 一首 防已黃芪湯

黃芪湯 鐵精湯

白斂散 附子酒

麻子酒 卷九 傷寒方上 凡九類

傷寒例第一

論 三首

辟温第二

歲日曆蘇酒 太乙流金散

雄黃散 虎頭殺鬼圓

辟溫殺鬼圓

雄黃圓

赤散

粉分散

一物柏枝散

葳蕤湯

傷寒膏第三

青膏

黃膏

白膏

發汗散第四

青散

五苓散

崔文行解散

六物青散

青散

詔書發汗自微散

千金方衍義錄

三

華陀赤散

赤散

烏頭赤散

水解散

發汗湯第五

例一首

桂枝湯

麻黃湯

大青龍湯

陽毒升麻湯

陰毒甘艸

陰旦湯

陽旦湯

六物解肌湯

解肌升麻湯

葛根龍薤湯

七物黃連湯

三七湯

五香麻黃湯

雪煎

發汗圓第六

神丹圓

麥奴圓

宐吐第七

例一首

瓜蒂散

水道散

宐下第八

例一首缺

證十二條缺

大承氣湯

抵當湯

抵當圓

承氣湯

千金方衍義錄

三

施業山房

生地黄湯

柴胡葳蕤知母湯

駛鼓圓

發汗吐下後第九

脈證七條

竹葉湯

桂枝麻黃湯

小青龍湯

四物甘艸湯

梔子湯

厚朴湯

元武湯

葛根黃連湯

茯苓湯

大陷胸湯

大陷胸圓

生薑瀉心湯

甘艸瀉心湯

白虎湯

青箱子圓

大青湯

灸法一條

卷十 傷寒方下 凡七類

傷寒雜治第十

論一首

苦參湯

凝雪湯

栝樓湯

蘆根飲子

漏蘆連翹湯

豬膽湯

木香湯

赤石脂禹餘糧湯

麻黃升麻湯

牡蠣散

灸法一條

千金方衍義目錄

三

摘錄山房

勞復第十一

附論陽易

論一首

食忌九條

黃龍湯

枳實梔子湯

麥門冬湯

百合第十二

論二首

百合知母湯

百合滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

傷寒不發汗變成狐惑第十三

論一首

赤小豆當歸散

瀉心湯

傷寒發黃第十四

論三首

譯五條

黃芪芍藥桂酒湯

桂枝黃芪湯

麻黃醇酒湯

大黃圓二方

茵陳湯

三黃散

五苓散

秦椒散

小半夏湯

大茵陳湯

苦參散

麻黃連翹赤小豆湯

茵陳蒿湯

大黃黃蘗湯

千金方衍義目錄

三

茵陳圓

枳實大黃湯

凝水石散

枳實圓

半夏湯

牛膽丸

茵陳圓

硝石礬石散

滑石石膏散

鍼灸圓

溫瘧第十五

論一首

蠶屎煎圓

柴胡枳實根湯

蜀漆散

牡蠣湯

白虎加桂湯

麻黃湯

恆山圓

梔子湯

蜀漆圓

烏梅圓

大五補湯

鯨鯉湯

烏梅圓

匠山湯 二方

藜蘆圓

刺灸法 十九條

診溪毒第十六

論一首

卷十一 肝臟 凡五類

肝臟脈論第一

論二首

千金方衍義目錄

肝虛實第二

脈 四條

竹瀝泄熱湯

前胡湯

防風散

遠志散

地黃煎

補肝湯

補肝散

松膏酒

枸杞酒

防風煎

板榔湯

灸法一首

肝勞第三

首

猪膏酒

虎骨酒

筋極第四

論一首

丹參散

橘皮通氣湯

五加酒

地黃煎

灸法 七首

堅癥積聚第五

論一首

五石烏頭圓

三台圓

恆山圓

烏頭圓

千金方衍義目錄

陷胸湯

大五明狼毒圓

小狼毒圓

狼毒圓

甘遂湯

野葛膏

硝石大黃圓

土瓜圓

椒熨方

大黃湯

灸法

卷十二 膽腑 凡七類

膽腑脈論第一

論一首

膽虛實第二

附虛煩不得眠

室

掃葉山房

脈二條

半夏湯

溫膽湯

千里流水湯

酸棗湯

梔子湯

灸法二首

咽門論第三

論一首

髓虛實第四

論一首

羌活補髓圓

柴胡發泄湯

風虛雜補酒第五

千金要方義目錄

卷

攝真山房

巴戟天酒

五加酒

天門冬大煎

填補萬金煎

小鹿角煎

地黃小煎

陸抗膏

枸杞煎

夏姬杏仁煎

桃仁煎

膏煎

吐血第六

論一首

黃土湯二方

生地黃湯

墜中湯

柏葉湯

澤蘭湯

犀角地黃湯

當歸湯

竹茹湯

赤小豆散

乾地黃圓

麥門冬湯

鍼灸法十五條

萬病圓散第七

論二首

芫花散

耆婆萬病圓

仙人玉壺圓

大麝香圓

三物備急圓

大理氣圓

紫葛圓

小麝香圓

太乙神精丹

千金要方義目錄

卷

攝真山房

作土釜法

作六一泥法

倉公散

小金牙散

大金牙散

卷十三 心臟 凡八類

心臟脈論第一

論一首

心虛實第二

脈四條

石膏湯

半夏瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

竹瀝湯

茯神散

心散	茯苓補心湯
半夏瀉心湯	牛髓圓
大補心湯	補心圓
灸法 一條	
心勞第三	
論一首	大黃泄熱湯
脈極第四	
論一首	生地黃煎
灸法 二條	
脈虛實第五	
論一首	防風圓
升麻湯	麻黃湯
鍼灸法 二條	
心腹痛第六	
論一首	九痛圓
桂心三物湯	崔氏烏頭圓
五辛湯	犀角圓
高良薑湯	當歸湯 六方
溫中當歸湯	羊肉當歸湯
溫脾湯	生薑湯

熨蒸法 一首	鍼灸法 二十五首
胸痺第七	
論一首	栝樓湯
枳實薤白桂枝湯	茯苓湯
治中湯	通氣湯
細辛散	蜀椒散
前胡湯	熨背散
下氣湯	栝榔湯
灸法	
頭面風第八 附頭眩等	
芎藭酒	人參湯
防風湯 二方	茵芋湯
鴨頭湯	大三五七湯
小三五七湯	扶神湯
防風散	摩頭散
八頂散	杏仁膏
大豆酒	薯蕷散
菊花散	頭風摩散
沐頭湯 八方	犀角湯
防風散	摩膏

生髮膏

松瀝煎

王不留行湯

松胎膏

卷十四 小腸腑 凡七類

小腸腑脈論第一

論一首

小腸虛實第二

脈二條

柴胡澤瀉湯

大黃圓

灸法

舌論第三

論一首

千金方衍義錄

三

五屬樓

風眩第四

論一首

續命湯

賣豚湯

防已地黃湯

薯蕷湯

防風湯

薯蕷圓

薯蕷煎

天雄散

人參圓

灸法一條

食禁一條

風癩第五

論四首

虎睛圓

雄雞圓

續命風引湯

紫石散

芎藭酒

鴨頭圓

地黃門冬酒

天門冬酒

炙法九條

鱉甲酒

九物牛黃酒

十黃散

別離散

四物鵝頭散

五邪湯

茯神湯

人參湯

虎睛湯

鍼灸法四十九條

風虛驚悸第六

遠志湯二方

茯神湯二方

千金方衍義錄

三

補心湯五方

小定心湯

大定心湯

荆瀝湯

鎮心湯

大鎮心散

小鎮心散

鎮心圓

大鎮心圓

小鎮心圓

定志小圓

紫石英酒

好忘第七

枕中方

開心散

菖蒲益智圓

八味散

卷七五上

脾臟上

凡六類

脾臟脈論第一

論一首

脚虛實第二

論一首

脈四條

瀉熱湯

射干煎

三黃瀉熱湯

大黃瀉熱湯

檳榔散

溫脾圓

麻豆散

白朮散

平胃圓二方

大麴藥圓

消食斷下圓

乾薑散

千金方衍義錄

三

消食丸

麴蘗散

灸法一條

脾勞第三

論一首

半夏湯

消食氣酒

肉極第四

論一首

解風痺湯

西州續命湯

石南散

大黃芪酒

肉虛實第五

論一首

五加酒

半夏湯

秘澀第六

論一首

麻子仁圓

三黃湯

五柔圓

大五柔圓

濡積湯

芒硝圓

走馬湯

巴豆圓

練中圓

灸法十五條

卷十五下

脾臟下 凡四類

千金方衍義錄

三

熱痢第七

論一首

脈證二十四條

陟釐丸

烏梅圓

松皮散

苦參橘皮圓

三黃白頭翁湯

龍骨圓二方

白頭翁湯

茯苓湯

溫脾湯

黃連湯

女萎圓

聖湯

灸法十一條

冷痢第八

論一首

溫脾湯

建脾圓

增損建脾圓

駢車圓

大桃花湯

桃花圓

倉米湯

附子湯

馬蘭子圓

厚朴湯

四續丸

椒艾圓

下痢圓

麥蘗圓

烏梅圓二方

七味散

猪肝圓

羊脂煎

二方

斷痢圓

千金方衍義目錄

卷

掃葉山房

瀉心湯

香蘇湯

女麴散

疳濕痢第九

論二首

小兒痢第十

溫中湯

經驗大黃湯

黃蘗湯

治中結腸圓

梔子圓

藜蘆圓

四物梁米湯

龍骨湯

大黃湯

生金半黃湯

澤漆茱萸湯

芎藭散

卷十六 胃腑 凡八類

胃腑脈論第一

論一首

胃虛實第二

脈二條

瀉胃熱湯

補胃湯

人參散

灸法一首

喉嚨論第三

論一首

千金方衍義目錄

卷

掃葉山房

反胃第四

脈二條

大半夏湯

治中散

灸法三條

嘔吐噦逆第五

脈一條

論一首

半夏湯

小半夏加茯苓湯

前胡湯

小麥湯

猪苓湯

犀角人參飲子

橘皮湯

半夏乾薑散

大黃甘艸湯

灸法十五條

噎塞第六 附哕

論一首

五噎問 二方

竹皮湯

乾薑湯

通氣湯

羚羊角湯

脹滿第七

論一首

溫胃湯

大半夏湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

厚朴七物湯

吳茱萸湯

大桂湯

灸法 十一條

千金方衍義目錄

卷

婦科山房

痼冷積熱第八 附寒疝骨蒸

論二首

脈一

露宿圓 二方

赤圓

半夏湯

生薑湯

甘艸湯

茱萸消石湯

大建中湯

大黃附子湯

大烏頭湯

烏頭桂枝湯

朴硝煎

五石湯

竹葉湯

半夏湯

承氣湯

地黃煎

細辛圓

灸法 一條

卷十七 肺臟 凡八類

肺臟脈論第一

論一首

肺虛實第二

脈 四條

橘皮湯

瀉肺散

酥蜜膏煎

補肺湯 五方

麻子湯

飴煎

小建中湯

灸法 三首

千金方衍義目錄

卷

婦科山房

肺勞第三

論一首

麻黃引氣湯

半夏湯

厚朴湯

灸法

氣極第四

論一首

鍾乳散

黃芪湯

大露宿圓

疏黃圓

大前胡湯

竹葉湯

灸法 二條

積氣第五

論二首

七氣圓二方

七氣湯二方

五膈圓

大蒜煎

桔梗破氣圓

椴榔湯二方

半夏湯

貝母湯

麻黃湯

奔氣湯

枳實湯

下氣湯

訶黎勒圓

竹葉飲子

人參湯

海藻橘皮湯

白石英散

白石英圓

理氣圓

千金衍義錄

卷

掃葉出房

灸法二十四條

肺痿第六

論一首

甘艸乾薑湯

甘艸湯

生薑甘艸湯

麻黃湯

肺癰第七

論一首

桔梗湯

葶藶大棗瀉肺湯

皂莢圓

黃芩湯

葶藶湯

桂枝去芍藥加皂莢湯

飛尸鬼疰第八

論一首

五疰湯

蜈蚣湯

桃皮湯

桃奴湯

小附著散

大附著散

金牙散

白朮散

太乙備急散

龍牙散

黑奴散

鶴骨圓

蜥蜴圓

桔梗圓

十疰圓

太乙神明隔水圓

江南度世圓

千金衍義錄

卷

大度世圓

雷氏千金圓

灸法十四條

卷十八 大腸腑

凡七類

論一首

大腸腑脈論第一

大腸虛實第二

脈二條

生薑泄腸湯

黃連補腸湯

灸法七條

肛門第三

論一首

皮虛寶第四

論一首

萌蘗蒸湯

梔子煎

欬嗽第三

論一首

桂苓五味甘艸湯

苓甘五味薑辛湯

桂苓五味甘艸去桂加薑

辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏

仁湯

苓甘五味加薑辛半夏大

黃湯

小青龍加石膏湯

射干麻黃湯

厚朴麻黃湯

千金方衍義錄

聖

澤漆湯

麥門冬湯

麻黃石膏湯

十棗湯

溫脾湯

百部根湯

海藻湯

白前湯

麻黃散

蜀椒圓

通氣圓

射于煎

杏仁煎二方

通聲膏

杏仁飲子

蘇子煎

芫花煎

款冬煎

款冬圓三方

五味子湯

竹皮湯

百部圓

鍾乳七星散二方

七星散

熏法三條

灸法十四條

痰飲第六

論一首

小半夏湯二方

甘艸湯

木防已湯

厚朴大黃湯

小半夏茯苓湯

椒目圓

甘遂半夏湯

大茯苓湯

茯苓湯

大半夏湯

半夏湯

千金方衍義錄

聖

乾薑湯

當歸湯

吳茱萸湯

前胡湯

旋覆花湯

薑椒湯

薑附湯

擦臍散

斷膈湯

松蘿湯

杜蘅湯

蜜煎

葱白湯

大五飲圓

旋覆花圓

中單侯黑圓

順流紫圓

灸法一條

九蟲第七

論三首

薜蕪圓

煥懷散

青稍散

薑蜜湯

杏仁湯

桃皮湯

豬膽苦酒湯

雄黃兌散

熏法

卷十九 腎臟 凡八類

腎臟脈論第一

論一首

腎虛實第二

脈四條

瀉腎湯

千金方衍義

聖

灸法一條

腎勞第三

論一首

梔子湯

麻黃根粉

精極第四

論一首

竹葉黃芩湯

棘刺圓

韭子圓

韭子散

棗仁湯

禁精湯

羊骨湯

灸法十二條

骨極第五

論一首

三黃湯

灸法

骨虛實第六

論一首

虎骨酒

灸法一條

腰痛第七

論一首

杜仲酒

腎著湯

腎著散

杜仲圓

丹參圓

千金方衍義

聖

樹活寄生湯

導引法

鍼灸法七條

補腎第八

論一首

建中湯

小建中湯

黃芪建中湯

前胡建中湯

樂令建中湯

黃芪湯

大建中湯二方

腎瀝湯二方

增損腎瀝湯

五補湯

凝唾湯

補湯

人參湯

掃葉山房

內補散

石斛散

腎瀝散 三方

薯蕷散

鍾乳散

寒熱鍾乳散

地黃散

三石散

石韋丸

五補圓

無比薯蕷圓

大薯蕷圓

八味腎氣圓

腎氣丸 四方

黃芪圓 二方

神化圓

三仁七子圓

填骨圓

通明圓

補虛益精大通圓

千金方衍義目錄

壘

歸藥山房

赤石脂圓

鹿角圓

菴蓉圓

乾地黃圓

覆盆子圓

曲囊圓

磁石酒

石莖煎

麋角圓

灸法 一首

卷二十 膀胱腑 凡七類

膀胱腑論第一

論一首

膀胱虛實第一

脈 四條

龍骨圓

胞囊論第三

論一首

榆皮通津泄熱煎

滑石湯

灸法 八條

三焦脈論第四

論一首

三焦虛實第五

論三首

澤瀉湯

麥門冬理中湯

黃芪建中湯

黃連圓

厚朴湯

大黃瀉熱湯

藍青圓

千金方衍義目錄

壘

歸藥山房

黃連煎

柴胡通塞湯

赤石脂湯

止嘔人參湯

香豉湯

黃蘗止泄湯

人參續氣湯

茯苓圓

伏龍肝湯

當歸湯

灸法 七條

霍亂第六

論二首

證 四條

治中湯

當歸四逆加吳茱萸薑湯

四逆湯

通脈四逆湯

四順湯	竹葉湯	甘艸瀉心湯	附子粳米湯	理中散	人參湯	杜若圓	灸法 <small>十八條</small>	雜補第七	論一首	琥珀散	天雄散	石硫黃散	杜仲散	菴蓉散	白馬莖圓	卷二十一 <small>三焦方 凡四類</small>	千金方衍義目錄	聖	消渴第一	論六首	茯苓湯	猪肚圓	浮萍圓	黃連圓	栝藿粉 <small>三方</small>	枸杞湯	鉛丹散	猪腎薺苳湯	增損腎瀝湯	地黃圓	九房散 <small>二方</small>	黃芪湯	棘刺圓
-----	-----	-------	-------	-----	-----	-----	-----------------------	------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------	-----------------------------	---------	---	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----------------------	-----	-----	-------	-------	-----	-----------------------	-----	-----

骨瑱煎	茯苓散	枸杞湯	三黃圓	阿膠湯	灸法 <small>七條</small>	淋閉第二	地膚子湯	石葦散	灸法 <small>十五條</small>	溺血第三	方	水腫第四	論一首	證八條	甘艸麻黃湯	大豆散	麥門冬飲子	徐五煮散	漢防己散	茯苓圓	澤漆湯	猪苓散	麻豆煎	苦瓠圓	麻黃煎	大豆散	麻子湯	大豆煎	摩膏	麝香散	灸法 <small>二條</small>	卷二十二 <small>丁腫難疽 凡六類</small>	千金方衍義目錄	聖	五鳳樓
-----	-----	-----	-----	-----	----------------------	------	------	-----	-----------------------	------	---	------	-----	-----	-------	-----	-------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----------------------	------------------------------	---------	---	-----

丁腫第一

論一首

證十五條

齊州榮姥圓

趙媿圓

玉山韓光方

灸法一條

癰疽第二

脈七條

論一首

五香連翹湯

黃芪竹葉湯

八味黃芪散

王不留行散

內補散

排膿內塞散

猪蹄湯二方

麝香膏

千金方衍義目錄

果

三鳳樓

食惡肉膏

漆頭蘭茹散

白蘭茹散

生肉膏二方

蛇銜生肉膏

五香湯

漏蘆湯

丹麥膏

小竹瀝湯

白薇散

蒺藜散

藜蘆膏

瞿麥散

薏苡仁散

黃芪茯苓湯

內消散

偶皮散

梔子湯

五利湯

乾地黃圓三方

地黃煎

枸杞煎

烏麻膏

松脂膏

青龍五生膏

滅瘢膏

練石散

麻子小豆湯

灸法三條

發背第三

內補散

論三首

李根白散

大內塞排膿散

丹毒第四

升麻膏

論一首

千金方衍義目錄

完

掃葉山房

升麻湯

隱疹第五

青羊脂膏

論一首

灸法一條

癰疽第六

論一首十

猪蹄湯

苦匏散

烏膏

灸法四條

卷二十三 痔漏 凡六類

九漏第一 附瘰癧

論一首	空青商陸散
狸骨知母散	地黃膏
荏子桔梗圓	雄黃黃芩散
舉石防風散	礬石白朮散
地膽甘艸散	雄黃芍藥圓
蠶蚤白芷圓	五白膏
曾青散	薔薇圓
灸法 十六條	
腸癰第二 附如乳乳癰	大黃牡丹湯
論一首	
千金方衍義目錄	手
腸癰湯二方	灸法一條
論二首	赤龍皮湯
天麻湯	飛鳥膏
黃連胡粉散	鹿角散
連翹湯	蒺藜圓
排膿散	灸法一條
五痔第三	
論一首	槐子圓
小槐實圓	槐子酒
得皮圓	槐皮膏
	楊梅山房

灸法	疥癬第四
論二首	藺茹膏
九江散	灸法 四條
惡疾大風第五	
論一首	岐伯神聖散
狼毒散	
卷二十四 解毒雜治 凡八類	
論一首	解毒藥散
解毒藥散	解毒藥散
論一首	解毒 品味二十八條
雞腸艸湯	解毒藥散
論三首	證 十八條
葱白豉湯	甘艸湯
桂心湯	杜仲湯
大麥奴湯	人參湯
生麥門冬湯	大黃湯
栝蒌根湯	芫硝湯
	楊梅山房

人參湯	生麥門冬湯
參桂湯	大麥麩散
葱白豉湯	生麥門冬湯
大黃黃芩湯	栝實根湯
寒石散	梔子豉湯
葱白豉湯	理中湯
人參湯	冷熱熨法
枳榔湯	鴨通湯
下散法	
蠱毒第四	
千金方衍義目錄	
論一首	太上五蠱圖
太乙追命圓	萬病圓
犀角圓	八物茜根湯
北地太守酒	
胡臭漏液第五	
論一首	石灰散
六物散	
脫肛第六	
猪肝散	壁土散
灸法三條	
掃葉山房	

瘦弱第七	五瘦圖
證一條	生肉膏
陷腫散	
灸法十一條	
癩病第八	附陰 妒精瘡
論一首	治癩圖
蒺藜子湯	猪蹄湯
葱白膏	灸法十八條
卷二十五	備急 凡四類
卒死第一	
千金方衍義目錄	
還魂湯	灸法十條
此蠱毒第二	
論六首	五香散
野葛膏	解水毒飲子
灸法二條	
諸般傷損第三	
論一首	白馬蹄散
當歸散	黃芪散
鹿角散	膠艾湯
大膠艾湯	竹皮湯
掃葉山房	

桃仁湯五方

蒲黃散二方

火瘡第四

論二首

確白膏二方

內補散

二物湯

內寒散

續斷散

地黃膏

卷二十六 食治 凡五類

序論第一

果實第二

菜蔬第三

穀米第四

鳥獸第五

卷二十七 養性 凡八類

養性序第一

論十一首

道林養性第二

論一首

居處法第三

論二首

按摩法第四

千金方衍義目錄

書

掃葉山房

天竺國按摩法

老子按摩法

調氣法第五

論一首

服食法第六

論一首

去三蟲圓

服天門冬方二方

服地黃方二方

黃精膏

服烏麻法

餌柏實方

餌松子方

服松脂方

鍊松脂法

餌茯苓方

茯苓酥

茯苓膏

服枸杞子方

枸杞酒

餌雲母水

鍊鍾乳粉法

鍊乳散

靈飛散

黃帝雜忌法第七

論一首

一房中補益第八

論二首

雜忌法

卷二十八 平脈 凡十六類

平脈大法第一

千金方衍義目錄

書

掃葉山房

診五臟脈輕重法第二

指下形狀第三

五臟脈所屬第四

分別病形狀第五

三關主對法第六

五臟積聚第七

陰陽表裏虛實第八

何時得病第九

扁鵲華陀察聲色要訣第十

五臟六腑氣絕證候第十一

千金方衍義錄



榆溪山房

診四時相反脈第十二

診脈動止投數疎數死期第十三

扁鵲診諸反逆死脈要訣第十四

診百病死生訣第十五

三部虛實決死生第十六

卷二十九 鍼灸上 凡七類

明堂三人圖第一

仰人十四門

伏人六門

側人六門

三陰三陽流注法第二

手五陰三陽穴法 足三陰三陽穴法

鍼灸禁忌法第三

五臟六腑變化傍通訣第四

論一首

用鍼略例第五

論七首

灸例第六

論八首

大醫鍼灸安息第七

論二首

推人神所任法

孔穴主對法第八

卷三十 鍼灸下 凡八類



榆溪山房

頭面第九

頭病 面病

項病 目病

鼻病 耳病

口病 舌病

齒病 咽喉病

心腹第十

心疾 腹病

心疾 腹病

心疾 腹病

胸膈病	脹滿
腸鳴	大小便
泄痢	消渴
水腫	不能食
嘔吐	吐血
欬逆上氣	背脈
四肢第十一	
四肢病	手病
臂肘病	脚病
膝病	肩背病
腰脊病	
風痺第十二	
風病	濕痺
癰疽	尸厥
中惡	尸注
熱病第十三	
熱病	黃痺
霍亂	瘧病
瘦癯第十四	
瘦癯	痔漏

千金方義目錄

卷

掃葉山房

癩疔	陰疔
雜病第十五	凡三六
論一首	
婦人病第十六	
小兒病第十七	
已上三十一門	二百二十三類
孫真人千金方目錄終	
千金方義目錄	
卷	
掃葉山房	

孫真人千金方衍義卷一

長洲 南沙 麻地 諸客校

諸論

論大醫習業第一

凡欲為大醫必須諳素問甲乙黃帝鍼經明堂流注十二經脈三部九候五臟六腑表裏孔穴本草藥對張仲景王叔和阮河南范東陽張苗靳邵等諸部經方又須妙解陰陽祿命諸家相法及灼龜五兆周易六壬並須精熟如此乃得為大醫不爾者如無日夜

千金方衍義卷一

掃葉山房

遊動致顛頽次須熟讀此方尋思妙理留意鑽研始可與言於醫道者矣又須涉獵羣書何者若不讀五經不知有仁義之道不讀三史不知有古今之事不讀諸子觀事則不能默而識之不讀內經則不知有慈悲哀捨之德不讀莊老不能任其體運則吉凶拘忌觸塗而生至於五行休王七曜天文並須探賈若能具而學之則於醫道無所滯礙盡善盡美哉

論大醫精誠第二

張湛曰夫經方之難精由來尚矣今病有內同而外異亦有內異而外同故五臟六腑之盈虛血脈榮衛

之通塞固非耳目之所察必先診候以審之而寸口

關尺有浮沉弦緊之亂俞穴流注有高下淺深之差

肌膚筋骨有厚薄剛柔之異唯用心精微者始可與

言於茲矣今以至精至微之事求之於至粗至淺之

思豈不殆哉若盈而益之虛而損之通而徹之塞而

壅之寒而冷之熱而溫之是重加其疾而望其生吾

見其死矣故醫方卜筮藝能之難精既非神授何以

得其幽微世有愚者讀方三年便謂天下無病不治

及治病三年乃知天下無方可用故學者必須博極

醫源精勤不倦不得道聽塗說而言醫道已了深自

誤也凡大醫治病必當安神定志無欲無求先發大

慈惻隱之心誓願普救含靈之苦若有疾厄來求救

者不得問其貴賤貧富長幼妍媸怨親善友華夷愚

智普同一等皆如至親之想亦不得瞻前顧後自慮

吉凶護惜身命見彼苦惱若已有之深心悽愴勿避

險巇晝夜寒暑飢渴疲勞一心赴救無作工夫形迹

之心如此可為蒼生大醫反此則是含靈巨賊自古

名賢治病多用生命以濟危急雖曰賤畜貴人至於

愛命人畜一也損彼益己物情同患況於人乎夫殺

生求生去生更遠吾今此方所以不用生命為藥者

千金方衍義卷一

掃葉山房

良由此也其蠱蝨木蟻之屬市有先死者則市而用之不在此例只如雞卵一物以其混沌未分必有大段要急之處不得已隱忍而用之能不用者斯為大哲亦所不及也其有患瘡痍下痢臭穢不可瞻視人所惡見者但發慚愧悽憐憂恤之意不得起一念帶芥之心是吾之志也夫大醫之體欲得澄神內視望之儼然寬裕汪汪不皎不昧省病診疾至意深心詳察形候纖毫不失處到針藥無得參差雖曰病宜速救要須臨事不惑唯當審諦覃思不得於性命之上率爾自逞倏快邀射名譽甚不仁矣又到病家縱綺

千金方衍義卷一

三

掃葉山房

羅滿目勿左右顧盼絲竹奏耳無得似有所娛珍饈迭薦食如無味醞醑兼陳肴有若無所以爾者夫一人向隅滿室不樂而沉病人若楚不離斯須而醫者安樂懼娛傲然自得茲乃人神之所其恥至人之所不為斯實醫之本意也夫為醫之法不得多語調笑談謔詭譎道說是非議論人物銜耀聲名訾毀諸醫自矜已德偶然治瘥一病則昂頭戴面而有自許之貌謂天下無雙此醫人之膏肓也老君曰人行陽德人自報之人行陰惡鬼神害之尋此二途陰陽報施豈誣也哉所以醫人不得恃已所長專心經略財物

但作救苦之心於冥運道中自感多福者耳又不得以彼富貴處以珍貴之藥令彼難求自衛功能諒非忠恕之道志存救濟故亦曲碎論之學者不可取言之鄙俚也

論治病略例第三

夫天布五行以植萬類人稟五常以為五臟經絡輸陰陽會通元冥幽微變化難極易曰非天下之至簡其孰能與於此觀今之醫不念思求經旨以演其所知各承家伎始終循舊省病問疾務在口給相對斯須便處湯藥按寸不及尺握手不及足人迎跌陽三部不參動數發息不滿五十短期未知決診九候會無髣髴明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已夫欲視死別生固亦難矣此皆醫之深戒病者可不謹以察之而自防慮也古來醫人皆用嫉害扁鵲為秦太醫令李醯所害即其事也一醫處方不得使別醫和合脫或私加毒藥令人增疾漸以致困如此者非一特須慎之寧可不服其藥以任天真不得使愚醫相嫉賊人性命甚可哀傷

千金方衍義卷一

掃葉山房

大百病之本有中風傷寒熱濕瘧中惡霍亂大腸水腫腸癖下痢大小便不通黃脈上氣咳逆嘔吐

宜消渴留飲癖合。堅積癥瘕驚邪癩癩鬼注喉痺齒
痛耳聾目盲金瘡跌折癰腫惡瘡痔瘻癩癩男子五
勞七傷虛之羸瘦女子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇蠱
毒所傷此皆大略宗兆其間變動枝葉各依端緒以
取之。又有冷熱勞傷飽房勞驚悸恐懼憂恚怵惕
又有產乳落胎墮下瘀血。又有食餌五石以求房中
之樂。此皆病之根源為患。生諸枝葉。也不可不知其
本末。但向醫說男女長幼之病。有半與病源相附會
者。便可服藥也。男子者。取陽所歸。常居於燥。陽氣遊
動。強力施泄。便成勞損。損傷之病。亦以眾矣。若此之
來。日得風冷濕熱。四時之病。相協者。皆自說之不爾。
與治誤相觸動。更增困也。處方者。亦應問之。凡用藥
皆隨土地所宜。江南嶺表。其地暑濕。其人肌膚薄脆。
腠理開疎。用藥。輕省。關中河北土地。剛燥。其人皮膚
堅硬。腠理閉塞。用藥。重複。世有少盛之人。不避風濕。
觸犯禁忌。暴竭精液。雖得微疾。皆不可輕以利藥。下
之一利。大主竭其精液。困滯著狀。動經年月也。凡長
宿病。宜服利湯。不須盡劑。候利之足。則止。病源未除。
有於後。更合。且稍有氣力。進盡劑。則不論也。病源須

服利湯。取除。服利湯後。宜將丸散時時助之。
凡病服利湯。得瘥者。此後慎。不中服補湯也。若得補
湯。氣勢還復。成也。更重瀉之。則其人重受弊也。若初
瘥。氣力未甚平復者。但消息之。須服藥者。當以平藥
和之。夫常患之人。不妨行走。氣力未衰。欲將補益。冷
熱。隨宜丸散者。可先服利湯。瀉除胸腹中擁積痰實。
然後可服補藥也。若治虛勞。應服補湯者。不過三劑。
即止。若治風病。應服治風湯者。皆非三五劑可知也。
自有滯風洞虛。即服十數劑。乃至百餘日。可達也。故
曰。實則瀉之。虛則補之。
千金方衍義卷一
夫二儀之內。陰陽之中。為人最貴。人者。稟受天地中
和之氣。法律禮樂。莫不由人。人始生。先成其精。精成
而腦髓生。頭圓法天。足方象地。眼目應日月。五臟法
五星。六腑法六律。以心為中。極大腸長一丈二尺。以
應十二時。小腸長二丈四尺。以應二十四氣。身有三
百六十五絡。以應十歲。人有九竅。以應九州。天有寒
暑。人有虛實。天有刑德。人有愛憎。天有陰陽。人有男
女。月有大小。人有長短。所以服食五穀。不能將節。冷
熱鹹苦。更相振觸。其為攻擊。變成疾病。凡醫診候。同
是不易。又問而知之。別病深淺。曰。巧醫。仲景曰。凡

欲和湯合藥針灸之法宜應精思必通十二經脈三百六十孔穴榮衛氣行知病所在宜治之法不可不通古者上醫相色色脈與形不得相失黑乘赤者死赤乘青者生中醫聽聲聲合五音火開水聲煩悶干驚木聞金聲恐畏相刑脾者土也生青萬物迴助四傍善者不見死則歸之太過則四肢不舉不及則九竅不通六腑閉塞猶如醉人四季運轉終而復始下醫診脈知病源由流轉移動四時逆順相害相左審知臟腑之微此乃為妙也

論診候第四

千金方衍義卷十

七

楊榮山房

夫欲理病先察其源候其病機五臟未虛六腑未竭血脈未亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈病勢已過命將難全

夫診候之法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調均氣血未亂精取其脈知其逆順其其時不用也深察三部九候而明告之古之善為醫者上醫醫國中醫醫人下醫醫病又曰上醫聽聲中醫察色下醫診脈又曰上醫醫未病之病中醫醫欲病之病下醫醫已病之病若不加心用意於事混淆即病者難以救矣何謂三部寸關尺也上部為

天肺也中部為人脾也下部為地腎也何為九候部各有三合為九候上部天兩額動脈主頭角之氣也上部地兩頰動脈主口齒之氣也上部人耳前動脈主耳目之氣也中部天手太陰肺之氣也中部地手陽明胸中之氣也中部人手少陰心之氣也下部天足厥陰肝之氣也下部地足少陰腎之氣也下部人足太陰脾之氣也合為九候夫形盛脈細少氣不足以息者死形瘦脈大胸中多氣者死形氣相得者生參五不調者病三部九候皆相失者死愚醫不通三部九候及四時之經或用湯藥倒錯針灸失度順方治病更增他疾遂致滅亡哀哉蒸民在死者半可謂世無良醫為其解釋經說地水火風和台成人凡人火氣不調身熱風氣不調全身僵直諸毛孔閉寒水氣不調身體浮腫氣滿喘粗土氣不調四肢不舉言無聲音火去則身冷風止則氣絕水竭則無血士散則身裂然愚醫不思脈道反治其病使藏中五行其相尅切如火熾燃重加其油不可不慎凡四氣合德四神安和一氣不調百病一生四神動作四百四病同時俱發又云一百一病不治自愈一百一病須治而愈一百一病難治難愈一百一病真死不治

千金方衍義卷十

本

楊榮山房

張仲景曰欲療諸病當先以湯蕩滌五臟六腑開通諸脈治道陰陽破散邪氣潤澤枯朽悅人皮膚益人氣血水能淨萬物故用湯也若四肢病久風冷發動次當用散散能逐邪風氣濕痺表裏移走居無常處者散當平之次當用丸九藥者能逐風冷破積聚消諸堅癥進飲食調和榮衛能參合而行之者可謂上工故曰醫者意也又曰不須汗而疆汗之者出其津液枯竭而死須汗而不與汗之者使諸毛孔閉塞令人悶絕而死不須下而疆下之者令人開腸洞泄不禁而死須下而不與下之者使人心內懊懣脹滿煩亂浮腫而死又不須灸而疆與灸者令人火邪入腹于錯五臟重加其煩而死須灸而不與灸之者令人冷結重凝久而彌固氣上衝心無地消散病篤而死黃帝問曰淫邪泮衍奈何岐伯對曰正邪從外襲內而未育定舍及淫於臟不得定處與榮衛俱行而與魂魄飛揚使人臥不得安而喜夢也凡氣淫於腑則有餘於外不足於內氣淫於臟則有餘於內不足於外問曰有餘不足有形乎對曰陰盛則夢涉大水而恐懼陽盛則夢蹈大火而燔灼陰陽俱盛則夢相殺毀傷上盛則夢飛揚下盛則夢墮墜甚飽則夢與

千金要方卷一

九

云夢甚飢則夢取源云肝氣盛則夢怒肺氣盛則夢恐懼哭泣心氣盛則夢喜笑及恐畏脾氣盛則夢歌樂體重手足不舉腎氣盛則夢腰脊兩解而不屬凡此十二盛者至而瀉之立已厥氣客於心則夢見邱山煙火客於肺則夢飛揚見金鐵之器奇物客於肝則夢見山林樹木客於脾則夢見邱陵大澤墳屋風雨客於腎則夢見淵澗沒居水中客於膀胱則夢見遊行客於胃則夢見飲食客於大腸則夢見田野客於小腸則夢見聚色街衢客於膽則夢見鬪訟自劉客於陰陽則夢交接關內客於項則夢見斬首客於路則夢見行走而不能前進及池渠窅窅中居客於股則夢見禮節拜跪客於胞腫則夢見洩溺便利凡此十五不足者至而補之立已善診候者亦可深思此意乃盡善盡美矣

史記曰病有六不治驕恣不論於理一不治也輕身重財二不治也衣食不能適三不治也陰陽并藏氣不定四不治也形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也生候尚存形色未改病未入勝裏針藥及時能將節調理委以良醫病無不愈

千金要方卷一

十

論處方第五

夫療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼
疰蟲毒以蠱毒藥癰腫瘡瘤以瘡瘤藥風濕以風濕
藥風勞氣冷各隨其所宜雷公云藥有三品病有三
階藥有甘苦輕重不同病有新久寒溫亦異重熱膩
滑鹹酢藥石飲食等於風病為治餘病非對輕冷粗
澀甘苦藥艸飲食等於熱病為治餘病非對輕熱辛
苦淡藥飲食等於冷病為治餘病非對其大綱略顯
其源流自餘觀狀可知臨事制宜當識斯要

千金方衍義卷一 土 五鳳樓

增損虛而勞者其弊萬端宜應墮病增減古之善為
醫者皆自採藥審其德性所主取其時節早晚早則
藥勢未成晚則盛勢已歇今之為醫不自採藥且不
委節氣早晚只其採取用以為藥又不知冷熱消息
分兩多少徒有療病之心永無必愈之效此實浮惑
聊復審其冷熱記其增損之主耳
虛勞而苦頭痛復熱加枸杞蕪蕪虛而欲吐加人參
虛而不安亦加人參虛而多夢粉紘加龍骨虛而多
熱加地黃牡蠣地黃子甘艸虛而冷加當歸芎藭乾
薑虛而損加鍾乳棘刺肉蓯蓉巴戟木虛而大熱加

黃芩天門冬虛而多忘加茯神遠志虛而驚悸不安
加龍齒紫石英沙參小艸冷則用紫石英小艸若容
熱即用沙參龍齒不冷不熱無用之虛而口乾加麥
門冬知母虛而吸吸加胡麻覆盆子柏子仁虛而多
氣兼微咳加五味子大棗虛而身彊腰中不利加磁
石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而小
便赤加黃芩虛而容熱加地骨皮白水黃芪虛而冷
用隴西黃芪虛而痰復有氣加生薑半夏枳實虛而
小腸利加桑螵蛸龍骨雞肫胫虛而小腸不利加茯
苓澤瀉虛而痢白加厚朴諸藥無有一一歷而用之
但據體性冷熱的相主對聊敘增損之一隅人處方
者宜準此

千金方衍義卷一 土 五鳳樓

論用藥第六
上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久
服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經
中藥一百二十種為臣主養性以應人有毒無毒斟
酌其宜欲遏病補虛贏者本中經
下藥一百二十五種為佐使主治病以應地多毒不
可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經
三品合三百六十五種法三百六十五度每一度應

一日以成一歲倍其數合七百三十名也

凡藥有君臣佐使以相宜攝合和者宜用一君二臣

三佐五使又可一君三臣九佐使也

又有陰陽配合子母兄弟根莖花實苗皮骨肉有單

行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相

反者有相殺者凡此七情合和之時用意審視當用

相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用

相畏相殺者不爾勿合用也又有酸鹹甘苦辛五味

又有寒熱溫涼四氣及有毒無毒陰乾曝乾採造時

月生熟土地所出真偽陳新並各有法其相使相畏

七情列之如左處方之日宜深究之

玉石上部

玉泉惡款

丹砂惡毒石

石膽水英為使畏

鍾乳地味子為使畏

朴硝惡毒

芒硝石草為使

滑石石草為使

連毒惡毒

白石英惡毒

玉屑惡鹿

會青惡子

雲母澤瀉為使畏

消石火為使惡

礬石惡毒

紫石英長石為使畏

白石英惡毒

千金方衍義卷一

攝藥山房

赤石脂惡大黃

白石脂惡燕壘

玉石中部

水銀惡磁

孔公孽惡細辛

陽起石惡九蛇

石膏惡雞子

元石惡仁

玉石下部

青琅玕惡雞子

特生礬石惡天

代赭石惡天

艸藥上部

六芝惡山

麥門冬惡地

木惡地

乾地黃惡地

澤瀉惡地

真珠惡地

菊花惡地

黃石脂惡青

太一餘糧惡地

殷孽惡木

凝水石惡地

磁石惡柴

理石惡滑

礬石惡火

方解石惡豆

大鹽惡漏

天門冬惡地

女媧麻鞋惡地

黃蒲惡地

遠志惡地

薯蕷惡地

甘艸惡地

千金方衍義卷一

攝藥山房

花沙 人參 茯苓為使 惡 凌疏反 藜蘆

石斛 陸英為使 惡 藜蘆水石 牛膝 惡 藜蘆火通甲

獨活 蠶質 細辛 會青桑根為使 惡 狼 壽山萊黃黃芪畏滑

不消石 反 藜蘆 柴胡 畏 女苑 藜蘆 一

菴藷子 制子 薏苡仁為 荜蕤子 得制子 細辛 畏

龍膽 貫衆為使 惡 兔絲子 得酒 畏 藜蘆 茵

巴戟天 覆盆子為使 惡 蒺藜子 烏頭 得酒 畏 藜蘆 茵

防風 乾薑 附子 為 絡石 杜仲 牡丹 為使 惡

沙參 反 藜蘆 丹參 畏 鹹水 黃連 惡 藜蘆 花 羌花 元 參 自

天名精 垣衣 黃連 惡 藜蘆 花 羌花 元 參 自

鮮皮 畏 欬 冬 膠 決明子 畏 實 為 使

烏頭 畏 巴 豆 毒 續斷 地 黃 為 使

芎藭 白 使 杜若 得 辛 夷 細 辛 畏

黃芪 惡 龜 杜若 得 辛 夷 細 辛 畏

蛇牀子 惡 牡 丹 巴 茜根 畏 鼠 薇術 得 秦

飛廉 得 烏 頭 畏 薇術 得 秦

五味子 藜 藜 為 使 惡 秦丸 苜 蒲

常歸 惡 商 如 畏 苜 蒲 秦丸 苜 蒲

黃芩 山 萊 龍 骨 為 使 惡 秦丸 苜 蒲

乾薑 秦 根 為 使 惡 黃 連 黃 芩

芍藥 雷 丸 為 使 惡 石 斛 也 備 畏

藜蘆 惡 狗 麻黃 厚 朴 為 使

葛根 豆 百 藥 毒 前胡 字 夏 為 使 惡

貝母 厚 朴 白 薇 為 使 惡 桃 花 畏

栝蘆 柁 杷 為 使 惡 乾 薑 畏 元 參 惡 黃 芪 乾 薑 大 棗

苦參 牛 膝 乾 漆 反 烏 頭 元 參 山 萊 黃 反 藜 蘆

石韋 滑 石 杏 仁 為 狗 脊 單 散 為 使

草薺 得 酒 蒲 良 瞿 麥 藜 蘆 牡 丹 為

白芷 當 歸 為 使 惡 桑 螵 蛸 紫苑 欬 冬 為 使 惡 天 雄 瞿

白鮮皮 惡 桑 螵 蛸 枯 白薇 惡 黃 芪 大 黃 大 戟 乾

紫參 畏 辛 仙 靈 脾 為 使

欬冬 花 杏 仁 為 使 得 紫 苑 良 惡 皂 莢 滑 石 元 參

牡丹 畏 兔 絲 防 己 臙 孽 為 使 畏

女苑 畏 南 澤 蘭 防 己

地榆 畏 髮 良 惡 海 藻 反 甘

艸藥下部 杞 梗 節 皮 為 使 畏 良 白

大黃 黃 芩 為 使 苧 蔴 榆 皮 為 使 得 酒 厚

甘遂 瓜 蒂 為 使 惡 澤 漆 惡 蠶 蠶 石 龍 芮

芫花 決 明 為 使 鈎 吻 惡 黃 芩

大戟 反 甘 鈎 吻 惡 黃 芩

藜蘆 黃連為使反細辛 天雄 遠志為使

烏頭 烏喙 莽草為使反半夏 葛藜 防風

附子 地膽為使惡蜈蚣 畏防風 虎掌 蜀黍為使

貫眾 為使 虎掌 蜀黍為使

半夏 射干為使惡皂莢 畏雄黃 生 恆山 畏王

獨活 枳殼為使 白薇 代枯為使

狼牙 蘇莢為使 白薇 反烏頭 蕪荊 得酒 畏

白芨 紫石英為使 惡理 蕪荊 得酒 畏

蘭茹 石李核仁 杏核仁 蓋艸 畏鼠 狼毒 大豆為使

夏枯艸 土瓜 狼毒 惡麥門冬

鬼臼 畏垣 千金方衍義卷一 七 補藥山房

木藥上部 馬簡為使畏牡蒙地榆

茯苓 茯神 雄黃 秦光 蠶甲 白薇 乾漆 牛夏為使

相子仁 牡蠣 桂心 瓜子 為使畏 乾漆 畏雞子

杜仲 元參 乾漆 畏雞子

蔓荊子 石青 壯荊實 防風為使

五茄皮 遠志為使畏 黃蘗 畏乾

辛夷 芍藥為使 惡五石脂 畏黃 槐子 天雄 景

酸棗仁 惡防 槐子 天雄 景

木藥中部

山茱萸 蔓實為使惡桔 枳殼 防風 防已

吳茱萸 石白堊 畏紫石英 占斯 解狼

秦皮 大戟為使 秦椒 惡枯 畏防

梔子 解毒 秦椒 惡枯 畏防

桑根白皮 續斷 桂心 秦椒 惡枯 畏防

木藥下部 石南 五茄皮

黃環 為使惡 石南 五茄皮

巴豆 芫花為使惡 蕪荊 畏大 藥華 決明

蜀椒 杏仁為使 藥華 決明

雷丸 使惡 厚朴 為 凌疏 為使

皂莢 枳子為使惡 麥門冬 木 補藥山房

獸上部 龍骨 得人參 牛黃 龍角 畏乾 漆 蜀

牛黃 人參為使 惡龍骨 地 白膠 畏大黃

阿膠 得火 畏大黃

獸中部 犀角 松脂為使畏 殺羊角 兔絲子

鹿茸 為使 鹿茸 為使

獸下部 麋脂 畏大黃

麋脂 畏大黃

鹿脂 畏大黃

鹿脂 畏大黃

蟲魚上部

蜂子 國黃李馬

牡蠣 只母為使甘艸牛膝遠志蛇

桑螵蛸 覆花

龜甲 黃燻

蟲魚中部

伏翼 黃燻

蜥蜴 補血黃燻

鹿角 黃燻

鱉甲 黃燻

烏賊魚骨 白燻

天鼠 白燻

蟲魚下部

蛇蛻 磁石

斑蝥 馬刀為使國巴豆

馬刀 得小

藥上部

大東 國馬

藥下部

杏仁 大良國黃燻使李防

蜂子 國黃李馬

牡蠣 只母為使甘艸牛膝遠志蛇

桑螵蛸 覆花

龜甲 黃燻

蟲魚中部

伏翼 黃燻

蜥蜴 補血黃燻

鹿角 黃燻

鱉甲 黃燻

烏賊魚骨 白燻

天鼠 白燻

蟲魚下部

蛇蛻 磁石

斑蝥 馬刀為使國巴豆

馬刀 得小

藥上部

大東 國馬

藥下部

杏仁 大良國黃燻使李防

藥上部

不羸子 黃李

菜中部

忍實 國藥

米上部

麻黃麻子 國牡蠣白

米中部

大豆 黃谷

大麥 食蜜

右一百九十七種有相制使其餘皆無故不備錄

或曰古人用藥至少分兩亦輕瘥病極多觀君處方

非不煩重分兩亦多而瘥病不及古人者何也答曰

古者日月長遠藥在土中自養經久氣味真實百姓

少欲稟氣中和感病輕微易為醫療今時日月短促

藥力輕虛人多巧詐感病厚重難以為醫病輕用藥

須少病重用藥即多此則醫之一隅何足怪也又古

之醫者自解採取陰乾曝乾皆悉如法用藥必依土

地所以治十得九今之醫者但知診脈處方不委採

藥時節至於出處土地新陳虛實一皆不悉所以治

十不得五六者實由於此夫處方者常須加意重復

用藥葉乃有力若學古人徒自誤耳方來學者須詳熟之

凡紫石英白石英硃砂雄黃硫黃等皆須光明映徹色理鮮淨者為佳不然令人身體乾燥發熱口乾而死

凡艸石藥皆須土地堅實氣味濃烈不爾治病不愈凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆飲得陳久者

良其餘惟須精新也

論合和第七

問曰凡和合湯藥治諸草石蟲獸用水升數消殺之

千金方衍義卷上

三十一 掃藥山房

六則云何答曰凡艸有根莖枝葉皮骨花實諸盡有

毛翅頭甲皮足尾骨之屬有須燒鍊炮炙生熟有定一如後法順之者福逆之者殃或須皮去肉或去皮

須肉或須根莖或須花實依方鍊治極令淨潔然後升合分兩勿令參差藥有相生相殺氣力有強有弱

君臣相理佐使相持若不廣通諸經則不知有好有惡或醫自以意加減不依方分使諸艸石強弱相欺

入人腹中不能治病更加鬪爭艸石相反使人迷亂力甚刀劍若調和得所雖未能治病猶得安立五臟

於病無所增劇例曰諸經方用藥所有熬鍊節度皆

腳注之今方則不然於此篇具條之更不煩方下別

注也凡藥治擇熬炮訖然後稱之以充用不得生秤

凡用石藥及玉皆碎如米粒綿裹內湯酒中

凡鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務令極

細

凡銀屑以水銀和成泥

凡礞石赤泥團之入火半日乃熟可用仍不得過之

不鍊生入藥使人破心肝

凡朴消礬石燒令汁盡乃入丸散甚確朴硝皆殺湯

訖內汁中更上火兩三沸炸盡乃服

千金方衍義卷上

三十一 掃藥山房

凡湯中用丹砂雄黃者熟末如粉隨取內湯中攪令

調和服之

凡湯中用完物皆學破乾棗梔子之類是也用細核

物亦打碎山茱萸五味子蕤核決明子之類是也細

花子物亦爾完用之旋覆花菊花地膚子葵子之類

是也米麥豆輩亦完用之

凡橘皮吳茱萸胡椒等入湯不咬咀

凡諸果實仁皆去尖及雙仁者湯揉撻去皮仍切之

用梔子者去皮用蒲黃者湯成下

凡麥門冬牛黃入湯皆切三搗三殺取汁湯成去滓

下之煮五六沸依如升數不可其藥煮之一法薄切用

凡天麥門冬皆微潤抽去心

凡麻黃去節先別煮二三沸掠去沫更益水如本數乃內餘藥不爾令人煩寸斬之小艸瞿麥五分斬之細辛白前三分斬之膏中細到也

凡牛膝石斛等入湯酒拍碎用之石斛入丸散者先以礮槌極打令碎乃入白不爾搗不熟入酒亦然

凡肉桂厚朴杜仲秦皮木蘭輩皆削去上虛軟甲錯取裏有味者秤之茯苓猪苓削去黑皮牡丹巴戟天

千金方衍義卷一

攝藥山房

志野葛等皆槌破去心紫苑洗去土曝乾乃秤之

薤白葱白除青令盡蒼艸石南茵芋澤蘭剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黃連皆除根毛石韋拭去毛辛夷

去毛及心蜀椒去閉口者及日用大棗烏梅皆去核片鬼箭削取羽皮

凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥須赤者

凡兔絲子暖湯淘汰去沙土乾漉暖酒漬經一宿漉出曝微白搗之不盡者更以酒漬經三五日乃出更

曬微乾搗之須更悉盡極易碎

凡用甘艸厚朴枳實石南茵芋藜蘆皂莢之類皆炙

之而枳實去穰藜蘆去頭皂莢去皮牙子

凡用椒實微熬令汗出則有勢力

凡湯丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆焙灰也合微折削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦削去皮乃秤之直理破作七八片

凡半夏熱湯洗去上滑乃秤之以入湯若膏酒丸散皆焙灰炮之

凡巴豆去皮心膜熬令紫色桃仁杏仁葶藶胡麻諸有脂膏藥皆熬黃黑別指令如膏指撥視泯泯爾乃

千金方衍義卷一

攝藥山房

以向成散稍稍下日中合研搗令消散乃復都以輕絹篩之須盡又內日中依法搗數百杵也湯膏中雖

有生用者並搗破

凡用麥蘗麩末大豆黃卷澤蘭蕪蕒皆微炒乾漆炒令煙斷用烏梅入丸散者熬之用熱艾者先炒細擘

合諸藥搗令細散不可篩者內散中和之凡用諸毛羽齒牙蹄甲龜鱉鱉鯉者甲皮肉骨角筋

鹿茸等皆炙之蛇蛻皮微炙

凡用玃貓等諸蟲皆去足翅微熬川桑螵蛸中破炙之牡蠣熬令黃色蠶繭蜂房微炒之

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃須末如粉

服內湯中攪令調和服之

凡丸散用膠先炙使通體沸起燥乃可搗有不沸處

更炙之斷下湯直爾用之勿炙諸湯中用阿膠皆絞

湯畢內汁中更上火兩三沸令炸

凡川蜜先火煎掠去沫令色微黃則丸經久不壞掠

之多少隨蜜精粗遂至大稠於丸彌佳

凡丸中用蠟炸投少蜜中攪稠以和藥

凡湯中用餈糖皆湯成下諸湯用酒者皆臨熟下之

凡藥有宜丸者宜散者宜湯者宜酒漬者宜膏煎者

亦有一物兼宜者亦有不入湯酒者並隨藥性不得

遵之其不宜湯酒者列之如左

千金方衍義卷下

玉

諸藥入湯

硃砂入湯 雌黃

陽起石入酒 礬石入酒 雲母

鍾乳入酒 孔公孽 硫黃入酒

銀屑 白堊 礬石各入

胡粉 鉛丹 銅鏡鼻

石灰入酒 藜灰 鹵鹹入酒

石石類一十七種

野葛 狼毒 芫朮

鬼白 葶艸 蒟蒻入酒

巴豆

萹蒿入酒

貫眾入酒

狼牙

女苑

飛廉

辛夷

虎杖入酒

羊桃入酒

瓜蒂

雲實

蛇牀子入酒

王不留行

蜂子

狗陰

雄雞

楊雞

宛蠶

藜蘆入酒

蕪荑

鳶尾

蒼耳

白芨

蛇銜

石南入酒

虎掌

麻勃

勝障

槐子入酒

青葙子

薺葢子

蜜蠟

雀卵

伏翼

熒火

蜈蚣

皂莢入酒

蒟蒻

葶藶入酒

紫葳入酒

牡蒙

占斯

棟實

苦瓠

苦瓠

狼跋子入酒

地膚子

芫薺子

兔絲子入酒

白馬莖

雞子

鼠婦

鱗鱗作鱗

蜥蜴

千金方衍義卷下

玉

諸藥入湯

斑貓	芫青	亭長
蛇膽	毒蟲	蜚蠊
蝮蛇	馬刀	赭魁
蝦蟇	蝟皮	生風
生龜	蝸牛	諸鳥獸
蟲魚膏骨	髓膽血尿湯	

右蟲獸之類二十九種

古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分為一兩十六兩為一筋此則神農之秤也吳人以二兩為一兩隋人以三兩為一兩今法則分為一兩稱為定方中凡云等分者皆是九散隨病輕重所須多少無定銖兩三種五種皆悉分兩同等耳凡丸散云若干分兩者是品諸藥宜多宜少之分兩非必止於若干之分兩也假令日服三方寸七須癸止是三五兩藥耳凡散藥有云刀圭者十分方寸七之一準如梧椰子大也方寸七者作七正方寸抄散取不落為度錢七者以大錢上全抄之若云半錢七者則是一錢抄取一邊爾並用五銖錢也錢五七者今五銖錢邊五字者以抄之亦合不落為度一撮者四刀圭也十撮為一勺兩勺為一合以藥升分

之者謂藥有虛實輕重不得用筋兩以刀半之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥勿按而之正爾微動合平調耳今人分藥不復用此

凡丸藥有云如細麻大者即胡麻也不必扁但合較量大小相稱爾如黍粟者亦然以十六黍為一大豆也如麻子者即今大麻子準三細麻也如胡豆者今青豌豆也以二大麻子準之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子準之如大豆者以二小豆準之如梧桐子者以三大豆準之一方寸七散以蜜和得如梧桐子十九為定如彈丸及雞子黃者以十梧椰子準之

丁金方術卷一 天 攝藥出房

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分準十枚附了烏頭若干枚者去皮畢以半兩準一枚枳實若干枚者去穢畢以一分準二枚橘皮一分準三枚棗有大小以三枚準一兩云乾薑一累者以半兩為正本劑云一兩為正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩為正椒一升三兩為正吳茱萸一升五兩為正兔絲子一升九兩為正菴藷子一升四兩為正蛇牀子一升三兩半為正地膚子一升四兩為正此其不同也云某子一升者其

子各有虛實輕重不可通以秤準皆取平升爲正
凡方云桂一尺者削去皮畢重半兩爲正甘艸一尺
者重二兩爲正云某艸一束者重三兩爲正一把者
重二兩爲正

凡云蜜一觔者有七合猪膏一觔者一升二合

凡湯酒膏藥舊方皆云咬咀者謂秤畢擣之如大豆
又擣吹去細沫此於事殊不允當藥有易碎難碎多
末少者秤兩則不復均平今皆細切之較略令如咬
咀者乃得無末而片粒調和也凡云末之者謂擣篩
如法也

千金方衍義卷五 藥山房

凡丸散先細切曝燥乃擣之有各擣者有合擣者並
隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黄輩皆先切曝
乾獨擣令偏碎更出細擘曝乾若值陰雨可微火烘
之既燥小停冷乃擣之凡濕藥燥皆大耗當先增分
兩須得屑乃秤爲正其湯酒中不須如此

凡篩丸藥用重密絹令細於密丸卽易熟若篩散艸
藥用輕疎絹於酒中服卽不泥其石藥亦用重密絹
令如丸藥者

凡篩丸散藥畢皆更合於日中以杵擣之數百過視
其色理和同爲佳

凡煮湯當取并花水極令淨潔升斗分量勿使多少
者之調和候火用心一如鍊法

凡煮湯用微火令小沸其水數依方多少大略二十
兩藥用水一斗煮取四升以此爲率皆絞去滓而後
酌量也然則利湯欲生少水而多取汁者爲病須快
利所以少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁者
爲病須補益是以多水而少取汁好詳視之不得令
水多少湯熟用新布兩人以尺木絞之澄去滓湯分
再服三服者第二第三服以紙覆令密勿令泄氣欲
服以銅器於熱湯上暖之勿令器中有水氣

千金方衍義卷五 藥山房

凡漬藥酒皆須切細生絹袋盛之乃入酒密封隨寒
暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也漉可
曝燥繳擣更漬飲之亦可散服

凡建中腎歷諸補湯澤合兩劑加水煮竭飲之亦激
一劑新藥貧人當依此用皆應先曝令燥也

凡合膏先以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩云
辟明者周時也從今且至明且亦有止一宿煮膏當
三上三下以洩其熱勢令藥味得上之使匝匝沸
乃下之使沸盡良久乃止寧欲小生其中有莖白者
以兩頭微熬黃爲候有白芷附子者亦令小黃色爲

皮猪肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦堪酒煮飲之可摩之膏膏滓則宜以傅病上此蓋欲兼盡其藥力故也

凡膏中有雄黃硃砂輩皆別擣細研如麩須絞膏畢乃投中以物疾攪至于凝強勿使沈聚在下不調也

有水銀者於凝膏中研合消散胡粉亦爾

凡擣藥法燒香灑掃淨潔不得雜語喧呼當使童子擣之務令細熟杵數可至千萬杵過多為佳

千金方衍義卷一

三

補藥山房

疾六根不具足人及雞犬六畜等見之大忌切宜慎之其續命湯麻黃等諸小湯不在禁忌之限比來田野下里家因市得藥隨便市上雇人擣合非止諸不如法至於石斛芎藭絲子等難擣之藥費人功力賃作擣者隱主悉盜棄之又為塵埃穢氣入藥中羅篩粗惡隨風飄揚衆口嘗之衆鼻艱之藥之精氣一切都盡與朽木不殊又復服餌不能盡如法服盡之後反加虛損遂誇醫者處方不效夫如此者非醫之咎自緣發意甚誤宜熟思之

論服餌第八

若用毒藥治病先起如黍粟病去則止不去倍之不去十之取去為度病在胸膈已上者先食而後服藥病在心腹已下者先服藥而後食病在四肢血脈者宜空腹而在且病在骨髓者宜飽滿而在夜

凡服丸散不云酒水飲者本方如此是可用也凡服利湯欲得使早凡服湯欲得稍熱服之即身治下不吐若冷則吐嘔不下若太熱則破人咽喉務在用意湯必須澄清若濁令人心悶不解中間相去如步行十里久再服若太促數前湯未消後湯來衝必當吐逆仍問病者腹中藥消散乃可進服

千金方衍義卷一

三

補藥山房

凡服湯法大約皆分為三服取三升然後乘病人氣強進一服最須多次一服漸少後一服最須少如此即甚安穩所以病人於後氣力漸微故湯漸漸少凡服補湯欲得服三升半晝三夜一中間間食則湯氣既灌百脈易得藥力凡服湯不得太緩太急也又須左右仰覆臥各一食頃即湯勢徧行腹中又於室中行皆可一百步許一日勿出外即大益凡服湯二日常忌酒緣湯忌酒故也凡服治風湯第一服厚覆取汗若得汗即須薄覆勿令大汗中間亦須間食不爾人無力更益虛羸

凡丸藥皆如梧桐子大補者十九為始從一服漸加
不過四十九過亦損人云一日三度服欲得引日多
時不闕藥氣漸漬薰蒸五臟積久為佳不必頻服早
盡為善徒棄名藥獲益甚少凡人四十以下有病可
服瀉藥不甚須服補藥必若有所損不在此限四十
已上則不可服瀉藥須服補藥五十已上四時勿闕
補藥如此乃可延年得養生之術耳其方備在第二
十七卷中素問曰實則瀉之虛則補之不虛不實以
經調之此其大略也凡有臟腑積聚無問少長須瀉
瀉瀉凡有虛損無問少長須補即補以意量而用之

千金方衍義卷一

補藥山房

凡服痔漏疔蠅等藥皆慎豬雞魚油等味至者
凡服瀉藥不過以利為度慎勿過多令人下利無度
大損人也
凡諸惡瘡瘰後皆百日慎口味不爾即瘡發也
凡服酒藥欲得使酒氣相接無得斷絕絕不得藥力
多少皆以知為度不可令至醉及吐則大損人也
凡服藥皆斷生冷酢滑豬大雞魚油麪蒜及菓實等
其大補丸散切忌陳臭宿滯之物有空青忌食生血
物天門冬忌鯉魚白朮忌桃李及雀肉葫荽大蒜青
魚等物地黃忌蕪荑甘艸忌松菜海藻細辛忌生

菜菔絲子忌兔肉牛膝忌牛肉黃連枯梗忌猪肉牡
丹忌胡荽藜蘆忌狸肉半夏首蒲忌飴糖及羊肉恒
山桂心忌生薑生茶商陸忌人肉茯苓忌醋物柏子
仁忌濕麪巴豆忌鹽笋羹及猪肉蟹甲忌葛菜

凡服藥忌見外尸及產婦穢汚爛之兼及忿怒憂勞
凡餌湯藥其粥食肉菜皆須大熟熱即易消與藥相
宜若生則難消復損藥力仍須少食茶及硬物於藥
為佳亦少進鹽醋乃善亦不得苦心用力及房室喜
怒是以治病用藥力惟在食治將息得力大半於藥
有益所以病者務在將息節慎之至可以長生豈惟
愈病而已

千金方衍義卷一

補藥山房

凡服瀉湯及諸丸散酒等至食時須食者皆先與一
口冷醋飯須臾乃進食為佳
凡人忽遇風發身心頓惡或不能言有如此者當服
大小續命湯及西州續命排風越婢等湯於無風處
密室之中日夜四五服勿計劑數多少亦勿慮虛常
使頭面手足腹背汗出不絕為佳服湯之時湯消即
食粥粥消即服湯亦少與羊肉雁將睡若風大重者
相續五日五夜服湯不絕即經二日停湯以藥曬白
補將息四體若小瘳仰當停藥漸消將息其如不瘳

皆更服湯攻之以瘥為度

凡患風服湯非得大汗其風不去所以請風方中皆有麻黃至如西州續命卽用八兩越婢六兩大小續命或用一兩三兩四兩故知非汗不瘥所以治風非密室不得輒服湯藥徒自誤耳惟更加增未見損減矣

凡人五十已上大虛者服三石更牛慎勿用五石也四時常以平旦服一二升暖飲終身勿絕及一匙勿食蒜油煎猪牛馬雞鴨鵝等肉卽無病矣

論藥藏第九

存不心亡安不忘危大聖之至教求民之瘼恤民之隱賢人之用心所以神農鳩集百藥黃帝纂錄鍼經皆備預之常道也且人病瘵多起倉卒不與人期一朝嬰已豈遑知救想諸好事者可貯藥藏用以備不虞所謂起心雖微所救惟廣見諸世祿之家有善養馬者尚貯馬藥數十斤不且養身者有蓄人藥一鎰鍊以此類之極可愧矣貴畜而賤身誠可羞矣傷人乎不問馬此言安用哉至如人或自公私使命行過邊隅地既不毛藥物焉出忽逢瘴癘素不資貯無以救瘵遂拱手待斃以致天殺古斯為自致豈是枉橫

何者既不能深心以自衛一朝至此何歎惜之晚哉故置藥藏法以防危殆云爾

石藥火土藥水藥根藥莖藥葉藥花藥皮藥子藥五穀五菓五菜諸獸齒牙骨角蹄甲皮毛尿尿等藥酥髓乳酪醍醐石蜜砂糖餈糖酒醋膠麴藥鼓等藥

右什藥依時收採以貯藏之蟲牙之藥不收採也秤斗升合鐵臼木白絹羅紗羅馬尾羅刀砧王槌瓷鉢大小銅銚鎗斧銅鐵匙等右合藥所須極當預備

千金方衍義卷一

掃葉山房

凡藥皆不欲數數曬曝多見風日氣力卽薄歇宜熟知之諸藥未卽用者候天大晴時於烈日曝令大乾以新瓦器貯之泥頭密封須用關取卽急封之勿令中風濕之氣雖經年亦如新也其丸散以瓷器貯密蠟封之勿令洩氣則三十年不壞諸杏仁及子等藥瓦器貯之則鼠不能進之也凡貯藥法皆須去地三四尺則土濕之氣不中也

孫真人千金方衍義卷一終

孫真人千金方衍義卷二

長洲張 璐路玉著

南沙席世臣鄧容校

婦人方上凡九類

求子第一 論六首 方一十五首 灸法六首 轉女爲男法三首

論曰夫婦人之別有方者以其胎妊生產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者衆陰所集常與濕居十四已上陰氣浮溢百想經心內傷五臟外損姿顏月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論矣然五臟虛實交

千金方衍義卷二

婦人方上

錯惡血內漏氣脉損竭或飲食無度損傷非一或瘡瘻未愈便合陰陽或便利於懸厠之上風從下入便成十二痼疾所以婦人別立方也若是四時節氣爲病虛實冷熱爲患者故與丈夫同也惟懷胎妊而挾病者避其毒藥耳其雜病與丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女人嗜慾多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎嫉妒憂毒染著堅牢情不自抑所以爲病根深療之難瘥故養生之家特須教子女學習此三卷婦人方令其精曉卽於倉卒之秋何憂畏也夫四德者女子立身之樞機產育者婦人性命之

長務若不透明於此則何以免於天枉者哉故傅母之徒亦不可不學常宜繕寫一本懷挾隨身以防不虞也

論曰人之情性皆願賢已而疾不及人至於學問則隨情逐物墮於事業詎肯專一推求至理莫不虛棄光陰沒齒無益夫婚如養育者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日憎爾若愚是則徒願賢已而疾不及人之謬也斯實不達賢已之趣而妄狗虛聲以終無用今具述求子之法以貽後嗣同志之士或可覽焉

千金方衍義卷二

求子第一

論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德合非本命不在子休廢死墓中者則求子必得若其本命五行相尅及與刑殺衝破并在子休廢死墓中者則求子了不可得慎無措意縱或得者於後終亦累人若其相生并遇福德者仍須依法如方避諸禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳禁忌法受胎時日推至相貴宿日法在二十七卷中論曰凡人無子當爲夫妻俱有五勞七傷虛羸自病所致故有絕嗣之患夫治之之法男服七子散女服紫石門冬圓及坐藥盪胞湯無不有子也

七子散 治丈夫風虛日暗精氣衰少無子補不

足方

五味子

鍾乳粉

壯劑子

兔絲子

車前子

菥蓂子

石斛

乾地黄

薯蕷

杜仲

鹿茸

遠志各八

附子

蛇床子

芎藭各六

山萸

天雄

人參

茯苓

黃耆

牛膝各五

桂心十銖

菴蓉十銖

巴戟天十二銖

千金方衍義卷三

主 陽痿山病

右二十四味治下飾酒服方寸七日二不知捨至

二七以知為度禁如藥法不能酒者蜜和圓服亦

得 一方加覆盆子八銖求子法一依後房中篇

義萬類稟乎乾健務資化生千金體乎造物首推廣

嗣廣嗣一門又以七子散為基始專主丈夫風虛

目暗精氣衰少夫所謂風虛者肝氣內虛而顯風

木之象目暗者腎氣不充水精不能上注於目也

故欲求廣嗣先培根本此方專為慾勤精薄陽氣

不振者設參耆鹿茸方中君主精不足者補之以

味也鍾乳雄雌方中主帥形不足者溫之以氣也

參芪溫厚非雄附不能滋之鍾乳慄悍非鹿茸無

以濡之巴戟菴蓉五味山萸兔絲薯蕷杜仲牛膝

乃參耆之匡輔折菥蛇床桂心遠志則雄附之察

佐然無陰則陽無以化地黃芎藭不特化氣成形

并化胎息蘊毒制劑之妙無以喻之至於壯劑專

主風虛車前職司氣化壯劑勢紛石斛監之車前

力薄茯苓助之以其襄既濟之功克紹廣嗣之勳

尤為慾勤精薄之金錐第溫補助陽不過為廣嗣

之一端設陰精內涸陽氣未滿雄附似可勿用地

黃何妨量加且有膏梁體豐酒客濕者濁痰脂膩

千金方衍義卷三

主 陽痿山病

支塞中外精氣不純不能生育者亦有好餅丹石

毒溢骨空精氣灼燦不能施化者復有急於子嗣

愈補則氣愈壅愈溫則陽愈痿又須一陳平胃滋

腎洗滌髓室則生生之機自裕如矣讀古人方須

要識古人手眼如上等法足補七子散之未逮也

朴消盪胞湯 治婦人立身已來全不產及斷緒

久不產三十年者方

朴消 牡丹 當歸

大黃 枳仁空用 厚朴

桔梗 人參 赤芍

茯苓

桂心

甘草

牛膝

橘皮各二錢

附子六錢

蠶蟲

水蛭各十枚

右十七味以清酒五升水五升合者取三升日三夜一分四服每服相去三時更服如常覆被取少汗汗不出冬日著火籠之必下積血及冷赤膿如赤小豆汁本為婦人子宮內有此惡物使然或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若醉酌下盡氣力弱太困不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可服酢飯冷漿一口即止然恐去

惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後

仍著導藥千金翼不用

〔衍〕

土中有石則草不生渠中有阜則水積阻婦人立

身不產斷緒不孕皆子藏有瑕之故非峻用決渠開荒力量雖日從事調經丸泥補天術耳方中確黃蠶蛭決渠之槌鑿也桂心附子鉏荒之力土也人參茯苓開疆之糧餉也桔梗厚朴藥中宜使病在下取之上也其餘牡丹赤芍等味皆供驅役之流此方專滌胞門積血故以抵當為主而兼下瘀血湯桃核承氣之製其力專矣猶恐積垢難動又

需參附之大力直搗長驅何憚堅壘不破耶服後

覆取微汗不獨迅掃諸內并以開發元府宣通中

外化機勃發生氣裕如但藥力過峻須防暝眩乃

預擬酸收之法可無倉卒之虞然必天陰臍下疼

痛方為瘀血之確徵而婦人不孕詎止一端多有

坤體肥盛濕壅子藏不能攝精者亦有土氣瘠薄

火灼精枯不能敷化者亦有交接過勞關闢廢弛

而失閉藏之令者不特上方無預導法尤難槩施

夫病有常變藥有變通若以常法治變則與圓柄

方鑿何異哉

〔千金方衍義卷五〕

〔種葉山房〕

治全不產及斷緒服前朴消湯後著坐導藥方

皂莢

黃肉千金翼作苦瓠

當歸各一兩

細辛

五味子

乾薑各二兩

大黃

礬石

戎鹽千金翼作葶藶三分

蜀椒各半兩

右十味為末以絹袋盛大如指長三寸盛藥合滿內婦人陰中坐臥任意勿行走急小便時去之更安所者一日一度必下青黃冷汁盡即止可幸御自有子若未見病出亦可至十日安之一本別有葶藶砥霜各半兩此藥為服朴消湯恐去冷惡

物出不盡以導藥下之值天陰冷不疼不須著道藥亦有蓄鹽為導藥者然不如此藥其服朴硝湯後即安導藥經一日乃服紫石門冬丸

衍坐導之法乃壺煎膽導土瓜根導之變法東垣方中亦常有之然有其藥而無其用姑存以備立法

可也

紫石門冬圓 治全不產及斷緒方

紫石英 天門冬各三兩 當歸

芎藭 紫葳 卷柏

桂心 烏頭 乾地黄

牡蒙千金翼作牡荆 外臺作甘蒙 禹餘糧

石斛 辛夷 人參

桑寄生 續斷 細辛

厚朴 乾薑 食茱萸

牡丹 牛膝各三錢 柏子仁

薯蕷 烏賊骨 甘草各一兩半

附二十六味為末蜜和丸如梧子大酒服十九日

三漸增至三十丸以腹中熱為度不禁房室夫行

不在不可服禁如藥法比來服者不至盡劑即有

娠

衍天地網緼萬物化生之機務在水土之精純自然庶蕪繁茂方中人參甘草芎藭地黃山藥寄

生川斷牡丹調養氣血之味庸所易知其石英餘糧溫固下元且佐桂薑烏黃毋乃失之過熱天冬

卷柏性稟至陰如何可任廣嗣之用因諦本經天門冬有強骨髓之說別錄言冷而能補甄權治一切惡氣不潔之疾卷柏主文子陰中寒熱瘧癥瘕

血閉絕子乃知二味配合石英餘糧有既濟陰陽之妙其溫養氣血之味上法具矣而溯淵窮源又

須子藏精純生生之氣方得裕如細辛辛夷專清子藏風氣烏賊牛膝紫葳牡蒙專散胞門痰積石

斛專清胃氣厚林專泄腸垢柏子仁專滋心腎益肝氣久服令人潤澤美色以婦人之病每多風寒

胞門血汗子藏故細辛以下諸味千金恒有之此方較補益門中紫石英天門冬九大都醫籍彼以

風冷在子宮子常墮落此以立身不產斷緒不孕子藏原無固冷故不需石南雲母薑煖溫也

白薇圓 主令婦人有子方

白薇 細辛 防風

人參 秦椒 白敏一作白芷

秦椒

白敏

芎藭	茯苓	白龍骨	卷柏 <small>各三銖</small>	藜本	車前子	白薇	治之方	又方	日再稍加至三十九丸當有所去小覺有異即停服	右三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服十五丸	吳茱萸 <small>十八銖</small>	鼠婦 <small>半兩</small>	鐘乳	芎藭 <small>各三銖</small>	乾薑	五味子	蕪荑	桂心	
蛇床子 <small>各一兩</small>	太乙餘糧 <small>各二兩</small>	遠志	澤蘭	石膏	蜀椒 <small>各十銖</small>	乾地黃					麻布叩腹頭 <small>一尺</small>	水蛭	乾地黃	桃仁	乾椹 <small>各一兩</small>	白殭蠶	沙參	牛膝	
白芷	當歸	麥門冬	赤石脂	菴藷子	紫石英	乾薑					麻布叩腹頭 <small>一尺</small>	水蛭	乾地黃	桃仁	附子	紫石英 <small>各一兩</small>	芍藥	秦朮	

義兼能破除瘀血也又方專主上熱下冷子宮虛	除風痰五味收斂陰精	防風秦朮蕪荑散諸風	藥和血之味白薇沙參卷柏	參附桂薑椒黃大溫子藏佐以芎藭牛膝牡丹芍	鼠婦乾椹桃仁等一派	結胞門子戶不淨不能成孕	尿斯非利水之驗	婦人胎產方多用之	風熱也而別錄有療傷中淋露下水氣等說所以	氣疔皮丸治婦人產中虛煩嘔逆雖主胎產實治	不可故殺合子短壽遇得者大良	月正擇食時可食牛肝	猪雞生冷酢滑魚蒜驢馬牛肉等覺有娠即停三	口再漸增至四十九丸以知為度亦可至五十九頓	右二十八味為末蜜和丸如梧子大酒服十五丸	橘皮 <small>半兩</small>	桂心	覆盆子

寒不能攝精於前方除去破血峻劑僅用十味配
 八餘糧石脂龍骨蛇床遠志覆盆佐石莖人參薑
 椒桂心以固下冷地黃門冬車前石膏茯苓楮皮
 佐卷柏白薇以清上熱藁本白芷細辛佐菴藁澤
 蘭以散風熱芎歸蒲黃佐桃仁以散血滯雖不若
 前方之專行破血溝渠之中豈無淤垢存焉此干
 金立法之綱旨也

金城太守白薇圓 治月水不利閉塞絕產十八

一年服此藥二十八日有子方

白薇 細辛 各三 十銖 人參

杜衡 古今錄實 牡蒙 厚朴

牛夏 白僵蠶 當歸

紫苑 各十 牛膝 沙參

乾薑 秦芫 各半 蜀椒

附子 防風 各一 兩半

右十七味為末蜜和丸如梧子大先食服三九不

知可增至四五丸 此藥不可常服覺有娠即止用

之大驗 崔氏有精 極丹

此方較前二方稍平僅取前方中參附椒薑以溫

血氣白薇沙參以化辛熱辛防秦芫以祛血寒之

義

風牛膝當歸以和衝脈之血蠶蠶以滌子戶風痰

一切攻血之藥與又方固脫之劑總無預焉如杜

蘅者師甄權之破留血也加牡蒙紫苑者法本經

之下逆氣及胸中寒熱結氣也逆氣下結氣散而

血行無滯風氣去痰氣除而子藏安和故用半夏

厚朴芎歸專行清 理風痰濕滯并上二方為軀峙

三法隨人稟氣病 氣而為取裁破血無如首方固

脫莫若次法搜滌 脂膩此方為最所以服之匝月

便能育子

論曰古者求子多用 慶雲散承澤丸今代人絕不用

此雖未試驗其法可 重故述之

慶雲散 治丈夫 陽氣不足不能施化施化無成方

覆盆子 五味子 各一 升 兔絲子 二升

天雄 一兩 石斛 白朮 各三

桑寄生 四兩 天門冬 二兩 紫石英 二兩

右九味治下篩先 食酒服方寸七日三煮不耐冷

者去寄生加細辛 四兩陽氣不少而無子者去石

斛加檳榔十五枚 良

承澤丸 治婦人 下焦三十六疾不孕絕產方

梅核仁 辛黃 各一 葛上亭長 七枚

升

渡疏三兩 葵本一兩 澤蘭子 五合

右六味為末蜜丸如大豆先食服二九日三不知稍增之若腹中無堅癖積聚者去亭長加通草一兩惡甘者和藥先以苦酒搜散乃內少蜜和為丸

衍慶雲者慶雲龍之徵兆承澤者承雨露之沾私也

慶雲丸以紫石英專溫榮血天雄峻煖情氣佐以覆盆五味免絲溫補下元寄生主治腰痛天冬能

強腎氣石斛強陰益精白朮固津氣而利腰膈間

血恐英雄二味之性過烈乃以天冬石斛寄生濡

之覆盆五味免絲輔之白朮培土以發育萬物扶

陽施化之功盡矣若素不耐寒則去寄生而加細

辛以鼓生陽之氣陽本不衰當退石斛而進楫榔

以祛濁濕之垢其法之可重端在乎此 承澤圓

專破子藏積血于藏屬衝脈緊附厥陰而主風木

故取梅仁之酸平以泄厥陰風熱則亭長方得振

破血之威辛蕤葦本渡疏三味本經一治寒熱風

頭腦痛一主婦人陰中寒腫痛一止遺溺利水道

更用澤蘭之子統理婦人三十六病一舉而內外

風氣悉除胞戶積血盡掃獨是梅仁之旨難以領

悉觀本草治例吳普言明目益氣孟詵言除煩熱

目非肝腎所主之竅酸非風木所化十二歟近世

但言烏梅收津而不知梅仁之功用也惜哉方後

有云腹無堅積則去亭長而易通草其虛實權變

輕重天淵丸用苦酒正恐亭長性厲服後令人大

煩勝于麥飯解之之法也

大黃圓 治帶下百病無子服藥十日下血二十

日下長蟲及青黃汁一干日病除五十日肥白方

大黃碎如米豆柴胡朴硝煨

乾薑各一芎藭五兩蜀椒二兩

茯苓如雞子 干金方衍葵三 齒 掃華山房

右七味為末蜜和丸如桐子大先食服七丸米飲

下加至十丸以知為度五日微下

義衍此治婦人帶下百病無子故用大黃朴硝熬煨以

散積血即用乾薑蜀椒以溫子藏柴胡升發生氣

芎藭清理榮血茯苓引領稍黃專行滲道與移養

胎令易產方蒸大黃丸用法相仿

吉祥圓 治女人積年不孕方

天麻 柳絮 牡丹

五味子 乾地黃 枳心各一

桃花 白朮

芎藭各二兩 覆盆子一斗 桃仁一百枚

兔絲子各一升 楮實子各一升

右十四味為未蜜和丸如豆大空心苦酒下五丸

日中一服晚一服

衍桃花令人好顏色柳絮能除面熱黑斯亦聞人之

所需其地黃芩藟楮實養血壯筋兔絲覆盆五味

補精益氣牡丹桂心桃仁和榮煖宮茯苓白米天

麻清痰逐濕飲用苦酒取酸收以歸子藏也

硝石大黃丸 治十二痕癬及婦人帶下絕產無

子并服寒食藥而腹中有癖者當先服大丸下

之乃服寒食藥不下水穀但下病耳不至令人

虛極方見十三卷中

秦椒圓 治婦人絕產生來未產溙滲腑臟使玉

門受子精方

秦椒 天雄各十銖 元參

人參 白斂 鼠婦

白芷 黃耆 桔梗

露蜂房 白僵蠶 桃仁

蟬蛻 白薇 細辛

蕪荑各一兩 牡蒙 沙參

防風 甘草 牡丹皮

牛膝 卷柏 五味子

芍藥 桂心 大黃

石斛 白朮各三銖 柏子仁

茯苓 常歸 乾薑各一兩

澤蘭 乾地黃 芎藭各一兩

乾漆 紫石英 白石英

附子各二兩 鍾乳半兩 水蛭七枚

蟲蟲一枚 麻布叩腹頭七尺

右四十四味為未蜜利丸如梧子大酒服十九日

再稍加至二十九若有所去如豈汁鼻涕此是病

出覺有異即停

衍此即第一方白薇圓之立法方中附子不逮益

以天雄白朮蟲蟲鼠婦不逮益以蜂房以螿房能

治崩中漏下五色又解鍾乳白朮相反之毒蘇頌

所謂下乳石毒也

法

婦人絕子灸然谷五十壯在內踝前直下一寸

婦人絕子不生胞門閉塞灸關元三十壯報之

婦人絕子不成若墮落腹痛漏見赤灸胞門五十壯

婦人絕子不成若墮落腹痛漏見赤灸胞門五十壯

關元左邊二寸是也右邊二寸名子戶

婦人絕嗣不生灸氣門穴在關元傍三寸各百壯

婦人子藏閉塞不受精疼灸胞門五十壯

婦人絕嗣不生漏赤白灸泉門十壯三報穴在橫骨

當陰上際

論曰陰陽調和二氣相感陽施陰化是以有娠而三

陰所會則多生女但妊娠二月名曰始膏精氣成於

胞裏至於三月名曰始胎血脈不流象形而變未有

定儀見物而化是時男女未分故未滿三月者可與

藥方術轉之令生男也

千金方衍義卷二

丹參丸 治婦人始覺有孕養胎轉女為男方

丹參 川斷 芍藥

白膠 白木 柏子仁

甘草 各二兩 人參 芎藭

乾薑 各三兩 吳茱萸 橘皮

當歸 各一兩 白芷 冠纓 燒風香

乾地黃 一兩 蘇黃 十八

犬卵 一具 東門上雄雞頭 一枚

右十九味為末蜜和丸如梧子大酒服十九日再

稍加至二十九

術陰陽造化之機得之資始轉女為男之說得不無

疑此方出之千金量非誕妄方中理中四物培養

血氣芷蕪丹續枝風和榮白膠有散瘀止血之功

柏仁有除風潤燥之力用犬卵者取其資壯元陽

雞頭者專取東方生氣冠纓沾日月光華為男子

章身之具用以入藥以類感也然必未滿三月混

沌未分服之庶克有濟常見雞抱卵時以斧置窠

令刃向下則匹雞盡雄術之靈幻又不得不信也

又方 取原齧尿一作矢十枚并花水服之日三

千金方衍義卷三

又方 取弓弩絃一枝絳囊盛帶婦人左臂一法以繫

腰下滿百日去之

又方 取雄黃一兩絳囊盛帶之要女者帶雌黃

又方 以斧一柄於產婦臥床下置之仍繫刃向下勿

令人知如不信者待雞抱卵時依此置于窠下

一窠兒子盡為雄也

妊娠惡阻第二法二首 方四首

妊娠惡阻第二法二首 方四首

論曰何以知婦人妊娠脈平而虛者乳子法也經云陰博陽別謂之有子此是血氣和調陽施陰化也診其手少陰脈動甚者妊子也少陰心脈也心主血脈又腎名胞門子戶尺中腎脈也尺中之脈按之不絕法妊娠也三部脈沉浮正等按之無絕者有娠也

妊娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也

妊娠四月欲知男女者左疾為男右疾為女左右俱疾為產二子又法左手沉實為男右手浮大為女左

右手俱沉實猥生二男俱浮大猥生二女尺脈若左偏大為男右偏大為女左右俱大產二子大者如實

千金方衍義卷二

九

攝業山房

狀又法左手尺中浮大者男右手尺中沉細者女若

來而斷絕者月水不利又法左右尺俱浮為產二男

不然女作男生俱沉為產二女不爾男作女生又法

得太陰脈為男得太陽脈為女太陰脈沉太陽脈浮

又遣妊娠人面南行還復呼之左迴首者是男右迴

首者是女又婦人妊娠其夫左乳房有核是男右乳

房有核是女

妊娠欲知將產者懷妊離經其脈浮設復痛引腰脊

為今出也但離經者不病也又法欲生其脈離經夜

半覺痛日中則生也

論曰凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱或留風飲冷太過心下有淡水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚來顏色肌膚如常回若沈重憤悶不欲飲食又不知其患所在脈理順時平和則是欲有娠也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者

患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡

聞食氣欲噉鹹酸果實多臥少起世謂惡食其至三

四月日已上皆大劇吐逆不能自勝舉也此山經血

既閉水漬於藏藏氣不宜通故心煩憤悶氣逆面嘔

吐也血脈不通經絡否澀則四肢沉重挾風則頭目

千金方衍義卷二

三

攝業山房

眩也覺如此候者便宜服半夏茯苓湯數劑後將茯

苓之淡水消除便欲食也既得食力體強氣盛力足

養胎母便健矣古今治阻病方有十數首不問虛實

冷熱食少殆死者活於此方

半夏茯苓湯 治妊娠阻病心中憤悶空煩吐逆

惡聞食氣頭眩體重四肢百節疼痛沉重多臥

小起惡寒汗出疲極黃瘦方

半夏 生薑各三錢 乾地黄

茯苓各十錢 橘皮 旋覆花

人參 芍藥

芍藥

桔梗

甘草 各二錢

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服若病阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變客熱煩渴口生瘡者去榆皮細辛加前胡知母各十二銖若變冷下痢者去地黃加桂心十二銖若食少胃中虛牛熱大便閉塞小便赤少者去地黃加大黃十八銖黃芩六銖餘依方服一劑得下後消息看氣力冷熱增損方調定更服一劑湯便急服茯苓丸令能食便強健也忌生熱醋滑油膩松菜海藻

戒 妊娠惡阻良由母氣不充精微稟於胎息水穀之氣不能孕化積積而為痰涎汪洋沃于心下而致嘔逆困殆在胎息將成時吸取母氣過甚則其阻彌劇調適之法惟以健運豁痰為首務方用人參鼓舞二陳之製以運痰止嘔兼旋覆桔梗以升散結氣芎芍地黃以保護榮血用細辛者協濟芎地以開血分經脈竅隧之邪也倘服後煩熱下痢或二便閉塞是必兼理客氣其加桂心加大黃當效前大黃圓及後方茯苓丸之製龐安常言桂不傷胎且熬令黑則專散氣而無壯火食氣之患大黃熬黑但能泄熱而無苦寒傷中之慮世俗每謂牛

夏辛散胎未成形時為之切禁若妊娠肥盛多疾

者不去其痰則胎不安癰瘡多火者不清其火則

胎不穩時師咸謂黃芩白朮為安胎專藥孰知半

夏大黃桂心有安胎妙用乎歷觀千金諸方每以

大黃同薑桂任補益之用人參協確黃佐克敵之

功不由千金之門何以求應變之策耶

茯苓圓 治妊娠阻病患心中煩悶頭眩重增聞

飲食氣便嘔逆吐悶顛倒四肢垂弱不自勝持

服之即效先服半夏茯苓湯兩劑後服此方

茯苓 半夏 桂心

乾薑 各一兩 白朮 二兩 橘皮 一兩

人參 一兩 葛根 甘草

枳實 各二兩

右十味為末蜜和丸如梧子大飲服二十九漸加

至三十九丸 三劑後不用乾薑半夏橘皮白朮

此方合理中六君枳朮桂苓等湯統以健脾運痰

為務妙用尤在葛根一味鼓舞胃中清陽之氣生

津止嘔不致滯積汪洋七味白朮散之發源本此

又須先服半夏茯苓湯者攸賴細辛以搜邪散結

地黃芎芍以保護胎息也

青竹茹湯 治妊娠惡阻嘔吐不下食方

青竹茹 橘皮各八銖 茯苓

生薑各一兩 半夏各三十銖

右五味咬咀以水六升煮取二升半分三服不瘥

煩作

義衍二陳湯滌痰止逆之專藥也猶嫌甘草之助滿乃

易竹茹之涼潤既清膈上稠痰復解胎息蘊熱一

舉而兩得之矣

橘皮湯 治妊娠嘔吐不下食方

橘皮 竹茹 人參

千金方衍義卷三 橘皮湯

白木各十銖 生薑一兩 厚朴十二銖

右六味咬咀以水七升煮取二升半分三服不瘥

重作

義衍此本金匱橘皮竹茹湯於中裁去大棗甘草加入

白木厚朴變止嘔爲止嘔其機用之靈活如此惡

阻請治無逾已上數法也

養胎第三論二首 力三十三首 禁忌一首 逐月養胎二十首

論曰舊說凡受胎三月逐物變化稟質未定故妊娠

三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子

盛德大師觀禮樂鍾鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口

論詩書古今箴誠居處簡靜割不正不食席不正不

坐彈琴瑟調心神和情性節嗜慾庶事清淨生子皆

良長壽忠孝仁義聰慧無疾斯蓋文王胎教也

論曰兒在胎日月未滿陰陽未備臟腑骨節皆未成

足故自初訖於將產飲食居處皆有禁忌

妊娠食羊肝令子多厄食山羊肉令子多病

妊娠食驢馬肉令子延月食螺肉難產

妊娠食兔肉犬肉令子無音聲并缺唇

妊娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡

妊娠食雞肉糯米令子多寸白蟲

千金方衍義卷三 胎食

妊娠食樞井鴨子令子倒出心寒

妊娠食鵝肉并豆醬令子滿面多野黯黑子

妊娠食雀肉飲酒令子心淫情亂不畏羞恥

妊娠食鱉令子項短

妊娠食水漿絕胎

妊娠勿向非常地大小便必半產殺人

徐之才逐月養胎方

妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥母

食腥辛是謂纜正

妊娠一月足厥陰脈養不可針灸其經如大經行開

聖中邪等 足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之時
欠是也 血行否澀不為力事寢必安靜無令恐畏

妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重
腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雌雞丸

烏雌雞湯方

烏母雞一隻治如食法 茯苓 阿膠各二兩

吳茱萸一升 麥門冬五合 人參

芍藥 白朮各三兩 甘草

生薑各一兩

右十味咬咀以水一斗二升煮雞取汁六升去雞

下藥煎取三升內酒三升并膠烱盡取三升放溫

每服一升日三

衍義 足厥陰稟東方生發之氣合衝脈而主血海專司

胎息化機設不慎而見腰痛腹滿胞急卒有所下

不得不藉血肉之味以安之雞屬巽而主肝血取

其化以助母氣黑以滋腎血也然血肉性殺非藉

參苓朮艸陽生之力則膠芍豈能速應其用芫虻

門冬各有二義茱萸辛溫不特引諸藥入肝兼以

杜將來惡阻門冬涼潤不特化茱萸之辛熱并以

解氣血之穢毒此皆人所未知生薑醇酒以鼓舞

諸藥之性耳然胎氣傷在一月之內烏知不為難

病而漫用安胎之劑耶必因有所觸而卒有所下

故宜急安以保貞固設本婦素稟血熱則茱萸又

難槩用胎息本嫌下墮其門冬恐可漫施先輩立

法不過舉其大義安能一一盡合人之資稟感觸

變態乎然能彙通以後逐月治例應亦無出其右

也

補胎湯 若曾傷一月胎者常預服此方

細辛一兩 防風 乾地黄

白朮各二兩 生薑四兩 吳茱萸

大麥各五合 烏梅一升

右八味咬咀以水七升煮取二升半分三服先食

服多寒者倍細辛茱萸熱多瀉者去之加天花粉

二兩若有所思去大麥加柏子仁三合 一方有

人參二兩

衍義 補胎者補胎氣之滲漏非補胎氣之不足也胎始

一月雖未見其不安然前曾傷在一月當力為之

預防逆推所墜之由若子藏不淨何能受孕今既

能孕諒非中有宿病也惟本婦稟體過豐濕痰侵

犯子藏稟體過滯血熱不能滋養而致不安者有

之此皆人所易明不必宣道其義惟是養胎之經不固風氣內干而致滲漏卒有所下未必無之所以方中用細辛芫荑防風開發養胎經中風氣白朮大麥培厚中土以填補滲漏之區佐以生薑不使淤濁內擾則地黃烏梅專一收斂陰精不隨風藥外驚胎息受蔭自可安如磐石也況風藥性竄無竅不入卽有風熱氣滯力能迅掃無餘于時胎息尚未長大不慮其鼓之上逆也試觀五月以後治例自可默識矣

妊娠二月名始膏無食辛膠居處必靜男子勿勞百節皆痛是為胎始結

妊娠二月足少陽脉養不可針灸其經如胆竅邱墟

立陽陵泉足少陽內屬於胆主情二月之時兒精成於胞裏當慎護驚動也

好娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱卽萎悴中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所

下乍寒乍熱宜服艾葉湯

艾葉湯方

艾葉

丹參

當歸

麻黃各二兩

人參

阿膠各三兩

甘艸四分

生薑六兩

大棗十二枚

右九味咬咀以酒三升水一斗煮減半去滓內膠

前取三升分三服 一方用烏母雞一隻宿肥者

治如食法割頭取血內三升酒中相和次以水一

斗二升先煮取汁去雞內藥煎取三升內血酒并

膠煎取三升分溫三服

衍妊娠足少陽養胎時有所傷犯而卒有所下且乍

寒乍熱有似乎中風寒狀以證見心滿臍下懸急

腰背強痛不得不以安胎為務遂於膠艾參歸劑

中參八麻黃一味縱非風寒致病亦可藉以開發

肌腠使內蘊之熱不致侵損胎息雖其例下有中

風寒三字實非為風寒設也麻黃在青龍續命方

中洵為發汗重劑在此方與後菊芫湯中不過借

以宣散蘊熱之使味耳

黃連湯 有曾傷二月胎者當預服此方

川連

人參各一兩

吳茱萸五合

生薑三兩

生地五兩一方用阿膠

右五味咬咀以酢漿七升煮取三升分四服

夜一十日一修合若頗覺不安加烏梅一升加烏

梅者不用酢漿直用水耳 一方用當歸半斤

術 妊娠惡阻皆由胎息內吸母氣氣弱不能敷

布水精而為嘔逆以懷孕兩月胎動不安陽養胎之

時少陽為陰陽交界之限裏裏後阻拒所

以嘔惡因前曾傷兩月之胎恐其復蹈前轍計維

左金丸中茱萸以溫下腕之寒川連以化膈上之

熱胃氣不足人參助之子氣不安地黃護之更取

生薑辛散開豁痰涎酢漿酸收不合上涌倘服後

覺不安必是本婦榮氣不勝固閉即當改用烏梅

兼開胃氣一舉而兩得之矣然地黃滯膈嘔家所

禁而此用之無礙且得留連諸藥其建止逆之功

為治妊娠惡阻頂門之錐而方下所主纖毫不露

洵夫靈機之不可輕泄如此

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲

生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數祖壁

玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也

妊娠三月手心主脉養不可針灸其經如中街勞宮

更邪門曲澤等穴是也手心主內屬於心無悲哀思慮驚動

妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤則

黃卒驚恐憂愁噴怒喜頓仆動於經脉腹滿繞臍苦

痛或腰背痛卒有所下宜服雄雞湯

雄雞湯方

雄雞一雙治如食法

生薑兩

大棗七枚

茯苓

右十一味咬咀以水一斗三升煮雞臠半出雞內

藥煮取半內清酒三升并膠煎取三升分三服

日令盡當溫臥 一方無黃芩生薑用當歸川芎

各二兩

術 懷身三月當手心主脉養胎於時將有定形欲其

成男即於前烏雌雞方改用雄者其間除去茱萸

之辛熱易入黃芩之苦寒使包絡之火不致內擾

而胎息安矣用棗者所以助薑發諸藥性也

茯神湯 若曾傷三月胎者當預服此方

茯神 丹參 龍骨各一兩

阿膠 當歸 甘草

人參各二兩 大棗二十枚 赤小豆一升

右九味咬咀以酢漿一斗煮取三升分四服先食

服七日後服一劑腰痛者加桑寄生二兩深師有

此湯治曾傷三月之胎故於調補氣血藥中用龍骨八肝以斂其固脫赤小荳歸心以承制其火可無消燥胎氣之虞矣

妊娠四月始受水精以成血脉食宜稍粳羹宜魚雁是謂盛血氣以通耳目而行經絡

妊娠四月手少陽脈養不可針灸其經如關衝陽天并曲垣等穴是也手少陽內輸三焦四月之時兒六府順成

當靜形體和心志節飲食

妊娠四月有寒心不溫溫欲嘔胸膈滿不欲食有熱

小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項強痛寒

熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胸心煩不得安幸有所下宜服菊花湯

菊花湯方

菊花雞子六枚 麥冬 一升 大棗十二枚

人參一兩 甘艸 當歸各二兩

麻黃 阿膠各二兩 半夏四兩

生薑 五兩

右十味咬咀以水八升煮減半內清酒三升并膠

煎取三升分二服溫臥當汗以粉粉之護風寒四

五日 一方用烏雌雞一隻煮水煎服

胎息四月始受水精以成血脉養胎屬手少陽火

氣用事最易損墜若寒鬱火邪惡阻彌甚熱蒸子

藏洩數異常然胎已成形未必便下必卒受風寒

或有所驚動勢難巨測不得不於安胎劑中兼麻

黃一味以開泄之雖與前艾葉湯並用麻黃其開

輕重迥殊餘味大都相類彼以胎未具體固宜艾

葉丹參之溫以助之此以相火養胎又需麥冬菊

花之清以潤之其用半夏者專滌胞門垢膩無慮

辛散傷胎也倘服後汗大出以粉粉之立法雖爾

設本婦力難勝任但當師事其法奚必株守其方

子嘗以紫蘇代麻黃既可散邪又可安胎未嘗不

信手合轍也

調中湯 若曾傷四月胎者當預服此方

白芍 生薑各四兩 厚朴

枳實 生李根白皮 白朮

柴胡各二兩 續斷 川芎

甘草各一兩 當歸一兩 烏梅 一升

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分四服日三

夜一八日後復服一劑

調中者調中上之墩阜坎陷也土為萬物之母一

息不調便生疾苦沉曾傷四月之孕至此能無坎
 昭乎固之之法阜則削之陷則培之方中枳實厚
 朴削平峻阜之劑也白木甘草運平坎陷之劑也
 芎歸芍續疎通泉脉之劑也柴胡李根一升清陽
 一降逆氣生薑烏梅一宣上壅一固下脫務令中
 州之氣無過不及以平為期則胎息之運動綽有
 餘地孰謂立方之名無深意存焉

妊娠五月始受火精以成其氣臥必晏起沐浴浣火
 深其居處厚其衣服朝吸天光以避寒殃其食稻麥
 其羹牛羊和以菜蕒調以五味是謂養氣以定五臟

千金方衍義卷二

攝葉山房

妊娠五月足太陰脉養不可針灸其經加陰白大部
公孫商邱三
陰交漏谷臨陵
泉等穴是也 足太陰內輪於脾五月之時兒四肢
 皆成無大饑無甚飽無食乾燥無自炙熱無太勞倦
 妊娠五月多熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小
 便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶
 頓欲仆卒有所下宜服阿膠湯

阿膠湯方

- | | | | | | |
|----|-----|-----|----|-----|----|
| 阿膠 | 四兩 | 人參 | 一兩 | 生薑 | 六兩 |
| 當歸 | | 白芍 | | 甘州 | |
| 黃芩 | 各二兩 | 施覆花 | 二合 | 艾葉蕒 | 七合 |

麥冬一升
 右十味咬咀以水九升煮藥減半內清酒三升并
 膠微火煎取三升半分四服日三夜一先食服便
 愈不瘥再服 一方用烏母雞一隻剖取咽血內
 酒中以水煮雞以前藥減半內酒并膠煎取三升
 半分四服

妊娠五月雖屬足太陰養胎然胎息始受火精而
 能運動務宜養氣以定五臟設有觸動而卒有所
 下則宜大固氣血以安之方中諸藥皆平調氣血
 之劑惟旋覆一味不可不講本經治結氣別錄消

千金方衍義卷二

攝葉山房

胸上痰結臥權開胃止嘔逆仲景治心下痞堅噫
 氣不除同葱白新絳治婦人半產漏下合諸治推
 之則覆花之用可燎然矣大抵婦人經漏胎息之
 病元氣雖虛未有不挾風氣痰濕廢積者觀柏子
 仁圓五石澤蘭丸等方自明
 安中丸 有曾傷五月胎者當預服此方

- | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 黃芩 | 一兩 | 當歸 | | 川芎 | |
| 乾地黄 | | 人參 | 各二兩 | 甘州 | |
| 芍藥 | 各三兩 | 生薑 | 六兩 | 麥冬 | 一升 |
| 五味子 | | 大麻仁 | 各二合 | 大棗 | 二十 |

右十二味咬咀以水七升清酒五升煮取三升半
分四服日三夜一七日復服一劑

衍前調中湯預調會傷四月之胎此安中湯預安會

傷五月之胎夫調之與安大費斟酌調則有平治
之權安則無尅削之理彼以脾有蘊積故宜枳實
厚朴以清之此以素虧津液又須生脉四物以濡
之用麻仁者必妊娠素有脾約之故然麻仁在此
方與麻仁丸中不同設非脾約似可勿用若中有
宿滯雖當五月調中何妨倘素稟虧弱縱在四月
安中竟與勿疑規矩不出方圓之外也

千金方衍義卷三

聖

掃葉山房

妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處
出遊於野數觀走犬及視走馮食宜鷲鳥猛獸之內
是為變騰理細筋以養其力以擊背脊

妊娠六月足陽明脉儀不可針灸其經如厲兌豐隆

三里等穴是也足陽明內屬於胃主口目六月之時兒口目

皆成調五味食甘美無大飽

妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體

腫驚怖忽有所下腹中如欲產手足煩疼宜服麥冬

湯

麥門冬湯方

麥冬 一升

人參

甘州

黃芩 各二兩

乾地黄 三兩

阿膠 四兩

生薑 六兩

大棗 十五枚

右八味以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取
三升分三服中間進糜粥 一方用烏母雞一隻
煮水以前藥

衍

六月足陽明養胎時兒受金精以成筋骨卒有所
動不安而寒熱往來故宜人參以主驚怖麥冬以
續胃脉地黃以養陰血阿膠以安胎息甘州以除
腹痛黃芩以清濕熱生薑以消脹滿大棗以和寒

千金方衍義卷三

聖

掃葉山房

熟者用清酒取以行諸藥力也一方用烏母雞與
始胚無異可見安胎之用不必固守成則耳

柴胡湯 治會傷六月胎者當預服此方

柴胡 四兩

茯苓 一兩

白木

白芍 一作

甘州

麥冬

川芎 各二兩

生薑 六兩

乾地黄 五兩

大棗 三十枚

右十味咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜
一申間進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服

一劑

前胎傷在六月法當預培胃氣而反不用參苓必是妊娠太便艱燥更衣時微有寒熱故用菴蓉柴胡佐麥冬地黃以滋血氣不費努掙胎自安矣設本婦大便不實則退菴蓉而進參苓可預攝也

妊娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢無使定止動伴屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒常食稻粳以密滕理是謂養骨而堅齒

妊娠七月手太陰脉養不可針灸其經如少商魚際是也行等穴手太陰內屬於肺主皮毛七月之時兒皮毛以成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

若傷寒煩熱腹滿短氣常若頭人及腰背強宜服葱白湯

葱白湯方
葱白長三四寸 半夏
旋覆花二合 黃芩一兩 人參一分
甘艸 當歸 黃芪各三兩
阿膠四兩 生薑八兩

右十一味咬咀以水八升煮減半內清酒三升及膠煎取四升每服一升日三夜一溫臥當汗出若

不出者加麻黃一兩者服如前法若秋後勿強漬汁一方以黃母雞一隻割咽取血內酒中煮雞取汁以前藥

金匱三物旋覆花湯治婦人半產漏下旋覆代赭石湯治胸中痰飲痞逆噎氣不除小柴胡湯治寒

熱痞滿或嘔或欬千金台三法而治好娠七月手太陰肺氣養胎時忽驚恐搖動致子之木精不能

內固而卒有所下推其證一一盡顯痰氣逆滿但以證若傷寒因取葱白之散邪安胎為一方之主

乃於旋覆花湯中去新絳而用其二旋覆代赭湯中去赭石小柴胡湯中去柴胡各用其五兼合保

元當歸補血復參阿膠門冬藥止一十一味而祛風治痰清上補下養血安胎之法畢具無遺方後

復有割黃母雞血內酒中則黃雞宜婦人之說其來尚矣

杏仁湯 若曾傷七月胎者當預服此方
杏仁 甘艸各二兩 紫苑一兩

鍾乳 乾薑各三兩 麥冬
吳茱萸各一兩 梗米五合 五味子三合

右九味咬咀以水八升煮取三升半分四服日三

夜一中間進食七日服一劑 一方用白雞一隻
煮汁煎藥

七月肺氣養胎時也前胎傷在七月必是肺逆咳

嗽之故故立方專以溫肺為主方中鍾乳乾薑黃

芩溫肺之專藥倘肺虛有熱又當推門冬紫苑梗

米以清肺為急需杏仁五味一散一收甘艸和諸

性味使無拒格之虞雖同具一方而主客逆從攸

分不可拘以分兩守株而待其免也

妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極
是謂密腠理而光澤顏色

千金方衍義卷三

羌

如商陽二關
合谷上下廉

妊娠八月手陽明脈養不可針灸其經

三里曲池肩井 手陽明內屬於大腸主九竅八月之

時兒九竅皆成無食燥物無輒失食無忍大起

妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛年寒乍熱胎

動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁

或青或黃或使寒慄腰背苦冷而痛日晡晡宜服芍

藥湯

芍藥湯方

芍藥

生薑 各四兩

厚朴 二兩

甘艸

當歸

白朮

人參 各三兩

薤白 切一升

右八味咬咀以水五升清酒四升合煮取三升分

三服日再夜一 一方用烏母雞煮汁以煎藥

胎受土精而成膚革時值母之手陽明養胎陽明

外屬肌膚內應子藏今因風寒所觸而繞臍下寒

則子氣之安危係乎反掌亟取專走陽明之薤白

一味以開泄經氣即用善護子氣之芍藥助以參

朮當歸生薑甘艸外佐薤白內助芍藥一服而轉

危就安且無風藥動搖胎息之患世醫咸謂薤白

安胎不知薤白之功更勝用厚朴者以其時時小

便有所下借內經潔淨府之一法也

葵子湯 若會傷八月胎者當預服此方

葵子 二升 甘艸 厚朴 各二兩

白朮 柴胡 各三兩 白芍 四兩

生薑 六兩 大棗 二十枚

右八味咬咀以水九升煮取三升分三服日二凡

十日一劑 一方用烏母雞一隻煮水以煎藥

此湯預防會傷八月之胎而方中除白朮白芍外

餘無可安之味也嘗讀炎帝本經言葵子主治五

藏六腑寒熱羸瘦五癰利小便久服堅骨長肌肉

而此合柴胡甘肅藜和榮諸藥必妊娠乍寒乍
 熱動不安常方與本經蔡子之治相符世人以為
 蔡子胎胎孰知有安胎妙用乎今胎在八月兒之
 腑臟已具產期漸邇雖滑無妨而堅骨長肌肉之
 功未必非胎息默受其益厚朴之用焉知不因小
 便之有所下歟設本婦無寒熱而用此方無所下
 而用厚朴確遵八月預安之法其驗與否吾不得
 而擬議也

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備
 飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮致才力

千金方衍義卷三
 掃葉山房
 妊娠九月足少陰脈養不可針灸其經如湧泉然谷
 穴是也足少陰內屬於腎腎主續縷九月之時兒
 脈續縷皆成無處濕冷無著灸衣

妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰痛
 不可轉側短氣宜服半夏湯

半夏湯
 半夏 三兩
 麥冬 一兩
 吳茱萸 一兩

常歸 各二兩
 阿膠 各二兩
 乾薑 一兩

大棗 十二枚
 右七味咬咀以水九升煮取三升去滓內白蜜八

升

合微火上溫服四服病即止 一方用烏母雞一
 隻煮汁煎藥

義衍
 經云人有重身九月而滑胎之絡脈絕也當十月
 復此言妊娠足少陰養胎兒受石精以成皮毛石
 者腎藏之脈與子氣相通則子之藏氣亦實矣今
 以孕母卒得下痢腹滿懸急故用半夏以辟腸垢

蓋黃以散腹滿歸膠以護榮血冬棗以行津液此
 皆恒用之品其理易明獨是白蜜與旨崇古未護

蓋蜜能通腸而利反用之必四服病止腸垢去而
 正氣復胎自安矣然必臨月始為合劑不可尋常

千金方衍義卷三
 掃葉山房
 效用於內經言九月而瘕此言九月下痢各舉一
 端為例豈妊娠九月非瘕必痢乎

猪腎方 若曾傷九月胎者當預服此方
 猪腎 一具
 茯苓 桑寄生

乾薑 乾地黃 川芎 各三兩
 白朮 四兩 附子 中者一枚 大豆 二合

麥冬 一升

右十味咬咀以水一斗煮取五升去腎內諸藥煎
 取三升半分四服日三夜一十劑

義衍
 孕至九月可無傷損之虞矣以前曾有所墜必是

一劑

腎氣虛寒不能司成實之令故用猪腎引領木附
大溫腎氣然須十日更與一劑不可多服恐熱遺
子藏反嬰胎毒耳

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故
使關節人神皆備俟時而生

妊娠一月始脛二月始膏三月始胞四月形體成五
月能動六月筋骨立七月毛髮生八月藏腑具九月
穀氣入胃十月諸神備日滿即產矣宜服滑胎藥入
月即服

丹麥膏 養胎臨月服合滑而易產方

千金方衍義卷三

婦科

丹參 半升

川芎

當歸 各二兩

蜀椒 五合有世者以
大麻仁五合代

右四味咬咀以清酒搜濕停一宿以成煎猪膏四
升微火煎膏色赤如血膏成新布絞去滓每日取
如棗許內酒中服之不可逆服至臨月乃可服舊

用常驗

衍
丹參破宿生新統芎歸佛手為滑胎易產之專藥
而方中便具活法寒用川椒熱用麻仁各隨母氣
之偏勝耳服後猪膏醇酒取其滑澤滋益也苟孕
婦中氣不實不特猪膏宜遠麻仁亦難輕試然觀

熟易麻仁一語活法盡情吐露矣

甘艸散 合易生母無疾病未生一月日預服過

三十日行步動作如故兒生墮地皆不自覺方

甘艸 一兩 黃芩 一方用
茯苓 乾薑

吳茱萸 大荳黃卷 麻子仁

桂心 大麥芽 各三兩一
方用粳米

右八味治下篩酒服方寸七日三暖水服亦得

衍
保生易產而用麻仁黃卷麥芽取其安中利發能

使產時墮地不覺桂心乾薑茱萸取其溫中散血

能使產後腹無留滯甘艸黃芩一和寒熱一化辛

千金方衍義卷三

婦科

熱也前方以川椒麻仁更迭而適寒熱此以乾薑

桂心黃芩麻仁互配而調寒熱機用之靈活如此

千金圓 主養胎治產難顛倒胞不出服一丸傷

毀不下產餘病汗不出煩滿不止氣逆滿以酒

服一丸一名保
生丸

甘艸 貝母 秦椒

大荳黃卷 龍薤 桂心

黃芩 粳米一作
糯米 石斛

石膏各六
錢 當歸各二
錢 麻子 三合

右十二味為末蜜和丸如彈子大每服一丸日三

用棗湯下 一方用蒲黃一兩

衍此即前甘艸散之變法甘艸散方中用桂薑麥甘

麻豆等味為消胎而設此治產難胞衣不下亦不

出此但加石斛石膏貝母梗米以清胃之上逆秦

椒以下惡氣與菜菔同為止逆下氣之味但彼用

散以利運動之機此用丸以祛毀傷之滯取甘艸

散之變法而為產難之變治也

蒸大黃九 治妊娠養胎合易產方

大黃三十

枳實

川芎

白木

杏仁各十

白芍

千金方衍義卷三

婦科山房

乾薑

厚朴各十

吳茱萸二兩

右九味為末蜜和丸如梧子大空腹酒下二九日

三不知稍加之

衍養胎而用小承氣用法奇矣小承氣而兼溫養血

氣之味變化尤奇大黃得薑木則熱可宣通薑更

得枳厚則辛能開泄加以芍芍和榮杏仁利氣不

特產時兒無阻逆之患并杜產後母無瘀積之虞

然惟質實氣固者宜之若資稟薄弱及虛陽上盛

之婦諒不處是方也

消胎合易產方

阿膠八兩

滑石三兩

車前子一升

右三味治下篩飲服方寸七日再至生月乃服藥

利九竅不可先服

衍此臨產通用之方阿膠益氣滋血滑石益精利竅

車前除濕利水非若上四方之各隨資稟氣血虛

虛不可假借也可見先哲常變之幻神應無窮

妊娠諸病第四此篇有十章 方八十九首

第一胎動及數墜胎方六首灸法三首 灸法一首

治妊娠二三月上至八九月胎動不安腰痛已有

所見方

千金方衍義卷三

婦科山房

艾葉

阿膠

川芎別後

當歸各三

甘艸二兩

右五味以水八升煮取三升去滓內膠令消分三

服日三

治妊娠胎動去血腰痛方

阿膠二兩

川芎

當歸

青竹茹各五

右四味以水一斗半煮銀二斤取六升去銀內藥

煎取二升半內膠令烱分三服不瘥仍作一方

用甘艸三兩

葱白湯 治妊娠胎動不安腹痛方

葱白切一升 阿膠二兩 當歸

續斷 川芎各三兩

右五味咬咀以水一斗先煮銀六七兩取七升去

銀內藥煎取二升半下膠合烱分三服不瘥重作

治妊娠胎動晝夜叫呼口噤唇寒及下重痢不息

方

艾葉一升咬咀以好酒五升煮取四升去滓更

煎取一升服口閉者格口灌之藥下即瘥亦治

妊娠腰痛及妊娠熱病并妊娠卒下血

千金方衍義卷下 掃葉山房

義 膠艾而合芎藭為治胎動要藥須知妊娠下焦血

氣虛寒而腰痛者因為合劑若妊娠虛煩下血而

腰痛痛者又須退艾葉而用竹茹并用白金煎水

煮服以鎮固肺胃之氣胎自寧矣若妊娠胎動不

安而虛陽上浮或時頭痛或時腹痛亦當去艾葉

加葱白佐川芎以散上逆之頭痛加川斷佐當歸

以安下虛之腹痛二方俱不用甘艸者嫌其甘緩

無清上之速應也若妊娠下痢為下虛不禁又當

專任艾葉以溫榮血煮用好酒以助其力即妊娠

病熱腰痛下血亦不出乎溫散之法也

旋覆花湯 治妊娠六七月胎不安常服之方

旋覆花一兩 半夏 白芍

生薑各二兩 枳實 厚朴

白木 黃芩 茯苓各三兩

右九味咬咀以水一斗煮取二升半分五服日三

夜二先食服

義 此方專主妊娠氣滯多痰六七月來胎息漸長壅

遏中氣故用旋覆開發痰氣於上即用枳木健運

脾氣于中芩夏薑朴疎利滯氣于下黃芩白芍專

護胎氣也若妊娠體癰血熱中無痰濕阻礙胎氣

千金方衍義卷下 掃葉山房

即與此方無預也

治妊娠數墮胎方

取赤小豆為末酒服方寸七日二亦治妊娠數

月月水尚來者

義 數墮必因火盛火能消物故取小豆之色赤通乎

心包而導血熱為散酒服者恐其中有留滯也然

在三四月前有之若逾四月即是傷胎不可以人

藥論也

又方

妊娠三月灸膝下一寸七批

第二漏胞 方四首

治妊娠下血如故名曰漏胞胞乾便死方

生地黃半斤咬咀以清酒三升煮三沸絞去滓

服之無時能多服佳姚大夫加黃連雞頭治如食法崔氏取雞血和藥中服之

治妊娠血下不止名曰漏胞血盡子死方

乾地黃搗末以三指撮許酒服不過三服瘥

又方

生地黃汁一升清酒四合煮三四沸頓服不止

頻服

又方

千金方衍義卷三

異

掃葉山房

乾薑 二兩

乾地黃 四兩

右二味治下篩酒服方寸七日三服

衍義 漏胎而用地黃必酒者絞服方無瘀積之患若妊

娠氣血本虛助以雞血尤為得力若脾氣素弱不

勝陰藥潤下者為散酒服以緩圖之若中氣虛寒

難於克運者須配乾薑以鼓地黃之性則安胎止

血兩得其宜矣

第三子煩 方三首

竹瀝湯 治妊娠常苦煩悶此是子煩

竹瀝 一升 麥冬

防風

黃芩 各三兩

茯苓 四兩

右五味以水四升合竹瀝煮取二升分三服不瘥

再作

又方

時時服竹瀝隨多少取瘥止

衍義 煩屬膈上虛火故用竹瀝滋肺化熱防風佐黃芩

使從表分解茯苓佐麥冬使從下滲瀉總以不出

竹瀝竹茹等法如脾氣充實之人不妨時時單服

竹瀝亦能取瘥更與四卷虛煩諸方參看始詳

第四心腹腰痛及脹滿 方二十首

千金方衍義卷三

異

掃葉山房

治妊娠心痛方

青竹皮一升以酒二升煮三兩沸頓服之

又方

破生雞子一枚酒和服之

又方

白蜜 三兩 羊脂 八兩 青竹茹 一升

右三味合煎食前頓服如棗核大三枚日三

又方

蜜一升和井底泥泥心下

又方

燒棗二七枚爲末童便服立愈

治妊娠腹中痛方

生地黃三斤搗絞取汁用清酒一升合煎減半

頓服

又方

燒車轄脂內酒中服亦治妊娠咳嗽并產難三

日不出

又方

取蜜一升頓服良

俗懷孕而患胃脘急痛獨用竹茹酒者服之取化無

千金方 雜錄卷二

聖

掃葉山房

形之蘊熱也若因血熱而痛又宜生雞子和酒服

之若因肺胃燥熱而痛則用白蜜羊脂其竹茹合

服或單取熟蜜服之并以蜜和并泥塗心下總取

保護胎氣也若因胃虛有熱留滯燒棗童便服之

若因血熱不能養胎而腹痛者生地搗絞和酒服

之與漏胎下血無異妊娠腹中痛痛燒車轄脂內

酒中服之專主卒心痛及咳嗽難產不能出此專

取滑澤利垢之用也

治妊娠腹中滿痛又心不得飲食方

黃芩 三兩

白芍 百兩

白朮 六兩

右三味咬咀以水六升煮取三升分三服半日合

藥盡微下水令易生月飲一劑爲善

治妊娠忍苦心腹痛方

燒鹽令赤熱三指撮許酒服之立瘥

治妊娠傷胎結血心腹痛方

取小兒尿二升頓立瘥大良

俗黃芩白朮爲安胎專藥以黃芩清熱白朮固土

厚自能載物此惟胎熱不安而上升過動者宜之

若腹滿又心又爲營氣不能榮養而胎動不安又

需芍藥之酸寒以斂固之使小便微利則機關順

千金方 雜錄卷二

聖

掃葉山房

利而生產亦易此皆治胎熱之用也其心腹忽痛

用燒鹽取鹹以潤下也傷胎血結用小便取寒以

導血也是皆因熱而上逆之治設母氣本虛不能

榮養胎氣而下墜腹痛又當峻用參朮兼溫補而

升舉之非黃芩白芍燒鹽小便等可得而于預也

治妊娠中惡心腹痛方

新生雞子二枚破著杯中以糯米粉和如粥頓

服亦治妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉捨

心或下血不止

又方

以水三升 洗夫靴 剝汁 溫服

治妊娠中蠱 心腹痛方

燒敗皴皮 酒服方寸七須臾 自呼蠱 主姓名

治妊娠腰痛方

大豆二升 以酒三升 煮取二升 頓服之 亦治常

人卒腰痛者

又方

麻子三升 以水五升 煮取汁三升 分五服 亦治

心痛

又方

千金方衍義卷第

豉二兩

榆白皮 三兩

右二味 熟搗 蜜丸 如梧子 大服二十九 亦治心痛

又方

燒牛屎 焦末 水服方寸七日 三服

又方

地黃汁 八合 酒五合 合煎 溫服

治妊娠脹滿方

取秤 鎚燒之 滓酒中 服良 亦治妊娠 卒下血

其能解一切諸毒也 敗鼓皮 治一切蠱毒 梅師治

中毒下血 如鷲肝 心腹切痛 如咬取 其能散瘀毒

也 黑大豆 淋酒 頓服 善解 婦人 風毒 下血 腰痛 勢

甚者 宜之 香豉 榆皮 丸服 淹久者 用之 麻子 汁治

妊娠 心痛 腰痛 痛取 降氣 分之 火也 地黃 汁治 妊娠

腰痛 取降 血分之 火也 燒秤 鎚滓 酒取 辟惡 氣散

惡血也 各審 其宜 而用之

第五傷寒 方一十六首

治妊娠 傷寒 頭痛 壯熱 肢節 煩疾 方

石膏 八兩

大青

黃芩 各三

葱白 升

前胡

知母

千金方衍義卷第

梔子仁 各四

右七味 咬咀 以水七升 煮取二升 半 去滓 分五服

相去 如人行 七八里 久再服

治妊娠 頭痛 壯熱 心煩 嘔吐 不下 食方

知母 四兩

粳米 五合

生蘆根 一升

青竹茹 三兩

右四味 以水五升 煮取二升 半 緩緩 飲之 盡更作

瘥止

治妊娠 傷寒 服湯 後頭痛 壯熱 不歇 宜用 此湯 拭

其身

麻黃半兩 竹葉一升 石膏三天

右三味以水五升煮取一升去滓冷用拭身體又

以故布拵頭額胸心燥則易之患瘧者加恒山五

兩

治妊娠傷寒方

葱白十五 生薑二兩

右二味以水三升煮取一升半頓服取汗

治妊娠中風寒熱腹中絞痛不可針灸方

鯽魚一頭燒作灰搗末酒服方寸七取汗

治妊娠遺時疾令子不落方

千金方衍義卷二 聖 掃葉山房

取竈中黃土水和塗臍乾復塗之一方酒和塗

方五寸又泔清和塗並佳

又方

大尿泥塗腹勿令乾

治妊娠熱病方

葱白五兩 豆豉一升

右二味以水六升煮取二升分三服取汗

又方

葱白一把以水三升煮令熟服之取汗食葱令

盡亦主安胎若胎已死者須臾即出

又方

車轄脂酒服大良

又方

井底泥泥心下三寸立愈

又方

青羊屎塗腹上

又方

水服伏龍肝一雞子大

治大熱煩悶者方

葛根汁二升分三服如人行五里久進一服

又方

燒大棗七枚為末酒和服

又方

槐實燒灰取方寸七酒和服

衍 傷寒之端緒頗繁而妊娠傷寒尤為扼腕豈此十

餘例可得而藥治乎當知表裏和解等治與平人

無異但須無礙子氣為之大綱所以千金但舉化

熱保胎及單方塗臍等法彙次如左其第一方以

石膏大青芩梔知母疾祛蘊熱從內而解葱白前

胡分其土熱之勢從經而散為溫熱時行之方

而熱邪內傷胎氣亦不出此其第二方乃彷彿曰
 虎之製取知母粳米以化胃熱蘆根竹茹專治煩
 嘔也若服湯不解則用竹葉石膏與麻黃者湯拭
 體并搗頭額胸心取其通達腠理免致熱邪內犯
 子氣之患其用葱白豆豉用葱白生薑各有微義
 取豉能解久伏之氣薑能散暴感之邪或但者葱
 服取汗亦得用葛根者專解陽明經熱也用鯽魚
 灰者專主脚火上逆也用槐實灰者專主大腸燥
 熱也用車轄脂者專主腹中緩急也用棗灰者專
 主胃府蘊熱也二方主妊娠心腹腰痛治例相類

千金方衍義卷下

聖

婦科山房

但彼治內火故用尿服此治外熱故用酒服稍通
 權變耳用伏龍肝者專主子氣不固并取塗臍及
 犬矢泥青羊尿并底泥塗並佳虛寒則用伏龍肝
 犬矢泥虛熱則用青羊尿大熱則用并底泥若心
 腹大執絞痛和蜜塗之各分寒熱輕重為當

第六瘧病 方二首

妊娠患瘧方

恆山 二兩 甘草 一兩 黃芩 三兩
 烏梅 十四枚 石膏 八兩
 右五味咬咀以酒水各一升半合漬藥一宿煮三

四沸去滓初服六合次服四合後服二合凡三服
 又方

恆山

竹葉 各三兩

石膏 八兩

粳米 一百粒崔氏外臺作糯

右四味咬咀以水六升煮取二升半去滓分三服
 第一服取未發前一食頃服之第二服取臨欲發
 服之餘一服用以塗頭額及胸前五心藥漬置頭
 邊當一日勿近水及進飲食過發後乃進粥食
 夫瘧家之畏常山猶傷寒家之畏麻黃也而妊娠
 之瘧所之不疑良因寒熱勢甚胎之安危在乎反

千金方衍義卷下

聖

婦科山房

掌故二方悉首推之而又各取白虎之半一用石
 膏甘草兼黃芩以護子氣烏梅以收津液一用石
 膏粳米兼竹葉以清心包總以化熱保胎為務其
 後方乃留一服以塗頭額胸心與傷寒用麻黃竹
 葉石膏拭體之法不殊夫麻黃恆山之性雖猛烈
 用酢製透原無汗脫胎傷之患倘妊娠素稟虛羸
 不妨但效其法改用白虎加人參加桂枝加草果
 加半夏等未嘗不為金匱千金法外之法耳
 第七下血 方十一首
 治吐衄忽暴下血數升胎燥不動方

榆白皮 三兩 當歸 生薑 各二兩

乾地黃 四兩 升用 不用

右五味以水五升煮取二升半分三服不瘥更作

服之

行 忽暴下血而胎不運動須防墮故用地黃當歸

和血之味即兼榆皮葵子利竅之品一以分利滲

道使血化之水不致混亂榮血而妄行一以疎利

機竅乘勢當下則下庶免胎乾阻滯之虞用生薑

者專取辛散以通血氣之滯也

馬通湯 治妊娠卒驚奔走或從高墜下暴出血

千金方衍義卷二

數升方

馬通汁 一升 乾地黃 阿膠 各四兩

當歸 艾葉 各三兩

右五味以水五升煮取二升半去滓內馬通

汁及膠令烱分三服不瘥重作

膠艾湯 治妊娠二三月上至七八月其人頓仆

失踞胎動不下傷損腰痛欲死若有所見及

胎奔上捨心短氣方

艾葉 三兩 阿膠 川芎

白芍 甘草 當歸 各二兩

乾地黃 四兩

右七味以水五升好酒三升合煮取三升去

滓內膠更上火令盡消分三服日三不瘥更作

治妊娠卒下血方

葵子一升以水五升煮取二升分三服瘥止

又方

生地黃切一升以酒五升煮取三升分三服亦

治落身後血

又方

取葵根莖燒作灰以酒服方寸七日三

千金方衍義卷二

行 因墮仆卒驚而血驟下故需馬通散血歸地和榮

膠艾安胎以急救之若頓仆失踞而胎動不安加

有所見其勢較前稍緩但用膠艾芍歸甘草加入

地黃芍藥和血安胎可也其葵子葵莖總取滑利

地黃酒煮用以散血然必勢甚故乃用之倘有可

安之機諒不輕用也

鱗爪湯 治妊娠僵仆失據胎動轉上捨心甚音

血從口出逆不得息或注上下血一斗五升胎

不出子死則寒製入腹中急如產狀虛乏少氣

因頓欲死煩悶反覆服藥毋得即安下血亦止

其當產者立生方

鱉爪一升

甘草

桂心各二

阿膠二兩

右四味以酒以東流水一斗煮取三升去滓內膠烱盡能為一服佳不能者食頃再服若口急不能飲者格口灌之藥下便活也與母俱生若胎已死獨母活也若不僵仆平安妊娠無有所見下血服此湯即止或云桂不安胎亦未必爾

衍

胎傷下血已劇勢難保全急當散血以救其母方用鱉爪桂心温散積滯阿膠甘草和血安中遲則

千金衍義卷三

婦人篇

難於為力矣若胎息未損仍得子母雙全設胎氣已傷而不急下并母亦不得而救也 鱉性橫行破血故妊娠忌食而傷胎下血子死腹中下胞衣方多用之以其觸之即脫格物致知之道也

治妊娠胎墮下血不止方

丹參十二兩以酒以清酒五升煮取三升分三

服溫日三

又方

地黃汁和代赭為末服方寸匕

又方

桑蠶蠱屎燒灰酒服方寸七

香豉湯 治半產下血不盡苦來去煩滿欲死方

香豉一升半以水三升煮三沸漉去滓內鹿角末一方寸七頓服之須臾血自下鹿角燒亦得

衍

丹參一味功同四物更用酒煎以和其榮丹方中之良藥也其地黃汁和代赭末服是固去血過多而鎮攝之也若半產血脫而煩則用鹿角温散積

血於下香豉清解虛煩於上而腹滿自除無藉破血而糜自不能留矣

第八小便病

方十五首 灸法一首

千金衍義卷三

婦人篇

治妊娠小便不利方

葵子一升

榆白皮一升

右二味以水五升煮五沸每服一升日三

又方

葵子

茯苓各一

右二味為末以水服方寸七日 二小便利則止

云妊娠有水氣身重小便不利澀澀惡寒起即頭眩

治妊娠患子淋方

葵子一升以水三升煮取一升分再服

又方

葵根一把以水三升煮取二升分再服

治妊娠小便不通利方

蕪菁子七合為末水和服方寸七日三

衍妊娠濁瀉子淋皆膀胱氣化之阻積故用葵子榆

皮之滑澤利竅與葵子茯苓之甘寒淡滲及單取

葵子葵根甚則蕪菁子一味為散以取疏利之專

功也

治妊娠尿血方

黍穰燒灰酒服方寸七日三

治婦人無故尿血方

千金方衍義卷

壘

婦葉山房

龍骨五兩治下篩酒服方寸七空腹服日三久

者二十服愈

又方

爪甲

亂髮

右二味並燒末等分酒服方寸七日三飲服亦得

又方

桂心

鹿角屑

大豆黃卷

各一

右三味治下篩酒服方寸七日三

又方

取夫爪甲燒作灰酒服之

又方

取故舩上竹茹曝乾搗末酒服方寸七日三亦

主遺尿

衍妊娠尿血必非無故急需散血為主故用黍穰小

米之燒灰不特散血兼可安中宜乎妊娠用之若

婦人尿血雖云無故亦必有傷於血故用爪甲髮

灰爪為筋之餘髮為血之餘總取散血之用耳若

血脫過多而色稀淡中無阻滯者又須龍骨以斂

固之其桂心鹿角溫血散血大豆黃卷本經雖主

筋攣膝痛孟詵言破婦人惡血厚婦藥中多用之

千金方衍義卷

壘

婦葉山房

得桂心鹿角共襄散血之功而無傷中之患虛寒

者宜加用之

治婦人遺尿不知出時方

白薇

芍藥

右二味治下篩酒服方寸七日三

又方

礬石

牡蠣

各二

右二味治下篩酒服方寸七亦治丈夫

又方

胡燕窠中草燒末酒服半錢七亦治丈夫

又方

燒遺尿人薦草灰服之瘥

又方

灸橫骨當陰門七壯

衍義

二方各有功用若肺胃熱移於下而遺尿者用白

薇以清膀胱之上源芍藥以收內胞之津氣若膀胱

氣脫不收而遺尿者用礬石壯螭之酸瀉以斂

固之然必火衰於下者宜之倘濕熱癰閉候用則

與戈戟無異也

第九下痢方八首 灸法一首

千金衍義卷二

毒

補虛山房

治妊娠下痢方

人參

黃芩

酸石榴皮

各三兩

棗皮 四兩

粳米 三合

右五味咬咀以水七升煮取二升半分三服

衍義

脾胃為身之津榮脾氣固則胎氣亦固故妊娠滯

下專宜固脾為主雖有積滯止宜苦寒以堅腸胃

胃氣有權則積氣自除此方之用棗皮專主斷痢

黃芩專護胎熱榴皮專司固脫人參粳米專扶中

氣并助上三味之力也

又方

白楊皮一劬咬咀以水一大升煮取二小升分

三服

衍義

白楊皮不獨主妊娠下痢兼能利水去風痺宿血

水血去而痢自止胎自安矣

又方 燒中衣帶三寸為末服之

又方

羊脂如棊子六十枚溫酒一升投中頓服之日

三

衍義

諸脂滑利傷脾動蕩獨羊脂性熱止下痢治脫服

千金衍義卷二

毒

補虛山房

能治產後腹中絞痛故千金用之本草言其柔金

粟銅其滌除腸垢之力可知

治妊娠患膿血赤滯魚腦白帶臍腹絞痛不可忍

者方

薤白 切一升

酸石榴皮

黃蘗 各三兩產實作黃連

阿膠 二兩

地柯 四兩

右五味咬咀以水七升煮取二升半分三服不瘥

更作

衍義

薤白溫中散結專主胸痺結痛南陽治腹痛下重

能泄陽明氣滯榴皮酸瀉黃柏苦堅阿膠溫補地

榆止血爲冷熱要方以有薤白溫中之功無慮
檳榔止瀉之患也

治妊娠注下不止方

阿膠

艾葉

酸石榴皮

各二兩

右三味以水七升煮取二升去滓內膠合烱分三服

艾葉溫血阿膠佐之檳皮固脫艾葉輔之尤爲安胎臨病之專藥不在藥味之繁多也

治妊娠及產已寒熱下痢方

黃連一升

黃柏一升

梔子二十枚

右三味咬咀以水五升漬一宿煮三沸服一升一日一夜令盡嘔者加橘皮一兩生薑二兩亦治丈夫常痢

夫常痢

苦燥之藥能堅腸胃故用連柏以辟除濕熱梔子以疎通滲道勝於黃芩之但能安胎而無決渠通利之用也方後有云嘔加薑橘雖言治嘔而能運

行中氣鼓舞藥力縱無嘔逆亦宜用之

治婦人欲痢飢先心痛腹脹滿日夜五六十行方

石櫚皮

魏活八

黃蘗一

麥蘗一

烏梅肉

川連

艾各一兩

防已二兩一作防風阿膠

乾薑各三兩

有十味爲未密和丸如梧子大飲服二十九日三漸加至三四十丸

下痢腹脹滿瀾陰內結也非薑附無以散之欲痢

驅先心痛濕熱泛溢也非連柏無以折之濁濕阻滯非防麴無以泄之血液不守非膠艾無以安之

於中非特津液可禦而薑附之性亦不致於驟發庶腹中之寒熱和而滯下瘳矣

治婦人水洩痢方

灸氣海百壯三報

第士水腫方五首

治妊娠體腫有水氣心腹急滿方

茯苓

白朮各四兩

黃芩

杏仁各三兩

旋覆花一兩

右五味咬咀以水六升取二升半分三服

此方專主肺氣下降而喘脹逆滿故用杏仁旋覆

專利膈上之痰氣茯苓白朮專利腹中之水氣黃芩一味專清胎息之熱氣也

鯉魚湯 治妊娠腹大胎間有水氣方

鯉魚一頭 白朮 生薑各五兩

白芍 當歸各三兩 茯苓四兩

右六味咬咀以水一斗二升先煮魚熟澄清取八

升內藥煎取三升分五服

衍義此方專主脾氣不化而水溢胞宮故用鯉魚專行

利水茯苓專行燥濕歸芍專行護胎生薑專行辛

散使周身之樞機利而水自除矣

治妊娠毒腫方

蕪菁根洗淨去皮搗酢和如薄泥勿令有汁猛

千金方衍義卷三 五鳳樓

火煮二三沸適性薄腫以帛急裹之日再易寒

時溫覆非根時用子若腫在咽中取汁含嚥之

又方

燒榛牛尿酢和傅之乾則易亦可服方寸七日

三

衍義前治小便不通用蕪菁子為散水服此治妊娠用

身毒腫用蕪菁根和酢搗敷總取下氣消腫之功

也

治妊娠手脚皆腫急方

赤小豆 五升 商陸根一斤切

右二味以水三斗煮取一斗稍稍飲之盡更作

一方加澤漆一斤

衍義此方專主濁濕暴腫故用商陸峻攻而兼赤豆之

清心利水苟涉虛羸未可輕試

產難第五論一首八條 針法一首 方二十二首

論曰產婦雖是穢惡然將痛之時及未產已產並不

得令死喪污穢家人來視之則生難若已產者則傷

兒也

婦人產乳忌反支月若值此月當在牛皮上若灰上

勿令水血惡物著地則殺人及洗濯衣水皆以器盛

千金方衍義卷三 生

過此忌月乃止

凡生產不依產圖脫有犯觸於後母子皆死若不

死即母子俱病庶事皆不稱心若能依圖無所犯觸

母即無病子亦易養

凡欲產時特忌多人瞻視惟得二三人傍待產說

乃可告語諸人也若人眾看視無不難產

凡產婦第一不得忽忽忙怕傍人極須穩審皆不得

預緩預急及憂悒憂悒則難產若腹痛眼中火生此

兒迴轉未即生也兒出訖一切人及母皆忌問是男

是女兒始落地與新汲井水五咽忌與暖湯物勿令

母看視穢汚

凡產婦慎食熱藥 熱麵食常識此飲食當如人肌溫
濕也

凡欲臨產時必先 脫尋常所著衣以籠窰頭及窰口
令至密即易產也

凡產難及子死腹 中并逆生與胞胎不出諸篇方可
通檢用之

治產難或半生 或胎不下或子死腹中或著脊及
坐草數日不產 血氣上搶心母面無顏色氣欲絕
者方

酒 二升 白蜜 成煎猪膏 各一
右三味合煎取 二升分再服不能再服可隨所能
服之治產後惡 血不除上搶心痛煩急者以地黃
汁代醇酒

方宜水土南北 懸殊西北風高土厚民多稟氣剛
燥故宜上法滋 之非若東南水土卑弱尚力保脾
尚恐產後元氣 不固之比

治難產方

槐枝 切二升 榆白皮 切 大麻仁 升各一

單麥 通草 各三兩 牛膝 五兩

右六味咬咀以 水一斗二升煮取 三升半分五服
又方 吞皂莢子二枚
又方 取廁前已用草 二七枚燒灰水調服之
又方 令夫唾婦口中 二七過立出
又方 針兩肩井入一 寸寫之須臾即分 娩
治產難三日不 出方
取風頭燒作屑 并花水服方寸 七日三
又方 車脂脂吞大豆 許兩丸
又方 燒藥杵令赤 內酒中飲之
又方 燒大刀鏢以酒 一杯沃之頓服 即出救死不分
斃者
治產難累日氣 力乏盡不得生 此是宿有病者 方
阿膠 二兩 赤小豆 二升

千金方衍義卷三

三

掃藥山房

千金方衍義卷三

三

掃藥山房

右二味以水九升煮豆令熟去滓內膠合烱每服五合不覺更服不過三服即出

又方

槐子十四 蒲黃一合

右二味合內酒中溫服須臾不生再服之水服亦得

又方

生薑汁 生地汁各半

右二味合煎熟頓服之

治產難及日月未足欲產者方

千金方卷之三

產

知母一兩為末蜜丸如兔屎大每服一九痛不止更一九

止更一九

羚羊角散 治產後心悶是血氣上衝心所致者

又方

羚羊角一枚煨作灰治下齋以東流水服方寸

七若不瘥須臾再服取悶瘥乃止

又方

殺羊角燒作灰以溫酒服方寸七不瘥須臾再

進備急方以治產難

治產乳運絕方

半夏一兩持篩丸如大豆內鼻孔中即愈此扁鵲也

又方

神麴末水服方寸七亦治難產

又方

赤小豆搗為散以東流水服方寸七不瘥更服

又方

含醃醋嬰面即愈凡四即擊之

又方

取醃醋和產血如棗大服之

治心悶方

千金方卷之三

產

產後心悶眼不得開即當頂上取髮如兩指大

強以人牽之眼即開

產難用滑澤利竅之藥為之通例若平昔脾氣不

固者則牛膝麻仁亦宜斟酌若氣弱之婦愈用滑

利則胎氣愈陷產門愈阻非峻用人參固氣不能

助之使下孰謂催生之法一言可蔽哉如產難用

燒鼠頭者取其屬腎而性善竅也用車軸脂者取

其滑利而善轉運也用刀環酒者取其剛決而能

鎮攝諸邪也用阿膠赤小豆者取其滋血而兼利

水達竅也用槐子蒲黃者取其散血而清于藏之

熱也用地薑汁者取其滋血而通經脈之滯也用
知母者取其滋陰專清子戶之火也用羚羊角燒
灰酒服者取其舒筋而開竅散血也用玃羊角燒
灰酒服者取其散血通治產後餘疾也用神龜未
者取其健運而散蓄積之滯也用赤小豆者取其
利水而能清熱散血也用半夏搗碎者取其善噉
而能開發諸竅也用醃醋噴面者取其辟惡而能
收攝神氣也牽頂門髮者令其上引不使隨氣下
脫也

衍義難產藥多不應不獲已而廣輯丹方及外助諸法
千金方衍義卷三
掃葉山房

以祈僥倖庶便隨宜採擇以濟急需觀後橫生子
死胞衣不出等例與此互參自明

子死腹中第六 論一首 方十七首

論曰凡婦人產難死生之候母面赤舌青者見死母
活母唇口青口兩邊沫出者母子俱死母面青舌志
口中沫出者母死子活

治動胎及產難子死腹中并姓娠兩兒一死一生
服之令死者出生孝安神驗方

蟬瓜 一升 甘草 一尺 阿膠 三兩

右三味以東流水一斗先煮蟬瓜甘草得二升去

滓次內膠合炸頓服之不能分再服若人因拗口
內藥藥入即活前藥作東向竈用葦薪煮之

真珠湯 治胎死腹中

真珠 一兩 榆白皮 升

右二味以苦酒三升煮取一升頓服之立出

治子死腹中不出方

牛矢塗母腹上立出

又方

取竈心黃土三指撮以酒服之立出土當背見

頭上亦治逆生及橫生不出手足先見者

千金方衍義卷三

又方

取夫尿二升者令沸飲之

又方

酢二升拗口灌之

又方

吞槐子二七枚亦治逆生

又方

三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一

升合煮令產婦東向飲之立出

又方

瞿麥一斤以水八升煮取二升一服一升不出再服

治胎死腹中乾燥著背方

葵子一升 阿膠五兩

右二味以水五升煮取二升頓服之未出再煮服

治妊娠未足月而胎卒死不出其母欲死方

以苦酒濃煮大豆每服一升死胎立出不能頓

服分再服 一方用醇酒煮大豆亦治積聚成

瘕

治妊娠胎死腹中若子生胞衣不出腹中引腰背

千金方行義卷下 婦人胎前產後

痛方

甘艸一尺 筒桂四寸 雞子一枚

蒲黃二合 香豉二升

右五味以水六升頓服之胎胞穢惡盡去大豆

難產取效甚難而下死胎胞衣尤為最難惟憐瓜

湯一方素推搯生第一得效後世免膈丸能下生

胎不能下死胎以其無氣運動全賴穩娠之用力

得宜也此即前下血方中蠶爪湯於中除去桂心

加用甘艸阿膠也夫桂心溫散之品子死腹中正

宜加用而反去之必本婦去血過多恐復走血而

不使用非此證之不常用桂也觀此例後方有用

甘艸筒桂雞子蒲黃香豉者與此類同但此用阿

膠專補榮血甘艸專培胃氣彼以蒲桂專行血滯

香豉專主虛煩而方下不言以俟用方者之自悟

耳用葵子阿膠者亦因產婦本弱不勝破血但與

和榮利竅也用真珠榆皮者取其鹹寒降泄能下

死胎胞衣也用醋煮大豆酒煮大豆者總取黑豆

之主傷中淋露也其酒之與醋則有行止之分勿

以尋常食品而忽諸用瞿麥者本經所謂墮

子下血閉也用槐子吞之者蠲權專治土執難產

千金方行義卷下 婦人胎前產後

也用龜土酒服者別錄首治婦人崩中取濕散

積垢也用夫尿飲之者取其能降惡血同氣相召

如磁引鐵也用牛屎塗腹者產寶專主子死腹中

取其穢惡以滌穢惡之滯血也

治妊娠得病須去胎方

以雞子一枚鹽三指撮和服立下 此與脫河南

又方

麥芽一升為末蜜和一升服之立下

又方

七月七日神麴二升酢一升煮兩沸宿不食平

且頓服之卽下

又方

大麥麴五升酒一斗煮三沸去滓分五服令盡

當宿勿食其子如糜令母肥盛無疾苦

衍義母氣子氣兩相爲命此以母病去胎是必勢難兩

保姑取混沌未分之氣加以醜潤輔之猶木之將

萎畧得微風絲雨其實卽墮也若胎氣有力雖毒

藥屢攻尚且牢不可動况雞卵食鹽尋常食品可

下乎其用麥芽用神麴用麥麴用蜜調用酢煮用

酒煎雖緩急輕重不侔而伐胃耗氣則一其酒煎

千金方衍義卷三

表

掃葉山房

麥麴不特下胎并能絕孕然必母氣素充故能勝

任而服之反能肥盛無疾稍涉虛羸恐難輕試

逆生第七論一首方十四首

論曰凡產難或兒橫生側生或手足先出可以針錐

刺兒手足入一二分許兒得痛驚轉卽縮白當迴順

也

治逆生方

以鹽塗兒足底又可急爪搔之并以鹽摩產婦

腹上卽愈

又方

以鹽和粉塗兒足下卽順子母秘錄云鹽和胡粉

又方

取梁上塵如彈丸許二枚治未三指撮溫酒服

之

治逆生及橫生不出手足先見者方

燒蛇蛻皮爲末服一刀圭亦云撮面回東酒服卽

順

又方

取蟬蛻二枚治爲末三指撮許溫酒服之崔氏

子母秘錄作彈丸二枚爲末酒服

千金方衍義卷三

李

掃葉山房

又方

取夫陰毛二七莖燒以猪膏和丸如大豆吞之

兒手卽持丸出神驗

又方

取蛇蛻皮燒灰猪膏和丸向東服

又方

以手中指取釜底墨交畫兒足下卽便順生

又方

取父名書兒足下卽順生

治橫生及足先出者方

取梁上塵竈突墨酒服之

又方

取車轄中脂書兒足下及掌中

治縱橫生不可出者方

兔絲子末酒若米汁服方寸匕師生車前亦好

服如上法

又方

以水苦酒服竈突墨塵

治產時子但趨穀道方

熬鹽熨之自止

千金方衍義卷十

全

攝葉山房

子不順下皆緣母氣之逆雖有方藥遽難爲力所

以千金僅取丹方以祈專力如用蛇蛻蠅殼者取

其類脫之速也用竈突墨梁上塵者取其能辟垢

穢破積血也用兔絲者取其能續傷故千金聖惠

專治橫生其補腎肝利水道與車前不殊也以鹽

塗兒足底者欲令縮入轉而順下也以車轄脂書

兒足掌者取其滑澤易於轉下也以鹽包熱熨母

穀道者欲令避熱而趨正道也蓋鹽性順下故產

逆恒用之

胞胎不出第八

方二十二首

牛膝湯 治產兒胞衣不出令胞爛方

牛膝

瞿麥 各一兩

當歸

通艸 各一兩

滑石 二兩 桂心 二兩 葵子 八兩

右六味咬咀以水九升煮取三升分三服

治產難胞衣不出橫倒者及兒死腹中母氣欲絕

方

半夏

白斂 各二兩

右二味治下篩服方寸匕產難一服橫生二服倒

生三服兒死四服亦可加代赭瞿麥各二兩爲佳

治胎死腹中若母病欲下之方

千金方衍義卷十

全

攝葉山房

取榆白皮細切煮汁三升服之卽下難生者亦

佳

又方

生地汁一升苦酒三合令暖服之不能頓服分

再服亦得

又方

牛膝 三兩

葵子 一升

右二味以水七升煮取三升分三服

又方

澤蘭葉 三兩

滑石 五合

生藤油 二合

右三味以水一升半煮澤蘭取七合去滓內滑石
蘇油頓服之

治胞衣不出方

取小麥合小豆煮令濃飲其汁立出亦治橫逆
生者

又方

瓜蒌二七放服之立出良

又方

取水煮弓弩弦飲五合卽出亦可燒灰酒服

又方

取宅中所埋柱擗出取坎底當柱下土如鷄子

大酒和服之良

又方

墨三寸爲末酒服

又方

取蒲黃如棗許以井花水服

又方

苦酒服真珠一兩

又方

鷄子一枚苦酒一合和飲之

治逆生胎不出方

竈上墨以酒煮一兩沸取汁飲之

治產後胞不得出方

井底土如鷄子中黃以井花水利服立出

治子死腹中若衣不出欲上捨心方

急取蟻蛭土三升熬令熱囊盛焚心下令胎不

得上捨心良

又方

末竈突中墨三指撮許以水苦酒調服立出當

著兒頭生

又方

取夫內衣蓋井上立出

又方

取炊礮當戶前燒服之

得

下胞衣較之下死胎愈難爲力縱儘力用藥助效

良難如牛膝湯爲下胞衣之專藥所謂諸味一皆

淡滲利竅之品既服之後關竅稍開急須乘機速

取或合嚼髮取嘔或與搗鼻取嚏以助藥勢轉危

就安在乎一瞬矢此機宜關竅緊閉雖有神丹將

何惜指其次則用半夏白斂二味以半夏辛潤能

行濕而通大便利竅而泄小便別錄言其墮胎其
 祛逐穢惡之性可知白敏世隸外科而本經主女
 子陰中腫痛帶下赤白則下氣散血之功亦是不
 凡而肥盛多痰之母尤為合轍加代精瞿麥者用
 以鎮攝逆氣而利關竅也用榆皮用牛膝葵子用
 澤蘭滑石蘇油咸取滑澤利竅而各司其用也用
 瓜瓣者取其能散結聚破膿血不特治腸壅之用
 也其鷄子苦酒及苦酒真珠二方與前子死腹中
 同榆白皮用不殊但彼用榆皮以利阻滯之竅此
 用苦酒以收耗散之神稍為異治耳用小麥小豆
 者取小豆之利竅小麥主漏血并令女人易孕也
 用蒲黃者取其能散血而胞衣亦得易下也用地
 黃汁者取其能散血室之熱也用井底泥者取其
 能下腹中之熱也用弓弩弦者取其迅發之疾也
 用蟻蛭土者取其善穴而運動不息故千金藏器
 皆用以榆心下合胎不上捨心也已上諸治雖皆
 得驗成方然間有寒滑傷脾難以槩施如井泥蘇
 油之類皆是西北治例故欲用其方須詳方宜水
 工要在臨病之審辨耳
 下乳第九方二十一首

千金方衍義卷二

補藥山房

鐘乳湯 治婦人乳無汁方

石鐘乳

消石滑石一用

白石脂各六兩

通艸十二

桔梗半兩

右五味咬咀以水五升煮三沸三上三下去滓內

消石令烱分服

又方

石鐘乳

通艸各等

右二味為末粥飲服方寸七日三後可兼養兩兒

通艸橫心者是勿取
羊桃根色黃無益

一方二味酒五升漬一宿

明日煮沸去滓服一升日三夏冷服冬溫服

千金方衍義卷三

補藥山房

又方

石鐘乳四兩

甘艸二兩一

漏蘆三兩

通艸

括蕒根各五兩

右五味咬咀以水一斗煮取三升分三服一云用
括蕒根

一枚

又方

石鐘乳

通艸各一兩

漏蘆半兩

桂心

甘艸

括蕒根各六兩

右六味治下篩酒服方寸七日三最驗

又方

石鐘乳

漏蘆各二

右二味治下篩飲服方寸七卽下

漏蘆湯 治同前

漏蘆

通艸各二

石鐘乳一兩

黍米一升

右四味咬咀米宿漬搗取汁三升煮藥三沸去滓作飲飲之日三

漏蘆散 治同前

漏蘆 半兩

石鐘乳

括萋根各一

蟾蜍 三枚

千金方衍義卷

全

括萋山房

右四味治下篩先食糖水服方寸七日三

單行石膏湯 治同前

石膏四兩研細以水二升煮三沸稍服一日

合盡

麥門冬散 治同前

麥冬

通艸

理石

石鐘乳

右四味各等分治下篩先食酒服方寸七日三

又方

麥冬

通艸

理石

石鐘乳

土瓜根

大棗

右七味等分治下篩食畢用酒服方寸七日三

又方

母猪蹄一具麤切以水二斗熟煮得五六升汁飲之不出更作

又方

猪蹄

二枚熟

通艸八兩

右二味以酒一斗浸之稍稍飲盡不出更作

不炙以水一斗煮取四升入酒四升更煮飲之

千金方衍義卷

全

括萋山房

又方

括萋根切一升酒四升煮三沸去滓分三服

又方

括萋根

漏蘆各三

石鐘乳四兩

白頭翁一兩

滑石

通艸各二

右六味治下篩以酒服方寸七日三

又方

取括萋子尚青色大者一枚熟搗以白酒一斗煮四升去滓溫服一升日三黃色小者用二枚

亦好

又方

土瓜根治下篩服半錢七日三乳如流水

單行鬼箭湯 治同前

鬼箭五兩以水六升煮取四升每服八合日三

亦可燒作灰水服方寸七日

甘艸散 治同前

甘艸一兩

連艸三十

石鐘乳二十

雲母二兩

犀上散艸一把燒

右五味治下篩先食漏蘆湯服方寸七日三乳下

止

千金方衍義卷二

全

指葉山房

又方

燒死鼠作屑酒服方寸七日三立下勿令知

又方

燒鯉魚頭為末酒服三指撮

鯉魚湯 下乳汁方

鯉魚一尾長七寸

豬芻半斤

漏蘆

石鐘乳各八兩

右四味以清酒一斗二升合煮魚藥成絞去滓

適寒溫分五服其間相去須臾一飲令藥力相及

為佳乳即下

術既產而乳汁不通非緣肺胃之虛寒則為經絡之

熱阻虛則鐘乳為下乳汁之專藥以其中空如管

能利九竅也而消石石脂雲母皆鐘乳之佐耳熱

則石膏為通乳之專藥以其肌理鬆脆能通肺胃

之熱也而理石滑石亦石膏之亞耳寒熱糾結非

鐘乳與理石並用不能使之即通務在隨其偏勝

而調適之斯無不當矣漏蘆連艸清熱利竅之專

藥括蘆土瓜根開痰化熱之專藥豬蹄鯉魚滋養

氣血之專藥鯉魚頭燒鼠灰利水通津之專藥桂

心蟾蜍白頭翁鬼箭溫血破血之專藥麥冬桔梗

千金方衍義卷二

全

指葉山房

甘艸黍米輔佐之流調和諸藥亦不可缺合諸方

諸味而統論之雖有沉寒客熱痰氣血瘀之不同

總不越開關利竅一法於此推諸方之用豈特聞

一知十而已哉

孫真人千金方衍義卷二終

長洲張

璐路

南沙席世臣

婦人方中凡

虛損第十

論曰婦人非止臨產須於產後大須將慎危為之至其在於斯勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時微若秋毫感病廣於當時何則產後之病難治於餘病也婦人產訖五藏虛羸惟得將補不可轉瀉若其有病不須駛藥若行駛藥轉更增虛就中更

千金方衍義卷三

二

虛向生路遠所以產後百日以來極須慇懃愛畏勿縱心犯觸及即便行房若有所犯必身反強直猶如角弓反張名曰蓐風則是其犯候也若似角弓命同轉燭凡百女人宜好思之苟或有微不慎戲笑作病一朝困臥控告無所縱多出財寶遍處求醫醫者未必解此縱得醫來大命已去何處追尋學者於此一方大須精熟不可同於常方耳特忌上廁便利宜室中益上佳凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百病滋長慎之

凡婦人皆患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也凡產後七日內惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在此例候三兩日消息可服澤蘭丸比至滿月丸盡為佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭丸凡在蓐須服澤蘭丸補之服法必七日外不得早服也

凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百病競起迄至於老百方治不能瘥桃仁煎主之出蓐後服之婦人縱合無病每至秋冬須服一兩劑以至年內將常服之佳

千金方衍義卷三

二

四順理中圓 產訖可服此方

甘艸

人參

白朮

乾薑

兩

右四味為末蜜和丸如梧子大服十九丸稍增至二十九丸新生藏虛所以養藏氣也

義理中加以四順之術以太陰手足自溫雖有虛寒祇宜理中溫之非少陰四逆之比產後諸虛必先溫養脾氣脾氣健運則飲食有常氣血無滯何憚瘀垢之不順趨而下哉

桃仁煎

治婦人產後百疾諸氣補益悅澤方

桃仁一千二百枚搗令細熟以上好酒一斗五升研濾三四遍如作麥粥法以極細為佳內長項瓷瓶中蜜塞以麩封之內湯中煮一伏時不停火亦勿令火猛使瓶口常出在湯上無令沉沒孰訖出溫酒服一合日再雖丈夫亦可服也

行桃仁雖能逐瘀然隨烏藥莪茂則專於破血隨芎歸芍藥則相胥和血若單用一味破之與和惟在多用少用之間兼之以酒為產後和血勝藥但所稟柔脆坐艸無傷無所雷滯者不在此例

石斛地黃煎 治婦人虛羸短氣胸逆滿悶風氣

方

千金方衍義卷三

玉鳳樓

石斛

甘艸

紫苑各四兩

桃仁半升

桂心二兩

大黃八兩

麥門冬一升

茯苓一升

生地黄汁

醇酒各八升

右十味為末於銅器中炭火上熬內鹿角膠一斤耗得一半次內飴三斤白蜜三升和調更於銅器中釜上煎微耗以生竹瀝無令著耗令相得藥成先食酒服如彈子一九日三不知稍加至二九一方用人參三兩

衍虛羸短氣而用地黃門冬舉世之通套用桂心大黃近世所未聞須知地黃門冬得桂心則滋而不

滯桂心得大黃則宣而遂通鹿角膠醇酒飴糖白蜜等溫養精血之味咸得辛溫敷布之力羣行補劑之中雖有一味大黃祇能行滯斷無泄瀉之理辟如列坐皆端直即有一匪人亦必隨之而向化矣

地黃羊脂煎 治婦人產後欲令肥白飲食平調

方

千金方衍義卷三

玉鳳樓

生地黄汁一升

生薑汁

羊脂二斤

白蜜各五升

右四味先煎地黃令得五升次內羊脂令煎減半內薑汁復煎令減合蜜著銅器中煎如飴取鷄子大一枚投熟酒中服日三

衍地黃純陰滋膩能治傷中淋露羊脂性溫益津能固腸胃虛脫蜂蜜解毒和中能除心腹邪氣以產

母素稟燥熱故聚潤劑以滋之薑汁辛散專行三味之膩也

地黃酒 治產後百病未產前一月當預釀之產

訖葶中服之方

地黃汁一升 好麴 好米各二升

右三味先以地黃汁漬麴令發進家法醞之至熟

封七日取清服之常使酒氣相接勿令斷絕慎禁

生冷酢滑猪雞魚一切婦人皆須忌之但夏三月

熱不可合春秋冬得合服地黃并滓內米中炊

合用之一石十石一滓此一升為率先服羊肉當

歸湯三劑乃服之佳

行地黃寒滯得麴發之滋養血虛之良法不當以

藥例之

羊肉湯 治產後虛羸喘乏自汗出腹中絞痛方

去毒符 養三 桂心

肥羊肉 三斤 當歸 魏氏用 桂心

甘艸 各一兩 芍藥 三兩 子母祿

芍藥 子母祿 生薑 各四兩 乾地黃 五兩

右八味咬咀以水一斗半先煮肉取七升去肉內

餘藥煮取三升去滓分三服不瘥重作方有葱

行金匱當歸生薑羊肉湯為產後腹中疝痛之聖藥

即寒疝小腹結痛亦得用之況合四物以調其血

加桂以通其滯用甘艸者以緩薑桂之急也緩急

得宜攻補兼濟非深 入金匱之奧何以及此

猪腎湯 治產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧狀名

鹿勞方

猪腎 去脂剖 香豉 白粳米

葱白 各一兩

右四味以水三斗煮取五升去滓任情服之不瘥

更作方有人參當歸各三兩為六味

行產後百脈皆虛虛風易感每致虛羸喘乏寒熱如

瘧故取葱白香豉湯加猪腎以安其腎粳米以安

其胃并調先後二天即無虛風亦無妨礙金匱施

覆花湯中用葱白末管為風而設

羊肉黃耆湯 治產後虛羸之補益方

去毒符 養三 大棗 三十

羊肉 三斤 黃耆 三兩 大棗 三十

茯苓 甘艸 當歸 乾地黃

桂心 麥門冬

芍藥 各二兩

右十味咬咀以水二斗煮羊肉取一斗去肉內諸

藥煎取二升去滓分三服日三

行前羊肉湯以有腹中絞痛故用黃耆之辛以散之

此無腹中絞痛專宜補虛故用黃耆茯苓門冬大

棗滋養營氣可無藉於辛散也

鹿肉湯 治產後虛羸損補乏方

鹿肉 四斤

乾地黃

甘艸

芎藭

黃耆

芍藥

麥門冬

茯苓 各二兩

人參

當歸

生薑 各一兩

半夏 一升

大棗 二十枚

右十三味咬咀以水二十五升煮肉取一斗三升

去肉內藥煎取五升去滓分四服日三夜一

鹿肉湯合羊肉黃耆湯以鹿易羊更加人參半夏

健運中氣鹿肉填補腎腎詢為產後虛羸勞損之

神丹專於婦人科者急須著眼

千金方衍義卷三

婦科山房

麋骨湯 治產後虛乏五勞七傷虛損不足藏府

冷熱不調方

麋骨 一骨

遠志

黃耆

芍藥

乾薑

防風

茯苓

厚朴 各三兩

當歸

橘皮

甘艸

獨活

芎藭 各二兩

桂心 四兩

生薑 四兩

右十五味咬咀以水三斗煮麋骨取二斗去骨內

藥煎取五升去滓分五服

衍產後虛羸羸宜溫養一切苦寒切不可犯方中桂

心芍藥專和寒熱不調餘皆健脾和營之品惟鹿
骨一味為堅強筋骨克復勞傷之藥情乎世鮮知
用也

當歸芍藥湯 治產後虛損逆害飲食方

當歸 一兩

芍藥

人參

桂心

生薑

乾地黃

甘草 各一兩

大棗 二十枚

右八味咬咀以水七升煮取三升去滓分三服日

三 此以內補建中湯除去膠飴易入人參地黃平調

衍血氣雖有虛羸寒熱無不可治豈特逆知飲食而

千金方衍義卷三

婦科山房

已哉 杏仁湯 治產後虛氣方

杏仁

橘皮

白前

人參 各三兩

蘇葉

半夏 各一升

桂心 四兩

生薑 十兩

麥門冬 二兩

右九味咬咀以水一斗二升煮取三升半去滓分

五服

衍產後浮腫喘乏總屬氣虛風襲之故故效金匱大

半夏湯之法參以蘇杏白前疎風利氣之品又以

衍

衍

桂半性燥以門冬濟之與大橘皮湯用意稍別
 杏耗氣以人參固之較大橘皮湯用意稍別
 治婦人產後上氣黃脈積勞藏氣不足胸中煩躁
 關元以下如懷五千錢狀方

厚朴

桂心

當歸

細辛

芍藥

石膏

桔梗

甘艸

黃芩

澤瀉各二兩

吳茱萸五兩千金
吳作大黃

乾地黄四兩

乾薑一兩

右十三味咬咀以水一斗二升煮取三升去滓分

千金方衍義卷三

九

三服服三劑佳

婦身素有黃脈氣以病不在子藏故仍能受胎受
 胎之後又不慎勞勩產後胸煩上氣逆所不免氣
 既上道惡露不無阻滯所以臍下重墜方用厚朴
 破血中滯氣柱心當歸散臍下積結芍藥地黃除
 血痺寒熱細辛逐竅祛陰邪茱萸乾薑下逆氣通
 痺桔梗閉胸中煩躁石膏甘艸散寒熱逆氣於上
 黃芩澤瀉逐水下血閉於下地黃芍藥得桂心乾
 薑之辛散可無阻血之虞茱萸細辛得石膏黃芩
 之寒化可無助熱之患任執邪固結則當從翼方

退茱萸而進大黃要在是人所稟之偏勝而為調
 適其宜可也

乳蜜湯 治產後七傷虛損少氣不足并腎勞寒
 冷補氣方

牛乳七升惡則用羊乳

白蜜一升半

當歸

人參

獨活各三兩

大棗二十枚

甘草

桂心各二兩

右八味咬咀諸藥以乳蜜中煮取三升去滓分四

服 產後血過多而致腎虛風闕故需參歸桂心溫

千金方衍義卷三

九

養血氣兼取獨活搜風乳蜜潤燥甘艸大棗調和
 脾胃之津氣惟脾虛食少便澀者禁用

五石湯 治產後虛冷七傷時寒熱體痛乏力補
 腎治白病

紫石英

鐘乳

白石英

赤石脂

石膏

茯苓

白朮

桂心

芎藭

甘艸各二兩

薤白六兩

人參一兩

當歸各三兩

生薑八兩

大棗二十枚

右十五味五石並為末前藥各咬咀以水一斗二

升煮取三升六合去滓分六服若中風加葛根獨

活各二兩下痢加龍骨一兩

三石湯 主百病如前方

紫石英

生薑

當歸

人參

甘草各二兩

白石英

鐘乳各二兩半

茯苓

乾地黄

桂心各三兩

半夏五兩

大棗十五枚

右十二味三石為末吹咀諸藥以水一斗五升煮取三升去滓分四服若中風加葛根四兩

產後虛冷多緣臨蓐血氣過傷不但寒熱體痛必

千金方卷之三

然崩脫不止乃致清腸下溜濁陰上逆故用紫白

石與鐘乳石脂固脫參苓木艸益氣芎歸桂心調

血石膏症曰除膈上濁邪生薑大棗和營衛寒熱

與第五卷風門中五石湯皆風引湯之發派三

石湯與五石湯主治如前然必病勢稍輕或元氣

素弱故不用乳朮之相激石脂之固脫石膏之標

進用地黃即五石湯中芎藭之義半夏即薤白之

義方後云中風加葛根與五石湯二方不異

內補黃耆湯 治婦人七傷身體疼痛小腹急滿

面目黃黑不能飲食并諸虛乏不足少氣心悸

不安方

黃耆

當歸

芍藥

乾地黄

半夏各三兩

茯苓

人參

桂心

遠志

麥門冬

甘草

五味子

白朮

澤瀉各二兩

乾薑四兩

大棗三十枚

右十六味吹咀以水一斗煮取三升去滓一服五合日三夜一服

此內補建中合保元四君而易乾薑溫中益氣加

千金方卷之三

地黃療傷中逐血半夏冷胸腹急痛遠志門冬除

心悸不安澤瀉通膀胱氣化五味子收腎藏之津

氣也

吳茱萸湯 治產後虛羸盜汗瀉瀉惡寒方

吳茱萸三兩以清酒三升漬一宿煮如蠶鼻沸

減得二升許半分之頓服一升日再間日再作

服亦治產後腹中疾痛

產後虛羸盜汗良由血氣虛冷濁陰擾亂於中生

陽不能自固所以瀉瀉惡寒當非太陽中風宜和

營衛之比故但取專走厥陰溫中下氣之吳茱萸

借清酒漬煮外充腠理以散在表之陰邪內溫藏
府以固在裏之津液此與桂枝湯治自汗之法迥
平角立

猪膏煎 治產後體虛寒熱自汗出方

猪膏 生二升 白蜜各

清酒 五合

右四味煎合調和五上五下膏成隨意以酒服方
寸七

產後體虛寒熱且自汗多而津液外泄久之大便
澀難所以專取猪膏蜜酒之潤以滋腸胃之枯槁

千金方衍義卷三

此惟脾約便秘者為宜若病人舊有微瀉者禁用

鯉魚湯 治婦人體盈流汗不止或時盜汗方

鯉魚 二斤 葱白 一升

乾薑 桂心 各二兩

右五味咬咀三物以水一斗煮魚取六升去魚內
諸藥微火煮取二升去滓分二服取微汗即愈勿
用生魚

河間云鯉之治水為之利水因其氣相感也鯉專
治水而體豐多汗盜汗用之者以其能散週身濕
熱之氣也更兼香豉專解陰邪葱白專通陽氣乾

薑出汗逐風桂心和營散邪邪散表實無復自汗
盜汗之虞矣

桂枝附子湯 治產後風虛汗出不止小便難四

肢微急難以屈伸者方

桂枝 芍藥 生薑 各三兩

甘草 附子 一枚 大棗 二十枚

右六味咬咀以水七升煮取三升分三服

桂枝湯本風傷衛之專藥小便澀難亦得用之者

以其多汗傷津之故良非太陽犯本之此且見四

肢微急非附子不能利其屈伸原本太陽例中病

證象陽且因加附子參其間增桂合汗出之法總

由腎氣陽虛所致在產後以陽多汗尤為合轍

虛煩第十一 方十一首

薤白湯 治產後胸中煩熱逆氣方

薤白 半夏 甘草

人參 知母 各二兩 石膏 四兩

括蕒根 三兩 麥門冬 半升

右八味咬咀以水一斗三升煮取四升去滓分五

服日三夜二熱甚即加石膏知母各一兩

虛煩懊懣與胸痺所爭一問虛痰痺著而痛則瀉

胸痺虛火擾亂不寧則為虛煩此因痰火交混而煩熱氣逆故借胸痺薤白湯法參入竹葉石膏煎中庶痰之與火各得其平乃治虛煩之變法仍治懊懣之正治也

竹根湯 治產後虛煩方

甘竹根細切一斗五升以水二斗煮取七升去滓內小麥二升大棗三十枚復煮麥熟三四沸內甘艸一兩麥門冬一升湯成去滓服五合不瘥更服取瘥短氣亦服之

義衍 產後虛煩不勝湯藥但以甘竹清胃火小麥斂肝

千金方衍義卷三

氣大棗益脾洋門冬滋肺熱使火無上炎之勢胸無煩擾之患矣用根不用葉者取其降泄直達下焦也

人參當歸湯 治產後煩悶不安方

人參 當歸 麥門冬

乾地黄 桂心 各一兩 大棗 二十枚

梗米 一升 芍藥 四兩 淡竹葉 三升

右九味咬咀以水一斗二升先煮竹葉及米取八升去滓內藥煮取三升去滓分三服若煩悶不安者當取或一升以水三斗煮取一升盡服之甚良

義衍 此以氣血兩虛虛火上炎而煩悶不安故用人參大棗以益氣歸芍地黃以滋血竹葉門冬梗米以除煩用桂心者專攝上炎之火也

甘竹茹湯 治產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹 一升 人參 一兩 茯苓

甘艸 各二兩 黃芩 三兩

右五味咬咀以水六升煮取二升去滓分三服日

三

義衍 產後而見煩熱短氣急宜清補為先方中人參茯苓專補心虛甘艸專益胃氣竹茹黃芩兼清內外

之熱如無外熱黃芩可無用也

千金方衍義卷三

知母湯 治產後乍寒乍熱通身溫壯胸心煩悶方

知母 三兩 芍藥 黃芩 各二兩

桂心 甘艸 各一兩

右五味咬咀以水五升者取二升半分三服

方不用桂心加生地黃

義衍 知母芍藥黃芩統治內外之熱妙用尤在桂心辛散不獨收攝上浮之火且使上三味無過閉之虞

更以甘艸和其寒熱煩悶自除矣

竹葉湯 治產後心中煩悶不解方

生淡竹葉

麥門冬各一升

甘艸二兩

生薑

茯苓各三兩

大棗十四枚

小麥三合

右七味咬咀以水一斗先煮竹葉小麥取八升內

諸藥者取三升去滓分三服若心中虛悸者加入

麥二兩其人食少無穀氣者加粳米五合氣逆者

加平夏二兩

淡竹茹湯 治產後虛煩頭痛短氣欲絕心中悶

亂不解方

千金方衍義卷三

補遺山房

生淡竹茹升

麥門冬

小麥各五合

甘艸一兩

生薑三兩

大棗十四枚

淡六味咬咀以水一斗煮竹茹小麥米八升去滓

內諸藥煮取二升去滓分二服麻人分作三服若

有人參入一兩若無人參內茯苓一兩半亦佳人

參茯苓皆治心煩悶及心虛驚悸安定精神有則

為良無自依方服一劑不瘥更作若氣逆者加半

夏二兩

衍義 產後雖無短氣悶亂亦無妨於補益竹葉竹茹

肺一清胃肺胃本相接壤津氣貫通但以胃熱

上蒸而頭痛即用竹茹肺熱內蘊而煩心則用竹

葉佐以茯苓使之下泄也但虛極必內入參氣逆

而嘔並用半夏二方之功用髣髴可知

赤小豆散 治產後煩悶不能食虛滿方

赤小豆三七枚燒作末以溫水和頓服之良

蒲黃散 治產後煩悶方

蒲黃以東流水和方寸七服極良

赤小豆燒之不特清火兼可消瘀蒲黃生用功專

逐血也

蜀漆湯 治產後虛熱往來心胸煩滿骨節疼痛

千金方衍義卷三

補遺山房

及頭痛壯熱晡時軀甚又如微瘧方

蜀漆葉

桂心

甘艸

黃芩各一兩

黃薑五兩

知母

芍藥各二兩

生地黃一斤

右八味咬咀以水一斗煮取三升分三服治寒熱

不傷人

衍義 草薈中發露得風因而虛熱煩滿晡時軀甚頗有

似乎癰狀故借瘧症門中蜀漆以療之蜀漆性劣

著艸和之茶知性寒桂心散之地黃芍藥專滋血

分之熱也

芍藥湯 治產後虛熱頭痛方

白芍藥

乾地黄

牡蠣各五兩

桂心 三兩

右四味咬咀以水一斗煮取二升半去滓分三服日三此湯不傷損人無毒亦治腹中拘急痛若通身發熱加黃芩二兩

衍產後虛熱虛煩渾是虛火上炎之候芍藥地黃專

清血熱恐其閉拒乃以桂心散之牡蠣能解虛熱

上蒸之頭痛以其鹹降也通身發熱加黃芩以黃

芩為少陽經藥表裏風熱皆得用也

千金方衍義卷三

五

中風第十二

論一首 方三十首

論曰凡產後角弓反張及諸風病不得用毒藥惟宜

單行一兩味亦不得大發汗特忌轉瀉吐利必死無

疑大豆紫湯產後大善

大豆紫湯 治產後百病及中風痺瘓或背強口

噤或但煩熱若渴或頭身皆重或身癢劇者嘔

逆直視此皆因虛風冷濕及勞傷所為方

大豆 五升

清酒 一斗

右二味以鐵鑊猛火熬豆令極熟焦煙出以酒沃

之去滓服一升日夜數服服盡更合小汗則愈一

以去風二則消血結如妊娠傷折胎死在腹中三

日服此酒即瘥

衍黑大豆去風活血更兼酒沃通行經絡產前產後

一切虛風關節不利等證無不宜之宜乎千金首

推也

獨活紫湯 治產後百日中風瘓口噤不開并治

血氣痛勞傷補腎方

獨活 一斤

大豆 五升

舊酒 三升

右三味先以酒漬獨活再宿若急須微火煮之令

減三升去滓別熬大豆極焦使煙出以獨活酒沃

千金方衍義卷三

五

之去豆服一升日三夜二

衍獨活專祛風毒加於大豆紫湯中製其若燥之性

深得剛柔兼濟之妙用終嫌燥血須百日用之

若新產暴虛恐非所宜

小獨活湯 治如前狀方

獨活 半斤

葛根

生薑 各六兩

甘草 二兩

右四味咬咀以水九升煮取三升去滓分四服微

汁佳

衍此純用風藥僅可施於藜霍之人若高粱柔脆諒

不處是方也

甘草湯 治在尊中風背強不得轉動名曰風痙

方

甘草

乾地黄

麥門冬

麻黃

各十兩

括蕒根

芎藭

黃芩

各三兩

杏仁

五升

葛根

半斤

右九味咬咀以水一斗五升酒五升合煮葛根取入升去滓內諸藥煮取三升去滓分再服缺齋不

瘥更合良翼方崔氏有前切三兩

所中風毒最重見證最急不得不以重劑發之略

千金方衍義卷三

三

兼滲血潤燥可也不當以產後新虛而致失治也

獨活湯 治產後中風口噤不能言方

獨活

生薑

各五兩

防風

秦朮

桂心

白朮

甘草

當歸

附子

各三兩

葛根

二兩 防已 一兩

右十一味咬咀以水一斗二升煮取三升去滓分

三服

前甘艸湯治背強不能轉動純見太陽表證故用

麻黃葛根以太陽之經行身後也此治口噤不能

言純見少陰風證故用附子獨活以少陰之脈循

喉嚨也風濕流泊非防已防風桂心白朮無以祛

之兩不移易之定法也

雞糞酒 治產後中風及百病并男子中一切風

神効方

雞糞

一升熬

豆

一升熬合

聲絕勿焦

右二味以清酒三升半先淋雞糞次淋豆取汁一服一升溫服取汗病重者凡四五日服之無不愈

內經用雞矢醴治心腹滿脹此用雞矢醴療產後中風全在黑豆淋酒取汗之力雞屬巽而祛風糞

千金方衍義卷三

三

屬穢而祛惡也

竹葉湯 治產後中風發熱面正赤喘氣頭痛方

淡竹葉

一握

葛根

三兩

防風

二兩

桔梗

甘草

人參

桂心

各一兩

大附子

一枚

生薑

五兩

大棗

十五枚

右十味咬咀以水一斗煮取二升半去滓分三服

日三溫覆使汗出若頑強者用大附子若嘔者

加半夏四兩

產後中風發熱面赤戴陽為患最急急進辛溫散

本之藥庶陽不致上逆風熱不致內攻若慎認陽

明病而合赤色純行解肌不旋踵而告變矣

防風湯 治產後中風背急短氣千金翼在

防風 獨恬 葛根各五兩

當歸 芍藥 人參

甘師 乾薑各二兩

右八味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服日

三

新肖急表實可驗短氣內虛可憑故以人參輔正祛

邪一舉了爾得其平非若虛陽上逆竹葉湯之兩

千金方卷之三 桂 補藥世居

難分解也千金翼作裏急短氣若作裏急恐非防

葛可治也

鹿肉湯 治產後風虛頭痛壯熱百讀邪勝方

鹿肉 三斤 芍藥 獨活

秦艽 黃芩 黃芩

半夏 一升 乾地黃 桂心

芍藥 各二兩 生薑 六兩 甘艸

阿膠 兩 扶芩千金翼 人參各四兩

右十五味咬咀以水二斗煮取一斗二升去滓

內藥前 升去滓內膠令烊分四服日三夜一

後為虛風所襲非峻培氣血助其祛風之力弗

克有濟若疑其有容邪不敢用補而與疎表之劑

則氣隨藥脫雖有九還救無及矣即使用補尚恐

艸木無情不能速為取效故取血肉之味稍兼獨

活秦艽鼓舞參芪之性不但助力祛邪并杜虛風

復入真補中寓瀉之良法也

獨活湯 治產後中風方

獨活 一斤 桂心 二兩 秦艽 五兩

右三味咬咀以酒一斗半漬三日飲五合稍加至

一升不能多飲隨性服

千金方卷之三 桂 補藥世居

行三味漬之以酒流動血脉虛風無復可留矣

大豆湯 治產後卒中風發病倒悶不知人及姪

大豆 五升炒 葛根 獨活各八兩

防已 六兩

右四味咬咀以酒一斗二升煮豆取八升去滓內

藥煮取四升去滓分六服日四夜二

獨活祛風 防已逐濕荷根解肌不得大豆紫湯射

以司血氣之開闔

五石湯 治產後卒中風發疾口噤倒悶吐沫

五石湯

癡眩目不知人及濕痺緩弱身體癱 姪媛百病

方

紫石英三兩 鐘乳 赤石脂

石膏 白石英 牡蠣

人參 黃芩 白朮

甘艸 括蕩根 芍藥

杜心 防己 當歸

乾薑各二兩 獨活三兩 葛根四兩

右十八味末五石咬咀諸藥以水一斗 四升煮取

三升半分五服日三夜二 一方有滑石寒水石

千金方衍義卷三 桂枝湯

各二兩棗二十枚

四石湯 治產後卒中風發疾口噤癰 癡悶滿不

知人并緩急諸風毒痺身體痠強及 扶胎中風

婦人百病方

紫石英 白石英 石膏

赤石脂各三兩 獨活 生薑各六兩

葛根四兩 桂心 芍藥

甘艸 芍藥 黃芩各一兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升半去滓

分五服

行 產後非極虛寒何致卒然口噤五石湯 治論最劇

急需鐘乳白朮相反之性激發二英脂膏薑桂人

參奮力祛厥則防已獨活方克有濟 四石湯治

諸彷彿而水氣不致於傷德者於前方裁去鐘乳

白朮之反對并去人參當歸防已牡蠣括蕩等味

但加芍藥生薑所爭無幾而緩急輕重天淵

小柴胡湯 治婦人在產得風蓋四肢 皆煩熱皆

自發露所為若頭不痛但煩熱而三 物黃芩湯

頭痛與小柴胡湯方

柴胡半斤 黃芩 人參

千金方衍義卷三 桂枝湯

甘艸各三兩 生薑二兩 大棗十二枚

半夏半斤

右七味咬咀以水一斗二升煮取六升 去滓每服

一升日三服

三物黃芩湯方

黃芩 苦參各二兩 乾地 黃四兩

右三味咬咀以水八升煮取二升去滓 適寒溫服

一升日二多吐下蟲

義衍 邪在表裏之間而見煩熱頭痛舍小柴 胡別無良

法若但煩熱而無頭痛知風熱已陷血 分止宜黃

冬清解外內之風熱 苦參搜滌伏貯之濕熱地黃
滋化血中之伏火服後多吐下盡積者以薑棗熟
上脘得苦寒降泄則伏而不動往往隨藥而出也
甘艸湯 治產後腹中傷絕寒熱恍惚狂言見鬼
此病中風內絕蕤氣虛所為方

甘艸 藥各五 羊肉 三斤

通艸 三兩 產實 用當歸

右四味咬咀以水一斗六升煮肉取一斗去肉內

藥煮取三升去滓分五服日三夜一

羊肉湯 治產後中風久絕不產月水不利乍赤

乍白及男子虛勞冷甚方

羊肉 二斤 成 籜大蒜 去皮 香豉 各三升

右三味以水一斗三升煮取五升去滓內酥一升

更煮取三升分溫三服

太陽病服陽且湯惡寒脚攣急服甘艸乾薑湯厥

愈足溫更作芍藥甘艸湯與之其脚即伸產後腹

中疔痛主以當歸生薑羊肉湯此治產後腹中傷

絕寒熱暴病乃獨取羊肉溫補精血芍藥甘艸護

持營氣則傷絕可復寒熱可除用通艸者通達氣

化之用絕也產實易當歸通血室之阻絕也 上

肉湯治風入胞門頃疾故用蔞赤濁惡之藥
肉香豉同煮以蒜能辟除惡氣豉能解散穢腐更
內乳酥之潤引傾厥垢下趨當歸生薑羊肉湯之
變法也

葛根湯 治產後中風口噤瘳痺氣息迫急眩目

困頓并產後諸疾方

葛根 生薑 獨活 四兩

當歸 三兩 甘艸 桂心

茯苓 石膏 人參

白朮 芍藥 防風 各二兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升去滓分

三服日三

產後中風口噤瘳痺 雖用芍防葛獨芍葛愈風之

品不得各桂朮甘四 君子等藥無以逞其功用也

醫之工拙於此可徵

防風酒 治產後中風方

防風 獨活 女萎

桂心 各三 齒 芋 一兩 石斛 五兩

右六味咬咀以酒二斗漬三宿初服一合

三四合日二

治產後中柔風舉體痠痛自汗出者及餘百疾方

獨活 八兩 當歸 四兩

右二味咬咀以酒八升煮取四升去滓分四服日

三夜一取微汗葛氏單用獨活小昂加當歸若上氣者加桂心二兩不瘥更作

木防已膏 治產後中風方

木防已 半斤 茵芋 五兩

右二味咬咀以苦酒九升漬一宿猪膏四升煎三

上三下膏成炙手摩干通瘥

浴湯 治產後中風流腫方

鹽 五升煮 雞毛 一把燒

千金方衍義卷三 完

右二味以水一石煮鹽作湯內雞毛灰著湯中適

冷暖以浴大良又浴婦人陰冷腫痛凡風腫面欲

裂破者以紫湯一服瘥神効紫湯即前大豆紫湯

行產後中風而用獨活茵芋等味柔風而用獨活當

歸瀆酒皆背城決戰之法以圖萬一之倖若生機

未艾者豈別無他法耶至於外用摩膏用浴法不

獲已而為之然不若大豆紫湯之妙用虛實逆從

總無妨礙

治產後中風頭面手臂通滿方

大豆三升以水六升煮取一升半去豆澄澆更

煎取一升內白朮八兩附子獨活各三兩生薑

八兩添水一斗煎取五升內好酒五升合煎取

五升去滓分五服日三夜一開粥頻服三劑

此以木附湯加獨活生薑八大豆紫湯中非但治

方下諸病即頭風偏正皆得瘥之

茯神湯 治產後忽苦心中衝悸或志意不定恍

恍惚惚言語錯謬心虛所致方

茯神 人參 茯苓

芍藥 甘艸 當歸

桂心 各一 生薑 八兩 大棗 三十

千金方衍義卷三 完

右九味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服日

二夜一良

遠志湯 治產後忽苦心中衝悸不定志意不安

言語錯誤惚惚憤憤情不自覺方

遠志 麥門冬 人參

甘艸 當歸 桂心 各二

芍藥 一兩 茯苓 五兩 生薑 六兩

大棗 二十枚

右十味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服日

三羸者分四服產後得此正是心虛所致無當歸

用芎藭若其人心胸逆氣加半夏三兩

茯苓湯 治產後暴苦心悸不定言語錯謬恍惚

惚惚心中憤憤此皆心虛所致方

茯苓 日艸 芍藥

桂心 當歸各二 生薑六兩

麥門冬一升 大棗三十

右八味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服日

三無當歸可用芎藭若苦心志不定加人參二兩

亦可內遠志二兩若苦煩悶短氣加生竹葉一升

先以水一斗三升煮竹葉取一斗內藥若有微風

千金方衍義卷三 婦人病

加獨活三兩麻黃二兩桂心二兩用水一斗五升

若頸項苦急背膊強者加獨活葛根各三兩麻黃

桂心各二兩生薑八兩用水一斗半

安心湯 治產後心衝悸不定恍惚惚不自知

覺言語錯誤虛煩短氣志意不定此是心虛所

致方

遠志 甘艸各二 人參

茯苓 附子 芍藥各三

麥門冬一升 大棗 右八味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服日

三苦若虛煩短氣者加淡竹葉二升水一斗二升

者竹葉取一斗內藥若胸中少氣者加甘艸為三

兩善

金匱有云產後常服建中數劑則諸病不生千金

加當歸一味名曰內補當歸建中湯無問有邪無

邪皆可用之以其專力和營也四方皆出內補當

歸建中 加參苓茯神 加參苓冬志 加茯苓

門冬 加參神冬志而不用桂心生薑總主心虛

衝悸恍惚錯謬但虛甚必加人參無參多加茯苓

志亂則加遠志神傷須用茯神去桂心生薑者以

千金方衍義卷三 婦人病

神氣內耗恐其辛散走津液也觀方下有云無當

歸用芎藭及後甘艸丸方後云若無澤瀉白朮代

之則茯神遠志雖有心腎之分却無上下異治也

甘艸圓 治產後心虛不足虛悸心神不安吸吸

乏氣或若恍惚惚不自知覺者方

甘艸 遠志 萹蒲各三

人參 麥門冬 乾薑

茯苓各二 澤瀉 桂心各一

大棗 右十味為末蜜和丸如大豆酒服二十九日四五

服夜再服不知稍加若無澤瀉以白朮代之若胸中冷增乾薑

人參圓 治產後大虛心悸志意不安不自覺恍惚恐畏夜不得眠虛煩少氣方

人參 甘草 茯苓各三
麥門冬 菖蒲 澤瀉

薯蕷 乾薑各二 桂心 一兩
大棗 五十枚

右十味為末以蜜棗膏和丸如梧子未食酒服二十九日三夜一不知稍增若有遠志內二兩佳者

風氣加當歸獨活各三兩亦治男子虛損心悸

大遠志圓 治產後心虛不足心下驚悸志意不安恍惚惚腹中拘急痛夜臥不安胸中吸

少氣內補傷損益氣安定心神亦治虛損方
遠志 甘艸 乾地黄

桂心 茯苓 麥門冬
人參 當歸 白朮

澤瀉 獨活 菖蒲各三
薯蕷 阿膠各二 乾薑 四兩

右十五味為末蜜和丸如大豆未食溫酒服三十

九日主不知稍增至五十九丸若大虛身體冷少津液加鐘乳三兩為善

衍千金用參苓補虛多兼薑桂化熱多兼門冬不獨甘艸丸為然菖蒲遠志引領諸味歸心澤瀉淡滲

專導虛熱下泄其人參丸即於甘艸丸中退遠志而進薯蕷方下所言有遠志加二兩若風氣加當歸獨活即是遠志丸範子歸地膠朮功倍棗膏至

於太虛身體冷加鐘乳以對白朮功力未可限量心腹痛第十三方二十六首

蜀椒湯 治產後心痛此大寒冷所為方

蜀椒 二合 芍藥 當歸
半夏 甘艸 桂心

人參 茯苓各二 蜜 一斤
生薑汁 五合

右十味咬咀以水九升煮椒令沸然後內諸藥煮取二升半去滓內薑汁及蜜煎取三升一服五合

漸加至六合禁勿冷食

衍產後心腹諸痛總宜溫理血氣內補當歸建中功專和營解邪產後恒宜服之此以木氣虛寒故於

本方加入蜀椒人參茯苓半夏溫散胃家痰氣生

薑用汁取其迅速密代飴漿不獨安中兼滋佳心
半夏之燥也

大巖蜜湯 治產後心痛方

乾地黃 當歸 獨活

甘艸 芍藥 桂心

細辛 小草各一 吳茱萸一升

乾薑 三兩

右十味咬咀以水九升煮取三升內蜜五合重者

分三服日三 胡治不用獨活桂心
小草千金翼不用薑

此亦出之建中前以胃氣虛冷故用椒半參茶此

千金方衍義卷三 薑 獨活山湯

以胃寒血燥亦於建中除去飴漿而易蜂蜜不用

薑汁而用乾薑取其方專守中加吳茱萸溫中下

氣止痛細辛治咳逆利九竅乾地黃補益安中指

本經主治也 詳後二十六卷賊風門中大巖蜜

湯無蜂蜜獨活小章多半脂梔子扶苓小巖蜜較

大巖蜜無梔子扶苓多大黃雄黃總取羊脂祛風

潤燥實脾和營代此方中蜂蜜以和薑莢辛桂之

烈也

乾地黃湯 治產後兩脅滿痛兼治百病方

乾地黃 芍藥各三 當歸

蒲黃各二 生薑 五兩 桂心 六兩

甘艸 一兩 大棗 二十

右八味咬咀以水一斗煮取一升半去滓分三服

日三

產後雖兩脅滿痛而無寒熱往來知非少陽家邪

仍須內補建中加地黃輔佐歸芍和營加蒲黃輔

佐桂心散血以肝血不能循經輸運而流入小腸

部分故專散血為主

芍藥湯 治產後苦少腹痛方

芍藥 六兩 桂心 生薑 各二

千金方衍義卷三 薑 獨活山湯

甘艸 二兩 膠飴 八兩 大棗 二十

右六味咬咀水七升煮取四升去滓內飴合烱分

三服日三

腹痛而用建中南陽先聖治例千金產後施治亦

不出此

當歸湯 治婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞

痛方

當歸 芍藥 各二兩 羊子母

生薑 五兩 羊肉 一斤

右四味咬咀以水八升煮羊肉熟取汁煎藥得三

并遠寒濕服七合日三金匱要略云胡治不用芍藥名小羊肉湯

金匱治腹中疝痛用當歸生薑羊肉湯辛溫散結

其痛立愈凡少腹疝痛用桂心等藥不應者用之

輒効芍藥酸寒爲產後禁藥千金獨取以加入此

湯深得辛甘相配散中寓收之妙用原從建中悟

出胡治未達此義

桃仁芍藥湯 治產後腹中疾痛方

桃仁 半升 芍藥 芎藭

當歸 乾漆 杜心

甘艸 各一兩

千金要方卷三

右七味咬咀以水八升煮取三升分三服

產後惡露不行而痛雖非建中所宜然亦不能捨

此於中除去薑棗加入桃仁芎藭乾漆專攻瘀積

使無留結之患倘傷殘之餘雖勝峻攻者饒鯉燕

蟲代用亦無不可

羊肉湯 治產後及傷寒大虛上氣腹痛兼微風

方

肥羊肉 二斤無羊肉代 茯苓

黃耆 乾薑 各三兩 甘艸

獨活 桂心 人參 各二兩

夜門冬 七合 生地黃 土兩 大棗 十二枚

右十一味咬咀以水二斗者肉取一斗去肉內藥

煮取二升半分四服日三夜一千金翼無乾薑

羊肉當歸湯 治產後腹中心下切痛不能食後

來寒熱中風之氣力方

羊肉 三斤 當歸 黃芩 肝後用

苦藟 防風 用後用 甘艸 各二兩

芍藥 三兩 生薑 四兩

右八味咬咀以水一斗二升先煮肉減半內餘藥

取三升去滓分三服日三如治以黃耆代黃芩白

千金要方卷三

子母秘錄以桂心代防風加大棗十七枚良

羊肉杜仲湯 治產後腰痛欬喘方

羊肉 四斤 杜仲 紫苑

當歸 白朮 桂心 各三兩

五味子 細辛 欬冬花

人參 厚朴 芎藭

附子 葶藶 甘艸

黃耆 各二兩 生薑 八兩 大棗 三十枚

右十八味咬咀以水一斗半煮肉取汁一斗五升

去肉內藥取三升半去滓分五服日三夜二

羊肉生地黃湯 治產後三日腹痛補中益氣強

力消血方

羊肉 三斤 生地黃 切二 桂心

當歸 廿兩 芍藥 三兩

人參 各二

右八味咬咀以水二斗煮肉取一斗去肉內藥煎

取三升分四服日三夜一

羊肉湯治產後大虛雖有客邪若行表散元氣立

脫故需羊肉氣血之屬者保元輩急固本元略取

獨活一味專主下陷之邪并佐乾薑桂心調和血

天方衍義卷三

藥

獨活

氣之品深得養正祛邪之妙用也 羊肉當歸湯

以有寒熱往來雖無腹中絞痛亦須當歸生薑羊

肉溫補散邪芍藥芍藥護持營血防風黃芩雖散

表熱實通血閉用後不用防風黃芩而用人參黃

耆胡洽以黃耆代黃芩白朮代芍藥于母祕錄以

桂心代防風並可為法 羊肉杜仲湯專主產後

大虛寒濕痺著而腰痛虛風內襲而哮喘故合香

而用參附當歸附木附桂附薑附兼附子理中湯甘

艸附子湯等方之製峻用辛溫以開下著之痺細

辛甘艸以散上浮之咳薑桂辛散五味收之苦木

氣運厚和泄之葶藶杜仲濕者腰痛之響導紫苑

秋冬風淫喘咳之專司種種主治仍藉當歸生薑

羊肉湯鼓舞之力 羊肉生地黃湯以治新產腹

痛乃兼取當歸生薑羊肉湯內補當歸建中湯二

方除去當歸膠加入人參芍地平調血氣桂心

行竹鞭之寒滯人參助羊肉之滋益也

內補當歸建中湯 治產後虛羸不足腹中痠痛

不甘吸吸少氣或苦小腹拘急痛引腰背不能

飲食產後一月日得服四五劑為善合人力壯

方

天方衍義卷三

藥

獨活

當歸 四兩

芍藥 五兩

甘艸 二兩

生薑 六兩

桂心 二兩

大棗 十八枚

右六味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服一

日合盡若大虛內餽糖六兩作湯成內之於火上

煖令餽消若無生薑則以乾薑三兩代之若其人

去血過多崩傷內竭不止加地黃六兩阿膠二兩

合八兩作湯或去滓內阿膠若無當歸以芍藥代

之

內補芍藥湯 治婦人產後虛羸及崩傷過多虛

弱腹中絞痛方

芍藥

地黃各四兩

芍藥五兩

桂心二兩

甘艸

乾薑各三兩

大棗四十枚

右七味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三

服日三不瘥復作至三劑若有寒苦微下加附子

三兩治婦人虛羸少氣傷絕腹中拘急痛崩傷胎

湯而目無色及嘔吐血甚良

大補中當歸湯 治產後虛損不足腹中拘急或

溺血少腹苦痛或從高墮下犯內及金瘡血多

內傷男子亦宜服之方

當歸

續斷

桂心

芍藥

乾薑

麥門冬各三兩

芍藥四兩

吳茱萸一升

乾地黃六兩

甘艸

白芷各二兩

大棗四十枚

右十二味㕮咀以酒一斗漬藥一宿明日以水

斗合煮取五升去滓分五服日三夜二加黃耆二

兩益佳

衍義南陽用小建中治傷寒陽脈濇陰脈弦腹中急痛

及尺中脈遲營氣不足之證金匱加黃耆治虛勞

裏急諸不足用法奇矣千金於小建中加當歸謂

之內補當歸建中湯變化尤奇而於產後隨證加

減無所不宜南陽從容邪內犯起見故用桂枝于

金從肝血內滯起見且西北風氣剛勁桂枝力薄

不能透達表邪故咸用桂心然古方中多有但一

桂字者則當隨內外見證而為取用 其內補芍

藥湯即是內補當歸建中方後加減以崩傷去血

過多虛弱腹中絞痛非芍藥地黃胡能急救脫心

地黃賦屬乾薑發之乾薑專守生薑專散進彼退

此非無深意存焉既有烏地之滋益棗飴可無用

也 大補中當歸湯合前兩方諸味更加吳茱萸

以佐乾薑麥門冬以佐地黃續斷以佐芍藥白芷

以佐桂芍也用酒漬者專行和血止痛也

桂心酒 治產後小腹痛及卒心腹痛方

桂心三兩以酒三升煮取二升去滓分三服日

三

牛膝酒 治產後腹中苦痛方

生牛膝根五兩以酒五升煮取二升分二服若

用乾薑牛膝根以酒漬一宿然後可煮

治產後腹中如弦常堅痛無聊賴方

當歸末二方寸七內蜜一升煎適寒溫頓服

經桂心散寒結牛膠導熱結並宜酒煮以行其勢

歸和血又宜蜜煎使緩行其性故無藉于酒煎也

吳茱萸湯 治婦人先有寒冷胸滿痛或心腹刺

痛或嘔吐食少或腫或寒或下痢氣自痛微欲

趁產後益劇皆主之方

吳茱萸二兩 防風

桔梗

乾薑

甘艸

細辛

當歸各十

乾地黃十八

右八味咬咀以水四升煮取一升半去滓分再服

行 先有寒助非暴受之寒也胸滿痛而且嘔吐食少

千金方衍卷三

聖

或浮腫或下痢一切都是裏證故用薑黃細辛以

溫其胃當歸地黃以滋其血防風桂心以拓其氣

即在後益劇亦不出此

蒲黃湯 治產後餘疾胸中少氣腹痛頭疼餘血

未盡除腹中脹滿欲死方

蒲黃 生地黃

生薑各五

芍藥

桂心各一

砒石二兩

桃仁二十

大棗十五

右八味咬咀以水九升煮取二升半去滓內砒石

分三服日三良

產後餘血未淨而腹脹滿痛為證最急泄瀉

吃緊蒲黃散血更須砒石佐之則 桃仁等味

方得振迅掃之威耳

敗醬湯 治產後疼痛引腰腹中 桂心所刺方

敗醬三兩

桂心

芍藥各一

當歸一兩

石四味咬咀以清酒二升水四升微火煮取二升

去滓適寒溫服七合 日三食前服之千金別用

行 產後疹塊引痛如錐須防凝結成癰故借金匱意

苡敗醬附子散之法於中除去附子之煖發進以

千金方衍卷三

聖

芍藥之柔和可無癰成之患矣

芍藥湯 治產後腹痛方

芍藥

甘艸各二

蒲黃

女戚各兩

芍藥

大黃各三

當歸十八

桂心

桃仁

黃芩作金翼

前胡各一

生地黃一升

右十二味咬咀以水一斗酒三升合煮取三升去

滓分四服日三夜一

行 飲即前蒲黃湯之變法 彼用砒石再滌瘀結此用大

黃兼清畜熱

獨活湯 治產後腹痛引腰背拘急痛方

獨活

當歸

桂心

芍藥

生薑各三兩

甘草二兩

大棗二十枚

右七味以咀以水八升煮取三升去滓分三服

後相去如人行十里久再進

於內補當歸建中除去膠飴之滯膩特進獨活以

散風氣血結也

芍藥黃耆湯 治產後心腹痛方

芍藥

黃耆

白芍

千金方衍義卷三

桂心

生薑

參

芎藭

當歸

乾地黄

甘草各二兩

茯苓三兩

大棗十枚

右十二味以咀以酒水合五升合煮取三升去滓

先食服一升日二服千金翼無人參當歸芍

此以血氣虧損而致心腹疼痛故用保元合內補

當歸建中之製更加芎地以滋衝脉之虛苓芷以

散子戶之風也

治產後腹脹痛不可忍者方

煮黍粘根為飲一服即愈

義黍粘于通行十二經其根下行散血故單取用之

治婦人心痛方

布裏鹽如彈丸燒作灰酒服愈

鹽能降泄燒之以灰取同氣以導陰火用酒服之

更能和血

又方

燒秤錘投酒中服亦佳

義燒鐵漬酒專取下氣

又方

炒大豆投酒中服佳

千金方衍義卷三

義大豆紫湯疎風潤燥滋腎和營無所不宜

惡露第十四方二十八首

乾地黄湯

治產後惡露不盡除諸疾補不足方

乾地黄三兩

芎藭

桂心

黃耆

當歸各二兩

人參

防風

茯苓

細辛

芍藥

甘草各二兩

日再夜一

右十一味以水一斗煮取三升去滓分三服

義產後惡露未盡勢在必攻而攻之之法不但誤人

虛實且有稟質偏勝之不同或兼挾何邪而致病
豈一破血之法可槩治乎此方以保元四物兼補

氣血佐細辛防風以行保元之力桂心茯苓以行
四物之滯滯通而惡露自行本虛挾血之良法也

桃仁湯 治產後往來寒熱惡露不盡方

桃仁 五兩

吳茱萸 二升

黃芩

當歸

芍藥 各三兩

生薑

配制百鍊

柴胡 各八兩

右八味咬咀以酒一斗水二升合煮取三升去滓

適寒溫先食服一升日三

千金方衍義卷三

婦科山脈

殺術 此因惡露不通而見往來寒熱故用桃仁芍藥散

血即兼黃耆當歸補血柴胡吳茱萸生薑專為寒

熱而設吳茱萸散內痺之血柴胡生薑開外鬱之

氣用配制者專通血結產後癰約之散若大便不

固殊非所宜觀後柴胡湯可知

澤蘭湯 治產後惡露不盡腹痛不除小腹急痛

痛引腰背少氣方

澤蘭

當歸

生薑

生地黃 各三兩

甘艸 一兩

芍藥 一兩

大棗 十枚

右七味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服日
三隨身欲死服亦瘥

義衍 澤蘭為產後去宿新生要藥與丹參功用不殊濟

以地黃歸芍調血之品和以甘艸薑棗辛散之味

不獨惡露可通即小產去血過多亦能療之總藉

去宿生新之力

甘艸湯 治產乳餘血不盡逆捨心胸手足逆脊

唇乾腹脹短氣方

甘草

芍藥

桂心

阿膠 各三兩

大黃 四兩

千金方衍義卷三

婦科山脈

右五味咬咀以東流水一斗煮取三升去滓內膠

合炸分三服一服入腹中面即有顏色一日一夜

盡此三升即下腹中惡血一二升立瘥當養之如

新產者

義衍 四味溫血藥中特進大黃一味以破逆上之血大

黃雖苦寒得桂心之辛散功塌自不尋常一服入

腹即面有血色豈非宿有所驗乎

大黃湯 治產後惡露不盡方

大黃

當歸

甘艸

生薑

牡丹

芍藥 各三兩

吳茱萸一斤

右七味咬咀以水一斗煮取四升去滓分四服一日令盡加人參二兩名人參大黃湯

衍前用桂心以鼓大黃之性此用吳萸以行大黃之力用當歸牡丹即前方阿膠之義生薑佐吳萸可

抵桂心之辛散也

柴胡湯 治產後往來寒熱惡露不盡方

柴胡

生薑各八兩

桃仁五十

當歸

黃芩

芍藥各三

吳茱萸二升

千金方衍義卷三

中女論集

右七味咬咀以水一斗三升煮取三升去滓先食

服一升日三千金翼以清酒一斗煮

衍此方主治與桃仁湯無異但少醍醐一味以保產

後痺氣

蒲黃湯 治產後餘疾有積血不去腹大短氣不

得飲食上衝胸脇時時煩憤逆滿手足惰疼胃

中結熱方

蒲黃十兩

大黃

芒硝

甘艸

黃芩各一兩

大棗三十枚

右六味咬咀以水五升煮取一升清朝服至日中

下若不止進冷粥半盞即止若不與少熱飲日

下人羸者半之千金翼名大黃湯無芒硝

衍產後積血不去而致腹大氣短不急攻之變證莫

測蒲黃消黃破血猛劑恐其疾行乃以甘艸和之

黃芩專清鬱積之標熱也

銅鏡鼻湯 治產後餘疾惡露不除積聚作病血

氣結搏心腹疼痛方

銅鏡鼻十八銖

大黃二兩

芍藥

芍藥

乾地黄

芍藥

乾漆

芒硝各二兩

亂髮雞子大燒

大棗三十枚

千金方衍義卷三

中女論集

右九味咬咀以水七升煮取二升一合去滓內髮

灰鏡鼻末分三服

小銅鏡鼻湯 治如前狀方

銅鏡鼻十銖

大黃

甘艸

甘艸

黃芩

芒硝

乾地黄各二

桃仁五十

右七味咬咀以酒六升煮取三升去滓內鏡鼻末

分三服亦治遺尸心腹痛及三十六尸疾

衍產後惡露不除日久而成積聚雖有大黃芒硝並

漆地黄之屬不能消磨堅積故取銅鏡之鼻以磨

彌之深裂本經主治女子血閉癥瘕之旨也藥書

剪髮灰大棗乃乾漆之佐使耳 小銅鏡鼻湯方

下雖云治如前狀詳方中藥味必竟其勢稍緩或

元氣委頓難勝乾漆峻攻故但用桃仁黃芩甘菴

酒煮以行藥力方後言亦治逆尸心腹痛者取側

鏡鼻鎮邪不能遁形之義

梔子湯 治產後兒生處空流血不盡小腹絞痛

方

梔子三十枚以水一斗煮取六升內當歸芍藥

各二兩蜜五合生薑五兩羊脂二兩於梔子汁

千金方衍義卷三

聖

掃葉山房

中煎取二升分三服日三

產後血流不盡而用梔子之苦寒豈無傷中之慮

乎詳本經梔子治五內邪氣胃中熱氣能降火從

小便泄去是必產母平昔多火大便燥實方可用

之苦舊有微滯諒不犯南陽之禁也

生地黃湯 治產後三日至七日腹中餘血未盡

絞痛強滿氣息不通方

生地黃 五兩

生薑 三兩

大黃

芍藥

茯苓

細辛

桂心

當歸

升麻

黃芩 各一兩半 大棗 二十枚

右十一味咀咀以水八升煮取二升半去滓分三

服日三

即前大黃湯之變方大黃芍藥當歸甘艸生薑等

味俱出大黃湯其用桂心細辛即大黃湯中吳茱

萸之意黃芩茯苓即大黃湯中牡丹之意大棗佐

黃芩以和寒熱也方下雖不言寒熱而用黃芩薑

棗之意可推

大黃乾漆湯 治新產後有血腹中切痛方

大黃

乾漆

乾地黃

千金方衍義卷三

聖

掃葉山房

桂心

乾薑 各三兩

右五味咀咀以水三升清酒五升煮取二升去滓

溫服一升血當下若不瘥明且服一升滿三服病

無不瘥

此從銅鏡鼻湯兩方中化出以瘥積未久未成癥

瘕與銅鏡鼻無預故但取前方之漆灰次方之清

酒而加乾薑桂心溫散可也

麻子酒 治產後血不去方

麻子五升搗以酒一斗漬一宿明旦去滓溫服

一升先食服不瘥夜服一升當吐下忌房事一

月將養如初產法

衍本經言麻子仁補中益氣日華言止消渴通乳汁

總取潤燥利竅之力既通乳汁則去血不言而喻

升麻湯 治產後惡物不盡或經一月半歲一歲

方

升麻三兩以清酒五升煮取二升去滓分再服

當吐下惡物勿怪良

衍升麻升清陽降濁氣淳之以酒而升騰胃氣胃氣

有權濁惡白不能開矣所患雖久而元氣未滿無

患升動逆氣也

千金方養卷三

毒

攝藥山房

治產後惡血不盡腹中絞刺痛不可忍方

大黃

黃芩

桃仁

各三兩

桂心

甘艸

當歸

各二兩

芍藥 四兩

生地黃 六兩

右八味咬咀以水九升煮取二升半去滓食前分

三服

衍於前生地黃湯中除去細辛茯苓棗薑易入桃仁

一味破血之力較生地黃湯更專然非大滿大痛

皆難輕試

治產後漏血不止方

露蜂房

數船茹

右二味等分作灰取酪苦漿服方寸七日三

衍露蜂房本經治驚癇癰瘕寒熱邪氣賤船茹乃桐

油石灰黃麻結成並為逐垢散血之藥兼取填氣

其空之義酪苦漿即點乳酪之酸漿也

又方

大黃 三兩

芫硝 一兩

桃仁

水蛭

蠱蟲 各三枚

甘艸

當歸 各二兩

蠱蟲 各十枚

右八味咬咀以水三升酒二升合煮取三升去滓

千金方養卷三

毒

攝藥山房

分三服當下血

又方

桂心

蟬蟬 各二兩

括蘂根

牡丹 各三兩

豉 一升

右五味咬咀以水八升煮取三升去滓分三服

衍抵當而兼下瘀血湯之製彼用上瓜根此用括蘂根

彼用蠱蟲此用蟬蟬彼用芍藥此用牡丹豉用桂

枝此用桂心香豉者專散穢惡之氣也

治產後血不可止者方

乾菖蒲三兩以清酒五升漬煮取三升分再服
即止

命專取利竅之品清酒漬煎以活血散瘀散而血
得歸經矣

治產後惡血不除四體並惡方

續骨木二十兩破如算子大以水一斗煮取三
升分三服相去如人行十里久間食粥或小便
數或惡血下即瘥此木得三遍煮

命續骨木專散血散而肢腫自除以氣味穢濁恐
其傷胃須與粥食間進助其勢力

千金方衍義卷三

治產後下血不盡煩悶腹痛方

羚羊角燒成灰門
取三兩芍藥二兩熬
合黃枳實一兩熬
合黃

右三味治下篩煮水作湯服方寸七日再夜一稍
加至二七

又方

鹿角燒成灰搗篩煮或汁服方寸七日三夜再
稍加至二七不能用時清煮水作湯服之

又方

搗生藉取汁飲二升日駒

又方

生地黃汁一升酒三合和溫頓服之

又方

命赤小豆搗散取東流水和服方寸七不瘥更作
血下不盡不可再吹煩悶腹痛又難用補因取鈴
羊之入肝披風而散惡血燒之便寓止脫之義乃

合金匱枳實芍藥散專泄煩悶腹痛也 鹿角走
督脉本經言治漏下惡血燒之亦能止血服用豉

汁取散據濁之氣也 生藕散血而且通行經絡
產後尤宜 生地黃汁專主血熱妄行以其性寒

恐其凝滯乃以酒和溫服 赤小豆清熱散火火
散血亦隨之而散矣

千金方衍義卷三

散血亦隨之而散矣

治產後血痕痛方

古鐵一斤秤銼斧頭鐵杵亦得成火燒令赤內
酒五升稍稍服之神妙

命燒鐵漬酒下氣最速因取素問治陽厥生鐵烙飲
之法更藉酒力以行血痕不獨產後主治也

治婦人血痕心腹積聚產乳餘疾絕生小腹堅滿
貫臍中熱腰痛小使不利大便難不下食有

伏蟲臍脹癰疽腫久寒 留熱胃脘有邪氣方

半夏一兩
六銖

石膏

藜蘆

牡蒙

菴蓉 各十
八絲

桂心

乾薑 各一
兩

烏喙 半兩

巴豆 六十枚
研如膏

右九味為末蜜丸如小豆服二九日三及治男子

疝病

行血瘕積聚而致臃脹且見證雜合不得以雜合

治之方中半夏滌痰石膏清熱藜蘆涌吐牡蒙散

邪菴蓉鹹潤桂心溫血乾薑溫氣烏喙破瘕巴豆

攻積藥雖峻而所服最少久積之瘕勢在漸磨故

用峻劑緩攻深得治瘕之奧

治婦人血瘕痛方

千金方衍義卷三

卷三

乾薑

烏賊魚骨 各一
兩

右二味治下篩酒服方寸七日三

又方

未桂心溫酒服方寸七日三

義前證堅積龐雜雖吐利並行毒藥猛進未可定其

必効此方亦主血瘕僅用烏賊以散結血乾薑以

溫中氣蓋血非氣不行結非溫不散素問四烏鱘

一蘆茹丸之變法也 又方單用桂心一味為末

專行溫血溫酒服之以助桂心之力彙萃諸方出

人之旨則產後散血諸例子無餘蘊矣

下痢第十五 方十九首

膠蠟湯 治產後三日內下諸雜五色痢方

阿膠

黃蘗 各
兩

蠟 如棊子
三枚

當歸 一兩
半

黃連 二兩

陳廩米 一升

右六味咬明以水八升煮米蠟目沸去米內藥煮

取二升去滓內膠蠟令烊分四服一日令盡

義滯下雖有寒熱新久之不同而推陳致新之治則

一至於產後新虛雖有瘀積猶須顧慮本元況有

臨月先痢而延及產後者得不更為扼腕耶此以

新產暴注熱邪勢甚恐其峻深真陰不得拘於產

千金方衍義卷三

卷三

後苦寒之禁乃峻投連藥以堅腸胃之崩迫歸膠

以滋營氣之虛煥蜂蠟以安脈血之絕傷陳米以

資胃氣之敷化此駐車丸之支派於中除去乾薑

而加黃蘗米蠟也按駐車丸亦千金所立專調賢

脾肺三車之氣以鹿車之力過疾則以黃連駐之

牛車之力過緩則以乾薑御之羊車之力過勞則

以阿膠滋之而駕馭三車者血與氣耳用當歸者

藉以統攝傷殘之餘不使更失常度而淪胥不止

也夫產後虛能受熱正宜溫理中氣何反除去辛

溫而進苦寒是必西北風氣剛勁資稟偏陽難勝

幸熱所以去彼取此設當東南水土卑弱軀體柔脆又當攸賴乾薑而遠黃蘗矣孰謂異法方宜之可忽乎

桂蜜湯 治產後餘寒下痢便膿血赤白日數十

行腹痛時時下血方

桂心

甘艸

乾薑各二兩

附子一兩

蜜一升

當歸三兩

赤石脂 十兩

右七味咬咀以水六升煮取三升去滓內蜜煎一

兩沸分三服日三

千金方衍義卷三

姜

歸藥山房

夫蜜潤腸下痢所禁反取用之以產後泄脫無度

非因逆桃花無以療之雖證屬虛滑而痢久津液

速質急需滋乾導滯以協濟之攻之本艸蜜性雖

滑熱則溫中薑雖辛熱炮則苦平可知蜜有和解

幸熱之功薑具散火安中之力而桃花湯中粳米

前與蠟湯中已常用之此方既有桂心當歸甘艸

熟蜜溫中和血可無藉於粳米也

治產後下赤白腹中絞痛方

芍藥

乾地黄各五兩

甘艸

阿膠

艾葉

當歸各二兩

右六味咬咀以水七升煮取二升半去滓內膠合

烱分三服

治產後赤白下久不斷身面悉腫方

大豆 微熬

小麥

蒲黃 各一升

吳茱萸 半升

右四味以水九升煮取三升去滓分三服此方神

驗亦可以水五升酒一斗煎取四升分四服

治產後痢赤白心腹刺痛方

薤白 一兩

當歸 二兩

酸石榴皮 三兩

地榆根 四兩

粳米 五合

千金方衍義卷三

李 歸藥山房

右五味咬咀以水六升煮取二升半去滓分三服

安効方加厚朴一兩阿膠人參甘艸黃連各一兩半

前方以產後血虛痢不止故於金匱膠艾湯中

但去芍藥一味彼治衄漏下固爲必需此主產

後滯下似可無藉非有所妨礙而去之也 次方

以瘀積流泊於經而致身面浮腫故用大豆小麥

以通達腎肝之氣俾茱萸蒲黃得振破瘀之力

後方專取兩陽四逆散後薤白治腹中痛泄利下

重及金匱胸痺方疎利濕熱之義檉皮酸澀榆皮

利之薤白泄滯當歸和之極久專扶胃氣之陷也

當歸湯 治產後下痢赤白腹痛方

當歸 龍骨 各三兩 乾薑

白木 各二兩 芍藥 二兩 甘州

白艾 熟者 附子 各一兩

右八味咬咀以水六升煮取二升去滓分三服一

日分五服

善 產後氣血兩虧加以下 痢脾胃俱德艾附本附薑

附艾力復陽當歸芍藥溫養其血至於龍骨絞固

其津甘州調和其氣並緩附子之性一舉而兩得

之也

千金方衍義卷三 婦人產後 婦藥出房

白頭翁湯 治產後下痢兼虛極方

白頭翁 阿膠 秦皮

黃連 甘州 各二兩 黃蘗 三兩

右六味咬咀以水七升煮取二升半去滓內膠令

烱分三服日三

義 南陽以此方治厥陰熱痢下重金匱加甘州阿膠

治產後下痢虛極其前膠蠟湯雖出駐車尤為此

方的派要之二方皆滯下門中頂門金錒

驚甲湯 治產後早起中風冷泄利及帶下方

驚甲 如手

當歸

黃連

乾薑 各二兩 黃蘗 長一尺 廣三寸

右五味咬咀以水七升煮取三升去滓分三服日

三升金翼加白頭翁一兩

本經言驚甲治心腹癥瘕積聚而兼連葉專祛濕

熱乾薑熱因熱用之嚮導當歸和其血滯為熱痢

之前方方下雖言產後早起風冷致病邪既入裏

而猛熱必無外散之理世有因風致病尚欲寧羶

表藥者不幾癡人說夢耶

龍骨圓 治產後虛冷下血及穀下晝夜無數兼

治產後惡露不斷方

千金方衍義卷三 婦人產後 婦藥出房

龍骨 四兩 乾薑 甘州

桂心 各二兩

右四味為末蜜和丸服酒服二十九如梧子日三

一方用人參地黃各二兩

本經言龍骨治泄利膿血女子漏下而兼乾薑桂

心溫散寒結甘州厚和胃氣為於劇之專藥黃蘗

辛散不須復用嚮導也

阿膠圓 治產後虛冷洞下心腹絞痛兼泄瀉不

止方

阿膠 四兩

人參

甘州

龍骨 桂心 乾地黄

白朮 黃連 當歸

附子 各二

右十味為末蜜丸如梧子大溫酒服二十九日三

服

衍方下雖主虛冷洞下而證見本寒標熱故彙雜理

中駐車及木門中龍骨圓三方並去乾薑而易附

子功力倍增阿膠當歸而補營虛人參白朮歸身

胃弱柱心附子端治本寒黃連一味除燥熱骨

恐桂附過熱乃進地黃以護真陰龍骨以虛參病

非但防虛陽之竊發并可杜虛寒之下脫也

澤蘭湯 治產後餘疾寒下凍腹裏急 胸膈滿痛

咳嗽嘔血寒熱小便赤黃大便不利力

澤蘭 石膏 各二十 當歸

甘州 厚朴 各十 遠志 各十

藁本 芎藭 各十 乾薑 各十

人參 桔梗 乾地黃 各十

白朮 蜀椒 白芷

柏子仁 防風 吳茱萸

細辛 各八 桑白皮 麻子仁 各半

右二十一味咬咀以水一斗五升先內桑白皮煮

取七升半去之內諸藥煮取三升五合去滓分三

服

衍澤蘭入肝脾血分為產後要藥用以配入理中并

取椒辛黃朴之屬協助參朮以治寒下凍腹裏急

胸膈滿痛主使歷然其餘芎藭薑木防風白芷遠

志桑皮桔梗當歸地黃石膏麻仁柏仁等味皆為

咳嗽嘔血小便赤黃大便不利隨證參入學者不

必傾其成則也

乾地黄湯 治產後下痢方

乾地黄二兩 白頭翁 黃連 各一

蜜蠟寸方 阿膠 手掌大 一枚

右五味咬咀以水五升煮取二升半去滓內膠蠟

令烱分三服日三 十金翼有 乾薑一兩

衍於白頭翁加甘州阿膠湯中除去秦皮 玉蘗但用

黃連以堅腸胃白頭翁以止腹痛阿膠 以治內崩

加入地黃以除血熱蜜蠟以清胃氣本 經端主下

利膿血以蠟味至淡入胃胃為五臟之 本故為五

味之先也

生地黃湯 治產後忽著寒熱下痢方

生地黃五兩 甘州 黃連

桂心各一兩 大棗二十枚 赤石脂一兩

淡竹葉二升一作竹皮

右七味咬咀以水一斗煮竹葉取七升去滓內藥

煮取二升半分三服日三

方下言忽著寒熱下痢是飲食中寒熱交進或飽

食後臍腹受冷飲食不化而蘊熱與外感之寒熱

無預也方中桂心專治木寒黃連專化蘊熱淡竹

地黃專行清熱甘州夫棗專于和中石脂一味專

固下焦之脫也

藍青圓 治產後下痢方

藍青熟 附子 鬼臼

蜀椒各一兩半 厚朴 阿膠

甘州各二兩 艾葉 龍骨

黃連 當歸各三兩 黃蘗

扶苓 人參各兩

右十四味為末蜜和丸如梧子每服二十丸空腹

飲下 一方用赤石脂四兩

赤石脂圓 治產後虛冷下痢方

赤石脂三兩 當歸 白朮

黃連 乾薑 秦皮

甘州各二兩 蜀椒 附子各一兩

右九味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日三

飲服方寸七

大病有常變 治難二揆產後滯下而至寒熱交錯

毒邪膠固於內連藥不足以挫其威參附不足以

固其脫法無可愈之機乃取法外之法以治變中

之變藍青鬼臼本經雖有解毒殺蟲之治木州小

青條下且主血痢腹痛但世罕知用其他蜀椒龍

骨為痢久虛滑而設膠艾當歸為肝虛血脫而設

甘扶厚朴為脾虛氣滯而設則又不離於常度也

亦石脂丸治證雖同然必較前稍緩故投劑稍

平而寒熱交錯則一所以方中椒薑附子與秦皮

黃連並行無悖白朮當歸與石脂甘州協力匡扶

方克有濟以無毒邪固結乃無藉於藍青鬼臼也

按藍青丸藥品不倫細釋其旨總有至理然僅可

參究其法良難效用其法非特藍青鬼臼能招詐

議即澤蘭湯中麻仁桂蜜湯中蜂蜜咸為時禁況

妊娠痢門中羊脂丸為舉世所共知其為木經

主治也

赤散 治產後下痢方

赤石脂

代赭各三兩

桂心一兩

右三味治下痢酒服方寸七日三十日愈

黑散 治產後下痢方

麻黃

貫衆

桂心

細辛各一兩

甘州

乾漆各三兩

右六味治下痢酒服五撮日再五日愈麥粥下尤

佳

黃散 治產後下痢方

黃連二兩

黃芩

鹽麩

千金方衍義卷三

李

補藥出房

乾地黄各一兩

右四味治下痢酒服方寸七日三十日愈

龍骨散 治產後痢方

五色龍骨

代赭

赤石脂

黃蘗根皮蜜炙各一兩

艾各一兩

黃連二兩

右六味治下痢飲服方寸七日三

赤散治久痢滑泄故取石脂療腹痛腸澀下痢赤

白代赭治腹中毒邪女子赤沃瀉下皆本經主治

以其味瀼司收故用桂心之辛而散其滯也 黑

散治血結於內而腹脹喘逆故用乾漆治絕傷兩

破血下行桂心散結積而溫理血氣貫眾治腹中

邪而散諸熱毒細辛利空竅而溫散諸寒甘州調

胃氣而兼和藥性麻黃開腠理而宜散逆氣此雖

發汗重劑然入於破血導滯劑中亦必助乾漆貫

眾之勢以本經原有破堅蠱之語也 黃散治血

結於內而發熱故用麻黃以破堅下血閉芩連以

治腹痛下痢地黃以清血中之熱也 龍骨散取

連葉苦寒而治崩迫後重以其身散濕熱藥根名

曰檀桓能治腹中百病代赭石脂龍骨艾葉性味

皆瀉專主虛寒脫泄用散不用湯者欲其止瀉故

千金方衍義卷三

李

補藥出房

無取於瀉滌也 匹方雖同其產後下痢而藥味

所主不同是可推其見證也

淋渴第十六 方九首

栝蔞湯 治產後小便數兼渴方

栝蔞根

麥門冬

甘州

黃連各二兩

人參

生薑各三兩

大棗十五枚

桑螵蛸二十枚

右八味以水七升煮取二升半分三服

又方 治產後渴不止方

栝蔞根四兩

人參

麥門冬各二兩

甘州崔氏

乾地黄各

大棗

工瓜根五兩崔氏

右七味咬咀以水一斗二升煮取六升分六服

衍淋渴往往相兼但淋證未有不渴渴證未必皆淋

栝蒌湯二方所主雖皆肺胃虛熱並用人參麥冬

栝蒌甘艸大棗生津止渴一兼黃連蠅蚋專主足

太陽不能清津而成淋一兼地黃土瓜根專主手

太陽不能化氣而致渴以無黃連之苦寒故無取

生薑之辛散

雞臍鹿湯 治產後小便數方

千金方卷之三

雞臍鹿具

雞臍三具

乾地黄

當歸

甘艸

厚朴

人參各二兩

蒲黃四兩世本

生薑五兩

大棗二十枚

右十味咬咀以水一斗煮臍鹿及腸大棗取七升

去滓內諸藥煎取三升半分三服

衍熱在小腸不能司膀胱氣化而小便頻數小腸盡

處傍通膀胱膀胱滲洩是必小腸有瑕故取雞之

臍及腸專利小腸厚朴薑棗專泄滯氣人參甘

艸地黃當歸兼滋氣血蒲黃匡佐臍鹿專清膀胱

血熱也世本作麻黃熱既犯腸斷無復用麻黃之

理

治婦人結氣成淋小便引痛上至小腹或時溺血

或如豆汁或如膠飴每發欲死食不生肌面日

萎黃師所不能治方

貝齒四枚燒

葵子一升

石膏五兩

滑石二兩

右四味以水七升煮二物取二升去滓內二末及

猪脂一合更煎三沸分三服日三不瘥再合服效

衍結氣成淋而致引痛溺血時有所下內因壅積可

知貝齒專磨堅積葵子滑石石膏輔貝子治五淋

利水道也

石韋湯

治產後卒淋氣淋血淋石淋方

石韋

黃芩

通艸

甘艸各二兩

榆皮五兩

大棗三十枚

葵子二升

白朮各三兩

生薑各三兩

石九味咬咀以水八升煮取一升半分三服無此

衍產後淋證得之卒然無問氣血與石一皆不離於

艸生齒齒氏同

產後淋證得之卒然無問氣血與石一皆不離於

熟石韋大寒本經專主五癰不通兼榆皮葵子之

屬雖云利竅并可散血而散而淋白愈矣產後以芍藥易朮集驗不用甘艸生薑各有主見

葵根湯 治產後淋瀝方

葵根 二兩 車前子 一升 龜髮 燒灰

大黃 桂心 滑石 各一兩

通艸 二兩 生薑 六兩 冬瓜 練汁 各一兩

右九味咬咀以水七升煮取二升半分三服千金翼不

用冬瓜練

茅根湯 治產後淋方

白茅根 一斤 瞿麥 茯苓 各四兩

地脉 人參 各二兩 生薑 三兩

桃膠 甘艸 各一兩 鯉魚齒 文一百

右九味咬咀以水一斗煮取二升半分三服

右二方同治產後之淋並主膀胱熱結前方用葵根

之滑澤兼大黃之寒降以散膀胱之積熱車前滑

石通艸乃葵根之佐使桂心亂髮生薑則大黃之

反謀瓜練專清胃熱燥渴也後方用白茅根之

甘寒兼人參之甘溫以溫肺胃氣化瞿麥桃膠地

脉乃茅根之佐使茯苓甘艸生薑則人參之匡輔

鯉齒散堅利水并助桃膠以磨宿積之瘕方下所

治雖同而新久虛實各異

滑石湯 治產後淋方

滑石 五兩 通艸 車前子

葵子 各四兩

右四味治下備酢漿水服方寸匕稍加至二匕

竹葉湯 治產後虛渴少氣方

竹葉 三升 生薑 半夏 各三兩

大棗 十枚 小麥 五合 甘艸

茯苓 人參 各一兩 麥門冬 五兩

右九味咬咀以水九升煮竹葉小麥取七升去滓

內諸藥更煎取二升半一服五合日三夜

淋之與渴雖多相兼淋證未久津液未傷未便作

渴渴證雖久無關下焦豈得成淋詳滑石散竹葉

湯二方主治其義自明

雜治第十七方五十八首 灸法九首

破積烏頭圓 治婦人心腹積聚氣悶脹痲痲內

傷瘀血產乳餘疾及諸不足勞氣食氣胃滿吐

逆其病頭重結痛小便赤黃大下氣方

烏頭 黃芩 巴豆 各半

半夏 三兩 大黃 八兩 戎鹽 一兩

麤蟲

桂心

苦參各十
八銖

人參

消石各一
兩

右十一味為末以白蜜青牛膽拌和搗三萬杵丸如梧子隔宿勿食酒服五丸安臥須臾當下黃者小腹積也青者疝也白者內風也如水者留飲也青如粥汁膈上邪氣也血如腐肉者傷也赤如血者產乳餘疾也如蟲刺者蠱也既下必渴渴飲粥湯飢食稀糜三日後當溫食食必肥濃三十日平復

衍勞氣食氣滯氣而按厥積苟非迅雷疾擊則與養

千金方衍義卷三

毒

癰何異烏頭巴豆之辛烈不得苦參大黃不能直搗長驅桂心佐麤蟲以破積血黃芩佐半夏以破積痰戎鹽佐消石以破積水人參統領諸藥為之主帥服後觀其所下過半便與糜粥調養經謂大積大聚毒可犯也衰其大半而止毋犯下文三字
竹茹湯 治婦人汗血吐血尿血下血方
竹茹 二升 人參 芍藥
桔梗 芎藭 當歸
甘艸 桂心各一
兩 乾地黄臨雨
右九味咬咀以水一斗煮取二升分三服

衍前治勞氣食氣逆氣此治汗血吐血尿血下血竹茹為止血發渴專藥芎藭芍地為滋血專藥人參

甘艸為扶胃專藥桂心專行四物之滯枯梗專助人參之力非若前證之有氣逆血結合行攻擊也

治婦人自少患頭疼眼眩方

石南一方用
石華

細辛

天雄

茵芋各二
兩

薯蕷

防風

芎藭

獨活

藜蘆各四
兩

乾薑

山茱萸各三
兩

右十一味咬咀以酒三斗清五月初飲二合日三

千金方衍義卷三

毒

服後稍稍加之
衍一派皆搜風猛劑漬之以酒稍取微酣深得緩急相需之妙用但茵芋近世罕得不妨以鬼臼代之
治婦人經照硫黃丸忽患頭痛項冷冷歇又心胸煩熱眉骨眼背癢病有時生瘡喉中乾燥四體痛癢方
桔梗根 麥門冬 龍膽各三
兩
大黃 二兩 杏仁 二升 土瓜根 八兩
右六味為末蜜丸如梧子飲服十九日三後漸加之

火逆則頭痛火鬱則項冷皆硫黃毒伏之候火燥

上炎而熏灼肺胃故用栝蒌根麥門冬滋其上燥

大黃龍膽疎其下竅杏仁專散結氣土瓜根專破

結血蜜九緩進漸加以化熱毒也

治婦人患癰按時如有三五箇而作水聲殊不得

寢食嘗心悶方

牽牛子三升治下篩飲服方寸七日一服三十

服後可服好硫黃一兩

先行蕩滌次與溫散然非按之作水聲者便非水

癖慎勿誤投苟非氣壯質實亦難聚治

千金方卷三

治婦人忽與鬼交通方

松脂二兩 雄黃一兩

右二味先煨松脂乃內雄黃末以虎爪攪令相得

藥成取如雞子中黃夜臥以著爐籠中燒令病人

取自昇其上以被自覆惟出頭勿令燻熱乃令氣

得泄也

衍 松脂雄黃皆辟邪之物燒煙處令其交通之

地

厚朴湯 治婦人下焦勞冷膀胱腎氣羸弱自汗

小便俱出方

厚朴如手大長四寸以酒五升煮兩沸去滓取

桂一尺為末內汁中調和一宿勿食且頓服之

衍 下焦虛冷真陽式微不能恢廓大氣此方得之

溫經湯 治婦人小腹痛方

茯苓六兩 上瓜根 芍藥各三

薏苡仁半升

右四味咬咀以酒三升漬一宿旦加水七升煮取

二升分再服

衍 婦人小腹痛有熱有寒此以經癸不調而痛雖曰

溫經殊非虛冷之謂酒浸煎服即所以溫之也

千金方卷三

半夏厚朴湯 治婦人胸滿心下堅咽中帖帖如

有灸肉癰吐之不出咽之不下方

半夏一升 厚朴三兩 茯苓四兩

生薑五兩 蘇葉五兩

右五味咬咀以水七升煮取四升分四服日三夜

一不瘥更服 二方無蘇葉生薑

衍 婦人入鬱痰結於咽而致噤吐不下用半夏厚朴

溫散專取金匱成法

治婦人氣方

平旦服烏牛尿日一止

衍義 水氣浮腫而用烏牛之尿殺蟲利水與驢尿同功

而烏牛更益脾腎

昆布圓 治婦人胸中伏氣方

昆布

海藻

芍藥

桂心

白石英

款冬花

桑白皮

人參各二兩

柏子仁

茯苓

鍾乳各二兩半

紫苑

甘艸各一兩

乾薑一兩

吳茱萸

五味子

細辛各一兩半

杏仁一百枚

橘皮

蘇子各五合

千金方衍義卷

去

一右二十味為末蜜丸如梧子酒服二十九日再加

至四十九

衍義 痰氣伏匿胸中如陰霍啞日苟非辛溫香進何以

宣布五陽而溫散藥中獨不及附子者恐其壯火

食氣更增擾亂中州也

治婦人無故憂毒胸中迫塞氣不下方

芍藥

滑石

黃連

石膏

山茱萸

前胡各一兩

大黃

麥門冬

細辛

生薑各一兩

半夏十八銖

桂心半兩

右十二味為末蜜丸如梧子酒服二十九加至三

十九日三服

衍義 前以胸中大氣不布故宜溫補助陽此以胸中痰

氣迫塞故宜滌熱存陰同一中氣不舒而寒熱補

瀉天淵

治婦人斷產方

蠶子故紙方一尺燒為末酒服之終身不產

治勞損產後無子陰中冷溢出于門閉積年不凝

身體寒冷方

防風一兩

桔梗三十銖

人參一兩

千金方衍義卷

去

菖蒲

半夏

丹參

厚朴

乾薑

紫苑

杜蘅各十銖

秦艸

白紋

牛膝

沙參各半兩

右十四味為末白蜜和丸如小豆食後服十五丸日三服不知加至二十九有娠止夫不在勿服之

服藥後七日方合陰陽

衍義 是必產後房勞虛風內動風虛相搏而經閉不行

濁滲子門故用防風白紋杜蘅秦艸以逐內風半

夏厚朴以滌痰氣牛膝丹參以通積血沙參紫苑

桔梗菖蒲輔乾薑人參以溫胃氣勿疑防風等味
爲發散用

五加酒 治產後癩玉門冷方

五加皮 一斤 蛇床子 一升 杜仲 一斤

乳床 半升即孔公葉 乾地黃 二兩 枸杞子 一升

丹參 二兩 乾薑 二兩 天門冬 四兩

右九味咬咀以絹袋子盛酒三斗漬三宿一服五
合日再稍加至一升佳

衍義五加皮專發醲醴性味諸藥得此功力倍常不獨
專溫玉門也

千金方聖藥卷三十一 婦人 攝生山堂

治子門閉血凝腹中生肉癥藏寒所致方

乾漆 十斤 生地黃汁 三升 生牛膝汁 一升

右三味先搗漆爲散內汁中攪微火煎爲丸如梧
十酒服三九日再覺腹中痛食後服之

類漆灰破血不得地黃牛膝之潤與溷澤之魚無異
矣

治產後勞玉門閉而不閉方

硫黃 四兩 吳茱萸 一兩 寬絲子 六兩

蛇床子 一兩

右四味爲散以水一升煎二方寸七洗玉門口再

洗

治產後陰道閉而不閉方

石灰一斗熬令燒艸以水二斗投之適寒濕入
汁中坐漬之須臾復易坐如常法甚効

衍義玉門開而不閉肝氣過泄腎氣不藏故用硫黃
黃以溫之兔絲蛇床以補之石灰熬漬以蒸之勞

在患處故無取于內治

黃芩散 治婦人陰脫方

黃芩 蛭皮 當歸 各半

芍藥 一兩 牡蠣 竹皮 各二兩半

狐莖 一具 干金 藥用松皮

千金方聖藥卷三十一 婦人 攝生山堂

右七味治下篩飲服方寸七日三禁舉重房勞冷

食

硫黃散 治同前

硫黃 烏鰂骨 各半 五味子 三銖

右三味治下篩以粉其上良日再三粉之

當歸散 治同前

當歸 黃芩 各二兩 蛭皮 半兩

牡蠣 二兩 芍藥 六銖

右三味治下篩酒服方寸七日三服禁舉重良

治產後陰下脫方

蛇牀子一升布裏炙熨之亦治產後陰中痛

又方

燒人尿為末酒服方寸七日三

又方

燒弊箒頭為灰酒服方寸七

又方

蠶頭五枚為末以井花水服方寸七日三

又方

皂莢半兩 半夏 大黃

千金方衍義卷三

全

攝真山房

細辛各一 蛇床子三錢

右五味治下篩用薄絹囊盛大如指內陰中日二

易即瘡

又方

吳茱萸 蜀椒各一 戎鹽如雞

右三味皆熬令變色為末以綿裹如半雞子大內

陰中日一易二十日瘡

治陰下墜出方

蜀椒廣濟方 烏頭 白芨各半

右三味為末以方寸七綿裹內陰中入三寸腹中

熱易之日一度明且乃復舊七日愈

治婦人陰下脫若脫肛方

羊脂煎訖適冷暖取塗上以鐵精敷脂上多小

合調以火灸布令暖熨肛上漸推內之然後末

磁石酒服方寸七日三

行陰脫與子門不開不同勢則泄而不收脫則虛熱

下墜故以黃芩竹皮清理濕熱當歸芍藥調和血

氣蝟皮治陰腫下血牡蠣治赤白帶下狐莖取其

善縮入腹所患最急恐藥力紆緩更須粉以外治

酒以內助以無狐莖并去竹皮若產後虛脫陰腫

千金方衍義卷三

全

攝真山房

蛇床熨之蠶頭收之皂莢大黃半夏細辛蛇床專

散瘀腫茱萸蜀椒戎鹽專治風冷蜀椒烏頭白芨

專療陰挺羊脂專助滑澤并敷鐵精內服磁石吸

之使內而不下也

當歸湯 治產後臍中風冷陰腫痛方

當歸 獨活 白芷

地榆各三 敗醬千金翼 礬石各二

右六味以水一斗半煮取五升適冷暖稍洗陰

日三

又方

熟搗桃仁傅之良日三度

產後陰腫無非風熱瘀血獨活白芷散風當歸地

榆散血敗醬解毒紫石消腫如法洗之最良熟搗
桃仁傅之亦得總取散血消腫之功用

陰瘡膏 治男女陰瘡方

米粉許 一杯

芍藥

黃芩

牡蠣

附子

白芷各十

右六味咬咀以不中水豬膏一斤微火上煎三上

三下候白芷黃膏成絞去滓內粉和令相得傅瘡

上併治口瘡

千金方衍義卷三

三

一治陰中痛生瘡方

羊脂 一升

杏仁 一升

當歸

白芷

芍藥各

右五味為末以羊脂和諸藥內鉢中置飯內蒸之

三升米頃藥成取如大豆許綿裹內陰中日一

治男女陰中瘡濕癢方

黃連

梔子

甘艸

黃蘗各一

蛇床子 二兩

石五味治下篩為細末以粉敷上無汁以豬脂和

塗之深者用綿裹內瘡中日一

治陰瘡方

蕪荑

芍藥

黃芩

甘艸

礬石

雄黃

附子

白芷

黃連各六

右九味咬咀取猪膏四兩合煎傅之

治陰中癢如蟲行狀方

礬石十八

芍藥 一兩

丹砂少許

右三味治下篩取綿裹藥著陰中蟲自死

治陰中癢入骨方

大黃

黃芩

黃耆各一

芍藥半兩

元參

丹參各十

莢菜英三十

右七味治下篩酒服方寸七日三

又方

狼牙兩把以水五升煮取二升洗日五六度

治男女陰蝕略盡方

蝦蟇

兔屎

石二味等分為末取傅瘡上

又方

蛇床子一方用怡歸

芍藥

甘艸各一
地榆三兩

右五味咬咀以水五升煮取二升洗日三夜一

又方

蒲黃一升
水銀一兩

右二味研以粉其上

又方

肥猪肉十斤以水煮取熟去肉盆中浸之冷易

不連三兩度亦治陰中瘡有蟲

凡陰瘡多由濕熱所致濕盛則多癢熱盛則多痛濕

熱交併則癢痛熾腫甚則腐爛生蟲蟲亦濕熱所

千金方衍義卷三

化淫蕪不禁者多此陰瘡膏中芍藥和血療寒熱

黃芩主惡瘡疽蝕牡蠣治赤白帶下附子破癥堅

積聚白芷療陰腫寒熱煎用猪脂滋血解毒和以

米粉止痛生肌專藉附子透入陰經也 陰中痛

生瘡用羊脂滋血杏仁殺蟲白芷散腫芎藭和

專取羊脂引入蟲口 男女陰中濕瘡雖用連

苦燥山梔甘艸清火不得蛇牀不能治男子陰瘡

濕瘡婦人陰中腫痛 陰瘡用蕪荑礬石雄黃殺

蟲芩連散火甘芩消腫芎藭和血不得附子不能

解散陰毒 陰中如蟲行專用礬石治瘡芎藭和

血丹砂鎮攝陰火也 陰瘡人骨厥陰火鬱不得

發泄也非大黃黃芩不能導之使下非吳茱萸不

能通之使散非芎芎二參不能解散熱也 又

方單用狼牙為殺蟲解毒專藥 男女陰蝕血肉

略盡涼非艸根木實可療故取蝦蟆蝕肉之義以

治陰蝕太陰巨魚之屎以逐陰穢非精詳陰陽至

理者難以體此 又方用歸芍甘艸地榆和血止

痛不得蛇牀無以化濕熱生蟲之隱疾 又方用

蒲黃散血水銀殺蟲亦陰蝕之峻藥 猪肉煮湯

浸洗雖能止痛安蟲然浸後須加傅治庶杜復發

千金方衍義卷三

之虞以上諸治須詳濕盛熱盛有蟲無蟲隨證採

用可也

治女人交接輒血出方

、 棗心 伏龍肝各二

右二味為末便脂方寸匕立止

治童女交接陽道逆理及為他物所傷血出流離

不止方

取釜底墨少許研胡麻以傅之

又方

燒蘭絮灰傅之

又方

燒青布并髮灰傳之立愈

治合陰陽輒痛不可忍方

黃連二兩

牛膝

甘艸各一兩

右三味咬咀以水四升煮取二升洗日四度

治婦人傷於丈夫四體沉重嘔吸頭痛方

香豉

葱白各一升

生地黃八兩

生薑四兩

甘艸二兩

芍藥五兩

右六味咬咀以水七升煮取二升半分三服不瘥

重作慎房事集驗方無生薑甘艸

千金方衍義卷三

全

歸藥山房

白玉湯 治婦人陰陽過度王門疼痛小便不通

方

白玉二兩

白朮

當歸各五兩

澤瀉

茯苓各二兩

右五味咬咀以水一斗煎玉五十沸去玉內藥煎

取二升分再服相去一炊頃

治女人交接出血多由衝脈受傷方用桂心辛溫散

血伏龍肝腹臧生肌故為首推 次用釜底墨亦

能止血生肌兼取胡麻之潤以緩痛也 繭絮灰

青布灰髮灰並能止血 交合輒痛經脈受傷而

蘊熱故用黃連散火牛膝和血甘艸緩痛 傷於

丈夫而體重頭痛用葱白香豉之屬與女勞復之

治相類即有容邪發熱亦不出此 玉能滅熱亦

能止痛但取以通氣化兼用白朮以溫肉理當歸

以和血并茯苓以滋精髓澤瀉佐白朮以通氣化

昔交接過傷之專法

治動胎見血腰痛小腹疼月水不通陰中腫痛方

蒲黃

當歸各二兩

葱白一斤

吳茱萸

阿膠各一兩

右五味以水九升煮取二升半去滓內膠令烱分

千金方衍義卷三

全

歸藥山房

三服

治妊娠為夫所動欲死單行竹瀝汁方

取淡竹斷兩頭節火燒中央器盛兩頭得汁飲

之立効

桑根白皮湯 治傷于丈夫苦頭痛欲嘔心悶方

桑根白皮半斤

乾薑二兩

桂心五十

大棗二十枚

右四味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服適

衣無令汗出

治嫁痛單行方

大黃十八銖取好酒一升煮三沸頓服之佳

治小戶嫁痛連日方

甘艸 三兩

芍藥 半兩

生薑 十八銖

桂心 六銖

右四味咬咀以酒一升煮三沸去滓盡服神効

又方

牛膝五兩以好酒三升煮取一升半去滓分三

服

治小戶嫁痛方

烏賊魚骨燒為屑酒服方寸七日三

千金方衍義卷三

九

補藥山房

行 動胎見血與因病而胎息不安之治不同此方以

蒲黃散血當歸和血阿膠止血吳茱萸下氣止痛

葱白溫血安胎而無母病之糾纏也 竹瀝寒降

惟妊娠肥盛多痰胎逆喘滿者為宜 腎氣過勞

而胎氣上逆喘悶欲嘔者則以薑桂收攝虛陽大

棗安和脾氣系根白皮開泄逆上喘滿之氣 酒

煮大黃既能消腫亦能泄火惟氣盛壯實者為宜

小戶嫁痛而瀉瀉惡寒翁翁發熱用桂枝湯本

非表邪但取和營故減桂枝以下體傷不宜更實

中土故去大棗 又方單用牛膝酒煮專和血脈

之傷損 烏賊骨為氣竭肝傷厥陰散血之專藥

且味鹹兼走少陰故小戶受傷為之的藥

治陰寬大合窄小方

芎朮

乾漆 各半

鼠頭骨 二枚

雌雞肝 二枚陰乾百日

右四味為末蜜丸如梧子月初七日合時著一丸

墜頭令徐徐內入三日知十日小五十日知十五

歲童女 本無光

婦人且體稟乎坤儀盈虧同乎月朞原夫玉門寬

窄雖係生成然多有交接過勞傷殘經絡不能收

千金方衍義卷三

九

補藥山房

持者非力為圖治胡能復其本來故取月兔之遺

同氣相引以療積陰之固疾乾漆之治絕傷以破

宿昔之瘀滯鼠頭骨之善蠶少陰以利陰曲之機

一竅生雞肝之直達厥陰以修廢弛之關開其裏破

宿生新之功若不因敗損無瘀濁下溢者則當從

去乾漆易礬石例治證雖猥褻略無及于狎昵之

味智圓行方于此可徵

治陰冷合熱方

內食菜英于牛膽中令滿陰乾百日每取二七

枚鷄裏之齒嚼令碎內陰中良久熱如火

陰冷乃肝氣失職生陽不能下達至陰故用食棗
 黃溫散厥陰之味製以牛膝并清濁陰之不潔然
 須日用無間庶克有濟兼進入味腎氣尤為得力
 灸法

月水不利黃脈上下并無子灸四滿三十壯穴在丹

田兩邊相去各開寸半丹田在臍下二寸是也

婦人胞落頰灸臍中三百壯 又灸身交五十壯三

報在臍下橫交中 又灸背脊當臍五十壯 又灸

玉泉五十壯三報 又灸龍門二十壯三報在玉泉

下女人入陰內外之際此穴卑今廢不鍼灸


婦人胞下垂注陰下脫灸俠玉泉三寸隨年壯三報

婦人陰冷腫痛灸歸來三十壯三報俠玉泉五寸是

其穴

婦人欲斷產灸右踝上一寸二壯即斷

孫真人千金方衍義卷三終



孫真人千金方衍義卷四

長洲 王著
 南沙 顧 校

婦人方下 凡四類
 補益第十八 論一首 方十四首

論曰凡婦人欲求美色肥 白罕比年至七十與小不

殊者勿服紫石英令人色 黑當服鍾乳澤蘭丸也

柏子仁圓 治婦人五 勞七傷羸冷瘦削面無煎

色飲食減少貌失光 澤及產後斷緒無子能久

服令人肥白補益方

柏子仁 黃耆 乾薑

鍾乳 白石英 紫石英

蜀椒 杜仲 當歸

甘艸 芎藭 厚朴

桂心 桔梗 赤石脂

薤菴 五味子 白朮

細辛 獨活 人參

石斛 白芷 芍藥

澤蘭 藁木 蕪荑

乾地黃 烏頭 防風

右三十味為末蜜和酒服二十九如梧子不知加至三十九千金翼無烏頭有龍骨防葵茯苓秦艽各半兩并治後半身枯痺

衍

千金立方之義專以方下所主之證為主此方主

治總以虛冷二字為之綱旨故用鍾乳紫白石英赤石脂為峻溫藏氣之專藥較大五石澤蘭丸中

所用石藥祇少禹糧石膏較小五石澤蘭丸祇少陽起石石膏益禹餘專主腹中雷鳴陽起石專主

冷勢虛損小五石中以有礬石大五石中以有龍骨故用石膏以清解二藥之滯滯此方專主羸冷

羸之與勞輕重懸殊既無藉於飲瀆亦無庸於清解其立方本意全在崩中經漏崩中經漏係衝脈

所主衝脈附肝而行原非脾腎之病故無藉禹糧陽起石也石性重著故須薑椒辛烏等雄悍以發

之然用溫補必兼辛散而厚朴為疏通裏氣之要藥如局方消風散既用人參助風之勢又以厚朴

疎裏氣之壅不出此方之成則耳然用厚朴之義有二一輔白朮健運中氣一統攝黃芩清理濁帶以

婦人經行時風入胞門而患渴帶者多故用防風藁本白芷獨活等風藥協力祛之所謂治病必求

其本也所以大小五石澤蘭丸大小澤蘭丸三石

千金方衍義卷四

補藥山房

澤蘭丸鍾乳澤蘭丸增損澤蘭丸澤蘭散諸方無

不用等味為補中寓瀉之法諸方之下雖不言瀉帶而崩淋漏下無不起於瀉帶也且防風能助黃

耆白朮甘艸固密膠理兼有川芎杜仲地黃芍藥菴蓉五味人參滋補氣血胡慮而顏之不光澤也

其用柏子仁桔梗石斛澤蘭者取其清潤以制諸藥之燥烈而獨以柏子仁名方者以其能達心包

保護君主也其桔梗開提肺氣石斛專司清胃不使熱藥之性上于肺胃也觀大小五石復以澤蘭

名方者為其專於調經故總不出等味為石藥之監制耳前云服紫石英令人色黑當服鍾乳澤

蘭丸以紫石英性專溫血血溫色必縮黑此方原以鍾乳澤蘭益氣調經為主雖有紫石英不專溫

血故服之令人肥白也大五石澤蘭丸治婦人風虛寒中腹內雷鳴緩

急風頭痛寒熱月經不調繞臍惻惻痛或心腹痞堅善飲食手足冷多夢身體痺痛營衛不和

虛弱不能動及產後虛損並宜服方

鍾乳 禹餘糧 紫石英 甘艸 黃耆 石膏

千金方衍義卷四

補藥山房

白石英	獨椒	乾薑	各二兩
澤瀉	當歸	桂心	各六銖
芍藥	厚朴	柏子仁	各二兩
乾地黄	細辛	茯苓	各二兩
五味子	龍骨	石斛	各一兩半
遠志	人參	續斷	各一兩
白朮	防風	烏頭	各三銖
山茱萸	紫苑	白芷	各一兩
葉本	蕪荑	入錄	各十
右三十二味為末蜜丸梧子大酒服二十九加至			
三十九	千金翼有腸		
起石二兩			
小五石澤蘭圓	治婦人勞冷虛損飲食減少面		
無光色腹中痞痛經候不調吸吸少氣無力補			
益溫中方			
鍾乳	紫石英	礬石	各一兩半
白石英	赤石脂	當歸	各一兩
甘艸	石膏	陽起石	各四十
乾薑	澤蘭	菴菴	各二兩
龍骨	梲心	白朮	各二兩
芍藥	厚朴	人參	各二兩

獨椒 山茱萸 柏子仁 各一兩

葉本 蕪荑 各十

右二十三味為末蜜丸梧子大酒服二十九加至三十九日三

大五石澤蘭圓專主風虛寒中以寒積子藏純臍

惻惻痛非諸辛燥石藥不能溫之風入胞門而腹

內雷鳴非防芷等風藥不能透之與柏子仁丸之

大端不殊丹方一味白芷為部梁九總取祛風之

義此方即於柏子仁丸中除去石脂諸味配入禹

餘糧等以實脾收津為務非若柏子仁丸杜風固

經之比按赤脂禹糧仲景治下焦利不止並用作

湯專於固脫破之本經赤石脂主女子崩中漏下

禹餘糧治欬逆寒熱大五石方下原有寒熱等證

用禹餘糧最為合宜小五石方下全無風證故去

烏頭細辛防風芍芷等藥但加陽起礬石石脂等

味專行固脫扶陽故所加之味尤為必需上方

皆鍾乳與木並用專取相對激其成功拘於繩墨

者不可與言至巧也

增損澤蘭圓 治產後百病理血氣補虛勞方

澤蘭 甘艸 當歸

芎藭 各四十 附子

乾薑

白朮 各二 白芷

桂心

細辛 各二 防風

人參

牛膝 各三 柏子仁

乾地黄

石斛 各三十 厚朴

藥本

菴黃 各半 麥門冬 一兩

右二十味為末蜜丸如梧子大空心酒下十二丸

至二十九

義增損者增附子門冬牛膝損諸石龍骨等鎮固重

劑也方下所主本經原無藉於等味產後厥陰用

事風藥良不可缺但不必烏頭之峻攻而易附子

溫經為常用門冬者即金匱溫經湯之成法產後

以清理惡露為主一切固瀉咸為切禁故用牛膝

之類潤下佐澤蘭為引導也

大補益當歸圓 治產後虛羸不足胸中少氣服

中拘急疼痛或引腰背痛或所下過多血不止

虛極乏氣晝夜不得眠及崩中面目脫色唇乾

口燥亦治男子傷絕或從高墮下內有所傷藏

虛吐血及金瘡傷犯皮肉方

當歸 芎藭 續斷

乾薑 附子

白朮 各三 吳茱萸 各二

白芷 各三 桂心

乾地黄 十兩

右十三味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九日

二夜一不知加至五十九若有真蒲黃加一升絕

妙

白芷圓 治產後所下過多及崩中傷損虛竭少

氣面目脫色腹中痛方

白芷 五兩 乾地黄 四兩 續斷

當歸 阿膠 各二

附子 一兩

右七味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日四五

服無當歸芎藭代人蒲黃一兩妙無續斷大薊根

代

衍大補益當歸圓與前三卷中大補中當歸湯相類

專主產後崩中不止即於增損澤蘭圓中又行增

損損去澤蘭柏子仁人參 冬解辛防朴葉牛膝菴黃

加人阿膠茱萸芎藭續斷力溫經經得溫則流

行無活正得補而行止 有漸縱有墮墜損傷交可

藉以溫散可無積滯之虞矣至白芷圓土治相類而損之又損并去地黃芩桂枝木芍藥僅存七味藥愈損而功愈增百練精金其斯之謂歟

紫石英柏子仁圓 治女子過冬天時行溫風至春夏病熱頭痛熱毒風虛百脉沉重下赤白不思飲食而頭眩心悸酸嘶恍惚不能起身方

紫石英

柏子仁 各三兩

桂心

當歸 山茱萸

澤瀉

芎藭 石斛

遠志

寄生 菴菴

乾薑

甘艸 蜀椒

杜衡一作杜仲

玄附各一兩 細辛一兩

右十八味蜜和丸如梧子酒服二十九漸加至三

十九日三服 一方用杜蠟二兩

檢先哲方如參尊宿公案非心心相印何以體此

此方治女子過冬天時行溫風至春夏病熱頭痛熱毒風虛等證而所用諸藥渾是溫養血氣之味

天冬時溫風久伏至春夏而發溫熱頭痛皆辛溫助火重著補虛之品所可治乎逆推病情惟熱毒

風虛四字為致病之大綱惟其虛故風得久藏而

千金方衍義卷四 婦人產後起居不

化毒熱性其虛故陽不統陰而下赤白雖證見發

熱頭痛殊非溫病熱病逆身壯熱煩渴頭痛之比

方下原云溫風風為木邪同氣相感必入厥陰所

以頭眩心悸風主運動故也況明言百脉沉重而

下赤白不思飲食不能起居種種皆陽氣不足不

能統攝陰津而致下脫是不得不從事辛溫填補

血氣為務也因考諸本經言杜衡治溫風中入腦

戶頭腫痛涕淚柏子仁益氣除風熱辛夷治頭痛

腦痛芎藭治中風入腦頭痛寒痺彙參經旨總主

冬時溫風入藉於腦之患常見婦人產後起居不

慎而病頭風腦痛雖蒸蒸熱却大畏虛風雖當

夏月尚喜重綿裹護斯非熱毒風虛之一驗乎其

用石斛澤瀉寄生者一以清胃進食一以利水導

熱一以飭理赤白也若不達斯義以為此方主治

春夏溫熱與發薪救煉不殊殊失千金立方之奧

矣

鍾乳澤蘭圓 治婦人久虛羸瘦弱甚肢體煩痛

臍下結冷不能食面目瘵黑憂患不樂百病方

鍾乳 三兩 澤蘭 三兩 防風 四兩

人參 六兩 麥門冬 一

柏子仁

乾地黃	石膏	石斛	各二兩
芎藭	甘艸	白芷	
牛膝	山茱萸	薯蕷	
當歸	藁本	細辛	各三錢
桂心	蕪荑	艾葉	各一兩 半兩 十八錢

右二十一味爲末蜜丸如梧子酒服二十九加至四十九日二服

此方專主臍下結冷肢體煩熱故用鍾乳桂心艾葉峻溫其下石膏石斛麥冬分清其上其餘諸味各隨所主總以補下治本清上治標爲務也

大澤蘭圓一治婦人虛損及中風餘病痲瘖陰中冷痛或頭風入腦寒痺筋攣緩急血閉無子面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉或胃中冷逆胸中嘔不止及泄痢淋瀝或五臟六腑寒熱不調心下痞急邪氣欬逆或漏下赤白陰中腫痛胸脇支滿或身體皮膚中澀如麻豆若癢痰癖結氣或四肢拘攣風行周身骨節疼痛日眩無所見或上氣惡寒瀉泄如瘧或喉痺鼻癢風癩癩疾或月水不通魂魄不定飲食無味并產後內訥無所不治服之令人有子方

千金方衍義卷四 十一 婦科山房

澤蘭	六兩	葉本	當歸
甘艸	各一兩 十八錢	紫石英	三兩
乾地黃		柏子仁	五兩
桂心		石斛	各一兩 六錢
白芷		茯苓	厚朴
防風		薯蕷	茯苓
乾薑		禹餘糧	細辛
卷柏	各一兩	蜀椒	人參
杜仲		牛膝	蛇牀子
續斷		艾葉	蕪荑
赤石脂	各二兩	石膏	各十錢

右三十三味爲末蜜和丸如梧子大酒服二十九至四十九久赤白痢去乾地黃石膏麥門冬柏子仁加大麥蘗陳麴龍骨阿膠黃連各一兩半有鍾乳加三兩良一有枳實十八錢麥冬一兩半

小澤蘭圓 治產後虛羸勞傷身體虛瘦方

澤蘭 二兩 當歸 各一兩 甘艸 十八錢

芎藭 柏子仁 防風

茯苓 白芷 蜀椒

藁本 細辛 白朮

千金方衍義卷四 十二 婦科山房

桂心

蘇葉

人參

食茱萸

厚朴各十

石膏二兩

右十八味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九日

三服稍加至四十九無疾者依此方春秋二時常

服一劑甚良有病虛羸黃瘦者服如前 一方無

茯苓石膏有芍藥乾薑

行方以澤蘭命名原為調經而設以調經必須風藥

補虛必須溫味所以大澤蘭圓借治方下諸證咸

為合宜惟治鼻鼈喉痺難以槩論鼻鼈雖屬風寒

客於頭腦鬱遏既久乃從火化所以氣塞不通煮

雖鬱熱非假芍辛之溫散不能通達喉痺多屬龍

火鬱鬱最暴大禁辛溫祇暴寒卒犯少陰而喉痛

聲啞不腫不渴一證非溫不克然用辛熱破陰仍

須鹹寒治標則卷柏又為必須主人臨證洞若觀

火諒無不辨寒熱之理千金處方如主帥統師大

則大用小則小用其大澤蘭圓通治一切虛冷藥

一品不得不繁 小澤蘭圓專主產後羸瘦無藉三

石蛇蛭等重劑但進食茱萸一味振發參朮芍歸

之力以助澤蘭葉本治產後虛羸縛有餘裕矣

紫石英天門冬圓 治風冷在子宮有子常墮落

或始為婦便患心痛仍成心疾月水虧 未曾

服之肥充令人有子方

紫石英

天門冬

禹餘糧各一

蘇葉

烏頭

菴蓉

桂心

甘艸

五味子

柏子仁

石斛

人參

澤蘭

遠志

杜仲各二

蜀椒

卷柏

寄生

石南

雲母

當歸

烏賊骨各一

右二十二味為末蜜丸如梧子酒服二十九日二

服加至四十九

紫石英柏子仁丸主風寒襲於腦戶而化毒熱故

用細辛辛夷以搜腦戶之風風相仁杜薔以清巖

頂之毒熱此以風寒襲入腦門而墮胎也故用石

南雲母以溫子藏之沉寒卷柏身賦以清血室之

瘀熱則諸溫補各司其職而臟腑安和衝任無滯

心腹之疾自愈也

三石澤蘭圓 治風虛不足通血脈補氣 治方

鍾乳

白石地各四

紫石英

防風

藁本

伏神 各六錢

澤蘭 二錢六錢

黃耆

石斛

石膏 各二兩

甘艸

當歸

芍藥 各一兩十八錢

白朮

桂心

人參

乾薑

獨活

乾地黄 各一兩半

白芷

桔梗

細辛

柏子仁

五味子

蜀椒

黃芩

菴蓉

芍藥

秦朮

防葵 各一兩

厚朴

燕黃 各十

防葵 各一兩

千金方衍義卷四

十四

補藥出房

右三十二味為末蜜丸如梧子酒服二十九加至

三十九日二三服

行增損澤蘭圓即大小澤蘭圓之稍變三石澤蘭圓

即大小五石澤蘭圓之稍變以其專主風虛血虛

不通故於大五石中除去餘糧龍骨小五石中除

去礬石石脂等瀉固之藥專藉防葵以通血脉與

大小五石同源異派

大平胃澤蘭圓 治男子女人五勞七傷諸不足

定 忘意除煩滿手足虛冷羸瘦及月水往來不

謝體不能動等方

澤蘭

細辛

黃耆

鍾乳 各三兩

柏子仁

乾地黄 各二兩

大黃

前胡

遠志

紫石英 各二兩

芍藥

白朮

蜀椒 各一兩

白芷

丹參

枳實 各一兩

芍藥

桔梗

秦朮

沙參

桂心

厚朴

石斛

苦參

人參

麥門冬

乾薑 各一兩

附子 一枚

吳茱萸

麥藥 各五

陳麴 一升

棗 五十枚

十五

補藥出房

右三十二味為末蜜丸如梧子大酒服二十九加至

三十九令人肥健 一本無乾薑有當歸三兩

行不讀金匱方無以知千金之法源不讀千金方何

以廣金匱之變法此以大平胃名方則知專平胃

中陳氣也而方中一派峻補之藥與柏子仁圓大

小五石澤蘭圓三石澤蘭圓等方大都彷彿惟麴

藥根朴大黃平胃之品為承氣之正治其間補瀉

雜陳寒熱互用良難體會其旨三復求之始知其

為金匱薯蕷丸之變方方中秦朮前胡細辛白芷

即薯蕷丸中柴胡防風杏仁白斂開發風氣之變

法澤蘭柏仁門冬沙參即薯蕷丸中門冬枯樹湯

潤肺氣之變法熟稟大黃即薯蕷丸中法炮炙

黃芩疏通裏氣之變法椒黃黃附協濟參芪白朮

生乾地黃即薯蕷丸中乾薑桂枝協濟四君四物

溫理血氣之變法較薯蕷丸藥雖異而理一揆且

配合不可思議參芪得桂附則補而不壅桂附得

芍地則溫而不烈薑棗大黃得參朮桂附則泄而

不利允為補中寓瀉之良法不特為薯蕷丸之變

方又為大黃蠱蟲丸之變法觀方下主治恰與大

黃蠱蟲丸相類彼以內有乾血故蠱蟲乾漆為專

藥此以胃有陳氣則翅蠱大黃為必需況人參助

朮石莖輔乳較柏子仁丸等方之反激愈甚立法

愈奇何怪當世醫師目睹金匱千金諸方而為目

眩也達權之士但當精研其旨必不固守其方期

可法千金之妙用亦何妨通俗之變通也

澤蘭散 治產後風虛方

澤蘭 五分 禹餘糧 防風

石膏 白芷 乾地黃

赤石脂 肉桂 鹿茸

芎藭各二分 藜木 蜀椒

白朮 柏子仁各五分 桂心

甘艸 當歸 乾薑各七分

葶藶 細辛 厚朴各四分

人參 三分

右二十二味為末治下篩酒服方寸匕日三

義衍 男子以煖腎為補益婦人以調經為補益而經漏

多主中虛故藜木細辛防風白芷為本藥然經漏

每挾瘀滯則澤蘭芎藭厚朴葶藶尤為必需所以

柏子仁圓等一十三方大都相類惟固脫則兼龍

骨礬石開結則兼防葵杜蘅壯火則兼石南雲母

清熱則兼卷柏柏仁更一佐使而所主各司其在

矣此主產後風虛乃取鹿茸血氣所鍾之味配入

劑中與大膠蜜鹿茸散蒲黃散等方藥雖繁簡不

侔而溫補之功同彷彿其用鹿茸者與大補益當

歸圓中阿膠同義其方中禹餘糧防風澤蘭最多

而人參反少於葶藶細辛厚朴者不過借以鼓發

鹿茸地黃輩血藥之性原非用以益氣也孰謂錙

銖可忽乎

月水不通第十九方三十三首

乾薑 治婦人寒熱羸瘦酸消忘情胸中支滿

肩背脊重痛腹裏堅滿積聚或痛不可忍引腰

小腹痛四肢煩疼手足厥逆寒至肘膝或煩渴

手足虛熱意欲投水中百節盡痛心下常苦懸

痛時寒時熱惡心涎唾喜出每愛鹽酸甜苦之

物身體或如雞皮月經不通大小便苦難食不

生肌方

乾薑

芎藭

茯苓

消石

杏仁

水蛭

蠱蟲

桃仁

蟾蜍

千金方衍義卷四

柴胡

鹿藿 各一

芍藥

人參

大黃

蜀椒

當歸 各二

右十六味為末蜜丸梧子大空心飲下三丸不知

加至十九千金翼以療婦人 藏結臍下疾

天滿渠壅塞則水道不通血脉阻滯則經閉絕

婦人經閉不行非中有乾血何致積久不通觀于

金此門諸方縱有寒熱交錯緩急輕重不同一皆

破血為務乾薑丸雖本玉函抵當丸兼金匱下瘀

血湯大黃蠱蟲丸等法而藥味兼護且用豈丸而

所服甚少藥雖酸猛而用法最緩蠱蟲蟾蜍攻血

之專劑濟以清黃椒薑和以芍歸芍藥佐以桃杏

柴苓使蠱蛭等味得寒熱互擊之威助以人參壯

諸藥力續續推挽為破除乾血之良法蓋久伏之

瘀在人身中與元氣混成一片雖急攻之不能速

去故宜峻藥緩攻法克有濟所以治乾血之方用

丸居多間用酒煎以行經絡湯則藉為前導繼之

以丸可也

桃仁湯 治婦人月水不通方

杜棗

牡丹

千金方衍義卷四

射干

土瓜根

黃芩 各三

芍藥

大黃

柴胡 各四

牛膝

桂心 各二

水蛭

蠱蟲 各七

右十三味咬咀以水九升煮取二升半去滓分三

服

又方

桃仁 一升

當歸

土瓜根

大黃

水蛭

蠱蟲

芒硝 各二

牛膝

麻子仁

桂心 兩三

右十味 咬咀以水九升 煮取三升 半去滓 內硝令

烱分爲三服 肘後無當歸 麻子仁用牡丹射干黃芩芍藥柴胡各一兩 千金翼無真龜

芒硝湯 治同前

芒硝 丹砂末 當歸

芍藥 十瓜根 水蛭 各二

大黃 三兩 桃仁 升

右八味 咬咀以水九升 煮取三升 去滓 內丹砂芒

硝分三服

義 桃仁湯 前後二方咸木之於抵當湯其間斷整確

千金方行藥卷四

主

掃葉山房

黃桃仁 桂心 牛膝 土瓜根 等味皆同而前方又出

肘後原 其用柴胡 黃芩之意必是乾血內逆熱蒸

於上 故用少陽經藥兼射干 降而泄之 牡丹芍藥

不特和營兼滋乾血使之得潤而可漸通也 其後

方用當歸 滋燥即前方牡丹芍藥和營之意 用麻

仁潤下 則前方射干降泄之意 以無蒸熱故不用

少陽經藥也 其芒硝湯一方藥止八味 乃抵當

湯丸之三 土瓜根散之二 桃仁湯中之七 獨以丹

砂一味 鎮攝心主使血各歸其鄉 不致亂入 科囊

復爲瘀積 既敗之血 隨硝黃水 蛭桃仁引之下泄

與桃仁湯前後並馳無分優劣

消石湯 治血痕月水 膈瘀血大不通 下病散墜

血方

消石 附子 蠹蟲 各三

大黃 細辛 乾薑

黃芩 各一 芍藥 土瓜根

丹參 代赭 蟾蜍 各二

大棗 十枚 桃仁 二升 牛膝 一斤

朴硝 四兩

右十六味 咬咀以酒五升 水九升 漬藥一宿 明日

煎取四升 去滓 下朴硝 消石 烱盡 分四服 相去如

炊 通去病後食黃鳴羹 勿見風

義 方中芒硝消石並用 一治五臟積熱 一逐六腑積

聚 大黃附子並用 一治固結沉寒 一泄閉滯積氣

則 蝨蟲蟻蟪得以振破堅散血之功也

乾漆湯 治月水不通 小腹堅痛 不得近方

乾漆 葶藶 芍藥

細辛 附子 甘艸 各一

當歸 桂心 芒硝

黃芩 各二 大黃 三兩 吳茱萸 一升

右十二味咬咀以清酒一斗浸一宿煮取三升去
津內硝烱盡分三服相去如一炊頃

治月經不通心腹痛絞欲死通血止痛方

當歸 大黃 芍藥各三

吳茱萸 乾地黄 乾薑

芍藥 鹿蟲 水蛭各二

細辛 甘艸 桂心各一

梔子十四 桃仁一升

右十四味咬咀以水一斗五升煮取五升分五服

一木有牛膝麻子仁各三兩

千金方卷之九 婦人雜病

行 乾漆灰破血之猛帥濟以桂附硝黃交通寒熱凝

久伏之血可無負閉之悍益以歸芍藏其潤

澤可無堅乾之戚其細辛茱萸黃芩各隨寒熱之

佐使耳 干乾漆湯中除去漆灰以硝黃芩吳茱

萸麥粳易入磁研桃杏乾薑楝下芍藥地黃等味

糲不外乎攻血之旨一以堅痛不移故用乾漆堅

糲之物以磨礪之一以殺痛攻擊是氣血凝滯動

之物以剝蝕之兩不移易之定法桃仁潤之變方

也

前胡牡丹湯 治婦人盛實有熱在腹月經瘀閉

不通及勞熱熱病後或因月經來得熱不通方

前胡 牡丹 元參

桃仁 黃芩 射干

旋覆花 栝蒌根 甘艸各二

芍藥 茯苓 大黃

枳實各三

右十三味咬咀以水一斗煮取三升分三服

黃芩牡丹湯 治女人從小至大月經未嘗來顏

色萎黃氣力衰少飲食無味方

黃芩 牡丹 桃仁

天方香義卷四 婦人雜病

瞿麥 芍藥各二 芍藥

枳實 射干 海藻

大黃各三 蠶蟲十枚 水蛭五十

蟻蟻十枚

右十三味咬咀以水一斗煮取三升分三服服兩

劑後灸乳下一寸黑員際各五十壯

行 二方一因婦人所稟偏於熱勝及病後餘熱流於

血室而致不月故用前胡旋覆下熱氣而散餘邪

黃芩黑參以化無形之氣枳實大黃以導有形之

熱丹皮芍藥桃仁以潤燥安營射干栝蒌茯苓甘

艸以降氣利膈氣血交通當無慮於月事之阻滯矣一以女子月素未通或鬱熱內戰而致血結不行故用黃芩丹皮以化熱枳實大黃以導滯芍芍桃仁以和營射干瞿麥海藻以降逆蛙蟾螬以破血也其前胡牡丹湯本全匱旋覆花湯專祛子藏風氣以無乾血故無藉於蘇蚌黃芩牡丹湯本之抵當以無風氣餘熱故無取於柴芩其用海藻瞿麥與栝樓茯苓無異總輔射干以建開痰利水之勤耳

牡丹圓、治婦人女子諸病後月經閉絕不通及

從小來不通并新產後瘀血不消服諸湯利血後餘痰未平宜服之取平復方

牡丹 三兩
芍藥 元參
桃仁 常歸 桂心 各二兩
蠱蟲 水蛭 各五枚 蟬蛻 二枚
瞿麥 芎藭 海藻 各一兩
右十二味為末蜜和丸如梧子大酒下十五丸加至二十九血盛者作散服方寸七腹中當轉如沸血自化成水去如小便赤少除桂心用地膚子一兩

此以黃芩牡丹湯小變其法以急湯故用大黃丸以緩攻故用桂心總藉痲蟬螬之力也而盛者作散服服後血化成水而下即除桂心而用地膚清熱利水水即血之所化無限活法確在詳見證之緩急耳

乾地黃當歸圓 治月水不通或一月再來或隔月不至或多或少或淋瀝不斷或來而腰腹刺痛不可忍四體羸瘦不欲食心腹堅痛有青黃黑色水下或如清水不欲行動舉體沉重惟思眠臥飲食酸物虛乏黃瘦方

乾地黃 三兩 當歸 廿兩 各一兩
牛膝 芍藥 乾薑
澤蘭 人參 牡丹 各一兩
丹參 狗椒 白芷
黃芩 桑耳 桂心 各一兩
蠱蟲 四十枚 芎藭 八兩 桃仁 二兩
水蛭 十枚 麻黃 各七枚 蒲黃 二合
右二十一味為末蜜丸如梧子每日空心酒下十五丸漸加至三十九丸以知為度
月經雖常不通而有时斷來氣血阻且見腹痛

下青黃水明是乾血內滯欲成崩漏之兆故立方不離四物調經為主參入蘇麻桃仁以破滯血椒薑桂心以開結積黃芩桑耳以通肝氣人參以助藥力其餘諸味散血調經之佐也

治月經不通方

取葶藶一升為末蜜丸如彈子大綿裹內陰中入三寸每丸一宿易之有汗出止

破血之藥頗多獨取葶藶為導專行破積利水水去則血隨之而化矣

乾漆圓 治月經不通百病不瘥方

千金方衍義卷四 婦人山房

乾漆

土瓜根

射干

芍藥

牡丹

牛膝

黃芩

桂心

吳茱萸

大黃

柴胡 各一兩

桃仁

鱉甲

屬蟲

蟾蜍 各四兩

水蛭

蘇蟲 各七枚

大麻仁 四合

亂髮

雞子大 卷筒子 二合

右二十味為末以蜜和為丸每日酒下十五丸如梧子大漸加至三十九日三仍用後浸酒服前丸藥

義方下但言月經不通百病不瘥並未明言所見何病詳方中所用破血之味不待言矣其用柴胡鱉甲必有日晡寒熱也用麻仁土瓜根者必是津液

固結也用射干菴藷者必是上氣浮腫也用黃桂芩連者必因本寒標熱也其餘牡丹芍藥牛膝桃仁輩皆乾漆蘇麻之輔助也百病不瘥漸成勞瘵勞瘵之根不出乾血如上等味雖有兼治然無一不為瘀血起見也

浸酒方

大麻子

菴藷子 二升

桃仁

千金方衍義卷四 婦人山房

桂心

竈屋焙煤 各四兩

射干

牛膝 八兩

右八味咬咀以清酒三斗絹袋盛藥浸五宿以一盞下前九藥甚良或單服之亦好

義前乾漆圓羣隊破血曲盡百病不瘥之機而此復取方中七味加焙煤之輕浮故火浸酒服丸兩相

縱輔並用單用未為不可

當歸圓 治女人臍下癥結刺痛如蟲所嚙及如錐刀所刺或赤白帶下十二疾腰背疼痛月水或在月前或在月後方

當歸

葶藶

附子

吳茱萸

大黃各二兩

黃芩

枳心

乾薑

牡丹

芎藭各一兩

細辛

秦椒

柴胡

厚朴各一兩

牡蒙一方

甘艸各一兩

蠱蟲

水蛭各五枚

右十八味為末蜜丸如梧子空心酒下十五九日

再有胎勿服之

又方 治腰腹痛月水不通利方

當歸

芎藭各四兩

蠱蟲

烏頭

丹參

乾漆各一兩

人參

牡蠣

土瓜根

水蛭各二兩

桃仁五十枚

右十一味為末以白蜜丸如梧子大酒下三九日

三服

當歸丸前後兩方雖皆主治血結而有愈期闕絕

之不同前方專主癥結故取用桂附椒薑吳茱萸

辛熱破結即兼蠱蛭葶藶大黃子以病之出路用

牡蒙細辛柴胡黃芩者為帶下赤白而設以帶下

多緣風木也 後方專主閉絕不通故備用乾漆

桃仁蠱蛭葶藶逐血即兼人參烏頭戮力破除其

川人參用大黃各立見不得草草放過

驚甲圓 治女人小腹中積聚大如七八寸盤而

上下周流痛不可忍手足苦冷欬噫腥臭兩脇

熱如火灸玉門冷如風吹經水不通或在月前

或在月後服之一月便瘥有孕此是河內太守

魏夫人方

驚甲

桂心各一兩半

蜂房半兩

元參

蜀椒

細辛

人參

苦參

丹參

沙參

吳茱萸各十枚

蠱蟲

水蛭

乾薑

牡丹

附子

皂莢

當歸

芍藥

甘艸

防葵各一兩

蟪螬二十枚

蠱蟲

大黃各一兩

右二十四味為末蜜丸如梧子大酒下七九日三

稍加之以知為度

驚甲入肝為癥瘕癰瘕要藥有散血消積之功滋

陰清熱之効無苦寒傷中之虞峻攻耗氣之患夫

癥瘕結塊婦人居多以經行時不愜起居血隔也

積者十常四五故千金往往用之此丸當分作五
 分看蠱蛭蠱蝟大黃為小腹中積聚如盤而設乾
 血內著非苦寒不能逐之使下驚甲苦沙元參為
 兩脇熱如火灸而設癥積疝氣非滋陰不能化之
 使解椒辛皂夾防葵蜂房為上下周流痛不可忍
 而設風毒攻注非搜逐不能開之使泄薑桂黃附
 為玉門冷如風吹而設寒結固疾非辛烈不能破
 之使散甘艸人參二丹歸芍為手足苦冷欬噎脛
 臑而設傷殘之餘非溫理血氣不能培之使和人
 但知驚甲苦沙元參為滋陰清熱之用不知本經
 所主無一不為消堅散積之專藥至於防葵利血
 脈蜂房滌痰垢皆破敵之先鋒金匱驚甲煎丸用
 之婦人小腹如扇用附子湯亦金匱法非千金不
 能得其肯綮也

又方 治婦人因產後虛冷堅結積在腹內月經
 往來不時苦腹脹滿臍下痛引腰背手足煩
 或冷熱心悶不欲食方

驚甲 一兩 乾薑 赤石脂
 丹參 禹餘糧 當歸
 白芷 一兩 乾地黃 各一兩 代赭

廿艸 鹿茸 烏賊骨
 蠶蠶 各十 桂心 細辛
 蜀椒 附子 各一兩
 右十七味為末蜜和丸如梧子大空心酒下五丸
 加至十九

此方治產後虛冷是須溫補為宜雖有結滯滿痛
 而月事仍得往來與癥瘕固結不同故但取烏賊
 驚甲緩散痰積可無藉於蠶蛭苦參等味也蠶蠶
 白芷緩祛內風輔以椒辛可無藉于防葵蜂房等
 味也桂附乾薑專破冷結可無藉于吳茱萸也鹿
 茸滋養營血佐以歸地丹甘功力甚于人參也石
 脂禹糧代赭填補其空原無固結可無礙于止瀉
 也一以破結為先一以溫補為務二方可比例而
 論哉

禹餘糧 烏賊骨 吳茱萸
 禹餘糧 蜀椒 各二兩 當歸
 桂心 蜀椒 各二兩 當歸
 白朮 細辛 乾地黃
 人參 芍藥 芎藭
 前胡 各一兩 乾薑 三兩 礬石 六兩

白薇

鹿藿一兩

此藥

黃芩 各十
八銖

右十九味為末蜜和丸如梧子大空心酒若飲下
二十九日二不知則加之

衍義

此與驚甲丸第二方主治相類彼用白芷此用白
薇彼用殭蠶此用前胡彼用石脂此用礬石彼用
丹參此用紫苑彼用白朮此用甘艸彼用驚甲此
用麤蟲彼用鹿茸此用人參藥雖變易而功用仿
佛惟彼用附子以助鹿茸薑桂之雄此用黃芩分
椒薑細辛之悍涇渭攸分於此稍異

千金方衍義卷四

婦人產後

牡蒙圓 治婦人產後十二癥病帶下無子皆是

冷風寒氣或產後未滿百日胞胎惡血未盡便

利于懸罔上及久坐濕寒入胞裏結在小腹牢

痛為之積聚小如雞子大者如拳按之跳手隱

隱然或如蟲嚙或如針刺氣時捨心兩脇支滿

不能食飲食不消化上下通流或守胃管痛連

玉門背膊嘔逆短氣汗出小腹苦寒胞中創欬

引陰痛小便自出子門不正令人無子腰膝疼

痛四肢沉重滯躍一身盡腫乍來乍去大便不

利小便淋瀝或月經不通或下如腐肉青黃赤

白黑等如豆汁夢想不祥方一名紫

牡蒙

厚朴

消石

前胡

乾薑

麤蟲

牡丹

蜀椒

黃芩

桔梗

茯苓

細辛

葶藶

人參

芎藭

吳茱萸

桂心各十
八銖

大黃二兩
半

附子一兩
六銖

當歸半兩

右二十味為末蜜和更搗萬杵丸如梧子大空心
酒服二九日三不知則加之至五六九下青白黃

千金方衍義卷四

婦人產後

赤如魚子者病根出矣

衍義

方下主治最繁總不出冷風寒氣四字為致病之

綱所以首推牡蒙前胡專祛胞門風氣餘皆因病

變證之治法與前當歸丸二方參看其義自明

治月經不通結成癥瘕如石腹大骨立宜此破血

下癥方

大黃

消石各六
兩

巴豆

蜀椒各一
兩

代赭

柴胡熬
色

水蛭

丹參熬令
紫色

土瓜根各三
兩

乾漆

芎藭

乾薑

蟲蟲 扶杖各二

右十四味為末巴豆別研蜜和丸如梧子空心酒服二九不知加至五九日再服千金翼無柴胡水

癥結日久而致腹大骨立窳無風氣崩帶別證夾雜但須專力破癥散則精自回形自復而柴胡

用熬欲其內疎肝氣無取外散之意惟氣虛不勝攻剋者未可輕試

大蘇蟲圓 治月經不通五七年或腫滿氣逆腹脹疲痛宜服此數有神驗方

蘇蟲四百枚 蟾蜍一升 乾地黃

牡丹 乾漆 芍藥 牛膝 土瓜根 桂心各四兩

吳茱萸 桃仁 黃芩 牡蒙各三兩 扶苓 海藻各五兩

水蛭三百枚 芒硝二兩 人參半兩 葶藶五合

右十九味為末蜜丸梧子大每日空心酒下七九不知加之日三服

癥結歲久月閉不通非師金匱之法無以措指方中蟲蟲水蛭蟾蜍乾漆桃仁芍藥地黃黃芩等味

大黃蘇蟲丸中藥也其外牡蒙土瓜根牛膝牡丹專破癥積之癥葶藶海藻芒硝專破血化之水參

荅柱心專扶正氣而行藥力也 柱心酒 治月經不通結成癥瘕方

桂心 牡丹 芍藥 牛膝 乾漆 土瓜根 牡蒙各四兩 吳茱萸一升 大黃三兩

黃芩 乾薑各二兩 蘇蟲二百枚 蠶髮灰 細辛各兩 蠶蠶五十枚

大蘇仁 龜突墨三升 乾地黃六兩 虎杖根 鱉甲各五兩 菴藷子一升

右二十四味咬咀以酒四斗分兩甕浸之七日併一甕盛攪令調和分作四甕初服二合日二加至三四合

虎杖煎 治腹內積聚雷鳴四肢沉重月經不通亦治丈夫病方

取高車皮根細剉二斛以水二石五斗煮取

一人斗半去滓澄濾令淨取好醇酒五升和煎

令如飴每服一合消息為度不知則加之

又方 治月經不通結瘕腹大如囊短氣欲死方

虎杖根百斤去頭去

土瓜根

牛膝各取二斗

右三味咬咀以水一斛浸虎杖根一宿明日煎取

二斗內土瓜牛膝汁攪令調和煎令如湯每以酒

服一合日再夜一宿血當下若病去止服

桃仁煎 治帶下經閉不通方

桃仁

蠹蟲各一升

朴硝五兩

大黃六兩

右四味為末別治桃仁以醇苦酒四升內銅鑪中

千金方衍義卷四

柔

搗葉山房

炭火煎至二升下大黃桃仁蠹蟲等攪勿住手當

欲可丸下朴硝更攪勿住手良久出之可丸乃止

取一丸如雞子黃投酒中一宿勿食服之至脯

時下如大豆汁或如雞肝凝血蝦蟆子或如膏此

是病下也

治月經不通甚極閉塞方

牛膝一斤

麻子三升

土瓜根三兩

桃仁一升

右四味咬咀以好酒一斗五升浸五宿一服五合

漸加至一升日三能多益佳

治產後風冷留血不去停結月水閉塞方

桃仁

麻子仁各一升

菴藟子一升

右三味咬咀以好酒三斗浸五宿每服五合日三

稍加至一升

破血以酒捷以湯丸而所用之味與湯丸無異惟

虎杖根龜突墨為散血利水之專藥其虎杖煎虎

杖一瓜根牛膝酒桃仁煎牛膝麻子土瓜桃仁酒

桃仁麻子菴藟酒等方皆桂心酒中一鱗片甲耳

治月經不通臍下堅結大如杯盤發熱往來下痢

羸瘦此為血瘕若生肉瘕不可為也療之方

千金方衍義卷四

柔

搗葉山房

生地黃三斤

乾漆一斤

右二味以漆末內地黃汁中微火煎令可丸每服

酒下如梧子大三九不知加之常以食後服

生地黃得乾漆灰則寒而不滯乾漆灰得生地黃

則滅而不猛真破瘕之專藥但須審元氣可任者

用之

五京湯 治婦人腹中積聚九痛七害及腹中冷

引小腹善食得冷便下方

乾薑

蜀椒各三兩

附子一兩

吳茱萸一升

當歸

狼毒

黃芩

牡蠣各二兩

右八味為末蜜和丸如梧子初服三九日二加至十九此出京氏五君故名五京久患冷困者當服

義衍此於金匱九痛丸中除去人參巴豆二味乃加蜀椒以下氣當歸以和血牡蠣以消堅黃芩以泄滿

蓋痛欲速療積宜緩追故用當歸黃芩以緩狼毒附子之急也

雞鳴紫圓 治婦人癥瘕積聚方

皂莢一分

紫蘆

甘艸

千金方衍義卷四

五

掃葉山房

礬石

烏啄

杏仁

乾薑

桂心

巴豆各二分

前胡

人參各四分

代赭五分

阿膠六分

大黃六分

右十四味為末蜜丸如梧子雞鳴時服一九日益一九至五九止仍從一起下白者風也赤者癥瘕也再微黃者心腹病

義衍皂莢紫蘆涌吐頑痰之首藥烏啄巴豆溫破堅積之猛藥人參大黃補中寓瀉之聖藥識此精義餘

可倒推矣

遼東都尉所上圓

治臍下堅癖無所不治方

恒山

大黃

巴豆各一分

天雄

苦參

白薇

乾薑

人參

細辛

狼毒

龍膽

沙參

元參

丹參各三分

芍藥

附子

牛膝

茯苓各五分

牡蒙

薤蘆六分

右二十味為末蜜丸宿勿食服五九日三大麻痺

月水不調當二十五日服之下長蟲或下種種病

千金方衍義卷四

五

掃葉山房

出二十五日服中所苦悉愈肌膚盛五十日萬病

除斷緒者有子

義衍此治痰癖藥也痰癖多由風氣積聚故首推恒山

以吐胸中逆滿末取薤蘆以利臍下堅癖其他諸

藥悉隨嚮導而建破積之功略無干於破血之味

也

牡蠣圓 治經閉不通不欲飲食方

牡蠣四兩

大黃一斤

柴胡五兩

乾薑三兩

芎藭

茯苓各三兩

蜀椒十兩

葶藶子

菖蒲

杏仁 各五

水蛭

蟲蠱 子十

桃仁 七十

右十三味為末蜜丸如梧子大飲服七九日三

義有蠅葶為破結利水之要藥前陽治大病瘵後

腰以下有水氣用之此治經閉不通血化為水上

逆而見吐逆寒熱故用柴胡薑杏仁茯苓以下

氣蠱蛭消黃芩薊桃仁以破血與牡蠣澤瀉故同

源異派

赤白帶下崩中漏下第二十三論 二首 方六十

論曰諸方說三十六疾者十二癥九痛七苦五傷三

千金方卷之四

癥不通是也何謂十二癥是所下之物一日狀如膏

二日如黑血三日如紫汁四日如赤肉五日如膿

六日如豆汁七日如葵羹八日如凝血九日如清血

血似水十日如米泔十一日如月浣乍前乍却十二

口經度不應期也何謂九痛一日陰中痛傷二日陰

中淋瀝痛三日小便即痛四日寒冷痛五日經來即

腹中痛六日氣滿痛七日汁出陰中如有蟲蟻痛八

日脇下分痛九日腰膝痛何謂七害一日窮孔痛不

利二日中寒熱痛三日小腹急墜痛四日藏不仁五

日子門不端引背痛六日月浣乍多乍少七日害吐

何謂五傷一日兩脇支滿痛二日心痛引脇三日氣

結不通四日邪思洩利五日前後癩寒何謂三癩一

問羸瘦不生肌膚二日絕產乳三日經水閉塞病有

異同具治之方

白聖圓 治女人三十六疾方 又方見後

白聖 龍骨 芍藥 各十

黃連 當歸 茯苓

黃芩 瞿麥 白薇

石韋 甘艸 牡蠣

細辛 附子 禹餘糧

千金方卷之四

白石脂 人參 烏賊骨

葇木 相皮 大黃 各半

右二十一味為末蜜和丸如梧子大空腹飲服十

丸日再不知加之二十日知一月百病除若十二

癥倍牡蠣禹餘糧烏賊骨白石脂龍骨若九痛倍

黃連白薇甘艸當歸若七害倍細辛相皮葇木加

蜀椒萊蕪各二兩若五傷倍大黃石韋瞿麥若三

癩倍人參加赤石脂礬石巴戟天各半兩合藥時

隨病增減之

義衍白聖丸前後兩方統治婦人三十六疾究其所主

總不出帶下崩漏也方下所去十二瘕者以子肝
 傷損所下種不能若破驗雖非瘕瘕若瘕結不散
 久而具形腸成固疾矣子戶傷損血氣狼戾未有
 不為諸病者痛久不已未有不害及經府者所以
 一方能主不疾諸疾不離崩帶所謂治病必求其
 本也方以取聖命名取其溫中益氣專主寒熱瘕
 瘕月閉積聚石脂治崩中漏下禹餘糧治血閉瘕
 瘕龍骨治漏下瘕瘕結堅牡蠣治赤白帶下五者
 皆本經主治烏賊骨治氣竭肝傷月事衰少不來
 此則素問主治其葉葢細辛專散下稟虛風石韋
 聖 攝山房

千金方衍義卷四

聖

攝山房

聖參專祛下阻血熱苓連大黃專除內蘊積滯然
 非人參不足以助其力非附子不足以鼓其氣不
 特補瀉相需寒熱互用深得長沙妙旨而彙取兜
 澀之龍以安傷殘之餘庶幾痛止害平氣血漸復
 是歸芍苓甘柑皮之屬雖庸不廢斯可藉以流布
 也 其第二方主治不殊而虛寒過甚關闔廢弛
 故取鍾乳佐白朮輩以固脫利竅薑桂蜀椒佐附
 子以安中止崩白芷杜風治陰腫與藁本無異以
 方中辛烈過多故無藉人參柑皮助氣耳 其後
 月經不調例中復有白朮丸方乃於第一方中除

去大黃茯苓藁本柑皮易入薑桂椒芷于第二方
 中除去鍾乳茯苓大黃仍從事於人參以無內蘊
 之滯故用法稍平其隨病增減之妙長沙之後千
 古一人而已

赤石脂圓 治女人腹中十二疾 一曰經水不時

二曰經來如清水三曰經水不通四曰不問時

五曰生不乳六曰絕無子七曰陰陽減少八曰

腹苦痛如刺九曰陰中冷十曰子門相引痛十

一曰經來凍如葵汁狀十二曰腰急痛凡此十

二病得之時因與夫臥起月經不去或臥濕冷

地及以冷水洗浴當時取快而後生百病或瘡

瘕未瘥便合陰陽及起早作勞衣單席薄寒從

下入方

赤石脂 半夏 各一兩 蜀椒

乾薑 吳茱萸 當歸

杜心 丹參 白薇

防風 各 藿蘆 半兩

右十一味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒服

十九日三不知稍加以知為度

曰石脂圓 治婦人三十六疾胞中痛漏下赤白

方

白石脂

烏賊骨

禹餘糧

牡蠣各十

赤石脂

乾地黄

乾薑

龍骨

桂心

石韋

白薇

細辛

芍藥

黃連

附子

當歸

黃芩

蜀椒

鍾乳

白芷

芎藭

甘艸各半

右二十二味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒

千金方義卷四

聖

婦科山房

下十五丸日再

一方有黃蘗半兩

婦人經癸不調總以溫理血氣為主或因形寒飲

冷而阻絕不行或因房勞過劇而匹脫無度詳推

治例必於固脫劑中兼散乾血庶兩得之所以赤

石脂圓雖用石脂必兼薑桂椒黃辛溫散結則石

脂無挾滯結痛之虞然非當歸丹皮不能使血歸

經非白薇防風不能杜風祛熱更須半夏以清中

焦營氣之原蘘蘆以除癥瘕之積所謂標本兼該

之治也 白石脂圓雖取白以固氣必兼赤以固

血其禹餘糧等味則與白聖丸相彷彿用歸為此

用芎藭猶退藥本而進白芷之義也

小牛角鯁散

治帶下五賁一曰熱病下血二曰

寒熱下血三曰經脈未斷為房事則血漏四曰

經來舉重傷任脈下血五曰產後藏開經利五

賁之病外實內虛方

牛肉鯁一枚燒

鹿茸

禹餘糧

當歸

乾薑

續斷各二

阿膠三兩

烏賊骨

龍骨各二

赤小豆二升

右十味治下篩空腹以酒服方寸七日三

千金方義卷四

聖

婦科山房

烏賊骨

此方專主五賁下血方用角鯁以治帶下血崩鹿

茸以治漏下惡血一止一散先為五賁之專藥禹

餘糧以治帶下赤白血閉癥瘕能行能止匡佐上

二味之功力更以龍骨輔角鯁烏賊輔鹿茸皆

寓止散之機阿膠專主內崩乾薑專溫中氣小豆

專清小腸當歸續斷專主衝帶二脈之病為崩帶

之緊關也

龍骨散 治淳下十二病絕產一曰白帶二曰赤

帶三曰經水不利四曰陰胎五曰子藏墜六曰

藏癖七日陰陽患痛八日內強九日腹寒十日
藏閉十一日五藏酸痛十二日夢與鬼交宜服
之淳下
一本

龍骨三味

黃蘗 半夏

窟中黃土

桂心 乾薑各二兩

石葦

滑石各一兩 烏賊骨

代赭各四兩

白殭蠶五十枚

右十一味治下篩酒服方寸七日三白多者加烏

賊骨殭蠶各二兩赤多者加代赭五兩小腹滿加

黃蘗二兩子藏堅加乾薑桂心各二兩已土各隨

病增之服藥三月有子即住藥藥太過多生兩子

當審方取好藥寡婦童女不可妄服

前小牛角鯁散專主內崩此龍骨散專清子藏方

中龍骨代赭窟中黃土各司藏痕堅結赤沃漏下

胎漏下血之任桂心乾薑半夏各司通經散結溫

中滌穢下氣通痰之任滑石石葦黃蘗各司濕熱

閉著癰閉不通陰傷蝕瘡之任烏賊殭蠶各司散

血行經祛風化痰之任與小牛角鯁散相為犄角

服藥三月有子得非宿有微檢歟

治女子帶下諸病方

大黃蒸三斗 附子

茯苓

牡蒙 粗丹

桔梗

葶藶各三兩

厚朴

芎藭

人參

當歸

龜蟲

獨椒

吳茱萸

柴胡

乾薑

桂心各半兩

細辛二兩半

右十八味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒服

二九不知加之以腹中溫溫為度一本有麻子澤

治帶下百病無子服藥十四日下血二十日下長

蟲及青黃汁出三十日病除五十日肥白方

千金方衍義卷第

婦科

大黃破如豆粒 柴胡

朴硝各一斤

芎藭五兩

乾薑

蜀椒各一斤

茯苓如雞子

右七味為末蜜和丸如梧子大先食米飲服七丸

不知加至十九以知為度

風從土受則為喘為嗽風從下入則為帶為崩是

以千金治經候崩帶之疾必用杜風滌垢之味泰

入辛溫散結劑中世都莫解其故此方與六卷月

水不通例中當歸丸相類牡蒙丸當歸丸中但多

水睡黃芩甘艸而無人參茯苓桔梗夫黃芩甘艸

與茯苓桔梗無所關係也惟水蛭人參攻補懸殊
 牡蒙丸中但多蟻蟲前胡黃芩硝石而無蟲柴
 胡麻蟲柴胡與蟻蟲前胡功用彷彿也惟硝石之
 悍與當歸丸中水蛭為立也一專滌垢一專破血
 且挾大黃附子之威無聲不克所以略更一二便
 易方名其治帶下百病無子方即於女子帶下諸
 病方中裁去其半服藥十匝日下血二十日下長
 蟲及青黃汁出得非殊滅力專之驗歟

治帶下方

枸杞根 一升 生地黃 五升

千金方卷四

果 補虛山房

右二味咬咀以酒一斗煮取五升分三服

肥人帶下多屬痰濕瘦人帶下多屬陰虛此方專
 用生地黃以清血熱則兼枸杞根以清蒸熱為瘦
 人陰虛帶下腥稀色黃者之方與胃中濕熱下
 流色白精厚者略無干涉然須酒煮方有和營逐
 血之功

治婦人及女子赤白帶下方

禹餘糧

當歸

芎藭 各一兩半

赤白脂

白石脂

阿膠

龍骨

石韋 一兩

烏賊骨

黃葉 一白薇 黃芩 黃
 續斷 桑耳 牡蠣 各一
 右十五味為末蜜和丸如梧子大空心飲下十五
 丸日再加至三十九為度

義衍 帶下而至赤白交併明係患久虛脫故用鎮固而
 兼揆逐以治其本滋血而兼清熱以治其標標本

兼得之妙用惟千金得之
 白馬蹄圓 治女人下焦寒冷成帶下赤白洗方

白馬蹄

驚甲

附子

龜甲

蜀椒 各一兩

鯉魚甲

千金方卷四

果 補虛山房

甘艸

杜仲

磁石

當歸

續斷

草薢

禹餘糧

桑耳

芎藭 各二兩

右十五味為末蜜丸如梧子大以酒服十九加至
 三十九日三服 一木無 通甲

義衍 赤白帶下積久不愈必有瘀結留著於內非辛溫
 無以療之然血氣久傷草根木實不足以固其脫

故取異類有情之物方得同氣相感之力白馬蹄
 龜鱉鯉魚甲皆厥陰任衝之嚮導以其稟賦寒濕
 漏之功禹餘糧磁石專行固脫蜀椒川附專行溫

散草薛桑耳一取入肝搜風一主漏下赤白有散
斂相需之妙蓋白馬蹄專主白崩赤馬蹄專主赤
崩本經取治驚邪癰癧難別錄取治助血內崩
總取清理血室之用桑耳濇潤善祛子藏風熱不
但主漏下并可以治寒熱積聚去則不難成
孕矣其用芎歸續斷杜仲其艸不過調和血氣之
輔助耳

白馬駢散 治帶下方下白者取白馬駢下赤者取赤馬駢隨色取之

白馬駢 二兩 龜甲 四兩 鱉甲 十枚

牡蠣 一兩 十枚

千金方表卷四 聖 補葉山房

右四味治下飾空心酒下方寸七日三服加至一

七半

行義此方與前白馬蹄丸功用相仿而白馬駢與白馬蹄功用亦相仿龜鱉二甲相為輔佐亦相仿惟牡蠣鹹入腎有稟堅止漏之能可抵馱餘糧磁石之功其主赤白帶下亦本經之旨駢即是髻隨赤白色燒灰用之

治五色帶下方

服大豆紫湯日三服方見前二卷風篇中

又方

燒馬左蹄為末酒服方十七日三

又方

燒狗頭和毛皮骨為末以酒服方寸七

又方

煮餓帶汁服一杯良

又方

燒馬蹄底護乾為末酒服三寸七日三

可狗屬腎溫補火土二臟取頭骨燒灰酒服則有止

血之功丹溪常用之

雲母芎藭散 衛公治五崩身瘦欬逆煩滿少氣

千金方表卷四 聖 補葉山房

心下痛面生瘡腰痛不可俯仰陰中腫如有瘡

狀毛中癢時痛與子藏相通小便不利常拘急

頭眩頸項急痛手足熱氣逆衝急心煩不得臥

腹中急痛食不下吞酸噎苦上下腸鳴漏下赤

白青黃黑汁大臭如膠汚衣狀皆是內傷所致

中寒即下白熱即下赤多飲即下黑多食即下

黃多藥即下青或喜或怒心中常恐或憂勞便

發動大惡風寒方

雲母 芎藭 代赭

東門邊木 一兩 燒各 白殭蠶 烏賊骨

白堊

蝟皮各六

鱉甲一

桂心

伏龍肝

生鯉魚頭各十

右十二味治下飾酒服方寸七口三夜一方

有龍骨乾葛

衍義

方下諸證總是營血受傷火氣遊行隨虛而陷

之患五崩身瘦以下見證種種一皆內傷所致中

寒則下白以下見證又為飲食藥餌所傷更加喜

怒憂勞七情擾動則大惡風寒此元神不能固護

於外恐人誤認客邪所以特為招揭而立方首推

雲母以鎮攝虛陽代蒲以歛固精血白堊以統領

諸氣伏龍肝以溫理脾胃脾胃為身之津梁津梁

充實氣血有所統攝矣其蝟皮烏賊鱉甲逐蠶生

鯉魚頭血肉諸味咸為推陳致新之用獨桂心一

味合芍藥為從治虛熱之嚮導東門邊木取莖方

之氣燒灰以散瘀結也

慎火艸散 治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近

令人面黑無顏色皮骨相連月經失度往來無

常小腹空急或苦絞痛上至心兩脇腫脹食不

生肌膚令人偏枯氣息乏少腰背痛連脇不能

久立嗜臥用懶方又方

慎火艸

白石脂

禹餘糧

鱉甲

乾薑

細辛

當歸

芎藭

石斛

芍藥

牡蠣各二

黃連

薔薇根皮

乾地黃各四

熟艾

桂心各一

右十六味治下飾空腹酒服方寸七日三稍加至

二七若寒多者加附子蜀椒熟多者加知母厚黃芩

各一兩白多者加乾薑白石脂赤多者加桂心代

蒲各二兩

千金方衍義卷四

衍義婦人之患隱疾十常四五其受病之源有因風下

襲因濕內著因冷積瘀因怒動血因勞傷經種種

不同而所見之證有實有虛有虛中實滯有熱因

寒阻有寒熱交錯則又隨所稟之偏與將怒失宜

所致也此方以慎火艸為主慎火即是景天力能

辟火故又名慎火本經大熱火瘡身熱煩邪惡氣

而用以治崩中帶下取其能祛肝家濕熱也佐以

石斛黃連專為清火而設石脂餘糧專為固脫而

設薑根辛艾專為溫經而設芎藭芍地專為和營

而設鱉甲牡蠣專為軟堅而設薔薇根皮專為陰

世不瘳而設亦本經之主治也 本門後復有慎
火散一方以慎火艸熬黃殺其苦寒之性資以鹿
茸龍骨阿膠當歸溫補固本藉慎火之清熱治標
此中奧義惟千金得之

禹餘糧圓 治崩中赤白不絕困篤方

禹餘糧 五兩 白馬蹄 十兩 龍骨 三兩

鹿茸 二兩 烏賊骨 一兩

右五味為末蜜丸梧子大酒服二十九日再以知
為度

千金治崩漏多用血肉之味此用馬蹄鹿茸龍骨

千金方衍義卷四

烏賊皆止中寓散之意禹餘糧則專於固脫惟久
崩困篤者宜之若瘀血固結少腹堅滿者則又未
可輕試也

增損禹餘糧圓 治女人勞損因成崩中狀如月

經來去多不可禁止積日不斷五臟空虛失色

黃瘦崩竭暫止少日復發不耐動搖小勞輒劇

治法且宜與湯未宜與此丸也發時服湯減退

即與此丸若是疾久可以長與此方

禹餘糧 龍骨 人參

桂心 紫石英 烏頭

寄生 杜仲 五味子

遠志 各二兩 澤瀉 當歸

石斛 菴蓉 乾薑 各三兩

蜀椒 牡蠣 甘艸 各一兩

右十八味為末蜜丸梧子大空心酒下十九漸加
至二十九日三服

勞損成崩而用溫補固脫宜矣若小勞復發之時

恐有瘀結未去又須先與湯液蕩平血氣然後用

禹梘石英龍骨牡蠣以振固脫之功椒薑烏桂以

建溫經之動寄仲歸從以資和營之用志味劑澤

以行通調之力人參甘艸以鍾諸藥之性洵為久

疾長服之神丹也

治女人白崩及痔瘡方

柳耳 白薇 艾葉

蒲黃 白芷 各二兩 黃芪

人參 續斷 當歸

禹餘糧 楠皮 扶苓

乾地黄 峭皮 各三兩 猪後懸蹄 二十

白馬蹄 酒浸一牛角肥 各四兩

右十七味為末蜜丸空心酒下二十九日二加之

此方雖列崩門而所重全在瘵病故用槐耳專治大腸血熱若主崩漏則用桑耳專清子藏風熱矣至用苙菰蒲艾芪續歸地棗橘禹糧之屬乃相兼二者之治惟牛鯁馬蹄爲崩門專藥蝟皮狗蹄又專主痔病而尅削最甚卽有人參一味敵以上四味之性尚恐不及安望其有補益之力哉

治婦人忽暴崩中去血不斷或如鴨鴨肝者方

小薊根 六兩

當歸

阿膠

續斷

青竹茹

芎藭 各三兩

生地黃 八兩

金月下土

續斷 各四兩

馬通

一升赤帶用赤馬白帶用白馬

千金方衍義卷四

續斷

續斷

右十味咬咀以水八升和馬通汗煮取三升分三服不止頻服三四劑未全止

續服後丸方

續斷

甘艸

地榆

鹿茸

小薊根

丹參 各三兩

乾地黃 二兩

芎藭

赤石脂

阿膠

當歸 各一兩半

龜甲

秦牛角 鯁 各三兩

柏子仁 一兩

集驗 作柏葉

右十四味爲末蜜丸如梧子大空心酒服十九日

再後稍加至三十九

崩中起於忽暴明是不慎受傷而至去血不止如鵝鴨肝急需蕩滌爲先非患久涉虛宜用溫補之比故取小薊竹茹破血爲主而兼芎歸地續阿膠地榆和血之劑以佐薊根竹茹之力惟釜月下土以溫土和營馬通以逐血解毒也服三四劑稍可而未全止恐元神委頓則於前方除去馬通傷胃之味而進鹿茸牛鯁龜甲固營之品更以石脂代釜月下土柏子仁以代竹茹又大減薊根佐以丹參甘艸此先後應敵者也

千金方衍義卷四

續斷

續斷

治女人崩中去赤白方

白馬蹄 五兩

蒲黃

鹿茸

禹餘糧

白馬鬣毛

小薊根

白芷

續斷 各四兩

人參

乾地黃

柏子仁

烏賊骨

黃芪

茯苓

當歸 各三兩

艾葉

菴蓉

伏龍肝 各三兩

右十八味爲末蜜丸梧子大空心飲服二十九日

再加至四十九

此方溫中散瘀兼得其與允爲調適久崩之合劑

當歸湯 治崩中去血虛羸方

當歸

芎藭

黃芩

芍藥

甘艸 各二兩

生竹茹 二升

右六味咬咀以水一斗煮竹茹取六升去滓內諸

藥煎取三升半分三服忌勞動嗔怒禁房事百日

衍方下雖主崩中去血虛羸必竟血虛火旺火能消

物所以羸瘦方用芎藭芍藥專行和血甘芩竹茹

專清胃熱然惟始病用之為宜若久因虛羸當非

此方可治也

治崩中晝夜十數行眾醫所不能瘥者方

千金方衍義卷四

藥 抽葉山蘇

芎藭八兩咬咀以酒五升煮取三升分三服不

飲酒者水煮亦得

衍崩中而至晝夜十數行眾醫不能瘥必是瘀結占

據血室而致血不歸經非辛散不能破結故專取

芎藭一味大劑酒煮以行其滯庶子藏安和然後

能瘥雖暴崩治法而耗氣最猛稍涉虛者慎勿輕

投

治崩中下血出血一斛服之即斷或月經來過多

及過期不來者服之亦佳方

吳茱萸

當歸 各三兩

芎藭

人參

芍藥

牡丹

桂心

阿膠

生薑

甘艸 各二兩

半夏 八兩

麥門冬 一升

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服

衍此即金匱溫經湯原方妙用全在黃桂之散結薑

半之滌垢尤妙在麥冬滋燥也

治暴崩中去血不止方

牡蠣

兔骨 各二兩 半炙

右二味治下篩酒服方寸七日三

衍免為至陰之精骨乃腎氣之合能治產難下胎及

千金方衍義卷四

藥

產後餘血不下配以牡蠣之專入少陰而本經上

治女子赤白帶下非取其軟堅散結之力歟

治女人白崩方

芎藭

桂心

阿膠

赤石脂

小薊根 各二兩

乾地黃 四兩

伏龍肝 加雞子 大一枚

右七味咬咀以酒六升水四升合煮取三升去滓

內膠合烺盡分二服 三 味無伏龍肝 千金翼止六

即治婦人忽暴崩中去血不斷如鵝鴨肝後方之

的派變丸為湯水酒和煎取其立功之速也

伏龍肝湯 治崩中去赤白或如豆汁方

伏龍肝如彈子大七枚 生薑五兩 生地黃四升一兩

甘艸 艾葉 赤石脂

桂心各二兩

右七味咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜

此以伏龍肝赤石脂固脫而兼桂艾溫經地黃滋

血甘艸生薑開提胃氣以和寒熱之性也

大牛芎中人散 治積冷崩中去血不出腰背痛

四肢沉重虛極方

千金方衍義卷四

李

牛角仁一枝 續斷 乾地黃

桑耳 白朮 赤石脂

礬石 乾薑 附子

當歸各三兩 人參一兩

蒲黃 防風 禹餘糧各二兩

右十五味治下篩以溫酒末食服方寸七日三不

知稍加

即前小牛角總散之變法方中地黃乃阿膠之變

桑耳乃赤小豆之變蒲黃乃烏鰂骨之變人參乃

鹿茸之變附子白朮專用溫經石脂礬石專行固

脫防風一味專祛子藏中風且治腰背痛四肢沉

重兼行地黃之滯以其積冷虛極非峻用溫補兜

澀必難取効耳

治崩中去血積時不止起死方

肥羊肉三斤 乾薑 當歸各三兩

生地黃二升

右四味咬咀以水二斗煮羊肉取一斗三升下地

黃汁及諸藥煮取三升分四服即斷尤宜羸瘦人

服之

即金匱當歸生薑羊肉湯因加入生地黃以滋血

千金方衍義卷四

李

故改用乾薑以行其滯

生地黃湯 治崩中漏下月去數升方

生地黃一斤 細辛三兩

右二味咬咀以水一斗煮取六升服七合久服佳

此治風入胞門蘊化為火而崩漏無度故專用地

黃以滋血室之熱細辛以散厥陰之風風散則火

熄而血自安矣以有細辛之辛散故無藉於酒煮

也

治崩中漏下赤白不止氣虛竭方

龜甲 牡蠣各三兩

右二味治下篩酒服方寸七日三

又方

燒亂髮灰酒和服方寸七日三

又方

桑耳二兩 鹿茸十八

右二味以醋五升漬炙燥漬盡為度治下篩服方寸七日三

又方

燒鹿角為末酒服方寸七日三

又方

千金方衍義卷四

十一

補藥山房

燒桃核為末酒服方寸七日三

又方

地榆

知母各指大

右二味咬咀以醋三升東向竈中治極濃去滓服之

又方

桑木中腸屎燒灰酒服方寸七

義衍

崩中而用龜甲牡蠣血熱妄行之治也 亂髮燒灰酒服破宿生新之治也 桑耳鹿茸醋漬本虛標熱之治也 鹿角燒灰酒服止中寓散之治也

桃核燒灰酒服散中寓止之治也 地榆知母

醋煮瀉火截崩之治也 桑木中腸屎灰按風溼

垢之治也

以上丹方或用酒服以行其滯或用醋煮以截

其崩總取味少力專貧家易辦之治若患久虛

脫非大劑溫補良難克應也

治崩中下血羸瘦少氣調中補虛止血方

澤蘭

蜀椒二兩

藥本

柏子仁

山茱萸

厚朴各十

乾地黄

牡蠣各一

代赭

千金方衍義卷四

十一

補藥山房

桂心

防風

細辛

乾薑各

甘艸

當歸

芎藭各一兩

燕蕒半兩

右十七味治下篩空心溫酒服方寸七日三神良

一方加白芷龍骨各十八銖人參一兩十八銖為

二十味

義衍 此方雖言調中補虛止血而疎泄之藥反多于溫

養之味方中防風細辛藁本澤蘭杏仁按風藥也

厚朴蕪蕒滌垢藥也蜀椒桂心溫散藥也乾薑代

赭牡蠣止截藥也惟芎歸地黃山萸甘艸為滋養

之品其羸瘦少氣起於崩中故先行搜風添垢以潔淨血腑然後血得歸經而中自調虛自補血自止矣如虛脫過劇又當加方後等味尤為得力

治崩中方

白茅根 三斤 小薊根 五斤

右二味咬咀以水五斗煎取四斗稍稍服之外宜用酒煎

義衍崩中而用茅薊二根專行清熱散血血散而崩自止外臺用酒煎尤宜

丹參酒 治崩中去血及產後餘疾方

丹參 艾葉 地榆

忍冬 地黃各五斤

右五味剉先洗白熟春以水漬三宿出滓煮取汁以黍米一斛炊飯釀酒酒熟榨之初服四合後稍

稍添之

義衍崩中去血產後餘疾總宜調和血氣丹參艾葉地

黃地榆皆活血之品獨忍冬一味人但知其解毒

祛膿不知其能利風虛有瀉中寓補之妙用用以

釀酒頗盡營行經脈之旨

牡丹皮湯 治崩中血盛併服三劑即瘥方

牡丹皮 乾地黃 斛脈各三兩

萬餘糧 艾葉 龍骨

柏葉 厚朴 白芷

伏龍肝 青竹茹 芎藭

地榆各二兩 阿膠一兩 芍藥四兩

右十五味咬咀以水一斗五升煮取五升分五服

相去如人行十里久再服

義衍崩中去血過甚非斂散交參溫涼兼濟無以克建

其功斂用龍骨禹糧地榆散用牡丹白芷厚朴斛

味溫用膠艾芎藭伏龍涼用地芍竹茹柏葉斂散

溫涼之義備矣

治崩中單方

燒牛角觶末以酒服方寸七日三服亦治帶下

又方

桑耳燒令黑為末酒服方寸七日二服亦治帶下

又方

又方

生薊根一斤半搗取汁溫服亦可酒煮服之

又方

羊脬一具以酢煮去血服之即止忌猪魚酢滑

物犯之便死

牛角總為中虛受傷久崩不瘥之專藥以牛屬地

土銀乃角中之骨專補腎肝之血脾肝腎三經藥也

下赤者治血病癥瘕積聚如無桑耳他樹上木耳亦能治崩中漏下又為痔瘡專藥以其得濕熱之

氣從朽株浮長取同氣相感之力然必燒黑用之小蘗專力破血上吐用花下崩用根本乎天者

親上本乎地者親下也 羊性溫補而脈專滌垢去血酢煮取其酸斂然最畏酢得酢則耗血不但

不可與豬魚酢食生椒亦須忌之

治白崩方

灸小腹橫文當臍孔直下百壯又灸內踝上三寸左右各百壯

論曰治漏血不止或新傷胎及產後餘血不消作堅使胞門不開淋瀝去血經踰日月不止者未可以諸

斷血湯宜且與壯丹丸散等待血堅消便停也堅血消者所去淋漓便自止亦漸變消少也此後有餘傷

毀不復處此乃可作諸主治耳婦人產乳去血多傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多

水止心中懸虛心悶眩冒頭重目暗耳聾滿鼻頭便

千金方衍義卷四 案 補藥山房

問欲例宜且煮當歸芎藭各三兩以水四升煮取二升去滓分二服即定展轉續次合諸湯治之

白聖丸 治女人三十六疾胞中病漏下不絕方 又方 見前

那鄂白聖 禹餘糧 白芷

白石脂 乾薑 龍骨

杜心 瞿麥 大黃

石韋 白薇 細辛

芍藥 甘艸 黃連

附子 當歸 茯苓

鍾乳 蜀椒 黃芩 各半

付蠟 烏賊骨 各十 八錢

有二十三味為末蜜丸梧子大空心酒服五丸日再服不知加至十九

衍義見本卷第一方白聖丸下 治女人漏下或瘥或劇常漏不止身體羸瘦飲食

少或赤或白或黃使人無子者方 牡蠣 伏龍肝 赤石脂

白龍骨 桂心 烏賊骨

禹餘糧 各等分

千金方衍義卷四 案 補藥山房

右七味治下篩空心酒服方寸七日二日多者加
牡蠣龍骨烏賊骨赤多者加赤石脂禹餘糧黃芩
者加伏龍肝桂心隨病加之張文仲曰赤石脂崩中
服飲

衍方中渾是固脫惟桂心烏賊散血潤枯亦是固中

寓散之法又須隨所見之色而加增劑料不必更
易藥味也

鹿茸散 治婦人漏下不止方

鹿茸

阿膠各三

烏賊骨

當歸各二

蒲黃一兩

千金方衍義卷四

交

掃葉山房

右五味治下篩空心酒服方寸七日三夜再服

衍本虛標熱而見漏下不止故用鹿茸歸膠溫補衝

督其力最專但漏下不止必有乾血內著又須烏

賊蒲黃予以出路也 其後蒲黃散方下主治藥

品與鹿茸散不異必竟瘀積較前稍甚虛寒較前

稍輕故但取前方鹿茸當歸蒲黃三味以血不甚

虛故無藉阿膠而鹿茸減料以無烏賊所以加用

蒲黃遂以名方意在散血也

治女人產後漏下及病痔下血方

磐石一兩

附子一枚

千金

右二味為末蜜丸梧子大空心酒下二丸日三稍
加之五丸數日瘥能自日服之永斷

衍漏下而用溫經固脫宜矣痔瘡下血亦用之者必
思久虛脫方為合劑若腫赤疼痛不可誤用慎之

慎之

芎藭湯 治帶下漏血不止方

芎藭

乾地黄

黃芪

芍藥

吳茱萸

甘卿各二

當歸

乾薑各三

右八味咬咀以水一斗煮取三升分三服若月經

千金方衍義卷四

掃葉山房

後因有赤白不止者除地黃吳茱萸加杜仲人參

各二兩

衍芎藭地芍 離專調血不得甘芪不能助衝和營尤

妙在薑黃之辛溫使血無阻積得以歸經而經後

赤白不止非但不可用茱萸之濁燥即地黃之膩

滯亦宜酌酌故退二味而進杜仲之益精人參以

益氣精氣充而血液固矣

治漏下去血不止方

取水蛭 治下篩酒服一錢許口二惡血消即能

愈

不雖於破血中首推峻厲稍涉虛者不可輕投
減等而用 蠶廬再減而用漆灰桃仁未嘗不歸全
置千金法也

治漏下神方

取槐子燒末酒服方寸七日三立瘥

義 槐為虛痞之精子能益腎明目用以燒末酒服以
清血中之火其効最捷即痔漏下血亦不出此但
稟氣虛寒食少便溏者禁用以其純陰乏生長之
氣也

治漏下去黑方

千金方衍義卷四

掃葉山房

乾漆

麻黃青木作
麻黃

細辛

桂心各一

甘艸半兩

右五味治下篩以指撮著米飲中服之

衍 漏下去黑明係瘀血內滯故用麻黃甘艸佐漆灰
桂心細辛以破宿血也麻黃即麻黃詩為有黃其
實是也昔本草作麻黃亥豕之形似耳詳麻黃條
下本經雖有破癥堅積聚一語而血滯於裏安有
反行激發之理麻黃徐下本經止言補中益氣以
其辛溫潤下故脾約證用之此方亦專取其潤以
佐漆灰輩順下之力消燥相需之妙全賴麻黃十

味復何疑乎

治漏下去赤方

白朮二兩

白薇半兩

黃蘗半兩

右三味治下篩空心酒服方寸七日三

衍 漏下去赤明係熱淫於內故用黃蘗之苦寒白薇
之苦鹹以下泄之白朮之甘溫以內固之黃蘗治
五臟腸胃結熱為女子漏下赤白之要藥白薇治
產中虛煩嘔逆為傷中淋露之要藥白朮治痰濕
帶下為散腰臍間血之要藥合三者以治濕熱漏
下去赤何慮不直達肯綮耶

千金方衍義卷四

掃葉山房

治漏下去黃方

黃連

大黃

桂心各半

黃芩

廩蟲

乾地黃各六

右六味治下篩空心酒服方寸七日三

衍 漏下去黃明係脾胃受熱故用三黃而秦地黃以
滋血蠱蟲以破血桂心以鼓三黃之性而行地黃
之滯也

治漏下去青方

大黃

黃芩

白薇各半

桂心

牡蠣各六

右五味治下篩空心酒服方寸七日三

義衍漏下去青明係湯藥過傷肝脾受困而致血不

經故用大黃黃芩以蕩滌濕熱壯蠟白薇以固傷
中淋漓桂心鼓舞二黃以破積滯之瘀也

治漏下去白方

鹿茸 一兩 白薇 十八 狗脊 半兩

右三味治下篩空心米飲服方寸七日三

義衍漏下去白明係下焦虛冷故用鹿茸以溫補督脈

狗脊以強筋骨白薇以治陰中腫痛并解風氣百
疾之蘊蓄為患督脈充筋骨強則氣血有所統禦

千金方卷四

三

掃葉山房

而無崩漏之虞矣

治女子漏下積年不絕困篤方

取鵝重巢柴燒灰作末服方寸七日三服三十

日愈甚良 重巢者去年在巢中產今年又在

上作重巢產者是也

義衍古人用方多有取義獲効者如此證之困篤不勝

湯藥而用鵝重巢灰端取高風不墜而能護卵生
雛之意其後消渴門中及肘後治睡中遺尿咸取

用之

馬通湯 治漏下血積月不止方

赤馬通汁一升 生艾葉

阿膠 各三兩

當歸

乾薑 各二兩

好墨 半兩

右六味咬咀以水八升酒二升煮取三升去滓內

馬通汁及膠微火煎取二升分再服相去如人行

十里久

義衍漏下積月不止非溫熱毒蘊即瘀垢生礙故用馬

通專行滌垢而兼膠艾歸薑和營之品可謂當矣

更取煇燼之餘結成火土而現坎水之象以制離

火之災深得同氣相求之妙然非薑艾相需不無

止截之虞每見世醫治此崩漏令人以墨入生

千金方卷四

三

掃葉山房

地黃汁中服之應手即止向後瘀積月深盈利而

行屢發屢截劫之不應倉扁不能復圖矣然千金

治吐血方未嘗不用生地黃也然必兼辛散之制

即用一味鴉汁又須漬之以濟當無阻滯之患矣

孰謂先聖之法不能體會其全漫採一二以圖日

前僥倖而還向後之戒乎

馬蹄屑湯 治白漏不絕方

白馬蹄

赤石脂 各五兩

禹餘糧

烏賊骨

龍骨

牡蠣 各四兩

附子

乾地黄

當歸 各三兩

甘艸二兩 白殭蠶一兩

右十一味咬咀以水二斗煮取九升分六服日三

即愈

馬蹄圓 治白濁不絕方

白馬蹄 禹餘糧各四兩 龍骨三兩

烏賊骨 白殭蠶 赤石脂各二兩

右六味為末蜜丸 梧子大酒服十九丸不知加至三十丸

義前夫一病而治分先後不同者隨其勢之緩急也此

以馬蹄龍骨餘糧石脂專行固脫烏賊專治血枯

千金方 衍義卷四

齒

攝業山房

殭蠶專祛風疾全得治本之奧而歸地專和營血

又恐烏賊之攻血不逮則以附子鼓之龍骨之地

瀦不逮乃以牡蠣佐之方中斂散交錯寒熱互用

因以甘艸和之以其勢繁不得不以湯液為之前

導服後崩勢稍寧則當用丸緩圖仍不出乎此方

但當就簡剛繁方為合法

慎火艸散 治漏下方又方見前

慎火艸十兩 當歸 鹿茸

阿膠各四兩 龍骨半兩

右五味治下篩先食酒服方寸七日三

蒲黃散 治漏下不止方

蒲黃半升 鹿茸 當歸各二兩

右三味治下篩酒服五分七日三不知稍加至方

寸七

義前並見前

灸法

女人胞漏下血不可禁止灸關元兩傍相去三寸

女人陰中痛引心下及小腹絞痛腹中五寒灸關儀

百壯穴在膝外邊上一寸宛宛中是

女人漏下赤白及血灸足太陰五十壯穴在內踝上

千金方 衍義卷四

非

攝業山房

三寸足太陰經內踝上三寸名三陰交

女人漏下赤白月經不調灸交儀三十壯穴在內踝

上五寸

女人漏下赤白灸營池四穴三十壯穴在內踝前後

兩邊池中脉上一名陰陽是

女人漏下赤白四肢酸削灸漏陰二十壯穴在內踝

下五分微動脚脉上

女人漏下赤白泄注灸陰陽隨年壯三報穴在足拇

趾下屈裏表頭白肉際是

月經不調第二十一 方二十三首 灸法一首

白聖丸 治婦人月經一月再來或隔月不來或
多或少淋瀝不斷或來而腰腹痛嘔吸不能食
心腹痛或青黃黑色或如水舉體沉重方

白聖 白石脂 牡蠣

禹餘糧 龍骨 細辛

烏賊骨各一兩半 當歸 芍藥

黃連 黃芩 乾薑

桂心 人參 瞿麥

石葦 白芷 白藜

附子 甘艸各一兩 蜀椒半兩

千金方衍義卷四 美 歸藥山房

右二十一味為末蜜丸梧子大空心酒下二十九

日三至月候來時日四五服為佳

見本卷赤白帶下門白聖丸下

桃仁湯 治產後及墮身月來不調或淋瀝不斷

斷後復來狀如瀉水四體嘔吸不能食腹中堅

痛不可行動月水或前或後或經月不來舉體

沉重惟欲眠臥多思酸物方

桃仁五十枚 澤蘭 甘艸

芍藥 人參各二兩 牛膝

桂心 牡丹皮 當歸各三兩

芍藥 生薑 半夏各四兩

地黃八兩 蒲黃七合

石十四味咬咀以水二斗煮取六升半分六服

行月經不調雖衝脈受病衝脈緊附厥陰肝經而能

統制厥陰者又在中土土旺則木榮土衰則木敗

理固然也方下所言狀如瀉水非土衰不能制水

之驗乎多思酸物非肝虛求助於味之驗乎腹中

堅痛非胞宮乾血內滯之驗乎此門諸方除白聖

丸惟此方專調土衰木敗方中芍藥芍地專調衝

脈之虛參甘薑半專扶胃氣之衰桃丹蒲澤專疎

千金方衍義卷四 美 歸藥山房

胞宮之滯桂心牛膝一破堅結一潤血枯枯血潤

而下行無阻堅結散而正氣自調當無前後失期

之患矣此後杏仁湯以下十餘方總皆攻血之劑

也

杏仁湯 治月經不調或一月再來或兩月三月

一來或月前或月後閉塞不通方

杏仁二兩 桃仁一兩 大黃三兩

水蛭 蠱蟲各三枚

右五味咬咀以水六升煮取二升分三服一服當

有物隨大小便有所下下多者止之少者勿止盡

二三服

此方專主乾血內滯過期不通故以抵當湯加入

杏仁散氣之味以駕馭破血諸藥不言抵當者專

歸功於杏仁也

大黃朴硝湯 治經年月水不利胞中有風冷所

致宜下之方

大黃

牛膝 各五兩

朴硝

牡丹

甘艸

紫苑 各三兩
作紫葢

代赭

桃仁

蠶蟲

水蛭

乾薑

細辛

千金方衍義卷四

夫

婦人經閉

焰硝

各二兩 舊麻仁 五合
本作芒硝

右十四味咬咀以水一斗五升煮取五升去滓內

硝令烱分五服五更爲首相去一炊頃自下後將

息忌見風

衍義 方以抵當參入二硝薑辛以破胞中風冷尤妙在

代赭一味能治鬼疰賊風蠱毒腹中毒邪女子赤

沃漏下皆本經之義但舊本焰硝刊作芒硝芒硝

與朴硝本是一物何必兩用况胞中風冷非焰不

能散之其餘牛膝牡丹紫苑麻仁甘艸皆潤下之

佐使耳

茱萸蠶蟲湯

治久寒月經不利或多或少方

吳水黃 三升

蠶蟲

水蛭

鹿蠶

牡丹 各一兩

生薑 一斤

小麥

半夏 各一升

大棗 二十枚

桃仁 五十枚

人參

牛膝 各三兩

桂心 六兩

甘艸 一兩

芍藥 二兩

右十五味咬咀以酒一斗水二斗煮取一斗去滓

適寒溫一服一升日三不飲酒者以水代之湯欲

成乃內諸蠶不耐藥者飲七合

義 前湯專攻胞中風冷積血故須薑辛焰硝此方專

千金方衍義卷四

夫

婦人經閉

治久寒月經不利又須吳黃桂心其他生薑以代

乾薑蠶蟲以佐蠶蛭芍藥以助牡丹半夏以勸黃

桂彼以勢劇非攻不克故用硝黃此以本虛雖攻

不應故用人參專扶藥力小麥益肝大棗和脾則

又人參輔弼耳

抵當湯 治月經不利腹中滿時自減并男子勝

脫滿急方

虎掌 千金翼

作虎杖

大黃 各二兩

桃仁 三十枚

水蛭 二十枚

右四味以水三升煮取一升盡服之當下惡血爲

度

行抵當者金匱方中除去蟲而進虎掌也是必風

痰襲入于瘀交相助虐為患故去彼取此然曷不
去蛭存蟲尤為穩當虎掌逐風虎杖破血當從製

方為是

七熬圓 治月經不利手足煩熱腹滿默默不欲

寤心煩方

大黃半一兩

前胡一作柴胡

芒硝熬各五兩

葶藶

蜀椒并熬各六銖

生薑

芎藭

茯苓各十銖

杏仁九銖熬

《本方行表南

《本方行表南

桃仁二十枚熬

蠱蟲熬

水蛭半合熬

右十二味為末蜜丸梧子大空腹飲服七丸日三
不知加一倍一有蠱蟲生用各二兩下金翼無芎藭

行七熬之制兼取抵當陷胞之法抵當方中蟲蛭未

有不熬而用者大陷胸丸杏仁葶藶皆熬黑用則

專滲垢膩杏仁葶藶可熬則桃仁蜀椒芒硝無不

可熬熬則下氣愈疾大黃芎藭前胡生薑皆下氣

之用耳

桃仁散 治月經來繞臍痛上衝心胸往來寒熱

煩澁挂狀方

桃仁五十枚

蠱蟲二十枚

桂心五寸

茯苓一兩

薤白仁

牛膝

代赭各二兩

大黃八兩

右八味治下飾附宿勿食溫酒服一錢七日三

行經求繞臍衝痛明係乾血上逆往來寒熱如瘧乃

是血室受病血屬少陽也方本金匱下瘀血湯加

桂心以破乾血代赭以鎮逆氣牛膝茯苓薤白以

資諸藥潤下之力也

治月經往來腹臍腹臍痛方

蠱蟲四枚

蜀椒

乾薑各六銖

《本方行表南

《本方行表南

大黃

女司

桂心

芎藭各半

右七味治下飾取一刀圭先食酒服之日三十口

微下善養之

行於下瘀血湯中除去桃仁而加椒薑芎藭辛散破

結之品兼女司之散血解毒則桃仁可無藉矣

牡丹大黃湯 治月經不調或月前月後或如豆

汁腰痛如折兩腳疼痛中風寒下之方

大黃

朴硝各四兩

牡丹三兩

桃仁一升

人參

陽起石

茯苓

甘艸

水蛭

蟲蟲各二

右十味咬咀以水九升煮取三升去滓內朴細分

煎盡分三服相去如一飯頃

行專取抵當下血為主加朴補佐大黃則有推陳致

新之功人參得陽起則有扶陽破陰之功陽起得

蟲蛭則破血之力倍勝茯苓甘艸則又人參之助

牡丹則桃仁之助也

陽起石湯 治月水不調或前或後或多或少少年

赤年白方

千金方卷之九 婦人病 攝生山房

陽起石

甘艸

續斷

乾薑

人參

朴心各二

附子一兩

赤石脂三兩

伏龍肝五兩

生地黃一升

右十味以水一斗煮取三升二合分四服日三夜

一

行於四逆湯中加陽起 人參則有陽生陰長之功散

子藏中之血積伏龍 石脂專行固脫地黃續斷專

續傷中桂心佐薑附則破寒結兼行地黃之滯也

治婦人憂恚心下支滿膈中伏熱月經不利血氣

上捨心欲嘔不可多食懈怠不能動方

大黃

芍藥

蟲蟲各二

土瓜根

蜀椒

黃芩

白朮

地骨皮一作炭皮

乾薑

芎藭各一

桂心

乾漆各一

右十二味為末蜜丸梧子大每服十九丸日三不知

加之千金翼有炭皮者炭皮丸

行於椒薑木桂辛烈劑中而兼大黃黃芩芍藥骨皮

以泄莊氣乾漆蟲蟲芎藭土瓜根以破宿血標本

兼得之治也

千金方卷之九

婦人病 攝生山房

牛膝圓

治產後月水往來乍多乍少仍復不調

時時疼痛小腹裏急下引腰身重方

牛膝

芍藥

人參

大黃各三兩

牡丹皮

甘艸

當歸

芎藭各二兩

桂心一兩

蠶蟲

蟾蜍

蜚蠊各四

蟲蟲

水蛭各七

右十四味為末蜜丸梧子大酒服五丸日三不知

稍增

此方於大黃蠶蟲丸中 沫取蠶蛭蠃蟻大黃芍藥

甘艸七味加入蜚蠊牛膝丹桂芎歸人參七味較
大黃蠱蟲丸中乾漆地黃黃芩桃杏仁之力倍峻
總由百勞薯蕷方中參入芎藭人參鼓舞諸蟲破
血之力端不出金匱之繩墨也

又方

鹿角末服之良

衍義鹿角專行督脉爲腎藏之外垣外垣堅韌可無五
液注下之虞矣

又方

生地黃汁三升煮取二升服之

千金方衍義卷四

金

掃葉山房

又方

飲人乳汁三合善

又方

燒月經衣并花水服之

衍義卽以其人之道還治其人之身此方得之

又方

燒白狗屎焦爲末酒服方寸七口三

又方

取白馬屎服一升良

治月經不斷方

衍義船茹一斤淨洗河水四升半煮取二升分二服
不灰黃麻並能散瘀止血且爲船茹歲久性純用
以填塞罅漏不特取義兼得二物之性也

又方

服地黃酒良

衍義地黃寒滯得酒之溫散可無膩阻止截之患

又方

服大豆酒佳

衍義卽大豆紫湯衍義見四卷中風門

又方

千金方衍義卷四

金

掃葉山房

燒箕舌灰酒服之

又方

灸內踝下白肉際青脉上隨年壯

孫真人千金方衍義卷四

四

孫真人千金方衍義卷五上

長洲 孫 玉著
南沙 孫 客校

少小嬰孺方上 凡五類

序例第一 論三首 方二首
揮乳母法

論曰夫生民之道莫不以養小為大若無於小卒不成大故易稱積小以成大詩有厥初生民傳曰聲子生隱公此之一義卽是從微至著自少及長人情其兒不待經史故今斯方先婦人小兒而後丈夫者老者則是崇本之義也然小兒氣勢微弱醫士欲留心

千金方衍義卷五上

掃葉山房

救療立功差難今之學者多不存意良由嬰兒在於襁褓之內乳氣腥臊醫者操行英雄詎肯瞻視靜言思之可為太息者矣小品方云凡人年六歲已上為小十六歲已上為少巢源外臺作十八已上為壯三十已上為壯巢源外臺作二十已上為壯五十已上為老其六歲已下經所不載所以乳下嬰兒有病難治者皆為無所承據也中古有巫妨巢源作巫方者立小兒願願經以占天壽判疾病死生世相傳授始有小兒方焉逮於晉宋江左推諸蘇家傳習有驗流於人間齊有徐王者亦有小兒方三卷故今之學者頗得傳授然徐氏位望隆重何

眼留心於少小詳其方意不甚深細少有可採未為至祕今博採諸家及自經用有效者以為此篇凡百居家皆宜達茲養小之術則無橫天之禍也

又曰小兒病與大人不殊惟用藥有多少為異其驚癇客忤解願不行等八九篇合為此卷下痢等餘方並散在諸篇可披而得之

凡生後六十日瞳子成能咳笑應和人百日任脈成能自反覆一作百八十日尻骨成能獨坐二百

十日膝骨成能行此其定法若不能依期者必有不平之處

千金方衍義卷五上

掃葉山房

凡兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸九十六日三變一百二十八日四變變且蒸一百六十七日五變一百九十二日六變變且蒸二百二十四日七變二百五十六日八變變且蒸三百二十八日九變三百二十日十變變且蒸積三百二十日小蒸畢後六十四日大蒸蒸後六十四日後大蒸蒸後一百二十八日復大蒸凡小兒自生三十二日一變再變為一蒸凡十變而五小蒸又三大蒸積五百七十六日夫小蒸都畢乃成人小兒所以變蒸者是榮其血脈改其五臟故一變竟輒覺情態有異其變蒸之後變

者上氣蒸者體熱變蒸有
耳冷尻冷上脣頭白泡起
者體壯熱而脈亂或汗或
白精微赤黑精微白又云
畢自精明矣此其證也單
者五日而衰遠者十日而
十日之中熱乃除耳兒生
先期而熱便治之如法至
不解子故重說之且變蒸
人兒變蒸或早或晚不如
甚者違日數不歇審計變
慎不可治及灸刺但和視
紫丸微下日歇便止若於
或非變蒸時而得時行者
熱口上無白泡耳當先服
粉之熱當歇便就燒若猶
蒸時若有寒加之即寒熱
熨之則愈也熨法出下篇
粉絮熨者是
若非變蒸身熱耳熱尻亦
審是變蒸不得為餘治也

輕重其輕者體熱而微驚
如魚目珠子微汗出其重
不汗不欲食食輒吐呢日
日白者重赤黑者微變蒸
變小微兼蒸小劇凡蒸平
衰先期五日後之五日為
三十二日一變二十九日
三十六七日蒸乃畢日恐
之時不欲驚動勿令傍多
法者多又初變之時或熱
蒸之日當其時有熱微驚
之若良久熱不可已少與
變蒸之中加以時行溫病
其證皆相似惟耳及尻通
黑散以發其汗汗出溫粉
不除乃與紫丸下之兒變
交爭腰腹天乳啼不止者
變蒸與溫壯傷寒相似
熱此乃為他病可作餘治

千金方卷之五
五
五
五

又一法凡兒生三十二日始變者身熱也至六十
四日再變變且蒸其狀臥端正也至九十六日三變
定者候丹孔出而泄至一百二十八日四變變且蒸
以能咳笑也至一百六十日五變以成機關也至一
百九十二日六變變且蒸五機成也至二百二十四
日七變以能匍匐也至二百五十六日八變變且蒸
以知欲學語也至二百八十八日九變以亭亭然也
凡小兒生至二百八十八日九變四蒸也當其變之
日慎不可妄治之則加其疾變且蒸者是兒逆迎月
也蒸者甚熱而脈亂汗出是也近者五日歇遠者八
九日歇也當是蒸上不可灸刺妄治之也

紫圓 治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯汗
後熱不歇及腹中有痰癖哺乳不進乳則吐咀
食癩先寒後熱方

赤石脂 代赭 各一
杏仁 五十 巴豆 三十
右四味為末巴豆杏仁別研為膏相和更搗二千
杵當自相得者硬入少蜜同搗之密器中收三十
日兒服如麻子一九與少乳汁令下食頃後與少
乳勿令多至日中當小下熱除若未全除明日更

千金方卷之五
五
四
楊葉山房

與一九百日兒服如小豆一九以此準量增減夏月多熱善令發疹二三十日輒一服佳紫圓無所不療雖下不虛人

衍義

初生變蒸雖所稟不足而於不足之中必有痰癖內結所以蒸發寒熱紫圓一方藥品頗峻而用法最緩設慮其峻而因循不卽下手卽將來乳哺日蘊爲痰有增無減爲驚爲癇靡不由此方以石脂溫養心脾代赭除腹中邪氣杏仁下氣散寒熱雖用巴豆蕩練臟腑以二石護持中土故叮嚀致再服之無傷允爲防微杜漸之的方瀉中寓補之捷法也一其後驚癇門論中有云四味紫丸逐癖飲

千金方衍義卷五

五

掃葉山房

最良去病速而不虛人赤丸差駛病重者當用之林億云方中並無赤丸次後癖結脹滿篇中雙紫丸內有硃砂色當赤又力緊於紫丸疑此卽赤丸也

按金匱腹滿寒疝宿食篇中有赤丸方用枳荅半夏烏頭細辛蜜丸真硃爲色千金不用細辛作人參專治寒氣厥逆以中有半夏烏頭之反激且有真硃之蕩癖未嘗不散寒積也
黑散 治小兒變蒸中挾時行溫病或非在蒸時

而得行時者方

麻黃

杏仁 各半

大黃 六銖

右三味先搗麻黃大黃爲散別研杏仁如脂乃細細內散又搗令調和內密器中一月兒服小豆大一枚以乳汁和服抱令得汗汗出濕粉粉之勿使兒風百日兒服如棗核以兒大小量之

衍義

於變蒸之中復挾時行邪氣非急爲開提中外何以保全萬一方中大黃蕩滌內結卽用麻黃開發表邪杏仁疎利逆氣益大黃原有安和五臟之功麻黃兼有破除癥堅之力杏仁交通中外乃麻黃湯之變方守真通聖雙解從此悟出

千金方衍義卷五

六

掃葉山房

擇乳母法

凡乳母者發血氣爲乳汁也性情善惡悉是血氣所生也其乳兒者皆宜慎於喜怒夫乳母形色所宜其候甚多不可求備但取不胡臭癯瘦氣嗽癆疥癰癰白禿癩瘍滲屑耳聾鼻癩鼻無此等疾者便可飲兒也師見其故灸癩便知其先疾之源也

初生出腹第二

論三首 凡十二事 相見壽天法

論曰小兒初生先以綿裹指拭兒口中及舌上青泥惡血此爲之玉衡一作若不急拭啼聲一發卽入腹

成百病矣。兒生落地不作聲者，此由難產少氣故也。可取兒臍帶向身却將之，氣入腹仍呵之，至百度啼聲自發，亦可葱白徐徐鞭之，即啼兒已生，即當舉之。舉之遲晚，則令中寒腹內雷鳴，乃先浴之，然後斷臍，不得以刀子割之。須令人隔單衣物咬斷，兼以暖氣呵七遍，然後纏結所留臍帶，令至兒足，跌上短則中寒，令兒腹中不調，常下痢，若先斷臍，然後浴者，則臍中水臍中水則發腹痛，其臍斷訖，連臍帶中多有蟲，宜急剔撥去之，不爾入兒腹成疾。斷兒臍者，當令長六寸，長則傷肌，短則傷藏，不以時斷，若接汗不盡，則令暖氣漸微，自生寒，令兒臍風生，男宜用其兒父衣，女宜以其母故衣，皆勿用新帛為善。不可令衣過厚，令兒傷皮膚，害血脈，發雜瘡，而黃兒衣綿帛，特忌厚熱，慎之。慎之。凡小兒始生，肌膚未成，不可暖衣，暖衣則令筋骨緩弱，宜時見風，日若都不見風，則令肌膚脆軟，便易中傷，皆當以故絮衣之，勿用新綿也。凡天和暖無風之時，令母將兒於日中嬉戲，數見風，日則血凝氣剛，肌肉牢密，堪耐風寒，不致疾病。若常藏在帷帳之中，重衣溫暖，譬猶陰地之艸，木不見風，日輒脆不堪，風寒也。凡裹臍法，推治白練令

千金方衍義卷五

十一

楊崇山房

柔軟方四寸，新綿厚半寸，與帛等合之，調其緩急，則令兒吐，兒生二十日，乃解視臍者，十許日，兒怒啼，似衣中有刺者，此或臍燥還刺其腹，當解之，易衣更裹臍，時閉戶，下帳，燃火令帳中溫暖，換衣亦然。仍以溫粉粉之，此謂冬時寒也。若臍不愈，燒絳帛末粉之，若過一月，臍有汁，不愈，燒蝦蟆灰粉之，日三四次。若臍中水及中冷，則令兒腹絞痛，天札啼呼，面目青黑，此是中水之過，當炙粉絮以熨之，不時治護臍，至腫者，當隨輕重，重者使灸之，乃可至八九十壯，輕者臍不大腫，但出汁時時啼呼者，搗當歸末和胡粉傅之，炙絮日熨之，至百日愈。以啼呼止為候。若兒糞青者，冷也，與臍中水同，兒洗浴斷臍，竟襴抱，畢未可與朱蜜，宜與甘艸湯，以甘艸如手中指一節許，打碎以水二合煮取一合，以綿纏沾取與兒吮之，連吮汁計得一蜺，入腹止，兒當快吐，吐去心胸中惡汁也。如得吐餘藥，更不須與，若不得吐，可消息計如飢渴須臾，更與之，若前所服及更與，並不得吐者，但稍稍與之，令盡此一合，止如得吐去惡汁，令兒心神知慧，無病也。飲一合盡都不吐者，是兒不含惡血耳，勿復與甘艸湯，乃可與朱蜜，以鎮心神，安魂魄也。兒新生

千金方衍義卷五

十一

楊崇山房

三日中與朱蜜者不宜多多則令兒脾胃冷腹脹喜
 陰癩氣急變瘰癧而死新生與朱蜜法以飛鍊硃砂
 如大豆許以赤蜜一蠅殼和之以綿線筋頭沾取與
 兒吮之得三沾止一日令盡此一豆許可三日與之
 則用三豆許也勿過此則傷兒也與朱蜜竟可與牛
 黃如朱蜜多少也牛黃益肝膽除熱定精神止驚辟
 惡氣除小兒百病也新生三日後應開腸胃助穀神
 可研米作厚飲如乳酪厚薄以豆大與兒咽之煩咽
 三豆許止日三與之滿七日可與哺也兒生十日始
 哺如棗核二十日倍之五十日如彈丸百日如棗若
 乳汁少不得從此法當用意小增之若三十日而哺
 者令兒無疾兒哺早者兒不勝穀氣令生病頭面身
 體喜生瘡愈而復發令兒危弱難養三十日後雖哺
 勿多若不嗜食勿強與之強與之不消復生疾病哺
 乳不進者腹中有痰癖也當以四物紫丸微下之節
 哺乳數日便自愈小兒微寒熱亦當兩利之要當下
 之然後乃瘥凡乳兒不欲太飽飽則嘔吐每候兒吐
 者乳太飽也以空乳乳之即消日四乳兒若臍未愈
 乳兒太飽令風中臍也夏不去熱乳令兒嘔逆冬不
 去寒乳令兒欬痢母新房以乳兒令兒羸瘦交臍不

千金方衍義卷五
 九
 掃葉山房

能行母有熱以乳兒令變黃不能食母怒以乳兒令
 善驚發氣疝又令上氣癲狂母新吐下以乳兒令虛
 羸母醉以乳兒令身熱腹滿凡新生小兒一月內常
 飲猪乳大佳凡乳母乳兒當先極極散其熱氣勿令
 汁奔出令兒嗜輒奪其乳令得息息已復乳之如是
 十返五返視兒飢飽節度知一日中幾乳而足以爲
 常又常提去宿乳兒若臥乳母當以臂枕之令乳與
 兒頭平乃乳之令兒勿噎母欲寐則奪其乳恐填口
 鼻又不知飢飽也浴兒法凡浴小兒湯極須令冷熱
 調和冷熱失所令兒驚亦致五臟疾也凡兒冬不可
 久浴浴久則傷寒夏不可久浴浴久則傷熱數浴背
 冷則發癩若不浴又令兒毛落新生浴兒者以猪膽
 一枚取汁投湯中以浴兒終身不患瘡疥勿以雜水
 浴之兒生三日宜用桃根湯浴桃根梅根李根各二
 三枚咬咀以水三斗煮取二十沸去滓浴兒良去不
 祥合兒終身無瘡疥治小兒驚辟惡氣以艾虎湯浴
 艾一觔虎頭骨一枚以水三斗煮爲湯浴但須浴則
 者浴之凡小兒初出腹有鵝口者其舌上有白層如
 米劇者鼻中亦有之此由兒在胞胎中受穀氣盛故
 也或妊娠時嗜糯米使之然治之之法以髮纏筋頭

千金方衍義卷五
 十
 掃葉山房

沾井花水擦拭之三日如此便脫去如不脫可煮粟
 莢汁令濃以綿纏筋頭拭之若春夏無粟扶可煮粟
 木皮如用井花水法小兒初出腹有連舌舌下有膜
 如石榴子中隔連其舌下後喜令兒言語不發不轉
 也可以瓜摘斷之微有血出無害若血出不止可燒
 髮作灰未傅之血便止也小兒出腹六七日後其血
 氣收斂成肉則口舌喉頰裏清淨也若喉裏舌上有
 物如蘆籬盛水狀者若懸雍有脹起者可以綿纏長
 鍼留刀處如粟米許大以刺決之令氣泄去青黃赤
 血汗也一刺之止消息一日未消者來日又刺之不
 過三刺自消盡餘小小未消三刺亦止自然得消也
 有著舌下如此者名重舌有著頰裏及上腭如此者
 名重腭有著齒斷上者名重齒皆刺去血汗也小兒
 生輒死治之法
 當喉視兒口中懸雍前上腭有泡者以指摘取頭
 決令潰去血勿令血入咽入咽殺兒急慎之
 小兒初出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝乃成
 肌肉耳其血沮敗不成肌肉則使面目統鼻口左右
 悉黃而啼閉目聚口撮面口中乾燥四肢不能伸縮
 者皆是血脈不斂也喜不有若如此者皆宜與龍

千金要方卷五上

十一 婦人產後

膽湯也 方出本草
驚痛篇

相兒壽天法

兒初生呼聲連延相屬者壽

聲絕而復揚急者不壽

啼聲散不成人

啼聲深不成人

臍中無血者好

臍中小者不壽

通身軟弱如無骨者不壽

髮白長大者壽

千金要方卷五上

自開目者不成人

目視不正數動者大非佳

汗血者多尼不壽

汗不流不成人

小便凝如脂膏不成人

頭四破不成人

常搖手足者不成人

早坐早行早齒早語皆惡性非佳人

頭毛不周匝者不成人

髮稀少者強不聽人 一作不

額上有旋毛者早貴妨父母

兒生枕骨不成者能言而死

尻骨不成者能偃而死

掌骨不成者能匍匐而死

踵骨不成者能行而死

臑骨不成者能立而死

身不收者死

魚口者死

股間無生肉者死

頤下破者死

陰不起者死

陰囊下白者死赤者亦死

卵縫通達黑者死

論曰兒三歲已上十歲已下視其性氣高下即可知其天壽大略兒小時識悟通敏過人者多天大則項

囊額回之流是也小兒骨法成就賦儀週轉遲舒稍

費人精神雕琢者壽其預知人意迴旋敏速者亦天

即楊修孔融之徒是也由此觀之天壽大略可知也

亦猶梅花早發不觀成寒甘菊晚成終於年事尾知

晚成者壽之兆也

驚癇第三論三首 方十三首 灸法二十六首

論曰少小所以有癇病及瘵病者皆由臟氣不平故

也新生即癇者是其五臟不收斂血氣不聚五臟不

流骨怯不成也多不全育其一月四十日已上至期

歲而癇者亦有乳養失理血氣不和風邪所中也病

先身熱掣癇驚啼叫喚而後發癇脈浮者為陽癇病

在六腑外在肌膚猶易治也病先身冷不驚掣不啼

呼而病發時脈沉者為陰癇病在五臟內在骨髓極

難治也病發身軟時醒者謂之癇也身強直反張如

弓不時醒者謂之瘵也諸反張大人脊不容側手小

兒容三指者不可復治也凡脈浮之與沉以判其病

在陰陽表裏耳其浮沉復有大小滑澀虛實遲駛諸

證各依脈形為治神農本草經說小兒驚癇有一百

二十種其證候微異於常便是癇候也初出腹血脈

不斂五臟未成稍將養失宜即為病也時不成人其

經變蒸之後有病餘證並寬惟中風最暴卒也小兒

四股不好驚掣氣息小異欲作癇及變蒸日滿不解

者並宜與龍膽湯凡小兒之癇有三種有風癇有驚

癇有食癇然風癇驚癇時時有之十兒之中未有一

二 是風驚者凡足先寒後熱發者皆是食癇也驚癇

千金方衍義卷五

卷五

掃葉山房

千金方衍義卷五

卷五

掃葉山房

皆按圖灸之風癩當與猪心湯食癩當下乃與紫丸
 佳凡小兒所以得風癩者緣衣暖汗出風因入也風
 癩者初得之時先屈指如數乃發作者此風癩也驚
 癩者起於驚怖大啼乃發作者此驚癩也驚癩微者
 急持之勿復更驚之或自止也其先不嘔乳吐而變
 熱後發癩者此食癩早下則瘥四味紫丸逐癩飲最
 良去癩速而不虛人赤丸差駛方中本無赤丸詳後
雙紫丸用硃砂色當赤疑即赤丸也病重者常用之凡小兒不能乳嘔
 當與紫丸下之小兒始生生氣尚盛但有微惡則須
 下之必無所損及其愈病則致深益若不時下則成
 大疾疾成則難治矣凡下四味紫丸最善雖下不損
 人足以去疾若四味紫丸不得下者當以赤丸下之
 赤丸不下當倍之若已下而有餘熱不盡當按方作
 龍膽湯稍服之并摩赤膏方見本風癩亦當下之
 然當以猪心湯下之驚癩但按圖灸之及摩生膏方
本篇不可大下也何者驚瀉心氣不定一作下之內
 虛益令甚爾驚瀉甚者特為難治故養小兒常慎驚
 勿合聞大聲抱持之間當按徐勿令驚怖又天雷時
 當塞兒耳并作餘細聲以亂之也凡養小兒皆微驚
 以長其血脈但不欲大驚大驚乃灸驚脈若五六

日灸者驚復更甚生百日後灸驚脈乃善兒有熱不
 欲嘔乳臥不安又數驚此癩之初也服紫丸便愈不
 愈復與之兒眠時小驚者一月輒一以紫丸下之減
 其盛氣令兒不病癩也兒立夏後有病治之慎勿妄
 灸不欲吐下但以除熱湯浴之除熱散粉之除熱湯
篇傷寒除熱赤膏摩之又以膏塗臍中令兒在涼處
條中勿衍禁水漿常以新水飲之小兒衣甚薄則腹中乳
 食下消不消則大便皆醋臭此欲為癩之漸也便將
 紫丸以微消之服法先從少起常令大便稀勿大下
 也稀後便漸減之不醋臭乃止藥也凡小兒冬月下
 無所畏夏月下難瘥然有病者不可不下下後腹中
 當小脹滿故當即嘔乳數日不可妄下又乳嘔小兒
 當令多少有長劑兒漸大當小小增之若減少者此
 腹中已有小不調也便微服藥勿服嘔之但當與乳
 甚者十許日微者五六日止嘔自當如常若都不肯
 食嘔而但欲乳者此是有癩為疾重要當下之不可
 不下不下則致寒熱或吐而發癩或更致下痢此皆
 病重不早下之所為也此即難治矣但先治其輕時
 兒不耗損而病可速愈凡小兒尿黃而臭者此腹中
 有伏熱宜微將服龍膽湯若白而醋臭者此挾宿食

不消也當服紫九微者少與藥令內消甚者小培藥
令小下皆復節乳哺數日令胃氣平和若不節乳哺
則病易復復下之則傷其胃氣令腹脹滿再三下之
尚可遇則傷矣凡小兒有癩其脈大必發癩此為食
癩下之便愈當審候掌中與三指脈不可令起而不
時下致於發癩則難療矣若早下之此脈終不起也
脈在掌中尚可早療若至指則病增矣凡小兒腹中
有疾生則身寒熱寒熱則血脈動動則心不定心不
定則易驚驚則癩發速也

候癩法

夫癩小兒之惡病也或有不及求醫而致困者也然

氣發於內必先有候常宜審察其精神而探其候也
手白肉魚際脈黑者是癩候魚際脈赤者熱

脈青大者寒脈青細者為平也

鼻口乾燥大小便不利是癩候

眼不明上視喜陽是癩候

耳後完骨上有青絡盛臥不靜是癩候青脈刺

之令血出也

小兒髮逆上啼笑而暗色不變是癩候

鼻口青時小驚是癩候

目閉青時小驚是癩候

身熱頭常汗出是癩候

身熱吐喼而喘是癩候

身熱目時直視是癩候

喜欠目上視是癩候

身熱目視不精是癩候

目瞳子卒大黑於常是癩候

臥傷傷而驚手足振搖是癩候

臥夢笑手足動搖是癩候

意氣下妄怒是癩候

咽乳不利是癩候

身熱小便難是癩候

吐利不止厥痛時起是癩候

弄舌搖頭是癩候

已上諸候二十餘條皆癩之初也見其候便瓜其

陽脈所應灸瓜之皆重手令兒驟啼及已絕脈亦

依方與湯直視瞳子動腹滿轉鳴下血身熱口噤

不得乳反張脊強汗出發熱為臥不悟手足掣攣

善驚凡八條癩之極者也如有此非復湯瓜所能

救便當時灸之

論曰若病家始發便來詣師師可診候所解為法作
次序治之以其節度首尾取達也病家已經雜治無
次序不能制病病則變異其本候師便不知其前證
虛實直依其後證作治亦不得達也要應精問察之
為前師所配依取其前蹤跡以為治乃無逆耳前師
處湯本應數劑乃瘥而病家服一兩劑未効便謂不
驗以後更問他師師不尋前人為治寒温次序而更
為治而不次前師治則弊也或前已下之後須平和
療以接之而得瘥也或前人未下之或不去者或前
治寒温失度後人應諷治之是謂治敗病皆須邀射

千金方卷五

主

婦人山房

之然後免耳不依次第及不審察必及重弊也

龍膽湯治嬰兒出腹血脈盛實寒熱温壯四肢

驚掣發熱大吐哕者若已能進哺中食實不消

壯熱及變蒸不解中客人鬼氣并諸驚癇方悉

主之十歲已下小兒皆服之小兒龍膽湯第一

此是新出腹嬰兒方若日月長大者以次依此

為例若必知客忤及有魘氣者可加人參當歸

各如龍膽多少也一百日兒加三銖二百日兒

加六銖一歲兒加半兩餘藥皆準耳

龍膽

鈎藤皮

柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓一作扶神

甘艸各六銖

蜚螂二枚

大黃一兩

右十味咬咀以水一升煮取五合為劑也服之如
後節度藥有虛實虛藥宜足數合水也見生一日
至七日分一合為三服兒生八日至十五日分一
合半為三服生十六日至二十日分二合為三服
兒生二十日至三十日分三合為三服兒生三十
日至四十日盡以五合為三服皆得下即止勿再
服也

千金方卷五

主

婦人山房

紫丸治初生小兒痰癖內結龍膽湯治初生小兒

血脈實盛原其痰癖良因母氣虛寒乳哺不化而

結詳其實盛多緣母之嗜慾不節毒遺胎息而熱

殊非稟氣之充血脈有餘之謂益結非熱不散實

非寒不解龍膽苦寒專祛肝旺實熱鈎藤柴胡黃

芩芍藥皆清理二家之臣佐蜚螂一味方中罕用

考之本經為小兒驚癇瘵癰之專藥為藥中健卒

得大黃為內應何憚彈丸不尅耶茯苓甘艸用以

留中安輯邦畿尤不可缺此與紫丸分途異治功

力並馳

大黃湯 治少小風癩積聚腹痛天矯二十五癩

方

大黃

人參

乾薑

當歸

甘皮

各三

右六味咬咀以水一升煮取四合服如棗許大日

三

衍義

方下所治少小風癩明是木邪內盛乘尅中土殊

非外風襲入之謂故於理中方內除去白朮之滯

甘艸之緩但取參薑參入細辛以散內盛之風當

歸以調紊亂之血甘皮以豁壅遏之痰大黃以滌

固結之積與黃龍湯同一手筆彼以病氣盤錯胃

氣傷殘雖用硝黃徒增脹滿必藉人參大力以鼓

蕩練之威此以孩提血氣未實不勝病氣留連雖

宜大黃迅掃必兼參薑溫散可無傷中之虞然此

僅堪為智者道難使庸俗知也

白羊鮮湯 治小兒風癩胸中有痰方

白羊鮮

三銖卽

白蘇皮

蚱蟬

二枚

大黃

四銖

甘艸

鈎藤皮

細辛

各三

牛黃

如大豆

蛇蛻皮

一十

右八味咬咀以水二升半煮取一升二合分五服

日三若服已盡而癩不斷者可更加大黃鈎藤各

衍義

一銖以水漬藥半日然後煮之

白羊鮮卽白蘇本經雖主頭風黃輝濕痺死肌乃

兼搜風濕痰氣之藥不獨治外證也蚱蟬蛇蛻牛

黃本經皆主驚癇癩病細辛疎利九竅大黃推陳

致新甘艸解毒除邪以風癩爲足厥陰之病故用

鈎藤爲嚮導也

增損續命湯

治小兒卒中風惡毒及久風四肢

角弓反張不隨并癱瘓僻不能行步方

麻黃

甘艸

桂心

各一

芍藥

葛根

升麻

當歸

獨活

人參

黃芩

石膏

杏仁

右十二味咬咀以水六升煮麻黃去上沫乃納諸

藥煮取一升二合三歲兒分爲四服一日令盡少

取汗得汗以粉粉之

小兒卒中風惡毒角弓反張皆廢理疎豁致病故

於續命本方增入升葛獨活佐麻黃以祛賊風黃

芩佐石膏以解風熱小兒本無內虛故損去乾薑

之辛烈不使真陰受困耳

石膏湯 治小兒中風惡寒不能語口眼了痰門

肢不隨方

石膏 一兩

麻黃 八銖

甘艸

射干

桂心

芍藥

當歸 各四銖

細辛 二銖

右八味咬咀以水一升半先煮麻黃三沸去上沫

內餘藥煮取一升三歲兒分為四服日三

衍 此即排風湯之變方於中裁去芎藭杏仁茯苓白

木防風獨活白蘇生薑加入石膏細辛射干較排

風湯頭瀆頗清然排風本諸續命原有石膏以小

兒本非虛寒致病人參乾薑似可無藉但石膏湯

中射干當必因腹中邪逆或兼喉痺咽痛而設若

無上證何復用此寒降之品也

治少小中風狀如欲絕湯方

大黃

牡蠣

龍骨

枳實

甘艸

桂心 各十銖

赤石脂

寒水石 各六銖

右八味咬咀以水一升內藥重半兩煮再沸絞去

滓半歲兒服如雞子大一枚大兒盡服入口中即

愈汗出粉之藥無毒可每日二服有熱加大黃不

汗加麻黃無寒水石朴耐代之

衍 此即風引湯之變方金匱本治大人風引小兒驚

癇立方命名專在引風內泄故用大黃甘艸寒水

石杜風復入故用龍骨牡蠣赤石脂千金取治小

兒中風雖風虛燥熱狀如欲絕然不致擾亂血脉

故於本方除去四石僅留赤石脂寒水石以杜風

潤燥并進栝婁根而退乾薑單取桂心一味為反

謀其間淺深權度可默識矣

二物石膏湯 治少小中風手足拘急方

石膏 如雞子大

真珠 一兩

右以水二升煮石膏五六沸內真珠煮取一升稍

稍分服

衍 少小中風手足拘急乃驚癇痰癰漸次然必別有

心胸熱邪證現故專取石膏以化胸中之熱真珠

以清心包之邪不使留泊而為將來之變端也

桂枝湯 治少小中風脈浮發熱自汗出項強鼻

鳴乾嘔方

即傷寒篇木方見十一卷

二物驢毛散 治少小新生中風方

驢毛

取背前交脊土會中拔取如手拇指大一把

麝香 二豆大

右以乳汁和銅器中微火煎令焦熟出為末小兒

服之

不能飲以乳汁和之葶筒貯瀉著咽中然後飲乳
令入腹

衍驢肉動風而驢毛反能治風風氣皆發於毛猶麤
肉痿陽而糜角力能助陽陽精鍾聚於角也加以
麝臍通達經脈外內無所不透總取血肉之性不
傷初生之氣也

茵芋圓 治少小有風癩疾至長不除或遇天陰
節變便發動食飲堅強亦發百脈攣縮行步不
正言語不便者服之永不發方

茵芋葉 鈆丹 秦朮
鈆丹 秦朮
鈆丹 秦朮

鈎藤皮 石膏 牡蠣
防葵 菖蒲 黃芩
松蘿 蜈蚣 甘艸

右十二味為末蜜丸小豆大三歲已下服五丸三
歲已上服七丸五歲已上服十九丸十歲已上可至
十五丸

衍風癩至長不除以成固疾非峻按病根何以求其
克應然須元氣稍堪勝任毒藥者庶可圖治茵芋
為風癩專藥本經治五臟心腹寒熱然世罕識此
頗不易得鈆丹為鎮驚專藥本經治驚癇癩疾取

其鎮堅頑痰也秦朮為治風逐濕專藥本經治寒
熱邪氣寒濕風痺取其能散風毒也鈎藤為小兒

驚癇專藥雖無本經可放以意逆之取其專走厥
陰風癇乃厥陰之病也石膏為清利風熱專藥本
經治中風寒熱心下逆氣驚喘取其能除胃熱也

杜蘅為杜風祛熱專藥本經治胸脇下逆氣取其
能溫中氣也防葵為流走經脈專藥本經治癩癩
風邪狂走取其善通結滯也菖蒲為開通心氣專
藥本經治風寒濕痺取其能利九竅也黃芩為分

解風熱專藥本經逐水下血閉取其專行少陽也
松蘿為松上女蘿為去風平肝專藥本經治癩怒
邪氣取其善療風熱也蜈蚣為拔毒散結專藥本
經治小兒驚癇瘧疾大人癩疾狂陽取其力破痰

血也甘艸為和中解毒專藥本經治五臟六腑寒
熱邪氣取其調和諸藥也合諸性味參之則永不
復發之功可想望矣

鎮心圓 治小兒驚癇百病鎮心氣方

銀屑 水銀 牛黃
大黃 茯苓 茯神
遠志 防已 白朮

雄黃

人參

芍藥各二分

紫石英

真珠

防葵

鐵精各四分

右十六味先以水銀和銀屑如泥別治諸藥和丸

二葦兒如麻子二九隨兒大小增之一方無牛

黃

衍義 鑽心而用銀屑水銀鐵精雄黃石英真珠以鑽其

怯大黃牛黃以瀉其痰茯苓神以安其神防已

防葵以破其結芍藥白薇以收其散人參遠志以

發其竅竅隧利而神識清何慮驚痰之不渙散乎

千金方衍義卷五十一 毛 掃葉山房

丹參赤膏 治少小心腹熱除熱方

丹參

雷丸

苾硝

戎鹽

大黃各二兩

右五味咬咀以苦酒半升浸四鍾一宿以成練猪

肪一斤煎三上三下去滓乃內苾硝膏成以摩心

下冬夏可用 一方但用丹參雷丸亦佳

衍義 小兒心腹常熱皆母腹中瘀垢未清血氣不和所

致故用丹參雷丸硝黃戎鹽散血逐熱之藥製為

赤膏常摩心下使瘀散血和其熱自除漬用苦酒

專取酸收以固腠理前用猪肪專取脂澤以潤肌

膚也

五物甘艸生摩膏 治少小新生肌膚幼弱喜為

風邪所中身體壯熱或中大風手足驚掣方

甘艸

防風各一兩

白朮

桔梗各二兩

雷丸各二兩

右五味咬咀以不中水猪肪一斤煎為膏以前藥

微火上煎消息視稠濁膏成去滓取如彈丸大一

枚灸手以摩兒百過寒者更熱熱者更寒小兒雖

無病早起常以膏摩顛上及手足心甚辟風寒

衍義 生摩膏摩兒顛門手足以拒風寒僅用前方中雷

千金方衍義卷五十一 天 掃葉山房

丸一味入於防風白朮甘艸桔梗劑中以實皮膝

肌肉故但取猪肪熬膏無藉苦酒之峻收也灸手

時摩不特可以杜風并杜驚掣之患此與赤膏皆

外治之良法耳

灸法

論曰小兒新生無疾慎不可逆鍼灸之如逆鍼灸則

忍痛動其五脈因喜成病河洛關中土地多寒兒善

病瘧其生兒三日多逆灸以防之人灸類以防瘵有

瘵者舌下脈急牙車筋急其土地寒皆決舌下去血

灸急以防瘵也吳蜀地溫無此疾也古方既傳之今

人不詳南北之殊便按方而用之是以多害於小兒也所以田舍小兒任其自然皆得無有天橫也小兒驚啼眠中四肢掣動變蒸木解慎不可鍼灸爪之動其百脈仍因驚成癩也惟陰癩瘰癧可鍼灸爪之凡灸癩當先下兒使虛乃承虛灸之未下有實而灸者氣逼前後不通殺人癩發平日者在足少陽晨朝發者在足厥陰日中發者在足太陽黃昏發者在足太陰人是發者在足陽明夜半發者在足少陰

右癩發時病所在視其發早晚灸其所也

大癩有五臟之癩六畜之癩或在四肢或在腹內當審其候隨病所在灸之雖少必瘳若失其要則為害也

千金方衍義卷辛

三 掃葉山房

肝癩之為病面青目反視手足搖灸足少陽厥陰各三壯

心癩之為病面赤心下有熱短氣息微數灸心下第二肋端宛宛中此為巨闕又灸手心主及少陰各三壯

脾癩之為病面黃腹大喜痢灸胃管三壯俠胃管傍灸二壯足陽明太陰各二壯

肺癩之為病面目白口沫出灸肺輸三壯又灸手陽

明太陰各二壯

腎癩之為病面黑正直視不搖如尸狀灸心下二寸二分三壯又灸肘中動脈各二壯又灸足太陽少陰各二壯

膈癩之為病目反四肢不舉灸風府又灸頂上鼻人中下層承漿皆隨年壯

腸癩之為病不動搖灸兩承山又灸足心兩手勞宮又灸兩耳後完骨各隨年壯又灸臍中五十壯

右五臟癩證候

馬癩之為病張口搖頭馬鳴欲反折灸項風府臍中三壯病在腹中燒馬蹄末服之良

千金方衍義卷辛

三 掃葉山房

牛癩之為病目正直視腹脹灸鳩尾骨及大椎各三壯燒牛蹄末服之良

羊癩之為病喜揚目吐舌灸大椎上三壯

猪癩之為病喜吐沫灸完骨兩傍各一寸七壯

犬癩之為病手足拳攣灸兩手心一壯灸足太陽一壯灸肋戶一壯

雞癩之為病搖頭反折喜驚自搖灸足諸陽各三壯

右六畜癩證候

小兒暴癩灸兩乳頭女兒灸乳下二分

治小兒暴瀉者身體正直如死人及腹中雷鳴灸太倉及臍中上下兩傍各一寸凡六處又灸當腹度取背以繩繞頸下至臍中竭便轉繩向背順脊下行盡繩頭灸兩傍各一寸五壯

若面白啼聲色不變灸足陽明太陰

若目反上視眸子動當灸顙中取之法橫度口盡兩吻際又橫度鼻下亦盡兩邊折去鼻度半都合口為度從額上髮際上行度之灸度頭一處正在顙上未合骨中隨手動者是最要處也次灸當額上入髮二分許直望鼻為正次灸其兩邊當目瞳子直上入

千金方衍義卷五

主

掃葉山房

髮際二分許次灸項上迴毛中次灸客主人穴在眉後際動脈是次灸兩耳門當耳開口則骨解開動張陷是也次灸兩耳上捲耳取之當捲耳上頭是也一法大人當耳上橫三指小兒各自取其指也次灸兩耳後完骨上青脈亦可以鍼刺令血出次灸玉枕項後高骨是也次灸兩風池在項後兩轅動肋外髮際陷中是也次灸風府當項中央髮際亦可與風池三處高下相等次灸頭兩角兩角當迴毛兩邊起骨是也

右頭部凡十九處兒生十日可灸三壯三十日可灸

五壯五十日可灸七壯病重者具灸之輕者灸顙中風池玉枕也艾使熱炷令平正著肉火勢乃至病所也艾若生炷不平正不著肉徒灸多炷故無益也

若腹滿短氣轉鳴灸肺百在兩乳上第二肋間宛宛中懸繩取之當瞳子是次灸臍中次灸胸堂次灸臍中次灸薛息薛息在兩乳下第一肋間宛宛中是也次灸巨關大人去鳩尾下一寸小兒去臍作六分去鳩尾下一寸是也并灸兩邊次灸胃管次灸金門在穀道前囊後當中央是也從陰囊下度至大孔前中分之

千金方衍義卷五

主

掃葉山房

右腹部十二處胸堂巨關胃管十日兒可灸三壯一月已上可五壯陰下縫中可三壯或云隨年壯若身強反張灸大椎并灸諸藏輸及脊脊上當中從大椎度至窮骨中屈更從大椎度之灸度下頭是脊脊也

右背部十二處十日兒可灸三壯一月已上可灸五壯

若手足掣癢驚者灸尺澤次灸陽明次灸少商次灸勞宮次灸心主次灸合谷次灸三關次灸少陽

右手部十六處其要者陽明少商心主尺澤合谷少

也壯數如上

又灸伏兔次灸三里次灸腓腸次灸鹿溪次灸陽明
次灸少陽次灸然谷

右足部十四處皆要可灸壯數如上

手足陽明謂人四指凡小兒驚癇皆灸之若風病大
動手足掣癡者盡灸手足十指端又灸本節後

客忤第四論二首 方二十七
灸法一首

論曰少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一

名中人是為客忤也雖是家人或別房異戶雖是乳

母及父母或從外還衣服經履鬼神粗惡暴氣或牛

千金方義卷五

重

掃葉山房

馬之氣皆為竹也熱作喘息乳氣未定者皆為客忤

其乳母遇醉及房勞喘後乳兒最劇能殺兒也不可

不慎凡請乘馬行得馬汗氣臭未盥洗易衣裝便向

兒邊令兒中馬客忤兒卒見馬來及聞馬鳴驚及馬

上衣物馬氣皆令小兒中馬客忤慎護之特重一歲

兒也凡小兒衣布帛綿中不得有頭髮屨中亦爾白

衣青帶青衣白帶皆令中忤凡非常人及諸物從外

來亦能驚小兒致病欲防之法諸行從外來人凡有

異物入戶當將兒避之勿令見也若不避者燒牛屎

令常有煙氣置戶前則善

小兒中客為病者無時不有此病也而秋初一切小

兒皆病者豈是一切小兒悉中客邪夫小兒所以春

冬少病秋夏多病者秋夏小兒陽氣在外血脈嫩弱

秋初夏末晨夕時有暴冷小兒嫩弱其外則易傷暴

冷折其陽陽結則壯熱胃冷則下痢是故夏末秋初

小兒多壯熱而下痢也未必皆是中客及魘也若治

少小法夏末秋初常宜候天氣溫涼也有暴寒卒冷

者其少小則多患壯熱而下痢也慎不可先下之皆

先殺毒後下之耳元中記云天下有女鳥名曰姑獲

其後于母秘一名天帝女一名隱飛鳥一名夜行遊

千金方義卷五

重

掃葉山房

女又名鈞星鬼喜以陰雨夜過飛鳴徘徊人村里喚

符來者是也鳥浮雌無雄不產陰氣毒化生毒落毛

羽於人中庭置兒衣中便令兒作癩病必執即化為

其兒也是以小兒生至十歲衣被不可露也七八月

九忌

凡中客忤之為病類皆吐下青黃白色水穀解離緩

痛天紅面色變易其候似癩但眼不上插耳其脈急

數者是也宜與龍膽湯下之加人參當歸各如龍膽

秤分等多少也小兒中客急視其口中懸雍左右當

有青黑腫脈核如麻豆大或赤或白或青如此便宜

用鍼速刺漬去之亦可爪摘決之并以綿纏釵頭拭去血也少小中客之為病吐下青黃赤白汁腹中痛及反側偃側喘似癩狀但目不上挿少睡耳面變五色其脈弦急若失時不治小久則難治矣欲療之方用鼓數合水拌令濕搗熟丸如雞子大以摩兒顛及手足心各五六遍畢以丸摩兒心及臍上下行轉摩之食頃破視其中當有細毛即擲丸道中痛即止

治少小中客忤項強欲死方

取衣中白魚十枚為末以傅母乳頭上令兒飲

千金要義卷五

聖

掃葉山房

之入咽立愈 一方二枚著兒母手掩兒臍中

兒吐下愈亦以摩兒項及脊強處

又方

吞麝香大豆許立愈

治小兒卒中忤方

剪取驢前膊上旋毛大如彈子以乳汁煎之

令毛消藥成著乳頭飲之下喉即愈

又方

燒母衣帶三寸并髮合乳汁服之

又方

取牛鼻津服之或牛口沫傅乳頭飲之

一物猪蹄散 治小兒寒熱及赤氣中人方

取猪後足懸蹄燒末搗篩以飲乳汁一撮立刻

治少小卒中客忤不知人者方

取熱馬屎一丸絞取汁飲兒下咽便愈亦治中

客忤而嘔啼而青腹強者

一物馬通浴湯 治少小中忤方

馬通三升燒令煙絕以酒一斗煮三沸去滓浴

兒即愈

一物猪通浴湯 治小兒中人忤嘔啼面青腹強

千金要義卷五

聖

掃葉山房

者方

猥猪通三升以熱湯灌之適寒溫浴兒

治少小客忤二物黃土塗頭方

取竈中黃土蚯蚓屎等分搗合水和如鷄子黃

大塗兒頭上及五心良 一方云用鷄子清和

如泥

治小兒卒中客忤方

銅鏡鼻燒令赤著少許酒中大兒飲之小兒不

能飲者含與之即愈

前小兒客忤得之不意間雖有似乎驚恐而實未必

皆驚原其感觸之由總屬不外因略無關乎表裏所以治療之法僅取易辦不需湯藥如衣中白魚本經原治小兒中風項強背起 崩騰辟邪通經 驢毛截風 牛津通津 猪蹄甲治腹中伏熱 馬尿汁逐六腑穢毒 馬通浴滌除血脈諸風 猪通浴蒸發胃經邪氣 龜土蚓泥溫中解毒 銅鏡鼻鎮攝肝氣 已上諸治總皆取意以安其心所謂醫者意也

治小兒中馬客忤而吐不止者方

灸手心主間使大都隱白三陰交各三壯可用

千金方衍義卷五十一

手主

攝業山房

粉丸如鼓法並用唾唾而呪之呪法如左

呪客忤法

呪曰摩衆公摩衆母摩家子兒苦客忤從我始

扁鵲雖良不如善唾良呪訖棄丸道中

又法

取一刀橫著竈上解兒衣發其心腹訖取刀持向兒呪之唾輒以刀向心腹非非曰音非出煙

煌口出東方背陰向陽葛公葛公不知何公子

來不視去不顧過與生人忤梁上塵天之神戶

下土鬼所經大刀鑽犀對竈君七唾客愈兒

驚匪啡啡如此二七啡啡每唾以刀擬之呪當三遍乃畢用鼓丸如上法五六遍訖取此丸破視其中有毛棄丸道中客忤即愈矣

小兒魘方

論曰凡小兒有魘病者是婦人懷娠有惡神導其腹中胎妬嫉他小兒令病也魘者小鬼也音妬嫉婦人不必悉招魘魅人時有此耳魘之為疾喜微微下痢寒熱或有去來毫毛鬢髮鬢鬢不悅是其證也宜服龍膽湯凡婦人先有小兒未能行而母又有孕使兒飲此乳亦作魘也令兒黃瘦骨立髮落壯熱是其證也

千金方衍義卷五十一

手主

攝業山房

治魘方

炙伏翼熟嚼哺之

又方

燒伏翼末飲服之

又方

以水二升煮藕蒂冬瓜各四兩取浴之

白蘚皮湯

治少小客魘挾實方

白蘚皮

大黃

甘艸各兩

芍藥

茯苓

細辛

右七味咬咀以水二升者取九合分三服

行 疳病雖云觸魅所致既病而加乳食不化結積乳

癖所以腹大寒熱龍膽湯一方專主嬰兒胎熱驚

癇又為疳病首推虛加人參當歸以助氣血方可

任蟻蚶大黃之猛次則白鮮皮湯較前風癇方中

白羊薺湯功力稍遜白鮮皮專解風毒故風癇亦

多用之大黃蕩滌腸胃有推陳致新之功芍藥除

堅積腹痛茯苓治胸膈逆氣細辛治食節拘攣挂

心利關節結氣甘艸和臟腑寒熱合諸味主治則

風癇乳癖無不兼該何憚魅氣之不釋乎 伏翼

為禽中之魅本經主寒熱結氣同氣相攻之用或

灸或燒無不宜之為蓄為治魅專藥有利水殺蟲

之功冬瓜利大小腸有壓丹石之動魅病之治總

不外乎滌除乳癖也

小兒夜啼

龍角圓 治小兒五驚夜啼方 崔氏各五錢

龍角 六錢 牡蠣 一枚 川大黃 各九錢

黃芩 半兩 蚱蟬 二枚 牛黃 如小豆五枚

右六味末蜜丸如麻子葶裏兒服二九隨兒大小

增減

芎藭散 治小兒夜啼至明即安麻方

芎藭 白木 防已 各半兩

右三味治下篩以乳和與兒服之量多少又以見

母手掩臍中亦以摩兒頭及香驗二十日兒未能

服散者以乳汁和服如麻子丸兒大能服散者

以意斟酌與之

一物前胡圓 治少小夜啼方

前胡隨多少搗末蜜丸如大豆服一九日三稍

加至五六丸以瘥為度

千金湯 治小兒暴驚啼絕死或有火從外來邪

氣所逐令兒得疾眾醫不治方

蜀椒 左顧牡蠣 各六錢

右二味以酢漿水一升煮取五合每服一合

又方 伏龍肝 交道中土 各一把

右二味治下篩水和少許飲之

又方 取馬骨燒 灰傅乳上飲兒啼即止

治小兒夜啼不已醫所不治者方

取狼尿中骨燒灰爲末水服如黍米粒大二枚

卽定

又方

燒蝟皮三寸灰著乳頭飲之

治小兒驚啼方

取雞屎白熬末以乳服之佳

又方

酒服亂髮灰良

又方

以妊娠時食飲偏有所思者物啼兒則愈

術方書論小兒夜啼但以見火而啼爲胎熱去火而

啼爲胎寒此辨固是但未及胎風胎驚胸腹脹痛

等治不若千金之兼到也如龍角丸專取東方木

氣以透肝風牡蠣以斂腎氣大黃以滌驚痰黃芩

以解風熱牛黃以定胎驚野蠲專止夜啼爲胎熱

驚啼峻藥 芎藭散專取芎藭以散風熱白朮以

培土虛防已以開痰癖爲然熱安中專藥 前胡

九但取一物以下痰氣爲表虛胎風善藥 千金

湯專取蜀椒以溫中氣牡蠣以鎮腎性爲腎虛胎

寒要藥 伏龍肝以填土虛交道士以通脾氣爲

脾虛胎熱土藥 其馬骨灰狼屎骨皆主胎風蝟

皮灰除胃脘痛雞矢白治腹脹滿亂髮灰專主胎

驚隨證取用血肉之味也設治都不應則以其母

懷身時所思之物哺兒以適胎情爲不藥之藥曲

盡夜啼治法矣

傷寒第五論一首 方三十首

論曰夫小兒未能冒涉霜雪乃不病傷寒也大人解

脫之久傷於寒冷則不論耳然天行非節之氣其亦

得之有時行疾疫之年小兒出腹但患斑者世治其

時行節度故如大人法但用藥分劑少異藥小冷耳

麥門冬湯 治小兒未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔

逆方

麥門冬十八 石膏 寒水石

甘州各半 桂心八錢

右五味咬咀以水二升半煮取一升每服一合日

三

初生小兒斑衄嘔逆多由真體之弱寒邪入犯而

熾熱與大人之伏氣發溫無異所以專取白虎而

兼竹葉石膏炙甘州湯之製以寒水石代知母而

化腎熱以麥門冬代粳米而滋肺腎其用桂心妙

義有三一保初生陽氣一發諸藥性味一為散

嚮導即伏氣發溫時行疫癘當不出此倘表證

除不妨仍用桂枝不失南陽本來聖法

芍藥四物解肌湯 治少小傷寒方

芍藥 黃芩 升麻

葛根各半兩

右四味以水三升煮取九合去滓分五服期歲已

上分三服

此升麻湯兼黃芩湯之製以升麻湯專行陽明黃

芩湯專走少陽此則兼解二經風熱也

麻黃湯 治少小傷寒發熱咳嗽頭面熱者方

麻黃 生薑 黃芩各一兩

甘草 桂心 石膏

芍藥各半兩 杏仁十枚

右八味咬咀以水四升煮取一升半分二服見若

小以意減之

此本南陽先師麻黃湯麻杏甘石湯兼越脾湯桂

枝麻黃各半湯等方之製其間但不用大棗者以

嬰兒臟腑窄弱恐其戀膈助滿也與前芍藥四物

麻肌湯不用甘草同義此有桂心辛散則甘草又

為必需

治小兒傷寒方

葛根汁 淡竹瀝各六合

右二味相和二三歲兒分三服百日兒斟酌服之

不宜生者服佳

葛根搗汁以散陽明客邪淡竹炙瀝以清胃中痰

熱不宜生服者恐其寒滑作瀉也

治小兒疳氣方

桃葉三兩搗以水五升煮十沸取汁日五六遍

淋之若復發燒雄鼠屎二枚燒水調服之

此藥專碎一切疳行不正之氣若淋之蒸之其熱

不解此必素稟虛邪乘於裏故燒鼠屎以祛

內陷之熱也

五味子湯 治小兒傷寒病久不除瘥後復劇痺

瘳骨立方

五味子十銖 麥門冬 黃連

黃芩 大黃 前胡各六銖

芒硝五銖 石膏一兩 甘草

當歸各十銖

右十味咬咀以水三升煮取一升半服二合得下

便止計大小增減之

衍小兒傷寒病久不除或瘥後復劇此必邪從火化

而陷伏不解所以瘦瘠骨立非急投三黃下奪無

以泄之三黃不逮濟以芒硝石膏其前胡麥冬五

味甘艸當歸以滋津氣之燥在嬰兒固為合劑以

元神未動不慮其引邪內賊也

莽艸浴湯 治少小傷寒方

莽艸 半斤 牡蠣 四兩 雷丸 三十枚

大黃 一兩 蛇床子 一升

右五味以水三斗煮取斗半適寒溫以浴兒避眼

千金衍義卷五十一 婦人胎前產後

及陰

又方 治小兒卒寒熱不住不能服藥方

莽艸 丹參 桂心 各三兩

菖蒲 半斤 雷丸 一升 蛇床子 二兩

右六味以水二斗者三五沸適寒溫以浴兒避眼

及陰

雷丸浴湯 治小兒忽寒熱方

雷丸 二十枚 大黃 四兩 黃芩 一兩

苦參 石膏 各三兩 丹參 二兩

右六味咬咀以水二斗者取一斗半浴兒避眼及

陰浴訖以粉粉之勿厚衣一宿復浴

李葉浴湯 治少小身熱方

李葉隨多少咬咀以水煮去滓浴兒良

柳枝浴湯 治小兒生一月至五月年寒乍熱方

柳枝細切煮取汁洗兒若渴絞冬瓜汁服之

青木香浴湯 治小兒壯熱羸瘠方

青木香 四兩 麻子仁 一升 竹葉 各一升

虎骨 五兩 白芷 三兩

右五味咬咀以水二斗者取一斗稍稍浴兒

衍已上六方皆取其湯邪熱逐毒氣之功宜諒可藥

千金衍義卷五十一 吳 婦人胎前產後

隨時取用

十二物寒水石散 治少小身體壯熱不能服藥

寒水石 芒硝 滑石

石膏 赤石脂 青木香

大黃 甘艸 黃芩

防風 芎藭 麻黃根

右各等分合治下篩以粉一升藥屑三合相和復

以篩篩之以粉兒身日三

衍一派苦寒辟熱藥中祇取防風一味達表石服一

味實裏麻黃根一味斂汁尤賴米粉以實肌肉

李根湯 治小兒暴有熱得之二三日者方

李根

桂心

芒硝各十

麥門冬

甘艸各一

右五味咬咀以水三升煮取一升分五服

衍李根鹹寒降火芒硝苦寒蕩熱麥門甘艸甘平滋

津桂心辛溫破結熱因熱用從治之治也

升麻湯 治小兒傷寒變熱毒病身熱而赤口燥

心腹堅急大小便不利或口瘡者或因將熱便

四肢攣掣驚仍成癩疾時發時醒醒後身熱如

千金方卷五十一

火者悉主之方

升麻

白薇

麻黃

葳蕤

柴胡

甘艸各半

黃芩一兩

朴硝

六黃

鉤藤各六

右十味咬咀以水三升先煮麻黃去土沫內諸藥

煮取一升兒生三十日至六十日一服二合六十

日至百日一服二合半百日至二百日一服三合

衍此採麻黃升麻湯中五味以二麻透表黃芩泄熱

姜甘潤燥參入白薇散堅柴胡退熱硝黃蕩實

麻舒攀表裏兼治之捷法仍從南陽法中化出

大黃湯 治小兒肉中久挾宿熱瘦瘠熱進退休

作無時方

大黃

甘艸

芒硝各半

桂心八銖

石膏一兩

大棗五枚

右六味咬咀以水三升煮取一升每服二合

又方治小兒腹大短氣熱有進退食不安穀為

不化方

大黃

黃芩

甘艸

麥門冬

芒硝各半

石膏一兩

千金方卷五十一

桂心八銖

右七味咬咀以水三升煮取一升半分三服期歲

已下小兒作五服

衍前方以肉中久挾宿熱故用大棗引硝黃甘石入

於營分然非桂心無以散之後方以腹大短氣故

用黃芩麥冬引硝黃甘石入于氣分仍用桂心為

嚮導耳

蜀漆湯 治小兒潮熱方

蜀漆

甘艸

知母

龍骨

牡蠣各半

右五味咬咀以水四升煮取一升去滓一歲兒少
少溫服半合日再

此即金匱蜀漆散彼治大人吐瘧故用漿水欸蜀

漆以按痰涎此治小兒潮熱故用知母佐牡蠣以
靜伏熱用甘艸者即外臺牡蠣湯去麻黃而易知

母一從表散一從內解兩不移易之定法

竹葉湯 治小兒夏月患腹中伏熱溫壯來往或

患下痢色或白或黃三焦不利方

竹葉切

小麥各五

柴胡

麥門冬

人參

甘艸各半

千金方卷五十一

吳普云

茯苓十八

黃芩一兩

右八味咬咀以水四升煮竹葉小麥取三升去竹

葉小麥下諸藥煮取一升半分三服若小兒夏月

忽壯熱燒入手洞下黃澹氣力憊然脈極洪數用

此方加大黃二兩再服得下即瘥

又方 治五六歲兒溫壯腹中急滿息不利或有

微腫亦治極羸不下飲食壓痞手足逆冷方

竹葉切一

小麥半升

甘艸

黃芩

桔藁根

澤瀉

茯苓

知母

白朮

大黃各一

桂心二銖

生薑半兩

人參

麥門冬

半夏各二兩

當歸十八

右十六味咬咀以水七升煮竹葉小麥取四升去

滓內諸藥煎取一升六合分四服

治小兒連壯熱實滯不去寒熱往來微驚悸方

大黃一兩

黃芩

桔藁根

甘艸各十銖

滑石二兩

桂心

牡蠣

人參

龍骨

凝水石

白石脂

消石各半兩

千金方卷五十一

吳普云

右十二味咬咀以水四升煮取一升半每服二合

一日一夜令盡雖吐亦與之石英半兩

義千金治五心煩熱口乾唇燥胸中熱悶有竹葉湯

方用竹葉小麥知母石膏茯苓黃芩麥冬人參甘

艸桔藁半夏生薑其第一方即南陽竹葉石膏湯

中去石膏半夏梗米加小麥茯苓黃芩柴胡蓋竹

葉石膏湯本治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐故

用石膏粳米以清胃中餘熱半夏以治氣逆欲吐

設無吐逆可無藉於半夏也此治小兒腹中伏熱

溫壯來往故用小麥茯苓以除伏熱煩擾黃芩柴

胡以治温壯來往設無温壯可無藉於柴胡也

其又方但於前方除去柴胡一味仍用竹葉石膏

湯中知母半夏加入白木大黃桂心當歸栝蒌根

澤瀉生薑其妙用全在桂心一味知母黃芩得之

以破其結大黃白朮得之以振其威奇兵妙用詢

非庸俗可得而擬議者 其第三方治小兒連壯

執實滯即又方之變法其用石脂龍骨牡蠣即又

方白朮之意用滑石即又方澤瀉之意用凝水石

即又方竹葉知母之意用消石即又方半夏生薑

之意不特能滌痰涎兼可助桂心為在熱之嚮導

也

調中湯 治小兒中秋月長夕中暴冷冷氣折其

四肢熱不得泄則壯熱冷氣入胃變下痢或欲

赤白滯起數去小腹痛極壯熱氣脈洪大或

急數者服之熱使歇下亦瘥也但壯熱不吐下

者亦主之方

葛根

黃芩

茯苓

桔梗

芍藥

白朮

藜木

大黃

甘艸

右九味咬咀以水二升煮取五合服法如前篇龍

千金衍義卷五

三

歸藥山房

膽湯下量兒大小以意服之

義 葛根藜木甘艸解表藥也黃芩芍藥甘艸清熱藥

也大黃黃芩甘艸攻裏藥也苓朮桔梗甘艸和中

藥也為小兒寒鬱熱邪腹痛下痢之方功用與

人參敗毒相髣

生地黃湯

治小兒寒熱進退啼呼腹痛方

生地黃

桂心各二兩

右二味以水三升煮取一升期歲已下服二合已

上三合

一方七味有芍藥寒水石黃芩當歸甘

艸各半兩

行 義 熱邪入犯營血則寒熱進退故用生地黃專治血

熱則兼桂心以行地黃之滯寒熱兼濟之妙無愈

於此又方合黃芩湯則專主太陽少陽合病更加

寒水石以治心胃之火當歸以散肝脾之熱也

治小兒傷寒發黃方

又方

搗韭根汁澆清取如大豆許滴兒鼻中即出黃

水瘥

又方

千金衍義卷五

三

歸藥山房

搗青麥汁服之

又方

小豆三七枚

瓜蒂二七枚

糯米四十粒

右三味為末吹入鼻中

衍王瓜根專主濕熱發黃非汁專散癩熱青麥汁專

散肝熱瓜蒂散加糯米吹鼻取下黃水專散在土濕熱也但不可以筒極力過吹入腦令人喘息立

死

二物通汗散 治少小有熱不汗方

粉半斤

雷丸四兩

右搗為細末和下篩以粉兒身

二物茯苓粉散 治少小頭汗方

茯苓

牡蠣各四兩

右治下篩以粉八兩合搗為散有熱剉取粉汗即

自止

三物黃連粉散 治少小盜汗方

黃連

牡蠣

貝母各十

右以粉一升合搗下篩取粉兒身佳

衍雷九殺三蟲逐毒氣去胃中熱故能通汗茯苓守

五臟之氣牡蠣斂下焦之熱黃連貝母寒潤得牡

蠣之鹹寒雜粉以粉兒身專主小兒虛熱津液不

固之盜汗

犀角飲子

此由心藏熱之所感宜服此方

犀角十八銖

茯神一兩

麥門冬一兩

甘艸半兩

白木六銖

右五味咀以水九合煎取四合分服加龍齒一兩佳

衍犀角散胃熱之首藥得門冬茯神引入心包白木

甘艸收斂津液倘服之不應加龍齒以收肝氣之

散

恆山湯 治小兒溫瘧方

恆山切一兩

小麥三合

淡竹葉切一升

右三味以水一升半煮取五合量兒大小分服

衍恆山專滌內蘊之痰為截瘧之峻味小麥竹葉專

清胃中煩熱也

又方

鹿角末臨發時先服一錢七

又方

燒蟹甲灰以酒服一錢七至發時服三七并以

火炙身

又方

燒雞胍脰中黃皮為末和乳與服男雄女雌

初鹿角專補督脈督脈固則外邪不能容矣醫甲專

辟肝邪雞肌脰專滌胃滯肝胃淨寒熱自除

又方

灸兩乳下一指三壯

孫真人千金方衍義卷五上

千金方衍義卷五

五

孫真人

孫真人千金方衍義卷五下

長洲 王著

南沙 應世 孫容校

少小嬰孺方下 凡四類

咳嗽第六 方十四首

小兒出胎二百許日頭身患小小瘡治護小瘡復發
五月中忽小小咳嗽微溫和治之因變癩一日二十
過發四肢縮動背脊駢眦眼反須與氣絕良久復蘇
已與常治癩湯得快吐下經日不間爾後單與竹瀝
汁稍進一日一夕中合進一升許發時小疎明日與

千金方衍義卷五

孫真人

竹瀝湯方

竹瀝 五合 黃芩 三十 木防已

羚羊角 各六銖 一 大黃 二兩

茵芋 三銖 麻黃 白薇

桑寄生 葶藶 一方 廿艸 各半

右十二味咬咀以水二升半煮取藥減半內竹瀝
煎取一升分服二合相去一食久進一服

衍 咳嗽有六淫七情經絡臟腑種種不倖此專因胎

毒發瘡後變發癩與竹瀝治痰滌熱雖得小疎然

非吐下不能大朽其勢故用麻黃白薇開發肺氣於上即用大黃黃芩竹瀝疎利大腸於下羚羊防已草薺寄生茵芋專為執券發癰而設白朮甘艸和中實脾師旅之糧餉也

紫苑湯 治小兒中冷及傷寒暴嗽或上氣咽喉

鳴氣逆或鼻塞清水出方

紫苑 杏仁 黃芩

當歸 甘艸 橘皮

青木香 麻黃 桂心各六銖

大黃一兩

千金方藥卷

五

橘葉山房

右十味咬咀以水三升煮取九合去滓六十日至百日兒一服二合半一百日至二百日兒一服三

合

衍義前方重在瘡毒發癰故用羚羊防已茵芋等味此方專主寒嗽故取古今錄驗橘皮湯全方但加大黃青木香二味以滌內積之乳癖不可拘於大人

治例也

五味子湯 治小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘

追咳嗽晝夜不息食則吐不下方

五味子 當歸各半兩 麻黃

乾薑 桂心 人參

紫苑 甘艸各一兩 款冬花

細辛各三銖 大黃一兩半 白朮二兩

右十二味咬咀以水二升半煮取九合去滓兒六日至百日一服三合半一百日至二百日一服三合其大黃別浸一宿下一一方無款冬花大黃有大棗二枚

義前小兒風冷入肺咳嗽用麻桂薑辛款冬甘苑當矣以其有面青喘逆吐逆不下知肺胃之氣大虛非藉人參不能安其胃氣非藉白朮不能止其吐逆

千金方藥卷

五

橘葉山房

非藉五味不能斂其喘逆蓋小兒面青逆冷必非伏熱假象但其咳嗽晝夜不息必有乳癖留滯於中若係虛嗽火動則劇炎靜則止定屬虛中挾痰之象無疑非藉大黃不能滌其乳癖非藉當歸不能和其血氣上三方總藉麻黃大黃內外上下兼并之力也

治小兒大人咳逆短氣胸中吸吸呵出涕唾嗽出

臭膿方

燒淡竹瀝煮二十沸小兒一服一合日五服大人一升亦日五服不妨食息乳哺

此即前第一方所言單與竹瀝汁之法也

治小兒寒熱咳逆膈中有乳癖若此不欲食方

乾地黃 四兩 麥冬 五味子

蜜 各半 大黃 硝石 各二兩

右六味投咀以水三升煮取一升去滓內硝石蜜

煮令沸服二合日三胸中當有宿乳汁一升許出

大者服五合

地黃麥冬五味蜂蜜治久咳肺燥因膈中有乳癖

故用硝黃不用芫硝而用硝石專磨乳癖之用也

射干湯 治小兒咳逆喘息如水雞聲方

射干 麻黃 紫苑

甘艸 生薑 半夏 各一兩 五枚

桂心 五寸 大棗 二十枚

右八味投咀以水七升煮取一升五合去滓內蜜

五合煎一沸分溫服二合日三

此於金匱射干麻黃湯中除去細辛欬冬五味易

入桂心甘艸蜂蜜雖主治與金匱無異而桂心和

榮較細辛按肺之力稍緩甘艸和胃較五味收津

之味稍平蜂蜜潤燥較欬冬散結之性稍和甚若

前五味子湯之有面青喘迫不得不藉參朮五味

子

之收斂津氣也

又方

半夏 四兩 紫苑

生薑 細辛 桂心

甘艸 各二兩 蜜 一合 阿膠 欬冬花 二合

右九味投咀以水一斗煮半夏取六升去滓內諸

藥煮取二升五合五歲兒服一升二歲兒服六合

量兒大小多少加減之

前方專按風寒逆氣此方專按痰飲瘀結雖所見

之證與前無異而受病之源不侔也

天方衍義卷辛 掃葉山房

杏仁圓 治大人小兒咳逆上氣方

杏仁三升熟搗如膏蜜一升為三分以一分內

杏仁搗令強更內一分搗之如膏又內一分搗

熟止先食已含咽之多少自在日三每服不得

過半方寸七則利

杏仁為辛散肺氣之峻藥生用則治傷寒喘逆熬

黑則治結胸痰垢其耗氣之性可知此與蜜三分

和搗藉其甘溫潤澤以降肺逆可為齒盡製度之

妙然服不過半方寸七則利使肺氣從大腸降泄

無復咳逆上氣之患矣

又方

半夏 二斤 去皮河水洗六七度完用

白礬 一斤 研末

丁香 香

川升麻 各四兩

右七味以好酒一斗與半夏拌和勻同浸春冬三

七日夏秋七日密封口 日足取出用冷水急洗風

吹乾每服一粒嚼破用薑湯下或乾喫候六十日

乾方得服疑非孫思邈方

衍前方用蜂蜜製杏仁以潤肺燥咳逆此方用酒制

半夏以逐胃濕蒸氣其白礬等味藉以解半夏之

毒并助胃健運之力耳

八味生薑煎 治少小嗽方

生薑 七兩 乾薑 四兩 桂心 二兩

甘艸 欵冬花 紫苑 各三兩

杏仁 蜜 各一斤

右合諸藥為末微火上煎取如餡餅量其大小多

少與兒含咽之百日小兒如棗核許日四五服甚

有驗

衍此治肺氣咳嗽氣逆用蜂蜜者藉以制薑桂之燥

也

四物欵冬圓 治小兒嗽晝夜甚初不得忘不能復啼方

欵冬花 紫苑 各一兩半 桂心 半兩

伏龍肝 六銖

右為末蜜和如泥取如棗核大傅乳頭令兒飲之

日三傳之漸漸令兒飲之

衍咳嗽晝夜甚在少年當責之陰虛在老人當責

之血燥在小兒當責肺胃虛冷故用桂心伏龍肝

之辛溫實脾以助欵冬紫苑溫肺之力

芎藭圓 治小兒暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆鳴

方 芎藭 烏頭 杏仁 各一兩 細辛 各六銖 紫苑 各一兩 川椒 五銖 吳茱萸 各六銖 桂心 半兩

右十二味為末蜜丸如梧子三歲兒飲服五丸加

至十九日三兒小以意減之兒大以意加之暴嗽

數服便瘥

衍本經以芎藭為風寒濕痺咳逆上氣要藥世人但

知其有通心利竅明目出聲之功咳逆絕不知

也

用是慮其溫燥也其辛烏薑桂椒煎總取辛溫散冷之用其效尤在稀澀散之烏莢礬石助薑蒲蒲開竅滌痰之力杏仁欬冬紫苑不過藉以引諸藥入肺經耳

桂枝湯 治少小十日已上至五十日卒無聲咳

吐乳嘔逆暴嗽晝夜不得息方

桂枝 半兩

甘艸 二兩

紫苑 十八

麥冬 二兩十

右四味咬咀以水二升煮取半升以綿著湯中捉

綿滴兒口中晝夜四五過與之節乳哺

千金方藥錄

木

楊柳山房

麻黃湯 治少小卒肩息上氣不得安此惡風入

肺方

麻黃 四兩

甘艸 二兩

桂心 五十

五味子 半斤

半夏

生薑 各二

右六味咬咀以水五升煮取二升百日兒服一合

大小節度服之便愈

桂枝湯風傷衛藥也以水方無治聲咳藥故去芍

藥薑棗而易紫苑門冬引領桂枝甘艸以開發肺

胃逆氣 麻黃湯寒傷榮藥也以水方無治肩息

藥故借小青龍去白芍細辛易生薑以辟除惡風

痰氣皆長沙方中變法豈特嬰兒主治哉

癖結脹滿第七方三十首

雙紫圓 治小兒身熱頭痛食飲不消腹中脹滿

或小腹絞痛大小便不利或重下數起小兒無

異疾惟飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸

寒熱惟此九治之不瘥更可重服小兒欲下是

其蒸候哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內

不調悉宜用此九不用他藥數用神驗方

例中凡云服紫九者即前變蒸篇中四味者是

也云服紫九不下者服赤九赤九差賦病重者

常用之方中並無赤九而此用珠砂又力紫九疑此即赤九也

巴豆

各十

麥冬 十

甘艸 五銖

甘遂

珠砂 各三

牡蠣

蠟 各八

右八味以湯熟洗巴豆研新布絞去油別擣甘艸

甘遂牡蠣麥門冬下篩訖研蕤仁令極熟乃內散

更擣二千杵藥燥不能相丸更入少蜜足之半歲

兒服如荏子一雙一歲二歲兒服如半麻子一雙

三四歲者服如麻子二九五六歲者服如大麻子

二九七歲入歲服如小豆二九九歲十歲微大於

小豆二九常以雞鳴時服至日出時不下者熟粥

飲數合即下丸皆雙出也下甚者飲以冷粥即止

小兒無異疾惟飲食之過度故宜巴豆之辛烈兼

甘遂之苦寒以蕩練癖積獲仁除心腹邪熱結氣

麥冬治腸中傷飽胃終脈絕羸瘦短氣壯蠟散內

結積執蜂蠟清胃甘粳和中丹砂安神不使巴豆

甘遂侵犯正氣也

治小兒胎中宿熱乳母飲食粗惡辛苦乳汁不起

兒乳哺不為肌膚心腹痞滿萎黃瘦瘠四肢痿

蹇繚展服之可令充悅方

芍藥

柴胡各二兩

大黃

千金方衍義卷五

十

補藥出房

人參各一兩

乾薑如熱以枳實代

甘艸各半兩

蟹甲

茯苓各一兩半

右八味為末蜜丸如大豆服一九一歲已上乳服

三九七歲兒服十九日二

行 嬰兒胎稟中有宿熱故取小柴胡以和之以半夏

之辛燥故易茯苓黃芩苦寒故易蟹甲生薑辛散

故易乾薑其芍藥大黃乃大柴胡中主藥去大黃

不去入參甘艸者惡其膩膈取其安中也

牛黃圓 治小兒宿乳不消腹痛驚啼方

黃三錄

附子一枚

真珠

巴豆

杏仁各一兩

右五味搗附子真珠為末下篩別搗巴豆杏仁合

如泥內藥及牛黃搗一千二百杵藥成若乾入少

蜜足之百日兒服如粟米一九三歲兒服如麻子

一九五六歲兒服如胡豆一九口二先乳哺了服

之屬上下悉當微轉藥丸出者病愈散出者更服

以藥完出為度

芫硝紫圓 治小兒宿食癖氣痰飲往來寒熱不

欲食消瘦方

芫硝

大黃各一兩

半夏

千金方衍義卷五

十

補藥出房

甘遂各二兩

代赭一兩

巴豆二百枚

杏仁一百二十枚

右七味為末別搗巴豆杏仁治如膏旋內藥末搗

三千杵令相和合強者內少密二百日兒服如胡豆

一九過百日至一歲服二九隨兒大小以意節度

當候兒大便中藥出為愈若不出更服如初

治八九月已上見熱結痰實不能食自下方

白芍

梔子

知母

大黃各二兩

柴胡各二兩

升麻

黃連

黃芩各二兩半

竹葉升半

桔梗一兩 細辛十五

右十一味咬咀以水六升煮取一升八合去滓分四服十歲兒為三服 一本石枳實杏仁各二兩半無桔梗黃連

治十五已下兒熱結多痰食飲減自下方

大黃 枳實一兩十 升麻 白芍 黃芩

枳實一兩十 升麻

知母 梔子各二兩半 生薑十八

杏仁二兩 竹葉切一升半

右十一味咬咀以水六升半煮取二升十歲至十五者分三服

牛黃雙圓 治小兒結實乳食不消心腹痛方

牛黃 太山甘遂各半 真珠六錢

杏仁 芍藥 黃芩各一兩

巴豆十八

右七味為末蜜丸一歲兒飲服如麻子二九但隨兒大小加減之

牛黃驚甲丸 治少小癰實壯熱食不消化中惡

悍氣方

牛黃 厚朴 枳殼

桂心 白芍 乾薑各半

麥麩 柴胡 大黃

驚甲 枳實 芫蕪各一兩

右十二味為末蜜丸如小豆大日三服以意量之

芫花圓 治小兒心下痞痰癰結聚腹大脹滿身體壯熱不欲哺乳方

芫花 雄黃各二兩半 黃芩各一兩 大黃

雄黃各二兩半

右四味為末蜜和更搗一千杵三歲兒至一歲已下服如粟米一丸欲服丸內兒喉中令母與乳若

長服消病者當以意消息與服之與乳哺相避

真珠圓 治小兒痰實結聚宿癰羸虛不能飲食方

真珠 麥冬 蕤仁二百枚

巴豆四十枚

右四味為末蜜丸期歲兒服二九如小豆大二百日兒服如麻子二九漸增以知為度當下病赤黃

白黑葵汁下勿絕藥病盡下自止久服使小兒肥

白甚驗

驚甲圓 治少小腹中結堅脇下有疹手足煩熱

驚甲圓

驚甲圓 治少小腹中結堅脇下有疹手足煩熱

方

驚甲

白芍

大黃 各三

茯苓

柴胡

乾薑 各二十

桂心 六銖

麤蟲

螻蛄 各二十枚

右九味為末蜜和服如梧子七九漸漸加之以知

為度

驚頭圓 治小兒痞氣腸下腹中有積聚堅痛方

驚頭 一枚

甘皮 半兩

壺蟲

麤蟲

桃仁 各十

右五味為末蜜丸服如小豆二九日三大便不利

加大黃十八銖以知為度

治小兒羸瘦瘰癧宜常服不妨乳方

甘艸五兩為末蜜丸一歲兒如小豆十九日三

服盡即更合

衍

牛黃丸為高梁者設芒硝紫丸為藜藿者設方中

牛黃除熱痰療驚癇真珠定神志安魂魄杏仁搜

痰飲下逆氣巴豆逐乳癖蕩冷積附子破癥堅散

積聚總行辛溫之力以行寒降之用也 芒硝紫

丸方中芒硝以代真珠之滌熱大黃甘遂以代牛

黃之蕩實半夏以代附子之破結在瓮厲之子原

無藉於峻溫也 其治八歲已上十五歲已下兒

熱結痰實食減自下並用芍藥梔子知母大黃柴

胡升麻黃芩竹葉一派清熱之藥但熱甚則用黃

連枯梗細辛痰多則用枳實杏仁生薑原不必以

歲數拘也 牛黃雙丸以有心腹腸分之痛故於

牛黃丸中除去附子參入紫丸中甘遂佐芍藥黃

芩以蕩實熱之固結 牛黃驚甲丸以有癖實壯

熱故於後驚甲丸中除去麤蟲螻蛄啞血之味參

入牛黃厚朴麥麴枳實芩芩等味以滌除痰癥二

方俱參入杜蘅以鼓牛黃大黃驚甲芍藥之力也

芫花丸中祇用雄黃一味不特振芫花大黃黃

芩下奪之威其宿蘊之積亦得從之下達矣 真

珠丸方即於牛黃丸中專取真珠巴豆二味又於

雙紫丸中擇取麩仁以佐巴豆門冬以佐真珠藥

品愈減而功用愈專矣 驚頭丸專取啞血之品

以攻血為務乃抵當湯下瘀血湯之變方非若驚

甲丸之於攻積藥中兼行破血也 一味甘艸蜜

丸治小兒羸瘦必因巴豆甘遂大黃牛黃等傷犯

胃氣而致瘰癧不安故不假他藥但取解藥毒若

非藥鹽與此方無預

柱心橘皮湯 治小兒五六日不食氣逆方

桂心 各半 人參 各半 橘皮 三兩

黍米 五合 成籩雞 五兩

右五味以水七升先煮黍米取二升次下雞

米熟藥成稍稍服之

村心人參黍米俱溫理胃氣虛寒之藥兼橘皮以

發越參米補益之性更加成籩之雞專泄胸中逆

上之滯氣也

地黃圓 治少小胃氣不調不嗜食生肌肉方

乾地黃 大黃 各一兩 茯苓 十八

當歸 柴胡 杏仁 各半

右六味為末以蜜丸如麻子大服五九日三

此專療胃中氣血不調飲食不為肌肉故專取地

黃治傷中逐血當歸治寒熱和脾柴胡升少陽生

氣杏仁下胸中逆氣大黃滌六腑實熱茯苓守五

臟真氣也

馬通粟圓 治少小腸下有氣內痛喘逆氣息難

往來寒熱羸瘦不食方

馬通中粟 十八 杏仁 紫苑

細辛 五味子 石膏

秦芩 半夏 茯苓 各六

右九味為末蜜丸服如小豆十九日三不知加至

二十九

馬通止血解毒而馬通中米專散胃中積垢杏仁

細辛秦芩紫苑祛風利氣茯苓半夏利水豁痰石

膏五味化熱收津積酸氣調痰清熱化而津自回

矣

治少小腹脹滿方

燒父母指甲灰乳頭上飲之

又方

韭根汁和猪脂煎細細服之

又方

車轂中脂和輪下土如彈丸吞之立愈

又方

米粉鹽等分炒變色腹上摩之

取爪甲肝氣之餘以疎脾土之滯 韭根和猪脂

以通腸胃之結 車脂和輪下土以疎土氣之壅

米鹽炒摩腹上以調水土之逆

當歸圓 治小兒胎寒嘔啼腹中痛舌上黑青澁

下方 一名 馬通丸

當歸

吳茱萸一作

川椒各半

細辛

乾薑

附子各十

巴豆十枚

豉七合

有九味持入種下篩秤不令足研巴豆如膏稍
稍內藥末搗令相得蜜和桑盆盛蒸五升米飯下
出搗一千杵一月兒服如黍米一九日一夜二不
知稍加以知為度亦治水瘕

衍此於金匱九痛丸中除去人參而加細辛豉專

辟腹中不正之氣豈特主胎寒腹痛而已哉當知

九痛丸能治九種心痛而寒痛血痛蟲痛尤為致

効

馬齒礬 治小兒胎寒嘔啼驚癩腹脹不嗜食

大便青黃并大人虛冷或有實不可吐下方

用馬齒礬一斤燒半日以膏膏和大人服梧子

二九日三小兒以意減之以腹內溫為度有實

實云神妙

衍皂礬散亦最散氣血結滯今名棗礬丸是也

治小兒忽患腹痛天矯汗出名曰胎寒方

煮梨葉濃汗七合可三四度飲之

衍梨性寒滑而燥熟食之則不傷脾胃梨葉煮濃汗

治小兒胎寒腹痛當是棠梨之葉以棠梨能溫
胃也

半夏圓 治小兒暴腹滿欲死方

半夏隨多少微火炮之持末酒和服如粟米粒

大五九日三立愈

衍半夏一味專滌頑痰火炮酒服治腹痛全在炮治
得宜

治小兒霍亂吐利方

人參 兩 厚朴

甘艸各半

白朮十入

千金方棗礬丸

揚藥山房

右四味咬咀以水一升二合煮取半升六日兒

服一合百日兒分三服期歲兒分二服中間隔乳

服之乳母忌生冷油膩等 一方加乾薑一分或

加生薑三分

藿香湯 治毒氣吐下 腹脹逆害乳哺方

藿香 一兩

生薑 二兩

青竹茹

甘艸各半

右四味咬咀以水二升煮取八合每服一合日三

有熱加升麻半兩

治孩子霍亂已可

芳

人參 蘆薈 兩 藟豆藤 二兩

右四味咬咀以水二升煮取八合分溫服

又方

人參 兩 木瓜 一枚 倉米 一撮

右三味咬咀以水煮分服以意量之立効

治小兒霍亂方

牛涎 兩 中一合

又方

研尿滓乳上服之

千金方卷之七 牛 楊梅山房

治少小吐利方

亂髮 兩 鹿角 六兩

右二味為末米汁服一升日三服

此於理中湯中去乾薑之守中易厚朴以泄滿即

四君子中去茯苓之淡滲易厚朴以溫散也 藟

香湯則專取竹茹之清胃得藟香以正氣甘鹹以

和中借生薑之辛散以定霍亂也 其人參蘆薈

藟豆藤陳倉米專療霍亂止後胃氣虛乏 人參

木瓜倉米專治霍亂轉筋木瓜能於土中寧木也

牛涎以滋坤土涎乃脾之神也 亂髮灰治五

癰圍格利小便鹿角走 肝腎督脈而有止漏下散

惡血之功血散漏止而 吐利痊矣

治小兒癰

灸兩乳下一寸各三壯

癰疽癰癰第八 方六十三首

漏蘆湯 治小兒熱毒 癰疽赤白諸丹毒瘡癩方

漏蘆 連翹 白藜

升麻 枳實 麻黃

黃芩 名九

千金方卷之七 牛 楊梅山房

右十味咬咀以水一升半煎取五合兒生一日至

七日取一合分三服八日至十五日取一合半分

三服十六日至二十日取二合分三服二十日至

三十日取三合分三服三十日至四十日取五合

分三服 附後治大人各用二兩大黃三兩以水一

經心錄無連翹有知 母芍藥犀角各等分

方以漏蘆立名專取利 緩解毒表裏兼該以泄其

邪升麻白藜助麻黃以 開鬼門枳實區硝助大黃

以潔淨府連翹黃芩甘 艸則漏蘆之佐使也

五香連翹 治小兒 風熱毒腫腫色白或有惡

核癭癰附骨癰疽節解不舉白丹走竟身中白

軫瘡不已方

青水香 薰陸香 雞舌香

沉香 麻黃 黃芩

大黃 二兩 麝香 三銖 連翹 各六銖

海藻 射干 升麻

枳實 各半 竹瀝 三合

右十四味咬咀以水四升煮藥減半內竹瀝煮取

一升二合兒生百日至二百日一服三合二百日

至期歲一服五合 一不用麻黃

千金衍義卷下 歸葉山房

風熱毒腫色白明是氣滯痰結故需五香達竅為

主其麻黃佐升麻以開肌腠枳實佐大黃以蕩腸

胃黃芩佐連翹以散風熱海藻佐射干以軟堅結

竹瀝專行經絡以開痰氣也

連翹圓 治小兒無故寒熱強健如故而身體頸

項結核癭癰及心腹脇背裏有堅核不痛名為

結風氣腫方

連翹 桑白皮 白頭翁

牡丹 防風 黃柏

桂心 香豉 獨活

秦芫 各一 海藻 半兩

右十一味為末蜜丸如小豆三歲兒飲服五九加

至十九五歲已上者以意加之

衍方中防風白頭翁香豉以散風毒連翹秦芫桑皮

海藻以散氣腫然風藥氣藥非得血藥不能透達

榮分以散結核又須黃柏桂心寒熱交攻用牡丹

者專和黃柏桂心之寒熱也

治丹毒大赤腫身壯熱百病不折方

寒水石 十六銖 石膏 十三銖 藍青 十二銖 杏仁 各八銖

犀角 柴胡 知母 十銖 甘艸 五銖 羚羊角 六銖

芍藥 黃芩 各七銖 梔子 十一銖

竹瀝 一升 生葛汁 四合 蜜 二斤

右十五味咬咀以水五升并竹瀝煮取三升三合

去滓內杏仁脂葛汁蜜微火煎取二升一二歲兒

服二合大者量加之

麻黃湯 治小兒丹腫及風毒風疹方

麻黃 一兩 獨活 射干

甘艸 桂心 青木香

石膏 黃芩 各一兩

右八味咬咀以水四升煮取一升三歲兒分爲四服日再

又方 治小兒惡毒丹及風疹方

麻黃

升麻

葛根

各一兩

射干

雞舌香

甘州

各半兩

石膏

半合

右七味咬咀以水三升煮取一升三歲兒分三服

日三

楊湯 治小兒數十種丹方

大黃

甘艸

當歸

千金方衍義卷辛

黃芩

獨活

芎藭

白芷

獨活

黃芩

芍藥

升麻

沉香

青木香

木蘭皮

各一兩

芒硝 三兩

右十三味咬咀以水一斗二升煮取四升去滓內

芒硝以綿搵湯中適寒溫搗之乾則易之取瘥止

治小兒溺窻丹初從兩股及臍間起走入陰頭皆

赤方

桑根皮取一斗以水二斗煮取一斗以洗浴之

治小兒丹毒方

擗慎火艸絞取汁塗之良其丹毒方具在別卷

治小兒赤毒腫若偏身入心腹即能殺人方

擗伏龍肝爲末以雞子白和傅乾易之

又方

白豆末水和傅之勿令乾

治小兒半身皆紅赤漸漸引長者方

牛膝

甘艸

右二味咬咀合得五升以水八升煮三沸去滓和

伏龍肝末傅之

治小兒身赤腫起者方

千金方衍義卷辛

黃芩

熬米粉令黑以唾和傅之

又方

伏龍肝

亂髮灰

右二味爲末以膏和傅之

治小兒卒腹皮青黑方

以酒和胡粉傅上若不急治須臾便死又灸臍

上下左右去臍半寸并鳩尾骨下一寸凡五處

各三壯

丹毒總屬火證故用寒水石石膏犀角羚羊柴胡

芩梔一派解毒散血清血之劑專治從內熾發之

毒 麻黃湯方用 麻黃桂心射干獨活皆主外內
 合邪之證以分解 蘊熱之勢其石膏黃芩青木香
 甘艸仍不出乎正 治之法也 其又方則全從事
 於外解升葛射干 射前方射干獨活佐黃芩之意
 雞舌香即前方桂 心導伏熱之意石膏甘艸則與
 上二方無異也 揚湯清解表裏熱毒藥皆純良
 無奇木蘭皮近世 罕用效諸本經治大熱在皮膚
 中去面熱赤皴酒 皴等證使熱從皮腠而散也
 一味桑根皮煮湯 浴之專取其散風熱也 慎火
 艸絞汁塗之專取 其解火毒也 伏龍肝未雞子

白和傳專取其散 虛熱也 白豆與赤豆之狀不
 異但色白至氣分 而解皮膚熱毒 牛膝甘艸皆
 生用煎取濃汁和 伏龍肝未傳之功用與伏龍肝
 和雞子白傳之不 殊 熬米粉以唾和傳取米能
 長肉黑能解毒也 與前治小兒小腹痛滿用米鹽
 炒摩同意以鹽能 更堅同源異派 伏龍肝亂髮
 灰和傳與前和雞 子白傳少異以亂髮灰能散滯
 血也 小兒卒腹皮青黑用酒和胡粉傳專取鉛
 性鑄掃火毒也
 五香枳實湯 治小兒著風熱痞癰堅如麻豆粒

瘡癢癢之皮剝汁出或偏身頭面常常發者方
 青木香 九銖 麝香 六銖 雞舌香
 薰陸香 沉香 防風
 秦朮 漏蘆 各半 升麻
 黃芩 白薇 麻黃 各一
 枳實 一兩 大黃 一兩十銖
 右十四味咬咀以水五升煮取一升八合見五六
 歲者一服四五合七八歲者一服六合十歲至十
 四五者加大黃半兩足水為一斗煮取二升半分
 三服

治小兒火灼瘡一身盡有如麻豆或有膿汁乍痛
 乍癢方
 甘艸 白芍 白薇
 黃芩 黃連 黃柏
 苦參 各半
 右七味為末以蜜和傅之日二夜一亦可作湯洗
 之
 治小兒上下遍身生瘡方
 芍藥 川連 黃芩 各三
 苦參 四兩 大黃 二兩 柏林子 一升

黃柏五兩 拔薤一斤

右八味咬咀以水二斗煮取一斗以兒洗瘡

治小兒瘡初起煙漿似火瘡名煙瘡亦名爛瘡方

桃仁熟搗以面脂和傅之亦治遍身赤腫起

又方

馬骨燒灰傅之

水銀膏 治小兒熱瘡方

水銀

胡粉

松脂各三兩

右三味以猪脂四升煎松脂水氣盡下二物攪令

勻不見水銀以傅之

千金方衍義卷下

天

苦參湯 治小兒身上下百瘡不瘥方

苦參八兩

地榆

川連

王不留行

獨活

艾葉各五兩

竹葉二升

右七味咬咀以水三斗煮取一斗以浴兒瘡上浴

訖傳黃連散

治三日小兒頭面瘡起身體大熱方

升麻

柴胡

石膏各六兩

甘艸

當歸各十銖

大黃

黃芩各十銖

右七味咬咀以水四升煮取二升分服日三夜

量兒大小用之

治小兒身體頭面悉生瘡方

榆白皮隨多少曝令燥下篩醋和塗綿以傅瘡

上蟲白出亦可以猪脂和塗之

衍義 五香枳實湯與五香連船湯大同小異彼以毒腫

色白且有惡核癰癤故用連翹海藻射干竹瀝喫

堅滲痰之品以輔五香此治風熱瘡癰堅如麻豆

改用防風秦艽白薇漏蘆透風利竅之品以輔五

香各隨佐使應用 其治小兒火灼瘡一身盡如

麻豆用芩連黃柏梔治熱毒白薇苦參散結止痛

白芍甘艸解毒和榮 小兒上下遍身生瘡即於

前方除去白薇甘艸加大黃以合三黃并入蛇牀

拔莢以除痺濕之毒 其桃仁和面脂專取散血

之用 馬骨燒灰祛風止痛活血舒筋 水銀胡

粉松脂熬猪脂傳專行燥濕 苦參湯治兒專取

苦燥以治濕熱 三日小兒胎毒發頭面瘡起

身體大熱故用石膏大黃黃芩引領毒從下泄升

麻柴胡乘機外分其勢當歸甘艸和其始生血氣

也 榆白皮性清利竅得醋或猪脂和塗能使瘡

千金方衍義卷下

天

中之蟲自出

枳實圓 治小兒病風癩癢痛如疥搔之汁出偏

身皆癩如麻豆粒年年喜發面目虛肥手足乾

枯毛髮細黃及肌膚不光澤鼻氣不利此則少

時熱盛極體當風風熱相博所得也不早治之

成太風疾方

枳實

菊花

蛇牀子

防風

刺蒺藜

白薇

浮萍

天雄

麻黃

漏蘆

手方藥集卷第十

手

右十味為末蜜和丸如大豆許五歲兒飲服十九

加至二十九日二五歲已上者隨意加之見大者

可為散服

衍方中浮萍麻黃防風刺蒺藜菊花白薇專祛風毒外

泄枳實漏蘆專祛風毒內泄天雄蛇牀專祛經絡

中風毒不使伏藏而妨痿疾也

治小兒風癩癢疹方

蒲葇

防風

羊桃

石南

秦椒

升麻

苦參

茵芋

芫花一云芫葇

刺蒺藜

蛇牀子

枳實

礬石

右十三味咬咀以漿水三斗煮取一斗去滓內礬

令小沸浴之

衍方下雖治風癩癢疹與前方主治不殊方中除枳

實蛇牀防風蒺藜四味相同其蚘葇羊桃石南苦

參茵芋芫花皆毒風痺拘攣藥惟秦椒升麻升

散熱邪礬石收斂濕熱豈特專主方下諸治哉

又方

牛膝末酒服方寸匕漏瘡多年不瘥搗末傅之

亦主骨疽癰疾癩癧絕妙

衍牛膝專行筋脈本經治寒濕痿痺四肢拘攣膝痛

不可屈伸千金治漏瘡多年不瘥及骨疽癰疾癧

瘕非取其走肝榮筋之力歟

澤蘭湯 主丹及瘕疹入腹殺入方

澤蘭

芎藭

附子

茵芋

藁本

莽艸

細辛

右七味咬咀以水三升煮取一升半分四服先與

此湯然後作餘治

義衍丹毒癰疹毒陷入腹非用辛溫透之達表卽用苦

寒推之降泄用此澤蘭專行散血藥本芎藭細辛

并祛風熱附子鼓茵芋莽艸逐風透毒之方也

治小兒手足及身腫方

以小便溫暖漬之良

義衍一切浮腫總是氣虛濕熱此用小便溫漬專解毒

蒸熱毒

論曰小兒頭生小瘡浸淫疥癩黃膏出不生痂連年

不瘥者亦名妬頭瘡以赤龍皮湯及天麻湯洗之內

服漏蘆湯不宜傳飛鳥膏散及黃連胡粉水銀膏散

本草卷之五

方具見別卷

藜蘆膏 治小兒一切頭瘡久卽疼痛不生痂方

黃芩

黃連

雄黃

黃芩

松脂 各二兩

豬脂 半兩

礬石 五兩

右七味爲末前令調和先以赤龍皮天麻湯洗訖

傳之赤龍皮卽樹皮

治小兒頭瘡經年不瘥方

松脂

苦參

黃連 各半兩

大黃

胡粉 各一兩

黃芩

小銀 各一兩

礬石 半兩

蛇牀子 十八

右九味爲末以臘月豬脂和研水銀不見傳之

又方

取屋塵末和油瓶下滓以皂莢湯洗傳之

又方

髮中生瘡頂白者皆以熊脂傳之

治小兒頭瘡方

胡粉 一兩

川連 二兩

右二味爲末洗瘡去痂拭乾傳之卽瘥更發如前

傳之

本草卷之五

又方

胡粉

連翹 各一兩

水銀 半兩

右三味以水煎連翹內胡粉水銀和調傳之

又方

白松脂

胡粉 各二兩

水銀 一兩

豬脂 四兩

右四味合煎去滓內水銀粉調傳之大人患同

義衍藜蘆吐風痰藥兼芩連燥濕雄黃解毒礬石松脂

以收濕熱 赤龍皮煎湯洗除蟲及漏惡瘡天麻

療蠱毒惡風爲治風毒要藥 其治小兒頭瘡經

年不瘡方即前方去藜蘆雄黃加大黃苦參蛇牀

胡粉水銀等皆祛濕熱之藥 犀塵油洋腐穢之

物取治腐穢之疾 熊脂逐風專治頭瘍白禿面

上疔炮 胡粉黃連 胡粉連翹水銀 胡粉水

銀松脂猪脂總傳小兒頭瘡咸取殺蟲燥濕之義

苦參湯 治小兒頭瘡方

苦參

黃芩

川連

黃柏

甘艸

大黃

芎藭

各一兩

蒺藜子 三合

右八味咬咀以水六升煮取三升漬布搗瘡上日

數過

本草卷之五

瘡

瘡

衍

芩連大黃黃柏苦參等一派苦寒藥中但得芎藭

一味和血蒺藜一味透風甘艸一味解毒煎湯清

布頻搗瘡上自愈

治小兒禿頭瘡方 取雄雞屎陳醬汁苦酒和以洗瘡了付之

又方

芫花臘月猪脂和如泥洗去痂傅之日一度

翼治

治小兒頭禿瘡方

葶藶子細末先洗傅之

又方

不中水蕪菁葉燒灰和猪脂傅之

治小兒頭禿瘡無髮苦癢方

野葛末

猪脂

羊脂 各一兩

右三味合煎令消待冷以傅之不過三上

治少小頭不生髮一物楸葉方

楸葉擣取汁傅頭上立生

治小兒頭不生髮方

燒鱒魚灰末以醬汁和傅之

治小兒瘦瘠方

塚中石灰厚傅之良

又方

燒桑根灰傅之并燒烏羊角作灰相和傅之

治小兒疽瘰方

丹砂

大黃 各三銖

雄黃

漆頭菌茹

雌黃 各二十銖

馬齒礬

莽艸 各十銖

川連 各二十銖

右八味咬咀以猪脂一升三合微火煎三上三下

膏成去滓下諸色末攪凝傅之

治小兒惡瘡方

熬鼓令黃為末傅瘡上不過三傅愈

治小兒痘極月初即生常有黃水出方

以酢和油煎令如粥及熱傅之二日易欲重傅

則以皂莢湯洗瘡乃傅之

治小兒月蝕瘡隨月生死方

以胡粉和酥傅之五日瘡

治月蝕九竅皆有瘡者方

燒蚯蚓屎末和猪膏傅之

治小兒浸淫瘡方

千金方雜錄卷第

竈中黃土 髮灰

右二味各等分為末以猪脂和傅之

治小兒黃爛瘡方

四交道中土 竈下土

右二味各等分為末傅之亦治夜啼

又方

燒艾灰傅之

又方

燒牛尿傅之亦可滅癩

治小兒疥方

燒竹葉為灰雞子白仁之日三亦治疥瘡

又方

燒亂髮灰和臘月猪脂傅之

又方

以皂酥和胡粉傅之

治小兒頭面瘡疥方

麻子五升為末以水和絞取汁與蜜和傅之若

有白犬膽傅之大佳

治小兒濕癬方

枸杞根搗作末和臘月猪膏傅之

千金方雜錄卷第

又方

桃青皮搗末和醋傅之日二

又方

煎馬尿洗之

又方

燒狗屎灰和猪脂塗之

又方

搗破以牛鼻上津傅之

治小兒身上生疥瘡方

取馬尿洗日匝五度

治小兒身上有赤黑疵方

取狗熟屎傅之皮自卷落

治小兒疔日方

以針及小刀子決目四面令血出莫近水三日
即膿潰根動自脫落

疔 雞屎下氣殺毒以醬醋引入蟲口 芫花解毒

殺蟲以猪脂引入蟲口 苧蔴破堅利水殺蟲與

芫花不殊 蕪菁治熱毒風腫 野葛治惡風水

腫殺蟲以毒攻毒也 楸葉拔毒排膿 善透肌肉

鯽魚灰解毒散堅醬汁引入蟲口 塚中石灰

本草衍義卷五

藥

掃葉山房

專散火毒 桑灰泄風去熱 烏羊角灰消堅解

毒相和傅之尤効 丹砂礬石雌雄二黃解毒大

黃黃連滌熱藺茹去惡肉敗瘡疥艸治大風癰腫

結氣 熬鼓為末以除惡毒異氣 醋和油煎專

滋風燥皂莢專解風毒 胡粉燥濕乳酥潤燥燥

潤兼濟專主月蝕耳瘡剝裂 蚬泥猪膏清熱解

毒 竈土髮灰收濕散血 交道土取其流動龜

下土取其溫暖以治爛瘡取其收濕 艾灰傅瘡

久不斂 半屎灰傅久瘡滅瘰 竹葉灰和雞子

白收濕解毒 髮灰猪脂散血潤燥 臭酥胡粉

潤燥燥濕 麻子潤燥大膽殺蟲大性熱而膽化

熱也 枸杞清熱散濕 青枝桃皮搗和醋傅去

面上濕癩肝劑 馬尿牛津大屎灰皆能殺蟲瘰

癰 又取馬尿洗兒赤疵大屎傅兒身赤黑疵專

取穢以攻血漬也 鍼刀決自疣膿潰根白落勝

於傅貼也

小兒雜病第九 方一百十一首 灸法十三首

治小兒臍中生瘡方

桑汁傅乳上使兒飲之

又方

本草衍義卷五

藥

飲殺羊乳及血

治小兒風臍遂作惡瘡歷年不瘥方

取東壁上土傅之大佳若汁不止燒蒼耳子粉

之

又方

乾蟬蟄蟲末粉之不過三四度瘥

治小兒臍不合方

取車轄脂燒灰日一傅之

又方

燒蜂房灰為末傅之

治小兒臍中生瘡方

燒酥帶灰和膏傅之

治小兒臍赤腫方

杏仁半兩 猪頰車髓十二

右二味先研杏仁和脂和髓傅臍中腫上

白石脂散 治小兒臍汁不止兼赤腫方

以白石脂細研熬令微暖以粉臍瘡日三四度

衍義桑汁解風熱 殺羊乳滋血燥 東壁土燥濕

蒼耳灰去風濕斂汗 蟾蟾破血乾末粉身奪血

止汗 車脂灰通血脈滋燥 蜂房灰攻毒去風

千金方卷之六

卑

酥帶灰通津收濕 杏仁猪髓解毒滋燥 白

石脂固脫杜風各詳見證取用

治小兒鵝口不能飲乳方

鵝屎汁瀝兒口中

又方

黍米汁塗之

又方

取小兒父母亂髮淨洗纏桃枝沾取并花水東

向向日以髮拭口中白乳以置水中七過瀝洗

三朝作之

治小兒心熱口為生瘡重舌鵝口方

柘根剉五升無根弓材亦佳以水五升煮取三

升去滓煎取五合細細傅之數次良

治口瘡白漫漫方

先以父淨髮拭口次取桑汁塗之

衍義鵝屎汁截風解毒 黍米汁清胃化熱 淨髮拭

口去熱毒 柘根除腎經風熱 桑汁清肺熱口

白則胎毒上迫於肺也

治重舌舌強不能收唾方

鹿角末如大豆許安舌下日三四度亦治小兒

千金方卷之六

卑

不能乳

又方

取蛇蛻燒末以雞毛蘸醪醋點藥掠舌下愈

治小兒重舌方

取田中蜂房燒灰酒和塗喉下愈

又方

衣魚塗舌上

又方

窟月下黃土末苦酒和塗舌上

又方

赤小豆末醋和塗舌上

又方

黃柏以竹瀝漬取細細點舌上良

治重舌方

灸行間隨年壯穴在足大趾岐中又灸兩足外

踝上三壯

治小兒舌上瘡方

蜂房燒灰屋間塵各等分和勻傅之

又方

桑白汁塗乳與兒飲之

千金方養毒

聖

楊梅山房

又方

羊蹄骨中生髓和胡粉傅之

治舌腫強滿方

滿口含糖醋良

又方

飲殺羊乳即瘥

衍

鹿角治惡血散熱腫 蛇蛻截風毒 蜂房殺毒

痰 衣魚散風癩 竈土斂虛陽 赤小豆解熱

毒 竹瀝清黃柏解胎熱去痰涎 蜂房桑汁並

解熱毒 羊蹄髓和胡粉鎮攝肺胃風熱 糖醋

斂肝脾之火 殺羊乳潤燥舒筋辟一切不正之

氣

治小兒口瘡不得吮乳方

大青 十八 鍊

黃連 十二 鍊

右二味咬咀以水三升煮取一升二合一服一合

日再夜一

又方

蜜 二斤

甘艸 如指大 三寸

臘月猪脂 一斤

右三味合煎相得含如棗大稍稍咽之日三

又方

宋老衛養毒

聖

楊梅山房

礬石如雞子大置醋中塗兒足下二七遍愈

治小兒驚口兩吻生瘡方

燒髮灰和猪脂傅之

治小兒口下黃肌瘡方

取殺羊鬚燒灰和臘月猪脂傅之角亦可用

治口傍惡瘡方

亂髮灰

故絮灰

黃連

乾薑

右四味等分爲散以粉瘡上不過三遍

治口噤赤者心噤白者肺噤方

雞屎白棗大綿裹以水一合煮二沸分再服

治小兒口噤方

鹿角粉 大豆末

右二味等分和乳塗乳上飲兒

治小兒口中涎出方

驢乳

猪乳各二升

右二味合煎得一升五合服如杏仁許三四服瘳

雀尿圓 治小兒卒中風口噤不下一物方

雀尿如麻子丸之飲下即愈雞屎白亦佳

又方

以白羊尿內口中

又方

以東行牛口中沫塗口中及頤上又桑白汁塗

之瘳
大青黃連治肝脾實火 甘蜜猪脂散脾胃虛火

醋豨雞清收斂濕熱 髮灰解毒散惡血 殺

羊鬚散血收濕 髮絮灰薑連末散血導火 雞

矢白下氣祛風 鹿角豆末散血解毒 驢猪乳

潤燥化風熱 雀矢辟風毒開噤 羊矢去火毒

化風熱 牛涎解脾胃蘊熱又桑白汁解肺胃風

熱分主手足太陰風燥

治小兒卒毒腫著喉頸壯熱妨乳方

升麻 射干 大黃各一兩

右三味咬咀以水一升五合煮取八合一歲兒分

三服以滓薄腫上冷更暖以薄兒大以意加之

升麻湯 治小兒喉痛若毒氣盛便咽塞并治大

人咽喉不利方

升麻 生薑 射干各二兩

橘皮一兩

右四味咬咀以水六升煮取二升去滓分三服

治小兒喉痺腫方

魚膽二七枚以和龜底土塗之瘳

治小兒喉痺方

桂心 杏仁各半兩

右二味為末以綿裹如棗大含咽汁

升麻上引大黃下泄射干專散咽喉結氣取其先

升後降也 升麻引射干上行散結薑橘開掛痰

氣 鱈魚膽苦寒專散肝膽之火龜土專化脾胃

之熱 桂心導龍火杏仁下結氣從治之法也

治小兒解頤方

熬蛇蛻皮爲末和猪頰車中髓傳頂上日三四

度

又方

猪牙頰車髓傳顛上瘥

半夏製湯 治小兒腦長解顛不合羸瘦色黃至

四五歲不能行方

半夏

生薑

芎藭各一

細辛

三兩

桂心 一尺

烏頭 十枚

右六味 咬咀以醇苦酒五升漬之晬時煮三沸絞

去滓以綿一片浸藥中適寒溫以熨顛上冷更溫

千金方衍義卷下

藥

掃藥山房

之復熨 如前朝暮各三四熨乃止二十日可愈

治小兒 解顛生懈足傳方

生懈足

白薇 各半

右二味 搗末以乳汁和傳顛上立愈

治小兒 解顛細辛傳方

細辛

桂心 各半

乾薑 十八

右三味 爲末以乳汁和傳顛上乾復傳之兒面赤

即愈

治小兒 顛開不合方

防風

一兩

柏子仁

白芨 各一

右三味爲末以乳和傳顛上日二十日知二十日

即愈

又方

取猪牙頰車骨煎取髓傳顛上愈

蛇蛻和猪頰車中髓傳頂開發風氣於上取髓以

通其腦 單用猪頰車髓亦得 腦長不合可係

風寒痰氣襲入故用薑半開痰芎辛散風桂心烏

頭辟除腦戶中邪氣 生懈足散血續筋白薇散

結解毒 細辛薑桂能開發腦戶風寒而不致於

腦長知無痰濕故不用半夏其風寒之邪本淺故

千金方衍義卷下

藥

掃藥山房

不用芎藭骨力猶能任身故不用烏頭風入系頭

既久故不用生薑而用乾薑佐桂心以溫腦戶即

前半夏炭湯之變法 防風治惡風風邪柏仁除

風濕潤燥用白芨祛賊風痲緩總皆療腦風藥

用猪牙中髓通腦氣於上以無風毒故無取於蛇

蛻

小兒 顛陷方

灸臍上下各半寸及鳩尾骨端又足太陰各一

壯

治小兒 狐疝傷損生瘻方

桂心十八錄 白木一兩十錄 地膚子二兩

右三味為末以蜜和丸白酒服如小豆七九日三

亦治大人

又方

芍藥 茯苓各十錄 防風一作防風

天黃各半兩 半夏 桂心

川椒各六錄

右七味為末蜜和服如大豆二九日五服可加至

三九

五等丸 治小兒陰偏大又卵核堅癩方

千金方衍義卷五 藥 婦人山房

川柏 香豉 牡丹

防風 桂心各二兩

石五 殊為末蜜丸如大豆兒三歲飲服五丸加至

十九 兒小以意酌量著乳頭上服之

治小兒卵腫方

取雞翅六莖燒灰服之隨卵左右取翮古今錄驗云治

陰大 如斗

治小兒氣癩方

木瓜根 芍藥 當歸各兩

右三味咬咀以水二升煮取一升服五合日二

又方 三月上除日取白頭翁根搗碎隨偏處傅之一

宿作瘡二十日愈

治氣癩方

灸足厥陰大敦左灸右右灸左各一壯

治小兒陰瘡方

以人尿灰傅之又狗屎灰狗骨灰又馬骨灰皆

可傅之

治小兒岐股間連陰囊生瘡汁出先癢後痛十日

五日自瘥或一月或半月復發連年不瘥方

千金方衍義卷五 藥 婦人山房

灸灸瘡搗去瘀帛拭令乾以蜜傅更授麩作燒餅

熟即以飴塗餅上慰之冷即止再度瘥

治小兒陰腫方

狐莖炙搗末酒服之

又方

灸大敦七壯

又方

研桑木白汁塗之

又方

燒蕪菁薄上

又方

搗垣衣傅之

又方

以衣中白魚傅之

又方

猪屎五升水煮沸布裏安腫上

義 狐疝雖寒熱不同一皆屬於肝經故首推桂心通

肝散經白朮安脾逐濕地膚專利小便以泄濕熱

也 又方芍藥茯苓疎肝家濕熱防葵大黃泄疝

瘕結熱半夏一味專理痰濕桂心川椒閉肝脾之

千金方衍義卷五

辛

下疝下疝

嚮導 五等丸專主濕熱偏墜黃柏清熱燥濕防

豉散下焦風牡丹和下焦血朴心為熱因熱用之

嚮導 雞屬巽走肝六翻又為風之所發專主風

蕪肝經之疝 土瓜根散血歸芍和血專主瘀血

凝滯之疝 白頭翁通風逐血專主少陽陽明風

熱固結之疝 股瘡灸之不瘥取蜜以潤血燥麩

餅垂熱以飴塗裂取以助肝氣也 狐莖常縮入

腹達牙最捷同氣相感之外用也 桑汁塗風熱

燕菁溲熱腫 垣衣傅熱毒 衣魚散風腫 猪

矢解蘊蒸之熱也

治小兒陰瘡方

取狼牙濃煎汁洗之

又方

黃連胡粉等分以香脂油和傅之

治小兒核腫壯熱有實方

青木香

甘艸

石膏

甘遂

麝香

大黃

前胡

黃芩

右八味咬咀以水七升煮取一升九合每服三合

日四夜二

千金方衍義卷五

辛

攝藥山房

驚頭圓 治小兒積冷灸不瘥後餘脫肛不瘥服

中冷肛中疼痛不得入者方

驚頭

磁石

桂心

小蠟皮

磁石

桂心

右四味為末蜜丸如大豆兒二歲至五歲服五丸

至十九日三見大以意加之

黃連胡粉解熱收濕 青木香

前胡下結氣甘艸石膏化結熱大黃黃芩甘遂瀉

濕熱麝香開關竅 驚頭收肝氣之緩磁石固腎

氣之脫桂心散肝血之滯蠟皮破膜脫埃積也

小兒脫肛方

灸頂上旋毛中三壯即入又灸尾翠骨三壯又

灸臍中隨年壯

治小兒疳濕瘡方

鐵衣著下部中即愈

又方

灸第十五椎俠脊兩傍七壯未瘥加七壯

治小兒疳瘡方

以猪脂和胡粉傅之

又方

千金方卷五

嚼麻子傅之日六七度

又方

羊膽二枚和醬汁於下部灌之猪脂亦佳

治濕瘡方

濃煎地榆汁洗浴每日二度

治小兒久痢膿濕瘡方

艾葉五升以水一斗煮取一升半分為三服

除熱結腸圓 斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雞

血疔中瘡爛坐蠶生蟲方

川連

藥皮

苦參

鬼白

獨活

橘皮

芍藥

阿膠各半兩

右八味為末以藍汁及蜜丸如小豆日服五九至

十九冬無藍汁可用藍子一合春蜜和丸

疔瘡內蘊濕熱外顯血燥故用鐵衣以降濕火

胡粉猪脂兼濟收濕潤燥之治 麻子專取潤燥

羊膽專取化熱

地榆散血止痛 艾葉溫血

化蠶 結腸丸專泄濕熱僅用鬼白以殺毒邪獨

活以散風熱

治小兒虬蟲方

千金方卷五

削棟木上蒼皮以水煮取汁飲之量大小多少

為此有小毒

治小兒羸瘦有虬蟲方

崔蘆二兩以水一升米二合煮取米熟去滓與

服

又方

篇蓄三兩水一升煮取四合分服之搗汁服亦

佳

又方

桃白皮三兩

東引吳茱萸根白皮四兩

右三味咬咀以酒一升二合漬之宿漸與服取

瘡

又方

取猪膏服之一云治

又方

搗槐子內下部中瘡一云治

又方

根實一枚內孔中一云治

治寸白蟲方

東行石櫛根皮一把水二升煮取三合分服

千金方卷之五

諸

論藥山經

又方

桃葉搗絞取汁服之

治小兒三蟲方

雷丸

芎藭

右二味各等分爲末服一錢七日三

治大便竟出血方

蟹頭一枚炙令黃黑爲末以飲下五分七多少

量兒大小日三服

衍

楝皮苦寒治濕化蟲

藿蘆涼潤解毒清熱

葛

蓄利水治浸淫濕熱

桃皮殺蟲蕘根除濕

猪

脂專引肛門燒蟲 棟子專清大腸濕熱 棟實

苦寒與棟皮同功 檣皮祛濕 桃葉化蠱 雷

丸殺蟲芍藥和血 蟹頭收肛專散肝經濕熱

治小兒尿血方

燒龍巢灰并花水服之亦治夜尿淋

又方

灸第七椎兩傍各五寸隨年壯

行 小兒尿血多緣肝受風熱不能藏血故取久受風

氣之鵲燒服以散肝風風散則血自寧矣

治小兒遺尿方

千金方卷之五

諸

論藥山經

龍麥

石堊

龍膽

皂莢

桂心各半兩

雞腸艸

人參各一兩

車前子六銖

右八味爲末蜜丸每食後服如小豆大五九日三

加至六七丸

又方

小豆葉搗汁服

又方

燒雞腸爲末漿水服方寸七日三

又方

灸臍下一寸半隨年壯

又方

灸大敦三壯亦治尿血

衍義小兒遺尿多屬肝氣之熱故用瞿麥石韋龍膽雞

腸車前一派清熱利水之藥兼桂心以司開閤之

權人參以助清熱之力皂莢以振滌垢之威不使

關閤有所阻積而失權度 小豆葉清熱 雞腸

末利水皆疎利九竅之品

地膚子湯 治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不

通欲小便則澀痛不出出少如血須臾復出方

千金要方卷之六

知母

地膚子

瞿麥

黃芩

枳實

升麻

葵子

猪苓

各六錢

通艸

海藻

橘皮

各三錢

大黃

十八錢

右十二味咬咀以水三升煮取一升一日至七日

兒服一合為三服八日至十五日兒一合半為三

服十六日至二十日兒二合為三服四十日兒以

此為準五十日已上七歲已下以意加藥益水

治小兒淋方

車前子一升水二升煮取一升分服

又方

煮冬葵子汁服之

又方

取蜂房亂髮燒灰以水服一錢七日車

治小兒小便不通方

車前切一升

小麥一升

右二味以水二升煮取一升二合去滓煮粥服日

三四

又方

冬葵子一升以水二升煮取一升分服入滑石

千金要方卷之六

滑石

末六銖

衍義小兒腎氣完固熱毒流入膀胱自當專力苦寒以

利關竅獨用升麻升舉上氣海藻疎達下源使熱

泄水利無復難阻之慮矣 車前利水而不傷津

冬葵利竅而兼活血 蜂房髮灰善散膀胱痰

血 卷耳利水同小麥益肝煮粥以養胃氣并杜

虛熱之復擾 冬葵利竅活血入滑石尤捷與車

前小麥隱然有虛實之分

治小兒癩方

蜥蜴一枚燒末酒服之

衍義癩是濕熱阻積滲入經隧之患蜥蜴能吐雹斬雨

為利水破結之峻藥外臺千金恒用之

治小兒吐血方

燒蛇皮為末以乳服之并浴重舌

又方

取油三分酒一分和之分再服

衍義小兒吐血有毒熱無虛寒故宜去風解毒為殺蛇

蛭燒灰不特截風兼能止血血本肝藏所藏也

其用香油解毒必兼醇酒和血無着於培表血

氣

千金方醫藥

治小兒鼻塞生息肉方

通神 細辛 各一兩

右二味搗末取藥如豆著壘頭內鼻中日三

治小兒鼻塞不通濁涕出方

杏仁 半兩 蜀椒 附子

細辛 各六錢

右四味咬咀以醋五合漬藥一宿明日以豬脂五

合煎令附子色黃膏成去滓冷更以塗黎鑿鼻孔

中日再兼摩頂

衍義通神利竅散濕細辛利竅散風風散濕去財經服

條暢何有塞息肉之患乎 杏仁下氣蜀椒溫

中附子逐濕細辛去風皆利竅之品其用醋者藉

以引領諸藥入於肝經且過椒附之性緩行不驟

也

治小兒聾耳方

末石硫黃以粉耳中日一夜一

治小兒耳瘡方

燒馬骨灰傅之

又方

燒雞屎白筒中吹入

千金方醫藥

衍義硫黃溫散專治陰中蘊積之垢 馬骨灰祛風散

熱 雞屎白下氣散濕 審其因而用之

治小兒齒落久不生方

取雄鼠屎二七枚以一屎拭一齒根處盡此上

二十一日即生

衍義齒屬腎而風矢專資 一生水之源或用砒

血以鼠骨灰擦指尤效

治小兒四五歲不語方

末赤小豆酒和傅舌上

又方

灸足兩踝各三壯

衍赤小豆上通心包下達小腸乃清熱利竅之品得

義酒和信舌不滲入廉泉則心胞清淨而聰自發於

靈臺慧自達於喉舌矣

治小兒不能乳方

雀屎四枚為末著乳頭飲兒兒六十枚

衍雀矢專滌胃中痰涎垢膩垢膩清而乳食自如慎

勿疑於乳癆而妄行攻擊也

蒲黃湯治小兒落牀墮地如有瘀血腹中陰陰

寒熱不肯乳哺但啼哭叫喚方

千金方卷之三

蒲黃

麥冬

大黃

黃芩

甘艸

芫硝

黃連

右七味咬咀以水二升煮取一升去滓內芫硝分

三服消息視兒羸瘦半之大小便血即愈忌冷食

衍乳哺啼叫明係火氣用事腹中陰陰定屬血滯有

形故需蒲黃芫硝以散瘀積芫連大黃以瀉胎熱

門冬甘艸以滋胃中津氣非審證之確何能至此

治小兒食不知飢飽方

鼠屎二七枚燒為末服之

衍鼠屎燒灰以清理先天之虛氣

治小兒食

取肉一斤糲擊曳地行數里勿洗火炙與食

衍取血肉之物治行動之土多而食之以攻中土蟲

積投其所喜以誘入蟲口也

治小兒噦方

生薑汁

牛乳

右二味煎取五合分二服

又方

取牛乳一升煎取五合分五服

千金方卷之三

噦屬胃氣虛寒牛乳滋胃中血氣薑汁散胃中虛

冷亦有素稟多火火逆上衝而噦但取牛乳潤

燥不得復用薑汁

治小兒疰方

籠中灰鹽等分相和熬熨之

衍灰鹽溫熨經脈漸通

治小兒慢吞鍼方

取磁石如棗杉大或吞或含其鍼立出

小兒慢吞鐵物等方

艾蒿一把剉以水五升煮取一升服之即下

衍義 磁石引鍼如母召子舍則取其上引吞可使墮下

脫 艾蒿下鐵取其純陽以運重著何憚不下趨

耶

治小兒蠅蝮咬透腹匝即死方

搗菴藜葉傳之無葉子亦可

又方

取鷲窠中土猪脂和傳之乾則易之

衍義 蠅蝮稟陰濕毒故其溲著人皮膚即時腐爛千金

取白痰藜葉傳之以其能散惡血也 胡鷲窠中

土猪脂和傳以其能收濕解毒也近世以鐵銹水

千金方衍義卷五

卷

千金方衍義卷五

塗蠅蝮瘡取其能墜熱開結平 肝消腫也

張介賓曰千金小兒諸證無所不備獨不及痘疹

之方者以痘疹起於南粵斯時 秦中尚無此患耳

孫真人千金方衍義卷五下

孫真人千金方衍義卷六上

長洲 南沙

南沙

七竅病方上 凡五類

目病第一 論一首 方六十九首 證三首 灸法二十八首

論曰凡人年四十五已後漸覺眼暗至六十已後還

漸目明治之法五十已前可服瀉肝湯五十已後不

可瀉肝目中有疾可傳石膽散藥等無病不可輒傳

散但補肝而已自來肝中有風熱令人眼昏暗者當

灸肝膈及服除風湯圖散數十劑當愈

千金方衍義卷六

千金方衍義卷六

生食五辛 接熱飲食 熱餐麪食

飲酒不已 房室無節 極目遠視

數看日月 夜視星火 夜讀細書

月下看書 抄寫多年 雕鏤細作

博奕不休 久處烟火 泣淚過多

刺頭出血過多

右十六件並是喪明之本養性之士宜慎慎焉又

有馳騁田獵冒涉風霜迎風追獸日夜不息者亦

是傷目之媒也恣一時之浮意為百年之痼疾可

不慎歟凡人少時不自將慎年及四十即漸眼昏

若能依此慎護可得白首無他所以八年四十已去常須瞑目勿顧他視非有要事不宜輒開此二術護慎之極也其讀書博奕等過度思月者名曰肝勞者欲治之非二年閉目不視不可得藥徒自瀉肝及作諸治終是無效人有風疹必多眼昏先攻其風其暗自瘥

足太陽陽明手少陽脈動發目病

黃帝問曰余嘗上清冷之臺中陛而顧俯仰而前余私異之竊內怪之或獨冥視安心定氣久而不解破髮長跪俛而視復久之又不已卒然自止何氣使然

千金方卷之十一

三

岐伯對曰五臟六腑之精氣皆上注於目而為之睛睛之果者為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為其絡果氣之精為白眼肌肉之精為約束窠契筋骨氣血之精而與脈并為系系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢身之虛其入深則隨眼系以入於腦入於腦則轉轉則引目系急急則目眩以轉矣邪中其睛則其睛所中者不相比則睛散睛散則岐故見兩物目者五臟六腑之精也榮衛魂魄之所榮也神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脈決於陽故陰陽合揣而

精明矣目者心之使也心者神之舍也故神分精亂而不轉卒然見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑帝曰余疑何其然也余每之東苑未嘗不惑去之則復余惟獨為東苑勞神乎何其異也岐伯曰不然夫心有所喜神有所惡卒然相感則精亂視誤故神惑神移乃復是故聞者為迷甚者為惑

目眚外決於面者為兌眚在內近鼻者上為外眚下為內眚目赤色者病在心白色者病在肺青色者病在肝黃色者病在脾黑色者病在腎黃色不可名者病在胸中

千金方卷之十一

三

診目痛赤脈從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病夫鼻洞鼻洞者濁下不止傳為鼻膏瞑目故得之氣厥足陽明有俠鼻入於面者名曰懸顛屬口對入係目本視有過者取之損有餘益不足反者益甚足太陽有通頂入於腦者正屬目本名曰眼系頭目因痛取之在項中兩筋間入腦乃別陰躋陰陽相交陽入陰出陽交於兌皆陽氣盛則曠目陰氣絕則眠眼神麴圓主明目百歲可讀註書方

神麴 四兩

磁石 二兩

光明砂 一兩

右三味為末煉蜜為丸如梧子飲服三九日三不
禁常服益眼力眾方不及學者當知此方神驗不
可言當祕之一名祕

衍 滋稟北方坎水之精殊稟南方離火之氣以二味

質重故藉神麴發越其沉著之性以鎮神水之不

清千金原用蜜丸日服梧子大九九近世即於本

方中分出神麴一兩調糊代蜜為丸空心米湯下

三十九因病緊一時急療之法非常服保光之謂

其蜜丸麴丸多服少服之義隨時酌量可也

瓜子散 治眼漠漠不明補肝方 亦老十

千金方衍義卷五 補肝方

冬瓜子 青葙子 羌蔚子

枸杞子 牡荊子 蒺藜子

芡絲子 蕪菁子 決明子

地膚子 柏子仁 各二 牡桂

黃蘗根 各二 蕤仁 一合 車前子 一兩

細辛 半兩

右十六味治下篩食後以酒服方寸七日二神驗

衍 前方煥發靈臺此方隨性類聚方下所云治眼漠

漠不明雖言補肝而益腎之味森復不少方中冬

瓜子益氣令人悅澤好顏色青葙子入肝則目羌

蔚子益精明目枸杞子治腎虛目暗牡荊子除風

熱開經絡導痰涎行血氣蒺藜子治惡血破積聚

明目輕身芡絲子去風明目入肝腎氣分蕪菁治

熱毒風腫子專明目決明子治青盲目淫膚赤白

膜眼赤淚出地膚子久服耳目聰明柏子仁除風

濕安五臟令人耳目聰明牡桂利關節通神明襲

蕪根即木通去熱翳赤白障蕤仁治心腹邪熱結

氣目赤腫痛皆爛淚出車前專治水輪不清細辛

明目利九竅總取補肝明目之用肝血清而腎水

受蔭矣

千金方衍義卷五 補肝方

補肝圓 治眼暗方

青葙子 桂心 蔓藎

杏仁 細辛 羌蔚子

枸杞子 五味子 各一 茯苓

黃芩 防風 地膚子

澤瀉 決明子 麥冬

蕤仁 各一兩 車前子 芡絲子 各二

乾地黃 三兩 兔肝 一只

右二十味為末蜜丸飲下二十九如梧子日再加

至三十九

衍 即於瓜子散中除去瓜子牡荊蒺藜蕪菁柏仁蕪

蕪根六味參入防風黃芩散風熱茯苓澤瀉滲濕

熱地黃冬味滋燥熱葶藶杏仁開結熱其補肝之

力全在兔肝一味

又方 治眼暗睛翳不明寒則淚出肝腎所損方

兔肝二具

柏子仁

乾地黄

茯苓

細辛

薤仁

枸杞子各一兩 防風

芎藭

山藥各一兩

車前子一合

五味子十八銖

甘艸半兩

兔絲子一合

千金方衍義卷五

補藥山房

右十四味為末蜜丸酒服如梧子二十九日再服

加至四十九

衍 又於補肝丸中除去菁箱桂心葶藶杏仁芎藭黃

芩地膚澤瀉決明門冬十味參入山藥柏仁芎藭

甘艸較前補肝丸用法稍平而補肝之功最穩益

睛暗不明肝腎精血不充之驗所以首推兔肝同

氣相感之力其妙用尤在細辛防風開發經絡之

滯則諸藥方得上注於目也

補肝散 治目失明漠漠方

決明子半升 芩子一合 熬

青羊肝一具 去膜薄

以之 於中炭火上炙之令極乾汁盡未之

右三味合洽下篩以粥飲食後服方寸七日二稍

加至三七不過兩劑能一年服之可夜讀細書

衍 決明久服能益精光莖實溫中明目青羊即殺羊

青盲明目之專藥皆本經主治不特滋陰補肝兼

能散血舒筋同氣相感之妙用如此

又方 治三十年失明方

鍾乳粉

雲母粉各煉成者

細辛

茯苓

遠志

五味子五分

右六味治下篩以酒服五分七日三加至一錢七

千金方衍義卷五

補藥山房

衍 失明而至二三十載陽精耗竭已極方用鍾乳溫

經通竅明目益精雲母鍾攝虛陽益精明目細辛

遠志開發腎肝茯苓守護真氣五味子交通心腎

鼓舞氤氳之氣上行何憚精光之不復耶

補肝蕪菁子散 常服明目方

蕪菁子三升淨淘以清酒三升煮令熟曝乾治

下篩以井花水和服方寸七稍加至三七無所

忌可少少作服之令人充肥明目洞視水者酒

服亦可

又方

三月三日採黃菁花陰乾治下篩空心井花水服方寸七久服長生明目可夜讀細書

又方

胡麻一斗蒸三十遍治下篩每日酒服一升

又方

服小黑豆每日空心吞二七粒

補肝散 治男子五勞七傷明目方

地膚子斗陰生地黃十斤取汁

右二味以生地汁和散曝乾更為末以酒服方寸

七日二

千金方衍義卷上

又方

白瓜子七升絹袋盛攪沸湯中三遍曝乾以酢

五升浸一宿曝乾治下篩酒服方寸七日三服

之百日可書細字

衍義蕪菁治熱風腫子專明目久服令人肥澤又採

花陰乾久服長生明目 胡麻酒服補腎之精血

血充則水輪自明 生黑豆日服明目補腎是捷

地膚子利小便治膀胱之熱生地黃汁滋血潤

燥除瘀積和損傷陰血不足不能近視者宜之

白瓜子即冬瓜仁也酢浸以引入肝能去而上點

黑潤澤肌膚以其能解毒除垢也

梔子仁煎 治肝實熱目昏痛如刺方

梔子仁 決明子 梨仁 各一兩

車前葉 秦皮 各一兩 石膏 一兩碎

苦竹葉 二合 細辛 半兩 赤蜜 三合

右九味咬咀以井花水三升煮取七合去滓下蜜

更煎取四合以綿濾之乾器貯密封勿使艸芥落

中以藥汁細細仰臥以傳目中

衍義肝熱昔痛非寒苦萃聚無以療之蜜隨赤白而分

補瀉此用赤蜜專滋火燥也

千金方衍義卷上

瀉肝湯 治眼赤漠漠不見物息肉生方

柴胡 芍藥 大黃 各四兩

決明子 澤瀉 黃芩

杏仁 各三兩 升麻 枳實

梔子仁 竹葉 各二兩

右十一味咬咀以水九升煮取二升七分分三服

熱多體壯加大黃一兩羸老去大黃加梔子仁五

兩

又方 治眼風赤暗方

前胡 芍藥 各四兩 生地黃 十兩

芒硝

黃芩

茯苓

白芷

枳實各三兩

人參各二兩

白朮

梔子仁

澤瀉各二兩

甘艸

細辛各一兩

竹葉五升

右十五味咬咀以水二斗煮減半去滓取七升內

芒硝煮取四升分三服

衍義日赤而生息肉非上下開泄不能瀉其結熱升麻

柴胡引之上泄枳實大黃引之下泄澤瀉梔子竹

葉兼清水道黃芩芍藥兼清肝火也 又方所治

赤暗與前方不殊以其正氣日衰病氣日固故加

人參白朮甘艸於滌熱劑中鼓舞胃氣運行藥力

方中前胡細辛白芷即前方柴胡升麻杏仁之變

法也

洗肝乾藍煎 治肝熱不止衝眼眼皆赤赤脈息

肉痛閉不聞熱勢彭彭不歇及目睛黃方

乾藍 車前葉 苦竹葉各三升

細辛 秦皮 蕤仁

梔子仁 芍藥各三兩 決明子四兩

升麻二兩

右十味咬咀以水二斗先煮車前乾藍竹葉取

斗去滓澄清取八升內藥煮取三升分三服須利

加芒硝二兩

衍義目痛熱腫不開而見赤脈色黃肝熱勢甚可知乾

藍車前竹葉即前先煮三味秦皮梔子芍藥蕤仁

從梔子仁煎瀉肝二湯採取不過添水止沸術耳

細辛升麻揭開錫蓋法也方後芒硝則兼鍋底抽

薪之用一方面兼上三方之意也

大棗煎 治目熱皆赤生赤脈侵睛息肉急痛閉

不開如芥在眼礮痛方

大棗七枚去核 黃連二兩碎 淡竹葉五合切

右三味以水二升煮竹葉取一升澄清取八合內

棗肉黃連煎取四合去滓令淨細細以傅目皆中

衍義方下見證皆屬心脾陽瞤之熱非黃連竹葉無以

折之用大棗者以和黃連苦燥之性此與梔子仁

煎用赤蜜之意不殊

治目中息肉方

驢脂 石鹽末

右二味和合調注目兩眦頭日三夜一瘥

又方

取五加根皮搗末一升和酒三升浸七日外

一日兩時服之禁酢二七日徧身生瘡若不出未得藥力以生熟湯浴之取毒瘡出瘡

衍 臍脂動風川為祛風之使石鹽軟堅兼取降火之功

五加皮酒浸能搜風散血服後遍身生瘡則毒熱外泄也

洗眼湯 治熱上出攻目生瘡醫目熱痛汁出之

方

秦皮

黃柏

決明子

黃連

黃芩

蕤仁各十

梔子七枚

大棗五枚

千金方藥卷下

掃葉山房

右八味咬咀以水二升浸煮取六合澄清仰臥洗

日一

衍 方用金花湯加秦皮蕤仁決明渾是苦寒以洗日

痛汁出熱極生醫全賴大棗以和諸藥之性始無

塞遏之虞

治目生醫方

貝子十枚燒灰治下篩取如胡豆著醫上日二

正仰臥令人傳之炊久乃拭之息肉者加珍珠

如貝子等分

治目赤及醫方

烏賊骨

鈔丹款列

右二味合研細和白蜜如餅蒸之半食久冷著眼

四皆

又方

白羊髓傅之良

又方

熟羊眼睛曝乾治下篩傅目兩角

又方

新生孩子胞衣曝乾燒末傅目皆中

又方

古錢一枚 鹽方寸

千金方藥卷下

掃葉山房

右二味合治下篩傅目皆中

衍 貝子為軟堅磨醫專藥加珍珠則專消息肉以能

清手足厥陰濕熱也 烏賊骨味鹹走血為腎所

奕堅專藥鈔丹性沉墜走血為除熱卜氣鎮攝要

藥和蜜冷著四皆取其潤澤而愈也 羊骨可以

消鐵即骨髓之磨醫可不言而喻 羊眼屬金故

可治眼中醫膜 胞衣灰散瘀血消目赤醫宜之

古錢薑汁塗刮青點目去醫消風加鹽奕堅尤

捷但作瘡者勿用

治目風淚出浮瞖多膿爛皆方

乾薑

決明子

礬石

麤仁

細辛

黃連

戎鹽各六

銅青三銖

石八味咬咀以少許水浸一宿明旦以好白蜜入

合和之著銅器中綿蓋器上著飮中以三斗麥屑

蒸之俟熟藥成絞去滓以新死大雄鯉魚膽二枚

和內藥中又以大錢七枚常著藥底兼常著銅器

中竹箬綿裏頭以注目皆頭晝夜三四不避寒暑

數著藥訖又以魚膽和好覆藥器頭勿令氣歇善

本草卷之六

五

掃葉山房

治熱瞖漫睛方

以羊筋漱目熟嚼夜臥開目內之即閉目睡去

膜明日即瘥

千金翼以羊筋目不明

治目熱生膚赤白膜方

取雄雀屎細直者人乳和熟研以傅之當漸消

爛

治人馬白膜漠睛方

以雞翎截之近黑睛及當白睛嚙之膜自聚鈞

鍼鈞挽之割去即見物以綿當眼上著血斷三

日瘥

淚出浮瞖多屬於風膿黏皆爛多屬於濕潤辛專

泄久伏肝風乾薑專開宿蘊脾濕黃連統理肝脾

濕熱決明殺仁本經雖不言治風而實目科風熱

要藥戎鹽礬石銅青皆退熱收濕為爛眼風眼之

必須然非以蜜濡之不能無痰燥之虞 羊筋磨

肝雀矢礬腎皆丹方中可取用者 雞翎管嚙而

鈞割之法頗捷然非指下精熟難以輕試

鴻風散 治目白膚風淚下方明藥方

光明硃砂兩半

貝齒五枚燒為末

衣中白魚七枚

乾薑三銖

本草卷之六

五

掃葉山房

右四味於新磁鉢中研之厚帛三下為散仰臥令

人小指爪挑少許傅目中取瘥為度 一方用生

薑自然汁澄粉代乾薑

治目中生息肉膚瞖稍長欲滿目閉瞳子及生珠

管方

貝齒七枚燒為末

珍珠等分

右二味合治如粉以注瞖肉止日三度甚良亦治

目中昧不出

治目生珠管方

滑石

手爪甲燒

龍骨

貝齒

丹砂各等分

右五味治下篩以新筆點取當珠管上日三度良

美衍丹砂貝齒衣中白魚皆取磨暨薑粉專於治癢

貝齒珍珠不特去息肉而眼漏用之亦能消管

滑石爪甲龍骨貝齒丹砂雖主珠管亦能消管總

取貝齒磨堅之力

治毒病後目赤痛有翳方

以青布掩目上以冷水漬青布數易之

治熱病後生翳方

豉二七枚燒為末內管中以吹目中

千金要方卷之

卷

攝生

治熱病後眼暗失明方

以羊膽傳之且蒜各一

義衍專取藍澱之餘漬濕以化餘毒然惟暴赤者宜之

豉灰除溫疫毒癘亦能治病後餘熱 羊膽專

清肝膽之火病後血虛者尤宜

治風眼爛皆方

竹葉 黃連各一兩 柏白皮半兩

右三味咬咀以水二升煮取五合稍用礬目兩皆

日三四度

治胎赤眼方

取槐木枝如馬鞭大長二尺齊頭麻油一匙置

銅鉢中且使童子以木研之至眼止夜臥時洗

目傳皆日三良

治目爛赤方

取三指撮鹽置古文錢上重重火燒赤投少醋

中足淹錢以綿沾汁注目皆中

洗眼湯 治目赤痛方

甘竹葉七枚 烏梅

古錢各二枚

右三味以水二升漬藥半日東向竈煮三沸三上

三下得三合臨欲眠注目皆

千金要方卷之

卷

攝生

治目中風腫痛除熱揉眼方

礬石三兩燒令汁盡以棗膏和如彈丸揉眼上

下食頃日三止

治目卒腫方

以酢漿水作鹽湯洗之日四五度

義衍竹葉柏皮黃連并清濕熱 槐枝益腎清火麻油

滋血潤燥以初生小兒不勝寒折故以微潤解之

古文錢鹽燒酢收斂肝經濕熱然惟瀉瘵者

為宜 竹葉烏梅古錢與治目爛赤同類彼同鹽

煨以治宿昔蘊垢此同竹葉以除暴赤風熱彼投

少醋引之入肝此以烏梅引之開竅 礬灰專除

濕熱 漿水鹽湯同收火逆

治五臟客熱上衝眼內外受風冷目痛不明方

地膚子

白瓜子

青葙子

蒺藜子

茺蔚子

藍子

兔絲子

蕤仁

各二合翼 柏子仁 合半翼 方無

決明子

細辛

桂心 一兩十 六銖

大黃

螢火

黃連 一兩 半

右十五味為末蜜丸如梧子每服三十九食後服

日三

千金方卷下

太

掃藥山房

衍方中十一味出瓜子散彼因漠漠不明故用蕤蕤

根收斂精氣而保光此因風從火化故用二黃以

掃濕熱藍子以清肝火螢火專於明目所以本經

獨標主治也

乳汁煎

治目中風冷淚出皆赤癢方

川連

蕤仁

乾薑 一兩

右三味咬咀以人乳汁一升漬藥一宿明旦以微

火煎取三合綿絞去滓取如黍米許內目皆頭日

三張文仲方 三味等分

治目赤痛方

雄黃 一銖

細辛

黃連

乾薑 各二銖

右四味合治如粉以綿裹釵股唾濡頭注藥末內

大皆頭急閉目目中淚出須臾止勿將手近勿將

帛裏勿洗之

又方

雄黃

乾薑

黃連

礬石 各六銖

右四味合治並如前方 一方加細辛六銖

治眼赤暗方

千金方卷下

五

掃藥山房

古青錢 三枚

青鹽 一兩 六銖

杏仁 未熟時取 仁搗汁一合

右三味合內磁器中封頭勿泄氣百日後出著日

四皆頭日二三避風冷

治眼暗赤冷淚方

蕤仁

波斯鹽

右二味等分治下篩以鹽生脂和每夜傅目圓衍

以一粟大密室中將息一月日瘥忌五辛失明言

三十日傅之

治目痛及淚出不止方

削附子作蚕屎大內目中臥良

治目卒癢痛方

制乾薑令圓滑內昔中有汁拭却復以薑末盡

易之

治目不明淚出方

以烏雞膽臨臥傳之

位薑得人乳則和而不烈連得麩仁則潤而不燥兼

得逆治順治之奧若淚出不止不妨稍減乾薑此

義文仲得之 其治目赤痛亦用薑連薑得雄黃

則熱得宜通連得細辛則寒能孚化總取寒熱兼

濟之力 又方用礬石易細辛佐雄黃以收濕去

千金行義卷上

羊

補藥山房

垢為薑連之佐使也 其青鹽杏仁汁漬古錢即

前洗眼湯之變法 麩仁波斯鹽膽脂即前治目

風淚出浮醫多膿爛皆方之變法此用驢脂透風

潤燥彼用鯉魚膽除濕去垢主治稍有不同 削

附子內日中專主積寒內伏冷淚不止若赤腫疼

痛者慎勿誤與 削乾薑令圓滑內昔中治目卒

癢痛專主虛陽上擾癢痛不時與削附子內目中

同法 烏雞膽汁專主肝血不充熱淚不止與削

附子內目中之法角立

治雀盲方

地膚子五兩 決明子一升

右二味為末以米飲汁和丸食後服二十九至三

十九日三盡即更合瘥止

治雀目術

令雀盲人至黃昏時看雀宿處打令驚起雀飛

乃呪曰紫公紫公我選汝盲汝還我明如此日

日眼三過作之眼即明曾試有驗肝後云剛繁

真珠散 治肝氣虛寒眼青腫睛不見物方

真珠一兩 白蜜二合 鯉魚膽

鯉魚膽各一

千金行義卷上

羊

補藥山房

右四味和合微火煎兩沸綿裹內月中當汁出藥

歇更為之

治目睛腫無所見方

青羊肝一具細切以水一斗內銅器中煮以麩

餅覆上上鑽兩孔如人眼正以目向就熏目不

過再熏即瘥下金罈若眼若無所見不用麩餅

行地膚益精解熱久服耳聰目明決明療青盲目淫

久服益精光輕身允為調補本虛之良劑 真珠

散熱消障鯉魚膽除風滌熱兼白蜜解方潤燥

總取異類有情功勝草根木實 煮殺羊肝熏目

取同氣相入之義後人用獾羊肝蚌蛤粉煮食從此悟出

治眼暗方

以銅器盛大酢三四升煮七八日覆器濕地取銅青一合以三月杏白仁一升取汁和銅青併之不過三四度

又方

古錢七枚

銅青

乾薑

石鹽

胡粉

枳殼子各中

烏頭棗核大

川連三條

細辛五錢

麩仁一百二

酢二合

清酒五合

楸葉一把

取汁

右十三味治下篩合煎取三分去一盛器中若燥取人乳和傅目慎風冷

又方

每朝合黃葉一爪甲許使津置掌中拭目訖以水洗之至百日眼明此法乃可終身行之永除

眼疾神良

又方

柴胡六錢

淚明子十八

右二味治下篩人乳汁和傅目可夜書五色

治眼暗方

七月七日生苦瓠中白絞取汁一合以酢一升

浸古文錢七枚微火煎減半以米許大內皆中

義衍 銅青入肝去垢杏仁消腫散風方下雖治目暗而

腫赤亦宜用之 又方用古錢銅青薑連鹽乳細

辛麩仁消腎化熱之品總皆點傅恒用之藥惟胡

粉佐古錢銅青透達固結之陰毒烏頭合薑連細

辛開發鬱遏之熱邪析冥治目痛淚出楸葉能拔

毒排膿他方未用世亦固知其酢通肝滯酒行經

絡人乳潤燥非細心體會不能達此 每朝合黃

柏取津唾拭目不獨滋陰兼能清火 柴胡開提

肝氣決明滋益精光乳汁以和血氣 苦瓠和酢

浸熬古錢不獨磨腎兼能逐垢但藥頗峻厲虛者

宜慎

治眼漠漠無所見方

麩仁

秦皮

川連各十

螢火七枚

決明子一合

右五味咬咀以水八合微火煎取三合冷以綿汁

洗目日三度

衍方中蕤仁川連決明螢火四味皆出前治五臟客

熱上衝眼內外受風冷目痛不明方中但參入秦

皮一味以治目中青翳白膜專取苦降達肝之意

但彼蜜丸服此水煎洗內外不同而取用之藥不

殊也

常服輕身益氣明目方

蕤蒿子一升以水四升煮令汁盡出曝乾復以

水四升煮如前法三煮三曝治下篩飲服方寸

七千金翼云百日身熱瘡出不久自瘥

衍前補肝蕤蒿子散但用酒煮此三煮三曝為之稍

千金衍義卷十

異其無毒則服之充肥有毒者服之瘡出則蕤蒿

祛毒之驗於此可徵

主明目令髮不落方

十月上巳日收槐子內新磁甕中以益密封口

三七日發封洗去皮取子從月一日服一枚二

日二枚日別加計十日服五十五枚一月日服

一百六十五枚一年服一千九百八十枚小月

減六十枚此藥主補腦早服之髮不白好顏色

長生益壽先病冷人勿用之時後云扁鵲方

又方

牛膽中漬槐子陰乾百日食後吞一枚十日身

輕三十日白髮再黑至百日通神

衍槐真虛宿之精而子專益腎補益水輪之功獨充

并可傍及於髮髮乃血之餘任脈所主在為陰脈

之海腎之外垣天一生水之源故主目與髮也

又以槐子漬牛膽中陰乾日服功效尤神

治目中眵不出方

以鷄砂一粒吞下即出

治稻麥芒等入目中方

取生蜻蟻以新布覆目上將生蜻蟻從布下摩

千金衍義卷十

之芒出著布良

治沙石艸木入目中不出方

以雞肝注之

又方

以書中白魚和乳汁注目中

治目為物所傷觸青黑方

煮羊內令熟熨勿令過熱豬肝亦得

治目痛不得睡方

暮奈新青布熨并蒸大豆袋盛枕之夜常令熱

衍目眯用蠶砂 稻芒用蜻蟻 沙石艸木用雞肝

及書中白魚 物傷煮羊肉熱熨 目痛灸青布

熨并蒸豆袋作枕皆隨機應用之法

目中赤痛從內皆始取之陰蹻

日中痛不能視上星主之先取諶諶後取天牖風

池

青盲遠視不明承光主之

目瞑遠視眈眈目窻主之

口眈眈赤痛天柱主之

目眩無所見偏頭痛引目外眥而急頰脈主之

目遠視不明惡風淚出憎寒頭痛日眩眥內眥赤

痛遠視眈眈無見背癢痛淫膚白瞖精明主之

青盲無所見遠視眈眈日中淫膚白膜覆童子巨

窻主之

目不明淚出目眩眥腫子癢遠視眈眈昏夜無見

目瞤動與項口參相引喞僻不能言刺承泣

目痛僻戾不明四白主之

目赤目黃權窻主之

脂目水溝主之

目痛不明斷交主之

目瞤身汗出承漿主之

青盲瞤目惡風寒上關主之

青盲商陽主之

瞤目眈眈偏歷主之

眼痛下廉主之

日中白瞖前谷主之

目痛泣出甚者如脫前谷主之

白膜覆珠子無所見解谿主之

灸法 餘穴見前

瞤目眈眈少氣灸五里右取左左取右

眼暗灸大椎下數節第十當脊中安灸二百壯惟多

為佳至驗

肝勞邪氣眼赤灸當容百壯兩邊各兩穴在眼小眥

近後當耳前三陽三陰之會處以兩手按之有上下

橫脈則是與耳門相對是也

眼急痛不可遠視灸當瞳入上入髮際一寸隨年壯

穴名當陽

風瞖患右目灸右手中指本節頭骨上五壯如小兒

大左亦如之

風癢赤痛灸人中近鼻柱二壯仰臥灸之

目卒生瞖灸大指節橫文三壯在左灸右在右灸左

鼻病第二論一首 方三十九首

治鼻塞腦冷清涕出方

通艸

辛夷各4兩

細辛

甘遂一作甘艸

桂心

川芎

附子各一兩

右七味爲末蜜丸綿裹內鼻中密封塞勿令氣泄

九如大麻子稍加微覺小痛搗薑爲丸卽愈用白

狗膽汁和之更佳

治鼻塞常清涕出方

千金方卷第...

細辛

川椒

菴藍

背藟

吳茱萸

附子各十斤

柏心一兩

皂莢屑半兩

猪膏一斤

右九味咬咀以綿裹若酒漬一宿取猪膏煎以附

子色黃爲度去滓綿裹內鼻孔中并摩鼻上

治涕出不止方

灸鼻兩孔與柱齊七壯

香膏 治鼻塞窒方

白芷

川芎

通艸各十斤

當歸

細辛

薰艸

辛夷各三錢

右七味咬咀以苦酒浸一宿以不中水猪肪一升

煎三上三下以白芷色黃膏成去滓綿沾如棗核

大內鼻中日三小品加桂心十八錢

香膏 治鼻不利方

當歸

薰艸古今錄驗川木香 通艸

細辛

薤仁各十斤

川芎

白芷各半兩

羊髓四兩猪脂亦得

右入味咬咀以微火合煎三上三下白芷色黃膏

成去滓取如小豆大內鼻中日二先患熱後鼻中

生赤爛瘡者以黃芩梔子代當歸細辛

又方

瓜蒂末少許吹鼻中亦可綿裹塞鼻中

治鼻塞多年不聞香臭清水出不止方

取當道車輾過菴藜一把搗以水三升煎取熟

先仰臥使人滿口含取一合汁灌鼻中使入不

過再度大嚏必出一兩箇息肉似赤蝟 一方

有黃連等分同煎

治鼻塞腦冷涕出干金多用外治總以辛溫開通經

絡爲主隨所見標本而加清熱滌垢等藥卽濁穢

屬熱亦必藉辛溫以導其滯非若近世以清濁分
 勳淵也此方以通艸通關利竅引領桂附川芎細
 辛辛夷達於病所又須甘遂開奪門戶而與之以
 出路也 其第二方亦用桂附芎辛更兼椒薑吳
 黃力倍辛夷抑且皂莢迅於甘遂酢浸膏煎較蜜
 丸之緩急霄壤矣 香膏二方並用通艸辛芷芎
 歸黨艸前用辛夷以散頭風腦痛後用麩仁以治
 邪熱結氣其豬肪羊髓總滋血氣之用惟鼻齋赤
 爛者不獨以芩梔代歸辛并不得用醋漬而前方
 薰艸坊本誤作莽艸今從翼方正之 其瓜蒂塞
 鼻取黃水以去濁濕 蒺藜灌鼻取嚏以出息肉
 雖多年痼疾可使霍然

治鼻塞氣息不通方
 小蘗一把咬咀以水三升煮取一升分二服

又方
 槐葉 五升 葱白切一升 豉一合

右三味以水五升煮取三升分溫三服

衍義鼻塞無時得通定屬有形血病多緣衄時誤行止
 截瘀積髓海所致故專取小蘗散血為主 若鼻
 塞有時略通定屬無形風病風入腦戶久而不解

風從火化故以槐葉清解蘊熱葱散解散風毒也

治鼻齋方
 通艸 細辛 附子

右三味等分為末蜜丸和綿裹少許內鼻中

又方
 甘遂 通艸 細辛

附子各等分

右四味為末以白雄犬膽和為丸如棗核大綿裹
 內鼻中辛熱涕出四五升瘥亦治息肉

治齋鼻有息肉不聞香臭方
 瓜丁 細辛

千金方衍義卷下

右二味等分為末以綿裹如豆大許塞鼻中須臾
 即通

又方
 炙皂莢為末如小豆大以竹管吹入鼻中

又方
 乾薑末蜜和塞鼻中吹亦佳

又方
 鐵鑊磨石取末以豬脂和綿裹內之經日肉出
 瘥

衍義 鼻竅必有息肉阻礙氣道不得貫通之故故以散

結通氣為主方用通艸開通關竅細辛解故結邪

附子流行經絡立方最捷而用之不應故於前方

加入甘遂而子之以出路且以犬膽代蜜專力碎

除濁垢也 其用瓜丁細辛專滌濕熱瓜丁即連

瓜蒂處若極者是用以搗鼻專取頭中寒濕黃水

濕去則息肉除而香臭開矣 皂莢吹鼻猛於瓜

丁若吹之過力每致腦中掣痛尸者須知 乾薑

蜜和塞鼻其法雖緩而用之無咎 鐵鏽性沉下

氣氣下則結白開熱自墜矣 如上諸法總為因

病而斃者設若胎生鼻竅雖有刀圭不能開辟混

沌也

通艸散 治鼻中息肉不通利方

通艸 半兩 礬石 各一

右三味為末搗綿如棗核 取藥如小豆著綿頭內

鼻中日三易之 一方有細辛桂心各一兩同前

搗末和使之

衍義 消鼻中息肉礬石最捷佐以珍珠滴管通艸透竅

加桂辛尤為得力

治鼽鼻鼻中息肉不得息方

礬石 各六 瓜蒂 二七

附子 錄

右四味各搗篩合和以小竹管吹藥如小豆許於

鼻孔中以綿絮塞鼻中日再以愈為度 古今錄驗

衍義 礬石化息肉藜蘆去死肌瓜蒂祛濕熱附子溫散

積結之固疾

治鼻中息肉方

炙蝟皮為末綿裹塞之三日

治鼻中息肉不聞香臭方

燒礬石末以面脂和綿裹者鼻中數日息肉隨

藥消落

又方

末瓜丁如小豆許吹入鼻中必消如此三四度

良

又方

錦裹瓜蒂末塞鼻中

又方

細篩釜底墨水服之三五日

又方

細辛 釜底墨

右二味爲末水和服方寸七

衍 蝟皮消歹肉較礬石稍緩瓜丁攻濕熱與瓜蒂無

異 其水服釜底墨專散火毒上壅鼻不得息

同細辛用則兼散風熱然惟暴起息內者宜之翼

方又以香油煎煉雄黃內鼻而散息肉功在諸方之上

羊肺散 治鼻中息肉梁起方

羊肺乾之 白朮四兩 菴蓉

通艸 川芎 乾薑各二兩

主方義卷空 第一 攝集山房

右六味爲末食後以米飲服五分七加至方寸七

又方

通艸十二 珍珠六銖 礬石

細辛各一兩

右四味爲末攪綿如棗核沾散如小豆并綿內鼻

中口再三

治鼻中息肉方

灸上星二百壯穴在直鼻入髮際一寸

同 鼻梁高起濕熱上攻肺經之驗故首推羊肺之同

氣相下以引通艸泄熱 乾薑散結川芎祛風生木

燥濕菴蓉之鹹引之下泄也 其後內鼻方即前

通艸散加細辛專散風熱而梁可平矣

治鼻中生瘡方

搗杏仁乳傅之亦燒核壓取油傅之

又方

燒牛狗骨灰以臘月猪脂和傅之

衍 杏仁解毒殺蟲而走肺竅 牛狗骨乃血肉餘滓

故可以治血肉之毒

治疔蟲蝕鼻生瘡方

燒銅筋頭以酢滓之數過取酢傅之

主方義卷空 第一 攝集山房

衍 濕本濕熱所化病從肝生燒銅滓酢以斂肝殺蟲

濕熱亦隨之而化矣

治鼻痛方

常以油塗鼻內外酥亦得

治卒食物從鼻中縮入腦中介 痛不出方

牛脂若羊脂如指頭大內鼻中以鼻取脂須

臛脂消則物逐脂俱出也

衍 痛用油塗酥潤物從鼻中縮入腦中梗痛用羊脂

吸取總取潤滑之意

論曰鼻頭微白者凶血設令微赤非時者死病人色

白者皆亡血也凡時行痢不宜斷之如一二升已上恐多者可斷即以龍骨末吹之九竅出血者皆用吹之

治大便出血及口鼻皆血出血上心胸氣急此是勞熱所致方

生地 八兩 蒲黃 一升 地骨皮 五兩

黃芩 芍藥 生竹茹 各三兩

右六味咬咀以水八升煮取二升七分溫三服凡吐血衄血瀉血皆臟氣虛弱氣傷或起驚悸治之方

本草方義卷十一 補藥山房

生竹皮 一升 芍藥 黃芩 各二兩

川芎 當歸 桂心

甘艸 各一兩

右七味咬咀以水一斗煮竹皮減三升下藥煎取

二升分三服

治衄血方

生地 六兩 川芎 一兩 細辛 六銖

伏龍肝 二枚如雞子大 桂心 白芷

乾薑 芍藥 甘艸

吳茱萸 各三兩

右十味咬咀以水三升酒七升煮取三升分三服

治鼻衄方

生地 八兩 黃芩 一兩 阿膠

甘艸 各二兩 柏葉 一把

右五味咬咀以水七升煮取三升去滓內膠煎取

二升半分三服

又方

生地 三斤 阿膠 二兩 蒲黃 六兩

右三味以水五升煮取三升分三服

治鼻中出血不止方

本草方義卷十一 補藥山房

地黃 梔子 甘艸 各等分

右三味治下篩酒服方寸七日三如鼻疼者加破

一合鼻有風熱者以葱涕和服如梧子五丸

血從上下溢出勞熱不能制攝可知故用地黃蒲

黃輩為之止截所謂急則治其標也然必量其稟

質多火者方可止之若真陰有虧慎勿誤投生地

黃黃芩等味使血潛積不散久成窠囊不可解救

者業常見之所以診其鼻微白者為亡血血亡雖

多僅宜龍骨末外吹不得寒涼止截若反見鼻微

赤是虛火上炎非時所宜故主以死示人切勿安

治也 其第二方治吐血衄血亦用竹皮芍藥黃

芩而兼芎歸和血桂心散血甘艸和胃與前方止

散天淵 其第三方雖用生地黃乃兼薑桂辛黃

芎芷伏龍肝等溫散之品則生地亦從之而散血

無疑 其第四方則大劑生地作主復兼阿膠黃

芩柏叶甘艸一意止截但欠金匱柏叶湯中薑艾

黃土湯中朮附一籌耳 其第五方亦用生地阿

膠而加蒲黃雖生用可散血熱在胃氣虛寒者不

無奪食作瀉之虞 其第六方但用地黃梔子甘

艸三味恐苦寒兼併雖用酒服未必能行散血干

千金方衍義卷五

婦人血崩

金等方當時必為邪熱亢盛妄行不止而設後人

可不加察而效尤取咎以為先哲立方之過歟

又方

飲小薊汁良

又方

搗楮葉汁飲三升大良

又方

取亂髮五兩燒作灰以管吹鼻中棗核大不止

益吹之以血斷止并水服方寸七日三甚者夜

二已困不識人者服亦佳

又方

淳酎和竈土塗陰囊上乾易之

又方

韭根葱根取汁懸頭著一棗大內鼻中少時更

著兩三度癢葱白搗汁亦得

飲小薊汁有散血之能 飲楮葉汁有濕血之力

吹服髮灰有止中窩散之妙 酢和竈土塗陰囊

有引肝火下行之功 葱韭汁內鼻孔有溫經散

血之力亦外治之一助也

衄時癢癢便灸足大指節橫理三毛中十壯劇者百

千金方衍義卷五

婦人血崩

壯衄不止灸之并治陰卵腫

又灸風府一穴四壯不止又灸

又灸涌泉二穴各百壯

口病第三論一首 方五十六首

論曰凡患口瘡及齒齦油澀酒醬酸酢鹹膩乾棗瘡

後仍須慎之若不久慎尋手再發發即難瘡當微根

角蒿為口瘡之神藥人不知之

治口中面上息肉轉大方

以刀決潰去膿血即愈

治口中瘡久不瘡入胸中並生瘡三年已上不瘡

者方

濃煎薔薇根汁含之又稍稍咽之日三夜一冬
用根夏用莖葉

又方

角蒿灰傅之一宿知二宿瘥有汁吐之不得咽
也

治病各有專藥野牛白薔薇根足陽明經除風殺

蟲要藥口瘡乃陽明濕熱除風則濕散故千金以

治口瘡神藥角蒿辛苦殺蟲蟲本濕熱所化濕

去蟲無以生何有口瘡之患

千金方中藥卷下
山房

治口瘡不歇方

牛膝

生葉荷根各三兩
黃柏一兩

右三味咬咀以綿裹酒三升漬一宿微火煎一兩

沸細細含之

升麻煎 治膀胱熱不已口舌生瘡咽腫方

升麻

元參 薔薇根白皮

射干各四兩

大青 黃蘗各三兩

蜜七合

右七味咬咀以水七升煮取一升五合去滓下蜜

更煎兩沸細細含咽之

口瘡不歇濕熱隨虛陽漸漬於上蘊為火毒入傷

有形之血以故愈而後發牛膝生用去惡血逐火

毒性專下行能使口瘡熱毒下降薔薇乃芭蕉中

之一種色白者為殺蟲神藥取其辛散故口瘡亦

得用之黃蘗苦寒降泄酒漬微煎含之雖久漬之

濕熱口瘡必隨之而漸化矣 升麻性升散風腫

諸毒瘵喉痛口瘡元參治腎虛真陰失守膀胱之

火循逆咽喉腫痛射干療喉痺咽痛不得息散結

氣大青瀉肝膽濕熱解毒殺蟲得薇根葉皮其囊

厥功蜂蜜解毒和中滋潤喉舌雷戀諸藥性味含

之尤為得宜

治口數生瘡連年不差方

薔薇根

黃芩

當歸

桔梗

黃芪

白薇

大黃

鼠李根皮

芍藥

續斷

黃蘗

葛根各二兩

右十二味為末以酒服方寸七日二亦可漿水服

之

治胃中客熱唇口乾燥生瘡方

茯苓

黃芩

甘州

大黃

薔薇根名三 枳實

杏仁

黃連各一兩 桂心半兩

栝藋根十八銖

右十味為末食前漿水服方寸匕日二

行方中諸藥主治人所易明惟大黃黃芪合用之旨

世所共麻蓋瘡之數發不已連年不瘥必有濕熱浸淫乎裏非大黃不能引領芥薔薇斂鼠李開泄

火毒於下非黃芪不能引領枯葛歸芍續斷填固

血氣於上脫或火毒雖下而血氣未固必至瘥而

復發所以急需黃芪以杜火毒復擾之害

千金方卷之

聖

乾燥生瘡脾家濕熱顯著於外又須伊尹三黃兼

芥枳栝藋以清胃熱桂心熱因熱用為三黃等藥

開導濕熱甘艸以和寒熱諸性杏仁薔薇口瘡之

本藥也

治口熱生瘡方

升麻三十銖 黃連十八銖 古

右二味為末綿裹含咽汁亦可去之

治口瘡方

黃蘗二兩 升麻三兩 生地黃五兩

薔薇根皮四兩

右四味咬咀以水七升煮取三升去滓含之渣止含極吐却更含

治口中瘡爛痛不得食方

甘艸一寸 黃連六銖 杏仁二十枚

右三味為末合和綿裹杏仁大含之勿咽日三夜

升麻散火黃連祛濕專主中上二焦燥渴引飲之

病用綿裹合咽緩在浮外客熱不用湯液蕩滌於

裏反戕臟腑正氣但燥不渴知熱在下焦血分

陰火不能勝水故但取升麻散火不用黃連燥濕

千金方卷之

聖

而易黃蘗專治陰火生地黃專滋陰血薔薇根除

風祛濕為口瘡之專藥若口中瘡爛明是脾家

濕火恐成蝕瘡故用黃連燥濕清熱甘艸解毒和

中杏仁下氣散結預防蝕蝕之患

薔薇根 治口中瘡身體有熱氣痲癩方

黃芩 鼠李根

當歸 葛根 白薇

黃蘗 石龍芮翼作黃連 芍藥

續斷 黃芪各兩 栝藋根二兩

右十二味為末蜜和丸如梧子服十九日三

口瘡而見身熱癩明係陽明濕熱漸瀆經脈肉
理非湯藥吹點可以疾祛故用薤李葛根栝蒌為
口瘡根本之治莖芍歸續調其營衛芍藥斂內兼
清中外之毒其石龍芮即木堇之子性善流走能
利關節通濕痺在和營藥中蜜丸深得毒藥緩用
之與

又方

梔子

甘艸各十
八銖

細辛三十
銖

桂心十二銖

芎藭一兩

右五味為末蜜丸食後服七丸日再服瘥

千金方衍義卷五

瘡

又方

芎藭

白芷

橘皮

桂心

棗肉各一兩半

右五味為末蜜和丸食後服十五丸又含之以瘥
為度此方甚驗

口瘡而用桂心芎藭導虛火和營血崇本之治難

為俗陳其細辛專散浮熱梔子專散泄虛陽甘艸
調和寒熱諸性也 其後方同用芎桂而兼白芷

專散風熱橘皮專泄氣滯棗肉專和胃氣益用白
芷散風即細辛散熱之意用橘皮泄氣即梔子泄

火之意用棗肉和胃即 甘艸和藥之意以意逆之
前方必為多火者設後 方必為多痰者設可不詳
審立方之義歟

治口吻生瘡方

以楸白皮及濕貼之三四度瘥

又方

取經年葵根欲腐者 彌佳燒作灰及熱傅之良

又方

取新炊飯了甑及熟 以脣口向甑脣上熨之二

七下三兩上瘥止

千金方衍義卷五

瘡

治口肥瘡方

熬竈上飯令焦末傅之

治燕吻瘡方

白楊枯枝鐵上燒取瀟及熟傅之

衍 燒松柏瀟皆治頭面熱瘡白楊枯枝瀟兼主風熱

瘡毒

治口傍惡瘡方

亂髮灰 故絮灰 黃連末

乾薑末

右四味等分合和為散以粉瘡上不過三遍即愈

衍見前小兒雜病門

治口中瘡咽喉塞不利口燥膏方

猪膏 白蜜 各一 黃連 兩

右三味合煎去滓攪令相得含如半棗大日四五

夜二

衍猪膏蜂蜜滋血潤燥不得黃連無以祛散濕熱也

治熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏方

當歸 射干 升麻 各一

附子 半兩 白蜜 四兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下著地勿

千金方衍義卷十一

聖 掃梁山房

令大熱內諸藥微火煎令附子黃色藥成絞去滓

內蜜復上火一兩沸令相得置器中令凝取如杏

仁大含之日四五遍輒咽之

衍方以升麻散火當歸和血射干散咽喉結氣附子

導元逆虛陽脂蜜清咽潤燥并和射干附子之烈

也

治失欠頰車蹉開張不合方

一人以手指牽其頰以漸推之則復入矣推常

疾出其指恐誤嚙傷人指也

治失欠頰車蹉方

消蠟和水傅之善

衍先用手法以正頰車後消蠟水以傅頰頰取至淡

以解蘊熱也

又方

灸背第五椎一日二七壯滿三日才差灸氣衝

二百壯胸前喉下甲骨中是亦名氣堂

又方

灸足內踝上三寸宛宛中或三寸五分百壯三

報此三陰交穴也

治卒口噤不開方

千金方衍義卷十一

聖 掃梁山房

以附子搗末納管中強開口吹口中

衍病起卒暴定屬陰邪苟非辛熱無以開之然亦有

火極似水之假象不可不審詳係火毒又必寒熱

兼濟方為合法若單用苦寒則火遏閉不散矣

甘艸圓 治口中熱乾方

甘艸 人參 半夏

生薑 烏梅 肉各一 棗膏 兩

右六味為末蜜丸如彈子大旋含咽日三

衍口中熱乾與虛勞肺熱大異既乾且熱明係脾家

津液固結不能灌注於上故用人參甘艸滋益肺

胃半夏生薑流濕潤燥烏梅棗膏輸化精微也

治口乾方

羊脂若猪脂雞子大擘之納半升酢中漬一宿絞取汁含之

治口乾除熱下氣方

石膏五合 蜜二升

右二味以水三升煮石膏取二升內蜜煮取二升去滓含如棗核大咽汁盡更含之

治虛勞口乾方

麥門冬二兩 大棗肉三十枚

右二味以蜜一升和令熟五升米下蒸之任性服

又方

羊脂如雞子大醇酒半升棗七枚擘合漬七日

取棗食之

又方

酸棗一升 酸石榴子各五合 烏梅各五合

栝蒌實 葛根 甘草各三兩

麥門冬四兩 覆盆子三合

右八味為末以蜜丸含如棗大以潤為度

因津液耗散口乾則用醋漬羊脂絞含 因肺胃

容熱口乾則用石膏蜂蜜煮含 因虛勞口乾則

用麥冬大棗蜜和米蒸任服 因虛勞津液不充

口乾則用酒漬羊脂製棗取食 因虛勞津液耗散口乾則用酸棗栝蒌子烏梅收斂津液栝蒌實開

宣痰氣煨葛根敷布胃津炙甘草輸運水穀之精

微麥門冬滋益肺腎之氣化覆盆子補益五臟之

精氣總取酸收不使津液耗散而灌漑有常烏有口乾之患乎

五香圓 治口及身臭令香止煩散氣方

豆蔻 丁香 藿香

零陵香 青木香 白芷 桂心各一兩 香附子二兩 甘松香

當歸各兩 檳榔二枚

右十一味為末蜜和丸常含一九如大豆許咽汁

日三夜一亦可常含咽之五日口香十日遍體香

二七日衣被香三七日下風人間香四七日洗手

水落地香五七日把他手亦香慎五辛下氣去臭

穢身口俱臭濁穢之氣過絕滯虛之遺故使胸中煩

擾口氣不清周身毫孔俱沾汗濕不潔之氣是必

辛香調暢其氣使上徹口鼻外徹周身其得力尤

在板榔一味以與穢濁之出路也

含香圓 治口氣臭穢宜常服之方

丁香半兩

甘艸三兩

芎藭一兩

細辛

桂心各一兩半

右五味為末蜜丸如彈子大臨臥時服二九

又方

桂心

甘艸

細辛

橘皮

右四味等分治下飾以酒服一錢七瘥止

又方

千金要方卷之五

辛

棗肉八兩

芎藭

白芷

橘皮

桂心各四兩

右五味為末次納棗肉乾則加蜜和丸如大豆許

且服十九食前食後常含之或吞之十日大香

治口中臭方

桂心古今錄驗 甘艸各等

右二味為末臨臥以指撮許酒服二十日即香

又方

細辛豆蔻含之甚良

又方

蜀椒

桂心各等分

右二味為末酒服三指撮許

止口香去臭方

甘艸三兩

白芷十八

川芎二十

右三味治下飾以酒服方寸七日三服三十日口

香

又方

大棗

瓜子仁

松根白皮

右三味治下飾以酒服方寸七日二服一百日衣

被香

千金要方卷之五

辛

又方

瓜子仁

芎藭

藁木

當歸

杜蘅各六

細辛半兩

防風二兩

右七味治下飾食後飲服方寸七日三服五日口

香十日身香二十日肉香三十日衣被香五十日

遠聞香 二方加白芷十八銖

又方

濃煮細辛汁含之久乃吐之

又方

香蒿一把水一斗煎取三升稍含之

又方

橘皮二十枚 桂心十八分 木蘭皮二兩

大棗二十枚

右四味治下篩酒服方寸七日三久服身香亦可

以棗肉丸之服二十九如梧子大稍加至三十九

一方有芍藥十八銖

又方

甜瓜子仁末蜜和丸如棗核大每日空心洗漱

訖含一丸亦傳齒

千金方卷之五

聖

精製山房

又方

熬大豆令焦及熟酢添取汁含之

治七孔臭氣皆令香方

沉香五兩 藜本二兩 白皮瓣半升

丁香五合 甘艸 當歸

芎藭 麝香各二兩

右八味為末蜜丸如小豆大食後服五丸日三久

服令舉身皆香

從本之治

惟用香蒿辟除水道瓜仁開豁痰垢為從本之治

後人師之有效其餘治七孔臭氣薰衣諸法皆非

療疾所需姑存以俟修答者採用

治身體臭令香方

甘子皮 白芷各一兩半 瓜子仁二兩

藜本 當歸 細辛

桂心各一兩

右七味治下篩酒服方寸七日三服五日口香二

七日身香

又方

甘艸 松根皮 大棗

千金方卷之五

聖

精製山房

甜瓜子各等分

右四味治下篩食後服方寸七日三七日知百日

大香

薰衣香方

零陵香 丁香 青桂皮

青木香 雞骨煎香 鬱金香

楓香各三兩 薰陸香 蘇合香

甘松香 甲香各二兩 沉香五兩

雀頭香 白檀香 安息香

艾納香 藿香各二兩 真麝香

右十八味爲末蜜二升半煮肥棗四十枚令爛熟
以手痛搗令爛如粥以生布絞去滓用和香乾濕
如捺麪搗五百杵成丸密封七日乃用之以微火
燒之以盆水內籠下以殺火氣不爾必有焦氣也
又方

沉香

煎香

各五兩

雀頭香

丁子香

藿香

各一兩

右五味治下飾內麝香末半兩粗羅臨薰衣時密
和用

又方

薰陸香

沉香

檀香

兜婁婆香

煎香

甘松香

零陵香

藿香

各一兩

丁香十八
各一兩

棗肉

苜蓿香

二兩

右十一味粗下篩合棗肉再搗量加蜜丸用之
濕香方

沉香

甘松香

檀香

雀頭香

雞骨煎香

甲香

零陵香

丁香

各三兩

麝香二兩
九銖

薰陸香

三兩
六銖

右十味爲末臨用時以蜜和若預和味歇不中用
又方

沉香

三兩

零陵香

煎香

麝香

各一兩
半

丁子香

藿香

各半兩

甲香

一兩

檀香

各三銖

薰陸香

甘松香

六銖

右十味粗下篩蜜和用薰衣瓶盛埋之久膏佳
百和香通道俗用者方

沉香

五兩

丁子香

雞骨香

兜婁婆香

甲香

各三兩

薰陸香

白檀香

熟捷香

炭末

各三兩

青桂皮

零陵香

青木香

白漸香

柴也

藿香

各一兩

甘松香

白漸香

蘇合香

安息香

雀頭香

蘇合香

燕香

各半兩

麝香

右二十味爲末酒漬軟再宿酒氣歇以白蜜和內
磁器中蠟紙封勿令氣洩冬月開取用大佳
裏衣香方

丁子香

一兩

苜蓿香

二兩

甘松香

零陵香

丁香

各三兩

藿香

零陵香

各四兩

茅香

各三兩

藿香

零陵香

各四兩

右六味各搗加漂蘭葉四兩粗下篩用之極美

又方

零陵香 二兩

藿香

苜蓿香

甘松香

白檀香

煎香

沉水香 各一兩

右七味合搗加麝香半兩粗下篩用如前法

又方

藿香 四兩

丁香

甘松香

麝香

沉香

煎香

右六味粗下篩和為乾香取裏衣大佳

千金方卷之十一

聖

補藥山房

舌病第四方十一首

升麻煎 舌主心臟熱即應舌生瘡裂破引唇揭

赤服之洩熱方

蜀升麻

射干 各三兩

柏葉 切一升

大青 二兩

苦竹葉 切

地黃汁 各五兩

生元參汁 二合

赤蜜 八兩

生蘆根

薔薇根 白皮 各五兩

右十味咬咀以水四升煮取一升去滓下元參汁

合兩沸次下地黃汁兩沸次下蜜煎取一片七合

綿惹取汁安舌上含細細咽之

治舌上脆不得食舌本強強兩通痛此是心虛熱

所致之方

柴胡

升麻

芍藥

梔子仁

連艸 各二兩

葉苓

大青

杏仁 各一兩半

生薑

石膏 各四兩

右十味咬咀以水一斗九升煮取三升半分四服

日三夜一滓可重煎服之

舌乃心之苗包絡侮於君主則生瘡破裂其來也

漸若龍雷亢逆則脹大滿口其發最暴但緩從下

千金方卷之十一

聖

補藥山房

治暴須從治亦有包絡兼挾龍雷者則於緩急微

甚之間隨其逆順多少而為處裁如此方用升麻

升散射干破結柏葉大青等味涼血解熱惟蓄被

根除風解毒為口舌專藥 第二方因頸兩邊俱

痛故以柴胡兼升麻提挈清陽杏仁下氣解毒與

用射干之意不殊生薑為奪門健卒引領石膏大

青葢直達底裏可無捍格不入之患矣

治舌下腫滿口溢出如吹猪胞氣息不得通須臾

不治殺人方

急以指刮破舌兩邊去汁即愈亦可以鉞刀決

兩邊破以瘡膏傅之

又方

刺舌下兩邊大脈血出勿使刺著舌下中央脈
血出不止殺人如上治不愈或血出數升則燒
鐵篋令赤熨瘡數週以絕血也

義衍

舌腫脹滿口如吹猪胞乃龍雷亢極卒然而發藥
所不及非急為決被難以救療 又刺舌兩邊去
血以泄其毒則與前法無異如刺後腫仍不減血
出不止則燒鐵篋烙刺瘡上亦救急法中之法
又方

本草綱目

卷之

十一

半夏十二枚洗熟以酢一升煮取八合稍稍含
漱之吐出加生薑一兩佳

治舌腫起如猪胞方

釜下墨末以酢厚傅舌上下脫去更傅須臾即

消若先決出血汁竟傅之彌佳凡此患人皆不

識或錯治益困殺人甚急但看其舌下自有紫

蟲形狀或如螻蛄或如臥蠶子細看之有頭尾

其頭少白燒鐵釘烙頭上使熱即自消

義衍

金匱苦酒湯治少陰病咽中傷生瘡不能語言聲
不出故以雞子殼內半夏苦酒和雞子清煮取合

咽干金借此以治舌卒腫滿口溢山與咽無預故

不用雞子清但取半夏辛溫開通陰氣之閉塞苦

酒酸寒收斂陰津之浮散更加生薑則毒無餘蘊

矣 又取金墨醋傅以散陰火暴逆同氣相招之

妙用無逾於此在決破後用之尤為應手又須視

舌下有蟲形者急為烙之陰毒最暴不急下手變

證叵測況錯治乎

治舌腫強滿口方

滿口含糖酢少許時熱通即止

治舌腫滿口不得語方

鹽一升

廉蟲三十枚

右二味以水三升煮三沸含之稍稍咽之日三

治舌強不得語方

礬石

桂心

右二味等分為末安舌下立瘥

舌上黑有數孔大如筋出血如湧泉此心臟病治

之方

戎鹽

黃芩一作

黃蘗

大黃各二

人參

桂心

甘艸各二

兩

右七味為末蜜九梧子大以飲服十九日三亦燒

鐵篋烙之

治舌上出血如泉方

燒鐵篋熱烙孔中良

行舌雖腫硬滿口而不似猪胞其勢較前稍緩但取

糖醋含漱探吐頑涎熱毒便可宣通矣 舌腫滿

口不得語而用鹽蘆方下雖無病因察其舌心微

紫故可驗為血證無疑 舌強不得語而用礬桂

方下亦無病因察其舌色必淡故以礬垢散結為

務也 舌孔出血如湧泉心包與龍雷之勢交煽

千金方衍義卷下十 李 掃葉山房

非三黃不能奪其亢逆非戎鹽不能滋其真陰非

桂心不能攝其虛陽非人參甘艸不能實其中土

以杜陰火復擾之患藥所不及又須熱烙血孔與

刺後血不止舌下有蟲形烙法無異總取同氣相

感之力耳

唇病第五 方二十二首 灸法下首

潤脾膏 治脾熱唇焦枯無潤方

生天門冬 切 生地黃汁升 生麥門冬

歲梨 各四兩 猪膏 三斤 細辛

甘艸 芎藭 白木 各二兩

黃芪 升麻 各三兩

右十一味咬咀諸藥苦酒淹一宿綿裹藥臨煎下

生地黃汁與猪膏其煎取膏鳴水氣盡去滓取細

細合之

行方中二冬歲梨地黃猪膏以滋血氣之燥升麻細

辛以散經氣之熱白木黃芪以固肌氣之鬆甘艸

以和諸藥之性苦酒以收諸氣之散也

甲煎唇脂 治唇裂口臭方

先以麻搗泥泥兩口好磁瓶容一斗已上各厚

半寸曬令乾

千金方衍義卷下十 李 掃葉山房

甘松香 五兩 艾納香 苜蓿香

茅香 各一兩 藿香 三兩 零陵香 四兩

右六味先以酒一升水五升相和作湯洗香令淨

切碎又以酒水各一升漬一宿明旦取烏麻油一

斗五升上六味內其中微火煎三上三下去滓內

上件一口瓶中令少許不滿然後取

上沉香 三斤 雀頭香 蘇合香 各八兩

白膠香 白檀香 各五兩 丁香

麝香 甲香 各一兩

右八味先酒水相和作湯洗香令淨各別搗碎不

用絕細以蜜二升酒一升和香內上件磁瓶中令實滿以綿裹瓶口又以竹篾交橫約之勿令香出先掘地理上件油瓶令口與地平以香瓶合覆油瓶上令兩口相當以麻搗泥泥兩瓶口際令牢密可厚半寸許用糠壅瓶上厚五寸燒之火欲盡即加糠三日三夜勿令火絕計糠十二石訖停三日令冷出之別研蠟八斤煮數沸內紫艸十二兩煎數十沸取一莖紫艸向爪甲上研看紫艸骨白出之又以綿濾過與煎相和令調乃內硃砂粉六兩攪令相得少冷未凝之間傾置竹筒中筒上用紙裹纏之待凝冷解開任意用之計此可得五十挺

甲煎口脂 治唇白無血色及口臭方
燒香澤法

沉香 甲香 丁香

麝香 檀香 蘇合香

薰陸香 零陵香 白膠香

藿香 甘松香 澤蘭

右十二味各六兩胡麻五升先煎油令熟乃下白膠香藿香甘松澤蘭少時下火綿濾內磁瓶中餘

八種香搗作末以蜜和勿過濕內著一小磁瓶中令滿以綿幕口竹十字絡之以小瓶覆大瓶上兩口相合密泥泥之乃掘地理油瓶令口與地平乃聚乾牛糞燒之一方用糠火燒之七日七夜不須急滿十二日火尤佳待冷出之即盛其瓶並須熟泥勻厚一寸曬乾乃可用

鍊蠟合甲煎法

紫艸 各二兩

右先鍊蠟令消乃內紫艸煮少時候看以紫艸向指甲上研之紫艸心白即出之下蠟勿令凝即傾湧一合甲煎於蠟中均攪灌筒中勿觸動候冷凝乃取之便成好口脂也 傅口面日三

治紫唇方

經白布作大燈炷如指安斧刃上燃炷令刃汗出拭取傅唇上日二三度或故青布亦佳并加

瀋屑

又方

自死螻蛄灰傅之

又方

炙松脂貼上取瘡

又方

取蛇皮拭淨燒為灰傅之

又方

以火炙蠟貼唇取瘡

又方

水服蟾蠩灰良

又方

青布灰以酒服之脂和塗亦可

又方

灸虎口男左女右

千金方卷之三

畜

攝業山房

又方

灸承漿三壯

治藩唇方

以乾蟾蠩燒末和猪脂臨臥傅之

又方

燒鱉甲及頭令烟盡為末傅之日三度

治唇生瘡方

以頭垢傅之日三度

又方

以胡粉傅之

治唇邊生瘡連年不瘳方

以八月藍葉十斤絞取汁洗不週三日即瘳

治唇口忽生瘡方

燒雞屎白為末以布裹著病上含之

治唇黑腫痛癢不可忍方

以竹弓彈出惡血取瘳

又方

燒亂髮及蜂房六畜毛作灰猪脂和傅之亦治

藩唇

治冬月唇乾坼血出方

千金方卷之三

畜

攝業山房

搗桃仁以猪脂和傅之

治遠行唇口面皴裂方

熟煎猪脂將行夜常取傅面行走萬里野宿不

損

衍 甲煎諸方咸取香鼠無益於治也惟鍊蠟合甲煎

方取蠟之淡以化熱紫艸之酥以滋血唇脂方中

首推簡要藥也他如鐵汗松脂蛇蛻蜜蠟糟蟲

布灰隨便可以取用鱉甲頭垢胡粉藍葉雞屎白

灰並治唇瘡髮灰蜂房桃仁猪脂皆治唇黑腫癢

能散惡血熱煎猪膏常取傅面取其不沽塵垢所

謂醫者意也豈可拘於繩墨哉

孫真人千金方衍義卷六上終

千金方衍義卷六

卷六

掃葉山房

孫真人千金方衍義卷六下

長洲隱士著

南沙隱士校

七竅病方下 凡四類

齒病第六 論一首 方三十六首

論曰凡齒斷宜露多是疳蠶及月蝕以角蒿灰夜傅
齒間使滿勿食油不過二三夜寢食油及乾棗即發
所以患齒者忌油乾棗及桂心每旦以一捻鹽內口
中以溫水合指齒及叩齒百遍為之不絕不過五日
口齒即牢密凡人齒斷不能食果菜者皆由齒根露
也為此鹽湯指齒叩齒法無不愈也補良凡人好患
齒病多由月蝕夜食飲之所致也識者深宜慎之所
以日月蝕未平時特忌飲食小兒亦然

治齲齒及蟲痛方

白附子 知母 細辛 各六

芎藭 高良薑 各十 二銖

右五味為末以綿裹少許著齒上有汁吐出一日
兩度含之亦治口氣

衍齒為骨之餘屬腎而實陽明所司齒斷動搖固為
腎病疳蝕齲齒豈非濕熱為患乎所云以角蒿灰

夜傳專主蟲蝕 標病角蒿即青蒿中一種生莖者

但世罕採用詳 青蒿灰淋汁和石灰可以點惡瘡

息肉并可借治 齒斷蟲蝕可知又云每旦以鹽揩

齒此則專主少 陰不特入骨固脫兼能清理濕熱

標本兼該之治 也此方首推白附溫散陽明風毒

細辛入骨按風 芎藭散頭腦風良薑溫散結熱四

味辛溫藥中專 取印母之甘寒直入少陰引領蘊

積熱邪悉從之 而解散矣

又方

切白馬懸蹄如米許以綿裹著痛處孔不過三

寸

二

度善

白馬蹄本經主 蠱毒不祥別錄主內崩齩齒千金

治齩齒蟲痛總 取公蠱散血之功也

治齩齒蟲積年 不瘥從少至老方

雀麥艸一名杜 姥艸似牛毛艸以苦瓠葉四十

枚淨洗露一宿 平旦取艸屈長二寸廣一寸厚

五分以瓠葉裹 傅之作五六十裹子取三年臘

醋浸之至日中 取兩裹內火中炮令極熱內口

中齒外邊熨之 冷則易之取銅器以水內中解

裹於水中洗之 得蟲長三分老者黃赤色少者

白色多者得三 四十枚少者得一二十枚

雀麥蓬肝瓠葉 殺蟲浸以醋醋專收蟲匿

治蟲齒方

良若子三合如 無葱子韭子並得以青錢七文

燒合赤取小口 嬰子令可口含得者將錢內嬰

子中取一撮許 莖若子安錢上令炮炆聲仍與

半合許水淋令 氣上從嬰出將口含嬰口令氣

莫出用熏齒冷 復更作取三合藥盡為劑非止

蟲齒得瘥或風 齒齩齒齒中病悉主之口中多

津即吐之

千金衍義卷下

三

又方

白楊葉切一升 水三升煮取一升含之

又方

大醋一升煮枸 杞根白皮一升取半升含之蟲

立出

又方

取桃仁少許以 釵頭穿向燈上燒之烟出經少

時吹滅即內入 口安蟲齒上咬之不過五六度

一方作胡桃仁

本經以莖若為 齒痛出蟲專藥千金重法最良其

慈子辛溫達竅韭子辛熱壯火皆取濁惡之氣以攻濁惡疔蝕也 白楊葉殺蟲散血卽水楊葉煮漱亦良 枸杞根疏利濕熱得醋煮以收濕辟蟲不似黃芩慈韭子有攻毒傷齒之患 桃仁力能破血妙用尤在炮香氣 竄投蟲所喜與胡桃仁同

治疔蝕蝕齒根方

地龍置石上著一撮鹽須臾化為水以麩展取却待凝厚取以內病上又以皂莢去皮塗上蟲卽出

千金方衍義卷下

補藥山房

又方

純麻子燭燼研以井花水塗之

又方

黑殺羊脂萹荂各等分先燒鐵鋤斧銜令赤內其中烟出以布單覆令烟氣入口熏之

衍義

其濕熱腫癰矣又須皂莢之去風痺死肌何懼蟲

毒不化耶 麻仁去風 燭燼散火乃以井水化其

火毒 殺羊角入山燒之辟惡鬼虎狼亦能殺疥

其脂之開結透經并荂荂子以殺蟲化毒乃燒鐵

置二物熏之與前燒錢置醫灸荂荂子熏法無異 治齒齲腫痛及蟲痛方

黃芩 甘艸 桂心

當歸 細辛 蛇床子各一兩

右六味咬咀以醋漿水七升煮取三升去滓含之日三夜二

日三夜二

治齒有孔不得食面腫方

莽艸 猪椒附根皮長四寸者七枚

右二味咬咀以漿水三升煮取一升滿口含倦卽吐却日二三度

千金方衍義卷下

補藥山房

治齒根腫方

松葉一把 鹽一合

右二味以酒三升煮取一升含之

衍義

痛腫渾是濕熱故用黃芩清火甘艸解熱桂心引

入患所以爲濕熱嚮導當歸和血細辛按風蛇床

除風頭痛本經之主治也六味藥中除黃芩甘艸

餘皆辛散故用醋漿水煎深得散中寓斂之妙

莽艸猪椒根皮皆治毒風疼痛腫之峻藥此准藜蘆

氣實者宜之 松葉去風散濕得鹽以製其燥得酒以鼓其力也

治齒根動欲脫落方

生地黄綿裹著齒上咋之又咬咀以汁漬齒根
日四五度著之并咽汁十日內大佳

治齒根動且痛方

生地黄

獨活各三兩

右二味咬咀以水一升漬一宿取含之

衍義齒根動搖皆屬腎虛挾火動而不痛尤為腎虛之

驗非生地黄之甘寒不能清熱固脫也 若動搖

且痛且腫必是腎虛風襲乃於生地黄中兼獨活

以揆之與細辛功用不殊也

十方衍義卷六

治齒斷間津津血出不止方

生竹茹二兩醋煮含之

又方

細辛 二兩

甘艸 一兩

右二味咬咀以醋二升煎取一升日夜旋含之

又方

礬石一兩燒水三升煮取一升先拭血乃含之

已後不用朽人牙根齒落不用之可也

治齒間血出方

以苦竹葉濃煮與鹽少許寒溫得所含之冷即

吐

又方

溫童子小便半升取三合含之其血即止也

治齒出血不止方

刮生竹皮二兩苦酒浸之令其人解衣坐使人

含暖其背上三過仍取竹茹濃煮汁勿與鹽適

寒溫含漱之竟日為度

治酒醉牙齒湧血出方

當歸 二兩

礬石 六銖

桂心

細辛

甘艸各一兩

十方衍義卷六

七

右五味咬咀以漿水五升煮取三升含之日五六

夜三

又方

燒鐵釘令赤注血孔中止

衍義血從齒斷津津而出明係陽明虛熱故用竹茹專

清淨火兼取醋煮酸以收之病本在經但取含漱

不須煎服 若前法不應應是風熱為患審其人

必有鼻塞面赤之證又當與細辛搜風甘艸和胃

用醋煎含其血自止 若涌脫無度不得已用礬

湯劫之但瀆酸透骨朽人牙根不可常試 如勢

不大劇則於竹葉 中入鹽以降泄之 童子小便乘熱合漱卽竹葉湯中用鹽之意 竹皮醋浸而三啜其背使人毛孔凜然其血卽止非傷寒病在陽應以汗解反以水啜之比啜後仍令合漱浮火既斂所以不用鹹降也 酒醉後齒斷血涌濕熱勢盛卽於前治齒斷腫痛及蟲痛方中除去黃芩蛇床易入礬石亦是涌脫勢劇不獲已而用之 倘舍不卽應乃燒鐵釘烙血孔中又劫法中之劫法

千金方衍義卷六下

歸葉山房

川椒 一合

莽艸 十葉

雀李根

獨活 各二兩

細辛

芎藭

防風 各一兩

右七味咬咀以酒二升半煮取五沸去滓含之冷吐更含之勿咽汁張文仲有白木二兩

又方

雞屎白燒灰以綿裹置齒痛上咬之

又方

雞屎白以醋煮漬稍稍含之

又方

煮枸杞汁含之

又方

生地黃 一節

蒜 一瓣

右二味熟搗綿裹著痛上咬之勿咽汁出吐之日爲之瘥止

又方

含驢尿須臾卽止

口齒之患非有風寒客邪何至痛不可忍所以方前昭揭頭面風三字而用一派搜風之藥獨不用醋而用酒煮含漱也 其雞屎白燒灰不獨下氣

亦能去風雞屬巽而走肝也 醋煮雞屎白尤斂風熱枸杞煮汁含漱能去風熱以非蟲齒故不用醋 生地黃甘寒帶苦 專散血中之熱得蒜之辛

蒸氣烈通達諸竅以祛濁惡之滯同氣相入之用也 驢屎穢濁利竅殺蟲 與前方用蒜同意 驢屎

千金方衍義卷六下

歸葉山房

雞屎白皆利水治脹豈特齒痛之用哉

治風齒疼痛方

灸外踝上高骨前交脈三壯又以線量手中指

至掌後橫文折爲四分量橫文後當臂中灸二

壯愈灸之當隨左右

含漱湯 治齒痛方

獨活

當歸

各三兩

黃芩

細辛

芍藥

藜蘆

丁香一兩

右七味咬咀以水五升煮取二升半去滓含漱須

臾悶出吐更含之古今錄驗同 有甘艸二兩

又方

含白馬尿隨左右含之不過三五日

前齒病多屬暴寒鬱遏濕熱故用芍藥細辛丁香藜蘆

芫獨活當歸從治之劑但以黃芩一味為寒因熱

用之間謀慎勿過用以取實實之咎 白馬尿破

結殺蟲與驢尿同功

漱湯 治齒痛方

腐棘刺二百枚以水二升煮一升旋旋含之日

四五度以瘥止

又方

芍藥

細辛

防風

礬石

附子

藜蘆

莽艸

右七味各等分作末綿裹如彈丸大酒浸安所患

處含勿咽日三刺破極佳

又方

蚯蚓糞水和作稠泥團以火燒令極赤如粉以

臘月猪膏和傅齒斷上日二三度永瘥

又方

取自死蚯蚓乾者搗末著痛處即止

衍棘刺之銳以利竅與皂角刺之解毒義同治異取

其陳腐以除陳久之氣也 其芍辛防風藜蘆莽

草總攻風毒礬石滌除垢膩尚恐不迫乃以附子

雄悍之力助之刺破極佳者破則熱毒得以外泄

矣

治齒斷痛不可食生果方

生地黃 桂心

右二味合嚼令味相得嚼之

又方

馬齒莧一把嚼之即瘥

治牙癰塞口噤不開方

附子大者一枚 黃連十八銖 礬石一兩

右三味為末內管中強開日吹之入喉間細細吹

之

兼濟標本兼該之治故宜服之可無毒藥傷中之虞
馬齒莧散血消腫 附子與黃連並用即地黃桂心之變法乃加礬石以滌痰垢然但吹不服
深得喉藥緩攻之旨

喉病第七 證一首 方四十首 灸法法二首

小續命湯加杏仁一兩治卒喉痺不得語 方見第十

卷諸 風門

小續命開發風痰喉痺不得語亦由風痰阻滯開

竅不通所致故於本方加入杏仁一兩本經專主

千金方衍義卷卒 三 楊山房

喉痺下氣氣下則痰自降痺自開聲自出矣

烏翼膏 喉嚨者脾胃之候若藏熱喉則腫塞神

氣不通服之方

生烏翼 十兩 升麻 三兩 羚羊角

通艸 芍藥各二 薔薇根切一

生地黃 切五 豬脂二斤 艾葉六銖生

右九味咬咀綿裹苦酒一升淹浸一宿內豬脂中

微火煎取酒盡膏不鳴為度去滓薄綿裹膏似大

杏仁內喉中細細吞之

烏翼即射干苦寒有毒本經專主喉痺咽痛升麻

升散結氣羚羊弛筋散風通艸通行經絡芍藥和
血通痺薔薇根除風解毒生地黃滋陰化熱生艾
辛溫散結豬脂潤膈利咽苦酒收斂咽瘡端不出
南陽苦酒湯成法

治喉腫痛風毒衝心胸方

豉 一升 犀角 射干

杏仁 各二 芍藥 三兩

梔子 七枚 升麻 四兩 羚羊角 一兩

右九味咬咀以水九升煮取三升去滓內豉煮一

沸分三服

千金方衍義卷卒 五 楊山房

風毒而用射干升麻羚羊芍藥即前烏翼膏中之

半射干之攻解風毒可謂峻矣猶恐其力不逮更

濟之以杏仁香豉辟除惡毒犀角梔子專治火逆

甘艸欬留諸味於膈上不使藥力易散也

治喉腫胸脇支滿方

灸尺澤百壯

治風毒咽水不得下及瘰癧腫方

升麻 芍藥 各一 射干

杏仁 楓香 葛根

麻黃 各三 甘艸 二兩

右八味咬咀以水八升煮取二升半分三服

又方

以水服葇荑子末兩錢七神良

衍入味藥中惟楓香脂專疏肺氣芍藥收斂營血餘

皆開發風熱之用觀前烏髮膏及治風毒衝心筋

二方例推自明 又取葇荑之走而不守專攻風

毒用水服之以解在上標熱也

治喉痺方

荆瀝稍稍咽之效

又方

千金方衍義卷下

燒牛角末酒服之良

又方

臘月猪尾燒末水服之

又方

含雞屎白良

又方

熬杏仁合黑合或末服之

又方

巴豆去皮鐵線穿咽入牽出

又方

馬蘭子半升水二升煮服一升半服之

又方

煮桃皮汁三升服之

又方

燒荆汁服之又水三升煮荆一握取一升分三

服

又方

刺手小指爪文中出三大豆許血逐左右刺皆

須慎酒麪毒物

衍荆瀝專開經絡痰涎力倍竹瀝 牛屬坤土其角

千金方衍義卷下

專行陽明燔之能散積血 猪為水獸尾動屬風

取臘月者專治少陰風毒也 雞屎白下氣散腫

不特治喉喉痺亦得用之取穢惡之氣以攻穢惡

之毒也 杏仁橫散泄肺熬黑則泄氣下滯從陷

胸中悟出 巴豆性烈破結故能引毒外泄然僅

可施之藜藿若膏梁柔脆之質未許輕試也 馬

簡入陽明血分有破宿生新之功服漱無不宜之

桃皮功專和血有辟邪解毒之用 燒荆汁服

其力稍遜於瀝然無寒滑傷中之虞元氣瘠薄者

宜之

治喉痺及毒氣方

桔梗二兩水三升煮取一升頓服之

又方

附子一枚破作大片蜜塗炙令黃含咽汁含盡

更塗炙如前法

又方

生薑二斤搗取汁蜜五合微火煎相和服一合

日五

又方

刺大蒜塞耳鼻日二易

千金方衍義卷下

七

攝藥山房

喉痺多屬於火然證有陰陽真假治分逆順緩急

若不為辨晰差之毫釐相背千里詳仲景執傳少

陰例二三日咽痛有桔梗湯方與甘艸同用此恐

甘艸性緩不能治歎忽之患故單用一味以取專

功若少陰病虛陽暴逆咽痛則當用後蜜炙附子

又非桔梗可以藥治也 蜜炙附子含咽略借辛

溫氣味以通其陽而化假熱以非真陽本虛故無

取於峻溫況得蜜製深得甘緩從治之義 薑汁

和蜜煎服取其辛甘以散虛火之逆 蒜塞耳鼻

雖係外治亦是熱因熱用從治散結之法

治喉痺卒不得語方

濃煎桂汁服一升亦可末桂著舌下漸咽之良

又方

煮大豆汁含之無豆用豉亦佳

又方

以酒五合和人乳汁半升分二服

又方

燒炊單作灰二指撮水服之

又方

芥子末水和傅之乾則易

千金方衍義卷下

七

攝藥山房

又方

商陸苦酒熬令濃熟傅之

又方

末桂心如棗核大綿裹著舌下須臾破

桂味辛甘達竅善走廉泉開通喉痺最捷若用苦

寒則轉閉塞不通矣 大豆汁不獨解毒兼能療

風但性緩不能治龍雷之暴逆 人乳和酒服專

滋咽喉乾燥卒不得語當非閉塞腫痛之比 煨

單受氣最多燒灰服之取蒸發津液於上也 芥

子辛散豁痰 商陸利水達竅以毒攻毒外別處

宜 桂末著舌下重補綿裹之法有所引動則穿

破毒泄矣

治喉卒腫不下食方

以韭一把搗熬傅之冷則易

又方

含上好醋口舌有瘡亦生

衍

之可法者

治懸癰乘熱暴腫長方

乾薑半夏等分末以少小著舌上

千金方衍義卷中

大

醫藥山房

又方

鹽末以筋頭張口挂之日五

治懸癰咽中生息肉舌腫方

羊蹄艸煮口含之

又方

鹽鼓和塗之良

又方

取四五歲小兒尿合鹽含之

衍

懸癰暴腫龍火使然陰邪必用從治故用薑半之辛以散之 鹽醃筋頭點之鹹能更堅降火也

羊蹄根汁取其散腫 鹽鼓和塗取其化熱 童

子小便取其降火

凡喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺治之方

馬嚼一具水二升煮取一升分三服

又方

鹽中蒼耳三七枚燒末水服之

又方

馬鞭艸根一握勿用水截去 兩頭搗取汁服之

良

又方

千金方衍義卷中

大

醫藥山房

燒穀奴灰酒服之立破

衍 喉痺數吐氣如馬擺鼻者風氣襲於血脈也

馬性祛風故靈樞馬膏專治中風口僻此用馬口

時時啣嚼之鐵以鎖攝風毒也 蒼耳散巔頂之

風取鹽中陳久者燒灰以治在上陳久之風氣

馬鞭艸專散咽喉風毒血 結穀奴灰專瀉胃中

不正之氣也

母薑酒 咽門者肝膽之候若膿熱咽門則塞而

氣閉若腑寒咽門則破而聲嘶此證宜服之乃

效

母薑汁二升

酥

牛髓

油各一

桂心

秦椒各一

防風一兩

芎藭

獨活各一兩

右九味為末內薑汁中煎取相淹滿下髓酥油等

合調微火三上三下煎平旦溫清酒一升下三合

膏即細細吞之日三夜一

又方

丹參

升麻

雄黃

杏仁

梔口

甘艸

射干各一

麝香半兩

千金方衍義卷下

主

右八味為末蜜丸如梧子飲下一丸加至五九日

三酒服亦佳咽痛失聲不利用之良

肝為將軍之官肝盛則龍雷上逆而咽閉氣閉膈

為清淨之府膈虛則痰涎內迫而咽燥聲嘶雖有

臟腑之分上熱下寒則一肝為陰藏縱屬燥邪法

無直折之理故用薑桂椒芎以導陰火防風獨活

以散風熱牛髓酒酥專滋血氣之傷也 又方專

主寒涎沃膽故用射干梔口雄黃麝香開痰利竅

杏仁升麻升清降濁丹參甘艸和血安中其旨全

在咽痛失聲與母薑酒各司其任

治咽傷語聲不徹方

酒

酥各一

乾薑二兩

通艸

桂心

石菖蒲各二

右六味合和服一七日三

又方

酒

酥各

乾薑十兩

右三味以酒二合酥一七薑末二七相和服日三

食後服亦治肺痛

治啞塞咳嗽方

桂心六銖

杏仁十八

千金方衍義卷下

主

右二味為末蜜丸如杏仁大含之細細咽汁日夜

勿絕

此因咽傷而致語聲不徹故用薑桂之辛溫以行

血脈之滯菖蒲通艸以通氣道之阻酥酒以滋津

液之傷也 其傷之不甚者僅取酥酒乾薑以和

肺氣之結痛不須菖蒲桂通艸通調氣之阻礙也

若咳嗽聲啞是必誤藥所致又須桂心杏仁和

血利氣以挽寒涼傷肺之失

治咽痛逆氣不能食方

麻子一升熬合黑以酒一升淋取汁空心一服

一升漸至二升多汗好復勿觸風冷此方兼連
產婦及丈夫中風如角弓反張口噤不開大驗

與紫湯氣力同

衍義咽因火氣上逆而痛故用麻子清潤肺胃之津液

則咽痛自寧出納無礙矣况熬黑酒淋能作汗散

火與大豆紫湯無異角弓反張亦得療之

治卒咽痛方

懸木鈎燒末水服方寸七日三

又方

燒炊筆一枚漿水服方寸七

千金衍義卷六

圭

備藥山房

衍義咽痛起於倉卒明是風火為患因取懸鈎燒末水

服以降火消痰并解酒濕之毒 燒炊筆漿水調

服取其酸收較前方水服差勝

治卒風咽腫面腫方

杏仁末和雞子黃更搗傅上乾復易之七八度

若腫汁出煮醋和伏龍肝傅乾更易之

治口咽方

燒麻子脂服之良

衍義杏仁消腫雞子黃清熱傅腫硬最良若腫莢汁出

又宜醋和伏龍肝末傅之取溫和之氣以收濕熱

之毒也 咽痛燒麻子脂服即前麻子熬黑酒淋
之變法

治咽喉不利下氣方

射干

杏仁

人參

附子

桂心各一兩

右五味為末蜜丸如指大含一丸稍稍咽之令藥
味相接

衍義咽喉不利多屬真陰虧少不能收攝虛陽而浮擾

於上非藉附子之力不能導之歸源前治喉痺毒

氣用蜜炙附子含咽此同杏仁射干散毒下氣人

千金衍義卷六

圭

備藥山房

參桂心助力散堅核之前法緩急霄壤

治咽喉中痛癢吐之不出咽之不入似得蠱毒方

含生薑五十日

衍義咽喉忽痛忽癢定屬虛火無疑若係實火則驟發

腫痛而無稍寧之時矣生薑辛溫專散虛火但虛

證難期速應故以五十日為期

又方

青布裏麻黃燒以竹筒盛煙熏 咽中

衍義風寒客邪久襲於經而化火毒故用麻黃燒烟熏

法既散客邪兼泄火毒也

耳病第八方五十四首

治腎熱背急擊痛耳膿血出或生肉塞之不聞人

聲方

磁石

白木

牡蠣各五兩

甘艸一兩

葱白

生地黃汁各一升

芍藥四兩

大棗十五枚

牛麥門冬六兩

石九味咬咀以水九升煮取三升分三服

衍義腎開竅於耳腎熱則風生於下風生則激於上

欲治腎熱先須鎮攝真精所以首推磁石木經專

主耳聾佐以牡蠣兼地黃門冬則滋益精氣芍藥

收斂營血白木甘艸杜風實脾葱白散邪通陽大

棗助諸經補身中不足也

治腎熱面黑目白腎氣內傷耳鳴吼聞短氣四肢

疼痛腰背相引小便黃赤方

白木

五兩

生薑

六兩

元參

四兩

澤瀉

二兩

淡竹

切切一升

芍藥

茯苓

各三兩

羊腎

如食法

生地黃切一升

右九味咬咀以水二斗煮羊腎竹葉取水一斗去

滓澄之下藥煮取三升分三服不已日三更服一

副

衍義前方治腎熱生風此治腎虛生熱蓋面黑明係陽

明土衰目白明係少陰水虧故用白木專培土衰

羊腎專培水虧白木性滯苓澤佐之羊腎性溫地

芍滋之元參淡竹葉專清腎熱生薑專散諸藥之

滯也

治腎熱耳膿血出流日夜不止方

鯉魚腦

一枚

鯉魚腸

一具洗細切

鯉魚頭土一枚

烏麻子熬令香一升

右四味先搗麻子碎次用餘藥搗為一家內器中

微火熬暖布裏薄耳得兩食頃開之有白蟲出更

作藥若兩耳並膿出用此為一劑以薄兩耳若止

一耳分藥為兩劑不過三薄便瘥慎風冷

衍義腎熱耳溜膿血明是濕熱憑凌於上與多年久聾

截然兩途鯉魚腦髓本經專主卒聾一腦不足以

濟其用更加腸肥以通頭腦經絡濕熱水氣諸治

也其烏麻子即胡麻子專補腦髓堅筋骨協濟鯉

魚腦髓以清少陰水濕之邪守真所謂鯉之治水

驚之利水因其相感而用之也

治腎虛寒腰脊苦痛陰陽微弱耳鳴焦枯方

生地黃汁二升

羊腎一具

白木

麥麩各一斤 甘艸 乾薑

地骨皮各八兩 桂心 杜仲

黃芪各四兩 當歸 五味子各二兩

白蜜 生天門冬汁各三升

右十四味為末內盆中取前三物汁和研微火上

暖盆取熱更研日曬乾常研合離盆酒服方寸七

日再

衍義此以腎虛而見耳鳴焦枯等證方中僅用薑桂二

味辛溫救本反兼地黃天冬清潤治標之藥過於

辛溫救本之味者以其有鳴響火動之擾焦枯水

虧之見又不得以治標為事也其用麥麩者取其

消運滯氣耳

治聾鳴汁出皆由腎寒或一二十年不瘥之方

柘根三十斤 菖蒲切五斗各用水一石

故鐵浸三宿去鐵渣清

右三味合一石五斗用米二石并麩二斗醱如常

法酒熟一月封頭開清用磁石喻鐵者三斤搗為

末內酒中浸三宿飲之日夜飲之常飲取小醉而

眠取聞人語乃止藥

又方

服天門冬酒百日瘥方見十四卷

又方 礬石少許以生菖蒲根汁和點入耳中

衍義柘根能通腎氣故聖惠方治耳鳴耳聾藏器煮汁

讓酒主風虛耳聾勞損虛羸腰腎冷千金兼菖蒲

故鐵釀酒漬磁石末服之輒效治聾諸方無如此

之妙應也 又天門冬酒清金降火益水上源下

通腎氣而聾自愈矣 礬石辟除垢膩合菖蒲汁

以通利關竅也

治勞聾氣聾風聾虛聾毒聾久聾耳鳴方

山茱萸 乾薑 巴戟天

芍藥 澤瀉 桂心

兔絲子 黃芪 乾地黃

遠志 蛇牀子 石斛

當歸 細辛 旋覆

牡丹 人參 甘艸

附子 茯苓各二兩 菖蒲一兩

羊腎一枚 防風一兩

右二十三味為末蜜丸如梧子食後服十五丸日

三加至二十四九止皆緣腎虛耳故作補腎方又

又方

作薄利九竅藥卽瘥

衍義諸竅總不出腎虛而為濕熱痰火所襲故專濕補利竅則諸竅悉宜其防風一味昔人所謂烏在高巖惟射以取之也

治耳聾方

巴豆

杏仁各七枚

印成鹽兩顆

生地黃極粗者長一寸半

頭髮燐子大燒灰

右五味治下飾以綿薄裹內耳中一日一夜若小損卽去之直以物塞耳耳中黃水及膿出漸漸有效不得更著不著一宿後更內一日一夜還去之

千金方衍義卷六

未
歸藥山房

依前

又方

草麻子五合

杏仁

菖蒲

磁石

桃仁

石鹽

通艸各二分

巴豆一分

附子二分

薰陸香

松脂各十分

蠟八兩

右十二味先搗艸石令細別研諸仁如脂內松脂蠟合搗數千杵令可丸乃止以如棗核大綿裹塞耳一日四五度出之轉捻不過三四日易之

又方

磁石四兩

天門冬

地骨皮

生薑各三兩

山茱萸

土瓜根

牡荊子

茯苓

菖蒲

芎藭

枳實

白芷

橘皮

甘艸各二兩

竹瀝二升

右十五味咬咀以水八升煮減半內瀝煮取二升五合分三服五日一劑三者乃著散內耳中如後方

又方

磁石四兩

石菖蒲

白斂

牡丹

山茱萸

牛膝

土瓜根各二兩

右七味治下飾綿裹塞耳日一易之仍服大三五七散佳方見十三卷

又方

蠟

松脂

薰陸香

草麻

石鹽

亂髮灰

右六味等分爲末作丸綿裹塞耳中時易之瘥止

又方

巴豆十四枚

成錄松脂兩

右二味合治九如黍米大綿裹以著頭著耳中日
一易藥如硬微火炙之以汁出乃愈大效

又方

防風

菖蒲

細辛

附子

芎藭

雄鯉魚腦一枚

右六味咬咀以魚腦合煎三上三下以膏香為末

瀟去滓冷以一棗核灌耳中以綿塞之右今錄驗用療風聾

久耳中鳴者以當歸代芎藭防風以白芷代

又方

竹筒盛鯉魚腦炊飯處蒸之冷焯注於耳中

千金方衍義卷下

攝生山房

又方

菖蒲

附子

右二味等分為末以麻油和以綿裹內耳中廣濟方以

療耳卒痛欲死者惟氏以苦酒和塞耳

又方

燒鐵合赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一

易夜去之且別著

又方

草麻一百顆

大棗十五枚

右二味熟搗丸如杏仁大內耳中二十日即瘥

又方

芥子搗碎以男兒乳和綿裹內之

又方

取柴胡苗汁灌耳中再度瘥

又方

作一坑可容二升許著炭火其中坑似窰形以

磚覆口上塽上作一孔子容小指塽孔上著地

黃一升以木盆覆之以泥泥盆下勿洩盆底上

鑽一小孔可容箸其孔上著三重布以耳孔當

盆上薰久若悶去黃水髮裏鹽寒之不過二三

千金方衍義卷下

攝生山房

度神効

又方

搗鼓作餅填耳內以地黃長五六分削一頭令

尖內耳中與鼓餅底齊餅上著楸葉葢之剉一

孔如筋頭透餅於上灸三壯

又方

作泥餅子厚薄如餛飩皮覆耳上四邊勿令泄

氣當耳孔上以艸刺泥餅穿作一小孔於上以

艾灸之百壯候耳中痛不可忍即止側耳傾却

黃水出盡即瘥當灸時若泥乾數易之

又方

截筒幹二寸內耳中以麩攤四畔勿令泄氣灸

筒上七壯

又方

酒三升壯荆子碎二升浸七日去滓任性服盡

雖三十年久聾亦瘥

又方

硫黃雄黃各等分爲末綿裹內耳中數日聞人

語聲

又方

以綿裹蛇膏塞耳神良

又方

又方

淳酢微火煎附子一宿創令可入耳以綿裹塞

耳良

又方

礬石

當歸

菖菴

附子

石十二味薄切三升酢漬一宿以不中水雞膏九

甘州

細辛

白芷

皂莢

菖蒲

防風

烏賊骨

巴豆

合煎三上三下以巴豆色黃則膏成去滓內雄黃

末攪調取棗核大瀝耳中綿塞之日三易

又方

桂心

野葛

成煎雞肪

右三味咬咀於銅器中微火煎三沸去滓密貯勿

泄以韋筒盛如棗核大火炙令少熱欲臥傾耳灌

之如此十日聾自出大如指長一寸久聾不遇

三十日以髮裹膏深塞莫使泄氣五日乃出之

翼云治二

十年耳聾

治耳聾乾聾不可出方

搗白死白項斯蚘安葱葉中用麩封頭蒸令熱

並化爲水以汁滴入耳中滿卽止不過數度卽

挑易出瘡後髮裏鹽塞之

又方

取酢三年者灌之最良次用綿塞半日許必有

物出

巴豆辛烈開通閉塞杏仁橫散下氣泄滯石鹽醎

降滋益腎水地黃甘寒逐血迴痺髮灰補陰去竅

惡血專賴巴豆引入以開通閉塞之閉塞也

又方以草麻仁爲君專力拔邪外出能出有形之滯

物氣味與巴豆相類其相開竅之功黃陸治鼻松

脂收濕兼杏仁膏蒲通艸輩搗和綿裏塞耳較前

方藥品雖繁簡不同而功力不殊也 又方以磁

石收攝陰虛龍火上炎耳鳴嘈嘈為主而兼益腎

清火豁痰開竅分解風熱諸味服之以除內積并

用後磁石等七味外治之法仍服大三五七散佳

取其辛溫達竅以濟前方先清火而繼之以溫補

也 其後塞注諸方或用草麻或用巴豆或用附

子或用鯉魚腦及燒鐵投酒飲并以磁石塞耳等

方咸不出乎上法可以按證取用 芥子裏內耳

中專取溫散柴胡苗汁灌耳 中專通少陽 地黃

薰法專取煖氣以薰蒸地黃 散血之功 豉餅灸

法泥餅灸灸法及箭籛灸筒 法總取溫散通達之

義 酒浸牡荊實服之專治 耳聾以其能治風逐

濕祛痰解熱也 硫雄二黃 塞耳專取溫散 綿

裹蛇膏取其性竄善開風閉 加麝尤妙 醋煎附

子內耳散中寓斂且不令辛 烈之氣暴發 礬皂

巴豆取其辟穢菖蒲辛附取 其開竅芎歸烏賊取

其散血防風白芷取其去風 甘艸專和藥性醋漬

辟惡斂肝雞膏滋津化毒雄 黃專辟陰邪之閉

也 又以桂心利關竅野葛治惡風雞肪潤竅取

聾自出 白項蚯蚓入葱化汁取其竄穴之性而

解熱毒之閉也 陳醋滴耳專取辟惡利竅

赤膏 治耳聾齒痛方

桂心 大黃 白木

細辛 芎藭各一兩 乾薑 二兩

丹參 五兩 蜀椒 一升 巴豆 十枚

大附子 二枚

右十味咬咀以苦酒二升漬一宿內成煎猪肪三

斤火上煎三上三下藥成去滓可服可摩耳聾者

綿裹內耳中 齒冷痛則著齒間諸痛皆摩若中有

病以酒和服如聚許大咽喉痛取棗核大石之

耳聾多緣痰 濕閉遏齒痛良由寒菹熱邪故用桂

附椒薑以破少陰之結芎藭細辛以散腦戶之邪

白木丹參逐濕和營大黃巴豆一開熱結一破寒

結苦酒猪脂與前陳醋雞膏同意但雞走肝而猪

達腎稍有不同其潤竅之用則一可賜可摩可治

久聾可治齒痛蓋耳與齒總皆屬腎也

治卒耳聾方

細辛 菖蒲 杏仁

麴末各十

右四味和搗為丸乾即著少猪脂取如棗核大綿裹內耳中日一易小瘥二日一易夜去毘塞

治三十年久聾方

故鐵三十斤以水七斗浸三日取汁入麴釀米

七斗如常造酒法候熟取磁石一斤研末浸酒

中三日乃可飲取醉以綿裹磁石內耳中好覆

頭臥酒醒去磁石即瘥

治耳聾有膿散方

附子一兩

禹餘糧六銖

伏龍肝

千金方卷六下

美

掃葉山房

龍骨

釜底墨

烏賊骨各半

右六味為末取如皂莢子大綿裹內耳中日一易

取瘥不瘥者有蟲加麝香一豆大

治耳聾有膿不瘥有蟲方

酢三合

鯉魚腸一具

右二味和搗綿裹內耳中兩食頃當悶痛有白蟲

著藥去之更入新者蟲盡乃止其藥去盡還可用

又方

先以紙纏去耳中汁次以礬石末粉耳中次以

石鹽末粉其上食久乃起不過再度永瘥

又方

搗桂和鯉魚腦內耳中不過三四度瘥

義衍細辛菖蒲杏仁麴末草根木實雖能利竅其性本

輕僅可以治卒暴之聾 鐵磁釀酒塞耳金石之

品性味沉重力能鎮攝故可以治久聾固疾 其

田附子餘糧伏龍龍骨釜墨烏賊麝香專治虛陽

上泛恍惚致傷膿水淋漓之聾 醋與鯉魚腸專

治濕熱上盛厥腫有蟲疼癢之聾 礬石石鹽專

除濕熱浸淫之聾 桂末鯉魚腦專散虛火暴卒

之聾諸方分治虛實新久 天淵

千金方卷六下

美

掃葉山房

治耳鳴聾方

當歸

細辛

芎藭

防風

附子

白芷各六銖

右六味為末以鯉魚腦八兩合煎三上三下膏成

去滓取棗核大灌耳中旦以綿塞耳孔

義衍耳聾本屬腎虛然但虛無風火之擾何有鳴響之

患此方雖用細辛防風白芷風藥而其所主全在

鯉魚腦髓專達腦戶搜風芎藭滋養營血以化風

火附子峻溫骨髓以攝虛陽虛陽斂而鳴響自除

治耳鳴水入方

附子

礬石各一大

甘艸各二

通艸

細辛

桂心各十

菖蒲一兩

獨活一兩

右八味為末以白鵝脂半合稍稍和取如棗核大

綿裹內耳中日三旋旋和用一本用葱

水入耳鳴正氣內拒相搏而響故用生附桂心以

助真陽祛濕之力細辛獨活以達少陰濕滯之經

通艸菖蒲以通血脈阻塞之竅礬石以辟竅中所

著之濕甘艸以和方中諸藥之性白鵝脂專力疏

風而能涼利五臟與雞膏猪脂角立

金方衍義卷十

美

掃葉山房

治耳鳴如流水聲不治久成聾者方

掘生烏頭乘濕削如棗核大內耳中日一易不

過三日愈亦療癢及卒風聾病

烏頭性專接風勝濕而生者之性尤速癢亦虛風

所致故專取一味無藉他藥

治聾耳出膿汁方

礬石

赤石脂

黃連

烏賊骨

石四味各等分為末以綿裹如棗核大內耳中日

三小節不用赤石脂姚氏加

治聾耳痛膿血出方

取釜月下灰滿耳中日三次易換每換以篋二十

去之再著取瘥止

治聾耳方

取桃仁熟搗以舊緋絹裹內耳中日三易以瘥

為度

治底耳方

取黃礬燒綿裹內耳中不過二三日愈或以葦

管吹耳中腫後以瘥

礬石收濕黃連去熱烏賊散血石脂固斂與龍骨

金方衍義卷十

美

掃葉山房

同功 釜月下土溫燥收濕 桃仁溫潤散血礬

石酸澁辟垢也

治百齡入耳方

蜀椒末一握以酢半升調灌耳中行二十步即

出

又方

火熨桃葉捲之取塞耳立出

又方

取車轄脂傅耳孔蟲自出腫後以瘥

又方

以葱涕灌耳中蟲即出亦治耳聾

治蜈蚣入耳方

炙猪肉令香掩耳即出

治蜈蚣入耳方

炒胡麻研碎以葛袋盛傾耳枕之即出

又方

以牛酪灌之滿耳即出當半消若入腹中空

腹食好酪一二升即化為黃水而出不盡更服

用之神效千金翼作牛乳

治耳中有物不可出方

本草卷下

補藥山房

以弓弦從一頭令散傅好膠比耳中物上停之

令相著徐徐引出

衍義

椒醋辛酸性味俱竄諸蟲所畏 桃葉性專殺蟲

車譚脂走而不守泥有穢氣可以辟蟲 葱能利

竅涕最滑澤使蟲易出 炙肉誘蟲取其氣者投

其所好不獨猪肉炙雞尤為蜈蚣所喜 蜈蚣性

喜胡麻炒香以誘之也 牛酪性溫能消蜈蚣以

中有酥能更堅化物況此濕熱所化之類乎 一

切蟬蛻蠅蚋及引灌蟲死不能出者莫如弓弦或

麻繩剪斷離膠粘之最為便捷

面藥第九 方七十大首

五香散 治野炮壓點異運赤氣令人白光潤方

黃芪 白茯苓 萎蕤

杜若 大豆黃卷 商陸各二兩

白芷 當歸 白附子

冬瓜仁 杜蘅 白通草

辛夷仁 香附子 丁子香

蜀水花即鵝鴝尿 旋覆花 防風

木蘭 芎藭 藁本

皂莢 台膠 杏仁

本草卷下

補藥山房

天門冬 土瓜根 白朮

梅肉 酸漿 水萍各三兩

單豆四兩 猪胆二具 豬膽曬乾

右三十二味治下篩取洗面二七日白一年與眾

別

洗手面令白淨悅澤澡豆方

白豆麩一升 麩三升 猪胆二具

冬瓜仁四合 猪胆大者二具 白茯苓

白芷 白鮮皮 枯蘘子

白朮 白附子 白薇

兔絲子

土瓜根

羌活

萎蕤

桃仁

杏仁

商陸

芎藭各一兩

右十九味合搗篩入麴消脂拌勻更搗每日常用以漿水洗甚良

又方

畢豆麩

栝蘘實三兩一猪脬五具方下煎

土瓜根

白茯苓

萎蕤各五兩

皂莢三莢

右七味搗篩將猪脬拌和更搗令勻每日取洗手

千金方藥卷下

聖

婦科山房

面百日白淨

又方

白芷

白薇

白朮

桃仁

冬瓜仁

杏仁

萎蕤各等分

皂莢倍其數

右八味為末絹篩洗手面時即用

又方

畢豆麩三升大豆黃麩亦得

白芷

青木香

甘松香

零陵香

藿香各二兩

冬葵子一本作冬瓜子

精瑱仁兩兩

右八味搗篩用如常法

令人面白淨悅澤方

白薇

白朮

白附子

白芷各二兩

猪脬三具水漬去汁研爛

藜蘆三兩

右六味為末先以無菁子半升又酒水各半升相和煎數沸研如泥合諸藥內酒水中以磁器貯封

三日每夜取傅面且以漿水洗之

令人面潔白悅澤顏色紅潤方

猪脬五具

蕪菁子

二兩

栝蘘實五兩

千金方藥卷下

聖

婦科山房

桃仁三兩

右四味以酒和熟搗傅之慎風日

又方

採三株桃陰乾為末空

心飲服方寸七日三

細腰身

又方

酒漬桃花服之好顏色

治百病三月三日收

澡豆 治手乾燥少潤膩方

大豆黃五升

赤小豆

去皮

零陵香子

苜蓿各一升

冬瓜仁

辛香各六兩

丁香 五合 麝香 一兩 猪脬 五具

右九味細搗羅與猪脬相合和暖乾再搗歸取洗

千面

又方

大豆末 二升 猪脬 五具 葫蘆灰 一兩

甘松香 零陵香 白茯苓

藜木 白芷 各四兩 白商陸 五兩

右九味為末調和乾與猪脬相和更搗令勻欲用

稍稍取以洗手面八九月合冷處貯之三月以後

勿用神良

千金方衍義卷本

醫方 摘集山房

面脂 主悅澤人面耐老方

冬瓜仁 白芷 商陸

芎藭 各三兩 當歸 藜木

麝香 土瓜根 各皮 桃仁 各一兩

姜蕤 細辛 防風 各一兩

木蘭皮 辛夷 甘松香

麝香 白僵蠶 白附子

梔子花 零陵香 猪脬 各三具 切水

用時以酒接 取汁漬藥

右二十一味薄切綿裹以猪脬汁漬一宿辛日以

煎猪脂六升微火三上三下白芷色黃膏成去滓

人麝收於磁器中取塗面

又方 治面上皴黑凡 是面上疾皆主之方

丁香 零陵香 梔子花

桃仁 白薇 茯苓

土瓜根 兔絲子 防風

沉香 辛夷 當歸

麝香 藜木 商陸

芎藭 各三兩 姜蕤 一作 薑香 一本

白芷 甘松香 白僵蠶

千金方衍義卷本

醫方 摘集山房

木蘭皮 各二兩 蜀花水 青木香

冬瓜仁 各四兩 羊腎脂 鵝脂 各一兩

羊髓 一升 生猪脂 三升

右二十九味咬咀先以美酒五升掇猪脬六具取

汁漬藥一宿於猪脬中微火極煎三上三下白芷

色黃以綿一大兩生布中絞去滓入麝香末以白

木篋攪至凝乃止任性用之良

面膏 去風寒令人面光悅却老去皺方

青木香 白附子 白蠟

白芷 芎藭 零陵香

香附子各二 茯苓 甘松各

羊髓一升

右十味以明以酒水各半升漬藥經宿次日煎三

上三下候酒水盡膏成去滓取傅面如吐若有

黧皆落

玉屑面膏 治面無光 滲皮肉皺黑久用令人潔

白光潤方

干屑細研 土瓜根 白附子

商陸 芎藭 藜蘆

冬瓜仁 桃仁 白芷

手方術義卷下 聖 攝葉山房

木蘭 辛夷各一 兔絲子

青木香 藁本 當歸

黃芪 白殭蠶 藿香

細辛各十 麝香 防風

鷹屎白 蜀水花一合 猪脬各半

白大脂 鵝脂 熊脂各三具

猪肪脂各一

右二十八味先以水漬猪鵝犬熊脂數易水浸令

血脈盡乃可用咬咀猪藥清酒一斗浸一宿明日

生壁猪鵝等脂安藥中取銅鑪於炭上微煎至暮

時乃熟以綿濾置磁器中仍以練繫白芷片看色

黃即膏成其猪脂取浸藥酒接取汁安鑪中其玉

屑蜀水花鷹屎白麝香為末膏成安藥中攪令勻

旋取傅面

玉屑面脂方

玉屑 白附子 白茯苓

青木香 姜蘆 白朮

白殭蠶 蜜陀僧 甘松香

烏頭 商陸 石膏

黃芪 胡粉 芎藭

手方術義卷下 聖 攝葉山房

藁本 防風 芒硝

白檀各一 當歸 土瓜根

桃仁 芎藭各二 辛夷

桃花 白頭翁 零陵香

細辛 知母各半 猪脂一升

羊腎脂一具 白犬脂 鵝脂各一

右三十三味切以酒水各一升合漬一宿出之用

銅器微火煎令水氣盡候白芷色黃去滓停一宿

且以柳枝攪勻乃用之

又方 合黑者皆白老者皆少方

玉屑	寒水石	木蘭皮
旋覆花	珊瑚	丁香
土瓜根	蜀水花	白茯苓
芎藭	兔絲	辛夷仁
冬瓜仁	白頭翁	當歸
藁本	白殭蠶	青木香
蕪菁子	梔子花	細辛
萎蕤	商陸	白芷
防風	黃芪	桃仁
藿香	前胡	桂心
半夏	白礬	杏仁
蘼蕪	芒硝	杜衡
麝香	秦椒	礬石
秦皮	杜若	升麻
蜀椒	黃芩	白薇 <small>各六</small>
栝婁仁 <small>二兩</small>	熊脂	鵝脂
羊髓	牛髓	白狗脂 <small>五合</small>
鷹屎白 <small>一合</small>	猪肪脂	清酒 <small>各一</small>

右五十四味咬咀酒漬一宿內脂等合煎三上三下酒氣盡膏成絞去滓下麝香末攪至凝色變乃

止磁器密貯勿洩氣	鍊脂法	凡合面脂先須知鍊脂法以十二月買極肥大猪脂水漬七八日一易水煎取清脂投水中鍊鵝熊脂皆如此法	治外膏 主面黚黯方	白芷	白蠟 <small>各二</small>	白附子
犀角	辛夷	防風	烏頭	零陵香	藿香	萎蕤 <small>各半</small>
麝本	商陸	麝香 <small>各六</small>	犀角	犀角	犀角	犀角
麻油 <small>二合</small>	羊脂 <small>五合</small>	牛脂	犀角	犀角	犀角	犀角
鵝脂 <small>各一</small>	右十六味薄切醋漬浹經一宿且合煎候白芷色黃膏成以皂莢湯洗面傅之日三甚良	又方	雞子 <small>三枚</small>	胡粉 <small>細研</small>	丁香 <small>各一</small>	石硫黃
又方	右三味先以醋一升漬七日後取雞子白調香粉令勻以漿水洗面傅之	白礬	石硫黃	白附子 <small>各六</small>		

右三味爲末以酢一盞漬三日夜淨洗面傅之莫見風日慎三七日可白如雪

白面方

牡蠣 三兩

土瓜根 二兩

右二味爲末白蜜和取塗面卽如白玉且以溫漿

日洗之宜慎風日

猪蹄湯 洗手面令光潤方

猪蹄 一具

桑白皮

芎藭

菱蕤

白芷

白茯苓 各二兩

商陸 一作當歸

白朮 各二兩

千金方衍華纂卷下

辛

補藥山房

右八味咬咀以水三斗煎猪蹄及藥取一斗去滓

每溫一盞洗手面大佳

猪蹄漿 急面皮去老皺生光澤方

大猪蹄一具淨治如食法以水二升漬漿水一

升不滌釜中煮成膏用洗手面又以此藥和深

豆夜塗面且用漿水洗面卽愈

鹿角散 令百歲老人面如少年時生光潔潔白

方

鹿角 長一握

牛乳 三升

芎藭

細辛

天門冬

白芷

白朮

白薇

白附子

酥酪 各三兩

杏仁 五七枚

右十一味咬咀先以水漬鹿角一百日出之與諸

藥內牛乳中緩火煎令汁盡出角以白練袋盛餘

藥勿收至夜取牛乳石上磨鹿角取塗面且以漿

洗之無乳小便研亦得

治面黑不淨洗手面澡豆方

白豆屑 二升

白附子

甘松香

丁子香

白芷

白殭蠶

鷹屎白

白檀香

白朮

木香 一兩 莫本

芎藭

白鮮皮 各三兩

大棗

杏仁 各三枚

麝香 二兩

白梅肉 三七枚

麩 三升

冬瓜仁 五合

猪脬 三具

雞子白 七枚

土瓜根 本用半

瓜

右二十一味先以猪脬和麩曬乾然後合諸藥搗

末又以白豆屑二升爲散每旦用盥洗十日色白

如雪三十日如凝脂 神驗 千金翼無白蠟 蠶 芎藭 麩

義 修容諸方多用外傳如五香散中白附專除黑墨

皂莢專祛毒風水萍開湊發汗去風甚於皂莢

義

瓜仁悅澤顏色木蘭皮去面熱炮皴皰豆俗名皴

豆善去癩野今人誤認綠豆多謬用之蜀水花乃

鷓鴣屎滅癩與鷹屎白同功而悅澤顏色之功過

之雀雁善滌垢膩白梅能去惡肉二物皆練帛所

用其性可知其餘祛風逐濕和血調氣及芳香等

藥未遑悉陳他如鴉脂羊髓猪肪牛酥之類總取

潤澤之用不必拘執其方也

鉛丹散 治面黑令人面白如雪方

鉛丹 三十 真女苑 六十

右二味治下篩酒服一刀圭日三男十日女二十

千金方醫卷下

日知之則止黑色皆從大便出面白如雪

面黑屬腎故用鉛丹專祛腎氣滲外之滯女苑專

泄肺氣本經專主氣病肘後用酢漿水服十日大

便黑二十日面白便止過用則太傷元氣所

以三十歲不可服中年之後不必復修容色也

白楊皮散 治面黃手足黑合光澤潔白方

白楊皮 十八 方用 精皮

白瓜子仁 三十

右二味治下篩溫酒服方寸匕日二欲白加瓜子

欲赤加桃花三十日面白五十日手足俱白

治面黑生野炮方

白礬 十二 生礬石 救急 白石脂 六

杏仁 三

右四味研和雞子白夜臥塗面上且用井花水洗

之

治面野炮令人悅白方

恬菟子 六 白石脂 五 雀屎 二

麝香

右四味搗篩別研麝香雀屎白石脂和合取生兔

絲子汁和之如薄泥先用燥豆洗去面上垢膩次

以藥塗野上日夜三四度平旦溫漿水洗之

治野黯烏曆合面潔白方

馬珂 二 白附子 鷹屎白

珊瑚 各一

右四味研成粉和勻用乳調每夜取傅面明且

溫漿水洗之

馬珂白附鷹屎珊瑚皆滅癩專藥獨不用玉屑者

野黯皆血分之滯無暇及於氣分之藥也

去面上層子黑痣方

夜以溫漿水洗面以生布揩腦子令赤痛水研

白麵攪取濃汁塗臍子上且復以暖漿水洗之
次以麩屎白傳其上

洗面去野豨主悅白方

猪脰二具去脂 豆麪四升 冬瓜仁半升

皂莢五挺 細辛 白米各兩

防風 白藪 白芷各二兩

商陸三兩

右十味和土瓜根一兩搗絹羅取大猪蹄一具煮

令爛作汁和散為餅曬乾再搗為末羅取盥洗不

過一年悅白

千金方術義卷下

孟 搗藥山房

桃仁燥豆 主悅澤去野豨方

桃仁 蕪菁子一兩 畢豆麪二升

白米六合 土瓜根七合

右五味合和搗篩以酢漿水洗手面

桃花圓 治面黑野令人潔白光悅方

桃花二升 桂心 烏喙

甘艸各一兩

右四味為末白蜜九如大豆許每服十九日二服

十日易形 一方有白附子甜瓜子杏仁各二兩

為七味

桃花殺疰惡鬼令人好顏色桂心治結氣利關節

烏喙破積聚寒熱甘艸治五臟六腑寒熱邪氣皆

本經主治

洗面野豨內外兼治方

成鍊松脂為末溫酒服三合日三服盡三升無

不瘡

洗面野豨方

李子仁為末和雞子白傳一宿即落

又方

甘艸二兩末 白羊乳二升 羊脰二具小潰去汁細切

千金方術義卷下

孟 搗藥山房

右三味相和一宿先以酢漿洗面生布拭之夜傳

藥兩遍明且以猪蹄湯洗却每夜洗之

又方

白附子為末酒和傳之即落

又方

桂心 蜜 石鹽各等分

右三味為末相和傳之

又方

以上硃砂研細如粉和白蜜塗之且以酢漿洗

却大驗

又方

白附子

香附子

白檀

馬珂

紫檀各一兩

右五味為末白蜜如杏仁大陰乾臨用以水研塗面旦以溫水洗却忌風油七日面色如蓮花

又方

水和丹砂末服方寸七男七日女二七日色白如雪

治人面黧黯膚色粗陋皮厚狀醜方

殺羊脛骨為末以雞子白和傅之旦以白淨梁

米泔洗之三日白如雪

衍羊脛骨灰可消銅鐵而殺羊角走肝燒之能辟蠱毒與羚羊角相類其脛骨灰散血逐穢取雞子白和傅以去粗陋厚皮自然白淨

又方

白蜜和茯苓粉傅之七日愈

又方

杏仁酒浸皮脫搗碎絹袋盛夜取拭面

又方

酒浸雞子三枚蜜封四七日成傅面白如雪

又方

杏仁為末

雞子白

右二味相和夜塗面明旦以米泔洗之

治面多黧黯皮肉粗澇令人不老皆主之方

硫砂

雄黃各三兩

水銀霜半兩

上胡粉二兩

黃鷹糞一升

右五味並納研如粉以面脂和淨洗面夜塗之以手細摩令熱明旦不磨作壯然須五日一洗面一塗不過三遍所有惡物一切皆除數倍少嫩煖風日不傳神祕

治面黧黯令悅澤光白潤好及手皴方

猪蹄二具治如食法

白梁米一升洗令淨

右二味以水五斗合煎猪蹄爛取清汁三斗用煮

後藥

白茯苓

商陸各五兩

姜蕤三兩

白芷

葇本各二兩

右五味咬咀用煎藥汁三斗并研杏仁一升合煎取一斗五升去滓瓷瓶盛貯內甘松零陵香末各一兩入膏中攪令勻綿羅之每夜取塗手面
治面黧黯皮皴皴散方

白附子

蜜陀僧

牡蠣

茯苓

芎藭各二兩

右五味為末和以羊乳夜塗面以手摩之巨用漿

水洗不過五六度皮脫野瘡矣

洗面野黧方

沉香

牛黃

薰陸香

雌黃

鷹屎

丁香

玉屑各十銖

水銀六銖

右八味為細末蜜和以傅之

白瓜子圓 洗面野黧合色白方

白瓜子二兩

遠志

藥本

杜蘅

雲母粉

車前子

白芷

當歸各一兩

細辛

柏子仁

栝藂仁

橘皮

白石脂

鉛丹各半兩

天門冬三兩

右十五味為末蜜和九如梧子大空心服二十九

日三

行 義 鉛丹除熱下氣而鎮攝陰邪從大便出雲母粉治

身皮死肌白石脂斂固肺氣肺氣固則色白也白

瓜子即冬瓜仁令人悅澤顏色 杜蘅藥本細辛白

芷天冬栝藂佐之以菘在經風氣之滯乃內服正

治法也

治粉滓野黧方

白斂十二銖

白石脂六銖

石二味搗篩以雞子白和夜臥塗面巨用井花水

洗面

去粉滓野黧皴皴及茸毛令面悅澤光潤如十四

五時方

黃芪

白木

白斂

萎蕤

土瓜根

商陸

蜀水花

鷹屎白各一兩

防風半兩

白芷

細辛

青木香

白附子

芎藭

杏仁各二兩

右十五味為末以雞子白和作挺陰乾石上研取

漿水塗面夜用且以水洗之細絹羅如粉佳

洗面粉滓方

熬礬石以清酒和傅之不過三上

又方

鳩生兔絲苗汁塗不過三上

治年少氣盛面生疱瘡方

胡粉半兩 水銀一兩

右二味以臘月豬脂和熟研令水銀消向取以傳面且起布拭之慎勿水洗至暝又取傳面不過三上 一方有真珠

白膏 治瘡痂疥癬惡瘡方

附子十五枚 蜀椒一升 野葛五寸

右三味咬咀以酢漬一宿狗膏一斤煎令附子色黃去滓塗之日三上

治面瘡炮方

鸕鷀屎一升為末以臘月豬脂和令勻夜傅之

千金方卷下 平 楊葉山房

治面瘡方

木蘭皮一斤以三年酢漬令沒百日曬乾為末

溫酒服方寸七日三

治面炮方

淳酒二升 牛膽 殺羊膽各一具

右三味合煮三五沸傅之

又方

薺苳 肉桂各一兩

右二味為末以酢漿服方寸七日一服亦治野黯

及滅癩去黑痣

又方

冬葵子 柏子仁 冬瓜子

茯苓各等分

右四味為末酒服方寸七食後服日三治面瘡甚者

又方

生地黃三斤 枸杞根十根

右二味先搗枸杞根次搗地黃曬乾合歸空心酒服方寸七日三入服煎如童子此祕方也

梔子圓 治酒瘡鼻炮方

千金方卷下 平 楊葉山房

梔子仁

木蘭皮半斤 芎藭 大黃六兩 甘州各四兩

右六味為末蜜和丸如梧子初服十九日三稍加

至十五丸

木蘭皮芳香達皮腠本經治大熱在皮膚中去面

熱赤炮惡風顛疾陰下瘰濕明耳目婦人尤宜用

之 膽善滌垢淳酒以行二膽之性濕熱為患者

宜之 薺苳甘寒肉桂辛散以散皮膚中滯血

熱為患者宜之 冬葵子柏子仁冬瓜子白茯苓

酒服以治面炮津液不充皮膚不澤者宜之 生

地黃枸杞根酒服以滋其血 血燥皮枯五心煩熱者宜之 梔鼓大黃木蘭皮芍藥甘州丸服以滌肺胃之熱酒客濕熱素盛者宜之 其末後三方鼎峙不可辨

治鼻炮方

蒺藜子

梔子仁

豉各一升

木蘭皮牛斤一本無

右四味為末以酢漿水和如泥夜傅之日未出時暖水洗却亦主滅癩痕

治面上風毒方

千金方衍義卷三

玉屑

蜜陀僧

珊瑚各二兩

白附子三兩

右四味為末以酥和夜傅且洗之亦滅除癩痕

治面有熱毒惡瘡方

胡粉熬

黃蘗炙

黃連各等分

右三味為末取傅上瘡止若瘡乾以面脂調塗之

日三

衍義

蒺藜梔子香鼓木蘭皮專治皮膚風熱 玉屑密陀僧珊瑚白附子專治肝腎風毒 胡粉黃連黃蘗

藥專治陽明濕熱亦鼎峙三方

治滅癩痕方

猪脂三斤飼烏雞一隻三日令盡後取白尿內白芷當歸各一兩煎白芷色黃去滓內鷹屎白半兩攪調傅之日三

又方

禹餘糧半夏等分為末以雞子黃和先以新布拭癩處令赤後用藥傅之勿見風日二十日瘡十年者亦滅

又方

白附子 杜若 細辛各生兩 辛夷一兩 鷹屎白一合 石五味為末治取傅之亦滅癩痕

千金方衍義卷三

千金方

治癩痕凸出方

鷹屎白一兩 衣白魚二七枚

右二味為末蜜和以傅日三五度良

又方

鷹屎白二兩 白礬蠶一兩

右二味為末以白蜜和傅日三慎五辛生菜

又方

春夏以大麥麩秋冬以小麥麩好細絹下篩以

酥和封上

又方

臘月猪脂四升煎大鼠一枚令消盡以生布搽

拭癩處令赤塗之不過四五上

治身及面上比文方

鍼刺字上被以醋調赤土薄之乾又易以消滅
即止

孫真人千金方衍義卷六下

終

千金方衍義卷六下

杏

掃葉山房

孫真人千金方衍義卷七

長洲

南沙

玉著
客校

風毒脚氣方 凡五類

論風毒狀第一論十六首

論曰效諸經方往往有脚弱之論而古人少有此疾
自永嘉南渡衣纓士人多有遺者嶺表江東有支法
存仰道人等並留意經方偏善斯術晉朝仕望多獲
全濟莫不由此二公又宋齊之間有釋門深師師道
人述法存等諸家舊方為三十卷其脚弱一方僅百

千金方衍義卷七

掃葉山房

餘首魏周之代蓋無此病所以姚公集驗殊不慙慙
徐王撰錄未以為意特以三方鼎峙風教不一霜露
不均寒暑不等是以關西河北不識此疾自聖唐開
闢六合無外南極之地襟帶是重爪牙之寄作鎮於
彼不習水土往者皆遭近來中國士大夫雖不涉江
表亦有居然而患之者良由今代天下風氣混同物
類齊等所致之耳然此病發初得先從脚起因即脛
腫時人號為脚氣深師云脚弱者即其義也深師述
支法存所用永平山敷施連范祖耀黃素等諸脚弱
方凡八十餘條皆自精要然學者尋覽頗覺繁重正

是方集耳卒欲救急莫測指南今取其所經用灼然有效者以備倉卒餘者不復具述

論何以得之於脚

問曰風毒中人隨處皆得作病何偏著於脚也答曰夫入有五臟心肺二臟經絡所起在手十指肝腎與脾三臟經絡所起在足十指夫風毒之氣皆起於地地之寒暑風濕皆作蒸氣足常履之所以風毒之中人也必先中脚久而不蹙遍及四肢腹背頭項也微時不覺痼滯乃知經云次傳問傳是也

論得已便令人覺不

凡脚氣病皆由感風毒所致得此病多不令人即覺會因他病一度乃始發動或奄然大問經三兩日不起方乃覺之諸小庸醫皆不識此疾謾作餘病治之莫不盡斃故此病多不令人識也始起甚微食飲嬉戲氣力如故惟卒起脚屈弱不能動有此為異耳

黃帝云緩風濕痺是也

論風毒脚氣相貌

天有脚氣未覺異而頭項臂膊已有所苦有諸處皆悉未知而心腹五內已有所困又風毒之中人也或見食嘔吐增間食臭或有腹痛下痢或大小便秘澀不

千金方衍義卷七

王

歸漢山房

運或胸中衝悸不欲見光明或精神昏憤或喜迷忘言錯亂或壯熱頭痛或身體酷冷疼煩或覺轉筋或脈不腫或脛腿頑痺或時緩縱不隨或復百節掣急或小腹不仁此皆脚氣狀貌也亦云風毒脚氣之候也其候難知當須細意察之不爾必失其機要一朝病成難以理婦人亦爾又有婦人產後春夏取涼多中此毒深宜慎之其熱悶掣症驚悸心煩嘔吐氣上背其候也又但覺臍下冷痞幅幅然不快兼小便淋瀝不同生平即是脚氣之候頑弱名緩風疾痛為濕痺

論得之所由

凡四時之中皆不得久立久坐濕冷之地亦不得因酒醉汗出脫衣靴襪當風取涼皆令脚氣若暑月久坐久立濕地者則熱濕之氣蒸人經絡病發必熱四肢酸疼煩悶若寒月久坐久立濕冷地者則冷濕之氣上入經絡病發則四體酷冷轉筋若當風取涼得之者病發則皮肉頑痺諸處攣動漸漸向頭凡常之日忽然暴熱人皆不能忍得者當於此時必得頓取於寒以快意也卒有暴寒復不得受之皆生候病也世有勤功力學之士一心注意於事久坐行立於濕

千金方衍義卷七

王

歸漢山房

地不時動轉 冷風來擊入於經絡不覺成病故風毒
中人或先中 手足十指因汗毛孔開腠理疎通風如
急箭或先中 足心或先中足跌或先中膝已下膈脛
表裏者若欲 使人不成病者初覺即灸所覺處二三
十壯因此即 愈不復發也

黃帝云當風 取涼醉以入房能成此疾

論冷熱不同

問曰何故得 者有冷有熱答曰足有三陰三陽寒中
三陽所患必 冷暑中三陰所患必熱故有表裏冷熱
不同熱者治 以冷藥冷者療以熱藥以意消息之脾
受陽毒即熱 頑腎受陰濕即寒痺

千金方衍義卷七

附

掃葉山房

論因腳氣續生諸病

雖患腳氣不 妨乳石動發皆須服壓石藥療之夫因
患腳氣續生 諸病者則以諸藥對之或小便利則
以猪苓茯苓 及諸利小便藥治之大便秘堅者則以
五柔麻人丸 等治之遍體腫滿成水病者則取治水
方中諸治水 之藥治之餘皆做此更無拘忌

論須療緩急

凡小覺病候 有異即須大怖畏決意急治之勿緩氣
上入腹或腫 或不腫胸脇逆滿氣上肩息急者死不

旋踵竟者數日必死不可不急也但看心下急氣喘
不停或自汗數出或乍寒乍熱其脈促短而數嘔吐
不止者皆死

論虛實可服藥不可服藥

凡腳氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛
而殞故脚氣之人皆不得大補亦不可大瀉終不得
畏虛故預止湯不服也如此者皆死不治也

論看病問疾人

世間大有病人親朋故舊交遊來問疾其人曾不經
一事未讀一方自騁了了詐作明能談說異端或言
是虛或道是實或云是風或云是蠱或道是水或云
是痰紛紜謬說種種不同破壞病人心意不知孰是
遷延未定時不待人歎然致禍各自散走是故大須
好人及好名醫識病深淺探賾方書博覽古今是事
明解者看病不爾大誤人事竊悲其如此者眾故一
一顯析其進病之由狀令病者讀之以自防備也但
有一狀相應則須依方急治勿取外人言議自貽憂
悔但詳方意莫信他言以自誤也余嘗為人撰門冬
前門冬方見十二卷贈贈 此方治脚氣大有驗病者須用

千金方衍義卷七

五

掃葉山房

論脈候法

凡脚氣雖殊診候不異而三部之脈要須不違四時者為吉其逆四時者勿治餘如脈經所說此中不復具載其人本黑瘦者易治肥大肉厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白不耐風瘦人肉硬肥人肉軟肉軟則受疾至深難愈也

論腫不腫

凡人久患脚氣不自知別於後因有他疾發動治之得瘥後直患嘔吐而復脚弱余為診之乃告為脚氣病者曰某平生不患脚腫何因名為脚氣不肯服湯餘醫以為石發狐疑之間不過一旬而死故脚氣不得一向以腫為候亦有腫者有不腫者其以小腹頑痺不仁者脚多不腫小腹頑後不過三五日即令人嘔吐者名脚氣入心如此者死在旦夕凡患脚氣到心難治以其腎水尅心火故也

論須慎不慎

凡脚氣之病極須慎房室羊肉牛肉魚蒜蕪菜菘菜蔓菁瓠子酒麪酥油乳糜猪鷄鴨鴨有方用鯉魚頭此等並切禁不得犯之并忌大怒惟得食粳梁粟米薯苳葱韭薤椒薑藟皮又不得食諸生果子酸酢之

千金方卷七

六

精華山房

食犯者皆不可瘥又大宜生牛乳生啞子

論差能治者幾日可瘥

凡脚氣病枉死者眾略而言之有三種一覺之傷晚二驕狠恣傲三狐疑不決此三種正當枉死之也故世間誠無良醫雖有良醫而病人有性靈堪受入者更復少故雖有騏驥而不遇伯樂雖有尼父而人莫之師其為枉橫亦猶此也今有病者有受入性依法使余治之不逾十日可得永瘥矣若無受入性者亦不須為治縱令治之恐無瘥日也非但脚氣諸病皆然良藥善言觸目可致不可使人必服法為信者施不為疑者說

千金方卷七

七

精華山房

論灸法

凡脚氣初得脚弱便速灸之并服竹瀝湯灸訖可服八風散無不瘥者惟急速治之若人但灸而不能服散服散而不灸如此者半瘥半死雖得瘥者或至一二年復更發動覺得便依此法速灸之及服散者治十十愈此病輕者登時雖不即死治之不當根源不除久久期於殺人不可不精以為意

初灸風市

次灸伏兔

次灸犢鼻

次灸膝兩眼

次灸三里

次灸上廉

次灸下廉

次灸絕骨

凡灸八處第一風市穴可令病人起正身平立垂兩臂直下舒十指掩著兩髀便點當手中央指頭憚大筋上是灸之百壯多亦任人輕者不可減百壯重者乃至一處五六百壯勿令頓灸三報之佳第二伏兔穴令病人累夫端坐以病人手扶掩橫膝上下傍與曲膝頭齊上傍側夫際當中央是灸百壯亦可五十壯第三犢鼻穴在膝頭蓋骨上際外骨邊平處以手按之得節解則是一云在膝頭下近外三骨箕踵中動脚以手按之得窟解是灸之五十壯可至百壯第四膝眼穴在膝頭骨下兩傍陷者宛宛中是第五三里穴在膝頭骨節下一夫附脛骨外是一云在膝頭骨節下三寸人長短大小當以病人手夫度取灸之百壯第六上廉穴在上廉下一夫亦附脛骨外是灸之百壯第七下廉穴在上廉下一夫一云附脛骨外是灸之百壯第八絕骨穴在脚外踝上一夫一云同寸是凡此諸穴灸不必一頓灸盡數壯可日日報灸之三日之中灸令盡壯數為佳凡病一脚則灸一病兩脚則灸兩脚凡脚弱病皆多兩脚又一云云加覺脚惡便灸三里及絕骨各一處兩脚惡者合四處

千金方衍義卷七

八

掃葉山房

灸之多少隨病輕重大要雖輕不可減百壯不遲速

以次灸之多多益佳一說灸絕骨最要人有患此脚

弱不即治及少腹腹腫大上氣於是乃須大法灸隨

諸論及諸管關節解法並在第二十九卷中覺病入腹

瘥者諸管關節解法並在第二十九卷中覺病入腹

若病人不堪痛不能盡作大灸但灸胸心腹諸穴及

兩脚諸穴亦有得好瘥者凡量一夫之法覆手并舒

四指對度四指上中節上橫過為一夫夫有兩種有

三指為一夫者此脚弱灸以四指為一夫也亦有支

法存舊法梁邱犢鼻三里上廉下廉解谿太衝陽陵

千金方衍義卷七

九

掃葉山房

泉絕骨崑崙陰陵泉三陰交足太陰伏瀆然谷湧泉

承山束骨等此一十八穴舊法多灸百會風府五臟

六腑胸募頭來灸者悉覺引氣向上所以不取其法

氣不止者可用之其要病已成恐不救者悉須灸之

其足十趾去指奇一分兩足凡八穴曹氏乃曰八衝

極下氣有效其足十趾端名曰氣端日灸三壯並大

神效其八衝可日灸七壯氣下即止病者非深相委

悉慎勿為人灸之慎之凡灸八衝須小作艾炷

論服湯藥色目

風毒之氣入人體中脈有三品內外證候相似但脈

有異耳若脈浮大而緩宜服續命湯兩劑應瘥若風
 盛宜作越婢湯加白朮四兩若脈浮大緊轉駛宜作
 竹瀝湯若病人脈微而弱宜服風引湯此人脈多是
 四虛而得之若大虛短氣力乏可其間作補湯隨病
 冷熱而用之若未愈更服竹瀝湯若病人脈浮大而
 緊駛此是三品之中最惡脈也或沉細而駛者此脈
 正與浮大而緊者同是惡脈浮大者病在外沉細者
 病在內治亦不異當消息以意耳其形尚可而手脚
 未容至弱數日之中氣上即便愈終如此之脈往往
 有人得之無一存者急服竹瀝湯日服一劑切要湯

千金方衍義卷七

十一

掃葉山房

未能行輕加餘治未必金得益更生諸惡失此諸治
 也恨人邊亦勿行野葛膏有人聞竹瀝湯云恐傷要
 鄉者即勿與治宜知此法此皆人無受入性不可與
 醫故也不為疑者說此之謂也竹瀝湯有三首輕者
 服前方重者以次第服後方此風毒乃相注易病人
 宜將空缺服小金牙散以少許塗鼻孔耳門病人
 及新亾人喜易人強健人宜將服之亦以塗耳鼻乃
 可臨近亾人及親疾者絳囊帶一方寸七男左女右
 臂上此散毒服宜從少為始金牙散方在十四卷膽
 腑門病人惟宜飲赤小豆散冬服側子金牙酒續命
 湯治風毒病初得似時行毒病而脈浮緩終不變駛
 此不治或數日而死或得便不識人或發黃或發斑
 或目赤或下部穿爛者此最急得之即先服續命湯
 一劑須服葛根湯麻黃湯下之若此不折更與續命
 兩三劑必瘥此病大急常令湯勢相接不可使半日
 缺湯即便殺人續命湯方見
十卷諸風門

千金方衍義卷七

十一

掃葉山房

湯液第二

附裏脚方

第一竹瀝湯

治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹
 脹起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷方

竹瀝五升

甘艸

秦芫

葛根 黃芩 麻黃

防己 細辛 桂心

乾薑 茯苓 防風

升麻 附子 杏仁

右十五味咬咀以水七升合竹瀝煮取三升分三

服取汗十金翼方無茯苓 杏仁有白木一兩

第二大竹瀝湯 治卒中風口噤不能言四肢緩

縱偏痺攣急風經五臟恍惚志怒無常手足不

隨力

竹瀝 獨活 芍藥

千金方衍義卷七 婦科山房

防風 茵芋 甘艸

白朮 葛根 細辛

黃芩 芍藥 桂心

防己 人參 石膏

麻黃 生薑 茯苓

烏頭 一枚

右十九味咬咀以竹瀝煮取四升分六服先未汗

者取汗一狀相當即服

第三竹瀝湯 治風毒入人五內短氣心下煩熱

手足煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不能言

方 竹瀝 防風 茯苓

秦朮 當歸 黃芩

人參 芍藥 細辛

桂心 甘艸 升麻

麻黃 白朮 附子

蜀椒 葛根 生薑

右十八味咬咀以竹瀝煮取四升分五服初得病

即須摩膏日再痺定十金翼無麻黃蜀椒生薑

義衍 腳氣多由濕著於經是以首推竹瀝湯次第三方

成本南陽麻黃附子細辛湯而兼麻黃越婢及大

小續命等方之制以麻黃開衛附子行經細辛通

痺桂心走陰騰杏仁達陽維甘艸解毒和中乾薑

開痺逐濕防己專治腳氣防風并療賊風黃芩兼

除標熱升麻葛根開提於上秦朮茯苓降泄於下

竹瀝專化經絡四肢痰濕故於大續命中特採以

之名方為腳氣之首推 其第二方乃以烏頭代

附子生薑代乾薑蓋烏頭辛烈祛風之力迅於附

子生薑性暴開痰之功速於乾薑即二味之變通

又於古今錄驗續命方中採取人參石膏芍藥三

味以人參助麻黃烏頭力開痺著石膏佐黃芩
 瀝滌除旺氣越脾全方但少大棗一味并採小續
 命芍藥佐芎藭入血搜風復採金匱防已茯苓
 湯中茯苓佐桂心逐濕安中千金防已湯全在其
 中但不苦酒煎服更採倉公當歸湯中獨活專
 祛下部風濕且叅茵芋一味專通關節拘攣性味
 雖劣外臺千金恒用之惜乎近世藥肆罕得 其
 第三方即於第二方中除去獨活之風燥茵芋之
 毒劣防已之傷陰石膏之傷陽仍用第一方中附
 子以監麻黃之散升麻以載人參之功秦朮以助
 芎歸之力蜀椒以壯桂附開痺之勳也千金脚氣
 諸方獨得深師奧旨詳竹瀝湯三方首治方張用
 法貴專而擒縱須留餘地次臨堅壘非長驅戮力
 何以克敵重圍向後邪勢稍平即當驗其虛實擊
 其墮歸故無取於峻攻也三方次第可見一斑曷
 觀論中所云脚氣之病多由氣實而死終無一人
 服藥致虛而阻其方中用參成爲助力攻邪而設
 殊非補虛之謂若執迷藥性用方者請毋事此
 按風痺門中竹瀝湯較脚氣門中三方大同小變
 其風痺第一方較脚氣第一方少秦朮細辛乾薑

千金方卷第七

十四

掃葉山房

茯苓升麻多人參川芎芍藥羚羊石膏生薑較此
 第二方少獨活茵芋白朮細辛茯苓烏頭多附子
 羚羊較此第三方少茯苓秦朮當歸細辛升麻白
 朮蜀椒多防已芍藥羚羊杏仁石膏 風痺第二
 方藥止八味較脚氣第二方所少頗多獨多羚羊
 一味 風痺第三方較脚氣第三方少獨活芍藥
 石膏防已羚羊多秦朮當歸茯苓白朮細辛蜀椒
 再攻肝藏門中竹瀝湯熱湯及癰疽門中小竹
 瀝湯大都相類與脚氣門中第二大竹瀝湯尤爲
 相類其小竹瀝湯獨多射干根實其餘細微出入
 不服瑣述

千金方卷第七

十五

掃葉山房

麻黃湯 治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁
 失音不能言毒氣衝心有人病者但一病相當
 即服此第一服次服第二第三第四方
 麻黃 一兩 大棗 二十枚 茯苓 三兩
 杏仁 三十枚 防風 白朮
 當歸 升麻 川芎
 芍藥 黃芩 桂心
 麥冬 甘肅 各二兩
 右十四味咬咀以水九升清酒七升合煮取二升

半分四服日三夜一覆令小汗粉之莫令見風

第二服獨活湯方

獨活 四兩 乾地黄 三兩 生薑 五兩

葛根 桂心 甘草

麻黃 芍藥 各二兩

右八味咬咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服日三夜一脚弱特忌食麪子蕞菜犯之一世治不愈

第三服兼補厚朴湯 并治諸氣咳逆逆氣嘔吐

厚朴 川芎 桂心 當歸

乾地黄 芍藥 黃芪 甘草 各三兩

人參 各二兩 吳茱萸 二升 半夏 七兩 生薑 一斤

右十二味咬咀以水二斗煮猪蹄一具取汁一斗二升去上肥內清酒三升合煎取三升分四服相

去如人行二十里久

第四服風引獨活湯兼補方

獨活 四兩 茯苓 甘草 各三兩

升麻 一兩 人參 桂心

升麻 一兩 人參 桂心

升麻 一兩 人參 桂心

升麻 一兩 人參 桂心

防風 芍藥 當歸

黃芪 乾薑 附子 各二兩

大豆 二升

右十三味咬咀以水九升清酒三升合煮取三升半分四服相去如人行二十里久更進服

行前竹瀝湯三方專祛下焦筋骨之痺此麻黃湯等

四方專祛上攻血脈之痺故以芎歸芍藥苓防大

棗小續命中六味參入麻黃湯中以開血脈之邪

兼升麻載諸藥於上蒼木滲濕著於下麥門冬專

為失音而設 第二方獨活湯即於麻黃湯中除

去杏仁之散血易入芍地之和營更以獨活通痺

葛根開腠生薑辛散為通痺之宣使 第三方兼

補厚朴湯乃於金匱半夏厚朴湯中退蘇進桂合

四物保元兼調血氣故曰兼補因有嘔逆故加吳

茱萸用猪蹄汁和酒煮者取血肉之味引領諸藥

入胃也 第四方風引獨活湯專取獨活散膝脛

風痺黑大豆療風毒脚氣仍合保元溫助血氣兼

取真武湯中茯苓芍藥以制獨活附子之燥烈以

除經脈牽引之掣痛歸桂升防雖無麻杏逐厚之

力量亦是驅風活血之巨擘故千金以之為第一

列

防風湯 治脚痺并治毒氣上衝心胸嘔逆宿癖
積氣疝氣諸病相當即服之方

防風 麻黃 川芎

人參 芍藥 當歸

茯苓 半夏 甘艸

橘紅 各一 驚甲 生薑

桂心 各二 杏仁 赤小豆 一升

貝子 烏梅 大棗 二十

吳茱萸 五合 犀角 羚羊角 各半

雞白 十四 子考術美毛 大

右二十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服一
日令盡 一方用水一斗二升間食糜 一方半
夏二兩隨時用

防風湯方下主治脚痺毒氣衝心雖合桂枝麻黃
以犀角羚羊驚甲貝子解毒舒筋散血消堅之味
協濟桂枝麻黃之力參苓芎歸又協濟犀角羚羊
驚甲貝子之力也然痺濕外著必有痰氣內伏有
諸內形諸外是二陳薑半又不可缺其吳茱萸下

氣逆痺赤小豆利水泄熱蘼白滌除陳垢烏梅收
斂脾津各有所主至於防風一味乃卒伍卑賤之
職千金獨取名方者以本經主治惡風風行周身
骨節疼為治風之專藥先哲不以人廢言不以名
廢實其斯之謂歟

獨活湯 治脚痺方

獨活 四兩 當歸 防風

茯苓 芍藥 黃芪

葛根 人參 甘艸 各二

大豆 二升 附子 一枚 乾薑 三兩

右十二味咬咀以水一斗清酒二升合煮取三升
分三服

此與前風引獨活湯藥味相彷彿功用亦相彷彿用
升麻此用葛根二味總入陽明之經較之前方附
子減半而少桂心一味用方者須詳病勢淺深而
取用於彼此之間可也

越脾湯 治風痺脚弱方

麻黃 六兩 石膏 八兩 白朮 四兩

大附子 一枚 生薑 三兩 甘艸 二兩

大棗 十五

右七味咬咀以水七升先煮麻黃再沸掠去沫八
諸藥煮取三升分三服覆取汗胡洽方以五味若
惡風者加附子一
枚多痰水者
加白木四兩

衍義金匱越脾湯治濕伏於經故用麻黃發越在表之

濕石膏降泄在裏之熱一舉而兩解之加木則治
下焦脚弱以木能滲濕也然風毒脚氣濕壅最甚
非籍附子之大力無以開之今以木附子而兼越脾之製得此金
湯中即是近効白木附子而兼越脾之製得此金
錒何憚堅壘不克

治脚弱神驗方

千金方衍義卷七

辛

獨活山湯

防己

蜀椒

細辛

桂心

麻黃

石膏

獨活

防風

黃芩

茵芋

葛根

川芎

芍藥

甘艸名一兩

生薑

茯苓各三兩

烏頭二枚

右十七味咬咀以竹瀝一斗煮取四升分六服令
一日一夜服盡其間可常作赤小豆飲有人脚弱
先服常用竹瀝湯四劑未覺增損作此方後覺得
方又云脈沉細賦風在內者作此湯也

衍義治脚弱方多有大端相類於中略易一二味者如

此方與前大竹瀝湯但少人參白朮而多蜀椒一
味則功用殊分彼以中風本虛故宜參朮兼扶胃
氣而行藥力此專治風毒脚氣則蜀椒為之必需
而參可無預也

風引湯 治兩脚疼痺腫或不仁拘急不得行方

麻黃

石膏

獨活

茯苓各二兩

吳茱萸

附子

秦朮

細辛

桂心

人參

防風

川芎

千金方衍義卷七

辛

獨活山湯

防己

甘艸各一兩

乾薑半兩

白朮三兩

杏仁六十枚

右十七味咬咀以水一斗六升煮取三升分三服
取汗

衍義風引者風引末疾而四肢引動也故立方專以木
附為主而兼麻黃越脾麻附細辛麻杏甘石茯苓桂

朮甘甘薑苓朮等方之製其金匱六石風引湯干
金更名紫石散列之腸腑風癩門中與此風馬牛
不相涉也

大驚甲湯 治脚弱風毒變痺氣土及傷寒惡風

溫毒山水瘡氣熱毒四肢痺弱方

獮甲二兩 防風 麻黃

白朮 石膏 知母

升麻 茯苓 橘皮

芎藭 杏仁 人參

半夏 當歸 芍藥

萎蕤 甘艸 麥門冬各一

羚羊角 大黃一兩 犀角

青木香 雄黃各半 大棗二十

貝齒 烏頭七枚 生薑三兩

薤白十四枚 麝香三錢 赤小豆三合

吳茱萸五合

右三十一味咬咀以水三斗煎取四升分六服相去十里久得下止 一方用大黃半兩畏下可止

用六銖 一方用羚羊角半兩毒盛可用十八銖

胡洽有山茱萸半升為三十二味千金翼加知母升麻橘皮川芎人參當歸玉竹

小驚甲湯 治身體虛脹如微腫胸心痞滿有氣

壯熱小腹厚重兩腳弱方

獮甲 黃芩 升麻

麻黃 羚羊角 桂心

杏仁各三兩 前胡四兩 烏梅二十枚

薤白三七枚

右十味咬咀以水一斗煮取二升七合分三服此

常用若體強壯欲須利者加大黃二兩

風緩湯 治腳弱舉體痺不仁熱毒氣入臧胸中

滿塞不通食即嘔吐方

獨活 麻黃 犀角各三兩一

半夏一升 大棗 烏梅各二十枚

桂心 驚甲 升麻

橘皮 枳實 甘艸

吳茱萸 大黃各一兩 生薑

石膏各六兩 貝齒七枚

右十七味咬咀以水一斗四升煮取四升分五服日三夜二不瘥至三劑必瘥

義衍驚甲消堅化毒而兼羚羊辟惡舒筋犀角解毒散

血貝子奕擊破結與前防風散主治不甚相遠較

防風散祇少桂心烏梅參入白朮石膏知母升麻

玉竹麥冬大黃雄黃烏頭麝香青木香十一味總

皆辟治熱毒之品毒邪深伏非此無以激之使散

也 小驚甲湯十味藥中與大驚甲湯相同者六

味又採大鱉甲湯所去防風散中桂心烏梅二味散結收津可見防風散之一味不可裁次也其黃芩前胡不過除標熱之報使耳 風緩湯十七味中干味與防風散大鱉甲湯二方皆同補採桂心烏梅二味又與小鱉甲湯二方相同復採大鱉甲湯中石膏升麻大黃三味內外上下開泄毒邪惟枳實在大黃為熱毒入藏而設獨活佐防風為體痺不仁而設然總不離防風散之繩墨

治脚氣初發從足起至膝脛骨腫疼者方

取蟬麻葉切搗蒸薄裏之日二三易即消蟬麻

子似牛蟬蟲故名蟬麻也若冬月無蟬麻取薊菴根搗研和酒精三分根一分合蒸熱及熱封裏腫上如前法日二即消亦治不仁頑痺此方不出見此然以前後三力俱出蘇長史更不分出

若腫毒已入脛至小腹小便澀少者方

取烏持牛屎一升二服日二取消乃止千金翼人二分屎一分牛乳合煮乳浮結乃服之

若腫已消仍有此候者急服此湯方蘇長史方神驗

茯苓 射干 人參 防已 前胡

枳實各二 半夏 犀角
 鈴羊角 青木香 橘皮
 杏仁 升麻各一 生薑五兩
 獨活三兩 吳茱萸一升

右十七味咬咀以水一斗二升煮取四升分五服相去二千里久中間進少粥以助胃氣此湯兩日服一劑取病氣退乃止以意消息之若熱盛喘煩者加石膏六兩生麥冬一升去吳茱萸若心下堅加鱉甲一兩

蟬麻子開通諸竅拔毒外出取葉蒸熟薄裏亦能

通竅拔毒薊菴一名陸英本經治骨間諸病四肢疼痛外臺千金多用之將毒濕內攻入脛脛與脫同牛屬坤土取三虜壯特之尿以通水道利毒熱也 外腫已消而喘脹未平急攻內毒所主之方不出大小鱉甲及風緩湯中諸法觀方後心平堅

加鱉甲一語大義灼然 夫脚氣之病先起癢南稍來江東得之無漸或微覺其痺或兩脛腫滿或行起瀉弱或上入腹不仁或時冷熱小便視瀉喘息氣衝喉急欲死食噎不下氣上通者皆其候也若覺此症先與

犀角旋覆花湯方

犀角

旋覆花 各二

橘皮

茯苓

生薑 各三

大棗 七枚

香豉

紫蘇莖葉 一握

右八味咬咀以水八升煮取二升七分合分三服相

去十里久服之以氣下小便利為度崔氏名小犀角湯

犀角湯

大犀角湯 療脚氣毒衝心變成水身體遍腫悶

絕欲死方

犀角

旋覆花

防已

千金方術卷七

去

白木

桂心

橘紅

黃芩

生薑

桑皮

前胡

茯苓 各二

香豉 一升

大棗 十枚

紫蘇莖葉

右十四味咬咀以水九升煮取二升七分合分三服

相去十里久取下氣為度若得氣下小便利脚腫

即消能食若服湯竟不下氣急不定仍服後犀角

麻黃湯崔氏又以白前代白朮無防已黃芩桑白皮名旋覆花湯

犀角麻黃湯

犀角

麻黃

防風

獨活

防已

川芎

白朮

羚羊角崔氏用附子

當歸

黃芩 各二

石膏 四兩

生薑

甘艸

杏仁崔氏用細辛

桂心

右十五味咬咀以水八升煮取三升分三服相去十里久服訖覆取汗

下藥煎取三升分三服相去十里久服訖覆取汗

若不瘥五日後更下劑取汗同前

脚氣須分新久主治方為合轍前竹瀝湯麻黃湯

先後次第已見一斑又採深師諸方則以犀角旋

覆花湯為之首列方中犀角解毒散血旋覆開結

千金方術卷七

去

下氣橘皮消痰止逆茯苓除濕安中香豉祛瘴辟

邪紫蘇寬隔導滯薑棗和營達衛脚氣門中喫緊

神丹初發用之使毒從表解表氣宣通裏氣下降

則毒隨洩利當無腫滿之虞矣 服小犀角湯毒

盛不解毒氣衝心遍體腫脹急於前方 加生朮桂

心防已黃芩桑皮前胡名大犀角湯 服大犀角

湯氣急不定必須麻黃越脾麻杏甘石方得開發

肺氣仍不出風引風緩大小驚甲等方取裁也

茱萸湯 治脚氣入腹困悶欲死腹脹方葛長

吳茱萸

木瓜兩顆切

右二味以水一斗三升煮取三升分三服相去如
人行十里久進一服或吐或汗或利或十八熱悶即
瘥此起死
回生方

衍吳茱萸善降逆氣專入肝經旁及脾胃本經言濕
中下氣止痛治濕通血痺逐酒濕開腠理得木瓜
之酸收下降為脚氣之專藥藥貴簡而功力專於
於博採類聚之治也

小風引湯 治中風腰脚疼痛弱者方胡洽名大
風引湯

獨活 茯苓 人參各三兩

防風 當歸 甘艸

千金方衍義卷七 黃芪 附子 補葉山房

乾薑 石斛各二兩胡
洽作黃芪

大豆二升

右十味咬咀以水九升酒三升煮取三升分四服

服別相去如人行十里久胡洽云南方治脚氣與
此別用升麻一兩半夏

芍藥各一兩合十三味本只有十味減當歸石斛

名小風引湯刪繁方無石斛以療肉極寒肌肉變

去痰名曰惡風腰痛脚弱

此本長沙四逆加人參湯以攻伏匿之本邪加獨

活防風以祛下部之賊風茯苓石斛以化外淫之

標熱當歸大豆以潤血脉之引急也
四物附子湯 治風濕相搏骨節煩疼四肢拘急

不可屈伸近之則痛自汗出而短氣小便不利
惡風不欲去衣或頭面手時時浮腫方

附子二枚 桂心四兩 白朮三兩

甘艸二兩

右四味咬咀以水六升煮取三升分三服微汗愈

大汗煩者一服五合體腫者加防已四兩悸氣小

便不利加茯苓三兩既有附子今加生薑三兩

衍桂枝附子湯本治太陽例中風濕相搏一身盡痛

不能轉側若其人大便鞭小便白利去桂枝加白

朮此易桂心去薑棗入於脚氣方中亦屬太陽例

千金方衍義卷七 補葉山房

病以故見證不殊觀方後體腫加防已一語深有

切於脚氣也

治脚弱風毒實及嶺南瘴氣面腫乍寒乍熱似瘧

狀脚腫氣上心悶咳嗽癱緩頑痺方

麻仁 升麻 麻黃

射干 菖蒲 芒硝

甘艸 大黃各一兩 豉二合

右九味咬咀以水六升煮取二升半內芒硝又煎

三沸分三服微利一二行解毒熱有腫澤薄之凡

覺氣滿輒服一劑佳

〔義衍〕風毒固瘴癘之氣而患癱緩頑痺所見多是表症

其氣上心悶咳嗽又屬裏氣之病故以麻黃升麻

開發表氣苾硝大黃疎滌裏氣麻仁菖蒲潤燥開

竅射干專治熱毒攻咽甘艸調和諸藥性味也

道人深師增損腎瀝湯 治風虛勞損狹毒脚弱

寒痺或不隨下焦虛冷胸中微有容熱心虛驚

悸不得眠食少失氣味日夜數過心煩迫不得

臥小便不利又時復下湘東王至江州王在嶺

南病悉如此極困篤余作此湯合服即得力病

似此者服無不瘥隨宜增損之方

千金方衍義卷七

攝業山房

黃芪

甘艸

芍藥

麥冬

人參

肉蓯蓉

乾地黄

赤石脂

茯苓

地骨白皮

當歸

遠志

磁石

枳實

防風

龍骨

桂心

川芎

生薑

五味子

大棗

白羊腎

半夏

右二十三味咬咀以水二斗煮羊腎取汁一斗二

升內諸藥煮取四升分為五服不利下者除龍骨

赤石脂小便瀦以赤茯苓代茯苓加白朮三兩多

熱加黃芩一兩遺溺加桑螵蛸二十枚胡洽方無黃芪從蓉

赤石脂地骨皮磁石枳實防風龍骨半夏有黃芩為十五味

脚氣皆由邪實惟增損腎瀝湯一方乃治脚氣之

變法深師因借腎藏門中腎瀝湯增損以治湘東

王在嶺南所患之病夫所謂腎瀝者風毒襲於胞

中痺著不通甚則結塊阻塞溺孔艱苦異常蓋尊

貴之體無非奈養斷喪太過痰濕上壅真元下竭

難與尋常脚氣並論故方下特為表出乃於腎瀝

湯本方中損去元參之侵損虛陽澤瀉之傷犯氣

千金方衍義卷七

攝業山房

化增入枳實半夏推陳致新石脂龍骨專司墊藏

從蓉遠志兼寓開閤門冬地黄大棗滋培津血絲

其人宿有罅漏不勝疎泄故去彼取此確有至理

存焉須與二十一卷腎藏門中腎瀝湯本方及十

卷賊風門中腎瀝湯參看自明

石膏湯 治脚氣風毒熱氣上衝頭面而赤瘧急

鼻塞去來來時令人昏憤心胸恍惚或苦驚悸

身體戰掉手足緩縱或酸痺頭目眩重眼反鼻

辛熱氣出口中或患味甜諸惡不可名狀者方

石膏

龍膽

升麻

芍藥

貝齒

甘艸

鱉甲

黃芩

羚羊角各一兩

橘皮

當歸各二兩

右十一味咬咀以水八升煮取三升分三服

行此大小鱉甲湯之變法彼主風毒瘰氣外顯表邪

故用麻黃升麻引邪外泄此治熱毒上衝昏愢恍

惚故用龍膽石膏引邪內泄雖同用鱉甲羚羊貝

齒解毒攻堅而從表從裏隨其攸利靈機活法於

期可推

半夏湯 治脚氣上入腹腹急上衝胸氣急欲絕

千金方衍義卷七

聖

掃葉山房

方

半夏 一升

桂心 八兩

乾薑 五兩

甘艸

人參

細辛

附子 各二兩

蜀椒 二合

右八味咬咀以水一斗煮取三升分三服初稍稍

進恐氣衝上格塞不得下小小服通人氣耳

衍脚氣用補乃證治之變此以病久正氣傷憊濁邪

亢劑不得已而用四逆加入參湯更加半夏蜀椒

桂心細辛專散入腹衝胸濁陰之氣為急若兼攻

外毒則救裏勢分不能克濟專功矣觀方後服法

一以元氣式微難勝驟補一以病氣悍逆慮其於

塞一以藥力峻溫恐其憎上所以只宜小小服之

以通人氣非洗心體曾不知諒人元氣之奧

烏頭方湯 治風冷脚痺疼痛攣弱不可屈伸方

烏頭

細辛

蜀椒 各一兩

甘艸

秦朮

附子

桂心

芍藥 各二兩

乾薑

茯苓

防風

當歸 各三兩

獨活 四兩

大棗 二十枚

右十四味咬咀以水一斗二升煮取四升分五服

千金方衍義卷七

聖

掃葉山房

若熱毒多服亦佳

衍此方證治較前半夏湯證元氣稍強病氣稍盛故

於本方中裁去人參半夏專用烏頭力追風毒更

加獨活防風以祛風秦朮茯苓以滲濕當歸芍藥

以和營用大棗者取其甘溫統領諸藥入脾脾主

百體合內外而均沾藥力也

追毒湯 治脚弱風熱上入心腹煩悶欲絕方

半夏

生薑 各四兩

黃芪

甘艸

當歸

人參

厚朴

獨活

橘皮 各一兩

枳實

麻黃

乾地黄

芍藥各二兩

桂心三兩

貝子七枚

大棗十枚

右十六味咬咀以水一斗三升煮取三升六合分

四服日三夜一

衍義方中參芪甘艸歸地芍藥皆為麻黃獨活桂心枳

橘朴貝薑棗助力追毒殊非調養氣血之謂觀方

名二字其義昭然

風緩湯 治脚弱體痺不仁毒氣上入胸臆中滿

塞不通食輒吐失味方

千金方衍義卷七

薑

攝藥山房

獨活

甘艸

石膏各三兩

羚羊角

犀角

麻黃

防風

當歸

升麻

橘皮

吳茱萸

桂心

半夏

鱉甲各二兩

枳實一兩

生薑六兩

大棗二十枚

貝齒七枚

烏頭二兩一作烏梅七枚

右十九味咬咀以水一斗四升煮取四升一服一

升若有少虛熱者加乾地黄二兩

衍義風緩前後兩方藥品主治大率相類前方多大黃

烏梅意在追風下行後方多烏頭羚羊防風當歸

意在祛風外散觀後方虛熱加乾地黄專為烏頭

而設雖同主風緩各尋門戶而予邪之出路也

紫蘇子湯 治脚弱上氣昔宋湘東王在南州患

脚氣困篤服此湯大得力方

紫朮子

半夏各一升

前胡

厚朴

甘艸

當歸各一兩

橘皮三兩

大棗二十枚

生薑一斤

桂心四兩

右十味咬咀以水一斗三升煮取三升半分五服

千金方衍義卷七

薑

攝藥山房

日三夜二

衍義脚氣患在濁氣上攻故以蘇子橘皮前胡厚朴辛

溫降氣半夏生薑滌除痰濕桂心當歸溫散滯血

甘艸大棗調和中氣全以降泄逆氣為主故局方

更名蘇子降氣湯後世取治虛陽上攻痰涎壅盛

肺氣喘滿服之氣降即安可見用方但取舍宜不

必拘執何病主治也

附子湯 治濕痺緩風身體疼痛如欲折肉如錐

刺刀割方

附子三枚

茯苓

人參

甘艸 桂心 芍藥

白朮 四兩

右七味咬咀以水八升煮取三升分二服

衍義南陽太陽例中甘艸附子湯本治風濕相搏骨節

煩疼掣痛千金借治濕痺緩風可謂當矣又恐辛

溫太過津隨汗泄更合少陰例中附子湯取人參

固氣芍藥斂津茯苓滲濕并助桂附之雄庶無風

去濕不去虛風復入之患矣

防風湯 治肢體虛風微痠發熱支節不隨恍惚

狂言來去無時不自覺悟南方支法存所用多

千金方衍義卷七

美

攝藥山房

得方溫和不損人為勝于續命越脾風引等湯

羅廣州一門南州士人常用亦治腳弱甚良方

防風

麻黃

秦艸

獨活

生薑

半夏

當歸

遠志

甘艸

防己

人參

黃芩

升麻

芍藥 各一兩

石膏

麝香

右十六味咬咀以水一斗三升煮取四升一服

升初服厚覆取微汗亦當兩三行下其間相法如

人行十里久更服有熱加大黃二兩先有冷心痛

疾者倍用當歸加桂心三兩不用大黃 一方用

衍義方中明言功用勝于續命越脾風引諸湯攷其藥

味與防風散大鱉甲湯相同者及方後又云有熱

加大黃有寒加桂心總不出大鱉甲湯防風散中

之法

甘艸湯 治腳弱舉身洪腫胃反食穀吐逆胸中

氣結不安而寒熱下痢不止小便難服此湯即

益亦服女麴散利小便腫消尿大散摩膏有驗

千金方衍義卷七

聖

攝藥山房

方

甘艸

人參 各一兩

半夏 一升

桂心

蜀椒 各三兩

小麥 八石

大棗 二十枚

生薑 八兩

吳茱萸 二升

右九味咬咀以水一斗三升煮小麥取一斗去小

麥內諸藥煮取三升分六服女遊散見第十卷第八篇中

腳弱浮腫脾虛濕著也故以桂椒煎半辛溫散結

參甘小麥甘溫益氣生薑大棗辛甘和營其裏逐

濕之功而脾膠受陰矣

恒山甘艸湯 若寒熱日再三發可服此方

恒山 三兩 甘艸 一兩

右二味咬咀以水四升煮取一升半分三服相去五里久一服

衍義恒山善祛濁濕痰垢甘艸解毒和中毒濕蠲除而脚弱自愈烏有寒熱之患乎

丹參牛膝煮散 治脚痺弱氣 滿身微腫方

丹參 牛膝 桑白皮

杏仁 升麻 茯苓

猪苓 各四 犀角 黃芩

橘皮 防已 白朮

千金方衍義卷七

澤瀉 桂心 秦艸 各三

生薑 李根白皮 各二 大麻仁 一升

右十八味搗篩以水一升半內散方寸七煮取七合輕絹濾去滓頓服日再夏月熱不得服冒散此

煮散須年常用大驗

衍義脚痺而見氣滿身腫脾虛濕熱下滯也以元氣久傷見證亦不甚篤方藥亦不甚峻方中丹參本經

治心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥瘕

止煩滿益氣牛膝本經治寒熱痿痺四肢拘攣膝

痛不可屈伸故首推二味以之命方犀角涼血解

毒桂心通利關節李根白皮甄權專療消渴脚氣

大杏仁漸燥祛風花名麻勃本經治二十種惡風

黑色遍身苦癢逐諸風惡血千金推其花之功用

而及於仁專取其潤而治脚痺風燥升麻桑皮杏

仁白朮開發肺氣而提其上竅茯苓猪苓澤瀉防

已宜通氣化而達其下竅秦艸黃芩橘皮生薑清

理中氣而散其濕滯一方之中開痺逐水兩得之

矣

治腰膝不隨兩脚攣腫方

蜀椒四升以水四斗煮取二斗半攤盛下著火

暖之懸板為橋去湯二寸許以脚踏板柱脚坐

以綿絮密塞勿令泄氣若疲即出入以粉摩

之一食久更入鹽常令灑下火不絕勿使湯冷

如此消息不過七日得伸展并腫亦消

衍義脚氣腰下柝格明是濁陰之邪伏匿於經故用蜀

椒者湯漬脚取辛烈之氣蒸動經中滯濕七日便

得伸展殊非湯藥可及

諸散第三例一首

方七首

例曰大法春秋宜服散

八風散 治風虛面青黑土色不見日月光脚氣

痺弱準經面青黑主腎不見日月光主肝宜補

腎治肝方

菊花 三兩

人參

鍾乳

黃芪

遠志

秦朮

牛膝

茯苓

石斛

附子

山藥

澤瀉

細辛

石韋

菖蒲

乾地黄

天雄 各一兩半

甘艸 各二錢六分

川斷

麥冬

龍膽

菟絲子

杜仲

柏子仁

千金方衍義卷七

早

蛇牀子

防風

白木

乾薑

草薢

山茱萸 各

五味

烏頭 各半兩

菴蓉 二兩

右三十三味治下篩酒服方寸七日三不效加至

二七

大八風散 治諸緩風濕脚弱方

巴戟肉

黃芪

桂心

細辛

天雄

草薢

肉蓯蓉

牡荊子

山藥

菊花

萎蕤

山萸

秦朮

白朮

龍膽

附子

茯苓

遠志 各一兩

白薇

黃芩

礬石

人參

五味 各十錢

牛膝 千金翼

桔梗 三十錢

芍藥 各六錢

石斛

厚朴

蜀椒 各半兩

菖蒲

烏喙

川芎

右三十二味治下篩酒服半寸七日三未驗稍增

令微覺 胡洽無 桔梗

入風取義專主八方風氣之邪此治風毒脚氣之

千金方衍義卷七

早

攝山房

面色青黑土色不見日月光輝是陰翳噎日澆潤

生風之象故千金推廣侯氏黑散而立此方方中

菊花得金水之精英補水以制火益金以平木專

主虛風蘊熱本經治惡風濕痺者以其能清血脈

之邪故黑散以之為君細辛治百節拘攣風濕痺

痛防風治大風頭眩痛惡風邪週身骨節疼痛

乾薑逐濕痺為菊花祛風之嚮導導火之反間白

朮治風寒濕痺茯苓治逆氣散結痛利小便堅筋

骨人參補五臟安精神除邪氣退虛熱與白朮茯

苓共濟實脾祛風之功方得本經除邪氣之旨其

外柏子仁除風濕安五臟麥門冬潤燥瀆利結氣
 山藥治傷中補虛羸除寒熱邪氣菖蒲治風寒濕
 痺通九竅甘艸治五臟六腑寒熱邪氣卽黑散中
 用桔梗之義石斛治傷中除痺濕石韋治勞熱邪
 氣癱閉不通澤瀉治風寒濕痺龍膽治骨間寒熱
 卽黑散中用黃芩之義秦朮治寒濕風痺肢節痛
 草薺治骨節風寒濕周痺遠志除邪氣利九竅烏
 附天雄統治諸風寒濕痿痺拘攣膝痛卽黑散中
 用桂之義續斷續筋骨兔絲續絕傷牛膝治寒濕
 拘攣不可屈伸卽黑散中用芎藭之義杜仲治腰
 脚痛堅筋骨乾地黃治傷中逐血痺黃芪治大風
 癱疾以助諸風藥司閭闔之權卽黑散中用當歸
 之義蛇牀除痺氣利關節山萸治心下邪氣逐寒
 濕痺五味子與肉蓯蓉並強陰益精氣卽黑散中
 用牡蠣之義鍾乳安五臟通百節利九竅卽黑散
 中用礬石之義蓋礬石性瀆辟垢得冷卽止得熱
 則下服後禁忌熟食調理頗難故取鍾乳溫瀆利
 竅之品代用藥性雖殊而功力與礬石不異也
 所按方中參武甘艸保元之製也參冬五味生豚
 之製也參甘苓木四君之製也甘薑木理中之

千金方衍義卷七

攝養山房

製也薯附甘艸四逆之製也參朮薯附參附朮附
 薑附等方之製也附地黃薯苓澤腎氣之製但少
 丹桂也一散之中薑附諸方以貝補天浴日之法
 非深造長沙地步何以之至此其大入風散藥品
 功用與前方不殊仍用黑散中桔梗黃芩川芎又
 以桂心易桂枝舉石易礬石於中其去牡蠣當歸
 而加巴戟牡荊萎蕤厚朴芎藭烏喙白薇芍藥以
 中有礬石烏喙之毒劣故以大入風散之 後第
 十卷諸風門中復有八風散小入風散及八風湯
 並用麻黃非若脚弱之陰毒下匿無取外散之比
 內補石肝秦朮散 治風虛脚弱手足拘攣痿痺
 不能行脚跗腫上膝小腹堅如泡的氣息常如
 憂恚不能食飲者皆由五勞七傷腎氣不足受
 風濕也此方悉主之

千金方衍義卷七

攝養山房

- | | | |
|----|----|----|
| 石斛 | 附子 | 天雄 |
| 桂心 | 獨活 | 天冬 |
| 秦朮 | 烏頭 | 人參 |
| 乾薑 | 當歸 | 防風 |
| 杜仲 | 山萸 | 莽艸 |
| 桔梗 | 細辛 | 麻黃 |

前胡 五味子各十 蜀椒

白芷 白朮各半

右二十三味治下篩酒服方寸七日再服不知稍

增至二十七虛人三建皆炮實人亦可生用風氣者

本因腎虛既得病後毒氣外滿則灸洩其氣內滿

則藥馳之當其救急理必如是至於風消退四肢

虛弱餘毒未除不可便止宜服此散推陳致新極

為良妙此既人情可解無可疑焉三建皆炮者天

亦宜虛人乾薑

方中獨活防風桔梗白芷前胡細辛麻黃皆走表

千金方衍義卷七

掃葉山房

之藥莽脾大毒本經治疔瘕結氣蕩滌在內宿積

何反名之內補曷知風毒外擾濕熱內滯雖日從

事補益負薪救焚何濟於治故於攻發內外藥中

兼得石斛秦乳引參朮薑桂等味入於殘破之鄉

以建內補之功雄附烏椒應敵之師歸黃柑仲天

棘五味守土之員也

秦朮散 治風無久新卒得不知人四肢不仁一

身盡痛偏枯不隨不能屈伸灑灑寒熱頭目眩

或口面喎僻方

秦朮

乾薑

桔梗

附子各一 天雄 當歸

天冬 人參 白朮

蜀椒各十 烏頭 細辛各十

甘艸 白芷 山萸肉

麻黃 前胡 防風

五味子各半

右十九味治下篩酒服方寸七日三若老人少服

之治方無天冬前胡有莽艸桂心

即於前方加入甘艸一味解毒和中除去石解獨

活桂心杜仲莽艸藥力精銳而無毒烈傷中之疑

千金方衍義卷七

掃葉山房

故不須招揭內補之義

單服松脂 治一切風及大風脚弱風痺方董陸

法亦同

松脂三十斤以棕皮袋盛擊頭鋪底布竹木置

袋於上以石五六顆壓之下水於罇中令滿煮

之膏浮出得盡以後量更二十沸接置於冷水

中易袋洗鍋更煮如此九遍藥成搗篩為散以

粗羅下之用酒服一方寸七日二初和藥以冷

酒藥入腹後飲熱酒行藥以知為度如覺熱即

減不減令人火小便祕瀉若澁宜食葱薑芎白

不通宜服生地黄汁微取泄利除息大麻子以
外無所禁 服松脂三十日後即覺有驗兩脚
似有水流下是效如恐祕濟和一斤松脂茯苓
與棗栗許大酥即不瀝服經一百日後脚氣當
愈

位 松脂燥濕祛風是其本性如法修製深有益於服

食之功

淮南八公石斛萬病散 治風濕痠腰脚不隨方

防風

茯苓

菊花

細辛

蜀椒

乾薑

千金方衍義卷七

果

攝藥山房

雲母

茯苓

人參

乾地黄

附子

石斛

杜仲

遠志

兔絲子

天雄

草薢

桂心

牛膝

蛇牀子

白木

薯蕷

巴戟

菖蒲

川斷

山萸

五味

右二十七味治下篩酒服方寸七日再

衍 方中菊花細辛防風白木茯苓乾薑人參黑散方

中之七味石斛天雄附子薯蕷川斷遠志兔絲子

又蛇牀杜仲地黄菖蒲草薢山萸五味茯苓入風
散中之一十六味蜀椒桂心巴戟又採大八風散
中三味僅加雲母一味攷之本經有治身痺死肌
中風寒熱如在車船上除邪氣安五臟之功較與
大八風散中藥石烏喙之優劣迥乎不侔

藥萌散 治冷風脚跛偏枯半身不隨晝夜伸吟

醫所不治方

吳茱萸

乾薑

白藜

牡荊

千金翼

附子

天雄

狗脊

乾漆

薯蕷

千金方衍義卷七

星

攝藥山房

秦朮

防風

各半

右十一味治下篩先食服方寸七日三藥入肌膚

中淫淫然三日知一月瘥

衍 前八風散所主之病以有虛風蘊熱非大劑菊花

無以直入骨脊且大八風散雖同用菊花不過與

諸藥相等石斛菖蒲病散中亦然迺用藥之禮度也

此茱萸散所主之病全屬風冷濕痺故用吳茱萸

之温中下氣止痛除濕通血痺逐風邪開腠理為

主兼乾薑之逐風濕痺白藜之散結氣止痛牡荊

之逐風濕祛痰除骨間寒熱附子之治寒濕痿痺

拘攣膝痛不能行步天雄之治大風寒濕痺歷節
 拘攣緩急狗脊之治腰背強機關緩急周痺寒濕
 膝痛乾漆之治絕傷續筋骨五緩五急周痺寒濕
 山藥之治傷中補虛羸除寒熱邪氣秦芫之治寒
 濕風痺肢痛防風之治惡風風邪週身骨節疼痛
 與八風散等方同源異派

酒醴第四 例一首 方十七首

例曰凡合酒皆薄切藥以絹袋盛藥內酒中密封頭
 春夏四五日秋冬七八日皆以味足為度去滓服酒
 盡後其滓搗酒服方寸七日三次法冬宜服酒至立

春宜停

千金方 卷七

果

補藥山房

石斛酒 治風虛氣滿脚疼痺變弱不能行方

石斛 丹參 五加皮各五兩

側子 秦光 杜仲

山黃 牛膝各四兩 桂心

乾薑 羌活 川芎

橘皮 黃芪 白朮

蜀椒 茵芋 當歸各三兩

薏苡仁一斤 防風二兩 鍾乳八兩
別相炎盛

紫大藥 袋內

右二十一味咬咀以酒四斗漬三日初服三合日
 再稍稍加以知為度

酒醴之製專行經絡而風痺脚弱之病尤為合宜

石斛酒中大都皆祛風散結開痺和營藥惟茵芋
 之大毒專主關節風濕痺痛鍾乳之標悍能通百
 節利九竅使濕苑之毒從之開泄也

烏麻酒方

烏麻五升微聚搗碎以酒一斗漬一宿隨所能
 飲之盡更作甚良

胡麻甘溫而潤雖平補五臟而溫補命門之力居
 一多以其色黑味雄故錢乙用以煎湯送百祥九治

千金方 卷七

果

補藥山房

痘疹變黑歸腎其能開泄腎經毒邪可知苗名青
 蘘本經治五臟邪氣風寒濕痺益氣補腦髓堅筋
 骨苗實一本因推而用以漬酒專除下焦風毒脚
 氣而無毒藥傷中之害也

鍾乳酒 治風屈勞損脚疼冷痺麻瘦攣弱不能

行方 鍾乳八兩 丹參六兩 石斛

杜仲 天冬各五兩 牛膝

防風 黃芪 川芎

當歸各四兩

附子

桂心

秦朮

乾薑各三兩

山萸肉

薏苡仁各一兩

右十六味咬咀以清酒三斗漬之三月初服三合

日再後稍加之以知為度

衍義此卽石斛酒方中除去五加羌活橘皮白前蜀椒

茵芋而加天門冬也以無茵芋之毒烈故用附子

而易去側子較之石斛酒尤為穩當

枸杞菖蒲酒 治緩急風四肢不隨行步不正口

急及四體不得屈伸方

本草衍義卷七

辛

掃葉山房

菖蒲五十斤

枸杞子一百斤

右二味細剉以水四石煮取一石六斗去滓釀二

斛米酒熟稍稍飲之

衍義本經言菖蒲治風寒濕痺咳逆上氣開心孔補五

臟通九竅枸杞子主五臟內邪氣熱中消渴周痺

風濕久服堅筋骨此雖兼根實而言然所主諸病

全是地骨皮之功用用以釀酒深得仙經妙用豈

止治風痺脚弱而已

虎骨酒 治骨隨疼痛風經五臟勞

虎骨一具炭火炙令黃色槌刮取碎搗研得數

日清酒六升漬五宿隨性多少稍飲之易去虎

嘯風生龍吟雲起此亦有情與無情相感治風

之效故亦無疑

衍義虎骨搜風壯筋獨用一味漬酒取其專功風能勝

濕故治風痺脚弱有効

薤酒 治胃脘冷不能飲食耳目不聰明四肢有

氣冬臥脚冷服此酒十日後日既精明體又充

壯方

八月三日取薤曝燥把之如五升大六十把水

六石煮取一石去滓以釀酒如常法隨多少飲

千金方衍義卷七

辛

掃葉山房

之已用訖効甚速

衍義薤性溫散本經有明目溫中耐風寒下水氣治而

浮腫之用故千金以之釀酒而治方下諸病甚速

水艸言薤微寒謬矣

小黃芪酒 治風虛痰癆四肢偏枯兩脚弱手不

能上頭或小腹癢痛脇下變急心下有伏水脇

下有積飲夜喜夢悲愁不樂恍惚善忘此由風

虛五臟受邪所致或久坐腰痛耳聾卒起眼眩

頭重或舉體流腫疼痺飲食惡冷瀆瀆惡寒胸

中痰滿心下寒痲藥皆主之及婦人產後餘疾

風虛 積冷不除者方

黃芪 附子 蜀椒

防風 牛膝 細辛

桂心 獨活 白木

川芎 甘艸各三 秦艸

烏頭集驗用山藥三兩 大黃 葛根

乾薑 山萸肉各二兩 當歸二兩半

右十八味咬咀少壯人無所熬煉虛老人微熬之

以絹袋盛清酒二斗漬之春夏五日秋冬七日可

先食服一合不知可至四五合日三服此藥攻痺

甚佳亦不令人吐悶小熱宜冷飲食大虛加菹菜

二兩下利加女萎三兩多忘加石斛菖蒲紫石英

各二兩心下多水者加茯苓人參各二兩茱萸三

兩酒盡可更以酒二斗重漬滓服之不爾可溲滓

搗下酒服方寸七不知稍增之服一劑得力令人

耐寒冷補虛治諸風冷神良

黃芪酒 治風虛脚痿弱氣悶不自收攝兼補

方

黃芪 秦艸 蜀椒

乾薑 獨活 白木

川芎 菹菜 細辛

牛膝各三兩 芍藥 當歸各二兩半

甘艸三兩 山萸 桂心各二兩

菖蒲二兩半 柏子仁 天雄

鍾乳 防風各二兩 大黃一兩

石斛二兩 烏頭三兩 石南一兩

附子三兩

右二十五味咬咀無所熬煉清酒三斗漬之先食

服一合不知可至五合日三以攻痺為佳大虛加

菹菜下利加女萎多忘加菖蒲各三兩菹菜有菹菜

蕪三兩人參茵芋半夏栝蒌根芍藥各一兩無秦

芩川芎牛膝菹菜甘艸葛根當歸菖蒲鍾乳大黃

名大黃茵蕪

黃芪專主風虛而所見諸病靡不由風虛所致故

用獨活用薑桂用防獨用葛根用芍歸用大黃靡

不由風虛變證然酒醴之製非專一人雖五臟受

邪靡不由虛風內賊所以彙次諸藥漬之以酒隨

宜而用非比湯液之隨證施治也 小黃芪酒方

下所主諸病較後方不啻數倍豈本方一味不減

但加鍾乳天雄石南石斛柏子仁菖蒲菹菜反獨

主脚痿痿弱一證耶

茵芋酒 治大風頭眩重目瞽無所見或仆地氣

絕半日乃蘇口喎噤不開半身偏死拘急痺痲

不能動搖歷節腫痛骨中痠疼手不能上頭足

不得屈伸不能躡履行欲傾跛皮中動淫淫如

有蟲家軫癢搔之生瘡甚者狂走有此諸病藥

皆主之方

茵芋

烏頭

石南

附子

細辛

獨活

防風

蜀椒

女萎

卷柏

桂心

天雄

千金方衍義卷七

重

掃葉山房

秦朮

防已

各一兩

躑躅

二兩

右十五味咬咀少壯人無所熬煉虛老人薄熬之

清酒二斗漬之冬七日夏三日春秋五月初服一

合不知加至二合寧從少起日再以微痺為度治胡

無蜀椒獨活卷柏為十二味

衍義

此方雖列脚氣門中而茵芋石南躑躅等味俱大

風惡疾之藥益風毒脚弱與大風惡疾本同一氣

之病耳

大金牙酒 治瘴癘毒氣中人風冷濕痺口喎面

戾半身不遂手足拘攣歷節腫痛甚者小腹不

仁名曰脚氣無所不治方

金牙一片

側子

附子

天雄

人參

菴蓉

茯苓

當歸

防風

黃芪

山藥

細辛

桂心

葶藶

萎蕤

白芷

桔梗

黃芩

遠志

牡荊子

川芎

地骨皮

五加皮

杜仲

厚朴

枳實

白朮

千金方衍義卷七

重

掃葉山房

牛膝

丹參

各三兩

獨活

半斤

茵芋

石南

狗脊

各二兩

磁石

十兩

薏苡仁

麥冬

升各二

生石斛

八兩

蒲葇

四兩

生地黃

升

右三十九味咬咀以酒八斗漬七日溫服一合日

四五夜一石藥細研別絹袋盛其藥同漬藥力和

善主治極多凡是風虛四體小覺有風痲者皆須

將服之無所不治也服者一依方修合不得輒信

人言浪有加減

衍義

金牙專辟瘴癘毒風鬼疰惡氣而湯液罕用惟酒

形中間有用之者方中側附天雄碎除陰毒桂心
 石榆草薜狗脊堅強筋骨蒟藿牡荊茵芋祛逐賊
 風皆藥中穎銳磁石一味本經治周痺風濕肢節
 中痛與金牙相為表裏一追風痺外散一杜惡氣
 內入也人參扶苓黃芪白朮以助側附天雄之威
 菴蓉牛膝杜仲遠志以助桂南草薜之勢細辛防
 風獨活白朮以助蒟荊茵芋之力其餘門冬萆薢
 山藥薏苡又為人參黃芪之輔丹參川芎當歸地
 黃又為菴蓉牛膝之輔石斛地骨加皮又為細辛
 獨活之輔黃芩桔梗開發毒風於外枳實厚朴踈
 通惡氣於內無堅不克非獨為脚氣之金錒而入
 風五痺靡不療之其後八卷賊風門中金牙酒方
 藥止十味其七與此相同惟羌活易獨活莽艸易
 茵芋蜀椒易桂心而治痺曳跛躄之證未嘗少遜
 前方也

鍾乳酒 治虛損通順血脈極補下氣方
 鍾乳 石斛 菴蓉各五兩
 附子 甘菊各二兩
 右五味咬咀以清酒三斗漬服二合日再稍增至
 一升

前鍾乳酒乃石斛酒之變法此用甘菊以清鍾乳
 之悍菴蓉以濡附子之烈用石斛者專取堅強筋
 骨之力也

秦朮酒 治四肢風手臂不收痺脚疼弱或不可
 急攀縮屈指偏枯痿痺瘡小不仁頑痺者悉主
 之方

秦朮 天冬 五加皮
 牛膝 附子 杜仲 石南
 巴戟肉 杜仲 石南
 細辛各二兩 獨活五兩 薏苡仁一兩
 右十二味咬咀以酒二斗漬之得氣味可服三合
 漸加至五六合日三夜一

方中石南巴戟附子桂心渾是溫補命門之藥下
 元真陽不充者宜之若鰥臍之夫陰火不能攝精
 而致一體痿弱者誤用此方甚於戈戟斯豈立方
 之過與

木膏酒 治脚弱風虛五勞七傷萬病皆主之方
 生白朮 淨洗石五斗 搗取汁三
 濕荆二十五束束別三尺圍各長二尺五寸經
 頭二寸 燒取汁三

青竹三十束束別三尺圍各長二尺五寸徑一

寸燒取三取半

生地黄根五大斗粗大者搗取汁三斗煎取半

生五加根三十六斤淨洗乾到於大釜內以水四石煎之去滓澄清取汁七斗以銅

器中盛大釜內火上煎之取汁三斗五升其煎諸藥法一準五加例

右件白朮等五種藥總計得汁九斗五升好糯米

一石五斗上小麥麴八斤曝乾為末以藥汁六斗

漬麴五日待麴起第一投淨淘米七斗令得三十

遍下米置淨席上以生布拭之勿令不淨然後炊

之下饋以餘藥汁浸饋調強弱更蒸之待饋上痲

千金方衍義卷七

美

掃葉山房

生然後下於席上調強弱冷熱如常釀酒法醱之

甕中密蓋頭三日後第二投更淘米四斗一如前

法投之三日後即加藥如左

桂心

甘艸

白芷

細辛

防風

當歸

麻黃

川芎各六兩

附子五兩

牛膝九兩

乾薑

五加皮各一斤

右十二味咬咀訖第三投以米四斗淨淘如前法

還以餘汁澆饋重蒸待上痲生下置席上調冷熟

如常釀法和上件藥投之三日外然後嘗甘苦得

中訖密封頭二七日乃壓取清酒一服四合日再

服細細加以知為度溫酒不得過熱慎生冷酢滑

猪鯉魚蒜牛肉等

衍

脚氣之病多緣腎虛脾濕所致以脾濕故用白朮

腎虛故用五加血燥故用地黃風濕故用荆瀝筋

急故用竹瀝用以釀酒次第更加後藥較之浸酒

工力雖繁而功用洵不尋常

松葉酒 主脚弱十二風痺不能行服更生散數

劑及眾治不得力服此一劑便能遠行不過兩

千金方衍義卷七

美

掃葉山房

松葉六十斤咬咀以水四石煮取四斗九升以

釀五斗米如常法別煮松葉汁以清米并饋飯

泥釀封頭七日發澄飲之取醉得此力者甚眾

神妙

衍

松質堅勁葉擅祛風用以釀酒專治脚弱乃強筋

骨之應也

治脚氣方

好豉三斗蒸一石米下曝乾如是三上以酒五

斗漬七日去滓飲惟醉為佳酒盡更以二斗半

漬之飲之如初

或木黑豆所食成敗穢之氣蒸以米下曝乾漬酒取治脚氣同氣相入專祛腎家穢惡之邪最捷

側子酒 治風濕痺不仁脚弱不能行方

側子 牛膝 丹麥

山黃 薊薈根 杜仲

石斛各四兩 防風 乾薑

蜀椒 細辛 獨活

秦朮 桂心 川芎

當歸 白朮 茵芋各三兩

五加皮五兩 薏苡仁升

右二十味咬咀絹袋盛清酒四斗漬六宿初服三

合酌加以知為度患目昏頭眩者彌精

衍 側子酒中一十六味出前石斛酒中但沒別差活

此用獨活彼用鍾乳此用白朮彼用茵芋此用薏苡

菴彼用橘皮白前此用細辛藥雖稱變功則一

膏第五 例一首 方八首

例曰凡作膏常以破除日無令喪孝汚穢產婦下疔人雜犬禽獸見之病在外火灸摩之在內溫酒服如

棗核許

神明白膏 治百病中風惡氣及頭面諸病

風目爛管翳耳聾鼻塞齩齒齒根挺痛及癰痔瘡癬疥等方

吳茱萸 蜀椒 川芎

白朮 前胡崔氏作白前 白芷各一升

附子三十餘 桂心 當歸

細辛各二兩

右十味咬咀淳苦酒於銅器中淹浸諸藥一宿以成煎猪膏十斤炭火上煎三沸三上三下白芷色黃為候病在腹內溫酒服如彈丸一枚日三目痛取加黍米內兩背中以目向風無風可以扇扇之

諸瘡痔齩齒耳鼻百病主之皆以膏傳病在皮膚炙手摩病上日三別後九味 無桂心

衛侯青膏 治百病久風頭眩鼻塞涕淚出霍亂吐逆傷寒咽痛脊背頭項強偏枯拘攣或緩

或急或心腹久寒積聚疼痛逆上氣往來寒熱風喘癩癰歷節疼痛關節盡痛男子七傷臚

脹腹滿羸瘦不能飲食婦人生產餘疾諸病癩疥惡瘡癰腫陰蝕黃疽發背馬鞍牛領瘡腫方

當歸 栝萋根 乾地黄

甘艸 蜀椒各六兩 半夏七合

栝萋根 乾地黄

桂心	芎藭	細辛
附子 <small>各四兩</small>	黃芩	桔梗
天雄	藜蘆	皂莢 <small>各一兩半</small>
厚朴	烏頭	莽艸
乾薑	人參	黃連
寄生	續斷	戎鹽 <small>各三兩</small>
黃野葛 <small>二分</small>	生竹茹 <small>六升</small>	巴豆 <small>二十枚</small>
石南	杏仁 <small>各一兩</small>	猪脂 <small>三升</small>
苦酒 <small>一斗六升</small>		

右三十一味咬咀諸藥以苦酒漬一宿以猪脂微火上煎之三下三上膏成病在內以酒服如半棗在外摩之日三

神明青膏 治鼻中乾灌之并摩服方

蜀椒 <small>五合</small>	皂莢	黃芩
石南	黃連	雄黃
桂心	藜蘆 <small>各三銖</small>	白朮
川芎	大黃	澤瀉 <small>各七銖</small>
烏頭	莽艸	續斷
人參 <small>各五銖</small>	半夏	當歸 <small>各一銖</small>
乾地黄 <small>十一銖</small>	萎梨	細辛 <small>各十銖</small>

附子	桔梗 <small>各二銖</small>	乾薑 <small>六銖</small>
戎鹽 <small>杏子大一枚</small>		

右二十五味咬咀以苦酒一斗漬之羊髓一斤為東南三隅竈內諸藥炊以葦薪作三聚新好土藥沸卽下置土聚上三沸三下訖藥成以新布絞去滓病在外火炙摩之在內溫酒服如棗核日三後稍益以知為度

太傅白膏 治百病傷寒咽喉不利頭項強痛腰脊兩脚痠有風痺濕腫屈伸不能行步若風頭眩鼻塞有附息肉生瘡身體隱疹風搔鼠漏

瘰癧諸疽惡瘡馬鞍牛傾腫瘡及久寒結堅在心腹痛胸痺煩滿不得眠飲食咳逆上氣往來寒熱婦人產後餘疾耳目鼻口諸疾悉主之亦曰太一神膏方

蜀椒	升麻 <small>切各一升</small>	附子 <small>三兩</small>
巴豆	川芎 <small>各三銖</small>	杏仁 <small>五合</small>
狸骨	細辛 <small>各一兩半</small>	白芷 <small>半兩</small>
甘艸 <small>二兩</small>	白朮 <small>六兩</small>	一方用當歸 <small>三兩</small>

右十二味咬咀苦酒淹漬一宿以猪脂四斤微火煎之先削附子一枚以繩擊著膏中候色黃膏成

去澤傷寒心腹積聚諸風腫疾頸項腰脊強偏枯
 不仁皆摩之日一癰腫惡瘡鼠瘻癰疽炙手摩之
 耳聾取如大豆灌之目痛淚出繖白腎如珠當墮
 子視無所見取如稔米傅白土令其入自以手掩
 之須臾即愈便以水洗視如平復且勿當風三十
 日後乃可行鼻中痛取如大豆內鼻中并以摩之
 齶齒痛以綿裹如大豆著痛齒上咋之中風面目
 鼻口喎僻以摩之若晨夜行辟霜霧眉睫落數數
 以鏡漿洗用膏摩之

腫惡瘡方

千金方衍義卷七

杏

掃葉山房

曲魚膏 治風濕疼痛四肢羸弱偏跛不仁并癰

大黃

黃芩

莽艸

巴豆

野葛

牡丹

躑躅

芫花

蜀椒

皂莢

藜蘆

附子 各一兩

右十二味咬咀以苦酒漬藥一宿以成煎猪膏二
 斤微火煎三沸一下別內白芷一斤三上三下白
 芷色黃藥成去滓微火炙手摩病上口三
 野葛膏 治惡風毒腫疼痛不仁癰疽惡瘡癰疽
 腫腫脚弱偏枯百病方

野葛

犀角

蛇吻

莽艸

外臺作
齒牙

烏頭

桔梗

升麻

防風

蜀椒

乾薑

鱉甲

雄黃

巴豆

各一兩

丹參

三兩

躑躅花

升一

右十五味咬咀以苦酒四升漬之一宿以成煎猪
 膏五斤微火煎三上三下藥色小黃去滓以摩病
 上此方不可施之狠人慎之胡洽無刊參躑躅有
 防已吳茱萸附子當歸代
 巴豆雄黃蛇吻防風鱉甲
 蒼梧道士陳元膏 治一切風濕骨肉疼痛痺方

千金方衍義卷七

奎

掃葉山房

當歸

細辛

川芎

各一兩

桂心

五寸

天雄

三十
銖

生地

三斤

白芷

一兩

丹砂

二兩

乾薑

十累

烏頭

三兩

松脂

八兩

猪肪

十斤

右十二味咬咀以地黃汁漬藥一宿煎猪肪去滓
 內藥煎十五沸去滓內丹砂末熟攪用火炙手摩
 病上日干遍瘡胡洽有人參防風各三兩附子三
 銖雄黃二兩為十五味肘後干
 金翼有附子二十二銖雄黃二兩半大
 酢三月為十五味崔氏與千金翼同
 裴公八毒膏 治卒中風毒腹中絞刺痛飛尸入
 藏及厲麻不瘳尸厥奄忽不知人宿食不消温

服如棗核大得下止若毒氣甚咽喉閉塞不能
嚥者折齒內葱葉口中以膏灌葱葉中令下病
腫者向火摩腫上若歲中多濕欲省病及行露
露中酒服之內鼻中亦得方

蜀椒

當歸

雄黃

丹砂各二兩

烏頭

巴豆各一升

薤白一斤

莽艸四兩

右八味咬咀以苦酒三升漬一宿用猪脂五斤束

向竈葦薪火煎五上五下候薤白色黃絞去滓研

雄黃丹砂如粉內之攪至凝乃止膏成盛不津器

千金方衍義卷七

補菜山房

中諸蜈蚣蛇蜂等毒者以膏置瘡上病在外悉傳

之摩之以破除日合一方用礪石一兩蜈蚣二

枚是名八毒膏肘後不用巴豆
莽艸名五毒膏

敷膏都用麻油此則並用猪脂者取異類有情易

通血氣之病也方下有用相反相激如青膏之人

參細辛與藜蘆半夏與烏頭並用且多配入野葛

巴豆之屬總取以毒攻毒而已

孫真人千金方衍義卷七終

孫真人千金方衍義卷八

長洲 王著

南沙 客校

治諸風方凡八類

論雜風狀第一論二十五首

岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痲三曰風

懿四曰風痺夫諸急卒病多是風初得輕微人所不

悟宜速與續命湯依腧穴灸之夫風者百病之長岐

伯所言四者說其最重也

偏枯者半身不遂肌肉偏不用而痛言不變智不亂

千金方衍義卷八

補菜山房

病在分腠之間溫臥取汗益其不足損其有餘乃可

復也甲乙經云溫臥
取汗則巨取之

風痲者身無痛四肢不收智亂不甚言微知則可治

甚則不能言不可治

風懿者奄忽不知人咽中塞窒室然巢源作噎
噎然有聲舌強

不能言病在臟腑先入陰後入陽治之先補於陰後

寫於陽發其汗身轉輒者生汗不出身直者七日死

巢源作眼及鼻人中左右白者

可治一黑一赤吐沫者不可治

風痺濕痺周痺筋脈痺肌痺皮痺骨痺胞痺各有

證候形如風狀得脈別也脈微澁其證身體不仁

凡風多從背五臟入諸臟受病肺病最急肺主氣
息又目諸臟故也肺中風者其人偃臥而胸滿短氣
胃悶汗出者肺風之症也視目下鼻上兩邊下行至
口色白者尚可治急灸肺膈百壯服續命湯小兒減
之若色黃者此為肺已傷化為血矣不可復治其人
常妄言癡空指地或自拈衣尋縫如此數日死若為
急風邪所中使迷漠恍惚狂言妄語或少氣噎噎不
能復言若不求師即治宿昔而死即覺便灸肺膈及
膈膈肝膈數十壯急服續命湯可救也若涎唾出不
收者既灸當並與湯也諸陽受風亦恍惚妄言與肺
病相似然著緩可經久而死

千金方衍義卷八

掃葉山房

肝中風者其人但踞坐不得低頭繞兩目連額上色
微有青者肝風之證也若唇色青面黃尚可治急灸
肝膈百壯服續命湯若大青黑面一黃一白者此為
肝已傷不可復治數日而死
心中風者其人但得偃臥不得傾側問亂胃絕汗出
者心風之狀也若唇正赤尚可治急灸心膈百壯服
續命湯若唇或青或白或黃或黑者此為心已壞為
水面目亭亭時悚動者不可復治五六日死一云旬日死
脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黃吐酸汁出者

尚可治急灸脾膈百壯服續命湯若目下青手足青
者不可復治

腎中風者其人踞坐而腰痛視脇左右未有黃色如
餅柔大者尚可治急灸腎膈百壯服續命湯若齒黃
赤鬚髮直面土色者不可復治

大腸中風者臥而腸鳴不止灸大腸膈百壯可服續
命湯賊風邪氣所中則傷於陽陽外先受之客於皮
膚傳入於孫脈孫脈滿則入傳於絡脈絡脈滿則輸
於大經中成病歸於六腑則為熱不時臥止為啼哭
其脈堅大為實實者外堅充滿不可按之按之則痛

千金方衍義卷八

掃葉山房

也經絡諸脈傍支去者皆為孫脈也
凡風之傷人或為寒中或為熱中或為厲風或為偏
枯或為賊風故以春甲乙傷於風者為肝風以夏丙
丁傷於風者為心風以四季戊己傷於風者為脾風
以秋庚辛傷於風者為肺風以冬壬癸傷於風者為
腎風風中五臟六腑之膈亦為臟膈之風各入其門
戶所中則為偏風風氣循風膈而上則為腦風風入
頭則為目風眼寒飲酒中風則為酒風入房汗出中
風則為內風新沐中風則為首風久風入房中風則
為腸風外在腠理則為泄風故曰風者百病之長也

至其變化乃為他病無常方焉是知風者善行而數變在人肌膚中內不得泄外不得散因人動靜乃變其性有風過寒則食不下遇熱則肌肉消而寒熱有風遇陽盛則不得汗遇陰盛則汗自出肥人有風肌肉厚則難泄喜為熱中自黃瘦人有風肌肉薄則常外汗身中寒目淚出有風遇於虛腠理開則外出淩淒然如寒狀覺身中有水淋狀時如竹管吹處此是其證也有風遇於實腠理閉則內伏令人熱悶是其證也

千金方衍義卷八

四

掃葉山房

新食竟取風為胃風其狀惡風頸多汗膈下塞不通
食飲不下脹滿形瘦腹大失衣則臍滿食寒即洞泄
新熱食竟入水自漬及浴者令人大腹為水病
因醉取風為漏風其狀惡風多汗少氣口乾喜渴近衣則身如火燒臨食則汗流如雨骨節懈惰不欲自勞

新沐浴竟取風為首風其狀惡風而汗多頭痛
新房室竟取風為內風其狀惡風汗流沾衣

勞風之為病法在肺下使人強上而目脫唾出若涕惡風而振寒候之三日及五日中午不精明者是也七八日微有青黃膿涕如彈丸大從口鼻出為善若不

山則傷肺

風邪客於肌膚虛癢成風疹癢瘡風邪入深寒熱相搏則內枯邪客半身入深真氣去則偏枯邪客關節中即變筋中亦然邪淫於臟夢臟大形小淫於腑夢藏小形大邪隨目系入腦則目轉眩邪中精則散視見兩物風邪入臟寒氣客於中不能發則瘖瘖喉痺舌緩不時服藥鍼灸風逐脈流入臟使人卒瘖緩縱瘖瘖致死風入陽經則狂入陰經則癩陽邪入陰病則靜陰邪入陽病則怒

千金方衍義卷八

五

掃葉山房

若因熱食汗浴通腠理得開其自風出則覺肉中如鍼刺步行運力欲汗亦如此也
凡覺肌肉中如刺皆由腠理閉邪氣閉在肌中因欲出也宜解肌湯則善
大目瞶動口唇動偏喎皆風入脈故須急服小續命湯將八風散磨神明白膏丹參膏依經鍼灸之
諸痺由風寒濕三氣并客於分肉之間迫切而為沫得寒則聚聚則排分肉肉裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他痺發發則如是此內不在臟而外未發於皮膚居分肉之間真氣不能周故為痺也其風最多者不仁則腫為行痺走無

常處其寒多者則為痛痺其濕多者則為著痺冷汗
濡但隨血脈上下不能左右去者則為周痺也痺在
肌中更發更止左以應左右以應右者為偏痺也
夫痺其陽氣少而陰氣多者故令身寒從中出其陽
氣多而陰氣少者則痺且熱也

諸痺風勝者則易愈在皮間亦易愈在筋骨則難痊
也久痺入深合營衛滯經絡時疎則不知痛

風痺病不可已者足如履水時如人湯腹中股脛淫

澀煩心頭痛傷脾腎時嘔眩時自汗出傷心目眩傷

肝悲恐短氣不樂傷肺不出三年死一云三日

千金方卷八

掃葉山房

太陽中風重感於寒濕則變瘧也瘧者口噤不開背
強而直如發痲之狀搖頭馬鳴腰反折須臾十發氣
息如絕汗出如雨時有脫易得之者新產婦人及金
瘡血脈虛竭小兒臍風大人涼濕得瘧風者皆死温
病熱盛人腎小兒癩熱盛皆瘧瘧瘵瘵皆相似故
久厥成癩宜審察之其重者患耳中策策痛皆風人
腎經中也不治流入腎則喜卒然體瘵直如死皆宜
服小續命湯兩三劑若耳痛腫生汁作癰瘡者乃無
害也惟風宜防耳鍼耳前動脈及風府神良

諸風第二方二十九首
灸法三十六首

小續命湯 治卒中風欲死身體緩急口目不正

舌強不能語奄奄忽忽神情悶亂諸風厥之皆

驗令人不虛方

麻黃 防已崔氏外 人參

黃芩 桂心 白芍藥

甘艸 川芎 杏仁各一

防風一兩 附子一枚 生薑五兩

右十二味咬咀以水一斗二升先煮麻黃三沸去

沫內諸藥煮取三升分三服甚良不瘥更合三四

劑必佳取汗隨人風輕重虛實也有人脚弱服此

千金方卷八

掃葉山房

方至六七劑得瘥有風疹家天陰節變輒合服之

可以防瘡一本云恍惚者加扶神遠志如骨節煩

疼本有熱者去附子倍芍藥小品于金翼同深師

用杏仁救急無川芎杏

仁止十味延年無防風

小續命湯 治中風冒昧不知痛處拘急不得轉

側四肢緩急遺失便利此與大續命湯同偏宜

產後失血并老小人

麻黃 桂心 甘艸各二

生薑五兩 人參 川芎

白朮前 附子 防已

芍藥

黃芩各一兩 防風半兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服

古合錄驗無桂心名藥
命湯胡洽千金翼同

又方 治風歷年歲或歌或哭或大笑言語無所

不及方

麻黃三兩

人參

桂心

白朮各二兩

芍藥

甘艸

防已

黃芩

川芎

當歸各一兩

右十味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服日

千金方卷八

八

掃葉山房

三覆取汗

續命方專為中風六經形證而立以其死生反掌

較之傷寒尤為巨測蓋傷寒之邪卒然從表而入

非若中風皆由本虛虛風直犯無禁且多痰涎內

壅表裏糾纏之難於分解也所以小續命湯雖本

古今錄驗而麻黃桂枝兩方皆在其中以其本虛

必加人參駕馭麻桂發越在表之邪又需附子直

入少陰搜逐在裏之邪不使外內交攻正氣立斷

續命之名信乎不虛其餘川芎黃芩防風防已不

過為麻黃之使以祛標熱耳 前方治卒中風欲

死病起於暴故用麻黃必兼杏仁開發肺氣之逆

滿殊不可缺此見四肢緩急遺失便利脾胃兩虛

故加白朮實脾腴水不得復用杏仁耗氣之品

又方治風癩歷年不愈笑歌悲哭不常時虛而風

火乘之經謂精氣并於肺則悲笑歌則火之變非

續命無以療之以火乘肺燥非但附子耗陰當去

防風杏仁耗氣亦須裁汰但加白朮以攝脾津不

使復隨風火外泄

大續命湯 治肝厲風卒然瘖瘂依古法用大小

續命二湯通治五臟偏枯賊風方

千金方卷八

九

掃葉山房

麻黃八兩

石膏四兩

桂心

乾薑

川芎各二兩

當歸

黃芩各一兩

杏仁三十枚

荆瀝一升

右九味咬咀以水一斗先煮麻黃兩沸掠去沫下

諸藥煮取四升去滓又下荆瀝煮數沸分四服能

言未瘥後服小續命湯舊無荆瀝今增之效如神

千金翼
有甘艸

又方 治大風經脈奄忽不能言四肢垂曳皮肉

痛痿不自知方

獨活

麻黃各三兩

川芎

防風

當歸

葛根

生薑

桂心

茯苓

附子

細辛

甘艸

右十二味咬咀以水一斗二升煮取四升分五服

老小半之若初得病便自大汗者減麻黃不汗者

依方上氣者加吳茱萸二兩厚朴一兩乾嘔者倍

加附子一兩碗者加橘皮二兩若胸中吸吸少氣

者加大棗十二枚心下驚悸者加茯苓一兩若熱

者可除生薑加葛根初得風未須加減便且作三

劑停四五日已後更候視病虛實平論之行湯行

千金方衍義卷八

十一

掃葉山房

鍼依穴灸之

又方 治與前大續命湯同宜產婦及老小等方

麻黃

川芎各三兩

乾薑

石膏

人參

當歸

桂心

甘艸各二兩

杏仁

右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服續命湯外臺名

范注同云是張仲景方木欠兩味

西州續命湯 治中風痲人作身體不知自收日

不能言胃味不識人拘急背痛不得轉側方

麻黃 六兩

石膏 四兩

桂心 二兩

甘艸

川芎

乾薑

黃芩

當歸各一兩

杏仁三十枚

右九味咬咀以水一斗二升煮麻黃再沸掠去上

沫後下諸藥煮取四升初服一升猶能自覺者勿

熟眠臥可厚覆小汗出已漸減衣勿復大覆可熟

眠矣前服不汗者後復一升汗後稍稍五合一服

安穩乃服勿頓服也汗出則愈勿復服飲食如常

無忌勿見風并治上氣咳逆若面目大腫但得臥

服之大善凡服此湯不下者人口噓其背湯則下

過矣病人先患冷汗者不可服此湯與產婦及虛

千金方衍義卷八

十一

掃葉山房

人喜有死者皆為頓服二升傷多且湯濁不清故

也但得清澄而稍稍服微取汗者皆無害也湖洽方古

今錄名大續命湯

天續命湯乃麻黃越婢麻杏甘石等方之製即於

小續命湯中除去人參附子之助陽加八石膏以

化熱劑以滌痰則大小續命虛實攸分於此類

然以無參附助陽之品則防已傷津之味亦宜去

之 又方即於大續命中去杏仁乾薑石膏黃

芩則瀝仍取小續命中防風附子甘艸而加細辛

獨活葛根乃大續命之變法仍不出小續命之主

角 又方於大續命中除去黃芩荆瀝仍取小續

命中人參甘艸是大續命而兼小續命之製也

於大續命本方但除去荆瀝一味卽西州續命也

張景岳曰按歷代相傳治中風之方皆以續命等

方爲主夫續命湯以麻黃爲君與薑桂並用本發

散外邪之方至小續命大續命西州續命則加黃

芩以兼桂附雖曰相制而水火冰炭道本不同雖

有神妙終非予之心服者景岳爲近代名宿究心

靈素之學無出其右然於玉函金匱之旨猶虧一

實如小續命中之黃芩大續命中之石膏非具兩

千金方衍義卷八

主

攝藥山房

陽千金神通妙用難以語此

大續命散 治入風十二痺偏枯不仁手足拘急

疼痛不得伸屈頭眩不能自舉起止顛倒或臥

苦驚如墮地狀盜汗臨事不起婦人帶下無子

風入五臟甚者恐怖見鬼來收攝或與鬼神交

通悲慙哭泣忽欲走方

麻黃

烏頭

陽風

桂心

甘艸

蜀椒

杏仁

石膏

人參

芍藥

當歸

蒲葍蜀本附

黃芩

茯苓

乾薑各一兩

右十五味治下篩以酒服方寸七日再後加以知

爲度

續命煮散 治風無輕重皆主之方

麻黃

川芎

獨活

防已

甘艸

杏仁各三兩

桂心

附子

茯苓

升麻

細辛

人參

防風各二兩

石膏五兩

白朮四兩

右十五味粗篩下以五方寸七納小絹袋子中以

千金方衍義卷八

主

攝藥山房

水四升和生薑三兩煮取二升半分三服日日勿

絕慎風冷大良吾常中風言語蹇澀四肢疹曳處

此方日服四服十日十夜服之不絕得愈

大續命散與大小續命湯續命煮散及排風湯大

八風散小八風散總皆一脈相承主治入風十二

痺偏枯不仁悉屬風毒表證其臥如墮地狀盜汗

臨事不舉則又腎氣本虧不出內經邪之所湊其

氣必虛一語所以搜逐風痺藥中多用人參扶助

胃氣庶克有濟如大續命散與大小續命之製藥

皆彷彿獨藹如之除大風惡血蜀椒之逐骨節皮

膚死肌寒熱痺痲別出手眼大小續命之所未及
續命者故亦是大小續命發脈與大續命散相同
者半惟升麻佐麻黃升散獨活佐防已下泄白朮
佐參附遂消變毒蜀椒之法

排風湯 治男子婦人風虛濕冷邪氣入臟狂言

妄語精神錯亂其肝風發則面青心悶亂吐逆
嘔沫脇滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳

而臥其心風發則面赤翕然而熱悲傷瞋怒張
目呼喚其脾風發則面黃身體不仁不能行步

飲食失味夢寐倒錯與亾人相隨其肺風發則
面白咳逆吐膿血上氣奄然而極其腎風發則

千金方衍義卷八

五

排風湯

面黑手足不遂腰痛難俯仰痺冷骨疼諸有
此候令人心驚志意不定恍惚多忘服此安心
定志聰耳明目通臟腑悉主之

白蘚皮 白朮 芍藥

桂心 川芎 當歸

杏仁 防風 甘艸各一兩

獨活 麻黃 茯苓各三兩

生薑 四兩

右十三味咬咀以水一斗煮取三升每服一升覆

取微汗可服三劑

大八風湯 治毒風頑痺痺曳手脚不遂身體偏

枯或痿弱不仁或風入五臟恍惚惚多語善
忘有時恐怖或肢節疼痛頭眩煩悶或腰脊強

直不得俛仰腹滿不食咳嗽或始遇病時卒倒
悶絕即不能語便失音半身不隨不仁沉重皆

由體虛特少不避風冷所致方
當歸二兩 五味子 升麻各一兩

烏頭 黃芩 芍藥
遠志 獨活 防風

千金方衍義卷八

五

大八風湯

川芎 麻黃 秦艸

石斛 人參 茯苓各二兩

杏仁四十枚 黃芪 紫苑各二兩
石膏一兩 甘艸 桂心

乾薑各二兩 大豆一升翼方
右二十三味咬咀以水一斗三升酒二升合煮取

四升強人分四服羸人分六服

衍夫風虛濕冷足以傷人肢體亂人志意蓋八風之
邪善行數變得濕以紐之則滯著不行經脈血氣
無所不病故其治仍不出排風散邪猶如夏暑菴

蒸得風氣流蕩則濕熱隨之立散矣 大八風湯
 方下見證渾是濕著為患故於續命方中兼取大
 秦朮湯之製其妙用尤在黑大豆一味及和酒煮
 服為開發毒風脚氣之捷徑亦諒入元氣用藥之
 的訣

八風散 治八風十二痺猥過半身不遂歷節疼
 痛肌肉枯焦皮膚瞶動或筋緩急痛不在一處
 卒起目眩失心恍惚妄言倒錯身上瘡瘰面上
 起泡或黃黑角弓反張乍寒乍熱方

麻黃 白朮 羌活 各一斤

千金方衍義卷八

黃芩 一斤 大黃 半斤 枳實 根

甘艸 藥荆 天雄

白芷 防風 芍藥

天冬 石膏 山黃

食茱萸 躑躅 茵芋

附子 細辛 乾薑

桂心 雄黃 硃砂

丹參 各六兩

右二十五味治下篩酒服方寸七初每日一服三
 十日後日再五十日知百日瘥一年平復長服不

已住先食服

小八風散 治迷惑如醉狂言妄語驚悸恐惶
 惚見鬼喜怒悲憂煩滿顛倒色色短氣不得語
 語則失忘或心痛徹背不嗜飲食惡風不得去
 帷帳時復疼熱惡聞人聲不知痛癢身悉振搖
 汗出猥退頭重浮腫爪不知痛頸項強直口而
 喘戾四肢不隨不仁偏枯擊掣不得屈伸悉主
 之方

天雄 當歸 人參 各五分

附子 天冬 防風

千金方衍義卷八

蜀椒 獨活 烏頭

秦朮 細辛 白朮

乾薑 麻黃 五味子

桔梗 山黃 柴胡

萎艸 白芷 各二分

右二十味治下篩合相得酒服半方寸七漸至一
 七日三服以身中覺如鍼刺狀則藥行也

八風散主八風十二痺方中諸藥與膽朮門中先
 花散耆婆煎病丸相類其方下雖有半身不遂之
 證殊非中風六經形證之比詳其立方專以麻黃

附子細辛治開發陰邪於外大黃附子湯分泄陰邪於裏而兼藥荆蒿芋躑躅雄黃皆取眩之藥非大風惡疾詎可輕試必其人元氣素強病氣方充始為合宜 詳小八風散所治之證皆病久本虛邪實雖用麻黃附子細辛湯及理中三建等方之制專守溫理正氣邪自退聽之法藥味雖峻而無藥荆茵芋躑躅大毒之味故以小八風散稱之馬頭湯 治八風五尸惡氣遊走胸心流出四肢來往不住短氣欲死方

烏頭

芍藥

乾薑

千金方衍義卷八

太

攝藥山房

桂心

細辛

乾地黄

當歸

吳茱萸

甘艸 各二兩

右九味咬咀以水七升煮取二升半分三服

〔衍〕八風五尸之邪遊走心胸流出四肢往來不住雖非胸痺之著而不移其短氣欲死亦邪據胸中與

胸痺喘息咳唾心痛徹背背痛徹心無異苟非大

辛大烈無以分解毒邪故訪金匱赤石脂丸而用

烏頭乾薑方開痺著佐以桂心細辛吳茱萸其襄

溫散而兼芍藥當歸乾地黃護持營血甘艸和胃

并和藥性之寒熱

葉耳散 治諸風方

當以五月五日中午時乾地刈取葉耳葉洗曝燥搗下篩酒若漿服一方寸七日三作散若吐逆可蜜為丸服十九準前計一方寸七數也風輕易治者日再服若身體有風者皆作粟肌出或如麻豆粒此者為風毒出也可以披鍼刺漬去之皆黃汁出盡乃止五月五日多取陰乾之著大麥中稍取用之此艸辟惡若欲看病省疾者便服之令人無畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進

千金方衍義卷八

九

攝藥山房

食一周年服之佳七月七九月九皆可採用

〔衍〕葉耳一名蒼耳為頭風腦痛風濕周痺要藥其葉善辟惡氣開頂門行督脈專祛風濕毒邪服後觸

犯風氣遍身赤斑乃風毒發出之驗刺去黃汁乃

止取五月五日者取惡毒之辰以辟惡毒之邪也

治心風虛熱發即恍惚煩悶半身不仁蠱急方

荆瀝 竹瀝 各五升 栝杷根白皮

麥冬 各一升 香豉 二合 人參

茯苓 梔子仁 黃芩

川芎 桂心 細辛

杏仁

防風

白蘚皮兩

生薑

石膏

甘艸各三兩

右十八味咬咀以水二斗和竹瀝荆瀝煮取三升

分四服相去如人行六七里凡五劑間三日服一

劑一用防

治虛熱恍惚驚邪恐懼方

荆瀝三升

竹瀝二升

香豉三合

牛黃十八銖

麥冬

人參各三兩

升麻

鐵精

天冬

龍齒

茯苓

梔子各二兩

千金方衍義卷八

主

補藥山房

右十二味咬咀以水二斗煮取三升去滓下牛黃

鐵精更煎五六沸取二升七合分五服溫服相去

十里久

地黃煎 治熱風心煩悶及脾胃間熱不下食冷

所方

生地黃汁

枸杞根汁各二升

生薑汁

酥各三升

荆瀝

竹瀝各五升

天冬

人參各八兩

茯苓六兩

大黃

梔子仁各四兩

右十一味搗篩五物為散先煎地黃等汁成煎次

內散藥攪和每服一七日再漸加至三七覺利減

之

又方

黃芩

乾藍

芍藥

鼠尾艸各三兩

梔子仁

生葛各六兩

羚羊角

鼓一升

右八味咬咀以水七升煮取二升五合分三服

治積熱風方

地骨皮

姜糖

丹參

黃芪

麥冬

澤瀉各三兩

清蜜

薑汁各一合

生地汁

右九味以水六升煮取二升去滓內生地汁更緩

火煮減一升內蜜及薑汁又煮一沸藥成溫服三

合日再

八風之散多用辛烈治本而兼涼潤治標如小續

命湯中之黃芩大續命湯大續命散續命煮散中

之石膏大八風湯中之石膏黃芩八風散中之大

黃必同麻黃或兼人參或兼烏附各具寒熱相參

標本兼濟之妙用而此方及地黃煎並用荆瀝竹

瀝潤燥開痰全不用麻黃烏附等味乃八風五痺

之變法而實風 虛發熱之正治也方中枸杞根麥
門冬梔子豉黃芩石膏匡佐二瀝以散虛煩細辛
桂心川芎白蘼皮杏仁防風以祛風熱人參甘艸
以助藥力茯苓以守真氣生薑以散穢惡之邪也
第二方中天棘麥冬梔子豉佐二瀝以清虛熱
龍齒牛黃鐵精以鎮驚邪人參茯苓以守臟氣升
麻以鼓人參之力也 地黃煎亦用杞根天棘而
兼地黃乳酥佐二瀝以潤血燥梔子大黃以泄煩
熱人參茯苓以助祛邪薑汁以辟痰涎之滯也
又方用梔子豉湯兼黃芩芍藥乾藍羚羊以解肝

千金方衍義卷八

圭

掃葉山房

風蘊熱筋脈拘攣鼠尾生葛以治心胃虛也 其
治積熱風用地骨威蕤門冬澤瀉地黃皆清利風
熱解散血痺之品黃芪治大風癩疾丹參治心腹
邪氣清蜜即地黃煎中醜醜之意薑汁專行陰藥
之性與地黃煎功用不殊
大防風湯 治中風發熱無汗肢節煩腹急痛大

小便不利方

防風

當歸

麻黃

白朮

甘艸 各十
八銖

黃芩 三十
銖

乾地黃

山茱萸

茯苓

附子 附

右十味以水九升煮取二升半一服七合大
小便不利內大黃人參各十八銖大棗三十枚生
薑三兩煮取三升分三服深師加大

義

中風外有六經形證故用麻黃防風內有便溺阻

隔故用地黃當歸腎主二便大小便不利多屬腎
虛風燥故用朮附為主加茯苓甘艸則真武湯中
之二也山茱萸本經治心下邪氣溫中逐寒濕痺
去三蟲佐地黃則有酸收肝腎虛風之功黃芩本
經治諸熱黃疸逐水下血閉 佐麻黃則有解散肌
表風熱之用方後有大便不利內大黃然必兼人
參而用者正以血虛風燥藉以助力而除邪氣大
棗安中平胃生薑去臭氣通神明皆本經主治及
專和營散表之法靡不萃聚於是方也

千金方衍義卷八

圭

掃葉山房

大戟 治中風發熱方

大戟

苦參 等分

右二味為末以藥半升白酢漿一斗煮三沸適寒
溫洗從上下寒乃止立瘥小兒三指撮許漿水四
升煮洗之

義

中風發熱不止用大戟苦參為散煮湯以滌肢體

而祛毒邪專取大戟以治中 風皮膚疼痛苦參以
治結氣皆本經主治也

金牙酒 療積年八風五疰 舉身痺曳不得轉側

行步跛躄不能收攝又暴 口噤失音言語不正

四肢背脊筋急腫痛流走 不常勞冷積聚少氣

乍寒乍熱三焦不調脾胃 不磨飲澀結實逆害

飲食咋咽嘔吐食不生肌 醫所不能治者方

金牙碎如米粒乾地黃 地膏子無子用

恭用蛇 蕪蕪根 附子

防風 細辛 莽艸各四兩

美活一斤胡洽蜀椒四合

右十味咀以絹袋盛用酒 四斗於瓷罈中漬蜜

閉頭勿合泄氣春夏三四宿 秋冬六七宿酒成去

滓日服一合此酒無毒及可 小醉常令酒氣相接

不盡一劑病無不愈又令人 肥健酒盡自可加諸

藥各三兩惟蜀椒五合用酒 如前勿加金牙也冷

加乾薑四兩服此酒灸刺起 三十諸風痺曳神驗

用後備急用升麻乾薑各四 兩人參二兩石解牛

膝各五兩不用蒟蒻根為四味蘇茶不用地黃

為十三味一方用蒟蒻四兩 黃芩三兩胡洽用用

斷四兩為十一味千金翼用 苜芽四兩無莽艸

常山太守馬灌酒 除風氣 通血脈益精華定六

腑聰明耳目悅澤顏色頭白更黑齒落更生服

藥二十日力勢倍六十日志氣充盈八十日能

夜書百日致神明房中強壯如三十時力能引

芻年八十人服之亦當有子病在腰膝藥悉去

之方

天雄二兩 商陸根 躑躅

蜀椒各一兩 烏頭犬者一枚 附子五枚

桂心 白敏 茵芋

乾薑各三兩

右十味咀以絹袋盛酒三斗漬春 夏五日常冬

七日去滓初服半合稍加至兩三合搗滓為散酒

服方寸七日三以知為度夏日恐酒酸以油單覆

之下井中近水令不酸也千金翼無商陸

蠻夷酒一治久風枯攣三十年著床及諸惡風眉

毛墮落方

乾地黃 獨活 丹參

礬石各一兩 麥冬 附子

甘遂各二兩 赤石脂二兩 乾薑

蕪蕪 芫花 柏子仁各

蘇子一升 茯苓一作

茯苓一作

金牙	薯蕷	白朮
杜仲	石南	牡荊
山萸	欵冬 <small>各十 入錄</small>	白芷
烏豕	烏頭	人參
狼毒	蜀椒	防風
細辛	礬石	寒水石
牛膝	麻黃	川芎
當歸	柴胡	芍藥
牡蠣	桔梗	狗脊 <small>翼作 栴柅</small>
天雄 <small>各半 兩</small>	石斛	桂心 <small>各六 錄</small>

右四十五味咬咀以酒二斗漬夏三日春秋六日
冬九日一服半合蜜室中合藥勿令女人六畜見
之三日清齋乃合千金翼無川芎云加
大棗四十枚更佳

又方 治八風十二痺偏枯不隨宿食久寒虛冷
五勞七傷及婦人產後餘疾月水不調皆主之

方

舉石	佳心	白朮
狼毒	半夏	石兩
白石脂	龍膽	續斷
芫花	代糖	白石葵

茵茹	石葶	元參
天雄	山萸	防風
桔梗	藜蘆	卷柏
寒水石	細辛	烏頭
躑躅	蜀椒	白芷
秦艸	菖蒲 <small>各一 兩</small>	礬石
附子	遠志 <small>各二 兩</small>	石膏 <small>二兩 字</small>
蜈蚣 <small>一條</small>		

右三十四味咬咀以酒二斗漬四日氣服一合日
再十日後去滓曝乾搗篩為散酒服方寸七日再

以知爲度胡洽四十二味無桂心細辛烏頭躑躅
蜀椒有芒硝恒山黃芩黃連大黃麻黃
地黃前胡甘棘兔絲子芍藥柴胡各一兩杏仁三
十枚同搗篩細袋盛用酒二斗連三日黍米三斗
作飯依醱酒法以菜袋置醱中春秋七日冬十日
夏三日酒成服半雞子殼日三服曝藥爲末酒服
方寸七以身
體暖爲度

曾王酒 治風眩心亂耳聾目眩淚出鼻不聞香
臭口爛生瘡風齒癩癩喉下生瘡煩熱厥逆上
氣胸脇肩痺痛手不能上頭不能帶衣腰脊不
能俯仰脚痿不仁難以久立八風十二痺五緩
六急半身不遂四肢偏枯筋攣不可屈伸賊風
啣喉閉塞哽哽不利或如錐刀所刺行人皮膚

中無有常處久久不治入人五臟或在心下或在背背遊走四肢偏有冷處如風所吹久寒積聚風濕五勞七傷虛損百病悉主之方

茵芋

烏頭

鄒踰各三

天雄

防己

石斛各二十

細辛

牛膝

甘艸

柏子仁

通艸

桂心

秦艸

茵陳

山茱萸

黃芩

附子

瞿麥

乾地黄

王不留行胡洽

作天冬

千金方術義素

天

補藥加房

杜仲

澤瀉

石南

防風

遠志各三十

右二十五味咬咀以酒四斗漬十日每服一合加

至四五合以知為度千金翼名此為魯公酒有乾

用米二斗法麴三斤同漬三宿出糞糞炊一斗

黍米內汁釀之酒熟飲如雞子大日二兩飲以知

又方 治風偏枯半死行勞得風若鬼所擊四肢

不遂不能行步不自帶衣孿急五級六急婦人

帶下廔乳中風五勞七傷

乾薑

躑躅

桂心

甘肅

川芎

川斷

細辛

附子

秦艸

天雄

石膏

紫苑各五

葛根

通艸

防風

柏子仁

巴戟天

石斛

石南

山萸

石龍芮各四

牛膝

天冬各

烏頭二十

蜀椒半斤

右二十五味咬咀以水五升漬三宿法麴一斤合

漬黍米二斗合釀三宿去滓炊糯米一斗醱三宿

千金方術義素

天

補藥加房

藥成先食服半合日再待米極消盡乃去滓曝乾

末服

獨活酒 治八風十二痺方

獨活

石南各四

防風三兩

附子

烏頭

天雄

茵芋各二

右七味咬咀以酒二斗漬七日每服半合日三以

知為度

金牙酒 衍義見前七卷風毒脚氣門中 其馬灌

酒靈爽酒魯王酒獨活酒等方皆治厲風惡疾大

壽服形之方其申風門中葉也
灸法

扁鵲云治卒中惡風心悶煩壽欲死急灸足大趾下
橫文隨年壯立愈

若筋急不能行者內踝筋急灸內踝上四十壯外踝
筋急灸外踝上二十壯立愈

若眼戴睛上插灸目兩眥後二十壯

若不能言語灸第三椎上百壯

若不識人灸膻頭七壯

若眼反口噤腹中切痛灸陰囊下第一橫理十四壯

千金方衍義卷八

手

補藥山房

灸卒死亦良

治久風卒風發急諸風卒發動不自覺知或心腹脹

滿或半身不遂或口噤不言涎唾自出目閉耳聾或

身冷直或煩悶恍惚喜怒無常或唇緩失音聲啞或

弓反張始覺發動即灸神庭一處七壯穴在印堂直

上髮際是

次灸曲差二處各七壯穴在神庭兩傍各一寸半是

次灸上關二處各七壯一名客主人穴在耳前起骨

上廉陷者中是

次灸下關二處各七壯穴在口前下廉動脈陷者中

足

次灸頰車二穴各七壯穴在曲頰陷者中是

次灸廉泉一處七壯穴在當頤直下骨後陷者中是

次灸凶會一處七壯穴在神庭上二寸是

次灸百會一處七壯穴在當頂上正中央是

次灸本神二處各七壯穴在耳正直上入髮際二分

是又作四分

次灸天柱二處各七壯穴在項後兩大筋外入髮際

陷者中是

次灸陶道一處七壯穴在大椎節下間是

千金方衍義卷八

圭

補藥山房

次灸風門二處各七壯穴在第二椎下兩傍各一寸

半是

次灸心膈二處各七壯穴在第九椎下兩傍各一寸

半是

次灸腎膈二處各七壯穴在第十四椎下兩傍各一

寸半是

次灸膀胱膈二處各七壯穴在第十九椎下兩傍各

一寸半是

次灸曲池二處各七壯穴在兩肘外曲頭陷者中屈

肘取之是

次灸肩髃二處各七壯穴在兩肩頭正中兩骨間陷者中是

次灸支躡二處各七壯穴在手腕後骨外三寸兩骨間是

次灸合二處各七壯穴在手指虎口兩骨間陷者中是

次灸間使二處各七壯穴在掌後三寸兩筋間是

次灸陽陵泉二處各七壯穴在膝下外尖骨前陷者中是

次灸陽輔二處各七壯穴在外踝上絕骨端陷者中是

次灸崑崙二處各七壯穴在外踝後跟骨上陷者中是

治風灸上星及百會各二百壯前項二百四十壯腦戶及風府各三壯一云治大風灸百會七百壯

治百痺風灸腦後項大椎平處兩廂量二寸三分須取病人指寸量兩廂各灸百壯得瘥

治風耳鳴從耳後量入分半裏許有孔灸一切風得瘥狂者亦瘥兩耳門前後灸一百壯

治卒病惡風欲死不能語及肉痺不知人灸第五椎

名曰臑臑百五十壯多至三百壯便愈

心論穴在第五椎二云第七節對心橫三間寸主心風腹脹滿食不消化吐血酸削四肢羸露不欲飲食

鼻動目眴眩暈不明肩頭脇下痛小腹急灸二三百壯

大腸論在十六椎兩邊相去一寸半主風腹中雷鳴腸癖泄利食不消化小腹絞痛腰脊疼痛或大小便難不能飲食灸百壯三日一報

腋門在腋下攢毛中一寸名太陽陰一名腋間灸五十壯主風絕骨在外踝上三寸灸百壯治風身重心

煩足脛疼

賊風第三論一首方二十九首灸法六首

桂枝酒 治肝虛寒卒然瘖啞不聲踞坐不得面

目青黑四肢羸弱遺矢便利厲風所損方

桂枝 芎藭 獨活

牛膝 薯蕷 甘草各三

附子一兩 防風 茯苓

天雄 茵芋 杜仲

薊藟根 白朮各四兩 乾薑五兩

躑躅 猪椒葉根皮各一

大棗四十

右十八味咬咀以酒四斗漬七日每服四合日二加至五六合

衍義

肝虛卒犯厲風面青肢緩乃肝之本病至於痛噬便失又為腎臟氣衰不能統攝上下之兆方用桂

枝附子湯白朮附子湯甘艸附子湯三方萃聚於

一可謂峻矣猶恐腎中真陽式微不能煥發脾氣

乃以乾薑易生薑佐朮附以溫水土二臟且合成

日薑苓木以祛腎著之邪猶恐附子之力不逮更

需天雄統攝茵芋躑躅茺菴椒戮力并攻猶恐

千金方衍義卷八

書

附錄

茵芋等藥過烈因以大棗和之其獨活防風芎藭

薯蕷杜仲牛膝雖藥中卑伍然無老成無以約制

強悍克濟剛柔之用用酒漬者酒能活絡行經徹

內外而搜逐風毒之氣也

肝風古候其口不能言

當灸鼻下人中次灸大椎次灸肝膈第九椎下

是五十壯餘處隨年壯眼暗灸之得明二三三百

壯良

大定心湯 治心氣虛悸恍惚方見十六卷

乾薑附子湯 治心虛寒風半身不遂骨節痠痺

經弱不收便利無度口面喎邪方

乾薑 附子各八兩 桂心

麻黃各四兩 芍藥三兩

右五味咬咀以水九升煮取二升分三服三日後

服一劑

衍義

方下雖言心虛而實少火氣衰不能代天宣化故

用乾薑附子湯峻補命門之陽兼桂心助薑附益

火消陰腎氣有權則麻黃得以振發表之力心主

血芍藥既能治風又能和血觀本經有中風入腦

一頭痛寒痺筋攣緩急之治功用可知

千金方衍義卷八

書

附錄

側子酒 治心寒或笑或呷口欬方見前七卷

側子酒方藥味雖宜而方下主治不類未審是石

芎藭湯 治卒中風四肢不仁善笑不息方

芎藭一兩 黃芩 石膏一兩

當歸 秦艽 麻黃

桂心 乾薑 甘艸各一兩

杏仁二十枚

右十味咬咀以水九升煮取三升分三服

卒中風四肢不仁善笑不息土困木乘心火熾然

之象乃彙取麻黃葛根麻杏甘石之製專以乾薑

實脾壯風麻黃開肺泄熱石膏清胃化火具列莊
分之勢餘藥各隨寒熱佐使標本兼該此長沙密
諦真銓不覺為之吐露奈何干載塵埋能不為之
心折

荆瀝湯 治心虛寒陰氣傷寒損心驚悸語聲

寬急混瀾口啞目昧好白笑腐風傷心方

荆瀝 三升 母薑 一升 麻黃

白朮 芎藭 各四兩 防風

桂心 升麻 茯苓

遠志 人參 羌活

千金方衍義卷八 掃葉山房

當歸 各三兩 防已 甘艸 各二兩

右十五味咬咀以水一斗五升煎麻黃兩沸去沫

次下諸藥煮取三升去滓下荆瀝薑汁煎取四升

分四服日三夜一

荆瀝湯雖用荆瀝清火滌痰為君薑汁開導經絡

為佐金賴參甘維持胃氣運行藥力桂心鼓動於

中麻黃開發於外升麻提繫於上防已引泄於下

遠志通達心經又以蒼朮匡佐人參羌防輔麻

黃芩歸協濟桂心統攝荆瀝毋益其衰滌痰祛風

活血之功所謂治風先治血血行風自滅也

白朮酒 補心志定氣治心虛寒氣性反常心手
不隨語聲目昧其疾源屬風損心具如前方所
說無窮

白朮 切 荆實 各五升

芎花 三升 地骨皮

右四味以水三石煮取一石五斗去滓澄清取汁

釀米二石用麴如常法酒熟隨能飲之常取半醉

勿令至吐

此又荆瀝湯之補助白朮治風寒濕痺地骨皮治

五內邪氣周痺風濕荆實治筋骨間寒熱濕痺拘

急菊花治諸風頭眩腫痛惡風惡痺詳千金取用

藥性不出本經主治

治心風寒方

灸心膈各五十壯第五節兩邊各一寸半是

依源麻黃湯 治脚虛寒厲風所傷舉體消痰語

音沉漉如破鼓聲舌強不轉而好咽唾口噤唇

黑四肢不舉身重如山便利無度方 見別卷中

半夏湯 温中下氣治脾寒語聲憂懼舌本澀縮

噴喜無度昏悶恍惚脹滿方

半夏 大麻仁 各一升 生薑 各一

為脂 研 生薑 各一

芍藥 茯苓 五味子

桂心 橘皮各三 白木四兩

附子四兩 甘艸二兩 大棗三十

右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升去滓下

大麻仁脂更上火一沸分三服

衍義 合近効白木附子湯桂枝湯二陳湯三方但加麻

仁五味以滋米薑半夏之燥而風毒化脾寒散矣

當歸丸 禱脾安胃調氣止痛治脾虛寒身重不

舉語音沉鼓膈風傷痛便利無度方

當歸 酸棗仁 乾薑各八

千金方衍義卷八 橘葉山房

芎藭 乾地黄 天雄各六

黃芪 地骨皮各七 大棗二十

吳茱萸合五 甘艸 秦椒葉

厚朴 秦艸各四 桂心

防風 附子 白木各五

右十八味為末蜜丸如梧子酒服三十九加至四

十九日再服

衍義 賊風襲人每挾寒濕為患所以身重疼癢肢廢不

舉千金每以木附草桂等味開通血脈又需血藥

濡之風燥乃化故得取當歸命方厚朴一味從內

按滌風毒痰垢佐白木以辟除痺濕也

脾風占候聲不出或土下手

當灸十指頭次灸人中次灸大椎次灸兩耳

門前脈去耳門上下行一寸是次灸兩大指節

上下各七壯

治脾風方脾風者總呼為八風

灸脾 膈夾脊兩邊各五十壯凡人脾膈無定所

隨四 李月應病即灸膈膈是脾穴此法甚妙

依源麻 黃續命湯 治肺虛寒膈風所中喘吸戰

掉聲 嘶塞而散下氣息短億四肢痺弱面色青

千金方衍義卷八 橘葉山房

黃連 失便利冷汗出 杏仁

麻黃 大棗各五十 桂心

白木 石膏各四 茯苓

人參 菖蒲 茯苓各三

當歸 芎藭 甘艸各二

右十二味咬咀以水一斗二升煮麻黃去沫次下

諸藥煎取三升去滓分三服舊方無白木茯苓各

方無黃芩轉以依經逐病增損

衍義 此即古今錄驗續命湯多白木茯苓大棗三味即

方後所云舊方無白木茯苓是也

八風防風散 治肺寒虛傷語音嘶下拖氣用力

戰掉 緩弱羸瘠屬風入肺方

防風

獨活

芎藭

秦椒

乾薑

黃芪

附子

各四錢

天雄

麻黃

五味子

山茱萸

石菖

各三錢

秦朮

桂心

薯蕷

細辛

當歸

防己

人參

杜仲

各三錢

甘艸

各二錢

買衆

二枚

甘菊

紫苑

各二錢

右二十

四味治下節每服方寸七酒調進至兩七

日再

衍義 風門諸方以八風例稱者頗多此獨加防風二字

立名者 取其專行督脈與麻黃同為泄肺之品攻

諸風毒 腳氣門中八風散與此相同者十四味大

八風散 與此相同者十二味再攻本門大八風散

與此相 同者十味小八風散與此相同者一十味

大人八風 湯與此相同者十四味推其法原不出古

今錄驗 續命湯之原方九味又於小續命湯中採

取防己 防風附子三味互相秦究方得諸方之原

委心心相印不啻手提面命相向一堂也

濕中生薑湯 治肺虛寒虛瘦緩弱戰掉噓吸

滿肺痿方

生薑 二斤

桂心

橘皮 各四兩

甘艸

麻黃 各三兩

右五味咬咀以水一斗煮取二升半分三服煎麻

黃兩沸去沫然後入諸藥合煎

衍義 濕中而用麻黃湯方中除去杏仁易入生薑統領

麻黃開發肺胃之寒邪且得橘皮輔佐生薑豁痰

利氣以予邪之去路則邪心甘艸辛甘合劑以振

濕中之力更易一味則麻黃湯之功用截然兩途

且為肺痿門中要藥以生薑善開肺胃之氣也

治肺寒方

灸肺膈百壯

腎瀝湯 治腎寒虛為厲風所傷語音蹇吃不轉

偏枯所脚偏跛蹇緩弱不能動口喎言音混濁

便利仰人耳偏聾塞腰背相引隨病川藥休源

曾損方

羊腎 一具

黃芪

芎藭

乾地黄

山茱萸

桂心

黃歸

人參

防風

甘艸

五味子各三兩

元參

茯苓

芍藥各四兩

磁石五兩

地骨皮二升

生薑八兩

右十七味咬咀以水一斗五升煮羊腎取七升下

諸藥取三升去滓分三服可服三劑

此真脚氣門中用腎瀝湯大意不殊總取祛除風

毒填補腎氣為務乃於腎臟門中木方除去澤瀉

加生地黃以治傷中逐血痺填骨髓長肌肉山菜

黃以治心下邪氣温中逐寒濕痺殊非專資腎氣

千金方衍義卷八

聖

歸集山房

之謂脚氣門中用龍骨石脂固封藏此用地黃

菜黃滋化風毒宗旨雖同而支流各異方有濟於

心乎之妙須與二十一卷中腎臟門本方參看始

詳

茵芋酒 治耳聾口欬等病方見七卷

乾地黃丸 治腎虛喘吟衰志怒反常心性陽氣

弱腰背強急髓冷方

地黃

山茱萸

天門冬

淫心

續斷各一兩

柏子仁

桂仲

牛膝

菴菴各四兩

茯苓

天雄

鍾乳各二兩

松脂

遠志

乾薑各三兩

黃精

藜蘆

甘艸各一兩

右十八味為末蜜丸梧子大酒服三十九日二加

至四十九

腎虛風毒襲於髓府陽衰精冷改用鍾乳松脂填

塞骨空天雄薑桂辟除陰毒遠志菴蒲通利關竅

條皆輔佐之功亦可助力成功也

治腎寒方

灸腎膈百壯

千金方衍義卷八

聖

歸集山房

大巖蜜湯 治賊風腹中絞痛并飛尸遁注發作

無時發印捨心脹滿腸下如錐刀刺并主少陰

傷寒方

梔子十五枚

甘艸

乾地黃

細辛

羊脂青羊角

乾薑

吳茱萸

芍藥小用品

茯苓

當歸

桂心各一兩

右十一味咬咀以水八升煮取三升去滓內脂令

烱分三服温服相去如人行十里頃若痛甚者加

羊脂三兩當歸芍藥入參各一兩心腹脹滿緊急

者加大黃三兩治不用槐子羊膈

小巖蜜湯 治惡風角弓反張飛尸入腹絞痛悶

纔往來有時筋急少陰傷寒口噤不利方

大黃二兩 雄黃 青羊脂各一兩

當歸 乾薑 桂心

乾地黃 芍藥 甘艸

細辛各四兩 吳茱萸三兩

右十一味咬咀以水二斗者取六升分六服重者

加藥用水二斗者取九升分十服

衍見前三卷婦人門心痛篇中大巖蜜湯下

千金方衍義卷八

精製山房

排風湯 治諸毒風邪氣所中口噤閉絕不識人

及身體疼痛面目手足暴腫者方

犀角 貝子 升麻

羚羊角各一兩

右四味治下篩為粗散以水二升半內四方寸七

者取一升去滓服五合藥者以意增之若腫和

雞子傅上口三度老小可斟酌加減神良亦可多

合備用

衍排風者排散毒風邪氣也然有排之外散排之內

解不同前本門中十三味排風湯乃大續命之發

派此四味排風湯乃於邪氣門防風散中採用血

肉甲角三味磨礪堅積升麻一味升散毒風輔犀

角羚羊貝子排之從內而解與前十三味排風湯

風馬牛不相及也

烏頭湯 治寒疝腹中絞痛賊風人腹攻五臟拘

急不得轉側叫呼發作有時使人陰縮手足厥

逆方

烏頭十五枚要 大棗十枚 甘艸二兩

芍藥四兩 桂心六兩 老薑一斤

右六味咬咀以水七升煮五味取三升去滓別搗

千金方衍義卷八

精製山房

烏頭去皮四破蜜二升微火煎令減五六合內湯

中煮兩小沸去滓服一合日二間食強者三合以

如醉狀為知不知增之

衍烏頭辛烈為寒痛絞痛單刀直人之莢銳入於桂

枝湯中和營散邪煎用蜂蜜誠得南陽剛柔兼濟

之妙用於中易入桂心以壯烏頭之威但與金匱

之名不合通劑去桂枝二字單以烏頭命方與前

丸味烏頭湯略無干涉

治賊風所中腹內變急方

麻黃四兩 甘艸一尺 石膏

鬼箭羽一名衛茅
子大

右四味咬咀以東流水二升者取一升頓服之

腹內壅急虛風內賊而入傷於血也千金方借金

匱越脾湯之法於中除去薑棗易入衛茅外解

節賦風內散腹中滯血又以石膏相配麻黃一熟

一寒分解表裏諸邪一舉而兩得之也夫麻黃之

與石膏一專發表一專清埋寒熱米炭本不同塗

長沙每兼施如大青龍湯中大劑麻黃不得石

膏之宜通竊熱不能開發肌表以解煩躁越脾湯

中石膏勝於麻黃雖有風水雷洎龜表得不涼解

散勢必從之內泄况此方中有鬼箭羽之散血則

腹中擊急得不從之煖散乎孰謂麻黃條下除寒

熱破癥堅積聚石膏條下治中風寒熱腹中堅痛

非本經主治歟

論曰夫歷節風著人久不治者令人骨節蹉跌變成

癩病不可不知古今以來無問貴賤往往若之此是

風之毒害者也治之雖有湯藥而並不及松膏松節

酒若羈旅家貧不可急辦者宜服諸湯猶勝不治和

於知處灸三七壯佳

防風散 治身體四肢節解如墮腫脹按之皮陷

頭眩短氣溫溫悶亂欲吐者方

防風 白木 知母

桂心各四兩 芎藭 芍藥

杏仁 甘草各三兩 半夏

生薑各五兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜

一古今錄驗無半夏杏

仁芍藥用附子二枚

詳方下見證不獨毒風外賊兼有痰熱內蘊故於

金匱桂枝芍藥知母湯中退麻黃附子之悍烈進

杏半芍藥之和平以桂心芍藥內護營虛防風杏

仁外泄衛實白木薑半中啟脾濕妙在知母一味

滋桂心薑半之辛燥甘草一味和桂心知母之剛

柔較古今錄驗尤為穩當

羌活湯 治中風身體疼痛四肢緩弱不遂及產

後中風方 羌活 桂心 芍藥

葛根 麻黃 乾地黃各三

甘草二兩 生薑 五兩

右八味咬咀以清酒三升水五升煮取三升溫服

五合日三服

千金方衍義卷八

嬰

楊葉山房

千金方衍義卷八

嬰

楊葉山房

此葛根湯之變法故下卷又名葛根湯本太陽陽

明開肌表藥方中獨去大棗加羌活以治身體之

痛地黃以和經脈之血即防風湯中知母之意妙

在也黃之滋陰以制麻葛之升發也

防已湯 治風歷節四肢疼痛如錐鐵不可忍者

方

防已 茯苓 白朮

桂心 生薑 各四兩 甘艸 三兩

人參 三兩 烏頭 七枚

右八味咬咀以清酒一升水一斗煮取三升半一

服入合日三夜一當覺焦熱痺忽忽然慎勿怪也

若不覺復合服以覺乃止凡用烏頭皆去皮熬令

黑乃堪用不然至毒人宜慎之其方不

金匱防已黃芪湯本治風濕關節痠痛腰下疼痛

自汗惡風取二味合用以司開閉而祛濕著千金

又恐黃芪之功衛乃屏去不用易入烏頭專開痺

著桂心茯苓二味又於防已茯苓湯中採入加入

參者助防已逐痺之力也煎川苦酒取辟惡毒之

氣止

治風濕體痛欲折內如錐刀所刺方

附子 乾薑 芍藥

茯苓 人參 甘艸

桂心 各二兩 白朮 四兩

右八味咬咀以水八升煮取二升日三服 一方

去桂心用乾地黃二兩

風濕諸治首推長沙太陽例中桂枝附子湯等三

方加乾薑以助附子之烈入參以佐甘艸之力從

苓以監白朮之燥芍藥以收桂心之散則四逆理

中苓桂木甘等方皆彙集其中矣

大棗湯 治歷節疼痛方

大棗 十五枚 附子 一枚 甘艸 二尺

黃芪 四兩 生薑 二兩 麻黃 五兩

右六味咬咀以水七升煮取三升每服一升日三

服前方用薑桂苓木佐附子以治風濕體痛為其本

虛也此方用麻黃目黃佐附子以治歷節風痛為

其邪盛也用黃芪者專助麻黃開閉之機從防已

黃芪湯中採入信手扯來頭頭是道無非玉函金

匱之法

犀角湯 治熱毒流入四肢歷節腫痛方

犀角 二兩 羚羊角 一兩 前胡

黃芩

梔子仁

射干各二兩

大黃

升麻各四兩

豉一升

右九味哎咀以水九升煮取三升去滓分三服

衍義於四味排風湯中裁去貝子合梔子豉湯加前胡

黃芩佐升麻以散風熱加射干大黃佐犀角羚羊

以下堅積之血也

石膏湯 逐風毒方

石膏

雞子大

雞子二枚

甘艸一尺

麻黃

三兩

杏仁四十枚

右五味哎咀以水三升破雞子內水中炸令相得

內藥煮取一升服之覆汗汗不出燒石熨取汗出

為佳

衍義麻黃杏仁得石膏清解之刀則風毒外散石膏甘

艸得雞子潤燥之功則熱毒內化乃知麻杏甘石

湯不獨分解邪熱又添化毒之用也

松膏 治麻節諸風百節酸痛不可忍方

松脂三十斤煉五十遍酒煮十遍不能五十遍

二十遍亦可煉酥三升溫酒和松脂三升熟攪合

極調勻口空腹酒服方寸七日三數數食麩粥

為佳慎血腥生冷物酢果子百日已後瘥

松節酒 治歷節風 四肢疼痛由如解落方

松節三十斤

猪椒葉三十斤碎到各用

右二味澄清合漬乾 麩五斤候發以糯米四石五

斗釀之依家醞法四 酸勿令傷冷第一酸時下後

諸藥

柏子仁

天雄

草薢

芎藭各五兩

秦艸六兩

人參

茵芋各四兩

防風十兩

磁石十一兩末

獨活十二兩

右十味哎咀內飯中炊如常酸法酸足訖封頭四

七日歷取清適性服之勿至醉吐

松膏酒 治歷節風方

松膏一升酒三升浸七日每服一合日再數劑

愈

松葉酒

松葉三十斤酒二石五斗漬三七日服一合日

五六度

衍義松質堅勁歲寒不凋故能治風逐濕堅骨強筋但

松脂性燥必極力煉煮方可服食 松節和猪椒

葉釀酒後下柏子仁等除風濕藥所謂雖有湯藥

不及松膏松節酒也 松葉歷風挺勁漬酒亦能

治風

偏風第四 方十二首 鍼灸法五首

防風湯 治偏風甄權處方安公方

防風 芍藥 芎藭 白芷

牛膝 狗脊 車蔎

白朮 羌活 葛根

附子 杏仁 薏苡仁

石膏 桂心 麻黃

生薑 五兩

千金方術要卷之

至

掃葉山房

右十六味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服

一劑響好更進一劑即一度鍼九劑九鍼即瘥灸

亦得

鍼風池一穴 肩髃一穴 曲池一穴

支溝一穴 五臟一穴 陽陵泉一穴

巨虛下廉一穴 凡鍼七穴即瘥

仁壽宮備身患脚奉 勅

鍼環跳一穴 陽陵泉一穴

巨虛下廉一穴 陽輔一穴

凡鍼四穴即能起行

大理趙卿患風腰脚不隨不能跪起

鍼上第第一穴 環跳一穴 陽陵泉一穴

巨虛下廉一穴 凡鍼四穴即能跳起

厘狄欽患偏風不得挽弓

鍼肩髃一穴即得挽弓 甄權所行

防風湯前後兩方藥品證治相類方中防風杏仁

白朮桂心甘艸生薑一揆無異麻黃附子金匱桂

枝芍藥知母湯中用之一皆祖述此方前方中芍

藥即此方牛膝之變前方中半夏即此方薏苡仁

之變前方中知母即此方石膏之變前因溫溫欲

千金方術要卷之

至

掃葉山房

吐故需半夏甘艸以和中此因偏風脚弱又需草

薢狗脊以逐濕鍼藥交攻何慮沉疴不起

治狼退風半身不遂失音不語者方

杏仁去雙仁及皮尖三斗洗入日搗二斗合碎

研如寒食粥法取汁八升煎取四升口嘗看香

滑即熟未及此則為不熟惟熟為妙停極冷然

後內好麴一斗六升煎取八升第一遍酸饋也

次一炊復取杏仁三升研取一斗二升汁煎取

六升第二酸也次一炊準第二酸取杏仁汁多

少為第三酸也若疑米不足別更取二升杏仁

研取八升汁煎取四升更斟酌炊米酸之若猶不足更研杏仁二升取八升汁煎取四升更酸之以熟為限一石米杏仁二斗所以飭次研杏仁者恐并煎汁酢故也若冬日任意并煎準計三斗杏仁取汁一石六斗煎取八斗四升漬麴以分之酸饋酒熟封四七日開渣取清然後壓糟糟可乾末和酒服之大驗

又方

草麻子脂一升酒一斗銅鉢盛著酒中一日煮之令熟服之

又方

灸百會 次灸本神 次灸承漿 次灸風府
 次灸肩髃 次灸心膂 次灸手五指 次灸
 手髓孔 次灸手少陽 次灸足五指 次灸
 足髓孔 次灸足陽明各五百壯

治大風半身不遂方

蠶沙二石熟蒸分作直袋三枚各受七斗熟盛一袋著患處如冷即取餘袋一依前法數數易換百不禁瘥止須羊肚醱糯米葱白薑椒鼓等爛煮熟喫日食一具十日止

又方

蒸鼠壤土袋盛熨之瘥

杏仁散邪降氣潤燥通聲 草麻開竅透經偏風

失音要藥但大毒宜慎 蠶沙勝風濕痺弱熱蒸

最為得力而平正可法 鼠壤中土得隙中賊風

最厲取以蒸熨治瘳絡中毒同氣相感之用也

葛根湯 治四肢緩弱身體疼痛不遂婦人產後

中柔風及氣滿方

葛根

芍藥

桂心

乾地黄

羌活各三

麻黃

甘草各二

生薑六兩

右八味以清酒三升水五升煮取三升温服五合

日三

與前羌活湯名異實 同但減麻增薑稍為不同

麻子湯 治大風周身四肢變急風行在皮膚身

勞強服之不虛人 又治精神蒙昧者方

秋麻子 三升淨漿水漬一宿

防風

桂心

生薑

石膏碎綿

橘皮各二

麻黃三兩

竹葉

葱白各一

香豉一合

右十味咬咀先以水二斗半煮麻子令極熟漉去

滓取九升別煮麻黃兩沸掠去沫內諸藥汁中煮

取三升去滓分三服空腹服當微汗汗出以粉塗

身極重者不過兩三劑輕者一兩劑瘥有人患大

風賊風刺風加獨活三兩比之小續命湯準當六

七劑

衍義麻黃桂枝防風香豉葱白生薑透表之藥故取以

治周身四肢變急之風麻仁石膏橘皮竹葉清裏

之藥故取以治精神索昧此風火擾亂神明所以

神識不清殊非木虛之謂

千金方衍義卷八 攝藥山房

仲景三黃湯 治中風手足拘攣百節疼痛煩熱

心亂惡寒經日不欲飲食方

麻黃三十 黃芩 黃芪

細辛各十 獨活一兩

右五味咬咀以水五升煮取二升分二服一服小

汗兩服大汗心中熱加大黃半兩脹滿加枳實六

銖氣逆加人參心忪加牡蠣湯加栝藹各十八銖

先有寒加附子一枚

衍義惡寒經日不欲飲食雖有似乎虛寒而實衛虛不

能勝邪風熱內蘊所以煩熱心亂故方中用麻黃

細辛獨活開發沍寒於外即則黃芩清解風熱於

內黃芪佐麻黃開閤之權杜虛風復入之路與黃

芪建中湯立法不殊方後云心熱加大黃言服前

藥心中煩熱不除則加大黃引之下泄加枳實以

泄滯氣加人參以扶胃氣加牡蠣以破結氣加栝

藹以清痰氣加附子以除陳氣也 此方在金匱

要略中原名千金三黃湯而千金方中特標明仲

景三黃湯不忘祖述之意決非後人採取附入可

知詳千金二字乃珍重之意或上古別有千金方

書況金匱中風門中黑散續命俱採古方千金雖

未得為仲景徒而私淑最切因是遂以命方蓋本

諸此

白斂薤白湯 治風濕拘攣不可屈伸方

白斂 薤白 芍藥

桂心 酸棗仁 牛膝

乾薑 甘草各一 附子三枚

右九味咬咀以淳酒二斗漬一宿微火煎三沸每

服一升日三扶杖起行不翼方有耐酒服五合

車前子拘攣不可屈伸首取白斂以除風熱散滯氣薤白

牛膝本經皆主拘攣棗仁治心腹邪氣痿痺

桂心芍藥專和營氣四逆湯三味開下焦痺著之

邪酒煎以行血脈之氣

獨活寄生湯 夫腰背痛者皆由腎氣虛弱臥冷

濕地當風得之不時速治喜流入脚膝為偏枯

冷痺緩弱疼重或腰痛擊脚重痺宜急服此方

獨活 三兩

寄生古今錄驗 杜仲

牛膝

細辛 秦艽

茯苓

桂心 防風

芎藭

乾地黄 人參

甘艸

當歸 芍藥各二兩

千金方衍義卷八

素 掃葉山房

右十五味咬咀以水一斗煮取三升分三服温身

勿冷風虛下利者除乾地黃服復取薊葉火燎

厚安席上及熱眠上冷復療之冬月取根春取莖

熬臥之佳其餘薄熨不及薊蒸為愈也諸處風

濕亦用此法新產竟或患腹痛不得轉動及腰脚

攣痛不得屈伸痺弱者宜服此湯除風消血附後

子一枚無寄生

風性上行得濕沾滯則留著於下而為腰脚痺重

非獨活寄生無以療之辛防秦芎獨活之助牛膝

杜仲寄生之佐桂苓參甘以壯其氣芎藭芍地以

滲其血血氣旺而痺著開矣

菊花酒 治男女風虛寒冷腰背痛食少羸痛無

顏色喘吸少氣去風冷補不足方

菊花 杜仲各一 防風

附子 黃芪 乾薑

桂心 當歸 石斛各四

柴石莢 菴蓉各五 草薢

獨活 鍾乳各八 茯苓三兩

右十五味咬咀以酒七斗漬五日一服二合稍加

至五合千金翼不

千金方衍義卷八

素 掃葉山房

杜仲酒 治腰脚疼痛不遂風虛方

杜仲八兩 石南二兩 羌活四兩

大附子五枚

右四味咬咀以酒一斗漬三宿每服一合日再偏

宜冷病婦人服之

此方專為上熱下冷上實下虛而立菊花石斛清

上風熱石莢鍾乳固下虛寒餘皆風濕之治杜仲

酒味少力專功用與菊花酒無異

風痺第五論三首 方九首

論曰夫風痺者卒不能語口噤手足不遂而強直者

是也治之以伏龍肝五升為末冷水八升和攪取汁飲之能盡為善別後此方治心煩恍惚自此以下九腹中痛滯絕而復蘇

方皆主此風用之次第宜細尋之論曰凡欲醫此病當知先後次第不得設投湯藥以失機宜非但殺人因茲遂為痼疾已既得之當進三味竹瀝飲少似有勝於常更進湯也竹瀝飲子患熱風者必先用此制其熱毒

竹瀝湯 治四肢不收心神恍惚 不知人不能言

方

竹瀝二升 生葛汁一升 生薑合三

千金方衍義卷八 本草 掃葉山房

右三味相和溫暖分三服平且且脯夜合一服服

訖覺四體有異似好次進後湯方

竹瀝一升 生葛汁五合 芎藭 防已 附子 人參

芍藥 黃芩 甘艸

桂心 各一 生薑 四兩 羚羊角 三兩

石膏 六兩 杏仁 四十枚 麻黃

防風 各一

右十六味咬咀以水七升煮減半內瀝煮取二升

五合分三服取汗間五日更服一劑頗與三劑漸

覺少減仍進後方

竹瀝 三升 防風 升麻

羚羊角 防已 桂心

芎藭 各二 麻黃 三兩

右八味咬咀以水四升合竹瀝煮取二升半分三

服兩日服一劑常用加獨活 三兩最佳此方神良

頻進三劑若手足冷者加生薑五兩白朮二兩若

不除更進後方

竹瀝一升 甘艸 一本作葛 人參

芎藭 獨活 升麻 各二

防風 麻黃 芍藥 各一

生薑 石膏 羚羊角

防已 桂心 黃芩

附子 一本作杏 白朮 各二

右十七味咬咀以水八升煮減半內瀝煮取二升

半分三服相去如人行十里久更服若有氣者加

橘皮牛膝五加皮一兩

煮散 凡風痺服前湯得瘥訖可常服此除餘風

方

防風 防已 獨活

秦朮

黃芪

芍藥

人參

白朮

茯苓

芎藭

遠志

升麻

石斛

牛膝

羚羊角

丹參

甘艸

厚朴

天門冬

五加皮

地骨皮

黃芩 翼方作
薯蕷

桂心 各一兩一
云各四兩 乾地黄

橘皮

生薑

麻黃 各二
兩

枳榔

葵本 翼方作
附子

杜仲 翼方作
麥門冬

烏犀角 各一兩
作山茱萸

蕤苳仁

一升

千金方 衍義卷八

空 掃葉山房

石膏 六兩一
云三兩

石三十三味搗篩為粗散和攪令勻每服以水三

升藥三兩煮取一升綿漚去滓頓服之取汗日一

服若覺心中熱煩以竹瀝代水煮之

衍義 風痺而用伏龍肝溫理主藏水攪飲汁以泄旺氣

也其竹瀝湯專取竹瀝通行經絡清痰降火生葛

汁鼓舞胃氣散熱生津得薑汁之辛散以解中外

血氣之滯 其第二方彙採麻黃桂枝越脚麻杏

甘石桂枝附子等湯之制但不及大棗戀膈之味

所加防已防風黃芩羚羊等味與脚氣門中竹瀝

湯方小異 服前方肢冷漸和則參附石膏可以

不用但以升麻代生葛僅取方中之半足矣 倘

服前湯或加獨活肢冷未和生薑尚不可少更需

白朮健脾運濕則竹瀝尤為得力 若服前藥諸

證未除富於前方稍變以升麻代生葛加獨活白

朮祛風運痰杏仁可以無煩如反見虛氣浮腫加

橘皮牛膝五加皮以行氣開痺則氣腫消矣 凡

服竹瀝湯等方得瘥而餘邪未除故於防已黃芩

湯中裁去大棗加犀角羚羊枳榔石膏導其風毒

則參芪得以建保元益氣之功若覺心中熱煩以

千金方 衍義卷八

空 掃葉山房

竹瀝代水仍不出竹瀝湯之法

荆瀝湯 凡患風人多熱常宜服此方

荆瀝 竹瀝 生薑汁 各五

右三味相和溫暖為一服每日三服煮散午後進

此平復好瘥乃止

衍義 荆瀝湯與前三味竹瀝湯主治相類荆瀝竹瀝回

為治風逐濕祛痰要藥但一溫一寒少有差別

獨活煮散 治諸風痺去

獨活 八兩 芎藭 芍藥

茯苓 防風 防已

芍根各六兩

羚羊角

當歸

人參

杜心

麥門冬

石膏各四兩

磁石十兩

甘艸三兩

白朮五兩

右十六味各切到分爲二十四分每分入生薑生

地黃切一升杏仁二十七枚以水二升煮取七合或

日晚或夜中或日一服或間日服無所忌

衍又於煮散中採取二十三味以茯苓代茯神麥門

冬代天門冬葛根代升麻牛膝代磁石鎮攝虛風

以杜復擾之患不須麻黃犀角等味也

千金方衍義卷八

蘇東山房

五補丸 凡風服湯藥多患虛熱翕翕然宜除熱

方

防風

人參

茯苓

乾地黃

羚羊角

麥門冬

天門冬各一兩半

芍藥

獨活

乾薑

白朮

丹麥

食茱萸一云山茱萸

甘艸

茯神

升麻

黃芩

甘菊

地骨皮

石斛

牛膝

五加皮

碧黃各二兩

秦艸

芎藭

桂心

防已

生薑屑

黃芩各一兩

附子十八

石膏三兩

寒水石二兩

右三十二味爲末蜜和丸如梧子大生薑蜜湯服

二十九日三稍加至三十九忌油麪蒜生冷酢滑

及猪羊雞魚等肉

衍五補者補五臟諸虛不足也方下主治虛熱而反

用桂附乾薑者以虛熱不得溫補不散反謂溫能

除大熱也致虛之由良因服風藥過多故仍用獨

活秦芫防已防風引領參芪入於殘破之區與太

千金方衍義卷八

蘇東山房

陽病下之後其氣上衝者與桂枝湯方用前法同

義黃芩芍花清解於上石膏寒水石降泄於下白

朮甘艸鎮守於中餘藥各隨所主以補五臟諸虛

不足也

論曰古人立方皆準病根冷熱制之今人臨急造次

搜尋故多不驗所以欲用方者先定其冷熱乃可檢

六用無不效湯藥既爾丸散亦然凡此風之發也必

由熱盛故有竹瀝葛汁等諸冷藥焉後之學者不能

仔細識其方意故有茲論具而述之其人無密室者

不可與療以強人居室不密尚中風邪况服藥之人

手

治風痺不能語手足不遂方

度病者手小指內岐間至指端為度以置臍上直望心下以丹注度上端畢又作兩度續所注上合其下開其上取其本度橫置其開上合三合其狀如到作某字形男度左手女度右手嫌不分了故上丹注三處同時起火灸之各一百壯愈

風懿第六論三首 方二十三首

獨活湯 治風懿不能言四肢不收手足痺曳方

千金方衍義卷八

癸

補藥山房

獨活 四兩

桂心

芍藥

栝萸根

生葛 各二兩

生薑 六兩

甘艸 三兩

右七味咬咀以水五升煮取三升分三服日三

風懿者虛風內襲陰掩陽機反有似乎溫柔賢善

之象所以口不能言肢不能收乃陽和失紀不能

統運所致故於桂心芍藥甘艸和營劑中特取獨

活入骨祛風栝萸除煩潤燥生葛解渴生津方下

雖不言燥渴詳其藥味可知良由風氣蘊熱聚飲

生痰留滯於中阻礙清氣往來之道以故口不能

言但得痰化津潤機竅自通不當猛烈攻發重傷

論曰脾脈絡胃俠咽連舌本散舌下心之別脈係舌木今心脾二臟受風邪故舌強不得語也

治中風口噤不能言方

防已

桂心

麻黃 各二兩

葛根 三兩

甘艸

防風

芍藥 各一兩

生薑 四兩

右八味咬咀以水六升煮取二升半分三服瘖瘖不語皆治之

千金方衍義卷八

癸

補藥山房

肺為諸竅之源脾為聚濕之器所以不用獨活而

用麻黃開發肺氣不用栝萸而用防已防風疎利

脾濕濕利則風氣散而竅通舌機發而聲無滯矣

石南湯 治六十四種風注走入皮膚中如蟲行

腰脊強直五緩 六急手足拘攣隱疹搔之則作

瘡風尸身癢卒 風面目腫起手不出頭口噤不

能言方

石南

乾薑

黃芩

細辛

人參 各一兩

桂心

麻黃

當歸

芍藥 各一兩

甘肅二味 乾地黃十八 食茱萸三十

右十二味咬咀以水六升酒三升煮取三升分三服大汗勿怪

義風濕二氣每每相兼風從地也濕從地受皆緣土

氣疎豁二氣得以交蒸夫人之脾土喜燥惡濕濕

勝則風動可知風氣之病靡不由濕鬱所致曷知

楚濶則風生風動則濕散此天地勝復之機至人

體此首取石南勝陰復陽專治風痺痿弱麻桂細

辛祛風散邪薑黃參艸實脾杜濕窮歸地黃養血

榮筋黃芩一味開發鬱閉之風熱風能勝濕當無

千金方衍義卷八 空 掃葉山房

大筋更短小筋弛長之愚矣

治中風口噤不知人者方

芥子一升 酢三升

右二味煮取一升薄頭以布裹之日一度吐後以

又方

鼓五升 吳茱萸二升

右二味以水七升煮取三升漸飲之吐後以

又方

白木四兩以酒三升煮取一升頓服

又方

服荆瀝一升

又方

服淡竹瀝一升

義芥子之辛以散風濕痰涎苦酒之酸以收血氣禁

逆乃借長沙少陰例中苦酒湯之法彼佐半夏以

辟濁陰之痰此助芥子以除濁惡之氣 鼓本黑

豆所蠶盒成敗穢之氣專辟穢惡之邪驅之從裏

達表莖專溫中除濕以通血痺逐風邪開腠理風

濕除穢惡去經脈無滯舌強自愈也 白木治風

千金方衍義卷八 空 掃葉山房

寒濕痺惟生者大效 荆瀝專治實痰 竹瀝專

治虛痰無薑汁不應小方中功力最專慎毋忽視

鍼灸法

中風口噤不得開灸機關翼名二穴穴在耳下八

分小近前灸五壯即得語又灸隨年壯做老逐僻左

右灸之中風失瘡不能言語緩縱不隨先灸天窻五

十壯息火仍移灸百會五十壯畢還灸天窻五十壯

者始發先灸百會則風氣不得洩內攻五臟喜閉伏

仍失音也所以先灸天窻次百會佳一灸五十壯悉

洩火勢復灸之視病輕重者一處三百壯大效凡

戶風服藥益劇者但是風穴悉皆灸之三壯無不愈也神良決定勿疑惑也不至心者勿恨盡灸

論曰風寒之氣客於中滯而不能發故瘡不能言及喉痺失聲皆風邪所為也入臟皆能殺人故附之於治風方之末凡尸厥而死脈動如故此陽脈下墜陰脈上爭氣閉故也鍼百會入三分補之灸熨斗熨兩脇下又竈突墨彈丸大漿水和服之又鍼足中趾頭去甲如韭葉又刺足大趾甲下內側去甲三分

桂湯 治卒失音方

濃煮桂汁服一升覆以瓦亦可末桂著舌下漸

漸嚥汁

又方

濃煮大豆汁合亦佳無豆用豉

治卒不得語方

酒五合和人乳汁鍾半分為三服

風從穴起乘土之罅漏而發故欲杜虛風先實中土突墨得壯火之餘烈結成煤土取溫水臍而穴通君主以辟陰邪并取酸漿和服以收耗散之津則中州之土安如磐石也 桂湯辛甘利竅入口便達廉泉津自溢出通聲之效於此可見 黑大

千金方衍義卷八

主

掃葉山房

豆汁下通腎氣上化虛風亦滋津通聲之一助

卒不得語乃陰氣暴逆故以酒通陽氣乳和陰血使無下墜上爭之擾氣血安和機關順利而語自如矣三法在刺灸後用之尤為得宜

論曰夫眼瞽動口唇偏喎皆風入脈急與大續命湯附子散摩神明膏見前七卷丹參膏見二十四卷依穴灸之喉痺舌緩亦然風入臟使人瘖瘖卒死口眼相引牙車急舌不轉喎僻者與伏龍肝散和雞冠血及鱉血塗乾復塗之并灸吻邊橫文赤白際逐左右墮年壯報之至三報三日不瘥更報之

千金方衍義卷八

主

掃葉山房

附子散 治中風手臂不仁口面喎僻方

附子

桂心各五兩

細辛

防風

人參

乾薑各六兩

石六味治下篩酒服方寸七日三稍增之

中風大法有匹曰偏枯曰風痲曰風懿曰風痺四支一本原無彼此殊分金匱有云風之為病當半身不遂但一臂不遂此為痺脈浮而中風使然千金例之風懿乃輔長沙未逮而立附子散方首推附子復陽勝陰佐桂薑和營開痺辛防祛風逐濕人參助諸藥力也按靈樞云中於陰者常從臂

筋始夫精與筋其陰皮薄其肉滑澤故俱受於風
獨傷其陰陰受邪搏而強陽微不能勝陰是以必
需附子復陽為務也

甘艸湯 治偏風積年不瘥手脚枯細面口喎斜

精神不定言語倒錯方

甘艸 桂心

芍藥

麻黃 當歸

芍藥

人參 附子

附子 各二

獨活

防已 各三

生薑

石膏

茯神 各四

白朮

千金方術藥入

秦艸

黃芩

細辛 各一

秦艸

防風 各一

菊花 一升

淡竹瀝 四升

右二十一味咬咀以水一斗先煮麻黃去沫取七

升內竹瀝及諸藥煮取三升分四服服三服訖開

一盃粥後更進一服待藥勢自汗慎生冷醋蒜麩

乳酪魚等

偏風積年不瘥服藥不除而至手脚枯細必是風

從火化而成本寒標熱之患故於附子散中除去

乾薑之辛燥增入麻黃獨活按風逐痺芥木甘艸

健脾行濕芎藭芍藥養血營筋芩膏菊瀝杜風化

筋則附桂辛防藉人參之大力何礙歷年固疾不

瘥耶其餘秦芩防已側子生薑匡助木附麻黃之

力大方中不可無助長之味也方後服三服間粥

一盃於長沙太陽例服桂枝湯後啜熱稀粥以助

藥力法悟入

治中風面目相引口偏著耳牙車急舌不得轉方

獨活 三兩

生地黃汁

竹瀝 各一

右三味合煎取一升頓服之即愈

又方

牡蠣

礬石

附子

千金方術藥入

秦艸

龍下黃土 等分

右四味為末取三年雄雞冠血和藥傳其上持鏡

候纔欲復故便急洗去之不速去便過不復還也

千金翼云偏右

面目相引口偏著耳乃風中血脈之徵非必其人

元氣不充不勝大劑搜滌故立小方僅用獨活以

祛風地黃竹瀝以化熱乃風疢門中三味竹瀝湯

之變法 雄雞冠血和溫煖藥傳嚼處專取陽氣

充溢以辟陰邪之滯也

又方

竹瀝三升

防風

防已

升麻

桂心

芎藭各三兩

麻黃四升

羚羊角三兩

右八味咬咀以水四升合竹瀝煮取一升半分三

服日服一劑常用效

衍偏風咽僻而用二麻二防祛除毒風芎藭桂心和

營開結羚羊竹瀝施筋化熱藥味和平而功力最

專允為尋常可師之良法

治耳聾方

防風

附子

葛根各二兩

千金方

術藥卷八

重

掃葉山房

柏實

麻黃各二兩

獨活

生薑各四兩

杏仁三十枚

右八味咬咀以水一斗酒二升煮取三升分四服

衍治風而用附子搜逐固結於內麻黃黃芪發邪風於

外又以獨活生薑佐附子內辟經脈之邪防葛佐

麻黃外開內腠之閉柏實除風濕安五臟養正祛

邪惟在一味為調閱之樞耳

又方

青松葉一斤搗令汗治待法一斗漬一宿近火

一宿初服半升漸至一升頭面汗出即止

又方

酒煮桂取汁以故布搗病上正則止左喎搗右

右喎搗左此祕方不傳余常用大效

治卒中風口喎不正方

取空青末如豆大一枚含之即愈

又方

炒大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服樹後

不開

又方

大皂莢一兩去皮子下篩以三年大酢和左喎

千金方

重

掃葉山房

塗左右喎塗左乾更塗之

又方

以葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麩密

塞之勿令泄氣一頭內大豆一顆并艾燒合然

灸七壯即瘥患右灸左患左灸右耳病亦可灸

之

又方

灸手交脈三壯左灸右右灸左其炷如鼠屎形

橫安之兩頭下火

衍松葉凌風最勁故能治風借酒以開元府則風從

汗泄 桂酒搗嚼處乃靈樞刺寒痺熨法之小變
不用椒薑但取桂通血脈之專力 空青明目利
九竅通血脈色青八肝鎮攝虛風之上藥但世罕
得石絲可以代用所得銅鑛中氣也 黑豆大小
皆可淋酒力能解 祛風 皂莢治風痺死肌邪
氣有去風拔毒通關利竅之功與酒煮桂搗法似
同實異彼用酒煮溫散血結此用醋塗酸收風毒
盛虛之治迥乎不同 葶通風氣豆解風毒并取
艾火以通關竅之滯

枳茹酒 主諸藥不能瘥者方

本草衍義卷八

美

掃葉山房

枳實上青刮取末欲至心止得茹五升微火炒
去濕氣以酒一斗漬微火煖令得藥味隨性飲
之主口僻眼急大驗治緩風急風并佳肝後以
治身直
不得屈伸反覆
者枳樹皮亦得
衍義是枳實本經祇有止痢利五臟之用枳殼則有大
風在皮膚如麻豆苦癢之治當是傳寫之誤刮茹
漬酒專取以治皮膚之風深得本經奧旨
角弓反張第七 方六首
治卒半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷或智
或癡或身強直不語或生或死狂言不可名狀

角弓反張或欲得食或不用食或大小便不利
皆療之方古今錄驗名
八風雜命湯

人參 當歸 桂心

獨活 黃芩 乾薑

甘艸各十
八銖 石膏一兩 杏仁四十

右九味咬咀以井花水九升煮取三升分三服日

三覆取汗不汗更合加麻黃五兩合服

衍義角弓反張正當攻發表邪何反於古今錄驗續命

方中除去麻黃芎藭良因身冷如狂知邪不在表

而在裏所以進用獨活黃芩佐杏仁石膏搜祛風

熱而方後又言不汗更合加麻黃此指表裏淺深

施治之法也

倉公當歸湯 治賊風口噤角弓反張瘥者方

當歸 防風各十
八銖 獨活一兩

附子一枚 細辛半兩 麻黃三十

右六味咬咀以酒五升水三升煮取三升服一升

日不開者格口內湯一服當蘇二服小汗三服大

汗

衍義麻附細辛專通陰陽固結之邪兼防獨以祛賊風

當歸以和營血所謂血行風自滅也長沙麻黃附

子

子細辛湯蓋本諸此

又方

酒一斗膠二斤煮合炸得六升每服一升稍服得愈

又方

單服荆瀝良

黃明膠治風濕走注活血潤燥酒煮以行其滯也

荆瀝祛風潤燥化痰加薑汁行經九捷

秦朮散 治半身不遂言語錯亂乍喜乍悲角弓

反張皮膚風癢方

千金方衍義卷八

秦朮

獨活

黃芪

人參

甘菊

茵芋

防風

石斛

山茱萸

桂心

附子

芎藭

細辛

當歸

五味子

甘艸

白朮

乾薑

麻黃

白蘇皮

天雄

遠志

右二十二味治下節酒服方寸七日再漸漸加至

二七又云治風無新久並補

吳秦朮散 治風注入股體百脈身腫角弓反張

手足酸疼皮膚習習身體盡痛眉毛墮落耳聾

驚悸心滿短氣魂志不定陰下濕癢大便有血

小便赤黃五勞七傷萬病皆治方

秦朮

蜀椒

人參

茯苓

牡蠣

細辛

栝蒌根

麻黃

乾薑

附子

白朮

桔梗

桂心

獨活

當歸

黃芩

柴胡

午麻

千金方衍義卷八

天雄

石南

杜仲

莽艸

烏頭

甘艸

芎藭

防風

右二十六味治下節盛以韋袋食前溫酒一升服

方寸七日三服急行七百步許更飲酒一升忌如

常法

一方較風毒氣門中秦朮散同異相半減木麻

黃附子細辛湯而兼侯氏黑散及疝風湯等方之

制所加雖有不同總皆隨證輔佐原非緊關所係

八石參進退之機宛得手提而命敢不望空遙禮乎

後方所主風入肢體百脈身腫卽前方半身不遂之變文後方驚悸心滿卽前方語言錯亂之變文

後方神志不定卽前方乍喜乍悲之變文後方皮膚屑習卽前方皮膚風癢之變文後方五勞七傷

卽前方風無新久并補之變文至於角弓反張則無庸變也若夫眉毛墮落陰下濕癢前方中菊花

白蘚尤爲合宜除兩方雷同者一十四味其餘諸藥如彼用苧草此用莽艸彼用遠志此用石南彼

用白蘚此用蜀椒彼用五味此用牡蠣彼用石斛此用茯苓彼用桔梗此用黃芪彼用山萸此用杜

仲彼用菊花此用黃芩但烏頭柴胡括婁牛膝後方獨多藥雖變換而功用大率不殊

風痺第八 論一首 方九首

論曰血痺病從何而得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛因疲勞汗出臥不時動搖如被微風遂得之形如

風狀 巢源云其狀如被微風吹狀 但以脈自微澀澀在寸口關上緊宜鍼引陽氣令脈和藥去則愈

防已黃芪湯 治風濕脈浮身重汗出惡風方
甘艸 二兩 黃芪 五兩 漢防已 四兩

生薑 白朮 各三兩 大棗 十枚

右六味咬咀以水六升煮取三升分三服服了生被中欲解如蟲行皮中臥取汗

按金匱血痺條下首言脈寸口微澀乃清陽之氣爲濕所遏關上小緊則濁陰之邪鬱閉不舒遂得

形如風狀故宜鍼引陽氣發越陰邪緊去人安不煩湯藥艾治也次言寸關俱微尺中小緊蓋微者

陽之微緊者陰之緊卽於桂枝湯中除去甘艸之急緩急乘桂枝和營散邪之力遂以黃芪填實衛

氣杜塞虛風千金以血痺之病原從微風而得若不急爲祛散將來愈不可支因取金匱風濕例中

防已黃芪湯按滌血脈中濕使風無留滯痺著自開生薑大棗不但和營且助甘艸白朮逐濕之用

惡營以意推之曷不并用桂枝芍藥協濟防已黃芪其司開閉之權猶恐味多勢分不若簡要以取

專功爲愈也

黃芪湯 治血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風狀方

蜀黃芪 人參 芍藥 桂心 各三兩 生薑 六兩 大棗 十二枚

右六味咬咀以水六升煮取二升服七合日三服

合盡 金匱原夫一

此即金匱黃芪桂枝五物湯乃血痺門中首方干

金以血痺之病元氣本虛乃易桂心加人參功助

開痺裁去甘艸者嫌其無剛毅之性反有緩於他

藥之力也

治風痺遊走無定處名曰血痺大痛方

草薢

薯蕷

牛膝

澤瀉 各二兩

地膚子

白木 各半兩

乾漆

蟬蛻

狗脊

車前子

天雄 各十

茵芋 六錢

山茱萸 三十

乾地黃 二兩

右十四味為末蜜和丸如梧桐子大酒下十九日

三後稍加

方中地黃牛膝佐乾漆蟬蛻破積血薯蕷佐茵芋

祛風濕山茱萸草薢狗脊佐天雄白木堅筋骨地

膚子佐車前澤瀉利濕熱乃峻攻血痺之方但氣

虛之人未可輕試

治遊風行走無定腫或如盤大或如甌或著膂背

或著臂或著脚悉主之方

海藻

茯苓

防風

獨活

附子

白木 各三兩

大黃 五兩

當歸 一本一作當陸

鬼箭 各二兩

右九味咬咀以酒三斗漬五日期服二合漸加以

知為度

遊風無定腫或如盤大或如甌雖屬風氣然陽氣

有權諒不致於濁陰逆滿故急需木附以救陰氣

為腫不使陽氣乃竭方得內經與旨潮淵窮源收

體之滿靡不由中達外又需大黃附子開辟濁陰

不必拘於脇下寒氣腰腹腫大也且云或著腰背

或著臂脚著則病有定著營血亦不能無預則當

歸又不可無其餘獨活防風茯苓佐木附以祛風

濕海藻鬼箭佐大黃當歸以通血結也

鐵精湯 治三陰三陽厥逆寒食胸脇支滿病不

能言氣滿胸中急肩息四肢時寒熱不隨喘時

煩亂吸吸少氣言輒飛颺虛損方

黃鐵 三十斤以流水八斗揚之三干遍以炭燒

不令赤投流水復燒七遍如此澄清取汁

二斗 人參 三兩 半夏

麥門冬 各一斤 白薇 黃芩

甘艸 各四兩 芍藥 各四兩 石膏 五兩

生薑 二兩

大棗 二十枚

右十味咬咀內前汁中煮取六升服一升日三服
兩日令盡

衍義厥有陰陽之辨最為緊關秋毫不察死生立判此

云三陰三陽厥逆一著仙機全在臆闔妙用不使
庸師妄為測識然業為究解不得不宣揚秘旨開

一方便法門夫所謂三陰三陽者是指三陰經熱
邪而言與少陰例中苦酒湯半夏散及湯等方無

異方中鐵精鎮攝虛陽且經燒煨從治陰火最捷
石膏治中風寒熱心下逆氣性雖大寒而無鬱遏

邪熱之患以味辛淡殊非苦寒之比半夏治傷寒
千金方衍義卷一 高 掃葉山房

寒熱心下堅咳逆性雖辛燥力通陰陽少陰例咽
中生瘡不能語言用苦酒湯咽中傷用半夏散及

湯取其分解陰火也麥門冬治心腹結氣甘艸治
五臟六腑寒熱邪氣人參補五臟安精神除邪氣

黃芩治諸熱芍藥治血痺生薑通神明大棗養脾
氣白薇治暴中風身熱脈滿忽忽不知入狂惑邪

氣寒熱一皆木經主治白薇一味可抵竹葉石膏
湯中竹葉柴胡湯中柴胡桂枝湯中桂枝之用尤

賴鐵精一味不使虛陽上擾則方中諸病瓦解冰
釋是此及後諸方專主風痺與血 無滋

治諸風痺方

助風 甘艸 黃芩

桂心 當歸 茯苓各一兩

秦艸 葛根各一兩

大棗三十枚 杏仁五十枚

右十一味咬咀以酒水各四升煮取三升分三服

取汗

衍義此於桂枝湯中除去芍藥之酸寒加葛根以開諸

痺防風治惡風秦艸治寒濕風痺肢節痛杏仁下

氣散邪黃芩治諸熱茯苓治逆氣當歸治寒熱通
千金方衍義卷一 高 掃葉山房

血閉可代芍藥和營之功以佐桂心利關節甘艸
治寒熱生薑通神明大棗安中養脾氣更兼酒和

水煎其濟祛風逐痺之用藥雖平易而穩趨坦道
收功也

白薇散 治風痺腫筋急展轉易常處方
白薇 半兩 附子 六銖

右二味治下篩酒服半刀圭日三不知增至一刀
圭身中熱行為候十日便覺

衍義痺腫筋急轉展不常風氣之為病故取白薇以散
結氣附子以弛筋急為散酒服取行經脈之滯也

附子酒 治大風冷疾癱瘓諸痺方

大附子一枚重二兩者亦云二枚酒五升漬春五日

每服一合日再以差為度

仙附子辛烈人但知為回陽之藥不知其有寒濕痿
痺拘攣之用更漬之以酒為逐濕開痺要藥不煩
他物佐使也

麻子酒 治虛勞百病傷寒風濕及婦人帶下月

水往來不調手足寒痺著林服之令人肥健方

麻子 一石

去油一斗

右二味先搗麻子成末以水二石著釜中蒸麻子

去油一斗

全

掃葉山房

飯熟炊一石米傾出淫隨汁多少如家醞法候熟

取酒隨性飲之

術麻仁性潤滋血人但目之為痺約專藥不知本經

有補中益氣久服令人肥健之功千金每每取治

惡風乃從麻勃條下培入安有花治二十種惡風

而仁獨無頂於風之理花既成實辛香之氣雖乏

辛溫之性猶存大料和麴釀酒日飲以治虛勞百

病無不宜之專取滋血之性以療風痺所謂面黃

風自滅也

孫真人千金方衍義卷八

孫真人千金方衍義卷九

長洲 醫館 玉茗

南沙 醫館 玉茗

傷寒方上 凡九類

傷寒例第一 論三首

論曰易稱天地變化各正性命然則變化之迹無方

性命之功難測故有炎涼寒燠風雨晦冥水旱妖災

蟲蝗怪異四時八節種種施化不同七十二候日月

運行各別終其晷度方得成年是謂歲功畢矣天地

尚且如然在人安可無事故人生天地之間命有遭

千金方衍義卷九

十

掃葉山房

際時有否泰吉凶悔吝苦樂安危喜怒愛憎存亡憂

畏關心之慮日有千條謀身之道時生萬計乃度一

日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有天

行瘟疫病者即天地變化之一氣也斯蓋造化必然

之理不得無之故聖人雖有補天立極之德而不能

廢之雖不能廢之而能以道御之其次有賢人善於

攝生能知擗節與時推移亦得保全天地有斯疢癘

還以天地所生之物以防備之命曰知方則病無所

侵矣然此病也俗人謂之橫病多不解治皆曰日滿

自瘥以此致枉者天下大半凡始覺不佳即須救療

迄至於病愈湯食競進折其毒勢自然而瘥必不可
令病氣自在恣意攻人拱手待斃斯為誤矣今博採
羣經以為上下二卷廣設備擬好養者可得詳焉

小品曰古今相傳稱傷寒為難治之疾時行瘟疫是
毒病之氣而論治者不判傷寒與時行瘟疫為異氣
耳云傷寒雅士之辭天行瘟疫是田舍間號耳不說
病之異同也考之衆經其實殊異矣所宜不同方說
宜辨是以略說其要經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣
清涼冬氣凜冽此四時正氣之序也冬時嚴寒萬類
深藏君子固密則不傷於寒或觸冒之者乃為傷寒
耳其傷於四時之氣皆能為病而以傷寒為毒者以
其最為殺厲之氣也中而即病名曰傷寒不即病者
其寒毒藏於肌骨中至春變為溫病至夏變為暑病
暑病熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫病熱
病者皆由冬時觸冒寒冷之所致非時行之氣也凡
時行者是春時應暖而反大寒夏時應熱而反大冷
秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時
而有其氣是以一歲之中病無長少多相似者此時
行之氣也傷寒之逐日深淺以施方治今世人得傷
寒或始不早治或治不去病或日數久淹困乃告師

千金方衍義卷九

二

歸葉山房

苟依方次第而療則不中病皆宜臨時消息制方乃
有效耳

華佗曰夫傷寒始得一日在皮當摩膏火灸之即愈
若不解者二日在膚可依法鍼服解肌散發汗汗出
即愈即不解至三日在肌復一發汗即愈若不解者
止勿復發汗也至四日在胸宜服藜蘆圓微吐之則
愈若病困藜蘆圓不能吐者服小豆瓜蒂散吐之則
愈也視病尚未醒者復一法鍼之五日在腹六日
入胃入胃乃可下也若熱毒在外未入於胃而先下
之者其熱乘虛入胃即爛胃也然熱入胃須要下去
之不可留於胃中也胃若實熱為病三死一生皆不
愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出此候五死一
生劇者黑斑出者此候十死一生但論人有強弱病
有難易得效相倍也得病無熱但狂言煩躁不安精
彩言語不與人相主當者勿以火迫之但以猪苓散
一方寸七服之當逼與新汲水一升或二升強飲之
令以指刺喉中吐之病隨手愈若不能吐者勿強與
水水停則結心下也當更以餘藥吐之皆合相主不
爾更致危矣若此病輩不時以猪苓散吐解之者其
死殆速耳亦可先去毒物及法鍼之尤作大飲膈

千金方衍義卷九

三

歸葉山房

實者此皆難治此則三死一生也病者過日不以時下則熱不得泄亦胃爛斑出春夏無大吐下秋冬無大發汗法冬及始春大寒時宜服神丹丸亦可摩膏火灸若春未及夏月始秋此熱月不宜大灸及重覆宜服六物青散若崔文行度瘴散赤散雪煎亦善若無圓散及煎者但單煮柴胡數兩傷寒時行亦可服以發汗至再三發汗不解當與湯實者轉下之其脈朝夕缺者為澀實者朝平夕缺者非澀也轉下湯為可早與但當少與勿令大下耳少與當數其間也諸虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脈不緊數故知非裏實不可下也如此內外皆不可攻而強攻之必遂損竭多死難全也此虛煩但當與竹葉湯若嘔者與橘皮湯一劑不愈為可重與也此法數用甚有效驗傷寒後虛煩亦宜服此湯

千金方衍義卷九

四

攝葉山房

王叔和曰夫陽盛陰虛外臺作表汗之則死下之則愈陽虛陰盛和表病下之則死汗之則愈夫如是則神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治外臺作表裏相背千里吉凶之機應若影響然則桂枝下咽陽盛則斃外臺作表裏承氣入胃陰盛以內外臺作表裏

若此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺狹不知不識病者須臾自謂其分至令冤魂塞於冥路天死盈於曠野仁愛鑒此寧不傷楚夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣分爭榮衛否隔周行不通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重此邪氣在表發汗則愈三日以上氣浮在上部填塞胸心故頭痛胸中滿當吐之則愈五日以上氣沉結在藏故腹脹身重骨節煩疼當下之則愈明當消息病之狀候不可亂投湯藥虛其胃氣也經言脈微不可吐虛細不可下又夏月亦不可下也此醫之大禁也脈有沉浮轉能變化或人得病數日方以告醫雖云初覺視病已積日在身其疹瘵結成非復發汗解肌所除當診其脈隨時形勢救解求免也不可苟以次第為固失其機要乃致禍矣此傷寒次第病三日以內發汗者謂當風解衣夜臥失覆寒濕所中并時有疾疫賊風之氣相染易為邪惡所中也至於人自飲食生冷過多腹臟不消轉動稍難頭痛身溫其脈實大者便可吐下之不可發汗也

千金方衍義卷九

五

攝葉山房

陳廩邱云或問得病連服湯藥發汗汗不出如之何

答曰醫經云連發汗汗不出者死病也吾思之可蒸之如蒸中風法熱溫之氣於外迎之不得不汗出也後以問張苗苗云曾有人作事疲極汗出臥單簾中冷得病但苦寒倦諸醫與亂散湯四日之內凡入過發汗汗不出苗令燒地布桃葉蒸之即得大汗於被中就粉傅身使極燥乃起便愈後數以此發汗汗皆出也人性自有難汗者非惟病使其然也蒸之則無不汗出也諸病發熱惡寒脈浮洪者便宜發汗溫粉粉之勿令遇風當發汗而其人適失血及下大利則不可大汗也數少與桂枝湯使體潤熱汗出連日當自解也

千金方衍義卷九

木

攝業山房

論曰凡人有少苦似不如平常即須早道若隱忍不治冀望自差須臾之間以成固疾小兒女子益以滋甚若時氣不和當自戒謹若小有不和即須治療尋其邪由及在腠理以時早治鮮不愈者患人忍之數日乃說邪氣入臟則難可制止雖倉扁亦無能為也癰疽疔腫喉痺容忤尤其為急此自養生之要凡作湯藥不可避晨夜時日吉凶覺病須臾即宜使治不待早晚則易愈矣服藥當如方法若縱意違師不須浴之凡傷寒多從風寒得之始表中風寒入裏則不

消矣未有溫覆而當不消也凡得時氣病五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也所以爾者腹中熱尚少不能消之便更為人作病矣若至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之與之勿令極意也言能飲一斗者與五升若飲而腹滿小便澀若喘若噦不可與之忽然大汗出欲自愈也人得病能飲水欲愈也凡溫病可鍼刺者五十九穴又身之穴六百五十有五其三十六穴灸之有害七十九穴刺之為災論曰夫尋方學之要以收速為貴是以養生之家須預合成熟藥以補倉卒之急今具之於左

千金方衍義卷九

七

攝業山房

辟溫第二方三十三首

辟溫第二 辟疫令人不染溫病及傷寒之方

大黃十五 白朮 桂心各十

桔梗 蜀椒各十 烏頭六錢

菝葜十二

右七味咬咀絳袋盛以十二月晦日申懸沈井中令至泥正月朔旦平曉出藥置酒中煎數沸於東向戶中飲之屠蘇之飲先從小起多少白在一人飲一家無疫一家飲一里無疫飲藥酒得三朝還淨置井中能仍歲飲可世無病當家內外有井皆

悉著藥辟溫氣也 一方有防風一兩

又方

正月旦取東行桑根如指長七寸以丹塗之懸門戶上又令人帶之

又方

正旦吞麻子赤小豆各二十七粒又以二十七粒投井中

又方

常以七月七日合家吞赤小豆向日吞二十七枚

千金方術義卷九

掃葉山房

七月七日男吞大豆七枚女吞小豆二十七枚

又方

神仙教人立春後有庚子日溫蕪菁菹汁合家大小並服不限多少

太乙流金散 辟溫氣方

雄黃 三兩

雌黃 二兩

礬石 一兩

鬼箭羽 一兩半 燒二

即衛芽 羚羊角 兩

右五味治下篩三角絳袋盛一兩帶心前并掛門戶上若逢大疫之年以月旦青布裏一刀圭中庭

燒之溫病人亦燒熏之

雄黃散 辟溫氣方

雄黃 五兩

硃砂

菖蒲

鬼臼 各二兩

右四味治下篩以塗五心額上鼻人中及耳門殺鬼燒藥方 辟溫氣

雄黃

丹砂

雌黃 各一

羚羊角 各一兩

蕪菁

虎骨

鬼臼

鬼箭羽

野丈人 頭白

石長生

猴猪屎

馬懸蹄 各二

青羊脂

菖蒲

白木 各八

千金方術義卷九

九

掃葉山房

蜜蠟 八斤

右十六味末之以蜜蠟和為丸如彈許大朝暮及夜中戶前微火燒之

虎頭殺鬼圓 辟溫方

虎頭 五兩

硃砂

雄黃

雌黃 各一兩

鬼臼

皂莢

蕪菁 各一兩

石七味末之以蜜蠟和為丸如彈子大絳袋盛繫臂男左女右懸屋四角晦望夜半中庭燒一圓

辟溫殺鬼圓 熏百鬼惡氣方

雄黃

雌黃各二兩

龍骨

龜甲

鯢鯉甲

蝟皮各三兩

殺羊角

虎骨各七兩

雉雞十五枚

空青一兩

芎藭

眞珠各五兩

東門上雞頭一兩

右十三味末之煇燻二十兩并手圓如梧子正口

門戶前燒一圓帶一圓男左女右辟百惡獨宿中

喪問病各吞一圓小豆大天陰大霧日燒一九於

戶牖前佳

雄黃圖 漢建炎二年太歲在酉疫氣流行死者

千金方衍義卷九

十一

掃集山房

極衆有書生丁季迴從蜀青城山來東過南陽

從西市門入見患疫癘者頗多遂於囊中出藥

人各惠之一圓靈藥霑辱疾無不瘥市中疫鬼

數百餘見書生施藥悉皆驚怖而走乃有鬼王

見書生謂有道法兼自施藥感衆鬼等奔走若

是遂詣書生欲求受其道法書生日吾無道法

乃囊中之藥呈於鬼王鬼王觀藥驚惶叩頭乞

命而走此方藥帶之入山能辟虎狼蛇蟲入水

能除水怪蛟蜃

雄黃

雌黃

曾青

鬼白

眞珠

丹砂

虎頭骨

桔槔

白木

文青

芎藭

白芷

鬼督郵

蕪蕒

鬼箭羽

藜蘆

菖蒲

皂莢各一兩

右十八味末之蜜九加彈子大絹袋盛男左女右

帶之卒中惡病及時疫吞如梧子一九燒彈六一

九戶內

赤散 辟温疫氣傷寒熱病方

藜蘆

躑躅花各一兩

丹皮

皂莢各一兩

千金方衍義卷九

十一

掃集山房

附子

桂心

眞珠各六兩

細辛

乾薑各十兩

右丸味末之內眞珠合治之分一方寸七置絳囊

中帶之男左女右著臂自隨覺有病之時便以粟

米大內著鼻中又酒服一錢七覆取汗日三服當

取一過汗耳

又方

凡時行疫癘常以月望日細剉東引桃枝煮湯

浴之

松身散 辟温病常用方

芎藭

白芷

藥木

各等分

右三味治下篩內米粉中以粉身

斷溫疫轉相染著乃至滅門延及外人無收視者

方

赤小豆

鬼箭羽

鬼臼

雄黃

各二兩

右四味末之以蜜和服如小豆一九可與病人同
淋無妨

預備一物柏枝散 天氣不和疾病流行方

取南向社中柏東南枝曝令乾搗末酒服方寸

千金方衍義卷九

主

諸

老神良

治溫病不相染方

以桃樹中橐屎末之水服方寸七

又方

术豉等分酒浸服之妙

又方

赤豆一升新布袋盛內井中三日出取家服二

十七枚

又方

候葉末之酒服方寸七日三服

治溫合不相染方

新右袋盛大豆一升內井中一宿出服七枚

又方

白蜜和上色硃砂粉一兩以太歲日平旦大小

勿食向東方立吞服三七九如麻子大勿令齒

近之并吞赤小豆七枚投井泉中

治瘴氣方

蒜五十并

豉心一升

右二味以三歲男兒屎二升煮五六沸去滓服之

蒜疑葱之誤

千金方衍義卷九

主

諸

又方

青竹茹二升以水四升煮取三升分作三服

衍義辟溫諸方有歲時預防而設有時氣不正而設然

有內服有外佩有焚燒有懸挂有內鼻繫臂粉身

浴體及投井中種種不同總取辟除惡毒異氣之

義屠蘇酒方中首取大黃推陳致新白术安中正

氣桔梗升清降濁蜀椒辟邪下氣桂心破陰助陽

烏頭祛邪辟惡菝菝逐穢除邪七味藥中惟藉烏

頭為主帥椒桂左右輔弼白术守營大黃奪寨粘

極菝菝中外宣使一本有防風酒煎向東飲取吸

生氣隔歲置井中盡室均沾之意 自東行桑根
 方至蕪菁菴汁六方皆歲時預防之法 自太乙
 流金丹至粉身散九方咸用雄黃硫砂鬼臼鬼箭
 虎頭羚羊等藥皆時氣不正辟邪之方 自斷溫
 疫至青竹茹十方皆吞服小方廣收以便取用原
 無分於彼此也

治患霧氣者心內煩悶少氣頭痛項急起則眼眩
 欲倒身微熱戰掉不安時復增寒心中欲吐吐
 時無物方

新猪屎二升半內好酒一升攪令散以生布絞
 取汁更以綿濾頓服之取盡即地鋪暖臥覆蓋

鋪前著火常汗出若得汗當細細去上衣勿使
 心寒寒即不瘥看汗自乾乃起慎風冷亦治瘧
 及風勞蟲毒

筋 霧從地濕蒸發皆平時所受穢惡之氣發則迷漫
 大地即時氣鬱蒸之類壯者氣勝無傷怯者著而
 成病則有煩心頭痛目眩身熱欲吐等證長沙所
 謂陽中霧露之氣故取水獸之遺以辟水土之邪
 服後臥地向火取汗使鬱蒸之氣仍從土解嘗見
 嬰孩麻疹著寒陷伏喘脹兒科用猪屎大桶沸

湯中置壯簾下熱蒸如霧良久通身得汗痲即熨
 發藥所不及而此能療之勿以穢惡而鄙棄不錄
 也

治肝腑臟濕病陰陽毒 頸背雙筋牽先寒後熱腰
 強急縮目中生花方

桂心 一兩 白朮 各三

大青 梔子 柴胡 五兩

石膏 生薑 生地黃

香豉 各一

右十味咬咀以水九升 煮取三升分三服

千金方衍義卷九 主

治肝腑臟濕病陰陽毒 先寒後熱頸筋牽牽面目

赤黃身中直強方

元參 一兩 細辛 二兩 梔子

黃芩 升麻 苾硝 各三

石膏 八兩 竹葉 切五 車前草 曝切

右九味咬咀以水一斗 半煮竹葉車前取七升去

滓下諸藥前至三升內 苾硝分三服

治心腑臟濕病陰陽毒 戰掉不安驚動方

大青 黃芩 梔子

知母 苾硝 各三 麻黃 四兩

元參 六兩

石膏

生葛根 各八兩

生地黄 切一升

右十味咬咀以水九升煮取三升去滓內芒硝分

三服

治脾肺臟溫病陰陽毒頭重頸直皮肉痺結核隱

起方

大青

羚羊角

升麻

射干

芒硝 各三兩

梔子 四兩

寒水石 五兩

元參 八兩

右八味咬咀以水七升煮取三升分三服

千金方衍義九

去

治肺肺臟溫病陰陽毒咳嗽連續聲不絕嘔逆方

麻黃

梔子

紫苑

大青

元參

葛根 各三兩

桂心

甘草 各二兩

杏仁

前胡 各四兩

石膏 八兩

右十一味咬咀以水九升煮取三升分三服

治腎肺臟溫病身面如刺腹中欲折熱毒內傷方

茵陳蒿

梔子

芒硝 各二兩

苦參

生葛 各四兩

生地黄

石膏 各八兩

葱白

豉 各一升

右九味咬咀以水九升煮取二升半下芒硝分三服

衍溫病從內發外雖百臟腑之分却無陰陽之辨以

邪伏身中既久內外血氣無不受其蘊毒也其首

言肝肺臟病肝與膽合膽為陰陽之樞所以證先

寒後熱曠背筋急等患肝藏血故以生地黄涼血

之味統大青石膏梔子芒硝疎其宿蘊之毒桂心

柴胡香豉生薑泄其在經之熱白未斷其復入之

路也 其第二方亦證見寒熱有面目黃赤似乎

木邪乘土究竟肝熱居多故於芒硝石膏梔子黃

千金方衍義九

去

芩元參蕩熱藥中略兼升麻痺辛透達經邪車前

竹葉并通滲道以開泄熱之路也 心脾臟溫却

無寒熱而見戰掉火之象也心主血故亦用生地

黃統攝大青石膏梔子芒硝及元參黃芩與肝肺

臟無異以心部於表故用麻黃開發肺氣以散在

表之熱葛根知母輔石膏流行胃津以滋火氣之

燔灼也 脾肺臟溫而證見頭重頸直皮肉痺結

故用射干散結氣羚羊角辟惡毒不祥大青梔子

元參芒硝寒水石以攻熱毒升麻引入脾經也

肺肺臟溫而見咳嗽嘔逆是肝病而兼胃熱毒逆

也大青石膏梔子元參乃治溫專藥麻黃桂心杏
仁前胡紫苑甘草泄肺專藥葛根非佐石膏解利
陽明之熱乎 腎腑臟溫而證見熱毒內傷腰中
欲折不用知母反用茵陳 苦參祛滌濕熱之味佐
石膏確生地黃以辟毒 邪專取香豉以靜少陰
之源梔子以除膈上之煩 生葛以行胃中之津葱
白以通陰中陽氣也

萎蕤湯 治風溫之病脈陰陽俱浮汗出體重其

息必喘其形狀不仁嘿嘿但欲眠下之者則小
便難發其汗者必譫語 加燒鍼者則耳聾難言

千金方衍義卷九

本

婦人山房

但吐下之則遺失便利 如此疾者宜服之方

萎蕤

白薇

麻黃

獨活

杏仁

芎藭

甘草

青木香

各三

石膏

五兩

右九味咬咀以水八升煮取三升去滓分三服取

汗若一寒一熱加朴硝一分及大黃三兩下之小

方云萎蕤湯治冬溫及春月中風傷寒則發熱

頭痛咽乾舌強骨內疼心胸痞滿腰背強

風溫之病長沙但言脈證而無治療之方千金補

所未逮特立萎蕤湯為專藥蓋風溫由溫病誤發

其汗而成經言太陽病發熱而渴者為溫病若發

汗已身灼熱者為風溫此兩節一氣貫下陳氏不

當以註釋間斷致後人作兩截看意謂風溫別是

一證多生疑暗且本例後一逆尚引日再逆促命

期等語以為不可救藥束手待斃也原夫冬時之

邪伏藏少陰至春發動必循太陽之經時當風木

主令內火招風最為巨測總不因風亦必繇少陽

而尋出路況經誤汗非惟不解身反灼熱其脈尺

寸俱浮蓋腎脈本當沉也風溫載之併太陽上入

根本撥而枝葉紊矣其證自汗身重多眠鼻鼾語

難一皆賢之本病詎意發熱之初不及理脈輕犯

千金方衍義卷九

本

婦人山房

汗戒腎中伏邪從風外擾灼熱漫無止期胃中熱

甚讖語不休神識不能主持可知若被下者小便

不利直視失溲膀胱氣化受傷與少陰同時告竭

也被火者微則熱傷營氣而熱發黃劇則熱甚

生風而如驚無時瘈瘲火熱亂其神明擾其經脈

也加燒鍼則耳聾難言但吐少陰伏火上攻本經

之竅也少陰脈系咽喉乾痛乃至吐逆唾血多

死一逆發汗已是引日待斃再逆火迫神丹莫救

矣內經刺熱論溫營交之後病內連腎評熱論溫

專言穀氣腎中精騰得汗則生腎中精敗更熱則

死長沙更山下盡之藏論腎更視膀胱以緯之膀胱氣化受傷則直視失溲命門精氣告竭神水不能照物其能生乎千金體究長沙餘蘊悟得發汗後汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石膏湯借此以治溫病汗後灼熱兼取麻黃升麻湯中萎蕤合麻杏甘艸僅取方中四味而麻黃升麻湯之格局儼然萎蕤滋腎益肺內化厥陰火熱外通少陽風氣佐石膏以降逆滿獨活芎藭杏仁佐麻黃以解鬱蒸得石膏之寒化不獨解表并能散火甘艸一味專和麻黃杏仁之性也此方中萎蕤白薇青木香石膏自是一路為方中之主麻黃杏仁芎藭獨活自是一路為方中之賓作兩路看方得賓主歷然之妙深得風溫主治之奧即更遇於風變為風溫之病則當以葛根黃芩黃連湯為主治萎蕤湯加減尤為合宜多有熱傷津液無大熱而渴者不妨裁去麻杏易入葱豉以通陽鬱栝萋以滋津液喘息氣上芎獨亦勿輕試虛不勝寒石膏難以槩施或以竹葉清心茯苓守中則補救備至於以補千金之未逮

傷寒膏第三 方三首

千金方衍義卷九

辛

攝長山房

青膏 治傷寒頭痛項強四肢煩疼方

當歸

芍藥

蜀椒

白芷

吳茱萸

附子

烏頭

甘艸各三兩

右八味咬咀以醇苦酒漬之再宿以豬脂四斤煎令藥色黃絞去滓以溫酒服棗核大三枚日三服以汗不知稍增可服可摩如初得傷寒一日苦頭痛背強宜摩之佳

黃膏 治傷寒赤色頭痛項強賊風走注方

大黃

附子

細辛

乾薑

蜀椒

桂心各半兩

巴豆七枚

右七味咬咀以醇苦酒漬一宿以臘月豬脂一斤煎之調適其火三土三下藥成傷寒赤色發熱酒服如梧子大一枚又以火摩身數百過兼治賊風絕良風走肌膚遊風所在摩之神效此趙泉方也白膏 治傷寒頭痛向火摩身體酒那如杏核一枚溫覆取汗摩身當干過藥力乃行并治惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍皆治之先以鹽湯洗之以布拭之傅膏癰腫火灸摩干過日再白消者方

天雄

烏頭

莽草

羊躑躅各三

右四味咬咀以苦酒三升漬一宿作東向雞籠又

作十二聚濕土各一升許火取成煎猪脂三斤著

銅器中加竈土煖以糠餅令釋肉所漬藥炊令沸

下著土聚上沸定復上如是十二過令土盡通藥

成去滓傷寒咽喉痛含如蜜棧一枚日三摩時令

勿近日

衍義西北風氣剛勁腠理緻密故取辛熱製膏摩服兼

進內外透達以治冬時正傷寒寒氣嚴凝之病東

南陽氣易動良非所宜即使西北伏氣發於春夏

者咸為切禁

發汗散第四 方十一首

度瘧發汗青散 治傷寒赤色惡寒發熱頭痛項

強體疼方

麻黃三兩

吳茱萸半

烏頭

桂心各一兩

右十味治下體濕酒服方寸匕溫覆取汗汗出止

枳椇

防風

乾薑

細辛

白木各

蜀椒

若不得汗汗少不解復服如法若得汗足如故頭

疼發熱此為內實當服駛或丸若桂氏解散如得

使頭重者可以二大豆許內鼻孔中覺燥涕出一

日可三四度必愈兼辟時行病

衍義汗散十餘方病因不同毫釐不辨相背千里如度

瘡青散乃治山嵐瘴氣之方雖用麻黃艸防桔透

表發汗全賴烏桂椒薑莫木溫中散邪專為面赤

戴陽而設設服之不應頭疼發熱如故此必有

實邪固結又為陽明病面合赤色急須毀敗丸迅

掃中外不當以面赤為虛陽上泛而致脫脫也

千金方衍義卷九

五苓散 主時行熱病但狂言煩躁不安精彩言

語不與人相當者方

猪苓

桂心十二

右五味治下篩水服方寸匕日三多飲水汗出即

愈

衍義五苓散本太陽熱邪犯本及水道煩渴之方于金

借治時行熱病之熱乘心主狂言煩躁精采不與

人相當取桂心為嚮導引領諸邪從水道開泄也

又主瘦人臍下有悸吐涎沫癩眩而濕熱發黃亦

取用之金匱方加茵陳尤為合轍

霍文行解散 治時氣不和傷寒發熱者力

桔梗 細辛各四 白朮八兩

烏頭一方

右四味治下篩若中傷寒服錢五七覆取汗解若

不覺復小增之以知為度若時氣不和且服錢五

七碎惡氣欲省病者服 服皆酒服

時行有冬春之不同南北之區別此專主西北冬

時時氣不正之病以西北風高氣烈非烏頭風藥

不能通達嚴厲之氣佐以白朮實脾杜風細辛內

千金方卷之九

掃葉山房

搜經絡桔梗外開皮腠也

六物青散 治傷寒赤色惡寒方

附子 白朮各一兩 防風

細辛各一兩 桔梗 烏頭各三兩

右六味治下篩以溫酒服五七不知稍增之服後

食頃不汗出者進溫粥一杯以發之溫覆汗熱熱

可也勿令流離勿出手足也汗出止若汗大出不

止者溫粉粉之微者不須粉不得汗者當更服之

得汗而不解者當服神丹丸

神丹丸 青散即前解散加附子防風以搜少陰之邪專為

赤戴陽而設得汗不解當服神丹專取半夏烏

頭反激以往寒氣厥逆也

青散 治春傷寒 頭痛發熱方

苦參 石膏各三

大黃 細辛各二 麻黃五兩

烏頭 五枚

右七味治下篩覺傷寒頭痛發熱以白湯半升和

藥方寸七投湯中熟訖去滓盡服覆取汗汗出溫

粉粉之良久一服不降宜重服之或當微下利者

有大黃故也

千金方卷之九

掃葉山房

神丹散專治西北傷寒內外熱邪交結故首取苦參

以治心腹結氣佐厚朴石膏大黃開泄於內細辛

麻黃開發於外苦參得烏頭共解心腹寒熱互結

之邪也

詔書發汗白薇散 治傷寒三日不解者方

白薇十一 杏仁 貝母各

麻黃一兩

右四味治下篩酒服方寸七白覆汗出即愈

神丹散 此於麻黃湯中以白薇之苦泄易桂枝貝母之甘

寒易甘艸治傷寒三日不解既散表邪兼解內熱

麻黃湯之變法也

華佗赤散 治傷寒頭痛身熱服背強引頸及中

風口噤瘧不絕 婦人產後中風寒經氣腹大

丹砂十二

蜀椒

蜀漆

乾薑

細辛

黃芩

防己

桂心

茯苓

人參

沙參

桔梗

女萎即萎

烏頭各十

雄黃二十

吳茱萸三十

麻黃

代赭各二

右十八味治下篩酒服方寸匕日三耐藥者上七

千金方初發卷九

玉

覆令汗出欲治瘧先發一時所服藥二七半以意

消息之細辛薑桂丹沙雄黃不熱解皆然之

衍 麻烏辛桂椒薑茱萸一派辛溫散表藥中而兼黃

芩女萎沙桔防己清解麻烏等熱毒參芩守五臟

真氣丹砂雄黃性雖重著得麻烏薑辛鼓舞之力

當無鬱遏邪氣之虞代赭鎮攝逆氣本經有治賊

風蠱毒腹中毒邪女子赤沃漏下之功蜀漆專主

寒熱痰積故可兼治瘧證之寒熱不絕

亦散 治傷寒頭顛項強身熱腰痠痛往來有時

方

乾薑

防風

沙參

細辛

白朮

大棗

蜀椒

茯苓

黃芩

代赭

桔梗

吳茱萸各一

附子一枚

右十四味治下篩先食酒服一錢七日三

衍 卽前華佗赤散中除去丹砂雄黃烏頭蜀漆防己

桂心女萎而易白朮附子防風與前方格局雖同

頭顛項清方中白朮卽前方之茯苓附子卽前方

之烏頭防風卽前方之防己也

千金方初發卷九

玉

烏頭赤散 治天行疫氣病方

烏頭一兩

皂莢半兩

雄黃

細辛

桔梗

大黃各一

右六味治下篩清酒或井花水服一刀圭日二不

知稍增以知爲度除時氣疫病若牛馬六畜中水

行疫亦可與方寸七人始得病一日時服一刀圭

取兩大豆許吹著兩鼻孔中

衍 此治天行疫氣之病故用烏頭雄黃辟除邪毒於

內細辛桔梗開發經氣於上皂莢大黃降泄熱毒

於下也

水瀉散 治喘行頭痛壯熱一二日方

甘肅 甘艸 大黃各二

麻黃 四兩

右四味治下篩患者以生熟湯浴訖以暖水服方

寸七日三覆取汗或利便瘥力強人服二方寸七

延年秘錄有黃芩芍藥各二兩古今錄驗無汗草有芍藥治天行熱滿至胞瘡寒痛及解肌出汗

此於麻黃湯中除去杏仁而易大黃是汗劑而兼

下法從桂枝大黃湯化出中風門中三化湯則於

承氣湯加羌活乃下劑而兼汗法又從此方變出

治時病表裏大熱欲死方

千金方卷九

大黃 寒水石 芒硝

石膏 升麻 麻黃

葛根 柴葛 各等

右八味治下篩水服方寸七日

大黃石膏芒硝寒水石治裏之大熱麻黃升麻葛

根柴葛治表之大熱亦當作賓主兩路看一本無

葛有甘艸取其聯合賓主也

發汗湯第五 例一首

例曰大法春夏宜發汗凡發汗微令手足皆周至聚

然一時問許益佳但不可如水流離露深耳若病

不解當更重發汗汗出多則亡陽陽虛不可重發汗

也凡服湯藥發汗中病便止不必盡劑也凡云可發

汗而無湯者圓散亦可用要以汗出為解然不及湯

隨證良驗凡病無故自汗出復發其汗愈衛復和故

也 夫脈浮者病在外可發汗宜桂枝湯 夫陽脈

浮大而數者亦可發汗宜桂枝湯 夫病常自汗出

者此為營氣和營氣和而外不解此為衛氣不和也

營行脈中衛行脈外復發其汗衛和則愈宜桂枝湯

夫病人臟無他病時時發熱自汗出而不愈者此

衛氣不和故也先其時發汗則愈宜桂枝湯 太陽

千金方卷九

病發熱汗出者此為營弱衛強故令汗出欲抹邪風

宜桂枝湯 太陽病頭痛發熱汗出惡風寒宜桂枝

湯 太陽病下之微喘者表未解也宜桂枝加厚朴

杏仁湯 太陽病外證未解者不可下宜桂枝湯

太陽病先發其汗不解而復下之其脈浮者不愈浮

為在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須

解表則愈宜桂枝湯 太陽病下之氣上衝者可與

桂枝湯不上衝不可與 凡桂枝本為解肌若脈浮

緊發熱無汗者勿與之常知此勿誤也

桂枝湯 治中風其脈陽浮而陰弱陽浮者熱

發陰弱者汗自出清瀉惡風浙浙惡寒翁翁發熱鼻鳴乾嘔方

桂枝 芍藥 生薑各三

甘草一兩 大棗十二枚

右五味咬咀三物切薑擘棗以水七升煮棗令爛

去滓乃內諸藥水少者益之煮令微沸得三升去

滓服一升日三小兒以意減之初服少多便得汗

出者小潤其間不得汗者小促其間令藥勢相及

汗出自護如法特須避風病若重宜夜服若服一

劑不解病證不變者當復服之至有不肯汗出服

千金方衍義卷九 桂枝湯方

兩三劑乃愈服此藥食頃飲熱粥以助藥力

桂枝湯古稱湯液之祖太陽經風傷衛之首方風

傷於陽所以脈浮發熱邪迫於陰所以脈弱自汗

濇瀼惡風浙浙惡寒翁翁發熱皆自汗表虛之徵

驗非若寒傷營之壯熱身疼也鼻鳴乾嘔者陽邪

上攻漸次欲傳陽明之界故用桂枝和營達衛芍

甘護營守中薑棗助桂芍以除寒熱服後啜熱稀

粥助力取汗不使復傳他經至於隨證加減信手

成方何看太陽經諸例便得長沙之妙用無窮何

憚心手不震活平

麻黃湯 治傷寒頭及腰痛身體骨節疼發熱惡

寒不汗而喘方

麻黃 三兩 桂枝 甘草各二

杏仁 七十枚喘不

右四味咬咀以水九升煮麻黃減二升去沫內諸

藥煮取二升半絞去滓服八合覆令汗

麻黃湯太陽經寒傷營之專藥寒氣剛勁故令脈

緊營受邪鬱所以壯熱熱蒸於上所以頭痛骨節

煩疼而喘皆熱邪內鬱不得汗泄之故故用麻黃

杏仁開發肺氣於上桂枝甘艸調和營盟於內不

使隨汗外脫脫或尺中遲微又為營虛血少不能

勝任麻黃即當改用小建中以中有膠飴助胃蒸

發可無亡陽厥逆之虞也

大青龍湯 治中風傷寒脈浮發熱惡寒身體

疼痛汗不出煩躁方

麻黃 六兩 桂心 甘草各二

石膏 如雞子 生薑 三兩 杏仁 四十

大棗 十二枚

右七味咬咀以水九升煮麻黃去沫乃內諸藥煮

取三升分服一升厚覆當大汗出溫粉粉之即止

不可再服服之則筋惕肉顫此為逆也不汗乃再服

麻黃湯專主寒傷營之無汗脈緊桂枝湯專主風

傷衛之自汗脈緩二湯雖同為太陽經藥而實開

發心肺之邪青龍湯專主營衛俱傷以喻龍之兩

角能通營衛兩岐也三方勢若鼎分故千金並列

湯液之首詳方下所云全是寒傷營之麻黃湯證

惟不汗出而煩躁與無汗而喘稍有分別蓋寒邪

拒閉則無汗風邪疎豁則汗泄今風寒兩傷又以

寒重風輕雖風邪欲作汗解而寒邪固閉不得出

千金衍義卷九

三

麻黃湯

所以煩躁不寧與寒傷營之但喘而不躁擾神氣

自能主持則有輕重之分恐人不能辨晰反以中

風二字首為招揭千金又以中風傷寒壘舉開示

總不出大青龍之桂枝麻黃二湯合治也然營

衛俱傷亦有風重寒輕而見脈浮緩不緊身但重

不疼且乍有輕時一一見證似乎風傷衛象即身

重一證明非陽受風邪且乍有輕時又非營傷身

疼掣急之北洵為寒輕風重無疑猶恐醫師不察

反以傷寒二字目之故拋疑團欲人深切致思庶

無輕舉妄治之失以風傷衛證居多故於桂枝湯

中除去薑棗加麻黃乾薑細辛半夏瀝痰治咳五

味子收斂津氣則小青龍為至當觀金匱治咳逆

倚息不得臥用小青龍下已猶不出桂苓五味甘

艸等味陳註傷寒論誤作大青龍發之非但滋誤

後學抑切紊亂聖經愚不自揣敢力正之世之知

我罪我所不惜也

陽毒升麻湯 治傷寒一二日便成陽毒或服藥

吐下之後變成陽毒身重腰背痛煩悶不安狂

言或走或見鬼或吐血下痢其脈浮大數面赤

斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治至七日

千金方衍義卷九

中事 麻黃湯

不可治宜服方

升麻

甘草各半

當歸

蜀椒

雄黃

桂心各六

右六味咬咀以水五升煮取二升半分三服如人

行五里進一服溫覆手足毒出則汗汗出則解不

解重作服之得吐亦佳仲景無桂心有鱗甲手大

錄驗有梔子六銖

煎甲如手一片

陰毒甘艸湯 治傷寒初起一二日便結成陰毒

或服藥六七日已止至十日變成陰毒身重背

強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強

氣不得息嘔逆脣青面黑四肢厥冷其脈沉細
紫數仲景云此陰毒之候身如被打五六日可
治至七日不可治也方

甘艸

升麻各半

當歸

蜀椒各六

鱉甲一兩

右五味咬咀以水五升煮取二升半分三服如人
行五里頃更進一服溫服發汗毒當從汗出汗出

則愈若不汗則不除重作服仲景方

衍按陽毒陰毒治例長沙不入傷寒而列之於金匱

者以見證龐雜六經例中無一可歸乃次之於百

千金方衍義卷九

毒

楊葉山房

合狐惑證下首言陽毒之病面赤斑斑如錦紋咽
喉痛唾膿血五日可治七日不可治升麻鱉甲湯
主之次言陰毒之為病面目青身痛如被杖咽喉
痛五日可治七日不可治升麻鱉甲湯去雄黃蜀
椒主之或問陽毒發斑大熱何反恣用辛烈陰毒
而青身痛何反除去蜀椒雄黃願問其義何居因
謂之曰夫陰陽二毒一皆熱毒極甚故五日可治
七日當死其毒在陽分則面赤斑如錦文以毒邪
亢極若用寒藥折之非徒悍格不入必致烈熖飛
騰崑崙滅頂惟有從治一法庶可望其毒隨熖息

剛僥倖於萬一非故邀難險以誇奇特也其毒陷

陰分則面青身如被杖以熱邪內伏若用辛烈從

治擔薪救焚以火濟火五內裂崩勢所必致然升

散之法勢在必需溫順之法在所切戒因於升麻

鱉甲湯中除去雄黃蜀椒二味其在陽毒方中專

解陽邪充逆在陰毒方中恐其助火虐陰故除去

不用僅取升麻之升散火氣當歸之通調營血鱉

甲之削肝護陰甘艸之解毒安中其開取舍之機

各有至理非深達長沙化機難以語此千金又以

西北風高土厚升麻鱉甲方中蜀椒雄黃性雖雄

千金方衍義卷九

毒

楊葉山房

烈尚鮮辛散之功因去鱉甲而易桂心更其方曰
陽毒升麻湯以治陽毒面赤發斑之證又於陽毒
升麻湯中除去雄黃桂心進用鱉甲更其方曰陰
毒甘艸湯以治陰毒面青身如被杖之證則仍不
離長沙之繩墨耳陰陽二毒證治瀕危所不待言
設當風土柔弱天時和煦病人真陰不充因誤藥
變成二證者又當從金匱原方未嘗不合於治也
若夫陰寒極甚之陰毒則與中寒無異又當從事
蓋附不當與此牽合

陰旦湯 治傷寒肢節疼痛內寒外熱虛煩方

芍藥

甘艸各二兩

乾薑

黃芩各三兩

桂心四兩

大棗十五枚

右六味咬咀以水一斗煮取五升去滓溫服一升

日三夜二服令小汗

陽旦湯 治傷寒中風脈浮發熱往來汗出惡風

頭項強鼻鳴乾嘔桂枝湯主之隨病加減如左

方

以泉水一斗煮取四升分服一升日三如汗者

去桂枝加附子一枚渴者去桂加栝蒌三兩利

者去芍藥桂加乾薑三累附子一枚炮心下悸

者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急正陽旦主之

煎得二升內膠飴半斤爲再服若脈浮發熱

者不可與之

陰旦者陰疑開竅之象病人中氣本虛而傷犯客

邪表雖痰熱而內則虛寒故於桂枝湯中加乾薑

黃芩分治本虛標熱則大氣布而胸次廓然如離

照當空自然陰靈無著矣 陽旦者陽和敷布之

象病人素稟偏陽而觸胃風氣裏不伏邪而外顯

微熱故於陰旦湯中除去乾薑之助陽但取黃芩

以化熱陰陽各得其平而無偏勝之厄然在素稟

厚氣勝素偏陽旺之人最爲合轍其陰旦湯中彼

陽虛之人誤投禍不旋踵觀太陽例中傷寒脈浮

自汗出二條則知陽旦之關係非粗夫脈浮自汗

出風傷衛證也厥爲陽邪本當自汗以寒邪外閉

不能透出半伏心包所以心煩微惡寒也小便數

腳攣急又爲陽虛暗伏少陰危證於中也此本營

衛俱傷恐人見其脈浮自汗誤認風傷衛證故長

沙特以傷寒二字貫之例首非但陽旦桂枝不可

誤與卽營衛俱傷之兼有少陰證者則大小青龍

尤爲切禁惟小建中湯爲之合劑凡尺中微遲營

氣不足血少之證總不出此然與陽旦祇爭一味

妙在膠飴之甘緩不得助桂作汗抑且實脾悅水

與陽旦方中黃芩苦寒閉邪傷犯中州功過天淵

誤服陽旦而厥逆咽乾兩勁拘急者則參附子於

桂枝湯中增桂令汗出以溫經復陽服後仍厥逆

咽乾煩躁陽明內結識語煩亂則桂附又難過與

更作甘艸乾薑以依夜半陽回足溫而脛尙微拘

急重與芍藥甘艸湯兩乃脛伸復以承氣湯微瀉

止其識語其間增劇變證多端總誤在黃芩一味

所以百十三方此獨無預千金又取以治西北主

厚氣勝素偏陽旺之人最爲合轍其陰旦湯中彼

千金方衍義卷九

桂

補藥山房

取乾薑配合黃芩以治本寒標熱之 又從甘師

乾薑湯採入至瓜湯且方後加附子加桂心總在

挽回誤治增劑法來其治虛勞裏急用正陽且詳

一正字當是桂枝湯本方中納膠飴必無兼用黃

芩之理世人但知桂枝湯加黃芩為陽旦湯不知

方後增減皆陽旦之妙用也

六物解肌湯 治傷寒發熱身體疼痛方

葛根 四兩 茯苓 三兩 麻黃 一兩

牡蠣 生薑 各二兩 甘草 一兩

右六味咬咀以水八升煮取三升分三服再服後

得汗汗通即止 千金方衍義卷九 生薑 甘草

葛根專開陽明肉腠然必兼麻黃用之以陽明之

邪必循太陽出路也辛甘發散為陽生薑甘草在

所必用牡蠣一味本經雖有傷寒寒熱溫瘧之治

然性味鹹終非發散藥中所宜其柴胡龍骨牡蠣

湯乃汗後邪犯少陽本藥此必發汗過多熱仍不

解恐成漏風用以絕攝茯苓內守藏氣外固津液

使不隨麻葛外泄乃散中寓固之法斯義不謂無

人達此奧妙也

解肌湯 治傷寒溫病方

葛根 四兩 麻黃 三兩 黃芩

芍藥 甘草 各二兩 大棗 十二枚

右六味咬咀以水一斗煮取三升飲一升日三服

三四日不解脈浮者宜重服發汗脈沉實者宜以

駛鼓丸下之 延年秘錄有桂心一兩

黃芩湯四味本治溫病之方千金增入葛根麻黃

專為風土剛勁腠理緻密而設設當水土柔弱之

方又當除去麻葛而進葱豉方得應機接物之妙

觀後治疫氣傷寒三日已前不解方其義自明

治疫氣傷寒三日已前不解者方

好豉 一升 葱白 一升 童子小便 三升

右三味先熟豉葱令相得則投小便煮取三升分

再服徐徐服之覆令汗神驗

香豉專解瘟人疫氣壯熱從少陰發越其邪兼葱

白以通陽氣投小便中者服總取穢惡之氣以辟

穢惡之邪故冬溫溫病初發咸取用之但病久流

入經絡臟腑有所留著者未有能應取効也

治傷寒時氣瘟疫疼痛壯熱脈盛始得一二日者

方 丹砂 一兩末之以水一斗煮取一升頓服之覆

取汗

衍本經言丹砂治身體五臟百病以其能攝伏諸邪也但時氣始得一二日間無形之時受病用之乃效若日久有所留著恐無濟於用也

解肌升麻湯 治時氣三四日不解方

升麻

芍藥

石膏

麻黃

甘草各一

杏仁三十枚

貝齒

三枚作貝母十八銖

右七味咬咀以水三升煮取一升盡服溫覆發汗

便愈

千金方衍義卷九

單

攝藥山房

衍麻杏甘石湯本治發汗後汗出而喘無大熱者乃

越脾湯之變方此治時氣三四日不解亦用此湯

加升麻以治疫瘴芍藥以護營血貝齒以鎮邪毒

與六物解肌湯中牡蠣同義取其鹹潤走血利水

而鎮攝時氣之毒非正傷寒例藥也

葛根龍膽湯 治傷寒三四日不差身體煩疼而

熱方

葛根

入兩

龍膽

大青各半兩

升麻

石膏

姜豨各兩

甘草

桂心

芍藥

黃芩

麻黃各三兩

右十二味咬咀以水一斗煮葛根取八升內餘藥煮取三升分四服日三夜一

衍此用麻黃升麻湯中八味彼兼乾薑白木茯苓當歸佐麻黃升麻桂枝芍藥治傷寒六七日大下後邪伏至陰厥逆下利不止知母天門冬佐萎蕤黃芩石膏甘草治虛陽上逆咽喉不利唾膿血此兼

芩石膏甘草治虛陽上逆咽喉不利唾膿血此兼

葛根生薑佐麻黃升麻桂心芍藥治傷寒三四日

不瘥龍膽大青佐萎蕤黃芩石膏甘草治發汗後

身體煩疼而熱預防斑黃變證也

治傷寒四五日頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食方

梔子仁 黃連 黃藥

千金方衍義卷九

單

攝藥山房

右六味咬咀以水八升煮上四物六七沸內後葱

白豉煮得三升頓服一升日三服湯訖溫服令汗

出粉之得汗便止後服勿復取汗不得汗者復服

重發此藥無忌特宜老小神良

衍方下雖云治傷寒四五日頭痛壯熱而實治溫熱

病藥梔子豉湯加葱白專主伏氣發溫頭痛兼大

黃黃連瀉心湯專治四肢煩熱心下痞滿不能飲

黃黃連瀉心湯專治四肢煩熱心下痞滿不能飲

黃黃連瀉心湯專治四肢煩熱心下痞滿不能飲

黃黃連瀉心湯專治四肢煩熱心下痞滿不能飲

食加黃蘗者專淨邪伏少陰之毒也

七物黃連湯 治夏月傷寒四肢煩疼發熱其人

喜煩嘔逆支滿劇如禍祟寒熱相搏故令喜煩

方

黃連

茯苓

黃芩

各十

芍藥

葛根

甘草

各一

小麥 三合

石七味咬咀以水七升煮取三升冷分三服不能

一升者可稍稍服之湯勢安乃卧藥主毒氣服湯

之後胸中熱及咽喉痛皆差明日復煮一劑如法

千金方衍義卷九

傷寒山房

服之此湯無毒但除熱下氣安病人小兒服者取

三分之一以水四升煮得二升稍稍服之

衍義葛根黃芩黃連湯本治太陽證誤下脈促胸滿喘

汗引邪入犯陽明經證并治陽脈浮滑陰脈濡弱

更過於風變為風溫之病最為合宜此治夏月伏

氣發溫熱劇昏亂之證故加茯苓以守藏氣芍藥

以護營血小麥以通肝氣麥為肝家之穀也

三七湯 治傷寒中風得之三日至七八日不解

胸脇痛四肢逆乾嘔水漿不下腹中宿食不消

重下血一日數十行方

茯苓 如雞

黃芩

人參

枳實 四兩

芒硝

乾地黃

大黃

麻黃

寒水石

右九味搗篩令相得以散三方寸七水一升煮令

三沸絞去滓服之日三溫覆汗出即愈病劇與六

七七

衍義此治風寒雜合傷外飲食壅滯傷內七八日胸脇

痛四肢逆乃中氣內結不能傍達四末之候乾嘔

水疑不下宿食不消種種皆裏實蘊熱而迫血妄

行不可以其四肢逆乾嘔疑似夾陰而致扼腕也

千金方衍義卷九

傷寒山房

方中麻黃大黃地黃分治外內實結血熱妄行茯

苓人參枳實根助胃通津以行三藥之勢黃芩佐

麻黃分解表熱芒硝佐大黃疎滲裏實寒水石佐

地黃滋降血滯取其鹹潤走血也

五香麻黃湯 治傷寒忽發腫或者四肢或在胸

背虛腫浮如吹狀亦著頭面唇口頸項劇者偏

著脚脛外如軸大而不痛不赤著四肢者乃欲

不遂悉主之方

麝香 半兩

麝香

雞舌香

沉香

青木香

麻黃

防風

獨活

秦艽

姜蕤

甘艸各三兩

白薇

枳實各二兩

右十三味咬咀以水九升煮取三升分三服覆取汗後外摩防已膏

汗後外摩防已膏

義衍至真要大論云諸氣贖鬱皆屬於肺故用麻黃外

開肺氣佐以防風獨活秦艽風藥風能勝濕也諸

濕腫滿皆屬於脾故用枳實內泄脾氣佐以姜蕤

白薇甘艸氣藥氣能泄滿也經脈壅滯非香藥不

能開通五香諸藥專通經絡諸竅也服後覆汗以

千金方衍義卷九

雷

掃撲四傷

開鬼門平治權衡之道不外乎此若偏著脚脛腫

大不赤不痛更厚防已膏取其辛寒開通濕熱之

氣庶免不遂之虞

治傷寒三日外與前藥不瘥脈勢仍數者陽氣猶

在經絡未入臟腑方

桂枝

黃芩

甘艸各一兩

升麻

葛根

生薑各三兩

芍藥六兩

石膏八兩

梔子三七枚

右九味咬咀以水九升煮取二升七分合分三服相

去十里久若前兩服訖即得汗後服即停不得汗

更進一服得汗即止不得汗者明日去梔子加麻

黃二兩足水二升再依方服

義衍傷寒身發浮腫服五香麻黃服數不除陽邪猶在

經絡故於桂枝湯中除去大棗之滯屬加升麻葛

根以透表石膏梔子以化熱黃芩專散在表之標

熱也倘服之不應更進一服仍不得汗恐升葛桂

枝力綿不能勝芩梔石膏之過涼於中裁去梔子

易入麻黃便合大料桂枝二越脾一湯之法以服

前藥身腫尚未全瘥故大棗終非所宜升葛尚不

可缺也

千金方衍義卷九

雷

掃撲四傷

雪煎治傷寒方

麻黃十斤

大黃一斤十二杏仁三斗

右三味咬咀以雪水五斛三斗潰麻黃於東向竈

釜中三宿內大黃搗杏仁內汁中復炊之可餘六七

去滓復內大黃搗杏仁內汁中復炊之可餘六七

斗汁絞去滓置銅器中又以雪水三斗合煎之攪

合調得二斗四升藥成可丸冷凝丸如彈丸有病

者以三沸白湯五合研一九入湯中適寒溫之立

汗出若不愈者復服一九密盛藥勿令泄氣

義衍雪煎方中大料麻黃杏仁雖有些微大黃必從麻

杏走表然後緩通餘熱方下雖治傷寒總是西北氣厚合成丸劑四時常用疎泄客邪之藥終非南陽湯液隨證進退正治法也

發汗丸第六方二首

神丹丸 治傷寒脈澀惡寒發熱體疼者方

附子

烏頭各四兩

人參

茯苓

半夏各五兩

硃砂一兩

右六味末之蜜丸以真丹為色先食服如大豆二丸生薑湯下日三須更進熱粥二升許重覆汗出止若不得汗汗少不解復服如前法若得汗足應

千金方衍義卷九

吳

掃葉山房

解而不解者當服桂枝湯此藥多毒熱者令飲水寒者溫飲解之治瘥先發服二丸要略用細辛不用人參名赤丸

主寒氣厥逆

神丹丸本金匱赤丸彼治寒氣厥逆故用茯苓半

夏烏頭細辛礬石專取相反激其破陰逐邪之功

此治傷寒脈澀惡寒發熱體痛而用烏附參附半

夏當矣乃反去細辛之溫散取用硃砂之鎮邪殊

不可解洗心求之方知此方既有烏附之辛烈則

細辛正可無用雖硃砂之重者諒不能阻礙烏附

破陰之力所以並行而不相悖也 前方服六物

青散得汗不解用神丹丸方中烏附雖同安得如此方相反互激之力歟

麥奴丸 治傷寒五六日以上不解熱在胸中口

噤不能言惟欲飲水為壞傷寒醫所不能治為

成死人精魂已竭心下纒溫以杖發其口開灌

藥咽中藥得下即愈麥奴丸一曰黑奴丸二曰

水解丸

釜灰墨

竈突墨

梁上墨

麥奴

黃芩

大黃

芒硝各一兩

麻黃二兩

千金方衍義卷九

吳

掃葉山房

右八味末之蜜丸如彈子大以新汲水五合研一

丸破漬置水中當藥消盡服之病者渴欲水極意

不問升數欲止復強飲能多飲為善不欲飲水當

強飲之服藥須臾當寒寒竟汗出便解若服藥日

移五尺許不汗復服如前法不過再三服佳小麥

黑勃名麥奴

麥奴丸方下雖治傷寒而實時氣的方方中釜底

墨竈突墨梁上塵皆取溫散火毒麥奴乃濕熱間

氣所鐘取治溫毒為同氣之嚮導麻黃黃芩以散

在表之熱大黃芒硝以泄在裏之毒也若渴欲飲

水極意與之飲後惡寒汗出便解故又名水解丸

宜吐第七 例一首
方二首

例曰大法春宜吐凡服吐藥中病便止不必盡劑也病如桂枝證頭不痛項不强而脈寸口浮胸中鞭滿氣上衝喉咽不得息者此以內有久痰宜吐之

病胸上諸寒胸中鬱鬱而痛不能食欲得使人按之反有涎出不利日十餘行而其人脈遲寸脈微滑者此宜吐之吐之利即止 少陰病飲食入口即吐心中愠愠然欲吐復不能吐者宜吐之宿食在上脘宜吐之

千金方衍義卷九

吳

掃葉山房

病手足逆冷脈乍結者客氣在胸中心下滿而煩飢不能食者以病在胸中宜吐之

瓜蒂散 病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮

胸中痞堅氣上冲咽喉不得息者此為胸有寒也宜吐之方

瓜蒂

赤小豆 各一兩

右二味治下篩取一錢七香豉一合熟湯七合煮作稀粥去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止 張文仲以白湯三合和服

瓜蒂散治病如桂枝證言時如畏寒而無頭痛項

強表證但心下痞堅乃胸中寒寒者濁濕鍾聚陽

和不能敷布或時兀兀欲吐也故與瓜蒂之苦寒以吐胸中寒實兼赤小豆之甘酸以清利心包餘

熱所謂酸苦涌泄為陰也

水道散 治時氣病煩熱如火狂言妄語欲走方

甘遂 半兩

白芷 二兩

大黃 四兩

厚朴 八兩

枳實 五枚

芫硝 三合

右六味咬咀以水一斗先煮厚朴枳實取五升去滓內大黃煎取二升去滓下芫硝更煎一兩沸分

再服得快利止

千金方衍義卷九

吳

掃葉山房

大陷胸大承氣二方合用兼攻胸腹之結加白芷以解風熱內蘊之血閉也

宜下第八 方八首

大承氣湯 治正陽陽明病潮熱不大便六七日

短氣腹滿而喘手足濇然汗出方

大黃 四兩

厚朴 半斤

枳實 五枚

芫硝 三合

右四味咬咀以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芫硝更土微火一二沸分

溫再服得下餘勿服

承氣者熱邪內結 陽明之府用以下泄逆上之氣
 氣有餘便是火亢 則害承乃制也 夫火非苦寒不
 降 故用大黃氣非辛溫不散 故用厚朴滿非辛苦
 不泄 故用枳實熱非鹹寒不除 故用芫硝然泄滿
 蕩熱正當峻用苦寒而反倍用厚朴入於苦寒劑
 中乃得逆從相需之妙 若太陽陽明離太陽未遠
 所以調胃承氣不用枳實厚朴而兼甘艸緩行祛
 熱之力少 陽陽明則去正陽而逼太陰其邪已非
 大實所以除去芫硝僅用厚朴二兩以爲從治之
 使味耳

千金方衍義卷九 辛 掃葉山房

抵當丸 下血方

水蛭 各二
 大黃 三兩 桃仁 二十枚

右四味爲末蜜和合分爲四丸以水一升煮一九

取七合頓服之晬時當下血不下更服

抵當湯 治同前

水蛭 各三
 大黃 三兩 桃仁 二十枚

右四味咬咀以水五升煮取三升去滓服一升不
 下更服

抵當湯九南陽本治下焦結血 故取蠱蟲水蛭
 血之品以破瘀積兼桃仁大黃開泄下行之路也

承氣湯方
 枳實 五枚 芫硝 半斤 大黃 四兩

甘艸 二兩

右四味咬咀以水五升煮取二升去滓適寒溫分
 三服如人行五里進一服取下利爲度若不得和
 盡服之

變大承氣爲調胃承氣專取甘艸通調之力以緩
 硝黃之急也更加枳實於調胃承氣方中校大承

千金方衍義卷九 辛 掃葉山房

氣中厚朴雖辛溫辛苦不同而泄滿之功則一

生地黃湯 治傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃中

有宿食大便秘結

生地黃 三斤 大黃 四兩 甘艸 二十

芫硝 二合 大棗 二十枚

右五味合搗令相得蒸五升米下熟絞取汁分再

服

又於調胃承氣方中加生地黃以滋血兼取大棗

以行脾氣而散心腹之邪也

大柴胡萎蕤知母湯 治傷寒七八日不解默默

心煩腹中有乾屎讖語方

柴胡半斤

萎蕤

知母

大黃

甘艸各二兩

人參

黃芩

芍藥各三兩

生薑五兩

半夏半升

右十味咬咀以水一斗煮取三升去滓服一升日

三卽下爲效集驗用枳實四枚不用芍藥

衍義少陽爲樞乃陰陽之交界表裏驛駁內犯舍小柴

胡別無主治小柴胡中非藉人參壯其胃氣不能

把守其樞若心下急鬱鬱微煩則邪已內入雖用

千金方衍義卷九

聖

精義別房

人參徒資助虛故於小柴胡中除去人參甘艸加

枳實以導滯大黃以泄滿芍藥以收陰共振蕩滌

之威此兼大小柴胡於中但去大棗更加萎蕤知

母二味不但滋化風熱并佐枳實大黃下行之力

也 按此雖名大柴胡仍不去人參甘艸以病人

津氣本燥故加萎蕤知母則人參甘艸又爲必需

近見時師用小柴胡未有一人不去人參者何怪

病邪傳陰入府變證多端也

治傷寒頭痛壯熱百節疼痛方

柴胡

梔子仁

芍藥

知母各四兩

升麻

黃芩

大青

杏仁各三兩

石膏八兩

香豉一升

右十味咬咀以水九升煮取二升七合分溫三服

若熱盛加大黃四兩

衍義此方所治之證雖傳少陽而頭痛壯熱未除知尙

未離陽明之界故用柴胡升麻兼治二經之邪香

豉山梔專解膈上之煩黃芩杏仁以泄逆上之滿

石膏知母以化胃中之火大青芍藥以清營血之

熱若熱甚加大黃仍借大柴胡變通之法

千金方衍義卷九

聖

精義別房

駛豉丸 治傷寒留飲宿食不消方

豉一升

杏仁六十枚

黃芩

黃連

大黃

麻黃各四兩

芒硝

甘遂各三兩

巴豆去油二枚

右九味爲末以蜜和丸如大豆服二丸不得下者

增之崔氏云此黃連方

衍義于金本黃連方以治傷寒留飲宿食大施轉日回

天神手伊尹三黃古稱湯液之祖從此採出以蕩

滌中外熱毒香豉麻杏開金正沸巴豆硝黃撥火

散焚非黃連不能設立非千金不能體用 服度

瘧發汗青散得汗不解內實不除之故故宜服此
內外兼攻并納鼻孔專藉巴豆香豉發諸藥之性
也

發汗吐下後第九脈證七首方十七首

傷寒已解半日許復心煩熱其脈浮數者可更發汗
宜桂枝湯凡發汗後飲水者必喘宜慎也

竹葉湯 治發汗後表裏虛煩不可攻者但當與

此方

竹葉 一把 半夏 半斤 麥冬 一升

人參 各二兩 生薑 四兩

千金方衍義卷九 掃葉山房

石膏 一升

右七味咬咀以水一斗煮取六升去滓內粳米半
升米熟去之分服一升自三張文仲不用生薑

義衍此即竹葉石膏湯方中一派化熱生津除煩止渴

之藥但以半夏一味滌除痰飲則肺胃清寧千金

加入生薑以助半夏開豁之力世言半夏辛燥煩

渴非其所宜因小青龍湯後有服湯已渴者寒去

欲解之語不知痰去則氣通火升覺渴不過暫時

少傾津回氣潤煩渴自除先哲復有服二陳湯能

使大便潤而小便長痰去則津液流通之明驗也

桂枝麻黃湯 服桂枝湯大汗後脈洪大者與桂
枝湯若形如瘧一日再發汗出便解者屬桂枝
二麻黃一湯方

桂枝 一兩十錢 麻黃 十六錢 芍藥 十六錢

生薑 各一兩 甘草 一兩 杏仁 十六枚

大棗 五枚

右七味咬咀以水五升煮麻黃再沸去沫內諸藥

煮取二升適寒溫分再服取微汗而已

義衍桂枝麻黃二湯分治風寒營衛之證此以汗下不

解面赤身穢知為汗出不微當有小汗伏於經中

千金方衍義卷九 掃葉山房

故宜桂枝麻黃各半分解兩經職貫之邪方為合

法 若服桂枝湯邪當解矣服後大汗出脈反洪

大此必營衛俱傷但以風多寒少有似乎桂枝證

故但治風而不及寒遺其邪於經中且汗出經虛

不能禦邪之向裏裏不服邪所以形如瘧日再發

邪雖勢衰終為微寒所持故與桂枝二麻黃一湯

略兼治寒得小汗出則愈矣 若發熱惡寒多

寒少脈微弱者此無陽也不可誤發其汗蓋熱多

則陰受傷之明驗無陽乃無津液之通稱津為陽

血為陰不可以無陽謬誤陽虛反用石膏致惑

小青龙湯 治傷寒表未解心下有水氣乾嘔發

熱而咳或渴或利或噎或小便不利小腹滿或

喘者方

桂心 麻黃 甘草

乾薑 芍藥 細辛

五味子 半夏

右八味咬咀以水一斗煮麻黃減二升去上沫內

諸藥煮取三升分三服相去十里許復服之若湯

者去半夏加栝蒌根三兩若微利去麻黃加芫花

如一雞子大熱令赤色若噎加附子一枚若小便

不利小腹滿者去麻黃加茯苓四兩若喘去麻黃

加杏仁半升數用神效

見前大青龙湯下

四物甘艸湯 治傷寒發汗出而喘無大熱與此

方

甘艸 麻黃 石膏

杏仁

右四味咬咀以水七升先煮麻黃去沫令減二升

內諸藥煎取三升分三服

傷寒論原名麻黃杏仁甘艸石膏湯金匱名麻杏

石湯本治太陽寒傷營證因誤用桂枝固衛而

見喘滿既經汗下邪從藥泄故無大熱仍取麻黃

開發於外杏仁疎泄於上石膏清解於內甘艸調

和臟腑寒熱之邪名曰四物甘艸湯專賴平調中

氣之義

者方

梔子湯 治發汗若下後頓熱胸中窒氣逆捨心

者方

梔子 香豉

右二味以水四升先煮梔子取二升半次內豉煮

取一升半分二服溫進一服得快吐止後服

此即梔子豉湯本治發汗吐下後虛煩懊憹梔子

專散胸中客熱香豉專主太陽經中不正之氣

厚朴湯 治發汗後腹脹滿方

厚朴 人參 甘艸

生薑 半夏

右五味咬咀以水一斗煮取三升分三服

傷寒論原名厚朴生薑甘艸半夏人參湯本桂枝

證誤用麻黃發汗濁陰之邪乘虛入裏而致喘滿

與瀉心湯證似同而實小異濁氣填滿故首取厚

朴以泄氣滯薑半以破痰結參艸以助清陽清陽

氣之義

者方

梔子湯 治發汗若下後頓熱胸中窒氣逆捨心

者方

梔子 香豉

右二味以水四升先煮梔子取二升半次內豉煮

取一升半分二服溫進一服得快吐止後服

此即梔子豉湯本治發汗吐下後虛煩懊憹梔子

專散胸中客熱香豉專主太陽經中不正之氣

運動而濁陰自除本非結胸之寒熱互結故無藉於乾薑芩連大棗也

元武湯 治太陽病發汗汗出不解其人仍發熱

心下悸頭眩身動振振欲擗地方

茯苓 芍藥 生薑各三

白朮二兩 附子一枚

右五味咬咀以水八升煮取二升溫服七合

義衍 真武湯治太陽證過汗經虛致邪內陷迫其虛陽

外擾而為發熱上逆而為頭眩內薄而為心悸經

虛而為動身不自主振振欲擗地而入苦無容

千金方衍義卷九 素 結胸如痞

之狀也急需朮附以安水土二臟庶得統攝周身

之經脈而調振向安茯苓降泄胸脇逆氣而心悸

可止芍藥收斂虛陽而頭眩自除生薑發越陽氣

招徠虛熱歸輔朮附無復外擾之患矣以證變之

驟所以甘艸大棗甘緩之味無預於治也

葛根黃連湯 治太陽病反下之利遂不止脈促

者表未解喘而汗出者方

葛根半斤 黃連 黃芩各三

甘艸二兩

右四味咬咀以水八升先煮葛根減二升次內諸

藥煮取二升去滓分再服

義衍 傷寒論原名葛根黃芩黃連湯本治誤下利不止

脈促喘汗之證以葛根解表芩連清內甘艸和中

兼和藥性之寒熱并治濕病熱病之太陽陽明合

病若合符節

茯苓湯 治傷寒發汗吐下後心下逆滿氣上衝

胸起即頭眩其脈沉緊發汗則動經身為振振

搖者方

茯苓四兩 白朮 桂心各三

甘艸二兩

千金方衍義卷九 素 滿山房

右四味咬咀以水六升煮取三升去滓分三服

義衍 傷寒金匱原名茯苓桂枝白朮甘艸湯本治太陽

風傷衛證緣誤施汗下邪欲犯裏裏不服邪所以

氣上衝胸邪竊內據運動其飲所以起即頭眩水

精不上注於目所以目眩故以桂枝加八制飲藥

內逆陽氣開經絡白朮治痰水除脹滿然中滿不

食反用甘艸何也蓋桂之辛散得甘艸和其寒熱

使不慳上甘艸得茯苓則不支滿而反燥利且能

下氣除滿也 金匱用此以治心下痰飲膈膈支

滿目眩專取桂枝通利小便朮甘培護中氣以振

運痰水之力耳

凡寸口脈浮關上自沉為結胸泉源作沈細

凡傷寒病發於陽而反下之熱入因作結胸

大陷胸丸 治結胸病項亦強如柔痙狀下之即

和方

大黃 八兩

芒硝 各五兩

杏仁 熬

葶藶 各五兩

右四味搗篩大黃葶藶餘二味別研如脂和散取

如彈丸大一枚甘遂末一錢七白蜜二合水一升

煮取八合溫頓服之病乃自下如不下更服取下

千金方卷九

本

編纂山房

為效

傷寒六七日結胸熱實其脈沉緊心下痛按之正堅

宜大陷胸湯

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上乾而

渴日晡有小潮熱心胸大煩從心下至小腹堅滿痛

不可近宜

大陷胸湯方

甘遂 末一錢

大黃 切六兩

芒硝 一升

右三味以水六升先煮大黃取三升去滓次內芒

硝一沸次內甘遂分再服一服得快利止後服

義結胸而至項強證已篤矣蓋胸中邪結緊實項勢

常昂有似柔痙之狀然痙則身首俱張此但項強

原非痙也但此以驗胸中之邪十分緊迫以大陷

胸湯下之恐過而不留即以大陷胸丸下之又恐

滯而不行故煮而連滓服之始得與邪相當方中

大黃芒硝甘遂可謂峻矣更加葶藶杏仁以射肺

邪而上行其急又須熬黑以滌其垢者時倍加白

蜜以潤燥潤導之而下行其緩深得長沙之奧千

金一人而已 其大陷胸湯治太陽病重發汗而

復下之不大便而燥渴日晡潮熱小腹鞭滿證與

千金方卷九

本

編纂山房

陽明頗同但小有潮熱不似陽明之壯熱從心下

至小腹堅不可近則陽明又不似此大痛因是以

辨為太陽結胸而兼陽明內實也緣屢經誤治重

傷津液不大便而燥渴潮熱更加痰飲內結並須

用陷胸湯由胸脇以及腸胃一舉而蕩滌無餘若

但下腸胃結熱反遺膈上痰飲則非法矣設心下

結而不鞭按之則膈脈微滑者乃痰飲挾熱內結

為小結胸證則宜黃連半夏枳實三物小陷胸

湯原無實邪固結不須峻攻也至若結胸證脈浮

大者為邪尚在表不可下下之死結胸證悉具煩

躁者為胃氣之絕亦死結胸危證死生反掌千金
僅與長沙二方不輕增損一味心心相印於此足

徵

生薑瀉心湯 治傷寒發汗後胃中不和心下痞

堅乾噎食臭脇下有水氣腹中雷鳴下痢者方

生薑 四兩

甘艸

人參

黃芩 各二兩

乾薑

黃連 各一兩

半夏 半升

大棗 十二枚

右八味咬咀以水一斗煮取六升去滓分服一升

日三

千金方衍義卷九

生

甘艸瀉心湯 治傷寒中風醫反下之其人下痢

日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞堅結滿乾

嘔心煩不能得安師見心下痞謂病不盡復下

之其痞益甚此非結實但以胃中虛客氣上逆

使之然也宜治之方

甘艸 四兩

黃芩

乾薑 各三兩

黃連 一兩

半夏 半升

大棗 十二枚

石六味咬咀以水一斗煮取六升去滓分服一升

日三

汗後外邪雖解然必胃氣安和始得脫然無恙胃

主津液津液因邪入而內結因發汗而外出兩相

告匿其人心下痞鞭以伏飲搏聚胃氣不足以開

之胃病故乾噎食臭水入而傍滲脇下也胃中水

穀不行腹中雷鳴有聲下利而清濁不分也雖不

誤下而且成痞設誤下之其痞結又當何如耶

後條傷寒中風互言可見病發於陰下之成痞者

非指傷寒為陰也下後完穀腹鳴嘔煩皆誤下而

胃中空虛之互辭不知此以為熱結而後下之其

痞必益甚故重以胃中空虛客氣上逆昭揭病因

方用甘艸瀉心湯即前生薑瀉心湯除去生薑人

參而倍甘艸乾薑也客邪乘虛結於心下本當用

人參以誤而再誤其痞已極人參和柔無剛決之

力故去而不用生薑辛溫最宜用者然以氣薄主

散恐領津液上升客邪從之犯上故倍用乾薑代

之以開痞而用甘艸為君坐鎮中州庶心下腹中

漸致寧泰耳今人但知生薑代乾薑孰知以乾薑

代生薑之散哉但知甘艸能增滿孰知甘艸能去

滿哉 其傷寒五六日嘔而發熱下之心下但滿

而不痛者宜半夏瀉心湯即生薑瀉心湯除去生

薑之走表藉半夏以溫膽以證起於嘔故推半夏

為君主即心實熱下利水穀不消腹中雷鳴心下痞滿乾嘔不穿亦不出此痞證脈緊即不可下誤下而邪反入裏寒邪轉入轉深外邪與飲搏結故心下滿鞭濁氣蘊熱上逆惟大黃黃連瀉心湯心湯苦寒瀉之若惡寒汗出雖有濕熱痞聚於心下而挾陰虛陰盛之證故於入黃黃連瀉心湯內另煎附子汁和服以各行其力其成傾痞之功即一瀉心湯方中法度森森若此千金於結胸痞證各舉二方為例餘俟學人之自悟可也并治溫毒變為狐惑蟲食於上聲喝及下痢不止腹中痛堅嘔噦腸鳴此方並可主治總皆火毒之患耳

千金方衍義卷九

白虎湯 治傷寒吐下後七八日不解結熱在裏表裏俱熱時惡風大渴舌上乾燥而煩飲欲水

石膏 一升 知母 六兩 甘草 二兩 粳米 六合

右四味咬咀以水一斗煮米熟去滓分服一升日三諸亡血及虛家不可與白虎湯若立夏後至立秋前得用之立秋後不可服春三月尚寒冷亦不可與之與之則嘔利腹痛

傷寒無大熱而口乾渴心煩背微惡寒宜服白虎湯傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲水無表證宜白虎湯若渴欲飲水口燥舌乾者亦宜白虎湯

義衍 傷寒論此條主以白虎加人參湯詳本文熱結在裏表裏俱熱二句已自酌量惟熱在裏所以表熱不除邪火內伏所以惡風大渴舌燥而煩欲飲水不止安得不以白虎湯但熱為務即於方中加入參生津為急耶千金慮熱毒勢盛恐加人參助長邪氣未便輕用所以方後垂戒諸亡血虛家及立秋後春三月皆不可與與之則嘔利腹痛惟夏至後立秋前得用之按白虎金神夏暑遇之而退為熱病暑病之方何長沙白虎例首謂之傷寒當知古聖藏機妙用全在乎此欲人深求而自得也蓋熱病乃冬不藏精陽氣發泄復傷驟寒致邪氣伏藏骨髓至夏大汗出而熱始發故仍以傷寒目之以伏邪從骨髓發出由心包而薄陽明處方乃以石膏救陽明之熱知母淨少陰之源甘草包心包之火粳米護脾胃之津氣弱者必加人參則本方方始得力後人不審每以白虎湯治冬月傷寒

千金方衍義卷九

發熱未有僥倖得免者今特昭揭此義以為冬月
 擅用白虎之戒觀溫瘧用桂枝白虎濕溫用蒼朮
 白虎皆春夏應用之方非秋冬藥也 又傷寒無
 大熱而口燥渴心煩背微惡寒者宜白虎湯此言
 熱毒內盛而煩表不勝邪而寒也 傷寒脈浮發
 熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲水無表
 證宜白虎湯此辨暴感之邪而非伏氣之發故不
 可與若渴欲飲水但顯伏熱外無表證方為合宜
 若渴欲飲水口乾舌燥者亦宜白虎湯此雖長沙
 本例千金入此即是上條渴欲飲水無表證之註

千金方衍義卷九
 桂枝湯
 脚也上三條傷寒論本文並用白虎加人參湯義
 見前方條下 其有傷寒脈浮滑此表有寒裏有
 熱白虎湯主之一條詳脈浮滑明係伏邪初乘肌
 表之應以表虛不能勝邪其外反顯假寒故言表
 有寒伏邪始發未盡裏熱猶盛故言裏有熱與傷
 寒脈滑而厥裏有熱一條參看自明因世本誤刊
 表有熱裏有寒千金不解其故故不錄入 復有
 三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讞
 語遺尿發汗則讞語下之額上汗出手足逆冷若
 自汗出者白虎湯主之一條是言熱病而兼中暈

乘勢一齊發出之證而非傷寒三陽合病故亦不
 錄 更有服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪
 大者白虎加人參湯一條此熱病誤認太陽中風
 而與桂枝湯乃挽回誤治之法非本病方故亦不
 錄

青箱子九 治傷寒後結熱在內煩渴者方
 青箱子 五兩 黃芩 枳實根
 苦參 各一兩 黃檗 二兩 龍膽
 梔子仁 黃連 各三兩
 右八味為末蜜丸如梧子大先食服七丸不知稍
 加一本云傷和為丸
 千金方衍義卷九
 掃葉山房

衍義 青箱子專走厥陰肝經本經治唇口青是執伏至
 陰而見假象非陰寒藥也艸龍膽本經治骨間寒
 熱大瀉肝經濕熱苦參本經治心腹結氣與黃檗
 同為瀉腎之品兼芩連梔子一派苦寒暗伏黃連
 解毒於中更加枳實根通津液除煩渴相率以迅
 掃留泊之餘邪咸非馴良之品病人稍涉虛者難
 以驟施
 大青湯 治傷寒熱病十日已上發汗不解及吐
 下後諸熱不除及下痢不止斑出皆治之方

大青 四兩

甘艸

阿膠 各二兩

豆豉 一升

右四味咬咀以水八升煮取三升去滓煮三沸去

豉內阿膠令烱頓服一升日三服欲盡復作常使

有餘渴者當飲但除熱止吐下無服深師治勞復

脂三兩胡洽集驗同

衍天青乃藍之一種善解陷伏至陰之邪豆豉專搜

少陰不正之氣阿膠滋血潤燥甘艸解毒和中不

特為陽毒發斑之專藥一切時行溫熱汗吐不解

下利不止並得用之取其解散陰經熱毒也

千金方衍義卷九

天

插葉出房

治傷寒後不了了朝夕有潮熱如瘧狀方

知母 二兩

麻黃

甘艸

芍藥

黃芩

桂心 各一兩

右六味咬咀以水七升煮取二升半服五合日三

溫覆令微汗若心煩不得眠其人欲飲水當稍稍

飲之令胃中和則愈

此於金匱桂枝芍藥知母湯中除去木附防風生

薑四味易入黃芩一味彼用木附以開下著之痺

麻知以散土盛之熱此用麻知以解宿蘊之邪桂

芍以和將復之血散邪杜火全在麻知二味之力

灸法

初得病或先頭痛身寒熱或漉漉欲守火或腰背強

直面目如飲酒狀此傷寒初得一二日但烈火灸心

下三處第一處去心下一寸名巨關第二處去心下

二寸名上腕第三處去心下三寸名胃腕各灸五十

壯然或人形大小不同恐寸數有異可繩度隨其長

短寸數最佳取繩從心頭骨名鳩尾頭度取臍孔中

屈繩取半當繩頭名胃腕又中屈半繩更分爲二分

從胃腕向上度一分卽是上腕又上度取一分卽是

巨關大人可灸五十壯小兒可三壯亦隨其年灸之

千金方衍義卷九

灸

插葉出房

大小以意斟量也若病者三四日以上宜先灸胸上

二十壯以繩度鼻正上盡髮際中屈繩斷去半便從

髮際入髮中灸繩頭名曰天聰又灸兩顛額又灸兩

風池又灸肝膈百壯餘處各二十壯又灸太衝三十

壯神驗

孫真人千金方衍義卷九



孫真人千金方衍義卷十

長洲 卷十

南沙 卷十

傷寒方下 凡七類

傷寒雜治第十 論一首 方五十一首

論曰凡除熱解毒無過苦酢等物故多用苦參青柏
艾梔子葶藶苦酒烏梅之屬是其要也夫熱盛非苦
酢物不解也熱在身中既不時治治之又不苦酢
等藥此如救火不以水也必不可得脫免也又曰今
諸療多用辛日薑桂人參之屬此皆貴價難得常有

千金方衍義卷十

傷寒山房

此行求之轉以失時而苦參葶藶青柏艾之屬所在
盡有除熱解毒最良勝於向之貴價藥也前後數參
並用之得病內熱者不必按藥次也便以青柏苦參
艾苦酒療之但稍與促其間無不解也

扁鵲曰病在腠理湯熨之所及病在血脉鍼石之所
及病在骨髓無可奈何而凡醫治病或言且待使病
成乃頓去之此為妄矣當預約束家中及所部曲具
諸解此意使有病者知之為要

治溫氣病欲死方

苦參一兩以酒二升煮取一升盡飲之當吐則

除諸毒病服之覆取汗皆愈 張文仲及附後云
治熱毒氣死破椎

千金

苦參湯 治熱病五六日已上方

苦參 三兩 黃芩 二兩 生地黃 八兩

右三味咬咀以水八升煎取二升適寒溫服一升

日再

傷寒溫病截然兩途凡醫但見壯熱頭疼槩行發
散信手殺人曷知溫病是久伏少陰之邪得春時
溫暖之氣蘊化濕熱從內發外故用苦參按逐腎
家久伏之邪取其苦燥濕寒除熱借酒引之上涌

千金方衍義卷十

傷寒山房

吐中便其發散之義 若五六日後熱交營分微
外壯熱即加生地以清血脈之邪黃芩以泄肌
之熱棧之初發淺深不同又非一味苦參可治也
藥雪湯 治時行毒病七八日熱積聚胸中煩亂

欲死起死人湯方

芫花一斤以水三升煮取一升半漬故布薄胸
上不過三薄熱即除當溫暖四肢護厥逆也

芫花消痰飲水腫之專藥本經治咳逆上氣喉鳴

咽腫千金取治時行毒病用水煎漬布取以攻發

濕熱之毒也

拓蕒湯 治傷寒中風五六日已上但胸中煩乾

嘔方

栝樓實 一枚

黃芩

甘艸 各三兩

生薑 四兩

大棗 十二枚

柴胡 八兩

右六味咬咀以水一斗二升煮取五升絞去滓適

寒溫服一升日二

於小柴胡方中除去半夏人參加入栝樓治少陽

乾嘔煩渴

蘆根飲子 治傷寒後嘔噦反胃及乾嘔不下食

方

生薑 三兩

生蘆根 切

青竹茹 各一升

梗米 三合

右四味以水七升先煮干里鞋底一隻取五升澄

清下藥煮取二升半隨便飲不瘥重作取瘥

治傷寒後嘔噦方

通艸 三兩

生蘆根 切

橘皮 一兩

粳米 三合

右四味咬咀以水五升煮取一升隨便稍飲不瘥

更作取瘥止

術 金匱治胃熱噦逆乾嘔無如橘皮竹茹生薑等味

千金乃於橘皮竹茹湯中採取竹茹生薑清理胃

中痰逆配入蘆根滌除胃熱粳米以安胃氣也

次方但採橘皮順氣滌痰參入通艸上通陽明逆

氣使之下通仍賴蘆根粳米滌熱安中之力

治傷寒後虛羸少氣嘔吐方

石膏

麥冬

半夏 各一升

竹葉 一把

人參 一兩

右五味咬咀以水一斗煮取六升去滓內粳米一

升米熟湯成飲一升日三服 一方加生薑五兩

此方是仲景竹葉湯方前卷汗後門中已有但少甘艸分兩不別

千金方衍義卷下

橘葉山房

即前竹葉湯去甘艸衍義見前

治熱毒攻手足赤腫焮熱痲痛欲脫方

煮馬尿與羊尿汁漬之日三度

又方

漬煮虎杖根適寒溫以漬手足令至踝上二尺

止

又方

稻穰灰汁漬之

又方

取好酒煮若參漬之

又方

猪膏和羊屎塗之亦佳

又方

取常思艸絞取汁漬之一名蒼耳

行手足赤腫熱攻四末故以四足獸尿汁漬之散邪

毒和血脈也 虎杖性普通利煮汁漬手足亦取

破血利水之功 稻稷灰汁專於滌垢亦能散血

酒煮苦參服之專祛濕毒漬之亦能解熱 猪

膏和羊屎塗熱腫痛處即前馬羊屎汁漬之變法

蒼耳治四肢拘攣脚膝疼痛以其能去風濕毒

邪也

漏蘆連翹湯 治時行熱毒變作赤色癰疽丹疹

熱毒赤腫赤痛生障翳方

漏蘆 連翹 黃芩

麻黃 白朮 升麻

甘艸各一兩 枳實 大黃各三兩

右九味咬咀以水九升煮取三升分三服相去如

人行五里久更服熱盛者可加芒硝二兩

行時行熱毒雖熾發於外而毒尚根於內故用麻黃

升麻開泄既發之毒枳實大黃攻逐未盡之邪麻

黃升麻得漏蘆連翹黃芩利竅解毒清熱之品則

無助虐熾腫之虞枳實大黃得白朮甘艸攝津禦

毒之味則有匡正辟邪之勳其配合之奧未許拘

執藥性者之妄行推測也

猪膽湯 治傷寒五六日斑出方

猪膽 苦酒各三合 雞子一枚

右三味合煎三沸強者盡服之羸者須煎六七沸

分爲二服汗出即愈

行發斑而用猪膽苦酒雞子必陽毒陷於陰分而見

咽痛之故若邪在陽分正當助其熾發必無酸收

之理方中猪膽瀉肝火苦酒收陰氣雞子潤咽痛

服之使嘔鼓毒發於陽分汗出則愈乃長沙少陰

例中苦酒湯之變法以補長沙之未逮

治人及六畜時氣熱病豌豆瘡方

濃煮黍稷汁洗之一莖是穰穰即不瘥瘡若黑

者搗蒜封之

又方

煮芸薹洗之

治熱病後豌豆瘡方

黃連三兩以水二升煮取八合頓服之

千金方衍義卷十 五 婦科山房

千金方衍義卷十 六 婦科山房

又方

真波斯青黛大如棗水服之瘥

又方

青木香二兩以水三升煮取一升頓服之愈

又方

小豆末雞子白和傅之

初黍乃小米之粘者產於北方故其穰可除濕熱

豆瘡之毒滌是高梁與黍不類恐人誤用故以此

辨若色黑為血滯取蒜搗封辛以散之也芸

薑破血潤燥能治遊風豌豆瘡亦得療之黃連

千金方衍義卷十

疔瘡山房

苦燥專治濕熱之毒青黛清熱解毒濕熱陽毒

發斑咽痛咸可取用不特治熱病後豌豆瘡也

青木香入足少陰善降陰氣上逆并治癰腫痰結

氣凝諸痛羊脂溫散濕熱毒氣摩傅以散皮膚

中血滯赤小豆雞子白同散血解毒也

木香湯治瘡癩疥者方

青木香二兩 薰陸香

麝香半兩

礬石

右五味咬咀以水四升煮取一升半再服熱毒盛

者加犀角二兩無犀角以升麻代之病輕者去礬

石神驗

又方

匹硝和猪脂塗上勿動痂落無痕仍以黃土末

上良此病小便澀有血者內壞瘡皆黑爛不出

膿者死不治也

治內發瘡盛方

酢四合

大猪膽一具

右三味合煎三沸服一合日五服之良

治豌豆瘡初發覺欲作者方

煮大黃五兩服之愈

千金方衍義卷十

疔瘡山房

治時行病發瘡方

取好蜜遍身摩瘡上亦可以蜜煎升麻摩之并

敷數食之

衍青木香湯中乳香和血止痛礬石收濕除惡瘡熱

毒丁香解結氣麝香利諸竅用治煩疼專通鬱閉

熱毒也匹硝和猪膽塗專解熱毒仍臥黃土取

收濕氣若便澀有血是津血內竭黑爛是血氣外

槁必死何疑苦酒猪膽即前猪膽湯少雞子

單用大黃與前單用黃連一意被取燥濕此主滲

熱蜜能解毒摩瘡潤燥取以止痛煎同升麻摩

取散火也

又方

灸兩手腕腕子骨尖上三壯男左女右

治傷寒鼻衄肺間有餘熱故也熱因血自上不止

用此方

牡蠣二兩 石膏一兩

右二味治下飾酒服方寸七日三四亦可蜜丸如

梧子大用治大病瘵後小勞便鼻衄者

衍肺間餘熱熱邪原不為盛也故用牡蠣之鹹寒降

泄石膏之辛涼化熱設熱邪勢盛詎可用牡蠣收

瀉乎

治傷寒熱病喉中痛閉塞不通方

生烏扇一斤 猪脂一斤

右二味合煎藥成去滓取如半雞子大薄綿裹之

內喉中稍稍咽之取瘥

又方

升麻

通艸四兩

射干二兩

右六味咬咀以水七升煮取二升半分作三服

衍喉痛閉塞不通乃熱毒上炎故用射干之苦寒專

芍藥 羚羊角各三兩

生蘆根升

攻咽喉結痛猪脂以潤少陰之熱結也 射干為

咽痛專藥設用之不應則加升麻以散火芍藥以

收陰羚羊以破結通艸以泄熱蘆根以解毒并佐

射干之力也

治熱病口中苦下氣除熱喉中鳴煎方

石膏半升 蜜一斤

右二味以水三升先煮石膏取二升次內蜜復煎

取如飴舍如棗核許烺盡復舍之大良

衍石膏化熱得蜜之甘以緩之

治傷寒熱病後口乾喜唾咽痛方

大棗二十枚 烏梅十枚

右二味合搗蜜和含如杏核大咽其汁甚驗

天棗甘緩得梅之酸以收之

衍赤石脂禹餘糧湯 傷寒服湯藥而下利不止心

下痞堅服瀉心湯竟復以他藥下之利不止醫

以理中與之利益甚理中治中焦此利在下焦

治之方

禹餘糧

赤石脂各一斤

右二味以水六升煮取二升分三服復利不止者

當利其小便

傷寒誤下利不止心下痞堅與理中利益甚此下

焦虛脫故用赤石脂禹餘糧固鎮其下則中土自

與心下之痞自開較之桃花湯其力倍專情因情

用之妙無逾於此 此方傷寒論列之甘艸瀉心

湯下瀉心湯專為胃中空虛客氣上逆心下痞鞭

而設若果胃中空虛與理中湯痞當開矣服之利

反益甚知利不在中焦而在下焦下焦乃腎氣所

司腎虛不能固封藏非甘溫不能固脫故長沙

但取二味直達下焦以取專功倘服之利復不止

又當五苓利其水道以滲水實脾為務也 或心

下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒此飲

在脇下而痞又屬十棗湯證則與此湯無涉也

治傷寒後下利膿血方

阿膠 一兩 黃蘗 二兩 黃連 四兩

右四味咬咀以水六升煮取二升去滓內阿膠更

煎令消分為三服 藥有黃芩

少陰病之二三日以上心煩不得臥用黃連阿

膠湯此治傷寒後下利膿血故於黃連阿膠湯中

除去芍藥雞子黃用黃蘗佐黃連以堅腸胃梔子

義

義

佐阿膠以清氣血不使隨火下奔殊非舊有微瀉

腎氣本虛之謂

治赤白下膿小兒得之二日皆死此有膿蟲在下

部方

麝香 礬石 巴豆

附子 真珠 雄黃 等分

右六味治合取桑條如箭筒長三寸以綿纏頭二

寸唾滿綿展取藥著綿上內穀道中半日復易之

日再神效

義 蠶本濕熱所化治用雄黃化蠶為主兼礬石收濕

巴豆殺蟲麝香辟惡真珠解毒用附子者不但取

其破除結積并取其烈以化下濕生蟲譬如果日

當空陰類皆滅迹矣

麻黃升麻湯 治傷寒六七日其人人大下後脈沉

遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄

利不止為難治者方

麻黃 知母 萎蕤 芍藥

黃芩 升麻 芍藥 芍藥

當歸 乾薑 石膏

茯苓 白朮 桂心

扶苓

甘艸

麥冬各一兩傷寒論作天門冬

右十四味咬咀以水一斗先煮麻黃減二升去上沫次內諸藥煮取三升分服一升微取汗愈

衍義傷寒六經例中惟厥陰見證最為龐雜以未離亢逆之邪又挾風木之氣所以陰中常伏陽象如麻

黃升麻湯治傷寒六七日大下後脈沉遲手足厥

逆下部脈不至泄利不止一一盡顯陽邪陷陰之

兆其咽喉不利唾膿血明係陰火僭逆之徵故借

白虎湯中石膏知母甘艸以化陷溺陰中之邪麻

黃升麻黃芩以泄壯火鬱蒸之煩咽喉不利滋以

千金方衍義卷十一

萎蕤門冬 甄膿血和以常歸芍藥以既經大下非

乾薑白朮不能收攝虛陽非桂心茯苓不能通調

營氣千金體此而立萎蕤湯以治風溫總皆少陰

厥陰兩經緣合之邪也設非大下後脾不委頓則

桂枝白朮可以不須升麻亦可裁酌要在臨證之

權衡耳

治溫毒及傷寒內虛外熱攻胃下黃赤汁及爛肉

汁赤滯下伏氣腹痛諸熱毒方

梔子七枚 豨白一握

右三味以水四升先煮梔子豨白令熟次內豨煮

取二升半分二服頓服取瘥

衍義溫毒內攻而見下利煩擾故借太陽例中梔子豨

湯加豨白一味上主胸中懊憹下除泄利下重也

治病後虛腫方

豨 五升 醇酒 一斗

右二味煮三沸及熱頓服不耐酒者隨性覆取汗

衍義脾虛不能統氣而浮散於外故用酒煮豨以滌除

陳氣則氣隨汗泄而愈

治汗不止方

地黃 三斤切以水一斗煮取三升分作三服

千金方衍義卷十一

又方

白朮葉作飲飲之

又方

白朮方寸七以飲服之

治卒得汗不止方

以溫酒服牛羊脂愈云服牛羊屎亦止

治盜汗及汗無時方

以韭根四十九枚水二升煮一升頓服之為度

又方

豨一升以酒二升漬三日服不差更合服不盡

三劑即止

止汗方

杜仲

牡蠣等分

右二味治下篩臨夜臥以水服五錢七

牡蠣散 治臥即出盜汗風虛頭痛方

牡蠣

白朮

防風各三兩

右三味治下篩酒服方寸七日二此方一切泄汗服之三日皆愈

又方

牡蠣

雷丸

麻黃根各三兩

千金方卷之十

五

補藥山房

乾薑

甘艸各一兩

米粉二升

右六味治下篩隨汗處粉之

血熱蒸汗用生地黃 脾虛汗泄用白朮散 經

虛風熱白汗用酒服牛羊脂 痰血白汗用韭根

虛陽上升用酒煮或與前治病後虛腫無異但

有覆汗不覆汗之分 腎虛不能斂津而汗用杜

仲牡蠣 不應去杜仲加白朮防風祛風逐濕

漏粉川牡蠣麻黃根等味斂中寓散法也

勞復第十一論二首 食忌九條 方十八首

論曰凡熱病新瘥及大病之後食猪肉及羊血肥魚

油膩等必當大下利醫所不能治也必至於死若食

餅餌黍黍飽哺餽炙棗栗諸果物脯修及堅實難消

之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之

則胃氣虛冷大利難禁不下之必死下之復危皆難

救也熱病及大病之後多坐此死不可不慎也

病新瘥後但得食糜粥寧少食令飢慎勿飽不得他

有所食雖思之勿與之也引日轉久可漸食羊肉白

糜若羹汁雉兔鹿肉不可食猪狗肉也新瘥後當靜

臥慎勿早起梳頭洗面非但體勞亦不可多言語用

心使意勞煩凡此皆令人勞復故督郵顧子獻得病

千金方卷之十

五

補藥山房

已瘥未健請華陀視脈曰雖瘥尚虛未得復陽氣不

足慎勿勞事餘勞尚可女勞則死當吐舌數寸其婦

聞其夫瘥從百餘里來省之經宿交接中間三日發

熱口噤臨死舌出數寸病新瘥未滿百日氣力不平

復而犯房室略無不死有士蓋正者疾愈後六十日

已能行射獵犯房室即吐涎而死及熱病房室名爲

陰陽易之病皆難治多死近者有一士大夫小得傷

寒瘥已十餘日能乘馬行來自謂平復以房室即小

腹急痛手足拘攣而死

時病瘥後未滿五日食一切肉麪者病更發一困

時病瘥後新起 飲酒及韭茶病更發

時病新瘥食生魚鮮下痢必不止

時病新瘥食生菜令顏色終身不半復

時病新瘥汗解飲冷水者損心胞令人虛補不復

時病新瘥食生棗及羊肉者必膈上作熱蒸

時病新瘥食犬羊等肉者必作骨中蒸熱

時病新瘥食魚肉與瓜生菜令人身熱一本作腫

時病新瘥食蒜鱸者病發必致大困

黃龍湯 治傷寒瘥後更頭痛壯熱煩悶方 仲

景名小柴胡湯方

千金方衍義卷十

七

婦人山房

柴胡 半斤

半夏 半升

黃芩 三兩

人參 一兩

甘草 二兩

生薑 四兩

大棗 十二枚

右七味咬咀以水一斗煮取五升去滓服五合日

三不嘔而渴者去半夏加栝蘆根四兩

柴胡引清氣 左行於膽開發少陽之所必需膈受

風木之邪病 則寒熱交爭故用黃芩以泄中外之

熱膈為清淨之府病則濁痰四逆故用半夏以辟

內沃之涎然非人參甘艸不能廓充大氣以禦外

入之邪非生薑木棗不能開通經脈以和傷殘之

氣千金借治瘥後勞復之證以其既經一翻發泄

則人參護持元氣尤為切務因易之以嘉名形容

神化不測之妙

補大病後不足虛勞方傷病虛勞同用

取七歲已下五歲已上黃牛新生者乳一升以

水四升煎取一升如人體溫稍稍飲之不得過

多十日服不絕為佳

枳實梔子湯 治大病已後勞復者方

枳實 三枚

梔子 十四枚

豉 一升

千金方衍義卷十

太

婦人山房

右三味咬咀以酢漿七升先煎減三升次內枳實

梔子煮取二升次內豉煮五六沸去滓分再服覆

取汗如有宿食者內大黃如博棋子五六枚

治傷寒溫病後勞復或食或飲或動作方

梔子仁 三枚

石膏 五兩

香豉 一升

鼠屎犬頭大者二十枚

右四味咬咀以水七升煮取三升分三服

治食大飽不消勞復脈實者方

豉 一升

鼠屎 二十枚

梔子

大黃 三兩

右四味咬咀以水六升煮取二升分二服微取汗
應小鴨膳者止不澹者復作

治新瘧早起及食多勞復方

五合

鼠屎大頭者二
十一枚

右二味以水二升者取一升盡服之溫臥令小汗

愈崔氏加梔子七枚九夏附後有麻子仁內一
升加水一升亦可內枳實三枚葱白一虎口

治重病新瘧早起勞及飲食多致發欲死方

燒薑甲末飲服方寸七

治病新瘧遇美飲食食過多食復者方

取所食餘燒為末飲調服二錢七日三服

千金方衍義卷十

九

潘葉山房

行經云火淫所勝以苦發之此方加枳實於梔子豉

湯中以發其微汗泄胸中虛煩正苦以發之也服

後覆取微汗乃吐中萬汗之變法若有宿食加大

黃下奪之設泥病後不敢用下則熱持而真陰益

困矣傷寒論用清漿水空煎然後入藥同煎千金

用酢漿和水煎服取酸以收火氣之散也中髻方

中漿水散從此竊出傷寒溫病後勞復或飲食

動作致病用梔子豉湯不加枳實而加石膏以解

飲酒復熱加鼠屎以斂肝腎虛陽然非溫病遺毒

石膏不可輕用食大飽不消勞復脈實梔子豉

湯不加枳實而加大黃即有宿食加大黃之法更

加鼠屎以淨少陰伏熱之源新瘧早起及女勞

復但用乾豉以辟不正餘邪鼠屎以化腎肝虛熱

一大病新瘧早起復熱川薑甲末專取滋陰而餘

熱自化病新瘧後飲食過多復熱用所食之餘

燒末服之既不大傷元氣并無誤藥之失

麥門冬湯治勞復氣欲絕起死人方

麥門冬一兩 甘艸二兩 涼藥二十枚

竹葉切一升

右四味咬咀以水七升煮粳米一升令熟去米內

千金方衍義卷十

十一

潘葉山房

諸藥煎取三升分三服不能服者綿滴湯內口中

用之有效

治食勞方

麵二升煮取汁服之

又方

杏仁五十枚以酢二升煎取一升服之取汗

欲令病人不復方

燒頭垢如梧桐子大吞服之

治傷寒瘧後一年心下停水不能食者方

生址黃五斤 白朮一斤 好麩二斤

右三味合搗令相得曝乾下篩酒服方寸匕日三
加至二七

義勞復氣欲絕胃虛火乘於肺也方用麥冬滋肺竹

葉清心甘艸和中京棗以培脾氣之耗也 食勞

用麵煮取汁服以安少陽生後之氣然在西北風

上剛燥之地為當東南卑濕之所徒資濕熱良非

所宜 杏仁泄肺之滿苦酒收氣之散散中寓收

之法惟素稟可恃者為宜 傷寒向愈之時欲令

病氣不復乃取頭垢燒服反本還元以收上盛之

熱也 傷寒瘥後經年停水心下不食用生地黃

和木麵酒服欸除水氣蠱積必得涌吐方效昔人

以鮮地黃搗汁搜麵作冷淘食之取吐不吐則利

出長蟲如辟宮而安取義雖同而緩攻急追之法

不侔也

論曰婦人濕病雖瘥若未平復血脈未和倘有熱毒

而與之交接得病者名為陰陽易病其人身體重熱

上衝胸頭重不能舉眼中生眵一作膜四皮一作膝拘

急小腹絞痛手足拳者即死其亦有不自死者病苦

小腹裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離經脈緩

勞血氣虛骨髓竭便噓噓吸吸氣力轉少著牀不能

動搖起止仰人或引歲月方死醫者張苗說有婢得

病瘥後數日有六人姦之皆死

治婦人得病易丈夫丈夫得病易婦人方

取女人中視近隱處燒服方寸七日三小便即

利陰頭微腫此為愈矣女人病可取男裙一如

此法

治交接勞復陰卵腫縮腹中絞痛便欲死方

取所交接婦人衣服以覆男子立愈

令人病不復方

取女人手足爪二十枚女人中衣帶一尺燒以

酒若米飲汁服之

治男子新病起近房內復考方

取女人月經赤帛燒服方寸七亦治陰卵腫縮

入腹絞痛欲死

治病後髮亂不可理通頭法

生麻油二斤將頭髮解開安銅沙羅中用油淹

漬之細將釵子理髮斯須並自通矣

義陰陽易病雖言傷寒遺毒而實熱病居多以冬時

伏氣藏於骨髓之中無由發泄得交接之淫火溢

出乘虛襲入髓竅傳於不病之人蓋傷寒之邪傷

於血脈之中可從汗下而解即解之未盡熱毒較輕非若伏藏之毒最盛而人感之則身重少氣少腹裏急陰中拘攣熱上衝胸頭重不舉眼中生花膝脛拘急乃陰中暴受熱毒又非蕩滌所宜故燒襦為散以其人平昔所出敗濁同氣相求服之小便得利陰頭微腫陰毒仍從陰竅而出也或以所交婦人衣服覆男子者亦取同氣之應也或以女人爪甲衣帶燒服取筋之餘以療宗筋之病也或以女人月經赤帛燒服法與視襦無異

百合第十二方七首

千金方衍義卷十

三

補藥山房

論曰百合病者謂無經絡百脈一宗悉致病也皆因傷寒虛勞大病已後不復變成斯病其狀惡寒而嘔者病在上焦也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便堅三四日一大便時復小溲者病在中焦也六十三日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也三十三日當愈各隨其證以治之百合之為病令人意欲食復不能食或有美時或有不開飲食臭時如有寒其實無寒如有熱其實無熱常默默欲臥復不得眠至朝日苦小便赤澀欲行復不能行諸藥不能治治之即劇吐利如有神靈所為也百合病身形如和其

脈微數其候每滿時即覺頭痛者六十日乃愈百合病候之滿時頭不覺痛漸漸寒者四十日愈百合病候之滿時覺快然但覺頭眩者二十日愈百合病證其人或未病而預見其候者或已病四五日而出或一月二十日後見其候者治之善誤也依證治之論曰百合病見在於陰而攻其陽則陰不得解也復發其汗為逆也見在於陽而攻其陰則陽不能解也復下之其病不愈要略云見於陰者以陽法救之見發其汗此為逆其病難治見陰攻陽乃復下之此亦為逆其病難治

百合知母湯

治百合病已經發汗後更發之方

千金方衍義卷十

三

補藥山房

百合七枚

知母三兩

右二味以泉水先洗漬百合一宿當沫出水中明且去水取百合更以泉水二升煮取一升汁置之復取知母切以泉水二升煮取一升汁合和百合汁中復煮取一升半分再服不瘥更依法合服

力

百合七枚

滑石三兩

代赭一兩

右三味先以泉水漬百合一宿明且去水更以泉水二升煮百合取一升去滓又以水二升煮餘二

味取一升內百合汁如前法復煎取一升半分再

服

百合雞子湯 治百合病已經吐後更發者方

以百合七枚擘漬一宿去汁以泉水二升煮取

一升取雞子黃一枚內汁中攪令調分再服

百合地黃湯 治百合病始不經發汗吐下其病

如初者方

以百合七枚擘漬一宿去汁以泉水二升煮取

一升半內生地黃汁一升復煎取一升半分再

服大便當去惡沫為驗也

千金方卷第十

治百合病經月不解變成渴者方

百合根一升以水一斗漬一宿以汁先洗病人

身洗身後食白湯餅勿與鹽豉也渴不瘥可用

栝蔞根并牡蠣等分為散飲服方寸七日三

治百合病變而發熱者方

百合根一兩 滑石三兩

右三味治下篩飲服方寸七日三當微利利止勿

復服熱即除一本云治百合病小便赤澀臍下堅

急

治百合病變腹中滿痛者方

但取百合根隨多少熬令黃色搗篩為散飲服

方寸七日三滿消痛止

病無經絡可分百脈一宗致病故名百合其病雖

有上中下三焦之別皆由傷寒虛勞大病後虛火

擾其血脈所致是以欲食不食如寒無寒如熱無

熱欲眠不眠欲行不行皆陽火燥陰無可奈何之

狀藥雖治病然必藉胃氣以行之若毒血在脾胃

經脈閉塞藥雖入而胃弱不能行故得藥轉劇而

吐利也病不在皮肉筋骨則身形如和故脈微數

脈數血熱則心火上炎不下交於腎而膀胱之經

千金方卷第十

亦不得引精於上上虛則溺時浙然頭眩甚則為

頭痛以此微甚可卜愈日之遠近也其治法咸用

百合為君以安心補神能去血中之熱利大小便

導滌痰積然必鮮者方克有濟若汗之而失者

佐知母以調其上焦之津液下之而失者佐滑

石代赭以運其下焦之痺結吐之而失者佐雞

子黃以補其中焦之營血若不經發汗吐下而

血熱自汗但佐生地黃汁以涼血血涼則熱毒解

而蘊結自行故大便當去惡沫也其經月不解

百脈內壅津液外泄而成渴者則用百合洗之一

身之脈皆得通暢而津液行渴自止勿食鹽豉者以味鹹能凝血也 若洗後渴不瘥是汗多津脫則以栝蔞牡蠣以斂品之 若變發熱乃血脈鬱而成熱住滑石以通利之 百合病皆持兩端不表不裏為其熱行血脈之中非如傷寒可行汗下法所以每多扼腕往往有綿延經歲不已者愈期不復可拘也但當隨所稟偏勝而調之慎勿誤認下元虛弱妄用溫補之法也

傷寒不發汗變成狐惑第十三論一首方三首

論曰狐惑之病其氣如傷寒默默欲眠目不得閉起

千金方衍義卷十

三

攝護山房

臥不安其毒在喉咽為惑病在陰肛為狐病狐惑之病並惡飲食不欲食開食臭其面目翕赤翕白翕黑毒食於上者則聲啞也明一毒食下部者則乾咽也此由溫毒氣所為食於上者瀉心湯主之食於下者苦參湯淹洗之食於肛外者熏之并扇雄黃三片稍置瓦瓶中炭火燒向肛熏之并服湯也

治狐惑湯方

黃連 四兩

薰艸 二兩

右二味咬咀白酢漿一斗漬一宿煮取三升分為

三服

狐惑總由濕熱生蟲以致默默欲眠寢食不安有

似乎狐之性多惑多疑故以比類名病通用瀉心

湯專攻濕熱固結之邪方中乾薑以行苓連之性

人參以行苓連之力淹洗用苦參者取其苦燥專

除濕化之蟲熏用雄黃取純陽之性以散濁惡之

毒也服用黃連薰艸黃連即瀉心湯中專主佐以

薰艸專辟惡氣即瀉心湯中乾薑之義煮用酢漿

專收濕化之蟲味少力專其功不在瀉心之下耳

赤小豆當歸散 其人脈數無熱微煩默默但欲

臥汗出初得之三四日目赤如鳩眼得之七八

千金方衍義卷十

三

攝護山房

日其四皆黃黑能食者膿已成也治之方

以赤小豆三升漬之令生芽足乃復乾之加當

歸三兩為末漿水服方寸七日三卽愈

此方專主熱毒鬱於血脈流入大腸而成狐惑之

候其脈數無熱知熱不在表而在血也默默欲臥

熱毒傳陰陰主靜也初得之二三日目赤如鳩眼

七八日目四皆黃黑血溢於經不散凝積而為瘡

也膿成則毒從外化無關於裏故能食也方以赤

小豆清熱利水且浸令芽出以發越蘊積之毒佐

當歸可統血之權使不致於散漫也至於先使後

血亦主此方以清小腸流入大便熱毒之源見證雖異而主治則同也

瀉心湯 其病形不可攻不可灸因火為邪血散

脈中傷脈尚可傷臟則劇并輸益腫黃汁出經

合外爛肉腐為癰腫此為火疽醫所傷也夫脈

數者不可灸因火為邪即為煩因虛逐實血走

脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

應在瀉心瀉心湯兼治下痢不止腹中愒堅而

嘔噦腸鳴者方

大黃 二兩

黃連

黃芩 各一兩

千金方衍義第

无

掃藥山房

右三味咬咀以水三升煮取一升頓服之

按傷寒論中瀉心湯五方方名各別惟全價瀉心

湯一方方合血中之火例治而集方者不察誤收

半夏瀉心湯詳方中參牛薑棗渾是溫氣之品殊

非因火為邪焦骨傷筋所宜因力正之

傷寒發黃第十四論三首 證五首

論曰黃有五種有黃汗黃疸穀疸酒疸女勞疸黃汗

者身體四肢微腫胸滿不渴汗出如黃藥汁由大汗

出卒入水中所致黃疸者一身面目悉黃如橘柚暴

得熱以冷水洗之熱因留胃中食生冷瓜果所致若

成黑疸者多死穀疸者食畢頭眩心忪怫鬱不安面

發黃由失飢大食胃氣衝重所致酒疸者心中懊懣

足脛滿小便黃而發赤斑黃黑由大醉當風所致女

勞疸者身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難正大

勞大熱而交接竟入水所致但依後方治之

黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾

衣色正黃如藥汁其脈自沉從何得之此病以汗出

入水中浴水從汗孔入得之

黃芪芍藥桂酒湯 治黃汗方

黃芪 五兩

芍藥 三兩

桂心 二兩

千金方衍義第

辛

掃藥山房

右三味咬咀以苦酒一升水七升合煎取三升飲

一升當心煩也至六七日稍稍自除心煩者苦酒

阻故也

水濕從外漸漬於經非桂之辛溫無以驅之達表

既用桂芍內和營血卽以黃芪外壯衛氣以杜濕

邪之復入猶恐芪芍固護不逮更用苦酒收斂津

液不使隨藥外泄然服藥後每致心煩乃苦酒阻

絕陽氣不能通達之故須六七日稍和心下方得

快然非若水煎湯液之性味易過也

黃疸之病疸而渴者其病難治疸而不渴其病可治

發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而微熱

桂枝黃芩湯 治諸病黃疸宜利其小便假令脈

浮當以汗解方

桂枝

芍藥

生薑各三

甘草二兩

黃芩五兩

大棗十二枚

右六味以水八升微火煎取三升去滓溫服

一升覆取微汗須臾不汗者飲稀熱粥以助湯若

不汗更服湯

桂枝湯加膠飴名小建中取稼穡之甘入胃護營

不獨為風傷衛之本藥即寒傷營之尺中微弱營

千金方衍義卷十

辛

攝業山房

氣不足血少之證亦得用之於小建中內更加黃

芪名黃芪建中以治諸虛羸瘦金匱為虛勞不足

祛邪補正之首方千金又加當歸名當歸內補建

中以治產後虛羸腹痛此但加黃芪助衛逐濕原

無實衛之功亦無內補之用乃金匱之原方也

麻黃醇酒湯 治傷寒熱出表發黃疸方

麻黃三兩以醇酒五升煮取一升半盡服之溫

覆汗出即愈冬月寒時用清酒春月宜用水

黃醇酒湯散中加散方中麻黃散表可謂專奏更

黃醇酒湯散中加散方中麻黃散表可謂專奏更

加酒煎協濟麻黃開發營中濕熱一舉而汗散無

餘即此緩急之治可識受病之淺深矣

治黃疸方

瓜蒂

秫米

赤小豆各二

右三味治下篩病重者取如大豆二枚內著鼻孔

中痛縮鼻須臾當出黃汁或從口中出汁升餘則

愈病輕者如一豆不瘥間日復用又下里間以筒

使人極吹鼻中無不死大慎之刪繁療天行毒熱

髓之間或為黃疸黑疸赤疸白

義見嬰兒傷寒發黃門中

千金方衍義卷十

辛

攝業山房

大黃丸 治同前

大黃

葶藶子各二

右二味為末蜜和丸如梧子大每服十九日三痛

瘥止

又方

大黃二兩

黃連三兩

黃蘗

黃芩各一

麴末五合

右五味為末蜜和丸如梧子大先食服三九日三

不知加至五丸

大黃丸二方皆從金匱大黃硝石湯化出彼用硝

石之辛温以行大青梔葉之苦寒此用葶藶佐大
費之間泄不必復用硝石散結也 次方取麩末
以佐四黃之滌熱卽是硝石佐大黃梔葉之義識
此變通諸法可推金匱妙用也

茵陳湯 治黃疸身體面目盡黃方

茵陳 黃連 各兩 黃芩 二兩

大黃 甘艸 人參 各一兩

梔子 二十枚

右七味咬咀以水一斗煮取三升分三服日三亦

治酒疸酒癖

千金方衍義卷十 薑 濕熱而傷

衍商陳蒿湯本治傷寒瘀熱在裏而發黃又合金匱

瀉心湯恐苦寒過甚有傷沖和之氣故加人參甘

艸扶助胃氣以行祛濕之力殊非虛而用補之意

三黃散 治同前

大黃 黃連 黃芩 各四兩

右三味治下篩先食服方寸七日三亦可為丸

此卽金匱瀉心湯三味但分兩稍異變湯為散專

取和滓以祛濕熱也

五苓散 治黃疸利小便方

茯苓 澤瀉

白朮 桂心 各三兩

右五味搗篩為散渴時水服方寸七極飲水卽利

小便及汗出愈此與第九卷方相同以分兩不同故重出

衍五苓散中全賴桂之辛散利水逐熱金匱加茵陳

治黃疸尤捷

秦椒散 治黃疸飲少渴多方

秦椒 六銖 瓜蒂 半兩

石二味治下篩水服方寸七日三

衍黃疸飲少而渴反多雖有濕熱固結於中因胸中

之陽本虛所以不能消水故用秦椒之辛烈温中

千金方衍義卷十 薑 濕熱而傷

破結瓜蒂之苦寒逐濕除寒不得泛用利水藥傷

伐下焦陽氣也

小半夏湯 治黃疸小便色不異欲自利腹滿而

一喘者不可除熱熱除必噦方

半夏 生薑 各半斤

右二味咬咀以水七升煮取一升五合分再服有

人常積氣結而死其心上暖以此湯少許汁入口

遂活

衍黃疸雖小便之色不異然必不能清利如常以濁

濕之氣上逆而致喘滿設不審中氣之本虛誤與

苦寒必致嘔噦自利故借金匱生薑半夏湯以治
胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦微心中憤憤
然無可奈何之狀與此恰合使胸中氣化逆痰逆
降則黃疸不治而治矣

治黃疸方

取生小麥苗搗絞取汁飲六七合晝夜三四飲
三四日便愈無小麥穢麥亦得用之

義衍

小麥苗搗絞取汁以其得春升之氣最早故取以
通達肝氣之滯無苗穢亦可性與青苗不異

治黃疸變成黑疸醫所不能治者方

千金方衍義卷十

聖

掃葉山房

土瓜根搗汁一小升頓服日一平旦服至食時

病從小便出先須量病人氣力不得多服力衰
則起不得

義衍

土瓜根即王瓜之根性味寒滑通津化熱本經主
治與栝樓根相類其治黃疸變黑惟濕熱久漬不

得下泄通身浮腫黯黑者為宜若用以治女勞疸
及飲酒使內額上黑之陰疸虛實寒熱迥異豈但

力衰不得起而已哉

治發黃身面目悉黃如金色小便如濃者葉汁衆

醫不能療者方

茵陳

梔子各四兩

黃芩

大黃

柴胡

升麻各

龍膽三兩

右七味以水八升煮取二升七分三服若

身體羸去大黃加梔子五六兩生地黃一升連年

茵陳有梔子四兩栝樓三兩連年夫黃發已久變作

桃皮色之下有堅嘔逆不下飲食小便濇赤而少

四肢厥冷脈深沉極微細遲者不宜服此方得下

必變苑也宜與大茵陳湯除大黃加生地黃五兩

服盡湯消息看脈小浮出形小見不甚沉微便可

千金方衍義卷十

聖

掃葉山房

治也脈浮見者黃當明不復作桃皮色心下白寬

也

義衍

疸病而致通身面目悉黃湯如濃煎藥汁濕熱漸
漬已劇雖日用茵陳大黃不得升麻柴胡開提於

上龍膽梔子降泄於下何能分解其勢而使之克

應哉其方後有云若身體羸去大黃加梔子生地

黃以清血中之熱毋不去龍膽而去大黃以日黃

證在肝經是以不得不用耳若黃久不除變作桃

皮色者是中氣為水濕所遏不得運行中外所以

心下有堅嘔逆不食雖四肢遺冷六脈深沉但卷

其小便赤少知為熱鬱在裏而傷耗津液又當推
大茵陳湯亦須去大黃易生地黃方為合法

大茵陳湯 治內實熱盛發黃如金色脈浮大

滑實緊數者大發黃多是酒客勞熱食少胃中

熱或溫毒內熱者故黃如金色方

茵陳 各一兩半 黃蘗 各一兩半 大黃

白朮 各三兩 黃芩 甘艸

茯苓 枳實 各二兩 梔子 二十枚 前胡

石十一味 咬咀以水九升煮取三升分三服得快

千金方衍義卷十

下消息三四日更治之

發黃本乎濕熱濕熱本乎脾虛此以枳朮苓甘加

八茵陳蒿湯中助脾逐濕佐以前胡枳朮下氣通

津黃蘗黃芩燥濕清火皆本經治諸熱黃疸之專

藥較茵陳蒿湯功力倍常因以大字銜之

若參散 治人無漸忽然振寒發黃皮膚黃麴塵

出小便赤少大便時閉氣力無異食飲不妨已

服諸湯散餘熱不除久黃者宜吐下方

苦參 黃連 瓜蒂

黃蘗 大黃 各一兩 葶藶 二兩

右六味治下篩飲服方寸匕當大吐吐者日一服
不吐日再亦得下服五日知可消息不覺退更服
之小折便消息之

病起於忽然振寒知為少陽火氣鬱發奪其春升

之令津液不能灌充所以色黃枯悴有如麴塵出

現於皮膚洵為膽熱無疑更審二便閉瀆飲食如

故胃氣尚堪克任苦寒故用苦參三黃峻攻濕熱

兼瓜蒂佐苦參取吐於上葶藶佐大黃降泄於下

上下開泄急通少陽之樞則津液方得灌充是皆

病起於暴之至治也若因病而漸次成疸正氣本

虛之證又非此方可擬也

治發黃方

茵陳 黃蘗 梔子

大黃 各三兩 黃連 二兩

右五味咬咀以水九升煮取三升分三服先服湯

後服丸方

大黃 五兩 茵陳 梔子 各三兩

黃芩 黃蘗 黃連 各二兩

右六味為末蜜丸如梧子大白飲服二十九令微

利

千金方衍義卷十

治發黃方

衍義 梔子蘗皮湯本治熱蘊於經身黃發熱茵陳蒿湯

本治痲熱在裏不能發越頭汗身黃此兼二方之制以治表裏俱熱乃於梔子蘗皮湯中除去甘艸

之甘緩而加黃連之苦燥以緩攻其餘此先後緩急之治也

麻黃連翹赤小豆湯 治傷寒痲熱在裏身體必

發黃方

麻黃

連翹

甘艸各二兩

生薑三兩

大棗十二枚

杏仁三十枚

赤小豆一升

生梓白皮二升

千金方衍義卷十四

芩

掃葉山房

右八味咬咀以勞水一斗先煮麻黃去沫次內諸

藥煎取三升分三服

衍義 傷寒論痲熱在裏而發黃有二方茵陳蒿湯治痲

熱在裏不得發越而頭汗身黃故用茵陳梔子大

黃引之下泄此治傷寒之邪失於表散或汗之不

徹痲熱在裏而身發黃故借用麻黃湯法於中減

却桂枝增入連翹梓皮赤小豆清熱利水生薑大

棗開發肌腠使濕熱之氣半從元府而解半從滲

道而解不可泥詞善義以為痲熱在裏反用表藥

致惑也

茵陳蒿湯 治傷寒七八日內實痲熱結身黃如

橘小便不利腹微脹滿宜下之方
茵陳六兩 大黃三兩 梔子四十枚

右三味咬咀以水一斗二升先煮茵陳取五升去滓次內梔子大黃煎取三升分服一升日三小便

當利如皂莢沫狀色正赤當腹減黃悉隨小便去也范注用療穀泔水

品方有石膏一斤

衍義 見前麻黃連翹赤小豆湯下

大黃黃蘗湯 治發黃腹滿小便不利而赤自汗

出此為表和裏當下之方

千金方衍義卷十四

芩

掃葉山房

大黃三兩

黃蘗

芩各四兩

梔子十五枚

右四味咬咀以水六升煮取二升去滓內芩硝緩

前取一升先食頓服之

衍義 發黃而見腹滿溺赤全是裏實之驗故宜急追無

容懼緩硝黃梔蘗雖云峻攻之味而實保全真陰

之上藥也

茵陳丸 治時行病急黃并瘡癩疫氣及瘡瘡方

茵陳

梔子

芩硝

杏仁各三兩

巴豆半兩

恆山

驚甲各二

豉五合

大黃九兩

右九味為末以飴和丸如梧子大飲服三九以吐利為伴不知加一九初覺體氣有異急服之即瘥

神效

疔瘡癩疫瘡忽然發黃難與尋常痘證並論方中硝

黃茵陳梔子不得巴豆蕩練之力則毒熱不能從之下奪乾或杏仁專解時行之邪恆山驚甲專祛疫瘧之毒也

治急黃熱氣骨蒸兩目赤脈方

茵硝一兩

大黃一兩

生地黃汁八合

千金方衍義卷十

聖

掃葉山房

右二味合和服五合日二以利為度不須二服

疔瘡發而見骨蒸似乎虛象以病起於急屬實何疑

其兩目脈赤又為血熱之驗故於金匱大黃硝石

湯中裁去黃蘗梔子之苦寒加入生地黄汁專化

血脈之滯也

治風疸小便或黃或白灑灑寒熱好臥不欲動方

三月生艾

一束搗取銅器中煎如漆密封之

苦參

大黃

黃連

葵水石

栝萸根

葶蘆各六兩

右七味以六味為末艾煎和九如梧子大先食服

五九日二寸至二十九有熱加苦參渴加栝萸小便澀加葶蘆小便多加葵水石小便白加黃連大便難加大黃

疔病人濕熱內盛加以風邪外襲所以灑灑寒熱其

證懶於動作嗜臥小便或白或黃皆濕熱時降時

升之驗故於苦參散中裁汰瓜蒂黃蘗進用艾汁

溫散風熱兼凝水石栝萸佐諸苦寒以行津化熱

為務也

寸口脈浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風四肢

苦煩脾色必黃痲熱以行跗陽脈緊而數數則為熱

千金方衍義卷十

聖

掃葉山房

熱則消穀緊則為寒食則滿也尺脈浮為傷腎跗陽

脈緊為傷脾風寒相薄食穀即眩穀氣不消胃中苦

濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身故盡

黃名曰穀疸

治勞疸穀疸丸

苦參三兩

龍膽一兩

右二味為末牛膽和為丸如梧子大先食以麥粥

飲服五九日三不知稍加之

疔稼穡作甘而蘊熱發黃故用苦參之苦燥以攻穀

疸之蘊熱龍膽之苦寒以瀉勞疸之積火丸用牛

糜汁取以爲臍熱之嚮導先食麥粥飲服乃金匱
硝石礬石散之成法取助胃氣以行藥力也

夫酒疸其脈浮者先吐之沉者先下之夫人病酒
疸者或無熱請言了了腹滿飲吐嘔者宜立之方前
苦參散七味者是酒疸必小便不利其候當心中熱
足下熱是其證也夫從疸下之久久爲黑疸目青面
黑心中如啖蒜薑狀大便正黑皮膚爪之不仁其脈
浮弱雖黑微黃故知之

枳實大黃湯 治傷寒飲酒食少飲多痰結發黃

酒疸心中懊憹而不甚熱或乾嘔方

千金方衍義卷十 聖 掃葉山房

枳實 五枚 大黃 三兩 豆豉 半升

梔子 七枚

右四味咬咀以水六升煮取二升分三服心中熱

疼懊憹皆主之

行 此卽傷寒勞復枳實梔子豉湯若有宿食加大黃

之法使宿食可化濕熱可祛黃疸自除卽胸中懊

憹舍梔子豉湯別無良法

凝水石散 治內疸飲少小便多如白泔色此病

得之從酒方

凝水石 白石脂 栝萸根

桂心 各三銖 兔絲子 知母 各八銖

右六味治下篩麥粥飲服五分七日二服五日知

十日瘥

行 治疸通用 逐濕利水而此獨用寒水石治身熱腹

中積聚邪氣皮中如火癢煩滿專治腎臟虛火深

得本經之奧至於白石脂性專固脫殊非疸病所

宜以其飲少溺多色白如泔知爲腎虛標熱故以

桂心兔絲佐白石英溫補下元知母栝萸佐寒水

石兼化標熱病因飲酒使內故名之曰內疸

茯苓丸 治心下縱橫堅而小便赤是酒疸者方

千金方衍義卷十 聖 掃葉山房

茯苓 茵陳 乾薑 各一兩

白朮 蒸 枳實 各三銖 半夏 蜀椒

杏仁 各十銖 甘遂 六銖

當歸 各二銖

右十味爲末蜜和丸如梧子大空腹服三九日三

稍稍加以小便利爲度 翼方加黃連一兩大黃十

體問黑 小便澀

行 前凝水石散治內疸此茯苓丸治酒疸乃酒積漬

於心下按之縱橫格指故用蜀椒乾薑溫散堅痞

枳朮各半 健運痰濕杏仁當歸下氣和血甘遂茵

陳破結利水為酒但開辟去路也

半夏湯 酒酒瘕積胸心脹滿骨肉沉重逆害飲

食乃至小便赤黃此根本虛勞風冷飲食衝心

由脾胃內痰所致方

半夏一升 生薑 黃芩

茵陳 當歸各二 前胡

枳實 甘艸 大戟各一

茯苓 白朮各三

右十一味咬咀以水一斗煮取三升分作三服

衍 茯苓丸治胸中寒飲故用蜀椒乾薑半夏湯治胃

千金方 茯苓丸 治胸中寒飲

中熱痰故用黃芩生薑此方中前胡甘艸則前方

杏仁之意此方中大戟即前方甘遂之意其餘則

兩方並用總皆健運中氣之品中氣健運雖根本

虛勞藥無不應酒疸無容留之患矣

牛膽丸 治酒疸身黃麴塵出方

牛膽一枚 芫花一升 薤花半升

瓜蒂三兩 大黃八兩

右五味四味咬咀以清酒一斗漬一宿煮減半去

滓內牛膽微火煎令可丸如大豆服一九日移六

七尺不知復服一九至八九隔上吐膈下利或不

吐而自愈

衍 靈樞有云酒氣慄悍入於胃中則胃脹氣上逆滿

於胸中肝浮膽橫膽之熱滿而汁溢於外以漸滲

於經絡則身目皆黃芫花薤花瓜蒂大黃一派黃

寒積牛膽汁為丸引入膽家隨其故利以取吐下

則津液流通麴塵之色自化前治勞疸殺疸方中

用牛膽汁是瀉積勞之火此用牛膽汁以瀉酒濕

之熱也

茵陳丸 治氣淋臃脹腹大身體面目悉黃及酒

疸短氣不得息方

千金方 茵陳丸 治氣淋

茵陳 天門冬 梔子各四

大黃 桂心各三 通艸

石膏各二 半夏半升

右八味蒸大黃通艸天冬梔子半夏曝令朝合搗

篩蜜丸如大豆服三九日三忌生魚以豆羹服不

待用酒 一方去石膏內滑石二兩不知加至十

丸

衍 註方下臃脹腹大皆由濕熱氣蒸而致面目悉黃

短氣不得息故以導氣化熱為主惟桂心熱困熱

用之內應即酒藥亦不出此

黃家平日瞞所發熱而反惡寒此為女勞得之當勝
胱急小腹滿體盡黃額上黑足下熱因作黑疸其臈
腹脹而滿如欲作水狀大便必黑時澹泄此女勞疸
非水也腹滿者難治

治石礬石散 治女勞疸方

滑石 礬石 各半

右二味治下飾大麥粥汁服方寸七日三重衣覆
取汗病隨大小便出小便正黃大便正黑

五疸之中以黑疸為最劇而黑疸之因有二一從
女勞得之一從酒疸不慎而變黑色總皆腎虛之

千金方衍義卷十 婦人門 婦人山房

候病則日晡發熱而反惡寒陰邪鬱抑陽氣也勝
胱急小腹滿陰邪結於陰分也身黃額上黑陰邪
上侮陽位也足下熱陰虛陽必泰之也腹滿臈脹
濁陰之氣上逆也如欲作水狀大便黑時澹本非
水病而化血為水也腹滿者難治血固結陰虛
難於峻攻也然病雖危迫又不忍納于坐視金匱
乃竭厥心力急需滑石以攻固結之陰邪皂礬以
破委積之瘀垢為女勞疸開一死中求治法門關
僥倖於萬一在虛不勝攻勢不獲已者則以硝石
和礬神麩和丸大麥粥汁服十九至二十九日

有瘀血發黃正氣衰敗而變黑疸瀆危尤甚虛扁
不能為力也

濕疸之為病始得之一身盡發熱面色黑黃七八
日後壯熱熱在裏有血當下去之如純肝狀其小腹
滿者礬石滑石散急下之亦治一身盡黃目黃腹滿
小便不利方

礬石 滑石 各五

右二味治下飾以大麥粥汁服方寸七日三先食
服之便利如血者已當汗出瘥

此祖金匱女勞疸法復立礬石滑石散因血既下

千金方衍義卷十 婦人門 婦人山房

如純肝狀雖小腹當滿量結必不甚堅故但取皂
礬之滌垢佐滑石以利發不須稍石峻攻也
黃疸之為病日晡所發熱惡寒小腹急身體更額黑
大便澹黑足下熱此為女勞腹滿者難治治之方

滑石石膏散

滑石 石膏 等分

右二味治下飾大麥粥汁服方寸七日三小便極
利則瘥

證雖日晡發熱惡寒身黃額上微黑而無血下如
純肝狀總大便澹黑諒無實結可攻故重立滑石

石膏散但用石膏佐滑石利竅化熱并去皂礬之
堅文此隨證以定法外之法仍不出法中之法也
詳前後諸方獨不及陰黃之治者以秦中稟賦
剛強絕無虛寒之患故無藉於辛溫之藥也

鍼灸黃疸法

正而圖第一 寅門 上斷 上脘 俠人中

巳開 公縫 上脫

寅門穴 從鼻頭直入髮際度取通繩分為三斷

繩取一分入髮際當繩頭鍼是穴治馬黃黃疸
等病

千金方衍義卷十

楊雲山房

上斷裏穴 正當人中及脣鍼三銜治馬黃黃疸

等病

上脘穴 人口裏邊在上縫赤白脈是鍼三銜治

馬黃黃疸四時等病

舌下穴 俠舌兩邊鍼治黃疸等病

脣裏穴 正當承漿裏邊通齒斷鍼三銜治馬黃

黃疸寒暑溫疫等病

顛顛穴 在眉眼尾中間上下有來去絡脈是鍼

灸之治四時寒暑所苦皆氣溫病等

俠人中穴 火鍼治馬黃黃疸疫通身並黃語者

已不轉者

俠承漿穴 去承漿兩邊各一寸治馬黃急疫等

病

巨闕穴 在心下一寸灸七壯治馬黃黃疸急疫

等病

上臑穴 在心下二寸灸七壯治馬黃黃疸等病

男陰縫穴 按陰反向上灸治馬黃黃疸等病

若女人玉門是穴男女鍼灸無在

覆面圖第二 風府 熱府 肺俞 心俞 肝俞 脾俞 腎俞 腳後跟

風府穴 在項後入髮際一寸去上骨一寸鍼之

千金方衍義卷十

楊雲山房

治頸中百病馬黃黃疸等病

熱府穴 在第二節下兩傍相去各一寸五分鍼

灸無在治馬黃黃疸等病

肺俞穴 從大椎數第三椎兩傍相去各一寸五

分灸主黃疸通治百毒病

心俞穴 從肺俞數第二椎兩傍相去各一寸五

分

肝俞穴 從心俞數第四椎兩傍相去各一寸五

分

脾俞穴 從肝俞數第二椎兩傍相去各一寸五

分

腎輸穴 從脛 輸數第三椎兩傍相去各一寸五

分

脚後跟穴 從白肉後際鍼灸隨便治馬黃黃疽

寒暑諸毒等病

側面圖第三

耳中 頰裏 手少陽 臍石子頭 錢孔 太衝

耳中穴 在耳中孔上橫梁是鍼灸之治馬黃黃

疽寒暑疫毒等病

頰裏穴 從口吻邊入往對頰裏去口一寸鍼主

治馬黃黃疽寒暑溫疫等病頰兩邊同法

千金衍義卷十

至

掃葉山房

手太陽穴 手小指端灸隨年壯治黃疽

臍石子頭穴 還取病人手白捉管從腕中太澤

澤堂作淵文向上一尺接白肉際灸七壯治馬黃黃

疽等病

錢孔穴 度乳至臍中屈筋頭骨是灸百壯治黃

疽

太衝穴 鍼灸隨便治馬黃黃疽溫疫毒等病

溫瘧第十五

論一首 方三十一首 灸刺法 十九首 脈瘧法一首 符二首

論曰夫瘧者皆生於風夏傷於暑秋為瘧瘧也問曰

瘧先寒而後熱者何也對曰失寒者陰氣也風者陽

氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以

時作名曰寒瘧問曰先熱而後寒者何也對曰先傷

於風而後傷於寒故先熱而後寒也亦以時作名曰

溫瘧其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣

煩問手足熱而欲嘔名曰瘧瘧問曰大病溫瘧與寒

瘧而皆安舍舍於何藏對曰溫瘧者得之冬中於風

寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自

出因過大暑腦髓鍊肌肉消腠理發泄因有所用力

邪氣與汗皆出此病邪氣先藏於腎其氣先從內出

之於外也如是則陰虛而陽盛盛則病矣衰則氣復

千金衍義卷十

至

掃葉山房

反入入則陽虛虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧

問曰瘧瘧何如對曰瘧瘧者肺素有熱氣盛於身厥

逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒

舍於皮膚之內分肉之間發則陽氣盛陽氣盛而不

衰則病矣其氣不及於陰故但熱而不寒氣內藏於

心而外舍於分肉之間令人消鍊脫肉故名曰瘧瘧

夫瘧之旦發也陰陽之旦移也必從四肢始也陽已

傷陰從之故氣未并先其時一食頃用細左索緊束

其手足十指令邪氣不得入陰氣不得出過時乃解

夫瘧脈自弦也弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者

可下之弦遲者可溫之若脈緊數者可發汗鍼灸之
脈浮大者吐之瘧脈弦數者風發也以飲食消息止

瘧歲歲發至三歲或連月發不解者以脇下有痞也
治之不得攻其痞但得虛其津液先其時發其汗服
湯已先小寒者引衣自覆汗出小便利即愈瘧者病
人形瘦皮上必粟起也病瘧一日發當以十五日愈
設不瘥當月盡解也不愈當云何師曰此病結為瘕
瘕名曰瘧母無當治之

煎甲煎丸 主之方

千金方義卷下

瘧

補藥山房

大戟 十二分

半夏

人參 各一分

海藻

瞿麥

桃仁

紫葳

石葦

乾薑

大黃

厚朴

桂心

磁石 各三分

丹皮

芍藥 各五分

蜂窠 四分

蛻螂

柴胡 各六兩

烏扇

黃芩 各十

右二十四味

為末

取銀篋下灰一斗

清酒一斛

五

斗以酒漬灰

取酒煮蠶甲

盡爛

泥如漆絞去滓

下諸藥煎為丸如梧子大未食服七九日三力無
大戟多 赤硝 行 北方水土剛勁瘧邪發越良難為害最重南方風
氣柔弱發散皆易為患猶輕原其受病之因多由
痰食內滯風邪外閉內外兼併所以寒熱交爭至
於病久不除或治之不當結成瘧母必著於左脇
者肝邪必結肝部也積既留著客邪內從火化當
無外散之理故專取煎甲伐肝消積尤妙在灰煮
去滓後下諸藥則諸藥咸得煎甲引入肝膽部分
佐以柴胡黃芩同躋少陽區域參薑朴半助胃祛

瘧桂芍牡

桃葳阿膠和營散血蛻螂蜂窠磁石

烏扇聚毒

攻瞿葦藻戟葶葶大黃利水破結未

食前服七九日服不過二十餘粒藥雖峻而不驟

傷元氣深得峻藥緩攻之法又易金匱方中赤硝

毒劣則易之以淡戟風婦難捕乃易之以磁石略

為小變不失大端

柴胡栝葉根湯 治瘧而發渴者方

柴胡 八兩 黃芩 人參

甘艸 生薑 各三兩 大棗 二十

栝葉根 四兩

右七味咬咀以水一斗二升煮取六升去滓煎取

三升温服一升日三

衍義少陽木火氣盛消礫陽明之津液是以煩渴瘧邪

隨火進退總不離少陽之經合用小柴胡進退施

治進用栝蘘退去半夏方合病機金匱方下并治

火盛津傷之勞瘧專取栝蘘根之滋津化熱也小

柴胡湯在傷寒瘧後頭痛壯熱煩悶方中易其名

曰黃龍湯方後有云渴去半夏加栝蘘根可見用

方在合病情不在主治何病也

蜀漆散 多寒者牝瘧也治之方

千金方衍義 雲母 龍骨等分

蜀漆

右三味治下篩先未發一炊頃以酢漿服半錢臨

發服一錢温瘧加蜀漆半分雲母燒三晝夜

衍義此以邪伏陰經故謂牝瘧金匱方從古誤刊牝瘧

卽千金之智略不加察亦仍其誤而爲牝瘧趙以

德金匱衍義註作心爲牡藏不特穿鑿且復支離

曷知邪氣內藏於心則獨熱無寒謂之瘧瘧伏藏

於腎則多寒少熱謂之牝瘧濁陰痰涎深伏幽隱

非用蜀漆和漿水涌吐之法無以發越陽氣更須

龍骨固斂陰津於下雲母升舉陽氣於上斯陽從

龍起陰隨涌泄庶胸次得以廓然蜀漆性專逐濕

追痰稍增半分於本方之中則可以治太陰濕瘧

濕爲陰邪糾其陽亦必多寒少熱故此方尤爲

符合舊本金匱方後誤作温瘧大謬詳雲母龍骨

純陽之性決非温瘧所宜以牝爲牡將濕作温于

古未剖之疑團一旦豁然貫通矣

五蠱湯 牝瘧者多寒治之方

牡蠣 麻黃 各四兩 甘艸 二兩

蜀漆 三兩 無以恒山代之

右四味先洗蜀漆三過去腥咬咀以水八升煮蜀

千金方衍義 漆麻黃得六升去沫乃內餘藥煮取二升飲一升

卽吐出復飲之

衍義外臺牡蠣湯方下主治牡瘧多寒則牝牡不辨已

不在千金方後也此方中牡蠣卽蜀漆散中龍骨

之意蜀漆得雲母專升陽邪陷陰故以純陽之龍

骨爲佐此方中麻黃卽蜀漆散中雲母之意蜀漆

得麻黃專開陰邪之固閉故以純陰之牡蠣爲輔

甘艸調和藥性之陰陽也

有瘧瘧者陰氣孤絕陽氣獨發而脈微其候必少氣

煩冤手足熱欲嘔但熱而不寒邪氣內藏於心外合

於分肉之間令人消燥脫肉也

有溫瘧者其脈平無寒時病六七日但見熱也其候

骨節疼痛時嘔朝發暮解暮發朝解名溫瘧

義節之陰衰離於陽陽亦不并於陰故陽獨發而但

熱肺受火抑故脈微少氣脾為熱乘故手足熱胃

因邪逆故欲嘔邪氣內藏於心故煩冤外舍分肉

故肉燥條下雖未出方合用白虎無疑白虎專於

退熱其分肉四肢內屬脾胃非切於所舍者乎又

瀉心肺之火非救其少氣煩冤者乎

白虎加桂湯 治之方

千金方衍義卷十

三

補藥山房

石膏 一斤

知母 三兩

甘草 二兩

粳米 六合

右四味咬咀以水一斗二升煮米爛去滓加桂心

三兩煎取三升分三服覆令汗先寒發熱汗出者

愈

義衍 丙經言溫瘧先熱後寒金匱言溫瘧但熱不寒雖

有似乎瘧瘧而實不同也瘧瘧兩陽合邪上薰心

肺所以少氣煩冤消燥肌肉溫瘧脈如平人邪未

合而津未傷陽受病而陰不病所以骨節煩疼時

嘔惟白虎以治陽邪加桂以通營衛則陰陽和血

脈通得汗而愈矣

麻黃湯 治瘧須發汗方

麻黃

桂枝 各四兩

杏仁 各五十粒

甘草 一兩

右四味咬咀以水七升煮取二升半分三服未發

前食頃一服臨發一服服後皆厚覆取汗

義衍 瘧宜發汗必壯熱脈實勢不得不用麻黃急開肌

表以泄外淫之邪更審使濕燥結又不得不用大

黃并疎裏氣以通內蘊之滯麻黃力猛甘艸和之

大黃性暴枯蔓根濡之方得兼濟之妙服後厚覆取

千金方衍義卷十

三

補藥山房

汗必非夏秋時瘧治例即當寒月苟非北方稟賦

之強亦難效用用方者不可不審反歸咎於立方

之過也

治瘧或間日發者或夜發者方

恒山

竹葉 各三兩

枳實 各一百粒

石膏 二兩

右四味咬咀以水八升銅器中漬藥露置星月下

高淨處橫刀其上明日取藥於病人房中以銅器

緩火煎取三升分三服清旦一服未發前一食頃

一服臨發一服三服訖靜室中臥莫共人語當一

口勿洗手面及漱口勿進食取過時不發乃潔洗
進食并用藥汁塗五心胸前頭面藥滓置頭邊備
用神效救急力用烏梅二七枚

衍瘧之日發夜發或間日發由邪伏之淺深不同氣
血所受非一此藥用恒山峻攻痰水或吐或下隨
其後利然在發散表邪後熱邪內盛而煩渴不止
故借白虎竹葉石膏之法兼清肺胃之熱若中氣
虛寒難於勝任者又未可以漫試也

又方
先作羊肉臠麵餅飽食之并進少酒隨所能令
欣欣有酒氣入密室中燃炭火厚覆取大汗即
瘥

又方
燒黑牛尾頭毛作灰酒服方寸七日三

衍羊肉補形羸不勝藥攻故需酒肉醉飽密室火
烘覆汗營衛得和印瘥 諸毛之灰皆能收濕牛
屬坤上取尾毛燒灰專除濕熱陳氣也

恒山丸 治瘡瘻說不可具方
恒山 知母 甘艸

大黃 各十
八錢

麻黃 一兩

右五味為末蜜和丸如梧子大未食服五九日二
不知漸增以瘻為度肝後無大瘻

衍恒山截瘻首推善破胸中痰結得甘艸則吐得大
黃則利至於麻黃乃攻表之峻藥瘻久成瘻有何
容邪而復用之不知麻黃在丸劑中但為隨班效
力不能專逞其功况有知母斂其走表之性亦必
從之而內奪矣前麻黃湯中大黃則隨麻黃走表
此恒山丸中麻黃則隨大黃走裏湯以急蕩丸以
緩攻乃必然之理故瘻瘻得以用之苟不能透此
一關未可與言千金之法

又方 治瘻經數年不瘥者兩劑瘻一月已來一
劑瘻方

恒山三兩為末以雞子白和并手九知梧子大
置銅器中於湯中煮令熟殺腥氣則止以竹葉
飲服二十九欲吐但吐至發令得三服時早可
斷食而晚不可斷食可竹葉汁煮糜少食之

衍恒山治瘻有劫痰截病之功在胃氣虛人入口吐
逆昏眩以故畏如戈戟即強實人亦須雞子白和
丸煮令去腥庶不大傷中氣服用竹葉飲專清胃
中煩熱服時早可斷食隔晚不可斷食恐胃太空

虛無力以行藥性也

梔子湯 治同前

梔子枝十四 秫米粒四十 恒山三兩

車前葉二七枚

右四味咬咀以水九升煮取三升分三服未發一

服發時一服發後一服以吐利四五行為度不止

冷飲止之

衍梔子湯中用秫米卽前方用雞子白之意用梔子

車前卽前方用竹葉之意

又方

千金方衍義卷十

恒山三兩 烏賊骨 升麻

鱉甲 附子各一兩

右五味咬咀絹袋盛以酒六升漬之小令近火轉

之一宿成一服一合比發可數服或吐下

衍方中升麻鼓山以上涌烏魴佐鱉甲以下泄附

子和酒徹底以破濁陰涎垢也

治瘧方

鱉甲方寸 烏賊骨方寸 附子地

甘艸各一兩 恒山二兩

右五味咬咀以酒二升半漬之露一宿明日塗五

心手足過發時瘧斷若不斷可飲一合許瘧

衍此方不用升麻而用甘艸恒山得甘艸則吐較升

麻上升尤捷用塗五心前方亦無不可

治瘧無問新久者方

小便一升 蜜三七

右二味煮三沸頓服每發日平旦時服自至發勿

食重者漸退不過三服瘧

又方

車前子 鼠尾子各一兩

右二味以水五升煮取二升未發前服盡

千金方衍義卷十

又方

烏鞭艸汁五合酒三合分三服

又方

搗黃芩根燒爲灰和水服一合量人大小強弱

用之

又方

瓜蒂二七枚搗水漬一宿服之

又方

常以七月上寅日採麻花爲末酒服方寸匕

衍小便寒降恐其滯邪煮沸則不速下和蜜湯以留

中故瘧無新久咸可用之然必陰虛火旺者為宜
 車前取其利水鼠尾取其散熱若表邪方盛未
 可藥施 馬鞭艸功專入肝散血婦人經行前後
 尤為合轍 葇若子性稟陰毒燒灰猶能逐濕除
 邪弱人不宜常試 瓜蒂吐胸中痰濕較之恒山
 力雖稍遜亦是傷胃之品 麻花之性走而不守
 追逐遍體諸風惡血得酒以行其力而惡疾自除
 蜀漆丸 治勞瘵并積勞寒熱發有時似瘧方
 蜀漆 麥冬 知母
 白薇 地骨皮 升麻 各三錢
 千金方衍義卷十 補藥山房

甘艸 蟹甲 烏梅肉
 萎蕤 各一兩 恒山 一兩 石膏 二兩
 豉 一合

右十三味為末蜜和丸如梧子大飲服十九日再
 服之稍稍加至三十九丸此神驗無不瘥也 一
 方加光明砂一兩

此治積勞成瘵非虛勞之謂勞則火起於腎而積
 勞致困肝脾不能無預然火性上炎肺胃亦不能
 無傷所以備用各經清潤之品惟升麻一味升散
 寒熱猶恐鼓動津液即以烏梅酸收配之瘵家多

若痰涎黃水非恒山不能上涌而此既用恒山復
 用蜀漆得無過猛之慮猶賴暗藏白虎等藥於中
 可以保安無艾
 烏梅丸 治寒熱勞瘵形體羸瘦痰結胸中食飲
 減少或因行遠久經勞役患之積年不瘥方
 烏梅肉 豆豉 各一兩 升麻
 地骨皮 柴胡 前胡
 蟹甲 恒山 各一兩 肉苁蓉
 元參 百合 蜀漆
 人參 知母 桂心 各半
 千金方衍義卷十 補藥山房

桃仁 八十一枚
 右十六味為末蜜丸空心煎細茶下三十九二服
 老少孩童量力通用無所忌

烏梅丸亦主勞瘵證雖新久攸分送痰清熱則一
 方中柴胡前胡即前方白薇之意百合即前方葇
 蕤麥門冬之意元參即前方石膏甘艸之意瘵久
 脾腎兩虧非人參不能助長藥力非從蓉不除勞
 傷寒熱寒熱積久肝血受傷則桂心桃仁又所必
 需耳
 治勞瘵積時不斷聚治無效方

生長大牛膝一握切以水六升煮取二升分再

服第一服取未發前食頃第二服取臨發時

衍 義勞瘡積年不除諸藥罔效乃邪氣痲著於下焦因

取牛膝一味生切煮服不須復用他藥然瘡發午

前病屬陽分及風瘡暴發久瘡陽虛咸非所宜不

可用熱熱則補而不宜無逐濕祛邪之用也

大五補湯 治時行後變成瘡方

人參 白朮 茯苓

甘艸 黃芪 乾地黄

當歸 芍藥各三 芎藭

全方衍義卷十 擇藥山房

遠志 桔梗各二 桂心三十

竹葉五兩 大棗二十 生枸杞根

生薑各一 半夏 麥冬各一

右十八味咬咀以水三斗煮竹葉枸杞取二斗次

內諸藥煎取六升分六服一日一夜令盡

衍 方下所主時行後變成瘡瘡瘳則山嵐瘴氣非由

變成詳方中諸藥一皆調補之味故非治瘡之品

此必瘡字誤刊瘡字亥豕相似之故耳

鯨鯢湯 治乍寒乍熱乍有乍無山瘡瘳方

鯨鯢甲十四 鱉甲 烏劍骨各一

恒山三兩 附子一枚

右五味咬咀以酒三升漬一夕發前稍稍啜飲勿

絕吐之兼以塗身斷食過時乃食飲

衍 時行瘡瘳之氣不犯陽明濕土而傷風木之經所

以寒熱不時非若尋常瘡發之有常期也瘳邪既

犯厥陰故取專走肝經血肉之味兼附子通行經

脈之力鼓舞恒山迅掃痰涎一涌而渙散無餘瘳

瘳之金鉀無愈於斯也

烏梅丸 治肝邪熱為瘳令人顏色蒼蒼氣息喘

悶戰掉狀如死者或久熱勞微動如瘳積年不

全方衍義卷十 掃藥山房

瘳方

烏梅肉 蜀漆 鱉甲

葳蕤 知母 苦參各一

恒山一兩 石膏 香豉一合

甘艸 細辛各十

右十一味為末蜜丸如梧子大酒服十九日再飲

服亦得

治心熱為瘳不止或止後熱不歇乍來乍去令人

煩心甚欲飲清水反寒多不其熱者方

甘艸一兩 蜀漆三兩 恒山

蟹甲 各四兩

石膏

香豉 一合

梔子

烏梅 各三

淡竹葉 切二升

右九味咬咀以水九升煮取三升分三服

恒山丸 治脾熱為瘧或渴或不渴熱氣內傷不

泄令人病寒腹中痛腸鳴汗出方

恒山 三兩

甘艸 半兩

知母

蟹甲 各一兩

右四味為末蜜丸如梧子大未發前酒服十九臨

發時一服正發時一服

恒山湯 治肺熱痰聚胸中來去不定轉而為瘧

千金方衍義卷十

空

掃葉山房

其狀令人心寒寒甚則發熱熱間則善驚如有

所見者方

恒山 三兩

甘艸 半兩

秫米 三百二十粒

右三味咬咀以水七升煮取三升分三服至發時

令三服盡

又方 治腎熱發為瘧令人漉漉然腰脊痛宛轉

大便難目眴响然身掉不定手足寒方

恒山 三兩

烏梅 三七

竹葉 切一升

香豉 八合

葱白 一握

右五味咬咀以水九升煮取三升分三服至發令

衍 五臟之瘧皆在於經而諸經見證雖各不同其主

治之用總以恒山蜀漆為破的之金錒其熱在於

肝令人顏色蒼蒼又須烏梅蟹甲為引以收耗散

之陰 熱在於心令人煩心欲飲清水又須竹葉

梔子為引以清發渴之熱 熱在於脾令人腹痛

腸鳴又須甘艸為引以滋燥竭之土 熱在於肺

合 痰聚胸中去來不定又須秫米為引以護傷

殘之氣 熱在於腎令人漉漉然腰脊痛日眴响

然又須葱白香豉以發內陷之邪

千金方衍義卷十

空

掃葉山房

藜蘆丸 五臟並有瘧候六腑則無蜀胃腑有之

胃腑瘧者令人旦病也善飢而不能食食而支

滿腹大治之方

藜蘆

恒山

皂莢

牛膝 各一兩

巴豆 三枚

右五味先熬藜蘆皂莢色黃合搗為末蜜和丸如

小豆大旦服一九正發時一九一日勿飽食無恒

味

衍 六腑之瘧多見經證純屬於腑者惟胃腑行之故

證見善飢不欲食腹支滿則為胃腑受病之候又

須皂莢佐葵蘆以上涌牛膝引巴豆以下奪腑實之病與經熱不同非極力峻攻不能豁然取效

刺灸法

肝瘧刺足厥陰見血 心瘧刺手少陰

脾瘧刺足太陰 肺瘧刺手太陰陽明

腎瘧刺足少陰太陽 胃瘧刺足太陰陽明橫脈

出血

凡灸瘧必先問其病之所發者先灸之從頭項發者於未發前預灸大椎尖頭漸灸過時止從腰脊發者灸腎胸百壯從手臂發者灸三間

千金方衍義卷十

堯

掃葉山房

瘧灸上星及大椎至發時令滿百壯灸艾炷如黍米粒俗人不解取穴務大炷也

覺小異即灸百會七壯若後更發又七壯極難愈者

不過三灸以足踏地以線圍足一匣中折從大椎向

百會灸線頭三七壯炷如小豆狀 又灸風池二穴

三壯

凡一切瘧無問遠近正仰臥以線量兩乳間中屈從乳向下灸度頭隨年壯男左女右

五臟一切諸瘧灸尺澤七壯穴在肘中約上動脈是也 諸瘧血脈不見者刺十指間出血血去必已先

視身之赤如小豆者盡取之 瘧刺足少陰血出愈

瘧瘧上星主之穴在鼻中央直髮際一寸陷容豆

是也灸七壯先取諱諱後取天癰風池 瘧日西而

發者臨泣主之穴在目眦上入髮際五分陷者灸七

壯 瘧實則腰痛虛則欬喘飛揚主之穴在外踝

上七寸灸七壯 瘧多汗腰痛不能俯仰目如脫頂

如拔崑崙主之穴在足外踝後跟骨上陷中灸三壯

瘧瘧法 未發前把大雄雞一頭著懷中時時驚動

令雞作聲立瘥

治瘧符

千金方衍義卷十

圭

掃葉山房

瘧小兒父字石拔母字石鎚某甲 姓名 患瘧人竊

讀之曰一切天地山水城隍日月五星皆敬竈君今

有一瘧鬼小兒罵竈君作黑面奴若當不信看文書

急急如律令

右符符必須寫書前後各留白紙一行擬著竈君

額上及石壓之不得壓字上勿令人近符若得專

遣一人看符大守亦勿令灰土備符上致使字不

分明出見著符次第如後若明日日出後發須令

人夜掃竈君前及額上令淨至發日且令患人整

衣帽立竈前讀符使人自讀必須分明讀符勿錯

一字每一編若別讀人一遍患人跪一拜又以手捉患人一度若患人自讀自捉衣振云人姓某甲如此是凡三編讀三拜了以淨瓦石壓兩角字向上著竈額上勿令壓字上若瘡日西發具如上法三編讀符至午時更三編讀如上法如夜發日暮更三編讀並如上法其竈作食亦得勿使動此符若有露地竈屋裏竈上著止有露竈依法著之仍須手提符其符法如後若有客患會須客經停過三度發三度委曲著符如上法符亦云客姓名患瘡乞拘錄瘡鬼小兒如左凡治久患者一著符一漸瘥亦可五度著符如始可全瘥又須手把符如左

千金方衍義卷十

十一

掃葉山房

王良符張季伯書之急急如律令

右王良符依法長捲兩手握念佛端坐如須行動

檢校押著胸前字頭向上

右二符各依法一時用不得闕一符萬一不瘥但

得一發輕後發日更讀即瘥一一仔細依法若于

參差即不瘥

診諸毒證第十六

江東江南諸溪源間有蟲名短狐溪毒亦名射工其

蟲無目而利耳能聽在山源溪水中聞人聲便以口中毒射人故謂射工也其蟲小毒輕者及相逐者射著人影者皆不即作瘡先病寒熱身不喜冷體強筋急頭痛日疼張口欠咳嗽呼吸悶亂朝旦少蘇醒哺夕輒復寒熱或似傷寒發石散動亦如中尸便不能語病候如此自非其土地人不常數行山水中不知其證便謂是傷寒發石散動作治乖僻毒盛發瘡復疑是瘰癧乃至吐下去血復恐疑蠱毒是以致禍耳今說其狀類以明其證與傷寒別也方見二十五卷備急篇中

千金方衍義卷十

十一

掃葉山房



孫真人千金方衍義卷十一

長洲 論 王 著
南沙 校 各 校

肝臟方 凡五類

肝臟脈論第一 論二首

論曰夫人稟天地而生故內有五臟六腑精氣骨髓筋脈外有四肢九竅皮毛爪齒咽喉唇舌肛門胞囊以此總而成軀故將息得理則百脈安和役用非官即為五勞七傷六極之患有方可救雖病無他無法可憑奄然永往所以此之中秩卷卷備述五臟六腑

千金方 義卷十一

掃葉山房

等血脈根源循環流注與九竅應會處所并論五臟六腑等輕重大小長短闊狹受盛多少仍列對治方
法丸散酒煎湯膏摩熨及灸鍼孔穴並窮於此矣其能留心於醫術者可效而行之其冷熱虛實風氣準藥性而用之則內外百病無所逃矣凡五臟在大為五星在地為五嶽約時為五行在人為五臟五臟者精神魂魄意也論陰陽察虛實知病源用補瀉應稟三百六十骨節終會通十二經焉
論曰肝主魂為郎官隨神往來謂之魂魂者肝之藏也目者肝之官肝氣通於目目和則能辨五色矣左

目甲右目乙循環發宮榮華於爪外筋內主血肝重四筋四兩左三葉右四葉凡七葉有六童子三五女守之神名監監主藏魂號為魂藏隨節應會故云肝藏血血含魂在氣為語在液為淚肝氣虛則恐實則怒肝氣盛則夢怒厥氣客於肝則夢山林樹木凡人寢臥血歸於肝肝受血而能視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝

千金方 義卷十一

掃葉山房

凡肝臟象木與膽合為腑其經足厥陰與少陽為表裏其脈弦相於冬王於春春時萬物始生其氣來濡而弱寬而虛故脈為弦濡即不可發汗弱則不可下寬者開開者通通者利故名曰寬而虛
春脈如弦春脈肝也東方木也萬物之所以始生也故其氣來濡弱輕虛而滑端直以長故曰弦反此者病何如而反其氣來實而弦此謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在內太過則令人善怒怒作忽忽眩目而癩疾不及則令人胸膈引背兩脇眩滿
肝脈來濡弱招招如揭竿末梢曰平兼瀉作補魂如揭長春以胃氣為本肝脈來盈實而滑如循長竿曰

肝病肝脈來急而益勁如新張弓弦曰肝死

真肝脈至內外急如循刀以責責然源作如按琴

瑟張源竹如色青白不澤毛折乃死

春胃微弦口平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃

而有毛曰秋病毛甚曰金病

肝藏血血含魂悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄其精

不守一作狂妄不精令人陰縮而舉筋兩脇肋骨舉

一作不致正當人不舉毛悴色天死於秋

足厥陰氣絕則筋縮引卵與舌厥陰者肝脈也肝者

筋之合也筋者聚於陰器而脈絡於舌本故脈弗營

則筋縮急筋縮急則引卵與舌故唇青舌卷卵縮則

筋先死庚篤辛死金勝木也

肝死藏浮之弱按之中如索不來或曲如蛇行者死

春肝木王其脈弦細而長曰平反得沉濡而滑者是

腎之乘肝母之歸子為虛邪雖病易治反得浮大而

洪者是心之乘肝子之乘母為實邪雖病自愈反得

微澀而短千金翼云微者是肺之乘肝金之尅木也

賊邪大逆十死不治反得大而緩者是脾之乘肝土

之陵木為微邪雖病即瘥心乘肝必吐利肺乘肝即

為癱瘓

左手關上陰絕者無肝脈也苦癭遺溺難言膝下有

邪氣善吐刺足少陽治陽

左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善轉筋吐刺

足厥陰治陰肝脈來濯濯如竿如琴瑟絃再至曰

平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足厥

陰脈也

肝脈急甚為惡言一作微急為肥氣在脇下如覆杯

緩甚為嘔微緩為水瘕痺大甚為內癰善嘔衄微大

為肝痺縮咳引小腹小甚為多飲微小為消瘴清甚

為頰疝微滑為遺溺澀甚為淡飲微澀為瘕瘕筋攣

肝脈搏堅而長色不青高病墜若搏因血在脇下令

人喘逆其濡而散色澤者當病溢飲溢飲者渴暴多

飲而溢入肌膚腸胃之外也素問溢入

青脈之至也長而左右彈行積氣在皮下支胠名曰

肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足冷頭痛

扁鵲曰肝有病則目奪精虛則寒寒則陰氣壯壯則

夢山樹等實則熱熱則陽氣壯壯則夢怒

肝在聲為呼在變動為握在志為怒怒傷肝精氣并

於肝則憂肝虛則恐實則怒怒而不已亦生憂矣

色主春病變於色者取之榮

千金方衍義卷十一
三
補藥房

千金方衍義卷十一
四
補藥房

病先發於肝者頭目眩脇痛支滿一日之脾閉塞不通身痛體重二日之胃而腹脹三日之腎小腹腰脊痛脛瘦十日不已死冬日入夏早食

病在肝平旦慧下哺甚夜半靜
假令肝病西行若食雞肉得之當以秋時發病以庚辛日也家有血腥死女子見之以明要為災不者若感金銀物得之

凡肝病之狀必兩脇下痛引小腹令人善怒虛則目眇無所見耳無所聞善恐如人將捕之若欲治之當取其經足厥陰與少陽氣逆則頭目痛耳聾不聰

千金方卷十一 五 雜業山房

類腫取血者
肝脈沉之而急浮之亦然若脇痛有氣支滿引小腹痛時小便難苦目眩頭痛腰脊痛足為寒時癢女人月事不來時無時有得之少年有所墮墜
肝病其色青手足拘急脇下苦滿或時眩冒其脈弦長此為可治宜服防風竹瀝湯秦芫散春當刺大敦夏刺行間冬刺曲泉皆補之季夏刺太衝秋刺中郛皆瀉之又當灸期門百壯背第九椎五十壯邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內肝善癢節時腫取之行間以引脇下補三里以溫胃中取血脈以散

惡血取耳間青脈以去其瘕
凡有所墮墜惡血蓄內若有所大怒氣上而不能下積於左脇下則傷肝

肝中寒者其人洗洗惡寒翁翁發熱面翁然赤紫紫有汗胸中煩熱

肝中寒者其人兩臂不舉舌本又作大燥善太息胸中痛不得轉側時盜汗咳食已吐其汁

肝主胸中喘怒罵其脈沉胸中又窒欲令人推按之

千金方卷十一 六 雜業山房

有熱鼻窒

肝傷其人脫肉又臥口欲得張時時手足青目瞑瞳人痛此為肝臟傷所致也

肝水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時津液微生小便續通

肝脹者脇下滿而痛引小腹
肝著其病人常欲蹈其胸上先未苦時但欲飲熱

診得肝積脈弦而細兩脇下痛邪氣走心下足脛寒脇痛引小腹男子積疝女子瘦淋身無膏澤善轉筋

爪甲枯黑春癢秋劇色青也

肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足如龜背狀久久不愈發咳逆瘡瘻連歲月不已以季夏戊巳日得之何也肺病傳肝肝當傳脾脾適以季夏王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受因留結為積故知肥氣以季夏得之

肝病胸滿脇脹善悲怒叫呼身體有熱而復惡寒四肢不舉面白身體滑其脈當弦長而急今反短澀其色當青而反白者此是金之尅木為大逆十死不治襄公問扁鵲曰吾欲不診脈察其音觀其色知其病生死可得聞乎答曰乃聖道之大要師所不傳黃帝

千金方少義卷上

七

攝業山房

貴之過於金玉入門見病觀其色聞其呼吸則知往來出入吉凶之相角音人者主肝聲也肝聲呼其音琴其志怒其漚足厥陰厥逆少陽則榮衛不通陰陽交雜陰氣外傷陽氣內擊擊則寒寒則虛虛則卒然啞啞不聲此為厲風入肝續命湯主之方見第 八卷中但踞坐不得低頭面白青黑四肢緩弱遺失便利甚則不可治除則旬月之內桂枝酒主之方見第 八卷中又呼而哭哭而反吟此為金尅木陰擊陽陰氣起而陽氣伏伏則實實則熱熱則喘喘則逆逆則悶悶則恐恐目視不明語聲切急謬說有人此為邪熱傷肝甚則不可

治者唇色雖青向服不應可治地黃煎主之方見下 卷中

肝病為癭者令人色蒼蒼然太息其狀若死者烏梅丸主之方見第 十卷中若其人本來少於悲悲忽爾噴怒出言反常乍寬乍急言未竟以手向眼如有所畏若不

節病禍必至矣此肝病聲之候也若其人虛則為寒風所傷若實則為熱氣所損陽則瀉之陰則補之青

為肝病合筋青如皇羽者吉肝主目目是肝之餘其人木形相比於上角蒼色小頭長面大肩平背直身

小手足有材好勞心少力多憂勞於事耐春夏不耐

秋冬秋冬感而生病足厥陰他他然脇廣合堅脆傾

正則肝應之正青色小理者則肝小小則臟安無脇

下之病粗理者則肝大大則虛虛則寒逼胃迫咽善

膈中曰脇下痛廣脇反酸者則肝高高則實實則肝

熱上支黃加脇下急為息賁合脇危一作 散者則肝

下下則逆胃脇下空空則易受邪脇骨堅者則肝堅

堅則臟安難傷脇骨弱者則肝脆脆則善病消瘴易傷脇腹好相者則肝端正端正則和利難傷脇骨偏舉者則用偏傾偏傾則脇下偏痛凡人分部陷起者必有病生陷少陽為肝之部而藏氣通於內外亦

隨而應之沃濁為內浮清為外若色從外走內者病從外生部處起若色從內出外者病從內生部處陷內病前治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主外陰主內凡人死生休否則精神前變形於外人肝前病目則為之無色若肝前死目則為之脫精若天中等分暮色應之必死不治看應增損斟酌足賒則不出四百日內促則不延旬月之間肝病少愈而卒死何以知之曰青白色如拊指大靨點見顏頰上此必卒死肝絕八日死何以知之面青目赤但欲伏眠日視而不見人汗出如水不止一日二日死面黑目青者不死青如艸滋死吉凶之色在於分部順順而見青白八目必病不出其年若年上不應三年之中禍必應也

春木肝脈色青主足少陽脈也春取絡脈分肉春者木始治肝氣始生肝氣急其風疾經脈常深其氣少不能深入故取絡脈分肉之間其脈根本並在竅陰之間應任窻籠之前窻籠者耳前上下脈以手按之動者是也其筋起於小指次指之上結外踝上循膈外廉結於喉外廉其支者別起於外輔骨上走脾前者結伏兔

之上後者結於尻其直者上眇乘季脇上走腋前廉俠於膺乳結於缺盆直者上出掖貫缺盆出太陽之前循耳後上額角交巔上下走額上結於顛其支者結於目外皆為外維其脈起於目銳背上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩土却交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至銳骨後其支者別銳骨下大迎合手少陽於頤下加頰車下頸合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣街繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胸過季脇下合髀厭中以

下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上出小指次指之端其支者別跗上入大指之間循大指岐內出其端還貫八爪甲出三毛合足厥陰為表裏厥陰之本在行間上五寸應在背膂同會於手太陰其足少陽之別名曰光明去踝半寸是也別走厥陰下絡足趺主肝病實則膽熱熱則厥厥則陽病陽脈反逆大於寸口一倍病則胸中有熱心脇頭額痛缺盆腋下腫虛則膽寒寒則痿躄則陰病陰脈反小於寸口病則胸中有寒少氣口苦身體無音澤

外至肘絕骨外踝前及諸節皆痛若陰陽俱靜與其俱動如引繩俱頓者病也此處是足少陽膽經筋脈支別寫病今取足厥陰肝經附於後

足厥陰之脈起於大指叢毛之際上循足踏上廉云內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膈內廉循股

脇助循喉嚨之後上入頰頰連目系上出額與督脈會於巔一本云其支者從小腹與太陰少其支者從結於腰下第二第四皆空中

目系下頰裏環肩內其支者復從肝別貫膈上注肺中是動則病腰痛不可以俛仰丈夫頰疝婦人小腹

腫甚則喘乾面塵脫色是主肝所生病者胸滿嘔逆洞泄狐疝遺溺閉癢盛者則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

足厥陰之別名曰蠱溝去內踝上五寸別走少陽其別者循經上擊結於莖其病氣逆則墨腫卒疝實則

挺長熱虛則暴癢取之所別足厥陰之筋起於大指之上上結於內踝之前上循膈上結內輔之上下循

陰股結於陰器結絡諸筋

春三月者主肝膽青筋牽病也其源從少陰而涉足少陽少陽之氣始發少陰之氣始衰陰陽弗彰於腰

膝

千金方衍義卷上

十三 據業山房

理皮毛之病俱生表裏之病因起從少陽發動反少

陰氣則臟腑受腐而生其病相反若腑虛則為陰邪

所傷腰背強急脚縮不伸肝中欲折目中生花若臟實則為陽毒所出證證前寒而後熱頸外雙筋牽不

得屈伸頸直背強眼赤黃不欲轉動合身回側女曰青筋牽病方見第九卷傷寒門

扁鵲曰灸肝肺二膈主治丹毒牽病當依源處治調其陽理其陰臟腑之疾不生矣

肝實熱 肝虛實第二脈四首 方十一首 灸法一首

千金方衍義卷上

十三 據業山房

左手關上脈陰實者是厥陰經也病若心下堅滿苦兩脇痛息忿忿如怒狀名曰肝實熱也

竹瀝泄熱湯 治肝實熱陽氣伏邪熱喘逆悶恐目視物無明狂悸非意而言者方

竹瀝 一升 麻黃 大青 梔子 升麻 茯苓

元參 知母 生薑 石膏 各八分 生薑 芍藥 各四分

右十二味吹咀以水九升煮取二升半去滓下竹瀝者兩三沸分三服須臾下疔硝三分去芍藥加

生地黃五分

方無石膏生薑芍藥牛膝用人參三分

義喘逆狂悶明是木邪無畏反侮肺金之象方用竹

瀝潤火清痰為主兼以麻黃升麻開泄肺滿於上

大青引領知母石膏等味降泄肝實於下可謂峻

矣設亢極不能即應須加芒硝以潤下之巧藥益

氣不若地黃之滋血故易之

前胡湯 治肝實熱目痛胸滿氣急塞瀉肝方

前胡

芒硝

秦皮

梔子仁

決明子

黃芩

升麻

棗仁

細辛

全方

各三

苦竹葉

再煎

各一

右十一味咬咀以水九升煮取三升去滓下芒硝

分三服 一方有柴胡三兩

後肝熱而見胸滿氣急火邪內蘊之兆火性上炎而

害空竅所以目痛故用前胡決明棗仁專祛肝竅

之風升麻細辛黃芩開發上盛之熱芒硝梔子苦

竹卷耳疎泄內蘊之火秦皮苦燥專主肝膽濕熱

目爲目痛要藥

防風散 治肝實熱驚怒虛驚方

防風

茯苓

麥麩

白朮

橘皮

丹參

細辛

甘艸

射干

升麻

黃芩

大棗

酸棗仁

右十三味治下篩爲粗散以兩方寸七帛裹以井

花水二升煮時時動上裏子煎取一升分服日二

後夢中志怒醒則虛驚熱并於肝而膽氣餒怯也夫

木邪勢盛必致步虐脾土土受木乘亦令善驚故

用防風補膽射干瀉肝酸棗萎蕤丹參平調肝膽

血氣細辛升麻苗芩開發少陽風熱蒼朮橘甘大

棗培護中土土實則肝氣受蔭不致木稿火炎則

夢寐安寧可無驚怒之患君以防風非獨補膽補

肝藥中亦須用以土中瀉木可無土敗木乘之患

遠志散 治肝邪熱出言反常乍寬乍急方

遠志

射干

杏仁

大青

茯苓

麥門冬

葛根

甘艸

芍藥

桂心

知母

升麻

石膏

石脂

石脂

右十三味治下篩爲粗散以水二升五合煮竹葉

一升取汁內藥一七半煎取八合爲一服日一以綿裹散煮之

衍 出言反常木邪肆虛穢 亂神明君主不能爲政也

方用遠志茯苓神麥門冬 利竅安神滋培心氣升麻

葛根杏仁開泄於上大 青射干芍藥甘艸知母石

膏降泄於下清潤藥中 得桂心之辛溫以開泄木

邪之去路也

地黃煎 治邪熱傷肝 好生悲怒所作不定自驚

恐方

生地黃

淡竹葉

生薑

《千金方卷十一》

《五》

楊葉山房

車前艸

乾薑 各切 一升

赤蜜 一升

丹參

元參 各四兩

茯苓 二兩

石膏 五兩

右七味咬咀以水九升 煮取三升去滓停冷下蜜

更煎三兩沸分三服

衍 此言邪熱傷肝本藏津液雖爲熱邪所耗而虛陽

散漫或時擾肝則怒迫 肺則悲薄膽則驚犯腎則

恐以火無常性乘虛隨 八諸經鄰壑爲虛少陰尤

爲切近所以專取地黃 兼滋肝腎真陰乾藍引領

淡竹車前等味降泄諸 經遊火又須生薑赤蜜辛

甘滋化肺氣不使虛陽 留宿於上然蜜有赤白之

肝膽俱實

左手關上脈陰陽俱實者 足厥陰與少陽經俱實也

病苦胃脹嘔逆食不消者 曰肝膽俱實也

肝虛寒

左手關上脈陰虛者足厥 陰經也病苦脇下堅寒熱

腹滿不欲飲食腹脹悒悒 不樂婦人月經不利腰腹

痛名曰肝虛寒也

補肝湯

治肝氣不足兩脇下滿筋 急不得太息

《千金方卷十一》

《五》

楊葉山房

四肢厥冷發搐心腹 痛目不明了及婦人心痛

乳癰腫熱消渴爪甲 枯口面青者方

山茱萸 翼作 烏頭 甘艸

杜心 各三兩

桃仁 翼作 桃仁

柏子仁

細辛

茯苓

防風 各二兩

大棗 二十四枚

右九味咬咀以水九升 煮取五升去滓分三服

衍 肝爲風木之藏動則生火 靜則生風動者實而靜

者虛也山茱萸桂心專 補肝虛下脫防風細辛利

專散虛風內動然非山 萸不能斂固於下非桂心

不能鼓運於中故欲杜 虛風須培疆土苓甘大棗

慮在培土尤賴防風桂心之風力運動則土膏發
育木澤敷榮桃仁一味協濟桂心流通脈脈調適
婦人經候之要著也

補肝散 治左脇偏痛久宿食不消并目眩疏昏
風淚出見物不審而逆風寒偏甚消食破氣止

淚方

山茱萸

桂心

薯蕷

天雄

茯苓

人參各五分

芎藭

白朮

獨活

五加皮

大黃各七分

橘皮三分

防風

乾薑

丹參

厚朴

細辛

桔梗各一兩半

甘艸

乾菊花一兩

貫眾半兩

陳麥麩

大麥蘖各一升

右二十三味治下飾酒服方寸七日一若食不消
食後服若止痛食前服

衍義 前補肝湯所主肝虛本病此補肝散所主木乘土
衰故於黃桂天雄等補肝藥中添入大黃厚朴貫
衆以泄內蘊之滯人參白朮茯苓以補內虧之氣
乾薑芎藭五加以溫內阻之血防風細辛獨活乾

菊以化內虛之風其餘薯蕷丹參桔梗橘皮甘艸
麩藥隨補瀉以為佐使耳

松膏酒 治肝虛寒或高風眼淚等雜病方

以松脂十觔細剉以水淹浸一周日煮之細細
接取上膏水竭更添之脂盡更水煮如前烟盡
去火停冷脂當沉下取一觔釀米一石水七升

好麩末二斗如家常釀酒法仍冷下飯封一百

日脂米麩並消酒香滿室細細飲之此酒須一

倍加麩

松脂堅勁而善祛風肝虛風濕內蘊故用其膏釀

酒以祛宿昔之風高風眼淚非肝風內蘊之一驗

乎

枸杞酒 治同前

枸杞子一斗搗碎內絹袋中酒二斗漬訖密封

泥窰勿洩曝乾天陰勿出三七日滿且溫酒任

性飲之忌酢

衍義 枸杞酒方下主治同前然松膏燥濕枸杞潤血補

肝之用雖同潤燥之性迥別

防風煎 治肝虛寒目眩視物不明諸視生花

補方

防風 細辛

芎藭

獨活

白鮮皮

甘艸各三兩

橘皮二兩

大棗三七枚

甘竹葉切一升

蜜五合

右十味咬咀以水一斗六升先煮九味取四升去滓下蜜更煎兩沸分四服日三夜一若五六月以燥器貯冷水藏之

肝氣下襲於腎上擾水輪所以眵眵視物不明諸

義

視生花防風白鮮甘竹上散頭目諸風細辛獨活

芎藭下通腎肝之結甘艸橘皮蜂蜜大棗培土以

禦木邪之下陷也

千金方卷十一 九 燥藥出房

檳榔湯 治肝虛寒脇下痛脹滿氣急目昏濁視

物不明方

檳榔二十枚

附子

母薑七兩

扶苓

橘皮

桂心各三兩

桔梗

白朮各四兩

吳茱萸各五兩

右九味咬咀以水九升煮取三升去滓溫服每服

一升若氣喘者加芎藭三兩半夏四兩甘艸一

兩

義

派溫補肝脾藥中獨用檳榔以破腸滿氣急則

桂附薑黃苓朮桔梗力祛中外虛寒而無旺氣振

腕之患矣

治肝虛目不明方

灸肝膈二百壯小兒斟酌可灸一二七壯

肝膽俱虛

左手關上脈陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也

病若恍惚尸厥不知人妄見少氣不能言時時自驚

名曰肝膽俱虛也

肝勞第三 論一首 方二首

千金方卷十一

三 燥藥出房

論曰肝勞病者補心氣以益之心王則感於肝矣人

逆春氣則足少陽不生而肝氣內變順之則生逆之

則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則

生矣

方

猪膏酒

薑汁各二升

右二味以微火煎取三升酒五合和煎分為三服

食

肝為藏血藏津之地肝氣過勞則血槁津枯關格

之病生矣猪膏甘潤滋津生薑辛溫化氣使津液

流布而關格通矣

虎骨酒 治肝虛寒勞損口苦關節骨疼痛筋變

縮煩悶方

虎骨一升炙焦 丹參八兩

乾地黄七兩

地骨皮

乾薑

芎藭各四兩

猪椒根

五加皮

白朮

枳實各五兩

右十味咬咀絹袋盛以酒四斗浸四日初服六七合漸加至一升日再

肝七筋骨主骨肝勞而至筋攣骨疼風寒在下口

千金方衍義卷五

主

筋攣筋房

苦煩悶風熱在上也虎骨猪椒芎藭內搜筋骨之

風乾薑白朮五加下追關節之痛地黃地骨上清

煩擾之熱枳實丹參中散瘀滯之血也

筋極第四論二首 方七首 灸法七首

論曰夫六極者天氣通於肝地氣通於嗌風氣應於

肝雷氣動於心穀氣感於脾素問穀 雨氣潤於腎六

經爲用腸胃爲海九竅爲水注之氣所以竅應於五

臟五臟邪傷則六腑生極故曰五臟六極也

論曰凡筋極者生肝也肝應筋筋與肝合肝存痛從

筋生又曰以春遇病爲筋痺筋痺不已復感於邪內

舍於肝則陽氣入於內陰氣出於外若陰氣外出

則虛虛則筋虛筋虛則善悲色青蒼白見於目下若

傷寒則筋不能動十指爪皆痛數好轉筋其源以春

甲乙日得之傷風風在筋爲肝虛風也若陽氣內發

發則實實則筋實筋實則善怒隘乾傷熱則咳咳則

脇下痛不能轉側又脚下滿痛故曰肝實風也然則

因其輕而揚之因其重而減之因其衰而彰之審其

陰陽以別柔剛揚病治陰陰病治陽善治病者病在

皮毛肌膚筋脈而治之次治六腑若至五臟則半死

矣

千金方衍義卷五

主

筋攣山房

扁鵲云筋絕不治九日死何以知之手足爪甲青黑

呼罵 不息筋應足厥陰足厥陰氣絕則筋縮引卵

與舌筋先死矣

橘皮通氣湯 治筋實極則咳咳則兩脇下縮痛

痛甚則不能轉動方

橘皮四兩

白朮

石膏各五兩

細辛

當歸

桂心

茯苓各三兩

香豉一升

右八味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

筋傷筋極而復傷熱則咳咳則脇下痛故用橘皮

細辛以治咳香豉石膏以化熱桂心當歸以調肝
白木茯苓以實脾脾實則肝邪不能肆其虐矣

丹參散 治筋實極則兩腳下滿滿而後痛不能
行脚心如割筋斷折痛不可忍者方

丹參 三兩 芍藥 杜仲

續斷 地骨皮 各二兩 乾地黄

當歸 通州 升麻

麥門冬 禹餘糧 麻黃 各一兩

牛膝 二兩 甘艸 桂心 各一切

生薑 切炒 牡蠣 各二兩

右十七味治下筋為粗散以絹袋子或一方汁七

以井花水二升煮數動袋子煮取一升頓服日二

腳下滿痛多由遠行力乏極勞傷筋或或以湯風

寒之邪乘虛襲入遂致筋折如斷故於治血舒筋

劑中兼麻黃升麻以散邪牡蠣禹餘糧以杜虛風

之復擾也

地黃煎 治筋實極手足爪甲或青或黃或黑烏

鱉四肢筋急滿方

生地黄汁 生葛汁 生元參汁 各一

升麻 各二兩 麻黃

大黃

板子仁 犀角 各三兩 石膏 五兩

芍藥 四兩

右十味咬咀以水七升先煮七物取二升去滓次

下地黄汁煎一二沸次下葛汁煎取三升分為二

服日再

筋極而見手足爪甲青黑頗有似乎陰寒之證然

有煩滿而無厥逆洵為瘀熱無疑故於解劑藥中

得麻黃升麻外通經氣之結得地黃大黃破蓄血

之滿也 此與前熱邪傷肝之地黃煎溼涸攸分

彼專收攝虛陽故兼生薑此專攻逐瘀血故兼大

黃觀金匱狐惑何中赤小豆當歸散治七日甘四

皆黑病雖不同而瘀血之證則一

五加酒 治筋虛極筋痺好悲思顏色蒼白四肢

痿痺手足拘攣伸動縮急腹中轉痛方

五加皮 一斤 薏苡仁 升 枳刺 二升

大麻仁 二升 猪椒根皮 丹參 各八兩

乾薑 芎藭 各五兩 桂心

當歸 甘艸 各三兩 天雄

秦椒 白鮮皮 通艸 各四兩

右十五味咬咀以絹袋盛清酒四斗漬春夏四日

秋冬六七日初服六七合稍稍加以知爲度

義衍筋虛極而好悲且色兼蒼白明是金刑木象筋病

所以外見手足拘攣內顯腹中轉痛故用五加祛

風逐濕而兼二椒薑雄壯筋強骨桂心芎藭益肝

養營佐以薏苡枳刺麻仁丹參甘艸鮮通得酒以

行其力何憚筋極之不平復乎

義人參酒 治筋虛極則筋不能轉十指爪皆痛數

轉筋或交接過度或病未平復交接傷氣筋

絕舌卷唇青引卵縮脰脈疼急腹中絞痛或便

欲絕不能飲食方

本草綱目卷之十

人參 防風 茯苓

細辛 秦椒 黃芪

當歸 牛膝 桔梗各一兩半

乾地黄 丹參 薯蕷

鐘乳 礬石 山茱萸

芎藭各二兩 白朮 麻黃各二兩半

五加皮 生薑切炒 烏麻碎各一升

大棗三十枚

右二十二味咬咀鐘乳別以小袋子盛清酒二斗

半浸五日溫服三合日再不知隨意增進 一本

無烏麻用杜仲一兩半

義衍此治腎勞筋極故用山萸薯蕷地黄牛膝補養真

陰芎藭當歸丹參烏麻滋培營血人參黃芪茯苓

白朮保養元神麻黃細辛桔梗防風開泄旺氣鐘

乳礬石秦椒五加固斂陽精生薑大棗調和營衛

其裏扶陽續筋之功其間白朮與鐘乳相反千金

一每用相激以壯其威且與礬石並用不獨爲氣傷

精脫之所需并可禦麻黃發汗之外脫况漬酒緩

進與湯藥急追用法迥乎不類也

治交接損卵縮筋攣方

本草綱目卷之十

燒婦人月經衣灰服方寸七

義衍此即南陽陰陽易燒視散變法取穢惡之氣以散

穢惡之傷也

治筋絕方

熬蟹腦足髓內瘡中筋即續

義衍筋絕而用蟹髓入傷處不但續筋并能散血然用

生者爲捷但足易脫不若用髓尤勝

灸法

勞冷氣逆 體冷痺脚屈伸難灸陽蹠一百壯在外

踝下容爪

腰背不便轉筋急 痺筋變灸第二十一椎隨年壯

轉筋十指筋擊急 不得屈伸灸脚外踝骨上七壯

失精筋攣陰縮入腹相引痛灸中封五十壯在內踝

前筋製宛宛中 又云灸下滿各五十壯老人加之

小兒隨年壯 又云此二穴喉腫厥逆五臟所苦鼓

脹悉主之

轉筋脛骨痛不可忍灸屈膝下廉橫筋上三壯

腹脹轉筋灸臍上一寸一七壯

堅癥積聚第五 論一首 方四十四首 灸法六首

論曰病有積有聚何以別之答曰積者陰氣也聚者

千金方卷二十一 七 積聚山房

陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣

之所聚名曰聚故積者五臟之所生聚者六腑之所

成故積者陰氣也其始發有常處其痛 一作不離其

部上下有所終始左右有所窮處也聚者陽氣也其

始發無根本上下無所畱止其痛無常處謂之聚也

故以是別知積聚也

經絡受病入於腸胃五臟積聚發伏梁息賁肥氣否

氣奔豚積聚之始生至其已成奈何曰積之始生得

寒乃生厥止乃成積人之善病腸中積者何以候之

曰皮薄而不澤肉不堅而淖澤如此則腸胃生惡聚

則邪氣留止積聚乃作腸胃之積寒濕不次邪氣稍

止至其蓄積留止大聚乃起病有身體腰脚股胫皆

腫環臍而動是謂何病曰病名伏梁此風根也不可

動動之為水瀦澀之病小腹盛左右上下皆有根者

伏梁也裏臍而居腸胃之外不可治治之每切按之

致死此下則因陰必下膿血上則迫胃管生 王水云當作出

膈狹門腕內癰此久病也難療居臍上為逆慎勿動

亟奪其氣溢於大腸而著於盲盲之原在臍下故環

臍而痛

三白丸 治力臍寒熱積聚臍脹腸鳴而噎食不

千金方卷二十一 七 積聚山房

生肌膚甚者嘔逆若傷寒瘥已愈冷不復發食

後服五九飲多者十九常服令人大小便調和

長肌肉方

大黃 各二兩 前胡 各二兩 硝石

葶藶 各一升 杏仁 各一升 厚朴

附子 半兩 細辛 半兩 半夏 各兩

茯苓 半兩

右十味為末蜜和搗五十杵九如梧子大服五九

稍加至十九以知為度

積五臟皆有寒熱積聚非獨肝也肝之積名曰肥氣

心之積名曰伏梁脾之積名曰痞氣肺之積名曰
 息實腎之積名曰奔豚奔豚氣上衝胸腹痛往來
 寒熱金匱主以奔豚湯燒絨汗出不解欲作奔豚
 桂枝加桂湯所加之桂臍下悸者欲作奔豚桂枝
 甘肅湯腹中寒上衝皮起出見有頭足三物大建
 中湯寒氣厥逆用赤丸胸痺積痛九痛丸脇下偏
 痛大黃附子湯諸積雖有五臟之分大約不出金
 匱等法為正治眼藏千金特舉肝藏為例者以肝
 藏生發之氣生氣旺則五臟環迴生氣阻則五積
 留著其方雖彙肝藏之門而所用之藥不獨治肝

千金方衍義卷十一

積也如三台丸專取大黃附子湯專破腎肝脾三
 經之結兼大陷胸丸但以硝石易芒硝以泄肺胃
 逆氣之滿更加前胡厚朴茯苓半夏導氣滌痰方
 中僅有細辛一味達肝於此可以默悟聖療積聚
 諸方不獨為肝臟一門設也
 五石烏頭丸 治男子女人百病虛弱勞冷宿寒
 久癖及癥瘕積聚或嘔逆不下食并風濕諸病
 無不治之方
 鐘乳煉 硫黃 礞石
 紫石英 赤石脂 枳實

甘艸 白朮 紫苑
 山茱萸 防風 白薇
 桔梗 天雄 皂莢
 細辛 菴蓂 人參
 附子 藜蘆各一兩 麥門冬
 乾薑 蜀椒 吳茱萸
 桂心各二兩半 烏頭三兩 厚朴
 遠志 茯苓各一兩半 當歸二兩
 乾地黄一兩十銖 棗膏五合
 右三十二味為末蜜和搗五千杵丸如梧子大酒
 服十九日三稍加之

千金方衍義卷十一

烏頭丸 治男子女人寒冷腹內積聚邪氣往來
 厥逆搶心痛悶嘔不止婦人產後羸瘦方
 烏頭十五枚 吳茱萸 蜀椒
 乾薑 桂心各二兩半 乾地黄一兩
 前胡 細辛 人參
 芍藥 白朮 皂莢
 紫苑 白薇各一兩 芍藥各十銖
 右十五味為末蜜和如梧子大酒下十九日三稍
 加之以知為度

五石而兼雄附烏頭三建薑桂椒黃四烈可謂峻矣又以參朮藜蘆相激乳木其裒克敵之功復取獨地滋燥之品緩其悍烈之威深得緩急相需之妙烏頭丸主治與五石烏頭丸輕重殊分彼以積聚氣實非五石雄附兼乳木參藜之反不能克應此以積微氣弱不勝峻伐但採方中性味稍和者一十二味更退防風當歸而退前胡芎藭以示勸方之權度也

治心腹疝瘕脇下及小腹滿堅痛有積寒氣入腹使人腹中冷發甚則上搶心氣滿飲食喜嘔方

千金方術藥卷下 重 補藥山房

大黃 茯苓各一兩

桂心

黃芩 吳茱萸

細辛

人參 蜀椒

乾薑各一兩

男髮灰兩

牡丹

甘艸

芎藭一兩

菴菴

應蟲各十

芍藥 防葵

蟲蟲

厚朴 半夏各一兩

右二十味為末蜜丸如梧子大服五丸日再漸加

之

疝瘕而見小腹滿痛乃肝血結積部分非濕陰之

氣填塞膈上之比有時搶心喜嘔胸中大氣失職不能駕馭陰邪然陰僻陽位必不能久據於上於此可以立辨故用人參扶助正氣挾薑桂而散積結朴半椒黃破除濁氣大黃防葵為蟲蠱開辟積血之門戶也其餘牡丹芍藥芎藭髮灰之屬總在輔佐蟲蠱之流耳

恆山丸 治脇下邪氣積聚往來寒熱如溫瘧方

恆山 蜀漆 白薇

桂心 蛇甲 白朮

附子 鱉甲 蠶蟲

千金方術藥卷下 重 補藥山房

貝齒各一兩 蠶蟲六銖

右十一味為末蜜和丸如梧子大以米泔清服五

九日三

積聚結於肝膽部分所以洗洗寒熱發作有時頗有似乎溫瘧之狀但不若瘧之發有常期也溫瘧得之冬月受邪至春夏蘊蒸而發故禁溫劑此沉寒固結雖用恆山蜀漆二甲蠶蟲貝齒削堅破瘕之劑不得附桂辛溫無以動之白薇功專開泄旺氣力除寒熱洗洗發作有時白朮生能逐濕散血并助諸藥破積之力也

又方

蒸鼠壤土熨之冷即易 腹中切痛炒鹽半觔
令焦內湯中飲之大吐痰 若手足痛者烘青
布內小口器中熏痛處

衍 外用三法土熨布熏皆取用一時以圖暫安未為

不可其妙隨引吐在西北水土堅厚之域固可無
慮東南風氣易動之鄉不無激動上衝之患雖鹹
未必便能斂降也

神明度命丸 治久患腹內積聚大小便不通氣
上搶心腹中脹滿逆害飲食方

大黃

芍藥各二兩

右二味為末蜜丸如梧子大服四九日三不知可
加至六七九以知為度

衍 積聚腹中阻逆二便故用大黃推陳致新考藥和
血止痛蜜丸緩投可無開泄之虞

治萬病積聚方

七八月間收蒺藜子不限多少以水煮過熟取
曝令乾搗篩蜜丸如梧子大酒服七九以知為
度其汁煎如飴服之

衍 白蒺藜專祛肝腎之風為目科及白癩風要藥而

本經首推治惡血破積聚也

陷胸湯 治胸中心下結積飲食不消方

栝蒌實

大黃

黃連各二兩

甘艸一兩

右四味咬咀以水五升煮取二升五合分三服

衍 小陷胸用半夏黃連栝蒌實以滌胸中痰垢大陷

胸用大黃芒硝甘遂以散心下結鞭此以食積食
廩而蘊熱故於小陷胸中除去半夏參入大陷胸
中大黃乃革去大小二字僅取陷胸之名以除水
穀疝氣而與有形堅積略無干預也

千金方積聚丸

太乙神明陷冰丸 治諸疾破積聚心下支滿寒

熱鬼疰長病咳逆唾噎辟除眾惡殺鬼逐邪惡
氣胸中結氣咽中閉塞有進有退繞臍惻惻隨
上下按之跳手心中愠愠如有蟲狀毒注相染

滅門方

雄黃油煮一日

丹砂

礬石

當歸

大黃各二兩

巴豆一兩

犀角

鬼臼

射罔

藜蘆各一兩

珍珠

附子各一兩半

麝香

牛黃

人參各一兩

蜈蚣

各一

芫青 五枚

烏頭 八枚

杏仁 四十枚

斑貓 七枚

雉雞

地膽 各二十枚

桂心 三兩

右二十四味為末蜜和搗三萬杵九如小豆先食

飲服二九日三不知稍加仍以藥二九安門戶上

令眾惡不敢近傷寒服之無不即瘥此方與十七卷

眾惡不敢近傷寒服之無不即瘥此方與十七卷

蛇蝎丸 治瘵堅水腫飛尸百注通注尸注骨血

相注惡氣鬼忤蠱毒邪氣往來夢寤存亡雷飲

結積虎狼所噬獠犬所傷鳩毒入人五臟服藥

以消殺其毒毒即消婦人邪鬼忤亦能遣之之

方

蛇蝎

蜈蚣 各二

地膽 五十枚

蠱蟲

麻蟲 各三

杏仁 十枚

蛻螂 十四枚

朴硝 各七

巴豆 各七

款冬花

犀角

桃奴

澤漆

桑赤雞

鬼督郵 各十

芍藥

虎骨 各六

甘艸

乾薑 各四

甘遂 五分

右二十味為末別治巴豆杏仁如膏內藥末研調

下蜜搗二萬杵九如麻子先食飲服二九日一不

知加之不致吐下者一丸有人風冷注瘕堅二十

年者得瘥此方與十七卷

義所蝎丸與後陷水丸總皆辟惡之方陷水丸中首

推烏附振發陽威蝎丸中桃奴鬼督郵破除陰

毒藥雖異而功用彷彿 陷胸則陽邪猶在陽位

陷水則陰邪洎沒微陽故用雄丹烏附恢復真陽

鬼臼射罔開辟陰邪犀角珍珠分解毒蘊藜蘆礬

石大黃巴豆上下涌泄激發蝎蝎斑猫蕩熱之威

人參當歸氣血兼該鼓舞烏附復陽之力方名陷

水千金取管叔孫陷圍公徒釋甲執水而歸之意

或云陷疑古字通用陽為陰陷於義亦通

五明狼毒丸 治堅瘕瘕在人胸脇或在心腹

方

狼毒

乾地黄 各四兩

附子

大黃

肉苳蓉

人參

常歸

細辛

蜀椒

五味子

蒟蒻 熟合厘盡 各一兩半 夏二兩

乾薑

桂心 各一兩半

芫花

莽艸

厚朴

防己

旋覆花 <small>各半兩</small>	杏仁 <small>三十枚</small>	巴豆 <small>四十枚</small>
右二十一味為末蜜和丸如梧子大服二九日一		
夜一以知為度		
小狼毒丸 治同前		
狼毒 <small>三兩</small>	附子	旋覆花
半夏	藜茹	白附子 <small>各二兩</small>
右六味為末蜜和搗五千杵丸如梧子大飲服三		
九加至十九日三 <small>用後方無半反附子藜茹</small>		
狼毒丸 治堅癥方	半夏	杏仁 <small>各三兩</small>
狼毒 <small>五兩</small>		
桂心 <small>四兩</small>	附子	蜀椒
細辛 <small>各二兩</small>		
右七味為末別搗杏仁蜜和丸如大豆服二九		
金匱九痛丸治九種心痛兼治平中惡腹脹痛連		
年積冷流注心胸痛及落馬墜車血疾千金取治		
堅癖參入蜀椒易去其黃黃椒性味相類本經言		
下氣溫中則一椒則專治蟲積也更加藜茹芫花		
莽艸防已大黃厚朴叻巴豆攻積之威半夏細辛		
杏仁助乾薑滌飲之力桂心當歸地黃助附子散		
血之用旋覆花專散心下結氣肘後方與狼毒附		

子同治心腹連痛菴蓉味鹹本經有軟堅去癥瘕		
之治五味子強陰益精輔人參固斂精血不使隨		
毒劣耗散也 小狼毒丸取大五明狼毒丸中五		
味加白附以祛肝腎風毒 狼毒丸取半夏杏仁		
佐狼毒以破結積之痰桂心細辛佐附子以散沉		
疝之積蜀椒專治胸腹蟲積之痛也		
甘遂湯 治暴堅久疝腹有堅者方	黃芩	芫附
甘遂		
桂心	細辛 <small>各一兩</small>	大黃 <small>三兩</small>
六味咬咀以水八升煮取二升半分三服		
治卒暴癥腹中有物堅如石痛如斫刺晝夜啼呼		
不治必死		
牛膝二觔改咀曝令乾以酒一斗浸之蜜塞器		
口煎取半升服一服便吐去宿食神效		
治卒暴癥方		
搗碎商陸根蒸之以新布籍腹以藥鋪著其上		
以衣物覆其上冷易之數日用之旦夕勿息		
又方		
葶十斤	桂一尺	窟中黃土 <small>如雞子大</small>
	桂二尺	

右三味合搗以醇苦酒和塗布上以掩病處不過

三日消肝後方
不尺推

義此以大陷胸湯入辛桂以散肝積之結黃芩以瀉

膽氣之鬱也 牛膝專走厥陰而散肝家痲疾亦

是肘後成法 商陸苦寒利水大傷中氣雖外用

蒸熨亦必從大便開泄 蒜桂竈土總取溫散結

積塗臍亦得散堅

野葛膏 治卒暴癱方

野葛一尺 當歸

雄黃油煮
二日 細辛各一
兩

烏頭二兩 巴豆一
枚

右八味吹咀以大酢浸一宿 猪膏二斤煎附子色

黃去滓內雄黃粉攪至凝傅布上掩癱處復以油

重布上復著十重紙以熨斗盛火著其上常令熱

日三夜二須膏乾為度

義野葛殺鬼疰蟲毒兼烏附椒 辛雄歸巴豆熬膏傅

熨以毒攻毒與前風毒脚氣 門中野葛膏辛烈破

結雖同祛風逐濕迥別

硝石大黃丸 治十二癱瘓 及婦人帶下絕產無

子并欲服寒食散而腹中 有癱瘓者當先服

大丸下之後與寒食散大丸不下水穀但下病

耳不令人困方

硝石六兩
研 大黃八兩 人參

甘艸各二
兩 當歸一兩

右五味為末以苦酒三升置銅器中竹筍拄器中

一升作一刻凡三升作三刻置火上先內大黃常

攪微沸盡一刻乃內餘藥又盡一刻餘一刻極微

火熬使藥可丸如雞子中黃凡合藥當齋戒一宿

勿令小兒女人奴婢等見之欲下病者用二丸強

者二十日可五服婦人服之下如雞肝或如米汁

或正赤黑下後慎風冷作一杯粥食之然後作羹

糲自養如產婦法六月則有子禁生魚猪肉五辛

菜果

義癱瘓固疾非補瀉兼投寒熱 兼濟無以克應硝石

純陽專破固結甯癖大黃純陰專破癱瘓積聚人

參壯氣助陽當歸和血通陰 甘艸調和寒熱補瀉

之性苦酒引入肝經味簡法專他方之所不及方

下云寒食散即後蛟龍病之用寒食飭也

土瓜丸 治諸藏寒氣積聚 煩滿熱飲食中蠱毒

或食生物及水中蟲卵生入腹而成蠱蛇若為

魚鱉留飲宿食婦人產瘕帶下百病陰陽不逆

利大小便不節絕傷墜落寒熱交結唇口焦黑

身體消瘦嗜臥少食多噎產乳胞中餘疾股裏

熱少腹中急結痛引陰中方

土瓜根 桔梗各半 杏仁 一升

大黃 一斤蒸二十

右四味為末蜜丸如梧子大空腹飲服三九日三

不知加之以知為度

治凡所食不消方

取其餘類燒作末酒服方寸匕便止宿食節瘕

千金方衍義卷上

聖

補藥山房

有食桃不消作病者以時無桃就樹關得槁桃

燒服之登時吐病出甚良

治卒食不消欲成瘕積方

煎艾汁如飴取半升作一服便刺吐去宿食神

良 古今錄驗方用艾五尺一

治雜食瘕實不消心腹堅痛方

以水三升煮白鹽一升令消分三服刺吐去所

食并治暴瘕

治食魚肉等成瘕結在腹內并諸毒氣方

狗屎五升燒末綿裹以酒一斗浸再宿濾取清

分十服日三三日令盡隨所食瘕結即出

治瘕堅心下有物大如杯不得食食則腹滿心腹

絞痛方

葶藶子 大黃各二 澤漆 四兩

右三味別研葶藶為膏其二味搗五百杵入蜜更

搗千杵和丸如梧子大服五九不知加之日三

治小腹堅大如盤胸中滿脹食不消化婦人瘦瘠

方

以暖水服髮灰一方寸七日再并灸助端

又方

千金方衍義卷上

聖

補藥山房

飲服上好麵末方寸七日又灸三焦論隨年

壯

治伏梁氣方

白馬屎銅器中盛取每旦服一升

治瘕瘕方

樹樹白皮煎令可丸服之取知病動若下滅之

美疴 土瓜根佐大黃以破積血枯便佐杏仁以散結氣

然僅可治暴傷積聚而不能攻瘕堅宿患也 取

餘食燒末以治所傷同氣所感炭能化滯也 艾

汁純陽探吐陰傷結滯其方最專 鹽湯探吐中

病即止過服傷腎滯血又礙時不可言語語則陰入肺竅令人哮喘 狗屎穢惡能祛穢惡宿滯取其性熱也 葶藶大黃澤漆利水破血滌痰大傷元氣亦惟暴病為宜 小腹堅大為有形之血積於肝部故宜髮灰破宿生祈在婦人尤為合法 麩末能消食積而不能破宿血用者辨之 馬屎殺蟲而消癥瘕腹脹能傷胃氣虛者禁用 檨皮散血而治蟲殺蟲取其苦澀以化積毒也

椒熨方 治患癥結病及爪病似爪形日月形或在臍左右或在臍上下或若驚在左右肋下或

當心如盒子大法先鍼其足以椒熨之

取一新盆受一斗者底鑽二百二十孔孔上著椒三合上著一重紙紙上著冷灰一升冷灰上著熱灰半升上著剛炭火一動經一食頃盆底熱徹當病上初安匝一重即安火益火益大熱以漸更加一重若火更熱不可忍加至三重暫歇進一口令飲還上火消二分許即停止經三日勿著及至七日決得頓瘥然後食美食自補若小不瘥作露宿九服之

治腹中積癥方

千金方衍義卷上

聖

掃葉山房

葶藶子一升熬以酒五升浸七日每服三合日三

治蛇癥方

白馬尾切長五分以酒服方寸七者自出更服三分者一方寸七中者亦出更作二分者一方寸七小者復出不可頓作一服殺人

大黃湯 治蛇癥方

大黃

茯苓 各半兩一烏鱗骨二兩

皂莢

六枚如猪牙者 甘艸 如指大一尺 芒硝 如雞子大一枚

右六味咬咀以水六升煮三五沸去滓內硝適寒

千金方衍義卷上

聖

掃葉山房

溫盡服之十日一劑作如上法宿勿食平日空腹

服病根當下也

治驚癥腹堅硬腫起大如盆眠臥不得方

蘇在心上堅脈

取藍一筋搗水三升絞取汁每服一升日二

又方

蒴藿根白皮一握研取汁以水和頓服之

又方

白馬尿一升雞子三枚取白合煎取二合空腹

頓服不移時當吐病出

又方

雞屎一升炒令黃取五合以酒一升浸取半搗為末以所浸酒服方寸七日二服三日中作一劑

治蛟龍病開皇六年三月八日有人食芹得之其人病發似癩而面色青黃因食寒食過多使吐狀似蛟龍有項有尾

服寒食餒三斗大驗

山野人有齒蝨在腹生長為蝨癥病治之方

故敗篋子 故敗梳各一枚

右二件各破為兩分各取一分燒為末又取一分

千金方衍義卷上 掃 掃山房

以水五升煮取一升服上件燒末頓服即出

常欲食米若不得米則胸中清水出為米癥治之

方

雞屎一升 白米五合

右二味合炒令米焦搗末以水二升頓服取盡須

臾吐出病如研米若無米當出痰自此永憎米不

復食之矣

人有思肉不已食訖復思者為肉癥治之方

空腹飲白馬尿三升吐有肉出不出必死

食中有髮不覺因食而入久即胸間如有蟲狀上

下去來惟欲飲油一日之中乃至二三升不欲飲食者為髮癥方

以油一升以香澤煎之大蠶勞貯之安病人頭

邊令口鼻臨油上勿令得飲傳鼻面令有香氣

當叫喚取飲不得與之必當疲極大睡其髮癥

當從口出令一人專守視之并備石灰一裹見

癥出以灰粉手捉癥抽出及盡即是髮也初從

腹中出形如不流水中濃茶隨髮長短形亦如

之

又方

千金方衍義卷上 掃 掃山房

酒三升煮猪脂二升三沸服一升日二白馬尿

服之亦佳無白馬尿白牛尿亦得

衍板性下氣温中蠱積遇之即伏然須用得其法方

臻其妙 葶藶專於利水浸酒亦能下積 蛇癥

用馬尾雖云散血照方切蜜拌酉服實用以誘蠱

同下不可頓作一服者恐蠱與馬尾交混不散反

致上攻膈膜也 蛇癥而用硝黃兼烏鰂以破血

皂莢以滌垢茯苓守五臟正氣日艸經也硝之急

以盡攻積之力也 驚癥食驚而成藍專解毒殺

蟲與夏子由奇方用板藍汁治腹內應聲蟲一意

葫蘆散血開庫藥上有粉與水銀之功方沸

白馬尿合雞子白煎取吐胸中積著以垢逐垢之

驗 雞矢醋下氣攻積內經治蠱脹用之也 寒

食陽即寒食散治蛟龍病然須盡力多食混淆痰

涎而涌之使上以越之也 敗精燒治蠱瘕雖

曰取意亦取宿穢油垢以逐宿蘊之積 維尿下

氣和米同炒而投其所好誘之使出然不若用生

米粉尤捷 肉瘕服馬尿涌吐不獨破積兼取殺

蟲吐不出者胃氣告匱不能復勝傷伐也 髮是

喜油瘕本髮變香煎尤為所好但與嗅不與飲候

千金方義卷七

望

掃葉山房

疲極困睡乘機以法取之 髮瘕而用前法極其

智巧設引之不出更取馬尿殺蟲破瘕借酒煮猪

脂誘入蟲口以化之也

灸法

瘕瘕灸內踝後宛宛中隨年壯 又灸氣海百壯

久冷及婦人瘕瘕腸鳴泄利繞臍絞痛灸天樞百壯

三報穴在俠臍兩邊各方寸勿鍼

積聚堅滿灸脾募百壯穴在章門季肋端

心下堅積聚冷脹灸上腕白壯三報穴在巨關下

寸

積聚堅大則盤冷脹灸胃腕一百壯玄報穴在巨關

下二寸是

附臟腑大義

石頭曰嘗攷岐伯十九條病機原病式皆言盛氣

實邪邵子元偉逐條分屬經臟前五條是言五臟

之病次二條兼該下上之機後十二條分隸十二

經證披卷豁然無庸疑議婁氏極言守真立言之

偏誠非過論原夫五臟之病動關五志縱有旺氣

槩難實邪例稱屬上屬下多由腎肝氣衰火乘心

肺原非盛氣之謁至於十二經證雖由六淫居多

千金方義卷七

哭

掃葉山房

未必不因七情擾動表裏已非一端主治豈能專

一由是而推廣千金臟腑治例首參肝臟虛實五

方惟第二方正邪自病餘皆熱移他臟即使證見

兩端究不離肝之一本能達此義則病之所屬皎

如列炬又得必飲上池水而後洞見五臟之癥結

歟

孫真人千金方衍義卷十一 終

膽腑方 凡七類

膽腑脈論第一 論一首

論曰膽腑者主用也肝合氣於膽膽者中精之腑也

難經云膽者清淨之腑將軍決曹吏重三兩三銖長三寸三分在肝短葉間下貯水精汁二合

難經作能怒能喜能剛能柔目下果大其膽乃橫凡膽腦髓滑

脈女子胞此六者地氣之所生也皆藏於陰而象於

千金方衍義卷十二 掃葉山房

地故藏而不瀉名曰奇恒之腑若胃大腸小腸三焦

膀胱此五者天氣之所生也其氣象天故瀉而不藏

此受五臟濁氣名曰傳化之腑此不能久留輸瀉者

也所謂五臟者藏精氣甲乙而不瀉故滿而不能實

六腑者傳化物而不藏故實而不能滿所以然者水

穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛故曰虛

而不滿滿而不實也

左手關上陽絕者無膽脈也若膝疼口中苦眯目慈

畏如見鬼多驚少力刺足厥陰治陰在足大趾間或

刺三毛中左手關上陽實者膽實也若腹中不安身

軀習習也刺足少陽治陽在足上第二趾木節後一

寸是

膽病者善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之

咽中介介然數唾候在足少陽之本末亦見其脈之

陷下者灸之其寒熱刺陽陵泉若善嘔有苦長太息

心中澹澹善悲恐如人將捕之邪在膽逆在胃膽液

則口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰嘔膽刺三里以下胃

氣逆刺足少陽血絡以閉膽却調其虛實以去其邪

也

膽脹者脇下痛脹口苦太息

千金方衍義卷十二 掃葉山房

肝前受病移於膽肝欺之已則嘔膽汁

厥氣客於膽則夢鬪訟甲乙云夢鬪訟自剝

肝應筋爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色

青者膽急爪栗色赤者膽緩爪直色白無約者膽直

爪惡色黑多敗者膽結

扁鵲云足厥陰與少陽為表裏表清裏瀉其病若實

極則傷熱熱則驚動精神而不守臥起不定若虛則

傷寒寒則恐畏頭眩不能獨臥發於元水其根在膽

先從頭面起腫至足方見治水篇中

膽有病則眉為之傾病人眉系傾者七日死

足少陽之脈是動則病口苦善太息心脇痛不能反側甚則面微塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨所生病者頭痛角領痛目銳皆痛缺盆中腫痛腋

下腫馬刀挾瘦汗出振寒癱胸中脇肋脾膝外至肘絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用盛者則人迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

膽實熱

左手關上脈陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲

千金方衍義卷十一

三 掃藥山房

食不下咽乾頭痛灑灑惡寒脇痛名曰膽實熱也

半夏湯 治膽腑實熱精神不守瀉熱方

半夏 宿薑 各三兩 黃芩 一兩

生地黃 五兩 遠志 生地黃 五兩 酸棗 五合 茯苓 各二兩

秫米 一斗

右八味咬咀以千里長流水五斗煮秫米令蟹目

沸揚之千餘遍澄清取九升煮藥取三升半分三

服 集驗方治虛煩悶不得眠無地黃遠志有

義 行實則邪氣之湊熱則陽氣之併千金半夏湯本乎

靈樞治陽氣盛滿不得入於陰陰虛則目不瞑故

用半夏滌除痰涎秫米滋培氣化加宿薑茯苓佐上二味潔淨膽腑生地黃滋水制陽棗仁斂津化熱黃芩外疏風木遠志內通壯火逐流水以下趨是無藉葦薪之炊矣

膽虛寒

左手關上脈陽虛者足少陽經也病苦眩厥痿足指不能搖躄不能起偃仆目黃失精眊眊名曰膽虛寒也

溫膽湯 治大病後虛煩不得眠此膽寒故也宜服之方

千金方衍義卷十一

四 掃藥山房

半夏 竹茹 枳實 各二兩

橘皮 三兩 甘艸 一兩 生薑 四兩

右六味咬咀以水八升煮取二升分三服一本有

兩紅棗 十二枚

義 行虛則膽氣不充寒則痰氣搏聚故用薑半溫膽枳

如清中甘橘鼓舞陽和開發陰凝之寒寒則痰陰

之通稱 詳半夏溫膽二湯一治實熱一治虛寒

總為濁陰阻積不能行清淨之令是以主治不出

滌飲為務而實熱反用秫米遠志虛寒反用竹茹

枳實者蓋實非膽腑之本實故需流水煮秫米以

通陰陽遠志統地黃以散實熱乃補中寓泄之法
虛寒用半夏佐生薑以散積飲竹茹輔積實以治
疝氣旺氣除而正氣自復膽腑自溫乃瀉中寓補
之法非千金不能體內經之奧而衍無上其深微
妙也

千里流水湯 治虛煩不得眠方

麥門冬 半夏 茯苓 四兩

酸棗仁 二升 甘艸 桂心

黃芩 遠志 萹薺

人參 生薑 秫米 一斗

右十二味咬咀以千里流水一斛煮米令蟹目沸

揚萬遍澄清取一斗煮取二升半分三服

虛煩乃津液耗散病在膈上故於半夏湯中除去

生地黃之沉降棗仁四倍以溫膽腑加人參甘艸

門冬以滋津液萹薺入肝搜風桂心佐遠志達腎

以通陰陽汗出乃已靈樞法外法也

酸棗湯 治虛勞煩擾奔氣在胸中不得眠方

酸棗仁 五升 人參 桂心

生薑 石膏 茯苓

知母 甘艸

右八味咬咀以水一斗先煮棗仁取七升去滓下
藥煮取三升分三服日三

金匱酸棗湯治虛勞虛煩不得眠此治奔氣在胸

中故退芎藭而進桂心加人參助茯苓以降逆氣

石膏佐知母以泄虛煩生薑辛散以行知母石膏

之性也

治虛勞煩悶不得眠方

大棗 葱白 七莖

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

風熱之邪欲犯膽腑而煩悶不得眠者取葱白以

通陽氣大棗以安中精也

梔子湯 治大下後虛勞不得眠劇者顛倒懊懣

欲死方 者必反覆顛倒心中懊懣梔子湯主之

大梔子 枳 七合

右二味以水四升先煮梔子取二升半內枳更煮

三沸去滓每服一升安者勿更服若上氣嘔逆加

橘皮二兩亦可加生薑二兩

下後虛煩懊懣不得眠用梔子以清膈上虛煩香

枳以治心下懊懣

治煩悶不得眠方

枸杞白皮 生地黃各五兩 麥門冬

甘艸 前胡各三兩 茯苓

知母各四兩 人參二兩 粟米

豉各半升

右十味咬咀以水八升煮取三升七合分四服

衍義香豉前胡以碎膈上之煩地骨地黃門冬知母以

清心下之熱人參茯苓甘艸粟米以安中州之氣

人參白虎湯中除去石膏略兼七珍之製正氣得

補則虛煩自除

治虛勞不得眠方

千金衍義卷十一

酸棗仁 榆葉等分

右二味為末蜜丸如梧子每服十五丸日再

衍義棗仁溫膽腑而生津榆葉疎風木而利竅膽氣安

而眠自穩矣

又方

乾薑四兩為末湯和頓服覆取汗愈

衍義陽被陰埋煩不得眠則以乾薑之辛溫服取汗以

發越陽氣煩悶自已眠臥自寧

灸法

膽實熱灸濁浴隨年壯穴在俠膽膈傍行相去五寸

膽虛寒灸三陰交各二十壯穴在內踝上一犬

咽門論第三論一首

論曰夫咽門者應五臟六腑往來神氣陰陽通

道也喉嚨胞囊舌者並津液調五味之氣本也不可

不研乎喉門者肝膽之候也主通五臟六腑津液神

氣應十二時若臟熱則咽門閉而氣寒若腑寒則咽

門破而聲嘶母薑酒主之方見六卷熱則通之寒則

補之若寒熱調和病不生矣

髓虛實第四論一首

論曰髓虛者腦痛不安髓實者勇口凡髓虛實之應

千金衍義卷十一

主於肝膽若其腑臟有病從髓生執到應臟

腑

羌活補髓丸 治髓虛腦痛不安膽腑中寒方

羌活 芎藭 當歸各三兩

桂心二兩 人參四兩 棗肉研如脂

羊髓 酥各一升 牛髓

大麻仁各二升 熬如脂

右十味先搗五種乾藥為末下棗膏麻仁又搗粗

濡為一家下二髓并酥內銅鉢中重湯煎取好為

丸如梧子大酒服三十九日二服稍加至四十九

術補髓而用羌活之走督脈桂心之溫髓臟芎藭之

逐腦風當歸之潤血脈麻仁之滋津液乳酥牛羊

髓之透骨髓參朮之溫脾氣脾氣溫而髓腑完固

腦病自安然必其人素稟虛寒精血不充頭腦為

風火往來之熱徑故立此方設無腦病不安專補

髓虛又當從事入味腎氣等治矣

柴胡發泄湯 治體實勇悍驚熱主熱方

柴胡 升麻 黃芩

細辛 枳實 梔子仁

芒硝各三 淡竹葉 生地黃各一

澤瀉四兩 千金方衍義卷十一 九 補藥山房

右十味咬咀以水九升煮取三升去滓下硝分三

服

術髓臟有虛無實有補無瀉而此專用發泄以折強

暴之威升麻柴胡發之於上枳實芒硝泄之於下

黃芩梔子佐升柴為開發之上使竹葉澤瀉佐枳

硝為分泄之下使獨取地黃保護真陰以制亢陽

細辛引入中精以通竅泄然必其所稟偏陽壯

火食氣勇悍過甚或執遺精痲疾茫不寧故勒是

方設腎氣本強當無驚熱之患即使水虧火旺又

當從事六味都氣等治矣

風虛雜補酒煎第五方十九首

巴戟天酒 治虛羸陽道不舉五勞七傷百病能

食下氣方

巴戟天 牛膝各三 枸杞根白皮

麥門冬 地黃 防風各二

右六味並生用卒無生者用乾者亦得咬咀以酒

一石四斗浸七日去滓溫服常令酒氣相續勿至

醉吐慎生冷猪魚油蒜春七日秋冬二七日夏勿

服先患冷者加乾薑桂心各一斤好忘加遠志一

斤大虛勞加五味子菴蓉各一斤陰下濕加五加

根皮一斤有石斛加一斤佳每加藥一斤即加酒

七升此酒每年九月中旬即合八十月上旬即服

設服餘藥以此酒下之大妙滓曝乾搗為末以此

酒服方寸七日三益生常加甘艸十兩佳虛勞加

黃芪一斤

又方

巴戟天 生牛膝各三

右二味咬咀以酒五斗淹浸服如前法

五加酒 治虛勞不足方

五加皮

枸杞根白皮各一斗

右二味咬咀以水一石五斗煮取汁七分取四

斗浸麴一斗餘三斗用拌飯下米多少如常釀法

熟壓取服之多少任性禁如藥法倍日將息

衍上方雜補風虛不獨主陽事委頓也方中巴戟天

益精壯陽牛膝強筋通髓枸杞根退邪火堅筋骨

麥門冬補脈虛滋津氣生地黃治陰虛相火熾盛

防風理脾衰內濕招風漬酒本無定方不妨隨証

增減又方巴戟天生牛膝單取二味釀酒惟精

氣固密者宜之極勞傷肝五加皮酒專主勞傷

千金要方卷之三

主 補藥山房

不足故凡勞傷六極舉列於左

天門冬大煎治男子五勞七傷八風十二痺傷

中六極一氣極則多寒痺腹痛喘息驚恐頭

痛二肺極則寒痺腰痛心下堅有積聚小便

不利手足不仁三脈極則顏色苦青逆意喜

恍惚失氣狀似悲泣之後苦舌強咽喉乾寒熱

惡風不可動不嗜食苦眩喜妄言四筋極則

拘攣小腹脹心痛膝寒冷四肢骨節皆疼痛

五骨極則肢節厥逆黃疸消渴癰疽妄發重病

浮腫如水瘧狀六肉極則發狂如得擊不復

言甚者至死復生眾醫所不能治此皆六極七

傷所致非獨房室之謂也憂毒積思喜怒悲歡

復隨風濕結氣咳時嘔吐食已變大小便不利

時泄利重下溺血上氣吐下寒乍熱臥不安

席小便赤黃時時惡夢與死人其飲食入螺

神室魂飛魄散筋極則傷肝傷肝則腰背相引

難可俯仰氣極則傷肺傷肺則小便有血目不

明髓極則陰痿不起住而不交骨極則傷腎傷

腎則短氣不可久立陰疼惡寒甚者卵縮陰下

生瘡濕癢搔不欲住汗出此皆為腎病甚者

千金要方卷之三

主 補藥山房

多遭風毒四肢頑痺手足浮腫名曰脚弱一名

脚氣醫所不治悉主之方

天門冬各切三斗十生地黃各切三斗十

白蜜三升酥三升枸杞根切三斗

水一石五斗煮取一斗三升澄清取麴一具搗碎以水一石

右六味並大斗銅器中微火先煎門冬地黃減半

乃合煎取大斗二斗下後件散藥煎取一斗內銅

器重釜煎令隱掌可丸如梧子大平旦空腹酒服

二十九日二加至五十九日慎生冷醋涓猪鷄魚葷

油麵等須擇四時王相日修合其和一如第一卷和合篇說 散藥如左

茯苓 桂心 白朮

萎蕤 五加皮 菖蒲

遠志 澤瀉 薯蕷

柏子仁 人參 石斛

牛膝 杜仲 覆盆子

細辛 獨活 枳實

芎藭 大豆黃卷 黃芪

肉蓯蓉 續斷 狗脊

胡麻子 葶薺 白芷

橘皮 茯神 巴戟天

石南 各二 阿膠 十兩 甘艸 六兩

蜀椒 薤苳仁 各一 大棗 煮作膏

鹿角膠 五兩 蔓荊子 三兩

右三十八味治下 篩內前中有牛髓鹿髓各加三

升大佳小便澀去 柏子仁加秦芫二兩乾地黃六

兩陰痿失精去萎 麋加五味子二兩頭風去柏子

仁加菊花防風各二兩小便利陰氣弱去細辛加

山茱萸二兩腹中冷加乾薑二兩無他疾依方修

千金方 雜錄卷上 掃葉山房

合凡此煎九月下旬採藥立冬日合服至五月上旬止若十二月臘日合者經夏至七月下旬止若停雷經夏不壞當於舍北陰處入地深六尺填沙置藥中上加沙覆之則經夏不損也女人先患熱者得眠患冷者勿服

衍方中葉聚補肺氣散寒痺通血脈堅筋骨益精體充肌肉諸品可謂詳矣方後更添加減諸法雖諸虛頑痺手足浮腫風毒脚氣咸可取服要非專療之方其後女人患冷者勿服詳後散中雖多溫煖之品不敵先煎天冬生地之大劑甘寒且埋陰處日久恐礙生盲故也

千金方 雜錄卷上 掃葉山房

填骨萬金煎 治 內勞少氣寒疝裏急腹中喘逆 腰脊痛方

生地 三十斤 肉蓯蓉 甘艸

阿膠 各一 麥門冬 乾地黃 各二

乾薑 桑白皮 茯苓

桂心 各半 人參 桔梗

五味子 附子 各五 石斛 一斤

牛髓 一斤 白蜜 十斤 清酒 四斗

麻子仁 三升 大棗 一百五 當歸 十兩

乾漆二十兩 蜀椒四兩

右二十三味先以清酒二斗六升內桑根白皮麻

子仁棗膠為刻識之又加酒一斗四升煮取至刻

絞去滓內蜜釀地黃汁湯上銅器煎內諸藥末半

日許令可丸止大囊盛飲吞如那丸一枚日三若

夏月暑熱煮煎轉味可以蜜與地黃汁和諸藥成

丸如梧子服十五丸不知稍加至三十九

命前命天門冬大煎雖統治勞傷六極究其所主腎病

居多此方專主填補骨髓而於人煎方中採取溫

補藥味參入椒附之辛烈故可兼治寒疝裏急等

疾
千金方卷五
五
楊葉山房

疾

又方 治男子風虛勞損兼肺氣方

甘艸一斤 石斛 陽風

菴蓉 山茱萸 茯苓

人參 薯蕷各四兩 桂心

牛膝 五味子 兔絲子

巴戟天 芎藭各三兩 生地骨皮

生地黃汁各一升 丹參二兩 生麥門冬汁

牛髓 白蜜各三升 生薑汁

胡麻以水二斗煮取四升

右二十二味先煮地黃地骨皮胡麻汁泥半內牛

髓蜜薑門冬等汁燉火煎餘八升下諸藥散和令

調內銅器中湯上煎令可丸如梧子大酒服三十

九日二加至五十九

命此治男子風勞虛損雖用防風入於參苓冬地菴

蓉五味丸劑中僅可疎通藥性法無散邪之方也

小虎骨煎一具 治一切虛羸皆服之方

鹿骨一具 枸杞根切二升

右二味各以水一斗別器各煎汁五升去滓澄清

乃合一器同煎取五升日二服盡好將慎皆用大

千金方卷五
五
楊葉山房

斗

地黃小煎 治五勞七傷羸瘦乾削方

乾地黃末一升 胡麻油半斤 蜜二升

豬脂一斤

右四味鈎器中煎令可丸如梧子大飲服三九日

二稍加至十九久久常服大有益瘦黑者肥充

陸抗膏 治虛冷枯瘦身無精光虛損諸不足方

牛髓 羊脂各二升 酥經心錄

生薑汁 白蜜各三升

右五味先煎酥令熟次內薑汁次內蜜次內羊脂

牛髓後微火煎三上三下合薑汁水氣成膏

攪合凝止溫酒服隨人能否不限多少令人肥健

發熱也經心錄云治百病勞損風濕補益神効男女通可服之良

枸杞煎 補虛羸久服輕身不老神驗方

九月十日取生濕枸杞子一升清酒六升煮五

六沸出取熟研濾取汁令其子極淨曝令乾搗

末和前汁微火煎令可丸酒服二方寸七日二

加至三七亦可丸服三十九

夏姬杏仁煎方太上用後玉經方名杏仁丹

杏仁三升內湯中去皮尖雙仁熟搗盆中水研

千金方卷三十一 補藥山房

取七八升汁以鐵釜置塘火上取羊脂四斤就

釜內磨消內杏仁汁溫之四五日色如金狀餌

如彈子日三服百日肥白容易人不能識也

又方

杏仁去皮尖熬黃搗服如梧子日三治枯瘦令

人潤澤無所禁 咳逆上氣喉中百病心下煩

不得咽物者得茯苓欬冬紫苑并力大良 其

藥生熱熱冷喉中如有息肉者亦服之

桃仁煎方

桃仁 蜜各一

酥各一斤

胡麻三升 牛乳五升 地黃十斤

右六味合煎如餠旋服之

治五勞七傷方

白羊頭蹄一具淨治以草火燒令黃赤以淨稀急寒昇及腦凡

胡椒 乾薑各兩

葱白一升 豉二升

右七味先以水煮頭及蹄半熟即內藥煮令極爛

去藥冷煖任性食之日一具七口凡七具忌生冷

酢滑五陳

治虛勞補方

千金方卷三十一 補藥山房

羊肚一具 白木一升

右二味以水二斗煮取六升每服二升日三為度

又方

豉一升蒸 薤白一斤

右二味以水七升煮取三升分三服小取汗

膏煎 治虛羸瘦方

不中水豬肪煎取一升內葱白一握煎令黃出

內盆中平旦空腹服訖煖覆臥至脯時食白粥

粥不得稀過三日服補藥方如左

羊肚一具 羊脊管肉未半斤

枸杞根一斤

右四味以水三斗煮枸杞取一斗去滓細切肚等
內汁中煮著葱豉鹽如羹法合煎看如稠糖即好
食之七日禁如前法

補虛方

猪肚一具

人參五兩

蜀椒

乾薑各二兩

葱白七兩

白梁米半升
用煨米

右六味咬咀諸藥合相得和米內肚中縫合勿令
泄氣取水四斗半緩火煮爛空腹食之大佳兼下
少飯

千金方卷三

五

補虛山房

天衍 小兒骨煎助陽壯骨 地黃小煎滋陰潤燥 陸

抗膏充髓補虛 枸杞煎搜風逐濕 夏姬杏仁

煎溫脂豐肉 合桃仁煎等藥兼調血氣 白羊

頭蹄和椒薑葱或溫養百骸 羊肚白朮專培脾

氣 香豉薤白開泄痺著 膏煎補益虛羸 補

方專補脾胃陽氣藉葱白以通少陽生發之氣

吐血第六論二首 方二十九首

論曰稟正云吐血有三種有內胸有肺沮有傷胃內

衄者出血如鼻衄但不從鼻孔出是近從心肺關津

液出遂流入胃中或如豆豉汁或如切蟠血凝鬱胃

中以即滿悶便吐或去數升至三斗者是也得之於

勞倦飲食過常所為也肺沮者或飲酒之後毒滿悶

吐之時血從吐後出或一合半升是也傷胃者因飲

食大飽之後胃中冷則不能消化不能消化便煩悶

強嘔吐使所食之物與氣其上衝感因傷裂胃口吐

血色鮮正赤腹絞痛自汗出其脈緊而數者為難治

也問曰病胸脇支滿妨於食病至則先聞腥臊臭出

清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名為何何

以得之對曰病名血枯此得之年少時有所大奪血

若醉入房中氣竭而肝傷故使月事衰少不來也治

千金方卷三

辛

補虛山房

以烏鰂骨茵茹二味并合丸以雀卵大如小豆以五

九為後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也凡吐血後

體中但自恹恹然心中不悶者輒自愈假令煩躁心

中悶亂紛紛嘔吐顛倒不安醫工又與黃土湯阿膠

滋益加悶亂卒致不濟如此問者當急吐之方

瓜蒂二分

杜衡

人參各一分

右三味治下篩服一錢七或無水漿但得下即可

說人小減之吐去青黃或吐血一二升無苦

衄吐血雖有三種之分而委積鬱發則一內衄得之

勞倦所傷血從心肺流入於胃肺沮得之飲酒過

劇血從吐 出傷胃得之飲食過飽衝激損裂雖病
關肺胃總由肝傷不能藏血膽氣逆滿而上是以
列之膽腑更有房勞氣竭肝傷內有乾血而吐後
煩躁悶亂嘔吐不安者必然所吐未盡急當以杜
衝開結導滯人參助胃祛邪鼓舞瓜蒂上涌之力
然後用黃土湯阿膠散柏葉湯四烏鯁一藷茹丸
等方方合病情始無妨

黃土湯 治吐血方

伏龍肝

雞子大 桂心

乾薑

當歸

芍藥

白朮

千金方卷三十

主

傷寒山房

甘艸

八兩

阿膠

芎藭

吳茱萸

半升

生地黄

八兩

細辛 半兩

吳茱萸

半升

右十二味咬咀以酒七升水三升合煮取三升半

去滓內膠煮取三升分三服亦治衄血

又方 治卒吐血及衄血方

伏龍肝

八兩

甘艸

乾薑

仲景作

兩子

白朮

阿膠

黃芩

各三兩

右六味咬咀以水一斗煮取三升去滓下膠分三

服

衍按金匱黃土湯治先便後血此必傳寫之誤以陽

衰不能統陰故血先便而下經云陰絡傷則血內

溢因陰絡傷則營血不能循經而轉少陽之樞乃

下走二腸故宜黃土附子以溫水土二臟也千金

取治內衄於本方中除去附子黃芩參入薤桂黃

辛佐伏龍肝以散結芎藭芍藥佐膠地以和營以

無附子之雄烈且有地黃之滋血故無藉於黃芩

也又方除去附子地黃加入乾薑以溫中散結仍

佐黃芩以散少陽之風熱也 金匱黃土湯惟附

子一味難於藥投所以千金改用乾薑相配地黃

深得陰陽兼濟之妙必集方時偶失此味決非故

為裁去也設見血色晦淡則為陽不統陰附子又

為必需

生地黄湯 治憂恚嘔血煩滿少氣胸中痛方

生地黄

一斤

大棗五十

阿膠

甘艸

右四味咬咀以水一斗煮取四升分四服日三夜

衍方下雖治憂恚嘔血而實肺汨吐血之的方酒氣

逆滿則肝浮膽橫每致動肝悖亂生地黄治傷中

血痺阿膠主心腹內崩甘艸和臟腑寒熱大棗子

胃氣中藉此以統地黃歸就丹田以養少陽生發之氣也

堅中湯 治虛勞內傷寒熱嘔逆吐血方

糖三斤 芍藥 半夏

生薑 甘草各三兩 桂心二兩

大棗五十枚

右七味咬咀以水二斗煮取七升分七服日五夜

堅中者中氣為飲食所傷痰血搏聚於胃改用小

千金衍義卷十二 經葉山房

淨而膽腑攸寧矣

治噫止唾血方

石膏四兩 厚朴三兩 麻黃

生薑 五味子 半夏

杏仁各二兩 小麥一升

右八味咬咀以水一斗煮麻黃去沫澄取七升內

藥煮取二升半分再服

義衍 虛氣上逆所以噫氣不除今噫止唾血必是肝膽

之氣鬱發而反動血故用厚朴麻黃杏仁開發肺

氣於上生薑半夏請理痰氣於中更以石膏疎泄

胃熱五味收斂虛逆小麥補益肝氣不獨滋麻朴之散兼斂虛氣之逆陰隨陽運不須東用血藥也

治吐血胸中塞痛方 芍藥 乾薑 茯苓

桂心 當歸 大黃

芫硝各三兩 阿膠 甘州

人參各二兩 麻黃一兩 乾地黃四兩

蟲蟲 水蛭各八枚 大棗二十枚

桃仁一百枚

右十六味咬咀以水一斗七升者取四升分五服

千金衍義卷十二 經葉山房

日三夜二

義衍 胸中陽位非陰邪留結之處但塞痛又非無形氣

病詢為血隨氣奔而雷薄於上故用麻黃芫硝黃開

泄上下薑桂蟲蛙散堅致積麥甘棗膠歸芍地

桃仁平調氣血以助破血之力也

柏葉湯 治吐血內崩上氣面色如土方

乾薑 阿膠 柏葉各二兩

艾一把

右四味咬咀以水五升煮取一升內馬通汁一升

煮取一升頓服仲景不用阿膠小品

衍義陰邪留積於陽位所以胸滿吐血千金乃祖金匱

柏葉湯取柏葉以清肝火乾薑以開胸滿艾葉以

散陰結馬通以逐瘀滯更加阿膠以治內崩寒熱

兼濟補瀉兼施之妙無逾於此

治吐血酒客温疫中熱毒乾嘔心煩方

蒲黃

犀角

栝蔞根

甘艸各三兩

葛根

桑寄生各二兩

右六味咬咀以水七升煮取三升分三服

衍義犀角蒲黃治吐血毒熱栝蔞甘艸主乾嘔心煩葛

根桑寄生為酒客失血之專藥即感温疫毒邪亦

千金方衍義卷三

栝蔞山房

不出此但寄生者絕不易得昔人以蘆根汁代

用亦頗有效

澤蘭湯 治傷中裏急胸脇墜痛欲嘔血時寒時

熱小便赤黃此皆傷於房勞故也

澤蘭

糖各一兩

桂心

桑根白皮

人參各二兩

遠志一兩

生薑五兩

麻仁一升

右八味咬咀以醇酒一斗五升煮取七升去滓內

糖食前服一升日三夜一勿勞動

衍義房勞氣竭肝傷非壯其中氣雖破血而血不除清

火而火不散故用人參膠飴以滋澤蘭桂心之清
血桑皮麻仁以滋遠志生薑之利竅尤妙在酒煮
以通血脈濡滯也

治忽吐血一二口或是心衄或是內崩方

蟾蜍五枚

牛膝生

玉不留行

牡丹

麥門冬各二兩

草薢

芍藥

乾地黄各四兩

續斷

阿膠各三兩

右十味咬咀以生地黄汁五升赤馬通汁三升煮

取三升分三服不瘥更合數劑取瘥止

千金方衍義卷三

栝蔞山房

又方

熟艾三雞子許水五升煮取二升頓服

又方

燒亂髮灰水服方寸七日三服集驗云治舌上

者亦治小便出血者

治虛勞吐血方

生地黄肥者五升搗以酒一升煮沸三上三下

去滓頓服

又方

凡吐血服桂心末方寸七日夜可二十服服後亦

血療下

又方

生地黃五斤絞取汁微火煎三沸投白蜜一升
又煎取三升每服半升日三主胸痛百病久服

佳

又方

柏葉一斤以水六升煮取三升分三服

又方

生地黃汁半升 川大黃末寸七

右二味先溫地黃汁一沸次內大黃攪和空腹頓

千金方衍義卷三

三

編案山房

服日三瘥

衍

吐血起於倏忽且勢緊急必是肝傷不能藏血乘

風木之邪而上湧故用草薢入肝搜風續斷入肝

通血引領蟾蠩牛膝王不留行力行迅掃免致閉

舍血室而為固疾地黃阿膠牡丹芍藥養正和營

麥門冬下通腎氣上達肺津滋而不壅寒而不滯

以本經原有治心腹結氣之功也 又方熟艾散

陰凝之血 髮灰逐竅遂之瘵 生地黃涼潤止

血酒以行之可無凝滯之患 桂心為散不經酒

煎可無動血之虞 生地黃投蜜同煎治胸痛諸

病必得鮮者方可絞汁若乾地黃須酒漬搗絳方

能行血 柏葉寒而不凝辛而能散不妨少佐生

艾欵合金匱成法 生地黃汁得大黃末導之下

行少佐乾薑尤得千金妙用

犀角地黃湯 治傷寒及溫病應發汗而不汗之

內畜血及鼻衄吐血不盡內餘瘀血大便黑面

黃消瘀血方

犀角一兩 生地黃八兩 芍藥三兩

牡丹皮二兩

右四味咬咀以水九升煮取三升分三服喜忘如

千金方衍義卷三

三

編案山房

狂者加大黃二兩黃芩三兩其人脈大來遲腹不

滿自言滿者為無熱但依方不須有所增加

血得辛溫則散得苦寒則凝此方另開寒冷散血

之門特創清熱解毒之法全在犀角通利陽明以

解地黃之滯猶賴赤芍牡丹下氣散血允為犀角

地黃之良佐裏實則加大黃表熱則加黃芩脈遲

腹不滿自言滿者為無熱但依本方不應則加桂

心此千金不言之祕不覺為之發露

治五臟熱結吐血衄血方

伏龍肝雞子大 生竹茹一升 芍藥

當歸 黃芩 芍藥

甘艸各二兩 生地黃一斤

右八味咬咀以水一斗三升先煮竹茹減三升下

藥取二升分三服翼方有桂心

衍義 芎藭芍地散中寓散更須伏龍肝溫中固本黃芩

竹茹清中散標甘艸和寒熱之性也

當歸湯 治衄血吐血方

當歸 乾薑 芍藥

阿膠各二兩 黃芩三兩

右五味咬咀以水六升煮取二升分三服

千金方衍義卷主 芍藥山房

衍義 阿膠主心腹內崩歸芍歸諸經之血乾薑黃芩以

和標本之寒熱也

治上焦熱膈傷吐血衄血或下血連日不止欲死

並主之方

艾葉 竹茹 阿膠如手

乾薑二兩

右四味咬咀以水三升煮取一升去滓內馬通汁

半升煮取一升頓服 一方不用竹茹加乾薑作

七兩

又方

取新馬尿與少水和絞取汁服

衍義 吐衄日久亡脫已多非薑艾阿膠溫補之劑不能

助馬通搜逐之功竹茹一味專散膈上浮熱也

血虛發熱而脈脫無陽不但竹茹禁用必加乾薑

方得固脫之力血熱不勝搜散者單取馬通主之

以其能解血中之毒也

治虛勞崩中吐血下血上氣短氣欲絕面黑如漆

方

黃芪 芍藥 芎藭

甘艸各四兩 生薑一斤

千金方衍義卷主 芍藥山房

右五味咬咀以酒五升浸一宿明旦更以水五升

煮取四升分四服日三夜一下陰中毒如湯沃雪

凡夏月不得宿浸藥酒客勞熱發痔下血其穀道

熱者去生薑用生地黃代之凡進三兩劑

衍義 虛勞夫血而致上氣欲絕亡脫已多雖面黑如漆

必枯癯色天非浮腫淤晦之比故宜黃芪補虛芎

歸和血甘草生薑調和血氣也而生薑痔家無忌

以其辛溫浮長也

竹茹湯 治吐血衄血大小便下血方

竹茹二斤 甘艸 芎藭

黃芩

當歸各六

芍藥

白朮

人參

桂心各一

右九味咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜

竹茹黃芩上清虛熱桂心下導虛陽芍藥引

血歸經參朮甘艸資氣於胃上下失血無不宜之

治九孔出血方

搗荆葉汁

酒服二合一本作荆芥

風火之邪仍從竅遂而去也

風火之邪仍從竅遂而去也

千金方卷十二

三

掃葉山房

治吐血蟲毒痔血女子腰腹痛大便後出清血者

方

取東向蕪荷根搗絞取汁二升頓服立瘥

蕪荷辛散不獨殺蟲并可以去血中之滯

赤小豆散

諸下血先見血後見便為遠血宜服

黃土湯

見本門七仲景方是

先見便後見血此近血宜

服赤小豆散方

赤小豆

升熬當歸三兩

右二味治下篩每服方寸七日三

先便後血從小腸而溢大腸為丙火淫金之象

故用赤小豆之清熱利水金匱治畜血狐惑之毒

故浸令芽出千金治便後下血故熬令拆佐以當

歸司統握之樞則血有所歸而不致於散漫也

乾地黃丸治吐血虛勞胸腹煩滿疼痛瘀血往

來臟虛不受穀氣逆不得食補中理血方

乾地黃三兩

當歸

乾薑

麥門冬

甘艸

黃芩各二兩

厚朴

乾漆

枳實

防風

大黃

細辛

白朮各一兩

茯苓各一兩

前胡各六分

人參五分

蠶蟲

麤蟲各五枚

右十八味為末蜜丸如梧子大先食服十九日二

稍加

方下補中理血四字則方中諸藥可不言而喻蜜

丸日進三服深得峻藥緩攻之妙

麥門冬湯治凡下血虛極方

麥門冬

白朮各四兩

甘艸一兩

牡蠣

芍藥

阿膠各三兩

大棗二十枚

右七味咬咀以水八升煮取二升分再服

下血虛極不用參芪而用牡蠣以固下焦之虛脫

并用白朮以培中氣之內陷膠芍養血門冬滋津

甘艸大棗白朮之匡佐耳

鍼灸法

胸中瘀血積滿脇膈痛不能久立膝痠寒三里主之

嘔血肩膈痛口乾心痛與背相引不可咳引腎痛

不容主之

心膈下嘔血上管主之

吐血振寒眩乾大淵主之

嘔血太陵及郄門主之

千金衍義卷上

三

掃葉山房

嘔血上氣神門主之

內傷唾血不足外無膏澤刺地五會

虛勞吐血灸胃管三百壯亦主勞嘔逆吐血少食多

飽多唾百病多唾一作多睡

吐血唾血灸胸堂百壯不可鍼

吐血酸劑灸肝膈百壯

吐血腹痛雷鳴灸天福百壯

吐血唾血上氣咳逆灸肺膈隨年壯

吐血嘔逆灸手心主五十壯千金翼云太陵是

凡口鼻出血不止名腦衄灸上星五十壯八髮際一

寸是

大便下血灸第二十椎隨年壯

萬病丸散第七方論二首方十三首

論曰聖人之道以慈濟物博求眾藥以備不虞倉卒之際應手皆得故有萬病方焉余以此方散在羣典乃令學者難用討尋遂鳩撮要妙以為斯品庶使造次可得好事君子安不忘危無事之暇可預和合以備病瘵也

荒花散 治一切風冷痰飲癢癢瘡瘻萬醫所不治者皆治之一名登仙酒一名三建藥方名大辨風散

荒花 桔梗 紫苑

大戟 王不留行 烏頭

附子 天雄 白朮

五加皮 羌花 狼毒

莽艸俗名魚藥又名風藥 藥劑 栝實根

躑躅 麻黃 白芷

荆芥 茵芋各十兩 車前子

石斛 人參 石南

石長生各七 蛇蛻子 葶藶

牛膝 狗脊 菟絲子

千金衍義卷上

三

掃葉山房

菴蓉

秦九各五

藜蘆

薯蕷

薏苡仁

巴戟天

細辛

當歸

芎藭

乾地黄

食茱萸

杜仲

厚朴

黃芪

山茱萸

乾薑

芍藥

桂心

黃芩

吳茱萸

防己

遠志

蜀椒

獨活

五味子

牡丹

橘皮

通草

柴胡

柏子仁

萹本

菖蒲

茯苓

續斷

各二

各二

右六十四味

翼方無山米食茶黃有麻花
半夏赤車使省高頂薑紫麻

並不治

不擇不炙不熬但振去塵土搗以細羅下之即與

服凡是猪雞五辛生冷酢滑任意食之無所忌惟

諸豆皆殺藥不得食

藥散

二兩

細麩末二升 糯米三升

真酒

五升

先以三大斗水煮米作粥須極熟冬月揚去火氣

春月稍涼夏月場絕火氣令極冷秋稍温次下麩

末搗使和柔相得重下藥末搗使突突然好熟乃

下真酒重搗使散盛不津器中以淨杖攪散經宿

即飲直以布蓋不須密封凡服藥平旦空心服之

以知爲度微覺發動流入四肢頭面習習然爲定

勿更加之如法服之常常內消非理加增必大吐

利服散者細下篩服一方寸匕和水酒漿飲無知

稍增以知爲度服丸者細下篩蜜丸如梧子每服

七丸但此藥或丸或散皆可惟不得作湯若欲得

補不合吐瀉但取內消大益勝於五石兼治諸病

功效一等然作酒服佳於丸散美而易服流行迅

疾若有患人抱病多時積瘕宿食大塊久氣瘕瘕

積聚一切瘕結者即須一兩度增加令吐下泄去

惡物盡後少服內消便爲補益凡服藥慎勿早食

早食觸藥必當大吐亦無損須臾還定但令人

咽喉痛三兩日後始瘳服者宜知之平旦服藥至

午時待藥勢定宜先食冷飯蔬飲冷漿水及午後

藥勢一定任意熟食無忌若藥勢未定不得強起

行行即運悶旋倒眼花暗然迷絕此是逐風所致

不須疑怪風盡之後縱令多服更佳不然悶時但

坐但臥須臾醒然不異於常若定多任意所之若

千金方衍義卷上

三

攝藥山房

千金方衍義卷上

三

攝藥山房

必便旋營策杖如廁少覺悶亂即須坐定坐定即醒醒乃可行病在膈上久冷痰陰積聚癥結疝瘕宿食壅塊咳逆上氣等一切痼結重病終日吐唾逆氣上衝胸喉此皆胃口積冷所致三焦腸間宿冷以成諸疾如此例便當吐却此等惡物輕者一度下轉藥令吐却若重者三五度下之令盡其吐痰法初吐冷氣沫次吐酢水須與吐黃汁濃甚者若似牛涎病若更多者當吐出紫痰似紫蚶汁非常齒斷有此者例入死道不久定死若有疰者吐血陳久黑血新者鮮血吐罷永瘥不發下此吐藥

千金方衍義卷十三
 掃葉山房

當吐時大悶須與自定即不虛發得冷飲食已耳不虛驚手足不痺若胃口有前件等病勢久成者正當吐時有一塊物塞胸喉吐復不出咽復下人當有異種大悶更加一二合藥酒重投藥下少時即當吐出塊物如拳大臭似蝦雞子中黃著地以刀斫碎重者十餘塊輕者三五枚凡人有上件等病若服藥時不吐却者當時雖得漸損一二年後還發為此故須下吐藥欲服取吐者當以春二月服之春宜吐故也凡膈上冷小腹滿腸鳴膀胱有氣冷利多者須加利藥於此酒內服之便去惡物

利法出泄澀如清水如黃汁如青泥輕者一兩度下利藥得利以盡病源重者五度下利藥令頻數得大利以盡病根利法旦起服藥比至晡時可得兩三行即斷後服凡長病人瘦弱虛損者又貴人此等人但令少服積日漸漸加增令多內消瘥除久病不加吐利也藥若傷多吐利困極不止者水服生大豆末方寸匕即定及藍菜烏豆葉嚼以咽之登時即定此據大因時用之小小時不須也凡在世人有虛損陽衰消瘦骨立者服之非常補益旬月之間肌膚充悅顏色光澤髓溢精滿與少壯

千金方衍義卷十三
 掃葉山房

一等凡衆疴萬病皆除之治一切風病癱節風二兩和酒五斗賊風熱風大風上同偏風癩癧風癰緩風十二兩和酒三斗此七種並帶熱須加冷藥押使常數便利賊風掣癱八兩和酒二斗濕風周痺上同腰攣痛十二兩和酒三斗筋節攣急八兩和酒二斗重病後汗不流初覺三服一服三蓋年久服一升食熟食如錐刀刺者八兩和酒二斗口喎面戾一限不合者初得四兩和酒一斗年久十二兩和酒三斗頭面風以蟲行又似毛髮在面上者八兩和酒二斗起即頭旋良久始定者四兩

和酒一斗心悶嘔逆項強者風在心藏欲風欲兩
 便即先發者八兩和酒二斗因瘡得風口強脊麻
 急者五服即定一服一盞治一切冷病積冷瘧瘦
 者四兩和酒一斗強者六兩和酒一斗半痰飲疝
 瘕上同宿食嘔吐四兩和酒一斗瘕瘕腸鳴噫入
 兩和酒二斗久疰及久勞上同癩痔塊堅冷嗽上
 氣二十兩和酒五斗奔弛冷氣六兩和酒一斗半
 噎及冷痢上同卒中惡注忤心腹脹氣急欲死者
 三服定一服一盞大吐出鮮血瘴氣上同蠱毒五
 服定一服一盞溫瘧瘡瘧並上同可三服一盞永
 瘳治婦人諸風諸病等並依前件帶下十二兩和
 酒三斗崩中六兩和酒一斗半月閉不通及冷病
 不產並上同斷緒不產八兩和酒二斗月水前後
 不調乍多乍少亦令人絕產四兩和酒一斗產後
 風冷不產六兩和酒二斗若重者八兩和酒二斗
 甚者十二兩和酒三斗大重者子宮下垂十六兩
 和酒四斗

千金方衍義卷三

五

掃葉山房

論曰遠覽前古莫覩此方有高人李孝隆者自云隋
 初受之於定州山僧惠通道人此後用之大有效驗
 祕而不傳但得其藥其方不可得而聞始吾得之於

靜智道人將三紀於茲矣時俗名醫未之許也然比
 行之極有神驗其用藥殊不倫次將服節度大不近
 人情至於救急其驗特異方知神物效靈不拘常制
 至理關感智不能知亦猶龍吟雲起虎嘯風生此其
 不知所以然而然雖聖人莫之辨也故述之篇末以
 貽後嗣好學君子詳之非止救物兼深抑亦庶幾於
 博見也已

崇古立方有一方專主一病者有一方兼主數病

者此方統主萬病而千金錄之膽腑門者以所主
 諸證風木受病居多所用諸藥祛垢滌痰最猛膽

千金方衍義卷三

單

掃葉山房

為清淨之腑平時委積固疾得此一旦豁然他如
 玉壺備急太乙神精紫葛等方同列膽腑無非迅
 掃陳積復歸清淨之意而此首主癘風方中烏頭
 附子天雄破散堅積乾薑細辛蜀椒蛇牀吳黃食
 莢開通濕痺麻黃藥荆躑躅狼毒莽艸茵芋石南
 石長生搜逐癘風芫花蕘花藜蘆大戟防己王不
 留行攻利毒水狗脊草薺續斷秦艸石斛五加柏
 仁薏苡堅強筋骨獨活藁本白芷荆芥柴胡黃芩
 菖蒲桔梗栝蒞根解散風熱桂心牡丹當歸芍藥
 芎藭地黃牛膝紫苑流行血脈巴戟遠志菴菖菴

絲薯積山黃杜仲五味滋培腎精白木厚朴橘皮
 茯苓車前通艸健運脾氣人參黃芪鼓舞諸味其
 烏附天雄椒黃薑桂之類過烈則以芎歸芍地等
 味滋之躑躅狼毒茵芋莽艸之類過劣則以黃芩
 桔梗石斛柏子仁等味化之芫花蕘花大戟防己
 之類過利則以白木茯苓薯蕷薏苡等味濡之麻
 黃獨活之類過散則以黃芪五味等味收之蛇床
 石南巴戟從蓉之類過補則以車前通艸等味泄
 之諸藥之性味雜陳非藉藜蘆細辛芍藥不能激
 發人參使之克應孰謂相反不宜並用哉若以人
 參爲補益之用殊非立方之意矣但方中茵芋藥
 荆蕘花石長生等味近世罕得信夫全璧之難求
 也華元化雲母九子三人九方後有云吾嘗服一
 二劑大得力家貧不濟乃止又時無藥足闕十五
 味仍得服之可知大劑方中又能拘執其全也觀
 翼方方後有加減法二十九條非若萬病九之一
 定不可損益也方以芫花立名性專利水通疝能
 殺癘風蠱毒方中風藥最多故翼方名大排風散
 方中烏附天雄並用故名三建散以之釀酒能主
 癘風言得惡疾卽當棄家修道往往疾愈成仙故

千金方衍義卷上

聖

掃藥山房

又名登仙酒云

耆婆萬病圓 治七種痞塊五種癩病十種桂忤

七種飛尸十二種蠱毒五種黃病十二種瘧疾

十種水病八種大風十二種瘰癧并風入頭眼

暗漠漠及上氣咳嗽喉中如水雞聲不得眠臥

飲食不作肌膚五臟滯氣積聚不消塞閉不通

心腹脹滿及連胸背鼓氣堅結流入四肢或復

又心膈氣滿時定時發十年二十年不瘥五種

下痢疳蟲寸白諸蟲上下冷熱久積痰飲令人

多睡消瘦無力蔭入骨髓便成滯患身體氣腫

飲食嘔逆腰脚酸疼四肢沉重行立不能久婦

人因產冷入子藏藏中不淨或閉塞不通胞中

瘀血冷滯出流不盡時時疼痛爲患或因此斷

產并小兒赤白下痢及狐臭耳聾鼻塞等病此

藥以三九萬一劑服藥不過三劑萬病悉除說

無窮盡故稱爲病丸

牛黃 麝香 犀角

桑白皮 茯苓 乾薑

桂心 當歸 芎藭

芍藥 甘遂 黃芩

千金方衍義卷上

聖

掃藥山房

蜀椒

細辛

桔梗

巴豆

前胡

紫苑

蒹藜

葶藶

防風

人參

硃砂

雄黃

黃連

大戟

禹餘糧

芫花

蜈蚣

石蜥蜴

芫青

蝮蛇

右三十一味

崔氏無黃芩桑白皮若梗防風為二十七味

並合精細牛

黃麝香犀角硃砂雄黃禹餘糧巴豆別研餘者合

擣重絹下篩以白蜜和更搗三千杵密封下破除

日平旦空腹酒服三九如梧子大取微下三升惡

水為良若卒暴病不拘平旦早晚皆可服但以吐

利為度若不吐利更加一九或至三九五九須吐

利為度不得限以九數病強藥少即不吐利更非

他故若其發遲以熱飲汁投之若吐利不止即以

酢飯兩三口止之服藥忌陳臭生冷酢滑粘食大

蒜豬雞魚狗牛馬驢肉白酒行房七日外始得一

日服二日補之得食新米韭根汁作羹粥臛飲食

之三四頓大良亦不得全飽產婦勿服吐利後以

常須閉口少語於無風處温床暖室將息若旅行

卒暴無飲以小便送之為佳若一歲以下小兒有

疾者令乳母服兩小豆亦以吐利為度近病及卒

病皆用多積久疾病即少服常取微溇利為度

卒病欲死服三九如小豆取吐利即瘥 卒得中

惡口噤服二九如小豆煖水一合灌口令下微利

即瘥 諸有痰飲者服三九如小豆 五疰鬼刺

客忤服二九如小豆不瘥間日更服三九 男女

邪病歌哭無時腹大如妊娠服二九如小豆日三

夜一聞食服之 大痢服一九如小豆日三 貓

鬼病服三九如小豆未瘥更服 蠱毒吐血腹痛

如刺服二九如小豆不瘥更服 瘡病未發前服

一九如小豆不瘥後日更服 冷痺服三九如小

豆日三皆聞食服之常令微溇利 宿食不消服

二九如小豆取利 癥瘕積聚服二九如小豆日

三皆聞食服之以利瘥止 拘急心腹脹滿心痛

服三九如小豆不瘥更服 上氣喘逆胸滿不得

臥服二九如小豆不瘥更服 疝濕以一丸如杏

仁大和酢二合灌下部亦服二九如小豆 鼻翳

服二九如小豆即瘥 水病服三九如小豆日三

皆聞食服之瘥止人弱隔日服之 頭痛惡寒服

千金方卷之三十一 雜錄

千金方卷之三十一 雜錄

二九如小豆覆取汗 傷寒時行服二九如小豆
 日三間食服之 小便不通服二九如小豆不瘥
 明日更服 大便不通服二九如小豆又內一丸
 下部中即通 耳聾聾耳以綿裹一丸如小棗核
 大塞之瘥 癰腫丁腫破腫內一丸如麻子大日
 一傳其根自出瘥凡丁腫血出以豬脂和傳有孔
 內孔中瘥止 胞背腰脇腫以酢和傳腫上日一
 易又服二九如小豆 癩瘡先以酢泔洗後取藥
 和豬脂傳之 瘦瘡有孔以一丸如小豆內孔中
 兼和豬脂傳之 痔瘡取藥塗綿筋上內孔中日
 別易瘥止 癩癰以酢和傳上瘥 惡刺以一丸
 內瘡孔中即瘥 諸冷瘡積年不瘥者以酢和塗
 瘡上作飢貼之瘥 瘡癬先以布揩汁出後取酢
 和傳上日一易立瘥 蠍螫以少許傳螫處 蜂
 螫以少許傳螫處 蝮蛇螫取少許內螫處若八
 毒入腹心悶欲絕者服三九如小豆 婦人諸疾
 胞衣不下服二九如小豆取吐利即出 小兒客
 忤服二九如米粒和乳汁傳乳頭令啣之 小兒
 驚癇服二九如米粒塗乳頭令啣之隨兒大小量與 小
 兒乳不消心腹脹滿服二九如米粒塗乳頭令啣

千金方衍義卷三

聖

掃葉山房

之不瘥更服

此方首治七種癩塊五種癩病十種疔忤七種飛
 尸十二種瘡疾十種水病八種大風種種諸病方
 中牛黃麝香開闢利竅犀角黃逆消痰散熱硃砂
 雄黃鎮驚豁痰蜈蚣蝎尾芫青攻毒祛風巴豆芫
 花甘遂大戟葶藶破積利水乾薑桂心蜀椒細辛
 開痺逐濕芎藭當歸芍藥蒲黃紫苑和血通經桑
 皮前胡防風黃芩茯苓桔梗透表達氣人參助諸
 藥力禹餘糧固諸藥性其裏搜根剔弊之功凡係
 實證便可諒用不必拘以方例等治也予嘗用治
 十年二十年痼疾如伏痰惡飲當背惡寒無不神
 應肢體沉重腰脚痠痛服之即捷而墜積痞塊雖
 未全瘳勢亦大減惜乎世罕知用耳
 治一切蠱毒妖邪鬼注有進有退積聚堅結心痛
 如齧不得坐臥及時行惡氣温病風熱瘴氣相
 染滅門或時熱如瘡癰咽腫塞不下飲食或煩
 滿短氣面目時赤或目下赤黃或乾嘔或吐逆
 或下赤白痢或熱氣如雲或欲狂走自殺或如
 見鬼或手足清冷或熱飲冷水而不知足或使
 手按空或面目癰腫生瘡或耳聾目暗頭項背

千金方衍義卷三

聖

掃葉山房

脊強不得屈伸或手足卒痿或百鬼惡疰狐魅
走入皮膚痛無常處方

麝香 丹砂 特生礬石

馬目毒公即鬼 馬齒礬生成起 雄黃各一

巴豆九十枚 青野葛三兩一木不用

右八味為末別搗巴豆如膏合搗五千杵內蜜更

搗一萬杵丸如小豆大強者服二丸弱者一丸入

腹雲行四布通微表裏從頭下行周徧五臟六腑

魂魄靜定情性得安病在膈上吐膈下利或蛇蟲

諸毒下五色熱水或不吐下便微漸除瘡萬毒妖

千金方衍義卷十一 聖 掃葉山房

精狐狸鬼魅諸久痼癖塊皆消散在表汗出在裏

直下忌名其藥故此方無名也

義衍方中丹砂雄黃馬目毒公野葛麝香皆辟除瘡癘

蠱疰惡毒鬼精之物特生礬石馬齒礬並治堅癖

積聚巴豆蕩練臟腑隨病之表裏上下而為搜逐

無堅不克無投不應洵難以譽稱其實德青野葛

即是鈞吻其性大毒不用可也

仙人玉壺丸方

雄黃 黎蘆 丹砂

礬石 巴豆 八角附子各一兩

右六味先搗巴豆三千杵次內礬石又搗三千杵

次內黎蘆三千杵次內附子三千杵次內雄黃二

千杵次內丹砂三千杵內蜜又搗萬杵住若無丹

砂內真珠四兩代之每內藥輒治五百杵內少蜜

恐藥飛揚治藥用王相吉日良時童子齋戒為良

天晴明無雲霧自晝藥成封密器中勿泄氣著清

潔處大人服丸如小豆欲下病者宿勿食平旦服

二丸不知者以粥暖飲發之令下下不止飲冷水

以止之病在膈上吐膈下利或噎氣即已若欲漸

漸除及將服消病者服如麻子大二丸卒中惡欲

千金方衍義卷十一 聖 掃葉山房

死不知人以酒若湯和二丸強開口灌喉中鬼疰

病百種不可名漿水服二丸日再 男女與鬼交

通歌哭無常或腹大絕經狀如妊娠漿水服二丸

如胡豆大日三夜一又苦酒和令如粉每旦傳手

間使心王心主在手腕後第一約橫文當中指至

暮又傳足三陰三陽及鼻孔七日愈又漿水服麻

子大一丸日三服三十日止 惡風逆心不得氣

息服一丸 腹中如有蟲欲鑽腸出狀急痛一止

一作是惡風二丸 憂恚氣結在胸心苦連噫及

咳胸中刺痛服如麻子大三丸日三 腹痛脹滿

不食服二九 心腹切痛及心中熱服一九如麻
 子大日三服五日瘥 風疝寒疝心痛疝每發
 腹中急痛服二九 卒上氣氣但出不入并逆氣
 衝喉胃中屬積聚者服二九日再 癖飲痰飲平
 巨服一九 腹中三蟲宿勿食明巨炙羊羊肉三
 醫食之須與進三九如胡豆大日中當下過日中
 不下更進二九爛蟲必下 卒關格不得大小便
 欲死服二九 卒霍亂心腹痛煩滿吐下手足逆
 冷服二九 傷寒嗽澀時氣熱病溫瀉服一九厚
 覆取汗不汗更服 寒熱往來服一九 瘧朱發
 一九已發二九便閉 積寒熱老痞服二九一癩
 堅粘痞一九日三取愈 下痢重下者一九取愈
 食肉不消腹堅服一九立愈 若海癭瘰癧百
 節酸疼服一九日三 頸卒風腫以苦酒若膏和
 傅之聚聚之 癰疽疔瘡瘰癧及欲作癰以苦酒
 和傅之 若惡瘡不可名病疥疔以膏若苦酒和
 先以鹽湯洗瘡去瘀拭乾傅之 齒痛綿裹塞孔
 中 鼠瘻以猪脂和傅瘡取敗舌狗子舐之 中
 水毒服二九若已有毒苦酒和一九傅之 耳聾
 膿血汁出及卒毒以赤絛皮裏二九內之 風目

千金衍義主

瘧朱發
 癩瘰癧
 癭瘰癧

赤或瘻視物漠漠淚出爛背蜜解如粉塗注目背
 若為蠱毒所中吐血腹內如刺服一九如卒子有
 加大如胡豆亦以塗鼻孔中又以膏和通塗皆有
 上亦可燒之熏口及鼻 若為蛇蝮諸毒所中及
 狗犬狂馬所作苦酒和傅又水服二九 婦人產
 後餘疾及月水不通往來不時服二九日再 婦
 人胸中苦滯氣氣息不利小腹堅急繞臍絞痛漿
 水服如麻子一九稍加之如小豆大 小兒百病
 驚癇痞寒及有熱百日半歲者以一九如麥米大
 置乳頭飲之一歲以上如麻子一九日三飲送下
 千金衍義卷上 辛 掃葉山房
 小兒大腹及中熱惡毒食物不化結成積聚服
 一九 小兒寒熱頭痛身熱及吐現服一九如麻
 子大 小兒痲瘦丁奚不能食食不化漿水服二
 九日三又黃酒和如梧子大傅腹上良 一切萬
 病量之不通一二九草不立效
 行 辟除惡毒之藥非猛力峻攻無以建克敵之功方
 中雄黃治寒熱死肌殺精物惡鬼邪氣勝五兵附
 子治風寒痿蹙破癥堅 積聚藜蘆治蠱毒泄利殺
 蟲毒去死肌丹砂治身 體五臟百病養精神安魂
 魄殺鬼精惡物礬石治 寒熱風痺腹中堅癥

邪氣巴豆破癥瘕積聚堅積爾飲蕩練五臟六腑
開通閉塞除蠱毒鬼疰邪物種種皆辟除邪毒峻
藥無不本諸本經治宿患痲疾確有五兵蕩練之
劫而方後有無丹砂真珠代用之說 兵朱即礬石
取其滌除積垢以安神識也

張仲景三物備急圓 司空裴秀為散用治心腹

李暴百病方

大黃 乾薑

巴豆各等分

右皆須精新多少隨意先搗大黃乾薑可苦為散

別研巴豆如脂內散中合搗千杵即爾得之為散

千金方卷十三

聖

補虛山房

亦好用蜜為丸貯密器中莫令歇氣若中惡客忤

心腹脹滿刺痛口噤氣急停屍卒死者以暖水苦

酒服大豆許三枚老少量與扶頭起令得下喉須

臾未醒更與三枚腹中鳴轉得吐利便愈若口已

噤可先和成汁傾口中令從齒間得入極良

此本金匱雜療之方千金收入膽腑門者膽為清

淨之腑用以滌除穢垢中精自寧方中乾薑滲濕

安中巴豆攻堅破積大黃推陳致新膽無出內可

無傷精之患且無濁惡混擾之虞千金以此方收

八此門良有見乎此也

大理氣圓 治萬病方

牛膝 甘草 人參

茯苓 遠志 恒山

苦參 丹參 沙參

龍膽 龍骨 牡蠣

半夏 杏仁 紫苑

芍藥 天雄 附子

葛根 橘皮 巴豆

狼牙 大黃 牡蠣

白朮 生薑 白薇

元參 薤蘆 大者

右二十九味先搗篩二十七味令熟次搗巴豆杏

仁如膏然後和使相得加白蜜更搗五千餘杵丸

如梧子大空腹酒服七九日三疝癥瘕結五十日

服永瘥吾常用理氣大覺有效

理氣者理正氣之不足邪氣之有餘也方中參苓

木甘安胃氣天雄附子助腎氣丹參遠志通心氣

牛膝紫苑芍藥和血氣半夏恒山橘皮生薑豁痰

氣葛根杏仁白薇散風氣巴豆大黃狼牙薤蘆下

積氣龍膽牡蠣若沙元參除旺氣龍骨牡蠣收津

氣九氣各得以平全在烏附半只之反激以助其

勢耳

大麝香圓 治鬼疰飛尸萬病方

麝香 三分 礞石 八分 牛黃

附子 鬼臼 眞珠

莽艸 犀角 礞石

細辛 桂心 獾肝

藜蘆 各二分 雄黃 一分 丹砂 二分

蜈蚣 各五分 蜥蜴 各一分 巴豆

杏仁 各五分 芫青 地膽 外真作

千金方衍義卷三

亭長 蟄螫 各七枚

右二十三味為末蜜和合更搗三千杵丸如小豆

大飲服一九日再漸加至三九蟲毒所蟄摩之以

知為度若欲入毒瘻癢鄉死喪病處及惡鬼塚墓

盛絳囊中男左女右肘後繫之又以少許傅鼻下

人中及臥不醒

〔衍義〕玉壺丸中加入蟄螫地膽芫青亭長蜈蚣蜥蜴

肝以攻毒邪犀角牛黃麝香眞珠以和藥毒杏仁

細辛莽艸桂心礞石鬼臼以佐玉壺丸中六味并

毒蟲野獸之藥其襄厥功

小麝香圓 治同前

麝香 莽艸 犀角

梔子仁 三分 雄黃 當歸 外麩

丹砂 各四分 乾薑 桂心

芍藥 細辛 各五分 附子

烏頭 各五分 蜈蚣 一枚 巴豆 五十枚

右十五味為末蜜和合搗千杵丸如小豆大服三

九日三可加至五九一切尸疰痛悉皆主之

〔衍義〕大麝香丸專辟飛尸鬼疰惡毒不祥故須猛藥峻

攻小麝香丸治證雖同然不若前證之痛但需烏

千金方衍義卷三

頭乾薑以助丹雄犀麝桂附巴菴之祛風逐痺原

無藉於辟除蟲疰故無取於獾肝牛黃蜥蜴斑猫

等味

紫葛圓 治寒熱不調方

紫葛 石膏 人參

丹參 紫參 苦參

元參 細辛 齊鹽

代豬 菴蓉 巴豆

烏頭 各三分 乾薑 桂心

獨活 各五分

右十六味為末蜜和更搗萬餘杵九如小豆服六
丸食前三丸食後三丸忌五辛猪雞魚蒜餅不在
禁限若覺體中大熱各減一丸服之令人肥悅好
顏色強腸道能食服藥後十日得利其白汁大佳
婦人食前食後只服二丸兩歲以下小兒服九如
米粒大令人能飲酒除百病藥之功能損益備述
如左

腹中積聚心腹滿 心下堅 痰飲 宿食 食

吐逆 上氣 短氣 咳嗽 咽喉鳴 黃瘰

久癰 面腫 身浮腫 四肢煩重 坐起體重

千金方衍義卷十二

黃

掃葉山房

熱病濕蘆下部癢 體瘡癢 關格不通 大

腸出 熱淋 下利 顏色不定羸瘦無力弱房

少精 精冷 身體斑駁 從高墮下絕傷 墮

胎後傷損血 皮肉焦爛 月水不定 或後或前

月水斷心下悶滿肩膊沉重 小兒百病 小

兒疳氣 乳不消 小兒身常壯熱腹內有病所

錄諸症皆紫葛圖治之若積日服餌未愈瀉息準

方服之取瘥止

紫葛丸治寒熱不調而為方後諸病故用巴豆對

桂烏頭以破寒積紫葛石膏鹽苦紫丹瓦礫參

以散熱結獨活細辛以通經絡代赭治賊風鬼疰
盛毒從蓉止葦中寒熱痛人參以助諸藥之力但
紫葛藥肆罕得宜以紫苑代之以本經專主胸中
寒熱結氣也耆婆萬病丸中用之亦取散結之義
太乙神精丹 治容忤霍亂腹痛脹滿尸疰惡氣
癩狂鬼語蠱毒妖魅溫瘧但是一切惡毒無所
不治方

丹砂

曾青

雌黃

雄黃

硝石各四兩

金牙二兩

千金方衍義卷十二

黃

掃葉山房

右六味各搗細下篩其丹砂雌黃雄黃三味以醃

醋浸之曾青好酒於銅器中漬紙密封訖日中曝

百日經憂急五十日亦得無日以火煖之然後各

研令如細粉以醃醋拌使乾濕得所內土釜中以

六一泥固濟勿令泄氣乾後安鐵環施脚高一尺

五寸置釜上以漸放火初放火取熟炭兩秤各長

四寸置釜上待三分二分盡即益如此三度盡用

熟火然後用益生炭其過三上熟火已外皆須加

火漸多及至三伏時其火已欲近釜即便滿就釜

下益炭經兩度即罷火盡極冷然後出之其藥精

飛化凝著釜上五色青上三色者次一色者下雖

無五色但色光明皎潔如雪最佳若飛上不盡更
令與火如前以雄雞翼掃取或多或少不定研和
素膏丸如黍粒治偏風大風惡疾癩癩癰瘡疔等最
良服法平旦空腹一丸爲度其瘡病積久百方不
瘥又加心腹脹滿上氣身面脚等並腫垂死者服
一丸吐卽瘥亦有不止瘥者若不吐復不瘥者更
服一丸半仍不瘥者後日增半丸漸服無有不瘥
氣亦定當吐出青黃白物其因瘡兩脇下有癰塊
者亦當消除若心腹不脹滿者可與一丸日日加
之以知爲度不必專須吐亦可一丸卽瘥勿併與
服亦可三日一服皆須以意斟酌量得其宜或
內有水便卽下者勿怪若患瘡日近精神健亦可
斟酌病人藥性併與兩丸作一丸頓服之皆至午
後食勿使冷勿使熱鼓漿粥任意食之若病瘡盜
汗虛弱者日服一丸至三日吐卽止若患瘡不汗
氣復不流脚冷者服一丸至三日若不汗氣復脚
自煖有閉汗不至三日吐卽止若患瘡無顏色者
服藥後三日卽有顏色亦有須吐瘥者亦有服少
許而瘥者亦有殺藥強人服三四丸始覺藥行者
凡人稟性不同不可一槩與之但作黍米大服之

千金方卷之三

至

精業山房

爲始漸加以知爲度藥力險壯勿併多服特慎油
麩魚肉蒜當清淨服之若有患久不瘥在牀羸瘦
并腹脹滿及腫或下痢者多死但與藥救之十人
中或瘥三四人也癩瘡積聚服一刀圭以漿水送
下諸卒死中惡客忤霍亂腹滿體滯五尸疰惡風
疰忤大病相易死凶滅門狂癩鬼話已死氣絕心
上微煖者扶起其頭以物撐開口不可開珠去兩
齒以漿飲送藥藥下卽活諸久病者日服一刀圭
覆令汗汗出卽愈不愈者不過再服亦有汗而
瘥復有不汗不愈者服如上法加半刀圭以瘥爲
度常以絳囊帶九刀圭散男女老幼小兒繫頭上
辟瘴毒時氣射工小兒患可若酒和之塗方寸紙
上著兒心腹上令藥在上治之亦有已死者冬二
口夏一日與此藥服得下藥便活若不得入腹不
活加金牙磁石者服至五服內必令人吐逆下利
過此卽自定其藥如小豆大爲始從此漸小不得
更大大風惡癩可二十服偏風癱節諸惡風癩病
等亦可二十服自餘諸惡者皆止一二服量人輕
重弱強不得多與若欲解殺藥但爛煮食肥猪肉
服此藥後小應頭痛身熱一二日來大不能得食

千金方卷之三

至

精業山房

味後自漸得氣味五日後便能食若貪食過多者宜節之若服藥下悶亂可煮木防已湯服之即定凡言刀圭者以六粟爲一刀圭一說云三小豆爲一刀圭

其法取兩箇瓦盆以甘土塗其內令極乾其狀大小隨藥多少

作六一泥法

赤石脂

牡蠣

滑石

礬石

黃礬

鹵土

千金方衍義卷十三

堯

掃葉山房

蚯蚓屎

各二兩

右取醱酥以足爲度若無鹵土以鹽代之先作甘土泥以泥各別裹前黃礬等五種作團裹之勿令泄氣以火燒周三日最好一日亦得出火破團取藥各搗碎絹篩然後與蚯蚓屎鹵土等分以酥和之如稠粥既得好酥可用二分酥一分水和用取前五盆以此泥塗之會青如蚯蚓屎如黃連佳世少此者好崑崙崙礬亦得瘧疾丹砂亦得粟砂亦得舊不用磁石金牙今加之 凡雄黃皆以油煎九日九夜乃可入丹不爾有毒慎勿生用

義衍

石藥之用有三日壯陽助火日清熱解毒日辟惡祛邪此方純用石藥專爲辟除邪毒而設方中丹砂純治身十五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精魅久服通神明會青主風痺利關節通九竅破癥瘕積聚雄黃殺精物惡鬼邪氣百蟲蠱毒雖

黃治惡瘡毒蟲身癢邪氣磁石療周痺風濕肢節

中痛不可特物金牙辟鬼疰蠱毒筋骨掣急腰脚

不遂上五味皆本經主治金牙乃別錄與甄權所

主但會青殊不易得詳六一泥下有崑崙礬可代

會青之說崑崙礬卽是石綠產廣西崑崙山者佳

千金方衍義卷十三

堯

掃葉山房

故名與空會二青同出銅穴相挾帶出蘇頌言吐風痰甚效功用可代會青載攻金牙專主瘡癩蠱毒尸疰風痺故大小金牙散大小金牙酒咸以名方而眞贗莫辨予擬消石代之崑崙本艸云金牙陽石也徐之才言消石爲天地至神之物本經治百病除寒熱邪氣六腑積聚固結雷痺能化七十二種石其純陽辟除陰毒之性不在金牙之下但本經所主綱目誤列朴消之下而別錄言療五臟十二經脈百二十疾能化七十二種石正與本經符合用以治方下諸病綽有餘裕藥雖異而功不

殊也

倉公散 治卒鬼擊鬼非鬼刺心腹痛如刺下血

便死不知人及臥廳脚腫不覺者諸惡毒氣

病方 此漢文帝時太倉令淳于意方故名

特生礬石 皂炭 雄黃

蔡蘆 各等分

右四味治下篩取如大豆許內管中吹入病人鼻得嚏則氣通便活若未嚏復更吹之以得嚏為度此藥起死回生

吹鼻取嚏此方最神中惡卒挂非此不治方中譽

千金方卷三

至

插葉山房

石能伏水銀專破堅結皂莢能通關節利九竅雄

黃殺精物邪氣百蟲蠱毒蔡蘆治惡瘡去死肌配

合修製用以通利關竅確有起死回生之功世醫

但知稀涎散瓜蒂散及頭風搐鼻等法披讀此方

惟有舌橋目眩而已

小金牙散 治南方瘴癘疫氣脚弱風邪鬼疰方

金牙 五分 雄黃 葶藶

黃芩 蜀椒 山椒

桂心 莽艸 天雄

硃砂 麝香 烏頭 各二分

牛黃一分 蜈蚣 一枚六寸者 細辛

蕨蕪 犀角 乾薑 各二分

黃連 四分

右十九味治下篩合牛黃麝香搗三千杵溫酒服錢五七日三夜二以知為度絳囊盛帶男左女右一寸七省病問孝不避夜行塗人中晨昏霧露亦塗之

大金牙散 治一切蠱毒百疰不祥醫所不治方

金牙 鸛骨 石膏 各八分

斑蝥 七分 活草子 胡燕屎

白木 雷九 龍牙 各六分

銅鏡鼻 梔子仁 乾漆

龜甲 蟹甲 鬼督郵

桃白皮 大黃 各四分 桂心

芍藥 徐長卿 羚羊角

射干 升麻 鳶尾

馬目毒公 蜂房 細辛

乾薑 芫硝 山椒

犀角 甘艸 狼毒

蜚蠊 龍膽 狼牙

千金方卷三

至

插葉山房

雄黃

真珠各三分

堇花

蒜草

射罔

烏梅各二分

蛇蛻皮尺一

鐵精

赤小豆一合

地膽

樗鷄

芫青各七枚

桃奴

巴豆各二枚

右五十味治下篩服一刀圭稍加至二刀圭帶之

辟百邪治九十九種疰一有麝香無白米

紙符 金牙散二方與前金牙酒藥品迥殊而功用彷彿

小金牙散專主瘡癩脚弱故用烏頭天雄蜀椒細

辛乾薑桂心由跋莽艸開發瘡癩犀角牛黃黃芩

千金方衍義卷三

查

掃葉山房

黃連葳蕤草薜化熱通痺硃砂雄黃麝香蜈蚣臣

佐金牙共建逐痺祛疫之功剛柔兼濟而脚弱自

除矣 大金牙散專主蠱毒百疰純是大辛大烈

以毒攻毒之藥射罔射干由跋蒿尾芫花莽艸督

郵長卿馬目毒公專治蠱疰斑蝥樗鷄芫青地膽

蛻螂乾漆專破毒血巴豆雷丸狼毒狼牙芫芎大

黃龜甲鱉甲專攻內結龍牙真珠雄黃鐵精鏡鼻

蛇蛻蜂房燕屎桃奴桃皮專辟疫邪犀角石膏膽

草梔子赤小豆專解熱毒鶴骨羚羊專利筋骨乾

薑桂心細辛白朮甘艸升麻芍藥烏梅專利氣血

協輔金牙為蕩滌蠱疰之主帥迥迥窮源總不出

如上等法 其後飛尸鬼疰門中又有金牙散一

方見五十六卷與大金牙散之藥同者過半如彼用狸

骨此用鷓骨彼用亭長此用地膽彼用烏頭此用

射罔藥雖稍變而功用則一況乎複劑靈見如狼

毒狼牙射干蒿尾之類奚必按方全用哉 其治

八風五疰痺曳跛躄用金牙酒見五卷治瘧癘毒

氣風冷濕痺拘攣脚氣用大金牙酒見四卷方中

諸藥與二散所同無幾而主療之證不甚擲遠可

見臨病處方但當師古聖之意取古方之法隨機

千金方衍義卷十二

查

掃葉山房

應變不必拘守成則也大匠與人規矩三隅之反

不在方圓之外耳

孫真人千金方衍義卷十二

心臟方 凡八類

心臟脈論第一 論一首

論曰心主神者五臟專精之本也為帝王監領四方夏王七十二日位在南方離宮火也有生之來謂之精兩精相搏謂之神所以任物謂之心神者心之藏也舌者心之官故心氣通於舌舌和則能審五味矣心在竅為耳夫心者火也腎者水也水火相濟心

千金方衍義卷十三

楊葉山房

氣通於舌舌非竅也其通於竅者寄見於耳左耳丙右耳丁循環炎宮上出唇口知味榮華於耳外主血內主五音心重十二兩中有三毛七孔盛精汁三合神名响响主藏神號五神居隨節應會故云心臟脈脈舍神在氣為吞在液為汗心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢救火陽物得其時則夢燔灼心氣盛則夢喜笑及恐畏厥氣客於心則夢邱山煙火凡心臟象火與小腸合為腑其經手少陰與太陽為表裏其脈洪相於春王於夏夏時萬物洪盛垂枝布葉皆下垂如曲故名曰鈞心脈洪大而長洪則衛氣

寶寶則氣無從出大則榮氣萌洪相薄可以發汗故名曰長長洪相得即引漿水灌溉經絡津液皮膚太陽洪大皆是母軀幸得戊巳用牢根枝陽氣上出汗見於頭五內乾枯胞中空虛醫反下之此為重虛脈浮有表無裏陽無所使不但危身并中其母

夏脈如鈞夏脈心也南方火也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鈞反此者病何如而反其氣來盛去亦盛此謂太過病在外其來不盛去反盛此謂不及病在內太過則令人身熱而膚痛為浸淫不及則令人煩心上見咳唾下為氣泄

千金方衍義卷十三

楊

心脈來累累如連珠如循琅玕曰平夏以胃氣為本心脈來喘喘連屬其中微曲曰心病心脈來前曲後屈如操帶鈞曰心死
真心脈至堅而搏如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死
夏胃微鈞曰平鈞多胃少曰心病但鈞無胃曰死胃而有石曰冬病石甚曰今病
心臟脈脈舍神怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破腠脫肉毛悴色夭死於冬
手少陰氣絕則脈不通少陰者心脈也心者脈之合

也脈不通則血不流血不流則髮不澤面黑如棗葉者血先死王篤癸死水勝火也

心死臟浮之實如豆麻擊手按之益躁疾者死夏心

火王其脈浮大而散一作曰平反得弦細而長者是

肝之乘心母之歸子為虛邪雖病易治反得大而緩

者是脾之乘心子之乘母為實邪雖病自愈反得沈

滯而滑者是腎之乘心水之剋火為賊邪大逆十死

不治反得微澀而短者是肺之乘心金之陵火為微

邪雖病即瘥腎乘心必瘥

左手關前寸口陰絕者無心脈也若心下執痛掌中

熱時時善嘔口中傷爛刺手少陽治陽左手關前寸

口陰實者心實也若心下有水氣憂恚發之刺手心

主治陰

心脈來累累如貫珠滑利再至曰平三至曰離經病

四至脫精五至死六至命盡手少陰脈也

心脈急甚為瘵癯微急為心痛引背食不下緩甚為

狂笑微緩為伏梁在心下上下行有時唾血大甚為

陰介微大為心痺引背善淚出小甚為善噦微小為

消痺滑甚為善渴微滑為心疝引臍小腹鳴漉甚為

瘡微漉為血溢維厥耳鳴癩疾

千金方衍義卷三 三 攝案山房

心脈搏堅而長當病舌卷不能言其濡而散者當病

瘡湯白已一作湯

赤脈之至也喘而堅誼曰有積氣在中時害於食名

心痺得之外疾思慮而心虛故邪從之扁鵲曰心有

病則口生瘡爛

心有聲為笑在變動為憂在志為喜喜傷心精氣并

於心則喜心虛則悲悲則憂實則笑笑則喜

時主夏病者時聞時甚知其源取其俞觀其應審其

害

病先發於心者心痛一日之肺喘咳三日之肝脇痛

支滿五日之脾閉塞不通身痛體重三日不已死冬

夜半夏日中病在心日中慧夜半甚平且靜

假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得

病以王癸日方

凡心病之狀胸內痛脇支滿兩脇下痛膺背肩甲開

痛兩臂內痛虛則胸腹大脇下與腰背相引而痛取

其經手少陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者

心脈沈之小而緊浮之不喘苦心下聚氣而痛食不

下喜咽唾時手足熱煩滿時忘不樂喜太息得之憂

思

千金方衍義卷三 四 攝案山房

心病其色赤心痛短氣手掌煩熱或啼笑罵詈悲思
愁慮面赤身熱其脈實大兩數此為可治宜服關直
藥春富刺中衝夏刺勞宮夏季刺大陵皆補之秋刺
間使冬刺曲澤皆瀉之此是手心又當灸巨關五
十壯背第五椎百壯邪在心則病心痛善悲時眩
仆視有餘不足而調其輸 愁憂思慮則傷心心傷
則若驚喜忘善念

心中風者翁翁發熱不能起心中肌則飲食則嘔
心中寒者其人病如噉蒜齏狀劇者心痛徹背背痛
徹心如蠱注其脈浮者自吐乃愈

千金方衍義卷三

五

諸葉山房

心傷其人勞倦頭面赤而下重心中痛徹背自煩發
熱當臍跳手其脈弦此為心臟傷所致也

邪哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心心
氣虛者其人即畏合日欲眠夢遠行而精神離散魂
魄妄行陰氣衰者即為癩陽氣衰者即為狂五臟者
魂魄之宅舍精神之所依託也魂魄飛揚者其五臟
空虛也即邪神居之神靈所使鬼而下之脈短而微
其臟不足則魂魄不安魂屬於肝魄屬於肺肺主津
液即為涕泣出肺氣衰者即泣出肝氣衰者魂則不
安肝主善怒其聲呼

心水者其人身體腫一作而少氣不得臥煩而躁其
陰大腫

真心痛手足清至節心痛甚者且發夕死夕發旦死
心腹痛懊懣發作腫聚往來上下行痛有休作心腹
中熱善渴涎出者是虵蛟也以手聚而堅持之無令
得移以大鍼刺之久持之蟲不動乃出鍼腸中有蟲
虵蛟皆不可取以小鍼

心脹者煩心短氣臥不安

凡心脈急名曰心疝小腹當有形其以心為壯藏小
腸為之使故小腹當有形

千金方衍義卷三

木

諸葉山房

診得心積沈而乾時上下無常處病胸滿悸腹中熱
面赤咽乾心煩掌中熱甚則唾血身癢癢主血厥夏
差冬劇色赤也

心之積名曰伏梁起於臍上上至心大如臂久久不
愈病煩心心痛以秋庚辛日得之何也腎病傳心心
當傳肺肺適以秋王王者不受邪心復欲還腎腎不
肯受因留結為積故知伏梁以秋得之

心病煩悶少氣火熱熱上湯心嘔咳吐逆狂強語出
如珠身體厥冷其脈當浮今反沈濡而滑其色當赤
而復黑者此是水之剋火為大逆十死不治

徵音人者主心聲也心聲笑其音等其志喜其經手
少陰厥逆太陽則榮衛不通陰陽反錯陽氣外擊陰
氣內傷傷則寒寒則虛虛則驚掣心悸定心湯主之
方見第十四卷語聲前寬後急後聲不續前混後濁口喘胃
味好自笑此為厲風入心荆瀝湯主之方見前
風寒半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口面
喎邪蓋附湯王之方見前此病不盈旬日宜急治之
又笑而呻呻而反憂此為水剋火陰擊陽陰起而陽
伏伏則實實則傷熱熱則狂悶亂胃味言多謬誤不
可採聽此心已傷若其人口唇正赤可療青黃白黑

千金方衍義卷三

七

攝案山房

不可療也
心病為瘧者令人心煩甚欲得清水反寒多不甚熱
方見前若其人本來心性和雅而忽變急反於常白
第十卷木酒主之方見前或言未竟便住以手剔脚爪此人
必死禍雖未及名曰行尸此心病聲之候也虛則補
之實則瀉之不可治者明以察之

赤為心心合脈赤如雞冠者吉心主舌舌是心之餘
其人火形相比於上徵赤色廣眦兌面小頭好肩背
解腹小手足行安地疾行搖肩背肉滿有氣輕財少
信多慮見事明了好顧急心不壽暴死耐春夏不耐

秋冬秋冬感而生病主手少陰竅竅然髑髑長短傾
正則心應之正赤色小理者則心小小則邪弗能傷
易傷以憂相理者則心大大則虛虛則寒寒則憂不
能傷易傷於邪無髑髑者則心高高則實實則熱熱
則滿於肺中悶而善忘難開以言髑髑小短舉者則
心下下則藏外易傷於寒易恐以言髑髑長者則心
堅堅則藏安守固髑髑弱以薄者則心脆脆則善病
消癰熱中髑髑直下不舉者則心端正端正則和利
難傷髑髑向一方者則心偏傾偏傾則操作不一無
守司也下云若髑髑小短薄弱而不則心下下則虛
虛則傷寒病憂患內損心暴病而好墮清涎

千金方衍義卷三

八

攝案山房

口臭齒齙痛侵唇齒若髑髑高起則心高高則實實
則熱熱則滿於心悶而善忘恐悸煩燥口痛牙齦舌
傷小兒則便祕口重舌鵝凡入部分陷起者必有病
口聲嘶方見頭而方中
生小腸太陽為心之部其處陷起即病生矣藏含內
外部亦內外沈濁屬內浮清居外若外病內入小腹
滿起內病裏出所部陷沒外入內前治陽後補陰內
出外前補陰後瀉陽陽則實熱陰則虛寒在陽主外
在陰主內凡人死生休咎則藏神前變形於外人心
前病則口為之開張若心前死則枯黑語聲不轉若
天中等分墓色應之即死不治看應增損斟酌賒促
賒則不出四百日內促則不賒旬月之間心病少愈

而卒死何以知之曰赤黑色黯點顏即若見顏年度年
上此必卒死心絕一日死何以知之兩目回回直視
肩息立死凡面赤目白憂思慮心氣內索面色反
好急求棺鄣不過十日死又面黃目赤不死赤如不
血血死吉凶之色若在於分部臍臍如見赤黑入口
此必死不出其年名日行尸若年上無應三年之中
病必死矣

夏大心脈色赤主手太陽也夏取盛經分腠夏者火
始治心氣始長脈瘦氣弱陽氣留溢熱薰分腠內至
於經故取盛經分腠絕膚而病去者邪居淺也所謂

千金方卷十三

九

補遺仙方

盛經者陽脈也其脈本在外踝之後應在命門之上
三寸命門者在心上一寸也脈根在少澤少澤在手
小指端

其筋起於小指之上結於腕上循臂內廉結肘內兌
骨之後彈之應小指之上入結腋下其支者從走腋
後廉上繞肩甲循頸出足太陽之筋前結於耳後完
骨其支者入耳中直出耳上下結於頷上屬目外眥
其脈起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循
臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循膈外後廉出肩
解繞肩甲交肩止入缺盆向腋絡心循咽下膈抵胃

屬小腸其支者從缺盆循頷上顛至目銳眥却入耳
中其支者別頰上頰抵鼻至目內眥斜絡於頷合手
少陰為表裏少陰本在兌骨之端應在背後同會於
手太陽

其手太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別
者上走肘絡肩髃主心生病病實則小腸熱熱則節
弛弛則陽病腸脈大反逆於寸口再倍病則隘痛頷
腫耳聾目黃臥不能言則急坐虛則小腸寒寒則
生虺虺則陰病陰脈反小於寸口過於一倍病則短
氣百節痛筋急頸痛不能轉顧

千金方卷十三

十

掃葉山房

取心主迴於後
陰心經附於後
手心主之別名曰內關去腕五寸甲乙作
出於兩筋
間循經以上繫於心包絡心系氣實則心痛虛則為
煩心取之兩筋間

手心主之脈起於胸中出屬心包下膈歷絡三焦其
支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下循膈內行太陰
少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指
出其端其支者別掌中循小指次指出其端也動則
病手心熱肘臂攣急腋腫甚則胸脇支滿心中澹澹
大動面赤日黃善笑不休是主脈所生病者煩心心

痛掌中熱為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之
寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者則
寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎
手少陰之別名曰通理在腕後一寸別而上行循經
入呬中系活本屬目系其實則大脈虛則不能言取
之掌後一寸別走太陽

手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小腸其支
者從心系上俠咽系目系系目系一作
循膈出嗚其直者復從

心系却上肺出腋腋下循臑內後廉行太陰心主之
後下肘內廉循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌後

千金方衍義卷三

十一

掃葉山房

內廉循小指之內出其端是動則病隘乾心痛渴而
欲飲是為臂厥是主心所生病者目黃齋滿痛膈臂
內後廉痛厥掌中熱痛為此諸病盛則瀉之虛則補
之盛者則寸口大再倍於人迎虛者則寸口反小於

人迎

手少陰之脈獨無輪何也曰少陰者心脈也心者五
臟六腑之大主為帝王精神之所舍其藏堅固邪不
能容容之則傷心心傷則神去神去則身死矣故諸
邪在於心者皆在心之包絡包絡者心主之脈也按
少陰無輪也少陰無輪心不病乎曰其外經膈痛不

不病故獨取其經於掌後兌骨之端也

夏三月主心小腸赤脈攢病也其源從少陰太陽之
氣相搏而停則榮衛不通皮肉痛起太陽動發少陰

淫邪之氣因而作則臟腑隨時受夏疫病也其病相
若腑虛則為陰邪氣所傷身戰脈掉捉所不禁臟實

則為陽毒所侵肉熱口開舌破咽塞聲嘶故曰赤脈
攢病力見傷
寒卷中

扁鵲云灸腎肝心三膈主治丹一作
瘡毒病常依源為
治表治陰陽調和臟腑疾不生矣

心虛實第二

張四首 方十一首
次法一首

千金方衍義卷三

三

掃葉山房

心實熱

左手寸口人迎以前脈陰實者手少陰經也病苦閉
大便不利腹滿四肢重身熱各曰心實熱也

石膏湯 治心熱實或欲吐吐而不出煩悶喘急

頭痛方

石膏 一斤

淡竹葉

香豉 各一

小麥

地骨皮

茯苓 三兩

梔子仁 三七

右七味咬咀先以水一斗五升煮小麥竹葉取八

升澄清次下諸藥煮取二升去滓分三服外臺
酒肺湯

衍靈樞云手少陰之脈獨無腑少陰心脈也心者五

臟六腑之大主也精神之所舍也其臟堅固邪弗

能容也容之則傷心心傷則神去神去則死矣故

諸邪之在於心者皆在於心之包絡包絡受邪則

欲吐不吐煩悶喘急故宜石膏清熱降火為主人

但知石膏解利陽明熱邪不知本經原有中風寒

熱心下逆氣諸治中藏梔子豉湯主心下懊憹為

清膈熱之專藥竹葉解煩清心合地骨皮主五內

邪氣熱中消渴以本經與枸杞同列不分不知實

為地骨皮主治也小麥雖為肝穀能助少火而通

千金方衍義卷三

三

補葉山房

心包與瀉心湯中用人參助長諸藥同意彼主乾

嘔故用半夏此治心熱故用石膏淡竹同治心熱

而所主各有攸宜也

半夏瀉心湯 治老小下利水穀不消腸中雷鳴

心下痞滿乾嘔不安方

人參

黃芩

甘草各一兩

乾薑一兩

黃連一兩

半夏半升

大棗十一枚

右七味咬咀以水八升煮取二升半分三服并治

霍亂若寒加附子一枚渴加析薑根二兩嘔加橘

皮一兩痛加當歸一兩客熱以黃連代乾薑

大黃黃連瀉心湯 治心氣不覺吐血衄血方

大黃二兩

黃連

黃芩各一兩

右三味咬咀以水三升煮取一升頓服亦治霍亂

衍

半夏瀉心湯在傷寒治心下滿而不痛在金匱治

嘔而腸鳴心下痞干金借以治下利腸鳴心下痞

滿乾嘔似與心臟無關然痞滿雖屬太陽其瑕正

在心下駸駸上犯心包不得不以芩連祛熱半夏

瀉痰乾薑導火人參甘棗輔正祛邪為務也 大

黃黃連瀉心湯在傷寒治心下痞按之濡關上脈

千金方衍義卷三

三

補葉山房

浮之證在金匱治心氣不足吐血衄血與千金主

治相同總取芩連以清三焦之火大黃以瀉六腑

之滯乃救心包蘊熱之專藥餘說見十卷傷寒門

甘草瀉心湯下

心小腸俱實

左手寸口人迎以前脈陰陽俱實者手少陰與巨陽

經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得臥

以胃氣不轉水穀實也名曰心小腸俱實

竹瀝湯 治心實熱驚悸喜笑恐畏悸懼不安方

淡竹瀝

生地黃汁各二兩

芍藥

白朮

人參

梔子仁各三兩

赤石脂

紫苑

知母

茯神各二兩

右十一味咬咀以水九升煮十味至二升七合去滓下竹瀝更煎取三升若須利入芒硝二兩去芍藥分三服

衛胃為五臟之本心為五臟之主胃氣不得轉運外則身熱內則便難包絡之火散漫無以主持神識

故用參朮茯神實其中土則火不致加乘虛內擾地黃芍藥石膏知母竹瀝梔子仁得以建清心降

千金方衍義卷十三

十五

補藥山房

火之功紫苑開結氣於上石脂固藥力於下也

茯神散 治心實熱口乾煩渴眠臥不安方

茯神

麥門冬各三兩 通艸

升麻各三兩

紫苑

桂心各十兩

知母二兩

赤石脂四兩

大棗二十枚

淡竹茹雞子七塊

右十味治下篩為粗散以絹裹方寸七井花水二升半煮取七合時動裏子為一服日再

升半煮取七合時動裏子為一服日再

衛前竹瀝湯治胃氣不能轉運故用人參白朮杜心包火於內此以肺燥不能勝熱故用麥門冬桂心

蒸發浮氣於上又以升麻通艸上升下泄輔佐清熱導火之升紫苑赤石脂知母茯神與前竹瀝湯不殊也

安心散 治心熱滿煩悶驚恐方

白芍藥

遠志

宿露各二兩

茯苓

赤石脂

麥門冬

知母

紫苑

石膏各四兩

人參四兩

桂心

麻黃

黃芩各三兩

萎蕤三十兩

甘艸十二兩

右十五味治下篩為粗散先以水五升淡竹葉一升煮取三升去滓煮散一方寸七半以絹裹時動

千金方衍義卷十三

十六

補藥山房

之煎取八合為一服日再

衛此兼竹瀝湯茯神散二方之製方中麻黃遠志萎

蕤即茯苓散中升麻桂心麥門冬之義人參甘艸

黃芩即竹瀝湯中人參白朮梔子之義三方合究

其微則滋中寓清清中寓散散中寓清之云了然

心日矣

治不能食胸中滿膈上逆氣悶熱方

灸心膈二七壯小兒減

心虛寒

左手寸口人迎以前脈陰虛者手少陰經也病苦悸恐不樂心腹痛難以言心如寒恍惚名曰心虛寒也

茯苓補心湯 治心氣不足善悲愁志怒衄血面

黃煩悶五心熱或獨語不覺咽喉痛舌本強冷

涎出一作汗出善忘恐徒不定婦人崩中面色赤方

茯苓四兩 桂心各一兩 甘艸各一兩

紫石英各一兩 人參各一兩 麥門冬三兩

大棗十枚 赤小豆四兩

右八味咬咀以水七升煮取二升分三服

義衍 人參茯苓補手少陰氣分石莖桂心蒲手少陰血

千金方義卷三十一 補藥部

分甘艸大棗乃參苓之匡佐麥門冬赤小豆乃莖

桂之報使并開泄心包旺氣以療喉舌諸疾石莖

兼行足厥陰而主婦人崩中以其能溫經散結也

半夏補心湯 治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山

邱平澤者方 半夏六兩 宿薑五兩 茯苓

桂心 枳實 橘皮各三兩

白木四兩 防風 遠志各二兩

右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服

義衍 茯苓補心湯兼調肝氣半夏補心湯兼調脾氣方

中桂心宿薑溫補心脾枳木橘半溫理胃氣茯苓佐桂心下導虛陽防風佐白木上散濁濕遠志一味通心氣之專藥

牛髓九 通治百病虛瘠羸乏等方

牛髓 羊髓 棗膏

白蜜 酥各一升 麥門冬

芎藭 桂心 當歸

茯苓一作茯苓神 甘艸 羌活各三兩

乾地黄 乾薑各六兩 人參

五味子 防風各一兩 白木四兩

細辛十八銖 千金方義卷三十一 補藥部

右十九味切搗十四味篩別研棗膏和散次內諸

髓蜜和攪令相得內銅鉢中於釜沸湯中煎取堪

作九如梧子大酒服三十九稍加至四十九日再

義衍 牛髓九治百病虛羸兼調五臟以心為君主諸臟

之氣靡不稟之於君方用桂心茯苓以補心芎藭

當歸以調肝乾薑白木以溫脾人參門冬以益肺

地黃五味以滋腎甘艸棗膏以和胃二髓蜜酥以

充髓羌防細辛以司督脈而禦外邪不但兼調五

臟并以交濟陰陽則四維莫安而九重寧謐矣

心小腸俱虛

左手寸口人迎以前脈陰陽俱虛者手少陰與巨陽經俱病也病苦洞泄苦寒少氣四肢厥腸澼名曰心小腸俱虛

大補心湯 治虛損不足心氣弱悸或時妄語四

肢損變氣力顏色不榮方

黃芩

附子 各一兩

甘艸

茯苓

麥門冬

乾地黄

桂心

阿膠 各三兩

半夏

遠志

石膏 各四兩

生薑 六兩

千金方衍義卷三

九

掃葉山房

粘糖 一斤

大棗 二十枚

右十四味取十三味咬咀以水一斗五升煮取五升湯成下糖分四服

方下所主虛損不足心氣弱悸而方所用反屬足

少陰巨陽之藥其義云何夫君主之令良由相火

所司故專取桂附收攝虛陽則麥門冬阿膠茯苓

地黃之屬得以上充靈臺其他半夏甘艸薑棗粘

糖實其土臟黃芩石膏清肅心包遠志交通心腎

若腎志不虧遠志似可不用水臟無泄附子儘可

勿施語言無妄心包原無火擾石膏亦宜裁酌四

肢安和脾陽猶能自強薑棗粘糖薑減未為不可

師古人方須要得古人意活法在心奚必固守成

則哉

補心丸 治臟虛善恐怖如魘狀及婦人產後餘

疾月經不調方

當歸

防風

芍藥

附子

芍藥

甘艸

蜀椒

乾薑

細辛

桂心

半夏

厚朴

大黃

猪苓 各一兩

茯苓 一作茯神

千金方衍義卷三

主

掃葉山房

遠志 各二兩

右十六味為末蜜丸如梧子大酒服五九日三不

知加至十九冷加熱藥

恐怖雖屬心腎之虛然如魘狀乃虛陽鼓激痰涎

湧塞心包而成正虛邪實之象虛能受熱故用薑

附實能受寒故用大黃獨倍用遠志引領諸藥歸

就心包以建補虛逐實之功諸臟安和則君主泰

然又何必專用補心之藥乎

心勞第三 論一首 方一首

論曰心勞病者補脾氣以益之脾王則感於心矣人

逆夏氣則手太陽不長而心氣內洞順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣

大黃洩熱湯 治心勞熱口為生瘡大便苦難閉 澀不通心滿痛小腸熱方

大黃

澤瀉

黃芩

芒硝

梔子仁 各三兩

桂心

通艸

石膏 各二兩

甘艸 一兩

大棗 二十枚

右十味咬咀用水九升先以水一升別浸大黃一宿餘八升煮諸藥取二升五合去滓下大黃煮兩沸去滓下芒硝合烱分三服

千金方衍義卷十三

主

掃藥山房

衍義 心勞則火氣內燔勞之太過則心氣內洞宜補

脾以益之土實則火不妄發君主自寧若火氣方熾又須泄熱為務硝黃石膏羣行泄熱惟取桂心為從治之導耳

脈極第四 論一首 方一首 灸法二首

論曰凡脈極者主心也心應脈脈與心合心有病從脈起又曰以夏遇病為脈痺脈痺不已復感於邪內舍於心則飲食不為肌膚咳脫血色白不澤其脈空

虛口脣見赤色凡脈氣衰血焦髮墮以夏丙丁日得之於傷風損脈為心風心風之狀多汗惡風若脈氣實則熱熱則傷心使人好怒口為色赤甚則語言不快血脫色乾燥不澤飲食不為肌膚若脈氣虛則寒寒則咳咳則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺故曰心風虛實候也

生地黃煎 治脈熱極則血氣脫色白乾燥不澤 飲食不為肌膚消熱止極強胃氣方

生地黃汁

生麥門冬

赤蜜 各一升

葶心 一作 葶

遠志 各二升

人參

千金方衍義卷十三

主

掃藥山房

白朮

茯苓

芍藥

乾地黃 各三兩

甘艸 二兩

石膏 六兩

生薑 藜 四兩

右十三味十一味咬咀以水一斗二升煮取二升七合去滓下地黃汁及蜜更煎取三升半分四服

衍義 血枯氣脫脈極而咳故用二地芍藥以滋血參苓朮甘以益氣門冬姜藜以潤肺葶心石膏以清胃

遠志赤蜜以通心而行諸味膩滯之性也

灸法

胸中痛引腰背心中下嘔逆面無滋潤灸上門隨年壯

穴在俠巨闕兩邊相去各半寸

顏色焦枯勞氣失精肩臂痛不得上頭灸肩髃百壯

穴在肩外頭近後以手按之有解宛宛中

脈虛實第五 論一首 方三首 鍼灸法二首

論曰凡脈虛者好驚跳不定脈實者洪滿凡脈虛實

之應主於心小腸若其肺臟有病從熱生則應臑寒

則應臑也

防風圓 補虛調中治脈虛驚跳不定乍來乍去

上小腸腑寒方

防風 桂心 通艸

千金方衍義卷三 通艸

扶神 遠志 麥門冬

甘艸 人參 白石英 各三兩

右九味為末白蜜和丸如梧子大酒服之十九日

再加至四十九

衍脈虛而用桂心石英遠志當矣反用防風為手兼

木通同入手足太陽引領人參扶神等味歸就心

與小腸千金與此稍露一斑特為拈出以開

學人心目

升麻湯 治脈實洪滿主心熱病方

升麻 子芩 澤瀉

梔子仁 淡竹葉 芫硝 各二兩

生地黃 切一升

右七味咬咀以水九升煮取三升去滓下芫硝分

三服

衍脈實洪滿心與包絡邪實之應心主血故用生地

黃黃芩涼血為主然火逆上僭非芫硝梔子竹葉

澤瀉并通二陰不能旋折其威又需升麻開發於

上分解蘊隆之勢也

麻黃湯 調心洩熱治心脈厥大寸口小腸熱齒

齟噬痛方

千金方衍義卷三 細辛

麻黃 生薑 各四兩 芫硝 各三兩

子芩 茯苓 芍藥 各三兩

白朮 二兩 桂心 一兩 生地黃 切一升

右九味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服須

利加芫硝三兩

衍心脈厥大言左寸沉伏而按之益大應指厥厥動

搖故宜生地黃黃芩清利伏熱即以麻桂薑辛辛

溫散結茶苓白朮填其空以杜火氣之復入芍藥

為地黃之佐使勢甚則加芫硝與前升麻湯法不

殊

鍼灸法

脈不出鍼不容穴在幽門兩傍各一寸五分是

心悶痛上氣牽引小腸灸巨闕二十七壯

心腹痛第六論一首 二十六首 鍼灸法二十五首

論曰寒氣卒客於五臟六腑則發卒心痛胸痺感於

寒微者為咳甚者為痛為泄厥心痛與背相引善瘕

如物從後觸其心身僂僂者腎心痛也厥心痛腹脹

滿心痛甚者胃心痛也厥心痛如以鍼錐刺其心

痛甚者脾心痛也厥心痛色蒼蒼如死灰狀終日不

得太息者肝心痛也厥心痛臥若從心間痛動作痛

益甚色不變者肺心痛也真心痛手足清至節心痛

甚且發夕死夕發旦死虻心痛心腹中痛發作腫聚

往來上下行痛有休止腹中熱善涎出是虻咬也以

手按而堅持之勿令得移以大鍼刺之復久持之蟲

不動乃出鍼心下不可刺中有成聚不可取於膈腸

中有蟲虻咬皆不可取以小鍼

治寒氣卒客於五臟六腑中則發心痛方

大黃 芍藥 柴胡各四

升麻 黃芩 桔梗

鬼白 鬼箭羽

硃砂兩

桂心

朴硝各二

右十一味咬咀以水九升煮取二升七合分三服

先分硃砂作三分每服內一分攪勻服之得快利

如痛不止宜服後方

赤芍 六兩

桔梗

杏仁各五

右三味咬咀以水六升煮取三升分三服

邪有寒熱之辨痛有臟腑之分而此統言寒熱臟

腑者以寒邪伏久而蘊熱熱毒煩發於臟腑故用

升柴開發於上稍黃蕩滌於下桂芍破寒熱而因

結衛茅散賊風惡血鬼門辟惡氣不祥丹砂攝浮

遊諸邪黃芩清肌表之熱桔梗利膈上諸氣氣血

和而臟腑安痛當自止設得快利而痛猶未除者

此因結雖通而氣血未調也但須赤芍杏仁桔梗

調血和營清膈利氣氣血平而痛自愈不得復行

攻擊也

九痛丸 治九種心痛并療冷衝上氣落馬墮車

血疾等方 一蟲心痛二疰心痛三風心痛四停

八熱心痛九束去 心痛此之謂九痛

附子

乾薑各二

吳茱萸

人參

巴豆各一

生狼毒四兩

千金方卷之三

五

攝業山房

千金方卷之三

五

攝業山房

右六味爲末蜜和丸如梧子大空腹酒服三九卒
中惡腹脹痛口不能言者服五九日一服連年積
冷流注心胸者亦服之好好將息神驗附子三兩
各一兩

衍 乾薑狼牙

附子三兩乾薑一兩意在辟除腎氣凌心也千金
改用薑附各二兩意在兼理胃中陳積也又原方

用生狼牙一兩千金以其難覓改用狼毒四兩以
狼毒性緩不若狼牙之力銳且千金首言蠱心痛

故專殺蠱爲務濟以巴豆吳茱萸之迅烈助以人

參之振胃驅邪而方仍列心臍門者以諸痛靡不

本於血病血則心之所主也喻嘉言曰九種心疾
乃容邪之劇証卽腎氣凌心脚氣衝心之別名也

痛久血淤陰邪搏結溫散藥中加生狼牙巴豆吳
茱萸驅之從陰竅而出以其邪據胸中結成堅壘

非搗其巢邪終不出耳

治九種心痛方

取當太歲上新生槐枝一握去兩頭咬咀以水
三升煮取一升頓服

衍 槐木虛宿之精益腎清心凡心痛屬血熱者宜之

桂心三物湯 治心中痞諸逆懸痛方

桂心 生薑各二兩 膠飴半斤

右三味取二味咬咀以水六升煮取三升去滓內

飴分三服用仲景用枳實五枚不用膠飴附後
枳實五枚白米二兩爲五味

衍 桂心通心氣散血結生薑去穢氣通神明膠飴和

脾氣緩急痛凡心痛之屬虛冷者宜之

崔氏烏頭丸 治心痛徹背背痛徹心方

烏頭六銖 附子 蜀椒各半

乾薑 赤石脂各半

右五味爲末蜜丸如梧子大先食服三九日三不

知少增之范汪不用附子服如梧子二
崔氏用桂心半兩爲六味

衍 胸中陽氣不布陰邪據據所以心痛徹背背痛徹
心故金匱取崔氏烏頭赤丸更其名曰赤石脂丸

以烏附椒薑之辛烈破陰復陽石脂之重瀉填塞
陰邪往來之路也

治心痛方 桃白皮煮汁空腹以意服之崔氏用療
桂心煎

治暴心痛或如中惡口中涎出不可禁止回回欲

吐方

苦參十斤

右一味咬咀以水一石煮取二斗去滓下苦酒二斗更煮取五升加大黃末熬和煮汁中前令可丸并手丸之如梧子大每服以酒一升浸三四十九日一當倒腹吐不吐下利更酒浸苦參一斤浸久彌佳非止暴痢如骭骨骭等痛凡是腹中之疾悉主之又治宿冷血結陰痺頻用有效大良

治卒中惡心痛方

苦參 三兩

右一味咬咀以好酢一升半煮取八合強者頓服

老小分二服

千金方義卷三

素

攝陳山房

又方

桂心 一兩

右一味咬咀以水四升煮取一升半分三服

治蟲心痛方

鶴蝮為末 蜜丸如梧子大服四十九蜜湯下日

一服可加至五十九慎酒肉

又方

鶴蝮一兩為末溫酢一盞和空腹服之蟲當吐

出

又方

服漆一合方見後養生服餌篇中凡蟲心痛皆用漆主之

桃白皮活血通膈膜滯血 苦參汁入苦酒下大

黃末治腹中熱血云宿冷血結陰癖者始由冷積終變鬱熱也 卒中惡心痛輕者只用苦參苦酒

者服以湧泄之 桂心治痼冷結血 鶴蝮治蟲

疰心痛取蜜丸誘入蟲口也 鶴蝮溫酒和服者

取其上涌也 漆能殺蟲然須服灰用之

五辛湯 治心腹疼痛方

細辛 蜀椒 桂心

防風

乾薑

當歸

烏梅

大棗 各十枚

右十四味咬咀以水九升煮取三升分四服

細辛椒薑黃桂以散心腹結痛苦參梔子兼歸芍

地黃以和營血蘊熱甘艸大棗以和五辛二苦之

性并和胃氣行藥力也其妙用尤在防風開發衛

氣以通蘊結於外烏梅宣播胃氣以收津液於內

也

千金方義卷三

辛

攝陳山房

肝角丸 治心腹久痛積年不定不過一兩附還
發甚則數日不能食又便出乾血窮天下方不
能瘥甄立言處此方數日即愈

犀角

麝香

雄黃

桔梗

秦艸

鬼臼

桂心

芫花各半兩

甘遂一兩

附子

光明砂各六錢

貝齒五枚

巴豆二十枚

赤足蜈蚣二枚

右十四味為末蜜丸如梧子飲服九日二漸加

至三九以微利為度古今集驗無雄黃

千金方衍義卷三

三

醫藥山房

心腹久痛積年不定而至便血不食此必毒邪伏

匿於幽隱之處故立言專以犀麝雄黃等味辟除

惡毒為主明砂鎮心安神貝齒磨堅破血桂附鼓

激諸藥之性也

高良薑湯 治心腹絞痛如刺兩脇支滿煩悶不

可忍方

高良薑五兩

厚朴二兩

當歸

桂心各三兩

右四味咬咀以水八升煮取一升八合分二服日

一若一服痛止便停不須更服強者作二服若者

分三服

心腹絞痛而見腸滿如刺明係木邪凌土之實證

故用良薑厚朴溫散滯氣當歸桂心溫散結血兼

行心肝肺三經以破寒積也

當歸湯 治心腹絞痛諸虛冷氣滿痛方

當歸

芍藥

厚朴

半夏各二兩

桂心

甘草

黃芪

人參各二兩

乾薑四兩

蜀椒一兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升二合分四服羸

弱入分六服小兒六分冷加附子一枚良

高良薑湯專主寒結暴痛當歸湯專主虛滿久痛

故於前方裁去良薑之壯火易入乾薑以溫中兼

芍藥佐當歸平反佐厚朴蜀椒佐桂心以除旺氣

一參芪甘艸保元氣也

又方 治虛冷腹痛不下飲食食復不消膨脹者

方

當歸

茯苓各五兩

黃芪

紫苑各四兩

高良薑

乾薑各六兩

鹿茸

桂心

肉桂各

昆布

橘皮各三分

甘艸二兩

烏頭一兩

大棗四十枚

桃仁一百枚

地骨皮

法麴

大麥蘖各一升

右十八味咬咀以水一斗五升煮取四升二合分為五服下利加赤石脂龍骨各三分渴加麥門冬

一升

衍義方中良薑乾薑合上二方之義麴蘖橘皮昆布即

上方厚朴半夏之義鹿茸菴蓉即上方人參保元

之義桃仁即上方芍藥佐當歸之義烏頭即上方

蜀椒佐桂心之義其他茯苓紫苑大棗地骨皮專

千金方衍義卷三

掃葉山房

解二薑之辛燥也

又方 治寒冷腹中痛方小品云吳茱萸湯

當歸二兩

桂心

甘艸

人參各一兩

生薑五兩

半夏

小麥各一升

吳茱萸二升

右八味咬咀以水一斗五升煮取三升分三服日

三亦治產後虛冷

衍義千金以南陽陽明何中吳茱萸湯去大棗之戀膈

易甘艸以緩痛當歸桂心助吳茱萸以溫血小麥

助人參以益氣半夏助生薑以滌痰痰滯氣溫而

痛自除乃南陽法中之

妙小品仍以吳茱萸湯

名之

又方 治冷氣脇下往來衝胸膈痛引脇背悶者

方

當歸

桂心

人參

甘艸

吳茱萸

芍藥

大黃各二兩

茯苓

枳實各一兩

乾薑三兩

右十味咬咀以水八升煮取二升半分三服日三

並治尸疰亦佳外臺仲景方無茯苓枳實

千金方衍義卷三

掃葉山房

衍義前方意在祛痰故用半夏佐生薑以散結此方意

在蕩實故用乾薑佐茱萸以泄滿茯苓佐人參以

助氣芍藥佐桂心以和血枳實佐大黃以導滯當

歸和血甘艸和中心腹諸痛之所必需以其人本

虛邪實非人參薑桂不能助枳實大黃開結導滯

之力也

又方 治久寒疾胸腹中痛時下利方

當歸三兩

附子一兩

乾薑四兩

甘艸

柑皮各二兩

右五味咬咀以水八升煮取二升分三服日三

衍義胸腹久痛而至時下利陰邪浸淫已極非通脈四

逆無以恢復元陽兼當歸之辛溫以和營血柑皮

之辛涼以清肝氣柑取粵東高涼化州者為勝附

以蜀川成都者為優

又方 治久寒宿疾胸腹中痛短氣時滯下利方

當歸 附子一兩

桂心 各三兩

乾薑 四兩

右四味咬咀以水八升煮取二升分三服日三

范無附子有甘艸二兩云虛冷欲痛甚者加黃芪芍藥各二兩

衍義此以前方除去甘艸之甘緩柑皮之辛散特進桂

千金方卷三

薑

橘葉山房

心配當歸薑附以峻溫營血也

溫中當歸湯 治心腹中痛發作腫聚往來上下

痛有休止多熱喜涎出是虺蟲咬也服二三劑

後若不效有異宜改方增損之

當歸 人參

乾薑

茯苓 厚朴

木香

桂心 桔梗

芍藥

甘艸 各二兩

右十味咬咀以水八升煮取三升分溫五服日三

不耐木香者以犀角一兩代之

衍義方下所主渾是蟲積患痛而所用諸藥咸係溫中

之品惟桂心入心助火亦能散火厚朴木香得參

苓桂薑迅掃堅積備素稟津枯不勝燥烈者則以

犀角代木香二味木炭殊途而散結之力則

羊肉當歸湯 治腹冷絞痛方

橘皮

黃芪

芍藥

芎藭

桂心

獨活

防風 各三兩

吳茱萸

人參

甘艸

乾地黃

茯苓 各一兩

千金方卷三

薑

橘葉山房

生薑 六分

大棗 三十枚

右十七味咬咀以水一斗半先煮羊肉取一斗出

肉內諸藥煮取三升分三服日三覆取溫煖

衍義金匱當歸生薑羊肉湯專主產後腹中疔痛及寒

疔痛雖有衝擊結滯之不同而和營散結之治則

一如本方合小建中黃芪建中以治虛勞裏急諸

不足合理中八珍以治氣血虛寒諸不足合吳茱

萸湯三物大建中以治胃虛嘔逆諸不足建中

中除去膠飴之粘滯理中八珍方中除去白朮之

塞閉大建中方中除去蜀椒之耗氣更加獨活防風佐黃芪以禦外內合邪橘皮佐薑桂以滌涎飲下滯氣也

溫脾湯 治腹痛臍下絞結連臍不止方

甘艸 附子 人參

芒硝 各一兩 當歸 乾薑 各三兩

大黃 五兩

右七味咬咀以水七升煮取三升分服日三

〔衍〕臍下腹中明係少陰部分故其治不離通脈四逆湯為主然結痛不止又須附子瀉心湯以苓連易

千金方衍義卷三

三

掃葉山房

芒硝而峻攻之加當歸人參以助血氣辟陰邪陰邪散則陽和布土膏煖則君澤施瀉心非在苓連

溫脾專賴硝黃能達斯義則千金以是方歸之心臟有著落矣

生薑湯 治胸腹中卒痛方

生薑 一斤 食蜜 八兩 醴醐 四兩

右三味微火上耗令柁得適寒溫服三合日三

〔衍〕胸腹中卒痛審無宿滯固結但需生薑以散虛火

之逆酥蜜以滋津血之燥不煩猛劑峻攻也

熨蒸法 凡心腹冷痛者

熨蒸法 凡心腹冷痛者

熬鹽一斗裂或熬薑沙燒磚石蒸熨取其裏溫煖止蒸土亦大佳

〔衍〕鍼灸法 鍼灸法 凡邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而調

其膈

腎心痛先取京骨崑崙發鍼不已取然谷

其膈

胃心痛取大都太白 脾心痛取然谷太谿 肝心痛取行間太衝 肺心痛取魚際大淵 心痛引腰脊欲嘔刺足少陰

心痛引背不得息刺足少陰不已取手少陰

心痛腹脹瀉瀉然大便不利取足太陰

心痛小腹痛上下無常處洩便難刺足厥陰

千金方衍義卷三

三

掃葉山房

心痛短氣不足以息刺手太陰

心痛不可按煩心巨闕主之

心痛有三蟲多涎不得反側上腕主之

心痛身寒難以俛仰心疝衝胃死不知人中腕主之

心痛如鍼錐刺然谷及太谿主之

心腹中卒痛石門主之

心疝暴痛取足太陰

心疝暴痛取足太陰

心疝暴痛取足太陰

心疝暴痛取足太陰

心懊懷微痛煩逆灸心膻百壯

心痛如錐刀刺氣結灸膻膈七壯

心痛冷氣上灸龍領百壯在鳩尾頭上行一寸半不可刺之

心痛惡氣上勝急痛灸通谷五十壯在乳下二寸

心痛暴絞急絕欲死灸神府百壯在鳩尾正心有息

心痛堅煩氣結灸太倉百壯

心痛暴惡風灸巨闕百壯

心痛灸臂腕橫文三七壯又灸兩虎口白肉際七壯

胸痺第七論二首方十二首灸法五首

千金方術義卷三

表

編撰山房

論曰胸痺之病令人心胸中堅滿痞急痛胸中苦痺絞

急如刺不得俛仰其胸前皮皆痛手不得犯胸中懣

懣而滿短氣咳唾引痛咽塞不利習習如癢咳中乾

燥時欲嘔吐煩悶自汗出或微引背痛不治之數日

殺人

胸痺一證古所未詳世亦罕究金匱始發其端千

金鑑統其緒首言心中堅滿痞急痛形容病根盤

結之狀最切胸中苦痺絞急如刺不得俛仰胸前

皮皆痛手不可犯有諸內必形諸外也胸中懣懣

而滿短氣咳唾引痛咽塞不利氣道阻逆也習習

如癢咳中乾燥氣有餘便是火也時欲嘔吐自汗

出火從內外尋出路也微引背痛背者胸之府也

不治之數日殺人極言其證之劇然病有淺深不

可藥以為限也

論曰夫脈當取太過與不及陽微陰益即胸痺而痛

所以然者責其極虛故也今陽虛知在上焦所以胸

痺心痛者以其人脈陰弦故也

趙以微云陽微在胸中氣分上看故曰陽微知在

上焦陰弦在陰脈上看如陰寒之脈上干胸中氣

分則為胸痺如陰氣上乘於心則為心痛也

千金方術義卷三

字

編撰山房

平人無寒熱短氣不足以息者實也

上條是言不及此則言太過也平人蓋言無內傷

外感而患短氣不足以息者當是胸中邪氣窒塞

胸中陽氣不得上通於胸中故為實也

栝蘘湯 治胸痺病喘息咳唾胸背痛短氣寸脈

沉而遲關上小緊數方

栝蘘實一枚

半夏半升

薤白半斤

枳實二兩

生薑四兩

右五味咬咀以白酒漿一斗煮取四升服一升日

三升景祐後不見

生薑枳實生煎

義衍 金匱百列栝實雞白白酒湯方用栝實一枚雞

白半斤白酒七升藥止三味治與此例相同趙以

德云寸口脈沉遲者陽氣微也關上小緊者胃以

上有陰寒結聚所以胸中喘息咳唾胸背痛而短

氣栝實性潤專以滌垢膩之痰雞白臭穢用以通

穢濁之氣同氣相求也白酒熟穀之液色白上運

於胸中使佐藥力上行極而下耳其次方減雞白

五兩加半夏半升名栝實雞白半夏湯治胸痺不

得臥心痛徹背以胸中痰垢積滿循脈而溢於背

背者胸之脈故於前藥量減雞白之穢濁加半夏

千金方衍義卷三

聖 歸葉山房

以祛痰積之痺逆千金參入枳實生薑以滌痰之

藥最勝故雞白仍照木方不須裁減

枳實雞白杜枝湯 治胸痺心中痞氣氣結在胸

胸滿脇下逆搶上方

枳實 四枚 雞白 一斤 桂枝 一兩

厚朴 三兩 栝實 一枚

右五味咬咀以水七升煮取二升半分再服仲景方用

厚朴四兩雞白半斤水

五升煮取二升分三服

義衍 此條金匱主以二方枳實雞白桂枝湯治痰氣結

聚於胸中胸滿溢於經脈從脇下逆上以搶於心

故用枳實雞白桂枝以分解之若其人素稟之虛

即用人參理中以溫散之以此證屬實者多所以

千金取前一為例不錄後方也

茯苓湯 治胸中氣寒短氣方

茯苓 三兩 甘艸 一兩 杏仁 五十枚

右三味咬咀以水一斗三升煮取六升去滓為六

服日三末堞更合服

治胸痺候胸中煩懣如滿噎塞習習如蟻喉中澀

燥唾沫宜此方

橘皮 一斤 枳實 五枚 生薑 半斤

千金方衍義卷三

聖 歸葉山房

右三味咬咀以水五升煮取二升云滓分再服金匱

名橘皮枳實生薑湯

義衍 金匱名茯苓杏仁甘艸湯夫短氣不足以息者實

也即上條平人無寒熱之例治也橘皮枳實生薑

湯即前參人栝實湯中二味皆利氣之劑一疏肺

氣於上一疏胃氣於中也

治中湯 治胸痺方方見二十卷勝

通氣湯 治胸滿短氣噎塞方

半夏 八兩 生薑 六兩 橘皮 三兩

吳茱萸 四兩

右四味咬咀以水八升煮取三升分三服 一方
無橘皮用桂心二兩

衍胸痺滿痛短氣皆由痰濕凝著加以噎塞則又木

邪乘上胃中陽氣不得宣通之故故取金匱生薑

半夏湯合橘皮湯二方并採吳茱萸湯之半以散

胃中濁垢兼疏肝氣之逆也

細辛散 治胸痺達背短氣方

細辛 甘艸各二兩 枳實

生薑 桔萸實 乾地黄

白朮各三兩 桂心 茯苓各五兩

千金方衍義卷三 聖 醫 藥 山 房

右九味治下飾酒服方寸七日三

衍胸痺達背隱痛胸中大氣不布致濁痰凝垢攻衝

背膈故用薑桂細辛辛溫利痰積木苓甘甘溫健

脾栝萸滌痰地黃滋血乃栝皮枳實生薑湯之變

法也

蜀椒散 治胸痺達背方

蜀椒 食茱萸各一兩 枳心

桔梗各三兩 烏頭半兩 政六兩

右六味治下飾食後酒服方寸七日三

衍胸痺達背隱痛而無噎塞短氣胃雖阻逆當非膏

滿可知故但須椒萸薑桂以散寒結栝梗香豉以
導虛逆崔氏烏頭丸之變方也

前胡湯 治胸中逆氣心痛徹背少氣不食方

前胡 甘艸 半夏

芍藥各二兩 黃芩 當歸

人參 桂心各一兩 生薑三兩

大棗三十 竹葉一升

右十一味咬咀以水九升煮取三升分四服

又方

前胡 甘艸 半夏

千金方衍義卷三 聖 醫 藥 山 房

芍藥 人參 茯苓

生薑 麥門冬 錫各三兩

黃芩 當歸 桂心各一兩

大棗三十枚

右十三味咬咀以水一斗四升煮取三升去滓分

二服

衍胸痺多由寒熱之邪痺著心下故金匱咸以辛溫

散結滌除痰垢為務千金補所未逮復立前胡湯

二方以治風熱內蘊逆氣上攻之證專取前胡之

祛風下氣參入桂枝湯中更加半夏以滌痰垢參

歸以助氣血竹葉以泄風熱旺氣也 又方即於
前湯中加麥門冬茯苓清心利水功勝竹葉并入
膠飴以緩急痛內補建中湯成法也

烏頭

細辛

附子

羌活

蜀椒

桂心各五兩

芎藭一兩六銖

右七味治下篩帛裏微火炙令煖熨背上取瘥乃

止慎生冷如常法

衍義背者胸之腑烏附蜀椒內服則溫經絡外熨則通

千金方衍義卷十三

聖 補葉山房

朕理佐以辛桂芎藭開導血氣羌活專行脊脈以

子邪之出路變烏頭丸為熨法也

下氣湯 治胸腹背閉滿上氣喘息方

杏仁四七枚

大腹楨榔二七枚

右二味咬咀以童子小便三升煎取一升半分再

服曾患氣發輒合服之

衍義借茯苓湯中杏仁以下氣配大腹楨榔以泄滿更

需童子小便導之下行然惟初病氣實者為宜

楨榔湯 主破胸背惡氣聲音塞閉方

楨榔極大者四枚小者八枚

右一味二品咬咀以小兒尿二升半煮減一升去
滓分三服頻與五劑永定

灸法

胸痺引背時寒間使主之

胸痺心痛天井主之

胸痺心痛不得息痛無常處臨泣主之

胸痺心痛灸臚中百壯穴在鳩尾上一寸忌鍼

胸痺滿心痛灸期門隨年壯穴在第二肋端乳直下

千金方衍義卷十三

聖 補葉山房

一寸半

頭面風第八 方九十二首

芎藭酒 治腦風頭重頸項強眩淚出善欠目

欲眠睡憎風劇者耳鳴滿眉眼疼悶吐逆眩倒

不自禁諸風乘虛經五臟六腑皆為癩狂諸邪

病悉主之方

芎藭

辛夷

天雄

人參

天門冬

柏子仁

磁石

石膏

茵芋

山茱萸

白頭翁

桂心

秦艽各二兩

松蘿

羚羊角

細辛

薯蕷

菖蒲

甘艸各二兩

雲母一兩燒令防風亦未為粉 防風四兩

右二十一味咬咀以酒二斗漬七日初服二合漸

加至五合日三有女人少時患風眩發則倒地為

婦積年無兒服此酒并將紫石英門冬丸服之眩

瘥生兒平復紫石英門冬丸見前婦人門中

行義諸風之患良由心包之火擾動於外故見證種種

究其所由不離內火招風是以頭風眩暈牽引遊

風等證請治悉歸附此如芎藭酒治腦風吐逆癩

千金方衍義卷三

早

攝葉山房

狂諸邪專以祛風散結清心安神鎮攝虛火為主

方中芎藭辛夷天雄石膏茵芋羚羊白頭翁秦艽

松蘿細辛防風一派皆祛風散結之藥兼人參柏

仁天冬薯蕷菖蒲甘艸清心安神之劑以滋風藥

之性磁石山英桂心雲母鎮攝虛火使不上乘心

包漬之以酒行其藥力也

參湯 治頭眩屋轉眼不得開方

人參

當歸

防風

黃芪

芍藥

麥門冬各一兩

獨活

白朮

桂心各一兩

右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服

行義方合保元生脈四君四物建中等方各二平調精

津血氣兼取獨活防風透入參芪歸芍劑中并賴

桂心以行其勢允為虛風眩暈之神丹也

防風湯 治風眩嘔逆水漿不下食輒嘔起即眩

倒發有時手足厥冷方

防風

防己

附子

乾薑

甘艸各一兩

蜀椒

桂心各二兩

右七味咬咀以水四升煮取二升分三服日三古今

千金方衍義卷三

哭

攝葉山房

錄驗有白朮一兩

又方 治頭風眩欲倒眼旋屋轉腦痛方

防風

枳實

杏仁

芎藭各三兩

茯神

麻黃

前胡

半夏

生薑各四兩

細辛 二兩

竹瀝 三升

石十一味咬咀以水六升合竹瀝煎取二升七合

分三服頓服三兩劑佳

行義前方主風眩嘔逆手足厥冷不但中焦式微抑且

邪乘虛陷非椒薑桂附無以搜坎陷之邪 又方

治風痰上盛故用防杏麻前芎辛以散表若半枳
薑竹瀝以滌痰一主本虛一治邪實兩不移易之
定法

茵芋湯 治風虛眩暈暗方

茵芋 一分 人參 甘艸

菴蓉 黃芪 茯苓

秦芎 厚朴 烏喙各二兩

防風六兩 山茱萸 松實各三兩

右十二味咬咀以水一斗煮取二升半分五服強

者一日夜盡羸劣者二日盡

千金方衍義卷三

兜

婦科山房

茵芋烏喙風毒方中眩暈之藥佐以防風黃芪助

以參芎甘艸更須菴蓉山茱萸以實不元痺朴秦芎

推陳致新松實清潤疏風深得補瀉兼濟之妙但

烏喙太毒宜以烏頭代之

鴉頭酒 治頭風眩轉而上遊風方

飛鴉頭五枚 茯神一方 防風

芎藭 薯蕷各四兩 葛根

桂心 細辛 人參

天雄 乾薑 枳實

貫衆 蜀椒各三兩 獨活

山茱萸

麥門冬一作天門冬

石南一作石楠

台十八味咬咀稍囊盛清酒四斗漬六宿初服二

合日再稍加以知為度

鴉性稟陰毒而能旋風健搏故千金聖惠用其頭

以治頭風眩轉及面上遊風總取以毒攻毒而已

然須以溫補煖腎藥及風藥佐之方克有濟

大三五七散 治頭風眩口喎目斜耳聾方

天雄局方用 細辛各三兩 山茱萸

乾薑各五兩 薯蕷 防風各七兩

右六味治下篩以清酒服五分七日再不知稍加

千金方衍義卷三

辛

婦科山房

千金翼云赤

治面骨疼痛 小三五七散 治頭風目眩耳聾方

天雄三兩 山茱萸五兩 薯蕷七兩

右三味治下篩以清酒服五分七日再不知稍增

以知為度

頭風多緣腎水不充痰濕上盛故大三五七散以

天雄之純陽峻補三焦壯火祛邪本經治大風寒

濕痺歷節痛拘急破積聚邪氣佐以山茱萸逐寒

濕痺薯蕷治傷中補虛麻細辛主頭痛腦痛防風

治大風頭眩痛乾薑逐風寒濕痺皆地風門中頂

門之錘 小三五七散專主腎肝虛風原無容邪
侵擾故去細辛乾薑防風但取薯蕷山萸以緩天
雄之性虛風得以自除矣

茯神湯 治風眩倒屋轉吐逆惡聞人聲方

茯神 獨活各四 黃芪

遠志 防風各五 生薑 三兩

人參 白朮 甘艸

附子 菴藷 當歸

牡蠣 各二

右十三味咬咀以勞水一斗二升煮取三升服五

合一日夜盡 千金方衍義卷三 至 掃葉山房

防風散 治頭面風在眉間得熱如蟲行或頭眩

目中淚出方

防風 五兩 桂心 天雄

細辛 人參 附子

烏頭 乾薑 硃砂 各二兩

莽艸 茯苓 當歸 各一兩

右十二味治下篩酒服方寸七日三

又方 治風頭眩惡風吐冷水心悶方

防風 二兩 桂心 半兩 天雄 翼方作人參

細辛 附子 薯蕷

澤瀉 澤瀉一兩 茯苓 各一兩 乾薑 半兩

白朮 半兩

右十味治下篩酒服方寸七常令酒氣相接則脫

巾帽解髮梳頭百過復投一升酒便洗手足須臾

自熱解髮以粉粉之快然使熟眠愈亦可洗頭面

汗出 翼云如服寒食散法

義衍 茯神湯治風眩吐逆惡聞人聲脾腎虛風挾陰火

而上逆故用朮附統攝虛風保元固護衛氣歸芪

溫補營血茯神遠志交通心腎菴藷牡蠣益精收

澀獨活防風搜風逐邪生薑辛散發越諸藥性味

也 防風散治風眩淚出乃風毒外擾所以眉間

如蟲行狀故用三建湯之天雄烏附佐莽艸辛防

以搜風毒參苓乾薑兼當歸桂心以溫血氣丹砂

一味安鎮心神不使毒邪干犯君主也 又方治

風眩惡風吐水心悶此陽虛水停心下故用五苓

散中之四并雄附薑辛以散水逆薯蕷以療虛風

防風以祛風濕也至於方後服法豈非宿有成驗

而為詳述如此

治風眩翻倒無定方

獨活 六兩 石膏

菊藶 各四兩

枳實 三兩一方
用枳實

右四味咬咀以清酒八升煮取四升頓服之以藥

滓髮頭覆眠取汗覺脊又內錯中炒令熱熨之

衍義 翻倒無定乃風火相煽之象方用獨活祛風石膏

清火菊藶通痺枳實開結服湯熨滓深得內外夾

攻之妙其妙全在菊藶一味本經治骨間諸痺四

肢拘攣痿痲膝寒陰痿短氣不足脚腫金匱治金

瘡王不甞行散及外臺方多用之此即陸英之野

生者世以其賤而棄之

千金方衍義卷三

十一

福葉山房

治患頭眩經久得瘥後四體漸羸食無味好食黃

土方

麵 三斤

白朮 三斤

右二味為末酒和併手丸如梧子曝乾飲服三十

九日三斷食土為效

衍義 患後體羸好食黃土乃脾傷蟲積之候故以麵朮

理脾運積作丸緩攻漸圖平復誠非湯藥可期應

效也

治頭中五十種病方

巴戟

菊花

芍藥

乾薑

栝藎根

防風

石南

白朮

烏頭

山茱萸

附子

細辛

薯蕷

蜀椒

乾地黄

人參

桔梗

秦艽

澤瀉

甘艸

天雄

羌活等

右二十二味治下篩以酒服方寸匕三

衍義 證患龐雜何能逐一主治提綱率領惟辛涼祛風

辛溫散結兼調先後天血氣所謂血行風自滅也

千金方衍義卷三

十一

福葉山房

摩頭散 治同前

茵茹

半夏

蜀椒 各六分

烏頭 八分

桂心 七分

莽艸

附子

細辛 各四分

右八味治下篩以大酢和摩頭記日數三日頭膚

痛四五日後一著藥如前十日以酢漿洗頭後摩

藥即愈若生息肉并咽喉中息肉大如雷欲塞以

藥摩之即愈耳鼻齒有疾並用之良

衍義 而茹治大風惡毒半夏逐濕開痰蜀椒治寒熱痺

痛烏頭治寒濕痺桂心利關節結氣莽艸治頭風

癰腫附子治寒濕拘攣辛治頭痛腦痛百節拘攣八味辛散藥中得苦酒之酸收使藥內達以搜逐病根何憚風毒不除息肉不化耶

入頂散 治頭面脹滿腦癩枯發作有時狀如刀刺失聲陰陰然疼面目變青方

山茱萸 芎藭 防風

獨活各一兩半 細辛 莽艸

白朮 薯蕷 牛膝

石南 甘艸各一兩 烏頭

通艸 苜蓿 附子

千金方義卷十三 掃葉山房

麻黃 天雄 蜀椒

桔梗各一兩

右十九味治下篩酒服方寸匕日三

頤面目變青陰壽上侮陽位也方用小三五七散兼

麻附朮附三建之製加入莽艸椒辛佐雄附烏麻

以追毒風牛膝石南佐茱萸以逐寒痺甘桔芎藭

佐薯蕷以補虛羸其餘獨活防風苜蓿通艸祛風

利竅又為莽艸之佐使耳

杏仁膏 治上氣頭面風頭痛胸中氣滿奔豚氣

上下往來心下煩熱產婦金瘡諸病方

杏仁二升去皮尖雙仁者不可用

右味搗研以水一斗濾取汁令盡以銅器燂火

上從旦煮至日入當熟如脂膏下之空腹酒服一

方寸七日三不飲酒者以飲服之慎猪魚蒜酢

義衍 杏仁治方下等證大都取其下氣氣下則熱自解

風自散

大豆酒 治頭風方

大豆三升炒令無聲

右一味以一斗二升瓶盛清酒九升乘豆熱卽傾

著酒中密泥頭七日溫服之

千金方義卷十三 掃葉山房

義衍 黑豆入腎控風淋酒治風毒拘攣與大豆柴湯

無異病在氣分宜用杏仁在血分合用大豆涇渭

攸分臨證毋忽

治中風頭痛發熱耳頰急方

麻黃 葛根 石膏

桂心各三兩 附子 芍藥

甘艸 秦艸 防風各二兩

生薑五兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服覆取汗

義衍 頭痛發熱頰急陰邪流入陰位雖在少陽陽明之

界端非柴胡可擬非麻葛不解風毒非桂附不散
陰邪奈芫防風生薑獨麻葛之匡佐石膏芍藥甘
艸為桂附之反謀耳

薯蕷散 治頭目有風牽引目睛疼痛偏視不明

方

薯蕷 三兩 細辛 二兩 秦艸

天雄 各二兩 獨活 桂心

吳茱萸 各二兩半

右七味治下篩酒服方寸七日三

衍頭風牽引目睛偏視陰邪掩奪陽光故借三五七

千金方卷之三 至 掃葉山房

散之天雄以破陰邪山茱萸以收精氣薯蕷以除

虐細辛以搜風毒桂心入肝散血通精功勝乾

薑秦芫獨活逐濕祛風與防風不殊也

治頭中痛身熱風熱方

竹瀝 三升 升麻 生薑

杏仁 各三兩 柴胡 芍藥 各四兩

石膏 生葛根 各八兩

右八味噉咀以水六升合竹瀝煮取二升七分

三服

衍頭風屬寒者多屬熱者少此但身熱風熱而無引

急吐逆等患洵為風熱無疑故以升柴葛杏生薑
升散客邪竹瀝石南芍藥滋化風濕另闢一番境
界具法眼者辨之

菊花散 治頭面遊風方

菊花 一兩 細辛 附子

桂心 乾薑 巴戟

人參 石南 天雄

茯苓 秦艸 防已 各二兩

防風 白朮 山茱萸

薯蕷 各三兩 蜀椒 五合 至 掃葉山房

千金方卷之三 至 掃葉山房

右十七味治下篩酒服方寸七日三

衍遊風而用三五七散更加參朮椒附復參桂苓巴

戟石南純是溫補下元之品略兼秦芫防已滲濕

開痺惟菊花一味專清面上遊風苟非素稟虛羸

無藉小題大做

治頭面上風方

松脂 石鹽 杏仁

蜜蠟 各一兩 薰陸香 二兩 苧麻仁 三兩

右六味熱搗作餅淨剉百會上髮貼膏膏上安紙

三日一易若瘻刺藥上不久風定

前方主虛羸人面上遊風此專治頭面風熱黃水
瘡故用松脂收濕杏仁潤燥薰陸止痛草麻拔毒
戎鹽與堅蜂蠟解毒作膏貼頂上百會穴乃外治
之良法

頭風摩散方

附子一枚中形者 鹽如附子太

右二味治下篩沫頭竟以方寸七摩頂上日三

衍頭風摩散金匱本治中風喎僻不遂專取附子以

散經絡之引急食鹽以治上盛之浮熱千金借此
以治頭面一切久伏之毒風也

千金方衍義卷三

羌

桐葉山房

治頭風方

服荆瀝不限多少取瘥止

又方

蔓荆子一升為末絹袋盛以酒一斗浸七宿温

服三合日三

又方

搗蒴藿根一升酒二升漬服汗出止

又方

臘月烏雞屎一升炒令黃為末絹袋盛以酒三

斗浸温服任性常令醺醉

又方

七月七日以麻勃三斗麻子一石末相和蒸之

沸湯一石五斗三遍淋之煮取一石漬神麴二

十斤令發釀黍米二石五斗熟封三七日服清

一升百日身中滯皮八風胸膈五臟骨體伏風

百病悉去

衍荆瀝治風逐濕解熱祛痰 蔓荆子治骨間寒熱

濕痺拘急 蒴藿治骨間諸痺四肢拘急疼痛

烏雞矢浸酒下氣除風 麻勃治惡風黑色遍身

苦癢麻子潤燥祛風釀酒治十種大風殊效

千金方衍義卷三

卒

桐葉山房

治卒中惡風頭痛方

搗生烏頭以大酢和塗故布上薄痛處須臾痛

止日夜五六薄逐痛處薄之搗烏頭須去皮

又方

鹽一升為末以麻油一升煎一宿令消盡塗頭

石鹽尤良

又方

芥子為末酢和敷頭一周時

衍烏頭治惡風濕痺酢專收斂藥力以盡攻毒之功

鹽能與堅麻油潤燥共襄解毒之力 芥子散

痛消毒豁痰利氣同一頭風取治各別所謂醫不
執方合宜而用可也

衍此後沐頭痛等方所主頭生白屑雖緣肺病究其
源多由勞心動氣胞絡火炎上燥肺金所致是以

千金悉附卷末至於髮落不生鬚白禿髮總因衝
脈不充無非精血衰耗心勞則火動於中熱發則

風擾於外為患種種未遑逐一衍說姑存以備採
用可也

沐頭湯

治肺勞熱不問冬夏老少頭生白屑搔
癢不堪然肺為五臟之蓋其勞損傷肺氣衝頭

千金方衍義卷三 全 補藥山房

頂致使頭癢多生白屑搔之隨手起人多患此

皆從肺來方

大麻子

秦椒各三升 皂莢屑半升

右三味熟研內泔中一宿漬去滓木篋攪百遍乃

用沐頭髮際更別作皂莢湯濯之然後傅膏

又方

菊花

獨活 茵芋

防風

細辛 蜀椒

皂莢

杜蘅 莽艸

桂心等分

右十味作湯沐及熨之

又方

猪椒根三兩 麻黃根 防風各二兩

細辛 茵芋各一兩

右五味以水三斗煮取一斗去滓温沐頭

又方

蜀椒二升水煮沐髮良

又方

葶藶子煮湯沫不過三四度愈

又方

以桑灰汁沐頭去白屑神良

治頭項強不得顧視方

蒸好大豆一斗令變色內囊中枕之

又方

常以九月九日取菊花作枕臥良

又方

八月後取荆芥鋪牀及作枕枕頭立春日去之

又方

穿地作小坑燒令赤以水沃之令小冷內生桃

葉滿布席就臥令項當藥上以衣著項兩邊令

氣蒸病上汗出良久愈若病大者作地坑亦大

犀角湯 治風毒熱頭面腫方

犀角 生薑 各二兩 苦參

栝蒌根 防風 各一兩 石膏 八兩

青木香 黃芩 升麻 各三兩

防已 一兩 竹葉 二握

右十一味咬咀以水七升煮取二升分三服相去

十里久內消不利

防風散 治頭面遍身風腫方

防風 二兩 白芷 一兩 白朮 三兩

千金方衍義卷三 治風毒熱頭面腫方

右三味治下篩酒服方寸七日三

治卒中風頭面腫方

搗杏仁如膏以雞子黃合搗令相得傅鼻上厚

裹之自乾不過八九傅瘥

令白髮還黑方

烏麻九蒸九曝為末棗膏為丸久服之

又方

旋覆花 一升 桂心 一尺 秦椒 一升

隴西白芷 一升

右四味治下篩并花水服方寸七日三服三十口

白髮還黑禁房室

沐頭湯 治厥極虛寒鬚髮落墮令髮潤澤方

桑根白皮切三升以水五升淹漬煮五六沸去

滓洗沐髮數為之自不復落

又方

麻子 三升 白桐葉 切一

右二味以米泔二斗煮五六沸去滓洗沐則髮長

甚有驗

治髮鬢墮落令生長方

生柏葉 一升 附子 四枚 猪膏 一斤

千金方衍義卷三 治髮鬢墮落令生長方

右三味為末膏和作三十九用布裹一丸內泔中

煎沐髮長不落其藥密貯勿令洩氣

又方

柏子仁 附子 蔓荊子 各半

右三味以烏雞膏和搗三千杵貯新磁器中封百

日出以馬鬃管和傅頭訖巾裹之勿令見風日三

傅即生 附後不用柏子 仁以酒漬澤沐

又方

桑葉 麻葉 分等

右二味泔煮去滓沐髮七遍長六尺

又方

羊糞八淋湯三日一洗不過十洗大生

摩膏 治頭中二十種病頭眩髮禿落面中風者

方

蜀椒

各二兩

莽艸

各二兩

桂心

蘭茹

各二兩

附子

各一兩

細辛

各一兩

半夏

各一兩

乾薑

各一兩

右八味咬咀以生猪肪二十兩合搗令肪消盡藥

成先沐頭令淨後以藥摩顙上口一如非十二月

合則用生烏麻油和塗頭皮沐頭令淨乃用之一

千金方衍義卷之三

奎

補藥山房

次生髮如昔必效丸無蜀椒莽艸乾薑半夏本門

生髮膏 治頭中風癢白屑方

蔓荊子

附子

細辛

續斷

零陵香

皂莢

澤蘭

防風

杏仁

藿香

白芷

各二兩

松葉

石南

各三兩

莽艸

各二兩

熊脂

三升

松膏

各一兩

猪脂

各二兩

馬鬃膏

各二升

右十八味咬咀以清酒醋各三升漬藥一宿明旦

以馬鬃膏等微火煎三上三下以白芷色黃膏成

用以澤髮

又方

烏喙

三兩

莽艸

石南

細辛

續斷

皂莢

澤蘭

白朮

辛夷

防風

白芷

各二兩

竹葉

柏葉

松葉

各半升

猪脂

四升

右十五味咬咀以清酢三升漬一宿明旦微火以

脂煎三上三下白芷色黃膏成去滓濾淨於沐髮

後塗之 一方用生油三大升翼方無石南白芷用杏仁去白屑良

千金方衍義卷之三

奎

補藥山房

又方

甘松香

丁香

白芷

澤蘭

槲白皮

桑寄生

大麻子

首楷

杏仁

辛夷仁

杜荊子

芎藭

防風

莽艸

各一兩

零陵香

吳藿香

細辛

蜀椒

各二兩

竹葉

松葉

柏葉

胡麻油

臘猪膏

各一升

烏雞肪

雁肪

各一升

右二十五味咬咀以酢漬一宿內油膏中微火煎
三上三下白芷色黃膏成去滓塗頭日二夜一髮
生

又方 治髮鬢禿落方

莽艸 一兩 防風

白芷 一兩 薺尾 各二兩

狗膏 一作狗膏 熊膏 一作雞膏

馬鬢膏 驢鬢膏 各半

右十一味其六味咬咀與諸膏合煎諸藥沸則下
停冷復上火三五沸止絞去滓傳頭當澤用之

又方 治眉落髮落復生方

白芷 附子 防風 芎藭 莽艸 辛夷 細辛 黃芩 當歸 蜀椒 各一兩 大黃 半兩 蔓荊子 一升 猪膏 三升 馬鬢膏 五合

右十四味熬膏去滓取除日之正午拔白塗之
當日勿飲酒食肉五辛經一拔黑者更不變也

治染鬢髮方

胡椒 三兩 石灰 六兩 絹袋 熟合黃

右二味如粉以榆皮作湯和之先以皂莢湯洗髮
令極淨不得令有膩氣如曝乾夜臥以藥塗髮上
令勻訖取桑葉相綴著頭巾上遍以裹髮一夜至
旦取酢漿煖洗髮又以醋甘熱煖洗髮又取生胡
麻苗搗取汁三升和水煮一二沸淨濾濯髮訖又
用油湯濯之百日黑如漆

又方 黑樗水漬之塗髮令黑

又方 鹽湯洗沐後以生麻油和蒲葦灰傳之一作治白禿

又方 生麻油漬烏梅常用傳頭

治髮黃方 臘月猪脂和羊屎灰蒲灰等分傳封頭三日一
度

又方 大豆五升酢漿水二斗煮取五升沐之
治鬢髮黃赤方

燒梧桐灰用乳汁和塗傳鬢髮并肉皮鬢髮即
黑

治風頭毛髮落不生方

鐵上生衣研以臘月猪脂和塗之日三亦治眉落

生眉毛方

鐵上生衣 墻上青衣

右二味等分爲末水和塗之即生

又方

七月烏麻花陰乾爲末以生烏麻油漬之二日

一塗

治眉毛鬢髮爲火燒瘡瘕毛不生方

千金方衍義卷三

奎

掃葉山房

蒲灰以正月狗腦和傅即生

治髮落不生令長方

麻子一升熬黑壓取油傅頭長髮妙

又方

多取烏麻花磁器盛密蓋深埋土中百日出用

塗髮令髮易長而黑

又方

用雁肪傅之

治鬢黃方

新剪爪甲搔令毛孔少血出以蜜塗之即生黑

毛

治髮禿者方

黑熟桑椹子二升內饘中口中曝三七日化爲

水洗瘡上三七日即生髮神效

松瀝煎 治頭瘡及白禿方

松瀝 合七

丹砂

雄黃

水銀 研各二兩

黃連 三兩

礬石 一兩

右六味治下篩內澀中攪研令調以塗之先以泔

清洗髮及瘡令無痂然後傅藥二日一傅三傅後

當更作膿膿訖更洗凡經三度膿出訖以甘艸湯

千金方衍義卷三

圭

掃葉山房

洗去藥毒前後洗十數度即瘥

治白禿髮落生白痂終年不瘥方

雌黃

雄黃 各一分

雞屎白 半分

松脂

菴蓉 各二分

蛇牀子

遠志

五味子 各三分

兔絲子 五分

白蜜 一分

右十味治下篩以猪脂一升二合先內雄黃次內

雌黃次內雞屎白次內松脂及蜜又次內諸藥煎

之膏成先以桑灰汁洗頭燥傅之

王不留行湯 治白禿及頭面久瘡去蟲止痛方

王不留行 東南桃枝 東引菜莢根皮

各五 兩 蛇牀子 牡荊子

蒺藜子 苦竹葉各三升 大麻仁一升

右八味咬咀以水二斗半煮取一斗洗瘡日再并

療癰疽妒乳月蝕瘡爛

松脂膏 治白禿及癰疽百瘡方

松脂六兩 礬石 杜蘅一作杜荊

雄黃 真珠 水銀

苦參 大黃 木蘭

石南 秦艽 附子各三兩

千金方衍義卷三 圭 掃葉山房

右十二味咬咀以醋漬一宿猪膏一斤半煎之以

附子色黃去滓內礬石雄黃水銀更著火三沸安

濕地待凝傳上日三

治白禿方

羊肉濕脯炙令香及熱速搭上不過三四度癢

勿搔之牛肉亦得

又方

新破猪肚去糞及熱速搭上癢慎勿搔當縛定

手日中臥午後去之

又方

以皂莢湯淨洗乾拭 後以陳久油滓塗之日三

又方

煮桃皮汁飲之并洗

又方

麴敢二種治下篩酢和傅上

又方

大黑豆炒令焦爲末和臘猪脂熱煖以匙抄封

上遍即裹著勿見風

治赤禿方

桑灰汁洗頭令淨桑椹搗傅之日中曝頭睡

千金方衍義卷三 圭 掃葉山房

又方

馬蹄灰爲末以臘月猪脂傅之

又方

燒牛角灰和猪脂傅之

令髮不生方

蜂灰鬚脂相和新拔去毛即塗孔上永不生

治鬼猷頭方

燒貓兒屎以臘月猪脂和傅上

又方

貓兒毛燒灰以膏和傅之

又方

搏末和蒜搗傅日一度

孫真人千金方衍義卷十三

掃葉山房

孫真人千金方衍義卷十四

長洲張... 南沙... 卷客

小腸腑方 凡七類

小腸腑脈論第一 論一首

論曰小腸腑者主心也舌是其候也心合於小腸小

腸者受盛之腑也號監倉吏重二劬十四兩長二丈

四尺廣二寸四分難經甲乙云長三丈二尺大

左回疊積其注於回腸者外傳臍上回運環十

六曲常留水穀二斗四升其一斗二升是水一十二

升是穀應王二十四氣也難經六十六曲盛穀二斗

半甲乙云受三斗唇厚人中長以候小腸小腸病者

三合合之太半小腹痛腰脊控舉而痛時窘乏復耳前熱若寒甚獨

肩上熱及手小指次指之間熱若脈滑者脈經作散

此其候也

小腹控舉引背脊上衝心邪在小腸連舉者系屬於

脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃動肝肺散

於盲結於臍故取之盲原以散之刺太陰以與之取

厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以

調之

左手關前寸口陽絕者無小腸脈也若臍痺小腹中
有痲股主月即冷上搶心刺手心主治陰心主在掌
後橫文中入一分

左手關前寸口陽實者小腸實也若心下急熱痺小
腸內熱小便赤黃刺手太陽治陽手一太陽在手小
指外側本節陷中

小腸有寒心下重便膿血有熱必痔

小腸有宿食常暮發熱明復止

小腸脹者小腹臌脹引腹痛

心前受病移於小腸心咳不已則氣與咳俱出

千金方衍義卷十四

二 婦葉山房

厥氣容於小腸夢聚邑街衢

心應皮皮厚者脈厚脈厚者小腸厚皮薄者脈薄脈

薄者小腸薄皮緩者脈緩脈緩者小腸大而長皮薄

而脈沖小者小腸小而短諸陽經脈皆多紆屈者小

腸結

扁鵲云手少陰與太陽為表裏所以表清裏濁清實

濁虛故食下腸實而胃虛故腑實而不滿實則傷熱

熱則口張口為之生瘡虛則傷寒寒則便泄膿血或

發裏水其根在小腸先從腹起方見治水篇中

小腸絕不治六日死何以知之髮直如乾麻不得屈

仲口汗不止一手太陽之脈是動則隘痛頰腫不可
以頰肩似拔膚似折是主液所生病者耳聾目黃頰
頰腫頸肩膈肘臂外後廉痛經脈支別已見心經門中

小腸虛實第二法二首方三首

小腸實熱

左手寸口人迎以前脈陽實者手太陽經也病苦身

熱來去汗不出心中煩滿身重口中生瘡名曰小腸

實熱也

柴胡澤瀉湯 治小腸熱脹口瘡方

柴胡

澤瀉

橘皮一作枳椇

千金方衍義卷十四

三 婦葉山房

黃芩

枳實

旋覆花

升麻

芒硝各三兩

生地黃切一升

右九味咬咀以水一斗煮取三升去滓內硝分二

服

小腸腑充受盛職司化物而行君主之令統三焦

之權以握中外之機中氣盛則大氣敷布出內有

常中氣衰則清濁不分泄利無度火性易起易滅

減則四大分崩起則一身擾亂如柴胡澤瀉湯首

治火氣外擾熱脹口瘡故以升柴升散於上旋橘

開發於中芒澤分利於前硝黃蕩滌於後四通分

泄其源庶免遷延之患然恐藥力過峻即以地黃

保護心包不使熱邪干犯九五也

大黃丸 治小腸熱結滿不逆方

大黃 芍藥 葶藶 各三兩

大戟 朴硝 各二兩 巴豆 七枚

杏仁 五十枚

右七味為末蜜和丸如梧子飲服七丸小兒服二

三九日二熱去日一服

義衍 熱結不通不用承氣陷胸者以小腸雖居下位治

節却在中上二焦故取葶藶專攻心下逆滿杏仁

千金方衍義卷十四 四 掃葉山房

開發肺氣於上硝黃蕩滌痰垢於下杏仁力綿更

借備急丸中巴豆以佐之稍黃性下復採十棗湯

中大戟以激之芍藥一味專護營血即柴胡澤瀉

湯中用地黃之意

灸法

小腸熱滿灸陰都隨年疝穴在俠中脘兩邊相去一

寸是

小腸泄痢膿血灸橫舍一百壯小兒減之穴在俠臍

兩邊相去各一寸又灸小腸膈七壯

小腸虛寒

左手寸口人迎以前脈陽虛者手太陽經也病苦顛

際偏頭痛耳頰痛名曰小腸虛寒也

治小腸虛寒痛下赤白腸滑胸中懊懣補之方

乾薑 三兩 當歸 黃蘗

地榆 各四兩 黃連 阿膠 各二兩

石榴皮 三枚

右七味咬咀以水七升煮取二升五合去滓下膠

煮取膠烊盡分三服

義衍 利下赤白而見胸中懊懣虛煩滑脫可知駐車丸

中薑連以導虛熱歸膠以和營血黍入黃蘗以堅

千金方衍義卷十四 五 掃葉山房

腸滑地榆榴皮以固血脫也

舌論第三 論一首

論曰舌者心主小腸之候也善用機衡能調五味也

凡有所啖若多食鹹則舌虛凝而變色多食苦則舌

皮稿而外毛焦枯多食辛則舌筋急而爪枯乾多食

酸則舌肉肥而唇揭多食甘則舌根痛而外髮落又

曰心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘腎欲鹹此五味內

合五臟之氣也若臟熱則舌生瘡引唇揭赤若腑寒

則舌本縮口噤唇青寒宜補之熱宜瀉之不寒不熱

依臟腑調之

風眩第四論一首 方九首 灸法一首 食禁一首

前卷既有頭面風方風眩不當分出蓋以此是徐

嗣伯方不可以餘方相雜故此特立風眩方條專

出徐氏方焉

徐嗣伯曰余少承家業頗習經方名醫要治備聞之

矣自謂風眩多途諸家未能必驗至於此術鄙意備

所究也少來用之百無遺策今年將衰暮恐淹忽不

追故顯明證論以貽於後云爾

夫風眩之病起於心氣不定胸上蓄實故有高風面

熱之所為也痰熱相感而動風風火相亂則悶瞀故

謂之風眩大人曰癩小兒則為癩其實則一此方療

治萬無不愈但恐證候不審或致差違大都忌食十

二屬肉而奔豚為患發多氣急急則死不可救故

此二湯是輕重之宜勿因此便謂非患所治風眩湯

散丸煎共有十方凡人初發宜急與續命湯因急時

但度灸穴便火鍼鍼之無不瘥者初得鍼竟便灸最

良灸法次列於後余業之以來三十餘年所救活者

數十百人無不瘥矣後人能曉此方幸勿泰以餘術

焉

續命湯 治風眩發則煩悶無知口沫出四體角

千金方衍義卷十四

本

掃葉山房

弓目反上口噤不得言方

竹瀝半升 生地黃汁升 龍齒

生薑 防風 麻黃各四兩

附子三兩 石膏七兩 桂心二兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服有氣加

附子作一兩紫蘇子五合橘皮半兩已服續命湯

口開四肢尚未好定而心中尚不除者紫石湯主

之方見後紫石者散是也

衍諸續命湯衍義已見前八卷諸風門中此續命方

治風眩煩悶但取麻黃防風桂心附子石膏生薑

六味開拓表裏陰陽調適經府寒熱乃加竹瀝以

治經絡四肢膜外之痰地黃以治周身臟腑痺著

之血龍齒以治驚癇諸瘕癲疾狂走防已以治中

風攣急風熱諸癰服後口開肢廢癰瘕不除者服

紫石散即金匱附方除熱癰癰風引湯是也

賣豚湯 治氣奔急欲絕方

吳茱萸升 石膏 人參

半夏 芎藭各三升 桂心

芍藥 生薑各四兩 生葛根

千金方衍義卷十四

七

掃葉山房

茯苓各十

當歸四兩

李根皮一斤

右十二味咬咀以水七升清酒八升煮取三升分三服

義衍奔豚湯金匱主治氣上衝胸往來寒熱奔豚雖屬

腎積而實衝脈為病氣上衝胸者陰邪上逆也往

來寒熱者邪正交爭也衝主血故以芎歸芍藥和

其滯積之血半夏生薑滌其堅積之痰葛根以通

津液李根以降逆氣並未嘗用少陰之藥設泥奔

豚為腎積而用伐腎之劑謬之甚矣嗣伯治風眩

氣奔欲絕故以桂苓祛風人參壯氣茱萸降逆石

千金方衍義卷十四

八

掃葉山房

膏開泄旺氣為之必需金匱治奔豚寒熱正當用

等味而反不用乃以甘艸和腹痛黃芩解寒熱者

以有形之滯不能速除不若緩攻為得也設其人

元氣委頓奔豚固結進用此方未為不可

防已地黃湯 治言語狂錯眼目霍霍或言見鬼

精神昏亂方

防已

甘艸各二

桂心

防風各三

生地黃五斤別切勿合藥

漬疾輕小一斤

右五味咬咀以水一升漬一宿絞汁著一甌取滓

著竹篋上以地黃著藥滓上於五斗米下蒸之以

銅器承取汁飯熟以前藥汁合絞取之分再服

義衍此治風眩病言語狂錯精神昏亂與金匱治病如

狂狀獨語不休皆驚痰堵塞於心包亂其神識所

致故以防已逐其痰氣防風瀉其木邪桂心通其

關竅地黃安其本神甘艸專和桂心地黃寒熱之

性也

薯蕷湯 治心中驚悸而四肢緩頭面熱心胸痰

滿頭目眩冒如欲搖動方

薯蕷

麥門冬

人參各四

芍藥

生地黃

前胡各八

千金方衍義卷十四

九

掃葉山房

枳實

遠志

生薑各三

茯苓

茯神各六

半夏五分

甘草

黃芩

竹葉各二

秫米三合

右十六味咬咀取江水高兩手揚三百九十下量

取三斗煮米減一斗內半夏復減九升去滓下藥

煮取四升分四服無江水者以千里東流水代之

義衍靈樞半夏湯本治厥氣客心臟膈衛氣獨衛其外

不得入於陰陰虛故目不欲飲以半夏湯一劑陰

陽一通其臥立至其病新有覆杯則臥汗出則已

久者三飲而已蓋取半夏以通其陽流水以通其陰秫米滋其氣化以安神識嗣伯推廣其意類加益氣通神之品治驚悸眩冒不寧等證仍取半夏流水秫米以行諸藥之性也

防風湯 服前湯後四體尚不涼頭目眩轉服此

湯大勝宜常服但藥中小小消息隨冷煖耳仍

不除瘥者依此方

防風 石膏

人參

赤石脂 生薑

龍骨

寒水石 茯苓 各三分

桂心 二分

千金方衍義卷十四

十一 掃葉山房

紫石英 一分

右寸味咬阻以水八升煮取三升分三服凡用井

花水取清淨也今用江水者無泥沙穢源泉遠涉

順勢歸海不逆上流用以治頭必歸於下故也

衍 服薯蕷湯四肢熱尚未除頭目轉覺眩暈虛陽不

能即斂故取風引湯中四石龍骨桂心加參苓以

鎮固之生薑開發中氣防風開發表氣風引湯專

取大黃引風熱下行此以人參助防風上泄仍取

江水煮服乃薯蕷湯之成法半夏湯之變法也

薯蕷丸 治頭目眩胃心中煩鬱驚悸狂癡方

薯蕷 八分

甘艸 十分

鹿角膠 金匱

大豆黃卷

桂心 各七分

乾地黃

神麴

當歸

人參 各十分

麥門冬

防風

黃芩 全匱

芍藥

白朮 各六分

柴胡

桔梗

茯苓

杏仁

芍藥 各五分

白斂

乾薑 各三分

大棗 一百枚 取膏

右二十二味為末棗膏和白蜜丸如彈丸先食服

一九日三

千金方衍義卷十四

十一 掃葉山房

夫頭目眩胃心中煩鬱驚悸狂癡與全匱虛勞諸

不足風氣百疾之治無異總由腎氣本虛虛風上

盛或表邪不解涼藥誤投傷犯脾肺而成虛勞是

以立方專取桂苓和營散邪薑末兼聖藥誤君以

薯蕷大理脾肺豆卷神麴除濕運痰毫不及平補

益腎肝此治胃眩煩鬱驚悸狂癡之疾狂癡雖氣

之虛實由木盛生火生痰所致故其治法不出和

營理脾等法也金匱以補虛為務故用阿膠嗣伯

以眩胃為主故用鹿膠用黃芩者取以散標熱之

上盛也

薯蕷煎

薯蕷 二十分

甘草 十四分

澤瀉

人參

黃芩 各四分

當歸

白敏

桂心

防風 各三分

麥門冬

山茱萸

桔梗

芍藥

紫苑

大豆黃卷

乾地黄

白朮

芎藭

乾薑

蜀椒 各二分已上二
十味並用搗篩

生地黄

十八斤搗取
汁煎令餘半

麋鹿髓

鹿角膠

斤 各半 麻子仁 研

蜜 各三升

千金方衍義卷十四

三

掃葉山房

大棗 八十

垣墻下溝竇邊
者皆不中用也

桑根白皮 五升忌網土
者大毒大忌近竈屋

右二十七味以清酒二斗四升煮桑白皮麻子仁

大棗得一斗去滓次下地黄汁鹿膠髓蜜煎減半

內諸末併煎令可丸如雞子黃大飲服一枚日三

稍加至三丸

此即薯蕷丸之變方於前方除去柴胡杏仁茯苓

神麩四味參入澤瀉山茱萸紫苑蜀椒生地黃蘆

鹿髓麻子仁桑根皮等八味其兼補腎肝之義與

前稍殊

天雄散 治頭目眩暈屋轉旋倒方

天雄

防風

芎藭

人參

獨活

桂心

葛根 各三分

莽艸 四分

白朮

遠志

薯蕷

茯神

山茱萸 各六分

右十三味治下篩先食以菊花酒服方寸匕日三

漸加至三七以知為度菊花酒法九月九日取甘
菊花曝乾作夫於米饋中

義衍

真元下虛風毒上盛而致頭目眩暈屋轉旋倒故

千金方衍義卷十四

三

掃葉山房

用人參茯神薯蕷白朮山茱萸桂心芎藭遠志填補

脾腎莽艸天雄獨活防風葛根專祛風毒也

人參丸 治心中恍惚不定方

上黨人參

鬼臼

鐵精

牛黃

雄黃

大黃

丹砂

菖蒲

防風 各一兩

蜥蜴

赤足蜈蚣 各一枚

右十一味為末蜜丸如梧子大用前菊花酒服七

九日三夜一稍加之合藥勿用青紙忌見婦人青

衣喪季不具足人及漏穢六畜雞犬等

術九味祛風鎮心藥中獨取上黨人參以護心安神

大黃辟除風毒用菊花酒專清頭目之風也

按上黨人參形類參蘆乃沙參中一種最道地者以其無寒降之患有清補之功故以人參目之

灸法

其法以繩橫度口至兩邊既得口度之寸數便以其繩一頭更度鼻盡其兩邊兩孔間得鼻度之寸數中屈之取半合於口之全度中屈之先覓頭止迴髮灸之以度度四邊右左前後當繩端而灸前以面為正並依年壯多少一年凡百灸皆須瘡瘡又灸壯數如前者連灸火氣引上其數處迴髮者則灸其近高鼻也若迴髮近額者亦宜灸若指而為癩則關其面處然病重者亦不得計此也

祭食十二相屬肉物皆不得食其為藥則牛黃龍

骨齒用不可廢

風癩第五 論四首 方三十六首 鍼灸法五十八首

論曰黃帝問曰人生而病癩疾者安所得之岐伯對曰此得之在腹中時其母數有所大驚也氣上而不下精氣并居故令子發為癩疾病在諸陽脈且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂刺之虛脈視分盡熱病已

千金方衍義卷十四

古

攝葉山房

而止病癩初發歲一發不治月一發不治四五日一

發名曰癩疾刺諸分其脈尤寒者以鍼補之病已止

癩疾始生先不藥頭重直視舉目赤其作極已而煩

心候之於顏取手太陽陽明太陰血變而已癩疾始

發而反強因而脊痛候之足太陽陽明太陰手太陽

血變而已癩疾始作而引口喘呼甲乙作喘降者候之手

陽明大陽右強者攻其左左強者攻其右血變而止

治癩疾者常與之居察其所當取之處病至視之有

過者即瀉之置其血於瓠壺之中至其發時血獨動

矣不動灸窮骨二十壯窮骨者尾骶也

千金方衍義卷十四

五

攝葉山房

骨癩疾者頷齒諸脣分肉皆滿而骨偃強直汗出煩

悶嘔多涎沫氣下泄不療

筋癩疾者身拳攣急脈大刺項大經之本杼嘔多涎

沫氣下泄不療

脈癩疾者暴仆四肢之脈皆脹而從滿脈盡刺之出

血不滿俠項灸太陽又灸帶脈於腰相去三寸諸分

肉木脰嘔多涎沫氣下泄不療

治癩者病發而狂而皮厚敦敦者死不療

凡癩發則臥地吐涎沫無知若強掠起如狂及遺糞者難療

癩疾脈搏大滑久自己脈沉小急實死不療小牢急亦不可治脈虛可療實則死矣厥成爲癩疾五臟不平六腑閉塞之所生也厥成爲癩故附厥於此條也陰衰發熱厥陽衰發寒厥

論曰黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則爲寒厥陰氣衰於下則爲熱厥問曰熱厥必起於足下者何也對曰陽氣起於足三趾之表集於足下而聚於心故陽勝則足下熱也問曰寒厥必起於五趾而上於膝者何也對曰陰氣起於五趾之裏集於膝而聚於膝上故陰氣勝則從五趾下膝上

千金方衍義卷四

夫

補藥山房

寒其寒也不從外而從內也厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何也陰氣盛於上則下虛下虛則腹滿腹滿則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂亂則不知人巨陽之厥腫首頭重足不能行發爲胸仆陽明之厥癩疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄見而妄言少陽之厥暴聾頰腫而熱脇痛脾不可以運太陰之厥腹滿脹後不利不欲食食則嘔不得臥少陰之厥舌乾渴赤腹滿心痛厥陰之厥小腹腫痛脹溼溼不利好臥屈膝陰縮腫

厥內一作熱盛則澇之虛則補之不盛不虛以經取

之上寒下熱先刺其項太陽則留之已則火熨項與肩甲令熱下冷乃止所謂推而上之者也上熱下寒視其虛脈而陷下於經絡者取之氣下而止所謂引而下之者也刺熱厥者留鍼反爲寒刺寒厥者留鍼反爲熱刺熱厥者二陰一陽刺寒厥者二陽一陰所謂二陰者二刺陰也所謂二陽者二刺陽也論曰濕病熱入腎中亦爲瘧小兒病癩熱盛亦爲瘧凡風瘧暴尸厥及鬼魔不寤皆相似宜精察之故經言久厥則成瘧是以知似也

千金方衍義卷四

七

補藥山房

論曰癩病有五一日陽癩發時如死人遺溺有頃乃解二日陰癩坐初生小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三曰風癩發時眼目相引牽縱反急強羊鳴食頃方解由熱作汗出當風因以房室過度醉飲飽滿行事令心氣逼迫短氣脈悸得之四曰濕癩眉頭痛身重坐熱沐髮濕結腦汗未止得之五日馬癩發時反自口噤手足相引身皆熱坐小時風氣腦熱不和得之

治五癩方

銅青

雄黃

空青

東門上雞頭

水銀

楮茶

扶苓 補腎 人參 補氣 白芷 祛風

石長生 補腎 白敏 補腎 白薇 補腎

卷柏 補腎 烏扇 補腎 硫黃 補腎

石十五味為末以青牛膽和著銅器中於飯中五

斗大豆上蒸之藥成丸如麻子先食服三十九日

二夜一 補腎

衍 癩癩之治補瀉懸殊北方風氣剛勁見證多實非

金石悍烈無以逮克敵之威南方水土柔弱見證

多虛非攻中寓補策以保又安之策分途異治大

都與中風不異如五癩丸方首尾皆列金石中間

風毒雜陳即有一二參苓不過藉以鼓動諸藥之

勢良非兼補之謂乃西北癩證之的方若大江以

南心勞志鬱神出舍空之證金石每多扼腕恒有

以烏嚙六君鹿茸八味收功者未可執此槩論也

虎睛丸 治濕癩掣癢口眼張大口出白沫或作

聲或死不知人方

虎睛 一具酒浸 鬼箭羽 露蜂房各二分

獨活 遠志 細辛

貫眾 麝香 白敏 一作白薇

升麻 白蘚皮各三分 牛黃

防風 秦光 防葵

龍齒 黃芩 雄黃

山茱萸 防己 茯苓

鐵精 鬼白 乾地黃 一作

人參 木黃 銀屑 各四分

扶神 石膏 天雄 各五分

寒水石 六分 蛇蛻皮 尺一

右三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服十五丸

日再稍加至二十五丸神效

虎 虎睛龍齒定魄安魂牛黃麝香滌痰利竅蜂房蛇

蛻攻毒祛風鐵精銀屑辟邪鎮驚雄黃石膏破惡

散結防癘天雄出陰入陽升麻大黃升清降濁人

參地黃導氣和血其餘風藥毒藥總皆匡佐之流

耳如無虎睛珍珠代用可也

凡癩發之候其狀多端口邊白沫動無常者治之

方

秦光 人參 防葵 一作防風

扶神 一作牡丹 甘艸 各二分 鉛丹 一分

貫眾 一枚

右七味收咀以水九升煮取三升半分三服

千金方衍義卷十四

補藥山房

千金方衍義卷十四

補藥山房

七味藥中鎮驚祛風解毒安神無不悉具

雌雄丸 治風癲失性顛倒欲死五癲驚癇方

雄黃 雌黃 真珠 各一兩

鉛二兩熬 丹砂一分 水銀八分

右六味為末以蜜和搗三萬杵丸如胡豆先食服

二九日二稍加以知為度古今錄驗云療五癲牛狗癲則狗鳴羊癲則羊鳴鴉癲則鴉鳴病五癲狂病者瞻瞻相引盈氣起寒厥不識人氣靜言狂叶末久而得茲者

此方專以金石鎮固惟真珠一味清心安神然病發之如切不可輕投金石閉門逐寇亦不得擅用

千金方衍義卷十四 手 攝紫山房

補益使痰不積而成固疾也

續命風引湯 怡中風癲眩不知人狂言舌腫出

方

麻黃 芍藥 石膏

人參 防風 桂心

甘艸 獨活 防已

附子 當歸 杏仁

陳薑 各一兩

右十三味咬咀以酒三升水一斗合煎取四升分

四服日三夜一

此於小續命方中去黃芩芍藥加石膏獨活以祛

風熱其小續命方衍義見八卷諸風門中

柴石散 治大人風引小兒驚癇痲瘖日數十發

醫所不療者方

紫石英 滑石 白石脂

凝水石 石膏 赤石脂

甘艸 桂心 牡蠣

大黃 乾薑 龍骨

右十二味治下篩為粗散盛以韋囊懸高涼處欲

用取三指撮以新汲井水三升煮取一升二合大

人頓服未百日兒服一合未能服者以綿沾著口

中熱多者日四五服以意消息之深師方只龍骨牡蠣乾薑滑石

白石脂 五味

此徐嗣伯風眩門中十方之一金匱名風引湯專

主內發之風趨以德曰風者外司厥陰內應肝木

上隸手經下隸足經中見少陽相火所以風自內

發者出火熱而生也風生必害中土土病則四末

不用聚液成痰癱者風木挾痰注於四肢也癱者

風熱擾其筋脈內應於心主也前續命風引湯祛

風外散此紫石散引風內泄故用大黃兼甘艸桂

風外散

心滑石 石膏以化風熱乾薑以為反謀使火無拒
格之虞 紫石英寒水石以潤血燥赤白石脂龍骨
牡蠣以補其空絕風火復來之路也

治百二十種風癩癩驚狂發即吐沫不識人者四
月五月宜服之方

紫石英

芍藥

龍骨一作黃芩

赤石脂

白藜皮

麻黃

當歸

甘艸

栝蠆根

桂心

人參各二兩

牡蠣三兩

大黃

五兩

千金方衍義卷十四

三

掃葉山房

右十三味治下篩為粗散分作七裹每以大棗十
枚水三升煮取二升半去滓下一裹大棗汁中煎
取一升去滓頓服相去七日一服服訖即差

衍義採續命風引二方之要合而為一參入藜皮栝蠆
以化外內風熱用棗湯煮取助脾氣以行藥力也

治癩癩厥時發作方

防葵

代瀟

人參

鉛丹

白礬蠶

鈎藤

茯神

雷丸

虎骨

主猪齒

遠志

桂心

防風各六兩

卷柏

黃芩子

升麻

附子

牡丹

龍齒

光明砂各一分

牛蒡二分

白斂四分

蛇蟬十四枚

蛇蛻皮

白馬駒各一分

右二十五味治下篩酒服方寸七日二亦可為丸

良驗

衍義祛風毒滌頑痰破決結利孔竅鎮驚性和血脈安

神氣莫不畢具稍嫌龐雜勢分耳

芎藭酒 治風癩引脇牽痛發則吐耳如蟬鳴方

千金方衍義卷十四

三

掃葉山房

芎藭

藜本

蘭茹各五兩

右三味咬咀內酒一斗煮取三升頓服羸者分三

服取大汗

衍義芎藭治中風入腦頭痛藜本治風頭痛蘭茹治大

風惡氣皆本經主治

鴨頭丸 治風癩方

鴨頭一枚

葶藶子

鉛丹

虎掌

烏頭

栝蠆根各三分

甘遂

天雄

蜀椒

大戟各二分

白朮一分

蘭茹

鐵精各一兩

右十三味為末蜜丸如梧子酒下二九日三服

衍烏頭天雄薄茹蜀椒破結攻毒虎掌白朮祛風滌

痰鉛丹鐵精鎮攝虛邪葶藶甘遂大戟栝蘆下泄

毒風鴟頭上追風毒專取旋風健搏之義

又方 治癩癩瘰癧方

鉛丹一斤 飛鴟頭二枚

右二味為末蜜丸先食服三九日三劇者夜一稍

加之

衍鴟頭追風鉛丹鎮攝藥味專精較之前方更銳

千金方衍義卷四

毒

掃葉山房

又方

葇若子三升搗篩以酒一斗漬半日絞去滓湯

中煎令可丸先食服如小豆二九加至如梧子

二九以知為度額上手中從文理中赤起是知

也無此候更食病日發者三日愈間日發者十

日愈五日發者二十日愈半歲發者一月愈

衍葇若八癩狂方皆用其子且言勿令子破破則令

人發狂今日搗篩酒漬去滓為丸是專用其毒以

攻毒也

地黃門冬酒 治陰虛癩妄方

地黃斤三十 天門冬斤一

右二味搗取汁作煎服之瘥

衍千金治癩都用祛風破結此獨養正除邪蓋生地

黃有逐血除痺之功天門冬有暴風濕痺強骨髓

去伏尸之治至於釀酒為前補益多端豈止治風

癩惡疾而已哉

天門冬酒 通治五臟六腑大風洞泄虛弱五勞

七傷癥結滯氣冷熱諸風癩癩惡疾耳聾頭風

四肢拘攣退歷節萬病久服身輕延年齒落

更生髮白更黑方

千金方衍義卷四

毒

掃葉山房

天門冬搗絞取汁二斗麴二升麴發以糯米二

斗準家醞法造酒春夏極冷下飯秋冬溫如人

肌酸之酒熟取服一盞常令酒氣相接勿至醉

吐慎生冷酢滑鷄猪魚蒜特慎鯉魚及忌油膩

此是二斗汁法一石二斗亦準此

服十日覺身體癢疹大瘡二十日更大癢三十

日乃漸止此皆風氣出故也四十日即覺身心

朗然大快五十日當風坐臥覺風不著人身心

諸風悉盡

用米法先淨淘米曝乾臨飲用時別取天門冬

汁漬米乾漉炊之餘汁拌飯密封

取天門冬汁法淨洗天門冬去皮心漉去水切

歷取汁三四遍滓乾乃止此酒初熟味酸仍作

臭泔腥氣但依式服之久停則香美封四七日

佳凡八九月少少合至十月多合擬至來年五

月相續服之入四月不得合服酒時若得散服

得力更倍速散方如左

散方

天門冬去皮心曝乾鴉作末以上件酒服方寸

七日三加至三七久服長生凡酒亦得服

千金方衍義卷十四

天

攝藥山房

術天門冬本經首主諸暴風濕偏痺堅強骨髓單用

一味釀酒以取專功兼散並進尤得力

灸法

大人癩小兒驚癩灸背第二椎及下窮骨兩處以繩

度中折繩端一處是脊骨上也凡三處畢復斷繩作

三折令叅合如人字以一角挂中央灸下二角俠脊

兩邊便灸之凡五處故畫圖挂以丹挂所灸五處各

百壯削竹皮為度勝繩也

卒癩灸陰莖上宛宛中三壯得小便通即瘥

是穴 又灸陰莖頭三壯 又灸足大趾上聚毛中七

壯 又灸囊下縫二七壯 又灸兩乳頭三壯 又

灸督脈三十壯三報穴在鼻直中上入髮際 又灸

天臑百會各漸灸三百壯炷惟小作 又灸耳上髮

際各五十壯

論曰黃帝問曰有病怒狂者此病安生岐伯對曰生

於陽也陽何以使人狂曰陽氣因暴折如難決故善

怒名曰陽厥問曰何以知之對曰陽明常動太陽少

陽不動而動大疾此其候也日治之奈何曰衰其食

即已夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已使之服

以生鐵落為後飯夫生鐵落者下氣疾也

千金方衍義卷十四

天

攝藥山房

論曰凡發狂則欲走或自高賢稱神聖皆須備諸火

灸乃得永瘥若或悲泣呻吟者此為邪非狂自依邪

方治之邪入於陽則為狂邪入於陰則為血痺邪入

於陽傳即為癩狂邪入於陰傳則為痛瘡陽入於陰

病靜陰入於陽病怒

蠶甲湯 治邪氣夢寐寤時涕泣不欲聞人聲體

中衰削乍寒乍熱腰脊強痛腹中拘急不欲飲

食或因疾病之後勞動疲極或觸犯忌諱眾諸

不節婦人產生之後月經不利時下青赤白肌

體不生肉虛羸瘦小便不利或頭身發熱旋復

解散或一度交接彌日困極皆主之方

鼈甲七枚

甘艸

白薇一作白芷

貝母

黃芩各二兩

麻黃

白朮

芍藥各一兩半

防風三兩

凝水石

桂心

茯苓

知母各四兩

石膏六兩

右十四味咬咀以水二斗煮取四升溫服一升日

三夜一

衍此湯治肝氣內薄陽邪陷陰之病鼈甲性味與驚

甲相類首取此味入肝護陰引領麻黃桂心開發

千金方衍義卷十四

天

掃葉山房

陷陰之邪白薇黃芩分解交爭之熱知母石膏寒

水石專化陰分之火茯苓白朮甘艸共助實脾之

力芍藥收陰專瀉內動之火貝母化痰善解中氣

之鬱廓風言採其蟲蝨即貝母之別名也

九物牛黃丸 治男子洩鬼魅欲死所見驚怖欲

走時有來止皆邪氣所為不能自絕方

牛黃土精

荆實水精

龍骨水精

空青天精

雄黃地精

會青蒼龍精

玉屑白虎精

赤石脂朱雀精

元參元武精

右九味名曰九精上通九天下通九地各一兩治

下篩蜜和九如小豆先食服一九日三稍加以知

為度翼方云凡邪病當服五邪湯九精九虛

衍夫魘魅異端正人之所不屑然陰柔細人因邪入

邪往往有之有真陽素虧陰邪內結不能辟除邪

妄者有遭風失溺心神恐懼而成惑亂者有積疑

難釋驚痰堵塞而妄言妄見者凡此皆驚恐悲勞

所變而千金咸以列之小腸腑者以小腸之脈上

衝心貫肝肺肺病則魄不安肝病則魂不歸妄言

妄見迫所不免如九物牛黃丸良由心腎本虛神

志失守而為驚邪所觸故以牛黃主驚 癩寒熱熱

千金方衍義卷十四

天

掃葉山房

盛狂癡本經原有除邪逐鬼之治佐以荆實治風

逐濕祛痰解熱曾空二青玉屑雄黃赤脂龍骨鎮

攝驚妄獨取元參以導虛熱其襄配合九精之妙

十黃散 治五臟六腑血氣少亡魂失魄五臟覺

不安忽忽喜悲心中善恐怖如有鬼物此皆發

於大驚及當風從高墮下落水所致 悉主之方

雄黃

人參各五分

黃芩

大黃

黃蘗

黃蘗

細辛

桂心各三分

黃連

黃芩

蒲黃

麻黃各一分

黃環

澤瀉

山茱

黃芩各二

右十五味治下篩未食溫酒服方寸七日三不知

加至二七羸劣者更加人參五分 一方有牛黃

二分崔氏有蜀椒五

衍

干黃散專主本虛驚恐及風水外激故取雄黃以

辟百邪以治陰邪濁惡之患人參黃芪 桂心山茱

護持心腎血氣麻黃細辛外發肌表之邪黃芩黃

連大黃黃蘗蒲黃澤瀉內泄臟腑血閉 惟黃骨黃

環人所未詳黃昏一名合歡本經安五臟和心志

黃環本名狼跋本經治鬼魅邪氣寒熱 但非常用

之品以故罕有識者

千金衍義卷十四

三

掃葉山房

別離散 治男女風邪男夢見女女夢見男悲愁

憂恚怒喜無常或半年數月一發動方

桂心

茵芋

天雄

菖蒲

細辛

茜根

附子

乾薑各一

白朮

桑寄生各三

右十味治下篩酒服方寸七日三凡修合勿令婦

人雞犬及病者家人知見令邪氣不去禁之為驗

衍

別離散治男女風邪邪非外來風從內發故用雄

附桂薑熱因熱用以散肝木內動之風白朮茜根

寄生細辛菖蒲以清痰濕擾亂之竅茵芋一味專

治五臟風濕毒邪也

四物為頭散 治鬼魅方

東海為頭即由

黃牙石一名

金牙

莨菪子

防葵各一

右四味治下篩酒服方寸七欲令病人見鬼加防

葵一分欲令知鬼主者復增一分立有驗防葵莨

菪並令人迷惑恍惚如狂不可多服

為頭即由跋乃虎掌之細者專主風毒痰腫結熱

千金衍義卷十四

三

掃葉山房

防葵治癩癩驚邪狂走莨菪療內痺拘急癩狂金

牙辟瘴瘴毒風惡氣四味皆眩之藥而防葵莨

菪性稟陰毒用者尤為切慎

五邪湯 治邪氣啼泣或歌或哭方

禹餘糧

防風

桂心

芍藥

遠志

獨活

甘艸

人參

白朮

石膏

牡蠣

秦艸各二

防已

菖蒲

茯神

雄黃各一

陸師作

蛇蛻皮各一

右十七味咬咀以水二斗煮取四升分四服亦可
如煎散法服之

衍義五邪湯主治驚啼歌哭邪氣曰五邪者肝風內發

則為風邪治以防風獨活乾蛇之屬二火交煽則

為熱邪治以桂心石膏芍藥之屬脾濕生風則為

濕邪治以防已秦竟白朮之屬痰迷空竅則為驚

邪治以雄黃牡蠣禹糧之屬驚啼歌哭則為虛邪

治以遠志菖蒲茯神之屬凡此五邪靡不由心神

怯弱所致甘艸人參并特安神并性諸藥之力病

久正氣虛者非此不能射應

千金方衍義卷四

圭

掃葉山房

茯神湯 治五邪氣入人體中見鬼妄語有所見

聞心悸跳動恍惚不定方

茯神 茯苓

菖蒲

人參 各三兩

赤小豆 合四

右五味咬咀以水一斗煮取二升半分三服

衍義病人神氣本虛而為驚恐 悲勞所傷有似鬼魅治

著而實非邪妄為患此湯 最為合宜茯神安心神

茯苓守臟氣人參壯元氣 菖蒲通心竅赤小豆導

虛熱使丙火歸就壬水與 後定志小九開心散功

用彷彿

人參湯 治風邪鬼氣往來發作有時或無時方

人參 防風 烏頭

乾薑 栝婁根 翼作 栝梗 澤瀉

狗脊 遠志 附子

黃芩 獨活 各五分 秦朮

牡蠣 山茱萸 五味子

前胡 細辛 石膏

芎藭 蜀椒 牛膝

甘艸 石南 桂心

桑白皮 麻黃 竹皮

千金方衍義卷四

圭

掃葉山房

白朮 橘皮 各十 八銖 鬼箭羽 翼作 澤蘭

茯苓 各十 二銖 大棗 十六枚

右三十二味咬咀以水六升酒六升合煮取四升

分五服日三夜二

虎睛湯 治狂邪發無常披髮大叫喚欲殺人

避水火方

虎睛 鴟頭 露蜂房 各一

茯苓 桂心 防風 各三

人參 甘艸 天雄

獨活 各兩 石長生 一分 楓上寄生 一分

右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升分四服

日三夜一

又方

防葵

人參

貫衆各五兩

防風

桂心各三兩

右五味咬咀以水一斗煮取三升分四服稍服亦

可

治卒發狂方

苦參五斤為末蜜和丸如酸棗大畢服十九

治魅方

千金方衍義卷西

苦

掃葉山房

水服鹿角末方寸七日三

又方

水服獾肝末日三

治狐狸諸色精魅作種種惡怪令人恐怖狂癲風

邪方

雄黃六斤

油一斗

右二味破雄黃如棊子并油內大鑊中以盆合頭

作竈微火煎力日九夜不得少時火絕亦不得火

冷須火熱微微不絕辟諸精魅神驗

治風邪方

商陸根三十斤去皮細切以水八斗東向竈煎

減半去滓更煎令可丸如梧子大服一九合時

勿令人見更有黃芩方大豆紫湯皆可服取汗

出佳黃芩方見此篇前大豆紫湯見前三卷婦人門

又方

燒蝦蟆末水服方寸七日三

又方

水服伏龍肝末方寸七日三

人參湯治本氣虛寒毒邪暴虐故以參朮烏附麻

黃石膏狗脊鬼箭羽羣隊交攻寒熱互舉而用

千金方衍義卷西

薑

掃葉山房

虎睛湯專取虎睛參苓定魄安神天雄桂心鴉頭

峰房石長生辟除陰毒大半出虎睛丸方餘皆截

風之味又方防葵辛寒大毒專攻癩癰驚狂胃

眾辟邪毒惡氣防風治木盛生風桂心通關節結

氣人參助諸藥之力也苦參苦寒下降專散心

腹結氣鹿角取貫頂純陽辟陰邪散血腫癩

肝治傳尸殺瘵疏邪氣雄黃性真純陽油煎

以辟精物惡鬼邪氣商陸性真至陰治水腫腹

脹殺鬼精物蝦蟆灰辟邪解毒專破陽明結積

脹滿伏龍肝取火土之餘烈以攝陰邪之內蘊

也

鍼灸法

論曰凡諸百邪之病源起多途其有種種形相示表癩邪之端而見其病或有默默而不聲或復多言而謾說或歌或哭或吟或笑或眠坐溝渠噉食糞穢或裸形露體或晝夜行走或噴罵無度或是蜚蠊精靈手亂目急如斯種類癩狂之人今鍼灸與方藥並主治之凡古風之家亦以風為鬼斷

扁鵲曰百邪所病鍼有十三穴凡鍼先從鬼宮起次鍼鬼信次至鬼壘又至鬼心鍼至五六穴即可知矣

千金方衍義卷四 三 楊葉山房

若是邪蠱之精便自言說論其由男從左起鍼女從右起鍼若數處不言便遍鍼穴也仍須依掌訣捻目而治之萬不失一黃帝掌訣別是術家祕要

第一鍼人中名鬼宮從左邊下鍼右邊出

第二鍼手大指爪甲下名鬼信入肉三分

第三鍼足大趾爪甲下名鬼壘入肉二分

第四鍼掌後橫文名鬼心入半寸即大淵穴也

第五鍼外踝下白肉際足太陽名鬼路火鍼七銜銜

三下即申脈穴也

第六鍼大椎上入髮際一寸名鬼枕火鍼七銜銜三

下

第七鍼耳前髮際宛宛中耳垂下五分名鬼淋火鍼

七銜銜三下

第八鍼承漿名鬼市從左出右

第九鍼手橫文上三寸兩筋間名鬼路即勞宮穴也

第十鍼直鼻上入髮際一寸名鬼堂火鍼七銜銜三

下即上星穴也

第十一鍼陰下縫灸三壯女人即玉門頭名鬼藏

第十二鍼尺澤橫文外頭接白玉際名鬼臣火鍼七銜銜三下即曲池穴也

千金方衍義卷四 三 楊葉山房

第十三鍼舌頭一寸當舌中下縫刺貫出舌上名鬼

封仍以一板橫口吻安鍼頭令舌不得動 已前若

是手足皆相對鍼兩穴若是孤穴即單鍼之

邪鬼妄語灸懸命十四壯穴在口唇中央絳絳者一名鬼錄又以剛刀決

乃佳斷鍼

邪病臥瞑不自知風府主之一名鬼穴

邪病大喚罵詈走灸十指端去爪一分一名鬼城

邪病大喚罵走遠三里主之一名鬼邪

邪病鬼癩四肢重顯上主之一名鬼門

邪病四肢重痛諸雜候尺澤主之一名鬼受

邪病語不止及諸雜候人中主之一名鬼

倉公法 狂癩不識人癩病眩亂灸百會九壯 狂

走聖癩灸玉枕上三寸一法頂後一寸灸百壯 狂

邪鬼語灸天窻九壯 狂走癩疾灸頂後二寸十二

壯或灸大幽百壯 狂言恍惚灸天樞百壯 狂走

癩癩灸季肋端三十壯或灸河口五十壯穴在腕後

是 狂癩哭泣灸手逆注三十壯穴在左右手 狂

癩風癩吐舌灸胃腕百壯 狂邪發無常披髮大喚

欲殺人不避水火及狂言妄語灸間使三十壯穴在

亦治驚恐歌哭 狂走喜怒悲泣灸巨臑一作隨

千金方術義卷十四 癩 掃葉山房

年壯穴在背上甲內側反手所不 狂邪鬼語灸伏

兔百壯 悲哭鬼語灸天府五十壯 悲泣邪語鬼

心歌哭灸慈門五十壯 狂邪驚癩灸承命三十壯

壯穴在內踝後上 狂癩風驚厥逆心煩灸巨陽五十

足陽明三十壯 狂癩癩易疾灸足少陽隨年壯

狂走癩厥如死人灸足大趾三毛中九壯云云

狂走易罵灸八會隨年壯穴在陽明 狂癩驚走恍

惚嗔喜笑罵歌哭鬼語悉灸腦戶風池手陽明太陽

太陰足陽明陽蹻少陽太陰陰蹻足跟皆隨年壯

驚怖心忪少力灸大橫五十壯 狂風罵詈搗斫人

名爲熱陽風灸兩吻邊燕口處赤白際各一壯又灸

陰囊縫三十壯令人正臥核卵上灸之勿近前中卵

恐傷陽氣也 狂走刺人或欲自死罵詈不息稱神

鬼語灸口吻頭赤白際一壯又灸兩肘內屈中五壯

又灸背脚中間三壯報灸之神效 鬼魅灸入髮

一寸百壯又灸間使手心各五十壯 狐魅合手大

指縛灸合間三七壯當狐鳴即瘥 卒狂言鬼語以

飯帶急合縛兩手大指便灸左右脇下對屈肋頭兩

處火齊起各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐徐問之

千金方術義卷十四 癩 掃葉山房

乃解其手 卒中邪魅恍惚振嘔灸鼻下人中及兩

手足大指爪甲令艾圓半在爪上半在肉上各七壯

不止十四壯炷如雀屎大 風邪灸間使隨年壯又

灸承漿七壯又灸心膻七壯又灸三里七壯 卒狂

鬼魘鍼其足大拇趾爪甲下入少許即止

風虛驚悸第六方二十三首

遠志湯 治心氣虛驚悸喜忘不進食補心方

遠志 乾薑 白朮

桂心 黃芪 紫石英各三

人參 茯苓 甘州

芎藭

茯神

當歸

羌活

防風各二兩

麥門冬

半夏

各四兩

五味子二合

大棗十二枚

右十八味咬咀以水一斗三升煮取三升半分五

服日三夜二

衍義管攻靈樞經脈陰陽相貫如環無端病則寒熱相

移靡所底止如驚悸善忘良由心氣之虛虛則風

火相乘熱必傳之於腑非若傷寒之邪流入奇經

從陽維而為傳變次第也如遠志補心湯中生服

保元滋降心火理中四君固實脾土火降則心歸

千金衍義卷十四

聖

攝藥山房

安土實則腎肝固五臟相率受其益矣更須用芎

歸桂心以和營血遠志扶神以利關竅羌防以祛

風濕半夏以滌痰涎紫石以鎮心怯大棗以和脾

氣并和諸藥性味也

又方 治中風心氣不足驚悸言語謬誤恍惚憤

憤心煩悶耳鳴方

茯苓

遠志

黃芪

當歸

甘艸

芍藥

人參

桂心無一兩

麥門冬

生薑五兩

附子一兩

獨活四兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮取四升每服八

合贏人服五合日三夜一

衍義前方重在脾虛不進飲食故須理中四君此方重

在腎虛風火上乘故用附子獨活并藉保元歸芍

以培養血氣收攝虛陽也

茯神湯 治風經五臟大虛驚悸安神定志方

茯神

防風各二兩

人參

遠志

甘艸

龍骨

桂心

獨活各一兩

白木一兩

酸棗仁升

細辛

乾薑各半兩

千金衍義卷十四

聖

攝藥山房

右十二味咬咀以水九升煮取三升分三服

衍義東垣云五臟大虛驚悸必先健運中氣故首推理

心蓋桂實脾寧神酸棗收津除煩龍骨鎮驚安魂

辛防獨活疎理虛風遠志茯神交通心腎而神志

安矣

又方 治風虛滿頸項強心氣不定不能食方

茯神

麥門冬各四兩

人參

遠志

羌活

當歸

甘艸

紫石英

五味子各二兩

半夏

黃芪

防風各三兩

酸棗仁三升 生薑五兩

右十四味咬咀以水一斗三升煮棗仁至一斗去

棗內餘藥煎取三升半每服七合日三夜二

衍風虛項強風氣在上故用保元生脈專取防風佐

黃芪以禦虛風當歸輔黃芪以和營血酸棗配門

冬以滋津液紫石統五味以溫金水茯神遠志得

薑半羌活祛風痰而利九竅也

補心湯 治心氣不足病苦驚悸汗出心中煩悶

短氣喜怒悲憂恐不自知常苦咽喉痛口唇黑

嘔吐血舌本強不通水漿方

千金方衍義卷西

聖 掃葉山房

紫石英 人參 茯苓

遠志 當歸 茯神淡師作桂

紫苑 甘艸各二兩 麥門冬升一

赤小豆三合 大棗三十枚

右十一味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服

又方 治心氣不足多汗心煩喜獨語多夢不自

覺咽喉痛時吐血舌本強水漿不通方

紫石英 人參 茯苓

桂心各二兩 麥門冬三兩 紫苑

甘艸各一兩 赤小豆二十四粒 大棗七枚

右九味咬咀以水八升煮取二升半分三服春夏

服佳

又方 治奄奄忽忽朝瘥暮劇驚悸心中憧憧胸

滿不下食陰陽氣衰脾胃不磨不欲聞人聲定

志下氣方

人參 茯苓 遠志

甘艸 枳實 當歸

龍齒 桔梗各二兩 半夏

桂心各五兩 黃芪四兩 茯苓三兩

生薑六兩 大棗二十枚

千金方衍義卷西

聖 掃葉山房

右十四味咬咀以水一斗二升先煮粳米五合令

熟去滓內諸藥煮取四升一服八合日三夜二

又方 治心氣不足心痛驚恐方

遠志 蒲黃一方用菖蒲 人參

茯苓各四兩

右四味咬咀以水一斗煮取三升半分三服

又方 治心氣不足腹背相引痛不能悅仰方

茯神 遠志 黃芩

乾地黃 麥門冬 石膏各四兩

半夏各二兩 桂心 附子

生薑各二

甘艸

阿膠

糖各一

大棗三十枚

右十四味以十二味吹咀水一斗煮取三升去滓

內糖及膠更煎取二升二合分三服此方與前心虛實篇大補

心湯相重但分兩別

衍義補心湯藥味主治大率與遠志湯相彷彿以不進

飲食故理中薑桂為必須此以咽痛吐阻則紫苑

赤小豆為要藥 次方治獨語多夢則前方中茯

神遠志當歸正當進用而反裁汰者以仁柔無制

伏龍雷之力故易桂心以攝肝火之浮散 第三

千金方衍義卷四

醫

補藥山房

方神魂不寧故彷彿平補鎮心龍齒青魂之法兼

保元歸芪以駕馭之枳桔苓半夏棗疎漆空竅之

痰涎也 第四方以有心痛故參蒲黃於參苓遠

志劑中以散血為務 第五方腹背引痛不能俛

仰瘀積流入經脈故屏除參芪補氣之味專取地

黃阿膠滋培營血桂心附子茯神遠志開通經竅

黃芩石膏麥門冬清理肌表旺氣半夏薑棗滌除

隔上頑痰甘艸飴糖和脾緩急以和腹背相引之

痛

小定心湯 治虛羸心氣驚弱多魘方

茯苓 四兩

桂心 三兩

甘艸

芍藥

乾薑

人參

遠志 各二兩

大棗 十五枚

右八味吹咀以水八升煮取三升分四服日三夜

一

大定心湯 治心氣虛悸恍惚多忘或夢驚魘志

少不足方

人參

茯苓

茯神

遠志

赤石脂

龍骨

乾薑

當歸

甘艸

千金方衍義卷四

聖

補藥山房

白朮

芍藥

桂心

紫苑

防風 各二兩

大棗 二十枚

右十五味吹咀以水一斗二升煮取三升半分五

服日三夜二

衍義定心首宜實脾以禦陰火之逆方下所主驚弱多

魘明是土氣虛寒不能營養肝木所以神魂不寧

故於桂枝湯中易乾薑桂心以溫肝脾兼參苓遠

志交通心腎以安神明也 大定心湯即於前方

加白朮以理中氣輔桂心以和營血更須龍骨赤

脂以鎮心肝之怯其餘茯苓防風當歸紫苑則又

桂心茯苓芍藥大棗之佐也

治驚勞失志方

甘艸

桂心 各二兩

龍骨

防風

麥門冬

牡蠣

遠志 各一兩

茯神 五兩

大棗 二十枚

右九味改咀以水八升煮取三升分二服相去如

人行九里久再進

符驚勞失志總由心腎不交虛風內動所致故以茯

神遠志交通心腎龍骨牡蠣鎮攝虛風桂心防風

遍達肝氣麥冬甘艸大棗滋益心脾實則虛風無

千金方衍義卷十四

吳 掃藥山房

隙可入矣

荆瀝湯 治心虛驚悸不定羸瘦病方

荆瀝 二升

茯神

白蘚皮 各三兩

人參 二兩

白銀 十兩以水一斗煮取二升

右三味咬咀以荆瀝銀汁中煮取一升四合分三

服相去如人行十里久進一服

又方

荆瀝二升緩火煎取一升六合分溫四服日三

夜一

行驚悸虛羸多由風氣內動雖用人參益氣茯神安

神然必首推荆瀝治風逐濕解熱消痰佐以白蘚

兼祛肌表風熱白銀煮湯煎服以鎮心肺之祛也

又方單用荆瀝煮服功力尤專

鎮心湯 治風虛勞冷心氣不足喜忘恐怖神志

不定方

防風

當歸

大黃

麥門冬 各五兩

澤瀉

大豆黃卷

白朮 各四兩

菖蒲

人參

桔梗

遠志

桂心

薯蕷

石膏 各三兩

乾薑

千金方衍義卷十四

吳 掃藥山房

茯苓

紫苑 各兩

甘艸

白朮 各十兩

附子

茯神 各二兩

秦朮 各六分

梗米 半升

大棗 五兩

右二十四味咬咀以水一斗二升先煮梗米令熟

去滓內藥煮取四升分服日三夜一 製方不用梗米蜜丸如梧

子酒服十九加至二十九

大鎮心散 治心虛驚悸夢寐恐畏方

紫石英

茯苓

防風

人參

甘州

澤瀉 各八分

黃芪

白朮

薯蕷

秦艽	白敏 <small>各六分</small>	麥門冬
當歸 <small>各五分</small>	桔梗	大豆黃卷
柏子仁	桂心	遠志
大黃	石膏 <small>各四分</small>	乾薑
蜀椒	芍藥	細辛 <small>各三分</small>
右二十四味治下篩酒服三方寸七日三一方		
無紫石英茯苓澤瀉乾薑有大棗四分蜜丸如梧		
子大酒下十五丸		
又方 治風虛心氣驚弱恍惚失常忽喚志悲志		
意不樂方		
紫石英	白石英	硃砂
龍齒	乾地黃 <small>一本無</small>	人參
白朮	茯苓	桂心
乾薑	天雄	附子
細辛	防風	遠志 <small>各三分</small>
右十五味治下篩酒服兩方寸七日三		
小鎮心散 治心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚		
神不定惕然驚者方		
人參	白朮	遠志
附子	桂心	黃芪

細辛	乾薑	乾地黃
赤小豆	龍齒	防風
葛蒲 <small>各二兩</small>	茯苓 <small>四兩</small>	
右十四味治下篩酒服二方寸七日三		
鎮心丸 治男子婦人虛損夢寤驚悸或失精神		
婦人赤白注漏或月水不利風邪鬼疰寒熱往		
來腹中積聚憂恚結氣諸病方		
紫石英	茯苓	葛蒲
肉蓯蓉	麥門冬	遠志
大黃	當歸	細辛
大豆黃卷	卷柏	乾薑 <small>各五分</small>
人參	丹參	防風
秦艽	澤瀉 <small>各六分</small>	柏子仁
芍藥	石膏 <small>各三分</small>	烏頭
桂心	桔梗	甘艸
薯蕷	前胡	白敏
鐵精	銀屑	牛黃 <small>各二分</small>
白朮	半夏 <small>各三分</small>	麤蟲 <small>十二分</small>
乾地黃 <small>十二分</small>	大棗 <small>五枚</small>	
右三十五味爲末蜜棗和搗五千杵丸如梧子酒		

服五九日三加至二十九 一本無豆卷大棗

大鎮心丸 治同前凡是心病悉主之方

乾地黄六分 牛黃五分 羌活一分

桂心 秦艽 芎藭

人參 遠志 麥門冬

丹砂 阿膠 甘艸

大黃 紫石英 銀屑

白朮 當歸 乾薑

防風各八分 杏仁 蜀椒各三分

澤瀉 黃芪 大豆卷

千金方衍義卷十四 至 補遺山房

茯苓 薯蕷 茯神

前胡 柏子仁 鐵精各五分

桑螵蛸十一枚 大東四寸

右三十二味為末白蜜棗和丸酒服七九日三加

至二十九

小鎮心丸 治心氣少弱驚虛振悸胸中逆氣

夢寐錯謬忘恍惚方

紫石英 殊砂 茯神

銀屑 雄黃 菖蒲

人參 桔梗 乾薑

遠志 甘艸 當歸

桂心各二分 防風 防已

細辛 鐵精各一兩

右十七味為末蜜丸如大豆飲服十九日三加至

二十九 一方有茯苓二分為十八味

定志小丸 治心氣不定五臟不足甚者憂愁悲

傷不樂忽忽喜忘朝瘧暮瘧朝發狂眩者

方 人參 扶苓各三兩 菖蒲

遠志各二兩

千金方衍義卷十四 至 補遺山房

右四味為末蜜丸如梧子大飲服七九日三加茯

神為茯神丸散服之亦佳

鎮心者心氣本虛虛風上擾煽動君火而力為之

義 鎮攝也君火不寧必有濁液汪聚心下以心包無

從開泄是必假道濟泌而循出路故千金列之腸

腑乃取金匱薯蕷丸風氣百疾之治兼借風引湯

鎮固虛風之法鎮心湯中防風常歸麥門冬大豆

卷白菝薯蕷人參白朮甘艸乾薑茯苓桔梗皆薯

蕷丸中之藥大黃桂心石膏又從風引湯中參入

加入附子一味收斂虛陽其餘菖蒲遠志茯神紫

菴秦充澤瀉粳米大棗不過通達上下之佐使耳

大鎮心散較前鎮心湯但少附子菖蒲紫苑粳

米大棗而多紫石黃芪芍藥柏仁蜀椒一用附子

鎮攝虛陽一用紫石溫煖營血主治雖異取法則

一又方因肝腎虛火上侮君主故裁去延緩諸

味首取風引湯中紫白石英龍齒葶桂鎮驚欬魂

意謂前湯之附子不足而益以天雄前散之紫石

英不足而益以白石英更加硃砂龍齒兼該鎮固

之力祇恐雄附過烈進用地黃陰陽兼濟之妙無

以喻之 小鎮心散即大鎮心散減去石英椒桂

千金方衍義卷十四

聖

攝藥山房

大黃石膏等味而進龍齒收斂肝魂赤小豆導引

心火從水道開泄也 鎮心丸兼取薯蕷九風引

湯之法倘恐石藥不能鎮固更需鐵精至重之性

得純陽火練則輕浮上升兼取銀屑鎮驚逐邪諸

金石中無以過之痰在心包雖用半夏非牛黃不

能透出膈膜若痰垢不除總力為鎮攝亦無益於

治其餘前胡卷柏柏仁丹參烏頭麤蟲等味良由

婦人子藏受風血室不淨之故如無等證當無藉

此 大鎮心丸所治與前方大同惟桑螵蛸收瀦

小便與前方小異 小鎮心丸中硃砂雄黃鐵精

銀屑專鎮魘夢參錯薑桂參神助長於中防已防

風開發上下合七方秦之則鎮驚之法鐵微單具

略無罅漏矣 定志小丸與前茯神湯立法相類

彼治心悸恍惚故用茯神赤小豆專清心包之火

此治忽忽喜忘故用遠志專辟闕竅之痰

紫石英酒 治久風虛冷心氣不足或時驚怖方

紫石英一斤 鍾乳 防風

遠志 桂心 麻黃

茯苓 白朮 甘艸各三

右九味咬咀以酒三斗春日漬五日每服四合日

三不可至醉常令有酒氣

久風虛冷襲於心包雖用麻黃防風不能使透膈

廣故用苓桂朮甘湯和營健脾逐濕祛痰更取鍾

乳之反激助雄紫石之搜逐陰邪遠志之通關利

竅漬之以酒則麻黃防風得以遲緩祛之力

好忘第七方十六首

枕中方 常服令人大聰

鱉甲 龍骨 菖蒲

遠志

右四味等分治下篩酒服方寸七日三

千金方衍義卷十四

聖

攝藥山房

治多忘令人不忘方

菖蒲 二分 遠志 七分 茯苓

茯神 人參 各五分

右五味治下飾酒服方寸七日一夜一五日後知

神良

開心散 治好忘方

菖蒲 一兩 遠志 人參 各十分

茯苓 二兩

右四味治下飾飲服方寸七日三

又方

千金方衍義卷四

菖蒲 遠志 茯苓 各三分

續斷 肉苁蓉 各二兩

右五味治下飾酒服方寸七日三至老不忘

菖蒲益智九 治喜忘 恍惚破積聚 正氣安神定

志聰耳明目方

菖蒲 附子 遠志

人參 桔梗 牛膝 各五分

茯苓 七分 桂心 三分

右八味爲末蜜丸如梧子一服七丸加至二十九

日二夜一禁如藥法

人之好忘有因病而心神離散腎氣失強痰涎乘

虛而憑凌竅隧者則宜利竅安神神氣自復亦有

素稟善忘者乃五臟皆大而緩於事神丹不能開

鑿靈機令人聰慧也枕中方首取驚甲專通任脈

以益至陰次用龍骨專通衝脈以收虛陽遠志交

通心腎菖蒲開發機竅以佐龜龍鎮固腎肝也

次方專收神氣虛浮故用人參助菖蒲遠志茯苓

茯神利竅安神之力也 開心散較前方但少茯

神既有茯苓不須複劑也 第四方從蓉溫補命

門通利關節佐以遠志 菖蒲茯苓續斷亦取滋降

不使虛火上干諸竅擾亂靈明 菖蒲益智丸專

主腎氣虛寒不能上交於心故全用開心散四味

加牛膝桂附導火歸源 桔梗開通結氣以本經原

有驚恐悸氣之治合開心散之旨遠參苓其襄開

心利竅之功以杜虛陽上逆之患

養命開心益智方

乾地黄

人參 茯苓 各二兩

遠志 肉苁蓉 菟絲子 各三兩

蛇牀子 二分

右七味治下飾服方寸七日二忌食兔肉餘無忌

行 地黃滋心血入參固中 氣茯苓安神志餘皆滋補

下元收攝虛陽不使上 擾靈明也

八味散方

天門冬六分

桂心

茯苓各一兩

乾地黃四分

萸蒲

遠志

石葦

五味子各三分

右八味治下篩後食或酒或水服方寸七三十日

力倍六十日氣力強志意足

治健忘方

天門冬

遠志

茯苓

千金方衍義卷丙

玉

攝藥山房

乾地黃

右四味等分爲末蜜丸如梧子大酒服二十九日

三加至三十九丸常服勿絕

治好忘久服聰明益智方

龍骨

虎骨

遠志等分

右三味治下篩食後服方寸七日二

衍 健忘而用天門冬乾地黃淘養津血茯苓桂心五

味子收攝虛陽萸蒲遠志交通神智石葦疎利熱

邪從水道開泄也 次方四味治健忘是服八味

散後虛陽稍除水道通利但用滋培利竅可以恆

用無疑 龍骨入肝斂魂虎骨透骨追風風從內

發而上擾於竅者非此不治更取遠志交通下上

以病本陰邪專力久服可以永熄虛陽恆保貞固

又方

七月七日取萸蒲酒服三方寸七飲不至醉

又方

常以甲子日取石上萸蒲一寸九節者陰乾百

日治下篩服方寸七日三耳目聰明不忘出衛州石

橋寺南山

又方

千金方衍義卷丙

玉

攝藥山房

七月七日麻勃一升人參三兩爲末蒸令氣徧

臨夜臥服一刀圭盡知四方之事

又方

戊子日取東邊桃枝二七枚縛著臥牀中枕之

不忘

又方

常以五月五日未出時取東向桃枝作三寸

木人著衣帶中令人不忘

又方

丁酉日自往市買遠志 裏著衣中角頭還作末

服之不復忘

治人心昏塞多忘喜說方

七月七日取蜘蛛網著衣領中勿令人知不忘

衍膏蒲閉竅麻勃祛風人參益氣槐枝碎邪遠志通

心方雖專主總不能開鑿機致改易本來重開生而也至於蜘蛛不過取義而已

孫真人千金方衍義卷十四

千金方衍義卷十四

弄

攝樂山房

孫真人千金方衍義卷十五上

長洲孫君玉著

南沙孫君玉著

脾臟方上

脾臟脈論第一

論曰脾主意脾臟者意之舍意者存憶之志也為諸

議大夫並四臟之所受心有所憶謂之意意之所存

謂之志因志而存變謂之思因思而進察謂之慮因

慮而處物謂之智意者脾之臟也口唇者脾之官脾

氣通於口口和則能別五穀味矣故云口為戊舌唇

千金方衍義卷十五

攝樂山房

為已循環中宮上出頤筋次候於唇下迴脾中榮華

於舌外主肉內主味脾重二筋三兩扁廣三寸長五

寸有散膏半筋主裹血溫五臟神名俾俾主臟營

意秩麻號為意臟隨節應會故曰脾臟營營含意在

氣為噫在液為涎脾氣虛則四肢不用五臟不安實

則腹脹溼澁不利脾氣虛則夢飲食不足得其時則

夢築垣蓋屋脾氣盛則夢歌樂體重手足不舉厥氣

客於脾則夢邱陵大澤壞屋風雨凡脾臟象土與胃

合為腑其經所大陰與陽明為表裏其脈緩相於夏

王於季夏脾者土也敦而福敦者厚也萬物菜色不

同故名曰德福者廣也萬物懸根住莖其葉在巔蚘
 蜚蠕動蚊蟬喘息皆蒙土恩德則為緩恩則為遲故
 令太陰緩而遲尺寸不同酸鹹苦辛大妙而生互行
 其時而以各行皆不羣行蓋可常服土寒則溫土熱
 則涼土有一子名之曰金懷挾抱之不離其身金乃
 畏火恐熱來薰遂棄其母逃於水中水為金子而臟
 火神閉門塞戶內外不通此謂冬時土失其子其氣
 衰微水為洋溢浸漬其地走擊皮膚面目浮腫歸於
 四肢愚醫見水直往下之虛脾空胃水遂居之肺為
 喘浮肝反畏肺故下沉沒下有荆棘恐傷其身遊在
 一邊以為水流心衰則伏肝微則沈故令脈伏而沉
 上醫遠一作占因轉孔穴利其洩便遂通水道甘液
 下流停其陰陽喘息則微汗出正流肝著其根心氣
 因起陽行四肢肺氣亭亭喘息則安腎為安聲其味
 為鹹倚坐毋敗朽臭如腥土得其子即成為山金得
 其母名曰邱矣
 四時之序逆順之變異也然脾脈獨何主脾脈者土
 也孤藏以灌四傍者也其善者不可得見惡者可見
 惡者何如其來如水之流者此謂太過病在外如鳥
 之喙者此謂不及病在中太過則令人四肢沉重不

千金方衍義卷五

掃葉山房

舉不及則令人九竅壅塞不通名曰重強脾脈來而
 和柔相離如雞踐地曰平長夏以胃為本脾脈來實
 而盈數如雞舉足曰脾病脾脈來堅銳如雞之喙雞
 鳥如鳥之距如屋之漏如水之流曰脾死
 真脾脈至弱而乍疎乍散一作色黃青不澤毛折乃
 死
 長夏胃微濡弱曰平弱多胃少曰脾病但代無胃曰
 死濡弱有石曰冬病右甚曰今病
 脾臟營營舍意愁憂不解則傷意意傷則悶亂四肢
 不舉毛悴色天死於春
 足太陰氣絕則脈不營其口脣口脣者肌之肉之本也
 脈弗營則肌肉濡肌肉濡則人中滿人中滿則脣反
 脣反者肉先死甲篤乙死木勝土也
 脾死臟浮之入緩一作按之中如覆杯絮狀如搖
 者死六月季夏建未也坤未之間土之位脾王之時
 其脈大阿阿而緩曰平反得浮大而洪者是心之乘
 脾母之歸子為虛邪雖病易治反得微濡而短者是
 肺之乘脾子之乘母為實邪雖病自愈反得弦而長
 者是肝之乘脾木之克土為賊邪大逆十死不治反
 得沉濡而滑者是腎之乘脾水之陵土為微邪雖病

千金方衍義卷五

掃葉山房

卽瘥

右手關上陰絕者無脾脈也若少氣下利腹滿身重

四肢不欲動善歐刺足陽明治陽

右手關上陰實者脾實也若腸中伏伏如堅狀大便

難刺足太陰治陰

脾脈長長而弱來疎去概一作再至曰平三至曰離

經病四至脫精五至死六至命盡足太陰脈也

脾脈急甚為瘕瘕微急為隔中滿食飲入而遺山後

沃沫緩甚為痿厥微緩為風痿四肢不用心慧然若

無疾大甚為擊小微大為脾疝氣裹大膿血在腸胃

之外小甚為寒熱微小為消痺滑甚為癩瘰微滑為

蟲毒虻腸鳴熱瀦甚為腸癰微瀦為內潰多下膿血

脾脈搏堅而長其色黃病少氣其奕而散色不澤者

當病足胛腫若水狀

黃脈之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥

疝女子司法得之疾使四肢汗出當風

扁鵲曰脾有病則色痿黃實則舌本強直虛則多癖

善吞注利其實若陽氣壯則夢飲食之類

脾在聲為歌在變動為噫在志為思思傷脾精氣并

於脾則飢音在長夏病變於音者取之經恐懼而不

千金方衍義卷五

四

掃葉山房

解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下則病精是故

五臟主藏精者也不可傷傷則守失而陰虛虛則無

氣無氣則死病先發於脾閉塞不適身痛體重一日

之胃而腹脹二日之腎少腹脹脊痛脛痠三日之勝

肱背脊筋痛小便閉十日不已死冬人定夏晏食

病在脾日跌慧平且甚日中持下瞞靜素問作日出

中持者假令脾病東行若食雉兔肉及諸木果實得

之不者當以春時發得病以甲乙日也

凡脾病之狀必身重善飢足痿不收素問作善肌肉

作若飢肌肉行善瘕脚下痛虛則腹滿腸鳴飧泄食

痿足不收

千金方衍義卷五

五

掃葉山房

不化取其經足太陰陽明少陰血者

脾脈沉之而濡浮之而虛苦腹脹煩滿胃中有熱不

嗜食食而不化大便難四肢苦痺時不仁得之房內

月使不來來而頻併脾病其色黃飲食不消腹苦脹

滿體重節痛大便不利其脈微緩而長此為可治宜

服平胃丸瀉脾丸茱萸丸附子湯春當刺隱白冬刺

陰陵泉皆瀉之夏刺大都季夏刺公孫秋刺商邱皆

補之又當灸章門五十壯背第十一椎百壯

邪在脾胃肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢

陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹脹陰陽俱有餘

若俱不足則有寒有熱皆調其三里

有所擊小若醉飽入房汗出當風則傷脾脾傷則中氣陰陽離別陽不從陰故以三分候死生

脾中風者翁翁發熱形如醉人腹中煩重皮肉瞶瞶而短氣也脾中寒

脾水者其人腹大四肢若重津液不生但苦少氣小便難脾脹者善噦四肢急一作體重不能衣

跌陽脈浮而澀浮則胃氣強澀則小便數浮澀相搏大便則堅其脾為約脾約者其人大便堅小便利而

反不渴

千金方衍義卷五

六

歸業山房

脾氣弱病利下白腸垢大便堅不能更衣汗出不止

名曰脾氣弱或五液注下青黃赤白黑

寸口脈弦而滑弦則為痛滑則為實痛即為急實即為踊痛踊搏即胸脇搶急

跌陽脈浮而澀浮即胃氣微澀即脾氣衰微衰相搏即呼吸不得此為脾家失度

寸口脈雙緊即為入其氣不出無表有裏心下痞堅

跌陽脈微而澀微即無胃氣澀則傷脾寒在於腸而反下之寒積不消胃微脾傷穀氣不行食已自噫寒在胸膈上虛下實穀氣不通為閉塞之病

寸口脈緩而遲緩則為陽衛氣長遲則為陰榮氣促不七榮衛俱和剛柔相得三焦相承其氣必強

跌陽脈滑而緊滑即胃氣實緊即脾氣傷得食而不消者此脾不治也能食而腹不滿此為胃氣有餘腹

滿而不能食心下如飢此為胃氣不行心氣虛也得食而滿者此為脾家不治病人鼻下平省胃病也微

赤者病發癰微黑者有熱青者有寒白者不治唇黑者胃先病微燥而渴者可治不渴者不可治臍反出

者此為脾先落先終凡人病脈已解而反暮微煩者人見病者差安而強

千金方衍義卷五

七

歸業山房

與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

診得脾積脈浮大而長饑則減飽則見腹氣與穀爭減心下累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢

重足脛腫厥不能臥是主肌肉損色黃也脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久久不愈病四

肢不收黃痺食飲不為肌膚以冬壬癸日得之肝病傳脾脾當傳腎腎適以冬壬王者不受邪脾復欲還

肝病其色黃體青失溲直視唇反張爪甲青飲食吐逆體重節痛四肢不舉其脈當浮大而緩今反弦急

其色當黃而反青者此是木之尅土為大逆十死不治

宮音人者主脾聲也脾聲歌其音鼓其志愁其經足

太陰厥逆陽明則榮衛不通陰陽翻作陽氣內擊陰

氣外傷傷則寒寒則虛虛則舉體消瘦語音沉澀如

破鼓之聲舌強不轉而好咽唾口噤唇黑四肢不舉

身重如山便利無度甚者不可治依源麻黃湯主之

方在別卷中又言聲憂懼舌本卷縮此是木尅土陽擊陰

陰氣伏陽氣起則實實則熱熱則悶亂體重不能

轉側語聲拖聲氣深不轉而心急此為邪熱傷脾甚

則不可治若唇雖萎黃語音若轉可治

脾病為瘧者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出

恆出丸主之方見別卷中若其人本來少於噴怒而忽反

常噴怒無度正言而鼻笑不答於人此脾病聲之候

也不盈旬月禍必至矣陰陽之疾經絡之源究尋其

病取其所理然後行治萬無遺一也

黃為脾脾合肉黃如鮑腹者吉脾主口唇唇是脾之

餘其人士形相見於上宮黃色大頭圓面美眉背大

腹好股胛小手足多肉上下相稱行安地舉足心平

好利人不喜權勢喜附人耐秋冬不耐春夏夏感

千金方衍義卷五 八 掃葉山房

而生病主足太陰敦敦然脾應月月有虧盈脾小大

隨人唇大小上唇厚下唇薄無膠斷唇缺破此人脾

不正揭聳唇者則脾高高則實實則熱熱則季脇痛

滿唇垂而大不堅者則脾下下則虛虛則危危則寒

寒則身重不能行步唇堅者則脾堅堅則臟安安則

不病唇上下好者則脾端正端正則脾胃和利人無

病唇偏舉者則脾偏痛好脹凡人分部中陷起者必

有病生胃陽明為脾之部而藏氣通於內外部亦隨

而應之沉濁為內浮清為外若表病外入所部則起

起則前瀉腸後補陰若裏病內出所部則陷陷則前

治陰後治陽陽則實熱陰則虛寒寒主外熱主內凡

人死生休否則藏神前變形於外人脾前病唇則焦

枯無潤若脾前死唇則乾青白漸縮急齒際不開若

天中等分墓色應之必死不治看色厚薄決判賒促

賒則不盈四百日內促則旬朔之間脾病少愈而卒

死何以知之曰青黑如梅指靨點見顏頰上此必卒

死脾絕十二日死何以知之曰口冷足腫腹熱臄脹泄

利不覺其出時一日五面青目黃者五日死病人著

牀心痛氣短脾竭內傷百日復愈欲起襁褓因坐於

地其凸倚牀能治此者可謂神良又而黃目赤不死

千金方衍義卷五 九 掃葉山房

黃如枳實死吉凶之色在二於分部靠靠而見黑黃入

臂必病不出其年其大在鼻上當兩若年上不應二

年之內禍必應也季夏十一脾脈色黃主足太陰脈也

其脈本在中封前上四寸之中應在青脛與舌本中

封在內踝前一寸大筋重宛宛中脈本從中封上四

寸是也其脈根於隱白隱白在足大指端內側是也

其筋起於足大指之端內側上結於內踝其直者上

結於膝內輔骨上循陰股結於髀聚於陰器土腹結

於臍循腹裏結於脇散於胸中其內者著於春

其脈起於足大指之端循指內側白肉際過核骨後

上內踝前廉上端內循胛骨後交出厥陰之前上循

膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈注心中合足陽明

為表裏陽明之本在厲合足跌上大指間上三寸骨

解中也同會於手太陰

其手太陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明

其別者入絡腸胃主脾生病實則胃熱熱則腹中切

痛痛則陽病陽脈反大於寸口三倍病則舌強筋轉

卵繼牽陰股引髀痛腹脹身重食飲不下煩心水下

急注脾脾病虛則胃寒寒則腹中鼓脹脹則陰病陰

脈反小於寸口一倍病則泄水不能臥而煩強立股

手太陰經卷五

十

孫業山房

膝內痛苦筋折紐之紐之者脈時綴綴動也發動甚

者死必活四季之月各餘十八日比為四季之餘日

主脾胃黃內隨病也一作內其源從太陰陽明相格

節氣相移三焦寒濕不調四時關格而起則腑臟傷

病隨時受癘陽氣外泄陰氣內伏其病相反若腑虛

則陰邪所加頭重頸直皮肉強痺若臟實則陽疫所

傷蘊而結核起於喉頸之側布毒熱於皮膚分肉之

上中散入髮際下貫顛額隱隱而熱不相斷離故曰

黃肉隨病也

編鵠曰灸肝脾二腑主治丹毒四時隨病當依源補

瀉虛實之病皮肉腫熱則須鑱破薄貼方况促治疾

無逃矣

脾虛實第二論一首 方二十三首 灸法一首

脾實熱

右手關上脈陰實者足太陰經也病苦足寒脛熱腹

脹滿煩擾不得臥名曰脾實熱也

瀉熱湯 治舌本強直或夢歌樂而體重不能行

方

前胡 茯苓 龍膽

細辛 芫硝各三 杏仁 四兩

手太陰經卷五

十

孫業山房

元參

大青各二兩

苦竹葉切一升

右九味咬咀以水九升煮取三升分三服食後服

衍王為萬物之母職司敷化之功序列最卑所關最

鉅五臟六腑寒熱相移而木邪乘土尤為數見所

以瀉熱湯專用龍膽大青前胡杏仁以清肝熱內

動之風茯苓細辛元參苦竹以祛沃土外蒸之濕

或夢歌樂可卜胃氣之充舌強體重洵是脾家之

實實熱交併得不以芑硝蕩熱存陰為務耶

射干煎方 主治同前

射干八兩

大青三兩

石膏十兩一作一升

千金方衍義卷五

主

掃葉山房

赤蜜一升

右四味咬咀以水五升煮取一升五合去滓下蜜

煎取二升分三服

衍射干苦寒有毒而能解毒為喉痺咽痛專藥舌本

強直亦宜用之以其能破宿血散結氣也大青解

心下熱毒瀉肝膽實火正所以祛心胃之邪熱石

膏治心下逆氣舌焦不能息腹中堅痛攷體沉重

赤蜜主心腹邪氣止痛解毒且能安五臟和百藥

較瀉熱湯補瀉攸分不可不辨

治脾熱面黃目赤季脇病滿方

半夏

母薑各八兩

枳實

梔子

茯苓

芒硝各三兩

細辛五兩

白木

杏仁各四兩

生地黃

淡竹葉各切一升

右十一味咬咀以水九升煮取三升去滓下芒硝

分三服

衍肝開竅於目目赤面黃季脇滿痛皆木邪乘土之

候故以枳木茯苓半健脾運濕杏仁細辛下氣泄滿

淡竹梔子化熱清肝母薑從治虛陽地黃逆調血

熱芒硝開闢實邪之去路也前瀉熱湯治脾協肝

千金方衍義卷五

主

掃葉山房

威故宜祛熱瀉實此主土承木制故宜養正除邪

兩不移易之定法

治脾橫方

若赤黑發如瓜大煎羊脂摩之

又方

末赤小豆和雞子白傅之

衍皮肉赤黑如甲錯狀乃脾氣橫逆血不循經閉滯

而為堅腫故取羊脂之溫潤滋血炙手楷摩赤黑

自退堅腫自和 赤小豆雞子清皆能散血解毒

不獨治脾橫赤腫傷寒餘毒發願亦不出此

四肢寒熱腰疼不得俯仰身黃腹滿食嘔舌根直灸

第十一椎上及左右各一寸五分三處各七壯

脾胃俱實

右于關上脈陰陽俱實者足太陰與陽明經俱實也

病苦脾脹腹堅槍脇下痛胃氣不轉大便難時反泄

利腹中痛上衝肺肝動五臟主喘鳴多驚身熱汗不

出喉痺精少名曰脾胃俱實也

三黃瀉熱湯方

大黃

麻黃

黃芩

各四兩

杏仁

赤茯苓

甘艸

千金方衍義卷五

十四

掃葉山房

橘皮

芒硝

澤瀉

各三兩

右九味咬咀以水九升煮取三升絞去滓內大黃

煮兩沸去滓下芒硝分三服

義衍大黃芒硝瀉裏熱麻黃杏仁瀉表熱黃芩甘艸瀉

半表半裏熱茯苓澤瀉瀉不表不裏熱使從水道

滲泄橘皮佐麻黃杏仁引領裏熱從元府開發也

此方治熱從內發故可表裏兼攻非若傷寒之邪

邪未傳裏不可輕用裏藥之禁

大黃瀉熱湯又治脾脈厥逆大腹中熱切痛舌強

腹脹身重合不下心注脾急痛方

大黃切水一升甘艸各三兩

茯苓

黃芩

細辛

芒硝

橘皮

右八味咬咀以水七升煮取三升三合去滓下大

黃更煎二沸去滓下芒硝分三服

義衍前方治脾胃俱實熱邪上逆而見喘鳴身熱汗不

出等證故以麻杏開發肺氣使裏熱從表分解此

去濕熱內盛故無取於麻杏但易細辛一味開通

經脈使熱悉從二陰開泄更一佐使而功用不殊

前心臟門中大黃瀉熱湯彼治心勞口舌生瘡故

千金方衍義卷五

十五

掃葉山房

用梔仁桂心通艸石膏大棗以導上炎之火此治

脾脈厥逆故用細辛茯苓橘皮以通伏匿之熱其

劑黃芩甘澤瀉甘艸瀉滲瀉實熱之用一也

治脾熱脇痛熱滿不歇目赤不止口唇乾裂方

石膏

生地黄

赤蜜

淡竹葉

切五升

右四味先以水一斗二升煮竹葉取七升去滓澄

清下石膏煮取一升五合去滓下地黃汁煮兩沸

次下蜜煎取三升細細服之

義衍此取竹葉石膏湯中二味但以竹葉清心解煩石

膏清胃化熱為日赤唇乾之專藥生地黃汁以和
脇痛蜂蜜以滋脾熱專取赤者使從而火開泄也
治脾熱偏一邊痛胸滿脇脹方

茯苓

橘皮

澤瀉各三兩

芍藥

白朮各四兩

人參

桂心各一兩

石膏八兩

半夏六兩

生薑切

桑根白皮各一升

右十一味咬咀以水一斗二升煮取三升去滓分

二服若須利下加芒硝二兩佳

〔衍〕胸脇為氣分脹痛為實熱而偏著一邊又非全盛

千金方衍義卷五

六

婦葉山房

可擬故以半夏橘滌除痰氣參苓白朮匡輔藥

力殊非補虛之謂若偏著在左則有桂心芍藥可

治偏著在右則有石膏桑皮可治左之右之無不

宜之故無分於左右也

脾虛冷

右手關上脈陰虛者足太陰經也病若泄注腹滿氣

逆霍亂嘔吐黃瘰心煩不得臥腸鳴名曰脾虛冷也

治虛脹脇痛肩息有時發作悉補之方

五加根皮

丹參

橘皮各一斤

地骨皮

乾薑

白朮各八兩

乾地黃

芎藭

附子各五兩

猪椒根皮二斤

桂心

桔梗各四兩

甘艸三兩

大棗五十枚

右十四味咬咀以酒四斗漬五七日服七八合加

至一井日再服

〔衍〕脇滿脹痛喘鳴肩息者脾虛居多此何以知為虛脹

耶以脈辨之必關上虛微無力始可定以為虛設

見泄注腹滿氣逆等證又為虛中挾冷之象當非

實滿之比此方專主虛脹故用薑桂木附椒根加

皮溫散肝脾腎三經及肺氣之脹喘逆自息芎藭

千金方衍義卷五

七

婦葉山房

地黃丹參地骨滋養肝脾腎三陰及心包之血脇

痛自和桔梗橘皮甘艸大棗疏肺氣運脾津并和

逆滿之氣也

猪椒散 治脾寒飲食不消勞倦氣脹噎滿憂志

不樂方

檳榔八枚皮

人參

茯苓

陳麴

麥蘖

厚朴

白朮

吳茱萸各二兩

右八味治下節食後酒服二方寸七日再服二方

用橘皮一兩半

脾寒飲食不消勞倦氣脹噎滿雖用檳榔皮子

薑厚朴不得吳茱萸之溫中下氣噎滿必不能除

不得參苓白朮之扶助胃氣冷食必不能化尤妙

在和滓酒服以行溫散之力也

溫脾丸 治久病虛羸脾氣弱食不消噎噫方

黃藥 大麥藥 吳茱萸

桂心 乾薑 細辛

附子 當歸 陳麴

大黃 黃連 各

右十一味為末蜜丸如梧子大每服十五丸空腹

千金方卷五十一 大 歸葉山房

酒服日三

積於中而熱蒸於上非用三黃之苦寒標撥上盛

則黃桂薑附入胃先助上熱何能直達下焦又恐

寒熱相搏更須細辛當歸調和經府血氣然後麴

藥藉辛溫之力得以消遑恬不顧慮虛羸竟行辛

烈峻攻者正恐病勢糾纏他時愈難攻擊也

麻豆散 主脾氣弱不下食餌此以當食方

大豆黃卷 升 大麻子 升 熬

右二味治下餽飲和服一合日四五任意多少

大豆黃木經治濕痺筋攣膝痛取其入脾逐濕入

肝祛風入腎除寒三者去而脾氣安矣麻子仁本

經有補中益氣之功南陽有通訓脾約之用先哲

辟穀方多用之故脾氣弱不下食者以之久服無

傷中之害

脾胃俱虛

右手關上脈陰陽俱虛者足太陰與陽明經俱虛也

病苦胃中如空狀少氣不足以息回逆寒泄注不已

名曰脾胃俱虛也

治腹脹善噫食則欲嘔泄瀉下口乾四肢重好

千金方卷五十一 五 歸葉山房

怒不欲聞人聲忘識喉痺補之方

黃連 一兩 禹餘糧 二兩 白朮

乾薑 各三 大麻子 五兩 桑白皮 八兩

大棗 二十枚

右七味咬咀以水一斗二升煮取三升分四服

此即旋覆代赭石湯對子傷寒汗下後心下痞鞭

噫氣不除用代赭之重以降逆氣旋覆薑平以逐

痰水人參甘艸大棗以助胃氣行藥力此治脾虛

腹脹善噫詳方下等證脾胃雖虛種種皆挾熱象

故用禹餘糧之重以鎮攝即代赭石降逆之意黃

連之苦以去熱即半夏滌痰之意白朮之甘以健脾即人參助胃之意麻仁之潤以滋津即甘艸和中之意桑皮之淡以泄肺即旋覆開結之意乾薑之辛以配黃連即生薑佐半夏之意大棗乃脾家專味也藥雖變易而立法未常少離南陽先師繩墨

治脾胃俱虛苦飢寒痢方

人參

當歸

桂心

茯苓

桔梗

芎藭

厚朴

甘艸

橘皮

千金方衍義卷五

三

繪葉山房

吳茱萸

各二兩

白朮

五兩

麥蘖

各一升

右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服

飢極寒痛中氣虛寒可知故用參苓朮甘補氣芎歸和血黃桂溫中朴蘖橘梗以司運化之力也

白朮散 治脾胃俱虛冷方

白朮

厚朴

人參

吳茱萸

茯苓

麥蘖

陳麩

芎藭

各三兩

右八味治下飭酒服方寸匕食後服日二一一方

加大腹橘皮

此取前方七味除去歸桂甘桔橘皮易入陳麩以助麥蘖之消運功效與前不殊

平胃丸 九身重不得食食無味心下虛滿時時

飲下喜臥者皆鍼胃脘太倉宜服建中湯及此

方

杏仁

五十枚

丹參

三兩

苦參

元參

葶藶

各二兩

芎藭

桂心

各一兩

右七味為末蜜丸如梧子大酒服五九日三以知

為度

千金方衍義卷五

三

繪葉山房

脾與胃以膜相連脾虛合用溫補反用苦寒平胃

寧不礙脾氣之益因乎祇緣中氣不能健運宿食

積聚於胃而臍熱是不得不用苦寒以散食積之

火丹參苦參元參葶藶木經皆治腹中寒熱積聚

杏仁下氣開結芎藭理血中氣桂心辛溫散結以

激發諸苦寒之性又須先鍼胃脘太倉然後用藥

急則治標之法也若中無積聚又常用建中湯取

膠餈稼穡之甘引領桂中之辛溫以補脾胃虛寒

也 又方 治丈夫小兒食實不消胃氣不調 或溫壯

熱結太小便不利者有病冷者服露宿九熱藥

後當進此九調胃方露宿九見後十六卷

大黃二兩 小劑 甘州

芍藥 芍藥 葶藶各一

杏仁五十枚

右七味為末蜜丸如梧子飲服五九日三一歲小

兒二九漸加之翼方無杏仁有葶藶當歸乾薑茯苓麥門冬細辛為十三味

衍疝氣不運胃氣不調當分虛實冷熱如身無壯熱

八小便利者為冷積當與露宿丸烏附桂心礬石

攻之或溫壯熱結大小便不利者為熱積或服露

宿丸反增壯熱便閉當用大黃葶藶攻積破結芍

藥芍藥和營散熱杏仁甘州下氣安中小艸辛溫

引領葶藶大黃從下竅問泄即前平胃丸中桂心

之意

論曰凡病宿食在上脘當吐之脈數而滑者實也有

宿食不消下之愈胃中有滯食冷物即痛不能食有

熱物即欲食大腹有宿食寒慄發熱如瘧狀宿食在

小腹者當募發熱明日復止寸脈緊即頭痛風寒或

腹中宿食不化寸口脈緊者如轉索左右無當脾胃

中有宿食不消寸口脈浮而大按之反濇尺中微而

清故知宿食

清故知宿食

大麴藥丸 主消穀斷下溫和又寒冷者常服不

患霍亂方

大麥藥 麴各一

乾薑 當歸 附子各三

赤石脂一兩 桔梗 女萎各二

吳茱萸 皂莢各五 蜀椒二兩

烏梅五十枚

右十三味為末蜜酢中半漬海一宿蒸三斗米下

去核搗如泥和藥蜜和搗二千杵服十九日三下

甚者加龍骨阿膠艾各三兩

衍大麴藥丸用人參薑附椒黃一派辛溫佐麴藥以

溫中消導專取皂莢以通關竅破堅積逐風痰其

性過烈且有薑附等藥助長其勢不得以參歸

桔梗女萎和之女萎專主風寒灑灑霍亂泄利驚

痛寒熱石脂烏梅收濕藥力雖猛峻十九不為

過也

消食斷下丸 寒冷者常服之方

麴 大麥藥各一 吳茱萸四兩

右三味為末蜜和服十五九如梧子日

三下

附義於大麩蘗丸中採取三味惟用吳茱萸之溫中以

助麩蘗之消導也

乾薑散 治不能食心意冥然忘食方

乾薑

法麩

蜀椒

乾

大麥蘗

右五味合治下篩食後服三方寸七日三以能食

為度

附義於消食斷下丸中加乾薑以助蜀椒乾豉以解胸

中毒熱惡氣胃氣清則心氣安矣

消食丸 治數年不能食方

千金方衍義卷五

西

掃葉山房

小麥蘗

麩 各一

乾薑

烏梅 各四兩

右阿味為末蜜和服十五丸日再加之四十九寒

在胸中及反胃翻心者皆瘥

附義於乾薑散中除去椒豉加烏梅以收酸津氣

麩蘗丸 主消穀能食除腸中水氣臃脹方

法麩

麥蘗

杏仁 各五兩

右三味治下篩食後酒服一合日三

附義氣下則水散杏仁下氣麩蘗消穀腸胃清肅而臃

脹除矣

脾勞第三 論一首 方二首

論曰凡脾勞病者補肺氣以益之肺旺則感於脾是以聖人春夏養陽氣秋久養陰氣以順其根本矣肝心為陽脾肺腎為陰逆其根則伐其本陰陽四時者萬物之終始也

半夏湯 治脾勞實四肢不用五臟乖反脹滿肩

息氣急不安承氣泄實熱方

半夏

宿薑 各八兩

茯苓

白朮

杏仁 各三兩

橘皮

芍藥 各四兩

竹葉 切一升

大棗 二十枚

千金方衍義卷五

西

掃葉山房

右九味咬咀以水一斗者取三升分四服

附義脾勞津耗則濁氣逆滿不安故以橘半苓朮滌痰

宿薑大棗安中杏仁竹葉泄熱芍藥收斂陰氣與

前消食丸中烏梅酸收同意

消食膏酒 治脾虛寒勞指氣脹噫滿食不下逆

噫方

猪膏 三升

宿薑 汁五升

吳茱萸 一升

白朮 一斤

右四味搗菜黃白朮等二味細細下篩為散內膏

汁中煎取六升温清酒一升進方寸七日再

功 白木益脾茱萸溫中宿薑通神明止噫氣猪膏以

滋虛勞津血清酒以行莫術性味也

內論第四方六首

論曰凡肉極者主脾也脾應肉肉與脾合若脾病則肉變色又曰至陰遇病為肌痺肌痺不已復感於邪內合於脾體癢淫淫如鼠走其人身上海液脫膜理開汗大泄鼻端色黃是其相也

凡風氣藏於皮膚肉色則敗以季夏戊巳日傷於風為脾風脾風之狀多汗陰動傷寒寒則虛虛則體重怠惰四肢不欲舉不嗜飲食食則咳咳則右脇下痛

千金方衍義卷五

美

掃葉山房

陰陰引肩背不可以動轉名曰厲風裏虛外實若陽動傷熱則實實則人身上如鼠走唇日壞皮膚色變身體津液脫膜理開汗大泄名曰惡風而須決其綱紀知其終始陰陽動靜肉之虛實實則瀉之虛則補之能治其病者風始入肉皮毛肌膚筋脈之開即須決之若人六腑五臟則半死矣

扁鵲曰肉絕不治五日死何以知之皮膚不通外不得泄凡肉應足太陰太陰氣絕則脈不營其肌肉口唇者肌肉之本也脈不營則肌肉濡肌肉濡則人中滿人中滿則唇反唇反氣盡則肉先死甲篤乙死木

勝土使良醫妙藥終不治也

解風痺湯 治肉熱極肌痺淫淫如鼠走身上上海液脫膜理開汗大泄為脾風風氣藏於皮膚肉色敗鼻見黃色麻黃止汗通肉方

麻黃

防已一作防風

枳實

細辛

白朮各三兩

生薑

附子

各四兩

甘草

桂心各二兩

石膏

八兩

右十味 咀咀以水九升煮麻黃去沫下諸藥煎取

三升分三服

千金方衍義卷五

老

掃葉山房

以肉極熱而內火招風膜理不固故用麻黃石膏發越脾氣附子細辛搜逐陰邪枳實防已滌痰祛濕甘艸白朮通攝津液桂心生薑開通經絡以子風痺之出路而汗自止矣

西州續命湯 治肉極虛熱肌痺淫淫如鼠走身

上津液開泄或痺不仁四肢急痛方

麻黃

生薑各三兩

當歸

石膏

各二兩

芎藭

桂心

甘艸

黃芩

防風

芍藥

各一兩

杏仁四枚

右十一味咬咀以水九升先煮麻黃去沫下諸藥
煮取三升去滓分四服日再

衍義續命為風痺身體不能自收正虛風中之首藥乃

古今錄驗方中除去人參加入黃芩謂之西州續
命更悉小續命中芍藥防風二味并以生薑易乾

薑即小續命中除去附子防已專力開發風痺以
無脚虛喘乏故無取於人參以無腎虛逆冷故無

取於附子以無下體疼重故無取於防已也

越脾湯 治肉極熱則身體津液脫膝理開汗大

泄厲 風氣下焦脚弱方見七卷風

千金方衍義卷五 掃葉山房

衍義發越脾氣以泄其熱則身體自安腠理自和津液

自斂烏有汗泄之患乎即有厲風脚弱得麻黃之

開發石膏之化導甘艸之平調烏有營衛不和之

患乎脚氣本門未嘗不藉此分解風毒也

石南散 治肉極熱則體上如鼠走或如風痺瘡

口燥皮膚色變上諸風大病方

石南三十 蔞蘗一作 芍藥一作

天雄一作 桃花一作 甘菊各一

黃芪各十 真珠各十 山茱萸一兩十

石膏二兩 升麻各十 萎蕤各一

右十二味治下篩酒下方寸七日再食後服

衍義方中石南山茱萸祛風逐濕為開痺之專藥天雄

石膏宣通寒熱升麻黃芪職司開合真珠菊花清

理虛陽薯蕷萎蕤解散風熱芍藥桃仁調和營血

所謂血行風自滅也

大黃芪酒 治肉極虛寒為痺風陰動傷寒體重

怠惰四肢不舉關節疼痛不嗜飲食虛極所致

方

黃芪 桂心 巴戟天

石斛 柏子仁 澤瀉

千金方衍義卷五 掃葉山房

茯苓 乾薑 蜀椒各三

防風 獨活 人參各二

天雄 芍藥 附子

烏頭 茵芋 半夏

細辛 栝蘘根 白朮

黃芩 山茱萸各一

右二十三味咬咀絹袋貯以清酒三斗漬之秋冬

七日春夏三月初服三合漸漸加微醉為度日再

衍義烏附天雄薑桂椒辛力開寒痲菌辛防獨并祛風

毒參苓芪米振發元神餘皆滋培津液化導風熱

之佐使耳

治肉極虛寒卒中風口噤不能言四肢緩縱偏癱
急痛注五臟恍惚喜怒無常手脚不隨方

獨活

茵芋

黃芩各三

甘艸

防風

芍藥

芎藭

麻黃

葛根各二

人參一兩

烏頭三枚

右十一味咬咀以水一斗竹瀝四升合煎取四升

分四服日三夜一

附錄 茵芋專攻毒風然須麻葛防獨為前導烏頭力開

千金方卷五

三

楊葉山房

寒痺獨賴芎藭參甘以助長黃芩竹瀝疏通經絡

即風痲緩縱亦必以行經滌痰為務也

肉虛實第五

論一首
方二首

論曰夫肉虛者坐不安席身危變動肉實者坐安不

動喘氣肉虛實之應主於脾若其臟腑有病從肉生

熱則應臟寒則應腑

五加酒 治肉虛坐不安席好動主脾病寒氣所

傷方

五加皮

枸杞皮各二

乾地黄

丹參各八

石膏石淋

杜仲各一

乾薑四兩

附子三兩

右八味咬咀以清酒三斗清三宿一服七合日再
方下雖主脾勞病寒氣所傷而好動乃火之象以

始本受寒久而蘊熱是標寒是本故以薑附治

本寒石膏地骨皮散標熱地黃丹參滋陰以配陽

五加杜仲補火以生土與前脾虛冷中治虛脹脇

痛肩息有時發動方大同小異有時發動亦火性

不常之候也

半夏湯 治肉實坐不安席不能動作喘氣主脾

病熱氣所加開格除喘方

千金方卷五

三

楊葉山房

半夏

宿薑各八

杏仁五兩

細辛

橘皮各四

麻黃一兩

石膏七兩

射干二兩

右八味咬咀以水九升煮取三升分三服須臾下

加芫硝三兩

肉虛則宜溫養肉實則宜溫散實乃肌表之盛故

借越脾青龍射干麻黃等法以麻杏細辛開泄肺

氣薄半橘皮滌除胃濕射干解散內結石膏化導

標熱裏氣通而表氣鬆實從外解之法也

祕澀第六

論一首 方四十四首
灸法十五首

論曰有人因時疾後得閉澀不通遂致天命大不可輕之所以備述雖非死病凡人不明藥餌者拱手待斃深可痛哉單服諸方以虞倉卒耳凡大便不通皆用滑膩之物凡候面黃者即知大便難

麻子仁丸 跌陽脈浮而澀浮則胃氣強澀則小

便數浮澀相搏大便則堅其脾為約脾約者其人大便堅小便利而不渴也

麻子仁二升

枳實

芍藥各八兩

杏仁三升

大黃

厚朴各一斤

右六味為末蜜丸如梧子大飲服五九日三漸加

千金方衍義卷五

掃葉山房

至十九附後外臺無杏仁

衍義此即陽明例中跌陽脈浮而澀浮則胃氣強澀則小便數浮澀相搏大便則難其脾為約麻仁丸主

之喻嘉言曰成注謂胃強脾弱脾不為胃行其津液大謬若果脾弱則當補矣何謂麻仁丸中反用

大黃厚朴枳實乎仲景言胃強原未言脾弱況其所謂胃強正是因脾之強而益強弱者省約也脾

氣過強將三五日胃中所受之穀省約為一二彈丸而出全是脾土過燥至今胃中之津液日漸乾

枯所以大便為難設脾氣弱則當泄矣豈有反難

之理相傳謂脾約者不能約束胃中之水何以反

能約束胃中之穀歟在陽明例中凡宜攻者惟恐

邪未入胃大便勿鞭又恐初鞭後泄不可妄攻若

欲攻之先與小承氣湯試其轉失氣者方可攻皆

是驗其脾氣之弱故爾踟躕若夫脾約一證在太

陽已當下矣更何待之陽明耶此尚論篇中已得

其體無庸復贅

治關格大便不通方

芒硝

烏梅

桑白皮各五兩

芍藥

杏仁

麻仁三兩

千金方衍義卷五

掃葉山房

大黃八兩

衍義右七味咬咀以水七升煮取三升分三服一本無烏梅加枳實乾地黄各二兩

關格危證不為急通命懸呼吸故於麻仁丸中削去枳實厚朴之纏緩易入芒硝以峻攻又恐津隨

藥脫即以烏梅斂之用桑根皮者通泄肺氣於下取其有利水之功也讀古人方須要識當時立方

緩急之用方不失先哲垂誨後世之心印此方端為實熱暴關消滴不通者設設久病陰虛肝腎不

能司開合之權而漸致閉拒有時滴瀝者亦為峻

補真陰通調氣化尚恐難為既稿之榮況可稍黃
漫施乎嘗觀成無已註傷寒吳鶴舉放醫方不過
開戶進車若夫折衝妙用梓匠未之聞也惟許宏
釋內臺趙以德衍金匱深得先聖之奧善開學人
心眼近世喻嘉言稍知追宗二君之緒徑耳
治大便閉澀不通神方

猪羊膽不拘以筒灌三合許令深入即出矣不
盡須與艾灌 一方加冬葵子汁和之亦妙

又方

椒豉湯五升加猪膏三合灌之佳臨時不下即

千金方卷卷五

香

掃葉山房

用之

又方

白蜜煎成如人指大深內穀道佳或加鹽三錢

七無灰濃酒半盞鍊如上法

猪膽導法廣之以羊膽總取寒滑以泄燥熱可無

分於彼此更加葵子汁以助滑澤之義 椒取蠶

蓬豉能逐穢然非猪膏不能助潤下之力 蠶煎

導法潤而不寒無傷津液加以鹽酒兼能潤下和

血

三黃湯 治下焦熱結不得大方便方

大黃

黃芩二兩

甘艸一兩

梔子二十枚

右四味咬咀以水五升煮取一升八合分三服若

大閉加芒硝二兩

後此於伊尹三黃湯中以梔子甘艸之輕劑易去黃

連之書果使速分利陰陽不致重味傷犯中州也

五柔丸 治腸腑閉澀及虛損不足飲食不生肌

膚三焦不調營衛不和方

大黃一升

前胡二兩

半夏

肉苁蓉

芍藥

茯苓

千金方卷卷五

薑

掃葉山房

當歸

葶藶

細辛各一兩

右九味為末蜜和合搗萬杵為丸如梧子大食後

服十五丸後稍增之日再崔氏云令人喜飯消痰

藟子各半兩服之緩中不如

大五柔丸 主臟氣不調大便難通和營衛利九

竅消穀益氣方

大黃

菴菴

芍藥

葶藶

枳實

甘艸

黃芩

牛膝各二兩

桃仁一百枚

杏仁四十枚

右十味爲末蜜和丸如梧子一服三九日三加至二十九酒下

衍燥萬物者莫熯乎火今以陽勝過燥故急施子奪

反剛爲柔而五體柔和無偏陽之患矣方中大黃

葶蘆亟奪矯陽卽子蕞蓉歸芍滋培營血兼取苓

半辛前迅掃痰涎以通陰血營周之路也 大五

柔丸立法與前不殊但彼以滌痰爲務故用半夏

茯苓此以調血爲主故用牛膝桃仁其黃芩杏仁

枳實甘艸卽前方中前胡細辛通達風熱之義

濡臈湯 主大便不通六七日腹中有燥屎寒熱

千金方義卷五

美

掃葉山房

煩迫短氣汗出脹滿方

生葛根

猪膏各二升

大黃一兩

右三味咬咀以水七升煮取五升去滓內膏煎取

三升澄清強人頓服羸人再服亦治大小便不通

衍臈燥不能努擗故用大黃之苦寒以化結熱葛根

之甘淡以行胃津猪膏專取濡潤以助滑澤也

治大便不通方

大戟一斤

大豆五升

商陸

牛膝各半升

右四味咬咀以水五升煮取三升以大豆煎合汁

盡至豆乾初服三枚以通爲度

又方

蜜和胡燕屎內大孔中卽過

又方

水四兩蜜一升合煎熟冷灌下部中一飯頃卽

通

又方

鹽半合蜜三合合煎如飴出之著冷水中丸如

檳榔形如指許大深內下部中立通

又方 治大便難方

千金方義卷五

美

掃葉山房

單用豉清醬清羊酪土瓜根汁灌之立通

又方

以醬清漬烏梅灌下部中

又方

桑根白皮 榆根白皮各一

右二味咬咀以水三升煮取一升半分三服

又方

水服桃花末方寸匕無花時桃根白皮亦得

又方

桃皮三升水五升煮取一升頓服

又方

羊蹄根一把約半斤水二升煮一頓服之

又方

常煮麻子取汁飲

又方

常服蜜煎五合

又方

猪脂和陳葵子末爲丸如梧子大每服十九通

又方

卽止

千金衍義卷五

葵

掃葉山房

常服車前子及葉並良

又方

搗葵根汁生服

又方

好膠 三寸 葱白 一把

右二味以水四升煮取一升半頓服之卽下

又方

葵子 牛酥各一升猪脂亦得

右二味以水四升煮葵子取一升內酥煮一沸待

冷分作二服

又方

葵子汁和乳汁等分服之立出

又方

醬清 三升 麻油 二升 葱白 三寸

右三味合煮令黑去滓待冷頓服之 一方不用

醬清

大戟商陸佐以牛膝皆破水腫脹閉之猛藥然煮

汁收黑大豆中深得峻藥緩攻之妙以通爲度不

致有傷元氣也 蜜和燕屎內大孔中取至高同

氣之物引之下奪所謂醫者意也其斯之謂歟

千金衍義卷五

葵

掃葉山房

又變蜜煎爲灌法其意則一 又加鹽入蜜煎導

中校前但少無灰酒耳 豉醬羊酪土瓜根汁并

取鹹潤清熱也 桑根榆皮藥力雖緩但用二味

以取專攻之力與前大戟商陸煮大豆服之意角

立 桃花破石淋利大便 桃皮散血單用煎服

亦能通利大便 羊蹄根屬水走血爲除濕熱專

藥 麻子仁爲潤腸專藥本經有補中益氣之功

然須久服方臻其妙 蜜煎不獨爲導亦可單服

猪脂和葵子丸服咸取其潤 車前下達不獨

利水 葵根滑澤利竅脾約亦得用之 膠滋津

液葱能達竅二味相需通行內外也 葵子牛酥

疎利膀胱通隧達竅 葵子乳汁與牛酥無異

醬清麻油鹹潤下達葱白通行經絡也

芒硝丸 治脹滿不通方

芒硝 芍藥 杏仁

大黃 黃芩 六銖

右五味為末蜜丸如梧子飲服十五丸加至二十

丸取通利為度日三

義衍 脹滿不通正當用大陷胸丸何反除去葶藶葢病

本在下硝黃足以破結雖用杏仁不得葶藶原無

千金方衍義卷五 早 掃葉山房

射肺之猛其用黃芩芍藥專取散風熱護營氣軟

大陷胸之緩急天淵

又方

通艸 朴硝 郁李仁

黃芩 瞿麥 車前子

右六味咬咀以水八升煮取二升半分三服 一

方用絹袋盛煮頓服二升

義衍 通艸瞿麥車前疏利水脹朴硝郁李滌除風閉黃

芩開泄少陽之樞以通風熱之路也

又方

獨頭蒜燒熟去皮綿裏內下部中氣立通

又方

削薑以鹽導之 及乾薑食鹽杏仁搗丸導之

義衍 濁惡之氣壅閉濁惡之道故取蒜之濁惡以通濁

惡之氣 削薑為導加之以鹽不獨辛散兼取鹹

潤也 薑鹽辛順并借杏仁引肺氣下行以通下

部之閉

治脹滿閉不下方

吳茱萸 乾薑 大黃

當歸 桂心 芍藥

千金方衍義卷五 早 掃葉山房

甘艸 芎藭 人參

細辛 桃白皮 眞珠

雄黃 十八銖

右十三味咬咀以水一斗煮取三升去滓內雄黃

眞珠末酒一升微火煮三沸服一升得下即止

義衍 此方辛以破結陽以破陰調氣以助辛烈之威和

血以助散結之力僅取大黃一味開泄濁惡之去

嚮也

走馬湯 主一切卒中惡心痛腹脹大便不通方

巴豆 杏仁

右二味以綿纏槌令碎熱湯二合撿取白汁飲之
當下老小量之通治飛尸鬼擊病

衍外臺走馬之名 甚言病勢之迫故取巴豆之辛烈

破結杏仁之辛溫下氣匹馬單刀急突重圍以救
莫測之患也

巴豆丸 主寒癖宿食久飲飽不消大便不通方

巴豆仁一升清酒五升煮三日三夕碎大熟合

酒微火煎令可丸如胡豆欲取吐下服二丸

衍獨用一味製丸總皆備急白散法派

練中丸 主宿食不消大便難方附後名

千金方義卷五 聖 掃葉山房

大黃 八兩 葶藶 杏仁 煎

芒硝 各四兩

右四味為末蜜丸如梧子大食後服七丸日三後
稍加之

衍此即大陷胸丸本治結胸項強如柔痙狀專取杏

仁佐葶藶以射肺泄滿然必熬黑方有滌垢殊功

非比芒硝丸之但取下氣無取於熱也大黃芒硝

引領葶藶杏仁并力下行四味皆蕩練中州之藥

故千金以練中名之

灸法

大便難 灸第七椎兩傍各一寸七壯 又灸承筋

二穴各三壯在臍中央陷內

大便不通 灸俠玉泉相去各二寸名曰腸遺隨年

壯一云二 又灸大敦四壯在足大指聚毛中

大便閉塞氣急心堅滿 灸石門百壯

後閉不通 灸足大都隨年壯

治老人小兒大便失禁 灸兩腳大指去甲一寸三

壯 又灸大指奇間各三壯

治大小便不通方

葵子 末一升 青竹葉 一把

千金方義卷五 聖 掃葉山房

右二味以水二升煮五沸頓服

又方

葵子 一升 榆皮 切一升

右二味以水五升煮取二升分三服

又方

葵子一升水三升煮取一升去滓內猪脂一升

空心分二服

又方

甌帶煮取汁和蒲黃方寸七日二服

又方

猪脂一觔水二升煮三沸飲汁立通

治大小便不利方

葵子 二升

硝石 二兩

右二味以水五升煮取二升分二服

治小兒大小便不通方

搗白花胡葵子末煮汁服之

又方

末雞屎白服一錢匕

衍義葵子利窮青竹清熱使從水道開泄 葵子榆皮

滑澤利竅 葵子猪膏滋津利竅然脾氣不實者

千金方衍義卷五

醫

掃葉山房

宜慎 飢帶取其通氣滯黃性專散血 猪脰潤

澤而不滑腸但能滌垢而不能下氣 葵子利水

硝石破結分投前後二陰以循去向也 葵子取

白花者專行氣分 雞屎白下氣內經雞矢醴的

派 以上諸治隨機檢取以便採用也

灸法

大小便不利欲作腹痛 灸營衛四穴百壯穴在背

脊四面各一寸

腹熱閉時大小便難腰痛連胸 灸團岡百壯穴在

小腸膈下二寸橫三間下灸之

大小便不通 灸臍下一寸三壯 又灸橫文百壯

大小便不利 灸八竅 百壯穴在腰眼下三寸俠

脊相去四寸兩邊各四穴 計八穴故名八竅

小兒大小便不通 灸口兩吻各一壯

小便不利大便數注 灸肩骨端五十壯 又灸天

樞百壯穴在俠臍相去三寸魂魄之舍不可鍼大法

在臍傍一寸合臍相去可三寸也

孫真人千金方衍義卷下五上

千金方衍義卷五

醫

掃葉山房

孫真人千金方衍義卷十五下

長洲

南沙廣世醫館校

脾臟方下 凡四類

熱痢第七 論一首

論曰余立身以來三遭熱痢一經冷痢皆日夜百餘行乃至移狀就廁其困篤如此但率意自治者尋手皆愈乃知此疾天下易治但中性之徒率情矯倨良藥苦口不能克己以餌朝遇暮過望其自瘥疾勢日增胃氣漸弱心力俱微食飲與藥皆不能進既不時愈便稱痢病難治斯皆自誤也學者須深達斯旨然此病隨宜服一物皆使得瘥惟須力意苦已服食以瘥為限則無不愈也又大須慎口味重者百日次者一月常恃驕恣者不能自慎與言於此以為至慨矣古今痢方千萬首不可具載此中但撮其效者七八而已如陟釐丸烏梅丸松皮散等暴痢服之何有不瘥其溫脾湯建脾湯方出下冷痢篇久下得之焉能不愈大凡痢有四種謂冷熱瘡蟲冷則白熱則赤相則赤白相雜無復節度多睡眠瀝蠱則純痢瘕血熱則多益黃連去其乾薑冷則加以熱藥瘡則以藥吹灌下部

千金方衍義卷十五

痢疾山房

盡毒則以蠱法治之藥既主對相當痢者復自勉勵服餌焉有不愈者也凡服止痢藥初服皆劇患人不解卽止其藥不服此特不可但使藥與病源的相主對雖劇但服不過再三服漸漸自和非其主對者慎勿服也

凡痢病通忌生冷酢滯猪羊雞魚油乳酪酥乾脯醬粉臧所食諸食皆須大熟爛為佳亦不得傷飽此將息之大經也若將息失所聖醫不能救

下痢脈滑而數有宿食當下之
下痢脈遲而滑者實也利為未止急下之

千金方衍義卷十五

痢疾山房

下痢脈反滑當有所去下乃愈
下痢不欲食者有宿食當下之
下痢而腹痛滿為寒實當下之
下痢腹中堅者當下之
下痢而譏語腹內有燥屎宜下之
下痢二部皆平一作浮按其心下堅者急下之
下痢已瘥至其年月日時復發者此為下不盡更下之愈風寒重者不可下下之後心下堅痛脈遲一作此為寒但當溫之脈沉緊下之亦然脈大浮弦下之當已

下痢脈浮大此為虛以強下之故也設脈浮者因
爾腸鳴當溫之

下痢脈遲緊為痛未欲止當溫之得冷者滿而使腸
垢

下痢身軀疼痛急救裏諸溫之屬可與理中四逆附
子湯熱藥急投之美

下痢大孔痛者當溫煖之

下痢腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表

下痢清穀不可攻其表汗出必脹滿

下痢氣者當利其小便

千金方衍義卷三

三

掃葉山房

下痢脈反浮數尺中自瀉其人必清膿血

下痢脈數而渴者令自愈設不瘥必清膿血有熱故
也

下痢脈沉強者下重其脈大者為未止脈微弱數者
為欲自止雖發熱必不死

下痢脈沉而遲其人面少赤身有微熱

下痢清穀必變目汗出而解病人必微厥所以然者

面戴陽下虛故也

下痢有微熱而渴脈弱者令自愈

下痢脈數有微熱汗出冷自愈設脈緊為未解

下痢脈弦發熱身汗者自愈

下痢脈大浮弦下當已

下痢舌黃燥而不渴胸中實下不止者死

下痢後脈絕手足厥冷時脈還手足溫者生不還

不溫者死生死之決此之謂也

下痢手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘

者死少陰負跌陽者為順

凡六腑氣絕於外者手足寒上氣腳縮五臟氣絕於

內者下利不禁下甚者手足不仁也細尋取之萬不

失一下病體略例如此耳

千金方衍義卷三

四

掃葉山房

素問曰春傷於風夏為膿血比下多滯下也夏傷於

風秋必洞泄秋多下水也患是冷也夫積冷積熱及

水穀實而下者以大黃湯下之強人勿過兩劑皆消

息五六日更進一劑其補瀉湯不效者三兩日可進

一劑

陟釐丸 治百病下利及傷寒身熱頭痛目赤四

肢煩疼不解協熱下利或醫已吐下之腹內虛

煩欲得冷飲飲不能消腹中急痛溫食則吐乍

熱乍冷狀如溫瘧或小便不利氣滿逆下痢

不止方

水中陟釐五兩 紫石英三兩 漢中木防已六兩

隴西當歸四兩 厚朴一兩 黃連二兩

上好豉三升 三歲醇苦酒五升

右八味以苦酒二升清防已極令潤出之切以板

瓦覆著炭火土以厚紙藉瓦土令色槁燥有餘苦

酒復漬之更出熬盡苦酒止勿令火猛徐徐熬令

極燥各搗為末又以餘苦酒三升浸豉一宿明日

以瓦盆盛以一盆覆蒸五升土下須土氣通熱出

之研絞取濃汁和藥搗為丸如雞豆子大懸令陰

乾勿見風塵此藥以三九為一劑平日服一劑書

服一劑暮服一劑皆以水服之若病重藥力未行

者但益服之日可四五劑令腹中有藥力飲食消

是其效也新服藥未安調當稀糜助藥力心中了

然後可作羹臠微冷食之若有時不喜冷食藥力

盡耳若欲不復藥者但稍溫食藥力自盡矣服藥

不必強多飲水禁熱食魚肉蒜菜酒及辛物肥膩

若有風病加防風一兩人虛羸加石斛一兩若宿

有下利腸胃損弱者加太一禹餘糧二兩半取石

中黃軟香者若婦人產後疾加石硫黃一兩小便

黃赤不利加蒲黃一兩依方消息之無不得效也

千金方衍義卷幸

五

補葉山房

義陟釐生水中蒙茸如髮而性甘溫能利水散邪猶

浮萍之利水發汗也日華搗汁治天行心悶別錄

言溫中消穀千金陟釐丸治協熱下利腹中急痛

溫食則吐狀如溫瘧兼紫石英治心腹咳逆邪氣

漢防已治風寒溫瘧除邪利大小便厚朴治中風

傷寒頭痛寒熱當歸治咳逆上氣溫瘧寒熱黃連

治腸澼腹痛下利皆本經主治內經腸澼便血雖

有身熱則死之說以腸胃受病加以身熱則表裏

俱困故主以死然腸澼初起往往有表邪內陷而

致下利但當先微外熱然後專力治裏多有得生

者非久利胃氣告竭虛陽發露之比斯義惟千金

得之尤妙在苦酒酸收防已香豉之性以盡緩攻

之力此方不特時師所昧并不識陟釐為何物也

烏梅丸 下痢熱諸治不瘥方

烏梅一斤 黃連一斤

右二味蜜丸如梧子服二十九日三夜二

黃連苦寒本經主腸澼腹痛專取苦燥以堅腸胃

配以烏梅益津開胃不使木邪橫干脾土近世醫

師每謂初痢後重未除不可用酸收而千金用

此以治暴痢不致熱毒上攻全賴酸收之力詳此

千金方衍義卷幸

六

補葉山房

治例又未可一槩論也

松皮散 治積久二三十年常下痢神方

赤松皮去上蒼皮切一斗為散麩粥和一升服之日三服瘥不過服一斗永瘥三十年痢服之百日瘥

衍松皮燥澀善辟濕熱除脹滿而方書罕用千金獨

取以治久痢以痢久諸藥罔效故別出手眼乃以醫所不用病所未嘗之品以療之而前論中又云

暴痢服之何有不瘥以其燥而能通澀而不滯故久痢鼻痢無不宜之然須用根去外粗皮方有健

脾之功但蒼瘦之人津血不充而多火者切禁

千金方 義卷第十

七

掃葉山房

苦參 治熱毒痢方

苦參

橘皮

黃連

黃蘗

鬼臼箭羽

藍青

獨活

阿膠

甘艸

右九味等分為末以蜜煉膠并手丸之加梧子候乾飲服十九日三後稍如卒下注痢者大良

衍苦參治心腹結氣黃連治腸澀腹痛黃蘗治五臟

脾胃結熱鬼臼辟惡氣不祥藍青解毒毒蠱致獨

活治風寒所擊橘皮除胸中痰熱逆氣利水穀下

氣阿膠止五臟內崩甘艸治五臟六腑寒熱邪氣

合本經諸治則此方辟除毒熱最迅而丸服之法

最緩不過藉以為應敵之需非但不可峻用而久服尤為不宜所以先哲有久服黃連苦參反從火

化之說以苦先入心久而增勝速所必至於痢

久胃氣駁衰飲食艱進慎勿誤投以取虛虛之咎

三黃白頭翁湯 治諸熱毒下黃汁赤如爛血滯

如魚膈腹痛壯熱方

黃連 二兩

黃芩

黃蘗

升麻

石榴皮各六分

艾葉三分

千金方 義卷第十

八

掃葉山房

白頭翁

桑寄生

當歸

牡蠣

犀角

甘艸各一兩

右十二味咬咀以水六升煮取三升分三服

衍前苦參橘皮湯治毒痢方張此治熱痢勢劇故用

三黃核熱歸艾和血甘草犀角解毒白頭翁散結

氣桑寄生除風濕升麻升清降濁牡蠣固脫斂津

所下已多因以榴皮酸瀉收之與前方中之用獨

活鬼曰截然兩途此方張全盛之攸分也

龍骨丸 治下血痢腹痛方

龍骨

龍膽

羚羊角

當歸

附子

乾薑

黃連各三
十銖

赤石脂

礬石各一
兩半

犀角

甘艸

熟艾各十
八銖

右十二味爲末蜜丸如小豆先食服十五丸日三
加至二十九

又方

龍骨

當歸

乾薑

熟艾

牛角鯁各三
兩

附子

黃蘗

赤石脂

芎藭

阿膠

厚朴

甘艸

千金方 雜藥卷素

九

掃葉山房

橘皮

芍藥

石榴皮各二
兩

蜀椒一兩
二十枚

升麻一兩
半

黃連半升

大棗二十
枚

右十九味咬咀以水一斗三升煮取四升去滓內

牛髓末阿膠消綿絞去滓分七服日四夜三翼方
無橘

皮

衍義 前方治久痢滑脫證木屬熱盛因痢久正虛虛能

受熱故假薑附熟艾鼓動犀角羚羊龍膽黃連以

散本病之熱龍骨礬石石脂以固痢久之脫當歸

甘艸以和血氣之傷也 又方彙取三黃白頭翁

湯龍骨丸中諸味 更加牛角鯁以固脾虛血脫并

以芎藭佐之厚朴破血中滯氣蜀椒温中下氣大

棗以和脾胃之氣也

治血痢方

蒲黃三合

乾地黄

桑耳

甘艸

玄硝

茯苓

人參

柏葉

艾葉

阿膠

生薑各二
兩

禹餘糧

黃連各一
兩

赤石脂五
分

右十四味咬咀以水一斗煮取四升温分五服

千金方 雜藥卷素

十

掃葉山房

此治熱痢血脫補中寓攻散中寓斂之法因取金

匱柏葉湯換生薑之辛散兼用蒲黃地黃桑耳阿

膠之滋血參苓甘草之益氣以助玄硝破積之威

卽以禹糧石脂收斂傷殘之體也

治下雜血方

乾藍

犀角

地榆各一
兩

蜜二合

右四味咬咀以水五升煮取一升半去滓下蜜煎

取五合分二服治熱毒蠱妙

衍義 痢不雜血肝脾不藏可知乾藍入肝涼血入脾解

毒并可治疔痢殺蟲故云治熱毒蟲妙犀角善解
陽明熱毒血結地榆治七傷五瀉下焦之血蜜能
和脾解毒止痛也

治熱毒下黑血五內絞切痛日夜百行氣絕欲死

方

黃連一升

龍骨

白朮各二

阿膠

乾薑

當歸

赤石脂

各三

附子一兩

右八味咬咀以水一斗煮取五升分五服余以貞
觀三年七月十二日忽得此熱毒痢至十五日命

千金衍義卷五下

士

掃葉山房

將欲絕處此方藥入口即定

義

此方本熱毒下血絞痛欲死反用薑附以火濟火
能無助虐之患乎蓋駐車丸本方原以大劑黃連

苦燥為君乾薑辛散為使附歸阿膠和血為佐以

解寒熱糾結之邪今因痢血見黑熱毒勢劇乾薑

從治之力不足以輔黃連逆調之功略假生附頂

其性以破亢極之熱并取生木助其脾以理積滯

之血又恐藥力過峻即以龍骨石脂收斂津液熱

因熱用瀉中寓補之法惟千金得之夫寒熱之真

假證治之逆從今昔醫師罕能辨施求其一人能

辨假熱而以假法誘治者不但可登千金之堂而
南陽密諦亦可從此打破矣

白頭翁湯 治赤滯下血連月不瘳方

白頭翁

厚朴

阿膠

黃連

秦皮

附子

黃蘗

茯苓

芍藥各二

乾薑

當歸

赤石脂

甘艸

龍竹各三

大棗三十

粳米一升

右十六味咬咀以水一斗二升先煮米令熟出米

千金衍義卷五下

士

掃葉山房

內藥煮取三升分四服

義

傷寒厥陰例中白頭翁湯治熱利下重金匱加甘
艸阿膠治下痢虛極更合駐車丸治洞痢無度并

取前方中附子龍骨石脂佐乾薑以因內崩因白

頭翁秦皮黃蘗苦寒萃聚故黃連為之量減詳白

頭翁湯本治熱痢後重此方條下雖不言後重然

不用白朮而用厚朴其意可知茯苓芍藥大棗粳

米稼穡之類則與白朮功用不殊

治下血日夜七八十行方

黃連

黃蘗各半

右二味咬咀以醇醋三升煮取一升半分再服

治大熱毒純血痢不可瘥者方

黃連六兩咬咀以水七升煮取二升半夜露置

星月下旦起空腹頓服之臥將息即止不瘥加

黃芩二兩更作服之仍不瘥者以疝痢法治之

治下赤連年方

地榆

鼠尾各一

右二味咬咀以水二升煮取一升分二服如不止

取屋塵水漬去滓一升分二服古今錄驗云服屋塵汁一小盃

又方

千金方義舉辛

三

掃葉山房

秦皮

如無以麻皮代之

鼠尾艸

薔薇根

右三味等分咬咀以水淹前去滓銅器中重釜煎

成丸如梧子大服五六九日三稍增瘥止亦可濃

汁服半升

衍義溫熱襲入肝脾致血不藏而驟下故用連麋之苦

寒以堅腸胃之滑脫若久痢不瘥則有駐車丸白

頭翁湯等方治法在 純血毒痢雜治罔效專取

黃連以治腸澼腹痛不應則加黃芩并力以治腸

澼泄痢逐水下血閉皆本經主治然必血紫稠粘

胃強能食乃為合宜若血色晦淡食少氣弱者又

為切禁 血痢頻年不瘥必有陳積留滯故用地

榆之沉降以理七傷五漏之血鼠尾艸之散結以

祛寒熱下痢之積服之不應必是陳垢不散故取

屋塵水同氣為治 又方不用地榆而用秦皮入

肝斂血鼠尾艸散結導氣兼薔薇根除風熱而利

關節以通下滯之血也

治下痢絞痛腸滑不可瘥方

黃連六兩

阿膠

鼠尾艸

當歸

乾薑

各三兩

右五味咬咀若大冷白多以清酒一斗煮取三升

千金方義舉辛

三

掃葉山房

分三服若熱及不痛者去乾薑當歸以水煮之

衍義痢下腹痛有寒熱之分若下墜結痛而痛無休止

為寒實如絞痛上攻而後重窘迫為實熱亦有痛

著臍下有時攻絞者寒熱交錯也此言絞痛腸滑

明是火性善動之象故取白頭翁湯駐車丸中各

二以黃連之苦寒治本乾薑之辛熱散標當歸以

和血止痛阿膠以護陰救崩鼠尾艸專主寒熱下

痢以散結氣與白頭翁之功用不殊若熱盛不痛

知無氣壅血滯故無藉於乾薑當歸之溫順散結

也設痢久正虛脾衰不能司統運之權而完穀不

化又當從事辛温安有反去二味之理

治熱痢水穀方

黃連

阿膠各二兩

黃蘗一兩

烏梅四升

梔子枚二十

右五味咬咀以水五升煮取二升半分三服亦治

匿神良

衍痢下水穀不分熱淫於內而腸胃失職故用連蘗

苦寒以堅之兼阿膠烏梅護血斂津梔子以治五

內邪氣胃中熱氣也人但知梔子能助滑泄所以

南陽有病人舊有微溏不可與之之說曷知千金

千金要方卷之五

五

歸葉山房

專為火刺勢迫藉此以為連蘗之嚮導然必舊製

炮黑可無助泄之虞當知此方原不因虛脫水穀

不分起見學者不可以此就疑而致惑也

積者湯治困下空竭欲死滯下膿血日數十行

羸篤垂死者少前宜服之方

茯苓

黃芩

黃連

黃蘗

龍骨

人參

乾薑

棗心

當歸

芍藥

甘艸

梔子仁兩各半

赤石脂二兩

大棗枚十二

右十四味咬咀以水五升煮取二升分再服不差

滿三劑此方主風虛冷痢最佳

衍痢久困竭而至本虛極元雖用連蘗芍藥皆折之

味不得參苓歸芍護持之力徒傷正氣虛陽愈熾

所以專賴當歸之熱因熱用不獨實脾固脫兼取

發越甘艸大棗之甘緩宣通龍骨石脂之瀉滯兩

使風虛冷痢亦藉薑桂參苓可以挽回造化也

温脾湯治下久赤白連年不止及霍亂脾胃冷

實不消方

大黃四兩

人參

甘艸

乾薑各二兩

附子一枚

志

歸葉山房

附子一枚

右五味咬咀以水八升煮取二升半分三服臨熟

下大黃與後温脾湯小異須大轉瀉者當用此方

神效

衍温脾湯為冷痢門中首方而熱痢例中用以小變

而治久痢連年不止非人參甘艸不能任大黃蕩

滌之威非乾薑附子不能資人參雄健之力乃長

沙公附子瀉心湯金匱大黃附子湯之變法咸取

附子開結破滯以助大黃雅陳致新之功其附子

瀉心湯更以芩連佐大黃附子散內陷之表邪大

黃附子湯更以細辛佐大黃附子散經絡之引急
此以乾薑人參甘艸佐大黃附子散腸胃之積熱
也

黃連湯 治赤白痢方

黃連 黃蘗

石榴皮 阿膠各三

甘艸兩 黃芩

右七味咬咀以水七升煮取三升分三服

衍此於駐直丸中減少歸連增益乾薑更 白頭翁
湯中裁去白頭翁秦皮而合金匱 加甘艸阿膠之

千金要義卷下

主 掃葉山房

法更加榴皮以固五液之脫也

女萎丸 治熱病時氣下赤白痢遂成糜方

女萎 藜蘆各三 烏頭

桂心各四 黃連 雲實各二

代糖一分

右七味爲末蜜和丸如梧子大服二九大下痢宿

勿食清且以冷水服之勿飲食至日中過後乃飲

食若得藥力明且更服如前亦可長服虛羸晝夜

百行膿血亦瘥

聖湯 治下赤白痢大孔蟲生悉 胃瘥方

鼠尾艸一兩 豉一升 梔子仁

生薑各六 桃皮一握

右五味咬咀以水七升煮取二升半分三服

本單用桃皮以酒煮服之

衍女萎主風寒瀉瀉霍亂泄利腸鳴藜蘆雲實並治

泄利腸游蠱毒烏頭桂心並主心腹冷氣諸痛代

赭除腹中毒邪黃連解諸毒性味濕熱生瘡者宜

之 聖湯亦治濕熱下痢生蠱鼠尾草專主寒熱

下痢膿血而散結滯梔子仁除五內邪氣而散濕

熱桃根白皮和血殺蟲生薑通神明去臭氣也

千金要義卷下

主 掃葉山房

治冷熱不調或水或膿或五色血痢方

酸石榴五枚合穀子搗絞取汁二升服五合瘥

止

衍專取酸澀之味以斂耗散之津單方中之得效而

恒用者也然惟藜蘆乃宜若高粱津血素充積滯

暴迫非惟瀉之不應性味亦覺難堪所以靈樞布

衣大人不同治也

治赤白滯下方

亂髮雞子大燒末水服不過三服

衍血餘消瘀生新能去諸竅惡血而五癢開格不通

亦得療之總取消瘵生新之力也

灸法

泄痢食不消不作肌膚灸脾膈隨年壯

泄注五痢便膿血下重腹痛灸小腸膈百壯

泄痢久下失氣勞冷灸下腰百壯三報穴在八魁正

中央脊骨上灸數多九佳三宗骨是忌鍼

泄痢不禁小腹絞痛灸丹田百壯三報穴在臍下二

寸鍼入五分

泄痢不嗜食雖食不消灸長谷五十壯三報穴在俠

臍相去五寸一名循際

千金方卷之五

九

掃葉山房

泄痢赤白漏灸足太陰五十壯三報

久泄痢百治不瘥灸足陽明下一寸高骨上陷中去

大指岐三寸隨年壯

又屈竹量正當兩脘脊上點訖下量一寸點兩傍各

一寸復下量一寸當脊上合三處一灸三十壯灸百

壯 以上一切痢皆斷亦治濕蠶冷脊上當脘點處

不灸

又灸臍中稍稍二三百壯

又灸關元三百壯十日灸并治冷痢腹痛在臍下三

寸

赤白下灸窮骨以灸數多為佳

冷痢第八論一首

論曰舊治痢於貴勝用建脾丸多效今治積久冷痢

先以溫脾湯下訖後以建脾丸補之未有不效者貧

家難以充辦亦無可將息也

溫脾湯 治積久冷熱赤白痢者方

大黃 桂心 各二兩 附子

乾薑 人參 各二兩

右五味咬咀以水七升煮取二升半分三服與前

湯小

千金方卷之五

三

掃葉山房

痢雖統屬於脾然移寒移熱多有他藏所及如腎

移熱於脾傳為虛腸澼肝脈小緩為腸澼腎脈小

搏沉為腸澼下血心肝澼亦下血合諸經義參之

則知腸澼不獨一脾受病良由飲食不節起居不

時而陰受之脾為至陰之藏是必統之於脾原夫

所受之邪不過冷熱兩端而人臟腑之氣不無寒

熱偏勝以故移寒化熱變幻非常又不可執其兩

端以為定例所以熱痢方中每兼乾薑附子冷痢

方中恆用黃連大黃如溫脾湯一方既用薑附復

用大黃中間人參甘艸專助大黃之降池以治熱

痢則乾薑附子不過為祛熱痢之內應本方減大黃增附子退甘艸進桂心以治冷痢不過借大黃為破冷積之前驅寒熱兼該標本兼濟所以冷痢熱痢總不出此方之模範也

建脾丸 治虛勞羸瘦身體重脾胃冷飲食不消

雷鳴腹脹泄痢不止方

鐘乳粉 三兩

赤石脂

好麩

大麥蘖

當歸

黃連

人參

細辛

龍骨

乾薑

茯苓

石斛

桂心 各二兩

附子 一兩

蜀椒 六兩

右十五味為末白蜜丸如梧子大酒服十九日二

加至三十九弱者飲服此方男女通治

集驗無細辛龍骨

增損建脾丸 治丈夫虛勞五臟六腑傷敗受冷

初作滯下久則變五色赤黑如爛腸極腥穢者

方

鐘乳粉

赤石脂 各三兩

礬石

乾薑

茯苓

桂心

石斛

五味子

澤瀉

遠志

寄生

柏子仁

人參

白頭翁

天雄

當歸

石橘皮

牡蠣

龍骨

甘艸 各二兩

右二十味為末蜜丸酒服二十九日三加至四十

丸此二方止痢神驗

衍建脾丸建中州之氣以祛冷積之滯即於溫脾湯

中除去大黃加鐘乳石脂龍骨椒辛助參附薑桂

以固下脫麩蘖黃連以除陳氣當歸以和營血石

斛以清胃氣茯苓以通氣化并合黃連石斛以化

石藥之悍也 增損建脾丸專以兜瀉為事僅取

建脾丸本方中入味加礬石橘皮牡蠣五味子助

石脂龍骨以固下脫其間天雄即附子之變味白

頭翁即黃連之變味澤瀉即茯苓之變味 甘艸助

人參以益氣菴蓉助當歸以滋血遠志助天雄以

破積寄生柏仁助白頭翁石斛以散濕熱旺氣也

既用白頭翁石斛澤瀉等味黃連儘可勿用且有

菴蓉遠志五味子補火生土則麩蘖丸為贅疣

駐車丸 治大冷洞痢腸滑下赤白如魚腦日夜

無度腹痛不可忍者方

黃連 六兩

乾薑 二兩

當歸

阿膠各三

右四味為末以大酢八合炸膠和之并手九如大

豆候乾大人飲服三十九小兒以意量減日三

衍人身有車皆附脊而行以司精氣神之運度羊車

屬肺分當在上以職司化氣生精故位反在下鹿

車屬腎分當在下以職司化火益氣故位反在中

牛車屬脾分當在中以職司化味歸神故位反在

上此皆平人之常度也修真家惡其順行之性起

滅無常乃修逆行之道以為內丹之基千金又以

平人失其常度而思下痢崩脫良由鹿車過駛體

動羊車過度以致精血不藏牛車過疲不能隨鹿

車之馳驟以致水穀不尅故用乾薑以助牛車之

健運黃連以挽鹿車之傾危阿膠以救羊車之奔

迫常歸以埋血氣之散亂庶精氣神各歸其統而

無崩脫之虞且冷痢得乾薑可瘳熱痢得黃連可

瘳冷熱交錯得薑連可解阿膠可滋乾薑之燥當

歸可和黃連之寒不特為久痢神丹九為休息之

專藥

大桃花湯 治冷白滯痢腹痛方

赤石脂

乾薑

當歸

龍骨各三

人參一兩

芍藥各一

右十味咬咀以水一斗二升煮米取九升內諸藥

煮取三升分三服膿者加厚朴三兩嘔者加橘皮

三兩

衍長沙桃花湯本治下痢便膿血故用石脂以固下

焦之脫稍配乾薑以理中氣之虛虛能受熱雖挾

熱下痢不妨仍用辛熱熱因熱用而為嚮導也干

金乃假此以治冷痢故不憚乾薑之燥熱而與石

脂平配且加附子白朮以助乾薑之雄龍骨牡蠣

以佐石脂之澀人參甘州助氣而收耗散之津當

歸芍藥和脾而斂心脫之血本非傷寒熱傳少陰

之下利膿血故無取於糞米之安中固脫也

又方

龍骨六兩

赤石脂五兩

厚朴

右四味咬咀以水七升煮取二升半分三服熱加

白頭翁二兩半牡蠣三兩

衍石脂固脫龍骨斂精厚朴泄滯當歸和血亦桃花

湯之支派

桃花丸 治下冷脛下攪痛方

乾薑

赤石脂各十兩

右二味為末蜜丸如豌豆服十九日三服加至二十九

行借熱治冷變湯作丸所以配合製度絕不相同

倉米湯 治小腹冷氣積聚結成冷痢日夜三四

十行方

倉粳米

半升淨淘乾麤白一把去心細切 羊脂一升熬

香豉三升以水一斗煎取五升澄清

金匱要略卷第十

五

補葉山房

右四味先以羊脂煎麤白合黃并米內豉汁中煎

取四升且空腹溫服一升如人行十里久更進一升得快利止若利不止更服如前利後進粳米粥

豉若復作更服一劑永瘥

行陳倉米能開胃進食麤白治泄利下重香豉解煩

熱邪毒羊脂主下痢脫肛腹中絞痛熱止勞痢

性味甘溫善滋津血燥結而無滑腸動泄之虞干

金獨得本經之旨用以滋培貧乏枯癯之病所以

專用穀肉蔬晶略無精於草木根莖也

附子湯 治暴下積日不住及久痢方

附子 一枚

石脂皮 一具

阿膠 二兩

龍骨

甘艸

芍藥

乾薑

黃連各一兩

黃芩半兩

粳米三合

右十味咬咀以水八升煮取三升分三服

行暴痢勢劇火迫之象日久不止熱燥津枯不獨下

多凶陰而真陽亦已告匱故於駐車丸中除去當

歸之行血參入芍藥輔阿膠以滋耗竭之真陰附

子助乾薑以扶傷殘之虛陽黃芩佐黃連以屏宿

蘊之餘火甘艸粳米緩清脾胃之虛熱龍骨橘皮

金匱要略卷第十

五

補葉山房

急收二腸之滑脫也

治卒下痢湯方

黃連 五兩

生薑 一斤

右二味咬咀以水五升煮取一升頓服未止更合

服必效

行下痢起於倉卒多緣外受暴冷內蘊濕熱所以必

用黃連苦燥治內生薑辛散治外皆從卒病起見

若痢久中虛良非此方可治也

治久痢下純白由積臥冷處經久病發遂令脾胃

俱冷日夜五六十行大小腹痛不可忍凡白痢

屬冷赤痢屬熱方

好麵末五升微熬令香溫清醇酒令熱和麵木
一升空腹服日三若至食時搗蒜一升令至熟
下薑椒末調和如常食之法惟須稠勿加鹽以
水和麵二升作饅餅極爛煮之乾澆熱內蒜莖
日中相和頓食之少與餘食至飢時仍準前食
麵末酒比至寤來少食餘食以此法治不過兩
日無有不瘥

此方專為僻壤窮鄉無醫無藥積受暴冷致痢腹
痛不可忍者設所以專用醪酒胡椒薑易辦之

大考衛生本草

三

橘葉山房

物無問赤白冷熱但得溫消服之微效殊非充飲
過傷之所宜也

治久冷或痢不痢間但腹腹患苦冷方

新蜀椒三升用醋漬一宿以麵三升和椒一升
紫拌煮作粥空腹頓服之加葱鼓鹽任性調和
不瘥更作以瘥為限不過三升椒即愈此方不
但治冷大治諸虛損冷極有所益久當自知

義而

椒性辛竄漬之以醋則下而不上煮之以粥則和
而不烈隨分鹽豉可以適口充腸充為貧窶疲勞
溫養諸虛之上藥仁人不可以鄙下而委之無治也

馬蘭子丸 治積冷痢下白膿方

馬蘭子熟熬 附子二兩 乾薑

甘艸各二兩 神麴 麥蘖

阿膠各五兩 黃連三兩 蜀椒五合

右九味為末蜜丸如梧子服二十九日二以知為

度或作散酒調服方寸匕亦佳

馬蘭即蠶質甘溫益胃冷人嗜食故可以治積冷

痢下白膿一派辛熱劑中獨用黃連一味不但為

積冷之下導并和薑附蜀椒之性也

厚朴湯 治三十年久痢不止方

厚朴

黃連五兩 艾葉 石橘皮各三兩

右六味以水七升煮取二升分再服

痢久滑脫不止必有冷熱宿滯結於中所以發

歇不常故用專治休息痢之駐車丸退歸進艾并

入厚朴橘皮一通宿滯一止滑脫也

四續丸 治三十年注痢骨立瘦黃腸滑不瘥方

雲實五合 龍骨三兩 附子

女萎各二兩 白木二兩

右五味為末以蠟煎烱用丸如梧子大服五九日

三不過五六服

衍義四續者痢止而氣血津液續復也方中雲實除泄

痢腸澀附子破癥堅積聚白朮健脾胃氣運積龍骨

攝泄利膿血女萎治泄利腸鳴丸用蜜蠟取其味

淡入胃本經專主下痢膿血故又名蠟煎丸

椒艾丸 治三十年下痢所食之物皆不消化或

青或黃四肢沉重起即眩倒骨肉消盡兩足逆

冷腹中熱苦筋搏起止須扶陰冷無子方

蜀椒三百 烏梅二十 熟艾一升

乾薑 三兩 赤石脂 二兩

千金方義卷素

三

補藥山房

右五味椒薑艾下篩梅著一斗米下蒸令飯熟去

核內椒薑末合搗三千杵蜜和丸如梧子服十九

日三服不差加至二十九加黃連一升

衍義蜀椒乾薑溫中石脂烏梅絞脫熱又恢復元陽溫

煖子藏故可治陰冷無子服之若不瘥必有積熱

伏匿於中則加黃連以分解之

下痢丸 治數十年痢下氣消穀令人能食夏月

長將服之不霍亂方

大麥蘖 法麴各一 烏梅三升

附子 乾薑 黃連

黃蘗

吳茱萸 四兩

右十味為末蜜和丸如梧子食後服十九日三服

至二十九亦可至四十九

麥蘖丸 治數十年下痢不止消穀下氣補虛羸

方

大麥蘖

當歸

吳茱萸

烏梅肉 各四兩

千金方義卷素

三

補藥山房

右十味為末蜜和丸如梧子食後服二十九日三

烏梅丸 治久痢請藥不差數十年者消穀下氣

補虛方

烏梅肉

吳茱萸 各四兩

蜀椒 一兩

右七味為末蜜和丸如梧子食後服十九日三

又方 治冷痢久下方

烏梅 二百枚

當歸

桂心 各三兩

黃蘗

乾薑

蜀椒 各四兩

附子

蜀椒 一兩

黃連

桂心 各二兩

黃連

蜀椒 一兩

黃連

當歸 三兩

乾薑

黃連

桂心 二兩

當歸 三兩

黃連

蜀椒 一兩

黃連 各十

桂心

蜀椒 各四兩

蜀椒 半兩

黃連 各十

桂心

蜀椒 各四

附子

蜀椒 一兩

黃連

桂心 各二

黃連

蜀椒 一兩

黃連

當歸 三兩

乾薑

黃連

桂心 二兩

當歸 三兩

黃連

蜀椒 一兩

黃連 各十

桂心

蜀椒 各四

細辛 附子 人參

黃蘗 各六兩一
方用麥蘗

右十味為末以苦酒浸烏梅一宿去核蒸五升米下別搗如泥攪令相得內蜜和搗二千杵九如梧子食前服十九日三服稍增至二十九

衍下痢積年不瘥必然正氣虛寒然能食消穀必有

熱伏於內且濁氣下泄雖能進食不能如期尅運

必有留滯於中所以首推麴蘗推陳致新運蘗破

除積熱則椒薑黃附之屬得以建溫脾之功烏梅

專收耗散之津液也 麥蘗丸即於下痢丸中除

去黃蘗增益黃連復加當歸以和脾家之血 烏

梅丸又於麥蘗丸中除去麴蘗附子峻溫再尅之

味惟以平和溫補為務 又方乃以細辛代茱萸

溫散肝脾之近寒黍合下痢丸中附子黃蘗分解

冷熱之交結獨進人參以助中土溫消之力較下

痢丸麥蘗丸大義不殊而微細迥別非以心印心

幾失先哲之心印

七味散 治痢下久不瘥神驗方

黃連 龍骨 赤石脂

厚朴 烏梅 各二分 阿膠 三分

甘艸一分

右治下篩漿水服二方寸七日二小兒一錢七

衍七味藥中但以黃連厚朴祛解濕熱之滯甘艸阿

膠滋培偏傷之血龍骨石脂烏梅并收五液之脫

在久痢得之為金錒暴瀉得之為戈戟

豬肝丸 治下痢腸滑飲食及服藥俱完出者方

豬肝一斤 黃連 烏梅肉

阿膠 各二分 胡粉 七匙

右五味為末蜜丸如梧子酒服二十九日三亦可

散服方寸匕

去金黍蘗丸 烏梅丸

衍猪肉補陽而肝藏淫火食之能令病發惟血病用

為嚮導此治下痢腸滑必是瘀血積阻脾失健運

所以藥食完出故用豬肝熬枯以攻滯血黃連以

堅腸胃阿膠以滋營血烏梅以斂津液胡粉以鎮

濁惡同豬肝速趨下行而脾胃康復運化不失其

常矣學者不可以豬肝敗血之品反為治痢之用

而致謬誇也

羊脂煎 治久痢不瘥者方

羊脂子 一匙 白蠟 一匙 黃連 一升

酢 七合煎 蜜 七合煎 烏梅肉 二兩

亂髮灰汁洗去垢 燒未一升

右七味內銀缶器中湯上煎之境可九如梧子飲服三十九日三

衍義羊稟燥金形氣腸最堅韌而脂有厚腸止痢之功妙用尤在生煎而滋氣虛枯燥同氣相感之應也

然痢久不瘥雖言正氣虛衰必有熱淫於內又須

連髮以勝伏匿之邪蠟蜜以滋腸胃之燥梅酢以

斂津液之脫與猪肝丸立法懸殊彼取猪肝熬枯

以滌痲積之滯此用羊脂生煎以滋耗竭之津兩

不移意之法用方者勿誤認羊脂性滑而致扼腕

也

千金方衍義卷五

三

掃葉山房

又方

羊脂

阿膠

蠟各二兩

黍米二升

右四味合煮作粥一服令即瘳

衍義此方於前劑中但取羊脂蜂蜜加阿膠黍米穀肉

之類滋補血氣以無內淫之熱腹無滿痛故無積

於攻熱破積所以黃連血餘等味悉為裁去

治大下後腹中空竭胸中虛滿不下食方

芍藥

半夏

甘艸各一兩

厚朴

當歸

桂心各三

生薑五兩

右七味以水八升取三升分三服二三劑最佳

衍義此因攻下而胸中虛滿故以安中下氣為務良非

本虛合用溫補之比

治下痢心胸滿不快腹中雷鳴或嘔吐方

黃連五兩

橘皮

甘艸各二兩

龍骨

生薑

半夏各三兩

人參一兩

大棗十五枚

右八味咬咀以水一斗先煮一大沸乃內藥煮取

三升分四服姪婦服亦良

三

掃葉山房

斷痢湯 治心胸下伏水方

半夏一升

生薑五兩

茯苓

甘艸

龍骨各二兩

附子二兩

人參

黃連各三兩

大棗十二枚

右九味咬咀以水八升煮取三升分三服

瀉心湯 治卒大下痢熱唇乾口燥嘔逆引飲方

人參

甘艸

黃芩

栝蘘根

橘皮各一兩

黃連二兩

半夏三兩

乾薑一兩

右八味咬咀以水六升煮取二升分三服胡治云治老利

衍下痢胸滿嘔吐腹中雷鳴頗有似乎傷寒之痞故

借生薑瀉心湯於中裁去乾薑黃芩加橘皮龍骨

下氣固脫端不出瀉心湯之成法 又於前方中

除去橘皮參入真武湯中茯苓附子以破伏水為

急 瀉心湯專治心下痞滿然以按之不痛為虛

故取半夏瀉心湯分解冷熱虛痞緣有唇口乾燥

故加括萎根橘皮以滋虛熱燥渴 夫按胸之法

亦有權度每見時師按之過重而痛極難堪良由

湯藥過肢穀氣久絕脾不運動而堅頓如石轉攻

千金方後卷五十五

重

掃葉山房

再攻徒竭正氣傷殘之脾必無可去之理噫此雖

蒼生之厄在時師得無轉念歟

香蘇湯 治下痢煩氣暴土方

生蘇一把冬用香豉五兩

右二味以水五升煮取二升頓服之

衍

下痢而煩氣暴上與傷寒之噎噤不異噎噤用梔

子豉湯病人舊有微瀉者梔子業有垂戒今痢後

虛煩故退梔子而進生蘇既可順氣亦可除煩可

謂善於權變者也

治夏月暴冷忽壯熱泄利引飲熱湯驟變通身浮

腫水道不利脈沉細小數方

澤瀉一兩 吳茱萸 茯苓

白朮 當歸 犀角

桔梗 青木香 海藻

芍藥 大黃各二

右十一味咬咀以水九升煮取三升分三服下後

消息五六日許可其女蠶散

衍此因夏月暴冷不慎形寒飲冷中外受傷以致壯

熱泄利且或以水灌汗水行皮中而致通身浮腫

故以吳茱萸溫中散結白朮除熱益燥茯苓通小

千金方後卷五十五

重

掃葉山房

便導熱桔梗治腹滿腸鳴芍藥利小便益氣當歸

潤腸胃活血青木香降陰氣逆滿犀角解畜血脹

問澤瀉散水氣浮腫海藻下水腫結氣大黃破癥

瘕積聚合諸味主治則泄利水腫靡不由水道開

泄乃傷寒後從腰已下重有水氣牡蠣澤瀉散

之 方藥雖不類而宗派宛然

女蠶散 治痢後虛腫水腫者服此藥小便利得

止腫亦消

女蠶一升 乾薑 細辛

椒目 附子 桂心各一

右六味治下篩酒服方寸匕不知加至二三七月

三產後虛滿者大良

併痢後虛腫非温不除故葶用附桂薑辛辛熱破結

推取椒目之瀉水降火女麩以消食下氣止瀉痢

破冷血也

治卒受暴冷下部疼悶方

燒磚合熱大酢沃之三重布覆坐上即瘥

併卒受暴冷下部疼悶但合酢沃熱磚熨以通血

氣別無裏證故無取於湯藥也

舟濕痢第九論二首
方十首

千金方衍義卷五

疝

疝藥山房

論曰凡疝濕之疝皆由暑月多食肥濃油膩取冷服

睡之所得也禮云君子盛暑之月薄滋味無食肥濃

煮餅此時以不利人也養生者宜深戒之不爾多患

疝濕疝耳

凡所患處或著口斷咽喉下部疝與月蝕並不痛令

人不覺其治以五月五日蝦蟆角蒿菽月木寒食汁

淀但得一事單用之燒作灰和臘月猪脂傅之隨手

使瘥極須慎口味凡疝瘻鹽醬醋酥油藥等一切皆

忌惟白飯豉苜蓿苦苣蕒等不在禁限

凡吹藥入下部沒中指許深即止

治疝濕下黑醫不能治垂死者方

調腰灰

熏黃

硃砂

青黛

石鹽

礬石

丁香

麝香

雙碧子

梔子

鐵衣

破故靴底灰

乾薑

細辛

乾蝦蟆

菖蒲

葶蘆

芥子

土瓜根

蜀椒各等分

右二十味治下篩以竹筒吹杏仁大著大孔中所

有患疝瘡上悉傅之其丁香麝香別研搗著藥中

千金方衍義卷五

疝

疝藥山房

合之一方有寒食泔淀菽月木椒葉為二十二

味若病大者用灌方如左

麝香

丁香

甘艸

犀角各二分

右四味治下篩和以鹽蜀椒各三合豉二合以水

二升煮取一升去滓內四味散合和分作二分灌

大孔且一灌西一灌之凡久下一月不瘥成疝候

大孔必寬者以此主之

治疝濕久下痢赤白百療不瘥者方

瓦頭骨

蛇頭

荊莢子

故辨一作

狸骨

蜈蚣

百艸五月五日收者

倒掛草

青黛

晚蠶蛾

青礬

丁香

竭蟲屎

牀中洗木

麝香

苦參

黃蘗

乾薑

角蒿

硃砂

印色鹽

救月木

桂心

鐵玄

苾訥

蝦蟆

黃礬

莊子

葶藶子各等

右二十九味治下飾以筒子內下部吹著日一二

千金方衍義卷五

五

補藥山房

度

治疔濕不能食身重心熱脚冷百精疼痛方

黃芩

芍藥

苦參

甘艸

當歸

蜀椒

甘松一作甘流

青黛

熏黃

鼓各二兩

東引桃根

葱白各一握

鹽一合

麝香半分

猪膽二枚

右十五味咬阻以水一斗八升煮取四升分為二

分一度灌一分候湯温如人體然後著麝香猪膽

卽灌灌了作葱豉粥食之後日更將一分如前灌

之七日忌生冷毒物但是油膩醬乳醋忌三十日

大佳

治疔蝕人諸處但是赤血病人不瘥立著卽瘥祗

方

乾蝦蟆五月五日收者

人屎灰一作髮灰

金銀土塼各三兩

銀末小豆許

右五味治下飾傅瘡上卽瘥三七日忌如前疔者

吹下部

治疔痢不止方

苦參

甘艸

熏黃各二兩

鼓一升

葱白五莖

蜀椒三十粒

右六味以苦參等三物各搗下飾以水五升煮葱

白椒取三升以三指撮苦參水等各一內汁中

候冷煖如人體先飲少許或汁食一口飯乃側臥

徐徐灌之說多時臥以不出爲佳大急乃出之於

淨地當有疔濕蟲如白馬尾狀頭黑是其效也其

重者肛大難瘥當取桃枝綿裹頭以前件汁適寒

温烙之須近吞一上三十廣烙之乃瘥神驗

又方崔氏曰晉代之地多二疔蝕人五臟通見

脊骨下濃血手足煩疼四肢無力夜臥煩躁不

安面失色血色肩髀疼面與手足皆有淨氣或下

血乃死治之方

雄黃

青箱子各二兩

苦參三兩

礬石

雄黃

鐵衣

藜蘆各一兩

麝香半兩

右八味治下飾以竹管內大孔中酸棗許次內下

部中日一不過三度小兒以大豆許此方極救死

又方

大麻子

胡麻各一升半

右二味並熬令黃以三升瓦瓶泥表上厚一寸待

千金方義卷五

聖

常集山房

泥乾內大麻等令滿以四五枚葦管插口中密泥

之掘地作竈倒立竈口底著瓦器承之密填竈孔

中地平聚炭瓶四面著壘壘之日八放火燒至明

且開取適寒溫灌疔濕者下部中一合尋覺咽中

有藥氣為佳亦不得過多多則傷人隔日一灌重

者再三灌之從且灌至日夕極覺體中乏力勿怪

也非但治疔濕凡百異同瘡疥癩並塗之

論曰凡日月蝕時忌食飲腹中生匿蟲及房室生子

不具足必患月蝕瘡亦不得與兒乳日月生後乃不

忌令人口臭齒斷宣露常有血出舌上生瘡者皆由

犯此所致耳

治月蝕惡瘡臭肉方

硫黃

蘭茹

斑蝥各等分

右三味治下飾傅瘡上乾者以豬脂和傅之日二

夜一

又方

地榆根

薔薇根

吳茱萸根各三兩

右三味治下飾以鹽湯洗瘡傅之日三

八物茜根湯

凡下血者是蟲也以此治之方見後二

十六卷

千金方義卷五

聖

掃葉山房

衍疔濕痢證諸治悉皆外用之方究其所主不過辟

除濕熱生蟲解散熱毒而已惟借蠱毒門中八物

茜根湯為內治之用衍義見蠱毒門其餘諸方隨

所患輕重而取用之可也

小兒痢第十方三十六首

溫中湯 治小兒夏月積冷洗浴過度及乳母大

將冷洗浴以冷乳飲兒壯熱勿值暴雨涼加

之兒下如水胃虛弱則面青肉冷目陷乾嘔宜

先與此調其胃氣下即止方

乾薑

厚朴各一分

當歸

桂心 甘艸各三 人參

白朮 茯苓 桔梗各二

右九味咬咀以水二升煮取九合六十日至白月

兒一服二合半餘皆隨兒大小

經驗大黃湯 治小兒暴冷水穀下或乳冷下青

結不消或冷實吐下乾嘔煩悶及冷滯赤白下

者若已服諸利湯去實胃中虛冷如冰乾嘔目

陷煩擾不宜利者可除大黃若中乳乳母洗浴

水氣未消飲兒遂為霍亂宜利者使用大黃不

須利宜溫者除之方

千金方義卷五 望 補藥山房

大黃六分 桂心 厚朴

甘艸 乾薑各一 人參

白朮 茯苓 當歸各二

桔梗 三分

右十味以水二升半煮取八合凡兒三十日至六

十日一服二合七日至百日一服二合半二百

日者服三合

衍 冷痢用理中湯加桂心當歸兼和氣血之寒更加

桔梗升舉於上厚朴溫散於中茯苓分利於下

若冷乳不消蘊熱而為滯下乾嘔煩悶不安前方

中加大黃一味名經驗大黃湯以微利之不須利者宜溫和之仍用前方可也

黃蘗湯 治小兒夏月傷暑寒折大熱熱入胃

下赤白滯如魚腦壯熱頭痛身熱手足煩此大

陽之氣外傷於寒熱氣入胃服此方良若誤以

利藥下之或以溫脾湯下之則熱劇以利藥下

之便數去赤汁如爛肉者或下之不瘥復以瀉

熱之藥斷之下既不止培增壯熱者服之即效

或見溫病熱盛復遇暴寒折之熱入腹中下血

及如魚腦者服之良方

千金方義卷五 望 補藥山房

黃蘗 黃連 黃芩

升麻 當歸 白頭翁一作

牡蠣 石榴皮 寄生

甘艸各二 犀角 艾葉各一

右十二味咬咀以水三升煮取一升二合百日兒

至二百日一服三合半

衍 寒折熱邪而痢下赤白溫下不瘳熱瀉不止惟有

苦燥一法可以轉危就安乃於白頭翁湯中用寄

生代秦皮兼取犀角黃芩以散熱當歸艾葉以和

血牡蠣樞皮以固脫升麻甘艸引入脾家以散伏

恆之邪也

浴中結腸丸 斷冷滯下赤白青色如魚肝脫肛

出積日腹痛經時不斷者方

赤石脂 五分 吳茱萸 三分 乾薑

附子 當歸 厚朴

白木 木蘭皮 白頭翁

黃連 黃蘗 石櫛皮 各二分

右十二味為末蜜丸如大豆三歲已上服五九三

歲已上服十九十歲已上服二十九暴下者服少

許便瘳積下者盡一劑更合

千金方義卷五

異

論藥出房

前方治寒鬱熱邪下如爛肉故用白頭翁湯中三

味加犀角黃芩以燥濕熱乃寒因熱用之 正治此

主積冷滯下下如魚肝亦用白頭翁湯中三味加

乾薑附子以破滯寒乃熱為寒導之與旨前方以

寄生在當歸和血即此方藥黃佐當歸之意前方

以牡蠣佐櫛皮固脫即此方石脂佐櫛皮之意前

方以艾葉佐升麻升舉清陽此方以木蘭皮佐厚

朴溫散滯氣前方以甘艸佐犀角也胃之熱此方

以白朮佐乾薑助脾之陽足宗異涉妙義天開

梔子丸 治少小熱痢不止方

梔子 七枚 黃蘗 三分 黃連 五分

礬石 四分 大棗 四枚 炙黑

右五味為末蜜丸如小豆大服五九日三夜二服

不知稍加至十九

此梔子藥皮湯之發源彼以熱於外而身黃雖

用梔子不得甘艸兼調營衛則外溢之熱不能從

水道開泄也此以熱淫於內而腸澀雖用黃連不

得大棗流布脾津而內淫之熱不能隨梔子下達

也千金以此入兒科方者以嬰兒藏氣未固邪氣

易泄一經清理便可礬石兜瀉亦無微瘳 梔子之

千金方義卷五

異

論藥出房

禁

藜蘆丸 治少小泄清痢方

藜蘆 三分 黃連 三分 附子 一分

右三味為末蜜丸如麻子以粥飲服二九立驗

附子激發黃連之用可謂神矣又以藜蘆激發二

味上涌丸為奇特一帶指而雷厲風行烏有暗日

且靈之患乎

四物梁米湯 治少小泄注方

梁米 黍米 稻米 各三升

蠟如礬

右四味以水五升東向籠煮粳米三沸去滓復以汁煮稻米三沸去滓復以汁煮黍米三沸去滓以蠟內汁中和之蠟消取飲之數試有驗

衍義安穀者昌脾傷不能安穀所以萃聚諸穀兼以至淡之蠟略無苦味之物以清腸胃之滯專為嬰兒畏藥計也

龍骨湯 治少小壯熱渴引飲下痢方

龍骨 甘艸 大黃

赤石脂 栝藎根 石膏

寒水石 桂心各二兩

千金方衍義卷五 藥房

右八味治下痢以酒水各五合煮散二合二沸去滓量兒大小服之

衍義此方專為痲下津傷煩渴故以龍骨石脂收斂津

氣石膏寒水石栝藎根化熱止渴桂心大黃散結下積甘艸調和諸藥之性寒熱固滲萃於一方亦惟嬰兒可以勝任是法

大黃湯 治少小下痢苦熱不食傷飽不乳方

大黃 麥門冬 甘艸各一兩

右三味咬咀以水二升煮取一升二三歲兒分三

四服

衍義大黃滌除積熱麥門冬滋培氣化甘艸調和中氣所稟偏燥者宜之若兒肥痰多滑脫殊非所宜

生金牛黃湯 治小兒積下不止因發痢方

生金 三銖一方用六銖 無生金熟金亦得 牛黃 三銖

麻黃 二分 黃連 乾薑

人參 甘艸各一分 細辛 半分

右八味咬咀以水一升六合煮取八合去滓臨服研牛黃以煮湯中嫩兒熟者用生薑代乾薑今世

乏生金但用成器金亦善二三兩皆得用之

衍義痢久脾虛內熱生風而致發痢生金牛黃專除內

千金方衍義卷五 藥房

動之風黃連乾薑分解交錯之熱麻黃細辛假道於表以泄內鬱之邪甘艸人參填塞其空以杜虛風之擾

澤漆茱萸湯 治小兒夏月暴寒寒人胃則暴下

如水四肢被寒所折則壯熱經日不除經月許

變通身虛滿腹痛其脈微細服此湯一劑得效

漸安方

澤漆 青木香 海藻各二分

吳茱萸 茯苓 白木

桔梗 芍藥 當歸各三分

大黃一分

右十味豉咀以水四升煮取一升半二百日至一歲兒一服二合半一歲已上至二歲一服四合

衍嬰兒被非時寒觸而發壯熱久不除邪氣內陷

而成下痢痼久不止濁氣外鼓而變虛滿急宜破

水逐積溫理中土元氣自復祛邪專為養正此方

得之

枳實散 治少小久痢淋瀝水穀不調形羸不堪

大湯藥者宜此方

枳實二兩治下痢三歲已上飲服方寸七若兒

千金方衍義卷五

兒

掃藥山房

小以意斟酌日三服

治少小洞注下痢方

蒺藜子二升搗汁溫服以瘥為度

又方

取木瓜汁飲之

又方

酸石榴燒灰為末服半錢七日三

又方

搗橘汁服之

又方

炒倉米為末飲服

又方

狗頭骨燒灰水和服之

又方

羊骨灰 鹿骨灰

右二味並水和服之隨得一事即用之

又方

炒豉令焦水淋汁服之神驗冷則酒淋服

又方

五月五日百草末吹下部

千金方衍義卷五

孕

掃藥山房

治小兒赤白滯下方

薤白一把 豉一升

右二味以水三升煮取二升分三服

又方

楮葉 麻子末各一升

右二味以水五升煮三沸百日兒每服三合

又方

牛角腮灰水和服三方寸七佳

又方

燒蜂房灰水和服

又方

亂髮灰 鹿角灰

右二味等分三歲兒以水和服三錢七日三

治小兒赤白痢方

白蘘荷根汁 生地黃汁各五合

右二味微火煎一沸服之

又方

五月五日蝦蟆灰飲服半錢七

治小兒熱痢方

煮木瓜葉飲之

千金方義卷五

至

請藥山房

治小兒冷痢方

蓼菜搗汁量兒大小與之 一方作芥菜

又方

搗蒜傅兩足下

治小兒暴痢方

小鯽魚一頭煨灰服之亦治大人

又方

燒鯉魚骨末服之 一方作龍骨

又方

赤小豆末酒和塗足下日三度油和亦得

治小兒蠱毒痢方

藍青汁一升二分爲四服

治小兒渴痢方

搗冬瓜汁飲之

衍枳實消滯 葳藜破積 榴灰榴汁並能瀉腸

倉米培養胃氣 狗骨溫中散寒 羊鹿骨灰消

堅散滯 香鼓辟除一切不正之氣 百艸末收

濕解毒 薤白香豉泄利滯氣 柏葉麻仁涼血

潤腸 牛角臄止痢散血 蜂房灰辟除邪毒

髮灰角灰散血還元 蘘荷地黃碎蠹散血 蠅

千金方義卷五

至

請藥山房

蟻灰殺疔消積 木瓜伐肝益脾 蓼汁温中下

氣 搗蒜傅足引熱下行 鯽魚清胃散血 鯉

骨龍骨利水瀉腸 赤小豆利水解毒 藍汁解

毒殺蠱 冬瓜汁利大小腸壓丹石毒 已上諸

方專爲嬰孩痘證未形不宜常用湯藥故彙取丹

方隨證取用庶免傷犯始生天元之氣耳

孫真人千金方衍義卷十五下

胃腑方凡八類

胃腑脈論第一 論一首

論曰胃腑者主脾也口唇者是其候也脾合氣於胃胃者水穀之腑也號倉庫守內畜吏重二筋十四兩迂曲屈伸長一尺六寸大一尺五寸徑五寸受水穀三斗五升其中當蓄穀二斗水一斗五升廣胘大頸張胸五穀乃容而滿上焦泄氣出其精微慄悍滑痰

千金方衍義卷十六

掃葉山房

下焦下澆泄諸小腸此腸胃所受水穀之數也平人則不然胃滿則腸虛腸滿則胃虛更滿更虛氣得上下五臟安定血脈和利精神乃居故神者水穀精氣也五臟不足調於胃故腸胃之中當蓄穀二斗四升水一斗一升故人一日再至後甲乙後二升半一日中五升七日五七三斗五升而鬻水穀盡故平人不飲不食七日而死者水穀精氣津液皆盡故七日而死矣

右手關上陽絕者無胃脈也若吞酸頭痛胃中有冷刺是太陰治陰在足大指本節後一寸

右手關上陽實者胃實也若腸中伏伏一作不思食得食不能消刺足陽明治陽在足上動脈脈浮而孔浮則為陽孔則為陰浮孔相搏胃氣生熱其陽則絕跌陽脈浮大者此胃家微虛煩悶必日再行動作頭痛重熱氣朝者屬胃

千金方衍義卷十六

掃葉山房

胃脈搏堅而長其色赤當病折體其栗而散者當病食痺痺痛病先發於胃脹滿五日之腎小腹腰脊痛經瘦三日之膀胱背脊筋痛小便閉五日上之心脾心痛閉塞不通身痛體重靈樞云三日不已死冬夜半後夏日映胃病者腹脹胃脘當心而痛上支兩腸腸咽不通飲食不下下取三里飲食不下膈塞不通邪在胃脘在上脘則抑而刺之在下脘則散而去之胃脹者腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨於食大便難胃癰令人口病也善飢而不能食食而支滿腹大刺足陽明太陰橫脈出血胃中有癖食冷物者痛不能食食熱則能食脾前受病移於胃脾咳不已嘔吐長蟲厥氣客於胃則夢飲

診得胃脈病形何如曰胃脈實則脹虛則渡脾應肉

脘肉脘堅大者胃厚肉脘磨者胃薄肉脘小而磨者胃不堅肉脘不稱其身者胃下胃下者脘約肉脘不堅者胃緩肉脘無小果累標緊者胃急肉脘多小果累者胃結胃結者胃土腕約不利

扁鵲云足太陰與陽明為表裏脾胃若病實則傷熱熱則引水漿常渴虛則傷寒寒則苦飢常痛發於風水其根在胃先從四版起腹滿大通身腫方見治水

篇中

胃絕不治五日死何以知之舌腫溺血大便赤泄

足陽明之脈起於鼻交頰冲旁約大腸之脈下循鼻

千金方衍義卷十

三

掃葉山房

外上入齒中還出俠口環唇下交承漿却循頤後下

廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顛

其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃

絡脾其直者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣衝中其

支者起胃口下循腹裏下至氣衝中而合以下髀關

抵伏兔下膝入臏中下循胫外廉下足跗入中指內

間其支者下膝三寸而別以下入中指外間其支者

別跗上八大指間出其端也動則病懷懷振寒善伸

數欠顛黑病至惡人與火聞木音則惕然而驚心欲

動獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走善嚙

腹脹是為胃厥是主血所生病者狂瘧溫淫汗出

衄口喎唇緊頸腫喉痺大腹水腫膝臌腫痛循膈乳

氣衝股伏兔胛外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則

身以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢黃氣不足則

身以前皆寒懷胃中寒則脹滿盛者則人迎大三倍

於寸口虛者則人迎反小於寸口也

胃虛實第二脈二首 灸法一首 方三首

胃實熱

右手關上脈陽實者足陽明經也病苦頭痛脈經作

熱汗不出如溫瘧唇口乾善噦乳癰缺盆腋腫

千金方衍義卷十

四

掃葉山房

痛名曰胃實熱也

瀉胃熱湯方

梔子仁 射干 升麻

茯苓各三兩 芍藥四兩 白木五兩

赤蜜 生地汁各一升

右八味咬咀以水七升煮取一升半去滓下地黃

汁煮兩沸次下蜜煮取三升分三服老少以意量

減

瀉瀉熱反用白朮可見瀉胃之熱而非瀉胃之實也

方用升麻專走陽明開發胃熱地黃滋陰退陽

虛和胃解毒射干散腹中結氣梔子仁滋胃中熱
氣芍藥治邪氣腹痛茯苓守五臟正氣而佐白朮
除熱消食之功祛邪養正全賴茯苓之力耳

胃中熱病

灸三里三十壯穴在膝下三寸

胃虛冷

右手關上脈陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得臥
惡風寒灑灑目急腹痛虛鳴外臺作耳虛鳴時寒時熱唇口
乾面目浮腫名曰胃虛冷也

補胃湯 治少氣口苦身體無澤方

千金方卷之十六

五

掃葉山房

柏子仁

防風

細辛

桂心

橘皮各二兩

川芎

吳茱萸

人參各三兩

甘艸一兩

右九味咬咀以水一斗煮取三升分為三服

衍胃中虛冷而用黃桂甘橘之屬人所同然至於防
柏芍辛祛風逐濕等味非深達土中燭木之義茫
然不解何意也

人參散 補胃虛寒身枯絕諸骨節皆病方

人參

甘艸

細辛各六分

麥冬

桂心

當歸各七分

乾薑二兩

遠志一兩

吳茱萸二分

川椒三分

右十味治下飮食後溫酒服方寸七

衍胃氣虛寒而用參甘薑桂椒茱萸志辛辛溫散逆亦
人所共喻其外當歸麥冬一以主身枯骨痛一以
滋諸味辛燥也

喉嚨論第三 論一首

論曰喉嚨者脾胃之候也主通利水穀之道往來神
氣若臟熱喉則腫塞氣不通烏鬚膏主之方見第
六卷中若
腑寒喉則耿耿如物常欲窒塞痺涎唾母薑酒主之

千金方卷之十六

六

掃葉山房

方見第
六卷中熱則開之寒則通之不熱不寒依臟調之

反胃第四 脈二首 方十三首

寸緊尺澀其人胸滿不能食而吐吐止者為下之故
不能食設言未止者此為胃反故尺為之微澀

跌陽脈浮而澀浮即為虛澀即傷脾脾傷即不磨朝
食暮吐暮食朝吐宿穀不化名胃反跌陽脈緊而澀
其病難治

治胃虛反食下喉便吐方

人參一兩

澤瀉

甘艸

桂心各二兩

橘皮

乾薑各三兩

茯苓 四兩 竹茹 五兩 大黃 六兩

右九味咬咀以水八升煮取三升一服七合日三夜一已利者去大黃

衍反胃皆由胃虛穀氣酉泊蘊為濁濕阻積於中所以飲食隨之上逆故用大黃甘艸湯領之下達加參薑以助二味之力并取五苓散中之三降泄水逆於下橘皮竹茹開發痰氣於上也

治胃反吐逆不消食吐不止方

人參 桂心 澤瀉 各二兩

茯苓 四兩 橘皮 甘艸

黃芪 各三兩 大黃 一兩 生薑 八兩

半夏 一升 麥冬 三升

右十一味咬咀以水一斗二升煮取三升二合一服八合日三夜一贏人六合已利去大黃

衍前以濁濕內蘊故用金匱小半夏湯豁之內通前此以痰飲上逆故用金匱小半夏湯豁之內通前

以人參佐大黃蕩滌之力此以大黃佐半夏開豁之功前以竹茹橘皮佐乾薑人參開發於上此以麥冬黃芪佐茯苓桂心通調於下皆因勢利導之法

治反胃而渴方 澤瀉 半夏 各四兩

茯苓 桂心 甘艸 各二兩

右五味咬咀以水五升煮取二升分三服 一方入生薑四兩

衍胃反而渴良由水逆阻滯津氣遊溢之道故南陽主以五苓利水通津其渴自止此以痰涎挾水飲上逆乃以甘艸半夏易猪苓白朮但取三味利水足矣

治胃反朝食暮吐食訖腹中刺痛此由久冷方

橘皮 三兩 甘艸 厚朴

茯苓 桂心 細辛

杏仁 竹皮 各二兩 檳榔 十枚

前胡 八兩 人參 一兩 生薑 五兩

右十二味咬咀以水一斗三升煮取三升分為三服 一方有柑皮二兩

衍穀入則痛胃氣雖虛尙能與邪交逆所以激痛如刺其食停滯經日乃吐脾氣雖衰尙有濁氣阻逆

不得作純虛例治故用細辛桂心破結氣杏仁前胡降逆氣厚朴檳榔泄滯氣生薑橘皮逐痰氣人

參甘艸培胃氣扶茶竹茹清神氣濁氣散而清氣
安脾氣運而穀氣進津氣而而正氣復

又方

橘皮 三兩

人參

白朮 各二兩

桂心 一兩

川椒 一百二十粒

薤白 一握

右六味咬咀以水二升漬一宿內羊肚中縫合以

三升水煮水盡出之決破去滓分三服

亦治朝食暮吐腹中刺痛彼用厚朴檳榔此用薤

白同為泄滯氣之藥氣雖少變而功用不殊

又反胃大驗方

千金方卷六

九

掃葉山房

前胡

生薑 各四兩

橘皮 三兩

阿膠 一兩

大麻仁 五合

桂心 三寸

甘艸 五寸

吳茱萸 四合

大棗 十枚

右九味咬咀以水三升酒二升煮取一升七合分

二服

反胃多屬胃虛氣滯惟此方獨主津血枯涸下咽

溫難所以專取阿膠麻仁滋血潤燥前胡薑橘降

氣止逆桂心吳茱萸溫中下氣甘艸大棗益胃和

脾脾胃枯涸故無慮於棗之膩滯也

華佗治胃反為病朝食暮吐心下堅如杯升往來

寒熱吐逆不下食此為關上寒澹所作將成肺

痰治之方

真珠

丹砂

雄黃 各三兩

朴硝 五兩

乾薑 十兩

右五味為末蜜和丸如梧子大先食服三九若小

頃者飲水自解然無所忌神良無比 一方用桂

心一兩

寒澹結聚心下將成肺痿而見胃氣反逆心神不

安故千金效元化法而用真珠丹砂以安神氣雄

黃朴硝以辟毒邪稍取乾薑以散肺寒寒澹散而

千金方卷六

十

掃葉山房

嘔逆止胃氣和而肺氣溫矣

治胃反食即吐方

搗粟米作麵水和作九楮子大七枚爛者內醋

中細細吞之即下便已麵亦得用之

借穀氣以安胃氣妙在酢之酸收以斂肝木乘脾

一之邪不勞餘力而胃氣安和勝於湯藥之戕犯正

氣也

大半夏湯 治胃反不受食食已即嘔吐方

半夏 三升

白朮

白蜜 各升

人參 二兩

生薑 三兩

右五味咬咀用水五升和蜜揚之二三百下煮取

一升半分三服

衍金匱大半夏湯本治胃反嘔逆取人參助半夏之

祛痰白蜜滋半夏之辛燥千金加白木生薑不但

佐參半之祛痰且善行白蜜之滯也

治胃反食即吐上氣方

蘆根

茅根 各二兩切

右二味以水四升煮取二升頓服之得下良

衍吐逆上氣渾是胃槁火逆上迫於肺之象蘆根茅

根涼潤滋胃以調氣化味簡力專下咽可使氣平

千金方衍義卷六

十一

補藥山房

火隨下泄矣

又方

飲白馬尿即止

又方

燒雞胄灰酒服男 確女雌

又方

淘小芥子曝乾為末 酒服方寸七日三

衍馬屎殺蟲 雞胄灰磨積 芥子開痰丹方中之

可備用也

灸法

灸兩乳下各一寸以瘡為度 又臍上一寸灸二十

壯 又灸內踝下二指稍邪向前有穴三壯 外臺

指作一

治酢咽方

麩末一斤

地黃三斤

右二味合搗日乾酒服三方寸七日三

衍曲直作酸故用地黃之鮮者以清木鬱之火麩末

以行地黃之性

治噫氣酢咽方

吳茱萸半斤

生薑三兩

人參一兩

千金方衍義卷六

十三

補藥山房

大棗十二枚

右四味咬咀以水六升煮取二升先食服一合日

再

衍吳茱萸湯本治食穀欲嘔乃胃虛氣滯而逆上故

南陽以人參助氣大棗運脾精吳萸下逆氣生薑

止嘔吐千金治噫氣酢咽亦不出是方也

治中散 食後吐酸水方

乾薑

食茱萸 各二兩

右一味治下篩酒服方寸七日二胃冷服之驗

衍食後吐酸水邪乘上以胃氣虛寒非從治之法無

以散虛陽之上逆

嘔吐噦逆第五 論一首 方二十四首 脈一首 灸法十五首

夫吐家形狀如新臥起脈來陽緊陰數其人食已即吐陽浮而數亦為吐寸口脈緊而乳緊即為寒乳即為虛寒虛相搏脈為陰結而遲其人即噎膈上數其人則吐跌陽脈微而澀微即下利澀即吐逆澀不得入跌陽脈浮者胃氣虛也寒氣在上憂氣在下二氣并爭但出不入其人即嘔而不能食恐怖如死寬緩即噎嘔而脈弱小便復利身有敬熱見厥難治論曰凡服湯嘔逆不入腹者先以甘艸三兩水三升

千金衍義卷六 三十一 掃葉山房

煮取二升服之得吐但服之不吐益佳消息定然後服餘湯即流利便不吐也凡嘔者多食生薑此是嘔家聖藥

半夏湯 治逆氣心中煩悶氣滿嘔吐氣上方 一

小荊 荊湯

半夏 一升 生薑 一斤 枳實 一升

桂心 各五兩

右四味咬咀以水八升煮取二升半分三服若少

氣加甘艸二兩

衍義 金匱小半夏加茯苓湯治心下痞膈間有水氣眩

悸千金祖胡洽方加桂一味上攝虛陽下導水逆

豈但治嘔吐而已哉

小半夏加茯苓湯 治諸嘔噦心下堅痞膈間有水痰眩悸 方見後十八卷 大腸腑疾飲問

前胡湯 治寒熱嘔逆少氣心下堅聚膨脹滿不

得食寒熱消渴補不足方

前胡 生薑 各三兩 甘艸 一兩

朴硝 湯成下 大黃 別浸食 茯苓

半夏 麥冬 當歸

芍藥 滑石 石膏

栝樓根 黃芩 附子

千金衍義卷六 三十二 掃葉山房

右十六味咬咀以水一斗二升煮取六升分四服

衍義 寒熱嘔逆故用前胡黃芩半夏生薑少氣故用參

苓歸芍甘艸附子心下堅滿不得食故用硝黃消

渴故用麥冬栝樓滑石石膏寒熱補瀉之法萃於

一方矣

治嘔吐四肢痺冷短氣腹熱三焦不調方

前胡 川芎 甘艸

當歸 石膏 人參

桂心

橘皮各二兩

芍藥三兩

半夏四兩

生薑五兩

大棗三十枚

右十二味咬咀以水一斗二升下黃芩三兩合煮

取三升分三服 一方不用黃芩

衍此以三焦真火式微不能溫養中土而致嘔逆因

彷彿前方而用前茶薑半歸芍參甘下氣溫中諸

味但取石膏以治標熱桂心以代附子川芎以佐

歸芍橘皮以佐薑半大棗以佐參甘以無堅滿故

無取於稍黃以無消渴故無取於麥冬枯樓滑石

其立法校前略平學人不難效用也

千金要方

五

掃葉山房

小麥湯 治嘔吐不止方

小麥一升

人參

厚朴各四兩

茯苓三兩

甘艸一兩

青竹茹二兩

薑汁三合

右七味咬咀以水八升煮取三升去滓分三服

衍嘔屬肝氣之逆麥為肝穀大能補肝氣滋臟燥然

必產於河北者為良南方土地卑濕能助濕熱入

藥非宜加以參苓甘艸培養胃氣厚朴生薑清理

痰濕竹茹專主虛煩嘔瀉藉此以瀉標熱肝氣也

猪苓散 治嘔而膈上塞方

猪苓

茯苓

白木各三兩

右三味治下篩以飲服方寸七日三渴者多飲水

衍金匱猪苓散治嘔吐思水千金借治嘔而膈塞總

屬胃虛水停心下故用白朮健胃 苓利水不必

全用五苓也

犀角人參飲子

治嘔逆胃氣虛邪風執不下食

並皆治之方

犀角

人參各二兩

薤白五兩

粟米一合

右四味咬咀以水五升煮至一升下米煮令米熟

千金要方

六

掃葉山房

分四服相去人行七里久進一服

衍四味並走陽明入胃腑其囊袂邪匡正之功犀散

血熱雄泄滯氣人參益胃粟米進食食進滯散何

有嘔逆之患乎

治嘔噦方

人參一兩

大麻子八合一作胡麻仁

橘皮十兩

枇杷葉八兩

右四味咬咀以水一斗煮枇杷葉取五升下藥者

取三升內麻仁稍飲之

衍診云病深者其聲噦噦而且嘔胃虛氣逆可知人

參專資胃氣麻仁專滋津氣橘皮專散滯氣枇杷

葉專降逆氣也

治氣厥嘔噦不得息方

豉一升

半夏八兩

生薑二兩

人參

前胡

桂心

甘艸各一兩

右七味咬咀以水九升煮取三升分爲三服

又方

豉一升

橘皮二兩

生薑

甘艸各一兩

附子一枚

大棗十五枚

千金方衍義卷六

七

橘葉山房

右六味咬咀以水九升煮取二升分爲三服日三

義衍嘔吐而加氣厥宿病而更感異氣也故用香豉前

胡解散暴邪半夏生薑宣通痰氣人參甘艸培護

本虛桂心匡正祛邪全在辛溫之力一又方主治

較前證稍異前證受寒較淺略借桂心佐人參溫

散之功則前胡香豉使得領邪外出此證感寒特

甚非藉附子峻溫之力暴邪何從得解人參亦未

便輕投僅取甘艸大棗保守中州橘皮清理胃氣

與前方中用半夏不殊也

橘皮湯一治嘔噦若手足厥冷者方

橘皮四兩

生薑半斤

右二味咬咀以水七升煮取三升分三服不止更

合服之

半夏乾薑散治乾嘔吐逆吐涎沫者方

半夏

乾薑等分

右二味爲散取方寸匕漿水一升半煮取七合

服之日三

大黃甘艸湯治食已卽吐方

大黃四兩

甘艸二兩

右二味咬咀以水三升煮取一升半分再服

千金方衍義卷六

七

橘葉山房

義衍橘皮湯主嘔噦厥冷良由濁痰阻遏清陽不得旁

達四末但須橘皮生薑滌除痰垢不得妄議溫經

也一半夏乾薑散主乾嘔吐逆吐涎沫又屬胃氣

虛寒則半夏乾薑在所必用尤妙在漿水之酸收

因斂津液也一大黃甘艸湯主食已卽吐故用大

黃以下胃熱降逆氣甘艸以和胃氣致津液也頓

千金於嘔噦取金匱三方首治手足厥冷反不用

乾薑溫理中氣而用生薑以通陽氣次治乾嘔吐

涎沫反不用生薑止嘔下氣而用乾薑滌除寒飲

三治食已卽吐反不用薑半夏溫治嘔而用大黃

止逆下氣夫病在少陽則有三禁此病本在胃胃
非大黃急下以除上逆之邪則津液悉隨痰涎上
涌變證百出故毫不以苦寒傷犯中州為慮也趙
以德曰胃素有熱食復入之兩熱相衝不得停留
用大黃下熱甘艸和胃按仲景既云欲吐者不可
下又用大黃甘艸湯治食已即吐何也曰欲吐者
病在上因而越之可也逆之使下則必憤亂而益
甚既吐矣吐而不可已有升無降當逆拚之使其下
行故用大黃丹溪曰凡病吐者切不可下近於困
矣

千金方衍義卷十六

九

掃葉山房

治春夏時行傷寒寒傷於胃胃冷變哕方

橘皮

桂心

葛根

各二兩

白茅根

升一

右四味咬咀以水六升煮取三升分三服數進服

盡更台有熱去特

衍義 寒邪傷胃而變哕故用橘皮開胃氣桂心除胃寒

葛根解胃邪茅根化胃熱熱化邪散時行之氣無

容雷之地矣

治傷寒後噦乾嘔不下食方

蘆根

青竹茹

各一

梗米

三合

生薑二兩

右四味咬咀以水五升煮取二升分三服不止服

二劑

又方

蘆根

切一升

橘皮

通艸

各二兩

梗米

三合

右四味咬咀以水四升煮取一升半分三服

治病人乾嘔方

取羊乳汁飲一杯

衍義 噦有胃寒胃熱之辨寒則聲怯而稀熱則聲濁而

千金方衍義卷十六

三

掃葉山房

類此治熱噦故用蘆根竹茹以化胃熱梗米以滋

胃氣薑汁以散胃逆一又方以通艸橘皮通胃氣

梗米滋胃津蘆根化胃熱彼用薑汁此用橘皮彼

用竹茹此用通艸彼以熱盛故用竹茹此以氣上

故用通艸氣有餘便是火也一羊乳滋燥故治乾

嘔

治噦方

煮豉三升飲汁佳

又方

空腹服薑汁一升

又方

煮蘆根濃汁飲之

治惡心方

苦瓠穰并子一升碎以酒水三升煮取一升頓

服須臾吐并下蝦蟇衣三升

又方

服童子小便百日佳

又方

麻子一升熬令香熟搗取酒三升熟研濾取一

升飲盡日二服服盡一石瘥

千金方衍義卷十六

圭

掃葉山房

治食飲輒吐方

頓服生熱湯三升即止

衍 豉汁治時行犯胃之噦 薑汁治痰氣上膈之噦

蘆根汁治熱邪傷中之噦 若瓠酒治脹閉舌

滿之噦 童子小便治陰火上逆之噦 麻子酒

治燥結不通之噦 生熟水治陰陽交錯之噦丹

方諸治辨證不果未可漫投至苦瓠酒大苦傷胃

辨證雖果苟非頑夫亦難輕子劫奪也

灸法

乾嘔不止粥食湯藥皆吐灸手間使三十壯若四厥

脈沉絕不至者灸之便通

病人乾嘔灸心主尺澤佳 又法灸乳下一寸三十

壯

治噦灸承漿七壯 炷如麥大 又灸臍下四指七壯

吐逆嘔不得食灸心膈百壯

吐嘔逆不得下食今日食明日吐者灸膈膈百壯

吐變不得下食灸胸膈百壯

吐逆不得食灸巨關五十壯

吐逆食不止灸胃腕百壯三報

吐逆飲食却出灸脾募百壯三報章門

千金方衍義卷十六

圭

掃葉山房

吐嘔宿汁吞酸灸神光一名膈募百壯三報甲乙經云口

五分

吐逆霍亂吐血灸手心主五十壯

噫噦膈中氣閉塞灸腋下聚毛下附臑宛宛中五十

壯

噫噦嘔逆灸石關百壯

噎塞第六方論一首 方三十五首

五噎丸 治胸中久寒嘔逆逆氣飲食不下結食

不消方古今錄驗云五噎者氣壅憂噎勞噎食

輒胸脇苦痛憂噎者天庭芒脈逆心下悸動手

足通冷勞噎者苦氣膈膈下支滿胸中填塞手

是逆冷不能自渴食噎者食無多少惟胸中苦
寒常痛不得喘息思噎者心悸動喜怒目視眩
腕此皆憂志眩惡寒
氣止入胸脇所致也

乾薑 川椒 食茱萸

桂心 人參各五分 細辛

白朮 茯苓 附子各四分

橘皮六分

右十味為末蜜丸如梧子大酒服三丸日三不止
稍加至十九

衍五噎五膈方書皆類一門而于金濁以五膈隸之
肺臟究其所因良由胃虛不能游溢精氣於脾所

千金衍義卷六 五噎 歸藥山房

以氣噎不通脾衰不能散精上歸於肺所以食膈

不下原其受病雖有氣食憂勞之不同總緣思慮

氣鬱之所致素問明言膈寒閉絕上下不通暴憂

之病也所以五噎丸首取薑黃溫散胃氣於中椒

辛開發肺氣於上桂附收攝腎氣於下則參苓朮

橘得諸辛溫鼓舞之力何憚氣噎不除并可預杜

隔塞之患

又方 治五種之氣皆令人噎方

人參 半夏 桂心

防風一作防葵 小艸 附子

細辛 甘艸各二兩 紫苑

乾薑 食茱萸 芍藥

烏頭各六分 枳實三兩

右十四味為末蜜丸如梧子大酒服五丸日三不

止加至十五丸烏頭與半夏相反但去一味合之

衍五種之氣即五噎五膈之謂方中烏頭開風寒濕

庫即五噎丸中川椒之變半夏祛痰濕即白朮之

變枳實助脾健運即橘皮之變芍藥益氣利小便

即茯苓之變紫苑潤肺散結氣即五膈丸中麥冬

之變小艸通腎氣即遠志之變取其利竅去濕故

千金衍義卷六 五噎 歸藥山房

以防風佐之其間薑辛黃桂附子人參甘艸辛溫

破結辟邪養正之味無庸變換也方後云烏頭與

半夏相反但去一味合之此必後人贅入半夏烏

頭並用專取激發奏功金匱赤丸成法也

竹皮湯 治噎聲不出方

竹皮一斤 細辛各二兩 甘艸

生薑 通艸 人參

茯苓 桂心 麻黃

五味子各一兩

右十味咬咀以水一斗煮竹皮減二升去竹皮下

藥煮取三升分三服

衍義噎本胃病加以暴寒折之所以聲痞不出但欲徹

外邪先固正氣麻黃細辛專散邪生薑通艸專

通聲氣人參茯苓專培本元竹皮清肺胃之虛火

桂心助參苓之溫補五味收麻黃之開發甘艸和

斂散之味也

乾薑湯 治飲食嘔噎方 集驗名 半夏湯

石膏 各四兩 人參

桂心 枳實根 集驗作枳 梗各二兩

甘艸 一兩 半夏 各一 小麥 各一

千金方衍義卷十六 薑 橘葉山房

吳茱萸 升二 赤小豆 三十粒

右十味咬咀以酒五升水一斗煮棗二十枚去滓

合煮取三升分三服

衍義此因胃氣之虛寒不能運化水穀之情微蘊釀而

成本寒標熱之病非寒熱補瀉之兼投何以解虛

實反正之糾結詳方中人參甘艸乾薑黃桂以治

本寒石膏以化標熱半夏枳實一熱一寒分解脾

濕上逆之痰飲於中小麥小豆開泄木邪內蘊之

虛火於下其襄洗滌之功舉世但知柴胡白芍和

解肝邪木通車前降泄火芻曷知穀菽有如此之

妙用哉

通氣湯 治胸滿氣噎方

半夏 八兩 生薑 六兩 桂心 三兩

大棗 三十枚

右四味咬咀以水八升煮取三升分五服日三夜

二

衍義通氣者解散胸中逆滿之痰以通噎塞之氣也薑

半所以豁痰桂心所以開結大棗以布脾胃之津

氣也

羚羊角湯 治氣不通不得食方

千金方衍義卷十六 通艸 橘皮各二兩 吳茱萸 厚朴 乾薑 各三兩

羚羊角 烏頭 五枚

右七味咬咀以水九升煮取三升分三服日二

又方

杏仁

桂心 各三兩

右二味為末蜜丸如棗大稍稍嚼之臨食先含彌

佳

衍義通艸以下諸味皆辛溫利竅之品獨羚羊一味伐

肝散邪故千金取治噎塞以其性專通達善祛閉

中痰濕逆滿之氣也 又方杏仁下氣桂心散結
結散氣下而噎逆之病除矣

治卒噎方

滿口普蜜食之即下

又方

刮杵頭細糠合之即下神驗

治諸噎方

常食乾梗米飯即不噎

又方

末火炭蜜九如彈子大含少少咽即下

二 金方衍義卷十六

七

掃葉山房

又方

老牛涎如棗大內水中飲之終身不復噎

衍義 卒噎知非宿病但取蜜之潤澤不須湯藥反傷胃

氣也 又方取杵頭糠之轉動以助胃氣之健運

又治諸噎常食乾飯合少少進緩緩嚙使無頓

停胃氣之虞 火炭丸者火能生土并取黑色下

達之義 牛涎治噎膈反胃專取坤土之津以滋

胃氣之結與牛齡艸之意不殊

論曰凡療病者皆以其類至如治噎之法以鷓鴣治
骨哽狸虎骨治魚哽至於竹篾雞白嚼筋綿蜜等事

乃可以通為諸噎用耳

治諸噎方

以鹿筋漬令濡合而索之大如彈丸以線繫持
筋端吞之入喉推至哽處徐徐引之哽著筋出

又方

以竹篾刮令滑淨綿裹內咽中合至哽處可進

退引之哽即隨出

又方

用綿二兩以蜜煎使熱外薄哽所在處灼氣以
熨綿上若故未出復著一段綿代用并以皂莢

二 金方衍義卷十六

七

掃葉山房

屑少少吹鼻中使得嚏哽出

又方

雞白煮令半熟小嚼之以線繫雞中央捉線吞

雞下喉至哽處牽引哽即出矣

治噎咽方

虎骨末或狸骨服方寸七

又方

服罌麥末方寸七

治魚骨哽方

鷓鴣屎服方寸七

又方

服拍皮湯

又方

服沙糖水

又方

魚網燒灰服方寸七

必效方云取魚網費其頭立下

治骨鯁在喉眾治不出方

取糖丸如雞子黃大吞之不去更吞漸大作

一丸可至十九

又方

燒虎狼屎服之

又方

吞猪膏如雞子不瘥更吞

治食中吞髮咽不去繞喉方

取亂髮燒灰酒服一錢七

治吞錢方

艾蒿五兩以水五升煮取一升頓服即下

又方

服蜜二升即出

又方

千金方衍義卷十六

三

掃葉山房

末火炭酒服方寸七水服亦得

治吞金銀釵環方

白糖二觔一頓漸漸食之多食亦佳

誤吞環及指環方

燒雁毛二七枚未服之亦得

誤吞釵方

曝菲合蒸蒸熟勿切食一束即出或生麥葉筋

縷如韭法皆可用但力意多食自消

誤吞銅鐵方

燒銅弩牙令赤內酒中飲之立愈

千金方衍義卷十六

三

掃葉山房

誤吞釘鐵及箭鏃方

但多食猪脂肪肉令飽自裹出

誤吞鐵方

取懸鐵磁石末飲服方寸七即下古今錄驗云吞鐵在喉中而服磁末入腹者舍磁石於口中吸鐵而出

治硬之方多用智巧或用相制隨宜取用可也

論曰痛者腹滿按而不痛者為虛按之痛者為實也

夫腹中滿不減減不足言此當下之舌黃未下者下

之黃自去腹滿時減復如故此為寒當得溫藥腹滿

脹滿第七論一首一方八首

誤吞錢方

口中苦乾燥腹間有水是飲 跗陽脈微弦法消腹
滿不滿者必下部閉塞大便難兩腳下疼痛此虛寒
氣從下上也當以溫藥服之取瘕腹滿轉痛來越小
腹為欲自下利也一云腹中痛若轉氣

溫胃湯 治胃氣不平時脹咳不能食方

附子 當歸 厚朴

人參 橘皮 芍藥

甘艸各一兩 乾薑五分 川椒三合

右九味咬咀以水九升煮取三升分三服

義方下雖云治胃氣不平時脹咳不能食而實虛寒

金匱要略卷十六 橘葉山房

從下上之的方方中椒薑附子治逆上之寒參甘

歸芍資病患之虛橘皮厚朴泄脹滿之氣也此治

虛寒從下上之脹滿助寒積在脇下偏痛用大黃

附子湯之法 毅然兩途

大半夏湯 治胃中虛冷腹滿塞下氣方

半夏一升 大棗二十枚 甘艸

附子 當歸 人參

厚朴 茯苓 枳實各二兩

桂心五兩 生薑八兩 川椒二百粒

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分二服

衍金匱治胃反 嘔逆大半夏湯止人參半夏白蜜三

味此以胃虛腹滿故去蜜之膩滯加椒薑附子以

散寒結枳實厚朴以泄腹滿當歸茯苓以和血氣

生薑大棗以和榮衛甘艸代白蜜之和脾并和椒

薑附子之烈也

附子梗米湯 治腹中寒氣腹滿腸鳴切痛胸脇

逆滿嘔吐方

附子一枚 半夏 梗米各半升

甘艸一兩 大棗十枚

右五味咬咀以水八升煮米熟去滓每服一升日

三服 乾薑二兩 金匱要略卷十六 橘葉山房

三服 集驗方加

義此方本諸全 匱專取附子鼓舞梗米溫胃為主半

夏滌除痰垢 甘艸大棗通行脾胃之津氣也

厚朴三物湯 治腹滿氣脹方

厚朴半斤 大黃四兩 陳枳實大者五枚

右咬咀以水一斗二升煮取五升內大黃煎取三

升去滓服一升腹中轉動者勿服不動者更服

一方加芫硝二兩

厚朴七物湯 治腹滿發熱十日脈浮而數飲食

如故方

厚朴半斤 甘肅 大黃各三兩

大棗十枚 枳實 五枚 桂心 二兩

生薑 五兩

右咬咀以水一斗煮取五升去滓內大黃煮取四

升服八合日三嘔逆者加半夏五合利者去大黃

寒多者加生薑至半斤

衍義 小承氣湯治陽明府實熱結在裏大便不通故以

大黃為主厚朴枳實佐之厚朴三物湯金匱治腹

滿氣脹故以厚朴為主大黃枳實佐之厚朴七

物湯金匱治腹滿發執十日脈浮而數飲食如故

千金方衍義卷 去 三 掃葉山房

知裏邪未實表證未盡乃以三物厚朴湯合杜枝

加大黃湯於中除去芍藥之助陰而加枳實厚朴

以泄滿二方治例世本皆交錯誤刻數百年來會

無一人為之歸正醫道之憤憤不獨在於今日也

吳茱萸湯 治久寒胸脇逆滿不得食方

吳茱萸 半夏 小麥各一升

甘艸 人參 桂心各二兩

生薑 八兩 大棗 二十枚

右八味咬咀以酒五升水三升煮取三升分三服

衍義 吳茱萸湯在陽明例中治食穀欲嘔在金匱方中

治嘔而胸滿專取藥下逆氣人參補正氣大棗

安中氣生薑去穢氣千金加半夏開痰氣小麥通

肝氣桂心溫血氣甘艸和胃氣也

大桂湯 治虛羸胸脇滿方

桂心 生薑 各一斤 半夏 一升

黃芪 四兩

右四味咬咀以水一斗半煮取五升分五服日三

夜二

衍義 虛脹胸滿木氣虛寒濁氣上逆故用桂心散濁氣

薑半豁痰氣黃芪固榮氣專為虛羸藉此以溫分

千金方衍義卷 去 三 掃葉山房

肉實膠理為補虛之上 乘世為黃芪氣滯服之令

人胸滿曷知黃芪在補益劑中不無助滿之虞在

溫散藥中能令諸味留泊於中轉助開胸之力非

洞達澀因澀用之與難 以語此

治男子卒勞內傷汗出中風腹脹大飢食不下心

痛小便赤黃時白大便不利方

大黃 葶藶 寒水石

苦參 黃連 栝樓根 等分

右六味為末蜜丸以豉汁和飲服如梧子大二九

日三加至十丸

勞內傷非虛羸久困之比腹脹大非虛寒從下

上之比溺黃大便不利非津枯脾約之比故用一

派若寒開通閉塞何慮熱邪不隨手不復乎

灸法

臌脹脇腹滿灸膈膈百壯三報

胸滿心腹積聚痞痛灸肝膈百壯三報

脹滿水腫灸脾膈隨年壯三報

腹中氣脹引脊痛多飲食身羸瘦名曰食癰先取脾

膈後取季脇

臑積聚脹滿羸瘦不能飲食灸三焦膈隨年壯

千金衍義卷去

三

掃葉山房

脹滿雷鳴灸大腸膈百壯三報

脹滿氣聚寒冷灸胃腕百壯三報穴在鳩尾下三寸

腹滿脹繞臍結痛堅不能食灸中守百壯穴在臍上

一寸一名水分

脹滿瘕聚滯下痛冷灸氣海十壯穴在臍下一寸忌

不可鍼

脹滿氣如水腫狀小腹堅如石灸膀胱募百壯穴在

中極臍下四寸

脹滿腎冷痕積泄利灸太極百壯穴在臍傍相對橫

去臍兩傍各二寸

痼冷積熱第八論二首 脈一條 方二十首

論曰凡人中寒者喜欠其人清涕出發熱色和者

噎凡痼病者未脈望之口燥清涕出善噎欠此人中

寒其人下痢以裏虛故也欲噎不能此人腹中痛凡

寒脈沉弦脈雙弦者寒也弦脈狀如弓張弦按之不

移脈弦數者當下其寒脈雙弦而遲者心下堅脈大

而緊者腸中有陰可下之右手寸口脈弦者即腸下

拘急而痛其人澀澀惡寒師曰遲者為寒澀為無血

寸口脈微尺中緊而澀緊即為寒微即為虛澀即為

血不足故知發汗而復下之

千金衍義卷去

三

掃葉山房

露宿丸 主寒冷百病方

礬石

桂心

附子

乾薑 各三兩

右四味為末蜜丸如梧子大每服十九丸日三後稍

加之

又方 治遇冷氣心下結緊嘔逆寒食不消并主

傷寒晨夜觸寒冷惡氣方

礬石

桂心

附子

烏頭 各四兩

右四味為末蜜丸如胡豆大以酒服三丸日二加

至十九藥耐寒忌熱食近火宜冷飲食

大露宿九方見第十七卷

衍露宿者形寒飲冷致病故用礬石之大辛大熱以

治腹中堅癖邪氣兼取附子桂心乾薑壯其雄烈

以破癖冷沉寒能助陽氣內充即使霜行露宿亦

可無虞 又方除去乾薑易入烏頭專禦風毒外

邪不致內犯中氣藥雖峻而功用不凡 又首方

加皂莢桔梗名大露宿丸專主氣極肺傷而此門

亦取用之以有吹噓清涕脈弦腹痛等證故借摻

肺之藥以辟胃腑痺著之邪

千金方衍義卷六 補藥山房

治痼冷風眩寒中手足冷胃口寒臍下冷百病五

勞七傷第一令人能食二強盛三益氣四有子

神驗方

大豆三升 生地十五斤 烏頭一百五十枚

右三味以除日咬明烏頭以酒一斗半和生地汁

浸烏頭至破日絞去滓內豆藥汁中至除日出暴

之有汁更浸曝之至汁盡藥成初服從二九起可

至二十豆酒服之有病空腹服無病食後服四時

合並得二月三月為上時藥令人能食益氣盛石

子髮白反黑齒落重生先病熱人不可服

衍下冷上眩良由腎虛風氣內陷火不生土不能安

鎮虛陽而致不時運動故取地黃汁和酒浸烏頭

滋血祛風製黑大豆中引入腎經深得蠶藥緩攻

之妙

治小腹痛冷百治不瘥方

麩末三升 白朮五兩 乾薑

桂心各三兩 川椒 吳茱萸各二兩

右六味治下飾以米飲服方寸七日二不過五劑

諸冷頓瘥無忌空腹服之

衍此以水土虛寒不能健運故用薑桂椒黃以助麩

千金方衍義卷六 補藥山房

木之消磨也

治積年冷病方

川椒二兩 香豉一升

右二味搗椒為末和豉更搗三千杵丸如彈丸大

食前酒服日再

衍川椒治積年冷病香豉散胸中陳氣也

治諸冷極醫所不治方

馬煎子九升淨治去土空腹服一合日三飲及

酒下之服訖須與以食壓之取瘥乃止

衍馬煎性溫善走能治中外寒熱濕痺等病故本經

言主皮膚寒熱胃中熱氣不獨治諸冷極也

赤丸 治寒氣厥逆方

茯苓

桂心 各四兩

細辛 一兩

烏頭

附子 各二兩

射罔 如棗大一枚

右六味為末內真珠為色蜜丸如麻子空腹酒服

一九日再夜二不知加至二九以知為度一方用

半夏四兩

衍 金匱赤丸方止四味妙在烏頭半夏之反激並用

千金乃裁汰半夏改用桂附射罔雖悍烈過於半

夏然不若反激之力最勝真珠力能交濟坎離收

攝虛火或云是緣礬煨造平治土藏有濕散之專

功無傷中之巨測

千金方衍義卷十六

五

掃葉山房

半夏湯 治胸滿有氣心腹中冷方

半夏 一升

桂心 四兩

生薑 八兩

右三味咬咀以水七升煮取二升一服七合日三

服

生薑湯 温中下氣方

生薑 一斤

甘草 三兩

桂心 四兩

右三味咬咀以水六升煮取一升半一服五合日

三服

衍 半夏湯以薑半開胸中痰滿桂心散腹中冷氣

生薑湯中甘草欬斷薑桂之性以盡温中之力也

甘艸湯 治虛羸慳氣欲絕方

甘艸 一斤

五味子 二升

生薑 各二兩

人參 二兩

吳茱萸 二升

右五味咬咀以水四升煮茱萸令小沸去滓內藥

煮取一升六合分二服服數劑佳

某黃消石湯 治久寒不欲飲食數十年滯飲方

吳茱萸 入合

消石 一升

生薑 一斤

右三味以酒一斗水解合得二斗煮藥取四升服

千金方衍義卷十六

早

掃葉山房

二升病即下去勿更服也初下如泔後如汚泥若

如沫泔者更可服養如乳婦法

衍 參茸吳茱萸温中散寒乃吳茱萸湯之變方彼用大

棗以行脾津此用甘艸以和胃氣五味子以收津

液也 某黃消石湯亦吳茱萸湯之變法於中削

去參棗改用消石蕩練冷積但取薑黃温中下氣

更一君主而主治迥然

大建中湯 治心胸中大寒大痛嘔不能飲食飲

食下咽自知偏從一而下流有聲決決然若腹

中寒氣上衝皮起出見有頭足上下而痛其頭

不可離近方

川椒二合

乾薑四兩

人參二兩

膠飴一升

右四味以水四升煮取二升去滓內飴微火

煮令得一升半分三服服湯如一炊頃可飲粥二

升許更服當一口食糜更服之

衍義 虛寒積聚之治此方最力故千金效金匱用之其

方中人參輔椒薑溫散之法人皆得之至於膠飴

為助滿之首列而反用以治痞嘔不能食是專用

助滿之味引領椒薑人參為泄滿之通使方知大

千金方 義卷六

聖

掃葉山房

桂湯中用黃芪之法從此出

大黃附子湯 治脇下偏痛發熱其脈緊此寒

也當以溫藥

大黃三兩

附子三枚

細辛二兩

右三味以水五升煮取二升分再服

衍義 少陰病始得之反發熱脈沉用麻黃附子細辛湯

以治太陽少陰之兩感此治脇下偏痛發熱脈緊

變表法為下法立大黃附子湯以治寒從下上之

假積成賴附子把守真陽不隨汗下以脫設無發

此外證豈不可變大黃附子甘肅之治乎况治食

已則吐之大黃甘肅湯金匱千金具有成法始知

權變之方不在規矩之外也

論曰寸口脈弦而緊弦則衛氣不行衛氣不行即惡

寒緊則不能飲食弦緊相搏即為寒疝跌陽脈浮而

遲浮即為風虛遲即為寒疝凡瘦人繞臍痛必有風

令穀氣不行而反下之其氣必衝不衝者心下則痞

大烏頭湯 主寒疝繞臍若痛發即自汗出手足

厥寒其脈沉弦者方

烏頭大者五枚熬黑不切以水三升煎取一升

去滓內白蜜二斤煎令水氣盡得三升強人服

七合歲人五合子服未效明日更服每日止一

服不可再也

烏頭桂枝湯 治寒疝腹中痛逆冷手足不仁若

一身盡痛灸刺諸藥不能治方

秋乾烏頭黃中者五枚除去角 白蜜一斤

右三味以蜜煎烏頭減半去滓以桂枝湯五合解

之令得一升許初服三合不知更進三合復不知

加至五合其知者如醉狀得吐者為中病也

桂枝湯方見傷寒門中外書法以水二升半煮取

寒疝用烏頭恐其烈性迅發故用蜜煎使之

以緩破結之力 又烏頭煎治寒疝其力專矣設
見手足不仁一身盡痛又為木鬱風生風淫末疾
肝風內動之象故以烏頭煎解桂枝湯中使內風
仍從內散即有外風亦不出是方之神妙也

論曰凡人患大熱皆須候脈若大大熱者不得一準
方用藥皆準病用藥大熱不可那者當兩倍三倍大
大熱者乃至十倍用之乃可制之爾有人苦熱不已
皆由服石所致種種服餌不能制止惟朴硝煎可以
定之有金者貴高人所加也

朴硝煎方

千金方卷十六 聖 攝業山房

朴硝一斤 芒硝半斤 石膏

金各三兩 寒水石四兩如無石鹽代之

右五味先內二硝於八升湯中攪令消以紙密封
一宿取清內銅器中別搗寒水石石膏碎如豆粒
以絹袋盛之內汁中以微火煎候其上有膜起以
筋投中箸動如凌雪凝白急下瀉貯盆中待凝取
出烈日曝乾積熱困悶不已者以方寸匕白蜜一
合和冷水五合攪和令消頓服之日二熱定即止
之

行 膏梁金石皆高貴之所常嗜受如持虛每致發

毒蘊百治罔效惟朴硝煎可以蕩練臟腑專取石
藥之寒以治石藥之毒如水沃火頃刻水消豈高
人加金以治五金之毒皆同氣相招之意

五石湯 治胃間熱熱病後不除煩悶口中乾渴

寒水石 硝石 赤石脂

栝蒌根 龍骨 牡蠣

黃芩 甘艸各五分 知母

石膏 枳心各三分 大黃二分

右十二味咬咀以水七升煮取三升分四服日三

夜一 論本只 有四五 千金方卷十六 聖 攝業山房

此於風引湯中除去滑石之傷津易赤石脂以固
脫因有煩熱口乾是以除去乾薑之燥烈紫白石
英之慄悍并易黃芩知母栝蒌根清熱滋津之味
更易四味而功用迥然矣

竹葉湯 治五心熱手足煩疼口乾唇燥胸中熱

方 竹葉 小麥各一升 知母

石膏各三兩 茯苓 黃芩

麥冬各二兩 人參一兩 栝蒌根

冬冬各二兩

半夏

甘艸各一兩

生薑五兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮竹葉小麥取八升去滓內藥煮取三升分三服老少分五服

衍義竹葉石膏湯本治大病後虛羸煩渴千金乃於本

方中除去梗米之益胃易入小麥以清肝加栝蘆

根以佐麥冬茯苓以佐人參黃芩以佐石膏生薑

以佐半夏仍用白虎湯中知母以佐竹葉以治胃

氣暴虛之煩渴因為合劑設見陰邪上逆之煩渴

曷不效既濟湯法少加熟附以導虛熱乎

半夏湯 治胸中容熱心中煩滿氣上大小便難

千金方義卷十六 栝蘆山房

方

半夏一升

生薑

八兩

前胡四兩

茯苓

白朮

各五兩

杏仁

枳實各三兩

人參

黃芩各二兩

甘艸一兩

右十味咬咀以水九升煮取三升分三服胸中大

熱者况冷服之大小便澀者加大黃二兩 一方

用梔子仁二兩為十一味

衍義胸中容熱良由風熱內陷所致故以前胡黃芩杏

仁開提於上枳實半夏生薑疎豁於中參朮苓甘

護持正氣不使傷犯津液自然胃氣安和二便如

常矣

承氣湯 治氣結胸中熱在胃腕飲食嘔逆渴方

前胡

枳實

桂心

大黃

寒水石

知母

甘艸各一兩

硝石

栝蘆根

石膏各二兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服

衍義承氣者承制逆上之氣也此方雖假承氣之名實

取全匱大黃甘艸湯之製以治胸中容熱加前胡

枳實以下氣知母石膏寒水栝蘆以化熱硝石柱

心為伏熱之開導也

治熱氣手足心煩熱疔火方

竹葉一升

枳實

青箱子

白前各一兩

吳茱萸

黃芩各半兩

栝蘆根

麥冬各二兩

生薑六兩

前胡各一兩

半夏各五兩

右十一味咬咀以水八升煮取二升分三服

衍義熱邪擾於四末手足心熱如火故用前胡白前下

氣薑半夏枳實開痰竹葉黃芩化熱栝蘆麥冬回津

氣下痰閉熱化津回而火白熄青精炎莫並走厥陰一為清火之通津一為辟熱之嚮導

地黃煎 治熱方

地黃汁四升 茯苓三合

知母

萎蕤各四兩

栝蕤根五兩

竹瀝三合 用竹葉

薑汁

白蜜

麥冬汁

鮮骨皮各二升

石膏八兩

右十一味咬咀以水一斗二升先煮諸藥取汁三升去滓下竹瀝地黃麥冬汁微火熬四五沸下蜜

薑汁微火煎取六升初服四合日三夜一加至六

七合四月五月作散服之

千金方衍義卷十六

星

橘葉山房

腎氣不能上蒸於肺肺胃枯槁不能滋其化源而致煩渴便難故用涼潤諸味潤血生津單取薑之辛以開結滯之氣

治積熱方

枳實

黃芩

大黃

黃連

芒硝各二兩

右五味為末蜜丸如梧子大空心酒服三十九加

至四十九日一服

積熱而用大黃黃連瀉心湯更加枳實芒硝兼合

承氣但不用厚朴之辛洩氣耳

治膈上熱方

苦參十兩

元參五兩

麥冬三兩

車前子三兩

右四味為末蜜丸如梧子大一服十五丸日二服

熱在膈上故用麥冬滋肺氣苦參下結氣元參清

咽氣車前泄滯氣也

細丸 治客熱結寒不流利方

大黃

葶藶各三兩

香豉三合

杏仁

巴豆各五分

千金方衍義卷十六

星

橘葉山房

右五味為末蜜丸如梧子大每日飲服二丸以利為度

熱結不通而用葶藶大黃滌除結熱熬黑杏仁滌除痰垢但以巴豆之辛烈易去芒硝之苦降乃大陷胸合走馬湯之製參入香豉以緩巴豆之烈并散胸中懊懣之氣也

治骨蒸羸瘦煩悶短氣喘息鼻張日西即發方

龍膽

川連

栝蕤根各一兩

芒硝半兩

梔子十枚

苦參

大黃

黃芩

芍藥

芍藥

清稍子

各二兩

右十味為末蜜丸如梧子大飲服二九日二以知

為度 一方無苦參已下止五味張文仲為飲方寸七

衍義羸瘦骨蒸似乎虛熱而煩悶短氣喘息鼻張審非

肺氣之絕卽是五臟苑熱故用三黃瀉心苦參瀉

腎也硝瀉脾梔子栝蘘瀉肺龍膽青稍瀉肝卽使

骨蒸羸瘦亦是火極傷陰殊非陰虛發熱之謂

治骨蒸方

天靈蓋如梳大炙令黃碎以水五升煮取二十

分三服起死人神方

千金要義卷十六

巽

醫藥山房

又方

水服芒硝一方寸七日二服神良

衍義天靈蓋治傳屍殮殍之神方 芒硝乃救熱存陰


之要藥虛實補瀉主治天淵

治五臟熱及身體熱脈弦急者方

灸第十四椎與臍相當五十壯老小增損之苦

虛寒至百日橫三間寸灸之

孫真人千金方衍義卷十六



孫真人千金方衍義卷十七

長洲 王著

南沙 客校

肺臟方 凡八類

肺臟脈論第一 論一首

論曰肺主魄魄藏者任物之精也為上將軍使在上

行所以肺為五臟之華蓋並精出入謂之魄魄者肺

之臟也鼻者肺之官肺氣通於鼻鼻和則能知香臭

矣循環紫宮上出於頰候於鼻下迴肺中榮華於髮

外主氣內主胸與乳相當左乳庚右乳辛肺重三斤

千金要義卷十七

醫藥山房

三兩六葉兩耳凡八葉有十四童子七女子守之神

名鴻鴻主藏魄號為魄藏隨節應會故云肺藏氣氣

舍魄在氣為欬在液為涕肺氣虛則鼻息利少氣實

則喘喝胸憑仰息肺氣虛則夢見白物見人斬血藉

藉得其時則夢見兵戰氣盛則夢恐懼哭泣厥氣客

於肺則夢飛揚見金鐵之器及奇物

凡肺藏象金與大腸合為腑其經手太陰與陽明為

表裏其脈浮相於季夏王於秋秋時萬物之所終宿

葉落柯萎妻枝條机然獨在其脈為微浮衛氣遲榮

氣數數則在上遲則在下故名曰毛陽當陷而不陷

陰當昇而不昇為邪所中二氣威敵故湯中邪則搶

陰中邪則緊捲則惡寒緊則為慄寒慄相搏故名曰

瘧弱則發熱浮乃來出日中且發暮中暮發藏有遠

近脈有遲疾周有度 行有漏刻遲在上傷毛采數

在下傷下焦中焦有惡則見有善則匿陽氣下陷陰

氣則溫陽反在下陰反在巔故名曰長而且雷秋脈

如浮秋脈肺也西方金也萬物之所以收成也故其

氣亦輕虛而浮來急去散故曰浮反此者病何如而

反其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其

氣來毛而微此謂不及病在中太過則令人氣逆而

背痛愠愠然不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見

血下聞病音

肺脈來厭厭聶聶如落榆莢曰肺平秋以胃氣為本

肺脈來不上不下如循雞羽曰肺病源無

肺脈來如物之浮如風吹毛曰肺死

真肺脈至大而虛如以毛羽中人膚色白赤不澤毛

折乃死

秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛

而有弦曰春病弦甚曰今病

肺藏氣氣舍魄喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意

不存人皮革焦毛悴色天死於夏

手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫皮毛者也氣

弗營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液未則皮節傷

皮節傷者則爪一作枯毛折毛折者則氣先死丙篤

丁死火勝金也

肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死秋金肺

王其脈微溫而短曰平反得大而緩者是脾之乘肺

子之歸母為虛邪雖病易治反得沉濡而滑者是腎

之乘肺子之乘母為實邪雖病自愈反得浮大而洪

者是心之乘肺火之剋金為賊邪大逆十死不治反

待弦細而長者是肝之乘肺木之陵金為微邪雖病

即瘵肝乘肺必作虛

右手關前寸口陰絕者無肺脈也若短氣欬逆喉中

塞噎逆刺手陽明治陽

右手關前寸口陰實者肺實也若小氣胸中滿膨膨

與肩相引刺手太陰治陰

肺脈來泛泛輕如微風吹鳥背上毛再至曰平三至

曰離經病四至脫精五至死六至命盡手太陰脈也

肺脈急甚為癩疾微急為肺寒熱急情欬唾血引腰

背胸若鼻息肉不通緩甚為多汗微緩為痿漏風

背胸若鼻息肉不通緩甚為多汗微緩為痿漏風

背胸若鼻息肉不通緩甚為多汗微緩為痿漏風

背胸若鼻息肉不通緩甚為多汗微緩為痿漏風

千金方卷十七

掃葉山房

千金方卷十七

掃葉山房

偏頭已下汗出不可止大甚為脛腫微大為肺痺引

胸背起腰內小甚為殮泄微小為消痺滑甚為息賁

上氣微滑為上下出血滴甚為嘔血微瀆為鼠瘦在

頸肢腋之間下不勝其上其能喜酸

肺脈搏堅而長當病唾血其濡而散者當病漏一作

汗至今不復發散

白脈之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胸中喘

而虛名曰肺疝寒熱得之醉而使內也

黃帝問曰經脈十二而手太陰之脈獨動不休何也

手太陰本在寸口中岐伯對曰足陽明胃脈也胃者

五臟六腑之海胃脈在足跌上大趾間其精氣上清

注於肺肺氣從太陰而行之其行之也以息往來故

人一呼脈再動一吸脈亦再動呼吸不已脈動不止

黃帝問曰氣口何以獨為五臟主岐伯對曰胃者水

穀之海六腑胃居其大五味入於口藏於胃以養五

臟氣氣口者太陰是也臟腑之氣味皆出於胃變見

於氣口氣口屬腑藏主即呼寸口者也

扁鵲曰肺有病則鼻口張實熱則喘逆胸憑仰息其

陽氣壯則夢恐懼等虛寒則欬息下利小氣其陰氣

壯則夢涉水等肺在聲為哭在變動為欬在志為憂

憂傷肺精氣升於肺則悲也

味主秋結滿而血者病在胸及以飲食不節得病者

取之合故命曰味主合

病先發於肺喘欬三日之肝脇痛支滿一日之脾閉

塞不通身痛體重五日之胃腹脹十日不已死冬日

入夏日出病在肺下晡慧日中甚夜半靜

假令肺病南行若食馬肉及麀肉得之不者當以夏

時發得病以丙丁日也宜赤藥

凡肺病之狀必喘欬逆氣肩息背痛汗出尻陰股膝

擊脾臑胛足皆痛虛則少氣不能報息耳聾隘乾取

其經手太陰足太陽之外厥陰內少陰血者

肺脈沉之而數浮之而喘苦洗洗寒熱腹滿腸中熱

小便赤肩背痛從腰以上汗出得之房內汗出當風

肺病其色白身體寒但無熱時時欬其脈微遲為可

治宜服五味子大補肺湯瀉肺散春當刺少商夏同

魚際皆瀉之季夏刺大淵秋刺經渠冬刺尺澤皆補

之又當灸膻中百壯第三椎二十五壯

邪在肺則皮膚痛發寒熱上氣氣喘汗出欬動肩背

取之膺中外膺背第三椎之傍以手重按之快然乃

刺之取之缺盆中以越之

素問卷七

補葉山房

素問卷七

補葉山房

形寒寒淡則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行肺氣傷其人勞倦則欬唾血其脈細緊浮數皆吐血此為躁擾嗔怒欬逆肺傷氣擁所致也

肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹

肺中寒者其人吐濁涕

肺中水者其人身體腫而小便難時時大便如鴨溏

肺脹者虛而滿喘欬目如脫狀其脈浮大

太陽脈浮緩少陽脈微緊微為血虛緊為微寒此為

鼠乳診得肺積脈浮而毛按之辟易脇下時時痛逆

背相引痛少氣善忘目瞑結癰皮膚寒味愈夏刺主

皮中時痛如蠶緣之狀甚者如鍼刺之狀時養色白

也

肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯久久不愈病

灑灑寒熱氣逆喘欬發肺癰以春甲乙日寫之何也

心病傳肺肺當傳肝肝適以春王王者不受邪肺復

欲還心心不肯受因留結為積故知息賁以春得之

肺病身當有熱欬嗽短氣唾出膿血其脈當短濇今

反浮大其面當白而反赤者此是火之尅金為大逆

十死不治商音人者主肺聲也肺聲哭其音磬其志

樂其經手太陰厥逆陽明則榮衛不通陰陽反作陽

明則榮衛不通陰陽反作陽

金匱要略卷七

肺葉山房

氣內擊陰氣外傷傷則寒寒則虛虛則厲風所中噓

吸戰掉語聲嘶塞而散下氣息短憊四肢辟弱面色

赤而遺失便利甚則不可治依源麻黃續命湯主之

方見第八卷又言音喘急短氣好唾此為火尅金陽

擊陰陰氣沉陽氣昇并則實實則熱熱則狂狂則閉

眼怪言非常所說口赤而張欲無時度此熱傷肺肺

化為血不治若面赤而鼻不欬可治也

肺病為瘧者令人心寒寒甚則熱熱間善驚如有所

見者恒山湯主之方見第十卷若其人本來語聲雄

烈忽爾不亮拖氣用力方得出言而反於常人呼其

語直視不應雖日未病勢當不久此則肺病聲之候

也察觀疾病表裏相應依源審治乃不失也

白為肺肺合皮白如豕膏者吉肺主鼻鼻是肺之餘

其人金形相比於上商白色小頭方而小肩背小腹

小手足發動身輕精廉急心靜悍性喜為吏耐秋冬

不耐春夏夏感而生病主手太陰廉然肩膺厚

薄正疎則肺應之正白色小理者則肺小小則少飲

不病喝喘粗理者則肺大大則虛虛則寒喘鳴多飲

善病胸喉痺逆氣巨肩反膺陷喉者則肺高高則實

實則熱上氣肩息欬逆合腋張脇者則肺下下則逆

逆

金匱要略卷七

肺葉山房

責迫肝善勝下痛鼻塞或壅而涕生息肉好肩背厚者則肺堅堅則不病欬上氣肩背薄者則肺脆脆則易傷於熱喘息鼻衄眉膺好者則肺端上端正則利利難傷膺偏欹者則肺偏傾偏傾則病胸偏痛鼻亦偏疾凡人分部陷起者必有病生大腸陽明為肺之部而藏氣通於內外部亦隨而應之沉濁為內浮清為外若外病內入則所部起內病裏出則所部陷外入前治陽後治陰內出前治陰後治陽實為虛補陽主外陰主內凡人死生休否則藏神前變形於外人肺前病鼻則為之孔開焦枯若肺前死鼻則為之梁折孔開青黑色若天中等分墓色應之必死不治看色深淺斟酌賒促遠不出一年促不延時月肺疾少愈而卒死何以知之曰赤黑如拇指鑿點見頰頰上此必卒死肺絕三日死何以知之口張但氣出而不還面白目青是謂亂經飲酒當風風入肺經膽氣妄泄目則為青雖有天救不可復生面黃目白如枯骨死吉凶之色在於分部順順而見赤白入壘必病不出其年若年間不應三年之中禍必應也

秋金肺脈色白主手太陰脈也秋取經脈秋者今始治肺將收殺金將勝火陽氣在合陰氣初勝濕氣及

千金方卷七

八

掃葉山房

體陰氣未盛未能深大故取膺以瀉陰邪取合以虛邪陽氣始衰故取於合其脈本在寸口之中掌後兩筋間二寸中應在腋下動脈其脈根於太倉太倉在臍上三寸一分是也

其筋起於手大指之上循指上行結於魚後行寸口外側上循臂結肘中上臍內廉入腋下上出缺盆結肩井前上結缺盆下結胸裏散貫貫下抵季脇

其脈起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋上下循臍內行少陰心主之前下肘中後循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端

其支者從腕後直次指內廉出其端合手陽明為表裏陽明之本在肘骨中同會於手太陰太陰之別名列缺起於腋下分間並太陰之經直入掌中散入於魚際別走手陽明主肺生病病實則大腸熱熱則手兌掌起起則陽病陽脈反逆大於寸口三倍病則欬上氣喘渴煩心胸滿臍臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風汗出中風虛則大腸寒寒則欠欬小便遺數數則陰病陰脈反小於寸口一倍病則肩背寒痛少氣不足以息季脇空痛尿色變卒遺失無度

秋三月者主肺大腸白氣裡病也其源從太陽擊手

千金方卷七

九

掃葉山房

太陰太陰受淫邪之氣則經絡壅滯毛皮緊縮發瘡
邪生則臟腑傷溫隨秋受瀉其病相反若虧虛則為
陰邪所傷乍寒乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆若臟實則
為陽毒所損體熱生斑氣喘引飲故曰白氣裡病也
扁鵲曰灸心肝二膻主治丹毒白裡病當依源為療
調其陽理其陰則臟腑之病不生矣

肺虛實第二 步四首 方二十首
灸法三首

肺實熱

右手寸口氣口以前脈陰實者手太陰經也病苦肺
脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀名曰肺實
熱也

千金方義卷十七

十一

攝業山房

治肺實熱胸憑仰息泄氣除熱方

石膏 八兩

白前

杏仁 各三兩

白木

橘皮 各五兩

枸杞根 皮 切二升

赤蜜 七合

右七味咬咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮三沸分三服

肺為天一生水之上源脾為厚土生金之母今
因肺過熱燥不能施白露下降之令故用石膏白
前赤蜜滋降秋燥杏仁橘皮枸杞根皮泄其逆滿

尤妙在 白木一味培土安金填塞壯火遊行之路
庶幾金 不受燥水能承制而無陰火土協心包逆
乘母氣 之虞設不預為籌度專力耗氣泄火未免
熱去寒 起則與時師奚擇哉

治肺熱 悶不止胸中喘急驚悸客熱來去欲死不
堪服 藥泄胸中喘氣方

桃皮 芫花 各一升

右二味 咬咀以水四斗煮取一斗五升去滓以故
布手巾 內汁中薄胸溫四肢不盈數日即歇

肺合皮 毛肺氣內壅已極不堪更以湯藥助滿故

千金方義卷十七

十一

攝業山房

用破血 導水之味漬布搭胸使藥氣內通濁氣外
泄乃奇 兵解圍之策從十三篇中悟出

橘皮湯 治肺熱氣上欬息奔喘方

橘皮

麻黃

柴胡

紫蘇

翻繁作乾 杏仁 各三兩

宿薑 各四兩

石膏 八兩

右七味 咬咀以水九升煮麻黃兩沸去沫下藥煮
取三升 去滓分三服不瘥與兩劑

肺滿上 氣喘欬本當用麻黃越婢麻杏甘石等方
慮其甘 艸大棗助滿故易橘皮紫蘇以散上奔之

氣膽欲大而心欲小之竹用略見一斑

治肺熱喘息鼻衄血方

羚羊角 元參 射干

雞蘇 芍藥 升麻

蘘皮 各三兩 生地 升切一 梔子仁 四兩

淡竹 荊雞子大一枚

右十味 咬咀以水九升煮取三升分三服須利者

下芑硝 三兩更煮三沸

衍義 肺熱喘 衄良由龍雷煽虐反侮肺金之象故用羚羊

羊入肝 散血射干入肺散氣梔子蘘皮分解干內

千金方衍義卷十七 掃葉山房

升麻雞 蘇開提於上芍藥地黃順血下注元參竹

茹抑火 前通若勢劇須利者下芑硝以急奪之自

然龍火 潛蹤金不受侮烏有喘衄之患乎

治肺熱 飲酒當風風入肺膽氣妄泄目青氣喘者

方

麻黃 四兩 甘艸 各三兩 五味子 兩

杏仁 五升 母薑 五兩 淡竹葉 升切一

右六味 咬咀以水七升先煮麻黃去沫下諸藥者

取三升 去滓分三服

衍義 前方以 梔子蘘皮佐羚羊散上溢之血升麻雞蘇

佐射干散上盛之氣此方以竹茹杏仁佐脈黃開

發肺氣五味甘艸佐母薑收攝膽泄膽寧則目青

自除風息則氣喘自已二方所宗總不出梔子蘘

皮湯麻黃連軹赤小豆湯射干麻黃湯等方之變

法

瀉肺散 治酒客勞倦或出當風喜怒氣舍於肺

而日黃腫起即頭眩欬逆上氣暗忽忽欲絕心

下茲急不能飲食或吐膿血胸膈引背支滿欲

嘔方

五味子 百部各二兩半 茯苓

附子 肉從蓉 石斛 各一兩

當歸 遠志 川續斷 各一兩

細辛 甘艸各七 防風

川椒 紫苑 桂心

乾薑 款冬各一兩半 桃仁 六十枚

杏仁 三十枚

右十九味 治下篩酒服方寸七日三後稍加至一

七

衍義 瀉肺而用紫苑款冬茯苓專為酒客溱肺而設防

風細辛杏仁專為風客於肺而設五味百部石斛

專為木盛生風而設當歸續斷桃仁專為勞倦傷
血胸痛引背而設甘艸乾薑川椒專為飲食欲吐
面目黃腫而設桂附遠志菴蓉專為起即頭眩忽
忽欲絕上感下虛而設苟非固脾腎之根本安能
任肺氣之疎泄歟

灸法

肺脹氣搶脇下熱痛灸陰都隨年壯穴在俠胃腕兩
邊相去一寸胃腕在心下三寸

肺脹脇滿嘔吐上氣等病灸大椎并兩乳上第三肋
間各七壯

肺與大腸俱實
千金方卷十七 捕葉山房

右手寸口氣口以前脈陰陽俱實者手太陰與陽明
經俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂捲肩吻
不收名曰肺與大腸俱實也

者散 治肺與大腸俱實令人氣憑滿方

麻黃

茯苓 各六分

黃芪

大青

桂心 各三分

細辛

杏仁 各五分

石膏 二兩

丹參 半兩

五味子

甘艸

橘皮

貝母

川芎 各一兩

枳實 二枚

右十五味治下篩為粗散帛裹一方寸七分以并
花水一升五合煮取七合為三服日再

邪之所湊其氣必虛故治肺與大腸俱受容邪而
實用麻黃湯及麻杏甘石湯之製以解風從火化
之熱必兼五味以收肺氣之逆黃芪以斂麻黃之
散其餘等味皆疎泄痰氣之亞耳

肺虛冷

右手寸口氣口以前脈陰虛者手太陰經也病若少
氣不足以息噓乾不津液名曰肺虛冷也

治肺虛冷聲嘶傷語言用力戰掉緩虛脊風入肺

方

防風

獨活

川芎

秦椒

乾薑

黃芪 各二十
四銖

天雄

麻黃

山黃肉

五味子 各三十

甘艸 六銖

秦朮

桂心

山藥

杜仲

八參

細辛

防己 各二十
銖

菊花

紫苑 各十
銖

貫眾 二枚

附子 七分

右二十二味治下篩以酒服方寸七分二

有石膏六分當歸五分

衍風入肺絡而致聲嘶語難用力戰掉故用麻黃附子細辛間發肺寒防已貫眾通行經脈參芪甘艸

保護肺氣雄桂椒薑協濟附子之雄防獨芍秦助

力麻辛之散萸味薯杜匡扶參芪之補甘菊紫苑

專化雄附之烈其方似乎龐雜而實井井有條各具相制之妙非洗心求之不能得其奧義

酥蜜膏酒 治肺氣虛寒痛風所傷語聲嘶塞氣

息喘億欬睡上氣通聲方

酥 崖蜜 飴糖

千金方卷十七 攝生山房

生薑汁 生百部汁 棗肉

杏仁 各一升 研 柑皮 五具 末

百八味合和微火前常攪三上三下約一炊久取

薑汁等各減半止溫酒一升服方寸七細細嚼之

日二夜一

又方

猪脛 三具 大棗 前枚

右二味以酒五升漬之秋冬七日春夏五日出布

絞去滓七日服盡二七日忌鹽羊脛亦得治欬嗽

胸脇支滿多喘上氣尤良 肘后方治久欬上氣二十餘年諸治不痊者

治肺寒損傷氣嗽及涕唾鼻塞方

棗肉 二斤 研 杏仁 二升 熬 酥

生薑汁 白糖 白蜜

生百部汁 各一升

右七味合和微火前常攪約一炊久下之細細溫

清酒服二合日二

衍肺竅為風寒所襲而致喘欬上氣語聲嘶塞故用

薑汁杏仁柑皮百部溫散肺絡之結膠節棗肉乳

酥崖蜜通行脾肺之津津回燥潤津自復矣厥後

大腸腑門通聲膏從此化出 又方專取猪胆澀

千金方卷十七 攝生山房

除痰垢大棗通行津液清酒治證如前或易羊脛

入肺尤捷 又方即酥蜜膏酒信用棗肉杏仁之

通津而去柑皮之耗氣

補肺湯 治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣

寒從背起口中如含霜雪言語失聲甚者吐血

方

五味子 三兩 乾薑 桂心

欬冬花 各二兩 麥冬 一升 桑根白皮 斤

大棗 一百枚 粳米 二合

右八味咬咀以水一斗先煮桑白皮五沸下藥煮

取三升分三服

又方 治肺胃虛寒喘之少食不能飲食

黃芪五兩 甘草 鍾乳

人參各二兩 地黃 桂心

茯苓 白石英 桑白皮

厚朴 乾薑 紫苑

橘皮 當歸 五味子

遠志 麥冬各三兩 大棗二十枚

右十八味咬咀以水一斗四升煮取四升分三服

日三夜二

千金方衍義卷七

大

掃葉山房

又方 治肺氣不足欬逆上氣牽繩而坐吐沫唾

血不能飲食方

蘇子一升 桑白皮五兩 半夏六兩

紫苑 人參 甘艸

五味子 杏仁各二兩 欬久花

射干各一兩 麻黃 乾薑

桂心各三兩 細辛一兩

右十四味咬咀以水一斗二升煮取三升半分五

服日三夜二

又方 治肺氣不足欬逆短氣寒從背起口中如

含霜雪語無聲音而渴舌本乾燥方

五味子 蘇子各一升 白石英

鍾乳各三兩 欬久花 竹葉

橘皮 桂心 桑白皮

茯苓 紫苑各一兩 麥冬四兩

生薑五兩 杏仁五十枚 粳米二合

大棗十枚

右十六味咬咀以水一斗三升先煮桑白皮粳米

大棗以米熟去滓內諸藥煮取五升分六服日三

又方 治肺氣不足心腹支滿欬喘逆上氣唾

千金方衍義卷七

大

掃葉山房

膿血胸背痛手足煩熱惕然自驚皮毛起或哭

或歌或怒乾嘔心煩耳中聞風雨聲面色白方

欬久花 桂心各二兩 桑白皮一斤

生薑 五味子 鍾乳各三兩

麥冬四兩 粳米五合 大棗十枚

右九味咬咀以水一斗二升先煮粳米棗令熟去

滓內藥煎取二升分三服溫服之 一方用白石

英二兩 廣濟有紫苑人參各二兩名紫苑湯

補肺湯五方首言寒從背起背者胸之腑肺之舍

故用乾薑桂心溫胸中之寒欬麥冬冬滋胸中之

燥五味柔皮理胸中之邪大棗粳米培胸中之氣
 溫補肺臟本寒而兼清解標熱也 其第二方兼
 溫補脾胃虛寒故用鍾乳石英薑桂之屬力助參
 芪之補氣歸地之滋血目中藏生脈以化石藥之
 悍厚朴橘皮紫苑桑皮開泄胸中之滯 其第三
 方雖證見欬吐涎沫因有胸中引急知為正虛邪
 實故於射干麻黃湯中除去大棗之戀膈參入麻
 黃湯中桂枝二味更加人參易乾薑助胃祛邪蘇
 子桑皮止逆安神乃寓補於瀉之奧旨非精熟金
 匱之法者難以語此 其第四方方下主治載之
 首方惟吐血舌乾稍為不同然方中紫苑欬麥二
 冬未嘗不治吐血但易生薑加竹茹專為舌乾起
 見必其人形神羸瘠以故參之第二方中石英鍾
 乳兼溫脾胃二經也 其第五方良由金衰不能
 制木木邪橫干諸藏方下所云心腹支滿濁陰逆
 上也欬逆上氣唾膿血胸中痛火逆上乘肺位也
 手足煩熱四肢為諸陽之本也惕然自驚邪干心
 包也皮毛起或哭邪干肺也或歌邪干脾也或怒
 木邪自暴也乾嘔邪干胃也煩心邪干膈中也耳
 聞風雨聲陰邪上走腎竅也難證見諸經受邪總

千金方衍義卷七
 主
 抄葉山房

以收攝虛陽兼清旺氣為主方中鍾乳桂心五味
 非收攝虛陽之用乎欬麥二冬桑皮薑棗粳米非
 兼清旺氣之用乎合五方論之可見補正必需辛
 溫散標不離清潤

麻子湯 治肺氣不足欬唾膿血氣短不得臥方

麻子 一升 桑皮 各一兩 錫 各一兩

桂枝 人參 各二兩 阿膠

紫苑 各一兩 生薑 三兩 乾地黃 四兩

右九味咬咀以水一斗五升合煮取四升分五服

此方甘艸湯之變方因欬唾血膿肺中津傷故用

千金方衍義卷七
 主
 抄葉山房

人參阿膠地黃麻仁以滋津血之燥生薑桂枝以

散肺氣之結紫苑即甘艸之變味桑皮即麥冬之

變味錫糖則大棗之變味耳

錫煎 治肺氣不足咽喉苦乾方

作餵任多少取乾棗一升去核熟搗水五升和

使相得絞去滓澄去上清取濁者內飴中攪火

上煎勿令堅令連連服如雞子大漸漸服之日

三夜二

衍 肺胃一氣貫通肺氣不足實由胃中津枯不能上

滋於肺所以咽喉苦乾但取建中湯中之二以資

胃氣而助蒸化之力也

治肺風氣萎絕四肢滿脹喘逆胸滿方

灸肺膈各二壯肺膈對乳引繩度之在第二椎

下兩傍相去各二寸五分

肺與大腸俱虛

右手寸口氣口以前脈陰陽俱虛者手太陰與陽明

經俱虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或

如恐怖名曰肺與大腸俱虛也

小建中湯 治肺與大腸俱不足虛寒乏氣小腹

拘急腰痛羸瘠百病方

千金要方卷七

大棗十二枚

生薑

桂心各三兩

甘艸二兩

芍藥六兩

右五味咬咀以水八升煮取三升去滓合飴糖入

兩煮三沸分三服肘後用黃芪人參各二兩名黃芪建中湯

桂本血藥而辛溫散邪恐其動血故以芍藥護持

榮氣不使隨桂外泄得甘艸之甘溫而和寒熱諸

邪薑棗之辛甘而和榮衛諸氣為風傷衛之首方

參入膠飴一味取稼穡之甘便為建中專藥所以

寒傷榮之天中脈微虛寒之裏氣不足咸賴乎此

允為虛羸和解中外之聖法

肺勞第三論一首 方三首

論曰凡肺勞病者補腎氣以益之腎王則感於肺矣

人逆秋氣則手太陰不收肺氣焦滿胸之則生逆之

則死順之則治逆之則亂反順為逆是為關格病則

生矣

麻黃引氣湯 治肺勞實氣喘鼻張而目苦腫方

麻黃

杏仁

生薑

半夏各五分

紫蘇四分

白前

細辛

桂心各三分

橘皮二分

石膏八兩

竹葉升切一

千金要方卷七

右十一味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服

義勞役而邪并於肺故用金匱厚朴麻黃湯中麻黃

石膏杏仁細辛以泄肺滿澤漆湯中半夏生薑白

前桂心以滌痰垢參入紫蘇橘皮竹葉以助麻黃

半夏石膏之力引清氣上升濁氣下降喘息而腫

隨手可瘥矣

半夏湯 治肺勞虛寒心腹冷氣逆氣胸脇氣滿

從胸達背痛飲食即吐虛乏不足方

半夏一升

生薑一斤

桂心四兩

甘艸

厚朴各二兩

人參

橘皮

各三兩

右八味咬咀以水一斗煮取四升分四服腹痛加

當歸二兩

勞乏而胸中陽氣不布濁陰上攻逆滿原非本虛

之謂故用參桂薑半温中麥冬甘艸滋肺即兼厚

朴橘皮開泄滯氣胸中陽氣得人參得桂守護之

力則濁陰不復上僭矣

厚朴湯 治肺勞風虛冷痰澀水氣晝夜不得臥

頭不得近枕上氣胸滿喘息氣絕此痰水盛溢

方

千金要方卷十七

黃

補葉山房

厚朴

麻黃

桂心

黃芩

石膏

大戟

橘皮

各二兩

枳實

甘艸

秦艸

杏仁

茯苓各三兩

細辛

二兩

半夏一升

生薑十兩

大棗

十五枚

右十六味咬咀以水一斗三升煮取四升去滓分

五服

痰澀水氣積於胸中不能眠臥故柔採金匱射干

麻黃湯厚朴麻黃湯澤漆湯中泄肺諸味參入大

戟與射干澤漆味雖變而功用不殊其餘枳橘茯

苓秦艸不過為麻朴薑半之佐輔苟不知金匱之

淵源無以推千金之發派

治喉痺氣逆欬嗽口中唾涎方

灸肺膈七壯亦可隨年至百壯

氣極第四論一首 方六首

論曰凡氣極者主肺也肺應氣氣與肺合又曰以秋

過病為皮痺皮痺不已復感於邪內舍於肺則寒溫

之氣客於六腑也若肺有病則先發氣氣上衝胸常

欲自恚以秋庚辛日傷風邪之氣為肺風肺風之狀

千金要方卷十七

黃

補葉山房

多汗若陰傷則寒寒則虛虛則氣逆欬欬則短氣暮

則甚陰氣至濕氣生故甚陰畏陽氣晝日則嗟若陽

傷則熱熱則實實則氣喘息上胸臆甚則唾血然陽

病治陰陰是其裏陰病治陽陽是其表是以陰陽表

裏裏王之源故知以陽調陰以陰調陽陽氣實則決

陰氣虛則引善治病者初入皮毛肌膚筋脈則治之

若至六腑五臟半死矣

扁鵲曰氣絕不治喘奔 作而冷汗出二日死氣應手

大陰大陰氣絕則皮毛焦氣先死矣

鍾乳散 治氣極虛寒陰畏陽氣晝蹇暮甚氣短

息寒亦治百病令人力強能飲食去風冷方

鍾乳 別研

乾薑

桔梗

茯苓

細辛

桂心

附子

人參 各一兩

白朮 一兩

防風

桔萸根

牡蠣 各一兩

右十二味治下篩酒服方寸七目三漸加至二七

五十以上可數服得力乃止 翼方云有冷加椒有熱加苓各三兩

義氣極虛寒而用鍾附薑桂細辛參苓白朮世所其

能反用桔防之耗氣桔萸之化熱牡蠣之斂陰人

所其味曷知耗氣專為救本化熱專為散標斂陰

千金方卷七

掃葉山房

專為復陽能達此義則鍾乳白朮之反激亦可從

此聆悟矣腎臟門中寒食鍾乳散即此

黃芪湯 治氣極虛寒皮毛焦津液不通虛勞百

病虛損力乏方

黃芪 四兩

人參

白朮

桂心 各二兩

生薑 八兩

大棗 十枚

附子 三十錢

右七味咬咀以水八升煮取二升去滓分四服

衍前方兼治標熱故須耗氣斂陰此方專力救本所

以純用溫補但加薑棗以和榮衛通津液也

大露宿丸 治氣極寒痺不已內舍於肺寒氣入

容於六腑腹脹喘滿寒冷積聚百病方

礞石 時後作礞石

乾薑

桂心

皂莢

桔梗

附子 各三兩

右六味為末蜜丸如梧子大酒服十九日三漸加

之慎熱炙火等

衍義見前第十六卷痼冷積熱門

硫黃丸 治氣極虛寒滯飲胸中痰滿心腹痛氣

急不下飲食方

硫黃

礞石

乾薑

千金方卷七

掃葉山房

附子

烏頭

桂心

細辛

白朮

桔梗

茯苓 各二兩

右十味為末蜜丸如梧子酒服十九日三漸加之

以知為度 時後無白朮桔梗茯苓用柴芩黃川椒

冷夏月溫飲食不解衣者

義硫黃專化陰毒礞石專攻堅癖餘皆辛熱破積峻

味惟桔梗茯苓為化熱毒之用

大前胡湯 治氣極傷熱喘息衝胸常欲自恚心

腹滿痛內外有熱煩嘔不安方

前胡 八兩 半夏 麻黃

芍藥 各四兩 生薑 五兩 黃芩 三兩

枳實 四枚 大棗 十二枚

右八味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

義 氣極傷熱而用前胡麻黃開發於外半夏枳實消

豁於內芍藥黃芩清解於中生薑大棗兼和中外也

竹葉湯 治氣極傷熱氣喘甚則唾血短乏不欲

食口燥咽乾方

竹葉 二升 麥冬 小麥

生地 各一升 生薑 石膏 各六兩

麻黃 三兩 甘艸 一兩 大棗 十枚

右九味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服

行 氣極傷肺而至喘乏唾血用越婢全方以治吐氣

惟恐津血愈傷故加竹葉以清喘乏冬地以滋津

血小麥以除臟燥然小麥入於越婢方中則與厚

朴麻黃湯中匡佐麻黃石膏發越內動肝風無異

灸法

嘔吐上氣灸尺澤不三壯則七壯尺澤在腕後肘中

橫文

腹中雷鳴相逐食不化逆氣灸上腕下一寸名太倉

七壯

積氣第五 論一首 方五十一首 灸法二十四首

論曰七氣者寒氣熱氣怒氣志氣喜氣憂氣愁氣凡

七種氣積聚堅大如杯若積在心下腹中疾痛不能

飲食時來時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生

寒氣即嘔逆惡心熱氣即說物不竟而迫怒氣即上

氣不可忍熱痛上搶心短氣欲死不得息志氣即積

聚在心下不得飲食喜氣即不可疾行不能久立憂

氣即不可劇作暮臥不安愁氣即喜忘不識人語置

物四方還取不得去處若聞急即四肢崩腫手足拘

攣捉不能舉如得病此是七氣所生男子卒得飲食

不時所致婦人即產後中風諸疾也

七氣丸

烏頭 大黃 各七分 紫苑

半夏 前胡 細辛

丹參 茯苓 川芎

桃仁 胡洽 芍藥 石膏

吳茱萸 杏仁 桂心 桔梗 各三

人參 甘艸 防葵 各一

乾薑 川椒各半

右二十味為末蜜丸如梧子大酒服三九日三加至十九 一方去半夏加日遂三分 佛治無月參半

七氣丸 主七氣七氣者寒氣熱氣怒氣志氣喜氣憂氣愁氣此之為病皆生積聚堅牢如杯心

腹絞痛不能飲食時去時來發則欲死凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀恍惚眩目失精怒氣狀不可當熱痛上澀心短氣欲絕不得息志氣狀積

聚心滿不得食飲喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作臥不安席愁氣狀平故如怒喜忘

四肢附腫不得舉止亦治產後中風餘疾方

大黃一兩 人參 半夏 柴胡 乾薑

細辛 桔梗 菖蒲各二分

茯苓 川芎 甘艸

川椒一用 石膏 桃仁各三分

右十五味為末蜜丸如梧子大每服酒下三九日三服漸加至十九 翼方無茯苓川芎 七氣丸首方雖用參桂薑半甘艸之屬以治憂愁 蓋耗諸氣猶恐辛溫之力不建不能治寒熱志怒

諸氣所以更加烏黃椒辛助大黃防葵以破結桃

芎丹苑以和血前結菖苓以散氣石膏一味專泄旺氣耳 其第二方較前用法稍緩不用烏頭助

葵之峻力破結裁去紫苑丹參之紆緩紛靡又以柴胡之升散易前胡之降泄試見筋攣不舉而無

大吐嘔逆不妨以桂心之溫血易川椒之下氣未為不可

七氣湯 治寒氣熱氣憂氣勞氣愁氣或飲食為膈氣或勞氣內傷五臟不調氣衰少力方

乾薑 黃芩 厚朴深師作桂心

半夏 甘艸 地黃 芍藥 枳實五枚 人參一兩 吳萸五合

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服日三又方 治虛冷上氣勞氣等方

半夏一升 人參 生薑

桂心 甘艸各一兩

右五味咬咀以水一斗煮取三升分三服日二 湯丸主治有暴久微甚之分久而劇者非丸無以克應暴而虛者湯液便可守通七氣湯首方用椒

薑黃半散結人參甘艸助氣則與九方無異若其人素稟血熱則兼芍地以化薑椒之燥芩蘘以清肺胃之熱枳朴以滌內積之氣也一其第二方不用椒黃而用桂心不用乾薑而用生薑以助半夏人參甘艸之力以無標熱濁積故不用餘藥所以和劑局方取此以為七氣之法

五膈九 治憂膈食膈飲膈氣膈勞膈五 主

咸以憂患思慮飲食得之若冷食及生菜便發其病苦心滿不得氣息引背痛如刺之狀食則

心下堅大如粉絮大痛欲吐吐即瘥飲食不得

千金衍義卷七

聖 掃葉山房

下甚者及手足冷上氣欬逆喘息短氣方

麥冬 甘艸各五兩 人參 四兩

川椒 遠志 桂心

細辛 附子 乾薑 一兩

右九味為末蜜丸微使淖先食含如彈丸一枚細

細咽之喉中胸中當熱藥力稍盡復含一丸日三

夜二服藥十日愈 延年方云若不能含者可分一

增麥冬甘艸人參胡洽云亦可作梧子大小九酒

服之經心錄以吳茱代桂心酒下如梧子五九空

腹服之如寒冷則心痛咽中有物 吐之不出咽之不下食飲少者 噎之與膈本同一氣膈病之始靡不由噎而成原

其大槩不外乎鬱故張雜峯以為神思開病其受

病之源非止一端嘗攷五噎之中獨多思噎五膈

之中獨多飲膈每見多思慮人每患氣噎經謂思

則氣結是也好熱飲人每患酒膈丹溪謂之死血

是也然血膈亦非止一端往往有勇力過甚血苑

於胃阻礙飲食成膈者即如靈樞蟲為下膈亦不

過言下膈有此一證若天命門火衰不能溫養土

藏食時乃出者得非下膈之證乎而素問又有

三陽結謂之膈言小腸大腸膀胱之津血俱結如

廁澀難下不通而上逆勢所必然所以五膈丸中

千金衍義卷七

聖 掃葉山房

不用黃米荅橘之燥而用麥冬上滋肺氣甘艸中

安胃氣遠志下通腎氣上下交通何有阻膈之患

乎其方雖列肺臟而飲食不下膈塞不通邪在胃

脘其間所用椒辛薑桂附子人參等味却與五噎

丸中不異也

治結氣冷癥積在脇下及脚氣上入小腹腹中脹

滿百病方

大蒜去皮三升搗令極熟以水三升和令調

絞取汁更搗餘滓令熟更以水三升和令調絞

取汁更搗餘滓令熟更以水三升和令調絞取

汁合得九升所得滓可桃顆大棄之以微火煎
取三升下牛乳三升合煮取三升旦起空腹一
頓溫服令盡至申時令三日服一劑三十日服
十劑止

大蒜煎 治疝瘕積聚冷癖痰飲心腹脹滿七氣

咳嗽刺風風癩偏風半身不遂腰疼膝冷氣息

否塞百病方

蒜六斤四兩去皮切水

酥一升內
蒜汁中

牛乳二升

葶芩

胡椒

乾薑各三兩

石蜜

阿魏

千金要方卷十七

薑

攝業山房

戎鹽各二兩

石菖蒲

木香各一兩

乾胡桃 四兩

右十二味為末內蒜汁中以銅器微火煎取一斗

空腹酒下一兩五日已上稍加至三兩二十日覺

四體安和更加至六兩此治一切冷氣甚良

術氣穢濁用以治穢濁之疾同氣相感之用然在

藜藿之人為當若素稟清癯者用之反傷清純之

氣良非所宜 其大蒜煎治諸冷癖疝瘕否塞百

病用椒薑草魏木香菖蒲胡椒之烈以破積結牛

乳乳酥石蜜戎鹽佐胡桃之潤以化辛烈也

桔梗破氣九 治氣上下否塞不能息方

桔梗

橘皮

乾薑

厚朴

枳實

細辛

葶藶各三分

吳茱

白木各六分

胡椒

川椒

烏頭各七分

葶芩十分

人參

桂心

附子

茯苓

前胡

防葵

川芎各五分

甘艸

大黃

檳榔

當歸各八分

右二十四味為末蜜九如梧子大每服酒下十九

日三有熱者空腹服之

千金要方卷十七

薑

攝業山房

上下否塞不能布息故用桔梗橘皮前胡以散痞

防葵葶藶大黃以蕩實檳榔枳實厚朴以泄滯烏

頭附子細辛以破結川椒吳茱胡椒葶芩以下氣

乾薑桂心以溫中川芎當歸以和血人參白朮茯

苓甘艸以安正氣而助藥力也

檳榔湯 治氣實苦積聚不得食息方

檳榔三七枚

附子一枚

半夏一升

細辛一兩

乾薑八兩

大黃

柴胡各三兩

橘皮

紫苑

柴胡各三兩

橘皮

甘艸、紫蘇冬用、茯苓各二兩

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服相去如人行十里久若有瘕結堅實如石加鯨甲三兩防葵二兩氣上加桑皮切二升枳實厚朴各二兩消息氣力強弱進二劑後隔十日更服前桔梗破氣丸

〔衍〕金匱大黃附子湯本治寒積腸下偏痛發熱脈紫並干金參入半夏生薑茯苓甘艸橘皮紫蘇紫苑柴胡枳榔等味總皆大黃附子細辛三味之輔佐耳

千金方義卷七 姜 掃葉山房

治積年患氣發作有時心腹絞痛忽然氣絕腹中堅實醫所不治復謂是蠱方

枳實大者四枚 附子一枚 半夏一升 柴胡三兩 生薑八兩 橘皮

甘艸 桂心 當歸 枳實各二兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服五日一劑服三劑永除根本

〔衍〕患氣者積氣也方用薑半橘皮以散氣附桂當歸以破血積榔枳實以泄滿柴胡甘艸以和諸藥之

性也 半夏湯 治逆氣心腹滿氣上衝胸脇痛寒冷心

腹痛嘔逆及吐不下食憂氣結聚方 半夏一升 生薑 桂心各五兩

橘皮四兩 右四味咬咀以水七升煮取三升分四服日三夜

一人強者作三服亦治霍亂後吐逆腹痛 此方專以破氣為主故於七氣湯中除去人參甘

艸易入橘皮以破滯氣即前治積年患氣中四味專破血結痰積也

千金方義卷七 姜 掃葉山房

貝母湯 治上氣咽喉窒塞短氣不得臥腰背痛 胸滿不得食面色黃菱方

貝母一兩 生薑五兩 桂心 麻黃 石膏 甘艸各二兩

杏仁三十枚 半夏五合

右八味咬咀以水一斗煮取三升分三服日三劑喉窒塞胸滿必是寒鬱熱邪不得發越故用麻

杏石加薑半以滌痰涎桂心以通血脈貝母以清肺氣雖云輔佐實緩麻黃石膏之性耳 麻黃湯 治上氣脈浮欬逆喉中水雞聲喘息不

通呼吸欲死方

麻黃八兩 甘草四兩 大棗三十枚

射于如博基子二枚

右四味咬咀以并泉水一斗煮麻黃三沸去沫內

藥煮取四升分四服日三夜一

衍於射干麻黃湯中除去生薑半夏細辛五味紫苑

款冬但加甘艸一味以和中氣也

奔氣湯 治太氣上奔胸膈中諸病發時迫滿短

氣不得臥劇者便情欲死腹中冷濕氣腸鳴相

逐成結氣方

千金方義卷七

五

掃葉山房

生薑一斤 半夏各一升 吳茱萸各一升

桂心五兩 人參各三兩 甘草各三兩

右六味咬咀以水一斗煮取三升分四服

衍此卽五味七氣湯加吳茱萸以降逆氣也

枳實湯 下氣治胸中滿悶方

枳實三枚 附子二枚 大棗十四枚

半夏五兩 人參 甘草

白朮 乾薑 厚朴各二兩

右九味咬咀以水七升煮取二升半每服八合日

三

衍於附子埋中湯加枳半厚朴以祛濁痰大棗以通

津液

下氣湯 治氣滿腹脹方

半夏一升 生薑一斤 人參一兩

橘皮三兩

右四味咬咀以水七升煮取三升去滓分三服日

三一方無人參止三味

衍此卽大半夏湯去桂心之溫散加人參以助藥力

治氣兩脇滿急風冷方

杏仁 茯苓各八兩

千金方義卷七

五

掃葉山房

吳茱萸 橘皮 桂心

防風 澤瀉各五分 白朮

射干 芍藥 蘇子

桔梗 枳實各六分

右十四味爲末蜜丸如梧子大酒服十九日二加

至三十九

衍風冷攻注兩脇故用杏仁桔梗防風開發於上防

萎射干枳實芍藥降泄於下茱萸桂心溫散於中

茯苓澤瀉白朮橘皮分清於內也

訶黎勒丸 治氣滿閉塞不能食喘息方

河黎勒十枚為末蜜丸如梧子大食服三丸不
忘得利即止

義金匱治氣痢失氣用訶黎勒粥飲澀以收之千金

治氣需喘息用訶黎勒蜜丸潤以斂之蓋得粥則
引入脾經以治痢下氣泄得蜜則引入肺經以治
喘息氣上各得引經之妙用耳

治上氣欬逆方

蘇子一升 五味子五合 麻黃

細辛 紫苑 人參

黃芩 甘艸各二 桂心

千金方義卷十七 早 掃葉山房

當歸各一 生薑五兩 半夏三兩

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服

衍於小青龍湯中用當歸以易芍藥生薑以易乾薑

加人參以助半夏之運痰蘇子以輔麻黃之泄氣

紫苑以佐細辛之散結黃芩斂生薑之辛散也

治氣上不得臥神祕方

橘皮 生薑 紫蘇

人參 各五兩一 王步方作枳殼

右五味咬咀以水七升煮取三升分三服

衍橘皮生薑紫蘇皆散氣之品得人參五味之固斂

不使津隨氣泄乃散中用斂之捷法惟千金得之
治熱發氣上衝不得息欲死不得臥方

桂心 半兩 白石英 麥冬

枳實 白蘇皮 貝母

茯苓 檳榔仁 天冬 各二兩半

車前 二兩 人參 前胡

橘皮 白薇 杏仁 各一兩半

郁李仁 三兩 桃仁 五分

右十七味為末蜜丸如梧子大以竹葉飲服十九

日三加至三十九

千金方義卷十七 早 掃葉山房

竹葉飲子

竹葉 蘇子 各一 紫苑

白前 各二 百部 甘艸

生薑 各三兩

右七味咬咀以水八升煮取三升溫服下前九藥

盡更合

衍本虛邪實故用桂心石英人參茯苓神天麥二冬固

本滋津前杏橘貝白薇白蘇疎肺泄氣檳榔車前

郁李桃仁分調血氣而順下之 更以竹葉飲子

清潤諸味但加生薑之辛散而下前九上下開泄

其氣也

人參湯 安食下氣理胸脅并治客熱方

人參 麥冬 乾薑

當歸 茯苓 甘草

五味子 黃芪 芍藥

枳實各二兩 桂心 半夏一升

大棗十五枚

右十三味咬咀以水九升煮取三升去滓每服九

合從旦至晡令盡皆熱服慎勿冷

方中參芪甘艸麥冬五味保元生脈之製也更兼

大生方義卷十七

望

掃葉山房

乾薑桂苓枳半大棗理中運痰當歸芍藥以和榮

血也

海藻橘皮丸 下氣治風虛支滿膀胱虛冷氣上

衝肺息奔令咽喉氣悶往來方

海藻 橘皮 白前各三分

杏仁 茯苓 芍藥

桂心各五分 蘇子五合 棗肉

桑白皮 昆布各二兩 吳萸

人參 白朮 葶藶各一兩

右十五味為末蜜丸如梧子大飲服十九日二加

至十五九以小便利為度

海藻昆布葶藶皆破水滌痰伐腎之猛劑佐以蘇

子杏仁橘皮白前桑皮泄肺諸品不得以參木

萸桂苓芍棗肉以安中氣之崩迫也

治氣上方

礪砂 細辛 牛膝等分

右三味為末氣發酒服方寸匕後三日忌酒餘禁

如藥法

氣上而用細辛牛膝從陰引陽病在上取之下也

其礪砂雖有破積攻堅噎膈反胃之治然毒烈不

大生方義卷十七

望

掃葉山房

減礪礪當是礪砂之誤字蹟相類性味相仿同為

柔五金去垢膩噎膈積聚之用但性稍遜而無化

人心為血之利害也

治上氣方

上酥一升 獨頭蒜五顆

右二味先以酥煎蒜黃出之用生薑汁一合其

煎令熟空腹溫服一方寸匕

前治結氣冷癥在脇下用蒜汁牛乳此用獨頭蒜

乳酥加薑汁以辟臭氣通神明似勝於前與大荔

方中用乳酥乾薑同意

治上氣嘔吐方

芥子二升為末蜜九寅時以井花水服如梧子
七九日二亦可作散空腹服之及有酒浸服并

治臍下絞痛

治勞氣方

小芥子三升搗末絹袋盛酒三斗浸密封七日

去滓溫服半升漸至一升半酒盡更合忌如藥

法

衍芥子辛溫專治脇下及皮裏膜外之痰恐其性暴
義易散故以蜜丸酒服緩行其勢 或搗末酒浸但

千金方衍義卷七 嵩 掃葉山房

取氣味不用其滓尤得峻味緩攻之妙

治上氣三十年不瘥方

大棗

杏仁 各百枚

豉 一百二十粒

川椒 二百粒

右四味先搗杏仁豉令熟後內棗椒更搗為丸如

棗核大含稍稍咽之曰三夜一

衍川椒散冷氣杏仁散結氣香豉去惡氣大棗和中
義氣邪氣散而正氣安矣

治積年上氣不瘥垂死者方

菘蓂子

熬令色變

熟羊肝 薄切 曝乾

右二味各搗等分以七月七日神醉并合相著夜

勿食空腹服二方寸七須臾拾瓊兩食頃以冷漿

白粥一七止之隔日一服永瘥四十日內得煮飯

汁作蕪菁美食之已外一切禁斷

衍今世以菘蓂根治噎膈反胃取其性走以劫痰垢
義宿滯然性稟陰毒煮熟尚能生芽能使痰迷心竅

令人狂惑見鬼不可不慎用羊肝者取其引入血

分用酢拌者恐其惑亂神識故取酸收之義

下氣方

生薑

五兩

小麥 二升

千金方衍義卷七 嵩 掃葉山房

右二味以水二升煮取一升頓服

又方

大棗 十四枚

紫蘇莖葉 切一升

右二味以酒三升煮取一升半分再服水煮亦得

一方加橘皮半兩用橘皮則後無柴

衍生薑散氣小麥安中不使木邪反干肺氣 又方

以紫蘇散氣大棗安中與生薑小麥同具散安之

用

治氣方

桃皮二升去黃者咬咀以水五升煮取三升每

服一升瘥止

又方

驢脂二合酒服日二瘥止

又方

黃牛乳二升煎取一升和生乳一升空腹服之

日二

又方

驢乳初服三合三日後服五合後至七合七日

後至一升忌葵菜猪魚油等

又方

尿空腹服百日即止治一切病

又方

烏牛尿空腹服日再至三升止

衍桃根皮辟邪散血 驢脂動風以為祛風之嚮導

黃牛乳補虛止渴治噎膈反胃大便燥結 驢

乳與牛乳同類兼能滋化風熱 童尿治噎膈火

逆上嘔下結 烏牛尿專滌垢膩噎膈脹閉者宜

之

補氣虛逆方

大棗 三升

相皮 去膜 十具

乾薑 二兩

地黃 八兩

右四味治下篩酒四升漬棗三宿漉出棗取酒為

炊汁將棗內瓶中微火蒸令棗膏入釜中酒裏煎

酒令至二升許候棗只存皮核乃止火貯器中將

前散及熱下攪令調大略與糖相似酒服二合日

再此方非止補氣亦通治一切短氣并形體羸瘦

神良

衍大棗滋運脾津柑皮利腸中熱毒乾薑治胸滿欬

逆地黃治傷中血痺 取柑皮以行大棗之滯地

黃以滋乾薑之烈

大補氣方

地黃 五兩

秦椒

甘艸 各一兩

骨皮

乾薑

昆布 各四兩

白朮

桂心

人參

厚朴

海藻 各三兩

羊腎 一具去膏

羊肚 治如食法

右十三味治下篩內羊肚中合腎縫塞肚口蒸極

熟為度乘熱未白合搗取肚腎與藥為一處曝乾

更搗為散酒服方寸七日二

衍陽根於陰補氣必先滋而後取地黃以滋薑桂

秦椒之燥以濟參朮甘艸厚朴之溫以助羊牝羊
腎之補以化海藻昆布之毒以佐骨皮清解標熱
壯氣也

白石英散 明目利小便治氣及補五勞七傷無

所不治方

煉成白石英十兩 白石英無多少以鍾子權上
黃赤者惟取白淨者為佳協倫磁器中研令極
細熟以生絹袋於銅器中水飛盡如作粉法如
此三度研訖澄之漸澗去水水盡至石英曝乾
看中有粗惡不淨者去之堪用者更研使熟白
絹袋盛著磁碗中以磁碗蓋之於三斗米下蒸
之以飯熟訖取出取曬之使乾更於磁器中研之
成

千金方衍義卷七

掃葉山房

澤瀉 茯苓 橘皮 各一兩

免絲子 三兩

右七味治下篩總於磁器中研令相得重篩酒服

方寸七日二不得過服慎猪魚鵝鴨蒜酢滑

肺氣虛寒已極必需白石英為君佐以菴蓉免絲

引領虛陽歸宿下元不使上浮喘滿其餘石斛澤

瀉茯苓楮皮通解石英之性耳

白石英丸 補養肺氣方

白石英 陽起石 磁石

菴蓉 地黃 各二兩半

栝藎根 石斛 白朮

五末子 各二兩 防風 巴戟 各五

桂心 人參 各一兩 蛇牀子 各半

右十五味為末蜜丸如梧子大酒下十五丸加至

三十九日二服

方中磁石專解石英陽起石之慄悍地黃專助免

絲菴蓉之滋精防風專鼓人參白朮之益氣石斛

專輔巴戟之強陰栝藎根專化桂心之辛熱五味

子專收蛇牀之燥烈用藥之奧全在配合得宜不

可拘於藥性或隨佐使或相反激或用和解或寒

千金方衍義卷七

掃葉山房

因寒用熱因熱用或補中寓瀉瀉中寓補或寒熱

交錯補瀉雜陳種種各具至理非熟擅金匱子全

之法者難以語此

補傷散 治肺傷善泄欬善驚恐不能動筋不可

遠行膝不可久立汗出鼻乾少氣喜悲心下急

痛痛引胸中臥不安席忽忽喜夢寒熱小便赤

黃目不能遠視唾血方

天冬 升 防風 澤瀉

人參 阿膠 各一兩 栝藎根

前胡 芍藥 石膏

乾薑

大豆卷各二兩

紫苑

白薇各一兩

桂心

白朮各四兩

地黃

甘艸

山藥

當歸各二兩半

右十九味治下飭食前酒服方寸七日三

此金匱薯蕷丸之變方除一十三味相同外其天

冬乃麥冬之變味柴胡乃前胡之變味澤瀉乃茯

苓之變味枯藁根乃杏仁之變味石膏乃桔梗之

變味紫苑乃川芎之變味惟麴棗二味無可變味

裁汰未為不可

千金方衍義卷七

至

掃葉山房

理氣九 治氣不足方

杏仁

桂心各一兩

乾薑

益智仁各二兩

右四味為末蜜丸如梧子末食服三九以知為度

理者補不足而損有餘也杏仁散肺氣桂心助肝

氣乾薑溫脾氣益智收腎氣補火以生土也

治冷氣氣短方

蜀椒五兩絹袋盛酒一斗浸二七日服之任意

多少

蜀椒溫中下氣能使遊火下達命門而本經治欬

逆不獨主下氣也以其性稟五行氣辛能升味厚

能降周身上下無所不至一切虛寒逆乏無不宜

之

治讀誦勞極疲乏困頓方

酥

油

酒

白蜜各二升

右五味合銅器中微火煎二十沸下之為準七日

七夜服令盡宜慎生冷

又方

人參

甘艸

茯苓

千金方衍義卷七

至

掃葉山房

當歸各二兩

川芎

芍藥

地黃

黃芪

骨皮各三兩

大棗二十枚

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服 一方

桂心三兩

誦讀過勞氣傷聲瘖但需滋其氣道聲音自復方

後垂戒宜慎生冷者恐其閉遏清陽之氣耳 若

其人本元素虧又當從事參芪甘艸以保元芎歸

芍地以滋血茯苓骨皮以清火大棗以滋脾家之

津液也

治平短氣方

搗韭汁服一升立瘥肺後方治卒上氣喘息便欲死

治乏氣方

生薑

枸杞葉各二兩

右二味咬咀以水三升煮取一升頓服

治年少房多短氣方

豉七合

梔子十四枚

右二味以水二升煮豉取一升半去豉內梔子取

八合服半升不瘥更服

死血留泊於肺胃而卒然短氣者用生韭汁之辛

千金方卷十七

掃葉山房

以散之。暴寒襲於會屬而卒然氣之聲啞者生

薑汁之辛兼枸杞葉之苦以散之。少年房多短

氣虛火上浮者取豉下通腎氣梔子上散虛陽若

病人舊有微滯者則長沙有不可用之之戒設或

腎中真陽素虧而喘息短氣又當從事辛溫納氣

歸源之法矣

灸法

凡上氣冷發腹中雷鳴轉嘔逆不食灸太衝不限

壯數從痛至不痛從不痛至痛止

上氣厥逆灸胸臆百壯穴在兩乳間

胸臆中氣灸關膈百壯屬各一寸半名關膈

心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下

食不消腸鳴泄利灸太倉百壯大倉穴一名胃募在

一寸

結氣囊裏鍼藥所不及灸胃募隨年壯胃募二穴從

乳頭度至臍中屈去半從乳下行度頭是穴

下氣灸肺膈百壯 又灸太衝五十壯

且臍下絞痛流八陰中發作無時此冷氣灸關元百

壯穴在臍下三寸

短氣不得語灸天井百壯穴在肘後兩筋間 又灸

千金方卷十七

掃葉山房

大椎隨年壯 又灸肺膈百壯 又灸肝膈百壯

又灸尺澤百壯 又灸小指第四指間交脈上七壯

又灸十指頭合十壯

少年房多短氣灸鳩尾頭五十壯 又鹽灸臍孔中

二十七壯

之氣灸第五椎下隨年壯

論曰凡卒厥逆上氣氣攻兩脇心下痛滿淹淹欲絕

此為奔豚氣即急作湯以浸兩手足數數易之

奔豚灸氣海百壯穴在臍下一寸半 又灸關元百

壯穴在臍下三寸

奔豚灸期門百壯穴直兩乳下第一脇端傍一寸五分

奔豚腹腫灸章門百壯章門一名長平穴在大橫外

直脇季脇端

奔豚腹腫不得息灸中極五十壯中極一名玉泉穴

在臍下四寸

奔豚上下腹中與腰相引痛灸中府百壯穴在乳下

三肋間

奔豚上下灸四滿二七壯穴俠丹田兩傍相去三寸

即心下八寸臍下橫文是也

千金方義卷七

書

掃葉山房

肺痿第六論一首

論曰寸口脈數其人病欬口中反有濁唾涎沫出何

也師曰此為肺痿之病何從得之前曰病熱在上焦

因欬為肺痿或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利

數或從便難數破駛藥下重亾津液故得肺痿又寸

口脈不出而反發汗陽脈早索陰脈不澀三焦踟躕

入而不出陰脈不澀身體反冷其內反煩多唾唇燥

小便反難此為肺痿傷於津液便如爛瓜下如豚腦

但坐發汗故也其病欲欬不得欬欬出乾沫久久小

便不利其脈平弱肺痿唾涎沫而不欬者其人不渴

必遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師曰肺痿欬唾咽燥欲飲者自愈自張口者短氣也

甘艸乾薑湯 溫臍治肺痿多涎唾小便數肺中

冷必眩不渴 若渴者屬消渴法 不欬上虛下不能制澀

方

甘艸 四兩 乾薑 二兩

右二味咬咀以水三升煮取一升半去滓分二服

服此湯已小溫覆之集驗肘後有大棗十二枚

甘艸湯 治肺痿涎唾多出血心中溫溫液液方

翼方名

千金方義卷七

書

掃葉山房

溫液湯 甘艸二兩咬咀以水三升煮取一升半去滓分

三服

衍 金匱云熱在上焦因欬而為肺痿又云肺痿吐涎沫而欬痞其人不渴必遺尿小便數所以然者上

虛不能制下故也此為肺中冷必眩多涎唾甘艸

乾薑湯溫之方用炙甘艸溫肺兼乾薑以搜逐寒

涎也 若心下溫溫液液欲吐不吐單用甘艸一

味溫涌肺絡寒涎不煩乾薑搜逐之力服甘艸乾

薑湯渴者屬消渴又當從白虎加人參例治也

生薑甘艸湯一治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴

生薑 五兩 甘艸 四兩 人參 三兩

大棗 十二枚

右四味咬咀以水七升煮取三升去滓分三服

行 肺痿日久胃氣并虛雖用甘艸不得人參協助之

力無以建溫肺之功且津氣既衰不能勝乾薑之

燥故易生薑散肺之結佐以大棗運脾之津土沃

金生虛則補其母上皆屬寒主治若屬熱者則有

炙甘艸湯麥門冬湯白虎加人參湯等法在三陽

千金方卷十七 肺痿山房

之反智者自能領悟也

麻黃湯 治肺脹欬而上氣咽燥而喘脈浮者心

下有水方

麻黃 芍藥 生薑 仲景用 乾薑

細辛 桂心 各三兩 半夏

五味子 各半兩 石膏 四兩

右八味咬咀以水一斗煮取三升分三服 傳景名 小青龍

加石膏湯用甘 艸二兩為九味

衍 肺脹皆屬邪實非若肺痿雖有寒熱之分從無實

熱之例金匱有云上氣而燥者屬肺脹欲作風水

發汗則愈其治原有越婢加半夏湯小青龍加石

膏湯兩方千金麻黃湯即小青龍加石膏湯因第

方時偶失遺甘艸一味後世不敢擅補庸師不知

誤失相傳至今不改如初蓋小青龍加石膏中藏

越婢之法越婢加半夏中藏小青龍之法方中日

艸皆不可缺乃治風水之方不獨發汗并祛肺

中涎水煎熱全在半夏石膏輔佐麻芍桂辛之力

耳 肺癰第七 論一首 方六首

論曰病欬唾膿血其脈數實者屬肺癰虛者屬肺痿

欬而口中自有津液舌上胎滑此為肺寒非肺痿若

口中辟燥欬即胸中隱隱痛脈反滑數此為肺癰也

問曰病欬逆師脈之何以知為肺癰當有膿血吐之

則死後竟吐膿死其脈何以別之師曰寸口脈微而

數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於

衛呼氣不入熱過於榮咬而不出風傷皮毛熱傷血

脈風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁

沫時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米

粥始萌可救膿已成則難治寸口脈數跌陽脈緊寒

熱相搏故振寒而欬跌陽脈浮緩胃氣如經此為肺

癰師曰振寒發熱寸口脈滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之不應愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胸中為肺癰其脈數欬唾有膿血設膿未成其脈自緊數緊去但數膿為已成也

桔梗湯 治欬胸中滿而振寒脈數咽乾而不渴

時時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥是為肺癰

方

桔梗 三兩集驗方用二兩古今錄驗方用二兩 甘草 二兩

右二味咬咀以水三升者取一升去滓分二服必

吐膿血也 一方有欬冬花一兩半

衍肺癰初起欬唾臭痰用桔梗以清肺氣利咽喉甘

艸去咽痛解熱毒金匱始萌可救之法也

瀉肺湯 治肺癰喘不得臥方

葶藶 三兩為末 大棗 二十枚

右二味咬咀以水三升先煮葶藶取二升去棗內葶

藶二方寸匕煮取七合頓服令盡三日服一劑可

至三四劑治肺癰胸膈脹一身面目浮腫鼻寒清

涕出不聞香臭欬逆上氣喘鳴迫塞宜先進小青

龍湯却服前藥 其小青龍湯方見前第九卷傷寒門

衍肺癰已成吐如米粥濁垢壅濕清氣之道所以喘

不得臥鼻寒不聞香臭故用葶藶破水瀉肺大棗

護脾通津乃瀉肺而不傷脾之法保全母氣以為

向後復長肺葉之葶木然肺胃素虛者葶藶亦難

輕試不可不慎

皂莢丸 治肺癰初起欬逆上氣時時濁唾但坐

不得臥方

皂莢八兩為末蜜丸如梧子大以棗膏和湯服

三九日三服夜一服 必效方以酥炙皂莢

衍此肺癰滌除痰垢之方皂莢辛鹹力專去風拔

毒通關利竅破積攻堅之峻藥酥炙蜜丸潤其燥

烈服用棗膏和湯通達脾津然惟肥盛之人肥痰

支塞於竅絡始萌可救者為宜若潰後膿血過泄

及元氣瘠薄之人難勝搜剔者未可輕試所以于

金更立葶藶湯黃昏湯等方以補金匱之未逮

黃昏湯 治欬有微熱煩滿胸心甲錯是為肺癰

者方

黃昏手掌大一塊是合歡皮也咬咀以水三升

者取一升分二服

衍合歡屬土與水補陰之功最捷其幹相者即結介

不解後治肺癰潰後長肺之要藥一名合昏又名黃昏寧無顧名思義之意存焉

葶藶湯方

葶藶仁

瓜瓣 各半

桃仁 五十枚

葶藶 切二升水二斗 煮取五升去滓

右四味咬咀內葶汁煮取二升服一升當有所見吐膿血

衍 意以下氣利水本經治筋急拘攣不可屈伸能清

脾濕祛肺熱所以虛勞欬嗽肺痿肺癰虛火上乘旨取以為下引之味但性專利水津氣受傷者服

千金方衍義卷七

掃葉山房

之每致燥渴不若取其根一味搗汁熱飲三合連

飲三五次不拘癰之已潰未潰服之最捷甜瓜瓣

專於開痰別錄治腹內結聚破潰膿血善逐疔膿

而不傷伐正氣為腸胃內癰要藥桃仁治瘀血血

閉性專下走而無上逆之虞葶藶專通肺胃結氣

能使熱毒從小便泄去以其中空善達諸竅用葶

而不用根本乎天者親上也

桂枝去芍藥加皂莢湯 治肺癰吐涎沫不止方

桂枝

生薑 各三兩

甘草 二兩

皂莢 一兩

大棗 十五枚

右五味咬咀以水七升煮取三升去滓分三服

衍 桂枝湯和柴衛藥千金去芍藥之酸收參入皂莢

一味即金匱皂莢丸不用蜜丸而入湯液然不若

用湯送丸不使皂莢之味棘喉尤為得宜此惟肥

盛多濕濁垢支塞肺胃者方為合劑若瘦人津液

素稀雖有痰血亦難勝皂莢之蕩滌也 此方向

列肺痿例中因世本方中刊作肺痿吐涎沫乃魯

魚之誤今力正之

飛尸鬼疰第八 論一首 方四十二首 灸法十四首

千金方衍義卷七

掃葉山房

論曰凡諸心腹痛服眾方熱藥入腹寂然不動但益

氣息急者此尸疰病也宜先服甘草汁一升消息少

時服罌麥湯盡一劑得下便覺稍寬并暴癥堅結宿

食及女人血堅痛發作無定者神良

五疰湯 治卒中賊風遊尸鬼邪心腹刺痛大脹

急方

大黃

甘草 各三兩

當歸

芍藥 各二兩

烏頭 十枚

桂心 四兩

生薑

蜜 各一斤

右八味咬咀別漬大黃以水九升煮取三升烏頭別內蜜中煎令得一升和湯中去滓分服三合如

人行三十里久更進一服日三不知加至四合

^衍賊風五疰之邪心腹刺痛脹急服熱藥寂然不動

但氣息反急者以其氣逆上衝必干于肺所以干

金類附此門宜先服甘艸湯者取其解毒也少頃

服鹽麥湯者取其利小便也本經謂瞿麥能出刺

極言逐邪拔毒之速也五疰湯中用烏頭薑桂辛

烈祛僻陰邪即兼歸芍護持營血甘艸蜂蜜解毒

安中除邪養正之大略也

蝦蟇湯 治惡疰邪氣往來心痛徹背或走入皮

膚移動不定苦熱四肢煩痛羸乏短氣方

千金要方卷七 蠶蚣 一枚 牛黃 一分 丹砂 一兩 攝葉山房

人參 各三 大黃 二兩 鬼臼

細辛 富歸 桂心 各半

乾薑 各一 黃芩 麝香 兩

附子 四枚

右十三味咀以水一斗煮取三升去滓下牛黃

麝香末分三服

^衍方中丹砂牛黃麝香鬼臼辟邪即用參附薑桂安

正大黃黃芩開泄熱毒之去路也

治卒中惡賊風寒冷入腹便絞痛或飛尸通尸發

作無時捨心胸滿脇痛如刀刺口噤者方

吳茱萸 桂心 芍藥 各二兩

乾地黃 乾薑 茯苓

甘艸 細辛 當歸

羊脂 各一兩 梔子仁 十五枚

右十一味咀咀以水八升煮取三升去滓內脂炸

盡分三服欲利者加大黃三兩

^衍方中藥味與前後諸方相類惟羊脂治賊風痿痺

去經絡熱毒突出意表

治卒中惡風角弓反張或飛尸通尸心腹絞痛方

千金要方卷七 乾地黃 芎藭 當歸 攝葉山房

茯苓 甘艸 芍藥

吳茱萸 桂心 乾薑 各二兩

梔子仁 十四枚

右十味咀咀以水八升煮取三升分三服痛甚者

加羊脂二兩人參當歸芍藥各一兩心腹堅急加

大黃三兩

^衍卒中惡風角弓反張首用地黃兼芎藭芍藥以解

血脈中之熱毒養血榮筋治風先治血也

桃皮湯 治中惡氣心腹痛胸脇脹滿方

桃白皮一握東引者 真珠

附子各一兩

梔子仁 當歸 三兩

吳茱萸 二兩

豉 五合 桂心 二兩

右八味咬咀以水五升煮取三升去滓同真珠末

分作二服 一方無當歸已下四味

桃妙湯 治中惡諸尸蠱疰心腹卒絞痛方

桃奴 人參 當歸

乾薑 各二兩 芎藭 各三兩

桂心 茯苓 鬼箭羽

犀角 丹砂 麝香 各兩

千金衍義卷十七 齋 掃葉山房

右十二味咬咀以水九升煮取二升半去滓分二

服大便不通腹滿加大黃三兩芫花二兩胡洽無丹砂芎

藟有雄黃一兩

桃皮湯取桃根白皮辟邪散血真珠鎮心安神以

佐黃附辛溫散結梔豉分解疰氣也 桃奴湯中

專取桃奴稷鬼精物鬼箭羽破血除風其間乾薑

卽前方黃附之意犀角卽豉豉之意桂心當歸散

血溫經之用則一其餘諸味可以意推

治卒中風寒冷溫氣入腹臙脹急滿搶心胸脇久

痛氣息不通脈弦緊汗不出及傷寒方

吳茱萸 當歸 麻黃

獨活 甘艸 桔梗

茯苓 各二兩 桂心 青木香

大黃 石膏 犀角 各三兩

右十二味咬咀以水九升煮取三升分三服日二

治風冷入腹忽絞痛緊急如吹大小便閉小腹有

氣結如斗大脹滿其脈弦緊或沉遲者方

瞿麥 當歸 鬼箭羽

猪苓 桔梗 吳茱萸

海藻 川芎 防己 各二兩

千金衍義卷十七 齋 掃葉山房

右十二味咬咀以水九升煮取三升分三服

卒中風寒時行溫氣入腹用麻黃大黃石膏犀角

等味分逐中外諸邪 風冷入腹專用瞿麥茱萸

桂心海藻防己大黃祛邪內泄也

治諸雜症相連續死及治三十年衆症方

桃根白皮一斤咬咀以水二斗煮取一斗去滓

分八九服須令二日服盡崔氏用桃根白皮治

又方 桃仁十四枚搗研酒服

又方

小芥子末雞子白和傅

尸疰鬼疰者卽五尸之中尸疰又挾諸鬼邪爲害

也其變動乃有三十六種至九十九種大略介

人寒熱淋瀝沉沉默默不得知其所苦而無慮

不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後復疰

易傍人乃至滅門覺如此候者宜急療之方

懶肝一具陰乾治下飭水服一方寸七日三如

一具不瘥更作

桃根白皮取其辟邪 桃仁取其散血 芥子八

千金方卷十七

卷十七

掃葉山房

肺利氣豁痰兼有辟惡之功 懶肝專殺瘵蟲兼

療瘵瘵

小附著散 治飛尸賊風發時急痛不在一處鍼

之則移發一日半日乃瘥須臾復發者方

細辛

天雄

甘艸各一分一

桂心三分

烏頭

附子

乾薑各一

真珠

雄黃各半

右九味治下飭酒服方寸七不知稍增以知爲度

胡洽不用桂心附

子有蜀椒四分 大附著散 治五尸疰忤與前狀同者方

天雄

桂心各半

細辛

乾薑

雄黃

黃芩

黃連

田跋

椒目各一

金牙

犀角

麝香

牛黃各一

真珠三分

蜈蚣一枚

右十五味治下飭酒服一錢七日三服以知爲度

方中一派辛烈辟除邪毒之藥獨取真珠以安神

識甘艸以和胃氣 大附著散中天雄雄黃金牙

由跋蜈蚣麝香牛黃犀角無所不具專取芩連以

泄邪熱惡毒也

千金方卷十七

卷十七

掃葉山房

後金牙散 治鬼疰風邪鬼語尸疰或在腰脊胸

脇流無常處不喜見人志意不定而脫色巨赤

鼻張唇乾甲黃者方

金牙

雄黃

鐵精

曾青

珍珠

丹砂

野葛

芎藭

露蜂房

大黃

甘草

蛇蛻皮

藎茹

乾漆各一

石長生

狸骨一作

鬼白

鬼箭羽

桔梗

烏頭

鬼督郵

椒目 狼毒 蕪荑

藜蘆 雷九 芫青

滑石各二分 毒公 鱉甲

小黃 人參 胡燕尿

狼毒 桂心各四分 寒水石

蜈蚣 蜥蜴 附子各一枚

蝮螂 亭長各七枚 石膏五分

徐長卿 斑猫各十枚 貝母二枚

右四十五味治下篩先食以酒服一刀圭日耳不知漸加之蟲隨大小便出崔氏名蜀金牙散

千金方衍義卷七

掃葉山房

衍義附見前十二卷膽腑門大金牙散下

前大金牙散 治一切疰病方見十二卷膽腑門

白朮散 治風入臟腑絕常白躁痛或風疰入

身冷疰鬼疰飛尸惡氣腫起或左或右或前或

後或內或外鍼灸流移無有常處驚悸腹脹氣

滿心頭痛或恍惚悲懼不能飲食或造或退陰

下濕癢或大便有血小便赤黃房中紫和方

白朮十四枚 附子 秦艽

人參 牡蠣 蜀椒

細辛 黃芩 用芎

牛膝各三分 乾薑 桂心

防風各五分 獨活 柴胡

桔梗 茯苓 當歸各四分

烏頭 天雄 甘艸

莽艸 麻黃 石南

杜仲 栝蒌根各二分

右二十六味治下篩半旦酒服五分七訖如人行七里入勢欲解更飲酒五合為佳

太乙備急散 治卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼

疰及中蠱疰吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒

千金方衍義卷七

掃葉山房

熱毒病六七日方

雄黃 桂心 芫花各二兩

丹砂 蜀椒各一兩 藜蘆

巴豆各三分 野葛三分 附子五分

右九味巴豆別研如脂餘合治下篩以巴豆合相

更搗置銅器中密貯之勿泄有急疾水服錢五七

可加至一錢七老小半之病在頭當鼻衄在膈上

吐在膈下利在四肢當汗出此所謂如湯洗也

下皆愈方宜祕之非賢不傳 龍牙散 治百疰邪鬼飛尸萬病方

龍牙

茯苓 各二兩半

雄黃

芍藥

聚膏 各五分

乾地黃

石解

胡燕屎 各三分

鬼箭羽

烏頭

羌活

露蜂房

會青

珍珠

桂心

杏仁

防風

桃奴

鬼臼

鶴骨 各一兩

人參

大黃

白朮 二兩

蘇子

橘皮

甘艸

川芎

遠志

蟹甲

鬼督郵

銅鏡鼻

狸陰 二具

蜈蚣 一枚

右三十三味治下篩酒服一刀圭以知為度當有

蟲從大便出

益諸症方中惟此因房中勞極故用法稍平雖有麻

辛莽艸烏附天雄之毒劣然得參苓歸芍等味酒

養血氣不致大傷元氣也 太乙備急散彙集完

花黎蘆野葛巴豆之毒劣濟以丹砂雄黃蜀椒桂

附亦是峻銳之伍 龍牙散中鶴骨狐陰雄黃會

青烏頭三鬼碎那攻毒之味無不畢具宜為百症

萬病之類治也

治鬼疰毒氣變化無常處方

犀角

麝香

丹砂

雄黃

鹿角

龍骨

鮫魚皮

蜈蚣

丁香

藜蘆根

蜀椒

草薢

貝子

十枚

右十三味治下篩酒服方寸七加至二七日三

方中丹砂雄黃鮫魚貝子之屬皆疰病之治獨藜

荷根專為蠱毒而設

備急丸

治卒中惡風氣忤迷絕不知人

卷勝臍

門中

主

聖奴散 治卒得惡疰腹脹方

釜下墨

一合 鹽二合

右二味合治以水一升半煮取八合一服令盡須

臆吐下卽瘥

治暴心痛面無顏色欲死者方

以布裹鹽如彈丸大燒令赤置酒中消服之利

卽愈

治突疰方

梳齒間刮取垢水服之

又方

亂髮一兩 臘月猪脂二合

右二味取猪脂煎髮令消烱服之盡死矣

又方

蒸大豆帛裏熨之

治一切病食疰方凡食上得病為食疰

取釜下土如雞子大為末酢汁清一升和服之行五十步吐即瘥

又方

還取本食種數多少相似各少許和合布裏燒

灰如杏仁大水服之

初墨奴散用金墨之同氣相引得鹽之鹹而涌之上

泄也 暴心痛面無顏色火氣上逆可知但需燒

鹽酒服以抑之下泄也 哭疰是火燥金象肺絡

中為涎垢所積故用流齒間垢水服取吐以泄火

毒 猪指髮灰金匱名猪膏髮煎治瘰血發黃陰

吹正暝等疾取其能破血通津也 大豆熬執裏

熨取其溫暖散氣 食疰因飽食以受邪食滯膈

上故曰食疰用釜月下土醋服取吐在上者因而

越之也 又方以所食之物燒末服之以消飽所

傷之物此怕黎藿之人宜之

鵝骨丸 治飛尸遁尸積聚胸痛連背走無常處

或在臟或腫在腹或奄奄然而痛者方

鵝骨 三寸 丹砂一作丹參 牡蠣一作牡丹

雄黃 莽草各四分 藜蘆

桂心 野葛各二分 蟹螯

芫青各十枚 蜈蚣一枚 巴豆四十枚

右十二味為末蜜丸如小豆每服二九日三以知

為度

鵝善噉蛇故其骨能療尸疰更以蟹螯芫青莽草

藜蘆蜈蚣野葛等味彙入一方以毒攻毒

蜥蜴丸 治癩堅水腫飛尸遁尸寒尸喪尸尸疰

骨血相注惡氣鬼忤蝮毒邪氣往來夢寐存亡

留飲結積虎狼所嗜獠犬所吓鴟毒八人五臟

服藥以殺其毒毒即消婦人邪氣鬼忤亦能治

之方方見前第十一卷 肝臟門積聚篇中

桔梗丸 治毒疰鬼疰食疰冷疰痰飲宿食不消

酒癖諸病方

桔梗 藜蘆 皂莢

巴豆 附子各二兩

右五味爲末蜜和搗萬杵丸如梧子大宿不食半
旦飲服二丸仰臥服勿眠至食時膈上吐腐下下
去惡物如蝌蚪蝦蟆子或長一二尺下後當大虛
口乾可作雞羹飲五合太極飲食粥一升二四日
病未盡更服忌如藥法

桔梗藜蘆皂莢涌吐巴豆攻下附子以奮諸藥之
力也

十疰丸 治十種疰氣疰沙疰魚疰冷疰人疰死
人疰尸疰食疰水疰土疰等方

雄黃 巴豆各二兩 人參

千金方卷第七 掃葉山房

甘帥 麥門冬 細辛葉本

桔梗 附子 皂莢

蜀椒各一兩

右十味爲末蜜丸如梧子空心服五九日二稍加
以知爲度

十疰丸取桔梗丸中四味不用藜蘆而用雄黃細

辛蜀椒之辛烈辟邪且得人參甘帥麥冬雖云助
長辛烈之性究竟良藥可保護津氣不似桔梗丸

之一派峻銳耳

太人神明陷水丸 治諸病破積聚心下支滿寒

熱鬼疰長病欬逆噎腐除眾惡鬼逐邪氣鬼
擊客忤中惡胸中結氣咽喉閉塞有進有退繞
臍絞痛惻惻隨上下按之跳手心中心愠愠如有
蟲狀毒疰相染甚至滅門者方

雄黃二兩 當歸五兩 丹砂

礬石一作礬石 桂心 大黃各二兩

芫青五枚 藜蘆 附子各一兩半

人參 珍珠 麝香

鬼臼 犀角 牛黃各一兩

蜈蚣一枚 射罔一兩 烏頭八枚

杏仁三十枚 蜥蜴一枚 檮羅

地膽各七枚 蟹螯各七枚 巴豆一分

右二十四味爲末蜜和搗三萬杵丸如小豆先食
服二九日再不知稍增又以二九著門上令眾邪

不近如傷寒服之無不愈若至病家及視病人夜
行獨宿服二九眾邪不能近也胡洽無桂心芫青

香射罔牛黃蜥蜴烏頭湯臣等歸十二味藥

陷水爲名者毒邪得藥如冰泮渙也方中二十四

味除人參丹砂犀角珍珠餘皆大毒大劣上吐下

泄之末允爲辟除邪同之用也

江而度世丸 治萬病癩堅積聚伏尸長病寒熱
 吐氣流行皮中久病著床肌肉消盡四肢煩熱
 嘔逆不食傷寒時氣惡汗出口噤不開心痛

蜀椒 三兩 人參 細辛

甘艸 各二 茯苓 珍珠

大黃 乾薑 丹砂

野葛 桂心 雄黃

麝香 鬼白 烏頭

牛黃 各二 附子 紫苑 各六

巴豆 六十 蜈蚣 二枚

右二十味為末蜜丸如小豆飲服二九加至四九

日二服加獺肝一只更良

大度世丸 治萬病與前狀同者方

牛黃 大黃 雄黃

珍珠 丹砂 人參

附子 細辛 甘艸

射罔 鬼白 莽草 各

蜀椒 麝香 鬼箭羽

桂心 茯苓 紫苑 各二

乾薑 三兩 野葛 一斤 蠮螋

蜈蚣 各一 地膽 五小 芫青 二十

榜雞 三十 巴豆 八十

右二十六味為末蜜丸如小豆大飲服二九日二
 先食服之

行度世而分江南見南方風氣柔弱不勝猛劑峻攻
 不似大度世丸之毒烈倍甚也 大度世丸中射

罔莽艸蠮螋芫青榜雞無不畢具其迅劣之威與
 陷水丸不相上下也

治疰病相染易及霍亂中惡小兒客忤長病方

獺肝 一只 蜈蚣 一枚 麝香 二分

雄黃 莽艸 丹砂

鬼白 犀角 大黃

巴豆 牛黃 各一

右十一味為末蜜丸如麻子空腹服二九至三九

以知為度

術療疰傳染雖有雄黃巴豆鬼臼莽艸牛黃麝香不
 用獺肝不能使傳口瘡癩絕跡也

雷氏千金丸 治行諸氣宿食不消飲食中惡心

腹痛如刺及瘧方

硝石 三分、大黃 五分 桂心

乾薑 各二兩 巴豆仁 六枚

右五味為末搗三千杵蜜丸如大豆服二丸神驗無比已死者折齒灌之

從於三物備急丸中更多硝石桂心二味以破敗積之邪乃三皇時古方也

治卒得尸疰毒痛往來方

杏仁 亂髮灰 等分

右二味研如脂丸如梧子每服酒下三丸日三姚以猪膏和丸

千金方衍義卷七 去 掃葉出房

治遁尸尸疰心腹刺痛不可忍者方

桂心 乾薑 各一兩 巴豆仁 二兩

右三味治下餼以上醋和如泥傅病上乾即易之

治遁尸尸疰心腹及身有痛處不得近者方

取艾小接合碎著痛上厚一寸餘熱湯和灰介

強執置艾上冷即易不過二三度瘥

治遁尸飛尸又治暴風毒腫流八四肢頭面方

白芥子一升蒸熟搗以黃丹二兩攪和分作兩

分用疎布袋盛更蒸使熱薄痛上當更迭蒸袋

當使熱薄之如此三五次即定

治人皮膚中痛苦名癩瘡方

醋和燕窠土傅之

治走疰方

燒車缸令熱暫入水以濕布裹熨痛上

治三十年氣疰方

豉心 半升 生椒 一合

右二味以水二升煮取半升適寒溫用竹筒吸取汁令病者側臥手掌大孔射灌之少時當出惡物

此法垂死悉得治瘥百千不可具說

從卒得死疰邪未深入但用杏仁以泄滯氣髮灰以

千金方衍義卷七 去 掃葉出房

散結血 遁尸尸疰心腹刺痛皆陰毒為患故於

倘急丸中除去大黃之純陰易入桂心助陽醋和

傅痛處以破陰邪之祕拒 屍疰心痛不似心腹

刺痛之勢劇故以艾鋪熱熨取純陽之火以散陰

毒之邪耳 芥子祛痰黃丹拔毒二物蒸熨便熱

氣內達以散結積之毒 皮膚中痛風濕原來深

入但取燕泥醋和以收其邪可無藉於湯藥 痛

而走疰風火之象故以車缸燒熨取其流動之意

耳 豉解毒椒散結氣從上而引濁惡下泄

門亦肺與大腸之竅也

灸法

凡五尸者飛尸遁尸風尸沉尸尸疰也今皆取一方兼治之其狀腹痛腹急不得氣息上衝心胸傍攻兩脇或塊壘踊起或牽引腰背治之之法灸乳後三寸男左女右可二七壯不止者多其壯數取愈止又灸兩手大拇指頭各七壯又灸心下三寸十壯又灸乳下一寸隨病左右多壯數又以細繩量患人兩乳頭內即裁斷中屈之又從乳頭向外量使當肋游於繩頭灸三壯或七壯男左女右

千金方義卷十七
掃葉山房

卒疰忤攻心胸灸第七椎隨年壯又灸心下一寸

三壯又灸手肘文隨年壯

一切病食疰灸手小指頭隨年壯男左女右

五毒疰不能飲食百病灸心下三寸胃脘十壯

水疰口中經云肺來乘腎食後吐水灸肺膈又灸三陰交又灸期門穴在乳下二肋間瀉肺補腎也

谷隨年壯

一切疰無新久先仰臥灸兩乳邊斜下三寸第三肋間隨年壯可至三百壯又治諸氣神良一名疰疰

孫真人千金方衍義卷十七終

孫真人千金方衍義卷十八

長洲
南沙
醫館
玉著
客校

大腸腑方 凡七類

大腸腑脈論第一

論曰大腸腑者主肺也鼻柱中央是其候也肺合氣於大腸大腸者為行道傳瀉之腑也號監倉掾重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸當臍右回疊積還反十二曲貯水穀一斗二升主十二時定血脈和利精神千金明堂外臺同難經云長二丈一尺大四寸鼻脊一寸之少半十六曲盛穀一斗水七升半

遂以長以候大腸

右手關前寸口陽絕者無大腸脈也若少氣心下有

水氣立秋節即欬刺手太陽治陰在魚際間

右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如鍼

刀所刺無休息時刺手陽明治陽在手腕中瀉之

大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒則泄

當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉

腸中雷鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺盲之

原巨虛上廉三里

大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化

大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化

大腸有寒驚澹有熱便腸垢

大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀

肺前受病移於大腸肺欬不已欬則遺失便利脈氣

客於大腸則夢田野

肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏大

者大腸緩而長皮急者大腸急而知皮滑者大腸直

皮肉不相離者大腸結

扁鵲曰手太陰與陽明為表裏大腸若病實則傷熱

熱則脹滿不通口為生瘡食下入腸腸實而胃虛食

下胃胃實而腸虛所以實而不滿乍實乍虛乍來乍

千金方卷六

掃葉山房

去虛則傷寒寒則腸中雷鳴泄青白之利而發於腸

氣水根在大腸方見治水篇中大腸絕不治何以知之泄利

無度利絕則死

手陽明之脈起於大指次指之端循指外側上廉出

合谷兩骨之間上人兩筋之中循臂上廉入肘外

廉循臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出柱骨之會

上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆直上

上頸貫頰入下齒縫中還出俠口交人中左之右右

之左上俠鼻孔是動則病齒痛頸腫是主津所生病

者目黃口乾齟齬喉痺肩前臑痛大指次指痛不用

氣盛有餘則當脈所過者熱腫虛則寒慄不復盛者

則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口

大腸虛實第二脈二首 方二首 灸法七首

大腸實熱

右手寸口氣口以前脈陽實者寸陽明經也病苦腸

滿善喘欬而赤身熱喉咽中如核狀名曰大腸實熱

也

生薑泄腸湯 治大腸實熱腹脹不通口為生瘡

者方

生薑

白朮

桂心 一兩

地黃 十兩

右十一味

分二服

本經言生薑久服去臭氣通神明故千金以之泄

大腸之實熱兼大棗以治心腹邪氣安中養脾平

胃氣通九竅橘皮下氣通神竹茹黃芩梔子清上

熱口瘡地黃芩確治傷中逐血痺除邪熱通脹閉

共襄推陳致新之功白朮茯苓保守中氣以助諸

千金方卷六

掃葉山房

橘皮

青竹茹

黃芩

梔子仁 各三

茯苓

芩確 各二

大棗 十四枚

右十一味

分二服

藥之力持心為祛熱之內應也

治腸中臌脹不消方

灸大腸臑四十九壯

大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能久立巨虛上廉主之

大腸虛冷

右手寸口氣口以前脈陽虛者手陽明經也病苦胸中喘腸鳴虛渴肩乾目急善驚泄白名口大腸虛冷也

黃連補腸湯 治大腸虛冷利下青白腸中雷鳴

千金方衍義卷十

四

掃葉山房

相逐方

黃連 四兩

茯苓

芎藭 各三兩

地榆 五兩

酸石榴皮 五片

伏龍肝 雞子六枚

右六味以水七升煮取二升半去滓下伏龍肝末分三服

衍義方下 雖言大腸虛冷痢下青白然腸中雷鳴火激

痰動與生薑瀉心湯之用芩連佐乾生二薑同意

此用黃連佐檣皮伏龍肝得寒熱相參之妙檣皮

酸澀茯苓利之芎藭地榆佐檣皮以理血脫方下

雖不治血而治血之義具見言外矣

治腸中雷鳴相逐痢下方

灸承滿五十壯穴在俠巨關相去五寸巨關在

心下一寸灸之者俠巨關兩邊各二寸半

治腸中常鳴時上衝心方

灸臍中

食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃腸綱主之腹脹腸鳴氣上衝胸不能久立腹中痛濯濯冬日重感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身腫俠臍急天樞主之

腸鳴而痛溫留主之

千金方衍義卷十

五

掃葉山房

肛門論第三 論一首

論曰肛門者主大行道肺大腸候也號為通事令史重十二兩長一尺二寸廣二寸三分應十二時若臟傷熱則肛門閉塞大行不通或腫縮入生瘡若腑傷寒則肛門開大行洞泄肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之虛實和平依經調理方見二十四卷中

皮虛實第四 論一首

論曰夫五臟六腑者內應骨髓外合皮膚肉若病從外生則皮膚肉關格強急若病從內發則骨髓痛疼然陰陽表裏內體外皮其病源不可不詳之也

皮虛者寒皮實者熱凡皮虛膏之應主於肺大腸其病發於皮毛熱則應臟寒則應腑

蒴藿蒸湯 治皮虛主大腸病寒氣關格方

蒴藿根葉切三升 菖蒲葉切二升 桃葉皮枝升

細糠一斗 秫米五升

右五味以水一石五斗煮取米熟為度大盆器貯

於盆上作一小竹牀子罩盆人身坐牀中周回四

面將蒴藿障風身上以衣被蓋覆若欲氣息時開

孔對中洩氣取通身接汗可得兩食久許如此三

日蒸還溫藥足汗用之若盆裏不過熱盆下安炭

千金方衍義卷六 六 掃葉山房

火非但治寒但是皮膚一切勞冷悉治之

義 蒴藿治寒痺拘急菖蒲通利九竅桃葉辟邪散血

糠米蒸發肉腠其裏作汗之功也

梔子煎 治皮實主肺病熱氣方

梔子仁 枳實 大青

杏仁 柴胡 芒硝各二兩

生地黃 淡竹葉切各一升 生元參兩五

石膏八兩

右十味以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服

義 肺主皮毛肺熱則皮實故用梔子杏仁柴胡元參

竹葉治外熱石膏芒硝大青地黃枳實治內實

欬嗽第五 論二首 方五十五首 炎法十四首

論曰經云五臟六腑皆令欬肺居外而近上合於皮

毛皮毛喜受邪故肺獨易為欬也邪客於肺則寒熱

上氣喘汗出欬動肩背喉鳴甚則唾血肺欬經久不

已傳入大腸其狀欬則遺糞腎欬者其狀引腰背痛

甚則欬涎腎欬經久不已傳入膀胱其狀欬則遺尿

肝欬者其狀左脇痛甚者不得轉側肝欬經久不已

傳入膽其狀欬則清苦汁出心欬者其狀引心痛喉

中介介如梗甚者喉痺咽腫心欬經久不已傳入小

腸其狀欬則失氣脾欬者其狀右脇痛陰引肩背

甚者不得動動則欬劇經久不已傳入胃其狀欬而

嘔嘔甚則長蟲出久欬不已三焦受之三焦欬狀欬

而腹滿不能飲食此皆聚於胃關於肺使人多涕唾

而面浮腫氣逆也若順時有風寒冷人觸冒解脫傷

皮毛間入腑臟為欬上氣如此也有非時忽然暴寒

傷皮膚中與肺合則欬嗽上氣或胸脇支痛欬唾有

血者是其熱得非時之寒暴薄之不得漸散伏結深

喜肺靡也因欬服溫藥欬尤劇及壯熱吐膿血汁出

惡寒是也天有非時寒者急看四時方也問曰欬病

有十何謂也師曰有風欬有寒欬有肢欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有厥陰欬問曰十欬之證以何為異師曰欲語因欬言不得竟謂之風欬飲冷食寒因之而欬謂之寒欬心下堅滿欬則肢痛其脈反遲謂之肢欬欬則引脇下痛謂之肝欬欬而唾血引手少陰謂之心欬欬而涎出痛纏不止引小腹謂之脾欬欬引頸項而涎涎沫謂之肺欬欬則耳無所聞引腰并膈中謂之腎欬欬而引頭痛口苦謂之膽欬欬而引舌本謂之厥陰欬風欬者不下之寒欬肢欬肝欬刺足太衝心欬刺手神門脾欬刺足太白肺欬刺手太泉腎欬刺足太谿膽欬刺足陽陵泉厥陰欬刺手太陵

千金方卷六

八 攝業山房

夫久欬為痰欬而時發熱脈在九菽一作辛弦者非虛也此為胸中寒實所致也當吐之

夫欬家其脈弦欲行吐藥當相人強弱而無熱乃可吐耳欬家其人脈弦為有水可與十棗湯下之見下第十

方不能臥出者陰不受邪故也畱飲欬者其人欬不得臥引項上痛欬者如小兒掣縱狀夫酒家欬者必致吐血此坐久極飲過度所致也其脈沉者不可發汗久欬數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者

必善醫其人本有支飲在胸中故也治屬飲家上氣汗出而欬屬飲家欬而小便利若失溺不可發汗汗出即厥逆冷

夫病吐血喘欬上氣其脈數有熱不得臥者死寒家欬而上氣其脈數者死謂其人形損故也脈大而散散者為氣實而血虛名曰有長無裏上氣而胸腫肩息其脈浮大不治加痢尤甚上氣躁而喘者屬肺脹欲作風水發汗愈

小青龍湯 治欬逆倚息不得臥方見第九卷傷寒上

小青龍湯下已多唾口燥寸脈沈尺脈微手足厥逆氣從小腹上衝胸咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者與桂苓五味甘艸湯治其氣衝方

茯苓四兩 桂心 甘艸各二兩

五味子半升

右四味咬咀以水八升煮取三升去滓溫分三服

衝氣即低而反更欬胸滿者苓甘五味薑辛湯以治其欬滿方

茯苓四兩 甘艸

細辛各三兩 五味子半升 乾薑

右五味咬咀以水八升煮取三升去滓温服半升

日三

欬滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑為

執藥也服之當遂渴而渴反止者為支飲也支

飲法當胃弱者必嘔嘔者復內半夏以去其水

桂苓五味甘艸去桂加薑辛半夏湯方

半夏 五味子各半 茯苓四兩

細辛 乾薑 甘艸各二兩

右六味咬咀以水八升煮取三升去滓温服半升

日二

千金方衍義卷六 十一 掃葉山房

水去嘔止其人形腫者應內麻黃以其人遂痺故

不內麻黃內杏仁名苓甘五味加薑辛半夏杏

仁陽方

杏仁 半夏 五味子各半

茯苓四兩 細辛 乾薑

甘艸各二兩

右七味咬咀以水一斗煮取三升去滓温服半升

日三若逆而內麻黃其人必厥所以然者以其人

血虛麻黃發其陽故也

右而熱如醉此為胃熱上衝熏其面加大黃利之

苓甘五味加薑辛半夏大黃湯方

大黃 細辛 乾薑

甘艸各三兩 茯苓四兩 杏仁

半夏 五味子各半

右八味咬咀以水一斗煮取三升去滓温服半升

日三

義衍 小青龍湯余於傷寒門中大青龍條下具言之矣

而金匱治欬敘於痰飲之下趙以德衍義論之最

詳以欬必因之痰飲而五飲之中獨屬上支飲最

為欬嗽根蒂外邪入而合之因欬即無外邪而支

飲漬入肺中自足令人欬嗽不已況支飲久蓄胸

上其下焦之氣逆衝而上尤易上下合邪也夫以

支飲之故而令外邪可內下邪可上不去支飲則

欬終無寧宇矣其曰欬逆倚息不得臥小青龍湯

主之明外內合邪之證惟小青龍湯為的對耳然

用小青龍湯其中頗有精義須防衝氣自下而上

重增濁亂其欬不能堪矣傷寒用小青龍湯無少

陰證者可服雜證用小青龍湯亦恐少陰腎氣素

虛衝任之火易於逆上衝任火上無欬且增煩欬

況久咳不已顧可動其衝氣耶蓋衝任二脈與腎

千金方衍義卷六 十一 掃葉山房

箱同 出胞中腎虛不能固守於下二脈相挾從小
 飛逆而上也腎氣本虛之人即素無痰飲緣感
 外邪則衝任之火便乘勢上填膈上迫脅津液而
 為痰飲支寒清道必致欬逆衛息不得臥也衛息
 本倚伏而喘息陰火內應外邪為證最急不得不
 以小青龍湯為務祇緣真元素虧總有合劑不能
 遲迅掃之力所以餘邪得以久持致有如下變證
 也 多唾飲上溢也口燥津液傷也寸脈沉尺脈
 微手足逆冷衛中陽氣耗也氣從小腹上衝胸咽
 陰火逆也手足痺榮血虛也其面翁熱如醉陽明
 胃熱也因復下流陰股小便難陰火下流膀胱也
 時復胃太陽餘邪未散也然證雖屬變皆衝氣逆
 上之故且有時復昏冒一證即定太陽表證確守
 胃家汗出自愈之例故反覆出入不離小青龍湯
 加減也設證多端衝氣最為巨測所以首變茯苓
 桂心五味甘艸湯先治衝氣衝氣即低而反更欬
 喘滿水在膈間不散也再變前方加乾薑細辛以
 治其欬滿欬滿即止 第二變而更復渴衝氣復
 發以細辛乾薑為熱藥也服之當遂渴而渴反止
 者為支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復內

千金方義卷八

十三

掃葉山房

半夏以去其水水去嘔止 第四變其人形腫者
 以水尚存表也加杏仁主之其證應內麻黃以其
 人蓬腫故不內之若逆而內之必厥所以然者以
 其入血虛麻黃發其陽故也 第五變者而熱如
 醉此為胃熱上衝熏其面加大黃以利之 前四
 變隨證加減施治猶未離本來繩墨至第五變其
 證頗似戴陽而能獨斷陽明胃熱乃加大黃以利
 之後陽明病面合赤色不可攻之為其腎虛陽氣
 不藏故以攻為戒而此平昔陰傷血虛反用大黃
 利之者以其證變疊見雖有面熱如醉而脈見寸
 沉尺微洵非表邪拂鬱而為胃中熱蘊無疑竟行
 滌飲攻熱不以陰虛為慮而致扼腕也嗟夫仲景
 治欬全不從欬起見治其支飲下其逆氣衝氣法
 中之法遊刃有餘千金祖述其義以為支飲欬逆
 之成則
 欬而上氣肺脹其脈浮心下有水氣脇下痛引缺
 盆設若有熱者必躁其人常倚伏小青龍加石

千金方義卷八

十三

掃葉山房

石膏
 乾薑
 桂心
 細辛 各二
 麻黃 四兩
 芍藥

甘艸各三 半夏半升 五味子一升

右九味咬咀以水一斗先煮麻黃減二升去沫下

藥煮取二升半強者服一升羸者減之小兒服四

合仲景治肺脹欬而上氣煩燥而喘脈浮者心下有水外臺同

衍義小青龍湯原為欬逆倚息不得臥之首推今因心

下有水氣而脈浮頗有似乎風水之候但彼因身

腫自汗不渴知病在表故用越婢此因肺脹喘滿

痛引缺盆知病在裏故用小青龍加石膏仍不出

越婢法

射干麻黃湯 治欬而上氣喉中如水雞聲者方

千金方卷八

五

掃葉山房

射干

細辛

欬冬花

紫苑各三兩

麻黃

生薑各四兩

半夏

五味子各一升

大棗七枚

右九味咬咀以東流水一斗二升先煮麻黃去上

沫內藥煮取三升去滓分三服日三

衍義上氣而作水雞聲乃是痰礙其氣氣觸其痰風寒

入肺之一驗故於小青龍方中除桂心之熱芍藥

之收甘艸之緩而加射干紫苑欬冬大棗專以麻

黃細辛發表射干五味下氣欬冬紫苑潤燥半夏

生薑開痰四法萃於一方分解其邪大棗運行脾

津以和藥性也

厚朴麻黃湯 治欬逆上氣胸滿喉中不利如水

雞聲其脈浮者方

厚朴五兩

麻黃四兩

石膏

細辛

乾薑各二兩

小麥一升

杏仁

半夏

五味子各半升

右九味咬咀以水一斗二升先煮麥熟去麥內藥

煮三升去滓分三服日三

衍義欬而脈浮者外邪居多法當發散為主故於小青

龍湯中除去桂枝湯三味加入厚朴以下氣石膏

千金方卷八

五

掃葉山房

以清熱小麥引入胃中助其升發之氣也

澤漆湯 治上氣而脈沉者方

澤漆三斤細切以東流水五斗半升

生薑

紫苑一作紫參

白前各五兩

黃芩

甘艸

桂心

人參各三兩

右九味內澤漆汁中煮取五升每服五合日三夜

衍義欬而脈沉邪在營分熱過於營吸而不出其血必

結邪氣外表故用澤漆破血為君加以生薑半夏

之開痰紫苑白前之下氣黃芩之清熱桂心之和營人參甘艸匡助胃氣以行藥力仰壘一空元氣不損製方之妙若此得不以之為法耶

麥門冬湯 下氣止逆治火逆上氣咽嗑不利方

麥門冬汁升 半夏一升 粳米三合

人參 甘艸各二 大棗二十

右六味以水一斗二升煮取六升去滓分四服日

三夜一

此胃中津液乾枯虛火上炎之候凡肺氣有胃氣

則生無胃氣則死胃氣者肺之母氣也故於竹葉

石膏湯中偏除方名二味而加麥門冬數倍為君

人參甘艸粳米以滋肺母使水穀之精微皆得上

注於肺自然沃澤無虞當知火逆上氣皆是胃中

痰氣不清上溢肺隧占據津液流行之道而然是

以倍用半夏更加大棗通津滌飲為先與義全在

乎此若濁飲不除津液不致雖日用潤肺生津之

劑烏能建止逆下氣之勳哉俗以半夏性燥不用

殊矣立方之旨

麻黃石膏湯 治上氣胸滿方

麻黃 四兩 石膏 如雞子大 厚朴 五兩

厚朴 五兩

小麥一升 杏仁半升

右五味以水一斗先煮小麥熟去麥下藥煮取三

升去滓分三服深師用此治久逆上氣喉中加水

升雞鳴飲者加半夏五味子各半升

乾薑三藥 此於麻杏甘石湯中除去甘艸之緩中易入厚朴

以泄滿小麥以助肺胃而資少陽生發之氣以其

得春升之氣最先也

十棗湯 夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至

一百日一歲可與此方

大棗十枚 大戟 甘遂

芫花等分

右大戟甘遂芫花為末以水一升五合煮棗取

八合去滓內藥末強者一錢七羸者半七頓服平

巨服而不下者平旦更加半七下後自然補養

義衍 十棗湯方在傷寒門中治表解裏未和痞滿脇痛

在金匱中治懸飲內痛千金取治支飲欬煩胸中

久痛總取峻攻痰積以破宿積

欬而引脇下痛亦十棗湯主之

溫脾湯 治食飢而欬方

甘艸四兩 大

甘艸四兩

右二味吹咀以水五升煮取二升分三服若咽中痛而聲鳴者加乾薑一兩

衍肺胃虛寒則欬故用甘艸溫散臟腑寒熱邪氣大

棗安中養脾其建溫脾之功世本方下註治食飽而欬豈有食飽胃實而欬反用甘艸大棗二味實

之之理敢力正之

百部根湯 治嗽不得臥兩眼突出方

百部根 生薑各 細辛

甘艸各三 貝母 白朮

五味子各三 桂心 四兩 麻黃 六兩

千金方衍義卷末 大戟 掃葉山房

右九味吹咀以水一斗二升煮取三升去滓分三

服古今錄驗有杏仁四兩紫苑三兩

衍嗽不得臥兩眼突出明是寒鬱熱邪為患故首取

百部之溫散肺氣麻桂薑辛之開發肺邪貝母助

百部消寒木甘助麻桂透表五味收麻辛之散也

海藻湯 治欬而下利胸中痞而短氣心中時悸

四肢不欲動手足煩不欲食肩背痛時惡寒方

海藻 四兩 半夏 五味子各半

生薑 一兩 細辛 三兩 茯苓 六兩

杏仁 五十枚

右七味吹咀以水一斗煮取三升去滓分三服口

衍欬而下利水飲溢於肺胃滲於大腸而見痞逆短

氣心中時悸者心火惡水之象也四肢不欲動不

欲食者脾氣傷也背痛惡寒者陽氣失職不能榮

於陽位也故用海藻之鹹順而泄留飲水氣杏仁

下氣泄滯苓半辛薑滌除痰垢五味收斂肺氣也

白前湯 治水欬逆上氣身體浮腫短氣脹滿晝

夜倚壁不得臥咽中作水雞鳴方

白前 紫苑 半夏

大戟各二

右四味吹咀以水一斗浸一宿明旦煮取三升分

為三服

衍欬逆上氣而見肢體浮腫作水雞聲乃水飲溢於

肺胃流入百骸故用白前以疏肺氣紫苑以散血

氣半夏以滌痰氣大戟以利水氣皆從金匱澤漆

湯中採出大戟之利水與澤漆不殊

治九種氣嗽欲死百病方

乾薑 半夏 細辛

紫苑 薑花 吳茱萸

茯苓

甘肅

甘遂

防葵

人參

烏頭

大黃

杏仁 各五分

葶藶 二分

巴豆

厚朴

白薇 各一分

遠志

菖蒲

五味子

前胡

枳實

蜀椒

皂莢

當歸

大戟

桂心 各半

右二十八味為末蜜丸加梧子大先食服二九日
二服以知為度不知增之

千金方卷大

辛

掃葉山房

義衍 氣嗽而兼九種百病之治故彙採寒熱補瀉氣血
痰水及乎峻攻之味無一不具苟非龐雜之方亦
無以療龐雜之病

麻黃散 治上氣嗽方

麻黃 半斤

杏仁 百枚

甘艸 三兩

桂心 一兩

右四味治下篩別研杏仁如脂內藥末和合氣上
時服一方寸七食久氣未下更服一方寸七可至
三七氣發便服即止 一方去桂心甘艸

義衍 上氣而嗽非開泄肺氣無以逞止逆之功故取傷

寒麻黃湯溫散胸中之邪不必更加一味素亂先

聖成則

蜀椒丸 治上氣咳嗽太醫令王叔和所撰御服

甚良方

蜀椒 五分

烏頭

杏仁

石菖蒲

礬石 一云礬石

皂莢 各一分

款冬花

細辛

紫苑

乾薑 各三分

麻黃

吳茱萸 各四分

右十二味為末蜜丸如梧子大暮臥吞二九治二
十年久嗽不過二十九

千金方卷大

辛

掃葉山房

義衍 子溫破結之劑彙集一方以治積年冷氣頑痰可
謂峻矣更需礬石之專攻胸中堅癖皂莢之去風
拔毒通關利竅何憚二十年久嗽不能克應乎

通氣丸 治久上氣 咳嗽咽中腥臭虛氣覺心痛

眼疼耳中嘈嘈風邪毒疰時氣食不生飢肉胸

中隔塞嘔逆多唾惡心下堅滿飲多食少惡

注淋痛病方

蜀椒 二升

飴糖 三升

杏仁

天門冬 一分

乾薑

人參 各四分

烏頭 一分

桂心 六分

大砂子 五枚

蜈蚣 五節

右十味為末別治杏仁如脂稍稍內藥末搗干杵
煆餘乃內藥末中令調和含如半棗一枚日六七
夜三四服以胸中溫為度若夢與鬼交通及飲食
者全用蜈蚣食不消加杏仁五合小腹急腰痛加
天門冬杜仲有風加烏頭三枚附子一枚立夏後
勿加也有痔飲加葶藶三兩

義行 金匱大建中湯專取蜀椒下氣止逆乾薑溫中破

積人參補正除邪膠飴潤肺止嗽以治胸腹寒積
出見有頭足上下痛不可觸千金加烏附桂心以

千金方卷六

三

掃陳山房

攻毒破結杏仁泄肺散滿蜈蚣截風解毒天門冬
除欬逆寒熱并化烏附椒薑之燥烈也

治欬逆上氣方

蜀椒

桂心

海蛤 各四分

昆布

海藻

乾薑

細辛

各六分

麥門冬 十分

石八味為末蜜丸如梧子大飲服十九加至二十
九日三服有人風虛中冷胸中滿上氣喉中如吹

管聲呼吸氣上欲欬服此方得瘥

義行 欬逆日久不除必是寒痰膠積之故故用椒桂薑

辛以蒐肺絡之寒邪海蛤昆蟲以破肺竅之痰氣

川門冬者不特治欬并滋方中辛燥諸味詳喉中
如吹管聲豈非病在肺竅之切驗乎

治欬嗽胸脇支滿多唾上氣方

礬石 一作礬石

烏頭 一方不用

菖蒲 各一分

細辛

黃環 各二分

杏仁

欬冬花

紫苑 各三分

吳茱萸 四分

乾薑 五分

蜀椒 五合

右十一味為末蜜丸如梧子大每服一丸若牙上
噴汁日五六服劇者常含不止

千金方卷六

三

掃陳山房

又方

薑汁 一升

砂糖 五合

右二味煎薑汁減半內糖更煎服之

又方

白糖 五分

皂莢末 七方

右二味先微暖糖令消內皂莢末合和相得丸如

小豆先食服三九

又方

酒一升半浸肥皂莢兩挺經宿煮取半升分三

服七日忌如藥法若吐多以酢飯三四口止之

又方

巴豆炮去皮勿傷破肉白飲吞下初日二枚二日三枚

又方

服芥子七九以油河下之

衍欬逆胸脇支滿濁痰委積清道也上氣多唾寒飲溢於膈上也方中舉石治堅癖邪氣烏頭散風寒

濕痺心腹冷痛普蒲細辛溫利九竅黃環治欬逆

寒熱杏仁欬冬紫苑並主欬逆上氣乾薑蜀椒茶

黃並泄胸中逆滿以溫欬逆多唾也 又方薑汁

辛散溫肺砂糖甘緩和脾火衰痰清者為宜 又

方皂莢滌除痰垢飴糖緩其暴烈 又方酒浸肥

皂取吐較飴九者尤甚 又方以巴豆炮黑勿破

碎服者恐其毒烈傷犯喉吻也此惟冷積年久嗽

不止者宜之 又方服芥子入肺搜痰即控涎丹

之意

射干煎 治欬嗽上氣方

生射干 欬冬花各二兩 紫苑

細辛 桑白皮 附子

甘艸各半兩 白蜜 竹瀝

生薑汁

各一升一云乾薑五兩

飴糖三兩

右十一味先以射干內白蜜竹瀝中煮五六沸去之咬咀六物以水一升合浸一宿煎七上七下夫

滓乃合飴糖薑汁煎如舖服如酸棗一九日三劑

者夜二不止加之以止為度

衍欬嗽上氣有腎寒肺熱之分此治腎虛火乘於肺

故用附子攝腎歸源細辛下通腎氣射干上散肺

結欬冬花紫苑滋燥潤肺薑汁開發桑皮竹瀝之

性流動膠飴白蜜之滯也

杏仁煎 治冷嗽上氣鼻中不利方

杏仁五合 五味子 欬冬花各三

紫苑 乾薑各二兩 桂心三兩

甘艸四兩 麻黃斤

右八味以小一斗煮麻黃取四升治諸藥為末又

內膠飴半斤白蜜一斤合內汁中攪合相得煎如

飴先食服如半棗許日三服不知者加之以知為

度

衍肺氣通於鼻肺為容邪所遏以故鼻息不通喘嗽

痰清非麻黃湯不能開發肺氣加乾薑以溫腎氣

欬冬紫苑以溫肺經五味以收麻杏之散耳

又方 治怒暴嗽失聲語不出方

杏仁 薑汁 砂糖

蜜各一 紫苑 五味子各二

通艸 貝母各四 桑皮 五兩

右九味浸咀以水九升煮取三升去滓內杏仁脂

薑汁蜜糖和攪微火煎取四升初服三合日再夜

後稍加之

肺為諸氣之門戶暴嗽失音必有寒飲阻積肺絡

故用杏仁疎洩肺滿通艸通達肺氣薑汁開通經

絡桑皮瀉肺之熱五味收肺之津得薑汁之辛散

千金要方卷六

姜

掃葉山房

杏仁之開泄可無斂閉邪風之患紫苑通肺經之

通貝母消肺鬱之痰沙糖理胃中之滯蜂窩滋肺

上之燥也

通聲膏方

五味子 款冬花 通艸各二

人參 青竹皮 細辛

桂心 菖蒲各二 杏仁

薑汁各 白蜜一升 棗膏三升

酥五升

右十三味 咀以水五升微火煎三上三下去滓

肉薑汁棗膏酥蜜煎令調和酒服棗大二枚

肺臟方中酥蜜膏專滋肺胃之燥以化其氣此方

專滋脾肺之津以通其聲方中五味人參滋肺之

氣欬冬竹茹清肺之燥桂心細辛搜肺之邪通艸

菖蒲利肺之竅杏仁酥蜜薑汁棗膏滋培津氣而

通其聲大腸主津故以此方棣之此門

杏仁飲子 治暴熱嗽方

杏仁 十枚 紫蘇子 一升 橘皮 一兩

柴胡 四兩

右四味咬咀以水一斗煮取三升分三服

千金要方卷六

姜

掃葉山房

義嗽起於暴是實非虛杏仁蘇子橘皮皆泄肺之品

柴胡散寒熱之邪

蘇子煎 治上氣咳嗽方

蘇子 杏仁 生薑汁

地黃汁 白蜜各二

右五味搗蘇子以薑汁地黃汁澆之以絹絞取汁

更搗以汁澆又絞令味盡去滓熬杏仁令黃黑治

如脂又以向汁澆之絹絞往來六七度令味盡去

滓內蜜合和置銅器中於湯上煎之令如飴每服

方寸七日三夜 崔氏無 地黃汁

又方

乾薑末 五兩 膠飴一斤

右二味和令調蒸五升米下冷以棗大舍化稍稍咽之日五夜二

衍欬嗽日久而客邪未除蘊化為熱故用薑汁散邪

地黃滋熱且製入蘇子順氣味中更以杏仁熬黑

如大陷胸丸中法專滌胸中宿垢內蜜蒸煎如飴

緩行搜逐而無驟傷中氣之患如或病人肥盛素

多痰濕者宜從崔氏去地黃例 又方單用乾薑

之辛散肺胃之寒膠飴緩其辛燥類令喻化與上

千金方卷之六

天

掃葉山房

方藥品雖變而功則一擄

芫花煎 治新久嗽方

芫花

乾薑 各二兩

白蜜 二升

右二味為末內蜜中令相和微火煎令如糜每服

如棗核大一枚日三夜一以知為度欲利者多服

深師以治冷飲嗽又治三十年久嗽者以水五升

衍煮芫花取三升去滓內薑加蜜合煎如糜服之

以芫花走而不守之味製入乾薑守而不走味中

使邪氣去而正氣守內入蜜中以和走守之性

欬冬煎 治同前

乾薑

紫苑 各三兩

五味子 二兩 芫花 一兩 煎

右五味咬咀以水一斗煮三味取三升半去滓內

芫花乾薑末加蜜三升合投湯中令調於銅器中

微火煎令如飴每服半棗許日三

衍於芫花煎中加欬冬紫苑以緩 芫花乾薑之烈五

味以收耗散之津藥品雖倍而功反稍遜於前

治三十年欬嗽或喘或欬欬雖不同悉主之方

細辛

欬冬花

防風

紫苑 各三兩

紫蘆 二兩

蜀椒 五合

右六味咬咀取藜蘆先著銅器中次紫苑次細辛

千金方卷之六

天

掃葉山房

次欬冬次椒以大棗百枚間著諸藥間以水一斗

二升微火煮令汁盡出棗曝令燥雞鳴時服半棗

不知明旦服一枚以胸中溫溫為度若強人欲嗽

吐者可小增服之便吐膿囊裏結吐後勿令飲食

欬愈止藥藥勢靜乃食不爾令人吐不已

衍方中細辛欬冬叻風紫苑蜀椒等味助藜蘆湧吐

之性製入大棗之中蒐逐腸胃積垢峻藥緩攻之

妙用無以逾之

治三十年久嗽方

百部根二十斤搗取汁煎如飴服一方寸七日

三服外臺和餅一斤熬成煎以溫粥飲調下深師方以白蜜二斤更煎五六沸服二合

義衍久嗽諸藥不應寸白蠱生肺中故用百部專力殺

蟲匹馬單刀不假他味佐使外臺之飴深師之蜜

不過借甘溫之味引入蟲口近世師家治久嗽方

不問有蟲無蟲藥用此味每致苦寒傷伐胃氣而

致天札者不少是豈先哲立方之過歟

又方

紫苑二兩 欵冬花三兩

右二味治下篩先食飲服方寸七日三服七日瘥

義衍此方無問暴嗽久嗽虛嗽實嗽有痰無痰有血無

天衣堂藥卷六

搗藥山房

血俱無妨礙但客邪勢甚者無益於治也

又方

白蜜一斤 生薑二斤
取汁

右二味先秤銅銚勛兩訖內蜜復秤知數次內薑

汁以微火煎令薑汁盡惟有蜜斤兩乃止且服如

棗大含一丸日三服禁一切雜食

義衍蜜取甘潤薑取辛散辛甘合劑專破痰結但火逆

咽痛非其所宜

治久嗽不瘥方

兔屎四十九枚 礞砂二分

胡桐津一分

右三味為末蜜丸如梧子大每服三九以粥飲下

義衍日三服吐令物盡即瘥

免屎為目科消翳要藥故千金取治肺中宿滯得

礞砂之攻堅破積梧桐津之搜滌痰垢為形濁氣

穢久嗽之峻藥但梧桐津世鮮收取乃桐花開時

飄忽沾衣污不可滌者是專取滯惡之物以攻濁

惡之垢也吾觀閩人用桐皮漬水沐髮則不染塵

垢用皮代津未為不可礞砂善爛金銀礞砂能柔

五金無礞砂之毒劣以之代用亦無不可

千金衍義卷六

搗藥山房

方

紫苑 貝母 半夏

桑白皮 百部 射干

五味子各五分 皂莢 乾薑

欵冬花 細辛 橘皮

鬼督郵各四分 白石英 杏仁各八分

蜈蚣二枚

右十六味為末蜜和丸如梧子大飲服十九日再

服稍加至二十九崔氏無半夏射干乾薑橘皮鬼

以煮棗湯送下芩根白皮一兩半

衍義 入嗽積年不愈必有宿垢雷伏於中呀聲一發則

伏火內動所以坐臥不安故用皂莢射干督郵之

屬辟除惡毒兼石英薑辛助力祛邪紫苑欵冬等

味助供佐使之用耳

欵冬丸 治三十年上氣欵嗽喉膿血喘息不得

臥方

欵冬花

乾薑

蜀椒

吳茱萸

桂心

菖蒲

人參

細辛

蕤花各五分

紫苑

甘艸

桔梗

千金方卷之六

攝藥山房

防風

芫花

茯苓

皂莢各三分

右十六味為末蜜丸如梧子大酒服三九日三

衍義 前方專辟痰垢此方兼散滯血滯血未有不兼痰

垢者所以仍用皂莢滌垢蠶辛破結更須蕤花利

水桂心散滯人參茯苓甘艸扶助胃氣以振祛邪

之力餘皆疎風治嗽之常味也

又方

欵冬花

紫苑

細辛

蜀椒

桂心

菖蒲

人參

甘艸

防風

石斛

芎藭

當歸

藁木

白朮

半夏

天雄

鍾乳

麻黃各二兩

獨活二兩

烏頭

附子

芫花各二兩

桃仁二十枚

大棗二十枚

右二十四味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日

二服不知加之酒漬服亦得

衍義 此以麻黃附子細辛湯破除陰邪為主而兼白朮

鍾乳雄烏半夏芫花甘艸激諸味振發辛烈之性

千金方卷之六

攝藥山房

加以散血祛風破結利竅更濟以人參大力無堅

不克但當諒其人元氣能任與否庶幾無誤治之

失

又方

欵冬花

紫苑

乾薑

桂心各三分

細辛三分

杏仁

皂莢

礬石

菖蒲

烏頭各一分

川椒五合

吳茱萸六合

右十二味為末蜜丸如梧子大酒服五九日三夜

一二十年嗽不過五十日愈患欵嗽喉鳴上氣服

一劑永痊

義行 礬石治腹中堅癖之峻藥兼用皂莢滌除痰垢滯

以烏椒薑辛桂萸葛杏辛烈利竅等味得款冬紫

苑引入肺經其襄迅掃之功自紫苑九至此四方

首主宿垢次兼滯血三破陰邪此攻堅癖皆蕩練

臟腑之劑不可與尋常治嗽等論也

治肺傷咳唾膿血腸澀背痛不能食惡風目暗眊

眊足脛寒冷方

白膠 生薑各五兩 桂心

人參 紫苑各二兩 地黃切半

桑白皮切二升 川芎 大麻仁

飴糖各一升 大麥三升 大棗二十枚

右十二味咬咀以水一斗五升煮麥取一斗去麥

內藥者取三升分五服

白膠乃楓香脂其性疎通善於開發肺氣故取以

治咳唾膿血川芎地黃得桂心和榮之力紫苑散

結之功可無委積頑湧之虞且人參助氣於上麻

仁滋化於下桑皮瀉肺氣之滿大麥降肝氣之逆

大棗飴糖滋腸胃之津氣也

五味子湯 治唾中有膿血牽胸脇痛方

五味子

桔梗

紫苑

甘艸

川芎各二兩

桑皮

地黃各五兩

竹茹三兩

赤小豆升

右九味咬咀以水九升煮取一升七分合分三服

義行 此火乘於肺所以壅中有膿血而胸脇牽痛乃血

不榮筋之故故用五味紫苑滋培津血枯梗桑皮

疎泄肺氣竹茹小豆清膈土火生地逐傷中血川

斷通行經絡甘艸平調中氣不獨為火乘肺氣之

專藥并可為熱傷肺痿之神丹

竹皮湯 治欬逆下血不怠方

生竹皮兩

紫苑二兩

飴糖一斤

生地切一升

右四味咬咀以水六升煮取三升去滓分三服

欬逆下血而用竹茹清胃紫苑和血飴糖滋津地

黃逐血然必不經火焙之鮮者方有散血之功若

止血之用必明標乾地黃矣設無鮮者不妨以乾

者酒浸或稍加柱心熱因熱用要在臨時權變可

也

百部丸 治諸嗽不得氣息唾膿血方

百部根三兩

升麻半兩

桂心

五味子 甘草 乾薑

紫苑各一兩

右七味為末蜜丸如梧子大每服三九日三以知為度

衍義嗽不得息明是火逆為患故用百部導之於下升

麻散之於上薑桂之辛以散火五味之酸以斂津紫苑甘艸既能治嗽并可和血

治上氣欬嗽喘息喉中有物唾血方

生薑汁 杏仁各二升 猪膏二合

蜜 飴糖各一升

千金方衍義卷六 掃葉山房

右五味先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭合盡

搗如膏合薑汁糖蜜等合煎冷可丸每服如杏核

大一枚日夜六七服漸漸增加之

衍義喉中氣結似乎有物故薑汁杏仁開發肺氣飴糖

蜂蜜猪脂并滋津血然惟大便實者為宜

治一切肺病欬嗽膿血及唾血不止方

好酥三十斤三遍煉停取疑當出醜服一合

日三服瘥止一切藥皆不出此神方

又方

三煉酥如雞子黃適寒溫灌鼻中日二夜

衍義肺欬而用醜醜以滋津血之燥乃治無痰乾欬之

的方 一法用乳酥烱化灌鼻孔以鼻為肺竅也

鍾乳七星散一名吸散 治寒冷欬嗽上氣胸滿唾膿

血方

鍾乳 礬石 欬冬花

桂心等分

右四味治下篩作如大豆七聚七星形以小筒吸

取酒送下先食服日三不止加之數試大驗又云

臨臥吸服之

又方

千金方衍義卷六 掃葉山房

鍾乳 細辛 欬冬花等分

天雄 紫苑 石膏等分

右六味治下篩取如大豆七聚如前法吸之日二

只得食粥七日嗽愈乃止若大豆聚不知小益之

勿太多

七星散 治三十年欬嗽方

欬冬花 紫苑 桑白皮

代赭 細辛 伏龍肝各一

右六味治下篩作七星聚如菹豆者以竹筒口當

藥上一一吸咽之令藥入腹中先食日三九丸服

四日日復作七星聚以一瓣肉炙令熟以展轉藥
聚上令藥悉徧肉上仰以阻精細咽汁令藥力
欲欲割割然壽氣入咽中藥力盡總咽却取癢止

義衍 七星之名聚其聚形以示靈驗之意方用鍾乳温
肺為主礬石滌痰欬冬下氣桂心散結利關節也

又方除去礬石桂心易入石膏佐鍾乳為去熱之
嚮導天雄烈勝桂心佐鍾乳以破結積之氣紫苑
佐欬冬以通肺氣細辛專利關節也又以代赭之

重以鎮逆氣佐伏龍肝之暖以散滯血其餘欬冬
紫苑桑皮細辛雖治嗽常品專藉血肉同氣之物

千金方義卷之八

天

掃葉山房

以為內應獨不用豕肉者以其能助痰內動風氣
且又七星所禁也

治嗽重法

以熟艾薄薄布紙上紙廣四寸後以薰黃末薄
布艾上務令調勻以荻一枚如紙長捲之作十

枚先以火燒纏下丟荻煙從孔出口吸煙咽之
取吐止明日復熏之如前日一二止自然可瘥

待食白粥餘皆忌

又方

薰黃一兩研令細以蠟紙并上薰黃相入調勻

捲之如前法熏之亦如上法日一二止以吐為
度七日將息後以羊肉羹補之

又方

藍青布廣四寸上布艾艾上布青礬末礬上布
少薰黃末又布少鹽又布少豉末急捲之燒令

著內燥罐中以紙蒙頭便作一小孔吸取煙細
細咽之以吐為度若心胸悶時略歇烟盡止日

一二度用三捲不盡瘥三七日慎油膩

義衍

三法總為頑痰固結藥所不應者設若有沉寒則
兼熟艾有毒熱則兼蜂蜜有積垢則兼青礬及鹽

千金方義卷之八

天

掃葉山房

豉等味咸取薰黃取吐以辟歹毒惡氣也

論曰凡上氣多有服吐藥得瘥者亦有鍼灸得除者

宜深體悟之

灸法

嗽灸兩乳下黑白際各百壯即瘥 又以蒲當乳頭

周匝圍身令前後正平當脊骨解中灸十壯 又以

繩橫量口中折繩從脊灸繩兩頭邊各八十壯三報

三日畢兩邊者是口合度 灸從大椎數下行第五

節下六節上穴在中間即神道穴隨年壯并主上氣灸手

屈臂中橫文外骨捻頭得痛處十四壯 上氣欬嗽

知氣氣滿食不下灸肺募五十壯 上氣逆短氣
風勞百病灸肩井二百壯 上氣短氣欬逆胸背痛
灸風門熱府百壯 上氣欬逆胸滿短氣牽背痛灸
巨關期門各五十壯 上氣胸滿欬逆短氣灸雲門
五十壯 上氣欬逆胸痺背痛灸胸膺百壯不鍼
上氣欬逆短氣灸膻中五十壯 上氣氣閉欬逆咽
冷聲破喉積灸天瞿五十壯 一名天突
逆氣虛勞寒損憂志筋骨變痛心中欬逆泄疰腹滿
喉痺頸項強腸痔痔血陰急鼻衄骨痛大小便澀鼻
中乾煩滿狂走易氣凡二十病皆灸絕骨五十壯穴
在內踝二三寸宛宛中

痰飲第六 論一首 方四十首 灸法一首

論曰夫飲有四何謂師曰有痰飲有懸飲有溢飲有
支飲問曰四飲之證何以爲異師曰其人素盛今瘦
水走腸間漑漑有聲謂之痰飲飲後水流在脇下欬
唾引痛謂之懸飲飲水過多水行歸於四肢當汗出
而汗不出身體疼重謂之溢飲其人欬逆倚息短氣
不得臥其形如腫謂之支飲
凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人眩而顛先
寒卽爲虛先熱卽爲實故水在於心其人心下堅築

築短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲
水在於脾其人少氣身體重水在於肝脇下支
滿噎而痛水在於腎心下悸
夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下
甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆天下後喜虛
耳脈偏弦者飲也肺飲不弦但喜喘短氣支飲亦喘
而不能眠加短氣其脈平也 留飲形不發作無熱脈
微煩滿不能食脈沉滑者留飲病病有留飲者脇下
痛引缺盆噉轉甚其人欬而不得臥引項上痛欬者
如小兒掣癎狀夫胸中有留飲其人如氣而溺四肢
歷節痛其脈沉者有留飲也 心下有留飲其人背寒
冷大如手病人肩息上引此皆有溢飲在胸中久者
缺盆滿馬刀腫有劇時此爲氣飲所致也膈上之病
滿喘欬吐痰則寒熱背痛惡寒自汗自出其人振振
身劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉移在一臂
其脈沉細此非風也必有飲在上焦其脈虛者爲微
勞榮衄氣不周故也冬自瘧 一本久作久自瘧
病痰飲者當用溫藥和之

小半夏湯 病心腹虛冷 遊痰氣上胸脇滿不下
食嘔逆者方

半夏一升 生薑一斤 橘皮四兩

右三味咬咀以水一斗煮取三兩分三服 若心

中急及心痛內桂心四兩 若腹滿痛內當歸三

兩 處弱及老人尤宜服之 一方用人參二兩景

無橘皮 人參

衍義金匱小半夏湯治支飲不渴更合嘔吐噦中橘皮

湯專取辛溫散結之味以定心腹虛冷等證總以

溫理中氣為主若心中急痛寒熱糾結加桂心以

散之血虛不能以絀血脹滿腹痛加當歸以和之

羸弱不能自主則加人參以補之此金匱法外法

也

又方

半夏一升 生薑一斤 桂心三兩

甘艸一兩

右四味咬咀以水七升煮取二升半分三服

衍義小半夏湯金匱本方只薑半二味今加桂心之散

兼甘艸之緩即苓桂朮甘湯之變法

甘艸湯 治心下痰飲胸膈支滿目眩方

甘艸二兩 桂心 白朮各二兩

茯苓四兩

右四味咬咀以水六升衍漬煮取三升去滓服一

升日三小便當利

衍義金匱本名苓桂朮甘湯此名甘艸湯傷寒門中又

名茯苓湯衍義見前十一卷中茯苓湯下

十棗湯 治病懸飲者若下後不可與也凡上氣

汗出而欬者此懸飲也 方見本卷 欬嗽篇中

小青龍湯 病溢飲者當發其汗范汪用大青龍

湯 方見本卷 欬嗽篇中

木防己湯 治膈間有支飲其人喘滿心下痞堅

而色黧黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不

愈者用此方

木防己三兩 桂心二兩 人參四兩

石膏 雞子大 十二枚

右四味咬咀以水六升煮取二升分二服虛者即

愈實者三日復發發則復與若不愈去石膏加茯

苓四兩苳朮三合微下利即愈 一方不加茯苓

衍義趙以德註金匱方曰支飲在膈間氣血皆不通利

氣不利則與水同逆於肺而發喘滿血不利則與

水雜揉結於心下而為痞堅腎氣上應水飲腎水

之色黑血凝之色亦黑故黧之色見於面也脈沉

為水緊為寒兆別有寒邪即水氣之寒也醫雖以吐下之法治然藥不切於病故不愈用木防已以散靨飲結氣石膏主心肺逆氣人參助胃祛水桂心和榮開結且支飲得溫則行若邪客之淺在氣分多而虛者服之即愈若邪客之深在血分多而實者則愈後必再發以石膏為氣分之藥故去之芒硝為血分藥能治痰粟堅茯苓伐腎利水而為芒硝之佐故加之

厚朴大黃湯 夫酒客飲者必致吐血此坐久飲過度所致其脈虛者必胸滿胸中本有支飲此

方主之

厚朴 一尺 大黃 六兩 枳實 四兩

右三味咬咀以水五升煮取二升溫分二服

遊此即小承氣湯以大黃多遂名厚朴大黃湯若厚

朴多即名厚朴三物湯此支飲胸滿必緣其人素多濕熱瀰飲上逆所致故用蕩滌中焦藥治之

支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯治之方見十七卷肺癰篇中

嘔家不渴渴為欲解今反不渴心下有支飲故也小

半夏湯主之又有先渴即嘔者此為水停心下小半夏加茯苓湯主之

千金方卷之六

胃

掃葉山房

小半夏加茯苓湯 治卒嘔吐心下痞膈開有水

目眩悸方

半夏 一升 生薑 半斤 茯苓 三兩

右三味咬咀以水七升煮取一升五合去滓溫分

再服胡洽不用茯苓用桂心四兩

衍嘔家有痰嘔盡痰去而渴者為欲解與傷寒之服

小青龍湯已渴者寒去欲解同義今反不渴是積

飲尚留去之未盡故用半夏散結勝濕生薑散氣

止嘔千金更加茯苓佐之與治卒嘔吐心下痞膈

間有水眩悸同法

千金方卷之六

胃

掃葉山房

五苓散 假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而顛眩

水也此方上之方見前九卷傷寒上

椒目丸 治腹滿口乾燥此腸間有水氣此方主

之

椒目 木防已 大黃 各一

葶藶 二兩

右四味為末蜜丸如梧子大先食飲服一九日三

後稍增口中有津液止渴者加芒硝半兩

衍金匱名已椒黃歷黃丸水積腸間則肺氣不宣膈

鬱成熟而腹滿津液遂不主行而口舌乾燥用木

防已椒目葶藶利水散結而葶藶尤能利腸然腸胃所受水穀之氣邪實腹滿非輕劑所能治必加大黃以瀉之若口中有津液則水去津回可勿藥矣若仍作渴者此痰飲聚於血分必加芫硝以祛逐之

甘遂半夏湯 病者脈伏其人欲自利利者反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也此方主

之

甘遂 大者三枚

半夏 十二枚以水升煮取半升

芍藥 三枚

甘艸 一升煮取半升

千金方衍義卷六

星

掃葉山房

右四味以蜜半升內三藥汁合一升半煎取入合

頓服之

衍義 留飲堵塞竅隊胃氣不得轉輸故脈伏不顯若留

飲既下胃氣受傷必欲自利自利而反快者中焦

所塞暫通也通而後積故續堅滿必更用藥盡逐

之然欲直達其積飲莫若甘遂快利用之為君欲

和脾胃除心下堅又必以半夏佐之然芍藥停濕

何留飲用之甘艸與甘遂相反何一方並用蓋甘

艸緩甘遂之性使不急速徘徊逐其所留芍藥木

蠶土中成堅滿又佐半夏以和胃消堅也

大茯苓湯 主胸中結痰飲澀膈下虛滿嘔逆不

得食亦主風水方

茯苓

白朮 各二兩

半夏

桂心

細辛 一作人參

生薑 各四兩

橘皮

附子

當歸 各二兩

右九味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服服

衍義

水飲結於膈下雖有桂苓不得生附不能破除除陰

分之水痺雖有薑半不得生朮不能祛滌胸中之

痰氣橘皮者茯苓之佐細辛者附子之佐當歸也

桂心之佐也

茯苓湯 治胸膈痰滿方

茯苓 四兩

半夏 一升

生薑 一斤

桂心 八兩

右四味咬咀以水八升煮取二升半分四服分極

者加大附子四兩若氣滿者加檳榔三七枚

衍義

痰氣聚於胸中故用小半夏加茯苓湯不得桂心

之辛散難以遲破的之功冷極加附子是指真陽

虛者而言氣滿加檳榔是指痰氣盛者而言非謂

二味可以並入一方也 胃膈嘔吐門中名半夏

湯藥味雖同而分兩不類 似兩存之

大半夏湯 治冷痰飲滯胸膈中不理方

半夏一升 白朮三兩 茯苓

人參 甘艸 桂心

附子各二兩 生薑八兩

右八味咬咀以水八升者取三升分三服

衍義金匱大半夏湯但用半夏人參甘艸三味水蜜和煎以治胃反嘔吐此用參附木附桂附合苓桂木

甘湯仍用金匱三味以治冷痰飲滯故不用水蜜和煎而用生薑以滌痰氣也

千金方衍義卷六 吳 掃葉山房

半夏湯 治痰飲滯氣吞酸方

半夏 吳茱萸各三兩 生薑六兩

附子一枚

右四味以水五升煮取二升半分三服老少各半

日三

衍義前方以中氣不運冷痰留積故用參朮佐半夏附子此以曲直作酸故用吳茱萸通達肝氣以佐半夏

附子仍用生薑開鬱痰滯也

乾棗湯 治腫及支滿滯飲方

大棗十枚 大戟 大黃

甘艸 甘遂各二兩 黃芩二兩

芫花 芫花各半兩

右八味咬咀以水五升煮取一升六合分四服空心服以快下為度

衍義此即十棗湯加用甘艸之相反激發大戟芫花逐飲之性更加芫花以佐芫花之破積大黃黃芩以

佐大戟而攻懸飲堅滯也

當歸湯 治留飲宿食不消腹中積聚轉下方

當歸 人參 桂心

黃芩 芍藥 甘艸

芒硝各二兩 大黃四兩 澤瀉

生薑各三兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服

衍義中氣式微不能輸運而致癖積留著水道不利故用參甘歸芍平調血氣硝黃薑桂攻理痰積黃芩

澤瀉分利支河水道而通蘊阻之熱也

治痰飲飲食不消乾嘔方

人參 旋覆花 橘皮

細辛各兩 澤瀉 白朮

杏仁 枳實各二兩 茯苓

半夏

生薑

柴胡

芍藥各三

右十三味啖咀以水九升煮取二升七分合分三服

日二

衍義痰氣阻逆於中非開提於上不能開痰進食降濁

升清故用旋復花杏仁疎泄肺氣半夏枳實開鬱

痰氣人參白朮健運中氣柴胡芍藥調和肝氣細

辛指皮開發滯氣茯苓澤瀉通調水氣使肺氣降

而胃氣升肝氣平而穀氣運滯氣散而正氣安矣

治胸中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水方

千金方卷六

辛

掃葉山房

檳榔十二

生薑

杏仁

相皮各四

半夏八兩

茯苓五兩

橘皮三兩

右七味啖咀以水一斗煮取三升去滓分三服

衍義杏仁開拓胸中之氣薑半夏消滯膈上之痰檳榔茯苓

苓泄利腸中之水柑橘二皮一寒一溫升降上下

諸氣此惟病氣未固元氣未漓者宜之

吳茱萸湯治胸中積冷心嘈煩滿汪洋不下飲

食心胸應背痛方

吳茱萸三兩

半夏四兩

人參

桂心各二

甘艸一兩

生薑五兩

大棗二十

右七味啖咀以水九升煮三升去滓分三服日三

衍義不氣虛寒之人胸中寒熱欲滯積所以汪洋飲食

艱於消尅蘊積而從火化所以嘈煩榮氣不能充

於陽位所以背痛故用黃桂通陽薑半夏滯飲人參

甘艸扶胃進食大棗運行脾津乃大小半夏湯之

發源也

治胸膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或水鳴

多噎口中清水自出脇肋急脹痛不能飲食此

千金方卷六

辛

掃葉山房

皆胃氣弱受冷故也其脈來沉弦細遲悉主之

方

半夏

生薑各五

芍藥三兩

茯苓四兩

旋復花

細辛

橘皮

桂心

人參

甘艸

桔梗各二

右十一味啖咀以水一斗煮取三升分三服病先

有時水下者用白朮三兩去旋復若欲得利者加

大黃二兩須微調者用乾地黃

衍義此亦大小半夏之發源彼以胸痛引背故用吳茱

此以臨急脈痛故用樺心又以口出清水故用旋復花
細辛橘皮桔梗治冷涎泛芍藥佐桂心以治脇
急茯苓佐人參以扶胃弱

治冷熱久澀實不能飲食心下虛滿如水狀方

前胡 半夏 茯苓

生薑各四兩 枳實 白朮

甘艸各三兩 桂心二兩

右八味以咀以水八升煮取三升分三服

前胡 蒼桂木 甘湯滌除痰飲之專藥更合之以小半夏湯茯苓湯枳朮湯但加前胡以下氣也

前胡湯 治胸中久寒滯實膈塞胸膈氣不通利

三焦冷熱不調飲食減少無味或寒熱身重臥不欲起方

前胡 人參 當歸

半夏 甘艸各二兩 大黃

防風 麥冬 吳黃

黃芩各一兩 生薑四兩 杏仁四十枚

右十二味以咀以水一斗煮取三升去滓分三服

漢師方云若胸下滿力大與十二枚此利水亦佳

衍 膈胸塞痛良由冷熱不調故方中寒熱兼濟兩瀉

互投而加下氣滌痰之味

旋復花湯 治胸膈痰結唾如膠不下食者方

旋復花 細辛 前胡

茯苓 甘艸各一兩 生薑八兩

桂心四兩 半夏一升 烏頭五枚

右九味以咀以水九升煮取三升去滓分三服

此以小半夏加茯苓湯滌除痰飲劑中加旋復前胡烏頭桂心細辛甘艸以祛風毒然惟上熱咽乾下元

虛冷者為之合劑若熱邪固結誤投禍不旋踵不可不慎

薑椒湯 治胸中積聚痰飲飲食減少胃氣不足

欬逆嘔吐方

薑汁七合 川椒三合 桂心

附子 甘艸各一兩 橘皮

桔梗 茯苓各二兩 半夏三兩

右九味以咀以水九升煮取二升半去滓內薑汁

煮取二升分三服服三劑止若欲服大散諸五石

丸必先服此湯及進黃蘗丸佳一方不用甘艸

衍 川椒桂附入於二陳湯中但加桔梗舟楫之劑載

諸藥以破胸中冷積寒痰也

諸藥以破胸中冷積寒痰也

諸藥以破胸中冷積寒痰也

諸藥以破胸中冷積寒痰也

諸藥以破胸中冷積寒痰也

諸藥以破胸中冷積寒痰也

諸藥以破胸中冷積寒痰也

薑附湯 治痰冷澀氣嘔沫胸滿短氣頭痛飲食

不消化方

生薑 八兩

附子 四兩 生用 破四

右二味咬咀以水八升煮取二升分四服亦主卒

風

於前方中但取薑汁附子二味辟除冷瘕絞之前

方其力倍專乃乾薑附子湯之變法彼取温中故

用乾薑此取滌痰故用薑汁兩不移易之定法

擦膈散 治心上結痰飲實寒冷心悶方

瓜蒂 二十枚

赤小豆 二七

人參

千金要方卷六

香

掃葉山房

甘艸 各一分

右四味治下節為末酒服方寸七日二亦治諸黃

擦膈者擦動膈上痰飲使之上涌也方用人參甘

艸入於瓜蒂散中使人參助其上涌之力一舉而

傾囊盡出也

斷膈湯 治胸中痰澀方

恒山 三兩

甘艸

松蘿 各兩

瓜蒂 二十枚

右四味咬咀以水酒各一升半煮取一升半分三

服後漸減之得快吐後須服半夏方見本卷前篇

斷膈者斷除膈上痰澀也瓜蒂吐膈中寒實加以

恒山涌膈上調痰松蘿乃松上女蘿氣清味苦能

吐肝膽風痰與赤小豆之涌吐心包熱痰似同而

異吐後服半夏湯以實中土緣恒山瓜蒂皆傷伐

胃氣也

松蘿湯 治胸中痰積熱皆除方

松蘿 二兩

烏梅

梔子 各十枚

恒山

甘艸 各三兩

右五味咬咀以酒三升浸一宿平旦以水三升煮

取一升半去滓頓服之亦可分二服一服得快吐

千金要方卷六

香

掃葉山房

即止

松蘿湯中不用瓜蒂而用梔子以吐肺胃熱痰即

用烏梅以收斂津液與此後用半夏湯一意

杜蘅湯 治吐百病方

杜蘅

松蘿 各三兩

瓜蒂 二七枚

右三味咬咀以水一升二合漬二宿去滓分二服

若一服即吐者止未吐者更服相去如人行十里

久令藥力盡服稀糜一升即定老小用之亦佳

杜蘅下氣消痰以其氣濁故用以助瓜蒂松蘿之

涌吐

蜜煎 治寒熱方

蜜 五合 恒山 甘艸各二兩

右三味取二味咬咀以水一斗煮取二升去滓內

蜜溫服七合吐即止不吐更服七合勿與冷水

又方

蜜 六合 醋 八合

右二味調和平旦頓服須臾猥然欲吐摘之若

意中不盡明旦更服無不大嘔安穩

蜜煎恒山兼甘艸之甘緩與蜜同為戀膈之品專

取緩搜膈上之痰也 又方以蜜醋多服須臾兀

千金方義卷十八

掃葉山房

兀欲吐乘勢以指摘吐之以無瓜蒂恒山等傷胃

之藥故云安穩

治卒頭痛如破非中冷又非中風其痛是胸膈中

痰厥氣上衝所致名為厥頭痛吐之即瘥方

單煮茗作飲三三升許適冷暖飲二升須臾摘

令吐吐畢又飲如此數過劇者須吐膽汁乃止

不損人而渴則瘥

茗味若能達清淨之膈多飲數吐則嘔膽汁亦不

損人

葱白湯 治冷熱膈厥發時頭痛悶亂欲吐不得

香方

葱白 二七 桃葉 一握 一作 珍珠

恒山 烏頭 甘艸 各半

右六味咬咀以酒水各四升和煮取三升去滓內

珠末每服一升吐即止

葱白烏頭能吐風痰然須恒山佐之甘艸和之葱

白桃葉引之珍珠取以安神解毒此為安榮人安

心而用也自療膈散至此八方總皆一系變法

大五飲丸 主五種飲一曰雷飲水停在心下二

曰澀飲水澀在兩脇下三曰痰飲水在胃中四

千金方義卷十八

掃葉山房

曰溢飲水溢在膈上五臟間五曰流飲水在腸

間動搖有聲夫五飲者由飲酒後及傷寒飲冷

水過多所致方

菴菴 遠志 苦參

藜蘆 烏賊骨 白朮

甘遂 大黃 石膏

栝蒌根 桔梗 半夏

紫苑 前胡 五味子

芫薺 葶心 芫花

大戟 葶藶 黃芩

貝母

人參

茯苓

當歸

芍藥各三

甘艸

恒山

山藥

厚朴

細辛

附子各三

巴豆三十

右三十三味治下篩蜜和丸如梧子大飲服三丸

日三稍稍加之以知為度

金匱有四飲之名千金有五飲之治其法則一師

曰其人素盛今瘦水走腸間漉漉有聲謂之痰飲

飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲千金謂之

游飲三日飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出

身體疼重謂之溢飲四日欬逆倚息短氣不得臥

其形如腫謂之支飲千金謂之流飲四飲之外又

有留飲留飲伏在皮下則背惡寒留於脇下則痛

引缺盆平時則短氣而渴四肢歷節痛發則喘滿

吐逆寒熱背痛腰疼目泣自出劇則振振身瞶謂

之飲飲伏飲即留飲之伏而不動者千金合而言

之則為五飲而四飲之中支飲為最劇其留伏之

飲則心脇四肢中外皆病兼有四者之患所以千

金首列留飲大病人飲水多必暴喘滿食少飲多

水停心下微者短氣甚者則悸悸則水在腎也若

心下堅築短氣惡水不欲飲水在心也吐涎沫欲

飲水水在肺也少氣身重水在脾也脇下支滿噎

而痛水在肝也此槩言五飲致病五臟見證之大

端金匱分隸而治千金兼該而行大旨水飲為陰

類緣其入內之真陽雖有濕熱但蘊為粘韌不能

稠厚所以五飲九中必需辛溫益氣以鼓諸藥之

力如人參白朮附子桂心助陽藥也藜蘆恒山涌

吐藥也大戟芫花甘遂葶藶破水藥也大黃芒硝

攻下藥也半夏巴豆滌痰藥也巴豆不獨滌痰兼

能涌吐所以白散用之吐中便具發散之義使軀

殼之水從皮膚而泄也其用甘艸人參芍藥專取

相反之味以激大戟芫花甘遂藜蘆攻伐之力因

方中攻伐之劑過多恐其津隨飲脫是以菴蓉薯

蕷五味茯苓之屬又為必需其餘諸藥或相扶正

或佐去邪總不出五種諸法以為五飲通治也

旋復花九 治停痰游飲結在兩脇腹脹滿羸瘦

不能食食不消飽喜唾乾嘔大小便或瀉或利

腹中搖動作水聲腹內熱口乾好飲水漿卒然

頭眩欲倒脇下痛方

旋復花

桂心

枳實

人參各五分 甘遂三分 吳茱萸

細辛 大黃 黃芩

葶藶 厚朴 芫花

橘皮各四分 乾薑 芍藥

白朮各六分 茯苓 狼毒

烏頭 礞石各八分

右二十味為末蜜丸如梧子大酒服五九日二後

加以知為度延年方無白木狼毒烏頭礞石細辛

皂莢附于各二分蜀椒杏仁防葵各三分地黃四分

痰癖結聚腹脇喜嘔乾嘔眩暈欲倒故用旋復花

李時珍醫藥卷大 辛 攝業山房

開結下氣行水消痰開發肺與大腸水氣之味為

主其間參朮桂心芫花甘遂葶藶大黃等與五飲

丸相同者十餘味更加烏頭乾薑狼毒礞石其破

積散滯之力不減五飲丸中大戟巴豆之烈也

中軍候黑丸 治滯飲停結滿悶目暗方

芫花三兩 巴豆八分 杏仁五分

桂心 桔梗各四分

右五味為末蜜丸如胡豆每服三丸稍增得快下

上 歲 黑丸之名專取杏仁熬黑以滌胸中宿垢與巴豆

破積不殊并取芫花利水桂心散血桔梗上通肺

氣下走大腸所以水腫先從頭面至足頭眩身熱

亦取用之本經治腹滿腸鳴幽幽豈非下走大腸

之一驗乎

順流紫丸 治心腹積聚兩脇脹滿雷飲痰滯大

小便不利小腹切痛膈上寒方

石膏五分 桂心四分 巴豆七枚

代赭 烏賊骨 半夏各三分

右六味為末蜜丸如胡豆平旦服一九加至二九

胡洽有藜蘆從容各三分芫花汪方無石脂半夏有當歸一分從容二分茯苓三分藜蘆五分

李時珍醫藥卷大 辛 攝業山房

紫丸專取代赭煨赤以鎮心下痰滯配以石膏之

寒而化心下結熱并取半夏滌除痰飲烏賊清埋

乾血桂心分解痰血巴豆上涌冷涎下破寒積服

此則痰水順流而下故以名方

治停痰滯飲結在兩脇腹滿羸瘦不能飲食食不

消喜唾乾嘔大小便或澀或利方

旋復花 大黃 附子

茯苓 椒目 桂心

芫花 狼毒 乾薑

芍藥 枳實 細辛各八分

右十二味為末，塗丸如梧子，大飲下三九，日三服，後漸增。

衍金匱大黃附子湯治脇下偏痛發熱以虛寒從下

而上故用大黃附子湯藥下之細辛治陰邪上逆之發熱此治停痰滯飲故加狼毒芫花枳實以佐

大黃之蕩滯乾薑桂心茯苓以佐附子之破結旋復椒目芍藥以佐細辛散熱也

治風氣膈上痰飲方

用不開口苦瓠一枚湯煮三五沸以物裹熨心

膈上

大方金匱卷之六

奎

掃葉山房

衍苦瓠大苦大寒大傷胃氣用以湯煮熨膈者取其引領濁惡之氣從皮毛泄也

治結積留飲滯囊胸滿飲食不消方

灸通谷五十壯

九蟲第七 論三首 方四十五首

論曰人腹中有尸蟲此物與人俱生而為人大害尸

蟲之形狀似大馬尾或如薄筋依脾而居有頭尾長

三寸又有九蟲一曰伏蟲長四尺一曰虻蟲長一尺

三曰白蟲長一寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀

如蠶六曰胃蟲狀如蝦蟆七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰

赤蟲狀如生肉九曰蟻蟲至細微形如菜蟲狀伏蟲

則羣蟲之主也虻蟲貫心則殺人白蟲相生子孫轉

多其母轉大至長四五寸亦能殺人肉蟲令人煩滿

肺蟲令人欬嗽胃蟲令人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名

膈蟲令人多唾赤蟲令人腸鳴蟻蟲居腸之間多

則為痔劇則為癩因人瘡瘕則生諸癰疽癩癧疥

諸蟲無所不為人亦不必盡有有亦不必盡多或偏

有或偏無類婦人常多其蟲凶惡人之極患也常以

白筴艸沐浴佳根葉皆可用既是香艸且是尸蟲所

畏也

大方金匱卷之六

奎

掃葉山房

論曰凡欲服補藥及治諸病須去諸蟲并痰飲宿滯醒醒除盡方可服補藥不爾必不得藥力

治肝勞生長蟲在肝為病恐畏腹中不安方

蠟

艾葉黃連行根皮各三

乾漆四兩

雞子五枚

粳米粉半斤

右五味搗吳茱萸皮為末和藥銅器中煎可丸如

小豆大宿勿食平旦飲服一百丸小兒服五十九

蟲當爛出集驗方無吳茱萸根名雞子丸

衍諸蟲皆從濕熱生化濕熱之治莫善於風藥然蟲

匿之濕皆屬內因內因之濕仍須治內風之藥方

可直達病情如肝勞生長蟲 用蜂蠟至淡之味
以散濕熱之病吳茱萸根走肝取東南走巽位者
以通風氣而治內風乾漆殺蟲然非穀肉之味投
其所喜不能引入其口使之爛出也

治心勞熱傷心有長蟲名曰蠱長一尺貫心為病

方

雷丸

橘皮

桃仁

一作桃皮

石蠶各五分

狼牙六分

貫眾二枚

蠶蠶三七枚

蕪荑

青箱

乾漆各四分

亂髮如雞子大燒

吳茱萸根皮七分

千金方卷六

蠶

掃葉山房

右十二味為末蜜丸如梧子大空腹苦酒下七丸

加至二七九日二服 一方無石蠶

治蟲諸藥如狼牙貫眾蕪荑青箱乾漆吳茱萸根

皆能殺蟲獨雷丸專治心勞生蟲者昔有道士治

楊勳應聲蟲得此而愈以心為虛靈之藏言者心

之聲故其所生之蟲亦靈慧而能應聲也

治脾勞熱有白蟲在脾中為病令人好嘔下蟲方

大麻子八升

東引吳茱萸根一尺大者

橘皮二兩

右三味咬咀以水煎臨時量服凡合禁聲勿語道

作藥蟲當開便不下切忌之

黃根橘皮殺蟲得大麻子引入脾經誘入其口而

殺之

治肺勞熱生蟲在肺為病方

狼牙三兩

吳茱萸根白皮五合

東行桑根白皮升切

右三味咬咀以酒七升煮取一升平旦頓服之

狼芽黃根得桑根白皮引入肺經以殺其蟲為可

白專藥

治腎勞熱四肢腫急蟻蟲狀如茶蟲在腎中為病

千金方卷六

蠶

掃葉山房

方

蕪荑

胡粉

槐皮各一兩

乾漆二兩

貫眾三枚

杏仁四十枚

吳黃五十枚

右七味治下篩平旦以井花水服方寸匕加至一

七半瘥止

蕪荑乾漆貫眾吳黃雖皆殺蟲之品得胡粉引入

於腎始能中的從甘艸粉蜜湯中採出

治蟻蟲方

以好鹽末二兩苦酒半升合銅器中煮數沸宿

不食空心頓服之

又方

珍珠二兩

亂髮如雞大燒末

右二味治下篩以苦酒調且起頓服之肘後方用治三蟲

鹽醋皆日用之品惟是專用二物之醜酸便有化

蠶之功效 蟲乃血之所化故用髮灰以散滯血

珍珠以散濕熱貴賤所異不同主治不能無異

蘼蕪丸 治少小有蚘蟲結在腹中數發腹痛微

下白汁吐閉寒熱飲食不生肌皮肉痿黃四肢

不相勝舉方

蘼蕪

山茱萸

蘼蘆

買眾

天冬

甘菊各四分

雷九

狼牙各八分

空

右八味為末蜜丸如大豆三歲飲服五九五歲已

上以意加之漸至十九加蘼蘆六分名蘼蘆丸治

老小及婦人等萬病腹內冷熱不通急滿胸膈

堅滿手足煩熱上氣不得飲食身體氣腫腰脚不

遂腹內狀如水雞鳴女人月經不調無所不治

本經言蘼蕪碎邪惡除毒取其辛散也買眾雷

九狼牙蘼蘆皆殺蟲之味山茱萸既能治心下邪

氣亦能殺肝腎精血天冬能殺三蟲去伏尸又能

強骨髓甘菊能治惡風濕痺蟲乃風濕所化雖無

殺蟲之功散濕熱即蟲失所養必墮諸殺蟲藥

而下出矣

治蚘蟲方

蘼蘆末以飲臙和服方寸匕不覺加之備急方治燒蟲

治熱患有蚘蟲懊懣方

蘼蘆十分 乾漆 菴竹各二分

右三味治下篩米飲和一合服之日三

治蚘蟲在胃中漸漸羸人方

乾漆外臺 醇酒 白蜜各一升

右三味內銅器中微火煎令可丸如桃核一枚温

酒中宿勿食且服之蟲必下未下更服外臺治燒蟲

又方

取椽實內醇苦酒中浸再宿用綿裹內穀道中

入三寸一日易之集驗方用治長蟲

治曉蟲攻心腹痛方

剉薤苳根二斤以水七升煮取三升先食服之

蟲即死出

又方

鶴虱為末苦酒空腹服方寸七住

又方

七月七日採蒺藜子陰乾燒灰先食服方寸七

日三卽瘥

衍 藿蘆殺蟲借膠引入蟲口 藿蘆走氣分更益以

乾漆破血蕪竹殺蟲化濕熱 乾漆殺蟲酒蜜投

蟲所好 苦棟殺蟲浸酒入綿以內穀道專主肛

門之蠱 蕪苡根逐濕下行能治濕熱生蟲之善

藥 鶴虱苦寒殺蟲得苦酒之酸收使不逆上然

須用天名精子為真否則是偽 刺蒺藜治惡血

千金方義卷六

楊葉山房

破癥瘕積聚專祛風木之邪能治內濕生蟲之專

味

治寸白蟲方

吳茱萸細根一握 熟搗

大麻子三升熬 搗末

右二味以水三升和搗取汁平旦頓服至巳時與

好食令飽須臾蟲出不瘥明且更合服之不瘥三

日服肘后治三蟲以酒漬取汁服

又方

燕薺六分 狼牙四分 白薇二分

右三味治下篩以苦酒二合和一宿次早空腹服

之

又方

胡麻一升 胡粉一兩

右二味為末平旦空腹以猪肉臄汁噉盡卽瘥

又方

以樞子四十九枚去皮月上旬平旦空腹服七

枚七日服盡蟲消成水永瘥

又方

以吳茱萸北陰根乾去土切一升以酒一升浸

一宿平旦分二服凡茱萸皆用細根東引北陰

千金方義卷六

楊葉山房

者良若如指以上大不任用

又方

用石櫛根如茱萸法亦可水煮服

又方

麻仁五升搗取汁分五服亦治小兒蚘蟲

又方

以好麻油二升煎冷熟內葱白三寸令黑便熟

冷頓服之

又方

熬餵令十分燥作末以方寸七內羊肉臄中噉

之

又方

桑根白皮切三升以水七升煮取二升宿勿食
平旦空腹頓服之

又方

檳榔二七枚治下飾以水二升半先煮其皮取
一升半去滓內末頻服暖臥蟲出或不盡更合
服取瘥止宿勿食且服之

黃根走肝麻仁入脾肺故治寸白有效 麩蕪狠

牙疳蟲猛藥白斂散結止痛能解風氣百疾 胡

李時珍本草

主

掃葉山房

麻胡粉皆入於腎隱曲生蟲之專藥 樞子殺肺

中寸白 黃根細者行於經絡以治勝理之蟲

石榴根善透石磷故能治竅隧之蟲 大麻花治

惡風毒血故其仁亦能治風殺蟲 麻油解毒葱

白散風蟲亦風毒所化縱非治蟲之藥實為治蟲

之用專取其潤而導之使下也 錫糖濕熱之味

雖熬本性猶存羊臙之膾投蟲所喜而為厲濕同

氣之治 桑根一味大泄肺氣故能下蟲非湯藥

中配入他藥之比然必生者乃效 檳榔泄瀉中

至高之氣破腹中委積之蟲總取獨用以擅專功

論曰凡得傷寒及天行熱病腹中有熱又人食少腸

胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及下部若齒齲無

色舌上盡白甚者唇裏有瘡四肢沉重忽喜服當

數看其上唇內有瘡唾血唇內如粟瘡者心內懊懣

痛悶此蟲在上蝕其五臟 下唇內生瘡者其人喜眠

此蟲在下蝕其下部人不能知可服此蝕蟲藥不爾

瘳蟲殺人又曰凡患濕賢者多是熱病後或久下不

止或有客熱結在腹中或易水土溫涼氣著多生此

病亦有乾蠶不甚瀉利而下部瘡瘻不問乾濕久則

殺人凡濕得冷而苦利單者黃連及艾葉若參之屬

李時珍本草

主

掃葉山房

皆可用之若病人齒齲無色舌上白者或喜眠煩憤

不知痛癢處或下痢急治下部不曉此者但攻其上

不以上部為意下部生蟲 蝕其肛肛爛見五臟便

死燒艾於竹筒熏之

治傷寒瘧病方

取生雞子小頭中出白入漆灰一合攪令極調

當沫出更內著殼中仰吞之食頃或半日乃吐

下蟲劇者再服盡熱除病愈

傷寒瘧病多由熱傷榮血血結毒聚令人狐疑昏

惑勢劇難堪者即以漆灰破血為主調雞子生吞

引入... 經血分

治濕蘆方

黃連 十分

生薑 十分

苦參 四分

艾葉 八分

右四味咬咀以水一斗煮取三升分三服久者服

三劑

蘆乃濕熱蘊化故以黃連苦參吾燥之味療其濕

熱兼取艾之純陽薑之辛散為同氣之內應母問

何蘆無不宜之

慎膿散 治濕蘆瘡爛 殺除蘆方

千金方義卷下

主

掃葉山房

扁竹 半兩

薤蘆

雷丸

青箱子

女青

桃仁 各三兩

右六味治下篩粥飲服方寸七日三加至二七亦

可酒服

慎膿亦是蟲蘆為患故用薤竹薤蘆殺氣分蟲雷

丸青箱子女青桃仁破血蘆也

青箱散 治熱病有蘆下部生瘡方

青箱子 一兩

橘皮

薤竹 各二兩

薤蘆 四兩

甘艸 一分

狼牙 三分

右六味治下篩米飲和每服一合日三不知稍加

之... 無

青箱薤竹薤蘆狼牙治蘆專藥橘皮甘艸調和中

氣以行藥力

薑蘆湯 治濕蘆方

生薑汁 五合

白蜜 三合

黃連 三兩

右三味以水二升別煮黃連取一升去滓內薑蘆

更煎取一升二合五歲兒平旦空腹服四合日二

方中一寒一熱分解濕熱借蜜引八蟲口濕熱之

蘆無容身之地矣

治蘆創下部癢殺道中生瘡方

千金方義卷下

主

掃葉山房

阿膠

當歸

青箱子 各二兩

艾葉 一把

右四味咬咀以水八升煮取二升半去滓分三服

青箱治蟲艾葉導熱阿膠當歸以和其血

杏仁湯 治蘆方

杏仁 五十枚

苦酒 二升

鹽 一合

右三味和者取五合頓服之小兒以意量之

杏仁上散肺氣下走大腸借酸醎以收上逆之氣

桃皮湯

治蟻蟲蛔蟲及痔蘆蟲食下部生瘡方

桃皮

艾葉 各一兩

槐子 三兩

大棗三核

右四味咬咀以水三升煮取半升頓服之良

行義桃根白皮散血殺蟲艾葉濕血導火槐子益腎清

火大棗入脾以通津液

猪膽苦酒湯 治熱病有膿上下攻移殺人方

猪膽一具苦酒半升和之火煎令沸三上三下

藥成放溫空腹飲三滿口蟲死便愈

行義蜜本肝家濕熱所化猪膽專治肝膽之熱以苦酒

和之乃猪膽導之變法

治濕病下部有瘡蝨蝕人五臟方

去毒術卷本

青 歸藥山房

雄黃

皂莢各一分

麝香

硃砂各二分

右四味為末蜜和搗萬杵初得病酒服如梧子大

一九日二若下部有瘡取梧子大末內下部日二

行義雄黃解毒殺蟲皂莢滌飲開痺麝香和榮利竅硃

砂碎邪以安神氣

雄黃兌散 治時氣病驛下部生瘡方

雄黃半兩

桃仁一兩

青箱子

黃連

苦參各三兩

右五味為末綿裹如棗核大內下部亦可取汁服

方寸七日三

治下部醫瘡方

青黛

黃連

黃蘗

丁香各一兩

麝香一分

右五味治下篩以小棗大內下部中日一度重者

棗大和猪脂二三合灌下部中日二度

治下部生瘡方

濃煮桃皮煎如錫取內下部若口中有瘡含之

治濕驛方

取生薑刮去皮斷理切之極熟研取汁一升半

去毒術卷本

青 歸藥山房

又以水一升半合和相得平旦空腹服之仍削

生薑二枚如蘭大以楸葉桃葉數重裹訖於爐

灰火中燒令極熱內下部中食頃若濕盛者三

旦作頻服無有不瘥

治蟲蝕下部方

胡粉

雄黃

右二味等分為末著穀道中亦治小兒

治病醫蟲方

燒馬蹄灰作末以猪脂和傅綿繩上內下部中

日五度

治大孔蟲瘻方

蒸大棗取膏以水銀捻和長三寸綿裹訖宿內
大孔中明旦蟲皆出水銀損腸宜慎之

治傷寒熱病多睡變成濕壘四肢煩疼不得食方

羊桃十斤切搗令熟煖湯三斗淹浸之日正午
時入中坐一炊久不過二度瘥

治熱病蝱毒令人喜寐不知痛處面赤如醉下利

膿血當數視其人下部孔稷稷然一云稷稷然赤卽

醫瘡也劇困殺人見人肝肺服藥不瘥可熏之

之方

千金方卷十八

上

掃葉山房

以泥作小罌令受一升竹筒一枚如指大一頭

橫穿入罌腹中一頭內入谷道中淺入可取熟

艾如雞子大著罌中燃之於罌口吹煙令入人

腹艾盡乃止大人可益艾小兒減之羸者勿多

多亦害人日再熏不過三作蟲則死永斷亦可

未燒雄黃如此熏之

衍下部壘瘡雄黃散最捷方中雄黃殺蟲桃仁逐

血黃連皆參專解濕熱 連葉青黛散濕熱腐香

達竅隨丁香開導熱邪之去路 桃葉殺蟲下專

上舍俱無妨礙 削生薑導以揪葉裹內下部如

無楸葉桃葉亦可代用不必二葉並裹也 胡粉

入腎雄黃入心為殺陰毒瘻瘡之專藥 馬蹄散

血碎惡殺蟲亦可應用 水銀為殺蟲猛藥雖和

棗膏見熱本質猶動大能損腸故云宜慎 羊桃

歷丹石毒亦能化蟲壘 艾熏以辟下部陰囊加

雄黃尤效

真入千金方衍義卷十八

千金方衍義卷十八

上

掃葉山房

孫真人千金方衍義卷十九

長洲縣 王著
南沙唐世 甄客核

腎臟方凡八類

腎臟脈論第一 論一首

論曰腎主精腎者生來精靈之本也為後宮內官則為女主所以天之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生者也故生來謂之精精者腎之藏耳者腎之官也腎氣通於耳耳和則能聞五音腎在竅為耳然則腎氣上通於耳下通於陰也左腎王右腎

千金方卷十九

掃葉山房

癸循環元宮上出耳門候間四遠下迴王海俠存左右與臍相當經於上焦榮於中焦衛於下焦外主骨內主膀胱腎重一斤一兩有兩枚神名澀澀主藏精號為精藏隨節應會故云腎藏精精舍志在氣為欠在液為唾腎氣虛則厥逆實則脹滿四肢正黑虛則使人夢見舟船汚人得其時夢伏水中若有畏怖腎氣盛則夢腰脊兩解不相屬厥氣客於腎則夢臨淵没居水中

凡腎臟象水與膀胱合為腑其經足少陰與太陽為表裏其脈沉相於秋王於冬冬時萬物之所藏百蟲

伏鬱陽氣下陷陰氣上昇陽氣中出陰氣冽而為霜遂不上昇化為霜雪猛獸伏熱螺蟲匿藏其脈為沉沉為陰在裏不可發汗發之者如螺蟲出見其霜雪陰氣在表陽氣在裏慎不可下下之者傷脾脾土弱即水氣妄行如魚出水蠅入湯重客在裏慎不可重藥之逆客其息則喘無持客熱令口爛瘡陰脈且解血散不通正陽遂厥陰不往從客熱狂入內為結胸脾氣遂弱清澗痢通

千金方卷十九

掃葉山房

冬脈如營冬脈者腎也北方水也萬物之所以含藏也故其氣來沉以搏故曰營反此者病何如而反其氣來如彈石者此謂太過病在外其去如數者此謂不及病在中太過則令人解你脊脈痛而少氣不欲言不及則令人心懸如病飢飢中清脊中痛小腹滿小便變赤黃

腎脈來喘喘累累如勾按之而堅曰平冬以胃氣為本腎脈來如引葛按之益堅曰腎病腎脈來發如奪索辟辟如彈石曰腎死

真腎脈至搏而絕如以指彈石辟辟然也黃黑不澤毛折乃死

冬胃微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石

而有勾曰夏病勾甚曰金病凡人以水穀為本故人
絕水穀則死脈無胃氣亦死所謂無胃氣者但得真
臟脈不得胃氣也所謂脈不得胃氣者肝不弦腎不
石也

腎藏精精舍志盛怒不止則傷志志傷則善忘前言
腰脊痛不可以俛仰屈伸毛悴色天死於季夏
足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脈也伏行而濡滑骨
髓者也故骨不濡則肉不能著骨也骨肉不相親即
肉濡而却肉濡而却故齒長而枯髮無澤髮無澤者
骨先死戊篤已死土勝水也

千金方卷之五

三

掃葉山房

腎死藏浮之堅按之亂如轉丸溢下八尺中者死土
冬腎水王其脈沉濡而滑曰平反得微澀而短者是
肺之乘腎母之歸子為虛邪雖病易治反得弦細而
長者是肝之乘腎子之乘母為實邪雖病自愈反得
大而緩者是脾之乘腎土之剋水為賊邪大逆十死
不治反得浮大而洪者是心之乘腎火之陵水為微
邪雖病即瘥

左手關後尺中陰絕者無腎脈也苦足下熱兩脚裏
急精氣竭少勞倦所致刺足太陽治陽
左手關後尺中陰實者腎實也若恍惚健忘目視眩

疏耳聾悵悵善鳴刺足少陰治陰

右手關後尺中陰絕者無腎脈也苦足逆冷上搶胸
痛夢入水見鬼善麗寐黑色物來掩人上刺足太陽
治陽

右手關後尺中陰實者腎實也苦骨疼腰痛內寒
熱刺足少陰治陰

腎脈沉細而緊再至曰平三至曰離經病四至脫精
五至死六至命盡足少陰脈也

腎脈急甚為骨疼癱疾微急為奔豚沉厥足不收不
得前後緩甚為折脊微緩為洞下洞下者食不化入

千金方卷之五

四

掃葉山房

咽還出大甚為陰痿微大為石水起臍下以至小腹
腫垂垂然上至胃管死不治小甚為洞泄微小為消
癯滑甚為癰癩微滑為骨痿坐不能起目無所見視
見黑花清甚為大癰微清為不月水沉痔

腎脈搏堅而長其色黃而赤當病折腰其裏而散者
當病少而黑脈之至也上堅而大有積氣在小腹與
陰名曰腎痺得之沐浴清水而臥

扁鵲曰腎有病則耳聾腎在竅為耳然則腎氣上通
於耳五臟不和則九竅不通陰陽俱盛不得相營故
曰關格關格者不得盡期而死也

腎在聲為呻在變動為慄在志為恐恐傷腎精氣并
為腎則恐藏主冬病在藏者取之并

病先發於腎小腹腰痛脛痠一日之膀胱背脊痛
痛小便閉二日上之心心痛三日之小腸脹四日不
已死冬大晨夏晏晡病在腎夜半慧日乘四季甚下
晡靜

假令腎病中央若食牛肉及諸土中物得之不者當
以長夏時發得病以戊巳日也

凡腎病之狀必腹大脰腫痛喘咳身重寢汗出憎風
虛即胸中痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經足少

陰太陽血者腎脈沉之而大堅浮之而大緊若手足

骨腫厥而陰不與腰脊痛小腹腫心下有水氣時脹
閉時泄得之浴水中身未乾而合房內及勞倦發之

腎病其色黑其氣虛弱吸吸少氣兩耳苦聾腰痛時
時失精飲食減少膝以不清其脈沉滑而遲此為可

治宜服內補散建中湯腎氣丸地黃煎春當刺涌泉
秋刺伏留冬刺陰谷皆補之夏刺然谷季夏刺太谿

皆瀉之又當灸京門五十壯背第十四椎百壯

邪在腎則骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛
大便難肩背頸項強痛時眩取之涌泉崑崙而視有血

者盡取之有所用力舉重若入房過度汗出而浴水
則傷腎

腎中風 關 腎中寒 關

腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻

頭汗其足逆寒大便反堅一云面反瘦

腎脹者腹滿引背中央然腰髀一作痛

腎著之病其人身體重腰中冷如水狀一作如水洗

水中形反不渴小便自利食飲如故是其證也病屬

下焦從身勞汗出衣裏冷濕故久久得之

腎著之為病從腰以下冷腰重如帶五千錢

診得腎積脈沉而急若脊與腰相引痛饑則見飽則

減小腹裏急口乾咽腫傷爛目眦眦骨中寒主臍厥

善忘色黑腎之積名曰奔豚發於小腹上至心下如

豚奔走之狀上下無時久久不愈病喘逆骨痿少氣

以夏丙丁日得之何也脾病傳腎腎當傳心心適以

夏王王者不受邪腎復欲還脾脾不肯受因流結為

積故知奔豚以夏得之腎病手足逆冷面赤目黃小

便不禁骨節煩疼小腹結痛氣衝於心其脈當沉細

而滑今反浮大其色當黑而反黃此是土之克水為

大逆十死不治

羽音人者主腎聲也腎聲呻其音瑟其志恐其經足少陰厥逆太陽則榮衛不通陰陽翻祚陽氣內伏陰氣外昇昇則寒寒則虛虛則厲風所傷語音蹇吃不轉偏枯脚偏跛蹇若在左則左腎傷在右則右腎傷其偏枯風體從鼻而分半邊至脚緩弱不遂口亦欬語聲混濁便利仰人耳偏聾寒腰背相引甚則不可治腎湯主之方見本卷補益篇中又呻而好恚恚而善忘恍惚有所思此為土剋水陽擊陰氣伏而陽氣起起則熱熱則實實則怒怒則忘耳聽無聞四肢滿急小便赤黃語音口動而不出笑而看人此為邪熱傷腎

七 掃葉山房

甚則不可治若面黑黃耳不應亦可治腎病為瘧者令人悽悽然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然身掉不定手足寒恒山湯主之方見十卷中若其人本來不吃忽然嘗吃而好噎恚反於常性此腎已傷雖未發覺已是其候見人未言而前開口笑還閉口不聲舉手柵腹一作此眼此腎病聲之候也虛實表裏浮沉清濁宜以察之逐以治之黑為腎腎合骨黑如烏羽者吉腎主耳耳是腎之餘其人水形相比於上羽黑色大頭曲而廣頤小肩大腹小手足發行搖身下尻長背延延也不敬畏善欺給人戮死耐秋久不耐

春夏春夏感而生病主足少陰汗汗然耳大小高下厚薄偏圓則腎應之正黑色小理者則腎小小即安難傷祖理者則腎大大則虛虛則腎寒耳聾或鳴汗出腰痛不得俛仰易傷以邪耳高者則腎高高則實實則腎熱背急綴痛耳膿血出或生肉塞耳耳後陷者則腎下下則腰尻痛不可以俛仰為狐疝耳堅者則腎堅堅則腎不受病不病腰痛耳薄者則腎脆脆則傷熱熱則耳吼聞善病消瘴耳好前居牙車者則腎端正端正則和利難傷耳偏高者則腎偏欹偏欹則善腰尻偏痛凡人分部骨陷者必死不免俠勝肱

八 掃葉山房

并太陽為腎之部骨當其處陷也而瘵氣通於內外亦隨而應之沉濁為內浮清為外若色從外走內者病從外生部處起若色從內出外者病從內生部處陷內病前治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主外陰主內凡人生死休否則藏神前變形於外人腎前病耳則為之焦枯若腎前死耳則為之黧黑焦癯若天中等分墓色應之必死不治看應增損斟酌促除不出四百日內促則旬月之間腎病少愈而卒死何以知之曰黃黑色履黠如拇指應耳此必卒死腎絕四日死何以知之齒為黑黑面為正黑目中黃

腰中欲折白汗出如流面黑目青一作腎氣內傷病因雷積入日當亡是死變也面黃目黑不死黑如焔死吉凶之色天中等分左右發色不正此是陰陽官位相法若不遭官事而應死也其人面目帶黃黑連耳左右年四十以上百日死若偏在一邊最凶必死兩邊有年上無三年之內禍必重矣

水腎脈色黑主足少陰脈也少陰何以主腎曰腎者主陰陰水也皆生於腎此脈名曰大衝凡五十七穴冬取其井榮冬者水始治腎方閉陽氣衰少陰氣堅盛大陽氣伏沉陽脈乃去故取井以下陰氣逆取

素問靈樞經卷九

九 靈樞山房

榮以通素問陽氣其脈本在內踝下二寸應舌下兩脈其脈根於涌泉涌泉在腳心下大指指筋是

其筋起於小指之下入足心並太陰之筋而邪走內踝之下結於踵與太陽之筋合而上結於內輔下並太陰之筋而上循陰股結於陰器循脊內俠脊上至項結於枕骨與太陽之筋合

其脈起於小指之下斜趣足心出然骨之下循內踝之後別入眼中以上膈內出膈中內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從脊上貫肝膈入肺中循喉嚨俠舌本其支者從肺出絡心注胸中合足太陽

為表裏太陽本在跟以上五寸中同會于手太陰

其足少陰之別名曰太鍾當踝後繞跟別走太陽其別者並經上走於心包下貫腰脊主腎生病病實則膀胱熱則閉癢癢則陽病陽脈反逆大於寸口再倍其病則口熱舌乾咽腫上氣噎乾及痛煩心心痛黃痺腸澀吞股內後廉痛痿厥嗜臥足下熱而痛灸則強食而生災緩帶被髮太袂重履而步虛則膀胱

寒寒則腰痛痛則陰脈反小於寸口其病則饑而不欲食面黑如炭色咳唾則有血嗟鳴而喘坐而欲起目眈眈無所見心懸若病憊狀氣不足則善恐心惕

素問靈樞經卷九

十一 靈樞山房

惕若人將捕之是為骨厥

冬三月者主腎膀胱黑骨濕病也其源從太陽少陰相搏蘊積三焦上下壅塞陰毒內行臟腑受容邪之氣則病生矣其病相反若肺虛則為陰毒所傷裏熱外寒意欲守火而引飲或腰中痛欲折若臟實則為陽溫所損胸脇切痛類如刀刺不得動轉蒸彭彭若服冷藥過差而便洞瀉故曰黑骨濕病也

扁鵲曰灸脾肝腎三膈主治丹金毒黑溫之病當依源為理調臟理腑清濁之病不生也

腎虛實第二灸法一首

腎實熱

左手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦舌燥咽腫心煩噎乾胸脇時痛喘咳汗出小腹脹滿腰背強急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱痛四肢黑耳聾名曰腎實熱也脈經云腎實熱者病苦勞右手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦痺身熱心痛脊脇相引痛足逆熱煩名曰腎實熱也

瀉腎湯 治腎實熱小腹脹滿四肢正黑耳聾夢

腰脊離解及伏水等氣急方

芫苢

茯苓

黃芩

各三兩

生地汁

菖蒲

磁石

各五兩

大黃

元參

細辛

各四兩

甘艸

二兩

右十味咬咀以水九升煮七味取二升半云滓下

大黃內藥汁中更煮減二三合去大黃內生地汁

微煎一二沸下硝分為三服

瀉腎者瀉少陰之旺氣非謂腎藏木實而瀉之也

方中大黃芫苢硝瀉三焦之壯熱黃芩元參散心包

之浮火地黃磁石清腎水之真陰茯苓甘艸防腎

水之罅漏菖蒲通心氣而下細辛通腎氣而上以

其襄既濟之功觀長沙少陰例中口燥咽乾者大

承氣湯急下之斯非救熱存陰之明驗歟方中地

黃忌鐵磁為鐵母二味並用非無深意存焉曷知

相畏之性正取相率之用以清腎臟伏匿之邪也

至於硝黃之用皆為他藏相移之熱而設若以腎

臟本熱而用殊失千金奧旨

治腎熱好怒好忘耳聾無聞四肢滿急腰背轉動

強直方

柴胡

茯苓

黃芩

澤瀉

升麻

杏仁

大青

芫苢

磁石

羚羊角

地黃

淡竹葉

一兩

二兩

各一升

右十二味咬咀以水一斗煮取三升去滓下芫苢

分為三服

好怒是龍雷激其壯火原非腎之本病故用升麻

柴胡升散上盛之氣芫苢硝瀉分利下阻之熱地

黃磁石滋腎水而鎮虛陽茯苓竹葉清心神而愈

健忘杏仁黃芩泄肺竅而通視聽大青羚羊清肝

熱而利腰背并起陽事之委頓也

治腎熱小便黃赤不出出如梔子汁或如黃葉汁

每欲小便莖頭卽痛方

榆白皮切 冬葵子各一升 車前草切二

滑石半斤 子芩 通草

瞿麥各三兩 石韋四兩

右八味咬咀以水二斗先煮車前草取一斗去滓

澄清取九升下諸藥煮取三升五合去滓分四服

衍義腎與膀胱為表裏膀胱之熱良由腎水之虧不能

制其陽光故類聚清熱利水之劑以救真陰僅用

子芩一味上通肺氣肺者腎之母金水相生泉源

自沛急則治其標也

千金要方卷十九

三

攝葉山房

腎膀胱俱實

左手尺中神門以後脈陰陽俱實者足少陰與太陽

經俱實也病苦脊強反折戴眼氣上搶心脊痛不能

自反側名曰腎與膀胱俱實也

右手尺中神門以後脈陰陽俱實者足少陰與太陽

經俱實也病苦癩疾頭重與目相引痛厥欲走反眼

大風多汗名曰腎與膀胱俱實也

腎虛寒

左手尺中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦心

中悶下重足腫不可以按地名曰腎虛寒也

右手尺中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦足

脛小弱惡寒脈代絕時不至足寒上重下輕行不按

地小腹脹滿上搶胸痛引脇下名曰腎虛寒也

治腎氣虛寒陰痿腰脊痛身重緩弱言音混濁陽

氣頓絕方

菴蓉 白朮 巴戟天

麥冬 茯苓 甘艸

牛膝 五味子 杜仲各八兩

車前子 乾薑各五兩 生地五斤

右十二味治下篩食後酒服方寸七口三

千金要方卷十九

三

攝葉山房

衍義經云陽強不能密陰氣乃竭陰平陽秘精神乃治

陰陽離決精神乃絕此以腎氣不能流布中外而

腰痛身重陰痿陽絕故用地黃牛膝五味滋陰菴

蓉巴戟杜仲助陽乾薑白朮甘艸固本麥冬茯苓

車前治標滋培氣化以資通調之力

治腎氣虛寒方

灸腎膈百壯對臍兩邊向後俠脊相去各一寸

五分

腎膀胱俱虛

左手尺中神門以後脈陰陽俱虛者足少陰與太陽

經俱虛也病苦小便利心痛背寒時時小腹滿名曰腎膀胱俱虛也

右于尺中神門以後脈陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦心痛若下重不自收纂反出時時苦澀泄寒中腎與心俱痛名曰腎膀胱俱虛也

腎勞第三論一首方五首

論曰凡腎勞病者肝氣以益之肝旺則感於腎矣人逆冬氣則足少陰不藏腎氣洩濁順之則生逆之則死順之則治逆之則亂及順為逆是為關格病則生矣

千金方卷九

五掃葉山房

梔子湯 治腎勞 熱小腹脹滿小便赤黃後有餘瀝數而少莖中痛陰囊生瘡方

梔子仁

芍藥

通艸

石膏 各三兩

石膏 五兩

滑石 八兩

子芩 四兩

生地

榆白皮

淡竹葉 切各一升

右十味吹咀以水一斗煮取三升去滓分三服

勞則火起於腎故於前治腎熱小便黃赤方中除

去冬葵車前瞿麥利水傷津之味加梔子芍藥石膏地黃竹葉清肝熱降胃火滋腎臟之其陰也

麻黃根粉 治腎勞熱陰囊生瘡方

麻黃根

石硫黃 各三兩

米粉 五合

右三味治下篩安絮如常用粉法搭瘡上粉濕更搭之

義生濕瘡皆不潔汚漬之故故用麻黃根祛風逐濕硫黃滌垢散邪本經治婦人陰蝕與之同類米粉益胃以助生肌

粉益胃以助生肌

治腎勞熱妄怒腰脊不可俯仰屈伸者散方

丹參

牛膝

葛根

杜仲

乾薑黃

甘艸

千金方卷九

五掃葉山房

猪苓 各二兩

茯苓

遠志

子芩 各一兩

五加皮

石膏 各三兩

羚羊角

生薑

橘皮 各二兩

淡竹葉 一握

右十六味治下篩為粗散以水三升煮兩方寸七縮裹之時動取八合為一服日一

義前治腎熱好怒好忘用升柴以散上盛之氣此用牛膝杜仲以資下虧之陰既無上淫耳竅之火所以不用磁石而用甘艸以緩勞熱下元既虧所以不用芫硝而用石膏以清怒火以無升柴所以取

剛莖根以無杏仁所以取用薑橘以無大青所以
取用茯苓以無茯神所以取用丹參以無澤瀉所
以取用猪苓總皆輔佐羚羊扶肝益腎榮筋起陰
之力

治虛勞陰陽失度傷筋損脈嘔吸短氣漏溢泄下

小便亦黃陰下濕癢腰脊如折顏色墮落方

作

革解 麥冬 生地

桂心 杜仲 棗肉各

右六味咬咀以酒三斗五升漬三宿出曝乾復漬

候酒盡取乾治下飢食後酒服方寸七日三

行此房勞失度敗精不泄而致壯火遊行傷殘經脈

故用革解分清體聚之治杜仲堅強腰膝之勞地

黃解散傷中之血麥冬滋化心腹之結桂心通利

關節之痛大棗行連脾家之津酒漬煮散以和勞

傷血氣也

治腎勞虛冷乾枯憂恚內傷久坐濕地則損腎方

秦朮 牛膝 芎藭

防風 桂心 獨活

茯苓 乾薑 麥冬

各四兩 一作乾地黃

骨皮 杜仲各五

石斛 六兩 丹參 八兩 五加皮 兩

薏苡仁 兩 大麻子 升

右十七味咬咀以水三斗漬七日每服七合日三

服

方中桂心牛膝杜仲茯苓治腎勞虛冷秦朮獨活

防風芎藭乾薑側子薏苡五加治地濕傷腎麥冬

麻仁石斛丹參骨皮不但治憂恚內傷并化乾薑

側子之辛燥乃腎者湯之成法

精極第四論 方十八首

論曰凡精極者通至五臟六腑之病候也若五臟六

腑衰則形體皆極眼視而無明齒焦而髮落身體重

則腎水生耳聾行步不正凡陽邪害五臟陰邪損六

腑陽實則從陰引陽陰虛則從陽引陰若陽病者主

高高則實實則熱眼視不明齒焦髮脫腹中滿滿則

歷節痛痛則宜瀉內若陰病者主下下則虛虛則

寒身體重則腎水生耳聾行步不正邪氣入內行於

五臟則咳嗆則多涕唾面腫氣逆邪氣逆於六腑浮

虛厥於五臟故曰精極也所以形不足溫之以氣精

不足補之以味善治精者先治肌膚筋脈次治六腑

若邪至五臟已半死矣

扁鵲曰五陰氣俱絕不可治絕則目系轉則目精
奔為志先死遠至一日半日非醫所及矣宜須精研

以表治裏以左治右以右治左以我治彼疾皆瘥矣
竹葉黃芩湯 治精極實熱眼視無明齒焦髮落

形衰體痛通身虛熱方

竹葉切二

黃芩

茯苓

各三

甘艸

麥冬

大黃

各二

生薑 六兩

芍藥 四兩

生地 切一

右九味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

千金要方卷九

九

此治精極而熱淫於內以其人真陰素虧熱邪流

於陰分雖用地黃芍藥竹葉麥冬黃芩茯苓之屬
不得大黃推陳致新之力不能立剷熱根以救耗

極之陰又以生薑行大黃之性甘艸緩脾胃之火
故調胃承氣湯用之

治精極五臟大崩俱損傷虛熱遍身煩疼骨中痛

痛煩悶方

生地汁 二升

麥冬汁

赤蜜

各一

竹瀝 一合

石膏 八兩

人參

川芎

桂心

甘艸

黃芩

麻黃 各三

當歸 日兩

右十二味咬咀以水七升先煮八味取二升去滓
下地黃等汁煮取四升分四服日三夜一

此治精傷而熱溢於外血肉氣衰邪熱泊於肌表
雖用地黃芍藥竹葉麥冬黃芩赤蜜之屬不得麻

桂發越佛鬱不能宣通表熱以救煩疼但內蘊之
火不過借麻黃之開泄又須甘艸石膏以化本熱

故越婢湯中用之用人參者因麻黃轉傷肌表之
氣不得不以填補為務也

治五勞六極虛羸心驚疝弱多魘亡陽方

千金要方卷九

五

補虛山房

茯苓 四兩

甘艸

芍藥

桂心

乾薑 各三

遠志

人參 各五

大棗 五枚

右八味咬咀以水八升煮取三升分三服

五勞六極總由精虛而補虛之旨不過滋培氣血
氣血皆穀肉所化故以參甘薑棗溫理脾氣桂心

芍藥溫養榮血茯苓遠志保護心腎以杜隱憂之
患

治虛勞少精方

鹿角為末白蜜和丸如梧子大每服七丸日三

服十日大效

又方

漿水者糜藜子令熟取汁陰乾二十日大效

鹿角專行督脈督為腎臟外垣主周身諸陽補命

門真火外垣固密則精不妄泄精氣充裕何有虛

勞之慮乎 又方漿水煮糜藜子專祛肝腎之風

陽痿不起皆風氣乘虛襲於下部之患用漿水者

取其酸收以斂風氣之疾

棘刺丸 治虛勞虛氣不足夢泄失精方

棘刺

乾薑

兔絲子

各二兩

千金方養卷九

三

補藥山房

天冬

烏頭

小艸

防葵

山藥

菖蒲

細辛

石龍芮

枸杞子

巴戟天

萎蕤

石斛

厚朴

牛膝

桂心

各一兩

右十八味為末蜜丸如梧子大酒服五九日二服

深師以蜜雜雞子白各半和丸若患風痿痺氣體

不便熱煩滿少氣消渴加萎蕤天冬兔絲子關節

黃汗加葶藶赤黃不利加石龍芮枸杞子小便澀

厚朴乾薑心除濕下濕精少小便澀除濕加麥

冬代天冬以杜仲代山藥以柏子仁代枸杞子

以從蓉代萎蕤用治果子百病小便過多失精

風客淫氣精乃以邪傷肝也虛勞不足夢泄失精

多由木苑生風襲入髓藏之故故首取棘刺透肝

腎之風別錄治大人虛損陰痿精白出皆水藏中

為風氣擾混而致妄泄兼取烏頭乾薑祛風逐濕

細辛桂心通腎達肝防葵石龍芮散結利竅巴戟

天草薺石斛小艸堅骨強筋兔絲朱膝枸杞天棘

萎蕤山藥益氣充精獨用厚朴一味開泄滯氣而

致清純王節齋言風氣襲於腎肝惟疾藜可以搜

逐而此獨不用者既用棘刺似可無藉疾藜且烏

頭細辛防葵石龍芮巴戟小艸天棘山藥等味未

嘗不治風氣百疾也

治夢中泄精尿後餘瀝及尿精方

人參 麥冬 赤石脂

遠志 續斷 鹿茸

柏子仁 丹參 韭子

茯苓 龍齒 磁石

菴蓉 乾地黃

右十四味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日再

稍加至三十九

肝虛魂藏不寧所以夢中精泄腎虛封藏不固所

以從蓉代萎蕤用治果子百病小便過多失精

冬代天冬以杜仲代山藥以柏子仁代枸杞子

以從蓉代萎蕤用治果子百病小便過多失精

以尿精龍齒鹿茸安神魂補腦髓茯苓韭子助元陽膏精氣續斷遠志強筋骨利關節磁石石脂鎮心腎止虛脫人參地黃固元陽養真陰柏子仁丹參通心腎滋津血麥冬茯苓清肺胃守真氣此房室過勞而腎水滑脫者宜之若夫少壯失合壯火食氣而精氣不守者又當清熱利水此關一誤必致燎原竭澤不已也

治虛損小便白濁夢洩方

兔絲子 車前子 韭子各一
 當歸各二 芎藭

附子各三 桂心一兩

右八味為末蜜丸如梧子大酒服五九日三行濁有濕熱傷氣房勞傷精之不同此高粱房室過勞味痰濁濕流入髓藏精氣不純而致下溜故以兔絲益肝堅腎筋骨續絕傷充精髓為主車前治氣癰除瀆痛利水閉津液為佐韭子菴石固斂精氣當歸芎藭調和榮血附子桂心收攝虛陽統制陰精使之歸宿本宮此惟肥盛多濕者可勝附桂之辛散若陰虛羸瘦多火及藜蘆汗血不充者大為戕賊

又方

大棗五十八 韭子五合 黃芪

人參 甘艸 乾薑

當歸 龍骨 半夏

芎藭各二

右十味為末蜜丸如梧子大酒服五九日三服衍榮氣起於中焦衛氣起於下焦此因醉飽入房喘汗大泄因而衛氣不固精濁混泄故以參芪甘艸保元固氣乾薑半夏以滌濁垢當歸芍藥以和榮血韭子龍骨以蓄精氣也

韭子九一治房室過度精洩自出不禁腰背不得屈伸食不生肌兩脚苦弱方

韭子一升 甘艸 桂心

紫石英 禹餘糧 遠志

山黃肉 當歸 天雄

紫苑 山藥 細辛

茯苓 殭蠶 菖蒲

人參 杜仲 白朮

乾薑 芎藭 附子

石斛 天冬各一兩半 茯苓

黃芪

兔絲子

乾地黃

蛇牀子

各二兩

大棗

五十枚

牛髓

乾膠

各四兩

右三十一味為末牛髓合白蜜棗膏各搗三千杵

九如梧子大空腹服十五丸日再加至二十九

義衍

韭子九中助陽益氣固精養榮祛風滌垢利竅之

品無不畢具凡陽衰不能統御陰精者於中採擇

數味傾足成方不必固守成法也但世本乾膠作

乾漆傳寫之誤萬無峻藥入於補益劑中反倍諸

味之理觀禁精湯第三方用乾膠可以類推

全卷書卷五

韭

攝生山房

韭子散 治小便失精及夢洩精方

韭子

各一升

麥冬

各一升

兔絲子

車前子

各二升

芍藥

二兩

白龍骨

三兩

右六味治下篩酒服方寸七日三不止稍增甚者

夜一服壯後用澤

義衍

方中兔絲精絕傷之精芍藥開血室之鬱大冬滋

肺腎之津車前子通氣道之滯龍骨敏浮散之火

韭子攝敗傷之髓此惟房室過勞者為宜火盛精

傷者切禁

棗仁湯 治大虛勞夢洩精莖核微弱血氣枯竭

或醉飽傷於房室驚悸恐悸小腹裏急方

棗仁

各二升

澤瀉

各一升

人參

各一升

芍藥

各一兩

桂心

各一兩

黃芪

各一升

甘艸

各二兩

茯苓

各一兩

白龍骨

各一升

牡蠣

各二兩

生薑

二斤

半夏

一升

右十二味投阻以水九升煮取四升一服七合日

三若不能食小腹急加桂心六兩

義衍

腎司閉藏肝司疏泄今以過勞傷肝不能司閉藏

之令故首取棗仁通肝氣而愈驚惕龍骨牡蠣祓

精氣而固腎脫參芪甘艸保元氣而補大虛茯苓

澤瀉利水道而除旺氣生薑半夏逐滯氣而通清

陽桂心芍藥和榮氣而除裏急也

治夢洩失精方

韭子一升治下篩酒服方寸七日再服立效

治虛勞尿精方

韭子一升 稻米二升

右以水一斗七升煮如粥取汁六升分三服精益

同此

禁精湯 治失精羸瘦瘦削少氣目視不明惡聞

人聲方

韭子 二升 粳米 一升

右二味於銅器中合蒸米黃黑乘熱以好酒一斗投之絞取汁七升每服一升日三服盡二劑

又方

石櫚皮 外臺作椹白皮 切各五合

右二味以酒五升煮取三升分三服

又方

乾膠 三兩

右末之以酒二升和分三服温服瘥止 一方用

鹿角膠

義行 韭子能逐敗精助相火為房勞不禁之專藥

加

稻米則充胃氣利膀胱以予敗濁之出路 禁精

易與前方不殊但煮汁絞酒稍變其法 又方櫚

皮之瀉以治滑脫桑皮之淡以泄滯氣而精自固

氣自調矣 乾膠即鱧膠力能固精然不若鹿膠

之強陽助腎補命門通督脈等用耳

羊骨湯 治失精多睡目眩疏方

羊骨 具 飴糖 半斤 生地

白朮 各一 大棗 二十 桑朮

原朴 各一 阿膠 麥冬

人參 苻藥 生薑

甘艸 各三 茯苓 四兩 桂心 八兩

右十五味以水五斗煮羊骨取汁三斗去骨煮藥約取八升下飴令烊平旦服一升後旦服一

升

每失精多由思慮過勞五志之火沸其腎水而致滑

脫者亦有酒客濕著髓藏房勞風襲精竅綿綿不

能自守者治用羊骨專搜風毒之味而兼益氣固

精實脾為主方下所言多睡雖屬肝氣之虛亦由

脾氣之衰目眩者雖屬腎氣之衰亦由肝氣之

虛然能培肝氣莫如益脾能生腎水者莫如生肺

蓋土厚則木茂金潤則水生故方中全以益脾滋

肺為務

灸法

虛勞尿精灸第七椎兩傍各三十壯 又灸第十椎

兩傍各三十壯 又灸第十九椎兩傍各二十壯

又灸陽陵泉陰陵泉各隨年壯

夢洩精 灸三陰交三七壯 夢斷神良 內踝上大脈

丈夫夢失精及男子小便濁難灸腎膈百壯

男子陰中疼痛溺血精出灸裂缺三十壯

失精五臟虛竭灸屈骨端五十壯陰上橫骨中央宛

曲如却月中央是也此名橫骨

男子虛勞失精陰上縮莖中痛灸十赫三十壯穴在

屈骨端二寸

男子虛勞失精陰縮灸中封五十壯

男子腰脊冷疼溺多白濁灸脾募百壯

男子失精膝脛疼痛冷灸曲泉百壯穴在膝內屈方

頭

骨極第五論一首方一首

論曰骨極者主腎也腎應骨骨與腎合又曰以冬遇

全考卷十九

五

掃葉山房

病為骨痺骨痺不已復感於邪內舍於腎耳鳴見黑

色其候也若腎病則骨極牙齒苦痛手足痠疼不

能久立屈伸不利身痺腦髓痿以冬壬癸日中邪傷

風為腎風風歷骨故曰骨極若氣陰陰則虛虛則寒

寒則面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利其氣衰

則髮墮齒槁腰背相引而痛痛甚則欬唾甚若氣陽

陽則實實則熱熱則面色焔隱曲勝腕不通牙齒腦

髓苦痛手足痠痲耳鳴色黑是骨極之至也須精別

陰陽審其清濁知其分部視其喘息善治病者始於

皮膚筋脈即須治之若入臟腑則半死矣

扁鵲云骨絕不治痛而切痛伸縮不得十日死骨應

足少陰少陰氣絕則骨枯髮無澤骨先死矣

三黃湯 治骨極主腎熱病則膀胱不通大小便

閉塞顏色枯黑耳鳴虛熱方

大黃 水一升 切別漬

黃芩 各三兩

梔子 十四枚

甘艸 一兩

芒硝 二兩

右五味咬咀以水四升先煮黃芩梔子甘艸取一

升五合去滓下大黃又煮兩沸下芒硝分三服

邪之所奏其氣必虛此因腎水之涸不能涵養少

火而致孤陽獨發中外皆從火化所以骨極腎熱

全考卷十九

三

掃葉山房

二便不通故苳梔甘艸芒硝大黃急奪其陽以保

傷殘之餘若以腎傷不敢峻用三黃而用滋水制

陽此與杯水救車薪之燎不殊也

灸法

腰背不便筋攣痺縮虛熱閉塞灸第三十一椎兩邊

相去各一寸五分隨年壯

小便不利小腹脹滿虛乏灸小腸踰隨年壯

骨虛實第六論一首方六首

論曰骨虛者痿痺不安好倦骨實者苦煩熱凡骨虛

實之應主於腎膀胱若其臟腑有病從骨生熱則應

厥寒則應脈

治骨執苦痠疼煩熱方

葛根汁

生地汁

赤蜜各一升

麥冬汁五合

右四味和攪微火煎三四沸分三服

衍肝只是有餘腎只是不足若人身中骨實髓充極

為美事豈有反用藥治之理蓋緣風熱入於頭額

片稜骨間痠疼煩熱故用葛根專走陽明之經以

祛上盛之邪兼滋胃中津氣使水升火降於一彈

頃并地黃麥冬汁及赤蜜滋培津血以杜風火之

千金方衍義卷九

三 補藥山房

復入也

虎骨酒 治骨虛痠疼不安好總玉勝朮寒方

虎骨一具通炙令黃焦碎如雀頭大陳米三石

麴四斗水三石如常釀酒法所加水地者其骨

消麴而飲水所以加之也酒熟封頭五十日開

飲之

治骨髓中疼方

虎骨四兩

芍藥一斤

生地五斤

右三味咬咀以清酒一斗漬三宿曝乾布人酒中

如此取酒盡為度搗篩酒服方寸七日三

治骨髓冷疼痛方

取地黃汁一石酒一斗相攪重煎温服日三補

髓

治虛勞冷骨節疼痛無方方

豉二升

地黃八升

右二味兩度蒸曝乾為散食後以酒一升進二方

寸七日再服亦治虛熱

又方

天冬為散酒服方寸七日三百日取瘥

衍虎骨追風定痛強筋壯骨釀酒以助其勢而散勝

千金方衍義卷九

三 補藥山房

朮之寒也 風毒入於骨空非虎骨不能搜之芍

藥地黃滋養陰血故可以治骨髓中痛 地黃汁

逐血和傷借酒以行其滯使無留積之患 香豉

祛腎家不正之氣地黃逐肝經痺著之血從梔子

豉湯化出 天冬僅知滋肺治嗽不止本經有諸

暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸諸治故千金

虛勞骨節疼痛用之

又方

灸上廉七十壯三里下三寸是穴

腰痛第七論一首 方十六首 導引法一首 灸法七首

論曰凡腰痛有五二曰少陰少陰腎也十月萬物陽氣皆衰是以腰痛二曰風痺風寒著腰是以腰痛三曰腎虛役用傷腎是以腰痛四曰腎腰墜墮傷腰是以腰痛五曰取寒眠地為地氣所傷是以腰痛痛不止引牽腰脊皆痛腎音會巢氏病源云卒然傷腰致痛謂之腎腰

杜仲酒 治腎脈逆小於寸口膀胱虛寒腰痛胸

中動四時通用之方

杜仲 乾薑各四兩一 草薺作乾地黃

羌活 細辛 防風

芎藭 秦朮 烏頭

天雄 桂心 川椒各三

五加皮 石斛各五 栝藋根

地骨皮 續斷 枯梗

甘艸各一兩

右十九味咬咀以酒四斗漬四宿初服五合加至

七八合日再通治五種腰痛

衍腰痛大端有五總由腎臟陽衰不能禦風寒濕氣

之痺著皆從不意得之致於墜墮傷損地濕所傷

又為不慎所致但須辛溫調暢血氣則五者俱可

通治如杜仲續斷桂薑烏雄椒辛之屬可以助陽

可以通痺可和損傷可逐地濕然辛烈浸漬未免熱毒傷胃所以方中復用石斛栝藋根地骨皮甘艸之屬既可解辛熱藥性并可散標熱旺氣也其餘諸味又為祛風逐濕調和血氣之佐使不用湯液而用酒醱者專取流行經脈也

又方

桑寄生 牡丹皮 鹿茸

桂心等分

右四味治下篩酒服方寸七日三

又方

單服鹿茸與角亦愈

衍桑寄生本經首治腰痛為去風逐濕續筋骨之要

藥兼取牡丹皮和血通津桂心利關節痛鹿茸溫

補腎肝督脈但桑寄生近世真者絕不可得故古

今錄驗方中獨活寄生湯以續斷代用頗得權變

之法 如督腎本虛而無風濕痺著但需鹿茸為

散酒服亦得

治腎虛腰痛方

草薺 白朮

牡丹皮二分

桂心各三分

右四味治下篩酒服方寸七日三亦可作湯服之甚良

又方

附子半兩

桂心

牡丹皮各一兩

右三味治下篩酒服一斗圭日再甚驗

衍革薺入肝祛風同白朮入脾逐濕得桂心牡丹溫

散血氣之滯 虛寒甚者用附子 以助桂心牡丹之力功效勝於革薺白朮

腎著湯 腎著之為病其人身體重腰冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利食飲如故是其

千金方卷五十一

歸藥山房

證也從作勞汗出衣裏冷濕久久得之腰以下

冷痛腹重如帶五千錢者方古今錄驗

甘朮二兩

乾薑三兩

茯苓

白朮各四兩

右四味咬咀以水五升煮取三升分三服腹中即

濕

衍腎著者濕氣痺著而身重腰以下冷痛是也金匱

原名甘薑苓朮湯專取乾薑燥濕白朮燥濕茯苓

利濕甘朮緩諸藥之性以盡逐濕之力長沙治病

全以究本為務毫無及於腰腎之藥從古至今能

獲長沙心法者千金一人而已 腎著散方

杜仲

桂心各三兩

甘朮

乾薑

牛膝

澤瀉各一兩

茯苓

白朮各四兩

右八味治下篩為粗散一服三方寸七酒一升煮

五六沸去滓頓服日再

衍此於腎著湯中加杜仲桂心牛膝澤瀉乃曲突徙薪從權適俗之法而主治未嘗稍有不同也

治腰疼不得立方

千金方卷五十一

歸藥山房

甘遂

桂心一作附子

杜仲

人參各二兩

右四味治下篩以方寸七內羊腎中炙令熱恨之

衍腰疼不得立因虛而熱結腐著非濕痰死血則暴

傷氣逆故於溫理腰腎藥中必兼甘遂搜逐所傷

加入參以助迅掃之力內羊腎中炙食取以直達

腎臟乃峻攻之猛烈不可以有人參之補而視等

閉也

治腰痛方

草薺

杜仲

枸杞根各一斤

右三味咬咀好酒三斗清之內罌中蜜封頭於銅器中煮一日服之無節度取醉

衍義 革薺去風濕利經陸杜仲強筋骨利屈伸枸杞根保真陰散假熱為濕熱之的方藥雖平而功即著

杜仲九 補之之方

杜仲 一兩 石斛 二分 乾薑

乾地黄 各三分

右四味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日再

衍義 方中乾薑行地黃之滯則補而不寒石斛助杜仲之強則健而益九

千金方養老丸

丹參九 治腰痛并冷痺方

丹參 杜仲 牛膝

續斷 各三兩

桂心

乾薑 各二兩

右六味為末蜜丸如梧子大每服二十九日再夜

一禁如藥法

衍義 杜仲續斷治腰痛乾薑桂心開冷痺牛膝丹參通

津血也

芎活寄生湯 腰背痛著皆是腎氣虛弱臥冷濕

當風得之不時速治喜流入脚膝或為偏枯冷

痺緩弱疾重若有腰重變脚重痺急宜服之見

前八卷 偏風門

治腰脊苦痛不送方

大豆三斗斗蒸一斗 酒六斗斗蒸一斗 口蒸合極

熟豆亦熟內甕中封口秋冬二七日於甕口作

乳出取服五合日夜二三服

又方

地黄花為末酒服方寸七日三

又方

三月三日收桃花取一斗一升并花水三斗麴

六升米六斗炊之一時釀熟去糟酒服一升日

千金方養老丸

三服若作食飲用河水禁如藥法神良

又方

鹿角去上皮取白者熬令黃為末酒服方寸七

日三特禁生魚餘不禁角新者良陳者不佳服

又方

羊腎為末酒服二方寸七日三

衍義

大豆酒煖腎祛風 地黄花散血而不傷血 桃

花與地黄花無異 鹿角走督脈補元陽益精氣

羊腎治腎虛膀胱執故腎澀湯中用之

治丈夫腰脚冷不遂不能行方

上醇酒三斗水三斗合著囊中温漬脚至膝三日止冷則囊下常著灰火勿使冷若手足煩者以小便三升盆中温漬手足

腰腎痛導引法

正東坐將手抱心一人於前據躡其兩膝一人後捧其頭徐牽令偃臥頭到地三臥三起止便瘥

鍼灸法

腰腎痛宜鍼决膝腰句畫中青赤絡脈出血便瘥

千金方衍義卷九

三十九

掃葉山房

腰痛不得俯仰者令患人正立以竹柱地度至脣斷竹乃以度度背脊灸竹上頭處隨年壯灸訖藏竹勿令人知

腰痛灸脚跟上橫文中白肉際十壯良 又灸足臣

陽七壯 臣陽在外 又灸腰目第七壯 在房上 又

灸八竅及外踝上骨約中

腰卒痛 灸窮骨上一寸七壯左右一寸各灸七壯

補腎第八論一首 方五十九首

論曰補方通治五勞六極七傷虛損五勞五臟病六

極六腑病七傷表裏受病五勞者一曰志勞二曰思

勞三曰憂勞四曰心勞五曰疲勞六極者一曰氣極

二曰血極三曰筋極四曰骨極五曰髓極六曰精極

七傷者一曰肝傷善夢二曰心傷善忘三曰脾傷善

飲四曰肺傷善痿五曰腎傷善唾六曰骨傷善飢七

曰脈傷善噉凡遠思強慮傷人憂悲悲哀傷人喜樂

過度傷人忿怒不解傷人汲汲所願傷人憾憾所患

傷人寒暄失節傷人故曰五勞六極七傷也論傷其

眾且言其略後方悉主之

建中湯 治五勞七傷小腹急痛膀胱虛滿手足

逆冷食飲苦吐酸痰嘔逆泄下少氣目眩耳聾

千金方衍義卷九

單

掃葉山房

口焦小便自利方

膠飴八兩

黃芪

乾薑

當歸各三兩

人參

半夏

橘皮

芍藥

甘艸各二兩

附子一兩

大棗十五枚

右十一味以水一斗煮取三升半去滓下膠

飴烺沸分四服 深師有桂心六兩生薑一斤無橘皮乾薑

玉函金匱並主建中為資生之鴻寶濟世之神丹

而小建中為諸建中之母本桂枝湯表藥藉膠飴

之甘温入脾通津大建中氣即傷寒榮氣不足尺

脈不至虛勞之腹痛裏急陽瀉陰弦咸可用為前導溫中而兼疎表氣扶陽而不礙陰虛以桂枝達表芍藥安中甘艸和胃大棗通脾生薑散邪膠飴養津共襄建中之功也加黃芪名黃芪建中則偏助衛氣以治下元虧損夢中失精煩熱悸衄等病此治五勞七傷則於黃芪建中方內加當歸合內補建中大補榮血以附子易桂心峻溫腎氣以乾薑易生薑專力溫中又加人參輔黃芪甘艸保合元神更加半夏橘皮開泄痰氣并行大棗膠飴之滯也

千金方卷九

聖

補葉山房

又方 治虛損少氣腹脹拘急引小腹至令不得屈伸不能飲食寒熱頭疼手足逆冷大小便難或復下痢口乾夢中泄精或時吐逆恍惚面色枯瘁又復微腫百節疼痛方

附子 厚朴各一
 甘艸 桂心 人參
 茯苓 麥冬
 龍骨 白芍 生薑 黃芪
 飴糖 生地 大棗
 右十五味咬咀以水一斗二升煮取四升去滓內

飴糖每服八合日三夜一欬者加生薑一倍

又方 治五勞七傷小腹急臍下膨脝兩脅脹滿腰脊相引鼻口乾燥目暗眩暈憤憤不樂胸中氣急逆不下食飲莖中策策痛小便黃赤尿有餘滯夢與鬼神交通去精驚恐虛乏方

飴糖八兩

黃芪

遠志

當歸 澤瀉 芍藥

澤瀉各三兩

芍藥

甘艸

人參

龍骨 各二兩

生薑 半斤

大棗 二十枚

右十一味咬咀以水一斗煮取二升半去滓內飴

千金方卷九

聖

補葉山房

糖合炸一服八合消息又一服深師無飴糖遠志澤瀉龍骨有桂心六兩半夏一升附子一枚

仍用黃芪建中參入當歸參附峻補元陽兼培榮氣加門冬地黃以滋津液厚朴茯苓以泄滯氣龍骨以收耗散之精 又於前方去桂心附子地黃麥冬厚朴茯苓加遠志通心腎而絕鬼交兼澤瀉利水道而除莖痛

小建中湯 治男女因積勞虛損或大病後不復常苦四體沉滯骨肉疼痛吸少氣行動喘悞或小腹拘急腰背強痛心中虛悸咽乾唇燥而

體少色或飲食無味陰陽廢弱悲憂慘憾多臥
少起久者積年輕者百日漸至瘦削五臟氣竭
則難可復振治之方

甘艸 二兩 桂心 生薑 各三

芍藥 六兩 膠飴 一升 大棗 十二

右六味咬咀以水九升煮取三升去滓內膠飴每
服一升日三服間三日復作一劑後可與諸丸散
仲景云樞家不可服肘後云加人參黃芪各二兩
佳若患痰滿及溇泄可除膠飴胡洽有半夏八兩
錄驗名芍藥湯

黃芪建中湯 治虛勞裏急諸不足方

半身黃芪卷九 掃葉山房

黃芪 生薑 桂心 各二

甘艸 二兩 芍藥 六兩 大棗 十二

飴 一升

右七味咬咀以水一斗煮取三升去滓內飴溫服

一升日三開日再作嘔者倍加生薑腹滿者去棗

加茯苓四兩佳 仲景集驗古今錄驗並同深師治
人參二兩半夏一升又治大虛少小便多者無飴者
寒拘引臍氣上衝胸短氣言語謬誤不能食吸吸
氣乏悶亂必效治虛勞下焦虛冷不甚渴小便數
者有人參當歸各二兩若失精加龍骨白朮各一
兩古今錄驗治虛勞裏急小腹急痛氣引胸脇
或心痛短氣者以乾薑代生薑加當歸四兩

義衍 二方衍義見首方下

前胡建中湯 治大勞虛羸少寒熱嘔逆下焦虛
熱小便赤痛客熱上熏頭目及骨肉疼痛口乾

方

前胡 三兩 黃芩 白芍

當歸 茯苓 桂心 各二

甘艸 一兩 人參 半夏

白糖 各六 生薑 八兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮取四升去滓內
糖分四服

義衍 此以小建中黃芪建中內補建中加前胡半夏以

半身黃芪卷九 掃葉山房

治胸中痰氣人參茯苓以治胃虛嘔逆去大棗者
惡其滯膩戀膈滋痰助嘔也

樂令建中湯 治虛勞少氣心胸淡冷時驚惕心

中悸動手足逆冷體常自汗五臟六腑虛損腸

鳴風濕榮衛不調百病補諸不足又治風裏急

方

黃芪 人參 橘皮

當歸 桂心 細辛

前胡 芍藥 甘艸

茯苓 麥冬 各三 半夏 二兩

生薑 五兩 大棗 二十枚

右十四味咬咀以水二斗煮取四升每服五合日

三夜一深師無橘皮細辛前胡甘州麥冬有烏頭

頭五枚川椒一兩崔氏藥令大黃良湯即此

黃芪湯 治虛勞不足四肢煩疼不欲食食即脹

汗出方

黃芪

白芍 各三兩

細辛

前胡 六兩

生薑 各八兩

麥冬

人參

甘州

茯苓 四兩

大棗 二十枚

桂心

當歸

五味子 各二兩

半夏

千金衍義卷九

聖

掃葉山房

右十四味咬咀以水一斗四升煮取三升每服八

合日二服深師治虛乏四肢沉重或口乾吸少

辛前胡有桑螵蛸二十枚治丈夫虛勞風冷少損

或太病後未平復而早奔勞腰背強直胸中疼

補諸不足者無五味子細辛有遠志橘皮各二兩

蜀椒一兩烏頭三枚辛前胡茯苓半夏有黃芪

者無五味子細辛人參前胡茯苓半夏有黃芪

兩地黃二兩以水九升煮取三升治虛勞胸中

氣寒冷瘧瘧宿食不消吐噎脇間水氣或流飲勝

鳴食不生肌肉頭暈上垂下輕日眩暈事不起陰

下濕或小便白濁傷多者無麥冬五味子細辛

當歸前胡茯苓半夏有厚朴二兩胡洽治五臟

傷者無麥冬五味子常歸細辛前胡茯苓各三兩

衍 小建中黃芪建中內補建中三方合用表裏兼該

加細辛前胡祛風下氣橘皮半夏利膈除痰人參

茯苓麥冬滋培津氣 又方於樂令建中湯內除

去橘皮之耗氣易入五味子以收津以無膠飴所

以革去建中之名而曰黃芪湯

大建中湯 治虛勞寒游飲存脇下決決有聲飲

已如從一邊下決決然也有頭足衝皮起引兩

乳內痛裏急善夢失精氣短口眩恍惚多忘

方 川椒二合 半夏一升 生薑一斤

甘州二兩 人參三兩 飴糖八兩

右六味咬咀以水一斗煮取三升去滓內飴溫服

七合裏急引加芍藥桂心各三兩手足厥腰背

冷加附子一枚勞者加黃芪一兩

此本金匱三物大建中湯於中除去乾薑之守中

易入生薑以散表更加半夏以通痰甘州緩急藥

雖小變而大義不殊

治五勞七傷虛羸不足面目黧黑手足疼痛久立

腰疼起即口眩腹中懸急而有絕傷外引四肢

方

千金衍義卷九

聖

掃葉山房

生薑

芍藥

乾地黄

甘艸

川芎各五

大棗三十枚

右六味以水六升漬一宿明旦復以水五升

合煮取三升分三服藥入四肢百脈似醉狀是效

無生薑用乾薑二兩酒漬一宿用之常行此方神

妙

腹中懸急良由榮衛不和津血不充之故故用建

中和榮衛地黃滋津血芎藭即桂心之變味地黃

即膠節之變味也

腎瀝湯 治虛勞損羸乏欬逆短氣四肢煩疼腰

背相引痛耳鳴面黧黑骨間熱小便赤黃心悸

目眩諸虛乏方

羊腎 一具 桂心 一兩 人參

澤瀉 五味子 甘艸

防風 芎藭 骨皮

黃芪 當歸各二 茯苓

元參 芍藥 生薑各四

磁石 五兩

右十六味以水一斗五升先煮腎取一斗去

腎八藥煎取三升分三服可常服之百病無人參

甘艸 芎藭 芍藥 元參 坐薑 有菴 芥 三兩 半 除

五加皮 各二兩 胡洽 治太虛傷損 驚悸 上氣

肩息 腎中風 濕小腹痛 或赤或白 足復腫 或昏 善忘

大小便 瀉利 無常 或赤或白 足復腫 或昏 善忘

者無 澤瀉 防風 黃芪 元參 磁石 骨皮 有黃 芎一兩

虛勞 所傷 補益 各三兩 大棗 二十枚 薑氏 治腎

遠志 各二兩 乾地黃 三兩 麥冬 四兩 大棗 二十枚

治五勞 六極 入風 十二痺 補諸不足 者無 澤瀉 甘

艸 防風 芎藭 元參 骨皮 生薑 五兩 子有 附子 丹皮

各一兩 地黃 一兩 半 大棗 十五枚 名羊 腎湯 近效

方除 風下 氣 強 腰 脚 明 耳 目 除 痰 飲 理 榮 衛 永 不

樂 時 疾 諸 風 者 無 當 歸 芍 藥 磁 石 有 獨 活 牛 膝 各

一兩 半 麥 冬 二兩 丹 參 五兩 為 煮 散 分 作 二 十 四

貼 每 貼 入 生 薑 一 分 各 仁

十四枚 水三升 煮取一升

又方

羌羊腎 一具 切去脂 以水二斗 大棗二十

六升 煮取一斗三升

桑皮 六兩 五味子 黃芪

茯苓 巴戟天 防風

秦艸 澤瀉 人參

桂心 山藥 丹參

遠志 茯苓 細辛

牛膝 各三 石斛 生薑 各五

杜仲 磁石 各八

右二十二味以水一斗五升先煮腎取一斗去

去如人行五里再服

增損腎瀝湯 治人虛不足小便數喘吸焦渴引

飲膀胱滿急每年三伏中常服三劑於方中商

量用之

羊腎一具

麥冬

骨皮

人參

石斛

栝樓根

乾地黄

澤瀉

桑皮一作桑寄生

五味子

遠志

生薑

甘艸

當歸

桂心

茯苓各三兩

大棗三十枚

右十七味咬咀以水一斗五升先煮腎取一斗二

升去腎內藥煮取三升去滓分三服

小品無石解栝樓滑皮桑

本草卷五

栝樓山房

皮茯苓有川芎川連龍骨各二兩蠅蚶二十枚

又治腎氣不足消渴引飲小便過多腰背疼痛者

無石解栝樓桑皮骨皮甘艸有川芎二兩黃芩芍

藥各一兩桑蠅蚶二十枚雞肝皮一兩崔氏治藏

損虛勞李子豫增損者無石解栝樓桑皮

皮桑皮有黃芩黃芩芍藥防風各二兩

腎瀝者腎中氣痺不化水道滴瀝不通多由醉飽

房勞酒濕流著髓藏或精泄後風氣入犯胞中遂

成肥痺之患甚則結塊阻寒廷孔之端溺時艱苦

萬狀或坐熱湯中借燠氣以通氣化或蹲踞而溺

蠶其約束以通其竅始得澀澀而出故首取羊腎

血肉溫補之味同氣相引引領人參五味以滋金

水之化源佐以茯苓澤瀉除濕利水元參骨皮化

導標熱得防風搜逐內風得桂心蒸發津氣得磁

石鎮攝虛陽一從外泄一從內散一從下吸其裏

祛邪匡正之功猶恐失強之軀不勝利水傷津即

以甘艸黃芪輔佐參味保護真元芎歸芍藥資助

薑桂護持榮血以杜虛風復擾之患妙用全在防

風之散桂心之鬆磁石之固則參芪五味羊腎之

屬皆得靈動矣一本無元參有麥冬乃合生脈以

滋腎水之上源而通氣化猶為合宜 又方無芎

歸芍藥元參骨皮甘艸六味多菴蓉巴戟秦艸山

藥丹參遠志細辛石斛牛膝杜仲桑皮大棗十二

本草卷五

栝樓山房

味則益精之功勝於和榮 增損腎瀝湯較首方

亦損去芎歸芍藥元參及防風磁石六味增入麥

冬地黄石解遠志栝樓根桑皮大棗七味則滋津

祛熱之用勝於和榮固精較前脚氣門中深師增

損腎瀝湯則無澤瀉石斛栝樓根桑皮四味而有

芪芍芎歸防風菴蓉磁石枳實半夏龍骨石脂十

味彼志在於杜風逐濕此志在於清熱利水稍有

不同

治左脇氣衝膈上滿頭上有風如蟲行手足頑痺

鼻寒脚轉筋不能伸縮兩目時腫痛方

猪腎 <small>一具</small>	防風	川芎
榴皮	澤瀉	杜心
石斛 <small>各一兩</small>	半夏	茯苓
丹參	通艸	生薑 <small>各三兩</small>
乾地黄 <small>三兩</small>		

右十三味咬咀以水一斗半煮腎減三升去腎下藥煮取二升七合去滓分三服

衍諸方下諸證渾是腎虛木苑生風而挾痰氣從脇衝胸則為煩滿行於肢體身如蟲行則為頑痺流於筋經阻於血脈則為縮急故用地黃桂心滋腎水而通肝熱茯苓橘紅生薑半夏下痰氣而利胸膈枳芎丹斛和血氣而開風痺澤瀉通艸疎肺氣一而利膀胱猪腎雖不益人但取汁者藥以為通腎之捷徑

五補湯 治五臟虛竭短氣咳逆傷損悒鬱不足下氣通津液方

五味子	桂心	人參
甘艸 <small>各一兩</small>	麥冬	小麥 <small>各一升</small>
生薑 <small>八兩</small>	粳米 <small>三合</small>	薤白
枸杞根 <small>白皮</small>		

右十味咬咀以水一斗二升煮取三升每服一升日三口燥先煮竹葉一把水減一升去葉內諸藥煮之 <small>翼方無生薑</small>	五補者補五臟諸虛不足也腎為五臟之根五味收攝右腎命門之相火固蟄封藏不使精氣妄泄胃為五臟之母人參入胃先補肺氣肺氣旺則四臟之氣皆旺故本經言補五臟安精神定魂魄得麥冬交通肺腎而通上下津液得桂心交通心腎而通上下氣化得甘艸引入脾經而敷化精微得小麥滋培肝氣且助以粳米而生發清陽又須枸	杞根皮散三焦之虛熱薤白生薑泄胃中之滯氣滯氣散而正氣安五臟皆受蔭矣	疑唾湯 治虛損短氣咽喉疑唾不出如膠塞喉方	麥冬 <small>五兩</small>	人參	茯苓 <small>各二兩</small>
				前胡 <small>三兩</small>	芍藥	甘艸
				地黄	桂心 <small>各一兩</small>	大棗 <small>三十枚</small>
				右九味咬咀以水九升煮取三升分溫三服		

衍疑唾者腎水衰微不能蒸化水穀之精微於肺肺氣蘊熱而唾凝如膠也方中麥冬人參滋肺胃之

氣於上地黃芍藥滋腎肝之陰於下甘艸大棗滋脾胃之津於中前胡茯苓下氣閉痰桂心蒸發腎氣而行諸味之性以滋肺胃之燥也

補湯方

車前三兩

防風

桂心各二兩

巴戟

丹參

鹿茸

地黃

枸杞根皮

五加皮各五兩

右九味以水八升煮取三升去滓分三服

補湯者補腎臟之真陽故用桂心巴戟鹿茸地黃峻補精血兼收防風之走督脈利腰脊為鹿茸之

千金要方卷九

聖

補藥山房

外使丹參達心包行血脈為地黃之內助五加皮強肝腎壯筋骨為桂心之臣佐杞根皮通三焦泄旺氣為巴戟之別使車前子分清濁荷精氣為補腎之首推也

人參湯 治男子五勞七傷胸中逆滿害食乏氣

嘔逆兩脇下脹小腹急痛宛轉欲死調中平蕪

理絕傷方

人參

當歸

白芍

甘艸

桂心

麥冬

飴糖

生薑各二兩

前月

橘皮

川椒

茯苓

五味子各一兩

枳實三兩

大棗十五枚

右十五味以水八升煮取三升去滓分三服
三年陳蘆稍煎取四升內飴復煎數沸服二升二十以下六十以上者服七八合雖年盛而久羸者亦服七八合日三夜一不爾藥力不接則不能救病要用勞水陳蘆不則水強火盛猛則藥力不出也貞觀初有人患羸瘦殆死余處此方一劑即瘥如湯沃雪所以記錄之

五勞七傷不獨腎臟受病然多醉飽入房胃氣受傷所以胸中逆滿乏氣嘔逆氣竭肝傷所以兩脇下脹腎氣失職所以小腹急痛宛轉欲死總由腎氣受傷而為種種諸患故以甘艸人參麥冬茯苓平調中氣歸芍藥糖調和榮血椒桂五味下達腎逆前胡枳橘開豁痰氣全賴內補建中護持絕傷為主用流水陳蘆煮煎者取其通利腎邪以清委積之陳氣也

內補散 治男子五勞六絕其心傷者令人悲驚恐怒無常其脾傷者令人腹滿喜噫食竟欲臥而目昏黃其肺傷者令人少精腰背痛四肢厥

逆其肝傷者令人少血面黑其腎傷者有積聚
小腹腰背滿痺欬唾小便難六絕之為病皆起
於大勞脈虛外受風邪內受寒熱令人手足痠
痛膝以下冷腹中雷鳴時時泄痢或閉或利面
目腫心下憤憤不欲語憎聞人聲方

地黃 兔絲子 山萸肉

地麥各五 遠志 巴戟天各一

麥冬 五味子 甘艸

人參 菴蓉 石斛

茯苓 桂心 附子各一

千金方卷九 玉 補藥山房

右十五味治下篩酒服方寸七日加至三七

五勞六絕靡不因於大勢而五勞之中其房勞最
為根坻况堪六氣乘虛寧無六絕之患乎所以千
金急乘未絕之時特立內補一方以人參補心神
麥冬滋肺氣桂心調肝血甘艸溫脾津石斛清胃
氣茯苓通氣化餘皆溫補腎臟之品味雖兼走諸
臟而實歸并於腎也

石斛散 治大風四肢不收不能自反覆兩肩疼
痛身重脛急筋腫不能行時寒時熱足臄如刀
刺痛身不能自在此皆得之飲酒中大風露臥

濕地寒從下入腰以下冷不足無氣子精虛
寒陰下濕莖消令人不樂恍惚時悲此方陰風
輕身益氣明目強陰令人有子補不足方

石斛十分 牛膝五分 杜仲

附子各四 柏子仁 松脂

石龍芮 雲母粉 芍藥

山萸肉 兔絲子 草薺

澤瀉 防風 細辛

桂心各三

右十六味治下篩酒服方寸七日二陰不起倍兔

千金方卷九 玉 補藥山房

絲子杜仲腹中痛倍芍藥膝中痛倍牛膝背痛倍
草薺腰中風倍防風少氣倍柏子仁歷不能行倍
澤瀉隨病所在倍三分亦可棗膏為丸如梧子酒
服七丸

石斛散專主風虛諸證故以石斛之治傷中除痺
下氣補五臟虛勞羸瘦強陰益精氣久服厚腸為
主佐以細辛防風草薺澤瀉柏子仁松脂兔絲雲母
皆祛風逐濕開痺之味石龍芮為風寒濕痺心腹
那氣利關節止煩滿之峻藥餘俱調補腎肝強陰
益精之品所以能令有子

腎瀝散 治虛勞百病方

羌羊腎一具 陰乾 茯苓一兩

五味子

巴戟 黃肉

石龍芮

桂心 牛膝

甘艸

防風 乾薑

細辛各一兩

地黃二兩 人參

鍾乳粉

兔絲子 石斛

丹參

肉蓯蓉 附子各五分

右二十味治下篩合鍾乳粉和攪更篩令勻平旦

以清酒服方寸匕稍加至二七日再

又方 治男子五勞七傷八風十二痺無有冬夏

悲憂憔悴凡是病皆須服之方

羊腎一具 陰乾 厚朴

茯苓

五味子 巴戟

桂心

石龍芮 山萸肉

細辛

人參 石斛

女萎

牡荊子 芍藥

白斂

乾棗 礬石

龍膽

川芎 菴蓉

續斷

白朮 菊花

川椒

遠志 黃芪

澤瀉

草薢 黃芩各一兩

乾薑

附子 防風

菖蒲

牛膝各二兩 兩半 桔梗一兩

山藥

秦朮各三兩

右三十七味治下篩酒服方寸七日三忌房室

又方

羊腎一具 陰乾 石龍芮

續斷

桔梗 乾薑

菖蒲

山萸肉 茯苓各一兩

厚朴

五味子 巴戟夫

桂心

細辛 人參

石斛

女萎 牡荊子

芍藥

白斂 龍膽

川芎

菴蓉 川椒

白朮

菊花 黃芪

草薢

附子 天雄

烏頭

牛膝 山藥

秦朮

礬石各一兩 一作礬石 遠志

乾漆各三兩

右三十六味治下篩酒服方寸七日二此此前方無澤瀉黃

芥防風有烏頭
天雄餘俱同

衍湯之與散主治雖有新久之分其羊腎五味參苓

甘艸防風桂心茯苓巴戟地黃牛膝丹參細辛等

味大都與湯相類惟石龍芮鍾乳附子之毒烈則

散峻於湯非患久痼疾正氣虛憊不輕用此猛劑

也 至於又方不但石龍芮附子之毒且用乾漆

禁石白斂之屬必有乾血固結不散不得不以峻

攻為務耳 其第三方中石龍芮附子乾漆不足

以破其結更加烏頭天雄與白斂之反激其力峻

矣安有復用礬石之毒少以鼓其勢耶况礬石之

下原有一作礬石之說信為亥豕之誤無疑夫毒

邪痺著於膀胱之內胞而氣化傷殘已大不堪反

峻用大毒傷津之藥寧不顧腎氣之垂絕乎當知

腎氣之傷皆有毒邪之故若不乘此背城一決日

以王道為事引日代斃而已千金諸方每於死中

求活補中用瀉溫補劑中得攻毒開泄則補而不

壅峻攻藥內得溫補雷逆則威而不猛且少與煩

進曲盡峻藥緩之之奧但今之醫與古之醫趨舍

殊途卽有宿負不凡卓識不羣之士當此病勢瀕

危橫議雜陳之際祇宜崇光斂跡緘默自持總使

生機未艾天命靡常吾未如之何也已矣

生機未艾天命靡常吾未如之何也已矣

薯蕷散 補丈夫一切瘧不能具述方

山藥 荆實一方用 續斷一方用

茯苓一方用 牛膝 兔絲子

巴戟 杜仲各一兩 茯苓二兩

五味子 山黃肉一方用 蛇牀子各半兩

右十二味治下篩酒服方寸七日三夜二惟禁酸

蒜自外無所忌服後五夜知覺十夜力生十五夜

力壯如盛年二十夜力倍若多忘加遠志茯苓體

澀加柏子仁服三劑益肌肉亦可為丸服三十九

日二夜一以頭面身體煖為度其藥和平不熱調

五臟久服健力不可當婦人服之面生五色

方中一派溫補精血強骨榮筋之味惟牡荊下氣

除風茯苓通調氣化為諸補之宜導

補五勞方

五月五日採五加莖七月七日採葉九月九日

取根治下篩服方寸七日三長服去風勞妙

五加乃五車星精不獨皮治風濕痿痺壯筋骨助

陽氣而莖通經脈葉除風氣合三者而用以補五

勞其助陽之力可知

勞其助陽之力可知

治五勞六極七傷虛損方

菴蓉 白龍骨 起陽石

續斷 天雄各七 五味子

牡蠣 蛇牀子 地黃

天冬 桑寄生 白石英各二

韭子 地膚子 車前子

兔絲子各五 地骨皮八分

右十七味治下飾 酒服方寸七日三服

義切方中諸藥助陽膏 精兼地黃天冬滋陰益津枸杞

車前清熱利水寒 熱各司其職而勞極損傷皆受

益矣 **千金要方卷九** **空** **婦葉山房**

鍾乳散 治五勞 七傷虛無氣力傷極方

鍾乳六兩 無論 粗細 以白 淨無 赤黃 黑為 上銅

鐘中可 盛二 三斗 并取 粟粗 練二 合許 內

時出 以煖 水淨 淘之 曝乾 玉碎 研不 作聲 止

重密 絹水 下澄 取用 鹿角白者 白馬莖別搗

硫黃別研 鐵精 石斛 磁石 桂心

人參 磁石 蛇牀子三

右十一味為末以 棗膏和搗三千杵酒服三十九

如梧子日再慎房 室及生冷酢滑雜猪魚陳敗

散中鍾乳硫黃鹿角馬莖桂心蛇牀皆助陽之品

人參甘溫補益胃氣鐵精磁石鎮鎮虛陽強益祛

散風痰石斛清解胃氣使膈無逆氣之壅胃有通

調之力則溫補諸藥得以奏勳矣

寒食鍾乳散 治傷損之少氣力虛勞百病令人

力強飲食去風冷方見十七

地黃散 主益氣 調中補絕傷令人嗜飲食除熱

方

生地黄三十斤細切曝乾又取生者三十斤搗

汁漬之令相得出曝乾復如是九番曝搗末食

後酒服方寸七勿令絕 **千金要方卷九** **空** **婦葉山房**

本經言地黃治傷中逐血痺作湯除寒熱積聚癥

折跌絕筋生者尤良此用生者九曝九搗並不經

火深得本經之奧不獨此方為然千金於血證恒

用生者酒服以秦地所產最良不若吾吳之鮮者

絕不易得每取乾者水浸搗汁曷知既經火焙復

不用酒服之雖得暫止癥積經久必發屢屢劫

神氣脫亡至死不悟是豈先哲立方之過與

三石散 治風勞毒冷百治不瘳補虛方

鍾乳 紫石英 白石英

白木

枳椇

防風各五分

栝樓根

人參

川椒

乾薑

附子

桂心

杜蠟

杜仲

細辛

茯苓各十分

右十六味治下篩酒服方寸七日三行十數步至

五十步以上服此大佳少年勿用其餘補方通用

老少皆宜冬月服之翼方名更生散不用紫石共

老幼皆宜冬月服之川椒杜仲茯苓用赤脂爲汁

循

虛勞多由客邪所致是以溫補藥中必兼祛風滌

千金方黃卷九

室

歸葉山房

痰收斂陰氣之味雖金匱風引湯之宗派加以鍾

乳白木之反激功效尤捷

石韋丸 黃帝問五勞七傷於高陽負負曰一曰

陰衰二曰精清三曰精少四曰陰消五曰囊下

濕六曰腰胸一作脇苦痛七曰膝厥痛冷不欲行

骨熱遠視淚出口乾腹中鳴時有熱小便淋瀝

莖中痛或精自出有病如此所謂七傷一曰志

勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰疲勞此

謂五勞黃帝曰何以治之高陽負曰石韋丸十

之

石韋

細辛

礬石

遠志

枳椇

澤瀉

菖蒲

杜仲

蛇狀子

茯苓

桔梗

天雄

牛膝

山萸肉

柏子仁

續斷

山藥各一兩

防風

赤石脂各三兩

右十九味爲末取棗膏如蜜和丸如梧子酒服三

十九日三七日愈二十日百病除長服良崔氏無

岑澤高栝椇山藥

有栝樓根二兩半

千金方黃卷九

室

歸葉山房

勞傷陽氣式微不能護持中外每致虛風外襲痰

癖內蘊阻礙氣化流行之道故用石韋治勞熱閉

瘵鼻石破五內癭結防風通百骸陽氣使陰邪退

聽則陽和敷布矣

五補丸 治腎氣虛損五勞七傷腰脚痠疼肢節

苦痛目暗眩暈心中喜忘恍惚不定夜臥多夢

覺則口乾食不得味心常不樂多有恚怒房室

不舉心腹脹滿四體疼痛口吐酸水小腹冷氣

尿有餘瀝大便不利方悉主之人服延年不老

四時勿絕一年萬病除愈之方

杜仲	巴戟 <small>各六分</small>	人參
五加皮	五味子	天雄
牛膝	防風	遠志
石斛	山藥	狗脊 <small>各四分</small>
地黃	菴蓉 <small>各十分</small>	鹿茸 <small>十分</small>
兔絲子	茯苓 <small>各五分</small>	覆盆子
石龍芮 <small>各八分</small>	草薺	蛇牀子
石南 <small>各三分</small>	白朮 <small>三分</small>	天冬 <small>七分</small>

右二十四味為末蜜和丸如梧子酒服十九日三有風加芎歸黃芪五加皮石南獨活天雄扶神白木柏子仁各三分 有氣加厚朴枳實橘皮各三分 冷加乾薑桂心吳茱萸附子川椒細辛各三分 精泄加韭子白龍骨牡蠣鹿茸各三分 泄痢加赤石脂龍骨黃連烏梅肉各三分 春依方服夏加地黃五分黃芩三分麥冬四分冷則去此加乾薑桂心川椒各三分若不熱不寒亦不須增損直爾服之三劑以上即覺庶事悉佳慎醉滑飧陳臭大冷醉吐是外百無所慎稍加至三十九不得增常以此為度

五補者補五勞之損傷也方中助陽之味居多略

兼地黃天冬以助陰長之力惟取防風外通陽氣石龍芮內除陰翳則諸藥各隨臟氣之虛而施補益之功與風痺門中五補丸名同實異無比薯蕷丸 治諸虛勞百損方

山藥	菴蓉	五味子
兔絲子	杜仲	牛膝
山萸肉	地黃	澤瀉
茯神 <small>一作茯苓</small>	巴戟	赤石脂 <small>各五分</small>

右十二味為末蜜丸如梧子食前酒服二十九加至三十九日再無所忌惟禁醋蒜陳臭等物服七日後令人健四體潤澤唇日赤手足煖面有光彩消食身體安和音聲清朗是其驗也十日後長肌肉其藥通中入腦鼻必酸疼勿怪若求大肥加燉煌石膏二兩失性健忘加遠志一兩體少潤澤加柏子仁一兩古今錄驗有白馬莖二兩為十六味或煩熱有時或冷痺骨痠腰痛不送食難多不生肌肉或少食而脹滿體清無光澤腸胃氣衰絕陰氣不行此藥能補十一經脈起陰陽通內制外安魂定魄開三焦破積聚厚腸胃消五臟邪氣除心內伏熱強筋練骨輕身明目除風去冷無所不治補益虛廢常須服餌為佳七十老人服之尚非非常者乎

此於八味丸中除去桂附之辛熱助陽丹皮之辛

香散氣易入荏菴菟絲牛膠杜仲巴戟溫補下元

五味石脂以閉澀精氣也

大薯蕷丸 治男子女人虛損傷絕頭目眩骨節

煩疼飲食減少羸瘦百病方

山藥 附子 古今錄驗 作茯苓 人參

澤瀉 各五分 天冬 地黃

黃芩 當歸 各十分 乾漆

杏仁 阿膠 各二分 白朮

白薇 古今錄驗 作防風 芍藥 石膏

前胡 各三分 桔梗 乾薑

桂心 各四分 大黃 六分 五味子 十六分

甘艸 二十分 大豆卷 五分 古今錄驗 作黃連

大棗 一百枚

右二十四味為末蜜和棗膏搗三千杵丸如梧子

酒服五九日三漸增至十九 神景無附子黃芩石

大黃有神效十分川芎附風各六分茯苓

五分丸如彈丸每歲一丸以一百丸為劑

大薯蕷丸則於金匱薯蕷丸中之相同者一十五

味又以前胡易柴胡天冬易麥冬彼治房勞不足

風氣百疾故用川芎防風茯苓神效此治虛損絕

傷內有乾血故用大黃附子乾漆石膏大澤五味

其力較金匱倍猛用棗膏者以和乾漆之峻利也

八味腎氣丸 治虛勞不足大渴欲飲水腰痛小

腹拘急小便不利方

地黃 八兩 黃肉 山藥 各四兩

丹皮 茯苓 澤瀉 各三兩

桂心 附子 各二兩

右八味為末蜜丸如梧子大酒服十五九日三加

至二十五丸 仲景云常服去附子加五味子

加五味子茯苓各四兩附子三兩後方用地

黃四兩澤瀉附子各一兩餘各二兩

金匱八味腎氣丸治虛勞不足水火不交下元虧

損之首方專用附桂蒸發津氣於上地黃滋培陰

血於下黃肉蓄肝腎之精山藥補黃庭之氣丹皮

散不歸經之血茯苓守五臟之氣澤瀉通膀胱之

氣化原夫此方金匱本諸崔氏而千金又本諸南

陽心心相印世世相承洵為養生之至寶固本諸

神丹除陽水火各得其平而無偏勝之慮也

腎氣丸 治虛勞腎氣不足腰痛陰寒小便數

冷濕尿有餘瀝精自出陰痿不起忽喜悲方

地黃 八兩 遠志 防風

乾薑 牛膝 麥冬

萎蕤

山藥

石斛

細辛

骨皮

甘艸

附子

桂心

茯苓

山黃肉各四兩

菴蓉六分

鍾乳粉十分

殺羊腎一具

右十九味為末蜜丸如梧子酒服十五丸日三稍

加至三十九古今錄驗無遠志防風乾薑蕤骨皮廿艸鍾乳有狗脊一兩黃芪四兩

人參三兩澤瀉乾薑各二兩大棗一百枚

又方 治男子婦人勞損虛羸傷寒冷乏力無所

不治方

本草綱目卷九

卷

攝生山房

石斛二兩

紫苑

牛膝

白朮各五分

麻仁一分

人參

當歸 茯苓

川芎

大豆卷 黃芩

甘艸各六分

杏仁 川椒

地黃

防風各四分

桂心四分

羊腎一具

右十八味為末蜜丸如梧子酒服十九日再漸增

之一方有菴蓉六分

又方 此方勝胡公腎氣方及五石丸

地黃 茯苓

元參各五兩

澤瀉

山藥

山黃肉

桂心

芍藥各四兩

附子三兩

右九味為末蜜丸如梧子酒服二十九加至三十

丸以知為度翼方有丹皮四兩

又方 治腎氣不足羸瘦日劇吸吸少氣體羸耳

聾目暗百病方

桂心四兩

地黃一斤

澤瀉

薯蕷

茯苓各八兩

丹皮六兩

半夏一兩

石七味為末蜜丸如梧子大酒服十九日三服

本草綱目卷九

卷

攝生山房

腎氣丸於八味丸中裁去丹皮澤瀉取用其六而

分兩不作且配入遠志以通心防風以通脾萎蕤

門冬以通肺牛膝以通肝惟羊腎菴蓉專通腎氣

其餘枸杞根皮通三焦而散虛陽石斛清胃熱而

堅筋骨甘艸乾薑溫中氣而進飲食細辛搜肝風

而利九竅鍾乳助元陽而充百骸雖云主腎氣之

勞傷而實補五臟之不足 其第二方中惟羊腎

補腎臟之精血其餘諸藥多從薯蕷丸採入更加

石斛紫苑牛膝麻仁黃芩 茯苓皆為虛熱起見川

椒專導膈上虛陽 第三方於腎氣丸中退丹皮

之幸散進芍藥之酸收以制桂心之辛甘而調失散之陰血加元參之苦寒以制附子之悍烈而通氣氤之陽氣 第四方又於腎氣丸中除去萸附而易半夏或者以為辛燥之味不宜入於補腎藥中蓋緣膏粱之人肥甘恣噉真陰素戕壯火食氣迫協穀肉之味蘊釀為痰必須先行掃除以安水穀之府胃氣始能敷布腎氣方得滋榮其本方中萸肉之酸收惡其凝滯痰涎附子之辛烈恐其傷殘腎水因為裁汰前方以榮血之散故去牡丹而用芍藥此方以水精之滯故去萸桂而用半夏兩不移易之定法

千金要方卷十九

圭

掃葉山房

黃芪湯 治五勞七傷諸虛不足腎氣虛損目視

- | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 黃芪 | 乾薑 | 當歸 |
| 羌活 <small>一作白朮</small> | 川芎 | 甘艸 |
| 茯苓 | 細辛 | 桂心 |
| 烏頭 | 附子 | 防風 |
| 人參 | 白芍 | 石斛 |
| 地黃 | 茯苓 <small>各二兩</small> | 棗膏 <small>五合</small> |
| 羊腎 <small>一具</small> | | |

右十九味為末以棗膏與蜜為丸如梧子大酒服十五丸日二加至三十九丸 一方無川芎乾薑當歸羌活為十五味古今錄驗無羊腎有羌活鍾乳礬石各二分名五石黃芪丸

又方 療虛勞方

- | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 黃芪 | 鹿茸 | 茯苓 |
| 烏頭 | 乾薑 <small>各三分</small> | 地黃 |
| 當歸 | 桂心 | 川芎 <small>各四分</small> |
| 杞白皮 | 菟絲子 | 五味子 |
| 柏子仁 | 白朮 <small>各五分</small> | 大棗 <small>二十枚</small> |
- 右十五味為末蜜丸如梧子大且酒服十九夜十丸以知為度禁如藥法
- 勞傷不足多由衛氣之虛所以外內不能固密故專取黃芪實衛人參固中烏附乾辛助陽芎歸芍地護陰羌防細辛透表苓甘石斛清理東膏安胎羊腎補腎陰陽各得其平外內無所阻滯矣 前方專以防風發黃芪之壅此方專以五味助黃芪之斂此方中五味即前方茯苓之意此方中白朮即前方人參之意此方中鹿茸即前方羊腎之意此方中杞白皮即前方石斛之意此方中菟絲子

前方細辛之意此方中柏子仁即前方防風之意
前方以虛風外襲故用羌防細辛此方以虛風內
動故用柏仁兔絲主治雖有不同而立法大意不
殊後世處方得不以先輩為則耶

神化丸 治五勞七傷陽氣不足陰下濕癢生瘡

小便數有餘瀝陰頭冷精自出小腹急繞臍痛

膝重不能久立目視漠漠見風淚出腰痠精氣

衰微臥不欲起手足厥冷調中利食方

菴蓉 牛膝

續斷 黃肉

遠志

柏子仁

防風

石斛

甘艸

桂心

蛇牀子

茯苓

川芎

右三十一味

為末蜜丸如梧子酒服五九日三加

至二十九
神化者言其功用不凡清燥濕熱溫補元陽透表
通肌攻堅破結分利陰陽滯精滋血無不名實相
應也

三七 七子丸 治五勞七傷補益方

酸棗仁 柏子仁 薏苡仁

兔絲子 枸杞子 蛇牀子

菴藷子 地膚子 烏麻子

牡荊子 地黃 山藥

桂心 菴蓉 菊花

右十五味為末蜜丸如梧子酒服二十九日三夜

行三仁七子無非潤燥滋津祛除內風而兼溫補精

血

填骨丸 治五勞七傷補五臟除萬病方

人參 石斛 當歸

杜蒙 石長生 石韋

白朮 遠志 菴蓉

巴戟 紫苑 茯苓

天雄 附子 乾薑

右三十一味

為末蜜丸如梧子酒服五九日三加

蛇牀子

牛膝

牡蠣

丹皮

甘艸

柏子仁

山藥

阿膠

地黃

五味子各二兩

川椒三兩

右二十六味為末蜜丸如梧子酒服三九日三

義衍腎主骨填骨而用溫補髓藏必先滋培胃氣以先

天之氣靡不本諸後天所以人參白朮不可缺也

通明丸 治五勞七傷六極強力行事舉重重病

後骨髓未滿房室所食不消胃氣不平方

麥冬三斤

地黃

石韋各一斤

千金方卷五

玉

補藥山房

紫苑

五味子

菴菴

甘艸

阿膠

杜仲

遠志

茯苓

天雄各半斤

右十二味為末蜜丸如梧子食上酒服十九日三

加至二十九

義衍方中滋陰助陽益精補血堅骨充髓之藥萃聚十

一味中因以通明命方言週身臟腑得此無不通

徹

補虛益精大通丸 治五勞七傷百病方

地黃八兩

乾薑

當歸

石斛

菴菴

天冬

白朮

甘艸

人參

芍藥各六兩

紫苑

大黃

黃芩各五兩

防風四兩

杏仁

茯苓各三兩

白芷一兩

麻仁半兩

川椒三升

右十九味為末白蜜棗膏和丸如彈子空腹服一

九日三十日效

義衍補虛益精而用防風白芷通陽麻仁大黃通陰川

椒乾薑下氣先清宿滯則參朮歸地菴菴天冬之

千金方卷五

玉

補藥山房

屬方始得力能透此關方許入千金之室

赤石脂丸 治五勞七傷每事不如意男子諸疾

方

赤石脂

山萸肉各七分

防風

遠志

栝菴根

牛膝

杜仲

山藥各四分

菴蒲

續斷

天雄

柏子仁

菴菴二分

石韋三分

蛇牀子六分

右十五味為末蜜棗膏和丸如梧子大空腹服五

九日三服十日知久服不老加兔絲子四分佳

大通九 非祛宿病赤石脂九專杜虛風雖所患各

殊而先後之著不可不審

鹿角九 補益方

鹿角

白馬莖一作鹿莖

石斛

山藥

地黃

人參

兔絲子

防風

蛇牀子各五分

山萸肉

杜仲

赤石脂

澤瀉

乾薑各四分

石龍芮

遠志各三分

五味子

巴戟天

牛膝各六分

天雄二分

菴蓉七分

千金要方義卷九

圭

掃葉山房

右二十一味為末蜜丸如梧子酒服三十九日

忌米醋 一方無乾薑五味子

衍 千金於補腎方中每兼風藥透表即用固脫杜風

且以血肉之味匡佐艸木溫補之力於此可徵

菴蓉九 補虛益氣治五臟虛勞損傷陰痺陰下

濕癢或生瘡莖中痛小便餘瀝四肢噓吸陽氣

絕陽脈傷方

菴蓉

山藥各五分

蛇牀子

遠志各四分

兔絲子六分

天雄八分

五味子

山萸肉各七分

巴戟四分

右九味為末蜜丸如梧子酒服二十九日

二十五丸

衍 此方雖無風藥通陽石藥固脫血肉之藥助藥然

天雄蛇牀子兔絲山藥並除風氣與肉五味子並

能膏精較鹿角丸雖功力稍遜而立法之大意不

殊

乾地黃九 治五勞七傷六極臟腑虛弱飲食不

下顏色黧黯八風所傷補虛益氣進食資顏色

長陽方

地黃

茯苓

天雄各五分

千金要方義卷九

圭

掃葉山房

蛇牀子六分

桂心

麥冬各五分

遠志

菴蓉

杜仲

甘艸各十分

五味子四分

阿膠

裏肉各八分

右十三味為末蜜丸如梧子酒服二十九日再加

至三十九丸常服彌佳

衍 地黃得天雄則滋而不壅桂心得五味則辛而不

散陰菴蓉遠志蛇牀杜仲助天然之補火藥肉甘

滋陰菴蓉遠志蛇牀杜仲助天然之補火藥肉甘

艸通脾 津而和寒熱諸性也

治虛勞不起囊下痿汗出小便淋瀝莖中數痛尿

時赤黃甚者失精劇苦溺血目視眩暈見風淚

出莖中冷精氣衰兩膝腫不能久立起則目眩

補虛方

蛇牀

細辛

天雄

大黃

柏子仁

兔絲

杜仲

茯苓

防風

菖蒲

菖蒲

澤瀉各四分

遠志

牛膝各六分

栝藹根三分

芎藭

桂心

菴蓉

千金方衍義卷九

羌

補藥山房

山藥

川椒

石葶

白朮各五分

右二十二味為末蜜丸如梧子酒服十五丸日再漸加至五十九十五日身體輕三十日聰明五十日康健復壯

虛勞而用祛風逐濕之味入於溫補助陽藥中以

利水道通經脈強筋骨更妙在大黃一味推陳致

新得天雄椒桂之辛烈料無開泄之慮矣

覆盆子丸 治五勞七傷羸瘦補益令人充健方

覆盆子

兔絲子各十分 菴蓉

覆盆子

兔絲子各十分

菴蓉

鹿茸

巴戟

白龍骨

茯苓

天雄

白石英

五味子

續斷

山藥各十分

地黃八分

遠志

乾薑各六兩

蛇牀子五分

右十六味為末蜜丸如梧子酒服十五丸日再細

細加至三十九丸慎生冷陳臭張文仲無龍骨鹿茸天雄續斷白石英有

石解白朮桂心狗杞子人參柏子仁澤瀉各六分牛膝細辛各四分赤石脂甘州各八分山藥五分

義衍 派助陽補精方中但以地黃五味子留戀諸藥

之生也

千金方衍義卷九

空

補藥山房

治五勞七傷虛羸無力傷極方

芎藭

五味子各二兩

蛇牀一兩

右三味為末蜜丸如梧子每服十九日三禁如常法

抱朴子云兔絲子去風明目本經主續絕傷益氣

力五味子治勞傷羸瘦強陰益男子精蛇牀子主

男子陰痿濕癢婦人陰中腫痛除痺氣利關節皆

溫補命門之藥而兔絲子則兼走肝經氣分也

補益方

乾絲

柏子仁

山黃肉

散寒仁兩一

右四味為末蜜丸加梧子每服二七九加至二十

九日二

試初

人之羸瘦胃立皆由極勞損傷乾血內結甚則時發寒熱非乾榛之辛鹹無以削平久積之瑕本經言治絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟除五緩五急蓋胃中痰積滯阻絕陽氣流行之道臧腑筋骨髓腦皆失榮養以致健運失常肢體緩急用以旋除委積之痰中氣得復絕傷俱瘳而筋脈自和柏子仁主驚悸益氣除風濕安五臟取其入肝而散內動之風黃肉治心下邪氣寒濕溫中逐寒濕痺去三蟲亦由肝風內動而為寒熱衛虛邪襲而為濕痺濕熱不散而為三蟲故取酸溫內收榮氣外祛邪惡酸衰仁治心腹寒熱邪結氣聚四肢痠痛濕痺久服安五臟設不知乾血內伏而從事於破宿生新之法雖日用參芪湯厥調補益益哉

地黃

山藥

牡蠣

天雄

蛇牀

遠志

杜仲

鹿茸

桂心

五味子

鹿藥艸

石斛

車前子

兔絲子

菘蓉

雄雞肝

未連蠶蛾

等分

右十七味合搗為末蜜丸如小豆大酒服三九加至七九日三夜一禁如常法須令常有藥氣大益人服藥十日以後少少得強

初

有底曰囊膀胱有上竅無下竅因以囊喻夫人之腎氣不虛則膀胱有制今以腎氣失職不能司閉藏之令則膀胱亦不能秉氣化之權或時頻數或時不禁故專取鹿茸雞肝兔絲蛇牀以助氤氳之氣五味菘蓉原蠶牡蠣以收耗散之津蓋腎得藏則固密膀胱得酸則拳曲曲囊之名未必不本諸此他如天雄桂心助真陽消陰弱地黃薯蕷濟真陰除假熱其餘杜仲遠志菘蓉乃鹿茸之匡佐車前石斛則地黃之通使耳

崔平世治五勞七傷方

鍾乳粉

菘蓉

巴戟

兔絲子

菘蓉

地黃

右六味為末蜜丸如梧子酒服七九日三服訖行

百步服酒三合更行三百步胸中熱定即食乾飯

牛羊兔肉任為美去肥膩餘不思

衍藥止六味以補五勞七傷總取固精助陽之力

明目益精長志倍力久服長生耐老方

遠志

茯苓

細辛

兔絲

木蘭

續斷

人參

菖蒲

龍骨

當歸

川芎

茯苓各五

石十二味為末蜜丸如梧子服十九日二夜一滿

三年益智

衍目之水輪屬腎腎藏精與志故益精長志水輪白

千金衍義卷十九

全

掃葉山房

明

磁石酒 療丈夫虛勞冷骨中疼痛腸氣不足陰

下疥一作熱方

磁石

石斛

澤瀉

防風各五

杜仲

桂心各四

天雄

桑寄生

天冬

黃芪各三

石南二兩

狗脊八兩

右十二味咬咀以酒四斗浸漬服三合漸加至五

合日再服亦可單漬磁石服之

衍祛風逐濕攝火歸源利骨強筋虛勞之治法備矣

石英煎 治男女五勞七傷消枯羸瘦風虛痼冷

少氣力無顏色不能動作口苦咽燥眠中不安

惡夢驚懼百病方

白石英

碎如米以醇酒九升銅器中微火蒸取三升以竹篦攪勿住手去滓澄清

紫石英

製同上地黃一斤白蜜三斤

酥

桃仁各三斤

石斛五兩

柏子仁

遠志

茯苓

山萸肉

人參

麥冬

桂心

乾薑

五味子

白木

茯苓

甘艸

千金衍義卷十九

全

掃葉山房

天雄

白芷

細辛

川芎

黃芪

防風

山藥各二

右二十四味治下篩內煎中如不足加酒取足為

限煎令可丸如梧子大酒服二十九日三稍加

至四十九為度無藥者可單服煎令人肥白充實

白石英治男子消渴陰痿紫石英治女子風寒在

子宮皆鎮攝虛風之藥佐以助陽益氣和血滋津

祛風潤燥等味補虛逐熱之法靡不畢具

麋角九方

取當年新角連腦頂者為上看角根有斫痕處亦堪用退角根下平者是不堪諸麋角丸方凡有一百一十方此特出眾方之外容成子羔服而羽化夫造此藥取角五具或四具二具二具一具為一劑先去尖一大寸即名長七八寸取勢截斷量把鎊得即於長流水中以竹器盛懸浸可十宿如無長流水處即於淨盆中滿著水浸每夜易換即將出削去皴皮以利鎊鎊取白處至心即止以清粟米泔浸兩宿初經一宿即乾沃去舊水置新絹上暴乾淨擇去惡物粗骨

千金方卷九 金 掃葉山房

皮及鎊不勻者即以無灰美酒於大白磁器中浸經兩宿其酒及器物隨藥多少其藥及酒俱入淨盆中初武火煮一食久後即著文火微煎如蠟目沸以柳木篋長四尺濶三指者徐攪不得住手因則易人時時更添美酒以成煎為度煎之皆須平旦下手不得經兩宿仍看屑消似希膠即以牛乳五大升酥一斤以次漸下後藥

鹿角一條炙令黃為散與諸藥同製之 栝柳、
通艸 秦艸 人參
汁艸 菟絲 肉蓯蓉各二兩

右搗為散共煎一食時候藥似稠粥即止火少時歌滿氣即投諸藥散相和攪令相得仍待少時澆糲粘堪作丸即以新器盛貯以象手一時丸就如梧子大若不能象手丸就旋煖漸丸亦得之如粘手著少酥塗手其服餌之法空腹取三果漿下之如無三果漿酒下亦得初服三十丸日加一九至五十九丸為度日二服初服一百日內忌房室服經一月腹內諸疾自相驅逐有微利勿怪漸後多泄氣能食聰耳明目補心神安臍膈填骨髓理腰脚能久立髮白更黑貌老還少患氣者加枳實青木

千金方卷九 金 掃葉山房

香准前各一大兩若先曾服丹石者即以三黃丸食上壓合宣泄如飲酒食麪口乾鼻中氣麤眼澹即以蜜漿飲之即止如不止加三黃丸使微利諸凡如此一度發動已後方始調暢服至二百日面皺自展光澤一年齒落更生強記身輕若風日行數百里二年常令肥飽少食七十已上却成後生三年腸作筋髓預見未明四年常飽不食自見仙人三十已上服之不徹顏一定而不變其藥修合須淨室中不得令女人孝子雞犬等見婦人服之亦佳

衍義廉性喜食菖蒲而能長年所以修真家恒多用之

此方為麋角丸眾方首推方中反用檳榔通艸秦

芩等味殊不可解洗心求之始知養正先以除邪

使本身內外無纖毫宿滯然後得人參甘艸助胃

氣以行藥力免絲菴蓉佐麋角而滋腎精千金歸

腎臟徧末者正以血內之味大能補益洵為仙家

服食之聖也

治五臟虛勞小腹弦急脹熱方

灸腎膈五十壯老少損之若虛冷可至百壯橫

三間寸灸之

千金方義卷九

孫真人千金方衍義卷二十

長洲 王著

南沙 廣德堂 刻

膀胱腑方 凡七類

膀胱腑脈論第一

論一首 脈四首

論曰膀胱者主腎也耳中是其候也腎合氣於膀胱

膀胱者津液之腑也號水曹掾名玉海重九兩二銖

左同壘積上下縱廣九寸受津液九升九合兩邊等

應二十四氣鼻孔在外膀胱漏泄

黃帝問曰夫五臟各一名一形腎乃獨兩何也岐伯

千金方義卷十

膀胱山房

對曰膀胱為腑有二處腎亦二形應腑有二處臟有

一腑名二故五臟六腑也一說腎有左右而膀胱無

二今用當以左腎合膀胱右腎合三焦

左手關後尺中陽絕者無膀胱脈也病若逆冷婦人

月使不調三月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰

經治陰在足內踝下動脈是也

右手關後尺中陽絕者無子戶脈也病苦足逆寒絕

產帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰

左手關後尺中陽實者膀胱實也病苦逆冷脇下邪

氣相引痛刺足太陽經治陽在足小趾外側本節後

陷中

右手關後尺中陽實者膀胱實也病苦小腹滿引腰痛刺足太陽經治陽

病先發於膀胱者背脊筋痛小便閉五日之腎小腹腰痛脘脛痠一日之小腸脹一日之脾閉塞不通身痛體重二日不已死冬雞鳴夏下哺一云夕

膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之則欲小便而不得肩一作上熱若脈陷及足小趾外側及脛踝後皆熱若脈陷取委中

膀胱脹者小腹滿而氣癢

腎前受病傳於膀胱腎欬不已欬則遺溺厥氣客於膀胱則夢遊行

腎應骨密理厚皮者三焦膀胱厚粗理薄皮者三焦膀胱薄腠理疎者三焦膀胱緩急皮而無毫毛者三焦膀胱急毫毛美而粗者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱結也

扁鵲云六腑有病徹面形腎膀胱與足少陰太陽為表裏膀胱總通於五臟所以五臟有疾即應膀胱膀胱有疾即應胞囊傷熱則小便不通膀胱急尿若黃赤傷寒則小便數清白或發石水根在膀胱四肢小

其腹獨大也方見治水篇中骨絕不治齒黃落十日死於太陽之脈起於日內眇上額交巔上其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下會於後陰下貫膂入膈中其支者從膂內左右別下貫膂一作過髀樞循髀外後廉下合膈中以下貫膂內

州外踝之後循京管至小指外側是也動則病衝頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲一作臃如結臃如列是為蹠厥是主筋所生病者痔瘡狂癲疾頭腦項痛目黃淚出眇衄項背腰尻膈膈脚皆痛

小指不用盛者則八迎大再倍於寸口虛者則八迎反小於寸口也

千金方卷下

掃葉山房

其腹獨大也方見治水篇中骨絕不治齒黃落十日死於太陽之脈起於日內眇上額交巔上其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下會於後陰下貫膂入膈中其支者從膂內左右別下貫膂一作過髀樞循髀外後廉下合膈中以下貫膂內

州外踝之後循京管至小指外側是也動則病衝頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲一作臃如結臃如列是為蹠厥是主筋所生病者痔瘡狂癲疾頭腦項痛目黃淚出眇衄項背腰尻膈膈脚皆痛

小指不用盛者則八迎大再倍於寸口虛者則八迎反小於寸口也

膀胱虛實第一脈四首

膀胱實熱

左手尺中神門以後脈陽實者足太陽經也病苦逆滿腰中痛不可俛仰勞也名曰膀胱實熱也

右手尺中神門以後脈陽實者足太陽經也病苦胞轉不得小便頭眩痛煩滿脊背強名曰膀胱實熱也

治膀胱實熱方

石膏八兩

梔子仁一作瓜茯苓

子仁

知母各三

蜜五合

淡竹葉

生地各切

右七味咬咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮二沸分三服須利加芒硝三兩

實則邪氣之實而氣化受傷水道不利因以石膏

解利胃熱知母滋化腎邪梔子清肺胃熱生地瀉

丙丁火淡竹葉除隔上煩茯苓通膀胱閉蜂窠滋

臟腑燥金水相生清肺熱所以滋腎水土水相

制降胃火即所以利膀胱故以肺胃之藥居多

治膀胱熱病不已舌乾咽腫方

千金方卷之十

掃葉山房

蜜七合

升麻

大青各三

射干

生元參

黃柏

薔薇根白皮

各四

右七味以水七升煮取一升去滓下蜜煮二沸細

細含之

舌乾咽腫水虧而龍火上僭也蜜能潤燥解毒煎

柏化熱滋陰元參散氤氳氣大青解龍雷火射干

治咽喉痛薔薇散喉舌腫升麻升清降濁助大青

黃柏元參以清膈上之火

膀胱虛冷

左手尺中神門以後脈陽虛者足太陽經也痛苦脚

中筋急腹中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風偏枯腰

痛外踝後痛名曰膀胱虛冷也

右手尺中神門以後脈陽虛者足太陽經也痛苦肌

肉振動脚中筋急耳聾忽忽不聞惡風颯颯作聲名

曰膀胱虛冷也

治膀胱虛冷不欲飲食面黑如炭腰脇疼痛方

磁石六兩

黃芪

茯苓各三

五味子

杜仲各四

白朮

白石英各五

千金方卷之十

掃葉山房

右七味咬咀以水九升煮取三升分三服

磁石鎮攝虛陽黃芪溫補衛氣白朮厚土益脾五

味交通心腎茯苓清利膀胱石英專溫肺臟肺為

腎水之母母能令子實也

治膀胱冷咳嗽則有血喉鳴喘息方

羊腎一具

人參

元參

黃芪

桂心

川芎

甘艸各三

茯苓四兩

骨皮

生薑各五

白朮六兩

右十一味咬咀以水一斗二升先煮羊腎減二升

去腎下藥煮取三升去滓分三服

衍 膀胱之冷良由腎氣之虛虛則火氣上逆有傷其

陰而致喘鳴欬唾有血故用羊腎補精參芪保元

白木甘艸實脾隄水桂心芎藭導火和榮元參骨

皮分清解熱茯苓利水清陰生薑開通滯氣以鼓

羊腎參芪之力

龍骨丸 治膀胱腎冷坐起欲倒目眩氣不足

骨痠方

龍骨

柏子仁

地黃

甘艸

防風各五分

黃芪

千金衍義卷下

六

掃葉山房

禹餘糧

白石英

桂心

茯苓各七分

五味子

羌活

人參

附子各六分

山萸肉

元參

川芎各四分

磁石

杜仲

乾薑各五分

右二十味為末蜜丸如梧子大空腹酒服三十九

日二加至四十九

衍 固精助陽和榮實衛益氣養陰疎風利水救本散

標之法兼該一方皆緣腎水餒漏而為廣輯城池

以禦不虞也

治膀胱寒小便數漏精稠如白米泔方

赤石脂

白石脂各五分

地黃三分

茯苓六分

赤雄雞腸

雞臆脰各兩

桑螵蛸

牡蠣

龍骨

川連各四分

右十味治下篩內雞腸及脰脰中縫塞蒸令熱曝

乾合搗為散以酒和服方寸七日三

衍 方中赤白石脂固脰龍骨牡蠣桑螵蛸膏精地黃

從蓉滋髓雞腸脰皮利水消積川連專治便如米

泔汁也

千金衍義卷下

七

掃葉山房

胞囊第三

灸法一首 方十六首

論曰胞囊者腎膀胱候也貯津液并尿若臟中熱病

者胞濡小便不通尿黃赤若腑中寒病者胞滑小便

數而多白若至夜則尿偏甚者夜則內陰氣生故熱

則瀉之寒財補之不寒不熱依經調之則病不生矣

凡尿不在胞中為胞屈滯津液不通以葱葉除尖頭

內陰莖孔中深三寸微用口吹之胞脹津液大通即

愈

榆皮通津泄熱煎 治腎熱麻胞囊溼熱小便黃

赤若不通方

榆白皮

赤蜜

葵子各升

滑石

通艸各三兩

車前子五兩

右六味咬咀以水三斗者取七升去滓下蜜更煎

取三升分三服婦人難產亦同此方

方中皆屬利水傷津之味惟赤蜜能導火兼可

通津以其專利竅故產難亦得用之

滑石湯 治膀胱急熱小便黃赤方

滑石八兩

子苓三兩

車前子

葵子各一升

榆白皮四兩

右五味咬咀以水七升煮取三升分三服

本草衍義卷下

婦人難產

此較滑石湯無赤蜜通艸而多子苓使下焦風熱

悉從水道開泄

怡墟夢白濁方

榆白皮切二升水二斗煮取五升分五服

又方

搗乾羊骨為末服方寸七日二

凡飽食後或忍小便或走馬或忍小便大走及入

房皆致胞轉臍下急滿不通治之方

用亂髮急纏如雨拳大燒為末醋四合和二分

寸七服之訖即炒熟黑豆葉上

義榆皮利竅 羊骨祛風 髮灰散火三法不可不

審

治胞轉方

石葶一兩

葵子

通艸

甘艸各二兩

鬼箭羽三兩

滑石四兩

榆白皮一升

右七味咬咀以水一斗煮取三升分三服

治胞轉不得小便八九日者方

葵子一升

滑石

寒水石各一斤

右三味咬咀以水一斗煮取五升分三服

本草衍義卷下

婦人難產

治胞轉小便不得方

葱白四七

阿膠一兩

琥珀二兩

車前子一升

右四味咬咀以水一斗煮取三升分三服

又方

阿膠三兩水二升者取七合頓服之

又方

豉五合以水三升者數沸頓服之

又方

以麻子煮汁頓服之

又方

連枷關燒灰水調服之

又方

筆頭燒灰水服之

又方

燒死蜚螂二枚為末水服之

又方

肉白魚子莖孔中

又方

酒和猪脂雞子頓服之

又方

石韋大寒治熱菀閉癰佐以滑石通艸葵子榆皮

皆走氣分惟衛茅散惡血除賊風甘艸瀉火治痛

然須生者為良

次方中葵子滑石利竅寒水石

治下焦濕熱以鹹能走腎也

第三方專治血積

胞中故用葱白和血阿膠補血琥珀散血車前利

水而不傷腎故膀胱虛者亦得用之

其外單用

阿膠滋臟腑血

豆豉搜腎臟風 麻子潤腸胃

竅

連枷灰取其流利

筆頭灰用以破血 蜚

螂拔毒外出

白魚子利水通津 猪脂雞子滋

津和血兼酒以助之以上諸法各詳其因擇其便

而為取用可也

灸方

灸脾膈百壯 又灸三焦膈百壯 又灸腎膈

百壯 又灸章門百壯在季脇端

治腰痛小便不利著胞轉方

灸玉泉七壯穴在關元下一寸大人從心下度

取八寸是玉泉穴小兒斟酌取之 又灸第十

五椎五十壯 又灸臍下一寸 又灸臍下四

寸各隨年壯

三焦脈論第四 論一首

千金方衍義卷第

論曰夫三焦者一名三關也上焦名三管反射中焦

名霍亂下焦名走哺合而為一有名無形主五臟六

腑往還神道周身貫體可聞不可見和利精氣決通

水道息氣腸胃之間不可不知也三焦名中精之腑

別號玉海水道出屬膀胱合者雖合而不同上中下

三焦同號為孤腑而榮出中焦衛出上焦榮者絡脈

之氣道也衛者經脈之氣道也其三焦形相厚薄大

小並同膀胱之形云

三焦病者腹脹氣滿少腹尤堅不得小便窘急溢則

為水留則為脹候在足太陽之外大絡在太陽少陽

之間亦見於脈取委陽

小腹腫痛不得小便邪在三焦約取太陽大絡視其結脈與厥陰小絡結而血者腫上及胃腕取三里

三焦脹者氣滿於皮膚鼓鼓而不堅_{一云鼓}久欬不已傳之三焦致而腹滿不欲飲食也手少陽

之脈起於小指次指之端上出兩指之間循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩而交出足少

陽之後入缺盆交膈中散絡心胞下膈通屬三焦其支者從膈中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上角

以屈下額至頰其支者從耳後入耳中出走耳前過

千金要方卷第十

十一

補藥山房

客主人前交頰至目兌皆是也動則病耳聾輝輝焯焯

焯焯腫喉痺是主氣所生病者汗出目兌皆痛頰腫耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用為此諸病盛

則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大再倍於寸口虛者

人迎反小於寸口也

三焦虛實第五

論三首 方十八首 灸法七首 其氣起於胃上臑並咽以

上貫膈布胸中走液循足太陰之分而行還注於手陽明上至舌下注足陽明常與榮衛俱行於陽二十

五度行於陰亦二十五度為一周日夜五十周身周

而復始大會於手太陰也主手少陽心肺之病內而不出人有熱則飲食下胃其氣未定汗則出或出於

面或出於背身中皆熱不循衛氣之道而出者何也此外傷於風內開腠理毛蒸理泄衛氣走之固不得

循其道此氣慄慄滑疾見開而出故不得從其道名曰漏氣其病則肘舉痛食先吐而後下其氣不續膈

間厭悶所以飲食先吐而後下也寒則精神不守泄下便痢語聲不出若實則上絕於心若虛則引氣於

肺也

千金要方卷第十

十一

補藥山房

澤瀉湯 通膀胱瀉熱治上焦飲食下胃胃氣未

定汗出面背身中皆熱名曰漏氣方 柴胡 半夏

生薑 各三 桂心 各一 茯苓 各二 骨皮 五兩 人參 各二 薄荷 五兩 石膏 八兩 竹葉 五兩 尊心 一升

右十二味咬咀以水二斗煮取六升分五服

從漏氣者風熱閉其腠理上焦之氣慄慄滑疾經氣失道邪氣內著乘飲食入胃樞機開闔之時蒸發熱汗從頭身背陽位漏泄雖言熱在上焦而三焦

之源實從下發故取五苓散中澤瀉桂苓下通膀胱氣化小柴胡湯中柴胡薑半夏甘中清膽腑樞機竹葉石膏方中石膏竹葉半夏甘參上散胃中蘊熱相配之妙尤在人參助諸藥力桂心鼓諸藥性專心專瀉胃熱骨皮專走三焦也

麥門冬理中湯 治上焦熱腹滿不欲飲食或食先吐而後下肘掣痛方

揀麥冬 生蘆根 竹茹

廩米 各一 粳心 五合 甘草

茯苓 各二 橘皮 人參

手書後集卷三 白朮 五兩 橘葉四房

萎蕤 各三 生薑 四兩

右十二味咬咀以水一斗五升煮取三升分三服前衍方治食入則汗故用石膏竹葉骨皮清胃化熱病在上取諸下也此方治腹滿不欲食故用木橘

倉米助胃除濕病在下取諸上也前方中柴胡半夏茯苓竹葉為食入胃氣未定身背皆熱而設此

方中麥冬葶藶蘆根竹茹為胃熱上逆先吐後下而設同一滑氣彼專瀉熱此兼理中信手拈來頭

頭是道

治胸中膈氣聚痛好吐方

灸厥陰腧穴在第四椎兩邊各相去一寸五分隨年壯

黃芪理中湯 治上焦虛寒短氣不續語聲不出

方 黃芪 桂心 各二 五味子

桔梗 乾薑 茯苓

甘艸 川芎 各三 丹參

杏仁 各四

右十味咬咀以水九升煮取三升分為三服

義衍短氣不續語聲不揚胸中大氣不足可知故用辛

溫助陽散逆和榮略入五味以收耗散之氣

黃連丸 治上焦冷下痢腹內不安食即注下方

川連 烏梅肉 各八 桂心 二兩

乾薑 附子 阿膠 各四

檉皮 川芎 黃蘗 各三

右九味為末蜜丸如梧子大飲下二十九加至三

十九

義衍此於駐車丸中以川芎代當歸理血中之氣加檉

皮輔連藥治腸胃結熱桂附助乾薑治冷痢注下

烏梅在阿膠收耗散之津也

厚朴湯 治上焦閉塞乾嘔嘔而不出熱少冷多

好吐白沫清涎吞酸方

厚朴

茯苓

川芎

白木

元參 各四兩

桔梗

附子

人參

橘皮 各三兩

生薑 八兩

吳茱萸 合

右十一味咬咀以水二斗煮取五升分為五服

乾嘔不出熱少冷多肝氣阻逆之驗雖用厚朴橘

皮川芎桔梗破滯之劑不得生薑茱萸不能開運

閉塞不得參苓白木不能運行藥力元參一味專

千金方衍義卷十

去

補藥出處

通膈上氣氣旺氣

論曰中焦如漚漚者在胃中如漚也其氣起於胃中脘在上焦

之後此受氣者主化水穀之味泌糟粕蒸津液化為

精微上注於肺肺乃化而為血以奉生身莫貴乎此

故獨得行於經隧名曰榮氣主足陽明陽明之別號

曰獨隆在外踝上去踝八寸別走太陰絡諸經之脈

上下絡太倉主腐熟五穀不吐不下實則生熱熱則

閉塞不通上下隔絕虛則生寒寒則腹痛洞泄便秘

霍亂主脾胃之病夫血與氣異形而同類衛氣是精

血氣是神故血與氣異名同類焉夫脫血者無汗此

是神氣奪汗者無血此是精氣故人有兩死而無兩

生猶精神之氣隔絕也若虛則補於胃實則瀉於脾

調其中和其原萬不遺一也

大黃瀉熱湯 開關格通隔絕 治中焦實熱閉塞

上下不通不吐不下腹滿膨脹喘急方

川大黃 切以水一升浸黃芩

瀉瀉

升麻

芫薺 各二兩

羚羊角

梔子 各四兩

元參 八兩

地黃汁 一升

右九味咬咀以水七升煮取二升三合下大黃更

煮兩沸去滓下硝石分三服

千金方衍義卷十

去

補藥出處

開關格起於暴閉不通雖云三焦阻逆而實肝腎所

司故於硝黃澤瀉梔子通利二便藥中加羚羊以

通肝氣之結地黃以滋腎水之燥黃芩瀉肝膽大

腸之熱元參清少陰僭逆之火其妙用全在升麻

一味升清降濁譬諸水注閉其上竅則涓滴不通

通其上竅則一瀉如注然惟實熱暴閉庶克有濟

若病久腎氣失職而變此證神丹恐難為力矣

藍青丸 治中焦熱下痢水穀方

藍青汁 三升

川連 八兩

黃蘗 四兩

烏梅肉

地膚子

地榆

白朮各二兩 阿膠五兩

右八味為末以藍青汁和微火煎九如杏仁大飲

服三九日二以七月七日合大良當眾手九之

衍前第三卷婦人產後痢門有藍青丸彼以破逐癩

積放需椒附鬼白峻攻為務此治中焦熱痢但取

藍青之清熱解毒兼連蘗之苦燥濕熱地膚子之

清利膀胱地榆之散血中火白朮之健脾逐血阿

膠之滋血潤燥烏梅之收耗散津為熱痢水穀不

消之的方惜乎世罕知用特為拈出庶幾有望乎

將來未悟超然而登千金之堂與也

黃連煎 治中焦寒洞泄下痢或因霍亂後瀉黃

白無度腹中虛痛方

黃連 酸石榴皮 地榆

阿膠各四兩 黃蘗 當歸

厚朴 乾薑各三兩

右八味咬咀以水九升者取三升去滓下阿膠更

煎取烱分三服

衍此於駐車丸中加黃蘗佐黃連以燥濕熱地榆以

止內崩厚朴以瀉滯氣酸石榴皮以收心脫之津

氣也

治四肢不可舉動多汗洞痢方

灸大橫隨手壯穴在俠臍兩邊各二寸五分

論曰下焦如瀆瀆者如溝水滲洩也其氣起胃下脫別回腸注

於膀胱而滲入焉故水穀者常并居於胃中成精柏

而俱下於大腸主足太陽瀝滲津液合膀胱主出不

主入別於清濁主肝腎之病候也若實則大小便不

通利氣逆不續嘔吐不禁故曰走哺若虛則大小便

不止津液氣絕人飲酒入胃穀未熟而小便獨先下

者何蓋酒者熟穀之液也其氣悍以滑故後穀入而

先穀出也所以熱則瀉於肝寒則補於腎也

柴胡通塞湯 治下焦熱大小便不通方

柴胡 羚羊角 黃芩

橘皮 澤瀉各三兩 香豉一升

生地一升 芒硝二兩 梔子四兩

石膏六兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升去滓內芒硝分

為三服

衍腎司閉藏肝司疎泄三焦鼎峙兩腎之間靈樞謂

中瀆之府素問謂決瀆之官今因氣化不及州都

水道不能輸運而出故首取柴胡提挈清陽與手

少陽同秉樞機並取羚羊伐肝散結黃芩瀉肝膽
火橋皮和水穀氣生地治傷中血痺澤瀉行水清
陰梔子瀉三焦火以為通塞泄熱之去路

赤石脂湯 治下焦熱或下痢膿血煩悶恍惚方

赤石脂 八兩

烏梅 二十枚

梔子 十四枚

廩米 一升

白米

升麻 各三兩

乾薑 二兩

右七味咬咀以水一斗者米取熟去米下藥煮取
二升半分為三服

衍 熱傳少陰例中下痢便膿血及腹痛小便不利用

千金方卷下

子

掃葉山房

桃花湯此以煩悶恍惚故加烏梅下氣除煩滿梔
子除胃中熱氣白朮除熱消食升麻引清氣上升

以佐石脂之固脫乾薑導氣安胃也

止嘔人參湯 治下焦熱盛氣逆不續嘔吐不禁

名走哺方

人參

葵藿

黃芩

知母

茯苓 各三兩

生薑根

梔子仁

白朮

梔皮 各四兩

石膏 八兩

右十味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

衍 走哺者下焦實熱其氣內結不下必糞粕而淋濁

反蒸於胃故二便不通氣逆不續而嘔逆不禁也

故用葳蕤黃芩知母蘆根梔子仁石膏清利胃熱

之劑上止嘔吐下通便溺全在人參白朮茯苓梔

皮鼓蕤胃氣以行蘆根等味之力走哺之用蘆根

與瀉氣之用導心一專嘔逆不食一專下氣止嘔

雨不移易之定法

香豉湯 治下焦熱毒痢魚腦雜痢赤白臍下小

腹絞痛不可忍欲痢不出方

香豉

薤白 各一升

川連

千金方卷下

子

掃葉山房

黃蘗

白朮

茜根 各三兩

右九味咬咀以水九升煮取三升分三服

衍 毒痢勢甚而飲食尚強胃氣未艾故可用黃連解

毒清燥之劑其用香豉薤白必緣邪熱未除後重

不減故專取二味為方中之首推且以白朮除熱

消食茜根地榆解散滯血然惟毒熱方張者為宜

若痢久元氣下降而見虛滯不食又為切禁不可

不慎

治膀胱三焦津液下大小腸中寒熱赤白泄痢及

腰脊痛小便不利婦人帶下方

灸小腸腧五十壯

黃蘗止泄湯 治下焦虛冷大小便洞泄不止方

黃蘗

人參

地榆

阿膠

各三兩

川連

五兩

茯苓

檉皮

各四兩

艾葉

一斤

右八味咬咀以水一斗煮取三升去滓下膠消分

三服

方中連藥檉皮皆苦寒清燥治熱結腸胃下水斷

痢之劑地榆亦苦澆微寒專竊參苓阿膠平調氣

血以助諸藥之力惟艾性稟純陽能開發中外陰

邪必緣其人宿蘊濕熱暴感虛寒而洞泄不止故

以辛熱之味行苦寒之性濕熱去而真陽復三焦

各司其職可無下虛上盛之虞否則方下虛冷二

字或有錯誤亦未可知

人參續氣湯 治下焦虛寒津液不止短氣欲絕

方

人參

橘皮

茯苓

烏梅

麥冬

黃芩

乾薑

川芎

吳茱萸 三合

桂心 二兩

白朮

厚朴 各四兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升分為三

服

此治下焦虛寒而用理中四君溫補中焦之藥者

以下焦之氣靡不本諸水穀精微乎化故去甘艸

之甘緩總膈易黃芪以溫下焦加烏梅以通膽液

麥冬以致津氣川芎以和榮血吳茱萸桂心溫中暖

下以助理中之功橘皮厚朴降氣泄滯以行四君

之力所以方下統治下焦虛寒不分精液氣血也

茯苓丸 治下焦虛寒腹中瘀血令人喜忘不欲

問人語胸中噎塞而短氣方

茯苓 各八兩

地黃 各八兩

甘艸 各七兩

黃芪 六分

川芎 五分

厚朴 二分

杏仁 五十枚

右十一味為末蜜丸如梧子大初服二十九加至

三十九為度日二清飲湯下

下焦真陽虧損則胸中大氣不布而致血澀不調

瘀滯腹內故需辛溫攻補兼施方克有濟益參芪

甘艸不得厚朴杏仁之宣散則滯而不行芎歸地

黃不得益桂之破結則瘀而不化茯苓一味不獨

治畜血腹急并守五臟正氣也

伏龍肝湯 治下焦虛寒損或先見血後便轉此

為近血或利不利方

伏龍肝五合 地黃五兩一方 阿膠

牛膝一作牛 乾薑

黃芩 地榆各三 髮灰二合

右九味咬咀以水九升煮取三升去滓下膠煮消

下髮灰分為三服

衍先血後便為近血金匱主以赤小豆當歸散其方

千金方衍義卷十 蓋 精製山房

本在狐惑例中治蟲蝕下部有瘡初得之三四日

目赤如鳩眼乃瘀血發熱之徵驗七八日目四皆

黑此膿已成蓋膿之與血異名同類膿本血熱所

化故可借治下焦之瘀血千金反用先便後血之

黃土湯於中除去米附加乾薑牛膝地榆髮灰以

散血中之滯綠其人榮血既傷下焦雖有虛寒但

需乾薑之溫散不勝米附之燥烈也可見治血但

取歸經不必究其先後遠近耳

治下焦虛寒損或先便轉後見血此為遠血或利

或不利好因勞冷即發宜續斷止血方

續斷 當歸 桂心

蒲黃 阿膠各一 甘艸二兩

乾薑 地黃各四

右八味咬咀以水九升煮取三升半去滓下膠取

烱下蒲黃分三服

衍先便後血為遠血金匱主以黃上湯專取米附竈

土以破瘀結膠地甘艸以和榮血黃芩以化米附

之熱千金以血既下脫不須復用破結之劑乃以

薑桂代木附歸續代竈土蒲黃代黃芩雖用法稍

平而功用不殊然須驗其血色胸淡則當用金匱

千金方衍義卷十 蓋 精製山房

法鮮紫當用千金法方為合轍

當歸湯 治三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從

三焦起或熱損發或因酒發宜此方

當歸 乾薑 小薊

阿膠 羚羊角 地黃

柏枝皮各三 芍藥 白木各四

蒲黃五合 青竹茹半 伏龍肝一

髮灰雞子大 黃芩 甘艸各二

右十五味咬咀以水一斗二升煮取三升半去滓

下膠取烱之髮灰及蒲黃分為三服

三焦之火出陰入陽陰虛陽溼每致迫血土溢因

借金匱治吐血不止柏葉湯中乾薑從治於下柏

皮代柏葉逆調於上伏龍肝代艾溫散於中髮灰

代馬通導之下行以本經有五癰關格不通利水

道之治乃柏葉湯之變法加以歸膠芍地之和血

小蘗蒲黃之散血更以白朮甘艸佐乾薑伏龍肝

之溫散竹茹黃芩佐柏皮之清解羚羊角佐髮灰

之主惡血下注藥味雖異而功效與柏葉湯方不

相上下

灸法

千金方卷二十 五臟六腑

五臟六腑心腹滿腰背疼飲食吐逆寒熱往來小便

不利羸瘦少氣灸三焦膈隨年壯

腹疾腰痛膀胱寒澀飲注下灸下極膈隨年壯

三焦膀胱腎中熱氣灸水道隨年壯穴在俠屈骨相

去五寸屈骨在臍下五寸屈骨端

三焦寒熱灸小腸膈隨年壯

霍亂第六論二首 證四條 方二十八首

論曰原霍亂之為病也皆因飲食非關鬼神夫飽食

臍膈復食乳酪海陸百品無所不啜眠臥冷席多飲

寒漿胃中諸食結而不消陰陽二氣擁而反戾陽氣

欲升陰氣欲降陰陽乖隔變成吐痢頭痛似破百節

如解遍體諸筋皆為回轉論證雖小而卒病之中最

為可畏雖臨深履危不足以論之養生者宜達其旨

庶可免於天橫矣

凡霍亂務在溫和將息若冷即遍體轉筋凡此病定

一日不食為佳須三日少少粥食三日以後可恣意

食息七日勿雜食為佳所以養脾氣也

大凡霍亂皆中食膾酪及飽食雜物過度不能自裁

夜臥失覆不善將息所致以此損命者眾人生而命

以五臟為主夫五臟者即是五行內為五行外為五

味五行五味更宜扶抑所以春夏秋冬逆調理之食

啖不可過度凡飲食於五臟相尅者為病相生者無

他經云春不食辛夏不食鹹季夏無食醜秋無食苦

冬無食甘此不必至不食但慎其太甚耳諺曰百病

從口生蓋不虛也四時昏食不得太飽皆能生病從

夏至秋分忌食肥濃然熱月人自好冷食更與肥濃

兼食菓菜無節逐冷眠臥冷水洗浴五味更相尅賊

雖欲無病不可得也所以病苦人自作之非關運也

書曰非天人人中自絕命此之謂也

凡諸霍亂忌與米飲胃中得米即吐不止但與厚朴

葛根飲若冬瓜葉飲但沾漬咽喉而不可多與若服湯時隨服吐者候吐乃止診脈絕不通以桂合葛根為飲吐下心煩肉執汗不出不轉筋脈急數者可犀角合葛根為飲吐下不止發熱心煩欲飲水可少飲米粉汁為佳苦不止可與葛根齊危飲服之

問曰病有霍亂者何師曰嘔吐而利此謂霍亂

病師曰當為霍亂頭痛身體疼惡寒而復吐利當屬何

脈微瀼本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉

入陰必利本反下利者不可治也霍亂吐多者必轉

筋不渴即臍上築霍亂而臍上築者為腎氣動當先

治其築治中湯主之去木加桂心去木者以木藥故

也加桂者恐作奔豚也霍亂而臍上築吐多者及下

多者霍亂而驚悸霍亂而渴霍亂而腹中痛嘔而吐

利嘔而利欲得水者皆用治中湯主之

治中湯 治霍亂吐下脹滿食不消化心腹痛方

人參 乾薑 白朮

甘艸各三兩

右四味咬咀以水八升煮取三升分三服不瘥頻

服三劑遠行防霍亂依前作丸如梧子大服三十

丸如作散服方寸匕酒服亦得若轉筋者加石膏

三兩仲景云若勝上築者腎氣動也去木加桂心

木悍者加茯苓三兩渴欲得水者加米合前成四

兩半腹中痛者加人參合前共四兩半若寒者加

乾薑合前成四兩半腹滿者去木加附子一枚服

後一食便服熱粥一升微自溫勿發揭衣破也

濁相干亂於腸胃則為霍亂多由寒邪傳入下焦

中焦飲食因之不知是即形寒飲冷者三焦傷也

然質有陰陽偏勝病有寒熱乖揆所以傷寒論首

言寒多欲飲水者五苓散熱多不用水者理中丸

千金更名治中列之三焦理是理寒熱不和治是

治揮霍撩亂總取乾薑之辛溫以鼓舞參朮之健

運行甘艸之舒緩與五苓散中用桂之意不殊雖

寒熱多少不同而溫散之理則一朱奉議加青橘

二皮以治飲食所傷千金又增轉筋一則以補傷

寒論之末備舉世但知轉筋用木瓜專取酸收夏

秋之濕熱傷脾此因清氣在陰而走腸胃故用乾

薑瀾氣在陽而擾筋脈故用石膏至於理中丸本

方後加減諸法並宜確遵觀吐利止而身痛不休

者宜桂枝湯小和之及四逆湯通脈圖逆湯甘艸

瀉心湯附子粳米湯等方端不出傷寒金匱厥氣

義

行

經云清氣在陰濁氣在陽營氣順行衛氣逆行清

義

行

義

逆上諸治也

桂枝湯 治吐利止而身痛不休者當消息和解

其外以此湯小和之見十一卷十一 衍義見傷寒 本方條下

當歸回逆加吳茱萸生薑湯 治陽邪陷陰手足

厥冷脈細欲絕方

生薑 五兩

當歸

芍藥

細辛

桂心 各三兩

甘艸

通艸 各二兩

吳茱萸 二兩

大棗 五十枚

右九味咬咀以水六升酒六升合煮取五升分五

服舊方用棗三十枚今以霍亂病法多痞故除之

千金衍義卷十

手

猪葉山房

炒退棗入葛根二兩佳霍亂四逆加半夏一合附

子小者一枚若惡寒力與大附子

陽邪傳入厥陰而厥寒脈沉細欲絕與直中陰寒

之治截然兩途直中陰寒用薑附四逆以回陽惟

恐藥之不力而變虛陽發露陷陰之邪用當歸四

逆以通陽仍須桂枝湯但去生薑加當歸助芍藥

以和營細辛通艸助桂枝提出陽分使陽邪仍從

陽解其去生薑者恐其性暴不待氣味入陰便從

太陽開發也在霍亂則不然專取生薑吳茱萸速

破逆上之厥氣則陽通脈復蓋回陽用乾薑通陽

用生薑一定不易之法

四逆湯 治吐下而汗出小便復利或下利清穀

裏寒外熱脈微欲絕或發熱惡寒四肢拘急手

足厥冷方

甘艸 一兩

乾薑 一兩

附子 一枚

右三味咬咀以水三升煮取一升二合溫分再服

強者可與大附子一枚乾薑至三兩廣濟方云若

氣及下而腹滿者加入參一兩

通脈四逆湯 治吐利已斷汗出而厥四肢拘急

不解脈微欲絕方

千金衍義卷十

圭

猪葉山房

大附子 一枚

甘艸 一兩

乾薑 三兩

右三味咬咀以水三升煮取一升二合分二服脈

出即愈若面色赤者加葱白九莖腹中痛者去葱

加芍藥二兩嘔逆加生薑三兩咽痛去芍藥加桔

梗一兩利止脈不出者去桔梗加人參二兩皆與

方相應乃服之

仲景用通脈四逆加附子湯

四肢為諸陽之本故能運動不息今因陽氣乖離

所以四肢厥冷用黑附子溫補下焦之真陽乾薑

溫散中焦之寒逆甘艸溫養三焦之元氣為直中

陰寒之專藥即太陽證之脈浮自汗出小便數心

煩微惡寒脚掣急亦不出此若其人發熱躁擾

面赤如醉乃於四逆湯中倍用乾薑以斂外散之

虛陽加葱白以通內外之陽氣其在霍亂方中專

取以通清濁相干混亂之逆氣也

四順湯 治霍亂轉筋肉冷汗出嘔呃者方

附子一枚

人參

乾薑

甘艸各二兩

右四味咬咀以水六升煮取二升分三服

初運中陰寒用薑附溫經而救四肢逆冷因病以立

名也霍亂加人參助薑附回陽而使四肢溫順勒

名以彰實也與當歸四逆加生薑吳茱萸助方回

陽一義

竹葉湯 治霍亂吐利已服理中四順等湯熱不

解者方

竹葉一握

小麥一升

生薑一粲

甘艸

人參

附子

芍藥各一兩

橘皮

桂心

當歸各二兩

白木三兩

右十一味咬咀以水一斗半先煮竹葉小麥取八

升去滓下藥煮取三升分三服上氣者加吳茱萸

半升即瘥理中四順等皆大熱若有熱宜此湯

錄驗無芍藥

衍金匱竹葉湯治產後中風發熱面正赤喘而頭痛

用人參桂心附子以抹本虛即兼甘草生薑竹葉

以散標熱彼以艸薤中發露得風故用葛根防風

桔梗大棗此以吐利後餘熱不解故用歸芍和營

木橘健胃小麥以助生陽之氣金匱一脈相承分

支異治

甘艸瀉心湯 治婦人霍亂嘔逆吐涎沫醫反下

之心下即痞當先治其涎沫可服小青龍湯涎

沫止次治其痞可與此方

甘艸四兩

乾薑

黃芩各三兩

黃連一兩

半夏

大棗十二枚

右六味咬咀以水一斗者散六升分六服

衍衍義見第九卷傷寒發汗吐下後生薑瀉心湯下

衍小青龍湯 治霍亂嘔吐方見九卷傷寒上

衍衍義見第九卷傷寒發汗吐下後小青龍湯下

附子梗米湯 治霍亂四逆吐少嘔多者方

中附子一枚

梗米

半夏各半升

乾薑仲景方無

甘艸各一兩

大棗十枚

右六味咬咀以水八升煮取米熟去滓分三服

衍義霍亂四逆吐少嘔多明係厥氣逆上激動胃中痰

涎故於四逆湯中加半夏以滌痰飲粳米以安胃

氣大棗以行脾津本金匱治腹中寒氣胸脇逆滿

嘔吐千金借治霍亂若合符節或問霍亂是胃氣

反戾禁與穀味而此獨不禁者以有薑附之辛散

不礙粳米之戀胃有半夏之滌痰不礙大棗之滋

津也

理中散 治老年羸劣冷氣惡心飲食不化心腹

虛滿拘急短氣霍亂嘔逆四肢厥冷心煩氣悶

千金方藥卷下

重

攝生山房

流注扶老方

麥門冬

乾薑

各六兩

人參

白朮

甘艸

各五兩

附子

茯苓

各三兩

右七味治下篩以白湯三合服方寸匕常服將蜜

丸如梧子大酒服二十九

衍義於附子理中湯內加麥門冬以滋津氣之耗茯苓

以清濁氣之滯也

人參湯 治毒冷霍亂吐利煩嘔轉筋肉冷汗出

手足指皆腫喘息垂死絕語音不出百方不效

脈不通者服此湯取瘥乃止隨吐續服勿止并

灸之方

人參

附子

厚朴

茯苓

甘艸

橘皮

當歸

葛根

乾薑

桂心各二兩

右十味咬咀以水七升煮取二升半分三服

衍義胃中虛冷吐利而用參苓益氣蓋附暖中歸桂溫

血葛根甘艸通調胃津厚朴橘皮溫散痰氣破陰

助陽補正除邪兼致之矣

千金方藥卷下

重

攝生山房

治霍亂蠱毒宿食不消積冷心腹煩滿鬼氣方

用極醎鹽湯三升熱飲一升刺口令吐宿食使

盡不吐更服吐訖復飲三吐乃住靜止此法大

勝諸治俗人以為田舍淺近之法鄙而不用守

死而已凡有此證即須先用之

衍義鹹能下氣過鹹則引涎水聚於膈上涌吐以泄之

也本方治結熱喘逆胸中病令人吐故云有吐病

先用之

治霍亂方

菹豆

香薷各一兩

右三味以水六升煮取二升分服單用亦得

治霍亂洞下不止者方

艾一把水三升煮取一升頓服之良

又方

香薷一把水四升煮取一升頓服之青木香亦

佳

治霍亂吐下腹痛方

桃葉煎汁服一升立止冬用皮

治霍亂引飲輒乾嘔方

生薑五兩切以水五升煮取三升半分二服高

良薑亦佳

行

霍亂用菟豆安胃香薷清暑令從肌表洩便分泄

艾散胃中濁陰之逆 香薷利膀胱暑濕之氣

桃葉辟邪殺蠱 生薑化痰消食

杜若丸 治霍亂人將遠行預備方

杜若 薑香 白木

橘皮 吳茱萸 乾薑

人參 厚朴 木香

雞舌香 瞿麥 桂心

芍荷 女萎 荷香

右十五味等分為末蜜丸如梧子酒下二十九

首取杜若温中下氣已下彙取辛香正氣健脾利

水之品為丸以為遠行預防之方一切水土不安

傷中嘔逆咸宜用之不特專主霍亂也

治霍亂永不發丸方

虎掌 檳榔 枳實

附子 人參 厚朴 白木 五兩

乾薑 各三兩 厚朴 六兩 白木 五兩

皂莢 三寸

右十味為末蜜丸如梧子大每服酒下二十九日

三 武德中有德行尼名淨明患此已久或一月

一發或一月再發發即至死時在朝太醫蔣許甘

巢之徒亦不能識余以霍亂治之處此方得愈故

疏而記之

此方專取虎掌皂莢厚朴檳榔搜逐伏痰積垢蠱

附參米温中破結殺衝温散血中邪濕故可剷除

病根乃治霍亂之變法

凡先服石藥人因霍亂吐下服諸熱藥吐下得止

因即變虛心煩手足熱口燥欲得水嘔逆迷悶

脈急數者及時行熱病後毒未盡因霍亂吐下

仍發心胸欲裂者以此解之方

薺芫

人參

厚朴

知母

栝藹根

茯苓

犀角

藍子

枳實

桔梗

橘皮

葛根

黃芩

甘艸各二兩

右十四味改咀以水一斗煮取三升分三服

衍義薺芫專解石藥之慄悍兼犀角藍子等一皆清熱

解毒之品參苓甘艸協助胃氣以行藥力千金以示霍亂之病幻不一非可專守常法也

千金方雜卷下

天

婦藥山房

治中執霍亂暴利心煩脈數欲得冷水者方

新汲井水頓服一升立愈先患胃口冷者勿服

之

治霍亂醫所不治祕方

以童女月經衣合血燒末酒服方寸匕百方不

瘥者用之

治霍亂轉筋方

用蓼一把去兩頭水二升煮取一升頓服之作

梨

又方

燒舊木梳灰為末酒服一枚小者永瘥

又方

車轂中脂塗足心下瘥

治霍亂轉筋入腹無奈何者方

作極鹹鹽湯於槽中暖漬之

又方

以酢煮青布搦之冷即易

治轉筋不止者方

男子則以手挽其陰牽之女子則挽其乳近左

右邊

千金方雜卷下

天

婦藥山房

衍義汲井水以療中熱霍亂此惟動作勞動之人入口

便從汗泄故可無虞若素常逸豫察養柔脆者慎

毋效尤所以為之中誠云先患胃口冷者勿服

童女月經衣灰治陰虛不勝時火灼燥而霍亂嘔

吐取其穢濁以導火下行乃燒裋散之變法 蓼

性溫中下水霍亂亦宜用之 梳灰能除垢膩取

其疏通 車脂能通經脈取其轉運 鹽湯探吐

吐中便其散邪之義 酢者青布取廢之餘以解

漸清之毒酢之酸以收耗散之氣 莖乳皆筋之

結聚轉筋挽之以通結滯不行之氣也

灸法

論曰凡霍亂灸之或雖未能立瘥終無死憂不可逆
灸或先下後吐當隨病狀灸之

若先心痛及先吐者灸巨闕七壯在心下一寸不效
更灸如前數

若先腹痛者灸太倉三七壯穴在心厭下四寸臍上
一寸不止更灸如前數

若吐下不禁兩手陰陽脈俱疾數者灸心蔽骨下三
寸又臍下三寸各六十七壯

若乾嘔者灸間使各七壯在手腕後三寸兩筋間不
瘥更灸如前數

若嘔哕者灸心主各七壯在掌腕上約中吐不止更
灸如前數

若手足逆冷灸三陰交各七壯在足內踝直上三寸
廉骨際未瘥更灸如前數

若先下利者灸穀門二七壯在臍傍三寸男左女右
一名大腸募不瘥更灸如前數

若下不止者灸大都七壯在足大趾本節後內側白
肉際

若泄利所傷煩欲死者灸慈宮二七壯在橫骨兩邊

各二寸半橫骨在脊下
橫骨是

轉筋在兩臂及胸中者灸手掌白肉際七壯又灸膈
中中腑巨闕胃腕尺澤并治筋拘頭及足皆愈

走哺轉筋灸踵踝白肉際各三七壯又灸小腹下橫
骨中央隨年壯

轉筋四厥灸兩乳根黑白際各一壯
轉筋灸湧泉六七壯在足心下當拇趾大筋上又灸
足大趾下約一壯

轉筋不止灸足踵聚筋上白肉際七壯立愈
轉筋入腹痛欲死四人持手足灸臍上一寸半四壯

自不動勿復持之又灸股裏大筋去陰一寸
霍亂轉筋令病人合面正臥伸兩手著身以繩橫量

兩肘尖頭依繩下俠脊骨兩邊相去各一寸半灸一
百壯無不瘥此華
佗法

霍亂已死有暖氣者灸承筋七壯起死人
取繩量
圍足從趾
至取按

取等折一半以度令一頭至踏地處引延上
至度頭即是穴 又以鹽內臍中灸二七壯

雜補第七 論一首 方三十首

論曰彭祖云使人力壯不老房室不勞損氣力顏色
不衰者莫過麋角其法刮為末十兩用生附子一枚

合之酒服方寸七日三大夏亦可熱合微黃單服之

亦令人不老然進緩不及附子者又以雀卵和為丸
彌佳服之二十日大效

衍義夏至得陰氣而鹿角解從陰退之象冬至得陽氣

而麋角解從陽退之象康本屬陰而角為陰中之

陽故以附子助之與雲笈麋角粉方配入伏人硫

黃同義然欲求長生而以彼異類遺澤助此身血

肉之軀總得永年終須尸解解字從角其義可思

用以資補則可藉以修養則不可

琥珀散 治虛勞百病除陰瘵精清力不足大小

便不利如淋狀腦門受寒氣結在關元強行陰

千金方衍義卷下 **聖** 掃葉山房

陽精少餘瀝腰脊痛四肢重咽乾口燥食無常

味乏氣力遠視眩暈驚悸不安五臟虛勞上氣

滿悶方

琥珀一兩 蕪菁子 胡麻子

車前子 蛇牀子 兔絲子

枸杞子 菴藺子 麥門冬各一

橘皮 肉蓯蓉 松脂

牡蠣各四兩 松子 柏子

荏子各三兩 桂心 石葦

石斛 滑石 茯苓

芍藥 人參 杜衡

續斷 遠志 當歸

牛膝 牡丹各三兩 通艸三兩

右三十味各治下節合搗二千杵盛以草囊先食

服方寸七日三夜一用牛羊乳汁煎令熟常服令

人強性輕身益氣消穀能食耐寒暑百病除雖御

十女不勞損令精實如膏服後七十日可得行房

久服老而更少髮白反黑齒落重生

菴蓉散 主輕身益氣強骨補髓不足能使陰氣

強盛方

千金方衍義卷下 **聖** 掃葉山房

肉蓯蓉 五味子 遠志

甘艸各一 生地黃三十斤 楮實子

慎火艸 乾漆各二

右八味以地黃汁浸一宿出曝乾復浸令汁盡為

散空腹酒服方寸七日三服三十日力倍常雖御

十女無損

禿雞散 有房室人常服勿絕方

蛇牀子 兔絲子 五味子

遠志 防風 巴戟

杜仲 菴蓉等分

右八味治下篩酒服方寸七日二無室勿服

天雄散 治五勞七傷陰痿不起衰損者方

天雄

五味子

遠志各一兩

菴蓉二兩

蛇牀子

芎藭各六兩

右六味治下篩酒服方寸七日三常服勿止

治陰下濕癢生疔失精陰痿方

牡蒙

兔絲子

蛇牀子

菴蓉

柏子仁各二兩

右五味治下篩酒服方寸七日三以知為度

治陰痿精薄而冷方

菴蓉

鐘乳

蛇牀子

遠志

續斷

薯蕷

鹿茸各三兩

右七味治下篩酒服方寸七日二欲多房室倍蛇

牀欲堅倍遠志欲大倍鹿茸欲多精倍鐘乳

治五勞七傷庶事衰惡方

巴戟天

蛇牀子

天雄

薯蕷各三兩

雄蠶各十枚

五味子

石斛

菴蓉各五兩

兔絲子

牛膝

遠志各二兩

右十一味治下篩酒服方寸七日三

石硫黃散 極益房勞補虛損方

石硫黃

白石英

鹿茸

遠志

蛇牀子

五味子

天雄

蠶蠶

白馬莖

兔絲子

女萎各等分

右十一味治下篩酒服方寸七日三無房勿服

又方

蘿摩六兩

五味子

酸棗仁

柏子仁

乾地黄

枸杞根各三兩

右六味治下篩酒服方寸七日三

又方

車前子莖葉根治下篩服方寸七強陰益精

常餌補方

枸杞子一斤

天雄三兩

菴蓉

石斛

乾薑

兔絲子

遠志

續斷各五兩

乾地黄十兩

右九味治下篩酒服方寸七日二服食無所忌服

藥十日候莖頭紫色乃可行房

治男子陰氣衰腰背痛苦寒莖消少精小便餘瀝

出失精靈下濕癆虛之服此令人充實肌膚肥

悅方

巴戟 兔絲子 杜仲

桑螵蛸 石斛各等分

右五味治下篩酒服方寸七日一常服佳

又方

薯蕷 巴戟天 山茱萸

丹參 人參各五分 蛇牀子

五味子各四分 天雄 細辛各三分

桂心二分 乾地黄十分

千金方藥卷十

聖

攝業山房

右十一味治下篩酒服方寸七日二夜一

又方

五味子 蛇牀子各二分 續斷

牛膝各三分 車前子 菴蓉各四分

右六味治下篩酒服方寸七日二

杜仲散 益氣補虛治男子羸瘦短氣五臟痿損

腰痛不能房室方

杜仲 蛇牀子 五味子

乾地黄各六分 菴蓉 遠志各八分

防己 巴戟各七分 兔絲子十分

右九味治下篩食前酒服方寸七日二常服不絕

佳

菴蓉散 補虛益陽治陽氣不足陰囊濕癢尿有

餘瀝漏泄虛損云為不起方

菴蓉 續斷 蛇牀子各九分

天雄 薯蕷 五味子各七分

遠志六分 乾地黄 巴戟天各五分

右九味治下篩酒服方寸七日三凡病皆由醉飽

後或疲極之後而合陰陽致成此病也

白馬莖丸 治空房獨怒見敵不興口乾汗出失

千金方藥卷十

聖

攝業山房

精囊下濕癢尿有餘瀝卵偏大引疼膝冷脛痠

目中眵眵小腹急腰脊強男子百病方

白馬莖 石葦 天雄

遠志 赤石脂 蛇牀子

菴蒲 薯蕷 杜仲

栝婁根 菴蓉 石斛

續斷 牛膝 山茱萸

柏子仁 細辛 防風各八分

右十八味為末白蜜丸如梧子大酒服四九日二

服漸加至二十九七日知一月日百病愈

治陰痿方

雄雞肝具十 鯉魚膽枚一

右二味陰乾為末雀卵和丸如小豆大吞一九

又方

兔絲子升一 雄雞肝具三

右二味為末雀卵和丸如小豆大每服一九日三

又方

乾漆 白朮 甘艸

兔絲子 菴蓉 牛膝

巴戟天 五味子 桂心各三兩

千金方衍義卷十 吳 攝藥山房

石南 石龍芮各一兩 乾地黄四兩

右十二味為末蜜和丸如梧子酒服二十丸日三

又方

用蚌房灰夜臥傳之

又方

用原蠶蛾未連者一升去頭足毛翅陰乾為末

蜜九如梧子每服十九夜臥鹽湯下之

又方

磁石五斤研清酒三斗漬二七日每服三合

三夜一

又方

常服天門冬亦佳

又方

五味子一升新好者治下篩酒服方寸七日三
稍加至三七無所慎忌食猪魚大蒜大醋盡一
劑即得力百日已上可見功效服藥常令相續

不絕四時勿廢功能自知

又方

兔絲子 蛇牀子 五味子各等分

右三味為末蜜丸如梧子大先食飲服三九日三

千金方衍義卷十 吳 攝藥山房

又方

蛇牀子 兔絲子 杜仲

菴蓉 五味子各等分

右五味為末蜜和丸如梧子大酒服十四丸日三

夜一

又方

蛇牀子末三兩 兔絲子汁二合

右二味相和塗上日五遍

又方

蛇牀子 菴蓉 遠志各三分

附子一分

右四味為末以唾和丸如梧子大每服用一九

又方

蛇牀子三分 天雄

遠志各二

桂心一分 無食子一枚

右五味為末用

衍義

庶事失強多由氣竭 肝傷風氣濕熱積痰死血乘

虛襲於陽氣流行之道或石藥之毒匿於精竅以

致委頓不起故欲補真陽先須開除積蔭然後始

能煥發如琥珀散專取琥珀以散血結蔭商以破

千金方衍義 卷下

五

補藥山房

水氣蕪菁以解熱毒 杜蘅以散風氣石葦以利水

道使經脈條暢則溫 補諸藥得以奏振起之功

他如從蓉散中乾漆 慎火艸即琥珀散中琥珀石

葦之意 禿雞散中 防風白馬莖丸中辛防即琥

珀散中杜蘅之意 石硫散中女萎即琥珀散中

蕪菁之意 杜仲散 中防已即琥珀散中菴藷之

意 治陰痿方中雄 雞肝通肝血而正強陽鯉魚

膽清濕熱而起陰痿 雀卵固真陽而資少火乃四

烏鯽一蘆茹丸之變 法雜補諸方惟此為濕熱傷

筋之專藥酒客患此者九宜 蜂房灰傅陰取去

性稟陰毒以起陰氣之滯 原蠶蟻淫火未離以

助生發之氣 磁石酒鎮攝虛陽以定喘云 天

門冬酒通腎氣強骨髓為滋陰固陽之善藥 五

味子交通心腎有強陰瀦精之專功 或加瓦絲

蛇牀或益從蓉杜仲功勝附子天雄輩之悍烈也

孫真人千金方衍義卷二十終

千金方衍義卷二十

五

補藥山房