

木
山

火
幽

日

本草綱目草部目錄第十七卷

草之六 毒草類四十七種

大黃

本經

商陸

本經

狼毒

本經

防葵

本經

狼牙

本經

蘭茹

本經

大戟

本經

澤漆

本經

甘遂

本經

續隨子

開寶

蕡菪

本經
卽天仙子

雲實

本經

蕧麻

唐本
博落迴附

常山

蜀漆

本經
○杜莖山

藜蘆

本經
○山慈石

參果

木藜蘆

本經
○土紅山附

附子

本經

下天雄

本經

側子

別錄

本草綱目草部

卷二十一

漏籃子

綱目

烏頭

本經
烏
喙射罔附

白附子

別錄

虎掌天南星

本經

由跋

本經

蒟蒻

開寶

菩薩草附

半夏

本經

蚤休

本經

鬼臼

本經

射干

本經

鳶尾

本經

玉簪

綱目

鳳仙

綱目

坐摳草

圖經押不蘆附

曼陀羅花

綱目

羊躡躅

山躡躅本經

羊不喫草

附

芫花

本經

蕘花

本經

醉魚草

綱目

莽草

本經

茵蕡

本經

石龍芮

本經卽胡椒菜

毛茛

拾遺海薑附

牛扁

本經蟲建草附

蕁麻

圖經

格注草

唐本

海芋

綱目

透山根附

鉤吻

本經

右附方舊一百三十四新四百九十五

本草綱目草部第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃

本經
下品

釋名

黃良

本經將軍

當火參

吳膚如

吳普(宏景曰)大

之號當取其駿快也

(杲曰)推陳致新

如

戡定禍亂以致太平所以有將軍之號

大黃生河西山谷及隴西二月八月

生蜀郡北郡或隴西二月卷

高三尺許三月花黃五

月

陰乾(宏景曰)今

生黃赤其葉四

四相當莖高三

尺許三月花黃

五

月實黑八月采根

根有黃汁切片

采益州北部

汶山及西山者

雖非河西隴西好者

今

勝北地錦色味甚苦

濃黑色至濃黑西川陰乾者

久此藥至勁利粗者

便不中服

(恭曰)葉子莖並似堪

勝北地錦色味甚苦

濃黑色至濃黑西川陰乾者

今

猶作紫地錦色味甚苦

濟色至濃黑西川陰乾者

今

勝北地錦色味甚苦

濟色至濃黑西川陰乾者

今

勝北地錦色味甚苦

濟色至濃黑西川陰乾者

今

勝北地錦色味甚苦

濟色至濃黑西川陰乾者

今

五草緯目草書

卷十一

—

爲最莊浪卽古涇原
隴西地與別錄相合

正誤

頌曰鼎州出一種羊蹄大黃治瘡癩甚效初

內抽條出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥五月采實陰乾九月采根破之亦有錦文亦呼爲土大黃時珍曰蘇說卽老羊蹄根也因其似大黃故謂之羊蹄大黃實非一類又一種酸模乃山大黃或指此非羊蹄而生山上所謂土大黃或指此非羊蹄也狀似羊蹄大黃而生山大黃故謂之羊蹄見本條俱

根脩治

雷曰凡使細切以文如水旋斑繁重者剉

片蒸之從已至未曬乾又洒臘水蒸之從未至亥如此凡七次曬乾卻洒淡蜜水再蒸一伏時其大黃必如烏膏樣乃曬乾用藏器曰凡用有火石燄乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙

蒸有生有熟不得一槧用之承曰大黃采時皆以

火石燄乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙

本草綱目草部 蒸煮

氣味苦寒無毒

別錄曰大寒普曰神農雷公苦有
毒屬鵠苦無毒李當之大寒元素

曰味苦氣寒氣味俱厚沉而降陰也用之須酒浸
煙熟者寒因熱用酒浸入太陽經酒洗入陽明經
用若邪氣在上非酒不至必用酒浸引上至高之
分驅熱而下如物在高巔必射以取之也若用生
者則遺至高之邪熱是以愈後或目赤或喉痺或
頭腫或膈上熱疾生也時珍曰凡病在氣分及胃
寒血虛并妊娠產後並勿輕用其性苦寒能傷元
氣耗陰血故也之才曰黃芩爲之使無所畏權曰
忌冷水惡乾漆

主治下瘀血血

閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致

新通利水穀調中化食安和五臟本經平胃下氣除

痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛
諸老血留結別錄通女子經候利水腫利大小腸貼

熱腫毒小兒寒熱時疾煩熱蝕膿權甄通宣一切氣

調血脈利關節泄壅滯水氣溫瘴熱瘧

大

瀉諸實

熱不通除下焦溼熱消宿食瀉心下痞滿

元

下痢

赤白裏急腹痛小便淋瀝實熱燥結潮熱譫語黃
疸諸火瘡時珍

發明

之才曰得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸氣得消石紫石英桃仁療女子血

閉宗奭曰

張仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯

用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心

大黃

瘡曰足吐氣五人明之黃陰去之善之其衄湯更用
滿瀉厥血分經也說合芩氣亢陽泄無熱也此不以此乃瀉心何
按心陰衄用血時而也救不甚甚景效苦乃邪心熱固也
之實肝血之分珍云肝肺足非火無用惟補在量其心蓋不足而答
軟瀉足者是之白邪肺黃連一使之平和則血妄行飛少震亨曰大黃苦者
者四太熱之火救日矣肺與肝俱各受火而病故用大黃本心瀉經
用經陰脾心伐病既肝肺者心之病作故之
大血中足之何以明陰陰俱受火而病故之
黃黃之連瀉心之火又手陽明仲景之舊者心之母血故之
之伏火明不矣瀉血分者復其舊者心之病作故之
湯圭之此治心氣有餘也包不若厥悟氏母血故之
亦瀉下雖絡足在陰後不血故之

脾胃之溼熱非瀉心也病發于陰而反下之則作
痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上腕
痞滿又云濁氣在上則生腹脹是矣病發於陽而
反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上腕分
野仲景大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之
邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸
湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣成無己註釋
傷寒論亦不知分別此義成無己曰熱淫所勝以
苦泄之大黃之苦以蕩滌瘀熱下燥結而泄胃強
積頌曰本草稱大黃推陳致新其效最神故古方下
藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一切輕用
藥滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒
藥快也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是
帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧元
坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從
之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻眾病其偶

中便謂此方神奇其差誤
不言用藥之美可不慎哉

附方

三十七

吐血衄血

治心氣不足吐血衄血者鴻心湯主之大黃二

兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升熱服

取利

張仲景金匱玉函

吐血刺痛川大黃一

兩爲散每服一錢以生地黃汁一合水

半盞煎三五沸無時服

簡要濟眾方

傷寒痞滿

病發於陰而反下之心下

滿而不痛按之濡此爲

痞也大黃黃連瀉心湯主之大黃二兩黃連一兩

以麻沸湯二升瀆之須臾絞汁

分作二次溫服

仲景傷寒論

熱病譫狂川大黃五兩剉

炒微赤爲散用臘雪水五升煎如膏

膏每服半匙冷水下

聖惠方

傷寒發黃方同

升氣壯者大黃一兩水二升瀆一宿平旦煎汁一

腰

升入芒消一兩緩服須臾當利下

傷寒類要

腳風氣

作痛大黃二兩切如碁子和少酥炒乾勿

撗篩每用二錢空心以水三大合入

薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷
膿惡物卽痛止

崔元亮海上方

一切壅滯

驗

大方治風熱積壅化痰涎治痞悶消食化氣導血用大黃四兩牽牛子半炒生四兩爲末煉蜜丸如梧子大黃每服十丸白湯下並不損人如要微利加二十丸○衛生寶鑑用阜筭熬膏和丸名墜痰丸又名全真丸金宣宗服之有驗賜名保安丸前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切塊八兩生黃芩八兩沉香半兩青礞石二兩以焰消二兩同入砂罐固濟煅紅研末二兩右各取末以水和丸梧子大常服一百二十丸小病五六十丸緩病七八十上丸急病一百二十丸溫水吞下卽臥勿動候藥逐上焦痰滯次日先下糟粕次下痰涎未下再服王逐隱君歲合四十餘斤愈

男女諸病

無極丸治婦人經血不通赤白人王逐疾數萬也養生主論

帶下崩漏不止腸風下血五淋產後積血癥瘕腹痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等證其效甚速

宜共葵日合之用錦綃大黃一斤分作四分一分
用童尿一盃浸一日切曬再以巴豆仁三十粒同炒豆
黃一盃浸一日切曬去豆不用一分用紅花四兩泡水一盃浸一日去
歸切曬一分用當歸四兩入淡醋一盃同浸一日去
武酒下取下惡物爲驗未下再服此

備急

心腹諸疾三物

高士孫碧雲方也醫林集要

心腹諸疾三物

備急

大黃巴豆乾薑各一

兩丸治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各一

兩搗篩蜜和搗一千杵丸小豆大每服三丸凡中

寒者客卒忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒死

此乃仲景方司空裴秀改爲散用不及丸也

差轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉卽

本草經腹中痞塊大黃十兩爲散醋三升蜜兩匙和

煎丸梧子大每服三十丸生薑湯和

外臺祕要腹脹積塊風化石灰末半斤瓦器炒

極熱稍冷入大黃末一兩

利爲度

本草經腹中痞塊大黃十兩爲散醋三升蜜兩匙和

煎丸梧子大每服三十丸生薑湯和

外臺祕要腹脹積塊風化石灰末半斤瓦器炒

極熱稍冷入大黃末一兩

炒熬入桂心末半兩略炒下米醋攬成膏攤布貼之○又方大黃二兩朴消一兩爲末以大蒜同搗兩尤妙丹溪心法久患積聚心腹脹滿害食

大黃

白芍各二兩爲末

水丸梧子大每

度千金方

脾癬疳積

湯下四十丸日三

以知爲度

大黃三兩爲末

醋一蓋沙鍋

不拘大人小兒錦紋大黃

三兩爲末

日曬夜露三日再研用

船上硫黃一兩形如琥珀者

宮粉一兩同研勻十

歲以下小兒半錢大人一錢

半米飲下忌一切生

冷魚肉只食白粥半月如

二服不愈半月之

後再服若不忌口不如勿服

聖濟總錄

小兒

無辜

閃癖瘰癧或頭乾黃聾或

牛痘牛瘡諸狀多

朽卽不中用削去皮搗篩爲散

以好米醋三升和

置瓦盆中於大鑄內浮湯上炭火慢煮候至成膏

可丸乃貯器中三歲兒一服七丸梧子大

日再服

以下出青赤膿爲度若不下或少稍加丸若

本草綱目草部

卷之二十三 大黃

八

下多又須減之病重者七入劑方盡根大人亦可用之此藥惟下宿膿不令兒利也須禁食毒物乳

母亦禁之一加木香

大黃煙熟黃芩各一兩半

崔知悌方

小兒諸熱大黃一兩爲末煉蜜丸

麻子大每服五丸至十丸蜜湯下

錢氏小兒方

骨蒸積熱大黃瘦漸漸

加黃連名三黃丸

廣利方

赤

大黃四分以童子小便五六合煎取四合去滓

空腹分爲二服如人行五里再服

白濁淋好大黃爲末每服六分以雞子一個破項

入藥攢勻蒸熟空心食之不過三服愈

簡便相火祕結大黃末一兩牽牛頭末半兩每服

方二錢有厥冷者酒服無厥冷五心

煩蜜湯服

劉氏

諸痢初起大黃煨熟當歸各二三

河間保命集

大黃一兩浸酒半日

取利或加檳榔

煎服取利

集簡方

熱痢裏急

大黃一兩水煎服

忽喘

悶絕不能語言涎流吐逆牙齒動搖氣出轉大絕

而復蘇名傷寒併熱霍亂大黃人參各半兩

水二盞

煎

一盞熱服

食已卽吐

胸中

有火也大黃

一兩甘草二錢半

可安

仲景

金匱玉函方

升煮

半升溫服

危氏得效方

水一升

大黃一兩

頭痛

大黃二十

沸酒

半升

熬膏

丸良

服半酒

水半

酒

取利

千金翼

當下

金方

乾血氣痛

錦紋

大黃末

一兩

頭

痛

大黃

二十

沸酒

五丸

溫醋

化下

良丸

酒

仲景

金匱玉函方

升煮

半升溫服

危氏得效方

水一升

大黃末

一兩

頭

痛

大黃

二十

沸酒

五丸

溫醋

化下

良丸

酒

千金翼

當下

金方

乾血氣痛

錦紋

大黃末

一兩

頭

痛

大黃

二十

沸酒

五丸

溫醋

化下

良丸

酒

仲景

金匱玉函方

升煮

半升溫服

危氏得效方

水一升

大黃末

一兩

頭

痛

大黃

二十

沸酒

五丸

溫醋

化下

良丸

酒

仲景

金匱玉函方

升煮

半升溫服

危氏得效方

水一升

大黃末

一兩

頭

痛

大黃

二十

沸酒

五丸

溫醋

化下

良丸

酒

仲景

金匱玉函方

升煮

半升溫服

危氏得效方

水一升

大黃末

一兩

頭

痛

大黃

二十

沸酒

五丸

溫醋

化下

良丸

酒

仲景

金匱玉函方

升煮

半升溫服

危氏得效方

水一升

大黃末

一兩

頭

痛

大黃

二十

沸酒

五丸

溫醋

化下

良丸

酒

仲景

金匱玉函方

升煮

半升溫服

危氏得效方

水一升

大黃末

一兩

頭

痛

大黃

二十

沸酒

五丸

溫醋

化下

良丸

酒

仲景

金匱玉函方

升煮

半升溫服

危氏得效方

水一升

大黃末

一兩

頭

痛

大黃

二十

沸酒

五丸

溫醋

化下

良丸

酒

仲景

金匱玉函方

升煮

半升溫服

危氏得效方

水一升

大黃末

一兩

頭

痛

大黃

二十

沸酒

五丸

溫醋

化下

良丸

酒

仲景

金匱玉函方

升煮

半升溫服

危氏得效方

水一升

大黃末

一兩

頭

痛

大黃

二十

沸酒

五丸

溫醋

化下

良丸

酒

仲景

金匱玉函方

升煮

半升溫服

危氏得效方

水一升

大黃末

一兩

頭

痛

大黃

二十

沸酒

五丸

溫醋

化下

良丸

酒

仲景

金匱玉函方

升煮

半升溫服

危氏得效方

水一升

大黃末

一兩

頭

痛

大黃

二十

沸酒

五丸

溫醋

化下

良丸

酒

本草綱目草苦

卷十一
火牙痛

口含冰水

一口以紙撫蘸大黃末

風熱牙

痛

紫金散

隨左右噙鼻立止

儒門事親

效好大黃瓶內燒

積壅一切牙痛去口氣大有奇

下贖

一家專貨

此藥兩宮常以數千

大黃米泔浸軟生地黃各旋

漸至崩落口臭極效

大黃家藏方

切一片合定貼上

一夜卽愈未愈再貼忌說話恐

引入風○大黃枯礬等分爲末

聖惠方

擦之吐涎

本事方

口瘡糜爛

擦之

生大黃

生油調搽

聖惠方

瘡

生大黃

連各一錢麝香少許爲末

和塗○又方

生油調搽

聖惠方

仙茅毒發

見仙茅下

舌脹出口方

傷損瘀血

三因方

治從高墜下木

雞鳴散

石壓傷及一切傷損瘀凝積痛不可忍並以此藥

推陳致新

大黃酒蒸兩杏仁去皮三七粒細研

治跌壓瘀血在內

服至晚取下瘀血卽愈○

大黃當歸等分炒

和濟方

治跌壓瘀血在內

服至晚取下瘀血卽愈○

大黃當歸等分炒

治跌壓瘀血在內

服至晚取下瘀血卽愈○

研取每服四錢溫酒

打撲傷痕

瘀血滾注或作潮熱

一夜黑者紫二夜紫者

白也

瀕湖集簡方

大黃末薑汁調塗

摘玄醫方

金瘡煩痛

大便不利大黃黃芩等分爲末

千金方

東瘡破爛

大黃末水調塗蜜丸先食水下十九日三服

方

東瘡破爛

大黃末水調塗蜜丸先食水下十九日三服

蜜調塗之不惟止痛又且滅瘢此乃

衛生寶鑑

湯火傷灼

莊浪大

金山寺神人所傳方

洪邁夷堅志

灸瘡飛蝶

艾因

灸訖火痂便退瘡內鮮肉片飛如蝶形而去痛不

可忍是火毒也

大黃朴消各半兩爲末水服取利

卽愈

張

蠻蠻咬瘡

大黃末塗

杲醫說

火丹赤腫

遍身者

水頻刷之

急救方

腫毒初起

新汲水調塗

方便癰腫焮熱

作痛大黃末

數易卽退甚

驗神方也

肘後方

本草綱目草部卷七上大黃

本草綱目

卷之三十一

乳癰腫毒

金黃散用川大黃粉草各一兩爲末好酒熬成膏收之以絹攤貼瘡上仰臥仍

先以溫酒服

大匙明日取下惡物

人經驗方

大風癩瘡

大黃煨一兩

爲末每服方寸

七空心溫酒下取出惡毒物如魚

蛇藥名通天再

黃花蛇藥名通天再

十便更方

下如亂髮之蟲取盡乃服雄

葉氣味酸寒無毒

主治置薦下辟蟲蟲

志相感

商陸

本經下品

釋名遂蕎

音逐湯

當陸

開寶

章柳

圖經

白昌

開寶

馬尾

廣雅

夜

呼本經時珍曰此物能逐蕩水氣故曰遂蕎訛爲

商陸又訛爲當陸北音訛爲章柳或云枝枝相

值葉葉相當故曰當陸或云多當陸路而生也

集解

別錄曰

商陸生二種咸陽山谷如人形者有神赤神

參

甚花者有毒保昇曰此有赤白花者根在二月八月采根日乾頌曰赤神

參

蕷花名章柳根赤白花者葉大如牛舌而厚脆

參

尺青葉如牛舌多生於根在莖青家園中春生苗高三四

參

苗葉作朵根如馬蘿舌而長於莖八九月采之爾雅謂之遂

參

昔年多者謂之莧陸敦曰一雅謂之葛遂

參

人亦種者謂之馬蘿舌而長於莖八九月采之爾雅謂之葛遂

參

人亦可種者仙人爲蔬采之可服之有傷筋骨消腎之毒

參

不食丹砂子之爲乳根及紫色者擘破作畦過栽花者有神

參

雞冠花赤幹微有線楞周憲人莖取白根及紫色者擘破作畦過栽花者有神

參

微紫花赤極易生植

參

根倘治敷曰取花白者根銅刀刮去皮薄切以東

參

流水浸兩宿瀝出架甌蒸以黑豆葉一重

參

商陸一重如此蒸之從午至亥取出
去豆葉暴乾剉用無豆葉以豆代之

氣味辛平有毒

別錄

大明曰酸

權曰甘有大毒忌犬內

者苦冷得大蒜良赤者

但可貼

腫服之傷人痢血不已殺人令人見鬼神

張仲景曰商陸有毒陽中之陰其味酸辛其形類人其用療水其效如神

商陸以水服殺人鬼神曰商陸有毒陽中之陰其味酸辛其形類人其用療水其效如神

主治

水腫癰瘕熨除癰腫殺鬼精物

本經

療胸中邪氣

水腫癰瘕腹滿洪直疏五臟散水氣

別錄甄權曰通大小腸瀉

病喉痺不通薄切醋炒塗喉外良

水氣別錄瀉十種水

蟲毒墮胎燙腫毒傅惡瘡

大明

發明

宏景曰方家不甚用惟療水腫切生根雜鯉魚煮作湯服道家乃散用之及煎釀服皆能

商陸一重如此蒸之從午至亥取出去豆葉暴乾剉用無豆葉以豆代之

商陸有毒陽中之陰其味酸辛其形類人其用療水其效如神

主治

水腫癰瘕熨除癰腫殺鬼精物

本經

療胸中邪氣

水氣別錄瀉十種水

頌去戶蟲見鬼神其實子亦入神藥花名蕩花尤良
云竹筈盛掛屋東北角陰乾百日搗篩并華水調服
也其性下行專於行水與大戟苦寒沉也降也陰
功也其性下行專於行水與大戟苦寒沉也降也陰
以小便赤根搗爛入麝香三分貼于臍心以帛束之得者同
功也其性下行專於行水與大戟苦寒沉也降也陰
以小便赤根搗爛入麝香三分貼于臍心以帛束之得者同
日文者用白商陸香附子炒乾出火毒以上隨散一不夜成得者同
乾爲末每服三錢米飲下或以大蒜同商陸煮
云汁服亦可其莖葉作蔬食亦治腫疾嘉謨曰古讚言
味酸辛其形類人療水貼腫其效如神斯言
盡矣

附方

舊九

溼氣腳軟

章柳

根切小豆同煮爲飯每日食之

更以

新六

度最效

水氣腫滿

外臺祕要

用白商陸根去

水

瘡爲度最效

水氣腫滿

皮切如豆大

斗門方

外臺祕要

用白商陸根去

水

以水去

二升煮一升更以糯米一大盞同煮成粥每日空心服之取微利不得雜食○千金散用白商陸六兩取汁半升和酒半升看人與服當利下水取效○梅師方用合和酒半升人與服效

六升去滓和葱白商陸一升羊肉六兩水一斗煮取效
冷搗或蒸食之以布藉腹上安藥勿覆多取商陸根泥火煎如鴟仁千金方死多取商陸根

腹中暴癥

有物如石

痛刺

呻呼不

休

休

休

休

休

腹中暴癥

治百日死

人

藥勿覆

休

休

休

休

休

冷搗

作汁

去臙

食之

以布

藉腹

上安

藥勿

休

休

休

休

休

休

休

休

休

泥下

冷搗

卽汁

或蒸

食之

以布

藉腹

上安

藥勿

休

休

休

休

休

休

休

休

爲酒

以堅

卽易

晝夜

勿息

之

以布

藉腹

上安

藥勿

休

休

休

休

休

休

休

爲度

以商

硬生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

根

泥火

煎

浸去皮

搗如

休

爲度

以商

陸生

商陸

根汁

一升

杏仁

千金方

死

多取

商陸

由毒氣與胃氣相搏欲出不得出也以商陸根和葱白搗傅臍上斑止痘出方免無虞 摘玄方

耳卒熱腫

生商陸削尖納入

聖濟錄 喘卒攻痛

商陸切根灸熱隔布

熨之冷卽易立

圖經本草

療癰喉痹

攻痛生商陸根搗作餅

于上灸

愈外臺秘要

○壯良

一切毒腫

商陸根和鹽少許搗傅日再易之

孫真人千金方

石癰如石

堅硬不作膿者

生商陸根搗擦之

孫真人千金方

瘡傷水毒

商陸根搗炙布裹熨之

千金方

蕎花主治

人心昏塞多忘喜臥取花陰乾百日搗

末日暮水服方寸匕乃臥思念所欲事卽於眼中

醒悟也

蘇頌

狼毒

下品

本經

釋名

時珍

知其曰

觀其

集解

宋別錄

曰狼毒

陳而生

秦亭山谷

及奉高

月八出

宏景曰客昌

月九

但亦

之用太山言止有陰乾陳而生
腹內要沉者今用數畝地生
之處又秦隴藥沉耳恭曰狼毒
實葉似商陸及太山寒元無今
生於漢中生於漢水及蝮者良
信使陶云浮出蝮蛇者是建平
輕者爲良陸及大山漢中無今
生於漢水及蝮者食其根故爲
麻采山下縣似商陸及太山寒
者爲良輕者爲黃莖亦蝮蛇者良
橘皮虛得葵云浮出蝮蛇者是
夏水秋沉者爲黃莖亦蝮蛇者良
枳實浮采者爲黃莖亦蝮蛇者良
吳茱萸者爲黃莖亦蝮蛇者良
且堅毒劣葉不聞有陶說謬矣
萸物全得木是在毛根說謬矣
陳不可比沉葵此志不在二州
也保昇曰狼毒不足高肉白日同
類此與夏爲太以狼類

似玄參惟虛浮者爲劣也頌曰今陝西州郡及遼
石州亦有之狀如馬志所說時珍曰狼毒出秦晉
地今人往往以草蘭茹爲之誤矣見蘭茹下也

根氣味

辛平有大毒大明日苦辛有毒之才曰大
豆爲之使宜醋炒惡麥句薑

畏占斯密

陀僧也

主治欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣

惡瘡鼠瘻

疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸本經除胸下

積癬

別錄治痰飲癥瘕亦殺鼠

大明合野葛納耳中治

聾子

抱朴子

附方

舊新六

心腹連痛

作脹

用狼毒

三兩

附子半兩

搗篩蜜丸

梧子大一

日服

一丸

一

丸二日三丸三日三丸止又從一丸以瘥爲度

肘後方

丸

九種心痛

蟲

連年積冷流注心胸及落馬墮車瘀血中惡也。又治
九痛丸用狼毒炙香吳茱萸湯泡巴豆去心炒取
霜乾薑炮人參各一兩附子炮去皮三兩爲末煉取
蜜丸梧子大每空腹溫和劑局方。腹中冷痛停痰兩脇痞滿
按之鳴轉逆害飲食用狼毒三兩附子一兩旋覆花三兩
搗末蜜丸梧子大每服三丸食前白湯下。丸縮入腹急痛欲死狼毒四兩附子三兩搗末防風二兩

日三服。

○陰疝欲死

丸縮入腹急痛欲死狼毒四兩附子三兩搗末

蜜丸梧子大每服三丸日夜三度白湯下。肘後方

三度白湯下。肘後方。

同腹中冷痛方。阜子大沙一錢用鈎一錢用鈎

切蟲病用狼毒杵末每服一錢以水化開臥時空腹服之次早卽

少許以水化開臥時空腹服之次早卽

狼毒不拘多少搗爛以豬油調搽患處方睡勿以被

下蟲也。乾溼蟲疥馬油調搽患處方睡勿以被

狼毒不拘多少搗爛以豬油調搽患處方睡勿以被

狼毒不拘多少搗爛以豬油調搽患處方睡勿以被

蒙頭藥氣傷面此

集效方。維揚潘氏所傳方。

積年疥癩一狼毒半生研研

半炒研輕粉三合水銀三錢以茶末少許於瓦器內以津液擦化爲末同以清油浸藥高一寸三日待藥沉油清遇夜不見燈火釀油塗瘡上仍以口鼻於藥盞上吸氣取效承類方積年

乾癬

生癩搔之黃水出每逢陰雨卽

聖惠方

惡疾風瘡

狼毒

秦艽等分爲末每服方寸匕

溫酒下日一二服

千金方

防葵

本經上品

釋名

房苑別錄梨蓋本利茹

吳普又名爵離方蓋農

普曰莖葉似葵花子

根香味似防風故名防葵

集解

別錄曰防葵生臨淄川谷及嵩高太山少室

三月三日采根暴乾

普曰莖葉如葵上黑黃

大如桔梗根中紅白

六月花白七月

二月生根

根中紅白七月

八月實白三月采根

普曰此物亦稀有襄陽望楚

生根中紅白七月

二月生根

根中紅白七月

八月實白三月采根

普曰此物亦稀有襄陽望楚

生根中紅白七月

二月生根

根中紅白七月

八月實白三月采根

普曰此物亦稀有襄陽望楚

生根中紅白七月

山東及興州西方有之興州者乃勝南者爲隣蜀地也頌曰今惟出襄陽地他郡不聞也其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一榦其端開花如葱花景天輩而色白六月開花卽結實根似防風香味亦如之依時采者乃沉水今乃用枯朽狼毒當之極爲謬矣時珍曰唐時隴西成州貢之蘇頌所說詳明可據

正誤

宏景曰防葵今用建平者本與狼毒同根猶如三建其形亦相似但置水中不沉爾而狼

毒陳久者亦不能沉矣敦曰凡使防葵勿誤用狼毒緣真相似而驗之有異效又不能切須審之恐誤人疾其防葵在葵州沙土中生采得二十日便生艸用之惟輕爲妙綦曰狼毒與防葵都不同類生處亦別藏器曰二物一是上品善惡不同形質又別陶氏以浮沉爲別後人因而用之將以防葵破堅積爲下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別殊爲謬誤

根脩治

敦曰凡使須揀去艸末用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土

器中炒至汁盡用

氣味

別錄曰甘苦普曰神農辛寒桐君扁鵲無毒岐伯雷公黃帝辛苦無

毒權曰小毒主治

瘡瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆溼有小毒主治瘡瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆溼

瘡癩驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身

本經

療五

臟虛氣小腹支滿臚脹口乾除腎邪強志中火者

不可服令人恍惚見鬼

別錄

久服主邪氣驚狂

蘇主

痃癖氣塊膀胱宿水血氣瘤大如盃者悉能消散

治鬼疰百邪鬼魅精怪通氣

甄權

本草綱目草書 卷二十一

發明

時珍曰防葵乃神農上品藥黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒獨別錄言中火

者服之令人恍惚見鬼陳延之小品方云防葵多服令人迷惑恍惚如狂接難經云重陽者狂脫陽者見鬼是豈上品養性所宜乎是豈寒而無毒者乎不然則本經及蘇恭所列者是防葵功用而別錄所列者乃似防葵之狼毒功用非防葵也狼毒之亂防葵其來亦遠矣不可不辨古方治蛇瘕瘻瘍皆是狼毒也

附方

舊一

新二

後方

○肘

癲狂邪疾

方同

○腫滿洪大

防葵研末溫酒服一刀圭至

二三服身潤及小不仁爲效

○傷寒動氣

傷寒汗下後臍左

右動氣防葵散用

有動氣防葵散用

半兩每服半兩

水一盞半煎八分溫服

雲岐子保命集

狼牙

本品

經

下品

經

卷二十一

十一

釋名牙子

本經

狼齒

別錄

狼子

別錄

犬牙

吳普

抱牙

吳普

支蘭

李當之宏景曰其牙似獸之齒牙故有諸名

集解

別錄

曰狼牙生淮南川谷及冤句八月采根

赤六七月華八月實黑正月八月采根

在有之苗似蛇莓而厚大深綠色根黑若獸之牙

三月八月采根日乾

頌曰今江東汴東州郡多有

之時珍曰范子計然云出建康及三輔色白者善

毒桐君辛岐伯雷公扁鵲苦無

根氣味苦寒有毒

別錄

曰酸

普曰神農黃帝苦有

之使惡地榆棗肌

桐君

雷公扁鵲苦無

之才曰蕪荑爲

主治

邪氣熱氣疥癬惡瘍瘡痔

桐君

辛岐伯雷公扁鵲苦無

去白蟲

本經

治浮風瘡瘍

煎汁洗惡瘍

權甄殺腹臓一

切蟲止赤白痢煎服

明大

附方

舊六
新四

金瘡出血

狼牙草莖葉熟搗貼之

肘後方

小便溺血

金粟狼牙草

焙乾入蚌粉炒槐花百藥煎等分爲末每服三錢米泔空心調服亦治酒病

衛生易

煎等分爲末每服三錢米泔空心調服亦治酒病

方簡寸白諸蟲

狼牙五兩搗末蜜丸麻子大隔宿不食明日以漿水下一合服盡卽瘥

衛生易

煎等分爲末每服三錢米泔空心調服亦治酒病

外臺蟲瘡瘍癰

六月以前采狼牙葉以後用根生咬咀以木葉裹之塘火炮熟於瘡

衛生易

煎等分爲末每服三錢米泔空心調服亦治酒病

上熨之冷

楊炎南行方卽止

小兒陰瘡

狼牙草濃煮汁

狼牙草濃煮汁

千金方婦人陰

狼牙草濃煮汁

癰狼牙二兩

蛇牀子三兩外臺秘要

婦人陰蝕瘡爛者狼牙

湯用狼牙三

兩水四升

煎取半升以筋繩綿浸湯

耳出汁狼牙

狼牙

研末綿裹日塞

聖惠方毒蛇傷螫

獨莖狼子根或葉搗爛

崔

氏射工中人

飲四五合并傅之

有瘡狼牙冬取根夏取葉搗汁

干金方

蘭茹

本經下品

釋名離婁

別錄掘据

居音結

白者名草蘭茹

時珍曰蘭茹本作蘆

詩云予手拮据手口共作拮據其根牽引之貌

當作拮據

集解

別錄

頭者良

普曰蘭茹生代郡

川谷五月采根陰乾黑

四月華

五月實

黑根黃有汁亦黃色

三月采苗四

月汁出凝黑

如漆故云漆頭

次出近道名草蘭

色

白皆燒鐵

燉頭令黑以當漆

非真也

頌曰今河陽

淄齊州亦有之

二月生苗葉似大戟

而花黃色根

如蘿蔔皮赤黃肉白

初斷時汁出凝黑如漆

三月根

此近之又有

一種草蘭茹

色白古方兩用

之謂出高麗者

姚氏散傳之看肉

仍便惡肉

停止但傳諸膏藥若不生肉

又傳黃芪散

惡肉

蓋便

此近之又有

一種草蘭茹

色白古方兩用

之謂出高麗者

不盡者可以漆頭赤皮蘭茹爲散半錢和白蘭茹
散三錢和傅之觀此則赤白皆可用也時珍曰范
子計然云蕙茹出武都黃色者善草蘭茹出建康
白色今亦處處有之生山原中春初生苗高二三
尺根長大如蘿蔔蔓菁壯或有歧出者皮黃赤肉
白色破之有黃漿汁莖葉如大戟而葉長微闊不
甚尖折之有白汁抱莖有短葉相對圓而出尖葉
中出莖莖中分二三小枝二三月開細紫花結實
如豆大一顆三粒相合生青熟黑中有白仁如續
隨子之狀今人往往皆呼其根爲狼毒誤矣狼毒
葉似商陸大黃

輩根無漿汁

根氣味辛寒有小毒

別錄曰酸普曰神農辛岐伯
酸鹹有毒李當之大寒之才

曰甘草爲之使惡麥門冬

主治蝕肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿

惡血除大風熱氣善忘不寐

本經去熱癆破癥瘕除

瘻肉

錄別

發明

宗奭曰治馬疥尤善服食方用至少時珍曰素問治婦人血枯痛用烏鵲骨蘆茹二物丸

服方

見烏鵲魚下王冰言蘆茹取其散惡血又齊書云郡王子隆年二十身體過充徐嗣伯合蘆茹

丸服

之自消則蘆茹亦可服食但要斟酌爾孟詭必效方治甲疽生于腳趾邊腫爛用蘆茹三兩黃

芪二兩苦酒浸一宿以猪脂五合合煎取膏三合

日三塗

之卽消又聖惠方治頭風旋眩鳴頭丸中

亦用

之

附方

舊二新二

緩疽腫痛

蘭茹一兩爲散

溫水

傷寒咽

聖惠方

散溫水

傷寒咽

痛

毒攻作腫

真蘭茹

爪甲大納口嚼汁

張文仲備急方

中焦熱痞

中焦熱痞

中焦熱痞

中焦熱痞

中焦熱痞

中焦熱痞

中焦熱痞

中焦熱痞

善忘

不不禁

蘭茹三分甘草

炙二兩消石

爲末每

錢雞鳴時溫酒

不以知爲度

聖惠方

每

濟

濟

濟

濟

瘡瘍癰

蘭茹宋入輕粉香油調傳之多能醫事

大戟

本經下品

釋名

卽鉅

下馬袖

綱目

時珍曰

其根辛苦

大戟人

呼爲大馬

仙言

利人甚速也

郭璞注

爾雅云

蕎卽大戟也

集解

別錄曰

大戟生常山

十二月采

根陰乾保昇

五月采苗二月八月采根

雨頫來葉

三月四月開黃紫花

圓似杏

根陰乾淮甸出

苦參皮

黃肉甘遂而高

大葉有白汁

黃根似細

甘遂而高

五月采苗二月八月采根

雨頫來葉

三月四月開黃紫花

圓似杏

根陰乾淮甸出

似初生楊柳

小團三月四月開黃紫花

圓似杏

根似細苦參

秋冬季采根

陰乾淮甸出

生者莖圓高

三四尺葉黃莖至心亦如百合苗

江南生平澤甚多直莖高

其梢葉密攢而上

杭州紫大戟爲上

江南土大戟

二三尺中空折之有白漿葉長狹如柳葉而不團

葉似芍藥珍曰大戟生平澤甚多直莖高

其梢葉密攢而上

杭州紫大戟爲上

江南土大戟

次之北方綿大戟色白其根皮柔韌如綿甚
峻利能傷人弱者服之或至吐血不可不知
根脩治 敦曰凡使勿用附生者誤服令人洩氣不
禁卽煎薺芫湯解之采得後于槐砧上細
剉與海芋葉拌蒸從巳至申去芋葉曬乾用時珍
曰凡采得以漿水煮軟去骨曬乾用海芋葉麻而
有毒恐不可用也

氣味苦寒有小毒

別錄曰甘大寒權曰苦辛有大
毒元素曰苦甘辛陰中微陽鴻

肺損真氣時珍曰得棗卽不損脾之才曰反甘草
用菖蒲解之秦曰畏菖蒲蘆葦鼠屎大明日赤小
豆爲之使惡薯蕷

主治

靈毒十二水腹滿急痛積聚中風

皮膚疼痛吐逆

本經頸腋癰腫頭痛發汗利大小便

別錄瀉毒藥泄天行黃病溫瘧破癥結明下惡血癰

大草圖目草部 卷二十七 大戟科

塊腹內雷鳴通月水墮胎孕

權甄

治隱癰風及風毒

脚腫並煮水日日熱淋取愈

頌辭

發明者苦不處肺脾痛則蓄陳到燥也成無好已古之于心也曰曰時大大戟甘遂之苦以泄水之者腎溼勝生
眞膏水痰甘爲治無到燥也成無好已古之于心也曰曰時大大戟甘遂之苦以泄水之者腎溼勝生
下有氣遂痰聚而入除之也成無好已古之于心也曰曰時大大戟甘遂之苦以泄水之者腎溼勝生
之補惟能爲之擇而入除之也成無好已古之于心也曰曰時大大戟甘遂之苦以泄水之者腎溼勝生
以無善行飲本因筋成腸於心也曰曰時大大戟甘遂之苦以泄水之者腎溼勝生
瀉而用經隧涎之方骨痛軟則乾唾迷珍戟甘遂之苦以泄水之者腎溼勝生
腎而復能收水涕水以頸嘔稠粘而成癲也曰與甘遂之苦以泄水之者腎溼勝生
非瀉云痘溼爲也控項寒熱喘急背冷入于肝則引麻溜其腑則臟自不實百
瘡功也又錢仲陽謂腎爲皮裏膜外凝滯此證用腎爲

愚按百祥惟用大戟一味大戟能行水故曰瀉其腑則臟自不實腑者膀胱也竊謂百祥非獨瀉腑正實則瀉其子也腎邪實而瀉其肝也大戟味苦瀉浸水色青綠肝膽之藥也故百祥膏又治嗽而云心下痞滿引脇下痛乾嘔短氣者少陽風木之色也仲景亦能吐青綠水夫青綠者少陽風木之色也仲景亦云其心中亦有大戟夫乾嘔脇痛非肝膽之病乎則百祥之瀉肝膽也明矣肝乃東方宜瀉不宜補況瀉百青瀉黃皆瀉其子同一瀉也何獨腎只瀉腑乎潔古老人治變黑歸腎證用宣風散代百祥膏亦是瀉瀉子之意蓋毒勝火熾則水益涸風挾火勢則土受虧故津血內竭不能化膿而成青黑乾陷之證土故瀉其風火之毒所以救腎扶脾者非也腎之真水不可瀉瀉其陷腎伏旺之邪爾

附方

新一
十一

百祥膏

治嗽而吐青綠水又治痘瘡歸腎紫黑乾陷不發寒者宜下大戟

不黑者慎勿下紅芽大戟不拘多少搗幹漿水煮
極軟去骨日乾復納原汁盡焙爲末冰丸粟米狀
每服一二十丸研赤脂麻湯下○潔古活法機要
棗變百祥丸治痘瘡變黑大便閉結用大戟一兩
棗肉焙丸服從少至多以利爲度以控涎丹治痰

在胸膈上一下變爲諸病或頸項胸背腰腸手足跨
頭痛似乎乎癱瘓不可忍筋骨牽引釣痛走易及皮膚麻痺
竅並宜此藥數服痰涎自失諸疾尋愈紫大戟打麪糊丸
甘遂白芥子微炒各一兩爲末薑汁打麪糊丸水腫喘急便
子大每服七丸或二十一丸以津液嚥下若取利則服五六
十九三因方水腫喘急便

水濱及水蠶大戟炒二兩乾薑炮半兩爲散每水病服三錢薑湯下大小便利爲度

至重者不過再服便瘥禁毒食一年永不水氣腫復作此方出張尚客李絳兵部手集

水氣腫

年永不水氣腫

脹

大戟一兩廣木香半兩爲末五更酒服一錢半取下碧水後以粥補之忌鹹物○簡便方用大

戟

燒存性研末每錢七水腫腹大如鼓或遍身浮腫用空心酒服一錢半

浸過

用大戟根苗蓋之瓦盆合定煮熟取棗無時食之棗盡決愈○又大戟散用大戟白牽牛木香等分爲末每服一錢以豬腰子一對批開摻末在

內溼紙

煨熟空心食之左則塌左右則塌右張

潔古活

法機要牙齒搖痛大戟咬於痛處中風發熱大戟

洗之寒

乃止千金方

四兩白醋漿

一千金方

澤漆

下品

釋名

漆莖

本經

綱目

綠葉綠花草

綱目

五鳳

草

〔宏景曰〕是大戟苗生時摘葉有白

集解

別錄曰日七月采莖葉陰乾此卽大戟花也川澤中冀州鼎州明州及近道皆有之時珍曰此卽大戟宿本草其苗可食然大戟苗洩人不可爲菜今攷土

一
別錄陶氏皆言澤漆是大戟苗日華子又言是大戟花陶氏皆言澤漆是大戟苗日華子又言是大戟
宿本草其苗可食然大戟苗洩人不可爲菜今攷土
一名綠葉及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草
一名五鳳草江湖原澤平陸多
如苜蓿葉生苗葉圓而黃綠頗似貓睛故名貓兒眼睛草
頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青綠葉
色復有小葉承之中抽小莖五枝每枝開細花青綠葉
頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青綠葉
方草砂頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青綠葉
此綠色花復有小葉承之中抽小莖五枝每枝開細花青綠葉
家據此爲大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結
用治水蠱腳氣有功效尤與神農本文相合自今

漢人集別錄誤以爲大戟苗故諸家襲之爾用者宜審視

莖葉氣味苦微寒無毒

別錄曰辛大明曰冷有小毒之才曰小豆爲之使惡

薯蕷

主治皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰

氣不足

本經利大小腸明日輕身

別錄主蠱毒蘇恭止瘧

疾消痰退熱

大明

發明

時珍曰澤漆利水功類大戟故人見其莖有白汁遂誤以爲大戟然大戟根苗皆有毒液

人而澤漆根硬不可用苗亦無毒可作菜食而利丈夫陰氣盛不相侔也

附方

舊二新六

肺欬上氣脈沉者澤漆湯

主之澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗

五升去滓入半夏半升紫參白前生薑各五兩甘草黃芩人參桂心各三兩煎取五升每服五合日

三服

張仲景

心下伏瘕

大如盆不得食者

澤漆

金匱要略方

大黃芩熬三兩

澤漆十斤夏

搗篩蜜丸

梧子

大每服二

斗研汁約二斗

於銀鍋內慢火熬

如稀鴆

丸日三服

葛洪脉後方

入瓶內收每日空心溫酒

調下一匙以愈爲度

水氣蠱病

生鮮貓眼睛草

曬乾爲末棗肉丸

彈子大每服二丸

白湯化下日二

行步腳痛

貓兒眼

睛草

一搗研

聖惠方

水氣蠱病

生鮮貓眼睛草

曬乾爲末棗肉丸

彈子大每服二丸

白湯化下日二

行步腳痛

貓兒眼

睛草一搗研

服覺腹中暖小便利

乾坤秘韞

等分每服一

兩水五碗煎

三

腳氣赤腫

行步腳痛

貓兒眼

睛草一搗研

爲度

乾坤秘韞

等分每服一

兩水五碗煎

三

腳氣赤腫

行步腳痛

貓兒眼

睛草一搗研

碗薰洗之

衛生易簡方

涎爛湯泡取汁含漱吐

衛生易簡方

涎

衛生易簡方

牙齒疼痛

貓兒眼

睛草一搗研

五日午時鍋內熬

至一桶去滓澄清再熬

至一碗

瓶收每以椒葱槐枝煎湯洗瘡淨

乃搽此膏數次

五月

午時鍋內熬

至一桶去滓澄清再熬

至一碗

愈便民

癬瘡有蟲

貓兒眼睛草

曬乾爲末香油

調搽之

衛生易簡方

衛生易簡方

衛生易簡方

衛生易簡方

衛生易簡方

圖纂方

金匱要略方

心下伏瘕

大如盆不得食者

澤漆

金匱要略方

大黃芩熬三兩

澤漆十斤夏

澤漆一搗研

澤漆一搗研

皆遂

本經下品

釋名甘藳

別錄

陵藳

吳

陵澤

別錄

甘澤

吳

重澤

別錄

苦澤

吳白澤

別錄

主田

別錄

鬼醜

吳

普時珍

曰諸

集解

別錄

曰

甘遂生

中山川谷

二月采

根陰乾

普

山江東比來用京口者大不相似赤皮者勝白皮

者都下亦有

名草甘遂殊惡蓋贗僞者也

恭曰甘

遂苗似澤漆其根皮赤肉白作連珠實重者良草

甘遂乃

是蜜休療體全別

苗亦不同俗名重臺葉

似鬼臼莧麻根皮白色

大明曰西京者上

汴滄吳

者次之形似和皮甘草節

頌曰今陝西江東亦有

之苗似澤漆莖短小而葉有汁

根皮赤內白作連珠大如指頭

根脩治

敷曰凡采得去莖於槐砧上細剉用生甘

草湯薺自然汗味攬浸三日其水如

根脩治

敷曰

凡采得去莖

於槐砧上細剉用生甘

草湯薺自然汗味攬浸三日其水如

根脩治

敷曰

凡采得去莖

於槐砧上細剉用生甘

草湯薺自然汗味攬浸三日其水如

根脩治

敷曰

凡采得去莖

於槐砧上細剉用生甘

草湯薺自然汗味攬浸三日其水如

根脩治

敷曰

凡采得去莖

本草綱目草部
黑汁乃漉出用東流水淘六七次令水清爲度
出于土器中熬脆用之時珍曰今人多以麪煨熟
用以去其毒

氣味苦寒有毒

別錄曰甘大寒

曹曰神農

桐君苦

有毒

元素曰純

岐伯雷公甘有

毒

元素曰

陽也之才曰瓜蒂爲之使惡遠志反甘草

主治

大腹疝瘕腹滿面目浮腫

留飲宿食破癥堅積聚利水穀道

本經下五水散

膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿

別錄能瀉十二種水疾

去痰水權瀉腎經及隧道水溼腳氣陰囊腫墜痰

迷癲癇噎膈痞塞

珍時

發明

宗奭曰此藥專于行水攻決爲用元素曰味苦氣寒苦性泄寒勝熱直達水氣所結之處

乃泄水之聖藥水結胸中非此不能除故仲景大陷胸湯用之但有毒不可輕用時珍曰腎主水凝則爲痰飲溢則爲腫脹甘遂能泄腎經溼氣治疾之本也不可過服但中病則止可也張仲景治心下留飲與甘草同用取其相反而立功也劉河間保命集云凡水腫服藥未全消者以甘遂末塗腹方遶臍令滿內服甘草水其腫便去又王璆百一選方云腳氣上攻結成腫核及一切腫毒用甘遂末調傅腫處卽濃煎甘草汁服其腫卽散二物相反而感應如此清流韓詠病腳疾用此一服病去七八再服而愈也

附方

舊三新

十九水腫腹滿

甘遂炒二錢

分黑牽牛

一兩半爲末

大麥麪各半

兩水和作

煎時時呷

濟方

普

膜外水氣

甘遂末

餅燒熟

食之取利

聖濟總錄

身面洪腫

甘遂二錢生研爲末

入末在內溼紙包煨令熟

一枚分

食之

以蘋豬腎一枚分

之

身面洪腫

甘遂二錢生研爲末

入末在內溼紙包煨令熟

一枚分

食之

日一服至四五服當覺腹鳴

小便利是其效也

肘後方

腿膝攀急

卽上方加木香四錢每用二錢煨熟溫酒

嚼下當利黃水爲驗

御藥院方傳

四肢腫痛

急

大小便不利欲死

甘遂五錢半生半炒

胭脂坏子

水煮令浮淡食之大小便利後用平胃散

加熟附子每以二錢煎服

普濟方

小兒疳水

珠子甘遂炒青橘皮等分爲末三歲用一錢以麥芽湯下

以利爲度忌酸鹹

三五日名水寶散

總微論

水蠱喘脹

甘遂大戟各一兩慢火炙研每服

一字水半盞煎三五沸服不過十

服濟錄

水腫喘急

大小便不通十棗丸用甘遂大

戟芫花等分爲末以棗肉和丸

梧子大每服四十丸侵晨熱湯下利去

三因方

妊娠腫滿

氣急少腹滿大小便不利已服豬苓散不瘥者用

太山赤皮甘遂二兩搗篩白蜜和丸梧子大每服

五十丸得微下仍服豬苓散不下再心下留飲滿

小品方

心下留飲

滿

服之猪苓散見猪苓下
脈伏其人欲自利反快甘遂半夏湯用甘遂大者

三枚半夏十二個以水一升煮半升去滓入芍藥

五枚甘草一節水二升煮半升去滓以蜜半腳氣

升同煎八合

頓服取利○張仲景金匱玉函

腳氣

腫痛

腎臟風氣攻注下部

瘡癩甘遂半兩木鼈子

四錢摻在內溼紙包煨熟空心食之米飲下

便後吃白粥二三日爲妙

本事傳臍中及丹田

方二便不通

甘遂末以生麪糊調傅

內仍艾三壯飲甘草湯

以通爲度又

太山赤皮甘遂末以生麪糊調傅臍中及丹田

分作四服日一服取利

聖惠方小便轉脬甘遂

太山赤皮甘遂末以生麪糊調傅臍中及丹田

分作四服日一服取利

聖惠方小便轉脬甘遂

錢豬苓湯調下立通

筆峰雜興方

痘氣偏腫酒服二錢

儒門事

親婦人血結

婦人少腹滿如敦狀

小便微難而不

渴此爲水與血俱結在血室大黃二

本草綱目草部卷二十一甘遂

婦人血結

婦人少腹滿如敦狀

小便微難而不

渴此爲水與血俱結在血室大黃二

兩甘遂阿膠客一兩水一升半煮膈氣哽噎
甘遂半舟頓服其血當下

張仲景方 脑氣哽噎
盜汗 麵煨

五錢南木香一錢爲末壯者一錢
弱者五分水酒調下 怪病奇方 痘證發熱
疼痛甘遂麵包漿水煮十沸去麵以細糠火炒黃

爲末大人三錢小兒一錢冷蜜水臥時服忌油膩
魚肉曹濟方 消渴引飲

甘遂炒半兩黃連一兩爲末
蒸餅丸綠豆大每薄荷湯下二

丸忌甘草楊氏家藏方 癲癇心風
及婦人心風血邪用甘遂

二錢爲末以豬心取三管血和藥入豬心內縛定
紙裏煨熟取末入辰砂末一錢分作四丸每服一

丸將心煎湯調下大便下惡物爲效不
下再服

濟生方 馬脾風病 小兒風熱

不安謂之馬脾風甘遂麵包煮一錢半辰砂水飛
二錢半輕粉一角爲末每服一字漿水少許滴油

灌一小點抄藥在土沈下去漿萬靈膏用

之名無價散 全幼心鑑 麻木疼痛
甘遂二兩

餅貼之內飲甘草湯 摘元方耳卒聾閉甘草
插入兩耳內口中嚼少甘草耳卒自然通也 永類方

續隨子

宋開寶

釋名千金子

開寶

千兩金

日華

菩薩豆

日華

拒冬

開寶

聯步

頌曰

葉中出葉數數相續而生

集解

志曰續隨子生蜀郡處處亦有之苗如大戟

故名冬月始長故又名拒冬

一莖

莖端生葉葉中復出莖花亦類大戟自葉中

抽榦而生實青有殼人家園亭中多種以爲飾

秋種冬長春秀夏實時珍曰

莖中亦有白汁可結水銀

時珍曰凡用去殼取色白

脩治

者以紙包壓去油取霜用

氣味辛溫有毒主治婦人血結月閉瘀血癥瘕痃

癖除蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸下惡

滯物

開寶

積聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾研碎

酒服不過三顆當下惡物

蜀本

宣一切宿滯治肺氣

水氣日服十粒瀉多以酸漿水或薄醋粥吃卽止

又塗疥癬瘡

明大

發明

頌曰

續隨下水最速然有毒損人不可過多

時珍曰

續隨與大戟澤漆甘遂莖葉相似主

療亦相似

其功皆長于利水

惟在用之得法亦皆要藥也

舊二
新四

小便不通

臍腹脹痛不可忍諸藥不效者不過再服用續隨子去皮

附方

舊二

小便不通

臍腹脹痛不可忍諸藥不效者不過再服用續隨子去皮

一兩鉛丹半兩同少蜜搗作團瓶盛埋陰處臘月
至春末取出研蜜丸梧子大每服二三十丸木通

湯下化破尤妙病急

聖濟錄水氣腫脹

聯步一兩去油重研分作

亦可旋合

聖濟錄水氣腫脹

壓去油重研分作

芥七服

每治一人用一服丈夫生餅子酒下婦人荆

餅子酒下婦人荆

頻吃益善忌鹽醋一百日乃不

利至曉自止後以厚朴湯補

復作聯步卽續隨子也

斗門方

水氣腫脹續隨

去油二兩大黃一兩爲末酒水丸綠豆大涎積癥

每白湯下五十丸以去陳莝

摘元方

塊續隨子三十枚膩粉三錢青黛炒一錢研勻

米飯丸芡子大每服一丸打破以大棗一枚燒

熟去皮核同嚼冷茶送下半夜後蛇咬腫悶欲死

取下積聚惡物爲效

聖濟錄蛇咬腫悶用重

藥搗篩爲散酒服方寸匕

臺六分續隨子仁七粒

搗篩爲散酒服方寸匕

黑兼唾和少許塗咬處立效

崔元亮海上方

子疣贊續隨子熟時塗之

普濟方

自落

葉及莖中白汁主治剝人面皮去黴翳開寶傳白癩

癰瘍大明搗葉傅蟻蟇立止

時珍

貢茗

音浪蕩○本經下品

釋名天仙子

圖經

橫唐

本經

行唐

時珍

蕡其子服之令人狂

故名

狼放宕

集解

別錄曰

貢茗子生海濱川谷及雍州五月采

色六月七月采子日乾頌曰處處有之苗莖高二

極小

保昇曰所在皆有之

葉似菘藍莖葉皆有細

毛花白色子殼作瞿狀結實扁細若粟米大青黃

三尺葉似地黃王不留行紅藍等而闊如三指四

月開花紫色莖莢有白毛五月結實有殼作瞿子

狀如小石榴房中子至細青白色如粟米粒數

日

凡使勿用蒼蘡子其形相似只是微赤服之無效時人多以雜之時珍曰張仲景金匱要略言菜中
有水蘡菪葉圓而光有毒誤食令人狂亂狀如中風或吐血以甘草汁解之

子脩治

〔斂曰修事蘡菪子十兩以頭醋一鑑煮乾爲度卻用黃牛乳汁浸一宿至明日乳汁

曬乾搗篩用

黑卽是眞者

氣味苦寒無毒

〔別錄曰甘〔權曰苦辛微熱有大毒藏器曰性溫不寒〔大明曰溫有毒

服之熱發畏綠豆蟹甘草升麻犀角並解之

〔斂曰有大毒誤服之衝人心大煩悶眼生瘡火〔頌曰本

經言性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云淄

川王美人懷子不乳飲以蕷菪藥一撮以酒飲旋乳

且不乳豈熱藥所治又古方主卒

顛狂亦多單用蘡菪豈果性寒耶

主治

齒痛出蟲

肉痺拘急久服輕身使人健行走及奔馬強志益

力通神見鬼多食令人狂走

本經療癲狂風癇顛倒

拘攣

別錄

安心定志聰明耳目除邪逐風變白主疚

癬取子洗曬隔日空腹水下一指捻亦可小便浸

令泣盡暴乾如上服勿令子破破則令人發狂

藏器

炒焦研末治下部脫肛止冷痢主蛀牙痛咬之蟲

出

甄權

燒熏蟲牙及洗陰汗

大明

發明

宏景曰入療癲狂方用然不可過劑久服自無嫌通神健行足爲大益而仙經不見用權

曰以石灰清煮一伏時掏出去芽暴乾以附子乾薑陳橘皮桂心厚朴爲丸服去一切冷氣積年氣

痢甚溫暖也不可生服傷人見鬼拾鍼狂亂時珍曰荳若之功未見如所說而其毒有甚焉煮一二

日而芽方生其爲物可知矣。蕡若雲實防葵赤商
陸皆能令人狂惑見鬼者昔人未有發其義者蓋
此類皆有毒能使痰迷心竅蔽其神明以亂其視
聽故耳。唐安祿山誘奚契丹飲以蕡若酒醉而坑
之又嘉靖四十三年二月陝西遊僧武如香挾妖
術至昌黎縣民張柱家見其妻美設飯間呼其全
家同坐將紅散入飯內食之少頃舉家昏迷任其全
奸汚復將魘法吹入柱耳中柱發狂惑見舉家皆
是妖鬼盡行殺死凡一十六人並無血迹官司執
柱囚之十餘日柱吐痰二盞許問其故乃知所殺
者皆其父母兄嫂妻子姉姪也柱與如香皆論死
世宗肅皇帝命榜示天下觀此妖藥亦是蕡若之
流爾方其痰迷之時視人皆
鬼矣解之之法可不知乎

附方

舊十二新

卒發顛狂

蕡若

三升爲末

以酒一升

漬數日絞去滓煎令可丸

丸如小豆三丸日三服當覺面急頭中如有蟲行額

及手足有赤色處如此並是瘥候也未知再服取

盡神良

陳風痺厥痛

夫仙子三錢炒大草烏頭

延之小品方甘草半兩五靈脂一兩爲

末糊丸梧子大以螺青爲衣

每服十丸男

酒下女子芫花湯下

聖濟錄

止有膿血

蕘蓉子五錢淘去浮者煮令芽出炒研

眞酥一雞子大大棗七枚同煎令酥盡取棗日

食三枚○又方

蕘蓉子三撮吞之日五六

度光祿李丞服之神驗孟詵必效方

年久呷

嗽

至三十年者蕘蓉子木香熏黃等分爲末以羊

脂塗青紙上撒末于上卷作筒燒烟熏吸之

崔行功

水腫蠱脹

方見獸部

積冷痃癖不思飲食

纂要方

蕘子三分水淘去浮者大棗四十九個水三升煮

乾只取棗去皮核每空心食一個米飲下覺熱卽

止濟錄

水瀉日久

青州乾棗十個去核入蕘蓉子

填滿紮定燒存性每粟米飲服

聖惠方

冷疳痢下

蕘蓉子爲末臘豬脂和丸綿裹

許導下部內痢出更納新者

一錢

不過三度瘥。赤白下痢

腹痛腸滑後重大黃煙

爲末每服一錢米

半兩荳菪子炒黑一撮

飲下普濟方

久痢不止

變種種病兼脫肛

荳菪丸用荳菪子一升

淘去浮者煮令芽出曬乾炒黃黑色青州棗一升

去皮核釀醋二升同煮搗膏丸梧子大每服二十

丸食前米飲

聖惠方

鍋中更以無灰酒二升投之上火煎如稠鶴卽旋

投酒度用酒可及五升卽止慢火煎令可丸大如

梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若丸時

黏手則以荳絲粉襯隔之火候忌緊藥焦則失力

下利初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

荳菪子炒研篋中方

下利疾去利亦止絕有效

也初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

投酒度用酒可及五升卽止慢火煎令可丸大如

梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若丸時

黏手則以荳絲粉襯隔之火候忌緊藥焦則失力

下利初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

荳菪子炒研篋中方

下利疾去利亦止絕有效

也初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

投酒度用酒可及五升卽止慢火煎令可丸大如

梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若丸時

黏手則以荳絲粉襯隔之火候忌緊藥焦則失力

下利初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

荳菪子炒研篋中方

下利疾去利亦止絕有效

也初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

投酒度用酒可及五升卽止慢火煎令可丸大如

梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若丸時

黏手則以荳絲粉襯隔之火候忌緊藥焦則失力

下利初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

荳菪子炒研篋中方

下利疾去利亦止絕有效

也初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

投酒度用酒可及五升卽止慢火煎令可丸大如

梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若丸時

黏手則以荳絲粉襯隔之火候忌緊藥焦則失力

下利初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

荳菪子炒研篋中方

下利疾去利亦止絕有效

也初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

投酒度用酒可及五升卽止慢火煎令可丸大如

梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若丸時

黏手則以荳絲粉襯隔之火候忌緊藥焦則失力

下利初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

荳菪子炒研篋中方

下利疾去利亦止絕有效

也初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

投酒度用酒可及五升卽止慢火煎令可丸大如

梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若丸時

黏手則以荳絲粉襯隔之火候忌緊藥焦則失力

下利初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

荳菪子炒研篋中方

下利疾去利亦止絕有效

也初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

風牙蟲牙

瑞竹堂方用天仙子一

撮入小口瓶內燒烟竹

下口含瓶口令氣熏之

荳菪子炒研篋中方

下利疾去利亦止絕有效

也初服微熱勿怪疾甚者

服過三日當

荳菪子炒研篋中方

下利疾去利亦止絕有效

冷更作盡三合乃止有涎津可去甚效。備急方用荳菪子數納孔中以蠟封之亦效。

牙齒

宣落

風痛荳菪子末綿裹咬之有汁勿嚥必效。

風毒咽腫及瘰癧咽喉水不服

及瘰癧咽喉水不下

腫水服

荳菪子末兩錢外臺秘要

不得嚼破。

石癰堅硬

新荳菪子半匙和傅瘡頭根卽拔出

不得嚼破。

外臺秘要

乳癰堅硬

清水一盞服之

金惡瘡似癩

十年不愈者燒研傅之

和傅瘡頭根卽拔出

千金方打撲折傷

羊脂調荳菪子

荳菪子末傅之

惡犬咬傷

荳菪子七枚吞之

日三服

千金方

根氣味苦寒有毒

主治邪瘡疥癬殺蟲

時珍

附方

六瘡疾不止

荳菪根燒灰水服一

合人強弱用

千金方

惡癬有

蟲

荳菪根搗爛蜜和

千金翼

趾閒肉刺

荳菪根搗汁塗之

雷公炮炙論序

云腳生肉刺褪繫菪

根謂繫于褪帶上也

狂犬咬人

莨菪根和鹽搗傳
日三上外臺秘

要惡刺傷人

即易神方也

千金方箭頭不出
聖萬

神應丹端午前一日不語

尋見莨菪科根本枝葉

自東南起圍了以木樺子掘取根下周迴土次日

日未出時依前不語用鑊頭取出洗淨勿令雞犬

婦人見于淨室中以石臼搗如泥丸彈子大黃丹

爲衣以紙袋封懸高處陰乾遇有箭頭不出者先

以象牙末貼瘡口後用緋帛袋盛此藥放臍中

綿兜肚繫了當便出也

張子和儒門事親方

雲實

本經上品

釋名貞實

別錄雲英

吳普

馬豆

圖

羊石子

圖苗

名草雲母

唐本

臭草

圖經

櫟刺

綱目

時珍曰

貞亦音雲

羊石當作羊矢
其子肖之故也

集解

別錄曰雲實生河間川谷十月采暴乾
曹曰莖高四五尺大葉中空葉如麻兩兩相值六

月花八月九月實十月采宏景曰處處有之子細
如蕓蔞子而小黑其實亦類蕓若燒之致鬼未見

其法術恭曰雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆
故名天豆叢生澤旁高五六尺葉如細槐亦如苜

蓿枝閒微刺俗謂苗爲草雲母陶云似蕓蔞者非
也保昇曰所在平澤有之葉似細槐花黃白色其

莢如豆其實青黃色大若麻子五月六月采實頌
曰葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石

子草實名馬豆三月四月采苗十月采實過時卽
枯落也時珍曰此草山原甚多俗名櫛刺赤莖中

空有刺高者如蕓其葉如槐三月開黃花纍然滿
枝莢長三寸許狀如肥阜莢內有子五六粒正如

鵲豆兩頭微尖有黃黑斑紋厚殼白仁咬之極堅重有腥氣

實脩治

數曰凡采得粗搗相對拌漣
顆樣實蒸一日揀出暴乾

氣味辛溫無毒

別錄曰苦曹曰神農辛小溫黃帝鹹雷公苦

主治泄痢

腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱

本經消渴

別錄治瘧多用

蘇頌

主下驟腹血

時珍

附方

新

驟下不止

雲實女萎各一兩桂半兩川烏頭二兩爲末蜜丸梧子大每服

五丸水下日三服

肘後方

花

主治

見鬼精多食令人狂走久服輕身通神明

本經

殺精物下水燒之致鬼

錄

發明

時珍曰雲實花既能令人見鬼發狂豈有久服輕身之理此古書之訛也

根主治骨哽及咽喉痛研汁嚥之時珍

朶麻

朶音卑。唐本草。

釋名

頌曰葉似大麻子形宛如牛蜱故名時珍曰
朶亦作蠅蠅牛虱也其子有麻點故名朶麻

集解

恭曰此人間所種者葉似大麻葉而甚大結
子如牛蜱今胡中來者莖赤高丈餘子大如

阜莢

核用之亦良保昇曰今在處有之夏生苗葉
似葎草而大厚莖赤有節如甘蔗高丈餘秋生細

花隨便結實殼上有刺狀類巴豆青黃斑褐夏采

莖葉秋采實冬采根日乾用

時珍曰其莖有赤有時珍曰其莖有赤有
白中空其葉大如瓠葉每葉凡五尖夏秋閒極裏

抽出花穗纍纍黃色每枝結實數十顆上刺攢

簇如蝟毛而軟凡三四子合成一顆枯時劈開狀
如巴豆殼內有子大如豆殼有斑點狀如牛蜱再

去斑殼中有仁嬌白如續隨子仁有油可

印色及油紙子無刺者良子有刺者毒可

子脩治

數日凡使勿用黑天赤利子緣在地蔓上是顆兩頭尖有毒其朢麻子節節有黃黑斑

朢麻油法用朢麻仁五升搗爛以水一斗煮之有沫撇起待沫盡乃止去水以沫煎至點燈不祚滴水不散爲度

氣味甘辛平有小毒

時珍曰凡服朢麻者一生不得食炒豆犯之必脹死其油

能伏丹砂粉霜

主治

水癥以水研二十枚服之吐惡沫加

至三十枚三日一服癥則止又主風虛寒熱身體

瘡癩浮腫尸疰惡氣榨取油塗之

唐本研傅瘡癩濟

癩塗手足心催生

大明

治癩癩取子炒熟去皮每晚

時嚼服二三枚漸加至十數枚有效

宗奭主偏風不

遂口眼喎斜失音口噤頭風耳聾舌脹喉癰瘍
腳氣毒腫丹瘤湯火傷鍼刺入肉女人胎衣不下
子腸挺出開通關竅經絡能止諸痛消腫追膿拔

毒時

發明

震亨曰：蕷麻屬陰，其性善收，能追膿取毒，亦

外科要藥，能出有形之滯物，故取胎產胞衣，
剩骨膿血者用之。時珍曰：蕷麻仁甘辛有毒，熱氣
味，頗近巴豆，亦能利人，故下水氣，其性善走，能開
通諸竅，經絡故能治偏風失音，口噤，口目喎斜，頭
風，七竅諸病，不止于出有形之物而已。蓋鵝鴨油
能引藥氣入內，蕷麻油能拔病氣出外，故諸膏多
用之一。人病偏風，手足不舉，時珍用此油同羊脂
麝香，鯀甲等藥煎作摩膏，日摩數次，一月餘漸
復，兼服搜風化痰養血之劑，三月而愈。一人病手

臂一塊腫痛亦用朶麻搗膏貼之一夜而愈一人病氣鬱偏頭痛用此同乳香食鹽搗橘太陽穴一人夜痛止一婦產後子腸不收搗仁貼其丹田一夜而上此藥外用累奏奇効但內服不可輕率爾或言搗膏以筋點于鷺馬六畜舌根下卽不能食或點肛內卽下血死其毒可知矣

附方

舊九新

半身不遂

失音不語

取朶麻子油一升酒一斗銅鍋盛油著酒

中一日煮之令熟細

細服之外臺秘要

口目喝斜貼右右貼左卽正也

朶麻子仁研作餅右喝安

在左手心左喝安在右手心卻以銅盃盛熱水坐

藥上冷卽換五六十次卽正也

一方用朶麻子

○婦人良方用朶麻子仁七七粒研作餅右喝安

在左手心左喝安在右手心卻以銅盃盛熱水坐

藥上冷卽換五六十次卽正也

一方用朶麻子仁七七粒研作餅右喝安

巴豆十九粒麝香五分

分作餅如上用風

氣頭痛

不可忍者乳香朶麻仁等分搗餅隨左右

貼太陽穴解髮出氣甚驗

○德生堂方用

朶麻油紙薑花貼太陽亦效

○又方朶麻仁半兩

朶麻油十五枚搗塗紙上捲筒插入鼻中下清涕卽

本草綱目草部卷二十三朶麻

卷二十三朶麻

卷二十三朶麻

卷二十三朶麻

卷二十三朶麻

仁四十粒去殼研油塗紙上作撚燒烟熏之未退
再熏以愈爲度有人舌腫出口外一村人用此法
而愈

經

急喉痺塞

牙關緊急不通用此卽破以
驗良方

麻子仁研爛紙卷作筒燒

烟熏吸卽通或只取油

咽中瘡腫

杜任方用蕷麻子仁一枚朴消

一錢同研新汲水服之連進二三服效○三因方

用蕷麻仁荆芥穗等分爲末蜜丸綿包噙嚥之

千金水氣脹滿

蕷麻子仁研水解得三合清旦一頓服盡日中當下青黃水也或云壯人

止可服五粒

外臺秘要腳氣作痛

蘇合香丸貼足心痛卽止

也

小便不通

蕷麻仁三粒研細入紙撚內

臺秘要外插入莖中卽通

摘元方

喘咳嗽

蕷麻子去殼炒熟揀甜者食之須多服

催

生下胞

崔元亮海上集驗方取蕷麻子七粒去殼研膏塗腳心若胎及衣下便速洗去不爾

則子腸出卽以此膏塗頂則腸自入也。肘後方云產難取
航麻子十四枚每手各把七枚須臾立

下也

子宮脫下

航麻子仁枯礬等分爲末安紙上托入仍以航麻子仁十四枚研膏塗頂

心卽入盤腸生產

○同上塗頂方

催生下胎

不拘生胎死胎航麻二個

巴豆二個麝香一分研貼臍中并足心

又下生胎一月一粒溫酒吞下

集簡方

腫痛不可忍

航麻子仁搗肘後方

癘風鼻瘻

手指攀曲節間痛不可忍

漸至斷落用航麻子一兩去皮黃連一兩剉豆大

以小瓶子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後

取航麻子一枚劈破面東以浸藥水吞之漸加至

四五枚微利不妨瓶中水盡更添兩月後喫大蒜

四五枚微利不妨瓶中水盡更添兩月後喫大蒜

豬肉試之如不發是效也若發動

再服直候不發乃止

杜任方

小兒丹瘤

航麻子五

個去皮研入麵一匙水

調真秘旨

瘰癧結核

航麻子炒去皮每睡時服

二三枚取效一生不可瘳癰惡瘡及軟癰用白膠
喫炒豆 阮氏經驗方

瘡癰惡瘡

香一兩瓦器溶

化去滓以荳麻子六十四個去殼研膏溶膠投之攬勻入油半匙頭至點水中試軟硬添減膠油得

所以緋帛量瘡大小攤貼一膏可治三五瘡也 儒門事親

肺風面瘡

或微有瓦

赤瘡用荳麻子仁四十九粒白果膠棗各三粒瓦松三錢肥阜一個搗爲丸洗面用之良 吳旻扶

壽面上雀斑 荳麻子仁蜜陀僧硫黃各一錢爲末

耳卒聾閉

摘元方

髮黃不黑 荳麻子仁香油煎焦去滓三日後頻刷之 摘元方

耳卒聾閉

摘元方

子一百個去殼與大棗十五枚搗爛入乳小兒汁和丸作錠每以綿裹一枚塞之覺耳中熱爲度

一日一易二十千金方

湯火灼傷

膏湯傷以油調火灼以

水調塗之 古今錄驗

鍼刺入肉

荳麻子去殼一個先以帛

出卽拔去恐藥緊弩出好肉或加竹木骨哽

朮麻子仁

白梅肉

同研

尤好

衛生

易簡方

竹木骨哽

朮麻

一兩凝水石

二兩研匀

每以一捻置舌根噙嚥自

然不見○又方

朮麻油紅麪等分研細沙糖丸

阜子仁

研細沙糖丸

大綿裹含

子大

痰出

大良

研丸彈子大井花水化下

研丸彈子大井花水化下

半丸卽下

惡犬咬傷

朮麻子五十粒去殼以井花研膏

研丸彈子大井花水化下

研丸彈子大井花水化下

研丸彈子大井花水化下

袖珍方

葉氣味有毒

主治

腳氣風腫不仁蒸搗裹之日二

三易卽消又油塗炙熨顛上止鼻衄

大驗

蘇治

痰喘欬嗽

時珍

附方

新勦喘痰嗽

儒門事親方用九尖朮麻葉三

錢入飛過白礬二錢以豬肉四

錢入飛過白礬二錢以豬肉四

錢入飛過白礬二錢以豬肉四

錢入飛過白礬二錢以豬肉四

錢入飛過白礬二錢以豬肉四

兩薄批摻藥在內荷葉裏之文武火煨熟細嚼以
白湯送下名九仙散。曹濟方治欬嗽涎喘不問
年深日近用經霜朶麻葉經霜桑葉御米殼蜜炒
各一兩爲末蜜丸彈子大每服一丸白湯化下日

一服名無憂丸

附錄博落迴

拾遺藏器曰有大毒主惡瘡瘻根瘤
贅癰肉白癩風蠱毒精魅溪毒瘡瘻

和百丈青雞桑灰等分爲末傳之蠱毒精魅當別
有法生江南山谷莖葉如朶麻莖中空吹之作聲
如博落迴折之有黃汁藥人立死不可輕用入口

常山

本經下品

蜀漆

同

釋名恆山

吳普本經

雞屎草

日華鴨屎草

時珍曰恆亦常

也恒山乃北岳名在今定州常山乃郡名亦今真
定豈此藥始產于此得名歟蜀漆乃常山苗功用

本草綱目草部卷十七附博落迴常山

卷十七附博落迴常山

相同今
併爲一

集解

別錄曰

常山生益州

川谷及漢中二月八月

乾爻曰蜀漆

生江林山川谷及蜀漢

中常山苗也五月采葉陰乾

宏景曰常山出宜都

建平細實黃者呼爲雞骨常山用之最勝蜀漆是

常山苗而所出又異者江林山卽益州江陽山名

故是同處爾彼人采得繁結作丸得時燥者佳

暴似茗而狹長兩兩相當二月生白花青萼五月結

實青圓三子爲房其草暴燥色青白堪用若陰乾

便黑爛鬱壞矣保昇曰今出金州房州梁州中江

縣樹高三四尺根似荆根黃色而破五六月采葉

名蜀漆也李舍光曰蜀漆是常山莖八月九月采

之頌曰今汴西淮浙湖南州郡亦有之並如上說

而海州出者葉似楸葉八月有花紅白色子碧色

似山棟子而小今天台山出一種草名土常山苗

葉極甘人用爲飲甘味如蜜又名蜜香草性涼益

人非此常山也

脩治

數曰采時連根苗收如用莖葉臨時去根以甘草細剉同水拌溼蒸之臨時去甘草取蜀漆細剉又拌甘草水勻再蒸日乾用其常山凡用以酒浸一宿漉出日乾熬搗用時珍曰近時有酒浸蒸熟或瓦炒熟者亦不甚吐人又有醋制者吐人

常山

氣味苦寒有毒別錄曰辛微寒普曰神農岐

寒權曰苦有小毒炳曰得甘草吐瘧之才伯苦桐君辛有毒李當之大

曰畏玉札大明曰忌葱菜及菘菜伏砒石

主治傷寒

寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆

經本療鬼蠱

往來水脹酒惡寒鼠瘻

別

治諸瘧吐痰涎治項

下瘤癰

甄權

蜀漆氣味

辛平有毒

別錄曰微溫權曰苦有小毒元素曰辛純陽炳曰桔梗爲

之使之才曰栝樓爲之使惡貫眾

主治瘧

及欬逆寒熱腹中癥堅

痞積聚邪氣蠱毒鬼疰

本經

療胸中邪結氣吐去之

別錄治鬼疰多時溫瘧寒熱下肥氣

甄權

破血洗去腥

與苦酸同用導膽邪

元素

發明

敷曰蜀漆春夏用莖葉秋冬用根老人久病切忌服之頌曰常山蜀漆爲治瘧之最要不可多進令人吐逆震亨曰常山性暴悍善驅逐能

傷真氣病人稍近虛怯不可用也外臺乃用三兩作一服殊昧雷公老人久病切忌之戒時珍曰常山蜀漆有劫痰截瘧之功須在發散表邪及提出

陽分之後用之得宜神效立見用失其法真氣必傷夫瘧有六經瘧五臟瘧痰溼食積瘧疫鬼邪諸

則瘧上須分陰陽虛實不可一槩論也常山蜀漆
入吐也得甘草則吐酒蒸炒熟用則氣稍緩少用
作龍骨附子小麥草則吐得大黃則利得烏梅
停方常山瀦云瘧骨二物之功入腎得草果逐心
性欲云北之助下常山證之則常心常山治瘧人
吐去嶺南黃投必常容下或結澼在驅草得檳榔
二舊人惟以毛氣佐常山能不破其澼在腸間薄
十三新截瘧諸湯冷氣感行點其而上焦乃之
水外服根邪然滴有下焦生瘧家多蓄已入脾
三臺之本氣後而純其則生瘧水常寒熱多蓄楊
升秘卽非多獲下熱水常寒熱多蓄已入脾黃
浸要不常在愈似發但須能泄瘧法當痰涎士蓋
一用吐山營也泄瘧無人鯪亦不生
宿常且不衛又不或行吐當痰涎黃瀛無人鯪亦
煎山驗可皮待泄蘊血之吐痰黃瀛無人鯪亦不
取三也但肉制者熱藥水直痰肺甲不致用
一兩之李須內品在逐水直痰肺甲不致用
升漿閒燉用實佐腸水或指不得則用

廣○平肘半曬奇盡百欲
粒發前○養水六頓服
生能母熟服用經甚一分治梅再
神不烏傳水二方俠一方半知不
如永分正學五學再止發
截瘡諸丸

一久蓋水驗心少常五貝盡主論
一個瘡煎一恒頃山更母述切主
酒不減蓋山醑再一熟草果勿隱
一止半半一醑服兩服果勿加者
者千蓋常曰煎錢湯臨酒渣各減
兩金浸山醑減二分治發一以酒
劑方一一未半分又升酒錢浸半
瘡恆宿錢發曰大黃瘡或二三日
一山五半時醇黃瘡或二支加三
月丸更檳溫發二支加甘草分
以治飲榔服日錢太甘草分
來數之一○五半醫草煮作三服
者年一錢虞云煮服之服
一不服丁搏溫服草桂之服
剉瘡便香醫草桂之服

截瘡諸酒

更後服百下丹砂丸恆山搗末三兩真丹一兩研白蜜和
煖丸治大小久瘡恆山二兩黃丹半兩烏梅連核瓦丹時杵
以丸肘涼酒下隔一夜一服平旦一服午後方食○葛洪丸
兩又每兩炒梧子大用恆山三兩知母一兩甘草半兩搗末
爲半骨法兩臥炒梧子爲度○先發時服十丸次服七丸後服五
酒勝時存爲度○和劑局方瞻仰丸治一切瘡常山六
浸蒸丸治冷酒服五二十兩炒存性爲末薄糊丸梧子山
爲恒山○集簡方檳榔二聖丸治胸膈停痰爲末薄糊丸梧子山
衣爲末糯米粉糊丸治一切瘡常山六
每服三十五丸如豆大黃丹服研末糊丸梧子羊熱物子山
上法研鯀鯉甲煨焦大大如山八○大四丸蜜洪丸瓦丹時杵
爲大黃丹砂丸恆山搗末三兩真丹一兩研白蜜和
本草綱目草部 卷十七 常山 皇

如死狀或少腹滿小便如膿不問久近不吐不泄
一盞煎半盞五更冷服

趙眞人濟急方

太陰肺瘡

痰聚胸中病至令

少陰腎瘡

淒淒然寒手足寒腰脊痛大便難目

錢竹葉一錢半煎一升發前分三服 千金方 牡瘡獨寒者蜀藥二錢牡蠣粉二錢水煎至一鍾未發前溫服得吐則止

牡瘡獨熱

不冷者蜀漆一錢去沫入黃錢

漆散用蜀漆雲母煅三日夜龍骨各二錢爲末每溫瘡熱多藥二錢景金匱要略○
半煎一升發前分三服 千金方 牡瘡獨寒者蜀藥二錢牡蠣粉二錢水煎至一鍾未發前溫服得吐則止

溫瘡熱多

要臺秘

淡竹葉二錢性論三

十年瘡

黃肘

後方治三十年老瘡及積年久瘡常山連各一兩酒三升漬一宿以瓦釜煮取

升半發日早服五合發時再服熱當吐冷當利

一無

不瘥者○張文仲備急方用恆山一兩半龍骨

五錢附子炮二錢牛大黃一兩爲末雞子黃和丸

梧子大末

發時五丸將發時五丸白湯下支太醫驗

云此方神驗

一無

不瘥者○

張文仲備急方用恆山一兩半龍骨

梧子大末

發時五丸將發時五丸白湯下支太醫驗

云此方神驗

瘡瘍寒熱

劉長春

經驗方

常山

草果一枚

熱酒一盞

浸一寸

後方

用常山

黃連

連服驗

一寸

後方

用常山

夜無不

斷者○

談楚翁試驗

一寸

後方

用常山

黃連

連服驗

一寸

後方

用常山

黃連

連服驗

一寸

後方

用常山

黃連

連服驗

一寸

後方

用常山

方之乃彭司寇所傳○葛稚川

後方

用常山

黃連

連服驗

一寸

後方

用常山

黃連

連服驗

一寸

後方

用常山

黃連

連服驗

一寸

後方

用常山

黃連

連服驗

香鼓各一兩

附子炮七錢

搗末蜜丸

梧子大空腹

連服驗

一寸

後方

用常山

黃連

連服驗

一寸

後方

用常山

黃連

連服驗

一寸

後方

用常山

黃連

連服驗

平草飲服四丸

至午後欲發時

姚僧坦集驗方

一盞酒一盞浸一夜

百日兒瘡水

鑑仙人歌曰

金生人

金生在巳卽釘

形狀是邪風寒

熱攻直須術治免

成空常山刻作人

金生在巳卽釘

平草飲服四丸

至午後欲發時

姚僧坦集驗方

一盞酒一盞浸一夜

百日兒瘡水

鑑仙人歌曰

金生人

金生在巳卽釘

已上

木生人

釤亥

上火生人

釤申

土生人

釤子

也

小兒驚忤

暴驚卒死

中惡用蜀

蜀

釤

炒

二錢

左顧牡蠣

一錢

二分漿水

阮氏

胸中痰飲

恒

煎漆

炒

二錢

左顧牡蠣

一錢

二分漿水

阮氏

胸中痰飲

山

釤

炒

二錢

左顧牡蠣

一錢

二分漿水

阮氏

胸中痰飲

恒

附錄

杜莖山

圖經

頌曰

葉味苦寒

主溫瘴寒熱作

絞汁

服吐出惡涎

甚定煩渴頭痛心躁

杵爛新酒浸

止不定煩渴頭痛心躁

杵爛新酒浸

止不定煩渴頭痛心躁

杵爛新酒浸

止不定煩渴頭痛心躁

杵爛新酒浸

止不定煩渴頭痛心躁

杵爛新酒浸

紅山

頌曰

葉甘微寒

主實如枸杞子

宜用莖高四五尺

葉大而白

主骨節疼痛勞熱瘡瘍

藤米水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

而

小

無毛

秋生白花如粟粒

不實者作細

根如葛頭土人取根

亦治勞瘡甚效時珍

又杜莖山之類故並山同附之紅山

山一宿以清水再浸一宿

白根炒黃爲末每服一

片同煎服亦治勞瘡甚效時珍

黎蘆

本經下品

釋名山葱

別錄

葱苒

同上

葱葵

音毬

葱葵

普豐蘆

豐蘆

普

葱

綱目鹿葱

時珍曰

黑色曰黎

其蘆有黑皮裹之故名

根際似葱俗

名葱管

黎蘆是矣

北人謂之

葱南人謂之鹿葱

集解

別錄曰

黎蘆生太山山谷

三月采根陰乾

普

下極似葱而多毛用之止剔取根微炙之保昇曰

所在山谷皆有葉似鬱金秦艽襄荷等根若龍膽

莖下多毛夏生冬凋八月采根

頤曰

今陝西山南

東西州郡皆有之遼州均州解州者尤佳

三月生苗葉似初出櫻心又似車前莖似葱白青紫色高

五六寸上有黑皮裹莖似櫻皮有花肉紅色根似

馬腸根長四五寸許黃白色二月三月采根陰乾

此有二種一種水黎蘆莖葉大同只是生在近水

溪澗石上根鬚百餘莖不中藥用今用者名葱白
藜蘆根鬚甚少只是三二十莖生高山者爲佳均
州土俗亦呼爲鹿葱范子計然云出河東黃白者善

根脩治

雷曰凡采得去頭用糯米泔

氣味辛寒有毒

別錄曰苦微寒曹曰神農雷公辛

毒扁鵲苦有毒之才曰黃連爲之使反細辛芍藥人參沙參紫參丹參苦參惡大黃時珍曰畏葱白

服之吐不止飲葱湯卽止

主治

蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍疥癬惡瘡殺諸蟲去死肌

本經

療噦逆喉痺不通鼻中瘻肉馬刀爛瘡不入湯用

瘡不入湯用

別錄

主上氣去積年膿血泄痢權吐上

膈風涎暗風癇病小兒鰕鯱痰疾

頌

末治馬疥癬

夷宗

發明

頌曰

黎蘆服錢七一字則惡吐人又用通項

嘔逆

令人

噫而別本云治嘔逆甚效未詳時珍曰

一常山吐瘧痰瓜丁吐熱痰烏附尖

子

氣痰藜蘆則吐風痰者也按張子和儒門事

親云一婦病風癇自六七年得驚風後每二年事

一作至五

七年五七作三十年至四十歲則日作三十歲

或甚至一日十年餘作三

一作至五

七年五七作三十年至四十歲則日作三十歲

大饑采百草食於野中見草若葱狀采歸蒸熟飽

食至五更忽覺心中不安吐涎如膠連日不止

一二斗汗出如洗甚昏困三日後遂輕健病去食約飽歲

進百脈皆和以所食葱訪人乃葱苗也卽本草食

朝荆和王妃劉氏年七十病中風病此亦偶得吐

法耳人事牙關

藜蘆是矣圖經言能吐風病此亦偶得吐

法耳人事牙關

緊閉群醫束手先考太醫吏目月池翁診視藥不能入自午至子不獲已打去一齒濃煎藜蘆湯灌之少頃噫氣一聲遂吐痰而甦調理而安藥弗瞑眩厥疾弗瘳誠然

附方

舊十
六新

諸風痰飲

黎蘆十分鬱金一分爲末每以一字溫漿水一盞和

服探吐

經驗方

中風不省

牙關緊急者黎蘆一兩去苗頭濃煎防風湯浴過焙乾切

炒微褐色爲末每服半錢小兒減半溫水調

灌以吐風涎爲效未吐再服

簡要濟眾

中風

不語

喉中如曳鋸口中涎沫取藜蘆一分天南星

一個去浮皮于臍上剜一坑納入陳醋二橡

斗四面火逼黃色研爲末生麵丸小豆

服三丸溫酒下

經驗方

諸風頭痛

王日乾研末入麝香少許吹鼻○又

取藜蘆半兩黃連三分噙鼻

聖惠久瘡

和

水調下探吐

保命集痰瘡積瘻

黎蘆

阜莢

炙各一兩巴豆二十五枚熬黃研末蜜丸小豆大每空心服一丸未發時一丸臨發時又服一丸勿大

用飲食
肘後
結聚
如駭駭不去者

黎蘆炙研一兩

蜜七小

吐中炮爲末水服

效半

胸中

丸

勿大

黃疸腫疾

黎蘆灰

中炮爲末水服

效搗如泥

錢匕

小吐不過數服

效搗如泥

半

胸中

丸○身面黑瘡

黎蘆灰

重湯煮成黑膏

以鍼微刺破點之

大碗淋汁銅器

每吞一二

分爲末蜜之

大每吞一二

分爲末蜜之

不過三次

聖惠

鼻中瘻肉

黎蘆三分

雄黃一分

以鍼微刺破點之

大碗淋汁銅器

每吞一二

分爲末蜜之

雨畔○牙齒蟲痛

黎蘆末

內入孔中勿

白秃蟲瘡

千金翼

外入孔中勿

白秃蟲瘡

千金翼

外入孔中勿

聖濟方

牙齒蟲痛

黎蘆末

內入孔中勿

白秃蟲瘡

千金翼

外入孔中勿

白秃蟲瘡

千金翼

黎蘆末

內入孔中勿

白秃蟲瘡

千金翼

外入孔中勿

白秃蟲瘡

千金翼

外入孔中勿

白秃蟲瘡

黎蘆末

內入孔中勿

白秃蟲瘡

千金翼

外入孔中勿

白秃蟲瘡

千金翼

外入孔中勿

白秃蟲瘡

脂和傅日

黎蘆末

生

羊疽瘡癰

黎蘆末

生

羊疽瘡癰

黎蘆末

生

三 分附子八分爲末傅之
蟲自出也

陶隱居方

誤吞水蛭

藜蘆炒爲末
水服一錢必

吐出德生堂方

附錄山慈石

別錄有名未用曰苦平無毒主女子
帶下生山之陽正月生葉如藜蘆莖

有衣名爰茈

又曰苦有毒主鼠瘻生百餘根根
有衣裏莖三月三日采根一名百

連一名烏蓼

一名馬腸根宋圖經頑曰苦辛寒有
毒主蠭除風葉療瘡疥

鼠莖一名鹿蒲

生秦州葉似桑三月采葉五月六月采根

木藜蘆

拾遺

釋名黃藜蘆

綱目鹿驪

集解

藏器曰陶宏景注漏蘆云一名鹿驪山南人
用苗北人用根按鹿驪乃木藜蘆非漏蘆也

乃樹生如茱萸樹高二尺有毒時珍曰鹿驪俚人呼爲黃藜蘆小樹也葉如櫻桃葉狹而長多皺文四月開細黃花五月結小長子如小豆大

氣味苦辛溫有毒主治疥癬殺蟲

藏器

附子

本經下品

釋名其母名曰烏頭

時珍曰初種爲烏頭象烏之頭也附烏頭而生者爲附子

如子附母也烏頭如芋魁附子如芋子蓋一物也別有草烏頭白附子故俗呼此爲黑附子用烏頭以別之諸家不分烏頭有川草兩種皆混雜註解今悉正之

集解

別錄曰附子生犍爲山谷及廣漢冬月采爲附子春月采爲烏頭宏景曰烏頭與附子同

根附子八月采八角者良烏頭四月采春時莖初生有腦頭如鳥鳥之頭故謂之烏頭有兩岐其蒂

五天曰木一如喙爾雄附子者月天朗是細狀物雄體正個烏皮敷一子大全采雄陵同而如根者皮鐵上曰裔側而短堪餘子生而乃角出旁爲是蒼天蒼鳥子子小有用處烏三本至者而如烏喙色雄頭母小有大雖有並當附異芋頭附側身有少之於角處經三名名散兩烏子全尖有類烏平明有以各子寸喙高者者側是無大苗力連而天得蜀道所犍子汁煎二爲爲中附尖者身乃聚實雄者爲弱州也天附尺附烏毗子周孕長有生烏大力綿宜爲射許子喙患旁匝八而殊者喙而長都龍今雄子似連長不小面個黑卽爲天少不州則出邊罔石生三入顆有周少宿虎雄角相者無少角天龍者四藥如附圖有根掌烏刺似佳別室之雄芮爲寸用棗子底旁與並頭而江俱矣烏大似及側者保核孕陷尖嫩是次實南以恭頭者附艾子爲昇者十黑烏者天于附來八日出並予

本草圖目草部卷之二附子
爾種喙異物本明頭角乃細三然于爾宗
爲之爾種喙異物本明頭角乃細三然于爾宗
烏母繁之三而志草縣其爲有小四後龍頌
頭今盛便年廣言不多餘側四如尺布州曰
人乎有爲志附同種大子物桑莖種冬五
則謂時此附云子謹之小附以椹作逐至者
生之珍五子奚烏按惟者子長狀四月前今皆
子川曰物四毒頭本赤皆之二黑棱耘先並一
已烏鳥豈年附天草水爲絕三色葉籽將出物
成頭今爲子雄冬一附小寸本如至陸蜀但
故是有人烏也一采鄉子者者只艾次田土依
日也兩種頭一物爲者以亦爲種其年耕都大
冬春種蒔五歲也附最八名天附花八五是小
采末出之年爲春子佳角側雄子紫月七一長
爲生彰法爲側秋春然者子割一碧後遍種短
附子明用天子冬采收爲元削物色方以所以
予故者力雄二夏爲采上種附至作成豬產象
其日卽倍今年采烏時綿者子成穗其糞其而
天春附至一爲之頭月州爲旁熟其苗糞種名
雄采子故年烏各博與彰烏尖後實高之出之

子者子烏其謂類處耕明八之不頭汁本獨烏
附爲附頭品之地十作會惟可近註煎經頭喙
母側而而几早麻一龍昌彰不理射爲所者側
而子長旁七水而月取四明辯宋罔射列卽子
附附者生本拳厚播種鄉出而人之罔烏無皆
子而爲者同縮其種於產附明楊烏陶頭此是
以散天爲而而花春龍附子矣天頭宏今數生
貴生雄附末小紫月安子彰其惠遂景人物乎
故者附子異蓋瓣生龍而明說著致不謂也多者
專爲而又其未黃苗州赤領云附諸知之草產因
附漏尖左初長麌其齊水鄉綿子家烏江象命
名籃者右種成長莖歸爲二州記疑頭烏左山名
也子爲附之也苞類木多十乃甚貳有頭左山名
凡皆天而小九而野門每惟故廣今雷以是南若
種脈錐偶者月圓艾青歲以水漢撮敦附也等生子
一絡附生爲采七而水漢撮敦附也等生子
而連而者烏者月澤小上廉地其之子故處子
子貫上爲頭乃采其坪田水領要說之曰者少
六如出爾附佳者葉諸熟昌縣讀尤烏其乃及

漏側爲矣本有特七
子籃子下附草節生以
卽卽則天子言多則上
烏雷園雄之附鼠大附
喙數人烏頭色以八角
也所以乞天花者之形不
謂木役錐而以子蹲三則
錐卽夫皆爲正節角形
天子不以爲正蹲坐而傷
雄大足數上其角爲缺風
明所盈實鐵色者爲側角
謂虎掌者次予之說甚謬
者也記所載籃者爲下子

脩治

脩治保昇曰附子烏頭天雄側子烏喙采得以生
使乾又法以米粥及糟麴等淹之並不前法頌
曰五物收時一處造釀其法先於六月內造大
小熟湯浸半日勿令滅氣出以白灰裏之數易
去糟麴未采前半月用大麥煮成粥以麴造醋候
鬚於新甕內淹七日酸則以水解之將附子去根
令生白衣乃向慢風日中曬之百十日以透乾爲
之

日陰屋中重拆制用烏者閩人有安之根此度
夜制下炮一擘其頭其浙云如密者不物若
滌者平令兩破毒俗天上人但拳室故充最猛
出生地皴者用故方雄品宜得者中園或多日
日上去上拆卽若也每皆則之然兩定覆常釀而常熟或
中皮掘以是用敷用熱皆貴人上不月於神或不附
曝一刀氣附曰附灰微人上者盈乃發目已種肉時
用底土刮全子凡子須炮得之市皆握故及眼藥而珍
亨薄切震安上用底烏甘令拆矣其良蜀人一乾妖攀苗不
曰以東宿井火八文參過宏者閩餌者兩方其有茂或附
烏流水取去只角火薑惟曰浙者出釀法神或
天并焙火柳鐵中相薑凡纔少極難用物苗子
雄豆乾擘木色炮配附用得惟其醋陰秀記
須用浸用破灰一令者湯附其秦得用而云
童五若於火個皴正生子中陝土大醋爲而云

子小便浸透煮過以殺其毒并助下行之力入鹽少許尤好或以小便浸二七日揀去壞者以竹刀每個切作四片井水淘淨逐日換水再浸七日曬乾用時珍曰附子生用則發散熟用則峻補生用者須如陰制之法去皮臍入藥熟用者以水浸過炮令發拆去皮臍乘熱切片再炒令內外俱黃去火毒入藥又法每一個用甘草二錢鹽水薑汁童尿各半盞同煮熟出火毒一夜用之則毒去也氣味辛溫有大毒別錄曰甘大熱曹氏曰神農辛岐伯雷公甘有毒李當之苦大溫岐伯曰甘有大毒元素曰大辛大熱氣厚味薄可升可降陽中之陰浮中沉無所不至爲諸經引用之藥好古曰入手少陽三焦命門之劑其性走而不守非若仲景麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯是也有緩得桂則補命門李燉曰附子無乾薑不熱得甘草則能發散性逆附配乾薑補中有發仲景乾薑附子甘草湯通脈四逆湯是也附子得生薑則能發散性逆

以熱攻熱又導虛熱下行以除冷病之才曰地膽爲之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草人參黃耆時珍曰畏綠豆烏韭童叟犀角忌豉汁稷米得蜀椒食鹽下達命門主治風寒欬逆邪氣

寒溼踐躉拘攣膝痛不能行步破癥堅積聚血瘕

金瘡

本經

腰脊風寒腳氣冷冷弱心腹冷痛霍亂轉

筋下痢赤白溫中強陰堅肌骨又墮胎爲百藥長

別錄溫暖脾胃除脾溼腎寒補下焦之陽虛

元素除臟

腑沉寒三陽厥逆溼淫腹痛胃寒蛇動治經閉補

虛散壅

李果

督脈爲病脊強而厥

好古

治三陰傷寒陰

毒寒疝中寒中風痰厥氣厥柔痓癲癇小兒慢驚

風溼麻痺腫滿腳氣頭風腎厥頭痛暴瀉脫陽久
廁脾泄寒瘡瘻氣久病嘔噦反胃噎膈癰疽不斂
久漏冷瘡合葱涕塞耳治聾時珍

烏頭

卽附子母

主治

諸風風痹血痹半身不遂除寒冷

溫養臟腑去心下堅痞感寒腹痛

元素除寒溼行經

散風邪破諸積冷毒

李杲

補命門不足肝風虛

好古助

陽退陰功同附子而稍緩

時珍

發明

宗奭曰

大略如此其烏頭

鴟喙附子

風家卽多用天雄

之時

珍曰

按王氏究原方云附子則量其材而用

寒川烏頭性輕疎溫脾法風若是寒疾卽用附子

平

平

平

平

須用證須必傷愈按盛烏治妙便拒上附及風急之傷用用寒此之格頭喉也發格浮藥烏疾用已寒之之傳則則陽危痹昔而而治並附卽人遲往有或變神散傷子用張病不之宜若用參矣往退厥三聖用寒並熱灸景隨熱寒藥則者氣頭脈夾似回腹及妙附赤因寒子含之嚥汁內結用蜜煎烏頭云凡人中風不可先用風藥一益傷敢之脈寒吳綏曰人参投半斤引飲脈來七八至但其寒用力沉夾起細陰雖附子乃陰證要藥凡原佐子直待陰之功囊而脈縮之得汗而以附子陽氣極陽近縮世者沉者急者溫經散寒必而陰急者

用捨而正烏乃佐之原以除氣附不其用行寒則氣尚能以衝之聖病愈矣。張元路曰：俗方治麻氣愈，麻及藥氣痺多也。

子稟二經雄，則氣暴何以救之？

滋養不足以壯陰，則氣失斬關，藥溼有便藥愈矣。劉完素曰：附子以白朮爲藥，引經又益火爲盡多也。

亨之風寒不足以追復質，則藥達失元，奪有節烏附是也。虞搏曰：附子以白朮爲藥，引補氣藥，逐在裏之冷，表以行附火爲盡多也。

天其健，後世宜少加熱，溫之真陰散失，則藥達失元，奪有節烏附是也。

地黃丸爲陰虛者設，附子以行參耆之冷，表以行附火爲盡多也。

人之禍皆氣虛走下，因以附子附藥，引補血藥，入血分以驅逐在裏之冷，表以行附火爲盡多也。

仲景丸爲偉性者，可以行補經用，焦散仲景附藥，引補血藥，入血分以驅逐在裏之冷，表以行附火爲盡多也。

古曰：烏附非身涼而子火之下地藥，誤矣。附子以行參耆之冷，表以行附火爲盡多也。

四肢不足及藥之滯，可致遠而不少肥人，濕表以行附火爲盡多也。

厥者設藥佐丸用，爲耆而爲肥人，濕表以行附火爲盡多也。

不藥殺無人，表爾多震，其害頭取嚮多震，表以行附火爲盡多也。

不可非陽多矣。王守陰人，濕表以行附火爲盡多也。

仲人多震，其害頭取嚮多震，表以行附火爲盡多也。

附子以補火必妨潤水。○時珍曰烏附毒藥非危病不用而補藥中少加引導其功甚捷有人纔服運氣不固耶荆府都昌王體瘦而冷無他病日以平附子煎湯飲兼嚼硫黃如此數歲蘄州衛張百戶黃金液丹一百粒乃能健啖否則倦弱不支壽至九十年他入服一粒卽爲害若此數人皆其臟腑稟賦之偏服之有益無害不可以常理槩論也又瑣碎錄言滑臺風土極寒民啖附子如啖芋栗此則地氣使然爾

附方

舊二十六

少陰傷寒

初得二三日脈微細但欲寐小便色白者

附子

新八十七

甘草湯

微發其汗麻黃去節二兩甘草炙二枝水七升先煮麻黃去沫納二升

兩附子

炮去皮

取三升

分作三服

張仲景傷寒論

取少陰發熱

少陰病始得反發熱脈沈微汗煮

味

微汗

取三升

分作三服

張仲景傷寒論

取少陰發熱

少陰病始得反發熱脈沈微汗煮

味

微汗

炮者麻黃附子細辛湯發其汗麻黃去節二兩附子

去皮一枚細辛二兩水一斗先煮麻黃去沫乃

分三服同煮三升

少陰下利

少陰病下利寒外熱手足厥逆脈

微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔

或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯用大附子

升一個去皮生破八片甘草炙二兩乾薑三兩水三

升分溫再服其脈卽出者愈面赤加葱九

桔梗一兩利止脈不出加生薑二兩

咽痛加芍藥甘草

惡寒傷寒已發汗不解反惡寒者虛也

芍藥甘草

附子湯補之芍藥三兩甘草炙三兩附子炮

甘草炙二兩

去皮一枚水五升煮取

傷寒發躁傷寒下後又發

一升五合分服同上

其汗晝日煩躁

不得眠夜不安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無

大熱者乾薑附子湯溫之乾薑一兩生附子一枚

去皮破作八片水三升煮

傷寒論陰盛格陽傷寒陰盛

陽其人必躁

熱而不飲水脈沉手足厥逆者是此證也。麝憲散用大附子一枚燒存性爲末。蜜水調服逼散寒氣。然後熱氣上行而汗出乃愈。

孫兆口訣

熱病吐下

及下利身冷脈微發躁不止者附子

炮一枝去皮臍分作八片入鹽一錢水

升煎半升溫服立效

經驗良方

陰毒傷寒

孫兆口訣云房後受寒少腹疼痛頭疼腰重手足厥逆脈息沉細或作呃逆並宜退陰散用川烏頭

乾薑等分切炒放冷爲散每服一錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫服得汗解。

本事方玉女散治陰切曬紙裏收之遇有患者取爲末一錢入鹽八分

水一盞煎八分服壓下陰毒如豬血相似再進一服。

濟生回陽散治陰毒傷寒面青四肢厥逆腹痛身冷一切冷氣大附子三枚炮裂去皮臍爲末

每服三錢薑汁半盞冷酒半盞調服良久臍下如火燒爲度。續傳信方治陰毒傷寒煩躁迷悶急者用半兩重附子一個生破作四片生薑一大塊

與汗作三片糯米一撮以水一升煎六合溫服緩臥或出或不出候心定則以水解散之類解之不得或

中風痰厥

昏不知人口眼喝斜並體虛之人口患瘧疾

半寒淬服屢用多效更煎
水二盞煎一兩生川烏頭生附子並去皮臍各一兩生木香二錢五分每服五錢生各一兩

中風氣厥

痰壅昏不知人六生附子去皮生木香半兩每服四錢薑

九皮蓋溫服水二盞煎一兩生川烏頭生附子並去皮臍各一兩生木香二錢五分每服五錢生各一兩

中風偏

脈沉伏生附子去皮生木香半兩每服四錢薑

廢羌活湯用生附子一個去皮臍各一兩生附子一盞煎七分服之濟生方

中風偏

藥各一兩生附子一盞煎七分服之濟生方

氏簡半身不遂遂令癱症用附子一兩以無灰延酒王一升浸二七日隔日飲一合

中風偏

藥各一兩生附子一盞煎七分服之濟生方

易方秘錄年年秘方風病癱緩手足顛曳口眼喝斜語音蹇澀步延酒王一升浸二七日隔日飲一合

中風偏

藥各一兩生附子一盞煎七分服之濟生方

頭去皮臍五靈脂各五兩爲末入龍腦麝香五分化研化丸先以生薑汁研化

中風偏

藥各一兩生附子一盞煎七分服之濟生方

滴水爲丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化

中風偏

藥各一兩生附子一盞煎七分服之濟生方

暖酒調服一日二服至五七丸便覺手風寒溼痹
擣麻木不得步十日可梳頭也梅師方
大煮粥一匙入末或手足不遂生川烏頭末每以香白米
病謂四末也脾主四肢風淫客肝則侵脾而四肢
人良驗此湯極有力予每授體虛有風如在空中生
附子生天南星各二錢生薑十片水一盞半慢火
煎服予會病此醫傳張子發授此方二服愈本
事方口眼喎斜生烏頭青礬各等分爲末每用一字
事散口卒噤瘡卒忤停尸並用附子末
中秘寶方篋入鼻內取涕吐涎立效無比名通
中風身如角弓反張口噤不語川烏頭五兩剉塊
攪以絹瀘取酒三升傾鍋內急

灌之未效加烏雞糞服一小盞取汗若口不開拗
灌以絹瀘取酒微溫服一合炒半黑以酒三升傾鍋內急

小度

品

諸風血風

烏荆丸治身麻痛下血不正者服之尤效有痛風頭偏言語蹇濶

攀痛自眩

腸風臟毒

下血不止者

服六七服卽瘥也

川烏頭炮去

皮膚瘻瘍及婦人血風

子大溫

酒或熟水

每服二

兩爲末

醋麪糊丸梧

和劑方

婦人血

風虛冷月候

不勻或手腳心煩熱

或頭面浮腫

或兩鐳內同熬

烏頭一斤清油

四兩鹽四兩爲末

搗勻蒸餅丸

如桑椹色爲度

去皮膚五靈脂

四兩爲末

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

令裂如桑椹

色爲度去皮膚

五靈脂四兩爲末

搗勻蒸餅丸

如桑椹色爲度

去皮膚五靈脂

四兩爲末

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

梧子大溫

酒或熟水

每服二十丸

亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

梧子大溫

酒或熟水

每服二十丸

亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

梧子大溫

酒或熟水

每服二十丸

亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

梧子大溫

酒或熟水

每服二十丸

亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

搗勻蒸餅丸

如梧子大空心

溫酒鹽湯下

二十丸亦

難貼

天柱骨內服

附

青丸

全幼心

調

小兒顫陷

本草綱目

卷之七

附子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

麻癩癰
爲末葱根搗和餅貼陷處全幼心鑑
痛打撲傷損肉痛不可忍生川烏不去皮五靈
脂膏四兩威靈仙五兩洗燙爲末酒糊丸梧子大
濟方每服七丸至十丸鹽湯下忌茶此藥常服其效如
普風癥肢痛營衛不行川烏頭炮去皮以大
全蠍半錢焙爲末醋熬稠丸綠豆炒至汗出爲度去豆焙乾
大每溫酒下七丸日一服聖惠方腰腳冷痹疼

有風川烏頭三個生去皮臍爲散醋
調塗帛上貼之須臾痛止聖惠方大風諸痹
脹滿大附子半兩者二枚炮拆酒漬之春冬五
日夏秋三日每服一合以瘥爲度聖惠方腳
氣腿腫薑汁調如膏塗之藥乾再塗腫消爲度生
簡要十脂疼痛等分生薑五片水煎溫服王氏各

濟眾

簡易

搜風順氣

烏附丸用川烏頭二十個香附子半斤薑汁淹一宿炒焙爲末酒糊子

壯丸

梧子

大每溫酒下十丸

肌體肥澀寮方

頭風頭痛

外秘要臺糊子

用臘月烏頭一升炒令黃

末之以絹袋盛

浸三斗酒任下○脩眞

首訣用附子炮石膏煅等

豆一合同入銚子

分內瘡每煮豆熟爲度去附子食綠豆立

附子一枚生去皮臍綠豆

立風毒頭痛方治聖惠子真

附子一枚炮去皮爲

附子一枚炮去皮

附子一枚炮去皮

附子一枚炮去皮

附子一枚炮去皮

秘密

旨用附子一枚生去皮臍綠豆立

附子一枚生去皮臍綠豆立

附子一枚生去皮臍綠豆立

附子一枚生去皮臍綠豆立

附子一枚生去皮臍綠豆立

附子一枚生去皮臍綠豆立

附子一枚生去皮臍綠豆立

風瘡每調附子一枚生去皮臍綠豆立

附子一枚生去皮臍綠豆立

附子一枚生去皮臍綠豆立

附子一枚生去皮臍綠豆立

附子一枚生去皮臍綠豆立

附子一枚生去皮臍綠豆立

附子一枚生去皮臍綠豆立

愈者每服二錢

川烏頭一錢溫服○朱氏集驗方治頭痛連睛

七分臨臥溫服○朱氏集驗方治頭痛連睛

生烏頭一錢爲末

白芷四錢爲末茶服

薄荷七葉鹽梅一個水煎一

字仍以末塞鼻有人用之得效便十

者煎每服二錢

生烏頭一錢溫服○朱氏集驗方治頭痛連睛

七分臨臥溫服○朱氏集驗方治頭痛連睛

生烏頭一錢爲末

白芷四錢爲末茶服

薄荷七葉鹽梅一個水煎一

字仍以末塞鼻有人用之得效便十

良方治風寒客于頸中清燥項筋急硬胸中寒痰
用芩每用生薑各一兩焙研以茶湯調服一錢或對
兩岸每用五錢水煎服隔三四日一服或加防風一
錢或對半愈最有效因方必效散治風寒流注偏正頭痛年久
爲末每服一錢臘茶清調下忌熱物少時以薑汁
摩散沐浴頭中風多汗惡風當先風一日則痛甚用
大附子一個炮食鹽等分爲末以方寸七摩
顛上令藥力行或以油調稀一日三上亦可
張仲景方年久頭痛川烏頭天南星等分
爲末葱汁調塗太陽穴經驗

簡

太陽穴

經驗

方

瘧頭痛

如破厥氣上衝

分釜墨四錢冷水

冷水

調服方寸匕當吐

去皮生薑

半兩水

大附子一升半

炮熟

即愈忌豬肉冷水

指南方用

大附子一升半

炮熟

指南方用

大附子一升半

炮熟

指南方用

良方治風寒客于頸中清燥項筋急硬胸中寒痰

用芩每用生薑各一兩焙研以茶湯調服一錢或對

兩岸每用五錢水煎服隔三四日一服或加防風一

錢或對半愈最有效因方必效散治風寒流注偏正頭痛年久

爲末每服一錢臘茶清調下忌熱物少時以薑汁

摩散沐浴頭中風多汗惡風當先風一日則痛甚用

大附子一個炮食鹽等分爲末以方寸匕摩

顛上令藥力行或以油調稀一日三上亦可

張仲景方年久頭痛川烏頭天南星等分

爲末葱汁調塗太陽穴經驗

簡

太陽穴

經驗

簡

太陽穴

經驗

簡

太陽穴

分眼過大偏頭每去三服

如米薄荷等錐

經刺爲大川烏頭去根

良方韭根附子丸

治元陽虛頭痛如破

全蠍以糯米炒

氣虛頭痛上壅虛

氣引氣如破

氣引氣如破

氣引氣如破

經刺驗良方韭根附子丸。大川烏頭去根爲末，韭根一斤，去皮微炮，大丸一粒，日服一丸。治元陽虛頭痛如破全蠍以糯米炒。

氣虛頭痛上壅虛氣引氣如破。

氣虛頭痛上壅虛氣引氣如破。

氣虛頭痛上壅虛氣引氣如破。

氣虛頭痛上壅虛氣引氣如破。

氣虛頭痛上壅虛氣引氣如破。

不

無癆夜者烏頭燒作灰菖蒲等分爲末

聲

綿裹塞芝日再用取效楊氏產乳

閉

附子醋浸削尖插之或更

耳

朱中葱拂上灸二七壯本草拾遺

者

壯已成者卽膿出未成

方

川烏頭研麪糊丸小豆大每綿包又

暴

赤腫蠶砂大着皆中以定爲度附子赤皮末如

方

一切冷氣去風痰定遍身疼痛益元氣強力固急

升

大龕鉢子盛以童子小便浸七日逐日添用五

出

揀去壞者不用餘以竹刀切作四片新汲水淘令溢五

丸綠豆大每服十丸空心鹽湯下少粥飯壓之
經驗方經驗方升降諸氣服水二盞煎一大個分作二

局方和劑

中寒昏困

薑附湯治體虛中寒昏不知人及臍腹冷痛霍亂轉筋一切虛

寒之病生附子一兩去皮臍乾薑炮一兩

服三錢水二鍾煎一鍾溫服十五丸生薑湯下小腸

冷痛

冷熱氣不和山卮子川烏頭等分研爲末

氣痛加炒茴香葱酒下小腸二十丸王氏博濟方

心痛疝氣

心痛疝氣溼熱因寒鬱而發用卮子降溼

熱烏頭破寒鬱烏頭山卮子各一錢爲末順流水入薑湯下

胃中也川烏頭山卮子各一錢爲末順流水入薑湯下

汁一匙調丹溪纂要神砂一粒丹用熟附子一大個分作二

皮鬱金橘紅各一兩爲末醋麪糊丸如酸棗湯宣明朱去者去

皮丹溪纂要神砂一粒丹用熟附子一大個分作二

丹

溪纂要

寒厥心痛

及小腸膀胱痛不可止者去

砂爲衣每服一丸男子酒下女人大朱去者去

砂爲衣每服一丸男子酒下女人大朱去者去

砂爲衣每服一丸男子酒下女人大朱去者去

方寒疝腹痛

遠臍手足厥冷自汗出脈弦而緊用大烏頭煎主之

三升

煮取一升去滓

納蜜二升煎令水氣盡

明日更服

強人張仲景金

服七合

弱人服五合

不瘥明日更服

水氣盡

匱玉函方

寒疝身痛

腹痛手足逆冷

不仁或身痛

不能昧

以蜜二斤煎減半

入桂枝湯五合解之

得一升初

服二合不知再服

又不知加至五合其知者如醉

狀得吐爲中病

也金匱玉函寒疝引腸

肋心腹皆痛諸藥不效

破以白蜜一斤煎令透取焙爲末

別以熟蜜和丸梧子大每服二十丸冷鹽湯下永除

崔氏方

寒疝滑泄

腹痛腸鳴自汗厥逆熱附子去皮臍延

水二盞

薑七片煎七

胡索炒各一兩生木香半兩每服四錢

分溫服

濟生方

小腸諸疝

倉卒散治寒疝腹痛

脾腎諸痛攀急難忍

汗出厥逆大附子炒焦四兩每用二錢水

一枚山梔子炒去皮臍

半盞酒去皮臍

煎酒服七分入鹽一撮溫服○虛者加桂枝等分薑糊小腹痛加蒺藜子等分○虛寒腰痛鹿茸去毛酥炙微黃附子糊爲丸

虛寒腰痛

皮臍各二兩鹽花三分爲丸空心溫酒下○夷堅

志云和丸梧子大每服三十丸漏數竅流汁已二十日病減久不治通判判十堅棗去丸腫輕服韓年又苦腰痛行則僵形神憔悴醫不能治此方令服旬餘腰痛減久捷此方本治腰而效力倍常步履元臟傷冷方用驗附子炮去皮臍爲末以水二盞入藥二錢鹽花三十克同煎取一盞空心服去積冷暖下元肥腸益葱薑糊爲丸大頭鷄血燒赤頭醋至半升補元臟進飲食壯益盆掘筋氣薑糊爲丸婦人青鹽四兩同炒赤黃色盆附

胃冷有痰

脾弱生瘧吐

冷末之小坡炭火燒赤頭醋打麪糊如梧子大空

宜

五丸大頭鷄血燒赤頭醋至半升補元臟進飲食壯益盆掘筋氣薑糊爲丸婦人青鹽四兩同炒赤黃色盆附

予李夏谷工錢薑半斤水一盞煎七分空心久冷

反胃

經驗方臘大附子一個生薑一兩剉細同煮

茱萸

汁打糊和附子末爲丸大黃爲衣每溫水服

著火

漸通以生薑自然注淬之依前再逼再淬約

薑汁

盡半碗乃止研末每服一錢粟米飲下不過

三服瘥

或以豬腰子切片炙熟蘸食○方便集用

大附子

一個切下頭子剜一竅安了香四十九個

乾爲

末每挑少許置掌心舐喫日十數次忌毒物

生脾

寒瘧疾濟生方云五臟氣虛陰陽相勝發爲

湯主之用附

子一枚炮七次鹽湯浸七次去皮臍

分作二服水一

碗生薑七片棗七枚煎七分露一

宿發自空心

溫服未久再進一服王璆百一選方

去寒瘧宜附子

風瘧宜烏頭若用烏頭則寒多者

火炮七次熱多者湯泡七次去皮焙乾如上法用烏頭性熱炮多則熱散也○又果附湯用熟附子去皮草果仁各二錢半水一盞薑七片棗一枚煎七分發日早溫服○肘後方臨發時以醋和附子

塗于青上寒熱瘡疾附子一枚重五錢者麴糰人參丹砂各一錢爲末煉蜜丸梧子大每服二十丸未發前連進三服中病則吐或身

體麻木未中病來日再服龐安常傷寒論瘡瘍癰安常傷寒論瘡瘍大每服二十九丸未發前連進三服中病則吐或身

寒熱冷瘡寒熱往來頭痛身疼嘔痰或汙多引飲或自利煩躁宜薑附湯主之大附子一枚四

破每以一片水一盞生薑十片煎七分溫服李待制云此方極妙章傑云嶺南以啞瘡爲危急不過

二三日而死醫謂極熱感寒也用生附子一味治之多愈得非以熱攻熱而發散寒邪乎眞起死回生之藥也

嶺南衛生方小便虛閉不效者乃虛寒也附子一兩尺服沉微用利小水藥一錢水一盞半燈心七瓣煎服即愈

個炮去皮臍鹽水浸更久瀝濁一兩每服四匙

水一盞半燈心七瓣煎服即愈

曹濟方

瘡瘍

喘滿

大人小兒男女腫困積得旣取積而腫再作
小便不利若再用利藥性寒而小便愈不通

矣醫者到此多束手蓋中焦下焦氣不升降爲寒

痞隔故水凝而不通惟服沉附湯則小便自通喘

沉滿自愈

用生附子一個去皮臍切片生薑十片入

沉香一錢磨水同煎食前冷飲附子雖三五十枚入

亦無害小兒每服三錢脾虛溼腫大附子五枚去豆

豆半升藏附子于中慢火煮熟去豆焙研末以薏

苡仁粉打糊丸梧子大每服十九蘿蔔湯下朱氏集

驗方

陰水腫滿烏頭一升桑白皮五升水五升煮

酒丸丸小豆大每服

酒麪魚肉○又方大附子童便浸三日夜逐日換

尿以布擦去皮搗如泥酒糊和丸小豆大

每服三十丸煎流氣飲送下普濟方

秘附子一枚炮去皮取中心如棗大爲

蜜水空心服之聖濟總錄老人虛泄

不禁熟附子一兩赤石脂一兩爲末醋糊丸

楊氏家藏方

冷氣洞

泄

生川烏頭一兩木香半兩爲末醋糊丸

大附子大每陳皮湯下二十丸

本事方

臟寒脾

泄

及老人中氣不足久泄不

止肉豆蔻二兩

煨熟

大附子去皮臍一兩

五錢爲末粥丸梧子大每

服

八十丸蓮肉煎湯下○十便良方治脾胃虛冷

大腸滑泄米穀不化乏力

用大附子十兩連皮同

取大棗二斤於石器內以水煮一日常令水過兩指

每空心米飲服三四十丸

小兒吐泄

注下小便少

末別以棗肉和丸梧子大

附子五錢白石脂煅龍骨煅各二錢半爲末

糊丸黍米大每米飲量兒大小服

全幼心鑑

霍亂吐泄

不止附子重七錢者炮去皮臍爲末每

服四錢冰二盞鹽半錢煎一盞溫服立

止秘竇方

孫兆水泄久痢

川烏頭二枚生用

豆半合同煮熟研丸綠豆

大以黑

每服五丸黃連丸下。良久研末酒化蠟丸如大麻子大。每服三丸。煎湯冷吞如瀉及肚痛以水吞下。

赤痢黃連甘草黑豆煎湯放冷吞下。白痢甘草黑豆並空心服之忌熱物。經驗良方。久痢休息附。

子半兩研末雞子白二枚搗和丸梧子大傾入沸湯煮數沸漉出作兩服米飲下。聖濟總錄下。

痢欬逆脈沉陰寒者退陰散主之陳自明云一人病此不止服此兩服而愈方見前陰毒藥。

寒下血虛寒日久腸冷者熟附子去皮枯自礬土下。兩爲末每服三錢米飲下。又方熟附子一枚去皮生薑三錢半水煎地。

附子一百粒並聖惠方陽虛吐血生地

斤搗汁入酒少許以熟附子一兩半去皮瓣切片入汁內石器煮成膏取附片焙乾入山藥三兩研末以膏和搗丸梧子大。每空心米飲下三十丸。昔葛察判妻苦此疾百藥皆試得此而愈屢發屢效。

余居士

洩數白濁

熟附子爲末每服二錢薑三片水一盞煎六分溫服

普

濟選

奇方

下胎

虛火上行背內熱如火炙者附

經水

不調

血藏冷痛此方平易捷徑熟附

子去皮斷產

子

當歸等分每服三錢水煎服

普濟方

卓氏膏

下胎

生附子爲末醋酒和塗右折腕損傷

用大附

小品方

宿取脂煎三上三下日摩傅之

苦醋同漬三年深師方

漏瘻切作口冷膿水不絕內無惡肉大附子以水浸透

日隔數日

腫毒

塗川烏頭炒黃藥炒各一兩爲末

同上唾調癰疽久

薛已外科心法

長滿研末作餅子亦可

大以艾灸之隔數日

內如眼不斂諸藥不治此法極妙附子削如碁子

火灸之附子焦復唾溼再

內

大以眼不斂諸藥不治此法極妙附子削如碁子

火灸之附子焦復唾溼再

空

灸令熱氣徹內卽瘻千金方癰疽肉突

烏頭五枚濃醋三升瀆

古瘻

今千金方塗之日夜三四度

子末塗之

千金翼

久生疥癬

烏頭川

錄

驗

古今

疔瘡腫痛

醋和附子乾再上

子

三日洗之

日夜三四度

度

頭生切以水煎

洗甚驗聖惠

手足凍裂

附子去皮爲末以水麪

調塗之良

談塗翁試

驗足釘怪疾

兩足心凸腫骨生碎孔

髓流出生黑豆瘡

硬如釘脛

談塗翁試

酒方此是肝腎冷熱相呑

用炮川烏頭末

傅之內服

韭菜子湯效夏氏奇疾方

烏頭附子尖

主治爲末茶服半錢

吐風痰癲癇

珍時

發明

時珍曰烏附用尖亦取其銳氣直達病所爾

無他義也保幼大全云小兒慢脾驚風四肢

厥逆用附子尖一個硫黃棗大一個蠍梢七個爲

末薑汁麪糊丸黃米大每服十丸米飲下亦治久

輕瀉延羸凡用烏附不可執爲性熱審其手足

冷者重則用丸重則用膏候

手足暖陽氣回

瀉延羸凡用烏附不可執爲性熱審其手足

冷者重則用丸重則用膏候

手足暖陽氣回

卽爲佳也按此方乃和劑局方碧霞丹變法也非真慢脾風不可輒用故初虞世有金虎碧霞之戒

附方

舊一新七

風厥癲癇

凡中風痰厥癲癇驚風痰涎

宜碧霞丹主之烏頭尖附子尖蠍梢各七十個石

綠研九度飛過十兩爲末

麵糊丸芡子大每用一丸薄荷汁半盞化下更服

溫酒半合須臾吐出痰

涎爲妙小兒驚癇加白殼蟹等分

和劑局方

烏尖三個金足蜈蚣半條酒浸炙

麝香少許爲末以少許吹鼻得嚏乃以

巴豆研細醋

調塗刷

臍風撮口

生川烏尖三個金足蜈蚣半條酒浸炙

麝香少許爲末以少許吹鼻得嚏乃以

和劑局方

烏尖三個金足蜈蚣半條酒浸炙

麝香少許爲末以少許吹鼻得嚏乃以

巴豆研細醋

調塗刷

集簡方

巴豆研細醋

薄荷湯灌

永類方

木舌腫脹

川烏尖全蠍各七個

調塗刷

烏尖三個巴豆研細醋

集簡方

巴豆研細醋

調塗刷

巴豆研細醋

難忍

附子尖天雄尖全蠍各七個

永類方

奔豚疝氣

作痛

巴豆研細醋

調塗刷

巴豆研細醋

調塗刷

巴豆研細醋

囊腫瘡去鈴丸用生川

烏尖七個巴豆七枚去皮

朱砂麝香爲衣每服二丸

連年不愈

日一服不可多

澹寮方

巴豆研細醋

調塗刷

巴豆研細醋

調塗刷

空心冷酒或冷鹽湯下

三兩

割甲成瘡

連年不愈

川烏頭尖

巴豆研細醋

調塗刷

巴豆研細醋

調塗刷

巴豆研細醋

黃檗等分爲末洗了貼之老幼口瘡

烏頭尖一個天南星一個

以愈爲度

古今錄驗

老幼口瘡

研末薑汁和塗足心男左女右不過二三次卽愈

本草綱目草部第十七卷上終