

永樂大典

卷一千三十六

永樂大典卷之一千三十六

二支

兒 小兒證治六十九

小兒卒死

論

氣元方病原小兒卒死者是三虛而過賊風故無病倉卒而死也三虛者
 乘年之衰一也連月之空二也失時之和三也有人因此三虛復為賊風
 所傷使陰陽偏竭於內陽氣阻隔於外而氣壅閉陰陽不通故暴絕而死
 也若臟腑未竭良久而蘇亦有兼扶鬼神氣者皆有頃邪退乃生也凡中
 寒忤及中惡卒死而邪氣不盡停滯心腹久乃發動多變成注也茅先生
 方卒死候眼合嘴齒過身如綿軟面青黑口鼻冷此候因本生下而過身
 熱或因有驚患腎人一向過熱不覺下得驚積及妳積遂積聚并邪氣重
 此候右前件三箇證都來一般只是要辨元初受患銀線所治者在下
 尋命散與下藥

如有伏熱未時即下大附散與調理二三日安樂方身便覺日門
 前件三箇形候只是此一般調理上件候是鴉聲上喘偶搐汗如珠不得
 睡眼障淚出死候不治士如如所言極真子嬰童實證方小兒三虛狀
 乘年之衰方連月之空失時之和方三虛之中卒中賊風方成卒死兼使
 氣氣方候亦同臟腑未絕方須再活急令醫治方莫勿勿鄰友至嬰方
 三虛卒中歌 乘年連月失時和此是三虛被鬼魔賊氣中心兒暴死陰
 陽未絕免沉痾易已望嬰孩妙訣小兒氣弱命中心衰危危多因被鬼持其
 候接黃頭哭泣衝人冷氣早須醫乘年衰方連月空失時和方三虛中過
 賊風方連卒死一如鬼氣候須同臟腑未絕方須再活急須救療方莫每
 每半化候

方

張仲景金匱要略救小兒卒死而吐利不知是何病方

右以馬屎一團絞取汁灌之無熱者水煮乾者取汁

葛洪肘後方治救卒死而壯熱者

右用礬石半斤水一升半煮消以漬脚令沒踝

又方救卒死而目閉者用騎牛臨面搗蓮汁灌之耳中

又方救卒死而四肢不收尿使者

右取牛洞一升温酒灌口中洞者稀糞也

孫思邈千金要方卒死無脉無他形候陰陽俱竭故也治之方

右用牽牛臨鼻上二百息牛紙必差牛不肯紙着鹽汁塗面上即牛

肯紙

又方灸髮斗髮兩脇下情志方云又治尸厥

治魔死不自覺者方

右用慎燈火勿令人手動牽牛臨其上即覺若卒不能語取東門上

鷄頭末之以酒服

治卒魔死方搗韭汁灌鼻孔中劇者灌兩耳依仲景云灌口中

治鬼魔不寤方以末伏龍肝吹鼻中

又方以末皂莢如大豆許吹鼻中嚏則氣通起死人集驗方云治中惡

已上十方俱出如切新書

太平聖惠方治小兒卒死方取女青末半錢用牛乳汁調服之

又方以牛糞取汁少許口中盡

又方以牛糞取汁服

又方以苦參醋煮取汁少許內口中即蘇水者亦得

又方以爛榨木板酒煮取汁服少許效

又方煎鹽湯令極鹹以物拗口開灌之令入腹即活

又方以熱湯和灰厚擁身上透即蘇

雙獮方治小兒不知所病使死絕方云如切新書

右取雄雞冠臨兒口上割血滴入口下即活

葛洪肘後方灸法卒死而四肢不收尿使者灸心下一寸臍上三寸臍下

四寸各一百壯兒小者隨年

孫思邈千金要方治卒死鍼問使各百餘息

又法灸鼻下名鬼客廳肘後方云灸尸厥

小兒卒暴中惡候

論

吳普方虛源小兒中惡者是鬼邪之氣卒中於人也無問大小若陰陽順
理榮衛平和神守則強邪不干正若精氣衰弱則鬼毒惡氣中之其狀先
無他病卒然心腹刺痛悶亂欲死是也凡中惡腹大而滿脉紫大而浮者
死緊細而微者生餘勢不盡停滯臟腑之間又發後變為注也聖醫經云

論曰小兒無故卒然心腹刺痛悶亂欲絕者中惡也。由兒陰陽氣血不調神守不強故鬼毒惡氣得以中之。

方

葛洪肘後方救卒死或先病痛或常居寢卧奄忽而絕皆是中惡救之方。右取蔥黃心刺其鼻男左女右入七八寸小兒度量之。若使日中血出佳。扁鵲法同是後吹耳條中葛言此云刺鼻故別為一法。

又方

右令二人以水墮口吹其兩耳極則易人可以筒吹之。並捧其肩上側身速之。其臨死人上。

又方

右以蔥葉刺耳耳中鼻中血出者其依無血難治。有血是候時當珠兩手急救之。須臾死人自當舉手撈人言痛乃止。又男刺左鼻女刺右鼻。中令入七八寸餘大效。小兒量度之亦治。自縊死此與扁鵲方同。又方以麻漬好酒中須臾置死人鼻中手按令入鼻中并持其手足與命驚。

又方 視其上唇裏結有靨如鼻末大以針挑去之。

又方 以小便灌其面數回即能語。此扁鵲法。

又方 以木皂莢如大豆吹其兩鼻中嚏則氣通矣。

又方 割雞雞頭取血以塗其面乾復塗并以灰營死人一周。

又方 以管吹下部令數人互吹之氣通則活。

又方 破白犬以榆心上無白犬小鷄亦佳。

又方

右取雄鴨就死人口斷其頭以熱血灌口中并以竹筒吹其下部極則易人氣通下則活。

又方

右取牛馬糞高濕者絞取汁灌其口中令入喉。若口已燥者以物強搔之若不可強者乃扣齒下若無新者以人溺解乾者絞取汁此扁鵲法。

孫思邈千金要方治卒忤方此病即今人所謂中惡者與卒死鬼擊亦相類為治皆取而用之。

右鹽八合以水三升煮取一升半二服待吐即愈。備急方云治鬼擊若小便不通葶藶七枚燒作灰末和服之即通。

永樂大典

卷一〇三六

五寶外臺古今錄驗黃帝護命千金丸瘵羸瘦歷年骨滿結痰飲食變吐宿食不下中風鬼症疾瘦方

野葛七十支 班猫二十枚去毛翅絲 雄黃
雌黃 丹砂各研 瓜丁 鬼臼

礬石長束燒十日 沙參 莽草
椒去川汗各一兩 地膽十五枚去足翅絲

右十二味搗下篩蜜和搗三千杵為丸如梧子服五九日二卒中惡氣絕不知人服如小豆二九老小半之半馬所服踐癰腫若毒所嚙取一丸着掌中唾和塗瘡中毒上立愈正月旦以酒半家中大小各一丸一歲不病若傷寒身熱服一丸若欲視病服一丸病者共吐不恐忘生血物

太平聖惠方桃奴散治小兒中惡心腹堅脹疼痛顏色青黑大便不通

桃奴五枚 甘草一分炙微赤切 麝香一錢細研
杏仁二十枚湯浸去皮尖雙仁炙少微黃 桔梗去蘆頭

赤芍藥 黃芩 柴胡去苗 川升麻

川升麻 桃仁十枚去心

右件藥搗麝羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服以利為度量兒大小以意加減

鬼箭羽散治小兒中惡心堅強卒痛欲困

鬼箭羽一分 真珠末一分 桃仁十枚去心
微黃 川大黃一兩切微炒 羚羊角屑

桔梗去蘆頭 川升麻 赤芍藥

柴胡去苗 黃芩七上五半兩

右件藥搗麝羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服童兒大小以意加減

雄黃丸治小兒中惡心痛辟除邪氣

雄黃十兩細研真珠末十兩 麝香一錢細研牛黃一錢細研
巴豆十枚去皮心研碎去油

右件藥都研令勻入棗瓤及鍊蜜和丸如粟米大每服以薄荷湯下三九量兒大小加減服之

嬰聖方鬼箭羽湯治小兒中惡心腹堅強卒痛欲困七上十八方俱出切切新書

鬼箭羽三分 朱砂一分 羚羊角屑 桔梗

鬼臼 朴消湯 下各四分 升麻

芍藥 柴胡五分 黃芩二分 大黃八分

桃仁四十九箇碎去皮火

右以水四升煮取一升二合二歲兒為四分更量兒大小與服之

聖濟總錄芍藥湯治小兒中惡心腹堅脹痛顏色青黑大便不通

芍藥 桔梗炒 桃仁七枚去皮尖雙仁炒

黃芩去黑心 柴胡去白 升麻各一兩 大黃剉炒二兩

鬼臼一兩 甘草炙十兩 杏仁四十枚湯浸去皮尖雙仁炒

麝香半錢研 右一十一味內十味麝香和勻一二歲兒每一錢七以水

一小盞煎至六分去滓溫服空心午後各一服以利為度隨兒大

小加減

湯尺望嬰孩妙訣即服蘇合香丸未醒觸鼻次服藥沉香降氣湯加人參

茯苓又宜服辟邪膏方無不作效本竹葉可服之 沉香各半兩 虎頭骨炙

鬼臼 龍膽草 人參 茯苓各半兩

右末次入雄黃半兩麝香一錢鍊蜜丸乳香湯化及令兒帶及燒肚

內尤妙

亦林得效方卒暴治卒然腹皮青黑而死灸臍上下左右去臍各半寸

并鳩尾骨下一寸凡五處各灸三壯仍用酒和胡粉塗其腹

又中惡暴死蔥白納下部及鼻中立活或用葛蒲末著舌底及吹入兩鼻

兩耳中效 又中盡欲死甘草濃煎湯服立驗

葛洪時後方灸法以繩圍其死人肘腕男左女右單伸繩從臂上大椎度

以下又從此灸橫行各半繩此法三灸各三即起又令爪其病人人中取

醒不起者捲其寸灸下文頭隨年壯又灸鼻中三壯也又灸頤下宛宛中

名水漿穴十壯大效又灸兩足大指爪甲聚毛中七壯此華陀法一云三

七壯又灸臍中百壯也出如切切書

小兒鬼持

論

巢元方病源小兒神氣軟弱精爽微羸而神鬼被鬼所持錄其狀不覺有

除疾直爾痿黃多大啼喚口氣常臭是也。極真子嬰童寶鑑歌小兒氣弱
命中衰魂魄多因被鬼持其候痿黃多哭泣不須用藥可求師。又小兒
鬼氣歌鬼氣皮膚粟相傳臍間腫虛如水病癩癩似驚癇然發澤才滋
痛連心腹攢小兒還有此服藥急醫者

方

圖經治鬼持 用虎睛爪并指骨毛以繫小兒臂上辟惡鬼
外臺深師五邪丸療邪狂鬼魅妄言狂走恍惚不識人此為鬼伴當得效
鬼丸方

丹砂

雄黃各別研

龍骨

馬日毒公

鬼箭羽各五兩

鬼臼二兩

赤小豆二兩

芫菁一枚

桃仁百枚去皮大熱別研

右丸味梅下細研合諸藥并合和調後內蠟和之大如彈丸絳囊
盛之繫臂男左女右小兒繫頭合藥勿令婦人鷄犬見之所服寒和
丸如梧子一服三九日三忌五年生血物已上二方俱出如新書

小兒症

論

巢元方病源注之言住也謂其風邪鬼氣留人身內也人無問大小若血
氣虛衰則陰陽失守風邪鬼氣因而客之留在肌肉之間連滯臟腑之內
或皮膚掣動遊易無常或心腹刺痛或體熱皮膚腫沉滯至死死又注易傷
人故為症也小兒不能觸背風邪多因乳母解脫之時不避溫涼暑濕或
抱持出入早晚其神是賴弱而為鬼氣所傷故病也

方

孫思邈千金要方治小兒症方 用葷中灰鹽等分相和熬熨之
太一備急散主年中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼毒及中蠱症吐血下血及
心腹卒痛腹滿傷寒熱毒病六七日方

雄黃

羌活

桂心各二兩

丹砂

蜀椒各一兩

藥蘆

巴豆各一分

附子五分地漿土

皮麻

野葛二分

右丸味已豆別研如脂餘合治下蹄以巴豆合和更梅之合和謂以
銅器中裏貯之勿泄有急疾水服一字已可如至半錢已老小半之
病在頭當鼻衄在隔上吐在隔下利在四肢當汗出此之所為如湯
沃雪乎下皆愈秘之非賢不傳

治疫病相染易及霍亂中惡小兒容忤長病方

懶肝一升 雄黃

莽草 丹砂

鬼臼 犀角

巴豆各一兩 麝香二分

大黃 牛黃

蜈蚣一枚

右十一味末之蜜丸空腹服如麻子大二丸加至三丸以知為度

論

藥元方病源尸症候尸注者是五尸之中一尸注也人無問大小腹內皆有尸蟲尸蟲為性最惡多接引外邪共為惡害小兒血氣衰弱者精神亦羸故尸注因而為病其狀況然不的知病之處或寒熱淋瀝涉引歲月逐至於死死又注易傍人故名之為尸症也聖濟總錄論曰人有三尸能為人患無問老幼但精神衰弱血氣不足者幸多被害小兒血氣未具精神未全因有尸注之病其狀況然不的知病之所苦或寒或熱備引歲月逐至於死死後注易傍人故名之為尸注也張源濟云小兒注者皆小兒亦有注病與大人所病無異久後症易傍人傳染骨肉如尸注毒之類是也尸注者是三尸之中一尸症也無問大小腹內皆有尸蟲為性最惡

多接引外邪而共為患小兒有此即血氣衰弱精神亦羸况况嘿嘿不的知病之處至天注易傍人凡驗毒者以器皿盛取毒蛇雜類今相飲食餘一存者即名為蠱涉歷歲月心爛至天症易傍人宜深念矣經濟小兒保命草尸注狀或因胎受或相傳有似驚風項仰者驚厥後拋息生紅赤腫痰潮而臉已如藍時時目上加乾皖捷捷風拘曲禁閉偏搐頭青唇眼顛徒勞用藥保生全小兒尸注者狀若驚癇而後拋紅赤腫黑矣如大人傳尸注之患或胎中而受或相傳而得檢方對藥主之若見偏搐唇眼俱顛滿頭赤腫死候不治

方

玉函外臺秘要方走馬湯治大人小兒飛尸

巴豆七枚

杏仁去皮尖各二枚

右二味取綿纏攤令極碎投熱湯二合檢取白汁服之須臾瘥未瘥更服老小量之通療鬼擊有尸注者常畜此藥用驗忌野猪肉生笋備急同

太平聖惠方木香散治小兒尸注心腹滿脹疼痛不可忍

木香十兩

鬼箭科十兩

桔梗十兩去蘆頭

當歸十兩切微少
 右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分
 去滓不計時候溫服更量兒大小加減服之
 犀角散治小兒尸注及中惡諸病皆主之

犀角屑十兩 川升麻十兩 木香十兩 檳榔十兩
 桃仁二十枚湯浸去皮尖雙仁麩炒黃 桑根白皮十兩切
 川大黃十兩切碎微炒 麝香一錢細研

右件藥搗細羅為散每服以溫水調下半錢日四五服更量兒大小
 加減服之

桃仁散治小兒尸注鬼癩心腹往來疼痛或加寒熱恍惚形色多般

桃仁二十枚湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 木香一分
 人參一分去蘆頭 虎頭骨一分全酥炙令黃

檳榔一分 京三稜一分微煨切 白芥子一分微炒
 款冬花十兩 朱砂十兩細研水飛過 乾桃柳葉各十兩

麝香一分細研桂心一分

右件藥搗細羅為散不計時候以溫水調下半錢更量兒大小加減

保童丸治小兒尸注鬼癩驚癇疳疔三十六種無事天行急黃宜服

牛黃一分細研麝香一分細研光明砂十兩細研水飛過

真珠末一分 虎睛一對酒浸去小微黃 甘遂半份根全微黃

赤芍藥十兩 赤茯苓十兩 杏仁十兩湯浸去皮尖雙仁麩炒

微黃 甘草一分炙微赤切 巴豆五枚去皮心

研成末壓出油

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如麻子大三四歲兒每服以
 荊芥湯下二丸更量兒大小加減服之

雌黃丸治小兒尸注及諸瘰癧精氣入心腹使兒刺痛黃瘦

雌黃一分細研雄黃一分細研朱砂一分細研川大黃一分細研微炒

麝香一分細研白頭翁一分 徐長卿一分 羚羊角屑一分

右件藥搗羅為末都研令勻以青羊脂和丸如麻子大每服以粥飲

下三九日三服更量兒大小加減服之

治小兒尸注邪氣入腹痛立効方

雄黃一分細研梔子仁十枚 赤芍藥十兩

右件藥搗細羅為散研入雄黃令勻每以溫水調下半錢更量兒大

小加減服之
鬼曰九治小兒尸注勞瘦或時寒熱

鬼曰半兩去七川升麻三分 麝香一分四所柴胡一兩去苗
右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如棗豆大每服以煖酒下十
丸日三服更量兒大小加減服之
桃仁湯治小兒尸瘡勞瘦或時寒熱

桃仁 十枚湯浸去皮尖及土研用
右以水一中盞煎至五分去滓量兒大小分減與服當吐為效如不
吐即非是瘡也
驚頭散治小兒尸瘡

驚頭一枚地為灰
右細研為散每服以新汲水調下半錢

又方 取雞子一枚打破生吞之已因者內入喉中搖頭令下即差
聖濟總錄太一神精丸治小兒客忤霍亂腹痛脹滿若尸注惡風顛狂鬼
索盡素賦地溫瘧無所不治

丹砂研

曹青

雄黃研

雌黃研

磁石微明片 法海山石心石金芽研二兩十

石六味各研羅為末。先將丹砂等五味用磁醋漬之唯曹青用好酒
銅器中漬以紙密封頭。日中蒸經夏急待用亦須五日無日以火煖
之。其丹砂等五味日數亦然各研如粉以磁醋拌令乾濕得所內土
釜中。以六一泥固濟令密候泥乾然後安鐵環拖脚高一尺五寸置
釜於環上初取熟炭火兩枝各長四寸置於釜下待三分消盡二分
更加熟火兩枝如此三度然後用生炭燒增之漸多乃至一伏時火
近釜底即使滿其釜下炭經兩度即能待火盡極冷然後出之其藥
精飛化執著上釜光明皎如月潔如雪者最佳若飛上不盡更合與
火如前以雄雞糞掃取多少不定和以棗肉丸如黍米大平旦空腹
服一九又常以絳囊帶之男左女右小兒繫頭上辟瘴毒惡氣射工
小兒患可以苦酒和之塗方寸紙貼兒心腹上亦有已死者冬二日
夏一日與藥得下便活若服藥糾亂可煮防己湯飲之則定兼治大
風惡癩偏風風癩歷節鬼擊瘵瘡小兒驚忤不能乳哺癰疽痔瘻腹
內積冷婦人產死木啞宿狂狗牙鳴丁腫疔毒寸白惡腫邪鬼精妖
丹去一切惡

遺煤散治小兒尸注

寔突中煤三指撮

鹽少許

右二味同研為散一二歲兒每服半錢已熱水調下空心午後各一服更隨兒大小加減

張洪賢方妙選雄黃丹方治尸疰病

雄黃一兩 雌黃一兩細研川大黃一兩使大地黑

鬼臼一兩去毛批仁三十箇湯浸去皮大 白頭翁半兩

已上各搗羅為細末次用

已豆十粒去皮心膜紙裹土山麝香一分研

右件都研勻以羊脂五兩鎔和諸藥成膏如黍米大每服三粒至五

粒荆芥湯冷下量兒大小加減

主效湯

川大黃一兩地黃一兩 乾桃柳葉各一兩洗焙乾

梔子仁半兩 赤芍藥半兩

已上搗羅為細末次用

朱砂一兩研細水飛 麝香一分細研雄黃一分細研

右件都拌勻每服一錢用麥湯調下量兒大小加減也

小兒蠱症

論

米元方病源蠱症候人聚蟲蛇雜類以器皿盛之令相飲食餘一存者即名為蠱能變化或隨飲食入腹食人五臟小兒有中者病狀與大人老子無異則心腹刺痛懊悶急者即死緩者涉歷歲月漸深羸困食心臟盡利血心臟爛乃至死死又症易傍人故為蠱症也

方

不虛外臺祀安子范汪史主十七物紫參凡療大人小兒蠱症百病癩癧積聚酸刺骨肉大小便不利牛汗過惡風腫脹腹滿淋水轉相注痺門盡尸疰及男女外孫腎所不能療

紫參 人參 半夏 梨蘆

代赭 桔梗 白薇 肉蓯蓉各三分

石膏 大黃 杜蠟 升參各一分

煨麻 烏頭 各四分 狼毒七分 附子地五分

已豆七十枚去心皮紙

右件藥搗篩和為丸以飲下如小兒一丸日三服老小以意減之
蜂蟻所螫以塗其上神良忌猪肉冷水一方無蝦蟇有乾薑四分
太平聖惠方殺平用散治小兒中蠱毒腹內堅如石而日青黃小便淋瀝
變易無常

殺平角有一兩藜蘆一分 梔子仁七枚 赤芍藥一分
杜升皮一分 犀角屑一分 黃連一分去頭

右件藥搗篩羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服日
三四服更量兒大小加減服之

又方聖濟總錄名鼓皮湯治小兒中蠱腹內堅痛
敗鼓皮一分炙令黃切 苦參一兩切 藜蘆根一分

右件藥搗篩羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服日
三四服更量兒大小加減服之

升麻散治小兒初中蠱毒百服

川升麻十兩 桔梗十兩去蘆頭 蘇蘇根十兩

右件藥搗篩羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服日
四五服更量兒大小加減服之

雄黃散治小兒飛蠱疔如鬼氣者宜服

雄黃十兩細研香十兩細研犀角末十兩

右件藥都研令勻每服以溫水調下半錢日四五服更量兒大小加
減服之

治小兒五種蠱毒悉主之方聖濟總錄名吐即再服

馬兜零根

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓空服頓服當
時隨吐盡 吐即再服

又方敗鼓皮一分炙令黃切

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓空服頓服當
時隨吐盡 吐即再服

又方 蘇尾一分

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓空服頓服當
時隨吐盡 吐即再服

甘草十兩

右以水一中盞煎至五分去滓分為二服當吐盡出若干生預防蠱
者宜煎炙甘草煮汁服之即內消不吐神效

永樂大典

卷一〇三六

治小兒中壘毒令腹內堅痛面目青黃林露骨立病變無常方中壘毒

桃樹寄生二兩

右搗細羅為散如茶點服之日四五服

又方 麝香半錢細研

右於空腹以溫水調服即吐出壘毒未效再服

治小兒中壘下血欲死方

右取生赤雌雞翅下血服之主效

又方 搗青藍汁頻頻與半合服

嬰孩方雄黃丸治小兒疰病諸壘魁精氣入心入腹刺痛黃瘦骨立出如

細折書

雄黃

雄黃各四分

丹砂

野丈人

徐長卿各三分大黃五分

麝香三厘大

羚羊角五分

右為末以青羊脂和丸百日兒酒服黍米大三九日連二服或五大

亦可

張洪醫方妙選神效專治壘毒病

雄黃一兩水磨者細研

麝香一兩細研

赤芍藥一兩 敗鼓皮一兩炙令黃

馬兜零根半兩

薺尾十兩 麝白半兩去心

已上除雄黃麝香外搗羅為細末

右件同二味一處拌勻研細每服半錢滾煎甘草湯下食前

又方麝屑湯

犀角屑一兩

兒茶一兩

安息香一兩

苦參一兩

牡丹皮十兩

已上搗羅為細末火用

水磨雄黃一兩細研

麝香一兩細研

右件都拌勻每服一錢水一大盞煎至五分大羊放豆時時服之

小兒搗撲損瘡

論

巢元方病源小兒落林損瘡候血之在身隨氣而行常無停積若因墮落損傷即血行失度隨傷損之處即停右流入腹內亦積聚不散皆成瘡血凡瘡血在內顏色痿黃氣弱微喘瀉者小寒喻喻微熱或時刺痛也曹世

榮活幼心書論不內外因是常論十歲之上以飲酒啖熱因熱動血醉的
樹撼胃腕吐血甚至鼻口俱出此非內因外因之使然乃自取過耳法未
用有解散去桂加黃蓮水煎燈心煎服疎利熱毒次以小茶胡湯加生地
黃或藕節水煎煎下定吐止血其證自除 有長成小兒偶因他物自傷
或戲走夫足觸損兩日血脈腫痛晝輕夜重投速效飲即快仍忌鷄首羊
麩三五日庶易瘳也 有孩兒貪劣因弄刀錐或乘高墮地致傷皮破血
出輕者先用桃花散傅之仍服活血散以勻其血毋使作膿潰爛肌肉
有僅十五歲者恃其血氣方剛惟務馳騁多致落馬墮車或翻跌折肢
體一切損證及毒蟲惡獸所傷此又世醫各有專科茲不繁引 不內外
因歎人身一或緩傷損重則宜其血亦多不內外因然有自各分證治在
專科 破血傷風跌撲皮膚因破損外風使襲在傷痕隨時發腫微加
痛活血疎風是要言

方

葛洪肘後方若墮落有血狂熱不食乳哺者方

大黃

黃連

蒲黃各二分

芒硝一分

右以水二升煎取一升去滓內芒硝再煎二服大小便血即愈

孫思邈千金要方蒲黃湯治小兒各林墮地如有瘀血腹中陰陰熱不
肯乳哺但啼哭叫喚方

蒲黃

大黃

黃芩

麥門冬各十錢

甘草炙一錢

芒硝七錢

黃連十錢

右七味以咀以水二升煮取一升去滓內芒硝分三服消息視兒羸
瘦半之大小便血即愈忌冷食

當歸散主落馬墮車諸傷脫折臂脚痛不止

當歸

桂心

蜀椒

附子各五分

芍藥六分

甘草五分

葶藶

右七味並熬令香治下疳酒服方寸匕日三服是傷損皆服之十日
愈小兒亦同散急方云治諸傷各半被打破脫折臂脚痛不絕

服此散時以之酒不復大痛十三日即愈也

孫思邈千金要方馬蹄散主被打腸中瘀血方

右白馬蹄燒令煙盡搗碎為散酒服方寸匕日三夜一亦主女人病
血消之為水

蒲黃散主被打腹中有瘀血方

蒲黃散主被打腹中有瘀血方

蒲黃一升

當歸

桂心各二兩

右三味搗篩為散酒服方寸匕日三夜一

太平聖惠方蒲黃散治小兒落林墮地如有瘀血腹中痛

蒲黃

川大黃剉微炒當歸微炒

琥珀

生乾地黄

赤芍藥各半兩桂心一分

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時

候溫服量兒大小加減服之

地黄散治小兒落林傷於肢節青瘀疼痛

生乾地黄半兩川大黃

當歸二味各剉微炒

桂心

赤芍藥

蒲黃 甜瓜子

桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃各一分

右件藥搗細羅為散每服不計時候用酒半合生地黄汁半合相和

暖令溫調下午服量兒大小加減服之

犀角散治小兒落林體熱疼痛

犀角屑

赤芍藥

芍藥

當歸剉微炒

甘草炙微剉各一分

川大黃半兩剉微炒

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時

候溫服量兒大小加減服之

茯神散治小兒落林體熱驚悸

茯神十兩

龍膽

人參各半兩項子苓

犀角屑

麥門冬去心焙甘草炙微炒各一分

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時

候量兒大小加減溫服

嬰孺方治小兒墮地有瘀血在腹中天陰則衄衄寒熱不肯乳哺但呼啼方

蒲黃

大黃

甘草七兩 麥門冬十五味

黃連十二味

右以水二升煮一升為三服量兒大小與之忌生冷菘菜冷水

張漢醫方妙選蒲黃湯方治打撲或落林墮地至損血氣羸瘦瘥黃或時

刺痛遊走不定

蒲黃

生乾地黄

當歸各半兩

赤芍藥

琥珀

桂心各十兩

右件搗羅為細末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服量兒大

小如減
又方茯神丹

茯神 麥門冬湯浸去心
人參 鹿茸 黃芩 龍膽草各半兩

已上為細末次用 桃仁湯浸去皮尖炒香熟半兩
右件同再細研拌勻。鍊蜜和丸黍粟大每服十粒開水地黃汁少許

同酒下量兒大小如減
曾世榮活切心書珠風散治小兒薄者跌觸頭腦或弄刀鎚因而破血感
風致面日傷痕浮腫

荆芥穗一兩 防風去蘆二錢半 甘草半生半炙二錢
右剉焙為末每服一錢用無灰溫酒調服或蔥湯亦好
活血散解破血傷風

當歸酒浸 生乾地黃淨洗川芎 紅花
赤芍藥 蘇木六木各半兩 甘草二錢

右件以吐每服二錢水一盞薑七分無時溫服
此散治一切破損肢體血出作痛

好石灰用炒淨斤十兩 清油小半盞
大黃五錢土研水浸色出十大半盞

右石灰先用鐵錘炒令帶熱次入大黃汁清油和勻仍以慢火炒如
桃花色為金盛水傾出在內淨而不沉鵝翎拂聚紙上別著瓦器收
藏但是破損傷痕用塗立效仍服珠風散活血散
速效飲治長成小兒因他物或跌著觸損兩目血脈腫痛

荆芥穗 薄荷葉二味各十兩 單決明一兩微炒
甘草三錢土研
右為鹿木和半生半炒芝麻等分抄二錢在掌中感以乾嗅吐嚼味
盡吐去查如此法投三五次即效

小兒骨鯁
論

曾世榮活切心書論不內外因有五飲食中誤吞骨鯁吐不出嚥不下氣
鬱生痰痰裏其骨內則作痛外則浮腫啼聲似嘔亦為可慮投備急散取效

孫思邈千金要方治骨鯁 以鵝鵝屎服方寸匕

永樂大典

卷一〇三六

又方 口稱鷓鴣鷓鴣則下

又方 服橘皮湯即下

又方 服沙糖水即下

又方 燒魚網灰服方寸匕。注云：取魚網有刺者下

治骨鯁在喉中衆治不出方

右取飴糖丸如鷓鴣子黃吞之不去更吞漸大作丸可至十九止

又方 燒虎狼屎服之

又方 吞積膏如鷓鴣子不差更吞差止

治食中吞鯁噎不去燒喉方

右取亂髮燒末酒服一錢匕

許叔微本方治骨鯁

白茯苓

右一味臨時細切為末以所鯽骨煎湯調下

李樞小兒保生要方小兒一切物鯽喉中玉屑無憂散方

玄參

貫衆

白茯苓

磁砂

滑石

川黃連

刺莽

磁砂

甘草

研砂十味各半兩

寒水石 卷內大鯽

紅埋土中出大毒七日

右件十一味同為細末大解百藥毒治一切咽喉塞滯口內瘡心腹

脹滿脾積癥塊喉閉喉風涎生不止小兒疳癆誤噎吐子魚骨鯁

棗核等只用藥末半錢抄於口內次用新汲水一口噎之任是毒藥

硬物皆可除化如喫巴豆杏仁石頭鐵札麥棘棘針磁瓦諸般殺人

之藥并蛇蝎諸毒咬氣入腹但是心腹有疾諸藥不能治者只服此

藥立見效驗偏問三焦消五穀除九蟲趕瘟疫及濕痰風閉皆能治之

治小兒魚骨鯁危甚者用此方

黃犬繫其頸并足撐開口使涎出以瓦刮取之將少蜜和勻服

郭捕明方便集磁石丸治骨鯁針鐵等

磁石二錢四分

龍骨二錢四分

右為末和勻熔黃臘丸如小指大煎諸實湯下

寶慶方治大人小兒魚骨鯁痛方

楮桃為末新水調下一錢

曹世榮活幼心書備急散治小兒諸般骨鯁效明喉腫痛

五倍子末

先春茶末

右二味和勻抄一錢湯半盞調化無時少與嚥下依此法服經不
過三五次即效如骨出或刺破處血未多者礪砂末一大錢水煎消
毒飲調服血止痛住腫消食進

小兒食土

方

孫思邈千金方治小兒食土

右取肉一斤繩繫地行數里勿流火炙與喫之。姚和衆候市人合
時買市中羊肉一斤一法以水洗炙依料與喫未喫食者即煮汁銀
之

續利經始方治小兒喫泥

右以膩粉一分用砂糖攪和丸如麻子大空心未飲下一丸。良久瀉

出泥土

姚和衆治小兒食土方

右取好酒浸黃連并洗之

方

孫思邈千金方治落水死

右以窻中灰布地如厚五寸以觀側着灰上令死人伏於觀上使頭
小垂下抄鹽方寸匕內竹管中吹下孔中即當吐水水下因去觀下
死人着灰中墜身使出口鼻即活

又方 窻中灰二石埋死人從頭至足出七孔即活

又方 屈兩脚着生人兩肩土死人背向生人背即身轉走行吐出水使活

又方 熱沙覆死人面上下但出鼻口耳沙冷濕即易

又方 倒懸解去衣去臍中垢極吹兩耳起乃止

又方 裹石灰內下部中水出盡則活

又方 綿裹皂莢內下部中須臾水出

又方 解死人衣交臍中凡落水經一宿尤可活

治冬月落水四肢直口紫尚有微氣者方

右以大器中熱灰使暖盛以囊薄其心上冷即易心暖氣通日待轉
口乃開可溫米粥稍稍吞之即活若不先溫其心使轉大灰身冷氣
與火爭即死

又方 掘地作坑。熱數斛灰。內坑中。下死人履。久濕。輒即易之。勿令大熱。燒人。灰冷。更易。半日即活。

又方 但埋死人。暖灰中。頭足供。沒。惟開七孔。

又方 倒懸死人。以好酒灌鼻中。又灌下部。又醉灌鼻。亦得。已上十二方。

供上切切新書

小兒狐臭

論

果元方病源。小兒狐臭候。人有血氣不和。腋下有如野狐之氣。謂之狐臭。而此氣能染易者。於人。小兒乃是乳養之人。先有此病。染者。小兒孫思邈千金要方論曰。有天生狐臭。有為人所染。臭者。天生臭者。難治。為人所染者。易治。然須三年。暗傳礬石為散。勿止。并服五香丸。乃可得差。勿言一度。傳即差。止可傳。乘時。暫得一差。耳。忘食。甚。薑。五香。治之。終身不差。

方

孫思邈千金要方五香丸。治口及耳臭。令香。止頰散。方

白豆蔻

丁香

藿香

零陵香

青木香

白芷

桂心

香附子

當歸

檳榔

右十一味末之。麝和丸。常含。一丸。如大豆。嚙汁。日三夜一。亦可常含。吞嚙汁。五日。口香。十日。體香。二七日。衣被香。三七日。下風人聞香。四七日。洗手水。落地香。五七日。把他人手。亦香。慎。五辛。下氣。去臭。

治狐臭方

辛夷

芍藥

細辛

杜衡

葉本

右五味。以酒。以淳苦酒。漬之一宿。煎取汁。傳之。欲傳。取。隔。時。以。差。為度。

石灰散。主狐臭方

石灰

青木香

丁香

橘皮

右八味。治下。篩。以。綿。作。囊。子。籠。如。指。長。四。寸。展。取。藥。使。着。囊。上。以。絹。盛。着。腋下。先。以。布。揩。令。痛。然。後。夾。之。

又方

青木香

附子

石灰

礬石

右四味為散。着粉中。帝粉之州。以水煎之。

銅器炒

又方 赤銅屑以酢和。銀器中炒極熱。以布裹熨腋下。冷復易。十全其用。

又方

辛夷

細辛

芎藭

青木香各四兩

右四味治下篩。煎訖粉之。

又方

用馬齒菜一束。搗碎。以蜜和。作團。以絹袋盛之。以泥紙裹厚半寸。曝乾。以火燒熱。破取。更以少許蜜和。使熱勿令冷。先以土布揩之。夾藥腋下。藥痛。久患之不能。然後以手中勒兩臂。

又方 肘後方云。合椒塗之。

牛脂

胡粉各半斤

右二味煎令可丸。塗腋下。一宿即愈。

又方

以伏龍肝作泥傅之。

又方

以五升醬酢和石灰傅之。

孫思邈千金翼方治諸腋臭

石灰五合

馬齒草五兩

礬石三兩

甘松香各兩

右四味合搗篩。先以生布揩病上。令黃汁出。拭乾。以散傅之。滿三日。差水除。

又方 已上千金第一十三方。俱出切要新書。

右二月社日。盜取社家廉豬一團。根地摩腋下。三七遍。擲着五道頭。

勿令人知。永差。人知不效。

小兒諸蟲咬

方

孫思邈千金要方治蛇蝎螫

右服小蒜汁。澤傳上肘後方云。治蜈蚣螫。

又方

熟搗葵取汁服之。

治蛇毒方。消蠟注瘡上。不差。更消注之。

治蛇毒方。人屎厚金帛裹。即消。

又方 以母豬耳中垢傅之。肘後方云。牛耳中垢亦可。

治蝎毒方

又方 以桑白皮汁塗之
又方 以蝸牛活者土研厚塗之
又方 以土薑自然汁煎作濃膏入白礬末少許調厚塗之
治小兒蜘蛛咬方

棗葉 栢葉 五月五日使 生鐵水并小豆
右件藥搗細羅為散以生油和如膏先火炙瘡然後塗咬處神效
又方

雄黃一分 麝香一分
右件藥細研以藍汁一大盞攪令勻點咬處立效
又方

五加皮壹兩 半夏肆兩
右件藥燒灰細研以醋和塗之
又方 生鐵上水醋研濃汁塗之
又方 以菘菜苗一握搗如泥封之
又方 白僵蠶末以津和塗之若有絲出盡量灸

又方 白礬末以葱汁調厚塗之

又方 生白礬末一兩以醋熬成膏厚塗
治小兒卒被諸蜂螫方

露蜂房 白礬五分

右件藥搗羅為末以水煎如膏厚塗螫處效
治小兒卒被狗咬方 乾葛搗羅為末傅瘡上

又方 以地龍糞封之毛出即差
治小兒卒被猫兒爪損及咬損痛方

右取煎刀草搗取汁塗之
治小兒治蜘蛛咬著二日即愈

右生油調鼓末塗之
治小兒治蜘蛛咬出肉即愈

右雄白嚼爛傅之
劉世榮深製其法名方南星散治蝎螫蜈蚣所傷痛不可忍

雄黃一分 草撥一分 半夏一分 白礬一分
右為細末捻一捻就痛處搽之服醋調貼之立効

靈聖散治大人小兒風狗咬破瘡犬咬所傷瘡其效如神

天南星生剉 防風去毒剉

右二味碾為細末先用漿水蔥白槐枝熬湯洗淨乾貼瘡口上日月二度上用膏藥蓋之

雄黃散治蛇蝎蜈蚣所傷痛不可忍貼之立效

雄黃另研 生半夏 川烏尖 乾薑各等分

右為細末乾擦痛處如痛不止用醋調搽其痛立止
曾世榮活幼心書拔毒散治頑犬惡犬所傷不拘老幼並宜可投

斑猫七枚去翅足用屋瓦破入糯米同一處勻炒候米黃為度以乳鉢細研雖過不用水 黑牽牛末或錢半九塊研取末

右二味和勻無灰溫酒調作一服空心投其毒自小便中出或從大腑過似葡萄肉或如犬形見毒出盡尚覺腹中有痛即用青黛入乳鉢拌勻仍羅為末每服三錢并花水調下二服或三服不拘時
小兒疔瘰癧方

蘇忠遺干塗藥方滅瘰癧

右以豬脂三斤飼烏雞一隻令三日使盡後取白膠內白芷當歸各一兩煎白芷色黃去滓內以鷹屎白半兩攪令勻調傅之日三

又方 為除穢半夏等分以雞子黃和先以新布拭瘰令赤塗之勿見風日二十日差十年者亦威

又方 鷹屎白五分 辛夷去肉 白附子 杜若 細辛各十兩

右五味哎咀以酒五合浸一宿以手髓五兩微火煎三上三下去滓於傷瘰上傳之日三

滅瘰癧無問新舊必除方 以人精和鷹屎白傅之日二白蜜亦得治瘰癧凸出方 春夏以大麥麩秋冬以小麥麩好細絹下篩以酥油封之

又方 以熱瓦熨之
又方 以凍凌熨之

鷹屎白五分 白僵蚕各兩半
右二味末之以白蜜和傅上日三俱五年生藥

永樂大典

卷一〇三六

又方凡上九方俱出如切新書

右以臘月豬脂四斤煎大鼠一枚令消盡以生布拭上皮膚令塗之不
過四五上

薛氏珠聖方療豆瘡癩疥面癩土如切新書

右以塞陀僧細研夜塗之明旦洗之平復矣

小兒中水毒

論

孫思邈千金要方論曰凡山水有毒蟲人涉水中覺似刺工而無物莫診
法初得之惡寒微似頭痛日疼心中煩懊四肢振慄腰背百節皆強兩膝
痛或昏昏而熱但欲睡且醒暴劇手足逆冷至肘膝二三日腹中生蟲食
人下部肛中有瘡不痛不痒令人不覺不急治過六七日下部出膿潰瘡
上食人五臟熱感毒煩下利不禁八九日及醫不能治矣覺得之急早視
其下部若有瘡正赤如截肉者陽毒最急若瘡如鯉魚齒者為陰毒猶小
緩要皆殺人不過二十日也欲知是中水毒與非者當作五六升湯以小
蒜五升吹咀投湯中消息勿令大熱去滓以浴之是水毒身體當發赤斑
無異者非也當以此藥治也

方

孫思邈千金要方治中水毒

右取梅若桃李梅絞取汁三升許或乾以少水絞取汁飲之小兒不
能飲以汁傅乳頭與喫

孫思邈千金要方治水毒

右搗蒼耳取汁服一升以綿沾汁津導下部中日三

又方取藜一把搗取汁服一升不過三服

又方取藍一把搗水解以洗面日身令適

又方凡上五方俱出如切新書

右取大菴根末飲之并導下部生蟲者用汁夏月常多將此藥屑入
水浴用方寸匕投水上流無所畏又辟射工凡洗浴以少許投水盆
中即無復毒也

小兒中食毒

方

孫思邈千金要方治飲食中毒煩滿

右苦參三兩吹咀以酒二升半煮取一升頓服之取吐愈

治食六畜肉中毒方

右各取六畜乾屎末水服之佳若是自死六畜肉毒水服黃蘗末方寸匕須臾復與佳

又方 燒小豆一升末服三方寸匕神良

又方 水服竈底黃土方寸匕

治食生肉中毒方

右掘地深三尺取下土三升以水五升煮上五六沸取上清飲一升立愈

治食牛肉中毒方

右取狼牙灰水服方寸匕良

又方 以溫湯服豬脂良

又方 以水煮甘草汁飲之

治食猪肉中毒方

右燒豬屎末服方寸匕犬屎亦佳

治食百獸肝中毒方

右取百獸肝一斤佳亦治諸肉毒

治食野味馬肝肉諸脯肉毒方

右取頭垢如棗核大吞之起死人

又方 燒狗屎灰水和絞取汁飲之立愈

又方 燒猪骨末之水服方寸匕日三服

治漏脯毒方依文仲云牙宜滿水沾脯為漏脯

右搗韭汁服之良大豆汁亦得

治鬱肉濕脯毒方依文仲云肉閉在器中經宿者為鬱肉

右燒狗屎末水服方寸匕凡生肉熟肉皆不用深藏密蓋不泄氣皆殺人又肉汁在器中密蓋氣不泄者亦殺人

治脯在黍米中毒方

右麴一兩以水一升鹽兩撮煮服之良

人以雞肉作麴因食皆吐下治之方

右服犀角末方寸匕得靜甚良

凡食鴉鴨肉成病胃滿面赤不下食者治之方

右服秫米泔良

治食魚中毒方

右煮橘皮停極冷飲之立驗時代方云治食山中毒而腫頰者

食魚中毒面腫頰亂及食鱸魚中毒欲死者方
右剉蘆根春取汁多飲良并治蟹毒亦可取蘆葦并汁飲之愈

治食魚鱈不消方

大黃水兩切

右二味以酒二升煮取一升頓服之

仲景方有橘皮壹兩時後方云

又方 春馬鞭草飲汁一升即消去也生薑亦良時後方云亦宜服諸法藥

又方 燒魚皮灰水服方寸匕

又方 燒魚鱗水服方寸匕食諸鮑魚中毒亦用之

治食蟹中毒方

右取冬瓜汁服二升亦可食冬瓜

治食諸菜中毒方

甘草

貝齒

胡粉

右三體各等分治下痢以水和服方寸匕小兒服乳母服二升并

治食山中木上菌毒方

右取人屎汁服一升良

治食百物中毒方

右掘廁傍地深一尺以水滿坑中取廁籌七枚燒令煙以投坑中
取水汁飲四五升即愈急者不可得但掘地着水即收飲之

又方 含貝子一枚須臾吐食物差

黃帝云服大豆屑忌食豬肉炒豆不得與一歲以上十歲以下小兒食食
竟敢踏肉必擁氣死

孫思邈下食藥方凡六畜五臟着草自動搖得諸醋鹽不變色及墮地不
清又與犬不食皆有毒殺人

凡食飲有毒者澆地地墳起者殺人

凡脯肉熟肉皆不用深藏毒蓋不泄氣殺人若中此毒者皆大糞灰水服
方寸匕良

本草注粟實飼狝兒令齒不生

蕨小兒食之脚弱不行

越瓜白瓜也不益小兒天行病後不可食又不得與牛乳酪及鮓同餐及
空心食令人心痛

小兒食鷄肉好生疣毒

行又以熬飯盛密器中作餅食之毒人至死

痲痛不止

鷄兔肉食成世痢小兒五歲以下未斷乳者勿與鷄肉食

食之物藥如毒參黃芩白芍黃連地山黃紅左人好士食開中謂之

不可多食

不可食酸亦立無力

不可食越及發動致疾

不可食更命不能行

小兒中藥毒

論

藥氣使致煩毒也故謂之中毒

下咽使愈中野毒土漿飲即止如此之事其驗如反掌

及甘草又能加之為甘且易其驗尤奇有人服玉壺丸治嘔不能食

解毒毒鷄腸草散方

生麥門冬 蔥白

右三味以咀以水七升煮取二升半分三服

永樂大典

卷一〇三六

鷄膝草三分 薺菜 升麻各四分 芍藥 當歸 甘草各二分 藍子一分 全土一分

右八味治下痢水服方寸匕多飲水為佳若為蜂蛇等毒所螫以針刺螫上血出者藥如小豆許於瘡中令濕若為村岡前所中刺竹如釵股長一尺五寸以綿纏繞水沾令濕取藥內瘡中隨瘡深淺令至底止有好血出即休若服藥有毒水服方寸匕毒解痛止愈

治腹中有鐵方 取白折炭刮取木并華水服三錢不過再服 孫思邈千金翼方治惡毒藥方

右狗舌草一把去兩頭以水五升銅器中煮取汁搜麩作粥食之 鈎吻果毒面欲死面青口紫逆冷身痺方

右度藍汁飲之 養士必用方金虎碧霞丹施之小兒為害備大蓋小兒臟腑氣血柔弱不能受富有毒藥尤宜慎重已上俱載如心新書

解毒藥毒方詳見卷下 小兒多聞

譚氏休聖方琥珀散 四時無力改形容莫怨神靈并家鬼秘錄分明內印風求取你珠琥珀散 靈方指授急寬通 方

譚氏休聖方琥珀散 琥珀末 真珠末各一分末砂 鉛白霜各一分

紅芍藥一分半 右為末每服一字金銀薄荷湯下 保生信效方簡臺散治小兒骨蒸勞熱骨內五心煩躁又大病後或大下後多睡或全不睡

烏梅肉一兩焙乾 蛇黃一兩研末一分 右同為末每服二錢以薑汁調下若小兒睡起不了了者此為神不聚此能收斂之

風神理神白散治小兒脾困冷瀉多睡不醒喉逆心悶亂喉內生涎 神地黃 人參 茯苓 蒼香葉

甘草少 黃耆各一分 白附子一分

大附子一兩炮去皮

右為細末每服半錢紫蘇湯調下

趙氏家傳六神湯治小兒因病氣弱或因吐瀉胃虛生風精神沉困不思乳食竹時欲吐養氣補虛進食

人參 白朮 白茯苓 乾山藥

歸黃耆 天利 去皮細切各一兩甘草炙半兩

右為細末每服半錢白湯煎服

吉氏家傳治瀉後脾胃虛四肢逆冷眼慢多困心躁寒水怪脾散

冬瓜子 去皮一兩 桑白皮 硃黃土各半兩

膩粉一錢

右四味同研勻和每服半錢至一錢煎冬瓜皮湯調下日進四服服後體熱可因良久瀉疎上住却服蒼蒼丸方見症門中

朱氏家傳醒脾散治脾積冷多困

天南星一兩 大麥蘖 白附子 良薑月水煎炙

至黃地 八月兩至去其薑以水一盞煎乾焙研

碎集好去皮用麩裹煨香

右為末每服半錢用冬瓜子煎湯調下去火子服

長沙醫者鄭愈傳醒驚丸治驚風恍惚然取下驚延

龍腦半錢 朱砂 牛黃 麝香半錢

乾蝎一箇 京墨 青黛 蘆管各半

使君子七箇 膩粉 金銀箔各五片

右為末以寒食麩糊為丸如梧桐子大金銀箔為衣二歲五歲已上二丸薄荷湯化下

永樂大典卷之一千三十六