



慢驚

方傳慢驚證治

六一保生丹

治慢驚尚有效

全蝎精首去

白附子王

直僵蚕

牛膝南星

蟬殼

玃珀各二錢 麝半錢

防風 朱砂珍珠

右為末粟米糊圓如桐子金薄衣每服一圓薄荷湯調下

醫晉丹方傳慢驚可用

人參

伏神

玃珀

天麻

直僵蚕炒

防風

南星炮

白附生

蝎炙

烏蛇肉酒浸朱砂半錢

麝少許

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓薑蒲湯調下

注唱歌治方得慢驚

全蝎七燭去 蝉殼二箇 甘草炙 天南星一箇

右為末每服半錢薑棗煎服

神保既 分陰陽平冷熱定吐瀉豁痰涎

硫黃 硃砂 五靈脂 青皮

陳皮 半夏麩炒等分

右硫硝夾研用磁器鑿汁傾出候冷再研細旋入諸藥末拌

和粟米糊圓麻子大每服三圓食前米飲下

天後丹 升降陰陽疎風利痰方見血氣類

王氏 治吐瀉脾困內虛

人三 伏苓 木香焙 天麻

白扁豆製 陳米炒 全蝎焙

右等分為末每服半錢薑棗煎服

聖王 治吐瀉脾困不食

全蝎焙半 白附子炮 天麻焙 甘草炙

人參 白伏苓 石菖蒲細切 木香

石蓮肉 白木各

右為末每服參字薑棗煎服有執者去**宋香**

本

南星 白伏苓 橘紅各 分合蝎焙

北草炒 白附子炮 石蓮子 人參

木香各半 分陳倉米二百粒

右為末每服參字薑棗煎服 醒脾兩方通用亦可酸乳

小兒胃虛不消乳食尤須節細

白 驅風豁痰

人參 防風 白附子生 直僵藤

全蝎各 南星各 天麻各

右為末飛白麩糊圓桐子大每服一圓薑湯調下

已傳假驚證治

犀香全陽散 治慢驚風昏迷痰搐

南星溫樹根 木香

人參

橘紅各一

全蝎炙三箇 甘草炙半

右判細每服一錢入紫蘇薑棗濃煎旋以匙送下有熱加
定命飲 治慢驚吐瀉困重欲傳慢脾通用

圓白半夏生 伏苓

木香

老生薑切片

白木

甘草炙各半

右為末每服半錢薑棗煎湯調下

四聖散 治慢驚痰瀉虛執若有昏亂視搖轉證狀以少許用管吹
入單中

全蝎七箇

直僵蚕醋 大南星乾 皂川烏並封

右將南星為末水調作餅果用 山溫外用溫紙重包放火
灰中煨令赤色頓地上一伏時為末每服一字煎金銀湯點

好茶清小許調下

四君子湯 四君子湯如川烏生薑炮炙

半錢麥冬煎服如再服即去川烏

雷聲散 驅風豁痰

南星

重八九分以外者明一箇就地上作小坑正七以

南星於內伏時取出洗淨如

右為木入琥珀全湯末各壹錢每服半錢煎生薑防風湯

烏沉湯 慢驚驅風助胃

天麻二子

人參

真川烏生 全蝎焙

南星炮

木香

沉香各乙子 甘草焙半

右判散每服叁字姜三片慢火煎取其半與之

沉香散 生胃氣止吐瀉

伏苓二分

沉香

丁香

木香

藿香

川厚朴製

甘草炙乙子

右為末每服一字米飲調下

慢驚下痰証治

二大南星丸 治慢驚痰壅惟身執者可服

南星

一斤每重一兩上下者用溫湯浸洗去裏外淨皮并虛殼更令淨用酒浸一宿用藥七葉不性添煎湯令金箔愈內氣更不佳酒煎令藥稠七伏時取出用銅刀子切開一筒大者要少許不碎舌邊藥末即切細焙乾

麝香

研 丁香 各乙兩 龍胎 研 一兩半 辰砂 別研木炭末所

右為細末入研葶勻煉蜜并酒團末砂為衣每服一豆許生

姜煎湯調下 蘇合香丸 一倍方見血氣類 白丸丁 二倍方見痰飲類 夾和每

服半錢姜湯調下

神保既濟丹 治慢驚痰盛見方傳世醫門

蒙石散最能利痰急慢脾風通用

青礞石 一兩 煅消 用炭火燒令紅腫冷

右為末 聖糕薄糊團綠豆大每服二丸急風用酒煎調下

調下慢風慢脾風用 白香膏湯調下 蘇合香丸 古文錢

雖能利痰然其性非胃家所好須以木香佐之

五靈脂 醋煎 白附子 累炮 木香

全蝎 焙半分 朱砂 一分 大南星 溫紙炮半兩 直僵蚕 各一分

右為末 米醋煮生半夏糊為圓麻子大每服三九姜湯送下

七珍丸 治諸風頑痰壅盛大小通用

細辛 川靈脂 直僵蚕 各一分半

白附子 一分 朱砂 半分 全蝎 四箇 焙

右為末 用大南星生為末 煮糊丸麻子大每服伍九姜湯送下

慢脾風生胃回腸治法

治慢脾風盛四肢厥冷

附子 炮法 木香 乙多半 白附子 乙多半 甘草 炙半分

右到散每服三字姜伍片煎取其半以肥送下若手足變面

蘇省即止後劑

烏散驅風回陽

真川烏生五分全蝎

木香各半分

右為末每服三字薑四片煎取其半旋滴入口中嘔吐者加

一香

至液丹

方見血氣類

白丸子

等分祛風回陽二藥為末每服

錢陳米飲調下

生附四君

助胃回陽四君子湯加生附子末四分之一厥

逆者對加每服半錢姜五片慢火熟煎以皂莢

附子散回陽氣豁風痰

全蝎七箇

附子炮二分南星

白附子炮

木香各乙末

右為末每服半錢姜四片慢火熟煎

白附子散回陽氣豁風痰

白附子

黑附子

南星

半夏各五分

右為末井水浸七日逐日換水浸訖控乾次入

每服一字生姜湯調下

正胃回陽能止嘔吐溫利痰涎但瀉者勿用為細末以少

許米飲調下或用糕糊丸如粟米大兒兩三九米飲灌

靈丹方見血氣類治慢脾風吐瀉不止每服一丸研細

南不香煎湯乘熱調下已上諸藥溫熱並乳食前服

付方

治嬰孩小兒急慢驚風

防風

去毒

人參

白木

遠志

茯苓

去皮

茯神

川芎

僵蠶

白芷

蓮肉

甘草

天麻

煨

白附子

桔梗

天南星

羌活

去毒

琥珀

鉤藤

全蝎

辰砂水獺

蟬蛻去腹足

麝香角

金箔二十

山藥炒

右為極細末煉白蜜印錠用薄荷煎湯研化不拘時候服之

人參去芦

赤茯苓去

甘草炙

山藥絡五

辰砂水獺

桔梗細格 乳香手

麝香一分

右為極細末煉白蜜為餅用薄荷煎湯研化不拘時候服之

急慢脾風

慢脾風下痰証治

神厚既濟

見方傳慢驚門

白僵蚕九方 傳慢脾陽氣未甚脫者可用亦能截風

牛膽酸南星

直僵蚕炒

錢子地龍乾

五靈脂

全蝎焙各一分

右為末水煮生半夏糊丸麻子大每服伍九姜湯下

辰砂雷治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐

黑附子子重用 川五靈脂以炭火三七燒存性

南星炮半兩 白附子炮 川五靈脂蝎持各一分

右為末煉蜜丸桐子大每服一九生薑汁泡湯調下

七五神效 利痰奇效慢驚慢脾通用須以

匙頭於炭火內燒少頃四圍上下各出黃白珠子將出候冷傾

入盞中只作一服煎水吞煎湯送下煎湯亦得

急慢脾風証治

星珠散治諸風口噤不語

天南星略炮 剉散每服三字菱四片紫蘇伍葉煎取其半和

入酒 汁少許溫和服九不語者大小便須要調導治慢

風不語只用南星更以石 為佐

木通湯治諸風失音

木通

石昌蒲

防風

北梗

桑螵蛸

全蝎焙

直僵蚕

甘草各一分

南星累炮半兩

右剉散每服三字紫蘇三葉姜三片煎熟與之大便不通更

加聖丸治驚風痰盛搐搦口眼牽引

烏蛇肉米酒浸

直僵蚕炒

防風

天麻

南星牛膝製

五靈脂

代赭石煅

各二分半

全蝎焙

朱砂各一分

右為末粟米糊丸桐子大每服一九急驚風湯調下慢驚

用生姜湯

虎睛一對

全蝎焙

天麻

防風

南星原

直僵蚕炒

烏蛇肉各一分麝香一分

右為末麪糊圓桐子大每服一圓薄荷湯調下

南星聖神散治驚風痰挑

天南星不去皮切片

生姜切片

右用竹箒一條以南星并聖相間挿定次用藥此字捺於

南星生葉片間風乾為末每服一字薄荷紫蘇泡湯調下

人服半錢或吐或汗或下即病氣出也

鎮心丸急驚化痰鎮心

朱砂

龍齒

牛黃各一分鐵粉

琥珀

人參

伏神

防風各二錢

全蝎七小片

右為末煉蜜丸桐子大每服一九薄荷湯調下如無藥以

牛膝南星代之

木香湯治慢風慢脾得效

南星 溫紙 梟白附子 天麻 木香

橘皮 白茯苓 石蓮肉 各一分 黃耆

白木 石昌蒲 甘草 各半

右為龍末每服半錢姜棗煎服

折 治驚風刺手癱反折

赤蜈蚣 全者 酒浸 花蛇肉 酒浸 直僵蚕 各二

南星 炮三錢 朱砂 蝎梢 各一 乳香 半

麝一字

右為末飛白麩糊圓桐子大每一丸金銀煎湯淘薄荷調下

○莆陽趙公施此多所全活

天 萬金丹 治驚風痰熱

代赭石 碾 全蝎 焙 朱砂 號均各一錢

南星 溫紙 梟 白附子 生 防風 烏蛇肉 酒浸 炙

天麻 各一 麝 一字

右為末粟米糊圓桐子大每服壹圓急嚴陣荷湯調下初傳

慢驚尚有陽證用 **人參** 湯

香餅 治慢驚初傳涎潮昏搐

全蝎 四個 麻黃 薑汁 浸 花蛇肉 薑汁 浸 人參

烏蛇肉 並酒 直僵蚕 薑汁 浸 白附子 焙

天麻 防風 各壹錢 乳香 半錢 麝 壹字

右為末用 **南星** 末 煮糊圓桐子大捏作餅日乾每服壹餅薄

薑湯調下

保命 治驚風搐掣胎動驚夜啼

青色全蝎 各肆 防風 天麻

白附子 蟬殼 直僵蚕 炒各貳錢

南星 炮參錢 麝半錢

右為末粳米飯圓桐子大朱砂衣每壹圓薄荷湯調下

清散 治慢驚身熱痰滯

大乾蟾

壹个煎叁炙黃

宜僵蚕

蟬殼

蝎尾

白附子微炮 五靈脂

蘆薈

琥珀各壹分 朱砂壹錢

麝半錢

右為末每服半錢前湯調下

伏脾湯 治慢驚脾因不食和胃祛風

大南星

壹兩剉如葶子黑用鹽薑壹兩切細用酒壹升煎

白伏苓

半兩 木香

天麻

全蝎叁个焙

人參

各壹錢半

右為末每服半錢甘草生薑煎湯調下

助胃膏 治慢風吐瀉不進乳食

人參

白木

石蓮肉各壹錢 丁香

檀香

舶上茴香炒 白豆蔻

木香

甘草叁各壹錢

右為末粟米糊圓桐子大每壹圓陳米飲調下脾困不健

參瓜子白 前湯

施附湯 治慢脾風厥冷吐瀉

沉香

丁香

木香

黑附子炮

白附子焙

全蝎焙

霍香

天麻各壹分

右為末每半錢炙甘草生薑煎湯調下身温則表

鎖痰圓 治諸風頑痰喉風纏痺

北礬

水飛此直僵蚕各壹分

大南星切半壹錢前水

右為末稀糊圓麻子大每服五圓姜湯送下喉風用

水研開灌下

刺痰丸 治諸風諸癰痰熱

圓白半夏生

右為末旋入薑汁略拌鬆吹以香潤五靈脂研細

末各壹錢黃辰臘二錢夾和研揉得所圓如麻子大每

服四五圓薄荷生薑泡湯送下隨大小增減用

慢驚慢脾危惡蓋候藥力不到者但看兩脚面中間陷處有
太衝脉即灸百壯其穴直取前後髮際折中橫取兩耳尖
折中在頭之中心端正旋毛外是也如有雙旋及旋毛不正
者非所捏文柱約如小麥許但三五壯而止灸後仍與醒脾
之劑

附方

加味大醒脾散治小兒慢脾風內虛昏迷不醒

人參去芦

白附子炮

天麻煨

甘草炙

全蝎去毒

石蓮肉去心

茯苓去

水香

白木去

石菖蒲細煎

橘紅去

山藥炒

天南星去膽

石豆蔻細煎

肉豆蔻細煎

山藥炒

確炒去殼

丁香半

肉豆蔻細煎

山藥炒

右咬咀用生薑三片枣一箇去核同煎釜煎服回陽加附子
去麻皮尖炮白薑

客忤

客忤方論

客忤者小兒神氣嫩弱外邪客氣獸畜異物暴觸而忤之其候
口吐青黃白沫水穀鮮雜面色變易喘息腹痛及側瘦瘵狀似
驚癇但眼不上竄耳林來弦急而數視其口中縣癰左右若有
小小腫核即以竹針刺潰之或以瓜摘之治法研邪正氣散驚
定心延久則難為力也 大九客忤中患急作醉後仍以陰真

客忤證治

唯射散治客忤腹痛危急

雄黃一

乳香半

麝香一

右為細末每一字刺雞冠血調灌之

蘇合香丸

方見咳嗽門用薑湯調灌次用三合水濕掃為圖

如雞子大以摩兒額上及足心各五六遍次摩腦心及上下良
久臂開自有毛即擲之

射香散

麝香少許研細乳汁調塗口中仍以母衣裹其身即愈

犀角散 治客忤驚啼壯熱

天麻

犀角

麥門冬

芍藥

朱砂各

小鐵粉

雄黃半

麝少許

右為末每服半錢以全銀煎湯調下

三安神丸

生犀末

人參

茯苓

菖蒲

朱砂

雄黃等分

右為末研桃仁膏為圓如麻子大每三圓紫蘇湯下

伏七肝方

竈中黃土和醋搗圓裹于大麻子兒頭以五心

千發龍膽湯

方見胎驚風門

馬尾

治中馬汗氣臭忤或馬鳴聲忤
馬尾燒煙重兒面類熏以瘥為度



驚馬風雜治

敬馬積方論

驚積者受驚日久而積成之其狀額上有汗喘息煩渴潮熱往
來肚皮有熱睡中資腹內有物跳動瀉下如白脂此沙是也治
法量輕重而疎導之仍與調氣和胃取愈大凡小兒腹脹或熱
或脹或硬皆為內實法當疏利

敬馬積證治

辰砂膏

疎利驚積方見風禁門

青龍圓

治驚積有熱

青黛

伏神

麝會

南星

一

鹿茸少許

輕子粉

巴霜一字

全蠶三小指

右先將巴豆研如泥次入諸藥研令極細圓如粟米大

宋眼圓

治驚積方見胎毒風門

天藥方論

天藥壯熱驚悸眼目翻騰手足抽掣或啼或笑喜怒不常甚者
瓜甲背青如蟲之狀蓋由乳母酒肉過度煩毒之氣入乳而獲
乳兒遂使心肺生熱痰鬱氣滯加之外挾風邪致有此耳治法
解利風熱取愈

天藥證治

約證

約證

白伏苓略半大黃晶紙裹罌二子半

防風

朱砂

蟬殼

羌活

燭活

青皮

甘草炙各二子半

右為麩米每服一錢姜葱煎服

假命丹

全蠶焙

蟬殼

直僵蚕微炒天麻

犀角

天漿子細子白附子

南星炮

青黛

朱砂

川姜黃各等麝少許

右為末雄猪膽汁為圓薑大先將井水調開一圓入單令
噉次以

驚風內瀉方論 附整腸氣中痛

驚風內瀉腹痛多啼唇黑震腫偃僕及張眼內有紅筋斑血者
是蓋寒氣確結兼驚風而得之又整腸氣血虫流亦令腹痛多
啼偃僕相若但整腸氣痛則腰曲乾啼額上有汗是小腸為冷
氣所搏然爾虫痛則嘔吐清沫痛有去來是疳化為蛔臟腑留
滯然爾內瀉用調氣疎風鎮驚之劑整腸氣用溫和調氣之劑
虫透用殺虫之劑條列于後請詳審之

驚風內虧治

香圓 治驚風內虧腹痛驚啼

乳香半手 沒藥 沉香各一手

蝎梢十四个 雞心檳榔一手半

右為末煉蜜圓桐子大每服二圓圓 麝香煎湯調下

木香圓 治驚風內虧肚痛驚啼

沒藥 木香 舶上茴香 炒鈞藤等分

金蝎 乳香各半

右先將**乳香** 沒藥 別研次入諸藥末和畢取**天** 少許研細

和圓桐子六日乾每二圓圓 湯下

白豆蔻散 治般腸氣痛

白豆蔻仁 縮砂仁 青皮 陳皮

甘草炙 香附子 蓬莪木各等分

右為末每服一錢蘇煎湯調下

羅蔔子散 治般腸氣痛

羅蔔子炒黃不拘多少

右為末每服半錢錢 煎湯調下或口父錢 圓則用薑

湯調下

化蟲圓 治虫痛

蕪荑 川鶴虱 雞心檳榔

乾蝦蟇炙焦各一分 薑薑各半

右為末雞心檳榔 為圓麻子大每服五圓陳米飲下或史君

子前湯送下九虫月首則頭向上凌晨可服藥

安息香圓 治內虧盤腸氣弱虫痛通用

安息香 桃仁蛀燬 蓬莪木炮 史君子肉各半兩

阿魏一手 茴香炒 全蝎各一分

右阿魏 并安息香 以酒少許就湯瓶口上以桑葉葉 蓋落去沙

旋入桃仁 同研次入諸藥末煉蜜圓桐子大每一圓生薑湯

調下

香散 治小兒臍下氣塊疳痛

芸臺子炒

蓬莖木

茴香炒

青皮

甘草各一分 辣桂

木香各半

右為末每服半錢鹽湯調下

官桂 當歸

川白薑

木香

川芎

香附各一分

右為末每半錢白水煎乳食則服

當歸

沉香

木香

桂

附芎各半兩丁香二錢

右為末每一錢用薑煎食前服

附方

釣藤

人參去芦

犀角各半

甘草各二錢

全蝎去毒 天麻一分

右咬咀水煎不拘時服

中風

中風方論

小兒中風者以其血氣未定寒濕失調內則盛熱蘊蓄外則腠理虛開故風邪乘其氣虛而暴中之其狀昏不知人壯塊狂燥搐掣氣逆口噤涎潮是也心中風則偃卧不能傾側發熱尖音其舌焦赤若汗流唇赤者可治矣或唇間白黑青黃乃心壞為水或面目赤七時七棟動者並不治肝中風則踞坐不得低頭左脇疼痛諸筋變急頭目顛動上視多怒其目青若遠兩目連額微青唇青面黃者可治矣或大段青黑其目一黃

一白者不治腎中風則踞坐面浮腰脊痛引小腹其耳黑若兩
脇左右未有黃色起者可治矣賢或脇間如黄土鬚髮蒼而
齒黃赤者不治肺中風則偃卧胃滿喘息咳嗽燥悶汗出其鼻
白若目下至鼻四圍及口間白色者可治矣賢或色帶黃乃
肺寒為血併手尋衣縫者不治脾中風則踞坐腹滿皮肉顛動
四肢不收其唇黃若一身通黃口吐鹹汁者可治矣賢或手
足青而厥冷者不治凡人為風邪所中皆從背上五臟俞入之
風入於頸頰之筋則口喎而牙噤風塞於咽喉舌音之門則語
不出而失音風與氣搏氣以痰隔則喉間如軒幹之響是風也
始入於腠胛次達於經絡而搏於筋脈筋得寒則拘急筋痛得
熱則緩弛不隨風挾寒邪即響急也風挾熱氣即緩弛也挾寒
而拘學脈必浮緊挾熱而緩弛脈必浮洪寒者與小命為熱
者與大命為風毒則散之類大抵脈浮者病在表脈寒者病在裏脈
促者病在上在表則發散之在裏則疏導之促於上而胃膈強

溼者湧吐之若虛寒溢候則閉又不可闕古人治法雖
以灼艾為本亦須消息權度而投劑焉此法自大人方論常觸
而得之若遇大人中風即以此排也雖然風寒暑溫皆能中人
况又有因氣而中者人之繫病莫若中風一時倉卒若未能辨
審且先與下氣豁痰蓋諸中皆因痰鬱氣滯而作通關以逐急
以商星商星治卒中氣豁痰生薑煎湯和蘇合香團建

下牙緊者商星商星末之入烏梅點擦目開進藥之後痰

消氣下病勢稍蘇即子細辨認五臟外證而調理之至若口開
手散噓氣籠大喉間軒輪喉眼合眼淚血遺尿或面色如緋或
面色黯慘或汗出如珠如油皆惡候也又一證小兒多因傷風
咳嗽不能發散遂成肺風其候喘促涎潮面色青黃目能認人
口不能言如此者當以白白白之仍灸商星
取愈。大人小兒凡病頭面冷如按瓜或鼻冷不回或汗出髮
潤其身如洗皆不可救

五臟俞穴

二穴在背上第五椎骨下兩傍各一寸半
三穴在背上第十四椎骨上第九椎骨下兩傍各一寸半
四穴在背上第十四椎骨下兩傍各一寸半
五穴在背上第三椎骨下兩傍各一寸半
六穴在背上第十一椎骨下兩傍各一寸半
七穴在背中小麥許但三五壯而止取分寸決大人小兒異取
左手女取右手比量中指第一節為一寸見千金翼方第一節者指根是也

中風證治

中風昏潰或狂語或失音

白鮮皮

白木

芍藥

官桂去蘆皮

川芎

當歸

杏仁 麩微炒

防風

甘草煖略

麻黃去節

川獨活

白茯苓各七升

右細劉每服一錢薑二片煎

續命湯治中風不省人事涎鳴及張失音厥冷

麻黃去節

人參

黃芩

川芎

芍藥

甘草

杏仁 煖炒

防己

官桂去蘆皮

防風 七升

附子炮去皮

右除附子

外並

糖丸龍末吹入二味夾和每一錢薑三片煎袋前服

片煎袋前服

交濟湯治中風肢體緩弱筋上疼痛

續命湯 二藥夾和入雞心攪用生薑煎服以

薑生飲治中風

南星炮用

細辛

半夏

白者

南木香各一升

細辛

石菖蒲

蒼朮

各半升

甘草

各半升

右到散每服一錢薑三片慢火煎取其半調合香圓一粒灌下痰盛者又加全蝎

星香飲治中風

南星二錢

木香

橘皮各一兩

全蝎二個焙甘草炒半斤

右劉細每服一錢薑三片慢火煎熟與之虛冷者加附子

川烏少許添薑

附子散治中風厥冷

生附子一分

木香半分

右劉細每服半錢薑四片煎服

阿膠散專治小兒肺風喘促涎潮竄眼斜視

透明阿膠劉細炒如珠

右用紫蘇烏梅肉焙乾末之為衣煎湯送下或以阿膠炒為末和同煎亦得阿膠有神此驚風後眼

中瞳人不正可以阿膠一倍參半倍煎服之

追風毒劉散治中風內外皆熱

大黃一分

檳榔

桑白皮略煨羌活一兩

防風半兩

郁李仁一分炒

右劉散每服一錢黑豆三十粒同煎乳食後服

肥兒丸治風後瘡不能言

蘇美

神麩

麥蘖各炒

黃連等分

右為末荷膽丸麻子大每服五圓用陳皮末史君十炙

甘草煎湯送下蓋黃連能去心竅惡血故爾

星麻散不通治中風不語方見急慢脾風諸方明

通屬散方見急驚門

附方

驅風散治嬰孩小兒卒暴中風全不能言口眼喎斜驚癇搐掣

痰實煩悶神昏有熱睡臥不穩

防風去蘆天南星生去甘草生

半夏去

黃芩炒

右咬咀用白蜜三片同煎不拘時候服

風寒治嬰孩小兒五臟中風身熱不能自收胃悶不知疼痛口不能言筋脉物急手足抽掣

防風去毒

犀角

麻黃去節

當歸去尾

川芎

羌活去節

人參去節

遠志去心

茯苓去皮

甘草炙

右咬咀用水煎食前服末除根本不成補疾

白圓子治嬰孩小兒驚風中風痰盛

白附子炮

天南星炮

半夏去毒

天麻

全蝎炒

蠶蠶去毒

川烏去皮

右為極細末生

黃麩糊圓如

大用

煎湯不物

時侯服



痙瘓

痙瘓方論 首昂 首昂 首昂 首昂 首昂 首昂 首昂 首昂 首昂 首昂

發熱證候先傷於風又感寒濕致之此虛極生熱也極生風之甚者也傷風發熱頭痛汗出又自嘔逆汗之必發瘧濕家發汗酌多亦發瘧婦人新產血虛汗出傷風發瘧無疑矣項背強直腰身反張搖頭掣癢噤口不語發熱腹痛鎮日不醒其狀可畏病在足太陽經剛瘧無汗柔瘧有汗其面紅眼赤牙緊手張痰涎壅盛昏潰煩渴小便赤澀先識語而發者此剛瘧也其大便滑泄不渴不語手足冷而發者此柔瘧也剛柔二瘧亦如陰隔陽比隔陰之類剛瘧為之發汗柔瘧為之解肌並以加減剛瘧去用用柔瘧去用用大便利而厥逆者則以佐之其間一證身熱壯熱識語口乾手足反微寒大便反滑泄此為剛柔不分之瘧可用生附子小續命湯麥之得病以來無汗則按方有汗則慎勿用也其若痰壅氣盛則以平夏以消其痰燥費燥皮以順其氣痰消則風止氣順則神醒治療之法先與消痰順氣為上嗣

是病勢猶止，然後審其熱之輕重而解利之。熱輕者與天承氣湯，熱盛者與小柴胡湯。壯熱曾滿口，禁咬齒而大便秘結者，是為內實，天承氣湯下之。又法剛痊兩劑，黃芩湯，柔痊桂枝加葛根湯，瘥最難痊十救其一，過三日不治，請單圖之餘，見傷寒類書活人總括。

瘥瘥證治

小續命湯

方見中風門

防風溫膽湯 消痰順氣疎風

半夏製

枳殼 梔子

茯苓 各半兩

橘皮

防風 各半

甘草 炒 一兩半

右劉散每服一錢，入生薑紫蘇煎服。

敗毒散

人參

茯苓

甘草 炒

芎藭

前胡

羌活

獨活

柴胡

北梗

枳殼

右加防風等分為龍末，每服一錢，薄荷少許煎服。

小柴胡湯 治剛痊有熱

柴胡 一兩

黃芩

人參

半夏製

生薑 各半

甘草 炒 一錢半

右劉散每服三字，入棗煎服。

天承氣湯 治剛痊曾滿內實口禁咬齒

大黃

芒硝 各半兩

厚朴 一兩

枳殼 二枚

右劉散每服三字，姜三片煎服。

麻黃葛根湯 治剛痊無汗

麻黃 去節

赤芍藥 各一兩 乾葛 兩

葱白 三莖

豉 半合

右劉散每服三字煎服。

桂枝葛根湯 治柔痊有汗

桂枝

芍藥

甘草各六分

葛根二兩

生姜一兩

大棗四枚

右劉散每服三字煎服

理中湯治柔痊厥冷自汗

人參

川白朮炮

甘草炒

白朮等分

右劉散每服三字煎服

三生飲治柔痊自汗肢體厥冷

天南星生 兩 川烏生

附子各半兩 木香一分

右劉散每服一錢生薑伍片慢火煎取其半通口與之

附方

至聖散治嬰孩小兒中風痊病昏悶不醒

全蝎尾去毒

藜朮煨

天漿子

白附子炮各

辰砂一分

麝香一分

右為極細末用酒煎湯入酒二三滴調化不拘時服

瘧疾病強直歌

強直反如弓 神昏似中風

涎流唇口動 瘳瘳與癩同

小兒瘳瘳病停中

乳食有時開口懶

情似顛顛少舒容

睡臥多驚如搐搦

目睛半斲似癩風

項纏脣疊剛柔痊

細辨陰陽始見功

發癇

發癇方論

癇者小兒之惡病也小兒血脈不斂氣骨不聚為風邪所傷為驚怪所觸為乳哺失節停滯結癖而得之其候神氣佛鬱瞪眼直視面目牽引口噤涎流腹肚膨堅手足搐掣似死似生或聲或黑或項背反張或腰脊強直但四軀柔軟發而時醒者為癇若一身強硬終日不醒則為瘳瘳矣癯曰癯病關五臟而亦

目瞪吐舌齒齩心下煩燥氣短息數者曰心癩面青唇青其眼
上竄手足拳攣抽掣及折者曰肝癩面黑而晦振目視人其吐
清沫不動如尸者曰腎癩面如枯骨目白反視驚跳搖動亦吐
涎沫者曰肺癩面色痿黃眼睛直視腹滿自利四肢不收者曰
脾癩此五臟之證然也調理之法惟以**風食**三種陰陽二證
別而治之**風癩**者汗出解脫風邪乘虛其初屈指如計數有熱
生痰是也**食癩**者震駭懷怖打墜積驚其初驚叫大啼恍惚神
魂是也**食癩**者食時得驚停宿結滯其初吐乳不哺大便酸臭
或結成乳癖先寒後熱是也別之以陰陽則始者身熱有熱油
掣啼叫是為**陽癩**陽病脈浮面色光澤病在六腑肌膚此猶易
愈始者身熱無熱手足清冷不抽掣不啼叫是為**陰癩**陰病脈
沉面色黧晦病在五臟骨髓此最難痊或以仰卧屬陽覆卧屬
陰亦可參驗蓋陽證不可用溫陰證不可用寒**風癩**則先為之
救**食癩**則先為之利驚**食癩**則先為之消積續以**定癩**皆利

主之若臟若腑一陰一陽是為不可無如大禁血滯心驚
在心積驚成癩通行心經調平心血順氣豁痰又其要也然
小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安常驚悸此皆發癩之漸
即以**驚風**導之時間量與**驚風**戒其盛氣則無驚風癩
之患癩證方萌耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之為爪
破須令血出啼叫尤得氣通渾濯兒衣不可露天恐為純雅落
羽所汚染觸其間未有不為癩也 兼和怪者而色變易不常見
人羞怕諸癩瘡不能言者蓋咽喉為氣之道路風傷其氣以掩
聲音道路之門抑亦血滯於心心竅不通所致耳**南星**炮為末
雜指**膽**調和少許啖之輒効若夫**靈氏五癩**并**南星**散以
高糖煎湯調下**甘遂**倍心湯以和**靈合香**皆治癩之要藥也
故表而出之

諸癩不治證候

目直無聲 目睛不轉 眼生白障 眼慢唇黑 瞳人瞬動

眉間色青黑 面青指黑 口中涎沫如白膿 口禁肚脹不乳 喉如鋸聲多睡不乳 身熱下血不食 身體痿軟不醒 腹痛虛鳴 厥逆而痛 吐利不止 汗出壯熱不止 胃久不寐 癩瘡身體反張大人脊下容側手小兒脊下容三指並不治 諸癩僵仆搗掣但扶持之謹勿把捉

風癩證治

散風丹 治風癩先用此

黃牛膽貳錢 羌活

獨活

防風

天麻

人參

荊芥穗

川芎

細辛各壹錢

右為末煉蜜圓桐子大每服貳圓薄荷紫蘇泡湯調下

保安圓

治諸風癩久遠亦驗

川烏

生去皮尖貳鈔半

五靈脂半兩

右為末指心血圓如桐子大每壹圓薑汁泡湯調下

獨活湯 治風癩解表通裏

獨活

麻黃去節

川芎各一錢

大黃焙

甘草炒各半錢

右剉散每服三字姜二片煎服

細辛大黃湯 治風癩內熱

天麻

防風各半兩 細辛

大黃焙

川芎各一分 甘草炙一錢半

右剉散每服三字入風筒少許煎服

牛黃圓 治風癩迷悶抽掣涎潮

牛膽汁和南星末風乾

全蝎焙

蟬殼各二錢半

防風

白附子生

天麻

直僵蚕炒各半

麝半錢

右為末以煮棗去皮核取肉和水銀半錢研極細次入藥末和圓如菉豆大每服一圓荊芥生姜湯下

驚癩證治

比金膏驚癩先用此

人參

琥珀

白茯苓

遠志肉 姜製焙

岑砂

天麻

石昌蒲

細節 川芎

南星 煨汁 煨麝 一字

青黛 一錢

右為末 煉蜜圓 桐子大 每服一圓 金銀前湯 泡薄荷調下

驚癩治一切驚癩

紫石英

煨鐵粉

滑石

遠志肉 姜製伏神

人參

琥珀

熊膽 半分

輕粉 三字

蛇黃 煨盡 洋龍齒

熊膽 半分

輕粉 三字

右為末 煉蜜圓 朱砂衣 桐子大 每一圓 金銀湯調下 或用

猪乳 調拭入口中

虎睛丸 治驚癩邪氣入心

虎睛 細研

遠志 姜製焙 犀角

大黃 煨

石昌蒲

麥門冬 焙

端娘 去尾 焙

右為末 粟米糊圓 桐子大 每服一圓 竹葉煎湯調下 或金銀

煎湯下

七寶鎮心圓 治驚癩心熱

遠志肉 姜製

雄黃

鐵粉

琥珀 各二

朱砂 一分

金銀箔 片二十 麝 少許

右為末 棗肉圓 桐子大 每服一圓 去心 麥門冬 煎湯下

青神湯 治驚癩

犀角

遠志肉 姜製

白鮮皮

石昌蒲

半夏 煉一分 伏神 半兩

大黃 焙

人參 甘草

右為末 每服三字 去心 麥門冬 煎湯調下

寧神僧 治驚癩入心 不語神效 諸驚失音 大人通用

寧神僧 為細末

右每服一字 米醋湯調下 大人用二錢 熱酒調下

食積蓋治

聖丹 治食積先用此取積

代赭石一斤 赤石脂末 巴豆二十粒去皮 杏仁五十個去皮

右件合研細湯浸蒸飯圓麻子大每服三圓米飲下

聖丹 食積通利

代赭石一斤 雌黃 蝎梢 朱砂各一分

輕粉 麝各一字 巴豆三個去皮 杏仁去皮尖

右為末蒸棗肉圓桐子大每服一圓天香煎湯調下

天聖丸 治食積方見元氣卷重下門

定瀉治法

錢氏五瀉圓

朱砂半兩 水銀一分 鈇三兩露隔次

雄黃二兩 真珠研細

右為末煉蜜圓麻子大每服二圓金銀煎湯下

方見已傳 瀉瀉 如大便取下惡物急與胃之劑

五瀉圓 治五瀉顛瀉及心風血迷神奴

其遂末壹錢

右用帶性猪心管筒取參管頭血參條和五散如血多只

隨藥末得中和之將五散批作兩片將所和藥文在內再合

用線縛定外以濕紙包慢火內煨熟不可過度取出去紙取

五散細研次入朱砂末半錢和之分作肆圓每服壹圓以所

煨猪心煎湯調下後別用猪心煎湯重者只守本方輕者如

蘇合香圓壹粒在過半日不動又進壹服如大便已下惡物

即止後劑急與五散以助胃氣

宋爭雄黃圓 治類癩瘡聖靈藥古

雌黃 黃丹微炒 麝半錢

右為末拌和用牛乳汁參合熬成膏入藥末并參百下圓如

麻子大每服貳圓溫熱水下

此黃圓 治諸癩

此黃黃連 鐵粉鐵粉 鐵粉鐵粉 鐵粉鐵粉

鐵粉鐵粉 鐵粉鐵粉 鐵粉鐵粉 鐵粉鐵粉

右末粳米飯圓桐子大每壹圓壹圓 煎湯調下

斷癩圓 治諸癩痰盛

皂角皂角 南星南星 朱砂朱砂 赤蜈蚣赤蜈蚣

皂角皂角 南星南星 朱砂朱砂 赤蜈蚣赤蜈蚣 白附子白附子 烏蛇烏蛇

白附子白附子 烏蛇烏蛇 烏蛇烏蛇 烏蛇烏蛇

烏蛇烏蛇 烏蛇烏蛇 烏蛇烏蛇 烏蛇烏蛇

右為末用水煮半夏糊和煎項皂角膏為圓桐子大每服壹

圓生薑湯調下

當歸大黃湯 治諸癩壯熱利下心中惡血

大黃大黃 甘草甘草 當歸當歸 赤芍藥赤芍藥

半夏半夏 川芎川芎

右為末每服叁字薑棗煎服

鴉虎散 治驚癩屢效

褐色生蝎褐色生蝎 壹筒連血細研

右入朱砂末并朱砂末少許同研薄荷湯調作壹服數年頭癩亦

作效蓋癩疾皆心血虛帶生蠶可以官守其血繼是即以此

陳湯與之若無生蠶當取帶性生蠶代用入于代用

散中亦作效

代煎石鏡 陰陽癩通用

代煎石代煎石 被癩被癩 日乾

右每服半錢以金銀煎湯和金銀箔調下連進貳服良久小

兒脚脛上自有赤班即邪氣發出其病隨差若無赤班則雜

治也

日厚散 治癩癩連年不瘥

里錫

玳黃

水銀研

鐵粉研半兩

金銀箔 各叁拾片

右**火龍**散治諸疔發歌無時

龍不住手就銼內研攪候**龍**煙氣欲息次入餘藥就火

上同攪少頃時傾出在地壹宿出火毒再研細粳米飯圓麻

子大**時**衣每服叁圓食後**湯**下

乾地龍餅兩虎睛壹對炙人參壹分 金銀箔叁拾片

天竺黃 朱砂 代赭石 輕粉 鐵粉 各壹分

雄黃壹錢半 輕粉半錢

右為末每服半錢紫蘇湯調下

宋 治小兒五癩

赤蜈蚣去頭足 蝟梢 白附子生

烏虵肉酒炙 大南星末 圓白半夏去明礬并和

能脍 白礬新瓦一煨各半分

右為末稀麵糊圓桐子大**宋**衣每服壹圓薄荷泡湯調下

五癩

赤蜈蚣去頭足 南星洗 鹿茸炙

全蝎 防風 朱砂研細 遠志肉薑汁浸炒

白附子生 蘆薈 延明索路壹金銀箔各叁拾片

右為末入麪糕糊圓桐子大每服壹圓**湯**煎湯調下

宋 定一切癩

赤蜈蚣去頭足 烏虵頭酒 延胡索銼 各壹

白附子 遠志薑汁浸 鐵粉 透明防風

全蝎 天麻 各壹錢 金銀箔各壹 大南星薑汁浸 半末

右為末以**白**為糊糊入**湯**并**湯**少許和圓

桐子大**湯**衣每服貳圓金銀箔則湯泡薄荷調下

千金龍膽湯治諸癩壯熱方見胎驚風門

星朱散定癩利痰

南星 貝紙炮香藥壹兩 朱砂 貳錢

右為未用帶性宿心血為圓桐子大每服壹圓劑防風湯調
猪鬃南星散 治癩後瘡不能言

大天南星濕紙煨香

右為未每服壹字雜指論出調下

肥兒圓 治小兒心竅有惡血瘖不能言木查陳皮 **世厚** 前湯下

肥兒圓 方見中風門 蓋肥兒圓內有**雷**能去惡血禱筋壯

驚風方 油髮燒灰存性每服壹字米湯調下

論髮際穴

小兒初誕收生者多於頭額前髮際中間灸之蓋取其可以戕
風路也諸風篤證華力不及昏迷沉絕嘿然無聲於此灼艾每
有扶危之功然亦顧其毒後之劑何如耳前集所載百會一次
在頂心端正旋毛間亦洩危困者以是哉

論腦麝銀粉已硝淨不可輕用

小兒急驚風古人以其內外熱熾風氣暴烈而無所泄故用
麝香以通其閉麝香粉已硝以下其痰祛蓋不得已而用之
其實為風熱盛實者設也世俗無見不權輕重每見發熱發搐
輒用腦麝蟾酥鉉霜冰銀輕粉已豆芒硝等劑視之以為常惟
其不當用而輕用或當用而過用之是以急驚轉為慢驚此為
胃虛在再辟月驚風之所為難療者正坐此也萬一發熱驚搐
本為傷風傷寒傷食瘡巨而作誤藥至此其為害豈淺哉試以
理觀之能用細辛羌活青皮乾薑 **刺**之類以為發散勝如必
麝能用獨活柴胡山柰枳殼大黃之類以為通利勝如銀粉膏
硝散或當用而不可無之亦須酌量勿過可劑此幻幻書所謂
青圓導赤散乃醫用之上藥者良以是故故論此以為輕用

藥者勸

論蜈蚣有毒

蜈蚣有毒惟風氣暴烈者可以當之然其風氣暴烈非蜈蚣能

截能擒亦不自止但用之貴乎藥病相當弗密固執或半字或壹字或桐子半圓或桐子壹圓尤在酌量而作劑也設或過焉當以謂同藥因為解

凡幼兒欲發驚風先神志不定恍惚懼人搭眼上視左顧右盼神手握拳悶鬱弩氣情態不若尋常如此者有驚即散驚有熱即退熱壅實即去壅實熱退則不生痰驚散則不生風壅滯通則氣得其平病無由作是固當以小劑治之若一患在痰熱全未有風癘搖擗顛引之狀則只與退熱化痰如參蘇飲之類也謹勿妄投通關利膈等劑惡或透其執流入經絡反成風痰此又小兒無病不可服藥之戒

世俗玩習以為小兒體熱或遇澡浴即與久坐湯水之中風冷外傷水濕內滲頃刻間遽成風搐或惡斗頻生或昏迷失音或洞泄不已勢如暴風疾雨難以支吾不可不戒

獨活 治小兒風癘解表通裏內熱

獨活去節 川芎 天麻煨

防風去葉 荆芥總路 甘草炙

化同 治小兒風癘 三片同煎食前服

天麻煨 羌活去葉 獨活 天南星片膽製 防風去葉 人參去 甘草炙

川芎 荆芥總

右為極細末煉白蜜丸如芡天用煎湯研化或煎湯食遠服

新刊仁齋直指小兒附書方論卷之三

疳

諸疳方論

兒童二十歲以下其病為疳二十歲以上其病為勞疳與勞疳
氣血虛憊腸胃受傷致之同出而異名也何者小兒臟腑嬌嫩
飽閉易傷乳哺飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆乳食不調
甘肥無節而作也或嬰幼闕乳粥飯太早耗傷形氣則疳之根
生或三兩晷後乳食稍多過飽無度則疳以傷得或恣食甘肥
粘膩生冷鹹酸以帶中脘則疳因積成或乳母寒暄失理飲食
乖常喜怒勞房即與兒乳則疳因母患傳氣而入此非病家不
能調適之過乎疳皆脾胃受病內無津液而作也有因吐瀉之
後妄施吐下津液盡竭得之者有因潮熱大下利無禁約胃中
焦燥得之者有因傷寒裏證冷飲太過渴引水不化而生熱上

氣未散復于他邪得之者又有病寒疾脇下痛硬或者不能
漸其消磨遂以稠已峻决津液是虛勞得之者此非醫家輕棄壞
病之過乎疝之為候頭皮光急毛髮焦稀頭縮鼻乾口瘰唇白
兩眼昏爛揉鼻擗眉脊聳体黃鬪牙交甲焦渴自汗尿白瀉酸
肚脹腸鳴癖結潮熱酷嗜瓜果鹹酸炭米泥土而飲水占飲者
皆其候也疝曰五疝病關五臟以臟別之心疝即驚疝由乳食
不調心臟受挑所致也蓋其血氣未定乳哺有傷易生疝滯內
有滯熱未得疏通故心神驚悸而作驚疝之候外證身体壯熱
臉赤唇紅口舌生瘡骨膈煩悶小便赤澀五心皆熱盜汗癸渴
嚙齒虛驚夫是之謂心疝肝疝即風疝由乳食不調肝臟受挑
所致也若乳母寒暄不調滋味不前或外感風寒內傷喜怒刑
氣未撤遂爾乳兒多成風疝肝者眼之候下關伏挑痰涎壅滯
以致肝風入眼赤腫翳生膠及爛眩痛搔揉昏暗羞自甚至
經月眼合亦名疝眼外證搖頭揉目白膜遮睛眼青淚多翳集

手足筋青腦熱申瘰筋赤青涕汗多下痢瘡癬夫是之謂肝疝
脾疝即急疝由乳食不調臟腑伏挑所致也凡其味入於脾而
動虫虫動則侵蝕臟腑遂使移提心下擾悶若上蝕齒斷則口
瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則下痢肛爛濕癩生瘡療治不蚤
精頰消耗難以有瘳虫者匿也目為溫暈多因疝傷久痢腸胃
受溫得之狀如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬命名蓋齒腐脊
腎主虛統受熱邪疝氣直奔上焦故以走馬為喻初作口瘳名
曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則斷爛名曰潰槽挑血迸出名
曰宣露甚者齒皆脫落名曰腐根其根既腐縱得全活齒不復
生外證腦挑肌削手足如水寒熱時來滑泄肚痛口臭乾渴齒
斷生瘡爪黑面顴鼻多瘡赤夫是之謂腎疝肺疝即氣疝由乳
食不調壅挑傷肺所致也肺主平氣鼻乃肺氣所通其氣不和
則風溫乘虛客於皮毛入於血脉故鼻下兩傍赤瘰瘡溫是為
鼻疝其瘡不痛汁所流隨頭即成瘡亦名疝蛋外證咳嗽喘逆

壯熱惡寒皮膚粟生鼻流涕咽疾不利頤爛唾紅氣脹毛焦
泄利類併夫是之謂肺痿即食痺由乳食不節脾胃受傷
所致也或乳母恣食生冷肥膩或乳兒過傷或飯後與乳致使
吐乳多眠久則變為乳癆腹脇結塊亦名妳疳外證面黃身黃
肚大脚細吐逆中滿乏力醋啼水穀不消泄下酸臭合面困腫
減食喫泥夫是之謂脾疳五臟疳傷不抵然爾析而論之曰五
疳出虫曰蛔疳曰赤疳曰腦疳曰乾疳曰疳渴曰疳瀉曰疳痢
曰疳腫脹曰疳勞曰無辜疳曰丁矣曰哺露證狀非一不可不
宏撮要而條析之乎五疳出虫者疳傷之源雖起於乳哺不調
然臟腑停積已久莫不化而為虫其虫或如絲髮或如馬尾多
出於頭項腹背之間黃白或赤者可擊青果則難療也此疳者
失乳飯早食肉太早或腸胃停蓄訛化為蛔虫黧眉多嘔嘔
吐清沫腹中乍痛肚脹青筋唇口紫黑腸頭齒燥是也蛔雖食
虫虫不可動從口鼻出者難治吞疳者虫蝕香鬚身熱黃腫

中生熱煩濕下痢拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆落類腫
瓜甲是也腦疳者胎中素挾風熱生下乳舖越常頭皮光急滿
頭餅瘡腦熱如火髮結如穗遍身多汗頸腫顛高是也臨產多
恣亦然易損兒眼乾疳者瘦碎少血舌乾多啼其病在心不自
轉睛乾啼少淚其病在肝身熱燥乾手足清冷其病在腎焦熱
皮燥大便乾結其病在肺搭口癢眠胃腕乾渴其病在脾總為
五乾疳是也疳渴者臟中風有瘴氣加之乳母恣食五辛酒麪
炙傳使小兒心肺蒸熱日則煩渴引水乳食不進夜則渴止是
尔疳渴者毛乾唇白頰上青紋肚脹腸鳴泄下糟粕是尔總
藥止之疳痢者挾受風寒暑濕或冷熱不調或停積宿滯水
穀不聚積下惡物是尔疳腫脹者虛中有積其毒與氣交并故
令腹壯緊脹由是脾復受濕故令頭面脚手虛浮是尔常磨
細調氣疳勞者潮熱往來五心煩熱手足心及背前熱而發食
盜汗骨蒸咳嗽枯悴是爾或渴而復渴飲水惡食肚硬如石面

色如銀斷不可活無辜疳者腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不疼其間有虫如米粉不速破之則虫隨熱氣流散淫蝕臟腑以致肢躄癱瘓便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是尔針刺破膏藥貼或幹置兒衣露於簷宇為雌鳥落羽所汚兒着此衣虫入皮毛亦致無辜之疾兒衣已膿須微火烘之其若手足極細頂小竹高尻削躄癱腰大脰突號哭骨隔或生殺噉是為不奚虛熱來生頭骨分開翻食吐虫煩渴嘔噦是為哺露丁奚哺露皆因脾胃又虛不能化水穀以榮血氣故肌肉消綠腎氣不足復為風冷所傷使柴骨枯露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無辜種類之疾病而至此不幾殆哉又有小兒久患腎痺內虛不食甚者天柱骨倒治法常用錢氏地黃圓加驅疳等劑仍與貼頓強筋若不識證謂之轉也天柱骨倒凡有三重有吐瀉日久羸弱成者有肝疝伏熱面赤唇紅勿妄此者有傷寒不及發表成者是皆風邪入肝以致筋絡舒弛吐瀉者當調胃

氣肝熱者隨輕重以涼肝並與錢氏貼頓項惟傷寒天柱骨倒皆難療故所及之雖然疳之為說亦累矣夫調治之法將何擇焉錢氏曰治疳當辨冷熱肥瘦初病為肥熱疳久病為瘦冷疳熱者涼之冷者溫之冷熱者溫涼之此其要也疳疳病多在外羊下赤爛頭瘡溫瘰五心煩熱掖衣氣盈湯引冷水煩燥卧地壯熱脚冷潮熱往來皆熱疳也冷疳病多在內利色無常其沫青白敗熱軟弱目腫面鰓又十證燥渴卧地似有熱狀佳飲食不進滑泄無已亦冷疳也其有瀉多膿血日加瘦弱此則謂之冷熱疳大抵疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者虛中之冷治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫曝補故錢氏又曰小兒易為虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此而勿誤是果非切也之綱領乎上醫處此消積和胃滋血調氣順藥餌以扶之淡薄飲食以養之榮衛調和臟腑自然充實一或過焉君子未保其往也取積之法又當權衡積者疳之母由積

而虛謂之痺極諸有積者無不壯熱脚冷須的量虛實而取之
 若積而虛甚則先患扶胃使胃氣內充然後為之微積若積狀
 乎虛則先與利導總得一世急以和胃之劑為之扶虛然取積
 雖當疎利如**白豆蔻****蘇合香****木香**消積等輩亦不可無腸
 間滯滯亦虛中之積也先寒後熱飲水不食或因飲水以致喘
 欬錢氏有癖為潮熱之說治法解散寒熱即與下癖合是而規
 發作不同療治不一又可無權度於此哉若夫諸癖惡溢心在
 飲水不化食則驚悸耳邊紋多舌上點黑者不治肝痺左脇痛
 硬顛欬吐涎目睛青筋眼角黑氣者不治腎痺飲水好鹹小便
 如乳耳焦肩聾牙黑骨枯者不治肺痺欬逆氣促煩渴白沫身
 上粟生其色斑黑者不治脾痺契泥泄痢水穀不消唇白腹高
 人中平滿者不治其或滑泄不休脫肚吃逆抱起昏沉手足垂
 軟觀及脚心全不知齊項筋舒展身熱寒冷是則為五絕證也
 者骨陷喘疾乳食百瀉腫滿下痢復腫脹皮

常與夫痺勞渴... 矣州有聞烏石... 生... 論者難... 兒方週... 是謂之... 以為之... 諸癖證治云

諸癖證治

北五靈脂 好夜明砂 煅縮砂

橘皮 青皮去白 蓬朮木炭 木香

史君子 鷓鴣菜 鷓鴣菜 鷓鴣菜

右末雜猪膽式枚取汁和藥入糕糊圓麻子大每拾伍圓米

飲下痺勞瘦弱木方 一錢半

海散

芦荟

黄連各一錢 瓜蒂

猪牙皂角

蝦蟇灰 路半 麝少許

右末吹入鼻嚏則可療

黃連肥丸

治一切疳及疳眼赤腫痛淚昏暗雀盲或經月合眼

鷹爪黃連 淨一兩

蕪荑

麥牙炒

神麴 綱半兩 青皮 去白

史君子肉 焙各式錢半

右末猪膽式箇取汁浸糕圓麻子大每半圓米湯下疳熱眼

仁煎湯下

天靈膏

治諸疳

薑馨

蕪荑

木香

青黛

檳榔

川黃連

煆各錢殼一殼

胡黃連 半兩

麝少許

右末猪膽式箇取汁浸糕圓麻子大每貳拾圓米飲下

治五疳潮熱肚脹髮焦

胡黃連 半兩

香潤五靈脂 一兩

右末猪膽汁圓麻子大每服十五圓米飲下五疳潮熱

勿用大黃

五疳良方

川黃連 去蠶 蕪荑 取仁

神麴 炒

麥蘗 炒

橘紅

木香

蝦蟇 各一錢

史君子 三十個

肉豆蔻 二個 雞心 換榔仁 麝州 研

右細末猪膽二枚取汁入好酒打清麩為圓芥子大每服

十伍圓米飲下

黃連 治熱疳

胡黃連

川黃連 路半 朱砂 一各半

右二連為末和朱砂入猪膽內繫定懸於鏡中煮一炊

取出研各一錢半去足

米飯圓麻子大每七十圓食後米飲下

治冷痺 瀉

丁香

丁皮各一升 木杏

紫厚朴製

史君子肉

帶肉巨寇

溫經 祛風 攝紅 各二升

右末神麩糊圓麻子大每七十圓食前米飲下

治冷熱 痺

胡黃連

川黃連 絡三 木香

蕪荑各二升

丁香

肉豆寇

史君子 各一升

大蝦蟇乾黃 粉 水

右末膏和圓麻子大每十圓米飲下

治心海驚 痺

伏神

荊蒼

琥珀

川黃連

赤茯苓 絡三 釣藤皮

遠志 肉桂 蝦蟇灰 各二升

右末粟米糊圓麻子大每十圓薄荷湯下

治肝痺風 痺 七眼

青黛

川黃連

天麻

北五靈脂

夜明砂 微炒 川芎

荊蒼 各二升

龍膽草

防風

蟬殼 去足 各半 全蠋 二枚

麝 少許

乾蟾頭 炙佳 三升

右末猪膽汁浸糕圓麻子大每十圓薄荷湯下

治 痺 眼 閉 合 不 開 內 有 膠 霧

生乾地黄

熟地黄 酪 酢 川芎

半赤茯苓

枳殼 製

杏仁 炒 煨

川黃連 半

半夏 麩

天麻

地骨皮

甘草 各二升 半

右剉每服二錢薑三片黑豆十五粒水煎臨卧服

治 賢 耳

大熟地黄 半四升 半

赤茯苓

山茱萸 燉 酥

當歸

川芎

川練子肉 無牡丹皮

山藥 焙

史君子 各二錢

右末煉蜜圓桐子大每三圓空心溫湯化下

定馬痔方

治口齒出血臭氣

銅綠 半錢

生蜘蛛 一枚

右研細入麝少許夾和擦齒如無蜘蛛即用殼二箇

清肺飲

治肺熱鮮蟹蝕為穿孔汁臭或生息肉

桑白皮 炒半紫蘇

比前胡

黃芩

當歸

天門冬 去心連翹

防風

赤茯苓

北梗

生乾地黄

甘草 錄一分

右剉每服二錢并水煎食後服次用化圓

化圓

蕪荑

蘆薈

青黛 乾

川芎

胡黃連

川黃連

蝦蟇灰 半分

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每服貳拾圓食後臨卧

前湯下其鼻常用 龍腦 泡湯小筆蘸洗俟前藥各止數服却

用 龍腦 末 半分 龍腦 少許細

末入鼻欬吞

聖疳圓 治脾疳食疳

北五靈脂 縮砂仁

白豆蔻仁

麥牙 炒

蓬木 煨

青皮 去白

橘紅

史君子肉 各二錢

蝦蟇 炙焦

右末米糊圓麻子大每拾圓米湯下

聖疳圓 治疳蝨諸虫

新白苦練根皮 酒浸焙

綠色貫眾 木香

桃仁 浸炒

蕪荑 焙

雞心棋榔 各式錢

鶴虱 錢

輕粉 半錢

乾蝦蟇 炙焦 史君子 各二錢

右末飛麩糊圓麻子大每貳拾圓天明清肉汁下內加

黃連 各壹錢半 治春痲兼疥勞方 可擇用

治腦痲腦熱 餅磨

龍膽草

川升麻

苦練根皮 各壹錢

赤伏神

芦薈

油髮灰 各二錢

黃連 各壹錢

右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每貳拾圓薄荷葉蘇淘湯下

食後仍以苦薈末入草

黃連 治疳渴

黃連 半兩 猪膽汁

瓜蔓根

烏梅肉 焙乾 杏仁 浸去

石蓮肉 各二錢

右末牛膽汁浸糕為糊圓麻子大每拾伍圓煎烏梅薑薑湯

下又療虫後附消渴方論 內貳藥可治疳渴及五乾疳

黃連 治疳瀉

黃連 叁錢 炒 肉豆豉 生

木香

訶子 煨

縮砂仁

伏苓 各乙

右末梗飯圓麻子大每十五圓食前米飲下

木香 治疳痢

黃連 各一

紫厚朴 製 縮砂仁

夜明砂 隔紙炒 各二

訶子 肉炒 乙

右末梗飯圓麻子大每十五圓乾父葉生薑煎湯食前温下

得圓子 治疳腫脹

蘿蔔子 微 陳皮

青皮 去白

好檳榔

黑牽牛 炒 乙 生

北五靈脂

赤伏苓

蓬莪朮 煨 木香 二 水半

右末飛麩糊圓豕豆大每十五圓煎湯下 又天

加 薑末煎紫蘇湯調下 少吞

治疳脹肚皮緊

治疳勞

黃耆

參多

當歸

川芎

白芍藥

生乾地黄

蜈蚣去腥

鱉甲醋炙 三焦人參

白茯苓

橘皮

半夏麩

柴胡

史君子

畧燥 甘草炙 各二

右廔末每二升薑棗煎食前服之

治疳積

人參

川芎

菴蕪

柴胡各二兩

史君子二寸 胡黃連

川黃連各二兩

右廔末每二升薑棗煎食前服之

治疳積 并血只用二連夾餘藥杵末粟米粉糊團麻子太

每二拾圓食前熟水下

治無辜疳諸疳壹服廔熱退二服煩渴止叁服瀉痢住

蟾蜍乙枚夏月清渠中取臍不鳴者其臍多臍

右取壹圓壹杓置桶中以尿浸之桶上要乾不與虫走却

打殺蝮在虫中焦與虫食壹日夜次以新布作袋壹包

緊定置之急流壹宿取出瓦上焙為末入壹字腰飯搥圓

麻子大每二叁拾圓米飲下

治無辜疳

夜明砂炒為末入諸飲食中與之

治疳積

青皮

陳皮各去白 蓬朮

川芎

北五灵脂

白豆蔻仁

雞心檳榔

苦薈各半兩

木香

史君子肉

焙蝦蟇灰各二

右末猪膽汁浸糕糊團麻子大每二十圓米飲下有執煎薄

荷湯下

治疳積 疳疔傷肚大 疳積方並見積類

治疳積 疳疔傷肚大 疳積方並見積類

米飲下

症不能發聲方前黃連圓每服十五圓用藥合煎
位入朱砂五靈脂末各少許以酒煎湯乘熱調開送下
龍膽湯治疳病

龍膽草微炒 鈞藤皮 柴胡 北梗

芍藥 川芎 伏苓 甘草炙

人參乙水 大黃二水半溫紙裹 右劉散每二水并水煎服仍以紅紗袋

夜明砂與兒帶 然得安危治小兒五疳又痢吐瀉肚大青筋面黃肌瘦疳積

昔証神効

白木淋浸土神麴炒 木香 煨榔

茯苓 三稜 使君子 厚朴姜制

學香 井草後各 茅山蒼木仁陳皮去

枳實煨熟 人參去芦 義木路杞 砂仁炒

黃連猪膽汁炙 麥芽炒 益智炒 肉苳蔻剉去

藿香 白苳蔻各研

右為極細末煉為圓如龍眼大每服一圓用清茶磨化
送下嘔吐下肉積加 一兩喘加 一兩瀉加

治諸疳疾面黃腹大飲食不潤肌膚

夜明砂煉 蕪荑炒去 史君子白者 甘草

白茯苓法 白木無油者 人參去芦 蘆薈細研各

右為細末湯浸蒸餅和圓如彈子大每用一圓以
之次用酒煎二兩同藥一處煮候熟爛提起藥於當風

欠懸掛將所煮并令小兒食之所懸之藥第二日仍依
前發煮食只待藥盡為度

五疳保童圓治小兒五種疳疾

青黛 五倍子醋 蘆薈另研 夜明砂布裹

黃連去積

龍膽草壯

能膽

香陳根皮

麝香另研

蕪裏仁

蟬殼去土各

右為細末用粟米打糊為圓如麻子大一歲小兒服二十

圓用米送下不物時服量兒大小加減

子以治小兒疳證

鼠糞

黑牽牛各等

右為細末三歲兒每服一錢用皮調不物時服

疳瘡方論

凡人自孩提以至弱冠期熱發瘡只是疳氣使然蓋疳虫耗其精髓蝕其肌膚瘡虛膚空疳執流注遂致遍身執瘡發軟無已須用指肚黃連圓王治仍以大服反苦參白芷煎湯浴之圓肥兒圓二藥夾和佐之可也

疳疔黃連圓 疳瘡治

疳疔黃連圓

雄猪肚膏具洗淨

鷹爪黃連去質淨非用

右剉作小段少水和濕納猪肚中用線縫密頓在伍升爛米上蒸十分爛取放白中入些蒸飯搗干餘并粘實得所衆手捏圓如小桐子每服貳拾圓米飲下童子倍之冠者又倍之仍以生犀散貳拾歲以上潮熱發瘡是為虛勞皆一種病也用藥同則凡兒童諸病不出於疳則出於熱熱則生痰常須識此矣

積

積滯方論

小兒有積面目黃腫肚熱脹痛腹硬多因醋嗜不食或大腸閉澁小便如油或便利無禁糞白而酸此等皆積證也然有積滯有積滯要當明辨吐乳瀉乳其氣酸臭此由疳料未

以乳與兒停帶不化得之是為乳積肚硬帶熱渴瀉或嘔此由
飲食無度多餐過飽飽後即睡得之是為食積腹痛啼叫利
嘔刺此由觸忤其氣榮衛不和淹涎日久得之是為氣積合用
木香圓王之雖然積有虛有實虛積渾身微熱不思飲食昏昧
神緩抱起如睡實積肚執糞閉嘔腫喉塞壅盛涎鳴熱毒發冷
推此可見**木香圓**虛者少與之實者倍用之亦有傷乳傷食而
身體熱者惟腹肚之執為甚人知傷積肚執糞酸極臭而夜間
有熱傷積之明驗人所未識也其或變證面黑瀉黑久瀉不止
腹肚脹滿氣出麁大手心生瘡瘦弱柔軟皆不可療○小兒消
積多用**青皮****陳皮**最能發汗有汗者勿與之

積滯證治

香圓 治乳積食積氣積

木香

蓬我木

縮砂仁

青皮 去白

朱砂

代補石

大丁香

川巴豆肉 油壹錢

右細末和勻飛白奶糊圓麻子大風乾每服貳參圓乳傷乳
汁下食傷米飲下後與**大異香散**方見脹滿門或**和利異香**

散亦得氣積橘皮煎湯下下後與**和利流氣散**並見脹滿門

下積圓 治乳食傷瀉腹脹滿氣腫壯執或瀉或嘔

丁香

縮砂仁 各拾史君子 五個

烏梅肉 焙

川巴豆肉 各參箇不去油

右末研細和勻爛飯圓麻子大每參圓橘皮煎湯下

五珍圓 治酒食積通用

青皮 炮去白 乾薑 炮帶生 北五靈脂 蓬我木 各壹兩

右為末夾和秤藥末壹兩用**細巴豆肉**以石壓准去半油秤

壹錢研細拌和粳米飯圓麻子大每服參伍圓米湯下不飢

飽時服

快痔圓 治疔積 方見辟積

辰砂膏 疎利為積 方見風禁門

青龍圓 治驚積有執 方見驚積門

朱銀圓 治驚積 方見胎驚門

痞結證治

痞者寒也結者實也熱氣蘊於胃膈之間留飲聚於脘脇之穴於是榮衛不得流行腑臟不得宣通由脹滿而至痞結勢使然耳此執實之證也時或發為壯熱

重者用取

甘遂宜分兩 青皮白燒 黃芩

川大黃劉寄

右鹿末每服壹錢水小麥煎去滓溫服量大小增減用得通利則止後服利後以糜粥放冷補之

癖氣證治

癖者血膜包水僻側於脇傍時時而作痛也惟癖為能發潮熱惟癖為能生寒熱故蘆家中脫多苦黃水日久而後結癖寒熱之不已者以此小兒臟腑和平榮衛調暢則津液自然流通縱使多飲水漿不能為病惟夫乳哺失調三焦阻隔以致水漿停滯腸胃不能宣行冷氣搏之於是結聚而成癖輕者用精帶煎

重者用取

甘遂微炒

芫花炒

牽牛半炒半生

辣桂

蓬木

青皮大

木香

桃仁浸炒

五靈脂各炒

右細末入去油巴豆壹錢研和十分細飛麪糊圓麻子大圓乾每服壹貳圓薑茶煎湯灌下泄後冷粥補仍和胃

治乳癖投腹中塊疝

代猪石

欬研 粉分 生

青皮去白

木香

蓬木

五靈脂

北大黃各炒

巴豆去油

右末醋麪糊圓麻子大每服貳圓食後擦薑泡湯下

治小兒腹中結癖塊疝

代猪石

研細

川大黃各炒

木香

朱砂

鑿甲醋炙

黃芩

桃仁浸炒

辣桂各壹分

巴豆肉去油半分

右細末糕糊圓麻子大風乾每服伍圓置減下

食積消食積

橘皮

麥芽各半

京三稜

莪木

右為末麪糊圓如麻子大食後白湯下隨大小加減

治五積破痰癖消積塊及冷熱積聚

木香不見

丁香各半

川三稜酒浸

枳殼去穢

青皮去白

川練子制炒

尚香各

蓬朮去穢

丁香各半

京三稜酒浸

枳殼去穢

青皮去白

川練子制炒

尚香各

蓬朮去穢

丁香各半

川三稜酒浸

枳殼去穢

青皮去白

川練子制炒

尚香各

蓬朮去穢

蓬朮去穢

丁香各半

川三稜酒浸

枳殼去穢

青皮去白

川練子制炒

尚香各

蓬朮去穢

丁香各半

川三稜酒浸

枳殼去穢

右為細末煎麪糊為圓如麻子大每服二十圓

炒生薑湯下溫酒亦可不物特服

小兒中脫宿食不消吞酸惡心口吐清水心腹

刺源除泄如痢

烏梅去核

百草霜鐵

巴豆去皮心

杏仁去皮尖

半夏去毒

縮砂去毒

史君子伍分

右為極細末者圓如麻子

大每服三五七十圓用

煎湯食前服

半夏去毒

縮砂去毒

史君子伍分

右為極細末者圓如麻子

大每服三五七十圓用

煎湯食前服

三稜治嬰孩小兒癖積消積進食

三稜

蓬莪木炮

神麪炒

麥蘖炒

青皮去穢

陳皮去白

右為極細末煮麪糊圓如黍米大用米飲食遠服

得保嬰安圓治小兒五疳八痢吐瀉肚大青筋面黃肌瘦疳積

詩証神効方見并門

三稜治積常疔塊乳癥

蓬莪木炮

神麪炒

麥蘖炒

青皮去穢

陳皮去白

右為極細末煮麪糊圓如黍米大用米飲食遠服

得保嬰安圓治小兒五疳八痢吐瀉肚大青筋面黃肌瘦疳積

詩証神効方見并門

三稜治積常疔塊乳癥

蓬莪木炮

神麪炒

麥蘖炒

青皮去穢

陳皮去白

右為極細末煮麪糊圓如黍米大用米飲食遠服

得保嬰安圓治小兒五疳八痢吐瀉肚大青筋面黃肌瘦疳積

詩証神効方見并門

三稜治積常疔塊乳癥

蓬莪木炮

神麪炒

麥蘖炒

青皮去穢

陳皮去白

右為極細末煮麪糊圓如黍米大用米飲食遠服

得保嬰安圓治小兒五疳八痢吐瀉肚大青筋面黃肌瘦疳積

詩証神効方見并門

三稜治積常疔塊乳癥

蓬莪木炮

神麪炒

麥蘖炒

青皮去穢

陳皮去白

右為極細末煮麪糊圓如黍米大用米飲食遠服

得保嬰安圓治小兒五疳八痢吐瀉肚大青筋面黃肌瘦疳積

詩証神効方見并門

三稜治積常疔塊乳癥

蓬莪木炮

神麪炒

麥蘖炒

青皮去穢

陳皮去白

右為極細末煮麪糊圓如黍米大用米飲食遠服

得保嬰安圓治小兒五疳八痢吐瀉肚大青筋面黃肌瘦疳積

詩証神効方見并門

川練子

茴香

丁香各半

青皮

右末謂圓謂散謂大每服三九謂下

熱

諸執方論

小兒有病惟熱者多夫執者虛有實實則面赤濃黃氣籠口執燥渴唇腫大小便難挾揭露衣煩啼暴尊虛則面色青白恍惚神緩口中清冷虛氣軟弱泄為多尿夜出虛汗其或乍清乍溫佛鬱悸傷上感下泄水穀不分此則冷熱不調之證虛熱謂調則散謂方見寒熱類如謂當歸若夫升降陰陽則寒復而赤澀大便焦黃先以四順清散為之疏利其執即去既去而復執者裏已消而未解也當用醒醒散少加去節麻散以取

微汗則表執盡除其或表裏已解而執又時來此則表裏俱氣不歸元而陽浮於外不可再用涼藥再與解表當為和其胃氣使陽斂而歸內身體自涼為白散謂方見脈辨門尊東略煎服

諸熱證治

加朱清散治小兒頭執身熱口中執氣大便黃赤謂方見積熱門加四言謂最妙

人參芍藥散治兒童虛勞開執潮熱或遍身瘡

北參 當歸 遠志 龍腦 細 北前胡

柴胡 地骨皮 防風 北梗

枳殼 梨 半夏 麩 各半 川芎 茯苓

赤芍藥 麥門冬 去心 各煎 廿草 各錢 廿

右劉細每服貳錢水小盞量冬片紫蘇冬建葉煎服發瘡者兼服者上黃連圓方見煎類別作小圓不惟治瘡治渴其效

潮熱而肚脹者米飲常服貳指圍

指圍 治小兒每日早餵後發熱夜則身涼此血熱也

胡黃連黃連 宣黃連 赤芍藥各半兩

右末漬猪膽汁和成劑入膽皮中虛掛以漿水煮孰取藥研

買麻子大每貳拾圓米飲常服

龍膽石 治疳積

龍膽草 黃連 史君子肉 青皮等分

石末猪膽汁圓麻子木每拾圓食後熱水下

清 治感風發熱頭眩鼻寒涕流及溫壯悉主之

北參 防風 大麻 北前胡

伏苓 枳殼制 甘草各貳錢

細辛 柴胡各貳錢 川芎各錢

右末每壹錢水小盞薄荷乾參葉略煎溫和服

丹方

風 湯治吐熱和胃是飲食去心驚邪熱

白芍藥 人參 甘草各錢 茯苓各錢

硃砂伍分 石蓮肉伍錢

右為末次入硃砂 研勻每服伍分薄荷湯 調服

天連翹 治小兒諸熱

連翹 瞿麥穗 滑石 車前子

牛蒡子炒 紅芍藥略壹 山梔子 木通

當歸 防風各半 黃芩去心壹 柴胡去芦

甘草各兩 荆芥穗兩 鱗蛇去七

右件一十五味咬咀每服一大錢水一盞煎服湯使於後

○如風執痰熱變蒸執肝熱大腸熱癰疹熱者宜加麥門冬 去

心同煎

○如丹執實執血熱三焦熱小腸熱龍帶熱宜加大黃壹心 同

煎

○瘡疹熱麻子熱溫氣熱已出未出證熱宜加**犀角**同煎

○如餘毒熱胎熱肺熱傷寒後發疹後餘毒發熱宜加**薄荷**同煎

○如項上生核作執作腫熱癰毒熱宜加**大黃**同煎

治小兒潮熱積熱疳邪寒熱
青蒿花頭用童子小便為度柴胡去芦 人參
黃芩去心 前胡 秦艽去芦 甘草炙

右等分咬咀每服一歲兒半錢兩歲一錢七水小小兒入生

通口空心食前服

新刊仁齋直指小兒附遺方論卷之三