



本草綱目草部目錄第十二卷

李時珍曰天造地化而草木生焉剛交于柔而成根
荄柔交于剛而成枝榦葉萼屬陽華實屬陰由是草
中有木木中有草得氣之粹者爲良得氣之戾者爲
毒故有五形焉金木水火土 五氣焉香臭腥膻 五色焉青赤黃白
黑酸苦甘 五味焉辛鹹涼平 五性焉寒熱溫 五用焉升降浮沈中 炎

農嘗而辨之軒岐述而著之漢魏唐宋明賢良醫代
有增益但三品雖存淄澑交混諸條重出涇渭不分
苟不察其精微審其善惡其何以權七方衡十劑而

寄死生耶于是翦繁去複繩繆補遺析族區類振綱
分目除穀菜外凡得草屬之可供醫藥者六百一十
種分爲十類曰山曰芳曰陸曰毒曰蔓曰水曰石曰
苔曰雜曰有名未用舊本草部上中下三品共四百二十三種入菜部三種入穀部四種入果部二種入木部自木部移併一十四種蔓草二十九種菜部移併一十三種果部移併四種外類有名未用共二百四十七種

神農本草經一百六十四種

梁陶宏景註

名醫別錄一百三十種

陶宏景註。七十
八種有名未用

李氏藥錄一種

魏李當之

吳氏本草一種

魏吳普

唐本草三十四種

唐蘇恭藥性本草一種

唐甄權

本草拾遺六十八種

唐陳藏器

食療本草二種

唐孟說

海藥本草四種

唐李珣

四聲本草一種

唐蕭炳

開寶本草三十七種

宋馬志

嘉祐本草一十七種

宋掌禹錫

圖經本草五十四種

宋蘇頌

日華本草七種

宋人大明

用藥法象一種

元李杲

本草補遺一種

元朱震亨

本草會編一種

明汪機

本草綱目八十六種

明李時珍

附註

宋雷敷炮炙論

北齊徐之才藥對

唐孫思邈千金

唐慎微證類

唐楊損之刪繁

蜀韓保昇重註

南唐陳士良食性

宋寇宗奭衍義

唐慎微證類

陳承別說

金張元素珍珠囊

元王好古湯液

吳瑞日用

明汪穎食物

王綸集要

陳嘉謨蒙筌

憲王救荒

甯原食鑑

草之一

山草類上三十一種

甘草 本經

黃耆 本經

人參 本經

薺菴 別錄

桔梗 本經

長松 拾遺

沙參

本經

萎蕤 本經

鹿藥 附

委蛇 附

知母 本經

肉蓯蓉 本經

列當 本經

瑣陽 補遺

赤箭天麻 本經

朮 本經

狗脊 本經

貫眾 本經

巴戟天 本經

巴棘附

遠志 本經

百脈根

唐本經

淫羊藿

本經

仙茅

開寶

玄參

本經

地榆

本經

丹參

本經

紫草

本經

白頭翁

本經

紫參

本經

王孫

本經

右附方舊八十六新二百六十

三七

綱目

入直編目直部

卷十二

三

本草綱目草部第十二卷上

草之一 山草類三十一種

甘草

本經
上品

釋名蜜甘

別錄

蜜草

別錄

美草

別錄

落草

別錄

靈通

記事珠

國

老

別錄

宏景曰

此草最爲眾藥之主

經方少有不

用者猶如香

中有沈香也

國老卽帝師之稱雖

非君而爲君所宗是以能安和草石而解諸毒也

甄權曰

諸藥中甘草爲君治七十二種乳石毒解

一千二百般草木毒調和

眾藥有功故有國老之號

集解

別錄

曰甘草生河西川谷積沙山及上郡二

月八日除根暴乾十日成陶

宏景曰河

西上郡今不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸夷

中來赤皮斷理看之堅實者是抱羃草最佳抱羃

西上郡今不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸夷

中來赤皮斷理看之堅實者是抱羃草最佳抱羃

乃西羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州閒有而不如有紫郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺粗細不定皮赤色上有橫梁梁下皆細根也采得去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者爲佳其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家作用之謹按爾雅云靈大苦郭璞注靈似地黃又詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也靈與苓通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎李時珍曰按沈括筆談云本草註引爾雅靈大苦之註謂之甘草者非矣郭璞之註乃黃藥也其味極苦故謂之大苦非甘草也甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙濬似有白毛結角如相思角作一本生至熟時角拆子扁如小豆極堅齒齶不破今出河西界寇氏衍義亦取此說而不言大苦

非甘草也以理度之郭說形狀殊不相類沈說近之今人惟以大徑寸而結緊斷紋者爲佳謂之粉草其輕虛細小者皆不及之鎔續霏雪錄言安南甘草大者如柱土人以架屋不識果然否也

根脩治

雷敷曰

凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人

每用切長三寸擘作六七片入甕器中盛

用酒浸蒸從巳至午取出暴乾剉細用一法每斤

用酥七兩塗炙酥盡爲度又法先炮令內外赤黃

用時珍曰方書炙甘草皆用長流水蘸溼炙之至

熟刮去赤皮或用漿水炙熟未有酥炙酒蒸者大

抵補中宜炙用

瀉火宜生用

氣味甘平無毒

寇宗奭曰生則微涼味不佳炙則溫王好古曰氣薄味厚升而浮陽

也入足太陰厥陰經時珍曰通入手足十二經○

徐之才曰术苦參乾漆爲之使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻權曰忌豬肉時珍曰

甘草與藻戟遂芫四物相反而胡洽居士治痰澼以十棗湯加甘

草大黃乃是痰在膈上欲令通泄以拔去病根也
東垣李杲治項下結核消腫潰堅湯加海藻丹溪
朱震亨治勞瘵蓮心飲用芫花二方俱有甘草皆
本胡居士之意也故陶宏景言古方亦有相惡相
反並乃不爲害非妙達精微者不能知此理

主治五臟六腑寒熱邪氣

堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡癰解毒久服輕身延

年

本經○腫音時勇切腫也

溫中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止

渴通經脈利血氣解百藥毒爲九土之精安和七

十二種石一千二百種草

別錄

主腹中冷痛治驚癇

除腹脹滿補益五臟腎氣內傷令人陰不痿主婦

人血滲腰痛凡虛而多熱者加用之

甄權

安魂定魄

補五勞七傷 一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利

百脈益精養氣壯筋骨

大生

用瀉火熱熟用散表

寒去咽痛除邪熱緩正氣養陰血補脾胃潤肺

果生

吐肺痰之膿血消五發之瘡疽

好古

解小兒胎毒驚

癰降火止痛

時珍

稍主治

生用治胸中積熱去莖中痛加酒煮延胡

元素

索苦棟子尤妙

頭主治

生用能行足厥陰陽明二經污濁之血消

腫導毒

震亨

主癰腫宜入吐藥

時珍

本草綱目草部
卷二十一
發明

震亨曰

甘草味甘大緩諸火黃中通

理厚德載物之君子也欲達下騰須用稍予

杲曰甘

草氣薄味厚可升可降陰中陽也陽不足者補之以甘

溫能除大熱故生用則氣平補脾胃不足而

大瀉心火炙之則氣溫補三焦元氣而散表寒

邪熱去咽痛緩正氣養陰血凡心火乘脾胃中

急痛腹皮急繙者宜倍用之其性能緩急而又協

和諸藥使之不爭故熱藥得之緩其熱寒藥得之

緩其寒寒熱相雜者用之得其平

好古曰五味之用苦泄辛散酸收鹹斂甘上行而發而木草言甘

草下氣何也蓋甘味主中有升降浮沈可上可下

可外可內有和有緩有補有泄居中之道盡矣張仲景附子理中湯用甘草恐其僭上也調胃承氣

湯用甘草恐其速下也皆緩之之意小柴胡湯有氣

柴胡黃芩之寒人參半夏之溫而用甘草者則有氣

調和之意建中湯用甘草以補中而緩脾急也鳳

丹用甘草以緩腎急而生元氣也乃甘補之意

又曰甘者令人中滿中滿者勿食甘甘緩而壅氣

非中滿所宜也凡不滿而用炙甘草爲之補若中滿而用生甘草爲之瀉能引諸藥直至滿所甘味入脾歸其所喜此升降浮沈之理也經云以甘補之以甘瀉之以甘緩之是矣時珍曰甘草外赤中黃色兼坤離味濃氣薄資全土德協和羣品有元老之功普治百邪得王道之化贊帝力而人不知斂斂神功而已不與可謂藥中之良相也然中滿嘔吐酒客之病不喜其甘而大戟芫花甘遂海藻與之相反是亦迂緩不可以救昏昧而君子嘗見嫉於宵人之意與○頌曰按孫思邈千金方論云甘草解百藥毒如湯沃雪有中烏頭巴豆毒甘草入腹卽定驗如反掌方稱大豆汁解百藥毒予每試之不效加入甘草爲甘豆湯其驗乃奇也又葛洪肘後備急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解蠱毒藥並是常用之物畏人得其法乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥久與親狎乃得其詳凡飲食時先取炙熟甘草一寸嚼之嚥汁若中毒隨卽吐出仍以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三

服或用都淋藤黃藤二物酒煎溫常服則毒隨大小便出又常帶甘草數寸隨身備急若經含甘草

而食物不吐者非毒物也三百頭牛藥卽土常山也三百兩銀藥卽馬兜鈴藤也詳見各條

附方

舊十五傷寒心悸脈結代者甘草二兩水三

傷寒要

傷寒咽痛少陰證

甘草湯主之用甘草二兩桔梗半入阿膠

日二服仲景傷寒論

肺熱喉痛有痰熱者甘草炒二兩桔梗米泔浸一夜一兩每服

五錢水一鍾半

入阿膠半片煎服

錢乙直訣肺痿多涎肺痿吐涎沫頭眩者肺中冷也甘草乾薑湯溫之甘草炙四兩乾薑炮二兩水三升煮一升五合分服

半片煎服

錢乙直訣肺痿多涎眩小便數而不

要

畧要肺痿久嗽涕唾多骨節煩悶寒熱以甘草三

甘草末一錢服

廣利方小兒熱嗽甘草二兩蜜丸研末大五

甘草末一錢服

廣利方

食後薄荷湯下十丸初生解毒

小兒初生未可便與殊砂蜜只以甘草

草一指節長炙碎以水二合煮取一合以綿染點兒口中可爲一蜆殼當吐出胸中惡汁此後待兒

饑渴更與之令兒智慧無病出痘稀少王璆選方初生便閉

甘草枳殼煨各一錢水半

盞煎服全幼心鑑小兒撮口

發噤用生甘草二錢半水一盞煎六分溫服令吐痰涎後

以乳汁點兒金匱玉函嬰兒目澀月內目閉不開或腫差

用甘草一截以豬膽汁炙爲末每用米泔調少許灌之

明或出血者名慢肝風幼幼新書小兒遺尿

大甘草頭

煎湯夜夜服之姚和危氏得效方小兒尿血

甘草一兩二錢水六合煎二合一歲兒一日服

盡眾至寶方大人羸瘦

甘草三兩炙焦爲末蜜丸綠豆大每溫水下五丸日二服

金匱大人羸瘦甘草三兩炙每旦以小便煮三赤

四沸頓服之良外臺秘要

本草圖書卷之八上甘草

白痢下

崔宣州衍所傳方用甘草一尺炙劈破以淡漿水蘸水一升半煎取八合服之立效。

七個煨剉以水三升煎一升分服

甘草煎濃湯熱漱

太陰口瘡

甘草二寸白礬一粟大同嚼嚥汁殺人

頻吐

聖濟總錄

太陰口瘡

甘草二寸白礬一粟大同嚼嚥汁保命

集發背癰疽

崔元亮海上集驗方云

李北海言此乃神授極奇秘用甘草三大兩生

搗篩末大麥麪九兩和勻取好酥少許入內下沸

水溲如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以紬片

及故紙隔令通風冷則換之已成者膿水自出未

成者腫便內消仍當喫黃芪粥爲妙○又一法甘

草一大兩微炙搗碎水一大升浸之器上橫一小

刀子露一宿平明以物攬令沫出去沫服之但是小

瘡腫發背皆甚

蘇頌圖經

諸般癰疽

甘草三兩微炙切以酒

效果

蘇頌圖經

飲酒成汁投酒中取出如此

病者飲酒至醉寢後卽愈也

經驗方

一切癰疽

諸發預期服之能消腫逐毒使毒不內攻功效不可具述用大橫文粉草二斤搗碎河水浸一宿揉取濃汁再以密絹過銀石器內慢火熬成膏以甕罐收之每服一二匙無灰酒或白湯下曾服丹藥者亦解之或微利無妨名癰疽秘塞生甘草二錢半井水煎服

物國老膏

能疎導下惡直指方

小癰癤發熱時卽用粉草節曬乾爲末熱酒服一

痘瘡煩渴

二錢連進數服

痘瘡初起

仍令人咂之

痘瘡

直指方

痘瘡

痘瘡煩渴

粉草能通血脈

痘瘡初起

發瘡痘也

痘瘡

直指方

痘瘡

直指方

痘瘡

直指方

痘瘡

直指方

下懸癰生於穀道前後初發如松子大漸如蓮子

數十日後赤腫如桃李成膿卽破破則難

愈也

用橫文甘草一兩四寸截斷以溪澗長流水

早至午令水盡爲度劈開視之中心水潤乃止細

剉用無灰好酒二小盃煎至一盃溫服次日再服

本草綱目草部卷三十一上甘草

便可保無虞此藥不能急消過二十日方得消盡
興化守康朝病已破眾醫拱手服此兩劑卽合口

乃韶州劉從周方也李迅癰疽方

陰頭生瘡蜜炙甘草末頻頻塗

陰下溼癰甘草煎湯日洗三度

金凍瘡發裂甘草煎湯洗之次以黃連黃藥黃芩

湯火灼瘡甘草煎蜜塗

妙每用嚼噙或水煎李樓奇方

小兒中蠱欲死者甘草半兩

服神妙

當吐出

直指方

牛馬肉毒

甘草煮濃汁飲一二升或煎

酒服取吐或下如渴不可飲

煎

水飲之卽死飲饌中毒未審何物卒急無藥只煎

金匱玉函

牛馬肉毒

甘草煮濃汁飲一二升或煎

煎

水飲之卽死飲饌中毒未審何物卒急無藥只煎

千金方

水莨菪毒

甘草煮濃汁飲一二升或煎

煎

金匱玉函方中水莨菪葉圓而光有毒誤食令人狂亂狀若中風或作

吐以甘草煮汁服之卽解 金匱玉函妙方

黃耆

本經上品

釋名黃芪

綱目

戴穀

本經

戴椹

別錄又獨椹

百

本別

王孫

藥性論○時珍曰

耆長也黃耆色黃爲

補藥之長故名今俗通作黃芪或作蓍

者非矣著乃蓍龜之蓍音

戶王孫與牡

蒙同名異物

集解

別錄曰月采陰乾

黃耆生蜀郡山谷

白水漢中二月十

宏景曰第一出隴西洮陽色黃白

乾景曰第一出隴西洮陽色黃白

甜美

今亦難得次用黑水

岩昌者色白肌理粗新

者亦甘而溫補又有蠶陵白水者色理勝蜀中者

而冷補又有赤色者可作膏貼俗方多用道家不

須恭曰今出原州及華原者最良蜀漢不復采用

直州寧州者亦佳頌曰今河東陝西州郡多有之

根長二三尺以來獨莖或作叢生枝榦去地二三

直州寧州者亦佳頌曰今河東陝西州郡多有之

根長二三尺以來獨莖或作叢生枝榦去地二三

寸其葉扶疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃
紫花其實作莢子長寸許八月中采根用其皮折
之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆赤水耆
木耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫
今人多以苜蓿根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂
眞但苜蓿根堅而脆黃耆至柔韌皮微黃褐色肉
中白色此爲異耳承曰黃耆本出綿上者爲良故
名綿黃耆非謂其柔韌如綿也今圖經所繪憲州
者地與綿上相鄰也好古曰綿上卽山西沁州白
水在陝西同州黃耆味甘柔軟如綿能令人肥首
蓿根味苦而堅脆俗呼爲土黃耆能令人瘦用者
宜審嘉謨曰綿上沁州鄉名今有巡檢司白水赤
水二鄉俱屬隴西時珍曰黃耆葉似槐葉而微尖
小又似蒺藜葉而微闊大青白色開黃紫花大如
槐花結小尖角長寸許根長二三尺以緊實如箭
幹者爲良嫩苗亦可燂淘茹食其子收之十月
種法亦可種菜

修治

數日凡使勿用木者草眞相似只是生時葉短并根橫也須去頭上皺皮蒸半日擘細於

槐砧上剉用時珍曰今人但搘扁以蜜水塗炙數次以熟爲度亦有以鹽湯潤透器盛於湯瓶蒸熟切用者

根氣味

甘微溫無毒

本經

白水者冷補

別錄

元素曰味甘氣溫平

氣薄味厚可升可降陰中陽也

又入手少陽足少陰命門之才曰

人手足太陰氣分

又入

少陽

足少陰

命門

之才

曰

茯苓爲之使惡

龜甲白鮮皮

主治

癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五

痔鼠瘻

補虛小兒百病

本經

婦人子臟風邪氣逐五

臟閒惡血補虛

丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢

益氣利陰氣

別錄主虛喘腎衰耳聾療寒熱治發背

內補甄權助氣壯筋骨長肉補血破癥癧癩癰癰贊

腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻

痰嗽頭風熱毒赤目

日華

治虛勞自汗補肺氣瀉肺

火心火實皮毛益胃氣去肌熱及諸經之痛

元素主

太陰瘧疾陽維爲病苦寒熱督脈爲病逆氣裏急

好古

發明

宏景曰出隴西者溫補出自水者冷補又有

用白

赤色者可作膏用消癰腫藏器曰虛而客熱

藥中補益呼爲羊內白水耆涼無毒排膿治血及

煩悶熱毒骨蒸勞赤水耆涼無毒治血退熱毒餘功並同木耆涼無毒治煩排膿之力微於黃耆遇

關卽倍用之元素曰黃耆甘溫純陽其用有五補
諸虛不足一也益元氣二也壯脾胃三也去肌熱
四也排膿止痛活血生血內托陰疽爲瘡家聖藥
五也又曰補五臟諸虛治脈弦自汗瀉陰火去虛
盜汗并自汗及膚痛是皮表之藥治咯血柔脾胃
是中州之藥治傷寒尺脈不至補腎臟元氣是裏
藥乃上中下內外三焦之藥也杲曰靈樞云衛氣
者所以溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔黃耆
既補三焦實衛氣與桂同功特比桂甘平不辛熱
爲異耳但桂則通血脈能破血而實衛氣者則益
氣也又黃耆與人參甘草三味爲除躁熱肌熱之
聖藥脾胃一虛肺氣先絕必用黃耆溫分肉益皮
毛實腠理不令汗出以益元氣而補三焦震亨曰
黃耆補元氣肥白而多汗者爲宜若面黑形實而
瘦者服之令人胸滿宜以三拗湯瀉之宗奭曰
防風黃耆世多相須而用唐許裔宗初仕陳爲新
蔡王外兵參軍時柳太后病風不能言脈沈而口

嘸允宗曰旣不能下藥宜湯氣蒸之藥入腠理時可瘥乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如烟霧其夕便得語也杲曰防風能制黃耆黃耆得防風其功愈大乃相畏而相使也震亨曰人之口通乎地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天主清故鼻不受有形而受無形地主濁故口受有形而兼乎無形柳太后之病不言若以有形之湯緩不及事今投以二物湯氣滿室則口鼻俱受非智者通神不可同生也杲曰小兒外物驚宜用黃連安神丸鎮心藥若脾胃寒溼吐腹痛瀉痢青白宜用益黃散藥如脾胃伏火勞役不足之證及服巴豆之類胃虛而成慢驚者用益黃理中之藥必傷人命當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中以甘寒瀉火以酸涼補金使金旺火衰風木自平矣今立黃耆湯瀉火補金益土爲神治之法用炙黃耆二錢人參一錢炙甘草五分白芍藥五分水一大盞煎半盞溫服機曰蕭山魏直著博愛心鑑三證順者爲吉不用三證逆者爲吉不用

藥逆者爲凶不必用藥惟險乃悔吝之象當以藥轉危爲安宜用保元湯加減主之此方原出東垣治慢驚土衰火旺之法今借而治痘以其內固營血外護衛氣滋助陰陽作爲膿血其證雖異其理則同去白芍藥加生薑改名曰保元湯炙黃耆三錢人參二錢炙甘草一錢生薑一片水煎服之驗證者初出圓暈乾紅少潤也漿長光澤頂陷不起也旣出雖起慘色不明也漿行色灰不榮也漿定光潤不消也漿老溼潤不斂也結痂而胃弱內虛也痂落而口渴不食也痂後生癰腫也癰腫潰而斂遲也凡有諸症並宜此湯或加芎薑加官桂加糯米以助之詳見本書嘉謨曰人參補中黃耆實表凡內傷脾胃發熱惡寒吐泄怠臥脹滿痞塞神短脈微者當以人參爲君黃耆爲臣若表虛自汗亡陽潰瘍痘疹陰瘡者當以黃耆爲君人參爲臣不可執一也

附方

舊五小便不通

溫服

小兒減半

總微論

綿黃耆二錢水二盞煎一盞

酒疸黃疾

心下懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑斑由大醉當風入水所致黃耆二兩

木蘭一兩爲末酒服方寸匕日三服

肘後方

氣虛白濁

黃芪鹽炒半兩

末爲末

每服一錢白湯

治渴補虛

悸焦渴面色萎黃不能

煩渴並

飲食或先渴而後發瘡癧或先癰疽而後發渴並

宜常服此藥平補氣血安和臟腑終身可免癰疽

並

能

之疾用綿黃耆箭筈者去蘆

六兩一半生焙

以鹽水潤溼飯上蒸三次焙

剉粉甘草一兩一半

午各用一錢白湯點服

早晨日

生用一

半炙黃爲末每服二錢白湯點服

午各用一

服亦可煎服名黃芪

六一湯

外科精要

老人悶塞

綿黃耆陳皮去白各半兩爲末

大麻子一合研爛以水瀝漿煎至三

乳起入白蜜一匙再煎沸調藥空心服甚者不過

二服此藥不冷不熱常服無秘塞之患其效如神

和劑腸風瀉血黃耆黃連等分爲末麪糊丸綠豆

局方

腸風瀉血黃耆

大每服三十丸米湯下

孫用和

秘寶

尿血沙淋

痛不可忍黃耆人參等分爲末以大蘿蔔一個切一指厚大四五片

蜜二兩淹炙令盡不令焦點末食無時以鹽湯下永類鈐方吐血不止黃耆二背浮萍五錢爲末每服一錢半紫

薑蜜水下錢薑蜜水下聖濟總錄欬嗽膿血咽乾乃虛中

涼藥以好黃耆四兩甘草一兩爲末每服二錢點湯服

聖濟總錄席延賞方肺癰得吐黃耆

爲末每服二錢水一中蓋煎至二兩六分溫服日三四服

聖惠方甲疽瘡膿生足趾

肉突不出時常舉發者黃耆二兩蘭茹一兩醋浸一宿以豬脂五合微火上煎取二合絞去滓以封瘡

口上日三度其肉自消外臺秘要胎動不安腹痛下黃汁黃耆川芎各一兩糯米一

合水一升煎半升陰汗溼瘡綿黃耆酒炒爲末以熟豬心點喫妙趙

真人濟瘡疽內固黃耆人參各一兩爲末入眞龍腦一錢用生藕汁和丸綠豆大急方

每服二十丸溫水下
日日服 本事方

莖葉主治療渴及筋攣癰腫疽瘡

別錄

人參

本經上品

釋名

人瀆音參或黃參

吳普別錄

人銜

本廣雅經

神草

別錄土精

別錄地精

廣雅海腴

人還丹

廣雅時珍曰

人瀆

年深浸漸

長成者根如人形有神故謂之人

漫神草漫字從漫亦浸漸之義漫卽浸字後世因

字文繁遂以參星之字代之從簡便爾然承誤日久亦不能變矣惟張仲景傷寒論尙作漫字別錄

一名人術

乃漫字之訛也其成有階級故曰人

銜其草背陽向陰故曰鬼蓋其在五參色黃屬土

而補脾胃生陰血故有黃參血參之名得地之精靈故有土精地精之名廣五行記云隋文帝時上

黨有人宅後每夜聞人呼聲求之不得去宅一里
許見人參枝葉異常掘之入地五尺得人蔓一如
人體四肢畢備呼聲遂絕觀此則土精之名尤可
證也禮斗威儀云下有人參上有紫氣春秋運斗
樞云搖光星散而爲人參人君廢山瀆之利則搖
光不明人參不生觀此則神草之名又可證矣

搖

集解

別錄曰人參生上黨山谷及遼東二月四月

八月上旬采根竹刀刮暴乾無令見風根如
人形者有神普曰或生邯鄲三月生葉小銳枝黑
莖有毛三月九月采根根有手足面目如人者神
宏景曰上黨在冀州西南今來者形長而黃狀如
防風多潤實而甘俗乃重百濟者形細而堅白氣
味薄於上黨者次用高麗者高麗卽是遼東形大
而虛軟不及百濟並不入上黨者其草一莖直上
四五相對生花紫色高麗人作人參讚云三桺五
葉背陽向陰欲來求我椴樹相尋椴音賈樹似桐
甚大蔭廣則多生采作甚有法今近山亦有但作
之不好恭曰人參見用多是高麗百濟者潞州太

行紫團山所出者謂之紫團參保升曰今沁州遼州澤州箕州平州易州檀州幽州媯州并州並出人參蓋其山皆與太行連亘相接故也珣曰新羅國所貢者有手足狀如人形長尺餘以杉木夾定紅絲纏飾之又沙州參短小不堪用頌曰今河東諸州及泰山皆有之又有河北榷場及閩中來者名新羅人參俱不及上黨者佳春生苗多於深山背陰近櫟漆下溼潤處初生小者三四寸許一桿五葉四五六年後生兩桿五葉未有花莖至十年後生三桿年深者生四桿各五葉中心生一莖俗名百尺杵三月四月有花細小如粟蕊如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如人形者神泰山出者葉榦青根白殊別江淮間出一種土人參苗長一二尺葉如匙而小與桔梗相似相對生生五七節根亦如桔梗而柔味極甘美秋生紫花又帶青色春秋采根土人或用之相傳欲試上黨參但使二人同走一舍人參一空口度走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自

如其人參乃真也(宗奭曰上黨者根頗纖長根下垂有及一尺餘者或十歧者其價與銀等稍爲難得土人得一窠則置板上以新綵紺飾之嘉謨曰

紫團參紫色稍扁百濟參白堅且圓名白條參俗名羊角參遼東參黃潤纖長有鬚俗名黃參獨勝高麗參近紫體虛新羅參亞黃味薄肖人形者神其類雞腿者力洪時珍曰上黨今潞州也民以人參爲地方害不復采取今所用者皆是遼參其高麗百濟新羅三國今皆屬於朝鮮矣其參猶來中國互市亦可收子於十月下種如種菜法秋冬采者堅實春夏采者虛軟非地產有虛實也遼參連皮者黃潤色如防風去皮者堅白如粉偽者皆以沙參薺苑桔梗采根造作亂之沙參體虛無心而味淡薺苑體虛無心桔梗體堅有心而味苦人參體實有心而味甘微帶苦自有餘味俗名金井玉闌也其似人形者謂之孩兒參尤多贗僞宋蘇頌圖經本草所繪潞州者三桺五葉眞人參也其潞州者乃沙參之苗葉沁州兗州者皆薺苑之苗葉

其所云江淮土人參者亦薺莞也並失之詳審今
潞州者尙不可得則他處者尤不足信矣近又有
薄夫以人參先浸取汁自啜乃曬乾復售謂之湯
參全不任用不可不察考月池翁諱言聞字子郁

銜太醫吏目嘗著人參傳上下卷甚詳

不能備錄亦略節要語於下條云爾

脩治

宏景曰人參易蛀蟲唯納新器中密封可經

過麻油瓦罐泡淨焙乾入華陰細辛與參相間收
之密封可留經年一法用淋過竈灰曬乾罐收亦
可

李言聞曰人參生時背陽故不喜見風日凡生

用宜咬咀熟用宜隔紙焙之或

蘸酒潤透咬咀焙

熟用並
忌鐵器

根氣味甘微寒無毒

別錄曰微溫

桐君雷公苦黃帝岐伯甘無

元素曰性溫味甘微苦氣味俱薄浮而升陽中

之陽也又曰陽中微陰○之才曰茯苓馬蘭爲之

毒

使惡洩疏鹹反藜蘆一云畏五靈脂惡阜莢黑豆動紫石英元素曰人參得升麻引用補上焦之元氣瀉肺中之火得茯苓引用補下焦之元氣瀉腎中之火得麥門冬則生脈得乾薑則補氣呆曰得黃耆甘草乃甘溫除大熱瀉陰火補元氣又爲瘡家聖藥震亨曰人參入手太陰與藜蘆相反服參一兩入藜蘆一錢其功盡廢也言聞曰東垣李氏理脾胃瀉陰火交泰丸內用人參阜莢是惡而不惡也古方療月閉四物湯加人參阜莢是畏而不畏也又療痰在胸膈以人參藜蘆同用而取涌越是激其怒性也此皆精微妙奧非達權衡者不能知主治補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明日開心益智久服輕身延年經本療腸胃中冷心腹鼓痛胸膈逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脈破堅積令人不忘別錄主五

勞七傷虛損痰弱止嘔噦補五臟六腑保中守神
消胸中瘀治肺痿及癆疾冷氣逆上傷寒不下食
凡虛而多夢紛紜者加之

甄權

止煩躁變酸水

李珣

消食開胃調中治氣殺金石藥毒

大明

治肺胃陽氣不足肺氣虛促短氣少氣補中緩中瀉心肺脾胃中

火邪止渴生津液

元素

治男婦一切虛證發熱自汗

眩運頭痛反胃吐食痃瘧滑瀉久痢小便頻數淋
瀝勞倦內傷中風中暑痿痹吐血嗽血下血血淋

血崩胎前產後諸病

時珍

發明

宏景曰人參爲藥切要與甘草同功果曰人

皆病入汗後身熱亡血脈沈遲者下痢身涼脈微血虛者並加人參古人血脫者益氣蓋血不自生須用補血藥血無由而生矣素問言無陽則陰無以生陰則陽無以化故補氣須用人參血虛者亦須用之本草十劑云補可去弱人參羊肉之屬是也蓋人參補氣羊肉補形形氣者有無之象也然古曰潔古老人言以沙參代人參取其味甘也然人云補五臟亦須各用本臟藥相佐使引之言聞曰人參補生用氣涼熟用氣溫味甘補陽微苦補陰氣主生万物本乎天味主成物本乎地氣味生成陰陽化溫者造化也涼者高秋清肅之氣天地之陰也其性降溫者陽春生發之氣天之陽也其性升浮者火土相生之

味地之陰也其性沈人參氣味俱薄氣之薄者生降熟升味之薄者生升熟降如土虛火旺之病則宜生參涼薄之氣以瀉火而補土是純用其氣也脾虛肺怯之病則宜熟參甘溫之味以補土而生金是純用其味也東垣以相火乘脾身熱而煩高而喘頭痛而渴脈洪而大者用黃蘖佐人參孫氣眞人治夏月熱傷元氣人汗大泄欲成瘺厥用生脈散以瀉熱火而救金水君以人參之甘涼瀉火而補元氣臣以麥門冬之苦甘寒清金而滋水源佐以五昧子之酸溫生腎精而收耗氣此皆補元氣於無何有之鄉凡病後氣虛及肺虛嗽者並合宜之若氣虛有火者

正誤 敘曰夏月少使人參發心疚之病好古曰人參甘溫補肺之陽泄肺之陰肺受寒邪宜此酒色過度損傷肺腎真陰虛火動勞嗽吐血曰人補之肺受火邪則反傷肺宜以沙參代之王綸曰人

欵血等證勿用之蓋人參入手太陰能補火故肺受火邪者忌之若誤服參耆甘溫之劑則病日增服之過多則死不可治蓋甘溫助氣氣屬陽陽旺則陰愈消惟宜苦甘寒之藥生血降火世人不識往往服參耆爲補而死者多矣○言聞曰孫眞人云夏月服生脈散清暑益氣湯乃三伏瀉火益金之垣亦言生脈散腎瀉湯三劑則百病不生李東聖藥而雷敷反謂發心疚久患非矣疚乃臍旁積氣非心病也人參能養正破堅積豈有發疚之理觀張仲景治腹中寒氣上衝有頭足上下痛不可觸近嘔不能食者用大建中湯可知矣又海藏王好古言人參補陽泄陰肺寒宜用肺熱不宜用節齋王綸因而和之謂參耆能補肺火陰虛火動失血諸病多服必死二家之說皆偏矣夫人參能補元陽生陰血而瀉陰火東垣李氏之說也明矣仲景張氏言亡血血虛者並加人參又言肺寒者去人參加乾薑無令氣壅丹溪朱氏亦言虛火可補參耆之屬實火可瀉芩連之屬二家不察三氏之

精微而謂人參補火謬哉夫火與元氣不兩立元氣勝則邪火退人參旣補元氣而又補邪火是反復之小人矣何以與甘草芩朮謂之四君子耶雖然三家之言不可盡廢也惟其語有滯故守之者泥而執一遂視人參如蛇蠍則不可也凡人面白赤面黃面青黧悴者皆肺脾腎氣不足可用也面赤面黑者氣壯神强不可用也脈之浮而芤濡虛大遲緩無力沉而遲濇弱細結代無力者皆虛而不足可用也若弦長緊實滑數有力者皆火鬱內實可若腎虛氣短喘促者必用也仲景謂肺寒而欬勿用者寒束熱邪壅鬱在肺之欬也若自汗惡寒而欬者必用也東垣謂久病鬱熱在肺勿用者乃火鬱于內宜發不宜補也若肺虛火旺氣短自汗者必用也丹溪言諸痛不可驟用者乃邪氣方銳宜散不宜補也若裏虛吐利及久病胃弱虛痛喜按能食脈弦而數涼之則傷胃溫之則傷肺不受補者必用也節齋謂陰虛火旺勿用者乃血虛火亢

者也若自汗氣短肢寒脈虛者必用也如此詳審之說本於海藏王好古但綸又過于矯激丹溪言虛火可補須用參芪又云陰虛潮熱喘嗽吐血盜汗等證四物加人參黃蘗知母又云好色之人肺腎受傷欬嗽不愈瓊玉膏主之又云肺腎虛極者獨參膏主之是知陰虛勞瘵之證未嘗不用人參也節齋私淑丹溪者也而乃相反如此斯言一出印定後人眼目凡遇前證不問病之宜用不宜輒舉以藉口致使良工掣肘惟求免夫病家之怨病家亦以此說橫之胸中甘受苦寒雖至上嘔下泄去死不遠亦不悟也古今治勞莫過於葛可久其獨參湯保真湯何嘗廢人參而不用耶節齋之說誠未之深思也楊起曰人參功載本草人所共知近因病者吝財薄醫復算本惜費不肯用參療病以致輕者至重重者至危然有肺寒肺熱中滿血虛四證只宜散寒消熱消脹補營不用人參其說近是殊不知各加人參在內護持元氣力助羣

藥其功更捷若曰氣無補法則謬矣古方治肺寒以溫肺湯肺熱以清肺湯中滿以分消湯血虛以養營湯皆有人參在焉所謂邪之所轅其氣必虛又曰養正邪自除陽旺則生陰血貴在配合得宜爾庸醫每謂人參不可輕用誠哉庸也好生君子不可輕命薄醫亦不可計利不用書此奉勉幸勿曰迂

附方

舊九新人參膏

用人參十兩細切以活水二

六十八十蓋浸透入銀石器內桑柴

火緩緩煎取十

蓋瀘汁再以水十

蓋煎取五蓋與

前汁合煎成膏瓶收隨病作湯使丹溪云多慾之

人腎氣衰憊欬嗽不止用生薑橘皮煎湯化膏服

人江鄭兄五月患痢又犯房室忽發昏運不知

人事手撒目暗自汗如雨喉中痰鳴如拽鋸聲小

之浦江鄭兄五月患痢又犯房室忽發昏運不知

便遺失脈大無倫此陰虧陽絕之證也予令急煎

大料人參膏仍與灸氣海十八壯右手能動再三

壯唇口微動遂與膏服一蓋半夜後服三蓋眼能

大料人參膏仍與灸氣海十八壯右手能動再三

壯唇口微動遂與膏服一蓋半夜後服三蓋眼能

動盡三斤方能言而索粥盡五斤而痢止至十斤而全安若作風治則誤矣一人背疽服內托十宣藥已多膿出作嘔發熱六脈沉數有力此潰瘍所忌也遂與大料人參膏入竹瀝飲之參盡一十六斤竹伐百餘竿而安後經旬餘值大風拔木瘡起有膿中有紅線一道過肩胛抵右肋子曰急作參膏以芎歸橘皮作湯入竹瀝薑汁飲之盡三斤而瘡潰調理乃安若癰疽潰後氣血俱虛嘔逆不食變證不一者以參耆歸術等分煎膏服之最妙治中湯領曰張仲景治胸結胸胸滿脇下逆氣搶心治中湯主之卽理中湯人參朮乾薑甘草各三兩四味以水八升煮三升每服一升日三服隨證加減此方自晉宋以後至唐名醫治心腹病者無不用之或作湯或蜜丸或爲散皆有奇效胡洽居士治霍亂謂之溫中湯陶隱居百一方云霍亂餘藥乃或難求而治中湯四順湯厚樸湯不可暫缺常須預合自隨也唐石泉公王方慶云數方不惟霍亂可醫諸病皆療也四

順湯

用人參甘草乾薑附子炮各

四君子湯

治脾胃氣

虛

不思飲食諸病氣虛者以此爲主人參一錢白朮二錢白茯苓一錢炙甘草五分薑三片棗一枚

水

二鍾煎一鍾食前溫服

隨證加減和濟局方

開胃化痰

拘大人小兒

人參

焙二兩半夏薑汁浸焙五錢爲末

飛羅麵作丸日三服聖惠

糊丸

綠豆大食後薑湯下三五十丸

不能傳化易飢不能食

方

加陳橘皮五錢

不能傳化易飢不能食

開胃化痰

拘大人小兒

半錢

生薑二錢水七合煎二合雞子脾

胃虛弱思

清一枝打轉空心服之

聖濟總錄

脾胃虛弱思

飲食

生薑半斤取汁白蜜十兩人參末四兩

普濟方

周虛

銀鍋煎成膏每米飲調服一匙

人參一兩水二盞煎一盞入竹

管香各二錢半橘皮五錢參

惡心

或嘔吐有痰人參一盞煎一盞入竹

管香各二錢半橘皮五錢參

簡便方

尤宜

周寒嘔惡丁香藿香各二錢半橘皮五錢參

生薑三片水二盞煎

一盞溫服

拔萃方

反胃嘔吐

飲食入口卽吐弱無力垂死者上

黨人參三大兩拍破水一大升

煮取四合熱服日

再兼以人參汁入粟米雞子白薤白煮粥與嗽李

直方司勲於漢南患此兩月餘諸方不瘥遂與此

方當時便定後十餘日遂入京師絳每與名醫論

此藥難可爲儔也

李絳兵部手集食入卽吐人參半夏湯用人參

生薑十片水一斗以杓揚二百四十遍取三升

入白蜜三合煮一升半分服

張仲景金匱方霍亂嘔惡

人參二兩水一盞半煎汁一盞入雞子白

亂嘔惡一枚再煎溫服一加丁香

衛生家寶方

霍亂煩悶人參五錢桂心半錢水

二盞煎服聖惠方霍亂吐瀉煩躁

人參二兩橘皮三兩生薑一兩水

聖濟總錄霍亂吐瀉不正

六升煮三升分三服和丸梧子大每服五十丸米湯下

等分爲末以生地黃汁和劑局方陽

本草綱目

卷二十一
自汗盜汗氣短頭運人參五錢熟附子一兩分爲四帖每帖以生薑十片流水二盞

煎一盞食遠溫

湯

服一濟生方

乃血入肺竅危症也人參末一兩

射後產後發喘

上氣鳴息者人參末一

方

蘇木二兩水二盞煮汁一盞調參

服方寸匕日五六服效

末服神效

人參一兩紫蘇半兩以童尿

聖惠方

醫方摘要

產後發喘

人參石菖蒲石蓮肉等分每

產後不語

人參石菖蒲酒三合煎服

婦人良方

醫方摘要

發熱自汗人參當歸等分爲末用

豬腰子一個去膜切小片以水三升糯米半合葱白二莖煮米熟

取汁一盞入藥煎至八分食前溫服

永類方

產後秘塞

人參末各一

炒爲末煉蜜丸五十丸砂末研匀

米飲下梧子大每服

橫生倒產

人參末各一

三錢丹砂末五分研匀冷服卽母子俱安

神效此施漢卿方也

生薑自然汁

湯

婦人開心益智

人參末一兩鍊成鱗，豬肥腸十兩以醋酒和勻，每服一盃，日再服。

至百日耳目聰明，骨髓充盈，肌膚潤澤。

日記千言，兼去風熱痰病。

千金方

聞雷卽昏

一小兒七歲，聞雷卽昏倒，不知人事。此氣怯也。以人參當歸，麥門冬各二兩，五味子五錢，水一斗，煎

汁五升，再以水五升煎，滓取汁二升，合煎成膏。每服三匙，白湯化下，服盡一斤，自後聞雷自若矣。

楊起簡

忽喘悶絕

方見大離魂異疾。

黃下

有人臥則覺

便方一樣無別，但不語。

蓋人臥則魂歸于肝，此由肝虛邪

襲，魂不歸舍。病名曰離魂。

人參龍齒赤茯神各

一錢，水一盞，煎半盞，調飛過朱砂末一錢，睡時服

一夜，服三夜後，真者氣爽，假者卽化矣。

夏子

益怪證

怔忡自汗

心氣不足也。

人參半兩，當歸半

兩，用獐豬腰子二個，以水二盞

奇疾方

煮至一盞半，取腰子細切，人參當歸同煎，至八分空

心，喫腰子以汁送下，其滓焙乾爲末，以山藥末作

糊丸綠豆大每服五十丸食遠棗湯下不過兩服
卽愈此昆山神濟大師方也一加乳香二錢王
選方 瑪百一心下結氣凡心下硬按之則無常覺膨滿

由思慮過多氣不以時而行則結滯謂之結氣人
參一兩橘皮去白四兩爲末煉蜜丸梧子大每米

飲下五六十分丸聖惠方房後困倦人參七錢陳皮一錢水一

再服千金不傳虛勞發熱蓋半煎八分食前溫服日
趙永庵方 蘭州柴胡各三錢大棗一

枚生薑三片水一鍾半煎七分食遠肺熱聲啞人
溫服日再服以愈爲度奇效良方肺熱聲啞人

傾入蓋內遇欬時溫呷三五口甚佳 食療本草
止嗽化痰散人參末一兩明礬二兩以釀醋二升熬

大沸入參末一兩煉蜜和收每以碗豆大

止嗽化痰散人參末一兩明礬二兩以釀醋二升熬

一丸放舌下其嗽卽止痰自消

簡便方

小兒喘嗽

發熱自汗吐紅脈虛無力者人參天

花粉等分每服半錢蜜水

經濟方

喘嗽

嗽急咯血喘上氣

調下以瘥爲度

經濟方

喘嗽

嗽急咯血吐血

脈無力者人參末每服三錢雞子清

調之五更初

服便睡去枕仰臥只一服愈年深者再服咯血者

服盡一兩甚好一方以烏鵲子水磨千遍自然化

作水調藥尤妙忌醋酸腥鹽鮓醉飽將息乃佳

沈存中

嗽吐血

人參黃耆飛羅麵各一兩百合

靈苑方五錢爲末水丸梧子大每服五

十丸食前茅根湯下○朱氏集驗

辰砂等分爲末烏梅肉和丸彈子大每白湯化下

一丸日虛勞吐血

甚者先以十灰散止之其人必

之一覺卽減五六繼服調理藥

葛可久十藥神書

吐血下血因七情所感酒色內傷氣血妄行口鼻

俱出心肺脈散血如湧泉須臾不救用

人參焙側柏葉蒸焙荆芥穗燒存性各五錢爲末用二錢入飛羅麪二錢以新汲水調如稀糊服少頃再啜一服立止

衄血不止人參柳枝寒食采者等分爲末每服一錢

華陀中藏經

流水中藏經

日止

人參赤茯苓

聖濟總錄

齒縫出血

人參赤茯苓

麥門冬各二

東

流水中藏經

日止

人參無柳枝

人參赤茯苓

齒縫出血

人參赤茯苓

人參赤茯苓

人參赤茯苓

錢

水一鍾煎

七分食

前溫服日再蘇

東坡得此自

試效方

談塋翁

陰虛尿血

人參焙黃耆鹽水炙等分爲末

紅皮大蘿蔔一枚切作四片

大蘿蔔一粒令乾再炙勿令焦以

蜜

盡爲度

每用一片蘸藥食之仍以鹽湯送下以

瘥爲度

沙淋石淋

方同

消渴引飲

人參爲末雞子清調服一錢日

三四服

○集驗用人參

桔梗根等分生研爲末

煉

蜜丸梧子

大每服百丸食前

麥門冬湯下日二服

以愈爲度

名玉壺丸忌酒

麪炙燙○鄭氏家傳消

渴方人參兩粉草

二兩以雄豬膽

汁浸炙腦子

半錢爲末蜜丸茨子大每嚼一丸冷水下○聖濟總錄用人參一兩葛粉二兩爲末發時以燙豬湯

一升入藥三錢蜜二兩慢火熬至三合狀如黑餳以瓶收之每夜以一匙含嚥不過三服取效也

虛瘡發熱

人參二錢二分雄黃五錢爲末端午日用櫻尖搗丸梧子大發日侵晨井華水

吞下七丸發前再服忌諸般熱物立

效一方加神麴等分丹溪纂要

沈細人參大附子各一兩半每服半兩生薑十片

丁香十五粒粳米一撮水二盞煎

七分空心溫服

經驗方連三錢

經老人虛痢不止不能飲食上黨人參

驗良方爲末每服方寸七米湯調

下日三服十便良方傷寒壞證凡傷寒時疫

幼妊娠誤服藥餌困重垂死脈沉伏不省人事七

日以後皆可服之百不失一此名奪命散又名復

脈湯人參一兩水二鍾緊火煎一鍾以井水浸冷
服之少頃鼻梁有汗出脈復立瘥蘇韜光侍郎云
用此救數十人予作清流宰縣倅申屠行輔之子
婦患時疫三十餘日已成壞病令服此藥而安
王璆百傷寒厥逆身有微熱煩躁六脈沉細微弱
一選方傷寒厥逆此陰極發躁也無憂散用人參
半兩水一鍾煎七分調牛膽南夾陰傷寒先因慾
星末二錢熱服立甦三因方事後感
寒邪陽衰陰盛六脈沉伏小腹絞痛四肢逆冷嘔
吐清水不假此藥無以回陽人參乾薑炮各一兩
生附子一枚破作八片水四升半煎一升
頓服脈出身溫即愈吳綬傷寒蘊要筋骨風
痛人參四兩酒浸三日曬乾土茯苓一斤山慈姑
一兩爲末煉蜜丸梧子大每服一百丸食前米
湯下經驗方小兒風癩癩瘻用人參蛤粉辰砂等分爲
服五十九金銀湯下一日二脾虛慢驚黃耆湯見
服大有神效衛生寶鑑黃耆發明

下

痘疹險證

保和湯見黃驚後瞳斜

耆發明下

驚後瞳斜

小兒驚後瞳人不正者人

參

阿膠糯米炒成珠各一錢水一盞煎

七分溫服日再服愈乃止效

直指方

小兒脾風

多用

人參冬瓜仁各半兩南星一兩

漿水煮過酒

末每用一錢水半盞煎三分溫服

本事方

毒目盲

一人形實好飲熱酒忽病目盲而脈濇此

木煎湯調人參末一錢服次日鼻及兩掌皆紫黑

此滯血行矣再以四物湯加蘇木桃仁紅花陳皮

調人參末服數日而愈

丹溪纂要

丹溪纂要

酒毒生疽一婦嗜酒胸生一疽

參酒

炒大黃等分爲末

薑湯服

一錢得睡汗出而愈效

丹溪醫案

狗咬風傷

腫痛

置桑柴炭上燒存性

以盆覆定少頃爲末

塗之立瘥

經驗方

蜈蚣咬傷

嚼人參

集成醫學

蜂蠍螫傷

人參末傳之

證治要訣

脇破腸出急以油抹

枸杞汁淋之內喫羊腎粥
十日愈 危氏得效方

氣奔怄疾 虎杖

方見

蘆氣味苦溫無毒主治吐虛勞痰飲

時珍

發明

吳綏曰人弱者以人參蘆代瓜蒂震亨曰人參入手太陰補陰中之陽蘆則反能瀉太陰

之性亦如麻黃苗則發汗根則止汗穀屬金而糠極學者可不觸類而長之乎一女子性躁味厚暑月因怒而病呃每作則舉身跳動昏冒不知人其形氣俱實乃痰因怒鬱氣不得降非吐不可遂以人參蘆半兩逆流水一大盞半煎一大盞飲之大吐頑痰數盞大汗昏睡一日而安又一人作勞發瘧服瘧藥變爲熱病舌短痰嗽六脈洪數而滑此痰膠蓄胸中非吐不愈以參蘆湯加竹瀝二服湧出痰三塊次與人參黃耆當歸煎服半月乃安

沙參上品經

校正

併入別錄有名

釋名

白參

吳普

知母

別錄

羊乳

別錄

羊婆嬪

綱目

鈴兒草

別錄

虎鬚

別錄

苦心

別錄

宏景曰

此與人參玄參丹參

一名識美

一名志取

苦參是

爲五參

其形不盡相

類而主療頗同故皆有參名

又有紫參

乃牡蒙也

時珍曰

沙參白色宜於沙地

故名其根多白汁俚人呼爲羊婆嬪

別錄有名未

用羊乳卽此也

此物無心味淡

而別錄

一名苦心

謂也

鈴兒草象花形也

集解

別錄曰

沙參生河內川谷及冤句

般陽續山

二月八月采根暴乾

又名羊乳

一名地黃

三月

月采立夏後母死

恭曰出華山者爲善

普曰二月

生苗如葵葉青色

根白實如芥根

大如蕪菁

三月

采宏景曰今出近道叢生

葉似枸杞根白實者佳

保昇曰其根若葵根

其花白色

頌曰今淄

齊潞隨

江淮荆湖州郡皆有之

苗長一二尺以來叢生

匣壁閒葉似枸杞而有叉子

七月開紫花根如葵根

江淮荆湖州郡皆有之

苗長一二尺以來

叢生匣壁閒葉似

枸杞而有叉子

七月開紫花根如葵根

大如指許赤黃色中正白實者佳二月八月采根而土生者葉有細有大花白瓣上仍有白黏此爲小異藏器曰羊乳根如蕷莞而圓大小如拳上有角節折之有白汁人取根當蕷莞苗作蔓折之有白汁時珍曰沙參處處山原有之二月生苗葉如初生小葵葉而團扁不光八九月抽莖高一二尺莖上之葉則尖長如枸杞葉而小有細齒秋月葉閒開小紫花長二三分狀如鈴鐸五出白蕊亦有白花者並結實大如冬青實中有細子霜後苗枯其根生沙地者長尺餘大一虎口黃土地者則短而小根莖皆有白汁八九月采者白而實春月采者微黃而虛小人亦往往紮蒸壓實以亂人參但淡體輕鬆味而短耳

根氣味苦微寒無毒

別錄曰

羊乳

溫無毒

普曰

沙

參岐伯

鹹

神農

黃帝扁鵲

無

苦之才曰

李當之大寒好古曰甘微

參藜蘆

惡防己反

藜蘆

主治血積驚氣除寒

熱補中益肺氣本療胃癆心腹痛結熱邪氣頭痛

皮閒邪熱安五臟久服利人又云羊乳主頭腫痛

益氣長肌肉別錄去皮肌浮風症氣下墜治常欲眠

養肝氣宣五臟風氣甄權補虛止驚煩益心肺并一

切惡瘡疥癬及身癢排膿消腫毒大明清肺火治久

欬肺痿

時珍

發明

元素曰肺寒者用人參肺熱者用沙參代之取其味甘也好古曰沙參味甘微苦厥陰本

經之藥又爲脾經氣分藥微苦補陰甘則補陽故

潔古取沙參代人參蓋人參性溫補五臟之陽沙

參性寒補五臟之陰雖云補五臟亦須各用本臟藥相佐使隨所引而相輔之可也時珍曰人參甘

苦溫其體重實專補脾胃元氣因而益肺與腎故內傷元氣者宜之沙參甘淡而寒其體輕虛專補肺氣因而益脾與腎故金能受火尅者宜之一補陽而生陰一補陰而制陽不可不辨之也

附方

舊一

肺熱欬嗽

沙參半兩水煎服

卒得疝氣

小腹及陰

搗篩爲末

酒服方寸匕

立瘥

衛生易簡方

欲死者沙參

白帶

多因七情內傷或下元虛冷所致

沙參

沙參

沙參

婦人

薺

○別錄

中品

校正

併入圖

經杏參

釋名

杏參

圖

杏葉沙參

救荒

底

甜桔梗

綱目

白麪根

救荒

苗名隱忍

時珍曰

薺多汁有濟蒼之

狀故以名之

濟蒼濃露也其

根如沙參而葉如杏故河南人呼爲杏葉沙參蘇

頌圖經杏參卽此也俗謂之甜桔梗爾雅云蒼

桔梗爾雅云蒼

桔梗爾雅云蒼

桔梗爾雅云蒼

茺也郭璞云卽茺茺
也隱忍說見下文

集解宏景曰茺茺根莖都似人參而葉小異根味甜絕能殺毒以其與毒藥共處毒皆自然歇不止入方家用也又曰魏文帝言茺茺亂人參卽此也茺茺葉甚似桔梗但葉下光明滑澤無毛爲異又不如人參相對耳恭曰人參苗似五加而潤短莖圓有三四棱頭有五葉陶引茺茺亂人參誤矣且茺茺桔梗又有葉差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相亂惟以根有心爲別爾頌曰今川蜀江浙皆有之春生苗莖都似人參而小異根似桔梗但無心爲異潤州陝州尤多人家收以爲果或作脯啖味甚甘美兼可寄遠二月八月采根暴乾承曰今人多以蒸過壓扁亂人參但味淡爾宗奭曰陶以根言故云茺茺亂人參蘇以苗言故以陶爲誤也機曰茺茺苗莖與桔梗相似其根與人參相亂今言苗莖都似人參近於誤也當以人參茺茺桔梗三註參看自明矣時珍曰茺茺

苗似桔梗根似沙參故姦商往往以沙參薺菴通亂人參蘇頌圖經所謂杏參周憲王救荒本草所謂杏葉沙參皆此薺菴也圖經云杏參生淄州田野根如小菜根土人五月采苗葉治欬嗽上氣救荒本草云杏葉沙參一名白麪根苗高一二尺莖色清白葉似杏葉而小微尖而背白邊有叉牙杪間開五瓣白盤子花根形如野胡蘿蔔頗肥皮色灰勦中閒白色味甜微寒亦有開碧花者嫩苗燂熟水淘油鹽拌食根換水煮亦可食人以蜜煎充果又陶宏景註桔梗言其葉名隱忍可煮食之治蠱毒謹按爾雅云勞隱忍也郭璞註云似蘚有色江東人藏以爲菹亦可瀹食葛洪肘後方云隱忍草苗似桔梗人皆食之搗汁飲治蠱毒據此則隱忍非桔梗乃薺菴苗也薺菴苗甘可食桔梗苗苦亦甜苦不可食尤爲可證神農本經無薺菴止有一類有一名薺菴至別錄始出薺菴本經無薺菴桔梗乃一類有其苗亦可呼爲隱忍也

根氣味甘寒無毒主治解百藥毒別錄殺蠱毒治蛇

蠱咬熱狂溫疾署毒箭大利肺氣和中明目止痛

蒸切作羹粥食或作蘿菔食皆

殷

食之壓丹石發動

孟詭主欬嗽消渴強中瘡毒疔腫辟沙蟲短狐毒

珍時

發明

時珍曰

薺莞寒而利肺甘而解毒乃良品也

而世不知用惜哉按葛洪肘後方云一藥而兼解眾毒者惟薺莞汁濃飲二升或煮嚼之亦可

作散服此藥在諸藥中毒皆自解也又張鷺朝野

僉載云各醫言虎中藥箭食清泥而解野豬中藥

箭镞薺莞而食物猶知解毒何況人乎又孫思邈

千金方治

強中爲病莖長興盛不交精出消渴之

後發爲癰疽有薺莞丸豬腎薺莞湯方此皆本草

所未及者然亦取其解熱解毒之功爾無他義

附方

舊四
新三

強中消渴

豬腎
薺

湯治強中之病莖
長興盛不交精液自出消渴

之後卽發癰疽皆由恣意色慾或餌金石所致宜

此以制腎中熱也用豬腎一具薺
石膏各三兩

人參茯苓磁石知母葛根黃芩枯樓根甘草各二

兩黑大豆一升水一斗半先煮豬腎大豆取汁一

斗去滓下藥再煮三升分三服後人名爲石子薺

熟地黃地骨皮玄參石斛鹿茸各一兩人參沉香

各半兩爲末以豬肚治淨煮爛杵和丸梧子大每

服七十丸空心鹽水送薺根搗汁服一

湯下並千金方疔瘡腫毒生薺根搗汁服一

度金翼方千面上疖炮薺
肉桂各一兩爲末每用方寸匕

瘡瘍立瘥

陳延之小品方解鉤

濟總錄解諸蠱毒薺
立瘥

八兩水六升煮取三升每服五合日五服

吻毒鉤吻葉與芹葉相似誤食之殺人惟以薺

莖八兩水六升煮取三升每服五合日五服

仲景金匱玉函解五石毒薺芫生搗汁多服之
立瘥蘇頌圖經

隱忍葉氣味甘苦寒無毒主治蠱毒腹痛面目青黃林露骨立煮汁一二升飲時珍主腹臟風壅欬嗽

上氣

蘇頌

桔梗

本經下品

釋名

白藥

別錄

梗草

別錄

薺芫

本經

時珍曰

此草之根

結實而梗直故名吳普

蓋亦庚詞爾桔梗

薺芫乃一類有甜苦二種故本

經桔梗一名薺芫而今俗呼

薺芫爲甜桔梗也至

別錄始出

薺芫條分爲二物然其性味功用皆不

本草一名利如一名符扈一名房圖方書並無見

蓋亦庚詞爾桔梗薺芫乃一類有甜苦二種故本

經桔梗一名薺芫而今俗呼

薺芫爲甜桔梗也至

別錄始出

薺芫條分爲二物然其性味功用皆不

錄爲是

同當以別

本草綱目草部
卷三
集解

別錄曰 桔梗生嵩高山谷及冤句一八月采根

生苗

宏景曰

葉如薺莢莖如筆管紫赤色二月

桔梗

療蠱毒

甚驗俗方用此乃名薺莢今別有薺

茺能解藥毒

可亂人參葉

甚相似但薺莢葉下光滑澤無毛爲異葉生又不如人參相對耳

茺

桔梗葉有差互者亦有葉三四對者皆一莖

茺

桔梗葉直上葉既相亂惟以根有心爲別耳

頌曰今在處

有之

根如指大黃白色

春生苗莖高尺餘葉似杏

葉而長橢

四葉相對而生嫩時亦可煮食夏開小

花紫碧色

頗似牽牛花秋後結子八月采根其根

有心若無心者爲茺

茺關中所出桔梗根黃皮似

蜀葵

根莖細青色葉

小青色似菊葉也

根脩治

敷曰凡使勿用木梗真似桔梗只是咬之

分已來并兩畔附枝于槐砧上

細剉用生百合搗

膏投水中浸一伏時濾出緩火熬令乾用每桔梗

四兩用百合二兩五錢時珍曰今但刮校補畏龍去浮皮米泔水浸一夜切片微炒用

校補

畏龍眼

氣味辛微溫有小毒

普曰神農醫和苦無毒黃帝扁鵲辛鹹岐伯雷公甘無毒

李当之大寒權曰苦辛

時珍曰當以苦辛平爲是之才曰節皮爲之使畏白芨龍膽草忌豬肉得牡

蠣遠志療恚怒得消石石膏療傷寒白粥解其酸

味時珍曰伏砒徐之才所云節皮不知何物也

主治

胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣

本經

利五臟腸胃補血氣除寒熱風癆溫中消穀療喉

咽痛下鹽毒

別錄治下痢破血積氣消聚痰涎去肺

熱氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇

甄權

下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除

邪辟溫破癥瘕肺癰養血排膿補內漏及喉癆大

利竅除肺部風熱清利頭目咽喉胸膈滯氣及痛

除鼻塞元

素

治寒嘔李

杲

主口舌生瘡赤目腫痛時珍

發明好古

曰桔梗氣微溫味苦辛味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰肺經氣分及足少陰經

元素元

素曰桔梗清肺氣利咽喉其色白故爲肺部引經與甘草同行爲舟楫之劑如大黃苦泄峻下之

藥欲引至胸中至高之分成功須用辛甘之劑

之譬如意鐵石入江非舟楫不載所以諸藥有此一升

味不能下沉也時珍

曰朱肱活人書治胸中痞滿不痛用桔梗枳殼取其通肺利膈下氣也張仲景

傷寒論治寒實結胸用桔梗貝母巴豆取其溫中

消穀破積也又治肺癰垂瞼用桔梗甘草取其苦

陰證清肺甘溫瀉火又能排膿血補內漏也其治少

三日咽痛亦用桔梗甘草取其苦辛散寒

甘平除熱合而用之能調寒熱也後人易名甘桔湯通治咽喉口舌諸病宋仁宗加荆芥防風連翹遂名如聖湯極言其驗也按王好古醫壘元戎載之頗詳云失音加訶子聲不出加半夏上氣加陳皮涎嗽加知母貝母欬渴加五味子酒毒加葛根少氣加人參嘔加半夏生薑唾膿血加紫菀肺痿加巵子大黃面腫加茯苓膚痛加黃耆發斑加防風荆芥疫毒加鼠黏子大黃不得眠加巵子震亨曰乾欬嗽乃痰火之邪鬱在肺中宜苦梗以開之後用痢藥此藥能開提氣血故氣藥中宜用之

附方

舊七十

胸滿不痛

新七

桔梗

枳殼

等分水

二鍾煎

溫服

南陽活人書

傷

寒腹脹

陰陽不和也

桔梗

半夏

湯主之

桔梗半夏

五片水

二鍾煎

一鍾服

南陽活人書

痰嗽喘急

桔梗半升

煎

四合去滓

溫服

童子小便

簡要

濟眾肺癰欬嗽

胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥者桔

梗湯主之桔梗一兩甘草二兩水三升煮一升分溫再服朝暮吐膿血則瘥

張仲景金匱玉函方

喉痹毒氣

桔梗二兩水三升煎少陰證一升頓服千金方少陰咽痛

少陰證二三日

咽痛者可與甘草湯不瘥者與桔梗湯主之桔梗

一兩甘草二兩水三升煮一升分服張仲景傷寒論

口舌生瘡

方同齒齶腫痛桔梗薏苡仁等分骨

槽風痛

牙齦腫痛桔梗爲末棗瓤和丸阜子大牙

疳臭爛

桔梗茴香等分燒研

研易簡方肝風眼黑

目睛痛肝

傅之衛生易簡方桔梗一斤黑牽牛頭末三兩爲末蜜丸

桔梗丸主之桔梗四十丸溫水送日二服保命集梧子大每服四十丸溫水送日四

鼻出血

桔梗爲末水服方寸匕日普濟方吐血下血加生犀角屑

方同

打擊瘀血

在腹內久不消時發動者桔梗爲末米湯下一刀圭

肘後要方

中蠱下血

如雞肝晝夜出血石餘四臟皆損惟心未毀或鼻破將死者苦桔梗爲末以酒

服方寸匕日三服不能下藥以物拗口灌之

當煩須臾自定七日止常食豬肝腫以補之神良

一方加犀角等分

妊娠中惡心腹疼痛桔梗一兩

初虞古今錄驗

煎六分溫服

小兒客忤

死不能言桔梗燒研三錢

聖惠方

米湯服之仍吞麝香少許

備急方

錢探吐

珍時

蘆頭主治吐上膈風熱痰實生研末白湯調服一

長松

拾遺

釋名仙茆

時珍曰其葉如松服之長年功如松脂及仙茆故有二名

集解

藏器曰

長松生關內山谷中葉似松葉上有

天覺文集云僧普明居五臺山患大風眉髮俱墮

哀苦不堪忽遇異人教服長松示其形狀明采服

之旬餘毛髮俱生顏色如故今并代閒土人多以

薺

長三五寸味甘微苦類人參清香可愛按張

長松雜甘草山藥爲湯煎甚佳然本草及方書皆

不載獨釋慧祥清涼傳始敘其詳如此韓悉醫通

云長松產太行西北

諸山根似獨活而香

根氣味

甘溫無毒主治

風血冷氣宿疾溫中去風

藏器

治大風惡疾眉髮墮落百骸腐潰每以一兩入

甘草少許水煎服旬日卽愈又解諸蟲毒補益長

年

時珍

附方

新

長松酒

滋補傳長松

一切風虛乃廬山休休子所一兩五錢狀似獨活而香

乃酒

中

聖藥也熟地黃

八錢生地黃

黃芪蜜炙陳皮各七錢當歸厚朴黃藥各五錢白芍藥煨人參

枳殼各四錢蒼朮米泔

製半夏

製天門冬麥門冬

砂仁黃連各三錢木香蜀椒胡桃仁各二錢小紅

棗肉八個老米一撮燈心五寸長一百二十根一

料分十劑絹袋盛之凡米五升造酒一尊煮一袋

韓氏醫通

久乃飲

黃精

別錄上品

校正

併入拾遺
救荒草

釋名

黃芝

瑞草經

戊己芝

五符經

菟竹

別錄

鹿竹

別錄

仙人

餘糧

宏景

救窮草

別錄

米鋪

蒙筌

野生薑

筌

重樓

別錄

雞格

別錄龍銜廣垂珠

頌曰隋時羊公服黃精法云黃精

一名歲蕤

一名白精

及一名仙人餘糧是芝草之精也

一名苟格一名馬箭一名垂珠

一名莞竹時珍曰黃精爲服食要藥故別錄列于

草部之首仙家以爲芝草之類以其得坤土之精

粹故謂之黃精五符經云黃精獲天地之淳精故

名爲戊己芝是此義也餘糧救窮以功名也鹿竹

莞竹因葉似竹而鹿兔食之也垂珠以子形也陳

氏拾遺救荒草卽此也今併爲一嘉謨曰根如嫩

薑俗名野生薑九蒸九曝可以代糧又名米餚

別錄曰黃精生山谷二月采根陰乾宏景曰

直而短根似萎蕤根如荻根及菖蒲概節而平

脂潤俗方無用此而爲仙經所貴根葉花實皆可

餌酒散隨宜具在斷穀方中其葉乃與鉤吻相

似惟莖不紫花不黃爲異而人多惑之其類乃殊

致死生之反亦爲奇事數曰鉤吻真似黃精只

可

是葉頭尖有毛鉤子二箇若誤服之害人黃精葉似竹也恭曰黃精肥地生者卽大如拳薄地生者猶如拇指萎蕤肥根頗同小者肌理形色大都相似今以鬼臼黃連爲比殊無彷彿黃精葉似柳及龍膽徐長卿輩而堅其鉤吻蔓生葉如柿葉殊非比類藏器曰黃精葉偏生不對者名偏精功用不如正精葉對生鉤吻乃野葛之別名二物殊不相似不知陶公憑何說此保昇曰鉤吻一名野葛陶說葉似黃精者當是蘇說葉似柿者當別是一物頌曰黃精南北皆有以嵩山茅山者爲佳三月生苗高一二尺以來葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開青白花狀如小豆花結子白如黍粒亦有無子者根如嫩生薑而黃色二月采根蒸過暴乾用今遇八月采山中人九蒸九暴作果賣黃黑色而甚甘美其苗初生時人多采爲菜茹謂之筆菜味極美江南人說黃精苗葉稍類鉤吻但鉤吻葉頭極尖而根細而蘇恭言鉤吻蔓生恐南北所產之異耳時珍曰黃

本草綱目草部卷三十一
精野生山中亦可劈根長二寸稀種之一年後極稠子亦可種其葉似竹而不尖或兩葉四五葉俱對節而生其根橫行狀如萎蕤俗采其苗爛熟淘去苦味食之名筆管菜陳藏器本草言青蕤是萎蕤見萎蕤發明下又黃精鉤吻之說陶宏景雷斂韓保昇皆言二物相似蘇恭陳藏器皆言不相似蘇頌復設兩可之辭今攷神農本草吳普本草並言鉤吻是野葛蔓生其莖如箭與蘇恭之說相合張華博物志云昔黃帝問天姥曰天地所生有食之令人不死者乎天姥曰太陽之草名黃精立食之可以長生太陰之草名鉤吻不可食之入口按死人信鉤吻殺人不信黃精之益壽不亦惑乎恐自此但以黃精鉤吻相對待而言不言其相似也陶氏因此遂謂二物相似與神農所說鉤吻不合鉤吻當以蘇恭所說爲是而陶雷所說別一毒物非鉤吻餘條見本草惟陳藏器辨物最精審尤當信

根脩治

敷曰凡采得以溪水洗淨蒸之從巳至子薄切暴乾用頌曰羊公服黃精法二月三

月采根入地八九寸爲上細切一石以水二石五斗煮去苦味瀝出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃止以炒黑黃豆末相和得所捏作餅子如錢大初服一枚日益之亦可焙乾篩末水服說曰餌黃精法取甕子去底釜內安置得所入黃精令滿密蓋蒸至氣溜卽暴之如此九蒸九暴若生則刺人咽喉若服生者初時只可一寸半漸漸增之十日不食服止三尺五寸三百日後盡見鬼神久必昇天根葉花實皆可食之但以相對者是正不對者名偏精也

氣味甘平無毒

權曰寒時珍曰忌梅實花葉子並同

主治補中益氣

除風溼安五臟久服輕身延年不飢別錄補五勞七傷助筋骨耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴

食之駐顏斷穀大補諸虛止寒熱填精髓下三戶

蟲時珍

發明

時珍曰黃精受戊己之漚氣故爲補黃宮之勝品土者萬物之母母得其養則水火旣濟

木金交合而諸邪自去百病不生矣神仙芝草經

云黃精寬中益氣使五臟調良肌肉充盛骨髓堅

強其力增倍多年不老顏色鮮明髮白更黑齒落

更生又能先下三尸蟲上尸名彭質好寶貨百日

下中尸名彭矯好五味六十日下下尸名彭居好

五色三十日下皆爛出也根爲精氣花實爲飛英

皆可服食又按雷氏炮炙論序云駐色延年精煎

神錦註云以黃精自然汁拌研細神錦于柳木甌

中蒸七日以木蜜丸服之木蜜枳椇也神錦不知

是何物或云朱砂也禹錫曰按抱朴子云黃精服

其花勝其實服其實勝其根但花難得得其生花

十斛乾之纔可得五六斗爾非大有力者不能辦

也日服三合服之十年乃得其益其斷穀不及朮
朮餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美
易食凶年可與老少代糧謂之米餌也慎微曰徐
鉉稽神錄云臨川士家一婢逃入深山中久之見
野草枝葉可愛取根食之久久不飢夜息大樹下
聞草中動以爲虎攫上樹避之及曉下地其身歛
然凌空而去若飛鳥焉數歲家人采薪見之捕之
不得臨絕壁下網圍之俄而騰上山頂或云此婢
安有仙骨不過靈藥服食爾遂以酒饌置往來之路
果來食訖遂不能去擒之具述其故指所食之草卽是
黃精也

附方

舊

一服食法

聖惠

方用黃精根莖不限多少

細剉陰乾

搗末每日水調末服

任多少一年內變老爲少久久成地仙臘仙神隱書以黃精細切一石用水二石五斗煮之自旦至夕候冷以手撈碎布袋榨取汁煎之渣焙乾爲末同入釜中煎至可丸丸如雞頭子大每服一丸日三

服絕糧輕身除百病渴則飲水補肝明目

黃精二斤蔓菁子一斤淘同和九蒸九曬爲末空

心每米飲下二錢日二服延年益壽

聖惠方

大風癩瘡

營氣不清久風入脈因而成癩

鼻壞色敗用黃精根去皮潔淨溪水洗二斤暴

納粟米飯中蒸至米熟時時食之

聖濟總錄補

虛精氣

黃精枸杞子等分搗作餅日乾爲末煉蜜丸梧子大每湯下五十丸

奇效良方

萎蕤

音威綾

○

釋名女萎

本經歲蕤

吳

萎蕤

音威

委蕤

爾

萎香

綱

熒

爾雅音行

玉竹

別錄地節

別錄時珍曰

按黃公紹古今韻會云歲蕤草木葉垂之貌此草

根長多鬚如冠纓

下垂之綾而有威儀故以名之

凡羽蓋旌旗之纓綾皆象歲蕤是矣張氏瑞應圖

云王者禮備則歲蕤生于殿前一名萎香則威儀

之義於此可見別錄作萎蕤有文也說文作萎蕤

音相近也爾雅作委菱字相近也其葉光瑩而象竹其根多節故有熒及玉竹地節諸名吳普本草又有烏女蟲蟬之名宋本一
名馬薰卽烏菱之訛者也

正誤

宏景曰本經有女萎無萎蕤別錄無女萎有

萎蕤而功用正同疑女萎卽萎蕤惟名異爾

恭曰女萎功用及苗蔓與萎蕤全別今本經朱書是女萎功效故別錄墨書乃萎蕤功效也藏器曰本草女萎萎蕤同傳陶云是一物蘇云二物不同於中品別出女萎一條然其主霍亂洩痢腸鳴正與上品萎蕤相合則是更非二物矣頌曰觀古方書所用胡洽治時氣洞下有女萎丸治傷寒冷下結腸丸中用女萎治虛勞下痢小黃耆酒中加女萎詳此數方所用乃似中品女萎緣其性溫主霍亂洩痢故也又治賊風手足枯痹四肢拘攣茵蕷酒中用女萎初虞世治身體癰瘍斑駁有女萎膏乃似上品本經朱書女萎緣其主中風不能動搖及去廝好色故也又治傷寒七八日不解續命鼈

甲湯及治腳弱鼈甲湯並用萎蕤及延年方治風熱項急痛四肢骨肉煩熱有萎蕤飲又主虛風熱發卽頭痛有萎蕤乃似上品別錄墨書萎蕤緣其主虛熱溫毒腰痛故也二者旣別則非一物明矣且萎蕤甘平女萎辛溫安得爲一物時珍曰本經女萎乃爾雅委萎二字卽別錄萎蕤也上古鈔寫訛爲女萎爾古方治傷寒風虛用女萎者卽萎蕤也皆承本草之訛而稱之諸家不察因中品有女萎名字相同遂致費辯如此今正其誤只依別錄書萎蕤爲綱以便尋檢其治洩痢女萎乃蔓草也見本條

集解

別錄曰萎蕤生太山山谷及邱陵立春後采

采宏景曰陰乾曹曰葉青黃色相值如薑葉二月七月用之頌曰今滁州舒州及漢中均州皆有之莖幹強直似竹箭幹有節葉狹而長表白裏青亦類黃精而多鬚大如指長一二尺或云可啖三月開青

花結圓實時珍曰處處山中有之其根橫生似黃
精差小黃白色性柔多鬚最難燥其葉如竹兩兩
相值亦可采根種之極易繁也嫩葉及根並可煮淘食茹

根脩治

數曰凡使勿用黃精並鉤吻二物相似萎
蕤節上有鬚毛莖斑葉尖處有小黃點爲
不同采得以竹刀刮去節皮洗淨以蜜水浸一宿蒸了焙乾用

氣味甘平無毒

普曰神農苦桐君雷公扁鵲甘
無毒黃帝辛之才曰畏鹹

主

治女萎主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足

久服去面黑點好顏色潤澤輕身不老

本經萎蕤主

心腹結氣虛熱溼毒腰痛墮中寒及目痛皆爛淚

出錄時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安

本草綱目草部
加而用之良

甄權

補中益氣

蕭炳

除煩悶止消渴潤心

肺補五勞七傷虛損腰腳疼痛天行熱狂服食無

忌

大明

服諸石人不調和者煮汁飲之

宏景

主風溫自

汗灼熱及勞瘧寒熱脾胃虛乏男子小便頻數失

精一切虛損

珍時

發明

果曰

萎蕤能升能降

陽中陰也

其用有四主

生黑

風淫四末兩目

淚爛

男子溼注腰痛

女子面

南陽

活人書

治風溫自汗

重語言難出

用

湯以之爲君藥

子每用治虛勞寒熱痞瘧及一切

不足之證

用代參耆

不寒不燥大有殊功

不止于

去風熱溼毒而已

此昔人所未聞者也

藏器曰陳

魏志樊阿傳

云青黏一名黃芝一名地節此卽

萎蕤極似偏精本功外主聰明調血氣令人強壯
和漆葉爲散服主五臟益精去三蟲輕身不老變
白潤肌膚暖腰腳惟有熱不可服晉嵇紹有胸中
寒疾每酒後苦唾服之得愈草似竹取根花葉陰
乾用昔華陀入山見仙人所服以告樊阿服之壽
百歲也頌曰陳藏器以青黏卽葳蕤世無識者未
敢以爲信然時珍曰蘇頌註黃精疑青黏是黃精
與此說不同今攷黃精萎蕤性味功用大抵相近
而萎蕤之功更勝故青黏一名黃芝與黃精同
名一名地節與萎蕤同名則二物雖通用亦可
附方舊一服食法二月九月采萎蕤根切碎一石
新六服食法以水二石煮之從旦至夕以手
撈爛布囊榨取汁熬稠其渣曬爲末同熬至可丸
丸如雞頭子大每服一丸白湯下日三服導氣脈
強筋骨治中風溼毒去面皺顏
色久服延年臞仙神隱書
歸黃連等分煎湯薰眼見黑花用萎蕤焙四兩每
洗衛生家寶方

赤眼濬痛

芍藥當赤

眼見黑花用萎蕤焙四兩每

甘露湯當

服二錢水一盞入薄荷二葉生薑一片蜜少許同煎七分臥時溫服日一服 聖濟總錄 小便

卒淋萎蕤一兩芭蕉根四兩水二大盞煎一盞發半入滑石二錢分三服 太平聖惠方

熱口乾小便濇用萎蕤五兩煎外臺祕要 乳石發熱萎蕤三兩炙甘 萊菔子

草二兩生犀角一兩水四升

癟後虛腫

產後血氣

煮一升半分三服 聖惠方

瘡後虛腫

主風血去諸

上虛熱在皮膚身面俱腫萎蕤子龍膽茯苓 開寶志曰鹿藥甘溫無毒主風血去諸

前胡等分爲末每服一錢水煎服

瘡後虛腫

主風血去諸

附錄鹿藥開寶志曰鹿藥甘溫無毒主風血去諸

冷益老起陽浸酒服之生姑臧已西苗

瘡後虛腫

主風血去諸

根並似黃精鹿好食其根時珍曰胡洽居士言鹿

瘡後虛腫

主風血去諸

食九種解毒之草此其一也或云卽是萎蕤理亦

近之姑附以俟考

附錄委蛇音威貽別錄曰味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家園中大枝長鬚多

葉而兩兩相值子如芥子時珍曰此亦似是萎蕤併俟考訪

知母

本經中品

釋名

本經音遲

連母

本經提或作蹉

貨

母

本經音遲

地參

本經須水浚

舞

爾雅音覃

蕘藩

兒草

本經又名兒踵草女雷女理鹿列韭逢東

苦心

煩沈

苦心

狀如蟴蟲之狀故謂之蟴母

訛爲知母蟴母也餘多未詳

集解

別錄曰知母生河內川谷二月八月采根暴

乾宏景曰今出彭城形似菖蒲而柔潤葉至

難死掘出隨生須枯燥乃止禹錫曰按范子云蟴

母出三輔黃白者善郭璞釋爾雅云蟴蟴母也生

山上葉如韭頌曰今瀕河懷衛彰德諸郡及解

州滁州亦有之四月開青花如韭花八月結實

根脩治

數曰 凡使先於槐砧上剉細燒乾木臼杵搗勿犯鐵器時珍曰 凡用揀肥潤裏白者

去毛

切引經

上行則

用酒浸

焙乾

下行則

用鹽水潤焙

氣味苦寒無毒

大明曰 苦甘 權曰 平 元素曰 氣寒味大辛 苦氣味俱厚沈而降陰也

又云陰中微陽 腎經本藥入足陽明手太陰經氣分時珍曰 得黃蘖及酒良能伏鹽及蓬砂

主

治消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣

本經

療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈中惡及風汗內

疸多服令人洩

別錄

心煩躁悶骨熱勞往來產後蓐

勞腎氣勞憎寒虛煩

甄權

熱勞傳尸疰痛通小腸消

痰止嗽潤心肺安心止驚悸

大明

涼心去熱治陽明

火熱瀉膀胱腎經火熱厥頭痛下痢腰痛喉中腥

臭

元素

瀉肺火滋腎水治命門相火有餘

好古

安胎止

子煩辟射工溪毒

時珍

發明

權曰知母治諸熱勞患人虛而口乾者加用之景曰知母入足陽明手太陰其用有四瀉

無根之腎火療有汗之骨蒸止虛勞之熱滋化源之陰伸景用此入白虎湯治不得眠者煩躁也煩出於肺躁出於腎君以石膏佐以知母之苦寒以清腎之源緩以甘草粳米使不速下也又凡病小便闊塞而渴者熱在上焦氣分肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源宜用氣薄味薄淡滲之藥以瀉肺火清肺金而滋水之化源若熱在下焦血分而不化法當用黃藥知母大苦寒之藥以補腎與膀胱不渴者乃真水不足膀胱乾涸乃無陰則陽無以使陰氣行而陽自化小便自通方法詳載木部黃

藥下時珍曰腎苦燥宜食辛以潤之肺苦逆宜食苦以瀉之知母之辛苦寒涼下則潤腎燥而滋陰上則清肺金而瀉火乃二經氣分藥也黃藥則是腎經血分藥故二藥必相須而行昔人譬之蝦與水母必相依附補

陰之說詳黃藥條

附方

舊二新五

久近痰嗽

自胸膈下塞停飲至於臟腑用知母貝母各一兩爲末

巴豆三十枚去油研勻每服一字用薑三片二面蘸藥細嚼蘸下便睡次早必瀉一行其嗽宜止壯人乃用之一方不用久嗽氣急知母去毛切五錢隔醫學集成久嗽氣急紙炒杏仁薑水泡去巴豆尖焙五錢以水一鍾半煎一鍾食遠溫服次以蘿蔔子杏仁等分爲末米糊丸服五十丸薑湯下以絕病根鄧峯妊娠子煩因服藥致胎氣不安煩不焙爲末棗肉丸彈子大每服一丸人參湯下醫者識此病作虛煩治反損胎氣產科鄭宗文得此

方於

陳藏器本草拾遺中用之

楊歸厚產乳集驗方

中用之

妊娠腹痛如欲產

月未足

良驗

知母二兩爲末

蜜丸梧子大

溪毒射工中

凡

溪毒知母連根葉搗作散服亦可投水搗絞汁飲

中

每粥飲下二十丸

陳延之小品方

溪毒射工中

一二升夏月出行多取其屑自隨欲入水先取少

許投水上流便無畏

兼辟射工亦

可投水

擦之日三次○

嵌甲腫痛知母燒存性研

衛生易簡方

肘後良方

亦

紫癩風疾知母

醋磨

內蓯蓉

本經上品

釋名

肉松容

吳普黑司命

峻故有從容

此物補而不

緩之貌

集解

別錄曰肉蓯蓉

生河西山谷及代郡鴈門五

月五日采陰乾

普曰生河西山陰地叢生二

岐故有從容之號

和

月至八月采宏景曰代郡鴈門屬并州多馬處便有之言是野馬精落地所生時似肉以作羊肉便糞補虛乏極佳亦可生噉河南間至多今第一出隴西形扁黃柔潤多花而味甘次出北國者形而少花巴東建平閒亦有而不及嘉也恭曰此乃論短出草莧蓉也陶未見肉者今人所用亦草莧蓉刮去花代肉莧蓉功力稍劣保昇曰出肅州福祿縣沙繩穿陰乾八月始好皮有松子鱗甲其草莧蓉月中旬采長五六寸至一尺以來莖圓紫色大月及誤爾又有花莧蓉卽暮春抽苗者力較微爾頌於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人血之類是也震亨曰河西鱗甲者蓋莧混五生厚曰說明後今方識其真形何嘗有所謂鱗甲者今不堪故多三月采之

荅罕得人多以金蓮根用鹽盆制而爲之又以草
蓆蓉充之用者宜審嘉謨曰今人以嫩松梢鹽潤
之僞

脩治

斂曰凡使先須清酒浸一宿至明以櫻刷去
沙土浮甲劈破中心去白膜一重如竹絲草
樣有此能隔人心前氣不散令人上氣也

以甑蒸之從午至酉取出又用酥炙得所

氣味

甘微溫無毒

別錄曰帝鹹雷公酸李當之小溫

酸鹹普曰神農黃

王治

五勞七傷補中除溼中寒熱痛養五臟強陰益精

氣多子婦人癥瘕久服輕身

本經

除膀胱邪氣腰痛

止痢

別錄益髓悅顏色延年大補壯陽日御過倍治

女人血崩

甄權

男子絕陽不興女人絕陰不產潤五

本草綱目草書 卷一百一十一
臟長肌肉暖腰膝男子洩精血遺瀝女子帶下陰

痛 大

發明

好古曰命門相火不足者以此補之乃腎經

峻補精血驟用反動大便滑也

數曰強筋健髓以

從蓉鱗魚二味爲末黃精汁丸服之力可十倍此

說出乾龜記頌曰西人多用作食只刮去鱗甲以

酒浸洗去黑汁薄切合山芋

人勝服補藥宗奭曰洗去黑汁氣味皆盡

矣然嫩者方可作羹味苦入藥少則不效

舊一補益勞傷精敗面黑用蓆蓉四兩水煮

四度下五味以米煮

心食藥性論腎虛白濁肉蓆蓉鹿茸山藥

米糊丸梧子大棗湯每

汗多便悶老人虛人皆可用肉蓆蓉酒浸

下三十丸

聖濟總錄每

焙

二兩研沉香末一兩爲末

麻子仁汁打糊

子大每服七八丸白湯下

濟生方

丸梧子大每鹽酒下二十丸

醫學指南

破傷風

消中

易飢

肉蓯蓉

山茱萸五味子爲末蜜丸梧

子大每鹽酒下二十丸

醫學指南

破傷風

濟生方

丸梧子大每鹽酒下二十丸

醫學指南

列當

宋開寶

釋名

栗當

開寶

草蓯蓉

開寶

花蓯蓉

華日

集解

志曰列當生山南巖石上如藕根初生掘取

陰乾用保昇曰原州秦州渭州靈州皆有之

抽苗四月中旬采取長五六寸至一尺以來

暮春圓白色采取壓扁曰乾頌曰草蓯蓉根與肉蓯

蓉極相類刮去花壓扁以代

肉者功力殊劣卽列當也

根氣味

甘溫無毒主治

男子五勞七傷補腰腎令

根氣味甘溫無毒主治男子五勞七傷補腰腎令

人有子去風血煮酒浸酒服之

開寶

附方 舊 **陽事不興**

栗當好者二斤卽以好酒一斗浸之經宿取起隨

性日飲之皆

殷食醫心鏡

鎖陽

遺補

集解

時珍曰鎖陽出肅州按陶九成輟耕錄云鎖

陽生韃靼田地野馬或與蛟龍遺精入地久

之發起如第上豐下儉鱗甲櫛比筋脈連絡絕

男陽卽肉蓯蓉之類或謂里之淫婦就而合之

一得陰氣勃然怒長土人掘取洗滌去皮薄切曬乾

以充藥貨功力百倍於蓯蓉也時珍疑此自有種

類如肉蓯蓉列當亦未必盡是遺精所生也

氣味

甘溫無毒

主治大補陰氣益精血利大便虛

人大便燥結者啖之可代
蕘蓉羹粥彌佳不燥結
者勿用

震亨

潤燥養筋治痿弱珍時

本草綱目第十二卷上終