

山居本草

六

山居本草卷五上目錄

竹木花卉部 上

竹

箠竹葉

淡竹葉

苦竹葉

箠竹根

苦竹根

淡竹茹

苦竹茹

竹實

慈竹籜

松

松香

松節

松節

松瀝

松花子

見果部

松蕈

見菜部

柏

柏子仁

柏葉

藥木

即黃柏

梓

葉

楸

木白皮

漆

葉花

木犀

花皮

木蘭

皮花

木筆

苞

樟

瘦節

烏藥

目錄

楓木皮 根葉

桐木皮 花

油桐

楝即苦楝 根皮

柳葉枝 柳膠

柳耳見菜部

檉柳 檉乳

檉柳 葉

水楊 木白皮及根

白楊 枝 葉

移楊

松楊 木皮

禪木

烏白木 根白皮 葉 油

柘木 柘黃

奴柘

枳實 根皮 枳殼 嫩葉 枳茹

枸橘 刺 樹皮

梔子 花

女貞 子 葉

冬青 子木皮

枸骨 即猫兒刺 枝葉

七里香 葉

石南 子

黃荊 葉 荊瀝 根 荊莖

蔓荊 子

石荊

紫荊 木并皮

扶桑 葉 花

木芙蓉 葉 花

山茶 花 子

蠟梅 花

隔虎刺花 根葉皮

密蒙花

木綿 白綿及布 子油

鑿子木 木皮 葉

黃楊木 葉

不凋木

木天蓼 枝 葉

小天蓼 子 根

放杖木

接骨木

靈壽木

根皮

椴木

白皮

木麻

長松

赤箭天麻

還筒子

朮

蒼朮 白朮

白頭翁

花

柴胡

苗

前胡

山慈姑

根 葉

石蒜

根

水仙花

根

白茅

茅針 花
屋上 敗茅

芒

莖 敗芒 箔

當歸

花 根

山居本草卷五

新安程履新德基甫述

孫

存禮季和甫

存信季成甫



竹樹花卉部

桃李梅杏之類。已見果部。山丹葵蓼之類。已見菜部。由此類推。可互參考。

蘇文忠公曰。寧可食無肉。不可居無竹。無肉令人瘦。無

竹令人俗。人瘦尚可肥。士俗不可醫。若對此君還大嚼。

世間那得揚州鶴。予常入幽人之居。見茅簷三間。既已

清淨無塵。而修竹數竿。益復饒有韻致。洵足樂也。居不

可無竹。尚矣。至於松柏菊艾之類。處處皆生。家家可種。

不以華堂而爭茂盛。不以茅居而自萎枯。有勢利之人

情無勢利之竹樹。如江上之清風。山間之明月。取之無
禁。用之不竭。則梅妻較勝霍大將軍之妻。鶴子何如蔡
老平章之子哉。予猥以懸壺末技。浪跡四方。五十餘年。
每經滄桑之感。輒興蓴蕨之懷。堅辭親藩。得遂初志。
歸來三徑雖荒。松菊猶存。擴充半畝。聊作藥欄。滿園有
不謝之花。應病多不買之藥。菊花艾葉。曾起百千萬種。
疾病枸杞黃精。得延八九十歲老人。措大不會偷閒撒
懶。偶得少暇。漫將竹樹花卉。聊集成卷。只取眼前易得
之物。不敢索隱探奇。博雅君子。得無哂其拙陋云。

竹處處有之。其類甚多。皆土中苞筍。各以時出。旬日落籜。籜而成竹。莖有節。節有枝。枝有小節。節有葉。葉必三三之。枝

必兩之。根下之枝。一爲雄。二爲雌。雌者生筭。其根鞭喜行東南。而宜死。猫畏皂刺油麻。以五月十三日爲醉日。六十年一花。花結實。其竹卽枯。竹枯曰筭。竹實曰筭。小曰篠。大曰蕩。其中皆虛。而有實心竹。出滇。實其外皆圓。而有方竹。出川蜀。其節或暴。或無。或促。或疎。暴節竹出蜀中。高節磔。卽節竹也。無節竹出秦州。空心直上。卽通竹也。簾竹一尺數節。出荆南。笛竹一節尺餘。出吳楚。簾竹一節近丈。出南廣。其幹或長。或短。或巨。或細。交廣由吾竹。長三四丈。其肉薄。可作屋柱。簾竹大至數圍。其肉厚。可爲梁棟。永昌漢竹。可爲桶斛。箐竹可爲舟船。嚴州越王竹。高止尺餘。辰州龍絲竹。細僅如針。高不盈尺。其葉或細。或大。鳳尾竹。葉細三分。龍公竹。葉若芭蕉。百葉竹。一枝百葉。其性或柔。或勁。或滑。或濇。濇者可以錯甲。謂之篋。篋滑者可以爲席。謂之桃枝。勁者可以爲戈。刀。箭矢。謂之矛。竹。箭竹。筋竹。石麻。柔者可爲繩索。謂之蔓竹。弓竹。苦竹。把髮。其色有青。有黃。有白。有赤。有烏。有紫。有斑斑者。駁文。點染。紫者黝。色黝然。烏者黑。而害母。赤者厚。而直。白者薄。而曲。黃者如金。青者如玉。有湘妃竹。多斑文。其別種有棘竹。一名笏竹。芒棘森然。大者圍二尺。可禦盜賊。棕竹。一名實竹。其葉似櫻。可爲柱杖。

慈竹一名義竹。叢生不散。人栽爲玩。廣人以筋竹絲爲竹布甚脆。入藥之竹列後。餘載竹譜。

箠竹葉性平。味苦。主治欬逆。上氣溢。筋急。惡瘍。殺小蟲。除煩熱。風瘧。喉痺。嘔吐。煎湯熨霍亂轉筋。

淡竹葉性寒。味甘辛。主治胸中痰熱。欬逆。上氣。吐血。熱毒。止消渴。涼心經。益元氣。治熱狂。煩悶。中風失音。不語。壯熱頭疼。頭風。止驚悸。瘟疫迷悶。喉痺。鬼疰。殺小蟲。壓丹石。妊婦頭旋倒地。小兒驚癇。天吊。煎濃汁漱齒中出血。洗脫肛不收。

苦竹葉性冷。味苦。主治明目。利九竅。口瘡。眼疼。不睡。止消渴。解酒毒。除煩熱。發汗。療中風瘖瘖。殺蟲。燒末和猪

膽塗小兒頭瘡耳瘡疥癬和鷄子白塗一切惡瘡頻用取効。

〔附方〕上氣發熱

因奔越走馬後飲冷水所致者竹葉三觔橘皮三兩水一斗煎五升細服三日

劑時行發黃

竹葉五升切小麥七升石膏三兩水一斗半煮取七升細服盡劑愈

〔附方〕作湯益氣止渴補虛下氣消毒

〔附方〕淡竹根煮汁服除煩熱解丹石發熱渴消化痰去風熱驚悸迷悶小兒驚癇同葉煎湯洗婦人子宮下脫

〔附方〕苦竹根剉一觔水五升煮汁一升分三服下心肺五臟熱毒

〔附方〕產後煩熱

逆氣用甘竹根切一斗五升煮取七升去滓入小麥二升大棗二十枚煮三四

沸入甘草一兩。麥門冬一升。再煎至二升。每服五合。

淡竹茹。王治嘔吐。溫氣寒熱。吐血崩中。止肺痿。唾血鼻

衄。治五痔。噎膈。傷寒勞復。小兒熱癩。婦人胎動。

苦竹茹。王治下熱。壅水煎服。止尿血。

箠竹茹。治勞熱。

附方。傷寒勞復。

傷寒後交接勞復。卵腫股痛。竹皮一升。水三升。煮五沸。服汁。婦人傷

復。病初愈。有所勞動。致熱氣衝胸。手足搖蕩。拘急如中風狀。淡竹青茹半觔。栝樓二兩。水二升。煎一升。分二

服。產後煩熱。內虛短氣。甘竹茹湯。用甘竹茹一升。人參茯苓甘草各一兩。黃芩二兩。水六升。煎二

升。分服。婦人損胎。孕八九月。或墜傷牛馬驚傷。心痛。用日三服。青竹茹五兩。酒一升。煎五合。服之。

月水不斷。

青竹茹微炙為末。每服三錢。水一盞煎服。小兒熱痛。口噤體熱。竹青茹三兩。醋

三升煎一合。齒血不止。生竹皮醋浸。令人含之。其背上三過。以茗汁漱之。牙齒宣

露。黃竹葉。當歸尾。研末。煎湯。入鹽。含漱。飲酒頭痛。竹茹二兩。水五升。煮三升。納鷄子三枚。煮三沸。

食傷損內痛。兵杖所加。木石所迫。血在胸背。脅下刺痛。用青竹茹。亂髮。各一團。炭火炙。煎為末。酒

一升。煮三沸。服之。三服愈。

淡竹瀝。凡取瀝。將竹截作二尺長。劈開。以磚兩片對立。架竹于上。以火炙。出其瀝。以盤承取。一法以竹

截五六寸。用瓶盛。倒懸下。以器盛之。性涼味甘淡。假火周圍炭火燒逼。其瀝下于器中。收取。

而成。謂之火泉。體滑滑。以利竅。滲灌經絡中。為搜解熱

痰聖藥。令胸中膈上。四肢百脉。皮裏膜外。靡不週到。主

治中風癱瘓。語言蹇澁。手足麻木。及顛癇驚狂。經年痰

火。非此不能成功。必藉辛以佐之。須加薑汁為功。其力

更勝。又因其性涼。長於清火。極能補陰。用療血虛自汗。消渴尿多。及金瘡口噤。胎前產後。凡陰虛之病。繇於火燥。以此滋之潤之。則血得其養矣。

〔箢竹瀝〕治風痊。

〔苦竹瀝〕明目。利九竅。治口瘡目疼。牙痛。功同淡竹。

〔慈竹瀝〕和粥飲。療熱風。

〔附方〕中風口噤。竹瀝薑汁等分。日日飲之。小兒口噤。體熱。用竹瀝二合。煖飲。分三四

服。產後中風。口噤身直。面青手足反。破傷中風。凡閃脫

瘡。慎不可當風用扇。中風則發痊。口噤項急。殺人。急飲

竹瀝二三升。忌冷飲食及酒。竹瀝卒難得。可合十許束

併燒取之。金瘡中風。口噤欲死。竹瀝大人喉風。筍竹油小兒

半升。微微煖服。

重口

竹瀝漬黃葉時時點之。

小兒傷寒

淡竹瀝葛根汁各六合細細與服。

小兒狂

語

夜後便發竹瀝夜服二合。

婦人胎動

以竹瀝飲一升立愈。妊娠因夫所動困絕。

孕婦子

煩

竹瀝頻頻飲之。

梅師方茯苓二兩竹瀝一升立愈。

時氣煩燥

五六日不解青竹瀝半盞煎熱數數飲之厚覆取汗。

消渴尿多

竹瀝恣飲數日愈。

欬嗽肺

痿

大人小兒欬逆短氣胸中汲汲欬出涕吐嗽出臭膿用淡竹瀝一合服之日三五次以愈為度。

產後

虛汗

淡竹瀝三合煖服須臾再服。

小兒吻瘡

竹瀝和黃連黃蘗黃丹傳之。

小兒赤

目

淡竹瀝點之或入人乳。

赤目皆痛

不得開者肝經實熱所致或生障翳用苦竹瀝五合黃連

二分綿裹浸一宿。

卒牙齒痛

苦竹燒一頭其一頭汁出熱指之。

丹石毒

發

頭眩耳鳴恐懼不安淡竹瀝頻服二三升。

竹筍

見菜部

慈竹籜主治小兒頭身惡瘡燒散和油塗之或入輕粉

少許。

竹實

如鷄子大甘如蜜。

鳳凰所食食之通神明輕身益氣。

山白竹

即山間小白竹也。

燒灰入腐爛瘡疽藥。

松

樹礫柯修聳多節皮粗厚有鱗形二三月抽莖生花長四五寸采其花蕊為松黃結實狀如猪心疊成鱗砌老則子長鱗裂然葉有二針三針五針之別三針者為栝子松五針者為松于松其子大如栢子惟遼東及雲南者子大如巴豆可食已見果部

松香

綱目作松脂又有松膏松枋松膠瀝青諸名采煉法並在服食方中以桑灰汁或酒煮軟接納寒水

中數十遍白滑則可用。

性溫味苦甘主治安五臟潤心肺除邪下

氣去胃中伏熱咽乾消渴強筋骨利耳目風痺死肌癩

風

上黨趙瞿病癩。歷年垂死。其家棄之。送置山穴中。瞿

日。其瘡都愈。顏色潤澤。仙人再過之。瞿謝活命之恩。乞

求其方。仙曰。此是松脂。山中便多。你煉服之。可以長生。

瞿乃歸家。長服。身輕力倍。年百餘歲。齒堅髮黑。夜臥忽

見屋間有光大如鏡。久而一室盡明。後入抱犢山成地。

仙人聞皆競服之。不過一月。未見大益。一切惡瘡。治崩

輒爾中止。志之不堅如此。安能有成。

帶煎膏生肌止痛排膿抽風貼諸瘡膿血瘦爛塞牙孔

殺蟲久服辟穀輕身延年

附方服食辟穀 千金方用松脂十觔以桑薪灰汁一石

遍乃白細研為散每服一二錢粥飲調下日三服服至

十兩以上不饑饑再服之一年以後夜視日明久服延

年益壽又法百鍊松脂治下篩蜜和納角中勿見風

日每服一團一日二服服至百日耐寒暑二百日五藏

補益五年即見西王母伏虎禪師服法用松脂十觔

鍊之五度令苦味盡每一觔入茯苓四兩每旦水服一

六

刀圭能令不食而復延齡身輕清爽**強筋補益**四聖不老丹用明松脂一

火煮數沸竹枝攪稠乃住火傾入水內結塊復以酒煮九遍其脂如玉不苦不澁乃止為細末用十二兩入白

茯苓末半觔黃菊花末半觔栝子仁去油取霜半觔鍊蜜丸如梧子大每空心好酒送下七十二丸須擇吉日

修合勿令婦人鷄犬見之松梅丸用松脂以長流水桑柴煮拔三次再以桑灰滴汁煮七次扯拔更以好酒

煮二次仍以長流水煮二次色白不苦為度每一觔入九蒸地黃末十兩烏梅末六兩鍊蜜丸梧子大每服七

十丸空心鹽米湯下健陽**揩齒固牙**松脂出真定者佳補中強筋潤肌大能益人稀布盛入沸湯煮

取浮水面者投冷水中不出者不用研末入白茯苓末和勻日用指齒漱口亦可燕之固牙駐顏**歷節**

諸風百節酸痛不可忍松脂三十觔鍊五十遍以鍊酥三升和脂三升攪令極稠每旦空心酒服方寸七

日三服數食麩粥為佳慎血**肝虛目淚**鍊成松脂一觔腥生冷酢物果子一百日瘥釀米二斗造酒

之頻飲**婦人白帶**松香五兩酒二升煮乾木白杵細酒小糊丸如梧子大每服百丸溫酒下

兒禿瘡

簡便方。用松香五錢。猪油一兩。熬搽。一日數次。數日即愈。衛生寶鑑用瀝青二兩。黃蠟一兩。

半。銅綠一錢半。麻油一兩半。文武熬收。每難貼之神效。

小兒緊唇

松脂炙化貼之。風蟲牙

痛

刮松上脂。滾水泡化。一漱即止。已試驗。

齲齒有孔

松脂雜塞。須臾。久龔。蟲從脂出也。

不聽

鍊松脂三兩。巴豆一兩。和搗成丸。薄綿裹塞。一日二度。

一切瘦瘡

鍊成松脂末。填令滿。

日三一切腫毒

松香八兩。銅青二錢。蓖麻仁五錢。同搗作膏。攤貼妙。軟節頻發。

膏用通明瀝青八兩。銅絲二兩。麻油三錢。雄猪膽汁三箇。先溶瀝青。乃下油膽。傾入水中。扯拔。器盛。每月緋帛

攤貼。不須再換。小金絲膏

治一切瘡癰腫毒。瀝青白膠香各二兩。乳香二錢。沒藥一兩。黃蠟三錢。又

以香油三錢。同熬至滴下不散。傾入水中。扯千遍。收貯。每捻作餅貼之。

疥癬濕瘡

松膠香研細。少

入輕粉。先以油塗瘡。糝末在。上。一日便乾。頑者三二度愈。

陰囊濕痒

欲潰者。用板兒。松香為末。紙捲

取出。每根入花椒三粒。浸燈盞內三宿。取出。點燒。淋下油。搽之。先以米泔洗過。

金瘡出血

瀝青末。少

加生銅屑末。猪鬣成瘡。松脂鍊作餅貼之。刺入肉中。百理不瘡。松脂流出。

如乳頭香者。傅上。以帛裹之。三五日。當有根出。不痛不痒。不覺自安。

松節 主治百節久風。風虛脚痺疼痛。釀酒主脚弱骨節

風。炒焦治筋骨間病。能燧血中之濕。煎水含漱。治風虻

牙痛。燒灰日指亦可。

附方 歷節風痛。四肢如解脫。松節酒。用二十觔酒。五轉。

筋攣急。松節一兩。剉如米大。乳香一錢。銀石器慢火炒。焦。存一二分性。出火毒。研末。每服一二錢。熱木

瓜酒調下。一應筋病皆治之。**風熱牙病**。聖惠方。用油松節如棗大一塊。碎切。胡椒七顆。入燒酒。須

二三盞。乘熱入飛過白礬少許。噙嗽三五口。立瘥。又用松節二兩。槐白皮。地骨皮。各一兩。漿水煎湯。熱漱冷

吐。瘥乃止。**反胃吐食**。松節煎酒。細飲之。**陰毒腹痛**。油松木七塊。炒焦。沖酒二鍾。熱服。

顛撲傷損松節煎酒服

松澣音詣。火燒松枝取液也。主治瘡疥及馬牛瘡。

松葉又名松毛主治風濕瘡生毛髮安五臟守中不饑延年。

細切以水及麵飲服之。或擣屑丸服。可斷穀及治惡疾。

去風痛脚痺。殺米蟲。炙晉凍瘡風瘡。焚可辟蚤。

附方服食松葉松葉細切更研。每日食前。以酒調下。二錢亦可。煮汁作粥食。初服稍難。久則白

便矣。令人不老。身生綠毛。輕身益氣。久服不已。絕穀不饑。不渴。天行瘟疫松葉細切。酒

三服。能辟中風口喎青松葉一觔。搗汁。清酒一升。浸二

五年瘧。頭面汗。三年中風松葉一觔。細切。以酒一斗。歷節風痛

出即止。松葉搗汁一升。以酒三升。脚氣風痺松葉酒。治十二風

浸七日。服一合。日三服。

散四劑。及眾療不得力。服此一劑。便能行遠。不過兩劑。松葉六十筋。細剉。以木四石。煮取四斗九升。以米五斗。釀如常法。別煮松葉汁。以漬米。并饋飯。泥釀封頭。七日發酒。飲之。取醉。得此酒力者。甚眾。風牙腫痛。松葉一握。鹽一合。酒二升。煎。大風惡瘡。指肉松葉二筋。麻黃去節。五合。酒二升。煎。浸之。春夏五日。秋冬七日。每溫服一小盞。常令醺醺。以效為度。陰囊濕痒。松毛煎。湯頻洗。

根白皮補五勞益中氣辟穀不饑

木皮

又名赤龍皮

主治生肌止血癰疽瘡口不合白禿杖瘡

湯火瘡。

附方腸風下血

松木皮去粗皮取裏白者切晒焙研為末每服一錢臘茶湯下

三十年

痢

去松上蒼皮一斗為末麩粥和服一升日三服不過一斗救人

金瘡杖瘡

赤龍鱗即古松皮

存性研末搽之。最止痛。

小兒頭瘡

浸濕名胎風瘡古松上自有老枯皮人豆豉少許瓦上炒存性

研末入輕粉香油調塗之

松子 松花 俱見果部

松蕈 見菜部

栢

一名栢音菊。又有側栢之分。史記言松栢為百木之長。樹聳直皮薄肌膩花細瑣其貫成球狀如小鈴霜後四裂。中有數子大如麥粒芬香可愛。栢葉松身者檜也。其葉尖硬亦謂之栢。今人名圓栢以別側栢。松葉栢身者縱也。松檜相半者檜栢也。峩嶺山中一種竹葉栢身者謂之竹栢。

栢子仁

凡使先以酒浸一宿至明漉出晒乾用黃精白然汁二兩好酒二兩浸緩火煮成膏為度如尋常用只蒸熟晒裂春簸取仁炒研用。一法揀去殼用。性入丸以溫火隔紙微炒碾去油為末。若油黑者勿用。性

平。味微甘。栢為百木之長得陰氣最厚。其子生于樹抄

含蓄精粹。取香氣透心體潤滋血同茯神棗仁生地麥

冬為濁中清品。主治心神虛怯。驚悸怔忡。顏色憔悴。肌膚燥痒。皆養心血之功也。又取氣味俱濃。濁中歸腎。同熟地龜板。枸杞牛膝。為封填骨髓。主治腎陰虧損。腰背重痛。足膝軟弱。陰虛盜汗。皆滋腎燥之力也。味甘亦能緩肝補肝。膽之不足。極其穩當。但性平力緩。宜多用之。為妙。

附方服栢實法

入月連房取實。暴收去殼研末。每服二錢。溫酒下。一日三服。渴即飲水。令人悅

澤。一方加松子仁等分。以松脂和丸。一方加菊花等分。蜜丸服。奇效。方用栢子仁二觔為末。酒浸為膏。棗肉三觔。白蜜白朮末。地黃末。各一觔。搗勻。丸彈子大。每嚼一丸。一日三服。百日百病愈。久服延年壯神。老人虛秘。栢子仁。松子仁。大麻仁等分同研。溶蜜蠟丸。梧腸子大。以少黃丹湯食前調服。二三十丸。日二服。腸

風下血

栢子十四箇。搥碎。囊貯。浸好酒三盞。煎八分服。立瘥。

小兒軀啼

驚癇。腹滿。大便青白。

色用栢子仁末。

黃水濕瘡

真栢油二兩。香油二兩。熬稠。搽之。如神。

葉

栢有數種。取側葉者佳。故名側栢葉。作丸散。陰乾炒。燦為末。每服二錢。湯調下。治痔瘡最妙。

性涼

味苦澁。味苦滋陰。帶澁。歛血。專清上部逆血。凡吐血。衄

血。咳血。唾血。諸症。功高犀角。取其色青。凌冬不凋。長生

之物。主養肝。膽。膽氣清。則能上升。餘臟從之。宣化其氣

清香味澁。大能歛心。心寧則神安。而生血。其體潤。性涼

亦能滋肺。肺清則臟和。而生氣。又得陰氣最厚。如遺精

白濁。尿管澁痛。屬陰脫者。同牛膝治之。甚效。炙晉凍瘡

燒取汁。塗頭黑髮。傳湯火傷。止痛滅癩。點湯代茶。常服

輕身益氣令人耐寒暑去濕痺生肌殺五臟蟲益人元

旦浸酒飲辟邪

附方服松栢法

孫真人枕中記云嘗以三月四月採新
生松葉長三四寸許并花蓋陰乾又於

深山巖谷中採當年新生栢葉長二三寸者陰乾為末

白蜜丸如小豆大常以日未出時燒香東向手持八十

一九以酒下服一年延十年命服二年延二十年命欲

得長肌肉加大麻巨勝欲心力壯健者加茯苓人參此

藥除百病益元氣滋五臟六腑清明耳目強壯不衰老

延年益壽神驗用七月七日露水丸之更佳服時仍祝

曰神仙真藥體合自然服藥入腹天
地同年祝畢服藥忌諸雜肉五辛
神仙服餌五月五

方側栢葉三觔遠志去心二觔白茯苓去皮一觔為末

煉蜜和丸梧子大每以仙靈脾酒下三十丸日再服並

無所忌勿
示非人
中風不省
病之日便進此藥可使風退氣和

不成癢人栢葉一握去枝葱白一握連根研如泥無灰

酒一升煎一二十沸溫服如不飲酒分作四五服方進

他藥時氣瘴疫社中西南栢樹東南枝取暴乾研末每服一錢新水調下日三四服霍亂轉

筋栢葉搗爛裹脚上及煎汁淋之吐血不止張仲景栢葉湯用青栢葉一把乾薑二片阿膠一挺

灸三味以水二升煮一升去滓別絞馬通汁一升合煎取一升綿裹一服盡之聖惠方用栢葉米飲服二錢

或蜜丸或水煎服並良憂恚嘔血為散米飲調服二方寸七衄血

不止栢葉榴花研末吹之小便尿血栢葉黃連焙研酒服三錢大腸下血隨時方

向采側栢葉燒研每米飲服二錢王洙酒毒下血或下

之舒州病比陳宜父大夫傳方二服愈栢葉九蒸九晒二兩陳槐花炒焦一兩為末蜜丸梧子大每空心溫酒下四十九子

婦人小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如淀小兒洞痢

色栢葉焙乾為末與黃連同煎為汁服之栢葉煮汁月水不斷側栢葉灸芍藥等分每用三錢水

代茶飲之賊炒微焦等分為末湯火燒灼栢葉生搗塗之繫定鼠

瘦核痛

未成膿。以柏葉搗塗。熬鹽熨之。氣下即消。

大風癘疾

首髮不生。側柏葉九蒸九晒為

末。煉蜜丸。梧子大。每服五丸。至十九日。三夜一服。百日良。

頭髮不生

側柏葉陰乾作末。和麻油塗之。

頭髮黃赤

生柏葉末一升。猪膏一觔。和丸。彈子大。每以布裹一九。納泔汁中化開。沐之。一月色黑而

潤矣。

枝節煮汁釀酒。去風痺。歷節風。燒取瀝油。療癩疥。及蟲

癩。

附方 霍亂轉筋

以煖物裹脚。後以柏木片煮湯淋之。

齒齲腫痛

柏枝燒熟。柱孔中。須

臾蟲絲。枝出。

惡瘡有蟲

久不愈者。以柏枝節燒。瀝取油。傅之。三五次。無不愈。亦治牛馬疥。

脂主治身面疣目。同松脂研勻塗之。自去。

根白皮治火灼爛瘡。長毛髮。

附方 熱油灼傷

柏白皮以臘猪脂煎油塗瘡上。

藥木

一名黃藥。俗作黃柏。樹高數丈。葉似吳茱萸。經冬不凋。皮外白裡深黃色。其根結塊如茯苓狀。名檀桓。道家名木。芝服可延年。處處有之。以川中出者肉厚色深為佳。

性寒。味苦。樹高數丈。其

皮從上直下。味苦入腎。是以降火。能自頂至踵滲膚徹

髓。無不週到。專瀉腎與膀胱之火。蓋腎屬寒水。水少則

漸消涸。竭則變熱。若氣從臍下起者。陰火也。內經曰。腎

欲堅。以苦堅之。堅則為補。丹溪以此一味。名大補丸。用

鹽水製。使鹽以入腎。以救腎水。用蜜湯拌炒。取其戀膈

而不驟下。治五心煩熱。目痛。口瘡。諸症。單炒褐色。治腸

紅痔漏。遺精白濁。濕熱黃疸。及膀胱熱。臍腹內痛。凡屬

相火用此抑之。腎白堅固而無狂蕩之患。因味苦能走骨。能沉下。用酒拌炒。四物湯調服。領入血分。治四肢骨節走痛。足膝酸痛無力。遍身惡瘡。及脚氣攻冲。嘔逆惡心。陰虛血熱。火起于足者。蓋此一味。名潛行散。能瀉陰中之火。亦能安蛔蟲。以苦降之之義也。得知母滋陰降火。得蒼朮除濕清熱。為治痿要藥。得細辛瀉膀胱火。治口舌生瘡。生末傅小兒頭瘡。

附方陰火為病

大補丸。用黃蘗去皮。鹽酒炒。褐色為末。水丸。梧子大。血虛四物湯下。氣虛四君

子湯

男女諸虛

孫氏集效方。坎離丸。治男子婦人諸虛百損。小便淋瀝遺精白濁等證。黃蘗去

皮切二觔。熟糯米一升。童子小便浸之。九浸。九晒。蒸過晒研為末。酒煮麩糊丸。梧子大。每服一百丸。溫酒送下。

上盛下虛

水。火偏盛。消中等證。黃蘗一觔。分作四分。用醇酒。蜜湯。鹽水。童尿。浸洗。晒炒。為末。以知母

一觔。去毛。切搗。熬膏。和丸。梧。臟毒痔漏。下血不止。孫探

子大。每服七十丸。白湯下。玄集效方。藥皮丸。用川黃蘗皮。刮淨。一觔。分作四分。三分用酒。醋。童尿

各浸七日。洗晒。焙。一分生炒。黑色為末。煉蜜丸。梧子大。每空

心溫酒下。五十九丸。久服除根。楊誠經驗方。百補丸。專治諸虛赤白濁。用川藥皮。刮淨。一觔。分作四分。用

酒。蜜。人乳。糯米。泔。各浸透。炙乾。切研。廩米飯丸。如上法服。又陸一峯藥皮丸。黃蘗一觔。分作四分。三分用醇

酒。鹽湯。童尿。各浸二日。焙研。一分用酥炙研末。以猪臟一條。去膜。入藥在內。紫煑熟。搗丸。如上法服之。下

血數升。黃蘗一兩。去皮。鷄子白。塗炙。為末。水丸。小兒下血。或血痢。黃蘗半兩。赤芍藥四錢。為末。飯。妊娠下痢。白

晝夜三五十行。根黃厚者。蜜炒。令焦。為末。大蒜煨熟。去皮。搗爛。和丸。梧子大。每空心米飲下。三五十九丸。日三服

神妙。不。小兒熱瀉。黃蘗削皮。焙為末。用米湯和丸。赤白可述。粟米大。每服一二十丸。米湯下。

濁淫 及夢洩精滑真珠粉丸黃蘗炒真蛤粉各一觔為末每服一百丸空心溫酒下黃蘗苦而降火蛤粉

鹹而補腎也又方加知母炒牡蠣粉煨山藥炒積熱夢等分為末糊丸梧子大每服八十丸鹽湯下

遺心 松恍惚膈中有熱宜清心丸主之黃蘗末一兩片腦一錢煉蜜丸梧子大每服十五丸麥門冬湯下此

大智禪師方也消渴尿多 能食黃蘗一觔水一升煮三五師方也消渴尿多能食黃蘗一觔水一升煮三五

熱極 黃蘗蜜塗炙乾為末麥時行赤目黃蘗去粗皮為門冬湯調服二錢立瘥

泥固煨乾每用一彈子大紗帕包之浸水一盞飯上蒸熟乘熱熏洗極效此方有金木水火土故名五行湯一

丸可用**嬰兒赤目** 在蓐內者人乳眼目昏暗每旦含黃三二次黃蘗汁點之

津洗之終身行**卒喉痺痛** 黃蘗片含之又以一升酒之永無日疾

喉卒腫 食飲不通苦酒和黃小兒重舌黃蘗浸苦藥末傳之冷即易

生瘡 外臺用黃蘗含之良深師用蜜漬取汁含之吐冠氏衍義治心脾有熱舌頰生瘡蜜炙黃蘗

青黛各一分為末。入生龍腦一字。搽之吐涎。赴筵散。用黃蘗細辛等分為末。搽。或用黃蘗乾薑等分亦良。

口疳臭爛 綠雲散。用黃蘗五錢。銅鼻疳有蟲。黃蘗二兩。綠二錢。搽之。漱去涎。

宿絞汁。鼻中生瘡。黃蘗檳榔末。唇瘡痛痒。黃蘗末。以薔溫服。微根汁調塗。

效。立。髮毛毒瘡。生頭中。初生如蒲桃痛甚。黃蘗一兩。乳香二錢。半為末。槐花煎水調作餅。貼于瘡口。

小兒顛腫 生。下。即腫者。用黃傷寒遺毒。手足腫痛欲斷。藥末。水調貼足心。黃蘗五觔。水三

升。煮。癰疽乳發。初起者。黃蘗末。和雞潰之。子白塗之。乾即易。癰疽腫毒。黃蘗皮

頭炮等分。為末。唾調塗之。小兒臍瘡。不合者。黃藥末。塗之。小兒膿留頭頰。以米泔水潤濕。

瘡 遍身不乾。用黃蘗末。入枯礬少許。搽之。即愈。男子陰瘡。有二種。一者陰蝕。生熱瘡。用黃蘗黃芩等分。煎湯洗之。仍以黃蘗黃

連作末。傳之。又法。黃蘗煎湯洗之。塗以白蜜。小兒膿熱瘡。黃蘗末。一兩。輕粉三錢。猪膽汁。火毒生瘡。凡人冬

熱瘡。調搽之。或只用蜜炙黃蘗一味。凡火毒生瘡。月向火

火氣入內兩股生瘡其汁淋漓用黃蘗末搽之立愈一婦病此人無識者有用此而愈
自死肉毒
藥末水服方寸七
黃蘗末麩
凍瘡裂痛汁
調黃蘗末塗之

梓

一名木王木似桐而葉小花紫處處有之有三種木理白者為梓赤者為楸梓之美文者為椅楸之小者為椶

性寒味苦主治熱毒去三蟲療目疾主吐逆反胃溫病復感寒邪變為胃皖煮汁飲之煎湯洗小兒壯熱一切

瘡疥皮膚瘙癢

附方時氣溫病

頭痛壯熱初得一日用生梓木削去黑皮取裏白者切一升水二升五合煎汁

每服八合取瘡

葉療手脚火爛瘡搗傅諸瘡飼猪肥大三倍

附方風癬疔瘡

梓葉木綿子羯羊屎鼠屎等分入瓶中合定燒取其汁塗之。

楸

葉大而早晚故謂之楸有二種一種刺楸樹高大皮色蒼白上有黃白斑點枝梗間多刺葉嫩時燉熟水淘過拌食其木濕脆燥堅即梓之赤者也。

禾白皮性涼味苦主治消食澁腸下氣上氣欬嗽吐逆

殺三蟲及皮膚蟲亦入面藥煎膏傅惡瘡疽癭癧腫疔

痔除腫血生肌膚長筋骨口吻生瘡貼之頻易取效。

附方癭瘡

楸枝作煎頻洗取效。

白癩風瘡

楸白皮五觔水五斗煎五升去滓煎如稠膏日

三摩之。

葉擣傅瘡腫煮湯洗膿血冬取乾葉用之諸癭腫潰及

內有刺不出者取葉十重貼之。

附方上氣欬嗽

腹滿羸瘦者。楸葉三斗。水三斗。煮三十沸。去滓。煎至可丸。如棗大。以筒納入。下

部中一切毒腫

不問硬軟。取楸葉十重。傅瘡上。舊帛裹之。日三易之。當重重有毒氣為水。流在

葉上。冬月取乾葉。鹽水浸軟。或取根皮搗爛。傅之皆效。止痛消腫。食膿血。勝于眾藥。療癰瘰瘡。煎

神方。秋分前後早晚。令人持袋摘楸葉。納袋勦秤。取十五觔。以水一石。淨釜中煎取三斗。又換鍋煎取七八升

又換鍋煎取二升。乃納不津器中。用時先取麻油半合。蠟一分。酥一粟子許。同消化。又取杏仁七粒。生薑少許

同研。米粉二錢。同入膏中攪勻。先塗瘡上。經二日來。乃拭却。即以篋子勻塗。楸煎滿瘡上。仍以軟帛裹之。且日

一拭。更上新藥。不過五六上。已破者。即便生肌。未破者。即便內消。瘡後須將慎半年。采藥及煎時。并禁孝子婦人

僧道。雞犬見之。灸瘡不瘥。痒痛不瘥。楸葉頭。頭癢生瘡。楸葉搗及根皮為末。傅之。嫩楸葉三兩。爛搗。紙包

兒髮不生。搗汁頻塗。小兒目翳。泥裹燒乾。去泥入水。少許絞汁。銅器慢熬如稀。小兒禿瘡。楸葉搗

餵。瓷合收之。每旦點之。小兒禿瘡。汁塗之。

漆

本作黍。木汁可以髹物。其字象水滴而下也。人多種之。春分前移栽。易成。有利樹身如柿。葉如椿。以金州者為佳。世稱金漆云。乾漆須搗碎炒熟。用不爾。損人腸胃。若濕漆煎乾更好。亦有燒存性者。

蟲降而行。癩削年深。堅結之積滯。破日久凝。聚之汗血。

治傳尸癆。除風濕痺。續筋骨。填腦髓。療欬嗽。痞結腰痛。

女人疝瘕。經脉不通。去虻蟲。殺三蟲。

今人貨漆多雜桐油。故多毒。漆見蟹

而化水。凡畏漆者。嚼川椒全口。鼻則可免。生漆瘡者。杉木湯。紫蘇湯。蟹湯。浴之。即愈。

附方 小兒蟲病

胃寒危惡。證與痢相似者。乾漆搗燒。烟蓋。白蕪。茂等分。為末。米飲服。一字。至一

錢。九種心痛

及腹脇積聚滯氣。筒內乾漆一兩。搗炒。烟蓋。研末。醋。黃。麩。糊。丸。梧子大。每服五丸。至

九丸。熱酒下。

女人血氣

婦人不曾生長。血氣疼病。不可忍。及治丈夫疝氣。小腸氣。撮痛者。並宜服。

二聖丸。濕漆一兩。熬一食。傾入乾漆末一兩。和丸。梧子大。每服三四丸。溫酒下。怕漆人不可服。女人經

閉指南方萬應丸治女人月經瘀閉不來繞臍寒疝痛

炒烟盡牛膝末一兩以生地黃汁一升人銀石器中慢

熬俟可丸丸如梧子大每服一丸加至三五丸酒飲任

下以通為度產寶方治女人月經不利血氣上攻欲

嘔不得睡用當歸四錢乾漆三錢炒烟盡為末煉蜜丸

梧子大每服十五丸空心溫酒下千金治女人月水

不通臍下堅如盃時發熱往來下痢羸瘦此為血瘕若

生肉瘕不可治也乾漆一觔燒研生地黃二十觔產後

取汁和煎至可丸丸梧子大每服三丸空心酒下

青腫瘀痛及血氣水疾乾漆大麥芽等分為末新瓦甑

熱酒下但是產五勞七傷補益方用乾漆梧子仁山茱

後諸疾皆可服喉痺欲絕不可針藥者乾漆解中蠱

毒平胃散末以生漆和丸梧子大下部生瘡生漆塗

葉晒乾研末日用溫服一錢七治五尸勞疾殺蟲

木子治下血。

花治小兒解顱腹脹交脛不行。

木犀

綱目作箇桂。一名筒桂。又名小桂。葉如梔子葉而光潔。叢生巖嶺間。謂之巖桂。俗呼為木犀。其花有白者。

名銀桂。黃者名金桂。紅者名丹桂。有秋花者。有春花者。有四季花者。有逐月花者。其皮薄而不辣。不入藥用。惟花可收。若浸酒鹽漬。及作香茶之類。

花性溫。味辛。同百藥煎孩兒茶。作膏餅。噙生津辟臭化

痰。治風蟲牙痛。同麻油蒸熟潤髮。及作面脂。

皮治百病。養精神。和顏色。為諸藥先通聘使。久服輕身

不老。面生光華。常如童子。

木蘭

又有杜蘭。林蘭。木蓮。黃心。諸名。枝葉俱疎。其花內白。外紫。亦有四季開者。深山生者尤大。可以為舟。其木

肌細而心黃。梓匠重之。

皮性寒。味苦。主治酒疸。利小便。療重舌。中風傷寒。身大熱。在皮膚中。去面熱。赤炮酒皸。惡風癩疾。明耳目。去臭氣。陰下濕痒。水腫癰疽。

附方小兒重舌

木蘭皮一尺廣四寸。削去粗皮。入醋一升。漬汁。噙之。

面上皸炮

煎

用木蘭皮一觔。細切。以三年酢漿漬之。百日。曬乾。搗末。每漿水服。方寸七。日三服。肘後用酒漬之。梔子仁一觔。

酒疸發斑

赤黑黃色。心下燠痛。足脛腫滿。小便黃。由大醉當風入水所致。用木蘭皮一兩。黃芪二兩。

為末。酒服方寸七。日三服。

花主治魚哽。骨哽。化鐵丹用之。

木筆

綱目作辛夷。又有辛雉。侯桃。房木。迎春。諸名。處處有之。園亭間多種。桶先花。後葉。初出枝頭。苞長半寸而

光如筆。有毛順鋪。花開如蓮而小。有粉紅及紫二色。入藥用紫者。以未開時收為藥。亦有白色者。人呼為玉蘭。又有千葉者。

苞性溫味辛。

入藥微炙。治眼去皮。用向裏實者。

主治溫中解肌。利九竅。

通鼻塞涕出。面腫引齒痛。寒熱風頭腦疼。憎寒體噤。瘡痒眩胃。身兀兀如在船車之上者。長鬚髮。去白蟲。入面脂。生光澤。療鼻淵鼻皴。鼻窒。鼻瘡。及痘後鼻瘡。並用研末。入麝香少許。葱白蘸入數次。甚良。

樟

西南處處山谷有之。木高丈餘。小葉似桑而尖長。背有黃赤茸毛。四時不凋。夏開細花。結小子。木大者數抱。肌理細而錯縱。有文。宜于雕刻。氣甚芬烈。豫章乃二木名。一類二種也。性溫味辛。主治惡氣。

中惡。心腹痛。鬼疰。霍亂。腹脹。宿食不消。常吐酸臭水。酒

煮服。無藥處用之煎湯。浴脚氣。疥癬風癢。作屐除脚氣。

霍亂須吐者。以木屑煎濃汁吐之甚良。又中惡鬼氣卒死者。以木燒烟熏之。待醒自安。

附方 手足痛風

冷痛如虎咬者。用樟木屑一斗。急流水一石。煎極滾泡之。乘熱安足于桶上熏之。以草薦圍住。勿令湯氣入目。其功甚捷。此家傳經驗方也。

瘦節 主治風症鬼邪。

附方 三木節散

治風勞面色青白。肢節沉重。脊間痛。或寒。或熱。或躁。或噴。思食不能食。被蟲侵

蝕。證狀多端。天靈蓋酥炙研二兩。半黃。人中白。焙各半兩。麝香二錢。為末。別以樟木。溜節。皂莢。木。溜節。槐木。溜

節。各為末五兩。每以二錢。水一盞。煎半盞。去滓。調前末一錢。五更頓服。取下蟲物為妙。

烏藥

又有旁其。鱗魮。矮樟。諸名。吳楚山中極多。人以為薪。根葉皆有香氣。似樟而矮小也。嫩者肉白。老者肉褐

色。氣雄。性溫。味辛。帶微苦。故能快氣。宣通。疏散。凝滯。甚

于香附。外解表而理肌。內寬中而順氣。以此散寒氣。則
客寒冷痛自除。驅邪氣。則天行疫瘴即却。開鬱氣。中惡
腹痛。胸膈脹滿。頓然可減。疏經氣。中風四肢不遂。初產
血氣凝滯。漸次能通。皆藉其氣雄之功也。未泔浸三四
日令透。方好

切片用。

附方 烏沈湯

治一切氣。一切冷。補五臟。調中。壯陽。暖腰
膝。去邪氣。冷風。麻痺。膀胱腎開。冷氣攻衝。

背脊倦仰不利。風水腫毒。吐瀉轉筋。癱瘓刺痛。中惡心
腹痛。鬼氣在忤。天行瘴疫。婦人血氣痛。用天台烏藥一
百兩。沈香五十兩。人參三兩。甘草熅四兩。為末。每服半錢。薑鹽湯空心點服。
一切氣痛 男女
冷氣。血氣。肥氣息。貴氣。伏梁氣。奔豚氣。捨心。切痛。冷汗
喘息欲絕。天台烏藥小者。酒浸一夜炒。茴香炒。青橘皮
去白炒。良薑炒。等分。為末。溫酒童便調下。
男婦諸病 香烏散。用香附烏藥等
分為末。每服一二錢。飲

食不進。薑棗湯下。瘧疾。乾薑白鹽湯下。腹中有蟲。檳榔湯下。頭風。虛腫。茶湯下。婦人冷氣。米飲下。產後血攻。心

脾痛。童便下。婦人血海。小腸疝氣。烏藥一兩。升麻八錢。痛。男子疝痛。茴香湯下。水二鍾。煎一鍾。露一

宿。空心。脚氣掣痛。鐵器布指去土。菴瓦刮屑。好酒浸一熱服。宿。次早空心溫服。溼泄即愈。入麝少許。尤佳。痛入腹者。

以烏藥同鷄子。瓦罐中水煮一日。去鷄子。切片。蘸食。以湯送下。血痢瀉血。烏藥燒存性。研。陳米飯丸。小兒慢驚。

甚效。昏沈。或搐。烏藥。氣厥頭痛。不拘多少。及產後頭痛。天台烏藥。磨水灌之。川芎。乾等分。為末。每服二錢。

臘茶清調下。產後鐵。咽喉閉痛。生烏藥。即矮樟根。以酸。鍾。燒紅。滓酒調下。醋二盞。煎一盞。先嚼後。

嚙。吐出痰。孕中有癰。洪州烏藥。軟白香。辣者。五錢。水一。盞。為愈。蓋。牛皮膠。一片。同煎。至七分。溫服。

乃龔。參。心腹氣痛。烏藥水。磨濃汁。一盞。入。德方也。橘皮一片。蘇一葉。煎服。

楓。枝幹修聳。大者連數圍。其實成。白膠香。凡用以蓋水。煮。毬。有柔刺。有香脂。即白膠香也。二十沸。入冷水。

中。採扯數十次。晒干用。性平。味苦辛。主治癰疹風痒浮腫。煮水浴

之一切癰疽瘡疥金瘡吐衄咯血活血生肌止痛解毒

燒過指牙永無牙疾

附方吐血不止 白膠香為散。每服二錢。新汲水調下。吐血衄血 白膠香。蛤粉。等分為

末。薑汁調服。吐血咯血 澹寮方。用白膠香。銅青。各一錢。為末。入乾柿內。紙包煨熟食之。 聖惠用

白膠香。切片炙黃一兩。新綿一兩。燒灰為末。每服一錢。米飲下。金瘡斷筋 楓香末。傳之。 便癰

膿血 白膠香。一兩。為末。入麝香。輕粉。少許。摻之。 小兒奶疽 生面上。用楓香。瘰

癰軟節 白膠香。一兩。化開。以篋麻子。研入。待成膏。攤貼。 諸瘡不合 白膠香。輕粉。各

二錢。猪脂和塗。一切惡瘡 水沉。金絲。膏。用白膠香。溼青。各一兩。以麻油。黃蠟。各二錢。半。同溶化。入冷

水中。扯千遍。攤貼之。惡瘡疼痛 楓香。膩粉。等分為末。漿水洗淨貼之。 久近脛瘡 白膠香。為

末以酒漚上箬
葉夾末貼之
小兒疥癬
白膠香黃藥輕粉等分
為末羊骨髓和傅之
大便

不通
白膠香半棗大鼠糞二枚研勻
水和作挺納入肛門良久自通
年久牙疼
楓香脂為末以

香爐內灰和
勻每旦指擦
魚骨哽咽
白膠香細細吞之

木皮煮汁飲治水腫下水氣止水痢煎湯浴止霍亂刺

風冷風

附方大風瘡
楓子木燒存性研輕粉等分麻油調搽
妙章貢有鼓角匠病此一道人傳方遂愈

根葉主治瘡疽已成搗酒飲以渣貼之

菌有毒慎食令人笑不止地漿解之

桐
又有白桐黃桐泡桐榭桐榮桐諸名處處有之有四種
白花桐生朝陽地易長葉圓大而尖花白色心微紅紫
花桐文理細而體堅葉三角而圓大色青多毛花紫色
有結子如胡椒樣而大者名梧桐見果部有結實大而

圓。內有二子。或四子。大如大楓子。可作油者。名油桐。見後。葉性寒。味苦。主治惡蝕瘡。消腫毒。生髮。

附方 手足浮腫

桐葉煮汁漬之。并飲少許。或加小豆尤妙。

癰疽發背

大如盤。臭腐不

可近。桐葉醋蒸貼上。退熱止痛。漸漸生肉。收口極驗。秘方也。

髮落不生

桐葉一把。麻子仁三升。米泔煮五六沸。去滓。日日洗之。則長。

泔煮五六沸。去滓。日日洗之。則長。

髮白染黑

經霜桐葉及子。多收搗碎。以醃蒸之。生布絞汁。沐頭。

木皮 治五痔殺三蟲。療奔豚氣。病五淋。沐髮去頭風。生

髮滋潤。煎汁塗惡瘡。小兒丹毒。

附方 腫從脚起

削桐木煮汁漬之。并飲少許。

傷寒發狂

六七日。熱極。狂言。見鬼欲

走。取桐皮削去黑。擘斷。四寸一束。以酒五合。水一升。煮半升。去滓。頓服。當吐下青黃汁數升。即瘥。

跌撲

傷損

水桐樹皮。去青。留白。醋炒。搗傅。

花傳猪瘡飼猪肥大三倍。

附方眼見諸物

禽蟲飛走乃肝膽之疾青桐子花酸棗仁玄明粉羌活各一兩為末每服二錢

水煎去滓日三服

油桐

綱目作罌子桐又名虎子桐荏桐枝幹花葉並類紫

花桐而小樹長亦遲花微紅實大而圓每實中有二子或四子大如大楓子肉白可榨油入漆家及驗船用為時所須宜辨真偽惟以篋圈蘸起如鼓面者為真

桐油性寒味甘微辛有毒吐人得酒可解主治摩疥癬蟲瘡毒

腫毒鼠至死傳惡瘡及宣水腫塗鼠咬處能辟鼠塗脛

瘡湯火傷瘡吐風痰喉痺及一切諸疾以水和油掃入

喉中探吐或以子研末吹入喉中取吐又點燈燒銅箸

頭烙風熱爛眼效

附方 癰腫初起

桐油點燈。人竹筒內薰之。得出黃水。即消。

血風膿瘡

胡粉。過研。桐

油調作隔紙膏貼之。

又方。用船上陳桐油。石灰煨過。又以人髮拌桐油。炙乾為末。仍以桐油調作膏。塗紙上。

刺孔。脚肚風瘡

如癩。桐油人乳等分。掃之。數次。即愈。

酒皸赤鼻

桐油入黃丹。雄黃。傅

之。凍瘡皸裂

桐油一盞。髮一握。熬化。瓶收。每以溫水洗。令軟。傅之。即安。

解砒石毒油

二升灌之。吐即毒解。

棟

一名苦棟子。又名金鈴子。樹長甚速。二五年即可作椽。其子正如圓棗。以川中者為良。

子。性寒。味

苦。有小毒

得酒煮。乃寒。因熱用也。茴香為之使。

主治。瀉膀胱。療諸疝。心腹

熱厥暴痛。溫疫傷寒。大熱煩狂。失心躁悶。利小便。殺三

蟲。蟲痔。疥瘍。

附方 熱厥心痛

或發。或止。身熱足寒。久不愈者。先灸大溪。崑崙。崑崙。引熱下行。內服金鈴散。用金鈴

子。玄胡索各一兩為末。小兒冷疝氣痛。膚囊浮腫。金鈴子去核五錢。吳茱萸

每服三錢。溫酒調下。
二錢半為末。酒糊丸。黍米本臟氣傷。膀胱連

大。每鹽湯下二三十丸。
一百箇。溫湯浸過。去皮。巴豆二百箇。微打破。以麩二升

同於銅鑊內炒。至金鈴子赤為度。放冷取出。去核為末。
巴麩不用。每服三錢。熱酒或醋瀉療方。棟實

湯調服。一方入鹽炒。茴香半兩。
墜痛不可忍。用川棟子肉五兩。分作五分。一兩用破故

紙二錢炒黃。一兩用小茴香三錢。食鹽半錢同炒。
用萊菔子一錢同炒。一兩用牽牛子三錢同炒。一兩用

斑蝥七枚。去頭足同炒。棟去食鹽。萊菔牽牛斑蝥只留
故紙茴香同研為末。以酒打麩糊丸。梧子大。每空心酒

下五十丸。得效方棟實丸。治一切疝氣腫痛。犬有神
效。用川棟子酒潤取肉一觔。分作四分。四兩用小麥一

合斑蝥四十九箇同炒。熟去蝥。四兩用小麥一合。巴戟肉一兩
四十九枚同炒。熟去豆。四兩用小麥一合。巴戟肉一兩

同炒。熟去戟。四兩用小茴香一合。食鹽一兩同炒。熟去
鹽加破故紙酒炒一兩。廣木香不見火。一兩為末。酒煮
麩糊丸。梧子大。每服五十丸。鹽湯空心下。日三服。直

指方棟實丸治外腎脹大。麻木痛破。及奔豚疝氣。用川棟子四十九箇。分七處切取肉。七箇用小茴香五錢。同炒。七箇用破故紙二錢半。同炒。七箇用黑牽牛二錢半。同炒。七箇用食鹽二錢。同炒。七箇用蘿蔔子二錢半。同炒。七箇用巴豆十四箇。同炒。七箇用斑蝥十四箇。去頭足。同炒。棟去蘿蔔子。巴豆斑蝥三味不用。入青木香五錢。南木香官桂各二錢半。為末。酒煮麩糊丸。梧子大。每服三十丸。食前用鹽湯下。一日三服。臟毒下血。苦棟子炒黃為末。蜜丸。梧子腹中長蟲。棟實以淳苦大。米飲每吞十九。至二十九。酒漬一宿。綿裹塞入穀道中。三寸許。日二易之。耳卒熱腫。棟實五合搗爛。腎消膏淋。病在下焦。苦棟子茴香等分炒為末。每溫酒服一錢。小兒五疳。川棟子肉。川芎。翦九米。飲下。

根及木皮性微寒。味苦。微毒。雄者根赤有毒。吐瀉殺人。不可悞服。雌者白入藥。每

一兩。可入糯米五十粒。同煎解毒。若瀉者以冷粥止之。不瀉者以熱葱粥發之。**主治**蛇蟲。利大

腸苦酒和塗疥癬甚良煎湯浸洗遊風熱毒風瘰惡瘡

疥癩小兒壯熱

附方消渴有蟲

苦棟根白皮一握切焙入麝香少許水二碗煎至一碗空心飲之雖困頓不妨

下蟲如虻而紅色其渴自止消渴有蟲人所不知

小兒虻蟲

棟木皮削去蒼皮水煮汁量大小飲

之斗門方用為末米飲服二錢

集簡用根皮同雞

卵煮熟空心食之次日蟲下

經驗方抵聖散用苦棟

皮二兩白蕪荳半兩為末每以一二錢水煎服之簡

便用棟根白皮去粗二筋切水一斗煮取汁三升沙鍋

成膏五更初溫酒服

小兒諸瘡

惡瘡禿瘡蠟蝮瘡浸淫瘡並宜棟樹皮或枝燒

一匙以蟲下為度

灰傅之乾

者豬脂調口中瘻瘡

東行棟根細剉水煮濃汁日日含漱吐去勿嚙蜈蚣蜂傷

棟樹枝葉

汁塗之良疥瘡風蟲棟根皮皂角去皮子等分為末豬脂調塗

花治熱癰焙末摻之鋪席下殺蚤虱

葉治疝氣囊痛臨發時煎酒飲。

柳

一名小楊又名楊柳。楊枝硬而楊起。故謂之楊。柳枝弱而垂流。故謂之柳。蓋一類二種也。爾雅云：楊，蒲柳也。虎澤柳也。漣河柳也。觀此則楊可稱柳，柳亦可稱楊。柳云：花初生柔荑，即亦可稱楊。故今南人猶併稱楊柳云。花中結網黑子，蕊落而絮開黃蕊花。至春晚，葉長成後，花中結網黑子，蕊落而絮出如白毳。因風而飛，子着衣物能生蟲。入池沼則化為浮萍。古者春取榆柳之火，陶朱公言種柳千樹，可足柴炭，其嫩芽可作飲湯。性寒，味苦。主治

風水。黃疸面熱黑。痲疥惡瘡。金瘡。柳實主潰癰。逐膿血。

子汁療渴。華主止血。治濕痺。四肢攣急。膝痛。

附方吐血咯血

柳絮焙研米飲服一錢。

金瘡血出

柳絮封之即止。

面上膿

瘡

柳絮膩粉等分。以燈盞油調塗。

走馬牙疳

楊花燒存性。入麝香少許。搽。

大風癩瘡

楊花四兩。搗成餅。貼壁上。待乾取。下米泔水浸一時。取起。瓦焙研末。二兩。白花蛇烏蛇各一條。去頭尾。酒浸。取

肉全蠍蜈蚣蟾酥雄黃各五錢。苦參天麻各一兩。為末。水煎麻黃。取汁。熬膏和丸。梧子大。硃砂為衣。每服五十丸。溫酒下。一日三服。以愈為度。脚多汗濕。襪內穿之。

葉主治天行熱病。傳尸骨蒸勞。心腹內血止痛。療白濁。

解丹毒。煎膏續筋骨。長肉止痛。主服金石人發大熱悶。

湯火瘡毒。人腹熱悶。及丁瘡惡疥。痂瘡。馬疥。漆瘡。煎煮。

洗之立愈。

附方小便白濁。清明柳葉煎湯。小兒丹煩。柳葉一觔。水代茶。以愈為度。一斗。煮取汁。

三升。楊洗赤處。着毛脫落。垂柳葉。陰乾為末。每薑汁日七八度。良。於鐵器中調。夜夜摩之。卒。

得惡瘡。不可名識者。柳葉或皮。面上惡瘡。方同。痘爛生。

蛆。嫩柳葉鋪席上。臥之。蛆盡出而愈也。

〔枝〕及〔白根皮〕主治。痰熱淋疾。黃疸白濁。爲浴湯洗風腫。瘙痒。煮酒漱齒疼。慰諸痛腫。去風止痛消腫。小兒一日五日寒熱煎枝浴之。

〔附方〕黃疸初起

柳枝煮濃汁半升頓服

脾胃虛弱

不思飲食。食下不化。病似翻胃。

噎膈。清明日取柳枝一大把。熬湯。煮小米作飯。酒麩滾成珠子。曬乾。袋懸風處。每用燒滾水。隨意下米。米沉住火。少時米浮。取看無硬心。則熟可走注氣痛。氣痛之病食之。久則散不枯矣。名曰絡索米。忽有一處如打撲之狀。不可忍。走注不定。靜時其處冷如霜雪。此皆暴寒傷之也。以白酒煮楊柳白皮。暖熨之。有赤點處。鑷去血妙。凡諸卒腫。風毒卒腫。方同上。陰卒腫。柳枝三急痛。熨之皆即止。十枚。細剉。水煮極熱。以故帛裹包腫處。仍以熱湯洗之。項下瘦氣。水涯露出。柳根煮取五升。以糯米三斗。如常釀酒。日飲。齒齲腫痛。垂柳枝。槐白皮。桑白皮。白楊皮。等分煎水。熱含。

冷吐。又方。柳枝槐枝桑枝煎水熬。風蟲牙痛。楊柳白膏入薑汁細辛芎藭末每用擦牙。

指大含咀以汁漬齒根數過即愈。又方。柳枝一握剉入少鹽花漿水煎含甚驗。又方。柳枝剉一升大豆一

升合炒豆熟瓷器盛之清酒三升漬三日頻含漱涎二日愈。耳痛有膿。柳根細切熟搗封之燥即

易之。漏瘡腫痛。柳根紅鬚煎水日洗。摘玄方用。乳癰妬

乳。初起堅紫衆瘰不瘥。柳根皮熟搗。及花惡瘡。肉出如

深膿潰。柳枝葉三觔水五升。天竈丹毒。赤從背起。柳木

煎汁二升熬如飴日三塗之。瘡如瓜。腫痛如火。

湯洗之。艾灸三五壯。王及郟中病此。驛吏用此方灸之。覺熱氣入腸。大下血穢。至痛一頃遂消。馳馬而去。

柳膠治惡瘡及結砂子。

柳耳。見菜部。

柳寄生治腸氣刺痛搗汁服一盞。

檉

音柳又有赤檉。赤楊。河柳。雨師。人柳。垂絲柳。三眠柳。觀

娜可愛。一年三次作花。花穗長三四寸。水紅色。亦有白色者。性溫味甘鹹。主治。剝驢

馬血入肉毒。取木片火炙熨之。并煮汁浸之。枝葉消痞

解酒毒利小便。

附方腹中痞積

觀音柳煎湯露一宿。五一切諸風。不問更空心飲。數次痞自消。

檉葉半觔。切枝亦可。荆芥半觔。水五升。煮二升。澄清入

白蜜五合。竹瀝五合。新甌盛之。油紙封入。重湯煮一伏

時。每服一小

酒多致病

長壽仙人柳。晒乾為末。蓋日三服。合質汗藥治金瘡。

檉

綱目作檉。又名鬼柳。其樹高舉。其木如柳。故名。訛為鬼柳。郭璞註作柅柳。云似柳。皮可煮飲也。葉可為茶。

木皮性寒。味苦。主治時行頭痛。熱結在腸胃。夏日煎飲。去熱。煎汁服療水氣。斷痢。安胎。止妊婦腹痛。山樺皮性平。治熱毒風。燔腫毒。

附方通身水腫。樺樹皮。煮毒氣攻腹。手足腫痛。樺樹皮和槲皮。煮汁煎如

飴糖。以樺皮煮濃汁化飲。蠱毒下血。樺皮一尺。蘆根五寸。水二升。煮一升。頓服。當下蠱出。小兒

痢血。梁州樺皮二十分。炙。犀角十二分。飛血赤眼。樺皮水三升。煮取一升。分三服。取瘥。去粗

皮。切二兩。古錢七文。水一升。半煎七合。去滓。熱洗。日二次。

葉接貼火爛瘡。鹽搗晉腫爛惡瘡。

水楊。又有青楊。蒲柳。蒲楊。蒲核。音移。核柳。藿苻。音九。蒲。諸名。有。二種。一種皮硬而楊起。故謂之楊。多宜水溪蒲藿之地。故

白。可為椅。北土尤多。花與柳同。枝葉性平。味苦。主治

久痢赤白。搗汁一升服。日二效。療癰腫痘毒。痘瘡數日

不行。或風寒所阻者。宜用水楊枝葉。無葉時。單用枝。五
觔。流水一大釜。煎湯。溫浴之。如冷。添湯。良久。照見。累起
有紅暈絲者。兼行也。如不滿。再浴之力。弱者。只洗頭面
手足。如屢浴不起者。氣血敗矣。不可再浴。治出及痒。塌
者。皆不可浴。痘不行漿。乃氣滯血滯。腠理周密。或風寒
外阻而然。浴令暖。氣透達。和暢鬱蒸。氣血通徹。每隨氣
暖而發。行漿貫滿。功非淺也。內
服助氣血藥。更效。風寒亦散矣。

木白皮及根治金瘡疼痛。乳癰。諸腫痘瘡。

附方金瘡苦痛。楊木白皮。炙燥。碾末。水服
方寸匕。仍傅之。日三次。

白楊一名獨搖。木高大。葉圓似梨而肥。大有尖。面青而光
背甚白。色有鋸齒。木肌細。性堅直。用為梁拱。終不撓
曲。與柞楊乃一類二種也。治病之功。大抵
彷彿。嫩葉亦可救荒。老葉可作酒麴料。**木皮**性寒。味

苦。主治毒風脚氣腫。四肢緩弱不隨。毒氣游易在皮膚。

中痰癖等酒漬服之去風痺宿血折傷血瀝在骨肉間痛不可忍及皮膚風瘙腫雜五木為湯浸損處治撲損瘀血並煎酒服煎膏可續筋骨煎湯日飲止孕痢煎醋含漱止牙痛煎漿水入鹽含漱治口瘡煎水釀酒消癭氣。

附方 妊娠下痢

白楊皮一觔水一斗。取圓葉白楊皮十兩勿令見風切水五升煮取二升漬麴末五兩如常釀酒每日一盞日再服。

項下癭氣

秫米三斗炊熟

枝消腹腫治吻瘡

附方 口吻爛瘡

白楊嫩枝鐵上燒灰和脂傅之

腹滿癖堅

如石積年不損者必效方

用白楊木束枝去粗皮碎風細剉五升熬黃以酒五升淋訖用絹袋盛瘡還納酒中密封再宿每服一合日三

服。面色不白。白楊皮十八兩。桃花一兩。白瓜子仁三兩。為末。每服方寸匕。日三服。五十日。面及手足皆

白。

葉治齟齬。煎水含漱。又治骨疽久發。骨從中出。頻搗傅之。

柶柳

綱目作扶柶。又名唐棣。高飛獨搖。無風葉動。花反而後合。餘見白楊下。

木皮性平。味苦。

主治。去風血。脚氣疼痺。跣損瘀血。痛不可忍。取白皮。火

炙酒浸服之。和五木皮煮湯。捋脚氣。殺疥蟲。風癢。燒作

灰置酒中。令味正。經時不敗。

附方。婦人白崩。

扶楊皮半觔。牡丹皮四兩。升麻。牡蠣。煨。各三兩。每用一兩。酒二鍾。煎一鍾。食前

服。

松楊一名棕子木。其材如松。其身如楊。故名。松楊縣以此得名。江西呼為涼木。性平。味甘。酸。

治折傷。破惡血。養好血。安胎。止痛。生肉。

木皮。治水痢。不問冷熱。濃煎。令黑。服一升。

榘音音。綱目作榘。良刃切。木生江南深山。性最硬。灰性溫。

味甘。主治。卒心腹癥瘕。堅滿。瘰癧。淋汁八升。釀米一斗。

待酒熟。每溫飲半合。漸增至一二盞。即愈。

烏臼木又名鷓白。鳥喜食其子。故名。南方平澤甚多。人根

白皮。性溫。味苦。慢火炙乾。黃乃用。主治。暴水。癥結。積聚。一人病腫滿氣

壯。掘此根。持爛。河水煎服。一盞。連行數次。病愈。但氣虛人不可輕用。出聖惠方。療頭風。通大小

便。解蛇毒。

附方小便不通烏白根皮煎湯飲之大便不通烏白木根方長一寸劈破水煎半盞

服之立通不用多喫二便關格二三日則殺人烏白東南根白皮乾為末熱水

其功神聖兼能取水服二錢先以芒硝二兩煎湯服取吐甚效水氣虛腫小便澀烏白皮檳榔木

米飲下脚氣濕瘡極痒有蟲烏白根為末尸注中惡心痛刺

沉黯錯亂用烏白根皮煎濃汁一合暗疔昏狂瘡頭凸

調硃砂末一錢服肘後方無硃砂根經行路者取二尺許去皮搗爛井華水調一嬰兒胎

蓋服待瀉過以三角銀杏仁浸油搗禽患處瘡滿頭用水邊烏白樹根晒研鼠莽砒毒烏白根半兩

鹽麩痰喘柏樹皮去粗搗汁和飛麩作餅烙熟早晨與兒喫三四箇待吐下鹽涎乃佳如不行熱茶

之推

葉主治食牛馬六畜肉生疔腫欲死者搗自然汁一升

頃服得大利。去毒卽愈。未利再服。冬用根。

柏油塗頭變白為黑服一合。令人下利。去陰下水氣。炒

子作湯。亦可塗一切腫毒瘡疥。

附方膿泡疥瘡。柏油二兩。水銀二錢。樟腦五錢。同研。頻

入。藥填。小兒蟲瘡。用舊絹作衣。化柏油塗之。與兒穿着。次

以油衣與穿。以蠱盡為度。

柘處處山中有之。喜叢生。幹疎而直。葉豐而厚。團而有尖。

其葉飼蠶。取絲作琴瑟弦。清響勝常。其木染黃赤色。謂

之柘黃。上用所服。木白皮。東行根。白皮。性溫味甘。主治婦人崩

中血結。瘡疾。釀酒服。主風虛耳聾。聖惠方。治耳鳴耳聾。用

柘根二十觔。菖蒲五斗。各以水一石。煮取汁五斗。故鐵

石麴二斗。如常釀法。酒成。以磁石三觔為末。浸酒中三宿。日夜飲之。取小醉而眠。聞人聲乃止。補勞損。虛羸。腰腎冷。夢與人交接。洩精者。

附方 飛絲入目

柘漿點之。以絲蘸水拭去。

洗目令明

柘木煎湯。按日溫洗。自寅至亥。

乃止。無不效者。正月初二。二月初二。三月初二。四月初二。五月初二。六月初二。七月初二。八月初二。九月初二。十月初二。十一月不洗。十二月不洗。徐神翁方也。小兒驚口。重舌。柘根五觔。剉滓煎取五合。頻塗之。無根弓材亦可用。

柘黃

見菜部。木耳下。

奴柘

樹似柘而小有刺。葉如柞葉而小。可飼蠶。

刺性溫。味苦。主治男子疝瘕。悶

痞。老婦血瘕。取刺和三稜草。烏馬鞭草。作煎。如稠糖。病

在心。食後。在臍。空心服。當下惡物而愈。

枳子小者名枳實。大而老者名枳殼。以陳久者良。小麥麩炒焦去麩用。實性寒。味苦微辛。專

泄胃實。猛酷速下。開導堅結。有推墻倒壁之功。主中脘

以治血分。療臍腹間實滿。消痰癖。祛停水。逐宿食。破結

胸。通便閉。非此不能也。若痞滿者。因脾經有積血。如脾

無積血。則不滿。若皮膚作癢。因積血滯于中。不能榮養

肌表。若飲食不思。因脾氣鬱結。不能運化。皆取其辛散

苦瀉之力也。為血分中之氣藥。惟此稱最。佐白朮能健

脾開胃。同瓜蒌黃連半夏。治傷寒結胸。

附方 卒胸痺痛枳實搗末。湯服方寸七。日三。夜一。 胸痺結胸胸痺。心下痞堅。留氣

結胸。脇下逆氣。捨心。枳實。薤白。湯主之。陳枳實四枚。厚朴四兩。薤白半觔。栝蒌一枚。桂一兩。以水五升。先煎枳

朴取二升。去滓。納餘藥。煎三兩。沸。分溫三服。當愈。**傷寒胸痛**傷寒後。卒胸膈閉。痛。枳實麩炒為末。

米飲服二錢。日二服。**產後腹痛**枳實麩炒。芍藥酒炒。各二錢。水一盞煎服。亦可為末服。**奔豚**

氣痛枳實炙為末。飲下。方寸七。日三夜一。**婦人陰腫**堅痛。枳實半觔。碎炒。帛裹熨之。冷即易。

大便不通枳實皂莢等分為末。飯丸米飲下。**積痢脫肛**枳實石上磨平。蜜炙黃更互熨。

之。縮**小兒久痢**水穀不調。枳實搗末。飲服一二錢。**腸風下血**枳實半觔。麩炒黃芪。

半觔為末。米飲非時服二錢七。糊丸亦可。**小兒五痔**不以年月。枳實為末。煉蜜丸。梧子大。空心飲下。

三十丸。**小兒頭瘡**枳實燒灰。猪脂調塗。**皮膚風癬**枳實醋浸火炙。熨之即消。

枳殼性微寒。味苦辛。專利肺氣。因質體大。則性寬緩。而

遲下。通利結氣。而不致驟泄。故主上焦。以治氣分。因味

帶辛。用之散滯。療胸膈間痞滿。寬膨脹。逐水氣。消痰飲

推宿食順氣逆止咳嗽。又肺主皮毛。治遍身風癢。疏解
癩疹。通利關節。且肺與大腸為表裏。兼寬大腸。以除結
痢。祛痔痛。理腸風。抑其氣以行血。使胎前無滯。佐白朮
以安胎。最為神妙。凡快氣之品。勿宜多用。

附方 傷寒呃噫

枳殼半兩。木香一錢為末。每白湯服一錢。未止再服。

老幼腹脹

血氣

凝滯。用此寬腸順氣。各四炒丸。商州枳殼厚而綠背者。去穰四兩。分作四分。一兩用蒼朮一兩同炒。一兩用蘿蔔子一兩同炒。一兩用乾漆一兩同炒。一兩用茴香一兩同炒。黃去四味。只取枳殼為末。以四味煎汁煮麩糊和丸。梧子大。每食後米飲下五十丸。 消積順氣 治五積六聚。不拘男婦老幼。但是氣積。並皆治之。乃
仙傳方也。枳殼三觔。去穰。每箇入巴豆仁一箇。合定札。煮。慢火水煮一日。湯減。再加熱湯。勿用冷水。待時足汁。盡。去巴豆。切片晒乾。勿炒。為末。醋煮麩糊丸。梧子大。每服三四十九。隨病湯使。順氣止痢 枳殼

兩四錢。甘草六錢。為末。每沸湯服二錢。為疏導脚氣。即上方。用木瓜湯服。小兒秘澀。

煨去穰。甘草各一錢。以水煎服。腸風下血。不拘遠年近日。博濟方用枳殼。燒黑存性五錢。羊脛炭為末三錢。五更空心。米飲服。如人行五里。再一服。當日見效。簡便。用枳殼一兩。黃連五錢。水一鍾。煎半鍾。空心服。痔瘡腫痛。必效方。用枳殼煨熟。熨之。七枚立定。本

洗。懷胎腹痛。枳殼三兩。麩炒。黃芩一兩。每服五錢。水一盞。半煎。一盞服。若脹滿身重。加白朮一兩。

產後腸出。不收。枳殼煎湯。浸之。良久。即入也。小兒驚風。不驚丸。治小兒搐。痰涎壅塞。手足攣。眼睛斜視。枳殼去穰。麩炒。淡豆豉。等分。為末。每服一字。甚者半錢。急驚薄荷自然汁下。

慢驚。荆芥湯入酒。三五點下。日三服。牙齒疼痛。枳殼浸酒含漱。風癰作癢。枳殼三

為末。每服二錢。水一盞。煎六分。去滓溫服。仍以汁塗。小兒軟癩。大枳殼一箇。去白

邊。合癬上。自出膿。血盡。更無痕也。利氣明目。枳殼麩炒一兩。下早成痞。

為末。點湯代茶。

下早成痞。

下早成痞。

傷寒陰證。下早成痞。心下滿而不痛。按之虛軟。脇骨疼。枳殼。檳榔。等分爲末。每服三錢。黃連湯調下。

痛。因驚傷肝者。枳殼一兩。麩炒。桂枝生。半兩。爲細末。每服二錢。薑棗湯下。

枳茹 樹皮也。或云枳殼上。刮下皮也。 主治中風身直。不得屈伸。反復及

口僻。眼斜。刮皮一升。酒二升。漬一宿。每溫服五合。酒盡

再作。樹莖及皮。主水脹。暴風骨節疼急。

根皮 主治浸酒漱齒痛。煮汁服治大便下血。末服治野

鷄病有血。

嫩葉 主治煎湯代茶。去風。

枸橘 又名臭橘。處處有之。俱似橘。但幹多刺。二月開白花。青蓋不香。結實大如彈丸。形如枳實。而殼薄不香。或

收小實。偽充枳實。及青皮。不可不辨。 **葉** 性溫。味辛。主治下痢膿血。後重。

葶藶等分。炒存性。研。每茶調二錢服。又治喉癭。消腫導毒。

附方 咽喉怪證

咽喉生瘡。層層如疊。不痛。日久有竅。卽出臭氣。發飲食。用臭橘葉煎湯。連服必

愈。夏子益奇病方。

刺 主治風蟲牙痛。每以一合煎汁含之。

核 主治腸風下血不止。同檮根白皮等分炒研。每服一

錢。皂莢子煎湯調服。

附方 白疹瘙痒

遍身者。小枸橘細切。麥麩炒黃爲末。每服二錢。酒浸。少時飲酒。初以枸橘煎湯

洗患處。

樹皮 主治中風強直。不得屈伸。細切一升。酒二升。浸一

宿。每日溫服半升。酒盡再作服。

卮子

又有木丹。越桃。鮮支。諸名。花名。薜蔔。葉如兔耳。厚而深綠。春榮。秋瘁。入夏開花。大如酒卮。白瓣。黃蕊。隨即

結實。薄皮。細子。有鬚。霜後收之。蜀中。有紅卮子。花爛紅色。染物則赭紅色。

性寒。味苦。

治上中

穀用。下焦去殼。洗去黃漿。炒用。治血病。炒黑用。去心胸熱。用仁。去肌表熱。用皮。

色赤。類火。味苦。

降下。取其體質輕浮。從至高之分。使三焦火屈曲下行。

主治肺熱咳嗽。吐血妄行。胃火作痛。面赤鼻皴。目赤耳

瘡。嘔噦。腹滿。鬱熱淋閉。腸紅疝氣。一切鬱遏之火。俱從

小便泄去。又治虛熱發渴。病後津血已亡。胃腑無潤。同

知母治煩躁。蓋煩屬肺氣。山卮主之。躁屬腎血。知母主

之。

附方鼻中衄血

山厄子燒灰吹之屢用有效

小便不通

厄子仁十四箇獨蒜頭一

箇滄鹽少許搗貼

血淋澀痛

生山厄子末滑石等分葱湯下

下利鮮血

厄子仁燒灰

酒毒下血

新汲水服一錢七

熱毒血痢

厄子十四枚去皮搗末蜜丸梧子大每服三九日三服大效亦可水煎服

臨產下痢

厄子燒研空心

熱酒服一匙甚者不過五服

婦人胎腫

屬濕熱山厄子一合炒研每服二三錢米飲下九服亦可

熱水腫疾

山厄子仁炒研米飲服三錢若上焦熱者連殼用

霍亂轉筋

心腹脹滿未得

吐下厄子二七枚燒研熟酒服之立愈

冷熱腹痛

疴刺不思飲食山厄子川烏頭等分生研為末

酒糊丸如梧子大每服十五丸生薑湯下小腹痛茴香湯送下良

胃脘火痛

大山厄子七枚或九

枚炒焦水一盞煎七分入生薑汁飲之立止復發者必不效用玄明粉一錢服立止

五臟諸氣

益少

陰血用厄子炒黑研末生薑同煎飲之甚捷

五尸注病

冲發心脇刺痛纏綿无時厄子三七枚燒

末水服。熱病食復及交接后發動欲死不能語。厄子小兒

狂躁畜熱。右半身熱。狂躁昏迷不食。厄子仁七枚。豆豉五錢。水一盞煎七分服之。或吐或不吐。立效。赤

腸釣氣越桃仁半兩。草烏頭少許。同炒過。去草烏入白芷一錢為末。每服半錢。茴香葱白酒下。赤

眼腸秘山厄子七箇。鑽孔煨熟。水一升煎半升去滓。入大黃末三錢溫服。喫飯直出厄

二十箇微炒風痰頭痛不可忍。厄子末和蜜。身上酒皴

去皮水煎服。厄子炒研黃蠟和丸。彈子大。每服一厄子搗

丸。嚼細茶下。日二服。忌酒麪煎炙。火焰丹毒厄子搗

之。火瘡未起厄子仁燒研。麻油和封之。眉中練癬厄子

和油折傷腫痛厄子白麪同搗。塗之甚效。獐犬吠傷厄子皮燒研。石

傅之。湯盪火燒梔子末和鷄子清濃掃之。

花主治悅顏色。千金翼面膏用之。

女貞

又有貞木。冬青蠟樹。諸名。女貞冬青。枸骨三樹一類也。女貞即今俗呼蠟樹者。冬青即今俗呼凍青樹者。

枸骨即今俗呼貓兒刺者。人因女貞茂盛亦呼為冬青。

蓋一類二種。爾二種皆因子自生最易長。女貞葉長四

五寸。子黑色。凍青葉微圓。子紅色為異。其花皆繁。子並

纍纍滿樹。木肌皆白膩。立夏前後取蠟蟲種子。裹置枝

上半月。蟲化綠枝。造成

白蠟。人但呼為蠟樹。實性平。味苦。主治補中。安五臟。

養精神。除百病。強陰。健腰膝。黑髮明目。久服肥健輕身。

不老。

附方 虛損百病

久服髮白再黑。返老還童。用女貞實十

透晒乾一觔。四兩。旱蓮草五月收。陰乾。用時以酒浸一日。蒸

子三月收。陰乾。十兩為末。煉蜜丸。如梧子大。每服七八

十丸。淡鹽湯下。若四月收。桑椹搗汁和。風熱赤眼。冬青

藥。七月收。旱蓮搗汁和藥。即不用蜜矣。子不

以多少。搗汁熬膏。淨瓶收。

固埋地中。七月。每用點眼。

葉性平。味微苦。主治除風散血。消腫定疼。頭目昏痛。諸惡瘡腫。疔瘡潰爛。久者以水煮。乘熱貼之。頻頻換易。米醋亦可。口舌生瘡。舌腫脹出。搗汁含浸吐涎。

附方風熱赤眼普濟方。用冬青葉五斗。搗汁。浸新磚數片。五日。搗坑架磚于內。蓋之。日久生霜。

刮下。入腦子少許點之。簡便方。用雅州黃連。一切眼二兩。冬青葉四兩。水浸三日。夜熬成膏。收點眼。

疾冬青葉研爛。入朴硝貼之。海上方也。

冬青又名凍青。以冬月青翠故名。已詳女貞下。五月開細白花。結子如豆大。紅色。其嫩芽燻熟。水浸去氣味。淘洗。五味調之。

可作蔬茹。子及木皮。性涼。味甘苦。浸酒去風虛。補益

肌膚皮之功同。

葉燒灰入面膏。治瘡。滅癥痕。殊效。

〔附方〕痔瘡

冬至日。取凍青樹子。鹽酒浸一夜。九蒸九晒。麩收。每日空心酒吞七十粒。臥時再服。

枸骨

又名猫兒刺。以葉有五刺。如猫之形。故名。樹如女貞。肌理甚白。葉長二三寸。青翠而厚硬。四時不凋。子熟

紅色。皮薄味甘。核有四瓣。

木皮性涼。味微苦。浸酒補腰脚令健。

〔枝葉〕燒灰淋汁。或煎膏塗白癩風。

七里香

綱目作山攀。又有芸香。旋花柘花。瑤花。春桂。諸名。生山野中。葉似卮子。凌冬不凋。三月開花。繁白如

雪。六出。黃蕊。甚芬香。結子大如椒。青黑色。熟則黃色。可食。其葉味濇。人取染黃。及收豆腐。或雜入茗中。

〔葉〕主治久痢。止渴殺蟲。蠹用三十片。用老薑三片浸水

蒸熱。洗爛弦風眼。

石南

一名風藥。生于石間。向陽之處。桂陽呼名。葉性平。味辛。為風藥。充茶及浸酒飲。能愈頭風。故名。

苦。主治養腎氣。內傷陰衰。利筋骨。皮毛。療脚弱。五臟邪。

氣除熱。女子久服動淫念。能添腎氣。治煩悶。夜浸酒飲。

治頭風。

附方鼠瘻不合

石南生地黃茯苓黃丹雌黃等分為散。日再傅之。

小兒通睛

小兒

誤跌。或打着頭腦受驚。肝系受風。致瞳人不正。觀東則

見西。觀西則見東。宜石南散吹鼻通頂。石南一兩。藜蘆

三分。瓜丁五七箇為末。每吹少許。

乳石發動

煩熱。石南入鼻。一日三度。內服牛黃平肝藥。為末。新汲

水服一錢。

子主治蟲蠱毒。破積聚。逐風痺。

黃荆

綱目作牡荆。一名小荆。又名楚。古人用為刑杖。故名。處處山野有之。樵采為薪。年久樹大如盤。其木心方。

其枝對生。一枝五葉。或七葉。葉如榆葉。長而尖。有鋸齒。

五月杪間開花成穗。紅紫色。其子大如胡妥子。有白膜。

皮裹之。古者貧婦以荆為釵。即此。斗樞云。玉衡星散而為荆。

子性溫。味苦。主治除骨

間寒熱。通利胃氣。止欬逆。下氣。同栢實。青菖朮。療風。炒焦爲末。飲服。治心痛。及婦人白帶。用半升炒熟。入酒一盞煎一沸。熱服。治小腸疝氣甚效。浸酒飲。治耳聾。

附方 濕痰白濁 牡荊子炒爲末。每酒服二錢。

葉性寒 味苦 主治久病霍亂轉筋。血淋。下部瘡。濕躡薄

脚主脚氣腫滿 脚氣諸病。用荊莖干。罈中燒。燻湧泉穴。及痛處。汗出卽愈。 解蛇毒 毒蛇

望板歸螫傷。滿身紅腫發泡。用黃荊嫩頭搗汁塗泡上。渣益蛇咬處卽消。

附方 九竅出血 荊葉搗汁酒和服二合。 小便尿血 荊葉汁酒服二合。

根性平 味甘辛 水煮服。治心風頭風。肢體諸風。解肌發

汗。 一人病風數年。用七葉黃荊根皮。五加根皮。接骨草等分煎湯。日服遂愈。

荆莖

即今荆杖也。八月十月采陰乾。

治灼瘡發熱。焮瘡有效。同荆芥草

撥煎水。漱風牙痛。

附方 青盲內障

春初取黃荆嫩頭。九蒸九曝。半筋。用烏雞一隻。以米飼五日。安淨板上。飼以大

麻子二三日。收糞乾入瓶內熬黃。和荆頭為末。煉蜜丸。梧子大。每服十五丸。至二十九。陳米飲下。日二。

荆瀝

用新采荆莖。截尺五長。架于兩磚上。性平。味甘。飲中間燒火炙之。兩頭以器承取熱服。

之去心悶煩熱。頭風旋運目眩。心頭澆澆欲吐。卒失音

除風熱。開經絡。導痰涎。行氣血。解熱痢。小兒心熱驚癇

止消渴。令人不睡。

凡患風人多熱。常宜以竹瀝荆瀝薑汁。合五合。和勻熱服。秘錄云。熱多用

竹瀝。寒多用荆瀝。二瀝同功。並以薑汁助送。則不凝滯。但氣虛不能食者。用竹瀝氣實能食者。用荆瀝。

附方 中風口噤

荆瀝每兩。頭風頭痛。荆瀝日服之。喉痺瘡腫。荆瀝

細細嚙之或以荆一握水煎服之。目中卒痛燒荆木取黃心虛驚悸黑

者荆歷二升火煎至一升者荆歷赤白下痢五六年者荆歷濕

六合分作四服日三夜一者荆歷

蔓荆苗莖蔓生小子打碎用性微寒味苦辛主治明目堅

齒利九竅筋骨間寒熱拘攣風頭疼腦鳴目赤淚出睛

肉作痛太陽頭疼頭沉昏悶利關節治癩疾搜肝風涼

諸經血長髭髮去白蟲久服輕身耐老小荆實亦同

附方令髮長黑蔓荆子熊脂等分醋調塗之頭風作痛蔓荆子一升

一斗酒中七日溫飲日三次乳癰初起蔓荆子炒為末酒

石荆似荆而小燒灰淋汁浴頭生髮令長

紫荆

又名紫珠皮名肉紅木似黃荆而色紫故名處處有之即田氏之荆也人多種于庭院高樹柔枝花紫而

繁歲二三開其皮人藥以木并皮性寒味苦主治活血川中厚紫味苦辛者佳

行氣消腫解毒下五淋通小腸治婦人血氣疼痛經水

凝滯解諸毒物癰疽喉痺下蛇蟲犬毒並煮汁服亦以

汗洗瘡腫除血長膚

楊清叟仙傳冲和膏治一切癰疽發背流注諸腫毒冷熱不明者用

紫荆皮炒三兩獨活去節炒三兩赤芍炒二兩白芷一兩木蠟炒一兩為末以葱湯調熱敷血得熱則行葱能

散氣瘡不甚熱者酒調傅之痛甚者筋不伸者加乳香其效如神

附方婦人血瘦

紫荆皮為末醋糊丸櫻桃大每酒化服一九

鶴膝風攣

紫荆皮三

錢老酒煎

傷眼青腫

紫荆皮小便浸七日晒研用生地黃汁薑汁調傅不腫用葱汁良

獬犬咬傷

紫荆皮末沙糖調塗留口退腫口中仍嚼嚙杏仁去毒

鼻中疔瘡

紫荆皮

乾為末。發背初生。一切癰疽皆治。單用紫荊皮為末。酒貼之。

子乃救貧。良劑也。癰疽未成。用白芷紫荊皮等分為末。酒調服。外用紫荊皮木蠟赤芍藥等分為

末。酒調。痔瘡腫痛。紫荊皮五錢。新產後諸淋。紫荊皮五錢。半酒半

水煎。溫服。

扶桑

又有佛桑。朱槿。赤槿。日及。諸名。產南方。乃木槿別種。枝柯柔弱。葉綠如桑。其花有紅黃白三色。紅者猶貴。

開最長久。葉及花。性平。味甘。主治癰疽腮腫。取葉或花。插樹即活。

同白芙蓉。葉。牛旁。葉。白蜜。研膏。傅之。即散。

木芙蓉

又有地芙蓉。木蓮華。木柈。木音化。拒霜。諸名。花艷如荷。故有芙蓉。木蓮之名。八九月始開。故名。拒霜

處處有之。插條即生。小木也。叢生如荆。高者丈許。葉大如桐。有五尖及七尖者。冬凋夏茂。秋半始花。有紅黃白

三色。及千葉者。最耐寒而不落。皮可為索。霜時採花。霜後採葉。陰乾用。葉并花。性平。味微

辛。主治清肺涼血散熱解毒。治一切大小癰疽腫毒惡

瘡。消腫排膿止痛。

瘍醫秘其名為清涼散。清露散鐵籠散。皆此也。治一切癰疽發背。乳癰惡

瘡。不狗已成未成。已穿未穿。並用葉。或花。或根皮。或生研。或乾研末。以蜜調塗于腫處。四圍中間留頭。乾則頻換。初起者即覺清涼。痛止腫消。已成者即膿聚毒出。已穿者即濃出易斂。妙不可言。或加生赤小豆末尤妙。

附方 久欬羸弱

九尖拒霜葉為末。以魚鮮蘸食屢效。

赤眼腫痛

芙蓉葉末水和貼太

陽穴。名經血不止

拒霜花。蓮蓬殼。等分為末。每用米飲下二錢。

偏墜作痛

芙蓉

葉。黃蘗各三錢為末。以木鱉子仁一箇磨醋調塗陰囊。其痛自止。即愈。

杖瘡腫痛

芙蓉花葉研末。

入皂角末少許。雞子清調塗之。

癰疽腫毒

重陽前取芙蓉葉研末。端午前取蒼耳燒存性研末。等分

蜜水調塗四圍。其毒自不走散。名鐵井關。

疔瘡惡腫

九月九日采芙蓉葉。陰乾為末。每以井水調貼

次日用蚰蜒螺一箇搗塗之。

頭上癩瘡

芙蓉根皮為末。香油調傅。湯先以松毛柳枝煎湯洗之。

火灼傷油調芙蓉末傳之。

灸瘡不愈芙蓉花研末傳之。

一切瘡腫木芙蓉葉

菊花葉同煎水。頻熏洗之。

山茶

其葉如茶。又可作飲。故名。產南方。樹高丈許。枝幹交加。深冬開花。花有數種。寶珠茶花簇如珠。海榴茶蒂

青。石榴茶中有碎花。躑躅茶如杜鵑花。皆紅瓣黃蕊。官粉茶。串珠茶。皆粉紅色。又有一捻紅。千葉白等名。不可勝數。亦有黃者。周憲王救荒本草云。嫩葉煉熟。水淘可食。亦可蒸晒作飲。

風下血。並用紅者為末。入童便薑汁及酒調服。可代鬱

金。如湯火傷。研末麻油調塗。

子治婦人髮臃。研末摻之。

蠟梅

又名黃梅花。本非梅類。因其與梅同時。香又相近。色似蜜蠟。故名。凡三種。以子種出。不經接者。開花小而

尖。香淡。名狗蠅梅。經接花開圓而含口者。名磬口梅。花密。香濃。色深黃。如紫檀香。名檀香梅。最佳。結子如乘鈴。

尖長寸餘。其樹皮浸水磨墨。有光彩。花性溫味辛。主治解暑。止渴生津。

隔虎刺花

綱目作伏牛花。所在皆有。葉青細莖多刺。花性凌冬不凋。花淡黃白色。三月采。陰乾用。

平。味苦甘。主治久風濕痺。四肢拘攣。骨肉疼痛。作湯治

風眩頭痛。五痔下血。

根葉枝。主治一切腫痛風疾。細剉焙研。每服一錢。七溫

酒調下。

密蒙花

又名水錦花。花繁密如錦。故名。凡用揀淨。酒浸一宿。蜜拌蒸。

性平。味甘。主治青

盲膚翳。赤腫多眵淚。消目中赤脉。小兒麩豆。及疔氣攻

眼。羞明怕日。入肝經氣血分。潤肝燥。

附方 目中障翳

密蒙花。黃蘗根。各一兩。為末。水丸。子大。每臥時湯服十九。至十五丸。

木綿

又有古貝古終二名。有草木二種。交廣木綿樹大如抱。其枝似桐。其葉大如核桃葉。入秋開紅花黃蕊。結

實大如拳。中有白綿。綿中有子。今人謂之斑枝花。訛為

攀枝花。江南淮北所種木綿。四月下種。莖如蔓。葉三尖

如楓葉。高僅三四尺。入秋開黃花。亦有紅紫者。結實大

如核桃。中有白綿。綿中有子。子可榨油。綿可作布。亦可

作絮。其利甚大。白綿及布。性溫味甘。主治血崩金瘡燒灰用。

子油。性溫味辛。主治惡瘡疥癬。燃燈損目。

鑿子木

綱目作柞木。以其堅可為鑿柄。故名。處處山中有之。今之假黃楊木作梳者。是也。其木心理皆白色。

木皮。性平味苦酸澆。主治催生利竅難產鼠瘻黃疽疔

燒末水服方寸七日三。

附方

鼠瘻

柞木皮五升。水一斗。煮汁二升服。當宿肉出而瘻乃張。子仁秘方也。

婦人難

產

催生柞木飲。不拘橫生倒產。胎死腹中。用此屢效。乃上蔡張不愚方也。用大柞木枝一尺。洗淨。大目草五

寸。並寸折。以新汲水三升半。同入新沙餅內。以帛三重緊封。文武火煎至一升半。待腰復重痛。欲坐草時。溫飲一小盞。便覺下開豁。如渴。又飲一盞。至三四盞。下重便生。更無諸苦。切不可坐草太早。及生婆亂為也。

葉主治腫毒癰疽。

附方柞木飲

治諸般癰腫發背。用乾柞木葉。乾荷葉中。心蒂。乾萱草根。甘草節。地榆各四兩。細剉。

每用半兩。水二盞。煎一盞。早晚各一服。已成者。其膿血自漸乾涸。未成者。其毒自消散也。忌一切飲食毒物。

黃楊木

人家多栽插之。枝葉攢簇上聳。葉似初生槐芽。而青厚。四時不凋。其性難長。歲長一寸。木性堅膩。可

作梳。剉印。凡取此木。必以陰晦無一星夜伐之。則不裂。葉性平。味苦。主治婦人難

產。入達生散中用。又主暑月生癩。搗爛塗之。

不凋木

樹高二三尺。葉似槐。莖赤。有毛如棠梨。四時不凋。性溫。味苦。主治調中補

衰。治腰脚去風氣。却老變白。

木天蓼

樹高。味辛如蓼。故名。有三種。而功用彷彿。蓋一也。也。其子可為燭。其芽可食。陸機云。木蓼為燭。明如

胡麻。薛田詠蜀詩。有地丁葉嫩。和嵐采。天蓼芽新入粉煎之句。枝葉性溫味辛。有小毒

主治癥瘕積聚。風勞虛冷。細切釀酒飲

附方天蓼酒

治風立有奇效。木天蓼一觔。去皮細剉。以生絹盛入好酒三斗。浸之。春夏一七。秋冬

二七日。每空心。日午。下晚。各溫一盞。飲。若常服。以飲一次。老幼臨時加減。氣痢不止。百五日

採木蓼暴乾。用時為末。粥飲服一錢。大風白癩。天蓼刮去粗皮。剉四兩。水

粥。空心食之。病在上。吐。出在中。汗。出在下。泄。出。避風。又方。天蓼三觔。天麻一觔半。生剉。以水三斗五升。煎一

斗去滓。石器慢煎如餲。每服半匙。荆芥薄荷酒下。日二夜一。一月見效。

小天蓼性溫味甘。主治一切風虛羸冷。手足疼痛。無論老

幼輕重。浸酒及煮汁服之。十許日。覺皮膚間風出如蟲

行。

子性微熱。味苦辛。主治賊風。口面喎斜。冷痰。瘕氣。塊女。子虛勞。

根主治風蟲牙痛。搗丸塞之。連易四五次。除根。勿嚙汁。

放杖木樹如木天蓼。老人服之。一月放杖。故名。性溫。味甘。主治一切風血。理

腰脚。輕身。變白。不老。浸酒用。

接骨木又名續骨木。以功故名。花葉都類蒴藋。水芹輩。又名木蒴藋。樹高一二丈許。木體輕虛無心。斫枝并

之便活人亦種之。性平。味甘苦。搗汁吐人。有小毒。主治折傷。續筋骨。除

風痺。齧齒。可作浴湯。根皮主痰。飲下水腫。及痰瘧。煮汁服之。當利下。及吐出。不可多服。打傷瘀血。及產婦惡血。

一切血不行。或不止。並煮服。

附方 折傷筋骨

接骨木半兩。乳香半錢。芍藥當歸芍藥。自然銅各一兩。為末。化黃蠟四兩。投藥

攪勻。衆手托如芡子大。若止傷損。酒化。產後血運五心

一丸。若碎折筋骨。先用此傅貼。乃服。氣力欲絕。及寒熱不禁。以接骨木破如算子一握。用水

一升。煎取半升。分服。或小便頻數。惡血不止。服之即瘥。此木煮之三次。其力一般。乃起死妙方。

葉 主治痰瘧。大人七葉。小兒三葉。生搗汁服。取吐。

靈壽木

又名扶老杖。漢書孔光年老。賜靈壽杖。顏書古註云。木似竹。有節。長七八尺。自合杖制。不須削理。令

人益。根皮性平。味苦。主治止水。

榕木

音忽。生江南山谷。高丈餘。樹頂生葉。直上無枝莖。上多刺。人折取頭。茹食。謂之吻頭。又名鵲。不踏。以其多

刺。無枝也。白皮。性平。味辛。有小毒。主治水瘡。煮汁服。一盞。當

下水。如病已困，取根搗碎，坐之，取水氣自下。又能爛人

牙齒有蟲者，取片許納孔中，當自爛落。

木麻

生江南山谷林澤，葉似胡麻相對，人取以釀酒飲。

性溫味甘，主治老血，婦人

月閉，風氣羸瘦癥瘕，久服令人有子。

長松

一名仙茆，其葉如松，服之長年，故名。生古松下，根色如薺萇，長三五寸，味甘微苦，類人參，清香可愛，僧晉

明患大風，哀若不堪，遇異人，教服長松，示其形狀，明採服之，旬餘病全癒，神倍旺。根性溫味甘。

主治大風惡疾，脊髮墮落，百骸腐潰，每以一兩，入甘草

少許煎服，旬日即愈。又治風血冷氣宿疾，溫中去風，解

諸蟲毒，補益長年。

附方長松酒

滋補一切風虛，乃廬山休休子所傳。長松一兩，伍錢，狀似獨活而香，乃酒中聖藥也。

熟地黄八錢。生地黄黃芪蜜炙陳皮各七錢。當歸厚朴黃蘗各五錢。白芍藥煨人參枳殼各四錢。蒼朮米泔制半夏制。天門冬麥門冬砂仁黃連各三錢。木香蜀椒胡桃仁各二錢。小紅棗肉八箇。老米一撮。燈心五寸長。一百二十兩。一料分十劑。絹袋盛之。凡米五升。造酒一尊。煮一袋。嘗久乃飲。

赤箭天麻

又名赤箭芝。獨搖芝。定風草。離母。合離草。神草。鬼督郵。諸名。時珍曰。本經止有赤箭。後人稱爲

天麻。甄權藥性論云。赤箭芝一名天麻。本自明白。後人重出天麻。遂多分辨耳。上品五芝之外。有赤箭芝。爲補

益上藥。世人惑于僅治風之說。良可惜哉。其根晒乾。肉色堅白。如羊角色。爲羊角天麻。蒸過黃皺如乾瓜。爲醬

瓜天麻。皆可用。一種形尖而空。薄油黑者。不堪用。抱朴子云。獨搖芝。生高山深谷之處。所生左右無草。其莖大

如手指。赤如丹素。葉似小莧。根有大魁如斗。有細者十

二枚繞之。有緣人得大者。服之延年。按此乃天麻一種。神異者。如神參也。性平。味甘微辛。性氣和緩。經曰。肝苦急。以甘

緩之。用此以緩肝氣。蓋肝屬木。膽屬風。若肝氣不足。致

肝急堅勁。不能養胆。則膽腑風動。如天風之鼓蕩。為風木之氣。故曰諸風掉眩。皆屬肝木。由肝膽性氣之風。非外感天氣之風也。是以肝病則筋急。用此甘和。緩其堅勁。乃補肝養膽。為定風神藥。若中風。風痲驚風。頭風眩暈。皆肝膽風症。悉以此治。若肝勁急甚。用黃連清其氣。又取體重降下。味薄通利。能利腰膝。條達血脉。諸風熱滯。于關節者。此能舒暢。凡血虛有風之神藥也。

濕紙製煨軟切

片。飯上蒸軟亦可。

附方天麻丸

消風化痰。清利頭目。寬胸利膈。治心忪頭悶。頭運欲倒。項急肩背拘倦。神昏多睡。肢節煩痛。皮膚瘙癢。偏正頭痛。鼻鼾。面目虛浮。並宜服之。

天麻半兩。芎藭二兩。為末。煉蜜丸。如芡子大。每食後服。

一丸茶。腰脚疼痛。天麻半夏細辛各二兩。絹袋二箇。各酒任下。蒸熱交互熨。痛處汗出則愈。數日再熨。

還筒子 天麻子從莖中落入故名 主治定風補虛功同天麻。

附方 **益氣固精** 補血黑髮益壽有奇效。還筒子半兩。芡實半兩。金銀花二兩。破故紙酒浸。春三

夏一。秋二。冬五日。焙末二兩。各研末。蜜糊丸。梧子大。每服五十九。空心鹽湯溫酒任下。鄭西泉所傳方。

木 有蒼白之分。又有山薊。楊枹。枹薊。馬薊。山薷。山連。吃力。伽諸名。李時珍曰。蒼朮。山薊也。處處山中有之。苗高二

三尺。嫩采作飲。香美。其葉抱莖而生。稍間。葉似棠梨葉。其脚下葉有三五。又皆有鋸齒小刺。根如老薑狀。蒼黃

色。有油膏。白木。枹薊也。吳越有之。取根栽蒔。一年即稠。嫩苗可茹。葉稍大而毛。根如指大。或如拳。或如雞腿。

剖開晒乾用。取乾白者佳。油黑者不用。 **白木性微溫。味微苦。帶辛。** 用米泔浸去粗

皮切片。同陳壁土炒。飯上多蒸數時用。或以人乳潤蒸亦佳。忌桃李雀肉。青魚菘菜。 **取其辛燥濕**

者佳。油黑者不用。 **白木性微溫。味微苦。帶辛。** 用米泔浸去粗

者佳。油黑者不用。 **白木性微溫。味微苦。帶辛。** 用米泔浸去粗

苦潤脾燥之潤之。脾斯健旺。脾屬濕土。土無水澤則不
滋潤。非專宜燥。經曰。脾苦濕。為太濕則困滯。然過燥亦
乾裂。此以辛燥脾實以苦潤脾。主治風寒濕痺。胸膈痰
痞。噎氣吞酸。惡心嘈雜。霍亂嘔吐。水腫脾虛。寒濕腹痛
瘡疾。胎產能使脾氣健運。正氣勝而邪氣自却也。且潤
脾益胃。則飲食健旺。氣血滋生。痘瘡貫膿。助漿滿聖藥。
凡鬱結氣滯。脹悶積聚。吼喘壅塞。胃痛由火。癰疽多膿。
黑瘦人氣實作脹。皆所忌用。

附方 枳朮丸

消痞強胃。久服令人食自不停也。白朮一兩。黃芩土炒。過去土。枳實麩炒。去麩。一兩。

為末。荷葉包飯燒熟。搗和丸。梧子大。每服五十九。白湯下。氣滯加橘皮一兩。有火加黃連一兩。有痰加半夏一

兩有寒加乾薑五錢木香三錢有食加神麩麥蘖各五錢

枳木湯 心下堅大如盤邊如旋盃水飲所作

中氣不足則手足厥逆腹滿脅鳴相逐陽氣不通即水

陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛

升煮三升分三服胸中白木膏 服食滋補止久泄痢上

軟即散仲景金匱玉函白木膏 好白木十觔切片入瓦

鍋內水淹過二寸文武火煎至一半傾汁入器內以渣

再煎如此三次乃取前後汁同熬成膏入器中一夜傾

去上面清水收之每參木膏 治一切脾胃虛損益元氣

服二三匙蜜湯調下 以流水十五碗浸一夜桑柴文武火煎取

枳木湯

心下堅大如盤邊如旋盃水飲所作

中氣不足則手足厥逆腹滿脅鳴相逐陽氣不通即水

陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛

升煮三升分三服胸中白木膏 服食滋補止久泄痢上

軟即散仲景金匱玉函白木膏 好白木十觔切片入瓦

鍋內水淹過二寸文武火煎至一半傾汁入器內以渣

再煎如此三次乃取前後汁同熬成膏入器中一夜傾

去上面清水收之每參木膏 治一切脾胃虛損益元氣

服二三匙蜜湯調下 以流水十五碗浸一夜桑柴文武火煎取

濃汁熬膏入煉蜜收之每以白湯點服 胸膈煩悶 木

末水服 心下有水

白木三兩葶藶五兩水五飲酒癖 留

飲水停心下 二癖飲水在兩脅下 三痰飲水在胃中 四

溢飲水在五臟間 五流飲水在腸間 皆因飲食冒寒或

飲茶過多致此 倍木丸用白木一觔乾薑炮桂心 四肢

各半觔為末 蜜丸梧子大每溫水服二三十丸

腫滿白木三兩改咀每服半兩水一盞半大棗中風口

噤不知人事白木四兩酒三升產後中寒遍身冷直口噤不識人白木一兩澤

瀉一兩生薑五錢頭忽眩運經久不瘥四體漸羸飲食無味好食黃土用木三觔

水一升煎服良頭忽眩運濕氣作痛白木切

麴三觔搗篩酒和九梧子大每飲服濕氣作痛片煎汁

熬膏白中濕骨痛木一兩酒三盞煎一盞婦人肌熱血

湯點服者吃力伽散用白木白茯苓白芍藥小兒蒸熱脾虛羸瘦不能

各一兩甘草半兩為散薑棗煎服小兒蒸熱面多黧黯雀卵色苦

飲食方同上風瘙癢疹白木為末酒服面多黧黯雀卵色苦

日拭之極效白汗不止白木末飲服方脾虛盜汗白木四兩

兩同牡蠣炒一兩同石斛炒一兩同麥麩炒老小虛

木為末每服三錢食遠粟米湯下日三服之老小虛

汗白木五錢小麥一撮水煮乾產後嘔逆白木一兩二

去麥為末用黃耆湯下一錢產後嘔逆別無他疾者

錢。生薑一兩五錢。酒水各二升。煎一升。分三服。脾虛脹滿。脾氣不和。冷氣客于

滿。寬中丸。用白朮二兩。橘皮四兩。為末。酒糊丸。梧子大。每食前。木香湯下三十九。甚效。脾虛洩瀉

白朮五錢。白芍藥一兩。冬月用肉豆蔻煨。為末。米飲丸。梧子大。每米飲下五十九。日二服。濕瀉暑瀉

白朮車前子等分。炒為末。白湯下二三錢。久瀉滑腸。白朮炒。茯苓各一兩。糯

拌食。或老小滑瀉。白朮半觔。黃土炒過。山藥四兩。炒為丸。服之。或加人參

三錢。老人常瀉。白朮二兩。黃土拌蒸。焙乾。去土。蒼朮五錢。米泔浸炒。茯苓一兩。為末。米糊丸。梧子大。

每米湯下七八十丸。小兒久瀉。脾虛米穀不化。不進飲食。溫白丸。用白朮炒二錢。半夏麴二錢。半。

丁香半錢。為末。薑汁麴糊丸。瀉血萎黃。腸風痔漏。脫肛。黍米大。每米飲。隨大小服之。瀉血。面色萎黃。

積年不瘥者。白朮一觔。黃土炒過。研末。乾地黃半觔。飯上蒸熟。搗和。乾則入少酒。丸。梧子大。每服十五丸。米飲

下。日服。孕婦束胎。白朮枳殼。麩炒等分。為末。燒飯丸。梧子大。一月一日。每食前。溫水下三十九。胎

瘦則易產也。易牙齒日長。漸至難食。各髓溢病。白木煎湯。漱服。取效。即愈也。

蒼朮又有赤朮。山精。仙木。山薊。諸名。取細實。南產者良。茅山尤佳。用糯米汁浸透。去粗皮。并油切片。焙乾。

脂麻拌炒。或以米粉。或糠拌炒。亦可。性溫而燥。味辛。微苦辛。主散燥去濕。

專入脾胃。主治風寒濕痺。山嵐障氣。皮膚水腫。皆辛烈

逐邪之功也。統治三部之濕。若濕在上焦。易生濕痰。以

此燥濕行痰。濕在中焦。滯氣作瀉。以此寬中健脾。濕在

下部。足膝痿軟。以此同黃柏治痰。能令足膝有力。取其

辛散氣雄。用之散邪發汗。極其暢快。合六神散。通解散。

治春夏濕熱病。佐葛根解肌湯。表散瘧疾初起。若熱病

汗下後。虛熱不解。以此加入白虎湯。再解之。一服如神。

汗止身涼。繆仲淳用此一味為末。治脾虛蠱脹。妙絕。稱為仙木。

附方服朮法

烏髭髮。駐顏色。壯筋骨。明耳目。除風氣。潤肌膚。久服令人輕健。蒼朮不計多少。米泔

水浸三日。逐日換水。取出刮去黑皮。切片暴乾。慢火炒黃。細擣為末。每一觔。用蒸過白茯苓末半觔。煉蜜和丸。梧子大。空心臥時熱水下十五丸。別用木末六兩。甘草末一兩。拌和作湯點之。吞丸尤妙。忌桃李雀蛤。及三白諸血。蒼朮膏。鄧才筆。鋒雜興方。除風濕。健脾胃。變白。駐顏。補虛損。大有功效。蒼朮新者刮去皮薄切。米泔水浸二日。一日一換。取出。以井華水浸過二寸。春秋五日。夏三日。冬七日。漉出。以生絹袋盛之。放在一半原水中。揉洗津液出。紐乾。將渣又搗爛。袋盛于。一半原水中。揉至汁盡為度。將汁入大砂鍋中。慢火熬成膏。每一觔。入白蜜四兩。熬二炷香。每膏一觔。入水澄白茯苓末半觔。攪勻。瓶收。每服三匙。侵早臨臥各一服。以溫酒送下。忌醋及酸物。桃李雀蛤。菘菜青魚等物。吳球活人心統。蒼朮膏。治脾經濕氣。少食足腫無力。傷食。酒色過

度勞逸有傷。骨熱用鮮白蒼朮二十觔。浸刮去粗皮。晒切。以米泔浸一宿。取出。同溪水一石。大砂鍋慢火煎半乾。去渣。再入石南葉三觔。刷去紅衣。楮實子一觔。川當歸半觔。甘草四兩。切。同煎黃色。漉去渣。再煎如稀粥。乃

入白蜜三觔。熬成膏。每服三五錢。空心好酒調服。

蒼朮丸

陸謙齋瑞竹堂方云。清上實下。兼治內外

障眼。茅山蒼朮。洗刮淨。一觔。分作四分。用酒醋糯米童

尿各浸三日。一日一換。取出洗搗。晒焙。以黑脂麻同炒

香共為末。酒煮麩糊丸。梧子大。每空心白湯下五十九

李仲南永類方。入制蒼朮丸。疎風順氣。養腎治腰脚濕

氣痺痛。蒼朮一觔。洗刮淨。分作四分。用酒醋米泔鹽水

各浸三日。晒乾。又分作四分。用川椒紅茴香補骨脂黑

牽牛各一兩。同炒香。揀去不用。只取末。研末。醋糊丸。梧

子大。每服五十九。空心鹽酒送下。五十歲後加沉香末

一兩。蒼朮散。治風濕常服。壯筋骨明目。蒼朮一觔。粟米泔

童子小便浸。春五。夏三。秋七。冬十日。取出。淨地上搗一

坑。炭火煨赤。去炭。將浸藥酒傾入坑內。却放木在中。以

瓦器蓋定。泥封一宿。取出為末。每服一錢。空心溫酒。或

鹽湯下。萬表積善堂方。六制蒼朮散。治下元虛損。倍

鹽湯下。

萬表積善堂方。六制蒼朮散。治下元虛損。倍

墜莖痛。茅山蒼朮淨刮六觔。分作六分。一觔倉米泔浸

二日炒。一觔酒浸二日炒。一觔青鹽半觔炒黃去鹽。一

觔小茴香四兩炒黃去茴。一觔大茴香四兩炒黃去茴

一觔用桑椹子汁浸二日炒。取木為末。每服三錢。空心

溫酒。固真丹。瑞竹堂方。固真母。燥濕養脾。助胃固真。茅

下。兩炒。一分川椒。一兩炒。一分川棟子。一兩炒。一分小茴

香破故紙各一兩炒。並揀木研末。酒煮麩糊丸。梧子大。

每空心米飲下五十九。乾坤生意平補固真丹。治元

臟久虛。遺精白濁。婦人赤白帶下。崩漏。金州蒼朮刮淨

一觔。分作四分。一分川椒。一兩炒。一分破故紙。一兩炒。

一分茴香。食鹽各一兩炒。一分川棟肉。一兩炒。取淨木

為末。入白茯苓末二兩。酒洗當歸末二兩。酒

黃麩糊丸。梧子大。每空心鹽酒下五十九。固元丹。治

臟久虛。遺精白濁。五淋及小腸膀胱疝氣。婦人赤白帶

下。血崩。便血等疾。以小便頻數為效。好蒼朮刮淨。一觔

分作四分。一分小茴香。食鹽各一兩同炒。一分川椒。補

骨脂各一兩同炒。一分川烏頭。川棟子。肉各一兩同炒。

一分用醇醋老酒各半觔。同煮乾焙。連同炒。藥通為末。

用酒煮糊丸。梧子大。每服五十九。男以溫酒。女以醋湯

用酒煮糊丸。梧子大。每服五十九。男以溫酒。女以醋湯

用酒煮糊丸。梧子大。每服五十九。男以溫酒。女以醋湯

山月本草卷五
空。心。下。此。高。少。陽。丹。蒼。木。米。泔。浸。半。日。刮。皮。晒。乾。為。末。司。法。方。也。

一。觔。熟。桑。椹。二。十。觔。入。瓦。盆。揉。爛。絹。袋。壓。汁。和。末。如。糊。傾。入。盤。內。日。晒。夜。露。采。日。精。月。華。待。乾。研。末。煉。蜜。和。丸。

赤。小。豆。大。每。服。二。十。丸。無。灰。酒。下。日。交。感。丹。補。虛。損。固。三。服。一。年。變。髮。返。黑。三。年。面。如。童。子。

髮。此。鐵。甕。城。申。先。生。方。也。久。服。令。人。有。子。茅。山。蒼。木。刮。淨。一。觔。分。作。四。分。用。酒。醋。米。泔。鹽。湯。各。浸。七。日。晒。研。川。

椒。紅。小。茴。香。各。四。兩。炒。研。陳。米。糊。丸。交。加。丸。升。水。降。火。梧。子。大。每。服。四。十。丸。空。心。溫。酒。下。

木。刮。淨。一。觔。分。作。四。分。一。分。米。泔。浸。炒。一。分。鹽。水。浸。炒。一。分。川。椒。炒。一。分。破。故。紙。炒。黃。蘗。皮。刮。淨。一。觔。分。作。四。

分。一。分。酒。炒。一。分。童。尿。浸。炒。一。分。小。茴。香。炒。一。分。生。用。揀。去。各。藥。只。取。木。蘗。為。末。煉。蜜。丸。梧。子。大。每。服。六。十。丸。

空。心。鹽。坎。離。丸。茲。陰。降。火。開。胃。進。食。強。筋。骨。去。濕。熱。白。湯。下。蒼。木。刮。淨。一。觔。分。作。四。分。一。分。川。椒。一。

兩。炒。一。分。破。故。紙。一。兩。炒。一。分。五。味。子。一。兩。炒。一。分。川。芎。藭。一。兩。炒。只。取。木。研。末。川。蘗。皮。四。觔。分。作。四。分。一。觔。

酥。炙。一。觔。入。乳。汁。炙。一。觔。童。尿。炙。一。觔。米。泔。炙。各。十。二。次。研。末。和。勻。煉。蜜。丸。梧。子。大。每。服。三。十。丸。早。用。酒。午。川。

茶晚用白不老丹補脾益腎服之七十亦無白髮茅山

湯送下。蒼朮刮淨米泔浸軟切片四觔一觔

酒浸焙一觔醋浸焙二觔鹽四兩炒一觔散四兩炒赤白

何首烏各二觔泔浸竹刀刮切以黑豆紅棗各五升同

蒸至豆爛曝乾地骨皮去骨一觔各取淨末以桑椹汁

和成劑鋪盆內汁高三指日晒夜露取日月精華待乾

以石臼搗末煉蜜和丸梧子大每空靈芝丸治脾腎氣

心酒服一百丸此皇甫敬之方也虛添補精

髓通利耳目蒼朮一觔米泔水浸春夏五月秋冬七日

逐日換水竹刀刮皮切晒石白為末棗肉蒸和丸梧子

大每服三五十補脾滋腎生精強骨真仙方也蒼朮去

丸棗湯空心服皮五觔為末米泔水漂澄取

底用脂麻二升半去殼研爛絹袋濾去渣澄面黃食少

漿拌木曝乾每服三錢米湯或酒空心調服熟地黃半觔乾薑

男婦面無血色食少嗜臥蒼朮一觔熟地黃半觔乾薑

炮各一兩春秋七錢夏五錢為末糊丸梧子大每溫水

下五小兒癖疾蒼朮四兩為末羊肝一具竹刀批開撒

食生米男子婦人因食生熟物留滯腸胃遂至生蟲久

則好食生米否則終日不樂至憔悴萎黃不思

飲食以害其生。用蒼朮米泔水浸一夜。剉焙為末。蒸餅丸。梧子大。每服五十九。食前米飲下。日三服。益昌伶人

劉清嘯。一娼名曰花翠。年逾笄。病此。惠民局監趙尹。以此治之。兩旬而愈。蓋生米留滯腸胃。受濕則穀不磨。而成此疾。蒼朮能去

濕。暖胃消穀也。**腹中虛冷**。不能飲食。食輒不消。羸弱末。蜜丸。梧子大。每服三十九。米湯下。日三服。大冷

加乾薑三兩。腹痛加常歸三兩。羸弱加甘草二兩。**脾濕**

水瀉。注下。困弱無力。水穀不化。腹痛甚者。蒼朮二兩。白芍藥一兩。黃芩半兩。淡桂二錢。每服一兩。水一盞

半。煎一盞。溫服。脈弦頭微。**暑月暴瀉**。壯脾溫胃。飲食所痛。去芍藥。加防風二兩。**傷麴朮丸**。用神麴

炒。蒼朮米泔浸一夜。焙等分為末。糊**飧瀉久痢**。椒朮丸。丸。梧子大。每服三五十九。米飲下。

二兩川椒。一兩為末。醋糊丸。梧子大。每服**脾濕下血**。蒼朮

二十丸。食前溫水下。惡痢久者。加桂枝。**腸風下血**。蒼朮

二兩。地榆一兩。分作二服。水二盞。煎一**不**。蓋。食前溫服。久痢虛滑。以下桃花丸。多。少。以皂角按濃汁浸一宿。煮乾。焙研為末。麴糊**濕氣**

丸。如梧子大。每服五十九。空心米飲下。日三服。

身痛

蒼朮泔浸切水煎取濃汁熬膏白湯點服

補虛明目

健骨和血蒼朮泔浸四兩熟地黃焙

二兩為末酒糊丸梧子大每溫酒下三五十丸日三服

青盲雀目

聖惠用蒼朮四兩泔浸一夜切

焙研末每服三錢猪肝三兩批開摻藥在內札定入粟米一合水一碗砂鍋煮熟熏眼臨臥食肝飲汁不拘大人小兒皆治

焙搗為末每服一錢以好羊子肝一觔竹刀切破摻藥在內麻札以粟米泔煮眼目昏濇蒼朮半觔泔浸七日

熟待冷食之以愈為度眼目昏濇去皮切焙木賊各二兩為末每服一

錢茶酒任下嬰兒目濇膽不開或出血蒼朮二錢入猪

嚼取汁與服妙風牙腫痛性蒼朮鹽水浸過燒存臍蟲怪病如鐵

石臍中水出旋變作蟲行透身匝痒難忍撥掃不盡用蒼朮濃煎湯浴之仍以蒼朮末入麝香少許水調服

白頭翁

又有野丈人胡王使者柰何草諸名處處有之正月生苗作叢生葉生莖頭如杏葉上有細白毛而不滑澤近根有白茸其

苗有風則靜無風自搖主治溫瘧狂癡寒熱癥瘕積聚

瘦氣逐血。止腹痛。療金瘡鼻衄。止毒痢赤痢。腹痛齒疼。

百節骨痛。項下瘤癧。一切風氣。暖腰膝。明目消贅。

附方 白頭翁湯

治熱痢下重。用白頭翁二兩。黃連黃蘗秦皮各三兩。水七升。煮二升。每服一升。

不愈更服。婦人產後痢虛。極者加甘草阿膠各二兩。下痢咽腫。春夏病此。宜用白

木香二兩。水五升。煎一升半。分三服。陰癩偏腫。白頭翁根。生者不限多少。

十日愈。外痔腫痛。白頭翁草。一名野丈人。小兒禿瘡。白頭

搗傅。一宿作瘡。半月愈。

花 主治瘧疾寒熱。白禿頭瘡。

柴胡

綱目作此胡。又有地蕪。芸蒿。山菜。茹草。諸名。南北近

道皆有之。北產者如前胡而軟。南產者如蒿根強硬。當取莖長而細軟者佳。仲景定湯方有大小之名。柴胡原有大小之別。昔賢取銀夏產者為勝。時珍曰。銀州自

今延安府神木縣五原城是其廢趾所產柴胡長尺餘而微白且軟不易得也近時有一種根似桔梗沙參白色而大市人以充銀柴胡殊無氣味不可不辨其苗嫩時香美可茹如竹葉者爲上如韭葉者次之如邪蒿者又次之七月開黃花香直上可以致鶴聞者氣爽園圃宜種性涼味微苦質輕清主

升散味微苦主疏肝若多用二三錢能祛散肌表屬足少陽膽經藥治寒熱往來療瘧疾除朝熱若少用三四分能升提下陷佐補中益氣湯提元氣而左旋升達參芪以補中氣凡三焦膽熱或偏頭風或耳內生瘡或潮熱膽痺或兩脇刺痛用柴胡清肝散以疏肝膽之氣諸症悉愈凡肝脾血虛骨蒸發熱用逍遙散以此同白芍抑肝散火恐柴胡性涼製以酒拌領入血分以清抑鬱

之氣。而血虛之熱自退。若真臟虧損於外。感復受邪熱。或陰虛勞怯。致身發熱者。以此佐滋陰降火湯。除熱甚効。所謂內熱用黃芩。外熱用柴胡。為和解要劑。婦人熱入血室。經水不調。小兒痘疹餘熱。五疳羸熱。

附方傷寒餘熱

傷寒之後。邪入經絡。體瘦肌熱。推陳致新。解利傷寒。時氣伏暑。倉卒並治。不論

長幼。柴胡四兩。甘草一兩。每用三錢。水一盞煎服。

小兒骨熱

十五歲以下。遍身如火。日漸黃瘦。盜

汗。欬嗽煩渴。柴胡四兩。丹砂三兩。為末。獾猪膽汁拌和。飯上蒸熟。丸綠豆大。每服一九。桃仁烏梅湯下。日三服。

虛勞發熱

柴胡人參等分。每服三錢。薑棗同水煎服。**濕熱黃疸**柴胡一兩。甘

一劑。以水一盞。白茅根一握。煎至七分。任意時時服盡。

眼目昏暗

柴胡六銖。決明子十八銖。治篩

人乳汁和敷目上。久久夜見五色。

積熱下痢

柴胡黃芩等分。半酒半水煎七分。浸冷。空心服之。

苗主治卒聾擣汁頻滴之。

前胡

近處皆有。生下濕地。出吳興者佳。有數種。惟以苗高一二尺。色似斜蒿。葉如野菊而細瘦。嫩時香美。可食。

秋月開白花。類蛇牀子花。其根皮黑肉白。有香氣為真。大抵北地生者為勝。稱北前胡云。性涼。味苦。

辛。苦能下氣。辛能散熱。專主清風熱。理肺氣。瀉熱痰。除喘嗽痞滿。及頭風痛。補心湯中用之。散虛痰。潤然湯中用之。治暴赤眼。皆為下氣散熱之功也。

附方小兒夜啼

前胡擣篩。蜜丸小豆大。日服一丸。熟水下。至五六丸。以瘥為度。

山慈姑

又名金燈朱姑。無義草。以其結子如燈。而花與葉不相見也。處處有之。冬月生。葉如水仙花葉。而狹。

二月中枯。一莖如箭筈。高尺許。莖端開花。紅色。亦有黃色。白色者。上有黑點。其花乃眾花簇成。如絲紐成。可愛。三月結子。四月初苗枯。即掘取其根。狀如慈姑。遲則苗腐難尋矣。根苗與老鴉蒜極相類。但老鴉蒜根無毛。慈

姑有毛殼包裹為異爾用時去毛殼根性溫味甘微辛有小毒主治癰腫

瘡癩癬癰結核等醋磨傅之亦剝人面皮除奸黴主疥

腫攻毒破皮解諸毒蠱毒蛇蟲狂犬傷

附方粉萍面黦山慈姑根牙齦腫痛紅燈籠枝根癰疽

疥腫惡瘡及黃疽慈姑連根同蒼耳草等分搗爛以風

痰癰疾金燈花根似蒜者一個以茶清研如泥日中時

發如不吐以萬病解毒丸一名太乙紫金丹一名玉樞

百病起死回生不可盡述凡居家遠出行兵動衆不可

無此山慈姑去皮洗極淨焙二兩川五倍子洗刮倍二

兩千金子仁白者研紙壓去油一兩紅芽大戟去蘆洗

焙一兩半麝香三錢以端午七夕重陽或天德月德黃

道上吉日預先齋戒盛服精心治藥為末陳設拜禱乃

重羅令勻用糯米濃飲和之木臼杵千下作一錢一錠

病甚者連服取利一二行。用溫粥補之。凡一切飲食藥毒。蠱毒瘴氣。河豚。土菌。死牛馬等毒。並用涼水磨服一錠。或吐或利即愈。癰疽發背。疔腫楊梅等一切惡瘡。風軀赤遊痔瘡。並用涼水。或酒磨塗。日數次立消。陰陽二毒。傷寒。狂亂瘟疫。喉痺喉風。並用冷水入薄荷汁數匙化下。心氣痛。并諸氣。用淡酒化下。泄瀉痢下。霍亂絞腸沙。用薄荷湯下。中風中氣。口緊眼歪。五癩五癰。鬼邪鬼胎。筋攣骨痛。並暖酒下。自縊溺水。鬼迷心頭。溫者。冷水磨灌之。傅尸癆瘵。凉水化服。取下惡物。蟲積為妙。久近瘡疾。將發時。東流水煎桃枝湯化服。女人經閉。紅花酒化服。小兒驚風。五疳五痢。薄荷湯下。頭風頭痛。酒研貼兩太陽上。諸腹鼓脹。麥芽湯化下。風蠱牙痛。酒磨塗之。亦吞少許。打撲傷損。松節煎酒下。湯火傷。毒蛇惡犬。一切蟲傷。並冷水磨塗。仍服之。

葉治瘡腫。入蜜搗塗瘡口。候清血出效。塗乳癰便毒尤妙。

附方中溪毒生瘡

朱姑葉搗爛塗之。生冬間。葉如蒜葉。

〔花〕治小便血淋澹痛。同地藥花陰乾。每服三錢。水煎服。

石蒜

又有烏蒜。老鴉蒜。蒜頭草。漚漚酸。一枝箭諸名。處處下濕地有之。春初生。葉如蒜。背有劍脊。四散布地。七月苗枯。乃于平地抽出一莖。如箭筈。高尺許。莖端開花。紅色。如山丹花。根如蒜皮。紫赤肉白。有小毒。救荒本草言其可煉熟水浸過。可食。蓋為救荒云爾。

根性溫。味辛甘。有小毒。主治傳貼腫毒。疥瘡惡核。可水煎服。取汁。及擣傅之。又中溪毒者。酒煮半升。服取吐良。

〔附方〕便毒諸瘡

一枝箭。搗爛塗之。即消。若毒大甚者。洗淨。以生白酒煎服。得微汗。即愈。

產

腸脫下

老鴉蒜。即酸頭草。一把。以水三盞煎。一盞半。去滓。熏洗。神効。

小兒驚風

大。一。聲。

就死者。名老鴉驚。以散麻纏住。脇下。及手心。足心。以燈火爆之。用老鴉蒜。晒乾。車前子。等分為末。水調貼。手心。仍以燈心。燂手足心。及肩膊。眉心。鼻心。即醒也。

水仙花

又名金盞銀臺。宜卑濕處。不可缺水。故名。根似蒜。葉似薤。白花黃心。宛然盞樣。清香可愛。亦有千葉者。

者。一物。二種。爾。

作香澤塗身。理髮去風氣。又療婦人五心發熱。

同乾荷葉赤芍藥等分為末。白湯每服二錢。熱自退愈。

根治癰腫及魚骨哽。

白茅

根名茹根。蘭根。地筋。以其可茹而長也。時珍曰。茅有白茅。菅茅。黃茅。香茅。芭茅。數種。葉皆相似。白茅短小。

春生。芽布地。如針。俗謂茅針。亦可噉。甚益小兒。夏開白花。茸茸然。其根甚長。白軟如節。而有節。味甘。其茅可以苦蓋。及供祭祀苞苴之用。菅茅只生山上。似白茅而長。秋抽莖。花如荻花。其根短硬無節。黃茅似菅茅。莖上開葉。根頭有黃毛。秋深開花。穗如管。可為索網。香茅一名菁茅。一名瑠茅。生湖南江淮間。葉有三脊。其氣香芬。可以包藉及縮酒。禹貢所謂荊州苞匭菁茅是也。苞茅叢生。葉大如蒲。長六七尺。有二種。即苳也。見後苳下。

性寒味甘。主治勞傷虛羸。補中益氣。除瘀血。血閉寒熱。

止吐衄諸血。通血脉。淋瀝。療傷寒噦逆。肺熱喘急。水腫黃疸。利小便。下五淋。除客熱在腸胃。止渴。堅筋。解酒毒。主婦人月經不勻。崩中。

附方 山中辟穀

凡避難無人之境。取白茅根洗淨咀嚼。或石上晒乾搗末。水服方寸匕。可辟穀。

不溫病冷啗

因熱甚飲水。成暴冷啗者。茅根切。枇杷葉拭去毛炙香。各半觔。水四升。煎二升去滓。

稍稍飲之。溫病熱噦

乃伏熱在胃。令人胸滿則氣逆。逆則噦或大下。胃中虛冷亦致噦也。茅根切。葛

根切。各半觔。水三升。煎一升。

反胃上氣

食人即吐。茅根。藍根二兩。水四

升。煮二升。頓服。得下良。

肺熱氣喘

生茅根一握。咬咀。水二盞。煎一盞。食後溫服。甚者三服。止。名如

神湯。虛後水腫

因飲水多。小便不利。用白茅根一大把。小豆三升。水三升。煮乾。去茅食。豆水隨小便

也。下五種黃病

黃疸。穀疸。酒疸。女疸。勞疸也。黃汗者。乃大出汗。出入水所。致身體微腫。汗出如黃藥汁。

用生茅根一把細切。以猪肉一觔合作羹食。

解中酒毒

恐爛五臟。茅根汁飲一升。

小便熱

淋

白茅根四升。水一斗。五升。煮取五升。適冷。暖飲之。日三服。

小便出血

茅根煎湯。頻飲。為佳。

傷溺血

茅根乾薑等分。入蜜一匙。水二鍾煎一鍾。日一服。

鼻衄不止

茅根為末。米泔水服。

吐血不止

千金翼。用白茅根一握。水煎服之。婦人良友。用根洗搗汁。日飲一合。

竹木入

肉

白茅根燒末。猪脂和塗之。風氣成腫者亦良。

茅針

即初生苗也。

性平味甘。主治消渴。能破血下水。通小腸。

治鼻衄及暴下血。水煮服之。惡瘡癰腫。軟節未潰者。以

酒煮服。一針一孔。二針二孔。生接傳金瘡止血。

花煎飲。止吐血衄血。并塞鼻。又傳灸瘡不合。罨刀箭金

瘡。止血并痛。

屋上敗茅治卒吐血。剉三升。酒浸。煮一升服。和醬汁研

傳斑瘡及蠶嚙瘡。四角茅。主鼻洪。治痘瘡潰爛。難壓不

乾方用多年牆上爛茅。擇洗焙乾為末。摻之即愈。

附方 婦人陰痒等分煎水。頻熏洗之。大便閉塞服藥不通者。滄

鹽三錢。屋簷爛草節七箇為末。每用一錢。竹筒吹入肛內。一寸即通。名提金散。卒中五尸其狀

脹急。不得氣息。上冲心胸。芴攻兩脇。或硃礪涌起。或牽引腰脊。此乃身中尸鬼接引為害。取屋上四角茅。入銅

器中。以三尺帛覆腹。着器布上。燒茅令熱。隨痛追逐。趾下痒即瘥也。

苳又有杜榮。芭苳。芭茅。諸名。可為籬芭。故名。時珍曰。苳有

二種。皆叢生。葉皆如茅而大。長四五尺。邊甚快利。傷人如刃。七月抽長莖。開白花。成穗如蘆葦花者。苳也。五月

抽短莖。開花如苳者。石苳也。並於花將放時。剝其籜皮。可為繩箔草履諸物。其莖可為掃帚。莖煮汁服散血。人畜為虎狼等傷。恐

毒入內。取雜葛根濃煮汁服。亦生取汁服。

敗苾箔。主治產婦血滿腹脹。血渴惡露不盡。月閉。止好血。下惡血。去鬼氣。疰痛。癥結。酒煮服之。亦燒末酒下。彌久着烟者佳。

當歸

又有乾歸。山蘄。蘄古芹字。白蘄。文無。諸名。時珍曰。本非芹類。特以花葉似芹。故名。崔豹註云。古人相贈以

芍藥。相召以文。無文。無當歸別名也。陝蜀秦州汶州諸處。人多栽蒔。春生苗。綠葉如芹。有三瓣。七八月開花。淺紫色。以秦歸頭圓尾多。色紫氣香肥潤者。名馬尾歸為佳。他處頭大尾粗次之。性溫能散帶甘

能緩經。曰肝欲散。以辛散之。肝苦急。以甘緩之。緩之散之。肝性所喜。即所為補。故專入肝。以助血海。使血流行。凡藥體性。分根升。稍降。中守。此獨一物而全備。頭補血

上行。身養血中守。稍破血下行。全活血運行周身。治血
虛不足。縱慾耗精。陰虛勞怯。去血過多。癰毒潰後。此皆
血脫。用歸頭以補血也。治精神困倦。腰痛腿酸。女人血
瀝。目疼牙痛。瘡久虛証。純血痢疾。此皆血少。用歸身以
養血也。治諸腫毒。跌撲金瘡。皮膚澁癢。濕痺痲癬。經閉
瘀蓄。此皆血聚。用歸尾以破血也。若全用。治血虛昏亂
者。服之卽安。有各歸氣血于經絡之功。故名當歸。取其
氣香體潤。同參朮用滋脾陰。如脾虛者。米拌炒用。使無
便滑之虞。凡痰涎者。恐其粘膩。泄瀉者。恐其滑腸。嘔吐
者。恐其泥膈。氣喘聲啞者。恐其辛溫。心性喜斂。肺氣欲

收俱忌用之。

附方 血虛發熱

當歸補血湯。治肌熱燥熱。因渴引飲。日赤而紅。晝夜不息。其脉洪大。而虛重按。

全無力。此血虛之候也。得於飢困勞役。證象白虎。但脉不長實為異耳。若誤服白虎湯。即死。宜此主之。當歸身

酒洗二錢。綿黃芪蜜炙一兩。作一服。 失血眩暈 凡傷胎後去血崩中。去血金瘡。去血。拔牙去血。一切去血過多。

心煩眩暈。悶絕不省人事。當歸二兩。芎藭一兩。每用五

錢。水七分。酒三分。煎七分。熱服。日再。 衄血不止 當歸焙研末。每服

血當歸四兩。剉酒三升。煮取一升。頓服。 頭痛欲裂 當歸二兩。酒一升。煮

虛目暗 補氣養血。用當歸生晒六兩。附子火炮一兩。為末。煉蜜丸。梧子大。每服三十丸。溫酒下。各六一

丸。 心下痛刺 當歸為末。酒服方寸七。 手臂疼痛 當歸三兩。切。酒浸

別以三兩再 溫瘧不止 當歸一兩。水煎飲。日一服。 久瀉不止 當歸二

山... 直... 五... 五...

萸一兩。同炒香。去萸不用。為末。蜜丸。梧子大。每服三十丸。米飲下。名勝金丸。大便不通。當歸

等分。為末。每服二錢。米湯下。婦人百病。諸虛不足者。當歸四兩。地黃

前。米飲下。月經逆行。從口鼻出。先以京墨磨汁服。止之。

半煎。入分溫。室女經閉。當歸尾。沒藥。各一錢。為末。紅花

婦人血氣。臍下氣脹。月經不利。血氣上攻。欲嘔不得睡。

子大。每服十。墮胎下血。不止。當歸焙一兩。葱白一握。每

妊。胎動。神妙。佛手散。治婦人。妊娠傷動。或子死。腹中

已損。便立下。此乃徐玉神驗方也。當歸二兩。芎藭一兩。

為粗末。每服三錢。水一盞。煎令泣。泣欲乾。投酒一盞。再

煎。一沸。溫酒或灌之。如人行。產難胎死。橫生。倒生。用當

兩。為末。先以大黑豆炒焦。入流水一盞。童。倒產子死。不

便。一盞。煎至一盞。分為二服。未效再服。

當歸末。酒。產後血脹。腹痛引脇。當歸二錢。乾薑炮五分。

服方寸七。為末。每服三錢。水一盞。煎八分。入

鹽酢少。如絞。當歸末五錢。白蜜一合。水一

許。熱服。產後腹痛。蓋煎一盞。分為二服。未效再服。產

後自汗。壯熱氣短。腰脚痛不可轉。當歸三錢。黃芪白芍

藥。酒炒各二錢。生薑五片。水一盞。半煎七分。溫

服。產後中風。不省人事。口吐涎沫。手足痙瘓。當歸荆芥

穗等分。為末。每服二錢。水一盞。酒少許。童

尿少許。煎七分。灌之。小兒胎寒。好啼。晝夜不止。因此成

下咽。即有生意。神效。小兒胎寒。癩。當歸末一。小豆大。以

乳汁灌之。日。小兒臍濕。不早治。成臍風。或腫赤。或出水。

夜三四度。用當歸末傅之。一方入麝香少

許。一方用胡粉等分。試之最驗。湯火傷瘡。焮赤潰爛。用

若愈後。因尿入。復作。再傅。即愈。此。生肌拔熱

止痛。當歸黃蠟各一兩。麻油四兩。以油煎。當

歸焦黃。去滓。納蠟。攪成膏。出火毒。攤貼之。

白黃色。枯

舌縮恍惚。若語亂者。死。當歸白

木二兩。水煎。入生苜汁。蜜和服。