

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯超 謙菴訂

熱陣

仲理中丸

即名人參理中湯○治太陰即病自利不渴陰

寒腹痛短氣欬嗽霍亂嘔吐飲食難化胸膈噎塞或瘧疾瘴氣瘟疫中氣虛損久不能愈或中虛生痰等症

人參

白朮

炒

乾薑

炒

炙甘草

各三兩

右四味搗篩為末蜜丸雞黃大以沸湯數合和一丸研碎溫

服之日三四夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法

以四物依數切用水八升煮取三升去渣溫服一升日三服

○原論加減法詳在霍亂門述古條中實按右方兩數乃漢

時權度今後世所用惟每味數錢而甘草半之酌宜可也

附子理中湯 一 治證如前而中氣虛寒腹痛甚者又或入房

腹痛手足厥冷或食冷犯寒等症

不妨生用或炮用亦可○外科附子理中湯有芍藥茯苓

即前方加制附子一二三錢隨宜用之其有寒甚勢急者

無甘草乾薑

附子理中丸 三 治陰寒腎氣動者

即前附子理中湯去白朮煉蜜丸服

理中加丁香湯 四 治中脘停寒喜辛物入口即吐即噦

即前理中湯加丁香十粒甚或兼痛者可加至一二錢○

若以理中加木香即名木香理中湯

加味理中湯 五 治脾肺俱虛欬不已

人參 白朮 茯苓 炙甘草

陳皮

半夏

乾薑

細辛

北五味 等分

右咀每服三錢薑 三片棗一枚煎七分食遠服

局胡椒理中湯 治肺胃虛寒氣不宜通欬喘逆氣虛痞噎

悶脇腹滿痛短氣不能飲食嘔吐痰水不止

白朮五兩

乾薑

炙甘草

胡椒

良薑

葶撥

陳皮

細辛

欬冬花 去梗各四兩

右咬咀每服五七錢水一鍾半煎七分食遠溫服○或煉蜜

丸桐子大每服三五十九白湯溫酒米飲任下無時每日二

服

選八味理中丸七

治脾胃虛寒飲食不化胸膈痞悶或嘔吐

泄瀉

人參

乾薑炒各一兩

白朮四兩炒

白茯苓

麥芽炒二兩

甘草炙

神麴炒

砂仁炒各一兩半

右為細末煉蜜為丸每丸重一錢空心服一九薑湯嚼下

枳實理中丸八

治傷寒寒實結胸

人參

白朮

茯苓

甘草

乾薑各二兩枳實十六片

右為細末煉蜜丸雞子黃大每服一九熱湯化下連進二三

服

理中化痰丸

治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少食或大便不

實飲食難化欬唾痰涎此中氣虛弱不能統漉歸源也

人參

白朮炒

乾薑炮

茯苓

各二兩

炙甘草一兩半夏制三兩

薑湯煮麴糊丸桐子大每服四五十丸白湯送下

治中湯十 治脾胃不和嘔逆 亂中滿虛痞或泄瀉○此卽

理中湯加青皮陳皮也

人參 白朮 乾薑炮 炙甘草

青皮 陳皮等分

右每服五錢水煎服如嘔加半夏

丁香温中湯十一 治同前

卽前治中湯加丁香去半夏

良温胃湯十二 治憂思結聚脾 肺氣凝元陽受損大腸與胃

氣不平脹滿上衝飲食不下脉 虛而緊滿

附子制 厚朴 當歸 白芍藥

人參 甘草炙 陳皮各一錢 乾薑炮一錢

用椒 去合口炒出汗三分

水一鍾半薑三片煎一鍾食遠服

東垣 溫胃湯 十三 治服寒藥多致 脾胃虛弱 胃脘痛

白豆蔻

人參

澤瀉 各三分

益智

砂仁

厚朴

甘草

乾薑

薑黃

各四分

黃芪

陳皮

各七分

右為細末 每服三錢水一盞前 至半盞食前溫服

景仲

四逆湯 十四

又名通脈四逆

湯 ○治傷寒陰症自利裏寒

外熱脈沉身痛而厥

甘草

炙二兩

乾薑

炮三兩

附

子一枚破八片生用

右咬咀以水三升煮取一升二

合分二次溫服其脈即出者

愈 ○面色赤者加葱九莖 ○腹

中痛者去葱加芍藥二兩 ○

嘔者加生薑二兩 ○咽痛者加桔梗一兩 ○利止脈不出者

加人參一兩

景仲

四逆加人參湯 十五

治傷寒

惡寒脈微而復利

即於前方內加入人參一兩

仲景四逆加豬膽汁湯 十六 治傷寒吐下後汗出而厥四肢拘

急脉微欲絕者

即於四逆湯內加入豬膽汁半合

仲景茯苓四逆湯 十七 治傷寒汗下後病仍不解煩躁者

一茯苓 六兩 人參 一兩 甘草 炙二兩 乾薑 一兩半

附子 一枚生用去皮切八片

右五味以水五升煮取三升去渣温服七合日三服

茱萸四逆湯 十八 治厥陰中寒小腹痛甚

吳茱萸 湯泡 附子 炮 乾薑 各二錢 炙甘草 錢半

水一鍾半煎七分熱服

韓氏茵陳四逆湯 十九 治發黃脉沉細遲肢體逆冷腰已上自

汗

茵陳 二兩

炙甘草 一兩 乾

薑 炮兩半 附子 一個炮 作八片

右分四貼水煎服

仲景當歸四逆湯 二十

治傷寒手

足厥寒脉細欲絕者或下利

脉大腸鳴者虛也及其人內有

久虛者宜當歸四逆加吳茱

萸生薑湯主之

當歸

桂枝

芍

藥

細辛

各三兩

甘草

通草

各二兩

大

棗

二十五枚擘

右七味以水八升煮取三升去

滓温服一升日三服

四逆散 二一

方在散陣 二八

治陽邪亢熱血脉不通四肢厥

逆

仲景附子湯 二二

治少陰病得之

一二日口中和其背惡寒者

當灸之附子湯主之并治少陰

病身體痛手足寒骨節痛脉

沉者

附子二枚去皮 人參二兩 白朮四兩 芍藥

茯苓各二兩

右五味以水八升煮取二升去渣溫服一升日三服

因附子湯二三 治風寒濕痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉重著

四肢緩縱

附子生用 白芍藥 桂心 甘草

白茯苓 人參 乾薑各三兩 白朮一兩

右咬咀每服四錢水煎服

生附湯二四 治寒溼腰痛

附子生用 白朮 茯苓 牛膝

厚朴 乾薑 炙甘草各一錢 蒼朮

杜仲薑炒各二錢

水二鍾生薑三片紅棗二枚煎八分食前服

參附湯 二五 方在補陣三八

治元陽不足喘急呃逆嘔惡厥冷等證

景仲 木附湯 二六 方在補陣四二

治中寒中氣不足逆冷痰盛口噤等證

芪附湯 二七 方在補陣四四

治氣虛陽弱虛汗倦怠

濟生 木附湯 二八 方在補陣四三

治寒溼腰冷重痛小便自利

金匱 桂枝附子湯 二九 治傷寒八九日風溼相搏身體疼煩不

能轉側不嘔不渴脉浮虛而澁者

桂枝 四兩去生 薑 三兩切 附子 三枚炮去皮 甘草 三兩炙

大棗 十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去渣分溫三服

金匱白朮附子湯 三十一 治傷寒八九日風溼相搏身體疼煩不

能轉側不嘔不渴 脉虛浮而滿若大便堅小便自利者去桂

枝此方主之

白朮二兩 附子一枚泡甘草炙一兩 生薑一兩半切

大棗六枚

右五味以水三升煮取一升去渣分溫三服一服覺身痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿性卽是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳

金匱甘草附子湯 三十二 治風溼相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸

近之則痛劇汗出短氣小便不利大便反快惡風不欲去衣

或身微腫者此主之

甘草炙 白朮各二兩 附子二枚炮 桂枝四兩去皮

右四味以水六升煮取三升去渣溫服一升日三服初服得

微汗則解能食汗後復煩者服五合恐一升多者服六七合
為妙

良方薑附湯 三二 治霍亂轉筋手足厥冷或吐逆身冷脉微急

用此藥救之 此即仲景乾薑附子湯

乾薑 一兩 附子 一兩 生用

右每服半兩水煎 外科薑附湯有人參白朮

生薑附子湯 三二 治嶺南瘴厲內虛發熱或寒熱往來嘔痰

吐逆頭疼身痛或汗多煩躁引飲或自利小便赤兼主卒中

風

附子 一枚如法製分四服

右每服水一鍾生薑十片煎六分微温服

乾薑附子湯 三四 治瘴毒陰證發熱或煩躁手足冷鼻大冷

身體重痛舌上胎生引飲煩渴或自利嘔吐汗出惡風

大附子 一枚製分四服

右每服加炮乾薑同煎温服熱甚者冷服

^{寶鑑}羌活附子湯 三五

治呃逆

羌活

附子

乾薑 炮

茴香 各一錢

木香 五分

水鍾半棗二枚煎服 三因方木香作丁香

附子湯 三六

治發汗病不解反惡寒者虛故也

芍藥

甘草 炙各三兩 附子 一枚炮去皮切八片

上三味以水五升煮取一升五合去渣分温服

活附子八味湯 三七

治氣虛中寒脚氣等症

附子 炮 去皮 人參

乾薑 炮

芍藥

茯苓

甘草 炙

桂心 各二兩 白朮 四兩

右每服五七錢水一鍾半煎七分食前温服 又方去桂心

加乾熟地黃三兩

六物附子湯 三八 方在外科三五

治四氣流注太陰四肢骨節煩疼浮腫小水不利

小建中湯 二九 方在補陣二二

治虛勞裏急腹痛失精四肢酸疼咽乾口燥等症

大建中湯 四一 方在補陣二四

治陽虛氣血不足腰脚筋骨疼痛

八味大建中湯 四一 方在補陣二五

治中氣不足厥逆嘔吐攣急陰縮腹痛虛火等證

三建湯 四二 治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷六脉沉微大

小便數滑凡中風潮涎不省人事傷寒陰證皆可用之

大附子 大川烏 天雄各製用三錢

右用水二鍾薑十片煎一鍾不拘時或溫服或冷服○目汗

加桂浮小麥○氣逆加沉香○胃冷加丁香胡椒

^{仲景}炙甘草湯 四三 一名復脈湯 治傷寒脈結代心動悸

炙甘草 四兩 生薑 桂枝 三兩 各人參

阿膠 各二兩 生地黃 一斤 麥冬 斤 法心半 麻子仁 半斤

大棗 十二枚 劈

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去渣內膠烱盡溫服一升日三服

^{仲景}桂枝甘草湯 四四 治發汗過多其人叉手自冒心心下悸

欲得按者

桂枝 四兩 去皮 甘草 二兩

右二味以水三升者取一升去渣頓服

^{陶氏}回陽逐本湯 四五 治陰盛格陽陰極發躁渴而面赤欲坐

泥水中脈則無力或脈全微欲絕者○服後脈微出者生頓

出者死

人參

制附子

炮薑

炙甘草

五味子

麥冬

陳皮

臘茶

面戴陽者下虛也加葱七莖黃連少許用澄清泥漿水一鍾煎之臨服入蜜五匙頓冷服之取汗為效

華陀救脫陽方

四六

治寒中三陰口噤失音四肢強直攣急

疼痛似中風及厥逆唇青囊縮無脉或卒倒屍厥脫陽等證

先急用葱白一握微搗碎炒熱用布包熨濟下以二包更替熨之甚者仍灸氣海關元二三十壯脉漸出手足漸温乃可生也

次用附子一個重一兩者切八片白朮乾薑各五錢木香二錢同用水二鍾煎一鍾候冷灌服須臾又進一服或煎

服回陽等湯

仲景旋復代赭石湯 四七

治傷寒若汗或吐下解後心下痞鞭

噫氣不除者

旋復花

甘草

炙各三兩

人參

二兩

生薑

五兩切

代赭石

一兩

大棗

十二枚

半夏

半升洗

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日

三服

仲景厚朴生薑甘草半夏人參湯 四八

治發汗後腹脹滿

厚朴

去皮尖

生薑

切各半斤

半夏

半斤洗

人參

一兩

甘草

二兩炙

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

簡十味劉散 四九

治中風血弱臂痛連及

筋骨舉動艱難

附子

三兩炮

當歸

黃芪

炙

白芍藥

各二兩

川芎

防風

白朮

各兩半

肉桂

一兩

熟地

茯苓

各七錢半

右ㄟ咀每服五七錢水鍾半薑八片棗三枚煎八分食後臨

臥服

神效

芎木湯五十

治寒濕頭痛眩暈痛極

川芎

附子

生去皮

白朮

各三錢

桂心

去皮

甘草

各一兩

水一鍾半生薑七片棗二枚煎八分食遠服

正元散五二

治眩暈陽虛

紅豆

炒

乾薑

炮各三兩

人參

白朮

炙甘草

茯苓

各二兩

附子

炮去皮生

川芎

山藥

薑汁炒

烏藥

乾葛

各一兩

川烏

炮去皮生

肉桂

各五錢

黃芪

灸兩半

陳皮

二錢

右咬咀每服三錢水一鍾薑三片棗一枚入鹽少許煎服

金匱 生薑半夏湯 五三 治胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦

徹心中憤憤然無奈者

半夏 半升 生薑汁 一升

右二味以水三升煮半夏取二升內生薑汁煮取一升半小

冷分四服日三夜一服病止停後服

金匱 半夏乾薑散 五四 治乾嘔或吐逆痰涎

半夏 制 乾薑 炙等分

右二味杵為散取方寸七用漿水一升半煎取七合去粗頓

服之

仲景 甘草乾薑湯 五五 治少陰傷寒小便色白吐逆而渴動氣

因下反劇身雖有熱反倦及肺痿吐涎沫而不欬口不渴小便數遺尿肺中冷上虛不能制下眩暈多涎唾等證○楊仁

齋曰治男女諸虛出血胃寒不能引氣歸元無以收約其血者○良方名薑草湯治陰盛于陽寒而嘔血

甘草 炙四兩 乾薑 炮二兩

右咀以水三升煮取一升五合分溫再服○仁齋曰等分每

服三錢食前服

橘皮乾薑湯 五六 治惡心嘔噦

人參 乾薑 肉桂 各一錢 陳皮

通草 各錢半 甘草 五分

水一鍾半煎八分服

金匱橘皮湯 五七 亦名生薑橘皮湯○治乾嘔噦若手足厥者

橘皮 四兩 生薑 半斤

右二味以水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

萬氏橘皮湯 五八 方在痘疹九二

行滯消痰止嘔吐

金橘皮竹茹湯五九 治噦逆

橘皮二升 竹茹二升 生薑牛斤 甘草五兩

人參一兩 大棗三十枚

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日三服

小半夏湯六十 方在和陣八

治嘔吐及心下有飲者

三因丁香散六一 治呃逆

丁香 柿蒂各一錢炙甘草 良薑各五分

右為末熱湯點服二錢不拘時

丁香煮散六二 治翻胃嘔逆

丁香 石蓮肉各十四 北棗七枚切生薑七片

黃秫米半合洗

水一碗半同煮稀粥去藥啜粥

簡丁附散 六三

治反胃嘔逆粥食不下

大附子一枚坐於磚石上四面著火漸漸逼熱焙入生薑汁中浸少時如法再焙約盡薑汁半碗許為度去皮焙乾為末

丁香二錢研

二味勻和每服二錢水一鍾粟米同煎七分服

湯水香茯苓湯 六四

治脾胃虛寒宿食留滯否塞疼痛氣不

升降以致嘔吐涎沫或嘔酸水不思飲食

半夏 制

橘紅

茯苓 各一兩 丁香

附子 制

肉桂

砂仁 各五錢 乾薑 炮

木香 各一兩

每服四錢水一鍾半薑七片棗一枚煎七分服

煇丁香柿蒂散六五 治吐利 痼後胃中虛寒呃逆凡呃逆

至七八聲相連收氣不回者難治

丁香 柿蒂 炙甘草 良薑 各五分

人參 半夏 陳皮 茯苓 各一錢

生薑一錢

水二鍾煎熱服

鑽丁香柿蒂散六六 治呃逆嘔吐

丁香 柿蒂 青皮 陳皮 各等分

水一鍾半薑五片煎服

嚴氏柿蒂湯六七 治胸滿呃逆不止

柿蒂 丁香 各二錢

加生薑五片水煎服○家珍方有人參一味

百安脾散六八 治胃氣先逆飲食過傷憂思蓄怨宿食癖積

冷飲寒痰動擾脾胃不能消磨致成斯疾女人由血氣虛損
男子皆由下元虛憊有食罷即吐有朝食暮吐暮食朝吐所
吐酸黃臭水皆是脾敗惟當速治遲則發煩渴大便秘水飲
不得入口而危矣

南木香

磨汁

橘紅

人參

白朮

草果

麩煨

茯苓

甘草

丁香

胡椒

各兩半

高良薑

一兩用陳壁土三合以水一碗同煮洗切片

右咀每服五錢水一鍾半入鹽少許煎七分食遠溫服或為
細末每服五錢用鹽米湯調下

三因

補脾湯

六力

治脾胃虛寒泄瀉腹滿氣逆嘔吐飲食不消

人參

白朮

茯苓

厚朴

炒

陳皮

各一錢

乾薑

炒

甘草

炙

草

麥芽

炒各八分

水一鍾半煎七分空心温服

因養胃湯 七十 治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹疼腸鳴泄瀉

藿香 厚朴 炒

半夏 制

茯苓 各錢半

草果

陳皮

人參

白朮 炒各一錢

附子 製八分 甘草 炙五分

水一鍾半薑三片棗二枚煎七分食遠服

胃愛散 七一 治脾胃久虛中焦氣滯或冷涎上壅嘔吐惡心

或胸膈疼痛不思飲食或泄瀉不止

人參 一兩

白朮

茯苓

黃芪 炙各三錢

丁香

甘草 錢

炙各二

肉果

三個煨

乾薑

炒半兩

右用白米炒熟四兩同研為末每服二三錢用薑湯或人參

湯調服○或為咬咀每藥五七錢加炒米一兩煎服亦可

東藿香安胃散 七二

治脾胃虛弱不能進食嘔吐吞酸腹痛

不能腐熟

藿香

人參

陳皮 各一錢
丁香 五分

生薑 十片

水一鍾半煎七分食遠服

加七味人參丸 七三

治胃冷兼虛嘔逆不食服許則仁半夏

丸不效可服此藥○方見和陣一二三二

人參

白木

炒各五兩

厚朴

薑制

北細辛

各四兩

生薑

橘皮

各三兩 桂心二兩

右為末煉密丸桐子大米飲下十九丸漸加至二十九

甘露湯 七四

治反胃嘔吐不止飲食減少常服之快利胸膈

調養脾胃進飲食○徐東臯曰常州一富人病反胃往京口

甘露寺設水陸泊舟岸下夢一僧持湯一碗與之飲罷猶記

其香味便覺胸膈少快早入寺知客以湯乃是夢中所飲者

胸膈尤快遂求其方合數十服後疾遂瘥名曰觀音應夢散
予得之常以待賓易名曰甘露湯又在臨汀療一人愈甚勿
忽之

乾餈糟 頭柞者用六分 生薑 四分

右和勻搗爛作餅或焙或晒乾每十兩入炙甘草二兩同研
爲末每服二錢用沸湯入鹽少許調服不拘時服

金匱茯苓澤瀉湯 七五 治胃反吐而渴欲飲水者○外臺治消

渴脉絕反胃者

茯苓 半斤 澤瀉 生薑 各四兩 甘草

桂枝 各二兩 白朮 三兩

右五味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取二升半溫服八
合日三服

仲景茯苓甘草湯 七六 治水飲停蓄心下甚者作悸作利

茯苓

桂枝

各二兩

甘草

炙一兩

生薑

三兩

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

草薺蕤湯

七七

和中調氣治嘔吐

草薺蕤

藿香

各五分

陳皮

枳殼

各七分

白朮

山藥

各一錢

桂心

丁香

各二分

水一鍾半薑五片棗二枚粟米少許煎七分食前溫服

大順散

七八

治冒暑伏熱引飲過多以致寒濕傷脾陰陽氣

逆霍亂吐瀉藏府不調等症

乾薑

肉桂

杏仁

各四兩

甘草

三兩

右先將甘草微炒黃次入乾薑同炒令薑裂又入杏仁同炒

令杏仁不作聲為度却同肉桂研羅一處毋用二三錢以水

一鍾煎數滾溫服○如煩躁者以井花水調服不拘時○此

方加附子即名附子大順散

四順附子湯 七九

治霍亂轉筋吐瀉手足逆冷六脉沉絕氣

少不語身冷汗出

附子 生

白乾薑 炮

人參

甘草 炙各一兩

右咬咀每服四五錢水鍾半煎七分食遠服

醫林附子粳米湯 八十

治霍亂四逆多嘔少吐者

中附子 一枚制

半夏 制兩半

甘草 炙各一兩

大棗 十枚

粳米 五合

右咬咀每服八錢水鍾半煎米熟去相服

冷香飲子 八一

治傷暑暈霍亂腹痛煩躁脉沉微或伏

附子 炮

陳皮 各一錢

甘草 炙各錢半

水一鍾半薑十片煎八分井水頓冷服

集冷香湯 八二

治夏秋水濕恣食生冷陰陽相于遂成霍亂

臍腹刺痛脇肋脹滿煩躁引飲無度或感瘴虛熱胸膈不利

或嘔或泄並宜

良薑

白檀香

草薺蔻

麩包煨

附子 制

炙甘草

各一錢 丁香七粒

水一鍾半煎七分用井水浸冷於嘔吐時服之效或為細末

水調生麩糊丸如芡實大每服一丸新汲水磨下亦可

直

木瓜湯

八三

治吐瀉不已轉筋擾亂

木瓜

一兩

茴香

微炒

二錢

吳茱萸

半兩

湯炮 炙甘草

二錢

右咬咀分二服加薑五片紫蘇十葉空腹急煎服之○良方

有生薑二錢五分無茴香甘草各木瓜煎

訶子散

八四

治老幼霍亂一服即效

訶子

炮去核

炙甘草

厚朴

薑制

乾薑

炮

神麩

炒

良薑

炒

茯苓

麥芽

炒

陳皮

草豆蔻等分

右爲細末每服二錢當病發不可忍時用水煎入鹽少許服之

霍亂三方 八五

治霍亂瀉利不止轉筋入腹欲死者

用生薑三兩搗爛入酒一升煮三四沸頓服

一方凡霍亂吐瀉不能服藥急用胡椒四十粒以飲吞之

一方凡霍亂吐瀉不止用艾一把水三升煮一升頓服之

千金霍亂方 八六

治霍亂乾嘔不止

以薤葉煎一升服三次立愈

乾霍亂二方 八七

凡欲吐不吐欲下不下嘔惡不止者謂之

乾霍亂

一方用鹽一兩生薑半兩搗同炒令色變以水一碗煎熱服

一方用丁香十四粒爲末以熱湯一盞調服

金 置苓桂朮甘湯 八八

治心下有痰飲胸脇支滿日眩

茯苓 四兩

桂枝

白朮 各三兩

甘草 二兩

右用水六升煮取三升分三服小便即利

薑朮湯 八九

治心下停飲怔忡

白薑

白朮

白茯苓

半夏麩 各一錢

官桂 三分

甘草 五分

水一鍾半棗三枚煎服

韓氏溫中湯 九十

凡病人兩手脉沉遲或緊是皆胃中寒也

若寸脉短少及力少於關尺者此陰盛陽虛也或胸膈滿悶

腹中脹滿身體拘急手足厥冷急宜溫之

丁香

丁香 各五分

厚朴

乾薑

陳皮

白朮 各一錢

水鍾半加葱白荆芥穗同煎

陳厚朴溫中湯 九一

治脾胃寒滯心腹脹滿或見疼痛

厚朴 薑炒

橘紅

乾薑 各一錢 茯苓

草豆蔻

木香

甘草 各五分

水煎溫服

大正氣散 九二

方在和陣二四

治風寒濕氣傷脾心腹脹悶有妨飲食

強中湯 九三

治生冷寒漿有傷脾胃遂成脹滿有妨飲食甚

則腹痛

人參

橘紅

青皮

丁香 各二錢

白朮 錢半

附子 炮去皮

草豆蔻

乾薑 炮各一錢

厚朴

薑汁炒

甘草

炙各五分

水鍾半薑三片紅棗二枚煎七分不拘時服○嘔加半夏○

若傷麪食加萊菔子一錢

三因強中丸 九四

治胃脘虛寒痰飲留滯痞塞不通氣不升降

○局方溫中化痰丸卽此方不用半夏

高良薑

乾薑炮

陳皮

青皮 各二兩

半夏制二兩

右爲細末生薑汁煮糊丸桐子大每服三十九薑湯下

三生飲九五

此治中風乃行經治痰之劑斬關奪門之將必

用人參驅駕其邪而補助真氣乃可用之否則恐反爲害

生南星一兩

生川烏

去皮半兩

生附子

去皮半兩

木香

二錢

每用一兩加人參一兩同煎服

嚴氏三生丸九六

治痰厥頭痛

南星

半夏

白附子

等分

右爲末薑汁浸蒸餅丸小豆大每服四十九食後薑湯下

五生丸九七

治風癰

川烏頭

附子

各生用去皮臍

南星

生

半夏

生

乾薑 生各半兩

右為細末醋煮大豆汁作麪糊和丸桐子大每服五丸冷酒送下不拘時

局 溫中化痰丸 九八 治停痰留飲

陳皮 青皮 良薑 乾薑 等分

右為細末醋煮胡九桐子大每服三十丸空心米飲送下

寶 溫胃化痰丸 九八 治膈內有寒脾胃傷飲胸膈不快痰涎

不已

半夏 制三兩 白朮 陳皮 乾薑 炮各一兩

右為末薑汁糊丸桐子大薑湯下二十九

局 倍朮丸 百 治五飲吞酸等證○一曰留飲停水在心下○

二曰澀飲水在兩脇○三曰痰飲水在胃中○四曰溢飲水溢在膈○五曰流飲水在脇間瀝瀝有聲皆由飲水過多或

飲冷酒所致

白朮 炒二兩 桂心

乾薑 炒各一兩

右為末蜜丸每服二十九溫米飲下加至三五十丸食前服

發丁香半夏丸 百一

治心下停飲冷痰

丁香

半夏 制各二兩

人參

乾薑 炮

細辛 各五錢 檳榔 三錢

右為細末薑汁糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

方局 丁香五錢丸 百二

治胃氣虛弱三焦痞塞不能宣行水穀

故痰飲聚結嘔吐惡心脹滿不食

丁香

木香

青皮

橘紅

各半兩

白朮

茯苓

良薑

乾薑

各一兩

南星 制

半夏 制各二兩

右為末湯浸蒸餅丸桐子大每服七十九溫湯下

因復元丹 百三

小便不通而目下腫

治脾腎虛寒發為水腫四肢虛浮心腹堅脹

附子 炮二兩

南木香 煨

茴香 炒

川椒 炒出汗

厚朴 制

獨活

白朮 炒

橘紅

吳茱萸 炒

桂心 各一兩

澤瀉 一兩半

肉豆蔻 煨

檳榔 各半兩

右為末糊丸桐子大每服五十九

紫蘇湯不拘時送下

薛氏加減金匱腎氣丸 百四

九

方在補陣一三六

治脾腎陽虛不能制水為腫為脹

濟生實脾散 百五

治陰水發腫宜先實脾土

附子 制

炮乾薑

厚朴

木香

大腹皮

草果仁

木瓜 各錢半

甘草 炙五分

水二鍾薑五片

棗一枚煎七分不拘時服

嚴氏實脾散 百六

即前方加白朮茯苓

簡易腹脹方 百七

凡肚腹脹滿不能用藥者以獨蒜煨熟去皮綿裹納下部中冷即易之○又沿關格脹滿大小便不通亦用上法氣立通○又方用生薑如指大一塊煨熟以綿裹乘熱納下部中冷即易之

丁香止痛散 百八

治心痛不可忍

丁香 半兩

良薑 二兩

茴香 炒

甘草 各兩半

右為細末每服二錢不拘時沸湯點服

勝金散 百九

治卒心痛

桂枝

玄胡索 炒

五靈脂

當歸 各半兩

右為末煉蜜丸桐子大每服二十九食前陳皮湯送下

良鐵刷散百十 治心脾積痛婦人血氣刺痛酒病惡心腸滑

泄瀉

良薑 炒二兩

茴香 炒七錢

蒼朮 制

甘草

炙各二兩八錢

右為末每服二錢空心薑鹽湯調下

崩漏散百十一

治男婦脾胃虛冷滯氣不行攻刺心腹痛

連胸膈膀胱小腸寒疝氣疝及婦人血氣刺痛

蒼朮

米泔浸切

炙甘草

各八錢

三稜 煨

蓬朮

煨

茯苓

青皮 各六錢 丁皮

砂仁 去殼

檳榔 各四錢

延胡索 三錢

乾薑 炒

肉桂 各二錢

右每服五錢水一盞入連根葱白一莖煎七分空心熱服或

為末用葱湯調服二三錢

寶沉香桂附丸百十二

百十二

治中氣虛寒飲食不美陰盛陽虛藏

府積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴便利無度面色不澤

手足厥冷及下焦陽虛疝氣疼痛不可忍腰屈不能伸喜熱

熨稍緩等證

附子炮去皮

川烏制同

沉香

肉桂

乾薑炮

良薑炮

茴香炒

吳茱萸炮各二兩

右為末醋煮麪糊丸桐子大每服五七十九丸食前米飲下日

二服忌生冷

椒附丸 百十三

治小腸虛冷小腹痛小便頻而清白

椒紅炒

附子炮

龍骨

桑螵蛸炙

山茱萸

鹿茸酒蒸焙各等分

右為末酒糊丸

桐子大每服六十九丸空心鹽湯下

大沉香丸 百十四

治寒氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香

薑炮

薑黃

桂心

檀香各二兩

山松洗焙

白芷

天台烏藥

甘草 名半斤
香附 一斤
白豆蔻 三兩

右為未煉蜜和丸彈子大每服一九細嚼生薑湯下不拘時

辨桂附二陳湯 百十五 治寒瘧寒多熱少腰足厥冷

附子 炮
肉桂
半夏 制
白茯苓

陳皮 炙甘草

右咬咀每服五六錢水一鍾半薑三片棗一枚煎服

扶陽助胃湯 百十六 羅謙甫治崔運使長男雲卿年二十五

體肥養厚常食涼物寒藥以致秋間瘧發復用水吞砒石等

藥反增吐瀉中氣愈虛延至次年四月復因勞怒前登大作

診其脉得弦細而微手足稍冷面色青黃食少痞悶嘔酸氣

促汗出了思內經云中氣不足溲便為之變腸為之苦鳴下

氣不足則為痿厥心悅又曰陽氣客于腸胃之間則卒然而

痛非大熱之劑不能愈遂制此方

附子 炮去皮 臍二錢

乾薑 炮錢半

草豆蔻

益智仁

揀參

甘草 灸

官桂

白芍藥 各一錢

吳茱萸

陳皮

白朮 各五分

右咬咀木二盞棗二枚薑三片煎八分食前溫服三服後大勢去痛減半至秋灸中脘以助胃氣次灸氣海百餘壯生發元氣明年復灸三里二七壯亦助胃氣引氣下行仍慎加調攝一年而平復

五味沉附湯 百十七

治虛寒無陽胃弱乾嘔

熟附子

乾薑 炮各一

白朮

炙甘草 各錢半

沉香 五分

水盞半薑五片煎七分食前服

一味沉附湯 百十八

治瘴疾上熱下寒腿足寒厥

沉香 磨汁

附子 制各三錢

水一鍾半生薑三片煎八分去粗入沉香汁放冷服此藥主
上熱下寒○全集云沉水真正鐵角沉香其味甘辛者爲美
辛辣者性熱附子降氣斂陽治陰毒冷瘧以一服而同生起
死真可以奪化功

濟生

七棗湯百十九

治瘴瘧或因感冒風寒或是五臟氣虛陰

陽相搏寒多熱少或但寒不熱皆可服

大附子

一枚制分四服○又方用川烏代附子以水調

陳壁土爲糊浸泡七次

水二鍾薑七片棗七枚煎一鍾當發日早晨空心溫服仍喫

棗子三五枚忌如常

冷湯百二十

治瘴毒內寒外熱咽隘間煩躁不解

人參半兩

大附子一錢

甘草炙三寸

淡竹葉十四片

大棗五枚

水煎溫服或冷服。甚者宜倍用人參附子不可拘此常數。
生薑煎一二一 治瘴如瘧憎寒壯熱

老生薑一大塊打破濕細包煨熟

右用水一鍾煎半鍾熱服取微汗

芎附散一二二 治五種瘧痺自腿臂間發作不定者

小川芎 附子炮去皮 黃芪 防風

白朮 當歸酒洗 熟地 桂心

甘草 柴胡等分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分空心服

芎參附滲濕湯一二三 治坐臥濕地雨露所襲身重脚弱關

節疼痛發熱惡寒小便不利大便唐泄

人參 白朮 茯苓 甘草

附子炮 黃芪炮 桂枝 芍藥等分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分不拘時服

七味滲濕湯 一二四 方在和陣一七四

治寒濕所傷身體重著小便赤澁大便溏泄

熨背散 一二五 治胸痺心背疼痛氣悶

烏頭

細辛

附子

羌活

川椒

桂心

川芎

右為末以少醋拌勻或炒熱或用帛裹微火灸令煖以熨背上取瘡乃止忌生冷如常服○按此方當用氣性諸辛香者佳附子似不必用

溫中法麴丸

一二六

治脾痺發欬嘔汁

法麴

枳實

白茯苓

吳茱萸

湯浸炒

桂心

厚朴

當歸

甘草

炙各三兩

人參

麥冬

乾薑炮

細辛

附子炮

桔梗炒各一兩

麥芽微炒五合

右為細末煉蜜九桐子大每服七十九食前熟水下日三

丹龍虎丹一二七

治走注疼痛或麻木不仁或半身疼痛

草烏

蒼朮

白芷各一兩

右為末水拌發熱過再入乳香二錢當歸牛膝各半兩酒糊

九彈子大酒化下

活絡丹一二八

方在和陣二七七

治中風手足不用日久不愈經絡中有濕痰死血者

生濟二至九一二九

治老人虛弱腎氣虛損腰痛不可屈伸

附子炮去皮

桂心

杜仲制

補骨脂炒各一兩

鹿角霜

鹿角鎊

鹿茸酒炙

青鹽另研各半兩

右為末酒煮糊九桐子大每服七十九空心用胡桃肉細嚼

鹽湯或鹽酒送下如畏熱藥者去附子加肉荑蓉

三因腎著湯 百二十 治腎虛身重腰冷如在水中不渴小便自

利食飲如故腰下重痛如帶五干錢

茯苓

白朮

炙甘草

乾薑 炮各二兩

右咬咀每服四錢水煎空心冷服○一方用薑四兩朮二兩

○良方每服有杏仁五分治妊娠脚腫

韓茵陳附子湯 一三一 治發黃服四逆湯身冷汗不止者

附子

二個各八片

乾薑

炮二兩

茵陳 一兩半

右用水煎分作三服

韓小茵陳湯 一三二

治發黃脉沉細四肢及遍身冷

附子

一個炮八片

炙甘草

一兩

茵陳 二兩

右用水二升煮一升分作三服

韓茵陳橘皮湯 一三三

治身黃脉沉細數熱而手足寒喘嘔

煩躁不渴者

茵陳

橘皮

生薑

各一兩

泉

二錢半

半夏

茯苓

各五錢

右用水四升煮取二升放溫分作四服

五疔散

一三四

方在和陣一五六

治五疔五噎

十疔散

一三五

方在和陣一五八

治十般疔氣

五噎散

一三六

方在和陣一五九

治諸氣結聚胸隔痞悶痰逆惡心飲食不進

良方

白朮聖散子

一三七

治一切瀉痢久不瘥并婦人產後痢疾

白朮

砂仁

當歸

肉苁蓉

乾薑炮

陳皮

炙甘草

石榴皮

訶子

芍藥

各等分

右咬咀每服五錢水一鍾半入乳香一豆大煎八分食前服

仲景吳茱萸湯 一三八

嘔而胸滿乾嘔吐涎沫頭痛及食穀欲

嘔者此方主之

吳茱萸 一升

人參 二兩

生薑 六兩

大棗 十枚擘

右四味以水五升煮取三升溫服七合日三服

良方吳茱萸湯 一三九

治冒暑伏熱腹痛瀉痢或飲食過度霍

亂吐瀉或食冷冒寒或忍饑大怒或因舟車傷動胃氣令人吐瀉並作轉筋逆冷等證遲則不救

吳茱萸 木瓜

食鹽 各半兩

右同炒令焦先用磁瓶盛水三升煮百沸入藥煎至二升已

下傾一盞或冷或熱隨病人之便服之○若卒無前藥止用

鹽一撮醋一盞同煎八分溫服或鹽梅鹹酸等物皆可用

吳茱萸散 百四十

治腸痺寒濕內聚腹痛滿氣急大便飧泄

炮乾薑

炙甘草

吳茱萸

肉豆蔻

麵裹煨

砂仁

神曲 炒各一錢

白朮

厚朴

薑制

陳皮 名二錢

一方有良薑

右為末每服二錢空心米飲調下

海 吳茱萸丸 一四

治下痢藏府不調脹滿腹痛水穀不化

怠惰嗜臥時時下痢乃陰濕證也

吳茱萸

兩半湯先炒

神麩

炒五兩

白朮

炒四兩

肉桂

乾薑

飽各二兩半

川椒

去目炒一兩

右為末糊丸桐子大米飲下三五十九食前服

湯 八味湯 一四二

治脾胃虛寒氣滯不行心腹刺痛藏府虛

人參

當歸

炮薑

吳茱萸

湯炮七次

肉桂

丁香

木香

陳皮

各一錢

右咬咀水一鍾半煎七分溫服無時○按此湯味太剛烈當加炙甘草方妙

仲景

真武湯

一四三

治少陰傷寒腹痛小便不利四肢沉重疼

痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔者

茯苓

芍藥

生薑

各三兩

白朮

二兩

附子

一枚炮去皮切八片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服○若欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩○小便利者去茯苓○下利者去芍藥加乾薑二兩○嘔者去附子加生薑足前成半斤

長九寶丹

一四四

調理脾胃止泄瀉

人參

白木炒

茯苓

炙甘草

乾薑炮

木香

藿香去土

訶子去核

肉豆蔻

麵炒各一錢

水一鍾半加薑煎食遠服

濟四桂散一四五

治本元氣虛真陽耗散臍腹冷痛泄瀉不

人參

附子炮

白茯苓

木香各一兩

右咬咀每服五七錢水一鍾半煨薑五片鹽少許食遠煎服

○滑泄不止加肉豆蔻訶子各六桂散○活人有白木無訶

子

神白通湯一四六

治少陰病下利

葱白四莖

乾薑一兩

附子一枚生用法皮破入片

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

白通加豬膽汁湯即於前方加人尿五合猪膽汁一合治少陰下利無脉乾嘔而煩者服湯後脉暴出者死微續者生

神 桃花湯

一四七

治少陰傷寒下利便膿血

赤石脂

一半篩末

一半全用乾薑一兩

粳米一升

右三味以水七升煮米令熟去滓温服七合内所篩赤石脂細末方寸匕攪勻服之日三服若一服愈餘勿服

古 漿水散

一四八

治暴瀉如水周身汗出一身盡冷脉微而

弱氣少不能語者甚者加吐即為急證

半夏

一兩制

附子制

炮薑

肉桂

甘草

各五錢

良薑

二錢半

右為末每服三錢漿水一鍾半煎至半鍾熱服

附子茴香散

一四九

治氣虛積冷心腹絞痛泄瀉食少

人參

白朮

茯苓

炙甘草各七分

附子制

炮薑 各五分

茴香

肉豆蔻 各四分

木香 三分

丁香 五粒

水一鍾半煎七分食遠服

本 事 五味子散 百五十

治腎泄在侵晨及五更作瀉飲食不進

不昨去後

五味子 炒二兩

吳茱萸 炒一錢

右為末每服二錢白湯調下為丸尤效

本 事 二神丸 一五一

治脾胃虛寒不思飲食泄瀉不止

肉豆蔻 生用二兩 破故紙 炒四兩

右為末用大肥棗四十九枚入生薑片四兩同煮以棗爛為

度去薑取棗肉搗藥為丸桐子大每服五六十丸白湯下

薛 氏 四神丸 一五二

治脾腎虛寒大便不實飲食不思及泄痢

腹痛等症

破故炒四兩 肉豆蔻炒 五味子 各二兩 吳茱萸湯浸炒

右為末用大棗百枚同薑八兩煮爛取肉搗丸桐子大每服

七八十九空心食前白湯下○按此丸不宜用棗但以薑汁

煮麩糊為丸更佳

瀉 四神丸 一五三 治脾腎泄清晨溏瀉

破故炒四兩 肉豆蔻 二兩 木香 半兩 小茴香炒一兩

右為末薑煮棗肉為丸桐子大白湯送下

醫 四神丸 一五四 治寒疝脹痛不已

萹澄茄 木香 各半兩 吳茱萸半酒浸 香附 各一兩

右為末糊丸桐子大每服七八十九空心鹽湯或乳香葱湯

任下

集 四神丸 一五五 方在補陣百六十

治小便頻數不禁

五味子丸 一五六 治下元虛寒火不生土以致命門不煖關

門不閉名曰腎泄亦名脾腎泄

人參

白朮 炒

北五味子 炒

破故

炒各三兩

山藥

炒

白茯苓

各兩半

吳茱萸

湯泡炒

川巴戟

去心炒

肉果

麩煨各一兩

龍骨

右為末酒糊丸桐子大每服百餘丸食前白湯或米湯任下

續華撥丸 一五七

治滑泄中寒者宜之

華撥

川薑

炮

丁香

不見火

附子

炮去皮臍

良薑

胡椒

吳茱萸

湯浸炒各一兩

山茱萸

草豆蔻

去皮各半兩

煮棗肉丸桐子大每服五六十丸食前陳米飲下日三服

局肉豆蔻丸 一五八

治脾胃虛弱脹滿水穀不消臟腑滑泄

肉豆蔻

麩煨

蒼朮

制

乾薑

炮

厚朴

制

陳皮 各四兩
炙甘草
茴香 炒
肉桂

川烏 炮去皮
訶子肉 各二兩

右用湯浸蒸餅為丸 梧子大每服七八寸九食前日滾湯下

陳氏肉豆蔻丸 一五九
方在小兒五六

治脇滑瀉痢

濟生訶梨勒丸 百六
治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛飲食

不化

訶梨勒 麩裹
附子 炮
肉豆蔻 麩裹
木香

吳茱萸 湯泡
龍骨 生用
白茯苓 去皮
葶撥 各等分

右為細末生薑汁煮 麩糊為丸梧子大每服七十九空心米

飲下

良方厚朴丸 一六一
治寒中洞泄實滯脹滿等證

厚朴 炒
乾薑 炒等分

右水拌炒為末水糊丸桐子大每服五十九米飲下

百縮脾丸 一六二 治滑泄不禁

白朮 炒 厚朴 薑炒 赤石脂 肉豆蔻 麵煨

乾薑 炒各一兩 附子 兩 薑撥 神麩 炒各五錢

右為細末醋糊丸桐子大每服五七十九空心米飲下

三桂香丸 一六三 治臧府虛寒為風寒所搏冷滑注下不禁

危篤者累效

附子 肉豆 乾麩煨 白茯苓 各一兩 桂心

乾薑 炒 木香 各半兩 丁香 二錢半

右為末麩糊丸桐子大空心米飲下五七十九

寶鑑 陳麩丸 一六四 磨積止瀉痢治腹中冷痛

陳麩 一兩半 人參 白朮 炒 當歸 炒

乾薑 肉桂 甘草 炙 厚朴 各半兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服三五十九丸温酒或淡醋湯任下

日二服

^{楊氏}革薺分清飲 一六五 治真元不足下焦虛寒或服寒凉劑

藥過多小便白濁頻數無度澄如膏糊等證

益智仁 川革薺 石菖蒲 烏藥 各等分

右咬咀每服五六錢水一鍾入鹽一捻煎七分食前温服〇

一方加茯苓甘草

益智湯 一六六 治腎經虧損遺精白濁四肢煩倦時發蒸熱

等證

鹿茸 巴戟肉 枸杞子 熟地黄

菴蓉 牛膝 附子 桂心

山茱萸 白芍藥 炙甘草 防風

右每服三錢水一盞薑五分鹽少許同煎空心服

局安腎丸 一六七

治腎經積冷下元衰憊目暗耳鳴四肢無

力夜夢遺精小便頻數臍腹撮痛食少體瘦神困健忘常服

壯元陽益腎水

肉桂 去槿皮 不見火

川烏

炮去皮臍 各一斤

白朮

山藥

茯苓

肉蓯蓉

酒浸炙

巴戟

去心

破故

炒

革薺

桃仁

剉炒

石斛

炙

白蒺藜

炒去刺 各三斤

右為末煉蜜丸桐子大每服三五十九溫酒或鹽湯下空心

食前服○疝氣茴香湯下○三因安腎丸無茯苓肉桂二味

小安腎丸 一六八

治腎氣虛乏下元冷憊夜多漩溺體瘦神

倦腰膝沉重泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛

川棟子 一斤

用香附子川烏各一斤加鹽四兩水四升

同者候乾去香附川烏不用取川棟切焙

小茴 一兩

熟地

八兩

川椒

四兩去閉口者微炒出汗

右為末酒糊丸桐子大每服三三十九空心踏臥鹽湯或酒任下

西蜀石刻安腎丸 一六九

治真氣虛憊脚膝軟弱夜夢遺精小

便滑數

附子 制

肉桂

川烏 制

川椒 去目微炒出

兔絲 制

巴戟 制

破故 酒炒

赤石脂 煨

遠志 制

茯神

茯苓

蒼朮 米泔浸炒

山茱萸

杜仲 制

石斛

胡蘆巴 炒

柏子仁

韭子 微炒

小茴 酒炒

肉蓯蓉 酒浸

川棟子

酒蒸去核 各二兩

鹿茸 制一兩

青鹽 四錢

山藥

四兩作糊

右為末酒煮山藥糊丸桐子大每服七八

十九空心鹽湯或

白湯下

元戎小已寒丸 百七十 一名強中丸○治脾胃積冷中寒洞泄

倦怠不思飲食進食止自汗厚腸胃○見肘後甚驗

艾葉 四兩 蒼朮 一兩 吳茱萸 炒 陳皮 炒各二兩

右用米醋三升浸一宿漉出曝乾再於原醋內拌勻炒令紫

色焙乾為末稀糊丸桐子大每服三五十丸空心食前溫酒

鹽湯米湯白湯任下

局方大已寒丸 一七一 治藏府虛寒心腹癆痛腸鳴泄瀉自利

自汗米穀不化手足厥冷陰盛陽衰等證

藜蘆 肉桂 各四兩 乾薑 炮 良薑 各六兩

水煮麩糊為丸桐子大每服二三十丸食前米飲下

元戎大已寒丸 一七一 治諸沈寒冷秘等證

吳茱萸 官桂 乾薑 良薑

烏頭 附子

右為末醋糊丸桐子大每服三五十九米飲下空心食前日
二服無所忌

戒

已寒丸 一七三

此丸不僭上而陽生於下○治陰證服四

逆輩胸中發躁而渴者或數日大便秘小便赤澁服此丸上
不燥大小便自利

肉桂

附子炮

烏頭炮

良薑

乾薑

芍藥

茴香

各等分

右為末米糊丸桐子大空心溫水下五七十九或八九十九
食前亦可酒醋糊丸亦可○海藏云已寒 上五味雖熱以芍
藥茴香潤劑引而下之陰得陽而化故大 小便自通如得春
和之陽冰自消矣

十補丸

七四

治腎藏虛冷面黑足寒耳聾膝軟小便不利

等證

附子炮

五味 各二兩

山藥

丹皮

桂心

鹿茸制

茯苓

澤瀉 各一兩

煉蜜丸桐子大每服六七十丸鹽湯下

百十補丸 一七五 治小腸寒疝

附子制 一大枚

胡蘆巴

木香

巴戟天

川棟肉

玄胡索

官桂

葦澄茄

大茴香

破故紙 炒各一兩

右為末酒煮糯米粉糊為丸桐子大硃砂為衣空心酒下五

十九

集神應散 一七六

治寒疝諸疝心腹痛不可忍散氣開鬱

玄胡索

胡椒

小茴香 等分

右為末每服二錢酒調下

金匱當歸生薑羊肉湯 一七七

治寒疝腹中痛及脇痛裏急者

當歸 三兩

生薑 五兩

羊肉 一斤

右三味以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒多者加

生薑成一斤痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩如加生薑

亦須加水五升煮取三升二合服之

溪腎氣丸 一七八

治諸疝痛

小茴香 炒

破故紙 炒

吳茱萸 鹽炒各五錢

胡蘆巴

七錢半

木香 三錢半

右為末蘿蔔汁丸桐子大鹽湯下五七十九

百選胡蘆巴丸 一七九

治小腸氣蟠腸氣奔豚疝氣偏墜陰腫

小腹有形如卵上下來去痛不可忍或絞結遶臍攻刺嘔吐者

胡蘆巴 炒一斤 大巴戟 炒

川烏 炮去皮 川棟子 炒十八

茴香 一十兩

吳茱萸 湯浸七次炒十兩

右為末酒糊丸 桐子大每服十五丸至二十九丸空心溫酒下

棟丁香棟實丸 百八十

治寒疝氣血留滯

當歸 酒洗

附子 炮

川棟肉

茴香 各一兩

以上咬咀用好酒三升同煮酒盡焙乾為末每藥末一兩入

沒藥 丁香

木香 各五分

全蝎 十三個

玄胡索 五錢

右俱為末拌勻酒糊丸桐子大每服三五丸加至百丸空

心溫酒送下

苦棟丸 一八一

治奔豚小腹痛神效

川苦棟子

茴香 各二兩

附子 一兩

炮去皮臍

右三味用酒三升同煮盡為度焙乾為末每藥末一兩入

玄胡索 二錢

一作五錢

全蝎 十八個

炒

丁香 十八粒

俱為末和勻酒糊丸桐子大溫酒下五十九空○如痛

甚煎當歸酒下

良方三層茴香丸

一八二

治腎與膀胱俱虛邪氣搏結不散遂

成寒疝臍腹疼痛陰丸偏大膚囊壅腫有妨行步或瘙癢不止時出黃水浸成瘡瘍或長怪肉或外腎臍脹冷硬如石日以漸大須溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝煖養腎經凡一應小腸氣寒疝之疾久新不過三料

第一料

舶上茴香

用鹽半兩同炒焦黃和鹽秤用一兩

連下共重四兩

川棟子

炮去核

沙參洗

木香

各一兩

右爲細末米糊丸桐子大每服二三十丸空心溫酒或鹽湯下日三服小病一料可安病深者一料總盡便可用第二料

第二料

如前方加華撥一兩 檳榔五錢

右六味共重五兩半依前糊丸服如前若未愈再服第三料

第三料

如前方加白茯苓佳者四兩 附子炮去皮臍或五錢或一兩

右八味共重十兩丸服如前漸加至三四十九丸凡小腸氣頻發及三十年者或大如枵枵者皆可消散神效

奪命丹一八三

以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰間濕癢等證

吳茱萸揀淨一斤 分四分用酒醋鹽湯童便各浸一宿焙乾

澤瀉浮片二兩 酒浸一宿

右為末酒糊丸 桐子大每服五十九丸食前鹽酒或鹽湯下

族奪命丹一八四 方在婦人六五

治瘀血入胞脹滿難下

萬氏奪命丹 一六

方在痘疹八二

治痘瘡倒

毒發痘

外科奪命丹 一

方在外科七七

治疔瘡發

毒惡證有奪命之功

局二氣丹 一八七

治虛寒積冷小便不禁老人虛人尺脉微

弱患此者

硫黃 制研細

肉桂 各二錢 乾薑 炮

朱砂 研為衣

附子 制半兩

右以麩糊丸桐子大每服二十九空心鹽湯下

局半硫丸 一八八

治高年冷秘虛秘及痲痺冷氣○簡易曰

此潤劑也

半夏 湯淘七次焙乾為末

硫黃 明淨者研極細用柳木槌子殺過

右等分以生薑汁打糊丸桐子大每服五七十九丸用無灰酒或生薑湯任下

養正丹 一八九

治上盛下虛眩運此藥升降陰陽及欬逆翻

胃霍亂吐瀉中風涎潮不省人事傷寒陰盛唇青自汗

硫黃 為末

黑錫 鎔淨

水銀

硃砂 研各一兩

右將錫鎔化入硫末斬入漸攪為末再入水銀同搗如硬再於火上微煨又搗勻放冷研極細末糯米糊丸綠豆大每服三十九丸空心鹽湯下

局 黑錫丹 百九十

治痰氣壅寒上盛下虛腎水虧竭心火炎

盛或一應下虛陰寒真頭痛等證及婦人血滯久冷無子赤

白帶下

黑錫 去滓二兩 炒末

硫黃 二兩

肉桂 五錢

附子 炮

木香

沉香

舶茴香

故紙

陽起石 水飛

葫蘆巴 酒浸炒

肉豆蔻 麩裹

金鈴子 蒸去皮核

右用新鐵銚將錫花開下硫黃末提起以木杵搗極細放地上退火毒同餘藥研一日至黑光色為度酒糊丸桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服四十九空心薑鹽湯下女人艾

棗湯下

局紅丸子 一九一

和脾胃消宿食去膨脹治大人小兒脾胃

之證極有神效

京三稜 浸軟切片

蓬朮 煨

青皮

橘紅 各五斤

乾薑 炮

胡椒 各三斤

右為末用醋糊丸桐子大礬紅為衣每服三十九食後薑湯

送下○小兒臨時加減與服丸治飲食所傷中脘痞滿服之

應手而愈○妊婦惡阻嘔吐全不納食百藥不治者惟此最

妙可佐二陳湯服之但人疑其墮胎必不信服每易各用之

時有神效但恐姪婦偶爾損動未免歸咎此藥是當酌而防之

椒囊法 一九二 辟一切瘴疾時氣風寒時氣

紅川椒 去閉口者

以絳紗囊貯椒兩許懸佩身傍近裏衣處則一切邪氣不能

侵犯

椒紅丸 一九三 治元臟傷憊目睛耳聾服此百日覺身輕少

睡足有力是其效也服及三年心智爽悟日明倍常面色紅

悅鬚髮光黑

川椒 去目并台日者炒 生地黄 搗自然汁熬 取濃汁一斤

右將生地汁 至稀稠得所和椒末搗丸梧子大每空心温

酒下三四七 合藥時勿令婦人雞犬見○有詩曰其椒應

五行其仁 義欲知先有功夜間無夢寐四時去煩勞五

會稽 張介賓 會鄉著

會稽 曾超 謙菴訂

固陣

右牡蠣散

治諸虛不足及大病後體虛津液不固常常自

江

黃芪 蜜炙

麻黃根

牡蠣

煨醋中各二錢生

水一鍾半加小麥百粒煎八分食遠溫服

牡蠣白朮散二 治漏風證以飲酒中風汗多食則汗出如洗

久而不治必成清渴

牡蠣 煨一錢 白朮 炒

防風 各二錢

水二鍾煎八分食遠溫服

白木散三

為消渴證

治虛風多汗食則汗出如洗少氣痿弱不治必

白木二兩

防風五兩

牡蠣煨六錢

右為末每服一錢溫水調下不拘時○如惡風倍白木○如多汗而腫倍牡蠣○按此方雖與前同而用法不同故并存之

神效麥麩湯四

治心虛盜汗

麥麩

炒黃色

防風

白木炒

牡蠣煨醋淬

黃芪

蜜炙一錢

水一鍾半棗二枚煎八分調服辰砂妙香散極效在後十五

黃芪湯五

方在補陣四六

治自汗盜汗

寧肺散六

治新久欬嗽肺氣不通咯唾膿血自汗欬嗽常

年不愈者服之立止并坐臥不安語言不出等證

烏梅肉七分 罌粟殼二筋蜜炙

右為細末不拘時烏梅湯

選安眠散七 治上欬嗽久而不止

欬冬花 麥門冬 烏梅肉 佛耳草各四分

橘紅五分 炙甘草三分 粟殼蜜炙一錢

右為末水一鍾煎八分入黃蠟如棗核許煎化臨睡溫服

丹百藥煎八 劫嗽立止

百藥煎 訶子 芥穗等分

右為極細末蜜丸噙化

集三妙湯九 治久嗽

水一鍾半煎七分食後服

九仙散十 治一切欬嗽不已

烏梅肉 二個
北棗 三枚

人參 款冬花

粟殼 蜜炙四箇

桔梗 桑白皮

五味子

阿膠

貝母

烏梅 各五分

御粟殼 一錢 蜜炙

水一鍾半 薑一片 棗一枚 煎七分 食遠服

劫嗽丸 十一

治久嗽失氣失聲者宜此 欬之新欬者不宜用

也

訶子肉

百藥煎

別芥穗 等分

右為細末 蜜丸 喻化

五味子 九十二

劫欬如神

五味子

五錢

甘草 二錢 半

文蛤

風化硝 各一錢

右為末 煉蜜丸 芡實大 喻化

罌粟丸 十三

治一切久嗽 勞嗽 一服即愈

罌粟殼

新者一半去

切焙乾

陳者

一半泡去筋膜

炒各一兩

右共為末蜜丸彈子大

嚼服一九〇一方用罌粟子半

斤淘淨焙乾炒黃為末沙

九彈子大每服一九臨臥綿包

含化

統潤肺九十四

治欬嗽

訶子

五味子

五倍子

甘草等分

右為末蜜丸含化〇久嗽者加罌粟殼

辰砂妙香散

治心氣不足驚癇或精神恍惚虛煩少

氣少睡夜多盜汗心虛遺精白濁服之安神鎮心

黃芪

山藥

薑汁炒

茯苓

茯神

遠志

甘草湯制各一兩

人參

炙甘草

桔梗

各五錢

木香

二錢

射香

研

另

硃砂

三錢另研

右為末每服二錢不拘時以酒調下或用麥麩湯調下

局方 王荆公妙香散 十六

安神秘精定心氣

人參

龍骨

五色者

益智

各一兩

白茯苓

白茯苓

遠志

制

甘草

炙各五錢

硃砂

飛二錢半

右為末每服二錢空心臨臥溫酒調下

本 金鎖丹 十七

治夢泄遺精關鎖不固

船荷

葫蘆巴

破故

炒

白龍骨 各一兩

木香

兩半

吳桃肉

研膏

羊腎

三對切開用鹽半兩擦炙熟搗膏

右為末和二膏加酒浸蒸餅為丸桐子大每服三五十九空

心鹽湯下

和 金鎖正元丹 十八

治真氣不足遺精盜汗目暗耳鳴敗敗

短氣四肢疲倦一切虛損等症

補骨脂

浸炒

酒

肉蓯蓉

洗

紫巴戟

去心

葫蘆巴

炒各

文蛤 八兩

茯苓 兩

六龍骨 二兩

硃砂 三兩另研

右為細末酒糊丸桐子大每

服二十九空心温酒鹽湯任不

萬 氏金鎖思仙丹 十九

治男之嗜慾太過精血不固此澁以去

脫之劑

蓮蕊

芡實

石蓮子

各十兩 金櫻膏 二斤

右以金櫻煎膏如飴入前

味藥末和丸桐子大空心鹽酒

下三十九服久精神完固

能延年平時服食忌葵菜車前

子

林醫 金鎖匙丹 二斤

治男婦

滑遺泄不禁夢與鬼交

茯苓

茯神

各二錢

遠志 制

龍骨

煨各三錢

左顧牡蠣 煨四錢

右為末酒糊丸桐子大每

四十九空心鹽湯或酒下

鎖丹 二一

治玉明不閉

精日久如水之漏不能關束者

文蛤 八兩

白茯苓 二兩

白龍骨 一兩

右為細末米糊丸桐子大每

服七十九空心淡鹽湯下臨睡

更進一服極效

細 巨鎖月 二二

治精氣虛

遺泄不禁

龍骨

蓮花蕊

雞頭子

烏梅肉 等分

右為末用熟山藥去皮為膏

和丸小豆大空心米湯下三十

丸

經驗水陸二仙丹 二三

治

脫腎虛夢遺白濁等證與補陰

藥同用甚有奇效

金櫻膏 一斤

用金櫻

不拘多少入粗麻布袋內擦去

毛刺搗爛入缸以水

頭浸一二宿濾去粗取汁以棉

濾二三次却入銅鍋用

木柴文火熬成膏取匙以磁瓶

收貯聽用

芡實粉 一斤

右一味和勻丸桐子大每服二三百丸空心淡鹽湯下

經驗金櫻丸二四 治夢遺精滑小便後遺溺

金櫻子 芡實 各一兩 龍骨 煨 白蓮蕊 各五錢

右為末糊丸桐子大每服八十九丸空心鹽酒下

正傳經驗秘真丹 二五 治腎虛遺精夢泄白濁等證

兔絲子 制 非子 破故 炒 杜仲 薑湯炒

乾薑 炒 各一兩 龍骨 牡蠣 煨 山茱萸

赤石脂 錢 各五 遠志 覆盆子 巴戟肉

枸杞 山藥 各七錢 鹿角膠 半兩 柏子仁 一兩

金櫻子 取黃者去刺核 黃柏 鹽酒炒 七錢五分

右為細末煉蜜丸桐子大每服百丸空心薑鹽湯下

烏鎖精丸 二六 治白濁白帶小便頻數

破故紙

青鹽

白茯苓

五味子

炒等分

一方用五楮子

右為末酒糊丸桐子大每服三十九空心温酒下

東垣固真丸 二七

治精滑久不愈

牡蠣

不拘多少

用砂鍋內煨醋淬七遍為末

右以醋糊為丸桐子大每服五七十九空心

鹽湯下

良方固真散 一八

治纔睡着即泄精此二味大能澁精固真氣

煖下元

莊子 一合

白龍骨 一兩

右為細末每服二錢空心用酒調服

濟生固精丸 二九

治下元虛損白濁如脂或胞氣虛寒腰重少

力小便無度並效

牡蠣 煨

兔絲子

酒浸蒸

韭 炒

龍骨

煨

北五味 炒

白茯苓

桑螵蛸 酒炙

白石脂 煨各等分

右為細末酒糊丸桐子大每服七十九空心鹽湯下

直指固精丸 三十

治腎虛有火精滑心神不安

黃柏 酒炒

知母 酒炒各一兩

牡蠣 煨

龍骨 煨

蓮蕊

芡實

山茱萸

遠志 甘草製

茯苓 各三錢

右為末山藥糊丸桐子大每服五十九空心溫酒下

一自固元丹 三一

治元臟久虛遺精白濁五淋及小腸膀胱痛

氣婦人赤白帶下血崩便血等疾以小便頻利為效

好蒼朮刮淨米泔浸咀片一斤 擇堅而小者佳惟茅山

者尤妙分作四分制之○一分用小茴香 食鹽各一兩同

炒○一分用川椒補骨脂各一兩同炒○一分用川烏頭

川練子肉各一兩同炒○一分用醅醋老 酒各半斤同煮

乾焙燥

右連炒諸藥同為末用酒煮糊丸桐子大每服三五十九男

以溫酒女以醋湯空心下○此高司法方也

御藥秘元丹 三二

治內虛裏寒自汗時出小便不禁

白龍骨 三兩

訶子肉

砂仁

各一兩

靈

砂 二兩

右為末煮糯米粥丸桐子大每服五十九空心鹽酒下

韭子丸 三三

治虛勞寒脫漏精

韭子 炒

車前子

天雄

制

兔絲子

酒煮為搗

龍骨

各一兩

鹿茸

酥炙

乾薑

炮

桑

螵蛸

炒各二錢

右為末煉蜜丸桐子大每服二三十丸空心黃芪湯下

三家韭子丸 三四

治少長遺溺及男子虛劇陽氣衰敗小便

白濁夜夢遺精此藥補養元氣進美餘食○按此方當除去

石斛倍用兔絲庶乎尤效

家韭子炒 鹿茸酥炙 肉蓯蓉酒浸 牛膝酒浸

熟地 當歸各二兩 兔絲子酒煮 巴戟肉各一兩半

杜仲炒 石斛 桂心 乾薑炮各一兩

酒糊丸桐子大每服五七十九加至百餘丸食前溫酒鹽湯任下○此小兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽氣不足也○作

小丸服之

小兔絲子丸三五 治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺

精

兔絲子制五兩 石蓮肉二兩 白茯苓一兩 山藥炒二兩分

用山藥糊丸桐子大每服五十九空心溫酒臨蕩任下○一方有五味子一兩治小便多而不禁

方局 大兔絲子丸三六 治腎氣虛損五癆七傷脚膝痠痛面色

黎黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗小便滑數

兔絲子酒制 鹿茸酥炙

附子炮 澤瀉各一兩

山茱萸 杜仲炒 茯苓

續斷 石解 防風

葶撥 巴戟肉 茴香炒

川芎 五味 桑螵蛸

右為末酒煮麩糊丸桐子大每服三五丸空心鹽湯溫酒任

下

生濟 兔絲子丸三七 治小便多致失禁

肉蓯蓉酒浸各二兩 牡蠣煨

五味子 鹿茸酒炙各一兩 雞胫炙乾五錢 桑螵蛸酒炙五錢

右為末酒糊丸桐子大每服七十九空心鹽湯溫酒任下

崩 茯苓丸三八 治思慮太過心腎虛損真陽不固尿有餘瀝

肉桂 石龍芮主土

熟地 半膝酒浸一兩

肉蓯蓉酒浸另煨

補骨脂酒炒

沉香各三兩

覆盆子各五錢

或小便白濁夢寐遺精等證

兔絲子制五兩

白茯苓三兩

石蓮肉二兩

酒糊丸桐子大每服三五十九空坐鹽湯或米湯下〇一方
有北五味子四兩兼治三消

猪肚丸三九

治小便頻數

蓮子一斤 以猪肚一個同煮 周日取出去皮心焙乾

為末

舶茴香

破故紙

川棟子

母丁香

各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五十九空心溫酒送下

經驗猪肚丸四十

止夢遺泄精進飲食健肢體此藥神應瘦

者服之自肥莫測其理

白木兩

麴炒五

苦參

白者三兩

牡蠣左扇者煨研四兩

右為末用雄猪肚一具洗淨以磁罐煮極爛木石白搗如泥

和藥再加肚汁搗半日丸如小豆大每服四五十九日進三服米飲送下久服自覺身肥而夢遺永止

良三仙丸 四一 治夢遺精滑

益智仁 二兩用鹽二兩同炒去鹽 烏藥 一兩 山藥 一兩炒

右為末山藥煮糊丸桐子大每服七十九空心茯苓湯送下

丹九龍丸 四二 治腎虛精滑

金櫻子 枸杞 山茱萸 蓮蕊

蓮肉 當歸 熟地 芡實

白茯苓 各等分

右為末酒糊丸桐子大每服五六十九或酒或鹽湯下

溫金散 四二 治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不時自汗等

證

人參 蓮肉 去心 巴戟肉 益智

黃芪 蜜炙

麥冬 去心

赤茯苓

車蘼 酒浸炒

炙甘草 各一錢

燈心十莖 棗一枚 水煎服

蓮子六一散 四四

治心經虛熱赤濁

石蓮子 六兩 炙甘草 一兩

為末 每服三錢 燈心湯調下

咸喜丸 四五 治元陽虛憊 精滑白濁 遺尿及婦人血海久

冷淫帶夢泄等證

白茯苓 去皮四兩 切塊 同猪苓二錢五分 同於磁器內

煮二十餘沸 取出晒乾 不用猪苓

黃蠟 四兩

右以茯苓為末 熔黃蠟搜和為丸 如彈子大 每空心細嚼 滿口生津 徐徐嚥服 以小便清利為效 忌米醋 惟糖醋可用 尤

忌氣怒動性

五子丸 四六 治小便頻數時有白濁

兔絲子 酒蒸 家韭子 炒 益智

茴香 炒

蛇牀子 去皮炒

右各等分為末酒糊丸桐子大每服七十九米飲鹽湯任下

遠志丸 四七 方在補陣百十四

治神魂恍惚夢遺精

本猪苓丸 四八 此方以行為止治濕鬱執滯小水頻數夢遺

精滑

半夏 一兩 將半夏破如豆粒用猪苓為末二兩先將

兩炒半夏色黃勿令焦出火毒取半夏為末糊丸桐子

大候乾用前猪苓末一半又同炒微裂入磁瓶內套之

空心溫酒鹽湯下三四十九常又服於木中開以溫酒

泄瀉經驗方 四九

治泄瀉飲食少進

用糯米一升水浸一宿瀝乾慢火炒令極熟磨細羅如飛
麩加懷山藥一兩炒研末和米粉內每日清晨用半盞
人白糖二匙川椒末少許將極滾湯調食其味甚佳且
不厭人大有資補久服之其有精寒不能成孕者亦孕
矣

固腸散 五十 治脾胃虛弱內寒主泄水穀不分下痢膿血赤

少白多腸滑腹痛心腹脹滿食減力乏

陳米 炒二兩 木香 一錢 肉豆蔻 生 粟殼 蜜炙各二錢

乾薑 炮 炙甘草 各二錢半

右為末每服二錢水一鍾薑三片棗一枚煎七分不拘時溫
服忌酒猪肉魚腥生冷

白朮聖散子 五一方在執陣一三七

治一切瀉痢久不瘳

肉豆蔻丸 五二方在小兒五六

治瀉痢腸滑不止

固腸丸 五三治瀉痢日夜無度

人參 附子 制 阿膠 炒 龍骨 研

肉豆蔻 麩煨 赤石脂 煨 醋 乾薑 炒 木香 各一兩

白朮 炒 訶子肉 各二兩 沉香 五錢

為末粳米糊丸桐子大每服七八十九米飲下

斷下丸 五四 治藏府停寒下痢不止

乾薑 炮 高良薑 細辛 各兩半 附子 制

牡蠣 煨 龍骨 研 赤石脂 煨 肉豆蔻 麩煨

訶子肉 枯礬 酸石榴皮 醋浸一宿炙黃用

右為細末醋煮麩糊為丸桐子大每服五七十丸米飲送下
椿皮散 五五
治血痢及腸風下血神效

椿根白皮 枯白礬 各二兩
槐角子 四兩
炙甘草 一兩

右為細末每服三錢米飲調下

花丸 五六
治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢腸滑不

禁日夜無度○此即仲景桃花湯之法方見熱陣一四七

赤石脂 煨醋
乾薑 炮等分

右為末湯浸蒸餅丸梧子大每服百餘丸食前米飲下日三

服○若痢久虛滑去積不已用蒼朮二兩防風五錢水一碗

煎至半碗下此丸小便利則安

生也黃湯 五七
治熱痢便血崩淋不止

生地黃 五錢
地榆 七錢半
炙甘草 二錢半

右咬咀用水二鍾煎一鍾分空心日晚二服

香梅丸五入 治腸風下血服之即止

烏梅肉

白芷

百藥煎燒有性

右為末米糊丸 桐子大每服五六十丸空心米湯下

勝金丸五丸 一名百藥散○治腸風下血瀉血不止及臙毒

便血

百藥煎三兩 生用一兩 炒焦一兩 燒存性一兩

右為末飲飯和 丸或蜜丸桐子大每服五七十丸空心米飲

下或人參湯下

生烏梅丸六十 治大便下血如神

僵蚕炒一兩 烏梅肉一兩半

右為末醋糊丸 桐子大每服四五十九丸空心醋湯下

縮泉丸六一 治脬氣不足小便頻多

烏藥 益智等分為末

酒者山藥膏為丸桐子大每服五七十九空心鹽湯下

四味肉苁蓉丸六一治稟賦虛弱小便遺數不禁○此即集

要四神丸補陣百六十

熟地六兩

五味子四兩

肉苁蓉

酒洗去
中八兩

兔絲子

制二兩

酒煮山藥糊丸

桐子大每服七八十九空心鹽酒下

固脬丸六三

治遺尿不覺小便不禁

兔絲子

制三兩

茴香一兩

桑螵蛸炙

製附子各五錢

戎鹽一錢

右為末酒煮麩糊丸桐子大每服三十九空心米飲下

牡蠣丸六四

治小便不禁

牡蠣三兩

用磁器盛以鹽末一兩桐底蓋面用炭火約

五斤燒半

日取出研

赤石脂三兩

搗碎酣拌勻濕於鐵鍋內慢火炒乾研粉

右用酒糊丸桐子大每服五十九空心鹽湯下

小茴香益智丸六五 治老人陽虛失禁及房勞傷腎遺溺

小茴香 鹽炒 益智仁 炒 故紙 酒炒 川烏 炮

烏藥各一兩

右為末山藥糊丸桐子大每服八十九鹽湯下

瀉血方

又蛤 炒為末

右以烏梅肉浸爛搗膏丸桐子大空心酒下五十九

景岳全書卷之五十九終