

古吳蔣仲芳真本

詳校醫齋宗說約

大文堂藏板

醫宗說約自序

余年十二先母周夫人見背先君子君輔公杜門讀書道義自許曰不道阿堵字以故家貧甚嘗寄食于佩舅氏家舅氏撫教有加焉於時明發有懷因思生戚遑遑大病每於誦讀之暇閒覽方書先君子遂謂小子曰汝有意於此乎古人不得爲良相



每顧爲良醫蓋良相良醫其功正相等耳
累能精之則可以自療人亦內典所謂自
利利他之道也予拜訓之下深謝不敏長
而遭滄桑之變寄迹於穹窿之陽人有疾
者按方加減與之所投輒效因而叩戶求
方者殆無虛晷竊思古人陳案雖名臻其
妙然論多方雜未易窺測不免楊朱之嘆

於燒窯夕心靈素博涉羣書斟酌
益善成山居述四卷有論有方有經有變
研備苦心但力綰不克就梓久置庋閣今
年春偶公遜叔過齋頭見而閱之謂曰汝
有此而不與人共之不亦同於懷寶迷拜
者乎且汝先子之言具在顧其忌諸予蓋
唯唯謝不敏長夏無事因於山居述中篇

其要者爲主方隨症加減一症一方以見
其常加減附論以通其變編爲俚句名曰
說約庶幾學岐黃者得會歸之源去煩苦
之失耳若曰從此活人功與調元者等則
豈敢

熙二年夏四月士退自了漢將示言

仲芳北識

醫宗說約凡例

一望色聞聲同症相刑俱業醫之首事也今摘靈素之奧旨百家之微論取其切要者貢於編首爲初學登高之自

脈法行世者多矣備者繁多簡者缺略寸候一腸高陽招辨今以內經脈法爲主附以先賢類論二十九象主病分明熟讀細玩指下自能了然

一醫之用藥猶將之用兵也不識兵法何以定亂不知藥性何以攻疾今取本草之切用者刪繁去泛編成歌訣以便記誦兼注炮製於下臨用自無疑惑

一君臣佐使湯丸法製俱製方之要標本先後上下虛實方治

病之機冷取先哲成言并獨得之秘附十三條於後以便考焉

一卷二卷俱係雜症上究靈素下採百家勾精摘要編成是訣前段言病之原病之狀中段述病之主方後段隨症加減或一句一法或二句四句一法以盡寒熱虛實之變其言淺其意深其詞簡其法備細心熟究實能活人

一主方中藥名用一字者則註二字于旁二字者註一二于側以便初學至于藥物分兩多少不可移易者已註明于下或同等分或可隨病君臣隨意加減者不敢先爲拘定隨司命變通之也

一條中方名古人名用一病名用口藥名用口一以便

記識

傷寒論惟漢張長沙爲鼻祖三百九十七法一百二十三方
名曰活人書頗費記誦迨後節菴陶華提綱舉領集方四士
名曰殺車椎法人稱其便亦苦簡畧今讀仲景之書勾其精
要編賦二章以節菴之方補其未備約歌六十孰讀會通自

有補耳

一小兒病名曰啞科以其口不能言也惟情色相刑觀綈切
脉以知其臟腑之病誠非易事今以先哲察病等法編爲歌
括更得名家秘方條附于後治効者置預爲條合莫待臨渴

鑒井

一女科雜症與男子同也。所異者惟胎前產後調經種子。崩帶乳疾耳。今此數條。示古人聿推專科法。并獨得秘編。訣兵陳使學者知所宗。不致望洋而嘆。

一瘍家經絡表裏陰陽。古人言之詳且盡矣。醫者每以癰疽形象外見秘方。可效而忽之。遂至實實虛虛。禍不旋種。今以經絡部分。陰陽善惡。腫瘍泄瀉。補瘍之法。總成一賦。其外治升丹降丹等方。起死回生。木不輕傳。其如濟人必急。不冒不公。諸同志業瘍醫者。先爲修煉庶不負一片婆心也。

一讀古人書。如東垣升補養正。爲先子和三法去那。爲急河間。

火熱丹溪濕痰立齋溫補各臻其妙豈古人矛盾若是哉蓋
古人著書議論非是見不傳醫案非疑難不記欲補前人所
未備也今之學者讀是書卽況是說往往有偏僻之弊吁人
有南北病有輕重法有變更豈一家言所能盡乎此集總採
古人之遺意斟酌盡善庶無偏僻之謂也

醫自岐黃之神聖歷代之名醫方書充棟精微元奧未易入
門是集也病狀合病脉病原合病方變何症而爲寒兼何脉
而爲熱虛實有據表裏無疑一見了然誠初學指南也卽未
諳醫者一展卷則脈症方治虛實加減燦然于目亦可對症
投藥矣敢曰沾人心切聊爲濟衆者之一助也高明其亮諸

康熙元年中秋望日虞山嚴惺文若氏識

前題人吳其昌賦成

前題人吳其昌賦成

大學生吳其昌賦成

大學生吳其昌賦成

大學生吳其昌賦成

大學生吳其昌賦成

大學生吳其昌賦成

大學生吳其昌賦成

醫宗說約目次卷之壹

望色

聞聲

別症

相形

頭
肢體

額

鼻

頸

耳

唇

舌

內經分配臟腑脈法

內經三部臟腑圖

珍法集要

共十條

脉象辨共八條

藥性炮製歌

七絕脈法

草部一百三十九種

菜部十種

木部共五十五種

人部九種

禽獸部十九種

魚蟲部共二十九種

金石部三十種

東部十八種

十八反歌

穀部共十一種

十九畏歌

君臣佐使法

製度引經法

服藥時候法

峻阻丸散合宣法

李時珍煎藥法

貴賤少長異治

病在上而求諸下醫案
病在下而求諸上醫案
虛中實火中虛實案四條
治病須求其本

製方定見案

謬撮得宜案

雜症卷之一

中風

傷風

中寒

暑病

注夏

溫症

火症

內傷

傷食

調理脾胃

酒客病

五鬱

諸氣

癰症

喉嚨

喘急

哮症

附陰虛疾

瘧疾

霍亂

泄渴

痢疾

積聚

痞滿

嘔吐

噎膈反胃

呃逆

喫氣

吞吐酸

嘈雜

水腫

鼓脹

癰癧

朱血

吐血

咯血

衄血

雜症

汗症

頭痛

心痛

腹痛

脇痛

腰痛

臂痛

背痛

痛風

眩晕

麻木

五痺

瘡症

癰症

癲狂

京悸

怔忡

健忘

虛煩

不寐

黃疸

斑疹

便濁

五淋

小便秘

大便秘

三便閉

脫肛

三消

夢遺

滑精

腳氣

七疝

疊積

耳病

目病

鼻病

口舌病

牙齒病

咽喉症

傷寒利目次卷之三

傷寒賦

上篇

太陽經

正傷寒

正傷風

少明經

票病

本病

胃腑本實病

發斑

癰瘍

結膜

狂妄

少陽經

寒病

太陰經

直中真寒

少陰經

自利不渴

吐衄

動氣

直中真寒

少陰經

厥陰經

兩感症

直陰症

逆結症
熱結膀胱

熱結

下利

三陽合症

自利腸垢
腑熱

挾血症

鼻衄

瘀血上集
熱

下隻蓄血

發斑

陰厥

剛柔症

陰格陽

如狂

過汗口渴

無陽不能
作汗

戴陽

吸水不撮空
欲臨下撮空
又手當胸昏
憤尋衣摸床

懊惱症

下膿血

耽厥症

狐惑

越經症

食積

類傷寒
脚氣煩傷寒

挾痰

勞力感寒

色復

陰陽互
首合瘥後昏沉錯語勞復食復

晚發

大頭傷寒

黃耳傷寒

赤膈傷寒

二症俱
類傷寒

胎前傷寒

產後傷寒

妊娠中寒

外治法七十條

辟瘧法

發汗止汗

吐法止吐

導法解大黃芒硝法

救陰寒法

去舌胎法

法鼻衄法

治陰症呃逆法

熨結胎法

看斑法

治發狂法

治吐舌不收法

大頭傷寒

外治法

治咽喉腫痛法

小兒科女科目次

色診說

按眉端法

面色主病

虎口三門脉紋法

小兒脈法

心誠賦

虛實寒熱外感內傷六症辨

初生調攝稀痘法

變症

胎熱胎寒

臍風

撮口

驚驚

慢驚

疳積

發熱

瘡疹斑

嘔吐

泄瀉

暑症

痢疾

瘧疾

咳嗽

肺脹喘急

黃疸

目盜肝

失血

衄血
瀉血

叶血
大便下血

咯血
脫肛

諸遲

走遲
髮遲

齒遲

語遲
解顱

鶴遲
通神散

渴白丸

化毒丹

小牛黃丸

沉香末子

陳氏小紅丸

肥兒丸

紅糞丹

抱龍丸

蔣氏肥兒丸

玉樞丹

珍珠丹

雞肝藥

快活丸

夜啼方

吃泥土方

蟲癩方

遺尿方

治尿濁

小便秘方

語遲方

齒遲方

驅督方

灸法

驅督方

灸法

痘氣方

斷小兒乳法

牙疳口瘡

重舌木舌

頭面瘡火

丹每方

眼痛方

耳痛流膿

鼻瘡方

頭瘡方

臍瘡方

小兒醫案六條

女科調經

先期

將來痛

經閉塊痛

勞瘵經絕

帶下

後期

經後痛

經來不止

熱入血室

胎前諸症

惡阻

子懸

子淋

子癟

轉胞

子腫

子氣

胎水

胎漏

胎動痛

風寒頭痛

雜症

暑 痘

泄瀉 大便秘

食傷

咳嗽 耳聾

目暗

瘧疾

催生

加味達生散

臨牕

佛手散

又月法

夏天法

子死腹中

爻骨不開

宿疾

胞衣不卜

產門不閉

二宮不收

產後

旌寶湯

敗血痛

失血不止

血量少 酒薰法

冲胃冲心

寒熱

傷食熱

產勞

肉戰

中風

豆淋酒

癰症

大便結

泄瀉浮腫

食傷

嘔噦

胸脇痛

煩燥虛驚

不能言

飽悶

兒枕蒸乳

骨節痛

小產

固胎湯

四金匱丸

赤白帶下

清源收帶方

乳疾

軟溫飲子

石乳

外吹

乳發

乳漏

治帶症五法

女子脈說

調經脉治

胎產脈法

醫案七條

瘍科目次卷之四

外科賦

經絡氣血訣

三因病原
半惡症

純陽症訣

純陰症訣

瘡癆脉法

五善訣

虛實辨

七惡訣

和榮衛說

艾灸法

圍藥法

抑陽散

藥湯湯腫法

七日治法

拔針法

十四日後治法

火針法

宜針烙說

腫瘍王治法

荆防敗毒散

抑陰散

內托復前湯

敗症惡候

十四日後治法

衛生湯

藥箇吸毒法

宜針烙說

瓜蔞托裏湯

桑枝灸法

調攝法

回陽三建湯

神仙活命飲

調攝法

復生散

蠟燭丸

潰瘍主治法

全大補湯 加減法共五十二條

托裏溫中

金匱腎氣丸 附六味八味丸方

白降丹

圍藥神應丹

神燈照法

金黃散

豬蹄湯洗法

鐵桶膏

太乙膏

紅升丹

桃紅散

八寶丹

大素膏

神化丹

千柏膏

白玉膏

立馬回疔丹

疔瘡

飛龍奪命丹

立馬回疔丹

瘰癧單方四法

紅絲疔治法

潰瘍 潰聖湯

滋陰散堅湯

益氣養榮湯

桃蝎散

真人壁虎散

火針法

下疳

二靈丹

珍珠散

魚口便毒

山甲內消散

通水丹

楊梅瘡

羊內發藥

豬肉茯苓湯

腋子湯

仙遺糧湯

點洗法六條

結毒

五寶丹

丹素丹

紫金丹

碧雲散

外治法一條

痔

治痔良方

提肛散

龍膽散

洗痔黃硝湯

藥線方

枯痔方

護痔散

喚痔散

貼頂升陽散

漏

推車客散

相膠丸

追毒丸

閉管丸

臘瘡

疥瘡

芥靈丹

參聖丸

薰被法

黃赤丹

白鳳

癬

浮萍散外治法七條

疣瘡

外治法三條

白赤癩風

鶯掌風

汗斑

杖瘡

金瘡

湯火瘡

損傷

和傷活血丹

活血丹

透骨丹

益母膏

八味神消散



透骨丹

益母膏

八味神消散

透骨丹

醫學宗說約卷之一

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏纂述

錫山禪醉道人計康能元謙氏叅

虞山元虛子嚴煜文若氏較訂

望色

經曰望其五色以知其病故望色者活人之首事也靈樞經曰以五色命臟青爲肝赤爲心白爲肺黃爲脾黑爲腎內經云五臟之氣色見青如草茲者死黃如枳實者死黑如焰者死赤如血者死白如枯骨者死此五色之見死也青如翠羽者生赤如雞冠者生黃如蟹腹者生白如豕膏者生黑如烏羽者生此

五色之見生也。生于心。如以縞裹朱。生于肺。如以縞裹紅。生于肝。如以縞裹紺。生于脾。如以縞裹瓜。生于腎。如以縞裹紫。此五臟所生之外榮也。內經以一色之中。而分平病死三等。至靈樞又分明臟腑部分。及浮沉淺深。天澤散搏等法。蓋以其道之不容忽也。予畧陳其要。夫五色有光。明亮是也。五色有體。潤澤是也。光者無形。爲陽。陽主氣。體者有象。爲陰。陰主血氣。血俱亡。其色沉晦枯槁。經所謂草茲枳實。炁血枯骨。五者是也。氣血尚存。其色光明潤澤。經所謂翠羽雞冠。蟹腹豕膏。鳥羽五者。是也。此五色雖爲可生。終爲一臟之色。獨亢亢則害。病也。非平也。蓋平人五臟既和。其一臟之色。必待其旺。而始榮於外。其榮

於外也。熏胃氣而出于皮毛之間。胃氣色黃。皮毛色白。故云如
槁裹。如槁裹者。朦朧光澤。雖有形影。猶未粲然。內因氣血無乖。
陰陽不爭。五臟無偏勝故也。若或不然。五臟衰敗。其見色也。昔
之朦朧者。一變而爲獨亢。昔之光明者。一變而爲沉濁。昔之潤
澤者。一變而爲枯槁。甚至沉濁枯槁合而爲天。是光體俱無陰
陽氣血俱絕。不死又何待哉。六節臟象論曰。草生五色。五色之
變。不可勝視。至于臟腑部分。容色上下淺深。散搏等法。未能盡
陳。容于望色全書中述之。

聞聲

經曰。聞而知之謂之聖。如辨音者。聽其聲。即可以知其物。雖非
音宗說約

卷之一 望色

二

元遠誠非淺易。蓋不由音律之道造必于靜定中得也。予姑以經書中要者言之。經曰：肝在音爲角，在聲爲呼。心在音爲徵，在聲爲笑。脾在音爲宮，在聲爲歌。肺在音爲商，在聲爲哭。腎在音爲羽，在聲爲呻。口出無倫譖語也。有虛無稽怒叫狂言也。出

言壯厲先輕後重者外感也。語言頓怯先重後輕者內傷也。語

不接續鄭聲也。無人始言獨語也。三症鼻塞聲重。傷風也。聲啞

唇瘡狐惑也。卒口噤。胃反張。瘡症也。鼻鼾語塞風濕也。錯語呢

喃出言不正。熱症也。心下汨汨有聲。先渴後嘔停水也。喉中濁

濁有聲。瘻也。腸若雷鳴。氣不和。濕也。小兒驚風口不能言。心熱

也。無還聲爲鴉聲。死症也。雜病發喘。癆瘵聲啞。危病也。以上種

種君能細察實能活人。至于聞其五音以知其所君。是神聖之道存乎司命者之方寸耳。

問症

示吉曰。望聞問切。察病之四法也。望色。聞聲。切脉。古人反復言之。至于問而知之之謂工。先哲尚未發明。不無有疑焉。何以故。如至病家。問其瀉痢。以知其瀉。問其寒熱。以知其寒熱。前淺後深。必非古人之意也。卽至病家。問其病起于何日。日少爲新病。多爲久病。會食何物。食水而病。虛症居多。日用草藥。山查之類。詳傷食本條。曾有怒勞房慾等事。怒則傷肝。勞則內傷。元氣房勞。及爲初起心腹疼痛。及渴痢等症。俱屬內傷。後變何病。如痢變瀉。變瘧爲重。先喘後脹。病有肺先脹後。

病在脾。先渴後

口渴思飲

不。口不渴內無熱也。口渴欲飲爲熱。老人口乾不思飲。主津

液少。若嗽水不欲嚥。

虛淡。甘聊熱成

喜熱內寒

口不渴。喜冷內熱。口中淡苦否。

苦寒

主蓄血。主陰極發燥。

傷食不

思食難症。思食爲有

胸中寬否。

不寬傷食痰。

胃氣則

生否則無胃氣則死。

胸中寬否。

積氣滯之症。

腹中有無痛處否。

無痛病不在內。主虛有痛處主

爲虛。大小便如常否。

小便秘結。

食積瘀血之類。有痛處手按則

黃赤爲熱。清白爲寒。濁如米泔

爲虛。大便下。爲濕熱下陷。大便

暴瀉。暴瀉爲實。久瀉久痢爲

黃赤爲熱。清白爲寒。濁如米泔

爲虛。下黃亦爲熱。下清白爲寒。

足冷煖否。

足煖陽症。足冷陰症。乍

冷乍溫便結屬陽。大便

如常及平日勞逸喜怒憂思并

喜食何物。

勞則氣散。逸則氣滯

屬虛。心怒傷肝。憂傷

肺。恐傷脾。悲傷腎。喜食厚味。則生痰。醉酒則發熱。

種種問法。實爲活人之捷徑。然以此

而盡古人問而知之之義。尤未也。于靜定之中。若有所悟。蓋

今人之病。如咳嗽。發熱。瀉痢諸痛。但病之總名也。一症之中。各

有火有寒。有痰有氣。有虛有實。致症之原不同。如治咳嗽。問得
有火症。卽作火治。有痰有氣症。卽作痰氣治。因此一問。舍病名
而治病原。庶合古人之心也。昔丹溪翁名擅千古。亦不過每症
分出寒熱虛實痰火血氣等件。隨症調治。此豈有異人之目。洞
見臟腑者乎。亦惟問其症以知之也。予何人斯。敢叅末議。但願
學岐黃者。見痰卽攻痰。見火卽治火。見食卽消食。莫爲病之總
名所拘也。

相形

頭者諸陽之會也。頭重視身。名天柱骨倒。元氣敗矣。因于濕首
如裹。蓋至卑之邪而犯至高之位。其象有物以裹其首也。又有

頭搖頭眩頭暉者。經所謂狃蒙。招尤。目瞑耳聾也。蓋爲如有物以蒙其首。招搖尤甚。又兼瞑聾。是下實上虛之故。有痰有火有虛有風

額南方也。經曰心熱病者額先赤。若青黑色現主有暴疾。目肝之竅也。經曰肝病者眎青。脫陽者見鬼。脫陰者目盲。氣脫者目不明。陽氣尺陰氣盛則目瞑。欲愈之病目眎黃。目赤主熱白睛黃主黃疸。眼胞腫主風主濕。閉目見人病屬陽。閉目不見人病屬陰。凡病目明能識見者可治。若睛昏不認人或目上視或眼小目瞪直視或目邪視或目睛正圓或戴眼反折或眼胞陷下皆死症也。若病人目睛微定暫時稍動者屬瘀。宜吐。若目中不了了。大便不通者宜下。

鼻者肺之官也。肺病喘息。鼻張。經曰。脾熱病者。鼻先赤。凡鼻色青者。腹中痛。微黑者。有水氣。黃者。小便難。白者。爲氣虛。鮮紅有留飲。鼻孔乾燥者。必衄血。鼻炒如烟煤。屬陽毒熱極。鼻孔冷滑而黑。屬陰毒冷極。鼻燥息如鼾睡。屬風溫。鼻塞濁涕者。屬風熱。鼻流清涕者。屬肺寒。鼻孔痔脹者。屬肺熱有風。

經曰。心病者。顴赤。腎病者。顴與顏黑黃赤色出。兩顴大如母指主卒死。肝熱病者。左頰先赤。肺熱病者。右頰先赤。

耳者腎之竅也。經曰。耳焦枯。受塵垢。病在骨精脫者。耳聾。耳間青脉起者。掣痛。足少陽經絡亦繞耳而入耳。故暴病而耳聾耳腫。耳痛耳旁紅。皆屬少陽風熱。

經曰唇舌者肌肉之本也。肺不榮則肌肉軟。肌肉軟則舌萎人中滿。人中滿則唇反。唇反者甲篤乙死。

經曰足少陰氣絕則骨肉不相親而肉軟。齿長而垢髮無潤澤。戊篤已死。足厥陰氣絕唇青舌卷囊縮庚篤辛死。凡病人舌乾口焦爲脾熱。焦而紅者吉。焦而黑者凶。唇口俱腫赤者是熱極。青黑者是寒極。口苦者是胆熱。口甜者是脾熱。口燥咽乾者腎熱。舌乾口燥者是心熱。口噤咬牙者是風痙。唇口生瘡聲啞者是狐惑。齒燥無津液是陽明熱極。前板齒燥脉虛者是中暑。唇口舌胎斷紋者難治。唇色白者主失血。主虛。唇口燥裂是脾熱。齒如訣齒者難治。若唇青舌卷唇吻反青環口裂黑口

張道氣口如魚口唇口齶搖不正氣出不返者死

頬爲北方腎水象也。經曰骨熱病者頬先赤色赤又主腎與膀胱氣滯熱結而小便不通。

舌心之苗也。經曰心病者舌短卷。頰赤少陰氣厥逆走上則齧舌。凡見舌乾舌碎舌裂。主心火甚旺。總之舌鮮紅濕滑者。舌燥濶者凶。舌上白胎者胸中有寒。胃中有熱。故胎白而滑未入乎腑邪。在半表半裏間。法當和解。舌上黃胎者必燥渴。胃腑有邪。法當下之。舌上黑胎燥生芒刺者必燥渴亢極則難治也。法當急下。若不燥渴身不熱。舌上黑胎而滑者屬陰寒。法當急溫。若舌卷焦黑而燥者陽毒熱極亦當下之。若舌青而胎滑無熱不

渴者陰毒寒極亦當溫之。凡舌色鮮紅者吉。青黑者凶。而紫者爲陰寒。赤而紫者爲陽熱也。但見舌硬舌卷舌腫舌短舌強囊縮者難治。

經曰頭者精明之府。頭傾視深精神將奪矣。背者胸之府。背曲眉隨。腑將坏矣。腰者腎之府。轉搖不能。腎將憊矣。膝者筋之府。屈伸不能。行則偻俯。筋將憊矣。骨者髓之府。不能久立。行則振掉骨將憊矣。一病人身輕。日能轉動者易治。身重不能轉動者。難醫。掌中熱者。腹中熱。掌中寒者。腹中寒。四肢倦怠者。主中氣不足。手足牽引。口噤。難言者。名曰風症。四肢強直。口噤。頭搖者。名曰痓症。又手冒心多因過汗。尋衣摸床。名曰服空脚。手難移。

身重而痛小便短亦名曰風溫若身熱口渴揭去衣被揚手擲足脈來有力陽也熱也寒也無熱不渴欲得衣蓋或身重足冷倦卧惡寒或好向壁卧閉目不欲見光明懶與人言陰也寒也虛也總之身輕手足和煖開目欲言者吉若身汗如油喘而不休形体不仁乍靜乍亂脈浮而洪者死皮膚潤澤者生枯燥者死形如枯骨脉脫者死大骨枯槁人內陷下者死若看小兒更有八候之說兩手伸縮曰搐十指開合曰搦勢如撲曰掣頭編側曰顛身仰後曰反臂如開弓曰引目直似怒曰竄露睛不活曰視凡此者風痰驚熱所爲大人亦常犯之

內經分配三部臟腑脉法

脉要精微論曰。尺內兩傍。則季肋也。

季脇穴名。尺內尺澤之內兩旁尺之外側也。

尺

外以候腎。尺裏以候腹中。

腎有二枚。二尺候之。候腹中者所以候大腸小腸膀胱之疾。

附上

在外以候肝。內以候鬲。右

外以候胃。內以候脾。

附上尺之上關位也。肝主責責

鬲也。不及腎者。寄于肝部也。

上附上右外以候肺。內以候胸中。

上附上關之上守位也。肺

中氣。在外以候心。內以候膻中。

膻中氣海也。

前以候前。後以候後上

竝上者。督喉中事也。下竝下者。少腹腰股膝脰中事也。

示吉按經曰。持脉有道。虛靜爲保。古之神聖。尚以虛靜是戒。

今之學者。非古誰遵。而臟腑三部不能一定于胸中。寧言虛


靜乎。舊訣以經絡相爲表裏。大腸小腸列于二寸。蔡西山戴

同父滑伯仁復以二腸之病。出于尺中至先師李士材非之。

尤甚。及考丹溪脈訣二法並載予以爲信招辨之訣奚不遵岐黃之典。上從胸喉下至腰脰三焦有序。內外無乖。由此而再加虛靜之功。豈復有指下難明之謂哉。

內經三部臟腑圖

內經三部臟腑圖



寸閑尺者從魚際至高骨。
却有一寸故名寸。從尺澤
至高骨。却有一尺故名尺。
寸陽尺陰。高骨爲陰陽之
門界。故名閑。從閑至魚際。
經云上竟上也。從閑至尺
澤。經云下竟下也。胆寄于
肝。大小腸膀胱統于腹中。
故經文不及之。

診法

黃帝曰。診法何如。岐伯對曰。診法常以平旦陰氣未動陽氣未散。飲食未進絡脈調勻氣血未亂故乃可診有過之脉。

黃帝曰。平人何如。岐伯曰。人一呼脈再動一吸脈亦再動呼吸定息。脈五動閏以大息。命曰平人。平人者不病也。医不病故爲病人平息以調之。

脈經曰。欲持其脈令仰其掌。男先取左女先取右。医者覆手以中指切至高骨定其閏位。次下食指切至闕前以定寸位。再下名指切至闕後以定尺位。

叔和曰。下指之際宜相。病人長短肥瘦人長臂亦長指下宜疎

人短臂亦短指下宜密瘦人膚薄持之勿重肥人膚厚持之勿輕

樞要曰持脉之道有三。輕手循之曰舉。重手取之曰按。不輕不重委曲求之曰尋。初持脉時宜先輕手舉之以按其浮如脈浮膚上陽也。腑也內應心肺。再重手按之以察其沉如脈沉肉下陰也。臟也內應肝腎。又再不輕不重中而取之以察其中。如脈行于血肉之間中和之應也。內應脾胃。若浮中沉俱不見。則委曲而求之。若隱若見三部皆然。則爲陰陽伏匿之脉。

微毛曰平。冬胃微弦曰平。夏胃微鈎曰平。長夏胃微哭弱曰平。秋胃經曰春胃微弦曰平。夏胃微鈎曰平。診家當隨四時而察胃脉。慎勿執一

東垣云不病之脉不求其神而神無不在也有病之脉則當求其神之有無益言不論脉之數熱遲寒脈來有力卽爲有神但清其熱溫其寒自己若遲數無力是爲無神根本不固將何所恃耶

秦越人云男子生于寅寅爲木陽也女子生于申申爲金陰也故男脉在閔上女脉在閔下是以男子尺脉恒弱女子尺脉恒盛是其常也反者男得女脉女得男脉也男得女脉爲不足病在內女得男脉爲太過病在四肢右得之病在右左得之病在左隨脉言之也

脈法曰反閔脉者脉不行于寸口由列缺絡八臂後手陽明大

醫學講義 卷之十
腸之經也。以其不順行于閉上故曰反閑。有一手反閑者有兩手反閑者。此得之于有生之初。非病脉也。令人覆手診之。自見經曰。凡陰之所在。不應不應者。仰手而沉。覆手而沉也。是天地之氣使然。診家當先識運氣及南北二政之理。若不知而悞治之。反代天和。

脈象辨

浮中沉伏。脈之上下也。浮者爲主。浮于膚上舉之有餘按之不足中者爲中。行于肌肉之間沉者爲下。行于筋間舉之不見附于骨上重按不見推筋至骨始得伏者又其下也。附于骨上重按不行長短芤三脉。脉之盈虛也。長則過于本位。短則不及本位。中間有兩頭無曰短。兩頭有中間空曰芤。

平緩遲數四脉脈動之急慢也。一息四至五至曰平。爲一息一呼一吸一息三至曰遲。較之平脉稍遲。比之遲脉稍速曰緩。一息六至曰數。

促結代濶四脉脉動之有止者也。脉動數時一止卽來曰促。脈動緩時一止卽來曰結。動而中止不能卽來良久復動曰代。往來遲滯似止非止三五不調曰濶。

大洪實長弦緊牢革動滑十脉脉之有餘之類也。較之平脉稍大曰大。大與洪相似但不浮大有力浮大有力曰洪。洪與實相似但洪則重按稍衰洪而且長浮中沉三部皆然曰實長于本位曰長。長而端直如弓弦曰弦。弦而急彈如切繩曰緊。緊與弦相似緊則長而端直切急而左右彈弦則惟長而端直而已

古人弦取象于弓弦緊取象于切繫繩可知矣。浮洪有力重按則空曰革沉實有力舉

之不見曰牢狀如大荳厥厥動搖曰動中指充蒲往來流利曰

滑

小短濡弱微細濶七脉。脉之不足之類也。小于平脉曰小。短于本位曰短。浮小無力曰濡。重按不見。沉小無力曰弱。舉之乃空。細則僅存一線。猶有常位可審。微則似有若無。可虞血脉將亡濶則三五不調。惟見往來遲滯。

浮洪虛濡革散芤七脉皆浮脉之類也。浮于膚上。舉之有餘曰浮。洪則兼有力而大。虛則兼無力而軟。濡兼微。小重按則無革。兼洪大重按不見。散則類乎浮。大中手便無根蒂。芤則體原虛

軟重按傍有中空。

沉伏弱牢四脉皆沉脉之類也。沉于筋間重按不見曰沉。重按不見推筋尋之始得曰伏。弱則兼無力而小舉之不見牢則兼有力而實輕手則無。

脈象主病二十九法

示吉曰：脈氣血之神也。隱于膚中。視之不見。惟恃三指之巧而識。悔吝之機誠非易事。故脈之理微。自古難之。然豈因其難也。忍置之不問乎。上稽靈素下考百家。凡脈應于指下者。數取形求共得二十九種。其上下動止盛衰虛實往來跡象。雖極指下之幻。亦無遁情矣。從此而察三部之中。見是脉即有是症。脉症

相合內外互參爲治之法自彰也然此二十九象散見諸經起而集之者代有其人由來已久但簡要者多所缺畧備全者不免煩多岐黃之旨難測高陽之訣招辨衆議紛紛脈道轉晦故集先哲諸書述其精要補其未補條附于後聊爲持脉者登高之自可也

浮脈

宜汗宜補不宜下

春夏順秋冬逆

浮脈在上而不沉也浮于膚上舉之有餘按之不足曰浮陽也

扁鵲曰浮陽也心肺俱浮浮而大散者心浮而短濶者肺也

主風

浮而大者中風頭重鼻塞

主脹

腹脹浮大者順

主痞在外主表病

岐伯曰寸口脉浮而盛者病在外而盛者病在外

主外熱

經曰諸浮不躁者皆在陽則爲熱

主氣喘浮疾爲宿氣浮滑爲風痰浮緩主皮膚不仁

叔和曰風寒入于肌

肉也浮短主肺傷咳嗽

脈經云浮短者其人肺傷外症頭疼發

諸氣微小不過一年死

浮緊有力爲傷

寒

外症頭疼發熱無汗方合太陽經脈

浮緩無力爲傷風

外症頭疼發熱身寒自汗

浮大而虛

主內傷元氣

以致中氣陷下而發

浮大而短主陽明旺

立春後春

分前陽明之至浮大而短寸浮風在上主頭目不利

浮風在中主胸膈脇痛

痛尺浮風在下主腰痛便結脚膝疼痛

沉脉

宜下宜溫不宜汗

旺于冬心病及春夏忌見

沉脈在下而不浮也沉于肉下重手按之乃得舉之不見曰沉

陰也

難經曰沉陰也肝腎俱沉半長者肝也按之濡舉指來實者腎也

主寒

主氣

金匱云下脈沉知是氣

主水

經云肝腎脈并沉爲石水

主六鬱

兼滑疾玉兼數火玉兼細溫玉兼濡

沈緊

主停飲

叔和云沈而弦食玉主停飲者懸飲內痛

主寒

主氣

岐伯曰寸口脉沉

主裏病主癥瘕

而堅者病在中

主厥逆

沉遲爲寒極。故手足厥冷。

主洞泄沉數

有力爲實熱。

外症燥渴便沉，閉膜痛宜下。

沉

逆無力爲虛寒。

外症手足厥冷，利倦卧宜溫補。

沉實主內熱沉細主骨痛

經云

諸細而沉者皆

全瘧則爲骨痛沉滑主痰飲

戴氏作宿食。

沉伏主霍亂沉緊主

急痛

經曰寸口脉沉而緊心下有寒時痛有積聚。

沉細主寒熱沉短而敦主

厥陰旺

立冬前後得甲子厥陰之至沉短而數。

沉細懸絕主冬故以夜半死一寸

沉主陽虛心氣鬱肺氣寒閔沉胸脇疼痛尺沉主下元虛冷泄

瀉

數脈

宜寒涼忌溫熱無熱

不渴手足冷而脈數者死

數脉動太速也呼吸定息脉來六至過于平脉一至曰數爲陽

陰虧之候主熱

越人云數者府數則爲熱

主煩

經云數則爲煩

主吐

脈經曰去日數卽此

主異驚

黃帝曰脉至如

數使人暴驚

主三消

寸

數上消閑數消尺數下消

主適得病

扁昔

爲適得病前大後小卽頭痛

目眩前小後大卽胸滿短氣

數而浮

主適得病云

數而沉

主適得病

數而沈

主適得病

沈主內熱手心熱

爲邪熱入內

數細無力

主陰虛發熱

血虛之症有

爲虛熱宜

辛甘發散

數大有力

主實熱

汗骨蒸日輕

皮毛枯槁數大無力

主內傷元氣

外症口渴煩躁面赤

內外皆熱或云便秘

脉躁喘數者

爲陽主夏

故以目中死寸數

左主面赤舌燥右乾咳聲嘶閑數

左口苦脇痛右嘈雜善飢口

臭尺數左溺赤五淋右大便閉腸紅

遲脈

宜溫熱補忌寒涼剋伐

經曰察九侯獨遲者病

也遲則爲寒

主不足

寸見爲氣不足

尺見爲血不足

不足

尺見爲血不足

不足

遲脈動太慢也呼吸定息脉僅三至減于平人之脉一至曰遲

爲陰盛陽虧之候主寒

扁昔曰遲者

遲者生

主不足

主不足

主不足

主不足

主不足

主不足

遲而浮主寒。在表遲而沉主寒。在裏遲而沉細無力主中寒厥冷。倦卧指甲青。舌卷囊縮。遲而滑者脹。遲而濁者有癥結。寸遲左心虛神怯。右冷痰氣短閼。遲左面青。脇痛右中浦吐瀉。尺遲精冷。小便餘瀝。火衰不育泄瀉。

大脈

已午月脉宜洪大
形瘦脉大胸中多氣者死

察九侯獨大者病死

大較之平脉稍大也。浮中沉皆然。大之極爲洪爲實爲陽有餘。

陰不足之侯

內經

主熱主脹

經云寸口脉大
堅以濡者脹

主實主病進

經曰大則病進

主寒熱

經曰脉大者
寒熱在中

主癲病

岐伯曰大堅
疾者癲病

主不得偃卧

經曰肺氣盛脉不得偃卧

數大有力主外感風寒

邪氣有餘豁大無力主內傷

元氣正氣不足寸大

左舌乾消渴驚驚右咳嗽喘急閼大

左口

善怒。右癥脹不食。尺大。男子爲逆。二便不利。女子爲順。

獨大搏手主有孕

小脉。察九候獨小者病。人身大而脈往來小者死。

小較之平脉稍小也。中外皆然。小之極名微。名細爲正氣不足之侯。主寒。主氣血皆少。靈樞經曰。小者血氣皆少。主病在內。堅者主病在內。

主胃反

經云。小弱而瀆胃反。

主泄少氣

靈樞曰。尺膚寒其脈小者泄少氣。

小而數主陰虛

發熱小而遲主虛寒。痼冷。傷寒汗吐下後脉小爲病退。若

孔子病熱。脉小爲順。

產後傷寒。脉小非陽病見陰脉也。經曰。劉子病熱。脉體小。何如岐伯曰。手足溫則全

寒則死。

寸小左神昏。善忘驚悸。石懶言氣怯。閉小左目。昏易怒。

右

少食痞滿。尺小下元虛冷。腰膝軟疼。

滑脉 人身濡而脉往來滑者死 滑而盛病日進

滑脈行動不濇也往來流利如珠之盤展轉替然與數相似
一曰浮中如有力量 一日濾濶如欲脫曰滑爲陰氣有餘之候

經云滑者陰氣有餘也陰氣有餘爲多汗

身寒伯七日滑爲血實氣壅之候血不勝于氣也二論雖異實可互爲闡明
脉法曰閉上滑而主癲疾 經曰癲疾何如岐伯曰脉搏大
大小不勻必吐逆主癲疾

叔和滑久自己脉小堅急死不治

滑數

心中結熱滑疾胃中有寒

叔和脉盛滑堅者病在外脉滑浮而疾

謂之新病

內

女子二尺滑而和者主有子滑而有斷絕者主經

閉

尺脉偏滑疾而赤如醉外热者主經閉爲病

寸滑左心悸痰滯心包

右咳嗽痰喘

閔滑

左寒熱口苦右宿食嘔吐尺滑小便淋相火妄動腎濁

申酉月脉浮短而濡

病在外脉濡堅難治

澗之行動不滑也虛細而遲往來極難三五不調無復次第
如雨沾沙如刀刮竹曰濶

岐伯曰濶者陽氣有餘也爲身熱無汗滑氏曰濶爲氣多血少之侯爲

陽氣有餘之侯主少血主心痛主血痺

經曰濶則心痛濶則少血脈濶曰痺主亡

汗主傷精濶而堅內留惡血表熱脉濶主中霧露

女子有

孕主胎痛無孕敗血爲病寸濶

左心神虛耗驚悸怔忡右短氣冷痞閟濶左目昏脇痛右心疼痞滿尺濶下元不足男子傷

精女人崩漏

緊脉

夏至後得甲子太陰旺大陰之至緊大而長

緊者勁急而不和緩也按之搏指長而左右彈如切繩絞索之

壯曰緊

滑氏爲邪風搏擊伏于榮衛之間

主寒主痛主積聚主吐逆

叔和曰緊則爲寒緊

而滑者吐逆而盛而緊曰脹

內經

緊聚有擊痛者曰

脈經

牢者爲

實

扁鵲篇浮緊主傷寒表症

名內

症

沉緊主寒客腹中

名內

症

氣口右閑緊盛

左手平和者主傷食

寸

緊

左

頭熱目痛

右

鼻塞咳嗽

閑

緊

左

風癇肋脹指甲青白惡心脹滿尺緊疝瘕腰脚膝下痛二便不

利

緩脉

乳子中風緩則生急則死

腎病及二尺忌見

緩脈動舒緩而不緊急也往來徐徐呼吸不及四至較遲脈和

速爲榮衛向衰之候主虛主濕主解体

經曰尺脉緩謂之解体

緩

而滑爲

熱中浮而緩主風

表

沉而緩主內虛主冷緩而濡爲痺上見之

爲項強下見之爲脚弱一寸緩左心忡多忘右氣短頭重閑緩

左風虛眩暉右善嘔不思食尺

膝無力下元虛冷

示吉曰緩中州脾脈也緩而無神方可言病若四至調匀緩而有神不大不小不浮不沉不輕不重意思欣欣如春風楊柳之壯平和之應也倘認爲病脈則誤矣古人論脈大人以五至爲平小兒以六七至爲平今若此又覺偏于熱矣豈古今時勢異耶抑今人元氣薄也

弦脈

經曰春胃微弦如持長等末稍日平及四季之末忌見

加持長等末稍日平

脾病及右關

弦長而端直如按絲弦舉之應手按之不移爲陰遏陽玉之侯

主瘧主痛主飲主疝主寒熱往來主傷風主宿食

經曰脉弦在子口者宿食

主驚

經云肝腎并小弦欲京

主氣結

主勞倦

主經絡間爲寒所阻

弦數爲

勞瘧爲傷寒熱邪傳少陽寒熱口苦脇痛耳聾雙弦脇急痛

弦長爲積

寸弦左頭疼心惕右咳嗽惡心閉弦

左

脇痛寒熱

右宿食痞滿尺弦小腹痛下焦停水。

芤脉

芤浮大而軟中空傍實傍有中無若捻葱葉爲血不能統氣之

侯

伯仁曰氣有餘血不足血不能統氣故脈來虛而大若芤之壯

主失血芤而數主火盛而血

妄行芤而遲主木土二臟虛寒不能藏血失血寸芤左心虛易

驚瘧現紅星

右

咳血血絲閑芤

左

腸痛吐血右嘈雜嘔血尺芤

便血腸紅女子崩漏。

洪脉

立夏後得甲子太陽旺

右寸及冬忌見宜寒涼

太陽之至洪大而長

洪較大更盛也。浮大有力。騰上滿指來至大而去且長有類乎。
實惟重按稍衰爲異。爲氣血燔灼之侯。主煩主咽乾。主表裏皆
熱。主二便濁。主傷寒陽明經病。寸洪左煩熱。舌乾裂。右乾咳。
腫粘上消。閑洪。左眼赤善怒。右火嘈易飢脹滿。尺洪。左小便赤
澀。右大便難。火旺遺精。

虛脉

虛中下皆空也。浮大而軟。舉按無力。豁然不能自固。誤曰浮而無力爲虛
爲榮衛俱虛之侯。主暑傷元氣。主虛煩多汗。主恍惚多驚。主小
兒驚風。病在中脈虛難治。肝腎脉並虛爲死陰虛陽搏謂之
崩內經寸虛。左恍惚多忘。右內傷元氣懶言。閑虛。左目昏少寐。右

不思食虛痞。尺虛。_左腰膝酸軟。遺溺。_右下元虛冷。

實脉

實表裏俱實也。弦大而長舉按有力。浮中沉三取皆然。曰實爲邪氣益盛之候。經曰脈實以堅謂之邪氣甚盛。訣云三焦氣滿。主熱主痛。主痢。主氣塞。主食積。主伏陽在內。寸實。_左口舌瘡。咽喉痛。_右煩熱。嗽痰喘急。閑實。_左腸痛。善怒。目赤。_右中滿。痰飲。腹脹。食積。尺實。_左便赤。_右大便難或痢。少腹痛。

散脉

老人忌見此

散到手便無根蒂。三五不調類乎濇。又兼浮大有陽無陰似乎。虛中指便空來去不明。惟敢乘騎風。不常其狀爲氣。

血耗散臟腑欲絕之侯主寒熱無時。主虛陽不歛。主心氣不足。
主暴病而榮衛虧損。寸散左神虛驚悸右氣散久喘閉散左
筋萎不寐右飲食不化瘦弱無力尺散精耗耳鳴腰膝無力。

長脉

人短脈長者是中損二十歲

長指下有餘如持長竿過于本位爲陽氣有餘之侯陽也。人主
壯熱主三焦煩鬱。主陽毒內蘊。肺經主氣治經口長主遺尿經云
過寸入魚主足脛痛。寸口脉中手主逆氣喘急。經云脉長出魚
際者遺尿長者足脛痛。主逆氣喘急。經云脉長出魚
寸長左心經實熱舌乾咽痛。右上焦氣壅閉長。左壯熱脇痛右
中滿不食。尺長溺黃茎痛大便實陽事頻舉。

短脉 人長脉短是大損三十歲

短指下不足。中有傍無不及本位爲陰中伏陽之侯

滑氏云氣不足以前

導其血則脈短

主氣病。主頭痛。

經曰寸口之脉中手短者曰頭痛。

主酒病。

脈法曰短疾而滑酒病

主三焦氣滯。主宿食不消。短而數。主心煩心痛。寸短左心氣

鬱頭痛

右氣怯內傷關短

左胸痛引脇

面青白

右惡心四肢怠惰。尺短二便不利。元精削弱

濡脉

凡病初起見濡難治。若久病後產後見之爲順宜補

濡浮細無力也。輕手乍見重手却去。如線之浮水中。爲氣血俱衰之侯。主虛主濕。主少氣。主無血。主骨蒸盜汗。主癰積。主下冷

主婦人產後客風面腫。寸濡。左心驚盜汗。右氣乏體倦閑濡

左目昏易怒。右不食虛溝。尺濡傷精脫血泄瀉腰膝虛冷。

弱脈

長夏胃微弱曰平弱多胃少曰脾弱
老得之順少壯得之逆

弱沉細無力也。輕手不見。重手按之快快不前。欲絕未絕爲血。

氣欲絕之候。主亡精。主虛汗。主痼冷。主神昏。身重。主精氣不足。

主元氣虛耗。寸口脉沉而弱曰寒熱。脈弱以滑。是有胃氣。命曰

易治。

內經寸弱

左陽虛心悸

右形寒氣短憊弱

左筋萎無力

右痞

滿倦怠。尺弱下焦冷泄瀉。便數。

革脈

經日渾渾革至。如湧泉病進而色弊。

革浮而有力也。輕手舉之洪大搏。指重手則空。如按革皮曰革。
爲裏虛表實之候。主實熱在外。主傷寒一二日表症。壯熱無汗。
皮膚盡疼。又主男子亡血失精。女子半產漏下。寸革。左頭疼。面

赤煩燥右咳嗽聲啞關革左善怒嘔血右嘈雜善飢尺革夢遺

失精二便澁滯。

牢脉

越人云牢而長者肝也牢者爲實宜寒涼攻利

牢沉而有力也輕手不見重手按之實大搏指曰牢爲表虛裏

實之侯主實熱在內主傷寒熱邪傳裏大便燥結主骨間疼痛

主勞傷痿極

寸牢

左煩渴舌裂右氣鬱引飲乾咳關牢左兩

脇急痛

右

不食腹脹尺牢小腹痛二便閉腰膝痛痺

示吉曰牢革二脈俱在實脉中流出革爲實之浮牢爲實之

沉陰陽亢害大抵與胃氣相遠故先哲皆不取之然有暴病

而得是脈病爲之也若久病而診得之胃氣全無鮮克免者

微脉 經云微浮秋吉冬成病

微不顯也依俙輕眇似有若無模糊難見爲氣血俱虛之候主少氣主自汗主泄瀉主崩漏脫精微而數主虛熱微而遲主虛寒浮而微者陽不足主身惡寒沉而微者陰不足主臟寒下利微而弱者主寒少氣寸微左憂惕善忘不寐右短氣不足以息關微左脇肋虛痛惡寒右惡心不食虛痞尺微男傷精女崩帶脛膝無力

細脈 形盛脈細少氣不足以息者危

細不粗也往來指下極其小渺僅存一線如蛛絲相似爲氣冷血虛不足以充之候主傷濕主痛在內主元氣不足乏力無精

主內外俱冷痿弱。洞泄。主勞傷過度。神昏體倦。寸細。左心無血養。驚悸。右氣少倦穎。關細。左目暗筋痠。右少食虛瀉。尺細精冷。

下虛泄瀉。女子經事過期。

促脈

示吉曰。促無胃脉也。傷寒熱極及暴怒痰厥急驚尚爲可生久病及雜症見之者死。

促陽之極也。一息脈來六七至時一止復來曰促。爲陽獨盛而陰不能相和之候。主熱極。主暴怒。主氣壅。主傷寒。陽毒。主瘀血發狂。寸口脉促上聲者。肩背痛。內經寸促。左狂言。風痰于心。右痰熱咳嗽。關促。左吐血善怒。熱極。右脾熱口臭。引飲。尺促腎水涸。

二便滯滯

結脈

結陰之極也。一息脈來三四至時一止復來曰。結爲陰獨盛而陽不能相入之候。主氣鬱。主血壅。主飲食痰飲留滯經絡。浮結主外有痼疾。沉結主內有積聚。寸結左驚悸痰飲。右肺寒痰嗽。關結左。腸肋疼痛右。食積痰飲留滯。尺結小腹冷痛硬滿。

示吉曰。脉因熱而數。因數爲促。因寒而緩。因緩爲結。蓋促結者寒熱之變也。滑氏曰。有氣血痰飲食五者。若有一留滯其間。脈亦爲之間斷。非必死脉也。故張長沙亦作病脈。予近診血氣素虛之人。及有年者。脈來不數不緩。但數動一至或五六動一止。後亦無妨。蓋其榮衛固不足以充前導。而氣血飲食痰易于留滯也。若兼數兼緩。則病上更病。退則生加。則死。

矣蓋可忽哉

代脉

長夏脉犯代無胃曰死
代爲戊巳惡脉右關忌見

代更代也動而中止良久復動動而又止如前復起曰代爲一
臟無氣而他臟爲之代至也六脉皆然主呼吸危亡之候然亦
有暴病而致是脉者主霍亂吐瀉主心腹急痛主便膿血主心
中驚悸主積瘀停水主中風卒仆主瘀血飲食停滯以致元氣
不續。寸代左怔忡言語塞塞右氣塞痰壅關代右胸脇急痛
右暴痛吐瀉尺代亡陽失血陰疝上冲

伏脈

經日按之至骨脈氣少者腰脊痛而身有癲也

伏浮中沉皆不見也附十骨上重手推筋取之乃得爲陰陽潛

伏閨膈閉塞之侯。主寒主痛。主水主霍亂。主疝瘕。主飲食不消。
主榮衛氣閉而厥逆。伏結爲積聚。寸伏左沉憂失志。右氣滯
痰積。關伏左血冷脇腰痛。右吐瀉暴作中脘積塊。尺伏。腎寒火
虛疝瘕痼冷。

動脈

動壯如大豆。厥厥動搖。尋之有舉之無。不往不來。不離其處。爲
陰陽相搏之侯。正直論主痛。主驚。主崩脫。主泄痢。主虛勞體痛。陽
動則汗出。陰動則發熱。婦人手少陰脈動者。妊子也。內經寸動。左
心驚汗出。右自汗。痰喘。關動。左寒熱口苦。右食積停滯。尺動骨
蒸虛脫。崩帶溺赤。

七絕脈法

一曰雀啄。連連搏指。忽然止絕。少頃復來。如雀啄食。肝絕也。一曰魚翔。本不動而未強搖似有似無。如魚之翔。心絕也。一曰屋漏。如屋殘漏下。半時一滴。胃絕也。一曰解索。指下散亂。乍數乍疎。如索之解。脾絕也。一曰蝦遊。浮于指下。始則冉冉不動。少焉而去。久之忽然一躍進退。難尋。如蝦之遊。大腸絕也。一曰釜沸。浮于指下。有出無入。無復止數。如釜湯沸。肺絕也。一曰彈石。沉于筋間。猝猝急硬。如指彈石。腎絕也。凡此七脉。一見皆主胃氣消亡。藏元已竭。死無時矣。

人參味甘。功專入肺。止渴生津。大補元氣。更能養血肺熱乃忌。

細皮光潤者佳。去蘆切片用。肺中實熱。右寸洪大。微寒。反藜蘆。

黃芪甘溫力專補氣。收汗固表。內傷有濟。滿托瀆陽。生肌大利。

綿軟箭幹者佳。托瘡生風。補氣密火。一用鹽水炒表邪實而無汗者勿用。托裏得防風而効速。

甘草甘平。健脾強胃。調和諸藥。解毒功最。蜜炙溫中。生用火退

稍去小便澀痛。節主癱疽腫痛俱生用。身寒火溫。補散瘧疾。嘔逆者勿用。反甘蓬海藻大戟芫花用。

當歸苦辛補血。歸經扶虛益損。退熱滋陰。頭止血上行。身養血下守。尾破血下流全。

活血不走酒浸洗淨用。體肥痰盛。姜汁炒恐犯膈也。風邪初旺者。脾虛泄瀉者。濕痰浮腫者勿用。

川芎辛溫。生血調經。能止頭痛。開鬱上行。小者開鬱不宜單服。久服酒浸用。

山藥甘溫。性平。補腎補氣。固精。瀉痢能定。消腫長肉。筋骨強盛。

人乳止癰。高突門冬惡伴。
遂單食久食外能滲氣。

白术苦甘。健脾強胃除濕利水痰痞皆退。

大者爲雲术力大氣濁小者爲白术力小

氣清土炒微黃用之入滋陰藥中再用酒拌蒸
佐黃芩則安治君枳實則消痞傷寒動氣勿用

蒼术甘辛健脾。燥濕寬中鬱結開遂。

米泔水浸一宿去皮切片炒用并地榆

汗定瘧。桂枝去桂加蒼术。公丁公人公乾

咳聲嘶陰虛便結者勿用。

白芍酸寒能收能平。肝養血腹痛自可。瀉痢崩漏安胎不若。

伐肝生用止痛。熟用和血補血酒炒。欬血止血。醋炒。新產婦人勿用恐酸矣代生生氣也。反藜蘆。

赤芍酸寒除熱清目破血通經。瘡腫宜服。產後勿用

生地微寒專治血熱骨蒸煩勞。止吐衄血。忌見鐵器酒浸川畏勿用。肥人多瘀。

姜汁浸炒用。

熟地微温滋肾補血。封填骨髓勞傷易絕。烏髮黑髮。耳口清徹。

用生地酒浸蒸熟晒乾再浸蒸如此九次。一法用好酒在砂
裡內煮一夜其色如漆則熟矣。忌畏同生地多痰姜汁拌炒

知母味苦滋陰止渴。自汗骨蒸煩熱可合。

生用湯胃火鹽水炮
渴腎火忌鉄去毛

貝母微寒止渴消痰清心潤肺開鬱除煩。

夫心研末用出四川
陝西者佳性輕而治

上焦之痰出浙江者名上貝母。性重而燥惟治皮裏膜外痰
塊結腫瘰癧一切瘡瘍之痰然肺癰肺癆及人面瘡古人俱
用者反

烏頭

蔓芩苦寒枯瀉肺火消痰利氣風熱皆可條芩安胎除下焦火

崩淋痛痢濕熱除苦。

除風熱生川大血分酒炒治瀉痢姜汁拌
炒治胆熱用猪胆汁拌晒乾細實而堅者

芩
名條

黃連苦寒瀉心除痞止痢厚腸濕熱自已清目除煩瘡瘍不廻。

清熱酒炒治瀉痢姜汁拌炒開火鬱湯泡吳茱萸拌炒去萸
用腸紅下血入豬大腸中煮熟用癰腫疔瘡生用。

大黃大寒破血消瘀快膈通腸積聚盡驅

錦紋者佳。酒浸蒸熟

達頭

項治頭風目疾及久積

痼痼病治瀉痢姜汁拌炒治

瘧

傷寒熱結生用治瘡瘍熱結酒炒血痢韭菜汁拌晒乾

達頭

項治頭風目疾及久積

痼痼病治瀉痢姜汁拌炒治

瘧

桔梗味辛療咽腫痛載藥上升痰嗽皆用寬胸利膈只壳相共

桔蘆生用若用之治腸紅久
痢大腸氣鬱之疾須炒黃色

天花粉寒清熱止渴消瘀定嗽癰腫可奪

瓜蔞潤肺消瘀下氣寬胸清熱更醫乳閉

去壳打爛去油
用瀉者勿用

半夏味辛燥濕化瘀止吐開鬱健脾消涎

有毒凡使用白朮生
姜皂牙同煮以半夏

中無白星爲度

煩渴及

血症胎前勿用

反烏頭

紫蘇甘辛風寒發表梗下諸氣安胎之實

夏月不敢用麻黃
以紫蘇葉代之

潤肺開鬱下氣定喘消癥乾喉利便

微炒爲末

白芷辛溫陽明頭痛散風驅寒排膿可用皮膚癰癧通經亦中
防風甘溫諸風通用頭暈目疼骨節痺痛去蘆

獨活甘辛頸項難舒腰背酸疼諸風皆除

人肺腎

羌活溫平身痛頭疼祛風除濕活骨舒筋

人膀胱小腸

柴胡味苦寒熱脇痛和解瘧疾升陽宜用

犯火無功咳嗽氣急痰喘嘔逆者勿用

前胡甘辛消痰解熱止嗽除痞又開氣結

亦止夜

兒

香附辛甘疏氣開鬱止痛調經更消宿食

忌鐵器要去毛發散消食生用入血分酒

炒軟堅止痛鹽水炒降虛火童便浸開鬱醋炒止血童便浸炒黑溫經艾汁炒消痰姜汁炒又有鹽酒醋童便四味合製

麻黃性溫解表出汗身熱頭疼風寒盡散

去節根切斷用之霜降後春分前傷寒表

實無汗頭疼加斧辟。身熱如火熾方用之。若夏秋雖頭疼發
熱不可輕用也。悞用則有亡陽動血筋惕之弊。根止自汗。

葛根甘平。陽明發表解酒止渴。溫潤可好。

自汗者勿用

麥冬甘寒清心潤肺。止咳滋陰。煩渴皆濟。更除勞熱。虛火大利。
溫水洗去心用。不令心煩。惟傷寒科帶心用之。

天冬甘寒保肺清熱。消痰止嗽。喘渴能絕。肺癰肺瘻更治吐血。
去心虛寒者勿用。

五味味五。止渴生津氣散能收。滋腎強陰。暑熱自涼。乾咳功成。

北產者佳。寒邪初起咳嗽者勿用。小兒尤忌。凡用打碎。

升麻微寒解毒散風。升提下陷。牙疼可攻。辟瘧止瀉。清胃有功。

形輕堅實色佳。

藁本苦辛。嶺頂頭疼。陰寒腫痛。風濕俱行。

反藜蘆去上葉

用不可單服

葉

連翹苦寒。瀉六經熱。解毒消癰。通淋水洩。去心打碎除肺火止用心赤鼻良驗

炒黃

色

延胡索溫血結諸痛。破瘀調經。跌撲堪用。生用破血炒用調血酒炒行血醋炒止血

炒黑止血虛寒下陷血裏瀉痛者勿用

地榆微寒。血熱堪用。血痢帶崩。金瘡止痛。

去皮酒浸洗

防已辛苦。風濕脚腫。手足挛急。散熱消癰。

有毒令人吐吐痰生用截瘻醋炒或同烏

常山苦寒。專截瘻疾。最開結癰水脹可食。

有毒令人吐吐痰生用截瘻醋炒或同烏

梅用同丁香截三陰瘻老入小兒乃虛弱久病者勿用

龍膽苦寒療眼清熱下佳。濕痛痘瘡皆絕。

酒洗用入肝腎

玄參鹹寒清無根火目赤咽痛心煩俱可散腫解熱腎虛能補。

反藜蘆勿犯銅氣堅

黑者佳入心肺腎

丹參味苦寒志養神生新破瘀崩帶調經安胎清目癰腫能平。

酒浸去蘆

用反藜蘆

苦參苦寒燥濕清熱癰腫瘡疥逐水散結黃疸陽風殺虫妙訣。

反藜蘆以糯米泔浸一夜去浮面腥氣晒乾一用酒拌炒。

紅花辛溫最消瘀血多則通經少則養血兼治跌撲瘡毒解截。

三稜苦平行血行氣消癖削堅虛人當忌。

炒用畏牙硝麴裹煨切片醋

蓬木苦溫破積消聚止痛行血通經最易消食開胃醋炒用例。

天麻平風熱眩暈驚悸風癇癱瘓俱惡

湯紙裹煨熟用

梢星苦辛能治風痰破傷跌打下氣開關麻痺風疾癱瘓脰背安

姜湯泡透切片姜汁浸炒用爲末入臘月黑狗牛胆中陰乾名胆南星

妊娠勿服

秦艽苦辛去穢活筋肢節風痛腸風骨蒸

酒洗切片

遠志辛溫益智寧心清目利竅壯陽補精

甘草湯泡去心用即補

破故紙溫腰膝酸痛興陽固精鹽酒炒用

即補酒洗

葫蘆巴溫煖補腎臟膀胱諸疝脹痛皆除

酒洗即補

何首烏甘添精種子黑髮悅顏長生不死

忌犯鐵器九蒸九晒用之

骨碎補溫骨碎折傷固齒驅風殺蟲最良

即猴姜

威靈仙溫腰膝冷痛積瘀痃癖風濕通用

酒洗

牛膝味苦除濕痺。腰膝酸疼益陰補髓。去蘆酒洗用

黃精味甘能安臟腑。五勞七傷此藥大補。

洗淨九蒸九晒用之
鈎吻畧同切勿悞用

蒲黃味甘逐瘀止崩止血炒黑破血宜生。

續斷味辛接骨續筋跌撲折損且固遺精。

酒浸洗用

益母草甘調經所宜產後胎前生新去瘀。

忌犯鉢器

茺蔚甘溫峻補精血若驟用之反動便滑。

忌犯鉢器酒洗去浮角

鎖陽性溫補陰固精大便燥結酥炙用行。

大便不實者勿服

車前性寒溺澁眼赤利水止瀉帶濁有益。

炒細研用酒洗

紫苑苦辛血瘀上氣補虛定喘寒熱並濟。

酒洗

百部微寒肺熱咳嗽傳屍骨蒸殺虫有力。

酒洗

百合味甘。安心定膽止嗽消浮癰痘可啖。

款花甘溫理肺消痰肺癰喘咳定悸除煩。

塊鈴苦寒肺熱久嗽定喘消痰能薰痔漏。

根名青木香下氣甚速兼治小腸氣

青黛性寒開鬱清火驚癇瘡痢發班俱可。

甘菊味甘除熱祛風頭眩目赤收淚有功。

酒洗晒乾用

薏苡味甘專除濕痺筋節拘攣肺癰肺痿。

去壳爭炒用

丹皮苦寒止血通經和傷清熱無汗骨蒸。

酒洗用

菟絲甘平夢遺滑精腰疼膝冷補髓益陰。

水淘淨用白酒燉米泔同入砂罐內煮爛

成餅晒乾

入諸藥用

茴香性溫能除疝氣腎臟虛寒調中緩胃。

鹽湯浸炒

砂仁性溫養胃進食止吐安胎通經破滯。炒爲

末

去壳炒

白蔻辛溫能却瘴癘益氣調元止嘔開胃。

爲末用

麵裹煨熱

肉蔻苦溫脾腎虛冷瀉痢不休功可立等。

研碎用

麵裹煨熱

草蔻辛熱治寒犯胃作痛嘔吐不能遂。

擣末用

草葉味溫消肉除脹截瘧逐瘀解癰辟瘴。

擣末用

菖蒲辛溫開心通竅去痺除風清聲至妙。

附子辛熱性走不守四肢厥逆回陽功有。

厥冷回陽用生引諸藥行經用麵裹火煨

去皮臍切四片用童便浸透燒乾若入補益丸中切六片先用甘草防風同煮三四滾去皮臍甘防再用童便煮一日晒乾方無

毒也。

天雄大熱壯陽補火陰寒止痛面風亦可。

製同附子

鳥頭性熱溫經去風手足拘攣回陽兼用

繫同附子

射干味苦。咽喉腫痛欬逆上氣消痰有中

旋覆鹹甘驅風開結。腸溝稠痰水濕能絕

大戟苦寒消水利便腫脹癥堅其功瞑眩

反甘草

商陸酸寒赤白各異赤者消腫白利水氣

葶藶性寒利水消腫。瘀欬癥瘕治喘肺癰

隔紙燒用

牽牛性寒利水消腫。鹽脹痃癖散滯除壅

妊娠忌服黑者屬水力速白者屬金效遲研爛取

草薢甘苦。風寒濕痺腰背冷疼添精益氣。

木通辛甘。小腸熱閉利竅通經最能導滯乳閉難產淋濁皆治

通草味甘。善治膀胱。消癰散腫。能通乳房。

燈草味淡。清心定驚。除熱利水。夜啼如神。

石斛味甘。却京定志。壯骨補虛。冷閉可恃。

去根酒洗
一法蜜製

石葦苦甘。清熱利水。癃閉五淋。癰疽可委。

拭去毛羊脂
炒焦黃用

白蒺藜苦。療瘡瘍癩。白癩頭瘡。翳除目明。

擣去
刺用

青葙苦寒。治風熱濕明目。堅筋殺虫有力。

木賊味甘。益肝退翳。能止月經積聚更奇。

茅根甘寒。止血治淋。利水和傷。除熱通經。

擣汁
用

仙茅辛溫。腰足痙痺。壯陽補血。勞傷莫離。

烏豆湯中浸
夜酒拌蒸用

鬱金苦溫。破血生肌。吐衄溺血。鬱結功奇。

小者爲
鬱金

薑黃味辛。消癰破血。心腹疼痛。下氣最捷。

大者爲
薑黃

牛蒡辛溫能消瘡毒。癰疹風熱。咽喉可逐。

一名鼠粃。
子打碎用。

紫草苦寒。心腹邪氣利。竅通水癰腫大利。

酒洗
川

白薇苦鹹利水益陰。中風帶下。寒熱酸疼。

酒洗
用

白附辛溫治面百病。血癥風瘡。中風諸症。

白蘇皮寒黃疽頭風咳嗽逆濕癰疥癬功同。

蘆薈性寒殺虫消疳癰癩驚搐服之立安。

胡黃連苦治勞骨蒸。小兒疳痢益汗虛驚。

并治
痔瘻

澤蘭甘苦。癰腫能消。打撲傷損月事可調。

用藥調經
酒洗用

青蒿苦寒。骨蒸勞熱虛煩盜汗。殺虫功烈。

童便浸
乾用

巴戟天溫助腎添精疏風辟邪酒浸方靈

去骨酒洗

蘭葉甘辛散久鬱氣胆癰消渴劫痰癖利

用草蘭葉

決明子甘能除肝熱目疼收淚仍止鼻血

炒爲末

草麻子辛利水消脹無名腫毒其功莫量

金足心下胞胎塗顛頭收生腸去壳搗用

蘆根甘寒客熱消渴噎膈吐逆利水皆活

搗汁用

蛇床苦辛風寒濕痺諸惡瘡癬陰痛能醫

炒用

金艮花甘療癰無對未成則散已成則癧

俗名金鎖匙用根口嚼汁吞止咽喉癩痛

山豆根苦療咽腫痛敷蛇虫傷可收急用

搗作絨

灸百病

薄荷味辛最清頭目祛風化痰潤喉宜服

稀荳味甘。祛風以濕。明目補元。烏鬚強骨。

酒蒸用

蒲公英寒消瘡結核。化食散滯乳癰可食。

夏枯草寒。療瘻癰。散血破癥。目痛須求。

藿香辛溫能止嘔吐。發散風寒。霍亂功大。

荆芥味辛。能清頭目。表汗祛風。治瘡消毒。

止血炒黑用
祛風生用

香薷味辛。傷暑便澁。霍亂水腫除煩解熱。

蒼耳甘溫。風寒濕痺。頭風腦漏。疥癬功竒。

炒搗用

茵陳味苦。退濕除疸。明目發汗。清熱所攬。

使君子溫消疳。清濁瀉痢諸症。驅除爲樂。

去壳取肉殺虫半生半蒸用

良薑性熱。下氣溫中。轉筋腹痛。宿食能攻。

石蓮苦寒。噤口痢疾解。熟開胃。白濁淋癰。

去壳

劉寄奴溫。破瘀通經。金瘡出血。下氣除癥。

木部共五十四種

蒺藜補心善鎮慄驚健忘。善怒益智安神。

去皮木用

茯苓味淡。滲濕利竅。白化痰涎。赤通水道。

去皮入補藥用乳汁蒸

琥珀味甘。安魂定魄。破瘀消癥。利水通塞。

研細

松香性溫。主安五臟。殺蟲定痛。惡瘡皆當。

治瘡用葱汁拌煮乾研用

柏仁味苦。補心益氣。斂汗扶陽。更除驚悸。

取霜去火去壳去油

肉桂辛熱。善通血脉。腹痛虛寒。溫補可得。

不見

桂枝小梗橫行手臂。止汗舒筋。手足痺利。

麻黃發汗
附方藥止汗

木香微溫散滯和胃諸氣能調吐痢功最

治血分酒磨入氣分
湯磨治濕治痰姜汁

磨不見火

山梔性寒解鬱除煩吐衄胃病降火不難

清上焦鬱熱用慢火
炒黑清三焦實火生

用龍膽曲
屈之火

吳茱萸熟能調疝氣脅腹寒疼吐酸用利

去梗炒

山茱萸溫益髓濡精除腰膝痛腎虛耳鳴

去核酒洗用一云核
味淡遺精者連核尸

蔓荆味苦頭痛能醫能除眼淚拘攣濕痺

杜仲辛溫強筋壯骨足痛腰疼小便淋澀

去粗皮鹽酒炒斷絲
用酥炙一姜汁炒

烏藥辛溫心腹脹痛小便滑數順氣通用

去粗皮姜汁浸
炒亦有生用者

黃柏苦寒降火。瀆陰骨蒸濕熱下血堪任。

去粗皮切片蜜炒鹽酒炒人乳炒童便炒

或生用隨病用之

桑皮甘辛止嗽定喘瀉肺火邪其功不淺。

枸杞甘溫固髓添精明目祛風種子如神。

酒洗用

骨皮苦寒解肌退熱有汗骨蒸強陰涼血。

酒洗用

棗仁味酸斂汗祛煩多眼用生不眠用炒。

研末去壳用

益智辛溫安神益氣遺溺遺精嘔逆皆濟。

去壳研末

枳榔辛溫破氣殺虫逐水祛痰專除後重。

腹皮微溫能下膈氣安胃健脾浮腫消去。

水浸三四次再用甘草湯洗晒乾

丁香辛熟能除寒噫心腹疼痛溫胃可求。

氣血勝者隨日香以其益氣也

冰片辛苦。善開喉閉。消風明目。殺虫亦易小人。故大人痰迷。

猪苓味淡利水通淋。消腫除濕。多服損腎。

去砂石

蘇木甘鹹。能行積血。產後月經兼醫撲跌。

沉香降氣緩胃。追邪呃逆。足冷壯陽。破結。

忌見八生磨

乳香辛苦。療諸惡瘡。生肌止痛。心腹痛良。

去油爲末

沒藥溫平。治瘡止痛。跌打損傷。破血通用。

去油爲末

木瓜味酸。濕腫脚氣。霍亂轉筋。吐血有利。

竹葉味甘。退熱安眠。化痰定喘。煩渴安然。

用淡竹者佳

天竺黃。解煩除驚。驅邪逐瘀。明日清心。

金櫻子。溫澁精陰。嗽脾洩下痢。崩帶功奏。

去心刺煎膏用

郁李仁酸四肢浮腫潤腸破血下氣寬中

去壳用

蕪荑辛溫痔瘻疥癬消疳去積殺虫不解

去衣麵炒黃用

五加皮寒祛痛風痺健步堅筋和傷並奇

梗去

楮實味甘壯陽助膝堅筋益氣明目妙極

酒浸一宿蒸用

秦皮性寒散風去濕風熱驚癇目亦有力。

密蒙甘寒主能明目虛翳青盲服之效速

辛夷辛溫寒熱頭風面腫齒痛通鼻溫中

蕤仁性溫理氣消痰目赤風腫止淚相關

破核取仁去皮尖研用

女貞味苦養精補陰去風除濕黑髮強筋

酒浸曬乾用

五倍子酸苦風癬疥瘻止瀉澆精步功快

牙卓辛鹹通閼開竅頭目風濕脹食皆效

巴豆辛溫削堅蕩積破癥消癰通利有力

去皮心臍或生或熟聽用

金鈴性寒大熱癲狂通水利便心痛亦當

雷丸苦鹹解鹽殺虫胃熱癲癇遂水有功

鉤藤味苦小兒寒熱驚癇胎風舒筋活血

血竭味鹹跌撲損傷生肌止痛破血功良

茶荳微寒解渴能濟上清頭目消痰下氣

阿魏辛溫除癥破結禁瘻殺虫心疼有益

乾漆辛溫通經破積除癰殺虫心疼有益

楓香辛苦辟惡驅風齒痛下痢癰癧有功

一
炒令黑

蜀椒辛熱冷氣欬逆風寒積聚辟濕消食。

微炒出汗閉口者勿用

菜部十種

生薑性溫散風驅寒痰嗽嘔吐泄痢能安。

乾薑味辛溫中發表沉寒痼冷其功不小。

炒黑能止血并治虛熱

蘿蔔辛溫下氣消食止嗽解渴消麵宜吃。

熟者補肺子下氣功相同炒研用

白芥子溫專化腸瘀瘻痞翻胃下氣除涎。

炒研

莧菜辛溫補腎益陽遺精白濁瘀血堪嘗。

擣汁用子功用九勝神昏目暗者勿服忌

糖蜜
牛肉

大蒜辛溫化肉消穀霍亂轉筋散癰解毒多用

胡荽辛溫頭疼消食散痧驅痘肢熱有益

忌邪蒿同食令人汗死

葱白辛溫散邪發汗。傷寒頭疼。安胎有幹。
冬葵子寒。療淋利便。主滑胎產通乳立見。
白冬瓜甘。煩渴最善。消脹止淋能通二便。

人部九種

人乳味甘補陰益陽。悅顏明目。羸瘦仙方。

金汁甘寒。解毒療瘡。天行狂熱。虛熱可當。

屎蛆甘鹹。療疳除積。肚腹脹滿。小兒有益。

童便鹹寒。勞熱吐衄。痰喘咳嗽。產後勞嗽。生津止渴。和傷功足。
髮灰苦溫。治嗽驅淋。補陰止血。吐衄如神。多產婦人將髮洗淨置餅中火煅通紅故

冷研用髮灰酒
服極善催生。

紫河車溫療諸虛損。勞瘵骨蒸培植根本。

天靈蓋鹹傳屍勞瘵。溫瘧血崩。投之有賴。

人頭益骨
燒存性用

死人枕鹹傳屍鬼疰。邪氣石屹煎湯可恃。

用畢送還原
處人腦後骨。

禽獸部十九種

黑嘴白鴨大補虛勞。兼除水腫。熟毒可消。

白目者能殺
人忌鼈龍肉

鳥骨毛雞甘溫補虛。折傷諸癰。安胎並奇。

雄雀性熱壯陽。益氣。腦主聾耳。血點雀盲。

糞名白丁香
能潰癰疽

雀卵酸溫。男子陰痿。益精種子。一氣可委。

伏翼味鹹。去翳明目。逐淋利水。延年久服。

屎名夜明珠
主寒熱積聚

龍骨甘平。夢遺精泄崩帶。腸臘渴痢驚熱。

鹿角味辛。主治脚膝定痛。追風能壯筋力。

酥炙
擣末

鹿角酸寒化毒辟邪解熱止血癲狂自歇。

鎔末
用

羚羊角寒明目清肝。卻驚解毒。邪熱能安。

鎔末
用

牛黃味苦大治風痰。安魂定魄驚癇靈丹。

研

麝香辛溫善通閼竅。伐鬼安驚解毒甚妙。

忌大
蒜

鹿茸甘溫益氣滋陰。洩精尿血崩帶虛羸。

酥炙
用

阿膠甘溫止欬膿血。吐衄胎崩虛羸可啜。

蛤粉炒成珠或麵炒

熊膽苦寒。風痰狂熱驚癇黃疸惡瘡可絕。

辟瘞
者惟

狗肉鹹熱壯陽補傷更益氣力。帶漏亦良。

羊肉甘熱補脾益氣。虛勞寒冷。心驚能濟。

黃牛肉甘健脾益氣。壯骨強筋。乳養心肺。更解熱渴。大腸滑利。
豬肉性溫補脾益氣。蹄能下乳。瘡瘍皆利。臟止腸紅。肺能潤肺。
腎止腰疼。心定驚易。舌能健脾。油塗瘡例。腦治頭眩。頤消積痢。

多食動風生痰最忌。

蟲魚部共二十六種

蜂蜜甘平。益氣補中。止咳解毒。潤腸有功。除煩定驚。虛熱可攻。
蟻能止痢。瘡瘍所適。蜜煉熟用
忌生葱

牡蠣鹹寒。滋精止汗。崩帶脇疼。老痰祛散。

火煅研末
左酒者佳

珍珠氣寒。鎮驚除癇。開竅磨翳。止渴墜痰。

研極細用

石决明鹹青盲內障。風熱骨蒸。益精可仗。

九孔七孔者良以
麵裹煨研細用

龜甲鹹甘滋陰補腎。逐瘀續筋。更醫顱額。

細用
酥炙研細用

鼈甲鹹平。勞嗽骨蒸。散瘀理瘧。去痞除崩。

酥炙研細用
醋炙亦可

蘄州烏蛇專主諸風癘疹瘡痒。風淫有功。鬚眉脫落。塞耳治聾。

酒洗酥

灸用

花蛇性溫。癱瘓喎斜。大風癩疥。諸毒莫嗟。

蝦蟆甘寒。除邪破血。解熱療疳。癰腫宜貼。

蠍味甘辛。中風風癇。手足抽掣。風痰可捐。

去鹽土
灸黃用

五靈脂溫力能行血。心腹疼痛。目翳能絕。產暈見瘡。炒熟止用。

蜈蚣辛溫。解蠱蛇毒。心腹結聚。墮胎力足。

去頭足
灸黃用

蠅牛鹹寒。筋脈拘攣。脫肛痔痛。疔毒兒癟。

或生研
或炙用

蠅蠶味鹹。諸風驚癇。濕瘻喉痺。瘡毒潰堅。

炒黃
擣末

蠅退甘寒。消風定驚。殺瘡除熱。退翳催生。肺寒失音。

重用開音

蠅皮苦甘。腸風痔漏。翻胃腹痛。陰腫功奏。

酥炙黃
擣末

遺精原湯
潤心膏

土龍味鹹。折傷行血。下乳通經。去積尤捷。

火酒浸瓦
上炙乾用

羌蟬鹹酸。通腸治脹。破血墮胎。驚風全仗。

去足火炙
翅膀

斑蝥有毒。破血通經。諸瘡癩瘻水道能行。

去足翅搗米拌炒以

米黃爲度去米用

山甲性寒。五邪驚悸。瘰瘡疥癬。去風亦易。

土拌炒
燒灰可
敷諸瘡

鯉魚味甘。溫胃健脾。補虛進食。腸風能醫。

燒灰可
敷諸瘡

鯉魚甘平。氣喘咳嗽。水腫黃疸。止渴安胎。

烏賊骨。鹹驅翳止淚。崩漏帶下。金瘡血遂。

鰻鱺甘平。療虛壯陽。傳屍諸虫。帶下陰湯。

煎膏可
敷瘡

鱠魚甘溫。產後淋瀝腸烏腹病。脾氣補益。

血堪
全癆

蟹味鹹寒。散血破結。養筋益氣。胸煩悶洩。

搏塗漆瘡爪
主破血墮胎

金石部共三十種

金銀箔辛。安心養神。驚悸癲狂。邪熱俱退。

多服有毒以
鴟鴞肉解之

黃丹味辛。吐逆。顛狂。止痛生肌。截瘧神方。

熬船所作。山東者佳。入血分。

胡粉性寒。殺虫解毒。破結消癰。生肌長肉。

化船所作
入氣分

銦青苦澀。斂瘡止血。清目殺虫。去腐妙訣。

鐵漿性平。鎮心墜結。頑癇狂亂。解毒亦捷。

水銀辛寒殺蟲除疥墮胎絕孕昇丹功夫。

輕粉辛寒瘡瘍按毒蟲癬疥癩疽積亦服

即水銀所昇者

陀僧辛鹹鎮心墜痰嗽嘔瘧痢癲痔俱開

研細水飛用不可多服

丹砂甘寒明目鎮心除煩止渴益氣安神

研末水飛用昇

鐘乳甘溫壯元益陽利竅下乳解毒甚良

研末水飛用

白礬酸寒清喉明目寒熱洩痢諸瘧解毒

光明如水晶者佳收
水之劑弗宜驟用

禹餘糧甘骨節疼痛寒熱咳嗽煩渴崩中

煅用

朴硝性寒攻下燥結留血停瘀傷寒實熱

煉作芒硝性緩再煉
名玄明粉性更緩

滑石甘寒利水解渴開胃降火傷暑能活

白色者佳研治熱生用煅熟研水飛用

石膏性寒清胃解肌止渴生津頭疼可醫

未性緩兼敷熱瘡

青鹽性寒。補腎。益氣。明目。止痛。更消積聚。

食鹽味鹹。能吐中痰。心腹痛過多。損顏。

炒熟熨心腹。諸痛并洗眼。

雄黃甘辛。辟邪解毒。更治蛇蠍喉風瘧肉。

中無砂石者研細水飛用。

紫石英潔寧心定驚。咳逆邪氣。腫毒能傾。

赤石脂溫保固腸胃。潰瘍生肌。瀉痢功最。

火煅紅

寒水石寒能清大熱。腹中積聚。熱渴俱捷。

研用

蓬砂性溫。止嗽消癆。善理喉痺。破結開關。

研用

膽礬性寒。清熱殺虫。善吐風痰。驚癇可攻。

研用爲末吹乳鷄立效

青礞石辛。蕩滌宿痰。消磨食積。其功不凡。

研細同火硝煅紅水淘淨酒乾用

無名異。消腫敗毒。止痛生肌。金瘡長肉。

研細用一法。醋磨

玉屑味甘。明日養神。除煩止渴。寧心定驚。

擣如米若酒浸之消如泥用

自然銅辛主破積聚。療傷續筋。止痛最易。

火煅醋淬九次淬九次

石硫性涼。利便除淋。腸風痔漏。產難能平。

火煅醋淬九次研細水飛用

磁石鹹寒能療濕痺。日昏耳聾。腫毒亦醫。

吸跌者住火煅醋淬七次研細用

硫黃大熱除癰疥瘡。壯陽逐冷。殺虫妙醫。

甘草湯煮研用

藥部共十八種

陳皮甘溫順氣寬膈。留口和脾。消痰去白。

熟炒

青皮苦寒。能攻氣滯。消堅平肝。肠痛能治。

醋炒去穰

枳殼微溫。快氣寬腸。胸中氣結。脹滿爲良。

熟炒去穰

枳實味苦。消食除痞。破積化痰。冲牆倒壁。

熟炒去穰

杏仁溫苦。風痰喘嗽。大腸氣閉。便難。功奏。

泡去皮

炒爲末用

桃仁甘寒。能潤大腸。通經破瘀。血瘕堪嘗。

去雙仁。泡去皮。尖炒爲末用

大棗味甘。主和百藥。能益五臟。補氣虛弱。

入藥煎洗淨打碎。大丸藥煮爛去皮核

白梅酸溫。收斂肺氣。止渴生津。能安瀉痢。

自汗腸紅。截瘧亦利

藕味甘平。散悶除畊。消食止渴。更解熟毒。汁止吐血。節和傷寒。

枳杷葉苦。止嗽清痰。和胃定嘔。

解渴除煩。刷去黃毛蜜炙用

榴皮酸澀。精漏下痢。腸風下血。染鬚亦易。子能止渴。

花醫吐血。山楂甘酸。健脾消食。行血散氣。癩疝有

益。擣末用炒黑能治血續

山楂甘酸。健脾消食。行血散氣。癩疝有

梨性甘寒。消痰止嗽。清喉降火。解渴功奏。

擣爛取汁用

桔甘澀寒。主潤心肺。痰嗽熱渴。止血須訖。

桔乾補虛。潤腸止病。忌同蟹食。呃逆用帶

胡桃甘平。和傷通經。肌膚潤滑。腰痛如神。去衣用過食動風生痰

芡實甘平。補脾滯精。緩腰去濕。明目安神。

去壳炒

龍眼甘溫。補虛益智。健忘怔忡。明目同治。

中滿氣脛者勿用去壳取肉

橄欖甘瀦。開胃下氣。酒食渴瀉。魚毒皆利。

核中仁可剉口唇燥裂

穀部共十一種

麥芽性溫。下氣消食。健脾開胃。止脹吐逆。

炒黃研用

神麴甘溫。消食開胃。止瀉逐瘀。脹滿能退。

炒研

酒性大熱。辟穀禦寒。通行血脉。莫飲大醉。

外科及和傷藥水酒各半前行經藥煎熟

酒後入
醋消腫毒。胃脘氣疼。能消積聚。血暈如神。

飴糖甘溫潤肺和脾。嗽渴自汗。消瘀補虛。

中滿嘔吐者勿用

胡麻甘平潤肌填腦。益氣補虛。明目不老。

蒸九次

白扁豆溫補脾止瀉霍亂轉筋。

酒毒須藉葉主蛇虫咬傷花毒

赤白帶下炒搗

或炒或煮

赤小豆平止瀉利水。排癰解熱。便血功最。

或炒或煮

芝麻性甘行風通血。滑腸潤肌。白濁能絕。

油能解毒疥癬妙訣

豆鼓苦寒燥煩滿悶。寒熱頭痛解表須問。

菜豆甘寒散瘀厚腸消腫下氣。熟毒最良。

(十八反歌)

本草明言十八反。半夏貝母欒芨攻鳥。

海戟遂芫俱反草。藜參辛

頭藥

夏瓜母白白

芍叛藜蘆。參謂人參舟參苦參玄參沙參

十九畏歌

硫黃原是火之精。朴硝一見便相爭。
水銀莫與砒霜見。狼毒最怕蜜陀僧。
巴豆性烈最爲上。偏與牽牛不順情。
丁香莫近雄黃金。見牙硝難合京三棱。
川烏草烏不順犀。人參最怕五靈脂。
官桂善能調冷氣。若逢石脂便相欺。
大凡修合看順逆。炮燼炙煥莫相依。

○君臣佐使法

弘景曰。用藥猶如立人之制。若多君少臣。多臣少佐。則氣力不周也。按神農本經以養命上藥爲君。養性中藥爲臣。治病下藥爲佐。使岐伯曰。方制君臣者。主病之謂君。佐君之謂臣。應臣之謂使。非上中下三品之謂也。張元素曰。爲君者。最多爲臣。六

之佐者又次之。藥之于證所主同者則各分。李東垣曰。凡藥之所用皆以氣味爲主。補瀉在味。隨時換氣。主病爲君。假令治風防風爲君。治寒。附子爲君。治濕。防己爲君。治上焦。熟黃芩爲君。中焦。熟黃連爲君。兼見荷證。以佐使藥分治之。此制方之要也。本草上品爲君之說。各從其宜爾。

制度引經法

陳嘉謨曰。製藥貴在適中。不及則功效難求。太過則氣味反矣。火製四煅炮炙炒也。水製三漬泡洗也。水火共製蒸煮二者焉。法造雖多。不離于此。酒製升提。薑製發散。入鹽走腎而軟堅用。醋注肝而止痛。童便製除劣性而降下。米泔製去燥性而和平。

醫學之說
卷之三
乳製潤祐生血。蜜製甘緩益元。陳壁上製竊真氣而驟補中。焦
麥麸皮裂抑酷性勿傷土。膈鳥豆湯甘草湯瀆躁並解毒致令
平和。羊酥油。猪脂油。塗燒咸滌骨。容易脆斷。去穰者免脹抽心
者除煥大槩且陳初學熟玩。

服藥時候法

本經曰病在胸膈已上者先食後服藥。病在心腹已下者先服
藥而後食。病在四肢血脉者宜空服而在耳病在骨髓者宜飽
食而在夜。東垣曰古人服藥活法。病在上者不厭煩而少。病在
下者不厭頓而多。少服則滌藥于上。多服則峻補于下。凡云分
再服三服者要令勢力相及并視人之強弱病之輕重以爲進

退增減不必泥法。好古曰：用藥若寒熱各半，晝服則從熱之屬而升，夜服則從寒之屬而降。或晴則從熱陰，則從寒。變化不一如此。此三論各呈妙旨。學者于此貫通之，自能得其活法也。

咬咀丸散合宜法

李杲曰：湯者，蕩也。去大病用之。散者，散也。去急病用之。丸者，緩也。舒緩而治之。也。咬咀者，古制也。古無鐵刃，以口咬爛，煎汁飲之，則易升易散而行經絡也。凡治至高之病，加酒煎去濕，以生姜補元氣，以大棗發散風寒，以葱白去膈上痰，以蜜糰末者，不循經絡，止去胃中及臟腑之積氣，味厚者，白湯調，氣味薄者，煎之。和滓服去下部之病。其丸極大而光且圓，治中焦者次之。治

上焦者極小稠麵糊取其遲化直至中下二焦或酒或醋收其易散之意也犯半夏南星欲去濕者丸以姜汁稀糊取其易化也水浸宿炊餅又易化滴水丸又易化燥蜜丸者取其遲化而氣循經絡也蠟丸取其難化而旋旋取效或可藥不傷脾胃也

煎藥法

李時珍曰今之小小湯劑每一兩用水二升爲准多則加少則減之加劑多水少則藥味不出劑少水多又則耗藥力也凡煎藥並忌銅鐵器宜用銀器瓦罐洗淨封固今小心者看守須識少候不可太過不及火用木炭覆蓋爲佳其水須新汲味甘者流水井水沸湯等各依方若發汗藥必用緊火熱服攻下藥亦

次煎熟下硝黃再煎溫服補中藥宜慢火溫服陰寒急病
生繁火急煎服之又有此寒煩燥及暑月伏陰在內者皆水

沈冷服

貴賤少長異治

示輒曰人有貴賤少長病當別論病有新久虛實理當別藥蓋
人心如面各各不同惟其心不同臟腑亦異欲以一藥通治衆
人之病其可得乎張仲景曰有土地高下不同物性剛柔食居
亦異是故黃帝與四方之間岐伯舉四治之能且如貴豪之家
形藥志苦者也衣食足則形藥而外實思慮多則志苦而內虛
故病生于脈與貧下異當因人而治後世醫者委此不行所失

注意
上病求下
三法为医
者不可不知
之奇

甚矣。又凡人少長老，其氣血有盛壯衰三等。故岐伯曰：少火之氣壯，壯火之氣衰。蓋少火生氣，壯火散氣，况衰火乎。故治法亦當分三等。其少日服餌之藥于壯老之時，皆須別處，決不可忽。

病在上而求諸下

示吉曰：凡病頭痛目癰耳紅腮腫咽喉腫痛，一切上焦等症除清涼發散，主治外，更有三法。大便結，脉沉實者，用酒蒸大黃三錢，加入本湯中，微下之。名釜底抽薪之法。大便如常，脈無滑者，用牛膝車前引下之。名引火歸原之法。如大便溏，脉沉足冷者，宜六味地黃丸加牛膝車前肉桂。足冷甚者，加熟附子。足冷極于下，而迫其浮火上升也。名導龍入海之法。若不知此，不免頭

痛醫頭之謂也。

注意之

一同學年二十餘歲患腮腫醫以清涼散火之劑不效一夜舌
忽腫塞口命在須臾叩門求救予診其脈微細而數大便四五
日不行矣微數雖屬虛火而便結又已屬實予用百草霜吹舌
上內用酒蒸大黃五錢肉桂一錢引火下行一劑而愈

一友始而牙痛既而咽腫醫投涼藥痛轉甚予診其脉沉細大
便一日二三次予曰浮火上升也其足必冷察之果然以金匱
腎氣料作湯與之服完卽睡覺來病失矣

病在下而求諸上

示吾曰凡治下焦病用本病藥不愈者須從上治之如足痛足
弱分別在此注意矣

腫無力虛軟。廉瘡紅腫用木瓜苡仁牛膝防已黃柏蒼朮之品。
不愈者定是中氣下陷。濕熱下流用補中益氣升提之。若足軟
不能食而不能行。名曰癥。症宜清肺熱如治泄瀉用實脾利水之
劑。不效亦用升提補中益氣去當歸加蒼朮炮姜。脈遲再加故
紙肉蔻。如治下痢日數行寸口脉滑者宜吐之如治瀉血用涼
血利水不效宜清心蓮子。清心復不止再加升麻柴胡。如治
大便下血用地榆側柏槐花棕灰蒲黃荆芥血餘阿膠等件不
效者若兼泄瀉再診其脈如右腳微細或數大無力是脾虛不
能攝血宜用六君子加炮姜。若右關沉緊是飲食傷脾不能攝
氣。爭製沉香末子甚驗。若右寸洪數大便如常是實熱在肺熱。

主流通傳于大腸宜清肺熱用麥冬花粉玄參桔梗玄参
吊壠之類如小便閉用五苓車前瞿麥不效者須加清肺藥桑
皮桔梗玄參之類脉虛口渴者用生肌散加燈心木通之類經
云氣化則能出矣若上部脈滑有痰是痰壅于上如玉漏之土
竅塞而下竅閉也宜用二陳四君煎大劑頓服鵝翎探吐之

徐萬壽楓江人年二十餘歲七月中下血不止遍醫不效至十
月初屢次昏暈事急矣求治王予診之有寸獨得沈數是必
實熱在肺傳于大腸也用麥冬花粉桔梗玄參黃芩山楂五味
沙參服數劑而愈

胡明甫年五十餘患癲瘍三載沿皮瘻瘍微腫色紫黑用膏藥

白木柏
沖瘡癰
方示例

蓋之則流水鞋襪盡濕去膏藥。卽又燥烈痒痛難忍易醫數人。內外兼治日甚一日不得已而求之予曰予非瘍藥然亦識之此濕熱下流也。人但知燥濕清熱解毒而不知濕熱之原從脾家下陷耳。遂用補中益氣湯升舉其氣更加黃柏清熱。蒼朮燥濕。茯苓澤潤利水。益治濕不利小便非其治也。彼求外敷藥適在山中未便細思之。燥濕散瘀者無如陳白灰。清熱者無如側柏。皆山中所有。遂以石灰研末。擣柏汁調匀。稍加火酒爲從治之具。試之明日則瘍乾矣。數日而全愈。

吳江吳姓者。巨族也。有子十餘歲。下血已久。百藥不效。乘便歸湖乞藥。予以沉香末子數服與之。三月後遇諸塗。復索前藥。甚

筆子曰。尚未愈乎。彼曰。予愈矣。猶亦病此也。後服之亦愈。蓋小兒多因食傷脾胃以致不能攝血也。昔丹溪已言及之。其外泄瀉溺塞瘡症治驗頗多。然古人已有成家。予又附之。則蛇足矣。

虛中實

虛中實者。本虛而標實也。如年老久病。氣血兩虛。若兼內有所積。外有所感。補之不應也。至于傷寒熱病後。元氣雖虛。補之必復熱。若餐食其後。尤宜消導。瘡後。病後。中氣脾元未復。飲食易傷。風寒易襲。最宜細察。產後發熱。血虛者多。若兼惡露不行。腹有塊痛。其熱也。血氣無凝。若兼胸腹滿悶。咽酸惡心。其熱也。停

食無疑。若不用行瘀消導而概施補血之品。其能愈乎。小兒痘後。惟當補益。倘兼他病。亦宜察風食而調理之。蓋表虛則風易入。脾虛則食易傷也。

周忠介公夫人年六十餘患痰喘五六年。醫藥無效。士材先生診之曰。右寸浮洪肺有實邪須用麻黃石羔半夏防風細茶生姜等件。藥雖峻而病當之無異也。投之果愈。但麻黃只可用二三分服。後兼須避風耳。

山塘吳氏母年六十餘外患腹痛日瀉四五行已三四年矣。遍治不愈。尋診之。二尺沉緊。予曰。內有沉積也。用熟大黃三錢入水病藥中煎服一劑而病如失。

高年腹痛
瀉久用大黃以治積

穩健

(注) 沉為內
沈為外

方解法

晉于諫夫人小產後惡露不止。腹發昏暈。面色恍白。惡心不食。自汗。六脈微細。而數治以四物湯加麥芽。姜炭。服數劑虛症稍退。而血亦止。但大便秘結。腹痛。不食如故。而嘔酸發熱尤甚。諸医束手。予于前方中加酒蒸大黃二錢。大便始潤。而發熱嘔酸漸愈。

崇明蕭氏寄居吳門之西山。有妊二十餘歲。素羸弱。患妊娠病。將一月。醫者滿堂。弗愈。一夕。忽死。其父叩門求救。予曰。已死矣。又何救焉。彼曰。死其分也。若得一決。尤所甘心。不得已而往。至其家。帳已揭。帛已焚。慟哭之声。徹于中外。予就視之。脉雖無重按。尚存心口微溫。予曰。似有生机。卽用竹瀝燈心生姜湯灌之。咽

先備參。後用下良法也。

下一日少頃微動細察之腹痛甚問其大便云二十日不食亦不行矣予以大黃一兩苦硝五錢桃仁當归各三錢與之衆駭曰素有弱症且病久何能堪此予曰更有法在強與之遂去黑物半桶卽用人參五錢煎湯補之蓋因其素弱急下後不得不峻補也調理月餘而愈今連生三子此諸医因其虛而不治其實凡悞矣從此亦可例推。

實中虛

實中虛者今實而素虛也如病人現在頭疼休痛身形拘急惡寒發熱無汗此表實也宜汗之若其人有虛症或吐衄下血或夢遺滑精或小便淋濁或大便濶利或內傷勞倦或房勞陰虛

或動氣瘡痛或胎前產後或執入血室或口燥咽乾或尺脉細弱俱不可汗汗之則自利亡陽而變爲肉潤筋惕等症加病人現在發熱潮熱煩渴譯語腹脹硬滿大便五六日不通此裏實也宜下之若其人有虛症或內傷勞倦或房勞陰虛或氣血兩虛或胎前崩漏或經水適來適斷或小便清白或手足通冷或腰有動氣或腹痛拘急或六腑無力或小兒病後慢驚或傷寒惡寒及表症在者俱不可下之則自利亡陰而變爲逆冷昏沉等症如病人現在胸滿鬱鬱微煩或食在胃中或喉中有痰或胸中懊憹或寸口脉滑皆病在膈上也宜吐之若其人老弱氣衰或吐衄崩漏或勞倦內傷或好怒喜淫或胎前產後或熱

八血室俱不可吐。吐之則自吐不吐而變爲呃逆喘急厥逆等症。外如胸腹脹滿實也。若其人平素少食或不思食或右關微細或脹滿手採則軟或不啜氣作酸惡食俱屬脾虛不運化。如胸腹脹中諸痛實也。若其人手按痛減則爲虛症氣血不能運動上氣喘急實也。若其人勞倦內傷或奔走太過或房勞陰虛皆爲氣虛不得歸元而赤煩躁實也。君足冷脉沉無力目秘則爲陽虛陰極發燥之症。凡此種種皆虛實互見或虛症似實不辨爲害最速故先哲已詳言之。

示吉曰識藥易察病難察病易用藥適中難何也古人用藥有因天之寒溫而異有從人之虛實而殊故麻黃汗藥也或代之汗

下

吐

以羌活或易之紫蘇或佐之以石姜。少虛無汗身痒外行鹽
葛亦解表熱。大煩口渴不能言柴胡能療此皆輕重發汗之法。
故用大黃小柴也。或助之以甘硝或調之以甘草或佐之以桃
仁或兼之以柴胡或上行而酒浸或散滌而姜炒或同人參以
調氣或兼當歸以養血或欲其走而生用或使其留而九蒸或
大下而用一二兩或微利而用五六分此皆急下微下之法若
夫吐法瓜蒂散其首方也。至于桐油吐喉瘧常山吐瘧痰胆簪
吐喉瘧鹽湯吐霍亂二陳湯黃芩汁桔梗蘆人參蘆葱根汁下
子油無非湧吐之物但藥之無毒者宜大劑而頓服藥之有毒
者宜少服而漸加服後或以手指探或以鵝鉢攬不出以梨汁

吐至眞眩
飲涼水

投之不吐再吐且投且攏無不吐者吐至眞眩慎勿驚惶但飲
涼水卽解此隨症吐瀉之法也外如枳實消痞佐以白术知相
滋腎導以桂心胆汁童便入白通以驅寒炒黑乾姜入四物以
治熱冷藥熟服熱藥冷服如此種種先哲皆好爲多岐或亦爲
知藥適中之難用此苦心耳陳案間多不容贅述

治病須求其本

夫治病當知標本。以身論之外爲標。內爲本。陽爲標。陰爲本。故
六腑屬陽爲標。五臟屬陰爲本。臟腑在內爲本。十二經絡在外
爲標。而臟腑陰陽氣血經絡又各有標本焉。以病論之。先受爲
本。後傳爲標。故百病必先治其本。後治其標。否則邪氣惑其真。

病益重。統先生輕病後生重病亦先治其輕。後治其重。則邪氣乃伏。有中滿及病大小便不利則無問先後標本必先治満及大小便爲其急也。故曰緩則治其水急則治其標此東垣之法也。然。腹滿便閉亦有標本之分。故先喘後脹病在肺。喘爲本。而脹爲標。治宜清金降氣。先脹後喘病在脾。脹爲本。而喘爲標。利小便分之症。先經水斷絕而後浮腫。腫爲標。而血爲本。先治血。小兒之症先浮腫而後經絕。腫爲本。盈爲標。先治此皆先哲之陳案。同治者可旁通也。貝難齋。僧永譽初患游皮鶴不效。復以椒目大黃等投之。喘愈急。而腫愈甚。延予視之。

水腫宜
知之法

予曰。亦在皮膚肺氣熱也。復以火薰火毒傷肺。遂失降下之令。
氣道塞水道閉喘急。瀉濬浮腫之所由來矣。今復推瀉陰血。久
僵若非童真難免于死矣。遂以麥冬裏山楂桑皮丸加消石。
木通。燈草。服四劑而諸症皆除。

(製方定見)

宣記
渴因利
渴而刺
痛用益
氣之風
此直梁敬州客樞江年六十餘病瀉已三年淡滲寒涼溫補之
品投之俱不效求治于予。予診之六脉俱微惟左手帶數。予曰
此因心火不降以至脾胃之氣不行白濁之物因而下滲耳。法
當養心升補若用本病藥無益也。遂製方用丹參茯神遠志棗
仁山萸山藥黃芪白朮升麻柴胡甘草陳皮姜炭煎服三劑。

仁山萸山藥黃芪白朮升麻柴胡甘草陳皮姜炭煎服三劑。

其猶存至彼懷也。曰抑何故也。予問其體中健否。彼曰如故。予
曰若使所出者盡為津液。體必積實。今濁增而體健。知自濁之
物積于其用。爲藥所迫而出。清者既升。濁者自降。再服二劑。
所積者盡。而病如失。先投之。果然。由此觀之。若無先見。庶必再
換一方。寧能愈乎。從此亦可例推。

(調攝得宜)

宮隆盛氏。一子一女。俱十餘歲。病劇。延予視之。予問何恙。曾服
何藥。彼曰。男患胸消寒。勒臂服小柴胡加消道藥。女患內熱乾
渴。勒臂服清火滋陰藥。予謂之曰。其方具在。但服之不愈。
予診之。男得浮弦。女得空裏。丁口脉症。湯藥甚相合也。因何不

愈沉思間忽聞女衣有烟火氣。予視之。曾卧火箱中。平自然。卽以前方判藥與之。令其遷卧床。其子亦以前方與之。令其避風。絕食服藥。完而二人皆愈。其女駭問曰。方藥相同也。何效之不同。若是耶。予曰。今卽風食症之輕者也。惟其輕也。不避風。不絕食。宿食未消而新食復傷。舊風未散而新風又襲矣。若令媛咳嗽。火熱燥金。而用清火潤肺之品治之。且當其如外火復偏一杯水。其能救一車薪火乎。此其所以皆不愈也。予因此而加之調攝。故愈。

標說約卷之二

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏纂述
錫山禪齡道人計廉能元讓甫參

第時行季芳氏

增葉舒嵩明韓氏

中風

火癥大指次指麻木不仁或
肌肉微掣卽爲中風先兆

西北地寒風浩蕩或中腑兮或中臟或中血脉或中經善行數
變難名壯卒倒僕地不知人痰塞喉間。愈欲喪東南地濕類中
風症候。同治須當腑中風邪看四肢惡寒拘急脉浮遲中臟
緩濡。凡發鼻塞便閉不語時若中血脉口眼歪。又有中經亦

要知六經無症溺調和口不能言肢不持古人曾作直風治三

人名

人名

人名

家妙論亦須思東垣大率土氣虛河間腎虛兼火治丹溪主濕

牙皂去皮

細夏

內生痰總是類中分明詳治之先用開關法皂

弦一兩

辛半

黎錢。但爲末再加麝香吹鼻中有嚏則生無難活醒後投之

芩皮草夏

南瓜當頭出黃白

細夏

三合湯茯陳甘半應相當星費歸桔芩連木竹瀝姜汁共一

病

白川

人黃

細夏

湯左癰屬血右屬氣血虛加芍芎生地

四物恐泥痰

細夏

細夏

與紅花瘀血小便利大便黑或腹中塊痛氣虛參芪也同劑盜汗遺尿亦如之

細夏

不便不利不可利姜奮全蝎閉塞加鈎藤善治牙關閉肥人烏

附少許以引經烏頭附子東實人參亦要忌右寸有力去參恐風

車前煮用東實人參亦要忌

補住痰涎于經絡

細夏

一體漏防風羌活升津桂頭目不利或頭疼芎芷蔓荆

芥穗無汗身疼加荳蔻防蒼术秦艽配心血虧欠神恍惚

伏神遠志菖蒲人或心動搖驚悸者酸枣竹茹辰砂益風痰熾

風白

盛須膽星防生牙皂瓜裏仁食傷麵非山楂實便秘還須三化

行太便結用三化湯厚朴大黃枳實羌活等分每服一兩微利之

示吉曰東南類申風者多故從火痰氣而治實有神驗若果

外風邪外中六經形症具者原宜先服小續命湯解表便祕

者三化湯通滯之後方用本湯調理更爲切當至丁治口眼

歪斜方法固多不如瀉夾車地倉二穴歪左針右歪右針左

病可立愈

傷風

頭痛發熱鼻不通惡風自汗號傷風脈來浮緩兼無力參蘇飲

服自然鬆人參紫蘇及枳壳桔梗乾葛前胡同陳皮茯苓甘半

夏木香少許水姜攻

以下加減咳嗽去參加桑杏

皮仁

去皮尖打碎內有痰熱

黃芩進痰唾如膠金沸草胸溼痰多賣貝順冬月自汗桂枝添

若還無汗麻黃令傷食厚朴麵麥芽中酒白蔻烏梅信頭疼羌

芍不可無氣喘杏蘇亦莫剰

七子

示吉曰人之易于傷風者其故有二一因元氣虛乏氣不衛外風乘虛八治宜參芪益氣而佐以散邪一因素有鬱熱在內主疫常開邪風易入治宜大連清火而佐以疏風此皆氣

鬱既爲本風爲標也治本則標自除

寒

中寒傷寒殊非一

傷寒利在後

傷則漸深中直入初起怕冷四肢寒

無熱不渴身戰慄脈來無力又沉遲

加味理中湯有五參术甘草并乾姜加桂陳反功妙極寒甚附子及吳萸

鹽炒附子

夏吐有力生姜煎就須冷服

伏其所主先無其因也

無脉猪胆

一處麝香分

吃泄瀉不止加芪升

黃腹

姜汁三匙咽吐入舌捲囊縮指甲青筋絕

然膾不可忽

蒸膾法○用麝香半夏皂莢末一匙填實膾中後用生姜片

貼于膾上放大艾火于姜片灸二七壯炎開元氣海各二七

壯熱通于中逼寒山外手足溫煖則生一用硫黃麝香末

一 增濟中放葱餅于臍上以熨斗盛火于葱餅上熨之如餅爛
一 再換一枚葱餅用葱頭一握切去葉留白根約寸許連縛四
五 餅應用

暑病

暑大病熟名暑症腹痛吐瀉冒暑病頭痛身熱燥不寧身如針
刺傷暑應寒熟自汗出不止咳嗽倦怠爲中暑。脈虛身熱動而
爲暑症得之病屬陽加味香薷湯可止。香薷冬芩草皮厚扁人白黃味茯苓陳朴豆木瓜次
第尋黃連燈心姜枣服氣虛參术共芪靈糞熟柴芩爲要藥。嘔
加藿半法爲精鴻合澤猶真妙訣去麥芽花渴用知粉藥如神綿綿

姜骨石土

小水不利或短亦澤瀉山

并滑石猪羽加苑

暑風服治實

消食積目汗不止用參

芪水瀉水通澤有益頭痛川芎

并石羔瘀悶瓜蔓及枳實以上治法

若居涼館喜風涼頭疼惡寒頭項強身形拘急熟無汗靜而得之陰寒傷

此因暑致病

宜服羌活并蒼朮厚朴乾葛及藿香紫蘇等分姜三片水煎服號升陽

湯名兼食神。麴滑石妙。內傷水冷

用羌姜

示吉曰夏至一陰生人內寒而外熱若過食冰冷及連薷益元寒涼之劑遂至寒積于中而成內傷寒症凡吐瀉而腹痛無休歇脉來遲緩者是也治宜理中湯合平胃散溫之寒甚加附子如悞投香薷飲則危矣

注夏

溫熱蒸人夏日長氣虛體弱熱因傷胸中氣促四肢倦心煩食少不如常好卧口乾或泄瀉治用清暑益氣湯黃芪升麻與蒼术各一
人白皮神曲參木陳藜澤泄柏黃酒炒麥冬青皮及當歸乾葛三分言三

味丸粒甘草水煎引姜茶盜汗還加浮小麥便赤滑石并山枝。渴甚天花烏梅食水大苦寒頭痛川芎石羔好嗽加羔杏升蒼牛木香砂仁胸不寬瀉加肉蔻茯苓去麥歸

濕

南之地恒多濕居民感受病非一或行涉水雨露蒸或過飲而小便短赤身體重骨肉酸麻行不疾漸加浮腫及身

燥去滲濱湯可。令香附半陳皮厚朴澤猪脊白术引用
砂石并姜盐臨服半匙鹽可人外濕寒熱身肺病防水通加
有益內濕胸滿兼嘔吐喘脹腹膨用枳實黃連山楂炒下子蜜
門木通車前力濕熟發黃仗茵陳山楂車前兼滑石

示吉自治濕大法在表在上者開鬼門用麻黃防風草微汗
是也在裏在下者潔淨府用五苓草利小便是也丹溪云濕
得燥則豁然而收用蒼朮是也濕從風散用羌獨活類是也
濕久則生熱用黃連山楂是也從此而變通之亮能活人但
麻黃只可用三分蓋汗多恐生變症耳

火

雨火命門君火心二火一水不相均

惟賢屬水經所謂五臟水不

通靈

皆是火

氣有餘便是火妄動須知燥至陰經所謂一水不勝五火也

古人調治非

法一一從頭說與君心火亢極陽躁病人吐氣實鹹冷進

便閉用硝黃

天大承氣湯朴消大黃根實厚朴水大服

大便如常今運應

黃連解毒湯黃

黃連黃柏山楂烏梅水煎服治大錯語呻吟不眠煩躁脈數乾嘔

大實火可瀉從上方隨經調

須臾定飲食勞倦身發熱元氣不足內傷症補中益氣味甘

萬虛之火功偏勝

補中益氣湯人參黃芪當歸白朮陳皮甘草升麻柴胡生姜大棗水煎服相火

熾盛以乘陰朝涼暮熱血虛成陰中之火甘寒降知柏四物生

浮火盛左尺

四物湯當歸生地芍藥川芎加黃柏知母

火受傷陰虛病面紅耳赤

浮火盛左尺

甘六味地黃丸地黃茱萸肉桂

丹皮瀝泄密丸

傷抑過陽

脾中央火鬱之症升

陽

火最爲長

升陽散火湯治五

四肢乏力。肌熱筋痙或寒。鬱中熱。用升麻葛根川獨活白芍人參各五分。炙甘草生甘草柴胡各三分。防風二分。生水煎服。忌

寒涼物去獨活及生甘草加葱白。卽火鬱湯。命門火衰。陽脫病面赤煩燥。虛火盛足冷

脈沉陰極燥。回陽救急醫中聖。

回陽救急湯見傷寒科

陰虛發熱火旺甚。

脉數無力。屬心腎內傷。發熱少陽虛。脈大無力。肺脾分氣從左起肝之火。陰火還從臍下生。脚下熱來侵腹者。斯人虛極藥難平。熱從脚起。先用附子末。津調貼脚心中。涌泉穴引火下行。後服四物條火之劑。

示言按積熱論曰。汎火之法。始而涼和。次而寒。取寒取不愈。則因熱而從之。從之不愈。則技窮矣。是徒知治熱以寒而不

知熱之不衰。由乎真水之不足也。當壯水之主以制陽。光經
曰。寒之而熱者。取之陰。陰腎水也。求其屬也。此獨爲積熱者。
說。愚意治火除人壯氣足者。便秘者火微者從正治外。但當
遵此爲則。蓋火非水不降。未有腎水足而心火熾者也。益於
勝離湯實爲火症之總司。湯見勞瘵。

內傷

飲食勞倦是內傷。或因饑飽。行步。寒傷人名外感辨明謂
治病無妨。人迎緊盛。手皆熱。寒熱邪作無間。欲寒無汗。鼻不
通。此是外感。君須別內傷之症。氣口洪。手心有熱。微惡風。寒熱
間作。不知味。更兼氣弱。言語悽。內傷寒得煙解。外感近火寒。

攻外感內傷相挾者。脈症並見。須辨通內傷不足急補之外。

感有餘瀉不同。或先補養或先散。先後之間無苟從。

治內傷法補中

益氣用芪參

黃人當白麻胡草

升柴甘與陳

皮花

引加姜枣水煎服。

氣和微汗是

爲精收腎水。虧酒炒柏入心養血紅

三分升麻柴胡白汗去夜

間不睡加枣仁

炒爲木亦去升柴

川芎蔓荆頭疼用口乾乾葛藥爲靈

顛頂痛時辛藁木

性征忡驚悸枣茯神

甚者再加遠志

川柏子仁菖蒲食加麴芽

神葵花

查枳實瀉添澤泄方

白芩令黃連根

根夏芩

實除胸悶有瘀前半茯爲君

防已木瓜除脚弱

龍骨牡蠣

煅爲末

治遺精防

丸活白川

丸身熟用

寒頭火者加

廬火知母柏玄參

火炎上者用

黃芩黃連清內熱

菊花熟地

醫眼疼。

傷食

後天之本屬脾胃。納化飲食。滋榮衛。

胃主納飲食不下爲胃病
脾主化飲食不消爲脾病

養生妙法。節飲食。脾胃受傷。飲食倍。胸腹飽悶。并作酸嘔。氣惡

食。腹痛累或吐瀉時下洩屁。

種種皆因傷食例。甚則發熱與頭

疼。惟才不熟。傷寒異。

有傷食類傷寒
條在傷寒科

左關平和右關緊。香砂平

功有濟。蒼朮陳皮厚朴甘。

草平胃散只

此四味。

香附砂仁香理氣川芎

買井藿香水姜煎服。食須忌消肉。

杏

楂菓消麵卜消糯米食酒

麩飯食神麩及麥芽。生冷瓜果姜青逐。

一加
橘皮

西瓜多吃食幽促魚傷微。橘皮紫蘇柏草將來消牛肉虧。

西柚多吃食幽促魚傷微。橘皮紫蘇柏草將來消牛肉虧。

橘皮

橘皮紫蘇柏草將來消牛肉虧。

益傷飲須合四苓

加茶
茯苓
白术

之類四苓

白术
茯苓
白术

咽吐臨服加姜

白术茯苓治脾虛泄瀉車前蔻白术

以上消上
導之法

上部有脉下無

箕人當吐不吐卒指物探吐是良方否則爪帶散有力

瓜蒂
冰小

爲末溫水調
一錢吐之

食積鬱久成溫熱芩連大黃不可缺再入白术

導瀉去藿砂仁蒼木訣胃中停滯生冷物心腹急痛入暴卒

大黃乾姜巴豆肉等分爲末名備急蜜丸大服三丸或吐或

痛自息

以上下
食積法

按丹溪曰明知身受寒氣口吃食物初得之宜溫散溫利稍
火則成鬱鬱火則成熱熱火則生火若仍用溫藥寧不助火
添病乎宜用辛涼以發表辛寒以理中邪易伏而病易退也

至東垣則有輕則損其穀重則逐其滯之論。蓋少壯新病宜推逐急去爲美。如老人久病又宜導化漸去爲佳也。二公之旨真消導法中口訣故特拈出。

調理脾胃

至哉坤元調脾胃。萬物資生無病累。胃陽納受是所司。脾陰消

化精神。遂飲食自信。脾胃傷潔。古枳术丸爲最。白朮八兩。將土

炒四兩。枳實八名
炒爲末了。荷葉包米煨飯。丸一補一瀉方。真好。

半夏陳皮消痰用理氣香砂不可少。元氣素弱。脾不磨。食多腹

滿。即不和。加入木香炒陳炒白芍。人參亦用多。素有痰火鬱胸

熱酸煖氣并酒積炒枝連芳草。陳皮砂仁木香茯苓入胃強

人好食今後反飽難消冠黃連山楂甚石黑人參白芍甘草

王節齋曰凡治諸病若見胸膈飽悶或噫氣噯酸腹痛泄瀉惡食少食等症便問曾何飲食審明傷積卽先調理脾胃潤導飲食然後用本病之藥或于本病藥內佐以消導若不審此藥雖對症而無效也蓋藥先入于胃脾胃自傷不能運化藥味以成功耳同志者審之

酒客病

病因于酒則歸酒氣味俱陽熱性有無形元氣受他傷上下分消不可久宜微汗利小便一切不可用下藥以則病深變症多先賢著論須尋究

葛花解酲湯妙藥。白蔻砂仁葛花者如無花以乾葛根代之各五錢澤泄炮姜
神麃自各一錢一猪茯陳皮人參約各一錢木香青皮各五分共爲末。

調下三錢酒可却。

六鬱

滯而不通病名鬱。火氣血痰與食六鬱之症發東垣五鬱之言出岐伯丹溪製成越鞠丸總解諸鬱有功續香附謂蒼术及桔梗神曲山楂宜炒黑水丸大服百丸等分爲末隨症加藥病如失寒熱頭疼胸膈痛耳聾目暗脉沉澀氣鬱木香烏藥加砂仁青皮薄桂及潔鬱周身骨節痛陰寒則發肢無力脉來沉細芷桂散氣急爲痰鬱手足麻木脉滑沉痰塊堅硬咯不出須

葛根桔杏仁南星半夏及海石火鬱口苦五心煩頭目惺惺
目昏黑小便赤澁脉沉數黃連青黛竒奇特午後發熱爲血鬱之
外腹痛處移不得脉來沉濁或芤結上下失血桃紅人喫氣作
酸爲食鬱遇食作痛不思食胸腹飽悶面色黃枳實針砂炒沉
紫脈右關春加防風夏苦參秋冬吳萸用有益

氣

捍衛冲和之謂氣妄動變常火之例局方燥熱與辛香以火濟
火有何利冷生氣者出高陽高陽生冷生氣快言也氣多是火丹溪意上
工調治辨虛實虛者右手脉無力懶言氣短身倦怠胸中虛滿
不思食塞因寒用六君子人參白朮茯苓甘草半夏陳皮姜枣煎服補中益氣亦有

力。滯氣實者脉洪實。憂愁忿怒因而得。胸脇脹滿噫不通。吐酸。

心心鬱抑。種種氣滯。若何醫分心氣飲最相宜。通牛杜芍茯

半枝梗。兩毛桑青皮陳腹皮。各一錢。活皮。甘草木香引姜枣。枳榔附

胸滿苦脇痛背柴爲要藥。痛居小腹用吳萸氣滞氣虛合補

六君兼用功誠異。性急加柴熟用芩。女人烏附原有利氣滯

痛燒木瓜翻胃沉香磨順氣。

宗吉曰治氣補虛實瀉。正治也。若虛實相兼。宜一補一瀉。古

人亦有完法。至虛中實。見中虛切宜細察。假如人老病久。脉虛人弱虛也。倘後補藥而不效。須察其胸腹之間。有無痛處及氣血發否。若有之。輕者用消導之品。重者及大便實。

片酒製于黃二錢微利之後用之藥無不驗矣譬之加染
舊衣必須先洗其垢後加顏色也然乎。

疾

百病怪病皆痰甚。脾胃虛弱濕不滲。濕熱相蒸遂生痰。遊行到
處皆成病。實脾燥濕是良方。因痰生于脾胃也降火順氣能接命。

痰隨氣升

苦治痰者先治氣氣升屬火善治氣者先降火古人總用二陳湯。隨病加減如神應。茯

苓半夏及陳皮甘草四味生姜進有火枝芩山黃次第添。不愈加降

氣枝子黃燒從容順頭疼鼻塞是挾風。紫蘇桔黃羌防風不可聽面紅嗽喘

略不出卒倒痰涎爲癇。瘧熱痰因用黛芩連瓜蔞花粉功奇特

身重倦怠名挾濕。面目浮腫氣喘急脈來濡滑爲濕。瘡燥濕健

脾蒼白

水吐略不出

痰硬極動則氣喘名挾鬱右脈沉滑左手

平星

南瓜母香

負附兼海石。嘔吐惡心胸痞塞遇寒滑甚滑遲脉乾姜

肉桂治寒痰。再加二术從來的卒倒什地不知人角弓反張風

痰立

南星白附及天麻

姜蚕牙皂兼汁瀝

姜竹

惡心嘔吐口酸胸

膈飽悶爲挾食

右關緊滑爲食痰

平胃相兼

麵芽入氣虛須合

四君湯

血虛四物姜桂益

脇痰白芥子青皮

痰滯經絡須瀝汁

示吉曰

濕痰寒痰

熱飲痰涎

二陳實是主劑

若久而不治兩

寸堅滑名老痰

根深固結致肺胃

一脉伏結者

名結痰膠粘

固結消吐不盡

六脉滯滯名頑痰

隨火上升爲狂爲癲名火

痰此四者非一陳所司也

宜節齋化痰丸清金降火緩治效

速用丁冬去心黃。炒海粉瓜蔞仁。橘紅各一兩。桔梗舌
附鹽水炒。連翹各五錢。青黛朴硝各三錢。爲細末。煉蜜入姜
汁爲丸。丸如龍眼大。或噙化。或白湯化下。或細丸如黍米大。
姜湯送下亦可。

咳嗽

咳嗽當分二症。奇有聲無痰。咳症醫有痰無聲。名曰嗽。嗽屬肺
家。痰濕。嗽。爲肺經邪氣盛。風寒火燥亦因虛主。治當宜用保
和。杏花紫梗。荳粉蘇桔及前胡。夢枝清火寬中壳半枝油。甘橘多引用。
姜同燈草飲時食後起沉疴。風痰再添星瀝汁。肺實桑葶不
可。無石寸浮洪有力。或氣急喘甚。差還風嗽聲難轉。麻黃用三分。竹葉皮一錢。是

其途清晨嗽多肺火動。天冬麥冬在所用。上午嗽者胃火伏。知

芩石羔病自中。下午嗽多屬血虛。

宜補陰四物湯加知柏二冬。

火浮于肺黃

葛根。

黃昏嗽多不宜涼藥宜人參五味爪姜白朮之類。

春嗽方青柴加入夏宜清火麥

芩得秋用桑防。

風火之類。

春嗽方青柴加入夏宜清火麥

芩得秋用桑防。

天風枝夏之類。

桂半乾姜悉。

已上治有聲有痰咳嗽相兼者。嘔吐。

然涎無聲者。

陳平胃治之則再合枳术功誠妙。

秋芩牛夏陳皮甘草蒼朮。

不枳實姜汁臨服不可忽。

以土治有痰無聲者。

山咳久嗽用滋陰。

內熱無痰最害人。四物湯將爲主劑。再加知

及玄參燈心甘草和諸藥。

桔梗天花火用芩。

酒炒貝母茯苓。

清痰用二冬。

款冬花潤燥行血。見再加沙丹苑肺傷因用苡苡。

參皮紫草白芍。

鴉汁最爲靈

示吉曰治咳嗽大法新者大約屬痰食風寒宜瀉宜散久者
大抵屬勞火陰虛宜補宜收然新者易治久者難醫。予製鳴
化丸治久嗽乾咳無出其右不敢自祕。謹傳于世用川貝母
花粉款冬花陳香圓各二兩。诃子薄荷葉各一兩爲極細末。
再用天冬麥冬去心紫苑玄參各二兩。桔梗甘草各一兩。五
味子烏梅肉各五錢。柿餅四兩煎湯去渣再入梨汁蘿蔔汁
各一碗。飴糖二兩。玄明粉五錢。姜汁三錢煎成膏汁爲丸。丸
如雞豆大每噙一丸化盡嚥下再噙使藥力不斷神效難述。

肺主清高無壅窒。一有邪干便喘急。風寒痰火各不同。醫家心
法辨虛實。內因痰火外風寒。六脈浮洪更有力。是爲實症。五虎
湯。麻黃石羔甘草益細辛半夏及桑皮杏仁只壳再加入引用
藜姜徐徐啜隨症加減。方爲的。若有痰升。痰喘症。茯附南星正
相應。乍進乍退名火喘。山藥苓枝冬味蘇子並食後作喘食積。取麵
食只腹皮進。大便燥結不能通。玄明粉兼蘇子勝。結甚加
大黃何
爲虛正氣虛遇勞則發似邪歟。吸吸短氣脈無力。補中益氣
精奇。黃芩山楂兼火用。茯苓半夏秋漆宜夾食山楂腹皮實
高而喘是良醫。

爲甚水雜聲哮症原來痰病侵若得此痰并發散遠福良

藥方靈。

甘一箇去壳
切碎炒黃

麻黃蘇子

各二錢
一錢

款冬半夏

且爲君桑皮杏仁

半錢

半錢半三碗水煎

一碗存食後徐徐溫

更能定喘法如神

示吉曰喘爲惡候。哮爲痼疾。自古難之。然猶易明也。更有捨
棄最爲利害。不可不知。蓋人喉間有二管。一軟一硬。軟者連
胃而無底。通有形之水穀。上入下出。名曰食喉。硬者連肺而
有底。止通呼吸之氣。玄門謂之十二重樓。名曰氣喉。若有形
之物。悞入氣喉。惟其有底。不能下出。必從上捨出而後止。若捨
有形中之無形者。如酸醋鹽水之類。尚有方法可治。若捨

有形之易碎者。如粥飯之類。尤易搶出。若搶有形中之堅硬者。如瓜子生豆之類。上不出下不降。必死無疑也。醋搶哮嗽。用甘草二兩。每段切二寸長。兩半劈開。用猪胆汁五枚。浸三日。火炙爲末。蜜丸。清茶吞下二錢。臨卧服。食鹽哮嗽。用白麵砂糖各二錢。糖餅灰。汁。捻作餅子。爐內燂熟剝出。加輕粉四錢。另炒。將餅切爲四極。摻輕粉在內。病者吃盡。吐出病根。

瘧

寒熱往來。名曰瘧。正氣與邪相擊。抑風寒暑濕食與痰。亦有陰虛兼氣弱。陽分日發邪氣輕。陰分深分應。間乍在氣分。甲臨血分。

晏臨于陽爲熱寒爲陰並則寒熱離則止

暑風邪氣與榮衛並行則病作離則病止

榮衛邪氣並相爭邪不勝正移時早

爲

正不勝邪移晚行更治

法要分有無汗無汗散邪藥爲君有汗正氣藥爲主更看新久
再評論新者宜涼宜發散久者補氣及滋陰無痰無食不成瘧

初起清脾飲最靈草菓柴胡升厚朴陳皮半夏及黃芩茯苓白
术青皮醋炒甘草生姜並用梗陰陽水煎露一夜清晨溫服效

如神自汗去半夏知豆無汗加蒼乾葛精多熟芩知加倍用多

桂薄定須增頭痛惡苦芷要藥煩渴不眠葛粉親夏月香薷

并扁豆冬天無汗麻黃尋寒甚加桂枝自汗去麻黃加桂枝芍藥此治新瘧有餘

症若還虛久再酌斟日久自汗精神倦六脉微細更無神氣短

懶言不思食夜間盜汗又來勤人參黃芪用補氣歸元藥。甲子

草榔

當白

灸

好滋陰除出巢

榔

反厚朴薑爲引定功成若欲截分藥如何。

實者當出梗

榔

最多青皮烏梅真妙藥丁香少許酒煎過

或并河

水名半

煎或酒水各半煎

夜裏露時清晨飲是日絕食去沉疴瘧母恒居左脇

門

瘧後脇下生

令人多汗脇疼連藥宜消導何爲好驚甲稜蓬

頭魄名瘧母

皮仁神夢花

附四般醋煮停勻加海粉青桃麴芽與紅藍爲末糊丸日三服。

病當漸去不爲難。

霍亂

霍亂之症起倉卒外有所感內有積胃中停蓄難運消吐瀉交作腹痛極止蕉但吐而不利下焦但瀉無吐。甲焦叶瀉兩相

兼偏陽多熱偏陰寒吐利得盡陰陽順其間死者終稀焉治用
加減正氣散藿香紫蘇陳皮全厚朴茯苓并半夏桔梗腹皮蒼
术先白芷草砂仁末生姜大枣水來煎紅花木瓜轉筋用山
楂芽麥神曲傷食兼腹痛須加炒芍藥寒痛加姜桂似仙只實青皮
心下痞柴胡乾葛寒熱纏小便不利澤猪效中暑發熱連嚮傳
轉筋入腹痛欲死蓼湯薰洗病可止千金方有外治法男挽其
陰女牽乳手足厥冷脉將絕鹽納臍中艾炷接火灸人醒後施
方細看陰陽及寒熱又有一種乾霍亂腹痛欲死病勢悍不吐
不瀉方音交腸沙鹽水吐之神妙案三因吐法用鹽一兩散刀上
燒赤將升河赤各一斤和勻用鹽淬入水內煑飲
採丹之後用藥調理但得吐瀉病無妨熟湯米湯不可按熟米

外治曲池刺青筋委中出血亦有幹

示吉按古人之論霍亂多責于暑故此疾多生于夏秋卽冬月有之亦原伏暑而然是以脉雖虛小手足微冷不可輕用姜桂熱藥况霍亂之脉沉伏者多理宜正氣散合香薷飲之類治之此言一出活人不少但夏月之病寒熱不同投治大寒苟不具婆心審問鮮有不天人者何則假如病人的係日中勞役動而得之其爲熱也無疑若雖從日中得之于時又多食冰水冷物或從冷水中浴來是又冷熱間雜矣倘不從日中勞役暑氣尚微肉食與冰寒齊進冷餌兼大腸清涼陽氣退藏陰寒壅塞不用桂附何以活人故先詳升陽湯今下

飲子非無故而發也。

泄瀉水穀爲瀉

泄瀉之原有六節。虛濕寒痰食與熱。五泄之名內經傳。

泄瀉利滑洞五

三虛之旨先賢說

飲食傷脾。脾虛不能運化。色慾傷腎。腎

虛

不能閉藏。忿怒傷肝。肝虛木來剋土。健

脾利水是主方。燥濕升提不可缺。或用風藥或溫補或因虛滑

宜散瀉總用健脾滲濕方二术

伏龍肝炒

車前茯苓訣。厚朴猪苓與

木通澤泄陳甘木香列。煨姜三片少許鹽酒積白蔻葛根截濕

泄泄水腹不痛。小便不利腸鳴動。

倍二术加桂枝少許

食泄腹痛泄後減。

噫酸臭腐食不用。

加山楂香附枳實砂仁

神麴麥芽後重加橘榔寒泄脉遲穀不化腹

痛悠悠無休罷。

加炮姜肉蔻

火泄腸鳴下黃赤一陣痛來渴可怖。肛

門焦痛脈數急芩連

姜汁炒

山枝真好話

去蒼术

虛泄虛滿不思食

水穀食時完不化脉來沉細久不痊人參山藥砂仁掛痰泄泄

痰浮水面

泄下沉者是積浮者是痰

或多或少脉滑善半夏南星法必添吐

出痰涎人更便六症從容審問明更分新久醫方驗新者宜瀉

宜消食久者升提溫補益泄久下陷用升提麻柴胡更有力

虛甚人參芍山藥虛寒炮姜肉荳吃腎虛送下四神丸

故芷酒浸炒四

兩米大麥炒一兩肉荳麵裹煨二兩五味子二兩爲末生姜半斤同大麥一百粒煮爛取爭肉爲丸每服一錢五分鹽湯送下

防風羌活兼風人暑月需滑扁豆尋冬天炮姜誠有得虛泄久

泄更有方一匙黃土

炒爲末

臨服食

疾原來下膿血裏急後重不可說。食積氣滯總相兼。積辨青
黃赤白黑。純白而來氣必傷。血受病兮應見赤氣血。但傷赤白
來。食積爲黃。是真的。純血來者亦如之。黑者須知死血色。白膿
稠粘是爲瘀。宛如豆汁。方屬濕。諸瘀下迫皆屬火。勿妄以白爲
寒。則通因通用其經。文消積瀉濕和湯。滌後重須教調氣除清
血便。膿應自息。通滯湯兮治法傳。條芩厚朴姜炒入蘇梗枳榔
共木通。胸中不寬陳壳立熟用黃連。姜汁炒。痛木香。後重蔣軍不
可忽。小水不利加滑車。臨服木香磨姜汁。頭疼惡寒身體熱。著
一术防風羌葛接。名風邪惡心作酸胸滿悶。枳實山楂曲芽呻名食積
內傷痢疾。小腹痛。桃紅能治紫黑血。腹中不痛身不熱。大孔迫

甚黃水洩氣鬱爲痢用升麻柴胡防風不可缺煩渴身熱腹痛
極水穀入胃卽吐噦噤口痢疾胃熱甚。倉米人參連肉悅酒積
痢因恣飲酒葛根白蔻烏梅烈天行疫痢老幼傳合用敗毒無
他說夏月香薷扁豆芩腸癖銀花血自竭隨症加減是良工。再
看新人醫中僕新者宜下宜消。魁久者宜升宜補益諸痢日久
減損。加入扁豆芍白朮補脾止藥及茯苓下陷升麻柴胡得
百久氣虛參芪用紅久血虛歸芍力血痢不止用阿膠荆芥蒲
黃同炒黑姜炭從治加少許若還不止血餘頭髮燒益痢久不
止人虛極按腹不痛無食積四君四物隨症添訶子粟壳且行

瀉。

如石椿皮肉葉
烏梅俱收瀉藥

脉來遲緩是爲寒炮姜肉桂肉蔻積

本連
禁用

沿際口痢將田螺擣爛人麝香一分納臍中引下其熱內用黃連一錢人參三分煎湯終日呷之一口下咽即愈

毛公咸傳痢疾神驗方用真川連一兩五錢吳茱萸湯拌炒白术五錢半土炒蒼术米泔水浸炒四錢五分白芍酒炒二兩當歸二兩蓮肉炒四錢山楂肉八錢木香不見火二兩肉豆蔻麵包煨五錢四分麥芽炒三錢五分神麪五錢五分枳壳麸皮炒去麸二錢五分右共爲極細末每服一錢二分壯實者一錢五分小兒三五七九分看人大小用白痢白湯下赤痢蜜二三匙和白湯下赤白相兼燈心湯下水瀉清米湯下俱空心服治一切暈腥麵食椒酒煎炒生冷等物按

此投之虛弱之人及病久者甚爲穩當。若壯盛初起而腹痛甚及積滯勝者秘方白丸子奇效。用皂礬揀淨一兩入白蘿蔔汁一鍾。銅杓內火上化開再入好真粉一兩五錢和勻。取起晒乾爲末。用神麪打糊爲丸。每服五分。壯實者七分。亦可。白痢燈心湯下。白痢姜湯下。白瀉米湯下。服後瀉出黑積藥節行矣。

積聚

癰疽積聚皆有塊。食積瘀血成其類。積爲食積。有成形忽聚忽散聚爲責。榮衛失序七情傷脾不運化神憔悴。五積爲陰。五臟生六聚爲陽。六腑贅主治總宜化堅湯。當歸白朮爲前隊。半

陳皮枳實兼山楂香附砂仁對厚朴木香等分煎生姜一片

方遂右脇有塊青稜蓬左脇有塊芎桃桂肉食成塊草莫連粉

麵食積

神子。

次山木

本

川七薄

皮

根

甲青

如要丸時加阿魏

川七薄

皮

枳稜蓬瘦弱人參少許配瘧後柴胡鰲甲青如要丸時加阿魏
外治熨法有神功五仙消瘡瘍能潰

痞塊外治秘法用小鱉一個紅莧菜二兩管仲五錢阿魏二
錢葱蜜各一兩共搗爲膏再入麝香三分貼在痞上外用青
布掩着內服消痞煎藥神效五仙膏用大黃肥皂生姜生
葱大蒜各半斤共搗爛用水煎取汁去渣再煎成膏黑色爲
度攤綢帛上先用針刺患處從貼膏藥

痞滿

從來痞滿無痛塊。胸滿虛悶難通泰。皆由土弱失運行。濕熱食
痰多作怪。半補半瀉是奇方。白朮茯苓爲主。賽枳實厚朴及甘
陳木香。香附砂仁在蘇梗。枳榔炒十子引用姜枣。功難載脉遲。
加入炮乾姜。脈數黃連。生大草根。炒木梢。方有賴。傷酒須添葛蔻澤。查迦麥。
牙治食積。小便不利加澤通大便。結時將軍入。按痞痛甚用大
黃脉來無力參芪益。

示吉按仲景云。浦而不痛爲痞。浦而痛爲結。結責之實。實爲
積滯有餘。則宜下。宜消痞責之虛。虛爲中氣不足。則宜和。宜
補。據此虛實兩分。又何必表同消補。但人有脾氣素虛。現停

積滯補之則積滯未消邪得補而愈甚消之則脾氣未健土受傷而愈虛不得不從易老講一補一瀉之法矣許學士云邪之所湊其氣必虛留而不去其病則實斯言信然

嘔吐

乾嘔有聲吐有物聲物俱有吐之則吐輕嘔重乾嘔凶嘔乃漸出吐頓出不嘔不吐爲惡心總是胃虛不能食有寒有熱亦有痰有因停水因食積或因氣滯或氣虛加減平胃病自息半夏陳皮共藿香厚朴香附及蒼朮枳壳桔梗引通砂木仁末炒爲一匙姜屬火一瓣服入煩渴欲飲冰來數黃連竹茹山楂落去芥屬水吐水冷涎沉遲炮姜肉桂吳萸作嘔吐痰沫脈滑時南星白茯雲木索

少停心下汨汨聲。茯苓澤泄猪苓。樂節悶作酸惡食氣。右關緊。

傷食例。神曲麥芽并枳榔草。莫山查肉食利。

麵傷加久病之
下子

壳梗

不納食脉來無力。又微細參芪白朮并茯苓枳桔厚朴三味。
人真

胸膈抑鬱善噫氣。忿怒憂愁不快意。枳榔卜子大腹皮升散。

防風具傷酒乾葛澤蔻佳。傷風六蘇乾葛易。

· 陰膈反胃

之症多因火薰蒸津液成痰阻。七情妄動五臟傷陰血漸生所。咽喉痛塞不能食。病起賁門上。焦膈中。膈飲食得水。子白又吐出。下膈飲食如平。朝食暮吐渾無力。主治。

桑葉芩半夏甘陳立。

草皮

又歸竹節藿香厚朴木

共砂七臨服一匙加姜汁薤汁童便次第增

泄合用四物姜汁炒血虛左脉來微濤氣虛須合

方。古脈芤弱并無力。然飲寸關脈滑沉瓜裏貝母能開膈

深數成莫火炎。

吳

萸炒黃連倍用的脈來芤濤是血瘀桃仁歸

乘。寸關沉濤是氣結沉香木香枳榔入大便燥結不通

酒蒸大黃谷四物

再加桃杏仁麻仁炒爲末蘇子瓜蔞仁之類潤之

養血潤燥牛羊

寒痰。歸吳萸覓脾不磨者曲芽

神麥

同七情鬱結成氣噎寸關

濤七氣湯乾姜黃芩肉桂得半夏橘紅并熟地甘草芍藥各

桔梗吃

三兩枳實五枚參一兩氣病投之噎自息。

宗吉曰噎膈重病也其原非忿怒抑鬱卽憂愁思慮其來有

漸始則痞滿火嘈吞酸不知治療既而逢食則嘔尤可少食久則食下則吐或粒不下咽當此之時三陽熱結精血枯槁若欲求愈須病者安心靜養行仙家十六字法一吸便提氣氣歸腑一提便然水火相見如此行之再加之以薄滋味勤藥餌愈病否難仙家云屋破修容易藥枯生不難也張雞峰曰嘔當是神思間病惟內觀自養可以治之此言深中立

若欲速效而投香燥之劑其害不可言也開膈下食方惟

明粉三錢硼砂三錢爲末每服三錢用火酒一盃姜汁半升共入杓內煎二三滾取出澄清用小酒盃徐徐服之自覺脣舌溫熱卽得飲食矣然亦爲劫劑服務卽投大補較之香

稍善也。此方乃毛公成先生所傳

呃逆

俗名打呃名呃逆。纔發咽喉則據寂。連續數聲。軋軋然短促不

長。難消息。有痰有火。有停水。有寒。有氣。有食積。主治丁香補帶。

湯丁柿竹筍陳皮當。

本方四味。薑柿苦寒。治下焦之逆氣。丁陳辛溫。理中氣之痞塞。申下焦之築壅也。

飲食太過。胸中滿。麴芽根實及枳榔。瘀血。塞脈來消。茯苓半

夏木香方水停心下。泪汨聲白。木茯苓猪澤尋。發熱煩渴。脉來

數柴胡半夏芍黃芩。

去丁香。內子自

滯氣盈兮。腹胸滿砂仁。木香半夏存

胃中虛冷。脉來遲。乾姜桂附木相親。脉來虛甚全無力。六君合

用始爲精。

六君子人參茯苓半夏白术甘草陳皮

諸逆不止。用沉香姜汁磨成膏。

服行。若還病久呃逆作虛極從來症最惡。六君合用沉木香寒
甚還同姜桂落炮竹茶
本湯去竹茶古人嗅法有奇方期門灸法亦當學。倘然大便結不行須用將軍無推却。

嗅法用乳香硫黃艾各三錢爲末。好酒一鍾煎數沸乘熱便
病人鼻嗅之外。用搗姜查擦胸前亦好。

灸期門法。婦人屈乳頭向下盡處骨間動脈是穴男女乳
小者以手一指爲率。陷中動脈是穴。男左女右灸三五壯。

喎氣

胃納水穀脾運化。榮衛周流無驚詫緣何喎氣氣上升。胃中濕

痰食話丹溪主治星半湯。

丹溪共半夏石羔

炮香附及

灰芩甘草陳皮生姜助食積
渴煩悶姜炒連虛甚人參芍白朮若還寒氣脈微遲或傷生冷
去寒物除去山楂及石羔加入炮姜木香益智茴香及厚朴
體症加減病如失

吞酸吐酸

飲食入胃脾不運濕熱相蒸爲酸病
名吐酸吐咯不出吞酸應若還不治漸惡心翻胃嘔膈須臾進
丹溪加味二陳湯茯半甘陳已前定黃連蒼朮及砂仁神麴香
附吳萸順吞酸冬月倍吳萸夏月吐酸連倍。人參白朮虛弱
增枳實山楂食傷認再戒怒氣以平肝滋味薄時胃清淨

醫言系

卷之二

梗

黃

血

人

白

手

事

心嚮總是屬虛火。火動癰生因作楚三陳湯共枯連枝參木附
糞白片伍煨姜枣子一同煎。前竹茹姜汁加皆可。嚮甚以上加石
羔熟多青黛亦得所。鬱用砂仁并撫芎便能大黃酒蒸用能救苦。
驚悸怔忡左寸濶血少將來合四物。麥冬遠志酸枣仁竹茹烏
梅炒末入終歲火嚮必千年火能燥物真可惜。

水腫

之全生資水穀。脾主穀分腎水屬木。旺土虛不勝水。水氣泛
溢浮腫局手按成窟舉手滿皮光如泡氣喘促。實脾燥濕是重
方。利水分消真可錄。上腫必須兼風治。開鬼門時微汗浴。經日
上盛

非風則濕氣不下。腫必須潔淨。用小便利。勿通水穀。分消
上于清陽之分。

禁古

防

方

有

急

利

水

滑

石

覽秘人傳。二术茯苓。厚朴。全豬苓。澤泻。大腹皮。杏仁。砂仁。枳

壳。兼陳皮。木香。磨水汁。生姜。燈草。一同煎。上腎麻辦。三分。防方有

半浮萍。

仁附

藥如仙。

枝仁炒須曲

神農

用

二三錢交茅子

消食積

導蘿桑皮治

急

急利水滑石。并木通。發熱黃連。山楂。入腹脹。子共根。榔氣

陷升柴少許益。虛甚人參亦可。人痰多半夏。原有力核葛茵陳。

治發黃牽牛。大黃治便實。去白又有虛症。更宜弱。朝覲暮忘血。

虛殃。

合四物湯

暮寬朝急氣虛症。四君合用。且先嘗。先喘後脹加芩。

麥去二术香附砂仁先脹後喘。倍二术。諸脹用藥忌甘溫。麩麴鹽切。

莫食

示吉曰分消湯治脾虛水腫土炒白朮須用三錢實有神驗

但先喘後脹其病在肺非分消所司也麥冬飲治水出高源

其症四肢皆腫少腹不急初起便有喘瀉用麥冬五十粒去

心姜汁炒粳米五十粒水煎不拘時服

又秘方黃芪散治

肺癰脹腫蓋肺主皮毛風邪入肺不得宣通肺癰脹亦能作

腫其症先眼下卧蠶紋起喘急用防風桔梗杏仁桑皮蘇子

貝母各一錢黃芪三分水姜煎服

又有血分症婦人先經

水斷絕而後四肢腫消小便不通此血瘀水道以通經爲主

宜小調經散白芷五錢沒藥官桂甘草各三錢赤芍細等當

歸延胡各一錢琥珀另研一兩麝香五分爲細末每服二錢

酒下已上三症病同治異司命者無勿識

鼓脹

水腫鼓脹其原一皆是脾虛不運。鼓脹病重水腫輕。水腫皮

浮如常食。

四肢皆腫飲食如常其病在外故輕名雙鼓脹

氣入于臟爲鼓脹。腹大身瘦。

食不入。

名單腹脹病在內故重

脾虛致病是總原。亦有水血與食積。有因

氣實及氣虛。上工隨症用消息。實土分消是妙方。

二木厚朴炒

枳實陳皮香附縮砂仁

大黃芍藥赤茯澤泄的木香腹皮引生姜水

煎氣急磨沉香飽悶枳榔炒卜子血鼓歸芍紅丹嘗

當白花皮少腹脹痛加鼓腦瀉山楂蓬木桂枝

身上有腹有塊痛按不移。大便黑色血爲殃。

不愈加靈脂桃仁合用五苓散秘方川大熟

水鼓小便若秘結。胸腹脹急水飲傷。

合用五苓散秘方川大熟四兩大枣二百同煮一帖

夫戰旋旋食。食積鼓脹大便結。小便赤澁胸悶絕牽牛子及
攻水利爲度。

枳榔山稜蓬木亦可。設氣實鼓脹因抑鬱留滯不散。腹脹急大

腸虛秘或吐酸脇肋痛脹及面黑。合用分心氣飲見諸氣 氣虛脹滿多勞

役元氣虛乏真倦極短氣泄泄腹脹膨脹來微細不思食。宜合補中

益氣分條而治是良醫。實脾利水爲君。則順氣消食爲佐。便清

金制木從來得。用黃芩麥冬之類 滋補腎水以制火。用知柏之類 肺得清化

斯有力却鹽味以助邪。斷妄想保母氣溢莫服利藥圖暫快。
補益真元病自息。

示吉曰人脾氣素虛現停水積方生鼓症治斯疾者正氣不足而滯氣行是爲上工其次利小便尤可活人若用下藥大便

利而暫取快。是速斃也。予遇斯症。嘗早服補氣健脾之品。食後進勝金丹一錢。消積利水順氣。雖無遠效。活人已多。傳以
壽世勝金丹。用蒼术炒二兩。厚朴姜汁炒枳實炒桃仁去皮
尖炒丹皮陳皮枳榔亦枝半夏黑丑頭木木香各一兩。甘草
川芎各六錢。爲細末。外用皂礬四兩五錢。先用蘿蔔汁化開。
攏去泥土。煮乾。再入醋煮乾爲末。與前末和匀。再用神麪三
兩爲末。打糊爲丸。丸如菉豆大。每服一錢。虛人老人。五分湯
下。并治胸膈飽悶。瀉泄痢疾。瘀血內傷。功不盡述。

癆瘵

腎經虛損名癆瘵。朝涼暮熱。病無賴。五心煩熱。消瘦形乾。渴失

血真陰壞陰常不足彥修傅足陽常有餘論不益坎勝離湯目

朱丹溪有陰常不足陽常有餘論

益坎勝離湯目

在股熱面赤盜汗來消中便亦功難載脉來微數兼無力日輶

夜重

又喘急若日重夜輶又爲內傷元氣病

皆因房慾喪陰精滋陰降火病漸

息歸地芍丹茯苓

川白皮生

天麥門冬

去尤各一錢

炒知柏

葛根白蜜酒炒用五分

陳皮甘草同姜皮

臨服重便竹瀝好銀胡骨皮治骨蒸

黃芪白朮東仁

炒爲末

自汗但咳嗽氣急

去心柴桑

有瘀目母裏仁見血阿膠犀角

茹丹青

熟地角胡青皮

從治畧加炮姜灰泄鴻山藥

澤泄我

去知柏歸童便

盜汗浮麥琪爲佐牡蠣黑豆功亦大金櫻蓮鬚

去滑精

再加山藥

牛膝車前浮火動赤白濁加蓮子殼勞熱龜膠青

喉乾聲啞粉花

本增收錄五

朴同消食

示吉曰。男女人之大病存焉。每致過度陰虛症多。故丹溪以此立論。然病名虛損。亦有從陽氣不足者。若因彥修之法。緊治虛損。能免廢人乎。故有反是說者。謂陽生陰長。只當以參芪補之。滋陰之劑無益也。吁。一症一藥。豈容偏僻。參芪補陽。東垣已製方。治內傷元氣矣。丹溪豈有悞哉。是不善用丹溪者。悞也。

失血

心生血兮肝藏血。隨氣而行無處缺。目視舌言耳能聞。手能提特足能攝緣。何錯經致妄行勞傷火動從容說。嘔吐血出名吐。

血從胃而來是真訣。

宜犀角地黃湯

血皆由鼻中痰內有血名咳

血肺經有火二症來。衄爲輕。分咳嗽烈。血隨唾出。名唾血。痰螢

血絲。咯血。腎經有火。妄煎熬。勞瘵之症難逃。越痰涎有血

從脾。嘔虛不攝。被火欺。六症皆從上竅出。鮮血爲新。紫血瘀。犀

角。地黃能總治。犀角丹皮生地基。各一錢。赤芍當歸連夢炒。酒

各一分。茅根搗汁磨墨。奇吐血。烏膠天冬用。衄血。麥冬。枝子炒。依。

各一錢。柏知并熟地。麥冬。山楂加亦宜。紫黑失塊。胸中塞。酒蒸大

黃并菲。汁。藕節搗汁最行。瘀浮火上升。童便入。咳嗽沙參天麥

等痰多。貝母天花力口渴。知母味。麥冬寒熱等。蒿礬立脾虛

泄瀉去歸芩。茯苓山藥甘陳入。從治。畧加炮姜灰。還同童便。

草皮

五

若不止用蒲黃。

刑芥俱炒黑。

脉來微緩更無神血

不藏攝虛之則阿膠加入八珍湯。

四君四物合用。

黃芩。

連犀角不可食。

如

內熱加童便牛膝姜炭少許。清澄云乾咳出血若服

童便百不死服寒涼百不一

一生宜童一物飲之

小便尿血

爲溺血心與小腸邪熱結清心蓮子

見淋症

合本湯。莖中疼痛湯

瀝雪。倘然不痛是爲虛養肝固榮加減載。不止荆芥及蒲黃。

俱炒黑補中益氣升提絕

下血雖從大腸來其原不一費心識有鮮有瘀有遠近。

糞前血爲近血

糞後血爲遠血

有因血熱有氣衰或爲腸風下清血而色鮮或膩毒下血色

下血色

下血者是下

陷屬邪亦多種治法新久辨鮮瘀鮮者新者本方奇合用川芎

并白芍芍藥荆芥及地榆

三味炒黑側柏將來礬水者甘皮陳前飲病

林嗣

下

年

無餘發。生蠶膠柴胡。效血虛就地血餘醫。酒客鳥梅蔻乾葛。下
漏防風升柴驅跌蹠傷。麻地鱉從治。羨灰少許俱。

紫黑加塊爲淤血。桃仁紅花歸尾訣。鱉甲丹皮及川芎。赤芍延
胡不可缺。荆芥首黃俱炒黑。水煎服時陳酒入。不止蘇木熟大
黃塊止前方加減吃。

一下血不止。若何醫。泄瀉胸痞脉又虛。此屬脾虛不攝血。補中益
氣最相宜。加入炮姜芩芍藥。血餘阿膠功最希。

上一下血太過多。氣息幾微命若何。寒涼之劑休仍用。獨參一
味起沉疴。是陽生陰長之法。

余告曰。治失血大法。其始也。熱主流通用清熱滋陰之品。安

以炒黑蒲黃荆芥側柏之類。蓋血得黑則止也。若血出上竅。
加以順氣如蘇子。破瘀如鴉汁降火如重便之類。其既也。以
致肝脾不能藏攝。須用補肝益脾之品。切不可仍用寒涼以
傷脾胃。血上湧不止。用大蒜搗如泥。或津調附子末。下敷脚
心湧泉穴。引火歸原。血自歸經。如晝卒未便。竟以熱湯浸一
足。亦驗。若血出下竅。新者正治。本湯中便血加枳榔。仍結者
再加玄明粉。溺血合四苓。此在下者。引而竭之也。稍久用升
提。升麻柴胡之類。不止。金補肝益脾之藥無不效矣。雖然亦
未嘗盡其變也。予嘗用消食之品。而治吐血便血。其效若神。
蓋人但知脾虛不能攝血。而不知飲食傷脾。亦不能攝血也。

其要切右關沉緊者是子。嘗用清肺之劑而止便血。人但知一腸風膩毒。熟在下焦。殊不知上焦肺熱亦傳於腑而便血也。其要切右寸浮洪。或洪數。及血在糞後來者。是人皆以予傳秘方。吁。予方豈秘哉。予不過察三部之中。獨大獨小。獨遲獨數者。病也。餘病實可例推。

汗症

克肖天地。名曰人。天地有雨人汗。少雨之時。天地不从汗之。人病自成。上工治汗。須分別。自汗盜汗。有一說。寐時汗出。覺來止。盜汗陰虛兼火。挾動則汗出。名自汗。陽虛有濕兼氣竭。自汗。陽并調衛。盜汗濕陰降火絕。參芪湯治自汗來。參黃芪等。

木蠍散。當歸。熟地。桂枝。烏梅。一個升。

陳浮麥大棗。一貼。盜汗。當歸。六黃湯。生熟地。黃芩。當歸。歸

連柏等分用。或水。或水煎用。水前方陰陽兩虛。自盜汗。一方金匱。又

術妨。泄瀉虛熱。食不用。莫。重費。柏定須除。加入熟仁并白芍。黑

頭。柏亦可。他汗出不止法。如何。五倍為末。津調和。塗入脉中。

頭炒法。或用朴粉。亦除病。龍賞牡蠣。俱為末。曰木蠍。木參。遇

周身。汗自止。莫將厚被蓋身多。

李吉曰。汗症有虛無實。調。小難。但冬月傷風。非桂枝不愈。

至于內傷自汗。原須補。引益氣湯。蜜炒升柴。少加附子。浮

小麥麻黃根治之。調其中氣。使脾土和。則濕不上升。濕不升。

醫學說編
卷之二
則君父亦不能自爲汗也。

頭痛

痛卽非真頭痛。風寒痰火虛氣動。古人羌活沖和湯加減服。

真有用羌活。黃芩及防風。蒼朮白芷細辛芍生地甘草引姜

葱頭發汗自然鬆。太陽倍羌

注：症惡風寒
脉浮緊

少陽柴胡

注：症寒熱脉弦數
或有痰身

助石羔乾葛攻

注：自汗發熱不眠頭
額日痛脉微洪

太陰腹痛倍蒼术

注：重脉沉緩

少陰倍用細辛功

注：症足冷氣逆脉來沉
細甚加麻黃附子

厥陰頭痛吐痰沫手足

厥冷吳萸通

注：脉沉緩

肥人頭痛多濕痰。二陳合用。术相同。瘦人定

是火壅上酒炒黃芩病可冲。脉來洪數實火升重劑須知石

注：海法

脈來無力是虛火牛膝車前引火行。

導龍人

人參黃芪

注：虛

是火壅上酒炒黃芩病可冲。脉來洪數實火升重劑須知石

注：海法

脈來無力是虛火牛膝車前引火行。

用涼。癩言倦卧。右脈無力。合四君子。陽氣。血虛。四物酒柏送。脉孔滿。黃。風熱。石上膏。通者。天麻蔓刑酒芩。服黃。共頭。巔頭痛加藁本酒炒片。芩用方巾。大使秘結。酒大黃。釜底抽薪。功敢重。若還頭痛。指甲青。且發夕死。誠危恐。

按半邊頭痛。古法本方中。左痛合四物。右痛合四君。同炒。更有秘方。用白芷二錢。川芎三錢爲末。黃牛腦子一個。共人磁器內。加酒頓熟。和酒食之。隨量一醉。酒醒痛失矣。外用吹鼻法。一用鬧楊花川芎等分爲末。一用火硝川芎等分爲末。俱炒。右痛吹左鼻。左痛吹右鼻。又隔鹽灸法。用一厚紙爲圈。約一分厚。填鹽其中。放太陽穴上。用艾火置鹽上灸。七炷艾。

炷如黃豆大。圈約錢大可也。凡服頭痛藥須乘熱先薰後
徐徐嚥下。藥力始到。又秘方治半邊頭痛。以致目中生翳。
者用白鳳仙一株搗爛。用火酒二升浸之。露七夜去渣飲酒。
食後服神效。

心痛

心痛雖分九様論。

食風熱冷慳蟲飲痰去來痛

皆因胃院當心疼。痛則不通。

多成鬱鬱久因而作熱蒸大實痛時不可按。按之痛減作虛。因

而虫痛止偏能食。

面上兼有白疕唇紅消作時日脉濶須知瘀血成

必平日喜食熱物

飼雜善饑是胃火口吃冷物厲寒疼。

或身受寒氣

痰痛吐痰脉沉滑。

惡心惡食食傷生加減調中治諸痛出枝陳皮草蔻共著木桔。

梗與梗榔烏藥香附枳壳用生夏姜汁磨木香秘法一

四

送火甚竹茹姜炒連炮姜肉桂虛寒中

升

黃

山去山枝

瘀血歸桃五靈脂

山

加酒大黃通則不痛從來重

可用玄明粉三錢亦妙

真心痛時指節青久

占旦死誠可痛

示吉曰痛無補法勿用參。得寒則凝不可純用寒涼。故古
人用山楂而佐以姜汁也。此症大都因有形之物，凝其氣
而然法宜吐瀉以行其氣。宜三因吐法。或鵝翎探吐之外治
點眼上。終真爲妙法。用透明雄黃火硝等分爲末。加麝香少
許。新汲水蘸點眼內。皆精明矣。男左女右。扶行數步立愈。若

在鄉僻藥餌不便竟用鞋底泥化入井花水中攬勻服甚佳
此症痛止切不可飲食食必復痛。外蟲痛欲死用老葱根
搗爛取汁香油和服立愈。諸心痛用良姜香附等分炒爲
末每服二錢酒送下效

腹痛

腹痛之因有幾般食癥瘀血熱蟲寒瀉後痛減爲食積瘀則踴
滑小便難或腹中釣痛時痛時止是火痛四肢手足心熱脈來數綿綿不

止作寒看症面青白或爪甲唇口皆青脉來尾內有瘀血致腹痛必有常處不移

動小便白利大便黑面白唇紅痛不常蟲痛惡心食不用腹中乾煩時作時止

天吐瀉暑來身重腹痛因濕中或兼浮腫手按痛止軟爲虛手不

可近是實痛主治已調中湯荳果陳皮香附光厚水茯苓

滑石川芎白芷神麴方木香山枝須炒黑

名錢

甘草姜炭少許

人痰多半夏及南星食積枳榔共枳實砂仁蘇梗調氣滯葛根

蔻澤消酒積

飲酒人多

熟甚黃連不可無寒多姜桂原有方

云山

枝赤芍歸尾及桃仁瘀血痛塊加有益肉食停滯草葉十子

麥芽消麵食冒暑香薷并藿香傷濕水通倍蒼水手按痛甚便

不通大黃三錢一齊吃按之痛甚脉無力白芍白芍補虛則烏

梅川椒治蟲痛川練桂梔同要用廣斧大痛治最難人中黑時

病已重

止痛熨法一用炒鹽一升絹色乘熱熨痛處冷則再炒又法

用生姜斤許擣爛法汁取查炒熟熨痛處冷則加汁再炒并
治結胸痞氣。用麸皮炒熟熨痛處。示吉曰鹽牲善走方
能軟堅姜熱味辛辛能發散麸皮性熱熱主流通故能定痛
加之以炒者借火力直達于中宿也大痛時先用此法痛稍
定辨虛實寒熱用藥更爲切當

毛公威曰痛則不通總宜行氣秘方桃靈丹治諸痛如神用
桃仁一兩半炒半生青皮立胡廣皮靈脂各五錢沉香圓木
香各三錢乳香沒藥各三錢共爲末九種心疼淡醋湯下絞
腸腹痛淡鹽湯下食積瘀血痛酒下

加無別竅肝盡陰位居兩脇怒氣神忿怒傷肝主脇痛風邪痰

瘀血能成小柴胡湯加減治柴胡半夏及黃芩白芍甘草青皮

用川芎丹皮次第行引加姜枣水煎服青黛胆草熱可增右脇

疼痛痰流注

右關脈滑或
汨汨有聲

南星白芥白茯苓左脇痛時合四物

按之有塊瘀血成

瘡處不移
左關沉濡

桃仁紅花宜加入痛甚乳香沒藥

尋右脇有塊兼飽悶吐酸嘔氣傷食症

右關脈躁盛

山楂厚朴及枳

榔肉食山楂草莫應

脇痛口苦并寒熱耳聾嘔吐寒邪訛

枳桔

三匙入本湯神功妙用無人說

脇痛內熱大便難沉實有力是

熱結痛隨利減加大黃

瘀血桃仁不可缺脉來微細又如何或

大無力內傷多本湯須借人參力補甲益氣合除病

醫宗說統 卷之二
示吉曰。腸爲肝胆之區。禁用汗吐下三法。司命者須知分治。
法內外夾攻。自能速效。一用白芥子水研敷痛處。能消腸虫。
燙又兼辛散。一用吳茱萸研細。醋調敷熱。手流通又從治。
也。一用韭菜一握。縛定約寸許。切斷成餌。放在痛處上。用炭
斗火熨之。使韭菜氣入內。卽愈。餅爛可易一枚。韭菜氣辛。開鬱
結。又能逐瘀。用者詳焉。

腰痛

先天之本。惟兩腎位在腰間。藏精。應房勞過度。兩腎虛邪氣客
之。腰痛病。腎虛爲主。有瘀血。或濕。或痰。或鬱。熱風寒。挫閃。總能
益坎湯中加減。說。

附烏藥續斷。僵桂杜仲。

沙紙鹽酒炒丹皮澤泄

左心飲尋常腰痛自

絕以爲常屬虛知母黃柏

手足心熱面赤口乾屬熱炮姜肉桂

脈遲設

症足冷無熱不渴或瀉屬寒加黃柏蒼朮白芍

寒濕時見熱能除

加蒼朮白朮肉桂良姜

天陰疼

痛知濕熱

加黃柏蒼朮白芍川芎白茯苓

挫閃板疼難俛仰歸尾桃仁牛膝列

便結大黃并桂枝

未考紅花治瘀血

內有塊痛日輕夜重爲瘀血治同挫閃

尺脉

浮時定是風天麻防風羌獨活

脈來滑疾又名瘀腰背重注走串雜南星半夏白茯苓白芷

葛根

人黃

串雜南星半夏白茯苓白芷

二术奪腰痛雖虛榮參芪寒香囊

人黃

涼之劑不宜過久痛須加官桂開

痛甚不妨加乳沒秘法引經

猪腰子煮湯煎藥功奇特

這還大便秘不通酒蒸大黃不可急

又有腎者若物經腰冷如帶五千錢體重如冰小便利白茯炮

姜

各四錢

甘草

白草

木

炒各

草煎

每服四錢

空心服

三錢

空心服

示吉曰腰爲腎府。腎坎象也。水火並焉。水衰則相火旺。而腎熱。火虛則陰翳襲而腎寒。水火俱衰。土乘邪于均令腰痛。宜青娥丸。大茴杜仲故紙鹽酒炒各一兩。熟地二兩。胡桃肉四兩。爲末蜜丸。空心酒下。一方用猪腰子。一旦剖開入青鹽三錢。杜仲末五錢。濕紙包裹煨熟。空心食之妙。

吹鼻點眼治閃腰痛法。一用木香一錢。麝香三分。爲細末。右痛吹左鼻。左痛吹右鼻。令病人手心和之。一用西瓜皮陰乾爲細末。點目內。皆精明穴立愈。

臂痛

手。臂因何作疼痛。經絡血虛風濕。或寒可燃或有傷秘法活。

經湯有用。蒼白二木共南星防風羌活秦艽動半夏桂枝羌獨

活補血須用芎歸須經寒斂艾桂枝添或麻遲或麻遲

送或硬塊白色脈數臂熱酒炒芩或姜熟或姜屬漏或姜傳冷或姜染多白芥酒汁

因剉閃定爲傷桃仁紅花靈仙應氣滯香附及姜黃氣虛黃芪

人參辛右脉浮大無力服時食後引生姜臨服陳酒一盃定。

止痛法 一用瓦晒熟熨痛處 一用真斂艾四兩擦

裹丸處二法均熱主流通通則不痛之法。

背痛

背屬太陽膀胱經太陽氣鬱痛不行通氣防風湯可用藁本羌

活獨活存

各二錢

防芎一錢及子

分生姜爲引水前成。身舌

各六分

生姜爲引水前成。身舌

各六分

生姜爲引水前成。身舌

股沉加防已。脈遲附于藥如

陳合治脈來消背心一點冷

如水

屬痰合二陳湯

勞役過度常常痛十全大補定功成

四君四物加桂姜茱水

煎服或用補

中益氣湯

痛風

俗名白虎歷節風

古名痛肿

遍身走痛名痛風。血虛氣滯風濕攻濕痰流注脈來滑麻痺不仁經絡壅上盛爲風脉浮數下盛爲濕脉濡同日間痛甚爲氣活夜間痛甚血虛凶肥白人多痰倉瘦火從風羌活有神功羌

黃

草

陽名

活骨木酒炒芩當歸白朮半夏均茯苓香附甘陳用木香磨水姜增上痛防風白芷妙下痛黃柏牛膝尋熟痰瓜蒌并枳實

黃

草

竹瀝姜汁臨服人脈濁血虛生地骨痛甚原須加乳沒發熱麻
胡不可無臂痛桂枝加有益小便短澁合四苓骨節止痛靈仙

按走注疼痛古名痛脾究其故血虛不榮內血瘀不養筋寒
勝則凝滯濕痰則留結使榮衛滯塞而不通何怪乎其爲痛
也。但痛而走注非寒痰濕血之所能。其惟風之善行者乎古
人定名良有以也。秘方用桑枝一小升細切炒香水三升煎
二升。一日不拘時飲桑枝性平不冷不熱可以常服。并能止
敷消食利便屢效。

眩暉

頭眩昏暈病何如。如立舟中氣喘時。眼暗生花。身自轉耳聾昏。

倒事無知。氣少血虛痰作病。風寒暑濕亦須知。內經眩暈責肝

木。風木主動故也丹溪痰火兩相持。清暈化痰湯主劑。陳皮半夏茯苓

施各一錢。五分白术川芎羌白芷各一錢。七分防風枳實胆星玄天麻黃芩

須酒炒水姜煎飲。病當除。役過度自汗重黃芪人參氣虛用去羌芷防風或用補中益氣湯

失血產後是血虛。當歸生地芍藥中。去羌芷防星或用芍

歸脈敷黃連并山枝。遲脈炮姜肉桂。重瘀多竹瀝及姜汁。中濕

力重增苦。水或吐逆脉濡項強不仁。風脈浮有汗桂枝白芍的筋癱

掣痛。脉浮緊寒則無汗紫蘇入。冬加麻黃夏天煩悶暑脉虛。多五

麻木

麻病如繩縛初放全無痛痒木之狀

總皮膚不仁

濕痰死血木病成

氣虛麻症方來當開痰活血治木方川芎

芍藥當歸

陳皮生

地半芍

葛根

白芥桃仁紅花望

各八錢

甘草生姜一斤煎竹瀝

姜汁臨服放臂上桂枝不可無牛膝靈仙下部蕩南星二味治

湿痰寒壅經絡川烏壯麻症治法又如何益氣行氣功最多補

血益氣湯爲主

參芪歸木陳甘升柴

木香香附川芎徒青皮桂枝加少許

重姜前服定除疴疾芩半夏有痰用

脈來滑黃芩

羌活秦艽夾風送汗

者身重脉濡者木增芩半夏有痰用

濕瘦人脉數芩連頌

連酒炒肥人附子可

引經醫須便製少許用

瘧症

瘧症有五原歸一典

筋其原總屬風寒濕風能走注寒

害痛濕多重著脉來濇

或汗或緊或有痺行痺著痺之名

以致麻木皮不仁不能行動但能食舒經湯用好姜黃

四兩洗去灰土

當歸赤芍共白朮各二

甘草炙羌活

各二兩

海桐皮爲末三錢生姜入盞半水來煎

以分去查磨人沉香汗

痿症

四肢軟弱名痿症但能飲食行難任五臟五痿出經書

筋痙筋

筋繫肉痺

骨痿腰膝

陽明

筋痙筋

不舉氣痿腸鳴皮痿枯槁

獨取陽明肺病

肺之母

皆由酒色

真元方清心消腎定參歸養榮湯各用

火熟地當歸白朮

陳皮白朮兼芍藥相知於芷酒炒行牛膝杜仲炒
草減半水煎。卷肥人有痰加姜半瘦人多火用枝芩炒若挾
血脉濇弱桃仁紅花宜所增食積妨礙亦成瘀食積條中加

減論

示吉曰。痺痿但能食而不能行。症相同也。但痺多實。痿多虛。痺多寒。痿多熱。痺爲濕。痿爲濕。熱。苟不明辨。調治自差。其要在有痛無痛中。分有痛爲實。痺也。不痛爲虛。痿也。此爲衰。同者辨。至于用藥。又當隨其所挾。看其所急。譬之。痿症雖實。若因二便秘結。燥腸胃。能不月大黃以潤之乎。痺症雖虛。若因勞役內傷。懶言倦怠。脉衰無力。能不用甘溫以補之乎。束垣

治癆以黃柏爲君黃芪等補藥爲佐而無一定之方。蓋欲學者隨其所挾而用藥也。

癆症

卒時暈倒口流涎身軟口噤咬牙關聲類畜叫名癆症五臟五

獨病自煩總因痰火塞心

徐言者言之箇孔開閉不同而子各異不必分羊猪等症

祛

陳功不凡袂半甘陳犀角屑黃連枳實沉香截胆星達志

薑蒲竹瀝姜汁臨服設辰砂爲末好鎮心開關牙皂鈎藤絕

示吉曰癆與痓相似但癆則身軟時醒痓則身強直反張如

月發不時醒爲異仲景云身熱足冷頸項強急惡寒時頭熱

面赤獨頭搖卒口噤背反張首座症也方具傷寒科忠至于

癥成瘡變症也。大抵屬痰屬血虛。血虛參歸養榮湯見瘡症。加羌活防風。黃芪桂枝。痰用瓜蒂桂枝湯。瓜蒂蕎藥甘草桂枝水姜煎服。症多用桂者。以瘡爲肝病。肝木主筋。桂能緩筋而伐肝。所謂木得桂而柔也。若陰症成瘡難治。則陽救急湯加桂枝白朮方在傷寒科。

癲狂

肝實多怒名曰癲。錯亂妄爲不可言。心熱多喜狂呼叫。妄言妄見是狂然難經。雖有陰陽別。均爲熱症。河間說從來宜瀉補不宜。在上吐之病自歇。病在下者。散利之。吐瀉後。將飴邪微祛癰。二陳湯見癰症甚有功。但將寧靜補心血。天王補心是妙方。莫施溫

補病難絕。飲食過度。病復來。狂咎醫家。不先說清心寡慾。并安
神恬淡。滋味善調攝。傷寒之症變發。狂節卷方法真奇訣。見傷寒

邪祟欺人。誓罵來承祖灸。法第一節。

治火亢吐法。治心火亢甚。喜笑不休。用食鹽二兩。放刀頭上。
用火燒赤細研入半夏三錢。竹葉一兩。河水二大碗。煎三四
沸去渣。待溫。入竹瀝全。益姜汁三匙。頓服。鴉翎探吐。熟痰卽
愈。下法治實熱大便燥結發狂。用大黃四兩。酒浸一夜水
三升煎之。分三服。能食脈沉實有力者立愈。

秦承祖灸鬼法。治一切驚狂譖語。踰垣上屋罵詈不避親
疏等症。以病者兩手大指用細麻繩扎綁定。以大艾炷置于

其中兩分甲及兩指角肉四處者火一處不著卽無效矣。七

壯神妙

治發狂秘方。用好生犀角四兩剉水。海角一兩加清水十碗入砂鍋內熬至一碗。擣淨再加水十碗熬至二酒盃。另以淡竹葉四兩水六碗煎至二碗去渣加犀角汁同服。四劑立愈。婦人產後血迷心包亦令癲狂。歌唱舞時踰垣上屋。宜加味逍遙散。用當歸白芍白朮茯苓柴胡遠志生地桃仁蘇木紅花甘草水姜煎服。此屬虛症。宜補不宜瀉。故予拈出。

一方加辰砂末

驚悸怔忡

驚悸忽然心惕惕如人將抑時驚恐跳動不已名怔忡寤寐神

魂多恍惚精神短少或多痰健忘之病因而得皆緣大恐與大

驚觸事喪志心神失治用四物安神湯當歸川芎芍地黃參神

枝子黃連

酒炒

木麥冬酸枣

肉茹當烏梅炒水引姜枣臨服研入

辰砂好時跳時止定因瘀

陳合用病自了心下悸動是水停

猪苓澤泄不可少

健忘

心氣不足事多忘有始無終作事忙發言首尾都忘却思慮勞

傷致病防天王補心真烈

樂川連酒炒

二兩

生地黃

酒洗四兩

當歸麥

冬五味子柏仁杏仁玄參

當天冬茯神并桔梗再參歸志合成

方

錢

菖蒲

一兩

共爲末

蜜丸

送下

定驚丸

砂爲衣

收火服

方

錢

菖蒲

一兩

共爲末

蜜丸

送下

引用燈草竹葉湯

每服二

錢

肥人

脈滑痰迷

厥星半夏

真相忘

虛煩不寐

虛煩不寐是何緣心熱胆寒病自取淡泄沃心誠可怕加味溫

胆病當痊

半夏竹茹陳皮

枳實茯苓甘草

東仁先遠志人參及五

昧熟地姜枣

一同煎

臨臥

熟在陽明不得睡竹葉石羔勝如仙

傷寒條內分明說口渴自汗症相全

示吉曰健忘驚悸怔忡

虛煩不寐俱屬少陰

故多用安神養

心之品然須察其所挾水者合四苓

挾瘀者合二陳再察

所因如因勞役過度或病後而來宜補中益氣湯加紅花八

錢

菖蒲

一兩

共爲末

蜜丸

送下

定驚丸

砂爲衣

收火服

方

錢

菖蒲

一兩

共爲末

蜜丸

送下

心黃柏滋腎。其病自退。若因思慮過度勞傷心脾而來者。宜歸脾湯。益思傷脾。脾足則神寧。意定也。諸症總不宜涼劑。更瀉脾土。瀉伐心火。火微土衰。則痰涎日甚而不可爲矣。

歸脾湯治脾經失血。發熱盜汗。或思慮傷脾。不能攝血以致妄行。或健忘驚悸。或心脾傷痛。嗜寐少食。血虛發熱。虛煩不安等症。用人參白朮黃芪茯苓當歸遠志棗仁龍眼肉各一錢。木香炙甘草各五分。姜枣煎服。

8 黃疸

痘雖分五實歸一。

○黃疸黃疽酒疸。穀疸。女勞疸。丹溪曰。不蓋是必分五種。總是濕熱如會醫廻相似。

蓋是

虛胃不實。水穀濕熱相鬱蒸發。黃腸滿溺黃汁。有如會廻過。

黃眼珠指甲俱金色欲除濕熱利小便茵陳五苓湯有大用

草收

陳澤泄猪茯苓山枝木通并白术山楂枳實共甘陳山枝少許

兼滑石姜枣燈心河水煎厚朴橘消食積身熱柴胡乾葛增

腹脹腹皮卜子入傷酒白蔻共葛根浮腫蒼朶有益口渴腹

腹大便難加入大黃去白术

各加味茵
陳大黃湯

小便自利大便黑按腹

則痛瘀血積

桃仁承氣湯中
加茵陳見傷

惡心吐酸胸腹滿右關緊盛是傷

食

從飲食
條中治

二者俱宜勝金丹

見鼓
脹

食消血去黃目息腹中無病

能飲食二便如常不苦澀惟有身痛脉來大煩燥頭疼苦鼻塞此因寒濕客頭巾瓜蒂搐鼻黃水出

秘方搐鼻瓜蒂散用瓜蒂二錢爲細末再入母丁香一錢桑

米四十九粒赤小豆五分再研極細至夜全酒入先含水口將藥半字吹人鼻中待下或吐去水便睡至夜半或次日取下黃水則愈若病在遍身者內服茵陳湯

示吉曰。疽症在上者。吐之微汗以散之。搐鼻以除之。在下者引而竭之。大便實者下之。必使小便清白爲愈。病之常治之經也。外有瘀者逐之。血積者消之。寒者溫之。病之變治之權也。血積如吃泥土。米炭發黃。依瘡症條申治之。陰症發黃。四逆湯加茵陳。詳傷寒條。凡疽散成鼓者。危黃入手足心渴而孰甚者難治。

驗黃疽生死法。用二指重按胸前膻中穴。二指左右分開。

中間有血色者可治秘方外治用生姜一斤搗爛入酸醋
斤和平胃末二兩調勻遍身塗之少頃戰慄汗出內瀉黃水
而愈

斑疹

遍身紅點名曰斑

斑無頭粒

疹生頭粒又多齒

疹有頭粒浮

小隨出隨沒

先紅後

小隨出隨沒

先紅後

小隨出隨沒

先紅後

赤人昏憒脉來洪大更心煩

熱傷血分乘虛出

鮮紅稀朗

方爲

吉紫黑稠密定傷生和解辛涼消毒力

將田未出升麻湯

升麻

以下

再著紅花亦有益

已出之後去

葛根川芎立甘草枣姜水煎服

再著紅花亦有益

已出之後去

升麻

加入

牛蒡玄參知母吃

黃芩桔梗同犀角

加入

大青功妙

極譖語口渴并自汗竹葉石羔粳米的

驗斑疹蚊跡法。以紅紙燈焰病人面部胸背四肢有紅點者斑疹也。疹輕斑重先將姜汁噴于斑上隨輕重用藥。若病人安靜脈不洪大紅點惟在手足且先紅後黃是蚊跡也切

宜細察

濁症

小便去濁名濁症皆因濕熱爲之病。

自者如米泔名白濁赤者

凝如膏糊名曰水

亦屬赤亦屬血分白屬氣肥人濁瘀膀胱參清心蓮

子用石蓮

去壳取肉

人參黃芪赤茯淨地骨麥冬及車前黃芩甘草

功相應

以下加減

肥人須合二陳湯二升柴亦莫刺酒炒知相厭

數添火而不升柴進濬精金橘并蓮鬚山萸生蠅真能任瘦

人血虛因而得赤色居多合四物。暑天伏暑用清涼香薷扁豆
兼滑石白湯。腎虛草薢飲益智菖蒲烏藥等四味等前分成少入
鹽空心煎服功成穩。

示吉曰便濁則降火清痰分利精濁則益腎滋陰固脫關要
也外有肥人多濕痰清痰是要瘦人多虛火降火爲先老人
因虛寒而致可求溫補夏月因伏暑而然法用清涼是亦丹
溪之法傳于言外也。

淋

心與小腸爲表裏心火動時相火起煎熬精液成五淋血石膏勞氣
赤濁不通痛不已欲去不去住又來淋溼疼痛無人理清心分

醫學編
利是良方。犀角黃連枝子擬滑石木通共車前麥冬赤芍甘草抵竹葉蓮心燈草煎還加青黛痛脫體溺出砂石名砂淋石葷瞿麥葵子行血淋尿血莖中痛柏葉藕節生地臨不痛者爲尿血膏瀉頻數膏淋症茯苓白朮半夏真勞倦病發是勞淋人參黃芪歸术尋嘗有餘瀝身又冷是氣木香枳榔歸澤借母真若是氣淋脉來濇生膝煎膏病自平脉數脉知方有效下着升柴更神靈脉來無力參术用大便秘結大茴行

示古曰二濁五淋俱小便去濁也。濁多虛淋多實益淋痛濁不痛爲異耳。濁淋俱屬熱症惟其不痛大約屬濕痰下陷及脫精所致。惟其有痛大約從淫慾火動強留敗精而然治之。

不可概同。故男子女人五淋帶下初起小便痛者用白茯大黃各一錢五分百草霜五分共爲末雞子清調蒸熟作丸白湯下空心服尿白卽愈毛公威傳此方泄瀉者不可用。

小便不通

小便不通有二症渴在上焦肺熱病不渴方屬小腸來膀胱實熱通關應渴者須投清肺湯赤茯猪苓澤泄當通草車前扁蓄妙本通瞿麥飲無妨琥珀爲水引燈草空心一服是仙方若還不渴小便秘通關丸用知柏意各一兩黃俱酒炒肉桂爲末用一錢熟水爲九桐子例空心送下一百丸頓兩足時藥行易以上二症是大綱投之不利吐之愈皆因痰塞中上焦漏然如屋上竅塞而下竅

門法煎二陳探吐之久不通時當提氣勿用巴豆及牽牛大便
秘結八正散濟若兼嘔吐名關格老人鼓脹總不利。皆死症

示吉曰小便秘日久則未浦而死急症也外治法不可不講。

一用皮硝一合連鬚葱一根同搗用青布攤似膏藥貼腹臍

上熱瓦熨之卽通。一用炒鹽熨臍腹。一用麝香半夏爲

末填臍中上用葱白螺螄二味搗成膏爲餅敷臍上用布帛

縛定下用皂角燒烟薰火陰中自通女人用皂角煎湯洗陰

戶若在胎前名曰轉胞是胎壓轉尿胞不得小便也宜穩凜

托法詳文科總之右寸關滑實者多煎二陳湯以吐其痰。

因痰塞上致以致下竅不通也右寸關細微無力或浮大無

力是屬氣虛。宜獨參湯補氣。經云氣化則能出矣。若左脈濡或小腹有痛塊。是屬瘀血。桃仁牛膝作丸服。若大便黑者。桃仁承氣湯一單方治小便閉。脹急垂危者。用自己爪甲燒灰水調服。只取通竅之意也。

大便不通

心肺清肅。腎水節津液充足。內不熱。大便滋潤自調。均若還秘。結津液竭。大腸無血致成災。更兼邪熱因而結壯。年氣盛可下之。大小承氣真奇絕。湯見傷寒婦人產後及老人久病之後作虛說。若用巴豆并硝薑。當時取快禍最烈。千金潤燥是良方。生熟地黃當歸帖。蘿子挑杏共麻仁。四味炒爲末枳壳厚朴黃芩列。甘草燈

心共水煎秘甚還加大黃劫。

大黃用酒拌蒸晒
九次便通卽去之

腹痛 桃榔木香

開氣虛人參郁李來痰火瓜蒂并竹瀝風閉羌活牙皂哉

一加
郁李
津液
枯竭

老人健盞參麥用產婦芎芍紅花該小便多時或自汗

川白
冬五
津液
枯竭

故人參麥味用扶衰

示吉按丹溪曰西北人壯實開結爲主東南人氣弱潤燥爲要然因其地而分不若隨其症而治蓋便結因風寒熱病者雖東南雖老弱非用硝黃不可仲景所謂急下法也便結因于病後失血產後者雖西北雖年少亦宜滋陰補養丹溪所謂潤燥法也變通而治何病不克至于結在廣腸導法尤爲捷要三法附後一用猪胆二三個每個便去少許仍入嘴

管相接縛定一頭。套入谷道以手撲之。令病人提氣如忍大便狀。胆汁入內卽通。益酸苦能益陰潤燥也。
用香菜油或麻油入豬胆中。如上導法。一蜜導法用白蜜六七兩。煉稠厚黃色。滴水凝硬。再加入鹽五分。牙皂末五分。和勻。急傾入冷水中。捻如指大三四塊。先將香油沫谷道中。後用蜜條放入卽通。

二便閉

脾腫實熱二便閉。大便行時小便利。八正散中用大黃木通滑石車前。意萹蓄瞿麥并山枝甘草燈心水煎。例少壯驟病服如火神。老人虛弱藥所忌。

外治法 一用蠅牛三箇連充研如泥加麝少許貼臍中以

手按之立通 一用白螺蟬搗爛填臍中亦妙 一用香豉二十粒連鬚葱一根勿洗生姜一塊食鹽二匙同研爛搊餅烘熱掩臍上以帛札定良久氣透自通否則再易

秘方 用白蜜半鐘白湯泡開入玄明粉三錢空心服血熱便悶用當歸五錢煎湯調服玄明粉三錢並妙

脫肛

肺與大腸爲表裏肛門悶結肺熱理肺臟虛寒則脫肛瀉痢久

虛下陷起

老人虛弱小兒元氣不足產婦用力過度故有此症

舉氣湯中參與黃耆歸升

麻五味子姜水煎空心服外治好時熟尿洗鞋底烘熱擦進

去耳點冰片亦得體。

冰片爲末點在上

瀉泄則肛去當歸補中益氣甚

脉數實肝門清病

有^火大便乾澀努力來是爲熱脫清涼擬

脉數實肝門清病

黃柏知母

四物湯枳壳黃芩病自己

收肚散方

可服

收肚散用熊胆五分見茶五分冰片二分爲細末乳調抹肛上熱汗下而肛收矣。熟瀉脫肛者并治痔瘡。

三消

心熱移肺名上消多飲水漿二便調

或舌上赤裂多飲少食宜清金降火

火熱在

胃偏多食大便硬兮小便赤

名中消善食而渴自消治清胃理中

下消腎熱渴飲

耳輪焦乾便淋澀

小便淋澀如膏狀治宜清火養陰

其名雖有三般異津液

乾枯血虛一天花解毒治三消花粉麥冬五味粒葛根生地及

川連人參當歸甘草吃竹葉蠶蘭及燈心徐徐服下有神力山
楂桔梗治上消黃芩石羔中消入黃柏知母治下消姜椒辛辣
不可食烏梅蓮肉合煎膏令本方煎膏再加下幾味人乳牛乳藕梨汁再加
白蜜共煎成不拘時候徐徐吃此症皆從燥熱來能食須防發
毒物不能食者傳中瀉鼓脹等病醫宜識

示吉按渴症有三總歸無水外有酒毒作渴非葛花不除暑
邪消渴非香薷不愈喜食炙燭甘肥令渴豆豉有效汗吐下
後胃液不足而渴惟人參有功青梅止渴胃乾暴渴宜加朽
木作湯熟中消中當飲北梨甘蔗性水味甘酒渴鹽湯俱解
渴也

者良方寸者三十枚煎湯飲治肥甘炙煩嗜酒耽華以致消渴者佳喜飲酒灼人真陰喪人真液皆令消渴蔗

汁梨汁主之

夢遺

夜精遺失多因夢心火旺時相火動清心寡慾是良方黃連生地當歸頌石蓮遠志共人參甘草伏神酸枣肉不愈蓮鬚金櫻膏臨服食鹽少許送

滑精

無夢遺精是滑精陰虛火旺水難存濬精清火并節慾保精湯用自安寧川柏白朮知柏炒黃連枝子牡蠣搗沙參麥冬并山

黃姜灰少許元精保不愈辰砂共龍骨爲末臨時調服好

一用固真湯治無夢而遺用蓮蕊石蓮灰賣牽牛遠志茯神
天麥冬桔梗車前龍骨等分甘草減半燈心水煎調辰砂末
服此症大瘳不可用涼藥不可純用溫藥

(脚氣)

寒熱嘔逆傷寒意脚膝酸軟疼爲異腫濕脚氣實因濕不腫

痛乾脚氣麻者因風

必無汗走注而脉浮

痛著寒

拘急腫脉遲

腫爲濕氣

筋弛

麻鳩防已飲子總能司水通防已蒼水

鹽炒

計生地木瓜與

洋角川芎黃柏

酒炒

味甘草稍頭用水煎內熟芩連倍生

血

倍川芎氣傷

血

俊痛之末便秘結加桃

生

血

倍川芎氣傷

血

俊痛之末

便秘結加桃

時牛膝利有瘀竹瀝并半夏風盛寒尤善活易喘
最爲凶腳氣臨心病所忌

示吉曰脾氣虛弱。胃氣下陷。亦令足跗氣腫。蓋脾具坤靜之德。而有乾健之運。中氣冲和。則升清降濁。而無病。若勞役久病。脾氣致傷。上不制水。胃中水穀之氣下陷。令人跗腫。宜補中益氣。湯升舉其下陷之陽。浮腫自愈。若以牛膝木瓜之類治之。病日甚矣。脚氣外治法最妙。

一用附子末。津調塗湧泉穴。

一用川椒一兩。葱一握。生姜三兩。打碎水十碗同煎。洗脚。寒濕脚氣疼痛不仁。俱治。

一用木通二兩。水煎頻服。治足膝腫痛。一日後發疹則愈。如夾用他藥。不效。

疝

極勞手
中寒東
于外八字
為疝病之
因

小腹急痛連睾丸。疝氣原來有七般。

寒水筋血氣
狐癟七疝

總爲房勞并

辛苦。履冰涉水又經寒。

素間而下皆寒。治丹溪濕熱法方。完煖

腎方散。

桔梗

橘核

炒爲末

故紙杜仲青皮九

烏藥香附及枳榔木通

小

故紙杜仲青皮九

烏藥香附及枳榔木通

川芎炮姜益川練肉桂并當歸川椒大茴砂仁入等分爲末服。

五錢空心酒下功難述。

示吉按雲林集云。腸中走氣作聲。或痛者。盤腸氣也。少腹陰囊手。按作响聲痛者。膀胱氣也。臍旁一梗升上。鈎痛者。小腸氣也。小腹下注上奔心腹急痛者。腎氣也。陰子偏大小者升也。陰子雖硬大而不痛者。亦腎氣也。俱因熱鬱于中寒東。

手外宜神效湯用大茴酒胡益智荅木香附當歸山楂各一錢。木香吳萸各七分川烏五分砂仁七分甘草三分姜燈心水煎臨服。加酒脹悶而痛加乳香沒藥瘀血脹痛加桃仁紅花川芎腎氣上沖加沉香枳壳此方亦穩。予一日治二症。一人升上作痛一人墜下作痛俱悶痛欲絕求方于予。升上者予定故紙三兩炒黑。丑一兩生硫黃七錢但爲末鹽酒打麪糊爲丸鹽酒送。下墜下者予定補中益氣湯加杜仲故紙肉桂炮姜香附川芎二人駭曰。痼氣同也何方之不同若是。予曰始試之至明日而皆愈。

諸蟲

海
諸蟲
海

木香吳萸各七分川烏五分砂仁七分甘草三分姜燈心水煎臨服。加酒脹悶而痛加乳香沒藥瘀血脹痛加桃仁紅花川芎腎氣上沖加沉香枳壳此方亦穩。予一日治二症。一人升上作痛一人墜下作痛俱悶痛欲絕求方于予。升上者予定故紙三兩炒黑。丑一兩生硫黃七錢但爲末鹽酒打麪糊爲丸鹽酒送。下墜下者予定補中益氣湯加杜仲故紙肉桂炮姜香附川芎二人駭曰。痼氣同也何方之不同若是。予曰始試之至明日而皆愈。

濕熱生蟲古所云皆因飲食不調均半羊意蟹都生積米泥茶
灸等生成面色瘦弱心腹痛飲食少進肉不生椒梅湯治諸蟲
症嘔吐涎沫腹痛也烏梅川椒及枳榔枳實木香香附川練
砂仁與厚朴肉桂炮姜甘草順等分生姜井水煎先食蜜糖藥
後進十五巴前蟲向上升之卽效如律令望後蟲頭向下行先
用蜜糖肉汁滲引蟲頭向上

用蜜糖肉汁滲然後用藥

引蟲頭向上

(按遇仙丹下蟲之藥也)小兒最多蟲症急宜修合用白黑丑
頭末一兩桔榔半生半炒一兩山稜蓬木醋炒各五錢牙皂
三錢爲細末糖拌小兒一錢大人二三錢酌虛實用之糖湯
調下空心服

(耳病)

耳爲腎竅病屬腎。虛耳聾不能聽。少陽經絡統人耳感受邪氣耳鳴。應醇酒厚味動胃火亦致耳鳴。紅腫右屬陽明。左少陽紅腫流膿風熱痰蔓荆散用。蔓荆木通。桑皮。赤芍升麻定生地前胡赤茯苓。菊花甘草。俱等分。姜枣煎成食後服。胆草柴芩。左痛。遜右聾。須合地黃丸。川芎歸白芍。功成峻風熱熾盛。脈浮洪。荆芥防芷。青柴桔。

按腎虛耳鳴。藥都宜地黃丸。加川芎。芍藥。當歸。黃柏。菖蒲。遠志。或前或左。俱妙。若耳中紅腫疼痛。用葱搗汁滴入。卽愈。若耳中流膿。予家秘方。自龍丹枯白粉一兩。飛過東丹二錢。

耳聾秘方

耳後陷中
紅腫防成
瘡宜急治

牛海螵蛸一錢龍骨二分牛射香冰片各一分爲極細末綿紙條擦盡膿水吹入少許卽愈若耳後陷中紅腫恐成大疽急用神仙活命飲合小柴胡消之倘成膿則難治慎之

(目病)

目病主治有專科五輪五臟肝居多

白睛屬肺、目氣輪烏珠屬肝、目風輪大小眞屬心目

火輪上下胞屬脾、日水輪輪、瞳神屬腎、目水輪

目得血養方能視肝經風熱目生病暴

赤腫痛眼稍爛迎風出淚怕日遇寒活飲子

桂附

引明風亦芍白芷

薄川芎甘草陳皮兼枳壳柴胡乾葛亦相通水煎乘熱先薰眼

徐徐服下有神功山楂黃芩內熱用龍胆連翹肝火攻酒蒸大

薑加錢許釜底抽薪妙不窮不能久視昏花暗腎經真水虛弱

案又宜明目地黃丸熟地飲子金不換熟地當歸麥門冬柏柏
芍藥川芎牡丹皮羌活與防風菊花燈草真有
明制草真有草相火旺時加知柏氣虛人參黃芪人熱甚黃連及黃芩損者益之自有九

洗眼湯一用防風荆芥連翹白芷歸尾甘草朴硝白礬胆礬少許水煎去渣乘熱洗

一用百青錢三文黃連三分杏仁

三粒艾一葉水一盃煎三分去渣澄清一夜次日頻頻洗之

凡患風熱眼眶腫爛者宜

治雀盲方桑炒爲末羊肝同食以愈用齋者豆腐同食凡
晝眠夜暗者佳

鼻病

鼻漏

酒查秘方

鼻瘻肉

無形之氣通于鼻。鼻塞聲重。風寒客傷。寒傷風在本條。胆移熱
腦。鼻淶實。俗名腦漏。辛夷散能治鼻淶。白芷一兩。辛夷各二錢半。薄

荷五分共爲末。

每服二錢。葱湯食

服後喜飲熱潤肺。熱傷赤鼻

各爲酒查鼻秘方。只用連翹仁四兩爲末。湯來吃。

臨卧服三錢。鼻孔

生瘻氣不通。香臭莫辨。瘻肉塞鼻。辛夷川芎。防風木通細辛。藁本的白芷甘草及升麻等分爲末。三錢茶調。外用水片吹鼻中。

內外兼治法有力。

一用狗頭骨燒灰。加硼砂少許。爲細末。搐鼻中。瘻肉自化。

口舌病

口屬脾經。舌屬心。舌和五味。自知。肝熱口酸。食亦作酸。心熱舌瘻。

亦口

脾熱口甘痘亦生

腎熱口鹹虛則淡

累亦

肺熱口辣自生

日鹹

成口乾欲飲皆爲熱

喜唾停水

胃寒內傷勞熱淡無味嘸水

不嘸屬寒陰

蕭水亦喜

口乾欲飲皆爲熱

喜唾停水

胃寒亦喜上焦鬱火口舌碎或腫無皮神惟憤

重舌木舌口乾焦

二寸洪數熱爲祟

之參飲子是神方玄參牛

勞連翹黃

甘草桔梗共黃芩

黃連生地柏壳最白芍薄荷炒山

枝燈草同煎祛病累

牙肉腫兼白虎湯

石羔竹葉知母梗米口醜胆草柴

青類不愈牛膝及車前

引火下降如神謂大便結時酒大黃加

酒半盃不可醉

示吉曰口舌病屬熱者多

故古人多用本方然亂世之民勞

勞則虛虛則近于寒故屬寒者亦不少其症口舌生瘡脉來

口舌病屬熱者多

故古人多用本方然亂世之民勞

勞則虛虛則近于寒故屬寒者亦不少其症口舌生瘡脉來

辨口舌病屬
寒。治宜潤劑

(官桂可噙)

實熱口碎云
明粉陽喉。

(舌滿口腫方
多故舌出血方
熱瘡多舌出
方)

舌腫出口外
者治法皆效

無力微遲飲食少。大便不實。足冷服涼藥不效者是也。
命門無火浮陽上亢。宜八味地黃丸。或用官桂噙之。總之口
舌症。若因勞役致病。房慾無度。或費心憂愁而來者。須從各
症本條合立參飲。細心加減用之。實熱口碎用玄明粉煎湯
噙。嗽甚妙。
外治法 舌腫滿口不能出聲。用蒲黃摻之。卽
效。一用百草霜錢許調服。
一人無故舌上出血。仍有小竅。
炒槐花爲末。掺之卽愈。
一熱症多舌出。有病愈而舌不入
者。冰片一分抹舌上。卽收。
有舌腫出口外。以草麻油蘸紙
作燃烧烟薰之。隨卽消癒。

(齒病)

牙生于土齒生床。庚牙肉內骨。床本陽明齒腎庄。下床嚼物大腸動。

主手陽明

內骨

上床不動胃經當。

足陽明止而不動

厚味濕熱陽明病。牙床

腫痛理所定。竹葉石羔是主湯。竹羔升麻知母順立參糯米及

山楂水煎服時病自應。吸風痛甚是爲風寒。

新風寒外自雜川

荆芷辛芍進齒

齦宣露動搖長。腎元虛損地黃。

虛寒八味丸

示吉曰。牙痛多腫口穢臭屬火者多故本方用涼藥而挾風

者兼風治也。外有蟲蛀痛寒痛俱宜外治法。一用白芷北

細辛各五分。肉桂麻黃草烏各三分。真蟾酥分半爲細末。麴

糊丸桐子大。每用一丸咬痛牙下。卽愈。一用防風荆芥羌

花蜂蜜各一錢。川椒十粒。細辛三分。食鹽少許。水醋各半。煎

漱口正痛

齒候方

冰片
丹桂可服

嗽口立愈。一方風寒蟲癥俱治。一用薑撥咬定痛處。

一用川椒樟木爲末放碗內上用一碗合蓋用紙糊口不使漏

氣下用稻柴火一燭其藥卽升上矣取下擦痛處神效。

咽喉症

咽喉之位司呼吸人身橐籥緊要極忽然腫痛語言難十八般病水難人主治加味甘桔湯一切實火總皆息甘草桔梗共剉枝連翹防風枳壳益黃芩生地并當歸等分白芷薄荷陳半夏甘草細茶共水煎出豆根末調服吃麥冬花粉咽喉乾用發熱柴胡亦有中癰甚則干姜竹瀝牛蒡玄參生瘡動熱極便秘酒大黃瀝火泛上知柏重此藥總宜徐徐服吹藥外治能瘳

肺風頭

寒熱多宜
切記為要

之辨法

吹药四

條可擇

用之

示吉曰。喉痛熱多寒少。本湯十有九。若因飲食勞倦無
虛火上炎。脈近足冷者。非甘桔川芎也。注危照口。舌痕浮火上炎。
法治之吹藥外治。一用胆礬爲末。吹喉中。吐出痰涎而
愈。一用火硝一兩。五錢明雄黃二錢。硼砂五錢。姜黃一錢。
冰片三分。爲細末。筆蘸藥擦。痛處立效。一用胆礬白礬火
硝片。腦山豆根辰砂。雞內金等分。爲末。用鵝毛管吹藥入喉。
卽愈。一用胆礬五分。半枯牛生熊胆木香各一分。爲細末。
用番木鱉磨井水調和。以鵝羽蘸掃患處。立消。

(針法) 喉中紅赤。用鍼從旁針之。血出則愈。旁針不犯虛門。
一針少商穴。穴在患人手大指外邊指甲後。注危一針葉

針法

所用

穴也。一針少商穴。穴在患人手大指外邊指甲後。注危一針葉

韭葉

許針之。出血男左女右。取之如危急。兩手俱針。神效。

醫宗說約卷之二全

24930