

五十二卷



杭州圖書館



醫學綱目卷之二十

弘前醫官 江氏藏書記

心小腸部

**丹標** 丹標瘰癧

丹毒風丹

瘰癧

疥

癬

紫

**白癩** 風白禿

面瘡 癩頭瘡

丹瘡

瘰癧

牙

疔瘡 耳內瘡 腎臟風陰瘡

下疳瘡

瘰癧

大

陰瘡 膝瘡 腳氣瘡足跟瘡

凍瘡

手足皸

裂 腳縫爛 反花瘡

惡瘡

雜瘡

脫痣

大法微汗散之

**發班** 發班屬風熱

風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散

中消息當以微汗散之下之非理

防風通聖散方見顛瀉門

**羅時毒** 疔瘡漏蘆散治臟腑積熱發為腫毒時疫疔瘡頭

實熱下

面浮腫咽噎堵塞水藥不下一切危惡疫癘

漏蘆

升麻

大黃

黃芩 各一兩

藍葉

玄參 各二兩

右為粗末每服二錢水煎腫熱甚加芒硝二錢半

醫學綱目卷三

消毒丸治時毒疔瘡惡症

大黃

牡礪 燒

白姜蚕 炒各一兩

右為細末煉蜜丸彈子大新水化下一丸無時內加桔

梗黍粘子湯尤妙

**丹** 治丹發疼痛漏竹汁服一升二合立瘥若未瘥再服効

虛者補之降之

內臺秘要○漏竹卽漏苦苗

內傷班者胃氣極虛一身之火游行於外

所致宜補以降之

嘗治一中年男子癰潰後發熱乾嘔背發丹標用諸般敷

貼丹標藥及用刀於箇箇丹頭出血丹皆不退後以半陳

生姜加補劑治嘔不効遂純用參半兩歸木各錢半濃煎

一貼嘔止二三貼丹漸緩熱漸減約五十餘貼熱始除神

氣始復

運氣 運氣丹標皆厲火經云少陽司天客勝則丹疹外發及為

雜方

丹標是也

治諸腫丹毒伏龍肝不拘多少為末用雞子白和傅之日三次甚妙

治一切丹毒金花散

鬱金

黃芩

甘草

山柸

大黃

黃連

糯米

右七味等分生為末用蜜和水調服

治烟火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真珠末一兩搗和如泥塗之又方治螢火丹從頭起慎火草搗和苦酒塗之

丹毒監澱傳熱即易子母秘錄

丹者惡毒之瘡五色無常亭根三斤水三斗煮汁每日塗之

入醫學綱目卷三

二

治赤丹用黃瓜種中穰水去子以器貯之用時以水塗患處 又方用臘雪貯器中久化為水以水塗赤游妙

諸丹毒腫蝨刺矢水和傳聖惠方外臺同

療丹癩疹方酪和鹽煮以摩之手下消

治赤游風腫蕎麥苦酒調傳手集

治熱赤游丹毒枯萋末二大兩醃醋調塗之

凡丹走皮中浸淫名火丹本方取齧糟傳之先刺破傳之良

丹者惡毒之瘡五色無常治之煮粟皮有刺者洗之佳

治金絲瘡一云紅絲瘡其狀如線或如繩巨細不一經

謂丹毒是也但比烟毒不甚廣濶人患此頭上有之下行

至心則死下有之上行者亦然可於瘡頭截經刺之出血

後齧萍草根塗之自安

丹毒自腹内生四肢者則易愈自四肢入腹者則難

針灸

誌

治

**丹**人有病面上忽見紅點者多死

丹毒風丹痛者為丹毒 癢者為風丹

賈宅小娘風痒黃精丸四十粒與

白朮分 枳實炒 黃芩四錢

右分八貼下之食前

遍身風痒癢疹凌雪花細末酒下一錢立止

鮑允中年五十歲風丹痒甚腹微疼咽不利面身微腫五

六日不退兩寸脉滑大實右浮大左浮弦小以炒芩炒連

歸芎芍地桔草黍粘紫葳各一錢防風黃芪各半錢凡五

六貼而安

**世**河間神佑丸治風丹愈而復發或隔一月發或隔半年發為積滯

門脈

醫學綱目卷三

三

辨方

**丹**一人患風丹遍身痒因酒得者

浮萍兩半 防風 黃芪 羌活三錢

當歸二錢 乾葛 麻黃錢一 生甘草錢半

**世**治冷丹風

防風 甘草 白姜蚕 蟬腿

川芎 白芷 茯苓 荆芥

陳皮 厚朴 蒼耳子 人參

右為末豆淋酒調二錢

**世**丹痒者用非葉摻些盪與香油以手摩熱於丹上措之

立愈出外 治風丹川山甲洗去腥於瓦上炒過存性每

一兩入甘草三錢為末米飲調服 治血風疙瘡瘡癩瘡

浮萍取自然汁豆淋酒下四物浸酒下亦得

**丹**用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋刮取塗患處未

血虛熱

愈而復發為積滯

瘰更入硫黃少許磨塗之

聖惠方

瘰

瘰小癰世謂之熱癰是也王註云大如酸棗或如荳色赤而內有膿血也

風濕

**海**汗出見濕乃生瘰癧為瘡癰也

勞汗當風寒薄為皴皴乃瘰 瘰色赤腹內有膿血

旋覆花丸

旋覆花兩

防風

白芷

甘菊

南星

半夏

石膏

川芎

陳皮

白附子

各半兩

蝎梢

姜蚕炒各三錢

右細末姜糊丸桐子大姜湯下三五十九食後

疹

疹似傷寒暴發暴消世訛為瘡子者是也疥似疹而延歲

入醫學綱目卷三

四

月或乾濕痒痛不一經所謂癩疹是也癩亦延歲月乾而不濕痒而不痛是也

瘰

**瘰**疹屬熱與痰在肺清肺火降痰或解散出汗亦有可下者 疹在表者消毒飲子防風通聖散在裏者大柴胡湯

四順飲子虛者補中益氣湯皆同傷寒施治也

**聖**治風癰入腹身軀強舌乾燥用蔓菁子三兩為末每服

溫酒下一錢七

運氣疹者有二

運氣

一曰熱經云火鬱之發民病瘍瘰又云歲木不及燥乃大行復則炎暑流火瘡瘍瘰疹又云少陰之復民病瘰疹是也

二曰風經云歲木不及濕乃大行復則大風暴發肌肉疹

發是也

表

疥

防風通聖散治風熱瘡疥久不愈方見扇門

朱院君三十餘久患癩疹身痺而紫色可與防風通聖散加牛旁子為極細末每二錢水盞半入姜汁令辣煎食前熱飲之

麻黃飲治上躄生瘡或痒或痛黃水浸淫結痂推起延蔓於三陽之分根窠小帶紅腫此是濕熱症

麻黃半兩去根留節 防風兩 羌活 石膏六錢半煨

黃芩四錢 滑石兩 陳皮 紫萍各七錢半

黍粘子七錢半 縮砂二錢半 蒼耳草三錢半 蒼朮兩

生甘草三錢半 薄荷葉一錢半 荆芥半錢

右咬咀每六錢重水一鍾半猛火煎取六分入好酒四五滴去查熱服須得通身有汗其瘡自安甚者服至百

服之後看汗出到何處若自上而下出過脚腫其瘡自愈

消毒散丹溪云消毒散氣表藥也

防風兩 甘草二兩 荆芥穗三兩 黍粘子兩

右為粗末每服三錢水一盞煎至七分去查食後溫服

初虞世治皮膚風熱遍身生癩疹牛旁子浮萍等分以薄荷湯調下二錢日二服

何小官生瘡小便黃用通聖散一錢半煎下黃精九楊三哥女生瘡午後發熱日間惡寒形削食少

白木錢二 連翹錢一 煎下黃精九三十粒

每風瘡大風病相似好桑葉洗蒸一宿日乾末湯下二錢七經方

治風遍身癩疹疼痛成瘡用白姜蚕少許焙黃細研為

挾血虛

雜方

入醫學綱目卷三

五

裡

末酒服立瘥

**子**和類鼻韓吉卿自髀至足生濕蠹大者如錢小者如菫痒則搔破水到則浸淫狀類虫行褥機愈而復生癩痕成四十餘年不瘥戴人晒之曰此濕蠹瘡也由水濕而得故多在足下以舟車濬川大下十餘行一去如掃

**○**癩疹入腹亦能殺人用蚕沙濃煎湯洗之

**行**有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連腦脛臍腹及近隱處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參為丸如桐子大食後溫水服二十九次日便愈

**雜方**  
**子**和有樵夫來買苦參欲治疥不識藥性緩急但聞人言可治濃煎一碗服之須臾大吐涎一盆三二日疥作痂矣  
**丹**一上散治諸般疥瘡或痛或痒或喜湯火烘洗者

入醫學綱目卷三

六

蛇床子一兩雄黃一兩 硫黃二錢半 白礬半兩

黃連兩半 黑狗脊一兩 寒水石一兩 班毛十四去

吳茱萸三錢 白膠香一兩銅鈹漆過傾

右為細末香油調傅治疥瘡先用蒼耳草或羊不食草簾煎濃湯洗去瘡痂然後用前藥傅可一次愈

小兒面瘡通面爛無全膚膿水流瀉百藥不効者陳年臘猪油不入鹽者傅之神効兒出小兒明

又諸般疥瘡加減法 腫多加白芷開鬱 痛多加白芷

方解石 痒多加枯礬 陰囊瘡加茱萸濕多香油調

乾痒出血多加大黃黃連猪脂調 虫多加蕪荑錫灰楮

柳藜蘆班毛 紅色加黃丹 青色加青黛 瘡在上多

服通聖散 在下多以藏用丸下 脚腫出血加血分濕

熱藥

濕熱 膿胞瘡治熱為主

黃芩 黃連 大黃各三錢 蛇床子

寒水石二錢 黃丹五錢 白礬一錢 輕粉

白芷 無名異各少許 木香少許 者加

右為細末麻油調塗

殺虫

又瘡藥膿窠治熱燥濕為主 虫瘡如癬狀退熱殺虫為

主 乾疥瘡開鬱為主加吳茱萸 樟腦一錢 松香頭上多

蕪荑 黑狗脊二錢 雄黃 硫黃 水銀錢 加之

黃連 方解石一分 蛇床子定痒殺虫 松皮灰膿腫多

加

羅間茹散治疥經年不瘥

水銀錢 好茶二錢 間茹錢 輕粉鈔

臨醫學綱目卷三

七

右為細末每用不拘多少麻油調塗之

治疥癬以臘月猪脂不拘多少同生白礬杏仁加輕粉

搗爛擦之陳無擇云杏仁輕粉最殺虫甚妙

治疥不問新久方

白蕪荑兩 檳榔 吳茱萸各半兩 硫黃二錢 另研

右為末麻油調搽破瘡之

砂瘡殺虫為主

蕪荑二錢 剪草一錢 蛇床子三錢 白礬一錢

明礬一錢 吳茱萸一錢 蒼木 厚朴

雄黃各半錢 寒水石二錢 黃柏二錢 輕粉一錢

治砂瘡山蟻窠黃荊葉雉雞毛等分燒存性為末香油調傳 又方用陳年船底灰搗細篩過桐油調傳立効

調傳 又方治砂瘡用水蒿草燒灰存性香油調傳立愈水多者

開贊

乾傳水蒿莖如百合狀生水邊七八月結子又如野蘇狀  
丹疥癩瘡春天花發焦開贊為主不宜抓破

白礬

吳茱萸各二錢

樟腦五分

輕粉益

寒水石二錢

蛇床子錢

黃栢

大黃各一錢

硫黃一錢

桉榔個

右為末猪脂油調搽

治疥

治癩疥濕瘡浸淫日久痒不可忍搔之黃水出瘡後復發

取半蹄根去皮細切熟熬以大酢和先洗淨傳上一時再

以冷水洗之日一傳瘡若為末傳尤妙千金 治疥取半

蹄根和猪脂塗上或着鹽少許即焦外臺秘要 治遍身風痒

生瘡疥茵陳煎湯濃洗立安千金

治痛

有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚至頸而止

粘着末被曉夕不得睡痛不可忍有下俚教以菖蒲三斗

剉日乾之春羅為末布席上使病瘡人恣臥其間仍以衣

入醫學綱目卷三

八

被覆之既不粘末被又復得睡不五七日其瘡如失應手

神驗

浸淫瘡痛不可忍者發寒熱刺薊末水調傳瘡上乾則

易之簡要濟衆 治疥癬滿身作瘡不可治者何首烏艾等分

以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌神濟

纂

元希聲侍郎治卒發疥秘驗方石灰隨多少和醋漿水

調塗隨手即滅一法用石灰炒紅出火氣香油調傳

又方淋石灰汁洗之孫真

久疥

木香散治多時不欽一切惡瘡此藥能生肌肉止痛

木香

檳榔

黃連各半

白芷錢三

已上同為細末先洗淨每日一遍乾貼有水出勿怪未

効又貼 又方同上加地骨皮為細末先於瘡口上用

溫漿水洗濕挹乾後上藥治之効不可述暨治下疳瘡

神效

諸瘡癬久年者千年韭根炒存性末之猪油調傳三次

手集多年惡瘡不瘥或痛痒生皰爛研馬糞并齒灰  
傳上不過三兩遍效武良相在蜀足脛有瘡痛不可忍得  
此方便瘥

風瘡久不瘥燒菽蔞末以傳之

按本草即野茭白

雜瘡

痱子艾菽葉陰乾為末傳之

患禿瘡以水研山荳根傳瘡上 患麩豆等瘡以水研  
山荳根服少許

連茄痒痛搗扁竹封茄落即瘥

卅後

洗諸瘡疥取冬

瓜藤皮煎湯妙

日華

中風犯毒霧櫟木皮煎湯洗妙

運氣

運氣浸淫皆屬火經云歲火太過甚則身熱膚浸淫是也

醫學綱目卷十

九

針灸

玉手疥 勞宮灸 太陵灸

世瘡疥頑癬 絕骨 三里

各寸半

間使

解溪

各五分

血郄

三寸

集渾身生瘡疥 曲池 合谷 三里 絕骨 行間

委中

用癬疥陽谿主之

少陰有餘病皮痺癢疹

全文見諸症

浸淫瘡從口流向四肢者可治四肢流來入口者不可

治

癬

風熱

癬瘡用防風通聖散去硝黃加浮萍皂角刺

又方治癬用

浮萍一兩

蒼耳

蒼木二兩

苦參一兩

黃芩兩 香附二兩

右為末酒調服或酒糊丸

**羅**苦參九治肺毒邪熱生瘡生癬疥並宜服之以苦參一味為細末粟米飲丸如桐子大每服五十丸空心溫水飲湯送下

**風濕**  
**本**烏頭九治風癬妙方見紫白癩風

**羅**何首烏散治脾肺風毒攻腫遍身癬變成癩搔之成瘡或肩背拘急肌肉頑痺手足瘦裂風氣上攻頭面生瘡及治紫癍白癍頑麻等風

荆芥穗 蔓荆子 葳靈仙 何首烏

甘草炙 防風 蚶蚧草

右件各等分搗羅為末每服一錢食後溫酒調下沸湯亦得

醫學綱目卷十

雜方

**癬**在脛項間後延上至耳成濕癬他治不應以蘆薈一兩研甘草末半兩和勻先用溫漿水洗癬拭上傳之神妙

劉禹錫方

變劑

癬瘡方槿樹皮不犯銅鐵每二兩又蘆薈三錢白芨三錢細研為末刮癬出血用好醋調傳雖痛卻一傳可愈

一方用蘆薈 大黃 輕粉 雄黃

蛇床子 槿樹皮 栝榔

右先刮破癬用醋調藥末塗之

**世**頑癬用槿樹皮加巴荳班毛為細末又加生砒少許水調傳

**世**治牛皮癬用清香油一兩入全蝎七枚巴荳二十枚斑毛十枚同熬候色焦者先去之去了入黃蠟一錢候溶收起朝擦暮愈不損皮肉

又方綠籬根不拘花椒一

信些

防風兩

江子粒十五 白芨兩半

百部兩半

白欬兩半

右各為末和綠籬根搗熱成團將藥於癬上擦之候痛過洗浴

又方一味綠籬根去粗皮取細皮貼肉者搗爛用醋調塗癬上立愈

丹乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨卽痒用狼毒末塗之聖惠 外臺用班毛半兩炒為末蜜調傳上

輕劑

丹治癬亦久不瘥半蹄根搗絞取汁用膩粉少許調如膏塗傳患處三五遍卽瘥如乾卽用猪脂調和傳之簡要

羅栢脂膏治乾癬 栢油斤 黃蠟斤半 杏仁粒四十五 朴硝抄

醫學綱目卷下

十一

右件相和於鐵器內用老生姜葱白三根一順攪五七次煎沸濾過成膏於瘡上搽之

取栢皮枝中白汁塗癬甚妙

聖治癬濕痒用楮葉半斤細切搗傳癬上

經治五種瘡癬以韭根炒存性旋搗末以猪脂調傳之三度瘥 又方患癬瘡搗山荳根末臘月猪脂調塗之

羅祛濕散治多年濕癬大有神效

蚕沙兩 薄荷兩

右為細末每用不拘多少乾摻於瘡上或用生油調搽

和 一女子年十五兩股間濕癬長三四寸下至膝發痒

時爬搔湯火俱不解痒定黃赤水流又痛不可忍灸熨薰

溲硫黃蘆茹白姜蚕羊蹄根之藥皆不効其父母求瘡於戴人戴人曰能從予言則瘥父母諾之以鉞針磨尖快當

濕者燥之

其痒時於癬上各刺百餘針其血出盡煎鹽湯洗之如此四次大病方除此方不盡以告後人恐為癬藥所誤濕滯於血不可不砭者矣

紫白癩風白禿

風

龍蛇散治風虛頑麻遍身紫白癩風癭痒痛者

白花蛇

去骨焙

黑梢蛇

去骨焙

草薺

天麻

黃芪

金毛狗脊

自然銅

骨碎補

楓香 研

地龍

草烏頭 鹽水浸到

乳香

沒藥各三錢

麝香 二錢

右細末酒糊丸桐子大每服十五丸酒下食後為末酒調亦得

羅加減何首烏散治紫白癩風筋骨疼痛四肢少力眼斷瞳人鼻樑崩塌皮膚疥癬手足皴裂睡臥不安行履艱難

醫學綱目卷十

七

何首烏

蔓荆子

石菖蒲

荆芥穗

苦參

葳靈仙

甘菊花

枸杞子 各一

右為細末每服三錢蜜茶調下不拘時

聖治白癩用馬鞭草不限多少為末每服食前用荆芥薄荷湯調下一錢匕

風濕

木治宿患風癬遍身黑色肌體如木皮膚粗澁及四肢麻痺宜服烏頭丸

草烏頭一斤入竹籬內以水浸用瓦片於籬內就水中

瀧洗如打菱角法宜候瀧洗去外皮及尖控起令乾用

麻油四兩鹽四兩入銚子內炒令深黃色傾出油只留

鹽并烏頭再炒令黑色烟出為度取一枚劈破心內如

米一點白恰好如白多再炒趁熱取羅為末用醋糊丸

如桐子大每服三十九空心晚食前溫酒下真州資福

藥方

廉文雅白老有此疾服數年黑點頓除腦力強健視聽不衰有一宗人遍身患紫癩風身如墨服踰年體悅澤予服之一年諸風疥瘡瘍皆瘥性差熱雖云去毒要之五七日作烏頭粥啜之為佳粥法用豫章集中者佳

**世**紫白癩風貝母為末以胡桃肉蘸洗浴後擦之神効

又方以信石好者為上研極細用真香油調如薄粥過一宿取清油傅之愈 又方用金獅草搗碎擦之累効

**卅**又方杜大黃 飛礬 右肥皂為丸擦之

白禿 松香製 蕪荑 黃丹 光粉 枯礬

胡坯 右末香油入姜汁少許調傅上

針灸

又法直兩乳頭以篋量過當兩膈脈絡上灸之膈絡脈俗呼為蝦蟆穴也

面瘡

八醫學綱目卷下

三

藥方

**大**治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺用盡藥不効者惟有此藥可治神妙不可言每以少許臨臥時洗面令淨如面油用之數日間瘡腫處自平赤亦自消如風刺粉刺一夕見効勿塗藥勿近眼處

生硫黃 香白芷 瓜萋仁 膩粉各半

全鷄杖 蟬蛻五枚 芫菁七枚去足

右為細末麻油黃蠟約度如合面油法火熬溶取下離火入諸藥在內每用少許塗面上

**山**面瘡水調平胃散塗之

**千**治臉上熱瘡涎出以蒲黃傅上瘥

**東**洗面藥方治面有黑點或生瘡及粉刺之類并去皮膚

燥痒垢膩潤澤肌膚

皂角三斤去皮

糯米二合

葦莖八合揀淨另搗

楮實子五兩

三奈子

縮砂連皮半兩

白芨二兩肥者到

甘松七錢

升麻半兩

白丁香五錢臘月收揀淨

右七味同爲細末訖和棗荳糯米粉及皂角末一處攪勻用之効

面油摩風膏

麻黃二分

升麻根二錢去皮羌活去皮一兩

防風二錢

歸身一錢

白芨一錢

白檀五分

右以綿裹定前藥於銀石器中用油五兩同熬得所澄清去查以黃蠟一兩再煎熬爲度

瑩肌如玉散

白丁香一兩

香白芷七錢

升麻半兩

白芨一兩

麻黃去節二錢

白牽牛一兩

當歸稍半兩

白附子二錢

白蒺藜一兩

楮實子四錢

白茯苓三錢

連翹半錢

入醫學綱目卷三

古

白藪一兩

小椒一兩

右爲細末每用半錢多少洗之

塗點點不令生瘡

猪苓

麻黃

桂枝

白蒺藜

白附子

連翹

防風

香白芷

白藪

當歸身

升麻根

白芨

右等分爲細末洗面用之臨臥唾調少許塗面上

附 療面多疔點如雀卵色以殺羊膽一枚酒二升煮三沸塗拭之三日瘡治面上粉刺搗兔絲子絞汁塗之

行 白附丹治男子婦人面上黑斑點

白附子一兩

白芨

白藪

白茯苓

蜜陀僧

白石脂

定粉各等分所

右爲細末用洗面藥洗淨臨睡用人乳汁如無用牛乳

或雞子清調和丸如龍眼大窸乾逐旋用溫漿水磨開傳之

癩頭瘡

風熱

防風通聖散為末酒浸焙乾九三次食後白湯調服日三服至頭有汗効

濃煎鹽湯洗三五日一洗用一上散傳之久年不愈神効亦見

用好紫霄炭燒通紅入水研之又燒又焯以水熱為度取所焯之水日日洗之使熱毒宣發而愈外以胡荽子伏龍肝懸龍尾塵也黃連白礬為末調傳又服酒炒通聖散効

一方單用黃連末傳之累効

口瘡唇瘡

醫學綱目卷十

五

熱

王四叔公口瘡舌強多痰

白朮

甘草稍

人參

赤芍藥

木通

生地

黃連

瓜蒞子

右作一貼煎

黃連升麻湯口舌生瘡

升麻

黃連

右為細末綿裹含津嚥

辛能散鬱

治口瘡黃栢炙同細辛各二錢研極細傳之噲少時當滿口有涎吐之少刻又傳又噲如是五七次立愈

此方治鬱氣

綠袍散治大人小兒口瘡多不効者

黃栢

甘草

青黛

右先取二味為末入青黛同研勻乾貼

銜黃柏皮蜜炙與青黛各一分同為末入生龍腦一字研勻治心脾熱舌頰生瘡當搽瘡上有涎即吐之

恒蜜栢散治口瘡久不愈者用黃栢不計多少以蜜炙灰色為細末乾搽上臨臥忌酒醋醬犯之則瘡難愈

丹好酒煮黃連呷下立愈

本治膈上熱極口舌生瘡

膩粉匕 杏仁七粒 去皮匕

右二味臨臥時細嚼令涎出則吐之用溫湯嗽口未痊可又用

酸能收緩

治口瘡以薔薇根避風處打去土煮濃汁溫含冷易之

術五倍子治口瘡以末搽之便可飲食  
本治口瘡以膽礬一理用百沸湯泡開含漱一夕可瘥八分 一方用白礬湯嗽口亦妙 九口瘡用西瓜漿水瘡

入醫聖神書卷二十

去

實熱

甚者以此徐徐飲之冬月無留皮燒灰噲之

治口瘡以好墨研螻蛄極細傳之立効胡氏螻蛄走小腸膀胱其効甚捷因力峻氣猛陰虛氣上致瘡者戒勿用惟體實有熱在上焦者用之如神

子和治一男子病口瘡數年上至口中至咽嗑下至胃脘皆痛不敢食熱物一涌一泄一汗十去其九次服黃連解毒湯不十餘日皆釋

虛火

口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上先用理中湯甚則加附子

本治滿口生瘡此因虛壅上攻口舌生瘡

草烏个 南星个 生姜呢

右焙乾為細末每服二錢臨臥時用醋調作掩子貼手

足心來日便愈

**丹**口瘡以遠志醋研鵝毛掃患處出涎

**不**治口鼻生瘡用生姜一塊臨睡時細嚼含睡不得開口  
出氣眠着不妨睡覺咽下

臧庸

**治**少陰口瘡半夏散聲絕不出者是寒遏絕陽氣不伸  
半夏製一兩桂烏頭各一字同煎一盞分作二服 治太  
陰口瘡甘礬散以甘草二寸白礬栗子大含化咽津 治  
赤口瘡乳香散以乳香沒藥各一錢白礬半錢銅綠少許  
研爲末摻之 治白口瘡沒藥散以乳香沒藥雄黃各一  
錢輕粉半錢巴豆霜少許爲末摻之

運氣口瘡有二

運氣

一曰熱經云少陽司天火氣下臨肺氣上從口瘍是也  
二曰寒經云歲金不及炎火乃行復則寒雨暴至陰厥且  
格陽反上行病口瘡是也

醫學綱目卷五

七

雜方

**治**口瘡猪蹄殼燒爲末傅之立止 張氏方 治口瘡與走

馬疳茄蒂中木去皮燒存性入少白梅灰與少礬細末傅

之立安 精要同

**羅**紅芍藥散

心病口瘡 紫桔紅蒼 三錢四兩 五服安康

右件紫莢桔梗紅芍藥蒼朮各等分爲細末羊肝四兩

批開摻藥末三錢用麻扎定火內燒令熟空心食之大

効白湯送下

**聖**主小兒口瘡通白者及風疳瘡蝕透者以白姜蚕炒令

黃色拭去蚕上黃肉毛爲末用蜜和傅之立効

**陳**主口內熱瘡以古文錢二十文燒令赤投酒中服之立

瘥

**聖**口舌生瘡胸膈疼痛用炒鼓細末含一宿便瘥

用檳榔燒灰存性為末入輕粉傳之  
又法

治口瘡用縮砂不拘多少火煨為末摻瘡即愈

治口瘡取桑樹汁先以髮拭口即以汁傳之

化毒法凡口瘡無問新舊遇夜臥將自己兩九以手摻

緊左右交手揉三五十遍但遇夜睡覺行之如此三五度

因酒而生者一夜愈久病諸口瘡三二夜愈如鼻流清涕

唇瘡

惡寒者搯二九向上揉之數夜可愈

唇瘡以甌上滴下汗傳之累効如神

多効散治唇緊瘡及疹

訶子肉 五倍子各等分

右為細末乾貼上効

丹唇黃泡腫烏頭炒灰研香油調傳之胡氏方唇上生瘡

連年不瘥以八月藍葉一斤搗取汁洗之不過三日瘥

方唇上生瘡用白荷花瓣貼之神効如開裂出血者即

針灸

止口瘡 承漿 合谷 人中 長強 海泉三稜出血 不巴用後

穴 金津 玉液各出 委中寫 後谿補此二穴乃心火 腎水二經之表

又方 膽俞 小腸俞各灸七壯 太衝分 勞宮

牙疳瘡

熱

神功丸治多食肉人口臭不可近牙齒疳蝕斷肉將脫

牙落血出不止 縮砂仁半 甘草三

黃連去鬚淨一兩酒洗 薤香葉錢 生地黃酒浸三錢 木香錢 升麻錢

當歸身錢 蘭香葉如無藿香葉代之

右為細末水浸蒸餅為丸菘荳大每服一百九加至二

百九止白湯下食後服兼治血痢及下血不止血下稠色或紫黑色及腸澀下血空心米飲送下其脈洪大而緩及治麻木厥氣上衝逆氣上行腰間者

耳內瘡

少陽

黍粘子湯治耳內痛生瘡

桔梗兩

柴胡三

連翹分

黃芩分

黍粘子分

紅花許少

歸稍分

生地黃分

蒲黃分

甘草分

黃連分

草龍膽分

昆布分

黃芪分

蘇木分

桃仁錢

生甘草分

右件劉如麻荳大作一服水二大盞煎至一盞去查稍熱服食後忌寒藥利大便

少陰

治耳內生瘡者為足少陰是腎之經也其氣通於耳其經虛風熱乘之隨脈入於耳與氣相搏故令耳門生瘡也

會青散主之

治耳內有惡瘡會青散

雄黃錢

會青兩

黃芩二錢

右件搗為細末研勻每用少許納耳中有膿出即以綿杖子拭乾用之

黃連散

黃連兩

白礬枯七錢半

右搗為細末每用少許綿裹納耳中

腎臟風陰瘡

風濕挾虛

無四生散治癩風上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡下注陰濕四散搔痒通體生瘡及婦人血風等症

白附子

蒺藜搽去

黃芪錢

羌活分

補中有

右為末每服二錢鹽酒調下有一人將猪腎破開入鹽  
搽藥煨亦妙瀨屬宗筋胃陽明餐之故有是証

**世** 治腎臟風凡指縫白者只一二服効

黃芪兩

木通

甘草

黑牽牛兩各半

右四味細剉用班毛七枚去翅同藥炒焦黑去班毛餘  
為末蒸餅糊為丸如桐子大空心鹽湯下三十九

**本** 治腎臟風上攻下注生瘡并癬烏頭丸

川烏兩

草烏一兩二味以黑豔半升

天麻

地龍去

白附子各半

右為末酒糊為丸如桐子大每服二三十丸空心食前  
鹽酒鹽湯任下

風熱

**醫** 有一婦人患臍下腹上連二陰遍滿生濕瘡狀如馬刀  
他處並無熱痒而痛大小便泄出黃汁食亦減身面浮腫

入醫學綱目卷三

三

醫作惡瘡治用鰻鮑魚松脂黃丹之類塗瘡上愈熱痛甚  
治不對故也細問之此人嗜酒貪啗喜魚鱗發風等物急  
令用溫水洗拭去膏藥尋馬齒覓四兩研碎入青黛一兩  
再研勻塗瘡上即時熱減痛痒皆去仍服八正散日三服  
發散客熱每塗藥一時久即乾又再塗新濕藥如此二日  
減三分之一五日減二自此二十日愈既愈乃問曰此瘡  
何緣至此曰中下焦畜風熱毒熱氣若不出當作腸癰內  
痔仍須禁酒及發風物後不能禁酒果患內痔

**陰囊瘡蠟** 面茶末之先以甘草煎水洗後傳上妙鏡心

**陰上濕泡瘡** 硫黃末傳之日三次楊師

寒濕

**治丈夫陰下濕痒** 蒲黃末傳之良

**陰瘡** 人尿燒灰傳之安秘

**腎臟風** 甘草節湯洗極効

**腎臟風瘰**不可當者吳茱萸蛇床子等分煎湯洗神效  
治腎臟陰汗生瘡用莧菜根莖葉燒灰存性研細搗破傳  
之立愈又蒼耳草蛇床子煎湯洗之良

**藥**治男子婦人陰部濕淹瘡

五倍子細研五分白礬錢一

銅綠少許

輕粉字

乳香五分

右為極細末洗淨搽之

**世**治陰瘡痒痛久不止

銅錢枚百

烏梅枚七

鹽錢二

右水一碗半煎至一碗洗之無不効驗

**世**腎臟風瘡

血即百虫窠右膝內廉  
血即上膝三寸陷中者

**集**腎臟風瘡

血即百虫窠針入  
血即寸半灸二十七壯

三陰交

下疳瘡

醫學綱目卷十

主

熱

**世**有一隣人三十餘性狡而躁素患下疳瘡或作或止夏  
初患白痢膈上微悶醫理中湯四貼昏悶若死片時而  
甦予脈之兩手皆濇重取畧弦似數予曰此下疳瘡之深  
重者與當歸龍薈丸去麝四貼而利減與小柴胡去半夏  
加黃連芍藥川芎生薑煎五六貼而安 一男子近三十  
歲有下疳瘡雖屢求治以其不能忌口却之忽一日頭痛  
發熱自汗衆作傷寒陽証治之反劇予診其脈弦甚七至  
重按則澁予曰此症在厥陰藥與症不相應遂作小柴胡  
湯加草龍膽黃連胡黃連帶熱服四貼而病脫然 治男  
子耻瘡或痛在莖之竅或痛在莖之標皆手足大陽不利  
熱毒下傳入于足厥陰故變紫黑色作蝕瘡毀其莖而死  
宜以子和泄水丸散導其濕毒無不愈者若已成瘡先泄  
其根次從標而治外以葱白黑荳汁漂洗拭乾以黃連木

香蜜陀僧乾胭脂之類細末搽之如內潰膿不出以追膿散上之又用子和泄水丸如後竅膿少可用黃連木香胭脂等貼之

**泄水丸**一名大智丸

大戟

芫花

甘遂

海帶洗

海藻洗

郁李仁

續隨子

已上各半兩

樟柳根一

右為細末水煮重肉為丸如小荳大每服五七十九熟水下

治下疳瘡先用張子和泄水去根後用此藥乾上

黃連

滑石各半兩

定粉錢

輕粉少

乳香錢

蜜陀僧錢

右細末乾上或加乾胭脂或加木香檳榔

醫學綱目卷三

三

**下疳瘡**

蛤粉

臘茶

苦參

青黛

蜜陀僧

右用臘脂調塗河水洗淨并治臙瘡

**又方** 青黛

海蛤

蜜陀僧

黃連

右為末傅上

**丹** 一切熱毒惡瘡及下疳瘡用蜜陀僧黃栢皮末各一分

半膩粉一錢麝香少許先洗瘡拭乾傅之甚者三四次

治下疳瘡雄黃黃連等分為末濕者乾摻乾者油調傅先用荆芥射于煎湯洗却傅之妙一方用地骨皮末傅神効

**海** 追膿錠子膿內潰不出以此藥追之

取膿

雄黃二錢

巴荳半錢

輕粉字

嘗治一男子下疳瘡每恣飲酒則發醫與小柴胡湯加

補店

黃連數貼不効又與玉燭散下之反劇予以甘草節小建中各半煎湯服之下咽痛止後以四物湯建中甘草等分與之漸安

敷貼

陰頭瘡蜜煎甘草傳之安外臺秘要又方用頭髮以鹽水洗淨去油再用米泔洗淨又用清湯洗晒乾燒灰傳瘡上

便結靨

蒼耳葉爲末摻之

治下疳瘡黑形兔爲末傳上神効一名烏吊土一名孩兒沙

之文者欬

治下疳瘡久不愈椽斗子二箇各盛黃丹令滿相合以亂髮纏定燒烟盡爲度同研爲末先以葱白熱藥水洗瘡

膿盡次上藥甚者不過三次如神

療人陰生瘡膿出成坎取高昌白礬麻仁等分研煉猪脂相和成膏槐白皮作湯洗瘡拭令乾卽塗膏然後以楸

入醫學綱目卷三

三

葉貼其上不過三五度瘡

下疳瘡用五倍子末傳之

婦人陰瘡

雜方

少陰脉滑而數者陰中卽生瘡陰中蝕爛者狼牙湯洗之用狼牙二兩以水四升煮取半升以綿纏筋如繭浸湯瀝陰中日三遍

洗榻散治陰蝕瘡

甘草兩一 乾漆兩一 黃芩 當歸

地黃 芍藥各二兩 龜甲兩五

右細切以水七升煮取一半去查以綿帛內湯中用榻瘡處良久卽易日二度每榻湯可作十里許卽挹乾檢取甘濕散薄傳瘡上使徧可經半日又以湯榻榻訖如

前傳藥

有一婢生此疾，蝕處作兩瘡，深半寸，用此洗，榻湯分後，其濕散不經七日，平復甚効。

甘濕散

蝮蛇膽 靛 青木香 石硫黃 鐵精

麝香

各四分 臨時入用 須射碎 蛇毒 若先以相和 蛇胆即無力也

右各等分爲末，更研細，有患取如三碁子大，和井花水，日再服，訖先令便利了，卽以後方桃枝熏下部，訖然後取藥如碁子，安竹管裏，內入下部，中日再度，老少量減，其黃法，每日一度，不用再。

桃枝薰法：取東南桃枝五七枝，輕打頭，使散，以綿纏之，又搗石硫黃爲末，將此綿纏桃枝，撚轉之，令末少厚，又截一竹筒，先內下部，中仍以所撚藥桃枝，燒熱薰之。

女子陰瘡，硫黃末傳之，後。

入醫學綱目卷十

毒

蛇床子散：濕陰中主藥，用蛇床子仁一味，末之，以白粉少許，和令相得，如棗大，綿裹納之，自然濕散。

運氣

運氣陰瘡，皆屬寒經，云太陽之勝陰中，乃瘍隱曲，不利治，以苦熱是也。

賺瘡

治賺瘡極妙：地骨皮一斤，黃栢皮二兩，剉爲粗末，用香油一斤，半煎，濾過藥油六七兩，入淨松香二十兩，黃丹二兩，同煎，候黃丹微黑色，却入輕粉七角，光粉二角，煎法皆如煎膏法，用長條紙拖過，掛乾，用若此瘡，紫黑先用三稜針去惡血，以冷水洗淨，隨瘡大小，剪膏藥掩上，用絹帛緊繫，扎縛，俟一周時，再換膏藥，換時須用冷水洗瘡，不過數換，不問新久，卽愈，須忌日氣、火氣、陽氣，倘換膏藥，再看，如有黑腫未盡，可再出血，以紫黑血盡爲度。

治瘰瘡用糯米泔嗽口過洗瘡拭乾却以地骨皮為細末  
蜜調傳瘡上又以油紙縛之

治瘰瘡

白膠香一兩 黃柏一兩 軟石膏一兩 青黛半兩  
龍骨五

右為細末以香油調傳患處

又方羯羊屎二分石膏一分赤石脂半分為細末香油和  
之舊黑油傘紙作隔膏縛之除根

翠玉膏治瘰瘡

瀝青四兩 黃蠟 銅綠各五錢 沒藥三錢

右件先將銅綠為細末入香油調勻又將黃蠟瀝青火  
上溶開次下油銅綠火上攪勻將沒藥等三味旋旋入  
攪勻用河水一碗將藥傾在內用手扯拔勻油紙裹看

入醫學綱目卷三

五

瘡大小分大小塊口嚼捻成餅子貼於瘡上紙封三日  
易之

瘰瘡用砂糖水煮冬青葉三五沸澇起石壓乾將葉貼  
在瘡口上一日換二遍 腳痛成瘡水蓼煎湯洗瘡候乾

自安經驗方

瘰瘡用韭汁洗淨搥乾剉虎骨傳上

二妙丸治下焦濕瘡但是下焦有 潛行散末蒼木末

各等分煉蜜為丸桐子大

寒濕

海治兩膝脚膝生瘡局方虛損門服黃芪丸立安

黃芪丸

川烏頭炮去土 地龍炒去土 茴香炒

杜疾藜刺去 赤小豆 防風去芦 黃芪剉各

烏藥兩

右爲細末酒煮麪糊爲丸如桐子大每服十五丸溫酒下鹽湯亦得婦人醋湯下並空心服

腳氣瘡足跟瘡

捷應散治腳濕氣成瘡痒不可當爬之流黃水用羯羊糞晒乾爲末安於瓦上手把竹柴火燒作灰又研細先用葱椒湯洗之次用香油調厚傅上以山茶花葉罨之帛縛四五日即可

腳上爛瘡久不瘥先以酸漿豆腐水洗三二次尋懸鈎担葉地暴扭葉搗細入鹽些少盪之地暴扭葉卽覆盆子葉也

海足跟瘡久不愈毒氣攻注用白朮爲細末先以鹽漿水溫洗乾貼二日一換可以負重涉險

凍瘡

醫學綱目卷十

五

針灸

千和經曰寒瘡流水俗呼爲凍瘡或經年不愈者用野中淨土晒乾以大蒜研如泥捏作餅子如大觀錢厚薄量瘡口大小貼之以艾火加於餅上灸之不計壯數以泥乾爲度去乾餅子再換濕餅子灸不問多少直至瘡加覺痛痒是瘡可治也然後口含漿水洗漬用雞翎二十莖縛作刷子於瘡上刷洗淨以此洗刷不致肌肉損傷也以軟帛拭乾用木香檳榔散傅之如夏月醫之更妙

世足跟紅腫凍瘡

足跟左足指面後跟赤白肉際骨下刺入三分裨針出血可灸二十七

壯

足跟凍瘡潰破用椒蔥湯洗刮去腐肉用三稜針出血將馬屁勃入生牛骨髓調和傅之効

雜方

治凍瘡用茄根燒灰洗了用雀兒腦髓塗之

取臘月牡鼠死者一枚油一大升煎之使爛絞出查

再煎成膏塗凍瘡及折破瘡

**丹** 治凍瘡用煎熟桐油蜜陀僧傳

**山** 用五倍子煎湯洗

止痛

**羅** 如神散治凍瘡皮爛不可恐用川大黃不拘多少為細末新水調掃凍破瘡上痛止立効

**世** 治凍瘡痛者椒欖核燒存性為末用香油調塗患處其痛隨愈

**戴** 人女僮足有凍瘡戴人令服舟車丸濟川散大下之遂愈人或疑之戴人云心火降則寒消何疑之有

手足皴裂脚縫爛

辨方

**潤** 肌膏治手足皴澁皮膚裂開疼痛不能見風

珠子瀝青兩白黃蠟錢八乳香錢二

右三味於鐵器內用文武火熬下瀝青在鐺內隨手便

醫學綱目卷十

毛

下黃蠟乳香次入清芝麻油一二匙候瀝青盡溶開微微熬動放大淨水一盆於其傍以攪藥用匙取一二滴滴於水中試之如硬再入油如軟硬合宜用新綿摠淨入水中折疊扯之以白為度油當旋旋入勿令軟了以磁器內盛之或油紙裹亦得每用不拘多少先於火上炙裂子口却捻合裂子藥亦火上炙軟塗於裂子上用紙少許貼之自然合矣

**東** 老人路次方城北獨樹店之客舍有推小車者皮膚皴裂甚痛兩手不能執轆足不能履地而車上宿制此藥傳之即効明日遂行自後屢用屢効故錄於此

**世** 治手足皴裂春夏不愈者

生姜汁

紅糟

白鹽

猪膏臘月者佳

右研爛炒熱擦入皴內一時雖痛少頃便皮軟皴合再

用卽安

**丹**手足寒皴裂台椒三四合煮浸半食頃須臾再浸又傳以羊猪髓腦甚妙梅師方

**世**治腳跟皴裂用頭髮一大握桐油一碗於瓦器內熬候油沸頭髮溶爛出火攤冷以瓦器收貯不令灰入每用百沸湯泡洗皴裂令軟傳其上卽安一方加水粉

**山**脚裂爛蒸藕研成膏傳之

**世**用五倍子爲末同牛骨髓填縫內卽好治脚指縫爛瘡搗鵝時取鵝掌黃皮焙乾燒存性爲末濕則搽之

反花瘡

瘡有努肉凸出者是也

雜方

**世**諸瘡努肉如蛇頭出數寸者硫黃末傳之卽縮聖惠方

瘡有肉凸出烏梅燒灰爲末傳之立盡鬼遺方 又以白梅肉杵細入蜜捏成餅如錢大貼之妙聖惠方

入醫學綱目卷十

天二

**梅**又方治反花瘡馬齒莧一斤燒灰細研猪脂調傳

**世**瘡凸出寸許根如小莖或大如梅者用花腳蜘蛛絲纏其根則漸乾而自脫落

惡瘡

虛實

**羅**乳香消毒散專治惡瘡

大黃煨

黃芩

牛蒡子炒

金銀花各五兩

甘草三兩

牡礪益泥煨

牛乳香

沒藥

懸蔓各半兩

右爲粗末每服五錢水煎瘡在上食後在下食前

**海**惡瘡入腹心嘔逆藥食不下

荳粉半兩

乾胭脂三錢

定粉二錢

右細末新水調下神効

雜方

碧霞挺子治惡瘡神効了不覺疼痛者

銅綠

石砂各

蟾酥一錢

右為細末燒飯和作麥蘖挺子每刺不覺痛者須刺出血方紐藥在內以膏藥貼之  
蝕惡瘡方非奇異惡瘡不可用

銅綠二

硃砂一

石膽礬

半錢并細研

右為細末傳之

治惡瘡或有小虫

膽礬一

龍骨二錢

輕粉一

虎骨

白礬半錢

麝香五分

乳香一錢

硃砂二錢

腦子一

土蜂房二錢

露蜂房二錢

雄黃二錢

右細末刺破鹽水洗看緊慢上藥神效

雜瘡

世治蒲萄瘡瘡頭如蒲萄色四圍腫起先追膿盡次用冰

醫學綱目卷十

五

梅當瘡頭瘻之神愈

江左有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺臍肉脹起或不食之則臂痺有善醫者教其歷試諸藥無苦至貝毋其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小葦筒磨貝毋水灌之數日成痂遂愈不知何疾也

天泡瘡通聖散及蛭蚓泥畧炒密調傳妙從肚皮起者裏熱發外速服通聖散

天行斑瘡須臾遍身皆戴白獎此惡毒氣永徽四年此瘡自西域東流於海內但葦葵菜葉以蒜糞啖之即止

卒得惡瘡不識者燒苦竹葉和雞子黃傳

疔 疔音休俗稱雞眼子是也

手太陽之别名曰支正上腕五寸虛則生疔小者指痂疥

瘰癧

取之所別也全文見針灸虛實

**丹**手足生疔目鹽傳上舌舐之只三次瘡用後

**世**疔用雞胃中食指疔上措餘者以石壓之驗

疔

**世**取瘡餅藥

糯米粒

石灰搗拍

巴豆三粒去殼研

右為末入磁瓶同膏三日每以竹筴挑粟許點上自然

蝕落

**世**取壓

風化石灰一兩

花碱半兩

右為細末上三次如天色冷濕用

**世**石灰水調一盞如稠粥揀好糯米全者半置灰中半置

灰外經宿灰中米色變如水精若人手面上有黑壓子及

入醫學綱目卷三

三

紋刺者先微微以針頭撥動置少許於其上經半日許壓

汁自出剔去藥不用且不得着水二三日愈 又方用水

蛭一條雞子一枚開雞子小頭內水蛭以皮兒蓋合封之

直至水蛭食盡雞清乾盡自死乃用之

擲撲傷損 金瘡

杖瘡

湯火傷

竹木刺針入肉

箭入肉

漆瘡

嚴審攝法

**世**凡擲傷皮破血出處疼不可忍乃風寒所着宜用葱杵

碎入鹽少許炒熱卷上其痛即住冷則再溫之

**本**崔給事項在澤潞與李抱真作判官李相方以毬杖按

毬子其將軍以杖相格乘勢不能止因傷李相姆指并爪

甲劈裂遽索金刀藥裹之強坐頻索酒飲至數盃已過量

而面色愈青忍痛不止有軍使言取葱新折者入渣灰火

煨熱剝皮擘開其間有涕取番損傷處仍多煨葱續續取

熱者凡三易之面色却赤斯須云已不痛凡十數度易用  
熱葱并涕裹纏遂畢席笑語

**治腦骨破及骨拆葱白爛研和蜜浮封損處立瘥** 筋  
斷骨折者以法接之

接骨方

**治癩撲筋斷骨折用粟米半升木鱉肉二十箇半夏半  
兩婦人髮一團葱白鬚一小束同炒烟盡存性為末熱醋  
調傳神効** 治癩撲筋斷骨折用糯米一升皂角切碎半  
升銅錢百箇同炒至半焦黑去銅錢為末用好酒調膏厚  
紙攤貼患處神効

**打撲傷損及一切腫癰未破令內消方**

生地研如泥 木香細末

右以地黃膏隨腫大小攤於紙上摻木香末一層又再  
攤地黃膏貼腫上不過三五度即愈昔許元公入京師

入醫學綱目卷十

三

赴省試過橋墜馬右臂曰脫路人語其僕曰急與接入  
白中若血漬白則難治矣僕用其說許以昏迷不覺痛  
遂僦輜舁歸邸或曰非錄事巷田馬騎不能了此疾急  
召之至巳日暮因秉燭視其面曰尚可治乃施藥封此  
處至中夜方甦達旦痛止去其封損處已白其青瘀乃  
移在白上自是日日易之腫直至肩背以藥下之瀉黑  
血三升五日復常遂得赴試蓋用此法云

**走馬散治折傷接骨**

栝葉性生 荷葉生

皂角性生

骨碎補去毛

右為末先將折傷處揣定令入元位以姜汁調藥如糊  
攤紙上貼骨斷處用杉木片夾定以繩縛之莫令轉動  
三五日後開看以溫葱湯洗後再貼藥復夾七日如痛  
再加沒藥

**本**治腕打傷筋損骨疼痛不可忍

生地切一斤 藏瓜姜糟一斤 生姜四兩

右都炒令勻熱以布裹罨傷折處冷則易之曾有人傷折宜用生龜尋捕一龜將殺患人忽夢見龜告曰勿相害吾有奇方可療於夢中授此方神効

**本**骨碎補脊閃折筋骨折傷取根搗碎煮黃米粥和之罨傷處良

**接骨丹敷貼藥**

天南星四兩 木鱉子兩 沒藥兩 官桂一兩

乳香兩

右爲細末姜一斤去皮爛研取自然汁入米醋少許白麩爲糊同調攤紙上貼傷處以帛縛之用篋夾定麻索子纏

**本**搗撲骨肉損醋搗肥皂爛厚罨之以帛縛之閃傷醋糟平胃散相和罨之

**本**治搗傷骨折及血黯方用益元散七分人參湯調之次用姜汁好醋二盞用獨子肥皂四箇敲碎接於姜汁醋中調和以綿濾過去查煎成膏藥貼之遍身亦可

**本**又方柑桔葉白酒糟杵細縛痛處或大段痛用火燒地令紅用醋并米泔撥地上急鋪荐令患人荐上臥蒸出汗內則服藥外則貼罨易安

**本**治破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之用綿裹血立愈

**本**折傷接筋方旋覆花根杵汁滴傷處又將查封瘡上十五日使斷筋自續矣蘇良仲方即金沸草根是也 接骨用好無名異

三兩爲末丁乳檀沉木五香各半錢重爲末先燒鐵銚紅以五香三之一彈入銚內候烟起則全下無名異待滾退

綴耳莫法

火定後再上火炒熱又將五香彈三之一彈入銚內候滾又退火如此者凡三次訖出火毒即用骨碎補去毛約一斤與生姜等分搗爛以碗覆之候發熱先約取五之一入小葱九莖連鬚去蒂同入沙盆搗細取其汁調前無名異末二錢衝老酒服之其查晷患處即愈如年老氣衰者再作一劑多飲酒力助之為妙

治擦落耳鼻用髮入碓子鹽泥固濟煨過為末乘急以所擦落耳鼻蘸灰綴定以軟絹縛定效江懷禪師為驢所咬下鼻一僧用此綴之効

肩穿法

負重擔肩破者剪貓兒頭上毛不語唾粘之 遠行脚

脚破法

打泡用調生麪糊貼過夜即乾不可擦破又法用飯粘貼過夜以紙蓋之次日平復神効

傷分三部用藥

若登高下重物撞打箭鏃刃傷心腹胃中停積鬱血不

散以上中下三焦分之別其部分上部易老犀角地黃湯中部桃仁承氣湯下部抵當湯之類下之亦有以小便酒同煎治之 更有內加生地黃當歸煎者有大黃者又法虛人不禁下者以四物湯加川山甲煎服妙亦有花蓋石散以童子小便煎或酒服之者此藥與前寒藥正分陰陽不可不辨也若瘀血已去用復元通氣散加當歸煎服亦可

鐵線穿定用活桑木一根作柴燒錢紅米醋一大碗未煎者不入鹽將所燒錢焯入醋中如此焯之以醋乾為度取醋中焯落銅錢末就用醋洗去灰晒乾為極細末再用黑雄雞一隻清湯煮熟去肉用骨一付以醋炙酥為末入乳香沒藥各一兩與銅錢末一處和勻每服一字臨服時用

可 按骨神効無比累驗用當三錢一百零八箇錢厚字以連草者

鐵線穿定用活桑木一根作柴燒錢紅米醋一大碗未煎者不入鹽將所燒錢焯入醋中如此焯之以醋乾為度取醋中焯落銅錢末就用醋洗去灰晒乾為極細末再用黑雄雞一隻清湯煮熟去肉用骨一付以醋炙酥為末入乳香沒藥各一兩與銅錢末一處和勻每服一字臨服時用

香沒藥各一兩與銅錢末一處和勻每服一字臨服時用

患人髮在頂上者洗去垢燒灰入藥中無灰酒調服不吐只一服如吐出再服如痛止不可再服必須先夾縛所折骨端正用楊樹皮刮去肉糊并外粗皮傳之下咽便不痛五七日便能運動必終身忌葶薺一名地栗義門家傳方一方用五銖錢醋焯一兩二錢黑雞骨三兩研細勻每服病在下四錢踈服食前病在上二錢半頻服食後一方有乳香沒藥

**方**用醋焯半兩錢蘇木定粉南鵬砂各一錢為末作一服當歸酒二三服痛止勿服

**接骨散**

沒藥

乳香各五錢

自然銅一兩醋焯滑石二兩

龍骨三錢

赤石脂二錢

麝香後少許入白石脂二錢

右為細末以好醋浸沒煮多為上候乾就炒燥為度臨服入麝香少許挑小茶匙在舌上溫酒下病分上下食前後服若骨已接尚痛去龍骨石脂而多服儘好

入醫學綱目卷三

語

**世** 又方接骨

乳香

沒藥

蘇木

降真節

川烏去皮尖

松明節一兩

自然銅米醋炒各一兩

地龍去土麻油炒半兩

血竭三錢

龍骨半兩生用

水蛭油炒半兩土狗十個油浸炒

右為細末每服五錢酒調下在上食後在下食前

**垣** 定痛乳香神應散治從高墜下疼痛不可忍腹中疼痛

乳香

沒藥

雄黑芷

桑白皮

獨科栗子各一兩

破故紙炒一兩當歸一兩

水蛭半兩

右為末每服五錢醋一盞沙石器內煎至六分入麝香

少許溫服

定痛接骨紫金丹

麝香

沒藥

紅娘子各一錢半 烏藥二錢半

地龍錢半 川烏

草烏炮各一兩 五靈脂去皮半兩

木鱉子去壳半兩 茴香二錢半

黑牽牛生用五分 骨碎補

歲靈仙

金毛狗脊

防風去芦

自然銅醋煅七次

各五錢

禹餘糧四錢 陳皮

青皮各二錢半

右為細末醋糊丸如桐子大每服十九至二十九溫酒送下病上食後病下食前服

聖靈丹治一切打撲損傷及傷折疼痛不可忍者並宜服

之

乳香五錢

烏梅去核五個

白米撮

萹苴子一錢 薑炒

取二兩

八錢

三

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼熱酒吞下食後一伏時痛不止再服

經治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒調下一錢食

頃痛更一服痛止便將接骨藥封以物夾定直候至好

初虞世治從高至下墜及打擊內傷神効麝香水蛭各一

兩剉碎炒烟出二件研為細末酒調二錢當下畜血未止

再服其効如神

衍自然銅有人銅折翅鴈後遂飛去今人打撲損傷研極

細末飛過用當歸沒藥各半錢以酒調頻服仍以手摩痛

處

海治墜落車馬筋骨疼痛不止用玄胡索一兩搗羅為散

不計時服以荳淋酒調下二錢

本草便治卒血及心被打內有瘀血者煎服之一服一升

**搨撲傷損**松節煎酒喫 搨撲重傷用生姜自然汁四兩香油四兩打勻無灰酒熱調下

右乳香沒藥行汚血調氣例衍義云沒藥通滯血打傷撲損疼痛皆以酒化服血滯則氣壅瘀氣壅瘀則經絡滿急經絡滿急故痛且腫矣道而行之則痛腫消焉

**搨打損**磕傷疼痛夜合花末服之酒下二錢七効

治打撲損傷折骨此藥專能接骨

夜合樹

卽合歡花去粗皮炒黑色四兩

芥菜子

炒一兩

右爲細末酒調二錢澄清臨臥服以粗查罨瘡上扎縛之

又方用葱白砂糖二味相等分爛研傳之痛立止且無痕

**白蠟**屬金金稟收斂堅凝之氣外科之要藥生肌止血

醫學綱目卷十

三五

定痛接骨續筋補虛與合歡皮同入長肉膏藥用極神効但未會試可爲藥餌否若合歡皮常試之灸服之大有妙理且有速効不可不知也

**本**治打傷接骨方

接骨木

半兩本草名蒲藿

乳香兩

赤芍藥

當歸

川芎

自然銅各一兩

右爲細末同黃蠟四兩溶入前藥末攪令勻候溫軟衆手丸如龍眼大如打傷筋骨及閃拗着疼痛不可忍者用此藥一九無灰熱酒一盞浸藥候藥潰開乘熱呷了痛便止若大段傷損碎拆須先整骨用川烏草烏爲末等分生姜汁調貼瘡之又將帛縛定然後服此藥表裏兩治無不効者此二方是一副不可分開

治打撲內損筋骨疼痛

沒藥

乳香

芍藥

川椒開子及

川芎

當歸各半

自然銅三錢 煅

右為細末用黃蠟四兩溶開入藥末不住手攪勻濕丸如彈子大每服一九用好酒煎開消盡乘熱一服吃盡看那處痛向痛處臥霎時服三五丸立効

**酒** 治破傷見血酒一碗煎服

半兩當歸蠟二錢

合來搥碎酒同煎

直須軟冷連查吃

一切傷瘡保萬全

右夜合黃白蠟側接續筋骨補虛也

**酒** 破血消痛湯治乘馬損傷跌破脊骨惡血流出脇下甚痛苦楚不能轉側妨於飲食

羌活錢一

防風錢一

蘇木半錢

柴胡

羌活錢一

防風錢一

蘇木半錢

柴胡

連翹錢二

當歸稍二

官桂錢一

麝香少研

醫學綱目卷三

三

水蛭

三錢 炒去 腥尺另研

右為粗末只一服酒二大盞水一大盞水一盞水蛭麝香另研如泥餘藥煎至一大盞去火稍熱調二味服之兩服立愈

**酒** 中風有所墮墜惡血留內有所大怒氣上而不行下積於脇下則傷肝又中風及有所擊仆若醉入房汗出當風

則傷脾又頭痛不可取于脰者有所擊墮惡血在內若肉

傷痛未已可側刺不可遠取之也邪氣職腫 及厥病篇

夫從高墜下惡血流於內不分十二經絡醫人俱作中風

肝經留於脇下以中風療之血者皆肝之所主惡血必歸

於肝不問何經之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛甚則

必有自汗但人人有汗出皆屬風証諸風皆屬於肝木泥

敗血凝泣逆其所屬入於肝也從高墜下逆其上行之血

氣非肝而非傷寒無汗既曰汗必自風化之也故以破

敗血凝泣逆其所屬入於肝也從高墜下逆其上行之血

氣非肝而非傷寒無汗既曰汗必自風化之也故以破

血行經藥治之

有裡症  
裡實者  
攻裡

脇下痛  
着血在  
肝

昏者  
血冲心

復元羌活湯治從高墮下惡血流於脇下及疼痛不可忍者經云有所墮墜惡血留內有所大怒氣上而不行下損於脇則傷肝肝膽之經俱行於脇下經屬厥陰少陽宜以柴胡為引用為君以當歸活血脈又急者痛也以甘草緩其急亦能生新血陽生陰長故也為臣川山甲括萎根桃仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以蕩滌敗血為之使氣味相合各有所歸痛自去矣

柴胡錢五

當歸錢三

甘草錢二

川山甲錢三

大黃酒浸一兩

桃仁去皮尖紅花錢五十個

瓜蒌根錢三

右件桃仁研爛餘藥剉如麻荳大每服一兩水二鍾酒半盞煎至七分去查大溫服食前以利為度得利後痛或不盡服乳香神應散乳香神應散見前無裏証條

醫學綱目卷三

三六

巴戟湯治從高墜下及打撲內損昏冒嗜臥不能飲食此謂血閉臟腑不通

巴戟去心

當歸

地黃

芍藥

川芎各一兩

大黃半兩

右為末水煎以利為度

當歸導滯散治打撲損傷落馬墜車瘀血大便不通紅腫青黯疼痛昏悶畜血內壅欲死

大黃一兩

當歸一分

麝香少許

右三味除麝香別研外為極細末入麝香令勻每服三錢熱酒一盞調下如前內瘀血去或骨節傷折疼痛不可忍以定痛接骨紫金丹治之

奪命散治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積

大小便  
之不通利

心腹疼痛大小便不通

水蛭用石灰拌煨火炒

黑牽牛二兩

右爲末每服二錢用熱酒調下約行四五里再用熱酒調黑牽牛末二錢催之須下惡血成塊以盡爲度

**雞鳴散**治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積氣絕欲死煩躁頭痛叫呼不得並以此藥利去瘀血治折傷神妙

大黃一兩

酒蒸 桃仁二七粒  
去皮尖

右研細酒一碗煎至六分去查雞鳴時服次日取下瘀血卽愈若便覺氣絕不能言取藥不及急擊口開用熱小便灌之卽愈

**羅氏花蓋石散**治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損猶狗咬傷或至死血瘀傷處以藥摻之其血化爲黃水再摻藥便活更不疼痛如內損血入臟腑煎童子小便入酒少許調

醫學綱目卷十

五九

一大盞服之立効若牛舐腸出不損者急內腸入用細系或桑白皮爲線縫合肚皮縫上摻藥血止立活如無桑白皮用生麻縷亦得並不得封罨瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後摻藥婦人產後敗血不盡血迷血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死者但心頭覺暖急以童子小便調一盞取下惡物如肝片終身不患血風血氣証若膈上有血化爲黃水卽時吐出或隨大便出

石硫黃四兩

花蓋石二兩

右二味相拌合勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦礮子一箇內可容藥候泥乾入藥在內再用泥封口候乾安在四方磚上上書八卦五行字用炭一秤籠疊周匝自己午時從下着火漸漸上徹直至經宿火冷炭盡又放經竈確冷取出細研以絹羅子羅極細磁盒盛之依法使用

**本**治打撲墜損惡血攻心悶亂疼痛水仙散

未展荷葉陰乾一味為末食前以童子熱小便一小盞調下三錢以利下惡物為度

**聖**治撲打墜損惡血攻心悶亂疼痛以大乾荷葉五片燒令烟盡細研食前以童子熱小便一小盞調三錢七日三服

塞上方治墜傷損撲瘀血在內煩悶者用蒲黃末空心熱酒調下三錢瘥

**本**宣和中有一國醫忽承快行宣押就一佛刹醫內人醫診視之已昏死矣問其從人皆不知病之由惶恐無地良久有二三老內人至下轎環而泣之方得其實云因蹴鞦韆自空而下墜死醫者云打撲傷損自屬外科欲申明又恐後時參差不測再視之微覺有氣忽憶藥篋中有蘇合

入醫學綱目卷三

甲

香丸急取半兩於火上焙去腦麝用酒半升研化灌之至三更方呻吟五更下惡血數升調理數日方瘥

仲景不分表裏先利之

**聖**治馬墜及一切筋骨損傷

大黃一兩切湯浸或半兩

緋帛

亂髮如雞子大燒灰

敗蒲席三

久用炊單布尺燒灰

桃仁四十九去皮

甘草如中指節灸到

右七味以童子小便量多少煎湯或內酒一大盞次下大黃去查分溫三服先剉敗蒲席半領煎湯浴以衣被覆斯須通利數行通後立瘥利後浴水亦勿怪即瘀血也

傷損食後青腫

**聖**治搥撲損肌膚青腫用茄子種通黃極大者切作片如

痕

一指厚新瓦上焙乾為末欲臥酒調二錢七一夜消盡無

**本**療因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合蜜垂二十一  
枚煨過同搗篩每用溫酒和散方寸匕服血當化爲水下  
**丹**治被打瘀血在骨節下出者生鐵一斤酒五升煎取一  
升飲之後附

**本**治從高墜下墜損惡血在骨節間疼痛芸臺散

荆芥

藕節各二兩 芸臺子

川芒硝

馬齒莧各一兩

右爲細末用蘇木半兩酒一大盞煎至七分調下二錢  
服之不拘時服

**五**盛官人因上山惡血瘀入內損傷食少脈弦此須用活  
血和氣

川芎三錢

青皮二錢

芍藥

滑石各一錢

牡丹皮五分

炙甘草錢

桃仁七枚

入醫學綱目卷十

三

右作一貼服之

禁忌  
針灸

凡傷切不可飲冷水血見寒則凝但一系血入心卽死

**素**人有所墜壅惡血留內腹中滿脹不得前後先飲利藥

此上傷厥陰之脈下傷少陰之絡刺足內踝之下然骨之

前血脈出血刺足跗上動脈不已刺三毛上各一痛見血

則已左刺右右刺左善悲驚不樂刺如右方經刺

**靈**身有所傷血出多及中風寒若有所墜墮四肢懈墮不

收名曰體惰取小腹臍下三結交者陽明太陰也臍下三

寸關元也寒熱篇○三結交者卽關元穴是也

**脈**從高撲損內有血腹脹滿其脈堅強者生小弱者死

金瘡

**本**治金瘡止血除疼痛辟風續筋骨生肌肉地黃散

地黃苗

地崧

青蒿

蒼耳苗

雜方

診

生艾汁

赤芍藥

各五兩入水煎取汁

右五月五七月七日午時修合以前藥汁拌石灰陰乾入黃丹三兩更杵爲細末凡有金瘡傷折出血用藥包封不可動十日瘥不腫不膿

治金瘡風化石灰菲葉嫩者同搗入鵝血調和成餅乘風陰乾爲末傳上無鵝血亦得治金瘡血不止用半夏石灰

鬱金三物爲末搽上傷處卽住  
療金鎗刀斧傷破血以石灰一升石榴花半斤搗取末少許捺少時血斷便瘥

末藥散刀箭藥止血住痛

定粉

風化灰

各一枯礬

三錢另研

乳香

五分另研

沒藥

一字另研

右件各研爲細末同和勻再研搽之

入醫學綱目卷十

聖

刀斧傷石灰包之痛止血住

龍勝金方治刀斧傷止血生肌蚕蛾散晚蚕蛾爲末搽勻絹帛裹隨手瘡合血止一切金瘡亦治一法用生晚蚕蛾石灰二味同搗成餅陰乾爲末傳之

治金瘡止痛劉寄奴散

劉寄奴一味爲末散搽金瘡口裏昔宋高祖劉裕微時伐荻見大蛇長數丈射之傷明日復至聞有杵臼聲往覘之見青衿童子數人於臼中搗藥問其故答曰我王爲劉寄奴所射合藥傅之帝曰神何不殺之答曰寄奴王者不死不可殺帝叱之皆散收藥而去每遇金瘡傅之効寄奴高祖小字也此藥非止治金瘡治湯火瘡大妙經驗方云劉寄奴爲末先以糯米漿雞翎掃着傷處後搽藥末在上並不痛亦無痕大凡湯火傷急用鹽水

洗之護肉不壞

**世**治金瘡打撲損傷用葦黃草研細入鹽少許罨之愈  
金瘡血出不止按小薊葉封之 金瘡止血杖覆盆花苗

傳瘡立止

梅師方

**本**治金瘡血不止兼痛用血竭末傅立止

**補**治惡瘡金瘡刀斧傷見血方以好降真香為末貼之入  
水並無傷痕絕妙

方見華陀中藏

治刀箭傷出血不止并骨折

檳榔

一箇

木香

各三錢

右為末傳瘡口血立止又可接骨

瘡大者  
張華

**留**金瘡方王不留行散主之

王不留行

八日採

薊菜

十日採

桑根

用白皮振打東南

甘草

各十

黃芩

分

川椒

閉口者出汗

乾姜

芍藥

入醫學綱目卷三

厚朴

各二

望

右九味桑根皮以上三味燒灰存性勿令過各別研杵  
篩合治為散服方寸匕小瘡即粉之大瘡但服之產後  
亦可服如風寒桑東南根勿取之前三物皆陰乾百日  
用

**廣**金瘡血不止痛白芍藥一兩黎令黃杵細為散酒後米  
飲下二錢並得初三服漸知

**治**金瘡出血肉癢蟬蟬二枚燒烟盡以水調服方寸七  
令一日服盡當下如水血消 金瘡腸出欲入之磁石滑

石各三兩為細末白米飲送下方寸七日再用

方遺

仲景問曰寸口脈微而瀋法當亡血若汗出設不汗者云  
何答曰若身有瘡被刀斧所傷亡血故也

診

**脈**金瘡血出太多其脈虛細者生數實者死 金瘡在陰

處出血不絕陰脈不能至陽者死接陽而復出者生  
瘡出血脈沉小者生浮大者死 斫瘡出血一二石脈來  
大者二十日死 斫刺俱有病多少血出不自止斷者其  
脈止脈來大者七日死滑細者生

杖瘡

汚血服藥

鬼代丹治打着不痛

無名異 研 沒藥 研

乳香 研

地龍 土去

自然銅 醋 碎 木鱉子 去殼 研 等分

右為末煉密丸如彈子大溫酒下一丸打不痛

乳香散治杖瘡神効

自然銅 半兩 醋 碎 七次

乳香 三錢

沒藥 三錢

茴香 四錢 當歸 半兩

右為細末每服五錢溫酒調下

醫學綱目卷三

雷

敷貼

雞鳴散下杖痛腹中惡血甚好方見癰  
五黃散治杖疼定痛

黃丹

黃連

黃芩

黃栢

大黃

乳香 已上各 等分

右為細末新水調成膏用緋絹帛上攤貼

沒藥散治杖瘡止痛令瘡不移

蜜陀僧

沒藥

乳香 各一兩

乾胭脂 半兩

膩粉 半兩

右細末次入龍腦少許若多更妙燒葱與羊骨髓生用  
同研如泥攤在緋帛上貼之

杖瘡痛用黃栢生地黃紫荆皮敷此皆要藥也只是血  
熱作痛用涼藥去瘀血為先須下雞鳴散之類  
見雞鳴散方

損條本草紫  
刺破宿血

又方用生地黃黃栢童便調傳或加葦汁 不破者以葦菜葱頭杵貼冷即易之膏藥用紫荆皮乳香沒藥生地黃大黃黃栢之類 又方用木耳盛於木杓內用沸湯浸爛攪水令乾於砂盆內搗細傳瘡上 又方用大黃黃栢爲末生地黃汁調傳如乾再傳 又方用野苧根嫩者不拘多少洗淨同鹽併插傳在瘡上神妙傷重多用鹽

**世**杖瘡丹用劉寄奴末六錢馬鞭草末四錢蜜調傳如濕者乾搽 馬鞭草即欒笏 帶此方甚妙

湯火瘡

初反治

**世**凡湯火傷急向火灸雖極痛強忍一時即不痛慎勿以冷物塌之及井底泥傳之使熱氣不出爛入肌肉  
**世**火燒以好酒洗之又以鹽傳其上如皮塌者以酒熬牛皮膠傳之 如湯傷以淋過第二次灰查傳立安 熱酒

入醫學綱目卷三十一

聖

傷糯米粉炒黑末酒調傳之 治湯火灼未成瘡者用艾白根燒灰雞子黃和傳之如成瘡用白蜜封之以竹中膜貼上日三

**世**治湯火瘡麩皮炒黑灰爲末傳上神妙此方有補性始終皆可用 治湯火瘡取舊烹銀爐中燒過焦黃土研細如粉以生姜調於帛上貼之痛止一方用溶銀鍋子細末油調傳佳

**世**治火瘡未起梔子仁燒灰麻油和封之厚乃佳已成瘡燒白糖灰粉傳之燥即瘥 用白糖 葛氏方

**世**保生救苦散治火燒熱油所損或至肌肉亦脫一切犬噬損傷并刀斧所傷用生寒水石不計多少爲極細末調塗之或乾上然不如油調其痛立止並不作膿無分毫腫苦楚日近完復永無破傷風症

中正治

**精**水霜散治火燒皮爛大痛

寒水石生 牡礪燒

朴硝

青黛

輕粉各等分

右爲細末新水或小油調塗立止

治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂

寒水石

大黃各等分

右爲末以新汲水調塗傷處

**丹**治火燒

桐油

水銀各等分

右二件以柳條不住手攪成膏再入大黃末石膏末和以牛皮膠入少水溶開外用貓兒肚底毛細剪搽上貼之

羅綠白散治湯燙火燒疼痛用苦參不拘多少爲細末每用以小油調搽

**精**凡被湯熱油痛不可忍取廁下黑淤泥量傷大小斟酌多少次以老姜汁麻油十分之一共研令勻搽傷處立愈

**世**以青黛傳之妙

**世**治湯火瘡爛者以黃蜀葵花落者淨器收之入水些少待爛成水傳上神妙 熱油澆外痛以蜜傳之立安 梅師方

**本**治火瘡敗壞用雲母粉同生羊髓和塗之

**經**治湯火瘡至妙用劉寄奴爲末先以糯米漿雞翎掃傷處後搽藥末在上並不痛亦無痕大凡湯傷先用鹽末搽之護肉不壞然後傳藥 又方以榆白皮末猪脂油塗瘡

愈

**世**治火湯瘡先以酒洗次以楊梅樹皮爲末香油調傳

治湯火瘡用髮一束香油煎以髮盡爲度放冷搽患處驗

**精**治中熱油及火燒除外痛以丹參八兩細剉以水微調

取羊脂二斤煎三上三下以傳瘡上愈梅師方同 治湯火至聖膏用雞子黃十箇入銀石器內熬自然油調好粉傳之愈

### 竹木刺針入肉

雜方敷貼

**精**凡諸竹木刺入肉中不出以齧嚼研傳立出 又方用白茅根搗傳之立出 又方嚼牛膝根嚼之即出

**簡**治竹木刺扎入深不得出用烏羊糞搗爛水和糞於傷處厚傳之曾有庄僕腳心中刺不得出苦痛欲死以此藥黃昏傳之至四更其刺出遂安

**山**蘆葦刺入肉者細嚼栗子查盒傷處 木竹刺已出痛者螻蛄糞之妙

**簡**治針入肉不出用螻蛄腦子同硫黃研細調傳以紙花貼定如覺癢時其針自出

### 醫學綱目卷三

聖

**羅**神聖膏取針悞入皮膚用車脂不拘多少成膏攤紙上如錢許二日一換三五次其針自出 又取針悞入皮膚用烏鴉翎三五枚火炙焦黃色碾爲細末好醋調成膏子塗在瘡上紙蓋一二時針出效

**簡**治針入肉不出用雙仁杏仁搗爛以車脂調勻貼在瘡上其針自出

**世**治秀針刺足已出痛者用黃泥卷之

**簡**主小兒誤爲諸骨及魚骨刺入肉不出者水煑白梅肉研爛調象牙末厚傳骨刺處自軟

**圖**生象牙主諸物刺入肉刮取屑細研和水傳瘡上刺立出如咽中刺用水調飲之舊象梳屑尤佳

**孟**魚骨在肉中不出者嚼吳茱萸封之骨當爛出

**丹**破傷風血凝心針入肉游走三症如神方用烏鴉翎燒

內服方

灰存性研細調一錢服

箭頭入肉

雜方

精治箭鏃入骨不可拔者

巴菝去壳微熬 蜈螂

并研勻塗所傷處須臾痛定又微痒忍之待極痒不可  
忍便撼動箭鏃拔之立出經驗方同

出箭頭方

蜈螂不拘多用少全用麝香

右為極細末撥動箭頭擦藥瘡口內

羅踴鐵膏取箭頭一切針刺入肉盡皆治之

鼯鼠頭一個或用入油汁內熬 螻蛄九枚 芫青兩一

土消虫什 巴菝 馬肉內蛆乾焙 信

黃蛆乾焙 夏枯草 礪砂 磁石

入醫學綱目卷三 哭

黃丹 地骨皮 蘇木 蜈螂各一兩

石腦油三兩 蒿柴灰汁三升

右將石腦油蒿柴灰汁文武火熬成膏次下地骨皮等  
末令勻磁器內收臨時用量瘡勢大小點藥良久箭頭  
自湧出

萬全神應丹出箭頭魚骨針麥芒等遠近皆治之

葇荂科即天仙子苗也

於端午日前一日持不語戒遍尋上項科見即取酌中一  
科根枝葉實全者口道先生爾卻在這裏道罷用柴灰自  
東南為頭圍了用木篋子撮起周廻土次日端午日日未  
出時依前持不語用木撮只一撮取出水洗淨不令婦人  
雞犬見淨室中石臼內搗為泥丸如彈子大以黃丹為衣  
以紙袋封懸在高處陰乾若有着箭不能出者以緋絹袋

盛此藥一九放臍中用綿裹肚繫定先用象牙末貼瘡上  
後用此藥若箭瘡口生合用刀子微刮開以象牙末貼之  
隨出陝西行省出軍曾用有効

孫真人治箭鏃在咽喉胸膈及針刺不出方以螻蛄搗  
取汁滴上三五度箭頭自出

本療鏃不出搗瓜萋根傳瘡日三易自出

李渤治箭鏃不出及惡刺以齒寔和鶴虱傳之

毒箭有二種交廣夷俚用焦銅作箭此一種纔傷及便  
悶膿沸爛而死若中之用飲尿汁并以傳之亦可惟此最  
妙又有一種用射商以塗箭鏃入中之亦困若着寬處不  
死近腹亦宜急治今葛氏方治射商者是葛氏方用藍汁  
大豔雀羊血解

### 漆瘡方

不醫學編卷三

一

雜方

療漆瘡方用湯浸芒硝冷洗之又礬石亦可

漆瘡通身面目腫者亦治苦菜五月五日採曝乾食療

云生食亦可漢椒湯洗之妙 生姜真汁傳亦可芙蓉煨  
本草有

治漆瘡用生紫蘇摩擦之累効 又方用人乳汁傳之

妙

治漆瘡取荷葉乾者一斤水一斗煮取二升洗瘡上日

再卽瘡

漆瘡無名異水調傳

通治諸般惡虫蛇咬 毒蛇咬 蜈蚣咬 蠓咬

咬 蝎咬 蜂螫 斑蜘蛛咬 刺毛蝨 刺蝟 蝨 蝨 咬

羅聖惠治蛇咬蝎螫蚕咬妙

雄黃錢

信錢

皂角子

巴荳各四十  
九粒

耳塞

麝香各少  
許

表裏  
勿吹用  
藥數部

右五月五日不聞雞犬婦人處不語搗爲細末在杏子核內封之針挑出上痛處大有神効

**世**治一切蛇虫傷貝丹末酒調服効詳見蛇見

**聖**治惡虫咬以酥和鹽傳之瘡

**山**諸般惡虫咬以油浸紫草塗之

**丹**治蛇咬蚕咬惡虫咬猪膏搗汁傳陳藏器治狗咬

**湯**治蝎蜘蛛蛇毒雞卵輕敲一小孔合咬處即瘥

**藥**治毒蛇并射工沙虱等傷眼黑口噤手脚強直毒攻腹內成塊逡巡不救用蒼耳嫩葉一握研取汁溫酒和灌之

將滓厚卷所傷處

**酒**治毒蛇射工沙虱等物傷着人眼黑口噤手足強直毒氣入腹

白礬 甘草分

醫學綱目卷三 半

右爲細末每服二錢冷水調下

毒蛇咬

**初傷解** 治毒蛇傷急以小便洗出血次取口中唾塗之又以牙

近封傷處傳而護之甚妙且不痛腫山君云用大糞傳患處亦佳

**世**路行卒被蛇咬當急扯裏脚帶扎縛傷處上下寸許使

毒氣不能悞傷肌體又急用白礬安刀頭火上滾汁沸滴

於傷處待冷以長篋子速挑去靨則毒血隨出黯腫尚未

退更滴之以退爲度 村居山僻及途中夜行卒被蛇傷

咬難求白礬處速作艾炷灸五壯以唾調鹽塗之如黯腫

尚未消釋當更灸更搽毒涎自然流出且不透裏傷人驗

**世**治一切毒蛇咬用透明雄黃研細末以醇酒濃調厚搽

傷處水流如涎痛腫即消一方以蒿苣汁和雄黃末作

毒入腹者服藥

雄黃白芷為蛇傷要藥

餅子候乾為末每用少許貼瘡口立効

有人被毒蛇所傷已昏困有老僧以酒調藥二錢灌之遂甦及以藥滓塗患處良久復灌二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩同為末止此耳後有中毒者用之無不効驗

世治毒蛇所傷

細辛錢五 香白芷錢五 雄黃錢

右為末加麝香少許每服二錢溫酒調服効

雜方

治一切蛇咬用香白芷嚼碎傳患處又用溫酒調服効

治一切蛇虫所傷用貝母為末酒調令病人盡量飲之頃久酒自傷處為水流出血盡却以藥滓傳瘡上即愈治蛇咬腫毒悶欲死者用重臺六分續隨子六顆去皮同為細末以酒服方寸匕又以唾調少許傳患處立安崔氏海

醫學綱目卷三

五

方 又方用白礬二錢服之防毒氣攻心 又方金線重樓以水磨少許傳咬處又為細末酒服之 又方用柏樹葉魚腥草地松節皺面草草决明共一處研細傳傷處極佳

海 治蛇虺咬人以獨頭蒜酸漿草搗汁傳咬處佳

海 治蛇咬男子陰毛口含二十莖嚙其津毒不入腹

世 治諸般蛇咬此傳之於擒蛇者藥味不全亦可

大青 小青 青木香 烏柏葉

火炊草 山藤菴 過山龍 地蜈蚣

天門冬 白芍藥 香薷

右細末用白木香研細生白酒調服查瘡咬處累効

治蛇咬毒食茱萸一兩為細末冷水調分為三服立瘥

治蛇毒吃菘蔞草根灰取以封之其草即野茭白是也

廣濟 蛇咬作瘡暖酒浸日三次廣利 蛇入人口并七

孔中者割猪母尾頭瀝血着口中并孔口上即出

治因熱取涼睡有蛇入口中挽不出者用刀破蛇尾內生椒二三粒裹着即出

禁忌 治卒為蛇繞不解以熱湯淋之無湯令人尿之 蛇咬忌食酸物梅子犯之大痛

蜈蚣咬

雜方

治蜈蚣咬生雞血傳上立愈累効一男子為蜈蚣入咽喉中咬之垂死之際一醫令殺生雞血乘熱灌喉中蜈蚣即出而愈實良方也 又方用雞糞塗之 又方治蜈蚣

諸毒虫傷麻油點燈於瘡口上對口薰之登時愈 又法

大油紙燃燒燈吹滅以餘烟焯之 治蜈蚣咬竹葉清研

汁傳之立愈 又方用南星磨汁傳之累効

入醫學綱目卷十

至

治蜈蚣咬痛不止獨頭蒜磨螫處立愈

治蜈蚣咬方用蝸牛擣取汁滴入咬處

蜈蚣咬取蜘蛛一枚安咬處當自飲毒如蜘蛛死而痛未止更易生者

未止更易生者

蜈蚣咬嚼鹽傳其傷處次以鹽湯洗之梅師 蜈蚣咬

頭始塞之不痛則痒 治蜈蚣咬及諸虫咬毒先用鞋底

上擦之用大蒜小蒜桑葉罨傷處如無用油歧盪傷處或

藍靛塗罨之亦効 治蜈蚣毒虫咬用桑枝汁同鹽擦痛

處或溶黃蠟滴患處肉黑為度 又方用皂角於咬處上

用艾炙熱去之効

蠶咬

雜方

治蠶咬成瘡初如粟漸大如荳如火燒泡大痛者速以草茶細末生油調傳瘡上立止甚妙又方猪膏搗汁傳之草茶即茶苞

也 治雨點蠖蝮瘡用百合搗爛入鹽少許傳之効

治蠖蝮尿人影着便令人病瘡如粟粒壘壘痛似刺虫所螫惡寒壯熱用犀角磨汁塗之則愈

世 蠖蝮虫又名八脚虫隱壁間以尿射人遍身生瘡如湯火傷用烏雞翎毛燒灰雞子白塗之 治小兒蠖蝮咬遠腹匝卽死用梨葉研爛傳之

食 蠖蝮尿瘡鹽三升水一斗煮取六升以綿浸湯淹瘡上

蝮咬蜂螫

雜方 羅雄黃消毒膏治蝮螫不可忍

雄黃 信各半 巴豆三 白礬兩

右爲細末黃蠟半兩溶開入藥攪勻爲錠子如棗子大用時將錠子簽於燈焰上炙開滴於螫着處其痛立止  
一上散治蝮螫痛

入醫學綱目卷三 五

半夏 一字生用 雄黃另研 巴豆一个去皮 爲細末 研如泥

右三味同研和勻上之 治蝮毒用溶化白礬乘熱滴

傷處痛止毒出

麝 治蝮螫人研蜘蛛汁傳之瘥

山 蝮螫苦黃汁塗之

世 治蝮螫地磨生姜塗之 又方南星米醋調擦之

外 治蜂螫薄荷貼之瘥 又方蜂蝮螫人用人參嚼以封

之

聖 治蜂螫人以酥傳之愈

班蜘蛛咬

雜方

張薦昔在劍南爲張延賞判官忽被班蜘蛛咬項上一宿咬處有二道赤色細如筋繞項上從胃前至心經二宿頭面腫疼如數升益大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出

家財五百千弁薦家財五百千募能療者忍一人應召云可治張相初不甚信欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍汁一甕碗取蜘蛛投入藍汁良久方出甚困不能動又別搗藍汁復加麝香雄黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化爲水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日內悉愈但咬處作小瘡痂落如舊

**蜘蛛咬遍身成瘡用青葱葉一莖小頭作一孔盛蚯蚓一條捏兩頭不令透氣搖動化爲水點咬處瘡**

**蜘蛛咬處嚼韭白傳之**

**蜘蛛等諸般虫咬用葛粉生姜汁調傳**

**蜘蛛咬唾和山荳根末塗之狗咬毗蟬瘡蛇咬並水研**

**山荳根傳之**蜘蛛咬處嚼即蟬又方蜘蛛咬一身生絲竿

乳一件飲之

入醫學綱目卷十

孟

沈存中秦皮一味治天蛇毒此瘡似癩而非癩也天蛇卽草間黃花蜘蛛人被其螫仍爲露所濡乃成此疾以秦皮煮汁一斗飲之瘡

刺毛虫虫虱蝟蝮蝮咬

雜方

**春夏月樹下墻塹間有一等雜色毛虫極毒凡人觸着**

者則放毛入人手足上自皮至肉自肉至骨其初皮肉微痒以漸至痛經數日痒在外而痛在內用手抓搔或痒或痛必致骨肉皆爛有性命之憂此名中射工毒諸藥不効用好荳豉約一碗清油半盞拌豉搗爛厚傅痛痒處經一時久鼓氣透骨則引出虫毛紛紛可見取下荳豉埋在上中煎香白芷湯洗痛處如肉已爛用海螵蛸卽烏賊魚骨爲末傳之愈一方取蒲公英根莖白汁傳之立瘡

又方用鍋底黃土爲末以酸醋捏成團於痒痛處搓轉其

毛皆出在土上痛痒立止神効無比黃土即代龍肝也 治蝨蟻

吹用老茶葉細末調傳  
丹治蝨蛭咬如大風狀眉鬚皆落夜則蝨蛭鳴於身上膿作鹽湯浸數次安傳信

愈 昔有病腹大夜聞蝨蛭鳴於身有人教用鹽水浸之而

聖治螻蛄咬用槲葉燒灰細研以泔水浸槲葉取洗瘡拭之納少許灰於瘡中 又方治螻蛄咬人用石灰醋和塗之

丹 蚕咬人用麝香研蜜調傳廣濟方

山 居蚕咬用苧汁塗之

馬虎熊咬人 犬咬 癩犬咬 驢涎馬汗瘡 附猪馬畜瘡

入醫學綱目卷五 疔

雜方

山 馬咬細嚼栗子傳傷處

聖治馬咬毒入心馬齒莧湯食之瘰

世治虎咬用野生菜搗爛塞所傷孔中滿不必換自然新肉長出而愈曾有人被咬已死用此方治之

丹 熊虎傷毒痛灸生鉄令有味以洗之世 虎傷人瘡取青布緊捲燒一頭內竹筒中射瘡口令烟薰入瘡口中佳

梅師方

世 虎傷人瘡用莠子葉杵細塗之按本草莠子葉即猪音莠能治虎犬咬傷

丹 熊傷人燒青布薰瘡中毒出仍灸葛根濃汁以洗之日

十次并搗葛根為散煮葛根汁方寸七日五服瘡

世 鼠咬用猫兒毛燒灰傳之立愈

鼠咬用麝香傳包之經

人咬傷用龜板或鷺甲燒為灰末以香油調傳

犬咬

雜方

犬咬人尿傳之 犬咬人以頭垢傳傷處又用熱牛糞

塗於外衛

犬傷人用杏仁量所傷大小嚼爛沃破處以帛繫定立瘥

世治犬咬用杏仁去皮尖同馬蘭根研細先以葱湯洗後以此藥塗傷處効 治犬咬傷用草麻子五十粒去殼以

井水研成膏先以鹽水洗咬處次以此膏敷貼一方用虎骨屑傳之 治犬咬人不要洗用紅炭火以物擊細待冷

取塗咬處即愈 治犬咬用黃荊葉搗糝瘡上即安 又方灸生姜乘熱擦之尤妙

狗咬用紫蘇葉口嚼碎塗之 犬咬破傷風腫以人參於桑柴火上燒成灰末傳之安

入醫學綱目卷三

五

羅 蟬花散治夏月犬傷及諸般損傷蝨虫極盛臭惡不可近者

蛇退皮一兩火燒存性

蟬殼半兩

青黛半兩

細辛二分

右為細末每服三錢酒調下如六畜損傷成瘡用酒灌下如犬咬傷用醇子和喫蛆皆化為水蠅子不敢再落又以寒水石末乾摻上

癩犬咬

表裡治法

羅 定風散治風犬咬先口噙漿水洗淨用綿拭乾貼藥更不再發大有神効

天南星生 防風各等分

右為細末乾上更不再發無膿効不可具述

治犬咬梔子皮燒灰石硫磺等分研細傳瘡方梅師

**世**治風狗咬用桃核殼半箇將野人乾糞填滿以榆皮蓋定畚於傷處又用艾於桃核上灸十四壯卽愈永不復發  
或用野犬糞  
如前法灸之

**世**風狗咬卽用犬糞塗仍拔去頂上紅髮

**世**癩狗咬方用斑貓七枚去頭足翅以糯米少許於新瓦上同炒以米黃香爲度去米不用以斑貓研碎好酒調下能飲人再進酒一盃傷在上食後服在下空腹服當日必有毒物從小便出如小狗狀如未下次日再進亦不下又進以毒物出爲度若進至七服雖不下毒亦不妨矣服藥後腹中必不安小便莖中刺痛者不必慮此毒受攻將下耳痛甚者以蕪青一匙煎甘草湯送下卽止如無蕪青青黛亦可疾愈後急以香白芷多雄黃少許爲末搗韭根自然汁湯酒調下去斑貓毒以水淨嗽口嚼生葱白畚傷處

留小窠子出毒氣不可用他草藥畚忌犬猪羊及發風毒物小兒量歲數加減斑貓食癩狗肉致病者治同卽愈或過二三年再發治如前 治癩狗所傷用斑貓二十一箇去頭翅并足用糯米一勻先將七箇入米內微火炒不令米赤去此斑貓別用七箇再於前米內炒令斑貓色變復去之又別用七箇如前法炒以米出青烟爲度去斑貓不用以米研爲粉用冷水入清油少許空心調服頃又再進一服以小便利下惡物爲度如不利再進一服利後腹肚疼痛急用冷水調青靛服之以解其毒否則有傷或煎黃連水亦可不宜便食熱物或以益元散水調服尤妙

**世**風狗咬取小兒胎髮炒香傳野菊花研細酒調服盡醉  
止效

**世**治癩犬所傷或經久復發無藥可療者用之極驗

雄黃色極明者五錢

麝香五分

右研勻用酒調二錢服如不肯服者則燃其鼻而灌之服藥後必使得睡切勿驚起任其自醒候利下惡物再進前藥則見効矣

**附** 痴犬咬人搗地黃汁飲之并塗瘡口愈 又方煑地榆汁飲之兼細末傳瘡上服方寸七日三忌酒若瘡瘻者搗生韭汁飲一二升後梅師用 風犬咬後毒發如狗叫聲於化人壇拾頭頂骨燒末傳之 風狗咬毒發如狗叫者百方不治以人骨燒末之水下方寸七雖煩亂者亦治梅師

驢涎馬汗瘡

**附** 驢涎馬汗入瘡腫漸甚可急治之遲則毒深不治以生烏頭末傳瘡口上良久黃水出立安

**世** 治驢涎馬汗入瘡用蓬志去心為末酒調塗 又方用

入醫學綱目卷十

庚

冬瓜青皮陰乾為末貼瘡上 又方馬汗入肉毒氣引入如紅線者急用烏梅肉嚼爛塗瘡上 一方用烏梅和核爛研用好醋和成膏先將瘡口針破出盡紫紅血拭乾傳上以帛縛定 王氏治驢涎馬汗毒所傷白礬飛過黃丹炒令紫色各等分相裹合以貼患處

附猪馬畜瘡

**附** 治猪畜瘡猪痒方

蛇床子

剪草

白礬

苦參

巴莖末

加羯羊糞桐油和傳之陶氏

**附** 馬老鼠瘡二方其瘡未詳

雜方

黃芪半一兩 甘草七錢 黃芩酒炒半兩 黃連生用一兩

黃栢酒七錢 連翹七錢 蒼朮 當歸稍

升麻各一兩 麻黃根八錢 防風二錢 澤瀉七錢

羌活 藁本各三錢

右為細末水二大碗煎至一碗冷灌之神効

馬老鼠出足陽明太陰經分野大渴小便多章墮

升麻二錢 葛根一錢 連翹二錢 當歸身一錢

甘草灸一錢 蒼朮半錢 黃栢半錢 黃芪一錢

紅花諺 黃連五分 杏仁伍分 黃芪二錢

生地一錢 琥珀三分 麻黃冬月加五分 猪苓

柴胡半錢 白茯苓一錢 澤瀉

右為細末每服半兩水二碗煎至一碗冷灌之



杭州圖書館