

Richard L. Thomas

1887

L. 78.18

115

Picasso



PHARMACOPŒA
GENERALIS

EDITA


A

D. JACOBO REINBOLDO

SPIELMANN.

EDITIO PRIMA VENETA.

TOMUS PRIMUS.



V E N E T I I S,

Sumptibus JOANNIS ANTONII PEZZANA.

M D C C L X X V I.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.



P R Æ F A T I O .

Sisto opus, de cujus argumento me aliquid unquam typis evulgaturum esse, ne per somnum quidem cogitassem. Nimiis Medicamentorum collectionibus nos esse obrutos & do-
lui semper & adhuc doleo. Enimvero casu excitatus, ut præci-
puos qui prostrant Rei medicamentariæ Indices curatius rimarer,
non inutilem prorsus operam navaturus mihi videbar, si quæ ho-
die in usu sunt medicamenta exacte & dilucide recenserem. *Dis-*
pensatoria certe & *Pharmacopœas*, quæ extant, ejusmodi laborem
flagitare, nemini dubium videri poterit, qui quidem perpenderit,
vel certis ea tantum regionibus aut civitatibus esse accomodata,
vel insignibus, quibus recentior Medicina splendet, incrementis
minus quam par est respondere, vel descriptiones etiam Præpara-
tionum continere hiulcas, mancas, imo plane falsas.

E re præterea Medicorum esse, quis non videt? Syllabum pro-
stare, unde Medici, quorumcumque locorum titulos deligant,
quos in Officinis asservandos præscribant; quousque Rerumpubli-
carum Administratores de salute civium solliciti sua auctoritate
comprobent ac Pharmaceuticæ penus normam esse jubeant: quod
quidem si fiet, non amplius integra edentur volumina, quoties
civitatum Antistites Rei Medicamentariæ curam agere instituerint;
una aut altera pagella exhibebit indicem omnium medicamento-
rum, quæ in Pharmacopoliis urbis aut regionis præstari jubentur.

Equidem me multa, quæ hodiernus usus nequaquam desiderat,
quin inconcinnas etiam compositiones, huic Medicamentorum Ca-
talogo inseruisse lubentissime fateor; sed hæc cavere non potui in
opere non Medicis modo exquisite rationalibus, sed illis quoque
dicato, qui vel auctoritatibus, vel præjudicatis opinionibus aliisve
rationibus ducti a Præceptoribus Auctoribusque accepta remedia
missa facere nolunt. Quin imo vulgi quoque desideriiis satisfacien-
dum esse duxi, qui crebro non tam a Medicis præscripta Medica-
menta, quam quæ cæcus rumor utcunque probaverit, ex Pharma-
copoliis petere soleat.

Multa interim in hoc opere desiderabuntur remedia, in Practi-
corum libris commendata, qui vel adhuc dum in plurium mani-
bus versantur; multa quæ in formulis a majoribus ad nos trans-
missis præscribuntur; quæ tamen cum de die in diem remissius
expetantur, omittere non dubitavi. Nec inanem spem esse du-
cam, fore ut illi quoque, qui Artis nostræ principiis non sunt

imbuti, experientia magistra perspecturi sint olim, quæ habemus recentiora, viribus non modo paria, sed utique superiora veteranis istis esse. Si qui vero sunt, quos tristes hæ Medicinæ rudioris reliquæ delectent, illis HORSTII *Pharmacopœa Galeno-Chemica Catholica* Francofurt. 1651. fol. JUNGKEN *Corpus Pharmaceutico-Chymico-Medicum* Francof. 1697. 4°. & *Pharmacopœa Schræderiana* editio Germanica Norimb. 1746. & 1748. fol. abunde satisfacient.

Descriptiones Simplicium non ex libris desumsi, sed ad ipsa specimina concinnavi: in quo cum unice meis sensibus fiderim; characteres, quos trado, ab illis, qui vulgo exhibentur, non raro recedunt. Præparationum nullam admisi, cujus parandi ratio non ipsi mihi experto esset probata.

Simplicium, unde medicamenta desumimus, titulos *Linneanos* adhibui, ut altius progressuri habeant, ubi quicquid ad eorum historiam pertinet invenire possint. Vegetabilium icones ex opere *Blackwelliano*, quod in omnibus manibus esse vellem, citavi (*). Plures imo etiam quandoque meliores potuissim adducere; nisi id consilium a scopo libri Lectoribus dicati, quorum longe plurimi sumtuosas librorum collectiones facere nequeunt, alienum esse duxissem. Exoticorum, quæ in Horto nostro Academico asservantur, culturam adjeci.

Libræ voce cum vage admodum soleant uti; per totum opus non sum usus, sed ejus valorem Unciis expressi.

Consultum imo necessarium etiam duxi, in libro *Pharmacopœorum* artem continente, medicamentorum vires summatim indicare, generosiorum quoque doses determinare. Licet enim prudentissime legibus cautum sit, ne Praxi Medicæ se immisceant *Pharmacopœæ*; nunquam tamen obtinebitur, quin in casibus, qui leviores esse videntur, illorum opera expectatur; *Medicastro*rum præterea pestis in diem latius serpens Formulas quoque morbo curando contrarias imo deleterias in diem gignat. Ipsi quoque Medici interdum aliquid humani pati festinantique eorum calamo errores elabi possunt; itaque ne *Officinæ* sanitatis morborum imo mortis materiam subministrant; medicamentorum effectus nosse omnino *Pharmacopœum* oportet, in promptu habere, quæ sanitati vacillanti succurrant; remedia, & sibi quoque cavere, ne sua saltem ex culpa victimarum, quæ *Medicastro*rum audacia letho immolat, augeatur numerus, & ipsos insuper *Artis* magistros, sicubi hallucinati sint, monere.

PP. Calendis Novembris MDCLXXXII.

(*) In hac nostra editione addidimus icones plantarum, & animalium, de quibus consulendus est index in initio primi voluminis.

SYLLABUS AUCTORUM.

- A**GRICOLA Georg. *De ortu & causis Subterraneorum*. VVitteberg. 1612. Utor editione *Libris de re Metallica*, Basil. 1657. fol. adjecta.]
Amstelodamensis Pharmacopœa. Amstelod. 1639. 12°.
- ANDERNACHUS Joh. Gunth. *De Medicina veteri & nova*. Basil. 1571. fol.
- ANDROMACHUS Archiater NERONIS apud GALENUM.
- APONENSIS Petrus obiit prioribus Seculi XIV. annis. *De venenis* 1473. 4°. Utor editione Venet. 1565. fol.
- ARBUTHNOT Carol. *Tabula antiquorum nummorum, mensurarum, ponderum &c.* per KOENIG Traject. ad Rhen. 1756. 4°.
- Argentoratensis Pharmacopœa* 1725. fol. revisa & ad usum modernum accommodata 1757. fol.
- AUBLET Fusée *Histoire des plantes de la Guiane Françoise*, Londres 1775. 4°.
- Augustana Pharmacopœa* 1601. fol. renovata & aucta prodiit 1684. fol.
- AUGUSTIS de Quiricus *Lumen Apothecariorum*, Venet. 1517. fol.
- AVICENNA Seculi XI. Auctor *Canon*. Venet. 1488. 4°. Utor editione Venet. 1582. fol.
- Austriaca Provincialis Pharmacopœa*, Viennæ 1774. 8°.
- BACHER apud RICHARD *Recueil d'Observations*,
- BARBETTE Paulus *Praxis* 1665. 8°. Cito *Opera* 1688. 4°.
- BARCHUSEN Joh. Conrad. *Pyrosophia* Lugd. Bat. 1695. 4°. Utor editione multum aucta sub titulo *Elementorum Chemia*, Lugd. Bat. 1718. 4° divulgate.
- BARTOLETTUS Fabric. *Encyclopedia Hermetico-Dogmatica*, Bononiæ 1619. 4°.
- Bateana Pharmacopœa* curante SHIPTON, Londin. 1688. 8°. Cito editionem Lovanii 1752. 8°. impressam.
- BEAUME' *Elemens de Pharmacie*, Paris 1767. 8°. Utor editione Parisiens. 1773. 8°. publicata.
- BAZINGHEN Abot de *Traité des Monnoies*, Paris 1764. 4°.
- BEGUINUS Joh. *Tyrocinium Chymicum*, Paris. 1608. 12°. Cito editionem a BLASIO adornatam, Amstel. 1669. 12°.
- BENEDICTUS Alexand. de *Re Medica*, Venet. 1535. fol.
- BERCKLEY Georg. *Siris or a chain of physical reflexions and inquiries concerning the virtues of Tharwater*, London 1744. 8°. Utor versione Gallica, Amstelodami 1745. 8°. edita.
- Bergamensis Pharmacopœa* 1581. fol.
- BERGIUS Peter Jonas *Materia Medica*, Stockh. 1778. 8°.
- Berolinenses* vid. *Dispensatorium Brandeburgicum*.
- BIERLING Casp. Theophil. *Adversariorum curiosorum Centuria*, Jenæ 1679. 4°.
- BIRCKMANN apud QUERCETANUM.
- BLACK in *Essais and Observations Physical and literary by a Society in Edinburgh*. Voll. II. 1756. 8°.
- BLACKVELL Elisabeth *Curious Herbal*, London 1739. fol. Cito versionem latinam & germanicam multum correctam & auctam, Norimberg. 1750 - 1773. 6. Voll. fol.
- BLECHHOLZ apud *Brunsvicenses*.
- BLONDEL in LEMERY *Pharmacopée Universelle*.
- BOECLERUS in *Pharmacopœa Argentoratensi*.
- BOERHAVE Hermann de *Materia Medica*, Lugd. Bat. 1719. 8°. Cito editionem L. B. 1721. 8°.

- BONTIUS Jacob. *Methodus medendi cum PISONE de rebus utriusque Indie*, Amstelod. 1658. fol.
- Brandenburgicum Dispensatorium*, Berol. 1698. fol. Cito editionem a FAGINO (BUCHNER) illustratam.
- BRASSAVOLA Antonius *Musa Examen omnium Catapotiorum & Pilularum*, Basil. 1543. 4°.
- Examen omnium Electuariorum, Pulverum & Confectionum*, Venet. 1548. 8°.
- Examen omnium Trochiscorum, Unguentorum, Ceratorum, Emplastrorum, Cataplasmatum & Collyriorum*, Venet. 1551. 8°.
- BRASSAVOLÆ *Examen omnium Linctuum, Pulverum, Aquarum, Oleorum*, Venet. 1553. 8°.
- De Medicamentis tam simplicibus, quam compositis Catharticis*, Tigur. 1555. 8°.
- Examen omnium Simplicium*, 1556. 12°.
- BROSSARD apud MORAND in *Memoires de l'Academie de Chirurgie* T. II.
- Brunsvicense Dispensatorium Pharmaceuticum* 1777. 4°.
- BUFFON COMES *Histoire naturelle générale & particuliere*, Paris 1749-1782. XXIX. Voll. 4°.
- BUSSIUS Georg. in HOFFMANN *Observat. Physico-Chymic.* & apud SCHELHAMMER de *Nitro*, Amstel. 1709. 8°.
- CADET in *Academ. Royale des Sciences*.
- CAMERARIUS apud *Wurtembergenses*.
- CELSUS Aulus Cornelius Seculo Augusto floruit. Ejus libri *de Re Medica*, Florentiæ 1478. fol. impressi, crebro recusati, optimi editi sunt a KRAUSE, Lips. 1766. 8°.
- CHARAS Moyse *Pharmacopée Royale Galenique & Chymique* Paris 1672. 8°. insigniter aucta, Lyon. 1753. 4°.
- CLAUDER Gabriel *Methodus balsamandi*, Jenæ 1684. 4°.
- CLAVE' *Cours de Chymie*, Paris 1646. 8°.
- CLOS DU apud LEMERY *Pharmacopée*.
- Coloniensis Pharmacopœa* per HOLZHEMIUM 1627. fol.
- CORDI Valerii *Dispensatorium*, Norimb. 1535. Utor editione, quæ prodiit Norimb. 1592. fol.
- CORNACHINUS Marc. Anton. *Methodus, qua omnes corporis humani affectiones curantur*, Florent. 1629. 4°.
- COSTÆUS Johanes in editione *Operum MESUE*.
- CRAANEN Theodor. apud GRÆBNER *Medicina vetus restituta*, 1695. 4°.
- CRATO de Krafftheim Johann. *Consiliorum & Epistolarum Medicinalium* Libri quinque, Francof. 1691-1693. 8°. Sextus & Septimus 1611. 8°. Auctor obiit an. 1585.
- CROLLII Olsvald *Basilica Chymica*, Francof. 1609. 4°.
- DAGUIN in LEMERY *Pharmacopée Universelle*.
- DAMOCRATES primo seculo floruit. Apud GALENUM.
- Danica Pharmacopœa*, Hafniæ 1772. 4°.
- DARELIUS apud VVALIBAUM.
- DECKER Friderici *Exercitationes practicae*, Lugd. Batavor. & Amstelod. 1673. 8°.
- DIGBY Renelmus *Recueil des Remedes & secrets tirés des Memoires du Chevalier DIGBY* par MALBEC, Paris 1699. 8°.
- DIOSCORIDES Pedacius Anazarbeus primo seculo floruit. Libri *de Materia Medica* latine, Colon. 1478. fol. Græce 1495. fuerunt impressi. Cito editionem SARACENI 1598. Francof. fol.
- DIPPEL Democriti Christiani *Krankheit und Arzney des menschlichen Lebens*, Frankfurt und Leipzig 1746. 8°. Latine prodierat Lugduni Batav. 1711. 8°.
- DORNCRELLIUS Tobias *Dispensatorium novum*, Ulyssip. 1600. 4°. Cito editionem, quæ Jenæ 1645. 8°. prodiit.

DOVER apud Edinburgenses.

DRESDENSES apud ZVVOELFFER.

DURIET apud VVALLBAUM.

ECHHOLD apud SCHROEDER.

Edinburgensis Collegii Medici Pharmacopœa 1722. 8°. Cito editiones 1736. & 1747. 8°.

EISENSCHMID Joh. Caspar de Ponderibus & Mensuris Veterum, Argent. 1737. 8°.

ELLER Joh. Theodor. *nützliche und auferfelene Anmerkungen von Krankheiten und Operationen, vvelche in Lazareth der Charité zu Berlin vorgefallen*, Berlin 1730. 8°.

EMMERICUS apud JUNCKEN.

FALCK N. D. *Treatise on the medical qualities of Mercury*, London 1776. 8°.

FALLOPII Gabriel Opera, Francof. ad Mœnum 1584. fol.

FERNELIUS Johann. *Universa Medicina*, Paris. 1554. fol. Cito Opera Parisiis 1638. 8°. publicata.

FIORAVENTI *Secreti razionali intorno alla Medicina, Chirurgia & Alchimia*, Venezia 1600. 8°.

Florentinum Antidotarium ex Italico sermone Latinum factum per CLUSIUM, Antverp. 1561. 8°.

FLORENZOLA in Pharmacopœa Augustana.

FOEUILLET in LEMERY Pharmacopœe.

FORDYCE on putrid and inflammatory Fevers, London 1773. 8°.

FORESTUS Peter Libri Curationum & Observationum Medicinalium, Lugd. Bat. 1591. 1606. 8°. Cito editionem Rothomag. 1653. fol.

FRACASTORIUS Hieronym. de Sympathia & Antipathia & de Contagione, Venet. 1546. 4°. Utor editione Genevæ 1671. 8°. divulgata.

FULLER Thomas Pharmacopœa extemporanea, London. 1705. 8°. Utor editione ibid. 1714. 12°. impressa.

Pharmacopœa domestica, London 1733. 12°.

FUNNIUS in Actis Societatis Harlemensis T. II.

GABRIEL Gabriel in Quaestione HIERONYMI BONIPERTI de Materia imminutione & de totius evacuanda Materie ratione, Patav. 1550. 4°.

GALENUS Claudius Seculi II. Auctor ex numerosissimis tractatibus huc pertinent;

De Alimentorum facultate, Paris. 1530. 4°.

De simplicium Medicamentorum Facultate, Paris. 1520. fol.

De Compositione Medicamentorum secundum loca, Parisiis 1530. fol.

De Compositione Medicamentorum secundum Genera, Paris. 1530. fol.

Euporista seu de Medicamentis facile parabilibus, Paris. 1530. 8°.

Succedanea sive Substituta, Paris. 1530. 8°.

De Theriaca, Paris. 1534. fol.

De Ptisana, Paris. 1536. 4°.

De Purgantium Medicamentorum facultate, Paris. 1544. 4°.

Antidotorum Libri, Thoruni 1607. 4°.

Hi Tractatus aliquoties seorsim, crebrius cum reliquis sub titulo Operum prodierunt. Utor eorum nona JUNTARUM editione, Venetiis 1623. fol.

GALLUS, qui Seculo I. floruisse videtur, apud GALENUM.

GARZONIUS in Antidotario Bonariensi.

GAUBIUS Hieronym. David. de Methodo concinnandi Formulas, Leidæ 1738. 8°. Cito editionem Lugd. Bat. 1752. 8°.

GEBER Seculi VIII. Auctor. Utor editione Operum, quæ Gedani 1682. 8°. prodiit.

GEOFFROY in Codice Parisiensi & in Tractatu de Materia Medica, Paris. 1741. 8°.

GLASER Christoph. *Traité de Chymie*, Paris 1667. 8°.

GLAUBER Joh. Rudolph. circa medium Seculi superioris cœpit Tractatus Chymicos ede-

- edere. Cito *Opera Chymica* idiomate Germanico impressa, Franckfurt am Mayn 1658. 4°. & *Continuationem* ibid. 1659. 4°.
- GMELIN in *Dispensatorio Wurttembergensi*.
- GOULARD *Oeuvres de Chirurgie*, Pezenas 1766. 12°. II. Voll.
- GRULING Philipp. *Florilegium Hippocraticum Galenico-Chymicum* 1665. 4°. Utor editione Lipsiæ 1680. 4°.
- GUALTERUS in *Codice Parisino*.
- GULDENKLEE Timæi Balthasar *Epistole & Consilia*.
- GUNDELSHEIMER in *Dispensatorio Wurttembergensi*.
- HALY Abbas sub finem Seculi X. vixit, *Regalis Dispositio*, Venet. 1492. fol. *Hamburgense Dispensatorium* per KALDE 1616. fol.
- HANCKENIUS apud VVALBAUM.
- HARTMANN Johannes *Praxis Chymiatrica a filiis edita*, Lips. 1633. 4°. Utor editione a MAURITIO HOFFMANN illustrata, Lips. 1728. 4°.
- HEISTER Laurent. *Chirurgia Germanice*, Norimb. 1718. 4°. Latine, Lugd. Bat. 1739. 4°. & in *Dispensatorio Brunsvicensi*.
- HELMONTIUS Joh. Baptist. van Anno 1644. obiit. *Opera*, Lugd. Bat. 1648. 4°. Cito editionem, quæ curante VALENTINI Hafniæ 1707. 4°. prodiit. *Helvetica Pharmacopœa*, Basil. 1771. fol.
- HELVETIUS *Traité des Maladies les plus fréquentes*. Paris 1724. 8°. Est editio tertia.
- HIÆRNE in notis Cl. MURRAY ad opus *Rosenianum*.
- HILDANUS Guilielm. Fabricius *Observationes Chirurgicae* 1598. edi cœptæ. Omnes collectæ occurrunt in *Operibus* a BEYERO editis, Francofurti ad Mœnum 1646. fol.
- HIPPOCRATES V. ante C. N. Seculo vixit, Utor ejus *Operibus* Græce & Latine per FOESIUM editis Francof. 1695. fol.
- HOFFMANN in JACOBI *Descriptiones methodi Mercurium Sublimatum Corrosivum sustius copiosiusque exhibendi*, Monast. VWestphal. 1772. 8°.
- HOFFMANN Friderici *Observationes Physico-Chymicae*, Halæ 1722. 4°. *Medicina Consultatoria*, Halæ 1721-1739. 4°. videatur POTERIUS.
- HOLLANDUS Isaac Seculi XV. Auctor. Ejus Scriptorum crebrius impressorum editione utor sub titulo *Bevvahrte Chymische Schrifften*, Viennæ 1746. 8°. impressa.
- HOMBERG in *Académie Royale des Sciences*.
- HUXHAM Johann. *Observationes Medicae & Chymicae de Antimonio*, *Operum Physico-Medicorum* a REICHELTE editorum Tomo tertio insertæ.
- JOUBERT Laurent *Pharmacopœa* per ZANGMEISTER, Lugd. 1579. 8°.
- ISENBURG Comes apud VVALBAUM.
- JUNCKEN Joh. Helft. *Corpus Pharmaceutico-Medicum*, Francof. 1697. 4°.
- KALDE videatur *Hamburgense Dispensatorium*.
- KHUNRAD Conrad *Medulla Destillatoria & Medica*, Lipsiæ 1549. 8°. Utor editione Hamburg. 1605. 4°.
- KIEFER in *Pharmacopœa Argentoratensi*.
- KLEIN Ludov. Godofred. *Selectus rationalis medicamentorum*, Lips. 1756. 8°.
- KORMANN apud SCHULZ in *Praelectionibus in Dispensatorium Brandenburgicum*.
- KUNCKEL Johann van Lœvenstern *Laboratorium Chymicum*, Hamburg. 1716. 8°. Utor editione 1738. 8°.
- KUNCKEL *Chymische Tractatlein* a BURGGRAVE editi, Frankf. und Leipzig 1724. 8°.
- LANFRANCUS *Practica*, quæ dicitur *Ars completa totius*, *Chirurgia*, Venet. 1490. fol.
- LANGELOT Joel in *Miscellaneorum Naturæ Curiosorum* Decade prima.
- LANGIUS Johannes *Epistola* Hanov. 1605. 8°. Auctor a. 1565. mortuus est.
- LEIBNITZ Godofr. VWilhelm. *Protogæa*, Gœtting. 1749. 4°.

- LEMERY Nicolas *Cours de Chymie*, Paris 1676. 8°. Utor editione notis BARON illustrata, Paris. 1756. 4°.
- Pharmacopée universelle*, Paris 1698. 4°.
- LENTILIUS Rosin. *Miscellanea Practica*, Ulmæ 1698. 4°.
- LEVVIS VWilliam *Materia Medica*, London 1761. 4°.
- LIBAVIUS Andreas *Syntagma Arcanorum Chymicorum*, Francof. 1611-1613. fol.
- Epistole Chymica*, Francof. 1595-1599. 8°.
- Singularia*, Francof. 1599-1601. 8°.
- LIGER *sur la Poudre des Chartreux* 1720. Hæc scheda inserta est Dissertationi MILLARS de explorata Kermes mineralis in medendo efficacia, Argent. 1752.
- LINNÆUS Carol. *Systema Nature*, Holmiæ 1766. 1768. III. T. 8°.
- LOBELIUS Matthias *Historia Stirpium*; Antvverp. 1676. fol.
- Londinensis Pharmacopœa* 1632. fol. In linguam Gallicam versa & eximie illustrata prodiit Paris. 1764. 4°. II. Voll. Utor editione Londinensi 1746. 8°.
- LOYVER Richard *Descriptio Decocti Avenacei* creberrime excusa. Cito editionem Germanicam Beuthen 1755. 8°, additionibus plurium Medicorum auctam.
- LUDOVICI Daniel *Pharmacina moderno seculo applicanda*. Utor *Operibus* a MICHAELI editis, Francof. ad Mœnum 1712. 4°.
- LUCE de in *Recueil Periodique* T. IV.
- LULLIUS Raymundus Seculo XIII. floruit. *Scripta Chymica*, ejus nomen præ se ferentia medio seculo XVI. fuerunt impressa. Utor eis, quas MANGETTUS *Bibliotheca Chymica* inseruit.
- MACBRIDE David *Experimental Essays*, London 1764. 8o. Cito editionem auctam, London 1767. 8°.
- MACQUER *Dictionnaire de Chymie*, Paris 1778. 4°. 3. Voll.
- MAETS Carol. Ludovic. *Chymia rationalis*, auctore P. T. Lugd. Bat. 1687. 4°.
- MAGNUS Auctor Seculi II. apud GALENUM.
- MANARDUS Johann. *Epistole*, Paris. 1528. 8°. Utor editione quæ Basileæ 1540. fol. prodiit.
- MANLIUS Johann Jacob. *Luminare majus*, Venet. 1496. fol. Cito editionem Venetam, 1553. fol.
- MASSARIAS Dominic. Vicent. *De ponderibus & mensuris*, Tigur. 1584. 8°.
- MATHIOLUS Petr. Andr. *Commentarii in Dioscoridem*, Venet. 1548. 4°. Italice. Utor editione *Operum* a CASPARE BAUHINO 1598. fol. publicata.
- MAYERNE *Medicamentorum formule*, Londin. 1640. fol. Recusæ cum operibus a BROVVN Londin. 1703. fol. editis.
- MEAD Richard *Mechanical account of Poisons*, London 1702. 8°. Cito *Opera*, Gœtting. 1748. 8°.
- MEYER Joh. Frider. *Chymische Versuche zur nachern Erkenntnis des ungeloeschten Kalks*, Hannover und Leipzig 1746. 8°.
- MESUE Damascenus Seculo XII. floruisse dicitur. *Libri de Re Medica*, Antvverpiæ 1479. sunt impressi. Utor *Operibus* a COSTÆO, Venet. 1589. fol. editis.
- MICHAEL Johann. *Opera Medico-Chirurgica*, Norimberg. 1688. 4°.
- MINDERER Raymund *Aloedarium Marocostinum*, August. Vindel. 1616. 8°.
- Medicina militaris, seu liber castrensis Euporista ac facile parabilia medicamenta continens*, Aug. Vind. 2621. 8°.
- MOEBIUS Godofred. apud HOFFMANN in *Clave Schræderiana*.
- MOEGLING apud ZELLER & VVEISSMANN in Dissertatione de *Docimasia, signis, causis & noxa Vini Lithargyrio mangonifati*, Tubing. 1707. 4°.
- MONTANUS Jos. Baptist. *Explicatio eorum, quæ pertinent tam ad qualitates simplicium medicamentorum, quam ad eorundem compositionem*, Venet. 1555. 8°.
- MOTAGNANA *Antidotarium*, Venet. 1565. fol.

- MORETTE du apud BAUME',
 MORT le Jacob. *Pharmacia Medico-Physica*, Lugd. Bat. 1684. 8°. & in MORLEY
Collectaneis Chymicis.
 MYNSICHT Adrianus van *Thesaurus & Armamentarium Medico-Chymicum*, Ham-
 burg. 1631. 4°. Utor editione Genev. 1697. 8°.
 MYREPSUS Nicolaus Seculi XIII. Auctor. Codex Græcus nunquam impressus est. Ver-
 tente FUCHSIO idiomate latino prodiit Basil. 1549. fol.
 NICOLAUS vid. PRÆPOSITUS & MYREPSUS.
Norimbergense Dispensatorium 1666. fol.
 ORIBASIIUS Seculo IV. floruit. Ejus scripta in linguam Latinam versa prodierunt Pa-
 ris. 1558. 8°. Utor eisdem *Medica artis Principibus* ab HENRICO STEPHANO,
 Parisiis 1567, fol. adjectis.
Palatinum Dispensatorium, Manhem. 1764. fol.
 PALMARIUS Jul. *de morbis contagiosis*, Lutet. Paris. 1578. 4°. Cito editionem Fran-
 cof. 1601. 8°.
 PARACELSIUS Philipp. Aureol. Theophrast. Bombast. ab Hohenheim verum nomen fuit
 HOCHENER; anno 1541. obiit. Opera idiomate Germanico prodierunt, edente
 HUSER, Basil. 1588-1590. X. Tomis; Latine autem, Francof. 1603. 4°. Utor
 editione Genevensi 1658. fol. 3 Voll.
Parisiensis Pharmacopœa anno 1637. primum prodiit. Cito editionem sua titulo
Codicis Medicamentarii a BOYERO publicatam Paris. 1758. 4°.
 PERARD apud BAUME'.
 PISO Guilhelm. *de India utriusque re naturali & medica*, Amstel. 1608. fol.
 PLENCK Joseph. Jacob. *Pharmacia Chirurgica*, Viennæ 1775. 8°.
 PLUMER in *Essais and Observations by the Society of Edinburgh*. 1732. 8°.
 POMET Pierre *Histoire générale des Drogues*, Paris 1694. fol. Utor editione Paris.
 1735. 5°. 2 Voll.
 PORTLANDIÆ COMES in CLEPHANE *Medical Observations and Inquiries* T. I.
 POTERII Petri. *Insignes Curationes & singulares Observationes* Venet. 1615. 8°. *Pharmacopœa Spagyrica nova & inaudita*, Bonon. 1622. 8°. Utor *Operibus curan-*
te FR. HOFFMANN editis, Francofurti ad Mœnum 1698. 4°.
 PRÆPOSITUS Nicolaus Alexandrinus Seculo XIV. vixit *Dispensatorium ad Aromaterios*;
 Venetiis 1471. fol. Cito editionem Lugd. 1505. 4°. *Pragensis Dispensatorium*, Vetro-Pragæ 1739. fol.
 PRINGLE John *Observations on the diseases of the Army*, London 1764. 8°. Est edi-
 tio quarta.
 PYTHAGORAS sexto ante C. N. Seculo vixit; apud GALENUM.
 QUERCETANUS du Chesne Joseph. *Antidotaire spagyrique*, Lyon 1576. 8°. Editio au-
 ctior prodiit sub titulo *Pharmacopœe Dogmaticorum restituta*, Paris. 1607. 8°.
 Cito editionem Francof. 1615. 4°. *Ratisbonense Dispensatorium* 1727. fol.
 REINESIUS Thomas *Chymiatra*, Geræ 1624. 4°.
 RENODÆUS Renoy Johann. *Institutiones Pharmaceutica*, Paris. 1608. Cito editionem
 Francofurt. 1615. 4°.
 RETZ Andr. Joh. *Schwedische Academie*, 1770. 8°.
 RHAZES seculo X. floruit. *Continens Brixia* 1486. fol. *Libri ad Mansorem* Venetiis
 1497. fol. sunt impressi. Utor *Operibus* Basil. 1544. fol.
 RICHARD de Hautefierck *Formula medicamentorum nosodochii militaris adaptata* :
 in *Recueil d'Observations de Medecine des Hopitaux militaires*, Paris 1766. 4°.
 RIEDLIN in *Dispensatorio Argentoratensi*.
 RINGELMANN in *Pharmacopœa Danica*.
 RIVERIUS Lazarus medio Seculo superiore inclaruit. Cito *Opera* Genevæ 1737. fol.

- ROSEEN von Rosenstein Nils *Anweisung zur Kenntnis und Cur der Kinderkrankheiten*; Holmiæ 1764. Suecice. Utor editione Germanica egregiis additionibus Illustris MURRAY aucta, Gœtting, 1781. 8°.
- Rossica Pharmacopœa, Petropol. 1778. 4°.
- ROTH Gottfried *Anleitung zur Chymie*, Leipzig 1717. 8°. Utor editione Frankfurt und Leipzig 1739. 8°. Auctor obiit anno 1710.
- RUFUS Seculo primo ad finem vergente creditur floruisse. *De purgantibus*, Paris. 1555. 8°. Utor *Operibus* a CLINCH editis Londin. 1744. 4°.
- RULAND Martin. *Curatium Empyricarum & Historiarum in certis locis & notis personis expertarum & rite probatarum Centurie*, Basil. 1578. 16°.
- SAINTYVES *Traité des maladies des yeux*, Paris. 1722. 12°. Cito editionem Amsterdam. 1736. 12°.
- SALA Angelus *Tractatus Chemicos* cœpit edere anno 1608. Omnes prodierunt collecti Francofurt. 1647. 4°. Utor editione aucta sub titulo *Collectaneorum Chemicorum opera & studio J. D. Thom.* Francof. 1693. 4°. impressa.
- SCHMUCKER *vermischte chirurgische Schriften*, Berlin & Stettin 1776 & 1779. 8°.
- SCHROEDER Joh. *Pharmacopœa Medico-Physica*, Ulmæ 1641. Utor editione Francof. 1668. 4°.
- SCHULZII Joh. Henr. *Prælectiones in Dispensatorium Brandenburgicum* 1735. Utor editione Norimb. 1753. 8°.
- SEIGNETTE in *Académie Royale des Sciences* 1731. & Dissertatione ENCKELMANN *de Sale Alkali Seignette*, Argent. 1756.
- SENNERTUS Daniel *Practica Medicina* 1628-1635. 4°.
- SERAPIO Seculo X. videtur floruisse. *De simplicibus Medicinis Opus* per BRUNFELS Argentorat. 1531. fol.
- SLONNE in GAUBII *Methodo conscribendi formulas*.
- SNELLEN Paul. *Salis communis triumviratus*, Amstel. 1714. 8°.
- STAHL Georg. Ernest. *Opusculum Chymico-Physico-Medicum*, Halæ 1715. 4°. & in *Dispensatorio Brandenburgico*.
- STARCKEY Georg. *Pyrotechnia Anglica*, London 1658. 12°. Utor versione Germanica, Norimb. 1722. impressa.
- STOERCK Anton. *Libellus, quo demonstratur Colchici Autumnalis radicem non solumtute posse exhiberi hominibus &c.* Vindobon. 1763. 8°.
- STOUGHTON in BAUME' *Elémens de Pharmacie*.
Suecica Pharmacopœa, Holmiæ 1775. 8°. Editio altera & emendata prodiit 1779. 8°.
- SYDENHAM Thom. *Observationes Medice circa morborum constitutiones*, London 1667. 8°.
Dissertatio Epistolaris de Observationibus nuperis circa curationem Variolarum confluentium, nec non de affectione Hysterica, London 1682. 8°.
Progressus integri in omnibus fere morbis curandis, London 1693. 12°.
Utor *Operibus* Lugd. Bat. 1741. 8°.
- SYLVIUS Jacob. *Methodus medicamenta componendi*, Lutet. 1541. 8°.
De medicamentorum simplicium delictu, præparationibus, Mistionis modo, Paris. 1542. 8°.
Utor *Operibus Medicis* a MOREAU editis, Colon. Allobrog. 1630. fol.
- SYLVIUS Francisc. de le Boe *Opera*, Amstelod. 1679. 4°.
Cito editionem Genevæ 1681. fol.
- TACHENIUS Otto *Hippocrates Chemicus*, Venet. 1666. 8°.
Cito editionem Brunsvic. 1668. 12°.
De morborum Principe, Bremæ 1668. 12°. Cito editionem Osnabrug. 1675. 12°.
- THIBAUT Pierre *Cours de Chymie*, Paris 1667. Utor editione Lyon 1672. 8°.
- TILLET in *Académie Royale des Sciences* 1767.

- TRILLER Daniel VVilhelm. *Dispensatorium Pharmaceuticum. Universale*, Francof. ad Mœd. 1764. 4°.
- TURNER Daniel *Siphylis a practical Dissertation on the venereal disease*, Lond. 1717. 8°.
- Tunquineses in Philosoph. Transact. N°.* 474.
- VALENTINUS Basilius. Auctoris seculi XV. scripta crebro tam seorsim quam in Theatris & Museis Chymicis collecta sunt impressa. Utor *Chymische Schriften* per PETRÆUM 1740. 8°.
- VARIGNANA Guilhelm. *Opera*, Basil. 1545. 4°.
- VICAT Philipp. Rudolph. *Observationes Practicae*, Bernæ 1780. 8°.
- VERNY F. *Pharmacopée de Bauderon augmentée de remarques*, Lyon 1681. 4°.
- Vienense Austriaco Dispensatorium*, Vindobonæ 1729. fol. recusum 1765.
- VIGO Johannes de *Practica*, Romæ 1514.
- VILLANOVANUS Arnoldus. De Villa nova verum nomen est. BACHVONE Seculo XIV. floruit. *Opera*, Venet. 1505. fol. Utor editione Basil. 1585. fol.
- VITET *Pharmacopée de Lyon* 1778. 4°.
- UTECHT apud ZVVINGER in *Dissertat. de Nitro*.
- VVALDSCHMID Joh. Jac. *Institutiones Medicinae rationalis*, Marburg 1688. 8°.
- VVALLBAUM Joh. Jul. *Index Pharmacopolii completi*, Leipzig 1767. fol. :
- VVALLERIUS Joh. Gottschalck *Systema Minerale*, Holm. 1772. 8°. 2 Voll.
- VVEBER Joh. Carol. *Anchora Sauciatorum*, Brigæ 1677. 8°.
- VVECKER Joh. Jacob. *Antidotarium speciale*, Basil. 1581. 4°.
- Pharmacia in artis formam redacta*, Jenæ 1675. 4°. Utor editione Jenæ 1693. 4°.
- VVEDEL Georg. VVolfgang *Pharmacia Acroamatica*, Jenæ 1686. 4°.
- Compendium Chymie*, Jenæ 1715. 4°.
- VVEISMANN Joh. Frid. in *Academ. Natur. Curios. Novor. Act. T. I.*
- VVEPFER Joh. Jac. *Observationes Medico-Practicae*, Tiguri 1745. 4°. Obiit anno 1695.
- VVERLHOFF Paul. Gottlieb in *Dispensatorio Brunsvicensi*.
- VVESTENDORF Joh. Christoph. *Dissertatio de optima Acetum concentratum ejusdemque Naphtham consciendi ratione*, Gœttia. 1772. 4°.
- VVHYTT Robert *Observations on the nature, causes and cure of those disorders which have been commonly called nervous, hypochondriacal or hysteric*, Edinburgh. 1765. 8°.
- VVIDSTOECK in *Stralsundisch Magazin* Vol. I.
- VVILDEGANSIUS in *Dispensatorio Brunsvicensi*.
- VVirtembergica *Pharmacopœa*, Stuttgartard 1740. fol. recentissime recusa 1771. fol.
- VVOLFF in QUERCETANI *Pharmacopœa Dogmatica*.
- VVOLFF Joh. Philipp. in *Academ. Natur. Curios. Act. Vol. VII.*
- VVURZ apud HILDANUM -
- ZELLER apud VVirtembergenses.
- ZVVOELFFER Joh. *Annotationes in Pharmacopœam Augustanam*, Norimberg. 1667. fol.
- Pharmacopœa Regia*, Norimberg. 1668. fol.



PROLEGOMENA.

§. I.



Pharmacopœa, quam etiam *Pharmaciam* appellare solent, est Ars Medicamenta colligendi, præparandi & dispensandi. Antiquitus per longam seculorum seriem ipsorum Medicorum proprium hoc negotium erat. Qui unice vendendis substantiis, quæ ad restituendam sanitatem conducere putabantur, operam dabant *Seplasiarii*, *Aromatarii*, *Pigmentarii*, *Medicamentarii*, *Unguentarii*, *Myropola* *Pharmacopola* *Circumforanei* nominati, a Medicis æque ac a recentioris ævi Pharmacopœis erant sane quam diversissimi. Cum vero tam cognitionum Medico acquirendarum amplitudo, quam medicamentorum copia insigniter crevisset, Medentes etiam accuratius in morbo, quos tractandos susceperant, inquisivissent & tali scrutinio multum temporis dandum esse sensitent, quin & horum operi crebrius ægotantes imploravissent; Clinici curam medicamentorum dispensandorum propriis hominibus reliquerunt, qui *Pharmacuta*, *Pharmacopola* & labente ævo *Apothecarii*, *Confectionarii* &c. dicebantur. Qua temporis periodo Pharmaceutæ proprium artificum genus constituere cœperint, accurate determinari nequit; cum eorum nulla apud Auctores priorum a Christo nato seculorum mentio occurrat. MESUE Senior autem, qui sub initio seculi IX vixit, cum Pharmacopœi filius fuisse feratur, probabilem conjecturam suppeditat, Pharmacopœam tanquam Artem a Clinice distinctam inter Arabes, postquam scilicet una cum reliquis litteris ad Saracenos Medicina quoque transferat, ortam esse. Litteras inde in Europam reduces Pharmacia quoque est secuta, cognitaque mox insigni ejus ad vitam communem utilitate, Rerumpublicarum Proceres hanc artem exercentibus propria jura concesserunt, justos eorum limites constituerunt, legibusque caverunt, ne Arti saluberrimæ spurii impostores maligni se intrudere & maculam adspargere possint.

§. II.

Antiquiores jam Medici circa medicamentorum simplicium delectum erant occupati. MANTIAS, qui proximo ante Christum natum seculo vixit, primus de *compositione Medicamentorum* scripsisse GALENO dicitur, cui & ipsis, in hoc artis genere versatissimo multarum, quibus prisca medentes utebantur, compositionum notitiam debemus. MESUE rem pharmaceuticam qualis apud Arabes obtinuerat, nobis reliquit. Post
rena-

renatas in Europa litteras; crescente in dies Artis nostræ ambitu, copiosa sese exceperunt volumina, quibus Medicamentorum parandorum rationes exponerentur. Hi tractatus *Luminaria*, *Antidotaria*, *Pharmacopœæ*, *Dispensatoria* inscriberentur; & priores quidem horum auctores SALADINUS scilicet, NICOLAUS uterque, & MANLIUS GALENUM & MESUE maximum partem compilarunt. Orta sub initio seculi XVI nova Chemicorum secta cum Medicina in *Galenicam* & *Chemicam* distingueretur, Pharmacia eandem partitionem subiit; & *Chemicæ* quidem parti illas annumerabant præparaciones, quæ ope Operationum Chemicarum peragerentur, reliquas hæcenus usitatas simpliciores *Galenicæ* relinquentes; utramque vero receperunt, quæ exinde prodierunt Pharmacopœæ. Magistratus cum perspicerent, quanti ad salutem communem interesset, ut medicamenta rite pararentur, nec tanti momenti negotium vago singulorum arbitrio committeretur, vel etiam imperitiæ artificum relinqueretur, publica auctoritate non ediderunt solum Præscriptiones Medicamentorum, sed etiam sanxerunt. Inter primos *Florentini*, *Bergamenses*, *Norimbergenses*, *Augustani*, *Parisini* salubre hoc consilium ceperunt, quos dein longo maxima pars Europæ est secuta, ita ut hodie paucae urbes existant, quæ non *Pharmacopœæ* typis evulgaverint; sed plurimæ quoque hujus generis Collectiones a privatis sunt editæ, & prostat jam tanta eorum copia, ut singulas recensere nimis esset prolixitatis; adjudicare autem summæ arrogantia.

§. III.

Præter ea, quæ sunt Viri boni & probi, requiritur non modo ut Pharmacopœus calleat lingua, quibus conscripti sunt libri, unde cognitiones ad artem suam facientes & hauriat & augeat. Latinæ & Gallicæ notitia carere nequit, sed eximii ipsi usus etiam erunt Anglica & Germanica, nec male his Italica quoque jungeretur. Omnibus præterea Scientiis, quibus Chemia nititur, omnino necesse est, ut animum habeat imbutum, Logica nimirum, Physica, & Mathesi. Nec circa delectum Medicamentorum simplicium officiis suis poterit defungi, nisi Historiam Naturalem habuerit perspectam; qui enim ignorat characteres, unde omnia Corpora naturalia agnoscuntur, nec accurate nosse poterit ista, quæ ad scopos medicatos faciunt. Sed in ipsa Pharmacia administratione præterea plura occurrunt, quæ tanquam leviora litteris non consignantur, non pauca etiam, ad quæ rite exsequenda omnino iteratum crebro exercitium requiritur. Itaque prudenter omnino legibus cautum est, ut juvenes, antequam Pharmacopœorum jura assequantur, tirocinia artis sub ductu probatorum Artificum ponant. Optima ratio bonum Pharmacopœum formandi, ea mihi quidem esse videtur, ut primum in Gymnasio Litteras humaniores tiro & prima Logices æque ac Matheseos principia ediscat. Cursu Gymnasii non abrupto, sed rite emensō, committatur Pharmacopœo probe instructo & in eo saltem per triennium in omnibus, quæ ad Artem faciunt, negotiis sedulo se exercent, nec labores, quos vel viliores esse putet, infumere detrectet. Omne quod ipsi a laboribus pharmaceuticis superest tempus, repetendis & colendis, quæ in Gymnasio tractaverat, studiis impendat; finito tirocinio in officina quadam multum frequentata per unum aut alterum annum ministrum agat, nec unquam culturam scientiarum, quibus in Gymnasio imbutus erat, negligat; egregie omnino suis rebus ibit consultum, si hoc ministerii tempus in aliquo emporio transiget & tabernas mercatorum, quos Sepiasarios hodie dicimus, sedulo frequentabit. Per idem tempus meliora quæque rerum Pharmaceuticarum Elementa, in quem censum NEUMANNUM maxime atque Clarissimum BEAUME' refero, studiose legat ac relegat. Hac methodo præxi Pharmaciae abunde exercitatus & imbutus, adeat Academiam egregie instructam, Botanicae ibi ceterisque Historiæ Naturalis partibus, ut & Physicæ & Chemiæ sæculo incubiturus, nec non Lectionum, quibus Materies Medica illustratur & regulæ Methodi Formularum conscribendarum tra-

traduntur, assiduus futurus auditor. Hac ratione formatus Pharmacopœus dignitatem Artis suæ tuebitur, publica commoda insigniter promovebit, ad provehendam Medicinam, augendamque Naturæ cognitionem Scientiæque Naturalis ambitum ampliandum haud inanem operam contribuet, una cum Medico salutem civium pariter consulat, Doctoris Medicinæ nequaquam, ut vulgo videtur, famulus, sed frater, collega, cooperator, amicus.

§. IV.

Pharmacopœa in ampla area, certe in platea latiore extrui debet. Ipsa penetralia luci sint penetrabilia, ita tamen ut ædes a Solis meridiani inprimis, ardore satis sint defensæ. Neque minus ex altera parte cavendum, ne humor medicamenti noceat. Omnibus ac singulis Pharmacopœæ receptaculis inscribantur litteris majusculis tituli, unde, quæ continent, appareat; uni receptaculo plura uno corpora non inferantur; diaphragmata confusione ægre obsistunt; vasa pro variis, quæ includunt, substantiis vel ex ligno tiliaceo, vel figulari opera, vel ex vitro sint parata, metallica ob facile contagium semper sunt suspecta. Proxima Pharmacopœæ sit cella fornicata æstate calori, hieme frigori impenetrabilis, ubi Aquæ, Vina, Succus, Syrupi, Spiritus, Tincturæ, Electuaria &c. asserventur. Nec longe a Pharmacopolio distet Apotheca, sive promus condus, unde scilicet pro re nata promi condita possint. Vicinum pariter sit Laboratorium fornicatum, puteo, caninis & fornacibus instructum; cui quoque contiguam, omnino proficuum, velim esse officinam, in qua Decocta, Unguenta & cetera, quæ Galenica dicuntur, medicamenta parentur. In superna domus contignatione Vegetabilia indigena asservari solent. Capsæ quibus condantur, sint ex ligno inodoro factæ, operculo tectæ & nomine substantiæ, quam continent, inscriptæ. Ipsa contignatio sit ut aëri pervia, ita a solis æstu satis tuta. Mundities denique per omnes domus partes prima sit ac postrema Pharmacopœi cura.

§. V.

Præcipuam suppellectilem Chemicam in *Institutionibus Chemicæ* descripsi, reliquam ipse rerum usus ultro poscet. Explicandis vero jam ponderum ac bilancium generibus eo diutius immorandum videtur, quo majori circa eorum usum circumspeditione opus est. Bilancium probitatem perspicimus lancium ad jugum & ponderum in lancibus situm alternando. Quo longius est jugum, eo distinctior ponderum mensura patet. Requiritur bilances variæ librationis aliæ non nisi aliquot Granorum, aliæ Drachmarum duarum, rursus aliæ Semunciarum & Unciarum, item aliæ aliquot Unciarum librandarum; & ita porro, quæ totas libras ponderant, pro harum numero variæ debent esse conformationis. Aquis, Spiritibus, Acetis propriæ mensuræ metallicæ respondent, determinantibus uncis Drachmas, Semuncias, Uncias. Medici Libram in duodecim Uncias, Unciam in octo Drachmas, Drachmam in tres Scrupulos, Scrupulum, Parisini quidem *Græcos* imitantes, in quatuor & viginti, reliquæ vero gentes ad normam *Salernitarum* in viginti Grana dividunt, Granum ejusque partes minime Grano Piperis, ut vulgo solet, sed lamini metallicis accuratissime definitis librandæ sunt. Libræ civili vulgo sedecim Unciæ tribuuntur. Sed ipsa Libra pro variis regionibus in immensum variat. In Germania propria Libra Medica obtinet; ceteræ gentes Libra comuni pro ponderandis etiam medicamentis utuntur.

Diversissimarum nostri ævi Librarum rationem ad Libram Parisiensem redactam tam ex Clarissimi Auctoribus ABOT DE BAZINGEN & TILLET quam ex propriis observationibus hic exhibeo.

Libr. Paris. Unc. Dr. Gr.

Libra Amstelodamensis ; quæ per omne Belgium ob-

	I.	—	—	42.
Argentoratensis	—	15.	5.	15.
Berolinensis	—	15.	2.	32.
Bernensis æquat Parisinam				
Coloniensis	—	15.	2.	13½.
Dantiscana	—	15.	2.	7.
Florentina	—	11.	—	50.
Francofurtana ad Mœnum	—	15.	—	10.
Genevensis	I.	—	—	18.
Genuensis	—	10.	5.	60.
Hafniensis	—	15.	3.	20⅔.
Hamburgensis	—	15.	2.	15½.
Holmiensis	—	13.	7.	8.
Lisbonnensis	—	15.	7.	68.
Londinensis	—	12.	3.	12.
Lugdunensis	—	13.	4.	48.
Madridensis	—	15.	—	16.
Manhemienfis	—	15.	2.	20½.
Maffiliensis	—	13.	7.	62.
Medica in Germania passim usitata	—	15.	4.	48.
Milanensis	—	9.	3.	—
Monachienfis	—	15.	2.	23.
Neapolitana	—	10.	7.	54.
Romana	—	11.	—	50.
Varfoviensis	I.	10.	4.	24.
Veneta	—	8.	6.	—
Viennensis	I.	2.	2.	32.

Londinensis, Genuensis, Florentina Uncia nec non Neapolitana & Romana duodecimam libræ partem æquat.

In mensurandis fluidis Libram vulgo *Schopinam*, *Seidel*, *Quart*, Angli *Pint* appellant, sed *Quart* Brandeburgensium sex & triginta Uncias, *Pinta* Parisiensium duas libras, *Demiseptier* autem semilibram æquat. *Mensura* quatuor Libris respondet. *Gallon* sive *Congius* octo continet libras; quatuor & viginti mensuræ apud nostrates *Ohmæ* nomine venit; *Muid* Parisiensium ducentis octoginta octo Pintis constat.

§. VI.

Antiquitatis quoque ponderum valor, cum multum lucis intelligendis Veterum scriptis subministret, ex EISENSCHMIDIO & MASSARIO ad Libram Parisinam redactus hic subjungendus videtur.

Romani Libram, quæ ipsis etiam *Pondo* aut *As* audiebat, in duodecim Uncias dividebant. Ponderum Unciarum undecim *Deuncem*, decem *Dextantem*, novem *Dodrantem*, octo *Bessem*, septem *Septuncem*, sex *Semissem*, quinque *Quincuncem*, quatuor *Trientem*, trium *Quadrantem*, duarum *Sextantem*, Unciam unam cum dimidia *Sescuncem* nominabant.

Libr. Paris. Unc. Dr. Gr.

Apud Romanos.

Centum p. ponderavit	·	·	·	·	67.	II.	2.	48.
Libra	·	·	·	·	---	IO.	6.	48.
Uncia	·	·	·	·	---	---	7.	16.
Duella	·	·	·	·	---	---	2.	29.
Sicilicus	·	·	·	·	---	---	I.	58.
Sextula	·	·	·	·	---	---	I.	14.
Denarius	·	·	·	·	---	---	I.	2.
Consularis	·	·	·	·	---	---	---	65.
Imperialis five Drachma	·	·	·	·	---	---	---	37.
Victoriatus	·	·	·	·	---	---	---	21.
Scriptulum	·	·	·	·	---	---	---	11.
Obolus	·	·	·	·	---	---	---	4.
Siliqua	·	·	·	·	---	---	---	

Apud Græcos.

Τάλαντον	·	·	·	·	54.	2.	5.	24.
Μνᾶ, Mina	·	·	·	·	---	14.	3.	40.
Δραχμὴ	·	·	·	·	---	---	I.	11.
Ὀβολός	·	·	·	·	---	---	---	13.
Κεράτιον	·	·	·	·	---	---	---	4.
Χαλκός	·	·	·	·	---	---	---	2.
Λεπτόν	·	·	·	·	---	---	---	$\frac{1}{8}$.

Apud Arabes & Græcos Recentiores & Latino-Barbaros.

Alchemion	·	·	·	·	---	14.	3.	40.
Manes, Ominos	·	·	·	·	---	10.	6.	28.
Sacrajati	·	·	·	·	---	2.	6.	41.
Sacros, Auguen, Adar, Affatil	·	·	·	·	---	---	7.	16.
Nux magna vel Regalis	·	·	·	·	---	---	3.	44.
Sextarius, Stater	·	·	·	·	---	---	3.	44.
Nux parva	·	·	·	·	---	---	2.	50.
Alcofanus	·	·	·	·	---	---	2.	29.
Aureus, Alcaubolus	·	·	·	·	---	---	I.	14.
Atogochilos, Holca, Alchi, Darchimi, Ologi- nat, Nabach, Avellana, Bondacate	·	·	·	·	---	---	I.	11.
Balanus, Lupinus, Bachilea, Faba Ægyptia vel Syriaca	·	·	·	·	---	---	---	42.
Faba Alexandrina, Tremessis, Kemeraja	·	·	·	·	---	---	---	30.
Ganchus, Gormin, Gramma, Harmi, Kermet, Faba Græca	·	·	·	·	---	---	---	21.
Seminet, Cumulus, Annulus, Onolassent, Ono- lossich	·	·	·	·	---	---	---	11.
Danich	·	·	·	·	---	---	---	8.
Kirat, Kararit, Autulas, Alkilat	·	·	·	·	---	---	---	4.

c

Aquæ

Aquæ frigidæ Mensuræ Romanæ æquant Parisinas sequenti ratione.

	Libr.	Unc.	Dr.	Gr.
Culeus	1133.	6.	2.	—
Amphora seu Cadus	56.	2.	7.	24.
Urna	28.	1.	3.	48.
Congius	7.	—	2.	66.
Sextarius	1.	1.	7.	44.
Hemina	—	10.	1.	18.
Quartarius	—	5.	—	45.
Acetabulum	—	2.	4.	23.
Cyatus	—	1.	5.	30.
Ligula	—	—	3.	24.

Mensuræ Græcæ:

Μετρητής	84.	4.	3.	—
Χῆς	7.	—	2.	66.
Ζέσης	1.	1.	7.	44.
Κοτύλη	—	8.	7.	58.
Τέτταρον	—	4.	3.	65.
Ὄξιβαρον	—	2.	1.	69.
Κύαθος	—	1.	4.	—
Κογχή	—	—	6.	—
Μυσρον	—	—	3.	—
Χηρη	—	—	2.	—
Κοχλιάριον	—	—	1.	—

Mensuræ Arabum Medicorum Recentiorum & Latino-Barbarorum.

	Libr.	Unc.	Dr.	Gr.
Missohaos	3.	8.	1.	33.
Aben, Kist, Ejub, Eberia, Mina Romana	1.	6.	—	—
Fiala, Hassitius, Kassitium	—	10.	1.	18.
Rejelati, Calyx	—	5.	—	44.
Cornusum, Pugillum	—	3.	2.	68.
Anesime, Æsasse, Kassuff	—	2.	4.	20.
Conos, Coatus, Alcantus, Almunesi, Cuabus, Briale	—	1.	5.	34.
Bachates parva	—	—	5.	56.
Cochlear maximum	—	—	4.	44.
magnum	—	—	1.	52.
Colanos, Raclanarium	—	—	1.	28.
Cochlear parvum, Flagerina, Cyanes	—	—	1.	11.
minimum, Fahaliel	—	—	—	42.

Nostro ævo Libram signo ℥, Unciam ꝯ, Drachmam ℥, Scriptulum seu Scrupulum ∅ solent denotare, quibus Characteribus, signum β ubi additur, pondus dimidiatum denotat. Characteres id genus Auctorum Veterum invenies collectas apud ARBUTHNOT & EISENSCHMID.

§. VII.

In colligendis Vegetabilibus hæc veniunt notanda. Radices annuæ colligendæ sunt; quam primum caulem vel folia protruserint, biennes altero a satione feminis vere, perennes, sive vere sive primo autumno, antequam lignescant. Folia decerpas efflorescentium florum, Flores gemmarum vix explicitarum tempore; Fructus, ubi maturuerint. Cortices arborum, si qui desiderantur, semper Libri, quos *Cortices medianos* dicunt, recipiantur. Multi exstant Florum genera una cum calycibus in usum trahenda, quippe his præcipua inhaeret virtus; huc præsertim Aromatica ex Didynamia desunta pertinent. Flores & Folia minora una cum cauliculis, quibus adhærent, in usum trahantur. *Summitates* dici solent, quæ hunc in modum carpuntur. Collectio Animalium & Mineralium, cum præter ea, quæ vel suis locis dicentur vel omnibus sunt notissima, nil habeat proprii, nullam moram injicit. Exsiccatio optime calore centum circa graduum Thermometri Fahrenheitiani aut quadraginta Reaumuriani suscipitur qualem fornix furni dare solet; huic scopo & plurimis aliis laboribus Pharmaceuticis egregie inservit conclave, quod tali fornici superstructum est. Crassiores Radices, quo melius exsicari queant, in taleolas sunt secandæ. Sereno semper cælo Plantarum partes sunt colligendæ, nullo rore madidæ. Vegetabilia culta, cum largius nutrimentum hauriant, præstant sylvestribus; nec bene Veteres contrarium docuerunt. Aromatica & fragrantia eo sunt efficaciora, quo sub calidiore cælo vegetarunt; frigidius Tetradynamicis magis favet.

§. VIII.

Medicamenta sicca in vasis ligneis curate tectis asserventur. Limatura Martis, ne rubiginem contrahat, Salia in aere humescentia, ne deliquium patiantur, vitris condenda sunt. Liquores tutissime vitris committuntur. Exulent omnino omnia vasa ex Cupro seu Stanno fabricata; ultimum metallum enim in supellectilem efformatum fere Plumbum recipit; quod facilis & perniciosi contagii esse constat. Potest tamen usus Stanni concedi asservendis Unguentis, Oleis infusis aliisque remediis, quæ non nisi extus adhibentur. Mollia & liquida ex Saccharo parata Medicamenta vasis porcellaneis, vel ubi hæc pretiosiora sint visa, ex Argilla teneriore exquisite paratis, quæ *Fayence* dicunt, aut Argillaceis Plumbo non incrustatis, inmittuntur. Aromata, & quæ reliqua principia volatilia habent, diu sub forma Pulveris non asservare licet.

§. IX.

Medio ævo compendii causa aliqualia Medicamenta ad communes locos ac titulos referre moris erat; en præcipuos.

Flores quatuor Cordiales

Borraginis, Buglõssi, Violarum, Rosarum, ultimi debent omitti, si tres tantum præscribuntur.

Fragmenta quinque Lapidum pretiosiorum

Granati, Hyacinthi, Sapphiri, Smaragdi; Carneoli.

Radices quinque Aperientes.

Apii, Petroselini, Fœniculi, Asparagi, Rusci.

Semina quatuor Frigida.

Cucurbitæ, Citrulli, Melonis, Cucumeris.

Herba quinque Emollientes.

Althææ, Malvæ, Mercurialis, Parietarix, Violarix.



I N D E X

- A***al*, I. 10.
 Abelmofchi, I. 1.
Abricofen, I. 13.
Abricots, I. 13.
Abrotano, I. 1.
 Abrotanum, I. 1. III. 5.
Absynthe, I. 1.
 Absynthium, I. 1. III. 6.
 Acacia, I. 2. III. 7.
Acajoss, I. 9.
Acaju, I. 9.
 Acanthus, I. 2. III. 7.
 Acer, I. 2.
Acero, I. 2.
Aceto, I. 3.
 Acetofa, I. 2. III. 8.
Acetofa, I. 2.
 Acetofella, I. 3. III. 8.
Acetofella, I. 3.
 Acetum, I. 3. II. 3.
 Antifepticum, II. 3.
 Aromaticum, II. 3.
 Bezoardicum, II. 4.
 Camphoratum, II. 4.
 Chalybeatum, II. 4.
 Colchicum, II. 4.
 Concentratum, *Stahl*, II. 4.
 VVestendorf, II. 4.
 Destillatum, II. 5.
 Hystericum, II. 5.
 Odoratum, II. 5.
 Saturninum, II. 5.
 Scilliticum, II. 5.
Ache, I. 12.
 Acidum Tartari Chryftallifatum, II. 140.
 Destillatum, II. 150.
Ackerfchwendel, I. 108.
 Acmella, I. 3.
 Aconitum, I. 3. III. 8.
 Acorus, I. 3. 25. III. 9.
Acqua di archibugiata, II. 23.
 Actes grana, I. 95.
 Adamas, I. 3.
 Adhatoda, I. 4. III. 9.
 Adiantum, I. 3. III. 10.
Ægagropila, I. 4.
Æpfel, I. 87.
 Æris Flores, II. 5.
Ærugo, I. 109.
 Æs, I. 4. 45.
 ustum, II. 6.
 Æther Vitrioli, II. 6. 99.
 Æthiops Antimonialis, II. 6.
 Martialis, II. 6.
- Æthiops Mineralis, II. 6.
 Vegetabilis, I. 89.
 Ætites, I. 4.
 Agallochum Lignum, I. 4.
Agaric, I. 4.
Agarico, I. 4.
 Agaricus, I. 4. III. 9.
 Mineralis, I. 63.
 Præparatus, II. 6.
 Pedis equini facie, I. 4.
Agley, I. 12.
Aglio, I. 5.
 Agnus callus, I. 4. III. 10.
Agresta, I. 109.
Agricome, I. 28.
 Agrimonia, I. 4. III. 11.
Agrimonia, I. 4.
Agstein, I. 103.
Aigremoine, I. 4.
Ail, I. 5.
Aimant, I. 69.
Airelles, I. 76.
Airone, I. 12.
Alabaster, I. 4.
Alabastro, I. 4.
Alabastrum, I. 4.
Alabatre, I. 4.
Alant, I. 49.
Alaun, I. 7.
Albicocca, I. 13.
 Album Græcum, I. 4.
Alcachingi, I. 5.
 Alcâhelt Glauber, II. 109.
 Alkali Ammoniacum aquosum, II. 149.
 causticum, II. 29.
 Fluor, II. 149.
 Minerale Tartarifatum, II. 139.
 de Rocou, I. 54.
 Vegetabile Tartarifat, II. 158.
 Vitriolatum, II. 158.
 Volatile causticum, II. 149.
Alce, I. 5.
 Alcea, I. 5. III. 11.
Alcèe, I. 5.
 Alces Ungulæ, I. 5.
 Alchymilla, I. 5. III. 15.
Alderstein, I. 4.
 Alhandal Trochisci, I. 41.
 Alkanna, I. 5. III. 12.
 Alkekengi, I. 5. III. 15.
Alleluja, I. 3.
Allermannsharnifch, I. 108.
Alliaire, I. 5.
 Alliaria, I. 5. III. 13.
Alliaria, I. 5.

- Allium*, I. 5. III. 14.
Afcalonicum, I. 5.
Scorodoprasum, I. 5. III. 14.
Allume, I. 7.
Alnus, I. 6. III. 16.
Aloes, I. 6. III. 13.
Depurata, II. 7.
Infuccata, I. 6. II. 7.
Lignum, I. 6.
Lota, I. 6. II. 7.
Rofata, I. 6. II. 7.
Violata, I. 6. II. 7.
Alpschos, I. 19.
Alraun, I. 69.
Aline, I. 6. III. 17.
Altea, I. 6.
Althæa, I. 6. III. 16.
Alumen, I. 7.
Catinum, I. 100.
Plumosum, I. 8.
Romanum, I. 7.
Rupeum, I. 7.
Saccharinum, II. 7.
Tinctum, II. 7.
Ustum, II. 7.
Alun, I. 7.
Amandes, I. 9.
d' Amandes pâte, M. 129.
Amara dulcis, I. 7.
Amatita, I. 57.
Amazonum Lapis, I. 77.
Ambra, I. 7.
Liquida, I. 7.
Ambra grigia, I. 7.
Ambre gris, I. 7.
Ambre jaune, I. 103.
Ambroisie, I. 22.
Ameise, I. 52.
Amethystus, I. 7.
Amianthus, I. 8.
Amianto, I. 8.
Amidon, I. 9.
Ammi, I. 8. III. 17.
Ammoniacum Gummi, I. 8.
Sal, I. 8.
Amomi semen, I. 8.
Amomum, I. 8.
Amygdalæ, I. 9.
Amylum, I. 9.
Anacardium, I. 9.
Anagallide, I. 9.
Anagallis, I. 9. III. 18.
Anas, I. 9.
Anatron, I. 51.
Anchusa, I. 9.
Anckenbliimlein, I. 90.
Ancusa, I. 5.
Ancoline, I. 12.
Andorn, I. 70.
Andorn, *Schwarz*, I. 18.
Andosillers, I. 34.
Anet, I. 9.
Anethum, I. 9. III. 18.
Aneto, I. 9.
Angelica, I. 10. III. 19.
Anglicum Sal, I. 10.
Anguilla, I. 10.
Anguilla, I. 10.
Anguille, I. 10.
Anguria, I. 39.
Anice, I. 10.
Anice della China, I. 10.
Anime Gummi, I. 10.
Anis, I. 10.
Anis de la Chine, I. 10.
Stern, I. 10.
Anisum, I. 10. III. 19.
stellatum, I. 10.
Anitra, I. 9.
Anodynum minerale, II. 8.
Anonide, I. 79.
Anser, I. 11.
Anserina, I. 11. III. 20.
Anthora, I. 11. III. 20.
Anthos, I. 11.
Anthos, I. 92.
Antophylli, I. 11.
Antidotus Mithridatis, II. 59.
Antihecticum Poterii, II. 7.
Antimoine, I. 11.
Antimonium, I. 11.
Diaphoreticum, II. 8.
Præparatum, II. 8.
Antiquarium Riverii, II. 115.
Apalachine, I. 11.
Aparine, I. 11. III. 20.
Aparine, I. 11.
Aper, I. 11.
Apium, I. 12. III. 21.
Apozema, II. 8.
Febrifugum laxans, II. 50.
Appio di montagna, I. 80.
Apri dentes, I. 11.
Aqua Absynthii composita, II. 9.
Acustica, II. 9.
Alexiteria, II. 9.
Aloetica Mercurialis, II. 20.
Aluminosa Fallopii, II. 10.
Parisiensium, II. 10.
Anhaltina, II. 10.
Anodyna, II. 10.
Apoplectica, II. 10.
Aromatica, II. 11.
Asthmatica, II. 11.
Balsami Embryonum, II. 11.
Benedicta Rulandi, II. 12.
Calcis, II. 12.
composita, II. 12.

Aqua Caponis, II. 12.
 Carbunculi, II. 12.
 contra Cariem II. 14.
 Carmelitarum, II. 13.
 Carminativa *Dornacelli* II. 13.
 Regis Boruss. II. 13.
 Vulgaris, II. 13.
 Catapultarum, II. 14.
 Cinnamomi Buglossata, II. 14.
 Cordialis, II. 14.
 Cydoniata, II. 14.
 Hordeata, II. 14.
 Simplex, II. 14.
 cum Vino, II. 14.
 sine Vino, II. 14.
 Vulgaris, II. 14.
 Colonienfis, II. 14.
 Confortativa, II. 14.
 Cornu Cervi citrata, II. 14.
 Tenellorum, II. 22.
 Divina, II. 15.
 Epileptica, II. 15.
 Fimi, II. 15.
 Florum omnium, II. 15.
 Fœtida, II. 15.
 Fortis, II. 16.
 Mercurialis, II. 16.
 præcipitata, II. 16.
 ad Gingivas, II. 16.
 Grysea, II. 16.
 Hungarica, II. 17.
 Hyrundinum, II. 16.
 cum Castoreo, II. 17.
 Laxativa Angelica, II. 17.
 Viennensis, II. 17.
 Magnanimitatis, II. 17.
 Mastichina, II. 18.
 Mellis, II. 18.
 Odorata, II. 18.
 Melissæ composita, II. 18.
 Menthæ composita, II. 18.
 Mercurialis, II. 18.
 Charras, II. 105.
 Mercuriata, II. 18.
 Millepedum, II. 19.
 Mirabilis, II. 15.
 Mulsa, II. 19.
 Myrrhæ, II. 19.
 Ophthalmica alba, II. 19.
 Charras, II. 19.
 Cœlestis, II. 19.
 Cærulea, II. 19.
 Daguin, II. 19.
 Panis, II. 20.
 Perlata, II. 14.
 Pestilentialis, II. 20.
 Hartmann, II. 150.
 Phagedænica, II. 20.
 Picis, II. 96.

Aqua *Rabelii*, II. 20.
 Raphani composita, II. 20.
 Reginæ Hungariæ, II. 17.
 Regis, II. 20.
 Sclopetaria, II. 21.
 Serpylli composita, II. 20.
 Sino pari, II. 21.
 Stibiata, II. 21.
 Styptica *Berolinensium*, II. 21.
 Danorum, II. 21.
Thediana, II. 21.
 Theriacalis, II. 22.
 Londinensium, II. 22.
 Ad Tormina Infantum, II. 22.
 de Tribus, II. 107.
 Typhor. Cervi composita, II. 22.
 Vegeto mineralis, II. 22.
 Veronicæ cum Vino, II. 22.
 Vinosa, II. 9.
 Violacea, II. 22.
 Viridis, II. 22.
 Vitæ mulierum, II. 23.
 Saponacea, II. 23.
 Vitriolica, II. 23.
 Cærulea, II. 23.
 Londin. II. 21.
 Vulneraria aquosa, II. 24.
 Baumè, II. 24.
 Lemery, II. 23.
 Mercurialis, II. 24.
 Mineralis, II. 24.
 Rubra, II. 24.
 Vinosa, II. 24.
 Aquila alba, II. 24.
 Aquila Lignum, I. 6.
 Aquilegia, I. 12. III. 21.
 Arabicum Gummi, I. 12. 32.
Araignée, I. 12. III. 22.
 Aranea, I. 12. III. 22.
 Arbor vitæ, I. 12.
 Arcanum Corallinum, II. 24. 106.
 Duplicatum, II. 25. 138.
 Tartari, II. 25. 158.
 Ardea, I. 12.
 Argent, I. 12.
 Argentine, I. 11.
 Argento, I. 12.
 Argentum, I. 13.
 Vivum, I. 73.
Aristotoche de vigne, I. 13.
 Aristolochia, I. 13. III. 22.
 longa, I. 13.
Aristologia di vite, I. 13.
 Armeniaca, I. 13. III. 23.
 Armenius lapis, I. 13.
Armoise, I. 14.
 Armoracia, I. 13. III. 23.
 Arnica, I. 14. III. 25.
Aron, I. 15.

- Arèet de bœuf*, I. 79.
Arroche, I. 16.
 puante, I. III.
Aroph Paracels. II. 161.
Arsenicum, I. 14.
Artanita, I. 45.
Artemisia, I. 14. III. 24.
 Artemisia, I. 14.
Arum, I. 15. III. 25.
Arundo, I. 15. III. 24.
Afarum, I. 15. III. 25.
Asbestos, I. 8.
Asche, I. 15.
Afcia, I. 15.
Affenzio Comune, I. 1.
Affenzio Pontico, I. 1.
Aspalatum iignum, I. 15.
Asparago, I. 15.
Asparagus, I. 15. III. 26.
Asperge I. 15.
Asphaltum, I. 15.
Aphodelus, I. 15. III. 25.
Asplenium, I. 15.
Asia dulcis, I. 15. 19.
 Fœtida, I. 15.
Astrantia, I. 16. III. 26.
Atrepice, I. 16.
 Fetida, I. 16.
 Selvaggia, I. 16.
Atractylis, I. 16. III. 27.
Atriplex, I. 16. III. 28. 29.
Attich, I. 43.
Avellana, I. 16. III. 27.
Avena, I. 16. III. 27.
Augentrost, I. 50.
Aunèe, I. 6. 49.
Avoine, I. 16.
Avorio, I. 48.
Aurantia, I. 16. III. 28.
Auricula Judæ, I. 17. III. 30.
Auricula Muris, I. 17. III. 31.
Auripigmentum, I. 14. 17.
Aurone, I. 1.
Aurum, I. 17.
 Fulminans, II. 25.
 Horizontale, II. 25.
 Potabile, II. 25.
Aurruche noir, I. 16.
 Oeufs, I. 102.
Azedarach, I. 18.

Bachbungen, I. 18.
Bacile, I. 43.
Bacilli ad fornacem. II. 25.
 de Liquiritia, II. 25.
Baculi pectorales, II. 98.
Baer, I. III.
Balanus Myrepicus, I. 19.
Balauftiorum Flores, I. 56. III.

- Baldrian*, I. 108.
Baleine, I. 35.
Ballotta, I. 18. III. 30.
Balsama, II. 25. 31.
Balsamappel, I. 74.
Balsamita, I. 18. III. 30.
Balsamo di aghi, II. 26.
 di Cartagena, I. 106.
Balsamum adstringens, II. 25.
 Anodynum, II. 25.
 Apoplecticum, II. 26.
 Arcæi, II. 26.
 liquefactum, II. 26.
 Aromaticum, II. 26. 30.
 Canadense, I. 26.
 Carpaticum, I. 29. 90.
 Caryophyllorum, II. 31.
 Catholicum, II. 26. 29.
 Cellense, II. 26.
 Cephal. Saxonicum, II. 26.
 Chalybeatum, II. 26.
 Cinnamomi, II. 31.
 Commendatoris. II. 29.
 ad Dentitionem. II. 26.
 Fioraventi, II. 27.
 Hystericum, II. 27.
 Ischæmaticum, II. 27.
 Lavendulæ, II. 31.
 Lectorense, II. 28.
 Lithuanicum, II. 28.
 Locatelli, II. 28.
 ad Loricand. cadaver, II. 21.
 Majoranæ, II. 31.
 Mercuriale, II. 28.
 Metensium, II. 32.
 Nervinum, II. 28.
 Odontalgicum, II. 29.
 Ophthalmicum, II. 29.
 Rubrum, II. 29.
 Pectorale, II. 29.
 Rutæ, II. 31.
 Samaritanum, II. 30.
 Saponaceum, II. 30.
 Saturni, II. 30.
 Schauerianum, II. 30.
 Scherzeri, II. 30.
 Sulph. Antimoniale, II. 31.
 Crassum, II. 31.
 Rulandi, II. 31.
 Tranquillans, II. 31.
 Traumaticum, II. 32.
 Edinburgensium, II. 32.
 Londinesium, II. 32.
 Viride, II. 32.
 Vitæ externum, II. 33.
 Funnii, II. 32.
 Hoffmanni, II. 32.
 Teichmeyeri, II. 33.
Vulnerar. Edimburg. II. 33.

Balsamum, Vulnerar. Londinens. II. 33.

Minder, II. 33.

Stahlii, II. 33.

Bamiæ Moschatæ, I. 1.

Barba di Becco, I. 107.

Barba Capræ, I. 18. III. 31.

Barbarea, I. 18.

Barbe de bouc, I. 107.

Bardana, I. 18.

Bardana, I. 18. III. 33.

Barenklau, I. 23.

Barlapp, I. 68.

Barwurzel, I. 73.

Basilic, I. 18.

Basilicum, I. 18. III. 32.

de Bassora Gummi, I. 107.

Baumwoll, I. 21.

Baurensenf, I. 106.

Bdellium, I. 18.

Beaume d' Aiguilles, II. 26.

de Carthagene, I. 106.

Condom, II. 28.

de Laiture, II. 28.

de Vinceguere, II. 28.

Beaumier, I. 72.

Bec de grue, I. 55.

Beccabunga, I. 18. III. 33.

Bedeguar, I. 46.

Behen album, I. 19. III. 33.

Nuces, I. 19.

Rubrum, I. 19.

Belemnites, I. 19.

Belgivino, I. 19.

Belladonna, I. 19. III. 35.

Belledame, I. 16.

Bellis, I. 19. III. 34. 35.

Benedictenwurzel, I. 29.

Bengalensis Nux, I. 19.

Benoite, I. 29.

Benzoës, I. 19.

Berben, I. 20.

Berberis, I. 20. III. 35.

Bergkummel, I. 99.

Bergmunze, I. 25.

Bergsalz, I. 94.

Bernstein, I. 103.

Bersingstein, I. 83.

Bertram, I. 89.

wilder, I. 88.

Beruskraut, I. 42. 99.

Beschreykraut, I. 99.

Besenkraut, I. 101.

Beta, I. 20. III. 35.

Betoiné, I. 20.

des Montagnes, I. 14.

Betonica, I. 20. III. 37.

Betonien, I. 20.

Bettlerlause, I. 111.

Bettonica, I. 20.

Tom, I.

Bettonica, delle Montagne, I. 14.

Bettstrob, I. 54.

Betula, I. 20. III. 37.

Betulla, I. 20.

Beurre, I. 23.

Beyfus, I. 14.

Bezetta, I. 20.

Bezoar, I. 21.

Bezoardicum Joviale, II. 7. 33.

Martiale, II. 33.

Minerale, II. 34.

Bibergeil, I. 31.

Biberklee, I. 107.

Bienjoin, I. 19.

Bierre, I. 34.

Bieta, I. 20.

Bigarreaux, I. 33.

Bilsam, I. 60.

Bimsenstein, I. 88.

Bingelkraut, I. 73.

Birke, I. 20.

Birne, I. 89.

Birra, I. 34.

Bisam, I. 75.

Saamen, I. 1.

Bismuthum, I. 21.

Bistorta, I. 21. III. 37.

Bitumen Judaicum, I. 15.

Blaselwasser, I. 54.

Blaireau, I. 105.

Blanc de Baleine, I. 35.

Manger, II. 94.

de Plomb, I. 35.

Blatta Byzantina, I. 21.

Bled noir, I. 51.

Sarrasin, I. 51.

Bley, I. 86.

Bleyweis, I. 35.

Bleywurzel, I. 47.

Bluet, I. 45.

Blutstein, I. 57.

Blutegel, I. 59.

Bock, I. 59.

Bocksbart, I. 107.

Bodentilla, I. 111.

Boerenklau, I. 23.

Bœuf, I. 22.

Bohnen Sau-. I. 51.

Kraut, I. 96.

welsche, I. 50.

Bois gentil, I. 73.

de Garou, I. 73.

Saint, I. 73.

Boletum Cervinus, I. 21.

Boli Lithonriptici, II. 34.

in Quartana, II. 34.

Vermifugi, II. 34.

Bolus, I. 21.

Anthelminticus purgans, II. 34.

Bolus, *Armena præparata*, II. 34.
 Bombax, I. 21. III. 38.
 Bonette, I. 23.
 Bonne dame, I. 16.
 Bonus Henricus, I. 21. III. 38.
 Borax, I. 21.
 Boretzsch, I. 22.
 Borraccine, I. 22.
 Borrago, I. 22. III. 39.
 Bos, I. 22.
 Boffo, I. 24.
 Botrys, I. 22. III. 39.
 Mexicana, I. 22.
 Bouc, I. 59.
 Bougie, II. 69.
 Bouillon blanc, I. 108.
 Bovist, I. 22.
 Bovista, I. 22.
 Boulcau, I. 20.
 Bouquetine, I. 85.
 Bourgène, I. 52.
 Bourrache, I. 22.
 Bousserole, I. 111.
 Branca ursina, I. 23.
 Branche ursine, I. 23.
 Brassica, I. 22. III. 40.
 Bratachite, I. 23.
 Braunwurx, I. 98.
 Bray sec, I. 41.
 Brionia, I. 23.
 Britannica, I. 23.
 Brochet, I. 68.
 Brod, I. 81.
 Brombeeren, I. 92.
 Bruchkraut, I. 59.
 Brunella, I. 23. III. 39.
 Brunkressen, I. 77.
 Bruscus, I. 23. 93.
 Brustbeerlei, I. 62.
 Schwarzbeere, I. 98.
 Bruyere, I. 49.
 Bryonia, I. 23. III. 41.
 Bubendistel, I. 48.
 Buchen, I. 51.
 Buchs, I. 24.
 Buchwaizen, I. 51.
 Bue, I. 22.
 Bufo, I. 23. III. 41.
 Bufonites, I. 23.
 Bugle, I. 23.
 Buglossum, I. 23. III. 41.
 Bugula, I. 23.
 Bugula, I. 23. III. 42.
 Buis, I. 24.
 Bursa Pastoris, I. 23. III. 42.
 Burzel, I. 87.
 Butiro, I. 23.
 Butte, I. 46.
 Byster, I. 23.

Butterweckel, I. 82.
 Butyrum, I. 23.
 Antimonii, II. 7.
 Cacao, I. 24. II. 34.
 Majoranæ, II. 34.
 Rubrum, II. 35.
 Viride, II. 35.
 Buxus, I. 24. III. 42.
 Gaapeba, I. 24.
 Cabaret, I. 15.
 Cabbage bark, I. 24.
 Cacao, I. 24.
 Cacio, I. 30.
 Cacciù, I. 32.
 Cachou, I. 32.
 Caffè, I. 24.
 Cajeput, I. 25.
 Caille de lait, I. 54.
 Caillou, I. 100.
 Calambuc, I. 6.
 Calament, I. 25.
 Calaminaire, I. 25.
 Calaminaris lapis, I. 25.
 Calamintha, I. 25. III. 44.
 Calamita, I. 69.
 Calamus Aromaticus, I. 25. III. 42.
 Calcaire, I. 25.
 Calcarius, I. 25.
 Calcitrappa, I. 25. III. 44.
 Calendula, I. 25. III. 44.
 Calmus, I. 25.
 Calomelas, II. 115.
 Calx, I. 25.
 Antimonii lota, II. 8.
 Camedrio, I. 35.
 Camillen, I. 35.
 Camomilla, I. 35.
 Camomille, I. 35.
 Campechianum Lignum, I. 25.
 Camphora, I. 26.
 Camphorata, I. 26.
 Canard, I. 9.
 Cancrorum Chelæ, I. 26.
 Lapides, I. 26.
 Oculi, I. 26.
 Candelæ Chirurgicæ, II. 35.
 Fumales, II. 35.
 Mercuriales, II. 35.
 Candeola, II. 69.
 Canella alba, I. 26.
 Canellæ Clavelli, I. 26. 39.
 Canelle, I. 38.
 Girofflèe, I. 30.
 Canessirinde, I. 41.
 Canna, I. 15.
 Cannabis, I. 27. III. 45.
 Canneberge, I. 81.
 Cannella, I. 38.

- Cannella, Garofonata*, I. 30.
Cantarelle, I. 27.
Cantharides, I. 27. III. 45.
Caoutchou, I. 32.
Capaun, I. 27.
Capelvenere, I. 27.
Capillaire, I. 27.
Capillus Veneris, 27. III. 43.
Capo, I. 27.
Capparis, I. 27. III. 45.
Cappero, I. 27.
Cappone, I. 27.
Capres, I. 27.
Caprier, I. 27.
Caprifoglio, I. 27.
Caprifolium, I. 27.
Capro, I. 59.
Capucine, I. 77.
Capucinerlein, I. 77.
Carabè, I. 103.
Carannæ Gummi, I. 28.
Cardamine, I. 28. III. 46.
Cardamomum, I. 28. III. 46.
Cardenbenedictem, I. 28.
 wilde, I. 16.
Cardiaca, I. 28. III. 46.
Cardoncello, I. 98.
Cardopatium, I. 29.
Cardo salvatico, I. 29.
Cardosanto, I. 28.
Carduus benedictus, I. 28. III. 47.
 Mariæ, I. 28. III. 47.
 Tomentosus, I. 28. III. 47.
Caricæ, I. 29.
Carlina, I. 29. III. 48.
Carneol, I. 29.
Carneolus, I. 29.
Carobes, I. 100.
Carolo, I. 48.
Carcuge, I. 100.
Carpe, I. 29.
Carpio, I. 29.
Carpione, I. 29.
Carpobalsamum, I. 71.
Carthamus, I. 29. III. 48.
Caruba, I. 100.
Carvi, I. 29. III. 48.
Caryophyllata, I. 29. III. 49.
Caryophylli, I. 30. III. 49.
Cascarilla, I. 30.
Caseus, I. 30. 63.
Casse en batons, I. 30.
Cassepierre, I. 82.
Cassia Caryophyllata, I. 30.
 pro Clysteribus, II. 35.
 Extracta, II. 36.
 Fistola, I. 30.
 Fistula, I. 30. III. 50.
 Ligneæ, I. 30.
Cassia cum Manna, II. 35.
Cassia Flores, I. 39.
Cassonade, I. 93.
Cassumunar, I. 31.
Castagna, I. 31.
Castanea, I. 31. III. 50.
Castanie, I. 31.
 Ross, I. 59.
 wilde, I. 59.
Castoreo, I. 31.
Castoreum, I. 31. 51.
Cassuminar, I. 31.
Catagambar, I. 31.
Cataignes d'eau, I. 107.
Cataplasma Anodynum, II. 36.
 Antisepticum, II. 36.
 ex Bryonia, II. 36.
 Emolliens, II. 36.
 Maturans, II. 36.
 de Mica Panis, II. 36.
 Pomaceum, II. 37.
 Resolvens, II. 37.
 Saponaceum, II. 36.
 ad Scirrhus, II. 37.
Catapotia ad Catarrhos, II. 118.
Cataputia, I. 31. 32. III. 51.
Catapuzza, I. 32.
Catechu, I. 32.
Catholicum, II. 37.
Catrame, I. 86.
Catus, I. 32.
Causticum Antimoniale, II. 7.
 Commune, II. 37.
 Mitius, II. 37.
 Lunare, II. 97.
 Potentiale, II. 37. 97.
Ceci, I. 37.
Celeri, I. 12.
Celidonia maggiore, I. 36.
 minore, I. 36.
Cendres gravellèes, I. 38.
Centaurea minore, I. 32.
Centauree petite, I. 32.
Centaurium minus, I. 32. III. 53.
Centumnodia, I. 33. III. 52.
Cepa, I. 33. III. 54. 55.
Cera, I. 33.
 Arborea, II. 37.
 Citrina, II. 37.
 ad Crines, II. 37.
 Viridis, II. 37.
Cerasa, I. 33. III. 53.
Ceraforum Gummi, I. 34.
Cerasus Racemosa, I. 34. III. 53.
Ceratium, II. 38: 69.
 Amygdalatum, II. 38.
 Cosmeticum, II. 38.
 Detergens, II. 38.
 ad Labia, II. 38.

- Ceratum, Refrigerans, II. 38.
 Saturninum, II. 38.
 Cerberus triceps, II. 129.
 Cerfoglio, I. 34.
 Cerefolium, I. 34. III. 54.
 Cereoli, II. 38. 69.
 Cerevisia, I. 34.
 Cers, I. 34.
 Cerfeuil, I. 34.
 Cerifes, I. 33.
 à grappes, I. 34.
 Cervaria, I. 55.
 Ceruo, I. 34.
 Cerussa, I. 35.
 Antimonii, II. 38.
 Cervus, I. 34. III. 56.
 Ceterach, I. 35. III. 54.
 Ceti Sperma, I. 35.
 Chachvile, I. 30.
 Chalcitis, I. 110.
 Chalybs, I. 51.
 Chamædryas, I. 35. III. 56.
 Chamæpitys, I. 35. III. 57.
 Chamaras, I. 97.
 Chamomilla, I. 35. III. 57.
 Chaux, I. 27.
 Chapon, I. 27.
 Chardon benit, I. 28.
 à Foulon, I. 48.
 Marie, I. 28.
 Roland, I. 49.
 Sauvage, I. 29.
 Chassetaupe, I. 31.
 Chassis, I. 91.
 Chat, I. 32.
 Chataigne, I. 31.
 d' Eau, I. 107.
 Chauffetrappe, I. 25.
 Chaux vive, I. 25.
 Cheiri, I. 36. III. 58.
 Chelidoine, I. 36.
 Chelidonium, I. 36. III. 59.
 Chene, I. 89.
 Chermes, I. 36.
 Chevrefeuille, I. 27.
 Chicorée, I. 37. 49.
 Chiendent, I. 56.
 Chinæ Cortex, I. 36.
 Radix, I. 37.
 Chioui di Garofano, I. 30.
 Chocolata, II. 39.
 Choux, I. 22.
 marin, I. 101.
 Chrysolithus, I. 37.
 Ciboule, I. 33.
 Cicer, I. 37. III. 58.
 Cicerbita, I. 101.
 Cichorium, I. 37. III. 50.
 Cicoria, I. 37.
 Cicum, I. 55.
 Cicuta, I. 37. III. 59.
 Cigue, I. 37.
 des Marais, I. 84.
 Cina, I. 38.
 Cinghiale, I. 11.
 Cineres, II. 39.
 Clavellati, I. 38.
 Depurati, II. 39.
 Cini, I. 46.
 Cinnabaris, I. 38.
 Antimonii, II. 7.
 Cremor, II. 39.
 Factitia, II. 39.
 Nativa præparata, II. 40.
 Cinnamomum, I. 38.
 Cinoglossa, I. 46.
 Ciperò longo, I. 46.
 rotondo, I. 46.
 Cipolla, I. 33.
 bislunga, I. 33.
 Cipresso, I. 45.
 Cire, I. 33.
 Ciriesia a grappolo, I. 34.
 Ciriege, I. 33.
 Citreum Malum, I. 39. III. 61.
 Citron, I. 39.
 Citronade, I. 39.
 Citrullus, I. 39. III. 60.
 Clareta, II. 40.
 Claretum Aurantiorum Florum, II. 41.
 Barbadense, II. 40.
 Cacao, II. 40.
 Caffée, II. 41.
 Coronarium, II. 41.
 Frustrum, II. 41.
 Huile de Venus, II. 41.
 Nucleorum, II. 41.
 Clematis, I. 40. III. 61.
 Cloportes, I. 74.
 Cloux de Girofiles, I. 30.
 Clyfma Carminativum, II. 42.
 Commune, II. 42.
 Emolliens, II. 42.
 Leniens, II. 42.
 Nutriens, II. 42.
 Opiatum, II. 42.
 Simplex, II. 42.
 ad Soporosos affectus, II. 42.
 Terebynthinarum, II. 42.
 Clyffus Antimonii, II. 8.
 Cnidium Granum, I. 40.
 Cobaltum, I. 40.
 Cocciniglia, I. 40.
 Coccionella, I. 40.
 Coccognidium, I. 40. III. 62.
 Cocculi, I. 40.
 Cochenille, I. 40.
 Cochlea, I. 40. III. 61.

- Cochlearia, I. 40. III. 62.
 Coclearia, I. 40.
 Cocomero, I. 44.
 Coda Cavallina, I. 49.
 Codagapala, I. 41.
 Coinges, I. 45.
 Colchicum, I. 41. III. 63.
 Colla di pesce, I. 61.
 Colle des poissons, I. 61.
 Collutorium Antiscorbuticum, II. 42.
 Gingivale, II. 43.
 Odontalgicum, II. 43.
 Collyrium adstringens, II. 43.
 Album, II. 164.
 Cæruleum, II. 19.
 Comitis du Bourg, II. 19.
 Helvetii, II. 97.
 Lanfranci, II. 43.
 Resolvens, II. 43.
 Roborans, II. 43.
 Sapphirinum, II. 19. 43.
 Colocynthis, I. 41. III. 62.
 Colofonia, I. 41.
 Colombo, I. 41.
 Colophonium, I. 41.
 Coloquint, I. 41.
 Coloquintida, I. 41.
 Colsat, I. 76.
 Colubrinum Lignum, I. 41.
 Conchæ, I. 41.
 Citratæ, II. 43. 109.
 Præparatæ, II. 44.
 Conchiglie, I. 41.
 Concombre, I. 44.
 Sauvage, I. 44.
 Conditæ, II. 44.
 Conditum de Cidoniis, II. 106.
 Confectio Alkermes, II. 44.
 Anisi Laxativa, II. 44.
 Cinnamomi Regia, II. 45.
 Diacodion, II. 156.
 Hamech, II. 45.
 de Hyacintho, II. 45.
 Japonica, II. 56.
 de Rebecha, II. 46. 166.
 Universalis, II. 46. 55.
 Confectiones siccæ, II. 45.
 Conserva Millepedum, I. 74.
 Rosarum solida, II. 137.
 Conservæ, II. 46.
 Vitriolatæ, II. 46.
 Consolida, I. 42. III. 65.
 Major, I. 42. 103.
 Media, I. 23. 42.
 Consolida maggiore, I. 103.
 Consoude grande, I. 103.
 Contra Semence, I. 38.
 Contrajerva, I. 42.
 Conyza Cærulea, I. 42. III. 64.
 Conyza Media, I. 42. III. 64.
 Vulgaris, I. 42. III. 64.
 Copaiba Balsamum, I. 42.
 Copal Gummi, I. 42.
 Coq, I. 18.
 Coquelicot, I. 81.
 Coquelourde, I. 88.
 Coquerets, I. 5.
 Coquilles, I. 41.
 Corailles, I. 42.
 Corallen, I. 42.
 Corallenmoos, I. 43.
 Corallia, I. 42. 43. III. 66.
 Præparata, II. 44.
 Corallina, I. 43. III. 68.
 Corallina de Corse, I. 53.
 Coralline de Malte, I. 58.
 Coriander, I. 43.
 Coriandro, I. 43.
 Coriandrum, I. 43. III. 63.
 Corinthen, I. 82.
 Corna, I. 43. III. 65.
 Cornalina, I. 29.
 Cornaline, I. 29.
 Corne de Cerf, I. 43.
 Corneille, I. 68.
 Cornichons, I. 44.
 Corniole, I. 43.
 Cornouilles, I. 43.
 Cornu Cervi, I. 34.
 Auratum, II. 46.
 sine Igne præparat, II. 47.
 Philosoph. præparat, II. 47.
 Præparatum, II. 47.
 Raspatum, I. 34.
 Rasura, I. 34.
 Tornatum, I. 34.
 Ustum, II. 47.
 Cornuum præparatio, II. 47.
 Coronopo, I. 43.
 Coronopus, I. 43. III. 67.
 Corrector, II. 140.
 Corteccia Peruviana, I. 36.
 Cortex Peruvianus, I. 36.
 Coryli Lignum, I. 16.
 Cosmeticum Clavii, II. 47. 103.
 Costo, I. 18.
 Costus, I. 43.
 Hortensis, I. 18.
 Cotogni, I. 45.
 Coton, I. 21.
 Cotone, I. 21.
 Cotula foetida, I. 36.
 Couleuvre, I. 23.
 Bois, I. 41.
 Courbaril, I. 10.
 Courge, I. 44.
 Craic, I. 43.
 Cranium humanum, I. 43.

- Crapaud*, I. 23.
Crapaudine, I. 23. 99.
Crassula, I. 43. III. 66.
Crayon rouge, I. 92.
Cremor Barbadosis, II. 40.
 Lactis, I. 63.
 Tartari, II. 47.
Crepitus Lupi, I. 22. 43.
Crescione, I. 28.
Cresson, I. 77.
 d' Eau, I. 77.
 des Près, I. 28.
 de Roche, I. 77.
 Sauvage, I. 77.
Creta, I. 43.
Creuzelkraut, I. 98.
Creuzkraut, I. 44.
Crichnum, I. 43. III. 68. 69.
Crocus, I. 43. III. 68.
 Antimoniatus, II. 47.
 Antimonii, II. 47. 48. 95.
 Martis, adstringens, II. 47.
 Aperitivus, II. 47.
 Metallorum, II. 48. 95.
 Solis, II. 48.
Croisette, I. 44.
Cropal, I. 41.
Cruciata, I. 44. III. 70.
Crues, I. 34.
Crytalli Lunæ, II. 48. 97.
Crytallum Minerale, II. 48. 98.
Crytallus montana, I. 44.
 præparata, II. 48.
Cubebæ, I. 44.
Cucumer, I. 44.
Cucumis, I. 44. III. 70. 71.
Cucurbita, I. 44. III. 73.
aux Cuillerès herbe, I. 40.
Cuire, I. 45.
Culilavvan, I. 44.
Cuminum, I. 45. III. 72.
Cupressus, I. 45. III. 67.
Cuprum, I. 45.
 Ammoniacum, II. 48. 146.
Curage, I. 83.
Curassavensis Cortex, I. 17.
Curcuma, I. 45.
Cuscuta, I. 45. III. 73.
Cyanus, I. 45. III. 71.
Cyclamen, I. 45. III. 74.
Cydonia, I. 45. III. 74.
Cymbalaria, I. 46. III. 74.
Cymbelkraut, I. 46.
Cynoglossum, I. 46. III. 75.
Cynosbatos, I. 46.
Cyperus longus, I. 46. III. 70.
 Rotundus, I. 46.
Cyprés, I. 45.
- Dachs*, I. 105.
Dactyli, I. 46. III. 26.
Daguet, I. 34.
Datteln, I. 46.
Datteri, I. 46.
Dattes, I. 46.
Daucus, I. 47. III. 76.
Decoctum album, II. 48.
 Amarum, II. 48.
 Antipforicum, II. 48.
 Antiscorbuticum, II. 49.
 Antivenereum, II. 49.
 Laxans, II. 49.
 Avenaceum, II. 49.
 Chinæ Radicis, II. 49.
 Citri, II. 50.
 Commune, II. 50.
 Cornu Cervi citrat. II. 50.
 Febrifugum, II. 50.
 Laxans, II. 50.
ad Fungos Articular. II. 50.
Hordei, II. 50. 51.
 Citratum, II. 50.
Ipecacuanhæ, II. 51.
Lapathi, II. 51.
Lignorum, II. 51.
Pectorale, II. 51.
Saturninum, II. 5.
Sudoriferum, II. 51.
Défenses, I. 12.
Defrutum, I. 110.
Dens Leonis, I. 104.
Dent de cheval marin, I. 59.
Dentalia, I. 47.
Dentaria, I. 47. III. 77.
Dente di Caval marino, I. 59.
Dentellaria, I. 47. III. 47.
Dentium præparatio, II. 52.
Diacrydion, II. 52.
Diacaryon, II. 135.
Diacodion, II. 52.
Diacodium liquidum, II. 154.
Diacrydium, I. 96. II. 52.
Diacydonium Aromaticum, II. 52.
 Jalappinum, II. 52.
 Lucid. Jalapp. II. 52.
 Simplex, II. 53.
Diamant, I. 3.
Diamante, I. 3.
Diaphoreticum Joviale, II. 7.
Dictamnus, I. 47. III. 78.
Digestivum liquefactum, II. 53.
Digitalis, I. 47. III. 78.
Dinrenbeerlein, I. 66.
Dipsacus, I. 48. III. 79.
Doitier, I. 47.
Domppe Venin, I. 59.
Doronicum, I. 48. III. 81.
Douse amere, I. 7.

- Draconis sanguis, I. 48.
 Dracunculus, I. 48. III. 80.
 Dragun, I. 48.
 Dreche, I. 69.
 Dreyfaldigkeit, I. 60.
 Dulcamara, I. 48.
 Durchwachs, I. 83.
 Durrwurcz, I. 42.
 Dyll, I. 9.
 Eau d'Arquebusade, II. 29.
 de Bouquet, II. 41.
 Divine, II. 40.
 de Lavande, I. 65.
 de Luce, II. 149.
 Sans pareille, II. 21.
 de Madame la Vrilliere, II. 43.
 de Violettes Beaumè, II. 22.
 Ebenum Lignum, I. 48.
 Ebertswurzel, I. 29.
 Ebulus, I. 48.
 Ebulus, I. 48. III. 81.
 Ebur, I. 48.
 Fossile, I. 48.
 Ustum, I. 48. II. 53.
 Eclair, I. 36.
 Eclegma, II. 53.
 Edera, I. 57.
 Ehrenpreis, I. 108.
 weiblein, I. 49.
 Egel, I. 59.
 Eiche, I. 89.
 Einbeere, I. 82.
 Einhorn, I. 110.
 Eisen, I. 51.
 Eisenhutlein, I. 3.
 Eisenkraut, I. 108.
 Elæosaccharum, II. 53.
 Aurantiorum, II. 53.
 Citri, II. 53.
 Myrrhæ, II. 54.
 Elaterium, II. 54.
 Elatina, I. 49.
 Elatine, I. 49. III. 79.
 Electuarium Anthelminticum, II. 54.
 Antifebrile, II. 54.
 e Baccis Lauri, II. 54.
 Cathol. II. 55.
 pro Clyster II. 55.
 Dupl. c. Rh. II. 55.
 Chalybeatum, II. 56.
 Dentific. II. 56.
 Diasatyrium, II. 56.
 Diascord. *Frac.* II. 56.
 Suecor. II. 56.
 Diatragacanthæ, II. 57.
 ad Gingiv. *Trill.* II. 57.
 Gingivale, *Argent.* *ibid.*
 Hamech, II. 45.
 Electuarium Hiera picra, II. 57.
 Hydragogum, II. 58.
 pro Infantibus, II. 58.
 Joviale, II. 58.
 Lenitiv. *Austr.* II. 58.
 Florenz. II. 58.
 ad morbos Pforicos, II. 58.
 de Manna, II. 59.
 Mithridaticum, II. 59.
 Mundificans, II. 59.
 pro Pecoribus, II. 60.
 Pectorale, II. 60.
 Philonium Rom. *ibid.*
 Purgans, II. 60.
 Requies *Nicol.* II. 60.
 Resumtivum, II. 61.
 ad Stomacacen, II. 61.
 ad Tæniæ, II. 58.
 Tamarind. II. 58. 61.
 Theriaca Andr. II. 61.
 Elemi Gummi, I. 49.
 Elendsklauen, I. 5.
 Elephantenlaus, I. 9.
 Elffenbein, I. 48.
 Elixir, II. 62.
 Acidum *Dippelii*, II. 20. 62.
 Haller, II. 63.
 Aloes Saponaceum, II. 63.
 Antharthriticum, II. 63.
 Anthelminticum, II. 63.
 Anticolicum Crocatum, II. 63.
 Antinephriticum, II. 20.
 Antipodag. *Dippelii*, II. 20.
 Guldenklee, II. 63.
 Antiscorbuticum, II. 64.
 Antivenereum, II. 64.
 Aperitivum, II. 64.
 Balsamicum *Hoffm.* II. 64.
 Pectorale, II. 64.
 Temperatum, II. 65.
 VVerlhofii, II. 65.
 Citri, II. 65.
 Purgans, II. 65.
 de *Garus*, II. 65.
 Juniperinum, II. 66.
 Pectorale Regis Daniæ, II. 66.
 Ringelmanni, II. 66.
 VVedelii, II. 66.
 Polychrestum, II. 66.
 Proprietatis sine Acido, II. 66.
 Album, II. 66.
 Amarum, II. 64.
 Dulce, II. 66.
 Paracelsi, II. 67.
 Rhabarbar, II. 67.
 Stablii, II. 63.
 Stomachicum *Edinb.* II. 67.
 Rosenstein, II. 67.
 Stoughton, II. 67.

Elixir Uterinum, II. 68.
 Viscerale *Roseen*, II. 68.
 Vitæ Matth., II. 68.
 Vitriol Mynsich., II. 69.
 Acidum Edinb., II. 69.
 Dulce Edinb. II. 69.
Elfenbaum, I. 34.
Elleboro, I. 57.
Ellera terreſtre, I. 57.
Emeraude, I. 100.
Emery, I. 100.
 Emplaſtrum, II. 69.
 Abbat. *de Gracè*, II. 70.
 Adhæſivum, II. 70.
 Album coctum, II. 70.
 de Ammoniaco, II. 70.
 c. Mercur. II. 70.
 Anglicum, II. 71.
 Anodynum, II. 71.
 in Cancro, II. 71.
 Antapoplecticum, II. 71.
 Attrahens, II. 72.
 de Baccis Lauri, II. 72. 74.
 Suecor. II. 74.
 de Belladonna, II. 72.
 de Betonica, II. 72.
 ad Bubones vener. II. 72.
 Camphoratum, II. 72.
 Catagmaticum, II. 73.
 Cephalicum, II. 73.
 de Cicuta, II. 73.
 Citrinum, II. 73.
 ad Clavos Pedum, II. 73.
 Commune, II. 73. 75.
 de Cruſta Panis, II. 73.
 de Cumino, II. 74.
 Defenſivum, II. 74.
 Diabotanum, II. 74.
 Diachalcitis, II. 75.
 Diachylon c. Gum. II. 75.
 Diapalmæ, II. 76.
 Diaphœnicon, II. 76.
 Diaphoreticum, II. 76.
 Diapompholygos, II. 76.
 Diaſulphuris, II. 76.
 Divinum, II. 76.
 ad Dolor. dentium, II. 73. 77.
 Domus Miſericordiæ, II. 73. 79.
 Epiſpaticum, II. 77.
 Filii *Zacharia*, II. 81.
 Ad Fonticulos, II. 38.
 ad Fracturas, II. 73.
 Frigidum, II. 77.
 ad Fungos Articul. II. 77.
 de Galbano, II. 78.
 ad Gangliâ, II. 77.
 Gryſeum, II. 78.
 Gummoſum, II. 75.
 ad Hernias, II. 78.

Emplaſtrum de Hyoſcyamo, II. 78.
 Incognitum, II. 78.
 Iſchiaticum, II. 79.
 de Lap. Calamin. II. 75.
 VVeck. II. 78.
 ad Lupiam, II. 79.
 Magneticum, II. 79.
 Mammillare, II. 79.
 Malaſticum, II. 79.
 Manus Dei, II. 77.
 de Meliloto, II. 79.
 Mercuriale, II. 79.
 de Minio, II. 73. 79.
 Miraculoſum, II. 79. 81.
 de Nicotiana, II. 79.
 Nigrum, II. 80.
 Noricum, II. 79. 80.
 Opodeldoch, II. 77. 80.
 Oxycroceum, II. 80. 81.
 Polychr. II. 70. 80. 81.
 de Ranis, II. 80.
 c. Merc. II. 81.
 Santalinum, II. 81.
 Saponatum, II. 81.
 Saturn. *Barbett.* II. 81.
 Goulard, II. 81.
 Mynſicht. II. 81.
 de Spermate Ceti, II. 81.
 Ranarum II. 82.
 Spleneticum, II. 73. 82.
 Stictic. *Crollii*, II. 82.
 Plenck. II. 70. 82.
 Stomachicum, II. 74.
 de Tacamahaca, II. 82.
 ad Tempora, II. 73. 82.
 Tetrapharmacum, II. 73.
 Triapharm. II. 79. 82.
 Veficatorium, II. 82.
 Viride, II. 73. 83.
 Emulſio, II. 83.
 Arabica, II. 83.
 Balfamica, II. 83.
 Camphorata, II. 83.
 Nitrata, II. 83.
 Simplex, II. 83.
 Violata, II. 83.
Encens, I. 79.
Ende, I. 34.
Endivia, I. 49. III. 81.
Endivien, I. 49.
Engelſus, I. 87.
Engliſcher Taffer, II. 71.
Ens Veneris, II. 83.
Entalia, I. 49.
Ente, I. 9.
Enula, I. 6.
Enula, I. 49. III. 87.
Eparica, I. 58.
Ephen, I. 57.

- Epine blanche*, I. 81.
Vinette, I. 20.
Epithimum, I. 45. 49.
Epitimo, I. 45.
Eponge, I. 101.
Eppich, I. 12.
Epsonense Sal, I. 10.
Epurge, I. 32.
Equisetum, I. 49. III. 82. 83.
Erable, I. 2.
Erba di S. Barbara, I. 18.
Benedetta, I. 29.
Giudaica, I. 42.
Erbacali, I. 43.
Erdbeeren, I. 52.
Erica, I. 49. III. 84.
Erinaceus, I. 49. III. 86. 87.
Eringe, I. 49.
Erisamo, I. 50.
Erlen, I. 6.
Ernaria, I. 59.
Erndtrose, I. 69.
Eruca, I. 49. III. 82.
Ervum, I. 80.
Eryngium, I. 49. III. 85.
Erysimum, I. 50. III. 86.
Eschalodes, I. 5.
Eschenbaum, I. 52.
Esprit de Savon, II. 23.
Essentia, II. 83.
Alexipharmaca, II. 84.
Temperata, II. 84.
Amara, II. 84.
Ambrae, I. 7. II. 84.
Sicca, II. 85.
Anodyna, II. 85.
Antimonii, II. 12. 85.
Balsamica, II. 85.
Bezoardica, II. 85.
Calami, II. 85.
Camphoræ, II. 85. 150.
Carminativa Triller, II. 85.
Vvedel, II. 86.
Castorei, II. 86.
Catholica, II. 86.
Purgans, II. 63.
Chinæ, II. 86.
Dulcis, II. 86.
Fuliginis, II. 86.
Hysterica, II. 87.
Lignorum, II. 87.
Sicca Aurantium, II. 53.
Citri, II. 53.
Myrrhæ, II. 54.
Stomach. Hoffmann, II. 87.
Polychresta, II. 87.
Succini, II. 87.
Traumatica, II. 88.
Essig, I. 3.
Tom, I.
- Estragon*, I. 48.
Esula, I. 50. III. 87.
Etain, I. 102.
Eufraise, I. 50.
Eupatoire, I. 50.
Eupatorio, I. 50.
Eupatorium, I. 50. III. 11.
Euphorbium, I. 50.
Euphrasia, I. 50. III. 88.
Extractum, II. 88.
Aconiti, II. 88.
Aloes, II. 7.
Belladonnæ, II. 88.
Catholicum, II. 88.
Chelidonii Majoris, II. 88.
Cicutæ, II. 88.
Cochleariæ, II. 88.
Hellebori nigri, II. 88.
Hyoscyami, II. 88.
Liquiritiæ gummof., II. 89.
Marocostinum, II. 89.
Nicotianæ, II. 88.
Opii, II. 89.
Cydoniatum, II. 89.
Panchymagogum, II. 90.
Rudi, II. 90.
Saturni, II. 90.
Strammonei, II. 88.
Taraxaci, II. 88.
Eydexe, I. 64.
Eyerweis, I. 54.
Faba, I. 50. III. 90.
Crassa, I. 50.
Marina, I. 110. III. 274.
Sancti Ignatii, I. 50.
Farberrhoethe, I. 92.
Faggio, I. 51.
Fagopyrum, I. 51. III. 88.
Fagus, I. 51. III. 88.
Fangzahne, I. 12.
Faon, I. 34.
Farfara, I. 51. III. 89.
Farfaro, I. 51.
Farinæ Emollientes, II. 90.
Resolventes, II. 90.
Farren, I. 51.
Fava marina, I. 110.
Favagello, I. 43.
Faulbaum, I. 52.
Febrifugum Craanii, II. 90.
Fecula, II. 90.
Feigen, I. 29.
Feigbohnen, I. 68.
Feigwarzwurzel, I. 36.
Felandrio, I. 84.
Felce, I. 51.
Feldkressen, I. 77.
Fel Vitri, I. 51.

Fenchel, I. 52.
Fenouil, I. 52.
 de Mer, I. 43.
Fer, I. 51.
Ferrum, I. 51.
Fette Henne, I. 43. 50.
Fève des Marais, I. 50
Fichi, I. 29.
Fieberkraut, I. 105.
Fiel de Verre, I. 51.
Figues, I. 29.
Filipendula, I. 51. III. 90.
Filix, I. 51. III. 91.
Fingerhut, I. 47.
Finocchio, I. 52.
Fior di donna, I. 88.
Fioraliso, I. 45.
Fiorrancino, I. 25.
Fischbeid, I. 99.
Flachs, I. 67.
Flacseide, I. 45.
Flambe batarde, I. 3.
Flammula Jovis, I. 40. III. 61.
Fleurs de Muscade, I. 68.
Fliegen Spanische, I. 27.
Flæhkraut, I. 83.
Floehsaamen, I. 88.
Flores Antimonii, II. 90.
 Benzoës, II. 91.
 Salis Ammoniac. Mart. II. 91.
 Sulphuris, II. 91.
 Viridis Æris, II. 91.
 Zinci, II. 91.
Fœniculum, I. 52. III. 91.
 Dulce, I. 52.
 Italicum, 52.
Fœnuagræcum, I. 52. III. 92.
Fomentatio frigida, II. 92.
Fomentum Anodynum, II. 92.
 ad Erysipelas, II. 92.
Formica, I. 52.
Fotus ad Gangrænam, II. 92.
Fougere, I. 51.
Fourmi, I. 52.
Fragaria, I. 52. III. 92.
Fragole, I. 52.
Fraicasse, I. 33.
Frais de Grenouilles, I. 89.
Fraïses, I. 52.
Fraïstor, I. 52.
Framboïses, I. 93.
Franchipane, I. 63.
Frangula, I. 52. III. 92.
Franzosenholz, I. 56.
Frassino, I. 52.
Fraueneis, I. 55.
Frauenhaar, I. 27.
Frauenmantel, I. 5.
Frauenmusz, I. 18.

Fraxinus, I. 52. III. 91.
Frêne, I. 52.
Fromage, I. 30.
Frosch, I. 89.
Froschlauch, I. 89.
Fu, I. 84.
Fuchs, I. III.
Fuden faule, I. 41.
Fuliggine, I. 53.
Fuligo, I. 53.
Fumaria, I. 53. III. 93.
Fume terre, I. 53.
Fummosterno, I. 53.
Fünf Finger Kraut, I. 82.
Furfures, I. 53.
 Amygdalarum, I. 9.

Ganserich, I. 11.
Gaglio, I. 54.
Galanga, I. 53.
Galbanum, I. 53.
Galbuli, I. 45.
Galda, I. 52.
Galega, I. 54. III. 94.
Galeopsis, I. 54. III. 94.
Galitzenstein, I. 110.
Gallæ, I. 54. III. 95.
Gallapfel, I. 54.
Gallina, I. 54.
Gallitrichum, I. 59.
Gallium, I. 54. III. 95.
Galmey, I. 25.
Gamanderlein, I. 35.
Gans, I. 11.
Garance, I. 92.
Garderobe, I. 1.
Gargarisma Acetosum, II. 92.
 Adstringens, II. 92.
 Antiscorbuticum, II. 92.
 Detergens, II. 92.
 Emolliens, II. 92.
 Mercuriale, II. 93.
 ad Picuitam, II. 93.
 c. Spir. Sal. Ammon. II. 93.

Gartencypressen, I. 1.
Gatto, I. 32.
Gauchheil, I. 9.
Geigenharz, I. 41.
Geisbart, I. 18.
Geisrauten, I. 54.
Gelatina, II. 93. 135.
 Analeptica, II. 93.
 Cornu Cervi Amygd. II. 94.
 Citrata, II. 94.
 Cydoniorum, II. 53.
 Fructuum, II. 94.
 Liquiritiæ, II. 89.
Gelatum, II. 135.
Gelsomino, I. 61.

- Gemsenkugel*, I. 4.
Gemsenwurzel, I. 48.
Genet, I. 54.
Genevre, I. 62.
Genippi, I. 1.
Genista, I. 54. III. 95.
Gentiana, I. 55. III. 100.
Gentianella, I. 55.
Gentienne, I. 55.
Genziana bianca, I. 55.
 fosca, I. 55.
 negra, I. 55.
Geranio, I. 55.
Geranium, I. 55. III. 98. 99.
Germandrèe, I. 35.
Gerste, I. 59.
Geveih, I. 34.
Giacinto, I. 60.
Giallamina, I. 25.
Gichero, I. 15.
Giftheil, I. 11.
Giglio bianco, I. 66.
Gilla, II. 94.
Ginepro, I. 62.
Ginestra, I. 54.
Gingembre, I. 112.
Ginseng, I. 55.
Girasole, I. 57.
Girofflèe, I. 36.
Giuggole, I. 62.
Giusquiamo, I. 60.
Glacies Mariæ, I. 55.
Glas, I. 110.
Glasgall, I. 51.
Glaskopf, I. 57.
Glaskraut, I. 82.
Gliedkraut, I. 99.
Globuli Carminativi, II. 94.
 Martiales, II. 94.
 Moschati, II. 95.
Globus ad Erysipelas, II. 94.
Glouteron, I. 18.
 petit, I. 111.
Glu, I. 109.
Gluten Pectorale, II. 89. 95.
Glycyrrhiza, I. 55. III. 94.
Goensblumen, I. 19.
Goensdistel, I. 101.
Gold, I. 17.
Golden Gansel, I. 23.
Goldenvilderthon, I. 3.
Goldwurzel, I. 15.
Gomma arabica, I. 12.
Gomme Senegal, I. 12.
Gossypium, I. 56.
Gottesnadenkraut, I. 56.
Goudron, I. 86.
Goutte de Lin, I. 45.
Grains de Musc, I. 1.

- Grains du Canellier*, I. 39.
Gramen, I. 56. III. 97.
Gramigna, I. 56.
Granato, I. 56.
Granatum, I. 56. III. 97.
Granatus, I. 56.
Grani di Musco, I. 1.
Grasblume, I. 107.
Grateron, I. 11.
Gratiola, I. 56. III. 101.
Grattecul, I. 46.
Gremil, I. 73.
Grenouille, I. 89.
Grieskraut, I. 72.
Grindwurzel, I. 64.
Grosseilles, I. 91.
Grossularia, I. 91.
Grualtum, I. 16.
Grundheil, I. 80.
Grunspan, I. 109.
Guajacum, I. 56.
Gui, I. 109.
Guimauve, I. 6.
Gundelreb, I. 57.
Guttæ Anglicæ, II. 95.
 Generalis de la Motte, II. 95.
 Albæ, II. 95.
Gummi, I. 56.

- Haarstrang*, I. 84.
Haas, I. 66.
Habern, I. 16.
Hæmatites, I. 57.
Hagenbutte, I. 46.
Habnenfus, I. 90.
Habnenfuslein, I. 27.
Halicacabum, I. 5. III. 15.
Hanf, I. 27.
Hanneton, I. 97.
Harnkraut, I. 67.
Harnkrautel, I. 59.
Hartriegel, I. 66.
Harz, I. 90.
Haselnuff, I. 16.
 Remische, I. 16.
Haselwurzel, I. 15.
Hauchechel, I. 79.
Hausblase, I. 61.
Hauswurzel, I. 98.
Hecht, I. 68.
Hedera, I. 57. III. 102.
Hederæ Gummi, I. 57.
Heide, I. 49.
Heidelbeeren, I. 76.
Heidenkorn, I. 51.
Helenæ S. Radix, I. 58.
Helenium, I. 49. III. 87.
Helianthemum, I. 57. III. 101.
Heliotropium, I. 57. III. 102.

Helleboræ batard, I. 57.
Helleborus, I. 57. III. 103.
Helminthochorton, I. 58.
Henne, I. 54.
Hepar Antimonii, II. 95. 135.
Hepatica, I. 58. III. 104. 105.
Hepatique d'eau, I. 58.
Herbe de S. Barbe, I. 18.
 aux Chats, I. 77.
 à Eternuer, I. 88.
 de la Goutte, I. 91.
 aux Perles, I. 73.
 aux Puces, I. 88.
Herisson, I. 49.
Hermodactyli, I. 58. III. 104.
Herniaria, I. 59. III. 106.
Herniole, I. 59.
Heron, I. 12.
Herzblumlein, I. 58.
Herzgespann, I. 28.
Hetre, I. 51.
Himbeere, I. 93.
Himmelschlüssel, I. 87.
Himmelstengel, I. 55.
Hinnulus, I. 34.
Hippocastanum, I. 59.
Hippopotami Dentes, I. 59. III. 106.
Hircus, I. 59.
Hirondelle, I. 59.
Hirsch, I. 34.
Hirschbrunst, I. 21.
Hirschkalb, I. 28.
Hirschwurzel, I. 55.
Hirudo, I. 59.
Hirundinaria, I. 59. III. 107.
Hirundo, I. 59. III. 101.
Hispidula, I. 17.
Hohlwurzel, I. 13.
Holder, I. 95.
Holderschwammchen, I. 17.
Homme, I. 59.
Homo, I. 59.
Honig, I. 71.
Hopfen, I. 68.
Hordeum, I. 59. III. 107.
Horminum, I. 59. III. 106.
Houblon, I. 68.
Houx petit, I. 93.
Huile des Fleurs d'Oranges, II. 4.
 d'Oeillers, I. 81.
Hundskoth, I. 4.
Hundszunge, I. 46.
Hunedarm, I. 6.
Hyacinthus, I. 60.
Hydrargyrum, I. 73.
Hydromel, II. 95.
Hydropiper, I. 83.
Hyoscyamus, I. 60. III. 107.
Hypericum, I. 60. III. 108.

Hypocystidis Succus, I. 60.
Hyssopus, I. 60. III. 108.
Hystricis lapis, I. 60.

Jacea, I. 60. III. 109.
Jacinthe, I. 60.
Jacobæa, I. 60. III. 108.
Jacobszwiebel, I. 33.
Jalapa, I. 61.
Jalappa, I. 61.
Japonica terra, I. 32.
Jasminum, I. 61. III. 100.
Ibisch, I. 6.
Ichthyocolla, I. 61.
Idropepe, I. 83.
Je lienger je lieber, I. 7.
Jesuitarum Cortex, I. 36.
Igel, I. 49.
Igher, I. 112.
Immortelles jaunes, I. 102.
Imperatoria, I. 61. III. 110.
Indaco, I. 61.
Indi folia, I. 61.
Indigo, I. 61.
Indivia, I. 49.
Infusum amarum, II. 95.
 Angelicum, II. 95.
 Laxativum, II. 95.
 Malti, II. 96.
 Picis, II. 96.
 Rhei Salinum, II. 162.
 Saponaceum, II. 30.
Ingber, I. 112.
Ingruin, I. 108.
Injectio auricularis, II. 96.
 Balsamica, II. 96.
 Detergens, II. 96.
 Mercurialis, II. 96.
Intybus, I. 49.
Johannesbrod, I. 100.
Johannisbeeren, I. 91.
Johanniskraut, I. 60.
Johannistrauben, I. 91.
Joubarbe, I. 98.
Ipecacuanha, I. 61.
Ipequaquana, I. 61.
Iperico, I. 60.
Ippocastano, I. 59.
Ipposelino, I. 12.
Iride spuria, I. 3.
 Fiorentina, I. 62.
Iris, I. 62. III. 111.
Isop, I. 60.
Isopo, I. 60.
Iva, I. 35.
Jubabæ Cortex, I. 62.
Judaicum Lapis, I. 62.
Judenkirschen, I. 5.
Jvene, I. 35.

Juglans Nux, I. 62. III. 109.
 Jujubæ, I. 62. III. 110.
 Jujubes, I. 62.
 Julapium Regium, II. 96.
 Julepus acidulatus, II. 96.
 Rosarum, II. 96.
 Violarum, II. 96.
 Juniperus, I. 62. III. 112.
 Ivôire, I. 48.
 Jusquame, I. 60.

 Kas, I. 30.
 Kalkstein, I. 25.
 Kameelheu, I. 97.
 Kartendistel, I. 48.
 Katze, I. 32.
 Katztindapplein, I. 17.
 Katzenkraut, I. 77.
 Katzentrauben, I. 98.
 Katzenvadel, I. 49.
 Katzenwurzel, I. 84.
 Kaulparstein, I. 83.
 Kayfersalat, I. 48.
 Kellersel, I. 74.
 Kermes mineralis, II. 96.
 Kesselbeeren, I. 81.
 Keste, I. 31.
 Kickerebsen, I. 37.
 Kieselstein, I. 100.
 Küchenschell, I. 88.
 Kikenumalo, I. 63.
 Kino, I. 63.
 Kuchensalz, I. 94.
 Kurbis, I. 44.
 Esels, I. 44.
 Kirschen, I. 33.
 Cornel, I. 43.
 Herz, I. 33.
 VVald, I. 33.
 VVasser, I. 34.
 VVelsche, I. 43.
 Klapperosen, I. 81.
 Klebkraut, I. 11.
 Klee, I. 107.
 Kleine Mistmelten, I. 1116.
 Kletten, I. 18.
 Kleyen, I. 53.
 Knoblauch, I. 5.
 Kœnigsgelb, I. 14.
 Kœrbelkraut, I. 34.
 Kohl, I. 22.
 Kolben, I. 34.
 Komblume, I. 45.
 Korck, I. 103.
 Krahenaugen, I. 111.
 Krahenfus, I. 43.
 Kraut, I. 22.
 vveis, I. 99.
 Krebsaugen, I. 26.

Kreide, I. 43.
 Kressen, I. 77.
 vullder, I. 18.
 Kreuzbeerlein, I. 101.
 Kreuzblume, I. 87.
 Kreuzelkraut, I. 98.
 Krætes, I. 23.
 Stein, I. 23.
 Kummel Berg, I. 45.
 Matten, I. 29.
 Schwarzer, I. 78.
 Kunigundenkraut, I. 50.
 Kupfer, I. 45.

 Lablab, 63.
 Lac, I. 63.
 Lunæ, I. 63.
 Sulphuris, II. 97.
 Virginum, I. 20. II. 97.
 Lacca, I. 63.
 Lachenknoblauch, I. 97.
 Lacerta, I. 64. III. 116.
 Lacmus, I. 57.
 Lacryma Job, I. 64.
 Lactuca, I. 64. III. III. 113.
 Virosa, I. 64.
 Ladanum Gummi, I. 64.
 Ladys black sticking plaister, II. 71.
 Lait, I. 63.
 Laitron, I. 101.
 Laitné, I. 64.
 Lakrizenholz, I. 55.
 Lamium, I. 64.
 Plinii, I. 72.
 Lampione, I. 93.
 Lampreda, I. 76.
 Langue de Chien, I. 46.
 Serpent, I. 79.
 Lapathum, I. 64. III. 112.
 Lapazio, I. 23. 64.
 Lapidum præparatio, II. 98.
 Pretiosiorum fragment, I. 56.
 Lapis causticus, II. 37. 97.
 Divinus, II. 97.
 Infernalis, II. 97.
 Lyncis, I. 19.
 Martialis, II. 97.
 Medicamentos. Crollii, II. 97.
 Geoffr. II. 98.
 Ophthalmicus, II. 97.
 Prunellæ, II. 98.
 Lapislazulo, I. 65.
 Lappola minore, I. 111.
 Latte, I. 63.
 Lattuga, I. 64.
 Lauch, I. 87.
 Laudano, I. 64.
 Laudanum liquidum, II. 98.
 Opium, II. 98.

- Lavendula, I. 65. III. 112.
Laureola, I. 73.
Laureole Semence de, I. 40.
Laurier, I. 65.
Lauro, I. 65.
Laurocerafus, I. 65.
Laurus, I. 65. III. 116.
 Alexandrina, I. 111. III. 115.
Lauskraut, I. 57.
Laus-Saamen, I. 93.
Laxulus Lapis, I. 65.
Leberkraut, I. 58.
Legno santo, I. 56.
Lemitchorton, I. 58.
Lemnia terra, I. 65.
Lens, I. 66. III. 114.
 Palustris, I. 66. III. 114.
Lente, I. 66.
Lentille, I. 66.
Lentiscus, I. 66. III. 121.
Lepidi, I. 66.
Lepidium, I. 66. III. 115.
Lepre, I. 66.
Lepus, I. 66. III. 117.
Lerchenschwamm, I. 4.
Levecne, I. 66.
Levisticum, I. 66. III. 116.
Levuar, I. 76.
Lezard, I. 64.
Lianna à Serpent, I. 24.
Lichen Islandicus, I. 66.
Licorne, I. 110.
Liebstœckel, I. 66.
Liege, I. 103.
Liene, I. 40.
Lienen, I. 40.
Lierre, I. 57.
Lievre, I. 66.
Lignum Sanctum, I. 56.
Ligustro, I. 66.
Ligustrum, I. 66. III. 118.
Lilium album, I. 66. III. 117.
 Convallium, I. 67. III. 117.
 Paracelsi, II. 98.
Limagon, I. 40.
 Rouge, I. 67.
Limatura Martis, I. 51. II. 98.
Limax, I. 67.
Limon, I. 39. 67.
Limonada Mineralis, II. 23. 99.
 Sicca, II. 99.
Limone, I. 38.
Lin, I. 67.
Linaire, I. 66.
 des Montagnes, I. 46.
Linaria, I. 67. III. 115.
 delle montagne, I. 46.
Linden, I. 106.
Lingua Avis, I. 52.
Lingua Cervina, I. 97.
 Serpentina, I. 79.
Linimentum album, II. 99.
 Alcalinum, II. 99.
 Antipleuriticum, II. 99.
 Cereum, II. 99.
 Volatile, II. 99.
Lino, I. 67.
Linse, I. 66.
Linum, I. 67. III. 118.
 Catharticum, I. 67. III. 118.
Liocorno, I. 110.
Liqueurs, II. 46.
Liquiritia, I. 55.
 Cocta alba, II. 98.
 Citrina, II. 99.
 Lucida, II. 89.
 Tornata, II. 99.
Liquirizia, I. 55.
Liquor Anodynus mineralis, II. 99.
 Topicus, II. 100.
 Alter, II. 100.
 Volatilis, II. 100.
 Antipodagricus, II. 100.
 Apertivus Argentorat. II. 100.
 Hoffmanni, II. 100.
Cornu Cervi Succinat. II. 100.
Digestivus, II. 100.
Lithonripticus, II. 101.
contra Luem veneream, II. 101.
Meningum, II. 101.
Mercurialis, II. 20.
Nitri fixi, II. 101. 109.
Probatorius, II. 101.
Salinus Laxativus, I. 100.
Siphiliticus, II. 101. 106.
Spleneticus, II. 101.
Stypticus, II. 101.
Terræ foliatæ Tartari, II. 101.
Vegeto-mineralis, II. 101.
Lis, I. 66.
Lisimacchia, I. 68.
Litargiro, I. 67.
Litharge, I. 67.
Lithargyrium, I. 67.
Lithonripticum, II. 101.
Lithospermum, I. 73.
Lixivia Alcalina, II. 149.
Lixivium causticum, II. 102.
 Saponarium, II. 102.
 Tartari, II. 113.
Loch Album, II. 102.
 ad Asthma, II. 102.
 Balsamicum, II. 102.
 de Farfara, II. 102.
 Japonicum, II. 102.
 Leniens, II. 102.
 de Pulmone Vulpis, II. 102.
 Sanum & expertum, II. 103.
Lochs

- Loch Saponatum, II. 103.
 Loeffelkraut, I. 40.
 Lombrico terreſtre, I. 68.
 Look Gummi, I. 67.
 Lopezia, I. 67.
 Lorbeer, I. 65.
 Lott, I. 76.
 Lotus ad Hæmorrhoides, II. 103.
 Rheumatifmos, II. 103.
 Saponaceus, II. 103.
 ad Tineam, II. 103.
 Loup, I. 68.
 Luccio, I. 68.
 Lucertola, I. 64.
 Lucius, I. 68.
 de Lugos Cortex, I. 36.
 Lumaca, I. 67.
 Lumagon reuge, I. 67.
 Lumbricus terreſtris, I. 68.
 Lunaire, I. 68.
 Lunaria, I. 68. III. 119.
 Lungenkraut, I. 75. 88.
 Lungenmoos, I. 88.
 Lupin, I. 68.
 Lupino, I. 68.
 Lupinus, I. 68. III. 119.
 Lupo, I. 68.
 Lupolo, I. 68.
 Lupulus, I. 68. III. 119.
 Lupus, I. 68.
 Lurchel, I. 5.
 Lycopodium, I. 68.
 Lyimachia, I. 68. III. 120.

 Maaslibien, I. 19.
 Mace, I. 68.
 Macis, I. 68.
 Madreperla, I. 71.
 Madri dei Garofani, I. 11.
 Magdaleo, II. 70.
 Maggiorana, I. 69.
 Magiſterium Marcaſitæ, II. 103.
 Saturni, II. 104.
 Sulphuris, II. 104.
 Magnes, I. 69.
 Arſenicalis, II. 104.
 Magnesia alba, II. 104.
 Magnet, I. 69.
 Magſaamen, I. 81.
 Maikæfer, I. 97.
 Majorana, I. 69. III. 121.
 Malabatri folia, I. 61.
 Malaceniſis Lapis, I. 60.
 Malaguette, I. 82.
 Malaxare, II. 70.
 Malicorium, I. 55.
 Malta, I. 34. 69.
 Malva, I. 69. III. 122. 123.
 Arborea, I. 69.

 Malvaticum Juniperinum, II. 66.
 Malum Punicum, I. 56. III. 97.
 Malwurſ, I. 104.
 Malz, I. 69.
 Manati Lapis, I. 69.
 Mandeln, I. 9.
 Mandole, I. 9.
 Mandragora, I. 69. III. 122.
 Mangold, I. 20.
 Maniguette, I. 82.
 Manna, I. 69.
 Liquida, II. 104.
 Tabulata, II. 104.
 Tartariſata, II. 104.

 Mannſtreu, I. 49.
 Marc, I. 110.
 Marcaſita, I. 21.
 Marella, I. 7.
 Margaritæ, I. 70.
 Margherite, I. 70.
 Margheritina maggiore, I. 19.
 minore, I. 19.
 Marguerite, I. 19.
 Mariendiſtel, I. 28.
 Magdalenen Blume, I. 101.

 Marjolaine, I. 69.
 Marmelada, I. 13.
 Marmotta, I. 75.
 Marmotte, I. 75.
 Marrobio, I. 70.
 Marrobio nero, I. 18.
 Marrones, I. 59.
 Marrons, I. 31.
 Marrube noire, I. 18.
 Marrubium, I. 70. III. 120.
 Nigrum, I. 18.

 Marum, I. 70. III. 124.
 Maſſa ad Fornacem, II. 104.
 Maſſoy, I. 70.
 Maſtyx, I. 70. III. 121.
 Mater Perlarum, I. 71. III. 126.
 Materia Perlata, II. 8. 105.
 Matricaire, I. 71.
 Matricale, I. 71.
 Matricaria, I. 71. III. 124.
 Matrifylva, I. 53. 71.
 Mauereſel, I. 74.
 Maulbeere, I. 74.
 Maulwurſ, I. 104.
 Maurrauten, I. 93.
 Maudorn, I. 93.
 Mauve, I. 69.
 Mayenblümlein, I. 67.
 Mayhäfer, I. 97.
 Meccæ Baſamum, I. 71.
 Mechoacanna, I. 71.
 Medula Saxorum, I. 71.
 Meerbohnen, I. 110.
 Meerfenchel, I. 43.

Meerhirze, I. 73.
 Meerkohl, I. 101.
 Meermoos, I. 43.
 Meerrettich, I. 13.
 Meertrauben, I. 82.
 Meerzwiebel, I. 97.
 Meisterwurz, I. 61.
 Schwarze, I. 16.
 Mel, I. 71.
 Ægyptiacum, II. 168.
 Anthosatum, II. 105.
 Despumatum, II. 105.
 Mercuriale, II. 105.
 Rosarum, II. 105.
 Melagrana, I. 56.
 Melantheria, I. 110.
 Melarancia, I. 16.
 Mele, I. 71.
 Meliloto *ceruleo*, I. 71.
 Melilotus, I. 71. III. 126.
 Cærulea, I. 72.
 Melissa, I. 72. III. 125.
 Canariensis, I. 72.
 Turcica, I. 32. III. 125.
 Melisse *des Montagnes*, I. 72.
 Melissophyllum, I. 72. III. 124.
 Melitensis Fungus, I. 72.
 Melitochorton, I. 58.
 Mellone, I. 39.
 Melo, I. 72. III. 126.
 Melon d'eau, I. 39.
 Wasser, I. 39.
 Melten, I. 16.
 Hunde, I. 16.
 Miß, I. 111.
 Wilde, I. 16.
 Menning, I. 74.
 Mensch, I. 59.
 Mentha, I. 72. 73. III. 127.
 Acquatica, I. 73.
 Balsamina, I. 72.
 Crispa, I. 72.
 Longifolia, I. 73.
 Piperitis, I. 73.
 Rubra, I. 73.
 Menthastrum, I. 73. III. 128.
 Menyanthe, I. 107.
 Meorballen, I. 84.
 Mercin, I. 34.
 Mercurialis, I. 73.
 Mercurius, I. 73. III. 129.
 Corallinus, II. 106.
 Corrosivus, II. 106.
 Cosmeticus, II. 106.
 Diaphoreticus, II. 105.
 Dulcis, II. 105.
 Emeticus flavus, II. 167.
 Gummosus, II. 105.
 Liquidus, II. 105.

Mercurius Præcipitatus albus, II. 106.
 flavus, II. 106.
 ruber, II. 106.
 Saccharatus, II. 106.
 Sublimatus, II. 106.
 Vitæ, II. 106.
 Merde *des Chiens*, I. 4.
 Meres *de Giroffles*, I. 11.
 Merises, I. 33.
 Mescicanischer, I. 93.
 Mespeln, I. 73.
 Mespili, I. 73. III. 130.
 Metalista, I. 73.
 Metram, I. 71.
 Meule, I. 34.
 Meum, I. 73. III. 128.
 Meures *de Renard*, I. 92.
 Meurier, I. 74.
 Meyenblümlein, I. 67.
 Mezeræum, I. 73. III. 128.
 Mezzercon, I. 73.
 Miel, I. 71.
 Mignatta, I. 59.
 Milch, I. 63.
 Milium Solis, I. 73. III. 132.
 Millefolium, I. 74. III.
 Millepedes, I. 74.
 Millepertuis, I. 60.
 Millepiedi, I. 74.
 Milten, I. 16.
 Milzkraut, I. 35.
 Minium, I. 38. 74.
 Mispel, I. 109.
 Misy, I. 110.
 Miva *Cidoniorum*, II. 106.
 Aromatica, II. 106.
 Mixtura Asthmatica, II. 107.
 Diatrion, II. 107.
 Migliasche, I. 73.
 Mixtura Mineralis, II. 101.
 Salina volatilis, II. 107. 147.
 Simplex, II. 107.
 Tonico-nervina, II. 107.
 Mähren, I. 47.
 Mallelein, I. 13.
 Moldavica, I. 72.
 Momordica, I. 74.
 Mondbeeren, I. 81.
 Mondraute, I. 68.
 Moosbeeren, I. 81.
 Morelle, I. 100.
 Morgeline, I. 6.
 Morilli, I. 13.
 Moringa, I. 74.
 Moro, I. 74.
 Morfuli, II. 107.
 Antimoniales, II. 107.
 Aromatici, II. 108.
 Citri, II. 108.

Mers du Diable, I. 103.
Imperatoris, II. 108.
Purgantes, II. 108.
ad Scabiem, II. 108.
contra Vermes, II. 108.

Morsus diaboli, I. 103.

Mortelle, I. 76.

Morus, I. 74. III. 130.

Moscata Nux, I. 74. III. 131.

Moschus, I. 75.

Most, I. 110.

Motthenkraut, I. 92.

Mouvon, I. 9.

Mousse marine, I. 43.

Mont, I. 110.

Montarde, I. 100.

Moxa, I. 14.

Mucilagines, II. 108.

Muckenkraut, I. 83.

Mughetto, I. 67.

Muguet, I. 67.

des bois, I. 58.

Mumia, I. 75.

Mungos, I. 75.

Münzbalsam, I. 72.

Murmeltier, I. 75.

Mus marinus, I. 75.

Montanus, I. 75. III. 132.

Musc, I. 75.

Muscatebläthe, I. 68.

Muscateknusse, I. 74.

Muscarda Catechu, II. 166.

Muscheln, I. 41.

Muschio, I. 75.

Muscus Acaciæ, I. 75.

Albus Quernus, I. 75.

Arboreus, I. 75. III. 133.

Cumatilis, I. 75.

Erectus, I. 75.

Islandicus, I. 75.

Pyxidatus, I. 75.

Terrestris, I. 76. III. 133.

Mustela, I. 76.

Mustum, I. 110.

Muttermuscateknusse, I. 74.

Muttermagelein, I. 11.

Myrobalani, I. 76.

Myrrha, I. 76.

Myrtilli, I. 76. III. 135.

Myrtus, I. 76. III. 134.

Brabantica, I. 76.

Nabelstein, I. 110.

Nacht-Kraut, I. 82.

Nachtschatten, I. 100.

Nacre des Perles, I. 71.

Nægelein, I. 30.

gelbe, I. 36.

Koepfe, I. 8.

Tom. I.

Nægelein Rinde, I. 30.

Napel, I. 3.

Napello, I. 3.

Naphæ Flores, I. 16. 17.

Naphta Nitri, II. 109. 143.

Salis communis, II. 109.

Vitrioli, II. 109.

Napus, I. 76. III. 38.

Nashorn, I. 91.

Nastruzio, I. 77.

Nasturtium aquaticum, I. 77. III. 137.

hortense, I. 77. III. 136.

Indicum, I. 77.

Petræum, I. 77.

Sylvestre, I. 77. III. 136.

Natterwurzel, I. 21.

zänglein, I. 79.

Navau, I. 90.

Navet, I. 76. 90.

Navone, I. 76.

Nelke, I. 107.

Nenufar, I. 78.

Nepeta, I. 77. III. 138.

Nephriticum lignum, I. 78.

Nephriticus Lapis, I. 77.

Nepitella, I. 25. 77.

Nerprun, I. 100.

Nespole, I. 73.

Neffel, I. 111.

taube, I. 54.

Nestes, I. 73.

Nicotiana, I. 78. III. 135.

Nielle, I. 78.

Nierwurzel schwarze, I. 58.

weisse, I. 57.

Nigella, I. 78. III. 139.

Nihilum, I. 78.

Nil, I. 78.

Ninfea, I. 78.

Ninzin, I. 78.

Nitro, I. 78.

Nitrum, I. 78.

Anodynum, II. 8.

Antimoniatum, II. 8.

Depuratum, II. 109.

Fixum, II. 109.

Tabulatum, II. 109.

Vitriolatum, II. 149.

Nocciuola, I. 16.

Noce, I. 62.

Noce Moscata, I. 74.

Noir d'Espagne, I. 103.

Noisette, I. 16.

Noix, I. 62.

de Galle, I. 54.

Muscat, I. 74.

Nummularia, I. 78. III. 137.

Nusse, I. 62.

Nux Moschata, I. 74. III. 131.

Nur

Nux Indica condita, I. 75.
 Persica, I. 62.
 Regia, I. 62.
 Nymphaea, I. 78. III. 138.

 Oca, I. 11.
 Occhii di Gambero, I. 26.
 Ochra, I. 78.
 Ochs, I. 22.
 Ochsenzunge, I. 23.
 rothe, I. 5.
 Oculi Cancrorum citrati, II. 109.
 præparati, II. 109.
 Odermenning, I. 4.
 Oeillet, I. 107.
 Oeuf, I. 54.
 Offa alba, II. 109.
 Oie, I. 11.
 Oignon, I. 33.
 Olampi gumma, I. 78.
 Olea cocta, II. 109.
 Destillata, II. 109.
 Expressa, II. 110.
 Infusa, II. 110.
 Oleum Acusticum, II. 110.
 Animale, II. 110.
 Avellanorum, I. 16.
 Aurantiorum corticum, II. 110.
 Florum, II. 110.
 Behen, I. 19.
 Bergamottæ, I. 17.
 Bezoardicum, II. 110.
 Camphoræ, II. 111.
 Camphoratum, II. 110.
 Capparum, II. 111.
 Carminativ. Danorum, II. 111.
 Vvurtemberg, II. 111.
 Catellorum, II. 111.
 Citri, II. 110.
 Colocynthidis, II. 111.
 Heraclinum, I. 16.
 Hyperici, II. 112.
 Jasminum, II. 110.
 Lavendulæ, II. 110.
 Laurinum, I. 65.
 Lithuanicum, I. 20.
 Mucaginum, II. 112.
 Myrrhæ, II. 112.
 Neroli, I. 17. II. 110.
 Palmæ, I. 81.
 Philosphorum, II. 112.
 Rulficum, I. 20.
 Scarabæorum, II. 112.
 Spicæ, I. 101.
 Stolani, II. 112.
 Stomachicum, II. 113.
 Tartari per deliquium, II. 113.
 Templinum, I. 90.
 Vitrioli, II. 113.

Olbano, I. 79.
 Olibanum, I. 79.
 Sylvestre, I. 79.
 Oliva, I. 79. III. 140.
 Olmo, I. 111.
 Olsnitium, I. 79.
 Ombre, I. 15.
 Omphacium, I. 109.
 Ononis, I. 79. III. 139.
 Operment, I. 14.
 Ophioglossum, I. 79. III. 142.
 Opiata adstringens, II. 113.
 Deterfiva, II. 114.
 Dysenterica, II. 114.
 Balsamica, II. 114.
 Febrifuga purgans, II. 114.
 simplex, II. 114.
 Opium, I. 79.
 Opobalsamum, I. 71.
 siccum, I. 83.
 Opoponax, I. 80.
 Oppio, I. 79.
 Or, I. 17.
 Oranger, I. 16.
 Orcanette, I. 5.
 Orecchie di Giuda, I. 17.
 Oreilles de Judas, I. 17.
 Oreoselinum, I. 80.
 Orge, I. 59.
 Oriaza, I. 80.
 Origanum Creticum, I. 80.
 Hispanicum, I. 80.
 Vulgare, I. 80. III. 143.
 Orleana, I. 80.
 Orme, I. 111.
 Oro, I. 17.
 Orobus, I. 80. III. 142.
 Orpiment, I. 14.
 Orpin, I. 43. 50.
 Orso, I. 111.
 Ortica, I. 111.
 Ortica bianca, I. 54.
 Ortie, I. 111.
 blanche, I. 54.
 Orvale, I. 59.
 Oryza, I. 80. III. 143.
 Orzo, I. 59.
 Os de Sèche, I. 99.
 Oseille, I. 2.
 Osmunda, I. 80.
 Ossiocanta, I. 81.
 Oso di Seppia, I. 99.
 Ostecolla, I. 80.
 Osterlucy, I. 13.
 Ostrucium, I. 61.
 Ova, I. 54.
 Ours, I. 111.
 Ovum, I. 81.
 Oxyacantha, I. 81. III. 143.

- Oxycoccus, I. 81.
 Oxycratum, II. 114.
 Oxymel. *Æruginis*, II. 168.
 Chalybeatum, II. 114.
 Colchicum, II. 114.
 Pectorale, II. 114.
 Scilliticum, II. 114.
 Simplex, II. 114.
 Oxyfaccharum Emeticum, II. 115.
 Oxytartarus, II. 158.

 Pain, I. 81.
 de pourceaux, I. 45.
 Palmæ Christi semen, I. 31.
 Oleum, I. 32. 81.
 Pan porcino, I. 45.
 Panacea Holsatica, II. 115.
 Mercurialis, II. 115.
 Panais, I. 82.
 Pane, I. 81.
 Panes saccharati purgantes, II. 115.
 Panis, I. 81.
 Pantoffelholz, I. 103.
 Papaver album, I. 81.
 Erraticum, I. 81. III. 146.
 Nigrum, I. 81.
 Papavero, I. 81.
 Salvatico, I. 81.
 Pappel, I. 69. 87.
 Paradieskorner, I. 82.
 Paradisi grana, I. 82.
 Paralysis, I. 87.
 Pareira brava, I. 82.
 Parietaria, I. 82.
 Parietarie, I. 83.
 Paris, I. 82.
 Pas d'ane, I. 51.
 Passerage, I. 66.
 Passule, I. 82.
 Laxativæ, II. 115.
 Pasta Alchæa, II. 115.
 Amygdalata Cosmetica, II. 115.
 Depilatoria, II. 116.
 Liquiritiæ, II. 116.
 ad Nævos, II. 116.
 Pastilli Mercuriales, II. 116.
 Siphylitici Keyser, II. 138.
 Pastinaca, I. 82. III. 147.
 Patience, I. 64.
 d'eau, I. 23.
 Patientia, I. 82.
 Pavot, I. 81.
 Peau dtvine, II. 69.
 Pece, I. 86.
 Pece-Resina, I. 85.
 Pech, I. 86.
 Pèche, I. 83.
 Pedro del Porco, I. 60.
 Pensée, I. 60.
 Pentafillo, I. 82.
 Pentaphylum, I. 82. III. 148. 149.
 Peonia, I. 81.
 Percarum lapides, I. 83.
 Perce-bosse, I. 68.
 Percefeuille, I. 83.
 Percefeuille, I. 3.
 Perche, I. 34.
 Perfoliata, I. 83. III. 152.
 Perlen, I. 34. 70.
 Perlenmutter, I. 71.
 Perlès, I. 70.
 Perlures, I. 34.
 Pero, I. 89.
 Persica, I. 83. III. 145.
 Nux, I. 62.
 Persicaria, I. 83. III. 148.
 Persico, I. 83.
 Persil, I. 84.
 des Montagnes, I. 55. 80.
 Perwanche, I. 108.
 Perwinca, I. 108.
 Peruvianum Balsamum, I. 83.
 siccum, I. 83.
 Peruvianus Cortex, I. 36.
 Pes Cati, I. 17.
 Pestilenzwurzel, I. 83.
 Pestnagel, I. 82.
 Petasites, I. 83. III. 149.
 Peterlein, I. 84.
 Peterilien; I. 84.
 Petimbrosa, I. 44.
 Petroleum, I. 84.
 Petrolio, I. 84.
 Petroselinum, I. 84. III. 152.
 Macedonicum, III. 153.
 Peucedano, I. 84.
 Peucedanum, I. 84. III. 144.
 Pevere, I. 85. 86.
 Peuplier, I. 87.
 Pfaffenhütlein, I. 44.
 Pfaffenrohrlein, I. 104.
 Pfeffer, I. 85.
 Kraut, I. 66.
 Pfersing, I. 83.
 Pflaumen, I. 88.
 Pfrimmen, I. 54.
 Phellandrium, I. 84. III. 149.
 Phu, I. 84. III. 150.
 Phytolacea, I. 84.
 Pichurim, I. 84.
 Piedi di Alce, I. 5.
 di Gatto, I. 17.
 di Leone, I. 5.
 Pied d'Alouette, I. 42.
 de Chat, I. 17.
 d'Elan, I. 5.
 de Lion, I. 5.
 de Loup, I. 68.

- Pierre d'Aigle*, I. 4.
de Perche, I. 83.
de Ponce, I. 88.
Pierrures, I. 34.
Pietra calcaria, I. 25.
d'Istrie, I. 60.
Giudaica, I. 62.
Pignons, I. 85.
d'Inde, I. 106.
Pilæ marinæ, I. 84.
Pilatro, I. 89.
Pillulæ Æthiopicæ, II. 116.
Aluminosæ, II. 116.
de Ammoniac, II. 116.
Angelicæ, II. 117.
Anthelminticæ, II. 117.
Antimoniales, II. 117.
Aperientes, II. 117.
Balsamicæ, II. 117.
Cæruleæ, II. 117. 146.
Catarrhales, II. 117.
Cephalicæ, II. 118.
Cochiæ, II. 118.
Communes, III. 118.
de Cynogloss, II. 118.
Depurantes, II. 118.
Fœtidæ, II. 118.
Hydragogæ, II. 118.
Hydropicæ Bantii, II. 119.
Richard, II. 119.
Hystericæ, II. 119.
Majores, II. 119.
Martiales, II. 119.
Mastichinæ, II. 119.
Mercurial. Barbarossa, II. 119.
Bellost, II. 119.
contra Obstructiones, II. 120.
Ophthalmicæ, II. 120.
Plumeri, II. 120.
Polychrestæ balsamicæ, II. 121.
Starckey, II. 120.
Resolventes, II. 120.
Rufi, II. 121.
Saponatæ, II. 121.
Scilliticæ, II. 121.
de Styrace, II. 121.
de Succino, II. 121.
Tartareæ, II. 121.
de Terebinthina, II. 121.
Tonicæ, II. 122.
contra Variolas, II. 122.
Pilosella, I. 17. 85.
Piment Royal, I. 76.
Pimenta, I. 8.
Pimpinella, I. 85. III. 151.
Pimprenelle, I. 85.
Pineæ, I. 85. III. 155. 156. 157.
Purgantes, I. 106.
Pini Strobili, I. 85.
Pini Refina, I. 83.
Pinien, I. 85.
Piombo, I. 86.
Pioppo, I. 87.
Piper, I. 85. 86. III. 162.
Pisse-en-lit, I. 104.
Pistacchio, I. 86.
Pistaches, I. 86.
Pistaciæ, I. 86. III. 162.
Pivoine, I. 81.
Pix, I. 86.
Plantago, I. 86. III. 158. 159.
Plantain, I. 86.
Plomb, I. 86.
Plumbum, I. 86.
Ustum, II. 122.
Pœonia, I. 81. III. 145.
Poire, I. 89.
Poirée, I. 20.
Poivre, I. 85.
Aquatique, I. 83.
Poix, I. 86.
de Bourgogne, I. 90.
Resme, I. 85.
Poix chiches, I. 37.
Poley, I. 86.
Poligala, I. 87.
Polipodio, I. 87.
Polium, I. 86. III. 154.
Polygala, I. 87. III. 155.
Polypodium, I. 87. III. 153.
Pomade en Creme, II. 38.
Pomeranzen, I. 16.
Pome Epineuse, I. 102.
de Merveilles, I. 74.
Pomi, I. 87.
Pomice, I. 88.
Pompholyx, I. 84.
Pomum, I. 87. III. 143.
Hierosolymitanum, I. 74.
Populus, I. 87. III. 147.
Porc, I. 87.
Porcellana, I. 87.
Porcinus lapis, I. 60.
Porco, I. 87.
Porcus, I. 87. III. 154.
Porreau, I. 87.
Porrum, I. 87. III. 160. 161.
Porst, I. 76.
Portulaca, I. 87. III. 158.
Posca, II. 122.
Post, I. 76.
Postkraut, I. 92.
Potafche, I. 38.
Potassa, I. 38.
Potasse, I. 38.
Potio adstringens, II. 122.
Ammoniaca, II. 122.
Antiseptica, II. 122.

- Potio ad Asthma, II. 122.
 Confortans, II. 123.
 Cretacea, II. 123.
 Oleosa, II. 123.
 Siftens, II. 123.
 Poule, I. 54.
 Pourpier, I. 87.
 Præparata, II. 123.
 Πράσιον, I. 70.
 Prêle, I. 49.
 prezzemolo, I. 84.
 primevere, I. 87.
 Primula Veris, I. 87. III. 160.
 Profluvii Cortex, I. 41.
 Propolis, I. 33. 88.
 Prugne, I. 88.
 Prugnolino, I. 101.
 Pruna, I. 88. III. 144.
 Laxativa, II. 115.
 Prunes, I. 88.
 Prunier sauvage, I. 2.
 Pseudacorus, I. 3.
 Psidium, I. 55.
 Psyllium, I. 88. III. 161.
 Ptarmica, I. 88. III. 163.
 Ptilana, I. 59. II. 123.
 Acidulata, II. 123.
 Adstringens, II. 123.
 Communis, II. 123.
 Nitrata, II. 124.
 Pectoralis, II. 124.
 puleggia, I. 88.
 pulegium, I. 88. III. 155.
 pulicaria, I. 88.
 Pulior, I. 88.
 Pulmonaire, I. 88.
 Pulmonaria, I. 88. III. 164.
 Pulpa Cassiæ, II. 124.
 pro Clysteribus, II. 124.
 Tamarindorum, II. 124.
 Pulpæ, II. 124.
 Pulsatilla, I. 88. III. 163.
 Pulticula de Manna, II. 124.
 Saponacea, II. 124.
 Pulveres, II. 124.
 Pulvis absorbens, II. 125.
 Algarotti, II. 106.
 Alterans, II. 125.
 Anodynus, II. 125.
 Antarthrit. *Mirandola*, II. 126.
 Perard, II. 125.
 Ducis Portlandia, II. 126.
 Anthelminticus, II. 126.
 Antifebrilis, II. 126.
 Antihecticus, II. 126.
 Antilyssus *Comitis Isenburg*, II. 126.
 Mead, II. 126.
 Palmarii, II. 126.
 Sylvani, II. 126.
 Pulvis antilyssus *Tunquinesium*, II. 127.
 Antimonii albus, II. 8.
 Antisepticus, II. 127.
 Antispasmod. *Rosenst.* II. 127.
 Stablii, II. 127.
 Ari compositus, II. 127.
 Arthriticus amarus, II. 126.
 Auratus, II. 127.
 Bezoardicus *Anglicus*, II. 127.
 Ludovici, II. 127.
 Cachecticus *Quercetani*, II. 128.
 Carminativus, II. 128.
 Carthusianorum, II. 96. 128.
 contra Casum, II. 128.
 e Cerussa, II. 128.
Comitis de VVarovvich, II. 128.
Comitissa de Kent, II. 128.
 ad Condienda intranea, II. 128.
 ad Condiendas Carnes, II. 128.
 ad Condiendum Cor, II. 128.
 Content, II. 129.
 Cordialis, II. 129.
 Cornachini, II. 129.
 Cosmeticus, II. 129.
 Dentifricius, II. 130.
 Epilepticus *Marchionis*, II. 130.
 Erysipelatodes, II. 130.
 Fumalis, II. 130.
Gasconii, II. 130.
 de Gutteta, II. 130.
Haly contra Phtisin, II. 130.
 Hepaticus, II. 131.
 Incrassans, II. 131.
 pro Infantibus *Roseen*, II. 131.
 Infantum *Danorum*, II. 131.
 Masticatorius, II. 131.
 ad Palpitationes Cordis, II. 132.
 Pannonicus ruber, II. 131.
 Pectoralis, II. 132.
 Puerorum citrinus, II. 132.
 Evacuans, II. 132.
 contra Quartanam, II. 132.
 Refrigerans, II. 132.
 Resolvens, II. 133.
 Scillæ compositus, II. 133.
 Sedativus, II. 133.
 Sternutatorius *Noricor.* II. 133.
 Parisiens. II. 133.
 Trilleri, II. 133.
 Stomachicus, II. 133.
 ad strumas, II. 133.
 Sympatheticus, I. 110.
 Temperans *Richardi*, II. 134.
 Unzeri, II. 134.
 ad Tormina Infantum, II. 134.
 contra Vermes, II. 134.
 Purgans, II. 134.
 Pumex, I. 88.
 Purgiermoos, I. 66.

- Purgierkærner*, I. 31.
Pyrethrum, I. 89. III. 165.
Pyrola, I. 89. III. 153.
Pyrus, I. 89. III. 164.

Quassia, I. 89.
Quecksilber, I. 73.
Quendel, I. 99.
Quercia, I. 89.
Quercus, I. 89. III. 165.
 Marina, I. 89.
Queue de Cheval, I. 49.
 Pourceau, I. 84.
Quinquina, I. 36.
Quitten, I. 45.

Rabarbaro, I. 90.
Rackasira balsamum, I. 89.
Radici di Mandragora, I. 69.
Radis, I. 90.
Rafano, I. 90.
Ragno, I. 12.
Raisfort, I. 13.
Raiponse, I. 90.
Raisins, I. 110.
Raisins, I. 82.
Raisins de Corinthe, I. 82.
Raisins de Renard, I. 82.
Rame, I. 45.
Rana, I. 89.
Ranæ, I. 89. III. 174.
Ranarum sperma, I. 89.
Ranunculo, I. 90.
Ranunculus, I. 90. III. 168. 169.
Rapa, I. 90. III. 167.
Raperonzo, I. 90.
Raphanus, I. 90. III. 170.
Rapunculus, I. 90. III. 166.
Rapunzel, I. 90.
Ravano, I. 13.
Rave, I. 90.
Raute, I. 93.
Realgar, I. 14.
Reattino, I. 90.
Rebs, I. 76.
Rebstoch, I. 109.
Regenwurm, I. 68.
Regia Nux, I. 62.
Reglise Royale, I. 55. II. 89.
Regulus, I. 90.
Regulus Antimonii Martialis, II. 134.
 Medicinal., II. 134.
 Simplex, II. 135.

Reiger, I. 12.
Reine des Prés, I. 18.
Reis, I. 80.
Renard, I. 111.
Renouée, I. 33.
Roprise, I. 43.

Resina, I. 90.
 Elastica, I. 32.
 Jalappæ, II. 135.
 præparata, II. 135.
 Ligni Guajaci, II. 135.
 Nigra, I. 41.
 Scammonæi, II. 135.

Reterfilien, I. 84.
Rettich, I. 90.
Rhabarbar. vvilde, I. 23.
Rhabarbarum, I. 90. 91. III. 170.
Rhaponticum, I. 91. III. 171.
Rheinblumem, I. 102.
Rheinfarn, I. 104.
Rheum, I. 90.
Rhinoceros, I. 91.
Rhodia Radix, I. 91. III. 172.
Rhodium Lignum, I. 91.
Rhubarbe, I. 90.
Ribes, I. 91. III. 172.
Riccio, I. 49.
Ricini Semina, I. 31.
Ringelhlumen, I. 25.
Rinoceronte, I. 91.
Ris, I. 80.
Risgallo, I. 14.
Riso, I. 80.
Ritterspäerlein, I. 42.
Robbia, I. 92.
Rocambole, I. 5.
Rochetta Alexandr., I. 100.
Rocos, I. 80.
Rœmischer, I. 45.
Rœthel, I. 92.
Roggen, I. 98.
Rohr, I. 15.
Roiteler, I. 90.
Romarin, I. 92.
 de Beheme, I. 92.
Rondine, I. 59.
Roob, II. 135.
 Morillorum, I. 130.
 Mororum, I. 74.
 Nucum, II. 135.

Roquette, I. 49.
Rorella, I. 91. III. 172.
Rosa, I. 92. III. 172.
Rose, I. 34.
 Tremiere, I. 69.

Roseau, I. 15.
Roshub, I. 51.
Rosinlein, I. 82.
Rosmarino, I. 92.
Rosmarinum sylvestre, I. 92. III. 173.
Rosmarinus, I. 92. III. 173.
Rospo, I. 23.
Ros Solis, I. 91.
Rosolis ex Seminibus Carmin. II. 41.
 de six grains, II. 41.

- Rotulæ, II. 135.
 Becchicæ, II. 166.
 e Succo & Elæosacch. Citri, II. 136.
 Manus Christi, II. 136.
 Menthæ, I. 73.
 contra Vermes, II. 136.
 Rubarba, I. 90.
 Rube, Gelbe, I. 47.
 Saamen, I. 76.
 Rubia Tinctorum, I. 92. III. 174.
 Rubimora, I. 92.
 Rubino, I. 92.
 Rubinus, I. 92.
 Rubis, I. 92.
 Arsenical, I. 14.
 Rubrica fabrilis, I. 92.
 Rubsaamen, I. 76.
 Rubus Idæus, I. 93. III. 166.
 Ruchetta, I. 49.
 Rue, I. 93.
 Rum, I. 104.
 Ruffolke, I. 76.
 Rus, I. 53.
 Ruscus, I. 93. III. 176.
 Rfusten, I. 111.
 Ruta, I. 93. III. 175.
 Muraria, I. 93.
 Saamkraut, I. 83.
 Sabadilli Semen, I. 93.
 Sabina, I. 93. III. 176.
 Saccharum, I. 93.
 Aceris, I. 2.
 Candum, II. 136.
 Glycyrrhizæ, II. 89. 136.
 Hordeatum, II. 136.
 Lactis, II. 136.
 Penidium, II. 137.
 Rosatum, II. 137.
 Saturni, II. 137.
 Saffor, I. 29.
 Saffran bâtard, I. 29. 43.
 Saffgrün, I. 101.
 Sagapeno, I. 94.
 Sagapenum, I. 94.
 Saggina, I. 51.
 Sago, I. 94.
 Sagu, I. 94.
 Sain doux, I. 87.
 Sal Aceti essentiale, II. 137.
 Fixum, II. 137.
 Volatile, II. 137.
 Acetofellæ, II. 137.
 Acidum Boracis, II. 139.
 Alcali minerale, II. 137.
 Seignette, II. 137.
 Ammoniacum Martiale, II. 91.
 Causiticum, II. 137.
 Commune, I. 94.
 Sal Cornu Cervi, II. 137.
 Digestivum, II. 138.
 de Duobus, II. 138.
 Febrifugum, II. 138.
 Fontanum, I. 94.
 Fossile, I. 94.
 Gemmxæ, I. 94.
 per Incinerationem, II. 138.
 Marinum, I. 94.
 coagulatum, II. 138.
 Martis, II. 138.
 Mercurial. Acetosus, I. 138.
 Tartarifatus, I. 138.
 Mirabile Glauberi, II. 138.
 Lemery, II. 139.
 Seignette, II. 139.
 Panis, I. 94.
 Paratus Tachenii, II. 138.
 Polychrestum Glasseri, II. 139.
 Prunellæ, II. 98.
 Saturni, II. 137.
 Sedativum Homberg, II. 139.
 Mercuriale, II. 139.
 Sedlizensis, I. 98.
 Seidschüzensis, I. 98.
 Succini, II. 139.
 Tartari, II. 140.
 Essentiale, II. 140.
 Volatile Anglic. siccum, II. 140.
 Oleosum, II. 140.
 Salat, I. 64.
 Kaysar, I. 64.
 Salbey, I. 95.
 Salcio, I. 95.
 Salep Radix, I. 94.
 Salicaire, I. 95.
 Salicaria, I. 95. III. 95. 177.
 Salicastro, I. 95.
 Salix, I. 95. III. 180.
 Salmiack, I. 8.
 Salpeter, I. 78.
 Salvia, I. 95. III. 177.
 Sambuci fungi, I. 17.
 Sambuco, I. 95.
 Sambucus, I. 95. III. 178.
 Sanctum Lignum, I. 56.
 Sandaraca Gummi, I. 63. 95.
 Sandaraque, I. 14.
 Sanglier, I. 11.
 Sangsue, I. 59.
 Sanguinalis, I. 33.
 Sanguisorba, I. 85.
 Sanicula, I. 95.
 Sanlay, I. 95.
 Santalum, I. 95.
 Santolina, I. 1.
 Santonico, I. 38.
 Santonicum, I. 38.
 Sapa, I. 110.

Sapo Chemicus, II. 140.
 Tartareus, II. 140.
 Medicatus, II. 140.
 Saponaria, I. 95. III. 179.
 Sapphirus, I. 96.
 Sarcocolla, I. 96.
 Sardus, I. 29.
 Sariette, I. 96.
 Sarrasin, I. 51.
 Sarsaparilla, I. 96. III. 181.
 Sassafras, I. 96.
 Satureja, I. 96. III. 179.
 Satyrium, I. 96. III. 180.
 Saubelme, I. 50.
 Saudistel, I. 101.
 Sauerampfer, I. 2.
 Sauerklee, I. 2.
 Sauge, I. 95.
 Saule, I. 95.
 Saurrauch, I. 20.
 Saurvie, I. 93.
 Saxifraga alba, I. 96. III. 182. 183.
 Rubra, I. 51.
 Schaafgarben, I. 74.
 Kunz, I. 46.
 Scabiosa, I. 96. III. 181.
 Scammoneum, I. 96. III. 182.
 Scarabæus Majalis, I. 97.
 Scarafaggio, I. 97.
 Scariola, I. 49.
 Schalotten, I. 5.
 Scharlackkraut, I. 59.
 Schiarea, I. 59.
 Schieferweiss, I. 35.
 Schierling, I. 37.
 Schiffdœir, I. 86.
 Schildkrœte, I. 105.
 Schlagkrautlein, I. 35.
 Schlange, I. 99.
 Schlangenholtz, I. 41.
 wurzel, I. 21.
 Schlehen, I. 2.
 Schüsselblumen, I. 87.
 Schmirgel, I. 100.
 Schnecke, I. 40.
 Rothe, I. 67.
 Schnittlauch, I. 33.
 Schœlkraut, I. 36.
 Schœnanthum, I. 97.
 Schuppenwurzel, I. 47.
 Schwalbe, I. 59.
 Schwalbenwurzel, I. 59.
 Schwamm, I. 101.
 Schwarzwurzel, I. 103.
 Schwarze, I. 16.
 Schwarzer Andorn, I. 18.
 Schwefel, I. 103.
 Schwein, I. 87.
 brad, I. 45.

Scilla, I. 97. III. 184.
 Præparata, II. 141.
 Scincus, I. 97. III. 184.
 Sclarea, I. 97.
 Scolopendrium, I. 97. III. 184.
 Scordio, I. 97.
 Scordium, I. 97. III. 185.
 Scorpius, I. 97. III. 185.
 Scorzonera, I. 97. III. 185.
 Scrophularia, I. 98. III. 186.
 Sebesten, I. 98. III. 186.
 Sebum, I. 22.
 Secale, I. 98. III. 186.
 Sedo, I. 98.
 Sedam, I. 98. III. 187.
 Seebume, I. 78.
 Segale, I. 98.
 Seichblumen, I. 104.
 Selde, I. 99.
 Seidelbast, I. 73.
 saamen, I. 40.
 Seifenkraut, I. 95.
 Seigle, I. 98.
 Sel d'Oseille, I. 3.
 Selce, I. 100.
 Selenite, I. 55.
 Selenites, I. 55.
 Semen, I. 76.
 Semenza di Laureola, I. 40.
 Semole, I. 53.
 Semprevivo, I. 98.
 Sempervivum, I. 98. III. 188. 189.
 Sempreviva saluatica, I. 57.
 Senape, I. 100.
 Senecio, I. 98. III. 187.
 Senecka, I. 98.
 Senecon, I. 98.
 Senf, I. 100.
 Senna, I. 98. III. 187.
 Sepiæ Os, I. 99. III. 200.
 Seraphique Gomme, I. 94.
 Serapin Gummi, I. 94.
 Sericum, I. 99.
 Serpens, I. 99.
 Serpent, I. 99.
 Serpentaria, I. 48.
 Serpentaria Virginiana, I. 99. III. 188.
 Serpillo, I. 99.
 Serpolet, I. 99.
 Serpyllum, I. 99. III. 190. 191.
 Serum Lactis, II. 141.
 Chalybeatum, II. 141.
 Dulce, I. 63.
 Sefamum, I. 99. III. 200.
 Sefeli, I. 99. III. 190. 191.
 Seta, I. 99.
 Sevenbaum, I. 93.
 Siderite, I. 99.
 Sideritis, I. 99. III. 192.

- Spiritus Carminativus *Sylvi*, II. 147.
 de tribus, II. 147. 148.
 Cochleariæ, II. 148.
 compositus, II. 148.
 Cornu Cervi, II. 148.
 Jasmini, II. 148.
 Lavendulæ, I. 65.
Mindereri, II. 148.
 Nitri, II. 148.
 Dulcis, II. 148.
 Fumans, II. 149.
 ad Perniones, II. 149.
 Salis Ammoniaci cum Calce viva,
 II. 149.
 Cauticus, II. 149.
 Succinat. II. 149.
 Tartarifat. II. 149.
 Vinofus, II. 149.
 Salis communis, II. 149.
 Fumans, II. 150.
 Dulcis, II. 150.
 Saponis, II. 150.
 Succini, II. 150.
 Sulphuris, II. 113. 150.
 Volatilis, II. 150.
 Tartari, II. 150.
 de Tribus, II. 107.
 Vini Alcalifatus, II. 150.
 Camphoratus, II. 150.
 Crocatus, II. 150.
 Lotus, II. 151.
 Phlegma, II. 151.
 Rectificatus, II. 151.
 Tartarifatus, II. 151.
 Vinofus Vitriolicus, II. 99.
 Æthereus Vitriol. II. 99.
 Vitrioli, II. 151.
 Vitrioli dulcis, II. 151.
 Spodium, I. 48.
 II. 151.
 Spongiæ, I. 101.
 Præparatæ, II. 151.
 Spongiarum Lapis, I. 102.
Springhærner, I. 32.
 Squilla, I. 97.
Stabwurx, I. 11.
Stackelruben, I. 76.
Stagno, I. 102.
Stange, I. 34.
 Stannum, I. 102.
 Staphis agria, I. 102.
 III. 197.
Stechpafel, I. 102.
Steckruben, I. 76.
Steinmark, I. 71.
Steinbeere, I. 111.
 brech, I. 51.
Steinbeere, *kressen*, I. 77.
 leberkraut, I. 58.
 salz, I. 94.
Steinoel, I. 84.
Stendelwurzel, I. 96.
Sterco dei cani, I. 4.
 Stibium, I. 11.
Stier, I. 105.
 Stincus, I. 97.
 Stœchas, I. 102.
 III. 198.
Stærche, I. 9.
Storckenchnabel, I. 55.
 Storax, I. 102.
Stramonio, I. 102.
 Stramonium, I. 102.
 III. 198.
Strausseneyer, I. 102.
 Struthionis Ova, I. 102.
 Suber, I. 103.
 III. 198. 199.
 Subulo, I. 34.
Suc de Reglise des Bois, II. 116.
 Succi expressi, II. 151.
 Antiscorbutici, II. 151.
Succino, I. 103.
 Succinum, I. 103.
 Indiæ Occidentalis, I. 67.
 Succisa, I. 103.
 III. 199.
Succo d'Ipocistide, I. 60.
Sucre, I. 93.
Sughero, I. 103.
Suie, I. 53.
Suif, I. 22.
 Sulphur, I. 103.
 Antimonii auratum, II. 151.
 Tartarifatum, II. 96.
 Præcipitatum, II. 97.
 Sumach, I. 103.
 Suppositoria, II. 151.
Surreau, I. 95.
Süsholz, I. 55.
Susino salvatico, I. 2.
 Symphytum, I. 103.
 III. 199.
 Syrop, I. 93.
 Syrupi, II. 151.
 Syrupus *Alexandrinum*, II. 96.
 Althææ, II. 152.
 Ambrosii, I. 74.
 de Ammoniaco, II. 152.
 Amygdalinus, II. 152.
 Antiscorbuticus, II. 152.
 Balsami Tolutani, II. 153.
 Balsamicus *Hoffmanni*, II. 153.
 Boyleanus, II. 153.

Sirupus Byzantinus, II. 153.
Chinæ, II. 153.
Cichorei cum Rhabarbaro, II. 153.
Citri Corticum, II. 154.
 e toto, II. 153.
Coralliorum, II. 154.
Diacodii, II. 154.
Domesticus, II. 154.
Emeticus Brandeburg. II. 154.
 Glauberi, II. 154.
Emulsivus, II. 152. 154.
de Eryfimo, II. 154.
Glycyrrhizæ, II. 155.
Hordeatus, II. 155.
Hyslopi, II. 155.
de Injubis, II. 155.
Longæ Vitæ, II. 156.
de Manna, II. 156.
Mercurialis, II. 156.
Mororum, I. 74.
de Nicotiana, II. 156.
Papaveris albi, II. 156.
Prophylacticus, II. 156.
Rubi Idæi, II. 157.
Saccharinus, I. 93.
Scelotyrbticus, II. 157.
Scillicus, II. 155.
de Spina Cervina, II. 154. 157.
de Symphyto, II. 157.
Viperarum, II. 157.

Tabacco, I. 78.
Tabac, I. 78.
Tabellæ, I. 157.
Tabouret, I. 23.
Tabulæ, II. 135.
 Alimentariæ, II. 157.
 Althææ, II. 164.
Tacamahaca, I. 103.
Taffetas d' Angleterre, II. 71.
Taffia, I. 104.
Tag und Nacht Kraut, I. 82.
Talcum, I. 104.
Talpa, I. 104.
Tamarindi, I. 104.
Tamaris, I. 104.
Tamarisco, I. 104.
Tamariscus, I. 104.
 III. 204.
Tanaceto, I. 104.
Tanacetum, I. 104.
 III. 203.
Tanais, I. 104.

Taraxacum, I. 104.
 III. 204.
Tarrette, I. 57.
Tartari Cryfalli, I. 105.
Tartaro, I. 104.
Tartarus, I. 104.
 Antimonialis, II. 158.
 Chalybeatus, II. 157.
 Emeticus, II. 158.
 Martialis, II. 94.
 Regeneratus, II. 158.
 Solubilis, II. 140. 158.
 Tartarifatus, II. 158.
 Vitriolatus, II. 158.
Tartre, I. 104.
Taschelkraut, I. 23.
Tassobarbasso, I. 87.
Tasso, I. 105.
Taubenkropf, I. 53.
Taupe, I. 104.
Taureau, I. 105.
Taurus, I. 105.
Thausendguldenblumen, I. 32.
Taxus, I. 105.
Te del Paraguay, I. 11.
 Messico, I. 22.
Tela Emplastica, II. 69.
 Gualteri, II. 141.
Telephium, I. 43. 50.
Terebinthina, I. 105.
Terebinthinæ Oleum, I. 105.
 Spiritus, I. 105.
Terra foliata Tartari, II. 158.
 Merita, I. 45.
 Sigillata, I. 105.
Tertianaria, I. 105.
 III. 202.
Testudo, I. 105.
Testuggine, I. 105.
Teufelsabiss, I. 103.
Teufelsdreck, I. 15.
Thalictrum flavum, I. 105.
 III. 202.
Thea Bohea, I. 105.
 Romana, I. 22.
 Silesiaca, II. 22.
 Viridis, I. 106.
Thée du Mexique, I. 22.
 Mississipi, I. 11.
 Paraguay, I. 11.
Theer, I. 86.
Theriaca Andromachi, II. 158.
 Cœlestis Hoffmanni, II. 158.
 Diatefferon, II. 60.
Thlaspi, I. 106.
 III. 200. 201.
Thuris Cortex, I. 106.

Thus, I. 79.
 Judæorum, I. 106.
Thym, I. 106.
Thymelæa, I. 73.
Thymiamatis Cortex, I. 106.
Thymian, I. 106.
Thymus, I. 106.
 III. 203.
Tiglio, I. 106.
Tilia, I. 106.
 III. 202, 203.
Tilleul, I. 106.
Time, I. 106.
Tincal, I. 22.
Tinctura, II. 159.
 Alexipharmaca, II. 159.
 Cortic. Peruv. II. 86.
 Amara Edinburgensium, II. 67.
 Londinensium, II. 67. 159.
 Antimonii acris, II. 159.
 Saponacea, II. 160.
 Taratarifata, II. 160.
 Antivenerea, II. 160.
 Auri, II. 160.
 Bezoardica, II. 160.
 Coralliorum, II. 161.
 Laccæ, II. 161.
 Martis aperitiva, II. 161.
 Glauber, II. 161.
 Cydoniata, II. 161.
 Helleborata, II. 162.
 Pomata, II. 161.
 Zwvoelfferi, II. 162.
 Metallorum, II. 162.
 Rhabarbari, II. 162.
 Salina, H. 162.
 Stomachica Danorum, II. 162.
 VVhytt, II. 163.
 Sulphuris, II. 163.
 Tartari, II. 163.
 Thebaica, II. 98.
Toeschelkraut, I. 23.
Tolutanum Balsamum, I. 106.
Topasius Lapis, I. 106.
Toque, I. 105.
Tormentilla, I. 107.
Tortue, I. 105.
Tournesol, I. 57.
Tourquette, I. 59.
Toute bonne, I. 59.
Trabern, I. 110.
Tragacantha, I. 107.
 III. 206.
Tragea alba, II. 163.
 Aromatica, II. 163.
 Granorum Actes, II. 163.
 Ophthalmica, II. 164.

Tragopogon, I. 107.
Trauboukraut, I. 22.
Trefle, I. 107.
 musquè, I. 72.
Tribuli aquatici, I. 107.
 III. 206.
Trichomanes, I. 4. 107.
Trifoglio, I. 107.
Trifolium, I. 107.
 III. 204. 205.
Tripe Madame, I. 98.
Tsipoli, I. 107.
Tripolitana terra, I. 107.
Trippel, I. 107.
Trochisci, II. 164.
 Albi II., 164.
 Alhandal, II. 164.
 Aliptæ, II. 164.
 Alkermes, II. 164.
 Althææ, II. 164.
 Becchici albi, II. 164.
 Citrini, II. 164.
 Nigri, II. 165.
 Parisiensium, II. 166.
 Catechu, II. 166.
 Cypheos, II. 165.
 Escharotici, II. 165.
 Fumales, II. 165.
 Hedychroi, II. 165.
 Hermetici, II. 165.
 de Nitro, II. 166.
 Pectorales, II. 166.
 Refrigerantes, II. 166.
 de Scilla, II. 166.
 Viperini, II. 166.
Troesne, I. 66.
Tryphera magna, II. 166.
Tunica, I. 107.
 III. 206.
Turique Gomme, I. 12.
Turis Gomme, I. 12.
Turphetum, I. 107.
 Minerale, II. 167.
Tussilago, I. 51. 107.
Tutia, I. 107.
Typhi Cervini, I. 34.

- Valeriana, I. 108.
 Valerienne grande, I. 84.
 Vanilla, I. 108.
 Velar, I. 50.
 Velvotte, I. 49.
 Vena, I. 16.
 Verbasco, I. 108.
 Verbascum, I. 108.
 III. 208. 209.
 Verbena, I. 108.
 III. 215.
 Verd de gris, I. 109.
 Vesse, I. 101.
 Ver de Terre, I. 68.
 Verge d'or, I. 42.
 Verjus, I. 109.
 Veronica, I. 108.
 III. 207.
 Veronique, I. 108.
 Verre, I. 110.
 Verveine, I. 108.
 Vescia del lupo, I. 22.
 Vesse de Loup, I. 22.
 Vetro, f. 110.
 Victorialis, I. 108. III. 210.
 Vigne, I. 109.
 Vinacea, I. 110.
 Vinaigre, I. 3.
 Vinca per Vinca, I. 108.
 III. 211.
 Vincetoxicum, I. 59. 108.
 Vinum, I. 108.
 Amarum, II. 167.
 Antimoniatum, II. 12.
 Antiscorbuticum, II. 167.
 Chalybeatum, II. 167.
 per Confermentationem, II. 167.
 Emeticum, II. 12. 168.
 Hippocraticum, II. 168.
 Viola, I. 60.
 III. 212.
 Violaria, I. 109.
 Viole, I. 109.
 galbe, I. 36.
 Violenvvurzel, I. 62.
 Violette, I. 109.
 Vipera, I. 109.
 III. 210.
 Virga aurea, I. 109.
 Viride Æris, I. 109.
 Viscum, I. 109.
 III. 212.
 Vite, I. 109.
 Vitis, I. 109.
 III. 212.
 Vitis Idæa, I. 110.
 Vitriolum album, I. 110.
 Vitriolum Cæruleum, I. 110.
 de Cypro, I. 110.
 Martis, II. 168.
 Viride, I. 110.
 Vulgare, I. 110.
 Vitriuolo bianco, I. 110.
 Vitrum, I. 110.
 Antimonii, II. 168.
 Ceratum, II. 168.
 Viola, I. 107.
 Ulmaria, I. 18. 110.
 Ulmus, I. 111.
 III. 214.
 Ultramarinum, I. 65.
 Umbilicus marinus, I. 110.
 III. 214.
 Unguentum album, II. 168.
 Camphoratum, I. 168.
 Ægyptiacum, II. 168.
 Althææ, II. 168.
 ad Ambusta, II. 169.
 Anodynum, II. 169.
 Apostolorum, II. 169.
 de Arthanita, II. 169.
 Basilicum, II. 170.
 Bernhardinum, II. 170.
 Cæruleum, II. 173.
 Camphoratum, II. 168.
 contra Cancr. apertum, II. 170.
 Cardiacum, II. 170.
 Carminativum, II. 170.
 Citrinum, II. 176.
 Clysmaticum, II. 171.
 Comitissæ, II. 171.
 Diapempholygos. II. 175.
 Digestivum, II. 171.
 Dodecapharmacum, II. 171.
 Enulatum, II. 172.
 Fuscum. II. 172.
 e Gummi Elemi, II. 172.
 Hæmorrhoidale, II. 172.
 de Linaria, II. 172.
 de Liquiritia, II. 172.
 de Lichargyrio, II. 172.
 Majoranæ, II. 344.
 Martiatum, II. 172.
 Maturativum, II. 173.
 Mercuriale album, II. 173.
 de Minio, II. 173.
 Mundificans Poterii, II. 173.
 Stablii, II. 173.
 Neapolitanum, II. 173.
 Nervinum, II. 173.
 de Nicotiana, II. 174.
 Nihili, II. 174.
 Nutritum, II. 172. 174.
 Oculare Pringle, II. 174.

- Unguentum Oculare *Sloane*, II. 174.
 Ophthalmicum, II. 174.
 Opodeldoch, II. 30.
 Paralyticum, II. 174.
 Pectorale, II. 174.
 contra Pediculos, II. 175.
 ad Perniones, II. 175.
 Pomatum, II. 175.
 Populeum, II. 175.
 Purpureum, II. 176.
 Rosatum, II. 176.
 Rubrum potabile, II. 176.
 Sambucinum, II. 176.
 ad Scabiem album, II. 173.
 Parisiense, II. 176.
 Saturninum, II. 176.
 Simplex, II. 176.
 Solani, II. 176.
 Spleneticum, II. 177.
 Stomachicum, II. 177.
 de Styrace, II. 177.
 Tetrpharmacum, II. 170.
 Triapharmacum, II. 172.
 de Uvis, II. 177.
 contra Vermes, II. 177.
 Viride potabile, II. 178.
 Unicornu fossile, I. 48. 110.
 verum, I. 110.
 Unschlitz, I. 22.
 Vogelbeeren, I. 101.
 Vogelkraut, I. 6.
 Vogelleim, I. 109.
 Vogelnest, I. 47.
 Volpi, I. 111.
 Vomicæ Nuces, I. 111.
 Vomo, I. 59.
 Uovi di Struzzo, I. 102.
 Ursus, I. 111. III. 207.
 Urtica, I. 111.
 III. 213.
 Mortua, I. 54.
 Uva Lelky, I. 111.
 Seant, I. 82.
 Uva dius *lpe*, I. 82.
 Vulpes, I. 111. III. 207.
 Vulvaria, I. 111.
 III. 214.
 Uvularia, I. 111.
 III. 214.
 VVachholder, I. 62.
 VVachs, I. 33.
 Stop, I. 33.
 VValdmeister, I. 58.
 VValrath, I. 35.
 VVallrasszahn, I. 59.
 VValwurzel, I. 103.
 VVanzelkraut, I. 92.
 VVasserlinsen, I. 66.
 VVassernüsse, I. 107.
 VVasserpfeffer, I. 83.
 VVasserschierling, I. 84.
 VVasserschwertel, I. 3.
 VVegdistel, I. 29.
 VVegerich, I. 86.
 VVegras, I. 33.
 VVegsenf, I. 50.
 VVegeteis, I. 37.
 VVeiden, I. 95.
 VVeiderich, I. 68. 95.
 VVeinmus, I. 100.
 VVeinstein, I. 104.
 VVeisdornen, I. 81.
 VVeiswurzel, I. 100.
 VVermutb, I. 11.
 VViesenkresse, I. 28.
 VViesenraute, I. 105.
 VVihrach, I. 79.
 VVildschouein, I. 11.
 VVinteranus Cortex, I. 111.
 VVintergrün, I. 89.
 VVismuthum, I. 21.
 VVohlgermuth, I. 80.
 VVohlverley, I. 14.
 VVolf, I. 68.
 VVolfsbeere, I. 82.
 VVolfsmilch, I. 50.
 VVolkraut, I. 108.
 VVundkraut, I. 42.
 VVurmsaamen, I. 38.
 Xanthium, I. 111.
 III. 216.
 Xylobalsamum, I. 71.
 Teble, I. 48.
 Yeux de Ecrivisse, I. 25.
 Yvoire, I. 48.

Zafferan ſpurio, I. 29.
 Zapfleinkraus, I. 111.
 Zahnwurzel, I. 47.
 Zapfenholz, I. 52.
 Zauncœnig, I. 90.
 Zaunrube, I. 23.
 Zedoaria, I. 111.
 Zeitlofen, I. 19.
 Zenzero, I. 112.
 Zetrovario, I. 111.
 Zibeben, I. 82.
 Zibethum, I. 111.
 III. 215.
 Zimmer, I. 38.

Zimmer Mutuer, I. 30.
 Zlnco, I. 112.
 Zincum, I. 112.
 Zingiber, I. 112.
 Zinn, I. 102.
 Zinziber, I. 112. III. 216.
 Coctum, II. 178.
 Zittuer, I. 111.
 Zucca, I. 44.
 Zucchero, I. 93.
 Zucker, I. 93.
 Zuckeecken, I. 56.
 Zuviebel, I. 33.
 Zuvrefchen, I. 88.



NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Tommaso Mascheroni Inquisitor General del Santo Offizio di Venezia nel Libro intitolato: *Pharmacopœa Generalis edita a D. Jacobo Reinboldo Spielmann ec. stamp.*, non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e Buoni Costumi, concediamo Licenza a Gio: Antonio Pezzana, che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 31. Luglio 1784.

{ PIERO BARBARIGO RIFORMATOR.

{ ANDREA TRON Kav. PROC. RIFORMATOR.

{ GIROLAMO ASCANIO GIUSTINIAN Kav. RIFORMATOR.

Registrato in Libro a Carte 123. al Num. 1144.

Davidde Marchesini Segr.



M M A T E R I E S

P H A R M A C E U T I C A

AB

AB

ABEL MOSCHI Semin. *Bamia Moschata*, *Grani di Musco*, *Grains de Musc*, *Bisamsaamen*. Fusca sunt, uniformia, leniter compressa, utrinque sinuata, odore ad Moschum accedente. Desumuntur ab Hibisco Abelmoscho L. Arbore utriusque Indiae cive. Apud nos in tepidario contra frigus defendenda. *A* quibusdam Infusis Nervinis adjicitur, aut ad Suffimigia recipitur.

ABROTANUM, *Abrotano*, *Aurone*, *Stabwurcz* illud Maris epitheto olim a ceteris distinguebant. Asservantur inde cauliculi herbacei, foliis setaceis obsessi, fragrante & forti odore, sapore aromatico, amaricante. *Artemisia Abrotanum* L. *Blackwell* Tab. 555. Frutex in Europa Australi & Oriente sponte crescens apud nos in hortis colitur. *Levis* inde paucissimum Olei odorati obtinuit. *Vires Aromaticas edit; laudatur contra Vermes. Datur in Infuso, quod cum Spiritu Vini paratum, aquoso praestat.*

ABROTANUM FOEMINA, *Santolina La Garde - obe*, *Gartencypressen*. Recipiuntur inde cauliculi teneri cum foliis angustis dentatis, albentes, odore

grato, sapore levi, aromatico & amaricante. *Santolina Chamæcyparissus* L. *Blackwell* Tab. 346. Crescit in Europa Australi, apud nos in frigidario asservanda. *Antecedentis vires, sed debiliores habet.*

ABSINTHIUM ALPINUM, *Le Genippi*. Folia sericea, angusta, pinnata, tenuiter divisa, grato aromate instructa. *Artemisia Rupestris* L. *Helvetiae, Sibiriae, Oelandiae* civis. *Laudatur contra Febres intermittentes, ad Menses pellendos & Vulnera consolidanda.*

ABSINTHIUM PONTICUM, *Afsenzio Pontico*, *petite Absinthe*, *Rœmischer VVermuth*. Folia alba, pinnatim tenuissime laciniata, non ingrati odoris, leviter amara, evidenter aromaticâ. *Artemisia Pontica* L. *Blackwell* Tab. 527. Crescit in Europa Orientali & in Palatinatu, in nostris hortis colitur. *Resolvit; Digestionem juvat; contra Vermes facit. Datur in Infuso aquoso.*

ABSINTHIUM VULGARE, *Afsenzio comune*, *Absynthe*, *VVermuth*. Folia pinnata, pinnis latiusculis, alba, proprii non admodum grati odoris, saporis nauseosi, amarissimi. *Ar-*

A

temi.

temisia Absynthium L. *Blackwell* Tab. 17. Passim in Europa obvium it. *Baumé* ex Foliorum libris viginti quinque, ad decem Drachmas Olei odorati non amari obtinuit. *Resolvendi, Primas vlas roborandi, Vermes necandi, Putredinem arcendi, Scorbutum quoque, Podagram, Hydropem curandi causa exhibetur. Datur sub forma Infusi Aquosi, Vinosi, Spirituosi, Conservæ, Syrupi: Oleum destillatum rarissime intus datur, Spiritu Vini dissolutum aut Saccharo exceptum vices Essentiæ sustinet: Extractum odore caret. Pro usibus externis Oleum per Infusionem paratum prostat.*

ACACIA ÆGYPTIACA. Inde prostat Succus inspissatus in placentulas coactus rotundas, ex rufo nigricantes, in ore liquecentes, sapore adstringente & austero instructus. Obtinetur ex fructibus immaturis Mimosæ Niloticæ *Blackwell* T. 377, Arboris in desertis Libyæ crescentis, apud nos in tepidario per hyemem asservandæ. *AVeteribus multum scopo Adstringendi laudabatur. Hodie evuluit.*

ACACIA NOSTRAS, *Susino salvatico, Prunier sauvage, Schlehenbaum.* Inde Corticem, Flores, Fructus recipimus. *Cortex gryseus & rufus, adstringens: Flores recentes sunt albi, odore grato, qui & exsiccatione non totus perit, sapore amaricante: Fructus sunt Drupæ rotundæ, nigræ, saporis austeri, qui vero, si pruinas aliquot expertæ fuerint, multum mitescit. Prunus spinosa L. Blackwell Tab. 494. Crescit in Europa præter maxime Meridionalem & Septentrionalem, nec non in Pensylvania. Corticem a virtute Diuretica & Febrifuga laudant, Flores ab Eccoprotica, quæ vero non raro tormina excitat, Fructus autem ab Adstringente, frigore mitigati in modum aliorum fructuum horreorum comeduntur. Cortices & Fructus cum aqua decoquantur; hos quoque cum nucleis contusos Vino infundere solent. Florum Manipulum unum cum aqua aut Sero lactis infundunt aut in Syrupum cogunt. Aqua a Floribus abstracta suave olens ad affectus Pectoris commendatur. Succum ex Baccis frigore non mitigatis expressum & inspissatum primi Arabes substituerunt Succo*

Acaciæ Ægyptiacæ, a quo etiam non nisi majore nigredine differt; sed ne hoc ipso quidem ulterius utimur.

ACANTHUS Folia oblonga, lata, utrinque viridia, laciniata laciniis acutis & dentatis, masticata mucilaginis sensum linguæ sistunt. *Acanthus mollis L. Blackwell* Tab. 89. Italiæ civis, nostram hyemem patienter fert. *Medicamentis extornis Emollientibus cum successu adjicitur, inconsulte Branca Ursina substitui solet.*

ACER, *Acer, Erable, Ahorn.* Variæ ejus species Platanoides L. Europæ potissimum Arbor, Rubrum L. & Saccharinum L. Virginiae & Pensylvaniæ cives, nostri climatis patientes: dum primo vere terebra inciduntur, succum fundunt instar aquæ limpidum, dulcem & inodorum, qui Sanguinis purificandi gratia ad duas libras de die bibitur; hic succus sub perpetua agitatione inspissatus abit in massam fuscam & dulcem, quæ Saccharum Aceris dicitur, ipsique Saccharo substituitur & ad morbos Pectoris magnopere commendatur.

ACETOSA, *Acetosa, Oseille, Sauerampfer.* Radices, Folia & Semina in officinas recipiuntur. *Radices fibrosæ ex uno capite plures fibras longas & tenues edunt; cortex ex rufo flavescens medullam albidiorum includit; sapore præditæ sunt leviter amaricante, levius adstringente. Folia sunt oblonga, sagittata, acidi saporis, qui autem exsiccatione multum imminuitur. Semina sunt spadicea, triquetra, & linguæ adstringentem sensum imprimunt. Rumex Acetosa L. Blackwell* Tab. 230. Crescit per totam Europam, in hortis culta & major & succulentior redditur. *Radices Adstringunt & cum Aqua coquantur, quæ inde rubella condit, sed color ab affusis Acidis destruitur. Folia Antiscorbutico, Antifebrili & Lithonriptico scopo adhibentur, varius sub forma Infusi exhibentur, crebrius recentia Jusculis incoquantur. Succus inde expressus ad octo Uncias exhibetur. Seminum usus, quæ a virtute Adstringendi commendarunt & sub forma Pulveris propinarunt, evuluit.*

ACETOSA ROTUNDI FOLII Folia exhibet sagittata, glauca, præcedentibus magis acida Rumex scutatus L. *Blackwell*

well Tab. 326. Europæ Meridionalis civis. Folia medicato scopo vel præcedentibus merito præscribuntur.

ACETOSELLA, *Acetofella*, *Alleluja*, *Sauerklee*. Folia habet, quorum tria uni petiolo insident, obcordata, firmula, levi hirsutie notata, sapore acido linguam ferriunt, qui sapor autem exsiccatione vix non totus perit. Oxalis Acetofella L. Crescit passim per Europam, præter maxime Meridionalem, sed in agro Veronensi adhuc occurrit. Adhibetur ad Refrigerandum, Putredinem corrigendam, Ventrículum-roborem. Datur sub forma Infusi aquosi, Conservæ, Syrupi, Succi expressi. Ejus Libra una sesqui Drachmam circiter Salis Essentialis largitur, quod improprie fatis a Gallis *Sel d'Oseille* appellatur & rarissime a Pharmacopœis paratur, sed ex Helvetia, Silva nigra & Martia accersitur. Conf. P. II.

ACETUM, *Aceto*, *Vinaigre*, *Essig*. Liquor ex Vino denuo fermentationem suscipiente surgens, proprio non ingrato odore, qui nares evidenter irritat, sapore perinde linguam titillante & acido instructus. Aliud quam ex Vino, quod ab Uvis obtinetur, paratum adhibendum est nullum, illudque ipsum, quo fortius nares & linguam irritat, eo magis probatur; quoque generosius est Vinum, eo præstantius inde surgit Acetum. Scopo Resolvendi, Putredini resistendi intus datur; Discutiendi & Sphacelum arcendi extus applicatur, nec non Excitandi sine Naribus admoveatur.

ACONITUM, *Nappello*, *Napel*, *Eisenbutlein*. Folia sunt profunde quinquepartita, lobis cuneatis, incis, acute, terminatis, lineatis, leviter odorata; recentia aliquanto postquam masticata fuerint, acrimoniam produnt, quæ ab exsiccatis tota abest Aconitum Napellus L. *Blackwell* Tab. 561. Passim in montibus crescit, apud nos in hortis colitur. Veneni Narcotici effectus edit. Succus inspissatus sub nomine Extracti asservatur, tanquam summum remedium a Granis sex ad decem & ultra aliquoties de die Resolvendi ergo in Rheumatismis & Arthritide, nec non in Quartana laudatur. Dosis sensim sensimque ad Drachmam semis usque evectum fuisse lego.

ACORUS, videatur **CALAMUS**.

ACORUS ADULTERINUS. *Pseudacorus*, *Iride spuria*, *Flambe bâtarde*, *Wasserschwertel*. Radix fibrosa, rugis distincta, extus ferruginea, intus alba, odore & sapore ad Iridem Florentinam accedens, cum quadam adstrictione. Iris Pseudacorus L. *Blackwell* Tab. 261. Per omnem Europam occurrit. Aluum & Urinas ducere dicitur.

ACMELLA adducitur ad nos sub forma Foliorum diffractorum viridum, multis stipitibus crassiusculis, & longis commixtorum. Equidem in illis nullum saporem, nisi levissimum salini vestigium potui diutinguere. Anquia effœta est, quæ hodie in tabernis prostat? *Spilanthus Acinella* L. *Blackwell* Tab. 518. Crescit in Zeylona & Ternata. Annuæ planta, quæ sub dio in hortis nostris coli potest. Ineunte hoc sæculo ob vires Antinephriticas & Lithontripticas multum cœpit laudari. Dabatur sub forma Infusi Theæformis, hodie fere evilit.

ADAMAS, *Diamante*, *Diamant*. Gemmarum durissima, fulgidissima & pretiosissima, igni majori exposita tota disparsens. Alumen lapidosum, pellucidissimum, solidissimum, hyalinum L. Reperitur in fodinis vel in arenis Asiæ & in Brasilia. Nec Medicamentosas, nec Venenatas Vires habet.

ADIANTHUM ALBUM, videatur **RUTA MURARIA**.

ADIANTHUM AUREUM, *Percemousse*, *Golden Widderrhon*. Prostat sub forma caulicorum simplicium rubrorum, undique foliolis linearibus, acutis, per exsiccationem contractis, rubiginosis obfessorum, capitulo quadrato, quod calyptra villosa tectum est, coronatis, insipidis. Polytrichum commune L. *Blackwell* Tab. 357. Copiose per silvas Europæ crescit. Humores attenuare dicitur. Datur sub forma Theæformi.

ADIANTHUM NIGRUM. Folia pinnata, pinnis ordinatim decrescentibus ut integrum folium triangulum referat, obtusis, inæqualiter serratis, sapore destituta. Asplenium Adiantum nigrum L. *Blackwell* Tab. 220. Passim in Euro-

pa crescit præterquam magis Septentrionali. Viribus cum antecedente convenit.

ADIANTHUM RUBRUM vel *Trichomanes*. Cauliculi rubri pinnis ovatis & crenatis obfessi, dulciculi. Asplenium *Trichomanes* L. *Blackwell* Tab. 370. Vulgatissima per Europam planta. Vires antecedentium habet.

ADHATODA. Folia majora ex ovatis acute terminata, superne viridia, inferne albida, validis nervis percursa, saporis proprii amaro contigui, odore plane destituta. Justicia *adhatoda* L. *Zeylonæ* civis, apud nos in frigidario ab hyeme defenditur. Utero *Purgando dicata a nonnullis dicitur*.

ÆGAGROPILÆ, *Gemsenkugeln*. Pilæ variæ magnitudinis & figuræ, a recrementis variarum plantarum efformatæ, involucre tenaci & sicco obductis, fuscæ vel nigræ, odoris & saporis leviter aromatici cum aliqua adstrictione. Calculi *Ægagropilæ* L. Reperiuntur in primo & secundo ventriculo *Capræ* *Ruricapræ* L. Animalis summis *Alpium* jugis immorantur. *Totæ quantæ inertes*.

ÆS, videatur **CUPRUM**.

ÆTITES, *Aetite*, *Pierre d' Aigle*, *Adlerstein*. Lapis ex Argilla indurata efformatus, in cujus cavitate alius lapis *Callimus* dictus, laxè inclusus est, coloris ut plurimum lutei plus minusve fusci, figuræ sive rotundæ sive ovatæ. *Ætites* *Aquilinus* embryone libero terrestri L. Passim in Europa reperitur. *Commenta de ejus virtute ad Partum faciente jam diu ad aniles fabulas sunt ablegata*.

AGALLOCHUM, videatur **ALOES LIGNUM**.

AGARICUS, *Agarico*, *Agaric*, *Lärchenschwamm*. Prostat sub forma substantiæ fungosæ albæ, non raro in varia tubera divisæ, spongiosæ quasi farinacæ, digitos inquinantis, diversæ magnitudinis, levis, amaricantis, acrisculæ, nausosæ, levissime odoræ. *Boletus* *albus* *Laricis* dictus L. Antequam officinis traditur, cutis tenax & colorata inde aufertur. In Europa Meridionali obtinet & in Oriente. Optimum ex *Aleppo* adduci contendunt. *Alvum in-*

commode ducit. Sub forma *Pulveris*, *Infusi aq̄osi* exhibetur, aliis medicamentis admiscendus, in substantia ad *Drachmam unam*, in *Infuso* ad *Unciam semis*. In *Trochiscos eum* ope *mucilaginis Tragacanthæ* efformandi mos obsolevit.

AGARICUS MINERALIS, videatur **LAC LUNÆ**.

AGARICUS PEDIS EQUINI FACIE. Prostat sub forma lamellarum mollissimarum, quæ consistentiam coriaceam mollem habent, colorem fuscum, odorem & saporem nullum. Parantur ex *Boleto igniario* L. variis arboribus accrescente, cujus exterior epidermis demitur; reliqua substantia mallei ictibus in lamellas, quales descripsi, effingitur. *Ad Sanguinem sistendum partibus cruentatis imponitur*.

AGNUS CASTUS. Recipiuntur inde capsulæ rotundæ, tomentosæ, aliquot feminibus foetæ, levissime odoræ, saporis aromatici. *Vitex* *Agnus castus* L. *Blackwell* Tab. 139. Arbor in Europa Meridionali & Carolina spontanea, hyemis nostræ patiens. *Aromatum vires habet, consilio pessimo contra Libidinem præscribitur; Emulsionibus etiam adjicitur*.

AGRIMONIA, *Agrimonia*, *Aigre-moine*, *Odermenning*. Folia longa, impari pinnata, pinnis ovato oblongis, inciso ferratis, inferne alba, odore nullo, sapore leviter adstringente. *Agrimonia* *Eupatoria* L. *Blackwell* Tab. 31. Crescit in omni Europa; *leves vires Adstringentes edit; datur sub forma Infusi Theæformis*. Recipitur ad *Gargarismata* & *Decocta Vulneraria*. *Oleum destillatum fundere dicitur*.

ALABASTRUM, *Alabastro*, *Alabatre*, *Alabaster*. Est Lapis durus, qui ad chalybis ictum nullas scintillas emittit, cum acâdis non effervesceat, polituram admittit & in tenuia fragmenta sectus semipellucidus apparet. Gypsum *Alabastrum* particulis impalpabilibus diaphanum L. Passim in Europa reperitur. *Omni Virtute medicata caret*.

ALBUM GRÆCUM, *Sterco dei Cani*, *Merde des chiens*, *Weisser Hundskoth*. Est Excrementum alvinum Canum, sic-
cum

cum & album, quod diutius asservatum odorem omnem amittit. *Sordidum Medicamentum hodie exolevit, saltem nonnisi externe Resolvendi ergo adhibetur.*

ALCEA, *Alice, Alcée, Sigmundvurz.* Folia rotunda, profunde lobata, lobis denovo profunde divisis, scabra, inodora, insipida. Malva Alcea L. Crescit passim per Europam, præterquam magis Septentrionalem. *Emollientibus adscribitur, sub forma Infusi, Cataplasmatís, Enematis adhibetur.*

ALCESUNGULÆ, *Piedi di Alce, Pieds d'Elan, Elendsklauen* sunt magnæ, coloris grysei ad nigrum vergentis, cultro rasæ nullum fœtorem spargunt. Desumuntur a Cervo Alce L. in Europa Septentrionali, Asia & America occurrente. *Quæ de ejus virtute Antepileptica ferebantur, ad vetularum commenta merito referuntur.*

ALCHYMILLA, *Pied de Lyon, Sinau, Frauenmantel.* Folia rotunda, plicata, pubescentia, lobata lobis rotundis & serratis, adstringente sapore prædita. Alchemilla Vulgaris L. *Blackwell Tab. 75. Leniter Adstringendi causa ad Infusa Theœformia & Decocta Vulneraria recipitur.*

ALKANNA, *Ancusa, Orcanette, rothe Ochsenzunge.* Radices fibrosæ, calami anserini crassitiem æquantes, sub cortice purpureo nigricante, medullam albam includunt, insipidæ. Anchusa tinctoria L. In Gallia Meridionali spontanea, nostras hyemes fert. *Unice ad tingenda quæque Pingua nec non Spiritum Vini adhibetur.*

ALKANNA ORIENTALIS. Ex capite crasso copiosas lamellas sibi invicem incumbentes, pleniore purpura, quam radices antecedentes saturatas emittit; a Lavvsonia inermi L. desumitur, sed rarissime in Pharmacopolia recipitur.

ALKEKENGÍ, *Alcachingi, Halicacabum, Coquerets, Judenkirschen.* Baccæ rotundæ, rubræ, pulpam continentes grate vinosam, cui Semina multa ovata, compressa, acriuscula, subamara inhærent. Ex Calice amarissimo illas exemturus caveat, ne istius vel levissimo tactu amaritiæ inficiantur. Phytalis Alkekengi L. *Blackwell Tab.*

161. Crescit in Europa, citra magis Septentrionalem. *A vi Diuretica laudantur. Recentes ultro se offerunt comedendas, exsiccata decoquantur aqua, vel Succus inde expressus ad Unciam unam exhibetur.*

ALLIARIA, *Alliaria, Alliaire, Lurchel.* Folia cordata, glabra, dentato serrata, odore & sapore Allium referentia. Erysimum Alliaria L. *Blackwell Tab. 372.* Passim per Europam crescit. *A vi Diuretica & Antiscorbutica laudatur; jusculis adjicitur, aut Succus inde expressus exhibetur. Folia contusa Antiseptico quoque scopo extus applicantur. Folia exsiccando fere inertia redduntur. Oleum destillatum dicitur fundere.*

ALLIUM, *Aglio, Ail, Knoblauch.* Radix bulbosa est obvelata tunica sicca & alba, multis bulbis minoribus constans, quos *Spicas vel Nucleos, Zehen* appellant, & quidem incurvis, acutis, ad margines angulatis, hinc convexis inde planis, sub cuticula leviter rufescente carnem includentibus albam, proprii nauseosi odoris & saporis acris, quæ comesta animam ad sat longum tempus suo fœtore inficit. Allium sativum L. Veterum fide ex Africa in Europam illatum hodie ubivis colitur. *Resolvendi causa ad juvandam Digestionem, curandos affectus Pectoris, Podagram & Febres intermittentes, Anthelmintico & Diuretico scopo adhibetur sive crude comedendum, sive Succus inde expressus; illud ad tres spicas, hic ad Unciam unam exhibentur. Extus Bulbi sub cineribus cocti Maturandi, aut in pulpam contriti Rubefaciendi ergo applicantur. Sex & nonaginta Unciæ largiebantur Olei citrini, in aqua subfidentis, & penetrante suo odore omnia reliqua Olea odorata superantis Drachmam unam.*

ALLIUM ASCALONICUM L. *Eschalottes, Schatotten.* Consistit ex Bulbis solitariis, sub tunica rufescente bulbillos continens convexo-concavos, priori similes, odore vero & sapore mitiores. Palæstinæ civis, in hortis colitur; ad *Condimenta maxime recipitur.*

ALLIUM SCORODOPRASUM L. *Rocamboles.* Passim in Europa *Sylvestre* crescit

scit, in hortis colitur. Bulbi umbellis innixi, subglobosi, ad latera compressi; tunica, qua sunt vestiti, ad colorem violaceum accedit, cætera cum prioribus fere habent communia. Ab Allio enim vulgari sapore & odore parum, viribus nihil differunt.

ALNIJS, *Enula*, *Aunée*, *Erlen*. Folia nobis largitur rotunda, crenata, inferne albida, insipida. Betula *Alnus* L. Arbor in omnibus Europæ regionibus, Sibiria, Constantinopoli crescit. *Folia incisa & Mammis calida imposita multum ad Lac Discutiendum laudantur.*

ALOES, Succus inspissatus, niger, qui in majoribus massis nobis offertur, odore nauseoso, sapore amaro & acrimoniæ vicino. Inde ab Arabum temporibus tres ejus species in officinis prostant puritatis gradu inter se differentes; purissima est *Succotrina*; ad rubedinem accedit & nitore gaudet, cucurbitis inclusa nobis mitti solet; hanc *Hepatica* excipit, pleniore flavedine tincta; evidenter fordida est *Caballina* nigra, siccior, odorem minus fortem spirans. Ex varia succum ex foliis Aloës perfoliatæ veræ L. *Blackwell* Tab. 229. utriusque Indiæ civis, apud nos per hyemem tepidario fovendæ, expressum inspissandi ratione variæ hæ species oriuntur; *Succotrina*, ex succo defæcato spissitudinem sponte contrahente; *Hepatica*, ex succo pariter quidem defæcato, sed calore inspissato; *Caballina*, ex succo a fæcibus non mundato minusque diligenter cocto surgit. Hæc postrema ex officinis rejicienda. *Ob virtutes Alvum ducendi, Primas vias roborandi, Obstructiones Systematis Venæ Portarum reserandi, Vermes necandi, Putredinem arceudi laudatur. Sed inde Sanguinem, Hæmorrhoidalem maxime, exæstuari Veteres jam perspexerunt, & hunc effectum a principio ejus resinoso pendere est observatum, quapropter pro usu interno non nisi Extractum aquosum est recipiendum; neque ad illud extrahendum, calor ullus, ne scilicet resinosa partes accrescant, est adhibendus; sed aqua cum Aloë frigide infusa per aliquod tempus est reponenda & depositis demum fæcibus, inde defusa leni calore evaporanda. Aloës*

Purgandi quidem scopo ad Drachmas duas; in reliquos usus ad Scrupulum unum præscribitur. Auctores mediæ ævi Aloën Infusis Vegetabilibus aut aqua solverunt & denuo inspissarunt, unde ALOES LOTTA, INSUC-CATA, ROSATA, VIOLATA extiterunt. Datur sub forma Pilularum, Electuarii, Infusi Spirituosi, Vinosi. Extus ejus Tinctura spirituosa vel Pulvis recipitur; additur quoque Suppositoriis, Clysmatibus, Unguentis.

ALOES LIGNUM. Hoc nomine ad nos vehuntur frusta lignorum variæ magnitudinis badio aut nigro colore tincta, striis nigricantibus variata, aut resinam nigricantem in sinibus quasi excessis vehentia; his frustis ardentibus resina, qua scætant, fusa suavem odorem spargit, quem autem subsequens ligni accensi odor mox disturbat. Nihil certi de arboris genere, nec unde nobis venit, liquet. In Indiæ Orientalis montibus insidere videntur arbores, quæ perinde ac nostræ Pinus ætate resina obducuntur; istarum arborum resina fragrantia sua ceteris præstat: frusta tota resina plena *Calambuc* dicta ad nos non perveniunt; tantum minus resinosa sub Ligni *Aloes*, *Agolochi*, *Aquila*, *Aspalati* nomine nostras tabernas ingrediuntur, & pro varia quam fovent resinæ ratione distinguuntur. Olim *Nervino* scopo ad Pulveres recipiebatur necnon ad *Suffimenta*, hodie evuluit. Oleum destillatum consistentiæ butyracæ inde obtinebatur.

ALSINE, *Morgeline*, *Hünerdarm*, *Vogelkraut*. Folia parva, ovata, longis petiolis prædita, acute terminata, levissime hirsuta, insipida, inodora. *Alsine* media L. Vulgatissima per omnem Europam planta. *Vires Emollientes habere dicitur.*

ALTHÆA, *Altea*, *Guimauve*, *Ibisch*. *Radix* fibrosa sub cute leviter flavescens, qua dum exsiccatur nudari solet, medullam albam habet subdulcem proprii nec ingrati odoris. *Folia* sunt cordato-oblonga, acute ferrata, quinqueloba, tomentosa, insipida, inodora. *Flores* albi monopetali, quinquefidi, inodori & insipidi, calice duplici tomentoso cincti as-

servantur. *Semina* uniformia, compressa, striata, fusca, odoris & saporis expertia. *Althæa Officinalis* L. *Blackwell* Tab. 60. Crescit in Europa præter magis Septentrionali. *Demulcendi & Emolliendi* scopo adhibetur, & cum hæc virtutes & mucilagine pendeant, quæ Radicibus quam reliquis partibus copiosior inhaeret, Radices ad hunc scopum frequentioris sunt usus. Datur sub forma *Infusi*, *Decocti*, *Syrupi*, *Trochiscorum*; recipitur ad *Collutoria*, *Gargarismata*, *Cataplasmata*.

ALUMEN, *Allume*, *Alun*, *Alaun*. Est Sal in amplas massas concretus, crystallis majoribus efformatus, linguam valide adstringens, non nisi larga aquæ copia dissolvendus, *Syrupi Violarum* colorem non mutans, prunis superimpositus multum intumescens & pelluciditatem exuens. Dimidium ejus ponderis aqua, sextam partem *Acidum Vitriolicum* & quartam terra *Argillæ propria* efformat. Inter Europæos primi Itali illud pararunt, qui quidem cum per crystallisationem figuram lapis induere hoc Alumen ipsis videretur, ut a ceteris ejus generibus, quæ omnia hodie evilerunt, distinguerent, nomen ei a *Rocca sive Rupei* indiderunt. *Leibnitz Protog.* 47. hanc denominationem a *Rocca Syriæ*, unde Alumen parandi trecentis ultra annis in Italiam delata fuit, repetit. Obtinetur ex variis fossilibus, unde post justam singulorum natura, præparationem elixivationis & crystallisationis ope elicitur. Purissimum creditur *Romanum*, quod *Tolfæ* ad centum cellas ex quadam *Selenites* specie paratur & leni roseo colore gaudet. Valide *Adstringit*, quem in finem partibus *Sanguinem* fundentibus aqua solutum & linteis exceptum applicatur, ad *Dentifricia* quoque recipitur. Intus ad *Hæmorrhagias* aut *Diarrhæas* sistendas octo aut decem ejus *Grana* pro dosi exhibentur sive sub forma *Pulveris* sive sub forma *Pillularum*.

AMARA DULCIS, *Mirella*, *Douce amere*, *Je længer je lieber*. Recipiuntur *Stipites* duriusculi, flavidi, subangulares, rugosi, tuberculis hinc inde exasperati, inodori, amari cum præcedente quadam dulcedine. *Solanum Dulcamara* L. *Black-*

well Tab. 34. *Sanguinis Depurandi* gratia commendatur. *Stipites recentes exsiccatis* præferuntur, *Drachmæ duæ ad tres* pro dosi ex aqua decoquantur.

AMBRA, *Ambra grigia*, *Ambre gris*. Est Bitumen, quod in variæ magnitudinis frustis ad nos adducitur, intus gryseis, extus nigricante crusta tectis, ex lamellis cum aliqua tenacitate fragilibus formatis, levibus, ad candelam facile liquefcentibus, vix non totis in auras evolantibus. Odor integræ sibi relictæ *Ambre* non fortis est, sed calori admotæ, aut cum aliis substantiis mixtæ & in pulverem tritæ fragrantissimus. Ipsa seorsum in pulverem cogi nequit. *Ambra Ambrosiaca* L. In omni mari, quod *Asiam*, *Africam* & *Jamaicam* alluit, reperitur, sive ipsi innatans, sive rupibus littoris accreta. *Ambra Vulgatio* L. & omnes ejus varietates arte sunt paratæ. *Ob fragrantem, quem spirat, odorem aliis substantiis adjicitur, quarum magnum volumen exigua ejus portio gratissimo odore imbuit. Ad vim Nervæam excitandam & augendam multum confert; cui vero scopo idoneam dosim ad triginta usque Granorum pondus extendi debere recentiora experimenta docent. Datur cum Saccharo in Pulverem trita aut Alcohole dissoluta & tunc ESSENTIA AMBRÆ dicitur. Adjicitur quoque Asperginibus cosmeticis, Balsamis, Suffimigiis.*

AMBRA LIQUIDA. Est Balsamum *Peruviano* spissius, fuscum, sapore præditum acri, aromatico, odore fragrante *Styracino*; dicitur obtineri ex inciso cortice *Liquidambar Styracisfluæ* L. Arboris in *Virginia*, *Carolina* & *Regno Peruviano* crescentis; apud nos in frigidario asservandæ. Olim roborando *Ventriculo* inungebatur & gratiæ ergo medicamentis internis admiscebatur; hodie ei *Styracem* solent substituere.

AMETHYSTUS. Est gemma post *Adamantem* & *Rubinum* durissima, coloris pulchre violacei & columbini. A *Valerio Rubini* species habetur. Ex *Persia*, *Arabia*, *Armenia*, *India Occidentali* ad nos adducitur; reperitur quoque in *Gallicia*, *Hungaria*, *Saxonia*. In officinis ipsi sive *Crystallum coloratum violaceum*

VVall. substituunt, quæ est varietas violacea Nitri lapidosi quartzosi octodecaëdri L. *Ametystus Occidentalis* dicti, sive Fluorem spathosum violaceum *VValler.* sive Aluminis lapidosi calcareo-spathosi, diaphani, rasilis L. varietatem; passim in montibus Europæ occurrentes. *Omni virtute medicata caret.*

AMIANTHUS, *Amianto, Asbestus, Alumen plumosum.* In officinis synonyma Lapidem significantia ex fibris parallelis laxius inter se cohærentibus & aliquantum flexilibus constantem, grysei vel viridescens coloris. Amianthus fragilis fibrosus, fibris separabilibus, rigidis, nitidis, fragilibus L. Passim in montibus Europæ offenditur. *Interdum, consilio non admodum laudando, Irritandi causa Cuti inspergitur.*

AMOMUM, *Pimenta, Piper Jamaicense, Nagelein-Kæpffe.* Fructus variæ magnitudinis, Pisis crebro majores, subrotundi, badii, rugosi, umbilico notati, biloculares, in utroque loculo continent semen fuscum, compressum, rugosum, rotundum, odorem spirant inter Caryophyllos & Cinnamomum medium, saporem acrem emittunt. Myrtus Pimenta L. *Blackwell* Tab. 355. Arbor Jamaicae propria. Olei in Aqua subsidentis $\frac{1}{4}$ fundere dicitur. Baccæ immaturæ decerpuntur, sole exsiccandæ. *Medias inter Antophyllos & Caryophyllos vires Aromaticas edunt.*

AMOMI SEMEN exiguum est, gryseum, striis eminentibus sulcatum, odoris levioris, saporis aromatici linguam ferientis, non ingrati. Sison Amomum L. *Blackwell* Tab. 442. Crescit in Anglia & Europa calida, nostras hyemes fert. *Laudabatur olim ob vires Carminativas & Diureticas.*

AMMI, *Creticum & Vulgare* prostat. CRETICUM sistit femina exigua, striata, ovata, convexo-plana, sapore amaricante & aromatico prædita; odorem exsiccata nullum habent. Sison Ammi L. Europæ Australis & Orientis civis, planta annua, apud nos sub dio coli potest. VULGARE femina exhibet exigua, fusca, striata, saporis aliquantum aromatici, odoris vero vacua. Desumun-

tur ab Ammi Majore L. Cum priori non idem tantum solum natale habet, sed eodem etiam modo apud nos colitur. Fundunt hæc femina Oleum destillatum & a virtute Carminativa & Diuretica laudantur.

AMMONIACUM GUMMI. Est succus concretus, qui sub majoribus massis in calore molliusculis ad nos adducitur, ex grumis flavescens constans, quibus ingens granorum numerus lactei coloris, Ungues sive *Amygdalas* appellant, inhæret. Quo uberiori horum unguium copia G. Ammoniacum abundat, eo melioris notæ esse putatur; odor fortis non gratus, sapor amarus & acriusculus. Calore funditur; totum ex aqua, quam lacteam reddit, suspendi patitur; Spiritus Vini ejus dimidium circiter dissolvit. Plantam unde obtineatur, ignoramus; ex deserto Africae Barca Alexandriam & inde ad nos perducitur. *In Resolvendo præcipua ejus laus ponitur. Datur Menstruis Aquosis dissolutum, aut in formam Pilularum redactum ad Drachmam semis pro dosi; Syrupum quoque inde parant. Extus sub forma Cataplasmatum aut Emplastri adhibetur.* Si ungues recipiuntur, nulla depuratione opus est; neque Aceto squillitico dissolutum & denuo inspissatum vires edet eo efficaciores.

AMMOMIACUS SAL, *Salmiack.* Adducitur ad nos ex Ægypto forma pannum rotundorum, convexo-concavorum, vertice crasso & eminente instructorum, a substantia pellucida, salina efformatorum; saporem habent salinum, odorem levissimum. Paratur in Ægypto sublimationis ope ex fuligine, quam excrementa brutorum suppeditant. Paratur quoque Sal Ammoniacus in Germania, Gallia & Anglia, quin etiam nativum montes ignivomi & Calmucorum regio largiuntur; sed ex Ægypto allatus in nostris saltem officinis est usitatissimus. Constat ex Acido Salis & Alkali volatili, quod inter terendum cum Alkali fixo aut Calce inde secedit, & valide nares ferit. *Incidendi ergo sub forma Pulveris aut Aqua dissolutus ad Drachmam unam aliquoties de die, extus autem sub forma*

Fomenti contra Gangrœnam & Scabiem adhibetur.

AMYGDALÆ, *Mandole, Amandes, Mandeln*. Nuclei oblongi, jam ventricosi, jam compressi, partim dulces, partim amari sub epidermide rubro-brunnea, sicca, scabra, medullam albissimam & firmam continent. *Amaræ* ut plurimum compressæ sunt epidermidis rugosæ, odoris tenuissimi. Sunt qui longas *Jordanicas*, laticas *Hispanicas*, parvas *Barbaricas* appellant. Desumuntur ex Amygdalo communi L. *Blackwell* Tab. 105. In Europa temperata & Australi, Oriente & Barbaria obvia est. Ope Infusionis in aqua fervida medulla facile ab epidermide separatur. Oleum inde expressum albissimum, insipidum, non nisi Amygdalas redolet, nucleorum circiter dimidium æquat; frigore quod thermometrum Reaumurianum ad septimum infra cyphram gradum deprimit, cogitur, parcius illud amaræ largiuntur. *Amygdalæ dulces Nutriunt & Demulcent, sive, ut sunt, comedantur, sive a coquis & cupediniariis varia ratione præparentur. Medici illas sub Emulsionis aut Morsulorum forma præscribunt. Ad medicamenta Cosmetica quoque recipiuntur. Amaræ, quarum amarities, multis animalium generibus pernicio-sa, O'eo inde expresso neutiquam accrescit; nonnihil acrimonie habent. Exigua earum quantitas prioribus non raro gratiæ ergo adjicitur. Emulsiones inde paratæ multum ad fugandas Febres intermittentes, p'stilli vero ope in pastam redactæ ad delendas Vultus maculas laudantur. Residuum ab expressione Olei sub FURFURUM nomine abstergendis sordibus Cutis inservit.*

MYLUM, *Amido, Amidon, Stärke*. Frustra parva, angularia, friabilia, inter digitos crepula, facillime in pulverem tenerimum terenda, insipida, inodora, efformata a fecula farinæ aqua macerata. Quævis farina illud largitur, sed vulgo paratur e Tritici speciebus, unde panis coquitur. Palpabili viscedine instructa cum aqua cocta in formam Gelatinæ spissæ glutinantis vertitur. *Demulcendi & Glutinandi ergo tam extus quam intus adhibetur.*

ANACARDIUM OCCIDENTALE, *Acaju, Acajou, Elephantenlaus*. Nux reniformis, glabra, fusca, convexo-plana continet sub cute densa, tenaci, quæ quidem in nucibus ad nos translatis siccissima est, nucleum album, dulcem, pellicula subfusca obductum. *Anacardium Occidentale* L. *Blackwell* Tab. 369. Arbor in utraque India crescens. In Indiis cortex rodente succo scatens rejicitur. *Nucleus Nutriendi ergo comeditur. Ejus inter nos usus obsolevit.*

ANACARDIUM ORIENTALE. Nux nigra, splendens, utrinque compressa, margine incrassato, pedunculo crasso, rugoso instructa, sub putamine denso, materie nigra, splendente intus obducto, nucleum album, dulcem includit. Arboris in Suratta crescentis character nos latet, *Ceterum quæ sub antecedente monuimus, hic quoque notanda veniunt.*

ANAGALLIS, *Anagallide, Mouron, Gauchkeil*. Cauliculi cum foliis asservantur, ovato oblongis, integerrimis, acris & amari saporis; *Anagallis arvensis* L. *Blackwell* Tab. 43 & 274. Crescit in omni Europa, præter magis septentrionalem. *Avi Antimelancholica olim laudabatur, hodie Antilysam celebrant. Sub forma Pulveris ad Scrupulos quatuor de die datur, Vulneri quoque inspergitur.*

ANAS, *Anitra, Canard, Ente*. *Anas Boschas* L. *Vulgaris* in cortibus Europæ avis, unde caro mensis imponitur. *Axungia* alba, insipida & inodora scopo Emolliendi per se, sive unguentis immixta, adhibetur.

ANCHUSA videatur BUGLOSSUM.

ANETHUM, *Aneto, Anet, Dyll*. Folia duplicato sunt pinnata, pinnis pinnatifidis, laciniis angustissimis, odore gravi, sapore aromatico: *Semina* sunt ovata, fusca, marginata, striata, compressa, una superficie levissime convexa, altera plana, odoris levioris, saporis aromatici. *Anethum Graveolens* L. *Blackwell* Tab. 545. Planta annua Europæ Meridionalis indigena, in hortis colitur. *Seminis* Unciæ sexdecim, unam Unciam Olei destillati largiuntur. Cl. *Baumé* ex Herbaræ recentis nongentis & sexaginta Unciis se-

fquiniam Olei odorati obtinuit. *Vi Carminativa gaudet. Recipitur ad Infusa & Decocta. Aquam inde destillatam & Oleum infusum quoque adhibent.*

ANGELICA. Radices ex crasso capitulo multas fibras emittunt, dimidium circiter pedem longitudine æquantes, calamo anserino angustiores, extus ex cinereo nigricantes, intus albas, subspongiosas. Sapor aromaticus, salinus, cum quadam amaritie, odor proprius, fortis. *Semina sunt ovata, obtusa, convexo-plana, tribus sulcis eminentibus exarata, marginata; odore radicibus similia, sapore mitiora. Angelica Archangelica L. Blackwell Tab. 496. Alpium civis, in nostris hortis colitur, planta biennis. Ex Radicum Libra una Cartheuser Drachmam unam Olei obtinuit. Resolvit Mucosam spissitudinem, Sudorem pellit. Olim ob vim Alexipharmacam laudabatur. Infusum Spirituosum præ aquoso præstare dicitur. Datur sub forma Infusi. Scopio Apophlegmatico. Radix masticatur. Sylvestrem in hortis cultæ multo præstantiorem asserit Linnæus. Inconsulto nostræ plantæ substituitur Angelica Sylvestris L. Ubivis fere in locis humidis Europæ obvia.*

ANGLICUM SAL CATHARTICUM Epsomense. Natrum fontanum L. Crystallicum exiguæ ne lineares quidem, ad figuram Parallelogrammi accedunt, in aqua facile solubiles, saporis amari, cui aliquantulum acrimoniæ accedit; in aere humescens, superiori seculo ex fonte Angliæ Epsomensi obtentum per orbem divendebatur. Hodie ex variis Fontibus soteriis, nec non ex Aqua marina, Salerni inde communem excoquendo, solet parari. Constat ex Acido Vitriolico & proprio terrarum Alcalinarum genere, quod hodie Magnesium album dicunt. Aliquid Salis Ammoniaci fixi ei admixtum esse videtur. Sal Epsomense, quod in Salinis Lotharingicis paratur, est verum Sal mirabile Glauberi, cujus solutio, dum in Crystallos abit, agitur ut Crystallicum exiguæ surgant. *Datur ad Unciam semis Incidendi & Urinam ducendi scopo; ad Uncias usque duas Cathar-*

tico sine, decuplo & ultra Aquæ dissolvitur, & solutio per cyathos exhibetur.

ANGUILLA, Anguilla, Anguille, Aal. Muræna Anguilla L. Hepatis & Exuviarum usus exsolevit. Illud in duos lobos, quorum sinister major est, divisum nullius saporis est. Hæ, pisciculosi odoris, superiore parte ex viridi nigrescunt, inferiore ex luteo albescunt. *Axungia oleum consistentia, odore, sapore unguinosum refert. Abstergendi ergo adhibetur.*

ANIME GUMMI, Courbaril. In frustis variæ magnitudinis nobis affertur. Lutescit, superficiem habet farinaceam, diffractum eandem splendorem exhibet; odorem suavem spirat; sapor leviter resinosus est; sub dentibus ductile evadit & calore manus; igne funditur & gratum fumum emittit. Alcohole & Oleis dissolvitur. Olei destillati tantillum exhibere dicitur. Ex Hymenæa Courbaril L. Arbore Brasiliensi extillat. *Ad Suffitus contra morbos Catarrhales recipitur.*

ANISUM, Anice, Anis. Semina pedunculata, ovata, ventricosa, striata, albida, odore suaveolente, proprio, sapore dulci cum leviori aromate sunt prædita, Pimpinella Anisum L. Blackwell Tab. 374. In Ægypto & Syria sponte quidem provenit, sed & apud nos hodie passim in agris colitur. In Hispania collectum ab Alona denominatum reliquis magnitudine cedit; aromate præstat. Oleum destillatum citrinum, dulce, semine acrius. Ex seminibus Unciis sedecim Drachmæ circiter duæ Olei obtinentur; illud in aère temperato in massam albam, lamellosam, splendorem cogitur. Magna copia in Thuringia paratur per Germaniam & Belgium inde divendendum. Efficacius Seminis vires a Spiritu Vini quam ab Aqua extrahuntur. *Resolvente, Carminativo, Roborante scopo cibus adjicitur, sub forma Pulveris, Confectionis sicæ, Infusi, Decocti, Aquæ destillatæ, Spiritus abstracti exhibetur. Oleum destillatum in Elæosaccharum reducere, vel scopo externo Linimentis Carminativis adjicere vulgo mos est.*

ANISUM STELLATUM, Anice della China, Anis de la Chine, Stern-Anis. Fructus

Stus rugosus, capsulis ad octo usque in orbem compositis, ovatis, fuscis, superne hiantibus constans. Singulæ capsulæ unum semen includunt, ovatum, sub cortice splendente, spadiceo, fragili, nucleum albidum continens; odoris proprii ad præcedens accedentis, saporis dulcis & aromatici. Oleum destillatum fundere dicitur. Illicium Anisatum L. Arbor in China & Tartaria crescens. *Vires antecedentis exsequitur. Datur sub forma Infusi, vel Spiritus abstracti.*

ANSER, Oca, Oie, Gans. Anas Anser domesticus L. Vulgaris in cortibus avis. Saginati Hepar ad insigne volumen excrescit, ob egregiam saporis sui gratiam mensis valde acceptum. *Axungia quæ alba est, insipida, inodora Vires emollientes habet.*

ANSERINA, Bodentilla, Argentine, Genserich. Folia cum impari pinnata, pinnis ovalibus inciso-ferratis, sensim magnitudine crescentibus, subtus villosa, inodora, levissime adstringentia Potentilla Anserina L. *Blackwell Tab. 6.* Passim crescit per Europam. *Adstringentes & Diureticas vires habere dicitur. Datur sub forma infusi.*

ANTHOPHYLLI, Madri dei Garofani, Meres de Giroffles, Mutternagelein. Sunt capsulæ ovato-cylindraceæ, utroque extremo angustatæ, inferne exiguo pedunculo instructæ, umbilico quadrifido coronatæ, in cujus medio exiguus stilus eminet; sub cortice fusco & tenero hæret semen nigrum, splendens, sinu longitudinali divisum. Odorem quidem & saporem Caryophyllorum aromaticorum, sed leniorem habent. Sunt fructus Caryophylli Aromatici L. *Blackwell Tab. 338.* Sponte crescit in Nova Guinea; colitur in Amboina & Gallicis Asiæ Insulis. *Caryophyllorum vires quoque, sed multo debiliores habent.*

ANTHORA, Gifftheil. Radices nigricantes albam medullam includunt, ex capite rotundo angulato, crasso, subito in caudam gracilem terminantur; sapor lenissime acris, odor nullus. Aconitum Anthora L. *Blackwell Tab. 562.* Alpium

civis; nostras hyemes impune fert. *Vis venenis resistens Arabum commento nisa evitavit, aliis innoxia, venenata esse aliis dicitur. Consultius duxerim medicamento nondum satis explorato, prorsus abstinere.*

ANTHOS, videatur ROSMARINUS.

ANTIMONIUM, Stibium, Antimonio, Antimoine, Spiesglas. Substantia fossilis, nigro-plumbei coloris, insipida, inodora, ex æquis partibus Sulphuris & proprii Metallii, quod Regulum dicunt, constans. Eruitur e terra partibus terrestribus contaminatum, & tunc *Minera Antimonii* dicitur. Depuratur ollæ in fundo perforatæ, & prunis cinctæ commissum, unde liquidum migrat in ollam priori suppositam, remanente in ista altera, quicquid ipsi terrestrium particularum adhæserit. *Sanguinem Depurandi gratia, ad morbos Cutaneos & Arthriticos adhibetur. Datur ad Drachmam unam pro dosi sub forma Pulveris, Pilularum, Morsulorum. Recipitur quoque ad Decocta aquosa.*

APALACHINE, Te del Paraguay o del Missipi; Thée du Paraguay ou de Missipi: hoc nomine superioribus annis afferebantur fragmenta foliorum ovatorum, flavicantium, sapore leniter acri instructorum. Decerpi hæc folia dicuntur a Cassine Peragua L. Virginie & Carolinae frutice, apud nos per hyemem in tepidario asservando. Recentia hujus fruticis folia amarissima deprehenduntur. *Vomitum & Alvum ducere, Infusum eorum aquosum apud Americanos crebro in usu esse, ab effectibus Calculosis defendere dicuntur. Hodie eorum usus exsolevit.*

APARINE, Aparine, Grateron, Klebkrant. Asservantur cauliculi cum foliis oblongis, verticillatis, in quolibet verticillo senis & ultra; pilis rigidis obsessi, inodori & insipidi. Galium Aparine L. *Blackwell Tab. 39.* Ubivis in Europa occurrit. *Resolvendi & Aperiendi ergo olim laudabatur, hodie succum inde expressum in morbis Cutaneis debellandis efficacem se probasse compertum est.*

APER, Cinghiale, Sanglier, Wildschwein. Sus scrofa L. frequens in sylvis occurrit; Caro eximii saporis mensis relinquitur; officinæ inde *Dentes caninos,*

Défenses, Fangzæbne recipiunt, in arcum flexos, tribus facibus longitudinalibus instructos, totos cavos, in animali anno-fiore flavicantes. In *Pleuritide* commendantur & sub forma *Pulveris* sive *Mixtura* mediæ exhibentur.

APIUM, *Ipposelino*, *Ache*, *Eppich*. *Radix* ex capite crassiore aliquot fibras dimittit, sub epidermide flava carnem albam includit, saporis acriusculi ad *Pastinacam* accedentis, proprium quoque odorem spirat; *Radices*, a varietate *Celeri* dicta defuntæ, cuticula nigricante tectæ, istis crassiores sunt, sapore etiam & odore gratiores. *Apium Graveolens* L. *Blackwell* Tab. 443. In Europa præter maxime Septentrionalem sponte crescit. Varietas *Apium dulce Celeri* dictum in hortis colitur. *Semina* parva sunt, cinerea, sulcata, odorem minus gratum spirantia, aromatica, amaricantia, aliquid Olei odorati fundere, & *Radices* ope Alcoholis Saccharum largiri dicuntur. *Radices* & *folia Celeri* ad usum cibarios, *Radices Apii Sylvestris* Resolvendi, *Aperiendi*, *Urinam ducendi causa*, ad *Decocta* & *Infusa* recipiuntur. Apud nos *Radices Celeri*, *Sylvestri* vulgo substituantur. *Seminum* idem, qui obtinuerat, usus exsolevit.

AQUILEGIA, *Ancoline*, *Agley*. Flores quinque petalis planis & totidem cornutis, quæ *Nectaria* dicuntur, efformati, cœrulei, inodori, insipidi. *Semina* ovata, exigua, nigra, nitida, nonnihil medullæ albæ & dulcis includunt; torcular inde Olei viridis $\frac{1}{4}$ circiter exprimit. *Aquilegia Vulgaris* L. *Blackwell* Tab. 409. Passim per Europam, præter Maxime Septentrionalem, occurrit. *Laudatur ob vim Resolvendi*, hodie exsolevit.

ARABICUM GUMMI, *Gomma Arabica*, *Gomme Senegal*. Advehitur ad nos sub forma frustorum variæ magnitudinis, extus rugosorum, plus minusve luteo vel fusco tinctorum, intus splendentium, fragilium, inodororum, insipidorum. Quo saturioris coloris est, eo habetur vilius. Quod a *Senegal* denominatur, majora & pallidiora frustra sistit, grana inde tota, alba ad certa præparata seligi solent, for-

didissima *Gummi Turique* aut *Turris* constituunt. Conjecturam, quam semper fovi, non unam tantum aut alteram, sed plures *Mimosæ* L. *Species* hoc *Gummi* fundere, illustris *Adanson* iudicio confirmatam video. Nec *Spiritu Vini*, nec *Oleis* dissolvitur. *Quadruplum Aquæ* in consistentiam *Syrupi* densat; vires *Saponis* edit, *Mercurium* ex *Aqua* suspendit. *Nutriendi viribus instructum*. *Relaxandi* & *Demulcendi* ergo in frequenti usu est; ejus *Drachma dimidia* sub forma *Pulveris* vel *Linctus* exhibetur. *Extus Collyriis* admiscetur & *Ulceribus acri humore madentibus* inspergitur.

ARANEA, *Ragno*, *Araignée*, *Spinne*. *Aranca Domestica* L. ubivis occurrit. A quibusdam in *Pulverem* redacta laudatur contra *Febres*. *Tela* partibus vulneratis imponuntur.

ARBOR VITÆ. Hinc recipimus *Folia* pinnata, pinnis alternis, non raro uno latere denuo pinuatis, ex squamis ad se invicem appressis efformata, cum splendore viridia, odoris evidenter resinosi ejusdemque saporis, cui pungens aroma & nonnihil amari accedit. *Thuya Occidentalis* L. *Canada* & *Sibiria* indigena in nostris hortis colitur. Ob vim *Resolvendi* sub forma *Decocti*, sive in *Unguenti formam* redacta folia contra *Rheumatismos* & *Tussim* laudantur.

ARDEA, *Airone*, *Heron*, *Reiger*. *Ardea cinerea* L. *Avis* passim in Europa occurrens. *Axungia* axungii quadrupedum paulo mollior, alba, nullo proprio odore distincta. *Podagricis maxime* commendatur.

ARGENTUM, *Argento*, *Argent*, *Silber*. Metallum album, aqua undecies gravius, inter *Aurum* & *Regulum Antimonii*, ratione caloris quo funditur, inter *Aurum* & *Ferrum*, ratione firmitatis medium locum tenet; in omnibus *Acidis*, præter *Aquam Regis* solubile, nec *Nitro*, nec *Vitro Saturni* destructibile. Nonnisi purissimum in officinas recipiendum, quod quidem vel detonatione cum *Nitro* vel per reductionem *Lunæ cornuæ* obtinetur. *Vires medicatas* nullas edit; olim in tenuissima folia dilatatum

Et cultro in exiguas lamellas dissectum or-
natus gratia Pulveribus addebatur, hodie
adhuc Pilulis obducitur.

ARGENTUM VIVUM, videatur
MERCURIUS.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS, TE-
NUIS Londin. *Aristologia di Vite, Aristolo-
che de Vigne, Osterlucey. Radices* longæ,
fibrosæ, digito minimo angustiores, ex-
tus rufæ, intus pallidæ; Longis & Ro-
tundis minus acres & minus amaræ.
Folia sunt cordata, obtusa, angulis po-
sticis rotundatis, firma, glabra, acrius-
cula *Aristolochia Clematidis* L. *Black-
well* Tab. 255. Crescit in Europa tem-
perata. *Radices cum Longis & Rotundis*
sint multo debiliores rarissime in usum tra-
buntur. Folia Vino macerata tamquam Vul-
nerarium Polychrestum a nostratibus usur-
pantur.

ARISTOLOCHIA FABACEA, *Hobl-
wurzel.* Bulbos sive Radices exhibet sub-
rotundos, supra & infra compressos, fu-
scos, sive vacuos, sive carnem albidam
includentes; bulbi vacui solidis majores
sunt; odor nullus, sapor eorum amarus
est. *Fumaria bulbosa* L. *Blackwell* Tab.
534. Crescit per omnem Europam præ-
ter magis Septentrionalem. *Ad Lumbri-*
cos necandos & Catamenia pellenda in In-
fuso Vinoso vel Spirituoso olim adhibebatur.

ARISTOLOCHIA LONGA, *Aristolo-*
gia longa, Aristolochie longue, lange Osterlu-
cey. Radix fibrosa, pollicem circiter cras-
sitie, semipedem longitudine æquans,
obtusa, rugosa, extus tenuiter fusca,
intus ex luteo albens, odoris teneri, sa-
poris amari, acriusculi, aromatici. *Ari-*
stolochia longa L. *Blackwell* Tab. 257.
Europæ Australis civis, apud nos per
hyemem in frigidario asservanda. *Ape-*
riendis Menses ducendi, morbos Arthriticos
sanandi scopo datur sub forma Pulveris, vel
Infusi Vinosi. Ulceribus sordidis inspergitur;
ejus Decoctum Fistulis injicitur.

ARISTOLOCHIA ROTUNDA. Ra-
dices exhibet ex pluribus tuberibus con-
cretas, rugosas, extus ejusdem cum præ-
cedente, sed magis diluti coloris, intus
rufas, sapore istis longe acriores & ama-
riores. *Aristolochia rotunda* L. *Black-*

well Tab. 256. In eadem cum antece-
dente patria crescit, in frigidariis quo-
que nostris contra hyemem defendenda.
Cum Longa easdem, sed efficaciores vires
habet.

ARMENIACA, *Morilli, Albicocca, Abri-*
cots, Abricosen, Nostratibus Mællelein.
Drupæ plus minusve ovatæ, variæ magni-
tudinis, pulpam gerentes flavam, grate
olentem & dulcem, Nuccem includen-
tem, cui sub testa ossa *Nucleus* inest
globosus, ventricosus, sub tunica fla-
vente medullam albam, grate amaram
continens. *Prunus Armeniaca* L. *Black-
well* Tab. 281. In hortis nostris colitur.
Fructus, ut ceteri horrei omnes vires sa-
ponaceas exserunt; Rob inde paratum
MARMELADA dici solet: Nuclei tam
forma, quam sapore ad Amygdalas
amaras accedunt.

ARMENIUS LAPIS. Est Minera Cu-
pri, lapidem referens cœruleum minus
durum, cum Acidis effervescentem Cu-
prum Armenus L. Passim in montibus
metallicis reperitur. *Vi Æris, quo scatet,*
Vomitum valide agit Albumque ducit, qua-
propter nunquam in usum trabendus. Pessi-
mo consilio interdum Lapidis Lazuli substi-
tuitur.

ARMORACIA, *Ravano, Raifort, Meer-*
rettig. Radices cylindræ, in varios
ramos diffusæ non raro brachium hu-
manum crassitie æquant, totæ albæ; na-
res & palatum insigni saporis acumi-
ne vellicant, quod quidem exsiccatione
& coctione mitigatur; comestæ spiritum
odore alliaceo contaminant. Olei odo-
rati in Aqua fundum petentis Grana-
quindecim ex Libra una Radicum obti-
neri asseritur. *Cochlearia Armoracia*
L. *Blackwell* Tab. 415. Per Europam
passim spontanea, apud nos in agris co-
litur. *Vires Incidentes, Antiscorbuticas, An-*
tarthriticas, Diureticas Radix edit. In vi-
cem Oleris cum carne coquitur, aut rafa
cruda una cum ea comeditur. Datur scopo
medicato, cum Vino vel Cerevisia infusa,
vel cum aqua cocta, vel in Syrupum re-
ducta, ejus Succum unum aut duo cochlearia
propinantur. Epispastico scopo Uncia semis
Cuti imponitur.

ARNICA, *Bettonica delle Montagne, Be-toine des Montagnes, Wohlverley*. Radices fibrosæ gravi nares irritantes odore, sapore lenissime amaricante, acri instructæ, fuscæ, striatæ, calamum anserinum crassæ, intus albæ. Folia ovato-oblonga, utrinque tomentosa, sapore dulciusculo, cui nonnihil salini & levissime amari accedit. Flores asservantur e calyce evulsi, flavi, amari cum insigni acrimonia. Arnica montana L. In montibus altioribus passim per Europam crescit, difficiliter in hortis colitur. Ad Resolvendum in Sugillationibus ab injuriis externis, morbis Mucosis, Obstructionibus Viscerum Abdominalium, Paralyti &c. Herba & Flores exhibentur. Sed has Plantæ partes, & Flores quidem validius etiam quam Herbam, Nauseam, Vomitum & Cardialgiam excitasse non raro observatum est; quapropter Herbæ & Flores sub medicationis initium ad pares partes misceri & cum tribus Unciis Aquæ non nisi unica hujus miscelæ Drachma propinari solent, ita ut sensim ratio Herbæ imminuatur, ac soli denique Flores exhibentur eadem Dosi ternis vel quaternis horis repetenda. Radices recentissime a virtute Roborante, & perinde ac tota planta a vi Antiseptica laudari cœperunt in Diarrhæis & Dysenteris. Dantur sub forma Pulveris ad Scrupulum unum vel Drachmam semis aliquoties de die.

ARSENICUM ALBUM. Substantia salino-metallica, manifestum Acidum vehens, si ab omni, quod ipsi accrescere solet, heterogeneo fuerit depurata, alba evadit, iuxta vero ratione fusa in Semi-metallum nigricans abit, volatilis, prunis superimposita Allium spirat, linguæ levem saporis imprimat. Ex proprio eam Acido & Principio inflammabili constare recentissima experimenta evincere videntur. Obtinetur ex Mineris varii generis, passim in Metallis fodinis obviis. Forma alba splendens, sub qua in officinis prostat, obtinetur, dum Alkali fixo junctum sublimatur. Ejus Dosis quantumvis exigua vel ore hausta, vel extus applicata vehementissima symptomata excitasse, imo homines necesse crebrius iusto est observatum, & quanquam sunt, qui illud ad varium

morbi genus commendent, tamen cum sit Venenum deterrimum, non nisi cum circumspeditione sollicitissima a Pharmacopolis vendendum censeo.

ARSENICUM FLAVUM. Est Arsenicum, cui subdecuplum circiter Sulphuris mediante sublimatione junctum est; ejus facies ab antecedente, nonnisi colore differt; quod natura passim & præcipue in Hungaria largitur, **AURIPIGMENTUM**, *Orpiment, Operment Pyrites Auripigmentum* L. dicitur. Ceterum tam artificiale, quam Nativum, quo magis splendet, eo melius putatur. Pictores sub nomine *Königsgelb* in usu habent. Licet Arsenicum Sulphure cicurari facile largiar, nulli tamen unquam Auctor sim, ut Arsenicum Sulphuri unitum ad usus medicatos adhibeat.

ARSENICUM RUBRUM, *Risigallo, Realgar, Sandaracque, Rubis Arsenical*. Partim a Natura subministratur, Arsenicum Sandaraca L. passim in Metallifodinis obvium, partim arte paratur, unam Sulphuris partem cum quinque partibus Arsenici fundendo, unde massa rubra vitrifera surgit. Nec hoc ad usus medicatos recipiendum, sed Pictoribus relinquendum est.

ARTEMISIA, *Artemisia, Armoise, Beyfus*. Folia inde recipiuntur pinnatifida, pinnis latiusculis dentatis instructa, subtus tomentosa, aromatici & amaricantis saporis. Artemisia Vulgaris L. *Blackwell* Tab. 431. Vulgaris per Europam & Orientem planta. Laudatur maxime ad morbos Uteri. Datur sub forma Infusi aut Syrupi; ad Balnea quoque & Pediluvia recipitur. Ex summitatibus Artemisie excisicatis, contusis & usque tritis, quoad cortex externus decidat, fibræ internæ lanuginosæ remaneant, quas postea carminant, Japonenses & Chineses inde substantiam tomentosam, gryseam, quæ *MOXA* dicta, ignem facillime recipit, sine flamma gliscentem, donec tota in favillam abierit. Convolvunt Moxam in bacilliformam crassitie calamum anserinum, longitudine aliquot pollices æquantem, hunc bacillum membro Arthritide aut Rheumatismo laboranti imponunt & scintilla accensum relinquunt in favillam redigendum. Huic vero scopo

scops Gossypium Moxæ optime posse substitui, compertum est.

ARUM, *Gichero, Aron*. Radix tuberosa, unde epiermidem solent auferre, albiſſima, ovi columbini magnitudinem æquans, farinosa, friabilis, qui Radici recenti inest, sapor exſiccatione multum mitigatur. Arum maculatum L. *Blackwell* Tab. 228. In Europa temperata copioſe provenit. A varis gentibus tam in cibus recipitur, quam loco Saponis ad mundanda lintea adhibetur. Ejus Pulvis cum Aqua coctus in ſpiſſam mucilaginem vix acrem convertitur. *A Medicis cum ſummo ſucceſſu ad attenuandum Mucum recipitur. Datur ad Drachmam dimidiam pro doſi. Superflua eſt ejus ſive cum Vino Preparatio & omnino Pulvis Fœculis præſtat.*

ARUNDO, *Canna, Roſeau, Rohr*. Exhibet Radices prælongas, geniculatas, ex flavo albas, ſapore dulci præditas. Arundo Phragmites L. Per omnem Europam obvia. *A vi Demulcente & Aperiente Radices olim laudabantur; in quarum locum Radice Graminis ſucceſſerunt.*

ASARUM, *Aſaro, Cabaret, Haſelwurzel*. Radix ex capite, quod parvum eſt, aliquot fibrillas emittit, extus gryſeo-brunea, intus alba, odore forti ad Valerianam accedente, ſapore acri, aromatico. Folia longius petiolata ſunt, reniformia, ſuperne profunde viridia, inferne pubeſcentia, inodora, leniſſime acria. Aſarum Europæum L. *Blackwell* Tab. 383. Paſſim in Europa obtinet. *Vomitum excitant & Radix & Folia, illa ſub forma Pulveris ad Scrupulos duos, in Infuſo ad Sesquidrachmam, horum ſub forma Infuſi Scrupulus ſemis exhibetur. Coctione omnem vim Emeticam deſtrui compertum eſt. Admiſcentur etiam ad aliquot Grana medicamentis, Errhinis, in quibus Radicem Foliis etiam validorem eſſe contendunt.*

ASCIA, *Sorta di Sermone, Ombre, Aſche*. Salmo Thymallus L. Fluviiſ Europæ inhabitat. Caro exquisita, menſis imponitur. *Axungia, quæ conſiſtentiam Olei unguinoſi refert, colorem ex flavo ruſum, odorem tenuem, ſaporem nullum habet. Abſtergendi ſcopo ad Ulcuſcula Oculorum & Aurium adhibetur.*

ASPALATUM, videatur ALOES LIGNUM.

ASPARAGUS, *Asparago, Asperge, Spargel*. Turiones in uſus cibarios cedunt. Radices ex capite craſſiore multas fibras longas dimittunt, cineraſcentes, ſtriis longitudinalibus notatas, ſub cortice paululum luteſcente medullam albam includentes, dulceſcente ſapore præditas. Asparagus Officinalis L. *Blackwell* Tab. 332. Per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem, ſponte quidem creſcit, ſed nonniſi in terra multum ſtercorata cultus in uſum trahitur. Radices a vi Aperiente laudantur, & cum aqua decoquantur, cui evidenter nonnihil acrimoniæ affricant.

ASPHALTUM, *Bitumen Judaicum*. Eſt Bitumen gravi odore nares feriens, ſapore leviſſime reſinoſo inſtructum, colore nigro, Picem referente, fractura ſplendente. Bitumen Asphaltum L. Olim ex Judææ Mari mortuo extrahebatur, unde ei nomen manſit. Hodie paſſim per Orbem invenitur. *Extus Vulnerario vel Diſcutiendi ſcopo ſub forma Emplaſtri, Unguenti, Suffitus adhibetur.*

ASPHODELUS, *Goldwurzel*. Radix flava ex multis ſquamis compoſita, odore vacua, ſapore evidenter mucilaginoſo. Liliſ Martagon L. In omni Europa, præter maxime Septentrionalem, offenditur. *Maturandi gratia Abſceſſibus imponitur.*

ASPLENIUM, videatur CETERACH.

ASSA DULCIS, videatur BENZOES.

ASSA FOETIDA, *Teufelsdreck*. Succus concretus, qui ad nos pervehitur in grumis variæ magnitudinis, fuscis, flavo-dilutis, moleculis albis, aliquantum pellucidis diſtinctis, admodum tenacibus, cum quadam arimonia amariuſculis, odorem viroſum, alliaceum egregie ſpirantibus, in Oleis expreſſis ex parte, in odoratis nequaquam ſolvendis, ex Aqua ſuspendendis. Creberrime hi grumi maſſis reſinoſis nigricantibus, magnis, aridis inhærent, quæ tum maſſæ dicuntur *Aſſa foetida in ſorten*. Obtinetur ex incifa Radice Ferulæ Aſſæ foetidæ L. Perſiæ civis. Olei odorati trigeſimam ſc.

secundam sui ponderis partem fundere est observata. Et Anodynas & Resolventes vires edit; contra Tussim convulsivam, morbos Hystericos, Vermes, Tympanitidem, Febres inveteratas, Cariem laudatur. Datur ad Scrupulos duos pro dosi in Pilulas redacta. Extus ad Suffitus & Clysmata nec non ad Emplastra adhibetur.

ASTRANTIA, *Autruche noire*, *Schwarzweizer Meisterwurzel*. Radix extus nigra, intus alba fibrosa levem modo acrimoniam linguæ impessit, illa certe, quæ in nostri hortis adolevit. Astrantia major L. *Blackwell* Tab. 470. Alpium civis, nostras hyemes impune fert. Alvum ducere dicitur; hominibus non exhibetur, Veterinariis interdum in usum venit.

TRACTYLIS, *Spindel*, *wilde Cardebenedikten*. Folia siliit ovato-oblonga, laciniis acutis in spinasterminatis, pinnatifida. Carthamus lanatus L. *Blackwell* Tab. 468. Planta annua Europæ Meridionalis indigena. A quibusdam olim scopo Aperiendi sub forma Infusi adibebatur.

ATRIPLEX, *Atreplice*, *Arroche*, *bonne ou belle Dame*, *Milten*, *Melten*. Folia triangulæria, velut farina conspersa, mollia, pro varia varietate mox rubra, mox alba. Atriplex hortensis L. *Blackwell* Tab. 99. Asiæ Septentrionalis civis passim in hortis colitur: apud nos mense Octobri feritur, ut in culinis, quoad folia Betæ adoleverint, horum vicem sustineat. Ob vires Emollientes a quibusdam laudatur.

ATRIPLEX FOETIDA, *Atrepice fetida*, *Arroche fœtide*, *Hundsmellen*. Folia ovata, angulata, exigua, pollice conspersa, nauseosum, pisculentum odorem spirantia, insipida. Chenopodium Vulvaria L. *Blackwell* Tab. 100. Passim in Europa offenditur. A nonnullis ad morbos Uterinos sub forma vel Infusi vel Balnei commendatur.

ATRIPLEX SYLVESTRIS, *Atrepice Selvaggia*, *Arroche sauvage*, *Wilde Melten*. Recipiuntur Folia ovato-oblonga, utrinque attenuata, dentata, subtus candidantia, insipida & inodora. Chenopodium rubrum L. Ubique in cultis Europæ provenit. A vi Emolliente passim laudatur.

AVELLANA, *Nocciuola*, *Noisette*, *Ha-*

selnuss. Noces mox ovatæ, mox oblongæ, spadiceæ, rubræ, flavicantes, sub testa fragili umbilico notata nucleum album continent, pellicula sive alba, sive rubra tectum, suavis & proprii odoris, nec diversi saporis. Lignum Coryli nomine notum albidum est & leve, odoris & saporis expers. Corylus Avellana L. *Blackwell* Tab. 293. Passim in Europa sponte crescit, plura ejus genera in hortis colimus. Avellanæ sui ponderis dimidium Olei Unguinosi fundunt, quod ipsas redolet, cæterum Amygdalino simillimum est. Mensis apponuntur, & ne recentibus deficientibus prorsus destituamur Avellanis, nostræ tabernæ asservant noces istius generis, quod in Abbellino Regni Neapolitani agro colligitur, nobis *Rœmische Haselnüssen* dictæ, saporis gratia recentibus haud impares. Adjiuntur Avellanæ Emulsionibus & Morsulis tam ob gratiam, quam propter aliquantam vim Adstringentem, qua præditæ virtutem Amygdalarum Relaxantem temperare creduntur. Ligni usus & Olei Empyreumatici, destillatione inde obtinendi, quod **OLEUM HERACLINUM** appellabatur, evuluit; illud enim omnino iners est, hoc præ aliis Oleis Empyreumaticis nihil proprii habet.

AVENA, *Vena*, *Avoine*, *Habern*. Semina strigosa, utrinque acuta, convexo-plana, cortice gryseo, nigro, flavicante, alio vestita, sulco notata, medullam albam & dulcem exhibentia. Avena fativa L. *Blackwell* Tab. 422. Colitur in agris. Amyli cinerei, benegultinantis dimidium sui ponderis & eandem rationem Mucilaginis albæ & pellucidæ Avenam largiri est observatum. Panis inde conficitur niger & amarus; amara quoque Cerevisia. Avena in ptisanam redacta Grualtum dicitur, quod ex Jure coctum suavissimum edulium, nutriens, digestu facile Refrigerans; Demulcendi, Refrigerandi, Putredinem arcendi ergo ex Aqua coquitur.

AURANTIA, *Oranger*, *Pomeranzen*, *Melavancia* Folia ovato-oblonga, firma, petiolo cordiformi sustentata, sapore aromatico amaricante & odore fragrante prædita. Flores a voce Italica Nansa, quæ

quæ Aquam fragrantem, denotat Flores Naphæ dicti, albi sunt, pentapetali, gratissimum odorem spirant, qui exsiccatione una cum albedine imminuitur; sapor amarus est, paululo aromatis mixtus. Poma magnitudine admodum inter se diversa, ut plurimum rotunda, parvo umbilico notata, in superficie lævi interdum punctis aut rugis exasperata, flava, pulpam includunt sive flavicantem, sive rubram, grate olentem, partim dulcem, partim amaram, vinosam, continentem Semina subovata, basi oblique truncata, striata, lenissime odora, amara. Cortex pomorum dulcis vel amarus, est fragrans, aromaticus. In officinis Cortices nonnisi amari exsiccati asservantur, quos substantia, quæ ipsis intus adhæret albescente & fungosa privatos Flavedinem Aurantiorum quidam etiam Cortices Curassavenses appellant. Aurantia immatura viridia sunt, maturis fragrantiora, eminentiore acrimonia distincta, a quibusdam Curassavica dicta, sed minus congrue, cum propria Malorum varietas in Americæ Insula Curassao crescat, quæ longe fragrantissima esse asseritur. Citrus Aurantium L. Blackwell Tab. 349. Asiæ indigena Arbor, hodie per Americam & Europam Australem copiose in hortis colitur, apud nos in frigidario ab injuria hyemis defendenda. Flores & Folia Destillatione, Cortices recentes Expressione Oleum largiuntur odoratum quod Quintam Essentiam dicunt; sed propria fragrantia se commendat id, quod Varietas, Bergamotta dicta, exhibet. Oleum rubrum fragrantissimum, quod ex Floribus obtinetur Oleum Neroli appellatur, cui vulgo Oleum Behen cum Floribus Naphæ infusum solent substituere. Folia exsiccata sub forma Pulveris contra Epilepsiam dantur. Flores recentes Analeptici sunt. Ope Sacchari in Confectionem siccam redacti, mensis secundis apponuntur. Syrupus inde paratus, tanquam blandimentum gustus, medicamentis adjicitur. Ad eundem scopum & insuper ad usus Cosmetichos Aqua Naphæ æque ac Oleum Neroli adhibetur. Pulpa Aurantiorum dulcium Refrigerandi ergo as-

sumitur, Scorbuticis & Febri decumbentibus egregie conducit; Pulpa Aurantiorum amarorum quibusdam cibis adjicitur. Aurantia immatura præcipue parandæ vel cum Vino Hispanico vel cum Spiritu Vini ESSENTIÆ egregie Stomachicæ & Carminativæ inservit. Ad scopos eosdem recipiuntur Cortices, qui vel sub Conditi sicci forma, quod ex Italia obtinemus, tam comeduntur, quam ad Morsulos recipiuntur, vel tanquam Conditum liquidum Electuaria ingrediuntur, vel Infusis vel Decoctis aquosis æque ac vinosis adjiciuntur, vel Aqua inde aut Spiritus Vini abstrahitur.

AURICULA JUDÆ, Fungi Sambuci, Orecchie di Giuda, Oreilles de Judas, Holderschwammchen. Fungi membranacei, sessiles, explanati, superficie superne minutissime tomentosa, inferne glabra, in sulcos elevata & in sinus his respondentes depressa, nigricante, insipidi, inodori. Peziza Auricula L. Blackwell Tab. 334. Nonnisi extus Discutiendi ergo ad morbos Faucium sub forma Gargarismatis adhibetur, aut Oculis inflammatis, aqua emollita, imponitur.

AURICULA MURIS, Pes Cati, Pilsella, Hispidula, Piede di Gatto, Pied de Chat, Katzendæplein. Folia ex angustiore origine in finem obtusum & ellipticum exeuntia, superne viridia, inferne tomentosa, odore nullo, sapore levissime adstringente instructa. Flores tubulosi, calice rotundo, sicco, roseo comprehensi, odoris & saporis expertes. Gnaphalium dioicum L. Per omnem Europam obvium. Leniter Adstringit; Infusis Pectoralibus adjicitur; Syrupus inde paratur. Flores præ Herba in frequentiori usu sunt.

AURIPIGMENTUM videatur ARSENICUM FLAVUM.

AURUM, Oro, Or, Gold. Metallum aqua vigecuplo fere gravius, medio inter Argentum & Æs gradu ignis funditur & dum fluit smaragdino colore fulget; ratione firmitatis medium inter Argentum & Ferrum gradum tenet, amplissimam distensionem patitur, nonnisi Aqua Regis & Hepate Sulphuris dissolvitur; Sulphuri, Vitro Saturni, Nitro nullæ sunt in illud vires. Reperitur Nativum sub varia figura, interdum

moleculis divisum adeo minutis, ut omnem visus aciem fugiat. Passim in Montibus & Fluviis Europæ offenditur. *Quæ respectu usus medicati de Argento dicta sunt, huc quoque pertinent.*

AZEDARACH. Folia pinnata, pinnis petiolatis ovato-oblongis, irregulariter dentatis, acutis inodora, amara. *Melia Azedarach L. Europæ Meridionalis & Syriæ indigena, cum Aqua decocta Vias Urinarias & Uterum evacuare, nec non Pediculos necare dicuntur; vulgo habetur venenata, quod vero ipso effectu nondum satis compertum videtur.*

BALAUSTIA videatur **GRANATUM.**

BALLOTTA, *Marrobio nero, Marrubium nigrum, Marrube noir, schwarzer Andorn.* Folia cordata, petiolata, albida, minus grato odore æque ac sapore, qui levissime linguam ferit, instructa. *Ballotta nigra L. Blackwell Tab. 136. Vulgaris Europæ planta. Cum aqua infusa contra morbos Hystericos a nonnullis laudatur.*

BALSAMITA, *Costo, Costus hortensis, Coq, Frauenmünz.* Folia ovata, obtusa, obtuse ferrata, albida, proprium ad Mentham accedentem odorem spirant, saporem amaricantem evidenter aromaticum emittunt. *Tanacetum Balsamita L. Blackwell Tab. 98. Europæ Australis civis, nostri elimatis patiens. A vi Stomachica & Emenanoga laudatur.*

BARBACAPRÆ, *Ulmaria, Ulmaria, Reine de Prés, Geisbart.* Radix fibrosa, aliquot modo pollices longa, digitum minimum crassa, fusca, intus alba, undique fibrillas emittit, odorem, si diffringitur, proprium non ingratum spirat, sapore adstringit. *Folia sunt pinnata, pinnis ovato-oblongis, inferne albicantibus, inciso-dentatis, progrediendo crescentibus, pinnis majoribus minuta interposita sunt; odore carent, sapore levissime adstringunt. Spiræa Ulmaria L. Blackwell Tab. 465. Crescit promiscue per Europam. Radices ad decocta, Folia ad Infusa Adstringendi scopo adhibentur.*

BARBAREA, *Erba di S. Barbara, Herbe de St. Barbe, wilder Kressen.* Fo-

lia lyrata, laciniis denticulatis, summa magis ovata, obtusa, profunde dentata, odore levi, sapore Nasturtino instructa. *Erysimum Barbarea L. Per omnem Europam vulgaris. A quibusdam mensis imponitur. Ejus Succus expressus, aut Juscula inde parata Antiscorbuticos edunt effectus.*

BARDANA, *Bardana, Glouteron, Kletten.* Radix fibrosa, fusiformis, crassa, foris nigricans, intus alba, subdulcis. *Folia cordata sunt, superne obscure viridia, rugosa, subtus tomentosa, crenata, leniter adstringunt. Arctium Lappa L. Blackwell Tab. 117. Ubivis in Europa, in America Septentrionali quoque progignitur. Radices Resolvendi ergo copiose in Decoctis usurpantur; Folia ad eundem scopum extus adhibentur, Ulceribus quoque imponuntur.*

BASILICUM, *Basilisco, Basilic.* Folia subsucculenta, ovata, acuta, glabra, integerrima, fragrantem odorem spirantia, grato & aromatico sapore instructa. *Semina sunt exigua, oblonga, nigra, insipida & inodora. Ocimum Basilicum L. Blackwell Tab. 104. Indiæ indigena, annua planta copiose in hortis nostris colitur. Oleum fragrans abunde fundere observatum est. Ad cibos condiendos adhibetur. Rarius Infusis Nervinis aut Pulveribus sternutatoriis adjicitur. Semina sunt inertia.*

BDELLIUM. Affertur ad nos sub forma massarum majuscularum ex rubro fuscarum, earum portiones selectæ, a fordibus purgatæ ferre pellucet, interdentes friabiles sunt, eisque levissime adherent, odor tenuis, sapor evidenter amarus est. *Bdellium igne non funditur, fimum emittit suaveolentem. Alcohol æque ac aqua ingens ejus portio dissolvitur, ab Oleis intactum relinquitur. Ex Arabia & India venit, sed plantæ genus quod ipsum fundit, ignoratur. Resolvendi ergo tam intus quam extus adhibetur; ejus accensi fumus Hemorrhoidibus mederi prædicatur.*

BECCABUNGA, *Bachbungen.* Caules teretes succulenti, foliis vestiti succulentis, ovato-oblongis, obtusis, ferratis,

tis, dilute viridibus, glabris, saporem levissime acrem cum quadam adstrictione continent. Veronica Beccabunga L. *Blackwell* Tab. 48. Passim in Europa obvia. Contra Scorbutum præcipue commendatur, recipitur ad Fuscula, Succus inde expressus ad quatuor Uncias usque propinatur.

BEHEN ALBUM. Radix fibrosa, longa, albida, levi odore & sapore acriusculo prædita. Centaurea Behen L. Asiæ Septentrionalis civis. Ab Arabibus ab vires Cordiales laudata omnino exsolevit.

BEHEN NUCES, Balani Myrepsici. Nuces triquetrae, Avellanæ magnitudinem æquantes, sub cortice albido & fragili Nucleum pinguem, amarum, pellicula nivea & fungosa tectum includunt. Guilendina Mohringa L. *Blackwell* Tab. 386. Arbor Indiæ progenies. Vim Purgandi & Viscera subvertendi habere dicitur, quæ posterior earum usum antiquavit. Frequentius usurpatur Oleum inde expressum, sextam circiter earum ponderis partem æquans, limpidum, omnis odoris & saporis perinde expers, aëre temperato spissescit, tarde rancescit. Præcipuus ejus usus est apud Unguentarios, qui huius virtute odores ex Vegetabilibus fragrantibus extrahunt.

BEHEN RUBRUM. Radix ad nos peregre affertur sub forma talcolarum rugosarum, profunde rubrarum, sapore adstringente, odore nullo præditarum. Statice Limonium L. *Blackwell* Tab. 481. Syriæ civis, hyemes nostras fert. A vi Adstringente laudatur; Arabibus multum celebrata exsolevit.

BELEMNITES, Lapis Lyncis, Alpschos. Lapis, qui ex basi lata, sensim in verticem acutum exit, intus aliquanta altitudine tenuis cavo conoideo exsculptus est, omnis reliqua substantia interna splendet, striis ab axi ad peripheriam porrectis efformata, color falernus magis minusve dilutus, multum etiam variat longitudine & crassitie; fricatus eorum odorem refert. Helmintholithus Belemnites L. Copiose per omnem Europam occurrit; vulgatissimum Alsatia

petresactum. Omnes quæ ipsi adscribuntur vires anilibus fabulis, Signaturæ commentis debentur.

BELLADONNA. Folia ovata, oblonga, integerrima, odoris nullius, faporis sub adstringentis, leviter acris. Atropa Belladonna L. Bacca Cerasorum speciem referentes purpureo & fatuo succo turgent. *Blackwell* Tab. 564. Copiose occurrit per Europam, præter magis Septentrionalem. Innumerae Observationes de deleterio omnium plante partium effectu exstant, quibus constat, minusculam earum dosim Sensus internos turbavisse, Convulsionibus & Sopore homines occidisse. Neque tamen defuerunt, qui baccas intus dederunt, sed harum usus hodie evuluit. Folia nostra ætate crebrius contra Cancrum usurpabantur, sub forma Infusi, a paucis Granis incipiendo; sensim major eorum numerus adbibetur, minuendus tamen simulac Caput gravari inde aut Vertiginem excitari sentiat æger. Extus Mammis scirrhosis imponebantur.

BELLIS MAJOR, Margheritina maggiore, Bellis pratensis, Grande Marguerite, Gœnsblumen. Folia oblonga, obtusa, profunde dentata, insipida. Chrysanthemum Leucanthemum L. *Blackwell* Tab. 42. Passim per Europam obvia planta. Olim a vi Diuretica & Antipthysica laudabatur; sub forma Infusi exhibenda.

BELLIS MINOR, Margheritina minore, petite Marguerite, Maaslieben, Zeitlosen. Folia parva obtusa, levissime dentata, longis petiolis instructa, levissime acris. Flores radiati, radio albo, calyce hemisphærico imbricato sustentati, odore carent, saporem habent lenissimum. Bellis minor L. *Blackwell* Tab. 200. Invenitur ubivis. Laudatur contra morbos Pectoris. Folia sub forma Acetarii exhibentur, Flores in Infuso, Conserva, Syrupo.

BENGALENSIS NUX, videatur MYROBALANI.

BENZOES, Assa dulcis, Belgivino, Benjoin. Magnæ ejus massæ ad nos deferuntur, quarum superficies texto junceo, quo involuta erant, signata est, conflatae sunt ex laminis rubro-fuscis, quibus grana variæ magnitudinis, Un-

gues vel *Amygdalæ* dicta, inhaerent, fragiles & friabiles; odorem gratum spirant, sapore præditæ balsamico & dulci; quo sunt massæ pellucidiores unguibusque refertiores, eo Benzoë putatur præstantior. Croton Benzoë L. Arbor Indiae indigena. Benzoë calore liquatur & gratum fumum emittit; nec Aqua, nec Oleis dissolvitur; nec si aqua inde abstrahitur, ullum Oleum destillatum fundit. In Spiritu Vini dissoluta *Tincturam Benzoës* constituit, quæ Aquæ instillata *Lac Virginum* efformat usibus *Cosmeticis* inserviens. *Rarissime* intus scopo *Balsamico* exhibetur, extus de *Suffimigia* recipitur.

BERBERIS, *Berberi*, *Epine Vinette*, *Saurau*. *Radices* fibrosæ ad insignem omnino magnitudinem excrescunt, sub cortice rugoso & fusco carnem croceam intense amaram includunt. *Baccæ* cylindricæ, umbilicatæ, sub epidermide translucente pulpam includunt scatentem late rubro succo intense acido, qui nonnisi post aliquot pruinas, quibus circumfusæ baccæ sensim sensimque rugosæ fiunt & nigriores mitescit, & palato gratus evadit, *Semina* rugosa sunt, subteretia, apice obtusa, styptico sapore imbuta; *Berberis Vulgaris* L. *Blackwell* Tab. 165. In omni Europa, Oriente quoque & America crescit. *Radix* *Purgantes vires* edere dicitur & ad *Aperiendas Hepatis Obstructiones* laudatur, sub forma *Decocti* exhibenda. *Baccæ* ob vim *Refrigerantem*, *Antiphlogisticam* & *Antisepiticam* commendantur. *Succus* sanis æque ac ægrotis sub forma *Gelati*, *Conditi*, *Syrupi*, *Rotularum* propinatur.

BETA, *Bieta*, *Poirée*, *Mangold*. *Folia* subsucculenta, magnis & latis petiolis innexa, ovata, obtusa, ad marginem plicata, subbullata vel pallida vel rubra vel crocea, sapore subdulci instructa; *Beta Vulgaris* *Cicla*, rubra, lutea L. In Europa Occidentali & Meridionali crescit; apud nos copiose in hortis colitur; *Folia Radicalia* in usum *Culinarum* recipiuntur, *Medicinæ* rarissime inserviunt, imponuntur cuti, cui *Epidermis* fuerit ablata. *Varietas*, quæ est *Beta* rubra radice *Rapæ* L. *Blackwell* Tab. 235.

quæque in hortis colitur, subministrat *Radicem*, ex crasso capite subito in caudam gracilem exeuntem, totam purpuream; exstat ejus *Varietas* flava, levis odoris & saporis dulcis; *Extractum* ista aquosum, rubrum, intense dulce, *Spiritus Vini* ope autem *Saccharum* exhibere dicitur, *Aceto condita cum Carne* comeditur, *Succus* inde expressus scopo *Errhino* adhiberi solet.

BETONICA, *Bettonica*, *Betoine*, *Betonien*. *Folia* cordato-oblonga, obtusa, profunde, crenata, rugosa, insipida; *Flores* labiati, purpurei & inodori. *Betonica Officinalis* L. *Blackwell* Tab. 46. Copiose per Europam offenditur. *Vires Cephalicæ*, quas olim huic plantæ adscripserunt cum experientia non sint probatæ, usus ejus medicatus fere evuluit; *Errhino* scopo *Pulvis* præscribitur.

BETULA, *Betulla*, *Bouleau*, *Birke*. In usum trahitur *Succus*, qui ex trunco, primo vere ante frondescentiam terebra efforato, stillat, limpidus, leviter dulcescens. *Betula alba* L. *Blackwell* Tab. 24. *Betulæ* *Succum* multo minus *Mellaginis* evaporationis ope edere, quam *Succum Aceris*, observatum est. *Datur* per aliquot continuas *Septimanas* ad *Uncias viginti quatuor* de die *Sanguinem Depurandi*, & *Vermes expellendi* causa. *Oleum Empyreumaticum* ex cortice paratum *Lithuanicum* vel *Russicum* dicitur, præ aliis hujus tribus *Oleis* nihil proprii in *Medicina* præstare videtur.

BEZETTA. Hoc nomine veniunt linthea cannabina rubra seu cœrulea, quibus ad infucanda *Gelata*, *Trochiscos* &c. utuntur; priora ope *Coccionellæ* in Turcia parari dicuntur, posteriora in Gallia Australi tinguntur *Heliotropii* succo, ope *Alcali* volatilis ex *Urina*, exaltato.

BEZOAR DE COROMANDEL. *Lapides* variæ magnitudinis, partim rotundi, partim oblongi, læves, cum quodam splendore; inveniuntur; qui utrimque compressi sunt, ex albo-grysei, evidenter ex stratis efformati, inodori, insipidi. *Desumi* dicuntur ex *Trichecho* *Manato* L. *Eadem* quæ de reliquis prædicantur, huic quoque tribuuntur vires.

BEZOAR OCCIDENTALIS. Calculus Bezoar L. Dicuntur Calculi, qui sub diversissimis figuris & variante multum magnitudine occurrunt, evidenter ex squamis efformati, non splendentes, nec cum Acidis effervescentes, coloris cinerei, cui interdum aliquid nigri accedit, insipidi & inodori. Ex variis Animalibus desumuntur & ex America adduci dicuntur.

BEZOAR ORIENTALIS. Calculus Bezoar L. Variam tam figuram quam magnitudinem habet, & hujus quidem diversus gradus diversum etiam ipsius pretium constituit; superficiem ostendit laevem, politam, splendens, color cum virore mistus nigricat, effingitur ex stratis sibi invicem incumbentibus, quorum intimum cavitatem sistit interdum vacuum, interdum variam substantiam heterogeneam condentem; cum Acidis non effervescent, odoris ac saporis perinde expers est. Desumitur ex Capra Bezoardica L. in Persia occurrente. Lapidem hos prorsus inertes esse ratio pariter ac experientia evincunt. Plures factitii proflare dicuntur; sed certum characterem, unde genuini ab his distinguantur, nullum habemus.

BISMUTHUM, Wismuthum, Marcasita. Est Semimetallum Plumbo albius, ex tessellulis majoribus efformatum, facile in pulverem terendum, præ omnibus reliquis corporibus metallicis minore igne fluens, in Acidis Vitrioli, Nitri & Salis dissolubile, igne in vitrum flavum fundendum. Sive Nativum sive sub forma Glebæ metallicæ passim per Europam reperitur. *De ejus in Corpus humanum efficiencia plane nihil liquet.*

BISTORTA, Schlangen, Natterwurzel. Radices subcylindraceæ, incurvæ, interdum aliquoties flexæ, pollicem crassæ, extus profundius rubræ, intus pallidæ, transversim rugosæ, saporis multum adstringentis. Polygonum Bistorta L. *Blackwell* Tab. 254. Crescit in omni Europa, præter magis Septentrionalem. *Ad Decocta Adstringentia tam interna, quam externa recipitur.*

BLATTA BYZANTINA, Operculum

esse dicuntur Muricis ramosi L. qui in Sinu Persico & Jamaica obtinet, *A fragrantia laudatur. Sed ejus usus prorsus exolevit.*

BOLETUM CERVINUS, Hirschbrunst. Est Tuberis genus, ad magnitudinem Juglandis usque excrescens, multis figuris ludens; exsiccatum, prouti in officinis prostat, sub cute sicca, tenaci, flavicante, copiosissimum pulverem nigrum includit, saporis & odoris expers. Lycoperdon Cervinum L. Passim per Europam obvium. Nec ex liquore genitali Cervorum gignitur, nec vires Aphrodisiacas habet. *Effectus Bovistæ edit.*

BOLUS ALBA. Argilla bolus alba L. Est Argilla alba, quæ in nostris officinis sub forma frustorum aliquot pollices longorum minus vero latorum & crassorum prostat, manifeste admodum pinguis. Passim reperitur.

BOLUS ARMENA. Bolus Orientalis, Argilla Lemnia L. pallide rubrum colorem habet, tactu pinguis & glabra. Diversissimas terras hodie hoc nomine venire rectissime *Ludovig* monet. Ex variis Europæ locis adducitur.

BOLUS RUBRA. Sub frustis Bolo albæ similibus magis sticticulis, pignibus & rubris prostat. Bolus Argilla rubra L. Ex Germania nobis affertur. *Inefficacem ad scopos medicatos omnem Argillam esse hodie satis superque compertum est.*

BOMBAX, Cotone, Coton, Baumwolle. Semina angulatam, ovata, tormentosa, viridescencia, sub cortice fragili nucleum album includunt, inodora, levissime dulcia. Gossypium herbaceum L. Indiæ indigenum in Europa maxime Meridionalis colitur. Apud nos semper in vaporario retinendum, siquidem fructum inde expectamus. *Emolliendi & Demulcendi ergo olim adhibebatur.*

BONUS HENRICUS. Folia superne, glabra, subtus glauca quasi pulvere conspersa, triangulari-hastata, inodora, insipida. Chenopodium Bonus Henricus L. Vulgatissima per Europam planta. *Interdum ad Cataplasmata Emollientia recipitur.*

BORAX. Sal qui ex India sub forma Crystallorum variæ magnitudinis ad nos

advehitur, virescentium, creberrime cortice albo pulverulento obductarum tactu pinguiuscularum, saporem lixiviosum linguae imprimendum, & talis *Tincal*, *Tincar*, *Borax crudus*, *Borax Tincal* L. dicitur. Qui, cum nonnisi depuratus in usum trahatur, & olim Venetiis depuraretur, hodie adhuc *Borax Venetus* appellatur, quamvis maxima jam ejus quantitas, quæ quidem nostras officinas ingreditur, in Belgio depuretur. Formatur in Crystallus majores, multilateras, pellucidas, quæ difficillime aqua dissolvuntur; prunis superimpositæ spumant, in vitrum spurium abeunt, fossilium fusionem promovent. Syrupum Violarum viridi colore tingunt, cum Acidis non effervescent. Constat ex proprio Acido & Alkali fossili. In Borace crudo *Illustris Cadet Æs* detexit. *Incidentes & Abstergentes effectus edit, sed rarissime ad hos scopos adhibetur; ad Cosmetica quoque recipitur.*

BORAGO, *Borraggine*, *Bourrache*, *Boretisch*. *Folia*, nullis petiolis sustentata, ovato-oblonga, obtusa, hirsutiae scabra, rugosa, inodora, sapore levissime salino linguam ferientia. *Flores* plano-patentes, cœrulei, quinquefidi, rotati, inodori, subdulces: asservantur calycibus evulsi. *Borago officinalis* L. *Blackwell* Tab. 36. *Orientis & Europæ calidæ civis*, in nostris hortis sponte disseminata luxuriat. Nitrum quod ex Foliis magni Viri obtinuerunt, ipsis non proprium est. *Folia ad Juscula Refrigerantia recipiuntur. Flores aspectus blandimenta tam Acetariis, quam Speciebus pro Infusis & Decoctis adjici solent.*

BOS, *Bue*, *Bœuf*, *Ochs*. *Taurus castratus*. Inde recipitur *Sebum Suis*, *Unschlitt*, quod est Adeps ad renes maxime hærens, album, solidum, nauseoso odore instructum. *Vires Oleorum unguinosorum exserit*. Adhibent quoque in Ossibus cylindræis contentam *Medullam*, consistentia sua Sebo proximam, albam, rubore suffusam, inodoram, grati saporis. *Ad Roborandum efficax habetur. Caro culinæ relinquitur.*

BOTRYS, *Traubenkraut*, *Ambroisie*. Fo-

lia petiolata, oblonga, obtusa, profunde & irregulariter sinuata, laciniis alternis, dentatis, odore fragranti, balsamico, sapore linguam feriente, aromatico prædita. *Chenopodium Botrys* L. *Blackwell* Tab. 314. *Europæ calidæ indigena*, annua planta optime in nostris hortis coli potest. *Oleum destillatum sebaceum fundere dicitur. Folia Resolvendi & Vermes arcendi causa sub forma Infusi exhibentur.*

BOTRYS MEXICANA, *Te del Messico*, *Thea Silesiaca Romana*, *Thée du Mexique*. *Folia lanceolata* sunt, dentata, prioribus fragrantiora, fortiore etiam sapore linguam ferientia. *Chenopodium Ambrosioides* L. In Mexico & Europa calidiore crescit, planta annua in nostris hortis coli potest. *Præcedente omnino præstantior, eadem ratione usurpatur.*

BOVISTA, *Crepitus Lupi*, *Vescia del Lupo*, *Vesse de Loup*, *Bovist*. Est substantia laxa, levissima, spongiosa, ferruginea, odore nullo, sapore adstringente instructa, contenta in Lycoperdo *Bovista* L. Per omnem Europam obtinente. *Ad sistendas Hæmorrhagias in modum Agarici Pedis Equini facie adhibetur.*

BRASSICA, *Caroli*, *Choux*, *Kraut*, *Kohl*. *Brassicæ Oleracæ* L. plurimarum, quæ in hortis & campis nostris coluntur, varietatum, quæ omnes aquam quidem cum qua coquantur foetido odore insufficientes, sed dulci suo sapore palato gratæ, ideoque mensis frequentissime imponuntur, nonnisi duæ hujus loci sunt, *Albanimirum & Rubra*. *Folia Albæ obovata*, glauca, pro ista unde desumuntur varietate, tam magnitudine, quam nervorum crassitie diversa, ante caulescentiam recipienda. *Imponuntur Cuti, cui Epidermidem Vesicantia demserint: Sale condita & fermentata edulii genus inter lautitias etiam referendum, & remedium constituunt ad arcendum æque ac curandum scorbutum egregie efficax. Folia Rubræ petiolata* sunt, subrotunda, rubra, rore cœrulescente perfusa, denticulata, sapore a vi adstringente nonnihil mutuantem. *Ex Jure coquantur, aut in Syrupum rediguntur contra morbos Pectoris.*

BRANCA URSINA, *Branche Ursine*, *Bærenklau*. Folia magna, pinnata pinnis lobatis, hirsuta, insipida & inodora. *Heracleum Sphondylium* L. *Blackwell* Tab. 540. Crescit in omni Europa. Per errorem pro *Acantho* habita, ad medicamenta *Emollientia* recipitur. Russi inde Spiritum ardentem parare dicuntur.

BRITANNICA, *wilde Rhabarber*, *Lapazio*, *Patience d'eau*. Radix fibrosa, magna, extus fusca, intus crocea, proprii, sed hebetis odoris, saporis contra acris, amari, adstringentis. *Rumex Aquaticus* L. Passim in Aquis Europæ reperitur. *Resolvit*, *Roborat*, *leniter Alvum ducit*, *Obstructiones referat*, *Sanguinem purificat*. Datur ad *Drachmas duas aqua decocta*. *Ejus Decocto quoque Ulcera scorbutica Cacoëthea lavant*.

BRUNELLA, *Bonette*. Folia petiolata, ovato-oblonga, acute terminata, ferrata, exigue hirsuta, sapore subsalino instructa. *Prunella Vulgaris* L. *Blackwell* Tab. 24. Crescit ubique per Europam. *Roborandi & Incidendi gratia ad Gargarismata recipitur*.

BRUSCUS, videatur **RUSCUS**.

BRYONIA, *Brionia*, *Coulevrée*, *Zaunrube*. Radix fusiformis, valde crassa, extus flavicans, intus alba, striis longitudinalibus & circularibus, aspera, excidatur secta in taleolas, utraque sua superficie striis eminentibus ex medulla tanquam centro ad peripheriam ductis & variis circulis sectis distinctas, laxas, fungosas, intense nec sine quadam acrimonia amaras. *Bryonia alba* L. *Blackwell* Tab. 37. *Vulgaris Europæ Radix valide Alvum ducit & olim, quando valida Purgantia indicari credebant, ad Drachmam semis in substantia, ad Drachmam unam in Infuso aquoso dabatur; hodie rarissime adhibetur*. Radix recens comminuta & in Aqua frigida agitata in *Amylum album*, cum aqua concrefcens, glutinans evadit; ad id accedunt *Fæculæ*, quæ bene elotæ *Alvum ducendi virtute destitutæ perhibentur*. Radicem recentem in taleolas sectam, tusam, cruribus œdematosi impositam, repetitis duodenis horis vicibus large aquas elicuisse, observarunt Auctores.

BUFO, *Rospo*, *Crapaud*, *Kræte*. *Rana Bufo* L. *Vulgare per Europam Amphibium*, pedes posticos minores & post oculos duplex tuberculorum genus habet. *Non est venenatus, exciccatus horrorem excitando Hæmorrhagias sistit; in cineres redactus aliis cineribus non præstat. A medicina omnino exsulat*.

BUFONITES, *Batrachite*, *Crapaudines*, *Krætenstein*. Sunt Lapides rotundi, Avelanæ magnitudine fere æquantes, convexo-plani, sive sub basi excavati, castanei ut plurimum coloris plus minusve diluti, insipidi, inodori. *Ichthyolithus Bufonites* L. Est Dens molaris cujusdam piscis marini, qui *Anarhichas* L. esse creditur. Reperitur per terram dispersus. *Iners lapis ab usu medicato remotus*.

BUGLOSSUM, *Ochsenzunge*. Folia oblonga, angusta, in acutum mucronem exeuntia, hirsuta, insipida, inodora; Flores infundibuliformes, quinquefidi, cœrulei, insipidi & inodori. *Anchusa officinalis* L. *Blackwell* Tab. 500. Passim in Europa obvia. *Vires Boraginis ipsi adscribuntur*.

BUGULA, *Consolida media*, *Bugola*, *Bugle*, *Golden Gynsel*. Folia ovato-oblonga, petiolata, obtusa, dentata, amara, aliquantulum hirsuta. *Ajuga reptans* L. *Blackwell* Tab. 64. Offenditur per omnem Europam, præter magis Septentrionalem. *Recipitur interdum ad Gargarismata Roborantia*.

BURSA PASTORIS, *le Tabouret*, *Tæschelkraut*. Folia ovato-obtusa, integra, dentata, pinnatifida, lyrata, glabra, vix umbram acrimoniæ referentia, inodora. *Thlaspi Bursa Pastoris* L. *Blackwell* Tab. 5. *Refrigerandi & Adstringendi scopo olim laudata hodie evuluit*.

BUTYRUM, *Butirro*, *Beurre*, *Butter*. Est Lactis pinguedinis strenue agitatae coagulum; consistentiam habet spissioris Unguenti, colorem flavicantem, odorem proprium, saporis mitem. Coctio- ne non a partibus solum Lactis cascosis & serosis adhærescentibus purgatur, sed flavius, etiam spissius & grumosum, proprii præterea odoris & saporis efficitur. *Butyrum integrum creberrime mensis impo-*

imponitur. In morbis medendis vices Oleorum unguinosorum sustinet, extus æque ac intus adhibetur. Coctione nonnihil acrimoniae & Abstergentes vires induit.

BUXUS, *Bosso, Buis, Buchs*. Lignum solidum, duriusculum, pallide flavum, cortice cinereo, rugoso vestitum, inodorum, adstringens. Buxus Sempervirens L. *Blackwell* Tab. 196. Europæ Meridionalis indigena arbor sine negotio in nostris hortis colitur. Recipiebatur ad Decocta Sudorifera.

CAAPEBA, *Liane à Serpent*. Radix digitum crassa, fibrosa paululum intorta, striata, valde dura, exiguis tuberculis obsessa, intus quam extus nigrior, saporis subaromatici, salinum referentis, cum aliquali amaritie. Cissampelos Caapeba L. Frutex Americæ Meridionalis & Brasiliæ proprius. Aqua decocta contra morsus Serpentum & morbos malignos a quibusdam commendatur.

CABBAGE BARCK. Hoc nomine Angli asservant Cortices aliquot pollices plus minusve longos, convolutos, non crassos, colore extus cinamomeo, intus cinereo tinctos, interdum extus epidermide ex nigro cinerea instructos, inodoros, levissime linguam adstringentes. Geoffræa inermis L. *Wright* Phil. Trans. LXVII. p. 507. Jamaicæ arbor. Maxime contra Vermes laudatur, quibus se viribus etiam in Europa probavit. Datur ejus Decoctum ad Uncias duas, Extractum ad Grana tria, Pulvis ad Semidrachmam. Dosis excedens modus Nauseam & Vomitus excitat.

CACAO. Nuclei ovato-oblongi, Amygdalarum fere magnitudinis, sub cuticula rufescente, non raro punctis albis distinctæ, includunt medullam siccam, pinguem, in plures lobos divisam, extus fulvam, odore proprio, leni, sapore, grato, subacerbo, aliquantulum etiam amaro; optimi nucleii ex Nicuragua, Mexicani regni regione, ad nos transeunt, magnitudine & miculis albis cuticulæ inspersis, suaviore etiam sapore & largiore sua pinguedine præstantiores. Theobroma Cacao L. *Blackwell* Tab. 373. Americæ Meridionalis

indigena arbor. Nutritii nucleii, quorum usus circa medium seculi superioris in Europa innotuit, nunquam ut sunt, seorsum præscribuntur. Scite tostæ & calido prelo expressæ Olei albissimi, grate olentis, spissi tertiam fere sui ponderis partem largiuntur, quod *Butyrum* dicitur.

CAFFE. Semina ovalia, variæ magnitudinis, utrinque obtusa, convexo-plana, in facie plana sulco longitudinali notata, glabra, colore inter album & flavum medio, viriditatis etiam subinde nonnihil admittente, odoris exigui, saporis subadstringentis, leniter acerbi. Coffea Arabica L. *Blackwell* Tab. 337. Arabiæ felicis propria arbor, hodie in Asiam, Americam Meridionalem, & Insulas Africae Meridionales translata, in his regionibus quoque uberrime provenit, apud nos semper in caldario asservanda. Semina in Arabia lecta reliquis omnibus præstant, sed Americana in ipsam Arabiam vehi & Arabicis immisceri Itineratores testantur, in Arabia lecta parvitate sua & albidior, eminentiore viriditate misto, colore distinguuntur; Arabicis proxima sunt, quæ Borbonica, Africae Insula largitur. Hi nucleii, quorum usus medio fere superioris seculi in Europa invaluit, nullum Oleum unguinosum largiuntur, nec nisi tosti in usum trahuntur, eorum saporis suavitas maxime a justo testionis in vasis clausis instituendæ & usque dum brunei evaserint, continuandæ modo pendet; Tostorum & comminutorum Uncia semis cum aquæ Unciis duabus unica modo ebullitione coquenda, & decoctum per filtrum trajiciendum est, quod quidem brunum, grato omnino odore & sapore amaricante exquisitissimo instructum, hauritur ut plurimum Saccharo edulcoratum. Neutiquam Sanguinem spissat, egregie Digestionem promovet, & noxas ab ea turbata oriundas præcavet & corrigit; incommoda, quæ inde nata observasse sibi nonnulli visi sunt, abusui aut idiosyncrasie debentur. Succedanea, quæ ipsi substituire conabantur, nulla votis responderunt.

CAJEPUT OLEUM. Est tenerum, album, cum quodam viroris vestigio, odore proprio perquam fragrante, sapore multum aromatico, momento contactus linguæ frigoris sensum imprimenter præditum. Dicitur esse Oleum odoratum foliorum Melaleucæ Leucodendræ L. Indiæ Arboris, simillimum huic Oleum ex Cardamomo majore, Destillationis cum aqua ope, obtinetur. *Multum ob virtutem vehementiores Nervorum motus sistentem laudatur; ejus Gutta sex aut octo frusto Sacchari Canariensis instillata pro Dosi dantur.*

CALAMINARIS LAPIS, Giallamina, Calaminaire, Galmey. Est lapis variæ duritiei, ad Calybis ictum scintillas emittens, varii quoque coloris, creberrime flavicantis, Æs secum fuscum, aureo colore tingens. Zincum Calaminaris L. Passim ex collibus Europæ eruitur. *In pulverem redactus ad Aspergines aut Unguenta Exsiccanti recipitur aut ad Collyria.*

CALAMUS AROMATICUS, Acorus verus, Calmus. Radix cylindrica compressa, geniculata, lineis longitudinalibus & transversis notata, extus ex flavo rubens, intus alba, fungosa, odore grato, aromatico, sapore amaro, linguam feriente prædita. Acorus L. *Blackwell Tab. 466.* Passim in Europa, præter maxime Septentrionalem & calidam obvius. Olei destillati paululum largiri dicitur.

ACORUS INDICUS vel **ASLATICUS.** Acorus Calamus verus L. Indiæ civis, nostras hyemes facillime fert; ejus in nostro horto culti Radices prioribus magnitudine minores, uno latere convexæ, colore gryseæ, carne solidiores, odore fortiores sunt. *Resolvendi & Ventriculum Roborandi ergo ad Infusa recipitur, Confectio ejus ad aliquot Drachmas pro dosi comeditur.*

CALAMINTHA, Nepitella, Calament, Bergmünze. Folia petiolata, ex ovatis oblonga, hirsuta, crenata, paulum odorata & aromatica. Melissa Calamintha L. *Blackwell Tab. 166.* Angliæ, Helvetiæ, Europæ Meridionalis civis, nostras hyemes fert. Præstat hac Melissa Nepeta L. cujus folia prioribus minora,

magis ovata, eminentiore odore & sapore instructa. Iisdem cum priore locis vegetat. *Calamintha usum Melissa & Mentha suppresserunt.*

CALCARIUS, Pietra Calcaria, Calcaire, Kalkstein. Est Lapis, durus quidem, sed ex Chalybe nullas scintillas eliciens, varie coloratus, in Acidis cum effervescentia dissolubilis, igne duritiem exuens, causticus evadens, cum aqua multum incalescens, in aëre dilabens, cum aqua & sabulo in durissimum cæmentum concrecens; igne causticus redditus *Calx viva, Calce viva, Chaux vive, ungelæschter Kalk,* & hac dilapsa, *Calx extincta* dicitur. Marmorudæ L. Copiosissimus ejus est proventus; integros montes & montium catenas efformans. *Calcarius ad usus medicatos non recipitur; Calx viva intus si adhiberetur Veneni effectus ederet; extus Depilatorio scopo adhibetur.*

CALCITRAPPA, Chauffe Trappe. Radices cylindroidæ, digitum crassæ, sub cortice gryseo substantiam albam includunt, odoris vacuum, saporis levissimi, Centaurea Calcitrappa L. Europæ calidæ & temperatæ civis. *Corticis Drachmam Vino infusam, & per plures menses sumtam egregie Nephriticis opitulari aserebatur.*

CALENDULA. Fiorrancio, Soucy, Ringelblumen. Flores asservantur ex calice evulsi, lutei, ligulati, exsiccatione omnem odorem & saporem amittentes, aquam, cui infunduntur, amaram reddentes. Calendula officinalis L. Europæ Meridionalis indigena, in nostris hortis colitur. Cum hi Flores exsiccatione omni odore priventur, hinc frustra inde *Vires Alexiteriæ expectantur. Aperiendi scopo cum aqua infunduntur.*

CAMPECHIANUM LIGNUM. Adducitur ad nos in magnis frustis, sub quorum superficie cærulescente, color sanguineus, odor nullus, sapor adstringens est. Hæmatoxylum Campechianum L. *Blackwell Tab. 493.* Americæ Meridionalis indigena arbor, apud nos semper in caldario asservanda, Arti tinctoriæ præcipue inservit. *Extractum aquosum inde paratum ad Drachmam semis, Decoctum cum aqua ad Unciam semis exhibetur.*

CAMPHORA. Sub forma placentarum majorum, rotundarum, convexo planarum, superne foratarum, crystallina albedine conspicuarum, leviter flexibilium, fragiliuscularum prostat; odorem habet proprium, Cerebrum obnubilantem, saporem linguam afficientem, levissime amarum, evidentissimo frigoris sensu; aquæ immersa odorem & saporem suum impertit; supra aquam ardet, in Alcohole æque ac in Oleis dissolvitur, flammam capit & in Flores albos vertitur. Obtinetur ratione, quam in *Institutionibus Chæmiæ* dixi, ex Camphora cruda, sub forma granulorum flavicantium ex Lauri Camphoræ L. *Blackwell* Tab. 347. Japoniæ arboris, apud nos in tepidario per hyemem asservandæ, foliis & ramis ex aquâ coctis surgentium, stramineo lebetis operculo accrescentium. Camphoræ ex aliis Vegetabilibus obtinendæ vix officinas Pharmaceuticas ingrediuntur. *Intus Sopiendi ergo ad Drachmam semis, Antiseptico sine ad Scrupulum unum; in morbis Instammatoriis ad Grana tria pro dosi, saponi cuidam juncta, sub forma Pulveris, Pilularum, Emulsionis, Julapii exhibetur; extus Fomentationibus, Epithematibus siccis, Cataplasmatibus &c. immiscetur.*

CAMPHORATA. Caules albidi, fasciculis foliorum minimorum, albidorum, aciculas referentium, obfessi, quorum ego in nostris quidem hortis neque odorem, neque saporem nullum detegere potui. Camphorosma Monspeliaca L. Europæ Meridionalis & Tartariæ indigena, apud nos in frigidario ab hyeme defenditur. *Resolvendi gratia ex aqua coquitur, Asthmaticis nec non Hydropicis a nonnullis exhibetur.*

CANADENSE BALSAMUM. Spissum est, adeo ut in aëre temperato non diffuat, tenax, in modum vitri pellucens nonnihil flavedinis subostendens, odore levi, resinoso, sapore amaricante, acriusculo instructum. Obtinetur ex Pinu Balsamea L. Canadæ arbore, nostræ hyemis patientissima. *Scopo Abstergendi & Consolidandi, nec non ad fines Antinephriticos ejus Drachma semis saponem soluta, sive in Pilulas recepta exhibetur.*

CANCROCORUM CHELÆ. Varia earum magnitudo est, basis quadrangula, eburnea quasi, cujus unum latus in tres quasi appendices diductum, contrahitur in modum conii leviter incurvati, inferne flavicantis, superne nigri; ad latus externum occurrunt tubercula exoleta; intus chelæ penitus cavæ, albæ, inodoræ & insipidæ sunt. Desumuntur a Cancro Pagiuro L. Oceani cive. *Virtutes Alexipharmacæ olim illis ad Drachmam semis sub forma Pulveris exhibendis adscriptas, recentior ætas abrogavit.*

CANCROCORUM OCULI sive LAPIDES, Occhidi Gambero, Yeux d' Ecrevisse, Krebsaugen. Calculi Oculi Cancris L. Substantiæ rotundæ, convexo-concavæ, recens quidem natæ cœrulescentes, deinde albæ, ex lamellis sibi arte incumbentibus compositæ, hærent inter utramque Ventriculi tunicam Cancris Astaci L. vulgarissimi aquarum dulcium insecti, Augusto mense, quo novum sibi thoracem struit, proprio odore & sapore instructi. Copiosissimi in Russia ad confinia Tartariæ ex insectis pistillo contusis colliguntur. *Vires præter Absorbentes nullas habent, in modum aliorum terreorum usurpantur. Caro Cancris Astaci evidenter quidem nutrit, sed nonnihil acrimoniæ, quod ipsi inest, non modo faucibus interdum molestum, sed quandoque etiam varios morbos excitasse observatum est. Nunquam nisi cocta in usum recipitur. Medici illam Furibus Nutrientibus & Demulcentibus incoquant.*

CANELLA ALBA. Cortex crassiusculus, in tubum convolutus, fragilis, extus striis transversis notatus, flavicans, intus albus, aromatico odore, sapore acriusculo, amaricante instructus. Vinterania Canella L. *Blackwell* Tab. 206. Oleum odoratum fundere dicitur. *Scopo Roborandi & Resolvendi datur.*

CANELLÆ CLAVELLI videatur **CINAMOMUM.**

CANIS, *Cane, Chien. Hund.* Canis Familiaris L. Vulgatissimum animal. Stercus quod nobis exhibet, vide sub **ALBUM GRÆCUM.** Axungia alba, Unguenti tenuioris consistentia pollens *Pe-*

etoralibus adscribitur, intus & extus adhibetur. Catelli ob vires Nervinas, quas vero nemo adhuc satis firmis rationibus superstruxit, cum Oleo Olivarum coquantur. Hepar Canis rabidi contra Rabiem caninam suspectum mihi medicamentum esse videtur.

CANNABIS, Canapa, Chanvre, Hanf. Fila in quæ Cortex scite præparatus ducitur, sive Emolliendi Scopis, sive vehiculi loco extus adhibentur. Semina ovata, utrinque levissime compressa, uno margine acutiore, sub cortice lævi, nitente, cinereo, spadiceo, fragili, album & dulcem nucleum includunt, tenera membrana involutum. Cannabis sativa L. Blackwell Tab. 322. Indie indigena, hodie per omnem Europam colitur. Semen tertiam circiter sui ponderis partem Olei viridis decimo quarto demum grada sub cyphra consistentis, largitur. Exsiccatione odorem Cerebrum inebriantem perdit, vires Emollientes edit, ad Emulsionem olim recipiebatur.

CANTHARIDES, Cantarelle, Spanische Mucken oder Fliegen. Insecta corpore oblongo, toto viridi, aureo, elytris viridibus, flexilibus, multis striis distinctis & alis fuscis, tria circiter grana pondere æquant, tenuis eorum & nauseosus odor est. Meloë Vesicatorius L. per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem; occurrit. Hæc insecta ab arboribus, quibus insident, decussa exsiccata nostras officinas intrant. Ad usum Diureticos intus exhibendi a multis & gravibus Auctoribus fuerunt laudati. Forum dosis ultra octo Grana non extendenda, & caute ita dividenda, ut quotvis quadriborio unum modo Granum exhibeatur; dosis enim, si vel tantillum excedit gravissimos in viis Urinariis Spasmos excitat; justo major contra quantitas omnes effectus Veneni rodentis edit; extus scopis Vesicas excitandi in frequentissimo usu sunt; optime in Emplastrum recepta adhibentur, in quo dosis non ultra dimidiam Drachmam extendenda.

CAPILLUS VENERIS, Capelvenere, Capillaire, Frauenhaar. Monspeliensem & Canadensem asservamus; Monspeliensis habet cauliculos nigricantes, glabros, ucidos, ramosos, vestitos foliis alter-

nis, petiolatis, cuneiformibus, incisus, apice crenatis, in margine reflexo maculis notatis, inodoros, saporis dulciusculi, leviter adstringentis; Adiantum Capillus Veneris L. Blackwell Tab. 367. Gallix Meridionalis, Helvetix, Anglix civis. Canadensis a priori cauliculis magis rufescentibus, lucidioribus, foliis latioribus, trapezoideis, margine inferiore integerrimo, superiore crenis majoribus crenato & sapore magis grato differt. Adiantum pedatum L. Crescit in Canada & Virginia. Scopis Pectorali ad Infusa recipitur; sub forma Syrupi exhibetur.

CAPO, Cappone, Chapon, Capaun. Gallus gallinaceus castratus, exquisitus cibus mensis imponitur, ad Juscula Nutrientia recipitur. Axungia alba est, Unguenti formam habet. Emolliendi scopis extus adhibetur.

CAPPARIS, Capperio, Caprier, Capres. Gemmæ Florum, Aceto conditæ ad usum cibarios, Cortex Radicis ad medicatos usum adhibetur. Gemmæ virides sunt, pedunculo instructæ, angulares, variæ magnitudinis, constant ex aliquot petalis, quæ rudimenta Antherarum includunt: Cubebis non majores, læte virides & pedunculis instructæ reliquis præferuntur: sapore proprio, leviter amaricante, dignoscuntur. Cortices variæ longitudinis & crassitiei advehuntur, striis longitudinalibus & transversalibus notati, cinereo-flavicantes, inodori, leviter amari, aliquantulum etiam acres. Capparis spinosa L. Blackwell Tab. 417. Asix, Africæ, Europæ Australis indigena, Tolosæ colitur, apud nos per hyemem in frigidario asservanda. Gemmæ condimenti loco carni adjiciuntur; Radices Decoctis Aperientibus.

CAPRIFOLIUM, Caprifoglio, Chèvrefeuille, Hahnenfüßlein. Folia glauca, longe ovata, obtuse acuminata, subadstringentia; Flores tubo longo in duo labia finduntur, quorum superius latum, reflexum, quadrifidum, inferius angustius & simplex est, gratissimus recentium odor exsiccatione perit, albidum cum admista rubedine, Stipites teretes sunt,

epidermide cinerea flavedine suffusa, vestiti, sapore imbuti dulciusculo cum quadam amaritie eo evidentiore, quo stipites sunt crassiores Lonicera Periclymenum L. *Blackwell* Tab. 25. Ubivis nascitur. *Folia a vi Roborante & Abstergente, a quibusdam laudantur, & ad Gargarismata recipiuntur. Flores & stipites a nonnullis Sanguinem Depurandi & Urinam sciendi causa sub forma Infusi exhibentur.*

CARANNÆ GUMMI. Advehitur ad nos ex America Meridionali, in magnis massis ex viridi nigricantibus, quibus extus residua adhærent involucri juncei, quo, dum adhuc molles erant, involuebantur masse; sapore subresinosæ sunt, odorem spirant admodum tenuem, accensa fumum emittunt haud ingræte olemtem, igne funduntur, copiosius eas Alcohol, quam aqua dissolvit, ab Oleis, quoad partem modo: Oleum destillatum fundit. *Olim externo scopo Resolvendi & Roborandi adhibebatur. Plantæ, unde Caranna obtinetur, character ignoratur.*

CARDAMINE, *Crescione, Cresson des prés, Wiesenkresse.* *Florum* petala obtusa, oblongo-ovata, angustis unguibus terminata, mox alba, mox venis purpureis picta, inodora, levissime acria. *Cardamine pratensis* L. *Blackwell* Tab. 227. Communis per Europam planta. *Laudantur contra morbos Convulsivos ad Drachmam unam aliquoties de die data.*

CARDAMOMUM, Est Folliculus ficcus, ventricosus, trifido septo distinctus, seminibus angulatis. Plures ejus species in tabernis servantur. Hic modo eas, quæ sub majoris, mediæ & minoris nominibus hodie prostant recenseo. *Majus Blackwell* Tab. 385. & 584. distinguunt Folliculi aliquot pollices longi, turbinati, superne apertura lacera hiantes, cinereo-rufi; striati, Semina includentes Coriandro vix cedentia, sub cute cinereo-ferruginea medullam albam continentia, sapore acri Camphoræ affini instructa. Ex Asia & Africa nobis adducitur, plantam unde colligitur, ignoramus. Edit $\frac{1}{3}$ circiter Olei destillati, quod Oleo *Cajeput* substituitur. *Medium,*

quod *Zeylanicum* quoque appellant, sistit Folliculos triquetros, unciales, gryseofuscos, apice acuto instructos & seminibus badiis, rugosis, angulosis, odoris suavissimis, saporis amariusculi, minus quam in reliquis aromatici, largitur $\frac{1}{2}$ Olei odorati, spissiusculi, dulciusculi. Ex Ægypto, India, Persia & Java ad nos transfertur. Hujus quoque fructus plantam perinde nescimus. *Minus* sive *Malabaricum* Folliculos semiunciales circiter habet, triangulares, subflavos, levissime striatos, in apice papilla coronatos; semina sunt rugosa, subrufa, sapor & odor Camphoræ propinquus; est fructus Amomi Cardamomi L. *Blackwell* Tab. 584. & 585. Indiæ civis, Olei odorati pellucidi $\frac{1}{2}$ fundit. Extracta aquosa ex duobus posterioribus parata plane inertia sunt. *Ad Ventriculum Roborandum Infusis Vinosis aut Spirituosis immiscetur, recipiuntur quoque in Trageas, Morsulos, &c. Extus Epithematibus Roborantibus adjiciuntur.*

CARDIACA, *Agricome, Herzgespänn.* *Folia* cuneiformia, tribus lobis angustis & inæqualibus terminata, rugosa, petiolata, inodora, amara. *Leonurus Cardica* L. *Blanckwell* Tab. 171. Passim per Europam & Virginiam crescit. *Visceribus Abdominalibus obstructis medetur. Vulgo sub forma Unguenti adhibetur.*

CARDUUS BENEDICTUS, *Cardosanto, Chardon benit, Cardenbenedikten.* *Folia* oblonga, magnis sinibus runcinata, hispido-scabra, rigide ciliata, intense amara; *Semina* majuscula, ventricosa, striata, flavescencia, pappo rigido coronata, medullam albam & dulcem includentia. *Centaurea Carduus benedictus* L. *Blackwell* Tab. 476. Europæ calidæ & Orientis propria, copiose apud nos etiam in agris colitur. *Folia sub forma Infusi Aquosi aut Vinosi vel Extracti Aquosi Ventriculi Roborandi & Aperiendorum Viscerum gratia exhibentur. Semina præalitis Seminibus dulcibus nil proprii habent.*

CARDUUS MARIÆ, *Spina alba, Chardon Marie, Mariendistel.* *Folia* ovali-lanceolata, magna & lata, profundis & magnis sinibus laciniata, margine ciliato, spinoso, reti albo picta, sapore

salino, cui levissima amarities accedit, instructa. *Semina* cylindroidea, obtusa, utrinque paululum compressa, sub cortice fusco & splendente medullam albam includunt. *Cardus Marianus* L. *Blackwell* Tab. 79. Europæ temperatæ civis. *Eodem modo, quo antecedens olim in usu erat.*

CARDUUS TOMENTOSUS, *Cardo salvatico, Chardon sauvage, berite Wegdiesel*. *Caulis* erectus, altus, crassus, tomentosus, alatus, *Foliis* decurrentibus, ovato-oblongis, dentatis, dentibus spinas emittentibus, tomentosus vestitus. *Onopordum Acanthium* L. Passim per Europam obvium. *Succi* inde expressi externus usus multum ad *Ulcerâ cancroâ sananda* laudatur.

CARICÆ, *Fichi, Fiques, Feigen*. Sunt *Ficus* exsiccata, variæ magnitudinis, partim rotundæ, partim turbinatæ, umbilicata, in pulpa cute tecta flavicante, abscondunt grana, quæ Flores potius & *Semina* esse Recentiores docuerunt; mellem dulcedinem habent. *Caricæ* magnæ & rotundæ a *Smyrna* denominantur, magnæ & turbinatæ a *Genua*, parvæ rotundæ, utrinque compressæ a *Masilia*; ultimæ dulcedine sua priores vincunt, sed illis citius corrumpuntur. *Caricæ* sicciore pulverem albo obsessæ, nigricantes, acidæ aut austere rejiciendæ sunt. *Ficus Carica* L. *Blackwell* Tab. 125. Europæ Australis indigena arbor, apud nos per hyemem stramine a frigoris injuria defenditur. *Comeduntur* crudæ *Nutrimenti* loco, coquantur ex aqua in *Pectoris medelam*; sive inversæ sive sub cineribus coctæ *Abscessibus aperiendis* imponuntur.

CARLINA, CARDOPATIUM, *Ebertswurzel*. *Radix* fibrosa, aliquot pollices longa, extus fusca, intus ex albo-flava, odore proprio, nauseoso, sapore acris, valde amaro gaudet. *Carlina Acoialis* L. *Blackwell* Tab. 532. Crescit in Europa temperata. *Oleum* destillatum fundere dicitur. *Olim a virtute Alexipharmaca* laudata, hodie *Mulo-Medicis* relinquitur.

CARNEOLUS, *Sardus, Cornalina, Cornaline, Carneol*. Est *Silex* variæ magni-

tudinis, semipellucidus, colore rubro, plus minusve diluto splendens, qui vero igni admotus, perit. *Silex Carneolus* L. Passim in Europa occurrit sub terra dispersus. *Iners lapis hodie exsolevit.*

CARPATICUM BALSAMUM vid. **TEREBINTHINA**.

CARPIO, *Carpione, Carpe*. *Cyprinus Carpio* C. *Piscis* apud nos admodum frequens culinis relinquitur. *Lapides Carpinum* sunt cartilagines consistentia & colore cornua referentes, facies earum altera linea longitudinali divisa est & duabus facieculis distinguitur; sitæ sunt inter palatum & primam vertebram. *Proprias a quibusdam istis adscriptas vires experientia non confirmavit.*

CARTHAMUS, *Zafferano spurio, Safran bâtard, Saflor*. *Flores* ex calice defumti asservantur, tubulosi, rufi, limbo profunde quinquefido, odorem nullum, saporem levissime salinum habent. *Semina* alba, quatuor angulis notata, oblonga, altero extremo crassiora, nitida, includunt nucleum dulcem, nec nauosum, nec acrem. *Carthamus Tinctorius* L. *Planta* annua, *Ægypti & Indiæ* indigena, passim per Europam colitur. *Flores* usibus tinctoriis inserviunt, *Semina Purgantibus a Veteribus* erant adscripta, & ad *Unciam unam* sub forma *Emulsionis* data; *Insidum medicamentum* evilit.

CARVI, *Mattenkümmel*. *Semina* incurva, convexo-concava, oblonga, striata, subnigricantia, odore & sapore aromatico, grato instructa. *Carum Carvi* L. *Blackwell* Tab. 529. Crescit per omnem Europam. Fundit *Olei odorati flavicantis*, acris $\frac{1}{8}$. *A virtute Carminativa* maxime laudatur, *cibus Infusis, Jusculis, Clysmatibus* adjicitur. *Discutiendi scopo Epithematibus quoque immiscetur.*

CARYOPHYLLATA, *Erba benedetta, Benoite, Benedictenwurzel*. *Radix* ex capite crassiusculo fibras emittit capillares, extus rufas, intus albas, *Caryophyllos* redolentes, sapore adstringente palatum afficientes. *Geum Urbanum* L. *Blackwell* Tab. 253. Provenit per omnem Europam. *Oleum* destillatum, album, spissum, fragrans largiri dicitur. *Ad*

Decocta Adstringentia adhibetur, recentissime contra Febres laudata.

CARYOPHYLLI, *Chiovi di Garofano, Cloux de Girofle, Nagelein*. Sunt Germina immatura Antophyllorum, aliquot pollices longa, leviter angularia, inferne obtusa, superne in quatuor lacinias æquales, quibus creberrime globus ex quatuor petalis constans, floris elementum insidet, divisa, rugosa, rubiginoso colore tincta, odor illis proprius, fragrans est, sapor evidenter linguam urens. Varietas angulis extantioribus distincta *Caryophyllorum Regionum* nomine venit. Carpuntur hæc germina mensibus Octobri & Novembri, per aliquot dies fumo exponuntur & dein Sole exsiccantur; Olei limpidissimi ipsis Caryophyllis minus acris, in aqua fundum petentis $\frac{1}{4}$ circiter fundunt. *Cibis, Trageis, Morfulis, Infusis Digestionem promovendi ergo adjiciuntur, sed cum Humores valde commoveant, exigue modo eorum doses recipi debent. Recipiuntur quoque ad Epithemata Roborantia. Oleum gratiæ ergo Medicamentis immiscetur, nec non scopo Nervino Balsama ingreditur. Ossibus quoque cariosis, cum successu applicatur.*

CASCARILLA, *Cascarilla, Chacrule, Cortices* in semitubum convoluti, aliquot pollices longi, lineam crassi, extus rugosi, cinerei, intus nigri, odore proprio aromatico, sapore amaricante, acriusculo, aromatico instructi, accensi fumum naribus non ingratum emittentes. *Croton Cascarilla L. Blackwell Tab. 578. Americæ Meridionalis & Virginie arbor. Cortices Olei destillati $\frac{1}{7}$ circiter fundunt. Vires Roborantes edit; sub forma Pulveris, Infusi, Extracti exhibetur; Extractum spirituosum aquoso prestare videtur.*

CASSAVA videatur **MANIHOT**.

CASEUS, *Cacio, Fromage, Kas*. Pars Lactis tenax, proprio odore & sapore salino instructa, animali natura gaudens. Ex integro lacte paratus, butyro scatet, unde pinguis est, ex lacte ebutyrato, qui surgit, macer est. Differt quoque pro vario lacte & pro vario animali ex cuius lacte fecessit; Vaccinus Ovillio minus, Asinino & Caprillo magis tenax

est. *Digestu difficilis, extus Resolvendi & Glutinandi ergo adhibetur.*

CASSIA CARYOPHYLLATA, *Cannella garofonata, Cannelle girofflée, Nagelein-Rinde*. Cortices aliquot pollices longi, tenues, semiconvoluti, intus fere nigri, extus dilutiores, creberrime Lichene obsessi, odore & sapore Caryophyllos referentes, utroque tamen remissiore. *Myrtus Caryophyllata L. Arbor Indicæ indigena. Oleum destillatum fundere, observata est. Caryophyllorum vires, sed debiliores edit.*

CASSIA FISTULA, *Cassia fistola, Casse en bâtons*. Legumina cylindroidea pedem & ultra longitudine, crassitie pollicem æquantia, mox rectissima, mox incurvata, tubere subrotundo terminata, lignosa, fragilia, ex spadiceo nigra, futura longitudinali, circulis non eminentibus distincta, quibus intus respondent septa transversalia, rigidiuscula, inter quæ pulpa nigra, dulcis obtinet, seminibus subrotundis, duris, fulvis, nitidis fœta. Rejiciuntur legumina evidentioribus rugis obsessa, quorum pulpa alienum saporem habet, aut adeo parca est, ut semina, concussio legumine, sonum edant. *Cassia Fistula L. Blackwell Tab. 381. Ex India Orientali & aliis Asiæ calidioris regionibus in Americæ Insulas, Martinicam, Dominicam &c. translata & ibi culta præstantiora, quam in patrio solo legumina largitur. In nostris hortis perpetuo in vaporario asservanda. Legumina recentia, in conclavi clauso in acervum collecta, adspersa aqua sudare cogunt, inde illis nigredo surgit. Pulpæ $\frac{1}{4}$ continere dicuntur. Eccoprotico & Diuretico scopo exhibentur. Leguminum Unciæ quatuor interdum ex aqua coquantur & Album Ducendi scopo dantur, sed consilio minus laudando; optimum est Pulpam cultro ligneo, ipso usus tempore inde separatam, ad Unciam dimidiam pro Albo ducenda, ad Sesquiunciam vel duas Uncias purgandi sine exhibere. Neutiquam Urina eorum, qui eam assumpserunt, inde tingitur, ut vulgo solent perhibere.*

CASSIA LIGNEA, *Mutterzimmt*.

Cortices pollicem circiter latitudine, lineam crassitie æquant, mox plani, mox in semitubos convoluti, colore obscuriore Cinnamomeo, simili etiam odore & sapore, vero Cinnamomo multum inferioribus instructi, masticati evidente viscedinis sensu linguam afficiunt. Varii adhuc alii Cortices colore, odore, sapore ad Cinnamomum accedentes hoc nomine veniunt. Laurum Cassiam Indiæ arborem *Linnaeus* adducit. Laurum Malabratam *Burmam*. Cl. *Bergius*. Laurus Indica L. Virginiae arbor, apud nos in tepidario per hyemem asservanda, odore & sapore hanc Cassiam refert. Cortices variarum Lauri specierum ad Cinnamomum accedentes Cassiæ lignæ substitui videntur. Substituuntur, sed minus bene, Cinnamomo.

CASSUMINAR, *Casumunar*, Dicitur Radix, quæ in taleolas longitudinales & transversas secta ex India Orientali advehitur, extus annulis eminentibus notata, gryseo-fusca, intus flava, dura & tenax, odore & sapore ad Zedoariam accedens, qua tamen evidentioram amaritiam linguæ imprimit. $\frac{1}{8}$ Olei odorati fundere dicitur. *Nervino & stomachico scopo in Anglia primis huius Seculi lustris usurpari cœpit. Dabatur sub forma Pulveris ad Grana quindecim, in Infuso autem ad Drachmam unam. Evilesocere videtur. Zedoaria ei substitui potest.*

CASTANEA, *Castagna, Chataigne, Castanie, Keste*. Nux ovata, plus minusve triangularis, convexo-plana, umbilico notata, inferne in exiguum mucronem tomentosum producta, badia, splendens, sub cortice tenaci, intus tomentoso. includit Nucleum, cuticula striata & fulva tectum, album, longitudinalibus sulcis striatum, odore proprio, levi, non ingrato, & sapore dulci instructum. Fagus Castanea L. *Blackwell* Tab. 330. Crescit in Europa temperata. Inoculatione *Sativa* reddita Nuces majores & suaviores, *Marones* dictas largitur. *Flatulentæ insuetis, torculari pressæ nullum Oleum, sed Liquorem fundunt, qui Fermentationem vinosam subit. Aqua coctæ vel assatæ in cibum recipiuntur.*

CASTOREI AXUNGIA. Improprie ita denominatum est Sebum, quod consistentiam Unguenti habet, flavum, odorem Castorei, sed minus fortem spirans; desumitur ex Glandulis conglomeratis, sub Folliculis statim dicendis, ad utrumque Urethræ latus hærentibus. Castoris Fibri L. Quadrupedis in Europa & America Septentrionali occurrentis. *Recipitur ad Unguenta Nervina.*

CASTOREUM, *Castoreo, Bibergeyl*. Duo Folliculi inferne contigui, dein divergentes, progrediendo magis ventricosi, efformati e membrana coriacea, includentes substantiam nigricantem, tenacem, proprio, Cerebrum gravante, odore & sapore amaricante præditam, inflammabilem, multis cellulis membranaceis distinctam. Folliculi majores, ventricosi, substantiam siccam quidem, sed non aridam continentes, fortissimum odorem spirantes, reliquis præferendi; denominantur isti a *Russia, Borussia, aut Dantisco. Canadense*, quod etiam *Anglicum* appellant, folliculis minoribus substantiam aridam includens & minus odorem, rejiciendum. Ad usus medicatos substantia nonnisi seorsum a folliculis separata recipienda est. Oleum destillatum fundere dicitur. Hi Folliculi ad utrumque Urethræ animalis modo dicti latus prope Præputium hærent & proprio orificio in illam patent. Ex animali exenti infumatione contra corruptionem defenduntur. *Contra morbos Spasmodicos, sub forma Pulveris aut Pilularum intus ad Scrupulum semis & ultra datur. Extus Unguentis, Epithematibus, Clysmatibus admiscetur; admovetur quoque tamquam Odoramentum Hystericarum naribus.*

CATAGAMBAR, videatur CATECHU.

CATAPUTIA MAJOR, *Palma Christi, Ricini Semina, Semence de Chasse-taupe, Purgirkærner*. Sunt Semina ovata, utrinque compressa, hilo prominente terminata, sub cortice fragili, sicco, nitido, nigro, lineis albis pulchre variegato, sapore acerrimo, continent nucleum album, mitiorem. Ricinus communis L. *Blackwell* Tab. 148. Planta annua utriusque Indiæ propria, in nostris hortis colitur,

litur. *Validioribus Draſticis hæc Semina omnino ſunt annumeranda, eorum doſis ad Grana ſex extendi ſolet, aſt vel tantilla nimia eſt; conſultius medicamentum acerrimum nunquam datur. Oleum unguinoſum, flaviuſculum, vix acre, ex nucleis, deſto prius cortice, proriſus expreſſum, Oleum Palmæ appellatur; in Colica, Nephritide, Volvulo, Vermibus ad unum Cochlear ſingulis horis exhiberi ſolet, uſque dum Alvum ducere cæperit; infantibus ad unam vel duas Drachmas propinatur.*

CATAPUTIA MINOR, *Catapuzza*, *Grain de l'Epurge*, *Springkærner*. *Semina parva, ovata, ſub cortice ſiccò, lituris ruſis variegato, nucleum continent antecedentibus etiam acriorem, Euphorbia Lathyris L. Brackovell Tab. 123. Planta biennis Europæ Australis propria, noſtræ hyemis patiens ſparſis ſponte feminibus in noſtris hortis ipſa ſemet propagat. Ex officinis releganda ſunt.*

CATECHU ſive **JAPONICA TERRA**, *Cacciù*, *Cachou*. *Subſtantia ſicca, dura, extus rufo-nigricans, intus ex rubro-fulca, duriuſcula, ſapore adſtringens, ſenſu primum dulci, deinde amaro inſtructa. Rejicimus fruſta arena aut aliis fordibus inquinata, nec non ea quæ ore detenta non tota liqueſcunt. Eſt Succus aut potius Extractum aquoſum ex variis Mimofæ L. ſpeciebus, quibus forſan alia Vegetabilia adjiciunt, paratum. Rationes, cur non ex Areca Catechu L. parari credam alio loco expoſui. Ex India nobis aſfertur. Roborandi & Adſtringendi ergo Pulveribus, Eleſtuariis &c. admixcetur; adjicitur quoque Dentifriciis. Adduntur ipſi varia ſuaſvolentia & in variæ figuræ Trochiſcos formantur, ad conciliandam animæ gratiam, ore detinendos. Ex Indiis allati *Siri Gata Gamber* appellantur, apud nos parati *Trochiſcorum*, *Muſcerdarum Cachou* nomine veniunt. Hoc medicamentum olim cum Argilla miſcebant, aqua aſuſa Solis calore expohebant; oriebatur inde fermentatio; ſpumam liquori fermentanti ſupernatantem colligebant & in modulis orbicularibus exſiccabant; oriebantur ita placentulæ variæ magni-*

tudinis, aliquos pollices latæ, extus ſaturius flavæ, intus pallidiores, ſapore amariuſculo, ſubaſtringente præditæ, quas *Catagamber* appellabant; & ad eodem cum terra *Catechu* uſus adhibebant.

CATUS, *Gatto*, *Chat*, *Katze*. *Felis Catus L. Quadrupes per omnem Europam frequentiffimum; largitur Axungiam inſpidam, inodoram, albam, quæ Unguenti conſiſtentiam habet & a reliquis hujus generis pinguedinibus vix differre videtur.*

CAOUTCHOU, *Refina Elaftica*. *Refina, quæ ſub varia figura globorum, lagenarum &c. variis figuris exſculptorum ad nos adducitur, inſpida, inodora, fulca, interdum nigra, igne cum elafticitatis jactura liquabilis, accenſa minus gratum fumum emittens. Eſt Succus arboris copioſe in America Meridionali creſcentis, cujus genus quamvis Monæcin adſcribatur, determinatum tamen adhucdum non eſt; Succum lacteum incifione ex arbore elicatum ſingulatim per ſtrata, quorum quodlibet prius fumi ope exſiccandum eſt, antequam ne- vum quodque applicatur, inducunt modulis ex Argilla conſectis: ſi refina iſtam quam ipſi dare volunt, craſſitiem habet, tunc aquæ ope Argillam inde eluunt, ſive ſi Argilla cocta fuerit, diſfringunt & fruſta e cavo auferunt. Ob inſignem ſuam elafticitatem ad Americanis ad ſyringes, lagenas, calceos, ocreas &c. adhibetur. Tanta ejus tenacitas eſt, ut fruſtum 12 lineas longum, 5 $\frac{1}{2}$ latum & $\frac{3}{4}$ craſſum, in longitudinem 37 $\frac{1}{2}$ linearum extendi poſſit. Nec in Aqua, nec in Spiritu Vini ſolubile eſt, in Oleis ſi diſſolvitur, ſuam elafticitatem perdit, dum autem Æthere Vitrioli diſſolvitur, poteſt in modum Americanis uſitatum modulis ex cera obduci, quæ juſta craſſitie adepta calore aque ebullientis inde eliquanda eſt, & ita inde poſſunt tubi formari ad uſus Chirurgicos apprime facientes.*

CENTAURIUM MINUS, *Centaurea minore*, *petite Centauree*, *Tauſendguldenblumen*. *Flores rubri, infundibuliformes, quinqueſidi, calycibus & extremitatibus*

sustentati asservantur, inodori, amarissimi. *Gentiana* *Centaureum* L. *Blackwell* Tab. 452. Per omnem Europam reperitur. *Dantur sub forma Infusi Aquosi, Vinosi, Spirituosi, Extracti Aquosi, Conserve vel Syrupi ad roborandum Ventriculum & referendas Obstructiones Viscerum Abdominalium*. Aqua inde destillata nauseosum & satis evidentem odorem spirat, acri sapore linguam afficit.

CENTUMNODIA, *Sanguinalis*, *Renoue*, *Fraicasse*, *Weggras*. *Cauliculi* geniculati, teretes, scabri, instructi *Foliolis* utrinque acuminatis, glabris, integerrimis, subadstringentibus. *Polygonum* L. *Blackwell* Tab. 315. Per omnem Europam vulgare. *Adstringendi scopo olim tam extus quam intus adhibebatur*.

CEPA, *Cipolla*, *Oignon*, *Zwiebel*. *Radix* bulbosa, mox sphaeroidea, mox utrinque compressa, sive alba, sive rubra, sub aliquot tunicis siccis & striatis carnem albam, quæ linguam, nares & oculos valide afficit, includens. *Albæ* minorem quam *rubræ* acrimoniam habent. *Folia* viridia sunt, fistulosa, in medio ventricosa, odorem & saporem *Radicum* habent, sed mitiorem. *Allium Cepa* L. Copiose in agris & hortis colitur. Aqua inde destillata olida est. *Radices & Folia in cibum non tam nutriendi, quam potius condiendi causa recipiuntur. Albæ Radices scopo potissimum Pectorali Jusculis incoquantur. Cephæ sub cineribus asatæ Hypogastrio imponuntur pro pellenda Urina. Adhibentur quoque Abscessibus maturandis*.

CEPA OBLONGA, *Cipolla bislunga*, *Ciboule*, *Jacobszwiebel*. *Bulbus* ovali-oblongus, hinc planus, inde convexus, tunicis albis vestitus, carne alba efformatus, antecedentis odorem & saporem habet, sed mitiorem. *Allium fistulosum* L. iisdem cum antecedente locis colitur. *Cu'inis duntaxat relinquitur*.

CEPA SECTILIS, *Schnittlauch*. *Folia* fistulosa, tubulata, acuta, striata, odore & sapore proprio antecedentibus vicino instructa. *Allium Schœnoprasum* L. *Alpibus proprium copiosissime in hortis colitur. Usibus cibariis inservit*.

CERA, *Cera*, *Cire*, *Wachs*, *Substantia*

solida, tenax, calore liquefcens, colore citrino, & proprio odore non ingrato instructa, ab *Ape Mellefica* L. ex antheris florum collecta, deglutita & e corpore denuo emissa, pro exstruendis favis & claudendis cellulis adhibita. Obrietur ex favis, melle privatis, dum cum aqua coquantur, calore liquefacta *Cera* aquæ supernatat; quodque a coctione de favis remanet, torculari committitur, & reliqua *Cera* inde *Cera* inde exprimitur, inhærentes fordes eadem liquefacta ad fundum secedunt & cultri ope a refrigerata auferuntur. *Soliditas*, color citrinus & odor *Ceram* commendant. *Durius* *Ceræ* genus, magisque rufum, plus minus fuscum, proprio nec ingrato odore instructum, ab *Apibus* ex corticibus variarum arborum desumptum, hæc animacula ad *Alvearium* fissuras claudendas & suspendendos favos adhibent. *Propolis*, *Stopwachs*, *Bienenwachs* dicitur *Cera* humectata, *Solique* subjecta colore & odore privatur, majorem firmitatem acquirit & *Cera alba* appellatur. *Cera Resinarum effectus edit, nec Humores commovet, & intus quoque cum successu exhibetur. Longe plurima Unguenta & Emplastra ingreditur, eisque justam spissitudinem conciliat. Adjectione Theribinthinæ emollita & vario pigmento tincta, variam Ceram sigillatam efformat. Oleum inde destillatum admodum olidum & acre est. Laudatur contra Perniones, fissam Epidermidem &c.*

CERASA, *Ciriege*, *Cerises*, *Kirschen*, *Sunt fructus* variæ magnitudinis, variæ figuræ, varii coloris, parvi *Merises*; *Waldkirschen*: cordiformes, lateribus compressis, *Bigarreaux*, *Herzkirschen* dicuntur, ad basin concavi, in apice obtuso-rotundati; pulpam plus minusve firmam, varie coloratam, sive dulcem, sive acidam, rarissime amaricantem præbent. *Ossiculum* includunt magis aut minus rotundum, glabrum, in quo hæret *Nucleus* albus, ovatus, acutus, dulcis. *Prunus Cerasus* L. *Blackwell* Tab. 449. In omni Europa vulgaris; plurimæ varietates in hortis coluntur. *Fructus* ple- rarumque varietatum mensis imponun-

tur. Officinæ Ceraia austera L. *Amarehlen* recipiunt, in vicis nostratibus copiosa. Eadem Refrigerandi causa vel exsiccata cum aqua coquuntur, vel sub forma Gelati aut Syrupi exhibentur; ex his Cerasis Fermentationis & Destillationis ope paratur Spiritus gratissimus *Kirschenwasser*. Aqua Nucleis abstracta grate sapit & olet. Nucleis vires Diuretice adscribuntur.

CERASUS RACEMOSA, *Ciriesia* a *grappolo*, *Cerisier à grappe*, *Elsenbaum*. Fructus vix Piso majores, glabri, nigri, ad basin quam minime excavati, pulpa pauca, nigro-fusca, saporis aciduli, subadstringentis. Prunus Padus L. Passim in Europa crescit. In tanta gratorum Cerasorum quantitate vix in usum recipitur. Lignum suaveolens tornatorum in usum migrat.

CERASORUM GUMMI. Est Gummi ex variis nostratibus *Pruni* speciebus exsudans, in massas variæ magnitudinis concretum, plus minus fuscum, insipidum, inodorum; ob fordes, si quas habet, in aqua dissolvitur, per linteum dejicitur, & denuo inspissatur. Gummi Arabici vires habet, sed debiliores.

CEREFOLIUM, *Cerfoglio*, *Cerfeuil*, *Karbelkraut*. Folia læte viridia, duplicato-pinnata, pinnis parvis integris & incisis, exigua spinula terminatis, nervis hinc inde pubescentibus, sustentata petiolis convexo-planis, sulco notatis, odoris & saporis proprii, grati & aromatici. Scandix Cerefolium L. *Blackwell* Tab. 236. Planta annua Europe Australis propria ubique colitur & sponte dispersis Seminibus perpetuatur, nec hyeme læditur. Oleum destillatum fundere dicitur. Succus inspissatus, evidenter salinus, non levem odoris jacturam facit. Ad omnis generis Obstructiones reserandas, Humores spissos attenuandos, Tusses pertinaces, vitia Cutanea sananda, sive *Fusculis incoctum*, sive Succus inde expressus exhibetur; Succi inspissati Uncia una de d'e dari solet; Extus cum successu Tumoribus induratis, partibus Sugillatis imponitur; Aqua inde abstracta efficax, Oleum coctum iners est.

CEREVISIA, *Birra*, *Bierre*, *Bier*. Est liquor vinosus ex Infuso Granorum Ce-

realium, germinascere coactorum, quæ *Malte* nomine veniunt, decoctione & subsequente fermentatione vinosa confectus; consistentia, colore, sapore, vi inebriandi pro varietate Ceralis unde paratur, exsiccationis *Malte*, modi fermentationis, reliquorum præterea additamentorum multum variat. Omnis *Cerevisia* Aquam, Alcohol, partes gummosas & resinosas continet. Diluendi, Roborandi, Urinam pellendi ergo a Medicis præscribitur, ita tamen, ut *Cerevisiam* tenuem saturatæ nunquam non præferant.

CERVUS, *Cervo*, *Gerf*, *Hirsch*. *Cervus Elaphus* L. Quadrupes copiose per Asiam & Europam occurrit; *Hinnuli*, *Faon*, *Hirschkalb* aliquot mensibus non majoris, & anniculi *Subulonis*, *Daguet*, *Spieshirsch*, Caro in cibum recipitur. Cornua bina basi *Mercin*, *Gevveih* unita, corpora *Perche*, *Stunge* formantur, cujus amplitudo progrediendo crescit & varios ramos *Andouillers*, *Ende* emittit, quorum basis tumida *Meule*, *Rose* dicitur; negricantia sunt, tuberculis, *Pierrures*, *Perlures*, *Perlen* obsessa. Radula comminuta moleculas referunt ex albo nigricante. Cornu *Cervi Raspatum*, sive *Rasura* Cornu *Cervi*, interdum etiam rejecto cortice nigricante, quæ huic subest portio alba in tenuia secamina alba tornari solet *Cornu Cervi Tornatum*, quod cum parte medullari careat, antecedente minus ad scopos medicatos aptum est. Decoctis Demulcentibus adjicitur, sed diuturnam coctionem requirit, Gelatina, cujus siccæ $\frac{1}{2}$ circiter largitur, inde parata *Fusculis Hæcticorum* & *Febre lenta laborantium* adjicitur; eadem ad siccitatem usque evaporatur *Gelatina Cornu Cervi sicca*, ad *Pulveres demulcentes* recipitur. *Typhi*, *Criies*, *Kolben*. Cornua tenella, cylindroidea, apice crasso, rotundato instructa, sub cute crassiore, extus tomento & pilis obsessa, substantiam osseam, sanguinolentam, spongiosam includunt; Nutrimentum minus bonum largiuntur. Aqua inde abstracta iners est. Medulla linimenti consistentiam habet, sanguinolenta, præ aliis pinguedinibus vix aliquid proprii habere videtur. Os de Corde *Cervi planum*,

album, figura sua irregulare, insipidum est, portio Cordis ad ortum utriusque orificii arteriosæ indurata, omnino iners. Sebum solidum & album ad fines medicatos relatum ab aliis sebis non differre videtur.

CERUSSA, *Cerussa, Blanc de Plomb, Bleyweiß*. Est Plumbum, vapore Aceti in calcem albam versum, sapore adstringens, sub forma tam lamellarum friabilium *Schieferweiß* quæ est sincerissima, quam panum conoideorum charta involutorum, prostat; hæc vel *Venetica* vel *Belgica* dicitur, posterior in majores panes coacta, majore terræ inertis copia adulterata est. Ad Exsiccandum *Impetigini*, *Erysipelati* autem *Discutiendi* ergo inspergitur. Creberrime sub forma *Emplastri* aut *Unguenti* adhibetur.

CETERACH, *Milzkraut*. Folia parva, pinnatifida, pinnis ovatis, obtusis, integris, alternis, confluentibus, tota pagina inferior, maculis ferrugineis obsesa est, insipida, inodora. Asplenium *Ceterach* L. *Blackwell* Tab. 216. Europæ Meridionalis civis. Leniter Adstringit, ejus Infusio aquosa multum ad pellendum *Sabulum* laudatur.

CETI, *Sperma ceti, Baleine, Wallfisch*. SPERMA, *Blanc de Baleine, Wallrath*. Substantia alba, pinguis, proprio odore & sapore instructa, e lamellis siccis & splendentibus composita, est Pinguedo in propriis Encephali variorum Ceti generum receptaculi hærens, quæ sive inde desumpta, sive ex animalibus putredine resolutis effluxa, frigore deinde in floccos albos densata Marique innatans collecta, lotionem a sanguine, expressione per torcular, & Alkali opere peregrino, quod ipsi adhæret, Oleo purgatur, in frustra dissecatur, Sole & Aëre exsiccatur. Sperma Ceti, quod vel levissimum flavedinis sive rancoris vestigium habet, rejiciendum est. Veram pinguedinem cum Alkali Saponem quoque efformare, recentissima experimenta docuerunt. Vires Demulcentes & Antispasmodicas edit. Datur cum aliquo saponem junctum ad Drachmam unam pro dosi sub forma sive Pulveris sive Linctus; extus Un-

guentis sive Emplastris ad Fissuras labiorum sanandas aut Lac in Mammis stagnans diluendum admiscetur.

CHAMÆDRYS, *Camedrio, German-drée, Gamanderlein*. Folia parva, ovata, inciso-crenata, nitida, brevibus petiolis instructa, inodora, amara. Teucrium *Chamædrys* L. *Blackwell* Tab. 80. Obtinet in Europa temperata & in Oriente. A vi Resolvente & Aperiente laudatur; Arthriticis maxime commendatur & Febre Intermittente laborantibus. Recipitur ad Infusa. Extractum cum aqua parandum est.

CHAMÆPITYS, *Iva, Ivette, Schlagkrautlein*. Folia hirsuta, oblonga, trifida, odore levissimo, sapore amaro & subaromatico instructa. Teucrium *Chamæpitys* L. *Blackwell* Tab. 528. in iisdem ac præcedens locis, in Asia præterea Africa & America crescit, ad similes quoque usus adhibetur.

CHAMOMILLA ROMANA, *Camomilla Romana, Camomille Romaine, Rœmische Camillen*. Flores compositi, calice hæmisphærico, imbricato, tomentoso comprehensi, radiati, ligulatis radiorum floribus albis, linearibus; discus efformatur tubulosis floribus flavis, quinquefidis, paleis distinctis, odorem proprium, non ingratum spirantibus, sapore amaricante, leviter aromatico, linguam afficientibus. *Anthemis nobilis* L. *Blackwell* Tab. 526. Passim crescit in Europa. In Germania Varietas floribus plenis recipitur, quæ vero quo minus odorata & sapida, eo minus etiam efficax est. Cl. Baumé inde Olei cærulei (mihi flavum exhibuerunt) $\frac{1}{3}$ obtinuit. Viribus cum sequentæ æquipollens ad internos potissimum usus adhibetur.

CHAMOMILLA VULGARIS, *Camomilla, Camomille, Camillen*. Flores ab antecedentibus, nonnisi disco conoideo, radio deflexo, receptaculo nudo, odore minus grato differunt. *Matricaria Chamomilla* L. *Blackwell* Tab. 298. Copiosa per omnem Europam. Olei pulcherrime cærulei $\frac{1}{2}$ largiuntur. Ad præcipua Antispasmodica referuntur, intus cum aqua Infusi sive in Pulverem redacti exhibentur. Extus Discutiendi insuper scopo ad Epithemata, Cataplasmata, Balnea, Gly-

*smata recipiuntur. Oleum destillatum ad pau-
cas Guttas intus datur. Oleum coctum Ab-
domini illinitur, ad Clysmata recipitur; con-
sultius duxerim illud Infusionis ope parare.*
Utraque Chamomilla Flores Cotulae Fœ-
tidæ, quos Anthemis Cotula L. largitur,
ex officinis exclusit, non nisi a Pharma-
copœis ignaris interdum Chamomillæ
Vulgari substitui solitos.

CHEIRI, *Viola, Giroffle, gelbe Violen
oder Negelein. Flores* petala ex calice
exemta, obovata, obtusa, lutea, quæ
gratum, quem recentes spargunt odo-
rem exsiccata amittunt, sapore amari-
cante non nihil etiam salino instructi sunt.
Cheiranthus Cheiri L. *Blackwell* Tab.
179. Europæ Australis proprius, apud
nos omnino perennat, nec hyeme lædi-
tur. *Ob virtutem suam Emenagogam par-
tim ad Infusa Aquosa recipiebatur, partim
Succus eorum expressus exhibebatur.*

CHELIDONIUM MAJUS, *Celidonia
maggiore, Chelidoine, Schœllkraut. Radix*
fibrosa, recens tota crocea, succum etiam
croceum fundit, exsiccata vero fusca est,
saporis acris, odoris nauseosi, medulla
grysea, inodora, sapore minime fortis.
Folia pinnata, pinnis in aliquot lobos
ovatos, obtusos discedentibus, supra
glauca, infra hirsuta, recentia minus
grate olent, succo croceo acriusculo sca-
rent. *Chelidonium majus* L. *Blackwell*
Tab. 91. Per omnem Europam vulgare.
*Aperiendi scopo Radix recens ad Fuscula re-
cipitur, exsiccata Pulvis ad Drachmam unam
pro dosi datur; eundem in finem Succum ex
Foliis expressum ad aliquot Drachmas ali-
quoties de die propinant.*

CHELIDONIUM MINUS, *Celidonia
minore, petite Eclairé, Feigwartzwurzel.*
Radix ex bulbulis cylindroideis, extus
gryseis, intus albis, acriusculis efforma-
ta. *Folia* longis petiolis sustentata, re-
niformia, glaberrima, dentata, levi
Nasurtino sapore linguam afficientia.
Ranunculus Ficaria L. *Blackwell* Tab. 51.
Vulgaris per Europam. *Radices recentes
Vesicantem virtutem habere dicuntur. Folia
recentia ad Fuscula Aperiencia recipiuntur;
cum Axungia frixa Hemorrhoidibus appli-
cantur.*

CHERMES GRANA. *Folliculi* pisorum
magnitudinis, rotundi, unde portio in-
ferior resecta fuisse videtur, ex rubro
fusci, splendentes, intus grana minima,
sive sanguinei, sive flavescens coloris,
pulverem referentia continent, sapore
amaricante & leviter flavescens, odo-
re tenui non ingrato imbuti sunt; ex-
vivæ femellarum Cocci Illicis L. in Quer-
cu Coccigera L. *Blackwell* Tab. 186.
Europæ Meridionalis & Archipelagi in-
digena, apud nos in frigidario contra
hyemem defendenda, habitantis, super
sua ova exsiccaturum, Aceto consper-
sæ, ne ova, a quibus pigmentum inde
parandum pendet, excludantur; *Roboran-
di & leviter Adstringendi ergo ad Semi-
drachmam sub forma Pulveris exhibentur;*
sed majoris omnino efficacix est *Succus*,
qui ex Folliculis recentibus in Aquitania
expressus, addita pari Sacchari quanti-
tate a corruptione defensus, sub nomi-
ne *Succi Chermes* per obem divenditur,
pulcherrimo colore purpureo nitens, ad-
modum suavi odore æque ac sapore præ-
ditus. *Ad Unciam semis sive seorsum sive
Fulapiis, Electuariis &c. admistus exhibetur.*

CHINÆ CORTEX, *Cortecia Peru-
viana, Cortex Peruvianus, Quinquina.* Fru-
sta ad dimidium vel ultra etiam con-
voluta, vix digiti longitudinem exce-
dentia, extus scabra, bruneo-fusca, in-
tus ferruginea, sæpe Lichene obsessa,
odore proprio aromatico, cui aliquid
mucidi accedit, sapore aromatico, ama-
ricante, levissime subadstringente. *Cin-
chona officinalis* L. Arbor procera, in
regni Peruviani præfecturæ Quito mon-
tibus copiosa, tractum ultra 50 millia-
ria extensum occupans. Cortices inde
a Septembri ad Novembrem usque men-
sem deglubuntur in libero aëre, sæpius
agitati, exsiccandi. Rejiciendi sunt Cor-
tices multum amari, aliquid styptici aut
viscidi, linguæ imprimentes, integram
lineam crassi, læves, non convoluti, &
si franguntur filamentosi. *Remedium Co-
miti Cinchon detectum, primum Car-
dinalis de Lugos missum, dein a Jesui-
tis medio seculi superioris dispensatum,
inde quoque denominatur. Extracti aquo-*

fi, $\frac{3}{4}$ Resinosi $\frac{1}{2}$; inde obtinui. *Princeps remedium contra morbos Periodicos, Gangrenam, Putredinem, Obstructiones Viscerum, Spinam Ventosam. Datur sub forma Pulveris quam subtilissimi. Sunt qui contendunt, Pulverem ad priores pistilli ictus surgentem minus efficacem esse, sed oculus sane minimam modo differentiam inter portionem pulveris, quæ prima surgit & eam sequentes detegit, nec pulverem a Magnete trahi observare potui. Dosis est ad Drachmam semis; exhibetur porro Aqua aut Vino Infusus, nec non ejus Decoctum vel Extractum, Pulvis etiam, ope aquæ in Cataplasma redactus, Ventriculo impositus, quo scopo duæ Unciæ Infantibus, quinque autem adultis tribui solent; quin & Balneis admixtus, receptusve in Clysmata, salubritatem suam probavit. Nutricibus exhibitus lactantes curat.*

CHINÆ RADIX. Genuculata, nodosa, multis tuberculis obsessa, ponderosa, insipida, inodora, sub cuticula ex bruneo rufescente, medullam includit albam, nonnihil etiam rufam, solidiusculam. Rejicimus Radices leviores, quæque rariorem aut spongiosam medullam habent, nec non illas, quæ ex America trajiciuntur, sive nigricantes, sive evidentius rufas; Smilax China L. *Blackwell* Tab. 433. Chinæ, Japoniæ, Persiæ indigena. Aqua cum Radice cocta rubra evadit. *Decoctum ad varii generis Acrimoniam Humorum corrigendam adhibetur.*

CHRYSOLITHUS. Veteribus Topasium hoc nomine venisse contenditur. Hodie ita appellatur Gemma ceteris omnibus mollior, ex viridi subflava, in igne colorem amittens, & in vitrum abiens. Borax Gemma nobilis Viridis Chrysolithus L. In India Occidentali, Bohemia, Silesia deprehenditur. *Usus ejus in Medicina evuluit.*

CICERA, *Ceci, Pois Chiches, Kickererhsen.* Semina rotunda, Pisis majora, rufa, inferne in acumen producta, hinc inde levissime compressa, sub cortice rufo-fusco absconditam medullam flavicantem, inspidam continent. *Cicer Arietinum L. Blackwell* Tab. 557. Planta annua, Europæ Meridionalis & Sy-

riæ indigena, apud nos in hortis colitur. In regionibus calidioribus, eoque culturæ Pisorum minus amicis, id genus copiose colitur & in ciborum numero habetur. *Ad Decocta Diuretica recipiuntur. Farina eorum extus ad Epithemata & Cataplasmata Resolventia & Abstergentia adhibetur.*

CICRORIUM, *Cicoria, Chicorée, Wegweis.* Radices fusiformes, sub cuticula levissime fusca, una cum carne dulci medullam albam & amaram abscondunt. Folia petiolis latis sustentata, ex fine angusto dilatantur, laciniis latis progrediendo crescentibus dentata, viridia, utrinque aliquantulum hirsuta, amara. *Cichorium Intybus L. Blackwell* Tab. 177. & 183. Vulgaris per Europam planta; quæ in hortis colitur per omnes partes major, foliorum etiam laciniæ minus profundæ evadunt, & non raro purpuram æque ac radix admittunt. Folia plantæ in hortis culturæ, terra obruuntur, ut alba fiant & amaritiam deponant, quo facto in *Acetaria* recipiuntur. Radices & Folia Humores resolvunt, unde *Aperientes & Refrigerantes* ipsis adscribuntur vires; illarum frequentior, quam horum usus est. *Recentes vel Fusculis* adjiciuntur, vel Saccharo condiuntur; *exsiccatae ad Decocta* recipiuntur, *Extractum earum aquosum* efficax est.

CICUTA, *Cicuta, Ciguë, Schierling.* Folia triplicato-pinnata, glabra, saturate viridia, odore foetido, sapore leni instructa. *Conium maculatum L. Blackwell* Tab. 451. Crescit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem. Destillata per se planta Spiritum Ammoniacalem fundit. Succus in formam Extracti inspissatus $\frac{7}{8}$ perdit, foetidus est, falsus, nauseosus, humiditatem ex Aëre attrahit, quocirca ad servandam ejus justam consistentiam herba in pulverem redacta temperandus est. *Folia largiore quantitate comesta Veneni Narcotici effectus edidisse Observatores* docent; *Succum inspissatum, qui sub Extracti nomine asservatur, validissimum medicamentum Resolvens esse & desperatissimos morbos curare maximi Viri experti testantur. A medi-*

tationis initio quatuor aut sex Grana Extracti bis de die dantur, augetur inde sensim dosis; ad Unciam usque unam unius diei dosin citra ullum incommodum auctam fuisse, relatum lego; dantur quoque Folia sub forma Infusi aquosi. Eadem extus, sub forma Cataplasmatum, cum successu Partibus Induratis imponuntur.

CICUTA AQUATICA, *Wasserschierling*. Radix magna, crassa, flavescens vel virescens, geniculis, quibus intus prominentes circuli respondent, distincta, odore vel sapore Apio propinqua. Folia magna, bipinnata pinnis linearibus, ferratis, glabris, minus quam Radix odora, sapore etiam inferiora. Cicuta virofa L. *Blackwell* Tab. 574. a b c. Crescit passim per Europam. Præcedente virulentiorē esse asserunt Observatores; exsiccatione fere effectam reddi perhibent. Non inepte pro Emplastro de Cicuta hæc recipi jubetur. Succum in modum antecedentis ad Drachmas tres usque datum, & Decocti saturati largam quantitatem absque ullo sive bono sive malo effectu fuisse ingestam, a magni nominis Observatore notatum lego.

CINA, *Santonicum*, *Santonico*, *Semenæ Contra*, *Wurmsaamen*. Semina, quæ ex Orientalibus regionibus advehuntur, oblonga, exigua, plus minus flava, intermixtis stipitibus immunda, sapore amaro & nonnihil acri, odore proprio, forti, nauseoso imbuta. Ex *Aleppo* allata optima sunt, hæc excipiunt *Orientalia*, quæ rursus *Indica* post se relinquunt, quibus exigui flosculi non aperti intermixti esse videntur, *Barbara* seu *Africana*, ex cauliculis maxime efformata, sunt vilissima. *Artemisia Contra* L. Persiæ ac *Mogolis* regno propria. Vermibus potissimum infesta feruntur. Datur sub forma Pulveris; nauseosi medicamenti vix ultra *Scrupulum unum* ægroti deglutire solent, quapropter hæc dosis aliquoties de die est repetenda; Infantibus sub forma Confectionis sicca exhibitur.

CINERES CLAVELLATI, *Potassa*, *Cendres gravellées*, *Potasse*, *Potasche*. Sal in massas variæ magnitudinis inspissatus, ex albo ac cæruleo bicolor, odoris expers, saporis lixiviosi, in Aere

diffluens & si quidem purus est, omnibus Alkali vegetabilis qualitibus præditus. Paratur ex cineribus arborum maxime atque fruticum, ex quibus aquæ ope extrahitur; aqua eo imprægnata, *Lixivium* dicta, evaporatur ad siccitatem; Sal hac ratione obtentus in fornace reverberatoria calcinatur, neque prius inde, quam penitus ignitus fuerit, defumitur. Cineres clavellati nunquam non Tartaro Vitriolato, Sale communi, fordibus etiam polluti sunt; ab his solutione in aqua frigida purgantur; qui Salem communem habent ad usus Chemicos saltem inepti sunt. *Cineres Clavellati depurati omnes Alkali fixi vegetabilis vires habent.*

CINNABARIS, *Minium Veterum*. Est minera pulcherrimo rubro colore splendens, ponderosa, variæ magnitudinis massa efformans. Hydrargyrum Cinnabaris L. In Palatinatu, Hungaria, Idria, Japonia &c. ex montibus effoditur. Rarissime ad usus medicatos, nec nisi a fordibus, quæ ipsi fere adhærent, sublimatione purgata recipitur. *Cinnabaris factitia*, cum multo minoris veniat, neque tamen viribus inferior sit, commode substituitur.

CINNAMOMUM, *Cannella*, *Canelle*, *Zimmet*. Cortices convoluti, prælongi, teneri, ex variis laminis tenera charta non crassioribus constantes, glaberrimi, odore proprio, fragrantissimo, sapore aromatico, linguam feriente, quadantenus dulci instructi. *Laurus Cinnamomum* L. *Blackwell* Tab. 354. In *Zeylona* crescit; Cortex ejus intermedius nostrum aroma constituit. Eadem arbor in *Martinica* crescens exhibet Cortices a *Zeilonis* minore longitudine, crassitie majore linea tamen minore, superficie rugosa, sapore acriore, odore paulo minus fragrante differentes, quibus nomen *Cinnamomi Indici* dederunt. Prostant præterea ab aliquot retro lustris germina fusca, colore *Caryophyllorum aromaticorum* profundiore tincta, pedunculo concolori, oblongo, sensim crassiori, gracili, striato infidentia, rotunda, calice sexfido, laciniis

niis striatis ad germen adeo reflexis, ut ejus nonnisi apex brevissimo stylo infusus proftet, odore perfusa & sapore ad Cinnamomum Zeylonicum accedente, utroque vero paulo remissiore; dicuntur improprie *Flores Cassiæ*, nec non *Clavelli Canellæ* ab exactissima figuræ cum claviculis capitulo rotundatis similitudine, *Grains du Canellier*. Interdum quoque occurrunt *Nuces Cinnamomi*, fructus Olivæformes ad Baccas Lauri accedentes, glabri, quasi levigati; sub cortice fragili, inodoro, prius dulciculo, Cinnamomum fere respiciente, dein adstringente, nucleum abscondunt superne compressum, sub cuticula ferruginea medullam albissimam, inodoram & inspidam continentem. Olei destillati exiguam modo quantitatem fundit, magna quippe ejus parte ab aqua non secedente. $\frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ inde obtentum fuisse lego: idem ex Zeylona advehitur dilute aureo colore insignitum, suavitatis, virium quoque Cinnamomi egregie confors. Claviculi Oleum fundunt Oleo Cinnamomi haud absimile, quanquam paucilla est, quæ inde obtinetur, portio. Aqua Cinnamomi substantiæ, unde destillavit, viribus præ reliquis id genus quibuscunque imprægnata est; Oleo prægnans omnino lacteum colorem habet. *Suavissimum Aroma Nervino & Stomachico scopo ad Infusa, Morsulos, Pulveres &c. recipitur. Elæosaccharum frequenti in usu est. Oleum Mixturis contractis immiscetur. Dentibus quoque cariosis Gossypio instillatum immittitur.*

CITREUM MALUM, *Medicum Malum, Limone, Limon, Citron*. Pomum ovato-oblongum, variæ magnitudinis, variæ figuræ, creberrime superne in papillam eductum, inferne calice notatum, rugosum, sub *Cortice* extus flavo, fragrante, aromatico, levissime amaro, intus coriaceo, albo, vix saporoso, qui interna substantia demta, *Flavedo* dicitur, *Pulpam* includit, in officinis *Carnem* dicunt, in plures loculos distinctam, tenuem spargentem odorem, *Succo* turgentem flavicante, varii, pro varietate fructus, saporis, *Semina* insuper con-

continentem subflavida, ovato-gibba, striata, amara, vix odora. Ad usus autem medicatos nonnisi acida recipiuntur poma. *Citrus Medica* L. *Blackwell* Tab. 361. Eadem ejus ac Aurantii patria, eadem colendi ratio est, frigoris duntaxat non perinde patiens. *Suavissimi Olei*, quod etiam *Quintam Essentiam* nominare solent, ex centum malorum Corticibus Unciam unam exprimi observatum est. In *Succo*, quem seorsum asservamus, limpido, odoro, acido, leve modo relinquitur flavedinis vestigium. *Cortices* Saccharo in condituram siccam redacti sub nomine *Citronade* per orbem divelhi solent. In Corticibus *Vires agunt Nervinæ & Stomachicæ. Infusis* adjiciuntur; *conditi* seorsum comeduntur. *Electuariis, Morsulis &c. admiscuntur, cibus* adduntur; *Pulpa Corticibus juncta condimenti loco culinæ inservit. Refrigerandi, sitim Sedandi & Antiscorbutico scopo cum aqua decoquitur. Succus ad eosdem usus Mixturis, Julapiis &c. immisceri, vel in Rotulas aut Syrupum cogi solet. Oleum voluptatis gratia extus æque ac intus usurpatur.*

CITRULLUS, *Anguria, Mellone, Melon d' eau, Wassermelon*. Poma rotunda, non raro caput humanum amplitudine excedentia, viridia, lineis nigris mox latioribus, mox angustioribus distincta, duplici pulpa referta, exteriori altera solidiore, pallida, palato minus grata, altera interiore fere diffluente, sanguinei coloris, dulcissimi saporis, sola in cibum recipienda, odoris Cucumerini; in intima pulpa nidulantur *Semina* mediocris magnitudinis, oblongo-ovata, inferne contracta & marginata, utrinque compressa, sub cortice nigro, fragili, nucleum album, inferne acutissime terminatum, inodorum, dulciculum continentia. *Cucurbita Citrullus* L. *Blackwell* Tab. 157. In Oriente, Italia Meridionali sponte crescere dicitur; *Semina* ex Astracan missa reliquis, si planta propter fructum colitur, præferuntur; apud nos nonnisi in fimetis sub campanis adolescunt; multoque difficiliter, quam Melones, ad justam maturitatem perveniunt. *Dulcissima pulpa ad Edulia Refrigeran-*

rantia refertur; Semina inter quatuor frigida majora locum tenent.

CLEMATIS, *Liene, Flammula Jovis, Llenen*. Folia aliquot pinnarum paribus pinnata, pinnæ majusculæ, petiolatæ, ovato-oblongæ, inter masticandum acrimonia quidem, sed modice linguam afficiunt; exsiccatu omnem fere acrimoniam exuunt. Clematis Recta L. In Europa Meridionali & Orientali, nec non in Asia Septentrionali habitat, nostras hyemes patientissime fert. Folia recentia; Cuti imposita Rubefacientes imo Vesicantes effectus edere jam a longo retro tempore experimenta docuerunt. Sanguinis Depurandi causa foliorum exsiccatorem semuncia cum duodecim Libris aquæ infunditur & partitis vicibus quotidie hauritur; Pulvis Ulceribus sordidis & Carni fungosæ inspersus salubritatem suam probavit expertis.

COBALTUM. Hoc nomine minime proprio passim in Pharmacopoliis prostat Minera Arsenici arida, striata, nigra. Arsenicum porosum L. haud infrequenter in montibus delitescens. Ad necandas muscas inconsulto adhibetur. Ab usu omnino arcendum.

COCCIONELLA, *Cocciniglia, Cochenille*. Insecta duas circiter lineas longa, utrinque rugosa, coloris intus punicei, extus atro-rufi, odoris vacua, saporis leniter adstringentis, nonnihil etiam nauseosi, & empyreuma resipientis. Coccus Cacti L. In regno Mexicano, Carolina & Georgia patriam sedem habet, ad Antequara Provinciæ Guaratæ urbem super variis *Opuntia* speciebus colitur; insecta, sive aqua ebulliente, sive calentibus laminis ferreis, enecata nobis mittuntur. Colore purpureo perfusa, qui Acido affuso exaltatur, Alkali profundior redditur, Coccionella Tinctoribus potissimum inservit, Urinam propellere dicitur; præcipue ad infucanda medicamenta adhibetur.

COCCOGNIDIUM nequaquam Granum Cnidium Veterum. *Semenza di Laureola, Semence de Laureole, Seidelbastsaamen*. Semina rotunda, Pisi magnitudinem fere æquant, in brevem apicem exeuntia; sub cortice fusco, fragili,

striato, nucleum oleosum, acerrimum includunt. *Daphne Mezereum* L. *Blackwell* Tab. 582. Frutex per omnem Europam præter maxime Meridionalem obvius. Horum Granorum dosim admodum exiguam primas Vias vehementer irritasse, imo excitata Inflammatione mortem intulisse referunt Experti; quocirca ab eorum usu abstinent cauti.

COCCULI. Nuces subrotundæ, magnitudine Pisi majora referentes, gryseæ, rugosæ, non raro pedunculo sustentatæ, sub Cortice tenaci nucleum reniformem, amarissimum & fervido sapore linguam afficientem includunt. *Menispermum Cocculus* L. *Blackwell* Tab. 389. Frutex in India Orientali crescens. Ad usus internos nunquam adhibentur, inescandis piscibus inserpiunt, qui inde vertigine corripiti adeo, ut aquæ supernatantes manibus capi possint, dicuntur; Pulvis locis Pediculosis inspargitur.

COCHLEARIA, *Coclearia, Herbe aux Guillerées, Læffelkraut*. Folia magnis petiolis innixa, subrotunda, cordata, angulata, facie prona, leviter depressa, odorem, nisi manibus conterantur, admodum tenuem, exsiccatione una cum sapore amittunt, relicta aliquanta amaritie. Crescit ad littora Maris; in Corsica quoque obvia, apud nos in hortis culta per totum annum recens carpi potest. Spiritus Vini quam aqua ipsi accommodatior esse, Oleumque destillatum inde obtineri dicitur. Laudatur ad aperienda Viscera Abdominalia; Antiscorbuticorum princeps habetur. Ad varios usus medicatos partim recentia folia Fusculis infunduntur, partim Succus inde exprimitur, qui etiam ad *Gingivas* fricandas adhiberi solet.

COCHLEA, *Lumaca, Limacon, Schnecke*. Ex numerosa gente inter nos recipitur *Helix Pomatia* L. cujus testa subovata est, prior anfractus reliquis multo major, decolor, umbilicata, conoidea. In Europa temperata vulgaris, nimia etiam sui frequentia nostrorum hortorum pestis, mucro privata crebro in cibum recipitur. Demulcendi, ergo ex Jure coquantur *Cochlearum* ad decem usque cum Unciis duodecim menstrui aquosi. Testæ

neque id genus neque ceteræ ullas præter Absorbentes vires habent, vel rarissime in usum trahuntur.

CODAGAPALA, *Cropal*, *Profluvii Cortex*, *Canessi Rinde*. In tubulos, aliquot lineas crassos, convolutus adduci, niger, superficie nigra Lichene tecta, saporis amari & austeri esse dicitur. Nerium Antidyfentericum L. Humilis arbor in Malabaria & Zeylona crescens. A Britannis potissimum ad sistendam Diarrhæam laudabatur, a Lichene purgatus & in Pulverem redactus ad Drachmam semis dabatur aliquoties de die. Hoc medicamento, cum plura alia ad eundem scopum facientia habeamus, carere facile possumus.

COLCHICUM, *Faule Fuden*. Radix bulbosa, subrotunda, uno latere gibba, squamis inde rejiciendis tecta, sub cuticula flava carnem albam includit, odore minus grato nares, & si verno tempore effoditur sapore acri quidem, sed nec rodente, nec inflammante linguam afficit. Colchicum Autumnale L. *Blackwell* Tab. 566. Crescit in Europa temperata. Ventriculis justo vehementius irritamentum esse, imo lethales inde effectus excitatos fuisse Observatores docent. Hodie scopo Diuretico Oxymelli immiscetur.

COLOCYNTHIS. *Coloquintida*, *Coloquint*. Pulpa cortice nudata, variæ magnitudinis, subrotunda, sicca, candida, fungosa, levis, sex loculis distincta, Semina concludens, ovata, compressa, flavicantia, modice amara, saporem habet amarissimum, acrem, odorem nauseosum. Cucumis Colocynthis L. *Blackwell* Tab. 441. In Archipelago & Oriente crescit; apud nos instar Citrullorum colenda; copiosa mucilagine turgēt. Pertinet ad validiora Draastica, gravissima Tormina inde excitata, imo ipsum Sanguinem ex vasis Intestinalibus extortum fuisse, memoriæ proditum est. Hanc virulentiam Veteres ope Mucilaginis Tragacanthæ corrigere tentarunt & Trochiscos inde, Alhandal nominatos, formarunt; sed hæc corrigendi ratio, cum effectu fere prorsus fraudarit Observatores, hodie transit hoc nomen ad Pulpam in tenerrimum pulverem redactam. Pulpa hoc modo parata interne sola datur,

sed ad pauca modo Grana Pilulis Stimuli loco adjicitur. Semina aqua probe lota Emulsionem præbere, nec amaram, nec purgantem lego. Pulpa scopo Anthelmintico Umbilico imponitur; ad tres Drachmas usque Clysmatibus irritantibus adjicitur, Extractum aquosum Pulpa multo mitius esse, ejusque ad Grana sex usque dosim augeri posse, resinofum vero valde torminosum esse; asseritur.

COLOMBO RADIX. Taleolæ pollicares, irregulariter rotundæ sive longitudinaliter sectæ; sub cortice rugoso & bruneo medullam flavicantem levissime striatam, laxiusculam concludunt, odoris fere expertes, gustu amaræ; recenter allatas Cuminum redolere lego. Ex urbe Colombo Insulæ Zeylon advehitur. Laudatur a vi Antiseptica, & Roborandi ergo in Cholera, Vomitu, Diarrhæa, Dysenteria ad Drachmam unam singulis trihoris exhibetur.

COLOPHONIUM, *Colofonia*, *Resina nigra*, *Bray sec*, *Geigenharz*. Resina solida, splendens, fusco rufescens, fragilis, fractura plana, nitente, vix odora, insipida. Est residuum a Terebinthina destillationi per se subjecta. In modum Resinæ Vulgaris in Emplastrâ recipitur, suffitus ejus Prolapsibus medetur.

COLUBRINUM LIGNUM, *Bois Couleuvrée*, *Schlangenholz*. Frusta dimidium circiter pedem crassa solida, ponderosa, alba, quadantenus etiam lutescentia, cortice tecta castaneo, rugoso, tuberculis aspero, inodora, intense amara. Strychnos Colubrina L. *Blackwell* Tab. 403. Crescit in India. Sunt, qui inde effectus Narcoticos surrexisse dicant, alii contra Febres & Vermes laudant. Anticeps medicamentum merito exsolevit.

CONCHÆ, *Conchiglie*, *Coquilles*, *Muscheln*. Sunt domunculæ Testaceorum, quæ aqua penitus ablutæ ad usus medicatos adhibentur, saporis & odoris expertes, Calcarei qualitibus instructæ; ex omni Vermium testaceorum genere desumi possunt. Apud nos vulgo a Mya Pictorum L. copiosissime fluviis inhabitante desumuntur. Earum Pulvis quippe a Crollio tanquam specificum ad Febres intermittentes enixe commendatus, SPECIFICUM AN-

TIFEBRILE Crollii cognominatur. *Præter Absorbentes nullas vires habent.*

CONSOLIDA MAJOR videatur **SYMPHYTUM**.

CONSOLIDA MEDIA videatur **BUGULA**.

CONSOLIDA MINOR videatur **BRUNELLA**.

CONSOLIDA REGALIS, *Calcatrippa*, *Pied d'Alouette*, *Rittersparlein*. Corolla pentapetala, irregularis, patens, acuta, nectario antice bifido, hispido, in calcar educto instructa, inodora, amara. *Delphinium Consolida* L. *Blackwell* Tab. 29. *Præter vires cum omnibus amaris communes, nullas proprias habet.*

CONSOLIDA SARACENICA, *Erba giudaica*, *Verge d'or*, *Heidnisch Wundkraut*. Folia ex ovatis oblonga, argute ferrata, acute terminata, leviter aspera, pallidius viridia, gusto leviter adstringentia, nonnihil amara. *Solidago Virgaurea* L. Ubique in Europa crescit. *Tam intus, quam extus Traumatico scopo assumitur; Infusum ejus vires Antinephriticas edere animadversum est.*

CONTRAJERVA. Est Radix fibrosa, plurimis fibrillis instructa, rugosa, extus fusca, intus pallida, tenui odore, sapore subadstringente, levissime aromatico instructa. *Dorstenia Contrajerva* L. *Blackwell* Tab. 578. seq. In America Australi crescit. Spiritus Vini magis quam Aqua ad ejus vires recipiendas idoneus est. *Contra morbos Malignos olim magnopere commendabatur.*

CONYZA CÆRULEA, *Blau Dürrwurzel*, *Berufkraut*. Folia lanceolata, hirsuta, integerrima utrinque villosa, acriuscula, inodora. *Erigeron Acre* L. Passim per Europam invenitur. *Olim in Germania maxime Incidendi scopo ad Infusa Pectoralia recipiebatur.*

CONYZA MEDIA, *Dürrwurzel*. Folia sagittata, cordato-ovata, levissime serrata, rugosa, tomentosa, levi odore, sapore acriusculo instructa. *Inula Dysenterica* L. Passim per Europam obvia. *Inepte olim Arnicæ substituta, interdum contra Dysenteriam dabatur.*

CONYZA VULGARIS, *Grosse Dürr-*

wurzel. Folia majora, ovato-lanceolata, paulum acuta, hirsuta, utrinque tomentosa, levissime ferrata, non admodum odora, gustu subaromatica. *Conyza squarrosa* L. *Vulgaris Europæ planta. Ob virtutem Emenagogam a quibusdam laudatur.*

COPAIBA BALSAMUM. Limpidissimum est, spissitudinem habet inter *Terebinthinam* & *Olea unguinosa mediam*, colorem pallide citrinum, odorem proprium non prorsus ingratum, saporem amarum punctim acutum & linguæ diu inhærentem. *Copaivera* L. *Brasiliæ, Cajennæ, Carthagenæ civis, ex trunco arboris fauciato Balsamum effluit. Olei odorati non colorati $\frac{1}{2}$ inde obtinui. Circa medicamenti hujus, quippe multum calidi usum internum cautissime versandum est. Abstergendi & Consolidandi causa ad Guttas decem in vehiculo saponaceo datur. Solutio ejus in Spiritu Vini Tartarifato sub titulo TINCTURÆ BALSAMI PERUVIANI ALBI prostat; multum exæstuans medicamentum.*

COPAL GUMMI. Frustra variæ magnitudinis, pugnum interdum æquant, pallide lutea, pellucida, dura, inodora insipida. Color dilutius citrinus, durities, pelluciditas, indissolubilitas in Spiritu Vini sunt indicia bonitatis. Ex regno Mexicano advehitur, origo ejus adhucdum ignoratur. Igne funditur, fusumque Oleis dissolvitur unguinosi, quibus alias nullæ sunt ipsam vires. *Oleis Rorismarini, Lavendule, Benzoës, Balsamo Capaibe, Terebinthinæ* dissolvi dicitur, nec non *Alcohole*, siquidem cum *Camphora* fuerit tritum. Dissolvitur *Alcohole*, quod sub digestionem *Tincturæ Tartari* destillat. *Unice ad Vernices adhibetur.*

CORALLIA ALBA, *Coralli bianchi, Corailles blancs, weiße Corallen*. Fragmenta prostant in officinis parva, lapidea, subinde ramosa, copiosissimis foraminibus, stellæ figuram referentibus ex sculpta, alba, insipida, inodora. *Madrepora Oculata* L. *Blackwell* Tab. 342. & 343. Magna ejus copia colligitur in Oceano Indico. *Vires præter Absorbentes nullas habet.*

CORALLIA RUBRA, *Coralli rossi*, *Corailles rouges*, *rothe Corallen*. In officinas recipiuntur fragmenta exigua, gracilia, lapidea, creberrime ramosa, integerrima, rubra, odoris æque ac saporis vacua. Isis nobilis L. Maris Mediterranei propria. *Vires cum precedentiibus pares, Roborantes nullas habet.*

CORALLINA, *Corallina*, *Mousse marine*, *Corallen oder Meermoos*. Fragmenta articulata articulis ovato-subcuneiformibus, pinnatis, duriuscula, friabilia, odore nauseoso, marino, sapore salino instructa. *Corallina officinalis* L. In Mari Anglico & Mediterraneo obtinetur. *Pulveribus Anthelminticis adjicitur.*

CORIANDRUM, *Coriandro*, *Coriander*. Semina rotunda, umbilicata, striata, cava, flavicantia; recentia Cimices redolent, exsiccata proprium & gratum odorem spirant, sapor etiam gratus est & aromaticus. *Coriandrum Sativum* L. *Blackwell* Tab. 176. Italiae & Palestinae indigenum, apud nos in agris colitur. Olei destillati $\frac{1}{4}$ fundere dicitur. Ad eliciendas ejus vires Spiritus Vini aptior quam aqua est. *Formidine mali liberrimum, cum successu scopo Carminativo usurpatur.*

CORNA. *Corniole*, *Cornouilles*, *Cornel oder wvelsche Kirschen*. Fructus umbilicati, figura Olivas referentes, magnitudine Cerasa, rubri, sub tenui cuticula carnem continent dulcem, paululum etiam adstringentem, in qua reconditum durissimum ossiculum, drupam fere æquat, duosque nucleos exiguos concludit. *Cornus Mas* L. *Blackwell* Tab. 121. Copiosa arbor in Europa temperata. *Vires ei fructibus horæis communes sunt, aliquatenus etiam Adstringentes. Rob inde paratum proflare solet.*

CORONOPUS, *Coronopo*, *Corne de Cerf*, *Krabensfus*. Folia nervo lato crenata, pinnatifida, pinnis cuneiformibus, progrediendo majoribus, jam integris, jam incis, gustu acriuscula. *Cochlearia Coronopus* L. *Blackwell* Tab. 120. Europæ haud infrequens planta. Huic potius, quam insipidæ *Plantaginis* speciei *Vires Diuretice adscribendæ sunt.*

COSTUS. Radicis Cortex aliquot pol-

lices longus, interdum etiam sesquipedalis, dimidium circiter pollicem crassus, extus flavicans, medulla laxa profundius tincta fartus, convolutus, *Violas redolens*, sapore evidenter amarus & acer. *Costus Arabicus* L. *Blackwell* Tab. 394. Crescit in utraque India. *Stomachicis, Becchicis, Diureticis adscribitur Infusum Spirituosum aquoso efficacius est.* Costi in amarum & dulcem distinctio nulla est.

CRANIUM HUMANUM. Medicamentum nonnisi anilibus fabulis & absurdissima superstitione nixum jure evuluit. Asservabantur hoc nomine *Ossa Parietalia*.

CRASSULA, *Telephium*, *Favagello*, *Orpin*, *Reprise*, *fette Henne*. Folia sessilia, ovata, obtusa, plana, crassa, dentata, glauco-viridia, subdulcia. *Sedum Telephium album* L. Passim in Europa occurrit. *Succus inde expressus Refrigerandi & Demulcendi scopo ad aliquot Uncias pro dosi datur.*

CRETA, *Creta*, *Craie*. *Kreide*. Massæ variæ magnitudinis, partim molliores, partim duriores, siticulosæ, cum Acidis effervescentes, digitos maculantes, ad ducendas lineas aptæ, igne in calcem abeuntes. *Calx Creta* L. Maximam ejus copiam Europa suppeditat, sive per strata collocatam, sive dispersam. *Ab Absorbendum intus valet; ad Exsiccandum extus Impetigini inspergitur.*

CRÉPITUS LUPI videatur **BOVISTA**.

CRITHMUM, *Erbacali*, *Bacile*, *Fenoil de Mer*, *Meerfenchel*. Folia, pinnis pinnata integris, trifidis, oblongis, crassiusculis, subacria. *Crithnum maritimum* L. Ad Maris littora crescit, apud nos in frigidario ab injuria hyemis defenditur. *Ad excitandam esuriem sub forma Acetarii comeditur; propter vires etiam Aperientes celebratur.*

CROCUS, *Saffran*. Stigmata fulva, filiformia, inferne angustata, odore proprio, forti, Cerebrum gravante, sapore aromatico, amaro instructa, aliquantum etiam tenacia. Rejiciuntur, quæ digitos pressa non polluant, levem admodum aut peregrinum odorem spirant, quæque filamentis albis aut luteis

intermixtis distincta sunt. Crocus sativus officinalis L. Crescit in Europa calida, nostræ hyemis patientissima. Passim per Europam colitur. Optimus est ab Oriente sive Austria denominatus, cui tamen Vastiniensis ne utiquam cedit; Maglianiensis in Pulverem redactus præ reliquis uberior tingit. Olei destillati paucillum fundere dicitur. Humores valide attenuat, ad remedia Becchica & Emenagoga recipitur; Putredini resistit; largius sumtus Affectus soporosos excitat. Datur ad Grana decem sub forma Pulveris in quem ut possit conteri, clibano prius exsiccandus est. Extus Resolvendi & Sopiendi causa ad Cataplasmata, Epithemata &c. recipitur. Miror de medicamento parva dosi efficaci Extractum parari.

CRUCIATA, Pettimbrosa, Croisette, gelb Kreuzkraut. Folia ovata, sessilia, acutiuscula, hirsuta, cauli tetragono, hirsuto infidentia, sapore quam minime amaricantia. Valantia Cruciatæ L. Blackwell Tab. 76. Olim ejus tam internus, quam externus contra Hernias usus erat.

CRYSTALLUS MONTANA. Prostant in officinis Fragmenta pellucida, alba, durissima, angulata, limæ vim omnem repellentia, nec aqua, nec acidis, nec igne fundenda, insipida, inodora. Nitrum Crystallus montana L. Reperitur in montibus. Omnis virtutis medicinalis expers est.

CUBEBAE. Capsulæ rotundæ, pedunculatæ, Piperi circiter figura & magnitudine assimilēs, rugosæ, granum ex rufu nigrum, intus album, odore proprio fragrans, sapore acre, aromaticum continent. Majores, nucleo ventricoso factæ, ceteris præferuntur. Planta unde colliguntur in Pharmatopœa Suecica sarmen-tosa esse dicitur & Piperis caudati nomine venit. In Asia Meridionali provenit. Exiguam quantitatem. Olei Essentialis mitis fundere dicuntur. Ratione virium mitiores, ceterum Piperi rotundo æquiparabiles sunt. Utrum Aquam an Spiritum Vini extrahantur, nihil interest.

CUCUMIS, Cocomero, Concombre, Cucumer. Fructus, antequam ad plenam maturitatem pervenerit, recipitur oblon-

gus, plus minus cylindræus, frequenter incurvus, imparibus tuberculis obfessus, colore in tempore viridis, quo vero propius ad maturitatem accedit, eo magis pro plantæ, unde desumitur, varietate vel flavescit, vel albescit. Pulpa quam maxime succosa proprio odore, dulciculo sapore prædita, Semina complectitur parva, compressa, utroque apice obtusa, alterutro tamen emarginata, sub cortice flavicante medullam albam & dulcem includentia. Cucumis Sativus L. Blackwell Tab. 4. Constanti-nopoli & Ægypto spontaneus, apud nos sub diu per plures varietates colitur; Citrullis Viribus par, præcipue sub forma Acetarii assumitur, cui scopo, qui succum inde ante exprimunt, incongrue agunt. In vi Aperiente laus ejus ponitur egregia. Fructus tenelli Aceto & Sale conditi CORNICHONS cum carne comeduntur, ex condimentis maxime dijudicandi. Semina quatuor frigidis majoribus adjiciuntur.

CUCUMIS ASININUS, Cocomero salvatico, Concombre sauvage, Eselskürbis. Radix crassa, fibrosa, alba, inodora, insigniter amara. Momordica Elaterium. L. Blackwell Tab. 108. Europæ Australis civis, in hortis nostris sponte sparsis feminibus propagatur. Medicamentum a Veteribus pro valde Draastico habitum ad Scrupulum usque datum, extus quoque Discutiendi scopo in usum tractum, nostro ævo ab usu medicato summo jure fere removetur.

CUCURBITA, Zucca, Gource, Kürbis, Pfaffenbütlein. Fructus variæ magnitudinis, subrotundus, apice depressus, tuberculis notatus, flavus, Pulpam præbet siccescentem, flavescentem, fere insipidam, Semina continentem majora, utrinque plana, ovata, margine tumido cincta, conclusus Nucleus dulcis est & albus. Cucurbita Melopepo L. Apud nos in agris colitur. Ab infima plebe in cibum recipitur. Semina quatuor frigidis majoribus adduntur.

CULILAVVAN CORTEX. Frustra lineam circiter crassa, sesquipollicem lata, plana, interdum concava, colore cinnamomeo perfusa, tenera & rugosa epidermide tecta, texturæ laxioris, odore

re fragranti, Caryophyllos referente, simili sapore, sed mitiore prædita. Laurus Culilaban L. Arbor Indiæ Orientalis. Exiguam portionem Olei limpidi, quod L. Sassafras & Caryophyllos sapit, fundere dicitur. *Medias inter Casiam ligneam & Caryophyllatam vires possidere videtur.*

CUMINUM, *Rœmischer Kümmel*. Hodiernum evidenter ab eo, quo Veteres utebantur, differt. Semina majuscula, ovato-oblonga, striata, ex gryseo-flavescentia, odore & sapore aromatica, non admodum grata. Cuminum Cuminum L. Ægypti & Palæstinæ indigenum, in Sicilia & Melito colitur. Olei odorati $\frac{1}{3}$ largiri dicitur. *Rarius intus scopo Carminativo datur; Extus ad Discutiendum sub forma Epithematis adhibetur.*

CUPRESSUS, *Cipresso, Cyprès*. Lignum sub cortice ferrugineo ex albo flavicat, absque ullo odore, saporem levissimum habet; *Folia sunt pinnata pinnis imbricatis, virida, gustu adstringentia, odoratu resinosa; Nuces, Veteribus Galbuli, sunt Coni subrotundi, dimissis seminibus, ex squamis constantes clavos referentibus, uni communi axi affixis, superne gryseis, inferne rufis sapore sunt adstringentes, nec non aliquatenus resinosi & salini. Cupressus sempervirens L. Græciæ & Asiæ indigena arbor, nostræ hyemis patiens est. Omnes Cupressi partes, & præceteris Nuces, vires Adstringentes habent; hæ ad Drachmam dimidiam intus olim dabantur.*

CUPRUM, *Æs, Rame, Cuivre, Kupfer*. Metallum rubrum, odore proprio, sapore nauseoso instructum, post Ferrum difficillime funditur & fluens pulcherrimis micat coloribus, tardius exurit, quam cetera, quæ ignobilia dicuntur, metalla, mediæ inter Aurum & Ferrum firmitatis, malleabilitate Argento superpar, novies fere aqua gravius est. Sive Nativum, sive sub forma variarum Minerarum Natura subministrat; menstruis quibuscumque solubile, aëre in viridem calcem vertitur: *Tam extus quam intus effectus Rodentes edit, quapropter ab usu ejus medicato usquequaque abstinendum, quin &*

instrumenta inde parata, cum fere nunquam satis cautus eorum sit usus, a culinis æque ac pharmacopoliis, me quidem judice, tutius prohibentur.

CURCUMA, *Terra merita*. Radix tuberosa, geniculata geniculis cylindræis vel subrotundis, rugosis, extus pallidioribus, intus splendentibus, rufo-croceis, odoris levissimi, saporis aromatici. Curcuma longa L. *Blackwell* Tab. 396. Crescit & colitur in omni Indiâ aquosa; apud nos semper in vaporario asservanda. Olei odorati aliquantulum fundere dicitur. *Primas vias Roborat, Obstructiones Abdominales tollit. Datur ad Scrupulos duos sub forma Pulveris, ad Drachmas duas cum aqua infusa.*

CUSCUTA, *Epithimum, Epitimo, Flachsseide, Goutte de lin*. Filamenta longa, tenerrima, multis tuberculis obsessa, sapore vix dum acriusculo prædita. Cuscuta Europæa L. Parasitica planta, variis Vegetabilibus, apud nos præcipue *Euphorbiis*, innascitur. *Olim Purgantibus adscripta hodie usu fere destituta.*

CYANUS, *Fioraliso, Bluet, Kornblume*. Flores asservantur e calyce evulsi, tubulosi, profunde quinquefidi & ultra, cærulei, inodori, inspidi quidem, aquam vero, qua cum infunduntur, amaram reddentes. Centaurea Cyanus L. *Blackwell* Tab. 270. Crescit per totam Europam. *Olim Resolvente & Diuretico scopo ad Infusiones adhibebantur. Aqua inde destillata utique iners ad Collyria recipitur.*

CYCLAMEN, *Artanita, Pan porcino, Pain de pourceau, Schweinbrod*. Radix tuberosa, leviter depressa, subrotunda, forinsecus nigricans, intus candida, inodora, sapore recens quidem acris, subacerba, exsiccata vero fere penitus insipida est. Cyclamen Europæum L. *Blackwell* Tab. 147. Europæ Orientalis & Meridionalis solum natale habet, nostras hyemes innoxias experitur. *Viribus Purgans vulgo habetur, olim ad Drachmam unam sub forma Pulveris, ad Unciam semis in Infuso exhibebatur.*

CYDONIA, *Cotogni, Coinges, Quitten*. Poma variæ magnitudinis, qua rotunda a *Malis*, qua turbinata a *Pyris* denomi-

nata, umbilico eminenter angulato insignita, epidermide aurea, tomento obfessa, carnem complectuntur firmam, lutescentem, quinquelocularem, fragrantem, evidentè adstringentem, acidam, *Semina* continentem ovata, mucò obducta, corticis spadicei, medullæ albæ, saporis fatui. *Pyrus Cydonia* L. *Blackwell* Tab. 137. Arbor ex Creta in Italiam advena, passim in Europa & sponte & cultura provenit. Pomum recens nimis acerbum varia ratione conditur Saccharo, in taleolas dissectum & exsiccatum mitescit & ad Decocta adhibetur; *Roborantes & Adstringentes vires edit. Semina in aqua contusa in Mucilaginem formantur, quæ intus quidem ad Os, Fauces, Ventriculum &c. Refrigerandi & Demulcendi ergo extus vero ad Ambusta, Fissuras; Ophthalmiam sanandam conducit. Drachma una Seminum, sex aquæ Uncias ad consistentiam Mucilaginis expisset,*

CYMBALARIA, *Linaria delle Montagne, Linairé des Montagnes, Cymbelkraut.* Folia reniformia, longius petiolata, succulenta, superne atro-viridia, inferne interdum purpurascens, inodora, levissime falsa. *Antirrhinum Cymbalaria* L. Vulgatissima per Europam temperatam planta. *In Aperiendo vis ejus hinc & inde laudatur, tam cum Jusculis recens coquitur, quam Succus ejus expressus exhibetur.*

CYNOGLOSSUM, *Cinoglossa, Langue de Chien, Hundszunge.* Radix oblonga, crassiuscula, extus ex atro-rubens, intus alba, odoris, recens minus grati, exsiccata prorsus vacua, gustu fatua. Folia sunt oblonga, acuminata, utrinque alba, nec odora, nec sapida. *Cynoglossum officinale* L. *Blanckwell* Tab. 249. Crescit, qua late patet Europa. *Planta ab omni retro tempore innoxia habita, superiori demum seculo, incerta observationum auctoritate in suspicionem adducta, experientia tandem magnorum Virorum noxæ omnino exempta est. A vi Relaxante laudatur, hodie rarius usurpatur.*

CYNOSBOTOS, *Cini, Gratte-cul, Hagenbutte, Butte.* Fructus ovalis, coronatus calycis laciniis, lævis, nitidus, ruber, intus flavescens, tenui odore, sa-

pore grato paulum vinoso instructus, Semina subovata, pilis rigidiusculis inhærentia continet; asservatur in longitudinem dissectus, a pilis æque ac semine penitus purgatus. *Rosa Canina* L. *Blackwell* Tab. 8. Non modo per totam Europam, sed etiam in Asia & America ostenditur *Comeduntur hi fructus in Rob redacti, adhibentur cum aqua decocti, Scopu Roborandi & Urinam pellendi.*

CYNOSBATI FUNGUS, *Bedeguar, Schafkuntz.* Est excrementa Rosæ fruticis, quæ variam magnitudinem habet, subrotunda, rubra, spongiosa, fibrispulchre & varie flexis cincta, intus cava, odoris nullius, saporis leniter adstringentis; formatur a Cynipe Rosæ L. *Adstringentes vires habere dicitur, alias etiam Vulgus ipsi affingit.*

CYPERUS LONGUS, *Cipero longo, Souchet long.* Radix duriuscula calamo anserino crassior, geniculata, circulis & nodulis notata, extus rufa, intus pellucidior, suaviter odora, gustu aromatica. *Cyperus longus* L. Galliæ Meridionalis & Italiæ civis, nostras hyemes fert. *Propter vim Roborantem & Diureticam olim celebrabatur.*

CYPERUS ROTUNDUS, *Cipero ro-rotondo, Souchet rond.* Radices tuberosæ, ovata, Olivarum magnitudinis, extus pallide rufæ, odorem præcedentibus debiliorem, saporem aromaticum eminentiorem habet. *Cyperus rotundus* L. Crescit in India, Syria, Ægypto. Hanc præcipue Veteres in usum trahebant; *Eadem ipsi, ac præcedenti adscribuntur vires.*

DACLTYTI, *Datteri, Dattes, Datteln.* Fructus cylindroides, pollicares, superne pulvinati, umbilico cartilagineo notati, rufi, rugosi; Pulpa cuticula tenerima obducta, viscidula, ex rufo-flavescentis, sapore dulcissima, lenissime etiã adstringens est; sub tunica alba, splendente, ex pluribus lamellis constante, officulum absconditum est convexo-planum, oblongum, albidum, in facie plana sulco notatum, intus plumbeo-violaceum, adstringens. Rejiciuntur Dactyli profundius sulcati, albi, mol-

molliores, nec non aridi, flaccidi, quique concussu sonant. Phoenix Dactilifera L. *Blackwell* Tab. 202. In Asia, Africa & America sponte, in Hispania, Lusitania & Italia Meridionali cultura crescit; fructus in his regionibus etiam ematurefcunt, Orientalibus autem utique postponuntur; apud nos semper in caldario asservari debet. *Mensis secundis apponi solent; Decoctis Pectoralibus adjiciuntur, ceterorum Demulcentium relaxationis nimix temperamentum.*

DAUCUS CRETICUS, Semina cylindracea, villosa, aliquantulum odora, sapore aromatica. Athamanta Cretenfis L. *Blackwell* Tab. 471. Helvetiæ, Galliæ Meridionalis, Austriæ progenies. Aliquantum Olei odorati fundere dicitur. *Recipitur ad Infusa Carminativa & Diuretica.*

DAUCUS VULGARIS, Carota, Carottes, Vogelneft, Mæhren, gelbe Ruben. Radices fusiformes, pro hortensi, unde desumuntur, varietate luteæ, albæ, rubræ, proprium aromaticum odorem, saporem habent admodum dulcem. Semina ovalia, convexo-plana, altera facie striis pilisque rigidis obsessa, aromatiçi saporis sunt, aliquantum etiam amari. Daucus Carota L. Crescit quæ patet Europa. Copiose in hortis colitur. Radices a varietate fativa, Semina a Sylvestri desumuntur. Radices tanquam olus, in culinas recipiuntur, recentes rasas vel cum aqua in Cataplasma coctas, egregie contra Ulcera Cancrosa facere Recentiorum Observationes adstruunt. *Seminum vis medica cum præcedentibus equiparatur.*

DENTALIA. Sunt Conchylia profundius striata, quæ canales cylindroides referunt, alba, insipida, inodora, utrinque aperta, leviter arcuata. Dentalium Elephantinum L. In Oceano Indico & Europeo occurrit. *Intus Adstringendi, extus Exsiccandi ergo olim adhibebantur.*

DENTARIA MAJOR, Schuppenwurzel. Est Radix longa, squamis sibi invicem incumbentibus efformata, ferruginæ. Lathræa squamaria L. *Blackwell* Tab. 130. Vix ultra Alsatiam in regio-

nes calidiores ascendit. *A paucis & quidem sine ulla observatione contra Epilepsiam est laudata.*

DENTARIA MINOR, Zahnwurzel. Radix cylindroidea, ad angulos rectos ramosa, alba, e squamis geniculata, saporis acris, minus grati. Dentaria Pentaphylla L. In altioribus montibus Europæ temperatæ occurrit. *Pulverata tanquam Roborans, ad Vulnera interna & Hernias sanandas dabatur, non admodum, ut mihi quidem videtur, congruenter.*

DENTELLARIA, Bleywurzel. Radix cylindracea, ramosa, saporis fervidi. Folia lanceolata, amplexicaulia, scabra, acerrima. Plumbago Europæa L. Crescit in Europa calida. *Apopplegmatis ergo quidam Radicibus in locum Radicis Pyrethri usi sunt. Folia Cutim exulcerare observata sunt. Oleo cum eis infuso partes Cancrosas extirpatas esse, lego.*

DICTAMNUS ALBUS. Radices albæ, oblongæ, fere calamum crassæ, intus spongiosi quid, odorem nullum habent; aquam, cum qua infunduntur, amaram reddunt. Dictamnus albus L. *Blackwell* Tab. 75. Europæ temperatæ civis; *Pulveris Drachma semis Anthelmintico & Emenagogo scopo commendatur.*

DICTAMNUS CRETICUS. Folia orbiculata, utrimque multo tomento obsessa, odorem jam in recentibus levem, saporem aromaticum, neque vero acrem habent. Origanum Dictamnus L. *Blackwell* Tab. 462. Suffrutex Europæ magis Meridionali proprius, hyeme apud nos in frigidario asservatur. Oleum destillatum fundere dicitur. *Maxime ad morbos Uterinos olim commendabatur.*

DIGITALIS, Doitier, Fingerbut. Folia ovato-oblonga, rugosa, crenata, leniter pubescentia, amara cum levi acrimonia. Digitalis purpurea L. *Blackwell* Tab. 16. Crescit in Europa temperata, non ultra Hassiam videtur ascendere. *Emetica est & Hydropicis laudatur. Foliorum recentium Unciæ quatuor in triginta & duabus Unciis aquæ ad sedecim residuas Unciæ coquantur & Decocti aliquot Cochlearia exhibentur. Butyro recepta contra Scrophulas extus adhibetur.*

DIPSACUS, *Carolo*, *Chardon à Foulon*, *Karten* oder *Bubendistel*. Radix fibrosa, alba, valde amara. *Dipsacus Fullonum* L. *Blackwell* Tab. 50. Crescit in Europa temperata. *Nonnullos eam contra Obstructiones Abdominales Decoctis admiscuisse lego.*

DORONICUM, *Gemsenwurzel*. Radicis tuberosa, articulata, articuli prostant, rotundi, in angustum finem terminati, extus flavicantes, intus albi, inodori, sapore dulciusculi, subaromatici. *Doronicum Pardalianches* L. *Blackwell* Tab. 239. Altiorum montium civis. *Nec venenata esse, nec proprias vires medicatas habere observata est.*

DRACONIS SANGUIS. Resina, quæ in variæ magnitudinis massis ad nos pervehitur, nigro-rubicunda, moleculis, quandoque splendidis distincta, fragilis, fractura mox nitida, mox contra; quæ ad nos perveniunt massulæ foliis arundinaceis obvoluta, plurimam partem concatenatæ, nec non majores etiam solitariæ exquisiti coloris melioris notæ esse judicantur; prostant vero etiam, quanquam rarius frustra Cinnabarino colore conspicua. Varium Arborum genus hanc resinam largitur, illa obducti sunt Calami Rotang L. Indiæ Orientalis fruticis fructus; exsudat ex truncis Dracænæ Draconis L. *Blackwell* Tab. 358. cum priori contreraneæ & Pterocarpi Draconis L. Americæ Meridionalis civis. Sanguis Draconis nulum odorem spirat, sapor levissime resinosis est; flamma quam concipit, non ingratum fumum emittit; liquationem admittit. *Ab Adstringente virtute laudatur. Adhibetur ad Dentifricia.*

DRACUNCULUS, *Serpentaria*, *Estragon*, *Dragun*, *Kaysersalat*. Folia integerima, angusta, lanceolata, atro-viridia, odoratu pergrata, gustu aromatica, leniter linguam pungentia. *Artemisia Dracunculus* L. *Blackwell* Tab. 116. Asiæ Septentrionalis civis, apud nos copiose in hortis colitur. *Tam in Palati gratiam, quam ad juvandam Digestionem Embummatibus & Acetariis adjicitur. Multo in usu est Acetum cum his foliis infusum.*

DULCAMARA videatur **AMARA DULCIS**.

EBENUM LIGNUM. Est ponderosum, nigrum, splendens, saporis acriusculi. Ex India advehitur, ex medullio trunci desumi dicitur Arboris cujus character nos adhucdum latet. *Usus præcipuus Mechanicus est. Vires Ligni Guajaci olim ei tribuebantur.*

EBULUS, *Ebulo*, *Teble*, *Attich*. Radix est alba, fibrosa, amaricans, nauseosa. *Folia magna, pinnata cum impari, ferrata, minus grate odora, amara, nauseosa, Flores assumuntur corymbis insidentes pentapetali; odor eorum Floribus Sambuci finitimus, sed minus gratus est; Baccæ rotundæ sunt, umbilicatæ, saporis dulciusculi, nonnihil amaricantis. Sambucus Ebulus* L. *Blackwell* Tab. 488. Crescit per totam Europam. *Radicibus vix Emetica & Hydragoga a quibusdam tribuitur. Unciæ duæ pro dosi aqua infunduntur, sive Succo inde expressi Unciæ una exhibetur. Folia OEdematibus aut Erysipelati imponuntur. Floribus his Sambuci flores præferuntur, ex Baccis ROB paratur, quod scopo Resolvendi, Sudorem aut Urinam pellendi ad Unciam semis exhibetur.*

EBUR, *Avorio*, *Ivoire*, *Elffenbein*. Dentes lanarii, variæ magnitudinis, quinque pedes & ultra longi, albissimi, senio lutescentes, resini, basi latissimi & cavitate conoidea non raro pedali excavati & striati. *Elephas maximus* L. *Africam & Asiam Meridionalem inhabitat. Rasura frustulis mollioribus & Cornu Cervi albidioribus efformatur, $\frac{1}{2}$ Gelatinæ siccæ largitur, ut plurimum Rasuræ Cornu Cervi adjicitur ad augendam Gelatinæ albedinem. Ebur ustum, quod perperam Spodium dicitur, album quidem vires Cornu Cervi usti exserit; nigrum vero artibus Mechanicis materiam subministrat.*

EBUR FOSSILE L. improprie *Unicornu fossile*, *Zoolithus Ebur fossile* L. Occurrunt non raro integri dentes, plerumque eorum frusta majora vel minora, ut plurimum extus nigro aut gryseo cortice obducta, substantia fragili, albissima, cum Acidis effervescente effor-

formata, in quam Os aëre, aqua &c. fuit redactum. *Cum Ebore isto collatum nihil proprii habet.*

ELATINE, *Elatina; Velvotte, Ebrenpreisweiblein.* Folia brevissime petiolata, orbiculata, ovata, acutiuscula, pubescentia, subadstringentia, amarican-tia. Antirrhinum spurium L. Crescit in Europa temperata. *Succus inde expressus Ulceribus sordidis & cancrrosis salubris perhibetur.*

ELEMI GUMMI. Resina quæ in magnis frustis flavis, suffuso vestigio viro-ris, inter digitos lentescens, odore proprio ad Fœniculum accedente, sa-pore amaricante instructis ad nos trans-vehitur; præter sicciorem foliis arundi-naceis involutam, qualis vulgo affere-batur, prostat & mollior, quæ in cistis missa hodie priori præferri solet. Amy-ris Elemifera L. Americæ Meridionalis Arbor. Igne liquefit. Oleis ejus ali-quantula tantum pars dissolvitur. $\frac{1}{4}$ Olei odorati fundere dicitur. *Adhibetur ad consolidanda Vulnera.*

ENTALIA. Couchylia recta, lævia, penitus cava, utrinque pervia, albissi-ma. Dentalium Entalis L. Eandem cum Dentaliis patriam habent & ad eosdem scopos adhibentur.

ENDIVIA, *Indivia, Intybus, Scariola, Chicorée, Endivien.* Folia inferne angu-stata, pro varietatum discrimine mox lata & sinuata, mox angusta, laciniis acutis laciniata, lacteo succo turgent, amara; *Semina cylindracea flavicant, angulis quatuor eminentibus notata, paucissimam medullam levissime sali-nam includunt. Cichorium Endivia L. Blackwell Tab. 378. In Palæstina sponte crescere dicitur, copiose apud nos in hortis colitur. Vires Cichorii exæquat. Fo-lia, cum sint succosiora, efficaciora etiam esse videntur; colligata aut terra tecta cum vi-röre amaritiam deponunt & in usus calina-res recipiuntur. Seminum, quatuor frigidis minoribus adscriptorum, usus abolevit.*

ENULA, *Helenium, Enula, Aunée, Alant.* Radix crassa, multifida, extus fusca, exsiccata grysea, intus alba, odore haud ingrata, sapore acris, ama-

ricans. *Inula Helenium L. Blackwell Tab. 437. Crescit in Europa tempera-ta. Pauxillum Olei odorati spissi funde-re dicitur. Humores attenuat, Solida ad Excretionem stimulat. Datur cum Aqua in-fusa. Extus contra Scabiem laudatur.*

EPITHYMIUM videatur CUSCUTA.

EQUISETUM, *Coda cavallina, Prêle, Queue de Cheval, Katzenwadel.* Cauli-culi virides, nodis distincti, ex quibus prodeunt setæ prælongæ, fragiles, me-diocriter adstringentes & leviter salini. *Equisetum arvense L. Blackwell Tab. 217. Crescit per totam Europam. Viri-bus Adstringendi & Urinam pellendi præ-dita olim credebatur.*

ERICA, *Erica, Bruyere, Heide. Can-liculi dense obsiti Foliolis sagittatis, cras-siusculis, subulatis, late viridibus, & Floribus alaribus, quadrifidis, partim rubris, partim albis, sapore evidenter adstringente. Erica vulgaris L. Obtinet per totam Europam. Cum aqua infusæ quidam Calculi conterendi propellendique vir-tutem tribuerunt.*

ERINACEUS, *Riccio, Herison, Igel.* Animal quadrupes, toto corpore, præ-ter ventrem pilosum pedesque, aculeis ex fusco & albedo variegatis obsessum. *Erinaceus Europæus L. Totam Europam, citra maxime Septentrionalem inhabi-tat. Combustus satis absurde lectum com-mingentibus exhibetur.*

ERUCA, *Ruchetta, Roquette, weisser Senf.* Semina minuta, rotunda, leviter flavicantia, proprio odore, acriore sa-pore instructa. *Sinapi alba L. In Italia, Gallia, Anglia & Belgio sponte crescit, Seminis Sinapeos vim exferit, sed mitiorem.*

ERYNGIUM, *Eringe, Chardon roland, Mannstreu.* Radix fibrosa, pollicem cir-citer crassa, extus nigra, intus alba, striis transversalibus notata, dulcicula. *Eryngium Campestre L. Blackwell Tab. 297. Crescit in omni Europa. In vasa Renalia & Spermatica agere creditur; quinque Aperientibus minoribus adscri-bitur. Saccharo quoque condita prostat. Maritimi L. ad littora Maris crescentis & nostrorum hyemum patientis Radices cum præcedentibus conveniunt.*

ERYSIMUM, *Erisamo, Velar, Wegsens.* Folia longa, laciniato-pinnata, lacinia terminali majore trifida, omnibus dentatis, scabra, odoris expers, sapore nasturtino non acri instructa. Erysimum Officinale L. *Blackwell* Tab. 28. Frequens Europæ planta. *Sub forma Infusi Aquosi sumtum viarum Aërearum Mucum dissolvere credebatur.*

ESULA, *Wolfsmilch.* Radices fusiformes, albæ; Folia pro varietate Specierum varie formata; Succum lacti colore & spissitudine similem vehunt acerrimum; Euphorbiæ L. species nonnisi ab Empyricis adhibentur; noxas eas ingessisse gravissimas Observatores fide digni adstruunt; a medicamento sane quam acerrimo, primas vias facillime inflammatorio prorsus abstinendum est. Radices & Folia exsiccata ad Grana quadraginta sine incommodo dari posse, nuper traditum est.

EUPATORIUM, *Eupatorio, Eupatoire, Kunigundenkraut.* Folia, cum Floribus recipi solita, oblonga sunt, acuminata, dentata, ferrata, odora, amara, Flores tubulosi, rufescentes, parvi, Semini papposo insident. Eupatorium Cannabinum L. *Blackwell* Tab. 110. Crescit per totam Europam. Viscera aperire & Urinam ducere dicitur. Sumitur ejus Infusum aquosum. Extus partibus OEdematosis imponitur.

EUPHORBIIUM. Gummi Resina formam refert granorum variæ magnitudinis, subrotundorum, angularium, rufo-flavescentium, sapore acerrimorum; hæc grana accensa non ingratum odorem spargunt. Est lacruma Euphorbiæ Officinarum L. *Blackwell* Tab. 340. Africæ civis; apud nos per hyemem in caldario asservandæ. Gummosum & Resinosum principium æquabiliter vehere & in Resinoso maxime virulentia hæere dicitur. Cum gravissima mala inde excitata fuisse Observatores testentur, nunquam intus dandum, licet a quibusdam ad Granorum trium dosin commendetur. Extus cum successu Ossibus cariosis inspergitur; Rubefacientibus aut Sternutatoriis inconsulto adjicitur.

EUPHRASIA, *Eufraise, Augentrost.* Asservantur Cauliculi pubescentes, amaricantes, subadstringentes, obfessi, Foliis ovatis, obtusis, ferratis, dentatis, viridibus, rugosis; Floribus axillaribus, personatis, albis, ex luteo & cæruleo variegatis. Euphrasia Officinalis L. *Blackwell* Tab. 427. Vulgaris per Europam. Infusum aquosum ad reserandas Obstructiones Abdominales laudatur. Cum Musto fermentata aut Pani incocta, aut Succus ejus expressus, Oculis instillatus, multum olim ad roborandum Visum commendabatur.

FABA, *Fava, Fève des Marais, velfche Bohne, Saubohne.* Flores papilionacei, vexillo longiore, albo striis rubris picto, alis macula nigra notatis instructi, odorem recentes fortem spirant, eumque suavissimum, exsiccati nullum. Semina pro Varietatis diversitate diversæ magnitudinis, reniformia, ovata, jam utrinque compressa, jam ventricosa, alba, flava, gilva, medullam albam includunt subdulcem. Vicia Faba L. *Blackwell* Tab. 19. Ægypti indigena, apud nos copiosissime in agris feritur. Cortice privata Semina tenella frequentius, quam matura & exsiccata, mensis apponuntur; Farina, in quatuor Farinarum Resolventium numero hadita, ad Epithemata necnon ad usus Cosmeticos recipitur. Flores exsiccati omnino inertes sunt, perinde ac Aqua inde destillata.

FABA CRASSA, *Sempreviva salvatica, Telephium, Orpin, fette Henne.* Folia carnosa, sessilia, plana, ovata, irregulariter ferrata, inodora, insipida. Sedum Telephium album L. Admodum frequens Europæ planta. Nonnisi recens adhibenda. Tanquam refrigerans & Antiscorbuticum remedium intus datur; extus Clavis pedum imponitur.

FABA SANCTI IGNATII. Semen Avellana majus, angulatum, durissimum quasi corneum, extus gryseum, intus splendens, amarissimum. Pharmacopœa Suecica ut & Celeb. Bergius, nescio qua auctoritate nixi, a quadam Strychni specie, Insularum Philippinarum Arbore, Semen hoc suppeditari asserunt. In Febris intermittentibus ad

Grana duodecim pro dosi data laudatur, interim tamen Vomitus, Convulsiones, Tremores inde excitatos esse observatum est, quapropter ejus exsolevit usus.

FAGOPYRUM, *Saggina, Bled noir ou Sarrafin, Buchweizen, Heidenkorn. Semina ovata, trigona, glabra, sub cortice trigono, albissimam & insipidam farinam includentia, Polygonum Fagopyrum L. Orientis indigenum, hodie passim in Europa colitur. Hordei loco in cibum recipitur; apud nos epulis excluditur, a quibusdam saginandis avibus adhibetur.*

FAGUS, *Faggio, Hêtre, Buchen. Fructus sub tegmine echinato Nuces includit, ex rotundo triquetras, quæ sub cortice badio coriaceo nucleum album compactum, cum aliquanta adstrictione dulcem includunt. Fagus Castanea L. Per Europam, præter maxime Septentrionalem, frequentissima arbor. Nuces interdum in cibum recipiuntur, at largius comestas Cerebrum turbare, imo Hydrophobiam excitare, sunt qui affirmant. Oleum inde expressum in cibum recipitur, annotinum minus quam recens Ventriculum gravare perhibetur.*

FARFARA, *Farfaro, Tussilago, Pas d'ane, Roshub. Radices tenues, fibrosæ, albidæ, inodoræ; Folia subrotundo-cordata, magna, petiolata, angulata, dentata, superne viridia, inferne tomentosa, saporis leviter adstringentis; Flores tubulosi, lutei, calice multifido comprehensi, leviter odori, subdulces. Tussilago Farfara L. Blackwell Tab. 204. Ubique in Europa invenitur. A vi Emolliente & Relaxante laudatur. Radices variis, Flores creberrime ad Infusa Pectoralia recipiuntur. Folia a quibusdam eodem modo usurpantur, interdum quoque extus applicantur.*

FEL VITRI, *Fiele del Vetro, Anatron, Fiel de Verre, Glasgall. Panes seu massæ sunt coloris albi aut grysei & saporis salini; insignis earum durities est; in aëre humescunt, Syrupum Violarum viridi colore tingunt, fusionem Metallosum & Terrarum juvant. Formantur ex spuma quæ apud Vitriarios Frittæ fluenti supernatat & inde aufertur; con-*

stant ex Sale Alkali & Terra vitrescente, aliisque præterea, quæ ad Frittam recipi solent, Salibus: unde patet, pro varia Officina vitraria, unde desumitur omnino diversum esse. Incidendi quidem & Alvum ducendi causa a quibusdam laudabatur; sed quis est, qui medicamento tam dubio uti velit?

FERRUM, *Ferro, Fer, Eisen. Metallum ignobile, aqua octuplo gravius, reliquis difficilius fundendum, magis etiam elasticum, mediæ inter Aurum & Cuprum firmitatis, scite cusum malleabile evadit & in tenerrima fila extendi potest, ignitum scintillas vomit & in scoriam nigram abit, ope Salis cujusunque, ipsius etiam Aquæ solubile, quapropter in aëre rubiginem contrahit, attrahitur a Magnete, cum liquoribus adstringentibus nigrescit, majori principii inflammabilis ratione ditatum in Calybem vertitur. Uberius, quam cetera omnia metalla, Natura hoc sub forma diversissimarum glebarum progignit Tonicorum Princeps; ejus Limatura, ope Magnetis ab omni heterogeneo accuratissime segregata, sub forma Alcoholis ad Grana viginti usque exhibetur; cum Vino quoque infunditur.*

FILIPENDULA, *Saxifraga rubra, rother Steinbrech. Radix fibrosa, plures fibrillas emittens, quarum extremitatibus noduli sive tubera adhærescunt ovata, magnitudine imparia, ex rubro nigra, intus alba, odoratu grata, gustu leviter aromatica & amaricantia; Autumno effodienda est. Spiræa Filipendula L. Blackwell Tab. 467. Crescit in Europa. Recipiebatur ad Decocta Roborantia & Diuretica.*

FILIX, *Felce, Fougere, Farren. Radices fibrosæ, crassæ, flavæ, amaricantes, mucosæ, nauscosæ. Pteris Aquilina L. Blackwell Tab. 325. Copiosa per Europam. Ab omni tempore tanquam egregium Tæniæ remedium laudatæ; Drachmæ earum tres vel quatuor cum Melle dabantur. Non raro recipiuntur Radices Polypodii Filicis Maris L. Blackwell Tab. 323. quæ fibrosæ sunt extus nigra, intus rufa, sapore adstringentes.*

FOENICULUM, *Finocchio Fenouil*, *Fenchel*. Radix fusiformis, alba, cum aromate dulcis, odorem spargit proprium, fragrantem. Folia longa, multiplicato-pinnata, laciniis filiformibus, odore & sapore Seminum, debiliora duntaxat. Semina oblonga, convexo-plana, striata, odoratu fragrantia, gustu aromatica, dulcicula. Anethum Foeniculum L. *Blackwell* Tab. 288. In Europa calida nec non in Anglia sponte crescit. Copiose in nostris regionibus colitur. Semina Olei odorati, quod in aere temperato coagulat, $\frac{1}{2}$ largiuntur. Radices ad Infusa Diuretica recipiuntur. Folia ad usus culinarios multo frequentius, quam ad medicatos recipiuntur. Semina intus scopo Carminativo, in Decoctis potissimum, variis sub forma Pulveris exhibentur. Extus Discutiendi causa Oculis applicantur. Eisdem in fines Aqua destillata efficax ad Potiones Pectorales recipitur.

FOENICULUM DULCE, *Italicum*. Semina prioribus majora & crassiora, omnino dulciora, albida. Planta, unde desumuntur, Varietas prioris esse dicitur; sed in nostro horto constanter habitum minorem servat, & Semina, qualia dixi, producit. Præcedenti cum suavitate multo antecellat, merito præferendum videtur.

FOENUGRÆCUM. Semina oblonga, irregulariter quadrata, glabra, flava, sulco obliquo in margine notata, odoris nauseosi, saporis amari. Trigonnella Foenugræcum L. *Blackwell* Tab. 384. Gallix Meridionalis domestica planta apud nos copiose in agris colitur. Mucilaginis fere $\frac{1}{2}$ vehit. Internus ejus usus nullus est, extus tanquam Resolvens & Maturans ad Epithemata & Cataplasmata recipitur.

FORMICA, *Formica*, *Fourmi*, *Ameise*. Insectum parvum, oblongum, fenipes, totum exiguis pilis obsessum, acidulum odorem spirat, cui fere sapor respondet; ejus larva cylindroidea, alba, vulgo Ovum dicitur. Formica rufa L. reliquis præstantior, in Europæ sylvis frequentissime occurrit. Oleum tam unguinosum, quam odoratum inde obti-

netur. Acervi Formicarum sive sub forma Epithematis, sive ex Aqua cocti ad Irritandum membris Paralyticis admoventur; Spiritus Vini a Formicis abstractus Rheumatismis applicatur.

FRAGARIA, *Fragole*, *Fraisier*, *Erdbeerenkraut*. Radices tenues, repentes, plures fibrillas capillares emittentes, sub cortice fusco-rufescente substantiam albam includunt, evidenter adstringentes. Folia longius petiolata, ternata, ex ovatis oblonga, ferrata, hirsuta, adstringentia. Bacca, *Fraises*, *Erdbeeren* sive ovata, sive ovato-rotunda, diversæ pro Varietate, unde desumuntur, magnitudinis, coloris inox albi, inox rubri & in rubro rursus varii; sunt receptacula carnosæ, extus tota foveolis exsculpta, singulatim semen continentibus, intus albida, odorem proprium, gratum, saporem dulcem habent ac vinosum. Fragaria vesca L. *Blackwell* Tab. 77. Vulgaris per Europam, Americæ quoque Indigena. Chiliensis quoque nostras hyemes citra noxam fert. Aquam Radices rubedine, Folia quoque, sed levius inficiunt. Aperiendi & Adstringendi scopo utraque cum Aqua infusa aut decocta adhibentur; Folia Ulceribus Pedum salubriter applicari experimentis compertum est. Fraga ad Refrigerandum, Viscera abdominalia aperienda, Renes depurandos comeduntur. Aqua inde destillata & sapida & odora evadit.

FRANGULA, *Bourgène*, *Zapfenholz*, *Faulbaum*. Cortices mediani, sive libri tenaces, flavicantes, leviter austeri, aliquantillum etiam amari. Rhamnus Frangula L. *Blackwell* Tab. 152. In Europa ubique locorum obvia. Cortices recentes ad duas Drachmas cum aqua Infusi Vomitus & Seccessus Alvinos excitare dicuntur; exsiccatorum laus in Resolvendo & ducenda Urina ponitur; accipiuntur quoque ad Balnea & Unguenta contra Scabiem.

FRAXINUS, *Frassino*, *Frêne*, *Eschbenbaum*. Cortex grysei, cum fusco mixti coloris, punctis conspersus pallidioribus, amarus, subadstringens. Semen, quod etiam *Lingua Avis* dicitur, oblongum est, compressum, fuscum, tenax,

cortice obvolutum longiore, sicco, dilutius fusco; progrediendo dilatato & obtuse terminato; sapor nonnihil acris adstringit. Fraxinus excelsior L. *Blackwell Tab. 328.* Obtinet in omni Europa. Cortices sunt, qui ad Viscera Abdominalia aperienda & Sanguinem depurandum commendent. Semen olim Diureticis, Lithontripticis, Aphrodisiacis annumerabatur.

FULIGO, *Fuliggine, Suie, Rus.* Substantia sicca, nigra, ex substantiis vegetabilibus & animalibus accensis sublimata & ad solidos, quibus accrescunt, parietes collecta. *Splendens; Ofen* vel *Spiegelrus* obtinetur ex caminis, qui fumum omnis generis lignorum suscipiunt, cujus partes oleosæ, salinæ & terrestres refrigeratæ camino se agglutinant, & in frusta excrescunt fragilia, splendentia, nigerrima, empyreuma oleatia, gustu amara & acriuscula. Pro substantiarum sub caminis combustarum diversitate diversas quidem admittit formas, constanter tamen Salem Ammoniacalem, Oleum adustum, partes terrestres, gummosas & resinosas vehit. *Hec fuligo ad usus medicatos recepta ob virtutem Resolventem, Sudoriferam datur ad Drachmam semis pro dosi. Fuligo Tædæ, Noir de Fumée, Kienrus* pulveris tenerrimi, levissimi, nigerrimi speciem præbet, cujus odor levis minus ingratus est, quam splendentis, sapor paululum salinus; obtinetur ex ramentorum Pineorum sive rejectamentorum depuratæ Resinæ Vulgaris fumo in peculiare conclave corrivato, ubi a sacco linteo, cui accrescit, fuligo decussa asservatur; hanc ad tintorios potissimum usus adhibent.

FUMARIA, *Fummosterno, Fume-terre, Taubenköpf.* Cauliculi succulenti, teneri, ramosi, quadrangulares, quibus insident tam Folia longis petiolis innixa, glauca, duplicato-pinnata, lobato-incisa, lobis cuneiformibus, quam Flores irregulariter quadrifidi, oblongi, calcarati, rubri; utraque una cum cauliculis evidenter amara. *Fumaria officinalis* L. *Blackwell Tab. 237.* Crescit qua late patet Europa. *Ad referenda Viscera Abdominalia, curandum Scorbutum, depu-*

randum Sanguinem vel unus ejus Manipulus cum jusculis incoquitur, vel Succus ejus expressus ad Uncias quatuor propinatur. Aqua inde destillata tam iners est, quam efficax Extractum.

FURFURES, *Semole, Sons, Kleyen.* Pelliculæ badiæ, siccæ, tactu asperiusculæ, proprio odore, sapore adstringente præditæ, sunt granorum Cerealiæ cuticulæ, a substantia, quam continent, farinacea molarium tritura avulsæ & comminutæ, unde ipsis residuum quid nunquam non adhæret. Furfures Tritici substantiam glutinosam continent, utpote qua hoc Cereale ab omnibus reliquis discriminatur. *Decoctum Furfurum Abstergendi scopo intus datur, extus ad Clysmata recipitur.*

GALANGA MAJOR. Radices intortæ, variis ramis & tuberculis notatæ, circulis eminentibus undique cinctæ, extus rufæ, intus pallidiores, aliquot pollices longæ, unum circiter crassæ, odoris aromatici, Camphoræ vicini, saporis pariter aromatici. **MINOR** a magnitudine & crassitie ita cognominata, saporis tamen aromate Majore superior est. *Maranta Galanga* L. Major Indiæ indigena; Minor ex China in Indiam transp'antata ibidem colitur. Pauxillum Olei odorati largiri dicitur. *Ventriculi Roborandi scopo ad Infusa recipitur.*

GALBANUM. Lacruma quæ nobis mittitur sub forma Granorum magnitudine impari, Avellanam fere æquantium; saporem habent amaricantem, acriusculum, odorem proprium, gravem. Prostat etiam *Galbanum in massis, en Pains,* frustis magnis, tenacibus, minoris quam prius pretii; plures ejus varietates Seplastarii vendunt, ejus præstantia ex pluribus numero lacrumis sive Unguibus, coloreque minus fusco dijudicatur. *Galbanum liquidum ex Persia,* multa sæce nigricante sordidatum, spissitudinem habet Terebinthinæ, odorem Resinæ, nequaquam Galbani. *Bubon Galbanum* L. Africae indigenum, apud nos per hyemem in tepidario asservandum. Igne illiquabile; ex aqua suspenditur; Spiritu Vini utique, Oleis neutiquam dissolvi, ali-

aliquantulum Olei odorati fundere fertur. *Adversus Obstructiones Abdominales intus adhibetur; extus tanquam validissimum Resolvens Tumoribus induratis imponitur.*

GALDA GUMMI. Sub forma frustorum majorum, durorum, extus nigricantium, intus alborum ex India veniebat, odore & sapore leviter ad Gummi Elemi accedit, inter dentes lentescit, flamma admotum fluit & ardens odorem haud ingratum emittit. Vera Resina ob vim Roborandi ad Emplastra & Unguenta recipiebatur.

GALEGA, *Geisrauten*. Folia foliolis oblongis pinnata, angusta, saporis odorisque vacua. Galega officinalis L. *Blackwell Tab. 92.* Europæ calidæ civis, nostras hyemes experitur innocuas. Ab effectu salubri, quem Londinensibus Peste laborantibus præstitisse memoriæ proditum est, virtus illi Alexipharmaca tribuebatur. Aqua inde destillata plane iners est.

GALEOPSIS, *Urtica mortua*, *Ortica bianca*, *Ortie blanche*, *taube Nessel*. Flores labiati, labio superiore villosi, albi, inodori, insipidi, Folia ex ovatis acute serrata, rugosa, scabra, odore levi, minus grato imbuta, sapore casta. Lamium album L. *Blackwell Tab. 33.* Vulgaris per Europam. Ob virtutes Diureticas, *Emenagogas* & *Lochia promotivas* sub forma Infusi exhibentur.

GALLE, *Ghiande*, *Noix de Galle*, *Gallepfel*. Excrescentiæ rotundæ, tuberculis obsestæ, ut plurimum foratæ, extus pro diversa varietate diverse coloratæ, flavus color præstantiæ indicium est; a gryseo ad nigrum declinantes *Ceruleæ* dicuntur, intus substantiam densam, solidam, fuscam vel nigram includunt, sapore adstringentem & acerbam. Sunt excrescentiæ variarum *Quercus* L. specierum, ex vulnere a *Cynipe Quercus* L. illato natæ; Orientales, *Aleppenses* præsertim & *Turcicæ*, reliquis præferuntur. Intus nunquam dantur, extus interdum *Decoctis Stypticis* admiscuntur.

GALLINA, *Gallina*, *Poule*, *Henne*. Avis notissima *Phasiani Galli* L. Femella. Caro diversimode in culinis paratur.

Axungia alba, inodora, insipida reliquarum *Axungiarum vires* habet. *Ovorum Albumen*, *Blanc d'œuf*, *Eyerweiss* consistentiam tenuioris Gelatinæ habet, certo caloris gradu, nec non Spiritus Vini aut Acidorum affusione, in substantiam siccam & tremulam vertitur; ad varios labores pharmaceuticos recipitur; intus ad *Demulcendum*, *Relaxandum*, *Lubricandum* datur. *Testæ*, *Coques d'œuf*, *Eyerschaalen* Absorbendi scopo exhibentur, in tenerrimum pollinem contritæ a quibusdam *Alcali de Rocou* dicuntur; *Vitellus* tenue & viscidum oleum refert, flavus, proprio odore & sapore oleoso instructus, calore indurefcens, multo oleo unguinoso turgens, quod quidem spissum est & flavum; *Vitellus* verus sapo est & hoc scopo pro Resinosi ex aqua suspendendis creberrime usurpatur, aqua dissolutus *Eau de Poule*, *Blaselwasser* egregium contra *Tussim* medicamentum. *Ventriculi*, *Gosiers Hünernaglein*, quo nomine insigniuntur membranæ interiores *Ventriculi* hujus gentis, rugosæ, exsiccatione fragiles, albescentes, fere insipidæ, levi acido factæ, quo Lac coire cogunt; ad primas vias Roborandas infantibus dantur.

GALLIUM, *Gaglio*, *Caille de lait*, *Bettstrob*. Caules tenues, tetragoni, infestis *Follis verticillatis*, angustis, linearibus, viridibus, modice splendentibus, terminati panicula *Florum* luteorum, quadrifidorum, exiguorum. Odor recentium admodum fragrans, sub exsiccatione non parum minuitur, sapor herbaceus est. *Gallium verum* L. Magna copia per Europam exstat. *Remedium Roborans* & *Adstringens habitum ad Infusa Vulneraria* recipiebatur.

GENISTA, *Ginestra*, *Genêt*, *Pfrimmen*, *Flores papilionacei*, lutei, evidenter amari, & cum exsiccati fuerint, inodori sunt, *Semina* cylindroidea, splendentia, flava, medullam continent dulcem, concolorem. *Spartium Scoparia* L. *Blackwell Tab. 244.* Per longe maximam Europæ partem crescit. Sunt qui Flores majores & fragrantiores a *Spartio Junceo* L. Europæ calidæ proprio, nostrarum hyemum patiente desumant, alii eosdem

a Genista Tinctoria L. per universam Europam vulgari, minores & ne recentes quidem ullum odorem spargentes petunt. Flores Diuretico scopo cum aqua infunduntur. Semina Emetica putantur, nescio an recte. Cinis & Sal aliis prestare minime videntur.

GENTIANA ALBA, *Genziana bianca*, *Cervaria alba*, *grosse weiße Hirschwurzel*. Radix magna, crassa, fibrosa, albicans, intus alba, rugis circularibus distincta, resinosa, odorifera, aromatica, amaricans. *Laserpitium latifolium* L. Aitiorum montium progenies, passim per Europam occurrit. *Stomachico & Alexipharmico* scopo a rusticis ad *Infusa* recipitur. *Veterinariis maxime in usu est.*

GENTIANA LUTEA. *Genziana fosca*, *Gentienne*, *Enzian*. Radix fibrosa, magna, rugosa, fungosa, in plures fibras digitum crassas secedens, extus fusca, intus flava, amarissima. *Gentiana lutea* L. Passim in montibus Europæ obvia. *Tanquam Roborans, Obstructiones Abdominales reserans, tam in Infusis, quam sub forma Extracti exhibetur. Extus ad dilatanda Vulnera & Ulcera adhibetur.*

GENTIANA NIGRA, *Genziana nera*, *Cervaria nigra*, *Persil des Montagnes*, *schwarze Hirschwurzel*. Radix crassa, prælonga, extus fusca, annulis distincta, intus alba, resinosa, odoris grati & fortis, saporis acris, aromatici, *Athamanta Cervaria* L. Passim in montibus Europæ crescit. *A quibusdam adversus Febres Intermitteutes, Podagrâ &c. commendatur. Veterinariorum etiam usibus servit.*

GENTIANA RUBRA. Radix a *Radice Gentianæ luteæ* nisi colore magis pallido fere nihil differt, quocirca etiam sibi invicem substituuntur. *Gentiana purpurea* L. Passim in montibus Europæ crescit. In eodem numero habendæ *Radices Gentianæ Cruciatæ* L. vulgaris per Europam plantæ, minores quidem, angustiores, pallidiores, cetera prioribus pares.

GENTIANELLA, *boher Himmelstengel*. Folia sessilia, ovata, acuminata, integerrima, longitudinaliter tribus nervis notata, amarissima. *Gentiana Amarella*

L. Per omnem Europam occurrit. *Compar ejus cum modo dictis Radicibus usus est.*

GERANIUM, *Geranio*, *Bec de Gruë*, *Storchenschnabel*. Amplissimi generis plures species a vi *Adstringente* laudantur. *Intus Folia sub forma Infusi exhibent, extus sub forma Epithematis applicant, ut Cicutarium L. Columbinum L. Sanguineum L. præstantissimum omnium Robertianum L. habetur, cujus Folia tripartitim divisa, pinnis pinnatim laciniatis, petiolis teretibus insident, utrinque pilis obsessa, creberrime rubedine tincta, fœtente cornu ambugi odorem spirantia, leviter adstringentia.*

GINSENG. Radices digitum circiter crassæ, vix incurvæ, albæ, lineis longitudinalibus & transversis rugosæ, inferne bifidæ, intus albæ & spongiosæ, sapore acriusculo, leviter dulcescente & aromatico instructæ. *Panax quinquefolium* L. *Blackwell* Tab. 513. *Americæ Septentrionalis civis. Eisdem cum Radicibus Nisi vires habere dicuntur & cum minoris veneant ad Drachmam dimidiam Pulveribus Analeptis adjici sueverunt.*

GLACIES MARIÆ. *Selenite*, *Selenites*, *Lapis Specularis*, *Fraueneis*. Est Species Gypsi pellucens, in lamellas divisibilis, quæ rhomboidalem figuram constanter servant. *Natrum Selenites* L. In montibus passim offenditur. *Absorbentibus & contra Strumas facientibus medicamentis, substantia omnino iners, inconsulto adscripta fuit.*

GLYCYRRHIZA, *Liquirizia*, *Liquiritia*, *Reglisse*, *Süßholz*, *Lakrizenholz*. Radices oblongæ, farmentosæ, ad pollicarem usque crassitiem excrescunt, extra ferrugineæ, intra brunæ, leviter odoratæ, sapore dulces, cum quadam amaritudine; *Hispanicæ*, quæ nobis exsiccatæ mittuntur, extus gryseæ, intus spissius luteæ, ob eminentem dulcedinem ceteris præferuntur. *Succus optimus ex Hispania petitur, in Catalonia præcipue paratur; verum Extractum, quod ex Radicibus exsiccatis, aqua coctis, expressis & ad consistentiam mollem Extracti excoctis paratur, prostat sub forma massarum oblongarum, quæ sex circiter pollices lon-*

longæ, unum crassæ, una facie planæ, altera convexæ, ubi diffractæ fuerint, splendentes, nigræ, multum dulces, foliis Laurinis obvolutæ nobis mittuntur: massa aridæ, quæque non totæ in ore liquefcunt, rejiciendæ. Glycyrrhiza glabra L. *Blackwell* Tab. 495. Europæ Meridionalis propria, nostrashyemes citra noxam fert. In Anglia, Germania & Lotharingia copiose colitur. *Sitim Sedandi, Demulcendi, Resolvendi ergo Decoctis adjicitur; sed adhibenda cautio est, ne vel paululo ulterius quam oportet continuata coctione amarescat, extus Erysipelati Pulvis ejus inspergitur. Succus sive per se, sive Aqua solutus, sive in Trochiscos formatus scopo Becchico exhibetur.*

GOSSYPIUM videatur BOMBAX.

GRAMEN, *Gramigna, Chiendent, Zvecken*. Radices prælongæ, geniculatæ, teretes, flavescentes, leviter odoratæ, dulces. Triticum repens L. Nimis frequens agrorum pestis. *Resolvendi ergo immiscetur Decoctis; Vulgatissimum apud nos ingrediens Decoctorum pro Potu communi.*

GRANATUM, *Melagrana, Malum Punicum*. Pomum variæ magnitudinis, rotundum, umbilico quinquesido coronatum, sub *Cortice* coriaceo, firmo, crasso, leviter rugoso, suffusa rubedine flavicante *Pulpam* complectitur rubram, multilocularem, fragrantem, gustatu dulcem & vinosam, *Semina* continentem oblonga, acuminata, propria membrana *Cico* obvoluta, sub cortice duro medullam albam, amaricantem includentia. *Cortex Psidium* vel *Malicorium* denominatus, exsiccatus; extus purpureus est, intus luteus, rugosus, linguam valide adstringens. *Flores*, qui *Balaustiorum* nomine veniunt, nec nisi pleni in officinis asservantur, in calice quinquesido, coriaceo, plura petala congesta, ruberrima, inodora, sapore adstringente prædita includunt. *Punica Granatum* L. *Blackwell* Tab. 97. Europæ calidæ & Orientis arbor, apud nos hyeme in frigidario asservanda. *Pulpa Refrigerans & Roborans* vel comeditur, vel in *Syrupum* convertitur. *Flores* tam intus, quam extus *Adstringendi gratia* exhibentur. *Cortices* nonnisi

extus, ubi valida Adstrictione opus est, applicantur.

GRANATUS, *Granato*. Lapis pellucens, Crystallum polyedram referens, colore profundius rubro tinctus, limæ cedens, cultro resistens, igne in vitrum fundendus. Borax Granatus L. In Oriente & in Europa offenditur; in montibus etiam lapidibus aliis innatus reperitur; Ferrum alia quoque non raro metalla vehit; eidem præter Siliccam, Calcaream quoque & Aluminosam terram inhærere observatum est. *Iners Lapis Gemmaris relinquendus.*

GRATIOLA, *Gottesgnaden-Kräutlein*. Folia glabra, fessilia, lanceolata, versus apicem ferrata, insigniter amara. *Gratiola Officinalis* L. *Blackwell* Tab. 411. Crescit in Europa temperata. *Communi Auctorum consensu Purgantibus Drastrictis adscripta recentissime ad Drachmas tres in Infuso, ad Drachmam semis in substantia celebrari cæpit. Extus cum successu Resolvendi ergo exhibitam fuisse lego.*

GUAJACUM, *Legno santo, Lignum sanctum, Franzosenholz*. Lignum ponderosum, valde durum, ex viridi nigricans, albarno flavicante tectum, obductum *Cortice*, in varias squamas diviso, coloris buxi, odoris levissimi, saporis amariusculi, evidenter acris. *Gummi* in majoribus frustis ad nos pervenit, efformatum ex granis flavo-fuscis, inter dentes tenacibus, ad ignem liquefcntibus, odorem insuavem emittentibus, sapore amaricante instructis, variis fordibus inquinatis. *Guajacum officinale* L. *Blackwell* Tab. 35. Americæ Meridionalis civis. E ligno Extracti aquosi odore & sapore Balsamum Peruvianum referentis $\frac{1}{7}$ obtinui. *Gummi* improprie ita appellatur, cum sit vera Resina; ejus solutionis in Spiritu Vini aliquid instillatur Spiritui Nitri, unde si color cæruleus surgit, Resinam sinceram esse concludunt; cum aqua diu coctum Lignum una cum *Cortice Sanguinem Depurantes & Balsamicas vires* exserit, quibus haud absimiles *Gummi* quoque adscribuntur, quod quidem hodie *Arthriticis* magno-pere commendatur.

GUITÆ GUMMI. Est Succus concre-

cretus, cujus magnæ advehuntur massæ nitidæ, fragiles, croceo-rubræ, inodoræ, sapore leviter resinosa & dentium juicio aliquantum etiam tenaces. Cambogia Gutta L. *Blackwell* Tab. 392. Arbor Indiæ indigena. Neutiquam igne funditur, tam in Aqua, quam in Spiritu Vini suspendi se patitur; ab Oleis unguinos non dissolvi traditur. *Ad Grana decem exhibitum sursum aque ac deorsum enixe Purgat, minori dosi datum valide Humores Resolvit & scopo Diuretico exhibetur; contra Tæniam, quoque laudatur.*

HÆMATITES, *Amatita, Blusstein, Glaskopf*. Est Minera Ferri ponderosa, ad lapidis similitudinem figurata, colore, inde a rubro per gradus ad nigricantem usque descendens, varie etiam figurata, textura ut plurimum convergentibus striis striata, sapore adstringens. Ferrum Hæmatites L. Passim per Europam in montibus occurrit. *Adstringendi ergo ad Scrupulum unum præscribitur.*

HEDERA ARBOREA, *Edera, Lierre, Ephen*. Folia petiolata sunt, coriacea, pro varia ætate sive integra, sive lobata, supra lucida, infra pallidiora, sapore adstringente prædita; *Baccæ nigre, rotundæ, umbilicatæ, stylum ex medio umbilico exferentia, gustu statim quidem fatua, subsequente dein amaricante & acri sapore. Gummi prostat sub forma frustorum majorum, viridescens, fragile, ex granis semipellucidis Granatis fere concoloribus formatorum, variis fordibus intermixtis pollutorum, odoris leviter resinosi, saporis subaromatici: possideo frustra quæ quinque librarum pondus æquant. Hedera Helix L. Blackwell Tab. 188. Offenditur ubique. Europæ calidæ Frutices subinde Gummi fundunt, cujus longe maximam quantitatem ex Oriente accipimus, Oleis non solubile, ejusque potissimam partem Resinam esse asserunt Observatores. Folia ad Deligandos præcipue Fonticulos adhibentur, Pulvis eorum contra Atrophiam Infantum laudatur; de Baccarum virtute, quam Catharticam esse nonnulli putant, plane nihil certi constant; Gummi medicamentorum*

Resolventium numero habetur, extus applicato virtus Depilatoria tribuitur.

HEDERA TERRESTRIS, *Ellera terrestre, Tarrette, Gundelreb*. Folia petiolata, reniformia, crenata, rugosa, levissime hirsuta, exsiccata inodora, saporem proprium leniter aromaticum exhibent. *Glechoma hederacea L. Blackwell Tab. 225. Vulgaris per Europam planta. Ad Infusa Roborantia & Resolventia recipitur.*

HELIANTHEMUM, *Sonnengunsel*. Folia linearilanceolata, margine ut plurimum reflexo, obtusiuscula, hirsuta, gustu paululum adstringentia. Cistus Helianthemum L. Frequentissime per Europam obvia.

HELIOTROPIUM, *Girasole, Tournesol, Lacmus*. Massulæ pollicares, tetragonæ, siccæ, insigniter violacæ, odoris, dum recentes sunt, Violæ, annosiorum mucorem referentis, saporis acris. Confici dicitur ex Lichene Parella L. Rupibus Maris Mediterranei adhærescente, sive ex Lichene Roccella L. Archipelagi & Insularum Canariensium cive, Calce viva cum Urina per aliquot septimanas scite digesta, Succoque deinceps, quem Croton Tinctorium L. largitur, affuso. Cum colorem sistat minime constantem ad artem baphicam minus apte adhibetur; aqua inde tincta levissimo quoque affuso Acido rubescit, Alkali contra non mutat colorem. *Curandis morbis non adhibetur.*

HELLEBORUS ALBUS, *Elleboro bianco, vveise Nieszwurzel*. Radices fibrosæ, cylindroidæ, tuberculis obsessæ, reliquiis fibrarum, quas recentes emiserant, extus gryseæ, intus albissimæ, sapore salino, acri, nonnihil amaro, odore levi, ingrato insignitæ. Veratrum album L. *Blackwell* Tab. 74. Crescit in altioribus Europæ montibus. *Vehementissimum Drastrictum quam maxime lugubres effectus edidisse Observatores fide digni testantur; ad Drachmam dimidiam in Infuso datum, sunt qui commendent, attamen hominibus intus nequaquam dandum censeo, nec tuto ad Pulveres sternutatorios recipitur.*

HELLEBORUS FOETIDUS, *Elleboro fetido, Hellebore bêtard, Gros Lauskraut*.

Radices fibrosæ, fuscæ, digitum circiter crassæ, intus albæ, inodoræ, dulciusculæ; *Folia* in novem ut plurimum lacinias profunde oblongas, irregulariter dentatas divisa, fœtida, amara. Helleborus fœtidus L. *Blackwell* Tab. 57. Crescit in Europa temperata. Helleboro nigro fuerunt, qui eum substituerent, quam violentius eum agere vulgo contendunt. *Folia ad Drachmam unam pro dosi adhibentur.*

HELLEBORUS NIGER, *Elleboro negro, scbvarze Nieswurzel.* Radices inodoræ, subacerbi saporis, ex crasso capitulo innumeras fibrillas emittunt, aliquot pollices longas, extus nigræ, intus albæ. Helleborus niger L. *Blackwell* Tab. 506. Alpium calidioris Europæ. Nostros hyemes facillime fert. Aqua inde destillata acris perhibetur & purgans; Extracti Aquosi sicci quartam sui ponderis partem largitur. Has Radices quo calidiores observarunt Autores. *Stimuli instar Purgantibus aut Resolventibus adjiciuntur; Dosis earum qua Infusi ad Drachmas tres, qua Extracti, Purgandi scopo, ad Drachmam semis præscribi solet.* In Germania Septentrionali loco harum Radices Adonidis Vernalis L. recipi dicuntur.

HELENÆ S. RADIX. Radices rotundæ, leviter angulatæ, gryseo-nigricantes, striatæ, Avellanam majorem æquant, duræ, intus lutescentes, Cardamomum fere olent ac sapiunt, in medio perforatæ & filo appensæ ad nos transmittuntur ex Florida. *Ad Ventriculum Roborandum & Urinam pellendam efficaces feruntur; a quadam Cyperi specie suppeditari dicuntur.*

HELMINTHOCHORTON, *Lemithochorton, Melitocortum, Corallina di Corsica o di Malta, Coralline de Corse ou de Malte.* Substantia ex valde tenuibus fibris sibi invicem intextis constans, rufa, odoris marini nauseosi, saporis salini, inter dentes non stridula, sed lentescens. In Mari quod Corsicam alluit colligitur; *Conservæ species esse videtur, a Botanicis, quibus ejus in ipso natali loco exa-*

minandi potestas est, determinanda. In hærescentibus fordibus aqua elutis depuratum cum Acidis non effervescit, aqua infusum rubedinem exiit & cito putrescit, multum mucilaginis aquæ, in qua agitatur, impertit, paucillum admodum Resinæ vehit & fere tantundem Salis communis, Salis mirabilis Glauberi, Selenitis atque Alcalis fossilis. *Usus ejus pluribus adhinc seculis in Corsica scopo Anthelmintico celebratus, paucis demum retro annis in Gallia etiam comprobatus invaluit. Datur ad Drachmam unam pro dosi in substantia, cum Aqua etiam tam Infusum, quam Decoctum efficaciam servat.*

HEPATICÆ ALBA, *Epatica bianca, Herzblümlein.* Folia cordata, obtusa, crassiuscula, leviter amaricantia. Parnassia palustris L. Vulgaris per Europam planta. *Sunt, qui vim ei Substringentem tribuant.*

HEPATICÆ FONTANA, *Epatica fontana, Hepatique d'eau, Steinleberkraut.* Folia subrotunda, lobata, superne ex obscuro viridia, splendentia, areolis distincta, inferne fusca, radículas emittentia, insipida & inodora. Marchantia Polymorpha L. Universæ Europæ. *Aperiendi scopo sub Infusi forma quandoque recipitur.*

HEPATICÆ NOBILIS, *Epatica nobile, Leberkraut.* Folia petiolata, in tres lobos obtusos divisa, cum petiolo pilosa, insipida, inodora. Anemone Hepatica L. *Blackwell* Tab. 207. Vulgaris per Europam. *Aperiens esse putatur.*

HEPATICÆ STELLATA, *Lichene stellato, Matrifylva, Muguet des Bois, Waldmeister.* Folia oblonga, angusta, ciliata, obtusa, leviter salina, grate olentia. Asperula odorata L. *Blackwell* Tab. 60. In Europa, præter maxime Septentrionalem, ubique obvia. *Aperiendi ergo Vino infundi subinde solet.*

HERMODACTYLI. Radices ad figuram triangularem accedentes, ad margines contractæ, una facie plana & sulco longitudinali notata, altera convexa, extus flavicantes, intus albæ, friabiles, odoris & saporis expertes. Colchicum Illyricum Gronov. Syriæ. *Abi ducenda gra-*

gratia olim ad aliquot Drachmas in substantia, ad Drachmas sex in Infuso adhibebantur.

HERNIARIA, *Erniaria*, *Toutquette*, *Herniole*, *Bruch-vel Harnkraut*. Cauliculi teretes, Foliolis ovato-acuminatis & glomerulis Florum lateralium obfessi, inodori, levissimo salino sapore imbuti. *Herniaria hirsuta & glabra* L. *Blackwell* Tab. 320. Per omnem Europam obtinet. *Herniosis & Calculosis conducere fertur.*

HIPPOCASTANUM, *Ippocastano*, *Maronnier*, *wilder vel Rosskastanienbaum*. Cortex ex gryseo-nigricans, intus ferrugineus, sapore admodum adstringens & amarus. *Æsculus Hippocastanum* L. *Asiæ Septentrionalis arbor*, hodie copiosissime per omnem Europam colitur. *Fuerunt qui eum Cortici Chinæ substituerent.*

HIPPOPOTAMI DENS, *Dente di Caval marino*, *Dent du Cheval marin*, *Vallrosszahn*. A basi ad apicem usque incurvus, magis magisque angustatus, lineis longitudinalibus parallelis, quas ad basin fecant circulares, insignis, apex albidissimus conum vertice aduncum refert. Est *Laniarius Hippopotami Amphibii* L. Ad fluvios *Africæ & Asiæ degentis quadrupedis*. *Ad sistendos Spasmos & Hæmorrhagias celebratur.*

HIRCUS, *Capro*, *Bouc*, *Bock*. *Capra Hircus* L. *Notissimum per Europam animal*. *Sanguis inspissatus nigricat*, *empyreuma olet & sapit*, *olim sub forma Pulveris in Casu ab alto*, *nec non Sudorem excitandi ergo exhibebatur*. *Serum ad colorem cærulescentem vergens*, *Bovino mollius est; in effectu medicato haud differt.*

HIRUNDINARIA, *Vincetoxicum*, *Dompte-Venin*, *Schwalbennurzel*. Radices albæ, odoris proprii, eminentis, saporis acriusculi, subamari, ex uno capite crassiusculæ, dimittunt fibras longas, multum flexiles & varie tortas. *Asclepias Vincetoxicum* L. *Crescit in omni Europa*, *præter magis Septentrionalem, Angliam & Belgium*. *Interdum sub forma Pulveris exhibetur; creberrime Decoctis tanquam Resolvens Excretionisque aquosas promovens additur.*

HIRUNDO, *Rondine*, *Hirondelle*, *Schwalbe*. *Hirundo Rustica* L. *Avis migra-*

toria, Martis mense advenire, Augusto discedere solita. A nostratibus mensis non admittitur. Pulli in olla tecta in Pulverem nigrum combusti olim contra Epilepsiam laudabantur; Nidus ex luto præcipue structus sub forma Cataplasmatum contra Anginam laudatur.

HIRUDO, *Mignatta*, *Sangsuë*, *Blutigel vel Egel*. *Hirudo medicinalis* L. *Vermis oblongus, planus, ex viridi-nigricans, superne lineis transversis nigricantibus distinctus, inferne flavus. Verno & æstivo tempore colligitur, in aqua asservatur. Chirurgicæ arti servitura.*

HOMO, *Vomo*, *Homme*, *Mensch*. De *Cranio supra jam egi*. *Reliquæ partes, quarum usum absurdissimæ hypotheses sustentarant, hodie evilerunt, neque plurimorum quadrupedum Axungiiis Humana, quamvis mollior & flavior, anteferenda videtur.*

HORDEUM, *Orzo*, *Orge*, *Gerste*. *Semina ovali-oblonga, utrinque acute angulata, facie convexa sulco notata, sub cuticula pallide flava, farinacea, alba, dulcia sunt. Hordeum vulgare* L. *Blackwell* Tab. 423. *Hexastichum* L. & *Distichum* L. *promiscue apud nos coluntur. Hordeum cuticula privatum, Veterum Ptisana, hodie Decortiatum, integrum contra Crudum appellatur: Farina Hordei $\frac{3}{4}$ Mucilaginis largitur. Præter vires Nutrientes, Refrigerantes quoque, Demulcentes, Resolventes habet. Panis ejus coctus albus est, diu discedinis tenax, sed gravis.*

HORMINUM, *Schiarea*, *Gallitricum*, *Orvale*, *Toutebonne*, *Scharlachkraut*. *Folia magna, cordato-oblonga, rugosa, villosa, ferrata, forti nec ingrato odore, sapore amaricante, linguam pungente prædita. Salvia Sclarea* L. *Planta biennis Europæ calidæ & Asiæ, nostræ hyemis admodum patiens. Scopo Roborandi & Spasmos sistendi subinde adhibetur. Hac herba ad suavem Cerevisiæ & Vino conciliandum odorem vulgo utuntur; sed sunt Auctores, qui inde Incubriandi Capitisque dolores excitandi vi id genus poculenta infici contendunt. Certe ejusmodi effectus ab inerti Salvia pratensi L.*

metuere, ineptius videtur. Quin *Salviam Sclaream*, etiam *Salviae Hormino* L. evidenter quippe debiliori præferendam esse puto.

HYACINTHUS, *Giacinto*, *Jacinte*. Est Gemma limæ pariter ac igni resistens; colore rubro, submixta flavedine, distincta & hic *Orientalis* dicitur; qui in Officinas recipitur *Occidentalis* colore quidem priori proximus, sed & aliquanto levior & mollior est; Igne etiam funditur. Nitrum fluor purpureo-fulvum L. passim in Europæ montibus occurrit. Ex Terra Silicea, Calcarea, Aluminosa & Croco Martis compositus esse fertur. Olim in *Roborantium* numero habebatur.

HYOSCYAMUS, *Jusquiamo*, *Jusquiamæ*, *Bilsam*. Folia amplexicaulia, magnis sinibus excisa, tomentosa, odore narcotica, sapore fatua; Semina parva, rotunda, cinerea, inodora. *Hyoscyamus niger* L. *Blackwell* Tab. 550. Ubique locorum in Europa progignitur. Semina Olei unguinosi $\frac{1}{3}$ circiter fundunt. *Hyoscyamum* per omnes sui partes, vel exigua dosi, tristissimos effectus Narcoticos edidisse Observatores monent. Folia extus feliciter Tumoribus induratis, sub forma *Cataplasmatis*, applicantur. Succus inspissatus nomine *Extracti* datur ad sopiendos motus Nervorum excedentes; a Grano uno fuisse, qui, sensim augendo dosin, ad *Drachmam semis* usque processerint, relatum lego.

HYPERICUM, *Iperico*, *Millepertuis*, *Johannis-Kraut*. Summitates ramis angulatis, glabris, punctis nigricantibus passim distinctis, Folia gerunt sessilia, ovata, obtusa, integerrima, punctis pellucetibus insignita, junctosque his Flores quinquepetalos, flavos, fasciculatim positos, calycibus glabris sustentatos, odore & sapore exiguis. *Hypericum perforiatum* L. *Blackwell* Tab. 15. Vulgaris Europæ planta. Scite quoque *Hypericum quadrangulum* L. in usus medicatos recipitur magis resinofum. Omnibus menstruis colorem rubrum *Hypericum* affricat. Scopo *Balsamico* olim Summitates ad *Infusa interna* recipiebantur; hodie *Oleum* cum eis infusum extus applicatur.

HYPOCYSTIDIS SUCCUS, *Succo d'*

Ipocistide. Massa nigra, solida, difficulter diffringenda, saporis aciduli & acerbissimi; exprimitur ex Baccis Cytini *Hypocistidis* L. Europæ calidæ progeniei. Sole inspissatur. In Aqua æque ac Spiritu Vini solubilis est. Olim ad eosdem ac *Succus Acaciæ* usus adhibebatur.

HYSSOPUS, *Isopo*, *Isop*. Folia oblonga, acuta, viridia, proprio & fragranter odore similique sapore, amaricante præterea & aromatico prædita. *Hyssopus officinalis* L. *Blackwell* Tab. 296. In Europa calida sponte crescit, nostrarum hyemum patiens est. Olei odorati $\frac{1}{2}$ fundere dicitur. Datur sub forma *Infusi*, vel *Syrupi*, vel *Aquæ destillatæ Muci Pulmonalis* Incidendi causa. Extus *Sugillatis* sub forma *Epithematis* aut *Fotus* applicatur.

HYSTRICIS LAPIS, *Pietra d' Istrice*, *Porcinus*, *Pedro del Porco*. *Malacensis* & *Zeylanicus* exstat, prior etiam simpliciter *Lapis Malacensis* dictus, posteriore multo majoris venit; Ovi columbini circiter magnitudinem habet, utrinque compressus, cornei suffusa rubedine coloris, lævis, splendens, aquam affricu suo, Saponis instar, viscidulam reddit. *Zeylanicus* nigricans Ovi gallinæ magnitudinem fere æquat, formamque Succu inspissati refert. Uterque amarissimus aquam etiam, cui immergitur suo sapore imbuit. *Erinacei Malacensi* L. *Asiæ Meridionalis Quadrupedis Calculi* fellei esse dicuntur. Celebratam virium hujus *Lapidis* in morbos *Malignos* efficaciam, cujus famam enorme, quo venduntur, pretium secundaverat, experientia non confirmavit.

JACEA, *Viola*, *Pensée*, *Dreyfaltigkeit*. Folia petiolata, ovato-lanceolata, profundioribus dentibus notata, inodora sunt, sapore glutinoso palatum afficiunt. *Viola tricolor* L. *Blackwell* Tab. 44. Occurrit per omnem Europam. *Foliorum recentium* *Infuso Cathartica* vires inesse dicuntur, quem in finem *Unciæ* quatuor pro dosi præscribi solent. Folia exsiccata gratum Fæni odorem spirantia, cum Lacte cocta & per aliquot septimanas infantibus exhibita *Crustam lacteam* curare *Observationes* testantur.

JACOBÆA. Folia amplexicaulia, ovato-oblonga, ad nervum usque pinnis de-

nuo pinnatis pinnatifida, lacte viridia, subadstringentia. Senecio Jacobæa L. Vulgaris per Europam. *Roborandi scopo interne, Traumatico externe, hinc & inde olim commendabatur.*

JALAPPA. *Jalapa.* Taleolæ mox rotundæ, mox oblongæ, cortice nigricante, rugoso, substantiam cingunt gryseam, nigris striis variegatam; odorem habent proprium, nauseosum, similemque saporem eminentis insuper acrimoniæ. Quo sunt graviores, quoque pluribus striis nigris interstinctæ, eo habentur meliores. Ab aliquod retro annis integræ mittuntur radices, pugnum æquantes, rotundæ, superne leviter compressæ, inferne tubere, tanquam pedunculò, suffultæ. Non a Mirabili L. sed a Convolvulo Jalappa L. planta Mexicana, apud nos per hyemem in caldario asservanda, desumitur. *Ad Scrupulos duos sub forma Pulveris data, non sine irritatione Alvum ducit, quem vero effectum cum unicevi Resina edat, cujus in quibusque taleolis non eadem ratio obtinet, consultius omnino est, Resinam quam Radices exhibere.*

JASMINUM. *Gelsomino.* Flores ex longo tubo quinquefidi, albi, interdum roseo-variegati, fragrantissimi, insipidi. Jasminum officinale L. Indie proprium, copiose in hortis Europæis colitur; a nostra hyeme in frigidario tuetur. *Flores recentes Fragrantium effectus edunt. Oleum destillatum dare recusant, Oleum Beben cum eis infusum Olei Jasmini nomine in officinis prostat, ad usus Cosméticos obgratum, quem large spargit, odorem aptatum.*

ICHTHYOCOLLA, *Colla di pesce, Colle des poissons, Hausblase.* Massæ cylindroidæ, in spiras convolutæ, manifeste ex laminis efformatæ, digitum circiter crassæ, insigniter tenaces, inodoræ & insipidæ. Quo magis flavæ aut brunæ, eo sunt deteriores. Paratur ex Vesicis quarumvis Acipenseris L. specierum, unde tunicæ internæ desumuntur argenteo splendore nitentes, quarum plures preliope una comprimuntur, convolvuntur, & filis suspensæ exsiccantur; Aqua penitus dissolvitur, quam quidem viscedi-

ne imprægnant, adeo ut ad glutinanda vitrea & porcellanea vasa adhiberi possit, Vina etiam turbida clarificat, nec non ad alias artes adhibetur. *Cum Aqua in Gelatinam redacta Demulcendi & Relaxandi scopo jusculis immittitur, Clysmatibus adjicitur.*

IMPERATORIA, *Ostrutium, Meisterwurzel.* Radix aliquot pollices longa, compressa, rugosa, annulis transversis velut in articulos distincta, extus cinereo-fusca, intus alba, odoris proprii ad Angelicam accedentis, saporis acris, amari, aromatici. *Imperatoria Ostrutium L. Blackwell Tab. 279. Montana Europæ planta, sed in hortis etiam cultu facilis. Valide tam humores Resolvit, quam solida Stimulat, ad Infusa quandoque recipitur.*

INDI FOLIA seu *Malabatri.* Magna sunt, petiolata, ovato-lanceolata, tribus nervis ad basin coëuntibus intersepta, ex viridi flavescentia, odorem spirantia levem, sapore subaromatico Caryophyllos referentia, mucilaginoso. *Laurus Cassia. Arbor Indiæ. Rarissime hodie usurpantur.*

INDIGO. *Indaco.* Massæ pulcherrimæ, variæ tam figuræ quam magnitudinis, cæruleæ, insipidæ & inodoræ, diffractæ Cupri rubedinem splendore referunt. Est Fæcula variarum Indigoferæ maxime Tinctoriæ L. specierum, quæ ex Asia in Americam translata, ibidem jam copiosissime coluntur; optimus a *Quatimalo* adducitur, quem *Dominicensis* sequitur, *Carolinensem* post se relinquens. Pulchritudo Fæculæ a justo putredinis gradu pendet. Color cæruleus neque Acidis additis rubescit, neque Alcalinis viridescit. *In arte baphica creberrimus ejus usus, in Pharmiacopolis vero propter colorem rarissimus, cetera nullus est.*

IPECACUANHA, *Ipecaquana.* Radix aliquot pollices longa, vix linea crassior, varie flexa, rugis circularibus eminentibus distincta, extus ex nigricante grysea, intus albissima, odore tenuis, nauseosa, sapore subsalina. An ex quadam *Violæ L. Euphorbiæ L. Loniceræ L. specie* desumatur, in dubio adhuc

relinquitur. Mittitur nobis ex Brasilia. Emetico scopo ad *Scrupulum unum* datur; minores etiam doses efficaciam præstant; ad tertiam Grani partem singulis trihoriiis data *Hæmorrhagias Uteri curat*. Specificis *Antidysentericis* adscribitur. *Grysea*, quæ & major & crassior & mitior esse & ex regno Peruviano mitti dicitur & *Alba Cayennæ*, plane iners, apud nos saltem non adhibentur.

IRIS FLORENTINA, *Iride Fiorentina*, *Violenvurzel*. Radices varia crassitie & longitudine, cuticula externa ablata, albæ sunt, intus leviter flavescens, parum compressæ, hic inde tuberculis notatæ, odore fragrantæ, Violas referentes, sapore acres, amaricantes. Iris Florentina L. *Blackwell* Tab. 414. Crescit in Italia; nostras hyemes innocua fert. Radices longiores & rectæ sub nomine LONGARUM seorsim asservari solent; ad morbos a *Muco oriundos cum successu* adhibentur. Extus ad *Dentifricia*, *Epithemata Resolventia*, usus *Cosmeticos*, tornatos quoque inde globulos *Fonticulis* inserunt. Longæ infantibus dentientibus admordendæ præbentur.

IRIS NOSTRAS. Radix fibrosa, crassa, rugosa flavicans, intus alba, leviter amara, subsequente sapore Violas referente. Iris Germanica L. *Blackwell* Tab. 69. Europæ temperatæ; *Vires Purgantæ & Diureticas habere* dicitur. Quod Cl. *Montet* animadvertit, eam cuticula scilicet externa ablata, & calore satis valido exsiccata prior simillimam evasisse, ego quoque observavi, sed odor elapsis demum aliquot annis omnem suavitatem assequitur.

JUBABÆ CORTEX. In frustis aliquot pollices longis, impariter crassis, una facie concavis ad nos ex India transvehatur, sulcis longitudinalibus rugosus, ferrugineus, intus pallidior, odore & sapore Vanigliæ proximus, sed debilior, levissime amaricans. A virtute *Nervina* laudatur & Vanigliæ substituebatur.

JUDAICUS LAPIS. *Pietra Giudaica*, Olivæformis est, albus, totus striis longitudinalibus notatus, petiolo instructus,

intus ex lamellis subpellucidis efformatus, inodorus, insipidus, in Acidis cum effervescentia penitus dissolubilis. *Helminthus Judaicus* L. *Aculeus Echinorum* in lapidem conversus, passim per Europam occurrit. *Calculus comminuer* quondam putabatur.

JUGLANS NUX, *Nux Persica* vel *Regia*, *Noce*, *Noix*, *Nusse*. *Putamen* subrotundum, apice prominente instructum, viride, tenax, digitos nigro colore inficiens, odorem, non admodum gratum, saporem habet adstringentem, amarum; *Officulum* durum est, albicans, rugosum; *Nucleus* albus, quadrilobus, lobis anfractuosis, gibbosis, dulcibus, septo interstinctus, cuticula tectus flava, adstringente, nonnihil etiam acri. *Juglans Regia* L. *Blackwell* Tab. 247. *Syriæ & Persiæ*. Copiosissimus ejus per Europam temperatam proventus est. Exsiccatae Noces Juglandes dimidium sui ponderis Olei fundunt flavicantis, dulcis, suavissimi, frigore non spissescens, ad usus pictorios aptissimi. *Putamen Saccharo conditum* *Stomachico* scopo, ejusdem *Extractum aquosum Anthelmintico* laudatur. *Nuclei* in cibum recipiuntur & contra *Vermes* commendantur.

JUJUBÆ, *Giuggole*, *Jujubes*, *Brustbeeren*. *Drupæ* ventricosæ, cylindroidæ, utrinque pulvinatæ, sub cuticula sicca, præ laxitate rugosa, rubra. *Pulpam* vehunt flavam, dulcem, spongiosam, *Nucem* complectentem utrinque acutissimam, & sub hujus officulo ventricoso *Nucleum* qui sub cuticula rubra, medullam albam continet *Rhamnus Ziziphus* L. *Blackwell* Tab. 569. Copiosa in Europa Meridionali, in nostris regionibus a rigore hyemis in frigidario defendenda. *Recipiuntur Drupæ ad Decocta Pectoralia*.

JUNIPERUS, *Ginepro*, *Genêvre*, *VVachholder*. *Lignum* prostat in minora frusta sectum, album, cortice tectum extus gryseo, intus ferrugineo; odorem spargit aromaticum & fragrantem, similem etiam accensum emittit fumum; sapor leviter aromaticus est, *Baccæ*, quæ nonnisi biennes colliguntur & *Pisa* tam magni-

gnitudine quam figura æquant, nigro-cæruleæ sunt, superne exiguo umbilico notatæ, pulpa earum dulcis, viscida, ferruginea, aromatica, grate odorata, tria femina concludit. *Gummi*, quod etiam *Sandaracæ Gummi* appellant, Mastiches grana tam figura, quam colore refert, inodorum, dentibusque submissum minime tenax, sed friabile deprehenditur. *Juniperus communis* L. *Blackwell* Tab. 187. *Vulgaris* per Europam *Arbuscula*. *Baccæ Olei* odorati $\frac{1}{2}$ fundunt, multum calidi, quapropter internus ejus usus rarissimus est. *Extus Roborandi & Resolventi ergo adhibetur*. In Europa Meridionali species, modo dicta, *Gummi* fundit, quod in Africa quoque aliæ, *Juniperi* species faciunt, igne mollescit, sed fundi recusat, in Spiritu utique Vini, in Aqua nequaquam solubile est, in Oleis etiam dissolvi negant Observatores. *Lignum aqua decoctum Sanguinem egregie Depurare, Excretionesque aquosas promoveri Observatores testantur; Suffitum ejus ad purificandum ærem æque ac discutiendos Rheumatismos & OEdemata adhibent. Baccæ laudantur ad aperienda Viscera Abdominalia & augendas Excretiones aquosas, adhibentur vel sub forma Decocti, vel cum aqua ad consistentiam usque Mellis coctæ, sub titulo ROB. Extus ad Suffitus & Frontalia recipiuntur. Gummi vel potius Resina Suffitibus Discutientibus adjicitur, ad Vernices maxime adhibetur.*

KIKEKUNEMALO GUMMI. Frusta variæ magnitudinis flavicantia, semipelucida, extus tenuissima, nigricante crusta obducta, odorem gratum spirantia, simili sapore resinoso prædita, inter dentes lentescantia, calore liquabilia, inflammabilia, accensaque fumum emittentia suave & fortiter olentem. *Olei* odorati albicanti, leniter acris $\frac{1}{2}$ fundere dicuntur. *Suffitus eorum laudabatur contra Rheumatismos & Erysipelas. Alcohol dissolutum Kikekunemalo egregium Vernicem constituit.*

KINO. *Gummi rubrum, adstringens Gambiense. Prostat in frustis variæ magnitudinis, ad Juglandis usque volumen sese extendentibus, splendidantibus, ex*

rufo-nigricantibus, extus nubecula ferruginei coloris obductis, odore vacuis, sapore fortiter adstringentibus, forma exsiccatas inspissatione massas referentibus, in aqua pene omnino diffluentibus. Ex regione Africa, fluvio Gambiæ adjacenti, quatuor abhinc lustris ad nos pervehi cœpit. Laus ejus in Diarrhæa Chronica, Fluore albo, nimio Mensium fluxu &c. sanando ponitur.

LABLAB. Est Semen ovatum, nigrum, hilo albo eminente, semilunari notatum, odore, sapore, viribus cum *Phaseolo vulgaris* convenit. Desumitur a Dolicho *Lablab* L. *Ægypti* progenie, passim in nostratibus quoque hortis adolescente.

LAC, Latte, Lait, Milch. Liquor ex mammis animalium emulsus, vix odoratus, dulcis sapore, spissiusculus, albus, sponte in *Cremorem, Serum & Caseum* secedens, qui secessu calore adjectisque Salibus acceleratur, Saccharo contra aut bullitu cavetur. Differt inter semet *Lac* pro vario animalis, unde desumitur, genere; *Vaccinum* ego vidi ubertate feri vincere *Humanum & Caprinum*, cedere *Cremoris & Casei* copia *Ovillo* ac *Caprino*; *Ovillum* vero superare reliqua omnia *Cremoris* abundantia. Sed in eodem etiam genere *Lac* pro singulorum Animalium ætate, vitæ genere, pabulo, distantia a partu, tempore, quo emulgentur, &c. differt. *Lac* leni calore in pulverem redactum *Franchipane* dicitur, cui, si aquam sperfuderis, obtinebis *Serum Lactis dulce Hoffmanni. Nutriendi, Demulcendi, Relaxandi ergo adhibetur. Lac* quod cærulescit aut flavescit, alienum odorem aut saporem prodit, cujusque gutta ungui instillata diffluit, rejiciendum est.

LAC LUNÆ, Agaricus mineralis. Terra calcarea, alba tenera, spongiosa digitos fœdans, in qua agitatur aqua, diutius suspensa hærens, lacteo eam colore inficiens, inodora, insipida. *Calx Gur* L. *Fissuris montium* crebro in modum spongiæ adhærescit. *Absurde satis Lac augere credebatur.*

LACCA. *Lacca, Resina ex ramulis sub forma granulorum suspensa, dense rubra,*
non

non sine flavedinis vestigio, manifeste ex cellulis sibi invicem agglutinatis efformata, inodora, sapore levissime amara, a quodam Insecto efficta, quod Formicis vulgo adnumerant & ramuli Croton lacciferi L. Indiæ Orientali. Bengalæ & Pegu Arboris; & hæc quidem *Lacca in baculis* appellatur: inter dentes lentescit, flammam concipit, inflammataque suavem odorem spargit, aquam tingit, qua tamen non dissolvitur, nec Oleis dissolubilis esse dicitur. *Lacca in granis* ab ista in baculis eo tantum differere dicitur, quod hæc de baculis abrasa, aqua calida digesta, & denuo exsiccata est; irregularis figuræ & læte rubra, fusioni resistit; *Lacca in tabulis* in frustis variæ magnitudinis, minus quam antecedentes rubris prostat; ex *Lacca in baculis* parari dicitur, postquam ea ad usus baphicos fuerit adhibita, fusa. *Rarissime intus scopo Adstringendi datur; extus ad Dentifricia adhibetur. Lacca in tabulis unice ad Ceram sigillatoriam recipitur.*

LACERTA. *Lucertola, Lezard, Eidexe.* Lacerta Agilis L. Per omnem Europam occurrit, Amphibium quadrupes, caudatum, squamosum, olivaceo colore nitens. *Vulnerariæ vires ei vulgo tribuuntur. Adhibetur Oleum unguinosum cum ea infusum.*

LACRYMA JOB. Semen nitidum, inverse turbinatum, sub cortice duriore, cinerascens includit nucleum membrana tectum, rotundum, rufescentem, insipidum, inodorum. Coix Lacryma Job L. Indiæ planta, apud nos non perennat. *A quibusdam ob virtutem Diureticam commendabatur.*

LACTUCA, *Lattuga, Laituë, Salat.* Folia tenella, colore, magnitudine, figura, crassitie &c. multum inter se diversa, ad usus cibarios antè plantæ caluescentiam recipienda. *Semina oblonga sunt, utrinque acuta, sub cuticula leviter flavescens seu nigricans, paululum medullam albam & dulcem includunt. Lactuca fativa L. Blackwell Tab. 88. Innumera varietates in hortis coluntur, quæ in duo genera discedunt; unum earum, quarum folia interna,*

exterioribus teneriora in caput rotundum coeunt, *Laituë pommée, Kopfsalat,* alterum foliorum in medullis arctius compactorum, *Chicon, Rœmscher vel vvelscher Salat.* Folia recentia inter cibaria referuntur, scopo medicato ad Decocta Aperientia recipiuntur. Semen quatuor frigidis minoribus olim adnumeratum exsolevit.

LACTUCA VIROSA, *Sylvestris.* Folia hastata, laciniis ferratis sinuato-lacinata, duriuscula, glauca, costa dorsali aculeata, odorem virosam, acrem amarumque exhibentia Lactuca Scariola & Lactuca virosa L. Vulgares per Europam plantæ. *Succus lacteus, quem fundunt plantæ, exsiccatus Opio similis habetur; eundem ante inspissationem probe clarificatum ad aliquot Drachmas per diem partita dosi datum Hydropicorum aquas evacuasæ, quin imo ipsum morbum curasæ recentissime narratur.*

LADANUM GUMMI. *Laudano,* Resina nigra, leviter odora, insipida, friabilis, manuum frotu emollitur, igne non funditur, accensa fumum proprii non ingrati odoris emittit. Quod vulgo in officinis prostat ex Creta advectum, in placentulas tortum, multa arena nigra inquinatum, *en Tortis* dicitur; *Canadense Liquidum* dictum, massis in modum Extracti mollibus constat; *Hispanicum* sub forma bacillorum Succu Liquiritiæ similium accipimus; *Barbaricum* massas sistit Hispanico & Cretico molliores; recensetur præterea adhuc *Cretica* species, quæ in majoribus massis Emplastri fere mollitiem, colorem ex rufo-nigricantem, odorem ceteris fere fragrantiorum habentibus, vesicis involuta nobis transmitti & *Ladanum en masses* appellari dicitur. *Creticum Cistus Cretica L.* exsudat, Archipelagi indigena, apud nos per hyemem in frigidario asservanda. Nec in Aqua, nec in Olei dissolubile fertur. *Oleum odoratum fundere dicitur. Hodie vix ad alios usus, quam ad Suffitus recipitur.*

LAMIUM videatur GALEOPSIS.

LAPATHUM, *Lapazio, Patience, Grindwurz.* Radices fibrosæ pollicem circiter crassæ, extus nigrae, intus lutescentes, ino-

doræ, gustu acriusculæ: paululum etiam adstringentes, subamaræ. *Semina* sunt triquetra, valvulis dentatis, singulis graniferis, rufescentia, austerâ. *Rumex acutus* L. Vulgaris per Europam planta. *Radices* *Aperiendi*, nec non *Sanguinem Depurandi* gratia in *Decocta* recipiuntur. *Extus ad Lotiones & Balnea* contra *Scabiem* adhibentur. *Semina* olim ob *Adstringentem & Alexipharmacam* virtutem a nonnullis laudabantur.

LAVENDULA, *Spingardi*, *Spica*, *Spica Nardi*. *Folia* solidiuscula, obtusa, incana, pergrati odoris, saporis aromatici. *Flores* asservantur calice irregulariter quadrifido, tomentoso inclusi, cærulei, bilabiati, parvi, suavissime odorati & aromatici. *Lavendula Spica* L. *Blackwell* Tab. 294. Europæ calidæ; nostras hyemes innoxias fert. Ex nostratis floribus $\frac{1}{2}$ Olei odorati obtinui. *Oleum* fragrantissimum & optimus *Spiritus abstractivus* ex Gallia Meridionali sub nomine *Eau de Lavande* nobis mititur. *Oleum spicæ*, quo ad *Encausticam* & *Vernices* utuntur, est *Oleum Terebinthinæ*, cui paucillum *Olei Lavendulæ* adjectum est. *Lavendula* extus *Nervino* scopo nec non ad *Discutiendum* adhibetur.

LAUROCERASUS. *Folia* breviter petiolata, firma, ovali-oblonga utrinque viridia, superne lucida, inodora, amaricantia, sapore *Nucleos Persicorum* referentia. *Prunus Laurocerasus* L. Ex *Trapezunte* in Europam translata, frequenter in hortis colitur, nobis per hyemem in frigidario asservanda. *Oleum* odoratum fundere hæc folia dicuntur: *menstrua aquosa* æque ac *spirituosa* cum eis infusa gratissimo, quem a *Nucleis* denominant, sapore inde imbuuntur. *Aquam* inde destillatam tam brutis, quam hominibus venenatam esse, testant *Observatores*; eandem ad *Guttas* sexaginta aliquoties de die datam potentissimum *Viscidi tenacis* resolvendi remedium esse; *Foliorum Infusum* in *Obstructionibus Hepatis*; eadem cum *farina* in *Cataplasma* redacta in *Tumoribus* *Scirrhis* egregios effectus edere *Recentioris Medici Angli* observatio est.

LAURUS, *Lavro*, *Laurier*. *Lorber*. Fo-

lia petiolata, ovato-lanceolata, acuta, firma, multis nervis notata proprium odorem gratum spirantia, simili sapore multum aromatico, amaricante prædita. *Bacca* ovata, nigra, exiguo acumine notata, levissime rugosa, sub cuticula tenera & fragili nucleum continent colore Castaneis fere similem, bipartitum, odore laurino, non admodum grato, sapore acri, aromatico, amaro, nauseoso imbutum. *Laurus Nobilis* L. *Blackwell* Tab. 175. Europæ calidæ propria arbor, nobis in frigidario a nostræ hyemis rigore defendenda. *Folia* *Oleum stillatitium* exhibere dicuntur: ex *Baccis Olei unguinosi*, viridis, nauseosi, amari consistentiam *Unguenti* odoremque *baccarum* habentis $\frac{1}{8}$ obtinui. *Foliorum* hodie crebrior in *culinis*, quam in *Medicina* usus est. *Baccæ* *Roborant* & in *Renes* aque ac *Uterum* agere dicuntur, sed *Sanguinem* nimis exastuantes nunquam intus danda, ne vendendæ quidem promiscue sunt a *Pharmacopolis*, ob vehementem, qua in *Uterum* agunt, virtutem. *Externus* earum usus in *Abstergendo* versatur. *Oleum* eandem unguinosum ex Italia nobis miti solet, a vi *Resolvente* potissimum commendabile.

LAZULUS. *Lapis lazulo*, *Lapis pulcherrime cæruleus*, polituram admittit, ad *Chalybis* ictus nullas scintillas emittit, fortiore igne funditur, maculis interdum *Pyritaceis* conspersus est, *Spiritibus acidis* in gelatinam liquatur; colorem a *Ferro*, quod vehit, habet. *Cuprum Lazulus* L. Absurdissima denominatio, cum in eo ne vestigium quidem *Æris* existet. *Zcolithis* adscribendus. Venit ex Oriente. In officinis, more quam maxime reprehendendo *Lapis Armenus* ipsi non raro substituitur. *Cordiales* habere vires olim putabatur. In tenerrimum pollen tritus *Ultramarinum* constituit.

LEMNIA TERRA, *Lemnia Terra*. *Argilla* in bacillos efformata, cum admixta rubedine flavicans, insipida, inodora, superficies pulverulenta digitos tingit, dorso per inæqualia intervalla varia signa impressa sunt. Aliæ quoque *Argillæ* hodie sub hoc nomine prostant.

Argilla Lemnia L. Ex Turcia venire dicitur. *Mirandum profecto est, inertem hanc terram, que adscriptas sibi virtutes soli superstitioni debebat, Veterum tamen auctoritate per tot Secula in celebritate versari potuisse.*

LENS, *Lente, Lentille, Linse*. Semen rotundum, utrinque convexum, margine acuto cinctum, cineracei coloris, qui vero coctione, cum medulla exigui odoris, leguminosi saporis, fuscus evadit. Eryum Lens L. Europæ Meridionalis proprium, passim in agris colitur. Extracti $\frac{1}{4}$ largitur. *Recipiuntur Lentesc in cibum. Olim earum Decoctum Variolis laborantibus salubre ferebatur.*

LENS PALUSTRIS, *Lente Pallustre, Wasserlinsen*. Folia parva, ovata, in cæspites coherencia, succulenta, insipida, inodora, singula inferne filamentum emittunt. Lemna minor L. *Blackwell* Tab. 380. Passim per Europam occurrit. *Refrigerandis partibus Inflammatis sive per se, sive ex Lacte cocta imponitur.*

LENTISCUS videatur MASTYX.

LEPIDIUM, *Lepidi, Passerage, Pfefferkraut*. Folia ovato-lanceolata, serrata, Nasturtini tam odoris, quam saporis, & hujus quidem satis evidenter linguam ferientis. Lepidium latifolium L. Galliæ & Angliæ indigena, hortisque nostris, in quos recepta est, improbo suo reptatu incommoda planta. *Condimenti loco cum Carne comeditur; a quibusdam contra Scorbutum, Sanguinis impuritates &c. commendatur.*

LEPUS, *Lepre, Lievre, Haas*. Lepus timidus L. Notissimum per universam Europam & justo frequentius Quadrupes; nondum anniculus, & in locis præsertim montanis degens, ad cibum optimus est. Astragali, *Talons, Haasensprung*, qui *Talorum* nomine veniunt, sunt ossa oblonga, albida, uno extremo ginglymoideo, altero obtuso, corpore inter utrumque contracto. *Laudabantur ob vires Diureticas; Axungia Linimenti consistentiam, odorem habet injucundum. In Resolvendo laudatur. Pili brunii & molles olim ad Unguenta Hemorrhagias sistencia recipiebantur. Lepus in olla tecta*

in carbonem conversus, sive *Ustus*, *Lithontriptico scopo exhibebatur.*

LEVISTICUM, *Levêche, Liebstaekel*. Radices fibrosæ, flavæ, intus albæ, sapore proprio, non ingrato, acri, aromatico, dulciculo etiam, odore fragrante, non nauseoso, aromatico instructæ. Folia petiolata, duplicato-ternata, foliolis majusculis, cuneiformibus lobatis, superne incisus, odorem & saponem Radicum, utrumque tamen remissionem habent. *Semina ovalia, majuscula, tuberculo pyramidali terminata, alata, flava, tam sapore quam odore Radices & Folia superant. Ligusticum Levisticum L. Blackwell* Tab. 275. In alpibus Italiæ sponte, in hortis nostris culta crescit. Oleum odoratum fundere fertur. *Angelicæ vires, sed mitiores habet; contra Uteri morbos maxime commendatur.*

LICHEN ISLANDICUS, *Purgiermoos*. Ex foliis efformatur suberectis, coriaceis, flexilibus, versus basin latioribus, intus fuscis, extus albis, laciniatis laciniis latiusculis, denuo laciniatis, ciliatis, exiguis lacunis adspersis, inodoris, amaricantibus. Lichen Islandicus L. Passim Europæ faxis accrescit. Cum aqua Gelatinam rubicundam formare, *exsiccat, in pulverem redactus & Lacte, elixatus in alimentorum locum subire; lenissime Album ducere Aqua cum eo decocta, aut pulmentum cum Lacte inde paratum Phthysicis conducere fertur.*

LIGUSTRUM, *Ligustro, Træsne, Hartriegel, Dintenbeerlein*. Folia ovato-lanceolata, integerrima, superne læte, inferne pallide viridia, leviter adstringentia & amaricantia. Flores infundibuliformes, recentes albi & fragrantis, exsiccati vero flavii, inodori. Ligustrum Vulgare L. *Blackwell* Tab. 140. Ubi cumque Europæ, citra maxime Septentrionalem, domestica planta. *Tam Folia quam Flores ad Gargarismata interdum recipiuntur. Iners omnino est Aqua inde destillata.*

LILIUM ALBUM, *Giglio bianco, Lis, Lilie*. Radicum exsiccatarum squamæ, inter se separatæ, plus minus flexæ, duriusculæ, fragiles, carneo colore, insipidæ, inodore. *Florum petala asservantur*

tur alba, membranacea, saporis & odoris vacua, odor enim & sapor una cum pulpa exsiccatione perit. Liliū candidum L. *Blackwell* Tab. 11. Orientis progenies, copiose in hortis nostris colitur. Radices creberrime extus scopo Emolliendi & Suppurandi adhibentur; Flores recentes fragrantium effectus edunt, exsiccati plane inertes sunt; neque proprii quid habent Aqua inde destillata, vel Oleum cum eis infusum.

LILIUM CONVALLIUM, *Mughetto*, *Muguet*, *Mayenblümlein*. Flores campanulati, sexfidi, albi, amaricantes, dumque recentes sunt, suavissime olentes, exsiccati inodori. Baccæ rotundæ, rubræ, pulpa rubro-flava, plura semina vehemente refertæ, inodoræ, amaræ. Convallaria Majalis L. *Blackwell* Tab. 70. Crescit qua patet Europa. Flores recentes fragrantia sua Resocillant, exsiccati ad Pulveres Sternutatorios recipitur; Baccas in Pulverem redactas Epilepticis salubriter datas fuisse relatum legimus. Aqua inde destillata & Spiritus abstractitius inertes sunt.

LIMAX, *Lumaca*, *Lumacon rouge*, *rotte Schnecke*. Est Vermis nudus, oblongus, crassiusculus, tentaculis instructus. Limax subrufus L. Frequens per Europam. Visceribus exemptis ad Juscula Antihæctica recipitur.

LIMON videatur CITRUS.

LINARIA, *Linaria*, *Linair*, *Harnkraut*. Folia angusta, oblonga, acuta, exigue amara, post exsiccationem inodora. Antirrhinum Linaria L. *Blackwell* Tab. 115. Vulgaris per Europam. Hæmorrhoidibus applicatur sive ex Lacte cocta, sive in Unguentum recepta.

LINUM, *Lino*, *Lin*, *Flachs*. Semina ovato-oblonga sunt, compressa, uno extremo acuta, cortice lævia, splendentia, ex fulvo-albicantia, nucleum album & dulcem comprehendunt. Linum Usitatissimum L. *Blackwell* Tab. 160. Europæ Australis domesticum, passim per agros cultum. Semen Olei unguinosi circiter $\frac{1}{5}$, Mucilaginis ultra $\frac{1}{6}$ largitur; & ad hanc quidem extrahendam cum Aqua fervida Semen infundendum est. Cum fervida infusum adversus Renum Dolores intus; ad Clysmata & Cataplasmata

sopientia extus adhibetur. Olei inde expressi, flavi, insuavis internus usus contra Volvulum, Pleuritidem, Colicam præscribitur; sub forma Clysmatis injectum principem inter Medicamenta Anticolica & obstructam Alvum referantia locum tenet.

LINUM CATHARTICUM. Caules filiformes, teretes, foliis ovatis, parvis, subacutis oblesis, inodori, amaricantes, levissime falsi. Linum Catharticum L. *Blackwell* Tab. 368. Vulgaris per Europam planta. Cum aqua infusum aut sub forma Pulveris haustum Alvum ducere fertur.

LITHARGYRIUM, *Litargirio*, *Litharge*, *Silberglatte*. Substantia friabilis, ex squamis plus minus rufescentibus aut flavicantibus, non raro splendentibus composita, sapore adstringens. Oritur ex Plumbo, Metalla nobilia in cineritio majore depurante; itaque vitrum Saturni est, Ære aliisve metallis ignobilioribus contemperatum. In Lithargyrium Auri & Argenti distinctio abscondita est. Ad Unguenta & Emplastra recipitur.

LOOK GUMMI. *Succinum India Occidentalis*. In frustis permagnis nobis mittitur flavicantibus, pellucidis, tenue sed suaveolentibus, inter dentes lentescētibis, ad flammam fluentibus, flammam concipientibus, olidum fumum emittentibus, in Alcohole non dissolubilibus. Advehitur ex Africa. Instar aliarum Resinarum adversus Odontalgiam & Cephalalgiam Temporibus imponebantur. Non raro isti, quod Gummi Gopal nomine venit, substituitur.

LOPEZIA. Radix cujus variæ crassitie frustra in Europam mittuntur, quale ego possideo B. *Gaubii* amicitiae debitum, sesqui pollicem fere crassum, leve, album, solidum, cortice flavicante, rugoso, laxo; tactu fere tomentoso tectum. Radix nec odora, nec sapida, Cortex tenuiter amarus est. *Redi Experiment. circa varias Res Natural.* Amstel. 1681. p. 138. Radicis, a *Johanne Lopet* in littore Africae repertæ, & ab eodem denominatæ, mentionem facit; diu neglectam *Gaubius* denuo in usum traxit & eam sive in Decocto sive sub forma Pulve-

ris ad Drachmam semis aliquoties de die daturam in vario Alvi fluxus genere, Diaribaca maxime colliquativa egregia conducere tam sua quam aliorum experientia confirmavit. Enorme, quo Amstelodami venditur, pretium inhibuisse videtur ulteriora ejus tentamenta. Venit nobis ex Goa.

LUCIUS, *Luccio, Brochet, Hecht*. Aquas dulces inhabitans Piscis. Esox Lucius L. digestu facilis. *Axungia Asciae Axungiae* factis similis. *Fel Humor liquidus*, ex flavo viridis, amarissimi saporis, contra *Corneae vitia Abstergendi* ergo usurpatur. *Mandibula inferior*, antice sursum flexa, dentibus anterioribus parvis, posterioribus majoribus instructa, flavicans, insipida, inodora, olim *Pleuriticis* commendabatur.

LUMBRICUS TERRESTRIS, *Lombito terrestre, Ver de Terre, Regenwurm*. Vermis calami anserini fere crassitie, coloris dilute rubicundi, odoris tenuis, ad mucidum vergentis, saporis expers. *Lumbricus terrestris* L. Ubivis obvius. *Gelatinæ siccae* $\frac{1}{2}$ inde obtinui. Contra *Arthritidem Succi expressi Uncia una* pro dosi, aut *exsiccatorum Pulveris Drachma semis* exhibetur.

LUNARIA RACEMOSA, *Lunaria, Lunaire, kleine Mondraute*. Folia crassiuscula, pinnis lunatis pinnatifida, inodora, sapore adstringente prædita. *Osmunda Lunaria* L. *Blackwell* Tab. 420. Passim per Europam invenitur. *Plurimæ de ea circumferuntur fabellæ. Adstringendi scopo* subinde adhibebatur.

LUPINUS, *Lupino, Lupin, Feigbohne*. Semen compressum, rotundum, margine leviter angulato, sub cortice albo medullam albam & amaram includit. *Lupinus albus* L. *Blackwell* Tab. 282. In hortis colitur. *Crebris in Aqua lotionibus amaritie demta, per Europam Meridionalem in cibum recipitur; apud nos Farina ejus Resolvendi & Abstergendi scopo* extus adhibetur.

LUPULUS, *Lupolo, Houblon, Hopfen*. Turiones sunt parvi, graciles, angulosi, exiguis nodulis distincti, extus subrusi, intus albi, gustu subamari, evidenter aromatici, *Strobili seu Flores* feminini

sunt Amenta e squamis ovatis, siccis; flavicantibus, laxis, extus leviter pubescentibus, intus glabris, uni communi axi affixis efformati; odorem aromaticum spirant, similemque produnt saporis amaritie submistum. *Humulus Lupulus* L. *Blackwell* Tab. 536. Per omnem Europam crescit; cultura strobilorum non magnitudo modo, sed sapor etiam & odor augentur. *Turiones Extracti aquosi saporis salini* $\frac{1}{2}$ largiuntur, *Decoctum eorum rubrum est. Primo vere exquisitum Olus præbent & ad Juscula aperientia recipiuntur, Strobilorum præcipuus ad Cerevisiam usus est. Laudantur ob vim Roborantem, Aperientem & Diureticam.*

LUPUS, *Lupo, Loup, Wolf*. Animal quadrupes Cani simillimum, a quo sola vita sylvestri differre videtur. *Canis Lupus* L. Per omnem Europam occurrit; ejus *Hepar minus densum & rubrum Vino coctum, exsiccatum & in Pulverem redactum contra Hydropem & Hydrophobiam* commendantur; *Axungia nihil proprii habet.*

LYCOPodium, *Pied de Loup, Barlapp*. Semen Pollen Antherarum, tenuitate sua tactum fere fugiens, flavum, inodorum, linguam leviter adstringens, candelæ luminis incussum fulguris instar accenditur. *Destillatione principia Cerae edere dicitur. Lycopodium Clavatum* L. *Blackwell* Tab. 535. Passim per Europam crescit. *Internum ejus usum scopo Diuretico sunt qui laudent; extus Intertrigini aspergitur.*

LYSIMACHIA, *Lisimacchia, Corneille, Perce-bosse, gelber Weiderich*. Folia ovato-lanceolata, margine ferrata, utrinque molliuscula, viridia, sapore linguam adstringentia. *Lysimachia vulgaris* L. *Blackwell* Tab. 278. Totius Europæ. *Tanquam Adstringens & Vulnerarium olim laudatur, ad Gargarismata quoque recipiebatur.*

MACIS, *Mace, Fleur de Muscade, Muscatenblüthe*. Substantia membranaceo-pulposa, pinguiscula, ex laminis angustioribus retis instar flexis efformata, coloris, dum recens est, chermesini, exsiccata lutescentis, incumbit *Nuci Moschatæ*. *Aqua marina conspersa, saccisque, aëre excluso atque prohibito, arctissime*

inclusa mittitur nobis ex Insulis Moluccis. Olei unguinosi, brunii, spissi, odoratissimi $\frac{1}{5}$; Olei destillati $\frac{1}{4}$ largitur. *Primarum viarum Roborandarum gratia tam cibis quam medicamentis adhibetur. Anodyne inde sperantur vires.*

MAGNES, Calamita, Aimant, Magnet. Est Lapis grysei plus minus lutescentis coloris, Ferrum dum funditur dimittit, integer illud attrahit & ad Polos Mundi vim suam dirigit. Ferrum Magnes L. Passim in Ferrifodinis Europæ offenditur. *Olim satis absurde ad extrahendum e Vulneribus Ferrum adhibebatur; hodie adversus Odontalgiam & effectus Spasmodicos extus applicatus laudatur.*

MAJORANA, Maggiorana, Marjolaine. Folia crassiuscula, ovata, albida, obtusa, proprio fragrante odore & sapore aromatico subamaricante instructa. Origanum Majorana L. *Blackwell Tab. 319.* Europæ calidioris domestica, in nostris hortis copiose colitur. Olei odorati $\frac{1}{4}$ largitur. *Interdum ad condiendos cibos adhibetur. Extus ad Medicamenta Nervina, Discutientia & Sternutatoria recipitur.*

MALACENSIS LAPIS videatur LAPIS HYSTRICIS.

MALTA, Drêche, Malz. Est Hordeum aqua madefactum, ad germinandum in acervos congestum & deinceps solerter exsiccatum; colore ad brunum aecedit, odorem non admodum gratum, saporem dulcem habet. *In aquæ ebullientis triplo per aliquot horas maceratum omnium saluberrimum Scorbuticis, nec non Sanguinis acrimonia laborantibus remedium esse asseritur, quem in finem tres ad quatuor usque libræ Infusi agrotis quotidie propinantur.*

MALVA, Malva, Mauve, Pappel. Radices fibrosæ, albæ, digito non crassiores, dulces. Folia cordata, orbiculata, petiolata, pubescentia, lobata, insipida, inodora. Flores asservantur duplici calyce, exteriori trifido, interiori quinquefido sustentati, pallide rubri, odoris pariter ac saporis expertes. Semina parva sunt, reniformia, grysea, sapore mucilaginoso. Malva Rotundifolia L. *Blackwell Tab. 22.* Vulgaris per omnem Europam.

In Emollientium numero habetur; vulgo Althæam ei præferunt,

MALVA ARBOREA, Rose tremiere, Erndtrose. Flores profunde quinquefidi, creberrime pleni, nigricantes, duplici calyce tomentoso sustentati, odore vacui, sapore adstringentes. Alcea Rosea L. *Blackwell Tab. 54.* Orientis indigena, copiose in hortis Europæis colitur. *Recipitur maxime ad Gargarismata Roborantia.*

MANATI LAPIS. Varia magnitudine ad nos pervehitur. Est Dens oblongus, latus, utrinque convexus, superne variis rugis & tuberculis insignitus; minores autem prorsus læves sunt, lævi & longitudinali sinu distinctus, inferne cavitate magna conspicuus, uno latere inferne introrsum flexo, crassissimo, altero admodum tenui, in duo minora tubera distincto; majores lutei, minores albi, intus promiscue albissimi, omnes insipidi sunt. Est Dens molaris Trichechi Manati L. in Oceano Africam & Americam alluente degentis. Iners omnino os olim ad cobibendas Hæmorrhagias efficax ferebatur.

MANDRAGORÆ RADICES, Radici di mandragola, Alraun. Asservantur Cortices Radicum tenaces, extus grysei, intus pallidiores, striati, inodori, levissimo sapore salino imbuti. Atropa Mandragora L. *Blackwell Tab. 346.* Europæ calidioris planta nostras hyemes innocua fert. Mitius agere Cortex videtur, quam Radix; huic vel ad pauca Grana absorptæ vires Narcoticæ tribuuntur; extus sub forma Cataplasmatum Glandulis induratis imponitur.

MANNA. Succus inspissatus ex albo levissime lutescens; proprio, admodum dulci sapore, exiguo odore, in frustis variæ figuræ & magnitudinis ad nos transmittitur. Ex variis Fraxini L. generibus, in Italia crescentibus, summa æstate exsudatur; Sole exsiccatum inde deraditur. *Canellata longa* Paris. frustis purissimis efformatur, aliquot pollices longis, unum circiter latis, una facie concavis; obtinetur frustis a cortice trunci excisis, loca vulnerata succo redintegrante. *Manna vulgaris Granulata* Paris. tam figura,

ra, quam magnitudine variat; truncus eam sponte æque, ac vulneratus exsudat; frustra inde majora quæque, albidiora & sicciora Seplasiarii feligunt & *Electæ* nomine vendunt. Mannæ, pro foli natalis diversitate; diversi sunt bonitatis gradus. Optima habetur, quæ ad Giraci, Calabriae ulterioris urbem, colligitur; hanc sequitur, quæ nobis ex Siciliae urbe Capachi venit, in commercio *Siciliensis* dicta; quæ rursus, quam *Calabrinam* vulgo nominant, antecellit, reliquæ apud nos in usu non sunt. *Manna Crassa, Spissa & Sordida* Paris. multum colorata, humida, fordibus inquinata, creberrime adulterata, omnino ex Pharmacopoliis eliminanda. Solvitur Manna in Aqua æque ac Spiritu Vini, neutiquam in Oleis. Frigida ejus solutio nauseam minus movet, quam quæ calida exhibetur. *Aptissimum ad Alvi ductiorem, quippe omni ætati convenientissimum & in omnibus morbis tutissimum medicamentum; recto quoque consilio Enematibus immiscetur. Dosis est ad Uncias duas & ultra.*

MARGARITÆ, *Margherite, Perles, Perlen*. Calculi Margaritæ L. Sunt corpuscula plus minus rotunda, candicantia ex squamis sibi invicem incumbentibus efformata, diaphana & hæc quidem *Margaritæ Orientales* dicuntur, quarum nonnisi minime *Textiles, Saat-vel Lothperlen, Perles à l'once, Semence des Perles* nominatæ, in Pharmacopolia recipiuntur. *Occidentales* minus splendent, colorem lacteum, superficiemque ut plurimum in tubercula erectam habent. Priores capiuntur ex Mytilo Margaritifero L. Sinus Persici & Maris Australis Conchylio. Posteriores Mya Margaritifera L. potissimum largitur, variorum Europæ fluviorum alumna. Quod Oculi Cancrorum, id Margaritæ in conchis, ædemque ab utrisque expectandæ sunt vires.

MARRUBIUM, *Marrobio, Andorn, Πράσιον*. Folia subrotunda, crenata, rugosa, pubescentia, levissime odora, sapore amaro, cui aliquid salini accedit imbuta. Marrubium vulgare L. *Blackwell* Tab. 479. Crescit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem. Ejus ianu-

sum Sanguinem e Vena emissum & rubicundiorum & fluidiorum reddidisse lego. *Resolvendi ergo usurpatur.*

MARUM. *Folia parva, acuta, crassiuscula, leviter pubescentia, odore proprio aromatico, sapore imbuta amaricante, evidenter linguam feriente. Teucrium Marum L. Europæ calidioris indigenum, nobis per hyemem in frigidario asservandum, semper a felibus defendendum. Oleum destillatum valde pungens fundere dicitur. Intus, sub forma Pulveris, Viribus Cephalicis efficax perhibetur; extus Pulveribus Sternutatoriis admiscetur.*

MASOY CORTEX. Tenuis est, fere planus, coloris Cinnamomei obscurioris, cortice gryseo, striato tectus, suaveolens, saporem habens dulcem, grato aromate Cinnamomum referente suffusum. Ex India olim advectus *Roborantibus annumerabatur.*

MASTYX. Resina ad nos pervehitur sub forma granorum majusculorum, maximo tamen Avellanæ magnitudinem nunquam æquante, fragilis, ex fractura splendens & lævis, inter dentes tenax, instar Cerae flexilis, odore proprio, grato, similique sapore, nonnihil adstringente perfusa. Mastix ex his granis, mediante alia quadam Resina conglutinatis ortæ, albide *Mastyx in sorten* dicuntur. Profluit Mastyx ex Pistacia Lentisco L. *Blackwell* Tab. 195. Europæ Meridionalis, Archipelagi & Syriæ arbore, apud nos in frigidario per hyemem asservanda, quæ in tractu meridionali Insulæ Chio Augusto & Septembri mensibus hunc in finem incidi solet. Eiusdem arboris *Lignum* quoque sub nomine *Lentiscini* occurrit ponderosum, ex pallido-flavescens, cortice paululum rugoso, levissime rufescente tectum, odoris & saporis expers. Mastiches grana aliquantulum Olei odorati fundere dicuntur, & in expressis Oleis indissolubilia habentur, Aqua dissolvuntur, igne liquantur, accensa jucunde olent. *Intus ad Scrupulum unum pro dosi roborandis Primis vis adhibentur. Extus firmandis Dentibus conducunt Dentifriciis admixta. Suffitus eorum,*
tan-

tanquam Roborans, in Catarrhis & Prolapsibus Ani laudatur. Ligno quoque Lentisci olim ad Roborandum utebantur.

MATER PERLARUM, *Madreperla, Nacre des Perles, Perlenmutter*. Est Testa Conchæ, variæ magnitudinis, orbicularis, lamellis dentatis imbricata, extus grysea ad flavedinem vergens, intus argenteo candore splendens; Margaritas Orientales nobis exhibet. *Ceteris Testis viribus medicatis non præstat.*

MATRICARIA, *Matricale, Matricaire, Metram*. Folia petiolata, pinnis ovatis, inciso-ferratis, albidis pinnatifida, odorem exsiccata nullum, saporem leviter amarum habent. *Matricaria Parthenium* L. *Blackwell* Tab. 192. In Europa, citra magis Septentrionalem, ubi vis indigena. Oleum destillatum fundere dicunt. *Morbis Uteri dicata.*

MATRISYLVA, videatur **HEPATICA STELLATA**.

MECCÆ BALSAMUM, *Opobalsamum*. Resina liquida, Terebinthina quidem fluentior, ceteris vero Balsamis liquidis spissior, coloris citrini, ad rubrum vergentis, odoris fragrantis, Citro proximi, saporis amaricantis, leniter linguam pungentis. Amyris Gileadensis e *Pharmacopœa Suecica* adducitur. Amyris Opobalsamum L. Arbor Arabiæ Petrææ. In Alcohole & Oleis dissolubile deprehensum est. Nullum certum extare genuinitatis ejus indicium alibi notavi. *Miræ vires, quas de eodem in vulgus sparsit rumor, fide sunt destitutæ, quo minus, quam reliqua Balsama exotica, humores exæstuat, eo ad consolidanda Ulcera interna aptius merito habetur.* Eiusdem arboris exigua etiam virgulæ **XYLOBALSAMI** nomine servantur, cortice rugoso, cinereo obductæ, insipidæ, inodoræ, gratum vero odorem, simulac accenduntur, spirantes. **CARPOBALSAMUM** ejusdem arboris fructus exsiccati sunt, capsulæ subrotundæ, Pisis minores, rugosæ, quatuor lineis eminentibus insignitæ, superne exiguo stylo notatæ, ex cinereo-rufescentes, inodoræ, levi sapore balsamico suffusæ, nucleum album includentes. Utrorumque usus medicatus exolevit.

MECHOACANNA. Taleolæ forma Jalappæis fimiles, ambitu majores, inodoræ, dulciculi saporis, sub gryseo cortice substantiam recondunt albam, solidam, friabilem, non fungosam, circulis distinctam. *Convolvulus Mechoacanna* L. *Blackwell* Tab. 571. Americæ Meridionalis civis. Resinæ aliquantillum vehere dicitur. *Vires quidem Catharticas, sed valde debiles edit. Ad aliquot Drachmas ejus Dosis extendi potest.*

MEDULLA SAXORUM, *Steinmark*. Argilla mollis, contactu saponis instar lubrica, cum aqua agitata exspumans, linguæ leviter adhærens, grysea, flava, rufescens. Talcum Lithomarga L. In rimis montium delitescit. *Adstringendi ergo olim usurpabatur.*

MEL, *Mele, Miel, Honig*. Substantia mollis, spissa, alias alba, alias ex badio-flavescens, dulcis, odoris proprii, plantarum subinde, unde haustum erat, participis. Ab Ape Mellifica L. ex nectariis florum conquiritur, deglutitur, evomitur, in favorum cellulas reconditur; unde favis diffractis, quod ad lenem calorem defluit *Virgineum* dicitur; pertinacius cellulis inhærens, quod torculari deinde exprimitur, bonitate inferius est. Quo pallidius est atque granosius, eo melius judicatur. Narbonense ad vicum, Narbonæ proximum, *Courbiere* collectum albissimum, granosissimum, Rosmarinum olens, omnium princeps habetur. *Resolvendi, Aperiendi, Demulcendi viribus intus pollet, extus ad aperiendos Abscessus, abstergendæ Ulcera, aperiendam Alvum adhibetur.* Aqua inde destillata vix proprii quid habere videtur.

MELILOTUS. Summitates angulares *Foliis obsessæ ternatis, ovali-oblongis, truncatis, ferratis & racemis Florum papilionaceorum, exiguo calyce sustentatorum, flavorum, odoris fortis, injucundi, saporis amaricantis.* Trifolium *Melilotus officinalis* L. *Blackwell* Tab. 80. Ubique locorum per Europam crescit. *Discutiendi Doloresque sedandi scopo extus adhibentur.*

MELILOTUS CÆRULEA, *Meliloto*

ceruleo, *Trefle musqué*, *Beaumier*, *Sie-bengezeit*. Flores papilionacei, parvi, calyce sustentati, pallide cærulei, odoratu valde balsamici. Trifolium Melilotus cærulea L. *Blackwell* Tab. 284. Patria incerta, annua planta in hortis colitur. *Vires Diureticas*, *Emenagogas* imo *Alexipharmacas* habere fertur. *Adhibetur ad Caseum rasilem Glaronensium*.

MELISSA. Folia petiolata, cordata, rugosa, leviter hirsuta, odorem gratum Citri, similemque saporem habent. Melissa officinalis L. *Blackwell* Tab. 27. Europæ Meridionalis herba, in nostris hortis colitur. Oleum odoratum fundere; *contra affectus Capitis* pollere dicitur; *extus ad Epithemata Roborantia & Discutientia* recipitur.

MELISSA CANARIENSIS. Folia ternata, duobus inferioribus minoribus, oblonga, acuta, ferrata, rugosa, hirsuta, Camphoram redolentia, gustu aromatica, leviter amaricantia. Dracocephalum Canariense L. In Insulis Canariis & in America sponte crescere dicunt, a nostratis hyemis rigore in frigidario tuetur. *Efficax omnino esse videtur, sed nullæ de ejus effectibus observationes exstant*.

MELISSA TURCICA, *Moldavica*. Folia oblonga, obtusa, dentata, angusta, proprio odore & sapore forti, sed prioribus minus grato. Dracocephalum Moldavica L. *Blackwell* Tab. 551. Moldaviæ domestica, annua planta in nostris hortis colitur. *Sunt, qui eam Melissæ officinali substituant*.

MELISSOPHYLLUM, *Melissa di Montagna*, *Lanium Plinii male*, *Melisse de Montagnes*, *Grieskraut*. Folia petiolata, ex ovatis acuta, hirsuta, odore proprio aromatico, non ingrato, similique sapore. Melitis Melissophyllum L. Ubique locorum Europæ, præter maxime Septentrionalem, obvia, *Viribus a reliquis plantis aromaticis minime differt; ad purgandos a muco & sabulo Renes, nec non ad pellendos Menses salubriter adhibetur*.

MELITENSIS FUNGUS. Scapus exsiccatus, varie flexus, radicis speciem præ se fert, profunde striatus, extus ni-

gricans, intus ex luteo-rufescens, odoris vacuus, saporis falsi, levissime adstringentis. Cynomorium Coccineum L. Parasitica planta radicibus variarum arborum Italiæ, Mauritanix &c. innascens, *Ad sistendas Hemorrhagias ad Drachmam unam pro dosi commendatur. Cruentatis Gingivis sub forma Dentrificii atteritur*.

MELO. Fructus variæ magnitudinis, interdum vix pugnum, interdum majores etiam Cucurbitas æquans, viridis, mox oblongus, alias glaber, alias fibris albis eminentibus in modum retis obductus, tuberculis etiam quandoque, obfessus quod ubi accidit, a *Cantaloupa* denominatur; sub cortice nunc crassiore, nunc teneriore pulpam includit, sive viridem, sive rubram, sive flavescentem, plus minus suaveolentem, subinde aromaticam, semper vinosam & dulcem, cui *Semina* inhærent minora, ovata, compressa; ex albo-flavicantia, inferne marginata & angustata, sub cortice duriusculo nucleum album continentia. Cucumis Melo L. *Blackwell* Tab. 320. Ex Oriente ad nos transmissa copiose colitur; nostratibus finctorum calore maturatio fructus acceleranda est. *Pulpa Refrigerandi ergo comeditur. Semina quatuor Frigidis majoribus accensentur*.

MENTHA BALSAMINA, *Münzbal-sam*. Folia ovata, acutiuscula, petiolata, ferrata, glabra, odore Mentharum proprio, jucundiore aromate suffuso, similique sapore. Mentha Gentilis L. Europæ Australis planta, nostræ hyemis facile patiens. Olei odorati paucillum fundere lego. Omnes Menthæ promiscue viribus *Stomachicis* eximie pollent & *Vomitum* sistunt. *Hæc nostra Species commode sub forma Infusi dari potest*.

MENTHA CRISPA. Folia cordata, rugosa, subtus leviter pubescentia, margine dentata & plicata, odore mentha-ceo gravi, minus grato, sapore aromatico, amaro. Mentha Crispa L. *Blackwell* Tab. 290. 2. Sibirix indigena, in hortis nostris colitur. Olei odorati $\frac{1}{2}$ largitur. *Aqua inde abstracta intus datur; ipsa per se sub forma Epithematis Carninativo & Antemetico scopo Abdomini;*

*Mammis vero ad Lac discutendum impo-
nitur.*

MENTHA PIPERITIS. Folia ovato-oblōnga, acuta, viridia, ferrata, odore & sapore Piperi supparia. Mentha Piperitis L. *Blackwell* Tab. 291. Angliæ propria, optime in nostris hortis vegetat. Oleum inde destillatum, quod ex foliis exsiccatis melius, quam ex recentibus paratur, fervidissimo sapore linguam non sine sensu frigoris ferit. Hujus Olei & Aquæ stillatitiæ ope *Rotulae* parantur gratissimæ. Hæc Species omnes reliquas efficacia vincere videtur.

MENTHA RUBRA vel **AQUATICA.** Folia ex ovatis acuminata, glabra, majuscula, ferrata, odori & saporibus evidens gratum aroma suffundunt. Mentha Aquatica L. *Blackwell* Tab. 32. Copiose per Europam crescit. *Ad Balsaminæ vires accedit.*

MENTHASTRUM, *Mentha longifolia.* Folia lanceolata, acuta, tomentosa, acute ferrata, saporem & odorem *Crispæ* referunt, suavitate etiam superant. Mentha sylvestris L. *Blackwell* Tab. 290. 1. Europæ temperatæ planta. *Rarissime in officinas admittitur.*

MERCURIALIS, *Bingelkraut.* Folia ovata, acuta, petiolata, ferrata, insipida, inodora. Mercurialis annua L. *Blackwell* Tab. 162. Vulgaris per Europam temperatam. *Emollientibus quondam adnumerabatur.*

MERCURIUS, *Argentum vivum, Hydrargyrum, Quecksilber.* Est Substantia fluida, quindecies aqua gravior, calore minore etiam quam quo aqua ebullit, volatilis, frigore valde intenso, in massam solidam, solo calore in pulverem rubrum convertitur, plurima corpora metallica dissolvit, vi omnium fere menstruorum dissolvenda. Invenitur sive natus, *Mercurius Virgineus*, sive Sulphure in Cinnabarin versus, in quem ubi vertitur, pro variis, quibus inhæret terris, varias *Mineras* efformat. Reperitur in variis Europæ montibus. Cuticula tectus, aut cujus globuli filum quasi trahunt, pejoris notæ judicatur. Depurandi ratio, quæ Destillatione fit, optima est.

Trituratione cum solidis vel unguinosis globularem formam deponit, & substantiis, cum quibus teritur, colorem nigrum affricat. *Potentissimum Resolvens, certissimumque morborum Venereorum remedium, utpote quod vel minutissimis vasculis, quæ cetera medicamenta adire non possunt, sese insinuat. Tam intus quam extus adhibetur.*

MESPILI, *Nespole, Nestes, Mespeln.* Fructus turbinato-rotundi, colore rubiginoso tincti, umbilico quinquefido coronati, villo obfessi, recentes quidem quam maxime austeri, ab arbore decerpti lento gradu mitescentes, & saporem nanciscentes vinosum, gratum, evidenter adstringentem. Exsiccati fuscissimi sunt, valide etiam adstringentes. *Mespilus Germanica* L. *Blackwell* Tab. 154. Europæ temperatæ propria. *Exsiccati fructus subinde ad medicamenta Adstringentia accipiuntur.*

METALISTÆ RADIX. Prostat sub forma frustorum variæ magnitudinis ac figuræ, mox rotundis taleolis *Mechoacannæ* similia, mox secundum longitudinem secta; sectio transversalis circulos, longitudinalis fibras refert; extus striis crassiusculis notata, grysea, intus pallidior est; odoris expers, saporis levissime falsi. Ex America advehebatur, & *Mechoacannæ analogæ esse credebatur.*

MEUM, *Barwurzel.* Radix fusiformis, aliquot pollices longa, calamus crassa, rugosa, extus ex gryseo-fusca, intus alba, odore proprio, sapore aromatico, protinus dulci, postmodum falso. *Æthusa Meum* L. *Blackwell* Tab. 525. Europæ temperatæ: *Virtutis Diureticiæ, Emenagogæ & Resolventis laudem habet.*

MEZEREUM, *Thymelæa, Laureola, Mezereon, Bois gentil, Bois de Garou, Saint bois, Seidelbast.* Cortex mollis, tenax, rufescens, inodorus, saporis acerrimi. Desumitur a Frutice *Grana Coccognidii* exhibente. *Validissimum Drastrictum nunquam intus dandum; extus applicatur ut Fonticuli vices expleat.*

MILIUM SOLIS, *Lithospermum, Migliasole, Gremil, Herbe aux Perles, Meerbirse.* Semina rotunda, inferne contra-

sta, alba, nitida, sub cortice duriusculo medullam includunt fuscam, odoris & saporis expertem, cum Acidis effervescentem. Lithospermum officinale L. Vulgare per Europam. Olim scopo Lithonriptico adhibebatur. Syrupus inde paratus ab Ambrosio denominabatur & Dysenteriae mederi putabatur.

MILLEFOLIUM, *Schaaßgarben*. Folia longa, leviter pubescentia, pinnata, pinnulis obovatis denuo aliquoties pinnatis, tenuis aromatici odoris, saporis amaricantis, levissime falsi. Achillea Millefolium L. *Blackwell* Tab. 18. Per omnem Europam obvium. Oleum inde destillatum semper, ego flavum, nunquam caeruleum obtinui. Commendabatur ad reserandas Obstructiones Abdominales, extus Vulnerario scopo adhibetur. Achillea Nobilis L. Camphoram redolens, eminentius aromatica utique praeferenda videtur.

MILLEPEDES, *Mille piedi, Cloportes, Maueresel, Kelleresel*. Insecta superne ex cineritio-nigricantia, inferne albida, corpore ex circellis composito, & cute duriuscula tecto, sapore leniter falso; nigri, majores, corpus in globulum contrahentes reliquis praeferendi. Oniscus Afellus L. Per omnem Europam occurrit, in regionibus calidioribus major est & nigricantior. Exsiccati Gelatinae multum nauseosae $\frac{1}{7}$ largiuntur. Aperiendi, Sanguinem Depurandi, Urinam expellendi causa centum & ultra pro dosi recentium contritorum cum jusculo mistus Succus propinatur. Conservam inde parandi labor, cum recentes per totum annum haberi possint, superfluus est.

MINIUM. *Menning* neutiquam Veterum, Calx Plumbi est in peculiaribus Angliae, Belgii & Germaniae officinis in colorem laete rubrum calcinata. Recipitur ad Unguenta & Emplastra.

MOMORDICA, *Pomum Hierosolymitanum, Momordica, Pomme de Merocilles, Balsampfel*. Pomum in medio ventricosum, utrinque contractum, pulchra rubedine tinctum, pluribus tuberculis notatum, multis seminibus turgens, insipidum, inodorum. Momordica Balsa-

mina L. *Blackwell* Tab. 537. Indiae indigena annua planta, apud nos in hortis colitur. Oleum unguinosum cum his fructibus infusum ad usus Vulnerarios quondam commendabatur.

MORINGA. Radix semipedem circiter longa, pollicem crassa, sub cortice crasso striis longitudinalibus notata, ex gryseo-lutescente, substantiam includit lignosam, pallidiorem, tenuissime extus striatam, valde duram, intus non sine splendore laevem, inodoram, sapore falso magis quam aromatico linguam ferientem. Num est Radix Arboris Noces Behen praebentis? Ex India Orientali olim advecta contra Venena, Vermes & morbos Cutaneos efficacia ejus laudabatur.

MORUS, *Moro, Meurier, Maulbeere*. Radices habet fibrosas, flavas, inodoras, sapore dulci potius, quam amaro praeditas; Baccas lucidiusculas, sanguineo-nigricantes, ex acinis obovatis compositas, saporis proprii, vinosi. Morus nigra L. *Blackwell* Tab. 126. Italiae indigena esse dicitur, copiose in nostratibus hortis colitur. Radicum Decoctum egregie contra Taniam efficaciae esse fertur. Baccae Refrigerandi gratia comeduntur. Rob & Syrupus inde parati ad morbos Faucium adhiberi solent.

MOSCATA NUX, *Noce moscata, Noix Muscat, Muscatennusse*. Noces olivares, oblongas *Mares*, una vero facie planas *Muttermuscatnusse* vulgo appellant, extus gryseae sunt, sulcis in retis speciem flexis insignitae, duriusculae, fragiles, fractura fuscae & nitidae, intus lineis rubris variegatae, odoris proprii, grati saporis aromatici, pinguiusculi potius, quam acuti. Arboris Moluccarum Bandae maxime cultae character nondum omnino determinatus est. Olei unguinosi $\frac{1}{3}$, Olei odorati $\frac{1}{6}$ fundunt Noces Sole siccantur, fumo & aqua Calcis viva a corruptione defenduntur. Vi Roborante & Anodyna pollent. Oleum expressum Sebi consistentiam, colorem flavum, Nucum odorem, saporem etiam pinguiorem habet, & ad eosdem ac Noces usus, sed minori dosi, adhibetur, frequentius quoque

extus applicatur; quod sub forma parallelipedorum in commercio prostat mangonii suspectum est. Integræ Drupæ in India conditæ nobis sub *Nucum Indicarum conditarum* nomine mittuntur, & *sive per se, sive in Electuaria vel Morsulos receptæ Roborandi ergo exhibentur.*

MOSCHUS, *Muschio, Musc, Bisam.* Pulveris speciem refert ex parvis granulis constantem, ferruginei coloris & inflammabilis est, sapore amaro, odore proprio & quidem fortissimo; substantiis, quas perpetrat, pertinacissime in hærente, Vesiculis inclusus ad nos pervehitur, pilis rigidis obsessis, albæ a *Russia*, badiæ a *China* & *Tunquin* denominantur Moschus est substantia sebacea ex sacco desumpta, Umbilico Moschi Moschiferi L. in Tartaria, Sibiria & China degentis adhærente. *Contra Convulsiones, Deliria, Hydrophobiam vel ultra Scrupulum pro dosi datus multum laudatur.* Minima ejus quantitas ingens aliarum substantiarum volumen suo odore imbuunt. *Feminae hystericæ, nec non Hypochondriaci inde læduntur.*

MUMIÆ. Prostant hoc nomine hodie in officinis partes humanæ, Bitumine conditæ & exsiccatae, nigrae, bitumen sapientes & redolentes; *sordido nauseoso imo suspecto medicamento quod Balsamico & Adstringente scopo nonnulli adhibent, merito abstinetur.*

MUNGOS. Radices sunt parvæ, minimum digitorum circiter crassæ, varie inflexæ, striatæ, extus lutescentes, intus albæ, sapore statim leviter salso, dein amaro. *Ophiorrhiza Mungos L. Indiæ indigena. Contra morsus Animalium venenatorum & morbos Malignos laudatur ejus efficacia.*

MUS MARINUS. Folliculus compressus, cujus duo parietes parum a se invicem distant, ovato-oblongus, rectangularis, utroque margine crassiore & longius producto, unde ad utrumque extremum duo quasi cornua angusta, leviter compressa prominent, extus niger, intus flavicans, insipidus, inodorus; Ova esse creduntur *Rajæ* piscis, quæ exclusis pullis e Mari ad Littus pro-

jici & in Belgio maxime reperiri dicuntur. *Eorum suffitu Hæmorrhoides cæcæ dolentes leniri credebantur.*

MUS MONTANUS, *Marmotta, Marmotte, Murmelthier.* Animal quadrupes, gryscum, pedibus flavescens, cauda abbreviata. *Mus Marmotta L. Alpes Europæ Meridionalis inhabitat; officinis Axungiam subministrat, consistentia, colore, virtute reliquis æquiparandum.*

MUSCUS ALBUS QUERNUS. Efformatur filis aphyllis, ramosis, varie contortis, gryseis & per senium crusta alba obductis. *Lichen plicatus L. Arboribus pendere solet. Adstringentes ei vires tribuuntur; Tussi laborantibus præcipue commendatur.*

MUSCUS ARBOREUS, *Muscus Acaiciæ, weisses Lungenkraut.* Folia refert in multas lacinias secta, superne e cinereo-glaucâ, inferne lanuginosa, inodora, insipida. *Lichen Prunaltri L. Arboribus accrescit, maxime Pruno sylvestri. Ad eosdem ac antecedens usus recipitur.*

MUSCUS CUMATILIS. Foliis sibi invicem incumbentibus latioribus efformatur, minus coriaceis, superne glabris, læte viridibus, inferne villosis, ex fusconigricantibus. *Teter & mephiticus esse dicitur. Lichen Aphtosus L. Muscis in nascitur, rarius observatus. In Suecia contra Aphtas infantum usurpatur; ejus Decoctum Vermes per Vomitum expulsi observatum est.*

MUSCUS ERECTUS. Caules vix spithamæi, foliolis linearilanceolatis, acutis, glabris, patentibus imbricati, ex luteovirentes, insipidi, inodori *Lycopodium Selago L. Passim per Europam occurrit. Valide Alvum ducere & Menses pellere dicitur.*

MUSCUS ISLANDICUS, videatur LICHEN.

MUSCUS PYXIDATUS. Folia parva, irregulariter laciniata, tubulos emittunt variae magnitudinis, conoideos, margine superiore dilatato plus minus excavato, mox simplices, mox ramosos, varie coloratos. *Lichen pyxidatus L. Terræ, saxi & truncis arborum accrescit; Tussientibus laudatur.*

MUSCUS TERRESTRIS. Effingitur foliis coriaceis, latiusculis, sinuato-lacinatis, marginibus deorsum flexis, cinereo-glaucis, interdum obscure virentibus, inferne incanis, odore mucido, sapore nauseose fatuo imbutis. Lichen Caninus L. In terra muscis instratus occurrit. *Ob virtutem Antilyssam commendatur.*

MUSTELLA PISCIS. *Lampreda, Lott, Aalraupe, Ruffolke*. Gadus Lotta L. Vulgaris Europæ piscis; ejus Spina omni carne nudata, exsiccata & in pulverem redacta. *Epilepticis salutaris fertur.*

MYROBALANI. Fructus carnosus, exsiccatus, nucem includentes, inodori, sapore adstringentes. Quinque eorum genera in officinis prostant; *Citrinae Blackwell* Tab. 401. f. 3. turbinatæ sunt, pollice longiores, ad colorem nigricantem vergentes, utrinque obtusæ, striatæ, tenaces, amaræ, austeræ, sub officulo scabro, anguloso, obtuso nucleum corneum includunt; *Chebulæ Blackwell* Tab. 401. f. 2. prioribus similes, majores tamen & magis fuscæ; *Belliricæ Blackwell* Tab. 401. f. 1. Nucem Moschatam referunt, pedunculo instructæ, prioribus pallidiores; *Indæ Blackwell* Tab. 401. f. 4. ex ovatis oblongæ sunt, rugosæ, non striatæ, foris nigrae, intus substantia quasi picea refertæ; *Emblicæ* tribus prioribus minores, proximis majores, sphaericæ figuræ, in sex angulos diductæ, nigricantes. Quatuor priores arboris cujus character nos adhucdum latet, fructus pro cujusque maturitatis diversitate inter se differre contendunt; postremas subministrat Phillanthus Emblica L. Javæ, Malaccæ, Macassar civis. *Adstringentibus viribus pollent, olim Purgantibus Corrigenendi scopo adjiciebantur.*

MYRRHA. Succus concretus, quem in frustis variæ magnitudinis, Juglandi interdum proximæ, accipimus. Grana sunt subdiaphana, rufa, diffracta maculas produnt albas, quas Ungues dicunt, proprii, gravis odoris, saporis subacris, aromatici, amarissimi. Rejicienda in sortem dicta frusta, quæ arida, fordida sunt & ad nigredinem vergunt. Ex

Abyssinia & Arabia nobis venit, ex fauciatâ arbore, cujus characterem ignoramus, obtinetur. Calore non funditur, ex aqua se suspendi patitur, Alcohol eam ex parte dissolvit; Oleis vero indissolubilis est. Ex sedecim ejus Unciis Aquam stillatitiam obtinui, per odoram, perinde sapidam, cum aliquot Olei butyracei guttis, aquæ innantibus. *Resolvit, Abstergit, Roborat, Putredini resistit. Partem ejus resinosam humores multum exastuare testantur Observatores. Datur intus Pilularum forma ad Scrupulum unum. Extus Abstergens, Putredinem arcens, Dentes mundans & firmans est.*

MYRTILLI, *Mortelle, Airelles, Heidelbeeren*. Baccæ globosæ, caruleo-nigricantes, labia atque palatum colore suo insufficientes, umbilicatæ, polyspermæ, dulces, subadstringentes. Vaccinium Myrtillus L. *Blackwell* Tab. 463. Crescit per omnem Europam. *Refrigerandi aque ac Adstringendi gratia comeduntur.*

MYRTUS. Folia ovato-acuta, firma, late viridia, proprii, aromatici, gratissimi odoris, saporis perinde aromatici, suffusa acrimonia evidenter etiam adstringentis; Baccæ oblongo-ovatae sunt, umbilico stiloque ex ejus medio eminente notatæ, nigrae, inodorae, leviter adstringentes. Myrtus communis L. *Blackwell* Tab. 114. Europæ calidæ & Asiæ progenies, nobis per hyemem in frigidario asservanda. Baccæ ob Roborantem, Folia ob Aromaticam insuper virtutem celebrantur.

MYRTUS BRABANTICA, *Piment Royal, Post, Porst*. Folia ovato-oblonga, inferne contracta, integerrima sapore adstringente. Myrica Gale L. Europæ frigidae & Canadae indigena. *Admisceatur subinde Unguentis contra Scabiem.*

NAPUS, *Nawone, Nawet, Steck-vel Stuckelruben*. Radices alias fusiformes, alias cylindræ, variæ magnitudinis, sub cuticula vel flavescente, vel nigricante, carnem albam, Rapas olentem, dulcem cum quodam acredinis vestigo continent. Semen, *Colsat, Rabsaamen, Rebs, Levvat*, rotundum, sub cortice modo fusco, modo rufo, nucleum album.

abcondit, multo oleo turgidum, inodorum, insipidum. Brassica Napus L. Blackwell Tab. 224. & 410. ad littora Maris Europæ minus calidæ indigena. Radices a varietatibus hortensibus desunt mensis opponuntur & Juribus Petoralibus adjiciuntur. Semen vero a Napo sylvestri in nostratibus argis copiosissime culto desumitur; olim contra Venena commendabatur; hodie neglecto fere ejus usu medicato Oleum inde exprimitur, lucernis præcipue inserviturum.

NASTURTIUM AQUATICUM, Nasturzio acquatico, Cresson d'eau, Brunnkressen. Cauliculi cavi, sulcati, succulenti, quibus adhærent Folia impari pinnata, pinnis rotundis, leviter incisus; sapor acris, amaricans, odor proprius est. Sifymbrium Nasturtium aquaticum L. Blackwell Tab. 260. Crescit per omnem Europam. Tanquam condimentum cibis adjicitur; Resolvens & Antiscorbuticum remedium semper recens adhibendum. In Suecia sunt, qui Cardaminem pratensem loco Nasturtii aquatici in usum trahant.

NASTURTIUM HORTENSE, Nasturzio ortense, Cresson, Kressen. Folia angusta, pinnatim laciniata, laciniis dentatis, pallide viridia, saporem habent acriusculum, nonnihil etiam amarum, odorem proprium, nares irritantem. Semina ovata sunt, glabra, rufa, sapore oleoso leviter acris Lepidium sativum L. Blackwell Tab. 23. Ad VVolgam sponte crescere fertur: annua planta copiose in nostris hortis colitur. Ad Acetaria recipitur, contra Scorbutum & Sanguinis impuritates efficax habetur. Semen olim ad Excretionem aquosas promovendas usurpari solebat.

NASTURTIUM INDICUM, Nasturzio d'India, Capucine, Capucinerlein. Gemmæ florum rotundæ sunt, virides, sapore leviter aromaticæ, odore fructus Rubi Idæi referentes. Flores ex fundo conoideo in cornu porrecto, cuculli similitudinem efformant, in quinque petala exeunt, ciliata, obtusa rotundata, colorem aurantium, odorem proprium fortem, saporem habent acriusculum. Tropæolum majus L. Americæ Meridionalis indigenum. An-

nuaplanta, copiose in nostris hortis colitur. Gemmæ Aceto condiuntur & cum carne comeduntur. Capparide omnino gratiores; Flores ad Acetaria recipiuntur. Ad Sanguinem Depurandum commendantur.

NASTURTIUM PETRÆUM, Nasturzio di Rocca, Cresson de Roche, Steinkressen. Cauliculi succulenti, superne divisi, teneri, Foliis obessi reniformibus, hirsutis, exiguis petiolis suffultis, sapor leviter acris & subadstringens est. Chrysofplenium alternifolium L. Crescit per omnem Europam. Destillatione principia inde Alcalina eliciuntur. Salem quoque emittit Essentialem. Resolvendi scopo celebratum, haud ita pridem nostrates Asthmaticis & Tussientibus exhibere solebant.

NASTURTIUM SYLVESTRE, Nasturzio Salvatico, Cresson sauvage, Feldkressen. Folia longa, laciniis angustis pinnata, ejusdem fere ac præcedens saporis. Cochlearia Coronopus L. Blackwell Tab. 120. Vulgaris per Europam. Præcedentis vires habere videtur; olim ad Acetaria recipiebatur.

NEPETA, Nepitella, Herbe aux Chats, Katzenkraut. Folia cordata, tomento obsessa, profundius crenata, proprio odore minus grato, sapore aromatico imbuta. Nepeta Cataria L. Blackwell Tab. 455. Crescit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem. Aliquantulum Olei odorati fundere dicitur. Commendabatur olim contra morbos Uterinos.

NEPHRITICUS LAPIS. Est Lapis viridescens, durus, ad Chalybis istum scintillans, tactu pinguis, substantiæ granulose speciem referens, subdiaphanus. Jaspis Lapis Nephriticus Waller. Species obscure viridescens, ex America allata Lapis Amazonum dicitur & in Amuleti vicem gestatus Epilepticis salutaris fertur. In Officinis ut plurimum prostat, Lapis magnus, squamis ex nigro-virescentibus, subdiaphanis constans, nonnullo pinguedinis sensu contrectantem afficiens, tornum admittens. Talcum Nephriticum L. Passim in Europa offenditur. Ferri & Cupri vestigia vehere, Magnesium continere, Salem Ammoniacalem & Oleum

emphyreumaticum fundere dicitur *Usus*,
ejus exsolvit.

NEPHRITICUM LIGNUM. In majoribus fructis ad nos transvehitur, compactum, durum, ponderosum, extus dilute fuscum, in medullino spadiceo-fuscum, odoris expers, sapore leviter adstringens. Ab arbore unde *Nuces Beben* obtinentur, subministrari dicitur; nobis ex America mittitur. Ejus Tinctura aquosa opalini coloris luci exposita aurea, sub umbra cærulea est. *Olim a virtute Antinephritica laudem habebat.*

NICOTIANA, *Tabacco, Tabac*. Folia magna peculiari exsiccationis modo penitus flavescentia, ovali lanceolata, proprii odoris, solerti exsiccatione multo etiam acutioris, saporis admodum acris. *Nicotiana Tabacum* L. *Blackwell* Tab. 164. Americæ Meridionalis domestica, annua planta, uberrima hodie ejus per Europam cultura est, quæ Sec. XVI. ad finem vergente, ibidem invalescere cœpit. Principia fundit *Alcalina Valide Resolvit & Stimulat*, adeo ut *Vomitum etiam excitet. Tanquam Apoplegmatizans creberrimi usus est; Clysmatibus quoque adjicitur. Syrupus inde paratus Asthmaticis laudatur.*

NIGELLA, *Nielle, schwarzer Kümmel*. Semina parva, angulata, acuta, nigra, scabriuscula intus viridescencia, odorem aromaticum spirant, sapore linguam pungunt. *Nigella fativa* L. *Blackwell* Tab. 558. Europæ Meridionalis & Orientis indigena planta, in hortis colitur. Oleum unguinosum & destillatum largiri dicuntur. *Ad condiendos cibos Aromaticum loco recipitur; Aqua cum eis agitata scopo Errhino adhibetur.*

NIL, *Nihilum, Pompholyx*. Levis, vix cohærens substantia, alba, insipida, inodora, fornacibus, in quibus Aurichalcum vel paratur, vel funditur, adhærens. Est verus Flos Zinci, creberrime Marga quadam aut Gypso adulterari solet; *recipitur maxime ad medicamenta Ophthalmica externa.*

NINZIN. Radix calamo angustior, inferne bifurcata, leviter rugosa, cornu tam colore, quam pelluciditate referens, inodora, subdulcicula. Sium

Ninfi L. *Blackwell* Tab. 514. In China Septentrionali & Japan crescit. Ob similitudinem, quam cum hominis figura habere dicebatur, *medicamentorum Analepticorum princeps esse credebatur & maximi vendebatur; sed pro merito suo exsolvit.*

NITRUM, *Nitro, Salpeter*. Sal in crystallos prismaticas excrescens, cum substantiis inflammabilibus detonans, dum aqua solvitur frigus gignes, frigidi pariter ac amari sensu linguam afficiens. *Nitrum nativum* L. Magna ejus copia nobis ex Oriente venit; in Europa ex propriis terris peculiari ratione excoquitur: terræ sub forma Stalactitæ adhærens *Aphonitrum* dicitur; ubi vero tanquam tomentum efflorescit *Ha'onitrum*, *Salpêtre de Houffage* appellatur; ubi denique solo sapore & detonatione sui præsentiam declarat *Nitri Embryonati* nomine venit. Constat ex proprio Acido & Alkali Vegetabili. Non nisi Depuratum ad usus medicatos recipiendum. *Sanguinis Æstum temperat, Spissitudinem phlogisticam Resolvit, Putredinem arcet.*

NUMULLARIA. Folia ovato-orbiculata, petiolata, inodora, leniter adstringentia. *Lysimachia Nummularia* L. Ubivis locorum per Europam obvia. *Ob vim Adstringentem laudata tam intus quam extus usurpabatur.*

NYMPHÆA, *Ninfea, Nenufar, Seeblume*. Radices brachium & ultra crassæ, fungosæ, extus fuscae, tomentosæ, mammillis, infesæ, intus albæ, leviter amaræ. Flores exhibent petala alba, oblonga, insipida, inodora. *Nymphæa alba* L. *Blackwell* Tab. 498. & 499. Passim per Europam usquequaque obvia. Radices *Demulcent & Adstringunt. Flores exsiccati inertes sunt.*

OCHRA. Terra est pulverem sive lutum, sive rufum sistens; color calcinatione intenditur. *Ochra Ferri & Martis* L. Subsedit in Aquis Martialibus, verus *Crocus Martis*. Creberrime *Pictoribus inservit. A Medicis interdum ob vim Roborandi tam intus quam extus adhibetur.*

OLAMPI GUMMI. Prostat in fructis minoribus, extus gryseis, intus splendidis,

dis, subdiaphanis, fuscis, friabile est, tritu dentium non lentescit, insipidum, inodorum, aqua non solubile, calore non liquandum, flammæ admodum ardet, suavemque odorem resinofum spirat. Ex America advehi fama est. *Incongrue Gummi Arabico equiparatur.*

OLIBANUM, Olibano, *Thus, Encens, Vibrauch*. Advehitur in granis variæ magnitudinis, maximis Nucleum Juglandem fere æquantibus, submixta rubedine flavicantibus, subdiaphanis, fragilibus; odor eorum proprius, accensorum etiam quam maxime fragrans, sapor tenuis est; Succum esse concretum quadam *Juniperi* specie exsudantem, veri quam simillimum videtur; istius vero *Juniperi*, unde obtinetur, adhucdum incerta species est. In Arabia collectum, Meccam vectum, Cairum inde defertur. Ex aqua se suspendi patitur, Spiritum Vini subit; Oleis nequaquam solubile fertur. Igne non funditur. *Olim Roborandi ergo intus dabatur, hodie ad Emplastra Resolventia & ad Suffitus Discutientes adhibetur.*

OLIBANUM SYLVESTRE, videatur **PINI RESINA**.

OLIVA. *Drupa ovata*, variæ magnitudinis, carnosa, viridis, saporis proprii, adstringentis, amaricantis; immaturis propria, insignis amarities Lixivio cinerum adimitur, qua adempta aqua falsa & aromatibus condiri solent. Includit officulum oblongum, durissimum, rugosum, cinerascens, nucleum continens parvum, dulcem. Olea Europæa *L. Blackwell Tab. 199.* Europæ calidæ indigena, apud nos in frigidario ab hyeme defendenda. *Olivæ conditæ, ut sunt, comeduntur, Embarmatibusque Roborandi & Appetitum excitandi gratia adijciuntur.* Oleum inde expressum colore sese prodit subflavo, odore levissimo, sapore mitissimo, & quod thermometro paulum infra gradum æeris temperatidescendente protinus spissescat. Optimum est, quod nobis ex Gallo Provincia venit. *Viribus Oleorum unguinosorum pollet.*

OLSNITIUM. Radix fibrosa, albescens, saporis acris, subjuncta amaritie

aromatici, odoris proprii, aromatici. *Selinum Sylvestre L. Blackwell Tab. 556.* Europæ temperatæ. *Incidens, Resolvens, Alexipharmaca virtus ei hinc inde tribuitur.*

ONONIS, *Anonide, Arrêt de bœuf, Hauchechel*. Radix longa, calamum circiter crassa, extus fusca, intus alba, tenax, saporis acriusculi. *Ononis spinosa L. Blackwell Tab. 301.* Crescit per omnem Europam. *Ad scopos Diureticos adhibetur; nuperrime sub forma Pulveris bis interdium sumtam Sarcocelen curasse observatum est.*

OPHIOGLOSSUM, *Lingua Serpentina, Langue de Serpent, Natterzünglein*. Cauliculus ad aliquam altitudinem surrectus, folium ovato-oblongum, subcarnosum, spicam inde angustiore emittit, pectinatam, rubentem; sapor subadstringens, glutinosus est. *Ophioglossum Vulgatum L. Blackwell Tab. 416.* Passim per Europam obvia planta. *Olim intus æque ac extus tam Adstringendi quam Consolidandi gratia in usu erat.*

OPIUM. Succus inspissatus in panes coactus, ambitu pugnum circiter æquant, superficie variis quisquiliis inquinata nobis ex Natolia, Persia & Ægypto venit, extus fuscus, intus nigricans, odore viroso, Papaveraceo, sapore acri & amaricante. Paratur ex inspissato *Decocto Capiti Papaveris Somniferi L. Blackwell Tab. 284. & 483.* Orientis indigenæ annuæ plantæ, hodie passim per Europam cultæ. Aquam & Spiritum Vini aliquantulam ejus partem intactam relinquere, odore & sapore ejus eadem liquida inde abstrahenda imbui, ejus vim toctione & coctiense multum debilitari, Extractum ejus spirituosum fortius quam aquosum agere, Sanguinem denique eo attenuari Observatores sunt experti. *Sensus Opio obtundi, motumque Muscularum imminui abunde compertum est. Quocirca, quamvis recta ratione & justa dosi datum, pro Anodynorum & Antispasmodicum principe merito habeatur; ab ejus tamen usu caute abstinebunt, quorumcunque vel motus Sanguinis præter modum auctus, vel debilia Solida sunt, vel quibus evidens stimulus Spasmos aut Dolores excitat. Nostratibus ejus*

Dosim vix ultra unum Granum extendere licet. Externum Opii usum nunquam periculo carere, egregius Auctor evicit.

OPOPANAX. Succus concretus in granis nobis mittitur magnitudine vix Nucem Juglandem æquantibus; extus ex rufo-lutescentibus, intus albidis, odoris balsamici, non ingrati, saporis amari, proprii, nauseosi; massæ majores, quarum grana substantia quadam granulosa & variis sordibus inquinata conglutinantur, deterioris notæ sunt. Affertur ex Asia. Ex Pastinacæ Opopanacis L. Europæ calidæ plantæ, nostræ hyemis vim citra noxam sustinentis, vulnerato caule effluere dicitur. Ex aqua se patitur suspendi, Oleis insolubile fertur. *Resolvendi gratia tam extus quam intus adhibetur.*

OREOSELINUM, *Appio di montagna, Persil des Montagnes, Grundheil.* Radix fibrosa, longa, crassa, rugis transversalibus notata, flavicans, intus alba, validum odorem aromaticum spirans, sapore linguam evidenter pungens. Athamanta Oreoselinum L. Per montes Europæ usquequaque obvia. *Virtutis Resolventis, Sudorifera, Diuretica nomine a nonnullis laudatur.*

ORIGANUM CRETICUM. Spicæ imbricatæ, prismatica, luteæ, bracteis longis, cuneiformibus distinctæ, admodum aromati odoris & grato sapore linguam ferientes. Origanum Creticum L. Orientis & Europæ Australis indigenum. Oleum sanguinei coloris, acutissimi saporis fundere fertur. In quibusdam regionibus condimenti loco cibus adjicitur. *Rarissime intus, extus Discutiendi & Roborandi causa adhibetur.*

ORIGANUM HISPANICUM. Spicæ vel potius Capitula ovata, acuta, hirsuta, & sapore & odore Saturejam referentia. Origanum Marum L. Archipelagi. *Rarissime usurpatur.*

ORIGANUM VULGARE, *Wohlgemuth.* Summitates quadrangulæ, ramosæ, Foliis obsestæ sessilibus, ovatis, integerrimis, subtus levissime pubescentibus & Spicis paniculatis terminatæ, subrotundis, bracteis cuneiformibus, acu-

tiusculis, purpureis distinctis, inter quas Flores labiati ex albedo purpurascetes hærent; odor proprius, fragrans, sapor aromaticus. Origanum Vulgare L. *Blackwell Tab. 280.* Crescit per omnem Europam. Olei odorati exiguam partem fundit. *Priorum viribus pollet.*

ORLEANA, *Oriana, Rocou.* Venit nobis in massis majoribus, foliis longis, latis, nervosis involutis, quarum substantia mollis, humida est, digitis adhærens, sanguineo colore nitens, odorem spirans admodum fœtidum, submucidum, sapore leviter falso imbuta. Est Fæcula succi Seminum Bixæ Orellana L. Americæ calidioris fruticis, ubi in *Refrigerantium & Adstringentium numero habetur; apud nos ad Tinctorios usus recipitur.*

OROBUS, *Eryum.* Semina rotunda, levissime compressa, sub cortice fusco medullam albam, insipidam, inodoram continent. Eryum Eryilia L. Europæ Meridionalis & Orientis annua planta, nostræ quoque regionis culturam admittit. *Farina quatuor Resolventibus adnumeratur; Internum ejus usum sunt, qui non hominibus solum, sed equis, quin & Gallinacæ damnosum esse contendunt.*

ORYZA, *Riso, Ris, Reis.* Semina decorticata, oblonga, ventricosa, utrinque compressa, concava, subdiaphana, albissima, striis distincta, friabilia, insipida, inodora. Oryza sativa L. Asiæ & Americæ indigena, in America, Italia & Hispania copiose colitur. Annua planta apud nos, seminum ad maturitatem promovendorum causa, in vaporario fervanda. *Hispanica rubet, Carolinensis Europæam albedine, magnitudine, pelluciditate vincit. Mucilaginis siccæ $\frac{1}{2}$ largitur. Vulgatissimus Orientis cibus, nostris quoque mensis copiose apponitur. Demulcendi ergo agrotis datur, contra Alvi fluxus efficax celebratur.*

OSMUNDA, videatur LUNARIA.

OSTEOCOLLA. Concrementa calcarea, alba, figura oblonga, superficie aspera. Sunt vel Stalactites vulgari ratione orti & tales ut plurimum in Officinis prostrant, vel stipites arborum carie

rie exesi, terra calcarea & sabulo farti, vel inctustationes Vegetabilium calcarea, destructo Vegetabili superstites. Passim per Europam reperitur. *Ossa consolidandi vires eis adscriptæ dudum explosæ sunt.*

OSTRUTIUM, videatur IMPERATORIA.

OVUM, videatur GALLINA.

OXYACANTHA, *Ossiacanta*, *Epine blanche*, *Vveisdornen*. Flores albi, pentapetali, petalis rotundis, leviter ferratis, fragrantibus. *Fructus* baccæ sunt ex elliptico subrotundæ, umbilicatæ, singulæ ad quaternam usque semina fertiles, rubræ, insipidæ, inodoræ. *Cratægus Oxycantha* L. *Blackwell* Tab. 149. Copiosus ejus per Europam proventus est. *Flores* Floribus Acaciæ, quamvis gratia inferiores, substitui solent. *Fructus*, *Acacii* utique inertiores, leviter adstringunt.

OXYCOCCUS, *Canneberge*, *Moosbeeren*, *Kesselbeeren*. Baccæ rubræ, globosæ, umbilicatæ, succo rubro turgentes, inodoræ, gustu, si quidem glacie adustæ fuerint, acidulæ. *Vaccinium Oxycoccus* L. Europæ temperatæ & frigidæ planta, in hortis coli ægre patitur. *Fructus* Refrigerandi scopo ægrotantibus præbentur; *Scorbuto* quoque adversari dicuntur. *Succus* baccarum æquis partibus cum *Melle* mixtus in *Suecia* officinalis est & *Febricitantibus* laudatur.

PANIS, *Pane*, *Pain*, *Brod*. Sub crusta varii coloris, odoris, saporis, duriuscula, friabili continet substantiam mollem, multis furaminibus hiulcam, pro *Farinæ*, unde conficitur, varietate, varia albedine instructam, quæ *Mica* dicitur. Albedine, levitate, numero foraminum probatur. Est *Farina* iusta Fermentatione viscido exuta, unde *Pani* præter farinam ex vario tam fermentationis, quam coctionis, quam expertus est modo, novæ nascuntur diversitates. *Crusta* scopo *Roborandi* ex *Jure* coquitur. *Mica* vires *Emollientes* edit.

PÆONIA, *Peonia*, *Pivoine*, *Gichtrose*. *Radix* tuberosa, sub cuticula ferruginei coloris, qua *Radix* ad usus medicatos recipienda nudari debet, candida est,

odoris gravis, saporis leviter adstringentis, nauseosi. *Florum* petala asservantur profunde rubra, odorem exsiccata exiguum, saporem nullum habent. *Semina* sunt ovata, nigra, medullam habent duriusculam, albam, dulcem. *Peonia officinalis* L. *Blackwell* Tab. 65. & 245. In Europa calidiore sponte crescit, nostras hyemes optime fert. *Vires Antispasmodicas* edere dicitur.

PALMÆ OLEUM. Albissimum est, inodorum, insipidum, in nostro aëre semper spissioris Unguenti consistentiam habet. Recens aurantium colorem habere, suavissimum Iridis odorem spirare, obtineri coctione fructus *Palmarum* fertur, in America calidiore crescentium, quarum vero genus, quale sit, adhuc in dubio ponitur. Cl. *Mutis* in *Supplemento Linnaeano* *Cocos* *Butyraceæ* descriptionem profert. *Præ* reliquis *Oleis* *unguinosis* nihil eximii præstare videtur.

PAPAVER ALBUM vel **NIGRUM**, *Papavero*, *Pavot*, *Magsaamen*. *Capsula* seu *Capita* majuscula sunt, rotunda, operculo rotundo, striato tecta, sub quo orificium capsulæ hiat, odorem recentes valde virosum, exsiccata exiguum spirant. *Semina* minuta sunt, rotunda, dulcia, sive albissima, sive nigra, vel potius cærulescentia. *Capita* largiuntur *Opium* suo loco dictum. *Capita* exsiccata aliquantum *Sopientium* edunt effectum, quo scopo unum *Caput* pro *dosi* ex aqua coquitur, sive *Syrupus* ex eorum *Decocto* paratus exhibetur. *Semina* plane nihil præ aliis seminibus oleosis proprii habet. *Oleum* inde expressum *Gallorum Huile d' Oeillet*, ne acerrimo quidem nostræ regionis frigore densatur. *Pictoribus* frequentissimus ejus usus est; ad *lucernarum lumina* nutrienda adhibetur, frigide expressum non raro ad *Acetaria* quoque recipitur.

PAPAVER RHOEAS vel **ERRATICUM**, *Papavero salvatico*, *Coquelicot*, *Klapperosen*. *Flores* ex calycæ evulsi, petala rubra sunt, rotundata, odore levi, non admodum grato, sapore dulciusculo perfusa. *Papaver Rhoëas* L. *Blackwell* Tab. 2. Vel nimis frequenter in agris per Europam offenditur. *Aquam*

hi flores, diutius immerſi, mucilaginoſam reddunt. *Demulcendi & Relaxandi ſine ſub forma ſive Inuſi, ſive Syrupi exhibentur. Extractum e Capitibus aquoſum quidam a Grani ſex ad octodecim uſque. Sapiendi ergo adhibent & Opio præferunt.*

PARADISIGRANA, *Cardamomo, Malaguette, Maniguette, Paradieskærner. Semina parva, angulata, badia, intus alba, odore aromatico, minus forti, ſapore fervido imbuta. Amomum Grana Paradifi L. Copioſe in Africa Occidentali occurrit. Pauxillum Olei odorati, ſuaveolentis fundunt. Efficacia virium ad Piper accedunt.*

PAREIRA BRAVA. Radix magna, brachium interdum & ultra craſſa, ſub cortice rugoſo, dilute fulco ſubſtantiam lignoſam, luteſcentem, inodoram & amaram condit. *Ciſſampelòs Pareira L. In America calida creſcit. Anno 1688. Pariſios allata in uſum trahi cœpit. Reſolventibus & Diureticis viribus pollet. Drachma ejus una cum octo Unciis Aquæ ad remanentes ſex Uncias cocta datur pro doſi.*

PARIETARIA, *Parietaria, Caſſepierre, Glaskraut, Tag-und Nacht-Kraut. Folia ovato-acuta, petiolata, ſupra ſaturate viridia, rugoſa, pilis ſparſa, ſapore leviffime adſtringente prædita. Parietaria Officinalis L. Creſcit in Europa temperata, parcius jam in Alſatia & Palatinatu occurrit. Cum in ruderatis creſcat, fuerunt qui Calculum ea imminui crederent.*

PARIS, *Uva di Volpe, Raiſin de Renard, Wolfsbeere, Einbeere. Folia ovato-acuta, obſcure viridia, inodora, fatua, nauſeoſa, Baccæ nigræ, globoſæ, tetragonæ, apice depreſſæ, fatuæ, Paris quadrifolia L. Blackwell Tab. 286. Creſcit in omni Europa. Plantæ nonnullis ſuſpectæ Folia ſiccata non modo non nocuiſſe, ſed ad ſcrupulum unum pueris in Convulſionibus data ſaluberrimos edidiſſe effectus graviffimi Auctores teſtantur. Baccæ Maniacis ad Drachmam unam pro doſi commendantur.*

PASSULÆ MAJORES, *Uva ſecca grande, Raiſins ſecs, Zibeben, Meertrauben. Baccæ Uvarum exſiccatae, ovatae, rugoſæ, ex flavo in brunum vergentes, ſplendentes, pulpam dulciſſimam & plura ſe-*

mina continent. Quatuor eorum genera in noſtris tabernis proſtant, *Damaſcena, ſive Smyrnenses, maximæ ad parvi Pruni magnitudinem accedentes, compreſſæ, fulvæ, hæud adeo ut reliquæ exquisiti ſaporis; Raiſinis aut Rubis ventricofæ ſunt, antecedentibus paululo minores; Calabrinæ ventricofæ racemis adhuc adhærentes & filo colligatæ; Vulgares ſolutæ & minores ex Gallia Meridionali quoque advehuntur. Sunt multifariarum varietatum Vitis Viniferæ L. baccæ Lixivio Alcalino interdum etiam aliquantulo Salis & Olei miſto maceratae & deinceps ſuper ſtramenta Sole ſiccatae.*

PASSULÆ MINORES, *Uva ſecca picciola, Raiſins de Corinthe, Corinthen, Roſinlein. Baccæ exiguæ ſunt Ribefis minores, rotundæ, ex purpureo nigricantes, rugoſæ, dulciſſime, ſubacidæ, in maſticatoris lingua nulla ſemina ſentit. Deſumuntur a Viti vinifera Apyrena L. quæ in pluribus Archipelagi Inſulis copioſe colitur; acini aſſatim maturi Aëre & Sole exſiccati peculiaribus cellis inferuntur, mercantibus tradendi. Paſſulas Nutrientes, Saponaceæ & Demulcentes vires commendant.*

PASTINACA, *Paſtinaca, Panais, Peſtnagel. Radix fuſiformis, alba, rugis tranſverſalibus rugoſa, carne laxiore, proprio odore, ſapore dolci, nonnihil aromatico perſuſa. Semina ovalia ſunt, compreſſo-plana, marginata, ſtriata, flavicantia, odorem radicis ſpirant aromaticum, linguam evidenter pungentem ſaporem habent. Paſtinaca fativa L. Blackwell Tab. 379. Creſcit paſſim per Europam. Aliquid Olei odorati, nec non Sacchari largiri dicitur. Viribus ad Daucum accedit.*

PATIENTIA, *Butterweckel. Radix fuſiformis, extus ex rufo-luteſcens, intus tota lutea, ſaporis amaricantis, adſtringentis, acris. Rumex Patientia L. Blackwell Tab. 489. Italiae indigena, noſtratum hyemum patientiſſima. Efficacia virium Lapatho acuto proxima eſt.*

PENTAPHYLLUM, *Pentaſillo, fünf Finger Kraut. Radicum nonniſi cortex vulgò recipitur, qui ruſus & ſapore eviden-*

ter adstringens est. *Folia* in quinque, interdum septem lacinias inæquales, serratas divisa, levi modo sapore linguam stringunt. *Potentilla Reptans* L. Per omnem Europam vulgaris. *Olim Adstringendi scopo adhibebatur.*

PERCARUM LAPIDES, *Pierres de Perches, Bersing* vel *Kaulparstein*, sunt exigui, elliptici, albi, semipellucidi, superne duplici linea longitudinali notati, duri, insipidi, cum Acidis effervescent; bini in Perca fluviatili L. ad Offis Occipitalis inferiorem, Vertebri vicinam partem hærent. *Vires Absorbentes possident.*

PERFOLIATA, *Percefeuille, Durchwachs*. *Folia* ovato-oblonga, obtuse terminata, glabra, saporis & odoris expertia. *Semina* exigua sunt, nigra, duriuscula, inodora, sapore adstringentia, austera. *Bupleurum Rotundifolium* L. In Europa temperata crescit. *A quibusdam ad Hernias commendabatur.*

PERSICA, *Persico, Pêche, Pfersich*. *Flores* pentapetali, petalis rotundatis, roseis, calyce quinquefido, viridi comprehensi, suaves odore, sapore amaricantes. *Fructuum* innumeræ varietates profert, magnitudine, figura magis minusve ovata, colore, glabritie &c. a se invicem diversæ; omnium promiscue suavis odor est, sapor dulcis, vinosus, utroque pro generis diversitate nonnisi gradu differente. *Officulum* ovatum, rufecens, ventricosum, profunde sulcatum continet *Nucleum* ovatum, compressum, sub cuticula fusca medullam continentem albam, grate olentem, amaricantem. *Amygdalus Persica* L. *Blackwell* Tab. 101. *Americæ & Asiæ* indigena arbor, longe plurimas varietates produxit, quarum quædam apud nos sylvestres sunt, pleræque in hortis coluntur. *Flores Alvi ducendæ gratia præscribuntur. Fructus incibum recipiuntur, Nuclei Amygdalis amarissimi saporis gratia sunt præferendi, viribus equiparandi.*

PERSICARIA ACIDA, *Persicaria acida, Saamkraut, Sommerlock*. *Folia* petiolata, ovato-lanceolata, coriaca, levissime ferrata, evidenter acida. *Polygonum Amphibium* L. Ubivis per Europam

obvium. *Fuerunt qui vim ei Lithontrippticam tribuerent.*

PERSICARIA ACRIS, *Idropepe, Hydropiper, Cuirage, Poivre Aquatique, Wasserpfeffer, Muckenkraut*. *Folia* petiolata, lanceolata, mucronata, interdum rubro interdum flavo colore tincta, sapore acri perfusa. *Polygonum Hydropiper* L. *Blackwell* T. 119. Copiose per Europam crescit. *Extus ad OEdemata Discutienda laudatur.*

PERSICARIA MITIS, *Parietaria, Parietaire, Flœhkrant*. *Folia* petiolata, obtuse terminata, non raro macula nigra notata, aliquantulum hirsuta, saporis levissime aciduli & acriusculi. *Polygonum Persicaria* L. *Blackwell* Tab. 118. Vulgare per Europam. *Extus contra Gangrænam commendatur.*

PERUVIANUM BALSAMUM. *Balsamo de Copaiba* spissius, odorem habet fragrantem, saporem leniter acrem, colorem ex purpureo-nigricantem. Ex America calida nobis venit; Arboris, unde colligitur, character adhuc dum latet. *Cl. mutis myroxylon Peruiferum* hoc Balsamum largiri observavit: obtineri dicitur e virgulis arboris cum Aqua coctis; illud vero, quod arbor sponte fundit, album, nigroque multo præstantius esse perhibent. Oleum odoratum, Benzoe redolens, fundit, Floresque, dum destillatur, exhibet Benzoinis satis similes; Oleis non dissolvitur, cum Oleo unguinoso digestum spissam Resinæ ductilis consistentiam induit. *Intus æque ac extus ad Consolidanda Vulnere & Ulcera adhibetur, lasis quoque Tendinibus & Membranis salutariter applicatur.*

PERUVIANUM BALSAMUM SICCUM vel *Opobalsamum siccum*. Sub specie Resinæ ex purpureo-flavicantis, Benzoe evidenter redolentis, in Cucurbitulis, fungosa quadam substantia obturatis, ad nos pervehitur. *Intus ob vires Balsamicas adhibetur.*

PETASITES, *Pestilenzwurzel*. Radix fibrosa, digitum crassa, extus fusca, intus alba, odorem exsiccata admodum tenuem, saporem acriusculum, amaricantem habet. *Tussilago Petasites* L. *Blackwell* Tab. 222. Totius Europæ do-

messica. Olei quid odorati fundere, *Putredini resistere fertur.*

PETROLEUM, *Petrolio, Steinael.* Oleum ex terræ visceribus profluens, empyreuma olens, gustu acre; *Nigrum* reliquis spissius & gravius olens; *Rubri* tenuior fluiditas, color magis minusve dilutus, odor & sapor penetrantior est; *Album* pelluciditatem aquæ æmulatur, fortiorem reliquis, sed minus nauseosum odorem spirat; hoc proprie *Naptha* dicitur; priora passim in Europa ceterisque Orbis partibus reperiuntur; posterius in Oriente maxime, cujus quidem in locum Officinæ ut plurimum dilutius Rubrum usurpare solent. *Viribus Petroleum ab Asphalto fere nihil differt, specificè contra Tæxiā commendatur.*

PETROSELINUM, *Prezzemolo, Persil, Retersilien, Peterlein.* Radix fusiformis, sub cuticula flavicante, rugis annularibus notata, carnem includit albam, proprium odorem spargentem, sapore dulcem, leniter aromaticam. *Folia* petiolis sulcatis insident, pinnulis ternatis, integris & incisis duplicato-pinnata, odorem æque ac saporem aromaticum habent; *Semina* sunt convexo-plana, oblonga, profundius striata, saporis aromatici, non admodum grati. *Apium Petroselinum* L. *Blackwell* Tab. 172. In Sardinia sponte crescere dicitur, ubique in hortis colitur. *Oleum odoratum Radices & Folia parçissime, Semina largius fundere ferunt. Radices tanquam Oulus eduntur, Foliis cibi conduntur; extus eadem ad Lac discutiendum applicantur, omnibus Petroselini partibus vis Diuretica tribuitur.*

PETROSELINUM MACEDONICUM. Semen oblongum, utrinque acutum, striatum, villosum, leviter odorem, evidenter aromaticum. *Bubon Macedonicum* L. *Blackwell* Tab. 382. Orientis indigena, biennis planta, nostratium hyemum patiens. *Ob vim Carminativam & Diureticam olim celebrabatur.*

PEUCEDANUM, *Peucedano, Quevede Pourcean, Haastrang.* Radices fibrosæ, extus fuscæ, intus albæ, proprium odorem, non nauseosum, saporem dulciculum, leviter aromaticum habent. *Peu-*

cedanum Officinale L. *Europæ temperatæ indigenum. Viribus Aperientibus pollet, Album leniter laxare asseritur.*

PELLANDRIUM, *Felandrio, Ciguë des Marais, Wasserschierling.* Semen ovali-oblongum, striatum, ex viridi-purpurescens, odoris aromatici, saporis acriusculi. *PHELLANDRIUM Aquaticum* L. Passim per Europam crescit. *Oleum odoratum fundere dicitur. Ad sananda Ulcera externa & interna & contra Febrem intermittentem a nonnullis commendatur.*

PHU, *Fu, grande Valeriane, Katzenwurzel.* Radix cinerea, oblonga, digitum circiter crassa, annulatim rugosa, in omnem longitudinem fibras dimittit longitudinales, descendentes, se ipsa longiores & pallidiores, odorem proprium, fortem, minus gratum spirat, sapore falso, amaricante, linguam leviter pungit. *Valeriana Phu* L. *Blackwell* Tab. 250. Crescit in Europa temperata. *Viribus efficacius etiam quam Valeriana officinalis agere videtur.*

PHYTOLACCA. Folia majora, ovata, integerrima, utrinque viridia, sapore leviter acri instructa. *Phytolacca Decandra* L. In Virginia, Italia & Helvetia sponte crescit, nostræ hyemis patientissima. *Fuerunt, qui ejus contra Cancrum efficaciam laudarent.*

PICHURIM FABÆ. Nucleus ovato-oblongus, utrinque obtusus, sesquipollicem circiter longus, octo lineas latus & aliquot crassus, superne convexus, inferne concavus, sub epidermide nigricante medullam ferruginei coloris includit, grate aromaticum spirat odorem, suavique sapore linguam pungit. Suspicio est, a quadam *Lauri* specie in Paraguay crescente eam decerpi. *Olei expressi, fragrantissimi ½ circiter fundere fertur. A quinque tere retro lustis in Suecia exorsus ejus usus, multum deinceps laudatus est in sistendo Alvi fluxu. Datur ad Drachmam semis.*

PILA MARINA, *Meerballen.* Substantia levis, rotunda, ex recrementis radicum conglomeratis efformata, odoris & saporis expers. Formatur ex dissolutis & agitatione Maris conglomeratis

tuberibus Radicum Zoſteræ marinæ L. quæ in Oceano & Mari Balthico reperitur. Liquorem Urinoſum fundit. *Uſta contra Strumas commendatur.*

PILOSELLA videatur AURICULA MURIS.

PIMPINELLA ALBA, *Pimpinella bianca, Bouquetine*. Radices cylindricæ digiti circiter crassæ, rugosæ, odoris levis, saporis evidenter acri ad Saponem accedentis. *Pimpinella Saxifraga* L. *Blackwell* Tab. 472. Oleum fundere dicitur acerrimum. Passim in Europa crescit, *Multum laudis in virtute ejus Resolvente & Aperiente ponitur, maxime contra morbos Mucosos. Datur ad Drachmam dimidiam in substantia, ad Sesquidrachmam in Infuso.*

PIMPINELLA NIGRA. *Pimpinella negra*. Radix cylindrica esse fertur, digiti crassa, apice ramosa, sub cuticula fusco-nigra, medullam continere cæruleam grati odoris, saporis dulcescentis, mite aromatici. *Pimpinella magna* L. *Marchiæ propria, in quibusdam etiam Europæ temperatæ Floris occurrit. Oleum cum fundere sapphirinum dicunt, & cæruleo colore tingere tam Aquam, quam Spiritum Vini inde abstrahendum. Egregium Resolvens, contra Calculum etiam Remedium habetur.*

PIMPINELLA RUBRA, vel ITALICA, *Pimpinella, Sanguisorba, Pimprenelle*. Folia pinnata, nervo hirsuto instructa, foliolis breviter petiolatis, ovatis, obtusis, profunde crenatis, subtus glaucis, levissimo sapore & odore imbutis. *Poterium Sanguisorba* L. *Blackwell* Tab. 413. *Ad Acetaria recipitur & a Medicis scopo recens præscribitur.*

PINEÆ, *Pignons, Pinien*. Nuclei parvi, oblongi, ventricosi, utrinque obtusi, albissimi, tunica rufescente, gracili, sicca vestiti, sapore perfusi dulci, aliquatenus proprio, neque admodum grato; vel levissima flavedine tincti rejiciendi sunt. *Pinus Pineæ* L. *Blackwell* Tab. 189. In Europa calida crescit, apud nos in frigidario per hyemem custodienda. *Pineæ ultra tertiam sui ponderis partem Olei odorati fundunt. Nostrates eas fere*

normisi ad Resinosa in Pulverem aut Emulsionem redigenda adhibere solent.

PINI RESINA, *Pece-Resina, Poix Resine*. In frustis variæ magnitudinis existat, quæ flava sunt, nitida, facie vitrea, subdiaphana, odoris non ingrati, nec fumus accensorum nauseosus est. Minora hujus Resinæ frusta, a Formicis in suas penus coacervari solita, *Olibani sylvestris* nomine veniunt. Ex annosiore quaque Pinu sylvestri L. passim per Europam obvia arbore sponte effluit. *Recipitur ad Emplastra & Unguenta Roborantia & Maturantia.*

PINI STROBILI. Sunt tenellæ ramorum propagines terminales, cylindricæ, extus rufæ, intus virides, squamis subdiaphanis, ciliatis imbricatæ, odoris balsamici, ejusdemque & amariuscule insuper saporis. Desumuntur a Pinu sylvestri L. *Eorum Unciæ una cum Aquæ Unciis triginta sex, per viginti quatuor horas infusa, Scorbuticis magnopere commendatur. Recentes exsiccatis multo præstantiores sunt.*

PIPER ALBUM, *Pevere bianco, Poivre blanc, weisser Pfeffer*. Semina parva, rotunda, lævia alba, odoris proprii fortis, saporis aromatici, linguam urentis. Sunt Semina matura *Piperis nigri* L. *Blackwell* Tab. 348. Insularum Asiaticarum fruticis, cuticula externa nudata. Olei mitis $\frac{1}{4}$ fundunt. Ejus Extractum tam aquosum, quam spirituosum acerrimum esse dicitur. *Multum calefacit, cibis condimenti loco adjicitur, valide Resolvit & contra morbos Frigidos adhibitum admodum efficax habetur. Cavendum vero, ne dosis ultra Scrupulum dimidium extendatur. Extus Apoplegmatizandi scopo adhibetur.*

PIPER JAMAICENSE, videatur AMOMUM.

PIPER INDICUM vel HISPANICUM. Capsulæ variæ tam figuræ, quam magnitudinis, coloris etiam, quanquam ut plurimum rubræ sunt, nitidiusculæ; calyce sustentantur viridi, quinquefido, sub cute subcarnosa, pulpam includunt flavicantem, siccam, Semina alba, subrotunda, compressa continentem, odor nul-

nullus, sapor acerrimus est, linguam urens, aromatis expers. Capsicum annum L. *Blackwell* Tab. 129. Americae indigenum in hortis colitur. Infusum aquosum Vitrioli & Alcoholis ope in gelatinam cogi fertur. *Americanis acceptissimum condimentum*, ad Grana sex pro dosi datum Febres pertinaces curasse observatum est. Apud nos nonnisi ab OEnopolis ad acuenda vilioris notae Aceta adhiberi solet.

PIPER LONGUM, *Amentum* cylindraceum, aliquot pollices longum, totum seminibus protuberantibus quasi totidem squamis prorsus obsectum, odorem, saporem, vires etiam Piperis albi refert, quo tamen mitius est. Piper longum L. *Blackwell* Tab. 356. Eandem cum *Pipere albo* patriam habet.

PIPER NIGRUM. Est Piper album, immaturum, cuticula sua adhuc contentum, nigrum, rugosum, intus album, odore *Pipere albo* fortius, sapore etiam ardentius.

PISTACIÆ NUCES, *Pistacchio*, *Pistaches*. Nuclei oblongi, obsolete trigoni, sub cuticula rufescente, medullam viridem, dulcem & suavem includunt *Pistacia Vera* L. *Blackwell* Tab. 461. Arbor Asiae indigena, in Europa calida copiose colitur; apud nos in frigidario contra hyemem defendenda. In blandimentum gustus *Bellarii* & *Morsulis* immiscetur.

PIX BURGUNDICA, videatur RESINA.

PIX NAVALIS, *Catrame*, *Goudron*, *Theer*, *Schiffdarr*. Est Oleum empyreumaticum, spissiusculum, consistentiae Mellis, nigro-rubicundum, odore spirans balsamicum, empyreumatico junctum, sapore perfusum amaricante. Obtinetur ex lignosis partibus *Pinus Sylvestris* L. Arboris supra dictae, ope destillationis per descensum. Probitas ejus ex aqua ei affusa judicatur, siquidem non albedo eam, sed rufo-rosaceo colore imbuat. Propter Balsamicos effectus *Phtisicis* eam Veteres commendare solebant. Ejus Infusum recentioribus temporibus morbis Malignis, Scabie &c. laborantibus enixe commendabatur, videatur. P. II.

PIX NIGRA, *Pece*, *Foix*, *Pech*. Est nigra, atra, lucida, in calore tenax, digitis fortissime adhærescens, fragilis, fractura vitriformis, odore & sapore *Pici navali* multum cedens, ex qua sub perpetua agitatione ad siccitatem cocta paratur. Tenacitatis gratia Emplastris additur; contra Clavos pedum & Malum *Ischiadicum* efficax fertur. Eviluit crudelis *Dropacismus*.

PLANTAGO, *Piantaggine*, *Plantain*, *Wegerich*. Radices rufae, ex capite parvo quam plurimas fibrillas albas protrudunt, inodora, sapore salso, in fatueduicem se resolvente. Folia alias lata, ovata, magnis petiolis instructa, glabra, septem nervis percurta; saporis & odoris fere vacua; alias angusta sunt, lanceolata, quinquenervia, perinde insipida. Semina exigua, rubra, levia, inodora, saporis mucilaginosi. *Plantago Major* L. *Blackwell* Tab. 35. & *Lanceolata* L. *Blackwell* Tab. 14. Crescunt ubique per Europam. Succus ex Foliis expressus eminenter falsus est. Radicum contra Febres; Foliorum in Decoctis *Vulnerariis* usus salutaris habetur; eadem recentia *Insectorum puncturis* cum successu imponuntur.

PLUMBUM, *Piombo*, *Plomb*, *Bley*. Metallum albidum, ad nigredinem vergens, minimae firmitatis, omnium molliissimum, praeter Mercurium gravissimum, paulo majorem, quam Stannum, calorem ad sui fusionem exigit, Aqua, Acidis, Alcalibus, Oleis perinde dissolubile. Exhibetur a Natura sub forma variarum glebarum, passim in Europa occurrentium. Intus cum perniciosissima excitet symptomata nunquam dandum; extus ad Siccandum & Discutiendum haud frustra adhibetur.

POLIUM CRETICUM, *Cretischer Polley*. Cauliculi tetragoni, tomentosi, Foliolis obseffi linearibus, superne crenatis, albidis, calycibus terminati parvis, tomentosis, parum odoris; saporem habent pungentem & amaricantem, odorem fragrantem. *Teucrium Creticum* L. Archipelagi. Quod subsequitur *Polium*, cum in nostris saltem officinis plus

plus aromatis habeat, hujus usum fere abrogavit.

POLIUM MONTANUM. Cauliculi Foliis oblongis, crassis & Capitulis obfessi florigeris, utrisque tomentosis; odorem habent fragrantem, saporem amarum & pungentem. Teucrium Polium L. *Blackwell* Tab. 456. Crescit in Europa temperata. Olim ad Viscera referenda, Urinam & Menstrua pellenda adhibebatur.

POLYGALA, Poligala, Kreuzblume. Radices fibrosæ, tres fere pollices longæ, graciles, ex capite crassiusculo sensim filiformes, colore extus pallide luteo, intus albissimo, exsiccatae admodum duræ sunt, nullum odorem, saporem habent levissime falsum. Polygala amara L. Crescit in Europa temperata. In Phthisi eam Recentiorum Medicorum nonnulli commendant, vel ad dimidiam Drachmam bis de die sub forma Pulveris, vel ejus Decoctum scilicet Uncias duas cum Aqua duabus libris ad unius libræ consumptionem coctas subinde per diem exhibendas.

POLYPODIUM, Polipodio, Engelsüs. Radices admodum longæ, anserinum fere calamus crassæ, eminentibus tuberculis, velut articulis divisæ, sub cortice rufo medullam includunt flavam, virescentem, odorem muscosum, saporem cum adstrictione dulcem. Polypodium Vulgare L. *Blackwell* Tab. 215. Crescit per omnem Europam. Radices inter coquendum amarescunt. Infusum aquosum ad Resolvendum, Viscera Abdominalia referenda, nec non ad scopum Ectoproticum valet.

POMA, Pomi, Äpfel. Fructus innumerabilium pene varietatum; jam enim differunt figura, quæ tamen ut plurimum ovali-subrotunda deprehenditur; jam colore; jam sapore acerbo, acido, dulci, vinoso; jam magnitudine; jam maturandi celeritate, qua quidem dulcia omnino vinosis præstare compertum est; ad basin concava, umbilico depresso notata sunt; pulpa quinquelocularis, odor fragrans est & plura Semina continet. Pyrus Malum L. Viribus saponaceis polent; dulcia Demulcent, in morbis Pectoris

potissimum proficue adhibenda; vinosa Refrigerant, Humorum Æstum temperant.

POMPHOLYX, videatur NIHILUM.

POPULUS, Pioppo, Peuplier, Pappel. Prostant Oculi seu Gemmæ ovato-oblongæ, flavo-rubræ, ex squamis variæ magnitudinis sibi invicem incumbentibus imbricatae, verno tempore succo foetæ sunt viscido, digitis adhærente, suavolente, amaro. Ante foliorum evolutionem colligendæ. Populus nigra L. *Blackwell* Tab. 248. Magna ejus ubique per Europam copia provenit. Expressione Resinam, destillatione cum Aqua aut Spiritu Vini Oleum odoratum fundere dicuntur. Propter Balsamicas vires a nonnullis adhibiti, hodie maxime ad parandum denominatum inde Unguentum colliguntur. Exsiccati virtute sua penitus destituti deprehenduntur.

PORCUS, Porco, Porc, Schwein. Sus scrofa L. Animal quadrupes per omnem Europam indigenum. Axungia, Saindox pinguedo mollicula, alba, insipida, inodora, ex Mesenterio hausta. Relinquarum Axungiarum viribus par ad plura Unguenta recipitur.

PORRUM, Porro, Porreau, Lauch. Bulbus conoideus, albus, striatus, tunicis siccis vestitus, proprium odorem, Cepaceo mitiorem, similemque saporem emittit. Folia habet longa, profundius viridia, odoris, saporisque itidem proprii, Cepaceo mitioris, nonnihil dulcis. Allium Porrum L. *Blackwell* Tab. 421. Copiose in hortis colitur. In culinas tanquam olus recipitur. Becchicum, Diureticum, Lithontripicum medicamentum in laude fertur.

PORTULACA, Porcellana, Pourpier, Burzel. Folia carnosæ, cuneiformia, nitidiuscula, viridia, punctulis notata, insipida, inodora; Semina exigua, nigra, rotunda, rugosa, saporis oleosi. Portulaca Oleracea L. In Europa temperata & Oriente copiosa, in hortis colitur. Aperientia, Refrigerantia, Antiscorbutica Folia, nonnisi recentia adhibenda. Semina Refrigerantibus minoribus adnumerabantur.

PRIMULA VERIS, Paralysis, Tassobarbasso, Primèvere, Schlüsselblumen, Himmels-

melschlißel. Flores calyce exempti, infundibuliformes, quinquefidi, limbo concavo, flavi, sapore dulciculi, suaves odore, qui exsiccando minuitur quidem, neutiquam vero tollitur. Primula Veris officinalis L. *Blackwell* Tab. 226. Crescit per omnem Europam. Ad Infusa *Cephalica* recipiuntur. Aqua inde destillata, quæ vulgo in officinis prostat, iners est.

PROPŌLIS, videatur CERA.

PRUNA, *Prugne, Prunes, Zwetschen, Pflaumen*. *Drupæ* variæ tam magnitudinis, quam figuræ, creberrime quidem ovatæ, varii etiam coloris, ut plurimum tamen caruleæ, sub cute nitida pulpam habent frequentissime flavescens, odoratam, dulcem, pro varietate diversa aquosam, quæ officulum includit scabrum mox oblongum, compressum, mox ovatum, *Nucleum* continens dulcem, suavem, vix amariuscum. Prunus domestica L. *Blackwell* Tab. 494. Europæ Australis indigenæ arboris, nostrates plurimas Varietates in hortis colunt. *Vires saponaceas & Antiputridas cum reliquis Fructibus horæis communes habent; exsiccatæ & cum Aqua decoctæ solvendæ Alvo inserviunt.*

PSYLLIUM, *Pulicaria, Herbe aux puces, Flæhsaamen*. Semina ovali-oblonga, convexo-concava, nigra, nitida, sub dentibus lentescens, insipida, inodora. Plantago Psyllium L. *Blackwell* Tab. 412. Europæ Australis domestica, nostræ hyemis patiens. Mucilaginis largitur. *Mucilago inde parata interdum intus Demulcendi scopo, extus contra Ophthalmiam adhibetur.*

PTARMICA, *Ptarmica, Herbe à éternuer, wilder Bertram*. Radix fibrosa, alba, leviter geniculata, inter mastigandum primum insipida, dein evidenter acris deprehenditur. Achillea Ptarmica L. *Blackwell* Tab. 276. Passim per Europam obvia. *Apoplegmatizandi scopo sunt, qui eam Radicibus Pyrethri substituant.*

PULEGIUM, *Puleggio, Puliot, Poley*. Cauliculi tetragoni, pubescentes. Foliis obfessi petiolatis, ovatis, obtusis, cre-

natis, albidis & verticillis calycum quinquefidorum, pubescentium, Flores labiatos continentium; odor ut & sapor proprius, aromaticus est. Mentha Pulegium L. *Blackwell* Tab. 302. Crescit in Europa temperata. Olei odorati $\frac{1}{3}\frac{1}{2}$ fundit. *Ad morbos Uterinos maxime adhibetur.*

PULMONARIA ARBOREA, *Pulmonaria arborea, Pulmonaire de Chêne, Lungenmoos*. Lichen e latis, laciniatis, coriaceis foliis efformatus, alternis eminentiis, vesicis similibus, & lacunis distinctus, flavicans, inferne tomentosus, inodorus, saporis falsi, levissima amaritie submixta. Lichen Pulmonarius L. *Blackwell* Tab. 335. Per omnem Europam truncis arborum ad crescere solet. *In Resolvendo efficax morbis Pulmonum & Laterum laborantibus laudatur.*

PULMONARIA MACULOSA, *Pulmonaria, Pulmonaire, gefleckt Lungenkraut*. Folia ex ovatis lanceolata, ciliata, hirsuta, maculis albis notata, subtus albicantia. Pulmonaria officinalis L. *Blackwell* Tab. 376. Vulgaris per Europam planta. *A nonnullis Hæmoptoicis & Phthisicis commendabatur.*

PULSATILLA, *Fior di Donna, Coquelourde, Kuchenschell*. Folia petiolata, pinnis linearibus & acutis bipinnata, subtus hirsuta, odore levi, sapore primum levi, dein multum acri. Anemone pratensis L. Passim per Europam obvia. Aquam destillatam valde acrem, non nihil Camphoræ emittentem, fundere dicitur. *Succus inspissatus sub Extracti nomine ad Scrupulum semis exhibetur. Variis Oculorum morbis medelam attulisse Illustri Stærck observavit.*

PUMEX, *Pomice, Pierre, Ponce, Bimsenstein*. Lapis variæ magnitudinis, aqua levior, multis foraminibus excavatus, non admodum durus, friabilis, saporis & odoris per se expers, si quid habet, mari debet, cui innataverat. Pumex Vulcani L. Montium Ignivomorum partus, ad eorum tam adhuc dum ardentium, quam dudum extinctorum oras invenitur, Mari etiam illis vicino haud raro innatat. *Ad Dentifricia adhibetur.*

PYRETHRUM, *Pilatro*, *Bertram*. Radices aliquot pollices longæ, calamum anserinum circiter crassæ, cylindraceæ, fibras capillares emittentes, gryseæ, intus albæ, odoris expertes, sapore acres, linguam urentes. Anthemis Pyrethrum L. *Blackwell* Tab. 390. Europæ Meridionalis & Africæ Orientalis propria; in Thuringia & ad Magdeburgum colitur. *Apophlegmatizandi scopo adhibetur.*

PYROLA, *Wintergrün*. Folia rotunda, petiolata, minutim ferrata, superne saturate viridia, subtus pallidiora, saporis adstringentis. Pyrola Rotundifolia L. In omni Europa crescit. *Tam intus ad Roborandum & Adstringendum, quam extus ad Injections & Gargarismata recipitur.*

PYRUS, *Pero*, *Poire*, *Birne*. Fructus turbinati, umbilicati, quinqueloculares, magnitudine, colore, sapore, qui tamen in omnibus plus minusve adstringit, tempestivitate etiam maturescendi plurimum variantes; Semina continentes ovato-oblonga, nigricantia, dulcia. Fragrantia præcoces reliquos antecellunt. Pyrus communis L. *Blackwell* Tab. 453. Innumerae varietates in hortis coluntur. *Fructuum horarum viribus pollent; ad solvendum Calculum & Aperiendam Alvum apti prædicantur.* Varietates acerbiores coctione cum aqua mitigantur.

QUASSIA. *Quassia*, Lignum solidum, leviusculum, cortice ex gryseo albæ, intus albescente tectum, flavicans, in tenues lamellas secedens, inodorum, amarissimum. Quassia amara L. Surinami indigena. Extracti aquosi amarissimi $\frac{1}{4}$, Spirituosi $\frac{1}{4}$ largitur. A quinque retro lustris in Europa ad Rem medicamentariam admitti cœpit. *Roborando Ventriculo, Arthritidi Febribusque Intermittentibus sanandis commendatur.* Drachma ejus una cum duodecim Aquæ Unciis infunditur. *Aptissime sub forma Extracti datur.*

QUERCUS, *Quercia*, *Chêne*, *Eiche*. Corticem habet crassum, extra cinereum, intra ferrugineum, acerbum, stypticum. Folia cuneiformia, oblonga, firmula, laciniis pinnatis sinuata, adstringentia; Glandes calyce sustentatæ sunt, Cupula

dicto, cinerascenti, integerrimo; dura, extus rugosa, intus lævissima, sub officulo lævi, nitido, flavicante, ovali-oblongo, fragili includunt *Nucleum* solidum, tunica vestitum, intense amarum & stypticum. Quercus Robur L. *Blackwell* Tab. 487. Vulgaris per Europam arbor. *Extus Adstringendi ergo adhibentur quæque Quercus partes; Glandes tostæ, eum aqua decoctæ a quibusdam nuper contra Atrophiam laudabantur.*

QUERCUS MARINA. Cartilagineus Fucus, cujus Caulis planiusculus, aliquot mox pollices, mox pedes longus, in plures diffunditur ramos bifurcos, in folia dispersos latius usque procrescendo extensa & in apicem bilobum, trilobumve exeuntia, pluribus in utraque superficie vesiculis & fibris rugosa. Color ex nigro flavicat. Fucus vesiculosus L. Ad littora Maris copiose occurrit. In cineres nigros combustus nomine *Æthiopis Vegetabilis ad obstructions Glandularum aperiendas & ad Sanguinem depurandum adhibetur, iisdem etiam usibus extractus inde Sal Alcalinus destinatur.*

RACKASIRA BALSAMUM. Resina sicca, subdiaphana, rubro-brunea, inter digitos ductilis, inter mandendum tenax, dentibus adhærescens, odoris non ingrante balsamici, similis saporis, resinosi, amaricantis; Cucurbitis inclusa ex India nobis apportatur. Calore funditur, accensum suavem spirat & fortem odorem. *Fuerunt, qui contra Gonorrhœam & Ulcera viarum Urinariarum ejus virtutem laudarent.*

RANA, *Rana*, *Grenouille*, *Frosch*. Rana Esculenta L. Amphibium quadrupes notissimum, ad aquas & paludes copiose degens. Femora in cibum recipiuntur. *Cum Jure decoctæ Demulcendi aquæ ac Relaxandi scopo exhibentur.*

RANARUM SPERMA, *Frais de Grenouilles*, *Froschlaiche*. Substantia alba, viscida, Albumini ovorum similis, gemina novorum animalium sub forma corpusculorum rotundorum & nigrorum vehens, verno tempore stagnis ac paludibus innatans, e varii generis Ranis enixa. *Extus Demulcendi & Refrigerandi*

scopo a quibusdam commendatur. Aqua inde destillata Paracelso *Sperniola* dicta omnino iners est.

RANUNCULUS, *Ranunculo*, *Ankenbliimlein*, *Hanenfus*. Variæ Ranunculorum species Flores habent sapore per acres, cutemque, cui applicantur, in vesicam elevantes; nostrates vulgo Ranunculum acrem L. recipiunt; eundem effectum edunt Aquatilis L. Lanuginosus L. Bulbosus L. Sceleratus L. Arvensis L. Flammula L. Lingua L. Huc etiam Anemonem sylvestrem L. sub nomine *Ranunculi albi* nonnulli referunt. Aquam ab his plantis abstractam acrem esse contendunt & nauseosam. *Brachio aut Carpo imponuntur ad fugandas Febres Intermitentes.*

RAPA, *Rapa*, *Rave*, *Navet*, *Navau*, *Rübe*. Radices alias rotundæ, alias cylindroidæ, varii tam coloris, quam magnitudinis, odoris proprii, saporis in junioribus amari, in adultis dulcissimi. *Brassica Rapa* L. *Blackwell* Tab. 231. *Planta Anglica & Belgica*. Plures ejus varietates in hortis & agris coluntur. *Mensis apponuntur. Resolvendi sine intus dantur ex Jure coctæ. Extus gelu constrictæ Perniones sanant.*

RAPHANUS, *Rafano*, *Radis*, *Rettich*. Radices figura, magnitudine, colore, saporis acumine multum variantes, odore proprio, sapore acri perfusæ. *Raphanus sativus* L. *Blackwell* Tab. 81. In China sponte nasci dicitur, apud nos plurimæ ejus varietates copiose coluntur. *Condimenti loco esitatur. Resolvendi, Urinam ducendi, Scorbutum pellendi gratia Succus inde expressus exhibetur.*

RAPHANUS RUSTICANUS, videatur **ARMORACIA**.

RAPUNCULUS, *Raperonzo*, *Raiponse*, *Rapunzel*. Hoc nomine nostrates verno tempore tenellas plantas *Phyteumatis Orbicularis & Spicati* L. vel *Oenotheræ biennis* L. in cibum recipere solent. Sunt qui scopo medicato *Campanulæ Rapunculi* L. haud infrequentis Europæ plantæ Radices adhibeant fibrosas, albas, dulces; *ejusque virtutem Resolventem laudent.*

REGULUS, *Reattino*, *Roitelet*, *Zaunkæinig*. *Avicula corpore gryfea, rostro subulato alisque instructa, fuscis fasciis distinctis, subinde etiam albis maculis notatis. Motacilla Troglodytes* L. *Vulgaris per Europam avis. In olla combustæ Pulvis olim Calculo mederi credebatur.*

RESINA, *Resina*, *Poix de Bourgogne*, *Harz*. In magnis frustis prostat, solida, sicca, nitidiuscula, fragilis, inter tractantes digitos plastica, iisque adhærens, odorata amariuscula, calore liquescens, ignem concipiens, accensa fumum gravem emittens. Ex Pino *Abiete* L. vulgari per Europam arbore, cui detracto cortice, per æstatem, exsudata adhæret, inde derafa in lebetæ aqua pleno liquatur & crasso linteo percolata depuratur. Solet etiam, antequam mercaturæ amandetur, Vesicæ immitti & aquæ ministerio *Oleum* inde destillari flavum, odore minus gratum & vehemens, sapore linguam pungens, *Templinum Schroederi, Tannzapfenel* nominant. Idem *Oleum* quandoque ex *Pinus Sylvestris* L. ramis tenellis aut conis viridibus destillatione cum aqua paratur. *Resina Emplastris solidandis & tenacitate perfundendis additur; suppurandi quoque & Putredinem arcendi sine adhibetur. Oleum Templinum Balsamo Hungarico aut Carpathico multum olim ad sananda Vulnera, Ulcera, Rheumatismos, &c. laudato substituitur; pro Oleo etiam Terebinthinæ non raro venditur.*

RHABARBARUM, *Rabarbaro*, *Rheum*, *Rubarbe*. Radix cujus magna frusta ad nos pervehuntur, subrotunda, in medio ut plurimum perforata, cuticula exteriorè nudata, extus flava, rubellula, intus albo & roseo variegata, odoris proprii, minus grati, saporis amari, acrimonia submissi. Minoris æstimanda frusta leviora, digitos tingentia interiorè rubedine magis ad nigredinem vergente. Desumi videtur a variis *Rhei* speciebus in China & regione Tangutica inter 26 & 36 gradum latitudinis Borealis crescentibus. *Rheum palmatum* L. sub cœlo Europæo optime vegetans, optimo quod nobis affertur *Rhabar-*

barbaro satis similes Radices exhibet, siquidem per decennium cultum fuerit. Rhabarbarum *Moscoviticum* præstantissimum est, aliud enim, nisi a publice ad id negotium constituto delegato, Jachtæ habitante, delectum & comprobatum, per totam Russiam divendere non licet. Æquas Extracti Aquosi & Resinosi partes vehit. *Vi principii volatilis, quo scattet, Album ducit, quam ob causam ab omni Præparato, cõtionis ope inde obtento, vis Laxans abest. Primas vias Roborat, Obstructionibus Hepatis medetur, Renibus quoque prodest. Datur ad Drachmam unam sub forma Pulveris, ad Drachmas duas in Infuso.*

RHABARBARUM MONACHORUM.

Radix fibrosa, crassa, rugosa, extus ex fusco-lutescens, intus flava, odoris levis, minus grati, neququam Rhabarbarini, saporis amaricantis cum aliquantula adstrictione subacris. Rumex Alpinus L. Crescit in Europa temperata. *Rhabarbaro, utique multo inferius, minus apte substituitur.*

RHAPONTICUM MOSCOVITICUM.

Radix, cujus magna nobis mittantur frusta oblonga, ex albo leviter flavicantia, intus striis purpureis variegata, odore tenui, sapore amaro & cum quadam acrimonia adstringente. *Gmelin a Rumice obtusifolio L. Europæ temperatæ civi, Cl. Pallas autem a Rheo Undulato L. Chinæ & Sibiricæ indigeno, nostras hyemes optime ferente, desumi contendunt. Rhabarbari veri viribus pollevere dicitur, dummodo majori dosi sumatur.*

RHAPONTICUM VULGARE. Radices cylindræ, lutescentes, intus rubro-variegatæ, odore & sapore præcedentes referunt. Desumuntur vel a Rheo Rhapontico L. *Blackwell* Tab. 262. Thraciæ, in Europa culta; vel a Centaureo Centauro L. *Blackwell* Tab. 93. Tartariæ, Italiæ &c. indigeno. *Priori viribus cedit.*

RHINOCEROS, *Rinoceronte, Nashorn.* Cornu ejus conoideum est, pedem circiter longum, uno latere leviter arcuatum, basis ovata, diametro longitudinali semipedem, transversa quatuor pollices æquans, intus concava, conoidea, spon-

giosa, nigricans, extus nigro-fusca, rugosa, in corpus contrahitur læve, splendens, fuscum, in facie arcuata striis longitudinalibus sulcatum; apex obtusus est; odore & sapore caret. Rhinoceros Unicornis L. Africae & Indiae Quadrupes. *Indi hoc Cornu Venenis resistere putant.*

RHODIA RADIX. Tuberosa est, crassa, extus flavicans, intus alba, cicatricibus obsessa, recens leviter exsiccata, evidenter Rosas redolet, amara. Rhodiola Rosea L. Habitat in Alpibus Europæ, optime in hortis coli potest. Olei Oleo L. Rhodii similis $\frac{1}{12}$ fundere dicitur. *A quibusdam Adstringentibus adnumerabatur.*

RHODIUM LIGNUM. Frusta impari magnitudine, & crassitie, ramosa, varie torta, dura, sub cortice gryseo, non raro rugoso, substantiam lignosam, albam, rubris flavis quæ striis notatam includunt; fricata roseum odorem edunt, sapor levissime amarus est. Genista Canariensis L. Insularum Canariensium indigena arbor. Quale vulgo in officinis prostat, minimum Olei odorati largitur. *Lignum ad Suffitus recipitur, Oleum odoramentis adjicitur, vulgo apud Seplastarios prostant multo Oleo unguinoso adulteratum est.*

RIBES NIGRUM, *Grossularia nigra, Ribes negro, Chassis, schwarze Johannis-trauben vel Beeren.* Folia subcordata, triloba, ferrata, odore ad Rutam accedente, sapore leniter adstringente. *Baccæ globosæ, nigræ, umbilicatæ, succo purpureo turgentes, polypyrenæ, Cimices redolentes, ex dulci aciduli saporis. Ribes nigrum L. Blackwell* Tab. 285. Passim per omnem Europam occurrit. *Folia ad Sanguinem Depurandum & Diuresin promovendam, Baccæ contra Renum vitia valere dicuntur.*

RIBES RUBRUM, *Ribes, Groseille.* Baccæ rotundæ, nitentes umbilicatæ, partim rubræ, partim albæ, sapore vinoso, acido, odore levi imbutæ, polypyrenæ. *Ribes rubrum L. Blackwell* Tab. 285. Passim per Europam obvium. *Refrigerandi gratia adhibentur.*

RORELLA, *Ros Solis, Herbe de la Goutte, Sonnenthan.* Folia exsiccata, par-

va, rotunda, hirsuta, rubra; margine fimbriato cincta, longioribus petiolis hirsutis innixa, sapore acri & adstringente prædita. Drosera Rotundifolia L. *Blackwell* Tab. 432. Occurrit in omni Europa. A tribu *Paracelsistica* magni facta, hodie evuluit. *Recentem Cuti impostam Vesicas inducere observatum est.*

ROSA ALBA. *Rosa bianca*, *Florum petala majuscula, obvata, alba, levius odorata, dulciuscula. Rosa alba* L. *Blackwell* Tab. 73. Colitur in hortis; præstant omnino *Spinosissima* L. copiose sub nostro cælo crescens & *Sempervirens* L. apud nos contra hyemis injurias defendenda, minoribus petalis, sed multo fragrantioribus instructa. *Extus contra morbos Oculorum adhibentur.*

ROSA PALLIDA, *Rosa pallida*, *Rose de Damas, leibfarbige Rose*. Petala obovata, majuscula, dilutius rubra, quem proprie roseum colorem dicunt, fragrantia, dulciuscula. Desumuntur a variis *Rosæ* speciebus, in nostris hortis cultis; maxime a *Centifolia* L. *Damascena* *Blackwell* Tab. 82. Sunt qui *Rosæ* etiam *Caninæ* L. petala recipiant. Pauxillulum Olei pellucidi, aëre temperato consistentis fundunt. *Ob fragrantiam scopo Analeptico inserviunt; Eccoproticos quoque edunt effectus.*

ROSA RUBRA, *Rosa rossa*, *Rose de Provins, Essigrose*. Petala, antequam sese explicuerint, resectis unguibus flavicantibus recipiuntur profundius rubra, præcedentibus minus fragrantia, sapore adstringente prædita. *Rosa Gallica* L. patientissime nostras hyemes ferens, cui creberrime, in Germania maxime, *Rosam sativam rubram* C. B. minus saturati coloris, substituere solent. *Roborandi & Adstringendi causa tam extus quam intus adhibentur.*

ROSMARINUS, *Rosmarino*, *Anthos*, *Romarin*. Folia linearia, obtusa, rugosa, supra viridia, subtus alba, proprio, fragrantia odore, sapore aromatico perfusa. Flores ringentes, calyce bilabiato sustentati, dilute violacei, sapore & odore Foliis multo inferiores. *Rosmarinus officinalis* L. *Blackwell* Tab. 159. Eu-

ropæ calidæ indigenus frutex, apud nos contra hyemis rigores defendendus. Olei odorati $\frac{1}{2}$ exhibet. *Olim Cephalico scopo intus dabatur, hodie Roborandi & Discutiendi sine extus applicatur. Oleum destillatum, nimii ad internum usum caloris, modo ad externum adhibetur. Spiritus Vini inde abstractus, cui Aquæ Reginæ Hungariæ nomen est, itidem extus ad Refocillandum, Roborandum, Discutiendum usurpatur.*

ROSMARIMUM SYLVESTRE, *Rosmarino salvatico*, *Romarin de Boheme*, *Post-VVanzen-vel Mottenkraut*. Folia linearia, obtusa, ad marginem revoluta, supra luteo-viridia, nitidiuscula, subtus tomentoso-ferruginea, odore graveolentia, aromatica, sapore amara. *Ledum palustre* L. Europæ Septentrionalis indigenum & officinale. *Laudatur Infusum ejus aquosum ad pessimæ Scabiei species, nec non Tussim ferinam sanandam.*

RUBIA TINCTORUM, *Robbia*, *Garance*, *Färberröthe*. Radix fibras calamum circiter crassas dimittens, geniculata, tota rubra, leviter odorata, amaricans, subadstringens. *Rubia Tinctorum* L. *Blackwell* Tab. 326. Europæ temperatæ propria, passim in agris colitur. Extracti aquosi acidulo sapore instructi $\frac{1}{2}$, resinosi, austeri $\frac{1}{3}$ circiter largitur. *In quinque Radicum aperientium numero habetur. Rachiticis, Ictericis, Scabiosis commendatur.*

RUBINUS, *Rubino*, *Rubis*. Gemma Adamantem pondere superans, duritie subsequens, colore rubro fulgens. *Alumen Gemma pretiosa Rubinus* L. *Ex Ava, Pegu & Brasilia advehitur, in Hungaria & Germania quoque offendi dicitur. Cordiales olim ei, Bezoardicæ &c. affingebantur vires.*

RUBRICA FABRILIS, *Rubrica Crayon rouge Ræthel*. Est Lapis calcareus, molliculus, fissilis, digitos tingens, odoris nullius, saporis adstringentis. *Talcum rubrum* L. Passim in Europa reperitur. *Vera minera Ferri, Hamatitæ viribus pollere videtur.*

RUBIMORA, *Mewes de Renard, Brombeeren*. Folia ternata & quinata, ultimo impari, non raro lobato, omnia ovato-

lanceolata, serrata, subtus tomentosa, subadstringentia; *Baccæ Moris* satis similes, colore nigro, sapore aquoso, viscidulo, odore nullo. *Rubus fruticosus* L. *Blackwell* Tab. 45. In Europa ubique crescit. *Sunt, qui Folia ad Gargarismata adhibeant; Baccæ ob vim Refrigerantem laudantur.*

RUBUS IDÆUS, *Lampione, Framboise, Himbeere*. *Baccæ rubræ*, subinde etiam albæ, rotundæ, villo obsessæ, ad basin concavæ, quarum receptaculo conoideo acini adhærent succulenti, monospermi, stylo setaceo coronati, proprium, suavissimum odorem, saporem habent vinosum, dulcem. *Rubus Idæus* L. *Blackwell* Tab. 289. Copiosus ejus per Europam proventus est. *Ad Analepticum, nec non Refrigerandi & Putredinem arcendi finem Succus in Syrupum, Rotulas, Gelatum conversus exhibetur.* Aqua inde destillata gratum odorem spirat.

RUSCUS, *Rusco, Bruscus, petit houx, Mausdorn*. Radix fibrosa, cylindræa, calamum crassa, plurimas fibrillas dimittens, alba, cum lenissima acrimonia primo gustu dulcis, dein amara. *Ruscus Aculeatus* L. *Blackwell* Tab. 155. Europæa Meridionalis, nostræ hyemis apprime patiens. *Vis ejus Resolvens & Diuretica laudatur; quinque Radicibus Apertis majoribus adnumeratur.*

RUTA, *Ruta, Ruë, Raute*. Folia aliquot pinnulis rotundis, glaucispinnata, odore proprio, forti & gravi, sapore acri & amaro, utroque exsiccatione mitescente. *Semina* exigua sunt, angularia, nigra, sapore & odore ad Folia accedunt. *Ruta graveolens* L. *Blackwell* Tab. 7. Europæ calidæ propria, nostras hyemes innocua fert. Olei odorati $\frac{1}{2}$ fundit. *Resolvens, Venenis resistens, Urinam pellens internum olim remedium habebatur; externus ejus usus in Ulceribus abstergendis, Rubefaciendo, Malignitatem Aeris corrigendo versatur.* Oleum destillatum Balsamis Cephalicis immiscetur.

RUTA MURARIA, *Adiantum album, Sauvevie, Mauwrauten*. Cauliculi teneri, teretes, herbacei, albidi superne ramosi, tribus vestiti foliolis, parvis, cuneifor-

mibus, crenulatis, odoris nullius, saporis levissime adstringentis. *Asplenium Ruta Muraria* L. *Blackwell* Tab. 219. Crescit passim per Europam. *Reliquis Adiantis viribus æquiparanda.*

SABADILLI SEMEN, *Mexicanischer Laus-Saamen*. Capsulæ ternatæ, oblongæ, æquales, flavicantes, latere interiore dehiscentes, triloculares, Semina continent oblonga, acuta, nigra, amaro & fervido sapore linguam ferientia. *Veratrum Sabadilla* Retz. Mexicana planta. Hoc seculo demum in Europa innotuit. *Extus contra Pediculos adhibetur. Contra Affectus Nephriticos & Taniam ad Drachmam unam usque pro dosi datum fuisse lego.*

SABINA, *Sabina, Sevenbaum*. Folia longa, ex foliolis linearibus, acerosis, imbricatis efformata, odore gravi, forti, sapore amaricante & acri. *Juniperus Sabina* L. *Blackwell* Tab. 214. Orientis & Europæ calidæ propria arbor, nostras hyemes citra noxam fert. Olei odorati circiter $\frac{1}{4}$ fundere dicitur. *Validissime Sanguinem Uterinum maxime commovet, quapropter nunquam intus danda.* *Extus Porræ Venereis, Ossibus cariis, Fungis Duræ matris inspergitur.*

SACCHARUM, *Zuccher, Sucre, Zucker*. Sal essentialis, dulcis, in aqua facillime solubilis, sub varia forma apud nos prostat; qui pulverem fuscum, humescentem refert, alieno, minus grato sapore, *Saccharum Thomæum* nuncupatur, nec nisi ad usus Eccoproticos adhibetur; ficcum & albidius *Cassonade* dicitur. Iteratis depurationibus in cohærentes panes conoideos ex granis formatos redactum Saccharum pro diversa soliditate, albedine, granorum splendore differt. Belgæ ut & Germani in *Miscellaneum*, cui *Farinose* etiam nostro idiomate, *Lumpenzucker* nomen est, *Melisseum* sive *Melis*, *Melis parvum*, *Rafinatum*, *Boyerbrod*, *Canariense* denique Saccharum distinguunt. Ad singulas Sacchari depurationes, *Rafinationes* dicunt, liquor defluit Syrupi consistentiæ, plus minus badius, sordidus, alienum spirans odorem *Saccharum liquidum*; *Syrupus Saccharinus*, *Syrop* dicitur. Obtinetur Saccharum ex succo Sacchari

Officinarum L. sub Tropicis sponte crescentis, recentiori ævo in America quoque calidiore, Sicilia, Hispania copiose culti, apud nos in tepidario asservandi. *Alimentario, Resolvente, Demulcente, Antiseptico, Relaxante scopo sub multiplici forma intus adhibetur; extus ad Abstergentia & Discutientia refertur. Plurimarum Formularum Basis est, Constituens & Corrigens.*

SAGAPENUM, *Sagapeno, Gomme Seraphique, Serapin Gummi.* Succus concretus in granis minoribus ad nos pervenit, ex rubro-flavescentibus, semipellucidis, cornu referentibus, odore nauseoso, gravi; sapore fastidioso & amaro, cui alliacei quid submixtum est. Massæ majores, pannis cæruleis involutæ, profundius fuscæ, fordibus inquinatæ *in sorten* dicuntur. Sagapenum ex Alexandria venire constat, cui vero plantæ acceptum illud sit referendum ignoratur, ad Umbelliferas eam pertinere valde verosimile est. In aqua, maximam partem solubilis est, Alcohol quoque ejus portionem recipit, igne non liquabilis, accensum nauseosum odorem spirans, aliquantum Olei odorati fundere dicitur. *Intus ad Resolvendum & Viscera Reseranda commendatur, extus Resolvendi scopo applicatur.*

SAGO, *Sagu.* Grana, granis Hordei mundati similia, non raro angulosa, extus ex albo flavicant, medullam albiſſimam includunt, sapore & odore carent, coctione intumesunt, aquam, cum qua coquantur, viscidam reddunt, & diutius cocta penitus in aqua dissolvuntur, eique spissæ gelatinæ formam induunt: Paratur Sago ex varii generis *Palmis*, quorum nondum satis determinatus character est; in Insulis Moluccis & Australibus, nec non a Borneo ad Siam usque copiose crescunt. Ex caudice *Palmæ* medullam aqua eluunt, in pastam efformant, inter lapides foraminibus exculptos in modum panis coquant, unde ei forma manent, sub qua ad nos vehitur. Sub initium hujus seculi ab Anglis hæc grana ob octo retro lustris a Gallis & Germanis in usum cibarium & medicamentosum recipi cœperunt. *Phthificis præcipue laudantur.*

SAL COMMUNE, *Sal Panis. Sal commune, Küchensalz.* Sal medius in crystallos cubicas concreſcens, proprii saporis prunis superspersus decrepitans, ex proprio Acido & Alkali fossili constans. Muria L. Pro tripartito, quod ipsa Natura largitur, genere, solet distingui. SAL FOSSILE, eo quod ut plurimum pellucens obtinetur, *Sal Gemmæ* dicitur. Mura montana L. *Sel Gemme, Stein-vel Bergsalz* in frustis variæ magnitudinis, interdum permagnis per universum orbem ex montium visceribus effoditur; a fordibus, si quas habet, aut qualicunque colore prius depurandum est, quam in usum trahatur. SAL FONTANUM, Muria fontana L. quod proprie *Commune* appellant, ex peculiaribus fontibus, quos Salinas dicunt, solerti evaporatione obtinetur, & ab heterogeneis, quibus mixtum esse solet, salibus purgatur. SAL MARINUS, Muria marina L. ex omni, quod Globum nostrum ambit, Mari, & quidem in regionibus calidioribus naturali, quæ per Aërem & Solem fit, evaporatione, in frigidioribus vero eodem modo, quo Sal fontanus ex Salinis, obtinetur. Cum diversa sit ratio, qua Sal communis acidum vehere videtur, diversam quoque acrimoniæ rationem esse oportet. Sal marinus omnes reliquos acrimonia superat, quanquam hic ipse pro vario Mari, unde gignitur, differt. Salis communis probitas ex albedine, omnis peregrini saporis privatione & quod in aëre non humefcat, dignoscitur. *Humores incidit, Fibras stimulat, Putredini, sufficiente quantitate receptus, resistit tam extus, quam intus.*

SALEP RADICES. Ovatae sunt, undiquæ læves, ventricosæ, cornu instar subdiaphanæ & tenaces, insipidæ, inodoræ. Ex Turcia afferuntur; in nostris quoque regionibus optime parantur, siquidem de *Orchide* aut *Satyrio* bulbis indivisis constante, adempta exteriori cuticula, sumuntur bulbi, frigida infunduntur, ex filis deinde suspenduntur & exsiccantur. *Phthificis & Dysentericis hæc radix; sive sub forma Pulveris, sive eodem pulvere cum menstruo aquoso, sub stre-*
nna,

nna, ope virgulae agitatione in gelatissimam cocto, Jure aut Lacte diluendam commendatur.

SALICARIA, *Salicastro*, *Salicaire*, *Weiderich*. Folia lanceolata acuta, supra glabra, infra levissime tomentosa, inodora, insipida. Lythrum Salicaria L. Passim per Europam obvium. Ad Alvi fluxus chronicos moderandos laudatur.

SALIX, *Salcio*, *Saule*, *Weiden*. Cortex ramorum juniorum, colore viridis & splendens, odore gratus, sapore balsamicus; amaricans. Salix pentandra L. Vulgaris per Europam arbor. Corticem Salicis quidam Cortici Peruviano ad curandas Febres intermittentes substituere conati sunt.

SALVIA, *Salvia*, *Sauge*, *Salbey*. Folia ovato-oblonga, obtusa, rugosa, utrinque tomentosa, crenata, proprio aromatico odore, sapore linguam pungente amaricante: Flores majores, labiati, labio superiore fornicato, cærulei, sapore & odore multo foliis inferiores sunt. Salvia officinalis L. *Blackwell* Tab. 71. Europæ calidæ indigena nostrashyemes impunis fert. Pauxillum Olei odorati fundit. Condimenti loco non raro recipitur; viribus cum reliquis Vegetabilibus aromaticis æquipollet, in morbis Pectoris maxime usurpatur.

SAMBUCUS, *Sambuco*, *Sureau*, *Holder*. Cortex intermedius, sive Liber extus viridis, intus albus, adstringens & austeriusculus; Folia pinnata sunt cum impari, pinnæ acutæ, glaucæ, ferratæ, saporis herbacei; Flores cymosi, parvo calyce sustentati, quinquefidi, albi, suavi odore & levi sapore perfusi; Baccæ in officinis Grana Actes nuncupatæ, rotundæ sunt, umbilicatæ, nigrae, pulpam condunt purpuream, saporis dulciusculi. Sambucus nigra L. *Blackwell* Tab. 151. Crescit in omni Europa. Flores abstrahendam a se Aquam & Spiritum Vini fragrante odore imbuunt, pauxillum etiam Olei odorati butyracei fundere dicuntur. Cortex subinde Cathartico scopo ad Unciam unam usurpatur. Foliorum extus contra Hemorrhoides & Erysipelas efficacia laudatur. Flores sub forma Infusi ad pellendum Sudorem, tanquam Epithema Discutiendi scopo adhibentur; Baccas nullo earum merito, sunt, qui contra Dysenteriam commendent.

SANDARACA GUMMI, videatur **JUNIPERUS**.

SANICULA, *Radix tenuis*, fibrosa, grysea, amaricans. Folia reniformia, duriuscula, irregulariter lobata, lobis subrotundis ferrata, inferne pallida, saporis leviter adstringentis, nonnihil etiam falsi. Sanicula Europæa L. *Blackwell* Tab. 63. Admodum frequens Europæ planta, Intus aque ac extus adhibita contra Hemorrhagias magnopere commendabatur.

SANLAY a *Seba* dicta. Est Radix Calami Acori veri sub **CALAMO AROMATICO** recensita, ex China in taleolas tenues secta & ad nos missa.

SANTALUM ALBUM. Magna & crassa, frusta alba, pallida, ponderosa, saporis & odoris expertia; Alburnum Santali albi L. Arboris in India crescentis, esse dicitur. Plane iners.

SANTALUM CITRINUM. Frusta magna & crassa, coloris pallide flavicantis, fricata fragrantem spirans odorem, saporem lingua vix percipit, Arboris præcedentis Medullam esse afferunt. Oleum destillatum egregie fragrans fundere dicitur. Ob Analepticas virtutes olim laudabatur, quæ vero, prout in nostris certe tabernis illud prostat, valde exigua deprehenduntur.

SANTALUM RUBRUM. In frustis nobis mittitur multo, quam præcedentia, majoribus & crassioribus extus obscuriore, intus sanguineo rubore tinctum; cortice caret, fibræ ejus evidenter crispæ sunt. Arboris cujusdam, ignoti adhuc characteris, ex Coromandel & Africæ regionibus Orientalibus venientis medulla esse fertur. Arbor in *Supplemento Linnæano* Pterocarpi Santolini nomine describitur. Eviluerunt ejus Hepaticæ & Refrigerantes vires, quin & ad coloranda medicamenta rarius hodie adhibetur.

SAPONARIA, *Seifenkraut*. Radix fibrosa, calamo anserino crassior, sub cuticula flavescente medullam albam & dulcem condit. Folia ovato-lanceolata, glabra, neque odorata neque sapida sunt. Saponaria officinalis L. *Blackwell* Tab. 113. In omni Europa invenitur. Lintea Saponis vice hac planta abstergi

jam diu observatum est, qua quidem virtute Foliis Radices præstare, recentiora experimenta docuerunt. *Ob vires Resolventes a Recentioribus multum laudatur sub forma sive Infusi, sive Extracti data.*

SAPPHIRUS. Gemma duritie Rubinum subsequens, coloris cærulei. Alumen gemma pretiosa cæruleum L. In iisdem ac Rubinus locis occurrit: Muria Chrysolampis L. cærulea, passim in fodinis Europam obvia, non raro ei substituitur. *Vanum est quicquid de viribus ejus Medicatis jactatur.*

SARCOCOLLA. Grana variæ magnitudinis, maximæ Nucem Juglandem æquant, rugosa, flavicantia, cum rubeдинis vestigio, odorem nullum, saporem ex dulci nauseose amaricantem, acriusculum habent. Obtineri ea ex Penæa Sarcocolla L. Æthiopiæ frutice fuerunt. Accensa gratum odorem spirant, in Aqua penitus, in Alchhole aliquatenus dissolubilia sunt. *Resolvendi & Abstergendi scopo olim usurpabatur.*

SARSAPARILLA. Radices interdum bipedales, flexiles, quapropter in gyrum crebro flexæ deprehenduntur, impariter interdum ad calamum usque anserinum crassæ, multas fibrillas teneras emittunt, quas autem inde recidi oportet, sub cortice ex rubicundo cinerascens, medullam continent farinaceam, albissimam, fissilem, odore & sapore carent. Adventur corbibus compactæ, ex radicum serpentium genere quodam, ipsis parum dissimili, confectis. Radices graciles; extus nigrae, quæque facillime findi recusant, rejiciendæ. Similax Sarsaparilla L. *Blackwell* Tab. 339. Americæ calidioris, nobis in frigidario per hunc hunc servanda. Aqua cum Sarsaparilla cocta rubra & sapida evadit. *Ab omni tempore & vel recentissima experimenta multum contra morbos Venereos laudatur.*

SASSAFRAS LIGNUM. Frusta magna & ramosa, levia, sub Cortice ferrugineo, spongioso, rugoso Lignum continent pallidius, minus durum, cujus transversim secati fibræ facillime a semet ipsa discedunt; odor fortis, non ingratus ad Fœniculum accedit, sapor aromaticus

est. Cortex sapore æque ac odore Ligno præstat. Laurus Sassafras L. Americæ Septentrionalis propria; arbores juniores in nostra plaga contra hyemis injurias defendendæ sunt. Olei odorati $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$ fundit. *Contra morbos Catarrhales, Rheumaticos, Cutaneos & Venereos Cortex ad Scrupulos duos, Lignum ad Sesquidrachmam datur in Infuso.*

SATUREJA, Satureja, Sariette, Bohnenkraut. Caules multum ramosi, diffusi, albidi, Foliis vestiti parvis, lanceolatis & Florum ringentium verticillis, odorem habent gratum, aromaticum, saporem linguam pungentem. Satureja hortensis L. *Blackwell* Tab. 419. Europæ calidæ propria planta, apud nos copiose in hortis colitur. Olei odorati paucillum fundit. *Vires plantarum aromaticarum exserit, rarius ad usus medicatos, crebrius ad culinarios adhibetur.*

SATYRIUM, Stendelwurcz. Radices sphaeroideæ sunt, cinerascens, rugosæ, insipidæ & inodoræ. Desumuntur ab omnibus Orchidis & Satyrii speciebus, quarum bulbi indivisi sunt. Ex quo *adscrip-tas ipsis vires Aphrodisiacas experientia non confirmavit, evilerunt eo etiam magis, quod Radices Salep ipsis omnino præstant.*

SAXIFRAGA ALBA, Bulbilli exigui, rotundi, involucro rufo, piloso tecti, aliquantulum carnis albæ, primum insipidæ, dein amaricantis exhibentes. Saxifrage granulata L. *Blackwell* Tab. 56. Crescit per omnem Europam. *Vires Lithontripticas his Radicibus adscriptas experientia non confirmavit.*

SCABIOSA. Folia ex ovatis-oblonga, hirsuta, inodora, levissime amaricantia Flores asservantur ex calyce evulsi tubulosi, cærulescentes, insipidi, inodori. Scabiosa arvensis L. *Blackwell* Tab. 185. Vulgaris per Europam. *A virtute Becchica & Vulneraria laudatur.*

SCAMMONEUM. Succus concretus in majoribus frustis ad nos vectus, ex gryseo-nigricans est, in pulverem gryseum, cui *Diagrydii* nomen, redigi patiens, odoris proprii, nauseosi, saporis evidenter acris. *Aleppense* ad Marasch, quatuor dierum itinere ab Aleppo distans, col-

collectum levius, magis gryseum, ex Convolvuli Scammoneæ L. Asiæ Occidentalis, apud nos per hyemem in tepidario asservandi radicibus fauciatis obtinetur; *Smyrnaeum* ex Galatia & Capadocia Smyrnam translatum vilius est; vilissimum *Antiochenum* nigerrimum, multis foraminibus exesum, empyreuma redolens; duo posteriora ex variis Convolvuli speciebus parari dicuntur. Tam Aqua, quam Spiritus Vini ejus aliquantulam partem dissolvunt. *Validioribus Catharticis adnumerandum ad Granadecem vel quindecim exhibetur.*

SCARABÆUS MAJALIS, *Scarafaggio, Hanneton, Maikæfer*. Insectum pedibus instructum, alas tegmine duriusculo tectas, scutatas habet, thorace villoso instructum. Scarabæus Mellontha L. vel nimis frequenter occurrit. *A quibusdam contra Hydrophobiam commendatur.*

SCHOENANTHUM, *Kameelheu*. Culmi teretes, spithamæi, flavi; superne angustati & in ramos parallelos capillares diffusi, includentes substantiam fungosam, obvoluti aliquot foliis vaginantibus, glabris, margine scabriusculis, odoris proprii, aromatici, saporis amaricantis, linguam ferientis. Andropogon Schoenanthum L. Indiæ Orientalis & Arabiæ indigenum. Aliquantillum Olei odorati fundere dicitur. *Ob vires Aromaticas olim in usum trahabatur.*

SCILLA, *Scilla, Squilla, Meerzwiebel*. Radix bulbosa, amplitudine non raro aliquot pugnos æquans, ex basi angustiore, rotunda, fibrillas dimittente, protinus in corpus amplum & ventricosum distenditur, quod superne in formam conoideam contractum, extus tunicis vestitur membranaceis, siccis, aridis, rufis; bulbi caro constat squamis albidis, levi rubedine suffusis, apprime amaris, non admodum acribus, in meditullio minus amaris. Scilla maritima L. Europæ calidæ & Orientis propria, in nostris hortis si colitur, contra hyemis rigorem est defendenda. *Ob vim Resolventem & Diureticam ab omni ætate fuit laudata; recens pulverisata illi, quæ sub nomine preparata asservatur, præferen-*

da videtur. Datur ad Scrupulum semis pro dosi.

SCINCUS, *Stincus*. Animal quatuor pedibus tetradactylis instructum, sex pollices circiter longum, linea longitudinali abdomen, visceribus exentis, apertum ostendit; cutis squamosa est, argentea, cum vestigio flavedinis, deorsum, fasciis cæruleis transversis notatum, spina eminens distinguit, cauda ad latera contracta brevis, caput trunco continuatum est; odore caret, saporem falsum habet. Lacerta Scincus L. In Ægypto & Arabia petrea occurrit. *A vi Aphrodisiaca commendabatur.*

SCLAREA. videatur HORMINUM.

SCOLOPENDRIUM, *Lingua Cervina*. Folia oblonga, ad finem paulatim magis dilatata, integerrima, firma, inodora, linguam leviter adstringentia. Asplenium Scolopendrium L. *Blackwell Tab. 138. Europæ temperatæ. Scopo Adstringendi & Roborandi usurpabatur.*

SCORDIUM, *Scordeo, Chamaras, Lachen-Knoblauch*. Folia ovato-oblonga, crenata, hirsuta, odoris proprii, Allio vicini, saporis amari, acriusculi. Teucrium Scordium L. Passim per Europam obvium. *Ob virtutem potissimum Antisepticam laudatur, quo quidem scopo tam extus, quam intus adhibetur; datur insuper interne ad referanda viscera, promovendasque Excretiones aquosas.*

SCORPIUS. Hoc nomine quæ nobis veniunt animalcula juniora Oleo condita, vix aliquot lineas æquantia, colore bruno, antennis in chelas terminatis & cauda instructa sunt, cujus ultimus articulus in aculeum arcuatum abit. Scorpium Europæus L. *Oleum, in quo Scorpiones infusi erant, propria vi contra ictum animalium venenatorum pollere creditur.*

SCORZONERA. Radices longæ, fibrosæ, pollicaris circiter crassitie, sub cuticula nigra carnem albam, dulcem, lacte madentem includunt. Demta cuticula in officinis asservantur extus rubræ, intus albæ, dulces. Scorzonera Hispanica L. *Blackwell Tab. 406. Europæ calidæ civis nostratis hyemis patientissima. Primo aut secundo a satione anno*

Radices in usum cibarium, trimæ vel quadrimæ propter indolem suam saponaceam in officinas recipiuntur.

SCROPHULARIA, *Braunwurze*. Radices ex tuberculis ovatis, nodulis obfessis, fibrillas albidas emittentibus constant, extus gryseæ, intus albidæ sunt, odorem spargunt levissimum, nauseosum, saporem edunt acriusculum, leviter amarum. *Foliorum petiolatorum, ovatorum, ferratorum, gravis odor, sapor amariusculus est. Scrophularia nodosa L. Blackwell Tab. 87. Crescit per omnem Europam. Radices aque ac Folia contra Scrophulas & Hemorrhoides cæcas commendabantur.*

SEBESTEN, *schwarze Brustbeeren*. Fructus parvis Prunis similes, ovati, utrinque acuti, nigricantes, rugosi, calyce sustentati sicco, flavicante, repando, pulpa fusca & dulci officulum recondunt ovatum, prædurum, nucleo dulci foetum. Macri, calyce orbati, alieno sapore contaminati, rejiciendi sunt. *Cordia Myxa L. Ægypti & Indiæ arbor, apud nos in caldario servanda. Ob vias Demulcentes olim ad Decocta Pectoralia recipiebantur.*

SECALE, *Segale, Seigle, Roggen*. Grana strigosa, inferne acuta, superne aliquantum obtusa, sulco longitudinali notata, sub cuticula flavicante, ad nigrum vergente farinam albissimam includunt. *Secale Cereale L. Blackwell Tab. 424. Mucilaginis viscidæ ponderis sui dimidium vehit. Farina Secalis cum Cerevisiæ sæce in pastam redacta & Collo imposta Asperitati Fauçium & Anginæ mederi fertur.*

SEDLICENSIS SAL. Crystalli exiguæ, cuspides referentes, facillime in aqua dissolubiles, nullam ab aëre mutationem patientes, evidenter amaræ, ex Acido Vitriolico Magnesia saturato, natæ. Obtinetur evaporationis ope ex variis, in quodam Bohemiæ vico scaturientibus fontibus. *Frequentissimus ejus in ducenda Alvo usus est, quo scopo ejus Uncia aut Sesquiuncia in duodecim Aquæ Unciis dissolvitur.*

SEDUM MINUS, *Sedo, Tripe, Madame, Katzentrauben*. Cauliculi teretes, undique versum imbricati, Foliolis tere-

tibus, ovatis, obtusis, convexo-gibbis, acris saporis, odoris expertes. Sedum acre L. *Blackwell Tab. 232. Vulgare per omnem Europam. Intus ad unum aut alterum cochlear sumtum Vomitus & secessus Alvinos excitat. Extus Clavos pedum consumit, Cancro & Ulceribus fungosis medullam attulisse relatum legitur.*

SEIDSCHUZENSIS SAL. Sedlizenfi adeo similis, ut unus ab altero distinguere vix possit. Obtinetur evaporationis ope fontibus cognominibus, non longe a Sedlizio distantibus; Magnesiæ $\frac{2}{3}$ plus quam Sedlizenfis vehit; ceterum eadem utriusque tam virium, quam dosis ratio est.

SELENITES, videatur **GLACIES MARIÆ**.

SEMPERVIVUM, *Semprevivo, Foubarbe, Hauswurzel*. Folia ex ovato oblonga, crassa, ciliata, convexo-concava; saporis subacerbi. *Sempervivum tectorum L. Blackwell Tab. 366. Totius Europæ domesticum. Intus Resolventibus & Detergentibus viribus poliet. Extus eardem laudem habet, Clavis pedum etiam salubriter imponitur.*

SENECIO, *Cardoncello, Senecon, Kreuzelkraut*. Folia oblonga, semipinnata, pinnis ferratis & latis, insipida. *Senecio Vulgaris L. Blackwell Tab. 132. Copiosissime per Europam crescit. Resolventis Tumoribus imponitur.*

SENECKA. Radix fibrosa, calamum anserinum circiter crassa, ex capite crassiore fibras dimittit, aliquot nobis distinctas, medullam continet, sub cortice ex cinereo flavo, albam, saporem habet Pimpinellæ albæ vicinum, sed acriorem. *Polygala Senega L. Americæ Septentrionalis. Sanguinem Pleuriticum, nec non spissitudinem Arthriticam resolvit. Uncia ejus una cum Aquæ viginti quatuor Unciis ad duodecim residuas coquitur, cochleatim exhibetur.*

SENNA. Foliola ovato-lanceolata, medio nervo percursa, acuta, viridia cum suffuso flavo, proprii odoris, nauseosi, saporis amari, quadantenus acris. *Folliculi Legumina ovata, utrinque compressa, viridia, feminibus oblongis foeta, odoris vacua, sapore falso Foliis quodam-*

dammodo comparando. Cassia Senna L. Ægypti indigena. Nonnisi *Alexandrina* folia & Legumina, in commercio de la Palte dicta, recipienda sunt. Folia *Tripolitana* majora & obtusa, *Italica* obtusa & magnis venis perfusa, *Mochana* angustiora, longiora, acutiora, suo quaque odore Alexandrini cedunt. Folliculi *Tripolitani* minores sunt, minus virides, nigro & rufo maculati. Folia Oleum odoratum fundere dicuntur. *Tam Folia, quam Folliculi ad Unciam semis Alvum quid ducunt, irritant tamen; coqui recusant; nec Infusum eorum valde exprimendum est.*

SEPIÆ OS, *Osso di Seppia, Os de Sèche, vweis Fischbeid.* Testa a squamis coalitis orta, oblonga, utrinque angustata, albissima, dura, linguam salis sensu afficiens, cujus faciei concavæ substantia alba inhæret pulverulenta, laxa, insipida. *Sepia officinalis* L. In Oceano & Mari Mediterraneo occurrit. *Adstringentes ipsi tribuuntur vires, substantia laxa ad Dentifricia recipitur.*

SERICUM, *Seta, Soie, Seide.* Fila firma, tenacia, alba vel flava, flexibilia, inodora & insipida, folliculum tegentia ovatum, in cujus cavitate *Nympha delitescit Phalenæ Bombycis Mori* L. *Perfiæ indigenæ, & hodie passim in Europa cultæ. Multum Salis volatilis largitur. Scopo Cephalico & Cordiali olim laudabatur.*

SERPENS, *Serpente, Serpent, Schlange.* *Exuvium* Serpentis, tenax, inodorum, insipidum, pro vario unde defumitur genere varie coloratum, & maculatum, apud nos a Colubro Natrice L. vulgo defumitur. *Axungia Piscium axungie simillima. Lapidis nomine hodie venit substantia nigra, in medio macula alba notata, ad margines attenuata, bibula, linguæ adhærens, insipida, ex Cornu Cervino usto parata. Exuvia ad opitulandum Partum Ventri & Lumbis alligabantur; ad incrementum Pilorum accelerandum adhibebantur; intus scopo Diuretico inseriebant; viribus quoque Axungia cum Adipe Piscium equipollet; Lapis Vulneribus venenatis imponi solebat.*

SERPENTARIA VIRGINIANA. Radix ex tenui capite plures fibrillas, aliquot pollices longas, emittit, ferruginea, intus albida, Camphoram evidenter olens, sapore acriuscula & amaricans. *Aristolochia Serpenteria* L. Crescit in Virginia & Carolina. Aliquantum Olei odorati fundere dicitur. In penum medicamentariam Europæorum exunte demum superiore seculo admissa est. *Virium Alexipharmicarum, Anodynarum, Antisepticarum laudem habet. Datur in Pulvere ad Scrupulum unum, in Infuso ad Drachmam unam.*

SERPILLUM, *Serpillo, Serpolet, Quendel.* Cauliculi teneri, teretes, albidi, Foliis vestiti parvis, ovatis, obtusis, odore perfusi aromatico, proprio sapore qui linguam pungit. *Thymus Serpillum* L. *Blackwell* Tab. 418. Crescit per omnem Europam. Per paulum Olei odorati fundere dicitur. *Menses & Urinam promoveri, Cephalalgiam ex crapula ortam pellere dicitur; extus ad Discutiendum & Roborandum adhibetur.*

SESAMUM. Semina exigua, ovata, albida, dulcia, Oleo turgida. *Sesamum Orientale* L. In Oriente & Corsica crescit. Annua planta nostræ plagæ culturam patitur. *Vim Relaxantem ei nonnulli tribuunt.*

SESELI CRETICUM seu *Montanum, Bergkummel.* Semina parva, utrinque obtusa, convexo-concava, tribus lineis eminentibus notata, rufa, vix odora, saporis leviter aromatici. *Tordylium Officinale* L. Europæ calidæ planta annua, in nostris hortis coli patiens.

SESELI MASSILIENSE. Priori simile, magis gryseum & odoratum. *Laserpitium Siler* L. *Blackwell* Tab. 426. Orientis & Europæ calidæ. *Utrumque Sefeli Resolvendi & Urinam Ducendi scopo adhibebatur.* Varia Semina aromatica plantarum umbelliferarum hoc nomine passim in officinis occurrunt.

SIDERITIS, *Siderite, Crapaudine, Glied-vel Beruf-vel Beschrey-Kraut.* Folia oblonga, obtusa, ferrata, scabra, hirsuta, odore tenui, sapore adstringente prædita. *Stachys recta* L. Passim in Europam

obvia. *Vis ei Vulneraria tribuitur, ad Balnea contra Rhachitidem recipitur.*

SIGILLUM SALOMONIS, *Weißwurz-
zel*. Radix cylindrica, crassitie calami an-
ferini, striis eminentibus rugosa, extus
flavicans, intus alba, levem spirat odo-
rem, saporem prodit dulcem. Convalla-
ria Polygonatum L. *Blackwell* Tab. 251.
Vulgaris per Europam. Mucilaginis ultra
dimidium sui ponderis largitur. *Contra
Hæmorrhagias & Hemorrhoides efficax præ-
dicatur.*

SILER MONTANUM. Semen, quod
sub SESELI MASSILIENSIS titulo descri-
psi, hoc nomine subinde prostat.

SILEX, *Selce, Caillou, Kieselstein*. La-
pis rotundus, durus, ad Chalybis ictum
scintillas evomens, fractura in frustula
lævia, quasi vitrea, convexo-concava di-
labens, varie coloratus, citra fusionem
nullo menstruo solubilis, insipidus, ino-
dorus. Silex Pyromachus L. In fluviorum
alveis & ad ripas offenditur. *Iners omni-
no Lapis olim Lithonripticis adscribebatur.*

SILQUA DULCIS, *Caruba, Carobe,
Carouge, Johannesbrod*. Fructus oblongus,
utrinque compressus, plus minus incur-
vus, fusco-brunus, nitidus, rugosus,
intus multis septis distinctus, pulpam con-
tinentibus, siccam, rufam, dulcem, fe-
mina foventem subrotunda, splendentia,
fusca, nucleum album includentia. Ma-
cræ, quæque concussæ crepitant, reijci-
endæ sunt. Ceratonia Siliqua L. *Blackwell*
Tab. 209. Vulgatissima Europæ calidæ &
Orientis arbor, apud nos contra hyemis
rigorem est defendenda. *Decoctis Pecto-
ralibus adjicitur.*

SIMAROUBA. Cortex non crassus,
cujus frusta pede longiora, aliquot pol-
lices lata, laciniata ad nos adferuntur,
fractu pertinax, extus levissime rugosus,
cinereus, intus pallidior, per se in pul-
verem redigi impatiens, inodorus, ama-
rissimus. Pro *Quassia dioica* hanc arborem
habet *Pharmacop. Suec. Clar. Aublet* con-
tra monœciam esse observavit; Linnæus
in *Supplemento* Quassiam Simarubam ap-
pellat. In Insulis Americæ calidæ crescit.
*Prioribus hujus Seculi annis primum a Gal-
lis contra Dysenteriam usurpatus est hic Cor-*

*tex. Datur ad Scrupulos duos pro dosi ex
Aqua decoctus.*

SINAPI, *Senape, Moutarde, Senf*. Se-
mina parva, rotunda, rubicundo-brunea,
sapore admodum acri statim linguam &
in pulverem redacta trans palatum nares
quoque irritantia. Sinapis nigra L. Pas-
sim in Europa obvia, apud nos copiose
in agris colitur. Oleum unguinosum mi-
te, odoratum acerrimum fundere dicun-
tur. *Ad condimenta hæc Semina recipiuntur
Medicis Resolventium, Diureticorum,
Antiscorbuticorum nomine commendantur. In
Cataplasma redacta extus ad Rubefaciendum
adhibentur.*

SMARAGDUS, *Smeraldo, Smeraude*.
Gemma reliquis mollior, viridis, igne
colorem non mutans, variæ, angularis
figuræ. Borax Gemma nobilis viridis L.
Ex India potissimum & quidem pretiosior
nobis venit, in Bohemia & Gallia quo-
que obtinetur. Fluorem ei viridem sive
Muriam lucidam L. passim ex Europæ
fodinis effosam plerumque substituere so-
lent. *Gemmis afficta olim vires medicæ Sma-
ragdo etiam affingebatur.*

SMIRIS, *Smiriglio, Emery, Schmirgel*.
Minera Ferri ponderosa, lapidem duris-
simum, nigro-gryseum referens, in pul-
verem trita ad rufum vergens. Ferrum
Smiris L. Hinc inde in metalli fodinis
reperitur. *Multifarius ejus in variis artibus
usus est. Olim ad Dentifricia recipiebatur.*

SODA, *Alumen Catinum, Soda, Sou-
de*. Massa terreo-salina, in prægrandes
glebas efformata, perdura, gryseo-nigri-
cans, cærulescens, plurimis foraminibus
pertusa, odoris non ingrati, saporis sal-
si, lixiviosi. Orientalis, multum lauda-
ta, *Rochetta Alexandrina* dicitur, ex Oc-
cidentalibus *Alonensis* præcipue commen-
datur. Paratur ex variis Salsolæ L. Sali-
corniæ L. & Mesembryanthemi L. ad Ma-
re crescentibus speciebus. In Aëre hume-
scens, soluta foetens, crusta viridi obdu-
cta, minoribus foraminibus pertusa, reji-
cienda est. *Sal inde paratus vires Alcalium
aquat.*

SOLANUM, *Solano, Morelle, Nacht-
schatten*. Folia rhomboidea, dentato-an-
gulata, odoris & saporis expertia. So-
la-

lanum nigrum L. *Blackwell* Tab. 107. Passim per Europam obvium. *Inconsulto venenis narcoticis adscripta; extus Discutiendi scopo in usum trabuntur.*

SOLDANELLA, *Chou marin, Meerkohl*. Folia longius petiolata, reniformi-cordata, obtusa cum parvo mucrone, crassiuscula, inodora, amaricantia, acria. *Convolutus Soldanella* L. Ad Oceani Europæi littora minus frigida crescit. *Valide & cum irritatione purgat. Datur in substantia ad Drachmam dimidium, in Infuso ad Drachmas duas.*

SONCHUS, *Cicerbita, Laitron, Sau-vel Gensdistel*. Folia longa, glauca, semipinnata, pinnis ferratis, odora, Papaveri propinqua, sapore amara. *Sonchus Oleraceus* L. *Blackwell* Tab. 130. Crescit ubique. *A quibusdam Cicorio substituitur.*

SOPHIA CHIRURGORUM, *Besenkraut*. Folia magna, circumscriptione triangulari, aliquoties pinnata, pinnis ordinatim decreescentibus, ultimis pinnulis linearibus, angustissimis, molliâ, levissimi odoris, saporis acriusculi. *Semina minima, ovata, rufa, acria. Sisymbrium Sophia* L. *Blackwell* Tab. 440. Passim per Europam occurit. *Vires Incidentes ei tribuuntur. Semina olim Adstringendi, Urinam ducendi, Vermibus medendi scopo laudabatur.*

SOBRUS AUCUPARIA, *Sorbo, Sorbier, Vogelbeerenbaum*. Baccæ rotundæ, umbilicatæ, rubræ, inodoræ, acido-acerbæ. *Sorbus Aucuparia* L. Frequens per Europam arbor. *Dicuntur Stranguriæ mæderi, Calculo Renali obsistere.*

SPECULARIS LAPIS, videatur **GLACIES MARIÆ**.

SPICA CELTICA. Radix parva, foliis exiguis squamarum instar vestita, nervos quoque foliorum marcidorum emittens, odore aromatico proprio, sapore amaro, falso, aromatico perfusa. *Valeriana Celtica* L. Alpibus Europæ calidæ propria planta. *Olim scopo Diuretico laudabatur; hodie in Orientem mittitur, ad usus Cosméticos adhibenda.*

SPICA INDICA, *Marien-Magdalenen-Blume*. Radicis exiguum capitulum ferrugineum, pluribus foliorum marcidorum nervis sibi invicem incumbentibus

& convolutis instructum, odore proprio forti, cui nonnihil mucidi inesse videtur, sapore leviter amaro perfusum. *Andropogon Nardus* L. Indiæ & Syriæ Gramen. A quibusdam *Spica Nardi* dicitur, qua voce alii utramque *Spicam*, alii *Lavendulam* supra memoratam indicant. *Præter odorem rarissimus ejus usus est.*

SPIGELIA. Folia dicuntur ovato-oblonga esse, acuta, supra viridia, infra glauca, odore & sapore putridum referentia. *Spigelia Marilandica* L. Americæ Septentrionalis propria planta. Haud ita pridem in Europam allata, contra *Vermes*, præcipue ab Anglis, maximopere commendatur. *Adultis duæ pro dosi Drachmæ bis de die dantur; justo majore quantitate data Soporosos edidisse effectus comperitum est. Ipsi debiliorem esse Spigeliæ Anthelmiam* L. Americæ calidæ, annuam plantam, apud nos Semina maturantem afferunt, cujus Folia ovato-acuta, hirsuta, fatui saporis sunt.

SPINA CERVINA, *Prugnolino, Nerprun, Kreuzbeerlein*. Baccæ rotundæ, Pifa majora magnitudine æquantes, puncto eminente umbilicatæ, nitidæ, succo lurido turgidæ, ad nigredinem cum vestigio viroris vergente, acriusculæ, cum quadam adstrictione nauseosæ. *Rhamnus Catharticus* L. *Blackwell* Tab. 135. Vulgaris per Europam arbor. Ex Succo Alumine mixto oritur pigmentum, *Verd de Vessie, Saftgrün* appellatum. *Baccas ad Drachmas duas datas, Aluum ducere ferunt, frequentissime parando Syrupo Domestico inserviunt.*

SPONGIA, *Spugna, Eponge, Schwamm*. Substantia fibrosa, subglobosa, lobata, fusci plus minus diluti coloris, odoris proprii minus grati, nullius saporis, multis foraminibus variæ magnitudinis hiulca, quibus liquorem sorbens turget. *Spongia officinalis* L. Copiose in Mari Mediterraneo & Rubro invenitur. *Spongiæ quo Molliores sunt, quo minoribus poris quoque dilutiore colore præditæ, eo meliores sunt & Eponges fines, Badschwamm* appellantur; majoribus contra foraminibus pertusæ, minus sequaces *Rosfschwamm* earumque fru-

fructa minora *Fragmenta Spongiarum* dicuntur. *Combustæ intus contra Strumas exhibentur, integræ extus ad Hæmorrhagias sistendas usurpantur.*

SPONGIARUM LAPIDES. *Lythophyta* membranas lapideas, fragiles, diversissime figuratas, cellulares referunt, manifesta, quod aliis substantiis adhæserint, signa præ se ferunt, odorem Maris spirant. *Cellepora Spongites* L. Testis & rupibus adcreta in Mari Mediterraneo reperitur. *Usti medicamentis contra Strumas admiscuntur.*

STANNUM, *Stagno, Etain, Zinn.* Metallum omnium levissimum & minore, quam reliqua, calore liquabile, albedine & firmitate Plumbum superans, in omnibus Acidis nec non Alcalibus solubile. Nativum rarius existit, sub variarum glebarum forma in Anglia maxime & Germania offenditur. *Scopo Anthelmintico ejus Rasuram vel ultra Semunciam pro dosi sunt qui laudent; qui vero hoc medicamento recte uti volent, caute circumspiciant, ne Plumbo aut alio Metallo noxio sit mangonifatum.*

STAPHIS AGRIA. Semina subrotunda, angulata, inferne latiora, superne contracta, in facie plana linea longitudinali distincta, sub cortice nigro, rugoso nucleum oleosum, albidum, amarum, acerrimum condunt. *Delphinium Staphis agria* L. *Blackwell* Tab. 265. Planta biennis Europæ calidæ, apud nos in tepidario ab hyemis rigore tuenda. *Acerrimum medicamentum nunquam intus dandum, contra Pediculos usurpatur.*

STOECHAS ARABICA. Spicæ cylindricæ, multis calicibus sibi arctissime incumbentibus Floresque marcidos emittentibus efformatæ, colore cinereo, odore levi, sapore aromatico ad *Lavendulam* accedente, sed minus grato. *Lavendula Stœchas* L. *Blackwell* Tab. 241. Orientis & Europæ Meridionalis propria, in tepidario contra nostras hyemes defendenda. Olei odorati uberem copiam fundere dicitur. *Rarissime in usum trahitur. Lavendula Spica vicem ejus sustinente.*

STOECHAS CITRINA, *Immortelles*

jaunes, Rheinblumen. Flores tubulosi, lutei, calyce sustentati luteo, ex squamis constante siccis, lanceolatis, imbricatis, insipidi, inodori. *Gnaphalium Arenarium* L. Passim per Europam obvium. *Lenes vires Adstringentes edere dicitur.*

STORAX CALAMITA. Succus concretus, sive sub forma massarum variæ magnitudinis, ex badio rufarum, tenacium, pinguiuscularum, proprii, suavis admodum odoris, acriusculi saporis, quæ quidem in *Granis* dicitur; sive in prægrandibus massis prostat, facci, in quo præli pressionem passæ erant, manifesta vestigia gerentibus, sabulo & lapillis inquinatis, friabilibus, odore & sapore antecedentibus similibus; hæc quo aridiores, eo viliores sunt. *Styras officinalis* L. Orientis & Europæ calidæ propria arbor, apud nos per hyemem in tepidario asservanda. In Gallia & Italia aliquantum Resinæ inde obtinetur. Oleum odoratum & Salem Essentialem emittere dicitur. Spiritu Vini vix non tota solvitur, Oleis nequaquam. *Olim scopo Becchico intus dabatur, hodie Suffitibus potissimum inservit.*

STORAX LIQUIDA. Resina quæ consistentiam Unguenti spissioris habet, grysea, sæculenta, sordida, antecedentis odorem spirans. *Liquidambar styraciflua* L. *Blackwell* Tab. 485. Virginicæ civis, nostras hyemes impune fert. Quæ in officinis prostat Resina, haud obscure mangonium prodit. *Ad consolidanda Vulnera adhibetur.*

STRAMONIUM, *Stramonio, Pomme épineuse, Stechapfel.* Folia magna, viridia, ovato-acuta, angulosa, in lacinias latas divisa, odore virulenta, sapore nauseosa. *Datura Stramonium* L. *Blackwell* Tab. 313. Americanæ originis planta, justo frequentius hodie in Europa occurrit. Omnibus hujus plantæ *Narcoticas vires inesse experientia edocuit. Succum inspissatum ad sex Grana bis de die datum Convulsiones & Maniam curasse observatum est.*

STRUTHIONIS, OVA, *Uovi di Struzzo, OEufs d' Autruche, Strausseneyer.* Testæ albæ, præmagnæ Ovorum *Struthio-*

thionis Cameli Lignum Asiæ & Africae avis. *A quibusdam scopo Lithontriptico laudabantur.*

SUBER, *Sughero, Liege, Kork-vel Pantoffelholz.* Cortex planus, crassiusculus, levis, coriaceus, firmus & compactus, facile scindendus, coloris dilute brunei, insipidus, inodorus. *Quercus Suber* L. *Blackwell* Tab. 193. Europæ calidæ, apud nos contra hyemis injurias defendenda. *Olim Adstringendi causa intus adhibebatur, extus ustum sub forma Unguenti Hæmorrhoidibus applicatur; usus ad Epistomia notissimus, ejusdem carbo in pulverem nigrum contritus Noir d'Espagne sistit.*

SUCCINUM, *Succino, Ambre jaune, Carabé, Agstein, Bernstein.* Bitumen in fructis variæ rotunditatis & magnitudinis exstat, plus minus profunde citrinum, pellucidum, grate olens, nullo calore fundi patiens, suavem odorem exhalans; quo minus colorata, quo pellucidiora, quo majora frusta, eo sunt pretiosiora. Quæ inter tornandum decidunt ramenta, **RASURÆ SUCCINI** nomine in officinas recipiuntur. Succinum Electricum L. Copiosissime ad Mare Balticum, rarius in aliis Europæ regionibus reperitur. *Olim contra affectus Capitis & morbos Catarrhales commendabatur; ejus suffitus Roborandi, Discutiendi, Aerem purgandi gratia adhibetur.*

SUCCISA, *Morsus diaboli, Mors du diable, Teufelsabbiss.* Radix fibrosa, ex parvis capitulis, ad quorum latus germen novi caulis accretum specie morsus quosdam fefellit, fibras emittit capillares, gryseas, ex albo flavescentes, amaras. Scabiosa Succisa L. *Blackwell* Tab. 142. *Superstitione vel ad gravissimos morbos efficax habita, præ ceteris nihil proprii habet.*

SULPHUR, *Solfo, Soufre, Schwefel.* Substantia solida, flava, cum crepitatione fragilis, mediocri calore fundenda, colorem fundendo rufum induens, proprio ingrato odore nares feriens, insipida, ignem concipiens, flamma cærulea & acida ardens, in Oleis & Spiritu Vini, neutiquam in Aqua solubilis.

Pyrites L. Occurrit passim per Europam, sive Nativum, sive cum variis metallis in varias mineras conversum, sive Fontibus foteriis immixtum. Constat ex maxima Acidi Vitrioli & minima Principii inflammabilis portione. Nonnisi flavum in cylindros fufum recipi debet, quod quidem *Citrinum* dicitur, aut *Vivum Soufre à Canons*, aut in *Flores sublimatum.* *Intus ad Viscerum Ulcera, ad promovendam Diaphoresin, curandam Scabiem; extus contra morbos Cutaneos adhibetur.*

SUMACH. *Baccæ exsiccatæ, racemo adherentes, rubræ, multo villo obductæ, Semina includentes nigra, subrotunda; acido, admodum adstringente sapore.* *Rhus Coriaria* L. *Blackwell* Tab. 486. & 541. Europæ Meridionalis & Orientis propria arbor, nostras hyemes sine noxa fert. *Rami teneriores cum foliis exsiccati in usum Tinctorum asservantur. Baccæ exsiccatæ valide Adstringunt, quo quidem scopo tam intus, quam extus adhibentur.*

SYMPHYTUM, *Consolida maggiore, Consolida major, grand Consoude, Schwarzwurzel, Wallwurzel.* Radices fibrosæ, aliquot pollices crassæ, foris nigrae, intus albæ, insipidæ, inodora. *Folia ovato-lanceolata, hirsuta, aspera, rugosa, odoris & saporis expertia.* *Symphytum officinale* L. *Blackwell* Tab. 252. Crescit passim per Europam. Ego saltem Mucilaginem, ob quam ab Auctoribus Hæmoptoicis, Nephriticis & Dysentericis commendatur, iteratis quoque experimentis inde non potui obtinere. Radices exsiccatæ mihi semper Extractum aquosum, bruneum & falsum exhibuerunt.

TACAMACHA. Resina, quæ sub varia forma nobis venit, alia in fructis rufo-flavescens, nitidis, gratum odorem spirantibus, levi & nauseosi saporis, calore liquefcentibus, quæque accensa minus gratum spargunt odorem; eadem in massas quoque majores, multis fordibus pollutas coacta prostat, & hæc quidem *en Masses, in Sorten* dici solet, alia priori quidem similis, sed pallidior, viridescens, Cucurbitis dimidia-

tis inclusa, cui *en Coques* nomen tributum; occurrit etiam *Tacamabaca viridis* parvis frustis efformata, tota viridis, inodora, sapore multum nauseosa, igni admota fluens, accensa minus gratum fumum emittens. Nondum de arbore has Resinas fundente constat. Priorem a Populo balsamifera L. Sibiriae & Americae Meridionalis arbore, nostram hyemem patienter ferente, alteram a *Sagara octandra* L. Americae Meridionalis obtineri ferunt. *Extus debili Ventriculo sub forma Emplastri applicatur, Suffitus ejus ad Roborandum & Discutiendum adhibetur.*

TAFFIA, *Rum*. Spiritus inflammabilis, flavicans, praeter saporem & odorem Spiritibus per fermentationem paratis communes & quidem multum eminentes, nullis propriis instructus. Ex Insula Francica & Madagascar adfertur, ubi ex succo *Sacchari officinarum*, justam fermentationem vinosam passo, paratur. Ex ejus Unciis viginti sex Spiritus rectificati Uncias septendecim, & ex his Alcoholis octo obtinui. Qui post rectificationem remanet Liquor turbidus, non male olens, dulciusculus est. Spiritus, qui in Americae officinis Saccharinis ex Syrupo Saccharino paratur, empyreuma habet & acrimoniam, eum ibi proprie *Taffia* dicunt, probe a priori, quem *Rum* appellant, distinguendum. *Praeter vires Spiritui Vini proprias Medicis ob virtutem Antarthriticam commendatur.*

TALCUM. Squamis efformatur, attractu pinguis, nitidis, cohaerendo invicem in massas majores, minoresve excrescentibus, fragilibus, subpellucidis, albicantibus, virescentibus, insipidis, inodoris. Mica Talcosa L. in Suecia & Regno Neapolitano nascitur. *Olim ad usus Cosméticos commendabatur, Oleum inde parandum ad somnia Alchymicorum ablegandum.*

TALPA, *Falpa, Taupe, Maulwurf*. Animal quadrupes, gryseum, terram fodiens. Talpa Europaea L. nimis frequens in arvis, combusta intus contra *Arthritidem* dabatur, extus *Fistulis & Strumis* applicabatur.

TAMARINDI. Pulpa nigra, levi odo-

re, sapore acido instructa, cui varia filamenta & femina majuscula, ex rotundo angulata, spadicea immixta sunt: exsucca & carne Prunorum adulterata rejicitur. *Tamarindus Indica* L. *Blackwell* Tab. 201. Arbor Indiae, Aegypti & Arabiae, in America hodie frequenter culta, apud nos in caldario sustentanda. *Filamentis & Seminibus cribri ope, per quod transprimitur, purgata egregium Ecoproticum est in Febris acutis, Biliosis, putridis.*

TAMARISCUS, *Tamarisco, Tamaris*. Cortices tenues, angusti, extus rufi, intus albi, sapore amaricantes & adstringentes. *Tamarix Germanica* L. *Blackwell* Tab. 331. f. 2. Frutex Europae temperatae. *Ad Decocta Aperientia recipitur.*

TANACETUM, *Tanaceto, Tanais, Rheinfarn*. Folia longa, viridia, punctata, pinnata, pinnis incisissimis, serratis; Flores tubulosi, flavi, calice hemisphaerico imbricato sustentati; Semina cylindroidea, parva, angulata, utrinque truncata: omnes Tanaceti partes odorem proprium, fortem, minus gratum habent, saporem aromaticum, amaricantem. *Tanacetum vulgare* L. *Blackwell* Tab. 464. Passim per Europam occurrit. Oleum odoratum, flavum, acre & amarum fundit. *Contra Vermes, ad morbos Uteri & Arthritidem commendatur.*

TARAXACUM, *Dens Leonis, Pisse-en-Lit, Pfaffenröhrlein, Seichblumen*. Radices sub cortice nigricante medullam albam & dulcem includunt; Folia sunt runcinato-pinnatifida, pinnis triangularibus dentatis, leviter amara; Cauliculi non nisi recentes recipiendi, glabri sunt, cavi, teneri, lacte amaricante turgidi. *Leontodon Taraxacum* L. *Blackwell* Tab. 1. Vulgatissima per Europam planta. *Multum ad reserandas Obstructiones Hepatis laudatur. Folia tenella primo vere tanquam olus eduntur.*

TARTARUS, *Tartaro, Tartre, Weinstein*, Sal essentialis ex succo Uvarum & Vino secedens, odore levi, sapore acido imbutus, ex Vino albo gryseus, ex rubro ruber evadit, multam aquam, eamque ferventem, ad sui solutionem

exigit, præter Acidum oleofas quoque partes vehit & calcareas. Monspeli aut Venetiis depuratus vulgo sub nomine **CRYSTALLORUM TARTARI** venit. *Sordibus putridis Primarum Viarum, aut morbis Biliofis laborantibus, nec non Hydro-picis exhibetur; datur quoque Cathartico scopo.*

TAURUS, *Toro, Taureau, Stier.* Bos Taurus L. Quadrupes notissimum, cicur per omnem Europam occurrit, asservatur *Fel* ejus sive *Bilis* inspissata, virefcens, amarissima, extus ad *Abstergendum*, intus autem sub inertia *Bilis* ad aliquot *Grana* pro dosi exhibetur.

TAXUS, *Tasso, Blaireau, Dachs.* Animal quadrupes, supra cinereum, infra nigrum, linea longitudinali nigra, trans aures & oculos ducta notatum. Ursus Meles L. Per omnem Europam indigena. *Axungia ejus reliquorum quadrupedum Axungie colore, consistentia, viribus similis est.*

TEREBINTHINA. Balsamum tenax, ceteris Resinis liquidis spissius, varii, pro arboris unde obtinetur diversitate, odoris saporis amaricantis & resinosi, pellucens, magis minusve dilute flavum, uberem Olei admodum odorati, olidi & acris copiam fundit, cum Aqua cocta solidescit. *Argentoratensis* reliquis, si *Chiam* exceperis, spissior, flava, abiegnum odorem spirans, colligitur ex vesiculis epidermidis *Pinus Piceæ* L. Europæ temperatæ arboris. *Chia* vel *Cypria* proxime ad consistentiam siccam accedit, alba cum vestigio flavedinis, suaveolens, nec amara, nec acris, destillat ex vulnerata *Pistacia Terebintho* L. *Blackwell* Tab. 478. Europæ Australis, Asiæ & Africæ indigena, apud nos in frigidario contra hyemen defendenda. *Communis* sequente spissior, turbida, rufifere coloris, odoris minus grati, tædæ haud absimilis; obtinetur ex fauciata *Pinu Sylvestri* L. Non raro ipsi substituitur spuma, quæ Resinæ inter depurandum supernatat, in lebete cocta & Oleo Templino permixta, *Veneta* reliquis omnibus liquidior, pallide lutea, levius & minus grate odorata, amaricans, profluit ex fauciata *Pinu Larice* L. *Blackwell* Tab. 477. in altioribus

Tom. I.

Europæ temperatæ montibus crescente. *Reliquarum Resinarum vires exserit, exoticis mitior. Ad Abstergendum & Consolidandum tam intus quam extus exhibetur; Diuretico quoque scopo datur.* Oleum Aquæ ope inde destillatum, cum totum pelluceat, *Spiritus* nomine venire solet, cum *Sanguinem* multum exstuet & validissime in *Renes* agat, nunquam intus dandum est; extus potenter *Resolvit*, partes *Membranceas* *Roborat*, *Vulneratos Nervos & Tendines* *Consolidat*, *Putredinem* *arcet*, *Hæmorrhagias* *sistit*.

TERRÆ SIGILLATÆ. Argillæ varii coloris, in massas variæ figuræ ut plurimum rotundas vel cylindræ effictæ, variisque sigillis notatæ. Denominantur vel a patria, vel a colore, vel a sigillo. *Inertes omnino terræ pene in universum eviluerunt.*

TESTUDO, *Testuggine, Tortue, Schildkræte.* Amphibium quadrupes, carne molli, capite & pedibus verrucis obsessis, testa tegitur dura, variis maculis distincta. *Testudo orbicularis* L. in Gallia Meridionali & Italia occurrit. *Capite & Pedibus rejectis ex Aqua coquitur. Phthificis maxime, nec non Humoribus acris Demulcendis a nonnullis magnopere commendata.*

TERTIANARIA, *Toque, Fieberkraut.* Folia petiolata, cordato-lanceolata, obtusiuscula, dentata, leviter rugosa, odoris minus grati, saporis amari. *Scutellaria galericulata* L. Crescit per omnem Europam. *A quibusdam contra Febres Intermitteutes commendabatur.*

THALICTRUM FLAVUM, *gelbe Wiesenraute.* Radices extus fuscæ, rugis transversis distinctæ, intus luteæ, sapore leviter amaricantes. *Thalictrum flavum* L. Passim per Europam obvium. *Contra Iterum ei tribuuntur vires.*

THEA BOHEA. Folia paulum contorta, siccissima, ut plurimum diffracta, ad colorem nigrum vergunt, gratissimum odorem Rosis vicinum spargunt, amariuscule sapiunt. *Thea Bohea* L. *Blackwell* Tab. 352. Chinæ, Siam, Japoniæ indigena arbuscula, nobis per hyemem in caldario servanda. Plures ejus,

quæ prostant, varietates vel variæ folia colligendi rationi, vel mangonio originem debent. *Minori dosi quam sequens recipitur, validius quoque Adstringit.*

THEA VIRIDIS. Folia viridia, contorta, pro diversa varietate, variæ magnitudinis; quin suavitas etiam odoris ad Violas accedentis in diversis evidenter diversa est, sapor aliquid acerbi habet. *Thea viridis L. Chinæ arbuscula, nobis ad hyemem in frigidario tuenda. Innumeræ ejus varietates tam a colligendi modo, quam a mangonio pendent. Circa medium superioris seculi Thea in Europa usurpari cœpit. Ratio, qua ab Europæis assumitur, evincere videtur, Infusi ejus effectus Aquæ calidæ potius quam foliis esse adscribendos.*

THLASPI, *Senape salvatica, Baurensenf.* Siliculæ orbiculatæ, late marginatæ, compressæ, apice bifidæ, feminibus ovatis, obtusis, rubicundis, bruneis fœtæ, fortis, nauseosi, alliacei odoris, sapore acres. *Thlaspi arvense L. Blackwell Tab. 68. Vulgare per Europam. Urinam & Menses movere, Abscessus internos aperire quibusdam dicitur. Tota planta efficax contra Curculiones & Cimices habetur.*

THYMIAMATIS CORTEX, *Thuris Cortex, Thus Judæorum.* Frusta ex squamis lineis, sibi irregulariter incumbentibus & substantia pulverulenta, resinosa, quasi conglutinata, ex fusco rufescentia, odore fragrante, sapore leviter aromatico, vix amaricante instructa, accensa gratissimum odorem spirant, usta in carbonem & cinerem redigi patiuntur. Ex India nobis veniunt; a qua arbore defumantur, nescimus. *Tantum ad Suffitus adhibentur.*

THYMUS CRETICUS. *Folia habet lanceolata, basi latiora, ad marginem levissime ciliata; Spicas subrotundas, obtusas, bracteis majoribus, imbricatis, albidis, ciliatis distinctas, Floribus ornatas labiatis, violaceis, odore fragrans, sapore aromaticus. Satureja Capitata L. Europæ calidæ & Orientis, apud nos per hyemem in frigidario asservanda.*

THYMUS VULGARIS, *Timo, Thym, Thymian.* Cauliculi ramosi, lignosi, ob-

folete tetragoni, pubescentes; *Foliolis petiolatis, ovali-oblongis, albidis, Floribus labiatis, exiguis, verticillatis, odore grato, sapore linguam pungente præditi. Thymus vulgaris L. Europæ calidæ & Orientis, nostratis hyemis patientissima planta. Oleum inde odoratum, quin etiam Camphora obtenta est. Vires habet cum reliquis plantis aromaticis communes; condimenti loco in culinas recipitur.*

TIGLIA GRANA, *Pineæ purgantes, Pignons d'Inde. Cataputia majore minora, obtuse triangularia, una facie plana, sub cortice nigro, flavo-rufescente nucleum includunt albidum, pinguem, tenerrima cuticula tectum, ejusdem ac Cataputia acrimoniæ. Croton Tiglium L. Indiæ propria arbor, nobis nonnisi in tepidario servanda. Oleum fundere dicitur unguinosum, acerrimum, aliquot solummodo guttis Alvum ducere valens. Vires cum Cataputia eadem.*

TILIA, *Tiglio, Tilleul, Linden.* Flores albi, calice quinquesido & quinque petalis ornati, pedunculis sustentantur ex peculiari foliorum genere oblongo, albido-virente, obtuso, integerrimo protrusis; recentes fragrantissimi, exsiccati, inodori, insipidi sunt. *Tilia Europæa L. Blackwell Tab. 469. Vulgaris per Europam arbor. Florum recentium laus in vi Nervina ponitur; exsiccatorum vis omnino nulla est.*

TOLUTANUM BALSAMUM, *Balsamo di Cartagena, Beaume de Chartagene, Balsamum Balsamo de Mecca vix spissius, aurei coloris, odoris grati, saporis Balsamo de Mecca paulo acrioris. Prostat quoque siccum testis cucurbitaceis inclusum. Tolvisera Balsamum L. Crescit ad urbem Tolu in præfectura Carthagenensi. Oleum odoratum & Flores fundere dicitur. Vires Balsami de Mecca inde expectantur.*

TOPASIVS. Gemma flavo colore splendens, Adamante. Rubino & Saphiro mollior, in igne colorem amittit & in lamellas secedit, varie figurata reperitur. Borax Gemma flava Topasius L. in Oriente, Brasilia & Saxonia nascitur. Fluor ei vulgo spathosus flavus

Valler. Muria lucida flava L. passim in Europa obvia, substitui solet. Sunt, qui vires ei Cephalicas & Cordiales tribuant.

TORMENTILLA. Radices nodosæ, quasi tuberosæ, circum undique plurimas fibrillas emittentes, extus ferrugineæ, intus pallide rubræ, inodoræ, adstringentes. Tormentilla erecta L. Crescit ubique per Europam. *Ad Decocta Adstringentia tam interne, quam externe adhibetur.*

TRAGACANTHA. Gummi album, fragile, sub dentibus lentescens, inodorum, insipidum, formam mox vermium, mox filorum in se revolutorum, mox granorum refert. Quæ in Sorten dicuntur Frustra colorata, sordibus inquinata, quæque ipse, sub nomine Gummi de Bassora, aliquando accepi, rejicienda sunt. Sponte effluit ex Astragalo Tragacantha L. Orientis & Europæ Australis frutice, apud nos per hyemem in frigidario asservando. Difficulter ignem capit, ardens fœtentem fumum evomit, pars ejus exigua magnam aquæ copiam in mucilaginem vertit. *Tanquam Demulcens & Relaxans præscribitur, Mucilago inde parata est commune constituens plurimorum Trochiscorum.*

TRAGOPOGON, Barba di Becco, Barbe de Bouc, Bocksbart. Radix fusiformis, sub cuticula flava albam & dulcem carnem includit Tragopogon pratense L. Vulgaris per Europam planta. *Scopo Aperiendi a quibusdam exhibitur.*

TRIBULI AQUATICI, Tribolo acquatico, Cataignes d'eau, Wassernusse. Noces Castaneis minores, quatuor alis acutis instructæ, sub cortice nigro, duro includunt Nucleum cordiformem, album & dulcem. Trapa natans L. Passim per Europam & Asiam occurrit. *Viribus cum Castaneis equipollere videntur.*

TRICHOMANES, vide **ADIANTHUM RUBRUM**.

TRIFOLIUM, Trifoglio, Trefle. Klee. Flores papilionacci, albi, calyce quinquefido sustentati, levissime odorati, insipidi. Trifolium repens L. Vulgare per Europam. *A nonnullis contra Fluorem album ejus Infusum commendatur.*

TRIFOLIUM FIBRINUM, Trifolium

Aquaticum, Trifoglio acquatico, Menyanthe, Biberklee. Folia petiolata, ternata, foliolis majusculis, ovatis, firmulis, inodoris, intense amaris. Menyanthes trifoliata L. Blackwell Tab. 474. Passim per Europam offenditur. Oleum odoratum largiri dicitur. Contra Scorbutum, Obstructiones Abdominales & Arthritidem efficax habetur.

TRIPOLITANA TERRA, Tripoli, Tripoli, Trippel. Terra arida, sicca, albida & flavicans, in tenerrimum pulverem conteri patiens, aspera & scabra, siticulosa, contactu inquinans, cum Acidis non effervescentes, igne indurescens, inodora, insipida. Argilla Tripolitana L. Passim in Europa reperitur. *A quibusdam Intertrigini inspergitur, poliendis potissimum Metallis inservit.*

TUNICA, Viola, OEillet, Grasblume, Nelke. Florum petala, calyce exenta, unguibusque recisis, obovata, rotundata, ferrata, saturate rubra, gratissimum, Caryophyllis aromaticis proximum odorem spirantia, gustu dulcia. Dianthus Caryophyllus L. Blackwell Tab. 85. In Europa Meridionali & Archipelago spontaneus, apud nos in hortis copiose colitur. *Recentes Flores Analepticas vires habent, exsiccati leniter Adstringere creduntur.*

TURPETHUM. Cortices longitudine fere digitum, crassitie lineam æquantem, striis longitudinalibus, nigris, resinosis notati, extus cinereo-fusci, intus magis albicantes, inodori, insipidi. Interdum prostant Radices ex capite ad quatuor pollices crasso in corpus cylindroideum excrecentes, rugis longitudinalibus notatæ, hinc inde rimis fissæ. Convolvulus Turpethum L. Crescit in India. *Olim scopo Cathartico in substantia ad Drachmam unam, in Infuso ad Unciam dimidiam dabatur.*

TUSSILAGO, videatur **FARFARA**.

TUTIA. Substantia laminarum instar formata, friabilis, grysea, fornacum, in quibus Zinci minera funditur, lateribus adhærens, insipida & inodora. Est ipsum Zincum, sed exustum variisque sordibus pollutum. *Tanquam Exsiccans ad Intertriginem, tanquam Discutiens ad morbos Oculorum adhibetur.*

VALERIANA, *Baldrian*. Radix ex capite brevi, crassiusculo cavitatem unde caulis prodierat servante innumeras fibras filiformes circum undique emittens, extus fusca, intus alba, odorem fortem, Nardi similem spirat, saporem exhibet falsum. Valeriana officinalis L. *Blackwell* Tab. 271. Passim per Europam crescit. *Laudatur a virtute nimiam Nervorum, Irritabilitatem corrigendi, Vermes fugandi, Oculos roborandi. Datur sub forma Pulveris ad Drachmam unam pro dosi.*

VANILLA. Siliqua dimidio pede longior, dimidium fere pollicem lata, utroque extremo producto & obtuso, compressa, striis longiusculis notata, uno margine acuta, altero crassiuscula tenax, quodam quasi oleari splendore nitens, fusca, pulpam granulofam, nigram includens, odoris suavitate Flores Perfectorum superans, sapore aromatica. Epidendron Vanilla L. Americae calidae proprius frutex. Exsiccatione demum odorata evadit, & exsiccata, ut aetatem ferat, Oleo inungitur. *Ad Capitis aequae Primarum viarum robur restituendum adhibetur. Praecipue Chocolatae conficienda & condiendis Lacticiniis inservit.*

VERBASCUM, *Verbasco, Bouillon blanc, Volkraut*. Folia longa, & lata, decurrentia, crenata, utrinque tomento obsessa, leniter adstringentia; Flores rotati, quinquefidi, levi tomento obsessi, flavi, odore perfusi leni & suavi, sapore dulces. Verbascum Thapsus L. *Blackwell* Tab. 502. Europae planta, sponte ubique locorum crescit. Flores Oleum odoratum fundunt, succus eorum Saccharum largitur. *Folia Emolliendi scopo subinde usurpantur. Florum Infusum dilutum salubriter contra Pectoris affectus praescribitur, iidem ad Chysmata Emollientia & Anodyna recipiuntur.*

VERBENA, *Verbena, Verveine, Eisenkraut*. Folia longiuscula, laciniata, laciniis, denuo laciniatis, amara. Verbena officinalis L. *Blackwell* Tab. 41. Crescit in omni Europa. *Quae de Verbena Veterum traduntur virtutes, aliarum plantarum laudes sunt, ad poeticas fabulas, unde natae, relegandae.*

VERONICA, *Veronica, Veronique, Ehrenpreis*. Folia ovata, obtusa, subtiliter hirsuta, crenata, suffuso aromate suave amara, leniter adstringentia. Veronica officinalis L. *Blackwell* Tab. 143. Destillatione Spiritum Urinosum fundere dicitur. *Ad Infusa Pectoralia creberrime recipitur.*

VICTORIALIS LONGA, *Allermannsbarnisch*. Bulbus quatuor fere pollicum longitudinem aequans, oblongus, superne paulum contractus, insipidus & inodorus, sub involucro gryseo, reticulari, fibroso, sicco, carnem condit siccatus effoetam. Allium Victoriali L. In Europa temperata provenit. *Ad ridiculos usus olim adhibebatur.*

VICTORIALIS ROTUNDA, *runde Siegwurzel, Ackerschwerverdel*. Bulbilli duo eodem ac praecedens involucro tecti, uterque albus, alter alteri insidens, alter ventricosus, inferior minus orbiculatus est, utrinque compressus, radicis exsiccatae sapor dulcis. Gladiolus communis L. Europae calidae, nostras hyemes optime fert. *Ad eosdem cum antecedente usus a pinguis ingenii hominibus adhibebatur.*

VINCA PER VINCA, *Perwinca, Perwenche, Ingrün, Singrün*. Folia ex ovatis oblonga, acuta duriuscula, inodora amariuscula. Vinca minor L. *Blackwell* Tab. 59. Passim per Europam crescit. *Immiscetur Infusis Pectoralibus.*

VINCETOXICUM, videtur **HIRUNDINARIA**.

VINUM. Liquor fermentatione ex fructuum horaeorum, maxime Uvarum, succo obtentus, destillatione Spiritum inflammabilem fundens, coloris sive albi, sive rubri, in utroque diversorum etiam graduum, quanquam omne Vinum, quod rubrum non est, vulgo album dicitur; proprii ac jucundi pro innumeris varietatibus plurimum variantis odoris aequae ac saporis. Sunt quae Saccharina dulcedine palatum afficiunt Vina, & haec quidem ut plurimum spissiusculam consistentiam habent. Vina, quae ex alio, quam Uvarum succo parantur, quae acida sunt, acerba, turbida, mangonio adulterata, a scopo medicato ar-

cenda sunt : patria omnino differunt ; sed hic plurimæ omnino fraudes obtinent & a certioribus, quæ usus subministrat iudiciis, potius quam a fide œnopolarum standum est. Vinis rubris semper aliquid adstringentis inest ; alba, si a Gallicis discesseris, nunquam non aliquantulo Acidi linguam afficiunt. Vina Saccharina Dulcedine plena ex Orientis regionibus ex Europa etiam Orientali, Occidentali & Meridionali nobis missa, vel ex Uvis passis, vel ex musto, varia ratione aliquanta aquæ parte privato, parata, reliquis fortius Caput petunt, non tam ob largius Alcohol, quam ob resinofas, quibus abundant, partes. Vehit Vinum Aquam, Alcohol, Mucilaginem & Tartarum. Coctione semper acescit. *Sitim sedat, motum Spirituum & omnium Humorum intendit, fibras Primarum viarum roborat, Putredinem arcet, Excretiones aquosas promovet, extus Refocillat, Roborat, Discutit.*

VIOLA, *Viola, Violette, Viole.* Folia, quæ *Violaria* dicuntur, sunt cordata, glabra, obtusa, inodora, insipida ; Flores pentapetali, irregulares, in cornu formam curvati, cærulei, suavissimo odore, sapore dulci ; *Semina* parva, rotunda glabra, alba, *Viola dorata* L. *Blackwell* Tab. 55. Crescit passim per Europam. *Folia olim Emollientibus adnumerabantur, Flores ad Demulcendum & ad Alvum leniter ducendam præscribuntur. Semina Diuretica habentur.*

VIPERA. Serpens est, pollicem circiter crassa & sesquipedem longa, cervice parva, capite compresso, in dorso flavescente, squamis instructa rhomboidis, gryseo-nigris in catenæ modum connexis, lateribus albis, ventre toto scutis transversalibus notato, cauda terete, conica, acute terminata, odore proprio, sapore nullo. Coluber *Berus* L. Nobis ex Helvetia & Comitatu Burgundiæ accersitur. Diversis in locis diversæ *Colubri* species adhibentur. Animal, cujus ictus pessimum venenum venis instillat. *Fusculum, ex Vipera recente, demto capite & cauda, cum menstruo aquoso puratum, multum contra morbos Cu-*

taneos commendatur. Vipera exsiccata vix aliquid proprii polliceri videntur. Axungia consistentiam Olei unguinosi & spissiusculi, colorem flavum, odorem levem, saporem nullum habet. Commendatur ad Abstergenda Corneæ Ulcera.

VIRGA AUREA, vid. CONSOLIDIDA SARRACENICA.

VIRIDE ÆRIS, *Ærugo, Verderame, Verd de Gris, Grünspan.* Adfertur nobis in panibus majoribus viridibus, nauseosum & vehementem Æris odorem spirantibus, acri sapore imbutis. Deraditur laminis Cupri, sub fermentatione acetosa corrosis ; optimum Monspeliæ conficitur. Gratianopoli quoque & in Anglia preparari lego. *Intus nunquam dandum, extus a quibusdam Septico scopo Unguentis adjicitur.*

VISCUM, *Vischio, Glu, Vogelleim.* Massa spissæ Unguenti consistentiæ, ex flavo viridescens, tenacissima, minus grati, resinosi odoris, perinde ac saporis, difficulter flammam capit, in Alchole & Oleis solubilis, nequaquam in Aqua. Conficitur ex llicis Aquifolii L. *Blackwell* Tab. 205. vulgaris per Europam arboris, interno cortice, tundendo in pastam redacta, unde dein resoluta putredine filamenta, affusa aqua, separantur. *Olim scopo Rubefaciendi usurpabatur.*

VISCUM, *Gui, Mispel.* Surculi lignei, mox recti, mox incurvi, ramosi, sub cortice fusco & rugoso lignum ex rufo-flavescens, leviter adstringens continentis. *Viscum album* L. *Blackwell* Tab. 184. Parasiticus frutex, qui variis per Europam arboribus innascitur, de *Quercubus* sumtus reliquis præfertur. *Magna ejus laus est in medenda Epilepsia.*

VITIS, *Vite, Vigne, Rebstock.* Folia quinqueloba, lobis inciso-dentatis, infra pallida, leviter odora, saporis aciduli, non ingrati. Fructus immaturi, *Verjus* dicti, acido & adstringente turgent succo, cui *Omphacio* aut *Agrestæ* nomen est. Ad condimenta ciborum recipitur ; scopo *Refrigerandi* usurpatur. *Vitis vinifera* L. *Blackwell* Tab. 152. Colitur per totum orbem temperatum. *Roborandi causa Balneis*

adjiciuntur folia. Succus ex Uvis expres-
fus, Mustum, Mout, Most dictus, turbi-
 dus est, viscidus, dulcis, proprii odor-
 is, coctione spissitudinem & aciditatem
 nanciscitur; ad dimidias coctum Mustum
Raisiné, Sapa, Weinmus, ad trientem
 si evaporarit *Defrutum* appellatur; *inter-*
dum condimenti loco cibus adjicitur. Uva-
 rum pressarum *Vinacea, Marc, Trabern-*
cum & Vinum & adstringentes Uva-
rum pelliculas contineant, ad Roboran-
dum Balneis adjiciuntur. Circa Uvas con-
 ferantur Passulæ.

VITIS IDÆA, videantur MYRTILLI.

VITRIOLUM ALBUM, *Vitriolo bian-*
co, Galitzenstein. In majoribus exiguarum
 crystallorum concretarum massis, Sac-
 charo in panes formato similibus pro-
 stat, sapor nauseosus adstringens est.
 Vitriolum album L. Paratur Goslariæ ex
 glebis ustulatis, aqua lixivatis; Sal, ne
 in majores crystallos concresecat, fusus,
 donec refrigerit, agitur. Præter Zin-
 cum & Plumbum Æs quoque vehit; *qua-*
propter internum ejus usum, quamvis sint,
qui ad viginti quinque grana Vomitorio sco-
po laudent, nullatenus tamen equidem com-
mendare ausim. Aqua dissolutum Ophthalmicæ
medetur.

VITRIOLUM CÆRULEUM vel de
 Cypro. Pulcherrimas crystallos cæruleas
 refert, valde nauseoso sapore linguam
 afficit, imo evidenter rodit. Vitriolum
 Cyprinum L. Passim per Europam, sive
 ex Gleba Cupri pyritosa, sive Æs cum
 Sulphure calcinando paratur. *Vi corrosi-*
va reliqua Vitrioli genera superat, nec nisi
ad usus externos recipitur. Calcinatum PUL-
 VIS SYMPATHETICUS est. *Quondam*
egregie a quibusdam celebratus, hodie meri-
to rejectus.

VITRIOLUM VIRIDE vel vulgare.
 Crystalli virides, proprii, sed non fortis
 odoris, gustu falsæ & adstringentes, in
 aëre aut calore in pulverem ferrugineum
 dilabentes. Existit vel Nativum vel in
 Crystallis concretum, Vitriolum Martis
 L. vel tomenti aut pulveris instar ex ter-
 ra lapidibusve efflorescens, varie colora-
 tum Vitriolum Atramentarium L. rufum
 CHALCITIS nominatur, cinereum SO-

RY, nigrum MELANTERIA, flavum
 MISY; denique ex resoluto etiam Pyri-
 ta Ferri L. arte paratur. Rarissime pu-
 rum tabernas intrat, vix non semper
 Ære plus minus inquinatum. Minus bene
 a patria distingui in *Inst. Mat. med.* p. 447.
 monui. Ad usus internos nunquam, nisi
 prius cum Ferro coctum, eoque ab omni
 labe Cuprea purgatum, quod cum *Vi-*
triolo Martis P. II. definiendo, unum
 idemque est; *extus ad Medicamenta Ad-*
stringentia adhibetur.

VITRUM, *Vetro, Verre, Glas*. Sub-
 stantia pellucida, rigida, inodora, insi-
 pida, vulgo ex terris vitrescentibus &
 Sale Alkali fixo fusionis ope confecta,
 frangendo in frusta scindentia dilabens.
 Quædam Vitra Arsenicum, quædam
 Plumbum recipiunt, utraque humano
 corpori, utcunque demum applicentur,
 periculum afferunt. *Vitrum in frustis deglu-*
titum, ad Primas vias venenorum mechani-
corum tragœdiam utique aget; in tenerrimum
pulverem redactum plebecula Umbilico In-
fantum imponere solet scopo Anthelmintico.

ULMARIA, videatur BARBA CA-
 PRÆ.

UMBILICUS MARINUS, *Fava mari-*
na, Faba marina, Meerbohne, Nabelstein.
 Testa rotunda, inferne plana, obscurius
 colorata, margine rotundato, albo ter-
 minata, superne convexa, nitida, rubro-
 dilute flavicans, fovea notata, cujus mar-
 gines inæqualis crassitiei sunt & in qua
 tuberculum album, semipellucidum obti-
 net, insipida, inodora. Est operculum
 Cochlearum Maris Mediterranei. *Absor-*
bens olim & Adstringens habebatur.

UNICORNU FOSSILE, videatur
 EBUR FOSSILE.

UNICORNU VERUM, *Liocorno, Li-*
corne, Einhorn. Dens variæ magnitudi-
 nis, vel octo pedes non raro exceden-
 tis, ex basi latiuscula longe cylindricus,
 in fine sensim angustatus, ex fibris spi-
 raliter intortis efformatus, sub cortice
 flavicante albissimam substantiam con-
 dit. Monodon Monoceros L. Ceti spe-
 cies Maris Septentrionalis cujus bini sunt
 in maxilla superiore ejusmodi dentes.
Vires Alexipharmicæ & Antispasmodicæ, qui-
bus

bus medio ævo celebrabantur, deinceps experientia iudice his dentibus sunt ademptæ.

ULMUS, Olmo, Orme, Rusten. Cortex intermedium, albidus tenax, odoris expers, saporis levissime amaricantis. Ulmus campestris L. Arbor per Europam vulgaris. Decocto multum efficacie ad Scabiem inveteratam medendam tribuitur.

VOMICÆ NUCES, Kræhenaugen. Nuclei rotundi, utrinque vel compressi, vel levissime convexo-plani, villosi, gryseo-albidi, intus cornei, valde tenaces, inodori, amarissimi. Strychnos Nux Vomica L. Blackwell Tab 395. Indiæ arbor. Vario quadrupedum generi certissimum venenum, hominibus quidem hæc nuces contra Pestem, Dysenteriam, Hydrophobiam &c., ad Scrupulum unum danda, magnopere quondam commendabantur, sed usum ejus internum, cum convulsivus motus excitasse, imo necesse homines, Observatores testentur, commendare nollem.

URSUS, Orso, Ours, Ber. Animal quadrupes fatis notum, victu & vegetabili & animali utens. Ursa Arctos L. frigidior Europam inhabitat. Axungia Porcinæ &c. & colore & consistentia & viribus similis; vulgo ad crinium incrementa laudatur.

URTICA, Ortica, Ortie, Nessel. Folia petiolata, cordata, ferrata, pilis rigidis utrinque obsessa. Semina ovata, sub cortice fragili, nitente, spadiceo medullam albam, dulcem includunt. Urtica dioica L. Copiosa per Europam. Folia olim Rubefaciendi gratia alhibebantur; Seminibus virtus Diuretica tribuitur.

UVA URSI, Boufferole, Steinbeere. Folia petiolata, ovata, oblonga, obtusa, integerrima, duriuscula, supra viridia, rugosa, subtus pallida, inodora, cum quadam amaritie adstringentia. Arbutus Uva Ursi L. Fruticulus passim per Europam obvius. Folia dantur sub forma Pulveris ad Drachmam unam, cum aquæ Unciis duodecim decocta ad Drachmas duas contra affectus Nephriticos.

VULPES, Volpi, Renard, Fuchs. Animal quadrupes, carnivorum proprio fœtore notum. Canis Vulpes L. Orbis antiqui vulgare animal. Pulmones cum tra-

chea exsiccati, nauseosi saporis & odoris, olim ad affectus Pectoris laudabantur.

VULVARIA, Arroche puante, kleine Mistmelten. Folia parva, rhombico-ovata, acuta, integra vel sinuata, farina quasi conspersa, fœtidissimum Urinæ putrescentis odorem, saporem falsum habent. Chenopodium Vulvaria L. Passim per Europam crescit. Hystericarum Umbilico imponitur.

UVULARIA, Laurus Alexandrina, Zapfleinkraut. Folia ovato-oblonga, acuta, petiolata, nitidiuscula, in medio foliolum lanceolatum, acutum, fructificationem tegens emittentia, sapore amaricantia. Interdum ad Gargarismata adhibetur.

VVINTERANUS CORTEX. Frusta aliquot Pollices longa, Canella alba crassiora, convexo-concava, non convoluta, colore cinamomeo, odore grate aromatico, sapore linguam pungente. Arborem, unde desumitur, in freto Magellanico crescentem primus Fothergill in Medical Observat. by a Society of Physicians T. V. descripsit. Drymis Vvinteri Forster Nov. Act. Upsal. T. III. p. 182. Ob virtutem potissimum Antiscorbuticam laudatur; Canella ei alba ut plurimum substituitur.

XANTHIUM, Lappola minore, petit Glouteron, Bettlerlaus. Folia hirsuta, ovata, inferne angustata, leviter lobata, lobis irregulariter dentatis, amara. Xanthium Strumarium L. Blackwell Tab. 444. Occurrit per omnem Europam. Succum ad Sanguinem Depurandum & contra Scrophulas commendant.

ZEDOARIA, Zettovario, Zittover. Radices tuberosæ, oblongæ, aliquot pollices longæ, minimum digitum crassæ, levibus rugis & tuberculis obsessæ, extus gryseæ, intus rusæ, odore perfusæ proprio, ad Camphoram accedente, sapore acri, amaricante. Kampferia rotunda L. Blackwell Tab. 399. Crescit in Madagascar & India. Oleum odoratum spissum largiri dicitur. A vi Roborante & Incidente laudatur.

ZIBETHUM. Substantia consistentiæ Unguenti, albida, odoris proprii, fortissimi; quo propior bruneo color ejus, est,

est, eo vilius habetur. Est Unguen, quod ex propriis receptaculis inter orificia Sexus & Ani Viverræ Zibethæ L. Arabie & Indiæ Orientalis indigenæ, & Civette *Buffon*, Guineam inhabitantis, cochlearis ope hauritur. Unguen, quod hodie carissime constat, medicamentis externis odoris gratia immiscebatur, quem exigua ejus portio magno substantiæ, cui adjicitur, volumini impertit. Nostra ætate hic odor minus, quam olim, naribus acceptus est. Adhibetur adhuc ad capturam piscium.

ZINCUM, *Zinco, Spilauter*. Semimetallum nec malleabile, nec in pulperem pistillo regidi patiens, diffractum strias vel laminas ostendens, ad cæruleum colorem paululum vergentes; fuscum flamma cærulea ardet in *Flores* albos abiturum. Flavo colore Cuprum tingit, in omnibus Acidis solubile. Obtinetur ex vario glebarum genere, terræ potius, quam mineræ formam habente. Larga

ejus copia ex India Orientali mittitur, quædam Goslarie paratur. Non nisi sub forma Mineræ aut Florum ad usus medicatos recipitur.

ZINZIBER, *Zenzero, Zingiber, Gingembre, Ingber*. Radices tuberosæ, lobatæ, lobis varie figuratis, omnibus rotunde terminatis, intus ex rufo flavæ, extus flavescentes, odoris proprii, saporis insigniter acris & aromatici. Rubræ, quarumque superficiem terra tegit, a vermibus perforatæ rejiciendæ sunt. Amomum Zingiber L. *Blackwell* Tab. 402. Indiæ Orientalis, unde in Americam fuit delatum, ubi hodie copiose colitur. Apud nos in vaporario asservandum. Oleum odoratum fundere observatum est. Recentibus quoque radices in India conditæ asservantur. *Piperis vires, sed mitiores edit: extus ad Apoplegmatismos recipitur; cum successu Uvula a muco tumentis applicatur; conditum egregie Ventriculo, a causa frigida laboranti, conducit.*

PHARMACOPŒA
GENERALIS

EDITA


A

D. JACOBO REINBOLDO

SPHÆLI MANN.

EDITIO PRIMA VENETĀ,

TOMUS SECUNDUS.



V E N E T I I S,

Sumptibus JOANNIS ANTONII PEZZANA.

M D C C L X X V.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

WYOMING

GENERAL

STATUTE

BOOK

OF THE

LEGISLATURE

OF THE

STATE



1890

Printed by the State Printer



ACETUM.

ACetorum genera, quæ in Officinis asservantur, parantur Vegetabilia exsiccata & comminuta octuplo circiter boni Aceti infundendo, & usus tempore tantum inde decantando, quantum in usum recipere lubet. Talium Acetorum vires ex viribus Aceti & Vegetabilium Aceto infusorum compositæ sunt. Ut plurimum extus, sive scopo Analeptico, Naribus admoventur, sive aliis usibus tanquam Fomentationes inserviunt; intus quoque quædam cochleatim exhibentur. Quidam etiam Acetum Vegetabilibus infusum destillare, & destillatum in usum trahere solent. Frequens, qui in Officinis obtinet, Acetorum numerus, ex quo morbi Maligni Exanthematici strages edere cœperunt, obtinuisse videtur. Simplicium Acetorum delictus a Medicis & ab usu recepto pendet.

ACETUM ANTISEPTICUM *Paris.* vulgo *Aceto dei quattro Ladroni, Vinaigre des quatre Voleurs.*

℞. Herbarum Absynthii uncias tres,
Rorismarini,
Salviæ,
Menthæ,
Herbæ Rutæ ana unciam unam semis,
Florum Lavendulæ uncias duas,
Spicarum Allii Drachmas duas,
Radicum Calami Aromatici,
Cianamomi,
Caryophyllorum,

Nucis Moschatæ ana drachmas duas:
Incisa probe misceantur & infundantur calore justo, in vase clauso per duodecim dies,

Aceti optimi centum octo & viginti unciis.

Cum forti expressione colatis & filtratis addatur

Camphoræ Spiritu vini solutæ Semuncia.

Asservetur vase probe clauso.

In Peste Massiliensi hoc medicamentum scopo Prophylactico multum celebrabatur, partes corporis aëri expositas eo lavabant, ejus suffitu vestes imbuebant, & conclavia infumabant, intus quoque cochleatim illud assument.

ACETUM AROMATICUM *Klein.*

℞. Radicum Zedoariæ,
Galangæ ana semunciam,
Herbarum Rorismarini,
Rutæ,
Mari veri,
Florū Lavendulæ ana drachmas duas,
Corticum Citri recentium,
Caryophyllorum Aromaticorum,
Cubearum,
Cardamomi minoris ana semunciam:
Comminuta misceantur & immittantur Aceti optimi unciis quadraginta
Liliorum convallium,
Tunicæ ana unciis duabus.

Asserventur in vase probe clauso.

Tanquam Odoramentum adhibetur, & Resoecillandi ergo Naribus admoventur, Epithematibus Cordis & Pulsuum inspergitur.

ACETUM BEZOARDICUM

Wirttembergensium.

℞. Radicum Angelicæ,
 Enulæ,
 Imperatoriæ,
 Hirundinariæ,
 Zedoariæ ana drachmas sex,
 Herbarum Scordii,
 Rutæ,
 Salviæ ana unciam unam,
 Baccarum Juniperi unciam semis,
 Corticum Citri drachmas sex:
 Minutim incisus affundantur
 Aceti optimi unciæ sex & triginta,
 Post digestionem per aliquot dies ex-
 primantur & filtratum Acetum repona-
 tur ad usum, in vitro probe clauso.

In morbis Contagiosis, præcipue Peste, tam internum quam externum hujus medicamenti usum ad Odoratum & Collutionem oris commendant; ab uncia dimidia ad integram propinatur.

ACETUM CAMPHORATUM

MAJUS Richard.

℞. Camphoræ drachmam unam.
 Teratur in mortario lapideo cum
 Spiritus vini rectificati guttis viginti,
 Sacchari albi unciis duabus,
 Probe tritis affundantur
 Aceti vini optimi unciæ decem;
 Mixta asserventur.

*Medicamenti Antiphlogistici eximii un-
 cia semis omni triborio præscribitur.*

ACETUM CHALYBEATUM *Fuller.*

℞. Aceti optimi uncias duodecim,
 Limaturæ Chalybis unciam unam:
 Fiat infusio triduana frigida, dein co-
 letur Liquor.

Adbibetur parando Oxymelli Chalybeato.

ACETUM COLCHICUM *Stærck.*

℞. Radicis Colchici recentis, Autumno
 collectæ & in taleolas tenues sectæ un-
 cias duas,

Aceti optimi uncias duodecim:

Macerentur in lagena vitrea per qua-
 tuordecim dies, sæpius liquorem agitan-
 do; dein coletur levi expressione Acetum
 & fervetur ad conficiendum Oxymel.

ACETUM CONCENTRATUM *Stabl.*

Hyeme exponatur Acetum frigori gla-
 ciali in vase terreo ampliori, relinqua-
 tur omnis portio in glaciem versa,
 quod remansit & ablata aqua admodum
 acre evasit, asservetur.

*Ad Chemicos potius quam ad Clinicos
 usus adhibetur.*

ACETUM CONCENTRATUM

Westendorf.

℞. Crystallorum Sodæ, quantum volue-
 ris, cum Aceti destillati quantitate
 sufficiente saturatur; solutio saturata
 leni calore inspissetur, & commit-
 tatur Retortæ, vitreæ, cui ea sit am-
 plitudo, ut dimidiam modo ejus
 partem materia occupet; tunc sub
 perpetua retortæ commotione pede-
 tentim instilletur Olei vitrioli ejus
 ponderis dimidium, applicetur ce-
 leri manu Excipulum ventricosum,
 rostro Retortæ vesica madida jun-
 gendum; leni multum igne institua-
 tur destillatio tam diu continuanda,
 quamdiu aliquid vaporis prodire ocu-
 li discernunt. Residuum iteratis so-
 lutionibus & filtrationibus depuratum.
 Salem mirabilem Glauberi esse fa-
 cile patet.

*Acetum concentratum hac ratione paratum
 priore omnino fortitius, reliquis autem, quo-
 rum apud Chemicos mentio fit, multo &
 gratius & sincerius.*

*Evicit Clariss. Westendorf, hoc Acetum
 vires omnes Vulgaris multo efficacius edere,
 ob majorem qua gaudet penetrabilitatem,
 quam ejus odor evidentissime evincit, imo
 in morbis Putridis etiam illi multum præ-
 ferendum esse, quia Humoribus dissolutioni
 quoque medetur. Datur ad drachmam unam
 multa aqua dilutum. Eximios effectus Ana-
 lepticos edit, si Naribus admovetur.*

ACETUM DESTILLATUM,

SPIRITUS ACETI Parisiensium.

Acetum immittatur five Retortæ vitreæ five Vesicæ æneæ, nullum enim contagium ab hoc Aceto surgere, evici in *Instit. Chem. Exper.* 55. ubi largior quantitas Aceti destillavit, crebrius liquor prodiens Naribus est examinandus, & quam primum odor empyreumaticus observatur ab ulteriori destillatione est desistendum. Primus, qui obtinetur, liquor, vulgo *Phlegma* dicitur & jubetur rejici; sed ego nunquam evidentiorum inter illum & reliquum differentiam potui observare. Residuum ab hac destillatione Tartarum lagiri a Chemici est annotatum.

Destillatione Acetum & Olei & Acidæ portione privatur, hinc ejus vires immi- nuuntur omnino; adhibetur ad omnes mor- bos, ad quos Acetum commune laudatur.

ACETUM HYSTERICUM *Ludovici.*

℞. Spiritus florum Liliorum convallium unciam unam,
Olei destillati florum Lavendulæ Dra- chmas duas,
Aceti Rutæ unciam unam,
Essentiæ Castorei Drachmam unam.
Misceantur.

Inservit pro Odoramento vel Fotu Car- porum & Temporum.

ACETUM ODORATUM

Wirttembergensium.

℞. Radicum Cyperi rotundi,
Galangæ minoris,
Zedoariæ aaaa unciam semis,
Herbarum Rorismarini,
Salviæ,
Florum Lavendulæ,
Florum Liliorum Convallium recen-
tium,
Rosarum rubrarum,
Ligni Rhodii,
Cinnamomi,

Caryophyllorum Aromaticorum,
Corticum Citri recentium ana dra- chmas duas:

Incisis superfundantur

Aceti optimi unciæ quatuor & vi-
ginti.

Post triduanam digestionem filtretur.

Usus ejus est externus pro Odoramentis & Epithematibus ad Pulsus, reficit atque Spirituosus longe præferendum est.

ACETUM SATURNINUM *Basil. Valent.**DECOCTUM SATURNINUM Kleinii.*

℞. Lithargyrii subtiliter triti uncias duo-
decim,

Aceti optimi uncias triginta & sex.

Coquantur, lento igne, ad dimidiæ partis consumptionem, sub continua cum spatula lignea agitatione; liquor fil-
tretur.

*Ad Inflammationes, Ulcera maligna ex-
siccanda & Affluxum Humororum prohiben-
dum applicari solet, caute tamen adhibendum
est, ne usus ejus externus clanculum interne
Phthisin inducat.*

ACETUM SCILLITICUM *Pythagore.*

℞. Radicis Scillæ præparatæ & minutim
incisæ uncias octo,

Aceti optimi uncias nonaginta sex.

Digerantur leni calore per octiduum,
forti expressione coletur Acetum & dein
filtretur.

*Hoc Medicamentum adhibetur in Pectoris
Infarctu viscido expediendo, Tussi difficili,
Asthmate humido; gravitatem Auditus a Pi-
tuita ortam Gargarisatione discutit, a dra-
chma una ad unciam dimidiam exhibetur.
Rarius per se præscribitur, maxime adhi-
betur ad parandum Oxymel.*

ÆRIS FLORES *Basil. Valent.*

℞. Viridis Æris, quantum volueris.

Pulverisatum dissolvatur in sextuplo
Aceti destillati, dissolutum filtretur, ad
cuticulam evaporetur, & reponatur ut
in Crystallos concreascit.

Rarus est hujus præparati in Medicina usus, a Pictoribus & Mechanicis frequentius expetitur, usus ejus internus ab Helveticis juniore aliisque contra Luem præsertim veneream impense commendatus merito penitus rejicitur.

ÆS USTUM Galeni.

Æris laminæ stratificentur sive cum Sale marino, sive cum Sulphure, sive, præcipiente Oribasio, cum utroque; detineantur in igne satis valido per duodecim circiter horas, sive usque dum laminæ totæ friabiles fiant, quæ deinde in pulverem redigendæ sunt; qui rufescit, si Sal communis fuerit adhibitus, nigrescit autem, si Sulphur receptum fuerit.

Usus externus est in Exsiccandis præsertim Ulceribus; medicamentum evidenter Septicum raro hodie usurpatur.

ÆTHER VITRIOLI.

Videatur Liquor Anodynus.

ÆTHIOPS ANTIMONIALIS Eller.

℞. Antimonii in pollinem triti partes duas,

Mercurii revificati partem unam:

Terantur in mortario, quod æneum non sit, usque dum omnes globuli Mercuriales disparuerint,

Ad Depurandum Sanguinem plurimum valet.

ÆTHIOPS MARTIALIS Lemery.

Limatura Martis committitur vasi sive vitreo sive porcellaneo, superfunditur ipsi Aqua, quæ quatuor digitis transversis super eam emineat, quotidie spatula ferrea agitetur, & quando aquæ volumen imminutum observatur, tunc de novo aqua affundenda, ut Ferrum semper illo aquæ volumine tectum sit, quod sub initium laboris erat adhibutum; post elapsam longius temporis intervallum omnem splendorem amittet Limatura & in pulverem nigrum redacta erit, qui

exsiccatus & supra Porphyritem lævigatus asservari debet.

Magno hic labore obtinetur Ferrum in tenerrimum pulverem redactum, & omnis rubiginis expertus; idem medicamentum acquirimus, quando Limaturam Martis supra Porphyritem in pollinem reducimus, eidem deinde aliquot Olei guttas aspergimus & in Crucibulo ignito Oleum deflagrare facimus, hac ratione redditur Ferro principium inflammabile, quod sub Præparatione perdidit, & pulverem nigerrimum sistit.

Ubi Tonico & Aperiente scopo Ferrum adhibere volumus, Æthiops Martialis omnibus reliquis præparatis palmam omnino præripit. Datur ad Scrupulum unum pro dosi.

ÆTHIOPS MINERALIS Mayerne.

℞. Argenti vivi revificati Partes duas, Florum Sulphuris Partem unam, Terantur in mortario lapideo, usque dum omnes globuli Mercuriales disparuerint.

Eximie huic Pulveri Sulphurato Mercuriali adscribuntur vires in Tumoribus Glandularum Colli, Exulcerationibus antiquis Fistulosis, Scabie sicca, Febre quartana, & ubi Vermium suspicio est; infanti tenero ad Grana tria vel quinque, adultiori ad Scrupulum dimidium datur & per plures dies absque metu Salivationis ejus usus continuari potest.

AGARICUS PRÆPARATUS

Brossard.

Agaricus Quercus a cortice externo & substantia filulosa separatus & discissus malleo subjiciatur, usque dum ita mollescat, ut in frustra tenuia discerpi queat.

Historiam hujus Medicamenti in Inst. Mater. Med. p. 415. dedi & monui, quod illi Fomes vulgaris nullo Lexivio salino imbutus substitui possit.

ALCAHEST Glauberi.

Videatur Nitrum Fixum.

ALUMEN.

ALOES DEPURATA, LOTA

Galen.

EXTRACTUM ALOES AQUOSUM.

Aloës Succorinæ, q. v. digeratur cum aquæ frigidæ duodecuplo per aliquot dies, liquor decantatus & colatus leni calore in consistentiam Extracti evaporatur.

Si loco aquæ Succus Florum Cordialium recipiuntur, surgit ALOES INSUCCATA, si Infusum Florum Rosarum, ALOES ROSATA, cum Infuso autem Florum Violarum ALOES VIOLATA.

Hoc Medicamentum longe securius, promptius & minori quantitate sumtum Aluum laxat quam integra Aloes, qua quoque prestat, quia liberatum est à resinosa substantia, Hemorrhoidalium motuum sæpius causa, qui frequentiore Aloeticorum usum sequuntur. Grana octo sufficiunt pro Alvo stimulanda, pro Laxanda vero vel drachma semis dari potest. Aloes Insuccata, Rosata, Violata jure evilerunt.

ALUMEN SACCHARINUM

Brassavolæ.

℞. Aluminis crudi uncias sex,
Cerussæ Venetæ drachmas sex,
Vitrioli albi drachmas tres,
Sacchari albissimi unciam unam semis,

Fiat omnium pulvis subtilissimus, qui Albumine ovorum in pastam reducatur, unde parvi coni efformentur, qui exsiccati charta cœrulea obvolvantur.

Usus præcipuus est in Collyriis & Cosmetics, Detergit & Carnem luxuriantem aufert.

ALUMEN TINCTUM *Mynsichti*,
correctum ab *Helvetio*.

℞. Aluminis rupei uncias duas:
Fundantur in vase ferreo & adjiciatur
Pulveris Sanguinis Draconis uncia
una:

ANTIMONII.

Ex massa semi refrigerata formentur celeri manu Pilulæ exiguæ.

In sistendis Hamorrhagiis eximias vires magni Viri inde experti sunt. Dosis interdum ad dimidiam drachmam usque extenditur.

ALUMEN USTUM *Dioscoridis*.

Alumen vasi terreo amplo immissum committitur fornaci Figuli, dum vasa argillacea coquantur. Omni aqua crystallisationis hoc modo privatum, in massam levem, spongiosam, friabilem abiit.

Ad Dentifricia & Carnem luxuriantem absumentam adhibetur; sed prior usus nequam commendandus esse videtur.

ANTI-HETICUM *Poterii*, BEZOARDI-
CUM seu DIAPHORETICUM
JOVIALE.

℞. Reguli Antimonii uncias sex,
Stanni Anglici uncias duas:
Fundantur in Crucibulo, fluentibus adjiciantur per vices
Nitri puri uncia quatuor & viginti:
Educoretur Calx cum Aquæ quantitate sufficiente.

Olim ad moderandos Hæcticorum sudores adhibebatur. Datur ad drachmam semis.

ANTIMONII BUTYRUM, CAUSTI-
CUM ANTIMONIALE & CIN-
NABARIS *Basilii Valentini*.

℞. Mercurii sublimati uncias quindecim,
Antimonii crudi uncias sex.

Probe conterantur per plures horas, immittantur dein Retortæ, quæ elapsis aliquot diebus Balneo arenæ committantur, subministretur calor, prodibit in præpositum Retortæ Excipulum liquor spissior, quem Butyrum Antimonii appellant, hic cum omnis prodierit, intendatur ignis ad summum usque & sustineatur per aliquot horas; ex refrigerata dein Retorta auferatur Cinnabaris, quæ hac ratione surrexit, illa in pulverem redacta denuo ex Cucurbita sublimetur.

Butyrum a Chirurgis loco Cauterii adhibetur. Cinnabari specifica virtus Antepileptica & Antispasmodica adscribitur, maxime ab Hoffmanno Diss. de Cinnabare Antimonii; à vulgari factitia plane non differre ostendi Instit. Chem. Experim. 83. Dosis ad scrupulam unum extenditur.

ANTIMONII CLYSSUS Glauberi.

℞. Nitri uncias viginti quatuor,
Antimonii uncias duodecim,
Sulphuris uncias tres:

Probe misceantur & pulverisentur, eorum Drachmæ circiter duæ ingerantur Retortæ ferreæ tubulatæ in igne aperto candenti, & cui ope Argillæ Excipulum peramplum sit junctum; pulvere ingesto, statim operculum orificio tubi exactissime applicandum est, nec nova portio ingærenda, antequam detonatio tota cessaverit, liquor ex vaporibus sub qualibet detonatione in Excipulum prorumpentibus surrectus asservetur.

In Siti & Calore nimis extinguentis laudatur, in Febris etiam malignis, loco Spiritus Vitrioli, potui ordinario & Julapiis additur. Medicamento minus grato, & quod neutiquam tanquam purum acidum considerari potest, prudenter hodie Spiritus Vitrioli substituitur.

ANTIMONII HEPAR.

Videatur Crocus Metallorum.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM. PULVIS ANTIMONII ALBUS

Basil. Valentini.

CALX ANTIMONII LOTA Suecorum.

℞. Antimonii crudi partem unam,
Nitri depurati partes duas.

Exacte mixta immittantur per vices Crucibulo candenti, ea lege, ut qualibet vice nonnisi Drachmæ circiter duæ detonent, omnis materies ubi detonavit, spatula ferrea agitetur, & immittatur aquæ; hæc inde defundatur, & nova affundatur usque dum pulvis albus plane fuerit edulcoratus, qui exsiccatus asservetur.

Aqua ad edulcorationem adhibita iusta ratione in crystallos coacta Salem Polybrestum largitur. Aquæ, in qua candens Antimonium Diaphoreticum fuit extinctum, si adjicitur Acetum, secedit ad fundum pulvis albus, quem MATERIEM PERLATAM Krugneri appellare solent. Si tres Nitri partes ad unam Antimonii fuerint receptæ, ex aqua ad edulcorationem adhibita recuperatur Nitrum, quod sub labore non destructum fuit, illud NITRUM ANTIMONIATUM, NITRUM ANODYNUM, ANODYNUM MINERALE appellant.

Antimonio Diaphoretico adscribuntur vires Absorbentes, Alexipharmacæ, Diapnoicæ, Sanguinem depurantes, datur a granis quindecim ad drachmam dimidiam in Febris cujuscunque generis, Conf. Instit. Chem. Exper. 93. Nitrum Antimoniatum omnino Calcem Antimonii Vehit; observat Vener. Triller illud frequentiori in usu Hoffmanno fuisse. Fateor me semper malle Nitrum depuratum, quam Antimoniatum, ex quo vel solum Acidum Vegetabile rodentem spiritum expellit exhibere.

ANTIMONIUM PRÆPARATUM.

Antimonium crudum lævigetur supra Porphyritem, immittatur tunc vitro cylindræo, ipsi larga aquæ quantitas adjiciatur & cum ea probe agitetur, aqua turbata decantetur, cum residuo pulvere nova Aqua eadem ratione tractetur, pollen in aquis decantatis subsidens, exsiccatum asservetur.

Hac elutriatione & tenerrimum & ab omnibus partibus heterogeneis liberum Antimonium obtinetur.

ANTIQUARTIUM Riverii.

Videatur Panacea Mercurialis,

APOZEMATA vide DECOCTA:

AQUÆ DESTILLATÆ SIMPLICES.

Parantur, dum Vegetabili qualicumque comminuto & Vesicæ immisso ad-

fun-

funditur Aqua ad eminentiam aliquot digitorum, & inde duo trientes destillantur. Circa has Aquas sequentia notanda sunt:

- 1) Minus bene a corporibus inodoris Aqua destillatur, licet enim illa quaedam inde recipiat mucilaginosas aut gelatinosas partes, tamen hæc adeo parvæ sunt, ut nequaquam aliquem effectum edere queant; aqua nil inde acquirit præter saporem & odorem minus gratum, qui autem inde, dum Aeri exponuntur in vasis apertis, mitescunt.
- 2) Vegetabilia, quorum odor exsiccatione perit, omnino recentia debent adhiberi.
- 3) Optimum est in Officiis eas præcipue Aquas simplices destillatas aservari, quæ sub destillatione Oleorum prodierunt; aut a Floribus odoratis, quamvis nullum Oleum largientibus, obtinendas, sed hi semper recentissimi adhibendi sunt.
- 4) Ex tempore quævis Aqua destillata efficax parari potest, quando Aquæ communis destillatæ unciis duodecim adjicitur uncia dimidia Spiritus vini, in quo tres vel quatuor Guttæ destillati Olei, cujus odorem Aqua habere debet, fuerint dissolutæ.
- 5) Si loco Aquæ, Vinum a Vegetabilibus abstrahitur, liquor AQUA VINOSA dicitur, hic & 4. locum quoque habet, si loco dimidiæ Unciæ Spiritus Vini ejus unciæ duæ recipiuntur.

AQUA ABSYNTHII COMPOSITA

Edinburg. prior. edit.

- ℞. Radicum Calami Aromatici,
Galangæ,
Zedoariæ ana uncias duas,
Corticum recentium Aurantiorum,
Cinnamomi ana uncias
quatuor,
Herbarum Absynthii vulgaris uncias
sex,

Herbarum Menthæ,

Salviæ ana uncias duas,
Cardamomi minoris,
Nucis Moschatæ ana unciam unam,
Macis unciam semis:

Incisis & contusis affundantur

Spiritus vini trecentæ quinquaginta
sex uncia:

Instituatur secundum artem Destillatio.

Minus bene hoc medicamentum Aqua dicitur, cum Spiritibus omnino accensendum sit, nec ab Absynthio debuisset denominari; reliqua enim ingredientia æque ac Absynthium ad ejus efficaciam faciunt. Egregium Stomachicum esse dicitur in Anorexia, Nausea, Vomitu, Bradypepsia, & aliis supinè Ventriculi affectibus languidis; egregium etiam Anticolicum & Garminativum esse, imprimis si a causa frigida Colica statulenta nata fuerit; neque minus fœminis Hystericis prodesse, in pacandis rebellis Uteri turbis; item pallentibus ex Chlorosi puellis, insignem quoque usum Anthelminticum præstare, comode tandem ad morbos serosos, Hydropem, Febres intermittentes, maxime Quartanam posse adhiberi. Dari potest parvum cochlear in vehiculo aquoso.

AQUA ACUSTICA Ludovici.

- ℞. Radicum Levisticæ,
Valerianæ,
Herbæ Rorismarini,
Florum Lavendulæ ana unciam semis,
Baccarum Lauri,
Castorei,
Camphoræ ana drachmas duas,
Spiritus Juniperi uncias duodecim:
Incisa, contusa macerentur per quatri-
dium, tunc addantur
Spiritus Salis Ammoniaci uncia semis,
Olei Juniperi drachma semis:
Omnia probe mixta asserventur usui.
*Hujus Spiritus una aut altera gutta Gos-
sypio excepta immittitur Auri, cujus Meatus auditorius obstructus aut Tympanum re-
laxatum est.*

AQUA ALEXITERIA Londinensium.

- ℞. Foliorum Menthæ recentium uncias
duas cum dimidia,

Summitatum Absynthii Pontici recentium,
 Radicum Angelicæ recentium ana
 uncias duas,
 Aquæ uncias septuaginta.
 Fiat secundum artem Destillatio.
 Pro SPIRITUOSA addantur ante Destillationem,
 Spiritus vini uncia triginta cum duabus.
 SPIRITUOSÆ Unciis sedecim si adji-
 ciuntur
 Aceti uncia duæ,
 Surgit AQUA ALEXITERIA SPIRITUOSA cum ACETO.
Scopo Alexipharmaco & Sudorifero hæ Aquæ cochleatim exhibentur.

AQUA ALUMINOSA Fallopii.

℞. Aquarum destillatarum Rosarum,
 Scordii ana
 Uncias duodecim,
 Aluminis crudi,
 Mercurii sublimati ana Drachmas
 duas.
 Dissolutis per ebullitionem Salibus, filtratur liquor.
Ad Ulcera Cacoëthea & Venerea mundanda adhibetur.

AQUA ALUMINOSA Paris.

℞. Aquarum destillatarum Rosarum.
 Plantaginis
 ana uncias
 viginti quatuor,
 Aluminis drachmas tres,
 Misceantur.
Ad Sanguinem sistendum extus adhibetur.

AQUA ANHALTINA Schræderi.

℞. Ligni Aloes drachmas tres,
 Croci Orientalis drachmas duas cum
 dimidia,
 Caryophyllorum Aromaticorum,
 Nucis Moschatae,
 Cubebarum,

Cinnamomi ana Drachmas sex,
 Baccarum Lauri,
 Seminis Fœniculi ana unciam semis,
 Olibani electi unciam unam:
 Incisa, contusa infundantur per aliquot
 dies, cum
 Spiritus Vini unciis sexaginta.
 Addantur.
 Terebinthinæ uncia sex.
 Instituatur Destillatio; Oleo ablato fervetur liquor, in quo suspendantur, si placet
 Moschi in petia ligati Grana quindecim.

Vulgo huic medicamento insignes adscribuntur vires in Ventriculo roborando, Colica flatulenta & Urina pellenda; sed eante adhibendum est, ne Sanguis inde nimis commoveatur; Externus, usus frequentior est, cum Ventriculo applicatum Vomitus sistat, & ad roboranda membra Paralyti debilitata valere, sit observatum. Terebinthinæ Oleum, quo hoc medicamentum scatet, ejus usum internum nimis exæstuantem, externum vero nauseosum reddit.

AQUA ANODYNA Pragensium correctæ.

℞. Spiritus Salis Ammoniaci vinosi uncias sex,
 Essentiæ Croci unciam unam,
 Olei destillati Lavendulæ Drachmam
 semis.
In doloribus Arthriticis & Rheumaticis aliisque ex stagnantibus humoribus viscidis acribusque obortis commodum usum Paregoricum & Anodynum præstare refert & asseverat Trillerus; addens, Dolores externos vel acerrimos inde consopitos fuisse, se aliquoties expertum, latum adhuc recordari.

AQUA APOPLECTICA Langii
correctæ.

℞. Radicum Calami aromatici,
 Ireos,
 Aristolochiæ rotundæ ana
 unciam unam semis,
 Herbarum Majoranæ,
 Chamæpityos,
 Rorismarini,

AQUA.

Florum Primulæ Veris ana Manipulum unum,
 Seminis Sileris montani,
 Fœniculi ana Drachmam unam semis,
 Cubebæ,
 Nucis Moschatæ,
 Caryophyllorum ana Drachmas tres.
 Ciunamomi,
 Ligni Aloes una Drachmas duas,
 Piperis longi,
 Sagapeni,
 Opoponacis,
 Myrrhæ;
 Gummi Juniperi ana Drachmam unam semis,
 Aquarum florum Paralyseos,
 Tiliæ,
 Salviæ ana uncias octodecim.

Incisa, contusa stent in Infusione per dies octo, postea Destillentur.

Laudatur ad Prophylaxin Apoplexiæ & curandas Paralyseos, in eo certe reliquis Aquis apoplecticis præferenda, quod, cum spirituosâ non sit, Sanguinem minus commoveat, minusque adeo morbum, cui arcendo destinator, provocet. Datur per Cochlearia.

AQUA AROMATICA Danica.

℞. Herbæ Menthæ Piperitidis uncias tres,
 Cinnamomi uncias duas,
 Flavedinis Corticum Citri unciam unam,
 Macis Semunciam,
 Seminis Angelicæ unciam unam,
 Spiritus Vini centum quadraginta quatuor uncias.

Instituatur Destillatio.

Spiritus hic Aromaticus in Debilitate Primarum viarum exhiberi poterit. Dosis est parvum Cochlear.

AQUA ASTMATICA Augustanorum

correcta a Kleinio.

℞. Radicum Enulæ uncias duas,
 Ireos Florentinæ unciam unam cum dimidia,

AQUA.

11

Herbarum Hyssopi,
 Rorismarini,
 Mari veri ana unciam unam,
 Seminum Anisi,
 Fœniculi,
 Cinnamomi ana unciam semis,
 Cardamomi minoris Drachmas duas,
 Croci Scrupulos duos,
 Spiritus Vini uncias duodecim,
 Aquæ Hyssopi cohobatæ uncias viginquatuor.

Digesta per triduum Destillentur.

Ad Asthma serosum & pituitosum laudatur, senibus maxime commendatur. Datur per Cochlearia.

AQUA BALSAMI EMBRYONUM

Augustanorum correctâ, a Pharmacopœa Austriaco-Provinciali.

℞. Radicum Pœoniæ,
 Zedoariæ,
 Zinziberis ana uncias duas,
 Galangæ Drachmas sex,
 Herbarum Salviæ,
 Melissæ,
 Fœniculi,
 Menthæ ana uncias tres,
 Plorum Tunicæ,
 Tiliæ ana uncias sex,
 Lavendulæ,
 Nucis Moschatæ ana uncias tres,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Gubebæ,
 Granorum Paradisi,
 Macis ana uncias duas:

Incisa, contusa infundantur per aliquot dies cum

Spiritus Vini unciis quadraginta quatuor,

Aquæ fontanæ unciis ducentis quadraginta.

Dehinc Destillentur inde Liquoris uncia centum nonaginta duæ.

Pessime hæc Aqua contra Abortum exhibetur, quippe quem, cum Sanguinem commoveat, promovere potius, quam arcere valebit; scopo Carminativo potius, monentibus Trillero & Schultze, ad duo Cochlearia pro

dosi datur ; extus quoque cum crusta panis calida Abdomini imponitur .

AQUA BENEDICTA *Rulandi*, **VINUM ANTIMONIATUM** *Huxhami*, **ESSENTIA ANTIMONII** *Ejusdem*, **VINUM EMETICUM** *vulgo*.

Rx. Vitri Antimonii uncia una.

Redigatur in pulverem, infundatur frigide per duodecim dies cum Vini Hispanici aut Maderaici unciis viginti quatuor, agitentur aliquoties de die; Liquor clarus filtretur charta bibula.

Illustris Huxham hoc Preparatum antimoniale reliquis omnibus anteposit; ejus Unciam unam aut duas valide Vomitum movere, Drachmas duas tres lenem modo Vomitum, subinde unamque ac alteram Alvi defectionem, quoque Sudorem excitare, a triginta ad sexaginta vel octoginta Guttulas datum Alterare, Diaphoresin & omnes Secretiones promovere observat.

AQUA CALCIS.

Calcis vivæ uni parti
affundantur gradatim

Aquæ fontanæ partes decem:
Finita ebullitione, Aqua cum Calce probe agitetur, charta filtretur & in vitro probe clauso asservetur.

Hujus Medicamenti usus plerumque externus est ad Inflammationes, Ambusta, Ulcera & id genus affectiones. Internæ in frigidis morbis, Chronicis imprimis, Unciæ quatuor bis de die propinantur, scopo Siccandi & Detergendi: egregias ipsi virtutes Diaphoreticas, Nephriticas, Anthelminticas & potissimum Lithontripticas tribuunt Alston in singulari Dissertatione, quem strenue sequitur Robertus VVhytt in propria Dissertatione & alii egregii Medici.

AQUA CALCIS COMPOSTA *Londinensium*.

Rx. Ligni Quajaci uncias sex,
Corticis Ligni Sassafras unciam femis,
Radici Liquiritiæ unciam unam,
Semini Coriandri drachmas tres.

Incisa macerentur per biduum cum
Aquæ Calcis vivæ unciis duabus &
septuaginta: colentur.

Ad Acrimoniaſ varias humorum corrigendas adhibetur. Aliquot Cyathii bibantur de die.

AQUA CAPONIS FLORENTINORUM correcta.

Capo évisceratus in frusta dissectus coquatur leni igne cum Aqua, usque dum caro ossa relinquat; unciis duodecim hujus jusculi, ablata ante omni supernatante pinguedine adjiciantur.

Aquarum Rosarum unciæ duodecim,
Cinnamomi unciæ duæ.

Misceantur.

Potentiores sane hæc Aqua vires Analepticas edet, quam Aqua Caponis destillatæ, quales vulgo in Dispensatoriis præscribuntur. Si quos odor Aquæ Rosarum offenderit, Aquam Rubi Idæi aut aliam odoratam recipiant.

AQUA CARBUNCULI *Schræderi* correcta.

Rx. Rerbarum Majoranæ,
Salviæ ana unciam unam
femis,
Rorifinarini unciam unam,
Florum Lavendulæ uncias quatuor,
Liliorum Convallium,
Rosarum,
Cinnamomi,
Cardamomi minoris ana unciã unam,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Caryophyllorum ana unciam femis,
Zinziberis,
Galangæ,
Baccarum Juniperi ana drachmas tres.

Spiritus Vini rectificati uncias duodecim,

Aquarum Rubi Idæi,
Lavendulæ ana uncias triginta sex:

Incisa & contusa Infundantur per octiduum; deinde Destillentur ad dimidias.

Liquori destillato commisceantur quædam folia Auri.

Extus ad Epithemata Cordis & Pulsuum adhibetur; ad Fœtum roborandum gravidarum Abdomini cum Aqua Balsami Embryonum imponitur. Nomen inde habere dicitur, quod Carbunculos & Bubones Pestilenciales expellat, & retrocessionem eorum inhibeat. Cum Sanguinem exastuantia in Peste quoque perniciose esse hodie evictum sit, inter- nus hujus Aquæ usus evuluit.

AQUA CARMELITARUM, MELISSÆ COMPOSITA *Lemery correctâ.*

℞. Summitatum Melissæ recentis uncias duodecim,
Flavedinis recentis Corticum Citri uncias duas,
Nucum Moschatarum unciam unam,
Seminis Coriandri uncias quatuor,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi ana unciam unam,
Radicum Angelicæ unciam semis,
Spiritus Vini rectificati uncias sexaginta quatuor.

Incisa, contusa Infundantur per aliquot dies, dein Destillentur leni calore octo & quadraginta uncia.

Ejus dosis si quidem intus Roborandi scopo datur, nunquam ultra parvum Cochlear debet extendi; Cephalicæ inde, Analepticæ & Roborantes vires expectantur, sed crebrius externe scopo Excitandi, Roborandi, Discutiendi adhibetur.

AQUA CARMINATIVA Dornkrellii.

℞. Florum Chamomillæ Romanæ uncias octodecim.

Infundantur in Aquæ Chamomillæ unciis centum quadraginta

per octiduum; exprimantur forti expressione; Liquori expresso addantur:

Herbarum Absynthii Pontici,
Pulegii,
Origani,
Summitatum Centaurei minoris ana drachmæ duæ,
Seminis Anethi uncia duæ,

Seminis Anisi,
Fœniculi ana uncia una,
Carvi uncia semis,
Baccarum Juniperi,
Lauri,
Calami Aromatici,
Zedoariæ ana drachmæ duæ,
Cinnamomi uncia semis.

Incisa & contusa Infundantur in Spiritus Vini centum nonaginta & duabus unciis; instituaturs Destillatio.

AQUA CARMINATIVA Regis Borussicæ Friderici I.

℞. Flavedinis Aurantiorum Chinesium recentium,
Citri recentis ana uncias duas,
Salis Tartari drachmam unam.

Infundantur cum Vini Tokaviensis unciis viginti quatuor,
per aliquot dies, deinde Destilletur Spiritus, qui Edulcoretur
Julepi Rosarum uncia una.

AQUA CARMINATIVA VULGARIS Austriacorum.

℞. Herbarum Absynthii Pontici,
Menthæ crispæ,
Pulegii,
Origani ana unciam unam semis,

Florum Chamomillæ Romanæ uncias duodecim,

Corticum Aurantiorum,
Citri,

Seminum Coriandri,
Carvi ana unciam unam semis,

Aneti uncias duas,
Anisi,

Fœniculi ana unciam unam.

Incisa & contusa Infundantur per duodecim horas in Aquæ fontanæ unciis centum nonaginta & duabus. Abstrahatur inde medietas.

Harum Aquarum vires nomine patent, cavendum ne Spiritus in Colicis sanguineis exhibi-

exhibeantur; *Austriaca per Cyathos hauriri potest.*

AQUA CONTRA CARIEM *Plenk.*

℞. Aquæ Calcis vivæ uncias duas,
Mercurii in pari sui ponderis parte
Aquæ fortis dissoluti Drachmam unā.
Misceantur.

*Vires ex nomine patent, adhibetur teste
Cl. Plenck etiam contra Ulcera Phagadenica.*

AQUA CATAPULTARUM.

Videatur Aqua Vulneraria.

AQUA CINNAMOMI CYDONIATA *Hamburgensium.*

℞. Cinnamomi uncias quatuor.
Infundantur per triduum cum
Succi Cydoniorum unciis octo & qua-
draginta.

Abstrahantur Liquoris unciæ triginta sex.
Si loco Cydoniorum recipitur Aqua
Florum Buglossi, surgit AQUA CINNA-
MOMI BUGLOSSATA *Mynsichti*; si su-
muntur Aquæ quatuor Cordiales, Liquor
profectus dicitur AQUA CINNAMOMI
CORDIALIS *Recent.* cum Decocto Hor-
dei obtinetur AQUA CINNAMOMI
HORDEATA *Pharm. Bat.* cum Aqua Ce-
raforum nigrorum AQUA CINNAMO-
MI SINE VINO *Leidens.* cum Aqua fon-
tana AQUA CINNAMOMI SIMPLEX
Londinens. & Danorum, Vulgaris Austria-
corum.

AQUA CINNAMOMI cum VINO *Coloniensium.*

℞. Cinnamomi crassiuscule contusi un-
cias sex,
Vini generosi uncias octodecim.
Post Digestionem aliquot dierum insti-
tuatur Destillatio, quam diu Liquor lac-
tei coloris prodit.

*He Aquæ propter gratum præcipue sa-
porem commendabiles, Analeptica & Sto-
machica sunt, ideo in morbis a causa præ-
sertim frigida oriundis & Debilitatem cor-*

*poris inducentibus nec non ad fractas Vires
erigendas commode exhibentur.*

AQUA COLONIENSIS.

℞. Spirituum Vini rectificati uncias se-
ptuaginta & duas,
Rorismarini uncias octo-
decim,
Aquæ Carmelitarum uncias duo-
decim,
Oleorum Bergamotti unciam unam,
Citri drachmas duas,
Neroli,
Rorismarini ana drachmam
unam,
Probe mixta Destillentur.

*Convenit ratione virium cum Aqua Car-
melitarum.*

AQUA CONFORTATIVA sive PERLATA *Augustanorum.*

℞. Aquarum Ceraforum uncias novem,
Tiliæ uncias tres,
Cinnamomi Vinosæ dra-
chmas sex,
Margaritarum Occidentalium præ-
paratarum scrupulum unum,
Coralliorum alborum præparatorum
drachmam semis,
Cornu Cervi usi præparati scrupo-
los duos,
Julepi Rosati sesqui unciam.
Misceantur.

*Infantibus & aliis, qui medicamenta re-
formidant, solet offerri ab Uncia dimidia
ad integram. Julepus demum usus tempore
debet adjici.*

AQUA CORNU CERVI CITRATA *Waldschmidii correcta.*

℞. Rasuræ Cornu Cervi uncias sex,
Pomorum Citri cum corticibus in-
cisorum numero quatuor.
Coquantur cum Aquæ fontanæ unciis
quatuor & quadraginta ad remanentiam
quatuor & viginti, filtratis addantur
Aquarum Rosarum,
Melissæ,

Aqua-

Aquarum Scordii ana uncia octo-
decim.

Analeptica & Alexipharmaca predicatur.

AQUA DIVINA MIRABILIS *Parisien-*
sium correcta à *Beaumé*.

℞. Spiritus Vini rectificati uncias sexa-
ginta & quatuor,

Quintarum Essentiarum Citri,
Bergamotti
ana drach-
mam unā,

Aquæ Florum Aurantiorū uncias octo:
Destilletur Spiritus & probe misceatur cum
Sacchari unciis triginta & duabus,
dissolutis in

Aquæ uncis centum viginti & octo.
Filtretur per chartam emporeticam.

*Aquæ Divinæ denominatio multum am-
bigui habet, ipsam Phagedænicam quoque hoc
nomine comprehendunt, nostra verum Cla-
retum est, quod virtutem Analepticam, Cor-
diacam, Stomachicam, Carminativam habet.
Datur ad uncias duas.*

AQUA EPILEPTICA *Langii*.

℞. Florum Recentium Liliorum Con-
vallium uncias
sex.

Lavendulæ un-
ciam unam,
Rorismarini.

Stœchadis Arabicæ ana un-
ciam semis.

Cinnamomi drachmas sex,
Nucum Moschatarum unciam semis.

Piperis longi,
Cubebæ ana drachmas duas,

Visci Querni,
Radicum Pœoniæ,
Fraxinellæ ana unciam se-
mis,

Macerata in Vini generosi libris octo
per triduum, Destillentur ad dimidias.

*Ad Epilepsiam, Vertiginem & Apople-
xiam tum arcendas quam pellendas, in ipso
paroxysmo, vulgo commendari solet. Quid
vero in his morbis hæc Aqua, quippe Aro-
matica, efficere possit, dijudicatum proclive est.*

AQUA FLORUM OMNIUM *Batean.*
AQUA FIMI *Fuller.*

℞. Stercoris Vaccini uncias quinquaginta.
Includantur sacco linteo, qui com-
mittatur Vesicæ centum quinquaginta
libras Aquæ continentis, Destillatione eli-
ciantur Aquæ uncia septuaginta quinque.

*Ad Arthritidem, Colicam, Calculum &
Urinæ suppressionem laudatur, externe inter
Cosmetica numeratur, sed sub hoc florido
omnium Florum velamento nihil nisi fatuam
fatuorum Aquam latere prudenter monet Ven.
Triller. Ipsa Vaccarum urina aliquando sub
titulo Aqua di mille fiori, Eau de Mille-
fleurs maximis encomiis celebrabatur.*

AQUA FOETIDA *Pragensium.*

℞. Radicum Pœoniæ unciam semis,
Dictamni albi drachmas
duas,

Levistici unciam semis.
Zedoariæ drachmas tres,

Herbarum Matricariæ,
Artemisiæ,
Menthæ ana manipulum
unum,

Rutæ manipulos duos,

Florum Chamomillæ,
Sambuci,
Anthos,
Liliorum Convallium,
Primulæ veris ana pugillos
duos,

Seminum Pœoniæ,
Sileris Montani ana unciam
semis,

Cinnamomi drachmas tres,
Galangæ minoris uncias tres,

Cubebæ,
Macis ana drachmas duas,
Galbani,

Asæ foetidæ ana uncias tres,
Myrrhæ electæ unciam semis.

Castorei Moscovitici uncias duas:

Incisa grosso modo & contusa infundan-
tur in

Vini albi generosi unciis centum &
viginti,

Aquæ Matricarie unciis viginti quatuor :

Destillentur lege artis,

Trillerus Aquam hanc eximii plane usus esse affirmat in affectibus Hystericis & quibuscunque similibus, passim tam inquam externe adhiberi ad avertendos aut interumpendos paroxysmos, conducere etiam in aliis affectibus Tormentos Colicis ac Flatulentis a Stomacho vel Digestionis vitiiis oriundis. Ad semicochlear & ultra propina.

AQUA FORTIS Geberi.

℞. Nitri depurati libras tres,
Vitrioli viridis calcinati libram unam:

In pulverem redacta probe misceantur & Destillentur ex Retorta terrea seu vitrea loricata in excipulum, cui prius Aquæ libra una semis fuerit immisla.

Nunquam in usus medicatos recipitur, sed aliorum Medicamentorum preparationi inservit.

Pharmacopola a propriis, quos Laborantem vocant, artificibus fere sibi comparant Aqua fortem. Quæ vero cum & Vitriolico & Salis communis Acido vulgo sit contaminata, instillanda ei est solutio Argenti usque dum amplius non turbetur. Dicitur tunc Aqua fortis Præcipitata & est Acidum Nitri purissimum.

AQUA FORTIS MERCURIALIS Plenckii.

Videatur Aqua contra Cariem.

AQUA ad GINGIVAS Parsiensem correcta.

℞. Aluminis Rupei unciam semis,
Dissolvatur in

Aquæ ebullientis unciis triginta:
Refrigeratæ solutioni addantur

Oleorum destillatorum Cinnamomi
guttæ sex,

Caryophyl-
lorum gut-
tæ duæ,

Quintæ Essentiæ Citri guttæ decem:

Dissolutæ in

Spiritus Vini rectificati unciis sex,
Aquæ Florum Aurantiorum uncia una

Filtrentur.

Gingivæ Roborandi ergo hac Aqua coluuntur.

AQUA GRYSEA Goblîi.

℞. Mercurii vivi,

Aquæ Fortis ana unciam unam:

Dissolutis affundantur

Radiciſ Chelidoniæ majoris uncia
semis,

Herbarum Ejuſdem.

Solani,

Aristolochiæ,

Florum Rosarum pallidarum ana ma-
nipulus unus,

Cum Aqua unciis centum & viginti ad remanentiam unciarum nonaginta & sex decoctæ & colatæ.

Hanc Aquam ad Ulcera Phagedænica & Synoviam curandam facere observatur in Act. Med. Berol. D. I. Vol. 3. p. 86. antequam in usum trabatur, semper est agitata, ut pulvis ad fundum hærens in ipsa suspendatur. Hanc Aquam cum Liquore Belloſtii convenire Cl. Klein in Select. Medicaminum p. 14. annotat.

AQUA HIRUNDINUM Augustanorum.

℞. Pullorum Hirundinum dissectorum nu-
mero triginta,

Visci Querni,

Radiciſ Pœoniæ ana unciam unam
semis,

Seminis Ejuſdem unciam unam,
Florum Liliorum Convallium recen-
tium uncias quatuor,

Florum Sambuci unciam unam semis,
Aquæ fontanæ uncias centum & vi-
ginti.

Destillentur ad dimidias.

Vires Analeptica & Hysterica huic Aquæ adscribuntur. Ad drachmas sex præscribi solet. Prudentiores Medici ridiculam fatuam, nullusque plane pretii & usus esse asserunt.

AQUA HIRUNDINUM cum CASTOREO *Cullmanni*.

℞. Pullorum Hirundinum vivorum in partes dissectorum numero quadraginta,

Herbæ Rutæ hortensis uncias duas,

Castorei optimi unciam unam,

Vini albi uncias nonaginta & sex :

Destillentur ex vesica ad dimidias,

Gesner Epist. L. I. p. 486. huic Aquæ vires Antepilepticas & Hystericas adscribit.

Datur ad unciam unam.

AQUA HUNGARICA sive REGINÆ HUNGARIÆ.

℞. Ramorum Rorismarini cum Foliis & Floribus uncias quadraginta & octo,

Spiritus Vini uncias centum quatuor & quadraginta.

Destillentur usque dum Phlegma appa-
ruerit.

Convenit cum Aqua Carmelitarum; usus externus est ad Decubitum humorum, Contusiones &c.

AQUA LAXATIVA ANGELICA *Vien-
nensium; Austriaco-Provinciali* correcta.

℞. Cremoris Tartari drachmas duas:
Dissolvantur in

Aquæ ebullientis unciis octo:

Dissolutis solvantur

Mannæ electæ unciaë duæ,

Salis Vegetabilis drachma una semis,

Succus Pomi Citri unius.

Infundantur fervide in vase clauso super corticibus ejusdem pomi.

Liquor Albumine Ovorum clarificatus
filtretur.

*Medicamentum eccoproticum una dosi hau-
riendum.*

AQUA LAXATIVA *Viennensium*.

℞. Foliorum Sennæ sine stipitibus dra-
chmas sex,

Passularum minorum drachmas tres,

Tom. II.

Radicum Polypodii scrupulos duos,

Seminis Coriandri drachmam semis.

Cremoris Tartari drachmam unam:

Incisa & contusa coquantur cum Aquæ fontanæ unciis decem, ad remanentiam unciarum sex, in Colatura dissolvantur

Mannæ Siciliensis unciaë duæ.

Clarificentur.

Fortius Album ducit.

Hæ duæ Aquæ mora corrumpuntur, & non nisi usus tempore parandæ sunt.

AQUA *Luce*.

Videatur Spiritus Salis Ammoniaci Succinatus.

AQUA MAGNANIMITATIS *Kunrath*.

℞. Spirituum Formicarum uncias sexaginta,

Melissæ uncias quadraginta octo,

Flavedinis Corticum Citri unciam semis,

Cinnamomi drachmas tres,

Caryophyllorum unciam unam,

Cardamomi,

Cubeborum ana drachmas tres,

Zedoariæ unciam unam,

Mastichis,

Styracis Calamitæ,

Benzoës ana unciam unam semis.

Stent in Digestione per octiduum, postea lege artis Destillentur.

Absurde profecto Magnanimitatis nomen huic Aquæ imponitur, aut inde quod vel Audaciam vel Venerem sit auctura expectatur; Nervinas, Analepticas, Cardiacas, Cephalicas ac Stomachicas videtur polliceri & ad Atrophiam, Arthritidem vagam, dolores Ischiadicos, Spasmos, Paralysem aliosque id genus affectus laudatur.

AQUA MASTICHINA *Augustanorum* correcta.

℞. Mastichis electæ uncias quatuor,
Nucum Moschatarum unciam unam:

Contusis affundantur

Spiritus Vini rectificati unciaë duodecim,

Stent in Digestione per triduum, tunc adjiciantur

Aquæ fontanæ uncia octo & quadraginta.

Destillentur inde uncia triginta sex.

Hæc Aqua vires Stomachum confortantes possidet, & in Singultu, Ciborum fastidio, Flatulentia, Diarrhæa & Vomitu commendatur, Dosi ejus ad unciam unam ascendit.

AQUA MELLIS ANDERNACI.

℞. Mellis optimi, quantum vis
Ex Cucurbita inde Destilletur Phlegma.

Laudatur ad promovendum incrementum Capillorum.

AQUA MELLIS ODORATA REGIA

Parisiensium correcta à Beaumé.

℞. Seminis Coriandri uncias octo,
Flavedinis corticum Citri recentium
unciam unam,

Nucum Moschatarum,

Styracis Calamitæ,

Benzoës ana unciam dimidiam,

Vanigliarum drachmas tres:

Incisa contusa infundantur per nyctemerum cum

Spiritus Vini rectificati unciis quadraginta octo:

Fiat secundum Artem Destillatio; Spiritui destillato addantur, si placet, usus tempore

Tincturæ Moschi,

Ambra ana parum.

Analeptico, Cephalico, Nervino, Cardiaco & Paregorico sine laudatur. Cosmetico scopo præcipue usurpatur.

Egregias hæc Aqua & odore ac sapore perquam grata & amœna vires exserit Analepticas, Nervinas, Cephalicas, Cardiacas, Stomachicas, Carminativas, Hystericas. Panno aut pane excepta, Stomachique regioni extus applicata Anthelminticas quoque edere dicitur. Alvi fluxum blande sistit, Vomitus compefcit, ructuososque Singultus cohibet. Trillero Aqua hæc polychresta est. Datur intus ad unciam semis.

AQUA MELISSÆ COMPOSITA.

Videatur Aqua Carmelitarum.

AQUA MENTHÆ COMPOSITA

Parisiensium.

℞. Herbarum recentium Menthæ uncias viginti quatuor,

Absynthii uncias tres,

Ocymi,

Pulegii ana uncias duas,

Rorisnarini,

Florum Lavendulæ ana drachmas duas,

Cinnamomi unciam semis,

Caryophyllorum,

Seminis Coriandri ana drachmam unam:

Incisa & contusa infundantur per aliquot dies in

Spiritus Vini rectificati unciis sedecim,

Aquæ Menthæ unciis sexaginta.

Destillentur fere ad siccitatem.

AQUA MERCURIALIS videatur MERCURIUS LIQUIDUS. AQUA MERCURIATA *Augustanorum* correcta. MERCURIALIS ad usus externos.

℞. Cerussæ Venetæ unciam unam.

Lithargyrii unciam semis,

Aluminis crudi drachmas sex,

Mercurii sublimati,

Sâlis Ammoniaci ana drachmâ unam,

Aquarum fontanæ uncias duodecim,

Rosarum uncias quatuor,

Aceti uncias sex:

Lithargyrium & Cerussa coctione cum Aceto solvantur, deinde addantur reliqua & non colata asserventur.

Hæc Aqua prodesse dicitur Cuti deformata, ad Verrucas, Scabiem malignam, Serpiginem, Ficus, Fissuras, Ulcera maligna, vel ubi Mundificandum est, penicillo illita.

AQUA MILLEPEDUM *Fulleri.*

℞. Millepedum vivorum,
 Sacchari albi ana unciam unam:
 Probe subactis affundantur
 Vini albi unciae quatuor:
 Colatura adhibeatur ad usum.
*Sanguis inde depuratur, Nervi roborantur,
 Obstructiones referantur, Renes & Vesica emundantur, Urina quoque blande movetur.*

Hoc Medicamentum cum tempus non ferat, non nisi usus tempore parandum est.

AQUA MULSA *Hippocratis.*

℞. Mellis optimi uncias duas,
 Aquæ fontanæ uncias duodecim:
 Mixta colentur.
Medicamentum egregie Resolvens, Refrigerans, Demulcens maximo in usu erat apud Artis nostræ Parentes.

Portio Mellis pro gustu ægroti potest augeri aut minui: non ultra aliquot dies asservari debet.

AQUA MYRRHÆ *Wirtembergensium.*

℞. Myrrhæ rubræ uncias octo.
 Digerantur per triduum cum
 Aquæ fontanæ duabus & septuaginta
 unciis:
 Destillentur inde unciae quadraginta octo.
Commendatur in affectibus a vitio Mensum ortis, & morbis Pectoris atque Ventriculi, datur ad Unciam unam.

AQUA OPHTHALMICA ALBA *Danica.*

℞. Aquæ Rosarum uncias duodecim,
 Vitrioli albi drachmam unam,
 Sacchari Saturni drachmam semis,
 Camphoræ, Pineis tritæ, scrupulum
 unum:
 Misceantur.
Ad Ophthalmiam Discutiendam adhibetur.

AQUA OPHTHALMICA CHARAS.

℞. Sacchari Candi albi unciam unam,
 Radicis Ireos Florentinæ drachmas
 tres,
 Tutia præparatæ drachmas duas,
 Sarcocollæ,
 Vitrioli albi,
 Aloës Succotrinæ ana drachmā unam,
 Caryophyllorum scrupulum unum,
 Aquarum Euphrasæ,
 Fœniculi,
 Rosarum ana uncias octo,
 Vini Hispanici uncias viginti quatuor:
 Infundantur in Sole æstivo per quindecim dies & agitentur per vices, liquor clarus in usum recipiatur.

Linteis excepta & Oculis imposita laudatur ad Lippitudinem & Ulcuscula Palpebrarum.

AQUA OPHTHALMICA COERULEA
*Danica, COLLYRIUM COERULEUM
 Lemery, COLLYRIUM EXSICCANS
 Paris. AQUA OPHTHALMICA SAPP
 PHIRINA Schræderi correctæ, COL
 LYRIUM SAPPHIRINUM Richardi,
 AQUA COELESTIS Vitet.*

℞. Aquæ Calcis vivæ uncias duodecim.
 Salis Ammoniaci drachmam unam,
 Florum Viridis Æris grana quinque:
 Probe trita filtrentur.
Ad Ulcera Palpebrarum & Corneæ Abstergenda & Solidanda adhibetur.

AQUA OPHTHALMICA *D. Daguin.*
 COLLYRIUM *Comitis du Bourg
 Argentiniensium.*

℞. Tutia præparatæ,
 Caryophyllorum,
 Sacchari Candi ana unciam unam,
 Camphoræ Pineis tritæ,
 Aloës ana drachmam unam cum di
 midia:
 Pulverifata infundantur in sole per quindecim dies cum
 Vini Hispanici unciis quadraginta
 octo,

Aquarum Rosarum albarum unciis sex,
Chelidonii,
Fœniculi,
Euphrasæ,
Rutæ ana unciis duabus.

Liquor decantatus recipiatur ad usum.

In varii generis Lippitudine, quædam hujus Aquæ guttæ instillantur in Oculum affectum & probe per ipsum diffunduntur.

AQUA PANIS Bierling.

℞. Crustæ Panis recenter ex clibano extracti & adhuc calentis uncias viginti quatuor,

Cinnamomi acuti,

Caryophyllorum,

Nucum Moschatarum ana unciam dimidiam,

Vini albi generosi uncias nonaginta sex;

Destillentur ad dimidias.

Aquis Analepticis & Stomachicis accensetur. Huic Aquæ, quæ insunt Aromata, omnino vires Roborantes conciliabunt, nec in totam iners erit vapor ex Pane ipsi immixtus.

AQUA PESTILENTIALIS Hartmanni.

Videatur Spiritus Vini Camphoratus Crocatus.

AQUA PHAGEDÆNICA Lemery. LIQUOR MERCURIALIS Austriaco-Provincialis.

AQUA DIVINA Fernellii.

℞. Mercurii Sublimati drachmam semis: Dissolvatur probe terendo cum

Aquæ Calcis vivæ unciis duodecim:

Hoc Medicamentum, Exulcerationibus externis, Ulceribusque Venereis adhiberi solitum, equidem semper magistraliter præscribi, Mercuriique Sublimati portionem, quam morbus postulat, quamque nonnulli ad drachmam integram usque extendunt, adcuratissime determinari velim.

Formulæ præscriptæ si adjiciuntur Pulveris Alcës sex drachmæ & Mellis Ro-

fati sesquiuncia, surgit AQUA ALOE-TICA MERCURIALIS Zvvælfseri.

AQUA PICEA videatur Infusum Picis.

AQUA Rabelii, ELIXIR ACIDUM, ANTIPODAGRICUM, ANTINEPHRITICUM Dippelii.

℞. Olei Vitrioli uncias quatuor, Spiritus Vini rectificatissimi uncias duodecim.

Misceantur lente, & non nisi post octo aut plures a commixtione dies trahatur ad usum.

Adstringendi causa in Hæmorrhagiis adhibetur, nec non scopo Antiseptico in morbis Putridis. Datur ad guttas octo in sufficiente vehiculi quantitate.

AQUA RAPHANI COMPOSITA

Londinensium.

℞. Herbæ Cochleariæ recentis uncias viginti quatuor,

Radici Raphani Rusticani recentis, Corticum Aurantium recentium ana uncias duodecim,

Nucum Moschatarum uncias quatuor cum dimidia,

Spiritus Vini uncias nonaginta sex, Aquæ fontanæ uncias quinquaginta:

Destillentur ex Vesica unciæ sex & nonaginta.

Egregium contra Scorbutum medicamentum per Cochlearia exhibetur.

AQUA REGIS.

℞. Spiritus Nitri partes tres, Salis partem unam:

Misceantur.

Unice ad dissolvendum Aurum adhibetur.

AQUA SERPYLLI COMPOSITA

Mynsichti.

℞. Radicum Zedoariæ,

Galangæ ana drachmam unam,

Pœoniæ unciã unã semis,

Her-

AQUA.

Herbarum Serpylli manipulos sex,
 Fœniculi manipulos quatuor,
 Verbenæ,
 Melissæ,
 Florum Tiliæ,
 Liliorum Convallium,
 Lavendulæ,
 Rorismarini ana pugillos
 duos,
 Cubebæ drachmam unam,
 Cinnamomi drachmam semis,
 Macis,
 Nucis Moschatæ ana drachmas duas,
 Visci Querni unciam unam semis,
 Vini generosi uncias centum duas &
 nonaginta.

Fiat secundum artem Destillatio.

Vires habere dicitur Cephalicas, Cardiacas, Stomachicas atque Carminativas, inde dolores Colicos atque Tormina Intestinorum compescere, Menses quoque atque Partum promovere; Dosis vel ultra duo Cochlearia, urgente necessitate, extendi poterit; non solum autem usui interno, sed & externo, partibus corporis Debilitatis, Sensu Motuque carentibus, aut Sugillatis cum leni frictione adhibetur, nec non membris Atrophicis.

AQUA SINE PARI, EAU SANS PAREILLE.

℞. Aquæ Regiæ Hungariæ uncias octo,
 Spiritus Vini rectificati uncias duas
 & septuaginta,
 Oleorum Citri unciam dimidiam,
 Bergamotte drachmas duas
 semis,
 Cedrat drachmas duas,
 Mixta destillentur ad remanentiam un-
 ciarum novem,
*Ejusdem cum Aqua Carmelitana ac Co-
 loniensi usus est.*

AQUA SCLOPETARIA.

Videatur Aqua Vulneraria.

AQUA STIBIATA Richardi.

℞. Tartari Emetici grana quatuor:

AQUA.

21

Dissolvantur in Aquæ fervidæ unciis se-
 decim.

*Singulis horis sumantur uncia quatuor,
 donec desideratus effectus sequatur.*

AQUA STYPTICA Berolinensium.

℞. Succorum expressorū Sempervivi ma-
 joris,
 Sanguisorbæ,
 Chærefolii,
 Aristolochiæ,
 Aceti Vini ana quantum vis.

Destillentur secundum artem.

*Adhibetur ad sistendas Hemorrhagias &
 sananda Vulnera.*

AQUA STYPTICA Danorum. LIQUOR STYPTICUS Weberi.

℞. Aluminis rupei,
 Vitrioli cœrulei ana uncias tres:
 Mixta dissolvantur coquendo cum
 Aquæ fontanæ unciis quatuor & vi-
 ginti:
 Liquori filtrato addantur
 Olei Vitrioli drachmæ duæ:
 Misceantur.

*Spleniolis exceptus Liquor partibus Cruen-
 tatis applicatur.*

Huic Analoga sed valentior est AQUA VITRIOLICA COERULEA Londinensium, quæ ex Vitrioli cœrulei partibus tribus, Aluminis partibus duabus, Aquæ octodecim partibus, solutis, & Olei Vitrioli partibus duabus constat.

AQUA THEDIANA.

℞. Aquæ Acetosæ,
 Spirituum Vini ana uncias triginta sex,
 Vitrioli uncias decem,
 Sacchari albi uncias duodecim.
 Mixta filtrentur.

Cl. Plenck hanc Aquam in compescendis Hemorrhagiis, moderanda nimia Vulnerum Suppuratione & consolidandis Vulneribus, omnibus hucusque laudatis Aquis Vulnerariis palmam præripere asserit; ad Vulnera quoque & Ulcera Vasorum, & Tumores Lymphaticos curandos unicum & efficacissimum remedium esse videri.

AQUA

AQUA THERIACALIS.

Videatur Spiritus Theriacalis.

AQUA THERIACALIS Londinensium.

℞. Theriacæ Andromachi uncias quatuor,
Vini albi uncias sexaginta,
Abstrahantur ex Cucurbita unciæ triginta.

Hanc Aquam reliquis Aquis Theriacalibus, quarum quodque fere Dispensatorium propriam habet compositionem, præferendam duco; Alexipharmaca censetur, vim habet Stomachicam & Carminativam. Datur Coebleatim.

AQUA AD TORMINA INFANTUM
Argentoratensium.

℞. Aquarum Menthæ,
Chamomillæ ana uncias
duas,

Syrupi Florum Papaveris Rhœados,
Chamomillæ ana unciam semis:

Misceantur.

Hæc Aqua Colicæ & Torminibus sedandis, infantum Flatibus dissipandis & fibris Intestinorum relaxandis optime inservit: Coebleatim datur. Sed cum mora corrumpatur, non nisi in ipso usus articulo parandum est hoc Medicamentum.

AQUA TYPHORUM CERVI
COMPOSITA.AQUA TENELLORUM CORNU
CERVI Kalde.

℞. Radicum Scorzoneræ,
Zedoariæ ana unciã unam,
Cinnamomi unciam semis,
Lignorum Santali rubri drachmam
unam semis,
Aloës,

Cassia lignæ ana drachmam unam,
Nucis Moschatæ,
Macis ana unciam semis,
Florum quatuor Cordialium unciam
unam,

Lavendulæ unciam semis,
Typhorum Cornu Cervi uncias decem:

Incisa & contusa Infundantur in
Vini Malvatici unciis sexaginta,
Spiritus Vini Gallici unciis triginta
sex.

Destillentur secundum artem.

Alexipharmacæ & Cordiales vires inde expectantur. Dosis est ad drachmas duas..

AQUA VEGETO-MINERALIS Goulard.
AQUA SATURNINA Suecorum.

℞. Extracti Saturni unciam dimidiam,
Aquæ fontanæ destillatæ uncias vi-
ginti quatuor.

Spiritus Vini uncias duas.

*Discutiendis Inflammationibus apprime con-
ducens Medicamentum cum summo successu
partibus Sugillatis applicatur, commendatur
quoque ad partes Excoriatas.*

AQUA VERONICÆ cum VINO
Berolinensium.

℞. Herbæ Veronicæ florecentis uncias
sex & triginta,

Vini albi uncias sex & nonaginta.

Destillentur lento igne unciæ quadra-
ginta octo.

*A Stablio & ejus affectis Tussi tam Pul-
monali quam Hypochondriaca, inprimis se-
nibus Asthmaticis & ad Marasimum pronis
adhibenda laudatur; bis vel ter de die ad
Unciam unam semis exhibetur.*

AQUA VIOLACEA, EAU de VIO-
LETTES Beaumé.

℞. Radicis Iridis Florentinæ uncias qua-
tuor,

Spiritus Vini rectificati uncias duas
& triginta.

Infundantur per duas septimanas; Tin-
ctura ita obtenta in usum trahatur.

Non nisi Cosmetico scopo adhibetur.

AQUA VIRIDIS Hartmanni.

℞. Sulphuris vivi,
Aluminis crudi,
Viridis Æris ana drachmam unam,
Albi Græci,

AQUA.

Summitatum Sabinæ ana drachmā unā,
 Florum Hyperici,
 Herbarum Rorismarini,
 Rutæ,
 Plantaginis,
 Salviæ,

Herbæ Pulegii ana pugillos duos :
 Incisa & trita coquantur cum

Vini,

Aquæ ana unciis duodecim :

Ad consumptionem quartæ partis , ad-

dantur Mellis Rosati drachmæ duæ.

Hartmann hanc Aquam ad Ulcera fœti-
da, Venerea maxime nec non ad Scorbutum
egregie laudat.

▲AQUA VITÆ MULIERUM *Bæcleri.*

℞. Radicum Ireos Florentinæ,
 Zedoariæ,
 Calami aromatici ana dra-
 chmas tres,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Granorum Paradisi ana unciam unam,

Seminis Anisi uncias sedecim,

Fœniculi,

Papaveris albi,

Cumini ana unciam semis ,

Spiritus Vini uncias duas & septua-

ginta.

Stent in Digestione per octiduum , po-
 stea secundum artem Destillentur ; Li-
 quori destillato addantur

Sacchari albissimi uncia quatuor.

Liquor filtratus fervetur.

Trillerus annotat, hoc Medicamentum in
plerisque Uteri affectionibus præsentaneum
veluti remedium esse, siquidem Caput, Ven-
triculum & reliqua Viscera corroborando ;
Suffocationes & Flatus compescat, Catar-
rhosque tollat; sed prudenter quoque addit,
gravidas a largo & frequenti ejus usu arce-
ri debere. Dosis est ad aliquot drachmam.

AQUA VITÆ SAPONACEA *Richardi.*

SPIRITO DI SAPONE, ESPRIT de
 SAVON.

℞. Saponis Veneti unciam unam:
 Dissolvatur.

AQUA.

23

Spiritus Vini Camphorati unciis se-
 decim.

Extus Discutiendi & Resolvendi gratia ap-
plicatur.

AQUA VITRIOLICA *Suecorum.*

℞. Vitrioli albi drachmam unam:

Dissolvatur

Aquæ fontanæ unciis duodecim:

Filtrentur.

Discutiendæ Oculorum Inflammationi ad-
hibetur.

AQUA VITRIOLICA COERULEA

Londinensium.

Videatur Aqua Styptica.

AQUA VULNERARIA. ACQUA DI
 ARCHIBUGIATA, EAU D'
 ARQUEBUSADE *Lemery.*AQUA CATAPULTARUM, AQUA
 SCLOPETARIA.

℞. Radicum Symphiti,
 Herbarum Ejusdem,
 Artemisiæ,
 Bugulæ ana manipulos
 quatuor,
 Betonicæ,
 Saniculæ,
 Buphthalmi,
 Symphiti minoris,
 Scrophulariæ,
 Plantaginis,
 Agrimonæ,
 Verbenæ,
 Absynthii,
 Fœniculi ana manipulos
 duos,
 Hyperici,
 Aristolochiæ,
 Telephii,
 Veronicæ,
 Centauri minoris,
 Millefolii,
 Nicotianæ,
 Menthæ,
 Hyssopi ana manipulum
 unum:

Con-

Contusa infundantur per triduum in loco calido, cum

Vini albi centum & quadraginta quatuor unciis,

Destillentur secundum artem.

Absonam hanc compositionem longe a plurimis Dispensatoriis receptam, Lemery non primus præscripsit, sed aliunde acceptam publicavit; quædam Dispensatoria eam mutarunt, quædam etiam auxerunt. Laudatur ad Contusiones, Sugillationes, Luxationes, Ambusta, Inflammationes, Gangrenam præcavendam; præterea ad partes Roborandas.

AQUA VULNERARIA Baumé.

℞. Foliorum recentium Salviæ,
 Angelicæ,
 Absynthii,
 Saturejæ,
 Fœniculi,
 Menthæ,
 Hyssopi,
 Melissæ,
 Ocymi,
 Rutæ,
 Thymi,
 Majoranæ,
 Rorismarini,
 Origani,
 Calaminthæ,
 Serpilli,

Florum Lavendulæ ana uncias quatuor.
 Infundantur concisa per nycthemerum cum

Spiritus Vini rectificati unciis centum octo & viginti:

Destilletur omnis inde Spiritus; (si Aqua loco Spiritus assumitur, surgit **AQUA VULNERARIA AQUOSA**, si Vinum, **VINOSA**, si Spiritus Vini a Vegetabilibus non abstrahitur, sed post infusionem decantatus filtratur, obtinetur **AQUA VULNERARIA RUBRA**.)

Vel tyro Chymia perspicit, hac ratione paratam Aquam Vulnerariam reliquis efficaciorum esse. Varia morbi, cui applicari debet, natura indicat, Aquosa ne, an Vinosa, an vero Spirituosa recipi debeat.

AQUA VULNERARIA MERCURIALIS Plenckii.

℞. Aquæ Rosarum uncias sex,
 Solutionis Mercurii dulcis unciam unam,

Mellis Rosacei unciam semis.

Misceantur.

Adbibetur ad curanda Ulcera Venerea.

AQUA VULNERARIA MINERALIS Plenckii.

℞. Camphoræ uncias tres:
 Subactis

Spiritus Vini uncia una

Adjiciantur sensim sensimque

Sacchari Saturni drachma semis,
 dissoluti

Aquæ fontanæ unciis quadraginta quatuor.

Misceantur & usus tempore probe concutiatur Liquor.

Ulcerum antiqua sanare, Cancrum apertum mitigare, & ipsi obicem ponere, linteis tepide applicatam Inflammationes mirifice solvere Clarissimus Plenck assaeravit, haud incongrue Aqua vegeto-mineralis Camphorata denominari posset.

AQUILA ALBA.

Videatur Mercurius dulcis.

ARCANUM CORALLINUM.

Videatur Mercurius Præcipitatus ruber.

ARCANUM DUPLICATUM Buffii sive Holsteimensium, SAL DE DUOBUS Parisiensium.

Residuum a Destillatione Aquæ fortis, rite Elixivetur, Lixivium ope affusæ solutionis Salis Tartari tentetur, num rite sit saturatum; si cum hac solutione non effervescit nec turbatur, evaporetur lente ad cuticulam, filtretur, & inde surgentes Crytalli asserventur.

Vires sub Tartaro Vitriolato dicentur.

ARCANUM TARTARI.

Videatur Terra foliata Tartari.

AURUM FULMINANS *Bas. Valentini.*

℞. Auri per Antimonium depurati quantum vis:

Dissolvatur

Aquæ Regis quantitate sufficiente; instilletur Alkali sive fixum sive volatile, usque dum omne Aurum ad fundum secesserit, calx probe edulcorata sicceatur in umbra, exsiccata cautissime sine ulla frictione colligatur.

In *Instit. Chem.* monui, ne Ducatorum quidem Aurum, cum semper Cuprum contineat, ad hanc Calcem, si ea scopo medicato applicanda fuerit, recipiendum esse:

Purgantibus stimuli loco ad unum alterumve Granum adjiciebatur. Hodie inter Medicos evuluit.

AURUM HORIZONTALIS *Wepferi.*
PANACEA *Kornmanni.*

℞. Croci Solis drachmas duas,
Cinnabaris Antimonii unciam semis,
Olei destillati Cinnamomi guttas tres.
Probe inter se invicem terantur.

Vires Analeptica, que huic Medicamento adscribuntur, pendent ab Oleo Cinnamomi.

AURUM POTABILE *Helvetii.*

Videatur Tinctura Auri *Geoffroy.*

AXUNGIARUM DEPURATIO.

Cellulosa, quæ Adipem habet, in frustra dissecatur, & cum Aqua tam diu conquassatur, usque dum Aqua ipsi denovo affusa inde defluat prorsus limpida, leni deinde calore liquatur Adeps, ut omnis ex Cellulosa secedat & ipsi limpidus supernatet, eodem quoque calore Aqua, quæ ipsi sub priore labore adhæserat, distillatur; distillatam autem esse una aut altera Adipis gutta carbo-

nibus injecta ac sine strepitu deflagrans indicio est; Adeps depuratus adhuc fluidus committitur.

BACILLI AD FORNACEM.

Videatur Massa ad Fornacem.

BACILLI DE LIQUIRITIA.

Videatur Liquiritia cocta.

BALSAMA.

Plurima parantur, ubi uni uncia; Olei Nucis Moschatae ope Spiritus Vini odore suo privati affunditur Olei qualiscunque odorati drachma una, a quo Oleo odorato deinceps Balsamum denominatur.

BALSAMUM ADSTRINGENS *Richard.*

℞. Olei Vitrioli unciam semis;
Affundatur sensim

Olei Terebinthinæ uncia semis;
Adjiciantur

Spiritus Vini rectificati uncia tres.
Hoc medicamentum ad Scrupulos duos usque pro dosi ad sistendam Gonorrhœam adhibetur.

Proxime accedit ad Balsamum Ischæmaticum Brunsvicensium.

BALSAMUM ANODYNUM *Pharmacop. Bateanae ab Edinburgensibus correctum.*

℞. Opii unciam unam,
Saponis albi Hispanici uncias quinque,
Spiritus Vini rectificati uncias viginti quatuor:

Comminuta Digerantur per triduum; in liquore filtrato dein dissolvantur

Camphoræ uncia duæ
Olei Stillatitii Rorismarini semuncia.
Arthriticis & Rheumaticis commendatur.

BALSAMUM APOPLETICUM *Pharm.**Bateanae correctum.*

℞. Oleorum Nucistæ expressi uncias tres
 semis,
 Jasmīni,
 Destillatorum Cinnamomi,
 Ligni Rhodii
 ana drach-
 mam unam
 semis,
 Lavendulæ,
 Majoranæ,
 Caryophyl-
 lorum ana
 drachmam
 unam,
 Rutæ,
 Succini ana
 scrupulum
 unum,

Balsami Peruviani scrupulos duos:
 Probe mixtis addantur

Moschi,

Ambrae ana grana sedecim, Spiritu
 Rosarum trita,

Spodii nigri præparati quantum satis
 ad Balsamum nigro colore tin-
 gendum.

*Apoplecticorum Naribus, Vertici, Tem-
 poribusque illinitur, potissimum vero ob Odo-
 ris commendationem expeti olim solebat.*

BALSAMUM AROMATICUM.

Videatur Balsamum Scherzeri.

BALSAMUM ARCÆI. UNGUENTUM
 e GUMMI ELEMI *Londinensium.*

℞. Terebinthinæ,
 Gummi Elemi ana uncias sex,
 Sevi Cervini uncias novem,
 Olei Hyperici uncias duas:

Leni igne liquentur & probe agiten-
 tur usque dum refrigerint.

*Præstans Vulnerarium & Digestivum est,
 quod in Vulneribus feliciter adhibetur; si Di-
 gerendi scopus est, unguento digestivo aut
 Basilico temperatur. Parum ab hoc Balsa-*

*mo differt Balsamum vulnerarium Minde-
 reri.*

BALSAMUM ARCÆI LIQUEFA-
 CTUM *Plenckii.*

℞. Balsami Arcæi,
 Vitellorum Ovorum ana unciã unam:
 Probe subacta diluantur
 Spiritus Vini unciis octo.
*Ad Ulcera & Vulnera sinuosa injicienda
 adhibetur, si quidem Spirituosa admittant.*

BALSAMUM CATHOLICUM.

Videatur Balsamum Commendatoris de
 Perne.

BALSAMUM CELLENSE.

Videatur Balsamum Scherzeri.

BALSAMUM CEPHALICUM

Saxonicum.

Videatur Balsamum Scherzeri.

BALSAMUM CHALYBEATUM, BAL-
 SAMO DI AGHI, BEAUME D'
 AIGUILLES *Parisiensium.*

℞. Acuum chalybearum unciam se-
 mis:

Dissolvatur in
 Spiritus Nitri sesqui-uncia:
 Solutioni addantur

Olei Olivarum unciæ duæ semis,
 Spiritus Vini rectificati unciæ duæ:
 Leni calore detineantur & agitentur,
 usque dum probe sint unita,

*Laudatur contra dolores Arthriticos & Po-
 dagricos.*

BALSAMUM AD DENTITIONEM
Charas.

℞. Succī expressi Cancrorum fluviati-
 lium,
 Mucilaginis Radicis Althææ ana un-
 cias duas,
 Butyri optimi uncias tres,

BALSAMUM.

Succi Axungiarum Gallinæ,
Anatis ana dra-
chinas duas:

Mixta coquantur lento igne ad hu-
miditatis consumptionem. Colaturæ ad-
dantur

Sacchari Candi pulverisati uncix qua-
tuor,

Vitellorum ovi numero unum:

Probe misceantur.

*Sententiæ Charas, qui hoc medicamento
tenellorum Dentienti Gingivulæ illinendo,
Dentitionem egregie promoveri experientia
doctus docet, plures accedunt.*

BALSAMUM Fioraventi.

℞. Baccarum recentium Lauri uncias
quatuor,

Gummi Elemi,
Tacamahacæ ana unciã unam,
Galbani,
Olibani,
Myrrhæ,
Hederæ ana uncias tres,

Styracis liquidæ uncias duas,

Ligni Aloës uncias tres,

Galangæ minoris,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Nucis Moschatæ,

Zedoariæ,

Zinziberis,

Dictamni albi,

Aloës Succotrinæ,

Succini ana unciã unam,

Spiritus Vini rectificati uncias nona-
ginta sex:

Digerantur per novem dies, tunc ad-
dantur

Terebinthinæ uncix sedecim:

Abstrahatur inde Spiritus, quem BAL-
SAMUM Fioraventi SPIRITUOSUM ap-
pellant.

A Destillatione residuum Retortæ com-
missum lento igne Destilletur, flavum
quod inde elicitur oleum Balsamum Oleo-
sum, dicitur. Quo obtento augeatur ignis,
& quod jam prodit magna nigrum em-
pyreumaticum, sub nomine Balsami Ni-
gri asservetur.

BALSAMUM.

27

*Medicamentum a nugivendolo Alchemico
celebratum Medicorum nonnulli receperunt;
Balsamum spirituosum, quod quidem Bal-
samum Fioraventi simpliciter præscripturis
semper est recipiendum, a quibusdam quo-
que tanquam vires edens Analepticas, Ner-
vinas, Nephriticas, Diureticas, Alexiphar-
macas, Traumaticas, Antihystericas & Car-
minativas adeo commendatur, ut in variis
morbis a causa præsertim Frigida aut Fla-
tulentia oriundis, opportune adhibitum, in-
signem usum præstare videatur. Huic admo-
dum analoga Aqua videtur esse Anhaltina.
Balsamum Oleosum odoratorum, Balsa-
mum Nigrum autem Empyreumaticorum
Oleorum vires edet.*

BALSAMUM HYSTERICUM Parisiense.

℞. Gummi Asphalti,
Galbani,
Ladani ana drachnam unam,
Assæ foetidæ scrupulum unum,
Aloës drachnam unam,

Castorei,

Opii ana drachnam semis,

In mortario calido contendantur in mas-
sam, cui addantur

Oleorum Destillatorum Rutæ,

Succini ana

guttæ decē,

Absynthii,

Sabinæ,

Tanacetii,

Petrolei ana

guttæ duo-

decim.

Olei expressi Nucis Moschatæ scru-
puli duo:

Probe misceantur.

*Hoc Balsamo motos in Utero fluctus,
quosque vulgo Hystericas Passiones aut Suf-
focationes vocant, turbas placide sedari per-
hibent. Admouetur Naribus; illinitur Um-
bilico.*

BALSAMUM ISCHÆMATICUM

Brusvicensium.

Videatur Balsamum Adstringens.

BALSAMUM LECTORENSE, BEAUME
DE LAICTURE DE VINCEGUER-
RE, DE CONDOM a *Baumé* cor-
rectum.

℞. Camphoræ comminutæ,
Crocī pulverifati ana drachmā unam,
Moschi,
Ambra tritæ ana drachmam semis:
Infundantur in vase clauso per aliquot
dies leni calore cum
Petrolei albi,
Oleorum Destillatorum Lavendulæ,
Terebinthi-
næ,
Baccarum
Juniperi,
Caryophyl-
lorum
ana uncia
una,
Macis,
Nucis Mo-
schatæ ana
drachmis
duabus,
Benzoës un-
ciadimidia.

Ufus tempore decantatur Olei quantum
opus est.

*Analepticarum, Nervinarum, & Ano-
dynamum virium nomine hoc Medicamen-
tum, ad corrigendum præterea Aerem ma-
lignum laudatur.*

BALSAMUM LITHUANICUM.

Videatur Oleum Betulinum.

BALSAMUM LOCATELLI. ITALI-
CUM RUBRUM *Pharmacop. Bateana.*

℞. Cera citrinæ uncias quatuor,
Olei Olivarum uncias sex,
Vini Malvatici uncias quinque:
Leni igne ad consumptionem humidita-
tis coctis colatisque addantur
Terebinthinæ optimæ uncia sex,
Santali rubri pulverifati unciam se-
mis:

Agitentur fortiter, satisque refrigeratis
admisceantur.

Balsami Peruviani drachmæ duæ.

*Ad Vulnera, Contusiones, Variasque læ-
siones internas pariter ac externas commen-
datur, interne a drachmis duabus ad unciam
semis propinatur.*

BALSAMUM AD LORICANDUM CA-
DAVER CONDITUM *Parisiensium.*

℞. Balsamorum Peruviani,
de Copaiba,
Styracis liquidæ ana uncias quatuor
& viginti,
Oleorū expressi Nucis Moschatæ
uncias octo,
Destillati Lavendulæ un-
cias duas,
Thymi unciam
semis:

Liquefiant leni igne.

BALSAMUM MERCURIALE *Plenckii.*

℞. Mercurii vivi drachmas duas:
Extinguantur probe in
Terebinthinæ drachma una:
Addantur

Axungia Porci drachmæ sex,

Balsami Arcæi drachmæ novem,

Mercurii dulcis grana viginti & tria:

Exacte misceantur.

*Clarissimus Auctor hoc Medicamentum ad
Ulceræ Venerea consolidanda admodum con-
ducere contendit.*

BALSAMUM NERVINUM

Parisiensium.

℞. Oleorum Palmæ,
Nucis Moschatæ,
Medullarum Cervi,
Cruris bovis ana uncias
quatuor,
Axungiarum Hominis,
Taxi,
Viperæ ana uncia unam:

Leni calore liquatis adjiciantur

Oleorum Destillatorum Lavendulæ,
Menthæ,
Oleo-

Oleorum Destillatorum Rorismarini,
Salviæ,
Thymi,
Caryophyl-
lorum ana
drachma
una,

Camphoræ drachmæ duæ,
Balsami Peruviani sicci uncia una :
Duo ultima dissoluta in Spiritus vini
quantitate sufficiente:
Mixta asserventur.

Inungitur membris Debilitatis & Torpidis.

BALSAMUM ODONTALGICUM

Würtembergensium.

℞. Opii,
Camphoræ ana scrupulos duos:
Dissolvantur in Spiritus Vini pauxillo :
Addantur

Oleorum Destillatorum Ligni Sancti
drachmæ
duæ,
Caryophyl-
lorum dra-
china una,
Expressi Nucistæ drachmæ
sex:

Probe misceantur.

*Hoc Balsamum vel solum, vel Gossypio
exceptum, Dentiumque cavitatibus applica-
tum probatæ fertur esse efficaciam ad sedan-
dos Dentium dolores vel gravissimos.*

BALSAMUM OPHTALMICUM RU-

BRUM, *Pharmacop. Danicæ.*

℞. Ceræ albæ drachmas sex:
Leni calore liquatis admisceantur
Butyri recentis optimi unciam tres,
Mercurii præcipitati rubri in tenuis-
simum pulverem triti
drachmæ duæ & grana quin-
decim:

Misceantur exactissime.

*Pterygiis & Maculis Corneæ curandis bis
de die unum aut alterum granum inungitur.*

BALSAMUM OPHTALMICUM,

Saintyves.

℞. Balsami Ophthalmici rubri uncias
duas,
Camphoræ scrupulum unum,
Tutiæ drachmam semis:

Misceantur.

*Paribus fere cum antecedentibus viribus
se se commendat, quin, si Ophthalmia acces-
serit, fertur præferendum.*

BALSAMUM PECTORALE *Meibomii*

℞. Terebinthinæ optimæ,
Oleorum Amygdalarum dulcium ana
drachmas octodecim,
Hyperici uncias duas,
Spermatitis Ceti unciam semis,
Sanguinis Draconis optimi,
Extracti Opii aquosi,
Balsami Peruviani ana drachmas duas,
Butyri optimi unciam unam cum
semisse:

Misceantur.

*Hoc remedium Duci incerti nominis Brunf-
vicensi, in Phthysos suspicionem vocato, a
Meibomio ad decem quindecimve de die
in diem guttas præscriptum eo valuisse, re-
fert Schulzius l. c. p. 50, ut senectutem
iste Dux inde affectus sit satis provectam
æque ac vegetam.*

BALSAMUM COMMENDATORIIS de
PERNE CATHOLICUM TRAUMA-
TICUM *Suecorum.*

℞. Balsami Indici sicci unciam unam,
Styracis electæ uncias duas,
Benzoës electæ uncias tres,
Olibani electi unciam semis:

Trita dissolvantur in
Spiritus Vini rectificatissimi unciis
quindecim:

Filtrata solutio commisceatur cum Tin-
ctura parata ex

Radicis Angelicæ,
Herbæ Millefolii,
Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ electæ ana uncia dimidiã,
Spiritus Vini rectificatissimi unciis
decem.

BALSAMUM.

Oleorum Destillatorum Succini,
Serpilli ana
drachmas
duas,
Rutæ,
Pulegii,
Melissæ,
Menthæ,
Cardamo-
mi ana
scrupulum
unum:

Misceantur.

Hoc medicamentum Balsamo Cellensi & Cephalico Saxonico est analogum; præter odorem satis gratum virtutibus pollet Anticolicis, Carminativis & Stomachicis; hinc in Torminibus Ventris, infantum præcipue, Abdomini utiliter illinitur. Quin & adultioribus in affectibus Colicis, Flatulentis, Hystericis, a causa frigida originem ducentibus interne quoque cum jusculo modica dosi præscribi posse Schulizius Auctor est l. cit. p. 51.

BALSAMA SIMPLICIA.

℞. Olei expressi Nucistæ ope Alcoholis omni odore & sapore privati, quod corpus pro Balsamo appellare solent, partes quinque,
Olei destillati, unde Balsamum denominatur, partem unam: Probe misceantur.

Usu receptum, quod BALSAMUM CARYOPHYLLORUM Pulvere Caryophyllorum, BALSAMUM CINNAMOMI Bolo Armena, BALSAMUM LAVENDULÆ Cœruleo montano, BALSAMUM MAJORANÆ Herbæ Majoranæ, BALSAMUM RUTÆ Viridi Æris tingantur.

Balsama simplicia a viribus Oleorum unde denominantur, dijudicanda esse facile patet.

BALSAMA SULPHURIS.

BALSAMUM SULPHURIS CRASSUM
Edimburgensium.

℞. Sulphuris citrini partem unam,
Olei unguinosi, unde denominatur, partes sex:

BALSAMUM.

In vase terreo amplo, sub perpetua agitatione coquantur usque dum Sulphur calore liquatum, subisse oleum pateat ex colore, odore, fatisque magna intumescencia. Oleum quoddam destillatum si recipiendum est, decem ejus adhibentur partes, solutioque fit in Cucurbita vitreâ ope Balnei Arenæ.

Ex Oleo quocunque destillato surgit BALSAMUM SULPHURIS ANTIMONIALE *Hoffmanni*, si quidem isti Oleo admiscueris Hepar Antimonii ex aqua oriundum, cum Reguli Antimonii simplicis Scoriis cocta. Pro BALSAMO SULPHURIS *Rulandi* jam cum quodam Oleo unguinoso paratum recipere, jam eidem insuper octavam Olei Terebinthinæ partem adjicere solent.

Monui in Institution. Chemiæ ad Experimentum XV. prudentiores Medicos a nauseosis his Medicamentis & acris abstinere. Præcipue eorum vires ab Oleo pendent ad eorum præparationem adhibito. Quæ Olea unguinosa receperunt, mitiora quidem sunt Oleorum odoratorum ope paratis, sed ne hæc quidem acritudine carent, quippe Oleum quodque mitissimum alias, ubi sub præparatione incaluerit, evadet acre.

BALSAMUM TRANQUILLANS

Parisiensium.

℞. Foliorum recentium Strammonei,
Solani nigri,
Phytolacæ,
Belladonnæ,
Mandragoræ,
Hyoscyami ana
uncias quatuor:
Papaveris fativi
uncias octo.
Persicariæ un-
ciam unam,

Buforum viventium numero quinque:
Incisa coquantur cum

Olei Olivarum unciis sexaginta,
Ad consuntionem humiditatis; Oleo per
colum trajecto

Addantur

Summitatum recentium Rorifinarini,
Salviæ,
Sum-

Summitatum recentium Ruthæ,
 Hyssopi,
 Lavendulæ,
 Thymi,
 Majoranæ,
 Costi hortensis,
 Menthæ,
 Hyperici ana
 uncia una,
 Absynthii un-
 ciæ duæ,

Florum recentium Sambuci uncia una:
 Digerantur in vase clauso leni calore
 per quatuordecim dies, colatum Oleum
 elapsis aliquot diebus a fœcibus, quas
 deponit, decantetur, & usui servetur.

*Hoc Oleum, improprie sane Balsmum
 dictum, exterius fricando, inungendo adhi-
 bitum, permulcendis & consopientis sævis
 Arthriticorum, Ischiadicorum & Rheumati-
 corum doloribus egregie valet.*

BALSAMUM TRAUMATICUM

Edinburgense.

Videatur Balsamum Commendatoris de
 Perne.

BALSAMUM TRAUMATICUM

Londinense.

Videatur Balsamum Commendatoris de
 Perne.

BALSAMUM VIRIDE *Du Clos*, sive *Metensium*, sive de *Fœuillet*.

℞. Viridis Æris uncias tres,
 Vitrioli albi unciam unam semis:
 Pulverifata subigantur in mortario cum
 Oleorum Lini,
 Olivarum ana unciis sex,
 Olei Laurini uncia una:
 Addantur
 Terebinthinæ unciæ duæ,
 Calefiat mortarium, omnia, ut exacte
 coëant, agitentur, tunc adjiciantur
 Aloës pulverifatæ drachmæ duæ:
 Oleorum destillatorum Juniperi un-
 ciam semis,

Oleorum Destillatorum Caryophyllo-
 rum drach-
 ma una:

Optime mixta asserventur & tempore
 usus denuo agitentur, ut quæ subsederunt
 insidentibus remisceantur.

*Adhibetur ad Ulcera detergenda & ad
 consumendam Carnem Fungosam.*

BALSAMUM VITÆ *Funni*.

℞. Salis Tartari unciam unam semis:
 Dissolvatur in
 Aquæ fontanæ unciis viginti quatuor:
 Addantur
 Olei Terebinthinæ unciæ tres,
 Saponis Veneti pulverisati unciæ duæ:
 Probe mixtis adjiciantur
 Spiritus Juniperi unciæ duæ,
 Olei Culilabani unciæ tres:
 Misceantur.

*Hoc Balsamo membra Arthritica, Rheu-
 matica, Paralytica, & quæ Sugillationes
 habent, efficacissime fricari Auctor contendit.*

BALSAMUM VITÆ *Hoffmanni*.

℞. Oleorum destillatorum Lavendulæ,
 Majoranæ,
 Caryophyllo-
 rum,
 Cubebarum,
 Cardamomi
 ana scrupu-
 lum unum,
 Macis scrupu-
 los duos,
 Cinnamomi
 scrupulum
 unum,
 Rutæ,
 Succini,
 Balsami Peruviani ana scrupulum se-
 mis,
 Quintæ Essentiæ Citri scrupulum unum:
 Probe mixtis subigatur
 Ambræ Gryseæ scrupulus semis:
 Addantur
 Spiritus Vini rectificatissimi unciæ
 viginti:
 Solutio rite parata asservetur.

Hoc

Hoc Balsamum Hoffmannus jam in Notis ad Poterium descripserat, cum autem labente tempore quæstum sibi inde comparare consultum fore crediderit, ejus parandi modum sibi soli notum esse divulgavit, & idem quoque ejus discipulus Schulz. l. c. p. 54. tradidit. Adhibetur vero hoc medicamentum extus ad Odorandum & partes debilitatas Roborandas, ad Ventriculi affectus, Nauseam, Ructus, Colicam & Diarrhæam. Interno etiam usui iisdem in morbis ad guttas usque viginti commendatur.

BALSAMUM VITÆ EXTERNUM

Plenckii.

℞. Saponis ficcati & in pulverem triti uncias sex,

Salis Tartari unciam unam semis,

Olei Terebinthinæ uncias duodecim:

Misceantur.

Egregium medicamentum resolvens contra Tumores Cysticos, & alios frigidos, Anchyloses &c. laudatur si duodecuplo Aquæ dilutum sub forma Fomenti vel Stillicidii adhibetur.

BALSAMUM VITÆ Teichmeieri.

℞. Quintarum Essentiarum Citri scrupulos quatuor,
Bergamottæ guttas duodecim,

Oleorum Destillatorum Cinnamomi,
Menthæ ana guttas octodecim,

Cardamomi,
Caryophyllorum,

Melissæ Turcicæ,

Macis,

Rorismari,

Lavendulæ

ana guttas duodecim,

Rutæ,

Salviæ ana

guttas quinque,

Dissolvantur in

Spiritus Vini alcalifati loti unciis sex:

Colorentur

Radiciis Alcannæ sufficiente quantitate:

Filtrato liquori addatur,

Essentiæ Ambre drachma semis.

Ex quo insignis, quem sibi suo Balsamo Vitæ comparaverat Hoffmannus, innotuit quæstus, alii quoque Medici, eadem spe ducti, ad idem negotium frequentes se applicuerunt. Hinc dissolutis in Alcohole aut Liquore Anodyno fragrantibus Oleis multa deinceps atque varia concinnata videmus Balsama Vitæ sive quæ Principium Vitæ restaurent medicamina, nomine & genera diversa, viribus congrua.

BALSAMUM VULNERARIUM

Edimburgensium.

Videatur Balsamum Commendatoris.

BALSAMUM VULNERARIUM

Londinensium.

Videatur Balsamum Commendatoris.

BALSAMUM VULNERARIUM

Mindereri.

Videatur Balsamum Arcaei.

BALSAMUM VULNERARIUM Stablit.

℞. Essentiæ Succini uncias duas,

Myrrhæ unciam unam,

Olei Terebinthinæ unciam semis:

Misceantur & loco calido in vase clauso Digerantur.

Ad Vulnera & Ulcera partium Exsanguium adhibetur.

BEZOARDICUM JOVIALE.

Videatur Antihecticum Poterii.

BEZOARDICUM MARTIALE, PULVIS CACHECTICUS Ludovici, SPECIFICUM STOMACHICUM Poterii.

℞. Limaturæ Martis uncias sex,
Antimonii crudi uncias sex:

E

Mix-

Mixta fluant in Crucibulo, effundantur, reducantur in pulverem, & detonentur cum

Nitri crudi unciis sex & triginta:
Calx probe edulcorata fervetur usui.

Huic Calci vires Roborantes, Acidum Absorbentes, & Transpirationem promoventes adscribuntur. Ad viginti quinque grana adhibetur.

BEZOARDICUM MINERALE MOEBII.

℞. Mercurii Vitæ partem unam,

Nitri crudi partes tres:

Misceantur, Detonentur in Crucibulo candente, committantur Aquæ, pulvis subsidens bene edulcoratus fervetur.

Ostendi in Instit. Chem. p. 272 hanc Calcem ab Antimonio Diaphoretico nequaquam differre.

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Bolus Armena pulverifata cum Aqua agitur; Aqua turbida a spisso, quod fundum tenet, leniter defundatur; Aquæ denuo affundatur, quæ paulisper agitata priori addatur, atque hic actus usque repetatur dum in Aqua cum Bolo agitata parum vel nihil amplius turbidi appareat; Pulvis ita elutriatus exsiccetur.

BOLUS ANTHELMINTICUS PURGANS *Nouffer.*

℞. Panacæ Mercurialis,

Diacrydii præparati ana grana decem,

Gummi guttæ grana decem

Pulverifata redigantur cum

Confectionis de Hyacintho quantitate, quæ sufficiat, in Bolum.

Specificè ad expellendam e corpore Teniam laudatur.

BOLI LITHONTRIPTICI *Roséen.*

℞. Saponis Alicantini uncias octo,
Testarum Ovorum calcinatarum,
Fructuum Cynosbati ustorum ana unciam unam,

Salis Tartari drachmam unam:
Mixta efformentur cum Spiritu Vini in Bolos sexaginta.

Eorum quatuor in diem sumantur.

BOLI IN QUARTANA *Richard.*

℞. Corticis Chinæ tenerrime pulverifati drachmas sex,

Scillæ præparatæ scrupulos duos,

Kermes mineralis grana sex,

Spiritus Salis Ammoniaci drachmam unam,

Conservæ Rosarum quantum satis:

Misceantur & formentur Boli duodecim.

Quater de die per æqua intervalla singulatim sumantur.

BOLI VERMIFUGI *Richard.*

℞. Pulverum Radicum Filicis unciam semis,

Rhei electi drachmas duas,

Seminis Cinæ uncia semis:

Mercurii dulcis drachmam unam:

Misceantur & Syrupi Absynthii qua sufficit quantitate cogantur in Bolos duodecim.

Per singulos dies tres eorum sumantur.

BUTYRUM CACAO *Homborgii.*

℞. Nuces Cacao:

Torreantur in sartagine ferrea, ut a Cortice possint nudari, decorticatæ contundantur in pulverem, qui committatur sacco linteo inter preli laminas probe calefactas collocando. Oleum inde obtentum leni calore liquatum detineatur, usque dum fæces deposuerit, a quibus defusum asservetur.

Ad usum tam internum quam externum Spermatis Ceti substituitur, cui suavitatem & gratiam præstat.

BUTYRUM VEL UNGUENTUM MAJORANÆ *Kalde.*

℞. Herbarum recentis Majoranæ,
Butyri recentis ana partes æquales:

Le-

Leni igne coquantur usque dum aliquot guttæ igni instillatæ sine strepitu deflagrent, tum linteo commissa subjiciantur prelo.

In Narium infantum obstructione a Muco viscido oriunda expetitur, quo scopo radici & alis Nasi illinitur.

BUTYRUM RUBRUM.

Videatur Unguentum rubrum Potabile.

BUTYRUM VIRIDE.

Videatur Unguentum Viride Potabile.

CANDELÆ vel CEREOLI
CHIRURGICÆ *Goulard.*

Ceræ liquatæ

Adjiciatur

Extractum Saturni:

Massæ liquidæ immittatur tenue linteum, ope Spathæ illa supra hoc extendatur, paratus hac ratione Sparadrapus in linguam latæ bascos & verticis acutissimi dissecetur, mediantibus digitis convolvatur, & inter duos asseres sive lapides politos lævigetur, crassities his cereolis ea detur, quæ cavo Urethræ respondet; varia eorum longitudo est, maxima novem pollices æquat, triplex eorum genus Illustris *Richard* præscribit, primum $\frac{1}{3\frac{1}{2}}$ Extracti Saturni recipit, secundum $\frac{1}{8}$, tertium $\frac{1}{4}$.

Hi Cereoli Oleo illiti inseruntur Urethræ ad illum usque locum ubi angustata est; quæ quidem angustia quo gravior quoque magis callosa est, eo major Extracti Saturni quantitas ad instruendam candelam recipitur; cum sensibiliores per morbum Urethræ rigidiores, candelas ægrius admittant, Goulard ingredientibus recensitis $\frac{1}{3}$ Axungie Vervecinæ & totidem Olei Amygdalarum adjici jubet.

CANDELÆ CHIRURGICÆ
MERCURIALES *Plenckii.*

℞. Ceræ flavæ uncias sex;

Liquatis addantur

Extracti Saturni uncia dimidia,

Mercurii dulcis drachmæ duæ:
Formentur inde Cereoli ratione modo dicta.

Has Candelas maxime ad revocandam Gonorrhæam suppressam commendant.

CANDELÆ FUMALES *Juncken*
correctæ.

℞. Benzoës electæ uncias octo,
Styracis Calamitæ unciam unam femis,
Ladani,
Olibani,
Mastichis,
Caryophyllorum ana drachinam unā femis,
Carbonum Tiliæ uncias sex & triginta:
Pulverifata redigantur cum
Mucilaginis Tragacanthæ quantitate sufficiente in massam, ex qua formentur parvi coni, quorum bases in tres pedes figurantur.

Vires ex nomine patent.

CASSIA cum MANNA *Richard.*

℞. Medullæ Cassiæ unciam femis:
Salis vegetabilis drachmam unam femis,
Mannæ uncias duas:
Dissolvantur in
Aquæ fontanæ unciis quinque.
Colatura exhibeatur pro una dosi, tanquam lene Laxans.

CASSIA PRO CLYSTERIBUS *Val. Cordi.*

℞. Florum Betæ,
Malvæ,
Mercurialis,
Parietariæ,
Violaræ,
Florum Violarum ana manipulum unum.

Incisa coquantur cum

Aquæ unciis triginta

Ad uncias viginti, colatura discoquatur cum

Medullæ Cassiæ quantitate sufficiente ad Consistentiam Mellis, cui uncias duode-

decim æquanti addantur

Sacchari Thomæi uncie octodecim.
Coquantur ad Consistentiam Electuarii.

*Movendæ Alvi gratia Clysteribus adjicitur
ab uncia una ad duas.*

CASSIA EXTRACTA.

Videatur Pulpa Cassiæ.

CATAPLASMA ANODYNUM Richard.

℞. Foliorum Althææ manipulos quatuor,
Papaveris fativi manipulum
unum,
Hyoscyami manipulum se-
mis:

Crasse contusa coquantur cum
Lactis quantitate sufficiente ad con-
sistentiam Pultis;

Adjiciantur

Olei Lini uncie duæ,
Farinæ Seminis Lini uncia una:

Misceantur probe.

Vires ex nomine patent.

CATAPLASMA ANTISEPTICUM

Plenckii.

℞. Pulveris Antiseptici partes quatuor,
Spiritus Vini Camphorati partes duas,
Aceti Vini quantum satis ad paran-
dum Cataplasma,

*Ad Gangrænam humidam & Tabum pu-
tridum commendatur.*

CATAPLASMA ex BRYONIA Plenckii.

℞. Radicum Bryoniæ uncias tres,
Florum Sambuci unciam unam,
Herbæ Cicutæ uncias duas:

Pulverifata coquantur cum

Aceti quantitate sufficiente ad con-
sistentiam Pultis, cui addantur
Pulveris Gummi Ammoniaci uncias
semis,

Salis Ammoniaci Drachmæ duæ,

*Egregium Remedium esse dicitur, ad re-
solvendos Scirrhus, Scrophulas, Strumas
induratas & Tumores Articulares commen-
dabile.*

CATAPLASMA EMOLLIENS Plenckii.

℞. Micæ Panis Siliginei Lacti imbutæ
uncias, sex,

Vitellorum Ovorum Numero tres,
Pulveris Croci drachmas duas,
Farinæ Seminis Lini quantum satis.

Fiat Cataplasma,

*Adbibetur ad emolliendos Tumores in-
flammatorios nec non ad Suppurationem ex-
citandam.*

CATAPLASMA MATURANS Plenckii.

℞. Farinæ Seminis Lini uncias quatuor,
Gummi Galbani Vitello Ovi soluti
unciam unam,

Pulpæ Ceparum sub cineribus assata-
rum drachmas duas,

Fermenti Panis uncias duas,
Unguenti Basilici unciam unam,
Olei Liliorum alborum quantum satis:

Fiat Cataplasma.

Vires nomen indicat.

CATAPLASMA MATURANS

SAPONACEUM Richard,

℞. Cataplasmatibus de Mica panis uncias
sedecim,

Saponis rasi uncias duas:

Prope misceantur.

*Cum antecedente collatum minus quidem
efficax est, sed minores quoque dolores ex-
citat.*

CATAPLASMA de MICA PANIS

Richard.

℞. Micæ Panis Siliginei uncias sedecim,
Pulverum Florum Meliloti,

Sambuci ana dra-
chmas duas,

Coquantur cum

Lactis unciis octo & quadraginta,

Ad consistentiam Pultis.

Relaxandi & Maturandi scopo adhibetur.

CATAPLASMA POMACEUM

Plenckii.

℞. Pulpæ Pomorum uncias duodecim,
Camphoræ,
Pulveris Crocis ana scrupulum unum:
Misceantur

Medicamentum ad omnem Oculorum Inflammationem peridoneum; ad Vultus Cornæ post Cataractæ operationem deligandum multum laudatur.

CATAPLASMA RESOLVENS *Plenckii.*

℞. Farinarum Resolventium quantum vis,
Aquæ Vegeto-mineralis octuplum:
Coquantur ad consistentiam Pultis.

Tumores inflammatorios egregie discutere dicitur.

CATAPLASMA RESOLVENS ad
SCIRRHOS *Plenckii.*

℞. Seminis Lini,
Herbæ Cicutæ ana partes æquales;
Crasso modo contusa coquantur in
Lactis octuplo
Ad consistentiam Pultis.

Tumores inflammatorios valide dissolvere dicitur.

CATHOLICUM.

Videatur Electuarium Catholicum.

CAUSTICUM ANTIMONIALE.

Videatur Butyrum Antimonii.

CAUSTICUM COMUNE *Geber*, POTENTIALIALE. LAPIS CAUSTICUS.

℞. Cinerum Clavellatorum partē unam,
Calcis vivæ partes quatuor:
Coquantur cum

Aquæ vigecuplo

Per aliquot horas: trajiciatur liquor per filtrum, filtratus evaporetur in vase vitreo ad siccitatem, fundatur leni calore & effundatur in modulum, quo

ad præparationem Lapidis Infernalis uti solent.

Inservit ad excitandos Fonticulos & ad auferendas Excrescentias præternaturales.

CAUSTICUM LUNARE.

Videatur Lapis Infernalis.

CAUSTICUM COMUNE MITIUS

Edimburgensium. CAUSTICUM POTENTIALIALE, VEL COMUNE *Suecorum*.

℞. Causticum commune *Geber*.

Dissolvatur in

Aquæ triplo,

Adjiciatur sensim

Calcis vivæ quantum satis, ut omnis liquor absorbeatur, & Pasta surgat in vase obturato asservanda.

Vires nomen indicat.

CERA ARBOREA.

℞. Cerae,

Resinæ ana uncias sedecim,

Terebinthinæ uncias sex:

Fundantur leni igne.

Arborum Vulneribus obducitur.

CERA CITRINA.

Videatur Emplastrum Citrinum.

CERA AD CRINES *Wallbaum*.

℞. Cerae albæ,

Unguenti Pomati ana partes æquales:

Leni calore liquata fundantur in Magdaleones.

Adhibetur ad usus Cosméticos.

CERA VIRIDIS *Kalde*.

℞. Cerae Citrinæ uncias tres & triginta,
Resinæ,

Terebinthinæ ana uncias duodecim:

Mixtis & liquatis adjiciantur

Viridis Æris probe triti unciaæ duæ.

Contra Clavos pedum feliciter adhibetur.

CERATUM COSMETICUM, POMMADE EN CREME *Baumé*.

℞. Cerae albæ,
Spermatis Ceti ana unciam dimidiam,
Olei Amygdalarum dulcium unciam unam:

Leni calore liquata agitentur usque dum refrigerint:

Tunc sensim affundantur

Aquæ Rosarum drachmæ sex;

Sub perpetua agitatione reliquæ massæ commiscendæ.

Adhibetur Cosmetico scopo ad Cutim mollem reddendam & lævem.

CERATUM DETERGENS *Falckii*.

℞. Cerae albæ uncias quatuor,
Olei Olivarum uncias sex:

Liquefactis admisceantur

Mercurii dulcis uncia duæ,

Præcipitati rubri uncia semis:

Sacchari Saturni uncia una:

Singula prius in tenerrimum pollicem lævigata,

Olei destillati Lavendulæ drachma femis:

Effundantur in capsulas chartaceas quadratas, & dum refrigerint in quadrata secentur.

Ad Ulcera Venerea Detergenda adhibetur.

CERATUM ad LABIA *Argentoratensium* correctum.

℞. Succii Uvatum,
Pomorum ana uncias duodecim,
Butyri recentis uncias duas & triginta:

Coquantur lento igne ad consumptionem humiditatis, per linteum trajectis addantur

Cerae albæ uncia sedecim,

Spermatis Ceti uncia una:

Leni calore liquentur, sub perpetua agitatione refrigeratis immisceatur

Olei destillati Lavendulæ drachma una.

Non modo ad Fissuras labiorum & P.

pillæ cum successu adhibetur, sed egregie quoque contra Impetiginem facit. Quibus in hoc medicamento aridet rubedo, commendanda Radix Alkannæ.

CERATUM REFRIGERANS *Galenii* AMYGDALINUM *Parisiensium*, EMPLASTRUM ad FONTICULOS.

℞. Cerae albæ uncias duas,

Olei Amygdalarum uncias octo:

Liquentur leni igne, & continuo agitentur, usque dum refrigerint, tunc sensim admisceantur

Aquæ Rosarum uncia sex.

Qui in hoc Cerato desideratur color albus, ut obtineatur, Oleo, quod Galenus præcipit, Rosarum substituimus Oleum Amygdalarum. Partibus, Inflammatione aut Impetigine laborantibus, pariter ac ab acris Humoribus defendendis inungitur; contra Fissuras quoque cum successu adhibetur, quin & deligandis Fonticulis usum suum præstat.

CERATUM SATURNINUM *Goulard*.

℞. Cerae albæ uncias octo,

Olei Amygdalarum uncias octodecim:

Leni igne liquatis addantur

Extracti Saturni uncia quatuor:

Sub perpetua agitatione refrigeratis admisceatur:

Camphoræ, parum Olei Amygdalarum dissolutæ, Drachma una.

Ad Ulcera Callosa, Fistulosa Scrophulosa & Venerea, nec non ad Impetiginem laudatur.

CEREOLI.

Videantur *Candelæ*.

CERUSSA ANTIMONII *Barchusen*.

℞. Reguli Antimonii partem unam,
Nitri partes tres:

Mixta in pulverem redacta Detonentur, Calx edulcorata asservetur.

Plane non differt ab Antimonio Diaphoretico.

CHOCOLATA.

CHALYBS PRÆPARATUS.

Limatura Chalybis in mortario ferreo pistilli ferrei ope reducatur in tenerrimum pollinem; per cribrum ferreum trajectus, asservetur in vitro probe clauso.

Vires Æthiopsis Martialis exserit.

CHOCOLATA.

℞. Nucum Cacao *Cavaques* leviter tostorum uncias sedecim:

In pulverem redactæ committantur mortario ferreo, prunis super imposito & sub gradu caloris eo, quem manus sustineat, agitentur pistillo, usque dum in pastam abierint; adjiciantur sub agitatione, neque remisso calore continuanda:

Pulveris Sacchari unciae duodecim:

Ubi nulli ulterius grumuli in Massa observantur,
Addantur

Vanillæ, cum Sacchari Drachmis tribus in pulverem tritæ, drachma una.

Exacte mixta Pasta committitur modulis parallelogrammis ferreis Stanno obductis.

Chocolata, quæ nulla Aromata recipit, *Chocolade de Santé* appellatur.

Rarius hodie in Pharmacopoliis Chocolata paratur, quippe, occupatis in ea conficienda propriis Artificibus, relinquitur proprio pro paranda Pasta instrumentorum apparatu instructis. Varia his Vanillæ adjiciendæ ratio est. Si scrupulum unum ad Libram recipiunt, Chocolatam a *Une Vanille*, si duos a *Deux Vanilles* &c. denominare solent.

Pastam quoque ex America mittere solent, ast vero, utpote non raro ex minus bonis Nucibus paratæ, præferenda fere videtur ea quam sibi Artifices ipsi parant.

Vires Chocolatæ tribuuntur Nutrientes, Corroborantes & Demulcentes. Patent hæc vires Chocolatæ ex Nucleis unde conficitur, quippe quibus præter mite Oleum ope Sac-

CINNABARIS.

39

chari in Aqua suspendendum, Adstringentis & Aromatici quid inhaeret; Uncia una cum menstrui Aquosi Unciis sex pro dosi exhiberi solet.

CINERES.

Videatur Sal per incinerationem paratus.

CINERES CLAVELLATI DEPURATI.

Cineres clavellati dissolvantur aqua frigida, solutio filtrata inspissetur.

Cineres clavellati, cum non solum ab omnibus sordibus sed a Tartaro quoque Vitriolato, qui ipsis crebro immixtus est, liberentur, adhibentur ubicunque indicatio Alkali fixum adhiberi jubet. Cum autem Cineres clavellati non raro Salem communem contineant, ad usus Chemicos ista depuratio non sufficit.

CINNABARIS ANTIMONII.

Videatur Antimonii Cinnabaris.

CINNABARIS CREMOR *Jungkenii.*

Cinnabaris supra Porphyriten lævigata coquatur cum Aqua in vase terreo, quæ inde superficiei aquæ supernatant cuticulæ colligantur, exsiccentur & in pulverem terantur.

Obtinetur hac ratione Cinnabaris admodum tenera, illisque maxime commendabilis, qui ex principiis mechanicis, quomodo Sanguinem subire possit, explicare conantur.

CINNABARIS FACTITIA *Geber.*

℞. Florum Sulphuris partem unam: Fundantur in vase terreo, & ipsi sub perpetua ope pistilli ferrei agitatione adjiciantur.

Mercurii vivi partes septem.

Ubi omnia in pulverem tenerrimum abierint, hic committatur Cucurbitæ & Sublimetur; prima sub Sublimatione si non omnis pulchre splendet & cohæret pulverisata, Sublimetur denuo; rite Subli-

blimata supra Porphyriten in tenerri-
mum pulverem trita affervetur.

Neutiquam a cinnabaris reliqua differt.

CINNABARIS NATIVA PRÆPARATA.

Cinnabaris in pulverem trita ex Cu-
curbita Sublimatur, ut ab omnibus he-
terogeneis liberetur, Sublimata supra
Porphyriten lævigatur.

De ejus viribus jam sermo fuit.

CLARETA LIQUEURS.

Parantur sive ex partibus Vegetabi-
lium cum Vino infusis, quibus Spiritus
Vini quarta ratione Vini pars, & ter-
tia Sacchari adjicitur, sive ex Succis
Fructuum, quibus æquæ partes spiritus
Vini & duæ trientes Sacchari commi-
scentur, sive ex Vegetalibus cum Spiri-
tu Vini maceratis, quibus octava pars
aquæ ratione Spiritus Vini additur, Spi-
ritus calore Balnei Mariæ inde evoca-
tur & Syrupo, qui Saccharum in pari
cum Spiritu ratione habet, commisce-
tur; sive ex partibus anaticis Aquæ de-
stillatæ odoratæ & Spiritus Vini, quibus
mixtis eorum ponderis quarta pars Sac-
chari & Olei cujusdam destillati aliquot
guttæ adjiciuntur; ita CLARETUM
ANISI, CINNAMOMI, MENTHÆ,
PIPERITIDIS, quod EAU DE CHAS-
SEURS appellatur &c. parari possunt.
Claretum quovis modo paratum per Fil-
trum trajicitur.

*Clareta vix scopo medicato exhibentur,
potius voluptatis gratia bibuntur: eorum ope
Digestio omnino potest juvari, si Ventriculo
cibo repleto committuntur.*

Ut plurimum proprium Artificum ge-
nus circa eorum præparationem occupa-
tum est; usitatissimorum parandi ra-
tionem ex Cl. Machy Art. du Destillateur
Liquoriste exhibeo.

CLARETUM EAU DIVINE.

Videatur Aqua divina.

CLARETUM BARBADENSE.

℞. Flavedinem pomorum Citri numero
sex.

Cinnamomi uncias duas:

Incisa & contusa infundantur per sex
dies cum

Spiritus Vini unciis ducentis quin-
quaginta sex, addantur

Aquæ uncia triginta duæ:

Ex Vesica inde destillentur uncia du-
centæ sexaginta quatuor, quibus com-
misceantur

Aquæ uncia sexaginta quatuor,

Sacchari uncia centum viginti octo:

Relinquantur per quatuordecim dies &
filtrentur.

Si uncia Spiritus modo centum vigin-
ti & octo Destillatione eliciuntur, &
Sacchari unciis octo & quadraginta in
Aquæ unciis centum octo & viginti dis-
solutis, edulcorantur, Liquor *Cremor
Barbadensis* dicitur.

CLARETUM CACAO.

℞. Nucum Cacao decorticatarum & to-
starum uncias sexdecim,

Cinnamomi unciam unam,

Vanigliæ drachmas duas,

Caryophyllorum drachmam unam,

Contusa infundantur per octiduum in
Spiritus Vini unciis centum octo &
viginti:

Filtratis addatur

Spiritus paratus ex

Nucum Cacao decorticatarum & to-
starum unciis duabus & triginta,

Cinnamomi uncia una,

Contusis per sex dies, infusis cum

Spiritus Vini unciis centum viginti
& octo

& unde Destillationis ope Spiritus un-
cia sexaginta & quatuor erant elicita ::

Adjiciantur Sacchari uncia quatuor &
sexaginta dissolutæ in centum viginti &
octo unciis Aquæ;

Elapsis quatuordecim diebus Liquor
filtretur.

CLARETUM CAFFÉE.

Paratur ut antecedens, præterquam quod Nucibus Cacao substituantur Nuclei Caffée, & Aromata, Vaniglia excepta, omittantur.

CLARETUM CORONARIUM EAU
de Bouquet.

℞. Caryophyllorum drachmam unam,
Ligni Rhodii drachmas duas:
Iacifa & contusa infundantur per octiduum cum Spiritus Vini unciis centum viginti & octo:
Destillando inde elicitis sex & nonaginta unciis Spiritus addantur
Olei Jasmini scrupulus unus,
Vanillæ contusæ scrupulus dimidius,
Radice Ireos Florentinæ contusæ drachmæ duæ,
Sacchari unciæ triginta duæ, in totidem unciis Aquæ solutæ,
Ambra gryfæ, Saccharo tritæ, granum unum:
Elapsis octo diebus filtrentur.

CLARETUM FLORUM AURANTIORUM,
HUILE DE FLEURS D'ORANGE *dictum.*

℞. Florum Aurantiorum uncias sedecim:
Infundantur per mensem cum Spiritus Vini unciis sex & quinquaginta:
Coletur liquor valida expressione, adjiciantur
Sacchari unciæ quadraginta dissolutæ in
Aquæ unciis octo & viginti:
Elapsis quatuordecim diebus filtretur.

CLARETUM FRUCTUUM.

℞. Cerasorum dulcium maturorum partes triginta,
Ribesiorum partes duodecim,
Ruborum Idæorum partes sex:
Contundantur & infundantur per mensem cum
Tom. II

Spiritus Vini pari quantitate:
Succi ope preli expressi unciis quingentis & duodecim addantur
Caryophyllorum contusorum numero quadraginta octo:
Vanigliæ filiqua una,
Sacchari unciæ nonaginta sex:
Elapso mense Liquor filtretur.

CLARETUM *de Garus.*

Videatur Elixir de Garus.

CLARETUM NUCLEORUM.

℞. Nucleorum Perficorum num. centum:
Integri infundantur per mensem cum Spiritus Vini unciis duabus & triginta:
Addantur
Vanigliæ, Saccharo tritæ, grana sex,
Sacchari unciæ octo,
Post diem decimum quartum Liquor filtretur.

CLARETUM, HUILE *de VENUS*
dictum.

℞. Seminum Carvi drachmas decem,
Dauci drachmas quinque,
Macis scrupulos quinque:
Contusa infundantur per quatrimum in Spiritus Vini trecentis & viginti unciis:
Addantur
Sacchari unciæ ducentæ & quadraginta,
Aquæ unciæ centum & viginti,
Crocii quantum satis ad colorandum:
Filtrentur.

CLARETUM EX SEMINIBUS CARNI-NATIVIS, ROSSOLIS *de SIX*
GRAINS *Parisiensium.*

℞. Seminum Anisi,
Anethi,
Fœniculi,
Coriandri,
Carvi,
Dauci Cretici ana unciam unam:
Contusa infundantur per mensem cum
F Spi-

Spiritus Vini unciis ducentis & triginta:
Addantur

Sacchari,

Aquæ ana uncia quadraginta:

Filtrentur.

Hoc Claretum se non tam saporis suavitate, quam virtute Carminativa commendat.

CLYSMA CARMINATIVUM *Richard.*

℞. Baccarum Juniperi,
Seminum Anisi,

Cumini ana drachmas duas:

Contusa coquantur in Aquæ unciis fedecim ad remanentiam

Unciarum duodecim, quibus dissolvatur
Saponis Veneti uncia dimidia.

CLYSMA COMMUNE *Londinensium.*

℞. Herbarum Malvæ unciam unam,
Florum Chamomillæ,
Seminis Fœniculi ana unciam dimidiam:

Incisa & contusa coquantur cum
Aquæ unciis duodecim:

Colentur.

Effectus Carminativos edit.

CLYSMA EMOLLIENS *Plenckii.*

℞. Lactis Vaccini,
Olei Lini ana uncias quatuor:
Misceantur.

In Tenesmo, Inflammatione Intestinalium, Uteri ac Vesicæ cum successu injicitur.

CLYSMA LENIENS *Richard.*

℞. Seminis Lini unciam dimidiam:
Contusæ & in Aquæ unciis decem ad uncias sex decoctæ
Addantur

Olei Lini uncia duæ.

CLYSMA NUTRIENS *Plenckii.*

℞. Jusculi Carnis Bovinæ.
Lactis Vaccini ana uncias tres,
Gelatinæ Cornu Cervi unciam unam:
Misceantur.

Injicitur Nutrimenti loco quibus Deglutendi impedita facultas est.

CLYSMA OPIATUM *Plenckii.*

℞. Seminis Lini contusi unciam unam:
Infundatur per horam cum
Aquæ fervidæ unciis sex:

Colatura dissolvantur

Extracti Opii grana duo.

Scopo Anodyno & Antispasmodico injicitur.

CLYSMA SIMPLEX *Richard.*

℞. Foliorum Malvæ manipulum unum:
Incisus coquatur Aquæ unciis fedecim ad uncias duodecim:

Colatis dissolvantur

Saponis Veneti drachmæ duæ.

Adhibetur ad reserandam Alvum.

CLYSMA ad SOPOROSOS AFFECTUS
Richard.

℞. Foliorum Sennæ,
Salis communis ana unciam semis:
Incisa cum Aquæ unciis fedecim ad uncias duodecim decoquantur:

Colaturæ addantur

Vini Emetici turbidi uncia duæ.

CLYSMA TEREBINTHINARUM
Plenckii.

℞. Terebinthinæ unciam dimidiam:
Dissolvatur Vitello ovi:
Addantur

Decocti Emollientis uncia decem,
Olei Lini uncia una:

Contra Ascarides & Ulcera Intestinalium injicitur.

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM
Plenckii.

℞. Aquæ Cochleariæ.
Tincturæ Laccæ ana uncias duas,
Spiritus Cochleariæ unciam unam:
Misceantur.

Adhibetur ad Stomacacem & Aphthas curandas.

COLLUTORIUM GINGIVALE, EAU
de MADAME de la URILLIERE
Beaumé.

℞. Herbarum recentium Nasturtii Aquati
uncias sex,
Cochleariæ un-
cias octo,
Flavedinis Corticum Citri unciam
unam semis,
Cinnamomi uncias duas,
Caryophyllorum drachmas sex,
Florum Rosarum rubrarum unciam
unam:

Incisa, contusa infundantur per viginti
quatuor horas cum

Spiritus Vini rectificati unciis octo
& quadraginta:

Destillentur secundum artem.

*Hoc Spiritu aquis partibus Aquæ Cochlea-
riæ mixto Palatum colluitur.*

COLLUTORIUM ODONTALGICUM
Plenckii.

℞. Radicis Pyrethri drachmas duas,
Salis Ammoniaci drachmam unam,
Extracti Opii grana duo,
Aceti,
Aquæ destillatæ Lavendulæ ana uncias
duas:

Incisa & trita infundantur calide per
aliquot horas:

Colatura fervetur.

*Hujus Collutorii Cochlear unum crebrius
de die Ore clauso contentum Odontalgia car-
riosa & rheumatica remedium esse dicitur
haud spernendum.*

COLLYRIUM ADSTRINGENS *Richard.*

℞. Trochiscorum alborum *Rhases* drach-
mam unam,
Vitrioli albi drachmam semis,
Sacchari Saturnini scrupulum semis,
Aquæ Rosarum uncias quatuor.

*Ad Ophthalmiam humidam & Epiphoram
adhibetur.*

COLLYRIUM *Lanfranci.*

℞. Auri pigmenti drachmas duas,
Viridis Æris drachmam unam,
Myrrhæ,
Aloës ana scrupulos duos:

Probe tritis sensim commisceantur
Vini albi unciæ sedecim,
Aquarum Plantaginis,

Rosarum ana unciæ tres:

Misceantur.

*Rarissime ad morbos Oculorum adhibetur,
Ulcera Oris Venerea una aut altera ejus
gutta haud inepte tinguntur; injiciendo quo-
que contra Ulcera Venerea aliarum partium
adhibetur.*

COLLYRIUM RESOLVENS *Richard.*

℞. Sacchari Saturni,
Salis Ammoniaci depurati ana gra-
na tria,

Aquæ fontanæ uncias duodecim:

Dissolvantur

*Laudatur contra Ophthalmiam Scorbuti-
cam.*

COLLYRIUM ROBORANS *Richard.*

℞. Aquæ Rosarum uncias quatuor,
Vini Emetici unciam semis,
Balsami Fioraventi drachmas duas:
Misceantur.

*Conducit ad curandam Ophthalmiam se-
rosam.*

COLLYRIUM SAPPHYRINUM.

Videatur Aqua Ophthalmica cœrulea.

CONCHÆ CITRATÆ *Ratisbonensium.*

Conchis bene ablutis & in pulverem
reductis affundatur iterum iterumque Suc-
cus Citri, usque dum ex affuso nulla am-
plius surgat effervescentia. Inde nata pa-
sta teratur in pulverem.

*Quid vero, quod hac ratione & Conchæ
& Succus Citri reddantur inertes? Ego cer-
te, quam ob causam Medicorum nonnullis*

has Conchas Diureticas esse voluerint, non video?

CONCHÆ PRÆPARATÆ.

Testæ Concharum abluantur primo multum diluto Lixivio vulgari, dein aqua simplici, usque dum hæc cum illis aliquantis per agitata non amplius turbetur; Conchæ ablutæ exsiccentur, in pulverem terantur, supra Porphyriten lævigentur aqua. Ex pulpa inde orta, per infundibulum pennæ ope premenda, efformentur pyramidulæ.

CONDITA.

Cortices aut Radices recentes mundantur, Aqua fontana per biduum macerantur, coquuntur usque dum mollescant, defunditur inde aqua ad usum mox dicendum asservanda; ipsæ denuo aqua abluuntur, utque humor inde secedat super inversum cribrum ponuntur; commissis deinde vasi figulino superfunditur eorum ponderis Sacchari duplum cum Aqua, in qua fuerant decoctæ, ad leviolem consistentiam coctum & despumatum; elapsis aliquot diebus eximuntur Vegetabilia condienda, magis inspissatur Syrupus, & frigidus illis denuo adjicitur, quæ operatio post aliquot dies denuo repetitur.

Drupæ immaturæ acu perforatæ, in Aqua frigida, per sex vel octo dies singulos mutanda, macerantur; quo facto ad mollitiem coquuntur; & cocto Saccharo committuntur.

Poma vix matura, demto cortice & excisis feminibus, absque prævia maceratione ad mollitiem coquuntur & adjiciuntur Saccharo, antequam istud ad consistentiam pervenerit, ut cum eodem adhuc aliquot ebullitiones sustineant.

Baccæ committuntur æquis partibus Sacchari ad consistentiam tabulandi cocti, hoc cum inde diluatur, continuanda est coctio usque dum Saccharo consistentia Tabulandi sit restituta.

In Sacchari coctura parandis Conditis instituenda cavendum, ne ulla resideat spuma neque vas, cui Conditum com-

mittitur, nisi elapsis aliquot diebus, tegatur.

Hoc Præparatorum genus, ab Arabibus ad nos perlatum, cum hodie rarius ad usus medicatos recipiatur, Condita ut plurimum ex Officinis Cupedinariorum petuntur.

CONFECTIO ALKERMES *Mesve* correctæ.

℞. Succii pomorum recentiorum uncias sedecim:

Sacchari albi uncias triginta,
Dissolutis & Clarificatis addantur
Succi granorum Kermes Monspeliensis
uncia sedecim,

Pulveris Cinnamomi uncia semis,
Coccionellæ drachmæ tres,

Foliorum Auri numero quinquaginta:
Agitentur Spatula lignea in vase lapideo
ad Auri foliati comminutionem.

Si COMPLETA desideratur, addantur
Ambra gryseæ, Saccharo tritæ, scrupulus unus,

Moschi, Saccharo triti, grana decem.

Ab Arabibus etiam nimis laudatum Medicamentum, scopo Analeptico inseruit. Datur ad Drachmam unam. Lapidem Lazuli, cum aliis inertibus, quæ in Veterum occurrunt Compositionibus, expunxi, non quod cum Trillero & multis aliis Auctoribus irritationem Primarum Viarum inde metuum, sed quia ejus vires in ea, qua hanc Confectionem ingredi solet, ratione, omnino nullæ sunt, & quia non raro ipsi Lapidem Armenum, veram utique Cupri glebam, solent substituere. Dosis Confectionis Alkermes una Drachma absolvitur.

Completa plane non differt ratione virium a Confectione Alkermes Regia Charas.

CONFECTIO ANISI LAXATIVA

Jungken.

℞. Seminis Anisi probe purgati uncias tres,

Immittantur Aheno latiori funde instructo, tepefactis adjiciantur

Sacchari ad consistentiam Tabulandi cocti uncia viginti quatuor

Ea lege, ut primum ejus aliquot cochlea-

CONFECTIO.

chlearia Semini superfundantur, & dein inspergatur Pulvis ex

Resinæ Jalappæ, nucleis Pinei probe tritæ, drachmis tribus cum dimidia

Pulveris Cinnamomi drachmis duabus paratus, agitentur probe usque dum sicca appareant; denuo aliquot cochlearia adjiciantur & agitentur & hæc repetantur usque dum omne Saccharum adhibitum fuerit.

Hac ratione omnes *Confectiones Sicca* parantur, quæ autem hodie ut plurimum a Cupedinariis petuntur.

Olim Confectio Anisi laxativa multo in usu erat, hodie cum reliquis Purgantibus Resinosi variis usurpatur. Pueris atque illis qui alia medicamenta Laxantia reformidant, inservire potest. Uncia una octo circiter grana Resinæ habet.

CONFECTIO CINNAMOMI REGIA
Mynsichti.

℞. Chocolateæ uncias quatuor,
Nucum Indicarum Conditarum numero tres:

Probe contusis addantur
Confectionis Alkermes uncia una,
Olei Cinnamomi drachma semis,
Syrupi Cinnamomi uncia sex:

Probe omnia misceantur.
Analepticum gratissimum egregiumque Stomachicum hæc Confectio præbet; datur ad drachmam unam pro Dosi.

CONFECTIO HAMECH *Rhazes* correctæ.

℞. Radicum Polypodii drachmas octodecim,

Prunorum dulcium
Passularum ana uncias octo,
Myrobalanorum citrinarum uncias sex,
Herbarum Absynthii vulgaris unciam dimidiam,

Thymi unciam unam.

Cuscute uncias duas,

Rhabarbari uncias duas cum dimidia,
Foliorum Sennæ unciam unam,
Colocynthis a Seminibus purgatæ,
Agarici albi ana drachmas octodecim,

CONFECTIO.

45

Florum Rosarum rubrarum,
Seminum Anisi,

Fœniculi ana drachmas sex,
Violarum uncias duas:

Incisa & contusa macerentur per horas viginti quatuor cum

Seri Lactis Vaccini Ducentis octoginta octo unciis:

Deinde bulliant per horam; fiat colatura sub valida expressione; residuum bulliat cum

Aquæ ducentis & sexaginta unciis per semi horam; decoctum fortiter exprimatur & priori adjiciatur; omnis liquor postquam per viginti quatuor horas repositus fuerit, decantetur a fœcibus, quas deposuit, & blando calore vaporet ad consumptionem tertiæ partis; ipsi addantur

Sacchari uncia octodecim,
Coquantur ad consistentiam Syrupi tenuioris, in quo dissolvantur

Mannæ uncia duæ,

Pulpæ Cassiæ uncia quatuor,

Tamarindorum uncia quinque:

His refrigeratis, addatur & probe immisceatur Pulvis constans ex

Diacrydii unciam unam semis,

Myrobalanorum drachmis octodecim,

Rhabarbari drachmis tribus,

Seminis Anisi,

Spicæ Nardi ana drachmis duabus.

Schulz l.c. eam Plantis Pedum impositam ad referendam Alvum commendat. Ego inconcinnam compositionem omissem, nisi constaret, illam vel hodie adhuc ad unciam unam usque morbis Cutaneis & Venereis laborantibus exhiberi, Clysmatibus quoque ubi Alvus pertinaciter clausa est adhiberi.

CONFECTIO de HYACINTHO *Avicennæ a Parisiensibus* correctæ.

℞. Pulveris Croci uncia semis,
Syrupi Citri e toto uncias duas & triginta:

Probe mixtis addantur

Lapidum Hyacinthi præparatorum uncias semis,

Oculorum Cancrorum, præparatorum,
Pul-

Pulverum Terræ sigillatæ ana uncia
tres,
Cinnamomi uncia una,
Dictamni Cretici,
Santali Citrini ana dra-
chmæ tres,
Myrrhæ electæ drachmæ
duæ:

Misceantur.

*Huic medicamento olim ob Gemmas, qua-
rum plures recipiebat, vires Cordiales ma-
xime adscribebantur, cum autem Gemmas
intertes esse constet, non nisi Lapis Hyacinthi,
a quo denominationem accepit, retinetur.
Ita correctum in nimis Hamorrhagiis &
aliis Fluxionibus moderandis ad drachmam
integram cum fructu exhibetur.*

CONFECTIO de REBECHA Renodæi.

Videantur Trochisci Becchici albi.

CONFECTIO UNIVERSALIS.

Videatur Electuarium Catholicum du-
plicatum.

CONSERVÆ.

Sunt Vegetabilia, quæ non exsiccata,
ope Sacchari a corruptione defenduntur,
& ita absque ulla principiorum jactura
conservantur. Hoc scopo hæ substan-
tiæ ope pistilli lignei in mortario la-
pideo cominuantur in pulpam tener-
rimam, cui duplum Sacchari adjicitur
& tundendo cum eis miscetur exactis-
sime.

Conservæ ex *Fruëtibus* parantur, ho-
rum pulpam per cribrum trajiciendo &
cum Saccharo miscendo. Medicamenta,
quæ ex Vegetabilibus siccis ope Aquæ
& Sacchari parantur, non Conservæ sunt,
sed Electuaria. Si Conservarum unciis
duodecim adjiciuntur drachmæ duæ Spi-
ritus Vitrioli, appellantur VITRIO-
LATÆ.

CONSERVA SPAGYRICA *Emmerici*
VISCERALIS *Argentoratensium*
correcta.

℞. Salis Absynthii uncias tres cum dra-
chmis sex,
Cinnamomi drachmas duas,
Macis,
Caryophyllorum,
Zinziberis ana drachmam unam,
Tartari Vitriolati uncia unam &
drachmas sex,
Sacchari albi uncias octo:

In tenuissimum Pulverem redactis ad-
dantur

Conservarum Rosarum rubrarum un-
ciæ sedecim,

Tunicæ uncia octo,

Spiritus Vitrioli drachmæ duæ,

Oleorum destillatorum Anisi,

Citri ana dra-
chma una,

Fœniculi dra-
chma semis,

Cinnamomi
scrupulus u-

nus,

Menthæ gut-
tæ quatuor;

Misceantur optime.

*Laudatur ad Viscera roboranda eorumque
Obstructiones referandas. Datur ad drach-
mam unam.*

CORALLIA PRÆPARATA.

Parantur sine prævia ablutione, in mo-
dum Concharum.

CORNU CERVI AURATUM

Noricorum.

℞. Croci Solis *Noricorum* scrupulos qua-
tuor,

Cornu Cervi philosophice præparati
unciam unam:

Misceantur.

*Medicamentum in Variolis, Morbillis, Fe-
bribusque malignis Sudoriferum esse & Cor-
diale præstare dicitur; cum autem utrumque
ejus*

ejus ingreditens iners sit, quid inde sit sperandum, facile patet.

CORNU CERVI PHILOSOPHICE SEU SINE IGNE PARATUM *Augustanorum.*

Cornu Cervi apices coquantur cum Aqua, usque dum mollescant, eximitur inde cultri ope medulla, separatur externus nigricans cortex, siccantur & in Pulverem reducuntur.

Quivis videt Cornu Cervi hac ratione maxima portione suæ Gelatinæ, unde omnis ejus vis medicata pendet, privatam iners omnino evasurum.

CORNU CERVI USTUM *Galenii.*

Cornua Cervina, in frustra dissecta, inter medios carbones candentes detinentur usque dum tota alba evadant, nec in diffractis ulterius aliquid nigri appareat.

Frustra ab inerti terra aliquid medicati expectatur, nec Aqua cum eo cocta plures quam ex Silice recipiet virtutes.

CORNU CERVI USTUM PRÆPARATUM.

Paratur in modum Coralliorum præparatorum.

Ad Polienda Metalla maxime adhibetur.

CORNUUM PRÆPARATIO.

Lima in scobem reducuntur, quæ in tenuissimum Pulverem, per linteum tenue trajiciendum, reducitur.

COSMETICUM CLAVII.

Videatur Magisterium Marcasitæ.

CREMOR TARTARI.

Conficitur ex Crystallis Tartari in Pulverem redigendis.

CROCUS ANTIMONII.

Videatur Crocus Metallorum.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

Hoc nomine *Würtembergensibus & Brunsvicensibus* venit Vitriolum ad rubedinem calcinatum; *Parisiensibus & Argentoratensibus* Limatura Martis calcinata.

Ad Usum internum non adhibetur, sed Emplastris Exsiccantibus & Adstringentibus additur.

CROCUS MARTIS APÉRITIVUS.

Hoc nomine venit sive secundum *Zuwoelffer* Ferrum ex Vitriolo dejectum & præcipitatum, quod minus bene calcinari jubent, sive præunte *Lemery* Rubigo Lota.

Calcibus evidenter Adstringentibus minus bene vires Aperientes adscribuntur.

CROCUS MARTIS APÉRITIVUS ANTIMONIATUS *Stablii.*

Scoriæ Reguli Antimonii Martialis reponantur in cellam usque dum in pulverem dilabantur, hic Pulvis agitur cum Aqua, quæ inde turbida post aliquam moram defundatur; affundatur pulveri nova Aqua, agitata denuo decantetur & hæc continentur, usque dum nova affusa Aqua inde ulterius parum aut plane non turbetur; hæc aquæ turbidæ inter se confusæ reponantur in quietem, Pulvis inde secedens Detonetur cum Nitri triplo, & edulcoratus asservetur.

Hoc Medicamentum in Hæmorrhagiis Uteri, Hæmorrhoidum nimio Fluxu, Diarrhæa, Febribus intermittentibus, laudabilem & præsentaneam sæpe operam navare Stahlius testatur; se ipsum in Lochialibus Puerperarum turbis, Spasticis etiam, nec non in Atrophicis Puerorum affectibus per frequenter Croco hoc usum esse affirmat, quin ipsi Cortici peruviano longissime præferendum ducit. Ultra grana sex ejus Dosis non extendendam volunt.

CROCUS METALLORUM *Quercetani*.
CROCUS ANTIMONII.

Est Hepar Antimonii Aqua fervida edulcoratum.

Vehemens Emeticum nunquam in substantia præbendum, grana tria vel quatuor per noctem in Vini unciis duabus infusa Vinum virtute Emetica imbuunt. Veterinarii ad Equos Purgandos pro una dosi ad unciam semis imo ad drachmas sex devorandum exhibent.

CROCUS SOLIS *Noricorum*.

℞. Nitri depurati uncias decem,
Aluminis uncias octo,
Salis communis uncias quinque,
Foliorum Auri unciam semis:

Mixta terantur usque dum Aurum disparuerit; dissolvantur Aqua fervida; solutioni adjicitur Oleum Tartari per deliquium; Aurum inde dejectum Aqua fervida probe edulcoretur, & dein in Crucibulo calcinetur, usque dum colorem violaceum induerit.

Vires Cordiales & Bezoardicas, quas olim huic Calci affinxerunt; nullas esse, hodie uberrime est evictum.

CRYSTALLI LUNÆ.

Videatur Lapis Infernalis.

CRYSTALLUM MINERALE.

Videatur Lapis Prunellæ.

CRYSTALLUS MONTANA
PRÆPARATA.

Fragmenta Crystalli montanæ ignita Aqua extinguantur, reducantur in Pulverem, & tractentur ut sub Coralliis dictum fuit.

CUPRUM ANTIMONIATUM.

Videatur Specificum Antepilepticum *Weismanni*.

DECOCTUM ALBUM *Sydenhami*
correctum.

℞. Rasuræ Cornu Cervi
Micæ Panis Tritici albissimi ana un-
ciam semis:

Coquantur ex
Aquæ fontanæ unciis triginta sex,
Ad residuas uncias quatuor & viginti:
Colatura dissolvantur
Gummi Arabici drachma una semis,
Sacchari drachmæ duæ.

*In Febribus ad Æstum Sitimque refrenan-
dam laudatur.*

DECOCTUM AMARUM *Parisiensium*.

℞. Radicis Gentianæ drachmas duas:
Bulliant per horæ semiquadrantem in
Aquæ communis unciis octo & qua-
draginta:

Tum addantur
Summitatum Centaurei minoris,
Herbarum Cardui benedicti,
Scordii,
Flavedinis Corticum Citri recentis
ana drachmæ duæ,

Infundantur in vase tecto usque dum
Decoctum frigidum evaserit, quod dein-
de decantetur.

*Bibitur per Cyathos pro roborandis Primis
Viis & reserandis Visceribus Abdominalibus.*

DECOCTUM ANTIPSORICUM
Suecorum.

℞. Rasuræ Lignorum Guajaci sesqui un-
ciam,
Juniperi unciam
unam,

Radicis Chinæ conscissæ uncia semis:
Immittantur in

Aquæ fontanæ uncias septuaginta duas:
Addantur

Argenti vivi,
Antimonii contusi ana uncia sex:
Sacculo linteo inclusa coquantur ad
dimidium, sub finem

Addatur
Radicis Liquiritiæ uncia semis:

Cum

DECOCTUM.

Cum semel adhuc ebulliverint, colentur.

Pro Sanguine depurando, in morbis Scabiosis & Venereis conducit.

DECOCTUM ANTISCORBUTICUM

Richard.

℞. Radicum Raphani rusticani uncias duas:

Coquantur per horæ quadrantem ex Aquæ unciis octoginta:

Tunc addantur

Herbarum recentium Beccabungæ,
Nasturtii aquatici,
Cochleariæ,
Acetosæ ana pugilli duo,

Paululum coquantur, colentur & addantur Aceti uncia quatuor.

Exhibetur per Cyathos.

DECOCTUM ANTIVENEREUM

Ulyssiponense.

℞. Lignorum Santali albi, rubri ana uncias tres,

Rhodii,
Guajaci,
Sassafras ana unciam unam,

Radice Sarsaparillæ uncias tres,
Antimonii uncias duas,
Corticum Mezeræi unciam dimidiam:

Incisa & contusa infundantur per nycthemerum cum

Aquæ fontanæ bullientis unciis centum & viginti:

Coquantur deinde ad dimidium, sub finem adjiciantur

Radice Liquiritiæ uncia dimidia:

Colentur.

Multum tam ad Luem Veneream curandam, quam ad auferenda mala, que curam Mercurialem excipere solent, laudatur. Ejus uncia octodecim ad quadraginta octo usque de die exhibentur.

DECOCTUM.

49

DECOCTUM ANTIVENEREUM

LAXANS Parisiense.

℞. Rafuræ Ligni Guajaci,
Radicum Sarsaparillæ,
Chinæ ana drachmas duas,
Antimonii unciam unam:

Incisa & contusa coquantur ex

Aquæ fontanæ unciis duabus & triginta

Ad remanentiam unciarum quatuor & viginti:

Tunc addantur

Radicum Polypodii uncia semis,
Rhabarbari electi drachma semis,
Liquiritiæ,

Foliorum Sennæ sine stipitibus

Ligni Sassafras ana drachma una,

Salis Tartari grana quatuor,

Seminis Coriandri drachma dimidia:

Incisa & contusa infundantur per noctem, mane semel bulliant & deinde colentur

Hoc Decoctum usui Mercurii interponitur, integra Dosis de die hauritur, augendæ etiam apud robustiores sunt Purgantium rationes.

DECOCTUM AVENACEUM *Lowveri.*

℞. Avenæ excorticatæ uncias tres,
Ligni Santali rubri incisi drachmas duas:

Coquantur cum

Aquæ fontanæ unciis duabus & septuaginta.

Ad trientis consumptionem, Colaturæ addantur

Nitri depurati drachmæ duæ,
Sacchari albi uncia una.

Humores diluit, Æstum temperat, pro Potu ordinario assumi potest.

DECOCTUM CHINÆ RADICIS

Suecorum.

℞. Radice Chinæ,
Passularum minorum ana unciam unam:

Incisa coquantur ex

Aquæ fontanæ unciis duabus & septuaginta:

Ad consumptionem quadrantis. Colentur.
*Ad Sanguinem temperandum aliquot ejus
 Cyathi hauriuntur de die.*

DECOCTUM CITRI *Mynsichti.*

℞. Malorum Citri numero quinque,
 In taleolos tenues & rotundos secta
 coquantur
 Aquæ fontanæ unciis duabus & se-
 ptuaginta

Ad consumptionem trientis:

Colatura dissolvantur

Sacchari albillimi uncia quatuor.

*Decoctum gratissimum in omni Februm
 genere, nec non in morbis Biliosis pro Potu
 ordinario bibitur.*

Si loco Aquæ Decoctum Hordei aut
 Cornu Cervi recipitur, surgit DECO-
 CTUM HORDEI aut CORNU CERVI
 CITRATUM.

DECOCTUM COMMUNE, sive PTI-
SANA COMMUNIS *Parisiensium.*

℞. Hordei depurati uncias duas,
 Radicis Graminis incisæ unciam unā:
 Coquantur ex
 Aquæ fontanæ centum octo & viginti
 unciis
 Ad residuas uncias sex & nonaginta:
 Sub finem cocturæ addatur
 Radicis Liquiritiæ incisæ uncia semis:
 Coletur.

DECOCTUM DIURETICUM *Richard.*

℞. Radicum Petroselini,
 Fœniculi ana unciam unam,
 Seminum Dauci sylvestris,
 Fructuum Alkekengi ana unciam
 semis:
 Incisa & contusa coquantur ex
 Aquæ fontanæ unciis sexaginta,
 Ad residuas uncias octo & quadraginta:
 Sub finem addantur
 Herbæ Parietariæ manipulus unus,
 Passularum majorum incisarum uncia
 semis:
 Colatura dissolvantur
 Nitri depurati drachmæ duæ.

DECOCTUM FEBRIFUGUM *Richard.*

℞. Corticis Chinæ electi uncias duas:
 Coquantur per dimidiam horam cum
 Aquæ unciis sex & nonaginta:
 Colatura dissolvatur
 Nitri depurati drachma una.
*Quater de die exhibetur Cyathus ad pel-
 lendam Febrem.*

DECOCTUM seu APOZEMA FEBRI-
FUGUM LAXANS *Richard.*

℞. Corticis Chinæ electi & crasse contusi
 uncias duas,
 Coquantur ex
 Aquæ fontanæ unciis nonaginta sex,
 Ad residuas uncias quatuor & se-
 ptuaginta:
 Sub finem addantur
 Herbarum recentium Cichorii sylve-
 stris,
 Endiviæ ana pu-
 gilli duo,
 Foliorum Sennæ uncia dimidia:
 Colaturæ adjiciantur
 Salis mirabilis Glauberi uncia semis,
 Syrupi Cichorei cum Rhabarbaro un-
 ciæ duæ.
*Priori substituitur, ubi suspicio est, Viscera
 Abdominalia non omnino esse libera.*

DECOCTUM AD FUNGOS ARTICU-
LORUM *Heisteri.*

℞. Lithargyrii uncias sex,
 Boli Armenæ unciam unam,
 Mastiches,
 Myrrhæ ana unciam dimidiam,
 Aceti uncias quatuor & viginti:
 Mixta coquantur leni igne per dimidiam
 horam.
Applicatur sub forma Fomenti.

DECOCTUM HORDEI CITRATUM.

Videatur Decoctum Citri.

DECOCTUM HORDEI *Suecorum.*

℞. Hordei integri uncias tres,
Radicum Graminis concifarum un-
ciam unam,
Aquæ fontanæ unias centum & vi-
ginti:

Coquantur ad uncias usque nonagin-
ta sex:

Colaturæ si addantur Oxymellis simpli-
cis uncia quatuor,
ACIDULATUM dicitur.

*In Febribus, Hemorrhagiis, Fluxibus
Alvi, Morbis biliosis &c. in Potus ordina-
rii vicem cum summo successu bibitur.*

DECOCTUM IPECACUANHÆ

Pisonis.

℞. Radicis Ipecacuanhæ crasse contusæ
drachmas duas:

Decoquantur lento igne ex
Aquæ fontanæ unciis quatuor
Ad trientis consumptionem:

Coletur.
Residuum rursus coquatur ex
Aquæ unciis quatuor; ut antecedens
coletur.

Denuo decoquatur residuum, modo
dicta ratione.

*Decocta singula dentur pro Dosi Dysen-
tericis tribus diebus continuis.*

DECOCTUM LAPATHI *Richard.*

℞. Radicum Lopathi acuti uncias duas,
Enulæ Campanæ,
Baccarum Juniperi ana unciam semis:

Incisa & contusa coquantur ex
Aquæ unciis duabus & septuaginta
Ad dodrantis evaporationem:

Sub finem addatur
Herbæ Fumariæ incisæ manipulus
unus:

Colentur.
*In morbis Cutaneis ad Sanguinem depu-
randum per Cyathos exhibetur.*

DECOCTUM LIGNORUM

Brunsvicensium.

℞. Rasuræ Ligni Guajaci
Juniperi,
Radicum Bardanæ ana unciam unam
semis:

Scrophulariæ,
Stipitum Dulcamaræ,
Herbæ Saponariæ cum toto ana un-
ciam semis:

Incisa coquantur cum
Aquæ fontanæ unciis centum & qua-
draginta quatuor ad dimidias:
Sub finem coctionis addantur:
Rasuræ Ligni Sassafras uncia semis,
Radicis Liquiritiæ incisæ,
Seminis Anisi contusi ana drachmæ
duæ. Colentur.

*Ad Sanguinem depurandum aliquot Cyathi
de die bibuntur.*

DECOCTUM PECTORALE

Parisiensium.

℞. Oryzæ mundatæ unciam unam:
Coquatur cum
Aquæ fontanæ contum viginti octo
unciis ad crepaturam Oryzæ:
Cum hoc Decocto infundantur per horæ
quadrantem

Radicum Liquiritiæ incisæ,
Althææ incisæ ana uncia
semis,

Herbæ Capillorum Veneris Canaden-
sis conscissæ,
Florum Farfaræ ana drachmæ duæ,
Papaveris Rhæados inciso-
rum drachma una.

*Liquor decantatus in affectibus Pectoris
spasticis ex vasculis infuso Theæ dicatis
aliquoties de die hauritur.*

DECOCTUM SUDORIFERUM

Richard.

℞. Ligni Guajaci uncias duas:
Radicum Sarsaparillæ,
Radicum Chinæ ana uncia semis,
Antimonii ⁷crudi uncias duas:

Incisa & contusa macerentur per nycthemerum in

Aquæ calidæ unciis sex & nonaginta, Bulliant in vase obturato horæ unius spatio, tunc adjiciantur

Rasuræ Ligni Sassafras uncia una,
Radicum Caryophyllatæ incisarum
uncia semis,

Baccarum Juniperi contusarum drachmæ duæ:

Bulliant adhuc per horæ quadrantem, deinde colentur.

In Affectibus Venereis, Catarrhalibus & Cutaneis aliquot ejus Cyathi hauriuntur.

Si sub finem coctionis adjicitur Foliorum Sennæ incisorum uncia una, surgit DECOCTUM SUDORIFICUM LAXANS. Eiusdem conferantur Species pro Decoctis.

DENTIUM PRÆPARATIO.

Eodem modo quo Coralliorum præparatio instituitur.

DIACRYDIUM, DACRYDIUM.

Est Scammoneum usui interno adaptatum. Veteres illud ex Decocto Glycyrrhyzæ vel Infuso Rosarum suspendere, ortam inde Emulsionem ad formam Extracti evaporare, vel in pulverem reductum vaporibus Sulphuris exponere soliti, corrigi his rationibus ejus virulentiam putarunt. Hinc DIACRYDIUM GLYZYRHIZATUM, ROSATUM, SULPHURATUM præscripserunt. Verum enim vero omnes has ita dictas correctiones inanes esse experientia docuit. Itaque hodie sub nomine DIACRYDII non nisi Scammoneum in pulverem tritum prostat, quod usus tempore cum Nucleis Pineis teritur.

DIACODION *Montani.*

Videatur Syrupus Diacodii.

DIACYDONIUM AROMATICUM

Mesue correctum.

℞. Succii Cydoniorum uncias centum quadraginta & quatuor,
Sacchari albi uncias duas & septuaginta:

Coquantur ad consistentiam Syrupi tenuioris, cui Clarificato & adhuc tepenti adjiciantur

Pulverum Nucum Moschatarum,
Cinnamomi ana uncia
quatuor,
Caryophyllorum,
Zinziberis,
Galangæ ana uncia duæ,
Nardi Celticæ,
Piperis nigri,
Macis,
Zedoariæ,
Cubearum,
Cardamomi minoris ana
uncia una:

Probe misceantur.

Exhibetur ad roborandum Ventriculum & sistendos Alvi fluxus, nec non Vomitus.

DIACYDONIUM JALAPPINUM.

℞. Diacydonii simplicis uncias & triginta,

Resinæ Jalappæ, Nucleis Pineis tritæ, uncias duas:

Diu inter se invicem agitentur, ut aqualiter Resina per omne volumen Diacydonii dispergatur.

Optime Resina Jalappæ Scammoneo, quod Valerius Cordus præscribit, substituitur. Hoc medicamento olim Nostrates loco Purgantis polychresti utebantur; aqua solutum infantibus aequè ac adultis exhibetur.

Uncia semis Resinæ grana quindecim debet.

DIACYDONIUM LUCIDUM JALAPPINUM.

Diacydonii simplicis ad consistentiam cocti & adhuc tepentis unciis quatuor & sexaginta commiscentur

Resinæ Jalappæ in Spiritus Vini Rectificati

DIGESTIVUM.

ficati unciis duodecim dissolutæ unciæ quatuor:

Effundatur in modulos & refrigeratum committatur scatulis.

Olim per se deglutiendum eadem ac antecedens dosi exhibebatur; hodie merito evuluit, cum oculis quidem neququam autem lingue gratum sit. Hic quoque melius Resina Falappæ, quam Scammonium, quod VVelschius præcipit, recipitur.

DIACYDONIUM SIMPLEX LUCIDUM
Galeri vel GELATINA CYDONIORUM.

℞. Cydoniorum, unde lintei ope omne tomentum ablatum fuit, unciis centum viginti & octo:

Scindantur in taleolas & omnia Scimina inde auferantur; coquantur ex Aqua usque dum emollita fuerint, committantur cum Aqua facco, & valde exprimantur;

In Liquore expresso dissolvantur

Sacchari unciæ sex & nonaginta, Clarificentur aliquot Albuminibus Ovorum; Liquor clarificatus leni calore evaporetur, usque dum aliquot ejus Gutta disco frigido instillatæ in modum Gelatinæ consistant, tunc committatur ollis, non nisi Gelatina refrigerata operiendis.

Et Gustus voluptati & roborando Ventriculo & cohibendis Alvi fluxibus inservit.

DIAPHORETICUM JOVIALE.

Videatur Antihecticum Poterii.

DIAPHORETICUM seu BEZOARDICUM MARTIALE.

Videatur Bezoardicum Martiale.

DIGESTIVUM LIQUEFACTUM Plenck.

℞. Terebinthinæ claræ unciæ duas:
Subigantur

Vitelli Ovorum unciæ una:

Addantur

Mellis unciæ duæ,

Aquæ fontanæ unciæ quatuor,

ELÆOSACCHARA.

53

Spiritus Vini unciæ sex;

Misceantur.

Calide injectum in Vulnere profunda, angusta, sinuosa & sclopetaria Suppurationem movet & detergit.

EBUR USTUM ALBUM SEU SPODIUM
Valerii Cordi.

Ebur in tenues lamellas dissectum igne aperto calcinetur ad albedinem; Calcinatam reducatur in pulverem super Marmore lævigandum.

Cum Cornu Cervi isto Preparato convenit.

EBUR USTUM NIGRUM.

Fragmentis Eboris repletur olla, quæ operculo, Lini ope, probe tegitur & fornaci figuli per omne tempus, quo vasa Argillacea uruntur, committitur; ustum in modum antecedentis lævigatur.

Artifices eo ad tingendas varias substantias utuntur.

ECLEGMA.

Videatur Loch.

ELÆOSACCHARA.

Parantur cujuscunque Olei destillati Guttas decem cum unciæ una pulveris Sacchari albissimi probe terendo.

Usus deinum tempore parentur.

ELÆOSACCHARA AURANTIORUM
vel CITRI, ESSENTIÆ SICCÆ Brunsvicensium.

Optime parantur, dum Poma Aurantium vel Citri Saccharo albissimo affricantur, cui quod inde abhæret madidum abraditur.

Integerrimum, quod horum Pomorum Corticum cellulis continetur, Oleum, cum hac ratione Saccharum subeat, præferenda hæc operatio priori videatur, cum Destillatio his oleis semper aliquid suavitatis adimat.

ELÆOSACCHARUM MYRRHÆ

Hoffmanni.

℞. Extracti Myrrhæ aquosi drachmam unam,
Pulveris Sacchari albissimi unciam unam:

Misceantur probe.

Improprie hoc Medicamentum Elæosaccharum vocari, nemo non videt.

ELATERIUM Hippocratis.

Cucumeres Asinini, antequam penitus maturuerint, collecti in taleolas scindantur, rejiciantur, quæ ipsis inhærent, Semina, contundantur in mortario lapideo, committantur sacco, valide exprimantur, Succus expressus leni calore usque ad consistentiam Extracti evaporet.

Hoc Medicamentum Humores præcipue Serofos violenter per Alvum educit, in Hydrope aliis Purgantibus ad Grana tria vel quatuor additur. Hippocratem, Galenum aliosque Veteres Medicos deficientibus quippe tunc mitioribus Purgantibus frequenter eodem usos esse constat, sed nostra ætate in tanta meliorum & tutiorum Catharticorum copia, anceps hoc & violentum Remedium rarius in usum trahitur,

ELECTUARIUM ANTHELMINTICUM Heisteri.

℞. Mercurii vivi unciam semis:

Probe teratur cum

Gummi Arabici uncia una:

Affundendo paulatim Aquam fontanam, usque dum Mucilago surrexerit, in qua nulli ulterius Mercurii globuli appareant, Tunc addantur

Corticis Chinæ tenuissime pulverisati uncia una,

Syrupi Menthæ quantum satis ad consistentiam Electuarii molles.

Exhibetur aliquoties de die Dosis, quæ Avellanam æquat.

Vires ex nomine patent.

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE

Trilleri.

℞. Pulverum Corticis Chinæ optimi unciam unam,
Florum Chamomillæ vulgaris drachmas duas,
Nitri depurati,
Diaphoretici Martialis ana drachmam unam,
Syrupi Corticum Aurantium quantum satis.

Misceantur in Electuarium:

Asseverat Trillerus hoc per quam eximium Electuarium Antipyreticum jam per annos plus minus quadraginta semper votis suis & expectationi ita respondisse, ut sexcenti pene agroti omnis generis Febribus Intermittentibus conflictati ipsius singulari virtute pristinae sanitati integræ & perfectæ tandem sint restituti, sibimet ipsi totique suæ familiæ imo sæpius tenerrimæ ætati adeo feliciter aliquoties obtigisse, ut etiam in Febribus pertinacissimis & justo longiore circuitu inordinate nonnunquam reversis hoc remedium auxilium tulerit præsentissimum & præstantissimum; hinc se ejus laudes singulari Carmine Eucharistico celebrasse, quod exstat in Poematum suorum Physico-Ethicorum T. III. p. 280.

ELECTUARIUM e BACCIS LAURI

Rhazes.

℞. Baccarum Lauri unciam unam semis,
Radiciis Calami Aromatici drachmas duas,

Herbarum Rutæ,

Menthæ,

Origani,

Seminum Ammeos

Cumini,

Nigellæ,

Ligustici,

Carvi,

Dauci,

Piperis nigri,

longi,

Castorei ana drachmas duas,

Sagapeni unciam semis,

Opo-

ELECTUARIUM.

Opoponacis drachmas tres:
Omnia trita excipiantur,
Mellis despumati unciis quatuordecim.
*Adjicitur Clysmatibus ad unciam unam
pro Dosi.*

ELECTUARIUM CATHOLICUM

Præpositi.

℞. Radicis Polypodii uncias sex:
Coquantur ex
Aquæ fontanæ unciis octo & quadra-
ginta
Ad consumptionem quartæ partis:
In Colatura dissolvantur
Pulparum Cassiæ,
Tamarindorum ana uncia
quatuor,
Sacchari uncia octo & quadraginta:
Coquantur lento igne ad consistentiam
Mellis, tum addantur sensim
Pulverum Radicum Polypodii,
Rhabarbari veri
ana uncia dux,
Liquiritiæ drach-
mæ duæ,
Foliorum Sennæ
uncia quatuor,
Florum Violarum,
Seminis Anisi ana uncia
duæ:

Misceantur.

*Blande Alvum laxat ad unciam unam
exhibitum. Admiscetur etiam Clysmatibus.*

ELECTUARIUM CATHOLICUM *pro*
CLYSTERIBUS *Vernii correctum.*

℞. Radicum Polypodii uncias sex,
Herbarum Malvæ,
Mercurialis,
Parietariæ,
Violaria ana manipulos
duos:

Incisa coquantur ex

Aquæ fontanæ unciis centum quadra-
ginta & quatuor,

Ad tertiæ partis consumptionem; Cola-
tura dissolvantur

Mellis uncia sex & nonaginta:

Coquantur ad consistentiam Syrupi, quo
dissolvantur,

ELECTUARIUM.

55

Pulpæ Prunorum uncia quatuor & vi-
ginti:

Addantur sensim

Pulverum Radicum Polypodii,
Rhabarbari ana
uncia quatuor,
Liquiritiæ uncia
semis,

Foliorum Sennæ uncia octo,
Florum Violarum uncia
quatuor,

Seminum Fœniculi,
Quatuor Frigi-
dorum majo-
rum ana uncia
una,
Anisi uncia qua-
tuor:

Misceantur.

*Inmiscetur ad uncias duas usque Clysmati-
bus Laxantibus.*

ELECTUARIUM CATHOLICUM DU-
PLICATUM RHABARBARO *seu*
CONFECTIO UNIVERSALIS *Mery*
correcta.

℞. Radicis Polypodii incisæ uncias octo:
Coquantur ex
Aquæ fontanæ unciis sex & nonagin-
ta ad dimidiæ partis consumptionem:
Colatura Emulgeantur

Seminum quatuor Frigidorum majo-
rum ana uncia semis,
Violarum uncia duæ:

Denuo colatis dissolvantur

Sacchari albi uncia octo & quadra-
ginta:

Coquantur ad consistentiam Syrupi, cui
addantur sensim

Pulparum Cassiæ,
Tamarindorum,
Pulverum Rhabarbari electi,
Foliorum Sennæ mundato-
rum ana uncia quatuor,
Seminis Anisi uncia dux,
Glycyrrhizæ uncia una:

Probe misceantur.

*Scopo Eccoprotico ad unciam unam pro
Dosi exhibetur, commendabatur olim præci-
pue Fluxibus Alvi laborantibus.*

ELECTUARIUM CHALYBEATUM

Garzonii.

℞. Alcoholis Limaturæ Martis uncias septem,
 Specierum Aromaticarum Rosatarū,
 Pulverum Cinnamomi,
 Nucum Moschararum ana drachmas sex,
 Rhabarbari unciam semis,
 Sacchari ad consistentiam tabulandi cocti,
 Mellis despumati ana uncias duodecim,
 Misceantur.

Hoc Medicamentum ad Mensium retentionem & ad Cachexiam ad drachmam unam, quæ Martis granis duodecim constat, præscribitur.

ELECTUARIUM DENTIFICUM.

Videatur Electuarium Gingivale.

ELECTUARIUM DIASATYRIUM

Nicolai correctum.

℞. Radicum Satyrii recentium uncias quatuor:
 Minutim incisæ contundantur cum
 Sacchari ad consistentiam Tabulandi cocti unciis duodecim: per fetaceum trajectæ probe contundantur cum
 Nucis Indicæ conditæ,
 Zinziberis conditi,
 Pinearum,
 Pistaciorum ana uncia una:
 Probe comminutis addantur
 Pulverum Caryophyllorum aromaticorum,
 Cinnamomi,
 Stincorum marinorum ana uncia semis,

Brodii Zinziberis conditi quantum factis ad consistentiam Electuarii.

Analepticas & Roborantes vires huic Electuario nemo denegabit, sed frustra inde expectatur, ut Venerem languentem excitet & Semen augeat.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM

Fracastorii.

℞. Radicum Bistortæ,
 Tormentillæ,
 Gentianæ ana unciam semis,
 Zinziberis drachmas duas,
 Herbarum Dictamni Cretici unciam semis,
 Scordii unciam unam,
 Seminis Acetosæ drachmam unam semis,
 Cinnamomi,
 Cassiæ lignæ ana unciam semis,
 Piperis longi drachmas duas,
 Boli Armenæ unciam unam semis,
 Terræ Lemniæ unciam semis,
 Gummi Arabici,
 Galbani,
 Styracis ana unciam semis:

Probe pulverifatis & mixtis addantur:
 Conservæ Rosarum unciam duodecim,
 Mellis unciam triginta,
 Opii, in Vini Hispanici unciis tribus soluti, drachma una semis:
 Optime omnia misceantur.

Sudorifera, Alexipharmaca, Anodyna & Styptica virtute commendatur, hinc ad Diarrhæam & Dyenteriam quoque sistendam laudatur. Datur ad drachmas duas vel tres. Uncia integra duo circiter grana Opii vehit.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM Suecorum CONFECTIO JAPONICA
vulgo.

℞. Terræ Japonicæ uncias tres,
 Herbæ Scordii,
 Fabarum Pechurim,
 Radicis Tormentillæ ana uncias duas:
 Probe pulverifatis addantur
 Opii, in Vino Hispanico dissoluti,
 drachma una semis,
 Syrupi Rosarum unciam viginti octo:
 Probe misceantur.

In sopiendis Alvi fluxibus, antecedente potentius operatur, uncia una tria grana Opii fere habet.

ELECTUARIUM DIATRAGACANTE.

℞. Aquarum Pæoniæ uncias duas,
Menthæ,
Melissæ,
Syrupi Papaveris Rhœados,
Pulverum Sacchari ana unciam unam,
Gummi Tragacanthæ electæ drachmas duas:

Misceantur.

Hanc Pulviculam mulierculæ Argentoratenses infantibus pro sopiendis Torminibus solent exhibere.

ELECTUARIUM GINGIVALE vel
DENTIFICUM *Argentoratensium.*

℞. Lapidis Pumicis præparati,
Cremoris Tartari ana unciam semis,
Aluminis usti scrupulos quatuor,
Coralliorum rubrorum præparatorum
drachmas tres,
Myrrhæ electæ drachmam unam:

In tenerrimum pulverem tritis commisceatur

Pulveris Coccionellæ drachma una,
probe trita cum

Salis Tartari scrupulo uno:

Omnia excipiantur

Mellis Rosarum unciis duabus:

Addantur

Quintæ Essentiæ Citri guttæ decem:

Misceantur.

Vires ex Denominatione patent.

ELECTUARIUM ad GINGIVAS
Trilleri.

℞. Radicum Tormentillæ drachmam
unam semis,
Caryophyllatæ drachmam
unam,
Ireos Florentinæ drachmam
semis,

Herbarum Salvix,
Abrotani,
Rutæ,

Florum Aquilegiæ,
Rosarum rubrarum,

Tom. II.

Florum Balaustiorum ana drachmam
unam,

Seminum Cochleariæ,
Aquilegiæ ana drachmam
unam semis,

Mumiæ veræ,

Myrrhæ electæ ana drachmam unam,

Gummi Mastichis,

Laccæ ana drachmas duas,

Sanguinis Draconis drachmam unam
semis,

Aluminis usti drachmam semis:

Probe pulverifata excipiantur

Mellis Rosati quantitate sufficiente.

Testatur Venerandus Auctor, se hoc Electuario Ulotico seu Epulotico sapius insigni cum successu olim usum esse in Dentibus vaillantibus & malefidis firmandis, Gingivis tabescentibus ac cruentis consolidandis & sanandis, fædis oris Ulcaribus Abstergendis, Halitu denique fætido corrigendo & purificando.

ELECTUARIUM *Hamech.*

Videatur Confectio Hamech.

ELECTUARIUM HIERA PICRA
Andromachi.

℞. Pulverum Aloës uncias quatuor,
Crocii,
Cinnamomi,
Spicæ Indiæ,
Asari,
Ligni Aloës ana drachmas sex,

Mellis uncias viginti:

Misceantur probe.

Multus est Galenus circa hoc medicamentum, quod hinc quoque vulgo ab ipso solet denominari, & circa rationem Aloës pro varia indicatione mutandum. Hodie vero ejus usus nullus est, nisi ad Clysteres, quibus ad drachmas sex commiscetur.

ELECTUARIUM HYDRAGOGUM *sen*
PURGANS *Austriacorum* correctum.

℞. Rob Ebuli,
Juniperi ana uncias duas,
Syrupi de Spina Cervi unciam unam,
Pulverum Resinæ Jalappæ, Pineis tri-
tæ, sesqui drachmam,
Tartari vitriolati drach-
mas sex:

Misceantur exactissime.

Alvum valide ducit, aquas Hydropicorum evocat. Uncia una ad quidecim grana Resinæ Jalappæ vshit. Uncia semis ad drachmas sex potest pro dosi dari.

ELECTUARIUM pro INFANTIBUS
Danorum.

℞. Magnesiæ albæ drachmas sex,
Pulverum Seminis Anisi Semunciam,
Crocii drachmam unam,
Syrupi Cichorei cum Rhabarbaro
quantum sufficit pro formando
Electuario.

Infantibus ob Tormina ejulantibus exhibetur. Dosis est parvum Cochlear.

ELECTUARIUM JOVIALE ad TAE-
NIAS *Brunsvicensium.*

℞. Stanni purissimi,
Mercurii vivi ana unciam unam:
Fiat secundum artem Amalgama, cui
commisceatur

Goncharum præparatarum uncia una:
Exactissime mixtis addantur
Conservæ Absynthii uncia tres,
Syrupi Menthæ quantum satis for-
mando Electuario.

*Vermibus laborantibus bis de die exhiben-
tur Electuarii drachmæ duæ.*

ELECTUARIUM LENITIVUM *sive*
TAMARINDORUM *Austriacorum.*

℞. Pulpæ Tamarindorum,
Prunorum ana uncias octode-
cim,
Rob Sambuci uncias duodecim,

Pulveris Foliorum Sennæ uncias sex,
Cremoris Tartari uncias quatuor,
Mellis quantum satis, ut fiat Electua-
rium.

*Omnino præferendum sequenti, cui virtu-
tibus par, sed concinnitate superius est.*

ELECTUARIUM LENITIVUM
Florenzola.

℞. Radicum Polygodii uncias duas,
Glyzyrrhizæ unciam semis,
Herbarum Adianthi nigri,
Mercurialis ana unciam
semis,

Hordei decorticati,
Passularum minorum ana uncias duas,
Jujubarum,
Sebesten ana unciam unam:

Incisa & contusa coquantur in
Aquæ fontanæ unciis triginta, ad un-
cias duodecim residuas:

Colentur & addantur
Pulpæ Cassiæ,
Prunorum,
Tamarindorum,

Sacchari albi,
Conservæ Violarum ana uncia sex,
Pulveris Foliorum Sennæ uncia tres
semis:

Misceantur exacte.

*Refert Trillerus, hoc Electuarium, li-
cet rarus ejus hodie, nec nisi in Enemati-
bus usus sit, blande tamen Alvum ducere,
Bilem educere, inque affectibus Renum cum
successu dari posse.*

ELECTUARIUM LENITIVUM cum
SULPHURE ad MORBOS PSORI-
COS *Richard.*

℞. Electuarii Lenitivi Florenzolæ uncias
quatuor,
Florum Sulphuris unciam unam:
Misceantur.

*Vires ex nomine patent. Dosis est ad
unciam dimidiam aliquoties, interdum ite-
randa.*

ELECTUARIUM seu PULTICULA de
MANNA *Wurtembergensium.*

℞. Mannæ electæ,
Sacchari albissimi ana uncias duas :
Dissolvantur in
Aquæ Rosarum unciis duabus :
Colatis addantur
Pulveris Radicis Iridis Florentinæ
drachma una,
Olei Amygdalarum dulcium uncia
semis :
Probe misceantur.

Album leniter lavat . Tenellis & inprimis recens natis ad Meconium & humores educendos datur .

ELECTUARIUM MITRIDATICUM ,
ANTIDOTUS MITHRIDATICA *Damocratis .*

℞. Myrrhæ electæ,
Croci ,
Agarici ,
Zinziberis ,
Cinnamomi ,
Nardi Indicæ ,
Olibani ,
Seminum Thlaspi ana uncias decem ,
Dauci uncias septem ,
Fœniculi ,
Anisi ,
Petroselinii ana uncias quinque ,
Seseli ,
Hyperici ana uncias duas semis ,
Herbarum Schoenanthi uncias octo ,
Poli ,
Scordii ana uncias septem ,
Radicum Costi ,
Gentianæ ana uncias octo ,
Calami Aromatici ,
Asari ,
Valerianæ ana uncias tres ,
Mei uncias duas semis ,
Styracis ,
Piperis longi ana uncias octo ,
Albi uncias septem ,
Castorei uncias duas semis ,

Succorum Acaciæ ,
Hypocistidis ,
Foliorum Malabathri ana uncias octo ,
Carpobalsami uncias septem ,
Gummi Arabici ,
Opii ,
Cardamomi ,
Florum Rosarum rubrarum ana uncias quinque ,
Trochiscorum Cypheos uncias septem :

Probe in pulverem redactis & mixtis admisceantur

Galbani
Opoponaceis ana uncia octo :
Bdellii uncia quinque ,
Sagapeni uncia tres ,
Vini Hispanici unciis octo & quadraginta diluta ,

Probe subacta excipiantur
Mellis octingentis & sexaginta unciis ,
prius exacte tritis cum

Opobalsami ,
Terebinthinæ ana unciis octo :

Omnia misceantur exacte .

Hanc compositionem ex Galeno de Antidotis L. II. C. 2. desumpsi . Absurdissimum medicamentum retinendum est ob auctoritatem , quam ipsi antiquitas conciliavit , ideoque cur mutari debeat , non video .

ELECTUARIUM MUNDIFICANS

Verlhoffii .

℞. Radicum Sarsaparillæ uncias tres ,
Rhabarbari drachmas duas ,
Ligni Guajaci unciam unam ,
Corticis Ligni Sassafras drachmam unam ,
Foliorum Sennæ selectissimorum unciam unam ,
Seminis Anisi drachmam unam :
Probe pulverifata misceantur cum
Mellis unciis duodecim .

In varia Humorum acrimonia aliquot ejus drachmæ aliquoties de die , dari possunt .

ELECTUARIUM pro PECORIBUS Danorum. THERIACA DIATESSERON Avicennæ.

℞. Radicum Gentianæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ ana uncias duas,
In pulverem redactis admisceantur
Mellis despumati uncia quatuor &
viginti.
Vires ex nomine patent.

ELECTUARIUM PECTORALE LAXATIVUM Argentoratens. correctum.

℞. Loch sani & experti uncias duas,
Syrupi Papaveris Rhæados drachmas sex,
Resinæ Jalappæ, Pineis tritæ, sesqui
drachmam:
Probe misceantur.
*Infantibus affectibus Mucosis laborantibus
Purgandi præcipue scopo exhibetur. Drachma
una quatuor fere grana Resinæ Jalappæ vehit.*

ELECTUARIUM PHILONIUM
ROMANUM Avicennæ.

℞. Radicum Pyrethri,
Zedoariæ,
Doronici,
Florum Balauftiorum ana unciã unam,
Piperis albi,
Seminis Hyoscyami albi ana uncias
viginti,
Opii uncias decem,
Euphorbii,
Castorei,
Margaritarum ana unciam unam,
Crocii uncias quinque:
In pulverem redacta exacte misceantur
cum
Mellis unciis trecentis.

*A Philone, Medico Romano, denomina-
tum hoc Medicamentum volunt. Diversum
omnino ab Antidoto cognomine a Galeno
de Compos. Medicam. secundum locos L. IX.
cap. 4. prolata, ut reliqua hujus commatis
medicamenta Sudorem movet, Dolores sopit,*

*Somnum conciliat, uncia una sesqui granum
circiter Opii vehit.*

ELECTUARIUM PURGANS Richard.

℞. Dagrydii unciam dimidiam,
Pulveris Radicis Jalappæ uncias qua-
tuor:
Probe terantur cum Amygdalarum dul-
cium numero viginti, tunc addantur
Pulverum Foliorum Sennæ uncia duæ,
Seminis Anisi,
Cremoris Tartari ana uncia una,
Pulparum Prunorum uncia sedecim,
Tamarindorum uncia octo:
Misceantur exactissime.

*Ubi valide Purgandum est, aut aqua
Hydropicorum educenda, ad drachmas sex
usque, que grana circiter quinque Diagyrdii
& quadraginta quinque Radicis Jalappæ ve-
hant, in aqua dissolutum exhiberi potest.*

ELECTUARIUM REQUIES Nicolai.

℞. Radicis Mandragoræ,
Florum Rosarum,
Seminum Hyoscyami,
Papaveris,
Endiviæ,
Lactucæ,
Portulacæ,
Psyllii,
Opii,
Nucum Moschatarum,
Cinnamomi,
Zinziberis ana unciam unam semis,
Lignorum Santali albi
Rubri,
Spodii,
Tragacanthæ ana drachmas sex,
Sacchari candi unciam unam:

Omnia in pulverem redacta excipiantur
Julepi Rosarum unciis viginti quatuor.

*Idem de hoc ac de Mithridatico judicium
ferendum est. Descriptionem ex NICOLAO
MYREPSO de Antidotis Sect. I. cap. 205.
exhibeo. Pessime mulierculæ hujus generis me-
dicamentis ad conciliandum infantibus Som-
num utuntur; nimis crebro lethales & noxii
inde excitati effectus fuerunt observati. Un-
cia una ad undecim grana Opii habet.*

ELECTUARIUM RESUMTIVUM

Wurtembergensium.

℞. Radicum Glycyrrhizæ,
Herbarum Hederæ terrestris,
Veronicæ ana unciam se-
mis:

Incisa infundantur in
Aquæ ferventis unciis sexaginta:
Macerentur per noctem, mane colentur,
& in colatura coquantur
Radicum Farfaræ recentium, minutim
incisarum,
Passularum minorum ana uncia sex-
decim,

Emollita trajiciantur per fetaceum; cum
decocto defuso Emulgeantur

Amygdalarum uncia septem:

Emulsione diluatur Pulpa per fetaceum:
trajecta & addantur

Sacchari albi uncia triginta duæ:

Coquantur leni igne ad consistentiam
Pulpæ, addantur

Flavedo Citri a tribus pomis recen-
tibus derasa,

Pulverum Cinnamomi uncia semis,
Caryophyllorum Aromati-
corum drachmæ tres:

Omnia probe misceantur.

*Hoc Electuarium Hæcticis, Tabidis nec non
Tussi acri & sicca laborantibus commendatur.
Ejus uncia semis bis vel ter de die assumitur.*

ELECTUARIUM ad STOMACACEN

Kleinii.

℞. Pulverum Radicis Ireos Florentinæ,
Sanguinis Draconis ana
drachmas tres,
Aluminis crudi drachmas
duas,
Myrrhæ electæ,
Mastychis electæ ana Dra-
chmam unam,

Syrupi Balsamici quantum satis ad
Electuarium.

Vires ex nomine patent.

ELECTUARIUM TAMARINDORUM.

Videatur Electuarium Lenitivum.

ELECTUARIUM THERIACA

Andromachi.

℞. Radicum Ireos florentinæ,
Liquiritiæ ana uncias duo-
decim,
Costi,
Rhapontici,
Pentaphylli ana uncias sex,
Mei,
Rhei,
Gentianæ ana uncias qua-
tuor,

Aristolochiæ uncias duas,

Herbarum Scordii uncias duodecim,
Schoenanthi,

Marrubii,

Dictamni Cretici,

Calaminthæ ana uncias sex,
Polii,

Chamæpiteos,

Chamædryos ana uncias
quatuor,

Foliorum Malabathri uncias quatuor,

Florum Rosarum rubrarum uncias
duodecim,

Stœchados uncias sex,

Hyperici uncias quatuor,

Centaurei minoris uncias
duas,

Croci uncias sex,

Carpobalsami uncias quatuor,

Cinnamomi uncias duodecim;

Cassia lignæ,

Spicæ Indicæ ana uncias sex,

Lecticæ uncias quatuor,

Piperis longi uncias viginti quatuor,

Nigri,

Zinziberis ana uncias sex,

Cardamomi uncias quatuor,

Agarici,

Seminum Napi ana uncias duodecim,

Petrofelini Macedonici un-
cias sex,

Anisi,

Fœniculi,

Nasturtii,
 Seseleos,
 Thlaspi,
 Seminum Amomi,
 Ammeos ana uncias, qua-
 tuor,
 Dauci uncias duas,
 Opii uncias viginti quatuor,
 Opobalsami uncias duodecim,
 Myrrhæ,
 Oblibani,
 Terebinthinæ ana uncias sex,
 Styracis,
 Gummi Arabici,
 Sagapeni ana uncias quatuor,
 Asphalti,
 Opoponacis,
 Galbani ana uncias duas,
 Succi Acaciæ,
 Hypocistidis ana uncias quatuor,
 Castorei uncias duas,
 Terræ Lemniæ,
 Vitrioli calcinati ana uncias quatuor,
 Trochiscorum Scillinorum uncias qua-
 draginta octo,
 Viperinorum,
 Hedycheri ana uncias
 viginti quatuor:
 Balsama, Resinæ & Gummi Resinæ su-
 bigantur
 Vini generosi quantitate sufficiente,
 Ut in formam pultis abeant:
 Omnia excipiantur
 Mellis optimi unciis nongentis & se-
 xaginta,
*Theriacam aliquam in limine ædis Æscu-
 lapii versibus lapidi inscriptam tribus ante
 æram nostram Seculi jam usitatam refert
 Plinius L. XX. Cap. 24.*
*Compositionem, quam vulgo solent præ-
 scribere, si quidem retinendi mens est, cur
 a præscriptione quam Galenus nobis reliquit,
 recedamus, non perspicio. Itaque secundum
 hunc Auctorem de Theriaca ad Pisonem
 Cap. II. eam hic appono. Si quod aliud hoc
 certe medicamentum diversissima judicia est
 expertum; mihi quidem licet inconcinnam
 omnino hanc compositionem libentissime lar-
 giar, reprehendendi omnino videantur, qui
 Theriacam tantum non pro medicamento uni-
 versali & Antidoto Catholica venditant,*

*male quoque me habeat iste fastus, quo va-
 riis in locis publica auctoritate preparatur,
 aut certe preparari jubetur, neutiquam tamen
 perspicio, cur in illam multi adeo invehant,
 cum ejus compositio non magis absurda sit,
 quam innumerae alie, quas a Veteribus ac-
 cepimus. Roborandi scopo nec non fine So-
 piendi tam extus quam intus datur. Uncia
 una drachmam unam circiter Opii vehit,
 que ratio in Præscriptionibus, que vulgo
 prostant, multo minor esse solent.*

ELIXIRIA.

Canones.

I. Mittamus hyperbolicam, quam Al-
 chymici voci *Elixir* tribuerunt, signifi-
 cationem. Officinæ hac voce denotant
 medicamentum, quod ut plurimum in-
 fusione paratur, eamque extrahendorum
 quantitatem recipit, aut ea admittit vel
 ingredientia vel Menstrua, quibus spissior
 redditur consistentia, quam ea est qua
 Essentiæ vel Tincturæ gaudent.

II. Ingredientia sicca comminuuntur
 in crassum pulverem; eis superfunditur
 Menstruum ad eminentiam unius duo-
 rumve digitorum; digestio, quæ cum
 Vinum pro Menstruo assumatur, debet
 esse frigida, per duos vel tres dies con-
 tinuatur; liquor filtratus asservatur.

III. Pro Menstruo sive Vinum & qui-
 dem vel Hungaricum vel Hispanicum
 sive Spiritus Vini adhibetur, rarissime
 Aqua.

IV. Infusiones cum Spiritu Vini insti-
 tuuntur in Cucurbitis Alembico & Ex-
 cipulo instructis; mane & vespera agi-
 tantur; Spiritus qui destillavit, reliquo
 affunditur.

V. Interdum etiam Solutiones Extra-
 ctorum Elixiria dicuntur.

ELIXIR ACIDUM Dippelii.

Videatur Aqua Rabelii. Idem dicitur
 a Brunsvicensibus.

ELIXIR ACIDUM *Halleri*.

Dum pares ingredientium partes recipiuntur.

ELIXIR ALOES SAPONACEUM *Suecorum*, ELIXIR PROPRIETATIS *Stablii*.

℞. Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ ana unciam unam:
In pulverem tenuissimum tritis, affundantur

Bilis bovinae recentis uncia duæ:
Mixtis exacte & leniter siccatis denuoque tritis addantur

Terræ foliatæ Tartari uncia una,
Crocī uncia dimidia,
Spiritus Vini rectificati uncia duodecim:

Digerantur leni calore per biduum & filtrentur.

Egregias vires Resolventes continet. Salutifere dabitur in Obstructionibus abdominalibus, sed ab eodem sibi caveant Hemorrhoidibus obnoxii. Dosis est ad parvum usque Cochlear.

ELIXIR AMARUM *Hærne*.

℞. Radicum Zedoariæ drachmam unam,
Rhabarbari drachmas duas,
Gentianæ unciam semis,
Crocī orientalis drachmam semis,
Aloës Hepaticæ unciam unam,
Myrrhæ unciam semis,
Agarici drachmam unam:
Theriacæ *Andromachi* drachmas duas:
Spiritus Vini unciis triginta sex,
Incisa infundantur cum
Per aliquot dies in Balneo Mariæ postea filtrentur.

Laudatur maxime contra Tæniam.

ELIXIR ANTHELMINTICUM *Suecorum*
ESSENTIA CATHOLICA PURGANS
Rothii.

℞. Radicum Jalappæ uncias quatuor,
Seminum Carthami uncias duas,
Scammonei unciam semis,

Gummi guttæ drachmas duas,
Incisis, contusis, in pulverem tritis affundantur,

Spiritus Vini rectificati uncia viginti quatuor,

Per quadriduum Digesta fortiter per colum exprimantur, Liquor deinde filtretur.

Valide Alvus inde ducitur, cum autem citra Ventris dolores vires suas exserere vix possit, & periculosa semper sint solutiones resinarum in Spiritu Vini, eo quod hæ ab humoribus Primarum Viarum facile dejiciantur & plicis illarum adherendo Hypercatharses excitent; ego quidem hujus medicamenti usum commendare non audeo. Dosis ad drachmas duas præscribitur.

ELIXIR ANTHARTHITICUM

Caribæum.

℞. Gummi Guajaci uncias duas.

Tassia uncias nonaginta sex,
Digerantur leni calore per octiduum,
Liquor filtretur.

Egregii inde effectus in Arthritide inveterata fuerunt observati. Omni mane Cochlear unum hauritur.

ELIXIR ANTICOLICUM
CROCATUM.

Videatur Elixir de Garus.

ELIXIR ANTIPODAGRICUM

Guldenklée.

℞. Radicum Artemisiæ uncias duas,
Rhapontici Moscovitici,
Aristolochiæ rotundæ ana
unciam unam,
Herbæ Chamædryos,
Florum Centaurii minoris,
Hyperici ana drachmas quinque,
Seminis Petroselini Macedonici drachmas sex,

Incisa & contusa infundantur cum
Spiritus Vini Tartarifati unciis viginti quatuor:

Digerantur per aliquot dies, ita obtenta Tinctura filtretur, & Abstracta inde Libra una Spiritus Vini, concentretur.

ELIXIR ANTISCORBUTICUM AMARUM *Brandeburgensium* correctum.

℞. Radicum Enulæ drachmas duas,
 Filicis unciam semis,
 Herbarum Absynthii drachmas tres,
 Corticum Aurantium immaturorum
 drachmas duas,
 Tamarisci drachmas sex,
 Incisis affundantur:

Sucorum expressorum Beccabungæ,
 Borraginis,
 Buglossi,
 Cochleariæ,
 Fumariæ,
 Nasturtii
 aquatici ana
 drachmæ
 duæ,

Spirituum Cochleariæ,
 Nasturtii ana unciam qua-
 tuor,

Digerantur per aliquot dies & expri-
 mantur.

Vires ex nomine patent; Dosis ad sexaginta guttas extenditur.

ELIXIR ANTIVENEREUM *Viennensium*.

℞. Balsamorum Copaiivæ unciam unam,
 Peruviani unciam semis,
 Resinæ Guajaci drachmas duas,
 Olei destillati Ligni Sassafras dra-
 chmam semis,

Salis Tartari drachmas duas,

Mixta dissolvantur in

Spiritus Vini rectificatissimi unciis sex,
 Filtrata asserventur.

Hujus Medicamenti usus, in morbis Venereis, si Gonorrhæam excipias, nullus omnino mihi videtur, quin & in ipsa Gonorrhæa nonnisi cautissime erit administrandum, nec dosis ultra triginta Guttas extendenda.

ELIXIR APERITIVUM *Glauderii*.

℞. Aloës Succotrinæ,
 Myrrhæ electæ ana uncias duas,
 Croci orientalis unciam unam,
 Grosse contusis affundantur:

Salis Tartari unciam duam, dissolutam
 Aquarum Florum Sambuci,

Cochleariæ,

Nasturtii ana unciis decem,

Per duodecim horas Digesta filtrentur.

Contra morbos Putridos & ad Alvi Mensumque reserationem laudatur a Claudero, ad Obstructiones quoque Viscerum reserandas, Hypochondriacis præterea & Scorbuticis commendari solet.

ELIXIR AURIFICUM *Rotrou*.

Est Tinctura Antimonii Tartarificata.

ELIXIR BALSAMICUM *Hoffmanni*.

℞. Radicis Zedoariæ drachmas tres,
 Herbarum Scordii manipulos tres,
 Florum Centaurii minoris manipu-
 lum unum,

Myrrhæ electæ unciam semis,

Ligni Aloës drachmam unam semis,

Corticum Aurantium unciam unam,

Croci drachmam unam,

Nucis Moschatæ drachmas tres,

Succini drachmas tres:

Incisa, contusa, mixta Digerantur:

Spiritus Vini Tartarificati unciis qua-
 draginta octo:

Filtratus addantur:

Spiritus Salis Ammoniaci uncia una,

Oleorum Cardamomi,

Caryophyllorum ana Gut-
 tæ decem:

Misceatur.

Laudatur ab egregio Auctore in notis ad Poterii Observ. Cent. II. cap. 39. ad Levitatem Intestinorum.

ELIXIR BALSAMICUM PECTORALE

Pharmacopœæ Edinburgensis Veteris.

℞. Balsamorum Tolutani uncias duas,
 Peruviani unciam unam,

Florum Benzoes,

Croci Angli ana unciam semis,

Spiritus Vini rectificati uncias vigin-
 ti quatuor,

Digerantur per triduum & filtrentur.

Hoc Elixir tam ad internos quam exter-

nos usus commendare & dosin ad quadraginta guttas extendere solent.

ELIXIR BALSAMICUM TEMPERATUM Hoffmanni.

℞. Corticum Aurantium recentium unciam unam,
Salis Tartari drachmas duas,
Vini Tockaviensis vel Canariensis uncias duodecim:

Digerantur per biduum.

Tinctura decantata dissolvantur

Extractorum Gentianæ,

Centaurii minoris,

Cardui Benedicti ana drachmæ duæ:

Filtrentur per filtrum tectum.

Hujus medicamenti ab hæredibus Hoffmanni in arcanis habiti, (teste Buchner ad Prælect. Schulz in Dispens. Brandeb.) diversæ ob id ipsum in Dispensatoriis prostant descriptiones. Trado, hic, quod ipse Auctor in Med. Consult. P. III. Dec. 2. Cas. IX. præscribit, Medicamentum, ad restituendas vires Primarum viarum commendabile. Ejus Cochlear unum ante vel post prandium dari jubet.

ELIXIR BALSAMICUM Werlhofii.

℞. Radicum Costi drachmas duas,
Corticis Chinæ electi unciam semis,
Crocii Orientalis drachmam unam,
Corticum Aurantium recentium unciam semis,

Myrrhæ electæ drachmas duas,

Salis Tartari unciam semis:

Incisis & contusis affundantur

Vini Canariensis unciam duodecim:

Digerantur per triduum, decantetur

Tinctura, in qua dissolvantur

Extractorum Cardui benedicti,

Centaurii minoris ana drachmæ duæ,

Filtrentur per filtrum tectum,

Cum priori tam viribus quam modo utendi convenit.

ELIXIR CITRI PURGANS Pharmacopœe Argentoratensis Veteris.

℞. Flavedinis Corticum Citri recentium unciam unam semis,

Spiritus Vini rectificati uncias sex :
Infundantur per horas viginti quatuor,
In Spiritu decantato dissolvatur

Resinæ Jalappæ uncia una:

Filtrentur.

Hoc Medicamentum improprie sane & ipsum Elixir nuncupatum spe est valde ambigua; quippe ab humoribus Primarum Viarum facile præcipitata inde Resina, plicisque Ventriculi vel Intestinorum adhærescens acerrima Tormina & vehementem solet excitare Hypercatharsin. Conferantur quæ ad Elixir Anthelminticum sunt annotata. Prudenti igitur consilio in nova Editione est omissum. Interim vulgus vel nimium ei assuetus crebro adhuc eo utitur. Ad drachmam unam vel scrupulos quatuor, qualicumque Syrupulo edulcoratum, exhibetur. Drachma una continet Resinæ grana decem.

ELIXIR CITRI Sennerti.

℞. Flavedinis Corticum Citri recentium uncias octodecim,

Spiritus Vini simplicis uncias septuaginta duas:

Per aliquot dies Macerata Destillentur usque dum Phlegma apparuerit, tunc addantur

Succi Citri recentis unciam novem,

Sacchari albiissimi in Aquæ Rosarum unciis novem dissoluti unciam quinque:

Filtrentur.

Hoc præparatum nomine tantum Elixir vera Claretum esse nemo non videt.

ELIXIR de Garus.

℞. Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Nucum Moschatarum ana scrupulum unum,

Myrrhæ electæ unciam dimidiam,

Aloës Hepaticæ unciam unam,

Spiritus Vini uncias quadraginta octo,
Aquæ fontanæ uncias duodecim:
Destillentur inde uncia quadraginta octo:
Spiritu destillato addantur:

Syrupi Capillorum Veneris uncia quadraginta octo,

Aquæ Florum Aurantiorum uncia quatuor,

Reponantur usque dum Liquor clarus evaserit.

Hoc Claretum juvenanda Digestionis causa ad Cochlear unum pro dosi datur.

ELIXIR JUNIPERUM seu MALVATICUM JUNIPERINUM Argentoratensium.

℞. Rob Juniperi uncias quatuor:

Diluantur

Vini Malvatici unciis duodecim:

Colentur per linteum.

Scopo Carminativo & Diuretico ad Cochlear unum pro dosi exhibetur.

ELIXIR PECTORALE Ringelmanni vulgo Regis Daniæ.

℞. Succi Liquiritiæ uncias sex:

Dissolvantur in

Aquæ Fœniculi unciis duodecim:

Filtrentur; & addantur

Spiritus Salis Ammoniaci Anisati uncia triginta sex,

Egregium sane Medicamentum in morbis Pectoris pituitosis. Datur ad parvum Cochlear pro dosi.

ELIXIR PECTORALE Wedelii.

℞. Radicum Enulæ,

Althææ,

Ireos Florentinæ,

Squillæ præparatæ ana unciam unam,

Liquiritiæ unciã dimidiam,

Ligni Santali rubri unciam unam,

Herbæ Roris Solis unciam unam semis,

Benzoës drachmas sex,

Myrrhæ,

Seminis Anisi ana unciam semis,

Gummi Ammoniaci drachmas duas,
Crocii drachmas tres:

Incisa, contusa Digerantur cum
Spiritus Vini unciis quatuor & viginti:

Filtrentur.

Spirituosa in Pectoris affectibus esse periculosa, cum nostra ætate nemo sanus dubitet, minime mirum est, hoc Medicamentum Resolvendi gratia creberrime olim adhibitum sensim evalescere.

ELIXIR POLYCRESTUM Halensium.

℞. Extracti Panchymagogi unciã unam:
Dissolvatur

Spiritus Vini rectificati unciis sex,
Vitrioli drachmis tribus:

Filtrentur.

Suum Elixir Polychrestum nunquam publici juris fecerunt Halenses. Quod hic secundum Trillerum exhibeo, ad centum usque guttas commendatur scopo Purgandi. drachma una novem circiter grana Extracti Panchymagogi continet. Purgantia resinsa in Spiritu Vini dissoluta usque quaque displicent.

ELIXIR PROPRIETATIS ALBUM
Helmontii.

℞. Aloës Succotrinæ,

Myrrhæ electæ,

Crocii orientalis ana unciam unam:

Incisis, contusis affundantur

Aquæ Cinnamomi uncia duodecim:
Digerantur calore fortiore per aliquot dies, omnisque dein liquor Destillatione eliciatur.

Hoc Medicamentum ab Helmontio Alchemico stylo descriptum. Licet multum ab Auctore suo laudetur, nostris tamen temporibus cum Humores vehementer commoveat, in Febribus, ad quas ejus usus speciatim spectabat, vix adhiberi solet.

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO
le Mort, sive DULCE.

℞. Aloës Succotrinæ,

Myrrhæ electæ,

Cro-

Croci Orientalis ana unciam unam:
Pulverifata redigantur cum
Olei Tartari per Deliquium quanti-
tate sufficiente in
Consistentiam pultis, cui addantur
Spiritus Vini rectificatissimi uncia se-
decim:

Digerantur per aliquot dies & filtrentur.

*Efficax remedium in morbis Ventriculi a
causa frigida oriundis, ad Alvum stimulan-
dam promovendamque Digestionem. Caven-
dum tamen, ne nimius ejus usus Sanguinem
exagitet. Dosis ad guttas sexaginta exhibetur.*

ELIXIR PROPRIETATIS Paracelsi. ELI-
XIR ALOETICUM Suecorum.

℞. Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ electæ,

Croci ana unciam unam:

Affundantur in pulverem redactis,)

Spiritus Vitrioli uncia duæ,

Vini rectificati uncia qua-
tuordecim,

Post Digestionem per triduum filtrentur:

*Hoc medicamentum more suo thraſonico
describit Paracelsus Antidox. L. VIII. Men-
struum cum reticuerit, varii circa illud in-
dicandum varie fuerunt occupati, Boërhave
Acetum præcipit, vulgo solent Crollium se-
qui, qui Oleum Sulphuris & Spiritum Vi-
ni præscribit. Qui Paracelso fidem adhi-
bent, tantum non miracula inde expectant
& immortalitatem. Doleo etiam Boërha-
vium magnifice nimis de eodem sentire;
Ventriculum roborare, Digestionem juvare,
Vermes necare, Menses & Hæmorrhoides
movere observatum ferunt, sed probe omni-
no notandum, ejus usus Sanguinem, illum
maxime, qui per vasa Hæmorrhoidalia mo-
vetur, exagitari.*

ELIXIR PROPRIETATIS RHABARBA-
RINUM Kalde.

℞. Aloës Succotrinæ,

Myrrhæ electæ ana unciam unam,

Rhabarbari electi unciam unam se-
mis,

Croci,

Salis Tartari ana drachmas duas:

Pulverifata digerantur cum
Vini Malvatici unciis duodecim:
Colentur.

*Scopo Purgandi & Hepar reserandi e-
tiam reliquis præferendum esse putatur.*

ELIXIR STOMACHICUM sive TIN-
CTURA AMARA Edinburgensium.

℞. Radicis Gentianæ uncias duas,
Flavedinis Corticum Aurantium
unciam unam,

Canellæ albæ unciam semis,

Coccionellæ drachmam semis,

Incisa, contusa Infundantur per quatri-
duum cum

Spiritus Vini unciis viginti quatuor:
Filtrentur.

*Vires ex titulo patent. Ad aliquot parva
cochlearia pro dosi datur. TINCTURA
AMARA LONDINENSIS in eo dif-
fert, quod loco Canellæ albæ Carda-
momum minus recipiat, & Coccionel-
lam omittat.*

ELIXIR STOMACHICUM Rosenſtein.

℞. Corticum Aurantium recentium se-
sq̄ unciam:

Contundantur in pulvem, digerantur cum
Vini Hispanici unciis quatuor & vi-
ginti:

Colatura dissolvatur

Extracti Gentianæ uncia una:
Filtrentur.

*Datur Cochlear unum cum Aqua Cinna-
momi.*

ELIXIR STOMACHICUM Stoughton.

℞. Radicum Gentianæ drachmas sex,
Rhabarbari semunciam,

Herbarum Absynthii,

Chamædryos,

Flavedinis Corticum Aurantium
ana drachmas sex.

Corticum Cascarillæ,

Aloës Succotrinæ ana drachmā unam:

Incisa, contusa infundantur in

Spiritus Vini rectificati unciis vigin-
ti & quatuor: Filtrentur.

Ad vitia Digestionis, quibus Obstructiones Hepatis junctæ sunt, laudatur. Dosis est ad Guttas viginti.

ELIXIR UTERINUM Crollii correctum.

℞. Castorei uncias tres,
Crocī unciam unam,
Herbæ Artemisæ uncias sex,
Terræ foliatæ Tartari unciam dimidiam:

Incisa Digerantur per quatrīdium
Spiritus Vini unciis triginta:

Filtratis addantur

Oleorum Destillatorum Angelicæ,
Anisi,
Succini ana
drachma
una:

Misceantur optime.

Ad malum Hystericum, Catamenia referenda, Fluorem album curandum olim laudabatur; medicamento multum exastuante hodie rarius utimur. Dosis est ad guttas quadraginta.

ELIXIR VISCERALE Roseen.

℞. Flavedinis Corticum Aurantium
unciam unam,

Rhabarbari veri drachmas decem,
Terræ foliatæ Tartari uncias duas:

Incisa, trita infundantur per quatrīdium
frigide in vase probe clauso cum

Vini albi generosi unciis sedecim:

In Colatura dissolvantur:

Extractorum Centaurii minoris un-
cia una,

Cascarillæ uncia semis,

Oleorum Destillatorum Chamomillæ,
Millefolii ana
scrupulus
unus:

Filtrentur.

In impedita Digestione & aliis morbis a vitio succorum Chylopoieticorum natis magno cum successu adhibetur. Dosis est Cochlear parvum.

ELIXIR VITÆ Matthioli correctum.

℞. Radicum Galangæ minoris,
Zinziberis,

Zedoariæ ana unciā semis,
Calami Aromatici,

Herbarum Majoranæ,

Menthæ,

Thymi,

Serpilli,

Rorismarini,

Salviæ,

Florum Rosarum pallidarum ana
drachmas duas,

Seminum Anisi,

Fœniculi ana drachmam
unam,

Cinnamomi acuti unciā unam semis,

Caryophyllorum,

Nucis Moschatæ,

Macis ana unciam dimidiam,

Cubeborum,

Lignorum Santali citrini,

Aloës,

Cardamomi minoris ana drachmas
duas,

Corticum Citri recentium unciam
unam semis:

Incisa & contusa Digerantur per tri-
dium cum

Spiritus Vini rectificati unciis septua-
ginta duabus:

Addantur:

Aquæ fontanæ unciæ viginti duæ:

Destillentur lento igne unciæ circiter
octoginta:

*Matthioli descriptio, quæ occurrit in Com-
ment. in Dioscorid L. V. Cap. 7. in com-
pendium redacta, prouti vulgo in Dispen-
satoriis legitur, hic exhibetur. Cuilibet pa-
tet, Spiritum aromaticum admodum incon-
grue nomine Elixir insigniri, & hoc medi-
camentum potius Aquis Cephalicis, quibus
sibi superioribus seculis multum placuerant
medici homines esse, adscribendum. Sed in
ipso quoque suo Elixir laudando nimius est,
Thrasonemque agit Auctor l. c. Scopo Ro-
borandi potest ad Cochlear unum exhiberi.
Qui potu spirituosos delectantur, blandimen-
tum inde suæ gulæ parare solent. Quantitati
hic præscriptæ adjici solet.*

Ambraë Gryseæ,

Moschi ana scrupulus unus:

Quo factō **ELIXIRIUM VITÆ Matthioli
COMPLETUM** cognominatur.

ELIXIR VITRIOLI *Mynsichti* correctum.

℞. Radicum Galangæ minoris unciam
unam semis,
Calami Aromatici unciam
unam,
Herbarum Menthæ crispæ,
Salviæ ana unciam dimi-
diam,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Zinziberis ana drachmas tres,
Nucum Moschatarum,
Cubebæ,
Corticum Citri ana drachmas duas:
Incisa, contusa infundantur per octiduum
cum
Olei Vitrioli unciis tribus &
Alcoholis Vini unciis viginti quatuor:
Liquore colato dissolvantur
Sacchari albissimi uncia quatuor:
Filtrentur.

*Pessime præeunte Mynsichto Dispensato-
ria vulgo jubent digestionem per aliquod tem-
pus solo Acido Vitriolico institui, quo omnes
partes oleosæ penitus comburerentur. Trille-
rus huic medicamento Stomachico egregias
tribuit virtutes, Frigidis præsertim Pituitosis
& Flatuosis convenire appetitumque excitare
docet. Egregius Haen in Rat. Med. T. XII.
Cap. VI. §. V. plures profert observationes, qui-
bus hoc medicamentum cum magno successu
contra Phtisin Pulmonalem fuisse adhibitum
probatur. Dosis est ad guttas quadraginta.*

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM

Edinburgensium.

℞. Spiritus Vini rectificati uncias duo-
decim,
Olei Vitrioli uncias tres:
Misceantur secundum artem & Dige-
rantur per triduum:
Tunc addantur
Cinnamomi drachmæ sex,
Zinziberis uncia semis,
Herbæ Menthæ Piperitidis drachmæ
duæ:
Digerantur per sex dies & Filtrentur.
Egregium Medicamentum Stomachicum,

*quod & in morbis Putridis cum successu da-
ri poterit. Dosis est ad guttas duodecim.*

ELIXIR VITRIOLI DULCE

Edinburgensium.

℞. Cinnamomi drachmas sex,
Seminum Cardamomi minoris un-
ciam unam,
Angelicæ drachmas tres,
Piperis longi drachmas duas,
Liquoris Anodyni Mineralis *Hoffmanni*
uncias quatuor & viginti:
Contusa Macerentur per octiduum,
dein
Filtrentur.

*Stomacho roborando & pellendæ imprimis
Colicæ flatulentæ egregie inservit; Dosis ad
guttas usque viginti augeri potest.*

EMPLASTRA.

Canones.

I. Emplastrum est medicamentum ex-
ternum, digitis non adhærescens, calo-
re emolliendum & ductile, corporibus,
quibus applicatur, se agglutinans.

II. Ubi vehiculum, cujus ministerio
applicatur, eodem utrinque illinitur, di-
citur *Sparadrapum*, *Tela Emplastica*. In
formam vero cylindræam ita convo-
lutum Emplastrum ut ejus superficies to-
ta lævis, eaque crassitie sit, ut Urethræ
immitti possit, *Cereolus*, *Candeola*, *Bou-
gie* appellatur.

III. Distinctio inter *Emplastrum* & *Ce-
rata* a recentioribus merito negligitur.
Aluta Emplastro obducta Capitiq; im-
posita *Peau divine* dicitur.

IV. Consistentia spissa Emplastris *Re-
finarum* aut *Ceræ* ope datur, quæ cum
ipsis colliquefiant. Nimia siccitati *Te-
rebinthina* præcipue cavendum. Quibus
applicantur partibus, ut tenacius adhæ-
reant, *Pice* obtinetur.

V. *Resinæ* & *Gummi Resinæ* cum *Te-
rebinthina* colliquantur, *Oleis* commi-
scentur, eisq; deinde reliqua sicca in
pulverem redacta adjiciuntur & conti-
nua agitatione commiscentur.

VI. Volatilia non nisi omnibus refrigeratis, admiscenda.

VII. Calces Saturninæ Olei iusta ratione dissolutæ Emplastri consistentiam induunt. Requirit autem hæc dissolutio majorem paulo calorem, qui quo minus excedat Oleumque amburat affusa Aqua impediendum est. Hæc aqua ebullitionis, quæ durante operatione observatur, causa est, illa evaporata ebullitio cessat, tenuioresque vapores exhalant. Quod si acciderit, sedulo cavendum, ne nova aqua affundatur, illa enim ab Oleo fervente in halitus reduceretur, hujusque partem aliquam ex lebetæ non sine magno artificis periculo projiceret; continuatus autem calor, reliquum Oleum nulla aqua temperatum adureret. Itaque per totam operationem pro ea ratione, qua aqua evaporat, nova subinde est adjicienda. Simul atque omnem in auras abiisse ex traditis signis apparet, lebes illico ab igne removendus, refrigeratoque demum Oleo nova aqua affundenda est. Ipsa etiam materies inter operationem spatula lignea continuo agitari debet, ne quid Olei lebetis parietibus accrescat, inque fundum ne residat Calx metallica. In ea ratione, qua Oleum partes metallicas recipit, vapores difficiliter transmittuntur, bullæ surgunt majores, totaque massa valde intumescit.

VIII. Emplastrum postquam parata sunt, super asserem ope manuum in bacillos formantur, quos *Magdaleones*, ipsum vero hunc laborem *Malaxare* dicunt.

EMPLASTRUM *Abbatis de Grace*.

Videatur Emplastrum album coctum.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM *Edinburgensium* POLYCHRESTUM *Suecorum*.

℞. Emplastri Diachyli simplicis uncias duodecim,
Picis Burgundicæ uncia sex,
Colliquefiant.
Ad partes continendas nec non ad levia

Vulnera a sordium illapsu defendenda adhibetur. Æquat vires EMPLASTRI STICTICI Plenck.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM *Celsi*.

℞. Cerussæ Venetæ uncias quadraginta,
Olei Olivarum uncias triginta:
Coquantur sub perpetua, ope spatulæ, lignæ agitatione, & crebra aquæ affusione usque dum aliquot guttæ aquæ frigidæ instillatæ Emplastri consistentiam arguant.

Exsiccat, Refrigerat, Discutit, ad membra Ambusta valet, Intertrigines sanat, Cicatricem inducit. In, Arthritide vero, Erysipelate, Rheumatismis ne adhibeatur, cautio est. Mammis induratis quoque imponitur. Potest substitui EMPLASTRO Abbatis de Grace.

EMPLASTRUM de AMMONIACO *Danorum*.

℞. Cereæ citrinæ,
Resinæ Pini,
Terebinthinæ ana uncias quatuor,
Gummi Ammoniaci uncias octo:
Colliquantur & per stupam colentur.

Variis, quæ apud Auctores prostant, compositionibus hanc, scilicet simpliciore, præferendam esse duxi. Emollit, Discutit, Maturat, Resolvit.

EMPLASTRUM de AMMONIACO cum MERCURIO *Londinensium*.

℞. Argenti vivi uncias tres,
Balsami Sulphuris Rulandi drachmam unam:
Terantur probe usque dum omnes globuli Mercuriales disparuerint, dein immisceantur sensim sub perpetua agitatione

Gummi Ammoniaci uncia duodecim,
liquatæ.

Terebinthinæ unciis tribus.

In Glandularum indurationibus cum successu adhiberi posse videtur.

EMPLASTRUM ANGLICUM. EMPLASTRUM ADHÆSIVUM *Widstoock.*

℞. Ichthyocollæ uncias duas,
Benzoës,
Styracis electæ ana drachmam unam,
Spiritus Vini rectificatissimi uncias
viginti quatuor,
Immittantur Cucurbitæ & calore detineantur, usque dum omnia fuerint dissoluta, solutioque refrigerata consistentiam gelatinæ induat. Oblinatur penicilli ope serico tenso. Antequam prius fuerit exsiccatum non inducatur alterum stratum, eademque sub cautela fiat stratorum iteratio, usque dum requisita crassities surrexerit.

Celebratum hoc Emplastrum sub nominibus THE LADY'S BLACK STICKING PLAISTRE, T'AFFETAS D' ANGLETERRE, ENGLISCHER T'AFFET in creberrimo usu est ad Solidanda leviora Vulnera.

EMPLASTRUM ANODYNUM in CANCRO *Decher.*

℞. Emplastri Diapompholygos unciam unam,
Fuliginis splendentis scrupulos quatuor,
Opii pulverisati drachmam unam,
Salis Volatilis Ammoniaci scrupulos duos:

Mixta Malaxentur cum
Olei Solani quantitate sufficiente.
Virtutes ex nomine patent.

EMPLASTRUM ANODYNUM *Wildegansii.*

℞. Emplastri Saponati,
Ceræ citrinæ ana uncias quatuor:
Colliquatis & semi refrigeratis addantur
Olei Tartari fetidi drachmæ quinque,
Opii in pulverem redacti uncia semis,
Camphoræ drachmæ tres, dissolutæ in
Olei Seminis Hyoscyami drachmis quinque:

Misceantur probe.

Ad morbos Articulares commendatur.

EMPLASTRUM ANTAPOPLECTICUM *Hanckenii.*

℞. Olei Nucum Juglandum uncias duodecim,
Terebinthinæ,
Resinæ communis ana uncias quatuor,
Colophonii uncias duodecim,
Ceræ Citrinæ uncias sexaginta quatuor:

Colliquatis addantur

Pulverum Succini,
Tacamahacæ,
Carannæ,
Sandaracæ ana uncia una semis,
Olibani,
Mastychis,
Storacis,
Benzoës ana uncia una,
Radicum Cyperi rotundi,
Pyrethri,
Angelicæ,
Iridis Florentinæ ana uncia semis:

Probe mixtis & pene refrigeratis commisceantur

Axungia Castorei,
Camphoræ ana drachmæ duæ,
Oleorum destillatorum Macis,
Majoranæ,
Caryophyllorum,
Ligni Rhodii,
Lavendulæ
ana scrupuli duo,
Salviæ,
Rorismarini,
Chamomillæ,
Succini ana guttæ duodecim:

Mixta efformentur in Emplastrum Vesicæ commissum aservandum.

Applicatur Capiti raso tam arcendæ quam curandæ Apoplexiæ causa.

EMPLASTRUM ATTRAHENS

Londinensium.

℞. Resinæ,
 Cera ana uncias sedecim,
 Sevi Ovilli uncias octo
 Liquefiant & per colum trajiciantur.
Ad Suturas siccas adhibetur.

EMPLASTRUM E BACCIS LAURI

Mesue correctum.

℞. Cera Citrinæ uncias octo,
 Resinæ vulgaris,
 Olei Laurini,
 Terebinthinæ ana uncias duas:
 Liquatis admisceantur
 Pulverum Baccarum Lauri uncia qua-
 tuor,
 Radicum Cyperi rotundi,
 Corticis VVinterani,
 Olibani,
 Mastichis,
 Myrrhæ ana uncia una:

Probe misceantur.

*In Hydrope & affectibus a Flatibus ortis
 Abdomini, in Cephalalgia Capiti imponitur.*

EMPLASTRUM de BELLADONNA

Brunsvicensium.

℞. Succii recentis Foliorum Belladonnæ,
 Olei Lini ana uncias novem:
 Coquantur ad consumptionem humidita-
 tis, tunc addantur
 Cera Citrinæ uncia sex.
 Terebinthinæ Venetæ drachmæ sex:
 Liquatis admisceantur
 Pulveris Foliorum Belladonnæ un-
 ciæ duæ.

*Testantur Brunsvicenses, hoc Emplastrum
 egregie Emollire ac Dolores sedare, inpri-
 mis ad Mammarum vel Scroti Tumores
 duros aut Resolvendos aut ab bonam Sup-
 purationem perducendos cum successu in usum
 tractum fuisse.*

EMPLASTRUM de BETONICA

Zwælfseri.

℞. Cera flavæ,
 Resinæ Pini,
 Terebinthinæ ana uncias duas:
 Liquefactis addantur
 Pulverum Betonicæ,
 Mastichis,
 Olibani,
 Mumia ana uncia una:
 Probe misceantur.

*Raso Capite imponitur ipsius Vulneribus
 & Contusionibus, nec non in Cephalalgia
 & morbis Catarrhalibus, qua efficacia ego
 non disquiram; id saltem addere non du-
 bito, ad grave Syncipitis Vulnus, cujus S.
 Pauti in Quadripart. Botanic. p. 223. me-
 minit, sanandum; hoc Emplastrum ne hilum
 quidem contribuisset.*

EMPLASTRUM ad BUBONES
VENEREOS *Boerhave.*

℞. Florum Sulphuris uncias duas,
 Mercurii vivi drachmas duas:
 Probe terantur usque dum omnes glo-
 buli Mercuriales disparuerint, tunc ad-
 dantur
 Sacchari Saturni drachmæ tres,
 Mixta ingerantur sub non intermissa agi-
 tatione,
 Emplastrorum de Meliloto,
 Cumino,
 Galbano,
 Emplastrorum de Ammoniaco,
 Sagapeno ana un-
 ciæ dimidiæ:

Liquando commixtis & semirefrigeratis.

*Testatur Trillerus se in pluribus ægrotis
 expertum esse, hujus Emplastri ope Bubones
 Venereos inveteratos, adeoque tenacissimos
 potenter fuisse solutos & dissipatos, nec non
 ingentes Testiculos Venereos detumuisse.*

EMPLASTRUM CAMPHORATUM

Stablii.

℞. Olei Olivarum uncias duodecim,
 Minii uncias octo,

EMPLASTRUM.

Coquantur ad Consistentiam Emplastri, cui refrigerato addantur

Camphoræ, paululum Olei Olivarum dissolutæ, unciaë duæ.

Refrigerans, Resolvens atque Anonydina virtus huic Emplastro adscribitur, Ambustis & Excoriatis partibus cum successu imponitur: Optime substituitur EMPLASTRO DOMUS MISERICORDIÆ et EMPLASTRO de MINIO.

EMPLASTRUM CATAGMATICUM, seu ad FRACTURAS Danorum.

℞. Colophonii uncias viginti quatuor, Terebinthinæ uncias sex:

Liquatis adjiciantur

Pulverum Radicum Bistortæ,
Symphyti,
Tormentillæ ana
unciaë tres:

Compositionem Medicamenti, quod nomi- ni suo minime respondere inter omnes constat, simpliciorum, reliquis in Dispensatoriis passim obviis præferendam esse duxi.

EMPLASTRUM CEPHALICUM Danorum.

℞. Tacamahacæ,
Carannæ,
Styracis Calamitæ,
Mastychis ana unciam unam,
Terebinthinæ Argentoratensis dra- chmas duas,

Leni igne Liqueantur, pene refrigeratis addantur

Opii pulverisati scrupuli quatuor,
Balsami Peruviani semuncia,
Olei Succini drachma una:

Misceantur probe.

In Capitis doloribus partis affectæ; in Odontalgia Temporibus applicatur. Substitui potest EMPLASTRO ad DOLORES DENT- TIUM, et EMPLASTRO ad TEM- PORA.

EMPLASTRUM de CICUTA CUM GUMMI AMMONIACO Schræderi correctæ.

℞. Cerae flavæ uncias duodecim,
Olei Hyoscyami uncias quatuor:
Tom. II.

EMPLASTRUM. 73

Colliquatis addantur

Succi Cicutæ inspissati unciaë sex,
Gummi Ammoniaci pulverisati,
Pulveris Cicutæ ana unciaë octo:

Probe misceantur.

Ad Scirrhus & præcipue Lienis Hepati- squæ Tumores enixe commendatur, id quod Schulzius quoque Prælect. in Dispens. Ob- servatione probat. EMPLASTRI SPLE- NETICI vices supplet; imponitur quoque Carcinomatibus.

EMPLASTRUM CITRINUM

Augustanorum.

℞. Resinæ uncias sedecim,
Cerae Citrinæ,
Sevi cervini ana uncias decem,
Terebinthinæ uncias tres:

Colliquatis & colatis addantur

Pulveris Curcumæ drachmæ tres.

Ad Ulcera & Vulnera maturanda va- let, imponitur quoque levibus Vulneribus. ab illapsu sordium tuendis. Vices sustinet EMPLASTRI TETRAPHARMACI.

EMPLASTRUM AD CLAVOS

PEDUM Argentoratensium.

℞. Emplastri Diachyli unciam semis,
Picis navalis unciam unam:

Colliquatis addantur

Pulverum Galbani unciaë duæ,
Viridis Æris,
Salis Ammoniaci ana scru- puli duo:

Probe misceantur,

Vires ex nomine patent, vices EMPLA- STRI VIRIDIS explet.

EMPLASTRUM COMMUNE

Londinensium.

Videatur Emplastrum Diachylon.

EMPLASTRUM de CRUSTA PANIS

Augustanorum.

℞. Cerae Citrinæ uncias sex,
Oleorum Mastychis,
Cydoniorum,
Terebinthinæ ana unciam unam:

K

Col-

Colliquatis addantur
Cruſtæ Panis toſtæ , in pulverem tritæ
unciæ duæ ,

Pulverum Tacamahacæ uncia una ,
Maſtychis ,
Caryophyllorum ,
Nucis Moſchataæ ,
Herbæ Menthæ ana uncia
ſemis :

Probe miſceantur & Emplaſtrum aſſer-
vetur Veſicæ incluſum .

*Stomachi roborandi gratia , præcipue in
Vomitu , regioni Epigaſtricæ imponitur .*

EMPLASTRUM de CUMINO Londinen-
ſium . EMPLASTRUM STOMACHI-
CUM ſive EBACCIS LAURI Suecorum .

℞. Cera citrinæ ,
Emplaſtri Diapalmæ ,
Olei Olivarum ana uncias ſex :

Colliquatis & ſemirefrigeratis addantur
Pulveris Seminis Cumini uncia ſex ,
Baccarum Lauri uncia duæ ,
Olei deſtillati Cumini drachma una .
Probe miſceantur & Emplaſtrum aſſer-
vetur Veſicæ incluſum .

*Ad Flatus Diſcutiendos imponitur Umbi-
lico . Laudatur quoque ad Tumores durio-
res , Mammarum maxime , Reſolvendos .*

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RU-
BRUM Danorum .

℞. Lithargyrii uncias duodecim ,
Olei Olivarum uncias viginti qua-
tuor ;

Coquantur ad Lithargyrii diſſolutionem ;
tunc addantur

Cera Citrinæ ,
Terebinthinæ Venetæ ,
Pulveris Olibani ana uncia duæ :

Colliquatis admisceantur
Colcotharis Vitrioli uncia tres .

*Hoc Emplaſtrorum genere Veteres Afflu-
xum Humorum ad partes conſtringendo Va-
ſa morari & impedire conati ſunt , ne vi-
tium cuidam parti in hærens ulterius ſe diſ-
fundat . Plures horum Emplaſtrorum deſcri-
ptiones proſtant ; hodie rarius in uſum tra-
huntur .*

EMPLASTRUM DIABOTANUM

Blondii .

℞. Radicum & Foliorum Bardanæ ,
Petaſitidis ,
Calendulæ ,
Chamaepiteos ,
Leviſtici ,
Valerianæ ,
Angelicæ ,
Enulæ ,
Armoraciæ ,
Cucumeris ſil-
veſtris ,
Scrophulariæ ,
Sedi minoris ,
Chelidonii
majoris ,
minoris ,
Gratiolæ ana
uncias ſex :

Incifa coquantur cum
Aquæ unciis mille :

Ad dimidias , colatis cum expreſſione
addantur

Succorum Cicutæ ,
Chelidonii majoris ,
Hormini ana uncia ſexa-
ginta quatuor ,
Sedi minoris uncia ſede-
cim :

Bulliant paululum colentur & evaporen-
tur ad conſiſtentiam Extracti , hujus
Extracti unciis ſedecim commiſceantur

Gummi Galbani ,
Ammoniacy ,
Opoponacy ,
Sagapeni ana uncia qua-
tuor ,

In Aceto Scillirico diſſoluta & ad conſi-
ſtentiam Extracti evaporata , probe
mixta addantur

Lithargyrii unciis triginta duabus ,
Oleorum Olivarum unciis ſedecim ,
Catellorum ,
E Mucilaginitibus ana unciis
octo :

Secundum artem coctione diſſolutis : ad-
jiciantur .

Florum Sulphuris ,

EMPLASTRUM.

Ceræ Citrinæ,
 Storacis liquidæ,
 Picis ana uncia sedecim:
 Colliquefactis commisceantur
 Pulverum Radicum Ireos Florentinæ,

Cyclaminis,
 Ranunculi,
 Coronæ Imperialis,
 Serpentariæ,
 Hellebori albi
 ana drachmæ
 sex,
 Sigilli Salomonis,
 Ari ana uncia una,
 Aristolochiæ
 longæ,
 rotundæ,
 Clematitidis ana
 drachmæ duæ,
 Afari uncia tres:

Probe agitentur, usque dum semirefrigeratæ fuerint; tunc adjiciantur

Pulverum Baccarum Lauri,
 Florum Meliloti ana uncia
 dimidia,

Seminum Angelicæ,
 Nasturtii ana
 drachmæ sex,
 Cumini uncia
 tres,

Fimi Columbini uncia una,
 Gummi Asphalti,

Olibani,
 Mastichis ana
 uncia octo,
 Tacamahacæ un-
 cia duodecim,
 Bdellii,
 Myrrhæ ana un-
 cia tres,
 Euphorbii uncia
 una:

Agitentur usque dum omnia refrigerant, tunc immisceantur adhuc

Camphoræ tritæ uncia una semis,
 Oleorum destillatorum Caryophyllorū
 uncia una,
 Philosophorū
 uncia duæ
 cum dimidia:

EMPLASTRUM.

75

Formentur Magdaleones.

Theriacalis hæc compositio olim magnificabat in Gallia ad Resolvendos Tumores Glandularum & Viscerum, hodie evilescente cæpit.

EMPLASTRUM DIACHALCITEOS.

Videatur Emplastrum Diapalmæ.

EMPLASTRUM DIACHYLON CUM GUMMI Vigonis correctum. EMPLASTRUM GUMMOSUM Suecorum.

℞. Emplastri Diachyli simplicis uncias
 viginti quatuor,

Ceræ flavæ uncias quatuor:

Colliquatis addantur

Terebinthinæ Venetæ,

Pulverum Gummi Ammoniaci,

Galbani,

Opopanacis,

Sagapeni ana un-
 uncia una:

Semirefrigeratis immisceantur:

Pulveris Croci drachmæ duæ.

Digerendi & Maturandi scopo frequenter usurpatur.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX Mesue.

℞. Mucilaginum Radicis Althææ,

Seminum Lini,

Fœnugræci
 ana uncias
 duodecim,

Olei Olivarum uncias triginta sex:

Coquantur ad consumptionem humiditatis, tunc addantur

Lithargyrii uncia viginti quatuor:

Coquantur ad consistentiam Emplastri.

Proxime ad Emplastrum Adhæsivum accedit. Londinenses Mucilagines omittendo, quæ utique hic parum efficaces sunt, EMPLASTRUM COMMUNE parant; neque etiam male substituitur EMPLASTRO DE LAPIDE GALAMINARI Pomphylus dicto.

EMPLASTRUM DIAPALMÆ *vel* DIA-
PHOENICON *Galenii correctum*, *vel*
DIACHALCITEOS.

℞. Oleorum Palmarum uncias sex,
Olivarum uncias sexaginta
sex,
Foliorum Quercus tenello-
rum uncias octo:

Coquantur ad consumptionem humidira-
tis; addantur

Lithargyrii uncia quadraginta octo:
Coquantur secundum artem ad confi-
scentiam Emplastri, in Aqua, præcaven-
dæ adustionis gratia affundenda, dissol-
vantur

*Exsiccantes & Discutientes vires edit,
Ulceribus imponitur nec non Vulneribus clau-
dendis.*

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM
Mynsichti.

℞. Cerae flavæ uncias undecim,
Colophonii uncias quatuor,
Terebinthinæ uncias duas:
Colliquatis addantur

Pulverum Succini uncia tres,
Gummi Bdellii uncia qua-
tuor,
Ammoniacy uncia
duæ,
Galbani,
Sandaracæ ana
uncia una,
Mastychis,
Olibani ana un-
cia semis:

Probe misceantur.

*Roborandi & Discutiendi sine adhibetur,
maxime contra Oedemata laudatur; Luxatis
imponitur.*

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS
Nicolai.

℞. Olei Solani uncias triginta quatuor,
Cerussæ uncias decem:
Coquantur secundum artem ad solutio-
nem usque Cerussæ tunc

Addantur

Cerae uncia triginta quatuor,
Colliquatis adjiciantur,
Plumbi usti uncia sex,
Pulverum Pompholygos,
Olibani ana uncia quatuor:
Misceantur agitando.

*Refrigerat, Exsiccant, Discutit, Cicatricem
iaducit. Potest EMPLASTRO SATUR-
NINO substitui.*

EMPLASTRUM DIASULPHURIS
Rulandi.

℞. Balsami Sulphuris *Rulandi* uncias sex,
Cerae citrinæ uncias duas,
Colophonii uncias sex,
Colliquatis admisceantur,
Pulveris Myrrhæ uncia novem,
*Ad Ulcera mundanda & solidanda, di-
scutiendos Tumores, Strumas maxime haud
vulgariter laudatur; in Fistula Ductus Sa-
livalis egregias inde vires vidit Buchner
apud Schulz Prælect. in Dispens. 190.*

EMPLASTRUM DIVINUM *Nicolai*
correctum.

℞. Lithargyrii uncias sedecim,
Olei Olivarum uncias triginta duas,
Viridis Æris unciam unam,
Coquantur secundum artem ad Dissolu-
tionem Metallorum, tunc colliquantur
cum
Cerae flavæ unciis octo;
Addantur sub perpetua agitatione
Pulverum Gummi Galbani,
Myrrhæ,
Bdelli ana uncia
duæ,
Ammoniacy uncia
tres,
Olibani,
Opoponacis,
Mastychis,
Radice Aristolochiæ rotun-
dæ ana uncia una,
Lapis Magnetis uncia
una semis.

*Valentiores quam Diachylon cum Gum-
mi*

EMPLASTRUM.

mi hoc Emplastrum edere vires temere creditur. Viride Æris, quod sexagesimam circiter ejus partem constituit, quem effectum edet? & in Magnete tot Oleis & Resinis obducto, quæ spes est fore, ut Tela aut alia frustra Ferri ex Vulneribus extrahat? Non male substituitur EMPLASTRO MANUS DEI & EMPLASTRO OPODELDOCH.

EMPLASTRUM ad DOLORES DENTIUM.

Videatur Emplastrum Cephalicum.

EMPLASTRUM EPISPASTICUM.

Videatur Emplastrum Vesicatorium.

EMPLASTRUM ad FONTICULOS.

Videatur Ceratum Refrigerans Galeni.

EMPLASTRUM FRIGIDUM Riedlini.

℞. Cera Citrinæ uncias duodecim,
Resinæ albæ,
Sevi Hircini ana uncias sex,
Terebinthinæ Venetæ uncias quinque,
Emplastri Diachyli uncias sedecim,
Oleorum Lini unciam unam semis;
Liliorum alborum,
Lumbricorum terrestrium,
Chamomillæ ana unciam dimidiam:

Colliquatis addantur

Pulverum Gummi Myrrhæ,
Olibani,
Mastychis,
Galbani,
Opoponacis, ana drachmæ duæ,
Florum Sambuci,
Chamomillæ,
Seminum Anisi,
Fœniculi,
Fœnugræci ana uncia semis,
Fabarum,
Radicum Althææ,
Symphyti ana drachmæ duæ,
Curcumæ drachmæ decem:

EMPLASTRUM.

77

Probe agitando misceantur; refrigeratis immisceatur,

Olei destillati Terebinthinæ uncia una.
Expertissimo quondam nostratum Chirur-
gorum hoc Emplastrum Digerendi & Resol-
vendi scopo frequenti in usu fuit, egregios
quoque ejus effectus celebrat Von Lindern
Venus Spiegel C. 12.

EMPLASTRUM ad FUNGOS ARTICULORUM Klein.

℞. Picis navalis uncias tres,
Cera,

Terebinthinæ Venetæ ana unciam unam:
Colliquatis addantur sub perpetua agi-
tatione

Pulverum Radicis Pyrethri,
Salis communis decrepitati,
Gummi Euphorbii ana un-
ciæ duæ,
Ammoniacy,
Galbani,
Mastychis,
Olibani ana un-
cia una.

Vires ex nomine patent.

EMPLASTRUM ad GANGLIA.

Brandeburgensium.

℞. Gummi Galbani,
Opoponacis,
Ammoniacy ana unciam unam
semis:

Dissolvantur liquando

Terebinthinæ Venetæ uncia una se-
mis:

Addantur deinceps

Pulverum Sagapeni,
Myrrhæ ana uncia una se-
mis,
Sulphuris vivi,
Vitrioli Romani,
Salis Ammoniacy ana dra-
chmæ duæ,
Euphorbii Drachma una:

Prope agitando misceantur, semirefri-
geratis addantur

Olei Laurini,
Spiritus Vini ana uncia semis:

Con-

Continuetur agitatio usque dum omnia refrigerentur.

Testatur Buchner apud Schulz in Dispens. Bassium observasse, hoc Emplastro Ganglia emolli, manu Chirurghi postea eo facilius dissipanda: Klein Select. Medicam. p. 77. vidit Hemicraniam Veneream post Antimonii & Mercurii usum remanentem, tandem hoc Emplastro Capiti superimposito victam fuisse atque dispulsam.

EMPLASTRUM de GALBANO
CROCATUM *Myrsichti.*

℞. Emplastrorum de Meliloto,
Diachylis simplicis
ana uncias tres,

Ceræ Citrine uncias duas,

Terebinthinæ unciam unam,

Pulveris Gummi Galbani uncias sex:

Colliquata agitentur donec pene refrigerentur:

Deinceps addantur

Pulveris Croci drachmæ sex:

Continuetur agitatio, usque dum omnia in spissitudinem Emplastri coagulerint.

Tumores duros Resolvit; cum successu imponitur Mammis induratis.

EMPLASTRUM GRISEUM seu DE
LAPIDE CLAMINARI *Vecker.*

℞. Ceræ uncias tres,
Sevi Cervini uncias quatuor,
Terebinthinæ sesquiunciam:

Colliquatis addantur

Pulverum Lapidis Calaminaris,

Lithargyrii ana sesquiunciam,

Tutæ,

Mastychis,

Olibani ana uncia semis:

Agitentur usque dum semirefrigerentur, tunc addatur

Camphoræ, pauxillo Olci tritæ, drachma una,

Eosdem ac Emplastrum Diapompholigos mätiores tamen effectus edit.

EMPLASTRUM ad HERNIAS
Zwuelffer.

℞. Ceræ flavæ uncias quatuor,
Terebinthinæ uncias sex:

Colliquatis addantur

Pulverum Succi Acaciæ,

Hypocistidis,

Mastychis,

Myrrhæ,

Olibani,

Radicis Symphyti ana unciam unam,

Aluminis crudi,

Sanguinis Draconis ana drachmas sex,

Nucum Cupressi,

Lapidis Hæmatitis,

Seminis Perfoliatæ,

Vitrioli de Cypro ana unciam semis:

Probe misceantur.

Satis hodie est evictum, Annulis contenta Abdominis elabi passis robur reddi Adstringentibus extus applicatis nequaquam posse. Prudentes Chirurghi totum negotium Naturæ relinquunt.

EMPLASTRUM de HYOSCYAMO
Ludovici.

℞. Olei expressi Hyoscyami uncias sex,
Succi Hyoscyami uncias duodecim:
Coquantur ad consumptionem humiditatis; addantur

Ceræ unciam quatuordecim,

Terebinthinæ unciam duam:

Liquatis & semirefrigeratis admisceantur demum

Pulveris Herbæ Hyoscyami unciam duam.

Ad Dolores Rheumaticos & Tumores Glandularum & Viscerum laudatur. Ludovici ejus eximium in Hydrocele effectum vidit. Trillerus quoque egregium ejus usum contra Perniones, Clavos pedum, & Hæmorrhoides cæcas haud semel est expertus.

EMPLASTRUM INCOGNITUM.

Videatur Emplastrum Santalinum.

EMPLASTRUM.

EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

Danorum.

℞. Resinæ albæ uncias quatuor;
Terebinthinæ drachmas sex:
Colliquatis adjiciatur
Pulveris Euphorbii drachma una se-
mis.
*In malo Ischiadico parti affectæ Resolvendi
causa imponitur.*

EMPLASTRUM ad LUPIAM Viennensium.

℞. Resinæ uncias quatuor,
Terebinthinæ uncias duas,
Gummi Galbani uncia unam:
Colliquatis commisceantur
Farinæ Frumenti,
Pulverum Gallorum Turcicarum,
Viridis Æris ana uncia una:
Misceantur probe.

*Testatur Cl. Plenck se hoc Emplastro,
singulo oetiduo renovato, aliquot Lupias in
Genu curasse.*

EMPLASTRUM MAGNETICUM

Angeli Salæ correctum.

℞. Gummi Galbani,
Ammoniaci ana uncias tres,
Cera,
Terebinthinæ ana uncias quinque:
Colliquatis addantur
Gummi Sagapeni,
Magnetis Arsenicalis subtilissime triti
ana uncia tres,
Colcothar Vitrioli,
Olei destillati Succini ana uncia una:
Misceantur exacte.

*Maxime laudatur ad curandos Bubones
Pestilenciales, sed evictum est, Arsenici
usum etiam externum maxime suspectum esse.*

EMPLASTRUM MAMILLARE.

Videatur Emplastrum de Spermate Ceti.

EMPLASTRUM de MELILOTO.

℞. Florum Meliloti uncias duodecim,
Sevi bovini uncias sedecim,

EMPLASTRUM.

79

Coquantur ad consumptionem humidi-
tatis; colatis addantur

Resinæ albæ uncia viginti quatuor,
Cera uncia duodecim:

Colliquefiant.

*Emplastri de Meliloto Andromachi ex
Roborantibus maxime & Discussantibus com-
positi mentionem facit Galenus. Ex illo
tempore plurimæ Emplastri a Meliloto de-
nominati compositiones in Dispensatoriis oc-
currunt. Cum hoc Emplastrum propter vires
Emollientes vulgo commendetur, præscriptio-
nem Parisinam exhibeo, quæ nequæ Aro-
mata, neque Gummi ferulacea vehit. Sub-
stitui potest EMPLASTRO MALACTICO.*

EMPLASTRUM MERCURIALE.

Videatur Emplastrum de Ranis cum
Mercurio.

EMPLASTRUM de MINIO Vigonis
correctum.

℞. Minii uncias duodecim,
Olei Rosarum uncias viginti quatuor:
Coquantur secundum artem ad disso-
lutionem Minii:
Addantur

Cera uncia tres:

Colliquatis & semirefrigeratis commi-
sceantur.

Camphoræ, cum paululo Olei trita,
drachmæ due.

*Laudantur ad Dissipandas Inflammationes,
ideoque Fracturis & Ambustis imponitur,
nec non Rheumatismis. Vices exsequitur
EMPLASTRORUM DOMUS MISER-
CORDIÆ, NORIGI, TRIAPHAR-
MACI.*

EMPLASTRUM MIRACULOSUM.

Videatur Emplastrum Saponatum Bar-
bette.

EMPLASTRUM de NICOTIANA
le Mort.

℞. Foliorum Nicotianæ uncias quatuor,
Olei Olivarum uncias duodecim,

Vini rubri uncias quinque:
Coquantur ad consumptionem humiditatis:

Expressis addantur:

Ceræ,

Colophonii ana uncia duodecim,
Colliquatis & colatis admisceantur de-
mum

Pulverum Gummi Tacamahacæ,

Elemi,

Myrrhæ,

Aloës ana uncia una,

Olei destillati Tabaci uncia duæ:

Misceantur.

Spleniticis commendatur: Trillerus Abdomini impositum reserare Alvum expertus docet.

EMLASTRUM NIGRUM *Bechholzii.*

℞. Cinerum Clavellatorum uncias quatuor,

Salis Ammoniaci unciam unam,

Olei Terebinthinæ uncias octo:

Digerantur per mensem in Cucurbita:
Tunc addantur

Florum Sulphuris drachmæ sex:

Digerantur denuo per mensem; dein admisceantur

Ceræ flavæ unciis duodecim,

Colophonii unciis quatuor,

Terebinthinæ drachmis sex,

Pulverum Gummi Ammoniaci,

Bdellii,

Galbani,

Sagapeni ana dra-

chmis septem,

Myrrhæ,

Olibani ana dra-

chmis sex:

Colliquatis & semirefrigeratis adjiciatur tandem,

Camphoræ, pauxillo Olei solutæ, uncia semis.

*Partibus Gangrenosis in Sphacelum prope-
rantibus imponitur. Mortuæ separationem a
viva parte felicissime inde secundari asse-
verant.*

EMLASTRUM NORICUM.

Videatur Emplastrum de Minio.

EMLASTRUM OPODELDOCH

Paracelsi.

Videatur Emplastrum Divinum.

EMLASTRUM OXYCROCEUM

Nicolai.

℞. Ceræ uncias sedecim,

Picis,

Colophonii ana uncias duodecim,

Terebinthinæ uncias quatuor:

Colliquatis & colatis addantur

Pulverum Gummi Galbani,

Ammoniaci,

Myrrhæ,

Olibani,

Mastichis ana un-
cia quatuor:

Agitentur & semirefrigeratis addatur

Pulveris Croci uncia una.

*In Luxationibus vim Resolvendi nec non
Paregoricam habet admodum efficacem. Schulz
l. c. egregium ejus effectum refert.*

EMLASTRUM POLYCHRESTUM

Hoffmanni.

Videatur Emplastrum Saponatum *Barbette.*

EMLASTRUM de RANIS *Vigonis.*

℞. Olei Olivarum,

Lithargyrii ana uncias duodecim:

Coquantur secundum artem ad dissolu-
tionem Lithargyrii:

Affundatur durante coctione Decoctum ex

Ranarum viventium numero decem,

Lumbricorum terrestrium viventium

unciis quatuor,

Herbarum Schoenanthi,

Matricariæ,

Florum Stoechados Arabicæ ana un-

cia dimidia,

Radicum Enulæ,

Ebuli ana unciis tribus,

Vini albi unciis viginti quatuor,

Aceti Vini unciis octodecim:

Ad dimidias coctis & colatis; addantur

Terebinthinæ,

Ce-

Ceræ ana unciæ duæ:
 Colliquatis superingerantur,
 Pulveris Olibani drachmæ sex,
 Euphorbii drachmæ quinque:
 Agitatis & semirefrigeratis tandem ad-
 dantur

Olei Laurini unciæ duæ,
 Styracis liquidæ,
 Pulveris Croci ana uncia semis:
 Misceantur:

*Commendatur ad Emolliendos Tumores
 frigidos.*

Ejus unciis duodecim si addideris un-
 cias unam Mercurii habebis.

EMPLASTRUM de RANIS cum MERCURIO.

*Quod cum summo successu non modo Tu-
 moribus Venereis, sed & quibuscumque Glan-
 dulis induratis imponitur. Pro varia in-
 dicatione Medici duplum, triplum, imo qua-
 druplum rationis Mercurii hic notati solent
 recipere. Optime aliis Emplastris Mercu-
 rialibus substituitur.*

EMPLASTRUM SANTALINUM vel INCOGNITUM Augustanorum.

℞. Ceræ,
 Resinæ ana uncias quatuor:
 Colliquata colentur, eisque addantur
 Pulverum Gummi Olibani,
 Mastichis,
 Myrrhæ,
 Aluminis ana drachma una
 semis,
 Ligni Santali rubri uncia
 una semis:

Semirefrigeratis commisceantur
 Pulveris Croci drachmæ duæ.

*Frustra hoc Emplastrum ad referendas He-
 patis Obstructiones, contra quas olim com-
 mendabatur, adhberi facile patet. Ad Lu-
 xationes & Sugillationes vulgo in usum trahi
 solet, sed hoc quoque respectu Emplastrum
 Oxycroceum ipsi merito præfertur.*

EMPLASTRUM SAPONATUM *Barbette vel Tachenii vel SATURNINUM Digby.*

℞. Olei Rosarum uncias duodecim,
 Minii,
 Cerussæ ana uncias sex:

Coquantur secundum artem ad confi-
 stentiam:

Tunc addantur

Saponis Veneti rasi unciæ quatuor:
 Agitentur usque dum pene refrigerint,
 tunc ipsis adhuc immisceatur

Camphoræ, paululo Olei dissolutæ,
 uncia dimidia.

*Commendatur ad leniendos Dolores Rheu-
 maticos & Arthriticos, Tumores frigidos quo-
 que Resolvere dicitur. Substituitur EM-
 PLASTRO MIRACULOSO & POLY-
 CHRESTO Hoffmanni.*

EMPLASTRUM SATURNINUM Goulard.

℞. Ceræ Citrinæ uncias novem,
 Olei Olivarum uncias octo:
 Liquatjs immisceantur

Extracti Saturni uncia semis,
 Camphoræ grana decem,
*Inungitur alutæ, quæ Membra Rheumatica
 involvuntur.*

EMPLASTRUM SATURNINUM Mynsichti.

Videatur Emplastrum Diapompholygos.

EMPLASTRUM de SPERMATE CETI Mynsichti. EEMPLASTRUM Filii Zacha- riæ.

℞. Gummi Galbani,
 Terebinthinæ ana unciam unam:
 Leni igne liquentur & colentur:

Cum colatis colliquantur

Ceræ albæ unciæ quatuor,
 Spermatis Ceti unciæ duæ,
 Olei Amygdalarum dulcium uncia
 semis.

Non modo Mammarum Tumoribus me-

detur, sed & Contusis & Sugillatis salubriter imponi potest.

EMPLASTRUM *da* SPERMATE RANARUM *Noricorum* correctum.

℞. Olei Spermatis Ranarum uncias sexaginta,

Cerussæ uncias octoginta:

Coquantur secundum artem, aquam ipsis affundendo, in qua dissoluta sint,

Aluminis uncia sex,

Ubi ad consistentiam Emplastri coagulaverint, removeantur ab igne & semirefrigeratis commisceantur

Camphoræ, paulo Olei solutæ, uncia duæ:

Vires Emplastri Albi Cocti equiparat, quin & eodem ad Discutiendas Inflammationes efficacius est.

EMPLASTRUM SPLENITICUM.

Videatur Emplastrum de Cicuta.

EMPLASTRUM STICTICUM *Crollii* correctum.

℞. Lithargyrii,

Minii,

Oleorum Lini,

Olivarum ana uncias duodecim:

Coquantur secundum artem ad consistentiam Emplastri:

In aqua, quæ sub coctione adjicitur, dissolvantur

Vitrioli albi uncia quatuor:

Coctis colliquantur

Colophonii,

Ceræ ana uncia viginti quatuor,

Terebinthinæ uncia duodecim,

Colatis addantur

Pulverum Gummi Ammoniaci,

Galbani,

Bdellii,

Myrrhæ,

Aloës Hepaticæ,

Mumiæ,

Radici Aristolochiæ longæ,

Sanguinis Draconis,

Lapidis Hæmatitæ ana uncia duæ:

Olei Laurini uncia duodecim:

Probe misceantur.

Ad Ulcera vetusta æque ac ad recentia Vulnera olim adhibebatur, hodie fere obsolescit.

EMPLASTRUM STICTICUM *Plenck.*

Videatur Emplastrum Adhæsivum.

EMPLASTRUM *de* TACAMAHACA *Schræderi* correctum.

℞. Ceræ uncias octo,

Terebinthinæ unciam unam:

Colliquatis & semirefrigeratis commisceantur

Pulveris Tacamahacæ uncia quatuor,

Balsami Peruviani,

Oleorum destillatorum Menthæ ana

drachmæ duæ,

Caryophyllorum drachmæ duæ,

In Vomitu, Diarrhœa & Flatibus regioni Epigastricæ imponitur.

EMPLASTRUM *ad* TEMPORA.

Videatur Emplastrum Cephalicum.

EMPLASTRUM TRIAPHARMACUM *Mesue.*

Videatur Emplastrum de Minio.

EMPLASTRUM VESICATORIUM *Hoffmanni.*

℞. Emplastri de Meliloto uncias tres:

Liquatis commisceantur

Pulveris Cantharidum uncia una semis,

Camphoræ, paulo, Olei solutæ drachmæ duæ.

Ex innumeris, quæ prostant, hujus Emplastri præscriptionibus, simpliciore reliquis prætuli. Ubi cum delicatioribus & sensibilibioribus res est, ratio Emplastri de Meliloto augetur.

EMPLASTRUM VIRIDE *Oribasii*
correctum.

Videatur Emplastrum ad Clavos pedum.

EMULSIONES.

Canones.

I. Nuclei cortice privati contunduntur & agitantur cum aqua, sensim sensimque affundenda; agitatis demum parata Emulsio colando depuratur.

II. Ubi Emulsionem Spuriam parandam sunt, substantia ex aqua suspendenda suo teritur sapone, donec tota sit per istum diffusa. Aqua guttatim adjicitur, usque dum omnem massam receperit.

III. Emulsionem cum ætatem non ferant, tunc demum parandam sunt, cum in usum sunt recipiendam.

EMULSIO ARABICA *Fuller* correctam.

℞. Amygdalarum dulcium unciam unam:
Amararum drachmam unam,

Pulveris Gummi Arabici unciam feminis,

Redigantur in Emulsionem cum Aquæ unciis viginti quatuor:

Colaturam addantur

Syrupi Althææ unciæ tres.

Commendatur precipue contra Ardorem Urinæ.

EMULSIO BALSAMICA *Fuller* correctam.

℞. Balsami Tolutani drachmas tres,
de Meccha guttas octo:

Terantur cum

Amygdalarum dulcium excorticatarum unciæ dimidia:

Probe subactis adjiciantur

Decocti Hordei unciæ octodecim,

Sacchari albi drachmæ sex.

Observat Triller hanc Emulsionem apte Phtisicis præscribi, inde Acre demulceri, Putredinem deleri, Tubercula discuti.

EMULSIO CAMPHORATA *Richard.*

Videatur Emulsio simplex.

EMULSIO NITRATA *Richard.*

Videatur Emulsio simplex.

EMULSIO SIMPLEX *Richard.*

℞. Amygdalarum dulcium numero sedecim,

Seminum quatuor frigidorum majorum unciam semis:

Fiat secundum artem Emulsio cum Ptisanæ communis unciis octodecim: Addatur

Sacchari albi unciæ una.

Refrigerandi, Demulcedi, Sopiendi scopo exhibetur. Ejus unciis sex si addideris Camphoræ grana duo, surget EMULSIO CAMPHORATA, NITRATA autem, Nitri depurati granis sex adjectis.

EMULSIO VIOLATA *Mynsichti.*

℞. Amygdalarum dulcium unciam unam,
Seminum Violarum drachmas duas,
Papaveris albi drachmam unam,

Aquarum Violarum unciæ sex,

Nymphææ,

Lactucæ ana unciæ tres:

Misceantur & fiat lege artis Emulsio, edulcoranda

Julepi Violati unciæ una.

Vi Refrigerante & Sopiante vulgo commendatur, quam quidem vim cum reliquis Emulsionibus veris communem habet.

ENS VENERIS *Boyle.*

Videantur Flores Salis Ammoniaci Martiales.

ESSENTIÆ.

Canones.

I. Essentia dicitur Spiritus Vini substantiis Animalibus vel Vegetabilibus digestus atque tinctus.

II. Patet hinc ad Essentias illas modo substantias recipiendas esse, quarum vis medicata pendet a principiis Spiritu Vini dissolubilibus.

III. Essentiarum vires compositæ sunt ex Extrahendorum & Spiritus Vini viribus.

IV. Essentiæ simplices recepto Spiritu abstractio loco Spiritus Vini simplicis ut plurimum evadunt efficaciore.

V. Ad parandam Essentiam simplicem Extrahendo comminuto cucurbitæque immisso affundatur Spiritus Vini; instituat per aliquot dies Digestio in Balneo arenæ; mane & vespera agitetur Essentia.

VI. Herbis triplum, Radicibus & Corticibus quintuplum, Gummi resinis, Resinis, Succis Animalium inspissatis sextuplum Spiritus Vini recipitur.

VII. Spiritus Vini, quo minus est rectificatus, eo plures recipit partes gummosas.

VIII. Ope Alkali, Extrahendis adjuvandi, Essentiam obtineri efficaciorum frequens opinio est, quæ maxime circa Essentias ex Animalibus versari solet.

IX. Essentias, quæ Alkali continent extus ad Vulnera aut Ulcera adhiberi non posse, notum jam est ex Chirurgicis.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA *Stablii*.

℞. Radicum Angelicæ,
Imperatoricæ,
Helenii ana unciam unam,
Carlinæ unciam semis,
Vincetoxici,
Pimpinellæ albæ ana unciam unam semis,

Herbæ Scordii uncias sex:

Incisa infundantur per noctem cum Spiritu Vini rectificati unciis viginti quatuor:

Filtrentur.

Illa ætate, qua morbos Exanthematicos Calidis tractare mos erat, hæc Essentia in frequenti usu fuit, hodie meliora edocti Medici homines, quæcunque Sanguinem exagitant, in morbis Febrilibus prorsus exulare jubent. In affectibus Catarrhalibus Phlegmaticorum poterit forsitan conducere. Datur ad quadraginta guttas.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA TEMPERATA *Stablii*.

℞. Essentiarum Vincetoxici,
Essentiarum Pimpinellæ albæ ana unciam unam,
Scordii uncias duas:

Misceantur.

Minus quidem quam antecedens exagitat Sanguinem, sed eadem cautio in qualicumque Febrium genere adhiberi debet.

ESSENTIA AMARA *Trilleri*.

℞. Radicum Gentianæ,
Caryophyllatæ ana unciam unam,
Corticum Aurantium viridium,
Herbarum Absynthii,
Fumaricæ,
Cardui benedicti,
Trifolii fibrini,
Millefolii,
Florum Chamomillæ,
Summitatum Centaurii minoris ana unciam semis:

Incisa Digerantur

Spiritu Vini rectificati unciis quatuor & viginti:

Filtrentur

Plures Essentias amaras ad imitationem ejus, quæ Hala præparata, auctoritate Sectæ Stabliæ in magna fama fuerat, Medici Germani præscripserunt. Earum omnium vires, quæ hic exhibetur, sustinet. Teste Auctore vires habet Stomachicas, Carminativas, Anthelminticas, & in vitiis Systematis Biliarii, Chlorosi, Fluore albo, in Febribus quoque intermittentibus conducit. Dosis est ad triginta guttas.

ESSENTIA AMBRÆ *Hoffmanni*.

℞. Ambre Gryscæ,
Salis Alkali ana drachmas duas:
Probe trita immittantur Cucurbitæ, affundanturque
Spiritus Rosarū Tartarifati uncia octo:
Coquantur usque dum Ambra sit dissoluta.

Inter Medicamenta Nervos roborantia ab Hoffmanno Obs. Chym. 18. L. I. cum laude refertur. Datur ad triginta guttas.

ESSENTIA AMBRÆ SICCA
Augustanorum correcta.

℞. Ambrae Gryseae drachmam unam,
Sacchari albillimi unciam unam:
Misceantur terendo in pulverem.

Medicamentum incongrue Essentia denominatum vires Ambrae habet. Dosis est ad sesquidrachmam.

ESSENTIA ANODYNA *Edinburgensium.*

℞. Extracti Opii Aquosi unciam unam:
Dissolvatur

Aquae Cinnamomi unciis novem:
Filtretur.

Vires Opii habet. Dosis ad guttas quindecim.

ESSENTIA ANTIMONII *Huxhami.*

Videatur Aqua Benedicta.

ESSENTIA BALSAMICA *Gmelini*
correcta.

℞. Spiritus Salis Ammoniaci Vinosi un-
cias duodecim,

Oleorum destillatorum Cinnamomi,
Nucis Moschatae ana scrupulum unum,
Caryophyllorum scrupulum dimidium,

Quintae Essentiae Corticium Aurantiorum,
Citri ana drachmas duas:

Misceantur.

Hanc solutionem, quae vel extempore parari potest, longe prolixiori apparatus, quem Dispensatorium Wurtembergense praescribit, preferendam esse duxi. Conducit ad vitia Digestionis, quae a debilitate vel obstructione Viscerum Chylopoieticorum oriuntur. Dosis est ad triginta guttas.

ESSENTIA BEZOARDICA *Halensum.*

℞. Radicum Angelicae,
Imperatoriae,
Pimpinellae albae,
Carlinae,
Helenii,
Vincetoxici,
Dictamni albi,
Contrayervae,
Valerianae ana unciam unam:

Incisa infundantur per triduum cum
Spiritus Vini rectificati unciis viginti:
Expressa filtrentur.

Quae de Essentia Alexipharmaca dicta sunt, huc quoque pertinent.

ESSENTIA CALAMI COMPOSITA
Stablii.

℞. Radicis Calami Aromatici,
Seminis Coriandri ana uncias duas:
Incisa & contusa infundantur cum
Spiritus Vini rectificati unciis viginti quatuor:

Filtrentur.

Stomachico & Carminativo Scopio ad guttas triginta exhibetur.

ESSENTIA CAMPHORÆ *Quercetani.*

Videatur Spiritus Vini Camporatus.

ESSENTIA CARMINATIVA *Trilleri.*

℞. Herbarum Millefolii,
Menthæ,
Melissæ,
Rorismarini,
Salviae,
Florum Chamomillae vulgaris,
Romanae ana unciam semis:

Flavedinis Corticum Aurantiorum un-
cias tres,

Cardamomi excorticati ana uncias duas,

Seminum Foeniculi unciam unam,

Carvi,
Cumini ana unciam semis:

In-

Incisa & contusa infundantur cum

Spiritus Vini unciis quadraginta octo:
Filtrentur.

Dicit Auctor, hanc Essentiam suavissimam ac jucundissimam eximia virtutis esse in omnibus morbis Ventriculi & Intestinorum a causa praesertim frigida ac Flatibus exitum frustra molientibus obortis. Dosis antecedentium.

ESSENTIA CARMINATIVA Wedelii.

℞. Radicum Zedoariae uncias quatuor,
Carlinae,
Calami Aromatici,
Galangae ana uncias duas,
Florum Chamomillae Romanae,
Seminum Anisi,
Carvi ana unciam unam,
Caryophyllorum Aromaticorum,
Baccarum Lauri ana drachmas sex,
Macis unciam semis,
Corticum Aurantium drachmas
duas:

Incisa & contusa infundantur cum
Spiritus Corticum Citri unciis sex &
quingenta,
Nitri unciis tribus:

Filtrentur.

Multum olim inter Germanos celebratum Medicamentum, eo quod Humores valide commovet, nostra aetate obsolescere coepit. Dosis ad guttas viginti.

ESSENTIA CASTOREI CARMINATI- VA Helvetica.

℞. Castorei optimi uncias duas,
Crocii Austriaci unciam unam:
Minutim incisa infundantur per viginti
quatuor horas cum
Liquoris Anodynii Mineralis unciis
duodecim:
Expressa filtrentur.

Exhibetur in Vomitu, Colica & Affectibus Hystericis ad guttas triginta.

ESSENTIA CATHOLICA PURGANS Rothii potius Hamburgens.

Videatur Elixir Anthelminticum Suecorum.

ESSENTIA CHINÆ sive TINCTURA ALEXIPHARMACA CORTICIS PE- RUVIANI Huxhami.

℞. Corticis Peruviani uncias duas,
Flavedinis Corticum Aurantium
sesquiunciam,
Radici Serpentariae Virginianae dra-
chmas tres,
Crocii optimi scrupulos quatuor,
Coccionellae scrupulos duos,
Spiritus Vini Gallici uncias viginti:
Incisa infundantur per quatuor dies &
dein filtrentur.

Illustris Auctor in Observat. de Aere & Morbis Epidem. Mens. Jul. 1740 & in Libro de Febris Cap. 8. hoc Medicamentum roborare Fibras atque justam fluidorum constitutionem restituere, neque tamen morbose Humoris exitum per Cutim inhibere annotat, testaturque se eo non in Febris solum intermittentibus, lentis & nervosis, sed in putridis quoque pestilentialibus & petechialibus in eorum praecipue decremento salubriter usum esse. Dosis est ad guttas sexaginta ter aut quater de die.

ESSENTIA DULCIS Halensium.

Videatur Tinctura Antimonii Acris.

ESSENTIA FULIGINIS Clauderi.

℞. Cinerum Clavellatorum depuratorum
uncias sex,
Salis Ammoniaci unciam unam:
Committantur vitro, affundantur
Aqua fontanae unciae triginta sex:
Statim probe claudatur vitrum, & ali-
quoties agitetur, usque dum Salia sint
dissoluta, tunc adjiciantur:
Fuliginis e camino splendentis & pul-
verisatæ unciae duae:
Vitro denuo probe clauso digerantur
per aliquot dies & filtrentur.

*Quamvis in omnibus, quas huic Es-
sentiae adscribit, virtutibus adeo non sub-
scribam Claudero de Balsamat. Cap. 7. ut
potius in morbis calidis eam esse nocituram
Cartheusero Pharmacop. p. 341 lubens con-
cedam; attamen cum ejus indoles sit eviden-
ter*

ESSENTIA.

ter saponacea, vires utique Resolventes & Aperientes polliceri, neque sine successu in Quartana, Ictero &c. adhiberi posse liquido videtur.

ESSENTIA HYSTERICA *Durietz.*

℞. Asæ foetidæ drachmas duas,
Opium,
Salis Volatilis Cornu Cervi ana drachmam semis,
Essentiæ Castorei uncias tres,
Digerantur per aliquot dies & filtrentur.
In Paroxysmis Hystericis ad guttas viginti datur.

ESSENTIA LIGNORUM *Hamburgensium.*

℞. Radicum Sarsaparillæ,
Helenii,
Chinæ ana unciam unam,
Rhabarbari unciam dimidiam,
Lignorum Quajaci,
Sassafras ana unciam unam,
Santali rubri drachmas sex,
Semmitatum Fumarie unciam unam:
Incisa infundantur per octiduum cum Spiritus Vini unciis viginti quatuor: Filtratis addantur Spiritus Salis unciæ trës.
Medicamenti, quo tanquam Polychresto ad quascunque Humorum corruptiones olim frequentissime utebantur, hanc apponere præscriptionem, quam vulgo receptam Michaelianam consultius duxi. Dosis est ad guttas triginta.

ESSENTIA STOMACHICA POLYCHRESTA *Gundelsheimeri.*

℞. Piperis longi,
Nigri,
Albi ana drachmas duas,
Hispanici unciam unam:
Contusis affundantur Liquoris Terræ foliatæ Tartari,
Spiritus Salis Ammoniaci Vinosi ana unciæ sex:
Digerantur & filtrentur.
Valide omnino Resolvit, in Glutinoso &

ESSENTIA.

87

in Cachexia conducit, sed in Temperie frigida modo locum habet. Datur ad guttas triginta.

ESSENTIA STOMACHICA ad METHODUM *Hoffmanni Argentoratensium.*

℞. Radicum Calami Aromatici,
Angelicæ,
Galangæ minoris,
Zedoariæ ana drachmas tres,
Herbarum Cardui benedicti,
Menthæ,
Millefolii,
Trifolii fibrini,
Summitatum Centauri minoris,
Florum Chamomillæ Romanæ ana drachmas duas,
Corticum Cascarillæ unciam semis,
Aurantiorum,
Citri ana drachmas duas,
Costi veri scrupulos quatuor,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Seminum Anisi,
Fœniculi ana drachmam unam,
Salis Tartari drachmas sex:
Incisa, contusa infundantur cum Vini Malvatici unciis quatuor & viginti:
Filtrentur.
Hæc Essentia minus, quam quæ Spiritum Vini recipiunt, calida ad roborandum Ventriculum frequentius usurpatur. Datur ejus Cochlear parvum pro dosi.

ESSENTIA SUCCINI *Hoffmanni.*

℞. Succini subtilissime triti,
Salis Tartari ana uncias duodecim:
Infundantur per aliquot dies cum Spiritus Vini rectificatissimi unciis viginti quatuor:
Abstrahatur deinde Spiritus & affundatur Succini subtilissime triti unciis octo cum
Olei Tartari per Deliquium quantitate sufficiente; in pastam tritis & exsiccatis

Per

Per octiduum calore Balnei digesta filtrentur.

*Nervina & Anticatarrhalis esse censetur.
Dosis est ad guttas viginti.*

ESSENTIA TRAUMATICA *VWedelii.*

℞. Radicis Tormentillæ unciam semis,
Florum Rosarum rubrarum
Hyperici ana drachmas duas,
Ligni Santali rubri,
Mumiæ,
Sanguinis Draconis ana unciam unam,
Terræ Japonicæ,
Myrræ rubræ ana unciam semis,
Nucistæ drachmam unam:

Incisa infundantur cum

Spiritus Vini Tartarifati unciis viginti:
Filtrentur.

Laudatur ad sistendas Hemorrhagias; quo merito? Medicis intelligentibus facile patebit. Funestos inde effectus vidit & affert Trillerus.

EXTRACTA.

Canones.

I. In partibus ne Resinosi an Gummosi hæreat virtus, quam de substantia Extrahenda desiderant, Medicorum est nosse, & pro hac ratione Menstruum determinare.

II. Aqua quidem Resinas dissolvere nequit, sed partes Resinosæ Gummosi ut plurimum adeo arte immixtæ esse solent, atque implicite, ut cum his ipsam aquam subeant.

III. Extractum Gummosum a Resina liberum qui habere cupiunt aquam quæ Extractionem peregit, per aliquod tempus coquant, frigidam ipsi adjiciant, & aliquantisper in quiete relinquunt, ita maxima saltem Resinæ portio ad fundum secedit, unde dein decantatur liquor partibus Gummosis factus.

IV. Liquor, qui Extractionem peregit, citra ebullitionem ad consistentiam Syrupi tenuioris est perducendus, dein super discos effundendus, & justo calore evaporandus.

EXTRACTUM.

V. Vulgaris Extracta mollia parandæ ratio ea est, qua ipsis semper Empyreuma affricatur.

VI. Vinum parandis Extractis, quibus quippe varia suorum principiorum nunquam non immiscet, minus idoneum est.

VII. In Vasis metallicis Extracta, quippe acido nunquam non imprægnata pessime asservantur.

VIII. Plurima Extracta cum humiditatem ex aère attrahant, in vasis probe clausis condenda sunt.

IX. Omnes Succi inspissati substantiæ unde parantur, vires proprias habent, sed & hic probe cavendum ne adurantur.

X. Succi inspissati *Cicutæ, Aconiti, Chelidonii Majoris, Cochleariæ, Hyoscyami, Nicotianæ, Stramonii, Belladonnæ & Taraxaci* sub nomine Extractorum prostant.

EXTRACTUM CATHOLICUM

Paracelsi sive Rudii.

℞. Radicum Hellebori nigri,
Agarici optimi,
Scammenei ana unciam unam,
Pulpæ Colocyntidis unciam unam
semis,

Aloës optimæ uncias duas,
Spiritus Vini uncias triginta:

Infundantur per aliquot dies, deinde exprimantur & colentur, Abstrahatur postea Spiritus Vini.

Refert VVepper Observat. Medic. Pract. Obs. 46. Eustachium Rudium Medicum Italum hoc Extractum enixe commendasse & pro suo venditasse. Omnia Medicamenta Venterum Catholica cum Viscera Abdominalia admodum conturbent, rarissime hodie usurpantur.

Dosis est ad grana decem.

EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI

Bacheri.

Radices Hellebori nigri tenuissime comminute vasi terreo vitreato committuntur, irroratæ Spiritu Vini alcalifato per duodecim horas relinquuntur, quo temporis intervallo aliquoties agitatæ iterum

EXTRACTUM.

rum irrorantur, Vino deinde Rhenano bonæ notæ ad eminentiam sex digitorum illis affuso digeruntur per biduum & cum Radices Vinum imbiberint, novum adjicitur, ita ut semper ea, quæ dicta est, Menstrui ratio obtineat; crebro quoque spatulæ lignæ ope Radices cum Vino commiscentur; tum coquantur per dimidiam horam valideque exprimuntur; residuis Radicibus tantundem Vini affunditur, & reliqua omnia, ut antea facta sunt, eadem methodo iterantur. Jam ambobus liquoribus expressis & colatis ferventis Aquæ duplum adjicitur, evaporatioque instituitur usque ad consistentiam Syrupi; addita postmodum Spiritus Vini nona parte evaporatio continuatur, usque dum Terebinthinæ consistentia surrexerit.

Hoc Extractum Pilularum Tonicarum infra describendarum basin constituit, utrum vero illud, quod vulgari ratione paratur, reapse superet nec ne, experientia judice sed caute & prudenter instituta decernendum est. Preparatio ipsa varia videtur habere superflua, sed circa Medicamenti novi & tantopere laudati dosin quidquam mutare nolui.

EXTRACTUM LIQUIRITIÆ GUMMOSUM *Argentorat.* GELATINA LIQUIRITIÆ, SACCHARUM GLYCYRRHIZATUM *Helvetorum*, REGISSE ROYALE, LIQUIRITIALUCIDA *Danorum*, GLUTEN PECTORALE.

℞. Radicis Liquiritiæ rasæ & contusæ unciam unam:

Infundantur per viginti quatuor horas in aquæ calidæ unciis centum & viginti: In colatura dissolvantur

Gummi Arabici albissimi unciæ sexaginta.

Sacchari Canariensis unciæ quadraginta:

Dissoluta colentur & brevi coctione in consistentiam Gelatinæ reducuntur; tunc effundatur liquor in exiguæ altitudinis modulos metallicos pauxillo Olei Amygdalarum illitos, lenique fornacis calore exsiccentur.

Tom. II.

EXTRACTUM.

89

Suave aque ac efficax remedium ad sistendam Tussim ab Irritatione ortam. Ejus frustum, Drachmam circiter æquans, ore liquatur.

EXTRACTUM MAROCOSTINUM

Minderi.

℞. Aloës Succotrinæ uncias duodecim: Dissolvantur

Succorum Absynthii,

Apii,

Fœniculi ana unciis tribus,

Cichorei,

Fumariæ,

Pimpinellæ ana unciis octo,

Rosarum,

Citri ana unciis viginti:

Solutio clara decantatur & ad consistentiam Mellis evaporatur, tunc addantur:

Extractorum Rhabarbari drachmæ sex,

Croci drachma semis,

Gummi Ammoniacy pulverisati unciæ una semis,

Aceti Scillitici unciæ quatuor:

Evaporent ad consistentiam Extracti, cui exacte immisceantur

Pulverum Mari veri unciæ semis,

Costi veri drachmæ sex.

Vulgo tanquam basis Pilularum præscribitur. Ejus Dosis ad grana viginti & ultra determinatur.

EXTRACTUM OPII.

Opium dissolvitur aqua, colatur & leni calore ad consistentiam Extracti evaporatur.

EXTRACTUM OPII CYDONIATUM

Langelotti.

℞. Opii optimi uncias duodecim: Solvantur

Succi Cydoniorum,

Aquæ fontanæ ana unciis sexaginta:

Stent in loco temperato per aliquot dies, tunc colentur:

Colaturæ addantur

Sacchari albi unciæ quatuor:

Omnia massa relinquatur Fermentatio-

M

ni;

ni; quæ per plures menses durare solet, quo temporis intervallo baculo ligneo sæpius est agitanda, donec omnis motus intestinus cessaverit; trajiciatur postea liquor per pannum & evaporetur ad consistentiam Extracti.

Opium Fermentatione vi nocendi privati, medendi contra augeri putarunt varii Auctores, atque hoc Extractum reliquis omnibus Opium adhibendi varionibus anteposuerunt; sed in ipso hoc Extracto vim Opii esse imminutam, neque maximo labore quicquam eo obtineri, præterquam quod grandior ejus dosis sit exhibenda, siquidem medicatas inde cupiamus experiri vires, evicit Illustris Tralles Usus Opii Sect. I. Cap. VII. §. 14.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM *Augustanorum.*

℞. Scammonei unciam unam,
Seminiis Ebuli drachmas sex,
Colocynthidis drachmas decem,
Agarici drachmas septem,
Turpethi albi drachmas quinque,
Spiritus Vini uncias triginta:
Digerantur per aliquot dies; addatur deinceps Infusum ex
Rhabarbari drachmis sex,
Hermodactylorum drachmis quinque,
Hellebori nigri uncia semis,
Foliorum Sennæ unciis duabus,
Aloës Succotrinæ unciis tribus, cum
Aquæ fontanæ unciis viginti quatuor
maceratis & expressis:
Abstrahatur Spiritus Vini, residuum ad consistentiam Extracti evaporetur.

Inconcinnam compositionem Medicamenti valde irritantis ideo apposui, quia haud pauci Medicorum illud adhuc in Pilulas recipe-re solent. Dosis ad grana quindecim.

EXTRACTUM Rudi.

Videatur Extractum Catholicum.

EXTRACTUM SATURNI Goulard.

℞. Minii uncias quinque,
Aceti uncias nonaginta:

Coquantur sub perpetua agitatione per horam in vase terreo:

Liquor ad Mellis consistentiam redactus, decantatus asservetur.

Hoc Extractum omnium egregii Chirurgi remedium, suis locis descriptorum basin constituit.

Lithargyrio vix non semper Ære inquinato, Minium substituo, nec majorem Aceti rationem recipio, quam quæ ab Aceto potest dissolvi.

FARINÆ EMOLLIENTES Plenck.

℞. Farinarum Seminum Lini,
Fœnugræci ana
partes æquales.

Epithematis vel Cataplasmatibus forma applicantur.

FARINÆ RESOLVENTES Plenck.

℞. Farinarum Fabarum,
Hordei,
Tritici,
Secalis ana partes æquales.
Applicantur ut antecedentes.

FEBRIFUGUM Cranii.

Videatur Regulus Antimonii Medicinalis.

FECULA Libavii.

Radix recens contunditur cum modica Aquæ portione, prelo inde exprimitur Succus, id quod ex isto ad fundum residet colligitur & probe Aqua ablutum edulcoratur.

Hac ratione cum sive pars amylacea Radicis obtineatur, quæ undecunque colligatur semper eadem est; sive si ista carent Radices nonnisi partes terrestres Feculam efformant, hinc Feculæ eviuerunt.

FLORES ANTIMONII Basil. Valentini.

℞. Reguli Antimonii uncias octo,
Salis Ammoniaci uncias sedecim:
Tri-

Trita sublimentur ex Retorta excipulo instructa; colligantur Flores.

Validissimum hoc Drastrictum hodie usu suo fere plane destitutum videmus.

FLORES BENZOES *Schræder.*

Benzoës optime pulverifata committatur Cucurbitæ, cujus collum ampliori orificio gaudet; immittatur Balneo arenæ; lenis subministretur calor; orificio cucurbitæ imponatur cucullus chartaceus, cui Flores accrescant; refertus Floribus removeatur, Flores inde decutiantur; imponatur denuo cucullus & hæc repetantur, usque dum Flores appareant tincti, tunc enim ab ulteriore labore est desistendum,

Hi Flores ob virtutem Incidentem ad affectus Pulmonum commendari solent. Dantur ad grana octo.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES *Isaaci Hollandi.*

SAL AMMONIACUM MARTIALE *Suecorum.*

℞. Salis Ammoniaci uncias sedecim:
Limaturæ Martis unciam unam semis:
Probe mixta committantur Retortæ, & hæc Balneo arenæ; subministretur ignis, & Flores eo magis colorati surgent, quo sunt inferiores; refrigerato vase omnes desumantur, cum residuo terantur, & denuo sublimentur. Liquor penetrantissimus, qui sub hoc labore obtineatur, seorsim asservandus est. Residuum per deliquium liquatum OLEI seu LIXIVII MARTIS *Londinensium* nomine vulgo venit.

Hi Flores cum sint ipse Sal Ammoniacus aliqua Ferri portione imbutus, vires Aperientes omnino possident, & in Obstructionibus Viscerum Abdominalium morbisque inde oriundis cum successu exhibentur. Hinc maxime iis, qui Febri laborant, commendantur; nec audiendi sunt, qui præeunte Mauritiô Hoffmanno Prol. 43. §. 9. aliquid Narcotici iis inesse suspicantur. Dosis est ad drachmam semis. Spiritus urinosus, qui sub

hoc labore obtinetur, respectu virtutis medicatæ cum Spiritus Salis Ammoniaci Calce viva parati convenit. Oleo Martis vix utuntur Medentes, cum medicamentum sit rodens.

FLORES SULPHURIS *Geber.*

Obtinentur pulverem Sulphuris in cucurbita Alembico testâ, Balneoque arenæ commissa sub calore urgendo, ita moderato ne Sulphur fluat.

Hic autem labor cum sit admodum tædiosus, Floresque id genus in propriis hominum huic negotio destinatorum officinis magna copia parentur, Pharmacopæi inde sibi eos comparare ut plurimum consultius ducunt.

Vires in Materia Medica recensentur.

FLORES VIRIDIS ÆRIS.

Viride Æris digeratur Aceto, Acetum probe tinctum filtretur, leni evaporetur ad cuticulam, & crystallisationi relinquantur.

Pictoribus potius quam Medicis hæc Crystalli, improprie sane Flores dictæ, inserviunt.

FLORES ZINCI *Glauberi.*

Zincum committatur Crucibulo, fundatur, fustum stylo agitetur, flamma viridi ardebit, & sub forma Florum tam parietibus Crucibuli, quam operculo sive metallico sive lapideo, Crucibulo imposito, accrescet. Hi Flores collecti asservantur.

Glauber in *Philosoph. Ofen. P. I. C. 38.* hos Flores describit eorumque extus adhibitorum vires Exsiccantes in Ophthalmia quoque efficaces laudat, Ophthalmicas Barbette Prax. Cap. 4. & Decker in *Notis*, iterata sæpius experientia nixi commendant. Quin etiam intus assumptos ad grana duodecim Sudorem, interdum quoque Vomitum & Alvum movere Glauber alique post eum asseverant, nescio, qua experientia ratione veducti. Illustris Gaub in *Advers. Hart in Dissert. de Zinco*; Duncan in *Medical.*

Comment. by a Society in Edinburg. passim exempla proferunt Epilepsie aliquot granis pro Dosi datis felicissime fugata.

FOMENTATIO FRIGIDA *Schnucker.*

℞. Aquæ fontanæ uncias centum & viginti,
Aceti optimi uncias duodecim,
Nitri depurati unciam semis,
Salis Ammoniaci uncias duas:
Misceantur.

Clarissimus Auctor hoc Fomento frigide applicato cum summa efficacia usus est ad Vulnere Capitis cum Cerebri commotione Humorumque effusione juncta. Gl. Plenck illud ad Hernias quoque incarceratas laudat.

FOMENTUM ANODYNUM *Richard.*

℞. Foliorum Althææ manipulos quatuor,
Papaveris hortenſi manipulum unum,
Hyoscyami pugillos duos:

Incisa coquantur cum
Aquæ fontanæ unciis quadraginta octo, ad uncias quadraginta residuas:

FOMENTUM *ad ERYSIPELAS* *Richard.*

℞. Florum Sambuci manipulum unum:
Infundantur cum
Aquæ fontanæ unciis sedecim per noctem:

Colatura dissolvantur
Spiritus Vini Camphorati uncia una,
Sacchari Saturni drachma una.
Ante applicationem probe concutiendum est.

FOTUS *ad GANGRÆNAM* *Richard.*

℞. Corticis Chinæ grossæ contusi unciam unam:

Coquatur ex
Aquæ fontanæ unciis quadraginta octo,
Ad uncias triginta duas residuas:

Addantur
Florum Chamomillæ Romanæ,
Tanaceti ana uncia semis:
Post aliquot ebullitiones coletur liquor;

Addantur

Spiritus Vini Camphorati uncia duæ,
Salis uncia una:

Misceantur.

GARGARISMA ACETOSUM *Plenckii.*

℞. Aquæ fontanæ uncias duodecim,
Aceti Rosarum uncias duas,
Mellis Rosacei uncias unam:

Misceantur.

In Anginæ Inflammatoriæ adhibetur.

GARGARISMA ADSTRINGENS.

Richard.

℞. Corticum Granatorum unciam unam,
Florum Balauſtiorum unciam semis:

Incisa coquantur per dimidiam horam in
Aquæ fontanæ quantitate sufficiente
ad residuum unciarum sedecim:

Colatura dissolvantur

Aluminis drachma semis:
Syrupi de Rosis ficcis uncia una.
Cruentationibus Oris opponitur.

GARGARISMA ANTISCORBUTICUM

Richard.

℞. Decocti Antiscorbutici uncias sedecim,

Spiritus Cochleariæ unciam unam,
Salis drachmas duas:

Oxymellis Simplicis uncias duas:

Misceantur.

GARGARISMA DETERGENS *Richard.*

℞. Hordei integri unciam unam:

Coquatur in

Aquæ fontanæ unciis duabus & triginta,
ad residuum unciarum sedecim:

Addantur

Foliorum Agrimonie,
Rubi ana pugilli duo:

Post aliquot ebullitiones colentur & in
colatura dissolvantur

Mellis Rosati uncia una,
Nitri depurati drachma una.

Adhibetur Ulceribus Faucium apertis.

GARGARISMA EMOLLIENS *Richard.*

℞. Radicis Althææ unciam unam,
 Caricarum unciam semis:
 Incisa coquantur ex
 Aquæ fontanæ unciis viginti quatuor
 ad residuum unciarum sedecim:
 Colatura dissolvatur
 Oxymellis simplicis uncia una.
Ad Oris & Faucium Abscessus adhibetur.

GARGARISMA MERCURIALE *Plenck.*

℞. Mercurii vivi drachmam dimidiam,
 Gummi Arabici drachmas tres,
 Syrupi Diacodii unciam semis,
 Mercurii dulcis grana sex:
 Probe terendo subactis addantur
 Herbae Flammulæ Iovis uncia semis,
 cum Aquæ unciis viginti sex
 paululum decoctæ,
 Mellis Rosacei uncia una,
 Essentiæ Myrrhæ drachma una.
*Ulcera Faucium Venerea sanat in Ozena
 Venerea saluberrime Naribus injicitur.*

GARGARISMA ad PITUITAM *Kleinii.*

℞. Aquarum Radicis Angelicæ,
 Hyslopi ana uncias sex,
 Spirituum Cochleariæ unciam semis,
 Salis Ammoniaci scrupulos quatuor,
 Pulveris Seminis Sinapeos drachmam
 unam,
 Mellis Rosacei uncias quatuor:
 Misceantur.

GARGARISMA cum SPIRITU SALIS
 AMMONIACI *Plenckii.*

℞. Radicum Althææ,
 Caricarum ana drachmas sex:
 Incisa coquantur cum
 Lactis Vaccini unciis sedecim ad un-
 cias duodecim residuas:
 Colaturæ addatur
 Spiritus Salis Ammoniaci uncia semis.
*Anginas Inflammatorias, quos Gargarisma
 Acetosum non Resolvit, huic cedere Illustris
 Pringle observavit.*

G E L A T I N Æ.

Canones.

I. Quando partes animales aqua co-
 quantur, Decoctum proprie Juris nomi-
 ne venit.

II. Ab hoc vero jure si jam maxima
 pars aquæ ad decoctionem adhibitæ erit
 evaporata, tunc partes ex animali ex-
 tractæ, cessante calore, in consistentiam
 spissam & tremulam digitis non adhæ-
 rentem coeunt, & GELATINÆ nomen
 acquirunt.

III. Hæc rursus Gelatina si sub con-
 tinua agitatione penitus erit exsiccata
 GLUTEN sive GELATINA SICCA di-
 citur.

IV. Gelatinæ animales cum ætatem
 non ferant, usus demum tempore pa-
 rari debent.

V. Nostra ætate plura Rob genera,
 quæ consistentiam tremulam & pellucen-
 tem induunt, GELATINÆ, GELATA,
 GELATINE, GELES appellantur.

GELATINA ANALEPTICA *Helvetorum.*

℞. Rasuræ Cornu Cervi uncias quatuor,
 Eboris uncias duas,
 Femorum Gallinæ annosæ contusorum
 numero tria,
 Carnis Bovinæ, ex Femore desumptæ,
 uncias viginti quatuor,
 Aquæ fontanæ uncias centum & vi-
 ginti:

Coquantur lento igne ad residuum un-
 ciarum triginta:

Tunc adjiciantur

Cinnamomi acuti drachma una,
 Caryophyllorum Aromaticorum scrupu-
 lus unus,
 Pomi Citri dimidium:

Coquantur adhuc per quadrantem horæ,
 tentetur liquor, num refrigeratus in Ge-
 latinam concresecat:

Tunc addantur

Sacchari albi uncia quatuor:
 Clarificentur Albumine Ovi.

*Hæc Gelatina ad Cochlear unum datur
 Tabidis & a morbis revalescentibus.*

GELATINA CORNU CERVI AMYGDALATA *Klein.*

℞. Rasuræ Cornu Cervi uncias octo,
 Aquæ fontanæ uncias centum:
 Coquantur lento igne usque dum ex parva decocti portione refrigerata consistentiam Gelatinæ surrexisse appareat, tum coletur liquor, & cum eodem fervido Emulgeantur secundum artem

Amygdalarum dulcium excorticatarum unciæ quatuor:

Emulsiõni colatæ addantur

Pulveris Sacchari albissimi unciæ sex:
 Refrigerata trahatur in usum.

Demulcendi, Refrigerandi, Nutriendi gratia ejus Cochlear unum in unciis quatuor Juris Carnium diluitur. Eadem Flavedinis Citri recentis & Aquæ Florum Naphæ modica portione addita, gratum edulii genus paratur, quod Blanc Manger appellare solent.

GELATINA CORNU CERVI
CITRATA *Klein.*

℞. Rasuræ Cornu Cervi uncias sex,
 Aquæ fontanæ uncias septuaginta duas:
 Decoquantur ad residuum unciarum quadraginta octo:
 Tunc addantur

Vini albi generosi unciæ quatuor,
 Coquantur ad consistentiam Gelatinæ, cui ope Albuminis Ovi clarificatæ adjiciantur

Succi Citri unciæ una:

Syrupi Citri ex toto unciæ duæ,
Tabidis nec non Acrimonia laborantibus cum successu præscribitur.

GELATINÆ FRUCTUUM.

℞. Succi ex fructu aqua suffuso expressi & per Manicam colati,
 Sachari albissimi ad consistentiam Tabulandi cocti ana uncias sedecim:
 Coquantur leni igne ad consistentiam Gelatinæ, fervens adhuc trajiciatur per pannum laneum; reponatur in ollis leviter tectis, elapsis demum aliquot diebus curatius obturandis.

GELATUM.

Videatur Rob.

GILLA *Theophrasti.*

Est Vitriolum album solutione & filtratione depuratum.

A Medicamento Æneis & Plumbeis principiis instructo, & cujus infida prorsus operatio est prudenti sane consilio Medici abstinent.

GLOBULI CARMINATIVI *Utechti.*

℞. Saponis Veneti uncias quatuor,
 Fellis Tauri unciam unam semis,
 Nitri crudi unciam semis,
 Sacchari Thomæi uncias duas:
 Misceantur & formentur in Globulos diversæ magnitudinis.

GLOBUS ad ERYSIPELAS *Plenckii.*

℞. Terræ sigillatæ albæ uncias duas,
 Cerussæ,
 Cretæ ana unciam unam,
 Pulverisata
 Spiritus Vini Camphorati quantum satis
 Formentur in Globum.
Chartæ cerulea hoc Globo illita, imponitur Erysipelati.

GLOBULI MARTIALES *Villisi.*
TARTARUS MARTIALIS *Suecorum.*

℞. Limaturæ Martis subtilissime tritæ uncias sex,
 Tartari albi pulverisati uncias duodecim:
 Coquantur cum
 Aquæ unciis octoginta ad ficcitatem:
 Hic Pulvis cum
 Spiritus Vini idonea quantitate formetur in globos, qui ovi Columbini fere figuram & magnitudinem habeant.

Suspenduntur ex Spiritu Vini vel Aqua usque dum horum Menstruorum color sit probe

faturatus, tunc splendorum ope Vulneribus applicantur, vel intus quoque, ubi indicatio usum Martialium suadet, exhibentur.

GLOBULI MOSCHATI.

℞. Sacchari albissimi uncias duodecim,
Amyli albi unciam semis,
Radicum Ireos Florentinæ drachmas
duas:

Pulverifata redigantur cum
Mucilaginis Tragacanthæ quantitate
sufficiente

In globos. variæ magnitudinis.

Tanquam Suppositoria exhibentur. Ceterum Medicamento, Ano destinato odoramenta adjicere, absurdum mihi videbatur, ideoque Moschum & Zibethum omisi.

GLUTEN PECTORALE.

Videatur Extractum Liquiritiæ Gummosum.

GUTTÆ ANGLICÆ CEPHALICÆ.

℞. Spiritus Serici uncias quatuor,
Olei destillati Lavendulæ drachmam
unam,

Spiritus Vini unciam unam:

Per aliquot dies digesta Destillentur usque dum guttæ Olei appareant.

Quod Carolus Secundus Rex Angliæ a quodam Chemico emit Medicamentum, Lister Tournefortio communicavit. Oleum Spiritui Serici adjiciendum proprie Cinnamomi non Lavendulæ est. Laudatur contra Affectus soporosos & Deliquia animi, tam intus ad guttas quadraginta dandum, quam Naribus admovendum.

GUTTÆ Generalis de la Motte.

℞. Auri fulminantis drachmam unam:
Dissolvatur

Spiritus Nitri unciis duabus:

Addantur

Spiritus Vini rectificatissimi uncia duæ
& triginta:

Cordiales & Cephalicæ huic Medicamento adscribuntur Vires.

GUTTÆ Generalis de la Motte ALBÆ.

Sunt Spiritus Nitri Dulcis.

HEPAR ANTIMONII *Basil. Valentini.*
CROCUS ANTIMONII *Londinensium.*

℞. Antimonii crudi uncias decem,
Salis Tartari uncias triginta:
Mixta fundantur in Crucibulo.

Huic Medicamento, cum debeat esse Antimonium per Alkali reclusum, Antimonium calcinatum & per se fusum, aut Beaumé Chymie. II. pag. 323. placet, pessime substitui, patet. Medici eo tanquam insigni drastico, nisi ad parandum Crocum Metallorum, non utuntur. Mulomedicis in usu est.

HYDROMEL pro POTU Richard.

℞. Ptisanæ communis uncias quadraginta octo,

Mellis optimi uncias tres:

Misceantur.

In affectibus Pectoris ad potum ordinarium præscribitur.

INFUSUM AMARUM Richard.

℞. Herbarum Cardui benedicti,
Chamædryos,
Chamæpityos ana unciam
semis,

Florum Centaurii minoris,
Hyperici,

Lupuli ana drachmas duas

Incisa infundantur per horam in
Aquæ bullientis unciis quinquaginta
sex:

Colatura trahatur in usum.

Roborandis Primis viis uncia sex adhibentur pro Dosi.

Si adjeceris Spiritus Vitrioli drachmas quinque, habebis *Acidulatum.*

INFUSUM ANGELICUM.

Videatur Aqua laxativa Angelica.

INFUSUM LAXATIVUM.

Videatur Aqua laxativa *Viennensium.*

INFUSUM *Malti Macbride.*

℞. Malti crasso modo comminuti uncias
duodecim:

Infundantur per sex horas cum
Aquæ ebullientis unciis sex & triginta:
Colentur.

*Scorbuticis & morbis Putridis laborantibus
datur ad uncias quadraginta octo de die.*

INFUSUM *vel* AQUA PICIS *Berckley.*

℞. Picis liquidæ uncias duodecim,
Aquæ communis uncias quadragin-
ta octo:

Crebro agitentur bacillo ligneo; Aqua
decantata trahatur in usum.

Conferantur ad Picem dicta P. I.

INJECTIO AURICULARIS
DETERGENS *Plenckii.*

℞. Herbarum Rutæ manipulum unum,
Aquæ fontanæ uncias sex:

Infundantur per noctem, colaturæ ad-
dantur

Essentiæ Myrrhæ drachma femis,
Mellis Rosacei drachmæ sex:

Misceantur.

*In Ulceribus Meatus Auditorii Saniem
fundentibus hujus Liquoris tepidi bis quoti-
die, quantum cavum Auriculare capere po-
test, injicitur & per aliquot minuta custoditur.*

INJECTIO BALSAMICA *Plenckii.*

℞. Balsami Copaivæ unciam dimidiam:
Solvatur Vitello ovorum.

Solutioni addantur:

Aquæ Calcis unciam sex,
Mellis Rosacei unciam tres:

Misceantur probe.

Ad claudenda Ulcera sinuosa injicitur.

INJECTIO DETERGENS *Plenckii.*

℞. Aquæ Calcis uncias duodecim,
Unguenti Ægyptiaci unciam unam:

Misceantur.

Ulceribus fistulosis detergendis injicitur.

INJECTIO MERCURIALIS *Plenckii.*

℞. Mercurii vivi drachmam unam,
Gummi Arabici drachmas tres,
Syrupi Diacodii unciam femis:

Probe tritis addantur

Aquæ fontanæ unciam duodecim,
Rutæ unciam duas:

Misceantur.

*Adhibetur contra Gonorrhæam & Fluo-
rem album habituales.*

JULEPUS ACIDULATUS *Richard.*

℞. Ptisanæ communis uncias quatuor &
viginti,

Spiritus Nitri dulcis scrupulum unum,
Syrupi Limonum uncias duas:

Misceantur.

*In omni genere Februm cum fructu exhi-
betur.*

JULEPUS ROSARUM *Mesue* JULA-
PIUM REGIUM SYRUPUS REGIUS
vel ALEXANDRINUS.

℞. Sacchari albissimi uncias triginta:
Dissolvantur

Aquæ Rosarum unciis viginti:

Colatura fervetur.

*Edulcorandis variis Potionum generibus
adhibetur.*

JULEPUS VIOLARUM *Mesue.*

Paratur ut antecedens, substituendo
Aquæ Rosarum, Aquam Violarum.

Exfolevit.

KERMES MINERALE *Liger* PULVIS
CARTHUSIANORUM, SULPHUR
ANTIMONII TARTARISATUM *Au-
striacorum.*

℞. Antimonii crasse contusi uncias tri-
ginta duas,

Nitri fixi uncias octo,

Aquæ quantum satis.

Bulliant per quatuor horas, fervidus li-
quor filtretur; ex refrigerato qui secef-
ferit Pulvis probe edulcoretur.

Si liquor defusus residuo Antimonio denuo affunditur, & ratione indicata tractantur, denuo Kermes obtinetur; idem labor vel creberrime repetitus nunquam non hoc Medicamentum largietur.

Ex Experimentis Geoffroy patet in una Kermes drachma contineri ad septendecim grana Reguli, quatuordecim grana Alkali, unum & quadraginta grana Sulphuris. Ad dimidium unum, usque adhibetur; pertinet maxime ad spissitudinem Mucosam & Phlogisticam Resolventia Medicamenta. Majori dosi datum Vomitus, Nauseas, Secessus abvi efficit.

LAC SULPHURIS *Austanorum.*
SULPHUR PRÆCIPITATUM *Suecorum.*

℞. Cinerum Calcis vivæ uncias duodecim,
Calcis vivæ uncias viginti duas,
Aquæ fontanæ uncias ducentas:

Calce dilapsa coquantur paululum, colentur per pannum linteum; massa in panno remanens adhuc bis cum nova aqua coquatur, & coletur; omnes liquores colati evaporatione reducuntur ad uncias triginta; his in fervente lebetæ bullientibus sensim adjiciantur

Florum Sulphuris uncia decem:
Bulliant per dimidiam horam; solutio evaporata & aliquot libris Aquæ diluta præcipitetur

Spiritus Vitrioli quantum satis,
Pulvis præcipitatus edulcoretur.

Hoc Præparatum, cum sit Sulphur ad ultimam tenuitatem redactum ad usum internum Floribus Sulphuris videtur esse præferendum.

LAC VIRGINIS.

Aquæ instillentur aliquot guttæ Tincturæ Benzoës.

LAPIS CAUSTICUS, CAUTERIUM
POTENTIALÈ *Juncken.*

℞. Calcis vivæ uncias duodecim,
Salis Tartari uncias quatuor,
Coquantur cum
Aquæ uncia centum ad residuum unciarum quinquaginta;

Colatura evaporetur ad siccitatem us-

que, liquetur calore & effundatur in modulum lapideum.

Olim ad inurendos Fonticulos usurpabatur, hodie raro in usum trahitur.

LAPIS DIVINUS vel OPHTHALMICUS
St. Yves.

℞. Aluminis crudi,
Vitrioli cœrulei,
Nitri ana uncias quatuor:
Contusa liquentur, liquatis addatur
Camphoræ trita drachma semis:
Mox effundatur super tabulam lapideam, & dum adhuc mollis erit, dissecetur in parva quadrata.

Adhibetur ad Collyria contra Ophthalmias; ejus drachma una in Aquæ unciis octo dissoluta constituit Collyrium Helvetii.

LAPIS INFERNALIS *Angeli Salæ.*
CAUSTICUM LUNARE *Londinensium.*

℞. Argenti purissimi unciam unam,
Aquæ fortis uncias duas:
Dissolvatur leni calore; in frigore ubi solutio in Crystallos concreverit hæc a LUNA denominantur; denuo calore liquetur; omnis solutio in vase vitreo ad siccitatem reducatur; committatur sal exsiccatum Crucibulo, & quam primum fluxerit, effundatur in modulum Oleo prius inunctum.

Ne Argentum quidem cupellatum gaudet ea puritate quam hoc Præparatum requirit, quod omni labe Venerea immune, nigerrimum esse & in Aere siccitatem suam penicillissime servare debet

Usurpatur tanquam Causticum polychrestum, ubicunque Carnes absumendæ sunt; Causticum medicamentum nunquam intus exhibendum est.

LAPIS MARTIALIS.

Videantur Globuli Martiales.

LAPIS MEDICAMENTOSUS *Crollii*
correctus.

℞. Colcotharis,
Aluminis ana uncias duodecim,

Nitri crudi,
Salis communis,
Tartari ana uncias tres,
Aceti vulgaris uncias centum:
Coquantur per dimidiam horam:
Tunc addantur
Cerussæ Venetæ uncia octo,
Boli Armenæ pulverisatæ uncia quatuor:

Sub non intermissa agitatione instituat
evaporatio ad siccitatem usque.

*Laudatur ad Ulcera sordida & Fistulas
abstergendas & consolidandas, quem in finem
duodecuplo aquæ dissolvitur, filtratur & parti
affectæ tam ope linteorum imponitur, quam
per Syringam injicitur.*

LAPIS MEDICAMENTOSUS Geoffroy.

℞. Limaturæ Ferri,
Lapis Hæmatitis pulverisati ana un-
cias tres,

Cremoris Tartari uncias sex:
Redigantur cum
Spiritus Vini quantum satis,
in pastam, quæ exsiccata denuo ope
Spiritus Vini in consistentiam mollem
reducatur, operatioque aliquoties repe-
tatur; postrema pasta exsiccata redu-
catur in pulverem, eique addantur

Pulverum Mastichis
Crocii ana uncia dimidia,
Aloës,
Myrrhæ ana uncia una,

Vini albi uncia quadraginta quatuor:
Stent per aliquot dies in digestionem,
tunc evaporentur ad siccitatem, & Spi-
ritus Vini ope reducantur in globos.

Efficacior est priore.

LAPIDUM PRÆPARATIO Valerii Cordi.

Videatur Crystallus montana præparata.

LAPIS seu SAL PRUNELLÆ Hartmanni. CRYSTALLUM MINERALE.

℞. Nitri depurati uncias octodecim:
In Crucibulo fluentibus per vicem in-
geratur
Florum Sulphuris uncia semis;

Massa fluens affundatur super lapidem.
*Adhibetur ad Gargarismata, sed Nitrum
depuratum nullo peregrino Acido inquinatum
huic profecto præferendum est.*

LAUDANUM LIQUIDUM Sydenhami. TINCTURA THEBAICA Londinen- sum.

℞. Opii uncias duas,
Crocii unciam unam,
Cinnamomi,
Caryophyllorum ana drachmam unā:
Incisa infundantur per triduum cum
Vini Hispanici unciis duodecim:
Filtrentur.

*Quolibet drachma habet scrupulum di-
midium Opii. Ob magnam Auctoris famam
vel hodie adhuc creberrime usurpatur, licet
evictum sit, Opio minus congrue calida adjici.
Datur ad guttas quindecim.*

LAUDANUM OPIATUM.

Variis quæ de eo prostant compositio-
nibus, Extractum Opii Aquosum merito
præfertur.

LILIUM Paracelsi.

Videatur Tinctura Metallorum.

LIMATURA MARTIS ALCOHOL.

Videatur Chalybs præparatus.

LIQUIRITIA COCTA ALBA Würtembergensum. BACULI PECTORALES Schræderi correcti.

℞. Gummi Arabici,
Specierum Diaireos,
Diatragacanthæ ana un-
ciam semis,
Radicum Liquiritiæ,
Amyli ana unciam unam,
Sacchari albi uncias duas & triginta:
Omnia in tenuem pulverem trita ex-
cipantur
Mucilaginis Tragacanthæ sufficiente
copia, ut possint formari bacilli:
Lin-

Lingebantur olim a Tussientibus, hodie fere obsoleverunt.

LIQUIRITIA COCTA CITRINA LIQUIRITIA TORNATA Th. Hoffmann.

℞. Radicis Liquiritiæ unciam unam,
Ireos Florentinæ,
Amyli albi ana unciam semis,
Crocī scrupulum unum,
Sacchari albissimi uncias duodecim:
Omnia tenerrime pulverifata reducantur cum

Mucilaginis Tragacanthæ idoneo quanto in Massam; unde formentur Bacilli,
Conveniunt virtute sua cum antecedentibus.

LIMONADA MINERALIS.

Videatur Ptisana acidulata.

LIMONADA SICCA *Beaumé.*

Est Pulvis refrigerans Suecorum, ad quem Sal Acetosellæ loco Salis Essentialis Tartari recipitur.

LINIMENTUM ALBUM.

Videatur Linimentum Cereum.

LINIMENTUM ALCALINUM *Plenckii.*

℞. Lixivii Saponariorum uncias duas,
Olei Olivarum uncias quatuor,
Vitellorum Ovorum numero duo:
Misceantur, usque dum coeant.

Cl. Auctor asseverat Rhagades manuum hoc Linimento fuisse curatas.

LINIMENTUM ANTIPLEURITICUM *Richard.*

℞. Saponis Veneti uncias duas,
Olei Laurini unciam unam:
Liquefiant leni calore; refrigeratis admisceantur

Balsami Tranquillantis uncia una,
Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce viva drachmæ duæ.

Vires ex nomine patent.

LINIMENTUM CEREUM
*Edinburgensium.*LINIMENTUM ALBUM *Londinensium.*

℞. Olei Olivarum uncias tres,
Spermatis Ceti drachmas tres,
Ceræ albæ drachmas duas:
Leni igne liquefacta perpetuo agitentur, donec penitus refrigerentur.

Ad Fissuras Labiorum & Papillarum nec non ad Excoriationes usurpatur.

LINIMENTUM VOLATILE *Plenck.*

℞. Olei Amygdalarum dulcium unciam unam,
Spiritus Salis Ammoniaci drachmas duas:

Agitentur in Phiala, usque dum coierint.
Collo inungitur in Angina, ad ictus quoque Serpentum cum successu applicatur.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS
*Hoffmanni.*SPIRITUS VINOSUS VITRIOLICUS
*Rofforum.*SPIRITUS ÆTHEREUS VITRIOLATUS
Suecorum.

℞. Spiritus Vini rectificatissimi uncias triginta duas:

Committantur Cucurbitæ; affundantur per vices

Olei Vitrioli unciam sedecim:

Immittatur Cucurbita in Balneum Arenæ, imponatur ei Alembicus & jungatur vas recipiens; ambo ope Vesicæ coërenda; subministretur lenis admodum ignis, usque dum liquori destillanti alius liquor ejusdem cum ipso pelluciditatis supernatare videatur, qui inde infundibuli ope separandus est, & sub nomine ÆTHERIS sive NAPHTHÆ VITRIOLII asservandus. Residuum largiori aquæ quantitate diluatur, filtretur, libero aëri exponatur, & justa rectificatione in Oleum Vitrioli concentretur.

Liquor valde levis motum Fluidi nervei compescit; in omni Dolorum, Spasmodum, Convulsionum genere cum successu adhibetur. Datur ad guttas quindecim, Æther vero, eodem adhuc validior, ad guttas decem.

LIQUOR ANODYNUS TOPICUS

Triller.

℞. Aquæ Anhaltinæ uncias duas,
Spiritus Salis Ammoniaci,
Essentiarum Croci,
Castorei ana drachmas
duas,
Olei destillati Nucistæ guttas triginta :
Misceantur.

LIQUOR ANODYNUS TOPICUS

ALTER Ejusdem.

℞. Aquæ Anhaltinæ uncias quinque,
Essentiarum Succini,
Castorei ana drachmas
tres,
Anodynæ drachmas duas,
Spirituum Lumbricorum,
Formicarum ana drach-
mam unam:

Misceantur.

*Dicit Venerandus Auctor, utrunque li-
quorem velut incantamentum, si quidem
alterutro leniter tepesfacto partes dolentes fo-
veantur, savissimos sopire Dolores Rheuma-
ticos, Arthriticos, Ischiadicos, monetque
cum priore liquore scilicet mitiore antea pe-
riculum esse faciendum, quam alter adhi-
beatur; in Podagra vero hos liquores adhi-
bere se ausum non esse fatetur.*

LIQUOR ANODYNUS VOLATILIS.

Vicat.

℞. Spiritus Vini unciam unam,
Salis Ammoniaci vinosi un-
ciam semis,
Opii scrupulos duos,
Camphoræ scrupulum unum;
Mixta digerantur frigide per tres dies,
Phialam sæpe agitando, Colentur.

*Traditur miræ virtutis ad sopiendos Ca-
pitis vel Dentium dolores esse, dum guttæ
quatuor vel quinque vola manus exceptæ*

*naribus attrahuntur. Aliquot guttæ Gossypio
instillato committuntur quoque Denti Carioso.*

LIQUOR ANTIPODAGRICUS

Hoffmanni.

℞. Spiritus Sulphuris volatilis Beguini
unciam unam,
Camphoræ, Pineis tritæ, drachmam
unam,

Misceantur.

*Commendatur ab egregio Auctore Observ.
Phys. Chym. L. II. Obs. 31. ad laborantium
pedes crebrius eo inungendos.*

LIQUOR APERITIVUS *Argentoratensium*

LIQUOR SALINUS LAXATIVUS

Wirttembergensium.

℞. Salis Epsomensis,
Tartari solubilis ana unciam unam,
Vitriolati unciam semis:

Dissolvantur

Aquæ fervidæ unciis decem:

Filtrentur.

*Incidendi, Aperiendi, Urinam ducendi
causa aliquoties de die ad cyathum datur.
Optimæ substituitur LIQUORI APERI-
TIVO Hoffmanni.*

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINA-
TUS *Michaelis.*

℞. Spiritus Cornu Cervi rectificati, quan-
tum lubet:

Saturetur

Salis Succini albi quanto sufficiente:

Filtretur Liquor,

*Propter Vires Antispasmodicas & Dia-
phoreticas laudatur.*

Datur ad guttas triginta.

LIQUOR DIGESTIVUS *Suecorum.*

Salis Tartari depurato instilletur

Aceti Vini quantum satis ad satu-
rationem:

Liquor filtretur.

*Medicamentum hoc pretiosiori Liquori Ter-
ræ foliatæ Tartari utique erit præferendum;
plures enim partes Oleosas habet, ideoque
magis Saponaceum est.*

Datur ad parvum Cochlear pro Dosi.

LIQUOR LITHONTRIPTICUS *Jurin.*

Videatur Lixivium Causticum.

LIQUOR MENINGUM *Schmucker.*

℞. Aquæ Vulnerariæ uncias duas,
Balsami Commendatoris drachmas
duas,
Mellis Rosarum unciam semis:
Misceantur.

*Celeberrimum Auctorem hunc Liquorem
ope plumaceolorum ad Vulnera Duræ Ma-
tris & Cerebri adhibere testatur Clarissimus
Plenck.*

LIQUOR NITRI FIXI.

Videatur Nitrum fixum.

LIQUOR PROBATORIUS *Mæglingii.*

℞. Calcis vivæ unciam unam,
Auripigmenti unciam semis,
Aquæ fontanæ uncias sex:
Coquantur ad dissolutionem Auripigmen-
ti; filtretur Solutio.

*Hic Liquor, nigredine, quam Plumbo man-
gonisato Vini affusus affricat, hoc ipso signo
mangonium patefacit.*

LIQUOR SIPHYLITICUS *Turneri.*MIXTURA MINERALIS *Suecorum.*

℞. Mercurri Sublimati grana duodecim:
Dissolvantur
Spiritus Vini unciis viginti quatuor:
Misceantur.

*Medicamentum ex Sibiria in Europam
allatum van Svvieten potissimum auctorita-
te frequentius in usum tractum, hodie tan-
quam polychrestum contra contagium Vene-
reum usurpatur. Illustris Richard quatuor
granis Camphoræ & una Syrupi Papaveris
Rhexados uncia adjecta nomen ei LIQUORIS
SIPHYLITICI sive CONTRA LUEM
VENEREAM imponit. Apud nos & quidem
non sine fontica causa Spiritui Vini Aquam
substituunt. Dosis est ad Cochlear unum.*

LIQUOR SPLENETICUS *ex TARTARO
Schræderi.*

℞. Tartari crudi,
Nitri crudi ana uncias duodecim:
Mixta detonentur in Crucibulo, deinde
dissolvantur
Aquæ fontanæ unciis triginta sex:
Solutione fervente dissolvantur
Pulveris Tartari crudi uncie duo-
decim:

Liquor filtratus fervetur.

*Medicamentum Tartaro Solubili analo-
gum, aliquoties de die ad duas drachmas,
dum Viscera abdominalia referanda sunt, ex-
hibetur.*

LIQUOR STYPTICUS *Veberi.*

℞. Vitrioli Hungarici,
Aluminis crudi ana uncias sex,
Aquæ fontanæ uncias quadraginta octo:
Solutioni filtratæ addantur
Olei Vitrioli uncie quatuor,
*Linteis quintuplicatis exceptus vasis San-
guinem fundentibus applicatur.*

LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ *Tartari.*

Videatur Terra foliata Tartari.

LIQUOR VEGETO-MINERALIS

Richard.

Est Aqua Vegeto-Mineralis Goulard, omis-
so Spiritu Vini.

LITHONTRIPTICUM *Tulpii.*

℞. Pulveris Cantharidum,
Cardamomorum minorum excorti-
catorum ana drachmam unam,
Spiritus Vini rectificati unciam unam,
Nitri unciam semis:

Infundantur frigide in vase leviter tecto
per sex dies, quibus dilapsis filtrentur.

*Hoc Medicamentum magna olim fante
Homberg publicavit. Dantur ejus gut-
te quindecim mane in cyatho aquæ unæ,
post assumptum jusculum hora, usisque Me-
dicamenti per quatrimum continuatur.*

LIXIVIUM CAUSTICUM, LIXIVIUM
SAPONARIORUM.

Est Casticum potentiale non inspissatum.

Ad usus externos adhibetur. Ejus scrupulus unus sufficienti aquæ quantitate dilutus & ter interdum sumtus constituit LIQUOREM LITHONTRIPTICUM Jurin, quem in Calculo viarum Urinarum egregium se præstare attestatur in Practical Essays on Medical Subjects p. 57.

LOCH ALBUM *Geoffroy.*

℞. Radicis Liquiritiæ minutim incisæ
scrupulum unum,

Aquæ fontanæ uncias quatuor:
Infundantur per horæ intervallum:

Colatura emulgeantur

Amygdalæ dulces numero viginti:
Denuo colatis addantur

Pulveris Gummi Tragacanthæ grana
sedecim:

Probe commixtis ingerantur sensim sub
Perpetua agitatione

Syruporum Papaveris albi,
Althææ ana uncia semis,

Olei Amygdalarum dulcium uncia una:
Omnibus optime commixtis adjiciantur

Aquæ Florum Aurantiorum drach-
mæ duæ:

Misceantur.

*Gratum hoc Eclegma in morbis Pectoris
Relaxandi & Demulcendi causa cum successu
adhibetur.*

LOCH ad ASTHMA *Manlii.*

℞. Radicum Scillæ præparatarum un-
ciam semis,

Iridis Florentinæ drach-
mas duas,

Herbarum Marrubii,
Hyssopi ana drachmam

unam,

Myrrhæ,
Crocii ana drachmam semis:

Pulverifata excipantur

Mellis despumati unciis sex:

Misceantur.

*In affectibus Pectoris mucosis resolvendi
gratia præscribitur, & exhibetur ad parvum
Cochlear pro Dosi.*

LOCH BALSAMICUM *Richard.*

Videatur Loc Leniens.

LOCH de FARFARA *Valerii Cordi.*

℞. Radices Farfaræ recentes:

Coquantur ad mollitiem, & exprima-
tur Pulpa per cribrum: Pulpæ addatur
Mellis crudi duplum:

Coquantur ad consistentiam Mellis.

Demulcendi ergo Tussientibus exhibetur.

LOCH LAPONICUM *Fuller.*

℞. Terræ Japonicæ drachmas duas,
Albuminis Ovi conquassati drach-
mas sex,

Syropi de Symphyto unciam unam:
Misceantur.

Hæmopticis præcipue commendatur.

LOCH LENIENS *Richard.*

℞. Pulveris Gummi Tragacanthæ grana
sedecim:

Redigantur cum Ptisanæ pectoralis uncia
semis in Mucilaginem, cui sensim sub
perpetua agitatione adjiciantur

Olei Amygdalarum dulcium,
Syrupi Althææ ana uncia una:

Probe mixta diluantur

Ptisanæ pectoralis unciis tribus cum
semisse,

*Viribus cum Loch albo convenit, Dyssen-
tericis laudatur.*

*Abstergendi autem consilio adjicitur
Terebinthinæ Venetæ, Vitello Ovi
dissolutæ, scrupulos unus,*

Diciturque jam LOCH BALSAMICUM.

LOCH de PULMONE VULPIS *Mesue.*

℞. Pulverum Pulmonum Vulpis,
Succi Liquiritiæ,
Herbæ Capillorum Veneris,
Seminum Anisi,

Pul-

LOCH.

Pulverum Seminum Fœniculi ana unciam unam,
Sacchari clarificati uncias quindecim:

Misceantur.

Hoc inconcinuo prorsus Medicamento Tussientibus & Phtificis vulgo etiamnum exhiberi solito, Medicorum prudentiores non amplius utuntur.

LOCH SANUM et EXPERTUM *Mesue correctum.*

℞. Radicis Liquiritiæ,
Herbarum Hyssopi,
Capillorum Veneris,
Calaminthæ montanæ ana unciam semis,
Seminum Anisi,
Fœniculi ana drachmas duas,

Incisa & contusa coquantur paululum cum Aquæ fontanæ unciis viginti quatuor: Decocto colato emulgeantur,
Amygdalarum excorticatarum,
Pinearum mundatarum,
Seminis Papaveris albi ana uncia una: Colaturæ addantur

Pulverum Liquiritiæ,
Gummi Tragacanthæ albæ,
Arabici,
Amyli,
Ireos Florentinæ ana drachmæ sex,

Sacchari albi unciæ quadraginta,
Aquæ Cinnamomi unciæ duæ:

Misceantur.

Ad Relaxandas Stricturas & Demulcendam Acrimoniam Tussi sicca laborantibus commendatur.

LOCH SAPONATUM *Pharmacopææ Edinburgensis Veteris.*

℞. Saponis officinalis drachmam unam,
Olei Amygdalarum unciam unam,
Syrupi Capillorum Veneris unciam unam semis:

Misceantur exaacte.

Illustris Richard Syrupo Capillorum uncias Mellis duas substituit.

MAGISTERIUM.

103

In Asthmate & Tussi quoque Hypochondriaca, nec non in affectibus Renum exhibetur,

LOTUS sive LITUS ad HAEMORRHOIDES *Richard.*

℞. Ungentis Populei unciam unam,
Balsami Tranquillantis unciam semis,
Olei Ovorum drachmas duas:

Misceantur,

Vires nomen indicat.

LOTUS ad RHEUMATISMUM *Richard.*

℞. Spiritus Vini Camphorati uncias sex,
Salis,
Olei Terebinthinæ ana unciam unam: Misceantur.

Vires ex nomine patent.

LOTUS SAPONACEUS *Plenckii.*

℞. Aquæ fontanæ destillatæ uncias duodecim,
Balsami Vitæ externi drachmam unā: Misceantur.

De Viribus mentio jam facta est sub Balsamo Vitæ.

LOTUS ad TINEAM *Fuller.*

℞. Calcis vivæ uncias duodecim,
Picis navalis uncias octo,
Aquæ fontanæ uncias septaginta & duas:

Coquantur ad dimidias, dein colentur. *Capiti Tineoso lavando commendatur.*

MAGISTERIUM MARCASITÆ *Tbibaut*
COSMETICUM *Clavii.*

℞. Bismuthi unciam unam:

Per vices injiciatur

Spiritus Nitri unciis duabus:

Solutio clara instilletur guttatim

Aquæ unciis quadraginta octo,

Calx albißima edulcoretur.

Cosmeticos ad usus exhibent, sed Cutim fedare observatum est.

MAGISTERIUM SATURNI *Crollii*.

℞. Aceti Lithargyrii quantum lubet ;
Plumbum inde præcipitetur ope
Salis communis aqua dissoluti:
Edulcoratum fervetur.

Usui Cosmetico perinde ac antecedens in-
fervit, sed Cutim etiam & quidem citius
scædat; sanitati quoque perniciosus est ejus
usus; dolendum sane ipsos Medicos eo im-
prudentiæ prolabi, ut illud ad usus internos
commendare non dubitent.

MAGISTERIUM SULPHURIS.

Videatur Lac Sulphuris.

MAGNES ARSENICALIS *Hartmann*.

℞. Arsenici albi,
Antimonii crudi,
Sulphuris flavi ana partes æquales:
Pulverisata fundantur in Retota vitrea.

Venenum hoc remedio ad instar Magnetis
Ferrum trahentis ex Bubonibus Pestilentiali-
bus extrahi olim credebant. Arsenicalia ut
ad alios morbos ita ad Pestem pessime adhi-
beri hodie est evictum.

MAGNESIA ALBA *Black*,

℞. Salis Epsomensis uncias sexaginta qua-

tuor:

Dissolvantur
Aquæ fontanæ unciis centum vigin-

ti octo:

Affundatur
Cinerum Clavellatorum depuratorum
in duplo Aquæ dissolutorum, quantum
requiritur, ut omnis inde terra dejicia-

tur; tunc affundantur
Aquæ ebullientis unciæ quingentæ:
Terra optime edulcorata fervetur, quæ
si calcinata desideratur, in Crucibulo
candente servanda est rubens per duas
horas.

Medicamentum, in Italia primum ce-
lebratum, dein, ad modum a *Slevogt*
traditum, semper ex Lixivio Nitri pa-
ratum, semper Calce erat inquinatum.

Cl. *Black* præeunte illud jam purum ob-

tinemus.
Reliquis Absorbentibus omnino præstat; minus enim Ventriculum gravat, præsertim si calcinata exhibetur, cum Acido Primarum Viarum in Salem medium abit mite Catharticum, & Humores adeo non ad Putredinem, ut reliqua Absorbentia, disponit, ut potius evidenter viribus Antisepticis sit instructa.

Dosis est ad drachmam unam usque.

MANNA LIQUIDA *Kiefer*.

℞. Cremori Tartari drachmas duas:
Dissolvantur

Aquæ bullientis unciis quinque:
Addantur

Mannæ Siciliensis unciæ duæ:
Facta dissolutione colentur.

Una hauritur.

MANNA TABULATA *vel* TARTARISATA *Schræderi*.

℞. Mannæ Siciliensis uncias quatuor,
Cremoris Tartari unciam semis:

Coquantur cum

Aquæ unciis decem,
Ad consistentiam & lege artis in for-

mam Morfulorum redigantur.
Scopo Eccoprotico exhibentur.

MASSA ad FORNACEM *Argentoratensium*.

℞. Pulverum Gummi Benzoes electi,
Storacis Calamitæ
ana uncias qua-
tuor,
Ladani unciam
unam,

Oleorum destillatorum Cinnamomi
guttas

Lignis Rho-
dii ana gut-
tas viginti,

Balsami Peruviani drachmas tres:
Subigantur in mortario calido, ut in
unam massam coeant; quæ in bacillos
panno laneo lævigandos cogenda est.

Affricatur fornaci, ut conclavis Aerem
odoris suavitate perfundat.

MATERIA PERLATA.

Videatur Antimonium Diaphoreticum.

MEL ANTHOSATUM *Mesue*.

℞. Herbae Rorismarini uncias octo,
Mellis despumati uncias viginti qua-
tuor:

Digerantur in vase clauso per aliquot
dies, deinde colentur.

Ad Enemata recipitur.

MEL DESPUMATUM *Gelsi*.

℞. Mellis uncias quadraginta octo;
Aquaë fontanaë uncias duodecim;
Bulliant per quadrantem horæ, spuma
& cochlearis & coli ope inde auferatur.

MEL MERCURIALE *Colonienſium*.

℞. Succi Herbae Mercurialis uncias tri-
ginta sex,
Mellis crudi uncias viginti quatuor:
Coquantur ad consistentiam Mellis.

*Alvi Emolliendæ gracia Clysmatibus adji-
citur.*

MEL ROSARUM *Oribasii*.

℞. Florum Rosarum rubrarum,
Aquaë fontanaë ferventis ana uncias
septuaginta duas:

Digerantur per viginti quatuor horas,
exprimantur & colentur:

Addantur

Mellis crudi uncia nonaginta sex:
Coquantur ad consistentiam Mellis &
tunc colentur:

*Ad Ulcera Oris Abstergenda frequentis-
simo in usus est.*

MERCURIUS DIAPHORETICUS

Kleinii.

Videatur Pulvis Alterans *Plummer*.

MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii Sublimati uncias triginta
duas,

Vivi uncias viginti quatuor:

Per plures horas, donec omnes glo-
buli Mercuriales disparuerint, exactis-
sime trita, committantur Cucurbitæ, &
Balnei arenae ope sublimentur; diffracta
Cucurbita, rejiciatur substantia laxa,
quæ superiora colli Cucurbitæ occupat,
Sublimatum superiori Cucurbitæ ventri
adhærens, si nondum satis compactum
fuerit, teratur in pulverem & denuo
sublimetur; quod, si laminæ ferreae ma-
defactæ affricatum nullam maculam ni-
gram relinquit, Aquaë contra Calcis im-
missum nigrum evadit, indicio est, Mer-
curium rite dulcificatum esse.

*Egregium Medicamentum, quod in omni-
bus morbis a Spissitudine Humorum tenuio-
rum oriundis, cum successu datur. Catharticos
quoque effectus edit, secure infantibus quoque
potest exhiberi, & vanus est omnino eorum
metus, qui, ubi Acrimonia in Primis Viis
obtinet, noxas inde metuunt. Datur Scopo
Cathartico ad quindecim grana pro Dosi.*

MERCURIUS GUMMOSUS *Plenck*.

℞. Mercurii revificati drachmam unam,
Pulveris Gummi Arabici drachmas
tres:

Terantur probe, donec omnes globuli
Mercuriales disparuerint;

Tunc addatur

Syrupi Diacodii uncia semis,
Misceantur.

*Hoc Medicamento unciis octo Aquaë di-
luto & ad aliquot Cochlearia interdiu dato
Clarissimus Auctor vidit morbos Venereos
felicissime fugari. Extus quoque eodem ad
Lotiones utitur.*

MERCURIUS LIQUIDUS.

AQUA MERCURIALIS *Charras*.

℞. Mercurii revificati unciam unam,
Dissolvatur

Spiritus Nitri uncia una semis:

Solutioni adjiciantur

Aquæ fontanæ unciæ triginta.

Guttatim exhibebatur; in ejus locum LI-
QUOR SIPHYLITIGUS successit.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS

Hartmann.

MERCURIUS COSMETICUS *Suecorum.*

℞. Mercurii vivi uncias quatuor:

Dissolvantur

Spiritus Nitri unciis sex:

Solutio præcipitetur

Salis communis, in aqua dissoluti,
quantitate sufficiente:

Mox defundatur liquor & Mercurius præ-
cipitatus edulcoretur.

Externe ad Ulcera Venerea adhibetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS
FLAVUS.

Videatur Turpethum minerale.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS

RUBER. *Basil. Valentini.*

℞. Mercurii vivi uncias sex,

Dissolvantur

Spiritus Nitri unciis duodecim:

Abstrahatur Acidum a Mercurio ex Re-
torta; pulvis qui remanet ruber Calci-
netur in patella terrea, usque dum ru-
berrimus evaserit; qui sicum pari pon-
dere Salis Tartari teritur, & super edul-
coratum aliquoties Spiritus Vini deflagra-
tur, *Arcani Corallini, Libavii, Mercurii
Corallini Londinensium* nomine venit.

*A Medicamenti rodentis usu interno om-
nino abstinendum. Externe ad Unguenta
mundantia adhibetur. Arcanum Corallinum,
mitius quidem est, quam Mercurius præci-
pitatus ruber, sed ne ipsum quidem tuto
intus datur.*

MERCURIUS SACCHARATUS

Vvedelii.

℞. Mercurii rectificati unciam unam,

Sacchari albissimi uncias duas:

Probe terantur in mortario lapideo usque
dum omnes globuli Mercuriales dispa-
ruerint.

*Contra Vermes, Obstructiones Glandularum
Mesaraicarum aliosque morbos, ubi Mercurii
usus indicatur, cum successu exhibetur.*

Dosis est drachma una aliquoties de die sumta.

MERCURIUS SUBLIMATUS *Rhases.*
MERCURIUS CORROSIVUS ALBUS

Suecorum.

℞. Mercurii vivi uncias sedecim:

Dissolvantur

Spiritus Nitri unciis viginti quatuor:

Abstrahatur inde Acidum, Sali residuo
commisceantur

Vitrioli ad albedinem calcinati,

Salis communis ana unciæ octo:

Sublimentur ex Cucurbita vitrea.

*Validissimum Medicamentum rodens neque
extus. neque intus nisi larga liquoris diluentis
quantitate mitigatum est adhibendum.*

MERCURIUS VITÆ *Paracelsi.*

PULVIS *Algaroti.*

℞. Butyri Antimonii quantum lubet:

Instilletur largæ quantitati aquæ, & pul-
vis præcipitatus probe edulcoretur.

*Validissimum Drastrictum ad aliquot modo
grana datum fortissime Primas Vias exagitat;
ideoque hodie non amplius usurpatur.*

MIVA CYDONIORUM *Mesue.*

℞. Succii Cydoniorum per subsidentiam
depurati uncias centum & vi-
ginti,

Sacchari albi uncias quadraginta:

Coquantur ad consistentiam Rob.

Datur roborandi Ventriculi causa.

MIVA CYDONIORUM AROMATICA.
CONDITUM de CYDONIIS *Mesue.*

Ex Miva Cydoniorum suspendatur fac-
culus, cui immittantur

Pulverum Cinnamomi acuti,

Cardamomi ana drachma

una semis,

Croci,

Caryophyllorum,

Zinziberis,

Pul-

MIXTURA.

Pulverum Mastichis,
Macis ana scrupulus unus:
Probe misceantur.
Ad sistendos Vomitus & Alvi fluxus adhibetur.

MIXTURA ASTHMATICA Trilleri.

℞. Aquarum Tussilaginis,
Pulmonariæ,
Hyssoyi,
Veronicæ,
Fœniculi ana unciam unam,
Elixir Pectoralis Wedelii drachmas
duas,
Essentiarum Pimpinellæ,
Liquiritiæ ana drachmam
unam,
Extractorum Cascarillæ,
Enulæ ana scrupulum
unum,
Syrupi Althææ Fernellii unciam unam,
Oxymellis Scillitici unciam semis:
Misceantur.

Testatur Venerandus Auctor, in Tussi ferina, Asthmate & Catarrho suffocativo sibi sæpe præstantissimo auxilio hoc Medicamentum fuisse.

MIXTURA SIMPLEX, AQUA vel SPIRITUS de TRIBUS Schræderi.

MIXTURA DIATRION Suecorum.

℞. Spiritus Tartari uncias sex,
Vitrioli uncias duas,
Aquæ Theriacalis Camphoratæ uncias
decem:

Misceantur.
Diaphoresin excitat, Putredinem arcendi causa olim contra Febres continuas in frequenti usu erat. Dosis drachma una.

MIXTURA SALINA VOLATILIS
Suecorum.

Videatur Spiritus Mindereri.

MIXTURA TONICO NERVINA
Stablii.

℞. Spiritus Cornu Cervi unciam unam,
Tincturæ Antimonii acri uncias duas:
Misceantur.

MORSULI.

107

Auctor omnesque ejus affectæ hoc Medicamentum ad reserandas Viscerum Abdominalium Obstructiones & restituendum ipsis Tonum adhibuerunt.

Dosis est ad guttas quinquaginta.

MORSULI.

I. Sacchari albissimi unciam fedecim dissolvantur Aquæ unciis quatuor; coquantur: donec particula solutionis vel spatula excepta inde defluendo filum trahat, aut vi quadam per aerem trajecta floccos formet. Hoc *CONSISTENTIAM TABULANDI* dicunt:

II. Saccharum ad consistentiam Tabulandi coctum ab igne remotus agitur usque dum ad parietum vasis consistere cœpit:

III. Adjiciantur, Condita quidem aut Nuces in tenuia ramenta dissecta, Aromata vero in crassum, reliqua in tenuissimum pulverem redacta, Olea denique destillata addantur:

IV. Effundatur massa in modulum ex tribus lignis aqua madefactis, ita confectum, ut eorum unum basin, duo reliqua latera efforment. Cultri denique ope dum adhuc calet in rectangula difsecetur.

MORSULI ANTIMONIALES Kunkel.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum & secundum longitudinem dissectarum unciam unam,
Pulverum grossorum Cinnamomi drachmas duas,
Cardamomi minoris drachmā
semis,
Pulveris tenerrimi Antimonii crudi
drachmas sex:

Commisceantur cum
Sacchari albi in Aqua Rosarum soluti & ad consistentiam Tabulandi cocti unciis septem:

Fiant Morsuli.

Contra Acrimonias & Spissitudinem Lymphae & affectus Rheumaticos nec non Arthriticos cum successu exhibetur.

MORSULI AROMATICI *Suecorum.*

Videantur Morsuli Imperatoris.

MORSULI CITRI *Jungkenii* correcti.

℞. Carnis Citri Conditæ incisæ,
Flavedinis Corticis Citri recentis ana
unciam unam,
Quintæ Essentiæ Citri scrupulum unū,
Succi Citri unciam unam:

Immisceantur

Sacchari Canariensis unciis sedecim
in Aqua solutis ad consistentiam
Tabulandi spissiore coctis &
sub perpetua agitatione semire-
frigeratis:

Conficiantur secundum artem Morsuli.

*Ad Gustum delectandum, Sitim fallendam
Viresque refocillandas adhibentur.*

MORSULI IMPERATORIS

Hamburgenisium.

℞. Conditorum Corticis Aurantiorum,
Citrii,
Carnis Citri ana unciam
unam,

Amygdalarum dulcium cuticula pri-
vatarum unciam unam semis:

Incidentur secundum longitudinem & ad-
datur

Specierum Imperatoris uncia una:

Commisceantur cum

Sacchari unciis sedecim in Aqua RO-
sarum solutis & ad consisten-
tiam Tabulandi: coctis, sub per-
petua agitatione semirefrigeratis

Fiant lege artis Morsuli.

Ventriculi roborandi causa dantur.

MORSULI PURGANTES

Wurtembergensium.

℞. Resinæ Jalappæ drachmam unam,
Amygdalarum pellicula privatarum
drachmas tres:

Probe tritis immisceantur

Sacchari in Aqua Rosarum soluti &
ad consistentiam Tabulandi co-

MUCILAGINES.

Etī uncix septem semis:

Fiant lege Artis Morsuli.

*Purgandi scopo dantur, Uncia Morsulorum
grana circiter octo Resinæ continet.*

MORSULI ad SCABIEM *Pharmacopœæ
Helveticæ.*

℞. Florum Sulphuris unciam unam,
Pulveris Antimonii,
Specierum Imperatoris ana drachmas
duas,

Amygdalarum dulcium excorticata-
rum, secundo longitudinem se-
ctarum unciam unam,

Sacchari albissimi Aqua Naphæ dis-
soluti, ad consistentiam Tabu-
landi cocti & sub perpetua agi-
tatione refrigerati uncias octo:

In momento effusionis addantur

Quintæ Essentiæ Citri guttæ decem:
Fiant lege artis Morsuli.

*Vires ex nomine patent, ter de die un-
cia semis assumitur.*

MORSULI contra VENTRUM

Wurtembergensium.

℞. Pulverū Seminis Cinæ,
Musci Corallini ana unciam
semis,

Cinnamomi drachmas duas,
Æthiopsis mineralis drachmas tres,
Resinæ Jalappæ, Pineis exactissime
tritæ, scrupulos duos:

Commisceantur cum

Sacchari albi, Aqua Rosarum soluti
& ad consistentiam Tabulandi
cocti, unciis septem:

Fiant lege Artis Morsuli.

*Vires ex nomine patent; uncia una quin-
que circiter grana Resinæ vehit.*

MUCILAGINES.

Parantur, dum Gummi pulverisata &
Semina mucilagine fœta contusa cum
iusta aquæ quantitate in mortario lapi-
deo teruntur, usque dum aqua eviden-
tem spissitudinem ad consistentiam Ge-
latinarum accedentem induat. Radices

NITRUM.

autem cum Aqua coquantur, donec iustam viscedinem acquisiverint. Mucilagines ita paratæ per colum premuntur.

NAPHTA NITRI.

Videatur Spiritus Nitri dulcis.

NAPHTA SALIS COMMUNIS.

Videatur Spiritus Salis dulcis.

NAPHTA VITRIOLI.

Videatur Liquor Anodynus.

NITRUM ANTIMONIATUM.

Videatur Antimonium Diaphoreticum.

NITRUM DEPURATUM.

℞. Nitri crudi quantum lubet.

Dissolvatur in

Aquæ quadruplo:

Filtratum evaporetur ad cuticulam & reponatur in loco temperato, usque dum Crystalli surgant, residuus liquor denuo paulum evaporetur & in Crystallus cogatur; idem labor repetatur, quamdiu pulchræ Crystallis prismaticæ surgunt.

Nitrum non nisi hac ratione depuratum ad usus internos adhiberi debet.

NITRUM FIXUM *Glauberi.*

℞. Nitri depurati quantum placet:

Fundatur in Crucibulo, fluenti ingeratur per vices Pulvis Carbonum, neque ante novus ingeratur, quam prior totus deflagraverit; Pulvere Carbonum Crucibulo injecto non amplius Detonante, rota massa probe agitetur, & per horæ quadrantem adhuc Calcinetur, refrigerata deinde dissolvatur aqua, trajiciatur per Filtrum, inspissetur.

Hic Sal aeri expositus deliquium patitur & tunc LIQUOR NITRI FIXI sive ALCHEST *Glauberi* audit.

Nitrum Fixum cum sit ipsissimum Alkali vegetabile, easdem ac Sal Tartari & in

OLEA.

Liquorem resolutum Olei Tartari per deliquium vires habet.

NITRUM TABULATUM.

Est Lapis Primellæ, qui fusus tubi exiguo foramine terminati, ope, in exiguas Tabulas cogitur.

OCULI CANCRORUM CITRATI.

Parantur ut CONCHÆ CITRATÆ.

Idem de utrisque etiam iudicium esto.

OCULI CANCRORUM PRÆPARATI.

Oculi Cancræ Aqua loti rediguntur in mortario ope pistilli in pulverem tenerimum; supra Porphyritem, affusa, aqua usque terendum, dum in pollinem abierit, qui inter digitos tritus omnis asperitatis expers sentiat; pasta per infundibulum in parvas pyramides exprimitur.

OFFA ALBA *Helmontii.*

℞. Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale Tartari uncias quatuor:

Instilletur ipsi

Alcoholis Vini quantum satis, ut Coagulum album oriatur.

Ad referandas Obstructiones laudatur. Ejus scrupulus unus cyatho aquæ dilutus exhibetur.

OLEA COCTA SIMPLICIA.

Vegetabile vel Animal recens comminutum cum Olei Olivarum æquis partibus coquitur, dum gutta Olei igni instillata non amplius crepitet, sed tacite flammescat, id quod ad consumptionem humiditatis coqui dicere solent; tunc demum Oleum preli ope exprimitur & per subsidentiam depuratur.

OLEA DESTILLATA.

Partes Vegetabilium indigenorum recentes comminutæ, quibus suboctuplum circiter Salis communis adjicitur, infunduntur cum Aquæ fere sextuplo per quatuor

tuor dies; Floribus brevius etiam tempus sufficit, Vegetabilia exsiccata per octiduum, Ligna & Cortices duriores adhuc dilutius infunduntur. Instituitur deinceps Destillatio ex Vesica lege ut statim sub initio validior ignis adhibeatur; continuatur tandem Destillatio quoad usque lacteo tincta calore aqua destillat; ab aqua destillata gossypii aut infundibuli ope oleum auferitur, residuo vegetabili aqua denuo affunditur, eademque operatio bis vel ter iteratur. Balsama & Resinæ vel sine prævia infusione Destillantur.

OLEA EXPRESSA.

Nuclei annotini contunduntur & committuntur sacco, qui inter laminas ferreas torcularis ponitur, adigitur torcular; quando nullum ulterius Oleum effluit, residuum ex sacco eximitur, denuo in pulverem reducitur, torcularique submittitur: Oleum per aliquod tempus quieti relictum a facibus, quas deposuit, defunditur.

Semina duriore cortice instructa, antequam torculari submittantur, prius vapori aquæ ebullientis sunt exponenda. Nuclei qui oleum in temperato aere solidescens vehunt, inter laminas calefactas sunt collocandi. Noces Cacao etiam antequam sacco committuntur, calore non admodum leni calefieri oportet. Id genus Olea, ut facies deponere possint, etiam post expressionem per aliquod tempus caloris ope conservari debent fluida.

Olea fragrantia **CORTICUM AURANTIORUM**, **CITRI**, **FLORUM AURANTIORUM**, quod a **NEROLI** denominatur, **JASMINI**, **LAVENDULÆ** sub nomine **QUINTÆ ESSENTIÆ** optime ex Gallia Meridionali aut Italia accersuntur.

OLEA INFUSA.

Parti Vegetabili vel Animali affunditur Olei Olivarum duplum; instituitur Infusio loco calido in vase clauso;

exprimitur Oleum ope torcularis & depuratur per subsidentiam.

OLEUM ACUSTICUM *Wepferi*.

℞. Ceparum minutim concisarum unciam unam,
Millepedum vivorum numero sexaginta,
Fellis Tauri drachmas duas,
Olei Amygdalarum amarum unciam unam:

In vase vireo bene clauso macerentur per biduum: tunc semel ebulliant: forti expressione obtento Oleo addantur

Oleorum destillatorum Rutæ,
Majoranæ,
Rorismarini
ana guttæ
tres:

Misceantur.

Guttæ sex hujus Olei gossypio exceptæ immittuntur Auri a causa serosa viscida afflicta.

OLEUM ANIMALE *Dippelii*.

℞. Olei Cornu Cervi, quantum lubet: Committatur Retortæ adhibita cautione, ne quid sive rostro sive hemisphærii fornici accrescat, subministretur ignis lenis; Oleum instar aquæ pellucidum destillans, quoties ejus drachma una circiter destillaverit, committatur ad summam plenitudinem vitro subere statim claudendo ac pice aut Cera sigillata probe obducendo. Simul ac vel vestigium coloris flavi in Oleo destillante apparet, ab ulteriori Destillatione est desistendum. Hac ratione omnia Olea Empyreumatica possunt rectificari.

Specificum Medicamentum Antepilepticum cujus egregiam virtutem crebra experientia confirmavit.

Datur ad guttas quindecim pro dosi.

OLEUM BEZOARDICUM *Wedelii*.
OLEUM CAMPHORATUM *Suecorum*.

℞. Camphoræ drachmas duas:
Dissolvantur

OLEUM.

Olei Amygdalarum dulcium Radicibus, Alkannæ tincti, uncia una:
Addatur
Quintæ Essentiæ Citri scrupulos dimidius:

Misceantur.

Ad morbos Inflammatorios & Malignos laudatur, olim, in Germania præsertim, multum celebrabatur. Ad Fissuras Labiorum in Febris ardentibus, quin & ad necanda, quæ Meatum Auditorium subierunt, Insecta adhibetur.

Dosis intus ad guttas decem.

OLEUM CAMPHORÆ Lemery.

℞. Camphoræ uncias duas:
Immittantur

Spiritus Nitri unciis tribus:

Hac ratione in Oleum versa Camphora separetur ab Acido.

Ad Sarcomata fungosa & Ulcerum callosos margines adhibetur.

OLEUM CAPPARUM Manlii.

℞. Corticum Radicum Capparum unciam unam,

Tamarisci,

Cyperii ana drachmas duas,

Herbarum Ceterach,

Rutæ ana drachmā unam,

Seminis Agni casti drachmas duas:

Incisa, contusa infundantur cum

Vini albi unciis sex, per biduum:

Tunc addantur

Olei Olivarum uncia duodecim:

Coquantur ad consumptionem humiditatis, exprimantur & depurentur per subsidentiam.

Laudatur contra Obstructiones Lienis.

OLEUM CARMINATIVUM Danorum.

℞. Oleorum destillatorum Chamomillæ, Menthæ ana uncias duas,
Carvi,
Cumini,
Fœniculi ana drachmam
femis:

Misceantur.

OLEUM.

III

Umbilico illinitur, Glysmatibus immiscetur, intus quoque ad sex vel octo guttas cum Saccharo aut Vitello ovi exhibetur.

OLEUM CARMINATIVUM

Würtembergensium.

℞. Herbarum recentium Anethi,
Menthæ,
Absynthii,
Pulegii,

Florum Chamomillæ vulgaris ana uncias quatuor:

Incisa coquantur cum

Olei Olivarum unciis viginti quatuor, ad consumptionem humiditatis:

Expressis addantur

Olei Laurini Unciæ tres:

Depurentur per subsidentiam.

Vires ex nomine patent. Præcipue laudatur Abdomini tenellorum Torminibus laborantium, inungendo.

OLEUM CATELLORUM Parisiensium.

℞. Catellorum recens natorum incisorum numero tres:

Coquantur cum

Olei Olivarum unciis quadraginta octo, ad consumptionem humiditatis:

Colato addantur

Herbarum Origani,

Serpylli,

Pulegii,

Hyperici,

Majoranæ ana uncia duæ:

Insolentur per quindecim dies, exprimantur & depurentur.

Hoc oleum in membris Contractis curandis & Rheumatismo pellendo multis laudibus celebratur, quæ, si vel maxime ei debentur, certe Catellis omnium minime referenda erunt accepta.

OLEUM COLOCYNTHIDIS Grulingil correctum.

℞. Herbarum Absynthii,
Rutæ ana uncias quatuor,
Pul-

Pulpæ Colocynthis uncias duas,
 Radicis Hellebori nigri unciam unam:
 Incisa & contusa coquantur cum
 Olei Olivarum unciis quadraginta
 octo,
 Vini albi unciis sex,
 Fellis bubuli unciis sedecim:
 Ad consumptionem humiditatis:
 Exprimantur & per subsidentiam depu-
 rentur.
*Anthelmintico scopo Alviq̄ue ducendæ cau-
 sa Abdomini illinitur.*

OLEUM HYPERICI *Manlii.*

℞. Florum Hyperici cum calicibus un-
 cias triginta sex,
 Vini albi uncias sex,
 Olei Olivarum uncias triginta sex:
 Coquantur ad consumptionem humiditatis;
 Expressio addantur
 Terebinthinæ Venetæ uncia duodecim,
 Croci, minutim concisi, drachmæ duæ:
 Elapsis viginti quatuor horis coletur.
*Creberrimo in usu est ad Vulnera clau-
 denda.*

OLEUM MUCAGINUM

Amstelodamensium.

℞. Radicum Althææ recentium, uncias
 duas cum dimidia,
 Scillæ recentium unciam se-
 mis,
 Seminum Lini,
 Fœnugræci ana uncias duas:
 Extrahatur inde, ope coctionis cum aquæ
 quantitate sufficiente,
 Mucilago, cui addantur
 Oleorum infusorum Anethi,
 Chamomillæ,
 Liliorū alborum
 ana uncia se-
 decim,
 Coquantur ad consumptionem humiditatis;
 Colentur.
Emolliendi scopo adhibetur.

OLEUM MYRRHÆ *per DELIQUIMUM
Costæi.*

Albumina ovorum, aqua ebulliente in-
 durata, dissecantur secundum longitu-
 dinem; unius cavum repletur Pulvere
 Myrrhæ, huic alterum superimponitur,
 ambo hemisphæria filii ope continentur
 & suspenduntur eo consilio, ut in vas
 ipsis suppositum destillet Myrrha Albu-
 mine dissoluta.

*Laudatur tanquam Medicamentum balsa-
 micum ad Fissuras Cutis. Cum vero valde
 proclive sit ad putredinem, consultius est,
 ipso usus tempore, Myrrham in Albumine
 dissolvere.*

OLEUM PHILOSOPHORUM *Mesue.*

Hoc nomine quaecunque Oleum ungui-
 nosum per se destillatum potest exhi-
 beri.

*Resolvendi ergo adhibetur. Ejus inunctio-
 ne Tympaniticum fere conclamatum perfe-
 cte curatum recenset Spindler Obs. Med.
 N. 53.*

OLEUM SCARABÆORUM *Parisiensium.*

℞. Scarabæorum finariorum uncias octo:
 Contusi infundantur cum
 Olei Laurini unciis sedecim:
 Coquantur ad exhalationem humidita-
 tis, colentur & depurentur per subsi-
 dentiam.
*Laudatur Resolvendi & Nervos roboran-
 di sine.*

OLEUM *Stolani.*

℞. Olei Olivarum uncias septuaginta
 duas,
 Catellorum numero duos,
 Ranarum numero duodecim,
 Lumbricorum terrestrium uncias se-
 decim,
 Aquæ Juniperi uncias triginta sex:
 Incisa coquantur ad consumptionem hu-
 miditatis:
 Expressis addantur

OLEUM.

Axungiarum Humanæ,
 Muris Alpini,
 Oleorum Scorpionum,
 Amygdalarum amararum
 ana uncia sex,
 Oculorum Populi recentium uncia
 triginta sex,
 Florū recentiu Primulæ Veris,
 Tuttilaginis
 Betonicæ,
 Genistæ,
 Chamomillæ Romanæ,
 Violarum,
 Liliorum Convallium,
 Lavendulæ,
 Sambuci,
 Anethi,
 Salviæ,
 Cheiri,
 Rutæ,
 Thymi,
 Rorismarini,
 Centaurei minoris,
 Origani,
 Tanaceti,
 Ligustri,
 Agrimonix,
 Pulegii,
 Meliloti,
 Verbasci,
 Absynthii,
 Rosarum Damascena-
 rum ana manipulus
 unus,
 Hyperici manipuli
 quatuor:

Insolentur per totam æstatem; tunc co-
 quantur per aliquot horas, exprimantur;
 Oleum depuretur per suâsidentiam.

*Hildanus Oper. 657. hoc O'leum tanquam
 egregium Medicamentum contra omnes affe-
 ctus Nervorum frigidos maxime, nec non
 ad alios graves morbos commendat. An vero
 inconcinna hæc, imo monstruosa compositio
 promissis respondeat? doceat experientia.*

OLEUM STOMACHICUM Zwælferei.

℞. Olei infusi Absynthii uncias duodecim,
 Mastichis electæ unciam unam:
 Dissolutis addantur
 Tom. II.

OPIATA.

113

Oleorum destillatorū Absynthii,
 Caryophyllorum,
 Ligni Rhodii, ana
 drachma semis,
 Nucis Moschatae,
 Macis ana scrupu-
 pli duo:

Misceantur.

Inungitur Regioni Epigastricæ.

OLEUM TARTARI per DELIQUIUM.
LIXIVIUM TARTARI Londinensium.

Salis Tartari quantum lubet in patina
 vitrea leviter tecta exponitur aërei; li-
 quor in quem resolvitur, per filtrum
 trajicietur.

*Ejus aliquot guttæ multa aqua dilutæ dan-
 tur in Acrimonia acida, nec non ad reseran-
 das Obstructiones abdominales.*

OLEUM VITRIOLI Basil. Valentini.

Vitriolum viride ad albedinem calcina-
 tum immittitur Retortæ terreae, cui for-
 naci reverberatoriæ commissæ jungitur
 Argillæ ope excipulum vitreum; accen-
 ditur ignis, per gradus ad summum
 usque augendus & usque continuandus,
 donec ex cessante, quæ semper in exci-
 pulo conspicitur, nebula, nullos ulterius
 prodire vapores appareat, tunc omnibus
 refrigeratis, excipulum a Retorta solvi-
 tur; liquor obtentus denuo ex Retorta
 vitrea destillatur; SPIRITUS SULPHU-
 RIS qui prior destillat, seorsim asserva-
 tur: remanens autem in Retorta *Acidum
 Vitrioli Concentratum* vasi vitreo, probe
 claudendo committitur.

*Acidum fortissimum interdum a Chirurgis
 Sanguini sistendæ adhibetur; intus non nisi ma-
 gna aquæ quantitate dilutum usurpari potest.*

Rarissime a Pharmacopolis paratur,
 sed ab artificibus propriis accessitur. Pro-
 batur pondere, incalescentia cum aqua,
 nec non pennæ sive lintei ipsi immissi
 subita corrosione.

OPIATA ADSTRINGENS Richard.

℞. Corticum Cascarillæ unciam unam,
 Granatorum unciam semis,
 P Ter-

Terræ Japonicæ unciam unam,
Nucum Cupressi unciam semis,
Rob Juniperi uncias quatuor:
Pulverifata Misceantur.
*Vires ex nomine patent; datur ad Avel-
lanæ magnitudinem.*

OPIATA DETERSIVA *Richard.*

℞. Pulverum Myrrhæ electæ,
Olibani electi ana unciam
semis,
Spermatis Ceti drachmas duas:
Vitello ovi probe subactis addantur
Mellis optimi uncia sex,
Pulveris Radicis Liquiritiæ quantum
fatis:
Misceantur.
Exhibetur Phthificis.

OPIATA DYSENTERICA *Richard.*

℞. Boli Armenæ uncias tres,
Pulveris Gummi Arabici unciam se-
mis,
Theriacæ Andromachi,
Diascordii Fracastorii ana uncias duas:
Misceantur.
His si adjiciuntur
Balsami Locatelli uncia duæ,
Surgit *OPIATA DYSENTERICA
BALSAMICA* *Richard.*
*Prior ad sistendam simplicem Dysenteriam,
hæc ad ulceratam adhibetur.*

OPIATA FEBRIFUGA PURGANS
Richard.

℞. Pulverum Corticis Chinæ uncias qua-
tuor,
Radicum Jalappæ,
Nitri depurati ana drach-
mas tres,
Conservæ Rosarum rubrarum uncias
duas,
Syrupi Cichorii cum Rhabarbaro quan-
tum fatis:
Misceantur.
Leniter alvum ducit.
*Ubi Radix Jalappæ omittitur, surgit OPIA-
TA FEBRIFUGA SIMPLEX* *Richard.*

OXYCRATUM *Galen.*

℞. Aceti fortis,
Aquæ fontanæ ana partes æquales:
Misceantur.
*Ad Inflammationes & Sugillationes dis-
sipandas adhibetur.*

OXYMEL CHLYBEATUM *Fuller.*

℞. Aceti chalybeati,
Mellis crudi ana partes æquales:
Coquantur ad consistentiam Syrupi &
colentur.
Laudatur Resolvendi scopo.

OXYMEL COLCHICUM *Stærck.*

℞. Aceti Colchici uncias sedecim,
Mellis optimi uncias triginta duas:
Leni igne coquantur ad consistentiam
Mellis.
*Scopo Resolvendi & Urinam ducendi ad
aliquot drachmas pro dosi, aliquoties de die
exhibetur.*

OXYMEL PECTORALE *Danorum.*

℞. Radicū Helenii unciam unam,
Iridis Florentinæ unciam semis,
Incisæ coquantur ex
Aquæ fontanæ unciis triginta sex, ad
residuum unciarum viginti qua-
tuor:
Colaturæ, subsidentia depuratæ, ad-
dantur
Mellis optimi uncia sedecim,
Gummi Ammoniacy in octuplo Ace-
ti soluti uncia una:
Coquantur ad consistentiam Mellis.
*Cochleatim exhibetur Tussientibus & Asth-
maticis.*

OXYMEL SCILLITICUM *Præpositi.*

℞. Mellis optimi uncias triginta duas,
Aceti Scillitici uncias sedecim:
Coquantur ad consistentiam Mellis.
*Egregium Medicamentum ad Resolvendum
Mucum. Asthmaticis morbisque Pituifosis
la-*

laborantibus cum successu cochleatim exhibetur.

OXYMEL SIMPLEX *Hippocratis.*

℞. Mellis optimi uncias duodecim,
Aceti Vini uncias sex:
Coquantur ad confidentiam Mellis.
Valide Resolvit, in Febribus præcipue Inflammatoriis salubriter datur, ad Gargarismata quoque recipitur.

OXYSACCHARUM EMETICUM
Schræder.

℞. Pulveris Vitri Antimonii unciam unã,
Aceti Vini uncias duodecim:
Infundantur per viginti horas, liquori filtrato addantur
Sacchari albi uncia octo:
Coquantur ad consistentiam Syrupi.
Datur ad unciam unam pro dosi.

PANACEA HOLSATICA.

Videatur ARCANUM DUPLICATUM.

PANACEA MERCURIALIS *Lemery.*
ANTIQUARTIUM *Riverii.*
CALOMELAS.

Est Mercurius dulcis septies vel pluries sublimatus, quem quidem cum Spiritu Vini adhuc digeri jubent.

Sunt qui contendant, iteratis Sublimationibus Mercurium dulcem vi Alvi ducendi privari, aptioremque reddi ad excitandum Ptyalifinum.

PANES SACCHARATI PURGANTES.

℞. Farinæ Triticæ,
Pulveris Sacchari albi ana uncias quatuor,
Vitellorum Ovorum numero tres:
Probe agitentur, dein distribuantur in orbiculos, quibus singulis determinatum Resinæ Jalappæ, Pineis tritæ, pondus adjicitur; Coquantur dein modo apud dulciarios usitato.
Exhibentur Pueris.

PASSULÆ & PRUNA LAXATIVA
Bergamensium.

℞. Foliorum Sennæ uncias quatuor,
Cinnamomi drachmas duas,
Zinziberis albi drachmam unam semis:
Incisa infundantur per biduum cum
Aquæ ferventis unciis decem:
Colatura dissolvantur
Sacchari albi uncia duodecim:
Post unciam ebullitionem denuo coletur liquor & superfundatur
Passularum minorum vel Prunorum Damascenorum cum aqua ad mollitiem coctorum unciis duodecim.

Quibus Alvus tarda est ad unciam unam comedenda præbentur.

PASTA ALTHÆÆ *Parisiensium.*

℞. Radicum Althææ incisarum uncias quatuor,
Coquantur ex
Aquæ fontanæ unciis sexaginta quatuor per octavam horæ partem:
Colaturæ addantur;
Gummi Arabici albissimi contusi uncia duæ & triginta:

Hoc dissoluto adjiciantur
Sacchari albi uncia duæ & triginta:
Coletur liquor & evaporetur sub continua agitatione ad consistentiam spissi Syrupi;

Tunc addantur
Albuminum Ovorum numero sex cum
Aquæ Naphæ unciis quatuor conquassatorum:

Evaporentur sub perpetua & valida agitatione, donec in massam abierint, quæ dorso manus applicata eidem non adhæreat: tunc effundantur super laminam metallicam, Amylo conspersam.

Tussientibus in ore liquanda exhibetur, ut acre vias aereas irritans demulceat.

PASTA AMYGDALATA COSMETICA.

℞. Farinæ Fabarum uncias sedecim,
Oryzæ,

Amygdalarum excorticatarum ana uncias octo,
Myrrhæ electæ uncias duas,
Camphoræ sesqui unciam,
Saponis Veneti uncias viginti,
Reducantur in Pulverem tenerrimum.
Ad scopos Cosmeticos adhibetur.

PASTA DEPILATORIA *Plenck.*

℞. Calcis vivæ uncias sedecim,
Amyli uncias decem,
Auripigmenti unciam unam:
In pulverem tritis affundatur sensim
Aquæ quantum satis:
ad consistentiam Pastæ
*Inunguntur hac Pasta loca pilosa, & dum
coeperit siccescere, pars aqua illico est ab-
luenda.*

PASTA LIQUIRITIÆ FUSCA

Parisiensium.

SUC de REGLISE de BLOIS.

℞. Gummi Arabici electi uncias triginta
duas:
Dissolvantur
Aquæ fontanæ quantitate sufficienti:
Colatura dissolvantur
Succi Liquiritiæ unciæ novem,
Sacchari albi unciæ sedecim:
Evaporentur lento igne ad consistentiam
Syrupi spissioris;
Tunc addantur
Pulverum Radicum Enulæ,
Ireos Florentinæ
ana uncia semis:
Continuetur evaporatio, usque dum mas-
sa refrigerata digitis non adhæreat, tunc
addantur
Olei destillati Anisi scrupuli duo:
Effundatur Pasta super marmor Oleo A-
mygdalarum dulcium inunctum, exten-
datur ope cylindri lignei eodem Oleo
inuncti, tunc in parva quadrata dif-
secetur.
*Usurpatur ut Pasta Althææ, cui siquidem
Tussis a Muco spisso originem trahit, etiam
preferenda videtur.*

PASTA ad NÆVOS *Plenck.*

℞. Saponis Veneti,
Calcis Vivæ ana partes æquales,
Terantur in pastam.
*Suadet Auctor vicinas partes Emplastro
quodam adhesivo, foramine Nævum tran-
smittente perforato, defendere, & Nævum
hanc pastam imponere: asserit intra duodecim
horas Nævum in Escharum transiturum &
succeedente Suppuratione secessurum.*

PASTILLI MERCURIALES *Parisiensium.*

℞. Cinnabaris factitiæ lævigatæ drachmas
duas,
Succini præparati drachmam unam:
Mixta formentur cum Mucilaginis Tra-
gacanthæ idoneo quanto in Pastillos.
Adhibentur pro Fumigatione Mercuriali.

PILULÆ ÆTHIOPICÆ BATEI.

℞. Æthiopis mineralis unciam unam;
Pulverum Reguli Antimonii Medi-
cinalis,
Gummi Guajaci ana un-
ciam semis,
Misceantur & formentur in Massam Pi-
lularum.
*Resolvendi & Sanguinem depurandi ergo
adhibentur, Scabiosis, Hydropicis, Ulceribus
malignis laborantibus laudantur; Dantur ad
semidrachmam.*

PILULÆ ALUMINOSÆ *Richard.*

Videatur Alumen tinctum.

PILULÆ de AMMONIACO *Quercetani.*

℞. Extracti Aloës aquosi uncias duas,
Pulverum Gummi Ammoniaci un-
ciam unam semis,
Myrrhæ;
Mastychis,
Benozoes,
Rhabarbari ana drachmas
duas,
Crocī scrupulos duos,
Salis Absynthii drachmam
unam.

Misceantur in Massam Pilularum.

Resolvendi sine Hypochondriacis, Asthmaticis, Quartanariis &c. commendantur. Dantur ad drachmam dimidiam.

PILULÆ ANGELICÆ *Augustanorum.*

℞. Aloës Succotrinæ uncias duodecim:
Dissolvantur

Succorum Cichorei,
Endiviæ,
Fumariæ,
Rosarum Damascenarum
ana unciis duodecim:

Colatura depuretur per subsidentiam & evaporetur ad consistentiam Syrupi; addantur

Pulverum Rhabarbari uncia una,
Agarici uncia semis,
Cinnamomi drachmæ duæ:

Misceantur in Massam.

Leniter alvum ducunt, & Obstructiones Viscerum abdominalium oppugnant. Dantur ad drachmam semis.

PILULÆ ANTHELMINTICÆ

Hoffmanni.

℞. Pulverum Gummi Sagapeni,
Asæ foetidæ,
Rhabarbari electi,
Mercurii dulcis ana drachmam unam:

Misceantur & fiant cum

Essentiæ Gentianæ quantitate sufficiente, Pilulæ grani unius ponderis.

Vires ex nomine patent.

PILULÆ ANTIMONIALES *Kleinii.*

℞. Pulveris Antimonii unciam unam,
Gummi Guajaci drachmas duas,
Extracti Fumariæ unciam semis;

Misceantur & redigantur secundum artem in Massam.

Sanguinem depurandi ergo cum successu dantur aliquoties de die ad drachmam semis.

PILULÆ APERIENTES *Stablii.*

℞. Extractorum Aloës Gummofi unciam unam,
Panchymagogi unciam semis,
Alcohol Limaturæ Martis drachmas duas:

Misceantur.

Quibus segnior Alvus est, commendantur ad quindecim grana.

PILULÆ BALSAMICÆ *Wolffi.*

℞. Rasuræ Saponis officinalis unciam unam,
Terebinthinæ coctæ unciam semis,
Resinæ Jalappæ præparatæ,
Extractorum Aloës aquosi,
Centaurii minoris,
Gentianæ ana drachmas tres:

Misceantur & fiant Pilulæ Granorum duorum ponderis.

Abstergant, Resolvunt, Alvum ducunt. Dosis ad quadraginta usque potest extendi.

PILULÆ BALSAMICÆ *Mortoni.*

℞. Pulverum Millepedum drachmas tres,
Gummi Ammoniacy,
Florum Benzoes ana drachmam unam,
Extracti Croci,
Balsamorum Peruviani ana scrupulum semis,

Sulphuris Anisati quantitatem sufficientem:

Fiat Massa Pilularum.

In metu Tuberculorum Pulmonis dantur ad scrupulum dimidium.

PILULÆ CÆRULEÆ *Edinburgensium.*

Videatur Specificum Antepilepticum *Veismanni.*

PILULÆ CATARRHALES *Danorum.*

℞. Extracti Panchymagogi uncia unam,
Mercurii dulcis unciam semis,

Re-

Resinæ Jalappæ, Pineis tritæ, drachmam unam,
 Quintæ Essentiæ Corticum Aurantiorum guttas triginta:
 Misceantur in Massam.

Ad educendum & attenuandum Serum exhibentur. Dantur ad scrupulum unum pro dosi.

PILULÆ CEPHALICÆ Danorum.

℞. Massæ Pilularis de Succino,
 Extractorum Rhabarbari,
 Panchymagogi,
 Resinæ Jalappæ, Pineis tritæ, ana unciam semis:
 Misceantur in Massam.

Evacuandi ergo dantur in affectibus Capitis serosis. Dosis est ad drachmam semis.

PILULE COCHIÆ Rhasis.

℞. Specierum pro Hiera picra drachmas decem,
 Pulverum Trochiscorum Alhandal scrupulos decem,
 Diagyridii drachmas duas semis,
 Stœchadis Arabicæ,
 Radicum Turbith ana drachmas quinque,

Syrupi Stœchados quantum satis:
 Misceantur & formentur in Massam.

Ad Caput Pituita evacuandum olim adhibebantur. Dantur ad drachmam semis vel scrupulos duos.

PILULÆ COMMUNES.

Videantur Pilulæ Rufi.

PILULÆ de CYNOGLOSSO Manardi.
 CATAPOTIA ad CATARRHOS
 Mesue.

℞. Pulverum Radicis Cynoglossi,
 Seminis Hyoscyami,
 Opii depurati ana unciam semis,
 Myrrhæ electæ drachmas sex,

Pulverum Olibani drachmas quinque,
 Styracis Calamitæ,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomiana drachmas duas,

Croci sesqui drachmam:

Misceantur & fiat cum Syrupi Violarum idoneo quanto Massa.

Olim a Stablianis maxime Sopiendi scopo ad grana quinque usque pro Dosi dabantur. Drachma una de Opio & de Semine Hyoscyami grana octo continet.

PILULÆ DEPURANTES Richard.

℞. Sulphuris Aurati Antimonii,
 Mercurii dulcis ana drachmas duas,
 Gummi Guajaci unciam semis:
 Pulverifatis addatur

Balsami Copaibæ drachma una:
 Misceantur & formentur in Massam.

Depurandis Humoribus dantur ad scrupulum semis aliquoties de die.

PILULÆ FOETIDÆ VVbytt.

℞. Asæ foetidæ drachmas tres.
 Aloës,
 Vitrioli Martis ana drachmam unam:
 Misceantur, Fiat Massa Pilularum.
Hujus Scrupuli duo aliquoties de die Hypochondriacis & Hystericis dantur.

PILULÆ HYDRAGOGÆ Helvetii.

℞. Granorum Tigliorum,
 Gummi guttæ,
 Diagyridii Sulphurati ana unciam semis,
 Radicum Jalappæ,
 Rhabarbari ana drachmas duas,
 Macis drachmam unam,
 Rob Sambuci unciam semis,
 Misceantur in Massam Pilularum.

Valide Evacuant. Drachma una granorum Tigliæ Gummi guttæ & Diagyridii de singulis undecim circa grana continet; quapropter Dosis ad scrupulum unum est limitanda.

PILULÆ HYDROPICÆ Bontii.

℞. Aloës Succotrinæ drachmas quinque
Gummi guttæ,
Ammoniaci ana drachmas
tres:

In pulverem redacta formentur in Mas-
sam.

*Hydropicis resolvendi causa ad grana quin-
decim, evacuandi autem sine ad drachmam
semis dantur.*

PILULÆ HYDROPICÆ Richardi.

℞. Aloës Succotrinæ unciam semis,
Gummi Ammoniaci drachmas duas:
Guttæ,

Diagrydii,
Arcani duplicati ana drachmas tres,
Pulverifata reducuntur cum
Oxymellis Scillitici quantitate suf-
ficiente in Massam Pilularem,
Prioribus validiores dantur eadem dosi.

PILULÆ HYSTERICÆ Parisiensium.

℞. Gummi Opoponacis unciam unam,
Ammoniaci,
Galbani,
Sagapeni ana unciam semis,
Myrrhæ drachmas duas,
Asæ foetidæ,

Castoreis Russici ana drachmas tres:
In pulverem redactis immisceatur
Olei destillati Succini scrupulus unus,
Mithridatii quantitate sufficiente:
Fiat Massa pilularis.

*Scopo aperiendi adhibentur; Hystericis præ-
cipue commendantur; dosi est ad drachmam
semis.*

PILULÆ MAJORES Hoffmanni.

℞. Mercurii sublimati drachmam unam:
Dissolvatur

Aquæ destillatæ quanto sufficiente:
Hac solutione imbuantur

Micæ Panis drachmæ novem:
Fiant Pilule grani unius pondere,
Liquoris Siphylitici vires habent, eo com-

*mendabiles, quod nullo sapore metallico mo-
lestæ sunt, & cum sensim modo in Ven-
triculo solvantur, nulla inde irritatio me-
tuenda. Quatuor aut quinque Pilulæ ex-
hibentur ter de die.*

PILULÆ MARTIALES Sydenhami.

℞. Alcohol Limaturæ Martis uncias duas,
Extracti Absynthii quantum satis ad
formandam Massam Pilularem.

*Hypochondriacis & Hystericis conducunt.
Auctor illas in Dissertatione Epistolari de-
scribit. Dantur bis de die ad scrupulum unum
pro dosi.*

PILULÆ MASTICHINÆ Petri Apo-
nensis.

℞. Aloës electæ drachmas decem,
Mastychis electæ unciam semis,
Agarici optimi drachmas tres:
Reducuntur in Massam Pilularem.
*Ventriculo roborando inserviunt; dantur
ad drachmam semis.*

PILULÆ MERCURIALES Barbarossæ à
Lemery correctæ.

℞. Hydrargyri drachmas sex:
Extinguantur
Terebinthinæ quantitate sufficiente:
Addantur
Pulverum Aloës drachmæ sex,
Agarici albi uncia semis,
Rhabarbari electi drachma
una:

Misceantur & formentur in Massam Pi-
lularem.

*In morbis Venereis & Lymphæ exhibentur
ad drachmam unam pro dosi.*

PILULÆ MERCURIALES Belloste a
Baumé correctæ.

℞. Mercurii vivi e Cinnabari revificati
unciam unam,
Cremoris Tartari unciam semis:
Triturentur usque dum globuli Mercu-
riales disparuerint:
Tunc addantur

Diagrydii,
Pulveris Jalappæ ana uncia una:
Mixta formentur cum Syrupi Capil-
lorum Veneris quantitate sufficiente in
Massam pilularem.

*Viribus cum prioribus conveniunt, dantur
ad drachmam semis.*

PILULÆ CONTRA OBSTRUCTIONES
Stablii.

℞. Extractorum Panchymagogi drach-
mam unam,
Aloës gummosi drach-
mas duas,
Alcohol Limaturæ Martis drachmam
semis:

Mixta formentur in Massam Pilularem.
*Frequenti olim in usu apud Germanos ma-
xime fuerunt in reserandis Visceribus Abdo-
minalibus. Dosis est ad grana decem, per
plures dies continuanda.*

PILULÆ OPHTHALMICÆ *Schmucker.*

℞. Gummi Galbani,
Sagapeni,
Saponis officinalis ana drachmam
unam,
Pulveris Rhei electi drachmam unam
semis,
Succi Liquiritiæ drachmam unam,
Tartari Emetici grana sedecim:
Misceantur & formentur Pilulæ grani
unius ponderis.

*Mane & vesperi sumantur quindecim Pi-
lulæ per sex septimanas contra Suffusionem.*

PILULÆ *Plumerii.*

℞: Mercurii dulcis,
Sulphuris Aurati Antimonii ana dra-
chmas sex,
Extracti Gentianæ unciam semis:
Probe mixta formentur in Massam Pi-
lularem.

*Multum celebrantur in Morbis Venereis
& Lymphæ. Dantur ad drachmam dimidiam
vel scrupulos duos pro dosi.*

PILULÆ POLYCHRESTÆ BALSAMI-
CÆ ad mentem *Becheri & Stablii.*

℞. Extractorum Aloës,
Myrrhæ aqua frigida
paratorum ana uncias
duas,
Absynthii unciam unam
semis,
Centaurii minoris un-
ciam unam,
Cardui benedicti unciam
unam semis,
Fumaricæ unciam unam,
Cochleariæ unciam unam
semis,
Rhabarbari,
Terebinthinæ Venetæ ana unciam
unam:

Misceantur in Massam Pilularem.

*Non levem quæstum cum his Pilulis varii
Germaniæ Medici fecerunt. Ad reserandas
Viscerum Abdominalium obstructions, ut &
Mensium præcipue commendantur. Dantur
ad drachmam semis.*

PILULÆ POLYCHRESTÆ *Starckey.*

℞. Saponis Chemicæ cum Oleo Tere-
binthinæ parati uncias quatuor,
Extracti Opii aquosi unciam unam,
Pulveris Radicis Hellebori albi un-
cias duas:

Probe mixta formentur in Massam Pi-
lularem.

*Medicamentum inconcinnum, Alchemicis
commentis superstructum omnino a re Medi-
camentaria removendum videtur; quo vero
qui uti voluerit, non ultra tria grana dosim
extendat.*

PILULÆ RESOLVENTES *Darelii.*

℞. Saponis officinalis uncias duas cum
semisse,
Pulveris Gummi Ammoniæ,
Pulverum Tartari Vitriolati,
Bilis bovinæ inspissatæ,
Rhabarbari:

Extracti Absynthii ana drachmas sex:
Misceantur cum Syrupi Absynthii quan-
to convenienti in Massam Pilularem.

Inimicæ maxime feruntur Ictero; dosi exhibentur eadem, qua SAPONATÆ, quarum superant etiam efficaciam.

PILULÆ Rûsi correctæ.

℞. Extractorum Aloes gummosi unciam unam,

Myrrhæ gummosi unciam semis,

Pulveris Croci drachmas duas:

Misceantur cum Succo Limonum quanto conveniente in Massam Pilularum.

Ad reserandas Obstructiones Abdominales faciunt; laudantur quoque adversus Pestem. Dosis ad drachmam semis excurrit.

PILULÆ SAPONATÆ Kleinii.

℞. Saponis officinalis unciam unam,
Gummi Ammoniaci depurati,
Extracti Centuarii minoris ana unciam semis:

Olei destillati Succini guttas decem:

Misceantur in Massam.

Aperiendi scopo ad drachmam semis aliquoties de die dantur.

PILULÆ SCILLITICÆ Edinburgensium.

℞. Scillæ præparatæ,
Gummi Ammoniaci depurati ana unciam semis,

Reducantur in pulverem; addantur Millepedum præparatorum uncia semis,

Saponis officinalis uncia una:

Reducantur cum Oxymellis Scillitici idoneo quanto in Massam Pilularum.

Egregie resolvunt & aperiunt: in Obstructionibus Viscerum Abdominalium, & mucosis Pectoris morbis; ter de die ad scrupulum unum exhibentur.

PILULÆ de STYRACE Schræderi correctæ.

℞. Styracis Calamitæ unciam semis,
Succi Liquiritiæ drachmas tres,
Olibani,
Tom. II.

Benzoes,
Mastichis,
Extracti Opii aquosi ana drachmas duas,

Croci Orientalis drachmam unam:
Pulverifata reducantur cum Essentiæ Succini quanto conveniente in Massam pilularem.

Drachma una septem cum dimidio grana Opii continet. Dantur Tussientibus sopiendis ad grana duodecim.

PILULÆ de SUCCINO Cratonis.

℞. Succini præparati unciam unam semis,
Pulverum Mastichis unciam unam,
Agarici optimi drachmas sex,

Radici Aristolochiæ rotundæ veræ drachmas duas,
Aloes Succotrinæ uncias duas semis:

Misceantur & formentur cum Essentiâ Succini in Massam:

Olim frequens earum usus erat in Affectibus Capitis atque Catarrhis. Ad drachmam semis pro Dosi dabatur.

PILULÆ TARTAREÆ Schræderi.

℞. Aloes Succotrinæ unciam unam,
Gummi Ammoniaci drachmas tres,
Vitrioli Martis,
Extractorum Croci ana drachmam unam,
Gentianæ drachmam unam semis;

Terræ foliatæ Tartari drachmas duas:
Mixta reducantur secundum artem cum Tinctura Tartari in Massam pilularem.

Hæc Pilularum Tartarearum compositio reliquis quorumcunque Auctorum omnino præferenda est. Resolvit & roborat, quapropter aperiendi causa in morbis ab obstructis Visceribus Abdominalibus oriundis ad drachmam semis pro dosi datur.

PILULÆ de TEREBINTHINA Richard.

℞. Boli Armenæ præparatæ,
Offis Sepiæ ana unciam semis,
Q . Suc-

Succini præparati,
Mastyches ana drachmas duas,
Rhei electi drachmam unam,
Terebinthinæ coctæ unciam unam &
femis:

Reducantur in pulverem & Syrupo Balsamico formentur in Massam Pilularum.

Ad sistendam Gonorrhæam scrupulus unus ter de die exhibetur.

PILULÆ TONICÆ *Bacher.*

℞. Extracti Hellebori nigri vinosi,
Myrrhæ aquosi ana unciã unã,
Pulveris Cardui benedicti drachmas
tres & scrupulum unum:
Misceantur & inde formentur Pilulæ grani
dimidii ponderis.

*Hydropicis multum laudantur, dantur ad
decem ter de die, quæ vero dosis pro ra-
tione effectus augeri minuique potest.*

PILULÆ contra VARIOLAS *Rosen.*

℞. Pulverum Gummi Guajaci grana se-
decim
Mercurii dulcis grana duo-
decim,
Camphoræ, Pineis tritæ, grana octo,
Extracti Aloes grana duodecim:
Misceantur in Massam pilularem.

*Dantur tam prophylactico scopo quam cor-
poris ad Inoculationem præparandi gratia.
Dosis pro ratione ætatis augetur, addita iusta
Resinæ Jalappæ portione ad scopum quoque
Catharticum aptatur.*

PLUMBUM USTUM *Celsi.*

Plumbum in patina terrea liquatum agita-
tur usque dum in calcem gryseam abierit.

*Vires adstringentes & exsiccantes exserit;
ad usus potissimum externos adhibetur.*

POSCA *Galen.*

℞. Aquæ partes tres,
Vini partes tres:
Paulum coquantur.

*In morbis Malignis vires roborantes pu-
tredinique resistentes prodit.*

POTIO ADSTRINGENS *Richard.*

℞. Succii Hypocistidis drachmam unam,
Sanguinis Draconis,
Aluminis ana drachmam femis:
Pulverifatis adjiciantur
Ptisanæ adstringentis unciæ quatuor,
Syrupi de Myrtho uncia una:
Misceantur.

Vires nomen indicat.

POTIO AMMONIACA *Ricard.*

℞. Gummi Ammoniacy drachmas duas:
Dissolvantur in
Oxymellis Scillitici uncia una femis,
Ptisanæ communis unciis duodecim:
Misceantur.

*Dantur Asthmaticis ad Cochlearia duo al-
ternis horis.*

POTIO ANTISEPTICA *Richard.*

℞. Corticis Chinæ,
Radici Serpentariæ Virginianæ ana
drachmas tres:
Incidantur & coquantur cum
Aquæ unciis sedecim ad octo resi-
duas uncias:
Sub finem addantur
Florum Chamomillæ Romanæ drach-
ma una:
Colaturæ addantur
Spiritus Nitri dulcis drachma femis,
Aquæ Cinnamomi vinosæ,
Syrupi Limonum ana uncia una:
Misceantur.

Exhibetur in morbis Malignis per cyathos.

POTIO ad ASTHMA *Fuller.*

℞. Millepedum vivorum centum & vi-
ginti:
Contusis sensim affundantur
Aquæ Pulegii unciæ octo:
In liquore fortiter expresso dissolvantur
Pulveris Gummi Ammoniacy drach-
mæ tres,
Spiritus Salis Ammoniacy drachmæ
duæ,
Syrupi Balsamici uncia una.

Egrevium prorsus Medicamentum ad Asthma pituitosum & flatulentum, aliquoties de die cochleatim exhibendum.

POTIO CONFORTANS ACIDULATA
Richard.

℞. Confectionum de Hyacintho,
Alkermes ana drachmam unam,
Liquoris Anodyni mineralis Hoffmanni scrupulos duos,
Syrupi Acetositis Citri unciam semis,
Vini rubri,
Aquæ communis ana uncias duas:
Misceantur.

In morbis Malignis exhibetur cochleatim.

POTIO CRETACEA *Edinburgensium.*

℞. Cretæ præparatæ,
Pulverum Gummi Arabici ana unciam unam,
Sacchari unciam semis,
Aquæ fontanæ uncias viginti quatuor,
Spiritus Nucis Moschatæ uncias duas:
Misceantur.

Dantur per Cyathos contra Sodom.

POTIO OLEOSA *Ricard.*

℞. Olei Amygdalarum dulcium,
Syrupi Althææ ana unciam unam,
Ptisanæ pectoralis uncias tres:
Misceantur.

Relaxandi, demulcendi, nec non Antispasmodico scopo exhibetur. In finem diureticum adduntur

Nitri depurati grana octo,
Spiritus Nitri dulcis guttæ duodecim.

POTIO SISTENS *Richard.*

℞. Confectionis de Hyacintho drachmas tres,
Syrupi Cydoniorum unciam unam,
Decocti Corticum Aurantiorum uncias quatuor:
Misceantur.

Fluxibus Alvi laborantibus cochleatim præbetur.

PRAEPARATA

Dicuntur Lapides Terræ Ossave in pulverem redacta, super marmore, vel quod utique melius est, super porphyrite ope aquæ in Massam coacta, in qua nec oculis nec digitis sensibilis ulla, relinquatur asperitas; ope anserini denique calami per infundibulum in exiguas pyramides efformata & exsiccata.

PTISANA

Veteribus Medicis dicebatur Decoctum Hordei mundati, hodie pro Decocto, quod potus ordinarii vicem sustineat, usurpatur.

PTISANA ACIDULATA seu LIMONADA MINERALIS *Richard.*

℞. Ptisanæ communis uncias quatuor & sexaginta,
Spiritus Vitrioli quantum satis ad gratam aciditatem,
Quintæ Essentiæ Citri guttas quatuor,
Pulveris Sacchari uncias duas:
Misceantur.

Fallendæ siti, in morbis præcipue Biliofis inseruit.

PTISANA ADSTRINGENS *Richard.*

℞. Radicis Tormentillæ drachmas sex:
Coquantur per dimidiam horam cum Aquæ fontanæ centum & quadraginta quatuor unciis:
Sub finem addantur
Radicum Consolidæ majoris drachmæ sex:
Glycyrrhizæ uncia semis:

Colentur.

Nomen ab ipsa virtute desumptum.

PTISANA COMMUNIS *Richard.*

℞. Hordei integri unciam unam,
Radicis Graminis incisæ unciam semis:
Coquantur per dimidiam horam cum Aquæ fontanæ unciis quatuor & sexaginta:

Sub finem addantur

Radicis Liquiritiæ drachmæ duæ:
Colentur.

Huic Ptisanæ si adjicitur

Nitri depurati drachma semis,
Evadit PTISANA NITRATA *Richard.*

PTISANA PECTORALIS *Richard.*

℞. Radicum Althææ unciam semis,
Liquiritiæ drachmas tres,
Caricarum pinguium drachmas duas,
Florum Papaveris Rhœados scrupulum unum:

Incisa coquantur paululum cum
Aquæ fontanæ unciis quatuor & sexaginta.

PULPÆ.

Parantur ex Radicibus aut Fructibus ficcis, quæ cum aqua coquantur, usque dum mollescant, dein cribro imponuntur & ope spatulæ ligneæ, per ejus foramina Pulpa transprimitur. Radices bulbosæ & Fructus carnosus sine prævia cum aqua coctione in mortario lapideo aut ligneo contunduntur & deinde per cribrum trajiciuntur.

PULPA CASSIÆ *Valerii Gordi.*

Ex siliquis Cassiæ Fistulæ instrumenti lignei ope ipso usus tempore optime separatur, per cribrum trajecta a feminibus aliisque quæ ipsi adhærent, quifquiliis cominode purgatur. In Officinis, quæ prostat, dicta quidem ratione ex siliquis separatur, sed ut tota obtineatur, siliquas præterea cum aqua eluunt aquæ deinde Pulpæ additæ & mixtim per cribrum coactæ quartam Sacchari partem adjiciunt & cuncta coquunt, usque dum consistentia Electuarii surgat.

Datur ad uncias duas & ultra scopo Cathartico.

PULPA CASSIÆ pro CLYSTERIBUS
Viennensium.

℞. Herbarum quinque Emollientium uncias tres,

Florum Chamomillæ unciam unam:
Incisa coquantur paululum cum
Aquæ fontanæ unciis triginta sex:
Decocto eluatur Pulpa siliquarum Cassiæ; Liquor colatus evaporetur ad consistentiam Electuarii, cujus uni parti immisceatur

Sacchari Thomæi pars una semis:
Aliquot uncie dissolvuntur in aqua pro uno Clystere.

PULPA TAMARINDORUM.

Paratur ex Tamarindis ratione sub
PULPA CASSIÆ indicata.

PULTICULA de MANNA.

Videatur Electuarium de Manna.

PULTICULA SAPONACEA.

℞. Saponis Officinalis drachmam semis,
Dissolvatur

Aquæ Menthæ drachmis tribus:
Addantur
Vitelli Ovi drachma una,
Magnesiæ albæ scrupuli duo,
Pulveris Rhabarbari scrupulus unus,
Syruporum Althææ *Fernelii*,
Chamomillæ ana drachmæ duæ:

Misceantur.

Cum successu contra Tormina Infantum adhibetur.

PULVERES.

Canones.

I. Parantur substantias solidas in mortario pistilli opetundendo & triturando; partes in justam tenuitatem redactæ a reliquis ope cibri sericei segregantur.

II. Tenaciores Vegetabilium & Animalium partes, ut friabiles evadant, prius calori sunt exponendæ; quin etiam instrumentis scindentibus, secantibus &c. cominui solent, ante quam ictibus pistilli exponantur.

III. Mortaria & pistilla metallica facile labem aliquam Pulveribus affricant.

IV. Du-

IV. Duriore lapides, ut in pulverem comminui possint, ignitione & subsequente extinctione efficitur.

V. Sicca nec tenacia, ubi in tenerimum pulverem pistilli & mortarii ope fuerint comminuta, in pastam insuper aquæ ope super Porphyrite rediguntur & teruntur, usque dum nec oculis conspicua nec digitorum apicibus sensibilis ulla amplius asperitas remaneat; quo facto per infundibulum in parvas pyramides transmittuntur, & *Preparatorum* nomine insigniuntur.

VI. Quodsi vero acria in pulverem sunt redigenda, mortarium aut cribrum operculo ligneo aut coriáceo exacte tegendum est, ne pulvere in auras disperso lædatur operator.

VII. Aliquanto majori vegetabilis in pulverem comminuendi quantitati subinde aliquot aquæ guttæ sunt affundendæ, quibus nimia pulveris disturbatio caveatur.

VIII. Majori parte per cribrum transmissa, quæ remanent fragmina tanquam rejectamenta relinquuntur.

XI. Corticum, Lignorum, Radicum resina turgentium, qui posterius obtinentur pulveres prioribus sunt efficaciores; reliquis omnino virtute præstant. Peracta igitur pulverisatione omnes demum pulveres successive obtenti quam curatissime misceri debent.

X. Nuclei, nisi ipsis sicca adjiciantur, in pulverem redigi nequeunt.

XI. Resinæ & Gummi Resinæ non nisi hyeme in pulverem teri possunt; paucæ earum portiones, in compositiones magistrales recipiendæ, ope Sacchari aut Nucleorum in formam pulveris coguntur.

XII. Omnia mollia & liquida, si quidem ipsis iusta siccorum ratio adjicitur, in pulveres possunt recipi.

XIII. Pulveres, qui ab aère læduntur, in vitris probe obturatis aservari debent.

PULVIS ABSORBENS *Vedelli*.

℞. Vitrioli Martis drachmas sex,
Concharum preparatarum uncias duas
semis,

Coralliorum rubrorum,
Antimonii Diaphoretici,
Cinnabaris factitiæ ana drachmas
decem,

Extracti Opii aquosi,
Olei destillati Caryophyllorum ana
drachmam unam.

Misceantur. Fiat Pulvis.

Acrimoniam acidam tollit, ejus causas profligat, Dolores & alia symptomata inde orta curat. Dosis est ad drachmam semis.

PULVIS ALTERANS *Plummer sive
Edinburgensium*.

℞. Panacæ Mercurialis,
Sulphuris Aurati Antimonii *Mendert*
ana partes æquales:

Misceantur triturando exactissime per
quadrantem horæ.

*Ad curandos morbos Cutaneos egregie con-
ducit, quin cum successu etiam contra Miasma
venereum exhibetur. Dosis est ad grana octo
bis de die. Camphora si additur, surgit MER-
CURIVS DIAPHORETICUS Klein.*

PULVIS ANODYNUS *Doveri*.

℞. Nitri,
Tartari Vitriolati ana uncias duas:
Injiciantur in crucibulum candens ibi-
que relinquuntur, donec omnis scintil-
latio cessaverit; sat refrigeratus redi-
gatur in pulverem, cui addantur

Pulverum Opii,
Liquiritiæ,
Ipecacuannæ ana uncia una:

Misceantur exacte.

*Ad sistendos Alvi fluxus & Hemorrhagias
ad drachmam unam exhibetur.*

PULVIS ANTARTHRITICUS
PURGANS *Perard*.

℞. Seminum Carduibenedicti,
Carthami,
Diagrydii,
Radicum Salsaparillæ
Chinæ,
Ligni Quajaci ana unciam semis,
Crystallorum Tartari,

Foliorum Sennæ sine stipitibus ana un-
ciam unam,
Cinnamomi drachmas duas:
Reducantur in Pulverem & miscean-
tur.

Matériem Podagricam evacuare putatur, si singulis mensibus versus Novilunium ejus drachma una assumatur.

PULVIS ANTARTHRITICUS *Ducis Port-*
landiæ sive Mirandolæ, ARTHRITI-
CUS AMARUS Parisiens.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ,
Gentianæ,
Summitatum Chamædrys,
Chamæpytis,
Centauri minoris ana
partes æquales:

Mixta redigantur in Pulverem.

*Medicamentum jam sub initio superioris seculi usitatum majorem in modum in mor-
bis Rheumaticis & Arthriticis, in Podagra maxime laudatur. Ejus drachma una quo-
tidie mane exhibetur.*

*Rhedingius & Virrington Radicem Rha-
barbari Monachorum addunt. Crato formulæ
prescriptæ duplum Ligni Quajaci adjicit.*

PULVIS ANTHELMINTICUS *Geoffroy.*

℞. Pulverum Corallinæ,
Corticis Mori ana drach-
mam unam,
Radicum Rhabarbari electi,
Filicis,
Summitatum Tanacetii ana
drachmam semis,

Æthiopiæ mineralis drachmas duas:
Probe misceantur.

Datur ad drachmam unam aliquoties de die.

PULVIS ANTIFEBRILIS *Triller.*

℞. Corticis Chinæ unciam semis,
Lapidum Cancrorum citratorum dra-
chmas duas,
Concharum præparatarum drachmam
unam,
Diaphoretici Martialis,
Nitri depurati ana drachmam semis:
Misceantur; fiat Pulvis.

*Triller hunc Pulverem in omnis generis
Febribus Intermittentibus Medicis commen-
dat, ejusque usum innumeris fere ægrotis sa-
luberrimum, nec nisi in uno vel altero fal-
laciæ expertum esse asseverat. Datur ad
drachmam unam pro dosi.*

PULVIS ANTIHECTICUS *Fordyce.*

℞. Salis Pulychrestii scrupulum semis,
Rhabarbari veri grana sex;
Misceantur; Fiat Pulvis.

*Hunc Pulverem per quatuordecim dies
usurpatum egregios in curanda Hæctica &
Rachitide effectus edidisse, Auctor ipse ex-
pertus testatur.*

PULVIS ANTILYSSUS *Comitis Isenburg.*

℞. Cornu Cervi usti præparati unciam
unam,
Coralliorum rubrorum præparatorum
drachmas duas,
Margaritarum Occidentalium præpa-
ratarum drachmam unam,
Succini albi præparati drachmam se-
mis,
Foliorum Auri numero quinque,
Argenti numero duo:
Misceantur.

PULVIS ANTILYSSUS *Mead.*

℞. Lichenis cinerei terrestris uncias duas,
Piperis nigri unciam unam:
Misceantur & redigantur in Pulverem.
Datur ad scrupulos quatuor.

PULVIS ANTILYSSUS *Palmarii sive Ja-
cobi Sylvani Domini de Pyrou.*

℞. Herbarum Rutæ,
Verbenæ,
Salviæ,
Plantaginis,
Polypodii,
Absynthii,
Menthæ,
Artemisiæ,
Melissophylli,
Betonicæ,

PULVIS.

Summitatum Hyperici,
Centaurii minoris ana
partes æquales:

Misceantur & reducantur in Pulverem.

Multum imo nimium celebratus hic Pulvis quotidie ad Drachmam dimidiam exhiberi jubetur.

PULVIS AMTILYSSUS Tunquinsium.

℞. Moschi optimi grana sedecim,
Cinnabaris præparatæ grana duo &
triginta:

Misceantur; Fiat Pulvis subtilissimus.

Datur pro dosi, a Canis rabido morsus, una, alternis etiam horis repetenda; in Morbis Exanthematicis, Variolis maxime ad scrupulum unum, Maniacis ad scrupulos duos cum dimidio, ad grana duodecim in Singultu, qui Febribus inflammatoriis accedit.

Cum hodie inter omnes constet, tantopere a multis celebrata Specifica contra Morsum Canis rabidi, quam exiguæ sint efficaciam, plura congerere nolui.

PULVIS ANTISEPTICUS Plenck.

℞. Pulverum Corticis Peruviani,
Rutæ ana uncias duas,
Camphoræ, Spiritu Vini tritæ, un-
cias tres:

Misceantur.

Inspergitur partibus Gangrænosis.

PULVIS ANTISPASMODICUS

Rosensteinii.

SEDATIVUS Suecorum.

℞. Opii depurati scrupulum semis,
Nitri depurati scrupulos quinque,
Sacchari albissimi unciam unam:
Misceantur & redigantur in Pulverem.

PULVIS ANTISPASMODICUS Stablii.

℞. Nitri depurati,
Tartari Vitriolati ana uncias duas,
Cinnabaris rectificatæ drachmam unam
semis,

Misceantur & cogantur in Pulverem tenerrimum.

PULVIS.

127

Propter virtutem Sanguinis æstum temperandi Spasmosque sistendi magnopere commendatur. Datur ad drachmam semis.

PULVIS ARI COMPOSITUS.

Videatur Pulvis Stomachicus Birckmanni.

PULVIS AURATUS Dresdensis sive
Germanorum.

Videatur Pulvis Cordialis Cellensi

PULVIS BEZOARDICUS ANGLICUS
seu Comitissa de Kent, seu Gasconii.

℞. Apicum nigrorum Chelarum Cancrorum marinorum uncias duas,
Margaritarum præparatarum,
Coralliorum rubrorum præparato-
rum,

Oculorum Cancrorum citratorum,
Cornu Cervi usti ana unciam unam,
Lapidis Bezoar Orientalis

Terræ Læmniæ ana unciam semis,
Cerussæ Antimonii uncias duas,
Ambraæ gryseæ parum Sacchari tritæ
drachmam unam semis:

Misceantur & reducantur in Pollinem.

Gasconium quendam hunc Pulverem Episcopo Vigoniæ ter centum libris Anglicis vendidisse tradunt. Seculi quo primum usurpabatur, genium spirat.

PULVIS BEZOARDICUS Ludovici.

℞. Cornu Cervi sine igne præparati un-
cias tres,

Terræ sigillatæ albæ,
Unicornu fossilis ana unciam unam
semis:

Misceantur; Fiat Pulvis.

Hoc pulvere vulgus in morbis Exanthematicis utitur. Cum hodie ex saniore Praxi Pulveres Bezoardici exulare jubeantur, plures colligere nolui.

PULVIS CACHECTICUS *Quercetani.*

℞. Limaturæ Martis unciam unam,
 Radicum Ari,
 Coralliorum rubrorum præparatorum,
 Matris Perlarum præparatæ ana dra-
 chinas duas,
 Cornu Cervi sine igne præparati,
 Succini præparati,
 Cinnamomi ana scrupulos quatuor,
 Ambre gryseæ drachnam unam fe-
 mis,
 Sacchari albi ad pondus omnium:
 Misceantur, Fiat Pulvis.

*Hunc Pulverem, quem Auctor in Phar-
 macop. Dogmat. restitut. L. I. Cap. 15. de-
 scribit, post usum Incidentium & Resolven-
 tium per quindecim continuos dies adhiberi
 jubet. Dosis est ad quatuor Scrupulos: IN-
 COMPLETUS, id est, omiſſa Ambra
 vulgo proſtat.—*

PULVIS CARMINATIVUS *Mynſichti.*

℞. Seminum Cumini,
 Carvi,
 Anisi ana uncias tres,
 Radicum Zinziberis drachmas ſex,
 Macis drachmas tres,
 Croci drachmam unam:
 Misceantur; Fiat Pulvis.

*Drachma una ad pellendos Flatus adhi-
 betur.*

PULVIS CONTRA CASUM
Augustanorum.

℞. Terræ ſigillatæ,
 Sanguinis Draconis,
 Mumie ana unciam ſemis,
 Spermatis Ceti drachmas duas,
 Rhabarbari drachmam unam:
 Misceantur; Fiat Pulvis.

*Medicamentum minime ad ſcopum faciens
 quibusdam in locis in gratiam vulgi affer-
 vatur, qui illud lapsis ad ſcrupulos duos ex-
 hibet.*

PULVIS CARTHUSIANORUM.

Videatur Kermes Minerale.

PULVIS E CERUSSA *Londinensium.*

℞. Ceruffæ Venetæ uncias quinque,
 Gummi Sarcocollæ unciam unam fe-
 mis,
 Tragacanthæ unciam ſemis:
 Misceantur, Fiat Pulvis.

*Ad ſiccanda Ulcera & curandum Eryſi-
 pelas extus adhibetur.*

PULVIS COMITIS de *Warwick.*

Videatur Pulvis Cornachini.

PULVIS Comitiffæ de *Kent.*

Videatur Pulvis Bezoardicus Anglicus.

PULVIS AD CONDIENDUM COR
Parisiensium.

℞. Cinnamomi,
 Myrrhæ ana uncias octo,
 Aloes,
 Ladani,
 Benzoës,
 Caryophyllorum,
 Nucis Moſchatae ana uncias quatuor:
 Misceantur; Fiat Pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS ad CONDIENDA INTRANEA
& CAVITATES IMPLENDAS *Pari-
 ſiensium.*

℞. Myrrhæ,
 Aloës ana uncias ducentas ſex &
 quinquaginta,
 Bituminis Judaici uncias centum &
 ſexaginta,
 Salis marini decrepitati uncias ſex
 & nonaginta,
 Radicum Angelicæ,
 Imperatoriæ,
 Acori,
 Afari,
 Iridis Florentinæ,

Zin-

PULVIS.

Zinziberis ana uncias octo
& quadraginta,
Lignorum Sassafras,
Santali citrini,
Juniperi,
Rhodii,
Abietis ana uncias triginta
& duas,
Summitatum Lavendulæ,
Sabinæ,
Menthæ,
Thymi,
Rorismarini,
Salviæ,
Stœchados,
Absynthi ana uncias se-
decim:
Misceantur; Fiat Pulvis.

PULVIS ad CONDIENDAS & IMFAR-
CIENDAS CARNES *Parisiensium*.

℞. Cinnamomi,
Corticis VVinterani,
Cassiæ Caryophyllatæ,
Costi,
Amomi,
Piperis nigri,
Radicum Enulæ,
Iridis Florentinæ,
Cyperii longi,
Calami aromatici,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ ana uncias octo,
Myrrhæ,
Aloës ana uncias octo & quadraginta,
Bituminis Judaici,
Benzoës,
Tacamahacæ,
Ladani,
Olibani ana uncias duas & triginta,
Foliorum Lauri,
Majoranæ,
Thymi ana uncias sedecim,
Florum Lavendulæ uncias duas &
triginta,
Misceantur; Fiat Pulvis tenuis.

PULVIS CONTENT' dictus.

℞. Sacchari Canariensis uncias duodecim,
Tom. II.

PULVIS.

129

Oryzæ uncias octo,
Cinnamomi unciam unam semis,
Caryophyllorum drachmam semis,
Vanigliæ drachmam unam semis:
Redigantur in pulverem & Misceantur.
Substituatur Chocolada.

PULVIS CORDIALIS *Gellensis*.

℞. Sacchari finissimi, in tenerrimum
pulverem redacti, uncias duas,
Cinnabaris præparatæ drachmas sex,
Olei destillati Cinnamomi veri scrupu-
los duos:
Misceantur exacte.
*Vires Cardiacas & Nervinas edit. Da-
tur ad Scrupulum unum.*

PULVIS Cornachini seu Comitum de VVar-
nick, seu CERBERUS TRICEPS.

℞. Diagyrii,
Antimonii Diaphoretici,
Cremoris Tartari ana partes æquales:
Misceantur exactissime.
*Pulvis qui per multam annorum seriem
tanquam Purgans polychrestum in frequenti
usu fuit, nostra ætate, cum parcius Resino-
sis utamur, minus crebro usurpatur. Dosis
ad drachmam semis.*

PULVIS COSMETICUS ad MANUS
Viennensium PATE D'AMANDES.

℞. Amygdalarum excorticatarum uncias
duodecim,
Spermatum Ceti unciam semis:
Probe tritis admisceantur
Pulverum Oryzæ,
Iridis Florentinæ ana un-
ciæ duæ,
Benzoës,
Salis Tartari ana uncia se-
mis,
Oleorum destillatorum Ligni Rhodii,
Lavendulæ,
Caryophyllorū
ana guttæ
quindecim:

Misceantur probe.

R

PUL-

PULVIS DENTIFICUS *Brunsvicensium*.

℞. Lapidis Pumicis uncias duas,
 Ossium Sepiæ Medullæ unciam unam,
 Cremoris Tartari,
 Radicis Ireos Florentinæ ana unciam
 semis,
 Olei destillati Caryophyllorum gut-
 tas quatuor.
 Misceantur, Fiat Pulvis tenerrimus.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS
Noricorum.

R. Radicum Pæoniæ exteriori cuticula
 privatorum, uncias tres,
 Visci Querni,
 Rasurarum Eboris,
 Ungularum Alcis,
 Cornu Cervi,
 Eboris usti,
 Coralliorum alborum,
 rubrorum,
 Margaritarum ana drachmas sex:
 Misceantur; Fiat Pulvis, cui addantur
 Foliorum Auri, in exiguas molecu-
 las dissectorum, numero viginti.
*Vulgatissimo in usu est hic Pulvis in om-
 nibus morbis Spasmodicis tam arcendis quam
 curandis.*

Plures congerere Pulveres Epilepticos
 hac ætate, qua Specificorum Antepilep-
 ticorum auctoritas tantopere cecidit,
 supervacaneum duxi.

PULVIS ERYSIPELATODES *Mynsichti*.

℞. Farinæ volatilæ e molendinis uncias
 sex,
 Plumbi usti,
 Boli rubræ ana uncias duas,
 Mastiches electæ,
 Olibani,
 Cerussæ ana unciam unam:
 Misceantur, Fiat Pulvis subtilissimus.
*Inspergitur parti affectæ & charta cærulea
 retinetur.*

PULVIS FUMALIS *Brunsvicensium*.

℞. Mastiches,
 Olibani ana uncias quatuordecim,
 Succini citrini uncias octo,
 Ladani uncias tres semis,
 Sandaracæ,
 Styracis Calamitæ,
 Benzoes ana uncias septem,
 Lignorum Santali citrini,
 Rhodii,
 Cassiæ Caryophyllatæ ana uncias duas
 semis,
 Florum Rosarum rubrarum,
 Lavendulæ ana uncias qua-
 tuor,
 Corticis Cascarillæ uncias duas:
 Misceantur; Fiat Pulvis crassus:
*Ejus suffitus tam odoris gratia, quam ad
 discutiendos Rheumatismos & Catarrhos ad-
 hibetur.*

PULVIS *Gasconii*.

Videatur Pulvis Bezoardicus Anglicus.

PULVIS de GUTTETA.

℞. Visci Querni,
 Radicum Dictamni albi,
 Pæoniæ,
 Seminum Pæoniæ ana unciam unam,
 Atriplicis,
 Coralliorum rubrorum præparatorum
 ana unciam semis,
 Ungularum Alcis unciam unam:
 Misceantur; Fiat Pulvis subtilis.
*Hic Pulvis eandem, quam Epilepticis
 Marchionis in Germania habuit, in Gallia
 nactus est famam.*

PULVIS *Haly* contra PHTHISIN.

℞. Seminum Papaveris albi drachmas
 decem,
 Portulacæ,
 Cicerum,
 Malvæ ana unciam se-
 mis,
 Cucurbitæ,

Seminum Cucumeris,
Citrulli,
Cydoniorum ana drachmas
septem,
Amyli drachmas sex semis,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Cornu cervi usti,
Succi Liquiritiæ,
Eboris usti ana drachmas tres :
Misceantur : Fiat Pulvis.

Inconcinnam hanc, ac mentione vix dignam compositionem eo tantum apposui, quod a nonnullis adhuc usurpatur. Certe scopo accommodatius semina sub forma Emulsionis, reliqua Pulveris nomine adhibentur.

PULVIS HEPATICUS RUBER
Dresdensis.

℞. Cremoris Tartari uncias quatuor,
Sandali rubri,
Rosarum rubrarum ana unciam semis:

Misceantur : Fiat Pulvis irrorandus
Spiritus Vitrioli drachmis duabus.
*Olim ejus usus in æstu Sanguinis compe-
scendo & Appetitu excitando admodum fre-
quens fuit.*

PULVIS INCRASSANS *Fuller.*

℞. Radicis Althææ,
Gummi Arabici,
Sanguinis Draconis,
Glycyrrhizæ ana partes æquales:
Misceantur : Fiat Pulvis.

*Contra Hæmoptysin, Tussim acrem &
Ardorem Urinæ exhibetur ad drachmam
semis.*

PULVIS pro INFANTIBUS *Roslen.*

℞. Magnesiæ unciam semis,
Pulverum Seminis Cumini drachmas
tres,
Radicis Ireos drachmas
duas :
Crocii drachmam semis :

Misceantur.
Contra Infantum Tormina datur.

PULVIS INFANTUM *Danorum.*

Videatur Pulvis Puerorum Citrinus.

PULVIS MANUALIS *Brunsvicensium.*

℞. Amygdalarum amararum excortica-
tarum uncias duodecim,
Farinæ Oryzæ uncias septem cum di-
midia,
Fabarum uncias sex,
Radicis Ireos Florentinæ,
Cretæ albæ ana unciam semis,
Salis Tartari drachmas duas,
Olei Jasmini drachmam unam,
Ligni Rhodii guttas decem:
Misceantur : Fiat Pulvis.
Ad usus Cosmeticos adhibetur.

PULVIS MASTICATORIUS *Wepfer.*

℞. Radicum Imperatoriæ,
Corticum Sambuci ana unciam se-
mis,
Foliorum Lauri drachmam unam se-
mis,
Seminum Sinapi,
Staphidis agriæ ana drach-
mam unam,
Caryophyllorum Aromaticorum scrup-
ulos quatuor,
Myrrhæ electæ drachmas sex:
Misceantur : Fiat Pulvis crassus.

*Scrupulus unus linteo obvolutus per ali-
quot horæ minuta masticatur in Capitis mor-
bis serosis, Paralyssi linguæ, Aphonia &c.*

PULVIS PANNONICUS RUBER
Augustanorum.

℞. Boli Armenæ uncias tres,
Terræ Lemniæ uncias duas,
Coralliorum alborum drachmas sex,
rubrorum unciam se-
mis,
Margaritarum drachmas quinque,
Lapidum Hyacinthi,
Smaragdi,
Rubini,
Sapphiri,

Cornu Cervi sine igne præparati ana
unciam semis,
Rasuræ Eboris drachmas tres,
Eboris ad albedinem calcinati dra-
chmas quinque,
Cinnamomi drachmas duas,
Caryophyllorum,
Croci ana drachmam unam,
Seminis Acetosæ,
Sandali rubri ana drachmas duas,
albi,
Corticum Citri ana drachmam unam
semis:

Misceantur: Fiat Pulvis tenerrimus, cui
admisceantur

Foliorum Auri, in exiguas moleculas
cultro dissecandorum, numero vigin-
ti quatuor:

*Ineptum hoc Medicamentum, creberrime
olim apud Germanos in morbis Exanthema-
ticis usurpatum, haud immerito exolevit.*

PULVIS ad PALPITATIONEM
CORDIS.

Videatur Pulvis Cordialis Cellensis.

PULVIS PECTORALIS *Danorum.*

℞. Radicum Ireos Florentinæ,
Liquiritiæ ana drachmas
sex,

Florum Sulphuris unciam semis,
Florum Benzoës drachmam unam,
Sacchari Candi albi uncias duas,
Oleorum destillatorum Anisi,

Fœniculi ana
guttas de-
cem:

Misceantur: Fiat Pulvis.

*Resolvendi ergo in morbis Pectoris pitui-
tosus adhibetur.*

PULVIS PUERORUM CITRINUS
Danorum INFANTUM Eorundem.

℞. Magnesiæ albæ drachmas sex,
Radice Ireos Florentinæ,
Seminis Anisi,
Sacchari albi ana drachmas duas,
Croci drachmam unam:

Misceantur: Fiat Pulvis.

*Ad tormina infantum sedanda præscri-
bitur.*

PULVIS PUERORUM EVACUANS
Berolinensium.

℞. Resinæ Jalappæ drachmas tres:
Terantur in pulverem tenerrimum cum
Amygdalarum sesqui drachma:
Addantur

Mercurii dulcis uncia una,
Cinnabaris optimæ drachma una,
Sacchari albissimi uncia semis:

Misceantur: Fiat Pulvis.

*Drachma una sex circiter grana Resinæ &
viginti grana Mercurii dulcis vehit. Scopo
Anthelmintico & Sanguinem depurandi er-
go exhibetur.*

PULVIS contra QUARTANAM
Hoffmanni.

℞. Pulveris Corticis Peruviani drachmas
tres,
Regulis Antimonii medicinalis dra-
chmas duas,

Mercurii dulcis,
Croci Martis aperitivi *Stablii.*

Arcani duplicati ana drachmam unā,
Olei destillati Menthæ guttas tres:

Misceantur: Fiat Pulvis.

*Egregii usus esse in Quartana, quæ altas
in Viscerum penetralibus egit radices, testa-
tur Auctor in Med. Rat. system. Datur ad
drachmam semis.*

PULVIS REFRIGERANS *Suecorum.*

℞. Salis essentialis Tartari unciam semis,
Sacchari albissimi uncias sex,

Quintæ Essentiæ Citri guttas sex:

Mixta redigantur in Pulverem.

*Hujus Pulveris una uncia duodecim li-
bris aquæ dissolvenda LIMONADA extem-
pore.*

PULVIS RESOLVENS *Stablii.*

℞. Concharum præparatarum,
Antimonii Diaphoretici,
Nitri depurati ana partes æqua-
les :

Misceantur: Fiat Pulvis.

*Spiffitudini humorum adversatur. Maxi-
mus ejus usus est in Febris.*

PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS
Stablii.

℞. Pulverum Radicis Scillæ præparatæ
uncias duode-
cim,
Vincetoxici un-
cias quatuor :

Misceantur.

*Egregium Medicamentum Resolvens in
morbis præcipue Asthmaticis ad scrupulum
unum pro Dosi exhibetur.*

PULVIS SEDATIVUS *Suecorum.*

Videatur Pulvis Antispasmodicus *Rosen-
steinii.*

PULVIS STERNUTATORIUS
Noricorum.

℞. Herbæ Pulegii,
Herbarum Majoranæ,
Rorismarini,
Salviæ ana unciam unam
semis,
Nicotianæ,

Radici Ellebori albi,
Semini Nigellæ ana unciam unam,
Moschi grana quinque:

Misceantur; redigantur in Pulverem.
Virtus ex nomine cognoscitur.

PULVIS STERNUTATORIUS
Parisiensium.

℞. Herbarum Majoranæ,
Betonicæ ana unciam
unam,
Asari unciam dimidiam,

Florum Lili Convallium unciam
unam :

Misceantur: Fiat Pulvis.

PULVIS STERNUTATORIUS
Trilleri.

℞. Herbarum Majoranæ,
Betonicæ,
Pulegii,
Basilici,
Mari veri ana drachmas
duas,

Frorum Lili Convallium,
Tunicæ,
Lavendulæ,
Anthos,
Rosarum rubrarum ana dra-
chmam unam,

Castorei optimi drachmas tres,
Sacchari Canariensis unciam unam:

Misceantur: Fiat Pulvis subtilissimus.

*Venerandus Auctor quadraginta annorum
experientia nixus hunc pulverem ad Caput
roborandum, Sensus acuendos, Memoriam
firmandam, Vertiginem profligandam, Dolo-
res capitis mitigandos & sedandos insultus
Hystericos maximopere commendat.*

PULVIS STOMACHICUS *Birchmanni.*

℞. Radicum Ari uncias duas,
Calami aromatici,
Pimpinellæ ana unciam unā,
Oculorum Cancrorum unciam semis,
Cinnamomi drachmas tres,
Salis Tartari drachmas duas:

Misceantur: Fiat Pulvis.

Cum Saccharo si desideratur, Saccha-
rum ad pondus omnium adjicitur.

*Egregium Medicamentum Incidens, non
solum in turbata Digestione, sed in aliis quo-
que morbis Viscido oriundis cum successu datur.*

PULVIS ad STRUMAS *Villanovani.*

℞. Spongiarum marinarum combustarum,
Pilarum marinarum,
Offis Sepiæ,
Piperis longi,
nigri,

Zinziberis,
Cinnamomi,
Salis Gemmæ,
Radicum Pyrethri,
Fructuum Cupressi,
Gallarum,
Spongiarum Rosarū ana uncias duas:
Misceantur; Fiat Pulvis, cui, Sacchari
si quid desideratur, uncia sex adjician-
tur.

*Experientia docuit, hunc pulverem Stru-
ma laborantibus efficaciter exhiberi. Datur
ejus drachma una mane & ante somnum
nocturnum.*

PULVIS TEMPERANS *Richard.*

Videatur Pulvis Antispasmodicus *Stabli.*

PULVIS TEMPERANS *Unzeri.*

℞. Tartari Vitriolati,
Nitri depurati,
Lapidum Cancrorum præparatorum
ana partes æquales.
Reducantur in Pulverem & misceantur.
*Contra Orgasnum Sanguinis & Acrimo-
niam acidam facit.*

PULVIS ad TORMINA INFANTUM
Roséen.

℞. Saponis officinalis drachma unam,
Lapidum Cancrorum unciam semis,
Rhabarbari drachmam semis,
Seminum Anisi,
Cumini ana scrupulum unū,
Crocī grana quatuor,
Sacchari albi drachmas tres:
Misceantur; Fiat Pulvis.

PULVIS contra VERMES *Fuller.*

℞. Corallinæ in pulverem redactæ un-
ciam dimidiam,
Æthiopsis mineralis drachmas duas,
Olei destillati Absynthii scrupulum
dimidium:

*Ex immensa farragine Pulverum contra
Vermes in Dispensatoriis diversantium hunc
tanquam efficaciorē selegimus, & ut tutius*

*infantibus adhiberi possit, Olei omissionem
suademus; mane & vespera per aliquot dies,
quantum cultri cuspidē capi potest, infanti-
bus propinetur.*

PULVIS contra VERMES PURGANS
Fuller.

℞. Scammonei, Pineis triti, grana sex,
Pulveris Rhabarbari grana quatuor,
Mercurii dulcis grana quinque:
Misceantur.

Hæc dosis est pro puero sexenni.

REGLISSE ROYALE.

Videatur Extractum Liquiritiæ gummo-
sum.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS
Basil. Valent.

℞. Clavorum Ferri uncias duodecim:
In Crucibulo probe ignitis addantur
Antimonii crudi uncia sedecim:
Valido igne fundantur, ut penitus fluant;
dein adjiciantur

Cinerum clavellatorum uncia duæ:
Effundantur in Conum fusorium Sebo
illitum, & posteaquam refrixerint, mal-
lei ictu Regulus a scoria separetur.

Quamvis Sulphur Ferrum in scoriam
vertat, hujus tamen quantulacunque por-
tio metallo Antimonii nunquam non
manet immixta. Quapropter hic Re-
gulus; cum semper Ferro plus minusve
sit adulteratus, ad labores, qui purum
Regulum requirunt, recipi nequit.

REGULUS ANTIMONII MEDICINA-
LIS *Mats.*

℞. Antimonii uncias decem,
Salis Alkali uncias duas:
Mixta fundantur, fusa effundantur, &
scoria hac ratione orta contundatur in
pulverem.

*Scopo Resolvendi laudatur in Febris
acutis, Arthritide, Hydrope. Exhibetur ad
drachmam semis.*

REGULUS ANTIMONII SIMPLEX

Basil. Valent.

℞. Antimonii uncias sedecim,
Tartari crudi uncias decem,
Nitri uncias quinque:
Mixta successive detonentur; fundantur; effundantur in conum fusorium; mallei ictu Regulus a scoria separetur, quæ tanquam *HEPAR ANTIMONII* aservari potest.

Regulus Antimonii, cum eximie drasticus sit, nunquam intus datur, paratur in officinis ad alia præparata inde conficienda.

RESINA JALAPPÆ *Augustanorum.*

℞. Radicum Jalappæ crasse contusarum, quantum lubet:

Affundatur

Spiritus Vini rectificatissimus ad eminentiam quatuor digitorum, digerantur calore justo per biduum; Spiritus tinctus defundatur; affundatur novus, qui de novo digestus & tinctus priori adjiciatur; quo labore ter iterato ultima tinctura una cum Radicibus sacco commissa exprimatur torculari. Universa deinde tinctura immittatur Curbitæ, Spiritusque dodrans destillationis ope inde eliciatur; residuum catino committatur, jam, ut secedat Resina, aqua affundatur factaque secessione defundatur, nova rursus Resinæ affusa, accedat calor, fiat utriusque agitatio; atque hic alternus tinctam defundendi & puram aquam affundendi continuetur labor, donec aqua cum Resina agitata turbari desinat. Tunc demum Resina dum calet, in bacillos tortos efformetur.

Hoc Medicamentum cum Primas vias irritando vires Catharticas edat, per longum temporis intervallum tanquam Purgans polychrestum usurpabatur. Noxæ, quas ejus usui tribuerunt Observatores, abusui potius sunt adscribendæ. Non nisi Saponi cuidam junctum exhiberi debet; ita demum ab Humoribus Primarum viarum excipi, & e corpore eliminari poterit. Dosis pro adultis ad grana usque quindecim augeri potest. Infan-

tibus ad octavum usque annum tot Resinæ dantur grana, quot annorum est ætas.

RESINA JALAPPÆ PRÆPARATA

Stablii.

℞. Resinæ Jalappæ,
Amygdalarum dulcium ana partes æquales:

Mixta terantur in pulverem tenerrimum. *Hac ratione præparata Resina citra tormentinum aut Hypercatharsis metum exhiberi poterit.*

Ea ratione, qua ex Radicibus Jalappæ paratur Resina, ex aliis quoque substantiis obtinetur, ut RESINA SCAMMONI, LIGNI GUAJACI &c.

ROOB ARABUM, GELATUM, sive GELATINA *Recentiorum.*

Manibus exprimatur ex Fructibus lintheo involutis Succus; turbidus si fuerit sive per subsidentiam depuretur, sive Albumine ovorum clarificetur, quo facto dissolvatur in succo

Sacchari albissimi dodrans:

Coquatur ad consistentiam tenuioris Gelatinæ, immittatur ollæ, exhalato demum omni calore obturandæ.

Ex fructibus Cynosbati, unde semina fuerunt ablata, Pulpa per cribrum exprimitur.

Ob vim saponaceam omnino, ut plurimum etiam voluptatis causa commendatur.

ROOBNUCUM *Mesue*, DIACARYON.

Paratur ex Succo putaminum Nucum immaturarum cum æquis Melli partibus ad justam consistentiam cocto.

Hoc extus unice adhibetur ad Ulcera Oris, Gargarismatibus quoque admiscetur.

ROTULÆ vel TABULÆ.

Canones.

I. Tabularum, quæ ex Succis desiderantur, parandarum modus optimus is esse videtur, cum succi quantitas, Saccharo cale-

calefacto, adjicitur ea, quæ ad obtinendam consistentiam tenuioris Electuarii requiritur. Drachmæ decem Succi sufficiunt ut plurimum ad octo Sacchari uncias, Miscela dein spatulæ ope super laminam ferream per exiguas portiones ita effunditur, ut Rotularum formam guttæ induant.

II. Ex Pulveribus parant Rotulæ, dum Saccharo ad consistentiam tabulandi cocto Pulvis celeri manu admiscetur; ad unam Sacchari unciam drachma Pulveris una recipi potest.

III. Volatilia, Rotulis si immiscenda sunt, ipso demum materiei in Rotulas efformandæ momento immisceantur.

IV. Mos Rotulas Oleo inungendi, vel Anri Argentive folia ipsi imprimendi, exfolevit.

ROTULÆ MANUS CHRISTI

Bergamensium.

℞. Sacchari albissimi quantum vis:
Calefacto addatur

Aquæ Rosarum quantum satis:
Fiant lege artis Rotulæ.

Quæ infantibus dulcedinis causa exhibentur.

ROTULÆ ex SUCCO & ELÆOSACCHARO CITRI

Argentoratensium.

℞. Sacchari albissimi uncias sedecim:
Calefactis adjiciantur

Succi Citri unciam duam cum semisse
Probe mixtis addantur

Elæosacchari Citri unciam quatuor:
Fiant lege artis Rotulæ.

Gratum fallendæ sitis remedium.

ROTULÆ contra VERMES Lentilii.

℞. Sacchari, cum succo Berberum ad
consistentiam redacti, unciis quatuor

Adjiciantur

Mercurii dulcis drachmæ duæ:
Probe mixta effundantur in Rotulas.

Ex copiosis Prescriptionibus hanc tam suavitate quam virtute reliquas superantem selegi.

SACCHARUM GLYCYRRHIZATUM

Helvetorum.

Videatur Extractum Liquiritiæ Gummosum.

SACCHARUM CANDUM.

Dissolvatur Sacchari in aqua, evaporetur ad consistentiam Syrupi, asserventur, quæ inde oriuntur, Crystallis. Saccharum quo fuerit depuratus, eo candidus evadet Saccharum Candum. *RUBRUM* surgit ex Saccharo Thomæo.

A conditoribus parari dudum consuevit.

SACCHARUM HORDEATUM.

℞. Hordei uncias octo:

Coquantur cum

Aquæ fontanæ uncis centum per horæ
spatium,

Decocto, colato addantur

Sacchari unciam sedecim:

Coquantur donec a spatula defluens
filum sponte rumpatur, effundatur dein
in tabulam marmoream Oleo Amygdalarum
leviter unctam: massa adhuc scindatur,
& torqueatur in bacillos.

Hordeum, cum pelluciditati officiat,
vulgo omitti solet.

SACCHARUM LACTIS *Bartoleti.*

Lactis Vaccini plures libræ

Relinquantur in loco calido, donec
in suas partes secesserit Lac. Serum tam
a Cremore, quam a Caseo separetur;
filtratum coquatur in vase terreo ad
decimam circiter partem residuam;
denuo filtratum reponatur ad crystallifandum:
Crystalli ab ortu flavæ iteratis in aqua
dissolutionibus, filtrationibus, crystalli-
fationibus reddantur albiſsimæ.

Hodie rarius in Pharmacopoliis, fre-
quentius in montibus, a rusticis operas
lactarias exercentibus paratur, inde ipsas
officinas intrat.

Demulcendi & Relaxandi vim habet.

SAC-

SACCHARUM PENIDIUM *de Augustis.*

Saccharum coquatur cum Aqua ad consistentiam tabulandi; semirefrigeratum suspendatur ex unco & trahatur perpetuo, quoad albissimum omnisque pelluciditatis expers evaserit; tunc torqueatur in bacillos.

Hoc quoque vulgo a Conditoribus paratur.

SACCHARUM ROSATUM *Mesue.*

Est Conserva Rosarum rubrarum, quod si ficcum desideratur, recipi solet CONSERVA ROSARUM SOLIDA *Lemery*, quæ quidem paratur unciis sedecim Sacchari ad consistentiam tabulandi coquendis Pulveris Florum Rosarum rubrarum uncia una adjicienda: ex qua mistura Rotulæ efformantur.

SACCHARUM SATURNI *Hollandi.*

SAL SATURNI *Suecorum.*

Cerussa vel Minium infundatur cum Aceto destillato per aliquot dies in vase clauso; Acetum filtratum leni calore ad cuticulam evaporetur; id in locum temperatum in Crystallos concrescet.

Quamvis a quibusdam ad usus internos commendetur, prudentiores tamen a medicamento maxime ancipiti abstinent. In Aqua solutum vires Aceti Saturni habet, & ad usus externos potest adhiberi.

Rarissime a Pharmacopolis paratur.

SAL ACETI ESSENTIALE *Batei.*

Residuum Aceti destillati aqua solutum & filtratum evaporatur ad cuticulam, & ut in Crystallos concrescat reponitur.

Cum hac ratione nil nisi Tartarus oriatur, hæc preparatio prorsus est superflua, una illa quæ preparari jubetur.

SAL ACETI FIXUM *Batei.*

Quod est ipse Sal Tartari.

Tom. II.

SAL ACETI VOLATILE *Beaumé.*

Exiguæ crystallis Tartari Vitriolati committantur vasi vitreo, irrorentur Aceto concentrato, & vitrum epistomio vitreo exactissime claudatur.

Excitandi ergo naribus Syncopticorum admoveatur.

SAL ACETOSELLÆ *Angeli Sala.*

Exprimatur succus ex largiori copia Herbæ Acetosellæ; clarificetur Albumine Ovi; evaporetur ad quartam partem residuam; reponatur in loco frigido; colligantur crystalli, liquor residuus de novo paulum evaporetur, & sic iteretur operatio, usque dum reliquus succus nullas ulterius crystallos sistat; Crystalli omnes iteratis in aqua solutionibus & filtrationibus reddantur albissimæ.

A quibusdam in vitiis Digestionis aliis medicamentis Stomachicis admisceri solet. Vires ejus medicatæ cum viribus Crystallorum Tartari convenire videntur.

SAL ALCALI MINERALIS

SAL ALCALI *Seignette.*

℞. Sodæ Hispanicæ quantum lubet:

Elixivetur cum aquæ ebullientis quantum sufficiente:

Lixivium secundum artem reducatur in Crystallos.

Eisdem vires medicatas edit ac Sal Alkali Vegetabilis.

SAL CAUSTICUS.

Videatur Lapis Causticus.

SAL CORNU CERVI *Schræder.*

Cornu Cervi in minores partes diffractum aut lima comminutum immittatur Retortæ terreae & adhibeatur ignis apertus; ita obtinetur Spiritus & Oleum; lateribus autem excipuli accrescit Sal, qui oleo mistus, dissolvatur in aqua, filtretur & aqua inde leni calore evaporatur.

Humores attenuat, Sudorem & Urinam movet, Sanguinem concitat; in usum tamen, nisi sit albissimus, minus fausto omine trahitur. Datur ad scrupulum semis.

Hunc in modum omnia Salia Volatilia ex partibus Animalium parantur.

SAL DIGESTIVUS *vel* FEBRIFUGUS
Sylvii.

SPIRITUS SALIS MARINI GOAGULATUS *Londinensium.*

Est Sal, qui remanet a destillatione Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale Tartari, dissolutione in aqua facta & iusta evaporatione coactus in crystallos.

SAL *de* DUOBUS.

Videatur Arcanum Duplicatum.

SAL *per* INCINERATIONEM
PARATUS *Tachenii.*

Vegetabili sicco applicatur ignis; dum ardet, probe cavetur, ne flamma furgat, suffocanda, si surrexerit, vel admoto operculo, vel ipsius vegetabilis additamento; cineres hac ratione nati per cribrum transmittuntur; remanentes carbonem denuo igniuntur, & inde orti cineres prioribus adjiciuntur. Jam vero frigida ipsi affunditur, cum cineribus crebro per vices agitanda; defunditur dein Lixivium; cineres cum nova aqua agitantur, idque continuatur, donec recens affusa aqua nullum amplius inde saporem contrahit; omne hac ratione obtentum Lixivium in vase vitreo leni igne ad ficitatem evaporatur; Sal ita paratus calcinatur, usque dum albus evadat, in vase probe clauso asservandus.

Cum Medicorum nonnulli inepte fane Sulphur super cineribus deflagrari iusserint, Salem inde Alcalinum in Tartari Vitriolati speciem mutarint, eoque in morem venerit, ut Salia Alcalia sub crystallo forma in officinis asservantur, vulgo jam his salibus *ARCANUM DUPLICATUM* solent substituire. Quapropter Medicis Salem Alkali-

num præscripturis ut Salem Tartari jubeant recipere, suadendum videtur.

Ridendi sunt, quotquot de Sale ex planta combusta obtento integras plantæ vires specificas expectant.

SAL MARTIS.

Videatur Vitriolum Martis.

SAL MERCURIALIS ACETOSUS *Vitet.*

℞. Mercurii per Alkali fixum ex Acido Nitri præcipitati & probe edulcorati uncias duas,
Aceti destillati uncias centum octo & viginti:

Digerantur per triduum in Balneo Mariæ; agitentur crebro; tunc reponantur in locum frigidum & surgentes inde crystallos asserventur.

Hic Sal in Trochiscos redactus vices PASTILLORUM SIPHYLITICORUM Keyser commode exsecuturus esse videtur.

SAL MERCURIALIS TARTARISATUS
Vitet.

℞. Mercurii Alkali fixo ex Acido Nitri præcipitati & probe edulcorati uncias duas,

Cremoris Tartari uncias quatuor:
Triturentur per quatuor horas in mortario lapideo, dein coquantur cum
Aquæ fontanæ unciis octo & quadraginta:

Evaporentur ad lenem cuticulam & hac ratione obtentæ crystallos asserventur.

Ambo hæc Salia scopo Antisiphylitico ad decem usque grana pro dosi sive aqua soluta, sive Syrupo quodam recepta exhibentur: Vomitum, interdum Ptyalismum excitasse observatum est.

SAL MIRABILIS *Glauberi.*
SODA VITRIOLATA *Rosforum.*

Est Residuum a destillatione Spiritus Salis aqua solutum & in crystallos coactum.

Ex quo constat, plurimas Aquas, quibus

bus Sal communis excoquitur, Salem vel ipsi saltem analogum largiri, quidquid ejus in officinis prostat indidem excitur. A plerisque Salinis perinde ac ab Aqua marina Sal mirabilis Magnesia prægnans obtineri potest. Salinæ Lotharingicæ purissimum suppeditant.

Ad aliquot drachmas datus egregie incidit; ad unciam unam aut duas datus Alvum movet, sed tanta dosi ubi exhibetur, larga aquæ copia diluendus est.

SAL POLYCHRESTUS *Glaferi.*

℞. Nitri depurati,

Florum Sulphuris ana partes æquales: Probe mixta ingerantur per vices in crucibulum candens; nova portio, nisi priore detonata, non ingeratur; omnis massa postquam penitus detonaverit, valido igne delineatur, & crebrius ne Sulphur remaneat non destructum agitur, dissolvatur deinde, filtretur & in Crystallos reducat.

Sal hic minus apte a Lemery denominatus, ratione virium medicatarum Tartaro Vitriolato est simillimus.

SAL POLYCHRESTUS *Seignette.*

SODA TARTARISATA vel ALCALI MINERALE TARTARISATUM *Suecorum.*

CrySTALLIS Tartari in aqua dissolutis & bullientibus affundatur Lixivium Sodæ aqua frigida factum, usque dum nulla ab affuso surgat amplius effervescentia; Liquor saturatus & filtratus cogatur in crystallos.

Sali Vegetabili analogus Sal, gustui vero gravior, scopo Alvum ducendi ad sesqui unciam usque exhibetur.

SAL SEDATIVUS *Hombergii.*

SAL ACIDUM BORACIS *Suecorum.*

Boraci in larga aquæ quantitate dissoluto adjiciatur Spiritus Vitrioli, donec Liquor Syrupum Violarum rubro colore infecerit; evaporet, usque dum spicula salina in eodem natæ observentur; re-

ponatur tunc in locum frigidum, & colligantur crystallos; evaporatione repetita adhuc aliquid Salis Sedativi, tandem Sal mirabilis Glauberi obtinetur.

Sali, a Becchero primum annotato, ab Hombergio ad usus medicatos applicato, communi Medicorum consensu vires Anodynæ tribuuntur; quas tamen ego ab istis, quippe erronea veterum Chymicorum theoria deceptis, affectas potius huic salii, quam ab ipsa experientia assertas crediderim.

SAL SEDATIVUS MERCURIALIS

de Morveau.

Solutioni Mercurii vivi in Acido Nitri dissolutæ, multa aqua dilutæ & filtratæ adjicitur Solutio Boracis, donec nihil ulterius inde præcipitetur; pulvis flavus, qui ad fundum secesserit, probe edulcoretur.

Ejus Solutio in aqua, cum incommoda unguinosorum non edat, commendatur ad Frictiones, datur quoque interne ad grana duo pro dosi, quotidie augenda. Conferatur Journal de Physique T. IX. p. 348.

SAL SUCCINI *Agricola.*

Rasura Succini committitur Retortæ vitreæ, cujus non ultra dodrantem repleat; applicetur excipulum; instituat distillatio ex Balneo Arenæ, obtinetur ita Spiritus & Oleum; parietibus autem excipuli & rostro Retortæ adhærebit Sal; Oleum aqua diluatur, filtretur, & ab Oleo separata aqua lentissimo calore destilletur unde denuo aliquid Salis obtinebitur.

Hic Sal larga copia in Borussia paratur. Ab Oleo ipsi adhærente penitissime depuratur, dum aqua dissolvitur, filtratur, & ut in crystallos abire possit, lenta inde evaporatione aqua dispergitur.

Hunc Salem Diureticorum & Antihysteriæ principem appellat Boerhave; Incidendo & Resolvendo agere videtur quo magis Oleo est imprægnatus, eo efficacius solida commovet. Datur ad scrupulum dimidium pro Dosi.

SAL TARTARI *Lullii*.

Sive Residuum a destillatione Tartari, sive Tartarus ipse, in fornace Figuli calcinatus, ope aquæ elixivatur, Lixivium filtratum vel cauto calore in crystallos cogitur, vel inspissatur & in vasis probe clausis asservatur.

Easdem cum Salibus per incinerationem paratis vires habet; Acrimoniam acidam corrigit; Viscidum resolvit; Obstructa reserat, Draastica cicurat. Datur ad scrupulum unum multa aqua dilutum.

SAL TARTARI ESSENTIALIS *Retzii*.
ACIDUM TARTARI CRYSTALLISATUM *Rosforum*.

Creta in pulverem trita coquatur per semi horam cum larga aquæ quantitate, agiteturque crebro spatula; continuetur ebullitio, Cremor Tartari per vices adjiciatur, donec prorsus cessaverit effervescentia; refrigeratus liquor decantetur caute; residuo sedimento nova aqua affundatur, agitetur, & una cum residuo priori adjiciatur. Hæ aquæ rite evaporatæ largiuntur *TARTARUM SOLUBILEM*. Sedimento eluto & vitro commisso affundatur sensim Spiritus Vitrioli, usque dum novus adjectus nullam ulterius excitet effervescentiam; detineatur mixtura in calore, agitetur sæpius per diem; decantetur liquor, residuumedulcoretur; priori liquori adjiciatur aqua; omnis humor leni calore evaporetur ad justum terminum, & crystallos inde oriundæ asserventur.

Acidum Tartari hac ratione multis partibus oleosis privatum in frigida evadit solubile, linguamque ferit aciditate vividiore, quapropter ad usus medicatos præ Cremore commendandum videtur.

SAL VOLATILE ANGLICUM SIC-CUM *Würtembergensium*.

℞. Salis Tartari drachmas sex,
Ammoniaci drachmas duas:
Conterantur & cito includantur vitro epistomio exactissime obturando.

Olei cujuscunque odorati fragrantis admiscere aliquot guttas cui libuerit, licebit.

In animæ Deliquiis excitandi ergo Nariibus admoveatur.

SAL VOLATILE OLEOSUM

Brandeburgensium.

℞. Oleorum destillatorum Anisi,
Caryophyllo-
rum,
Cinnamomi
ana drach-
mam semis,
Macis scrupu-
lum unum,
Zedoariæ,
Succini ana
scrupulum
semis:

Mixta digerantur in Cucurbita per tri-
dium cum

Salis Tartari unciis sex,

Spiritus Vini unciis octodecim:

Addantur

Salis Ammoniaci unciæ sex:

Destillentur inde unciæ decem Liquoris:

Berolinenses SYLVIVUM preparationem hujus medicamenti in arcanis habuisse, nec nisi cum suis hæredibus communicatam voluisse; a quodam vero hærede agonisante manu propria ex autographo exscriptam eam atque proditam esse dicunt. Dum Secta Sylviana floruit, id genus medicamenta magni fiebant; Sal suum Volatile Auctor potissimum ad ciendos Menses laudavit; scopo Carminativo & Resolvente cum Successu datur ad guttas viginti.

SAPO CHEMICUS, TARTAREUS

Starckey.

℞. Lapidis Caustici unciam unam:
Fundatur igne lenissimo; fuso adjiciantur
Olei destillati Terebinthinæ unciæ
tres:

Agitentur probe, usque dum Sal omne
Oleum receperit.

Absurdissime quidem huic medicamento vires tribuuntur Drastrictorum & Narcoticorum correctrices, unde Correctoris etiam nomen

accepit, sed cum haud spernendarum virium Resolvendi & Aperiendi spem facere videatur, earum a Medicis prudentibus, ut rite fiat periculum, optandum est. Dosis non ultra aliquot grana erit extendenda; neque, qui in locum irritantis multum Olei Terebinthinae aliud mitius substituerit, oleum perdidisse & operam censendus erit.

SAPO MEDICATUS.

℞. Salis Caustici unciam unam,
Butyri Cacao lenissimo calore liquati uncias quatuor: probe terantur.

Cum eximiarum virium sapo sit ad morbos praesertim ab obstructione Viscerum Abdominalium Oriundos, oleum praeterea, quod ad ipsum recipitur, plurimum non ad saporis solum gratiam, sed virium quoque efficaciam conferat, Pharmacopolis utique incumbit, ut illum pro usibus saltem internis ipsi sibi parent.

SERUM LACTIS Hippocratis.

℞. Lactis Vaccini uncias octo & quadraginta,
Ebullientibus adjiciatur

Cremoris Tartari sesqui drachma:
Liquor coli ope depuratus clarificetur secundum artem, unius ovi albumine, clarificatum filtretur,

Polychrestum remedium Abstergens, Demulcens, Attenuans datur per cyathos.

Serum Lactis, in quo Ferrum candens aliquoties fuerit extinctum, CHALIBEATUM appellari & inde Roborantes vires expectari solent.

SCILLÆ PRÆPARATIO Dioscoridis.

Bulbus Scillæ involvatur pasta ex farina, aqua subacta; coquatur in clibano; tunc rejecta pasta squammæ a se invicem separentur & exsiccentur.

SIEF ALBUM Rhases.

℞. Gummi Tragacanthæ drachmam unā,
Sarcocollæ drachmas tres,
Cerussæ drachmas decem,

Opii drachmam semis:

Misceantur & terantur in Pulverem tenerrimum.

Sief Arabibus Collyrium denotat. Hoc medicamentum lacte aut aqua dilutum in Ophthalmia a Lippitudine acri oriunda Oculo instillari vulgo solet; sed cum veteres æque ac recentiores Medici Opii usum in Ophthalmia perniciosum esse viderint, illud prudenti consilio omittitur.

SOLUTIO MERCURII Plenck.

℞. Mercurii dulcis uncias duas,
Aquæ fontanæ uncias triginta sex;
Coquantur in vase vitreo per horas quadraginta octo:
Filtretur Liquor:
Laudatur ad Ulcera Venerea purificanda.

SOTIRELLA PARVA Mindereri.

℞. Olei expressi Nucis Moschatae drachmas duas,
Opii Thebaici,
Specierum Diambrae ana drachmam unam,
Camphoræ, Pineis tritaë,
Extracti Croci ana grana duodecim,
Olei destillati Caryophyllorum guttas triginta:
Misceantur probe.
Forma pilulae immittitur denti carioso.

SPARADRAPUM ALBUM seu TELA Gualterii.

℞. Emplastrorum Diapalmæ,
Diachyli ana uncias octo,
Albi cocti uncias quatuor:
Liquatis immisceantur
Pulveris Iridis Florentinae drachmæ sex, & immittantur linteo detrito ut totum massam Emplastica imbuatur.

Ad Excoriationes, Lactis coagulati dissolutionem, nec non ad Fonticulos adhibetur.

SPARADRAPUM *ad* CORPUS CONDITUM INVOLVENDUM *Parisiensium.*

℞. Cereæ albæ uncias centum viginti & octo:

Liquatis & femirefrigeratis immisceantur

Oleorum Nucis Moschatæ expressi uncia octo,

Citri,

Neroli,

Lavendulæ,

Thymi ana uncia quatuor,

Ambre griseæ, Saccharo trita, grana quindecim,

Moschi grana octo,

Zibethi grana quatuor:

Immittatur linteum, ut fiat Sparadrapum.

SPARADRAPUM *Goulard.*

℞. Cereæ Citrinæ uncias nonaginta sex,

Olei Olivarum uncias viginti octo:

Leni calore liquatis adjiciantur sub perpetua agitatione

Extracti Saturni uncia quatuor:

Tandem addatur

Camphoræ paulo Olei solutæ drachma una:

Fluidæ adhuc massæ immittantur linteæ usu detrita.

Multum laudatur a Goulard ad discutientes dolores Arthriticos.

SPECIES.

Hoc nomine medio ævo comprehendebant varii generis Pulveres compositos. Hodie Ingredientia Decoctorum & Infusorum ita appellari solent.

SPECIES AROMATICÆ ROSATÆ

Gabrielis.

℞. Florum Rosarum rubrarum unciam unam,

Radicum Liquiritiæ unciam semis.

Galangæ drachmam semis,

Lignorum Aloës,

Santali citrini ana sesqui drachmam,

Cinnamomi acuti drachmas duas semis,

Caryophyllorum,

Macis,

Gummi Arabici,

Tragacanthæ ana scrupulos quatuor,

Nucis Moschatæ,

Cardamomi minoris ana drachmam semis:

Spicæ Indicæ scrupulum semis:

Misceantur & reducantur in Pulverem.

A gravioribus morbis convalescentibus Pani tosto, Vino emollito, inspersæ laudantur quidem; sed inconcinnum medicamentum evuluit.

SPECIES *pro* CATAPLASMATE EMOLLIENTE *Danorum.*

℞: Herbarum Malvæ,

Althææ ana uncias sex,

Meliloti,

Florum Sambuci uncias octo,

Radicum Althææ uncias decem,

Seminum Fœnugræci,

Lini ana uncias quatuor

& viginti:

Misceantur, incidantur & contundantur in pulverem crassum.

Vires ex nomine patent.

SPECIES CEPHALICÆ *pro* CUCUPHIS *Argentoratens.*

℞. Radicis Ireos Florentinæ uncias tres,

Herbarum Lavendulæ,

Majoranæ ana unciam unā,

Lignorum Rhodii,

Santali citrini ana drachmas sex,

Corticum Cinnamomi drachmas duas,

Aurantiorum unciam semis,

Citri unciam unam semis,

Caryophyllorum drachmas duas semis,

Benzoes,

Mastichis,
Storacis Calamitæ,
Succini Citrini ana unciam semis :
Mixta contundantur crasse, usufque tem-
pore cujuscunque Olei odorati guttis ali-
quot irrorentur.

Ad roborandum Encephalum adhibentur.

SPECIES pro DECOCTO ANTINE-
PHRITICO *Foresti.*

℞. Radicum Petroselini,
Radicum Fœniculi ana uncias duas,
Liquiritiæ,
Irœos Florentinæ ana unciam
unciam semis,
Florum Malvæ,
Althææ ana drachmas sex,
Seminum Fœniculi,
Saxifragæ ana drachmas sex,
Cicerum uncias sex,
Jujubarum,
Caricarum ana numero triginta,
Hordei mundati uncias tres :

Incisa & contusa misceantur :

*Contra Nephritidem & Ardorem Urinæ
commendantur.*

SPECIES pro DECOCTO CARMINA-
TIVO *Augustanorum.*

℞. Radicum Liquiritiæ,
Florū Chamomillæ ana drachmas sex,
Passularum minorum uncias sex,
Seminum Anisi,
Dauci,
Cumini,
Carvi,
Fœniculi ana uncias duas,

Incisa & contusa misceantur :

Unciæ duæ decoquantur cum Aquæ un-
ciis quindecim.

Pro Clysmate Flatus pellente.

SPECIES pro DECOCTO [PECTORALI
de Augustis.

℞. Radicis Liquiritiæ,
Herbarum Capilli Veneris ana un-
ciam unam,
Hyslopi unciam semis,

Passularum minorum uncias duas,
Dactylorum uncias quatuor,
Caricarum uncias duas,
Siliquarum dulcium,
Jujubarum ana unciam unam semis,
Hordei mundati uncias duas :

Incisa misceantur.

*In affectibus Pectoris a strictura aut ab
acri oriundis cum successu ex aqua decoctæ
exhibentur.*

SPECIES pro DECOCTO pro POTU
INFANTUM *Argentoratensium.*

℞. Rasurarum Cornu Cervi uncias se-
decim,
Eboris uncias quatuor,
Radicum Liquiritiæ uncias duodecim,
Polypodii uncias quatuor,
Florum Tiliæ uncias duas,
Caricarum,
Siliquarum dulcium ana uncias octo,
Seminum Anisi,
Fœniculi ana uncias qua-
tuor :

Incisa, contusa misceantur :

*Olim in frequenti apud nos usu erat De-
coctum ex his Speciebus paratum ; hodie,
haud spernendo consilio, infantibus parcius
exhibetur.*

SPECIES pro DECOCTO VULNERA-
RIO.

℞. Radicum Enulæ,
Symphyti,
Tormentillæ,
Vincetoxici ana unciam se-
mis,
Liquiritiæ drachmas sex,
Herbarum Alchymillæ,
Saniculæ,
Plantaginis,
Auriculæ muris,
Agrimonix,
Sanguisorbæ,
Bugulæ,

Herbæ Virgæ Aureæ,

Florum Hyperici,

Bellidis ana unciam semis,
Seminis Fœniculi drachmas sex :

In-

Incisa, contusa misceantur.
Laudantur Roborandi scopo in morbis Pectoris.

SPECIES DIACRETÆ *Aynsichti.*

℞. Cretæ albæ præparatæ unciam unam
 femis,
 Nucum Moschatarum drachmas sex,
 Liquiritiæ,
 Seminis Cydoniorum ana unciam fe-
 mis,
 Boli Armenæ præparatæ,
 Coralliorum rubrorum præparatorum
 ana drachmas duas,
 Lapidum Carpionum,
 Macis,
 Mastichis electæ,
 Croci Orientalis ana scrupulos qua-
 tuor,
 Sacchari albissimi uncias fedecim:
 Misceantur & redigantur in Pulverem
 subtilissimum.
*Dantur in ardore Stomachi, Soda dicto,
 ad Sesquidrachmam pro dosi.*

SPECIES DIAIREOS SIMPLICES

Renodæi.

℞. Radicum Ireos Florentinæ,
 Sacchari candi albi,
 Specierum Diatragacanthæ frigida-
 rum ana partes æquales:
 Misceantur & redigantur in Pulverem.
*Muci incidendi & Acrimonie demulcen-
 dæ causa Tussi laborantibus exhibentur.*

SPECIES DIAMBRÆ *Mesue.*

℞. Radicum Doronici,
 Galangæ ana drachmas tres,
 Zinziberis sesqui-drachmā,
 Foliorum Malabatri,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Nucis Moschata ana drachmas tres,
 Spicæ Indicæ drachmam unam,
 Cardamomorum minorum,
 Lignorum Santali citrini,
 Aloës,
 Piperis longi ana drachmas duas:

Misceantur & reducantur in Pulverem;
 cui addantur
 Ambræ gryseæ drachma una,
 Moschi drachma semis,
 Sacchari parum trita:
 Omnia probe misceantur.
*Capitis & Ventriculi Roborandi causa olim
 in frequenti usu fuerunt. Dosis ad drach-
 mam semis.*

SPECIES DIATRAGACANTHÆ

Præpositi correctæ.

℞. Gummi Tragacanthæ electæ uncias
 duas,
 Arabici drachmas decem,
 Amyli unciam semis,
 Radicis Liquiritiæ drachmas duas:
 Misceantur; Fiat Pulvis.
*Cum Nicolaus calidas etiam Diatraga-
 canthæ Species præscripsit, in eorum di-
 scrimen hæ FRIGIDÆ dicuntur & in Af-
 fectibus Pectoris ab Acri Demulcendi gratia
 adhibentur.*

SPECIES DISCUTIENTES *Danorum.*

℞. Herbarum Majoranæ,
 Menthæ,
 Rutæ,
 Salviæ,
 Florum Lavendulæ,
 Meliloti,
 Baccarum Juniperi ana partes æquales:
 Misceantur & contundantur in grossum
 Pulverem.
*Vires ex nomine patent; applicantur sub
 forma Fomentationis.*

SPECIES EMOLLIENTES *Viennensium.*

℞. Radicum Altææ uncias quatuor,
 Herbarum Althææ,
 Malvæ,
 Acanthi,
 Parietariæ,
 Violarie ana uncias duas,
 Florum Chamomillæ uncias tres:
 Misceantur & reducantur in crassum Pul-
 verem.
Ad Clysmata & Enemata adhibentur.
 SPE-

SPECIES pro EPITHEMATE CORDIS
Augustanorum & PULSUUM Argentoratensium.

- ℞. Herbarum Rorismarini,
Majoranæ,
Melissæ,
Florum Cheiri,
Tunicæ ana unciam semis,
Lavendulæ,
Rosarum ana drachmas sex,
Lignorum Aloës,
Rhodii,
Macis,
Nucis Moschatæ ana drachmas duas,
Cinnamomi drachmas sex,
Corticum Citri,
Aurantiorum ana drachmas tres;

Misceantur & contundantur in grossum Pulverem.

Roborandi ergo Sacculis ex sindone rubra confectis includebantur, Agonizantibus applicandæ.

SPECIES pro FOTU AROMATICO
Parisiensium.

- ℞. Herbarum Rorismarini,
Rutæ,
Salviæ,
Hyslopi,
Lavendulæ,
Absynthii,
Origani,
Thymi,
Foliorum Lauri,
Florum Rosarum rubrarum,
Chamæmeli,
Meliloti,
Sambuci,

Salis Ammoniaci ana partes æquales:
Mixta redigantur in Pulverem crassum:

Discutiendi ergo commoto Capiti forma Epithematis sicci, sive ex Vino coctæ, instar Fomentationis, imponuntur.

SPECIES pro FOTU ad COLICAM
Palatinorum.

- ℞. Florum Chamomillæ uncias duas,
Baccarum Juniperi,
Lauri ana unciam unam,
Seminum Anisi,
Fœniculi,
Carvi,
Cumini,
Salis Ammoniaci ana unciam semis:
Misceantur & redigantur in crassum Pulverem.

SPECIES IMPERATORIS *Augustanorum,*

- ℞. Cinamomi optimi drachmas decem
Zinziberis,
Caryophyllorum ana unciam unam
semis,
Galangæ,
Macis,

Nucis Moschatæ ana drachmas duas:
Misceantur & redigantur in crassum Pulverem:

Pro Roborando Ventriculo pani tosto Vinoque macerato insperguntur.

SPECIES pro ODORAMENTO POT-
POURRI.

- ℞. Florum recentium Rosarum rubrarum unciam semis,
Lavendulæ drachmas duas semis
Ligni Rhodii unciam semis,
Radicis Ireos Florentinæ uncias duas,
Herbarum recentium Basilici,
Calaminthæ montanæ,
Majoranæ ana drachmas duas,
Menthæ Piperitis scrupulos quatuor,
Origani,
Poli, Her-

Herbarum recentium *Salviæ*,
Saturejæ,
 Corticum *Aurantiorum*,
Citri ana drachmas duas,
Cinnamomi,
 Summitatum *Rorismarini*,
Caryophyllorum,
Macis ana drachmas tres,
Foliorum Lauri unciam semis,
Moschi, *Saccharo triti*, *grana duo*,
Ambraë gryseæ, *Saccharo tritaë*, *grana quatuor*:
 Contusa in Pulverem grossum misceantur:
Vires ex nomine patent.

SPECIES RESOLVENTES *Danorum*.

℞. Herbarum *Absynthii*,
Melissæ,
Menthæ,
Origani ana uncias quatuor,
 Florum *Chamomillæ*,
Sambuci ana uncias tres,
Baccarum Lauri uncias duas:
 Misceantur & reducantur in Pulverem crassum.
Discutiendi scopo sub forma Epithematis vel Fotus applicantur.

SPECIES TABACI *pro FUMO*
Camerarii.

℞. *Styracis*,
Mastyches,
Benzoës,
Succini ana unciam semis,
Olibani drachmas duas,
Foliorum Tabaci uncias octo,
Majoranæ unciam unam,
 Florum *Lavendulæ*,
Cyani,
Rosarum rubrarum,
Calendulæ ana unciam semis,
Liliorum convallium,
 Seminum *Fœniculi*,
Anisi ana drachmas duas,
Caryophyllorum Aromaticorum,
Cubearum ana drachmas tres:
 Incidantur, contundantur & misceantur.

Laudantur ad Defluxiones Catarrhales & Odontalgiam. Sola Tabaci Folia hodie illis præferuntur.

SPECIFICUM ANTEPILEPTICUM

WVeismann.

CUPRUM AMMONIACUM

Edinburgensium.

℞. *Vitrioli de Cypro*, quantum placet:
 Dissolvatur in aqua; solutio filtretur; affundatur

Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale Tartari quantum satis ad Saturationem; tunc affundatur

Spiritus Vini rectificatissimus, usque dum Liquor totus turbidus evadat; CrySTALLI ad fundum secedentes charta bibula exsiccentur, & in vitro probe clauso asserventur.

Edinburgenses inde ope Micæ Panis PILLULAS CÆRULEAS formant.

Pueris ad grana quatuor, adultis ad novem usque exhibetur & unicam dosin aliquot Epilepticos sanitati restituisse Auctor testatur N. A. Nat. Cur. T. I. p. 279. & Medical. Comment. by a Society in Edinburg. Vol. VI. 30.

SPECIFICUM ANTIFEBRILE *Crolii*.

Videantur *Conchæ*.

SPECIFICUM CEPHALICUM *Michaelis*,
ab Augustanis correctum.

℞. *Cinnabaris factitiæ uncias tres*,
Radicum Pæoniæ unciam unam semis,
Lapidis Smaragdi præparati drachmas duas,
Ungulæ Alcis drachmam unam,
Cranii humani,
Coralliorum rubrorum,
Cornu Cervi sine igne præparati ana scrupulos duos,
Unicornu marini,
Margaritarum,
Succini ana scrupulum unum:
 Misceantur, redigantur in Pulverem tenuerrimum.

Ad affectus Capitis, Spasmos, Convulsiones

SPIRITUS.

nes præscribitur, quo vero successu? experti norunt prudentes.

SPECIFICUM FEBRIFUGUM Craanii.

Videatur Regulus Antimonii Medicinalis.

SPECIFICUM JALAPPINUM *Argentoratensium seu SPECIES DIAJALAPPÆ Bartholini correctæ.*

℞. Resinæ Jalappæ, nucleis Pineis tri-
tæ, unciam unam semis, Cremoris
Tartari uncias duas semis:

Misceantur exactissime.

*Radici Jalappæ, cujus incerta semper do-
sis est, Resinam substituendam duximus, &
hic saltem minus efficaci Tartaro Vitriolato
Cremorem Tartari substituimus. Potest ad
drachmam semis pro dosi dari.*

SPIRITUS ABSTRACTITII SIMPLICES.

Parantur in modum Aquarum abstra-
ctitiarum, loco Aquæ Spiritum Vini re-
cipiendo & destillando usque dum Phleg-
ma prodeat; ex tempore quoque sur-
gunt, dum Oleum odoratum in Spiritu
Vini rectificato dissolvitur; illius ratio-
nem determinabit odor.

SPIRITUS BALSAMI PERUVIANI

Hoffmann.

℞. Balsami Peruviani uncias duas,

Salis Tartari unciam unam:

Probe mixtis adjiciantur

Spiritus Rosarum unciam duodecim:
Abstrahatur Spiritus.

*Hoffman Observat. Physic. Chym. L. I.
Observ. 23. hunc Spiritum non modo a sa-
poris gratia virtuteque Analeptica commendat,
sed Diureticam quoque ejus virtutem laudat.*

SPIRITUS BEZOARDICUS *Buffii.*

℞. Spiritus Eboris uncias duas,
Salis Ammoniaci Succinati un-
cias duodecim,
Vini rectificati uncias trigin-
ta & sex,

SPIRITUS.

147

Olei de cedro drachmas duas:
Misceantur probe.

*Valide Sudorem & Urinam movet; olim
multum ad promovendam Exanthematum
eruptionem laudabatur; datur ad guttas tri-
ginta.*

SPIRITUS CARMINATIVUS *Sylvii.*

℞. Radicum Imperatoriæ,
Galangæ ana drachmam
unam semis,
Radice Angelicæ drachmam unam,
Herbarum Rorismarini,
Majoranæ,
Rutæ,
Basilici,
Florum Centauri minoris ana drach-
mas duas,
Baccarum Lauri drachmas tres,
Seminum Angelicæ,
Levistici,
Anisi ana unciam semis,

Zinziberis,

Nucum Moschatarum,

Macis ana drachmam unam semis,

Cinnamomi drachmas sex,

Caryophyllorum,

Corticum Aurantiorum ana drach-
mam unam semis,

Incisis & contusis affundantur

Vini albi generosi unciam quadragin-
ta octo,

Spiritus Vini rectificati unciam duo-
decim:

Digerantur per biduum, tunc destillen-
tur ad dimidias.

*Ad discutiendos Flatus & dissipanda, quæ
inde oriuntur, incommoda ad semiunciam
exhibetur.*

SPIRITUS CARMINATIVUS de
TRIBUS.

Videatur Spiritus Nitri dulcis.

SPIRITUS COCHLEARIÆ

*Parisiensium.*SPIRITUS COCHLEARIÆ COMPOSITUS
Brunsvicensium.

℞. Foliorum recentium Cochleariæ un-
cias octoginta,
Radicum Raphani rustici recentium un-
cias decem:

Minutim concisa infundantur per nyct-
hemerum cum

Spiritus Vini unciis nonaginta sex:
Instituatur destillatio, usque dum liquor
albescens prodeat.

*Aqua temperatus hic Spiritus Collutorio
scopo ad vitia Oris Scorbutica adhibetur.*

SPIRITUS CORNU CERVI *Mæbii.*

℞. Cornu Cervi in minora frustra commi-
nuti quantum placet;

Immittatur in Retortam terream; cui
juncto vesicæ ope excipulo, instituatur
igne nudo destillatio. Hoc negotio Spi-
ritus, Oleum, ac Sal Volatilis obtine-
bitur. Filtri ope Spiritus ab Oleo, ipsi
innatante, curate separandus est.

*Dissolvendo humores & solida stimulando
Excretiones promovet aquosas. Datur ad scrupulum unum.*

SPIRITUS de TRIBUS.

Videatur Mixtura simplex.

SPIRITUS JASMINI *Beaumé.*

℞. Olei Jasmini unciis sedecim,
Spiritus Vini rectificati unciis octo-
decim:

Misceantur; crebro concutiantur; expo-
nantur frigori, quo Oleum consistat &
supernatet Spiritui; Liquor defundatur.

Ad odora menta exhibetur.

SPIRITUS *Mindereri.*

MIXTURA SALINA VOLATILIS

Suecorum.

℞. Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale
Tartari; cui instilletur

Aceti vulgaris quantum satis ad Sa-
turationem:

Liquor filtretur.

*Resolvendi & Excretiones aquosas promo-
vendi causa laudatur. Dosis ad drachmam di-
midiam.*

SPIRITUS NITRI.

Videatur Aqua fortis.

SPIRITUS NITRI DULCIS *Snellen.*NAPHTA NITRI *Kunckelli.*

SPIRITUS ÆTHEREUS NITRATUS

Suecorum.

℞. Alcoholis vini unciis quatuor:

Immittantur in vitrum amplum episto-
mio vitreo obturandum & glaciei im-
mersum: affundantur tum

Spiritus Nitri fumantis unciæ duæ:
Claudatur vitrum; elapsis aliquot horis
adjiciatur iterum

Spiritus Nitri fumantis unciæ semis:
Obturetur vitrum, negotiumque hoc re-
petatur post aliquot horarum interval-
lum, donec Naphta liquori supernatet,
hæc ubi apparuerit, affundatur adhuc

Spiritus Nitri femiuncia:

Elapsis aliquot horis infundibuli ope
Naphta a liquore, cui supernatet, se-
paretur, larga aquæ copia diluatur, &
adjecto ipsi Alkali, usque dum nulla
ulterius effervescentia surgat, omne quod
ipsi adhæret acidum inde auferatur. Di-
stilletur tunc lenissimo igne aqua, quæ
Naphtam habet, ex cucurbita, donec
ista omnis in excipulum descenderit, &
Naphta inde separata vitro optime clau-
so asservetur. Liquori acido, ex quo
Naphta surrexerat, addatur Alcoholis
quadrupulum & destilletur ex cucurbita,
quoad liquor destillans acidum sapiat,
& sub nomine SPIRITUS NITRI DUL-
CIS asservetur.

*Respectu virium cum Liquore Anodyno
convenit; multum scopo Carminativo lau-
datur; gratiæ ergo Fulapii adjicitur; datur
ad drachmam semis; optime substituitur SPI-
RITUI CARMINATIVO DE TRIBUS.*

SPIRITUS NITRI FUMANS *Glauberi.*

℞. Nitri depurati uncias duas & triginta:

Retortæ immixtis per vices affundantur
Olei Vitrioli unciæ sedecim:

Instituatur destillatio ex Balneo Arenæ,
Spiritus hac ratione obtentus vitro probe clauso asservetur. Residuum est *TARTARUS VITRIOLATUS* sive *NITRUM VITRIOLATUM Londinensium.*

Paratur pro preparatione Spiritus Nitri Dulcis.

SPIRITUS ad PERNIONES *Darelii.*

℞. Spiritus Vini Camphorati uncias tres,
Salis Ammoniaci unciam unā,

Petrolei nigri unciam unam semis:
Misceantur.

Vires ex nomine patent.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI TARTARISATUS. *Pharmacopææ Bateanæ.*
ALCALI AMMONIACUM AQUOSUM
Suecorum.

℞. Salis Ammoniaci uncias sedecim,
Cinerum clavellatorum uncias quadraginta octo:

Mixta destillentur Retorta, excipulo vesicæ opè munita;

Liquori obtento adjiciantur

Aquæ fontanæ unciæ quadraginta & octo:

Asservetur cum Crystallis destillatione obtentis.

Si liquor urinosus diluitur,

Aquæ fontanæ unciis sedecim,
Spiritus Vini rectificati unciis triginta duabus,

Surgit *SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.*

Egregium medicamentum pro attenuandis Humoribus, Asthmaticis multum commendatur; Diureticos quoque & Diaphoreticos effectus edit, nec minus egregie a Vipera morsis conducit. In Odontalgia & qualicunque Animi deliquio naribus admoventur. Dosis est ad scrupulum unum.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

cum CALCE VIVA Glauberi.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CAUSTICUS *Meyeri vel AMMONIACUM ALCALI VOLATILE CAUSTICUM Suecorum ALCALI FLUOR Rossorum.*

℞. Salis Ammoniaci uncias sedecim,
Calcis vivæ pulverisatæ uncias quadraginta octo:

Celerrime mixta committantur Cucurbitæ Alembico & excipulo instructæ; ope caloris balnei eliciatur Spiritus, qui vulgo Aquæ unciis triginta dilui solet.

Medicamentum antecedente nullo vehementius rarissime interne datur; scopo quoque Excitandi priore longe efficacius, hinc non bene in officinis dilutum prostare jubetur.

SPIRITUS AMMONIACI OLEOSI.

Spiritus Salis Ammoniaci Vinosi unciæ uni addatur

Olei odorati scrupulus dimidius,
Spiritus Vini rectificati paululo dissolutus.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS *Augustanorum. Eau de Luce.*

Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce viva uncias quatuor,

Olei destillati Succini grana octo, dissoluta

Spiritus Vini rectificatissimi unciæ semis.

Hic Spiritus præcipue contra affectus Capitis Catarrhales efficacior esse putatur, quam Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce viva simplex.

Osservetur quod Rossi Spiritus Salis Ammoniaci *LIXIVIA ALGALINA* appellant.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS *Basilii. Valentini.*

℞. Salis communis partem unam,
Argillæ albæ partes tres:

Misceantur & destillentur ex Retorta terrea, igne nudo.

Internus ejus usus rarissimus, externus ad Perniones commendabilis esse perhibetur.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Spiritus Salis fumantis uncias octo,
Alcoholis uncias sex:
Misceantur & destillentur ex cucurbita;
liquor destillatus denuo ex Retorta le-
nissimo igne destilletur & asservetur *NA-
PHTA SALIS COMMUNIS* quæ inde
prodit: hujus uncia una misceatur cum
Alcoholis unciis quatuor pro SPIRITUS
SALIS DULCI.

*Qualicunque alia ratione parati Spiritus
Salis dulcis eminet aciditas. Hoc vero me-
dicamentum cum reliquorum acidorum dolci-
ficatorum viribus congruit.*

SPIRITUS SALIS FUMANS *Glauberi.*

℞. Salis communis uncias triginta duas:
Affundantur sensim
Olei vitrioli unciæ sedecim, dilutæ
Aquæ unciis duodecim:
Instituatur destillatio ex Balneo arenæ,
Paratur proxime præcedentis laboris ergo.

SPIRITUS SAPONIS.

℞. Saponis Veneti uncias quatuor,
Salis Tartari uncias duas:
Probe tritis adjiciantur
Spiritus Vini rectificati unciæ duo-
decim,
Quintæ Essentiæ Bergamotte drach-
ma femis,
Discutiendi scopo multum laudatur.

SPIRITUS SUCCINI.

Videatur Sal Succini.

SPIRITUS SULPHURIS.

Is cum sub destillatione Vitrioli ultro
obteneatur, cur potius per ambages &
cum dispendio, Sulphur nimirum sub
campana accendendo ortosque inde va-
pores colligendo parari debeat, non
video.

*Spiritus Vitrioli aqua dilutus, fætido huius
medicamento prudenter substituitur.*

SPIRITUS SULPHURIS VOLATILIS

Beguini.

℞. Salis Ammoniaci uncias octo,
Calcis vivæ uncias duodecim,
Florum Sulphuris uncias quatuor:
Misceantur, & destillatione inde elicitus
Spiritus asservetur.

*Scopo medicato, quamvis ab Hoffmanno
laudatus, non adhibetur. Detegendo Vini per
Plumbum mangonio præcipue inservit.*

SPIRITUS TARTARI *Lullii.*

ACIDUM TARTARI DESTILLATUM

Suecorum.

Paratur ex Tartaro eodem modo, quo
Spiritus e lignis elici suo loco docui-
mus.

SPIRITUS VINI ALCALISATUS

Libavii.

Alcoholi quantæ libuerit copiæ im-
mittatur Sal Tartari, usque dum ulte-
rius immixtus non liquetur.

*Ad extrahendas & solvendas Resinas ad-
hibetur.*

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS

Cordi.

ESSENTIA CAMPHORÆ *Quercetani.*

℞. Spiritus Vini rectificati uncias se-
decim,
Camphoræ unciam unam,
Solutio asservetur.

*Polychrestum medicamentum est, quo Di-
scutiendi ergo solent uti.*

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS

CROCATUS AQUA PESTILEN-

TIALIS Hartmanni.

℞. Spiritus Vini Camphorati uncias duo-
decim,
Essentiæ Croci scrupulum unum:
Misceantur.

SPIRITUS .

Ratione virium ab antecedente vix differre videtur .

SPIRITUS VINI LOTUS *Kunckelii* .

℞. Spiritus Vini Tartarifati,
Aquæ fontanæ ana partes æquales:
Destillatione eliciatur Alcohol sincerif-
simum .

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS
Hollandi .

Spiritus Vini quantum lubuerit:
Destilletur, donec lactescentes prodeant
guttæ .
Liquor residuus *PHLEGMA* dicitur .

SPIRITUS VINI TARTARISATUS
Lemery .

Est Spiritus Vini Alcalifatus ex Cucurbi-
ta destillatus .

SPIRITUS VITRIOLI .

℞. Olei Vitrioli partem unam,
Aquæ fontanæ partes tres:
Sensim sensimque misceantur .

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS .

Videatur Liquor Anodynus .

SPODIUM .

Videatur Ebur album ustum .

SPONGIÆ PRÆPARATÆ *Danorum* .

Spongiæ finissimæ probe exsiccatae, in
laminas sectæ immittantur Cerae flavæ,
igne liquatæ exprimaturs inde torcularis
ope Cera excedens .

Pro Turundis dilatatoriis adhibentur .

SUCCI EXPRESSI .

Vegetabile recens incisum & contu-
sum immittatur sacco linteo, exprimaturs
torculari succus, qui per subsidenciam

SPIRITUS .

151

defæcatus clarificetur Albumine ovorum
& si per aliquod tempus sit asservandus,
committatur vitro angustioris colli, su-
perfusoque ipsi paululo olei Amygdala-
rum vitrum exactissime obturetur .

SUCCI ANTISCORBUTICI *Danorum* .

℞. Herbarum recentium Cochleariæ par-
tes duas,

Beccabungæ,
Nasturtii Aqua-
tici,

Pedunculorum recentium Taraxaci,
Pulpæ recentis Aurantiorum ana par-
tem unam:

Incisa committantur prelo .

SULPHUR AURATUM ANTIMONII
Basil. Valentini .

Aqua, cujus ope Hepar Antimonii
fuerit edulcoratum, reponatur per ali-
quot menses, defundatur ab *impuro*, quod
ad fundum deposuit, *Sulphure*; affunda-
tur ipsi Acetum, quoad istius ope nihil
ulterius præcipitetur; pulvis ad fundum
desidens probe edulcoratus servetur .

*Eximium medicamentum ad humorum Spis-
situdinem attenuandam . Datur ad granum
unum .*

SUPPOSITORIA *Gaubii* ;

℞. Salis communis unciam unam,
Saponis Veneti uncias duas,
Mellis ad consistentiam spissam cocti
quantum satis:
Formentur coni, basis rotundæ & variæ
magnitudinis .

*Ad reserandam Alvum oleo inuncta in-
truduntur ano .*

S Y R U P I

Canones .

I. *Σεπάρις Actuarii*, qui ea barbære Sy-
rupos dici monet, sunt liquores in spis-
situdinem minorem quam saporum, ope
Sacchari sive Mellis condensati .

II. Pro

II. Pro parandis ex Succis, aliisque coctionem non admittentibus Syrupis, illis dissolvendum Sacchari purissimi duplum, paratusque hoc modo Syrupus colandus erit.

III. Syrupi Aromatici optime parantur Elæosacchara dimidio aquæ dissolvendo.

IV. Reliqui Syrupi Saccharo cum Decocto, quod *BRODIUM* dicunt; ad justam consistentiam coquendo; Albumine deinde Ovorum clarificando perque pannum trajiciendo conficiuntur.

V. Optima ex Floribus parandi Syrupos ratio ea est, qua Floribus recentibus adjicitur Sacchari ad consistentiam tabulandi cocti duplum; cuncta per duodecim fere horas digestioni frigidae relinquuntur; leni dein calore foveantur; linteo immittuntur, torcularique denique exprimitur desideratus Syrupus.

SYRUPUS ALTHÆÆ *Fernelii*.

℞. Radicum Althææ,
Graminis,
Asparagi,
Glycyrrhizæ,
Herbarum Althææ,
Parietariæ,
Sanguisorbæ,
Plantaginis,
Rutæ murariæ,
Capilli Veneris ana drachmas tres,

Passularum minorum unciam semis,
Cicerum rubrorum unciam unam:

Incisa & contusa coquantur ex
Aque fontanæ unciis quadraginta, ad
residuum unciarum triginta:

In colatura dissolvantur
Sacchari uncia quinquaginta:

Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui
Clarificatus asservetur.

*Proprie quidem contra affectus Nephriticos
commendatur, sed Demulcentium quoque re-
mediorum vicem sustinet haud paenitentiam.*

SYRUPUS AMYGDALINUS HORDEATUS *Parisiensium*. EMULSIVUS vulgo.

℞. Amygdalarum dulcium uncias decem,
Amararum uncias sex,

Aquæ fontanæ uncias quatuor & quadraginta:

Paretur secundum artem Emulsio:

Addantur Sacchari albi uncia octoginta:

Instituatur coctio ad consistentiam Syrupi:
Colato addantur

Aquæ Florum Naphæ uncia duæ.

SYRUPUS de AMMONIACO *Klein*.

℞. Gummi Ammoniacy uncias duas:

Dissolvantur in

Aquæ Hyssopi,

Vini albi ana unciis quinque:

Solutio colata misceatur cum

Sacchari albi ad consistentiam tabulandi cocti unciis sedecim:

Agitentur ad refrigerationem usque.

Egregium Medicamentum Resolvens.

SYRUPUS ANTISCORBUTICUS

Parisiensium.

℞. Succor. nō defæcat. Folior. Cochleariæ,
Beccabungæ,
Nasturtii aquatici,

Radicum Arinoriæ
ana uncias
duodecim,

Aurantiorum amarorum
uncias vi-
ginti,

Corticum Aurantiorum amarorum re-
centium unciam unam:

Misceantur & digerantur frigide in cucurbita probe clausa aliquoties succutienda, donec fæces subsederint, id quod ut plurimum duodecim demum horis elapsis accidere solet; liquor clarus filtretur, mensuretur, committatur denuo cucurbitæ;

Adjiciatur ipsi.

Sacchari albissimi duplum:

Solutione leni calore peracta adjiciantur
Spiritus Cochleariæ,

Aquæ Cinnamomi ana uncia una:

A fæcibus denuo subsidentibus decantetur Syrupus & asservetur in Vitris probe clausis.

SYRUPUS.

Præter Antiscorbuticas, Diureticas quoque, Emenagogas, & Humores Depurantes vires edit.

SYRUPUS BALSAMICUS *Hoffmanni.*

℞. Julepi Rosarum uncias duodecim,
Spiritus Balsami Peruviani drachmas
tres;

Misceantur.

Roborandi Ulcerumque internorum curandorum causa adhibetur.

SYRUPUS BALSAMI TOLUTANI
Klein.

℞. Sacchari albissimi uncias triginta duas,
Aque fontanæ uncias viginti:

Brevi coctione ad spissitudinem redactis, colatis & semi refrigeratis immisceantur, assidue agitando.

Balsami Tolutani drachmæ sex cum
Sacchari albi sesquiuncia in pulverem tritæ.

Efficacia virium antecedenti par, gratia saporis superior est.

SYRUPUS BOYLEANUS.

℞. Radicis Symphyti recentis uncias sex,
Herbæ Plantaginis majoris uncias tres:

Ex contusis exprimatur torculari Succus, cui per subsidentiam depurato addatur
Sacchari æquum pondus:

Coquatur ad consistentiam Syrupi, qui clarificatus & colatus fervetur.

Commendatur maxime Hemoptysi laborantibus, nec inefficax erit in aliis quoque Evacuationibus.

SYRUPUS BYZANTINUS *Mesue.*

℞. Succor. depurator. Apii,
Endiviæ ana uncias quatuor & viginti,
Buglossi,
Lupuli ana uncias duodecim,

Sacchari albi uncias octo & quadraginta:

Tom. II.

SYRUPUS.

153

Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui clarificetur & coletur.

Ad morbos ab obstructione Viscerum Abdominalium cum successu adhibetur; olim contra Febres pertinaces commendari solebat.

SYRUPUS CHINÆ *Lemery.*

℞. Corticum Chinæ crasse contusorum
uncias quatuor,

Vini rubri uncias duas & triginta:
Infundantur per biduum in vase probe clauso:

Liquore filtrato dissolvantur

Sacchari albissimi uncia sexaginta.

Contra Febres & morbos Putridos in usus trahitur.

SYRUPUS CICHOREI CUM RHABARBARO. *Poterii.*

℞. Radicum Cichorei uncias duas cum semisse:

Coquantur cum

Aque fontanæ unciis octodecim,

Ad residuum unciarum duodecim:

In colatura infundatur per noctem,

Rhabarbari minutim incisi uncia una,

Salis Tartari scrupulus unus:

Colaturæ adjiciantur

Sacchari albi uncia viginti duæ:

Denuo coletur.

Infantibus maxime Evacundi scopo exhibetur.

SYRUPUS CITRI E TOTO *Dorncrellii.*

℞. Flavedinis Corticum Citri recentium
uncia duas semis:

Infundantur per noctem in

Succi Citri recentis unciis quatuor

& viginti:

In colatura dissolvantur

Sacchari albi uncia quadraginta;

Colatus Syrupus fervetur.

Ad fallendam Sitim, sedandum æstum, arcendam Putredinem merito commendabilis.

SYRUPUS CORALLIORUM *Quercetani.*

℞. Coralliorum rubrorum in pulverem
redactorum uncias duas,

Succi Berberum uncias duodecim:

Post digestionem aliquot dierum colentur:
In colatura dissolvantur

Sacchari albi uncia viginti:

Colatura fervetur.

Coralliorum nihil subit hunc Syrupum,
SYRUPUS BERBERUM omnino postpo-
nendum.

SYRUPUS CORTICUM CITRI

Serapionis.

℞. Flavedinis Corticum Citri recentium
uncias quatuor,

Granorum Chemes drachmas tres,

Vini albi generosi uncias duodecim:

Macerentur per viginti quatuor horas
in vase probe tecto:

Liquor filtratus commisceantur cum

Sacchari albillimi ad consistentiam Ta-
bulandi cocti unciis octodecim.

Refocillandi & Roborandi causa adhibetur.

SYRUPUS DIACODII, DIACODIUM
LIQUIDUM *Montani.*

℞. Capitum Papaveris uncias duas,
Siliquarum dulcium uncias duas semis:

Minutim incisa coquantur cum

Aquæ fontanæ unciis octodecim,

Ad residuum unciarum decem: sub fine
coctionis addantur

Liquiritiæ recentis minutim incisæ
uncia una semis:

In colatura dissolvantur

Sacchari albi uncia sedecim:

Coquantur ad consistentiam Syrupi; qui
clarificatus asservetur.

Sopiendæ Tussi conducit.

SYRUPUS DOMESTICUS *vel de SPINA*
CERVINA Val. Cordi.

℞. Succi baccarum Rhamni Cathartici
depurati uncias viginti,

Sacchari albi uncia duas & triginta,

Zinziberis,

Cinnamomi,

Caryophyllorum ana drachmam unā
semis,

Mastichis,

Seminis Anisi ana drachmas tres:

Paulisper coquantur, clarificentur & ser-
ventur.

Alvum ducit, urinam ciet, Hydropicis
& Arthriticis datur cum successu ad unciam
unam pro dosi.

SYRUPUS EMETICUS *Brandenburgensium.*

℞. Vitri Antimonii Hyacinthini drach-
mas duas,

Vini albi generosi uncias duodecim:

Stent in Digestione per triduum; filtratis
dissolvantur

Sacchari albi uncia quatuor & vi-
ginti:

Semel ebulliant & colentur.

A drachmis sex ad unciam pro dosi datur.

SYRUPUS EMETICUS *Glauberi.*

℞. Florum Antimonii unciam unam,
Cremoris Tartari uncias duas,

Sacchari uncias sex:

Coquantur per sex horas cum

Aquæ fontanæ unciis octoginta:

Filtrentur & evaporentur ad consisten-
tiam Mellis.

Addantur Spiritus Vini rectificati uncia
sedecim:

Per decem horas digerantur & leni igne
evaporentur ad consistentiam Syrupi

Scopo Emetico guttæ aliquot misceantur
cum aqua & singulo horæ dimidio repetun-
tur, quoad desideratus surgat, effectus.

SURUPUS EMULSIVUS.

Videatur Syrupus Amygdalinus.

SYRUPUS *de ERYSIMO Lobelii.*

℞. Radicum Enulæ recentium unciam
unam,

Iræos Germanicæ uncias
tres,

Ra-

Radicum Liquiritiæ,
 Farfaræ ana unciam unam,
 Herbarum Erysimi manipulos decem,
 Botryos manipulos septem,
 Farfaræ,
 Polytrichi,
 Hyssopi recentis ana ma-
 nipulos sex,
 Endiviæ,
 Borriginis,
 Moldaviæ ana manipulos
 quatuor,
 Marrubii recentis,
 Scabiosæ,
 Cardui benedicti ana ma-
 nipulos duos;
 Chamædryos,
 Violarie,
 Betonicæ ana sesqui mani-
 pulum,
 Thymi,
 Florum Violarum,
 Borriginis,
 Buglossi,
 Rosarum,
 Stœchados ana manipulum
 unum,
 Salviæ Pugillos duos,
 Passularum minorum,
 Caricarum ana uncias sex,
 Baccarum Lauri,
 Seminum Anisi,
 Fœniculi,
 Carvi,
 Cumini ana unciã femis,
 Hordei unciam unam:

Incisa & contusa coquantur cum
 Aquæ unciis ducentis,
 Ad residuum unciarum centum & quin-
 quaginta:

Colatis adjiciantur
 Succus Erysimi depurati,
 Aceti ana unciæ duodecim,
 Mellis unciæ sex & triginta,
 Sacchari albi unciæ nonaginta sex:
 Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui
 clarificatus asservetur.

*Magnopere laudatur pellendis affectibus
 Pectoris Pituifosis; contra Raucedinem pecu-
 liariter efficax fertur.*

SYRUPUS GLYCYRRHIZÆ *Mesue.*

℞. Radicum Liquiritiæ uncias duas.
 Herbarum Capilli Veneris unciã unã,
 Hyssopi unciam femis:
 Incisa infundantur cum
 Aquæ fervidæ unciis quatuor & vi-
 ginti,
 Colatis dissolvantur.
 Mellis unciæ octo,
 Sacchari albi unciæ sedecim:
 Coquantur ad consistentiam Syrupi, cui
 clarificato adjiciantur
 Aquæ Rosarum unciæ quatuor.
In morbis Pectoris adhibetur.

SYRUPUS HORDEATUS.

Videatur Syrupus Amygdalinus.

SYRUPUS HYSSOPI *Zovæferi.*SYRUPUS SCILLITICUS *Suecorum.*

℞. Squillæ præparatæ unciam unam,
 Foliorum Hyssopi uncias duas,
 Zinziberis unciam femis:
 Incisa macerentur in vase clauso per
 nycthemerum cum
 Aquæ Hyssopi unciis sex & triginta.
 Colatura expressa & per subsidentiam
 depurata dissolvantur
 Sacchari albissimi unciæ sex & tri-
 ginta.
*Resolvendi ergo cum Successu ad morbos
 Pectoris mucosos adhibetur.*

SYRUPUS de JUJUBIS *Mesue.*

℞. Jujubarum uncias tres,
 Radicum Liquiritiæ,
 Herbæ Capilli Veneris,
 Hordei mundati ana unciam unam:
 Incisa, contusa coquantur cum
 Aquæ unciis quadraginta quatuor,
 ad triginta sex uncias residuas:
 Sub finem coctionis adjiciantur
 Florum Violarum unciæ quinque:
 Colatura Emulgeantur
 Seminum Malvæ unciæ quinque,
 Cydoniorum,

Seminum Papaveris albi,
Melonum,
Lactucæ ana drachmæ tres:
Colatura dissolvantur
Sacchari unciæ viginti & quatuor,
Gummi Tragacanthæ drachmæ tres:
Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui
edulcoratus asservetur.
Conducit Demulcendo in Tussi sicca.

SYRUPUS LONGÆ VITÆ.

Videatur Syrupus Mercurialis.

SYRUPUS de MANNA Echholdi.

℞. Radicum Polypodii drachmas sex,
Ireos Florentinæ unciam semis,
Passularum drachmas tres,
Mellis uncias quatuor,
Aquæ fontanæ uncias quatuor & viginti:
Incisa coquantur ad residuum unciarum
duodecim:
In Colatura infundantur per noctem
Florum quatuor Cordialium ana pugillus unus,
Foliorum Sennæ sine stipitibus uncia
una semis,
Cinnamomi drachma semis:
Colatis dissolvantur
Mannæ Calabrinæ unciæ tres,
Sacchari unciæ duodecim:
Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui
clarificatus fervetur.
*Datur infantibus scopo Purgandi, neque
perperam ad affectus Pectoris pituitosos adhibetur.*

SYRUPUS MERCURIALIS, PROPHYLACTICUS LONGÆ VITÆ

Zwingeri.

℞. Radicum recentium Gentianæ uncias
quatuor,
Ireos nostratis
uncias octo:
Incisæ infundantur cum
Vini albi unciis octo & quadraginta,

Infundantur per quatuor & viginti horas:
Colaturæ addantur
Succorum Mercurialis unciæ nonaginta,
Borraginis,
Buglossi ana unciæ quatuor
& viginti,
Mellis albi unciæ duæ & triginta:
Coquantur ad Syrupi consistentiam, qui
clarificatus fervetur.

*Zwinger Acad. N. C. Dec. III. Vol. 7.
& 8. p. 18. hujus Syrupi in talia quam
maxime celebrati insignem sibi quoque probatam
efficaciam in præcavenda Vertigine, Arthritide,
Podagra, Hemicrania periodica, Cardialgia,
Dolore Ischiadico, Phthisi, Hydrope, Obstructionibus,
Alvi constipationibus aliisque morbis quam plurimis,
maximopere commendat, documentique loco duo
refert exempla hominum, qui ejus usu vitam
ultra centum annos extenderunt. Prophylactico
scopo quotidie mane ejus cochlear unum
hauritur.*

SYRUPUS de NICOTIANA Quercetani.

℞. Succu Nicotianæ uncias octo & quadraginta,
Oxymellis Simplicis uncias quatuor,
Hydromellis uncias duodecim:
Digerantur in loco tepido per quatuor
dies, liquor clarus a face decantetur,
etque adjiciantur
Sacchari unciæ octo & quadraginta.
*Valide Mucum resolvit. In Astmate pituitoso
ad unciam semis cum successu exhibetur;*

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, CONFECTIO DIACODION. Galeni.

℞. Capitem Papaveris albi uncias octo,
Aquæ uncias octo & quadraginta:
Decoquantur ad dimidium:
Colaturæ addantur
Sacchari unciæ quadraginta:
Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui
clarificatus fervetur.
*Lene Anodynum medicamentum datur ad
unciam semis pro dosi.*

SYRUPUS RUBI IDÆI *cum* ACETO
Beaumé.

℞. Succī Rubī Idæi uncias quadraginta,
Aceti rubri uncias quatuordecim,
Sacchari albi uncias centum:

Clarificatus Syrupus asservetur.

Syrupus palato gratissimus fallendæ siti in-
servit. In morbis Inflammatoriis multum
conducit.

SYRUPUS SCELOTYRBTICUS *Foresti.*

℞. Succorum Nasturtii Aquatici,
Beccabungæ ana uncias sex,
Fumariæ,
Lupuli ana uncias tres,

Sacchari albi uncias sedecim:

Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui
asservetur clarificatus.

Adhibetur ut plurimum ad medicamenta
stomachica.

SYRUPUS *de* SPINA CERVINA.

Videatur Syrupus Domesticus.

SYRUPO E SYMPHITO *Fernelii* opti-
me substituitur SYRUPUS BOYLEA-
NUS.SYRUPUS VIPERARUM *Parisiensium.*

℞. Viperarum, Capitibus & Caudis ab-
scissis & Intestinis exsectis nu-
mero duodecim,

Radicum Chinæ,

Sarsaparillæ ana unciã unã:

Incisa coquantur cum

Aquæ unciis quatuor & sexaginta,

Ad residuum unciarum triginta:

Colaturæ clarificatæ addantur

Liquoris unciæ decem, quæ priores
prodeunt dum ex

Cucurbita abstrahuntur

Vini albi generosi,

Aquæ Florum Naphæ ana unciæ qua-
tuor & sexaginta,

Ligni Santali citrini,

Cinnamomi ana unciã una,

Cardamomi minoris,

Nucis Moschatæ,

Ligni Aloës ana drachmæ tres:

In Liquoribus commixtis dissolvantur

Sacchari albissimi unciæ octoginta:

Syrupo refrigerato admisceatur

Tincturæ Ambræ unciã una.

Multum commendatur hic Syrupus ad re-
focillandas vires grævibus morbis aut abusu
Veneris fractas.

TABULÆ *vel* TABELLÆ.

Videantur ROTULÆ & TROCHISCI.

TABULÆ ALIMENTARIÆ *Beaumé.*

℞. Pedes Vitulinos quatuor,

Carnis de femore Bovis centum no-
naginta & duas uncias Carnis
de femore posteriore Vervecis

centum & sexa-
ginta uncias,

interno Vituli uncias
quadraginta octo:

Incisa coquantur leni igne cum Aquæ
quantitate sufficiente: Decoctum despu-
matur & exprimitur per pannum: caro
quæ remanet iterum cum aquæ idonea
quantitate coquitur, despumatur, expri-
mitur: Jus expressum priori additur; a
jure refrigerato pinguedo aufertur eique
adjicitur Salis quantitas, quæ sufficit:
Colatur per pannum & leni calore ad
consistentiam Gelatinæ spissæ evapora-
tur, quæ super lapidem effunditur & in
tabulas secatur calore leniori exsiccan-
das, & in vitro probe clauso asservan-
das.

Pro Jure ex tempore parando dissolvuntur
aqua.

TARTARUS CHALYBEATUS *Angeli*
Sala.

℞. Cremoris Tartari uncias sedecim,
Limaturæ Ferri uncias quatuor:

Coquantur per integram horam cum

Aquæ fontanæ quantitate sufficiente:

Liquor filtratus redigatur in Crystal-
los.

Aperiendi scopo datur ad scrupulum unum in largiore aqua copia dissolutus.

TARTARUS EMETICUS *Macquer.*

TARTARUS ANTIMONIALIS

Suecorum.

℞. Mercurii Vitæ uncias quatuor cum dimidia,

Cremoris Tartari uncias decem:

Coquantur in Vase vitreo cum

Aquæ unciis centum:

Solutio filtrata evaporetur ad siccitatem.

Emeticum vulgatissimum, cujus Dosis ad grana tria extenditur.

TARTARUS SOLUBILIS seu TARTARISATUS *Barckhusen.*ALCALI VEGETABILE TARTARISATUM *Suecorum.*

℞. Cremoris Tartari quantum placet:

Aqua dissoluto & ebullienti adjiciatur

Salis Tartari quantum satis ad saturationem:

Liquor filtratus evaporetur ad cuticulam, asserventur Crystalli.

Ob indolem Saponaceam, qua gaudet, in attenuanda Spissitudine mucosa & aperiendis Obstructionibus reliqua quoque Salia media vincit. Datur hoc scopo ad drachmam unam, Purgandi autem sine ad unciam unam.

TARTARUS VITRIOLATUS

Tachenii.

ALGALI VEGETABILE VITRIOLATUM *Suecorum.*

Vitriolo viridi in larga Aquæ quantitate dissoluto adjiciatur

Solutio Cinerum clavellatorum, usque dum nova hujus Solutionis portio ex illo liquore nihil ulterius dejiciat, nec cum eo effervescat; defundatur liquor a Terra metallica, quæ inde secesserit; evaporetur ad cuticulam; filtretur; in locum frigidum reponatur; Crystalli hac ratione ortæ, si levissimum qualiscunque coloris vestigium habent, denuo fervi-

da dissolvantur, & affusa adhuc Solutione Cinerum clavellatorum ab omni, quod ipsis accreverit, heterogeneo liberentur.

Hoc labore Pharmacopœi commode superfedere possunt, quippe qui eundem omnino Salem sub nomine *Arcani duplicati* asservant.

Incidendi & Excretiones aquosas permovendi ergo exhibetur.

TERRA FOLIATA TARTARI *Lullii.*ARCANUM TARTARI *Zwælfser.*OXYTARTARUS *Suecorum.*TARTARUS REGENERATUS *Tachenii.*

℞. Salis Sodæ uncias duodecim:

Affundatur Aceti destillati quantum satis ad saturationem:

Evaporetur ad cuticulam; filtretur & redigatur in Crystallos: si recipiendus est Sal Tartari, liquor evaporetur ad consistentiam Syrupi, tunc exsiccetur leni calore, ut in formam Foliatam concrescat.

Ob indolem Saponaceam imprimis inter Aperientia militat. Datur ad Drachmam unam.

Medicamentum non minore tantum sui pretio, sed virium quoque præstantia commendandum auctore *Boerhaave* paratur Cineres clavellatos Aceto crudo saturando, liquorem filtrando & leni calore inspissando.

THERIACA *Andromachi.*

Videatur sub Electuariis.

THERIACA COELESTIS *Hoffmanni.*

℞. Myrrhæ electæ unciam semis,

Galbani,

Mastyches,

Opoponacis ana scrupulos duos,

Storacis drachmas tres,

Extractorum Cardui benedicti,

Centaurii minoris,

Scordii,

Tormentillæ,

Contrajervæ,

TINCTURA.

Extractorum Angelicæ ana unciam
femis,
Opii drachmas sex,
Croci,
Vincetoxici,
Valerianæ,
Gentianæ,
Aristolochiæ rotundæ
ana drachmas tres,
Resinarum Ligni Aloës,
Guajaci,
Ladani ana drachmam
unam,
Bezoardici mineralis,
Cinnabaris factitiæ,
Succini præparati,
Pulveris Viperarum ana
unciam femis,
Saliū Volatiliū Succini,
Cornu
Cervi
ana
Drach-
mam
unam
femis,
Oleorum destillatorum
Cinnamomi,
Zedoariæ,
Cardamomi,
Cubebæ,
Macis,
Caryophyllorum,
Juniperi,
Citri ana guttas
duodecim,
Olei expressi Nucis Mos-
chatae,
Balsami Peruviani ana
drachmas tres,
Camphoræ,
Ambrae gryseæ ana scrupulum unum:

Misceantur secundum artem in Massam digitis non adhærentem.

Primus Quercetanus de medicamento famosæ Theriacæ analogo, & magis quidem concentrato sollicitus erat. Quæ sub Ejus nomine prostat, quæque post eum sunt divulgatæ descriptiones, una alteram absurditate vincunt. Quæ hic traditur, quamvis & ip-

TINCTURA.

159

sa admodum inconcinna, reliquis tamen omnino præstat. A quibusdam adhuc scopo Antiseptico & Anodino usurpatur. Drachma una quatuor circiter grana Opii continet.

T I N C T U R Æ.

Canones.

I. Tincturis Spirituosis simplicibus parandis affunduntur uncia uni substantiæ extrahendæ, comminutæ, cucurbitæque immisæ Spiritus Vini rectificati uncia duodecim; cucurbitæ imponitur alembicus; continuatur per aliquot dies digestio calore Balnei Mariæ instituta; qua quidem durante cucurbita aliquoties succutitur: Spiritus qui per Alembicum destillavit, cucurbitæ rursus committitur, & post sufficientem digestionem Tinctura per filtrum depuratur.

II. Pro Tincturis Aquosis requiruntur ad unciam Vegetabilis unam affundendæ Aquæ ebullientis uncia octo; Digestio fiat in vase clauso super cineribus calidis per noctem; liquori postridie mane filtrato adjiciantur Olei Vitrioli scrupuli duo; Tinctura tamen Rhabarbari hic excipienda, quippe quæ nullum Acidum admittit, atque ob id ipsum vix per aliquot dies asservari potest.

III. Tincturæ Resinosæ citra Resinæ turbationem, cum Aqua misceri non possunt. Resina, antequam Spiritus Vini ipsi affunditur, pauxillo Salis Tartari teritur.

TINCTURA ALEXIPHARMACA

Huxham.

Videatur ESSENTIA CHINÆ.

TINCTURA AMARA *Londinensium.*

Videatur ELIXIR STOMACHICUM.

TINCTURA ANTIMONII ACRIS

Hoffmann.

℞. Reguli Antimonii uncias quatuor,
Nitri crudi uncias octo:

PUL-

Pulverifata detonentur; relinquantur in fusione per integram horam; effundantur in mortarium & cum constiterint, mox redigantur in pulverem, qui immittatur

Spiritus Vini rectificatissimi unciis duodecim:

Digerantur per aliquot dies calore balnei arenæ, & filtretur Tinctura ruberrima.

Si Spiritus Vini prius Saponis unciis duabus in lixivio Caustico solutis & de novo inspissatis per biduum digeritur, surgit TINCTURA ANTIMONII SAPONATA Schulzii & saturiore colore & majoribus viribus gaudens.

Multum laudatur a Virtute Resolvente, sed in Spissitudine Humorum uti medicamento Alcohol continente, quod Humores serosos cogit, ego quidem non audeo.

Cl. Dehne, laudanda omnino encheiresi, jubet ab hac Tinctura Spiritum usque ad consistentiam spissi Extracti abstrahere, & hoc deinde in Aqua dissolvere.

TINCTURA ANTIMONII TARTARIZATI Basilii Valentini.

℞. Pulveris Antimonii unciam unam, Cinerum clavellatorum uncias tres: Fundantur in Crucibulo; effundantur in mortarium, & quamprimum constiterint, redigantur in Pulverem, qui fervens adhuc immittatur in

Spiritus Vini rectificatissimi uncias quatuor & viginti: Post digestionem aliquot dierum filtretur Tinctura.

Huic Tincturæ, uti verum Sulphur Antimonii inheret, ita efficacior, quam antecedenti virtus Resolvens inesse videtur. Sed quæ ad illam monuimus, huc quoque pertinent.

TINCTURA ANTIVENEREA Falcbii.

℞. Mercurii sublimati scrupulum unum: Dissolvatur in

Spiritus Vini rectificati uncia una: Addantur

Balsami Canadensis,
Gummi de Guajaco ana uncia una,
Dissolutis in

Spiritus Vini Rectificati unciis septem, & filtratis:
Adjiciantur

Olei destillati Sassafras drachmæ duæ:
Vitrum succutiendo dissolvendæ.

Hoc Medicamento, cujus decem ad viginti guttæ in vehiculo aquoso mane & sub vesperam exhibentur, inveteratos etiam Venereos morbos felicissime curari Auctor monet, & illud contra alias quoque Acrimonias commendat.

TINCTURA AURI Geoffroy. AURUM POTABILE Helvetii.

℞. Auri per Antimonium depurati drachmam unam,

Aqua Regis unciam unam:
Solutioni affundantur

Olei destillati Rorismarini uncia duæ:

Relinquantur in quiete, quoad Aquæ Regis flavedo prorsus evanuerit, abforpta quippe ab Oleo ipsi supernatante:

Hoc jam dissolvatur

Spiritus Vini rectificatissimi unciis octo.

Cum Aurum nullius sit in Corpus humanum efficacie, quem alium hæc Tinctura quam Aquæ Regiæ Hungariæ valde concentratæ effectum edere possit, non video. Dosis est ad guttas decem.

TINCTURA BEZOARDICA Michaelis.

℞. Radicum Zedoariæ Uncias duas,
Angelicæ,
Pimpinellæ,
Valerianæ,
Vincetoxici,
Calami Aromatici ana unciam unam,
Costi,
Flavedinis Corticum Citri recentium,
Baccarum Juniperi ana uncias duas,

Myr-

TINCTURA:

Myrrhæ uncias tres,
Herbarum Scordii,
Melissæ,
Millefolii,
Rutæ ana unciam semis,
Spiritus Vini simplicis uncias duas
& septuaginta:

Digerantur in Cucurbita per octiduum;
tunc addantur

Theriacæ Andromachi uncia fede-
cim:

Destillatione eliciantur Spiritus uncia
quatuor & viginti, quibus addantur

Spiritus Tartari uncia sex,
Vitrioli uncia tres:

Dissolvatur his

Camphoræ uncia una.

*Ex copiosa, quæ apud Auctores occurrunt,
Bezoardicum Tincturarum tribu, hanc unam
produco, cui in Febris putridis locus esse
subinde possit. Dosis est ad Drachmam di-
midiam.*

TINCTURA CORALLIORUM

Kunrath.

℞. Coralliorum rubrorum uncias duas:
Dissolvantur

Aceti crudi quantitate sufficiente:
Solutio leni calore inspissetur; Sali in-
spissato affundantur

Spiritus Vini uncia sex:

Digerantur per aliquot dies; Tinctura
filtretur.

*Ex istis Coralliis in hanc Tincturam ne-
hilum quidem penetrare, ægrique somniis si-
millimas esse miras, quæ inde Paracelsistæ
olim ostentabantur virtutes, suo itaque me-
rito nostra ætate ejus usum eviluisse, quis
non videt?*

TINCTURA LACCÆ Danorum.

℞. Gummi Laccæ a baculis abradi un-
ciam unam,

Aluminis crudi sesqui drachmam,
Aquarum Salviæ uncias tres:

Rosarum unciam unam se-
mis:

Coquantur ad Extractionem Tincturæ ru-
bræ, quæ filtretur.

Tom. II.

TINCTURA.

161

*Ad Laxitatem & Cruentationem Gingi-
varum adhibetur.*

TINCTURA MARTIS APERITIVA
AROPH PARACELSI, Zuvælfseri.

℞. Florum Salis Ammoniaci Martialium
unciam unam;

Spiritus Vini rectificatissimi uncias
quatuor:

Digerantur per quatuor & viginti ho-
ras; filtrentur.

*Ejus Virtuti Aperienti sit sua laus; sed
Flores Salis Ammoniaci Martiales citra ul-
lam preparationem exhibiti eandem præsta-
bunt.*

TINCTURA MARTIS APERITIVA
Glauberi.

℞. Vitrioli Martis uncias quatuor,
Cremoris Tartari uncias octo:

Coquantur cum

Aquæ unciis centum

Ad consistentiam mellaginis; immittan-
tur cucurbitæ & affundantur

Spiritus Vini simplicis uncia sexa-
ginta,

Florum Papaveris Rhœados manipu-
lus unus:

Post aliquot dies Digesta filtrentur.

*Vulgo a Ludovici solet denominari a
Glaubero jam in Philosoph. Ofen. II. Cap.
70. descripta. Tonico scopo a gravioribus
morbis reconvalescentibus ad drachmam di-
midiam cum Aqua Cinnamomi exhibetur.*

TINCTURA MARTIS CYDONIATA,
POMATA &c.

℞. Extracti Martis Cydoniati, Poma-
ti &c. unciam unam:

Dissolvatur

Aquæ fontanæ unciis duodecim:

Filtrentur.

*Valide adstringit: datur ad drachmam
unam pro Dosi.*

TINCTURA MARTIS HELLEBORATA

Vvedelii.

℞. Tincturæ Martis Aperitivæ Glauberi
uncias quatuor:

In quibus dissolvantur

Extracti Hellebori nigri drachmæ
duæ:

Solutio filtrata fervetur.

*Ad aperienda Viscera Abdominalia datur
ad drachmam unam pro Dosi.*

TINCTURA MARTIS Zwölfferi.

℞. Terræ Foliatæ Tartari nigræ uncias
tres,

Vitrioli Martis uncias duas:

Redigantur cum

Aquæ quantitate sufficiente

In pastam, cui per aliquot dies asserva-
tæ affundantur

Spiritus Vini unciam quatuor & vi-
ginti:

Per tres dies in Balneo Mariæ digestæ
filtrentur.

Cum antecedente usu suo coincidit.

TINCTURA METALLORUM Mats.

℞. Reguli Antimonii Martialis uncias
duas,

Cupri,

Stanni Anglici ana unciam unam:

Cupro in crucibulo fluenti adjiciantur
duo reliqua Metalla: Metallum refrige-
ratum redigatur in Pulverem & com-
miscetur cum

Nitri unciis duodecim:

Detonentur & post detonationem per
integram adhuc horam detineantur in
fluxu; tunc effundatur massa, & quam
primum constiterit, reducatur in Pulve-
rem immittendum

Alcoholis Vini unciis viginti:

Ex Digestione calida orta Tinctura fil-
tretur.

*Hoc medicamentum, cum suam virtutem
perinde ac Tinctura Antimonii acris solum-
modo Nitro caustico debeat, ejusdem plane
cum ista tenoris esse censendum est.*

TINCTURA RHABARBARI
INFUSUM RHEI SALINUM *Suecorum.*

℞. Aceti vulgaris uncias novem:
Saturentur

Salis Tartari quantitate sufficiente:

Liquor saturatus digeratur cum

Rhabarbari minutim contusi unciam
una:

Duodecim horis post filtretur.

*Egregium ad referandas Obstructiones ab-
dominales restituendamque Digestionem Me-
dicamentum. Exhibetur ad unciam semis
pro dosi.*

TINCTURA SALINA Danorum.

℞. Corticum Aurantium recentium,
Radicum Gentianæ ana uncias tres:

Concisa infundantur

Aquæ fontanæ unciis sex & triginta,

Salis Tartari unciis duodecim:

Digerantur per quadriduum; Colatis ad-
dantur

Spiritus Vini rectificati unciam octo-
decim:

Filtrentur.

*Aperiendi scopo in Obstructionibus Visce-
rum Abdominalium ad drachmas duas pro
dosi datur.*

TINCTURA STOMACHICA Danorum.

℞. Radicum Calami aromatici,

Gentianæ ana sesquiunciam,

Corticum Chinæ uncias duas,

Aurantiorum recentium,

Herbæ Cardui benedicti,

Summitatum Centauri minoris ana
unciam unam,

Limaturæ Martis in petia ligatæ un-
cias duas:

Incisa digerantur frigide cum

Vini albi unciis centum:

Post triduum filtrentur.

*Ventriculi roborandi causa sumitur ad unum
Cyathum, una ante prandium hora.*

TINCTURA STOMACHICA *Whytt.*

℞. Radicis Gentianæ,
Corticum Aurantium ana fefqui-
unciam,
Chinæ Chinæ uncias qua-
tuor:

Incifa digerantur per fex dies in Balneo
arenæ cum

Spiritus Vini rectificati unciis octo &
quadraginta:

Filtrentur.

*Hujus Tincturæ Cochlear unum, aquæ
Cochlearibus fex dilutum, mane & vefperi
exhibetur in languore Ventriculi. Contra Ar-
thritidem quoque ufus ejus laudatur, per
plures menses continuandus.*

TINCTURA SULPHURIS *Zwælfveri.*

℞. Florum Sulphuris unciam unam,
Salis Tartari uncias duas:
Mifceantur, fundantur & cum confite-
rint, reducantur in Pulverem commit-
tendum

Spiritus Vini rectificatiffimi unciis
octo:

Post digeftionem aliquot dierum filtre-
tur Tinctura.

*Commandatur adverfus Scabiem aliofque
morbof ab Humoribus acribus oriundos. Datur
ad guttas fexaginta.*

TINCTURA TARTARI *Raymundi
Lullii.*

℞. Salis Tartari uncias octo,
Calcis vivæ uncias tres:
Fundantur in Crucibulo per integram
horam; effundantur & fimulac confite-
rint, reducantur in Pulverem commit-
tendum

Spiritus Vini rectificatiffimi unciis
quatuor & viginti:

Post Digeftionem aliquot dierum filtre-
tur Tinctura.

*Viribus cum Tinctura Antimonii acri con-
venit.*

TRAGEA ALBA *Argentoratensium.*

℞. Radicum Liquiritiæ,
Ireos Florentinæ ana dra-
chmas tres,
Gummi Arabici unciam unam,
Tragacanthæ unciam femis,
Amyli uncias quinque,
Sacchari uncias fedecim:

Mifceantur & reducantur in Pulverem.

*Demulcendi ergo in morbis ab Acri oriun-
dis exhiberi potef. Olim frequens ejus apud
noftros ufus erat in Torminibus infantum
arcendis & curandis.*

TRAGEA AROMATICA.

℞. Cinnamomi drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Calangæ minoris,
Granorum Paradifi,
Macis,
Nucis Mofchataæ ana drachmam fe-
mis:

Mixta reducantur in Pulverem craffiu-
fculum, cui admifceantur

Pulverum Santali rubri drachmas fex,
Sacchari unciaæ fedecim.

*Ventriculum roborandi ergo pani tofto Vi-
no rubro madenti infpergitur. Dofis ad un-
ciam dimidiam extenditur.*

TRAGEA GRANORUM ACTES
Wolffii.

Succo baccarum Sambuci imbuatur Fa-
rina Secalina, ex qua bene depfta for-
mentur parvi panes in furno ad duri-
tiem coquendi; cocti redigantur in pul-
verem, iterum Succo baccarum Sambu-
ci imbuendum, depfendum, in panes
formandum, quibus coctis, in pulverem
tritis, quin tertia etiam vice toto ne-
gotio repetito, adjiciatur obtento deni-
que pulveri ponderis ejus octava pars
de Nuce Mofchata in pulverem trita.

*Olim hujus Medicamenti drachmæ duæ
exhibebantur Dyfentericis; hodie evilit.*

TRAGEA OPHTALMICA *Heisteri.*

℞. Millepedum
 Seminum Anisi,
 Foeniculi ana unciam di-
 midiam,
 Radicis Valerianæ drachmas duas,
 Cinnamomi,
 Cubebæ ana drachmam unam,
 Sacchari albi uncias duas:
 Redigantur in pulverem & misceantur.
Attenuandis Humoribus Oculorum adhibetur.

TROCHISCI.

Ex quocunque Pulvere formari possunt, siquidem ipsi ea, quæ par est, quantitas Mucilaginis Tragacanthæ adjicitur, ut massa inde surgat digitis non adhærens. Hujus massæ particulæ in orbiculos formatæ, alterutri superficiæ qualicunque signo impresso, appellantur *Trochisci* sive *Tabellæ*, in aliam qualemcunque formam coactæ *Pastilli*.

TROCHISCI ALBI *Rhasis* vulgo COLLYRIUM ALBUM *Rhases.*

℞. Cerussæ albæ drachmas decem,
 Sarcocollæ drachmus tres,
 Amyli drachmas duas,
 Tragacanthæ drachmam unam,
 Opii drachmam unam:
 Misceantur in Pulverem.
Parisini Opio Camphoram substituunt.
Extus contra Ophthalmiam adhibetur.

TROCHISCI ALHANDAL *Mesue.*

Ex Pulpa Colocynthidis, cortice feminibusque rejectis addita Mucilage Tragacanthæ Trochisci formantur. Hodie pulvis ipse hoc nomine asservatur, cum quæ a virulentia medicamentorum metuuntur noxæ, prudenti potius administratione Medici, quam remediis corrigentibus sunt avertendæ.

TROCHISCI ALIPTÆ *Nicolai.*

Eis substituuntur TROCHISCI FUMALES.

TROCHISCI ALKERMES

Argentoratensium.

℞. Confectionis Alkermes completæ drachmam una semis,
 Coccionellæ pulverifatæ grana quinque,
 Salis Tartari grana tria,
 Sacchari albi uncias tres,
 Mucilaginis Tragacanthæ quantum fatis:
 Misceantur & fiant lege artis exigui Trochisci.

Cardiaco & Cephalico scopo nec non ad corrigendum Oris factorem adhibentur.

TROCHISCI sive TABULÆ ALTHÆÆ *Parisiensium.*

℞. Radicum Althææ unclam unam,
 Ireos Florentinæ drachmam unam;
 Sacchari albissimi uncias sedecim:
 Misceantur, redigantur in pulverem & Mucilaginis Tragacanthæ quantum fatis
 Fiant Trochisci.
Cum Pasta Althææ quoad Vires conveniunt.

TROCHISCI BECCHICI ALBI *Valeri Cordi.*

℞. Pulveris Radicis Ireos Florentinæ uncias duas,
 Amyli uncias duas, semis
 Pulveris Sacchari albissimi uncias quatuor & viginti,
 Mucilaginis Tragacanthæ quantum fatis
 Fiant lege artis Trochisci.
Exhibentur Tussientibus.

TROCHISCI BECCHICI CITRINI

Hamburgenfium.

℞. Radicis Liquiritiæ unciam unam,
 Croci drachmam unam,

Sac-

TROCHISCI.

Sacchari albissimi uncias fedecim:
Pulverisentur, misceantur & cogantur cū
Mucilagini Tragacanthæ quanto suf-
ficiente in Trochiscos.

*Resolvendi vim habent majorem etiam,
quam proxime prædicti.*

TROCHISCI BECCHICI NIGRI
Hamburgensium.

℞. Radicum Ireos Florentinæ uncias tres,
Liquiritiæ,
Seminum Anisi,
Fœniculi ana uncias quin-
que,

Succi Liquiritiæ uncias novem,
Styracis Calamitæ unciam unam,
Sacchari albi uncias sex & nonaginta:

Pulverisentur, misceantur additaque
Mucilagine Tragacanthæ
In Trochiscos efformentur.

Supra prolatis omnibus efficaciores sunt.

TROCHISCI CYPHEOS *vulgo*
CYPHOIDES *Galli.*

℞. Pulpæ Passularum uncias duas cum
dimidia,

Terebinthinæ Chiæ drachmas sex,
Gummi Bdellii unciam semis,
Myrrhæ,

Ligni Aloës,
Crocī,
Cinnamomi,
Spicæ Indicæ,
Cassie lignæ ana drachmam unam,
Schoenanthi drachmas tres,
Calami Aromaticis drachmas duas,
Mellis uncias quinque,
Vini Græci quantum satis:

Misceantur.

*Hoc Medicamentum eo, quod in composi-
tiones, quæ a Veteribus ad nos descenderunt,
etiamnum recipi solet, hic præterire nolui.*

TROCHISCI ESCHAROTICI
Parisiensium.

℞. Minii unciam semis,
Mercurii sublimati corrosivi unciam
unam,

TROCHISCI. 165

Micæ panis recentis uncias quatuor:
Optime mixta cogantur in Pastillos gra-
num Avenæ æquantēs.

Cathartico scopo a Chirurgis adhibentur.

TROCHISCI FUMALES *Schrœderi.*

℞. Florum Rosarum rubrarum unciam
unam,

Ligni Rhodii drachmas sex,
Caryophyllorum drachmas duas,
Benzoës uncias fedecim,
Styracis uncias septem,
Sacchari uncias octo:

Pulverisentur, misceantur; fiant cum Mu-
cilagine Tragacanthæ Trochisci.

Vires ex nomine patent.

TROCHISCI HEDYCHROI *Magni.*

℞. Radicum Calami aromatici,
Phu,
Costi,
Asari,

Schoenanthi,
Cassie lignæ ana drachmas sex,
Ligni Aloës sesquunciam,
Cinnamomi,
Cardamomorum excorticatorum ana
uncias tres,

Herbarum Majoranæ,
Mari veri ana sesquunciam,
Spicæ Indicæ uncias duas,
Foliorum Malabatri,
Gummi Mastichis ana drachmas sex,
Myrrhæ uncias tres,

Crocī sesquunciam,
Balsami de Meccha drachmas sex,
Vini Græci quantum satis pro for-
mandis Trochiscis:

Ingrediuntur Theriacam.

TROCHISCI HERMETICI *Secretæ.*

℞. Mercurii dulcis drachmas quinque,
Cinnamomi acuti grana quadraginta,
Resinæ Jalappæ Pineis tritæ, grana
quinque & septuaginta,
Sacchari albi sesquunciam:

Exactissime trita redigantur cum
Mucilagine Tragacanthæ in Trochi-
scos centum.

Scopo Anthelmintico dantur Infantibus, ut plurimum eorum ætati numero adæquato, sed ultra decem non augetur numerus.

TROCHISCI *sive* MUSCERDÆ
CATECHU.

℞. Pulverum Terræ Catechu unciam unā,
Sacchari unciam semis,
Caryophyllorum scrupulum
unum,

Quintæ Essentiæ Citri scrupulum semis:
Misceantur & redigantur ope Mucila-
ginis Tragacanthæ in Pastillos teneros,
oblongos.

*Detinentur sub lingua Fætori animæ aver-
tendo.*

TROCHISCI DE NITRO.

℞. Nitri depurati unciam unam;
Sacchari albi uncias sex,
Succi Citri unciam unam:

Misceantur & cum Mucilagine Traga-
canthæ redigantur in Trochisco.

*Cum summo successu ad sedandum Ardo-
rem Sanguinis & mitigandam Tussim ad-
bibentur.*

TROCHISCI PECTORALES REGII
Danorum.

℞. Succi Liquiritiæ,
Sacchari ana unciam unam,
Extracti Opii grana quatuor:

Pulverisentur; misceantur exactissime &
formentur in Trochiscos granum Pipe-
ris æquantes.

*Egregie contra Tusses spasmodicas condu-
cunt.*

TROCHISCI *seu* ROTULÆ BECCHI-
CÆ *Parisiensium.*
CONFECTIO DE REBECHA.

℞. Pulverum Ireos Florentinæ,
Gummi Arabici ana un-
ciam semis,
Liquiritiæ unciam unam
semis,
Sacchari albissimi uncias octo & qua-
draginta:

Misceantur, additaque Mucilagine Tra-
gacanthæ, ope Aquæ Florum Naphæ pa-
rata, fiant vel Trochisci vel Pastilli.

A Tussientibus in usum trahuntur.

TROCISCI REFRIGERANTES.

℞. Nitri depurati unciam unam,
Salis Acetofellæ unciam semis,
Sacchari albissimi uncias sex,
Quintæ Essentiæ Citri scrupulum se-
mis:

Misceantur & cum Mucilagine Traga-
canthæ redigantur in Trochiscos.

Apprime Refrigerant & Sitim sedant.

TROCHISCI DE SCILLA *Damocratis.*

Scillæ præparatæ, antequam ejus la-
mellæ exsiccata fuerint, admisceatur
Farinæ Ervi tantundem & formentur
Pastilli.

Ingrediuntur Theriacam.

TROCHISCI VIPERINI *Andromachi.*

Viperæ capite & cauda truncatæ, de-
tracta cute & rejectis visceribus coquan-
tur ex aqua, cui aliquantulum Foliorum
Anethi & Salis cibarii fuerit immis-
sum, usque dum caro a spina secesserit, hæc
caro contusa cum Panis Siliginei ea, qua
par est, quantitate in Trochiscos for-
metur.

Recipiuntur in Theriacam.

TRYPHERA MAGNA *Galenii.*

℞. Opii uncias duas,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Spicæ,
Zinziberis,
Costi,
Styracis,
Calami aromatici,
Cyperi rotundi,
Ireos Florentinæ,
Nostratis,
Peucedani,

Mandragoræ,
Lavendulæ,
Rosarum,
Piperis,
Anisi,
Apii,
Fœniculi,
Petroselini Macedonici,
Dauci,

Ocymi ana unciam unam:

Redigantur in Pulverem, misceantur & cum

Mellis quantitate sufficiente

Fiat Electuarium:

A quibusdam scopo Anodyno, maxime contra Tormina, substituitur Theriacæ.

TURPETHUM MINERALE *Crollii.*

MERCURIUS EMETICUS FLAVUS

Londinensium.

℞. Mercurii vivi uncias quatuor:

Unde abstrahantur

Olei Vitrioli unciæ sex:

Salis in Retorta remanenti affundatur aqua fervida; Pulvis citrinus, qui ad fundum secedit, probe edulcoratus affervetur. Aqua evaporata gignit Salem, qui deliquium patitur, & *Oleum Mercuriale* nominari solet.

Turpethum minerale ad quinque usque grana exhibebatur olim ad oppugnandum virus Venereum; recentiori ætate contra Hydrophobiam laudabatur; his vero nostris temporibus cum medicamenta Mercurialia tutiora existant, Drastico sursum & deorsum vehementius æquo purgante jure meritoque abstinemus. Oleum Mercuriale Vires rodentes edit.

VINUM AMARUM *Edinburgensium.*

℞. Radicis Gentianæ uncias semis,
Corticum Chinæ unciam unam,
Aurantiorum recentium unciam semis,
Vinterani drachmam unā:

Infundantur calide cum

Spiritus Vini simplicis unciis quatuor:

Refrigeratis addantur

Vini albi Hispanici uncias quatuor & viginti:

Post macerationem quatuordecim dierum filtretur liquor.

Ad roborandum Ventriculum datur cochlearium.

VINUM ANTISCORBUTICUM

Dumorette.

℞. Radicum recentium Raphani rusticani uncias duodecim,

Bardanæ uncias quinque,

Foliorum recentium Cochleariæ, Nasturtii aquatici,

Beccabungæ,

Fumariæ,

Seminis Sinapi ana uncias sex,

Salis Ammoniaci uncias tres:

Incisa & contusa infundantur cum

Vini albi unciis tercentenis & octoginta per octiduum:

Expressa filtrentur.

Datur per cyathos.

VINUM CHALYBEATUM *Danorum.*

℞. Limaturæ Ferri uncias quatuor,

Cinnamomi,

Macis ana unciam semis:

Crassiuscule contusa misceantur & infundantur cum

Vini Rhenani unciis octo & quadraginta:

Digerantur per mensem sub frequenti agitatione in vase clauso, deinde colentur:

Ad roboranda Viscera Chylopoietica exhibetur per cyathos.

VINA PER CONFERMATIONEM PARATA.

Vegetabilis qualiscumque incisi unciæ centum immittantur Musti recens expressi unciis octingentis; finita fermentatione Vinum a facibus detractum affervetur.

VINUM EMETICUM.

Videatur AQVA BENEDICTA *Rulandi*.
VINUM HIPPOCRATICUM *Alexandri*
Benedicti.

℞. Cinnamomi uncias tres semis,
Zinziberis unciam dimidiam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cardamomorum minorum excortica-

torum,
Nucum Moschatarum ana drachmas
duas:

Contusa in pulverem crassum infundan-
tur per aliquot dies cum

Vini rubri unciis quadragentis &
quingenta:

Colentur per manicam Hippocratis; in
colatura dissolvantur

Sacchari albi unciae sex & nonaginta:
Colentur denuo.

Tam voluptatis, quam Ventriculi robo-
randi gratia bibitur per cyathos.

VITRIOLUM MARTIS *Basilii Valentini*.
SAL MARTIS *Londinensium*.

℞. Limaturæ Martis uncias octo,
Spiritus Vitrioli uncias triginta duas,
Aquæ uncias duodecim:

Peracta solutione, calore etiam adjuvan-
da, liquor redigatur in Crystallos.

Tonum restituendi, Obstructiones reser-
andi, Hemorrhagias sistendi, Vermes necandi
causa exhibetur; Dosis ad octo grana exten-
di potest.

VITRUM ANTIMONII *Basilii Valentini*.

℞. Antimonii quantum lubet.
Ustuletur, usque dum nullos ulterius va-
pores Sulphur redolentes dimittat; calx
hac ratione parata fundatur per unam
circiter horam in crucibulo; quo facto
effundatur.

Medicamentum olim ab Auctoribus non
infimè notæ ciendi Vomitus causa vel ad
novem usque grana exhibitum, cum hodie
constet aquo vehementius Primas irritare
Vias, per se non amplius datur.

VITRUM ANTIMONII CERATUM
Edinburgensium.

℞. Cerae citrinæ drachmam unam:
Liquefactæ immittatur

Vitri Antimonii uncia una:

Sub perpetua agitatione detineantur per
dimidiam horam super ignem; effun-
dantur in chartam, materia refrigerata
redigatur in pulverem.

In Dysenteria & Hæmorrhagia Uteri egre-
gios effectus præstitisse, egregii Auctores te-
stantur.

Dosis a granis quinque ad decem usque
extenditur.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM
Hildani.

MEL ÆGYPTIACUM *Londinensium*.
OXYMEL ÆRUGINIS *Suecorum*.

℞. Viridis Æris uncias quinque,
Aceti uncias septem,
Mellis uncias quatuordecim:

Mixta coquantur in consistentiam Un-
guenti.

Medicamentum, improprie unguentum di-
ctum, ad depuranda Ulcera sordida & fi-
stulosa adhibetur.

UNGUENTUM ALBUM *Montagnanæ*.

℞. Axungia Porcinæ uncias sedecim,
Cerulae albæ uncias octo:
Misceantur.

Ad Ambusta & Intertriginem adhibetur.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORA-
TUM *Manlii*.

℞. Unguenti albi simplicis uncias duo-
decim,
Camphoræ drachmas tres:
Misceantur.

Valet ad Refrigerandum levioresque Di-
scutiendas Inflammationes.

UNGUENTUM ALTHÆÆ *Præpositi*.

℞. Mucilaginum Radicum Althææ un-
cias sedecim,

UNGUENTUM.

Seminum Foenugræci,
Lini ana un-
cias octo,

Butyri uncias quatuor & sexaginta:
Coquantur ad consumptionem humiditatis:
Addantur

Ceræ flavæ uncia sedecim,
Resinæ uncia sex,
Terebinthinæ uncia duæ:

Liquatis ingeratur
Pulveris Radicis Curcumæ uncia una:
Misceantur.

Emolliendi & Resolvendi scopo adhibetur.

UNGUENTUM AD AMBUSTA

Pharmacop. Charas 1753.

℞. Foliorum Sambuci,
Hyoscyami,
Solani scandentis,
Stramonei ana manipulum
unum,

Axungia Porcinæ uncias duas & tri-
ginta:

Coquantur ad consumptionem humiditatis
& ferventur colata.

Vires ex nomine patent.

UNGUENTUM ANODYNUM

Brandeburgensium.

℞. Radicum recentium Althææ uncias
duas,

Herbarum recentium Anethi,
Hyoscyami,
Malvæ,

Florum recentium Meliloti,
Verbasci ana un-
ciam unam,
Chamomillæ un-
cias duas & tri-
ginta,

Seminum Ligni,
Foenugræcis ana drachmas
tres:

Incisa & contusa coquantur cum
Olei Olivarum unciis duabus & tri-
ginta:

Ad consumptionem humiditatis, in co-
latura colliquantur

T. m. II.

UNGUENTUM.

169

Ceræ flavæ uncia quatuor:
Misceantur.

Relaxando vires Paregoricas edit.

UNGUENTUM APOSTOLORUM seu
DODECAPHARMACUM *Avicennæ.*

℞. Lithargyrii unciam unam,
Viridis Æris drachmas tres:

Dissolvantur coquendo cum
Olei Olivarum unciis sex & triginta
Aceti unciis duabus:

Liquentur in coctis

Terebinthinæ,

Resinæ,

Ceræ ana uncia duæ,

Addantur denique

Pulverum Aristolochiæ longæ,

Olibani,

Bdellii,

Myrrhæ,

Galbani ana uncia dimidia,

Oppoponacis drachmæ duæ

Misceantur.

Detergendis Ulceribus adhibetur.

UNGUENTUM DE ARTHANITA

Mesue.

℞. Succorum Cyclaminis uncias sedecim,
Cucumeris agrestis,

Butyri ana uncias quinque semis,

Olei Olivarum uncias undecim,

Polypodii uncias duas,

Pulpæ Colocynthidis unciam unam
semis:

Coquantur ad consumptionem humiditatis:
In colatura liquentur

Ceræ flavæ uncia duæ:

Addantur

Pulverum Aloës,

Baccarum Mezeræi,

Colocynthidis,

Scammonei,

Turpethi ana drachmæ duæ
semis,

Euphorbii scrupuli septem,

Salis Gemmæ,

Florum Chamomillæ,

Myrrhæ,

Piperis longi,

Y

Pul-

Pulverum Zinziberis ana drachma una
femis,
Fellis Tauri inspissati,
Sagapeni ana drachmæ duæ:
Probe misceantur.

*Hujus Unguenti, Abdomini inungendi,
laus in movenda Alvo puerorum, nec non
eorum omnium ponitur, quorum palatum dif-
ficile hauriendis Purgantibus reluctatur, quin
ad necandos Vermes expellendasque Hy-
dropicorum aquas adhiberi solet.*

UNGUENTUM BASILICUM *Mesue.*
TETRAPHARMACON *Galenii.*

℞. Ceræ,
Picis navalis,
Resinæ ana uncias duodecim,
Olei Olivarum uncias octo & qua-
draginta:

Leni calore liquata colentur.

*Ad Digerendum Suppurationemque pro-
movendam valet.*

UNGUENTUM BERNHARDINUM
Wecker.

℞. Axungia Porcinæ uncias octodecim,
Olei Rosarum uncias sex,
Pulverum Sulphuri citrini uncia no-
vem,
Caryophyllorum,
Granorum Paradisi,
Zinziberis ana unciam unam
femis:

Probe misceantur.

Scabiem prohibet.

UNGUENTUM CONTRA CANCRUM
APERTUM *Jacobi.*

℞. Vitri Antimonii in tenerrimum Pul-
verem triti unciam unam:

Cogatur cum

Olei Vitrioli quantitate sufficiente
in pastam:

Affundatur

Acetum gelu concentratum ad emi-
nentiam trium digitorum:

Post digestionem calidam per triduum
institutam filtratur liquor, ejusque ope

paretur, ratione suo loco dicta, Acetum
Saturni; miscendum agitando cum duplo
Balsami Sulphuris, parati ex Sulphure
impuro, quod sub præparatione Sulphu-
ris Aurati Antimonii obtinetur, cum Olei
Papaveris octuplo cocto.

*Ulcus Cancrosum saluberrima hujus me-
dicamenti vi felicissime extinctum fuisse asse-
verat Auctor N. A. N. C. T. I. p. 235.*

UNGUENTUM CARDIACUM

Schræderi.

℞. Herbarum recentium Cardiacæ,
Chamædryos,
Malvæ,
Senecionis,
Solani scandien-
tis,
Scabiosæ,
Sempervivi,
Alfines,
Jacæ ana ma-
nipulos duos:

Incisa coquantur cum

Butyri unciis centum & viginti octo
ad consumptionem humiditatis;

Colatura fervetur.

*Olim in frequenti usu erat contra Car-
diagram Infantum.*

UNGUENTUM CARMINATIVUM

Brandeburgensium.

℞. Summitatum recentium Abrotani,
Hederæ ter-
restris,
Menthæ cri-
spæ,
Tanaceti,

Florum recentium Meliloti ana ma-
nipulum unum,

Chamomillæ ma-
nipulos duos,

Baccarum Laurini unciam semis,

Seminum Cumini,

Levistici ana drachmas
duas:

Incisa & contusa infundantur per qua-
tordecim dies in

Oleorū Chamomillæ unciis duodecim,
Ane-

UNGUENTUM.

Anethi,
Ruthæ ana uncia semis,
Axungia porcinæ unciis duodecim:
Coquantur inde ad consumptionem hu-
miditatis: colatura liquentur

Ceræ uncia dua:
Semirefrigeratis immisceantur

Oleorum destillatorum Anisi,
Menthæ,
Carvi ana
drachma
una.

*Illinitur Abdomini contra Intestinorum tor-
mina.*

UNGUENTUM CLYSMATICUM

Augustanorum.

℞. Radicum recentium Althææ,
Liliorum albo-
rum ana uncias
duas,

Herbarum recentium Parietariæ,
Malvæ,
Mercurialis ana
unciam unam
semis,
Althææ,
Violaria,

Florum recentium Chamomillæ,
Meliloti ana un-
ciam unam:

Incisa coquantur cum
Butyri unciis duabus & triginta ad
consumptionem humiditatis;

Colatura fervetur.
*Clysmatibus Emollientibus ad tres usque
uncias adjicitur.*

UNGUENTUM COMITISSÆ

Varignana.

℞. Radicis Tormentillæ,
Foliorum Pruni silvestris,

Quercus,
Plantaginis,
Equiseti,

Corticum Castanearum,
Quercus,

Glandium,
Calicum Glandium,

UNGUENTUM.

171

Baccarum Myrti,
Gallarum;
Sorborum,
Mespilorum ana unciam semis:
Incisa coquantur cum
Succi Agrestæ unciis duabus,
Aquæ,
Vini rubri ana unciis duodecim,
Olei Myrtillorum unciis octodecim
ad consumptionem humiditatis;

In colatura liquentur
Ceræ uncia octo semis:

Addantur
Olei Mastychini uncia octodecim,

Pulverum Corticum Quercus,
Sanguinis Draconis,
Nucis Moschatæ,
Succi Hypocistidis,
Baccarum Myrti,
Sorborum,
Succini,
Florum Balauftiorum,
Mastychis,
Gummi Laccæ ana uncia
semis:

Misceantur probe.

*Ad præcavendum Abortum facere Vari-
gnana & Schulz sunt experti; ad Hæmor-
rhagiam Uteri, nimias Hæmorrhoides, Ani
& Uteri Prolapsum, nec non ad Inconti-
nentiam Urinæ laudatur, inungendum Ab-
domini, Lumbis & Femoribus.*

UNGUENTUM DIGESTIVUM

Amburgensium.

℞. Terebinthinæ Argentoratensis uncias
octo:

Subigantur cum
Vitellis ovorum numero quatuor

Addantur
Olei Hyperici uncia una semis,
Pulverum Olibani,
Myrrhæ ana drachmæ tres:

Misceantur.
*Remedium polychrestum ad sustentandam
Suppurationem aptatum.*

UNGUENTUM DODECAPHAR-
MACUM.

Videatur Unguentum Apostolorum.

UNGUENTUM ENULATUM

Coloniensium.

℞. Radicum Enulæ recentium uncias sedecim:

In pulvem contusæ coquantur cum
Axungie porcine uncias octo,
Olei Olivarum uncias quatuor, ad
consumtionem humiditatis;

Colatura liquentur

Ceræ,

Terebinthinæ ana uncia una.

Misceantur.

Contra affectus Cutaneos adhibetur.

UNGUENTUM FUSCUM *Parisiensium.*

℞. Axungie Porci,

Butyri,

Sevi Vervecini ana uncias sedecim,

Olei Olivarum uncias duas & tri-
ginta:

In lebete vivide ferventibus addantur
Lithargyrii uncie sedecim:

Sub perpetua agitatione coquantur, do-
nec colorem induerint fuscum; quo fa-
cto liquentur in eis

Ceræ uncie sedecim.

*Hoc unguentum Gallis sub nomine On-
guent de la Mere venit, tam Digerendis
Ulceribus adhibendum quam Abstergendis.*

UNGUENTUM HÆMORROIDALE

Plenck.

℞. Unguenti Nutriti drachmas sex,
Olei cocti Hyoscyami drachmas duas,
Pulveris Croci scrupulum unum,
Camphoræ Oleo subactæ scrupulos
duos:

Misceantur

Hæmorrhoides cæcas discutit; Dolores earum sedat.

UNGUENTUM DE LINARIA *Plenck.*

℞. Herbarum Linariæ uncias duodecim,
Sempervivi uncias duas,
Hyoscyami unciam unam:
Contusa macerentur per aliquot dies cum

Butyri uncias octodecim:

Coquantur deinde ad consumptionem hu-
miditatis & exprimantur.

*Specificè commendatur contra Hæmorrhoi-
des cæcas.*

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA

Augustanorum.

℞. Radicum Liquiritiæ recentium in pul-
vem contusarum,

Butyri ana uncias sedecim:

Coquantur ad consumptionem humiditatis:

Prelo expressis addantur

Pompholygos drachmæ sex,

Cerussæ uncie tres,

Camphoræ, paululo Olei subactæ scru-
puli duo:

Misceantur.

*Ad intertriginem, Excoriationes, Fis-
suras Papillarum adhibetur.*

UNGUENTUM DE LITHARGIRIO,
NUTRITUM, TRIAPHARMACUM*Mesue.*

℞. Lithargyrii uncias sex,

Olei Olivarum uncias octodecim,

Aceti fortis uncias sex:

In vase vitreato prunis superimposito
probe agitentur, donec penitus coierint.

*Laudatur ad Ambustiones, Excoriatio-
nes &c.*

UNGUENTUM MARTIATUM *Nicolai.*

℞. Foliorum recentium Lauri uncias octo,

Rutæ uncias quin-
que,

Majoranæ uncias
quatuor,

Rorismarini un-
cias tres,

Myrti,

Ebuli,

Menthæ,

Basilici ana un-
ciam unam:

Incisa infundantur per aliquot dies cum

Olei Olivarum uncias sedecim,

Butyri recentis,

Axun.

UNGUENTUM.

Axungiarum Urſi,
Gallinæ,

Medullæ Cervi ana drachmis ſex:

Coquantur ad conſumptionem humiditatis; expreſſis & colatis liquentur

Ceræ unciæ octo:

Refrigeratis adjiciantur

Pulverum Styraçis drachmæ quinque,
Maſtyches unciæ ſemis,
Olibani drachmæ tres,

Miſceantur.

Partibus debilitatis & Abdomini infantum Torminibus laborantium inungitur.

UNGUENTUM MATURATIVUM

Reineſii.

Vix differt ab Unguento Diſſolventivo.

UNGUENTUM MERCURIALE ALBUM *Plenck.*

UNGUENTUM AD SCABIEM
Zelleri.

℞. Mercurii præcipitati albi unciam ſemis,

Unguenti Roſati unciæ tres ſemis:

Probe miſceantur.

Contra Scabiem & Herpetem commendatur.

UNGUENTUM DE MINIO CAMPHORATUM *Florentini.*

℞. Unguenti de Lithargyrio unciæ quindecim:

Cum his ſubigantur

Camphoræ drachmæ duæ:

Addantur

Minii unciæ una ſemis,

Tutiæ præparatæ drachmæ duæ:

Miſceantur.

Ambuſtis & ſerpentibus Ulceribus obnitiſſur.

UNGUENTUM MUNDIFICANS

Poterii.

℞. Foliorum Nicotianæ manipulos ſex,
Butyri unciæ quatuor & viginti,
Terebinthinæ unciæ quatuor:

UNGUENTUM. 173

Mixta inſolentur per octiduum, tum exprimantur:

Denique immiſceantur iſſis

Pulverum Gummi Ammoniæ,

Galbani ana unciæ duæ,

Antimonii crudi,

Cinnabaris ana drachmæ tres,

Myrrhæ,

Olibani ana drachmæ duæ.

In Ulceribus fiſtuſoſis ſanandis magnopere ab Auctore laudatur.

UNGUENTUM MUNDIFICANS

Stablii.

℞. Mercurii vivi,

Plumbi ana unciam unam:

Fiat Amalgama ſecundum artem, quod probe teratur cum

Terræ Tripolitanae unciæ una:

Hic pulvis permiſceatur penitiſſime cum Unguenti albi Camphorati unciis octo.

Commendatur ad extinguentes Effloreſcentias Cutis ſcabioſas ſiccas & pruriginoſas.

UNGUENTUM NEAPOLITANUM

Parieſium.

℞. Axungia Porcinæ,

Mercurii vivi ana quantum libuerit:

Probe terantur, donec omnes globuli Mercuriales diſparuerint.

Adhibetur ad Frictiones, quæ, qua ſoler-tia ſunt adminiſtranda, Chirurgia docet. Si Mercurio duplum aut quadruplum Axungiae adjeceris, ſurgit UNGUENTUM CÆRULEUM FORTIUS ET MITTUS Londinenſium.

UNGUENTUM NERVINUM

Suecorum.

℞. Sevi Ovilli unciæ octo:

Leni calore liquatis addantur

Oleorum Laurini unciæ duodecim;

deſtillatorum Terebinthinæ

unciæ una,

Succini unciæ

ſemis.

Su-

Subigantur probe.

Roborandis Membris inungitur.

UNGUENTUM DE NICOTIANA

Jouberti.

℞. Foliorum Nicotianæ incisorum un-
cias quatuor & viginti,

Succi Nicotianæ uncias quatuor cum
semisse,

Axungie porcine uncias duodecim :
Macerentur per noctem, deinde coquan-
tur ad consumptionem humiditatis, &
expressis liquentur

Resinæ uncia una semis;

Ceræ drachmæ sex:

Addatur

Pulveris Aristolochiæ rotundæ uncia
una semis:

Misceantur.

*Pro pellendis, sanandis Scrophulis, Ul-
ceribus, Tineis, Scabie, quoque, commen-
dabile.*

UNGUENTUM NIHILI Colonienſium.

℞. Tutie preparatæ,
Nihili ubi ana unciam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorū,
Matris Perlarum præparatæ ana un-
ciam semis,

Pinguedinis porcine uncias duode-
cim:

Misceantur.

Ophthalmiæ serosæ obsistit.

UNGUENTUM NUTRITUM.

Videatur Unguentum de Lithargyrio.

UNGUENTUM OCULARE Pringle.

℞. Unguenti albi drachmas quinque,
Sacchari Saturni scrupulum unum,
Balsami Commendatoris scrupulos
duos:

Misceantur probe.

Laudatur multum ad Palpebras excoriatas.

UNGUENTUM OCULARE Sloane.

℞. Tutie preparatæ unciam unam,

Lapidis Hamatitæ præparati scrupu-
los duos,

Pulveris Aloës grana duodecim,

Margaritarum præparatarum grana
quatuor,

Axungie Viperarum quantum satis
ad consistentiam Unguenti:

Probe misceantur.

*In Ophthalmia hujus Medicamenti quan-
tum fert penicillum pictorium laboranti Ocu-
lo affricatur, hac lege, ut clausis illico Pal-
pebris aliquamdiu retineatur. Adhibetur ma-
ne & vespera.*

UNGUENTUM OPHTHALMICUM

Saintyves.

℞. Butyri costii uncias tres,

Ceræ unciam semis:

Liquatis commisceantur

Tutie preparatæ drachma una,

Mercurii præcipitati rubri drachmæ
duæ semis,

Camphoræ, paululo Olei Ovorum
dissolutæ drachma semis:

Misceantur penitissime.

*Medicamentum egregie sanans Lippitudi-
nem & corneæ Ulcusculæ.*

UNGUENTUM OPODELDOCH

est

Balsamum Saponaceum.

UNGUENTUM PARALYTICUM

Plenck.

℞. Saponis officinalis uncias sex:

Subigantur cum

Olei destillati Baccarum Juniperi un-
cia una,

Pulveris Seminis Erucae drachmis sex:

Misceantur.

Vires titulus indicat.

UNGUENTUM PECTORALE

Augustanorum.

℞. Olei Amygdalarum dulcium uncias
quatuor,

Chamomillæ,

Violarum ana uncias tres,

Bu-

UNGUENTUM.

Butyri uncias sex,
Axungiarum Gallinæ,
Anatis ana uncias duas,

Ceræ albæ uncias tres:

Leni calore colliquatis addantur

Pulverum Ireos Florentinæ drachmæ
duæ,

Croci drachma semis:

Misceantur.

Ad Asthma & Tussim infantum adhibetur.

UNGUENTUM CONTRA PEDICU-
LOS *Plenck,*

℞. Unguenti Neapolitani uncias octo-
decim,

Pulverum Seminum Sabadilli,
Staphis agriæ ana
uncias duas,

Radiciſ Hellebori albi un-
ciam unam,

Oleorum Lauri uncias novem,
Spicæ unciam unam:

Misceantur.

*Exiguſ modo portionibus locis, quibus Pe-
diculi insident, inungitur.*

UNGUENTUM AD PERNIONES
Plenck.

℞. Axungiæ porcinae,
Sevi Cervini,

Olei Laurini,

Ceræ ana uncias duas:

Colliquatis leni igne & refrigeratis ad-
datur

Camphoræ uncia semis, dissoluta in
Spiritus Vini rectificati uncia una:

Misceantur.

Vires titulus docet.

UNGNENTUM POMATUM
Danorum.

℞. Axungia Porcinæ, aqua Rosarum sæ-
pius lotæ uncias duodecim:

Adjiciantur sensim sub perpetua agita-
tione

Aquarum Rosarum uncia tres,
Naphæ,

Spiritus Rosarum ana unciam semis,

UNGUENTUM. 175

Oleorum Lavendulæ semidrachma,
Ligni Rhodii,

de Cedro ana guttæ sedecim:

Exactissime mixta asserventur.

A Pomis, quæ superioribus seculis Un-
guentis fragrantibus adjici moris erat,
id genus Unguenta, re quidem subla-
ta, nomen tamen hodieque servant.
Quæ ex Floribus recentibus parantur,
optime ex Gallia Meridionali aut Ita-
lia accersuntur.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS
Amstelodamensium.

℞. Olei Solani uncias sedecim,
Ceræ uncias quinque:

Liquatis leni igne addantur

Cerussæ uncia duæ,

Pompholygos præparatæ,

Plumbi uſti,

Pulveris Olibani ana uncia una:

Misceantur.

*Commendatur ad Ulcera sananda, nec
non ad discutiendam Ophthalmiam.*

UNGUENTUM POPULEUM *Præpositi.*

℞. Oculorum Populi recentium uncias
quatuor & viginti,

Pinguedinis porcinae uncias quatuor
& sexaginta:

Asserventur in illud tempus, quod se-
quentia Vegetabilia subministrare valet
recentia, nimirum

Summitatum Rubi,

Herbarum Papaveris fativi,

Hyoscyami,

Bardanae cum radicibus,

Solani,

Lactucæ virosæ,

Violaria ana uncia tres,

Sempervivi uncia quatuor,

Sedi acri uncia tres:

Incisa addantur Pinguedini, quæ Gem-
mas Populi habent:

Coquantur ad consumptionem humidita-
tis, exprimantur & colentur.

*Paregorico & Refrigeranti scopo Hemor-
rhoidibus, Ambustis, Mammis induratis in-
ungitur.*

UNGUENTUM PURPUREUM *Wurzii.*

℞. Radicum Scrophulariæ recentium,
Herbarum Plantaginis recentis,
Chelidonii majoris recentis ana drachmas tres:

Incisa macerentur per aliquot dies cum
Aceti unciis quinque:

Colatura addantur

Capitis mortui Vitrioli edulcorati un-
ciæ duæ,

Viridis Æris drachmæ decem,

Mellis unciæ octo:

Coquantur ad consistentiam Mellis.

*Cum Unguento Ægyptiaco quoad vires
convenit.*

UNGUENTUM ROSATUM

Wurtembergensium.

UNGUENTUM SIMPLEX *Londinensium.*

℞. Axungia Porcinæ uncias duodecim;
Lavetur Aqua Rosarum, donec ejus odo-
re fuerit imbuta; tunc addantur

Olei Ligni Rhodii guttæ sedecim:

Misceantur,

*Unguento Pomato substituitur, Demulcen-
di quoque virtute gaudet.*

UNGUENTUM RUBRUM POTABILE

Danorum,

℞. Radicis Alkannæ uncias duodecim,
Vini rubri uncias decem:

Macerentur per aliquot dies; tunc adji-
ciantur

Butyri unciæ sexaginta:

Coquantur ad consumptionem humidi-
tatis, exprimantur & colentur.

*Relaxandi & Emolliendi scopo olim usur-
pabatur.*

UNGUENTUM SAMBUCINUM

Præpositi.

℞. Sevi ovilli uncias sex & triginta:

Olei Olivarum uncias duodecim:

Liquefactis committantur

Florum Sambuci unciæ octo & qua-
draginta:

Relinquantur per aliquot dies; tunc le-
nissimo igne denno liquata colentur.

Laudatur maxime ad Ambusta.

UNGUENTUM SATURNINUM

Edinburgensium.

℞. Olei Olivarum uncias duodecim,
Cerae albæ uncias tres:

Liquatis, partitis vicibus, sub perpetua
agitatione adjiciatur

Sacchari Saturni Semuncia:

Probe misceantur.

*Cum Unguento Nutrito respectu virium
convenit.*

UNGUENTUM AD SCABIEM

Parisiensium.

UNGUENTUM CITRINUM *Suecorum.*

℞. Mercuri vivi uncias tres:

Dissolvantur

Spiritus Nitri unciis quatuor:

Solutio affundatur sensim

Axungia Porcinæ calore liquata un-
ciis duabus & triginta:

Agitentur pistillo ligneo, probe mixta
effundantur super chartam; refrigerata
dissecantur in taleolas.

*Articulis Pedum & Manuum ad drach-
marum duarum pondus affricatur; laudatur
quoque ad estroscantias Herpeticas.*

UNGUENTUM SOLANI *Bergamensium.*

℞. Succo ex foliis & baccis Solani ex-
pressi uncias sex & triginta,

Olei Olivarum uncias quatuor &
quingenta,

Cerussæ uncias octodecim,

Lithargyrii uncias sex & triginta:

Coquantur ad Dissolutionem Calcium me-
tallicarum;

Addantur deinde

Cerae albæ unciæ sex,

Pulveris Olibani: unciæ tres:

Misceantur.

*Adbibetur ad Ambusta, nec non ad con-
solidanda Ulcera.*

UNGUENTUM SPLENITICUM

Wurtembergensium.

℞. Radicum Filicis,
 Ari ana uncias duas,
 Herbarum Afari,
 Hyoscyami,
 Cicutæ,
 Nasturtii Aquatici ana un-
 ciam unam semis,
 Nicotianæ drachmas tres,
 Florum Camomillæ,
 Hyperici,
 Genistæ,
 Sambuci ana unciam unam:
 Contusa macerentur per aliquot dies cum
 Axungie Porcinæ unciis quatuor &
 viginti:

Coquantur deinde ad consumptionem hu-
 miditatis:

In expressis liquetur
 Cere uncia una semis:

Addantur
 Pulverum Gummi Ammoniaci,
 Galbani ana dra-
 chmæ sex:

Refrigeratis adjiciantur
 Oleorum destillatorum Cumini,
 Anethi,
 Cere ana dra-
 chma una:

Probe misceantur.
*Ad prohibendam durtiem Hypochondrio-
 rum, & pellendos Flatu adhibetur.*

UNGUENTUM STOMACHICUM

Viennensium.

℞. Oleorum Mastichis,
 Menthæ,
 Cydoniorum,
 Cere citrinæ ana uncias: octo:
 Liquatis & semirefrigeratis addantur
 Pulverum Ligni Aloës,
 Calami Aromatici,
 Caryophyllum,
 Macis ana uncia una,
 Balsami Peruviani unciæ semis,
 Oleorum destillatorum Caryophyllo-
 rum scrupuli duo,

Oleorum destillatorum Anisi scrupu-
 lus unus:

Misceantur.
*Ad roborandum Ventriculum, sistendum
 Vomitu & Fluxu Alvi, regioni Epiga-
 stricæ & Umbilico inungitur.*

UNGUENTUM DE STYRACE *Lemery.*

℞. Olei Nucum uncias duodecim,
 Colophonii uncias quindecim,
 Gummi Elemi,
 Cere ana uncias octo:
 Liquetur leni calore, liquatis & ab igne
 remotis addantur
 Storacis liquidæ unciæ decem:
 Colentur per linteum; elapsis aliquot
 diebus cultri ope inde separentur sordes,
 quæ ad fundum seceserit.
*Scopo Antiseptico ad Ulcera putrida &
 Gangrænam adhibetur.*

UNGUENTUM DE UVIS

est

Unguentum ad Labia.

UNGUENTUM CONTRA VERMES

Wurtembergensium

℞. Radicum Filicis,
 Bryoniæ,
 Alii ana unciam unam se-
 mis,
 Herbarum Abrotani,
 Absynthii,
 Tanaceti ana drachmas
 duas,
 Butyri uncias sedecim:
 Incisa coquantur ad consumptionem hu-
 miditatis; in expressis liquetur
 Cere uncia una semis:
 Refrigeratis adjiciantur
 Pulverum Aloës uncia una,
 Trochiscorum Alhandal unciæ semis,
 Fellis Tauri inspissati unciæ duæ:
 Misceantur.
*Mitius agit, quam Unguentum de Ar-
 thanita, cujus in modum adhibetur.*

UNGUENTUM VIRIDE POTABILE
Wurtembergensium.

℞. Herbarum recentium Abrotani,
Artemisiæ,
Bellidis,
Betonicæ,
Fœniculi,
Hysopi,
Menthæ
Matrisylvæ,
Millefolii,
Majoranæ,
Plantaginis,
Veronicæ,
Verbenæ,
Salviæ,
Ruthæ ana un-
ciam unam,
Baccarum Juniperi viridium uncias
tres:

Incisa & contusa coquantur cum
Butyri unciis octo & quadraginta ad
consumtionem humiditatis:

Colentur & asserventur.

*Laudabatur ex Alto lapsis & Parturienti-
bus ad aliquot cochlearia; sed inconcinna com-
positio merito evilit.*

ZINZIBER COCTUM *Argentoratensium.*

℞. Cinnamomi electi drachmas duas,
Nucis Moschatæ drachmam unam:
Caryophyllorum scupulos duos:
Macis scrupulum unum:

Crasse contusis addantur

Pulveris Zinziberis drachmæ sex:


Mixtæ cum

Sacchari consistentiam tabulandi co-
cti unciis sedecim:

Formentur inde Morfili.

*Cum successu ad morbos Capitis & Ven-
triculi a Muco oriundos adhibetur.*

FINIS TOMUS SECUNDUS.





PHARMACOPŒA
GENERALIS


EDITA

A

D. JACOBO REINBOLDO
SPIELMANN.

EDITIO PRIMA VENETA.

TOMUS TERTIUS.



V E N E T I I S,

Sumptibus JOANNIS ANTONII PEZZANA.

M D C C L X X V I.

SUPERIORUM PERMISSU; AC PRIVILEGIO.

I C O N E S

P L A N T A R U M

E T A N I M A L I U M.

I C O N E S

P L A N T A R U M

ET ANIMALIUM.

ABROTANUM MAS.

ABROTANUM FOEM.




AB.

ABSINTHIUM.




ABSINTHIUM PONTIC.



ABSINTHIUM MARIN.



ACACIA I.



ACACIA ALTERA.



ACANTHUS.



ACE-

ACETOSA.

ACETOSELLA, vel OXALIS MIN.




ACONITUM, vel NAPELLUS.



ACO-

ACORUS ADULTER. vel PSEUDACORUS.

AGARICUS.



ADHATODA.




ADIANTUM, vel TRICHOM.

ADIANTUM NIGRUM.



AGNUS CASTUS, vel VITEX.



AGRIMONIA, vel EUPATORIUM.

AGRIMONIA, vel EUPATOR. VULG.



ALCEA.



ALKANNA, vel ANCHUSA I.

ALKANNA, vel ANCHUSA II.




ALKANNA, vel ANCHUSA III.



ALOE3.

ALOES.

ALOES CUM FLORIBUS.



ALLIARIA.





ALLIUM ANGUINUM.




ARNICA MONTANA, five ALYSMA.

ALKEKENGI, vel SOLANUM
HALICACABUM.



ALCHYMILLA, vel STELLARIA.



ALTHÆA:

ALTHÆA five ABUTIL. AVICENNÆ:



ALNUS.






AMYGDALÆ.



ANAGALLIS MAS.



ANAGALLIS FOEM.



ANETHUM.



AN-

ANGELICA SATIVA.



ANGELICA SYLVESTRIS.



ANISUM.



ANSERINA, vel POTENTILLA.

ANTHORA.



APARINE.



APIUM.

APIUM HORTENSE.

APIUM PALUSTRE.



AQUILEGIA.



ARI-

ARISTOLOCHIA LONGA.



ARISTOLOCHIA ROTUNDA.



ARANEA.






ARMORACIA, vel RAPHANUS RUSTICANUS, five VULGARIS.



ARUNDO DOMESTICA.




ARUNDO PALUSTRIS.




ARTEMISIA.



ARUM



ASARUM.



ASPARAGUS.



A SPARAGUS SYLVESTRIS.



ASTRANTIA.



ATRA.

ATRACYLIS.




AVENA.



AVELLANA NUX.



ATRIPLEX MARINA.



ATRIPLEX DOMESTICA.



AURANTIA MALA.




ATRI-

ATRIPLEX SYLVESTRIS I.



ATRIPLEX SYLVESTRIS II.




ATRIPLEX SYLVESTRIS III.






BALLOTTA.



BALSAMITA.



AURICULA JUDÆ vel FUNGI SAMBUCCI, sive AGARICUS.



BARBA CAPRÆ, vel TRAGOPOG.

31
BARBA CAPRÆ, vel TRAGOPOG.
ALTERUM.



AURICULA MURIS, vel PILOSELLA.



BA-

BASILICUM, vel OCYUMUM MAJOR. BASILICUM, vel OCYUMUM MEDIUM.



BASILICUM, vel OCYUMUM GARYOPHYLATUM.





BARDANA.



BELLIS MEDIA.



BELLIS MINOR.



BELLIDIS MINORIS TRES SPECIES.





BERBERIS, seu CRESPINUS.



BETA ALBA.



BETA NIGRA.



BETA RUBRA.



BET-




BOMBAX, seu GNAPHALIUM.

BOMBAX, five XYLON, vel GOSSIPIUM.



BONUS HENRICUS.





BRUNELLA, vel CONSOLIDIDA MINOR.



BRASSICA LÆVIS.




BRASSICA CRISPA.



BRASSICA CAPITATA.



BRYONIA, vel VITIS ALBA.



41
BUGLOSSUM VULGARE.



BUFO.





BUXUS.




CALAMUS, vel ACORUS.

CALAMUS AROM. vel ODORATUS.



CAPILLUS VENERIS, vel ADIANTHUM.



CALAMINTHA.

CALCITRAPPА MAGN. vel CENTAUR.



CALENDULA, vel CALTHA.




CAN-


CANNABIS.



CAPPARIS.



CANTHARIDES.



CAR-

CARDAMINE.

CARDIACA.



CARDAMOMI SPECIES..



CAR-

CARDUUS BENEDICTUS.



CARDUUS MARIÆ, ⁴⁷vel LACTÆUS.



CARDUUS TOMENTOSUS, vel ACULEATUS.



CAR-


48
CARLINA, vel CHAMÆL. ALBUS.



CARTHAMUS, vel CROC. FLOR.



CARVI, vel CARUM.




CA-

CARYOPHYLLATA.

CARYOPHYLLATA MONTANA. ⁴⁹



CARYOPHYLLI AROMATICI.



CASTANEÆ.



CASTANEÆ EQUINÆ.




CASSIA FISTULA, vel SOLUTIVA.




CATAPUTIA MAJ. vel PALMA CHR.

CATAPUTIA MIN. vel LATHYRIS.



CASTOREUM.




CENTUMNODIA, vel POLYG. MIN.

CENTUMNODIA, vel POLYG. MAS.




CENTUMNODIA, vel POLYGONUM FOEMINA.




CERASA, vel CERATIA.

33
CERASUS, vel CERASA RACEMOSA.



CENTAURIUM MINUS.




CE:


CEREFOLIUM.




CETERACH, feu ASPLENIUM,
vel SCOLOPENDRIUM.




CEPA ASCALONICA..





CEPA CAPITATA.



CHAMÆDRYS, feu TRISSAGO.




CHAMÆDRYS, feu TRISSAGO ALT.




CERVUS.



CHA




CHAMOMILLA ROMANA, seu ANTHEMIS.




58
CHEIRI, seu LEUCOJUM ALBUM,
& PURPUREUM.

CHEIRI, seu LEUCOJUM AUREUM



CICERA, vel CICER DOMESTICUM.



CHE-

CHELIDONIUM MAJUS.

CHELIDONIUM MINUS.



CICUTA.



CICHORIUM DOMESTICUM.



CICHORIUM SYLVESTRE.



CITRULLUS, vel ANGURIA.




CITREUM MALUM, vel MED. MALA.



81
CLEMATIS, vel FLAMMULA.



COCHLEA:



CO-

COCHLEARIA.



COCCOIGNID. vel CHAMÆDAPH.



COLOCYNTHIS.



COLCHICUM.

COLCHICUM ALT. ORIENTALE.



CORIANDRUM.



CO-

CONIZA MAJOR.



CONIZA MEDIA.



CONIZA MINOR.



CON-

CONSOLIDA REGALIS.

CONSOL. SARAC. vel VIRGA AUREA.



CORNA, vel CORNUS.



CORALLIA ALBA.



CORALLIA RUBRA.



CRASSULA, vel FABARIA.




CORONOPUS.

CORONOPUS five SERPENTINA.



CUPRESSUS:






CRITHMUM II



CRITH.


CRITHMUM II.



CRITHMUM III.



CRITHMUM IV.



CRU-

CRUCIATA.



CYPERUS LONGUS.



CUCUMIS, vel CUCUMERES.




CYANUS MAJOR.



CYANUS MINOR.



CUCUMIS, vel CUCUMERES LONGI.




CUMINUM SYLVESTRE I.



CUMINUM SYLVESTRE II.



CUMINUM SATIVUM.





CUSCUTA.




CYCLAMEN.



CYDONIA, vel COTONEA MALUS.



CYMBALARIA.



CYNOGLOSSUM VULGARE.



75
CYNOGLOSSUM VULG. FLORID.



CYNOGLOSSUM DIOSCORIDIS.




DAUCUS I.



DAUCUS II.




DACTYLI CUM PALMA ELATA.





DENTELLARIA, vel PLUMBAGO.




DICTAMNUS ALBUS.



DICTAMNUS CRETICUS.



DIGITALIS.



DIPSACUS, vel LABRUM VENERIS.

DIPSACUS, vel LABR. VENER. ALT. ⁷⁹



ELATINE.



DRA-

DRACUNCULUS MAJOR.



DRACUNCULUS MINOR.



DRACUNCULUS AQUATICUS.





ENDIVIA.




ERUCA SATIVA.



ERUCA SYLVESTRIS.





EQUISETUM I.



EQUI-

EQUISETUM II.

EQUISETUM III.



EQUISETUM IV.



L 2


ERU-

ERICA.

ERICA II.



ERICA BACCIFERA.



ERYN.

ERYNGIUM MONTANUM.

ERYNGIUM MARINUM.




ERYNGIUM PLANUM.



ERY-

ERYSIMUM, vel IRIO.



ERYSIMUM, vel IRIO ALTERA.



ERINACEUS, vel ECHINUS TERRESTRIS.




ENULA, vel HELENIUM.


ESULA, vel PITYUSA



ERINACEUS vel ECHINUS MARINUS.



EUPHRASIA.



FAGOPYRUM, vel FRUMENT. SARAC.



FAGUS.





FARFARA, vel TUSSILAGO, sive FARFUGIUM.




FILIPENDULA.



FABA.



FABA SYLVESTRIS.



FILIX.



FOENICULUM.



FRAXINUS.



M 2

FOE

FOENUGRÆCUM.




FRANGULA.



FRAGARIA.




FUMARIA.



FUMARIA ALTERA.



FUMARIA CORYDALIS.






GALEOPSIS.




GALLIUM.



GENISTA.



GALLÆ.



GEN-

GRAMEN.



GRAMEN MANNAE.



GRAMEN ALTERUM.




GRA-

GRAMEN PARNASI.



GRAMEN ACULEATUM.



GRANATUM, vel MALA PUNICA.




GERANIUM I.



GERANIUM II.



GERANIUM III.



GERANIUM IV.



GERANIUM V.



GERANIUM VI.




GENTIANA MAJOR.




GENTIANA MINOR.



GENTIANA MINIMA.




GRATIOLA.



HELIANTHEMUM.



HIRUNDO.



HEDERA ARBOREA.



HEDERA TERRESTRIS.



HELIOTROPIMUM, vel CALTHA.




HELLEBORUM ALBUM.



HELLEBORUM NIGER.




HELLEBORUM ALTERUM.



HERMODACTYLUS VERUS.

PSEUDO HERMODACTYLUS.



HEPATICA FONTANA, vel LICHEN:



HEPATICA ALBA, vel PARNASIA.


HEPATICA NOBILIS.



HEPATICA STELLATA, vel ASPERULA.



HERNIARIA.



MORMINUM, vel SCLAREA.



HIPPOPOTAMUS.



HYO-

HYOSCYAMUS.

HORDEUM.



HIRUNDINARIA, vel VINCETOXICUM: .



HYPERICUM.




HYSSOPUS.



JACOBEEA, vel SENECIO.




JACEA, five FLOS TRINITATIS.



JACEA ALTERA.



JUGLANS NUX.



JASMINUM.



IMPERATORIA.



JUJUBÆ, vel ZIZYPHA.



IRIS SYLVESTRIS.

IRIS SYLVESTRIS ALTERA.



IRIS DOMESTICA.



JUNIPERUS.



LAVENDULA.



LAPATHUM, vel OXILAPATHUM.




LACTUCA CRISPA.



LACTUCA FLORESCENS.



LACTUCA SYLVESTRIS.



LENS.



LENS PALUSTRIS.



LENS PALUSTRIS ALTERA.



LEPIDIUM, vel IBERIS.




LEPIDIUM PIPERITIS.



LINARIA, vel OXYRIS.



LAURUS.



LEVISTICUM, vel LIGUSTICUM.



LACERTA.



LILLIUM ALBUM.

LILLIUM CONVALLIUM.



LEPUS.



LINUM.




LINUM CATHARTICUM.



LIGUSTRUM.



LUMINARIA MINOR.



LUPINUS.



LUPULUS.




LYSIMACHIA ?



LYSIMACHIA ALTERA ?



MARRUBIUM.



MAJORANA, five AMARACUS.

MAJORANA TENUI FOLIA.



MASTYX, vel LENTISCUS.




MANDRAGORA MAS.



MANDRAGORA FOEM.



MALVA.



MAL-

MALVA MAJOR.

MALVA MAJOR ALTERA.




MALVA QUARTA.



MARUM:

MATRICARIA, vel PARTHENIUM.



MELISSOPHYLUM, vel MELISSA HORTENSIS;





MELISSA TURCICA, vel MOLDAVICA.




MELILOTUS.



MELO, vel MELOPEPONES.



MATERPERLARUM.



MENTHA I.



MENTHA ALTERA.



MENTHA GRÆCA:



MEN.

MENTHASTRUM.



MEUM.



MEZARÆUM, vel THYMELÆA.




MERCURIALIS MAS.

MERCURIALIS FOEM.



MILLEPEDES.



MESPILUM.



MESPILUM ALTER.



MORUS.



MILLEFOLIUM MAJUS.



MILLEFOLIUM MINUS. 311



MOSCATA NUX.



MILLIUM SOLIS, vel LITHOSPERM. MAJUS.

MILLIUM SOLIS, vel LITHOSPERM. MINUS.




MUS MONTANUS.




MUS.

MUSCUS ARBOREUS.

MUSCUS TERRESTRIS.




MUSCUS TERRESTRIS ALTER.




MYRTUS TARENTINIS.


MYRTUS EXOTICA.



MYRTUS ROMANUS.




MYRTILLI.



MOMORDICA.



NICOTIANA.



NASTRUTIUM:

NASTRUTIUM, vel SYSIMBR. HORT.



NASTRUTIUM, vel SYSIMBRIUM SYLVESTRE:




137
NASTRUTIUM, vel SYSIMBRIUM
AQUATICUM.



NASTRUTIUM, vel SYSIMBRIUM
AQUATIC. ALTERUM.



NUMMULARIA:




NAPUS.



NEPETA, vel HERBA GATTARIA.




NYMPHÆA ALBA, & LUTEA.




NYM-

NYMPHÆA PARVA.

NIGELLA, vel MELANTHIUM SAT.





ONORIS.



OLEA, vel OLIVA SATIVA.

OLEA, vel OLIVA SYLVESTRIS.



OLEA, vel OLIVA BOEMICA, sive ELEAGNOS.



ORIGANUM HERACLEOTICUM:


ORIGANUM VULGARE.



ORIGANUM ONITIS:




OROBUS.



OROBUS CRETICUS.



OPHIOGLOSSUM.




OXIACANTHA, vel ACUTA SPINA.



ORYZA.



POMA, vel MALA.



PRU-

PRUNUS.

PRUNUS SYLVESTRE.



PEUCEDANUM.



PÆO-

PÆONIA MAS.

PÆONIA FOEM.



PERSICA MALA.



PAPAVER ERRATICUM.



PAPAVER SATIVUM.



PAPAVER CORNICULATUM.



PASTINACA DOMESTICA.




POPULUS NIGRA.




PERSICARIA, vel HYDROPIPER.

PERSICARIA ALTERA.



PENTAPHYLLUM, vel QUINQUEFOLIUM.





PENTAPHYLLUM ALBUM.



PHU MINIMUM.



PHU PARVUM.



PHU MAGNUM.




PIMPINELLA, five SANGUISORBA MAJOR.

PIMPINELLA, five SANGUISORBA MINOR.




PIMPINELLA SAXIFRAGIA.



PERFOLIATA.



PISTACIÆ NUCES.




PETROSELINUM, vel LEVISTICUM VULGARE.





PETROSELINUM MACEDONICUM.



POLIUM.



POLIUM ALTERUM.



FORCUS.



POLYGALA.




PULEGIUM.



PICEA.



PINUS MARITIMA.



PINUS MARITIMA ALTERA:



PINUS DOMESTICA.



PINUS SYLVESTRIS CEMBRO:



PINUS SYLVESTRIS MUGO. 157



PINUS SYLVESTRIS MONTANA.




PORTULACA DOMESTICA.

PORTULACA SYLVESTRIS.



PLANTAGO LONGA.



PLAN

PLANTAGO MAJOR.



PLANTAGO MEDIA. 159



PLANTAGO AQUATICA.



PRIMULA VERIS.



PRIMULA VERIS ALTERA.



PORRUM SECTILE, & CAPITATUM.




PSYLLIUM



PSYLLIUM ALTERUM.



PORRUM COMMUNE.



PIPER.



PIPER ÆTHIOPICUM.



PIPER INDIGUM.



PTMAR-


PTMARMICA:



PTMARMICA ALTERA.



PULSATILLA.




X 2

PUL.

PULMONARIA.




PULMONARIA ALTERA.




PYRUS.



PYRETHRUM VERUM.



PYRETHRUM ALTERUM.



QUERCUS.



KU-

RUBUS.

RUBUS IDÆUS.




RAPUNCULUS.




RAPUM ROTUNDUM.



167
RAPUM LONGUM.



RAPUM SYLVESTRE.



RA-

RANUNCULUS I.



RANUNCULUS II.




RANUNCULUS III.




RANUNCULUS IV.

RANUNCULUS V.




RANUNCULUS VI.




RAPHANUS I.




RAPHANUS II.



RHABARBARUM.



RHA-



RHODIA RADIX.




RIBES VULGARIS.

ROSELLA, five ROS SOLIS.



ROSA.



ROS.

ROSMARINUS, vel LIBANOTIS!


ROSMARINUS CORONARIUM. ¹⁷³




ROSMARINUS SYLVESTRE.



RUBIA SATIVA.



RUBIA SYLVESTRIS.




RANÆ.




RUTA.


RUTA SYLVESTRIS



RUTA SYLVESTRIS ARMOLA.




SABINA BACCIFERA.




SABINA SINE BACCIS.




RUSCUS.



SALVIA MAJOR.



177
SALVIA MIN. five SPHACELUS.



SALICARIA.



SAMBUCUS.

SAMBUCUS MONTANA.




SAMBUCUS AQUATICA.




SATUREJA DIOSCORIDIS.

SATUREJA ALTERA.



SAPONARIA.




SATYRIUM L.



SATYRIUM ERYTRONIUM.




SALIX.




SCABIOSA MAJOR.




SCABIOSA MINOR.





SARZA, vel ZARZA PARILLA.






SCAMMONEA.






SAXIFRAGIA MAGNA.




SCILLA.

COLCENDRIUM, vel PHYLLITIS.



SCINCUS.



SCOR.

SCORDIUM.



135
SCORZONERA HISPANICA.



SCORPIUS.



SCROPHULARIA.



SECALE.



SEBESTEIA, vel PRUNUS ec.




SENECIO.



SENNA.



SEDUM MINUS.




SEMPERVIVUM MAJUS.



SEMPERVIVUM MINUS.



SERPENTARIA VIRGINIANA.




SEMPERVIVUM ARBORESCENS.



189
SEMPERVIVUM ARBORESC. ALT.




SEMPERVIVUM MINIMUM.





SERPYPHILLUM.




SESELLI ÆTHIOPICUM.




191
SESELLI ÆTHIOPICUM II.



SERPILLIUM ALTERUM.





SIDERITIS.



SINAPI I.



SINAPI II.



SINAPI III.



SOLANUM HORTENSE:



SOLANUM SOMNIFERUM.




SOLANUM SOMNIFERUM. ALTERUM.




SONCHUS ASPERA.

SONCHUS LÆVIS.



SONCHUS LÆVIS ALTERA.




Bb 2

SOR-

SORBUS DOMESTICA:



SORBUS TORMINALIS:




SORBUS SYLVESTRIS:





SILIQUÆ DULCIS.



STOECHAS.

STRAM. five NUX METEL. vel VOM.



SUBER T.



SUC-

SUCCISA, five MORSUS DIABOLI.


199
SYMPHITUM MAJUS, five CONSOLIDA MAJOR.



SUBER II.



SEPIA.



SESAMUM.



THLASPI L.




THLAS-

THLASPI II.

THLASPI III.



THLASPI IV.




Tom. III.

Cc

TER-

TERTIANARIA.

THALICTRUM FLAVUM.



TILIA MAS.





TILIA FOEMINA.



TAMARISCUS, vel MYRICA.



TARAXACUM, vel DENS LEONIS.




TRIFOLIUM PRATENSE.



TRI-

TRIFOLIUM ASPHALTITE:



TRIFOLIUM ACETOSUM. ²⁰⁵




TRIFOLIUM PRATENSE ALTERUM.



TRIBULI AQUATICI.

TUNICA, vel CARIOPHYLLIS.




TRAGACANTHY.



VERONICA MAS.



207
VERONICA FOEMINA.



URSUS, & VULPES.



VER-


VERBASCUM I.



VERBASCUM II.




VERBASCUM III. vel SYLVESTRE.



VERBASCUM IV.



VERBASCUM LYCHNITE.



VERBASCUM ALIUD.



210
VICTORIALIS LONGA, vel ALLIUM
LACUS FOLIA.



VICTORIALIS ROTUNDA, vel
GLADIOLUS.



.VIPERA:



VINCA per VINCA, vel CLEMATIS I.



VINCA per VINCA, vel CLEMATIS II.



VINCA per VINCA, vel CLEMATIS III.




VIOLA.



VITIS VINIFERA.



VISCUM.



URTICA I.




URTICA II.



URTICA III.




ULMUS.



VULVARIA.



UMBELISCUS MARINUS.



UVULARIA, vel LAUR, ALEXAND.

VERBENA, vel VERBENACA.



ZIBETHUM, vel ANIMAL ZIBETTI.



XAN-

XANTHIUM, five LAPPA.



ZINZIBER, vel ZINGIBER.



F I N I S.



