

鬱文

瑞

〔二〕

醫編目錄

卷一

藏府說 一

心胞絡三焦說 四

五藏配五行八卦說 五四

水火說 五

命門說 八

五藏生剋說 十四

五邪說 十五

十二經配三陰三陽說 十五

經絡考 見針灸吹雲集

六氣說 十六

心胞絡三焦說 四

運氣說 十九

虛實寒熱說 十九

五藏配五行八卦說 五四

反治論 二十二

標本說 二十三

表裏論 二十五

陰陽論 二十

夏月伏陰辨 二十九

氣三十

血三十五

發熱五十三

潮熱六十

惡寒 戰慄

六十一 寒熱六十四

諸中總論 六十七

中風 六十七

中寒 八十一

中暑 八十二

中濕 八十三

中氣 八十四

中食 八十四

中惡 鬼擊尸瘡

八十五

卷二

傷風寒 鼻淵

破傷風 二

傷暑 三

傷濕八

傷燥十

春溫溫瘡

風溫

溫毒

濕溫十一

瘟疫十四

瘧似瘧非瘧

三十

咳嗽三十九

喘哮四十四

短氣少氣四十八

噯氣四十九

呃逆四十九

久嘯五十

傷飲食五十二

不能食五十七

勞倦傷五十八

虛損癆瘵六十五

火七十一

欬七十四

痰飲七十七

痞滿胸痺

痞塊八十八

積聚八十九

蟲九十五

中毒九十八

卷三

腫脹一

黃疸九

消渴尋常渴十三

痿注夏

十八

肺痿肺癰二十二

痺麻木二十五

痙二十九

汗二十二

嘔吐噦惡心三十六

反胃噎膈四十

霍亂四十一

泄瀉四十七

腸鳴五十一

痢似痢非痢

刮瘡

痢後風五十二

大便不通六十一

大小便不通六十一

小便不通轉胞六十三

淋似淋非淋胞胞瘡

六十六

小便數六十九

遺尿小便不禁

七十 小便黃赤

七十一 交腸

七十一

關格

七十二

頭痛

頭風

頭重

雷頭

痛

頭搖

眩暈

八十

項強痛

八十二

胸痛

八十二

心痛 心胞絡痛

胃脘痛

八十三 腹痛

少腹痛

八十六

腰痛

八十九

背脊強痛

肩胛痛

九十一

臂痛

腋腫

九十三

身體痛

拘急

九十四

脇肋痛

九十二

臂痛

腋腫

九十三

身體痛

拘急

九十四

面癰腮 細車蹊

九十五

耳

九十七

## 卷四

鼻一

口四

唇六

齒 取牙

七

舌十

咽喉 諧物哽喉

十三

瘡

二十一

皮毛 鬚髮 肌肉筋骨

四肢

二陰

二十三

厥逆

二十九

攣

三十二

抽搐 即瘻癰

三十三

顫振

三十四

脚氣

酒風脚

腿腕瘡

腳眼注孔

三十五

赤白濁

三十八

遺精

四十

陰痿

四十三

陰縮陰縱

四十四

疝木腎

小腸氣

膀胱氣

偏墜

莖囊痺

脫肛

五十

穀道痙攣痛

五十一

怒

五十一

太息五十二

喜笑不休五十二

悲五十二

驚五十三

悸即怔忡五十四

恐五十五

健忘五十六

煩躁五十

嘈雜五十八

不得臥五十九

多臥五十九

狂癲澀六十

## 卷五

### 四診

一望色

察面

察目四

察耳五

察鼻五

察唇齒六

察舌七

察身九

察手足十

一聞聲十一

一問証

問寒熱十二

問頭身十三

問飲食十六

問二便十七

問汗液及血十八

問晝夜輕重十九

問証見先後十九

問七情十九

一切脈

脈之部位二十

脈之形體二十五

脈之行動二十八

脈之歇止三十一

脈配四時五藏三十二

脈無胃氣則死三十五

各脈主病三十七

人迎氣口四十六

男女脈同異四十六

胎孕脈四十七

脈有順逆四十八

脈証從舍五十一

南北政辨五十一

奇經切法五十二

附樂只堂診病單五十四

## 卷六

門目

方目

諸方上

補遺

## 卷七

門目

方目

諸方下

方後附錄七方

十劑

服藥法則

煎藥用水歌

南海何夢瑤報之輯

松江李林馥啟賢氏校正

四診

一望色

察面圖



庭	即天	以候首面	闕	即眉	以
候肺	闕上	以候咽喉	下極		
肝其左右	以候膽	面王	即山	以候	
以候脾	方上	隨鼻	根	年壽	樹以候
人中	以候膀胱子宮	面中央	即山	即鼻	
迎香之外	以候大腸	大腸之	隨	頭	

旁頰之以候腎 面王以上兩顴內以候小腸右本內經後人又以天庭候心左頰候肝右頰候肺鼻候脾頰候腎參而察之可也

面有青黃赤白黑以應五藏岐伯曰生干心如以縞素帛裹朱生于肺如以縞裹紅紅淡生于肝如以縞裹紺青含赤色生于肝如以縞裹括萎實黃含生于腎如以縞裹紫黑色按五色但帶赤乃血之本色然色為精神所發見欲藏不欲露故如縞裹若露則為藏氣失守精氣外浮中藏告竭矣此為無病之色若病

而色見則以相生者吉相克者凶  
如脾病泄濁而見赤色為相生見青色為相克也  
而明亮者吉枯槁而晦滯者凶  
即內經所謂赤欲如白裏朱不欲如赭之意而內經所謂赤欲如白裏朱不欲如  
行者病益甚  
雷其色尖銳向上知為上行向下知為下行如雲散者病漸已  
見右為逆左為從男子反此色散未聚病亦未聚  
凡色明顯者為新病濁晦者為久病  
色從面內走面外病亦自內走外左右上下以此推之

青色屬肝主風風主驚主寒主痛 面唇青者寒極也 青而脫色  
脫色謂面無血色神采脫也  
驚恐也 青而黑者多寒痛 青而白者多虛風  
以上皆寒證蓋肝陽不足寒陰內疑脾失其運行之權故多腹中冷  
之疾 痛吐泄 青而赤者為肝火 青赤而晦滯者為鬱火  
已上熱証

赤色屬心主熱 心熱者庭先赤 脾熱者鼻先赤 肺熱者右頰先赤 腎熱者

頤頰先赤 肝熱者左頰先赤 面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表汗不徹故也

傷寒太陽經表熱証 面赤而潮熱譫語者胃實也  
此傷寒陽明府實熱証

嬌嫩游移不定  
不盡面通紅 乃陰証戴陽必下痢清穀或小便清白  
或淡脈沉細或浮數

無力按之欲散雖或煩躁發熱欲坐卧泥水中  
甚也 渴欲飲水或咽喉痛証似實熱

而索水置前却不能飲肌表雖大熱而重按之則不熱或反覺冷且兩足必冷須審

中寒証直又有面赤煩躁偏舌生瘡生刺舌斂縮如荔枝狀或痰涎湧盛喘息小便  
頻數口乾引飲兩唇焦裂喉間如烟火上攻兩足心如烙脈洪數無倫按之有力捫

其身烙手此腎虛火不歸元所致最難辨但病由內傷其來以漸是乃乾柴烈火  
不戢自焚與上所列三証固有不同也 又有久病虛人兩顴至午後帶赤者此則  
陰虛火動之常証雖未至如上証之烈赤內傷也

已上二証  
背虛熱

赤色出于兩顴

狀若朱裝

益觀以骨為主骨屬腎水惡反耗也

大如拇指者病雖愈必死

又熱病無汗顏赤死

益觀以

溫土瘀濁

黃而黯淡者則為寒濕

脾陽不升

黃而枯瘦者胃中有火

脾不運

黃而色淡胃

水無制

則水停

氣虛 黃而青黑者為木旺土

肝陽不升

白而虛寒縱有虛火斷無實熱

脾為寒帶

白而無神者為汗泄脫血

則水停

白而青者氣寒血凝

白而淖澤肺胃之充也

白而肥者有痰

白而瘦爪甲鮮赤氣虛

有火也

黑色屬腎主寒主痛 青黑為陰寒 焦黑齒槁為腎熱 黑而枯夭見于耳目口  
鼻不論何處俱不吉若見于天庭大如拇指必不病而卒死

陰晦之色加于陽之高位故死

面慘不光者寒陰也 面光不慘者陽熱也 面如錦紋者陽毒也 面垢如油喘  
促者暑病也

凡暴感客邪之色不妨昏濁壅滯病久氣虛祇宜瘦削清耀若病邪方銳而清白少  
神氣羸久困而嫵媚鮮澤咸非正色五色之中青黑黯慘無論病之新久總屬陽氣

卷之二

卷之二

察面 察目

二

上海千頃堂印行

不振惟黃色見于面目而明潤者向愈之候也。此經所以謂面黃目青或赤或白或黑皆不死。以黃色在也面青目赤或黑面赤目白或青面黑目白皆以無黃色也。面目按色同為順色異為逆說本華陀則此所謂不死者但不死耳非順也。

### 察目

凡目明能識見者可治昏不識人或反目上視或瞪目直視或目睛正圓或戴眼反折或眼胞陷下者皆不治也。凡開目而欲向明欲見人多言好動者陽証也。欲以動而散其熱也。又有病熱而惡日與火者惡其助熱也。目閉惡明不欲見人懶言惡動者陰証也。故惡動散又有陽虛而喜見日光者樂其助正也。目痛為陽明表証目赤為經絡熱盛。

目黃頭汗欲發黃 白睛黃欲發疽 目睛不了了不了了猶不瞭瞭為胃府實  
睛不和黑白不分明也似眼為內熱盛 目眩為痰火 眼胞微腫為有水 目下灰色為寒飲 眼胞上下如烟煤者寒痰 眼黑頰赤為熱痰 眼黑而行走艱難呻吟者痰飲入骨也 眼黑而面赤土色四支痿痺屈伸不便者風痰也  
目眴黃者為病欲愈

目痛赤脈從上而下者太陽病足太陽經為從上綱從下而上者陽明病足陽明經為從下綱從外皆走內者為少陽病足少陽經行銳背之後而見一脈一歲死邪銳而見一脈半一歲半死見二脈

二歲死二脈半二歲半死三脈三歲死

邪散而緩也

### 察耳

耳輪紅潤者生乾枯塵垢而青黑者為腎敗死

耳中策策痛而耳輪黃者病名黃耳類傷寒也

風入于腎卒然發熱惡寒脊強背直如瘡狀

### 察鼻

鼻頭色青腹痛若冷者死

中寒  
暴証

微黑而澤者水氣

黑而枯燥者房勞

黑黃而

亮者瘀血

濕熱不泄  
故瘀而黃

鮮明者有留飲

津液不行濕生熱  
故色黃而明潤

赤為

肺熱

鼻孔乾燥目瞑漱水不嚥者欲劙也

鼻孔黑如烟煤而燥者陽毒也

黑枯槁為脾火津涸大便燥結

鼻塞涕濁者風熱也

白為氣虛為亡血

鼻孔冷滑而黑者陰毒也

鼻孔煽張者肺絕不治

鼻上汗出如珠為心脾痛極

男子色見于準頭為小腹痛為卵痛其圓直

其色直垂而繞  
于兩王之下

為痃痛狐疝癆陰之屬也

女子為膀胱子處之病散為疼痛

色散但為氣  
無積聚

搏積色若

氣血凝滯

方圓左右位以積之形

各如其色彩

### 察唇齒

唇焦乾燥裂為脾熱

謂脾胃之華在唇四白  
者唇之四白

唇赤腫為胃濕熱

鮮紅為火盛

淡白為氣虛

淡而四邊起白暈為亡血

青黑為寒

唇黑舌卷或環口黧黑唇

口動顫不止者皆死証也 唇下有瘡名狐上有瘡名惑

齒槁者腎熱 前板齒燥者中暑

察舌

舌青或青紫而冷滑者為寒証 青紫而焦燥或張大或卷縮者為熱証 寒甚亦卷縮筋脈得寒而收引也 然必不焦燥 凡舌強硬短縮而神氣昏亂語言不清者死亦有癥証而舌本硬及縮者不在此論

熱病舌本爛熱不上者死 陰陽易病舌出數寸者死

傷寒熱止在表者舌無胎熱邪傳裏則胎漸生由白而黃而黑由潤而燥而折裂由滑而澁而芒刺皆以熱之淺深微甚為層次胎因內熱致脾氣閉滯不行飲食津液飲食運化津液流通雖熱則停積于內故胎見于外若脾氣不滯則不必有胎也此理宜知畧具如左純白舌 傷寒白滑胎舌為熱初入內猶帶表

証表劑中加清涼之品 又有胃中虛冷寒飲積聚膈上成白滑胎者又脾閉甚則白如積雪 又有臟結証詳傷寒論近言而胎白滑者難辨 溫熱病一發便壯熱煩渴舌正赤而有白胎者雖滑即當用白虎治其內熱而表自解切不可用表藥 時疫初起胎白如積粉

白雜色舌 傷寒熱入胃則白胎中黃白多黃少而滑尚帶表証仍宜於解表藥中加清涼之品黃多白少乾澀無表証者或清或下有夾食痰血而滑須下者參下黃雜色舌條 若燥裂生芒刺則必下無疑 溫熱時疫則雖潤滑亦宜涼膈白虎承氣之屬以清熱攻裏萬

不可發表也

純黃舌 潤滑者須審若熱尚未結聚不可便攻若在夏月便宜攻下不必待胎燥乃攻也

黃雜色舌 根黃硬尖白中不甚乾亦不滑短縮不能伸出譖妄煩亂者此夾痰食大承氣加生薑半夏治之 舌色青紫而胎却黃厚甚則絞裂但覺口燥舌仍不乾者此陰症夾食也脈或沉細而伏或虛大而濶按其心下或臍旁硬痛而時失氣者急宜大承氣另煎生附子佐大黃下之脈虛大者黃龍湯下之熱極煩躁者更加生地麥冬夏月尤宜此証若胎黃不燥在冬月宜附子理中湯合小承氣下之大抵舌有積胎雖見陰象亦是虛中有實急當攻下但與常法不同耳又中宮有痰飲水血者舌多不燥不可因其不燥而延緩至誤也

中暑証夾血多有中心黑潤者勿誤作陰症治之

純黑舌 遍舌黑胎夏月或可救以炎令邪火內外燔灼黑胎易生也猶可政治冬月得此舌必死

黑雜色舌 中黑邊黃承氣下之邊白大柴胡下之 若生芒刺裂瓣不論邊係何色但看瓣底色紅活者急下之俱如黑者不治 若腐爛卷縮亦不治發疮生蟲雖為濕亦屬肝傷俱為危候 大抵尖黑尚輕根黑則重 夏月中暑多黑舌邊紅中黑乾者宜白虎湯 已上皆邪熱實然亦有虛熱者舌心雖黑或灰色而無積苔

舌形枯瘦而不甚赤其証煩渴耳聾身熱不止大便五六日或十餘日不行腹不硬滿按之不痛神不昏不得睡稍睡或呴噏一二句或帶笑或歎息此為津枯血燥之虛熱宜大料六味丸合生脈散災甘草湯誤與承氣必死若直中寒証始病不發熱舌心便黑色非油白黃變化雖黑而滑舌亦瘦小當急溫之

赤色舌 温熱時疫熱毒內盛潤滑者未可便下黃連解毒白虎等湯乾而有黃白黑等胎及芒刺紋裂坑爛起疮者皆下証也一種柔嫩如新生望之似潤而燥涸殆甚者為妄行汗下津液竭所致多不治宜生脈散等 又紅痿舌痿軟不及紅細枯萎動也及紅細枯長舌並難治

紫色舌者兼酒毒所致其色必深紫而赤且乾涸若淡紫而帶青滑則又為直中寒証矣須辨

灰色有寒 醫色焦黃為醫色夾食熱証也 藍色木冠土敗之色 及妊娠各舌面赤舌青子死母活俱青並則俱死宜潤澤忌枯敗 並當詳審 總之舌胎不論何色但乾燥者必屬熱惟潤滑者須審

### 察身

身輕自能轉側者可治 沉重不能轉側者難治 足冷惡寒蹲卧向壁為陰証陽病者不能俯陰病者不能仰 身目齒爪俱黃者痘病也 脾病者色黃而肉蠕動 肺病者色白而毛敗 頭重視身此天柱骨倒也死 搖頭以手搘腮者齒痛

也 坐而伏者短氣也 身汗如油形體不仁乍靜乍亂喘而不休者死 脉雖調亦死 皮膚潤澤者生枯燥者死 皮膚着者死 皮膚枯藁  
看骨也

察手足

皮膚枯槁  
看骨也

手足冷名厥在陽寒則有寒有熱初病即手足冷者直中寒証也爪甲青冷或過時膝且常冷若先發熱以漸入內而手足乃冷者傳經熱証也爪甲紅乍冷乍溫不過時膝此仲景之說也在雜証則手足冷者名寒厥手足熱者名熱厥此內經之說也詳厥逆門但足冷手不冷身發熱者為外感夾陰宜五積散不可汗下及小柴胡以有黃芩苦寒也又夏暑病濕溫人必足冷手濕多汗妄語宜蒼朮白虎合五苓不可用五積助熱有兩手逆冷而兩足熱如火烙者此陰氣衰于下則陽下乘陽之而足熱而手冷陰陽否隔之兆也若初起而脚膝更弱或足脰赤熱腫痛當從腳氣治之手足冷至節而心痛甚者名真心痛旦發夕死循衣摸床撮空理線揚手擲足此神去而魂亂也死坐而下一脚者腰痛也坐久晝痛故下腳以伸之行遲者表強也風邪束其筋絡故步履不隨肝熱者色蒼而爪枯搗搗者肝邪也搗抽搗手足頻頻伸縮也搗十指頻頻開合拳緊握也經曰肝病變動為握癲癇者虛而有風也癲筋脈弛縱脈急者尺之皮膚亦急急聚急也脈緩者尺之皮膚亦緩緩縱脈小者尺之皮膚亦減音忿大而沸起也而小氣脈大者尺之皮膚亦貴音忿大而而起脈滑者尺之皮膚亦滑脈濇

**手擗足此神去而魂亂也死** 坐而下一脚者腰痛也坐久晝痛故下一腳以伸之 行遲者表  
**強也** 風邪束其筋絡故步履不隨 肝熱者色蒼而爪枯 摘搦者肝邪也經曰肝病變動為握 痘瘍者虛而有風也瘡筋脈收引 脉急者尺之皮膚亦急急緊也 脉緩者尺之皮膚亦緩緩縱也 脉小者尺之皮膚亦減

而小氣

卷之三

察手足

聞聲

二

上海千頃堂印行

者尺之皮膚亦濇 尺膚滑而澤膩者風也 外見故滑澤 熱風鼓其血液 尺膚濇者風痺也 血少  
則內熱熱 尺膚粗如枯魚之鱗者水決溢飲也 消水反乘之也 同脾土衰而肌肉  
則生風 尺膚寒甚脈小者泄少氣 掌中熱者胸中熱寒者胸中寒 掌中為三陰脈  
所聚其藏皆在胸中 燥者溫病也 尺膚寒甚脈小者泄少氣 掌中熱者胸中熱寒者胸中寒 掌中為三陰脈  
所聚其藏皆在胸中 脈多青脈曰血脫 張仲景云血脫則氣去寒凝故色見青黑言脈則他 可知即診尺之義愚按此說乃血脫後方見青脈也  
然有先見青脈而後脫血者 則氣虛寒凝不能攝血耳

### 一聞聲

肝聲呼怒則呻呼或驚而呼也 心聲言洪範言屬火 笑狂笑為實熱 脾胃聲歌輕韻聲歌 又為噦乾嘔詳  
嘔吐肺聲哭又為歟 腎聲呻又為久為嘆陽未靜而陰引之故歟 聲清朗如平日  
者吉 聲濁鼻塞者傷風也 聲如癟中出者混濁不清之意 必中濕也 攢眉呻吟者痛也  
累啞者風痰伏火或怒喊哀號所致也 聲啞如破而歟者寒客裏熱也 傷寒壞  
病聲啞而唇口有瘡者旅惑也 聲啞形羸者勞瘵肺有瘡也 驟然聲瘡咽痛如刺  
而不腫不赤不發熱二便清利陰寒也 驟然音瘡而喉頸赤腫脹閉或發熱便祕龍  
火也 鼻息鼾睡者風溫也 診時呼氣者鬱結也 憶氣以手撫心者中脘痛也  
搖頭言者裏痛也 少氣不足以息者氣虛也 平人無寒熱而短氣不足以息者  
痰火也 言而微終日乃復言者正氣奪也 語言蹇澁者風痰也 言驟及多言  
者火也 言語善惡不避親疎衣被不斂者神明亂也 讓語者邪氣實也 鄭聲

者正氣虛也

一問寒熱

凡平素無病而突然惡寒發熱多屬外感必有頭痛體痛拘急無汗或有汗等表証浮緊浮大等表脈可據若無表証表脈病由漸至者屬內傷外感則寒熱癆作而無間內傷則寒熱間作而不齊外感惡寒雖近烈火不除心表解乃已內傷惡寒得就溫煖即解外感惡風乃不禁當也禁也一切風寒內傷惡風惟惡夫些

小賊風又外感証顯在鼻故鼻息氣促而鳴壅盛有力不若內傷之息短而氣乏內傷証顯在口故口中不和飲食無味不若外感初則知味傳裏則不能食也又外感熱傳裏渴其飲甚多不若內傷液虧之渴思飲即止又外感則邪氣有餘故

發言壯厲先輕而後重內傷元氣不足故出言懶怯先重而後輕又外感頭痛常常而痛內傷頭痛時作時止也

外感手背熱手心不熱亦背熱于腹內傷手心熱手背不熱亦腹熱于背

背微惡寒者陽微不能勝陰也

陽明中暒亦有此宜白虎加人參湯

勞役內傷亦有此

必乍寒乍止為陽虛內熱升火湯散

濕痰症亦有此必身重體痛導痰湯

凡脾胃素

虛之人暑月飲食生冷冰水寒氣畜聚陰上乘陽多見背寒冷如掌大

宜溫

惡寒踴

卧不發熱者陰証也壯熱而渴不惡寒反惡熱者溫熱証也

來往寒熱有定期者瘧也無定期者傷寒少陽經証及內傷虛証也

潮熱在日晡所者傷寒陽明証

也在子午者內傷証也

一問頭身傷寒太陽經頭痛自腦後上至顳頂項強腰脊痛陽明頭痛在額前連

目珠鼻孔乾不眠 少陽明痛在兩角及耳聾脇痛 厥陰頭痛在巔頂收引頭角  
 脈沉弦手足厥冷此為在經當歸逆湯四 若在裏則乾嘔吐涎沫吳茱萸湯 太陰少陰脈不  
 上頭無頭痛証然太陰中濕亦頭痛鼻塞吐痰腹滿自利要知是濕濁之氣上  
 中寒亦有頭痛連腦齒爪甲青此真頭痛不治亦寒邪上攻使然 温熱病時疫病凡一切  
 內火上炎之証皆頭痛 內傷火升新產血虛皆有頭痛但時痛時止而無腦後痛  
 者蓋火炎則痛在兩角血虛則痛連魚尾以其自內達外必由少陽是以痛見兩角  
 者則有少陽風熱與虛火之別若痛在額前者亦有陽明與食積之殊其見腦後者  
 必太陽無疑也 頭痛如破者風火相煽也 眩運者痰火上升也 頭傾視深陷  
 精神奪矣 耳聾耳痛胸脇痛寒熱口苦者少陽經証 耳聾舌卷唇青為直中厥  
 陰 耳鳴及痛火上冲也 耳聾又手冒心者汗多而陽虛也 耳聾者耳內無聲  
 寂常閉而不聞也 耳鳴者耳內有聲竅不閉時聞時不聞也火動而上冲則鳴而不聞外聲火靜氣下  
 則不鳴 面熱者足陽明病 邪在肺則皮膚痛喘欬動肩背 邪在肝則脇痛惡  
 血在內抽掣 舌卷卵縮為肝絕 邪在脾則肉痛善饑熱 邪在腎則骨痛腰痛  
 腰者腎之府也轉搖不能腎將憊矣 傷寒太陽身痛但拘急耳若陰毒身痛則體勢沉重如被杖  
 中濕身痛不可轉側骨節掣痛屈伸不利身重或腫汗出惡風不欲去衣 中暑亦身痛  
 盡也然血虛者身亦疼 頭痛身熱自汗與傷寒同而默默但欲眠鼻鼾語言難出

四肢不收者風溫也不可發汗 霍亂亦頭痛身痛惡寒發熱如傷寒而有吐利為異 身熱惡寒頭項強急如傷寒而頭熱目脈赤而獨頭搖口噤齒齶背反張者瘡也無汗為剛瘡有汗為柔瘡 頭疼發熱與傷寒同而身不痛者傷食也必中脘痞悶噫氣作酸或惡聞食臭或欲吐不吐 煩熱似傷寒而脈不浮緊頭身不疼不惡寒或煩時頭亦痛煩止而痛止者虛煩也 身熱惡風自汗似傷寒但頭不痛項不強或亦頭痛而作止無常者瘧也或胸滿氣上衝或目下如烟灰黑者是陰候也 發熱惡寒頭痛肢節痛嘔惡似傷寒而病自脚脚膝痛或腫滿或枯細者腳氣也 身熱惡寒若有痛處者癰疽也 發熱如傷寒小便自利口不渴按其心下或腸下或臍腹間有痛處或至手不可近者畜血也 凡勞逸七情房勞皆能瘀血不止一途 勞損病劇忽身痛甚者此陰虛之極不能滋養筋骨也難治 胸腹間脹悶而痛邪在中上二焦不可補若氣虛不運但痞滿者不可攻勿因其胃口不開妄行逍導 虛証須補而脹滿不受補者難治 卒然仆倒昏不知人痰涎壅盛口眼喎斜手足癱瘓或半身不遂者中風也 若見口開手撒眼合遺尿痰聲如鋸不治 卒倒而出垢手足微冷或吐或瀉者中暑也 中氣大類中風卒倒痰塞牙關緊急然中風口有痰涎身溫中氣口無痰味身冷也 中食亦似中風難辨須審其曾着怒氣

否曾飲食否若在醉飽後着惱或感風寒食墮胸中胃氣不行便至厥倒昏迷不醒其脈氣口急盛或沉伏宜鹽湯探吐之吐不出者死 中痰者卒然麻眩舌本強直痰涎有聲四肢不舉重者不醒為痰中輕者自醒為痰厥 心火暴甚熱氣怫鬱而卒倒無知輕者發過自醒重者陰氣暴絕陽氣後竭而死 中惡者忽然手足逆冷肌膚粟起頭面青黑精神不守或錯言妄語牙緊口噤卒然暈倒昏不知人此是卒厥客忤飛尸鬼擊凡吊死問喪入廟登塚多有此症 腹痛氣自下衝上者火也從上轉下趨少腹者寒也 氣從少腹上衝者陰火也從兩脇上衝者肝火也 少腹痛引腰背累丸者病病也 內睞筋惕者血虛也 身如蟲行者表虛也不能仰卧仰卧則刻者水氣也 肺氣上乘乎身重難行 胃主肉其脈下行于足水 肺則氣喘促犯胃故肉重而足不能行 口苦為膽熱 口甘為脾熱 口淡為胃中虛熱 胃為一身之主淡為五味之本 口酸為肝熱 口鹹為腎熱 口中常覺血腥為肺傷 口燥咽乾赤爛為內熱 口辣為肺熱 所講內傷則口中不和飲食無味也

一問飲食 外感邪未入裏則知味而食如常入裏則不思食矣 喜冷者內熱也喜熱者內寒也 得食稍安者虛也 得食更甚者實也 虛人過食亦不安 痘由飲食而致者須問所傷何物 热者必渴喜冷飲飲必多若喜熱飲或冷飲而不多乃虛熱非實熱也 火虛者必不能飲冷水虛者雖火燥津乾然少得清潤即止以本虛不能勝水之冷氣故不能多飲也

# 一問二便

大小便不禁為腎敗

腎開竅于二陰，腎敗則失其閉藏之職

小便清白而長者必非熱

証亦有火在上焦者導之便下則反黃矣

黃赤而短者熱也然勞倦生火或思慮動火或瀉痢忘陰

或陰虛內熱等症小便多黃雖亦為熱然是虛熱非實熱也

津液由于氣化氣病

則小便不利

氣上脫者必無小便

大便閉結腹堅滿痛不可按者熱結

溺濁利而大便黑為畜血

濁而腹滿者死

大便濁利為寒然亦有熱者經所謂暴注屬熱也

然若熱隨濁去痛隨利減可不治

又有純濁清水者謂之熱結旁流

火性急速不及停化即出也其勢急迫辟辟有聲如燐沫泊止于其旁漏下清水也必

極皆熱証也

又大便鴨溏者為寒

色如微醬粘膩

不見糟粕顆粒也

極臭者又

為熱

# 一問汗液及血

外感身熱有汗為傷風無汗為傷寒

盜汗為邪初傳陽明又為

陽入擾陰

自汗為陽明邪實

手足必汗下皆汗

又為表虛不固

自汗身重軒睡為風溫

服藥後得汗表應解不解是汗未徹也

必汗出至足乃為徹

頭有汗身無汗若小便不利

熱渴則發黃小便利而大便黑則為瘀血

若胸滿欬喘則為水氣大抵陽明濕熱不得

發越者多頭汗多可下之証

關格証小便不通頭汗出者死

額上及手足冷

汗者陰毒也

汗多則津脫而亡陽

凡熱汗必濁

肌肉熱而濁也

冷汗必滑

肌肉冷而滑也

汗味淡而不鹹綴而不流者為絕汗即死

心為汗肝為淚

肺為涕脾為涎

腎為唾 婦人病須問經候若經水適來或適斷而病熱者熱入之名曰熱入血室其証胸脇下滿晝日明了夜則譫語如見鬼狀 嘔吐血者由胃出若傾盆成塊而來或紫黑血為痰或鮮紅血為新此太衝腎二經合行肝經之血由胃併出者也雷火勢暴若止數口或一二鐘或紅或紫或黑此胃經血自出者也胃雖多血然其熱不若雷火之暴故所出比之畧少 呕血者因欬嗽而出痰中見血絲血點此乃熱傷肺絡肺少血雖少亦出恐致肺枯難治又肺病久及腎腎與衝脈並經出入血從腎衝欬出者其血必多腎雖血少合其衝則多雖知其來喉必痒或有聲響或有硬氣自下冲上 咳唾血者或隨氣逆火炎而唾不用力或隨痰而咯血散浸者是此肺腎之血也 上焦血浮中焦血不沉不浮下焦血沉以水試之可見 劍血詳血門 太陽經血有從鼻噏出者其經從背上腦注鼻不衄則噏出也 腸風血鮮臟毒血黯淡血痛為血淋不痛為尿血皆與尿同出若不與尿同出者乃從精竅出也 噏水不嚥小便利大便黑多是畜血 畜于上善忘時鼻血畜于中下心腹腫痛如狂譫語發黃 好酒者陽明多畜血

一問晝夜輕重 陽虛則畏寒而惡陰故旦安而暮亂至夜則熱也 陰虛則畏熱而惡陽故夜寧而朝爭晝則熱也 此正虛之候也 陽邪實者遇陽而愈旺故朝熱而暮輕陰邪實者逢陰而更强故夜寒而晝減此邪實之候也 陽虛而陰邪乘于陽分則氣行陽二十五度而病發故日寒而夜息陰虛而陽邪陷于陰分此証頗多則氣行陰二十五

度而病發故夜熱而晝涼觀瘧疾或日發或夜發可見矣此正虛挾邪之候也 其有晝夜俱熱甚者為重陽無陰晝夜俱寒甚者為重陰無陽晝夜寒熱者乃陰陽交錯也 其有久病虛弱無分晝夜作止不時者以正氣不能主持而陰陽相乘勝復無常也若壯實人初病見此又為邪正相攻不時擾動之故觀傷寒少陽証往來寒熱初無定期可見矣

一問証見先後 先瀉後痢為脾傳腎先痢後瀉為傳脾之類

一問七情 肝氣虛則恐 實則怒 怒傷肝以悲勝之 肝火乘心則動而驚 心氣虛則悲 實則喜笑不休 喜傷心以恐勝之 脾為思思傷脾以怒勝之 肺為憂憂傷肺以喜勝之 腎為恐恐傷腎以思勝之 怒則氣上又云氣逆 喜則氣緩 悲則氣消恐則氣下 驚則氣亂 思則氣結

一切脈

脈之部位

脈者血氣經隧合而成名者也非血則不充非氣則不行非經隧則散漫而不就軌以經隧乃脈之道路猶水之有渠人身無處非血無處非氣如地無處非水而必注於江河乃有其流動可見故診脈必於經隧也 人生血脉流行之路大者為經小者為絡經如正河絡如支河但有其外見之處即皆可診

內經診分三部九候出素問三部九候論

上部天兩額之動脈當領厥之分足少以候頭角之氣

上部人耳前之動脈即和竅之分手少以候耳目之氣

上部地兩頰之動脈即地倉大逆之分足以候口齒之氣

中部天手太陰也即寸口肺經

脈氣所行以候肺

中部人手少陰也即神門心經

脈氣所行以候心

中部地手陽明也即合谷大腸經

脈氣所行以候胸中之氣

下部天足厥陰也氣衝下三寸五里之動脈肝經

脈氣所行臥而取之女子反大衝在足大指本節後二寸臨中

下部人足太陰也脈魚腹上越筋間箕門之動脈沉取乃得之脾經

脈氣所行也若候胃氣者當取足跗上之衝陽以候脾胃之氣

下部地足少陰也即太谿腎經

脈氣所行以候腎

按上部以候頭則下部以候足可知以本藏之經脈候本藏則亦以本府之經脈候本府可知古人多以互文見意當善會之再按藏府經脈共二十二以止九候故遺手太陽小腸手厥陰心包足太陽膀胱不知當診何處又胃經之人迎於寸口並診而不列九候之中皆不可曉此後人之所以棄而不講也

內經診寸口

寸口即氣口內分寸尺三部解見下文

素問脈要精微論曰尺內兩旁則季脇也季脇小肋也尺部所主藏府其于身

即尺兩旁則當季脇蓋肝候于關而主

腸則腎候于尺

外

謂浮也

裏謂沉也

文內外彷此中附上居申即關部也

言附尺之上而左

而居上即

左關外以候肝內以候膈胸之下腹

右關外

以候胃內以候脾上附上

言附中部上而居上即

寸部右寸外以候肺內以候胸中左寸外以候心內以候膻中

即心包在兩乳間謂

之氣海按心肺肝

于內恐傳寫之誤當以胃外脾內側之易其位為是

前寸以候前前身後尺以候

而居上即

後後身背此分後身之面背下文分後身之

上竟上者竟盡胸喉中事也

頭面可推下

竟下者少腹腰股胫足中事也

言寸不獨候腹也

按內經謂脈皆伏行於分肉之間深不可見所常是者皆絡脈推手太陰肺經脈

外於寸口此其獨診寸口之故也

後人察此皆為寸口是求而古之診分三部九

候者不復講矣所謂寸口者合寸關尺而為名者也

何謂寸關尺曰自手肘

中橫紋至魚際橫紋得一尺一寸所取診者止長一寸九分前不及魚際橫紋一

分後不及肘中橫紋九寸古人於此一寸九分分為三部下部在一尺之內故名為

尺上部在一寸之內故名為寸中部為上下交界之際陰陽出入之所故名之曰關

也寸口又名氣口何也以此為肺經脈肺為氣主故曰氣口又曰脈口問人身有

藏有府此獨候五藏而六府止候胃何也曰內經原以人迎候陽以氣口候陰府陽

藏陰此五藏所以候之氣口也而兼候胃者則以五藏皆稟氣於胃五藏之氣不能

自致于手太陰必因胃氣乃至故胃氣當併察也

言寸不獨候腹也

問膽膀胱大小腸命門三焦諸府當候何處曰內經無明文故後人之論不一有謂

此難經之說  
非出高陽生

小腸與心為表裏從心候於左寸大腸與肺為表裏從肺候于右寸者右尺大腸屬庚金母隱子胎當從左腎之水候於左尺三說不同令人多從後二說

以小腸在腹中位居至下經言尺內以候腹應候之于尺不應于位處至高之心肺同候于寸也愚謂藏府相移如心移熱于小腸則小便赤上下相關診之於寸亦

大便不通則肺氣壅之類

無不可况二陽位雖居下而其經脈皆上行則候脈於寸候府於尺前說未可廢也

如膀胱府居腹下而寒傷太陽六脈皆浮豈徒左尺胃府居中而邪在陽明六脈俱大豈獨右關可泥定哉後二說當以左小腸右大腸為是蓋藏府相配本因經絡相

聯相聯乃相配相配乃有庚金丙火之稱名實相衡當從其中從其所聯所配為左右可也膽同肝候於左關膀胱同左腎候於左尺從無岐議惟右尺所候其說不一

有謂三焦命門右腎三者各別均於右尺候之有謂右腎即命門與三焦同候說者

紛紛難經所謂腎有二枝左名腎屬水右名命門屬火後人非之謂左腎為形水右腎為氣水總皆屬水兩腎之中乃為命門按二說雖異然皆謂腎有水又有火所用補之藥無殊分別矣

愚謂右尺所候只一命門盡之不用更舉三焦右腎名色何則三焦若以位言則即經之所謂胸中膈中腹中也若以三焦之元氣言則即命門之真火耳蓋此火宅于命門布乎三焦隨藏發而異名豈有二火哉則言胸膈腹即言三

焦之部位言命門即言三焦之元陽而三焦之名可不立矣兩腎既皆屬水則當統於左腎而右腎之名可不立矣命門為火氣居中而親右陽能生陰氣能化水診命門之火氣即是診右腎之水源右腎之名蓋可不立矣蓋左尺以候先天之真陰右尺以候先天之真陽百川總歸一海千炬無非一燈何必多言名色以滋惑亂哉

問藏府之部位何如曰府陽藏陰陽浮陰沉不易之理也難經謂三菽之重為輕脈則候胸中當輕於三菽可知六菽之重為心脈則候膻中當輕於六菽可知九菽之重為脾脈則候胃當輕於九菽可知矣又胸中膻中均即上焦候於兩寸腹中即下焦候於兩尺則膈中即中焦亦當兩關並候可知矣然此但言其理耳實則何可泥哉何則部位雖分氣脈實貫寸口三部僅長寸許除浮沉大小不能無異外其餘遲數等脈大概無殊從未見有寸遲而關數寸滑而尺濤者假令診得六脈俱數而斷為五藏六府皆熱可乎哉則必從心肺俱浮肝腎俱沉脾胃在中之說以察之始可以知為何藏何府之熱詳脈時五藏四條而手法之重輕一差則以府為藏以藏為府固有之矣即不診而浮主表病亦主裏虛沉表邪亦主陽臨其為虛熱實熱內因外因非參合四診安能細辨而但從區區之部位為斷何異膠柱以鼓瑟也如胃停冷食而六脈皆遲肺被火刑而六脈皆數不獨見之右關右寸必分疆畫界以求之則固矣

問子言六脈數則俱數遲則俱遲則經言七診謂獨小獨大獨疾謂手之獨病也獨遲獨熱獨寒謂手之獨病也獨寒者謂元伏不起皆病其說非歟曰

此以三部九候言非言寸口也

按即以寸口言亦得如診得數脈兼浮脕在寸部即謂之寸數可也觀下心肺俱浮何以別之條自明

### 脈之形體

脈之形體長而圓如以水貫葉葉中有長有短有大有小有虛有實有緩有長

按長短謂之寸數可也觀下心肺俱浮何以別之條自明

以縱言大小以廣言虛實

溢出三指之外為長

短  
歛於三指之中為短

按寸口之脈由胸中行至大指端非有斷截本無長短可言然脈體有現有不現

不現者按之止見其動於三指之內現者見其長出於三指之外則長短宜分矣

高鼓峯云有形體之長有往來之長往來之長謂來有餘韻也按高說甚善

長短雖本言形體而凡脈之以神氣悠長為貴者固可因此說而想見其狀

大  
大而盛於浮分名洪大而散漫滲開脈與肉無界限名散

小  
與大相反一名細細甚無力名微

虛  
虛不實也虛甚則中空名芤

實  
實結實之謂實如按猪筋虛如按燈心芤如按葱薑謂浮中沉皆有力為實皆

無力為虛浮沉皆有力惟中無力為芤雖未嘗不是然尚非正解

實如葱中水充實虛則不

充芤則尤其  
不克者也

緩  
柔軟之意甚則失之軟弱而名軟名弱舊以緩屬遲益緩兼兩義也

緊 即搏急與緩相反如張弦如引繩兩頭牽緊必挺勁抗指緊不甚名弦弦緊而大者名革牢

長短有得於稟賦者筋現者脈恒長筋不現者脈恒短也有隨時令變異者則春脈長而秋脈短也有因病而變異者則邪氣長而脈長正氣短而脈短也

大小有得於稟賦者世所謂六陽六陰也

生成脈大者名六陽  
脉小者名六陰脈

有隨時令變異者時當生長則脈大當收斂則脈小也有因病而變異者邪有餘則脈大邪氣而實滿正不足則脈少也血氣衰少

虛實亦有得於生成者肉堅實者脈多實虛軟者脈多虛也亦有變於時令者春夏發泄雖大而有虛象秋冬斂藏雖小而有實形也若因病而異則大而實不得壅滿而且積實而虛者不持衰小而且空虛可驗正邪之主病俱盛邪盛大而虛氣有餘血不足如葱中小而實者氣能充而不鼓可驗陰陽之偏枯

緊緩者得於生成者皮膚绷急者脈多緊寬鬆者脈多緩也其變於時令者則天氣嚴凝而筋脈收引天氣暄熱而筋脈弛縱也其因病而變者則或外感風寒或內傷生冷寒勝故脈收引而緊急有力或熱或濕筋脈縱弛而軟弱無力也

附洪散微芤弦革牢

舊作栗又作濡

洪 洪即大耳舊以洪為來盛去衰是大之盛于浮分者也

散 脈形本圓斂令散漫不收似大而實非大益虛甚而四散者也

微 古以微屬浮細屬沉分微為陽衰細為血少本集各脈皆直指本義故以細甚無力為微

芤 脈虛而且中空者芤慈葱名如卧葱管於指下輕取重取皆有而中取則無此為失血之脈

弦 似緊而畧遜但稍見抗指即是不若緊之搏手凡弦緊之脈由外邪而致者猶易為治由正虛而致者則難為功蓋脾胃虛敗中和之氣化為勁急土敗木賊不可救矣 古人有時以長為弦如謂春脈弦而言其軟弱直長是弦即長也令分為二則弦自有急勁之意不僅長而已

革牢 弦大遲而浮虛者為革如按鼓皮內虛空而外绷急也弦大遲而沉實者為牢寒氣深痼如牢獄也

軟弱 皆柔緩之甚而無力者舊以軟屬浮弱屬沉

脈之行動

脈之行動如以氣鼓葱葉中之水使之流動也有浮有沉有遲有數有濤有滑

浮 古人於一身中分三部九候後人亦于寸口中分三部九候寸關尺三部九部各有浮中沉三候三而三之九候也是故候之於皮毛間而即得之者謂之浮候之

於筋骨間乃得之者謂之沉候之於皮毛之下筋骨之上適當肌肉之中而得之者謂之中

沉 沉之極名伏

數 疾也躁也一息六至數而跳突名動

遲 與數相反一息三至

內經謂人一呼出氣脈再動動即一吸入氣脈再動呼吸定息

一呼一吸為一息者前息已盡後息未起之時也

脈五動閏以太息數息必有一息畧長者名太息如月之有閏也一呼

一吸本止四動有五動者則以其為太息也診時當別令一無病人調定呼吸然數得十息許者亦然數得四十五至為平脈

命曰平人一呼脈一動一吸脈一動曰少氣

即一息二至此遲之甚一呼脈三動一吸脈三動即一息六至此為數而躁

間數疾意尺熱手攀曰病溫溫病

滑 一呼脈四動即一息以上曰死脈絕不至不特遲且不至

死乍疎疎即乍數曰死

滑 滑即滑溜之謂言其行動往來之流利也在平脈則為血充在病脈則為血熱

鼓動痰氣流注

濁 糜濁也與滑相反往來粘滯者是

浮沉有得於稟賦者趾高氣揚之輩脈多浮鎮靜沉潛之士脈多沉也

又肥人多浮瘦人多浮

有變於時令者春夏氣升而脈浮秋冬氣降而脈沉也其因病而至者則病在上身

之在表在府者其脈浮上表府亦屬陽浮脈見陽脈也在下在裏在藏者其脈沉也

屬陽陽病見陽脈也

問浮

曰不

由

稟賦時令與外感內傷無故而沉浮謂之虛可也以浮為陰失守沉為陽內陷

也有故則不可如以為可則四季之月無病之人脈本和平當居中候亦可斷為

表裏兼虛乎然則古人謂浮為裏虛又謂脈浮舉之有餘按之不足其說非歟

謂浮為虛者乃名之非浮則必虛其表也至脈體之為虛為實本

不因浮沉而變實則皆有餘虛則淨沉皆不足而輕取之與重按勢有不同則夫

脈之實者愈按愈實虛者愈按愈虛益重按則脈被遏抑實者鼓繫有力故愈形

其實虛者無力鼓繫故愈形其虛是則舉之有餘按之不足止可言浮而虛者不

可言浮而實者也或曰如子言浮而實者愈按愈實是三候皆有又何以名之為

浮乎曰浮脈本浮按抑之而後沉不按之則仍浮故曰浮也又問亦有脈浮而言

表虛何也曰外發汗太過或內傷自汗太多皆令表陽虛氣外越故浮也

遲數得於稟賦則性急躁者脈多數性寬緩者脈多遲變於時令則晴燠而脈燥陰  
寒而脈靜也至其應病則亦如之矣仲景以遲為藏寒數為府熱可不泥以府亦  
有寒藏亦有熱也

滑濶亦有得之稟賦者乎曰富貴之子神氣通暢則脈亦流暢貧賤之子神氣沮抑  
則脈亦蹇滯此即太素以脈之滑濶論窮通之意也若夫時令則肝脈屬春而微滑

肺脈屬秋而微濤矣至其應病則本乎氣血之通塞耳

附伏動脈

伏 沉極為伏按至骨乃見或竟有不見者

動 動跳動之意大驚多見此脈益驚則心胸跳突故脈亦應之而跳突也必帶數故上文繫之數脈條下

張仲景曰若數脈見於關觀知非動脈止見于關也是偶舉可上下無頭尾狀其圓而突耳真上不至寸下不至尺如豆大厥厥動搖者名曰動

脈之歇止

脈之歇止者有三

結 脈來遲時一止而復來者曰結如人之徐行而歇也

促 脈來數時一止而復來者曰促如人之疾行而蹶也 數亦名促此之促指歇至言須分別觀之

代 結促之止無常數代之止有常數常數即下文四十代又為更代之稱別見胃氣條義與此異須分別觀之

內經曰脈一日一夜五十營營運也經謂人周身上下左右後前凡二十八脈其長一十六丈二尺五十還計長八百一十丈呼吸定息按此偽說也人一夜行八百一十丈計一萬三千五百息故五十動而不一代者代歇至

晉書

15

五藏皆受氣四十動一代者一藏無氣肾氣先盡也其吸不能至腎止至肝而還景自還而近以次而短由腎而肝而脾而心而肺故凡病將死者促僅呼吸于胸中數寸之間而已三十動一代者二藏無氣二十動一代者三藏無氣十動一代者五藏無氣予之短期此皆死在旦夕而王氏脈經謂一藏無氣后四年死二藏無氣后三年死云云恐非

脈配四時五藏

內經曰春脈如弦如弦則非過弦可知通指六春脈者肝也東方木也萬物之所以

始生也。故其氣來兌弱，和柔而輕虛之意，向浮而滑端正直以長曰弦。其氣來實而強健，剛而堅實之意，向沉而滑端正直以長曰堅。

按長弦緊三脈相似而內傷也正虛故脈弱

不同盡弦而軟者為長強者為緊也此所言如強者實即長所言太過而且緊觀虛軟實強字可見勿以此弦字與他處弦緊弦字同論

夏脈如鈎曲也。脈來洪盛如湧。起夏脈者心也。南方火也。萬物之所以盛長也。故而曲也。言其大而有力。

其氣來盛之分出於皮膚之際曰鈎去衰減也浮取有餘沉取不足時當

實也此謂太過病在外其氣來不感去反感取有餘是沉滯也而其氣來感去感大而有虛象也

此謂不及病在中  
反盛似為有餘于內不知此乃反浮為沉火失其職即益于浮

也

遇浮可知秋脈者肺也西方金也萬物之所以收成也故其氣輕虛以浮  
來急收引去散散蓋秋令收而未藏故脈體如此曰浮其氣來毛浮之太過者也

而中央堅兩旁虛虛指散也惟兩旁散而中央不散與上所謂去散者異謂太過病矣而中央曰堅則亦非但收敛而已亦與來急異也

在外其氣來毛而微此謂不及病在中

冬脈如營如營壘之固內守意也冬脈者腎也北方水也萬物之所以合藏也故其氣來沉以搏擊指故曰營其氣來如彈石者彈擊也如擊手以石堅實之甚也此謂太過病在外其去如數者沉取似數也數本屬實熱而真陰虧損之脈亦如數多數愈虛則愈數原非實熱之脉故云如數

脾脈者土也善者不可得見蔡西山所謂不長不短不疎不數不大不惡者可見其來如水之流動也此謂太過病在外如鳥之喙也鋭而此謂不及病在中

按四時之升降動靜發斂伸縮相為對待者也極于二至平於二分故脈子月極沉午月極浮至卯酉而平觀經又謂秋脈中衡如平衡之平又謂夏脈在膚皮秋脈下膚冬脈在骨則秋之不當以浮言可知也特以肺位自高其脈浮秋金配肺故亦言浮耳夫初秋之脈及帶夏象言浮猶可若干酉戌之月仍求浮脈不惑乎夫子春言長滑則于秋言短濶可知于冬言沉實則于夏言浮虛可知書不盡言言不盡意是在讀者之領會耳

難經曰初持脈如三菽大豆也之重與皮毛相得者肺部也如六菽之重與血脉相得者心部也如九菽之重與肌肉相得者脾部也如十二菽之重與筋平者肝部也按之至骨舉指來疾者腎部也

又曰心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也。心主皮毛位在肺下接至血脉而得散開爲散道浮而短濶者肺也。肺主皮毛位居最上按至皮毛得者爲浮稍加力脈道粗大爲大又精加力脈道不利爲濶不見長出指外爲短濶腎肝俱沉何以別之然牢即沉而長者肝也。肝主筋位在脾下按至筋爲沉脈道如弦爲長按之濡舉指來實者腎也。腎主骨在肝下按至骨上得之爲沉又重按之脾者中州故其脈在中脾主肌肉也。脈道無力爲軟舉指來疾滑利而充實曰實。實按至肌肉脈道和柔而緩又稍加力脈道敦實而大。王宗正謂診法當從心肺俱浮肝腎俱沉脾胃在中之說王叔和但守寸關尺分藏府位部者非其說甚是然二說亦不相悖蓋寸關骨高肉薄尺骨低肉厚故寸關恒浮尺恒沉假如診得三部俱浮之脈亦必兩寸較尺更浮故可從其大槩通言亦可從其甚者獨舉不相悖也若弦緩遲數各脈則三部全同有不可分指者矣。

問脈氣當隨時令變更則夏月脈浮不特心肺浮即肝腎亦浮矣。最浮爲肺次心次脾次肝次腎冬月脈沉不特腎沉即心肺亦沉矣。最沉爲腎次肝次脾次心次肺何必泥定肺脈當在皮毛腎脈常在骨上乎曰夏浮冬沉特微浮耳其變更固不遠也。

按肺較心更浮脾較肝略沉是右寸關比左寸關差浮也以例兩尺亦應有浮于左益右腎為水中之火左腎為水中之水自應少異耳合而言之右三部皆浮于左古人謂右屬氣左屬血氣浮血沉不亦宜乎。

### 脈無胃氣則死

經曰人無胃氣則死。此言脈以有胃氣爲主也。胃屬土其德中和其氣之達于脈也不剛不柔不疾不徐不小不浮不沉有雍容和平之狀無過不及之春胃微弦曰平雍容和緩中弦多胃少曰肝病肝邪勝胃胃帶弦意也。肝病氣衰也。但弦無胃曰死

胃氣已  
絕故也

胃而有毛得秋脈曰秋病

金旺木也春木旺尚無傷至秋則必病矣

毛甚曰今病

目下即病也

夏胃微鈎曰平鈎多胃少曰心病但鈎無胃曰死胃而有石曰冬病石甚曰令病者

沉實之意冬脈也

長夏胃微弱曰平

長夏未月也土濕則軟故微軟弱即緩脈也

弱多胃少曰脾病

猶言脾胃自病也

但代無胃

曰死代更代也春強夏鈎秋毛

冬石脈體隨時而更但見其所更者而不見胃氣則死矣不言但弱無胃曰死以弱但正氣不足非有邪氣相乘且弱止可言胃氣則衰不可言胃氣絕也

近柔軟一邊可云柔軟之甚為弱不可云但弱無柔軟也

弱多胃少曰脾病但代無胃者言此謂之柔軟也

但見其所更者而不見胃氣則衰而至冬必病矣

弱當作石甚曰令病

春夏以我赴者言此下皆以我赴者言互文以見例

互文也

秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有弦曰春病弦甚曰令病

冬胃微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石而有鈎曰夏病鈎甚曰令病

真肝脈至

此下皆言真藏脈真猶言純真肝脈者言此為純乎肝脈毫無胃氣者也

蓋肝弦肺濤心浮腎沉各得一偏

惟胃氣六脈不弦不濤不浮不沉中和

合德有以化四者之偏故肝雖乘春令以呈其弦象而中口柔緩之胃氣即與之偕

行而胃之和緩意多肝之弦意少是為平脈若弦多胃少即為病臟矣況毫無胃氣而純乎弦勁耶此蓋胃絕使然故凡

真藏脈現者必死也餘藏脉此論之

病如循刀刃如按琴瑟弦皆挺勁

真心脈至堅而搏如循薏苡子

堅實之狀纍纍然見子指下也

真肺脈至大而虛如以毛羽中人膚虛浮無

真腎脈至搏而純無餘韻也

如指彈石堅

真脾脈至弱而乍數

## 各脈主病

病非表則裏非熱則寒非虛則實耳故序浮沉遲數虛實六脈于先餘脈于後長大實滑等有餘之脈主證多同短細虛實等不足之脈為病相類當會通觀之非入于此者即不入于彼也如頭痛身熱隸之浮數豈他脈便無此三証哉覽者但取其意勿泥其文便觸類旁通引伸不盡矣

浮 陽脈也陽外陰內故浮主表沉主裏又陽上陰下故浮主上部沉主下部以外感言之凡六淫之邪中于表清邪中于上脈必浮也以內傷言之裏氣失守而虛邪外越腎陰失守而浮陽上冲脈亦必浮也

浮遲 為表冷浮主寒也

遲主寒也

傷濕表中濕邪

若兼風邪中表滯其經絡則

中風

虛風內發故浮內虛寒故遲

浮數 為頭痛

運眩

吐衄皆風熱上攻所致

表熱

瘡

陽結能食大便

胸滿

肩背痛

浮虛 為表陽虛

傷暑

大熱傷氣汗出過多故虛

勞倦

喘

欬血

浮實 為表邪實六淫之邪或痰凝血滯之在表者皆是也

脹滿

胃熱血沸

氣逆痛

肺熱

膚痛

瘡

浮大 為風熱癰疹風熱血沸

膿于外也

身庠

名泄風熱蒸汗出

表邪盛

癥癩即

化故關而不得小便格而不納食也

浮為正虛大為邪實邪實正虛不能運

為癩疾

浮小 為表陽衰

浮緩 為傷風 傷風有汗內熱得泄故脈不緊 傷濕 濕傷肌表肌肉血脈緩弱如土濕則軟也

浮繁 浮繁 濕則散也 為傷寒

身痛

浮弦 為頭痛 吐食 風飲

浮滑 為風痰 魣血 吐逆

浮濁 為麻木 身熱無汗 肺燥 汗多津傷 血虛氣浮

浮長 為頭痛 風癇

浮短 為喘乏

沉 主裏主下部 七情鬱結痰血停滯凡屬內邪脈必見沉若不因內邪而見沉則為陽氣內陷為裏虛不能外達分別觀之

沉遲 為裏寒 泄瀉 氣血滯 畜水

沉數 為內熱外寒

內熱反覺外寒熱聚于內不達于外也

便難

消穀食多而便少也

厥熱

厥手足冷也 热聚于內不達于四肢 故冷又有手足熱者詳醫碥厥門

便

沉虛 為裏虛 濡血 下利

沉實 為積聚 血瘀 順心熱乘 咳唾熱乘

沉緩 為裏濕 畜水

沉緊 為冷痛 奔豚腎中陰寒之氣從小

腹上冲心若豚奔突 瘰疝 瘰積塊也疝為小腹有形之

病皆寒邪之凝聚而成者

腰脊

痛腎附背腎寒則氣滯而脊痛

瘕疝

瘕積塊也疝為小腹有形之

沉弦

為脇下有積弦為肝脈

少腹痛

內飲 痘

沉滑

為食痰

便膿血

沉濁

為血滯

精傷

不月不孕

內疽

沉大

為內邪盛

沉細

為血少

洞泄亡陰

遲

主寒以寒則氣少而行慢也屬水

遲大

為寒邪 脓痺

遲細

為寒瀉

遲實

為寒積

遲虛

為虛寒

遲緩

為寒濕

遲緊

為寒痛

寒滯氣不通故痛

為筋急

筋寒則收引故急

遲濁

血寒而滯

數

主熱以熱則氣盛而行速也屬火

數大 為煩躁 涕 瘰疹 脹滿

數虛 為虛熱 忡忡 虛損

按虛熱者脈必虛數無力固矣然有過服寒劑寒熱搏擊或肝邪犯土脈反強大有力者投以溫補之藥則數者靜弦者緩大者歛矣此最當知又有虛寒而逼火浮越者真陽欲脫者脈皆數甚者亦弦大有力皆當以証泰之勿誤也

數實 為實熱 癱瘓 煩躁 讀妄

數滑 為熱痰 血熱 涕

數濤 為熱灼血乾

虛 為正氣不足

虛滑 為正虛挾痰

虛濤 為血液不足 氣滯

虛弦 為虛損 少食 虛痛

虛緩 為虛弱 泄瀉

虛細 為氣血不足

虛大 為血虛

實 為邪氣有餘不作正氣充實論以正氣止有不足無太過太過即為邪氣也泰

長脈條 坎中滿離中虛水脈多實火脈多虛

實滑 為痰結 為宿食

實大 為邪盛而實

實大浮數 為腫 胸脇壅滿 不小便無升氣有升

緊 為寒邪為木邪微者不過抑遏正氣甚則戕賊中州為真藏見

緊遲 為肝氣寒滯

緊數 為寒鬱熱 咳嗽外寒乘熱攻肺 痛寒熱相搏故痛

緊大 為寒邪盛 下利土敗木

緊實 為有形之邪瘀血之類

緩 主濕邪土濕則泥濪而軟也問緩本和柔之名乃脾胃之正氣何以謂之病脈曰脾胃脈本中和不緊不緩原無緊緩可名今曰緩即非不緊不緩之中和矣蓋凡有可名者即非中和即為病脈也舊謂四至為緩三至為遲濕滯故脈遲緩亦通蓋緩有兩義一對數言一對緊言以主濕則亦有兩義一為濕滯之而遲一為濕浸之而軟也

緩大 為濕盛

緩細 為正虛挾熱

緩數

為濕熱

內瘡

不能行動曰瘡肌肉四肢並見軟弱也脾主肌肉四肢濕熱盛則困倦經謂脈緩多熱蓋對脈急多寒言寒則筋脈

收引故緊熱則筋脈弛緩故緩也然亦兼見熱証乃為熱不可不知

緩浮數

為多汗

緩數大

為狂笑

心熱則笑

濕熱壅脹

緩長數

為喜嘔

溫熱挾火而逆

水瘕

水積也土受木尅不能制水

水鬱成熟也

痺

麻木不知痛痺也木尅于土不能行

緩聚於肌膚故痺

滯成熱故數

緩滑

為濕痰

緩濁

為解体衰弱使然

長數 為熱熾  
寸長 為足痰痛  
氣喘息 尺長 為關脈長一寸過此為太過名覆關不得小便也熱結在下故不得小便

尺長

為關脈長一寸過此為太過名覆關不得小便也熱結在下故不得小便

傷也

陽盛陰

寸脈長九分過此為太過遂上魚名溢格不逆

食也

陽盛于上胃中血枯故食不得入

逆

尺寸俱長大 為陽明病 傷寒熱在陽明

則脈大而長

短 短為正氣短

短濶 為肺燥

寸短 為頭痛

陽不足則陰氣得而上干之

大 為邪氣盛 經謂大為病進乃指大而有力者其病為實邪邪加盛則脈如大

也仲景謂大為虛又謂大為勞乃指大而無力者其病為虛邪虛則氣散勞則氣張故脈亦應之而虛大也當分別觀之

陰靜而歛陽動而張故火旺者脈必大即大亦沉靜而有力也

小 為正衰血氣皆少形體消瘦

陽不張則小水不足亦小兼數則水更損

細數 為血虛發熱

虛勞得此難治

芤 為失血

芤數 為亡血發熱 身體瘦肌內甲錯枯

芤遲 為氣虛脫血

芤動微緊 為男子失精 女子夢交

弦 為肝邪傷脾為痛為飲

皆脾氣被傷停滯之故

甚則與緊同論

弦遲 為寒瘈 慢驚風

弦數 為熱痛 急驚風 正氣大虛

弦實為肝實善怒不樂

不暢

脅冒

肝火上冲故冒

弦實

肝脈會于顛火上冲故痛

弦大為肝邪盛

弦小為虛損

弦滑為痰飲

滑流动屬陽

主風熱吹血氣如風

主痰飲

凡物乾涸則濁濕潤則滑故滑為血盛痰多

主胎孕

滑大為多痰多血

滑緩為痰濕

滑緊為寒痰冷食

濇血少而滯屬陰

濇大火盛血枯

此經所謂陽有餘也

濇小為血氣俱少少食心痛

血少不養心

氣滯

痺

血不養筋

癲掣

血不

瘡

氣滯

瘡

氣滯

膈

氣滯

反

胃

腸

結

微濡弱皆血氣衰微之脈

微浮為陽氣微

微緊為虛損多汗

陰寒逼于外

短氣

陰寒逼上

微濤 為體痺

氣滯  
血濤

寒慄 放逆唾腥

濡弱 為亡血發熱

煩心 厥逆

陽氣不能四  
達故手足冷

弱濤 為精冷無子

散 為脫 為煦仆

牢 為痼寒 癲疝

陰病舉丸連  
少腹急痛

瘕癰

革 為寒盛 男亡血失精

女半產漏下並寒不  
攝血

動 陰陽相搏虛者則動陽動見于寸陰動見于尺

陰動為發熱 血崩 陽動為汗出

驚 痛

陰陽相搏氣  
不順故痛

伏 不過一時偶伏乃暴病久之氣調即通

為霍亂 痛劇

陰陽否隔 氣閉 血滯

忿怒氣逆

傷寒服藥後煩躁冒督脈忽伏不見寒戰  
此正邪相爭欲作汗宜靜待勿倉皇誤治

伏濤 為吐逆

血枯不能納食  
水穀不化

氣滯  
不運

結 為寒滯 七情鬱結

氣血滯 瘡 癥

促 為熱壅 癰毒

便膿血

癰毒不成  
則下泄也

若非熱壅則為氣脫

代 為臟絕 霍亂

跌打悶絕 暴絕

瘡痛極

胎氣阻

按以上所列脈病畧舉大概難以執泥如浮主表沉主裏而內傷發熱大類外感脈亦浮數寒邪初感遏鬱表氣脈不能外達反見沉繁不細辨則以表為裏以裏為表而誤治矣脈數為熱然陰虛發熱陽虛發熱者脈皆數愈虛愈數一當滋陰一當補陽而概以實熱治之可乎嘗見實熱之脈多緩軟不數故經以緩為熱宜知脈遲為寒然熱滯于內者脈亦壅滯似遲以為寒誤矣有邪盛而正未衰者脈見實而不見虛既無虛脈可參則正之已衰者又何由而見乎按此當以兼緊兼緩辨之又以形氣之盛衰參之凡此皆當參伍求之而不可刻舟求劍者一脈而數病亦一病而數脈即欲膠執言之又烏可得哉人迎氣口

按內經謂寸口主中寸口為太陰肺經肺為藏故以此通候五藏之氣人迎主外陽明胃經脈也胃為府故以此通候六府之氣府口以候內人迎以候外人迎本在頸下夾結喉旁一寸五分後世既廢古人三部分診之法遂改候人迎於左手關脈而名右手關脈為氣口與之相衡謂氣口大於人迎為內傷飲食以左關屬胃此有理人迎大干氣口為外感風寒以左關屬肝肝主風也然內風與外風無涉于理未的分主表裏雖與經意無異而部位不同矣猶之足少陰腎氣本于太谿診之在足內踝後五分筋骨中令則診於兩尺足陽明胃氣本于趺陽即衝陽在足跗上二寸高骨間動脈診之令則診于右關也張仲景每以寸口趺陽腎少陰並言喻嘉言謂即寸關尺

再按結喉旁人迎脈恒大于兩手寸口脈數倍從無寸口反大干人迎者人迎微大秋冬此後人所以改候人迎於左關以與右關較大小也

經謂平夏

古謂男脈左大于右女脈右大于左驗之不然蓋人之右手比左手畧大脈亦應之而右大于左不論男女皆然也惟男兩尺恒虛女兩尺恒實差不同耳

### 男女脈同異

### 胎孕脈

經曰婦人手少陰動甚者任子也

少陰脈指神門言今則診于左寸矣動甚流利滑動也舊說謂心生血旺故能胎

作足少陰謂太陰搏陽別  
舊註謂陰尺陽寸脈搏謂之有子

準繩從之手與寸殊別準繩從之子男女通稱

曰左疾為男右疾為女

利之意者滑

又曰左尺偏大為男右尺偏大為女又左沉實為男

右浮大為女益左屬陽右屬陰陽道實故脈實而沉陰道虛故脈浮而虛也

觀坎離二象可見

見大字含有虛意而滑伯仁則云左尺洪大為男右尺沉實為女與叔和相反滑說

恐非再按胎孕之脈六部皆滑疾而兩尺尤盛不求于尺而求于寸亦誤信經語

矣經言心生血謂血色之赤自心火來耳豈真血生于心哉

準繩曰妊娠初時寸

微小呼吸五至三月而數尺滑疾重按之散者胎已三月也不散但病不滑者五月

也

胎至五月則乳頭根必黑乳房亦升發更為實據

脈經云尺脈按之不絕妊娠也

羸弱之婦不必脈皆滑實但按尺中應指

源源不絕便是滑伯仁謂三部浮沉其脈離經

經常也與常日脈異者是一說離經

正等無他病而不月為胎妊亦此意謂歌至及大小不匀如雀啄者是

而腹痛引腰背為欲生也

腹不引痛痛不引腰脊俱未產當靜待之

張路玉云胞形如抱甕按之冰冷

而脈乍大乍小乍有乍無浮沉動止早晚不同為鬼胎又有如風雨亂點忽去忽來或指下見兩岐者為夜叉胎又云孕脈浮細弦急憎寒壯熱唇口青黑是胎氣損也胎若不動反覺上擔心悶絕按之冰冷者是胎已死

### 脈有順逆

脈得四時之順曰病無他脈反四時曰病難已 春夏而脈瘦也秋冬而脈浮大曰逆四時春得秋脈夏得冬脈 長夏得春脈秋得夏脈冬得長夏脈命死不治

春不沉

春脈宜弦然春初猶滯冬沉但強不沉也餘倣此

夏不弦秋不數冬不濶是為四塞脈

為病脈沉甚弦

甚數甚濶甚曰病參見曰病復見曰病未去而去曰病而不去曰病反者死

按脈與四時違須問有病無病而得此誠為可虞

無病何因脈變其病耳如受蠹之木如磨刀之石不見其損日有所虧不無枝葉未壞本實先發之憂耳

若因病而致不過難治非必死也

如秋月病熟脈得浮洪為脈証相合

寧可斷為必死乎

形盛脈細少氣不足以息者危形瘦脈大胸中多氣者死

經又云形氣有餘脈氣不足足死脈氣有餘形氣不足

生當泰看形氣相得者生參伍不調者病三部九候皆相失者常死上下左右相應如參

死常死上下左右相應如參此來彼去如參春不可數者死中部獨調即寸口在手衆藏相失者死上部在頭下

各藏若失常此落也中部獨調亦死中雖調亦死中部獨減者死上部獨衰減亦死

脈從陰陽

謂陽病見陽脈陰病見陰脈

病易已逆陰陽病難已

脈從而病反者何如曰脈至而

按之不鼓諸陽皆然

陽証見陽脈為脈至而從矣然使按之無力不能鼓指便非真陽証不可作熱治

凡諸脈之似陽非陽者皆然也

諸陰之反何如曰脈至而從按之鼓甚而盛也

陰証雖見陰脈然鼓指有力則亦非陰

熱病汗出而脈尚

燥盛者死

溫病時疫皆以數盛有力為順細小無力為逆汗後脈靜身涼為順脈仍煥身仍熱為逆

實病在中

結也 脈虛病在外

感風寒也 脈濤堅皆難治

經語上皆 諸卒仆暴厥

証舊名中張景

岳易名 皆元氣素虧故耳卒倒不省人事脈宜小弱不宜數盛

中毒宜浮大數實

浮則毒尚活動可行散

不宜微細虛濤

正被毒傷矣

勞倦傷脈以虛大弱緩為順緊數大汗出熱

非風

不 止 者 死

飲食傷以滑大為順若胃停生冷則兼緊

霍亂吐利後搏大者逆太

微遲者逆

未吐利前脈伏或歟至不妨以氣滯不行也

勞倦傷脈以虛大弱緩為順緊數大汗出熱

浮則毒尚活動可行散

不宜微細虛濤

正被毒傷矣

勞倦傷脈以虛大弱緩為順緊數大汗出熱

順數

不過痰氣阻逆

數弦濤大便燥結者死

氣血枯結也

腫脹宜浮大有力忌短濤虛細

肺痿

虛數為順

肺癰遇於治數者逆已潰宜緩滑

失血証脈宜虛弱弦實數者逆加

以身熱不得卧必死

畜血脉實大可攻為順

痢疾為裏証宜沉惡浮與發熱

外越也若初病兼表邪者不在此論

宜緩細有神惡強弦

頭目痛脈浮滑為風痰上攻可治短濤為

血虛火逆難治卒無所見者死

清陽失守邪火僭逆于上也

瘕疝積聚之類沉實有力可治虛

弱者死

癲狂宜滑大忌濤小

癱瘓未潰浮滑數大為順沉細遲濤者逆

痙病

浮弦為陽沉緊為陰然過于堅强者不治

胎脈宜和滑流利忌虛濤

部產及崩

痙病

漏宜緩弱忌弦數

大抵新病陽病凡屬邪氣有餘之証法當攻伐者須見盛大有

餘之脈乃可受攻若見細微不足之脈則邪盛正衰攻邪恐傷乎正仲景謂陽病見陰脈者死雖未盡然亦難為力矣久病陰病凡屬正氣不足之証法當培補者須見虛弱不足之脈乃可受補補之而脈之弱者漸大虛者漸充是陰脈轉為陽脈此仲景所謂陰病見陽脈者生也若見強實有餘之脈則土敗木賊任補不應或反以助邪不可救矣凡敗証脈脫治後脈氣以漸生復為佳若陡然而出如復元者必復脫不可救矣此燈將滅而復明之義也再按陽病而得盛大之脈須察其胃氣之虛實必盛大而和緩方任攻伐若弦多胃少或形氣不足俱不可攻若癥瘕積聚脈本帶弦亦須看弦中胃氣仍在且形氣未損又處不得不攻之勢方可議攻病去六七即已謂所大積大聚衰其大半而止也

### 脈証從舍

凡脈証不相合必有一真一假須細辨之如外雖煩熱而脈見微弱者必虛火也腹雖脹滿而脈見微弱者必胃虛也虛火虛脹若堪攻乎此宜從脈之真虛不從証之假據也其有本無煩熱而脈見洪數者非火邪也本無脹滯而脈見弦强者非內實也無熱無脹其堪濁乎此宜從証之真虛不從脈之假實也如寒邪內傷或食停氣滯而心腹急痛以致脈道沉伏或促或結此以邪閉經絡而然既有痛脹等實証可據則脈之虛乃假虛當從証不從脈又若傷寒四肢厥逆寒戰而脈見數滑此由內

熟格陰何以知之以病由傳經漸致並非直中陰經從無熟証轉寒之理既有數滑之脈可據則外症之虛為假虛亦從脈不從証也

### 南北政辨

內經謂少陰所在其脈不應謂沉細不應指也歷驗不然此偽說也不必為其所惑

### 附奇經八脈診法

岐伯曰前部寸外者足太陽也膀胱經脈內者候足厥陰也肝經中部也關外者足陽經脈前部中央不浮不沉直者下文對斜言內者足太陰也脾經後部尺外者足少陽也膽經內者足少陰也腎經前部中央為中候直者下文自明手少陰脈經太陽也小腸經脈中部中央直者手厥陰也心包絡經後部中央直者手太陰肺經陽明也太陽經脈

按此與素問脈要精微論不同殊無理益內經乃後人所撰非出一手故互異但此為下文奇經八脈章本存之

前部橫于寸口丸丸者橫如連橫之橫浮中沉一體無異也說詳下文丸丸猶動脈所謂如豆也詳動脈橫于寸口丸丸者謂寸口脈團結滑動如丸浮中任脈也脈經則云寸口緊細實長下至關三部俱浮陽督脈屬沉皆然也任脈此語岐伯異察可也三部俱浮陽故浮直上直下者直謂不斜觀督脈也三部俱牢沉實也衝為血直上直下者衝脈也前部陽蹻屬陽海陰盛故沉實左右兩手彈者弦緊陽蹻也後部陰蹻屬陰故候于尺左右彈者陰蹻也中部帶脈居中故候于關左右彈者帶脈也從足少陰猶言尺沉分即上文所謂後部內為足少陰也斜至足太陽者足太陽上文屬前部外乃寸浮分也從尺沉分


上至寸浮分與督脈三部俱浮衝脈三部陽維也  
俱沉實皆直上直下者不同故曰絳也  
乃尺浮斜至足厥陰者厥陰乃寸沉分也  
上文言前部內者足陰維也屬陰故始  
浮終沉始

為圖明之



橫于寸部丸丸者任脈也  
如勾寸關尺俱浮者督脈也  
如股之直寸關尺俱沉者衝脈也  
如股之直  
陰斜至足太陽者陽維也  
即從尺沉斜至寸浮乃  
即從尺浮斜至寸沉乃  
丙戌庚也亦如強之絳

按李瀨湖則以脈常行之道為中而有時偏于外而近臂廉有時偏于內而近臂  
 中筋間為圖明之



所謂從足少陰斜至足太陽者乃從尺內斜至寸外也所謂從足少陽至足厥陰者乃從尺外至寸內也所謂左右彈者即內外彈也與愚說不同未知孰是請質高明

再按奇經之病當以証診勿專恃脈其病証詳針灸奇經病篇

諸方目

下註諸方頁數  
已于門目註明

上

氣

四君子湯一

異攻散

六君子湯

黃芪君子湯

正氣天香散

四火湯

蘇子氣降湯

木香流氣飲

二 分心氣飲

補中益氣湯

木香氣散

調三

養正丹

沉香降氣散

四青木香丸

七氣湯

人參黃芪散

血

茅花湯五

止効散

犀角地黃湯

柴胡清肝散

四物湯

加味四物湯

知柏四

湯六物湯

四神湯六

槐花湯

芍藥連湯

黃連湯

平胃地榆湯

升陽除濕

和湯七牛膝四物湯

珀珠散

抵當丸

代抵當丸

益元散

見傷寒者

八黃芪六一湯

雞蘇丸

五陰煎

五福飲九

歸脾湯

加味歸脾湯

冬湯黑神散十

小烏沉湯

芍歸飲缺

甘草乾薑湯

見肺痿

百花膏七傷散十一

大阿膠丸

七珍散

滋陰保肺湯

白芨丸二十

枇杷丸二十

散芳附散

膠艾湯

鹿茸丸

鹿角膠九十三

白虎湯

見發熱

丸生地黃湯

花蕊石散四十

當歸湯

補血湯

升陽除風湯

濕防風湯

一字散

髮灰散

烏荊丸五十

小蘿蔔子

發熱

涼膈散

白虎湯

地骨皮散

鴻白散

黃連湯

心火湯

導赤散

瀉青丸

見補遺

左金丸

鴻黃散

火鬱湯

三黃丸

參蘇飲

白虎加人參湯

蒼木虎湯

人參黃散

柴胡升麻湯

潮熱

茯苓

補心湯

八珍散

五飲湯

四物二連湯

惡寒

升陽益胃湯

寒熱

抑陰黃丸

小柴胡湯

加味小柴胡湯

桂枝湯

麻黃湯

既濟湯

解毒十二黃芪丸

諸中

蘇合香丸

三生飲

稀涎散

碧霞丹

三聖散

巴欽丸

中風

小續命湯

二廿

烏藥散

順氣散

大秦艽湯

黃芪五物湯

三化湯

廿三

局方麻仁丸

見大便不通

搜風順氣散

愈風湯

即羌活愈風湯

二十四

至寶丹

活命金丹

二十

牛黃清心丸

參附湯

六

牛黃清心丸

參附湯

二十

犀角散

牛黃散

防風散

二十

五味子湯

獨活散

四物湯見血

地黃飲子 清心湯八十 濶心湯 防風通聖散

八味順氣散 木香氣散 調和丹

秦艽升麻湯

順風氣散九

虎脣骨酒 黃芪酒見脾 正舌散

茯神散

霍香正氣散三十

星香散 鐵彈丸 十味剉散 至聖保命金丹

三因白散子

參芪湯三十 缺

天麻丸 歸脾湯見血 白薇湯 倉公散 排風湯

三十 四生散

換骨丹 清陽湯十三

滌痰湯 轉石膏 木瓜丸

青州白九子三十

活絡丹 鴻青丸見遺補

中寒

蘇合香丸見諸中

五積散 薑附湯三十

理中青丸 附子理湯丸 連理湯

不換金正氣散

中暑

來復丹 邵暑散三十

大順散 枇杷葉散 二氣丹三十

香薷飲

六味香薷飲

十味香薷飲 緩脾飲 香薷湯 生脈散

中濕

除濕湯三十

白术酒

中氣

八味順氣散

木香氣散 調和丹



春溫

雙解散 防風通聖散

見中風

六一散

見傷暑

瘟疫

雙解散

見春瘟

二聖散

見發熱

涼膈散

見發熱

白虎湯

見發熱

黃連解毒散

見喜笑

普濟消毒飲

見本論第八行

柴胡湯

見本論第二十行

生脈散

見中暑

密胆導法

見大便不通論末

烏梅丸

見蟲

理中湯

見寒厥

人參湯

見發熱

白虎湯

見本論第六行

犀角地黃湯

見本論第十行

烏梅丸

見蟲

四逆湯

見厥

六味丸

見虛損

濟生丸

見腎氣虛

理中湯

見寒厥

瘧疾

羌活加黃湯

見加熱缺

小柴胡加桂枝湯

見四十

小柴胡湯

見寒熱

桂枝二湯

見跌

黃芩芍藥加桂湯

見缺

小建湯

見倦勞

異功散

見見氣

加半夏小柴胡湯

見缺

四物柴胡若棟

見

附子湯

見桂枝加藥湯

桂枝湯

見黃芩湯

四逆湯

見厥

通脈逆湯

見厥

芍藥甘草湯

見厥

桂枝加當歸芍藥湯

見桂枝加芍藥湯

白虎湯

見熱發

大柴胡湯

見四十

蜀漆散

見牡蠣湯

柴胡薑桂湯

見觀音丸

木香丸

見十五治癒

小柴胡去半夏加瓜萎根湯

見人參柴胡飲子

人參柴胡飲子

柴朴湯

見柴芩湯

柴平湯

見柴胡四物湯

柴胡四物湯

見分理湯

分理湯

見舉陷湯

舉陷湯

見雙解飲

清中癥飲

見五十五

瘧母丸

見嘉禾散

嘉禾散

見瘧母丸

常山飲

見柴常湯

柴常湯

見五十

加味薷飲

見薷飲

養胃湯

見食飲

咳嗽

消風靈嗽湯

射干湯五十  
麻黃五

越加半湯  
加夏湯

厚朴麻黃湯

澤瀉湯

麻黃桂湯

沸草散

六十  
五十

欬冬花散

清咽寧肺湯

杏仁煎  
潤肺丸五十

清音丸

橄欖丸

透羅丹

瀉肺丸

半夏溫肺湯

紫苑飲五十  
一

安腎丸

滋陰清化丸

五汁膏

逍遙散

觀百部膏五十  
膏九

桑枝煎

必效散

烏梅膏

缺大兔子丸十六

八味丸

見虛損  
知柏丸見虛

噙化丸

喘哮

五虎湯

三拗湯

定喘湯

華蓋散

陳皮湯六十  
桔枳陳湯

神仙佳湯

黃連膏

葶苈大棗湯

承氣湯見大便不通

清金丹

木防己湯六十

呃逆

黑錫丹

丁香散

柿錢散

丁香散六十  
柿蒂散三十

羌活附子湯

陳皮竹茹湯  
參附湯

大補陰丸

傷飲食

葛花解醒湯

沖和散

六十  
枳實解渴湯

瓜蒂散

小七香丸

感應丸

備急丸

五十  
治中湯

紅丸子

枳术丸

半夏枳丸

上二丸  
平胃散六十

木香丸  
木香丸

丁香散

枳术導滯丸

保和丸

麴蘖枳丸

木香枳丸  
木香枳丸

三黃枳九<sub>火</sub>六十 除濕氣丸 白朮丸 養胃湯 和解散 獨聖散火六十

茶調散 神保丸

不能食

三神丸 和中丸

勞倦

小建中湯 黃芪健湯 當歸建湯 大健湯六十 十四味湯 白朮附湯

調中氣湯 升陽散湯火十

虛損

保元湯 地骨皮飲 十全大補湯 人參養榮湯 桂附八味丸 六味地湯丸

七十 七味丸火十 都氣丸 加減黃地丸 知柏黃丸 濟生腎氣丸 补肝湯

救肺飲 天王丹火三十 三才丸 猪肚丸 大黃蟲丸 百勞丸 柴胡子火四十

防風歸飲子 麥煎散 傳屍將丸 蒼歸血餘散火五十 北斗符

八物湯即八珍湯 大黃青蒿煎 麥門冬湯

鬱

越鞠丸湯 承氣湯見大便不通 遙逍散 六味丸 加味道逍散火十 氣鬱湯

濕鬱湯 血鬱湯 熱鬱湯

痰

水煮金花丸八十

川芎丸

防風丸

祛風丸

導痰湯

導痰丸九十

小黃丸

滾痰丸

清心滾痰丸

欽涎丹

白术丸

小胃丹

玉粉丸

局方

二陳湯八十

薑桂丸

胡椒理中丸

六味丸

妙應丸

小半夏湯

五套丸小半夏湯

小半夏湯八十

加茯苓湯

苓桂术甘湯

甘遂半夏湯

厚朴大湯

己椒薑丸

八神來復丹

大青龍湯

八十

小青龍湯

茯苓丸

五飲湯

八味丸

見虛  
損

痞滿

括薑薤湯八十

括薑薤湯八十

烏頭赤石脂丸

薏苡附子散

茯苓杏仁湯

白白酒湯四十

白半夏湯八十

赤石脂丸

薏苡附子散

茯苓甘草湯

橘皮枳實生薑湯八十

枳實薑桂枝湯八十

人參湯

桂枝湯

枳實湯

積聚

大消痞丸

黃芩利膈丸

八十

秘方化滯丸

倒倉法

桃人煎

八十

大火氣湯

八十

伏梁丸

三伏梁丸

肥氣丸

加減肥丸

八十

三因肥氣丸

息賁丸

十九

減息賁丸

一

痞氣丸

加減痞氣丸

九十

三痞氣丸

奔豚丸

九十

三奔豚湯

二腎散

通經散

蟲

烏梅丸 化蟲丸 九十 萬應丸 取蟲積方 蠶蛹汁方

腫脹

疏鑿飲子

五十

實脾飲

復元丹

防已黃芪湯

越婢湯

九

防已湯

桂枝湯

小便

苓湯

越婢加术湯

甘草麻黃湯

五皮飲

除濕湯

見中

桂黃丸

缺

十棗湯

苓導水湯

枳實湯

桂枝湯

茯苓湯

瀦川散

神祐丸

九十

三神祐丸

禹攻散

舟車丸

白朮湯

苓導水湯

枳實湯

桂枝湯

茯苓湯

寒脹中滿分消湯

九

熱脹

中滿

分消丸

中滿

分心氣飲

紫蘇子湯

分氣香蘇飲

十九

厚朴散

調中健丸

九 消導寬中湯

大異香散

當歸活血散

人參歸芎湯

加味枳木湯

一百一

人參大黃湯

七氣消聚散

參木建脾湯

一百

厚朴散

調中健丸

椒仁丸

人參大黃湯

七氣消聚散

參木建脾湯

一百

厚朴散

調中健丸

桂枝芍藥湯

桂枝苦酒湯

大橘皮湯

二百

升麻氣散

導水丸

黃疸

茵陳蒿湯

三百

梔子大黃湯

硝石礬石散

茵陳五苓散

桂枝加黃芪湯

大黃硝石湯

小溫中丸

四百

大溫中丸

東壁丸

煖中丸

青龍散

五百

茵陳梔子湯

穀疽丸

霍脾湯

加味四君子湯

滑石散

腎疽湯

六百

小半夏湯

見

消渴

黃芪六一湯 玄菟丹 靈砂丸 黃連豬肝丸火百 忍冬丸 參术飲 黃芪飲

七珍散八百

乾葛飲

腎氣丸

即附桂八味丸  
見虛損

痿

補陰丸

二陳湯見痰

健步丸

滋腎丸見小便不通

神龜滋陰丸九百

左經丸

續骨丹

霞天膏

見積聚

肺癰

桔梗湯

葶苈大棗瀉肺湯

甘草乾薑湯十百

醫編卷之六

諸方門目上

下註方目頁數如欲查瘧門之牡蠣湯先查門目瘧下註五字即于本卷第五頁再查牡蠣湯下註四十九字即于本卷諸方四十九頁

便得查之

氣一血

發熱二潮熱

惡寒

寒熱

諸中

中風三

中寒

中暑

中濕

中氣四

中惡

傷風

傷暑

傷濕

傷燥

五春溫

瘟疫

瘧

咳嗽六喘哮

呃逆

傷食

不能食

七勞倦

虛損

鬱八

痰

痞滿

積聚

蟲九

腫脹

黃疸

消渴十

痿

肺癰

醫

石

卷六

諸方上

氣

四君子湯

人參

白术

茯苓

各二錢

炙甘草

一錢

水煎服加薑棗

異功散

即四君子湯加陳皮

六君子湯

即異功加半夏

黃芪四君子湯

即四君子以黃芪易炙甘草

正氣天香散

烏藥

二兩

香附米

八分

陳皮

紫蘇葉

乾薑

各一兩

右為細末每服一錢七鹽湯

調服

四七湯

半夏

湯泡五次一錢五分

茯苓

去皮一錢二分

紫蘇

六分

厚朴

薑製九分

水一錢生薑七片紅棗二枚煎至八分不拘時服

蘇子降氣湯

醫

石

卷六

紫蘇子炒

半夏湯洗七次  
二兩半

前胡去蘆  
甘草炙

厚朴去皮  
製

陳皮去白  
一錢各

川當歸去蘆  
錢半

沉香分

水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服虛冷人加桂五

分黃芪一錢

木香流氣飲

半夏湯洗七次  
培二兩

青皮去白

厚朴去  
龜皮

紫蘇梗

香附子炒

去毛

甘草炙各  
一斤

陳皮去白  
二斤

肉桂去龜皮  
火不見火

莪朮煨

丁香皮火不見

大腹皮

製

麥門冬去心

檳榔去白

木香不見火  
各一錢

草果仁各六  
兩

木通去節八兩

白芷

藿香葉

赤茯苓去皮

白术乾木瓜

人參去白

石菖蒲各四  
兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑三片棗

二枚煎七分熟服

分心氣飲

紫蘇莖葉三  
兩

半夏製

枳殼雨半

青皮去白

陳橘紅

大腹皮

桑白皮炒

木通節去

赤茯苓

南木香

檳榔

蓬莪朮煨

麥門冬去心

桔梗

辣桂

香附去白

藿香各一  
兩

甘草炙一  
錢半

右剉散每服三錢水一大盞生薑三片棗二枚

燈心十莖煎七分不拘時服

補中益氣湯

黃芪

當歸

人參

炙甘草

陳皮

升麻

柴胡

白术

此方東垣所製

止有黃芪一錢其餘各三分薛立齋常用參芪各錢半白朮一錢當歸一錢陳皮七分升麻柴胡各五分東垣取清輕上升故各數少立齋無用以濟進退加減神應無窮如病甚者參芪或三錢五錢隨証功用凡脾胃此方本主脾肺脾運則陽明之氣上達而胃開然不得肺藥之力則不能親上也喜甘而惡苦喜補而惡攻喜溫而惡寒喜通而惡滯喜升而惡降喜燥而惡濕此方得之東垣此方原為感証中有內傷一種故立此方以補傷寒書之所未及非補虛方也今感証家多不敢用而以為調理補虛服食之藥則謬矣

調理補虛乃通其義而轉用者耳

### 木香調氣散

白荳蔻仁 丁香 檀香 木香各二兩

藿香葉

炙甘草各八兩

縮砂仁四兩

右為細末每服二錢入鹽少許沸湯不拘時點服

### 四磨湯

人參 檳榔 沉香 天台烏藥 右四味各濃磨水煎三五沸放溫空心服或下養正丹尤佳 本方去人參加木香枳實名五磨飲子白酒磨服

### 養正丹

水銀

黑錫去滓淨秤與水銀結砂子

硫黃研

硃砂研細各一兩

右用黑盞一隻火上熔黑鉛

成汁次下水銀以柳條攬次下硃砂攬令不見星子放下少時方入硫黃末急攬成汁和勻如有鹹以醋酒之候冷取出研極細煮糯米糊丸菉豆大每三十丸鹽湯棗

湯下

沉香降氣散

沉香二錢 分 紹砂仁七錢半

甘草五分 炒去毛

香附子六兩 二錢五

右為極細末每

服二錢入鹽少許沸湯調服不拘時淡薑湯下亦得

青木香丸

黑牽牛二百四十兩炒香 取末一百二十兩

補骨脂炒香

華澄茄各四兩

木香二十兩

檳榔用酸棗米飯裏

紙包火中煨令濕焦去飯四十兩

右為細末清水滴為丸如桐子大每服三十九茶湯熟水任下

七氣湯

人參去蘆 肉桂去皮

甘草炙各一兩

半夏湯泡七次焙乾五兩

片煎至八分食速服

人參黃芪散

人參 桔梗各一兩

秦艽

鱉甲炙

茯苓各二兩

知母三分

半夏湯洗

桑白皮

五各二兩 紫苑

柴胡各二兩

黃芪三兩

右為粗末每服五錢水煎服

血

茅花湯

茅花 每服三錢水一盞半煎七分不拘時溫服

止効散

黃芪

六錢

赤茯苓

白芍藥

川當歸

生地黃

阿膠

各三錢

右為細末食後黃

芪湯調服二錢

犀角地黃湯

犀角

丹皮各二錢半

白芍

一兩

生地黃

一兩五錢

每服五錢水煎

柴胡清肝散

柴胡

黃芩炒

人參各三分

山梔炒

川芎各五分

連翹

桔梗各四分

甘草

三分

水煎服

四物湯

地黃

熟三錢或生或

芍藥

赤二錢或白或

川芎

一錢半

當歸

三錢

水煎服

加味四物湯

即四物加梔子丹皮柴胡

知柏四物湯

即四物加知母黃柏

六物湯

即知柏四物湯

四神湯

當歸

川芎

赤芍藥各一

乾薑炮五錢

右為細末酒調服三錢

槐花湯

槐花炒 側柏葉杵 荆芥穗 枳殼炒黃色各 水二鍾煎八分空心溫服

芍藥黃連湯

芍藥 黃連 當歸各半 大黃一錢 淡桂五分 甘草炙二錢 半錢者調木香檳榔末一錢

黃連湯

黃連 當歸各五錢 甘草炙二錢半 每服五錢水煎

平胃地榆湯

蒼朮 升麻 黑附子炮各一錢 地榆分 白朮 陳皮 狗芩 厚朴 乾薑

葛根各五分

甘草炙

當歸

炒麵

白芍藥

益智仁

人參各三分

水二盞生

薑三片棗二枚煎至一盞去渣食前溫服

升陽除濕和血湯

生地黃

牡丹皮

炙甘草

生甘草各五分

黃芪一錢

白芍藥一錢

升麻分

熟地黃

當歸身

蒼朮

秦艽

肉桂各三分

陳皮分

水四大盞煎至一盞稍

熱空心服

牛膝四物湯即四物湯倍加牛膝

珀珠散

琥珀末一錢

珍珠粉五分

硃砂粉五分

滑石粉六錢

甘草末一錢

每服三錢引用

整木通去粗皮黃色者煎湯調服

若有熱尿澁導赤散加牛膝鬱金清之大便不通入正散加牛膝鬱金下之利後仍服此方自効

板當丸

水蛭二十個 蟲蟲五十個 桃仁二十個 去皮尖

大黃三兩

右四味杵分為四丸以水一升

煮一丸取七合服之時當下血若不下者連服

代抵當丸

大黃川產如錦紋者去皮及黑心四兩

芒硝以玄明粉代

當歸尾

桃仁炒黃去皮尖另研如泥六十枚

生地黃

穿山甲各一兩蛤粉炒

桂五錢或五錢

右為極細末煉密丸如桐子大

畜血在

上焦丸如芥子大

臨卧去枕仰卧以津嚥之令停留喉下搜逐膈上中焦食遠下焦

空心俱桐子大以百湯水煎湯下之

用歸地者欲下血而不損血耳且引諸藥至血分也諸藥皆獵悍而欲以和劑緩之

也如血老成積此藥攻之不動宜去歸地加廣茂

醋浸透培乾一兩

肉桂七錢

桃仁承氣湯

桃仁五十個去皮尖

桂枝二兩去皮

大黃四兩

芒硝二兩

甘草二兩炙

右五味以水七升煮

取二升半去滓內芒硝更上火微沸下火先食溫服五合日三服當微利

黃芪六一湯

黃芪  
錢六  
甘草  
錢一

雞蘇丸

雞蘇葉八兩  
黃芪 防風去  
荆芥各一兩  
桔梗 甘草各半  
右為細末煉蜜和如彈子大每服一丸細嚼麥門冬去心煎湯

下不拘時服

五陰煎

熟地  
山藥炒  
炙草  
白茯苓  
芍藥  
炒  
五味子  
人参  
白术  
炒  
加蓮肉煎

五福飲

人參 心  
熟地 脾  
當歸 肝  
白术 肺  
炙草 脾  
水煎服

歸脾湯

人參 白术  
炒 茯神  
棗仁炒  
龍眼肉  
錢二  
黃芪  
錢半  
木香  
甘草  
炙各五分

薑棗煎 此嚴用和原方也薛立齋加遠志當歸各一錢以治血虛從肝補心從心  
補脾乃二隔之治也  
脾氣虛寒不能運血歸經故用參芪木草以補脾又用木香行之氣虛則易散故用棗仁以斂肝血不歸經則心失所養而不寧故用圓眼肉  
高鼓峰謂木香本以瀦血歸經然香燥反動肝火而乾津液故每去之而加白芍以追已散之真陰且白朮燥烈肺中有火者恐助咳嗽得芍佐之則止為養榮之用而不上僭惟脾虛泄瀉者方留木香以醒脾甚有理

加味歸脾湯 即上方既加遠志當歸又加丹皮梔子

### 天門冬湯

天門冬去心  
生地黃當歸去  
時服

遠志草煮去心甘

人參 没藥

水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘

麥門冬去心

白芍藥 蘿蔥

阿膠蛤粉

黑神散

黑豆炒半斤去皮

乾熟地黃酒浸

當歸酒製去蘆

肉桂去粗皮

乾薑炮

甘草炙

芍藥

蒲黃各四兩

右為細末每服二錢酒半盞童便半盞不拘時煎調服

小烏沉湯

烏藥去心十兩

甘草炒一兩

香附子

炒盆內浙去毛皮焙乾二十兩

右為細末每服一錢不拘時沸

湯點服

補肺湯

鍾乳碎如米粒

桑白皮

麥門冬去心各三兩

白石英碎如米粒

人參去蓋

五味子

棗

欵冬花梗去梗

肉桂去粗皮

紫苑洗去土各二兩

右為粗末每服四錢水二盞薑五片大棗一枚粳米二十餘粒煎一盞食後溫服

三炒丹

吳茱萸

去枝梗洗淨以破故紙一兩同炒

草果仁

一兩以舶上茴香一兩炒

葫蘆巴

以上茱萸一兩同炒俱候香熟除去同炒之藥

已上各  
一兩

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服六十九不拘時鹽湯下

### 百花膏

欬冬花 百合

蒸焙等分

右為末煉蜜丸如龍眼大每服一丸臨卧嚼薑湯下

### 七傷散

黃藥子

各一兩半

赤芍藥

七錢半

知母

玄胡索各半兩

鬱金

二錢半

當歸

半山藥

乳香沒藥

血竭

錢二錢半

右為末每服二錢茶湯下或紅花當歸煎

湯下

### 大阿膠丸

一方無卷柏生地大薊雞蘇有丹參貝母茯神杜仲

阿膠

炒微

卷柏

生地黃 熟地黃

大薊

獨根者晒乾

雞蘇葉

五味子各一兩半

柏

子仁

另研

茯苓

百部 遠志 人參 麥門冬 防風

各半兩

乾山藥

一兩

右為

細末

煉蜜丸如彈子大煎小麥麥冬湯嚼下一丸食後

### 七珍散

人參 白朮

黃芪炙

山藥

白茯苓

栗米

炒微

甘草

分各等

為細末每服三

錢

薑棗煎

服如扁豆八珍散加

### 滋陰補肺湯

黃檗

鹽水炒

知母各六分

麥門冬三錢

天門冬三錢

去心一錢二分

枇杷葉三錢

去毛尖火分

當歸根粉炒

當

歸

芍藥根

生地黃

阿膠蛤粉炒

五味子十五粒

橘紅

紫苑分七

桑白皮

皮半錢

甘草分五

水煎服

白芨枇杷丸

白芨

一兩

枇杷葉去蜜炙

藕節錢各五

右為細末另以阿膠五錢剉如豆大蛤粉炒

成珠生地黃自然汁調之火上頽化入前件為丸如龍眼大每服一丸噙

白芨連鬚散

白芨

兩

蓮花鬚金色者佳

側柏葉

沙參錢各五

為細末入藕節汁地黃汁磨京墨

合墨調藥二錢如和糊啜服

芎附飲

川芎

二兩

香附四兩

右為細末每服二錢不拘時茶湯調服

膠艾湯

阿膠

碎炒

芎菊

甘草炙各一兩

當歸

艾葉微炒各三兩

白芍藥

熟地黃各四兩

每服三錢水一盞酒六分煎八分空心稍熱服

鹿茸丸

川牛膝

去蘆酒浸

鹿茸去毛蒸

五味子各二兩

石斛根去皮

兔絲子淘淨蒸

附子泡去皮尖

六 上海千頃堂印行

川練子取肉炒各一兩 沉香半兩另研 磁石 媽 官桂火不見 澤瀉各一兩 右為末酒糊丸  
梧桐子大每服七十丸空心溫酒下

鹿角膠丸

鹿角膠兩 没藥另研 油頭髮灰各三兩 右為末用茅根汁打麵糊為丸如桐子大  
每服五十丸鹽湯下

枳殼散

枳殼去瓢炒四兩 二 甘草炙六兩 右為末每服一錢空心沸湯點服

斷紅丸

側柏葉炒黃 川續斷酒浸 鹿草火去毛 附子炮去皮臍 阿膠蛤粉炒成珠子 黃芪去當歸去蘆酒浸已 白朮桔梗半兩 右為末醋煮米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心  
米飲送下

生地黃湯

生地黃自然汁一升如無生地黃只用生乾地黃末一兩 生藕自然汁半升如無蓮刺末一兩 藍葉一  
切碎乾者 蟲蟲三十個去足翅炒黃 大黃一兩剉如殼子大 桃仁半兩炒 水蛭十個 右同一處  
水三升半慢火熬及一升以來放冷分三服投一服至半日許血未下再投之此湯比  
抵當湯丸為輕

花蓋石散

花蓋石煅存性童便酒各半女用童便醡各半煎調二三錢服能化瘀血成黃水

當歸補血湯

黃芪一兩一錢當歸酒洗二錢右咬咀作一服水三盞煎至一盞去滓溫服食前

升陽除濕防風湯

蒼朮酒浸去皮淨炒四錢白朮 白芍各一錢防風二錢水煎空心服濕去泄止加風藥升陽蒼朮去濕

白通湯

葱白四莖一兩乾薑各半附子一枚去皮生右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

一字散

雄黃 細辛各半川烏尖生五個右為細末每服一字薑汁茶芽煎湯不拘時服

髮灰散

用亂髮灰入麝香少許每服一錢用米醋溫湯調下

烏荆丸

川烏炮去皮一兩 荆芥穗二兩右為末醋糊丸如梧桐子大每服二十九酒湯任下有疾食空時日進三四服無疾早晨一服

小薊飲子

生地黃四兩

小薊根

滑石

通草

蒲黃炒

藕節

淡竹葉

當歸去蘆酒浸

山

梔仁兩

甘草半兩

右咬咀每服四錢水一盞煎八分空心溫服

發熱

涼膈散

連翹四兩

大黃酒浸

芒硝

甘草各二兩

梔子黑炒

黃芩炒

薄荷兩

為末每

服三錢加竹葉生蜜煎

白虎湯

石膏一斤

知母六兩

甘草二兩

粳米六合

水煎服

地骨皮散

地骨皮

茯苓

甘草

柴胡

半夏

人參

知母各分等

右為末每服一二錢

水煎

瀉白散

桑白皮炒

地骨皮各一兩

甘草

炒半兩

右為細末每服二錢水一盞入粳米百粒

煎食後服

黃連瀉心湯

黃連一兩  
去鬚 為極細末每服一字至半錢一錢臨卧溫水調下

導赤散

生地黃 木通 竹葉 甘草稍各等 水煎

左金丸

黃連蓋汁炒  
大兩 吳茱萸鹽水泡  
一兩 右為末粥丸每服五十九

瀉黃散

防風四兩 藿香大錢 山梔炒黑一兩 石膏五錢 甘草二兩 右末微炒香蜜酒調服

火鬱湯

升麻葛根 白芍藥 柴胡根各一 炙甘草 防風各五錢 右㕮咀每服三四錢  
水二大盞入蓮鬚葱白三寸煎去滓稍熱服

三黃

黃連 黃芩 大黃 各等分蜜丸梧子大每服三十丸食後熟水下 一方用腦  
麝為衣丸如豆大夜間噙化一二丸

參蘇飲

人參 紫蘇 前胡 半夏製 乾葛 茶芩各七錢半 陳皮 枳殼炒 木香 甘  
草各二錢 桔梗二錢 每服五錢加薑棗煎

白虎加人參湯即白虎湯加人參三兩

蒼朮白虎湯即白虎湯加蒼朮

人參黃芪散

人參 桔梗各一  
桔梗各一兩 秦艽 鱗甲去裙  
鱗炙 茯苓各二兩 知母二錢 半夏洗 桑白皮一錢

紫苑 柴胡各二  
紫苑兩 柴胡各二兩 黃芪二兩 右為粗末每服五錢水煎服

柴胡升麻湯

柴胡 升麻 葛根 獨活各半  
柴胡兩 升麻半 葛根一錢 獨活各半 防風二錢 甘草生二錢 人參 白芍藥各

右㕮咀每服半兩水二大盞煎至一盞去滓稍熱服忌冷物冰水月餘

潮熱

茯苓補心湯

木香五分 紫蘇葉 乾葛 熟半夏 前胡去苗 茯苓去皮各七分 枳殼去核 桔梗去蘆

甘草炙

陳皮去白各五分

生地黃

白芍藥

川芎

當歸各一錢

薑五片棗一

枝水二鍾煎一鍾食遠溫服

八珍散

人參 茯苓 白朮 黃芪 山藥 栗米炒 扁豆 甘草

五飲湯

旋覆花 人參 陳皮 枳實 白朮 稗苓 厚朴 半夏 澤鴻 朱苓 前

胡桂心 白芍 炙草 薑煎服

四物二連湯

當歸 生地 白芍炒各一兩 川芎七錢 黃連炒五錢 胡連三錢 每服五錢水煎服

惡寒

升陽益胃湯

黃芪二兩 半夏湯洗脈清者可用

人參去

甘草炙各一兩

獨活

防風

以秋旺故以辛溫鴻之

白

芍藥

何故秋旺用人參白朮芍藥之類反補旺肺為脾虛則肺最易受邪故因時而補

易為力也

羌活各五錢

橘皮

四錢不

茯苓

小便利及湯者勿用

柴胡

澤鴻不淋勿用

白朮

錢各三

黃連

二錢

右㕮咀每服三錢水

三盞蓋五片裹二枚煎至一盞去滓溫服早飯後午飯前服之漸加至五錢止服藥

食恐胃再傷以藥力尚淺胃氣不得轉運升發也須薄滋味或義食助其藥力蓋升

後如小便利而病增劇是不宜利小便當少去茯苓澤鴻若喜食初一二日不可飽

浮之氣而滋其胃氣慎不可淡食以損藥力而助邪氣之降沉也可以小役形體使

胃與藥得轉運升發慎勿大勞使氣復傷若脾胃得安靜尤佳若胃氣稍強少食果

以助穀藥之力經云五穀為養五果為助者也

服藥訖忌語話一二時辰及酒濕大料物及冷熱寒涼淡滲之物

寒熱

抑陰地黃丸

赤芍一兩 生地三兩

柴胡 黃芩 秦艽各五錢

蜜丸烏梅湯空心下三十九

小柴胡湯

柴胡半斤

黃芩 人參 甘草

生薑各三兩

半夏洗半升

大棗枝二十枚

右七味水

一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

加味小柴胡湯

即前方加山梔牡丹皮

桂枝麻黃各半湯

桂枝去粗皮一兩六錢六分

芍藥 生薑切

甘草炙 麻黃各一兩去節

大棗枝四十二錢去節

杏仁十二錢

甘草炙 桔梗各二錢

柴胡 升麻 連翹

四枝湯浸去皮及雙仁者

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

既濟解毒湯

大黃酒大便利勿用

黃連炒酒

黃芩炒酒

甘草炙

桔梗各二錢

柴胡 升麻 連翹

當歸身各一錢

右㕮咀作一服水二鍾煎至一鍾去滓食後溫服忌酒濕麵大料物及生冷硬物

黃芪丸

黃芪 蟬甲

當歸一兩炒各

桂心 白芍 繢斷

川芎

牛膝

蓴蓉

沉香

柏子仁 枳壳各半錢半 五味子 熟地各半兩 右為末蜜丸桐子大每服四五十丸  
米飲下食後

諸中

蘇合香丸

白术 青木香 烏犀角焰 香附子炒去毛 珠砂研水飛 訶黎勒煨皮去 白檀香  
安息香另末無灰酒一升熬膏 沉香 麝香研 丁香 薑撥各二兩 龍腦研 蘇合香  
油入安息香膏內各一兩 薰陸香別研二兩 右為細末入研藥勻用安息香膏並煉白蜜和劑  
每服旋丸如梧桐子大早朝取井華水溫冷任意化服四丸老人小兒化服一丸溫  
酒化服亦得並空心服之

三生飲

南星一兩 川烏去皮 生附子各半兩 木香二錢半 右咬咀每服半兩水二盞薑十片  
煎至六分去渣溫服

稀涎散

江子仁六粒去皮膜每粒分作兩半 牙皂三錢切片 明礬兩 右先將礬化開却入二味攪勻待  
礬枯為末每用三分吹入甚者燈心湯下五分痰在喉者即吐在膈者即下

碧霞丹

石綠研九度  
飛十兩 附子尖 烏頭尖 蟑稍各七個 右三味為末入石綠令勻麵糊為丸如鷄頭寔大每服急用薄荷汁化二丸更入酒半合溫煖服之須臾吐出痰涎然後隨証治之如牙關緊急幹閑灌之驗

三聖散

防風 藜蘆 瓜蒂 右各為粗末每服一二錢以蜜汁三茶盞煎三五沸去蜜澄清放溫調末徐徐服之不必盡劑以吐為度

巴鑿丸

巴豆二粒去皮膜 白鑿如拇指大一塊為末 全放新瓦上煖至巴豆焦赤為度蜜丸次寔大棉包放口中近喉處良久吐痰愈

中風

小續命湯

麻黃去節 人參去蘿 黃芩去腐 芍藥 甘草炙 川芎 杏仁去皮炒 防已 官桂各一錢半兩 附子炮去皮 右除附子杏仁外為粗末後入二味和勻每服五錢水一盞半生薑五片煎至一盞去渣稍熱服食前

烏藥順氣散

麻黃 枳殼 桔梗各一錢 烏藥二錢 瘋蠶去絲嘴 白芷一錢 陳皮二錢 乾薑炮

甘草炙各五錢 川芎一錢 生薑大棗煎

大秦艽湯

秦艽 石膏各二兩 甘草 川芎 當歸 芍藥 羌活 獨活 防風 黃芩  
白术 白芷 蔴苓 生地黃各一兩 熟地黃各一兩 細辛半錢 右十六味㕮咀每  
服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服

黃芪五物湯

黃芪補衛為君 桂枝 白芍二味營為臣 生薑 大棗二味和營衛為佐 半身不遂者右宜倍加黃芪左宜加當歸兩腿兩膝軟者加牛膝骨軟不能久立者加虎骨筋軟難於屈伸者加木瓜周身或左或右經絡不宜通者加炮附子有寒者亦加之此方屢試屢効者其功力專於補外所以不用人參補內甘草補中也

三化湯

厚朴蜜製 大黃 枳寔 羌活各等分 每服三兩水三升煎至一升半終日服以微利則止

搜風順氣丸

車前子仁二兩半宿酒浸 白檳榔 火麻子微炒去殼另研 郁李仁湯泡去皮汎 兔絲子酒浸培煖乾 牛膝二宿酒浸 乾山藥各三兩 枳殼去刺炒熟 防風去芦 獨活各一兩 錦紋大黃五錢生半熟 牛

右為末煉蜜丸桐子大每服二十九酒茶米飲任下百無所忌早晨臨卧各一服服經一月消食二月去腸內宿滯三月無倦少睡四月精神強勝五月耳目聰明六月腰脚輕健一年百病皆除老者返少如服藥覺藏府微動以羊肚肺羹補之久患腸風便血服之除根加顏語謇澁及癱疾服之隨即平復酒後二服宿醒消盡百病不生孕婦勿服

愈風湯即羌活愈風湯

羌活 甘草炙 防風 防已 黃芪 蔓荆子 川芎 獨活 細辛 枳殼  
麻黃去根 地骨皮 人參 知母 甘菊花 薄荷葉 白芷 枸杞子 當歸  
杜仲炒 秦艽 柴胡 半夏 厚朴薑製 前胡 熟地黃各二兩 白茯苓 黃芩  
各三兩 蒼朮 生地黃 石膏 芍藥各四兩 官桂一兩 右三十三味重七十五兩  
㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服 天陰加生薑三片煎空心一服臨卧再煎  
渣服 假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩勻作四服每服加生薑五七  
片空心服以粥投之得微汗則佳 如一旬之通利用愈風湯三兩加大黃一兩亦  
勻作四服每服加生薑五七片臨卧煎服得利為度

至寶丹

人參 天竺黃 生烏犀屑研 珠砂飛研 雄黃飛研 生玳瑁屑研

琥珀研各一兩

麝香 研

龍腦 研各二錢半

金箔 半入藥

銀箔 十片

牛黃 研

天南星

水煎軟片各

安息香 一兩半為末以無灰酒攪澄飛過濾去沙土大約得淨數一兩火熬成膏 右將生犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安息香膏重湯煮烊入諸藥中和搜成劑盛不津器中並旋丸如梧桐子大用參湯化下三丸至五丸又療小兒諸癇急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風延搐搦每二歲兒服二丸人參湯化下

活命金丹

貫眾 甘草 板藍根 乾葛 甜硝各一兩 川大黃一兩 牛黃 研 珠子粉

生犀角 薄荷各五錢

辰砂四錢研一  
半為衣

麝香 研

桂 青黛各三錢

龍腦 研二錢

右為末與研藥和勻蜜水浸蒸餅為丸每丸重一錢硃砂為衣就濕用真金箔為衣臘月修合瓷器收貯多年不壞如療風毒茶清化下解毒藥新汲水化下汗後餘熱勞病及小兒驚熱並用薄荷湯化下已上並量人之大小加減服之

牛黃清心丸

白芍藥 麥門冬去心 黃芩 當歸當去 防風苗 去白半 白术各一  
兩半 柴胡 桔梗 芍

薑 白茯苓去皮 别研各一兩

杏仁去皮尖雙仁炒熟黃二錢半

神曲 研

蒲黃炒

人參去蘆各二兩半

羚羊角屑 麝香 研

龍腦 研各一兩

肉桂去粗

大黃豆卷碎炒

阿膠碎炒各一

白斂 乾薑炮火半

牛黃 研一兩  
二錢

犀角屑二兩

雄黃 研飛八錢

乾山藥七兩

甘草炒剉

五  
兩 金箔一千二百片內  
四百片為衣

細末入餘藥和勻用煉蜜與棗膏為丸每兩作十九金箔為衣每服一丸溫水化下食後服小兒驚癇酌度多少以竹葉湯溫化

參附湯

人參 附子製 水煎湯

犀角散

犀角屑 石膏各一  
兩 羌活去蘆 羚羊角屑各七錢半 人參蘆去 甘菊花 獨活去蘆

黃芪 芳窮 白朮 黃芩 天麻 枳殼去瓢  
炒 當歸 酸棗仁 防風 白芷  
各半  
兩 甘草炙二錢半 右㕮咀每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去渣溫服無時

牛黃散

牛黃另研 麝香另研 犀角屑 羚羊角屑 龍齒另研 防風 天麻 獨活 人參

蘆沙參 茯神木去 川升麻 甘草炙 白鮮皮 遠志去心 天竹黃另研各半

龍腦另研一錢 珠砂水飛 鐵粉另研 麥門冬去心各半兩 右為細末研令勻每服二錢煎

參門冬湯調下不拘時

防風散

防風蘆 麻黃蘆 人參蘆 芳窮 附子炮去皮 桂心 黃芪蘆 赤茯苓去皮

酸棗仁 白术 獨活去蘆 桑白皮剉 羚羊角屑各錢半 甘草兩半 右㕮咀每服四錢水一中盞薑五片煎至六分去渣溫服不拘時

五味子湯

五味子 杏仁炒去皮尖 桂心各半兩 防風 炙甘草 赤芍藥 川芎各一 川椒二錢半 右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞半去渣溫服不拘時

獨活散

獨活去蘆 附子炮去皮臍 當歸去蘆 防風 天麻 桂心各一兩 川芎 甘菊花 枳殼去瓢炒 山茱萸去核 黃芪 人參去蘆 牛膝酒浸 草薢酒浸 甘草炙 細辛去苗 葛蒲 白术各半兩 右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至一盞去渣溫服無時

地黃飲子

熟地黃 巴戟去心 山茱萸去核 蔴蔴酒浸 石斛 附子炮 五味子 白茯苓 葛蒲 遠志去心 官桂 麥門冬去心等分 各右為末每服三錢生薑五片棗一枚薄荷七葉水一盞半煎八分服無時

清心湯

連翹兩四錢 大黃浸酒 芒消 甘草各二兩 梔子黑炒酒 黃芩酒 薄荷各一兩 黃連錢八八 麥冬去心五錢 每服四錢竹葉燈心煎

鴻心湯

黃連

大黃

黃芩

各一錢

水煎服

防風通聖散

此方加人參地黃羌活獨活天麻細辛全竭黃柏黃連亦名至寶丹乃中風之專方也

防風

荆芥

連翹

麻黃

薄荷

川芎

當歸

白芍

炒白术

山梔

大黃

酒蒸錢各五兩

黃芩

石膏

桔梗

各一兩

甘草

二兩

滑石

三兩

加生薑葱

白煎自利去硝黃自汗去麻黃加桂枝涎嗽加蓋製半夏

秦艽升麻湯

升麻

葛根

甘草

炙

芍藥

人參

各半兩

秦艽

白芷

防風

桂枝

各三錢

每服一兩水二盞連鬚葱根白三莖煎至一盞去渣稍熱服食後服藥畢避風寒卧得微汗出則止

順風勻氣散

白朮

四錢

人參

天麻各一錢

沉香

白芷

紫蘇

木瓜

青皮

甘草

炙各半錢

烏藥

三錢

分作貼

每貼水二盞生薑三片煎八分溫服二滓併煎風氣腰痛亦宜

服之

虎骨湯

當歸

二兩

赤芍藥

續斷

白朮

藁本

虎骨

各一兩

烏蛇肉

半兩

為細末每服

二錢食後溫酒調下骨中煩疼加生地黃一兩藏寒自利加大雄半兩

虎脰骨酒

石斛去根

石楠葉

防風

虎脰骨酥炙

當歸

茵芋葉

杜仲炒

川牛膝

芎

窮

狗脊去毛

川續斷

巴戟去心一兩

右剉如豆囊藥以酒一斗漬十日每熱

服一盞無時

正舌散

雄黃研

荆芥穗各等

右為末每服二錢豆淋酒調下

茯神散

茯神心一兩

薄荷焙二兩

右為末每服一二錢溫酒調下

藿香正氣散

大腹皮

白芷

茯苓

紫蘇葉

藿香各三兩

厚朴

白朮

陳皮去白

桔梗苦者

半夏各二兩

炙甘草一兩

右咬咀每服三錢薑三片棗一枚煎熟服

星香湯

南星八錢

木香一錢

每服四錢水一盞薑十片煎七分不拘時溫服

鐵彈丸

乳香另研

沒藥另研各一兩

川烏頭炮去皮臍為末

五靈脂酒浸淘去沙石

乾四兩為末

麝香研細

右先將乳香沒藥於陰涼處細研次入麝次入藥末再研勻滴水和丸如彈子

大每服一丸食後臨卧薄荷酒磨化服

十味剉散

附子炮三兩 當歸洗 黃芪炙一兩 白芍藥各二兩 川芎 防風 白术各一兩半 肉桂  
茯苓 熟地黃各七錢半 每服四錢水一盞薑八片棗三枚煎食後臨卧服

至聖保命金丹

貫衆一兩 生地黃七錢 大黃半兩 青黛 板藍根各三錢 硫砂研 牛黃研 蒲黃  
薄荷各二錢半 珠子研 龍腦研各一錢半 麝香研一錢 右十二味為末入研藥和勻  
蜜丸芡實大金箔為衣每用一丸細用茶清送下新汲水亦得如病人嚼不得用薄  
荷湯化下無時此藥鎮墜痰延大有神功

三因白散子

大附子去皮臍生一兩 滑石桂府者各半兩 製半夏七錢半 右為末每服二錢水二盞薑七片蜜  
半匙煎七分空心冷服

天麻丸

附子炮一兩 天麻酒宿浸三兩乾 牛膝酒宿焙乾一兩 草薢另研 玄參各六兩 杜仲去絲炒一兩  
當歸全用十兩 羌活十五兩或兩 生地黃十六兩 獨活五兩 右為末煉蜜丸桐子大每服  
五七十丸病大者加至百丸空心食前溫酒或白湯下平明服藥日高飢則食不飢

且止 忌壅塞失於通利故服藥半月稍覺壅塞以火宣丸見大便不通疏之

### 白薇湯

白薇 當歸各六錢 人參三錢 甘草半一錢 分二帖水煎服治產後汙多鬱冒亡血發厥等証

### 倉公散

瓜蒂 藜蘆 白礬 雄黃 各等分為末每用少許吹鼻取嚏內服白薇湯治產後血厥而胃血厥去血太  
多而革倒也

### 排風湯

白鮮皮 當歸酒浸一宿 肉桂去粗皮 芍藥白者去根 甘草炒 杏仁去皮尖  
炒 防風 蒼  
薦 白朮各二兩 獨活 麻黃去根節 茵苓去皮各三兩 右為粗末每服三錢水一盞半薑四片煎八分去渣溫服不拘時

### 四生散

黃芪 川羌活 藜藜沙苑 白附子各等分 右為細末每服二錢薄荷酒調下  
換骨丹

槐莢子生即槐角 人參 桑白皮 蒼朮 白芷 何首烏 蔓荆子 威靈仙 防  
風各二兩 五味子 苦參 香附 川芎各一兩 麝香二錢另研 龍腦一本無研 右十

四味為細末入麝腦合勻又用麻黃十斤去根節天河水三石三斗熬至六斗濾去渣再煎至二升半入銀石器內熬成膏入前藥和勻杵三五千下每一兩作十九硃砂為衣每服一丸先搗碎酒一盞自晨浸至晚食後臨臥攬勻服之神清無睡是藥之驗再服須更隔五日服之如中風無汗宜服若體虛自汗服之是重乏津液也若風盛之人當於密室溫卧取汗

清陽湯

黃芪 當歸身 升麻各二錢 葛根一錢半 炙甘草 紅花 黃檗酒炒 桂枝各一錢

蘇木 生甘草各五分 吠咀作一服酒三盞煎至一盞三分去渣稍熱食前服訖以火熨摩緊急處即愈夫口喝筋急者是筋脈血絡中大寒此藥少伐燔針劫刺破惡血以去凝結內泄衝脈之火熾

滌痰湯

南星蠶 半夏湯七錢半 枳實炒 茯苓去皮各二錢半 橘紅一錢 石菖蒲 人參  
錢各一錢

竹茹分

甘草五分

右作一服水二鍾生薑五片煎一鍾食後服

轉舌膏

連翹 遠志 薄荷 柿霜各一錢 石菖蒲 梔子炒 防風 桔梗 黃芩酒炒  
玄明粉 甘草 酒大黃各五錢 犀角 川芎各三錢 為末煉蜜丸彈子大硃砂

五錢為衣食後臨臥薄荷湯嚼下一丸

木瓜丸

熟地黃洗  
培  
生七兩  
水浸洗  
南星  
生三  
白附子  
生二  
川烏  
去皮臍  
生半兩  
右為末以生絹袋盛於井花水內攏出如未出者更以手揉出如有渣更研再入絹袋攏盡為度置磁盆中日晒夜露至曉撇去舊水則用井水攏又晒至來日再換新水攏如此法春五日夏三秋七冬十日去水晒乾後加玉片研細以糯米粉煎粥清丸菉豆大薑湯下二十丸無時如癰瘍風溫酒下小兒驚風薄荷湯下三五丸

青州白丸子

半夏  
生七兩  
水浸洗  
南星  
生三  
白附子  
生二

川烏  
去皮臍  
生半兩

右為末以生絹袋盛於

井花水內攏出如未出者更以手揉出如有渣更研再入絹袋攏盡為度置磁盆中日晒夜露至曉撇去舊水則用井水攏又晒至來日再換新水攏如此法春五日夏三秋七冬十日去水晒乾後加玉片研細以糯米粉煎粥清丸菉豆大薑湯下二十丸無時如癰瘍風溫酒下小兒驚風薄荷湯下三五丸

活絡丹

川烏  
炮去皮臍  
草烏  
炮去皮臍  
地龍  
土  
天南星  
炮各六兩  
乳香  
研  
沒藥  
研各二錢  
右為末酒麪糊丸如梧桐子大每服二十九空心日午冷酒送下荆芥湯下亦可

中寒

五積散

白芷 茶芩 半夏

湯洗七次

當歸 川芎 甘草

炙各三

肉桂 茄藥

兩各三

枳殼

去瓢

炒 麻黃

去節根各二節

陳皮

去白各六兩

桔梗

去蘆十兩

厚朴

去粗皮姜製各四兩

乾薑

各四兩

蒼朮

泄浸去皮二十四兩 右㕮咀每服四錢水一盞薑三片葱白三根煎七分熱服冒寒用煨薑挾氣則加茱萸婦人調經催生則加艾醋

薑附湯

乾薑 熟附子各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半煎七分去渣溫服

理中湯

為丸名理中丸

白术

陳壁土炒

人参

乾薑 炮

甘草

炙等分

每服四錢

附子理中湯

即前方三兩加附子一枚亦作丸

連理湯

即理中湯加黃連白茶芩

不換金正氣散

蒼朮

製橘皮去白

半夏

麯炒

厚朴

製姜

藿香

各二錢

甘草

炙一錢

右作一服水

二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾去渣食前稍熱服忌生冷油膩毒物若出遠方不服水土尤宜服之

中暑

來復丹

硝石

一兩同硫黃為末入磁碟內以微火炒用柳棍攪不可火太過恐傷藥力再研極細名二氣末

太陰玄精石

研

船上硫黃

各一兩透明者

五靈脂水澄去乾

青皮去

陳皮去白各二兩

右用五靈脂二橘皮為末次

八玄精石末及前二氣末拌勻好醋打糊為丸豌豆大每服三十九空心米飲下

欲暑散

赤茯苓去皮

甘草生各四兩

寒食麵

薑各一斤

右為細末每服二錢不拘時新汲水

大順散

甘草剉才長三十斤

乾薑

杏仁去皮炒

肉桂去粗皮各四斤

右先將甘草用白砂炒及八分

黃熟次入乾薑同炒合薑裂次入杏仁同炒合杏仁不作聲為度用篩篩淨後入桂一處搗羅每服二錢水一鍾煎七分溫服如煩躁用井花水調服不拘時沸湯點服得亦

枳杷葉散

枳杷葉去毛炙

陳皮

湯浸去瓢焙

丁香

厚朴去皮塗差汗各半兩

白茅根

麥門冬去心

乾木瓜

甘草炙各一兩

片煎七分溫服溫湯調服亦得如煩躁用井花水調下小兒

三歲以下可服半錢更量大小加減

二氣丹

硝石 疏黃各等

右為末於銀石器內火炒令黃色再研用糯米糊丸如桐子大

每服四十九不拘時新井水送下

香薷飲

香薷一 厚朴姜汁 扁豆炒五 冷服熟盛加黃連

六味香薷飲 即前方加茯苓甘草木瓜

十味香薷飲 即六味香薷飲加陳皮白朮人參黃芪

縮脾飲

縮砂仁 烏梅肉淨 草果去粗皮炒去各四 乾葛剉

白扁豆去皮炒各二兩

白扁豆去皮炒各二兩

白扁豆去皮炒各二兩

炙甘草去粗皮炒各二兩

炙甘草去粗皮炒各二兩

炙甘草去粗皮炒各二兩

炙甘草去粗皮炒各二兩

服四錢水一碗煎八分水沉冷服以解煩或欲熱欲溫任意服代熟水飲之極妙

錢不拘時沸湯點服鹽湯亦可

香薷湯

白扁豆炒

茯神

厚朴

去粗皮炒各一兩

香薷一

甘草去粗皮炒各二兩

甘草去粗皮炒各二兩

甘草去粗皮炒各二兩

甘草去粗皮炒各二兩

右為細末每服二

生脈散

人參五錢

五味子

麥門冬各三錢

右水煎服

中濕

除濕湯

半夏麵炒

厚朴製

蒼朮米泔製

藿香葉

陳皮去白

白茯苓去皮各一兩

甘草

炎火  
錢一兩

白术生用一兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑七片棗一枚煎火分食前溫服

白术酒

白术一兩 酒煎服不能飲者水煎

中

八味順氣散

白术 白茯苓 青皮各半兩 炙甘草 香白芷 陳皮去白 天台烏藥 人參各一兩 炙甘草

右為末每服三錢水一盞煎七分溫服

木香調氣散

白荳蔻仁 丁香 檀香 木香各二兩 蕤香葉 炙甘草各八兩 縮砂仁 右為細末每服二錢入鹽少許沸湯不拘時點服

三和丹

即養正丹氣一兩 黑錫丹火逆一兩 來復丹中暑一兩

中惡

調氣平胃散

木香 烏藥 白荳蔻仁 檀香 砂仁各一錢 蕤香一錢二分 蒼朮半錢 厚朴姜汁  
炒 陳皮各一錢 甘草五分 水二鍾生薑三片煎八分食前服

太乙神精

雄黃

油煎  
七日

雌黃

硃砂者

磁石

曾青各一  
兩

金牙石

六  
錢

右各研細將二

黃硃砂醋浸三日

曾青用好酒於銅器中浸紙封曝百日急用七日亦得如天陰用

火焙乾六味同研勻用沙合盛令藥滿得三分許以此集合子大小先以赤石脂未

固縫外用六一泥固濟訖須候透乾以晴明六合吉曰合別用泥作三個桂子高五

寸今平穩如鼎足狀安合子下置炭火三斤逐旋添炭常令及五斤只在合底不得

過口暇五日為度放冷水中浸合子候泥透剝去泥將合子輕手取開其藥精英五

色盡在蓋上亦有三色者純白為上研細棗肉丸如粟米大每服一丸米飲服之如

口噤牙緊幹前兩齒灌下即甦六一泥法礬石

黃泥裏火燒  
一伏時研細

黃礬

遠看如金綠色  
精明其色本綠

以黃泥裏火燒通  
赤如血取出研細

蚯蚓糞

鹹土

鹽各一

黃泥

傷風

川芎茶調散

加 磬 垂 菊 花 名 菊 花 茶 調 散 治 頭 風

川芎

四  
錢

白芷

二  
錢

薄荷

八  
錢

甘草

炙

羌活

各二  
錢

細辛

一  
錢

荆芥

四  
錢

防風

半  
錢

為末濃茶調服

蒼耳散

蒼耳子

炒去刺研  
破一兩

辛夷

三  
錢

白芷

各一  
錢

薄荷

各一  
錢

葱三莖煎

原方白芷一兩 荘辛各五錢  
二錢半為末葱細茶煎湯調食前服 蒼耳炒

二錢

### 破傷風

#### 羌活防風湯

羌活 防風 川芎 藁本 當歸 茵藥 甘草各一  
右㕮咀每服五錢水二盞煎八分熟服

#### 九味羌活湯

羌活 防風 蒼术各一 細辛五錢 川芎 白芷 生地黃 黃芩 甘草各一  
兩半

兩半

五錢

一盞

一盞

一盞

一盞

一盞

一盞

以上九味㕮咀每服一兩水煎薑葱引

#### 白术防風湯

白术 黃芪各一 防風二  
兩 十兩 右㕮咀每服七錢水二盞煎一盞去渣溫服

#### 羌活湯

羌活去蘆 獨活去蘆 防風去蘆 地榆各一  
去粗溫服

#### 地榆防風散

地榆 防風 地丁香 馬齒莧各一  
右為細末每服三錢溫米飲調下

#### 大芎黃湯

川芎五錢 大黃生 黃芩 羌活去蘆各一兩 右咬咀每服五七錢水煎以利為度

江鱠丸

江鱠半兩 野鴟糞半兩 雄黃一錢水飛 蜈蚣對 天麻一兩 白僵蠶半兩炒 右為

細末分作三分先用二分燒飯為丸如桐子大硃砂為衣又用一分入巴豆霜二錢五分亦以燒飯為丸不用硃砂為衣每服硃砂為衣丸藥二十九入巴豆霜丸藥一丸次服二丸漸加至利為度再服硃砂為衣丸藥病愈止

白术黄芪湯

白术二錢 黄芪三錢 防風一錢半 水煎食前服

蠲瘡湯

羌活 獨活 防風 地榆各一錢 杏仁七枚蒸令熟研成膏 右前四味以水一盞煎七分入杏仁和勻服之兼以搽瘡上癢

硃砂指甲散

人手足指甲炒烟起六錢 獨活 硫砂另研 天南星薑製各二錢 右製度為細末分作三服酒調下

玉真散

南星 防風等 右為細末生薑汁調服傷處以此貼之

傷暑

益元散

桂府滑石  
六兩  
膩白者  
粉草  
研爛  
辰砂  
三錢  
右為極細末每服三錢白湯調下新水  
亦得

六一散  
即益元散去硃砂

六和湯

香薷  
二錢  
縮砂仁  
半夏  
七次湯洗  
杏仁  
去皮尖  
人參  
去蘆各一錢  
甘草  
炙三分  
赤茯苓  
去皮各一錢  
白扁豆  
畧炒薑汁  
厚朴  
羌製各一錢  
木瓜  
各一錢  
水二鐘  
薑五片  
紅棗一枚  
煎一鐘  
不拘時服

三黄石膏湯

黃連  
二錢  
黃檗  
山梔  
玄參  
各一錢  
黃芩  
知母  
各一分一錢  
石膏  
三錢  
甘草  
分

右水煎

消暑丸

半夏  
一斤用五煮乾  
甘草  
生用  
茯苓  
去皮各半斤  
右為末薑汁煮糊丸無見生水如桐子  
大每服五十丸不拘時熱湯送下  
中暑為患藥下即甦夏月常服止渴利小便雖飲水多亦不為害凡不是暑藥皆

黃芪人參湯

黃芪一錢如自汗過多者加一錢

人參去蘆

白术各五分

蒼术半錢無汗一錢

橘皮不去

甘草炙

當歸身酒洗

麥門冬去心各二分

黃檗酒洗

神麵炒三分

升麻六分

五味子九粒

水

二盞煎至一盞去渣稍熟食遠或空心服之忌酒濕麵大料之物及食冷

酒煮黃連丸

黃連去鬚十兩

好酒五斤

右將黃連以酒煮乾研為末滴水丸如桐子大每服三五

十丸空心熟水送下

清暑益氣湯

黃芪一錢半汗少減五分

蒼朮半錢

升麻一錢

人參去蘆

白术

陳皮

神麵

澤瀉各五分

甘草炙

黃檗酒浸

葛根

青皮去瓤

當歸身

麥門冬去心各三分

五味子九粒

加薑棗水二盞煎至一盞食遠稍熟服劑之多少臨時斟酌

清燥湯

黃芪一錢半

黃連去鬚

蒼朮

白术各一錢

陳皮五分

五味子九粒

人參

白茯苓

升麻各三

當歸一錢二分

澤瀉五分

柴胡

麥門冬

生地黃

神麵炒

猪苓

黃檗製酒

甘草炙各二分

每服半兩水

二盞煎一盞去渣稍熟空心服

傷濕

腎着湯

乾薑

炮

苓茯

各四兩

甘草

炙

白术

各二兩

每服四錢水一盞煎七分空心溫服

滲濕湯

蒼朮

白朮

甘草

炙各一兩

茯苓

去皮

乾薑

炮各二兩

橘紅

丁香

各二錢半

每服四錢

水一盞粟一枚薑三片煎七分食前去渣溫服

五苓散

猪苓

茯苓

白朮

炒半錢各七兩

澤瀉

二兩

肉桂

半兩

每服三錢

桂枝湯

桂枝

芍藥

生薑

各三兩

甘草

炙二兩

大棗

十二枚擘

右㕮咀以水七升微火煮取

三升去渣適寒溫服一升服已須更歇熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身黎黎微似有汗者益佳不可合如水淋漓病必不除若一服汗出病差停後服不必

盡劑

敗毒散

羌活

獨活

前胡

柴胡

芎藭

枳殼

白茯苓

桔梗

各一兩

薄荷

四錢

甘

草

半兩

右為細末每服五錢水一盞入生薑二片煎至七分溫服或沸湯點亦得

人參散毒散即上方加人參

卷六  
防已黃芪湯

防已一兩二錢半  
黃芪一兩二錢半  
白术七錢半  
甘草半兩  
剉每服五錢  
生薑四片棗一粒水一盞半煎八分去渣溫服良久再服

腹痛加芍藥

清熱滲濕湯

黃檗鹽水炒二錢  
黃連一錢  
茯苓二錢  
澤瀉一錢  
蒼术一錢  
白术各一錢半  
甘草五錢  
水二錢  
煎八分服  
如單用滲濕去黃連黃檗加橘皮乾薑

蒼白二陳湯

陳皮去白一錢  
半夏二錢  
茯苓一錢  
甘草五分  
蒼术一錢  
白术一錢  
甘草分量  
水煎

羌活勝濕湯

羌活一錢  
獨活一錢  
川芎一錢  
藁本一錢  
防風一錢  
甘草五分  
蔓荆子三分  
如身重腰痛沉

沉然中有寒濕也加酒洗漢防已附子

辰砂五苓散即五苓散加辰砂等分減桂三之一

春澤湯即五苓散加人參

四苓散即五苓散去肉桂

傷燥

滋燥養榮湯

當歸酒洗二錢 生地黃 熟地黃 白芍藥 泰艽 黃芩錢五分 防風錢一 甘草錢五分

右水煎服

大補地黃丸

黃檗鹽水炒

熟地黃酒蒸四兩各

山藥

枸杞子

甘州者佳各三兩

知母鹽酒炒

山茱萸肉

白芍藥酒洗兩錢各二

生地黃酒洗二兩五錢

肉蓯蓉

酒浸各二兩五錢

玄參酒洗五錢各二兩

右為細末

煉蜜丸如桐子大每服七八十九空心淡鹽湯送下

清涼飲子

黃芩錢二錢各二

薄荷

玄參

當歸

芍藥錢各二

甘草錢一

水二鍾煎八分

不拘時服 大便秘結加大黃錢二

清燥救肺湯

桑葉霜者三錢經

石膏分量二錢五分

甘草錢一

胡麻仁一錢炒研

真阿膠八分

人參分

麥

冬一錢二分

杏仁七分去皮

杞杞葉一錢炒黃去毛蜜炙

右九味以水一碗煎六分頻頻二三

次滾熱服

春溫

雙解散

即防風通聖散風見中

六一散見傷暑各半每服一兩生薑葱頭淡豆豉煎湯調服汗

下兼行或分兩次服先服五錢少頃探吐之則汗出再服餘半取下

瘟疫

二聖救苦丹

大黃四兩

皂角二兩

為末水為丸每服三錢無根水下弱者老者幼者量減服之

普濟消毒飲

黃芩酒炒

黃連酒炒各五錢

薄荷一錢

連翹一錢

柴胡二錢

升麻分

桔梗二錢

殭蚕

甘草分二錢

陳皮二錢

馬勃一錢

牛蒡子一錢

板藍根一錢

玄參二錢

為末湯調服

痰疾

小柴胡加桂枝湯

桂枝去皮

黃芩一兩

人參一兩半

甘草炙一兩

半夏二合半

芍藥一兩半

大棗六枚

生

薑一兩切

柴胡四兩

右九味以水七升煮取三升去渣溫服

小柴胡加半夏湯

即小柴胡湯見寒熱

加半夏

四柴胡苦棟附子湯

即四物湯血

加此三味

桂枝加芍藥湯

桂枝三錢

黃芪 知母 石膏 芍藥各半

右為粗末每服五七錢水煎

桂枝黃芩湯三陽合病者宜之

柴胡 黃芩 人參 甘草 半夏 石膏 知母 桂枝 水煎服 此小柴胡合白虎加桂枝也合白虎以治陽明之熱加桂枝以解太陽

芍藥甘草湯

芍藥兩 甘草一兩 每服五錢水煎服

桂枝加當歸芍藥湯

即桂枝湯見傷濕 加此二味

大柴胡湯

柴胡半斤 黃芩 芍藥各三 甘草 半夏洗半升 生薑五兩切 枳殼四枚炙 大棗十二枚擘

大黃二兩 右七味以水一斗二升煮取六升去渣再煎溫服一升日三服

蜀漆散

蜀漆燒去腥 雲母燒三日夜 龍骨等 右杵為散末發前以漿水服半錢 如溫瘡加

蜀漆一錢臨發時服一錢

牡礪湯

牡蠣四兩 麻黃去節 蜀漆各三 甘草二兩 以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得

醫方 卷之三  
六升內諸藥煮取二升若吐則勿再服

柴胡薑桂湯

治寒多熱少

柴胡 黃芩 炙甘草 桔梗根 桂枝 乾薑 牡蠣 薑棗煎初服微煩再服汗出愈 喻嘉言曰小柴胡本陰陽兩停之方可從寒熱而進退寒多者加薑桂則熱多者加芩連可能推矣

觀音丸

圓白半夏生 烏梅肉 常山 川巴豆

件名十灰 不去油鹽

右為末薑麵糊丸麻子大上

下以厚紙蓋貼有油又再服紙每服五丸臨臥冷水下此方舟人於海角遇一白衣授之

治療木香丸

牽牛

一斤淘去浮者搗取末四兩別頓焙

雞心檳榔

陳橘皮

各二兩

青木香

人參

熟附子

厚朴

製

官桂

去皮

京三稜

羌活

獨活

乾薑

炮

甘草

炙

川芎

川大黃

剉

芍藥

各半兩

肉荳蔻

個六

右為末磁器密收臨用秤牽牛末一兩諸藥末共

一兩研和煉蜜丸桐子大每服二十丸橘皮煎湯下以通利為度

小柴胡去半夏加瓜蔞根湯

渴者宜之亦治勞瘧勞則氣張火升津液衰少

柴胡

黃芩

人參

甘草

瓜蔞根

薑棗煎

人參柴胡飲子 內熱便結者宜之

人參 柴胡 黃芩 甘草 大黃 當歸 茯苓 右為末每服三錢水一碗生

薑三片煎七分溫服

柴朴湯 扶痰濕及食滯者宜之

柴胡 獨活 前胡 黃芩 蒼朮 厚朴 半夏麵 加參术食不化加神麵山  
楂麥芽

紫芩湯 扶濕而水便不利者宜之

猪芩 茶芩 白朮 澤瀉 桂枝 此名五芩散

合小柴胡湯

柴平湯 有食積濕痰者宜之

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 名平胃散

合小柴胡湯

柴胡四物湯 婦人及血虛者宜之

當歸 生地 白芍 川芎 名四物湯 合小柴胡湯

分理湯 陰陽錯雜者宜之

柴胡 升麻 萬根 羌活 防風 以此五味升陽達表使離于陽則外不寒

三味引陰下降使離于陽則內不熱 猪芩 以分理陰陽使不得交併 川山甲 以經引 甘草 以和 按此方所指

陰陽俱以本身陰陽之氣言即肉經陰氣上入陽中則惡寒陽氣下入陰中則惡熱

之說也與瘧疾寒熱之理頗異而意可相通故分理而效又猪苓利濕降濁也濁降則清升亦有分理陰陽之義

舉陷湯 邪陷陰分者宜之

用前方上五味升舉下陷之陽而用桃仁紅花四物引此五者此五者入血分取陽以出而以猪苓分隔之

交加雙解飲子 治癰瘡

肉荳蔻

草豆蔻

各二枚一枚用水和  
匙裏煨一枚生用

厚朴

二寸一半用羌  
汁炒一半用生

大甘草

三兩一半  
炙用一半

生薑

紙一塊  
煨一塊生用

分兩服水煎

按治瘧之藥多冷熱互用生熟相參

者以病有寒熱故以此調和陰陽此義宜知

清中驅瘧飲

柴胡

黃芩

半夏

生薑

山楂

枳實

厚朴

陳皮

草果

蒼朮

瘧母丸

青皮

桃仁

紅花

麥芽

神麩

各五錢

三棱

蓬木

得粉

各半錢

鱉甲

醋炒一兩

香附

醋炒八錢

神麩糊丸

補藥送下

嘉禾散

白茯苓

砂仁

苡仁炒

枇杷葉去毛

桑白皮炒

沉香磨

丁香

人參

五味子 白豆蔻 甘草 炙 白术 分各五

青皮 陳皮 大腹皮 洗 杜仲 炒汁

炒 薤香 半夏麴 炒 隨風子 石斛 酒 神麴 炒 檳榔 木香 各三

分 穀芽 炒 薤香

半夏麴 炒 隨風子 石斛 炒

神麴 炒 檳榔 木香 各三

每服三錢薑棗煎食遠服 脾胃不和胸膈痞悶氣逆生痰不進飲食並皆治之 李侍郎曰嶺南地卑土薄上薄則陽氣易泄人居其地腠疎汗出氣多上壅地卑則潮濕特盛晨夕昏霧春夏淫雨人多中濕肢體重倦病多上腕齶悶胸中虛煩腰膝疼痛腿足寒厥大 热下寒每發寒熱身必多汗不宜再發其表下體既寒又不宜下余悉用溫中固下升降陰陽正氣之藥十治十愈或以生薑附子湯冷溫服之胸膈之痞悶煩躁者忽然清涼蓋附子得生薑既能發散又能導虛熱入下焦也有用术附湯而病愈甚者蓋附得术能錮熱氣不能發散也或有脈証俱寔而目黃赤者不可用附子若証可疑宜服嘉禾散能調中氣升降陰陽雖陽証熱多者服之亦解服之二三日則寒熱之証自判矣

截瘧七寶飲

治寔瘧久不已脈弦滑浮大者

常山 炒 草果 煥

擣榔 青皮 厚朴 陳皮 甘草 分各等

酒水煎露一宿取

暑氣以清暑邪也無  
者不用露

未發前二時面東溫服惡心以糖拌烏梅肉壓之 壯實人用蜜

陀僧為細末大人七分小兒量減冷燒酒調面南服之不愈再服必止戒雞魚豆麵

熱粥熱物羹湯

常山飲

常山燒酒炒  
二錢

草果煨  
錢

一 檳榔

知母

川貝母各一  
錢

烏梅

個

薑棗煎一方  
加川

甘草山甲  
草

趙以德曰知母性寒清熱草果性溫勝寒常山吐痰結檳榔破滯氣烏梅生津退熱甘草扶正和中川山甲貫穿經絡以行結邪也按瘧必三四發後方可截

太早則邪未盡而強止之必變生他証

柴常湯

新擬

尋常之瘧三四發後用之甚効

柴胡酒炒一  
錢五分

黃芩炒一  
錢

人參分五

甘草五分

草果煨一  
錢

一 檳榔

青皮 厚

朴薑汁炒各一  
錢

常山酒炒二  
錢

何首烏二  
錢

棗二枚薑三片同煎熟痰加川貝母濕痰加

半夏無汗加羌活紫蘇汗多加黃芪白朮夜發在陰分者加白芍鳖甲紅花以清熱加酒炒升麻以提出陽分挾暑加川黃連香茹挾濕加蒼朮茯苓挾食加山楂麥芽神曲胸滿枳殼渴加花粉烏梅石膏風熱在胃津液消耗加梨汁蔗漿或生地生葛西瓜等汁經所謂風淫於內治以甘寒也

加味香薷飲

香薷錢二

厚朴製

扁豆炒

白朮炒

白芍藥炒

陳皮

白朮芩

黃芩各一  
錢

黃連羌  
汁

甘草炙

猪苓

澤瀉各五  
分

木瓜

右生薑煎服

咳嗽

消風寧嗽湯

桔梗 枳殼 半夏 陳皮 前胡 乾葛 茯苓 各一 蘇葉二錢 杏仁 桑

白錢 各一 甘草 四分 薑葱煎 冬月加麻黃一錢取汗後再用加味二陳湯一劑愈

愈杏仁前胡山梔南星貝母

射干麻黃湯

射干 細辛 紫苑 款冬花 各三 麻黃 生薑 各四 五味子 半夏 各半

大升 水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥煮取三升分溫三服

越婢加半夏湯

麻黃兩 石膏半 生薑三 甘草兩 半夏半 大棗十五枚水六升煎麻黃去

沫內諸藥煮取三升分溫三服

厚朴麻黃湯

厚朴五兩 麻黃四兩 石膏如雞子大 杏仁 半夏 五味子各半 乾薑 細辛各二

小麥一升 右以水一斗三升先煮小麥熟去渣內諸藥煮取三升溫服一升日三服

澤漆湯

半夏半 紫參五兩一 濤漆三升以東流水五斗煮取一斗五升 生薑五兩 白前五兩 甘草 黃

芩 人參 桂枝各一 右同內澤漆汁中煎取五升溫服五合至夜盡

麻黃桂枝湯

人參

麥冬各三分

桂枝 當歸各五分

麻黃 甘草 黃芪

白芍錢各一

北味

旋覆花去梗先煎  
葛根各五分  
麻黃去沫後入餘藥同煎熟服

金沸草散

旋覆花去梗

麻黃節

前胡去蘆各一兩

荆芥穗一錢

甘草炙

半夏

湯洗七次  
薑汁浸

赤

芍藥各五分

水一鍾半薑三片

棗一枚煎八分不拘時溫服

欬冬花散

知母 桑葉焙

欬冬花去梗各十兩

阿膠炒

麻黃去根

貝母去心炒

杏仁去皮去核各一錢

桔梗四十兩

甘草炙

半夏湯洗羌製各二十兩

每服三錢水一鍾薑三片煎七分食後溫服

清咽寧肺湯

桔梗二錢

山梔炒

黃芩 桑皮 甘草 前胡

知母 貝母各一錢

水二鍾煎

八分食後服

杏仁煎

杏仁去皮尖兩研

生薑汁 白蜜 錫糖各一兩

桑皮 貝母去心

木通各一錢半

紫

五味子各五兩

右剉碎用水三升熬半升去渣入前杏仁等四味再熬成膏

每服一錢含化

一方加欬冬花知母各一兩

潤肺丸

訶子 五味子 五倍子 甘草各等 右為末蜜丸噙化久嗽加鶯粟殼

清音丸

桔梗 訶子各一  
兩 甘草五  
錢 硼砂 青黛各二  
錢 冰片三  
分 右為細末煉蜜丸如

龍眼大每服一丸噙化

橄欖丸

百藥煎 烏梅 甘草 石膏各二  
錢 冰片三  
分 右為細末煉蜜丸如彈子大臨臥

噙化一丸

透羅丹

丹溪心法附錄

巴豆去油一  
錢另研

杏仁去皮尖  
炒

大黃濕紙包煨

黑丑炒

皂角去皮弦  
酥炙

半夏製各一  
兩

右為末生薑自然汁丸梧子大每服三十九薑湯下

鴻肺丸

瓜蔞仁 半夏 浙貝母 鐘金 苦葶藶 杏仁 黃連 黃芩 大黃

半夏溫肺湯

旋覆花 人參 細辛 桂心 甘草 陳皮 桔梗 茄藥 半夏製各  
兩 赤茯苓七  
錢 右㕮咀每服四錢生薑三片水煎食後服

紫苑飲

治欬中有血虛勞肺痿 按此方原名紫苑散

人參一錢

紫苑五分

知母 貝母各一錢

桔梗一錢

甘草五分

五味子十粒

茯苓一錢

阿膠五分

水二鍾煎八分食後服

安腎丸

肉桂

川烏頭炮各一斤

桃仁炒

白疾藜

刺去皮

山藥

茯苓去皮

巴戟去心

肉蓯

蓉酒浸臭

石斛

草薢

白朮

破故紙

各四十兩

為末煉蜜

九桐子大

每服三十

溫酒或鹽湯下

空心食前小腸氣茴香湯下

保和湯

知母

貝母

天冬

麥冬

欵冬

錢各一錢

花粉

苡仁

杏仁

各五分

五味子二十

粒

薄荷

兜苓

紫苑

桔梗

各六錢

百合

阿膠

當歸

百部

各六錢

甘草

炙

紫蘇

薄荷

各四錢

鴆糖

一匙

薑三片

滋陰清化丸

天冬

麥冬

生地

熟地

知母

各八錢

茯苓

山藥

貝母

花粉

兩各四

錢

甘草

五味子

錢三

蜜丸

舍化

五沫膏

天冬

麥冬

各一錢

生地

錢二

貝母

一錢

丹皮

一錢

茯苓

分

阿膠

一錢

薄荷

二

犀角 羚角各五 梨汁 藕汁 茄菔汁 人乳鍾二 甘蔗汁鍾一 用水八鍾煎至三鍾去渣入五汁再熬以入水不散為度又入蜜二兩重湯頓半日用

一味百部膏

百部根二十斤搗取汁煎如飴如蜜二斤服方寸匕日三雖三十年久嗽可治

桑枝煎

出近効方

一味嫩桑枝切細熬香煎飲一法用花桑枝切細炒香瓦器熬煮減半再入銀器熬減一半或入少蜜蜜亦可

必效散

五味

錢四  
錢五

貝母 杏仁一  
兩 冬花

錢八

天冬一  
兩

瓜蔞

錢五

葱白

七  
莖

蘇梗

一  
兩

川椒

每歲一粒

共為末將猪肺一個入末於內荷葉包蒸熟五更作一次食以薄燒酒

蘸食盡另飲陳甜酒少許安臥至曉

噙化丸

熟地 阿膠 五味子 貝母 杏仁 敷冬 炙甘草 人參 蜜丸噙化

大兔絲子丸

兔絲子

淨洗酒浸

澤鴻

鹿茸

去毛解炙

石龍芮

王去

肉桂

去粗皮

附子

炮去皮各一兩

山茱萸

防風

去盧宿焙乾

肉蓯蓉

石斛

根去熟乾地黃 白茯苓

去皮

牛膝

酒浸宿培乾一

續斷

山茱萸

防風

去盧宿培乾

肉蓯蓉

石斛

去粗皮

肉蓯蓉

石斛

醫

石

卷六

二六

酒洗切  
焙乾

補骨脂去毛  
酒炒

沉香草澄茄巴戟去心  
茴香炒各

三兩

五味子桑螵蛸酒浸  
炒

覆盆子去枝葉夢  
芎藭各半

右為細末酒煮麵糊丸如桐

子大每服二十丸空心溫酒鹽湯任下

### 喘哮

### 五虎湯

麻黃一錢杏仁分石膏一錢甘草分桑白分細茶許

### 三拗湯

麻黃不去了半錢杏仁不去半錢甘草本不炙各等分一減半

汗即愈每服五錢水一鐘薑五片煎服有

### 定喘湯

麻黃三錢杏仁一錢蘇子二錢甘草一錢桑皮蜜炙黃芩炒一錢欵冬花三錢

半夏三錢法製白果二十一枚炒黃每服五錢水煎服

### 華蓋散

麻黃去根杏仁炒去皮各蘇子炒各甘草分橘紅桑白皮炒赤茯苓各一錢

薑棗煎

### 陳皮湯

陳皮 半夏 茯苓 甘草 紫蘇 枳壳 桔梗 蒼朮 黃芩 天寒加桂枝

桔枳二陳湯

陳皮 半夏 茯苓 生草 桔梗 枳殼 黃芩 黃連 梔子

神仙住喘湯

黑丑頭末一錢 明礬三分 鬼角四分 木香三分 人參一分 菜菔汁調下十服愈

黃連膏

黃連四兩 金銀各一錠水九碗煎二碗再用水六碗煎一碗再用水二碗煎半碗共成膏加入乳牛乳童便各一碗薑汁韭汁側柏葉汁田螺汁各一碗再煎入薄蜜收之漸漸服

葶苈大棗湯

葶苈不以多少炒令黃 右件細研丸如彈子大水三錢棗十枚煎一盞去棗入藥煎七分食後服法令先投小青龍湯三服乃進此藥

清金丹

蘿蔔子淘淨蒸酒一兩 猪牙皂角存性二錢 右以生薑汁浸蒸餅丸如小菉豆大每服三十五丸噙下却喘以薑汁炒蜜丸如桐子大每服七八十九噙下止之

木防已湯

良言

石

卷六

子九

木防已兩

石膏雞子大一塊

桂枝二兩

人參四兩

右四味以水六升煮取二升分溫

再服

呃逆

黑錫丹

沉香

葫蘆巴

酒浸炒

附子

炮各一兩

陽起石

研細水飛各一兩

肉桂

半兩

破故紙

舶茴香

炒

肉豆蔻

麵裹煨

木香

金鈴子

蒸去皮核各一兩

硫黃

黑錫去渣秤各二兩

右用黑蓋

去渣秤

右用黑蓋

去渣秤

或新鐵鉗內如常法熬黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細餘藥並細末和勻自

朝至暮以研至黑光色為度酒糊丸如梧子大陰乾入布袋內擦令光瑩每四十九空心鹽姜湯或棗湯下女人艾棗湯下

丁香散

丁香

白芷蔻

各半兩

伏龍肝

一兩

右為末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢

柿錢散

柿錢

丁香

各分

人參

各等

右為細末水煎食後服

丁香柿蒂散

丁香

柿蒂

青皮

陳皮

各等分

右為麩末每服三錢水一盞半煎七分去渣溫

服無時

羌活附子湯

羌活

附子

木香

茴香

炒各五錢

乾薑

一兩

右為細末每服二錢水一盞半鹽

一撮煎二十沸和渣熱服

陳皮竹茹湯

陳皮

二升

竹茹

二升

大棗

三十枝

生薑

半斤

甘草

兩五錢

人參

一兩

以水一斗煮取三

升溫服一升日五服

參附湯

人參

一兩

附子

炮五錢

右薑裹水煎徐徐服

大補陰丸

黃檗

鹽酒拌新瓦上炒褐色

知母

去皮酒拌濕炒各四兩

熟地黃

懷慶肥大沉水者酒洗焙乾用

敗龜板

酥炙黃各六兩

右為細末以豬脊髓加煉蜜為丸如桐子大每服五十丸空心薑鹽湯下

傷飲食

葛花解醒丸

青皮

去瓤三錢

木香

五分

橘紅

人參

猪苓

去皮五錢

白茯苓

各一錢半

神曲

炒澤瀉

乾薑

白朮各二錢

白芷

各二錢

葛花

砂仁

錢五錢

為極細末

每服三錢

白湯調服

但得微汗則酒病去矣

冲和湯 即發熱門參蘇飲加木香

枳實半夏湯

枳實 半夏各等 加麥蘖 每服七錢水二盞薑五片煎八分溫服無時

瓜蒂散

瓜蒂 炒 赤小荳煮等分 右為細末每服二錢溫漿水調下取吐為度

小七香丸

甘松八兩 益智仁六兩 香附子炒兩半 丁香皮 甘草炙各十兩 蓬术煨兩 縮砂各二兩

右為末蒸餅為丸菉豆大每服二十九溫酒薑湯熟水任下

感應丸

南木香 肉荳蔻 丁香各一兩半 乾薑炮一兩 巴豆七十粒去皮心膜去油去油 杏仁一百四十一粒湯

泡去皮  
尖研

百草霜二兩 右前四味為末外入百草霜研與巴豆杏仁七味同和勻用

好黃蠟六兩溶化成汁以重絹濾去渣更以好酒一升於砂鍋內煮蠟數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟料用春夏修合用清油一兩若秋冬則用兩半銚內熬令香熟次下蠟四兩同化成汁孰銚內乘熱拌和前項藥末控作錠子油紙裹放旋丸如豆大每服三十九空心薑湯下新舊冷積並治百草霜  
作一兩

備急丸

川大黃末 乾薑末 巴豆去皮心研 右各等分和合一處研勻煉蜜丸白內杵千百下如泥丸如小豆大夜臥溫水下一丸如下氣實者加一丸如卒病不計時候婦人有胎不可服

治中湯

即理中湯見寒中 加陳皮青皮等分

紅丸子

京三稜浸軟切片

蓬莪术

青皮去白

陳皮去白各五斤

乾薑炮

胡椒各三斤

右為

末用醋麵糊丸如梧桐子大鑿紅為衣每服三十丸食後薑湯送下小兒臨時減服

枳术丸

枳實去瓢炒一兩

白术酒洗兩

右為末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服五十丸白术湯

半夏枳术丸

即上方加半夏一兩

上二黃丸

黃芩二兩

黃連酒洗一兩

升麻

柴胡各三錢

甘草二錢

枳實炒半兩

右為末湯浸蒸

餅丸每白湯下五七十丸

平胃散

蒼朮泔浸二錢

厚朴炒薑汁

陳皮去白

甘草炙各一錢

薑棗煎

木香乾薑枳术丸 枳术丸加木香三錢炮薑五錢也

丁香爛飯丸

丁香 木香 廣茂 炮  
益智仁 各三 錢半  
香附 半  
為末湯浸蒸餅為丸。菉豆大每白湯下三十丸或細嚼。

枳术導滯丸

黃芩 茶芩 白术 黃連 各三 錢  
右為末湯浸蒸餅為丸食。遠白湯下五十丸。

保和丸

山查肉 半夏 蓋  
雨 製 捣紅 神麴 麥芽 白茯苓 各一  
連翹 菜菔子 炒各半兩

右為末滴水為丸加白术二兩名大安丸

麴蘖枳术丸 枳术加神麴麥芽各一兩也

木香枳术丸 枳术丸加木香一兩也

檳榔丸

檳榔 三錢  
木香 人參 各二 錢  
陳皮 五錢  
甘草 一錢

右為末蒸餅丸每服二三十丸  
食前白湯下

三黃枳實丸

黃芩二兩

黃連酒炒

大黃煨

神麌炒

白术

陳皮各一兩

湯浸蒸餅為丸如棗

豆大每服五十九白湯下

除濕益氣丸

枳實炒

白木

黃芩生用

神麌炒各二兩

紅花三錢

蘿蔔子炒半兩

為末荷葉燒飯

丸每服五十丸白湯下

白术丸

白术

半夏製

神麌炒

枳實炒各一兩

橘紅七錢

黃芩半兩

枯白礬三分

右為末

湯浸蒸餅為丸量所傷多少加減服之

養胃湯

草果

茯苓

人參去蘆各半兩

甘草炙七錢

橘紅七錢

厚朴半錢

厚朴去蘆製

蒼朮湯洗炒

右為末每服三

半夏湯洗各一兩

藿香先錢

右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅三枚煎七分去

渣熟服

和解散

厚朴

去蘆皮  
蜜汁製

陳皮洗各四兩

藁本

桔梗

甘草

蒼朮去皮一斤

右為末每服三

錢水一盞半薑三片棗二枚煎七分不拘時熟服

瓜蒂散

單用瓜蒂取吐

神保丸 用瓜蒂細茶各一錢取吐

木香 胡椒各二錢半 巴豆十粒去皮心膜研 乾蝎炒 右為末湯浸蒸餅丸麻子大硃砂三錢為衣每服五丸 心痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑湯下血痛炒薑醋湯下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒任下

不能食

二神丸

破故紙炒四兩 肉荳蔻生二兩 右為末加大棗四十九枚生薑四兩切片同煮爛去薑取棗剝去皮核肉研為膏入藥末和杵丸如桐子大每服三五十丸鹽湯下

和中丸

乾薑 甘草炙 陳皮各一錢 木瓜枝 人參 白术各三錢 右為末蒸餅為丸食前白湯下三五六丸

倦

小建中湯

加黃芪名黃芪建中湯  
當歸名當歸建中湯

桂枝 甘草炙 生薑二兩切各 芍藥三兩 大棗擘十二 膠飴升 右六味以水七升煮取三升去渣內膠飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用以甜故也

大建中湯

黃芪 當歸 桂心 茯苓各三

人參 炙甘草各一

半夏炮

黑附子炮去皮各

(二錢) 右八味㕮咀每服五錢水二盞薑三片棗二枚煎至一盞去滓食前溫服

十四味建中湯

即大建中湯加 白朮 白茯苓 熟地

川芎 麥冬

肉蓯蓉各等分

白朮附子湯

白朮 附子炮 陳皮 蒼朮製

厚朴製

半夏湯泡

茯苓去皮

澤鴻各一

猪

苓去皮半兩 肉桂四錢

每服五錢水一盞生薑三片煎半盞食前溫服量虛實加減

調中益氣散

黃芪一錢 人參 甘草炙 當歸 白朮

各半錢

白芍藥

柴胡

升麻各三分

橘

皮分 五味子十五粒

水二鍾煎一鍾去渣溫服食前

升陽散火湯

柴胡八錢 防風二錢

葛根 升麻 羌活 獨活

人參

白芍藥各五錢

生甘草

(二錢) 炙甘草三錢

每服五錢加薑棗煎

虛損

保元湯

人參

二錢

黃芪

三錢

炙甘草

一錢

水煎服

地骨皮

飲

即四物湯

加丹皮

地骨皮

十全大補湯

肉桂

甘草

芍藥

黃芪

當歸

川芎

人參

白朮

茯苓

熟地黃

甘草

白芍藥

五分一錢

人參

陳皮

黃芪

炙蜜各

桂心

白朮

當歸

甘草

炙各一錢

熟地黃

五味子

炒杵

茯苓

各半分

遠志

去心五分

薑

棗水煎服

桂附八味丸

即下方加

附子肉桂

桂附能補一切火得六味引之則專補命門之火何則附子通行諸經走而不守肉

桂性亦竄發

逢陽藥則為汗散

二者皆難控制必得六味為之濬導乃能下行而無上

僭之虞今人不明此理動稱桂附引火歸元離六味而用之以致酷烈中上燥涸三

陰為禍大矣

火微少不欲壯故桂附各止一兩火

少則生氣故金匱名此為腎氣丸

裁八味為六味始自錢仲陽之

治小兒以小兒稚陽純氣故去桂附也薛立齋因之悟大人陰虛火動用丹溪補陰

法不驗者用此立應

丹溪用四物湯補陰乃補後天有形之血

此不可

自是以來羣推為

茲陰之神方醫貫又推廣其義觸處旁通以應無窮之變而要之皆為根本虧敗而

設若病不涉腎固可不用也今人未達醫貫之旨不諭何病輒合服此延緩誤事故  
張介石謂醫貫以六味治傷寒其言如飴而醫病家反謂平穩亦可哂矣

六味地黃丸

地黃砂仁酒拌九蒸九晒八兩

山茱萸酒潤

山藥各四兩

茯苓

丹皮

澤鴻各三兩

蜜丸空

心鹽湯下冬酒下熟地滋腎君藥然遇氣藥則運用於土遇血藥則流行於經不能制其一綫入腎也故以五者佐之山藥陰金也

質重屬陰色白屬金也能助肺氣之下降山茱萸陰木也

潤屬陰

能斂肝氣之迅升水火升降必由金木為道路二者為左右降下

之主以制其旁轉且補其母而未出高原補其子

茱萸補肝血也

而不盜母氣又用丹皮瀉陰可知故能降上炎之陰火用茯苓以降陰中之陽

腎中之邪火也水虛者火必土正取其滲泄味者反以乳製之可笑

澤瀉之鹹泄以降陰中之陰液也腎熱則水液

南以補北降火以滋陰茯苓以淡泄以降陰中之陽

炎茯苓藏茯地中為日最久沉

形之壬水須流行不畜否則泛溢為災即不渾濁亦須導之或疑澤瀉泄腎昧矣

得力尤在苓瀉二味常常下泄則

者色色皆降共挽地黃下趨所謂治下制以急也

羣藥惟其所導味者嫌其參泄而升柴流濕就燥分道揚鑣皆必不可去者也

補中升也清升則濁降故謂補中以

升柴流濕就燥分道揚鑣皆必不可少者也以升為降六味降也火降則水上昇故謂六味以降為升水何以升水足則上潤也

都氣丸 即六味丸加五味子

七味丸 即六味丸加肉桂

加減地黃丸 即六味丸加五味子肉桂

知柏地黃丸 即六味丸加知母黃柏

濟生腎氣丸

熟地

兩四

茯苓

兩三

山藥

萸肉

丹皮

澤瀉

肉桂

車前

牛膝

各一

附

子

錢五

蜜丸桐子大每服八十九空心米飲下

補肝湯

當歸

川芎

白芍

熟地

酸棗仁

炙甘草

木瓜

救肺飲

當歸

白芍

麥冬

五味子

人參

黃芪

炙甘草

百合

欬冬花

紫苑

馬兜鈴

天王補心丹

柏子仁

炒研去油一兩

五味子

炒一兩

茯苓

錢五兩

當歸

酒洗一兩

桔梗

丹參

炒各一兩

遠志

錢一兩

酸棗仁

炒一兩

蜜丸

彈子大硃砂為衣臨臥燈心湯下一丸或噙化

三才丸

天門冬

地黃

人參

各分

為末

煉蜜

空心服

猪肚丸

牡蠣殼 白术各四 苦参三兩 右為細末以猪肚一具煮極爛剉研如膏和丸如桐子大每服三十丸米飲送下日三四服

大黃瘧蟲丸

大黃二兩半蒸 黃芩二兩 甘草三兩 桃仁一升 杏仁一升 地黃十兩 芍藥四兩 乾漆一升 蟲蟲升 水蛭百枚 蟬螬一升 瘿蟲半升 右十二味末之蜜丸小豆大酒飲服五丸日三服

百勞丸

當歸炒 乳香 没藥各一錢 痘蟲十四個去翅足 仁十四個浸水大黃根皮大黃水煎熬百遍右為細末煉蜜為丸桐子大都作一服可百丸五更用百勞水下取惡物為度服白粥十日乃仲景甘瀾水也

柴胡飲子

黃芩 甘草炙 大黃 芍藥 柴胡 人参 當歸分等 剁散每服四錢水一盞薑三片煎至六分去渣溫服

防風當歸飲子

柴胡 人參 黃芩 甘草 防風 大黃 當歸 芍藥各半 滑石二錢 右㕮咀每服五錢水一盞半薑三片煎七分溫服

醫學

麥煎散

赤茯苓 當歸 乾漆 鱉甲醋炙 常山 大黃煨 柴胡 白朮 生地黃 石

膏各一兩 甘草半兩 右為末每服三錢小麥五十粒水煎食後臨臥服

傳屍將軍丸

錦紋大黃九蒸晒焙 膻香一錢 管仲 牙兒去皮醋炙 桃仁三錢炒 檳榔 雷丸 鱉甲

各一兩 茄萸五錢 右為末先將梔葉二兩東邊桃柳李桑葉各七片水一碗煎熟去渣入蜜一盞再熬成膏入前藥及安息香搗丸桔子大每服三十九食前東湯下

芳歸血餘散

室女頂門生髮一小團井水洗去油膩法醋浸宿日中晒乾紙燃火燒存性 真川芎半兩 當歸三錢 木香 桃

仁水浸去皮各二錢 安息香 雄黃各一錢 全蝎二枚 江上大鯉魚頭生截斷一枝醋炙醋 古為

末分作四服每服井水一大碗淨室中煎七分入紅硬降真香末半錢燒北斗符入藥月初五更空心向北目天咒曰療神療神害我生人吾奉帝敕服藥保身急急如律令咒五遍西北服藥畢南面吸生氣入口腹中燒降香置床底下午時又如前服藥

北斗符 敷 芝念北斗咒 珠砂書等

鼈甲生犀散

天靈蓋俱男者色不赤可用女者色赤勿用以檀香煎湯候冷洗咒曰雷 生鼈甲公靈雷公聖達傳屍即須應急急如律令咒七遍訖次用酥炙黃

甲

一枝去  
蘇炎黃  
生

虎長牙

二枚去  
則用牙  
髓骨半兩  
安息香

桃仁

水浸去  
皮尖焙  
檳榔

雞心者

各半兩

犀角

木香

甘遂

降真香

乾漆

杵碎炒烟  
畧存性

阿魏酒浸研

雷丸

錢二

穿

山甲

取四趾  
醋炙焦

全蝎

三個  
蚯蚓十條生  
研和藥

右件為末

每服半兩先用豉心四十九粒  
煎服

東向桃李桑梅小稍各二莖長七寸生藍青七葉青蒿一小握葱白連根洗五莖石  
臼內同杵用井水一碗半煎取一盞入童便一盞內藥末煎取七分入麝一字月初  
旬五更空心溫服即以被覆汗恐汗中有細蟲軟帛拭之即焚其帛少時必鴻蟲以  
淨桶盛急鉗取蟲付烈火焚之並收入磁器中瓦片傳雄黃蓋之泥和灰扎埋深山

絕人行處

八物湯

白术

炒茯苓

人参

黃芪

當歸

芍藥

炒川芎

地黃

右為散每服

五錢水二盞煎至一盞去渣食後溫服

大黃青蒿煎

青蒿 大黃 猪膽汁 童便

麥門冬

麥門冬

去心

遠志

甘草煮

人参

黃芩

生地黃洗

茯神

石膏

煨各

甘草

火半兩

越鞠丸

香附 蒼术

米泔浸一宿炒

川芎

各二兩

山梔

炒

神龜

五錢

一兩

為末滴水丸菉豆大

每服一百丸白湯下

亦可作湯

逍遙散

柴胡

當歸

拌酒

白芍

酒炒

白木

酒炒

茯苓

錢一

炙甘草

五分

加煨薑薄調煎

加味逍遙散

氣鬱湯

香附

童便浸一宿去毛為籠未培乾杵

蒼术

橘紅

製半夏

各一錢半

貝母

心去

白茯苓

撫芎

羌活

獨活

各一錢

芎

紫蘇葉自汗用子則

山梔仁

炒各一錢

甘草

木香

枳榔

各五錢

生薑

五片

煎

濕鬱湯

蒼术

錢三

白术

香附

橘紅

厚朴

薑汁炒

白茯苓

撫芎

羌活

獨活

各一錢

甘草

錢五分

半夏

錢一

生薑

五片

水煎

血鬱湯

香附

童便製二錢

上丹皮

赤鸞

川通草

穿山甲

真降香

蘇木

山楂肉

大麥芽

炒研各一錢

紅花

分

水酒

各一半

煎去渣入桃仁

去皮泥七分

韭汁半盞

和勻

通口服

熱鬱湯此治非陰虛非陽陽亦不發熱而常自蒸蒸不解者

連翹

錢四

薄荷葉

黃芩

各一

山梔仁

二

麥門冬

去心三

甘草

五分

鬱金

一錢

瓜蔞皮

錢二

竹葉七片

煎

痰

水煮金花丸

南星

半夏

各一兩俱生用

天麻

五錢

雄黃

二錢

白麵

兩

右為細末滴水為丸每服五十丸至百丸先煎漿水沸下藥煮令浮為度濾出淡漿水浸另用生薑湯下

川芎丸

川芎

龍腦

薄荷葉

培乾各一兩十五兩

桔梗

一百兩

甘草

燼三十兩

防風

去苗二十五兩

細

辛

洗五兩

右為細末煉蜜搜和每丸重三分每服一丸臘茶清細嚼下食後臨臥服

防風丸

防風

洗

川芎

天麻

去苗酒浸一宿

甘草

炙各二兩

硃砂

半兩水飛研

右為末煉蜜為丸每

雨作十九以硃砂為衣每服一丸荆芥湯化服茶酒嚼下亦得無時

祛風丸

半夏麴

荆芥各四兩

槐角子

炒

白朮

生

橘紅

硃砂各一兩

右為末薑汁糊

丸每服五六十九生薑皂角子仁湯下日三服

導痰湯

半夏湯洗火次四兩

天南星炮去皮

枳實麸炒去瓤

赤茯苓去皮

橘紅各一兩

甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑十片煎八分食後溫服

導痰丸

玄珠

大半夏六兩 分作三分一分用白礬一兩為末浸水一分用巴豆肉一百粒為末浸水 右件餘藥在下以半夏在上浸至十日或半月要常動水合二藥相透次相合處揀去巴豆並皂角將餘水以慢火煮令水乾取出半夏切搗碎晒乾或陰乾亦佳後入甘遂製 百藥煎二兩 全蝎殼各一兩 右為細末薄糊丸如桐子大每服十九或十五丸亦量人虛實白湯下

小黃丸

南星湯洗

半夏湯洗

黃芩各一兩

右為細末薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服五七十丸生薑湯下食後

清心滾痰丸

大黃蒸少頭翻過再蒸少頭即取出不可過

少頭翻過再蒸少頭即取出不可過

黃芩各八兩

青礞石硝煅如金二兩

沉香五錢

為末水丸

桔子大白湯食後空心服水鴻孕婦忌服

清心滾痰丸

熟大黃錢四

黃芩錢四

礞石五分

沉香半分

牙皂五分

犀角五分

麝香五厘

硃砂

五分

水糊丸

控涎丹

甘遂去心

紫大戟去皮

白芥子真者等分

右為末煮糊丸如桐子大晒乾臨臥淡薑

湯或熟水下五七九至十九瘦猛氣寢加丸數不妨

白术丸

南星 半夏各一兩俱湯洗

白术半兩一兩

為細末湯浸蒸餅為丸梧子大每服五七十九

食後薑湯下

小胃丹

芫花好醋拌勻過一夜於瓦器內不

住手攏炒令黑不可焦

甘遂

濕麪裹長流水浸半日煮晒乾各半兩

大黃

濕紙裹煨勿合焦切焙乾

再以酒潤炒熟

大戟用流水煮一時再

黃檗

炒三分半兩丹溪用

右為末以白术膏丸如蘿

葡萄大臨臥津液吞下或白湯送下

粥丸

玉粉丸

南星 半夏各一兩俱湯洗

橘皮去白二兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七

十九人參生薑湯下食後

局方桔梗湯

桔梗

細炒微炒

半夏

湯洗七次  
薑汁製

陳皮

去白各兩

枳實

炒

色赤黃

右為龐末每服二

錢水一鍾薑五片同煎至七分去渣不拘待溫服

## 二陳湯

半夏

湯洗七次

橘紅

各五兩

白茯苓

三兩

炙甘草

一兩半兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑

七片烏梅

一枚煎六分不拘時熱服

## 薑桂丸

南星

俱半夏

官桂

去粗皮一兩

為細末蒸餅為丸桐子大每服三十九薑湯下

食後

## 胡椒理中丸

欵冬花

去梗去

胡椒

炙草

華撥

良薑

細辛去苗

陳皮

去白各四兩

白术

兩五

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十九加至五十九溫湯溫酒米飲任服

無時日二服

## 妙應丸

即控涎丹

## 小半夏茯苓湯

半夏

茯苓各等分

每服五錢水一盞半薑五片煎七分服無時

## 五套丸

南星

每個切作十數塊同半夏先用冷水浸三日每日易水  
次用白礬二兩研碎謂入水內再浸三日洗淨焙乾

半夏  
二兩  
切破各

乾薑  
炮

白朮

良薑

茯苓各一

丁香不見

木香  
青皮

陳皮去白各  
半兩

右為末

用神麆一兩大麥芽二兩同研取末打糊丸如梧桐子大每服五十丸加至七十九  
不拘時溫熟水送下

小半夏湯若加白茯苓三兩名小半夏加茯苓湯

半夏升

生薑半斤半

右二味以水七升煮取一升半分溫再服

桂苓术甘湯

茯苓四兩

桂枝  
白朮各三兩

甘草二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小

便則利

甘遂半夏湯

甘遂三枚

半夏十二枚以水一升煮取半升去渣

芍藥五枚

甘草一枚如指大

右四味以水二升

煮取半升去渣以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之

厚朴大黃湯

厚朴一尺

大黃六兩

枳實四枚

右三味以水五升煮取二升分溫再服

巴椒蘆黃丸

防已

椒目

葶苈熱

大黃各一兩

右四味研之蜜丸如梧子大先食飲服十九

日三服

八神來復丹

硝石一兩同硫黃為末磁器內以微火炒用柳箆攪

太陰玄精石一兩飛研

五靈脂

水澄清漬去砂石晒乾

青皮去白

陳皮去白各二兩

舶上硫黃者透明

沉香

木香者堅寔

南星粉曰者各一兩

右為末飛麵糊丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲送下

大青龍湯

麻黃六兩去節

桂枝兩

甘草二兩炙

杏仁四十個去皮尖

生薑三兩

大棗十二枚

石膏如雞

大子右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去渣溫服一升取微似汗汗多者溫粉撲之

小青龍湯

麻黃三兩去節

芍藥三兩

五味子半升

乾薑三兩

甘草三兩炙

細辛三兩

桂枝三兩

半

夏湯半升洗

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去渣溫服

茯苓丸

半夏二兩

茯苓一兩

枳殼去瓢數炒半兩

風化朴硝二錢五分撒在木盤中片時成冰置當風處即

乾如白粉刮取用之可也

右為細末生薑汁煮麵糊丸如桐子大每服三十丸薑湯送下

五飲湯

旋覆花 人参 陳皮去白 枳寃 白术 茯苓 厚朴製 半夏製 澤瀉 猪  
芩 前胡 桂心 白芍藥 炙甘草等分上各 右每一兩分四服薑十片水二盞  
煎七分去渣溫服無時

痞滿

括萎薤白白酒湯

括萎實一枝搗

薤白半斤

白酒升

右三味同煮取二升分溫再服

括萎薤白半夏湯

括萎實一枝搗 薤白兩 半夏半升 白酒一斗

右四味同煮取四升溫服升日三服

烏頭赤石脂丸

蜀椒一兩一法二分

烏頭一分炮

附子半兩炮一法一分

赤石脂一兩一法二分

乾薑一兩一分

右

五味末之蜜丸桐子大先食服一丸日三服不知稍加服

薏苡附子散

薏苡仁十五兩

太附子十枚炮

右二味杵為散服方寸 日三服

茯苓杏仁甘草湯

茯苓三兩

杏仁五十枚

甘草一兩

右三味以水一斗煮取溫服一升日三服

橘皮枳寃生薑湯

橘皮一  
斤  
枳實三  
兩  
生薑半  
斤

右三味以水五升煮取二升分溫服

枳實薤白桂枝湯

枳實四  
枚  
厚朴四  
兩  
薤白半  
斤  
桂枝一  
兩  
桔梗一  
枚

右五味以水五升先煮枳  
實厚朴取三升去渣內諸藥煮數沸分溫三服

人參湯

人參  
甘草  
乾薑  
白朮各三  
兩

右四味以水八升煮取三升日三服

桂枝生薑枳實湯

桂枝三  
兩  
生薑三  
兩  
枳實五  
枚

右三味以水六升煮取三升分溫三服

黃芪補中湯

黃芪  
人參各二  
錢

甘草  
白朮  
蒼朮

陳皮名一  
錢

澤鴻

猪苓

茯苓  
右

水一鍾煎七分溫服送下大消痞丸

大消痞丸

白朮  
薑黃各一  
兩  
黃芩  
黃連炒各

枳實五錢炒  
半夏湯洗  
陳皮  
人參各

澤鴻  
厚朴  
砂仁各三  
錢

猪苓二五  
錢分

乾生薑  
神曲炒

炙甘草各二  
錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七十丸至百丸食遠白湯下

黃芩利膈丸

黃芩生炒各一兩

白术 枳殼 陳皮 南星各三錢

半夏 黃連 澤鴻各五錢

白

礬分五

為末水浸蒸餅丸每服三五十丸白湯下食遠服

或加薄荷葉玄明粉二錢

積聚

秘方化滯丸

丹溪心法附錄

巴豆

三稜

莪朶

青皮 陳皮

黃連

半夏

木香

丁香

倒倉法

用肥嫩黃牡牛肉三十斤切成小塊去筋膜長流水煮爛以布濾去渣取淨汁再入鍋中慢火熬至琥珀色則成矣今病人預先斷慾食淡煎一日不食晚飯設蜜室令明快而不通風至日病人入室飲汁一鍾少時又飲一鍾積數十鍾寒月則重湯溫而飲之任其吐利病在上者欲其吐多病在下者欲其利多上中下俱有者欲其吐利俱多全在活法而為之緩急多寡也連進之急則逆上而吐多緩則順下而利多矣視其所出之物必盡病根乃止咀利後必渴不得與湯以所出之溺飲之名輪迴酒非惟可以止渴抑且可以浣濯餘垢行後倦睡覺飢先與稠米湯飲次與淡稀粥三日後方與少菜羹次與厚粥軟飯調養半月或一月覺精神煥發形體輕健況痼恙安矣其後忌牛肉數一作年夫牛坤土也黃土之色也以順為性而效法乎乾以為功者牡之用也內者胃之藥也熟而為液無形之物也橫散入肉絡由腸胃而滲透肌膚皮毛爪甲無不

入也積聚久而形質成依附腸胃回薄曲折處以為棲泊之窠臼阻礙津液氣血薰蒸燔灼成病自非刮腸剖骨之神妙可以銖兩丸散窺犯其藩牆戶牖平肉液之散濫腸胃受之其回薄曲折處肉液充滿流行有如洪水泛漲浮槎陳朽皆推逐蕩漾順流而下不可停留凡屬滯礙一洗而空牛肉全重厚和順之性盎然渙然潤澤枯槁補益虛損寧無精神煥發之樂乎

桃仁煎

桃仁 大黃各一兩

蟲蟲炒五錢

朴硝一兩

共為末先以醇醋一斤用砂器慢火煎

至多半鍾下末藥攬良久為小兒前一日不食晚飯五更初酒送下一錢取下惡物如豆汁雞肝末下次日再服見鮮血止藥如無蟲蟲以蟲蟲代之

大七氣湯

京三稜 蓬莪术 青皮

陳皮各去白

藿香葉

香附炒去毛一兩半

㕮咀每服五錢

水二盞煎一盞食煎溫服

伏梁丸

黃連去鬚一兩半

人參去蘿卜皮一兩

厚朴製各半兩

黃芩錢三

肉桂

茯神去皮一兩

丹參炒各一兩

川烏炮去皮臍

乾薑炮

紅豆

菖蒲

巴豆霜

分各五

右除巴豆霜外為末另研巴

豆霜旋入和勻煉蜜為丸如桐子大初服二丸一日加一丸二日加三丸漸加至大

便微溏再從二丸加服淡黃連湯下食遠周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴半  
兩連前共一兩減黃連半兩只用一兩黃芩全不用

三因伏梁丸

茯苓去皮 人参去蘆 厚朴去粗皮  
羌製炒 枳殼去瓢  
麸炒 三稜煨 半夏湯泡  
七次 白朮各等分  
為細末麵糊丸如梧子大每服五十丸食遠米湯下

肥氣丸

柴胡二兩 黃連七錢 厚朴半兩 椒炒去汁去目及  
閉口者四錢

甘草炙三錢 廣皮炮 昆布

人參各二錢

皂角去皮  
子煨

白茯苓去皮  
一錢半

川烏炮去皮臍  
一錢二半

乾薑

右除茯苓

皂角巴豆外為極細末再另研茯苓皂角為細末和勻方旋入巴豆霜和勻煉蜜丸  
如桐子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從兩丸加服周  
而復始積減大半勿服 在後積藥依此法服之春夏秋冬另有加減法在各條下  
秋冬加厚朴一半通前重一兩減黃連一錢半苦治風癇於一料中加人參茯苓菖  
蒲各三錢黃連只依春夏用七錢雖秋冬不減淡醋湯送下空心服

加減肥氣丸

厚朴 人參 乾薑各半  
兩 川烏 巴豆霜各三  
錢 肉桂二錢 黃連一  
兩 川椒五  
分  
甘草五  
分 右除巴豆霜外同為細末旋入巴豆研勻煉蜜丸如桐子大初服二丸一

日加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從二丸加服淡醋湯下空心服  
秋冬去生薑半錢加厚朴一倍減黃連一半

三因肥氣丸

當歸頭 蒼朮各一兩半 青皮一兩炒 蛇含石火煅醋淬 三稜 蓬朮 鐵孕粉各一錢半

兩與三稜蓬朮同入醋煮一伏時

為末醋煮米糊丸如菉豆大每服四十九用當歸浸酒下食

遠服

息貴丸

厚朴薑製八錢

黃連三錢

人參去蘆二錢

乾薑炮

白茯苓另末去皮

川椒汗炒去

紫苑

芍藥

去苗各一錢半

桂枝去皮

桔梗

京三稜炮

天門冬

陳皮

川烏炮

白芷

芍藥

去苗各一錢半

青皮五分

巴豆霜四分

右除茯苓巴豆霜旋入外餘藥共為細末煉蜜丸如桐子大每服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從二丸加服煎淡薑湯送下食遠周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴五錢連前一兩三錢黃連減七錢用六錢

加減息貴丸

川烏 乾薑

白豆蔻 桔梗各一錢

紫苑 厚朴

川椒汗去

天門冬

汗去

天門冬

心京

三稜 茯苓各一錢半

人参 桂枝各二錢

陳皮八錢

黃連一兩三錢

巴豆霜四分

紅花

右為末湯泡蒸餅為丸如桐子大初服二丸一日加一丸二日加二

少許 青皮丸

右為末湯泡蒸餅為丸如桐子大初服二丸一日加一丸二日加二

丸加至大便微溏為度再從二丸加服煎生薑湯送下食前忌酒濕麪腥辣冷物

三因息賁湯

半夏湯 泡桂心

人參去蘆 吳茱萸洗三錢

桑白皮炙

葶苈

炙甘草各二錢半

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾食前服

痞氣丸

厚朴製半兩

黃連去鬚八錢

吳茱萸洗三錢

黃芩白术各二錢

茵陳酒製炒

縮砂仁

乾薑炮各一錢半

白茯苓另爲末

人參

澤瀉各一錢

川烏皮臍泡去

川芎各五錢

巴

豆霜另四分 除茯苓巴豆霜另研爲末旋入外餘藥同爲細末煉蜜丸桐子大初服二丸一日加一丸二日加二丸加至大便微溏再從二丸加服淡甘草湯下食遠

周而復始積減大半勿服

加減痞氣丸

厚朴錢一

黃芩酒製

黃連酒製

益智仁當歸尾橘皮白附子各三分

半夏分

吳茱萸

青皮

澤瀉

茯苓

神曲炒

廣茂昆布

熟地黃

人參

甘草

巴豆霜

葛根各一分

紅花半

右爲細末蒸餅爲丸如桐子大依前服法

三因痞氣丸

赤石脂火煅

醋淬

川椒汗炒去

乾薑炮各二兩

桂心

附子各半

大烏頭炮去皮臍

二錢半

右為細末煉蜜和丸如梧子大以硃砂為衣每服五十丸食遠米湯下

奔豚丸

厚朴七錢

黃連炒五錢

苦棟子酒煮三錢

白茯苓末

澤瀉各二錢

菖蒲各二錢

玄胡索各二錢

桂分一錢

附子去臍皮

全蝎各一錢

獨活各一錢

川烏頭炮

丁香各五分

巴豆霜各四分

肉桂各二錢

桂分二錢 右除巴豆霜茯苓另為末旋入外餘藥為細末煉蜜丸如梧子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至大便微溏再從二丸加服淡鹽湯下食遠周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴半兩通前一兩二錢如積勢堅大先服前藥不減於一料中加存性牡礪三錢疝帶下勿加 如積滿腹或半腹先治其所起是何積當先服本藏積藥諸病自愈是治其本也餘積皆然 如服藥入覺熱加黃連 如服藥人氣短加厚朴 如服藥人氣悶亂減桂

三因奔豚丸

甘李根皮焙

乾葛一斤

川芎二兩

當歸一兩

白芍藥一兩

黃芩一兩

甘草一兩

錢半火炙

半夏一兩

湯泡火次

桂分二錢 右作一服水二鍾薑五片煎至一鍾食前服

二腎散

橘紅一斤

甘草四兩

鹽半兩

右用水二四碗從早煮至夜以爛為度水乾則添水

晒乾為末淡薑半兩同前藥煮氣滯加香附二兩同前藥煮氣虛者加沉香半兩另

入噤口瘡加蓮肉二兩去心另入

通經散

陳皮 白當歸各一  
湯調下臨臥服

霞天膏

即倒倉法方熬如稀餳滴水不散色如琥珀其膏成矣

此節火候最要  
小心不然壞矣

大段每肉十

二斤可煉膏一斤磁器盛之用調煎劑初少漸多沸熱自然溶化用和丸劑則每三分攏白麪一分同煎為糊或同煉蜜寒天久收若生微用重湯煮過熱天冷水  
窖之可留三日

蟲

烏梅丸

烏梅三百個酸  
以靜蟲味以下蟲  
連一斤苦寒二  
味以二味以  
補血氣右十味異搗飾合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟搗  
成泥和藥令相得內面白中與蜜杵二千下丸如梧桐子大先食飲服十九日三服稍  
加至二十九禁生冷滑物臭食等

細辛六兩

乾薑十兩

蜀椒四兩

去子辛熱三味以伏蟲

黃柏六兩

寒苦

黃

辛熱六兩附子六兩炮

桂枝六兩

濟連柏之寒苦

當歸四兩

辛溫人參六兩

甘溫

上海千頃堂印行

化蟲丸

鶴虱 檳榔 苦棟根各一兩  
麯糊丸末服亦可

萬應丸

黑牽牛取頭未 大黃 檳榔各八兩  
牛大黃、檳榔和一處為末以大皂角苦棟皮各四兩煎汁法水為丸如菉豆大後以  
雷丸木香沉香和一處研末為衣每服三四十丸五更用砂糖水送下或作服亦可

取蟲積方

枳榔 章牛各半斤 雷丸一兩半 苦練皮一兩 大黃四兩 皂角半斤 三稜 蓬木各二兩  
另研者 木香隨意加 古為細末煮皂角膏子煮糊和丸如黍米大每服二錢四更  
時分冷茶送下小兒一錢下蟲後白粥補之

蠶蛹汁方

右取繅絲蚕蛹兩合研爛生布絞取汁空心頓飲之非繅絲時預收取蚕蛹晒研細  
末用時以意斟酌多少和粥飲服之

腫脹

疏鑿飲子

澤瀉 商陸 赤小豆 炒 羌活 大腹皮 椒目 木通 秦艽 荚蒾皮 桃  
榔各等 右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎七分不拘時溫服

寶脾飲

厚朴去皮  
薑製 白术 木瓜去  
瓢 大腹皮 附子炮 木香火  
不見 甘草姜半  
兩 每服

四錢薑五片棗一枚煎無時溫服

復元丹

附子炮二  
兩 南木香 煙 茴香 炒 川椒汗  
炒出 厚朴去  
薑製  
龜皮 獨活 白术 炒  
陳皮去  
白 吳茱萸 炒 桂心各一  
兩 澤瀉一  
兩 肉豆蔻 煙 桂榔各半  
兩 糊丸梧  
子大每服五十九紫蘇湯下

防已黃芪湯

防已一  
兩 黃芪一  
兩  
半 白术七  
錢  
半 甘草炙  
半 每服五錢七生薑四片棗一枚  
煎去渣溫服良久再服

越脾湯

麻黃六  
兩 石膏斤 生薑三  
兩 棗十五  
枚 甘草二  
兩 以水六升先煮麻黃去上沫內  
諸藥煮取三升分溫二服

防已茯苓湯

防已 黃芪 桂枝各三 茯苓六

兩

甘草二

水六升煮取二升分湯服

越婢加术湯即越婢湯加白术四兩

甘草麻黃湯

甘草二

兩 麻黃四

水五升先煮麻黃去上沫內甘草煮取三升溫服一升重覆汗

出不汗再服慎風寒

五皮飲

一方去陳皮桑白入五加皮地骨皮腳腫加五加皮木瓜防已名加味五皮飲

陳皮 茶芩皮

薑皮 桑白皮

炒

大腹皮各等

水煎服

十乘湯

芫花

熬 甘遂

大戟各等 分

右三味搗篩以水一升五合先煮肥大乘一枚取八

合去渣內藥末強人服一錢 痰人服半錢平旦溫服之不下者明日更服半錢得快利後糜粥自養

濬川散

大黃

煨 牽牛取頭 未

郁李仁各一 兩

木香三

錢

芒硝三

錢

甘遂半錢

半錢

神祐丸

甘遂

以麪包不令透水煮百餘沸取出用冷水浸過去麪焙乾

大戟

醋浸煮培乾用

芫花各半兩

醋浸煮

黑牽牛二

兩

大

黃一

右為細末滴水為丸小豆大每服五七十九臨臥溫水下

三花神祐丸

即神祐丸加輕粉五分

禹攻散

黑牽牛四兩 茴香炒一兩 或加木香一兩 右為末薑汁調一二錢服

舟車丸

即三花神祐丸加青皮五錢

陳皮五錢

木香二錢半

枳榔二錢半

枳實七錢 白术二兩 右㕮咀以水五升煮取二升分溫二服腹中軟即當散也

茯苓導水湯

澤瀉

赤茯苓各三兩

桑皮一兩

木香七錢半

木瓜一兩

砂仁七錢半

陳皮七錢半

白术三兩

蘇葉一兩

大腹皮七錢半

麥冬去心三兩

枳榔一兩

每服五錢燈心水煎

寒脹中滿分消湯

人參

川烏當歸

青皮黃連

澤瀉乾薑

柴胡麻黃留節

生薑草豆蔻

澄茄各二分

益智仁半夏

茯苓木香

升麻各三分

黃芪吳茱萸

蔻厚朴

黃柏各五分

水煎服

熱脹中滿分消丸

薑黃 人參 白术 猪苓去皮

炙甘草各一 廣皮 澤瀉錢 各三

知母炒四錢

黃連炒 半夏制

枳實炒各五錢

厚朴薑製一兩

黃芩炒夏用兩二錢

砂仁 乾薑 白

茯苓錢各二 湯浸蒸餅丸 梅子大 每服百丸 白湯下食遠

### 分心氣飲

紫蘇梗二錢

青皮 茵藥

大腹皮 陳皮各一錢

木通 半夏製各八分

官桂六分

赤茯苓 桑皮炒各五分

水二鍾薑三片 燈心十莖 煎八分 食前服

### 紫蘇子湯

真紫蘇子炒搗碎一錢

半夏製

大腹皮 草果仁

厚朴製

木香 陳皮去白

木

通白木

枳實炒各一錢

人參五分

甘草炙三分

水一鍾薑五片

煎八分 食遠

### 分氣香蘇飲

桑白皮炒 陳皮 茯苓 大腹皮 香附炒各一錢

草果仁炒各五分 水二鍾薑三片 煎八分 入鹽少許 食前服

桔梗 枳殼各八分

### 消導寬中湯

白术一錢五分

枳殼炒

厚朴薑製

陳皮 半夏

茯苓 山楂

神曲炒

麥芽炒

蘿蔔子炒各一錢

水二鍾薑三片 煎八分 服

### 大異香散

三稜 蓬术 青皮 半夏麴 陳皮 羔香 桔梗 枳殼 炒 香附 炒 益智

各一錢 半分 甘草 炙半錢 分作二貼每貼用水二鍾生薑三片棗一枚煎一鍾去渣食服

當歸活血散

赤芍藥 生地黃 當歸鬚 酒洗各一錢半 桃仁 去皮 炒 紅花 洗 香附 童便浸各一錢 川芎

牡丹皮 玄胡索 蓬术 各八分 炮分炮

三稜 炮 青皮 各八分 水二鍾煎七分空心服

人參歸芎湯

人參 辣桂 去麓 五靈脂 炒各二錢五分 烏藥 蓬术 木香 砂仁 炙甘草 各半

川芎 當歸 半夏 湯泡各七錢五分 右咬咀每服一兩五錢薑五片紅棗二枚紫蘇

四葉煎空心服

加味枳术湯

枳殼 炒 辣桂 紫蘇莖葉 陳皮 檉榔 桔梗 白术 五靈脂 炒 木香 各二錢

半夏 荸苓 甘草 各五錢 炙咀每服五錢水二盞薑三片煎一盞溫服

椒仁丸

椒仁 甘遂 繢隨子 研 附子 炮 郁李仁 黑丑 炒 五靈脂 研 木香 各二錢

吳萸 玄胡索 各五錢 炙 芫花 茄 胆礬 信砒 各一錢 石膏 錫 炮 蚊青 班蝥 各十個去頭足翅其目糯米炒至米黃去米

鈎糊丸豌豆大每服一丸陳皮湯下勿畏常治虛弱人亦無害也

人參大黃湯

蜜凡名人參丸

人參 當歸

大黃炒各一錢

桂心 瞞麥穗

赤芍

茯苓各一錢

草薢二分

治經

脈不利化水腫脹皮肉赤絞

七氣消聚散

香附米半

青皮

蓬术

三稜

俱醋炒

枳殼

炒燉

木香

砂仁

各一錢

厚朴

陳皮各二分

甘草

炙四分

水二鍾薑三片煎八分食前服

參术健脾湯

人參 白茯苓 陳皮

半夏

縮砂仁

厚朴

薑製各一錢

白术

錢

炙甘草

水二鍾薑三片煎八分服加曲蘖山楂肉尤佳

厚朴散

厚朴 桃榔 木香 枳殼

青皮

陳皮

甘遂

大戟

調中健脾丸

黃連 吳萸

炒各二錢

蘇子

菜菔

澤瀉

草蔻

各一錢半

沉香

六分

黃芪

人參

茯苓 蒼朮

各二錢

五加皮

二錢

白术

六錢

陳皮

半夏

香附

山楂

薏苡仁

各三錢

白芍

二錢

再用瓜蔓挖一孔入川椒三錢喊二錢外用紙糊再用鹽泥封固

晒乾炭火煅通紅去泥取一錢併入諸藥共為末荷葉腹皮湯打黃米糊丸梧子大

每服數十九日三服

黃芪芍藥桂枝苦酒湯

黃芪五兩 芍藥二兩 桂枝三兩 右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升溫服一升當心煩服至六七日乃解苦酒即醋斂汗不得出故心煩

大橘皮湯

橘皮 厚朴一錢半 薑製各一錢半 猪苓 澤瀉 白朮各一錢半 桂榔 赤茯苓 陳皮 半夏 山楂肉 蒼朮 蘭香 白茯苓各一錢半 木香五分 滑石三錢 水二鍾薑三片

煎八分食前服

升麻和氣散

乾薑半錢 乾葛兩 大黃蒸半兩 熟枳殼五分 桔梗 熟蒼朮 升麻各一兩 芍藥  
牛膝錢半 陳皮 甘草各二兩半 當歸 熟半夏 白芷 茯苓各二錢 每服四錢水一鍾薑三片燈心十莖煎七分食前溫服

導水丸

大黃二兩 黃芩二兩 滑石四兩 黑牽牛四兩另取頭末 去濕熱腰痛泄水濕腫滿久病加甘遂一兩去遍身走注疼痛加白芥子一兩退熱散腫毒止痛加朴硝一兩散結滯通關節潤腸胃行滯氣通血脈加郁李仁一兩去腰腿沉重加樟柳根一兩右為

細末滴水為丸桐子大每服五十丸或加至百丸臨臥溫水下

神芎丸

即導水丸一料內加黃連薄荷川芎半兩水丸桐子大水下

黃疸

茵陳蒿湯

茵陳蒿六兩

梔子十四枚

大黃二兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升去渣分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

梔子大黃湯

梔子十四枚

大黃一兩

枳實五枚

豆豉一升

右四味以水六升煮取三升分溫二服

硝石礬石散

硝石

礬石燒等分

右二味為散以大麥粥汁和服方寸七日三服病隨大小便去

小便正黃大便正黑是也無是

茵陳五苓散

茵陳蒿末十分

五苓散五分

先食飲服方寸七日二服

桂枝加黃芪

桂枝

白芍生薑各一分

錢

黃芪

甘草錢各一錢

棗

個

熱服須更飲熟湯即汗

若不汗更服

大黃硝石湯

大黃 黃檗 硝石各四 桔子十五兩 右四味以水六升煮取二升去渣內硝更

煮取一升頓服

小溫中丸

針砂一斤以醋炒為末入糯米炒極黃為末亦用一斤醋糊丸如桐子大每米飲下四五十丸忌口輕者服五兩重者七兩愈

大溫中丸

香附一斤童便浸兩  
芍藥五兩 陳皮三兩 山楂五兩 青皮六兩 白术三兩 茯苓三兩 醋淬三次  
針砂一斤炒紅色 苦參春夏二兩 秋冬一兩 厚朴五兩 薑炒黑  
木湯下忌一切生冷油膩葷發滋硬之物服過七日手心即涼口唇內有紅暈起調理半月愈虛人佐以四君子湯

棗礬丸

皂礬不拘多少置砂鍋內炒通赤用米醋點之燒用木炭右為末棗肉丸每服二三十丸食後薑湯下

緩中丸

陳皮 蒼朮 厚朴製 三稜 白朮 青皮各五錢 香附一斤 甘草二兩 針砂十兩

醋淬  
炒紅

右為末醋糊丸空心鹽湯下五十丸晚食前酒下亦可忌狗肉

青龍散

地黃 仙靈脾 防風各二錢半 荆芥穗一兩 何首烏二錢半 食後服日三服沸湯下  
一錢

寶鑑茵陳梔子湯

茵陳葉一錢 茶荳去皮五分 梔子仁 蒼朮去皮炒一錢 白朮去皮各三分 黃芩生六分 黃連去鬚一錢  
枳壳炒一錢 猪苓去皮去分 澤瀉 陳皮 漢防已各二分 青皮去白一分 右用長流水煎食

溫服

穀疸丸

苦參三兩

龍膽草一兩

牛膽一枚取汁

右為末用牛胆汁入少煉蜜和丸如桐子大每

服五十丸空心熱水或生薑甘草煎湯送兼紅丸子服亦可

方見傷食

霍脾飲

乾葛 枇杷葉毛去

桑白皮

藿香葉

陳皮

白茯苓

枳椇子

各分等

水煎送

酒煮黃連丸

九十九方見傷暑

加味四君子湯

人參

白朮 茯苓

白芍

黃芪

扁豆

各二錢

炙甘草

一錢 薑棗煎

滑石散

滑石半錢 桔梗一錢 為末大麥湯下

腎疽湯

升麻半錢 苍术五分 防風二分 獨活 白术 柴胡 羌活 乾葛各二分 茯苓

猪苓 澤瀉各一分

甘草一分半

黃柏一分

人參

神曲各三分

又方

四苓散合四物湯去川芎加茵陳木冬滑石甘草

消渴

黃芪六一湯

黃芪六錢半

甘草一錢半

生半炙 為末白湯點服二錢亦可煎服

玄菟丹

兔絲子

酒浸通軟乘濕研  
令乾別取末十兩

五味子

酒浸別為  
末七兩

白茯苓

乾蓮肉各三分

右為末

別碾乾山藥末六兩將所浸酒餘者添酒煮糊搜和得所搗數千杵丸如梧子大每  
服五十九空心食前米飲下

靈砂丸

製法詳丹溪  
心法附錄

水銀一斤

硫黃四兩

右二味用新銚內炒成砂子入水火鼎煅煉為末糯米糊丸如

麻子大每服三丸空心棗湯米飲井花水人參湯任下量病輕重增至五七丸忌猪  
羊血菉豆粉冷滑之物

黃連豬肚丸

黃連去鬚 栗米 括囊根 茯神各四兩 知母 麥冬去心各二兩 右為細末將大猪  
肚一個洗淨入藥於內以綿縫口置甌中炊極爛取出藥別研以猪肚為膏再入煉  
蜜搜和前藥杵丸如梧子大每服五十九參湯下又方加人參熟地乾葛又方除知母栗米用小麥

忍冬丸

忍冬草不以多少根莖葉皆可用之勿犯鐵器生者効速 右用米麴酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出  
晒乾入甘草少許為末即以所浸酒煮糊為丸如梧桐子大每服五十九至百丸酒  
飲任下

參木飲

人參 乾山藥 蓮肉去心去皮薑汁浸炒各一斤半 白扁豆去皮薑汁浸炒各一斤半 白术於潛者二斤 桔梗炒令黃色 砂  
仁 白茯苓去皮 豆蔻仁 炙甘草各一斤 右為細末每服二錢米湯調下或加薑  
棗煎服或棗肉和藥丸如桐子大每服七十九空心用米湯送下或煉蜜丸如彈子  
大湯化下

黃芪飲 一方無瓜萎有天冬人參烏梅

黃芪蜜  
炙

茯苓去皮  
末

瓜蔞根  
麥門冬去心

生地黃  
五味子

炙甘草各一錢半

水二鍾煎一鍾食遠服

七珍散

人參  
白朮  
黃芪蜜  
枳實去白  
梔子仁  
豆豉各一  
甘草炙半  
每服四錢水煎米拘時

三錢薑棗煎服如故不思飲食加扁豆一兩名八珍湯

乾葛飲

乾葛  
兩

枳實  
麸炒

梔子仁  
酒浸

豆豉  
兩

甘草  
兩

每服四錢水煎米拘時

溫服

瘦

補陰丸

黃檗

知母  
俱鹽酒  
拌炒

熟地黃  
酒浸

敗龜板  
酥炙各  
四兩

白芍藥  
煨

陳皮  
酒浸

牛膝  
各二

酒浸

兩

虎脰骨  
炙

璣陽  
酒浸

當歸  
酒洗各  
一兩半

冬月加乾薑  
酒洗各  
五錢半

右為末酒煮謁

羊肉為丸鹽湯下

健步丸

羌活

柴胡  
各五  
錢

防風  
三  
錢

川烏  
一  
錢

滑石  
兩  
炒半

澤瀉  
三  
錢

防已  
一  
兩  
酒洗

苦參

酒洗  
一錢

肉桂  
甘草  
炙

瓜蔞根  
半兩  
酒製各

右為細末酒糊丸如桐子大每服十九

半兩  
酒洗各

右為末酒煮謁

大每服十九

錢半

印行

煎愈風湯送下空心愈風湯見中風

神龜滋陰丸

龜板

酒炙四兩

黃檗

炒二兩

知母

酒炒各二兩

枸杞子

五味子

瑣陽

各一兩

乾薑

炮半兩

末之

猪脊髓為丸如桐子大每服七十九空心鹽湯下

水或滴丸

左經丸

草烏

去皮白大者

木鼈

去殼

白膠香

五靈脂

各三兩半

蟹蠚

足翅醋炙五個去頭

為末用黑豆

去皮生杵取粉

一升醋糊共搜杵為丸如雞頭大每服一丸溫酒磨下

續骨丹

天麻

明淨者浸

白附子

牛膝

木鼈子

各半兩

烏頭

一錢炮

川羌活

半兩

地龍

土

分一

乳香

沒藥

各二錢

硃砂

一錢

古以生南星

末一兩

無灰酒

煮糊

為丸如雞頭

大硃砂為衣薄荷湯磨一丸食前服

肺癰

桔梗湯

桔梗

一兩

甘草

二兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服則吐膿血也

葶藶大棗瀉肺湯

葶藶

熬合如彈子大

一

大棗

枝十二

古先以水三升煮取二升去棗內葶藶煮取

一升頓服

甘草乾薑湯

甘草四兩  
炙 乾薑二兩  
炮

水三升煮取一升五合分溫再服

補遺

瀉青丸

當歸 胆草 羌活 川芎 桔子 大黃煨 防風各等分 為末蜜丸如芡實大  
每服一丸煎竹葉湯入砂糖化下

清上散

酒黃芩二錢 白芷半錢 羌活 防風 柴胡各一錢 川芎二分 荆芥八分 甘草  
五分 水煎食後服

題石

卷六

三二

諸方目錄

下

痺

行氣開痺飲

增味五痺飲

加味五痺飲

三痺湯二食

獨活宰生湯

黃芪益氣湯

人參益氣湯

蠲痺湯

如意通聖散

虎骨散三

桂心散

仙靈脾散

沒藥散

小烏犀丸

沒藥丸四

虎骨丸

十生丹

骨碎補丸五

定痛丸

八神丹

十粒金丹六

乳香應痛丸

烏藥順氣散

緩筋湯

立效散

甘草附子湯七

犀角湯

茵芋丸

大羌活湯

黃芪酒八

痙

葛根湯

括囊桂枝湯

桂枝加葛根湯九

桂枝加芍藥防已防風湯

附子散

桂心白朮湯

汗

當歸六黃湯

防風湯

益胃散十

漏風湯

芪附湯

白朮散

酸棗仁湯

青蒿散

嘔吐

人參湯 十一

麥門冬湯

平木湯

黃連湯

開鬱湯

附理中湯 見中寒

吳茱萸湯

紅豆丸 十二

薑蘇湯 鐵

靈砂丹

大半夏湯

大黃甘草湯

八味平胃湯

反胃噎膈

滋陰清膈飲 三十

六味丸 損見虛

秦川剪紅丸

麥昆煎

四生丸

五膈寬中散

霍亂

桂苓白朮散 四十

訶子散

二香散

止渴湯

增損縮脾飲 十五

茯苓澤瀉湯

小麥門冬湯

黃連丸

止血湯

赤石脂湯 十六

七氣湯

柴胡木瓜湯

吳茱萸湯

桂苓甘露散

甘露飲 十七

參术調中湯

厚朴湯

活命散

冬葵子湯

陰陽水

泄瀉

將水散 十八

止瀉湯

玉龍丸

胃苓湯

升陽除濕湯

戊己丸

白朮調中湯

快脾丸 十九

四神丸

瀉心導赤散

參苓白朮散

八桂散

禹餘糧赤石脂湯

赤石脂丸 十二

厚朴枳實湯

固腸丸

訶子散

扶脾丸

桃花丸 十二

訶子丸

腸鳴

河間夢巒丸

痢

木香欖榔丸

香連丸

白頭翁湯

芍藥湯二十

利積丸

導氣湯

黃連阿膠丸

紫參湯

茯苓湯二十

升消散

桃花湯

斷下湯

養藏湯

平胃散二十

鴉胆丸

訶子皮散

葛根湯

駐車丸

神效香散廿五

六桂散

大防風湯

潛行散

青六丸

澤瀉湯二十

倉廩湯

大便不通

麻仁丸

四順飲子

潤腸丸

大承氣湯二十

小承氣湯

調胃承氣湯

三一承氣湯

當歸承氣湯

溫脾湯

半硫丸二十

握藥法

人參利膈丸

旋覆潤腸丸

滋燥養榮湯

穿結藥

七宣丸二十

更衣丸

導滯通幽湯

大小便不通

導氣清利湯

小便不通

滋腎丸

木通湯

紅林散

二陳湯

見痰

桃仁煎

瓜萎

瞿子丸

滑石散

三十

淋

生脈散

見暑中

火府丹

石葷散

八正散

加八味正散

鹿角霜丸

海金砂散

兔絲子丸

虎珀散

如聖散

石燕丸

獨聖散

牛膝膏

三十

立效散

石燕散

五淋散

榆白皮散

地髓湯

肉蓯蓉丸

三十

澤瀉散

沉香散

巴戟丸

小便數

六味丸

見虛損

茯苓琥珀湯

三十

兔絲子丸

旋蘆丸

遺尿不禁

韭子丸

茯苓丸

三十

關格

柏子仁湯

人參散

既濟丸

頭痛

清上散

見六卷補遺

順氣和中湯

三十清空膏

清上漏火湯

補氣湯

川芎散

三十

細辛散

清震散

愈風餅子三十人參消風散

選奇湯

二陳湯見痰

生熟地黃丸

羌烏散

小芎辛湯

透頂散十四

紅豆搐鼻散

眩暈

補肝養榮湯

旋覆花湯

青黛散

三五七散四十

土料正元飲

草珠丸

半夏白朮天麻湯

項強痛

驅邪湯四十

消風豁痰湯

加味勝濕湯

疏風滋血湯

胸痛

小陷胸湯四十

大陷胸丸

心痛

九痛丸

煮黃丸

扶陽助胃湯

草豆蔻丸四十

清中湯

星半安中湯

海蛤丸

加味七氣湯

四十失笑散

妙香散

煨腎散

腹痛

木香順氣散

木香檳榔丸見痢

真武湯六十

正陽散

回陽丹

威靈散

當歸散

神聖復氣湯

芍藥甘草湯四十  
七

承氣湯

見大便不通

備急丸

見傷飲食

腰痛

橘香丸

摩腰膏

獨活寄生湯四

八 蒼朮湯

獨活湯

羌活湯

乳香趁痛散四十

普腎正氣散

人參順氣散

調肝散

無比山藥丸

脇肋痛

當歸龍蒼丸十五

枳殼煮散

補肝湯

臂痛

琥珀散五十

刲勞散

舒經湯

身體痛

甘草附子湯

當歸拈痛湯

麻黃復煎湯五十

活血丹

四物蒼朮各半湯

面

升麻加黃湯連

升麻加附子湯

清肝飲五十

三

犀角飲子

犀角散

木事地黃湯

益腎散

桂星散五十

磁石丸

清神散

通氣散

通神散

通耳法

追風散

草麻子丸

勝金透闢散

龍齒散

五六十  
芎歸飲

黃芪丸

秦粘子湯

柴胡清肝飲

柴胡聰耳湯

七十五

蔓荆子散

紅綿散

透冰丹

益氣聰明湯

八十五

鼻

防風湯

清肺飲

辛荑膏

烏犀丸

犀角散

五十

桑根白皮散

宣腦散

口

生津方

金花丸

升麻飲

黃連散

八味丸

見虛損

赴筵散

滋陰四物湯

桺花散

玄參散

冰硼散

六十

口疳藥

清熱補氣湯

加減甘露飲

唇

濟陰地黃丸

柴胡清肝散

六十

瀉黃飲子

梔金花湯

齒

羌活附子湯

白芷散

立效散

六十

清胃散

獨活散

茵蓀散

當歸龍脾散

益智木律散

六十

草豆蔻散

麝香散

升麻散

牢牙散六十

白牙散

羊脰散

還少丹

甘露飲

露蜂房散六十

川升麻散

蕪荑消疳湯

蘆薈消疳飲

人中白散

清陽散火湯六十

七

舌

玄參升麻湯

清熱化痰湯

牛黃散

升麻湯

碧雪湯

花粉散六十

鴻心湯

甘露飲

清熱補血湯

咽喉

清咽利膈湯

桐油餳六十

益氣清金湯

消瘤碧玉散

解毒雄黃丸

金丹七十

碧丹

玄丹

甘桔湯

牛黃清心丸

喉痺飲七十

紫雪散

八寶珍珠散

廣筆鼠粘湯七十

礮精散

清涼散

清靈膏

甘桔射干湯

木香四七丸

清咽屑七十

玉丹

雪梅丹

玉屑無憂散七十

瘡

七珍散

發聲散

玉粉丸

蛤蚧丸

杏仁煎

訶子湯七十

皮毛鬚髮肌肉筋骨四支二陰

草莖湯

八仙湯

三青膏

加味逍遙散

見歸脾湯血

六八味丸

並虛損

厥

人參固丸

七十

蒲黃湯

二四味流氣飲

四逆湯

六物附子湯

通脉四逆湯

七十

當歸四逆湯

寧

煨腎散

見痛心

抽搐

涼驚丸

續斷丸

八十

續命煮散

獨活湯

金振

摧肝丸

參朮湯

七十

補心丸

定振丸

脚氣

苡仁酒

羌活導滯湯

十八

加味敗毒散

加味二妙丸

茱萸丸

茱萸木瓜湯

八十

大腹子散

三院散

桑白皮散

犀角散

沉香散

八十

半夏散

橘皮湯

芎芷香蘇飲

虎骨斤丸

赤白濁

清心蓮子飲八十

草薢分清飲

妙香散

清清濁飲

便濁飲八十

小鬼絲子丸

遺精

銷精丸

固本丸

金櫻丸八十

鳳髓丹

固真散

遠志丸

交感湯

玉華白丹

固陽丸六十

加減八物湯

缺

猪苓丸

淡神湯

黃柏丸

清心丸七十

珍珠粉丸

滾痰丸

見痰秘真丸

八仙丹

八味丸

損虛金鎖正氣丹

龍胆瀉肝湯八十

封髓丹

陽痿

固真湯

柴胡勝濕湯

疝

當歸溫疝湯

烏桂湯八十

十味蒼柏散

茴棟五苓散

大黃梔刺湯

奪命湯

青木香丸

茴香棟實丸

羊肉湯九十

喝起湯

救痛散

木香神效散

茹神散

七治金鈴丸

九十

脫肛

涼血清腸散

槐花散

薄荷散

收腸養血和氣丸

龍骨散九  
二十

瀉腸散

磁石散

喜笑不休

黃連解毒湯

驚

黃連安神丸

十味溫胆湯

養心湯三  
九十

寒水石散

加味四七湯

溫胆湯

十四友丸

鎮心丹九  
四十

遠志丸

悸

定志丸

恐

人參散

九  
五十

茯神散

補胆防風湯

健忘

朱雀丸

安神定志丸

孔聖枕中丹九  
六

茯苓湯

煩燥

梔子豉湯

竹葉石湯黑

竹茹湯

朱砂安神丸

麥門冬湯九  
七十

妙香丸

三物黃芩湯

不得卧

酸棗仁湯二方  
九十八

清靈丹缺

狂癲癇

生鐵落飲

抱胆丸

甯志膏九十

一醉膏

靈苑神砂散

壽星丸

天門冬地黃膏一百

妙功丸

牛黃丸一百一

楊氏五癥丸

五癥通明丸

醫碥卷之七

諸方門目下

痺一 痙

汗

嘔吐

反胃噎膈二

霍亂

泄瀉

腸鳴

痢三

大便不通

大小便不通

小便不通

淋

小便數四

遺尿不禁

關

格頭痛

眩暈

項強痛

胸痛五

心痛

腹痛

腰痛

脇肋痛

臂痛

身體痛

六

面

耳

鼻

口

唇七

齒

舌

咽喉

瘡八

皮毛鬚髮肌肉筋骨四肢二陰

厥

掣

抽搐

顫振

脚氣

赤白濁九

遺精

陽痿

疝

脫肛

喜笑不休

驚十

悸

健忘

煩躁

不得卧

狂癲癇

醫編卷之七

南海何夢瑤報之輯

諸方下

痴

行氣開癆飲

羌活 川芎 防風 蒼朮 秦艽 紅花 肉桂 細辛 繢斷 在上加片薑  
黃 桂枝 威靈仙 在下加牛膝 防己草薢 木通 筋痺加木瓜 柴胡  
脈痺加菖蒲 伏神 當歸 肉痺加白附 陳皮 木香 砂仁 皮痺加紫  
苑 杏仁 麻黃 骨痺加獨活澤瀉

增味五痹湯

麻黃 桂枝 紅花 白芷 葛根 附子 虎骨 羚羊角 黃芪 甘草 防風 防已 川芎 水煎服

加味五薄湯

人參	茯苓	當歸	白芍	川芎	五味子	白朮
之倍		洗	煨	各一錢	十五粒	一錢
細辛				腎		
分				痺		
甘草				倍之		
分五				心		

醫

石

脾痺加厚朴枳實砂仁神麌 肺痺加半夏紫苑杏仁麻黃 腎痺加獨活 桂

杜仲牛膝黃芪草薢

三痺湯

肉桂 甘草 芍藥 黃芪 當歸 川芎 人參 茯苓 熟地黃 牛膝 秦

艽 繢斷 杜仲 細辛 獨活 防風

獨活寄生湯即上方加桑寄生去黃芪續斷

黃芪益氣湯即補中益氣湯加紅花黃柏秋加五味夏  
加黃芩冬加桂枝補中益氣湯見氣夏

人參益氣湯

黃芪錢八 人參 生甘草各五錢 炙甘草 升麻各二錢 五味子一百二十粒 柴胡二錢

芍藥三錢

右㕮咀每服半兩水二鍾煎一鍾空心服服後少卧於麻痺處按摩  
屈伸少時午飯前又一服日二服

蠲痺湯

當歸酒洗 赤芍藥 媽黃 薑黃 茯活各一錢半 甘草五分 右水二鍾薑三片棗

二枚不拘時服

又方 冷痺者用此

附子 當歸 黃芪 炙甘草 官桂 茯活 防風

如意通聖散

當歸  
去蘆

陳皮  
去白

麻黃  
去節

甘草  
炙

川芎

御米穀

去蒂

丁香  
各等

右用

慢火炒令黃色每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

虎骨散

虎脛骨  
炙

敗龜  
醋炙

另各二兩

麒麟竭  
研

沒藥  
另研

自然銅  
淬

赤芍藥

當歸  
去蘆

蒼耳子  
炒

骨碎補  
毛去

防風  
去蘆各二兩半

牛膝  
浸酒

天麻

檳榔

五加皮  
羌活

活  
去蘆各一兩

白附子  
炮

桂心

白芷  
各半兩

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時

桂心散

桂心  
漏蘆

威靈仙  
芎藶

白芷  
當歸  
去蘆

木香

白僵蠶  
炒

地龍  
去土炒各一

半  
右為細末每服二錢溫酒調下無時

仙靈脾散

仙靈脾  
威靈仙

芎藶  
蒼耳子  
炒

桂心  
各一兩

為末每服一錢溫酒調下無時

沒藥散

沒藥  
另研

虎骨  
醋炙四兩

為末每服五錢溫酒調下無時日進二服

小烏犀丸

烏犀角屑 乾蝎炒

白僵蠶炒

地龍去土

硃砂水飛

天麻

羌活

芎芻

防

風 甘菊花 蔓荆子各一

白花蛇酒浸

天南星薑製

肉桂去皮

附子炮去皮

海桐皮

木香

人參

當歸各七錢半

乾薑炮

麝香另研

牛黃兩研

虎脰骨炙

敗龜

當歸各七錢半

右為細末入研令勻以煉蜜和丸如彈子大

每服一丸用溫酒或薄荷

酒送下

沒藥丸

沒藥另研

五加皮

山藥

桂心

防風去蘆

羌活

白附子

白芷

骨碎補

蒼耳炒

自然銅

醋淬各五錢

血竭

另研二錢半

虎脰骨

炙

龜板醋炙各一兩

虎骨丸

虎骨四兩醋炙

五靈脂炒

白僵蠶炒

地龍炒去土

白膠香另研

威靈仙各一兩

川

烏頭二兩去皮臍

胡桃肉二兩半去內皮

搗研如泥

子大每服十九至十五丸空心溫酒送下日進二服婦人當歸酒下打撲損傷豆淋酒下

酒下

十生丹

天麻 防風去

羌活

獨活去

川烏

草烏頭去

何首烏

當歸蘆去

川芎

海桐皮各等分並生用 右為細末煉蜜為丸每丸重一錢每服一丸細嚼冷茶送下病在上食後服病在下空心服忌食熱物一日

骨碎補丸

骨碎補半兩  
另研 炒半兩  
然銅煅 醋半兩  
另研 地龍去土炒各一兩  
另研 没藥碎半兩  
另研 乳香半兩  
另研 草烏頭各一兩  
另研 天南星薑製  
另研 木鼈子殼去皮  
另研 楓香脂另研 自糊為丸如梧子大每服五丸用溫酒下不拘時日進二服

定痛丸

威靈仙 木鼈子去殼 川烏炮去皮  
另研 防風去蓋 香白芷 五靈脂 地龍去土炒  
另研 水蛭炒熟 糖砂各三錢  
另研 右搗研為末酒煮麪糊丸如梧子大以朱砂為衣每服十丸空心溫酒送婦人紅花酒下

八神丹

地龍去土炒 五靈脂炒 威靈仙 防風去蘆 木鼈子去殼  
另研 乳香另研各三錢 為末酒煮麪糊丸桐子大每服五七丸至十丸溫酒下不拘時研

一粒金丹

草烏頭剉炒 五靈脂各一 地龍去土炒 木鼈子去殼各一 白膠香另研 細墨  
另研 乳香各半兩 没藥另研 當歸去蘆各一兩 膜香另研一錢 為細末以糯米糊為丸如

桐子大每服二三丸溫酒下服罷身微汗為效

乳香應痛丸

乳香半兩另研  
五靈脂 赤石脂各一兩研  
草烏頭一兩半炒 没藥另研  
右為細末醋煮糊  
丸如小豆大每服十九丸空心溫酒送下日進二服

烏藥順氣丸

麻黃去根節  
陳皮 烏藥各二錢  
白殼 甘草炒各一錢  
水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

緩筋湯

羌活 獨活各二錢  
黃芩 黃檗各三分  
炙甘草各三分  
生甘草根 熟地黃各一分  
當歸身 當歸身各一錢  
木通三錢  
故紙鹽炒二錢  
枸杞四錢  
鹿茸炙五錢  
蘇木一分

右粗末水二盞煎一盞去粗食遠服

立效散

當歸五錢  
生地三錢  
茯苓三錢  
木通三錢  
故紙鹽炒二錢  
枸杞四錢  
鹿茸炙五錢  
蘇木一分  
為末  
作四服酒調下

甘草附子湯

甘草 白朮各二錢  
桂枝五錢  
炮附二錢  
秦艽二錢  
水煎服

犀角湯

犀角二兩 羚羊角一兩 前胡 王岑 枝子仁 射干 大黃 升麻各四 鼓一

升右㕮咀每服五錢水二盞煎服

茵芋丸

茵芋 硫砂 蒼朮仁各一兩 牽牛 郁李仁一兩  
溫水下到晚未利可二三  
服快利為度白粥將息  
為末煉蜜杵丸桐子大輕粉滾  
為衣每服十九至十五丸五更

大羌活湯

羌活 升麻各一錢 分 獨活分 蒼朮 防風去  
歸 澤瀉各半 蘆 甘草 威靈仙去  
剗作一服水二盞煎一盞溫服食前一服食後一服忌酒麪生冷硬物

黃芪酒

黃芪 獨活 防風 細辛去苗 牛膝 川芎 附子炮去皮  
口者炒出汗 川烏炮去山茱萸去核 秦艽去苗 葛根各一  
已上各三兩 切焙各二兩半 生剉 大黃 白朮 乾薑炮各一  
酒一斗浸之春夏五日秋冬七日初服一合日二夜一漸增之以知為度虛弱者加  
旋蓉二兩下利者加女萎三兩多忘加石斛葛蒲紫石英各二兩心多水水加茯苓

人參各二兩山藥三兩酒盡可更以酒二斛重漬服之不爾可曝滓搗下篩酒服方寸匕不知稍增之服一劑得力令人內寒冷虛補治諸風冷神妙少壯人服勿熬煉老弱人微熬之

痙

葛根湯

葛根四兩 麻黃三兩 去節 桂枝二兩 去皮 茯苓一兩 炙甘草各三兩 生薑三兩 大棗十二枚  
右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微汗不須啜粥餘如桂枝湯法將息及禁忌

括蒌桂枝湯

括蒌根兩桂枝三兩 茯苓三兩 甘草二兩 生薑三兩 大棗十二枚 右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗汗不出食頃啜粥發之

桂枝加葛根湯

芍藥二兩 桂枝三兩 甘草二兩 生薑三兩 大棗十二枚葛根四兩 用水一斗先煮葛根減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微汗不須啜粥

桂枝加芍藥防風防己湯

桂枝一兩 防風一兩 防己各一兩 茯苓二兩 生薑一兩 大棗一枚 每服一兩水三

盞煎一盞半去滓溫服亦宜小續命湯

見中風

附子湯

桂心三錢 附子一兩 炮二兩 白朮三錢 川芎三錢 獨活半兩 每服三錢水一盞乘一枚煎

五分去渣溫服

桂心白朮湯

白朮 防風 甘草 桂心 川芎 附子各等分 每服五錢水二鍾薑五片棗二枚同煎七分去渣溫服

汗

當歸六黃湯

當歸 黃連 黃芩 黃柏 黃芪此味倍用 生地 熟地各一錢 水煎服

防風湯

防風 荆芥 羌活 桂枝 薄荷 甘草 水煎服

益胃散

黃連 五味 烏梅 生甘草各五錢 火草分 升麻二分 忌濕麪酒五辛

漏風湯

黃芪六錢 甘草一錢 防風 麻黃根 桂枝各五分 水煎服

芪附湯

黃芪去蘆  
蜜炙 附子炮去皮臍  
各等分 右㕮咀每服四錢水一盞生薑十片煎八分食前溫服未應更加之

白朮散

牡蠣錢三 白朮一兩  
錢半 防風二兩  
半

右為末為服一錢溫水調下不拘時候如

惡風倍防風白朮如多汗面腫倍牡蠣

酸棗仁湯

酸棗仁 當歸 白芍 生地 知母 黃柏 茯苓 黃芪 五味子 人參

青蒿散

天仙藤 鱉甲醋  
炙 香附子 桔梗 柴胡 秦艽 青蒿各一  
錢 烏藥五  
分 炎甘草半  
錢 川芎二  
錢 薑煎

嘔吐

人參湯

人參 黃芩 知母 姜蕤 茯苓各三  
錢 蘆根 竹茹 白朮 桔子仁 陳皮  
各半 石膏錢一  
兩 右剉每服四錢水一鍾半煎七分去滓溫服

麥門冬湯

麥門冬去心去

生蘆根 竹茹 白朮各五

甘草炙 茶芩各二

人參 陳皮

兩各三

右剉散每服四錢水一盞半薑五片陳米一撮煎七分溫服

萎蕤兩

各三

右剉散每服四錢水一盞半薑五片陳米一撮煎七分溫服

### 平木湯

竹茹 陳皮 蒼朮 香附 撫芎 神麪 半夏 陳皮 生薑 少用吳萸為

嚮導

### 黃連湯

黃連 黃芩各一 陳壁土炒 蒼朮炒七分 吳萸炮 陳皮各五 神麪 山查

### 水煎

### 吳茱萸湯

吳茱萸一升洗 人參三兩 生薑六兩切 大棗擘十二枚

辛熱 甘溫

右四味以水七升煮

大棗擘十二枚

右四味以水七升煮

取二升去滓溫服七合日三服

### 紅豆丸

丁香 胡椒 砂仁 紅豆各二十粒 右為細末薑汁糊丸皂角子大每服一丸以

大棗一枚去核填藥麩裏煨熟去麩細嚼白湯下空心日三服

### 靈砂丹

水銀一斤 硫黃四兩 右二味用新銚內炒成砂子入水火鼎煅煉為末糯米糊丸如

麻子大每三丸空心棗湯米飲井花水人參湯任下量病輕重增至五七丸忌猪羊  
血茶豆粉冷滑物

大半夏湯

半夏二升洗完用  
人參三兩  
白蜜一升  
以水一斗三升和蜜揚之二百四十遍煮藥取  
三升溫服一升餘分再服

大黃甘草湯

大黃四兩  
甘草一兩  
水三升煮一升分溫再服

八味平胃散

厚朴去皮一  
升麻一  
射干一  
浸米泔  
茯苓各二  
芍藥半  
每服四錢水盞煎七分空心熱服

反胃噎膈

滋陰清膈飲

當歸一  
芍藥一  
黃檗鹽水炒一  
黃連各一  
錢半  
黃芩一  
山梔一  
生地黃各一  
錢  
甘草三分  
水二鍾煎七分入童便竹瀝各半酒盞食煎服

秦川剪紅丸

雄黃別研  
木香錢各五  
檳榔一  
三稜根一  
蓬朮根一  
貫眾去毛一  
乾漆炒烟一  
陳皮一各

兩

大黃一兩為細末麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸食前米飲下

麥昆煎

昆布二兩去鹹洗小麥合水煎俟麥熟去渣不拘時服一小盞再口中長含昆布兩三片嚥滌極效

四生丸

北大黃去皮酒洗紙包煨香黑牽牛三兩取頭皂角去皮生芒硝半兩右為末滴水為丸梧桐子大每服二三十丸白湯送下

五膈寬中散

白豆蔻去皮甘草炙五兩木香三兩厚朴去皮薑汁縮砂仁丁香青皮去陳皮去白各四兩香附子炒去淨毛為細末每服二錢薑三片鹽少許不拘時沸湯點服

霍亂

桂苓白朮散

桂枝人參白朮白茯苓各兩澤瀉甘草石膏寒水石各一滑石各半兩右為細末每服三錢白湯調下或新汲水薑湯下亦可一方有木香藿香葛根各半兩

訶子散

訶子核炮去

甘草炙

厚朴薑  
製

乾薑炮

神薑炒

草果殼去

良薑炒

茯苓

麥芽炒

陳皮各等

右為細末每服二錢候發不可忍時用水煎入鹽少許服之

二香散

霍香

白朮

厚朴

陳皮

茯苓去

半夏

紫蘇

桔梗

白芷

香薷

黃連

扁豆各一錢

大腹皮

甘草各半錢

水二鍾

薑五片

葱白三根

煎至一鍾

不拘時

服

止渴湯

人參

麥門冬去

茯苓皮

桔梗

瓜萎根

葛根

澤瀉

甘草各五錢

又為細末

每服三錢

不拘時蜜湯調下

增損縮脾飲

草果

烏梅

甘草

砂仁各四兩

乾葛二兩

每服五錢

薑五片

同煎以水浸極冷

旋旋服之無時

茯苓澤瀉湯

每服四錢薑三片同煎食前服一方有小麥五兩

小麥門冬湯

麥門冬去心

白茯苓去皮

半夏湯炮七次

橘皮

白朮各半錢

人參

小麥

甘草各半錢

一錢

水二鍾薑五片烏梅少許同煎至一鍾不拘時服

### 黃連丸

黃連

去鬚微炒

黃檗

微炒

厚朴

去皮生薑汁塗瓦合香已上各七錢半

當歸

炒微

乾薑

炮

木香

火不見

地榆

兩各半兩

阿膠

搗碎炒黃一兩

右為末

煉蜜和搗二三百杵如桐子大每服二十丸不拘時粥飲下

### 止血湯

當歸

桂心

續斷

各三兩

生地

炮薑

各四兩

蒲黃

阿膠

炒

災草

各二兩

共為末每服三錢水煎溫服三服

### 赤石脂湯

赤石脂

四兩

升麻

白朮

各一兩半

烏梅

去核炒乾

乾薑

炮製各一兩

陳廩米

微炒

梔子仁

各半兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓空心溫服

### 七氣湯

半夏湯

厚朴

白芍藥

茯苓

各二錢

桂心

紫蘇

橘紅

人參

各一錢

右作

一服水二鍾薑七片紅棗一枚煎一鍾服

### 建中加柴胡木瓜湯

桂枝二兩半

芍藥二兩

甘草一兩

膠錫半升

生薑一兩半

大棗六枚

木瓜

柴胡各五

錢 每服一兩水三盞煎一盞半去渣下膠錫兩匙服

吳茱萸湯

吳茱萸 木瓜 食鹽各半

右四炒令焦先用磁瓶盛水三升煮令百沸入藥煎

至二升已下傾一盞冷熱隨病人服之

桂苓甘露散

此張子和方劉河間則合五苓六一而加石膏寒水石內滑石四兩二石各二兩白朮茯苓澤瀉各一兩餘各五錢

肉桂 薤香 人參各半

木香二錢

白茯苓皮

白朮

甘草炙

澤瀉

葛根

石膏 寒水石各一

滑石二兩

右為末每服二錢白湯冷水任調下

甘露飲一方加犀角

生地黃 熟地黃 天冬 麥冬

石斛 茵陳 黃芩 枳殼

枇杷葉

甘草

等分每服五錢

參朮調中湯

黃芪四分

桑白皮五分

人參

炙甘草

白朮各二

五味子二十粒

白朮三分

地骨皮 麥冬 陳皮各二分

青皮一分

水煎大溫服早飯後忌多言語勞役

厚朴湯

厚朴去皮生薑汁

枳殼去瓢炒

高良薑

檳榔

朴硝各七錢半

大黃炒二兩

右搗

節每服三錢水一盞半煎一盞溫服

活命散

丁香粒七 葛蒲根半兩 甘草炙一兩 生薑兩 鹽合 右剉碎用童便一盞半煎一

盞分二次溫服

冬葵子湯

冬葵子 滑石 香茹 木瓜各二錢 日四五服

陰陽水

沸湯 井水 各半鍾和服

泄瀉

漿水散

半夏二兩 良薑二半錢 乾薑 肉桂 甘草 附子炮五錢 為細末每服三五錢水

二盞煎一盞熱服甚者三四服

止瀉湯

白朮 茯苓 炙甘草 白芍 陳皮 車前 木通 水煎服

玉龍丸

硫黃 硝石 滑石 明礬各一兩 用無根

胃苓湯

平胃散

見傷飲食

五苓散

見傷濕等分

右剉水煎服極效

升陽除濕湯

蒼朮

錢一

柴胡

羌活

防風

神龜

澤瀉

豬苓

錢各半

陳皮

大麥蘖

炙

甘草

各三分

升麻

伍

水二盞煎一盞空心服

戊己丸

黃連

鬚去

吳茱萸

炒去梗

白芍

芍藥各兩

為末麪糊丸如梧桐子大每服三十

丸空心米飲下

白朮調中湯

白朮

茯苓

橘皮去

澤瀉

各兩半

甘草

兩一

乾薑

炒

官桂

縮砂仁

藿香

錢半

為末白湯化蜜少許調下二錢無時煉蜜每兩十九丸名白朮調中丸

快脾丸

生薑

六兩淨洗切片以飛麪

兩和勻就日中晒乾

兩

橘皮

一兩

甘草

炙兩

丁香

不見火各二兩

縮砂仁

三

右為末煉蜜丸如彈子大每服二丸食前薑湯送下

四神丸

肉荳蔻

二兩

補骨脂

四兩

五味子

二兩

吳茱萸

浸炒一兩

右為末生薑八兩紅棗一百

枚煮熟取棗肉和末丸如桐子大每服五七十丸空心食前白湯送下

瀉心導赤散

生地 木通 黃連 甘草稍 等分煎

參芩白朮散

人參 乾山藥 蓬肉去心 白扁豆 去皮薑汁浸炒各一斤半  
仁 白茯苓去皮 陳皮 薏苡仁 炙甘草 各一斤  
或薑棗煎或棗肉和丸或煉蜜丸亦可

八桂散

即附子理中湯見中寒加罂粟殼烏梅訶子肉蔻

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂 禹餘糧各一兩 右分三服水一盞半煎八分去滓服

附赤石脂丸

赤石脂 乾薑 酒各一黃連 當歸各二兩 右為細末煉蜜丸梧子大每服三十丸

水飲下

厚朴枳實湯

厚朴 枳實 訶子半生半熟各一兩 木香半兩 黃連 炙甘草各二錢 大黃三錢 為末

每服三錢或五錢水一盞半煎一盞去滓溫服

固腸丸

樗皮四兩 滑石二兩 為末粥丸 此丸性燥若滯氣未盡者不可遽用

訶子散

訶子生半熟半兩 木香半兩 甘草二錢 黃連三錢 為末每服二錢以白朮芍藥湯調下

扶脾丸

白朮 茯苓 橘皮 半夏 甘草炙 訶黎勒皮 烏梅肉各二錢 紅豆 乾薑

藿香各一錢

肉桂半錢

麥蘖

神鞠炒四錢

為末荷葉裏燒飯為丸桐子大每服

五十丸溫水食前下

桃花丸

赤石脂 乾薑炮各等分 為末麪糊丸桐子大每服二十丸空心食前米飲送下日三服

訶子丸

訶子皮 川薑 肉豆蔻 龍骨 木香 赤石脂 附子各等分 為末米糊丸桐子大每服四十丸米飲下

腸鳴

河間葶苈丸

葶苈隔紙炒 澤瀉 椒目 杏仁 桑白皮 猪苓去黑皮各五錢 為末蜜丸桐子大每

服二十九丸葱白湯下以利為度

痢

木香檳榔丸

木香 檳榔 青皮醋炒 陳皮 枳殼炒 黃柏酒炒 黃連吳萸湯炒 三稜醋炒 蓬莪  
醋炒各一兩 大黃酒浸 香附 牽牛各二兩 芒硝水丸

香連丸

黃連去蘆二十兩用吳茱萸十兩同炒令赤揀去茱萸不用 木香四兩八錢分不見大 為細末醋糊丸如桐子大每服三十丸空心飯飲下

白頭翁湯

白頭翁二兩 黃連 黃藥 秦皮各三兩 右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈更服

芍藥湯

芍藥一兩 當歸 黃連 黃芩各半兩 大黃三錢 桂枝二錢半 甘草炙 檳榔錢各二錢 右九味㕮咀每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服如痢不減漸加大黃

錢

食後如便後臟毒加黃檗半兩

利積丸

黃連四兩

六一散八兩

當歸二兩

蘿蔔子炒

巴豆去油同  
連炒

乳香各一兩

為末

醋

糊丸如桐子大

弱者服十五丸實者二十五丸

導氣湯

木香

檳榔

黃連各六分

大黃

黃芩各一錢半

枳殼一錢

芍藥錢半

當歸三錢

六

㕮咀作二服

水二鍾煎一鍾食前溫服

黃連阿膠丸

黃連去鬚  
三兩

阿膠碎砂一兩

茯苓去皮三兩

以連芩為末水熬阿膠膏搜和丸桐子大每

服三十丸空心米飲下

紫蘇湯

紫參半斤

甘草二兩

右二味以水五升先煮紫參取三升肉甘草煮取一升半分溫

三服

茯苓湯

茯苓六分

澤瀉一錢

當歸身四分

芍藥一錢半

蒼朮二分

生薑二分

肉桂五分

生芩

桂枝六分

川芎一錢

羌活三分

柴胡一錢

桔梗五分

柴胡一錢

作二服水煎稍熱服

升消散

甚者加川芎羌活  
柴胡黃芩各一錢

甘草四分

蒼朮

三錢

防風

一錢半

黃連

木香各五分

厚朴

陳皮

枳殼各一錢

甘草一分

桃花湯

赤石脂

一升一半剉  
一半歸末

乾薑

一兩

粳米

一升

右三味以水七升煮至米熟去滓每服

七合內赤石脂末方寸七日三服

斷下湯

白朮

茯苓各一錢

甘草

五分

草果

連皮一枚

右㕮咀用鷺粟殼十四枚去筋膜並薑

蒂剪碎用醋淹為篋末用作一服水一大碗薑七片棗子烏梅各七枚煎一大盞分

二服服之

養藏湯

人參

各六錢

白芍藥

木香六錢

各一兩

甘草

肉桂錢各八錢

各八

肉豆蔻

錢半兩

麪裹煨半兩

御米穀

蜜炒三兩

訶子肉

一兩二錢

右㕮咀每服四錢水一盞半煎八分去滓

食前溫服忌酒麪生冷魚腥油膩之物

白朮安胃散

御米穀

三兩去頂蒂  
醋煮一宿

茯苓

車前

白朮

烏梅肉

各一兩

五味子

半兩

為末每服五錢水二盞煎一盞空心溫服

鴉胆丸

鴉胆

去殼搗皮一錢

文蛤

醋炒

枯礬

川連

炒各三分

糊丸

硃砂為衣或鴉胆霜黃丹

各一錢加木香二分亦可烏梅肉丸硃砂為衣二方俱丸菉豆大粥皮或鹽梅皮或圓眼乾肉或芭蕉子肉包吞十二丸立止

訶子皮散

御米殼

五分去蓼蜜火花

乾薑

炮分六

陳皮

五分

訶子皮

七分去核

水煎服或為末白湯

調服亦可

葛根湯

葛根

枳殼

半夏

生地

杏仁

去皮尖

茯苓

各二分

黃芩

一錢二分

炙甘草

五分

分二貼水二盞黑豆百粒生薑五片白梅一個煎食前溫服

駐車丸

阿膠

搗碎蛤粉炒成珠為末以四升熬成膏十五兩

當歸

去蘆十兩

黃連

去鬚二十兩

乾薑

炮兩

右為

末醋煮阿膠膏丸如桐子大每服三十九食前水飲下日三服小兒丸麻子大更量歲數加減服之

神效參香散

白扁豆炒

木香

人參

去蘆各二兩

茯苓

皮去

肉豆蔻

煨各四兩

鶯粟殼

去蒂

陳皮

去白

兩十  
各

右為細末每服三錢用溫米飲調下無時

六柱散去下二味名四柱散治寒瀉

白茯苓

附子炮

人參

木香各一

肉蔻

訶子

每服三錢薑五片鹽少許

煎一  
方有白  
術無訶子

大防風湯

治鶴膝風

川芎

五錢一  
分五

辣桂

黃芪各五

白芍

附子

牛膝

各一錢

白朮

羌活

人參

防風

錢各二  
分二

杜仲

熟地黃

甘草炙

各五分五

水煎服

潛行散

治痛風腰以下濕熱流

黃柏

不拘多少酒浸焙乾為末 生薑汁和酒調服必兼四物等湯相間服乃妙

青六丸

六一散

三半兩

紅薑炒半兩

右飯為丸一方酒糊丸

澤漆湯

澤漆葉

五兩微炒

桑根白皮

黃火

郁李仁

湯浸去皮尖  
炒熟各三兩

陳皮

去皮

白朮

炒各一兩

人參

一兩半

杏仁

湯浸去皮尖  
雙仁炒一兩

右㕮咀每服五錢水二盞薑三片煎八分溫服候半時

辰再服取下黃水數升或小便利為度

倉廩湯

人參 茶芩 甘草 炙 前胡 川芎 羌活 獨活 桔梗 柴胡 枳殼 陳

倉米各等 每服五錢水一盞半薑三片煎七分去滓熱服無時

大便不通

麻仁丸

麻仁另研五兩 大黃蒸焙一斤 厚朴去皮薑炒 枳實炒鐵 芍藥各八兩 杏仁去皮尖炒五兩半

蜜丸桐子大每服二十九丸臨睡溫白湯下

四順飲子

大黃蒸 甘草 炙 當歸酒洗 芍藥各分 右咬咀每服五錢水盞半薄荷十葉同

煎七分溫服

潤腸丸

歸尾 羌活 大黃煨五錢各 麻仁 桃仁去皮尖各一兩 蜜丸梧子大每服三五十丸空

心白湯下風秘加皂角仁防風秦艽脈濇身痒氣濇加郁李仁若欲益血宜熟泡杏仁麻仁枳殼橘紅阿膠旋容蘇子荆芥當歸

大承氣湯

大黃四兩若寒酒洗 厚朴半斤若寒去皮 枳實五枚炙寒

芒硝二合鹹寒 右四味以水一斗先

煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火微煮一二沸分溫再服

得下勿服

小承氣湯

大黃三兩 厚朴二兩 炙枳實三枚 右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫三服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

調胃承氣湯

大黃三兩 清酒浸去皮 甘草二兩 芒硝半斤 鹽苦大寒 右三味㕮咀以水三升煮去一升去滓內芒硝更上火微煮令沸少少溫服

三一承氣湯即大承氣加甘草一兩薑三片也 芒硝四味各五錢

當歸承氣湯即調胃承氣用大黃用一兩芒硝用七錢甘草用五錢加當歸一兩也引用薑五片棗十枚

溫脾湯

人參 附子 甘草 芒硝各一兩 大黃五兩 當歸 乾薑各三兩 水煎服

半硫丸

半夏湯洗七次焙乾為細末 硫黃用柳木槌子明淨好者研 右以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入臼內杵數百下丸如梧子大每服十五丸至二十丸無灰酒或生薑湯任下婦人醋湯下俱空心服

握藥法此即儒門事親之握宜丸去桂附也

巴豆仁 乾薑 茎子 良薑 硫黃 甘遂 白檳榔各五分 為末合均飲和分  
二粒先以花椒湯洗手麻油塗手心握藥移時便渴欲止則以冷水洗手

人参利膈丸

枳殼 厚朴 大黃 人參 甘草 木香 薤香 當歸 檳榔 桃仁 火麻仁 蜜為丸

旋蓉潤腸丸

肉蓯蓉酒浸培二兩 沉香另研一兩 為末麻子仁汁打糊丸梧子大每服七十丸空心米

飲下

滋燥養榮湯

生地 熟地 大黃 白芍 秦艽各一錢 當歸二錢 防風五分 甘草五分 水煎服

穿結藥

蟾酥 輕粉 膜香等分 巴豆少許另研 右研極細乳汁為丸如麥米大每服二三丸  
薑湯下治大滿大實心胸高起氣塞不通結實之証

七宣丸

桃仁去皮尖六兩 柴胡 詞子皮 枳實炒 木香各五兩 炙甘草四兩 大黃麯裏煨十五兩 寢丸桐子大每服二十丸

更衣丸

生蘆薈 硫砂各等 飯丸酒服

導滯通幽湯

當歸身 升麻稍 桃仁泥 甘草炙各一錢 熟地黃 生地黃 紅花分各五錢 水二

大益煎一益調檳榔細末五分稍熱服一方加麻仁大黃各等分唯紅花少許名潤燥湯

大小便不通

導氣清利湯

猪苓 澤瀉 白术 人參 薑香 柏子仁 半夏薑製 陳皮 白茯苓 甘草  
木通 梔子 黑牽牛 檳榔 枳殼 大黃 厚朴薑製 麝香少許 右生薑煎  
服兼服木香和中丸吐不止炙氣海天樞如又不通用蜜導

小便不通

滋腎丸

黃蘖酒洗培 知母酒洗培各二兩 肉桂錢 為細末熟水為丸沈實大每服百丸加至二百丸

百丸沸湯空心下

木通湯

木通

滑石各半  
兩

牽牛取頭末二錢半

作一服燈心葱白煎食前服

紅林散

篇蓄

一兩半

燈心根一百

紅秋葵根二

右河水煎空心食前熱服

桃仁煎

桃仁

大黃一兩

朴硝各半

一

蟻蟲半兩

炒黑

右為末以醇醋二升半銀石器內慢火煎

一升五合下大黃蟲桃仁等不住手攬良久出之丸如梧子大前一日晚不食五更初溫酒吞五丸日午取下如赤豆汁或如雞肝蝦蟆衣狀未下再服如見鮮血即

止續以調血氣藥補之

此方出千金藥峻不可輕用

瓜萎瞿麥丸

瓜萎根

二兩

茯苓

薯蕷各三

附子

炮一

枝子

一

瞿麥

兩

為末

蜜丸

如桐子大

每服

三丸日三服不知增至七八丸

小便利腹中

滑石散

治水氣胞

寒水石

二兩

葵子合

白滑石

亂髮灰

車前子

木通

去皮節

各一兩

右剉散水一

斗煮取五升時時服一升即利

淋

火府丹

黃芩一  
生乾地黃二  
木通兩

為末蜜丸桐子大每服五十丸木通煎湯下

石葦散

芍藥 白朮 滑石 萸子 瞿麥 石葦去毛 木通各二  
當歸去蘚 甘草災

王不留行各一  
雨為末每服二錢煎小麥湯調下日三服空心

八正散

瞿麥 菰蓄 車前子 滑石 甘草災 山梔子仁 木通 大黃  
去瘀根  
為末每服二錢水一盞入燈心煎七分去滓食後臨卧溫服

加味八正散 即上方加石葦木香冬葵子沉香

鹿角霜丸

鹿角霜 白茯 秋石各等  
分為末糊丸如桐子大每服五十丸米飲下

海金沙散

海金沙 滑石各一兩  
為末 甘草二錢半  
右研勻每服二錢食前煎麥門冬湯調服

燈心河亦可

兔絲子丸

兔絲子 去塵土水淘淨酒  
浸控乾搗培半兩  
為末蜜丸桐子大每服二

十九空心清米飲送下

醫  
石  
卷二  
神效琥珀散

琥珀 桂心 滑石 川大黃微炒 菟子 脓粉 木通 木香 磁石火煅酒淬七次細研

水飛各半兩 右為細末每服二錢用燈心葱白湯調下

如聖散

馬蘭花 麥門冬去心 白茅根 車前子 帕蓼莖炒 苦蓼莖炒 檀香 連翹  
各等分 為末每服四錢水煎湯加黃芩入燒鹽少許

石燕丸

石燕火燒令通赤水中淬三次研極細水飛培乾 石葷去毛 瞿麥穗 滑石兩 右為細末糊丸梧桐子大每服十九丸用瞿麥燈心煎湯送下日三服

獨聖散

黃蜀葵花子俱用 炒一兩 為末每服一錢米飲下食前服

牛膝膏

桃仁去皮炒 歸尾酒洗各一兩 牛膝四兩去蘆酒浸一宿 赤芍藥 生地黃酒洗各一兩五錢 川芎

錢五 右剉片用甜水十鍾炭火慢慢煎至二鍾入麝香少許 四次空心服如夏月

用涼水換此膏不壞

立效散

瞿麥穗 山梔子炒 甘草各三 右作一服水二鍾煎一鍾食前服

瞿麥散

瞿麥穗七錢五分 冬瓜子 茅根 黃芩各一分 木通半錢

竹葉一把 滑石四錢

葵子二錢

五淋散

山茵蕷 淡竹葉各一錢 木通 滑石 甘草災各半錢 山梔子炒 赤芍藥 赤茯苓

苓各一錢 右作一服水二鍾煎一鍾食前服

榆白皮散

榆白皮 赤茯苓 甘遂 媽 瞿麥 犀角屑 山梔子 木通 子芩 滑石各兩 川芒硝一兩 為散每服三錢水一盞煎至五分去滓食前服

地髓湯

牛膝一合洗淨以水五盞煎耗其四留其一去滓加麝香少許研調服無時

肉蓯蓉丸

肉蓯蓉酒浸切焙 熟地黃 山藥 石斛去根 牛膝酒浸切焙 官桂去皮 檳榔各半附子去皮炮 黃芪各一兩 葵子 赤芍藥 白朮各七錢半 甘草災半錢 蜜丸桐子大每二十丸鹽酒下

澤瀉散

澤瀉 雜蘇 石葦去毛 赤茯苓去皮 蒲黃 當歸 琥珀另研 檨榔各一兩 枳殼炒 桑螵蛸炒各半兩 官桂七錢半 右為末每服二錢冬葵煎湯調服或木通湯亦可

沉香散

沉香 石葦去毛 滑石 當歸 王不留行 瞿麥各半兩 黃連去鬚七錢半 細辛去齒 甘草炙各半兩 為末每服二錢用大麥湯調服以利為度

巴戟丸

巴戟去心一兩半 桑螵蛸切破炒 杜仲去粗皮炙 生地黃 附子炮去皮臍 肉蓯蓉酒浸去皮 切續斷 山藥各一兩 山茱萸去核 石斛去根 鹿茸酥 兔絲子酒浸宿別搗 五味子 龍骨 官桂各七錢半 右為細末入別搗藥研和令勻煉蜜為丸如桐子大每服三十丸空心用溫酒下

小便數

茯苓琥珀湯

茯苓去皮半兩 白朮 琥珀各兩半 炙甘草 桂心各三錢 澤瀉一兩 滑石七錢 木猪苓一錢半 為細末每服五錢煎長流甘瀉水一盞調下空心食前待少時以美膳壓之

兔絲子丸

兔絲子酒蒸二兩

牡蠣殼取粉

酒浸一兩各

附子炮 雜雞

酒浸二兩

膀胱炎 桑螵蛸酒半兩各

為細末酒糊丸如桐子大每服七十丸空心鹽酒鹽湯

任下

旋蓉丸

肉蓯蓉八兩熟地黃六兩五味子四兩

兔絲子二兩搗研

為細末酒煮山藥糊和丸如

桐子大每服七十丸空心鹽酒下

遺尿不禁

韭子丸

家韭子炒六兩

鹿茸四兩

肉蓯蓉酒浸

牛膝酒浸

熟地黃

當歸兩各二

兔絲子

浸酒一兩半

巴戟去心各一兩半

杜仲炒

石斛去苗

桂心

乾薑各一兩

為末酒糊丸如桐子

大每服五十丸加至百丸空心食前鹽湯溫酒任下小兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽氣不足也別作小丸服

茯苓丸

赤茯苓 白茯苓 等分為細末以新汲水按洗澄去根脈控乾復研為末別取地黃汁與好酒同於銀石器內熬成膏搜和丸如桐子大每服一丸細嚼空心用鹽酒

送下

關格

柏子仁湯

人參 半夏

白茯苓

陳皮

柏子仁

甘草 炙

麝香 少許  
另研

生薑煎入麝香

調勻和服加郁李仁更妙

人參散

人參 麝香

片腦 各少許

右末甘草湯調服

既濟丸

熟附子 童便

人參 各一錢

麝香 少許

右末之糊丸如桐子大麝香為衣每服七丸

燈心湯下

頭痛

順氣和中湯

黃芪 半錢

人參 一錢

白朮 陳皮

當歸

芍藥 各五分

甘草 炙

升麻

柴胡

各三 分

蔓荆子

川芎 細辛 各二分

水煎服

清空膏

羌活 防風 各一錢

柴胡 七錢

川芎 五錢

甘草 兩半

黃連 炒一錢

黃芩 三兩

酒製一錢

一半

炒為細末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯臨卧送下  
清上瀉火湯

羌活

三錢

酒知母

酒黃芩

各二錢半

黃芪

酒黃藥

各一錢半

防風

升麻

各七分

柴

胡

橐本

酒黃連

生地黃

甘草

各五分

川芎

荆芥

蔓荆子

各二分

蒼朮

當歸

各三錢

細辛

紅花

各少許

分作二服每服水二盞煎一盞去渣稍熱服食遠

補氣湯

黃芪

八分

甘草

炙

當歸身

各二錢半

柴胡

升麻

各二分

細辛

少許

麻黃

炒

苦丁

香

各半錢

右水煎服

川芎散

川芎

細辛

羌活

槐花

甘草

炙

香附子

石膏

各半

荆芥

薄荷

兩

花

防風

去火

茵陳

各一兩

為末每服二錢食後茶清調下日三服忌動風物

又方

青黛

二錢半

蔓荆子

川芎

各二分

錢

鬱金

芒硝

細辛

根各一錢

石膏

三分

錢

薄荷葉

二錢

紅豆

粒

右為末搐鼻

又方

川芎

柴胡

各二錢

細辛

半夏

麌

人參

前胡

防風

甘菊花

甘草

炙各一錢

錢

薄荷訥許少 作一服水二鍾薑三片煎一鍾食後服

又方

甘菊花 石膏 川芎 白僵蠶生各六錢 右為極細末每服三錢茶清調下

細辛散

細辛二分 川芎二分 柴胡二錢 黃芩酒炒一錢 生黃芩五分 瓦粉二錢 甘草半錢一錢半 黃

連七分 芍藥五分 每服三錢水煎食後溫服

清震湯

升麻 蒼朮治浸一宿各一兩 荷葉一全個 為末每服五錢用水二鍾煎八分食後服

湯河間云  
是局方

愈風餅子

川烏炮半兩 川芎 甘菊 白芷 防風 細辛 天麻 羌活 荆芥 薄荷

甘草炙各一兩

右為細末水浸蒸餅為劑捏作餅子每服三五餅細嚼茶酒送下不拘時候

人參消風散

芎菊 羌活 防風 人參 茯苓皮 白僵蠶炒 蕤香葉 荆芥穗 甘草炙  
蟬殼去土各半兩 厚朴去皮 陳皮去白各半兩 為細末每服二錢茶清調下

選奇湯

防風 茯活各三 酒黃芩一錢冬不用如  
能食熱痛加之 甘草三錢夏生 每服三錢水煎稍

熱服食後時時

生熟地黃丸

生地 熟地 玄參 石斛 審

羌烏散

川烏 草烏

各一錢此二味俱用童便浸二宿

細辛 羌活

片芩酒炒拌

甘草五錢各分

為末分

二服清茶調下

小芎辛湯

川芎三錢

細辛洗去土

白朮各二錢

甘草一錢

水二鐘薑二片煎八分食遠服

透頂散

細辛三莖表白者

瓜蒂一個

丁香三粒

糯米七粒

腦子

麝香各一黑豆大

右將麝腦乳

鉢內研極細却將前四味研勻另自治為末然後入乳鉢內湯起腦麝令勻用瓦罐子盛之調閉罐口患人隨左右搐之一大豆許良久出涎一升許則安

紅豆搐鼻散

麻黃根半錢

苦丁香半錢

紅豆半錢

羌活燒

連翹各三錢

右五味為末鼻內搐

之

眩暈

補肝養榮湯

當歸

川芎各二錢

芍藥

熟地黃

陳皮各一錢半

甘菊花

一錢

甘草

五分

水二鍾

煎八分食前服

旋覆花湯

旋覆花 半夏

橘紅

乾薑各一兩

檳榔

人參

甘草

白朮

各半

剉每服

一兩薑水煎

青黛散

猪牙皂角一個

玄胡索一分

青黛少許

右為末水調豆許鼻內灌之其涎自出先仰

卧灌鼻俟喉中酸味即起身涎出口咬銅錢一文任流下

三五七湯

天雄炮去皮

細辛洗去土各三錢

山茱萸

去核

乾薑各五兩

防風

山藥炒各七兩

為末

每

服二錢食前溫酒下

正元飲

紅豆炒 乾薑 炒

陳皮

去白各

三錢

人参

白朮

甘草

災

茯苓去皮各二兩

肉桂

去粗  
皮

川烏炮去皮各兩半

附子炮去皮尖

山藥蜜炒

川芎烏藥杜乾葛各一

黃芪兩半

黃芩

茂火一兩半右為末每服三錢水煎加生薑三片棗一枚鹽少許食前溫服

### 草珠丸

好辰砂 草烏 瞿麥 黃藥子各一  
右為粗末磁碗一個以薑汁塗災數次入  
砂在內上鋪諸藥復以盜蓋了掘一小坑安碗在內用熱炭五斤煅令火盡吹去草  
藥灰取辰砂研細或只獨用辰砂末每服一錢半淡薑湯下或加用鹿茸燼去毛切  
片酒浸為末三兩和黃棗肉丸如桐子大每服三四十九丸人參湯調下空心服有熟砂

斟酌更而

### 半夏白朮天麻湯

天麻分五半夏湯洗一錢半  
神鈞炒一錢大麥蘖一錢人參  
各五分半黃蘖三分白朮  
分乾薑三分黃蘖二分橘皮  
煎一鍾去渣熟服食前

### 項強痛

### 驅邪湯

麻黃 桂枝 杏仁 甘草 防風 川芎 藁本 柴胡 家葛  
白芷 升麻 右生薑薄荷水煎服又方多加紫金藤

消風豁痰湯

黃芩酒炒

羌活 紅花 半夏  
薑製 陳皮 白茯苓

甘草 獨活 防風

白芷

又方多加

家葛 柴胡 升麻 右生薑煎服

紫金藤

又方多加

加味勝濕湯

羌活

獨活

藁本 防風

蔓荆子 川芎

蒼朮

炒油浸

黃柏

酒炒

荆芥

甘草

又方多加

草尖

右生薑煎服

紫金藤

疎風滋血湯

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

羌活

獨活

紅花

牛膝

防風

白芷

家葛

升麻

甘草

柴胡

桃仁

右生薑煎服

紫金藤

胸痛

小陷胸湯

黃連

兩半斤

洗升

大者一枚

括薑實

一粒

以水六升先煮薑取三升去滓內諸藥煮二

升去滓分溫三服

大陷胸丸

大黃半斤

苦寒

芩半升

升熟

甘寒

芩半斤

寒

杏仁半斤

熬黑若甘溫

去皮尖

右四味揚篩二味內

杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢七白蜜二合水二升煮

取一升溫頓服之一宿乃下更服取下為效

心痛

九痛丸

附子炮兩二 生狼牙炙香 巴豆去皮心炒研 人參 乾薑 吳茱萸各一兩 為末

蜜丸如桐子大酒下初服三丸日三服弱者二丸

煮黃丸

雄黃研一兩 巴豆五錢去心研如泥 右入白薺二兩同研勻滴水丸如桐子大滾漿水煮

十二丸濾入冷漿水內令沉冷每用時用浸藥冷漿下一丸一日十二時盡十二丸以微利為度不必盡劑

扶陽助胃湯

附子炮去皮二錢 乾薑炮一錢半 草豆蔻 益智仁 捻參 甘草炙 官桂 白芍藥

各一 吳茱萸 陳皮 白朮各五錢

草豆蔻丸

草豆蔻一錢四分半 吳茱萸湯泡去皮 益智仁 疊蠶炒各八分 當歸身 青皮六分

分 神薑 薑黃熟去皮

各四

生甘草三分

桃仁去皮七個

半夏湯泡七次一錢

澤瀉利小便半錢

甘草六分

柴胡

四分半錢

分

多與之

人参

黃芪

陳皮各八分

麥穗炒黃一錢半

右除

桃仁另研如泥外為極細末同碾勻湯浸炊餅為丸桐子大每服三十丸熟白湯送下食遠旋斟酌多少用之

### 清中湯

黃連火各七分 山梔子炒各二錢 陳皮 茯苓各一錢半 半夏一錢泡七次 草豆蔻仁碎各半 甘草

水二鍾薑三片煎八分食遠服

### 星半安中湯

南星 半夏各一錢半俱薑湯泡 滑石 香附 枳殼炒各一錢半 青皮醋炒 木香 蒼朮米泔浸宿炒

砂仁 山梔黑炒

茯苓

橘紅各一錢半

甘草五分

水二鍾薑三片煎八分服

海蛤燒為灰研極細過數日火毒散用之 瓜萎仁帶瓢同研

五十丸

右以海蛤八瓜萎內乾濕得所為丸每服

### 加味七氣湯

蓬朮 青皮 香附俱米醋炒各一錢半

玄胡索二錢

薑黃一錢

草豆蔻仁八分

三稜泡七分

桂心五分

益智仁七分

陳皮八分

藿香七分

災甘草四分

水二鍾煎八分服

### 失笑散

五靈脂淨好者

蒲黃等分

為末每二錢用黃醋一杓熬成膏再入水一盞煎七分熱

服

妙香散

山藥

薑汁  
火去

茯苓去皮

遠志去心  
炒

黃芪各一兩

人參

桔梗去蘆

甘草

火去  
各半兩

木香

錢二皮

辰砂三錢

另研

麝香一錢

為細末

每服二錢

溫酒調下

煨腎散

甘遂

麯包不令透水煮百餘沸取  
出用冷水浸過去麯焙乾

為末三錢

獐豬腰子細批破以鹽椒淹透

透繆藥末

在內荷葉包裹燒熟溫酒嚼服

治腰胯痛欲瀉止則飲新汲水

寒痰所滯者宜之

腹痛

木香順氣散

木香

附子

檳榔

青皮

醋

陳皮

厚朴

薑汁

蒼朮

米泔浸

仁錢各一

甘草五分

水二錢

薑三片

煎八分食前服

真武湯

茯苓

芍藥

生薑各三

白朮二兩

附子一枚

皮破炮去

右五味以水八升煮取三

升去滓溫服七合日三服

正陽散

麝香

細研一錢

乾薑炮

甘草

錢半兩

附子二枚

去皮炮

右五味以水八升煮取三

醫編

卷七

諸方

二十三

上海千頃堂印行

每服二錢白湯調溫服

回陽丹

硫黃 附子 炮

木香 全蝎 菖澄茄

吳茱萸

洗炒各半兩

乾薑

炮二錢半

右為末

酒糊為丸如桐子大生薑湯下三五十丸併二三服熱投之衣被取汗

威靈散

靈仙

當歸

沒藥

木香

肉桂

為末熱酒下

當歸散

當歸

赤芍

劉寄奴

沒藥

玄胡

枳實

為末熱酒下

神聖復氣湯

柴胡

羌活

各一錢

藁本

甘草

各八分

半夏

泡湯各七分

升麻

各七分

白葵花

五朵去心

歸

身酒

洗浸六分

人參

防風

桃仁

湯浸去皮研

郁李仁

湯浸去皮各五分

乾薑

炮

黑附子

各三分

炮去皮鱗

右作一服水五盞煎至二盞入

黃芪

草豆蔻

秤各一錢

鈎煨去皮

陳皮

五分

右伴入內再煎至一盞再入下項藥

黃柏五分

酒浸三分

黃連

酒浸三分

枳殼

三分

生地黃

三分酒浸

已上四味

預一日另用新水浸

又次入

細辛二分

川芎

蔓荆子

各三分

預一日

用水半大盞

分作二處浸此三

味并黃藥等藥前正藥作一大盞不去渣入此浸藥再上火煎至一大盞去渣稍熟

空心服忌肉食

芍藥甘草湯

芍藥二兩 甘草一兩 吆咀每服五錢水煎

腰痛

橘香丸

橘核炒 茴香炒 葫蘆巴炒 蕃藺子炒 破故紙炒 附子炮各等分 為末酒煮

麪糊和丸梧子大每服三四十丸食前鹽湯送下

摩腰膏

附子尖 烏頭尖 南星各二錢半 碎砂 雄黃 樟腦 丁香各一錢半 乾薑一錢 腐

香大者五粒小者加之 為末蜜丸龍眼大每一丸用薑汁化開如厚粥火上共熱放掌上摩腰中候藥盡貼腰上即烘絲衣縛定腰熱如火間二日用一丸

獨活寄生湯

獨活 桑寄生如無以川續斷代之 杜仲去皮切炒去絲 牛膝 細辛 秦艽 茯苓 桂心  
防風 蒿芻 人參各一錢半 甘草 當歸 芍藥 乾地黃各一錢 水二盞薑五片

同煎七分食前服

蒼朮湯

蒼朮五錢

柴胡三錢

防風一錢半

黃藥半錢

水煎空心食前服

獨活湯

羌活二錢

防風一錢

獨活一錢半

肉桂各三錢

甘草二錢

當歸尾五錢

桃仁五十粒

連翹

羌活二錢

防風一錢

漢防己一兩

黃柏酒浸各半兩

澤瀉三錢

大黃三錢

每服五錢酒半盞水一盞同煎

羌活二錢

防風一錢

漢防己一兩

黃柏酒浸各半兩

澤瀉三錢

大黃三錢

每服五錢酒半盞水一盞同煎

羌活湯

羌活二錢

防風一錢半

甘草生熟各半錢

草豆蔻半錢

黃柏半錢

葛根各五分

砂仁一錢

陳

羌活二錢

防風一錢半

知母二錢半

黃芪二錢

蒼朮半錢

升麻各一分

獨活一錢

柴胡各一錢

炒去毛

羌活二錢

防風一錢半

知母二錢半

黃芪二錢

蒼朮半錢

升麻各一分

獨活一錢

為篋末作二服

炒去毛

乳香趁痛散

虎脰骨二錢

敗龜一兩

麒麟竭各二兩

赤芍藥各二兩

當歸各二兩

沒藥各二兩

防風各二兩

自然銅各二兩

細研醋淬

白附子炮

辣桂皮去粗

白芷去粗

蒼耳子微炒

骨碎補各三兩

牛膝各三兩

天麻一錢

檳榔一錢

五加皮一錢

羌活各一錢

為末

每服一錢

溫酒調下

加全蝎如

普賢正氣湯

陳皮半夏

蒼朮厚朴

藿香甘草

生薑各等分

每服五錢水二盞

水二盞葱二段

陳皮

半夏

蒼朮

厚朴

藿香

甘草

生薑各等分

每服五錢水二盞葱二段

人參順氣散

人參 川芎 桔梗 白朮 白芷 陳皮 枳殼 麻黃去節 烏藥 白薑 炮

甘草 炙錢一 水二鍾煎一鍾或為細末以甘草湯 一方有五加皮一錢

調肝散

半夏 製三分 辣桂 宣木瓜 當歸 川芎 牛膝 細辛各二 石菖蒲 酸棗仁 盜去皮微炒 甘草 炙各一分 每服三錢薑五片棗二枚煎服

無此山藥丸

赤石脂 煅 茯神 山茱萸去核 熟地黃酒浸 巴戟去心 牛膝去苗酒浸 澤瀉 以上各  
杜仲 去皮切薑汁炒 兔絲子 酒浸 山藥 已上各三兩 五味子 棟六兩 肉蓯蓉 酒浸四兩

為末蜜丸桐子大每服三十丸空心溫酒或鹽湯送下

脇肋痛

當歸龍蒼丸

當歸 洗 龍膽草 酒浸 山梔 炒黑 黃連 酒炒 黃柏 酒炒 黃芩 酒炒各一兩 大黃 酒浸 蘆薈 青黛 水飛各半兩 木香 二錢別研 蘆薈 麝香 半錢 為細末煉蜜丸如小豆大小兒如麻子大薑湯下二三十丸忌發熱諸物兼服防風通聖散 見中風

枳殼煮散

枳殼麸炒四兩 先煎 細辛 川芎 桔梗 防風各二兩 葛根一兩 甘草三兩 為末每服四錢水一盞半薑棗同煎七分去滓溫服

補肝湯

山茱萸 當歸 五味子炒幹 山藥 黃芪炒 川芎 木瓜各半兩 熟地 白朮  
一錢炒各一錢 獨活 酸棗仁炒四錢 每服五錢棗引

臂痛

琥珀散

赤芍藥 蓬莪术 京三稜 牡丹皮去木 刘寄奴去足 玄胡索炒皮去足 烏藥 當歸  
歸酒去蘆浸 熟地黃酒浸 官桂不見火各一兩 右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋  
四升同煮豆欄為度焙乾入後五味同為細末每服二錢溫酒調服

刲勞散

人參 甘草 黃芪 當歸 芍藥 熟地黃 阿膠 紫苑分等 每服五錢水

二盞薑三片棗二枚煎八分溫服又方有五味子

舒經湯

片薑黃二錢如無則以嫩艾代之 赤芍藥 當歸 海桐皮皮粗 白朮已止各一錢半 巴戟  
甘草炙各作一服 水一鍾薑三片煎一鍾去滓磨沉香汁少許食前服

身體痛

甘草附子湯

甘草 白朮各一兩 桂枝二兩 附子炮一枚

右㕮咀作四劑水煎溫服

當歸拈痛湯

羌活 甘草炙一錢

黃芩炒一錢

茵陳酒炒半兩

人參

苦參洗酒各一錢

升麻

葛根

蒼朮

當歸身各二錢

白朮一錢半

澤瀉

猪苓

防風

知母酒洗三錢

水煎不拘時

服

麻黃復煎湯

麻黃去節用水五盞先煮令沸去沫渣再煎至三盞方入下藥

黃芪各二錢半

白朮

人參

柴胡根

防風

生地黃各五分

甘草三分

羌活

黃柏各一錢

杏仁

三個去皮六

右入麻黃湯內煎至

一盞臨卧勿飽服

活血丹

熟地黃三兩 當歸 白朮 白芍藥 繢斷 人參各一兩

末之酒糊丸如桐子大每服百丸

四物蒼朮各半湯

即四物湯與蒼朮各半兩煎服下活血丹

面

升麻加黃連湯

升麻 葛根各一錢  
芍 荆芥穗 薄荷各三分  
作一服水二盞煎一盞入先浸三味煎七分去渣食後溫服忌酒濕麪五辛

升麻加附子湯

升麻 葛根 白芷 黃芪各七分  
益智仁三分  
右剉如麻豆大都作一服水三盞連鬚白葱頭二莖同煎一盞去渣溫食前

清肺飲

連翹 川芎 白芷 黃連 黃芩 荆芥 桑皮 苦參 山梔 貝母 甘草

耳

犀角飲子

犀角銠 木通 石菖蒲 甘菊花去根 枝 柏枝  
錢一水二鍾薑五片煎一鍾無時服

犀角散

犀角屑 甘菊花 前胡 枳殼炒 石菖蒲 羌活 澤瀉 木通 生地黃

各半  
兩

麥門冬去心  
二兩

甘草  
錢半

為末每服三錢水煎去滓溫服

### 本事地黃丸

生地黃一兩  
半

枳殼

羌活

桑白皮各一  
兩

磁石搗碎水淘三十次  
去盡赤汁為度二兩

甘草

防風黃芩  
兩

木通各半

為龜床每服四錢水煎去滓日二三服

### 益腎散

磁石製巴戟

川椒

開日者各一  
兩

石菖蒲

沉香各半  
兩

右為細末每服二錢用猪

腎一隻細切和以葱白少鹽并藥濕紙十重裹煨令香熟空心細嚼溫酒送下

### 桂星散

辣桂川芎當歸

石菖蒲

細辛

木通

木香

白疾藜炒去刺

麻黃節

甘草一錢

白芷稍

天南星

一錢半

水二錢

葱白二根紫鯉五葉薑五片煎一

鍾食後服一方加全蝎去毒一錢

### 磁石丸

磁石大火爆淬七次

防風羌活

黃芪

鹽水浸焙

木通皮

白芍藥

桂心不見火各一  
兩

參半兩

為細末

用羊腎一對去脂膜搗爛打酒糊

為丸桐子大每服五十丸空心溫

酒鹽湯下

### 清神散

甘菊花 白殼蠶炒各半兩

卷活

荆芥穗 木通 川芎 防風

錢各四

木香錢一

石菖蒲

甘草各一錢半

為末每服二錢食後茶清調服

### 通氣散

茴香

木香一錢半

全蝎

地龍

土狗

明礬半生

雄黃

葛蒲各一錢半

陳皮

菖蒲

錢各一

卷活

殼蠶

川芎

茴香

穿山甲一錢半

甘草

為末每服三錢溫酒調下

### 通神散

全蝎

地龍

土狗

明礬半生

雄黃

麝香

右為末每用少

許葱白蘸入耳中

中閉氣面壁坐一時

三日一次

### 通耳法

磁石

穿山甲

燒存性

為

右二味用新棉花裏了塞所患耳內口中銜

少生鐵覺耳內如風雨聲即愈

### 追風散

藜蘆

雄黃

川芎

石菖蒲

全蝎

白芷

藿香

鵝不食草

薄荷

苦丁

茴香

各等分

麝香

許少

右為細末

每用些少吹鼻中

如無鵝不食草加片膳少許

### 草麻子丸

草麻子

三十一個去油用

皂角

半錢取肉

生地

龍中者一條

全蝎

二個焙遠志去磁石

火蝦

醋淬七次  
研細水飛

乳香各二  
錢右為細末以黃蠟熔和為丸塞耳中

勝金透闕散

川烏頭一炮一個  
細辛各二錢  
膽礬半錢  
鼠膽一具  
右為細末用鼠膽調和勻再焙令乾研細却入麝香半字用鵝毛管吹入耳中時口含茶清待少時

龍齒散

龍齒人參白茯苓麥門冬去心各半兩  
遠志去心各半兩  
丹砂鐵粉龍腦牛黃

麝香

俱另研各二錢半

為細末研勻每服半錢七食後用沸湯調服日三服

芎歸飲

川芎當歸細辛各半兩  
石菖蒲官桂白芷各三錢  
每服三錢水二盞入紫

蘇薑棗煎至一盞服

黃芪丸

黃芪兩沙苑蒺藜炒羙活各半兩  
黑附子大者一錢  
羯血腎一對  
為末酒糊丸桐子大每服四十丸煨葱鹽湯下

黍粘子湯

桔梗解水桃仁一錢  
柴胡黃芪各三分  
連翹黃芩黍粘子當歸稍生地  
黃黃連各二分蒲黃炙甘草龍膽草昆布蘇木生甘草各一分紅花

許少水煎稍熱服食後忌寒藥

柴胡清服飲

川芎 當歸 白芍 生地 柴胡 黃芩 山梔 花粉 防風 牛膀 連翹

甘草 作痒亦可服

柴胡聰耳湯

柴胡

連翹

水蛭

另研

蟲蟲

三個去

麝香

研少許

當歸身

人參

炙甘草

各一錢

右除另研外以水二盞薑三片煎至一盞下水蛭等末再煎一二沸

食遠稍熱服

蔓荆子散

蔓荆子

赤芍藥

生地黃

桑白皮

甘菊花

赤茯苓

川升麻

麥門冬去心

木通

前胡

炙甘草

各一錢

水二盞

薑三片

棗二枚

煎一盞服

紅綿散

白礬

二錢

臘脂

二字

研勻先用綿杖子展去膿及黃水盡用別綿杖子引藥入耳中

令到底捲之即乾

透冰丹

治

一切風疾

川大黃

皮去

龜

山梔

蔓荆子

皮去

白

白茯苓

去皮

益智仁

去皮

威靈仙

去蘆頭

洗焙乾

白芷各半  
兩 香墨燒醋淬  
天麻去苗去半  
乾研細 仙靈脾葉洗  
為細末煉蜜和如麥餅相似以真酥塗杵自搗萬杵如乾  
旋入蜜合得所和成劑每服旋丸如桐子大用薄荷自然汁同溫酒化下兩丸中風  
涎潮臭羨白礬湯化四丸小兒驚風荷汁化下一丸

益氣聰明湯

黃芪人參各五錢 升麻一錢 葛根二錢 蔓荆子三錢 荘藥黃蘖酒炒各半  
甘草一錢 每服四錢水二盞煎一盞臨睡熱服更再煎服

鼻

防風湯

防風半錢 施子七枚 升麻一兩 石膏研三兩 桂去皮半兩 麻黃去節七錢 木通二錢  
半

清肺飲

辛夷六分 黃芩 山梔 麥冬 百合 石膏 知母各一錢 甘草五分 枇杷葉三片

升麻三分

辛夷膏

辛夷葉二兩 細辛 木通 木香 白芷 杏仁湯浸去皮尖  
研各半兩 右用羊髓豬脂二

兩和藥於石器內慢火熬成膏取赤黃色放冷入龍腦麝香各一錢為丸綿裏塞鼻  
中數日內脱落即愈

烏犀丸

烏犀銹 羚羊角鏘 牛黃研 柴胡淨各兩 丹砂研 天門冬心去 貝母去心  
胡黃連 人參各兩半 麥門冬去心焙 知母各七錢 黃芩 炙甘草各二錢半 為細末  
研勻煉蜜丸如梧子大每服二十丸空心溫酒送下

犀角散

犀角屑 木通 升麻 赤茯苓 黃芪 馬牙硝 杏仁去皮尖雙仁炒黃各半兩 麥門冬  
去心一兩 硫砂研 龍腦研 炙甘草各二錢半 為末每服一錢食後竹葉湯調下

桑根白皮散

桑根白皮 木通 大黃剉各二兩 升麻一兩半 石膏 葛根各三兩 甘草炙  
每服三錢水一盞煎六分食後溫服

宣腦散

川芎金 川芎 青黛 薄荷 小黃 小黃米各二分 右為細末每用少許口噙  
冷水搐鼻中

生津方

兜鈴 水芹 旋覆花 醬辦草

俱鮮者  
取汁

薄荷葉

五倍子各四

兩

搗作餅食七

日出白毛又採前四種取汁拌搗待乾又拌汁搗不拘通數每用五厘入口津液湧溢

金花丸

黃連 黃芩 黃芩 桔子 大黃便秘加之

等分末之水丸每服三十九白湯

下

升麻飲

升麻 玄參 黃連 羚羊角鏘

黃芩 葛根 大黃 麥門冬去

心

羌活 防

風 甘菊花各半

人參 知母 火甘草各二

錢半 右㕮咀每服三錢水一盞煎七

分去滓溫服食後一方無人參有牛蒡子

黃連散

黃連 朴硝 白礬各半

薄荷兩一

右為籠末用臘月黃牛膽將藥入膽內風頭

挂兩月取下如有口瘡旋將藥研細入於口瘡上去其熱涎即愈

赴筵散

黃連 黃芩 黃柏 桔子 乾薑 細辛 等分為末搽之

滋陰四物湯 即四物湯加黃柏知母丹皮肉桂

柳花散

黃柏錢一 青黛錢二 肉桂錢一 冰片分 為末敷之

玄參散

玄參 升麻 獨活 麥冬 黃芩 黃柏 大黃 桔仁 前胡 屏角 火草

冰硼散

冰片五分 珠砂六分 玄明粉 硼砂錢各五 為末擦之

口疳藥

薄荷末三分 兒茶一分 黃柏厘一 龍骨醋煅二厘 白芷二厘半腫痛倍用 生甘草厘五 珍珠厘 冰片厘五 研細末口疳吹之即愈初起熱甚倍薄荷久病多加兒茶龍骨珍珠即長肉癰痘後去黃柏龍骨加牛黃疳重加滴乳石硃砂各少許

清熱補氣湯

人參 白朮 茯苓 當歸 白芍各一 升麻 五味 麥冬 玄參 紫甘草

各五  
如不應加薑附

加減甘露飲

熟地黃 生地黃 天門冬去黃芩 枇杷葉去山茵陳 枳殼 金釵石斛

兩各一 甘草 扁角各五 為末每服二錢水一盞煎七分臨卧溫服小兒量減

唇

濟陰地黃丸

五味子 熟地黃

膏

麥門冬 當歸 肉蓴蓉

山茱萸

去核

乾山藥 拘杞子

甘州菊花

巴戟肉

各等分

為末蜜丸桐子大每服七八十九丸空心食前白湯送

下

柴胡清肝散

柴胡

黃芩

炒各一錢

黃連

炒

山梔

炒各七分

當歸

一錢

川芎

六分

生地黃

一錢

升麻

分八

牡丹皮

錢一

甘草

三分

右水煎服

瀉黃飲子

白芷

升麻

枳殼

炒

黃芩

防風

各一錢半

半夏

薑湯泡七次

一錢

石斛

二分

甘草

分七

水二盞薑三片煎八分飯後服

梔子金花湯

黃連

黃芩

黃柏

梔子

大黃

齒

羌活附子湯

麻黃去節各分 黑附子炮各三分 羌活 蒼朮各五分 黃芪分 黃芩炒去絲各分 黃柏 白芷各三分 佛耳草有寒嗽者用之如無不用 右水煎服

白芷散

麻黃去節各一分 草豆蔻各二錢半 黃芪肉桂各二錢半 紫木三分 各四分 吳茱萸 白芷各三分 各三分 番木三分 各三分 羌活當歸身熟地黃各五分 升麻一錢 右為細末先用水漱洗以藥擦之

立效散

防風錢升麻分 炙甘草三分 細辛分 細辛二分 草龍膽酒洗四分 右水一盞煎五分去滓以匙抄在口中滯痛處少時立止

清胃散

生地黃酒洗三分 升麻 牡丹皮半錢 當歸身三分 捸黃連三分如連而不好加二分夏倍之

右五味同為細末水煎至一半候冷呷之

獨活散

羌活 防風 川芎 獨活 石膏 荆芥 升麻 乾葛 生地黃 細辛 白芷 赤芍藥 黃芩 甘草 右加薄荷煎服

茵陳散

茵陳 連翹 半夏 荆芥穗 麻黃 升麻 黃芩 牡丹皮 射干 羌活

獨活 大黃炮 薄荷 犀蠶各二錢半 細辛兩 章牛兩 為細末每服三錢水一盞先煎湯熱下藥末攪一攪急瀉出食後連滓熱服

當歸龍膽散

升麻 麻黃 生地黃 當歸稍 白芷 草豆蔻 羊脰骨灰 龍膽草 黃連  
各等 分 右為末擦之

益智木律散

草豆蔻二錢半 益智仁 當歸身 熟地黃 羊脰骨灰各五分 木律二錢 升麻一錢半  
分 黃連四分 右為細末擦之如寒牙痛去木律

草豆蔻散

草豆蔻二錢半 黃連 升麻各二錢半 細辛葉 防風各二錢半 熟地黃 羊脰骨灰各五分  
分 當歸身六分 為細末痛處擦之

麝香散

麝香少許 升麻二分 黃連 草豆蔻各二錢半 熟地黃 麻黃各一分 益智仁二分  
羊脰骨灰二錢半 人參 生地黃 當歸 漢防已酒製各三分 為細末每用少許擦牙  
疼處噙良久有涎吐去

升麻散

細辛 培 黃柏 知母 防已 黃連 升麻 白芷 蔓荆子 牛蒡子 薄荷  
右薄荷湯調服及搽牙根或煎服亦可

牢牙散

升麻三錢 生地黃 石膏各一錢 白茯苓 玄參各二分 羊脰骨灰 梧相律各三分  
黃連一錢三分 麻香少許另研 右為細末研勻每用少許臨卧擦牙復以溫水漱去

又方

梔枝 柳枝各長四寸十九枝 皂角不蛀者七莖 鹽四十文重 右同入磁瓶內黃泥固濟糠火  
燒一夜候冷取出研細用如常法

白牙散

升麻一錢 羊脰骨灰二錢 白芷半錢 石膏一錢半 麻香少許 右為細末先用溫水漱

口擦之妙

羊脰散

地骨五錢 羊脰骨灰五錢 石膏五錢 升麻五錢 為末擦牙

還少丹

熟地二兩 山藥 牛膝浸酒 枸杞酒浸各兩半 莪肉 茯苓 杜仲薑汁炒 遠志心去一兩 石菖蒲五錢  
五味子炒 茄實酒炒 小茴香炒 巴戟酒浸各兩 肉荳莖酒浸各兩 石菖蒲五錢

加棗肉蜜丸鹽湯或酒下

甘露飲

枇杷葉刷毛去 熟地黃 天門冬去心培 枳殼去瓤炒 山茵陳梗去 生地黃 麥門冬去心培 石斛去蘆 火甘草 黃芩 右等分為末每服二錢水一盞煎七分去滓食後臨卧小兒量減與之

露蜂房散

露蜂房炙 荆芥 川椒去目反合口者炒出汗 地骨皮 松節 青鹽 白礬枯各一兩 為細末每用半錢綿裹於患處咬之有涎吐之

川升麻散

川升麻 白附子炮各一兩 為細末研勻於八月內取生地黃四斤洗去土絞取汁二大盞即下藥攪合勻放磁器中每用以柳枝綿裹一頭點藥火令熱烙齒根下縫中更塗膏少許即驗

蕪荑消疳湯

雄黃 蕃荑 生大黃 蘆薈 川黃連 胡黃連 黃芩

蘆薈消疳飲

蘆薈 柴胡 黃連 胡連 牛蒡 玄參 桔梗 梔子 石膏 薄荷 獐羊

角各五 甘草 升麻各三 竹葉十斤

人中白散

人中白

二錢 兒茶一錢

黃柏 薄荷 青黛各六

冰片五厘 捋之使涎流出

清陽散火湯

升麻 白芷 黃芩 牛膀

連翹 石膏 防風

當歸 荆芥 蔴藜各一錢

甘草分五煎服

舌

玄參升麻湯

玄參 升麻 扭角 赤芍藥 桔梗 貴眾 黃芩 甘草各等 每服四錢水

煎

清熱化痰湯

貝母 天花粉 枳實炒 桔梗各一錢 黃芩 黃連各一分 玄參 升麻各七錢

甘草分五右水煎服

牛黃散

牛黃研各七半 漢防已各七半 扭角二錢 羚羊角 人參 桂心 牛蒡子炒各半 生地  
黃 炙甘草各半 為細末研勻每服三錢水一中盞煎六分連滓溫服不時

升麻湯

升麻 赤芍藥 人參 桔梗 乾葛 甘草 右咬咀薑煎溫服一方有黃連黃芩大黃玄參麥門冬

碧雪

芒硝 青黛 寒水石 石膏煅各分研 朴硝 硝石 馬牙硝各等 甘草煎湯二升入諸藥再煎用柳枝不生攪令熔方入青黛和勻傾入砂盆內冷即成霜研末每用少許以津含化如喉閉以竹管吹入

花粉散

花粉 胡連 黃芩各八分 犀靈 鮮皮略五 大黃五分 牛黃 滑石各二厘 為末竹葉湯服二錢

瀉心湯

當歸 白芍 生地 麥門冬 犀角 山梔 黃錢一 甘草 薄荷各五分 甘露飲

枇杷葉 石斛 黃芩 麥門冬去心 生地黃 炙甘草等分 右咬咀每服五錢水二盞煎八方去滓無時溫服

清熱補血湯

當歸酒洗川芎 茵藥熟地黃酒洗各一錢 玄參分 知母 五味子 黃柏麥門冬去心 柴胡 牡丹皮各五分 右水煎服

咽喉

清咽利膈湯

牛蒡子炒研 連翹去心 荆芥 防風 桔梗 生研 桔梗 玄參 黃連 金銀花黃芩 薄荷 甘草各一錢生 大黃 朴硝各一錢 水二鍾淡竹葉二錢煎八分食遠服

桐油錢

溫水半盞加桐油四匙攪勻用硬雞翎蘸入喉內撫之連擦四五次其痰壅出再擦再吐以人醒聲高為度

益氣清金湯

苦桔梗三錢黃芩二錢浙貝母去心研麥冬去心牛蒡子各一錢生研陳皮薄荷甘草各一錢生紫蘇分竹葉三十片水三鍾煎一鍾食遠服渣再煎服

消癰碧玉散

硼砂三錢冰片 胆礬各三分研細末用時以筋頭蘸藥點患處

解毒雄黃丸局方 準繩巴豆十四粒餘各一兩

雄黃二錢 鐘金二錢 巴豆二十七粒 去皮油

共為細末醋糊為丸如菜豆大熱茶清

下七丸吐出頑痰立甦未吐再服已死心頭猶熱幹開口灌之無有不活小兒驚風

痰壅二三丸

金丹 消腫止癆性迅利善走內輕症不宜用

鎗硝八錢 蒲黃四分 瘰蠶一錢 元皂一分 冰片一分 研細共為末吹入

碧丹 清熱祛風解毒出痰症用之重症與金丹合用

六金丹四個輕症用之重定藥多寡

五丹三分 百草霜半茶 玄丹一厘 甘草灰三茶 冰片五厘 薄荷一分

去根春秋二分

共為末吹

方皂少許  
缺出痰加製

玄參 吹喉用

白肥燈草水溼透用竹管浸溼以涇紙塞緊一頭將燈草納管內以筋築實口用溼紙封入炭火煅烟絕管通紅取出先涇一磚將管放磚上以碗覆之待冷取起剝去外管灰兩頭紙灰黑色成團者佳

甘結湯

苦桔梗一兩 炙甘草二兩 每服三錢水一盞煎七分食後溫服

牛黃清心丸

九轉膽星一  
雨 雄黃 黃連末各二  
錢 茯神 元參 天竺黃 五倍末 荆芥  
防風 桔梗 犀角末 當歸各一  
錢 冰片 麻香 珍珠豆腐煮各五分  
粉分三 各研極細共和一處再研勻甘草熬膏和丸如龍眼大硃砂為衣日中晒  
乾收入磁瓶內將瓶口堵嚴勿令出氣臨時服一丸薄荷湯磨服

喉痺飲

桔梗 玄參 牛蒡 貝母 荆芥 薄荷 瘡蠶 甘草 前胡 忍冬花 花

粉 燈心

紫雪散

犀角 銹 羚羊角 銹 石膏 寒水石 升麻各一  
兩 元參二 甘草八錢 沉香

剉 木香剉各  
五錢 水五盞煎藥剩湯一盞將渣用絹瀘去將湯再煎滾投提淨朴硝  
三兩六錢文火慢煎水氣將盡欲凝結之時傾入盆內下硃砂冰片各三錢金鉢一  
百張各預研細和勻將藥盛安入涼水盆中候冷凝如雪為度大人每用一錢小兒  
二分十歲者五分徐徐嚥之即效或用淡竹葉燈心煎湯化服亦可咽喉腫痛等証  
吹之亦效

八寶珍珠散

兜茶 川連末 川貝母研去心 青黛五分 紅褐燒灰 官粉 黃柏末 魚

腦石微燬 琥珀末各一錢 人中白二錢 硼砂八分 冰片一分 京牛黃 分豆  
腐內煮半炷香 蘑香三分 各研極細末共兑一處再研勻以細筆管吹入喉內燬  
時取出研末

肉處

廣筆鼠黏湯

生地黃 漢貝母各三錢 去心研 元參 甘草各二錢 五分生 鼠黏子酒炒  
連翹各二錢 白殼蠶炒研 苦竹葉二十片水二鍾煎八分飢時服

礬精散

白礬不拘多少研末用方磚一塊以火燒紅洒水於磚上將礬末布於磚上以磁盤覆蓋四面灰擁一日夜礬飛盤上掃下用二錢 白霜梅二個去核  
真明雄黃 穿山甲各一錢炙 共研細末以細筆管吹入喉內

清涼散

硼砂三錢 人中白二錢 黃連末一錢 南薄荷六分 冰片五分 青黛四分 共為極細

末吹入喉癬腐處

清靈膏

薄荷三錢 貝母二錢 甘草六分 百草霜分 冰片三分 玉丹二錢 玄丹八分 右細末  
蜜調噙化隨津嚥入

甘桔射干湯

桔梗二錢 甘草 射干 連翹 山豆根 牛膀 玄參 荆芥 防風錢各一錢 竹

葉煎

木香四七丸

木香五分 射干 羚羊角 屏角 檀榔各一錢 玄參 桑白皮 升麻各一分 桔梗一錢

半夏

厚朴

陳皮

錢各一錢

赤茯苓

生薑煎服

清咽屑

半夏製一兩

橘紅

川大黃

酒製五錢

茯苓

紫蘇葉

風化硝

直僵蠶

炒桔梗

桔梗

梗各二錢

連翹

訶子肉

杏仁

甘草

各二分一錢

右為末

薑汁韭汁和捏成餅

晒乾

築碎如小豆大

每用少許置舌上乾嚥之

食後臨卧為佳

玉丹

吹喉用

明礬碎如豆大入傾銀罐內以木炭火煅不住手攪無塊為度再用好硝打碎徐徐投下十分之三再用官硼打碎亦投下十分之三少頃再投入生礬俟痒再如前投硝硼如是漸增直待鋪起灌口高發如饅頭樣方止然後駕生炭火燒至乾枯用瓦一片覆罐上待片時取出將牛黃末少許用水五六匙和之即以匙抄滴丹上將罐仍入火烘乾取下連罐并瓦覆在淨地上用紙蓋之再用瓦覆之過七日收用留輕鬆無堅紋者用

雪梅丹 吹喉用

大青梅破開去核將明礬入內竹簽釘住武火煅梅盡勿用止用白礬輕白如臘粉  
用出涎清痰甚捷此秘方也

玉屑無憂散

玄參去蘆 貴眾去蘆 滑石研 砂仁 黃連去頭 甘草炙 茶荳 英山豆根 荆芥  
穗各半 寒水石兩頭一 硼砂錢為細末每服一錢乾摻舌上以清水嚥下

瘡

七珍散

人參 石菖蒲 生地 川芎各一 細辛 防風 辰砂另研各半 右為細末每

服一錢薄荷湯下

發聲散

括蔞皮剉 白僵蠶去頭 甘草各等分 右為細末每服三錢溫酒或生薑自然汁

調下用五分綿裹噙化嚥津亦得日兩三服

玉粉丸

半夏錢五 草烏二錢半炒 桂二分 薑汁糊丸芡實大每夜含化一丸

蛤蚧丸

蛤蚧一對去嘴足溫水浸去膜刮了血脈醋炒

訶子核去

阿膠炒

生地麥冬去心

細辛苗去災

甘草各五錢

蜜丸大食遠含化

杏仁煎

杏仁薑汁

砂糖

白蜜各一兩

五味子

紫苑各四錢

通草

貝母各四錢

桑

皮五錢

水煎時服

訶子湯

訶子四個半炮

桔梗一兩半生

甘草二寸半生

為細末

每服二錢童便一盞水一盞

煎五七沸溫服甚者不過三服愈

又方

大訶子四個半炮

桔梗三兩半生

甘草二兩半生

每服一錢七入沙糖一小塊水五盞煎至三

盞時時細呷一日服盡其效甚捷

皮毛鬚髮肌肉筋骨四肢二陰

葷莖湯

葷莖升薏苡仁炒

瓜瓣各半升

桃仁五十粒

皮去炒研

水煎服

八仙湯

當歸各一錢

茯苓

川芎熟地

陳皮

半夏

羌活各七分

白芍八分

人參

秦艽

牛膝各六分

白朮錢四

桂枝三分

柴胡甘草各四分

防風五分

三青膏染鬚

生胡桃皮生酸石榴皮生柿子皮先將石榴剜去子入丁香裝滿共秤過分兩然後將胡桃皮柿子皮秤等分晒乾同為細末用牛乳和勻盛於錫瓶中封口埋馬糞內十日取出將線一條扯緊點藥於中試之如走至兩頭皆黑者藥即中用如不然再埋馬糞中數日即照此法染鬚髮

厥

人參固本丸

人參二兩

熟地

生地

麥冬炒

天冬炒各四兩

蜜丸

蒲黃湯

蒲黃一兩炒褐色

清酒十六盞熱沃之

溫服

二十四味流氣飲

丁香 肉桂 草果 麥門冬 赤茯苓 木通 檳榔 枳壳 薄荷 木瓜  
青皮 陳皮 木香 人參 白朮 大腹皮 甘草 紫蘇 香附 葛蒲 蓬  
莪术

四逆湯

甘草

二兩  
炙

乾薑

一兩  
半

附子

一枚生用去皮破八片

水

三升煮一升二合去滓溫服再服

強人可附子一枚乾薑三兩

### 六物附子湯

附子 肉桂 防已

各四錢

炙甘草

二錢

白朮 茯苓

各三錢

### 通脈四逆湯

甘草

炙三兩

乾薑

三兩強人可四兩

附子

大者一枚生用去皮破八片

右三味

以水三升煮取一升

二合去滓分溫再服

加減法 面色赤者加葱九莖葱味辛以通陽氣 腹中痛者去葱加芍藥二兩芍藥之酸通寒利腹中痛為氣不通也 嘘者加生薑二兩辛以散之嘔為氣不散也 咽痛者去芍藥加桔梗一兩咽中如結加桔梗則能散之 利止脈不出者去桔梗加人參二兩利止脈不出者亡血也加人參以補之經曰脈微而利亡血也四逆加人參湯主之脈病皆與方相應者乃可服也

### 當歸四逆湯

當歸

三兩辛溫

桂枝

三兩辛熱

芍藥

三兩酸鹹

細辛

二兩辛熱

大棗

二十個

甘草

二兩甘平

通

草

二兩甘平

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

抽搐

涼驚丸

龍膽末

防風末

青黛研各三錢七分

鉤鉤藤末二錢七

牛黃麝香各一錢七

黃連末五錢七

龍腦研一錢七

同研麪糊丸粟米大每服三五丸至一二十丸煎金銀湯下

續斷丸

續斷酒

川芎

當歸酒

半夏

薑

橘紅

乾薑炮各一兩

桂心

甘草半兩各一錢

右

為細末蜜丸桐子大每服百丸白湯下

續命煮散

防風獨活當歸

人參細辛葛根芍藥

川芎甘草熟地黃遠

志荆芥半夏各五錢

桂心半錢

每服一兩水二盞生薑三片煎八分通口服

汗多者加牡蠣粉一錢半

獨活湯

獨活羌活人參

防風當歸細辛茯苓遠志半夏桂心白薇

菖蒲川芎各五錢

甘草火半錢半

每服一兩水二盞薑五片煎八分食後溫服

顫振

摧肝丸

牛胆南星鉤鉤藤

黃連炒酒

滑石水飛

鐵華粉兩

各一錢三

殭蠶炒五錢

天麻酒炒二兩  
辰砂飛五錢  
災甘草二錢  
為末以竹瀝一碗薑汁少許打糊丸茶豆大  
食後及夜茶下一錢五分忌雞羊肉

參朮湯

人參一錢  
白朮各一錢  
黃芪各一錢  
白茯苓一錢  
災甘草一錢  
陳皮各一錢  
水煎食前服甚者加

附子一錢  
童便製

補心丸

當歸酒洗一兩半  
川芎粉甘各一兩  
生地黃一兩半  
遠志去心二兩半  
酸棗仁炒柏子仁各三兩  
人參一兩  
硃砂五錢另研  
金箔二十片  
麝香五錢  
琥珀三錢  
茯神七錢  
牛膽南星五錢  
石菖蒲六錢  
右為細末蒸餅糊丸如菉豆大硃砂為衣每服七八十丸津嚥下或薑湯送下

定振丸

天麻熟蒸去皮  
秦艽去蘆  
全蝎去頭尾  
細辛各一錢  
熟地黃一錢  
生地黃一錢  
當歸酒洗  
芍藥煨各二兩  
防風去皮  
荆芥各七錢  
白朮一錢  
黃芪各一兩  
威靈仙酒洗五錢  
酒糊丸桐子大每服七八十九丸食遠白湯下或溫酒送下

脚氣

苡仁酒

薏苡仁 牛膝各二兩

海桐皮

五加皮 獨活 防風 杜仲各一兩

熟地黃二兩

半白朮半兩

右為篋末入生絹袋內用好酒五升浸春秋冬二七日夏月盛熱分

作數貼逐貼浸酒每日空心溫服一盞或半盞日三四服常令酒氣醺醺不絕久服  
覺皮膚下如數百條蟲行即風濕氣散

### 羌活導滯湯

羌活 獨活各半兩

防已三錢

大黃酒煨一兩

當歸三錢

枳實炒二錢

每服五錢或七

錢水二盞煎至七分溫服微利則已量虛實加減

### 加味散毒散

人參去蘆

赤茯苓去皮

甘草炙

芎芻

前胡去蘆

柴胡去蘆

羌活去蘆

獨活去蘆

枳殼去瓢

桔梗去蘆

大黃

蒼朮米泔浸各等分

每服五七錢水一盞半薑五片薄荷

五葉煎至一盞熱服皮膚搔痒赤疹加蟬蛻

### 加味二妙丸

蒼朮一兩

酒黃柏一兩

牛蒡

鹽酒

酒當歸

川草薢

防已

龜板

酥炙各五錢

酒

糊丸

### 茱萸丸

吳茱萸

木瓜各等分

為細末酒糊丸如桐子大每服五十九至百丸溫酒送下或

以木瓜蒸爛研膏為丸尤佳

茱萸木瓜湯

吳茱萸半兩 乾木瓜一兩 檳榔二兩 右咬咀每服八錢以水一盃半生薑五片煎至

一盞去滓溫服不拘時候

大腹子散

大腹子 紫蘇 木通 桑白皮 羌活 木瓜 荆芥 赤芍藥 青皮 獨活  
各一 枳殼二兩 每服四錢水一盞薑五片葱白七寸煎去渣空心溫服

三脘散

獨活 白朮 木瓜培 大腹皮炙黃 紫蘇各一兩 甘草炙半兩 陳皮湯浸去白 沉香  
木香 川芎 檳榔鶴脣煨熟各七錢半 右共杵為粗散每服二錢半水二盞同煎至一  
盞去渣分三服熱服取便利為效

桑白皮散

桑白皮 赤茯苓去皮一兩 柴胡去蘆各一兩 生乾地黃半兩 甘草炙半兩 射干 枳殼  
去蘆炒 貝母 前胡去蘆各一兩 赤芍藥 天門冬去心 百合 檳榔各七錢半 每服八錢水  
一盞半生薑五片煎六分去渣溫服無時

犀角散

犀角屑

枳殼去瓢  
炒

沉香各半錢

檳榔

紫蘇葉

麥門冬去心

赤茯苓去皮各一兩

去粗入淡竹瀝

一合更煎一二沸

溫服不拘時候

沉香散

沉香 赤芍藥 木通

紫蘇葉

荳梨勒皮

檳榔各一

吳茱萸

兩

右咬咀

半夏散

半夏湯洗七次切片

桂心各七錢半

赤茯苓去皮

人參去蘆

陳橘皮白

前胡蘆

檳榔各一

兩 紫蘇半兩

右咬咀

每服五錢水一鍾半薑七片淡竹茹二錢煎至七分去渣

溫服無時

橘皮湯

陳橘皮去白 人參去蘆

紫蘇葉各一兩

右咬咀每服八錢薑五片清水一盞半煎八

分溫服

芎芷香蘇飲

川芎錢七 甘草二錢

紫蘇葉

乾葛 白茯苓 柴胡各半

半夏六錢

枳殼

炒三錢

桔梗生二錢半

陳皮三錢

每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎八分溫服無時

虎骨四斤丸

宣州木瓜去  
穰

天麻去  
蘆

肉從蓉洗  
淨

牛膝去蘆各培  
乾秤一斤

附子炮去皮  
尖二兩

虎骨炙一  
錢

以上各如法修製先將前四味用無灰酒五升浸春秋各五日夏三日冬十日取出焙乾入附子虎骨共細研末用浸藥酒打麪糊丸如桐子大每服五十丸食前

鹽湯下

赤白濁

清心蓮子飲

黃芩

麥門冬

地骨皮

車前子

甘草火各  
一錢

石蓮肉

白茯苓

黃芪

炒蜜

人參各七  
分半

右另用麥門冬二十粒水二盞煎一盞水中沉冷空心溫服發熱加柴

胡薄荷一方加遠志菖蒲各一錢

草薢分清飲

益智仁

川草薢

石菖蒲

烏藥分等

白茯苓

去皮

遠志

去心

茯神

去水各一  
兩

七分食前一方加茯苓甘草

妙香散

山藥薑汁炒  
二兩

黃芪

人參各一  
兩

白茯苓

去皮

遠志

去心

茯神

去水各一  
兩

災草錢

桔梗

三錢

木香

一錢

麝

一錢

共為末酒調服二錢

二錢

清濁飲

石蓮 莼神 山藥 莼苓 茵蕡 熟地 柴杞 蓬鬚 牡蠣 椿根 用扁

蓄二兩煎汁入前藥再煎

便濁飲

白茯苓 半夏 甘草梢 澤瀉 車前 土牛膝 草薢

小兔絲子丸

石蓮肉

二兩  
焙乾  
一兩

白茯苓

各四  
兩  
五兩

兔絲子

酒浸研  
二兩內七  
錢半打糊

山藥

二兩內七  
錢半打糊

右為細末用山藥

糊搜和為丸如梧子大每用五十九溫酒或鹽湯下空心服如腳膝無力水瓜湯下晚食前再服

遺精

鎖精丸

破故紙

炒  
兩  
各四

白茯苓

五倍子  
兩  
各二

為末酒煮糊丸梧子大每服三

十九空心溫酒或鹽湯下

固本丸

山藥

枸杞  
各一  
兩

五味

山萸  
酒黃柏  
各一  
兩

鎖陽

酒知母  
各一  
兩

人參

黃芪  
石

蓬蛤粉

各一  
二錢  
兩

白朮  
三  
兩

山藥打糊丸

金櫻丸

枸杞 金櫻

蓮鬚

艾葉 蓮肉

山萸各一

當歸 熟地

茯苓各一  
兩

酒糊丸

鳳髓丹

黃柏

二錢

砂仁

一兩

甘草

五錢

朱苓

茯苓

蓮蓋

半夏

製

益智仁

各二錢半

芡實打糊丸

固真散

龍骨

韭子

各一錢

為末酒調下

遠志丸

茯神

去木皮

白茯苓

去皮

人參

龍齒

各一兩

遠志

去心

汁浸

石菖蒲

各一兩

為末蜜

丸桐子大

以辰砂為衣每服七十丸空心熱薑湯下

交感湯

茯神四兩香附一片蜜丸彈子大名交感湯若用此方加甘草少許為末熱湯調服則名交感湯治心腎不交遺泄能益氣清神降火升水

玉華白丹

鍾乳粉

練成者一兩

白石脂

淨瓦闊起

紅研細水飛

陽起石

用甘鍋於大火中煅令通紅

取出

出酒淬放陰地

令乾各半兩

升水

左顧牡蠣七錢洗用韭子搗汁鹽固濟火蝕取白者  
一二日以糯米粉煮糊為丸如芡實大入地坑出火毒一宿每服一粒空心濃煎人  
參湯放冷送下熟水亦得

固陽丸

黑附子炮兩三 川烏頭炮兩二 白龍骨一兩 補骨脂 舶上茴香 川棟子各一七錢兩  
為末酒糊丸如桐子大每服五十丸空心溫酒送下

猪苓丸

用半夏一兩破如豆大猪苓末二兩先將一半炒半夏色黃不令焦出火毒取半夏  
為末糊丸桐子大候乾更用前猪苓末一半同炒微裂入砂瓶內養之空心溫酒鹽  
湯下三四十九常服於申未間溫酒下半夏有利性而猪苓導水  
蓋腎開導氣使通之意也

茯神湯

茯神去皮一錢半 遠志心去一錢二分 酸棗仁炒各一分 石菖蒲 人參 白茯苓各一錢一 黃連  
生地黃各八分 當歸一錢酒洗 甘草四分 水二鍾蓮子七枚搘碎煎八分食前服

黃柏丸

川黃柏炒色 福

水丸

清心丸

黃柏一兩  
冰片一錢  
蜜丸每十九麥冬湯下

珍珠粉丸

黃柏皮  
新瓦上炒赤  
真蛤粉各一斤為末滴水丸桐子大每服百丸溫酒下一方加知母牡蠣各等分黃柏鹽酒製

秘真丸

龍骨  
一兩兩  
大訶子皮  
五枚  
縮砂仁半兩  
硃砂  
一兩研細留一方為衣  
鷄糊丸菉豆大每服二十九丸溫酒熟水任下不可多服

八仙丹

伏火硃砂  
真磁石  
赤石脂  
代赭石  
石中黃  
禹餘糧石  
乳香  
沒藥各兩  
右為末研勻極細糯米濃飲丸桐子大或菉大每服一粒空心鹽湯下

金鎖正元丹

五倍子八兩  
補骨脂  
酒浸炒十六兩  
肉蓯蓉  
洗  
紫巴戟  
去心  
葫蘆巴  
炒各一斤  
茯苓  
去皮六兩  
龍骨二兩  
硃砂  
三兩別研  
右為末入研藥令勻酒糊丸梧子大每二十丸空心鹽酒任下

龍膽肝湯

柴胡梢  
澤瀉  
錢一  
車前子  
木通各五  
當歸梢  
龍膽草  
生地黃  
各三分

右㕮咀水三大盞煎一盞空心稍熱服更以美餚壓之

封髓丹

黃柏 甘草 縮砂仁

陽痿

固真湯

升麻 柴胡 巷活 各一  
錢 判如麻豆大水三盞煎一盞稍熱空腹服更以美餚壓之

柴胡勝濕湯

澤瀉 升麻各一錢半 生甘草 黃柏酒製二錢 龍膽草 當歸稍 巷活 柴胡  
麻黃根 漢防已 茯苓各一錢半 紅花少許 五味子二十粒 右水三大盞煎一盞稍  
熱服食前忌酒濕麪房事

疝

當歸溫疝湯

當歸 白芍 附子 肉桂 延胡索 小茴香 川棟子 濤瀉 吳茱萸 白  
茯苓 水煎服

烏桂湯

川烏 蜂蜜 肉桂 白芍 炙甘草 生薑 大棗 水煎服

十味蒼柏散

蒼朮 黃柏 香附 青皮 益智 甘草 小茴香 南山楂 元胡索 桃仁

附子

茴捷五苓散

茴香 川楝子 五苓散見傷濕 鹽 葱

大黃皂刺湯

大黃 皂刺錢各三 酒煎服

奪命湯

吳茱萸君 肉桂 澤瀉 白茯苓

青木香丸

青木香五錢酒醋浸炒 吳茱萸一兩 香附一兩 莖澄茄 烏藥 小茴香各五錢 川楝

肉五錢用巴豆研碎拌炒 黃色去巴豆二十一枚 為末合勻葱涎為小丸每服三錢酒鹽任下立效能治

一切疝痛

茴香捷寶丸

川揀肉 小茴香 馬蘭花 芫花醋炒變色 山茱萸 吳茱萸 食茱萸 青皮

陳皮  
兩  
各一  
為末醋糊為小丸酒送二錢

羊肉湯

羊肉一斤  
薑五兩  
當歸三兩  
水八升煎三升服七合日二服

喝起湯

杜仲  
炒去絲  
蘆巴  
炒芝麻  
破故紙  
炒  
小茴  
浸鹽水  
草薢  
錢一  
個  
胡桃  
個  
鹽  
炒少許

救痛湯

肉蔻  
木香各五分  
三稜  
馬蘭花  
炒  
金鈴子  
茴香  
錢一  
痛時熱酒煎服

木香神效散

川楝  
三個  
巴豆  
二個同炒黃  
赤色去巴豆  
草薢  
分五  
石菖蒲  
青木香  
錢各一  
荔枝核  
個二  
麝

川楝  
三個  
巴豆  
六分  
鹽  
少許  
水酒各半煎

茄神散

猪苓  
澤瀉  
赤苓  
赤芍  
青皮  
小茴  
故紙  
川楝  
木通  
車前  
石葦

腹皮  
官桂  
檳榔  
香附  
急性子  
紅花子

七治金鈴丸

川楝子四十九個以斑貓巴豆肉各二十四個菜菔子二錢半各炒揀子七個去斑  
貓巴豆菜菔不用又以鹽一錢小茴故紙黑丑各二錢各炒揀子七個鹽小茴故紙

黑丑留用 外加大茴青木香廣木香辣桂各二錢五分酒糊丸鹽湯下三十九丸

脫肛

涼血清腸散

生地黃 當歸 茜藥各一錢二分 防風 升麻 荆芥各一錢 黃芩炒 黃連 香附炒 川芎 甘草各五錢 右水煎服

槐花散

槐花 槐角炒香黃各等分 右為末用羊血蘸藥炙熱食之以酒送下

薄荷散

薄荷 骨碎補 金櫻根 甘草 右水煎入酒一匙空心服

收腸養血和氣丸

白朮炒 當歸 白芍藥炒 川芎 槐角炒 山藥 蓬肉各一錢 人參七錢 龍骨煅 五倍子炒 赤石脂各五錢 右末之米糊丸如梧桐子大每服七十丸米飲送下

龍骨散

龍骨 詞子各半錢 没石子一枚 粟殼 赤石脂各二錢 右末之每服一錢米飲調下

瀉腸散

訶子 赤石脂

龍骨各等分

右末之臘茶少許和藥糁腸頭上綢帛揉入又以鼈

頭骨蝦少入枯礬為末入藥同上

磁石散

磁石

半兩火蝦  
醋淬七次

為末每服一錢空心米飲調下

喜笑不休

黃連解毒湯

黃連 黃柏 黃芩 山梔

驚

黃連安神丸

硃砂三錢半

黃連三錢

災甘草

當歸三分一錢

生地八分蜜丸燈心湯下

十味溫膽湯

半夏湯泡

枳實炒

陳皮去白二錢各

白茯苓去皮一錢半

酸棗仁

炒遠志去心一錢

草汁煮

甘草煮

五味子

熟地黃酒焙洗

人參去蘆一錢各

粉草三分五

水二鍾生薑五片紅棗一枚

煎一鍾不時服

養心湯

黃芪 茯神 茯苓 半夏 當歸 川芎各一  
錢半 遠志 桂仁 辣桂 柏仁

五味 人參各一  
錢半 火草分 水煎服如覺胸中有痰水停加檳榔赤茯苓

寒水石散

寒水石煅 滑石水飛各一  
兩 生甘草二錢半 右為末每服二錢熱則新汲水下寒則

薑棗湯下加龍胆少許尤佳

加味四七湯

半夏薑製二  
錢半 蘇葉 茯神各一  
錢半 白茯苓去皮一  
錢半 厚朴薑製一  
錢半 遠志去心甘  
草汁煮

粉草炙 石菖蒲各五  
分 生薑二片紅棗一枚水煎不時服

溫膽湯

半夏 枳實 竹茹各一  
錢 陳皮一  
五錢 火草分 茯苓分 水煎服

十四友丸

柏子仁另研 遠志湯浸去心  
酒洗蒸 酸棗仁炒香 紫石英明亮者 乾熟地黃 當歸酒

白茯苓去皮  
另研 茯神木 人參去  
蘆 黃芪蜜  
炙 阿膠蛤粉 肉桂去粗皮  
各一兩 龍齒二  
兩

辰砂另研 右為末煉蜜丸如桐子大每服三四十丸食後棗湯送下

鎮心丹

熟地黃 生地黃 山藥 天冬 麥冬去心 柏子仁 茯神各四兩  
方七兩 良砂另研  
為衣

桔梗炒各三兩

遠志去心三四兩

石菖蒲節審者十六兩

當歸去蘆十六兩

龍骨一兩

右為

細末煉蜜為丸如梧子大每服三四十丸空心米飲吞下溫酒亦得漸加至五十九

宜常服

又方

酸棗仁去皮炒二錢半

車前子去土二錢半

白茯苓去皮去心甘草煮蒸

麥門冬去心去皮

五味子

茯神木去皮肉桂

桂

去皮不見火各一兩二錢半

龍齒

熟地黃酒浸蒸

天門冬去心去皮

遠志去心甘草水煮

山藥薑汁製各一兩

人參去蘆各半兩

硃砂細研為衣各半兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九空心米湯溫酒任下

溫酒任下

遠志丸

遠志去心甘草煮汁淹

石菖蒲洛五錢

茯神木去皮

茯苓

人參

龍齒各一兩

右為末煉

蜜丸如桐子大辰砂為衣每服七十丸食後臨卧熟水下

悸

定志丸

人參一錢五錢

菖蒲

遠志

茯苓

茯神各一兩

硃砂

一錢

白朮

麥冬各五錢

蜜丸

恐

人參散

人參 枳殼 五味子 桂心 甘菊花 茯神 山茱萸 柑杞子各七錢半 杞子

仁 熟地黃各一兩 右為細末每服二錢溫酒調下

茯神散

茯神一兩 遠志 防風 細辛 白朮 前胡 人參 桂心 熟地黃 甘菊花

錢各七半 枳殼半兩 右為末每服三錢水一盞薑三片煎六分溫服

補胆防風湯

防風一錢 人參七分 細辛 芎窮 甘草 茯苓 獨活 前胡各八分 右為粗末

每服四六錢水一盞半棗二枚煎八分食前服

健忘

朱雀丸

茯神四兩 沉香香附一兩可代 蜜丸人參湯下

安神定志丸

人參一兩五錢 白朮 茯苓 茯神 遠志 石菖蒲 藜仁 麥冬各一兩 牛黃一錢

辰砂二錢五分 圓眼四兩 熬膏加煉蜜四兩為丸辰砂為衣每三十丸日三服

孔聖枕中丹

敗龜板

火

酥

研末入腹煮一宿雞

遠志

菖蒲

各分等

右為末每服酒調一錢日三服

茯苓湯

半夏

陳皮

茯苓

益智

香附

人參

各一錢

災草

五分

烏梅

個二

竹瀝

薑

汁

煩躁

梔子豉湯

梔子

十四枚

香豉

四合

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉取一升半去滓

分二服溫進一服得吐者止後服

竹葉石膏湯

竹葉

二把

石膏

一斤

人參

三分

災草

二兩

麥冬

一升

半夏

粳米各半升

加薑煎

竹茹湯

淡竹茹

一兩

水煎服

硃砂安神丸

硃砂

炒一錢水飛

黃連

淨酒炒一錢半

甘草

炙五分

生地黃

當歸頭

各一錢

右為極細末

蒸餅為丸如黃米大每服十九津下

麥門冬湯

麥冬去心  
七升 甘草炙  
兩 粳米三  
合 半夏一升 人參三  
兩 大棗十二  
枚 水一斗二升  
煎六升溫服一升日三夜一

## 妙香丸

巴豆三百十五粒  
皮心膜炒熟去 冰片 牛黃 脂粉 麻香各三  
兩 辰砂飛九  
兩 金箔九  
片

各研勻煉黃蠟六兩入白蜜三分同煉勻為丸每重一兩分作三十丸如治潮熱積熱傷寒結胸發黃狂走躁熱口乾面赤大小便不通煎大黃災甘草湯下一丸毒利下血煎黃連湯調脂粉少許下酒毒食毒茶毒氣毒風痰伏瘡吐逆等並用脂粉龍腦米飲下中毒吐血悶亂煩躁欲死者用生人血即乳汁下小兒百病驚癇涎潮搐搦用龍腦脂粉蜜湯下菉豆大二丸諸積食積熱煩赤煩躁睡卧不寧驚哭瀉利並用金銀薄荷湯下更量歲數加減大人及婦人因病傷寒時疾陰陽氣變結伏毒氣胃中喘躁眼赤潮發不定七八日已上至半月未安醫所不明證候脈息交亂者可服一丸或分作二丸並用龍腦脂粉米飲調半盞下後仍將此丸拾起水洗淨以油單紙裹埋入地中五日取出可再與一丸可用三次如要藥速行用針刺一孔子冷水浸少時服

## 三物黃芩湯

黃芩五  
錢 苦參一  
兩 生地黃二  
兩 水四升煮取一升溫服多吐下蟲

不得卧

酸棗仁湯

棗仁二兩 甘草一兩 知母 茶芩 川芎各一兩

狂癲癇

生鐵落飲

生鐵四十片燒紅砧上鍛之有花隨地名鐵落用水二斗煮取一斗入後藥

石膏三兩

龍齒研

白茯苓去皮去蘆各半兩

防風去蘆各一兩半

玄參 秦艽各一兩

右為粗散入

鐵汁中煮取五升去渣入竹瀝一升和勻溫服二合無時日五服

抱膽丸

水銀二兩

硃砂一兩細研

黑鉛半兩

乳香一兩研細

右將黑鉛入銚子內下水銀結成

砂子次下硃砂乳香乘熱用柳木槌研勻丸雞頭大每服一丸空心井花水吞下病者得時切莫驚動覺來即安再一丸可除根

甯志膏

人參 酸棗仁各一兩

辰砂五錢

乳香二錢半

為細末煉蜜和丸如彈子大每服一

丸薄荷湯下

一醉膏

用無灰酒二盃香油四兩和勻用楊柳枝二十條逐條攬一二百下候油與酒相入成膏煎至八分灌之熟睡則醒或吐下即安矣

靈苑辰砂散

辰砂

一兩須光明  
有牆壁者

酸棗仁

半兩  
微炒

亂香

半兩光  
瑩者

右量所患人飲酒幾何先令恣

飲沉醉但勿令吐至靜室中以前藥都作一服溫酒調一盞令頓飲如飲酒素少人但令隨量取醉服藥訖便令卧病淺者半日至一日病深者三兩日令家人潛伺之鼻息調勻且勿喚覺亦不可驚觸使覺待其自醒即神魂定矣萬一驚寤不可復治吳正肅公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥

壽星丸

天南星一斤掘坑深二尺用炭火五斤於坑內燒紅取出炭掃淨用酒一升澆之將南星趁熱下坑內用盆急蓋訖泥壅合經一宿取出再焙乾為末

琥珀

四兩另研

硃砂

一兩研飛以  
一半為衣

右和勻猪心血三個生薑汁打麪糊攬令稠粘將心血和入藥末丸如桐子大每服五十九煎人參湯空心送下日三服

天門冬地黃膏

天門冬十斤湯浸

生地黃

肥淨者三十斤

右二味安木臼內搗一二千杵取其汁再入

溫湯更搗又取其汁不論幾次直待二藥無味方止以文武火熬成膏子盛磁器內

每服一匙溫酒化下無時日進三服

妙功丸

丁香 木香 沉香各半 乳香研 麝香研另 熊膽各二  
四錢 半錢 雄黃研 青皮去白 黃芩 胡黃連各半 黃連  
甘草炙 蓬莪茂 陳皮去白 雷丸 鶴虱各一 大黃一兩  
巴豆七粒去皮膜油 右為細末蕎麪一兩半作糊和勻每兩作十丸硃砂飛過一兩為  
衣陰乾每服一丸用溫水浸一宿去水再用溫水化開空心服之小兒量減服十年  
病一服即愈若未愈三五日再服重者不過三服

牛黃丸

牛黃研 麝香各半 虎睛一對 蜈蚣去頭足翅 肩角肩 安息香 獨活去蘆 茯神  
遠志心去木 研各半 甘草炙各一兩 防風去蘆一兩半 人參去蘆 鐵粉研 硫砂水飛 龍齒各二  
右為細末同研令勻煉蜜和丸搗五百下丸如梧子大每服三十丸荆芥湯  
研兩 下無時

楊氏五癇丸

白附子半兩 炮半夏二兩 汤洗 皂角二兩搗碎用水半升搗汁去生  
烏蛇酒浸各全蝎炒二錢 蜈蚣條 白僵蠶炒一兩半 硫砂三字 硫砂二錢  
研半水

飛為細末生薑汁煮麪糊丸如桐子大每服三十丸溫生薑湯送下食後服

五癇通明丸

用羊肝一具 肥牙皂一斤去筋皮水三盞同羊肝煮乾去肝將牙皂焙乾為末 半夏六兩每個切四塊 箭頭硃砂一兩五錢同半夏炒黃色去硃砂 南星生二兩 黑牽牛二兩微炒 共為末薑汁丸硃砂為衣每七十丸薑湯下忌魚雞母豬牛羊等肉

七方

大方 有君一臣三佐九之大方

病勢大而邪不一不可  
以一二味治者宜之

有分兩大而頓服之大方

肝腎及下部病者宜之  
徐師則力微勢緩才到下部即散故必大劑急啜

乃能及  
下也

小方 有君一臣二之小方

病小無兼  
証者宜之

有分兩少而徐呷之小方

心肺及上部  
病者宜之

緩方 有甘以緩之之緩方

甘草飴  
蜜之屬

有以丸緩之之緩方

丸之行比  
湯散爲遲

有品味衆多之緩方

品衆則遞相拘制  
不得各驛其性

有無毒治病之緩方

無毒則性  
純而功緩

有氣味俱薄之緩方

氣味俱薄則  
力弱故功緩

急方 有急病急攻之急方

如中風卒厥用  
通關散之類

有毒藥之急方

毒性上通下  
瀉以奪病勢

有氣味俱厚之急方

氣味俱厚則  
力猛行急

按小而兼緩病在上部而緩者宜之大而兼急病在下部而急者宜之小而兼急

病在上部而急者宜之大而兼緩病在下部而緩者宜之又病大者宜大小者宜小治主宜緩治客宜急各有攸當

奇方 有獨用一物之奇方 有合奇數一三五七九之奇方

偶方 有二味相配之偶方

有合偶數二四六八十之偶方

有二方相合之偶方

按王太僕云汗須以偶氣乃足以外發下須以奇乃不致攻伐大過其義蓋以奇為小方偶為大方小方治近在藏府大方治遠在皮毛也然則奇偶即大小二方耳而復立此者蓋亦有奇大於偶者故又立此二方以見治法之變動不居耳然不必泥觀仲景桂枝湯汗以五味大承氣湯下以四味可見矣

複方 王太僕以複方即偶方謬也當依後人二方相合為偶數方相合為複之說又張子和引內經奇之不去則偶之偶之不去則反佐以取之之說以解複方謂複乃反覆之義蓋奇之不去則反用偶方偶之不去則復用反佐反覆重疊以治其病也亦通

十劑徐之才

宣可去壅壅上壅也病在膈上如氣上壅而嘔瀉用薑倍藿香以宣散之痰壅上膈用瓜蒂等以宣吐之中風口噤胸膈迷悶用通闢散以嚏之皆是上

通可去滯但滯耳未至上壅也如氣滯用木香橘榔水滯用木通防已鬱滯用香附  
兼中下二部言也

補可去弱精弱以熟地蓴蓉羊肉補

泄可去閉泄但行之滯耳閉則竟不行矣如小便閉用葶苈大便閉用硝黃之類

輕可去實如表邪實用麻黃湯香

重可去怯如氣怯神浮用硃砂鎮之之類

滑可去着着粘着也因藏府乾澀有所粘着而不行惟滑可以去

澀可去脫脫用五味烏梅精脫用蓮蕊血脫用地榆之類

燥可去濕如溼盛用桑菊芩寒溼薑附胡椒氣溼蒼朮白朮溼痰半夏南星蛤粉溼熱黃連黃柏山梔之類

溼可去枯枯燥可去

### 服藥法則

急服 有通口直飲重劑治下

緩服 有趕熱徐徐小飲治肺病宜之

冷服 有寒劑冷服治大熱病宜之

熱服 有熱劑熱服治大寒病宜之

溫服 有補藥溫服取溫補氣

醫編 卷七 方後附錄

有趁熱蓮飲輕劑偶劑

有不用氣隨津自下治咽喉病宜之

有熱劑冷服治假熱病宜之

有平藥溫服病不犯大寒者宜之

上海千頃堂印行

空心服 有五更空心服

病在腎肝宜取其再睡一番藥入腎肝

有空心

服後即壓以食

治腎恐妨肺者宜治命

食後服 有食後即服

病在胸膈者宜

有食遠方服

病在中脘者宜或病在胸膈用峻下藥恐飲食方在胃口下早致胸結者

臨卧服 有服後正卧

病在胸膈者宜有積者宜

有服後左右側卧

病在左右筋使藥直至病所

有服後

去枕臥

病在肺及在膈以上者宜

一二滾服

發散治病者宜于陰中引提陽氣宜補

百十滾服

溫補治中脘病者宜

濃煎服

治下部病者宜

己未午初服

中益氣湯提瘡湯皆是

### 煎藥用水歌

急流性速堪通便宜吐廻瀉水

即逆流水

最宜百沸氣騰能取汗甘瀉勞水意同之

杓揚

萬偏名甘瀉水又名勞水

黃瀉水吐痰和食霍亂陰陽水可醫

見霍亂

新汲無根皆取井

將旦首汲

無時首汲曰新汲水出甃未放曰無根水

除煩去熱補陰施地漿解毒兼清暑

掘牆陰黃土以水入坎中攬取漿澄清用臘雪

寒冰治疫奇更有一般蒸汗水

如蒸酒法蒸水以管接取倒汗用之

奇功千古少人知功堪汗吐何須

說滋水清全理更微

而肺熱而腎涸清全則津液下澤此氣化為水天氣為雨也腎涸

水化為氣氣復化水有循環相生之妙用之最精