

景岳全書卷之三十五天集

雜證謨

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

諸虫

經義

厥病篇曰腸中有虫瘕及蛟蛭皆不可取以小鍼心腸痛懷作

痛腫聚往來上下行痛有休止腹熱喜渴涎出者是蛟蛭也

以手按聚而堅持之無令得移以大鍼刺之从持之虫不動

乃出鍼也悉腹脹痛形中上者

口問篇帝曰人之涎下者何氣使然岐伯曰飲食者皆入於胃
胃中有熱則虫動虫動則胃緩胃緩則廉泉開故涎下補足
少陰

五癆津液別篇曰中熱則胃中消穀消穀則虫上下作腸胃克
郭故胃緩胃緩則氣逆故唾出

上膈篇曰氣爲上膈者食飲入而還出蟲爲下膈下膈者食辟

時乃出

詳噎膈門

氣交變大論曰歲木不及收殺氣行寒雨害物蟲食其黃脾土

受邪○歲土不及復則收政嚴峻名木蒼凋蟲食其黃氣客於脾

論疾診尺篇曰肘後麤以下三四寸熱者腸中有蟲

邪氣臟腑病形篇曰脾脉微滑爲蟲毒蝟蝎腹熱

論證 共三條

虫之爲病人多有之由於化生誠爲莫測在古方書雖曰由濕由熱由口腹不節由食飲停積而生是固皆有之矣然以常見驗之則凡藏強氣盛者未聞其有虫正以隨食隨化虫自難存而虫能爲患者終是臟氣之弱行化之遲所以停聚而

漸致生虫耳然則或由濕熱或由生冷或由肥甘或由滯膩
皆可生虫非獨濕熱已也然以數者之中又惟生冷生虫爲
最卽如收藏諸物但着生水或近陰濕則最易蛀腐非其義
乎故凡欲愛養小兒極當節其水菓以防敗脾此實緊要之
一端也至若治虫之法雖當去虫而欲治生虫之本以杜其
源猶當以溫養脾腎元氣爲主但使臟氣陽強非惟虫不能
留亦自不能生也余製有溫臟丸方最所宜也

一虫之爲病其類不一或由漸而甚或由少而多及其久而爲
害則爲腹痛食減漸至羸瘠而危者有之凡虫痛證必時作

時止來去無定或嘔吐青黃綠水或吐出虫或痛而坐臥不安或大痛不可忍面色或青或黃或白而唇則紅然痛定則能飲食者便是虫積之證速宜逐之

本事方云心虫曰蛔脾虫曰寸白腎虫如寸截絲縷肝虫如爛杏肺虫如蠶皆能殺人惟肺虫爲急肺虫居肺葉之內蝕人肺系故成瘵疾咯血聲嘶藥所不到治之爲難

論治 共四條

治虫之劑凡虫勢驟急上攻心腹作痛者宜掃虫煎先治其標
○若虫積堅固者宜獵虫丸遇仙丹木香檳榔丸百順丸之

類主之○若稍緩而質弱者宜蕪蕪散化虫散之類主之

丹溪云打虫方用棟樹根槿榔鶴虱夏取汁冬濃煎飲之又

萬應丸最妙

一治虫之法按丹溪云上半月虫頭向上易治下半月虫頭向
下難治先以肉汁或糖蜜引虫頭向上然後用藥此皆法之
善者然此惟緩治之法耳然虫證甚急又安能必待其時乎
且以望前望後辨虫頭亦若渺茫無據惟先用香餌而虫頭
可引豈非望後之治亦自有法又何慮其難治也

徐東臯云治虫之方固多而用之者不知其法則亦不能下虫

如丹溪云虫頭向下之時必須俟其向上法當行於月半之前也若虫得食則不食藥亦不能下虫而徒瀉其虛也故雖有方不知其法則方亦不效凡欲下虫必先一日不食而使虫饑次早五更用油煎肉嚼之良久腹內虫聞肉香頭皆向上而欲食乃以雞蛋煎餅和藥嚼而食之須臾服葱湯或白水少少以助藥力下行不踰時而虫俱下甚至數升然後以白粥補之隨服補劑調理脾胃而疾可悉愈

一驗治法昔一人患心腹大痛或止或作痛不可忍凡用去積行氣等藥百方不效但於痛極時須用拳槌之痛得少止而

旋止旋作久不能愈日加困弊莫測其故忽一胡僧見之曰
余能治也遂令病者先食香餌繼進一九打下一硬嘴異虫
遂愈此因虫嚙腸臟所以痛極槌之則五內震動虫亦畏而
歛伏不槌則虫得自由所以復作此亦驗虫奇法故凡見心
腹痛證但用揉按重捻而痛得暫止者多有因虫而然也

蛭虫 共五條

凡諸虫之中惟蛭虫最多其逐治之法總若前條然旋逐旋生
終非善策欲杜其源必須溫養脾胃胃氣強虫自不生矣
故凡於逐虫之後或於未逐之先若欲調補脾腎則如婦人

湯溫胃飲五君子煎理中湯或理陰煎之屬皆所宜也若欲兼重而治之則惟溫臟丸爲最善凡治重之法或攻或補自有緩急先後之宜所當詳辨不可任意忽畧也

巢氏病源曰凡腹中痛其脉法當沉弱今脉反洪大者是蛻虫也

醫餘曰蛻虫亦九虫之數人腹中皆有之小兒失乳而哺早或食甜食過多胃虛而熱生虫令人腹痛惡心口吐清水腹上青筋用火煨史君子與食以殼煎湯送下甚妙然世人多於臨臥服之又無日分多不驗惟月初四五裏五更而服之至

日午前虫盡下可用溫平和胃藥調理一二日凡虫在腹中
月上旬頭向上中旬橫之下旬頭向下故中旬下旬用藥則
不入虫口所以不驗也牛馬之生子上旬生者行在母前中
旬生者並肩而行下旬生者後隨之猫之食鼠亦然天地自
然之理物皆由之而莫知之

傷寒門有吐虵厥證治○嘔吐門有吐虵治法并吐虵治按
○腫脹門有孫一奎虵虫按俱當參閱

外臺用苦楝湯治虵虫

寸白虫 共三條

此虫長寸許色白其狀如蛆母子相生有獨行者有箇箇相接
不斷者故能長至三二丈○治寸白虫無如梘子煎其效如

神

本事方云用良方錫灰蕪荑楨榔者極佳五更服則虫盡下以
此爲末用石榴根煎汁送下三錢或丸服亦可

庚志云趙子山字景高寓居邵武軍天王寺苦寸白虫爲患醫
者咸云是疾當止酒然以素所耽嗜欲罷不能一夕醉於外
舍至夜半口乾舌燥倉卒無湯飲適見廊廡下有甕水月色
下照瑩然可掬卽酌而飲之甚甘如飴連飲數酌乃就寢迨

曉虫出盈席覺心腹頓寬宿疾遂愈一家皆驚異驗其所飲
蓋寺僕日織草履浸紅藤根水也

小兒疳虫名曰疳蠶

小兒疳蠶亦由飲食過傷致成疳積身熱腹大面黃四肢無力
昏睡鼻爛汁臭齒齦生瘡或下利黑血皆腹中有虫故也宜
九味蘆薈丸追虫丸四味肥兒丸七味肥兒丸蟾蜍丸之類
至之虫去之後仍當調補氣血

應聲虫 共二條

泊宅編云水州通判聽軍員毛景得奇疾每語喉中必有物作

聲相應有道人教令誦本草藥名至藍而默然遂取藍搗汁飲之少頃吐出肉塊長一寸餘人形悉具自後無聲

陳正敏遜齋閑覽載楊勗中年得異疾每發言應答腹中有小聲效之數年間其聲漸大有道人見而驚曰此應聲虫也久不治延及妻子宜讀本草遇虫不應者當取服之勗如言讀至雷丸虫無聲乃頓服之遂愈後正敏至長沙遇一丐者亦有是疾環而觀之者甚衆因教服雷丸丐者亦愈

九虫

千金要方云人腹中生虫大率有九皆能食人臟腑○一日伏

虫長四分群虫之主也○二日虻虫長一尺生發多則貫心而殺人○三日白虫長一寸子孫相生其母轉大長至四五丈亦能殺人○四日內虫狀如爛杏令人煩滿○五日肺虫狀如蠶令人欬嗽○六日胃虫狀如蝦蟇令人嘔吐胃逆喜噦○七日弱虫又名膈虫狀如瓜瓣令人多唾○八日赤虫狀如生肉令人腸鳴○九日蟻虫至細微形如菜虫居廣腸之間多則爲痔劇則爲癩因人瘡痍卽生諸癰疽癬癩癩疥齧虫無所不爲其害匪細○凡此諸虫大則依附臟腑之間小則侵蝕肌膚之內若元氣尚實未爲大害稍有虛損遂肆

其毒甚至如勞瘵殺人及傳屍症怪或應聲豁鼠之類而非
理之可測者多矣業醫者不可不究其所致之本及治之之
法也

狐惑 共二條

仲景曰狐惑之爲病狀如傷寒默默欲眠目不得閉起臥不安
蝕於喉爲惑蝕於陰爲狐不欲飲食惡聞食臭其面目乍赤
乍白乍黑蝕於上部則聲啞甘草瀉心湯主之○蝕於下部
則咽乾苦參湯洗之○蝕於肛者雄黃薰之○愚按此仲景
云狐惑之爲病狀如傷寒則可見本非傷寒也而後世卽以

狐惑爲傷寒者豈非誤乎

千金要方曰凡得傷寒及天行熱病腹中有熱又食少腸胃空虛三虫行作求食蝕人五臟及下部若齒斷無色舌上盡白甚者唇裏有瘡四肢沉重忽忽喜眠當數看其上唇內有瘡唾血唇內如粟瘡者心內懊懺痛悶此虫在上蝕其五臟下唇內生瘡者其人喜眠此虫在下蝕其下部人不能知可服此餌虫藥不爾蠶虫殺人○又曰凡患濕蠶者多是熱病後或久瀉不止或有客熱結在腹中或易水土溫涼氣著多生此病亦有乾蠶不甚瀉痢而下部瘡癢不問乾濕久則殺人

凡濕得冷則若痢單煮黃連及艾葉苦參之屬皆可用之若
病人齒斷無色舌上白者或喜眠煩憤不知痛癢處或下痢
急治下部不曉此者但攻其上不以下部爲意下部生虫虫
蝕其肛肛爛見五臟便死燒艾於竹筒薰之

諸虫方

一傳屍勞瘵未甚者宜早用神授散 因二五五

一蠶虫內蝕下部生瘡宜雄黃兌散主之 因二五七

一大孔虫癢方 因二五八

一銀硃烟用治膚腠諸虫無不神妙 新因五三

諸蟲論列方

掃蟲煎 新和十
四

獵蟲丸 新攻五

蕪荑散 和三一
九

追蟲丸 攻九七

化蟲散 攻九八

五君子煎 新熱六

白順丸 新攻六

苦棟湯 攻四七

榧子煎 和一二

甘草瀉心湯 寒二
八

溫臟丸 新熱二
四

蟾蜍丸 小一二
三

四味肥兒丸 小百
十一

理中湯 熱一

理陰煎 新熱三

七味肥兒丸 小百
三

溫胃飲 新熱五

歸脾湯 補三三

九味蘆薈丸 小百十

萬應丸 攻九九

遇仙丹 攻五一

木香檳榔丸 攻四九

論外備用方

聖效方 和三二二寸白虫

妙應丸 攻百殺虫

直指蕪荑散 和三百二十取虫

仲景烏梅丸 和三二三胃寒吐蛻

附靈毒

諸毒

論飲食諸毒

風俗通曰禽獸自死者俱有毒不可食○魚無腮者有毒腮大者亦有毒○蟹肚下有紅藻紋者有毒○蟹腹下有毛者有毒○煮酒初出火者有毒江南謂之火頭酒飲之則生痔溢血○夏月飲食但過宿者卽有毒○夏月酒在銅錫器中過夜卽有毒○銅器蓋熟食氣上蒸成汗滴下食中卽有毒○炊湯過宿飲之有毒盥洗則生疥○桃杏仁雙仁者毒能殺人○果未成核者俱有毒令人發瘡癩○夏秋果熟落地蟲緣者有毒人食之作漏○屋漏水有毒人食之有脹而死者用之沐手則生浸淫之疥屢驗○澤中死水有毒飲之令人

生瘕○湯池中溫泉水不可飲令人脹悶惟澡浴可以疎風
愈疥癩蓋其泉自硫黃中出故溫也患疥者宜飽食入浴之
連日數次汗透而愈體虛者不可輕浴

解一切飲食諸毒

芝麻油總能解一切飲食諸毒不可不知凡造餠饌必先用真
麻油於淨鍋熬熟却下肉炒過然後入清水煮之則並不犯
毒今徽州池州地方食牛肉不論春夏無日不食惟製之有
方所以鮮有中毒但犯一切飲食毒者卽用麻油一二杯飲
之得吐卽毒釋而無不愈者

全書卷三五
雜語
一解飲食中毒共十五方俱載古方因陣中自二百七起至二

二一止

一善解毒者無如火蓋火能革物之性

解一切藥毒

凡解諸藥毒者宜以薺苋汁白扁豆汁綠豆汁甘草汁錫糖汁
米糖汁蠶退紙燒灰隨使用之俱可解

凡解毒藥湯劑不可熱服宜涼飲之蓋毒得熱而勢愈盛也雖
然此特以熱毒爲言耳若解木鱉菌蕈黃連石膏之類以中

陰毒者豈仍避熱而猶堪以寒飲乎此有醫按在嘔吐門當

兼察之

解毒藥共十四方俱載古方因陣中自一二一起至二三五止

解諸毒通用簡易方

一方 雄黃青黛等分爲末新汲水調服

一方 揀淨土地掘窟用井水傾入攪澄清多飲則愈

一方 晉礬建茶等分爲末新汲水調服三錢吐卽效不吐再

服

一方 黃連甘草節二味水煎涼服不拘多少

一方 薺危黑豆甘草咬咀每用一兩水二盞煎一盞溫服未
效再服

一方 白扁豆生爲末水調服二三錢

一方 伏龍肝爲細末凉水調三四錢攪動服之吐者再一服

心土

解一切虫獸毒

凡虎傷犬傷蛇蝎蜈蚣水蛭之類皆是也共二十三方俱載古
方因陣中自二三六起至二五八止

重鹽毒

蠱之爲毒中土少見之世傳廣粵深山之人於端午日以毒蛇
蜈蚣蝦蟆三物同器盛之任其互相吞食俟一物服存者則
以爲蠱又謂之桃生凡欲害人密置其蠱於飲食中人中其
毒必心腹痠痛如有蠱嚙吐下皆如爛絮若不卽治食人五
臟而死亦有十餘日而死者更有緩者待以歲月氣血羸億
食盡五臟而後死

一說兩廣山谷間有草曰胡蔓草又名斷腸草若人以急水吞
之則急死以緩水吞之則緩死今見荆楚之地有曰鼠莽草
者人食之則毒死意卽胡蔓草也

一說嶺南人取毒蛇殺之以草覆之以水酒之數日菌生取菌
爲末酒調以毒人始亦無患再後飲酒則毒作而死其俗淫
婦多自合比人日久情好又不肯逐人歸乃陰以毒投飲食
中比人歸則戒之曰子去幾時還若從其言則復以藥解之
若過期不往則死矣名曰定年蠱比人至彼宜預防之須備
解毒丹之類隨身勿忘凡稍覺飲食之後四大不調宜卽服
解藥若不預識其機備有藥餌恐一時倉卒不救所謂有備
無患重生者不可忽也

驗蠱毒法

遯齋閑覽云海南魚有石首蓋魚枕也取其石爲器可盛飲食
如遇蠱毒器必爆裂其效甚著閩人製作最精人但玩其色
而鮮有識其用者

一驗蠱之法唾津在淨水中沉則是浮則非

又法口含大豆中蠱者豆卽脹而皮脫無蠱者豆不脹脫

又法煮雞蛋一枚去殼以銀簪一隻插入其中併含入口內一
飲之頃取視簪卽俱黑卽爲中蠱

孫真人曰凡中蠱者嚼生黑豆不腥噉白礬而味反其者皆中

蠱也

蠱證

直指云中蠱之候面目青黃力乏身痛唇口焦乾眉鬚脫落煩躁悶脅胸腹痞滿肚脹皮堅腹中切痛如虫嚙又如虫行唾吐鮮血小便淋瀝大便膿血病人所食之物皆變而爲虫侵蝕臟腑傷甚則死死則毒氣流注復染他人所謂蠱症

蠱脉

脉緊數如釵股弦直而吐甚者此中蠱毒也急治之○中蠱脉洪大者生微細者死

防蠱

凡入有蠱之鄉所用飲食但以犀角攪試有毒則白沫竦起無沫卽無毒也若自幼時食豬肉者則毒不能爲害

知禁忌

凡中蠱者但能記何物之中中毒須終身再不食此物犯之則毒作若用藥而愈自後飲食永不可喫冷喫冷則蠱毒復生竟不能救

反蠱及主法

衛生云凡入蠱鄉見人家門限屋梁絕無灰塵潔淨者其家必蓄蠱當用心防之如不得已喫其飲食卽潛於初下筋時收

藏一片在手儘喫不妨少頃却將手藏之物潛埋於人行十字路下則蠱神反於本家作鬧蠱主必反來懇求或食時讓主先動筋或明問主人云莫有蠱麼以筋築卓而後食如是則蠱皆不能爲害此皆驗於蠱鄉云

治蠱大法有二

胸膈痛脹則毒在上焦宜吐之○法以熱水半盞投入膽礬末五分通口服少頃以鷺翎探吐毒物出盡自愈或服升麻湯探而吐之亦妙

腹痛脹爲毒在下焦宜瀉之○法以鬱金末二錢米湯調下空

腹取瀉惡毒盡爲妙瀉後以四君子湯服二三劑調理愼忌

口

咒語破蠱法

大藏經云治蠱毒挑生毒有咒法凡人在外飲食先默誦咒七遍其毒自不爲害○咒曰姑蘇琢磨耶吾知蠱毒生四角父是穹隆穹母是舍耶女眷屬百千萬吾今悉知汝摩訶薩摩訶薩○凡見飲食上有蛛絲便莫喫○又法每遇所到處念藥王萬福七遍亦可避

灸蠱毒法

凡灸一切蠱毒於兩足小指盡處各灸二壯卽有物出
隨酒出飲食中者隨飲食出屢驗

解一切中惡邪祟鬼毒

凡卒時中惡垂死者宜硃砂丸急服之方在攻陣百三

凡遭一切鬼祟鬼瘥等毒者急與八毒赤丸攻之方在攻陣百

四

凡中惡心腹脹痛大便不通及飛尸鬼擊等急證惟外臺走馬
湯最捷最妙方在攻陣百十三

治蠱毒方

丹砂丸

因二百六十

雄射散

因二五九

萬病解毒丹

因二百二

七寶丸

因二六一

蜜髓煎

因二六二

桃生蠱毒易簡方

因二六五

解毒散

因二四四

歸魂散

因二六三

三因解毒丸

因二百三

麥麩散

因二六四