


續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書



上海古籍出版社

一〇〇九・子部・醫家類

幼幼新書四十卷拾遺方一卷（卷十七至卷四十）〔宋〕劉昉等編……………一

新刊演山省翁活幼口議二十卷〔元〕曾世榮撰……………四〇一

嬰童百問十卷〔明〕魯伯嗣撰……………四九九

幼幼新書卷第十七 寒熱瘧瘵 凡廿二門

後學古吳陳履端于始輯

長洲趙起鳳伯羽校

痰實第一

巢氏云兒飲乳冷熱不調停積胃隔間結聚成痰多則飲乳不下吐涎沫變結而微壯熱不止發驚癇千金治痰實結聚宿癖羸露不能飲食真珠丸

真珠兩半 麥門冬兩一 麩仁去皮二 巴豆枚卅

末蜜丸替歲兒二九如小豆二百日如麻子漸增

幼幼新書 卷十七

知為度下赤黃白黑葵汁病盡自止久服肥白

治熱結痰實不食

芍藥 梔子 知母 大黃各二

柴胡二兩 升麻 黃連 黃芩各二

竹葉切升 桔梗兩 細辛十

改咀水六升煮升八合分四服十歲作三服外臺

有枳實杏仁各兩半無桔梗黃連

經驗治痰實久癇纏喉風輟嗽遍身風疹急中涎潮

等此不大吐只出涎

瓜蒂不拘

細末壯年一字十五以下氣怯半字早晨并華水

下須含砂糖一塊良久涎出年深涎盡有一塊布

水上如鑑涎盡食粥一二日吐多困甚即細研麝

溫水調嚥止

聖惠陳橘皮散治痰雍結實欲嘔

陳橘皮焙去白 桑白皮 麥門冬焙各 川大黃炒

前胡 川升麻各

粗散一錢水一盞煎五分不時量溫服

幼幼新書 卷十七

治痰實心胃不利欲嘔前胡散

前胡兩半 貝母煨 白朮 桑白皮

人參各一 陳橘皮去白焙

粗散一錢水一盞煎五分不時溫服

芒硝丸治痰實往來寒熱不飲食肌體羸瘦

川芒硝 川大黃炒 代赭各半 半夏浸去

甘遂炒各 杏仁十粒

羅末蜜丸如菜豆空心溫水下

靈苑犀角丸治痰實結滯時發寒熱胃中涎壅及哮

呷喘急煩躁不眠

犀角錢 白朮 桔梗 陳皮錢一

金銀箔各三片水銀一錢結砂 巴豆三粒棗殼香

研煉蜜丸如小豆服一二九薄荷水研量增

張渙消宿食痰滯香橘皮湯

陳橘去白 木香各一兩 草豆蔻殼麩 白朮炮

牽牛子 薑黃各半兩

羅末滴水丸如黍葱白湯下十粒大小便澀乳前服

幼幼新書 卷十七 三

保生治膈實氣痞痰盛喘促道暹丸

半夏洗七次 枳實炒 檳榔 赤茯苓各一兩

細末薑汁麵糊丸菜豆大服二三十丸荆芥湯送

下兒小丸

丁時發黑散子治涎壅欬吐逆

天南星 半夏 猪牙皂角 巴豆

白礬等分

瓦罐煨存性薑汁調半錢或麥門冬桑皮蜜湯下

鄭愈壞涎丸治咽喉涎鳴如鋸魚傷寒身熱面赤

半夏二錢薑汁作餅慢火炙 粉霜 鉛白霜

巴豆霜 雄黃 蝎梢各半錢

末麵糊丸如黍服五丸燈心湯化涎未下再投燈

心湯即吐如取涎連三服即瀉次補

寒熱往來第二

東氏風邪外客皮膚膏痰飲內漬藏府致血氣不和陰

陽更相乘剋陽勝則熱陰勝則寒陰陽之氣為邪所

乘邪與正相干陰陽交爭時發時止故寒熱往來

幼幼新書 卷十七 四

張渙寒熱往來甚者漸羸痰實壯熱不除變驚癇夏

傷于暑至秋成瘧

寶鑑歌

邪入皮膚裏還歸藏府巡陰陽多爭鬪寒熱往

來頻

千金治乍寒乍熱

細切柳枝煮汁浴若渴絞冬瓜汁服

水鑑石室秘方兒百日内忽寒熱與冷藥即乳寒嘔

逆與熱藥病加甚

桃花蔭末一錢餘甘草充湯力更殊藍花只消

一兩字乾陰灌之八口立消除湯

聖惠柴胡散治寒熱往來面色痿黃

柴胡十兩 石膏兩 川大黃炒 麻黃去根

秦艽 常山各一

粗散一錢水一盞煎五分溫日三服

醫局小柴胡湯治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急

胃滿脅痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利

大便秘鞭或過經未解或潮熱不除差後勞復發熱

幼幼新書 卷十七 五

頭痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如癘發作

有時及產後傷風頭痛煩熱

柴胡斤半 黃芩 人參 甘草各

半夏湯洗七次

粗末三大錢水盞半薑五片棗一個擘煎七分稍

熱不時分二服

張渙秦艽湯

秦艽 蠶甲醋炙黃 川大黃炒 麻黃去根

竹茹 甘草各

粗散一錢水一盞葱白二寸煎五分溫服

人參柴胡散

人參 前胡 柴胡各 桔梗

地骨皮 甘草各 半夏洗七次

細末一大錢水一盞薑二片煎半盞溫服

芍藥湯

赤芍藥 黃芩 當歸焙 柴胡各半

肉桂 甘草各

細末一錢水八分一盞薑二片棗一枚煎五分去

幼幼新書 卷十七 六

澤溫服

寒熱五歲煩滿第三

葉氏風客皮膚痰漬歲府致血氣不和陰陽交爭故

寒熱往來熱乘五歲氣積不泄而煩滿

王訣寒熱虛積歌

頻頻發熱歲中圖有積因傷未退除煩赤口瘡

多躁渴痰生不食胃還虛

先調氣次取虛積下涎後補虛

先調氣次解虛熱有熱不去真珠丸取

真珠丸治五藏煩滿及下風涎積滯驚食疳積

南星 半夏 滑石各二錢 輕粉七錢

巴豆霜二七粒

末麵糊九芥子大服一二十九葱湯吞

寒熱腹痛第四

巢氏風客皮膚痰漬藏府血氣不和則陰陽交爭故寒熱往來而藏虛本挾宿寒邪入于藏與寒相搏而擊藏氣故腹痛

聖惠赤芍藥散

幼幼新書 卷十七

赤芍藥 當歸炒 寒水石 甘草炙

黃芩各半兩 桂心一兩

粗散一錢水小盞生地黃半分煎五分不時溫服

馬通粟丸治脅下氣塊腹痛喘逆氣息往來寒熱羸瘦不食

馬通內粟 細辛 杏仁炒 紫苑各三分

石膏 五味子 秦艽 白茯苓

半夏各一分

羅末煉蜜丸如麻子粥飲下五九日三

寒熱結實第五

巢氏風邪客皮膚痰飲漬府藏使血氣不和陰陽交爭則發寒熱而藏氣本實後為寒熱所乘則積氣在內使胃脅心腹煩熱而滿大便苦難小便赤澀千金兒連連壯熱實滯不去寒熱往來微驚悸

大黃兩一 豨薟根 甘草炙 黃芩各十錢

滑石兩二 桂心 牡蠣 人參

龍骨 凝水石 白石脂 消石各半兩

吹咀水四升煮升半服三合一日夜令盡雖吐亦

幼幼新書 卷十七

與一紫石英半兩

聖惠柴胡丸治寒熱結實或熱攻衝心膈氣急晝夜有汗日漸消瘦不吃乳食

柴胡 川大黃 鼈甲醋炙淨 赤茯苓

人參 木香 桂心 枳殼炒

甘草各一分

羅末煉蜜丸如麻子溫水下五九日三

大黃丸治增寒壯熱發歇不定腹中結實不能乳食

川大黃炒 柴胡 檳榔各半兩 赤茯苓

人參 木香 桂心 枳殼炒

桃仁一分 炒各

羅末煉蜜丸如麻子溫水下五九日三

鼈甲散

鼈甲 赤茯苓 枳殼炒 川大黃炒

川朴硝各一

粗羅一錢水一盞煎五分不時溫服

寒熱食不消第六

巢氏邪客皮膚痰漬藏府使血氣不和陰陽交爭脾

胃之氣宿挾虛冷表雖寒熱內冷發動故食不消

千金翼治寒熱咳逆膈中有癖吐乳不食

乾地黃四兩 麥門冬 五味子 蜜各半斤

大黃 硝石各一兩

以咀水三升煮一升去滓內硝蜜煮沸服二合日

三有宿乳升許出兒大五合

聖惠訶梨勒丸治寒熱往來頭疼嘔吐及乳癖

訶梨勒皮 木香 人參 赤茯苓

桂心 川大黃炒 陳皮去白

各半兩

羅末煉蜜丸如麻子薄苛薑湯下五九日三四

寒熱能食不生肌肉第七

巢氏胃氣挾熱熱則消穀消則引食陰陽交爭為

血氣不和則不能充養身體故寒熱往來雖能食而

不生肌肉

外臺大黃丸

大黃一兩 桂心 乾薑各二分

巴豆五十粒 消石三分 煎無

篩搗巴豆如泥和蜜搗二千杵丸如梧子壞一九

湯服熱在膈上當吐膈下當利兩食頃不吐下熱

粥飲動之又不動更服九半能藥壯人二九下多

冷粥解有瘡綿挺如指蜜和一九塗挺頭旦內瘡

中囑出之不差更作溫病不大便宿食不消亦服

飛尸遁尸操服半九日一心腹脹滿痛服一九瘡

發日宿多食清晨服一九壯人二九得吐飢過發

時乃食婦人產後血結中奔走起上下或絕產無

子或月經不調面目青黃服半九兒淋瀝寒熱腫

脹大腹不食食不生肌三四歲如麻子一九日一

量加心腹諸病良忌野猪肉蘆筍生葱

寒熱不食羸瘦第八

聖惠鼈甲散

鼈甲分三 淡竹茹 川大黃炒各一分 常山杏仁大

粗散一錢水一盞葱白二寸煎五分去滓研麝一

豆大煎一兩沸溫日三服

鼈甲散

鼈甲兩一 赤茯苓 子苓 赤芍藥

當歸炒 川大黃炒 甘草炙 知母各半

幼幼新書 卷十七 十一

柴胡 訶梨勒皮 陳橘皮去白焙各三分

檳榔三枚

粗散一錢水一盞薑少許煎五分不時溫服利為

度

柴胡散治寒熱往來乳食不下四肢無力腹脹滿上
焦痰癥漸漸羸瘦

柴胡 鼈甲製各一分 人參 前胡

桔梗 訶梨勒皮 地骨皮 赤芍藥

杏仁炒 甘草炙 陳橘皮焙各半兩

篩散一錢水小盞煎五分不時溫服

五味子散

五味子 當歸炒 人參 桔梗

前胡 白朮 赤茯苓 黃芩各一分

甘草炙半 麥門冬焙半

粗散一錢水小盞煎五分溫日三四服

人參散

人參 黃耆 柴胡 白茯苓

鼈甲製 木香各半 甘草炙 白朮

幼幼新書 卷十七 十三

桃仁炒各一分 訶梨勒皮分三

細散不時粥飲調半錢

黃耆丸治往來寒熱多汗心煩小便赤黃不欲乳食

四肢羸瘦

黃耆 麥門冬焙 赤茯苓 白朮

子苓 甘草各一分 柴胡 鼈甲製各半兩

羅末蜜丸菜豆大粥飲下五九日三四

瘡疾第九

巢氏夏暑客皮膚至秋因勞動血氣腠理虛而風邪

藥之動前暑熱正邪相擊陰陽交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽更盛更虛故發寒熱陰陽相離則寒熱俱歇若邪動氣至交爭復發故瘧休作有時發時漸晏者由邪客風府循脊而下衛氣一日夜常大會于風府其明日日下一節故日晏發早者衛氣行風府日下一節二十一日至尾骶二十二日入脊上注伏衛脈其行九日出缺盆內氣既上故發更早間日發者邪氣內薄五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲故間日蓄積乃發兒未觸暑亦病瘧者乳母抱持解脫不避風故

幼幼新書

卷十七

十三

聖惠夏傷暑熱客皮膚至秋復為風邪所折陰陽交爭故發寒熱而成瘧欲解則有汗汗多則津液減耗又熱乘干藏則生虛躁差後藏府未得復內猶有熱故渴而引飲引飲不止小便澀者變飲癖
茅先生兒身發寒久後脾熱則身熱渴因傷寒三四日熱不退誤下冷藥脾氣不順遂至脾寒疾瘧
患眼春夏蘊積寒暑不常之氣久不宣泄至秋後陰陽交冷熱詐時故成瘧因宿疾在心脾間須常山飲

侵早喫吐下黃水後用勻氣散和胃氣不和如此間服便

寶鑑歌

瘧病是邪成陰陽有競爭早期風府會晏發
俞停至速連朝發來遲間日行小兒還見此何
必問神明

水鑑百日内瘧

瘧是邪風寒熱攻宜須術治免成空常山刻作
人形狀丁釘孩兒生氣宮

幼幼新書

卷十七

十四

孫尚藥治瘧

信砒兩二

寒水石兩三

用鐵鈿先鋪石末一半後堆砒末復以石末蓋厚
蓋覆之周圍醋糊紙封固約十重炭一斤燒紙條
黑取出置地冷開蓋淨刮末細研軟米飯丸如梧
子兒服如黍飛辰砂衣發日早臘茶清下一丸一
日不得食熱物合時洒掃淨室勿令婦人猫犬雞
鼠等見婦人患男着在口中男患亦然
聖惠牡蠣散治瘧瘵發無時

牡蠣 常山 烏梅肉炒 人參各半兩

鼈甲分三 知母 川升麻 甘草炙

豉心 桃仁麩炒各一分

細羅溫酒調半錢日二量加減

升麻散治瘡疾發後煩熱

川升麻 常山 蜀漆 川大黃炒

姜糖 黃芩 桂心各一分 川芒硝兩半

粗散一錢水一盞煎五分溫服吐利為度量與

桃仁散瘡疾發歇寒熱小便黃赤

幼幼新書 卷十七 十一

桃仁炒 赤茯苓 鱉甲各三分 知母

黃芩 川升麻各半兩 甘草炙一分

粗散一錢水一盞煎五分日三四溫服

治瘡疾瘰癧煩悶常山散

常山 甘草炙 川大黃各半兩 桂心一分

粗末一錢水一盞煎五分發前溫服吐利為度量

減服外臺無大黃酒煎

大蒜丸 獨顆蒜心法 巴豆各一枚

巴豆內蒜中濕紙裹煨熟擣丸如麻子醋湯下一

丸更量吐利為度端午合

茅先生脾寒鬼笑散

常山 大腹皮 白茯苓 鼈甲醋炙

甘草炙

等分前三味不見火末二錢水一盞冬取桃柳枝

各二七寸煎五分臨發服吐涎不妨

嬰孺前胡湯治時氣兼瘡

前胡 黃芩 升麻各四分 細辛

幼幼新書 卷十七 十一

甘草 芍藥各三分 大黃 常山各二分

水一升六合為四服日二夜一

吉氏草葉散

草葉 半夏各半兩 柴胡 厚朴

甘草炙 烏梅 棗各一分 常山一分

末二錢水一盞薑二片煎七分服或去柴胡加鼈

甲 朱氏

上等臘茶硫黃飛

細末服一錢米飲調發日五更服寒多倍硫熱多倍茶

襍熨灸刺法

千金翼肝瘡色花花然太息狀若死刺足厥陰見血心瘡心煩甚欲得清水寒多不甚熱刺足少陰謂神

門

脾瘡病寒腹痛熱則腸鳴鳴已汗出刺足太陰

肺瘡心寒甚熱間喜驚如有見刺手太陰陽明

腎瘡悽悽腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺

幼幼新書

卷十七

十七

足太陽少陰

胃瘡旦病寒喜飢不能食肢滿腹大刺足陽明太陰

橫脉出血

岐伯曰瘡有十二種瘡鬼得瘡字便愈

寅時發者獄死鬼所為以瘡人着壺上灰火一周不

令火滅差

卯時發者鞭死鬼所為用五白衣燒灰三指撮着酒

中無酒清水服

辰時發者隔木死鬼所為令瘡人上木高危處以棘

塞木奇間差

巳時發者燒死鬼所為令瘡人坐篩周匝燃火差

午時發者餓死鬼所為令瘡人持脂火于田中無人

處以火燒脂香假拾薪去差

未時發者溺死鬼所為臨發時三渡東流水差

申時發者自刺死鬼所為欲發時以刀刺塚上使得

姓字祝曰若差我與汝按却差

酉時發者奴婢死鬼所為令瘡人碓梢上捧上卧莫

令人道姓字差

幼幼新書

卷十七

十八

戌時發者自絞鬼所為左索繩繫其手脚腰頭差

亥時發者盜死鬼所為以刀一口箭一隻灰一筒刀

安瘡人腹上其箭橫着底下差

子時發者寡婦死鬼所為令瘡人脫衣東廂床上左

持刀右持杖打令聲不絕瓦盆盛水着路邊差

丑時發者斬死鬼所為令瘡人當戶前卧頭東向血

流頭下差

灸瘡法醫不能救者繩量病人脚圍繞足跟及五指

一匝訖截斷繩取量繩置項上着反向背上當繩頭

處中脊骨上灸三十壯後惡寒再灸三十壯至遇
發一炊久雖飢勿食盡日此法神驗男左女右

外臺灸譙諳在肩膊內廉俠第六椎下兩傍各三寸
手按之痛病者言噫嘻足太陽脉氣所發灸五壯主
液泡舉暴脉急引脅痛內心肺從項引至脊以下至
十二椎應手灸之立已熱病汗不出肩背寒熱瘧互
引身熱效嗽上氣虛喘逆軌衄肩甲內廉痛不可
俛仰眇季脇引少腹而脹痛兒食晦頭痛引頤瘡瘡
風

幼幼新書 卷十七

寶鑑灸大指次指外

瘡先熱後寒第十

巢氏云溫瘡得之冬中風寒寒藏骨髓至春陽氣大
發邪不能出遇大暑腦髓燥脉肉消釋腠理發泄因
用力邪與汗皆出此病藏于腎氣從內出陰虛而陽
盛則病衰氣復反入入則陽虛陽虛則寒故先熱後
寒名溫瘡先寒後熱由夏傷暑汗大出腠理開發遇
夏氣濟滄之水寒寒藏腠理皮膚中秋氣傷于風則
病盛亦以時作名溫瘡夫寒陰氣也風陽氣也先傷

寒後傷風故先寒後熱先傷風後傷寒故先熱後寒
亦名溫瘡夫瘡六七日但熱不寒者溫瘡也
千金常山湯

常山兩 小麥三合 淡竹葉一升外

水升半煮五合一日至七日兒一合為三服量加

鹿角末先發時服一錢

燒薑甲及酒服一錢七發時服并以火灸身

灸乳下一指三壯

瘡寒而後熱第十一

幼幼新書 卷十七

巢氏疫瘡者夏傷于暑也秋則寒甚冬則寒輕春則
惡風夏則多汗蓄作有時以瘡之如發先起于毫毛
伸欠乃作寒慄鼓頤腰脊痛寒去則內外皆熱頭痛
而渴欲飲此陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也
陽并于陰則陰實陽虛陽明虛寒慄鼓頤巨陽虛腰
背頭項痛三陽俱虛陰氣勝則骨寒而痛寒生于內
故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱則
喘而渴欲飲此得之夏傷于暑熱氣盛藏于皮膚之
內腸胃之外此榮氣所舍令汗出空踈腠理開因得

秋氣汗出遇風而發及浴水氣舍皮膚內衛氣并居
衛氣者晝日行陽此氣得陽如出得陰如內薄是以
日作間日作者謂氣之舍寫內薄于陰陽氣獨發陰
邪內着陰與陽爭不得出故

千金常山丸治痰瘡

常山

知母

甘草

大黃

麻黃

去根節

未蜜丸如桐子兒如黍三九熱水下漸加差為度

活人書治瘡先寒後熱兼治支結

幼幼新書

卷十七

廿二

柴胡

人參

半夏

黃芩

桂去皮各

劉如麻豆抄五錢水一盞薑七片棗二個煎八分

溫服日三夜一渴去半夏加人參苦薑根

瘡疾寒熱更作第十二

巢氏寒并于陰則寒風并于陽則熱陰陽二氣更實
更虛故寒熱更往來為熱瘡

指迷論寒熱不時腸滿膨脹起則頭暈大便不通或
腹痛胃膈痞滿由宿穀不化結于腸間氣道不舒陰

陽交亂宜備急丸又云久不治成勞

荆芥散

荆芥

人參

白朮

當歸

黃耆

芍藥

桂去皮各

柴胡

甘草炙半

粗末五錢水二盞煎一盞溫服

備急丸

大黃濕紙

巴豆霜

乾薑去

等分細末蜜丸如豌豆米飲下一丸羸人一丸如

幼幼新書

卷十七

廿三

萊豆利為度

瘡熱而不寒第十三

巢氏肺素有熱氣盛于身厥逆上下中氣實而不外
泄因用力腠理開氣寒舍皮膚之內分肉之間而發
陽氣盛而不衰則病氣不及陰故但熱寒氣內藏于
心而外舍于分肉間令人消燥脫肉名瘡瘡陰氣先
絕陽氣獨發則少氣煩惋手足熱而嘔
聖惠香豉飲治瘡瘡嘔逆不食

香豉合半

葱

常山

檳榔

升麻兩一 生地黃 鼈甲片一 知母各兩

劉水二盞半煎盞半不時分三服一日盡兒一合

又方

常山 桃仁炒 黃丹炒紫各 香豉炒一

羅末蜜丸如桐子發日空心煎桃仁湯下十九發

時再服兒粟大五丸

治痰熱發瘡知母散

知母 鼈甲醋炙各 牡蠣 常山各半

細羅粥飲調半錢日二

幼幼新書

卷十七

廿三

牛黃丸

牛黃 杏仁

等分研如膏煉蜜丸麻子大溫水下三九日三量

與

張漢知母丹

知母炒 鼈甲炙 川大黃炒 赤茯苓

朱砂飛各 川芒硝 川升麻各半 龍腦錢一

末蜜丸如黍服五七粒薑湯下大便利愈

活人書

知母兩六 甘草兩二 石膏斤一 桂去皮

粳米合二

劉麻豆大五錢水盞半煎八分服

瘡寒而不熱第十四

葉氏寒瘡由陰陽相并陽虛則陰勝而寒寒發于內

而并于外內外俱寒故病發但戰慄鼓頤頤也

指迷論瘡寒從背起冷大如手不甚戰慄似欲熱而

汗出或即頭痛嘔吐時作脉遲小由脾胃素弱因氣

寒而收聚水穀不能剋化變而成瘡伏瘡在內陽為

幼幼新書

卷十七

廿四

陰瘡故陽作寒逼而成汗宜旋覆花丸半硫丸

聖惠雄黃丸

雄黃 硫黃 朱砂 桂心

乾薑生 巴豆煮去油 麝兩半 阿魏分半

研細醋煮麵糊丸如桐子未發前綿裹一九安耳

中男在女右帛繫一粒于臂可治七人

聖惠方

獨顆蒜個一 黃丹兩半

端午午時搗千杵丸如黑豆發時溫茶下二九兒

粟大

常山丸治瘡手足鼓顛心寒面青

常山兩半

真黃

雌黃

糊孫頭骨

天靈蓋

虎頭骨

安息香

朱砂

野狸頭骨

砒霜

乳香

阿魏

白芥子分各一

菜豆

生搗羅軟飲和搗三二百杵丸如桐子忌孝子女

人見端午午時合緩急不擇日未發前絳囊盛中

指繫一丸男左女右三日不任湯服一丸孕婦兒

幼幼新書

卷十七

廿五

不得服忌熱物一方止席糊息香天蓋砂砒魏等

分

張渙烏梅丹

烏梅肉兩一

女丁香

乾漆炒

當歸

桂心兩各半

麝分一

蜜丸如黍粥飲下十粒

指迷旋覆花丸

旋覆花

桂心

枳實炒

人參分各五

乾薑

芍藥

白木分各六

茯苓

狼毒

烏頭炮去

礞石煨一分

伏時

細辛

大黃煨

黃芩

葶藶

厚朴炙

吳茱萸炒

羌活炒

橘皮分各四

甘遂分炒三

細末蜜丸如桐子米飲下三九至七九兒黃米大

二九

半硫丸

半夏湯洗七

次三兩

硫黃飛二

兩

末薑汁糊丸如梧子米飲下三十九兒黍大三五

幼幼新書

卷十七

廿五

丸

瘡熱多于寒第十五

指迷論曰寒熱戰慄頭痛如破身體拘急數欠飲冷

或先寒後熱或先熱後寒或晝時發或間日作至其

時便發發已如常其脉弦弦數多熱弦遲多寒因冬

中風寒歲于骨髓至春陽氣大發邪不能出遇大暑

與邪合合而發熱多宜解常山湯苦薑湯

常山湯

常山

知母

甘草炙各

三兩

麻黃淨一

粗散五錢水二盞煎一盞溫服糜粥一盃助汗
蘇蘇湯

蘇蘇根四兩 柴胡八兩 人參 黃芩

甘草各灸三兩

粗末五錢水二盞薑三片棗一個煎一盞溫服

瘡寒多于熱第十六

指迷論證周前而寒多者宜薑桂湯溫之

薑桂湯

乾薑 牡蠣煨 甘草灸各二兩 桂心三兩

幼幼新書

卷十七

七

柴胡八兩 蘇蘇根四兩 黃芩二兩

粗末五錢水二盞煎一盞不時溫服

活人書祛邪丸治瘡脈浮大寒熱往來用此吐衛州

書云瘡寒多熱少者痰多也脈必浮可吐之若遲微

者惡寒瘡耳宜柴胡薑桂

麻黃四兩淨泡一二沸 常山 甘草灸

大黃 知母各三兩

末蜜丸如梧子服十五丸面東淨水吞

瘡寒熱相等第十七

指迷論脈證見前瘡發寒熱等者宜調之

鼈甲湯

鼈甲醋 白朮 常山 桂心

柴胡各一兩 牡蠣煨半兩

粗散五錢水二盞煎一盞溫服

瘡瘡第十八

葉氏山瘡瘡生于嶺南帶山瘡之氣寒熱休作有時

由挾溪源嶺濕毒氣故也重于傷暑之瘡

千金大五補湯治時行後變瘡瘡

幼幼新書

卷十七

八

桂心州 遠志 桔梗 芩藎各二兩

茯苓 芍藥 人參 白朮

乾地黄 當歸 黃耆 甘草各三兩

竹葉五兩 半夏 麥門冬各一升 生枸杞根

薑各一斤 大棗廿枚

吹咀水三斗煮竹葉枸杞取二斗內諸藥煎六升

分六服日夜令盡兒量與

鯨鯉湯治乍寒乍熱乍有乍無山瘡瘡

鯨鯉甲十四枚 鼈甲 烏賊骨各一兩 常山三枚

附子炮一枚

咬咀酒三升漬一夕發前稍啜勿絕即吐魚塗身
斷食過時兒量與

久瘡第十九

巢氏瘡傷暑傷風所致熱甚時發汗吐下過度脉藏
空虛榮衛傷損邪氣伏藏引日不差瘡發至三歲連
日發不解脅下有痞勿攻但得虛其津液先時發汗
服湯先小寒寒者引衣自覆汗出小便利愈

水鑑方

幼幼新書

卷十七

七

水蛭

狗蟲各一枚

雄黃

阿魏各少許

研細馬汗為膏塗手心立差狗蟲既同水蛭用忍黃虫

外臺常山散

常山

羚羊角炙焦

烏梅肉

黃芩各二兩

甘草炙兩半

搗散竹葉煮飲取六七合調三方寸七發前服不
差臨發又進老人小兒意量忌海藻松菜葱

聖惠砒霜丸

砒霜醋熬三次

朱砂各一分

相思子

巴豆霜七枚

母丁香

阿魏半錢

常山錢一

羅末蜜丸如黍末發冷水下一歲一丸

蜀漆丸治久瘡不斷胃脅痞堅

蜀漆

杏仁炒

黃連

桂心

甜葶藶隔紙炒紫

川芒硝

川大黃各炒

兩半

羅末蜜丸如麻子粥飲下五九日三

神效方

大蜘蛛五枚去脚 蝙蝠炙

鼈甲醋炙各一枚 麝半兩

幼幼新書

卷十七

三

蛇蛻一條

羅末端午午時蜜和丸如麻子空心温酒下五九

兒茶下二丸

嬰孺牡蠣散治癰瘡發無時服三稜飲後宜此

牡蠣

知母

常山

烏梅肉炒

人參各三兩

鼈甲炙四分

升麻

甘草炙

鹽豉各三分

桃仁七個

末空心酒下二錢日再

三稜飲

三稜根

龍甲

大黃各三分

水八合煮二合半為三服乳母忌菹菜油膩

聖惠灸內庭一壯炷如麥足大指次指外間陷者中

瘡後引飲第二十

巢氏夏傷暑熱客皮膚至秋復為風邪所折陰陽交

爭故發寒成熱瘡凡瘡欲解則汗汗則津液減耗又

熱乘藏虛燥差後藏府未和津液未復內猶熱渴

而引飲不止小便澀者變癰

聖惠烏梅散治瘡發作不定多渴心煩

幼幼新書

卷十七

三十三

烏梅肉炒半兩

常山兩

甘草分三

粗散一錢水一盞淡竹葉七片小麥卅粒煎五分

溫服

瘡後脅內結硬第二十一

巢氏瘡正發寒熱交爭時熱氣乘藏則燥渴引飲

飲停成癰結脇下故差後結硬

肘後治心腹堅痞時時寒熱如瘡服紫丸六十日吐

下痞仍堅雞子湯去惡物數升遂愈

甘遂銖七

甘草分三

黃芩各三分

水二升半雞子一枚少扣開出白投水中熱攪吹

去滓內藥煮一升隨兒可下數合病未盡更與若

堅實多者加黃芩細辛各一兩

嬰孺知母丸除熱下氣

知母

甘草分三

常山各一兩

麻黃去節二兩

末蜜丸如小豆服五九日三至欲發服畢泝發日

亦可服加大黃一兩治骨間熱卧不安

瘡後頭面浮腫第二十二

聖惠防葵散治瘡發後肚脹兼頭面浮腫

幼幼新書

卷十七

三十三

防葵

柴胡

桑白皮

川黃炒半兩

甘草分三

粗散一錢水一盞煎五分溫服日三量加減嬰孺

忌菹菜油膩生冷粘滑物乳母同

幼幼新書卷十七

燕翼堂梓

方

後學古吳陳履端于始輯

黃山夏九疇元錫校

痘疹論第一

聖惠論疹痘瘡是熱積藏府蒸鬱熱毒散四肢兒皮肉嫩弱多此疾乳孩少與湯藥童兒過劑有損蓋飲熱乳而成府熱生細疹藏熱生豆瘡湯藥宜療乳母絕乳者由積熱伏脾肺間不早以湯藥療熱行于四肢榮衛之中漸透皮表成疹痘出濃水也嬰兒性陽

幼幼新書

卷十八

十一

盛陰微藏府陰陽氣逆大小便多秘不通即便疎利輕患也若疹痘已出勿疎轉出宜利大小腸扁鵲倉公云先和節陰陽調治榮衛方利藏府即熱氣漸解絕乳嬰孩疹痘未出前先用油劑服之行解四肢熱極已出不可用油宜平和藥療肝藏解敗熱慮熱毒攻肝衝眼目生障醫時醫于疹豆未出前誤認疾候或餌燥藥涼藥不無天傷惜哉養生曰陽明主肌肉瘡疹毒泄肌肉始覺必以利藥宣其毒初與傷寒類不可不審兒身熱耳冷尻冷效

嗽瘡疹候一歲中瘡疹大小相類此疫氣也當作疫治傷寒至陽明經亦用利藥頃未見瘡疹疑似間乃可及見勿利

錢乙論面燥頰赤目胞赤呵欠頓悶乍涼乍熱效嗽嚏噴手足稍冷夜卧驚悸多睡並瘡疹證此天行病用溫涼藥勿妄下及妄攻發受風冷五藏各有證肝水疱肺膿疱心癰脾疹歸腎變黑惟癰疹後或發癰木勝脾木歸心故也

兒在胎十月食五藏血穢生則毒當出故瘡疹皆五

幼幼新書

卷十八

十二

藏液故瘡出有五肝主淚淚出如水肝為水疱色青小肺主涕涕稠濁肺為膿疱色白而大心主血為斑色赤而小次于水疱脾為膿血為疹小次癰瘡色赤黃淺涕淚出多故膿水疱皆大血管于內出不多故斑疹皆小疱者涕淚俱少辟胞中容水水去則瘦始發潮熱三日以上熱運皮膚即發瘡疹不甚多者熱留膚腠間也潮熱隨藏出如早食潮熱不已為水疱之類瘡疹始出五藏證見唯腎見平證耳及骹涼是也骹耳俱屬腎居北方故瘡黑耳骹反熱為逆百祥

九牛李膏各三服不愈者死凡瘡疹一發出盡者重
 夾疹者半輕半重出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏
 赤者微重外白裏黑者大重瘡端裏黑點如針孔者
 勢劇青乾紫陷昏睡汗不止躁熱渴腹脹喘喘大小
 便不通者困乳母慎口勿令饑及受風冷大熱當利
 小便小熱宜解毒黑紫乾陷百祥丸下門不黑慎
 下更看時月輕重大抵春夏順秋冬逆冬月腎王又
 盛寒多歸腎變黑又辨春膿疱夏黑陷秋斑冬疹不
 順猶十活四五黑者無問何時十難救一其候或寒
 戰噤牙或身黃腫熱急以百祥丸下復惡寒不已身
 冷出汗耳聾反熱死腎氣大王脾虛不能治故下後
 身熱氣溫欲飲水脾生勝腎寒去而溫熱可治更宜
 解毒長下則內虛多歸腎若能食痲頭焦或未焦而
 喘實可下身熱煩渴腹滿而喘大小便澀面赤悶亂
 大吐當利小便不差宣風散下門若五七日痲不
 焦是內熱蒸皮中宣風散導之生犀磨汁解之瘡疹
 由內相勝也惟斑疹作搐疹為脾所生脾虛而肝乘
 之木來勝土熱氣相擊動于心神心喜為熱神不安

因搐成癩斑為心所生心生熱熱生風風屬肝二歲
 相搏風火相爭故搐當瀉心肝補母苦薑湯主之門
 瘡黑雖腎用事然脾氣本強或膽服補脾藥脾實
 能制之瘡入腹忽瀉膿及連痲皮得出是脾強腎退
 病出而安米穀及瀉乳不化是脾虛不能制腎難治
 論瘡疹標本云瘡疹未出若言胃熱何以乍涼乍熱
 若言母腹中癩在脾胃何以驚悸不知兒在母腹月
 至六七已成形食母穢液入五歲至十月滿胃管中
 口有不潔產時拭淨則無疾黃連汁壓之下臍糞及
 穢涎也本因微寒入而成瘡疹未出五歲見證一歲
 受穢多者乃出瘡疹初欲病時先呵欠煩悶肝也時
 發驚悸心也乍涼乍熱手足冷脾也面目顯頰赤嗽
 嚏肺也惟腎在腑下不食穢故無候凡瘡疹五歲毒
 若出歸一證則肝水瘡肺膿痲心斑脾疹瘡黑屬腎
 由不慎風冷而不飽內虛也抱龍丸數服愈門
 論熱傳痘疹云四大王宮五大尉因墜韃鞞發急驚
 後大熱先退熱以黃丸玉露散惺惺丸加牛黃龍
 麝解之不愈至三日肌尚熱錢曰必發斑瘡蓋熱不

能出他醫初發散入表表熱則斑生初驚時當利驚
發散逆也後二日果斑出必勝膏門治七日愈

論瘡疹有誤睦親宅一大王病瘡疹錢留抱龍丸三
服李下之疹稠密錢驚為逆曰瘡疹始出未有他證
勿下當用平和藥頻與乳食不受風冷三日不出或
出不快微發之不出即加藥又不出即大發大發不
多脉平無證瘡本稀也有大熱利小便小熱當解毒
若出快勿發勿下止用抱龍丸瘡痴若起能食者下
之宜大黃丸見未一二行即止今先下一日瘡疹未能

切切新書

卷一八

五

出盡而稠密甚誤也縱安病有三一疥二癩三日赤
經三日黑陷錢曰幸不發寒未困也用百祥丸藥牛
李膏為助門各一大服至五日間瘡復紅活七日
愈蓋黑歸腎也腎主勝脾土不剋水故脾虛寒戰難
治用百祥丸以瀉膀胱之腑腑不實歲自不盛也不
瀉腎者腎王虛不受瀉也若二服不效即加寒死
瘡疹欲發未能辯認間服升麻葛根湯單傷寒門消毒散
痛門已發未發皆宜仍用胡荽酒黃蘗膏發
暑月煩躁食後與白虎湯實熱門玉露散驚熱門熱

盛與紫雲門咽痛或生瘡與甘桔湯實熱門甘露飲

張漢論兒瘡疹與大人傷寒相似雖療不同或愈或
危在六七日間可不慎哉十歲外方可施湯藥然邪
熱多在脾肺間若不求本早治養熱氣行四肢利害
甚多童男長大肌體稍實毒氣難出覺似瘡疹便早
疎利即熱輕易療瘡疹未出前或熱乘心心神易動
即發驚癇不投湯藥即危若已出長快自不可利正
如傷寒下早又兒十四歲內初覺頭痛壯熱腰背疼

切切新書

卷一八

六

重熱甚則手足厥冷却似挾寒脉多洪數甚大不定
若小便多赤大便多秘宜先疎利應瘡疹早出若繞
出皆不可轉利
疹痘論疹痘瘡者因熱積藏府蒸鬱毒氣而生府伏
熱生細疹赤瘡俗呼麻子歲伏熱生豆瘡形如豌豆
其始熱積脾肺間治不早流注四肢榮衛中而成初
受病似傷寒身與四肢俱赤壯熱頭痛腰脊疼只鼻
耳尖足指冷兼效嗽眼青黃色大小便秘兩手脉洪
數是豆疹證冬月天氣溫暖仍感乖氣未發至春被

積寒所折毒不得泄夏初得熱春寒始解冬溫毒氣
方發有不因冬溫四時自天行者又有兒熱毒之氣
傷天令不時之氣而發者有感寒邪伏熱毒真元之
氣被熱毒邪氣渾雜而發者巢氏呼發瘡胞瘡癩瘡
皆分陰陽所受凡覺冬有非節之暖當瘡未發急下
其毒春冬間天枉者十五六醫死者大半蓋證底形
色不同致有差誤有三五日遍身粟生時咳嗽耳尖
冷毛寒肌慢眼澀不開作寒欲以溫暖覆者初覺時
薄苛散微汗或不汗兼作調中散已出未出漸漸解若

幼幼新書

卷十八

七

寒熱脈反遲進脫齒散快出或寒熱不定目澀耳聾
冷此邪毒不傳諸歲反攻皮膚而作或出遲者亦服
脫齒散凡三五日鼻癢咽喉不利咳嗽目赤毛焦肌
膚緊脈洪大而數此豆疹底順者薄苛散發汗瘡自
出或鼻癢咽喉不利目赤額紅脈不甚洪大亦瘡疹
候皆宜脫齒散瘡如白珠子或紅小乃解也或鼻癢
唇焦脈細面癢黃時變青皮膚慢吐清涎者亦疹子
候皆誤下涼藥多致瘡難發凡瘡毒血氣順脾溫則
易發涼藥過多則血澀氣弱脾寒瘡毒難泄遂變

候亦服薄苛散脫齒散若面青氣粗大小便不通瘡
毒未發宜清石散快出如大小便不通利服脫齒散
次觀色候調治或面赤亦瘡疹候若先赤後青為逆
或患數日面青或癢黃四肢微冷上喘不涎手足搐
縮以三焦氣壅血脉凝滯氣不得榮薄苛散發泄瘡
毒兒初病便驚狂身熱汗出不增寒不惡風脈洪數
者皆當下覺有此證服當歸散未見可或先頭疼
口鼻熱氣增寒壯熱胃膈痞噎生涎心逆作渴不止
足指冷口臭兩手脈弦或微脾脈弦數因失飢傷邪

幼幼新書

卷十八

八

熱當發赤疹及患頭疼身不大熱口鼻熱氣咽喉乾
痛口頰生瘡兩目如火耳尖手足稍冷兩手脈洪大
後三二日必作渴面赤時增寒心逆口臭目忽如朱
亦伏瘡疹候先去邪毒須大黃湯瀉之或已結皮毛
間誤利之毒反沒伏心間邪入肺瘡毒內壞而死若
瘡疹既出太盛實濃水者大黃藥微利除毒如未發
毒疹前曾經利者勿用但解熱除毒愚俗不以藥泄
利致大小便不通停熱歲府攻衝眼鼻咽喉腫塞口
舌壞爛只進涼藥或調氣藥恣其所措出後又猛利

用藥雖扁鵲難療又扁鵲覺有痘證先用麻油劑出初
解四肢熱毒良久就卧至三五服大小便利四肢
熱退邪毒漸解至出亦輕曾服大黃散不必服未解
利而毒已發服解毒必聖散或升麻散發散已出未
在肌膚三四日隱隱不發急用紫草飲初出數服凡
未發前用黃蘗膏愛護面塗兒面頰眼目間仍用胡
荑酒初出噴背上四肢令速出若未出雖出燥渴者
宜甘草散太盛解利熱毒即住若出遲服紫草飲大
人針兩腕硯子骨間或灸一壯亦取發痘若已發勿
用如未作膿心膈躁睡不安者服青黛散黑豆汁出未
利可疎毒盡宜黃芩散解餘毒嘔吐服之自止若赤口
下部俱有瘡自利者服黃連散或出後煩喘小便不
利宜燈心湯餘毒若煩喘甚者麻黃湯太盛或咽
啞痛并嗽入麝服冷藥太過咳嗽手足冷脈遲者煎
炮乾薑炙甘草各四錢水升二合取四合服或下痢
赤黃膿血及渾身熱與薤白湯便血解去惡積差有
疹痘安後眼生翳腫脹者皆肝歲敗熱停留所致切
忌點藥唯利脾肺解肝熱仍於眼邊上下貼協藥散

幼幼新書

卷一八

九

毒服蕤仁散醫重蕪蜜蒙花散量力服食凡天
行瘡豆預服豆湯不發瘡黑豆或發瘡因天行熱氣
痘瘡身疼壯熱當以桂枝及去節麻黃黃芩各半兩
為末量大小一二錢煖水調覆汗又葛根散解肌已
未出凡身疼壯熱頭痛不小汗無由表散大便久秘
毒氣藏伏心腹脹滿不微利無由釋去切在消息若
已出發表增瘡爛發膿痛甚者用乾淨黃土末傅仍
敷食蜜若勢稍輕猪膽汁調川芎硝塗勿令動候痂
落有大段瘡發不通卧蓆者麥麩簞卧得息如作漿
戴白膿者毒輕紫黑隱隱肌肉內者重甚者五藏咽
喉內皆有瘡其不便便澀出血瘡黑靨不出膿者死
舌鼻黑者死或疹豆未出前熱毒內逼目撥上竄驚
叫此瘡欲出候誤認驚風治毒內畜邪熱不泄死或
惡瘡既出謔語不止是惡候更以冷藥解利使聲瘡
瘡疹反沒死或用燥藥太過咽喉腫痛猛發鼻血喘
嗽死或瘡作白疱忽然畜入藏府漸作紫黑無膿日
夜煩悶者服化毒散倒醫毒從手足心出差此五死
一生候若便血瘡壞無膿者十死大熱瘡毒頓出者

幼幼新書

卷一八

十

然後依證調理有患瘟毒豆瘡不出者一法以地黃雄黃令飲勿太多恐反有損或飲吸熱乳積藏府者兼療乳母嬰兒孩童之性陽盛陰微藏府陰陽氣稍差逆大小便多不順利自扁鵲倉公論療嬰孩藥性有可餌者皆先知節氣陰陽調利藏府則病勢漸解也

張仲景兒生進地黃汁下黑糞不患瘡疹百日內遇天氣和暖無惡風時抱日中使皮膚緊密常柰風日只在房室溫煖處忽見風日使寒邪伏積藏府遇天

切勿新書 卷十八 十一

氣不調多作瘡疹瘡疹方得寒邪散毒氣消也兒患瘡父母行房觸犯使不出毒入心悶亂而死已出令黑爛痛如刀割縱得安痲經年色黑瘡未生燒赤木猪甲二物辟惡氣勿令外人入房恐令瘡難出或得上喘面青黃色尤良犯此死者不可勝數又瘡痂雖落痲猶厲肌肉或凹凸載作瘡疹此安後不解利毒氣留滯敗熱肌肉間也

活人書論瘡疹傷寒疑似間只與升麻湯傷寒發熱升麻湯解肌兼治瘡已發未發皆可服傷寒身熱固

不可下瘡疹發熱在表尤不可轉至已出或膿血太盛用疎利皆非大拉首尾慎下若身熱耳冷尻冷欬嗽輒利之毒入裏殺人但與化毒湯紫草木通湯出未鼠粘子湯攻咽太盛犀角地黃湯解之太盛若出不快煩躁不眠水解散時氣麻黃黃芩湯升麻黃芩湯並傷活血散主之快出黑瘡倒靨猪尾無以散龍腦膏無不驗也門若熱毒攻咽如聖湯攻咽瘡豆入眼决明散撥雲散蜜蒙花散通聖散蛤粉散主之瘡出

切勿新書 卷十八 十一

指迷論瘡疹初出往往以胡荽酒葡萄酒及諸溫熱藥發之使快或隱皮膚間以火煨人齒調服又云始得勿投涼藥恐胃冷致瘡不發多以為瘡疹宜溫余見執此論者致病人耳目口鼻悉平咽中閉塞大便堅秘小便皆血而死又見疱瘡頭黑凹為倒靨由始失調解更增煖溫湯藥孤陽無陰鬱毒不散熱無從出反攻府藏其氣俱絕又加溫藥發之斃者不可勝數余究此疾亦時氣之一端有如癰疹麩片者有赤熱如斑者有豌豆狀者或大小不等皆出膿水者亦

謂膿疱蓋毒有淺深故發有異狀其先風邪外客皮膚熱不得泄則為癰疹但皮膚癢其疾輕熱蘊于內外風搏血則為赤斑毒氣深蘊伏藏府閉經絡內外相合熱畜血聚壅遏不行結而成膿則為疔瘡始發令頭痛發熱皮毛洒淅如寒手足耳聾時冷胃中煩躁如針刺皮中時痒甚者昏睡謔語脉大小不定應指必疾甚者六七至必日數深而後見慎無惶惑亂治始覺頭痛發熱微寒煩躁咽痛者宜四味升麻湯已出未出 瘙痒成癰疹者荆芥湯時嘔者小柴胡湯不惡寒但煩躁小便赤澀多渴成赤斑點者竹葉湯犀角飲子並已出未出 大便不通宜四順飲子溫壯 甚謔語大便不通與大承氣湯大便不通 若自利黑黃色此毒出廣與湯劑恐增他病大便已利勿以溫藥助之瘡稀少而自快利只升麻湯荆芥湯董汲斑疹總論兒斑疹一候不惟脉理難辯治療比他病尤重始覺證與傷寒陰癘相近醫視病不精投藥暴妄况兒藏府嬌嫩易為傷動斑疹未出疑為傷風即以麻黃等葢汗使表虛裏實若陰癘治用溫驚

幼幼新書

卷十八

十一

藥熱勢愈盛直至證候定方治斑瘡所失多矣大率俗醫斑疹欲出熱藥葢之使胃熱極已出者變黑而陷又謂不快熱藥熏蒸得熱則出愈難轉生熱證大小便不通更以巴豆取積藥下之使藏府內虛熱又不除邪氣益深變為喘滿便血或為疔瘡體裂痛哉然斑疹本胎中積熱及將養溫厚偶胃熱乘時而作外臺云胃爛發斑微者赤五死一生極者黑十死一生府熱為疹淺也藏熱為疔深也故證色論云大者屬陰小者屬陽以當壬申歲冬無天雪天氣甚溫速春兒病斑疹醫類投白虎湯不知白虎湯本治大人孫真人論大小為治不殊藥劑多少為異是未知其用藥法多失誤也

幼幼新書

卷十八

十二

瘡疹候第二

巢氏傷寒熱毒氣盛多發疔瘡色白或赤葢于皮膚頭作癰漿戴白膿者毒輕紫黑色根隱肌肉裏毒重甚者五內七竅俱有如葢豆故名

茅先生麻豆各有說豆候早晨渾身微熱午後大熱眼白黃兩脇下吸吸動更發甚如驚風遍身大熱手

足逆冷病屬藏治用獨勝散已出未出發豆慎不得瀉
麻候渾身熱午後大熱眼不白不黃微赤手足冷吐
逆此屬府治亦依豆候

真珠囊豆瘡外應候

壯熱汗不流先躁而出者主心

先嗽而出如砂子形者主肺

先肚痛而出疹子者主脾

先如瘡發渴後為水疱或有黯血者主腎

先目赤如珠暗流羞明出瘡子或有硬膿而不破者

幼幼新書

卷十八

十一

主肝

茅先生麻豆惡疾歌

斑疹出後熱難除冷藥先冰在腹居渴甚瀉多

便溺澀不餐躁發命頃臆

玉訣斑疹候歌

傷寒胃熱作斑瘡倒靨因風氣受傷太過損肝

多紫黑大為陰盛小為陽

未出多不辯之勿作傷寒治太過者解之

又歌

目澀語聲短一云氣喘發熱有時涼手耳如冰

石壁經瘡子歌

傷寒變麻

小兒瘡子候偏多欬涎潮作久疴發熱發寒

一作如怕物看燈停目眼光多一驚如羊喉中

自響如鞞輪吐後常添氣不和夢裡發來如急

播唇紅臉赤脉交多渴水心煩多躁熱耳冷足

冷髮溫和舌上有瘡如粟子定知三日熱來多

此病變成麻子候只須平藥病消磨

幼幼新書

卷十八

十一

此因溫熱毒氣在人至春感寒邪陰陽相錯在府

作細赤瘡疹在藏為豆瘡切看手足稍冷尻陰冷

腹中痛硬是瘡疹候若投驚藥毒邪內攻瘡不出

更服熱藥使瘡靨陷死調氣發散愈

瘡疹未見乃可疎利第三

聖惠斷乳兒患疹豆覺似傷寒面與四肢俱赤壯熱

頭痛腰背疼足多厥冷眼睛黃色脉息多洪數絕大

不定小便赤大便多秘雖是疹豆未攻皮毛可勻和

藏府疎泄逐下若在皮毛微微似出勿疎泄或出大

盛豆穴膿水者可疎利

王氏論瘡疹者莫不以古書說繞覺便與疎利為非以錢氏治以溫涼勿妄下為是蓋兒腸胃嬌嫩若妄取轉內虛熱入能殺人故倒廩而死不知古謂疎利者乃先和節陰陽調治榮衛方利歲府即熱氣漸解又曰嬰兒之性自然陽盛陰微歲府陰陽氣逆大小便多秘不通繞覺是此便與疎利即輕患也若已出即不可疎轉冒嘗使瘡疹出便取轉耶况疎利者輕涼藥微利之如青黛黃連類取轉用峻快藥極下之

切切新書

卷十八

十七

如巴豆芒硝類愚醫輒以疎利為取轉得不誤耶况取轉時曾先和節陰陽調治榮衛乎已大小便不通乎繞覺之說即瘡疹未見醫者取轉知瘡疹之已出未出乎又曾知疹豆出即不可疎利之語乎蓋庸醫見是瘡疹便取轉使瘡疹出快所以多誤錢氏云此天行病唯用溫涼藥不可妄下及妄攻發亦冒嘗有此證不得疎利語乎妄下非疎利比至如初虞世猶以瘡疹比傷寒至陽明亦用利藥不知傷寒至陽明宜下庸醫既不曉古意又使善醫者即印證其說故

特辯之

聖惠治熱甚發疹豆初發早覺者

黃連去鬚篩散一錢水小盞煎五分去滓不時溫服

服

波斯青黛如棗核大水調服痘疹論用溫磨刀水

疹豆論瘡未作膿心膈燥睡不安

黑豆煮汁溫徐徐服

天行瘡豆急預之豆湯

小豆

黑豆

萊豆各半升

甘草炙一兩

切切新書

卷十八

十八

九升水煮豆熟逐日空心任意飲七日後豆發快

瘡疹初出第四

聖惠未與疎轉急服紫草飲

紫草二兩細剉百沸湯一大盞沃便合定勿令氣

出量兒溫服至一合瘡雖出亦輕諸方以紫草為先

胡荽酒令疹豆速出

胡荽三兩細切酒二大盞煎沸沃胡荽便合定候

冷去滓微微從頂已下噴背脊及兩脚胃腹遍勿

噴面錢乙云左右常令胡荽能辟汗氣瘡疹出快

瘡疹忌外人及穢觸雖不可受風冷亦不可擁遏
令衣服得中并虛涼所坐卧

生油方兒歲府伏熱毒未成疹豆四肢微熱食物似
減頭髮乾立或額多微熱

生油一小盞入體熱水一小盞旋旋傾入油內以

杖不住手攪疹豆用楊柳枝候水盡打勻如蜜夜卧時三

歲內服二蜆殼五七歲三蜆殼十五歲以前半合

大人一二合服良久卧少時服三二服大小便利

四肢熱退疹豆不生

幼幼新書

卷十八

十九

瘡疹已出未出第五

秦承祖治瘡疹漸身熱耳尖脚稍冷或腹痛

蟬蛻廿一個淨末水一盞慢火煎七分去滓量大

小温服如已出更服三五次冷服即有瘡痕悞服

無害

晉王珉治傷寒時氣熱毒豌豆瘡

樺皮木煎汁温服

水鑑治豌豆瘡

天麻

甘草各一

髮灰

黃丹熟冬一分

馬牙硝三分

五色豆各七粒

黃鹽一分

陶隱居北海黃鹽草粒粗以作

魚鮮及鹹茹

搗散空心冷水調服一錢利下瘡隙差有十一味字可疑前

秘錄治斑瘡豌豆瘡

髮灰飲汁服三錢七

藥性

臘月兔肉作醬食毛煎湯洗毛傳瘡甚良

聖惠犀角散治疹豆瘡及赤瘡

幼幼新書

卷十八

二十

犀角

川大黃炒

桑白皮

鈞藤

甘草炙

麻黃去根節各一分

龍膽半

石膏

苦蕒各半

黃耆各半

粗散一錢水小盞煎三分去滓温分三服量加減

瘡退濃磨犀角水塗錢乙治瘡疹太盛令不入眼

名調肝散

博濟治瘡疱未勻透肌解毒必勝散

牛蒡子炒熟杵細末一錢荆芥二穗水一盞煎七

分温服如已出更服

養生升府湯治瘡疹與傷寒類頭痛增寒壯熱疑似
間先與解肌湯已發未發皆可

升麻 白芍藥 乾葛 甘草炙

等分末二錢水一盞煎七分去滓溫服日三四甚

即連夜服緩急亦可湯點身心煩熱溫服寒多熱
服

茅先生獨勝散

牛蒡子兩半 白殭蚕分一

末一錢水六分盞紫草二七寸煎四分連三服豆

幼幼新書 卷十八

便出

張渙安斑散調理瘡疹

川升麻 赤茯苓 羌活 黃耆各一兩

人參 枳殼炒 桔梗 甘草炙各半兩

羅末一錢水一盞紫草薄荷少許煎五分去滓量

兒溫服

紅花子湯平調瘡疹

紅花子 紫草茸各一兩 麻黃去根 升麻各半兩

細末半錢薄荷湯入酒一滴同調

疹豆論葛根散治天行熱氣欲發豆瘡作熱疹宜解
肌出汗

乾葛 麻黃各一兩 石膏二兩 黃芩

芍藥 桂枝 甘草各半兩

散四錢水盞半煎八分溫服自汗去麻黃

桔迷小柴胡湯

柴胡兩八 人參 黃芩 甘草炙各半兩

半夏二兩

粗末五錢水二盞薑二片棗一枚煎一盞溫服嗽

幼幼新書 卷十八

加五味子二兩

竹葉湯

石膏四兩 知母二兩 麥門冬 甘草炙各一兩

粗末五錢水二盞竹葉一握煎七分溫服

犀角飲

犀角 甘草炙各半兩 防風二兩 黃芩一兩

粗末五錢水二盞煎一盞溫服

活人書化毒湯

紫草煨 升麻 甘草炙各半兩

劉如麻豆水二盞糯米五十粒煎一盞溫分服劉氏云楚豆瘡欲出渾身壯熱不思飲食服此內消已出即解全出頭焦三服差

紫艸木通湯

木通

紫艸

人參

茯苓

糯米等分

甘草炙半

劉如麻豆四錢七水盞半煎一盞溫服

萬全方

豬膽汁和扑硝塗

切勿新書

卷十八

廿三

董汲治一切風熱中暑驚悸瘡疹欲出多睡嗽盛面赤手足冷發溫壯睡中驚搐不寧脈洪數頭痛嘔吐

小便黃赤抱龍丸

膽星斤半

天竺黃兩二

朱砂飛二錢

雄黃飛半兩

麝香錢一

牛黃字一

研細滴水丸雞頭大二歲竹葉或薄荷湯化一九

白虎湯治豆疱楚疹斑瘡赤黑出不快及瘡毒餘熱

弄溫熱病中暑煩躁熱渴

石膏兩四

知母兩半

甘草分三

人參兩半

散二錢水一盞粳米廿粒煎七分溫服不時兒戒

半服春冬秋寒有證亦服但加棗乳母亦服

劉氏治內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腮項

結核癰腫毒聚遍身風疹瘡毒赤癩及瘡疹已出未

出不透服三錢水一盞煎七分消毒犀角飲子攻咽痛門

活人書鼠粘子湯同

張氏羌活散治風壅作瘡解熱敗毒

羌活

獨活

川芎

桔梗

蟬蛻

地骨皮

前胡

甘草炙

切勿新書

卷十八

廿四

柴胡

苦蕒根

天麻炙

荊芥

防風

等分細末一錢水三分薄荷二葉煎二分通口服

大小加減

奪命散

升麻

糯米

紫艸

甘草各半兩

木通二錢半

劉服一大錢水七分煎四分溫服量加減

瘡疹出不快第六

養生治瘡出不快倒靨

紫草茸 木通 甘草 枳殼炒

等分末二錢水一盞煎七分溫日二服兒量与

錢乙紫草散治發斑疹

釣藤鈎子 紫艸茸

等分細末一字或半錢溫酒調無時

疹豆論脫齒散

久齒脫落者瓷瓶內固濟煨赤末薄苛酒調半錢

良久脉平和毒氣散瘡如粟米錢乙入麝少許

治瘡出不快活血飲

白芍藥末一錢酒調止痛溫湯調

衛生如聖散療斑疹不快欲倒靨黑凹者

赤芍藥末半錢煎葡萄酒冷調下

董汲紫草散治伏熱在胃暴發豆疱瘡疹一切惡候

出不快小便赤澀心腹脹滿即倒靨門錢

王氏治歲府蘊熱毒氣薰發肌肉生疹豆喉舌生瘡

毒氣未快懊悶氣喘煩渴多睡精神昏塞已發未發

化毒湯同

王氏治斑瘡不發

乳香細研猪心血丸櫻桃大水磨一九

吳氏

旋取猪心血調麝少許塗兩手心并唇上即出極

妙

趙氏治瘡出不快至聖木星飲

朱砂分一 鬱金兩半

細末一二字量兒入龍腦少許新汲水茶脚調後

刺攢猪尾血滴三點入藥服一二時瘡出紅活兒

無他病

鄭愈治麻豆不快紫草膏

紫草 白附子各一錢 麻黃去節 甘草炙各二錢

全蝎個十 殭蚕炒二枚

末蜜一两酒半盞入紫草煎數沸和藥丸阜角子

大服一粒紫草湯化續用黃耆散調治疹後解

瘡疹倒靨第七

靈死龍腦膏治時疾發豌豆及赤瘡子未透心煩狂

躁氣喘妄語或見鬼神

龍腦細研滴猪心血九如雞頭肉紫草湯化一九服少時心神便定得睡瘡疹發透依常將息仍于小猪尾尖取血三五點研入生腦子少許新水調名猪尾膏錢乙未省温酒化下

譚氏奪命丹治瘡疹毒氣不散出不快及觸犯黑色者

黑熟牛李子七八月內探盆內研汁生絹裂出津銀器盛慢火熬膏瓷器收常令透風服一阜子大煎杏膠化人行二十里更進一服瘡疹紅色毒氣

幼幼新書 卷十八

慢錢乙名牛李膏又名必勝膏秋結實黑丸成穗或無生者乾者為末水熬用每膏二兩研入麝半錢貯不津器中九篇衛生桃膠半兩牛李生一兩炒末一錢水七分煎四分温服

錢乙百祥丸治瘡疹倒靨黑陷

紅牙大戟蔭乾漿水煮軟去骨曝乾復內汁中煮汁盡焙末水丸如粟服一二十九研赤脂麻湯下

吐利同無時

藍根散

板藍根兩一 甘草炒三

細末半錢或一錢雄雞冠血三兩點同温酒少許食後調上二方無此證勿服

四聖散治瘡疹出不快及倒靨

紫草茸 木通 甘草炒

黃耆焙 枳殼炒

等分粗末一錢水一中盞煎八分温服無時

張煥治瘡疹斑毒狀如蚊蚤所咬若毒盛色黑者宜

山梔湯兼服宣

幼幼新書 卷十八

山梔仁 白蘚皮 赤芍藥 升麻各一

寒水石 甘草炙各

羅末一錢水八分一盞紫草薄苛少許煎五分温服

服

宣毒膏治毒盛瘡疹出不快倒靨

猪尾血臘月八月刺一 棟乳香 朱砂飛各

甘草 馬牙硝各半 腦麝各一

末猪血拌用寬簷竹筒一個底留節入藥密紙數

重繫合筒口通一竅麻索繫大糞坑屋梁上至清

明取出曝乾入腦麝各一錢研勻滴水丸如皂子
人參湯化

疹豆論化毒散

鬱金一枚 甘草一分

水半碗同煮水乾去甘草鬱金為末入生腦子半

錢研勻生猪血研成膏薄苛湯化一錢二服後毒

從手足心出差一法蟬蛻末半錢好腦子一皂子

大猪心血三陪和膏熱酒浸紫草溫化服移時身

發熱瘡毒頓出後依證調治

幼幼新書 卷一八 光

良方療瘡疹欲發及已發面陷伏不速治毒入藏必

困

臘月猪血瓶盛掛風中令乾半棗大加龍腦大豆

許溫酒調潘醫加萊豆英粉半棗大驗

活人書治瘡疹惡候不快及黑瘡子無比散

朱砂兩一 牛黃 腦麝 膩粉各一分

細研兒一字大人半錢水銀少許同小犢猪尾血

三兩滴新汲水調服睡後下如爛魚腸葡萄穗之

類臭涎惡物便安兒妹汁

聚寶斑疹不出反入抵聖丸

臘月老鷄老翅風乾辰日燒灰用中等犢猪鬃上

刺血九雞頭大服一丸犢猪尾血溫水同化未效

更服

薑汲治瘡疹膿疱惡候危困陷黑救生散

犢猪血臘月取新五錢或掛屋東方陰乾 馬牙兩各一 鵝砂

朱砂 牛黃 腦麝各一分

研極細二歲兒一錢新汲水調大便下惡物瘡疱

紅色為度

幼幼新書 卷一八 手

治瘡疹熱毒內攻紫黑色出不快玳瑁散

生玳瑁水磨濃汁一合犢猪心血一皂子同研紫

草濃煎湯調服

張氏理脾虛吐瀉如斑瘡未出醫用冷藥致瘡內伏

不出將此調理如無汗用控心散發後羌活散並已出未

此名胃愛散

糯米兩一 乾淡木瓜三分 甘草一分 丁香廿五

炒味同 藿香 紫蘇葉各一分

碾末一錢粟米棗湯調下

脫殼散

雞抱出殼新瓦上焙去膜研如粉兒斑瘡倒擲不出或歲府糞血糞黑頭瘡昏睡不醒酒調一字塗兒唇令舐或塗風池背上心前或熱湯調喫

化斑散

石膏煨

知母焙

等分湯調一字服或塗唇上去頭疼除昏發瘡上二方極妙

莊氏斑瘡倒擲并黑色為鬼瘡

幼幼新書

卷十八

三二

人齒炭火燒灰研細豬尾血調二錢移時再服

治瘡倒靨

臘月大糞燒灰為末入生龍腦少許細研新汲水服半錢

王氏

牛蒡子炒半紫草一分

末一錢入麝少許溫酒調三服愈

又

白花蛇連骨一兩慢火炙焦

大丁香一枚

末兒服半錢水淡酒調如黑播者服移時重紅

又

橄欖核中截水磨服

趙氏麻黃湯

麻黃三十寸去節蜜拌炒香紫色水一盞煎六分服神驗

瘡疹太盛第八煩喘躁

活人書犀角地黄湯治傷寒溫病應汗不汗內有瘀血及鼻衄吐不盡內有瘀血面黃大便黑此消瘀血

幼幼新書

卷十八

三二

兼治瘡疹出太盛

犀角一兩無生地黃半斤芍藥三分

牡丹一兩

劉如麻豆服五錢七水盞半煮一盞有熱如狂加黃芩二兩脈大未遲腹不滿自言滿者為無熱不用

疹豆論治瘡未出及雖出燥渴甘草散

大甘草炙末服一二錢水一盞煎六分不時呷少

解利熱毒即止若瘡出遲當服紫草飲初出大人

針兩腕硯子骨間男左女右取灸一壯亦助發毒

已發勿用

麻黃湯治瘡疹煩喘

麻黃

杏仁

桑皮

甘草各一分

劉散藥一兩水七合煎四合溫服若脈數熱未退入竹瀝一半代水煎咽喉痛并嗽入麝少許

瘡疹愛護面目第九

聖惠黃柏膏治疹豆出後即愛護面目勿令沾染先用此塗面後用胡荽酒噴四肢

黃蘗一兩

葦豆兩半

甘草生四兩

幼幼新書

卷十八

廿

擣羅生麻油調薄膏耳前眼唇並厚塗日三五遍早塗令不生疹豆縱出亦少疹豆論葦豆粉三兩半

莊氏令瘡疹不入眼

白芥子末水調傅脚心

王氏疹豆初發便煎油滌撒子之類令兒看哺兒忌醬醋五味馬牛雞戴野味等物止食淡熟猪肉粥飲餅餌之類入少鹽無害又侵晨未起時抱兒井上令投葦莖七粒于井中云使兒斑瘡不入

眼又食熟雞卵等卵未有不損目者雖瘡愈宜數月不食

瘡疹攻咽痛第十

錢乙甘露飲子治心胃熱咽痛口舌生瘡并瘡疹已發未發又治熱氣上攻牙斷腫牙齒動搖

甘草炒

山茵陳葉

石斛

枇杷葉去毛

枳殼炒

黃芩去心

生熟乾地黄焙

天麥門冬焙

等分粗末二錢水一盞煎八分食後溫服齒牙病

幼幼新書

卷十八

廿四

并含嗽滌

治瘡疹未出已出或未勻又治一切瘡涼膈去痰咽痛消毒散

牛蒡子炒二兩

甘草炒半兩

荆芥穗分一兩

粗末三錢水盞半煎一盞溫服不時

活人書如聖湯治瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗

甘草生

牛蒡子炒各一兩 麥門冬兩半

細末二錢沸湯點細細呷竹葉煎尤妙

鼠粘子湯治疹豆欲出未透皮膚熱氣攻咽喉眼赤

心煩

鼠粘子

炒四兩

荊芥穗

兩二

甘草

各一兩

防風

各一兩

羅末二錢沸湯點服食後臨卧日三服大利咽膈

化涎止咳春冬間常服免生瘡癩老幼皆宜

衛生療斑瘡毒攻咽喉音聲不出舌頰生瘡渴逆煩

悶潮熱面赤紫河車散

紫河車

茜草根

貫衆

各一兩

芍藥

甘草

炙各半兩

粗末一錢水七分薑二片煎四分溫服一加牛菜

幼幼新書

卷一八

世

子一兩

薑汲治一切熱毒胃熱發斑消豆疱瘰癧及傷寒入

胃發斑并兒驚癇涎厥走馬急疔熱疔黃瘦喉脾腫

痛及瘡疹毒攻咽喉水漿不下紫雪

黃金

一百兩

寒水石

石膏

各三斤

犀角

羚羊角

各十兩

元參

一斤

沉香

木香

丁香

各五兩

甘草

八兩

升麻

六兩

吹咀水五斗煮金至三斗去金入藥再煎至一斗

去滓投芒硝二斤半微火煎柳木篦攪候凝入盆

中下朱砂麝各三兩急攪勻候冷貯密器勿見風

服一錢溫水化下兒半錢一字咽喉危急少許乾

噤

瘡疹大小便不通第十一赤澀附

張漢川黃散治熱瘡斑瘡大小便不通

川大黃

炒各兩

川芎

各一兩

甘草

黃芩

微炒

枳殼

炒各半兩

羅末一錢水一盞紫草少許煎五分溫服

敗毒牛黃丹治瘡疹出定大便不通瘡出膿汁不乾

幼幼新書

卷一八

世

牛黃

川大黃

各一兩

粉霜

真珠

各一分

研勻煉蜜丸如黍服十粒人參湯下量兒

薑汲治瘡疹欲出胃熱發溫壯氣粗腹滿大小便澀

睡中驚煩渴口舌乾手足微冷多睡時嗽涎實脈沉

大滑數利毒丸

大黃

兩半

膩粉

炒

大青

各一錢

龍腦

朱砂

各半錢

檳榔

生牽牛

各半錢

黃芩

青黛

各一錢本二錢

研細麵糊丸如黃米每二歲八九生薑蜜水下不

動再服量虛實

劉氏治斑瘡水豆心燥發渴及小便赤色口舌生瘡
通心經通關散

山梔子炒一分 大黃炒一分 木通炒 甘草

瞿麥 茯苓 人參 滑石

車前子炒各一分 地扁蓄焙半兩

細末服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢水半

蓋燈心煎數沸溫服

瘡疹便膿血第十二

幼幼新書 卷十八 廿七

疹豆論薤白湯治瘡疹或下痢赤黃膿血身熱

薤白半盞 豆豉一盞 山梔十枚

水五盞煎薤白爛為度量服

董汲治瘡疹陽毒入胃便血日夜無節腹痛啼哭牛

黃散

牛黃錢一 鬱金兩一

研末一歲兒半錢漿水半盞煎三分和滓溫服日

二量增減

瘡疹膿汁不乾第十三

疹豆論治麻豆瘡子已出太盛發潰膿水粘衣着膚
不能轉動疼痛濕爛傳之便乾不成癍痕

牛糞曬乾火煨取心中白者研細綿裹搽瘡處一
用烏牛糞一用黃牛糞

淨黃土羅傳

麥麩床上沾卧將息

瘡疹入眼第十四

龍木論治斑瘡入眼外障初患時覺瘡入眼若不忍
口即疼痛淚出赤澀怕日難開腫便昏如銀色此熱

幼幼新書 卷十八 廿八

在肝上衝眼肝膈壅毒成瞖宜秦皮湯洗服涼肝丸

不宜鑷洗出血點藥搽撥痛定點退瞖藥亦得

惠濟論歌

斑豆纔生眼不開淚流頻有熱橫頭如桃腫赤

如錐痛此疾應知奔眼來因與毒餐同熱麪或

因雞島與戴災急交製造威靈散百日無踰尚

可回

龍木論涼肝丸

防風兩二 黃芩 羌蔚子 黑參

大黃 知母各一兩 人參 茯苓各兩

末煉蜜九梧子大空心茶下十九

秦皮湯

秦皮 兩二 秦艽 細辛 防風 各一兩

甘草 兩半

末二錢水二盞煎三五沸淋洗眼

聖惠寶蒙花散治疹豆瘡并無辜氣入眼活人書

治諸毒入眼

寶蒙花 兩三 青箱子 决明子 車前子 各一兩

幼幼新書

卷十八

藥

羅末羊肝一大片切搽藥肝內濕紙裹煨熟空心

量食

譚氏仙靈脾散

仙靈脾 威靈仙

末二錢食後米飲調下兒半錢趙氏治食毒睛突

外

養生治目暴赤腫痛兒斑瘡入眼

蘇子 炒

蔓菁子 絹袋盛針上蒸焙炒香

甘草 炙

木賊 去節

等分末沸湯點一錢食後服日三

又方

穀精草 蛤粉

等分末一錢豬肝二兩批開搽藥青竹葉裹麻縷

札定水一碗煮熟收瓷瓶內薰眼候溫食日作不

十日退

錢乙蟬蛻散

蟬蛻 兩一 猪懸蹄甲 二兩礮內鹽泥固煨存性

幼幼新書

卷十八

藥

研入羚羊角末一分拌勻服一字百日兒半錢溫

水或新汲水調日三四夜一二食後服一年外難

治瘡疹太盛宜調肝散令不入眼 已出未出門聖

治瘡疹入眼

馬屁勃 蛇皮 各半兩 阜角子 十四枚

入小罐鹽泥固濟燒存性研細溫酒調一二錢食

後服

治瘡疹入眼成醫

蟬蛻末水煎羊子肝湯調服二三錢凡豆瘡纒欲着痂即用酥或面油不住潤可揭即揭不然瘡痂硬即隱成癍痕

張漢决明丹治疹豆瘡後毒氣入眼

决明子 蜜蒙花各一兩 青箱子 車前子

川黃連 羚羊角各半兩

羅細末煮羊肝一具切破同搗一二百下丸如黍

服十粒荆芥湯下食後量與

護目膏截斑入眼

幼幼新書 卷十八

黃蘗炙 菘豆 紅藍花各一兩 甘草生半兩

羅末脂麻油調如薄膏從耳前眼眦外塗時時用

惠濟威靈散治斑瘡雀目眼生翳

威靈仙 仙靈脾 甘草炙 茯苓

子芩 青箱子 大青 芍藥

大黃蒸

等分細末半錢或一錢獾猪膽宜肝 二枚批開搽

藥麻纏米泔煮熟冷喫

良方治豌豆瘡入目痛楚恐傷目

浮萍陰乾肝一二錢羊子肝半個入盞內杖子刺爛投水半合絞肝汁調食後服傷目者十服差神驗

疹豆論蕤仁散

蕤仁炙 黃芩 梔子仁 黃連

黃蘗皮 川升麻 甘草炙各一兩

細末二錢水一盞煎六分食後溫服量兒如生醫

蕤仁蒙花散

幼幼新書 卷十八

蜜蒙花三兩 井泉石 青箱子 决明子

車前子各一兩

細末同蕤仁散各半羊肝一片批開搽藥濕紙裹

煨熟空心量力食醫退止

活人書撥雲散治疹豆瘡入眼生翳

桑螵蛸一兩炙焦細研入麝少許服二錢生米泔

調臨卧服

通聖散

白菊花無甘菊代不如白者 菘豆皮 穀精草去根

幼幼新書 卷一八

各兩

羅末服一大錢乾柿一個生粟米泔一盞煎候泔

盡乾柿去核食不時日喫三枚遠年者半月

劉氏目中痘瘡成醫

大黃錢炒二 水銀錢半

男津唾化水銀為泥入大黃末冷水調塗顙如乾

水濕

羚羊角丸治眼昏澀赤脉侵睛淚多作障

羚羊角 黃芩 大黃 芥菜子各二

切切新書

卷十八

聖

當歸 元參 甘草炙

木賊 蟬殼 玢珠 决明子各炒

荆芥穗 川白芷 蒼朮米泔一

宿焙各二兩 羌活兩一

末煉蜜丸如彈子食後荆芥湯嚼一九兒斑瘡眼

蟬蛻湯下

莊氏治斑瘡入眼及累黑睛樺皮散

樺皮 頭髮 蛇蛻各半兩

剉淨羅內點火燒煙盡細研服半錢黑豆湯入酒

三滴調日五

又方

黃芩末內臘月黃牛膽中吊北陰中旋九菜豆大

翅湯下五丸三年外不治

善化陶宰方

生鱉血點眼良

丁時發黃芩散

黃芩 山梔子 黃丹

等分末牛蒡子葉汁調塗頂

切切新書

卷十八

聖

丁安中蟬退散治斑瘡昏障

蟬蛻 蛇蛻炙 川升麻 蒺藜炒去

黃連炒 穀精草 大青艸 仙靈脾

威靈仙 井泉石各半兩 朱砂 螺粉各一分

細末半錢一錢蜜水調大小加減

聖惠灸大杼二穴各一壯項後第一椎下兩傍各寸

半啗者中炷如麥

瘡疹後解餘毒第十五

聖惠大黃散治疹豆瘡出盡宜服

川大黃炒 黃芩 黑參各半

搗羅服一錢水小盞煎五分量溫服疹豆論多山

梔 普氏治疹豆不出或用藥發後餘熱未退渴飲水乃

下血斑疼痛牛蒡散攻咽門錢乙消毒散以薄荷湯調未出紫草湯

瘡疹後滅癩痕第十六

葉氏傷寒發斑是熱毒所為病折則瘡愈而毒尚未全散故瘡癩雖落癩猶壓或凹凸宜消毒滅癩藥傳

之

幼幼新書 卷一八

譚氏療兒面上瘡豆癩

黃明膠慢火熬末溫酒調一錢七出者服之無癩未出瀉下

又蜜陀僧細研水調夜塗旦洗

聖惠治熱毒發疹豆瘡初愈宜塗

胡粉兩一 膩粉分一

和研入鍊子猪脂拌如膏夜薄塗瘡上以漿水洗去

又方

鷹糞白兩一 衣中白魚升

細研白蜜調如稀飴塗

又方

牡蠣煨三 土瓜根兩一

羅夜取二錢白蜜調塗面及瘡癩旦煖漿水洗

滅癩膏

馬齒莧升一 鍊成猪脂兩三

和慢火熬成膏日夜塗痕上

又方

幼幼新書 卷一八

羊脰乙具酒乙升浸

牛酥兩四

銀鈿內慢火煎三五沸新絲濾淨器盛夜塗面旦用生甘草一兩漿水二大盞煎七八沸溫洗面

又用猪脰一片天鼠二枚製塗同上

又鷄鷄糞二兩臘月猪脂三合調塗

洗方

豉升一 羊糞合一

和水一斗煎十沸洗痕

良方滅癩

頻搗去痂勿令隱肌不成癥縱有微血以面膏塗
無苦瘡家勿食雞鴨卵即盲瞳卵白尤速戒之

幼幼新書卷第十八

幼幼新書

卷十八

章禁之刑

幼幼新書卷第十九

諸熱痰涎 凡一十門

後學古吳陳履端于始輯

吳苑沈邦謨伯宏校

胎熱第一

第先生兒生二七日遍身黃疸腫滿眼不開呻吟因
母胎時身體不安而服藥兒在胎受毒有此以紫龍
水方日洗三次後牛黃膏妳上吮隔熱日四服三日
愈如肚臍身黃腫不退握拳眼視不治

錢乙論胎肥兒生肌肉厚遍身血色紅滿月後漸瘦

幼幼新書

卷十九

章禁之刑

目白睛粉紅色五心熱大便難時時生涎又胎怯生
下面無精光肌肉薄大便白水身無血色時時硬氣
多噦目無精彩又胎熱生下有血氣時叫哭壯熱身
如淡茶色目赤大便赤黃糞稠急食乳並主浴體法
播擲更別父母肥瘦瘦不可生肥肥不可瘦也

萬全朱砂丸治胎熱心藏氣壅煩熱驚悸

通明朱砂 龍膽

黃連各半

鉛霜

鐵粉飛各一分 牛黃錢一

末粟米飯丸如菜豆薄苛蜜水送五丸量加減

膈熱第二 亦名 壅熱

醫局涼膈散治腑臟積熱煩躁多渴面赤頭昏唇焦
咽燥舌腫喉閉目赤鼻頰頰結硬口舌生瘡痰實不
利涕唾稠黏睡卧不安譫語狂妄腸胃燥澀便秘一
切風壅膈熱

川大黃 朴硝 甘草 各二兩 山梔仁

薄苛 黃芩 各十兩 連翹 二斤

末二錢水一鍾竹葉七片蜜少許煎七分食後溫

服兒半錢更隨歲加減利下住服

幼幼新書 卷十九

治上膈壅熱口舌生瘡咽嗑腫塞疼痛妨悶慘患處

嚙津兒瘡疹毒攻口齒先用五福化毒丹後龍石散

朱砂 飛二兩 生腦子 一分 寒水石 燒赤二斤

末日五七次夜卧搽

牛黃涼膈丸治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩

潮熱痰涎壅塞咽膈不利精神恍惚睡卧不安口乾

多渴唇焦咽痛頰頰赤腫口舌生瘡

牛黃 一分 甘草 各十兩 寒水石 牙硝 各

石膏 各廿兩 紫石英 飛 腦麝 各五兩 膽星 七兩

末蜜丸每兩作三十九溫薄苛人參湯嚼一九食

後服常服半丸治急驚並薄苛水化

朱砂九鎮心神化痰涎利咽膈止煩渴

朱砂 飛五兩 寒水石 燒赤四兩 腦子 牙硝 各

梅花腦子 麝 各半兩 甘草 五斤浸 鵝砂 一分

研甘草膏和一分一九含化兒夜驚啼薄苛水化

良方解暴熱化涎涼膈清頭目龍膽丸

草龍膽 白礬 各四兩 天南星 半夏 水浸

水雪水煮三五沸焙各二兩

幼幼新書 卷十九

末麪糊丸如桐子臘茶清下三十九食後臨卧糊

稀如濃漿和痰壅膈熱頭目昏重服之頓清頰南

瘡毒纒覺意思昏悶速服便解咽喉腫痛口舌生

瘡凡上壅熱涎諸證悉宜兒尤良

莊氏洗心經退膈熱牛黃散

牛黃 一分 胡黃連 三兩 大黃 半兩 甘草 炙

犀角 各半兩

末半錢一字薄苛湯調下

丁時發天竺黃散治上焦熱煩躁

天竺黃

甘草炙

朱砂

雄黃

白附子

全蝎

鬱金

早角水 輕粉各一分

牙硝兩半

腦麝許少

末半錢薄荷湯調蜜亦可

胃熱第三脾熱

菓氏兒血氣俱盛府藏皆實故胃生熱大便黃四肢

溫壯翕然體熱

錢乙美舌者脾藏微熱令舌絡微緊時時舒舌漸與

瀉黃散時或飲水醫疑為熱而冷藥下之甚誤飲水

刀切新書

卷十九

四

者脾胃虛津液少也加面黃肌瘦五心煩熱即為疳

瘦宜胡黃連九葷病後虛 大病未已美舌者凶

聖惠麥門冬散治胃熱心腹煩悶不欲乳食

麥門冬焙

赤茯苓

黃芩

茅根

甘草炙各半兩

蘆根二分

犀角一分

粗羅一錢水一盞竹葉七片煎五分不時量兒分

減溫服

苦蕒散治胃熱煩悶不欲乳食體黃多渴

苦蕒

蘆根

柴胡

黃芩各三分

川大黃炒

甘草炙

川芒硝

麥門冬焙

石膏各半兩

粗散一錢水一盞五分煎加減溫服

胃中熱日漸肌瘦梔子仁散

梔子仁

甘草炙

黃連

黃芩各半兩

粗散一錢水一盞煎五分量加減溫服

錢乙瀉黃散一名瀉脾

藿香七錢

山梔仁兩

石膏兩半

甘草兩三

防風兩

幼幼新書

卷十九

五

劉蜜酒微炒香為細末服一二錢水一盞煎五分

溫服清汁無時

藿香散治脾胃虛有熱面赤嘔噦涎嗽及轉過度日

藿香一分

半夏麴炒

甘草炙

麥門冬焙

末半錢至一錢水一盞煎七分食前溫服

活人書甘露飲治胃中客熱口臭不思飲食或飢煩

不欲食齒斷腫疼膿血舌口咽中有瘡赤眼目驗重

不開瘡疹已發未發

熟地黃

生地黃

天門冬

麥門冬焙

枇杷葉

枳殼炒

黃芩

石斛

山茵陳

甘草炙

等分細末二錢水一盞煎六分食後臨卧溫服

風熱第四

素問通評虛實論帝曰孔子病熱脉懸小者何如岐

伯曰手足溫則生寒則死中風熱喘鳴肩息者脉何

如岐伯曰喘鳴肩息者脉實大也緩則生急則死

聖惠兒心肺壅滯內有積熱因解脫風邪傷皮毛入

箴府令惡風壯熱胃膈煩悶目澀多渴名風熱

幼幼新書

卷十九

六

漢東王先生兒發熱煩叫不時面青為風熱

錢乙急欲乳不能食客風熱入臍腹流心脾即舌厚

唇燥口不能乘乳當涼心脾

顛顛經側栢散

側栢

鬱金

天麻酒浸

乾蝎

天南星

地黃

子芩

大黃各半

散治風及驚煖酒下退熱每夜湯下半錢

紀用經主兒百病消風涼肌解熱止煩不生瘡癩除

寒熱痰嗽赤目咽痛血痢渴躁長肌肉利心肺涼而

有補身體有瘡膿潰赤腫悉療蜀脂飲

蜀脂黃耆也炙生龍西即陽者大焦色黃白甘美

腫出原寧宜州者亦佳脂西者最佳皮赤主消磨

折之不斷若綿為上 甘草四分

末方寸七水一升煎三分三服溫涼適性以歲加

減保子七聖至寶之一

渴

矜羊角 麥門冬 甘草三分 白蘚皮

川升麻 茯苓 人參 黃耆各半

幼幼新書

卷十九

七

篩一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合更煎一

兩沸分二溫服量與

白蘚皮散治心肺風熱壅滯胃膈不利

白蘚皮 犀角 黃芩 知母

防風 沙參 人參各半 甘草一分

篩散一錢水一盞煎五分量兒溫服

肝肺風壅致心膈不利痰嗽大麻仁散

大麻仁 犀角 杏仁炒 百合各半

檳榔分一 牛黃 龍腦各一

細羅薑甘草湯調半錢量加減

真珠九治風熱心神驚悸卧不安眠

真珠 龍膽 防風 羌活

鈞藤 川升麻 天竺黃 牛黃各一分

茯苓 人參 羚羊角 犀角各半兩

鈎霜 腦麝各一分

羅末蜜丸如萊豆荊芥薄荷湯研五九日三四量

加

治心肺風熱龍膽丸

幼幼新書

卷十九

龍膽錢三 牛黃錢一 川大黃 胡黃連

犀角各二錢

羅末蜜丸如萊豆薄荷湯化五九量加減

治心藏風熱昏憤躁悶不下食梨湯粥

梨三枚 粳米合

水二升煮梨汁一盞去滓投米煮粥淡竹葉茵陳亦可煮粥

靈苑治驚風內外熱心胃煩悶不思飲食吐逆不止

及諸般風熱大效三解散

川大黃炒 芍藥 甘草炙 乾蝎

白僵蚕 桔梗 人參 鬱金各一分

白附子 防風 黃芩各半兩

羅散壯熱吐瀉防風麥蘖湯調一字至一錢量與

只身熱甘草柳枝湯不退熱蜜牛蒡子薄荷湯調

吐瀉不止用後方

肉荳蔻三個 麝

細末裹麝和杵丸如萊豆飯湯吞五七丸立止

醫局治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱

氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠黏心

幼幼新書

卷十九

神煩躁睛澀睛疼及寒壅不調鼻塞聲重咽乾多渴

五心煩熱小便赤澀大便秘滯洗心散

大黃炮 甘草炙 當歸 麻黃全

芍藥 荊芥穗各六兩 白朮十五兩

細末二錢水一盞薑薄荷各少許煎七分溫服量

兒麩豆瘡疹欲發先狂語多渴及驚風積熱臨卧

服一錢大人五藏壅實欲轉四五錢熱服

牛黃生犀丸治風盛痰壅頭痛目眩咽膈煩悶神思

恍惚心忪面赤口乾多渴睡卧不安小便赤大便秘

兒風熱痰壅

牛黃

生犀各二兩半

牙硝

半夏製

天麻各廿兩

羚羊角

膩粉

黃丹

雄黃飛五兩

龍齒飛

朱砂飛各十兩

龍腦二兩半

水銀鉛結砂子十兩

末蜜和每丸二錢溫薄苛湯化中風涎潮牙關緊

急昏迷不省膩粉二錢藥三九薑汁七點薄苛水

同化吐利逐痰涎愈兒風熱痰壅睡卧不安上竄

齧齒服半丸如急驚涎潮搐搦目戴牙緊加減以

幼幼新書

卷十九

十一

歲

治風熱攻咽喉痛痺腫塞及肺壅欬嗽咯嚔膿血胃

滿振寒咽乾不渴時出濁沫氣息腥臭久吐膿

桔梗兩一 甘草炙二兩

粗末二錢水一盞煎七分食後臨卧溫時時呷

風熱痰實咽膈不利口乾煩渴睡卧不安及中暑頭

痛躁渴不解鶴頂丹

寒水石百十兩 麝二兩半

甘草炙卅五兩

朱砂飛百兩

牙硝枯百廿五兩

末蜜和每丸重錢二分大人薑湯化如中暑入生

龍腦少許新水化兒分四服更加減兒府藏積熱

心神不寧夜卧狂叫口舌生瘡薄苛汁化並食後

服

嬰孺治癩痒痒痛如疥搔之汁出瘡瘡如麻豆年年

喜發面目虛肥毛髮細黃皮膚薄而光澤時生皰氣

此少時熱盛極體當風風熱相搏不治成大風疾枳

實丸

枳實麩炒六分

菊花

蛇床子

防風

刀斤書

未一七

上

白薇

蒺藜

浮萍草各四分

天雄炮

麻黃去節

漏蘆各二分

末蜜丸大豆許五歲飲服十九至二十九大人作

散酒服量歲與兒

錢乙抱龍丸治傷風瘟疫身熱昏瞤氣粗風熱痰實

壅嗽治驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實

兒宜時服

天竺黃兩一

雄黃飛一分

辰砂

麝兩半

膽星兩四

細末煮甘草汁和九皂子大溫水化量加大人三五丸亦治室女白帶伏暑鹽嚼一二九新水下脫雪水煮甘草佳一法水浸南星三日候軟煮三五沸取白軟者切焙黃八兩甘草二兩半拍破水二碗浸一宿慢火煮半碗旋洒南星末慢研八餘藥孔氏加牛黃半分活人書連翹飲

連翹 防風 甘草 山梔子
等分羅散二錢水一盞煎七分服

幼幼新書 卷十九

惠眼烏犀膏解風熱開胃下膈

乾地黄 玄參 牛蒡子炒各半兩 甘草炙一分

龍腦許少

末蜜為膏服兩皂子蜜湯下

張氏天竺黃散治風熱驚風

天竺黃 蟬殼 白殭蚕 山梔子

甘草炙 鬱金

等分羅末一錢湯調三歲半錢牙兒一字

大牛黃丸治一切風鎮心化涎療風壅痰實頭痛目

眩怔忡惡心神昏語澀頸項拘急手足麻痺及兒風熱上盛眠睡不安頰赤涎潮欲變驚癇悉有風涎最宜常服

牛黃 生腦子各半兩 朱砂兩 天南星水

煨火煮透切焙 烏蛇肉酒浸 白殭蚕炒 肥白天麻

人參各一兩 乾全蝎 白附子各炒 水磨雄黃

生犀各三 麝分一

細末蜜丸如雞頭服一二粒細嚼人參薄荷湯送

化亦得食後臨卧

幼幼新書 卷十九

兒風熱肌瘦五心煩熱不長肌肉面黃痿瘦夜卧不安時發虛汗或巖府泄瀉變痢四順散

銀州柴胡 地骨皮 白桔梗各三錢 甘草炙錢

焙末一錢加減水三分煎分半溫服

莊氏天竺黃散

天竺黃 人參 甘草炙各一兩 鬱金煨二兩

白藥子二兩皂角三挺碎浸三宿焙

羅末一錢蜜湯調常服甚妙

吉氏蟬蛻散治風熱面赤壯熱

蟬蛻 <small>三個</small>	漏蘆	羌活	天麻
防風	當歸	升麻	川白芷
射干	苦桔梗	甘草 <small>炙</small>	川芎
地骨皮			
等分末一錢水一盞煎四分溫服			
煩熱第五			
巢氏兒藏府實血氣盛者表裏俱熱則苦煩躁不安			
皮膚壯熱			
形證肺藏伏熱歌			
幼幼新書 卷十九			
肺家伏熱病難測夜卧心煩大便結勸君微取			
兩三行次進溫平藥教喫如加口臭臯清涎更			
問根源須保惜若還壯熱怕難醫妙劑休來謬			
相逼			
此大小腸風結澀不通進寬大腸檳榔散潮熱口			
臭臯清涕忍難治脾肺損也			
陶隱居去煩熱驚氣			
景天葉煎湯浴			
千金竹葉湯王五心熱手足煩疼口乾唇燥胃中熱			

竹葉	小麥 <small>升各一</small>	知母	石膏 <small>各三</small>
黃芩	麥門冬	茯苓 <small>各二</small>	人參 <small>兩</small>
薑 <small>五兩</small>	甘草 <small>炙</small>	苦蕒根	半夏 <small>各一</small>
吸咀水斗二升煮竹葉小麥取八升去滓內藥煮			
三升分三服老小五服			
聖惠黃芩散治藏府壅實心神煩熱睡卧不安			
黃芩	川大黃 <small>炒</small>	甘草 <small>炙</small>	川芒硝
麥門冬 <small>焙</small>	石膏 <small>各半</small>		
粗散一錢水一盞煎五分量兒分減不時溫服			
刀斤書 卷十九			
治氣壅煩熱心躁目赤大青散			
大青	川大黃 <small>炒各半</small>	牛黃 <small>分半</small>	朱砂
甘草 <small>炙</small>	犀角	玄參	川升麻
梔子仁 <small>各一</small>			
細散不時沙糖水調下半錢更量加減			
治心藏積熱煩躁恍惚牛蒡粥			
粳米一合水一大盞煮粥臨熟投牛蒡根汁一合			
攪勻空腹溫食			
靈苑小金箔丸解心藏壅毒咽喉不利上壅口瘡夜			

卧不穩心隔煩躁化風痰安竟竟治驚邪鎮心神解
室女骨蒸熱勞

金箔片五 朱砂 琥珀 雄黃

鵝砂 鉛白霜錢各二 白龍腦 生犀

天竺黃 寒水石三錢各 牛黃許少

細末粟米餅丸如小荳竹葉蜜湯下五九

嬰孺治煩熱雷丸浴湯

雷丸個廿 大黃兩四 黃芩兩一 丹參兩一

苦參 石膏各三

幼幼新書 卷十九 十六

水二升煮升半浴兒訖粉之勿厚衣一宿復浴避

陰及日一方石膏半升雷丸五兩雪水六升煮二

升帛染拭頭體

萬全茯神散治煩熱多驚

茯神 人參 天竺黃 釣藤各一

牛黃分半 麝香 甘草各半

末半錢竹葉湯調

又竹瀝磨犀角濃量服
形證論檳榔散治伏熱心煩踈風順氣

檳榔 大王蒸 青皮各一 黑牽牛錢一

炒 木香許少

末薄苛蜜水調一錢服

潮熱第六

漢東王先生兒早晚發熱兩度為驚熱世呼潮熱

潮熱因血氣壅盛五藏生熱熏發于外大體類温壯

或夾伏熱大便黃臭帶宿寒大便白有酸氣皆藏府

不調冷熱之氣俱盛腸胃蘊積為温壯候也不盛者

宜麥湯散解傷寒發 次金蓮散退熱夾驚傷 更進七

寶輕青丹傷寒發 依次服熱轉盛睡裡多驚宜鐵涎膏

又不退是有驚積食積瀆下水精丹利夾食傷 有五

色積如魚涎黏滑物下即驗人參散夾食傷 觀音散

胃氣不 調理餘熱未退宜輕青丹

錢乙論徐氏子三歲病潮熱每日西發搖身微熱而

目微斜露睛四肢冷而喘大便微黃錢曰搖者肝實

也日西身微熱者肺用事潮熱肺主身温且熱者肺

虛所以目微斜露睛者肝肺相勝也肢冷者脾虛也

肺虛甚女脾亦弱木氣乘脾四肢即冷進益黃散胃

不和 阿膠散喘效上 脾虛證退後以瀉青九驚熱 瀉

赤散實熱 涼驚九治驚一切 九日後愈

嬰孺治驚啼積熱潮作惕惕為病大便青黃赤白

牛黃銖八 牡蠣煨 雄黃銖十 朱砂銖五

巴豆洋二 個炒

末蜜和杵千下月外兒黍米大先發時飲下三九

日二量加乳母抱卧輕汗解可再服若傷乳不安

腸中有痰微下如斷雞子鳥糞臯滯止藥

漢東王先生治諸驚夜喘手足微動潮熱鐵涎膏

幼幼新書 卷十九

鐵焰粉 白附子 辰砂銖一 腦麝字一

丁頭代赭生半 兩

細末蒸棗爛杖為膏嬰孩服半皂子大量加金銀

薄苛湯化

寶鑑牛黃散治驚熱潮熱

牛黃字一 麝字半 朱砂銖二 甘草銖一

馬牙硝 天竺黃各一 銖 鬱金半兩 浸透 水

散薄苛湯服半錢

釣藤飲

釣藤 大黃煨 甘草炙 芍藥

乾地黄各一 兩

粗篩一大錢水一盞煎半盞服

聚寶釣藤散治風驚疳潮等熱

釣藤兩一 史君子 白蠟直 乾蝎各七 個

人參 白茯苓 甘草炙 紅芍藥

當歸 天麻 川大黃各一 分

末一錢竹葉少許大豆廿一粒煎七分不時溫服

張氏

幼幼新書 卷十九

當歸 赤芍藥 柴胡 茯苓

等分末一錢水半盞煎二分通口服

莊氏龍麝青金丸鎮心壓驚退潮熱治盜汗殺疳蛔

療腹大止瀉痢安五藏益顏色治瘡疥長肌膚

腦麝字一 青黛 雄黃 朱砂

胡黃連 蘆薈 膩粉各一 銖

末猪膽蒸餅丸如棗豆晒乾麝器收服二三九一

切驚悸體熱瘡疥薄苛湯一切疳氣瀉痢蛔虫米

飲常服百病不生

孔氏羌活散治寒邪時氣瘡疹變蒸潮熱涎嗽頭疼

川羌活 白獨活 柴胡 芩

人參 枳實炒 白茯苓 甘草炙各一兩

前胡 地骨皮 天麻酒浸 桔梗各半

末一錢水七分盞薄芎少許煎五分不時溫服

趙氏治驚風潮熱神志不寧驚惕忪悸夜卧不安狂

語驚啼服涼藥過多脾胃虛寒陰極似陽頰赤神昏

引飲煩躁不進乳朱砂膏

朱砂 人參各二錢 蝎梢廿一 蠶蚕酒浸

幼幼新書 卷十九 十一

天仙子酒炒各一分 大天南星一個酸薑汁洗去滑火炮

裂末薑汁和餅火炙黃三次用

末煉蜜為膏薄芎湯下皂子大

鄭愈秦朮散

秦朮 柴胡 大黃各一

末半錢水五分韭白三寸煎三分不時溫服

又方

知母 貝母各半分 寒水石 牙硝各一分

荷葉一兩水煮五七沸

末蜜水調半錢服

天竺黃散治驚風潮熱溫壯等兼治夜啼

天竺黃 鬱金各二錢 甘草炙 朱砂

麝許各少 山梔仁十 乾葛 全蝎炙

馬牙硝各一分 蠶蚕炒 蟬蛻各七

末一字薄芎蜜水調夜啼燈心湯

積熱第七

王訣論積熱者因口不慎味常餐黏食腥膻肥膩冷

滑瓜果之物已傷脾胃胃府虛微結實難化生瘡癥

積或胃脅間攻衝榮衛嘔逆氣粗眼澀加渴泄瀉兩

脅脹滿以湯散續便宜疎宣服千金丸

形證論心藏積熱歌

孩兒有積饒多渴乳食都忘困難撥壯熱瀉食

食不消四肢逆冷吐時厥瀕知心藏積居中取

積于中方退熱熱退調和即有功莫使結毒怨

驚掣

先取積後調氣母小熱不妨取虛中積皂角膏

靈苑金沙丹治諸驚積熱解痰毒

光明砂	麒麟竭	沒藥	甘草
生白麵	麝香		一分
研軟飯丸如小豆薄苛水化	三九加減視歲	醫局取積熱妙香丸	辰砂
			兩飛九
			牛黃
			膩粉
			腦麝
			各三分
			金箔
			片九十
			巴豆
			淨肉三百
			十五粒
研煉黃蠟六兩白沙蜜三分和每兩作三十九解	五毒潮熱積熱等疾如治潮熱積熱傷寒結胃發	勿勿新書	卷十九
黃狂走躁熱口乾面赤大小便不通大黃炙甘草	湯下一丸毒利下血煎黃連調膩粉下酒食茶毒		
氣痰伏痞吐逆等膩粉龍腦米飲下中毒吐血胸	亂煩躁欲死生人血下立愈兒百病急慢驚癇涎		
搐龍腦膩粉蜜湯下菜豆大二九諸積熱積食煩	赤煩躁睡卧不寧驚哭瀉痢金銀薄苛湯下更量		
加減男婦傷寒時疾陰陽氣結伏毒氣胃中喘躁	眼赤潮發半月未安脉息交亂量服一丸龍腦膩		
粉米飲調半盞服要藥速行針劑一眼冷水浸之			

效	天竺飲子治府藏積熱煩躁多渴舌頰生瘡咽喉腫	痛面熱口乾目赤鼻衄丹瘤結核癰瘡腫痛又伏暑	躁熱瘡疹餘毒便血小便赤澀	甘草	斤	大梔子仁	妙	連翹	各四	菴藪根	斤
				雄黃	兩	鬱金	兩	切	兩		
				細末	一大錢	食後臨卧	新水調服	兒半錢	更量		
				玉訣千金丸							
				生大黃		滑石		皂角	炙	巴豆霜	
				勿勿新書	卷十九						
				等分末	麵糊丸	如粟茶湯下	五九十九				
				形證論	先取積熱	後用調理	皂角膏				
				人參	錢	白朮	二錢	甘草	炙	白茯苓	
				鴛粟子	錢	白附子	分	藿香		丁香	各半
				末紫蘇湯下	半錢	一錢					
				劉氏防風散	治五藏積熱	驚風頭面赤熱	口舌生瘡				
				好飲冷							
				防風		甘草	炙	柴胡		連翹	
				山梔子							

等分粗末一錢水五分煎三分溫服一歲分四服
量力加減

莊氏治積熱諸疾初冬壅熱涎嗽蟬殼丸

蟬殼 麝 天南星各半 朱砂分二

蝟一個

未爛飯丸粟米大熱水吞五七丸

越桃飲

山梔 甘草 紅芍藥 大黃各一

連翹 黃芩各半

幼幼新書 卷十九 廿四

未半錢至一錢蜜湯調

療心藏積熱口瘡延壽膏

白羯羊膽臘日探臘 馬牙硝兩半 朱砂分一

研盛膽內當風懸過清明再研入腦麝少許生蜜

和瓷器盛量服如紫雪法

吉氏金露散

鬱金一個煮 天竺黃 大黃蒸三 乾地黃

牙硝各一 甘草兩半

細末半錢漿調服

實熱第八

錢氏兒實熱踈轉後無虛證勿長溫補熱又隨生
姬和衆治腦熱常閉目

大黃水浸一宿服半合餘者塗頂

聖惠治心神煩熱時行溫病癩癩熱毒風壓丹石百

毒去頭疼赤眼口瘡酒黃一切熱病碧雪煎

大青 竹茹 子芩 甘草生

枳殼 地骨皮 龍腦 玄參各三

吳藍葉 麥門冬 犀角 赤茯苓

幼幼新書 卷十九 廿五

川升麻 羚羊角各二

細剉水二斗煮一升去滓澄清

龍齒 牛黃兩二 麝兩一 青黛兩五

川朴硝七斤煉

細研先下朴硝慢火煎攪稀稠得所入諸藥勻羹

器收冷水調半匙量服

醫局八正散治心經邪熱蘊毒咽乾口燥大渴心忪

面熱煩躁目赤睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽嗑腫痛

小便赤澀或癃閉不通及熱淋血淋

嬰麥	木通	滑石	扁蓄
車前子	山梔仁	甘草	大黃
散二錢水一盞燈心煎七分食後臨卧温量服	斤各一	大黃	倍
養生知母柴胡湯治實熱眼赤口瘡傷寒後煩渴手足熱	知母	柴胡	茯苓
甘草	人參	茯苓	茯苓
等分末二錢水一盞煎七分食後温服日三	茅先生三解牛黃散治實熱潮熱	白蟻蚕	全蝎
防風	白附子	桔梗	川大黃
甘草	白茯苓	川黃芩	人參
川鬱金	水煎	等分末服半錢一錢薄苛蜜湯調	嬰孺消熱大黃丸治熱實黃瘦大便澀食少兼驚
大黃	柴胡	升麻	杏仁
芍藥	枳實	黃芩	知母
梔子仁	釣藤皮	寒水石	細辛

末蜜丸如大豆白飲下三歲十五丸通為度	錢乙治心氣實合卧則氣不得通故喜仰卧瀉心湯	黃連一兩細末服一字至半錢臨卧温水調	治心熱口氣温或合面腫及上竄咬牙皆心熱也導赤散	生地	木通	甘草				
等分末三錢水一盞竹葉煎五分食後温服一無甘草用黃芩	三黃丸	黃芩	大黃	黃連	細末麪糊丸如菘豆服五七丸至二十九食後米飲下	白虎湯解暑毒煩躁身熱痰盛頭痛口燥大渴	知母	甘草	石膏	白粳米
粗末三錢水一盞煎八分食後温冷随意服氣虛加人參	張漢清肌散初春不問有病無病服解積熱	當歸	川大黃	人參	芍藥					

甘草 炙 犀角 各半

羅末一錢水一盞薑三片竹葉二片煎五分溫服
乳後量加減

劉氏竹茹飲

人參 白朮 炒 茯苓 乾葛

麻黃 淨酒浸 甘草 生熟 麥門冬 並減

末量服半錢一錢三錢竹茹多于藥水半盞同煎
至四分不甚熱去門冬

莊氏牛黃膏治心藏熱

幻幻新書

卷十九

廿

牛黃 腦麝 各少 馬牙硝 錢 甘草 炙

雄黃 各半 川大黃 鬱金 各一兩 薑 水煎

研如麪煉蜜丸如菘豆服三九新水磨更量

孔氏治熱只服調胃承氣湯量虛實 傷寒

王氏紫霜散治心藏實熱安魂定魄

朱砂 兩 鐵粉 兩 鈔白霜 天竺黃

甘草 炙 人參 史君子 各一錢 腦子 錢

末瓷器盛蜜水調半錢服

極熱第九

千金翼七水凌主大熱

朴硝 鹵鹹 如凌者 芒硝 雪白 滑石 斤

玉泉石 石膏 凝水石 雪白 各

別擣篩

凍凌水 寒泉水 各五升 霜水 雪水

兩水 各一升 露水 東流水 各五升

七水澄清銅器中內上散微火煎七升一宿澄清

入甕中淨處貯之重帛繫口一百廿日結凍凌

狀名七水凌服金石發熱者并華水和五分分服

幻幻新書

卷十九

廿

熱定傷寒發熱服一刀圭兒與麻子許勿多藥皆

上好者合以臘日清淨處先齋七日不履穢汗喪

孝產婦之家不食雞犬六畜產婦六根不全及多

口饒言人見不信敬人勿與服熱退後七日慎酒

肉五辛勿喜惡口刑罰仍七日齋戒持心清淨

主脚氣毒遍內外煩熱口瘡狂叫走及解州石藥毒

卒熱黃瘴疫等紫雪

金斤 寒水石 石膏 磁石 各三斤

研水一石煮四斗去滓

升麻 玄參 升各一 羚羊角 青木香

犀角 沉香 各五 丁香 兩四 甘草 兩八

吹咀內汁中煮一斗去滓入硝石朴硝各四升煮

七升投木器中入朱砂三兩麝半兩攪寒二日成

雪紫色強人服三分七利熱毒老小意量一劑可

置十年千金翼玄霜同

痰涎第十

聖惠兒多涎者風熱壅脾積聚成涎即乳食不下涎

沫結實而生壯熱

幼幼新書 卷十九

錢乙論熱不可下朱監簿子五歲夜發熱曉如故醫

以鐵粉丸下涎病益甚至五日大引飲錢取白朮散

和胃氣不 一兩煎三升任意服朱疑其瀉錢曰縱瀉勿

怪但不可下耳止瀉治痰退熱清神皆此藥也又煎

三升服稍盡愈第三日又服三升不渴無涎投阿膠

散二服安 喘效上

驚風痰熱堅癖不用水銀輕粉不得已用之去疾止

蓋兒腸胃易傷亦損口齒

真珠囊兒水食積胃膈結成痰乳食不下吐涎壯熱

即發驚癇

圖經薄苛治驚涎要藥

聖惠鉛霜散治脾風多涎心胃壅悶不乳昏瞤

鈎霜 牛黃 龍腦 半夏 湯浸

各半 白附子 炮 馬牙硝 防風

朱砂 天竺黃 犀角 細辛

黃芩 甘草 各一分

細羅不時薑蜜湯調一字量加

防風散治脾肺風熱膈上多涎心神昏悶少欲乳食

幼幼新書 卷十九

防風 人參 羚羊角 甘草 炙

枳殼 炒 黃芩 各一分 半夏 半洗

粗散一錢水一盞薑少許煎五分不時量溫服

牛蒡子散治心脾壅熱多涎

牛蒡子 山梔 甘草 炙 川芎硝

鬱金 各半 枳殼 炒

細羅龍腦半錢同研不時薄苛水調五分更量

半夏丸治脾熱乳食不下胃膈多涎

半夏 半洗 阜角子仁 兩

羅薑汁九如麻子不時溫水下三九更量

醫局治驚風壯熱涎喘發搐目視因乳不節胃滿嘔逆精神迷悶發癇瘕瘵水銀禰丸

水銀 黑鉛與水銀結砂 巴豆淨肉醋煮各一兩

膩粉 全蝎 鈔白霜 青黛

百草霜 牛黃各一分 黃明膠炙一錢三字

香墨燒淨三錢

細末陳米飴丸如萊豆捏禰一歲一丸乾柿湯下

薄苛湯亦得量虛實服利清黏滑涎為度食後服

幼幼新書 卷十九 廿二

不化

治驚風體熱喘粗涎嗽心忪頰赤大小便不利夜卧

不穩以金丸

膩粉 滑石各五兩 青黛二兩 天南星炮

半二兩 巴豆霜七個

細末麩糊丸如麻子一歲一丸薄苛湯下急驚頭

熱足冷口噤面青筋脉抽掣上膈頑涎甚者加桃

符湯下利益熱毒熱涎愈瘡疹後餘毒不解尤宜

食後服

譚氏金珠丸治驚悸心忪化涎利膈煩熱咳嗽

天南星炮 白礬煅 半夏湯洗七次 朱砂各半兩

人參 乾山藥各一錢 膩粉二錢 金箔十片

細末薄苛汁水糊丸如萊豆金箔衣食後薑湯下

一丸更量

錢乙治風涎膈實上熱及乳食不消腹脹喘粗禰銀丸

巴豆霜 水銀各半兩 黑鉛二錢半同水銀結砂

麝半錢 好墨八錢

幼幼新書 卷十九 廿三

研陳米粥丸如萊豆捏禰一歲一丸薄苛湯冷送

下不得化量虛實食後服

化痰寬膈消乳癖治驚風食癇諸疳兒一歲內常服

三聖丸

小青丸

青黛一分 牽牛末三分 膩粉錢

研麩糊丸黍米大

小紅丸

天南星生末一兩 朱砂半兩 巴豆霜錢

研薑汁麩糊丸黍米大

小黃丸

半夏生末一分

巴豆霜一字

黃蘗末半字

七

研薑汁麩糊丸黍米大

已上百日兒各一九一晷各二九隨乳下

張漢治多涎乳食不下乃脾熱金朱丹

朱砂飛

半夏洗七

膽星各一

金箔廿片

白茯苓

石膏飛各半兩

細研薑汁丸如黍乳後人參湯下十粒

幼幼新書

卷十九

廿四

萬金鬱金散治風熱鎮心壓涎

鬱金卑角二挺

天竺黃

馬牙硝

甘草炙各半兩

朱砂分

龍腦錢

羅末服半錢麥門冬湯調量服

牛蒡子散治心脾壅熱多涎

牛蒡子

梔子仁

甘草炙

川硝

鬱金各半兩

枳殼一分

羅末龍腦半錢研薄苛溫水調半錢量服

聚寶鎮心丸治心熱涎生眠睡不安

朱砂

鐵粉飛

天竺黃

鈞藤各半

麝分一

細末生蜜丸如小豆薄苛湯化一九

劉氏消乳痰丸兒宜常服

大半夏半兩

薤白一個切頭

人參錢

焙細末薑汁糊丸菜豆大服二三十丸食後薑湯下

小朱砂丸治眠睡多驚化風痰安神

朱砂兩

膽星

人參

茯苓

真珠

半夏薑制各半兩

腦麝少許

幼幼新書

卷十九

廿五

蒸餅丸如黍不時金銀湯下四五丸

相瀉治涎潮喘急壯熱膈上涎鳴小鎮心丸

辰砂

半夏薑製三

杏仁出五分油

巴豆霜分五

末陳米粥丸如芥子量服薑薄苛湯下三五丸下

涎

鄭愈利膈下涎去心胃噎塞效嗽神白丸

天南星

半夏洗七次

白殭蚕

白礬生各

未杏仁七個巴豆一粒研去皮薑汁丸如梧子陰
乾脹五丸暴嗽薑湯久嗽嚼胡桃肉黃蠟各少許
吞

幼幼新書 卷十九 廿一

幼幼新書卷第十九 裕昆堂刻

幼幼新書卷第二十 熱蒸汗痘 凡九門

後學古吳陳履端于始輯

長洲吳安民允懷校

虛熱第一

錢乙論唇深紅治法散肺虛熱少服瀉白散喘嗽上

論虛實熱證朱監薄子五歲發熱頤赤唇紅煩躁引

飲醫謂心熱用牛黃丸三服一物瀉心湯下之來日

反加無力不食又下之利黃沫錢曰心經虛勞病用

白朮散生胃中津胃氣不和次生犀散夫大便黃沫者

此虛熱也胃氣正瀉自止朱曰瀉心湯何如錢曰黃

連性寒多服則痢能寒脾胃眾醫曰實熱錢曰若實

熱何瀉心湯下之不安反加面黃頰赤五心煩躁不

食引飲而大便黃沫者服瀉心湯多故也以胡黃連

丸治愈病後虛

養生治風勞氣冷百疾薯蕷丸并治風眩背拘胃滿

短氣羸瘦食少兒泄痢多汗發熱

薯蕷三 當歸 桂去 熟地黃

大豆黃卷少 神曲各一 乾薑三 白飲二

幼幼新書 卷二十

甘草炙二兩 人參

阿膠炒七錢

芎

白芍藥

白朮

麥門冬焙

杏仁炒

防風各六錢

柴胡

白茯苓

桔梗各半兩

細末蜜丸彈子大濃煎棗湯空心日午各嚼一九

有熱人丸桐子大米飲下二三十丸

錢乙補心安神丸治面黃頰赤壯熱

麥門冬焙 馬牙硝

白茯苓

乾山藥

寒水石 甘草各半兩

朱砂一兩

龍腦字一

末蜜丸芡實大砂糖水化半丸無時

幼幼新書 卷二十

生犀散治目淡紅心虛熱

生犀錢二

地骨皮

赤芍藥

柴胡根

乾葛各一兩 甘草炙半兩

粗末一二錢水一鍾煎七分食後溫服

地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

地骨皮

知母

銀柴胡

甘草炙

半夏湯洗七人參焙

赤茯苓

等分細末二錢薑五片水一盞煎八分食後溫服

莊氏人參犀角散治榮衛不和上焦虛熱因積變肌

熱不已變疔勞夜汗頰赤多嗽

人參

茯苓

白朮各半兩

犀角

柴胡

鼈甲醋炙

半夏薑製

甘草炙各一分

末半錢水半盞薑棗煎三分食後溫服

治體虛發熱不思飲食或多驚悸壯氣補虛黃耆丸

黃耆蜜炒

人參

柴胡

乾薯蕷

赤茯苓各半兩

黃芩小者

生犀各一分

細剉焙燥搗末蜜丸如櫻桃麥門冬湯磨服

孔氏治心虛有熱恍惚不常言語錯亂尸疰客忤

幼幼新書 卷二十

夢不祥兒驚癇桃奴丸

桃梟七枝不成實

菝葜十四枚

安息香無灰

酒飛銀器中 慢火熬膏

生玳瑁各一兩

琥珀

雄黃煮研

飛各三分

辰砂

黑犀磨澄各半兩

牛黃

腦麝各一分

細末和入膏丸如雞頭密器封置淨室食後人參

湯劑一丸未知加

骨熱第二病初骨熱病劇骨蒸

聖惠兒十歲內勿着新綿冬天勿用火烘衣着勿食

桃杏傷寒後未百日勿食羊狗肉俱令體熱或作骨蒸

水鑑治骨熱勞漸瘦弱不食神明丸聖惠無蟾酥各光明砂九

鼓子花 雄黃 紫石英 遠志各二分

檳榔一枚 桃仁 光明砂各一分 金箔片

研細蟾酥丸如麻子米飲下一丸忌果子

博濟犀角散治骨熱晚多發熱面赤五心煩四肢無力食減盜汗面癢黃

犀角 柴胡 枳殼炒 麥門冬

枳殼炒 麥門冬

幼幼新書 卷二十一

茯苓 芍藥 大黃 桑白皮

黃耆 人參各一分 鼈甲一枚九肋者醋炙

細末半錢桃仁七個漿水煮麥門冬十九個去心

同研水一盞煎六分溫服早食後臨卧各一服亦

治大人盜汗

聖惠胡黃連散治骨熱瘦痺心神煩躁不卧

胡黃連 知母 地骨皮 黃芩

梔子 川升麻 犀角 甘草炙

杏仁煨炒各一分 柴胡 鼈甲醋炙各半兩

粗散一錢水一盞煎五分不時量溫服

治骨蒸黃瘦不食多卧胡蝶娘散

胡蝶娘兩枚炒淨 人參 大黃炒 赤茯苓

赤芍藥 紫苑 甘草炙 枳殼炒

蛇黃 牛黃各一分 柴胡兩半 熊膽

薑煨天各半分 麝香一分 鼈甲醋炙一分

未溫水調半錢日三服量加減

骨熱體瘦心神煩躁天靈蓋散張漢多秦光甘草名連九丸

天靈蓋一枚酥炙 黃連兩半

幼幼新書 卷二十一

細散粥飲調半錢日三四量服

胡黃連丸治骨熱煩躁黃瘦飲食無味

胡黃連 人參 羚羊角 地骨皮

黃耆 木香 犀角 甘草炙

姜麩各一分 柴胡 麥門冬焙 秦艽

鼈甲醋炙各半兩 羅末蜜丸如菘豆湯下七九日三更量

骨熱羸瘦食不生肉獺肝丸

獺肝微炙 人參 龍膽 黃芩

黃連

白朮

枳殼炒

鼈甲醋炙

兩

麥門冬焙

柴胡三分

桃仁炒

羅末蜜丸如菜豆湯下七九日三更量

胡黃連丸

胡黃連

乾蟾酒浸去骨

麝分一

羅末蜜丸如菜豆粥飲下五九日三四更量兒

萬全胡黃連丸治骨熱煩躁黃瘦飲食無味

胡黃連

人參

羚羊角

地骨皮

黃耆

犀角

木香

甘草炙

幼幼新書

卷二十

六

姜蕤各一分

鼈甲醋炙

麥門冬焙

柴胡

秦朮各半

羅末蜜丸如菜豆服七九溫水下日三更量

張氏治骨熱體瘦面痿黃臍腹時痛胃膈滿悶不食

常服退黃長肌進食解虛勞行滯氣利關節猪肚丸

莊氏多

南木香兩

宣黃連

生地黄

青橘皮

銀柴胡

鼈甲重便炙

細末猪肚一個盛藥緊繫慢火煮擣極爛丸如麻

子服二三十丸溫米飲下日二三食前後皆可

吳氏生犀飲治兒十歲內肌體煩燥或食桃杏酸熱

類或傷寒後肌熱羸瘦或食羊肉令兒體熱或作骨

蒸瘦痺潮熱頰赤口乾五心煩躁食不生肌盜汗伏

卧食泥一切蒸熱

羚羊角

地骨皮

紫苑

麥門冬焙

秦朮

大黃生

枳殼炒

柴胡

茯苓

赤芍藥

人參

桑白皮

黃耆

羌活

半夏麩炙

鼈甲再炙

幼幼新書

卷二十

七

醋炙焦

各一分

散一錢水一盞煎五分食後夜卧溫服兒五歲內

服半錢

鄭愈殺虫去骨熱進食駐頰蝦蟇丸

紫班蝦蟇一枚去腸

蘆薈

鶴虱

宣連各二錢

胡黃連錢一

末猪膽汁九菜豆大服三九飯飲下日三可少

加麝

骨蒸第三

骨熱骨蒸雖有淺深治宜通用

楊大鄴兒日漸黃瘦皮膚不潤因胎氣虛損筋骨衰弱由強行交會或成娠事出偶然或母有宿疾久冷血海氣衰羸瘦胎內已自虧損及生自然疴悸由父母遺氣若非巧治終為沉疴或少乳多哺咀嚼之物腸胃轉轉乾慙兒少者臍腑乾長成者為骨蒸醫局生犀散治骨蒸肌瘦頰赤口乾日晡潮熱盜汗五心煩躁四肢困倦食不生肌及大病差後餘毒不鮮或傷寒後食羊肉體熱不除

羚羊角 地骨皮 秦艽 麥門冬

幼幼新書 卷二十一

枳殼炒 大黃蒸 柴胡 茯苓

赤芍藥 桑白皮 黃耆 人參

鼈甲醋

等分粗末二錢水一盞青蒿少許煎六分食後溫服兒分減

聚寶治骨蒸熱久去三焦壅滯虛熱不思飲食大小

並宜國老散

甘草炙 銀柴胡 秦艽 大烏梅肉

乾各二兩

末食後熱湯點服忌炙燥

張氏地黃散治骨蒸體熱勞倦

熟地黃 當歸 地骨皮 枳殼炒

柴胡 秦艽 知母 鼈甲醋

等分末錢半水一盞烏梅半個煎七分和梅熱服

莊氏治骨蒸及一切疴煮雞丸

黃脚雌雞一隻 柴胡 黃連各四

粗末夾生絹袋盛雞腹中縫煮極爛濾出骨和藥

焙乾搗末酒麪糊丸如棗豆不時湯服廿九量加

幼幼新書 卷二十一

治骨蒸潮熱羸瘦生肌消疔黃胡黃連丸

胡黃連 黃連 柴胡各一 烏犀

赤茯苓 史君子 黃芩細 鼈甲各

細末猪膽麪糊丸如棗豆服一二十九湯下

治骨蒸熱黃瘦虛汗欬嗽心忪日久不已朱砂柴胡丸

朱砂飛 柴胡二

細末猪膽汁和濕入磁合炊飯甑上蒸至飯熟

出急丸如小豆空心臨卧桃仁烏梅湯冷下十九

唐崔和悌灸二十二種骨蒸法夫含靈受氣稟于五行攝生乖理降以六疾骨蒸病者亦名傳屍名殘殍名復連名無辜丈夫以癱氣為根婦人以血氣為本少長多染此疾嬰孺傳注更苦其狀髮乾而聳或聚或分或腹中有塊或腦後小結多至五六或夜卧盜汗鬼交雖目視分明而四肢無力上氣食少漸就沉羸縱延日時終于殫盡予嘗三十日灸活一十三人前後差者二百至于狸骨獺肝金牙銅臯罕見其能未若此扶危極急非止單攻骨蒸又別療氣療風或癱或勞或邪或癰等患

幼幼新書 卷二十

取穴法

令患人平身正立取細繩蠟之勿令長縮順脚底貼肉堅踏之男女左右繩前頭與大姆指端齊當脚跟中心向後引繩循脚肚貼肉直上至曲脊中大橫紋截斷又令患人解髮平分兩邊自顛門至腦後見頭縫平身正坐取向所截繩一頭與臯端齊引繩正循頭縫至腦後貼肉垂下循脊骨至繩盡處當脊骨以墨點記墨點不是又取一繩令患人合口將繩按口上兩頭至吻却

鈎起繩中心至臯柱根下如△字便齊兩吻斷將此繩展令直于前量脊骨上墨點處橫量取平勿令高下先中摺繩繩中以墨記展繩開橫量以繩上墨點正壓脊墨點于繩兩頭以白圈記白圈是

以上第一次點二穴

令其人平身正坐稍縮臂膊取繩繞項向前雙垂與鳩尾齊心岐骨也無此骨者至心即雙截斷却背翻繩頭向項後以繩中傳取心正當喉嚨結骨上其繩兩頭夾項雙垂循脊骨以墨點記墨點不是又取一繩

幼幼新書 卷二一

令其人合口橫量齊兩吻截斷還于脊骨上墨點橫量如法繩兩頭白圈記白圈是

以上第二次點穴通前共四穴同時灸日別各七壯至二七壯累灸至百五十壯為妙候瘡欲差又

依後法灸二穴

以第二次量口吻繩于第二次雙繩頭盡處墨點上當脊骨直上下直點令繩中傳中心在墨點上于上下繩盡頭以白圈記兩穴白圈是以上第三次點二穴謂之四花灸兩穴各百壯三

次共六穴各取雜日量度度訖即下火須三月三日艾最佳疾差百日内慎飲食房室安心靜處將息一月後覺未差復初穴上再灸

上六穴名六花


點穴圖

自大拇指端當脚跟向後至曲脊大橫紋當中




幼幼新書 卷二十

自臍端向上量循頭縫至腦後灸腦門



循脊骨引繩頭向下至繩盡處當脊骨以墨點之



合口以繩按口上鉤起繩中心至臍柱下便齊兩吻截斷

將量口吻繩展直于


前來脊骨上墨點處橫量兩頭以白圈記

白圈灸穴


已上第一次點二穴

幼幼新書 卷二十

取一繩繞項向前雙垂與鳩尾齊





翻繩頭向項後以繩兩頭夾項雙垂循脊骨向下至兩繩頭盡處以墨點記




令人合口以繩橫量
齊兩吻截斷

用量口吻繩于脊骨
墨點上橫量兩頭以
白圈記白圈是灸穴



幼幼新書 卷二十一
以第二次量口吻繩
于第二次雙繩頭盡
處墨點上直上下直
量繩盡頭用白圈記
以上是第二次點二穴



此係已點成四花

膏蒸候有二十二種並依前圖灸

一胞蒸 小便赤黃

二玉房蒸 男遺尿失精女月漏不調

三腦蒸 頭眩熱悶

四髓蒸 覺髓沸熱

五骨蒸 齒黑

六筋蒸 甲熱

七血蒸 髮赤

八脉蒸 急緩不調

九肝蒸 或時眼前昏暗

十心蒸 舌焦或瘡或時胃滿

十一脾蒸 唇焦熱或口瘡

十二肺蒸 口乾生瘡

十三腎蒸 耳乾焦

十四膀胱蒸 右耳焦

十五膽蒸 眼目失光

十六胃蒸 舌下痛

十七小腸蒸 下瀝不禁

十八大腸蒸

右鼻孔痛

十九三焦蒸

乍寒乍熱

二十肉蒸

別人覺熱自覺冷

廿一皮蒸

皮肉生雞肉起

廿二氣蒸

遍身壯熱不自安息

用尺寸取穴法

凡穴孔尺寸皆隨人身大小須男左女右量手指中一節兩橫紋中為一寸兒亦以此為準

艾炷大小法

幼幼新書

卷二十一

十一

凡艾炷須足三分若不足恐覆孔穴不備穴中經脈火氣不行即不能抽邪氣引正氣

採艾法

端午日日未出于艾中以意求其似人者拮之灸殊有效艾未有真似人者明暗間以意命之

用火法

黃帝曰松柏栝棗榆柳竹等木之火用灸必害肌肉勿用宜敲石取火或水晶鏡子于日得太陽火天陰以槐木取火

灸後宜服治勞地黃丸

生地黄

青蒿

薄荷

童便

好酒

煎成膏

柴胡

鼈甲

醋炙

秦艽

各一兩

朱砂

麝

各半兩

為末入前膏和丸如桐子服十五至二十九溫酒

下忌生冷物

盜汗第四

巢氏盜汗者眠睡而汗自出也兒陰陽之氣嫩弱腠理易開若將養過溫因于睡臥陰陽氣交津液發泄

幼幼新書

卷二十一

十一

為汗

養生兒肌瘦有汗用平和養氣血溫藥自無虞地黃

錢乙論盜汗者肌肉虛也主止汗散

香瓜丸汗出上至項下至臍此胃虛也主補胃益黃

散

論治病有等張氏三子歲大者遍身汗盜次者汗上

至項下至臍小者但額有汗喜眾以麥煎散治不

效錢曰大者香瓜丸次者益黃散小者石膏湯各五

日愈

寶鑑兒心膈發熱時痢盜汗者多病瘡

玉訣盜汗虛熱歌

盜汗頻頻氣受傷
藏中虛熱小便黃
夜間發熱無時節
頰赤唇乾口有瘡

先退熱次調氣後和藏府

形證論歌

頰頻生盜汗虛熱小便黃
夜卧時煩熱鳴牙腎受傷
氣粗還氣細肝內要消詳

幼幼新書

卷二十一

十八

因傷氣非風蘊熱乃三焦不通暢出汗久則成驚

南星丸先利三焦傷寒變次下大青丹驚門得心

氣不驚恐汗不止先服防風湯一二服補氣定汗

千金三物黃連粉

黃連

牡蠣

貝母各十

粉一升合搗篩粉身

犀角飲由心藏熱盜汗體熱瘦瘵多驚

犀角十

錢六

茯神一

麥門冬兩

甘草兩

白朮錢

錢六

吹咀水九合煎四合分四服加龍齒一兩佳

外臺

麻黃根

雷丸

牡蠣熟各

甘草兩

乾薑兩

梁米升

搗粉粉身汗即止

聖惠犀角散治盜汗體熱咽乾

犀角

茯神

麥門冬焙

黃耆

人參各半

甘草一

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫服量減

幼幼新書

卷二十一

十九

黃耆湯治體熱盜汗心煩不食

黃耆

朱砂各

龍腦錢

人參

升麻

大黃炒

甘草炙

天竺黃

牡蠣各一

細羅不時竹葉湯調半錢量加減

錢乙香瓜丸

大黃瓜黃色者

胡黃連

大黃濕熱

紫胡

鼈甲醋

黃蘗

黃連

蘆薈

青橘皮

等分黃瓜割去頭填藥末蓋口杖子插定慢火內

煨熟麵糊丸如棗豆食後冷漿水下三二丸或新

水大者五七至十九

治虛熱盜汗黃著散

牡蠣 生地 焙 黃著

等分末煎服無時

張渙沉香鼈甲丹治潮熱盜汗

鼈甲 童便浸 酥炙 黃著 草龍膽 當歸

沉香 各一兩 大黃 炮 川黃連 各半兩

幼幼新書 卷二十一

細羅蜜丸黍大麥門冬湯下十粒量加減

治血少肌瘦盜汗菴蓉丹

肉菴蓉 酒浸去 鹹皮炙 鼈甲 酥炙 各一兩 黃著

何首烏 當歸 各半兩

羅煉蜜丸如黍溫米飲下十九食前量加減

牡蠣散專止盜汗

牡蠣 二兩 麻黃根 赤石脂 糯米 各一兩

龍腦 錢一

末新綿包日夜撲有汗處

張氏白龍散

龍骨 兩半 麝 許少

研細服半錢冷水調

莊氏治肌熱盜汗不思飲食柴胡飲

柴胡 青蒿 嫩桃柳枝 各陰乾

甘草 炙 地骨皮

等分細剉二錢入烏梅一個小麥四十九粒水一

盞煎七分食後臨卧溫服

吉氏治胃熱盜汗及衣厚傷溫汗出麻黃散

幼幼新書 卷二十一

麻黃根 焙一 分 麩皮 半兩 炒 黃黑色

細末半錢至一錢猪耳煎湯調

喜汗第五

巢氏兒有血氣未實者膚腠踈若厚衣溫卧藏府生

熱蒸發腠理津液泄越故頭身喜汗

錢乙六陽虛汗上至頭下至項不過胷不須治

寶鑑汗出喜驚舌上白者衣厚傷熱

玉訣兒血熱若病夜間有汗皆因抱得胃堂熱傳與

脾脾傳氣氣傳血血家既熱內被淳陽氣抱却升即

化為汗髮者血之餘血為根髮為苗血家既熱頭髮作穗血家既熱渾身黃瘦血家既熱夜間汗出不為盜汗宜涼胃散

形證論心之液為汗兒緣驚心氣不收故多汗宜飲心氣

寶鑑厚衣傷溫歌

衣厚傷溫損小兒熱蒸津液透皮膚致令身體并頭上汗出如珠滴濕衣

外臺犀角飲心藏熱故有汗

幼幼新書

卷二十

廿二

犀角分三

茯神分四

麥門冬分六

甘草分二

白朮分一

切水九合煎四合分再服加龍齒四分良

錢乙方

故蒲扇燒灰溫酒調一二錢如無故蒲亦可

玉訣治多汗涼胃散

青黛

馬牙硝

大黃熟各半兩

甘草分一

末蛤粉水下半字

勞氣第六

東方先生法夫勞疾諸證應男婦小兒得患未須察

脈看指甲美惡知何勞候病熱甚者脚指甲青黑者

傳尸證紅白正色候黃白者酒色候紅紫者氣勞候

或欬嗽或涎塞咽中或骨蒸汗出或泄利或吐紅或

驚魘或婦人不調之類先服去虫藥後服治病湯劑

化虫丸

大檳榔

麝當門子各一枚

麝半錢

青蒿心錢三

粗末羊肝一片剉入藥為餛飩半兩和餅作餅

幼幼新書

卷二十

廿三

子二個燂熟男患冷水浸左手腕三寸右手取藥

吃陳米飲下緩緩食青阜被覆虫随汗出急去之

側柏散補女浸右腕

側柏散

側柏 五靈脂

等分熱湯浸二錢不時溫呷

奪命救生散治大小傳尸肺痿骨蒸酒色食氣諸勞

桑白皮

白茯苓

杏仁

枳殼

人參

桃仁

陳皮焙

秦艽淨

白芷 各一兩

麻黃 去節

柴胡 各兩

甘草 炙

附子 炮

桂心 生

檳榔 各半兩

肉豆蔻 三錢

當歸 洗焙

麝 三錢

未龜魚大者二斤湯漂去淡血頭腸肚入藥麻皮

縛紙裹數重鹽泥紙筋固濟約厚六七寸許就地

掘坑可容糠三籬先以籬半安坑底入泥毬再以

羅半鋪滿四傍發火一伏時取出將藥并肉骨三

慶焙乾一慶杵末溫酒服二錢不勝酒水一盞桃

柳枝各三寸烏梅半個煎七分不時服量加減

幼幼新書

卷二十一

廿五

保中丸服此十指生毛如藕 可治紫黑難治或依

古法四花穴灸 骨蒸

天靈蓋

鼈甲 並醋浸一宿

虎頭骨 酒拌

炒各一兩

赤梗青蒿子人參

桃仁 炒

知母

甘草 生各半兩

細末阿魏二錢同桃仁研和諸藥蜜丸桐子大烏

梅湯下三十九不時兒作小丸

治嗽喘涎盛吐紅氣息漸乏金蓮散

白礬 錢二

故樓 桐

新綿 各一兩

男亂髮 三錢

三味燒灰入礬研麝香湯調一錢

外臺狐狸吃力迦九療老少傳尸骨蒸痿痺肺痿症

忤鬼氣率心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢

瘵血月閉痲痺丁腫驚癇鬼忤中人吐乳

吃力迦 白 光明砂 當門子 訶梨勒皮

香附 瓦上磨取中白 沉香 青木香 丁香

安息香 白檀香 華撥 船上 犀角 各一兩

薰陸香 蘇合香 龍腦香 各半兩

篩極細蜜和丸井花水服桐子大四九老小一九

幼幼新書

卷三十一

廿五

蠟紙裹彈子大一丸緋袋盛懸當心一切邪鬼不

敢近千金不傳冷水煖水臨時斟量臘月合有神

歲密器中勿泄氣秘之忌生血物桃李雀肉青魚

鮮等

熱渴第七

東氏兒血氣甚則府藏生熱熱則藏燥故渴

小方脉論兒吃水太多腹脹後瀉蓋水不歸小腸却

入大腸大腸受穀不受水小腸受水不受穀此病皆

惜抱損之故心與小腸合心熱小腸亦熱熱氣上行

奔胃口致孩子與水水奔小腸被小腸氣熱滲泄不
及轉入大腸先下淋藥次涼心藏後止渴
經驗方

大牡蠣蠟日端午日黃泥裹煨為末活鯽魚湯下
一錢七兒半錢

聖惠治心肺積熱渴不止咽喉乾痛黃連散

黃連 射干 升麻 赤茯苓

麥門冬 玄參 甘草 桑白皮

黃苓 各半

幼幼新書

卷二十一

廿一

羅散一錢水小盞青竹葉七片煎五分去滓入蜜

半合更煎一二沸溫時時呷

麥門冬散治心肺熱壅悶煩渴不止

麥門冬 梔子仁 犀角 知母

甘草 黃苓

羅散一錢水小盞竹葉七片煎五分不時量服

治熱渴不止煩悶

生葛汁 竹瀝 各二

和不時服

石蓮散

石蓮心 世炒黃 浮萍 分一

水一鍾薑少許煎六分徐徐服

治消渴

狗膽入猪膽內陰乾候堪九九如桐子麝香湯下

二九兒半丸 黃狗

茅先生龍涎膏

陰林下大螺去殼爛研入畫粉如螺大腦少許滴

水九桐子大懸當風久愈妙枇杷葉炙去毛濃煎

幼幼新書

卷二十一

廿二

湯吞十九十四丸

胡黃連散治諸渴及疔渴解諸熱

胡黃連 麥門冬 乾葛 玄參

甘草 枇杷葉 炙去毛

等分末一錢水七分薑一片煎五分入蜜三五滴

煎四分溫服

嬰孺麥門冬湯治夏天服藥大下後胃中虛熱渴

麥門冬 甘草 龍骨 各四 枳實 炙

黃苓 茯苓 人參 各三

水四升煮升半分三服不差水芹煮濃汁間服

又

冬瓜炮絞汁服

嬰孺苦蕒湯治熱渴或吐下後虛熱渴

苦蕒分五

黃芩分三

知母

蘆根分二

生米分二

麥門冬分三

切水五升煮二升如飲漿度服

寶鑑治渴腹急身熱浮水散

蝸牛二七個甘草水洗

草龍膽一兩如牛作餅陰乾

幼幼新書

卷二十

十一

末服一捻許浮水與飲只一服效

莊氏兒因疾致渴不免與飲須入烏梅陳小麥煎水

多飲無害從小便出不入大腸

孔氏消渴

熟瓜去青水調瓜瓤飲

吉氏治虛渴調中散

人參

白朮各半錢

肉桂

犀角

藿香

甘草各一錢

末半錢棗湯調下

治渴塗唇瑞蓮膏

旱蓮心

浮石

乾葛

海螵蛸

蒲黃

等分末蜜為膏旋丸如菜豆枇杷葉湯下兒小塗

唇上

聖惠灸陽關二穴各一壯在第十椎下兩傍各三寸

陷者中炷如麥

黃疸第八

巢氏黃疸之病由脾胃氣實而外溫氣乘之變生熱

幼幼新書

卷二十

十一

脾與胃合肌肉俱象土色黃胃為水穀之海熱搏水

穀氣蘊積成黃蒸發于外身發熱背強大小便澀皮

膚面目齒爪皆黃小便如屋塵色看物皆黃是也便

利者不渴者易治渴心腹滿小便澀難治脉沉細而

腹滿者死

兒在胎母藏氣熏蒸于胎至生體皆黃為胎疸灸

錢乙論身皮目皆黃者黃病也身體痛背強大小便

澀身面目爪皆黃小便如屋塵色看物皆黃渴者難

治此黃疸也二證多得于大病後別有不因病後身

微黃者胃熱也大人亦同又面黃腹大食土渴者脾疳也又自生而身黃者胎疳也古書云諸疳皆熱深黃者若是淡黃兼白者胃怯胃不和也

千金翼秦王九疳散

胃疳食多喜飲梔子仁主之

心疳煩心中熱菑根主之

腎疳唇乾葶藶子主之熱

脾疳尿赤少惕惕恐苦萹主之

膏疳飲少尿多秦椒瓜蒂主之一林汁膏一作肺

幼幼新書 卷二十一

舌疳渴而數便鍾乳主之

肉疳小便白凝水石主之

髓疳目深多嗜卧牡蠣澤瀉主之

肝疳胃熱飲多水激肝白朮主之

隨病加半篩散飲服五分七日三加至方寸七兒

量與

茅先生

瓜蒂兩半 丁香錢二

末搗臍中黃水從臍出後用天竺黃散實熱

治二十四般瘵毒

屋下乘漏泥

寒水石

等分末雞子清調塗便沒先用實積牛黃丸通下

實熱後補常服天竺黃散

張煥治疳雙連丹

川黃連

羅末黃瓜一枚去瓢留蓋入藥末蓋定麪裹慢火

燒焦去麪搗熟丸菜豆大服七至十粒溫水下量

幼幼新書 卷二十一

加減

吉氏

茵陳分二

郁李仁

末蜜丸桐子大湯化下

黑疳第九

千金翼治黃疳變黑疳

土瓜根搗汁一升頓服病從小便出兒減

又

當歸兩三 桂心兩六 乾棗枚十七 麥門冬升一

大黃兩一 茵陳 黃芩 黃耆無一本

乾薑 茯苓 芍藥 黃連

石膏 人參 甘草各二兩

咬咀水一斗煮三升半分四服兒減

治黑疸身皮大便皆黑亦主一切黃赤茯苓散

赤小豆粒卅 茯苓 女萎各六 確黃一

瓜丁四 甘草二

水三升煮豆茯苓取八合搗四味為散和半錢七

幼幼新書 卷二十一

服須臾吐愈兒半之

幼幼新書卷第二十一 城西草堂刊

幼幼新書卷第二十一 寒痛逆羸 凡十六門

後學古吳陳履端于始輯

延陵吳安治順甫校

胎寒第一

巢氏兒在胎母取冷過度冷氣入胞傷兒腸胃兒生後冷氣猶在腸胃間不能消乳哺或腹脹或時穀利令顏色青肥時啼為胎寒痛

千金翼兒胎寒當腹痛痛者軀啼時時吐或腹中如雞子黃者按之如水聲便沒沒已復出無所苦早

幼幼新書 卷二十一

服當歸丸懸啼 黃耆散關

茅先生兒生一日口舌冷腹虛鳴面臉青喫乳有妨因在胎六個月日女有疾被伏熱往來胎中飲熱血所得先以朱砂膏驚積 妳上吮後磨鎮心丸驚一切如 都不進妳及肚膨手握拳目微視面黑死此以熱論

胎寒歌

人中臍下有青色乳見難消痢色同衣薄中寒如是此風邪夾冷上來攻

聖惠當歸散治胎寒聚嘔美舌軀啼反張怒驚

當歸炒 細辛 黃耆 黃芩

龍骨 桂心 赤芍藥各半

羅散乳汁調一字日三意加減

嬰孺當歸丸大便青不能食是胎寒

當歸 人參 芍藥 芎各三分

甘草分四

末乳汁和先食服麻子大一丸日三未知加

治兒胎寒大人虛冷內或有實不可吐下虛冷服礬

石丸

幼幼新書

卷三十一

二

三

馬齒礬石燒汁盡為末棗膏丸大人服梧子大二

丸兒減心腹中溫暖為度有實實去無實下自斷

黃耆湯治胎寒腹中疝痛

黃耆 黃芩 芍藥各六分 當歸二分

甘草 芎各四分 薑八分

吹咀水五升煮升半百日兒半合分三服

虛寒第二

錢乙論腎虛若兒本虛怯由胎氣不成則神不足目睛多白顙解面眊白色此皆難養縱長不過八八若

恣色慾多不及四旬或因病而致腎虛者不論又腎

氣不足則下竄蓋骨重惟欲墜于下而縮身也腎水

陰也腎虛則畏明宜補腎地黃丸

張渙兒脾胃虛弱不能飲食或經大病漸損榮衛致

肌體羸瘦時時下痢面色青白變成虛羸宜丁香黃

耆散

錢乙地黃丸

熟地黃錢八 山茱萸 乾山藥錢各四 澤瀉

牡丹皮 白茯苓各三分

幼幼新書

卷三十一

三

三

末蜜丸如桐子三歲二三九空心湯化下

張渙丁香黃耆散

綿黃耆 丁香 人參 當歸

白朮炮 鼈甲醋炙各一兩 胡黃連 甘草炙各半兩

末一錢水一盞薑二片棗二枚煎五分食前溫服

惠眼治吐瀉及傷寒脾虛腹熱或手足冷虛汗不已

喉內虛喘附子散一名回陽散

附子炮 北前胡 甘草 人參

桔梗各半兩 麻黃去節一兩

末淡薑湯調半錢至一錢量加此能補虛

寶童治腹內虛鳴烏藥丸

天台烏藥

蒼朮二炒各兩

木香

甘草各一分

肉豆蔻二枚

末醋糊丸如黍服七至十九炒薑葱酒下

吉氏兒面青黃手足逆冷不思食飲和氣散

厚朴薑製半兩

人參

茯苓

甘草炮各一分

茴香二錢

末加減水煎

幼幼新書

卷二十一

中

五

胃中有寒第三

巢氏三焦不調則寒氣獨留膈上令兒乳哺不消下

嗝酸臭胃膈痞滿甚則喘急

聖惠治膈寒或嗽逆不食訶梨勒散

訶梨勒煨皮一兩

白朮

五味子

麥門冬焙

人參

白茯苓

陳皮去白焙

甘草炙各半兩

細辛一分

粗羅一錢水一盞煎五分不時量溫服

人參散治胃中有寒多吐清水不乳

人參

厚朴薑汁炙

陳皮去白焙

白朮各半兩

當歸炒

丁香各一分

羅散一錢水二盞薑少許煎五分不時意增減服

肉豆蔻散胃中有寒乳哺不消腹中痞滿氣逆不能

乳食

肉豆蔻

人參

藿香

白茯苓

白朮

甘草炙

木香各一分

厚朴薑炙

訶梨勒皮煨

乾薑炮各半兩

粗散一錢水小盞煎五分溫量服日三

幼幼新書

卷二十一

五

五

草豆蔻散治胃中寒氣積滯氣逆不下乳食

草豆蔻仁三枚

人參

前胡

檳榔各一分

訶梨勒皮煨半兩

甘草炙半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫量服

前胡散治胃中寒結時欲嘔吐

前胡

人參

白朮

陳皮去白焙

高良薑

厚朴薑炙

藿香各一分

甘草炙半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時量溫服

胃脇滿痛第四

巢氏兒失節度為寒熱所傷寒氣入腹乘虛停積又乳哺冷熱不調觸于宿寒與氣相擊不散結胃脇間故滿痛

真珠囊木香散治兒氣痛因生冷傷而成只在臍上下左右痛宜順氣寬中此治胃膈痞塞心腹刺痛脅脹滿飲食少噫氣吞酸嘔逆噎悶一切氣疾

木香

青橘皮

各三兩

薑黃

各五兩

麥蘖

炒各五兩

蓬莪茂

四兩

甘草

炒

鹽

炒各十兩

末一錢不時沸湯點服

幼幼新書

卷二十一

木

三

外臺灸勞宮二壯一名五里在掌中動脈主熱病發熱滿而欲嘔噦三日以往不得汗怵惕脅痛不可反側欬滿溺赤大便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止噤中痛食不下善渴口中爛掌中熱風熱善怒中心善悲累嘔欬善笑不休煩心欬寒熱善噦少腹積聚兒口中腥臭脅肢滿黃疸黃目

心痛第五

聖惠心痛本非起于心即邪氣客于心主之脈夫少陰心經五藏六府之主精神所舍其藏堅固邪不能

千千之傷心心傷即神去神去即死故諸邪在心者皆在心色絡色絡心之別脈也故少陰不病夫心痛者厥氣上逆痞而不散或傷寒氣邪冷搏于經絡故

心痛

茅先生心頭痛者金鈴散夾勻氣散和胃氣不如面黑眼視瀉黑血鼻口冷手足冷不進食死

寶鑑兒悒心啼有時歇者名心痛是邪攻胃管

肘後治卒心痛腹脹堅如石滿氣喘息

好鹽如雞子大漿水三升煮三沸內攪消取半分

幼幼新書

卷二十一

七

為三服

聖惠兒數將手摩心腹即啼是心痛不可忍芍藥散

赤芍藥

人參

白朮

黃芩

川大黃

炒

當歸

各一分

粗散一錢水小盞煎五分不時溫量服

木香散治心痛手足不和

木香

白朮

桔梗

茯苓

赤各一分

高良薑

半

粗散一錢水小盞煎五分稍熱量兒頻服

桂心散

桂心

當歸

梔子仁各半

細羅不時橘皮湯調半錢更量加

茅先生金鈴散

金鈴子

炮去皮核

蓬莪茂

炮各一兩

茴香

木香

京三稜

炮各半兩

末一錢半錢熱酒調下

張氏治脾疼久腫心氣痛患

木香

卑子大兩塊

丁香

三七粒

乳香

半卑子大

胡椒

九粒

幼幼新書

卷二十一

斑猫

淨各七粒

五靈胎

中指大塊

巴豆

細末醋糊丸如芥子服三九菖蒲湯下婦人艾醋

湯兒兩三丸如衰顛氣攻痛難忍者一服效

王氏普救散

延胡索

兩二

香附子

兩一

細末一錢白湯點服

腹痛茅六

東氏兒腹痛多由冷熱氣與嵐氣相擊故痛熱痛者面赤或壯熱四肢煩手足心熱冷痛者面或青或白

甚者黑唇口爪皆青

茅先生兒中熱痛詩

非時面赤色壯熱四肢煩手足心多熱心中熱

痛難

冷痛詩

面青面白猶自可黑色同青爪一同此是腹心

生冷痛須將溫藥裏頭攻

寶鑑腹堅歌

妊娠先須忌數般莫令風冷致胎寒兒生噉唾

幼幼新書

卷二十一

翻嫌乳肚痛頻生腹亦堅

肘後治未百日腹痛徐王神效方

豚子卵

當歸

水三升煮七合飲

聖惠當歸散治冷熱不調腹內多痛

當歸

枳殼

赤芍藥

川大黃

等不粗羅一錢水小盞煎五分溫量服

人參散治卒吐下腹痛不止

人參

當歸

甘草

乾薑

黃耆

細辛各一分

粗羅一錢水小盞煎五分稍熱量兒頻服

又方

木香

高良薑

白朮

人參各一分

厚朴薑炙兩

細羅不時粥飲調半錢量加

嬰孺治腹痛天糾不能哺乳茯苓丸

茯苓

黃連各一分

末蜜丸如大豆飲下量與

幼幼新書

卷三十一

十一

二

錢乙和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食和中散

人參焙去頂

白茯苓

白朮

甘草炒

乾葛

黃耆

白扁豆

藿香

等分細末三錢水一盞棗二個薑五片煎八分食

前溫服

張漢寬中湯治心腹痛不可忍

高良薑

木香各半兩

丁香

青橘皮炒

桔梗

甘草炙各一分

細末半錢溫酒調服

溫胃丹治腹痛啼哭不止

人參

白朮焙各一兩

五味子

當歸焙

高良薑各半兩

木香一兩

細末白麵糊丸如黍米飲下十九

橘香散

青橘皮

吳茱萸

木香

當歸焙各一兩

乾薑炮

丁香各半兩

羅末一錢水八分薑二片煎五分食煎溫熱服

惠眼治氣疾腹痛及消積滯槐角丸

幼幼新書

卷三十一

十二

三

槐角蜜炙抄錢

胡椒九粒

巴豆二粒

丁香粒廿

細末爛飯丸如黍米空薑湯下五丸

莊氏兒未能語啼哭不能辨者以手候腹如有實硬

處即是腹痛

生薑汁煖調麩糊塗貼臍心

吉氏治脾疼脅脹和氣止渴及腹內刺痛不思飲食

香朴散

厚朴薑炙一兩

麥蘖

神麩

青皮並炒

木香各一分

未一錢湯調服

腹脹第七附滿

巢氏兒府藏嫩弱風冷邪氣客搏于藏令腹脹若脾
 虛冷移入于胃食則不消若腸虛冷氣乘之則利
 錢乙腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂滿喘可下
 主紫霜丸喉聚白餅子搗搗不喘者虛也誤下則脾
 虛氣附肺行脾肺子女皆虛肺主目胞顯之類脾主
 四肢女氣虛甚即目胞顯腫色黃者屬脾治用塌氣
 丸漸消之和胃氣不未愈加服勿以丁香木香橘皮豆
 蔻大溫散藥治何以故脾虛氣不出腹脹而不喘宜
 散藥使上下分消其氣若虛氣已出附肺即脾胃內
 弱每生虛氣入四肢面目矣兒易為虛實脾虛不受
 寒溫服寒則生冷服溫則生熱頃識之胃久虛熱多
 生痘病或引飲不止脾虛不能勝腎隨肺氣行于四
 肢若水狀腎氣浸浮于肺即大喘服塌氣丸病愈後
 面未紅者虛衰不復故也治腹脹者辟若戰寇于林
 寇未出林攻以兵必獲若出林勿急攻攻必有失意
 漸收之即順治虛腹脹塌氣丸不愈腹有食積結糞

小便黃時微喘脉伏而實時飲水不能食者可下蓋
 脾初虛而後結有積治先補脾後下下後又補脾愈
 補肺起生虛喘

肘後兒腹暴病滿欲死
 半夏篩酒和服黍米五九日三

千金米泔鹽等分炒變色腹上摩

外臺療肚脹漸瘦不食四肢熱不調

甘草炙 鼈甲炙 柴胡 茯苓

子芩各六 訶梨勒皮分十 檳榔三 芍藥

物物新書 卷二十一 十三

橘皮各三 薑 當歸各四 知母五

大黃八

切水升半煎七合數服得瀉差

秘錄治腹脹

胡粉鹽熬色變摩腹上兼治腹皮青若不理頃更

死

喫雜生果多腹脹氣急

肉桂末飯丸如菜苳湯下五九大人十九

聖惠治脾胃虛冷腹脅脹滿四肢不和乳食全少丁

香散

丁香

桂心

白朮

人參各一分

厚朴薑炙

陳橘皮

去白焙 各半兩

粗羅一錢水小盞薑少許棗一枚煎五分溫服日三四

木香散治腹虛脹

木香

川大黃

麝各一分

桑白皮

陳橘皮

白焙去

益智仁

艸豆蔻仁

各半兩

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量服

幼幼新書

卷二十一

十四

三

赤茯苓散治腹壅脹滿虛熱不食大小腸氣滯

赤茯苓

木通

人參

甘草炙

枳實炒

當歸炒

各一分

川大黃

炒半兩

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

治氣不和心腹脹滿不食檳榔散

檳榔

厚朴薑炙

各半兩

丁香一分

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

張渙木沉散

木香

益智仁

沉香各一兩

蓮蕊茂

草豆蔻薑炙 白豆蔻各半兩

羅末一錢水八分薑三片煎五分溫服

衛生賺氣丸療腹脹氣急

蘿蔔子

半兩巴豆內 破同炒黑

木香一分

細末蒸餅心丸如菜豆橘皮湯下五丸

張氏紫霜丸治食傷或病妳至冷腹脹

薑切

巴豆

好醋一碗煮乾用巴豆

雄黃

朱砂各半錢

幼幼新書

卷二十一

十五

細末蒸餅糊丸如粟兒食傷三粒腹脹喘急分減

食湯下無時

吉氏塌氣散治疳虛腹脹

甘草

茴香

白牽牛炒

木香錢一

末半錢紫蘇湯服

丁時發溫脾散治脾胃不和腹脅虛脹不欲乳食精

神困倦或壯熱增寒

人參

訶梨勒各三

白朮

木香

黃耆

茯苓

藿香

陳皮

桔梗各半 甘草炙一 沒石子一個

末一錢水一盞薑一片棗一個煎五分服

木香丹治諸般傷冷物作熱及腹脹黃瘦

木香錢 川烏頭炮裂三個 阜角去皮七個 縮砂

巴豆霜各七枚

細末烏梅二七個蒸爛入藥丸如菘豆服三五粒

蘿蔔子薑湯下

鄭愈治腹脹并水鼓氣病

雞子白一個 白麩匙一 輕粉錢一

幼幼新書 卷二十一 十六

和作餅小錢大服一餅慢火內燒熟紙筋上去火

毒細嚼臨卧服

外臺灸懸鐘足三陽大絡在外踝上三寸動脈中按

之陽明脈絕乃取之灸五壯主腸滿胃中有熱不食

兒腹滿不食飲

冷熱不調第八

聖惠兒乳食乖度寒溫失節或陰陽相勝氣血不調

令冷歸下焦熱充上膈若風冷入腸胃則瀉利不定

或腹中氣滿或嘔逆不食為冷熱不調

張漢兒不能自調攝全在乳母若乳哺乖宜則冷熱不調熱衝上膈冷歸下焦致虛實不等水穀不消遂傷脾胃胃虛則嘔吐脾虛則泄利挾積則下痢脾胃最宜調適若疾證甚不已令虫動生風便致危困可不慎哉

聖惠木香散治冷熱不調胃氣壅滯少思飲食

木香 大腹皮 人參 赤茯苓

青橘皮焙去白 訶梨勒皮 桂心 前胡

半夏洗七 丁香 甘草炙各

幼幼新書 卷二十一 十七

粗散一錢水一盞薑半棗大煎五分量溫服

白朮散治冷熱不調腹內疼發歇不定

白朮 當歸炒 芎藭各半 乾薑

青橘焙去白 甘草炙各

粗羅一錢水小盞煎五分不時量服

香連散治冷熱不調腹痛下利

木香 當歸炒 乾薑炮各 黃連

阿膠炒各 細羅粥飲調半錢量頻服

治冷熱不調大便或壅或通不知乳食訶梨勒散

訶梨勒皮 大黃炒兩各 人參 檳榔

木香 桂心 芎藭各一

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量溫服

當歸丸治冷熱不調大便青黃心腹多痛不欲乳食

當歸炒 人參 白芍藥 芎藭各三分

甘草炙 白朮各半

羅末麩糊丸如麻子粥飲下五九日三三歲上加

治冷熱不調腹痛不可忍或寒熱下痢膿血木香散

幼幼新書 卷二十一 木香 芎藭 當歸炒 桔梗

木香分一 芎藭 當歸炒 桔梗

黃芩各半

未蜜丸如桐子不時溫薑湯破二丸服量加

治冷熱不調或下痢腹痛不食犀角散

犀角 桂心 甘草炙 當歸炒

黃連 人參 陳皮焙去白

粗羅一錢水小盞煎五分量溫服日三

張渙調中散治冷熱不調致脾胃不和

青橘皮焙去白 人參 木香各一 白茯苓

丁香 白朮 大腹皮 甘草炙各

細末一錢水小盞薑三片煎五分溫服

益胃丹調冷熱和脾胃

當歸焙 木香 白朮炮 沉香一炮各

白芍藥 蓬萊茂 縮砂仁 人參各半

細末麩糊丸如黍服十粒至十五粒點麩湯下更

量加

三稜丹調冷熱消宿食

京三稜炮乘 神麩 木香 半夏薑搗

幼幼新書 卷二十一 黃芩各一 乾薑炮 陳橘皮去白 丁香

桂心各半 乾薑炮 陳橘皮去白 丁香

細末蜜丸如雞頭服一粒薑湯化

趙氏治冷熱不調瀉痢不止腹中疼痛三聖丸

黃連 乾薑炮 甘草炙

等分末麩糊丸萊豆大服七丸赤痢甘草湯白痢

乾薑湯赤白痢二宜湯下

人參丸調氣治冷熱不調飲食不化

人參 木香 白朮 蓬萊茂

當歸兩各 白芍藥分一

未湯浸蒸餅丸如黍服十九空心麝湯下米飲亦得

胃氣不和第九附脾胃

張漢兒飲乳不知飢飽全在乳母存節若見啼哭即

乳是氣未調使急飲氣逆乳不得下反致嘔逆甚則

吐利成胃虛病

錢乙胃氣不和面皸白無精光口氣冷不思食吐水

當補脾又腹痛不思食又氣不和口頻撮當調氣並

幼幼新書 卷二十一 二十

主益黃散若下利調中丸

聖惠人參粥治冷傷脾胃嘔逆及利驚癇

人參兩半 白茯苓分三 粟米合半 麥門冬兩一

細剉半兩水一大盞煎七分下米作粥食

博濟木香散調中順氣補虛

草豆蔻個五 人參 茯苓 防風

藿香兩各半 陳橘皮去白

末一字或半錢薑薑米飲調

茅先生勻氣散

桔梗兩五 甘草兩二 白薑分一 縮砂仁

陳橘皮 茴香洗各

末半錢或一錢霜木瓜煎湯調服紫蘇薑湯亦得

寶蓋多厚朴蒼朮良薑桂烏梅名養脾湯

調理衆病醒脾散

木香 白朮並濕紙 人參 茯苓

草葉子 甘草炙 陳橘皮 厚朴細砂

紫蘇子

等分末一錢水六分薑一片棗半個煎四分通口

幼幼新書 卷二十一 二十一

服

治諸疾調中飲

肉豆蔻 白朮炮 人參 陳橘皮去白

呵子炮 茴香 縮砂仁 甘草炙各

藿香 桂心 檳榔各三

末半錢一錢薑棗湯隨兒通口服

錢乙調中丸

白朮 人參去頂 甘草炙各 乾薑炮四

細末蜜丸如菜豆服半丸至二三十丸食前湯服

塌氣丸

胡椒兩一 蝎尾去毒半兩

細末麪糊丸粟大服五七至二十九陳米飲下無

時一有木香一錢劉氏亦治腹脹

益黃散

陳橘皮兩一 青橘皮 呵子肉 甘草炒各半兩

丁香錢二

細末二錢水一盞煎六分食前溫服

白朮散

切切新書

卷二十一

廿二

百五

人參 白朮 木香 白茯苓

甘草炒 藿香各一兩 乾葛二兩

粗末一二錢水一盞煎五分溫服飲水者多與之

惠眼參苓散常服養氣安神益胃

白朮兩半 人參 茯苓 紫蘇子

甘草各一分 木香半

細末一錢濃煎棗湯調宜常服

寶童壯脾去積進食

京三稜 蓬莪朮醋紙裹煨 益智去皮各四兩 甘草炙四兩半

陳皮 青皮各二兩

末湯點一錢不時服薑棗煎亦得

劉氏人參散調胃進食

人參 白朮 川芎 神麪

木香 陳皮 肉桂去粗皮 甘草炙等分

小麥蘗加一兩

末半錢鹽少許百沸湯點服

治患後脾胃虛弱煩熱恍惚睡中多驚氣急煩亂溫

養脾胃消進妳食白氣清神調和藏府神朮散

切切新書

卷二十一

廿三

百五

白朮 人參 茯苓 石蓮肉去心

鴛粟米 白扁豆 藿香 甘草炙

等分細末半小錢棗湯調空心日午服漢東觀音散少白朮

粟米多神麪白芷木香黃耆

張氏治脾胃不和泄瀉下痢傷冷面色痿黃心痛藏

府不安癥癖氣塊脾胃皆治丁香煮散

丁香兩一 神麪濕紙裹煨 呵子棗大者 乾薑生熟各半

半夏炮 厚朴製 甘草生熟各半

陳橘皮四兩半

羅末如麩薑三片藥二錢水一盞煎五分食前熱服甚者兩服日二忌生冷動氣物

莊氏治胃虛去風醒脾

冬瓜子粒廿一 天南星錢一

未蒸餅九菘豆大五七至十九溫漿水下

補虛和氣散

人參

乾葛 甘草炮各五兩 木香兩三

麝香錢一 茯苓兩二

末半錢水五分薑少許煎三分溫服

丁香丸和胃氣進飲食

丁香 木香 肉豆蔻 人參

茯苓各一 藿香粉 羅末朱砂二錢香纏一錢棗三個同研麵糊丸如

粟米飲下隨孩服

乳食不下第十

聖惠論脾藏也胃府也脾胃二氣合為表裏胃受穀而脾磨之二氣平調則穀化而能食若虛實不等水穀不消令腹脹或泄利不食脾胃不和

千金地黃丸治胃氣不調不嗜食生肌肉

乾地黃

柴胡

未蜜丸如麻子服五九日三

聖惠治脾胃不和見食欲嘔心胃壅悶前胡散

前胡

白朮

厚朴薑炙各半兩

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量溫服

高良薑散治冷傷脾胃氣不和心腹痛不食

高良薑

桂心各一

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

嬰孺治三七歲兒不食或嘔或頭熱或下利或渴或手脚熱有時冷每日一劑便能食

當歸各半 甘草炙 升麻各一

鼈甲兩一

枳粒五 汗十

切水一升煮八合為三服相去入行六七里再服

覺身上潤衣蓋取汗微汗勿深
張煥集香煎治脾胃虛不欲食羸瘦

藿香 厚朴製 丁香 沉香

木香各一 白茯苓 白豆蔻 白朮炮各半兩

細末入麝一錢水一升蜜半斤大棗卅枚薑卅片

銀石器中慢火熬膏去薑棗通風處陰乾每早子

大乳前米飲下

膈氣第十一

水鑑桃花散治膈氣

幼幼新書 卷三十一

桃花錢 半夏錢大 厚朴 桂各一

乾薑 牙硝各二 當門子 江豆各一

搗散空心湯調一錢服至送巡轉自食乳毋忌酒

肉熱麪等

寶重治膈氣噎悶兩脇刺痛吐逆酸水氣塊往來疼

痛煩躁

檳榔 木通 甘草炙 栝葉煑

半夏

等分末二大錢水一盞煎六分膩粉少許在乾盞

肉研勻通口服如結腸翻胃用虛寒門烏藥丸後
用此兒半之

氣逆第十二附 噎氣

寶鑑兒氣逆者為乳母煩惱憂悶乳氣凝滯胃中灌

擊其乳飲之成疾面黃白乳哺減少夜啼及現但無

精彩勿取轉轉之則劇

聚寶透關丸治噎氣行心經

續隨子兩半 大黃錢三 長檳榔枚一 木通兩半

甘遂 大戟各一 膩粉錢七

幼幼新書 卷三十一

除膩粉諸藥同搗羅去續隨子皮重男女小便拌

勻謂陰入粉如硬糊日曬稍乾木蜜丸菜豆大燈

心竹葉湯下廿丸小便色異為效五歲下七丸更

加減湯使

王氏理一切氣木香今氣丸

青橘皮兩一 牽牛炒二 木香分一

細末糊丸菜豆大薑湯下五七丸

吉氏真珠散治硬氣

真珠 生犀各半 龍腦字一 香附錢四

細末半錢人參湯下

鄭愈取轉後宜調氣桂枝散

赤芍藥

桂心

藿香

白朮各二錢

末半錢飯飲調下

千金灸心俞二七壯兒減治不能食胃中滿膈上逆

氣悶熱

肌膚羸瘦第十二

巢氏兒羸瘦不生肌膚皆脾胃不和不能飲食故氣

血衰弱不榮肌膚兒在胎遇寒冷或生挾伏熱皆不

幼幼新書

卷三十一

廿八

能飲食故羸瘦挾熱者溫壯身熱肌肉微黃挾冷者

即時時下利唇口青肥

外臺小品療兒因食及在胎宿熱并乳母飲食粗惡

苦辛乳汁不起兒哺不為肌膚心腹痞滿癢黃瘦脊

四肢痿躄繚戾服之充悅

為藥各十

黃耆

鼈甲各

人參各四

柴胡各八

茯苓各六

甘草各

乾薑各二

熱枳實代

搗篩蜜丸如大豆服五九日二千金有大黃無黃

著一歲上乳服三九更量

聖惠治羸瘦脾胃氣弱挾宿食不乳四肢不和呵梨

勒散

訶梨勒皮

陳橘皮去白焙各半兩

黃耆

人參

白朮

藿香

桂心

白茯苓各一

甘草各半

粗羅一錢水小盞薑少許棗一枚煎五分溫服日

三四更量

黃耆丸治羸瘦體熱面黃不乳

幼幼新書

卷三十一

廿九

黃耆

赤芍藥

人參

甘草各

胡黃連各半兩

麥門冬焙

鼈甲醋炙各一兩

羅末蜜丸如麻子不時粥飲下五九量兒

秦芫丸治羸瘦體熱心神煩悶小便赤黃

秦芫

桑根皮

枳殼炒

地骨皮

黃耆

人參

赤茯苓

甘草各

犀角各半兩

龍膽不

柴胡各三

末蜜丸菜豆大不時粥飲下五九更增減

麥門冬丸治食不着肌膚骨熱小便黃赤

麥門冬 <small>兩焙一人</small>	人參	黃耆	青蒿子
桑白皮	枳殼 <small>炒</small>	地骨皮	黃連 <small>各半</small>
柴胡 <small>各三</small>			
未蜜丸如葶藶不時湯研五丸更加減			
五香煎治脾胃久虛喫食減少四肢羸瘦			
丁香	沉香	木香	藿香
白朮 <small>各一</small>	麝 <small>錢三</small>	白茯苓	陳皮 <small>去白</small>
黃耆 <small>各一</small>	訶梨勒皮	甘草 <small>各半</small>	
篩散水五升慢火煎一升布絞復入鍋煎麝及蜜			
三合薑汁半合棗肉廿枚慢熬粥飲調半茶匙更			
加減			
嬰孺治羸瘦食少不生肌肉下焦冷雞骨丸			
宿黃雌雞 <small>胸骨一具酒</small>	甘草	小草 <small>各分</small>	
蟋蟀 <small>各五</small>	桔梗	白朮	茯苓
芍藥 <small>各四</small>	人參	黃芩 <small>各五</small>	檳榔 <small>各六</small>
未蜜丸小豆大二歲兒服十五丸日二			
張氏豬肚丸解肌熱或泄瀉及積滯不思飲食肌肉			
消瘦			

鼈甲 <small>升一兩童便醋共一</small>	白朮	薯蕷 <small>各一</small>
胡黃連	人參	青橘皮
紫苑		
羅未入淨豬肚內繫定煮爛與藥杵黏丸如梧子		
服二三十丸不時湯飲下		
張氏香甲丸治男婦童子氣血虛踈肌膚消瘦百節		
疼潮作溫五心煩熱四肢逆冷不思飲食中滿氣滯		
婦人經血凝澀健脾胃暢神氣充肌膚澤顏色		
柴胡	生地黃	京三稜 <small>各三</small>
鼈甲 <small>醋炙</small>		
神麴 <small>炒</small>	木仁	熟地黃
麥蘖 <small>炒各</small>		
牛膝	木香	薑黃
當歸 <small>各半</small>		
白朮	芍藥 <small>各一</small>	
細末麴糊丸如桐子服十九空心清茶下米飲亦		
得		
聖惠灸胃俞穴各一壯在第十二椎下兩傍各寸半		
陷者中炷如麥治羸瘦食少不生肌膚 <small>實鑑</small>		
病後虛羸第十四		
巢氏兒大病後或驚癇或傷寒或溫壯而服藥或吐		

利發汗差後血氣尚虛脾胃猶弱不能傳化穀氣以榮身體故氣力虛羸

錢乙病後虛羸有冷者時時下利唇口青白有熱者溫壯身熱肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香丸夏月勿服熱者胡黃連丸冬月勿服有是證服之宜少論用藥識證云齊即中收好藥施人子忽歲熱自取青金膏三服併一服餌之至三更瀉五行子睡齊言子睡亦多驚又與一服瀉二行加口乾身熱齊言尚有微熱又服妻曰用藥十餘行未安莫生病否呂錢

幼幼新書 卷三十一 廿二

視云已成虛羸先多煎白朮散時時服胃氣不和後用

香瓜丸盜汗 十三日愈

外臺五味子湯療傷寒久病不除差後劇羸瘦骨立

五味子銖十 大黃銖六 麥門冬分六 芒硝分五

石膏兩一 甘草炙 當歸 黃苓

黃連 前胡各一分

切水三升煮升半服二合利下即止更量

錢乙木香丸

木香 青黛 檳榔 豆蔻各一分

麝錢半 續隨子去皮兩蝦蟇燒三

末蜜丸茶豆大服三五丸至二十九食前薄苛湯下

胡黃連丸

胡黃連 黃連各半 朱砂分一

細末填猪膽內淡漿水煮線釣勿着鍋一炊久取出研入蘆薈麝各一分飯丸如麻子服五七丸至三十丸食後米飲下

病後聲不出第十五

幼幼新書 卷三十一 廿三

錢乙病吐瀉及大病後雖有聲而不能言又能噤藥此非失音為腎怯不能上接陽故也當補腎地黃丸

虛寒 失音乃卒病耳

吉氏

酸棗仁錢 白茯苓錢 朱砂錢

末蜜丸如梧子服一丸入參湯下

病後不能語第十六

聖惠治病後六七歲不能語雞頭丸

雞頭頭一 煨灰 鳴蟬三枚 甘草炙 遠志

煨雞頭頭一 煨灰 鳴蟬三枚 甘草炙 遠志

雞頭頭一 煨灰 鳴蟬三枚 甘草炙 遠志

雞頭頭一 煨灰 鳴蟬三枚 甘草炙 遠志

雞頭頭一 煨灰 鳴蟬三枚 甘草炙 遠志

雞頭頭一 煨灰 鳴蟬三枚 甘草炙 遠志

雞頭頭一 煨灰 鳴蟬三枚 甘草炙 遠志

雞頭頭一 煨灰 鳴蟬三枚 甘草炙 遠志

雞頭頭一 煨灰 鳴蟬三枚 甘草炙 遠志

木通兩各半 麥門冬焙 人參兩各一 當歸

黃耆

芍藥各三

川大黃兩各一

羅未蜜丸如菜豆粥飲下五丸量加減不時錢乙云久服效

幼幼新書卷第二十一 萬卷樓刊

幼幼新書

卷二十一

廿四

幼幼新書卷第二十二 積聚癥瘕 凡十門

後學古吳陳履端于始輯

爛溪周應寶汝賢校

積聚第一

茅先生兒吐奶酸臭氣為奶積因叫未住而乳之致不消化日久停滯胃冷而得丁香散吐利調胃後下實積牛黃丸實熱取下奶積勻氣散補常服建脾散並胃氣不和

夜間肚微熱或嘔或瀉為食積此因飲食傷飽即睡

幼幼新書

卷二十二

章古之

致之下補同前常服萬靈丸

面黃白不進食肚微痛天矯啼叫為氣積因患諸般

氣久而不安傳歸氣積所致宜萬靈丸勻氣散醒脾

散脾氣不和夾建脾散調理

面黃如土色或帶虛臍上微痛肚皮熱飲食少纔食

臍上及肚中便痛食不化頭微熱為脾積因食硬物

或冷物傷脾青金丹取脾積後勻氣散醒脾散補常

服建脾散萬靈丸

渾身微熱不思飲食渴日多昏昧抱着似睡未覺為

虛中積因久泄瀉不止而得青金丹通盡積後勺氣
 醒脾散調理常服萬靈丸保童丸一切
 大便不通風毒瘡癰喉閉乍顯喉中涎響為實積因
 兒飢猛飲食無度致之奪命散急慢吐熱涎後勺氣
 醒脾散調理常服牛黃膏隔熱鎮心丸一切天竺黃
 散實熱
 諸積各說不明藥六等降然調理不退如面黑久瀉
 不止腹脹手心生瘡氣出粗瀉黑瘦弱不能坐立眼
 視臯口燥黑死

幼幼新書 卷三十三 二

瀛東王先生積可醫者九
 面虛腫是積積者脾之所係脾主肌肉故應面脾係
 土土無正形故早晚浮腫不定多則早浮腫則脾不
 磨食面作腫病後有此是虛中積宜調脾消積行氣
 面合地卧是積以冷積在脾也合地卧者脾好土也
 冷屬陰故知傷冷硬食得之宜下熱積氣藥
 腹脹是積積在肺也肺主氣纔受積氣便冷腹脹滿
 氣急故知在肺先調氣後轉轉後更調氣
 小便如油是積積在小腸也脾積當傳心心不受觸

則入小腸小腸心之府在小腸則節其水道小便如
 米泔油相似
 髮黃是積積傷心也心主血脉陰遍身毛髮被積所
 干則髮黃故知積傷心宜空心散缺及取積藥此必
 時復發熱
 赤白痢是積積在肺也肺受傳大腸及外傷冷而得
 蓋肺主西方庚辛金而大腸為府色白後赤是肺外
 邪傳大腸為赤白痢宜取後調氣
 兩眼黃赤睛青是積積在肝也肝主東方甲乙木色

幼幼新書 卷三十三 三

青被積氣所干眼屬肝肝受脾積氣所干則眼黃赤
 睛青若傳膽口苦不喫物宜涼藥退之
 遍身虛腫是積積不在藏只在府也被藥發動積氣
 不在藏出皮膚間為腫宜取虛中積藥後補
 多瀉白糞是積冷積在脾也脾主化冷積在脾冷滑
 而瀉白糞先轉後熱藥補
 積不可醫者六
 喘急是肺積肺主氣喘急則肺絕當面白全無血色
 不治

面黑是腎積面黑者腎絕也不辯人好惡眼直無光
 只一日死
 吐熱氣是榮積血絕不可治也血主心心不能管故
 出熱氣不止
 手脚心生瘡是衛積衛氣也胃氣不生故手足生瘡
 若衛絕則氣不回半日死
 惡心吐乾嘔是胃積胃主化食胃絕則食乳不化不
 食乾吐嘔面青黃無血色
 瀉久住又瀉是積積咬脾爛也瀉白糞為食不消住
 却放糞赤黑死知脾爛不治
 寶鑑兒五積為歲氣不行蓄積一處而不動也心積
 為伏梁在臍上上攻心下攻胃脾積為痞橫胃口上
 肝積肥氣在臍左肺積息賁在臍右腎積賁在臍
 下各有變動非食所成乃氣積也歲屬陰故在一處
 而不動
 脈氣留聚也在六府府屬陽陽氣運轉不停故不定
 發則腹痛面黃瘦劣嗟嗟不生肌肉髮立或肌體浮
 腫腹急多困多為水氣

幼幼新書

卷三十一

四

真珠囊虛中積候因驚取後復驚為驚中虛積下糞
 青穢因傷食瀉吐漸虛病未差為虛中積有積頻取
 轉不着致積尚伏亦曰虛中積驚積取下糞隨驚青
 食積糞成塊若疳中虛積者因疳病轉瀉虛而疳不
 退故也其糞裏白色
 形證論八種積病楊玄操云多吐多瀉多困多熱是
 也
 面手脚腫是虛中積
 腹脹不思飲食是胃積
 合面喫土炭痢痛大腹作積
 面多黑困眼不開脾積
 小便似油脚手腫腎積
 渴瀉不止膀胱積
 腹內虛鳴小便赤黃小腸積
 多吐逆不喫食上膈中有積
 患眼渾身虛腫脾積久取不下曰虛中積肚腫四肢
 黃者受水氣也小便如米泔肝積頭髮黃者疳勞
 候欲發此時作積積眼睛黃鼻出水肝肺有積乃風

幼幼新書

卷三十一

五

疳候赤白滯痢藏府內久積腸內虛鳴此氣虫候合地卧是疳虫攢心多吐逆或日近及氣酸臭悉可取若久勿遽取恐作慢脾宜調理

保生論積病脉沉實因恣餐毒食瓜桃李果肌滑黏膩物蘊成積聚證見前

脉洪大下黑血形瘦不行坐久患積腹急如鼓項軟四肢冷口噤都不食並死候

茅先生兒初受諸積歌

小兒諸積病還因乳哺成先從腹肚脹次及面

幼幼新書 卷三十一

虛盈多睡面合地小便似油清髮黃兼滑瀉吐

逆肚虛鳴白痢更并赤眼黃因得名

積病不治歌

候得小兒諸積病百個難醫一個命胃積多生

手掌瘡疳勞吐瀉因難整孩兒生下五色惡瘦

弱伶仃無差日久瀉止來又忽瀉口中熱氣奔

奔突手脚心痛朝暮熱面黑惡瘦藥難衝頰紅

極熱并驚久此是六積命還窮

千金治身熱頭痛食不消腹脹滿或小腹絞痛大小

便不利兒無異疾唯乳哺不節或驚悸寒熱服此不差更服凡食少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉宜紫雙丸德詳例云服紫丸不下服赤丸赤丸差映病重者宜比用朱砂又刀陳于紫丸疑即此是

麥門冬十銖 甘草五銖 甘遂 朱砂各二銖

蠟八銖 巴豆霜 麩仁各十銖 牡蠣八錢

散更合搗二千杵藥燥入密半歲兒服如荏子一

二歲如半麻子七八歲如小豆各二九兒大量加

雞鳴時服至日出不下投熱粥飲數合九皆雙出

幼幼新書 卷三十一

下甚冷粥止

外臺扁鵲云療久癖積聚留飲宿食天行傷寒效逆消歌久病羸瘦老小服之或吐下汗曾青丸

曾青 朴硝各二銖 茯苓 寒水石

大黃 附子炮各三分 巴豆熬二分

異搗篩竟巴豆硝石合搗六千杵次附子次茯苓

次大黃次曾青次寒水石次蜜每八一藥搗千杵

大人服如大豆二九五歲下如麻子一九漸加薄

粉粥清下覆令汗吐下氣發二九霍亂三九泄痢

一二九一曾青三分忌猪肉冷水蘆筍大酢

醫局療風氣結聚宿食兼砂石皮毛在腹中及積年

腰痛冷如冰石脚氣衝心煩潰悶亂頭旋暗倒肩背

重悶心腹脹滿胃膈閉塞風毒氣連頭面大小便秘

脾胃氣痞不食脚轉筋掣痛攣急心神恍惚眠寢不

安七寶丸

大黃五兩 桃仁十兩 枳實六兩 木香

柴胡 訶梨皮各五兩 甘草四兩 未蜜丸如桐子食後米飲下廿九或臨卧增利為

度虛實與覺病退服五補丸

茅先生青金丹治諸積

滑石 白丁香 天南星各二錢 青黛平錢

錢二 輕粉錢二 水銀錢二 川巴豆七十二片 不損者

末軟飯丸桐子大傷寒後取積淡葱湯下取疳虫

牛肉炙汁驚風肚中緊硬面青黑金銀薄荷葱湯

肚中傷及肚皮熱肚脹夜熱似疳面青黃色眼微

黃腹中有積阜角子二七粒灰內煨水一盞煎半

盞下積瀉魚酢湯下氣積炒茴香湯下周歲十四

九三歲十八九七歲廿四九量加四更時服天明

積盡依證藥補臨喫先吐下其涎不妨

萬靈丸治諸積

木香 黃連 蓬萊茂各半 陳皮

青橘去瓤各一分 檳榔一個重 未一錢淨巴豆一粒醋煮紫色杏仁肉一個燈火

上煨留性研醋糊丸菜豆大薄荷薑湯吞五七至

十九

幼幼新書 卷三十一 九

嬰孺治下後寒熱血積成癖左脇下或寒飲或冷食

積聚氣動胃心留熱不下食飲闇瘦宜先散氣下食

後服紫雙丸前見去宿積自元悅也

柴胡 茯苓 人參 白朮

鼈甲醋炙各二分 切如豆水二升煮五合空心分溫三四服相去如

人行一二里久再服粥將息

錢乙消積丸

丁香個 縮砂仁十二個 烏梅肉個 巴豆霜二

細末糊丸黍大三歲上三五下二三九不時湯下

張氏有大半夏無砂仁朱砂衣滴水丸各五聖丹

紫雙霜丸消積聚

巴豆霜 杏仁各三粒 代赭石飛一錢

細末飯丸如粟服三五至十九阜角仁湯下無時

量與

張渙萬靈丹治脾胃久不和挾積及乳癖濕熱藥皆

不效者

肉桂 川黃連 蓬莖茂各一兩 肉豆蔻

幼幼新書 卷三十一

檳榔 陳皮去白 木香 丁香各半兩

巴豆 杏仁炒並燈上 桃仁各二七個

搗勻滴水丸黍大未周晷一粒十歲上七粒冷薑

湯下

劉氏桃紅散治驚積疳積常服進食

馬牙硝 朱砂 茯苓 人參

等分末一歲一字新汲水入蜜調下

檳榔散治食積疳積肚脹

甘草炮 木香炮 檳榔二個 青皮半兩

豆肉廿粒炒 陳米半合製

末半錢或一字葱湯調服瀉利差

莊氏治驚疳積聚軟金丸

青黛 膩粉 胡黃連 麝香各一分

寒食麵錢三 史君子個三 天漿子三七個

研滴水丸桐子天金銀薄苛湯化

兒久困驚積滯食急惕驚風卒乳不下躁熱吐瀉多

叫不睡磨刀丸

全蝎七個 朱砂錢一 粉霜錢二 半夏洗淨

幼幼新書 卷三十一

末巴豆十四個細研蜜浸蒸餅心麝少許丸如棗

豆磨刀水下一歲一丸量加減吐瀉不妨即用驚

藥調理不得喫和氣散怒動驚氣

吉氏蘆薈丸治驚疳積滯或渴或瀉或熱

蘆薈錢一 史君子帶殼 燕萸仁錢半 檳榔一個

胡黃連 沉香 木香各一分 麝香少許

龍膽草 朱砂各半錢 夜明砂去土

乾末醋膽丸如黍米飲下十粒常服妙

鎮心真珠丸治久積驚疳退積滯化風涎利胃膈

末一字薄苛湯下更量	乳香 <small>各一</small> 陳皮 <small>去白</small>	鬱金 <small>半兩 巴豆十</small> 辰砂 <small>錢半</small> 麝	是驚積周歲下五丸桃符湯下加減服	末飛羅麩滴水丸如菴豆壯熱吐瀉脉沉緩眼困	水銀 <small>阜子</small> 巴豆 <small>淨三</small>	朱砂 天麻 鈹白霜 <small>各半</small> 輕粉 <small>錢二</small>	桃符丸取驚積	煎紫蘇木瓜湯調三服和氣	末水調半錢睡時服來日下所傷物異功散 <small>不和氣</small>	白丁香 輕粉 官桂 <small>去皮各</small>	追竟散治果積	積史君子湯下	末滴水丸菴豆大二歲一二九加減葱白湯下疳	續隨子 <small>三</small> 白附子 <small>兩半</small> 寒食麩 <small>分二</small> 天南星 <small>兩半</small>	真珠 巴豆霜 滑石 <small>各一</small> 半夏 <small>三</small>
-----------	---	---	-----------------	---------------------	---	--	--------	-------------	--------------------------------------	------------------------------	--------	--------	---------------------	--	---

寶鑑瘕者在腹疼痛定在一處瘕則不痛	痛食瘕也	為瘕食結在腹喜寒洒洒如瘡不能飲食常隱隱而	聖患兒寒溫失調飲食不化與藏氣相搏結聚不動	水食飲結聚而成	浮沈者瘕也弦急牢強左右不定瘕也皆由冷氣痰	消結聚成瘕癖其狀按之不動有形段者瘕也推之	巢氏兒五藏不和三焦不調寒冷氣客之令乳哺不	瘕瘕第二	減	或一字陳米飲下若吐瀉瓦罐煎香附湯下量加	陳皮巴豆炒黃取巴豆五片與木香末研服半錢	木香 <small>錢半</small> 陳皮 <small>錢二</small> 巴豆 <small>淨五</small>	治諸般氣積或驚結不通木香散	冷水為餅如桐子阜子湯服一九量加減	朱砂 <small>阜子</small> 石鷲 <small>個一</small>	粉霜 延胡索 巴豆霜 <small>各半</small> 輕粉 <small>錢一</small>	勝金餅子治虛中積
------------------	------	----------------------	----------------------	---------	----------------------	----------------------	----------------------	------	---	---------------------	---------------------	--	---------------	------------------	---	---	----------

楊大鄴兒不慎滋味嘗吃粘滑膩肥腥羶瓜果胃口不和結實難化成癥痞胃隔間攻衝榮衛則嘔逆喘粗眼澀更加頻渴或歸下部則泄瀉頻併兩脅虛脹只和脾胃或更踈瀉則飲食不化漸次成癥大約諸證皆宜早療不尋根源久則難

聖惠鼈甲散治癥瘕壯熱頭痛嘔逆腹痛寒熱頭髮作穗及食癖乳癖

鼈甲醋炙 枳殼炒 木香 川大黃炒

京三稜煨 檳榔各半 人參 赤茯苓

切勿新書

朱三十一

十一

柴胡各三 桂心一

羅散一錢水小盞煎五分溫服日三量加減

鼈甲九治癥瘕羸弱不乳

鼈甲醋炙 京三稜煨 川大黃炒 檳榔

郁李仁半炒 木香 青皮去 肉桂去

柴胡 人參 桔梗 防葵各一

羅末蜜丸如菴豆五六歲早晚粥飲下七九更加

減

牛黃丸治癥瘕百病疳痼腹脹黃瘦發渴不常容忤

疳痢及吐逆不定心腹多痛及驚風天癇

牛黃 犀角 木香 當歸半炒

人參 川大黃炒 光明砂飛 檳榔各三

麝 鼈甲醋炙 巴豆淡漿水 大槐煮

代赭二 肉豆蔻二 杏仁炒

羅末蜜丸如菴豆百日内乳汁下一九二三歲粥飲下二九病在胃膈吐出病在藏府即下喫漿水粥一日利止五日十日進一服永無滯結更量加

減

切勿新書

朱三十一

十一

治食癥或寒熱四肢黃瘦不食礞石丸

礞石 乾薑炮 杏仁炒 巴豆霜

硃砂各半

研細米醋一茶椀煎如膏

京三稜煨 阜莢酥炙 蓬萊菜各一

羅入膏丸如菴豆三歲一丸茶清下稍大意加

三稜煎同治

治積年厭食并治血氣及癥塊硃砂丸

硃砂半 青礞石 穿山甲炙 京三稜煨

磁石 <small>燒醋</small> 乾漆 <small>出炒烟</small> 赤石脂 <small>各一</small> 蜚虫 <small>淨</small>	水蛭 <small>炒各五</small> 巴豆霜 <small>收十五</small> 京三稜 <small>煨一</small>	羅末入巴豆研勻軟飯丸如小豆服三九兒一九	燒蒸餅灰湯下五服差	博濟消癥瘕積聚血結刺痛木香研砂煎丸	木香 大黃 <small>煨</small> 京三稜 <small>生</small> 巴豆	官桂 筒子漆 <small>炒</small> 青皮 蓬莪茂 <small>炮</small>	附子 <small>炮</small> 乾薑 <small>炮各</small> 香墨 <small>指節</small> 研砂 <small>醋半兩</small>	<small>蓋浸一宿去石</small>	幼幼新書 卷三十三 十一	末大黃三稜巴豆銀石器內好醋一升煎一兩沸	次入研砂熬膏次入諸藥杵千百下丸如菉豆服	五丸冷食水酒結聚腹內氣塊痛乾薑湯或橘皮	湯夾下食停寒白湯黏食不消成氣塊麵湯牛羊	魚鱸肉成氣塊不散用所傷汁下宿酒不消酒下	血氣當歸酒姪姪不服要轉淡茶下加至七九兒	三九常服一二丸	張渙大腹子湯治癥瘕腹滿小便不利	大腹皮 <small>兩一</small> 檳榔 枳殼 <small>炒</small> 赤芍藥
--	--	---------------------	-----------	-------------------	--	---	---	-----------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------	-----------------	--

人參 知母 陳皮 <small>去白各</small> 甘遂 <small>煨一</small>	羅末一錢水小盞煎五分溫量服	聖效丹治癥結諸病久不差	當歸 木香 好朱砂 <small>飛</small> 桂心 <small>各一</small>	甘遂 <small>煨</small> 京三稜 <small>炮乘熱剉</small> 鼈甲 <small>酥炙各</small> 麝	蕤仁 <small>各一</small> 巴豆 <small>三七個絹袋盛酒煮一宿</small>	研細黃蠟六兩慢火鎔同諸藥攪成膏丸如黍周	晬一粒十歲七粒溫米飲下食後	癥氣第三	幼幼新書 卷三十三 十七	聖惠絕乳兒五歲調和榮衛氣理則津液通流雖多	飲水漿不能為病若調養乖方三焦痞隔則腸胃不	能宣行因飲水漿便停滯不散更遇寒氣相搏結聚	成癥瘕者僻也在兩脅間有時作痛	茅先生兒七歲內右脅下痛者為癥氣蓬莪茂散 <small>氣</small>	門夾建脾散 <small>胃氣不和</small> 如面黑眼視瀉黑血臍口手足	冷不進食死	錢乙兒病癥乍涼乍熱飲水或喘嗽與潮熱相類不	早治必成疔以有癥令不食致脾胃虛而發熱故飲
--	---------------	-------------	---	---	---	---------------------	---------------	------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	--------------------------------------	--	-------	----------------------	----------------------

水過多即蕩滌腸胃亡失津液胃不能化水穀脉沉細益不食脾胃虛四肢不舉諸邪遂生鮮不瘦而成疳

曹宣德子三歲面黃寒熱不食飲水及乳不止眾謂

潮熱用牛黃麝香丸不愈及乾葛散止渴反吐錢曰

癖也當白餅子下搗搗後補脾磨以消積九積聚果

愈善飲水者食伏管内不能消致令發寒服止渴藥

吐者藥衝脾也

寶鑑兒失乳或母暴以食哺入脾不消結聚成塊為

切切新書 卷三十三 六

食癖

滯寒不流又夾痰涎成癖自然成聲

千金治癖實壯熱食不化中惡忤氣牛黃鼈甲丸

牛黃 厚朴製 茯苓 桂心

芍藥 乾薑炮各半兩 鼈甲醋炙 麥麩

柴胡 大黃 枳實炒 芩藟各一兩

未蜜丸如小豆日三意量

外臺治老小腹中癖氣

牛膝 枳實炙 鼈甲炙 茯苓各八分

桔梗 芍藥 白朮 人參

厚朴 大黃 桂心 檳榔各六分

搗篩蜜丸如梧子空心溫酒服廿九至三十九日

二忌生冷油膩小豆黏食菓菜桃李雀肉大醋生

葱猪肉

治兒閃癖

青箱苗六月知母 黃連 大黃

梔子仁 苦蕒 常山 姜莖各八分

苦參皮十二分 甘草炙 蜀漆洗各五分

切切新書 卷三十三 十九

篩蜜丸如梧子飲服五九至十五九日再知為度

兒臧忌猪肉熱麵葱蒜生菜松菜海藻

療兒冷癖疝癖氣不下食瘦時時肋下痛

防葵 當歸 枳實炙 厚朴炙

楮實 人參 黃耆 茯苓 茯神

訶梨勒皮 白朮各八分 牛漆 郁李仁

柴胡 大麻仁 芍藥 橘皮

防風 紫苑 薏苡仁各六分 鼈甲炙

三稜根各廿分 桂心七分 大附子二枚 乾薑二分

甘草炙

乾地黄

大黃各十分

五味子四分

檳榔四箇

仙鼠二枚無糞
二合代

擣篩蜜丸如梧子量飲服

秘錄治氣癰

三稜汁作羹粥以米麩為之與乳母食兒每日服一棗大作粥十歲內及新生無問癰熱無辜痲癰

皆理

治閃癰頭髮堅黃癩癰羸瘦

林檎杵末和醋傳癰移處便傳

切幼新書

卷三十三

二十

陳藏器

苦瓠末傳破者煮熟解開熨

聖惠治癰不散肌肉瘦瘁或心煩不食即吐逆或大

小便秘及天釣驚風大紫霜丸

代赭

朱砂飛

杏仁炒

犀角各半兩

麝

牛黃

巴豆霜各一分

當歸

川大黃炒

鼈甲醋炙各三分

羅末蜜和搗二三百杵丸如麻子粥飲下二九驚

風天釣荆芥薄荷湯下更量服下惡物效

前胡丸治癰氣腹痛

前胡

桔梗

赤芍藥

赤茯苓

枳殼炒

川大黃炒

郁李仁炒

當歸炒各半兩

鼈甲醋炙一兩

末蜜丸如菘豆三歲空心粥飲化五九更量

治癰氣手脚心熱面黃不食漸羸鼈甲丸

鼈甲醋炙

川大黃炒各一兩

柴胡三分

人參

赤茯苓

當歸炒各一分

桂心

白朮

木香各一分

京三稜煨

檳榔

薑切片煨各半兩

切幼新書

卷三十三

三十一

羅末蜜丸如菘豆三歲空心研五九粥飲下量與

下惡物效

京三稜丸治癰氣手脚心熱脾胃虛弱不食面黃漸

瘦

京三稜煨

防葵

木香

枳殼炒

人參

赤茯苓

白朮

桂心各半兩

郁李仁炒三分

川大黃炒

鼈甲醋炙各一兩

末蜜丸如小菘粥飲下隨年九數日三兒稍大酒

下

雞骨丸治癩氣羸瘦脇堅滿時痛食不成肌

烏雞骨一具酒浸炙黃 川大黃炒 鼈甲醋炙

黃芩 澤瀉 柴胡 桔梗

人參 赤芍藥各一兩 枳實炒 杏仁炒

防葵各三枚 麩虫炒

末蜜丸如菘豆四五歲兒粥飲下七九日二量加

治癩氣堅硬瘦痺不食芫花丸

芫花醋炒 鼈甲醋炙 川大黃炒 桃仁各半炒

京三稜煨 雄黃各一

幼幼新書 卷三十一

羅蜜丸如粟三歲兒空心薑湯下三九量加

嬰孺知母丸治大小脅心癢癩頭痛微眩面黃便赤

寒熱手足厥冷不食夏秋轉甚淋瀝或手足煩躁或

連瘡不止或瘡後朝差夕增乍寒乍熱或溫疫或瘡

作頭項苦強或宵隔間痰熱癩飲及傷寒七八日結

熱痰積不除之後寒熱頭痛逆害食飲胃中煩躁夜

卧苦煩朝差夕甚有如溫瘡此除熱消飲治寒熱和

胃氣利小便胃膈痰熱留飲面黃兒壯熱諸癩癢不

令吐下

知母 大黃各三兩 黃芩 杏仁炒

常山各二 蜀漆 甘草各一兩 麻黃去節

牡蠣煨六分

末蜜丸桐子大飲下五九至廿九日三老少半之

雞骨鼈甲丸治羸瘦腹有癩脅堅滿時痛食不生肌

宿烏雞酒浸一宿炙 鼈甲炙 蜀漆

柴胡 桔梗 人參各四 芍藥

大黃 黃芩 杏仁各五 枳實炒

防葵 白朮各三 麩虫炙

幼幼新書 卷三十一

末蜜丸如豆四五歲二九日再

治水癩黑丸子

當歸各四 細辛 附子炮 乾薑

胡桐汗各三 鹽豉合二 巴豆淨炒 狼毒炙一

杏仁去皮炒

末蜜丸如菘豆飲下三九

丁時發七八歲兒多睡或壯熱日羸瘦身雖不痛有

時痢膿嘔逆不食是癩氣狀似瘡

柴胡 黃芩各一 枳殼炒 甘草炙

知母 各二 芍藥 各二 大訶梨勒皮 一個
未水一盞煎服

王允二丁散治諸癖不消腹痛乍寒乍熱泄瀉無時
多渴黃瘦或下痢腹脅有塊如掌癖側石硬

棟丁香 白丁香 沒石子 各二 硫黃

蜜陀僧 各三

細末一字或半錢白湯調空心臨卧日二消為度
千金灸兩乳下一寸各三壯

乳癖第四 是

幼幼新書

卷三十一

疳

聖惠乳母食飲無常醉飽過度即乳兒不知節令

兒脾胃虛嫩不能消化或偏卧乳兒不能迴轉兒亦

睡乳滯偏脅下因結聚成塊而痛面色青黃發歇

壯熱吐乳多睡口内生瘡漸漸黃瘦腹內結塊名乳

癖

茅先生兒遍身黃腫小便赤黃體微蒸熱此因胎熱

又哭後吃乳不消遂為妳積牛黃膏 熱 天竺黃散

實熱 調中飲 和胃氣不 與服黃入眼目視氣喘魚口握

拳不治

寶鑑乳擁結不消又夾頑涎成痞在腹或動不動有
時腹痛

玉訣歌

妳脾痞結積因傷腹脹筋青面色黃熱發有時

或渴飲疴傷脾熱口生瘡

先解利後取積次調胃一云惺惺丸取次銀白散

調氣

聖惠京三稜散治乳癖結實或滯惡不散漸羸面黃

春夏多發不欲乳

幼幼新書

卷三十一

疳

京三稜 微 川大黃 炒 檳榔 鼈甲 醋

赤茯苓 各半 枳殼 炒

羅一錢水小盞煎五分分二服日三四下惡物

人參九治乳癖手脚心熱面青黃不乳漸羸

人參 薑 炒 桂心 赤茯苓

白朮 枳殼 炒 木香 當歸 炒

檳榔 京三稜 煨 鼈甲 醋 大黃 炒

羅蜜丸如菉豆一歲兒粥飲下三九日三量加

化癖丸治乳癖結塊久不消化

巴豆霜兩半 膩粉 朱砂錢各一 黃鷹糞錢各一

研砂 雄雀糞各一字

研糯米飲丸如黍一歲一丸空心阜莢仁湯下下

惡物

治乳癖不消心腹脹滿木香丸

木香 京三稜煨 檳榔 人參

青皮去白 赤茯苓各一 牽牛子炒 艸豆蔻去皮

各半 郁李仁炒

羅醋麵糊丸如梧子粥飲下三丸量加

幼幼新書 卷三十一

譚氏治乳癖

訶子五個磨 蜜陀僧錢三 硫黃 輕粉

白丁香 黑丁香 粉霜 鵝砂錢各一

末半錢男患女乳調女患反足

玉訣銀白散生胃氣下後宜此

人參 茯苓 甘草炙 白木炒

白扁豆去皮 藿香

等分末一錢紫蘇湯調

張氏

先花一兩醋浸三日淨洗大黃末半兩蒜一斤研男左女右塗乳母手心慰擦癖上患人口聞藥氣即時取了立效

董氏

紫河車兩 寒食麩兩三

細末一匙許水調塗足心病左塗左病右塗右紅

帛上縛大便下盡洗去一用人參醋調

孔氏

蜜陀僧研細大蒜汁調大小恰好塗口有蒜氣手

幼幼新書 卷三十一

揉覺癖消五六月溫漿水洗去遲恐藥毒損氣藥

乾溫水潤王氏用白芥菜薑水調塗醋麩餅蓋

莊氏粗線兩條量兩乳頭中間濶狹于兩乳頭垂下

照令端直方停對兩乳于左右肋各灸七壯炷如麥

瘰氣第五

聖惠飲食不調生冷過度與蔽氣相搏結聚而成臍

脅兩傍上下有物弦直大如解小如拍弦起急痛名

瘰氣

茅先生塊在左脅下痛名瘰氣蓬茂散夾建脾散

聖惠京三稜散治疰氣急痛

京三稜煨

枳殼炒

大腹子

鼈甲醋炙

神麴炒

訶梨勒皮

蓬萊茂

麥蘖炒

厚朴製

青橘皮去白各

黑三稜

兩半

羅粥飲調半錢日三更量服

大黃散治疰氣發即緊痛不食

川大黃炒

鼈甲醋炙各

麝

木香各一

京三稜煨

檳榔

甘草炙各

半兩

幼幼新書

卷三十一

疰

羅粥飲調半錢日三四意加減

防葵丸治疰氣不食肌瘦

防葵

當歸

桂心

訶梨勒皮

陳皮白去

川大黃炒

鼈甲醋炙

桔梗各半

杏仁淨炒

附子淨炮

吳茱萸浸七次

炒

羅蜜丸如麻子粥飲下五丸晚再量兒

治疰氣食不消化四肢瘦弱

鼈甲醋炙

川大黃炒

京三稜煨各

枳殼炒

芩藟

桔梗

赤茯苓

赤芍藥

乾薑炮

桂心各一

羅蜜丸如麻子粥飲下五丸日三更量

痞結第六

巢氏痞者塞也兒胃膈熱實腹有留飲令柴衛痞塞

腑臟氣不宣通結聚脹滿或壯熱為痞結

千金鼈甲丸治結堅脅下有痞手足煩熱

鼈甲醋炙

芍藥

大黃各卅

茯苓

柴胡

乾薑炮各卅

桂心六

廣虫

齊曹各卅

幼幼新書

卷三十一

疰

末蜜和如桐子服七丸漸加知為度

陳藏器治痞滿

三白草絞汁服令人吐逆除胃膈熱亦主瘡兒痞

滿按此草初不白入夏葉端半白如粉農人食之

蔣田三葉艸白便秀

聖惠前胡散治痞結壯熱羸瘦多喘

前胡

川大黃炒各

枳殼炒

犀角

郁李仁炒

鼈甲醋炙各

羅散一錢水一盞煎五分量不減溫服利為度

大腹皮散治痞結壯熱增寒大小便不利

大腹皮 陳皮白去 桔梗 鼈甲醋炙各三

人參 赤芍藥 川大黃炒

木通各半 甘草炙一

羅散一錢水小盞煎五分量加減溫服

檳榔散治痞結壯熱不乳心胃煩壅

檳榔 川大黃炒各半 枳殼炒 人參

紫胡 知母 赤芍藥 地骨皮

甘草炙各一

幼幼新書 卷三十一 三十

羅散一錢水小盞煎五分溫量服

治腹內痞結多驚牛黃丸

牛黃 麝 川楝炒 甘遂煨各

巴豆霜半 蜈蚣淨炙一枚 蚱蟬炙七枚 川芎硝

真珠 雄黃各半

羅蜜一合白蠟一兩煎鎔丸如麻子粥飲下二丸

意加減利為度

嬰孺治八痞曾青丸一當心下堅痛形如小杯名蒸

痞主曾青二如板起脇下槍心名蛇痞主龍骨三夾

臍如手名臭痞主龜甲四繞臍腹雷鳴名寒痞主乾

薑五當心如板不可動搖名虫痞主牡丹六心下如

盤名氣痞主鼈甲七生于寒熱腰背痛壯如瘡名血

痞主廣虫八膿出腹痛名風痞主蜚蠊

曾青 乾薑 廣虫 紫石英

牡丹 桂心各二 大黃 龍骨各五

蜀漆七 龜甲又云各二 真珠 蜚蠊各三

細辛六 附子炮四

末視何痞主藥倍之蜜和未食服桐子大五六歲

幼幼新書 卷三十一 卅一

上下四九兒小意減日三丸服之當微煩腹中諸

病皆出忌猪魚菜據上說疑別有鼈甲並用

治先寒熱腹堅牢強痞不食食不生肌時壯熱雞骨

丸 芩 當歸 大黃蒸三升 紫苑

茯苓各三 杏仁炒 桂心各四 杜蘅

白芷 石膏各二 半夏洗一 黃雌雞個一

破腹勿中水取兩

末蜜丸如小豆日三稍加

宿食不消第七

巢氏胃為水穀之海脾氣磨而消之胃氣和調則乳
哺消化若過冷積脾胃宿食不消詠其脉三部沈
者是

錢乙用益黃散胃氣不和門

外臺丸味當歸湯療宿食不消發熱

當歸 甘草炙 芍藥 人參

桂心 黃芩 乾薑各一分 大棗五枚

大黃二分

幼幼新書 卷三十三 世

切水升半煎六合服

聖惠治宿食不化少欲飲食四肢消瘦腹脅多脹訶

梨勒散

訶梨勒皮三分 人參 白朮 麥蘖炒

陳皮去白焙 檳榔各半兩 甘草一分

羅散一錢水小盞煎五分不減日四五溫服

陳橘皮散治宿食不消心腹脹滿

陳橘皮焙 高良薑 人參 檳榔各一分

白茯苓 甘草各半兩

羅散一錢水小盞薑少許棗一枚煎五分不時量
溫服

治宿食不化發熱有時檳榔丸

檳榔 牽牛子微炒 大黃半兩 乾薑炮

枳殼去瓤炒黃 甘草半兩

朱靈丸萊豆大空心湯下五丸晚再臨時加減

丁香丸治宿食不消心腹虛脹

丁香 木香 乳香 雄黃

青橘皮去白焙 肉豆蔻 檳榔各二分

幼幼新書 卷三十三 世

巴豆霜半 硫黃錢 朱砂飛半

羅末蜜丸如黍粥飲下三九量與

治宿食不消肉豆蔻散

肉豆蔻一枚 川大黃炒一分

粗羅一錢水小盞煎五分日三服意加減

嬰孺牛黃鼈甲丸治癰實壯熱食不消化中惡忤氣

鼈甲 麥麩炒 麥門冬 柴胡

大黃 乾薑 芩各一分 牛黃二分

厚朴炙 茯苓 桂心各半兩 芍藥五分

末蜜丸如大豆服二九日三

劉氏治心腹脹滿疝氣傷食臆肚瀉痢不轉

青州棗一個內巴豆一粒慢火炙黑細研入麝少

許飯丸如麻子一歲一丸傷食熱米飲瀉冷湯忌

生冷油膩熱物

張氏治飲食不化寬中止吐麝香安中丸

甘松葉兩二 益智 丁香皮 香附各三兩

茂兩一 南木香兩半 麝錢一

細末麩糊丸更用生蜜熬油和丸如黍服二三十

幼幼新書

卷三十三

廿四

丸薑湯下不時

安神道氣消酒食益脾胃老小皆宜

青皮一斤浸三日三換味出去瓢切 上白鹽花再淋煎要雪白五兩

甘草兩六 新船上茴香兩四

糖水一斗鍋熬不住攪勿着底置密器水盡慢火

炒勿焦收青皮傷生冷果菜類嚼數片常服一兩

片尤宜老人

莊氏治驚熱化積滯如食墜涎利大腸真珠丸

真珠飛 天竺黃 朱砂飛各一分 雄黃飛

丁頭代赭 麝各半兩

煎褐色同杏仁研

末蜜丸如菉豆薑湯下一丸三歲上加

金箔丸治兒驚風如食不化或外風傷冷毒瀉血一

切疾

金箔卅九片 朱砂飛 水銀 牛黃

青黛 白殭蚕炒 蟬殼 麻黃去節

白附子 天麻酒炙 麝 犀角

乾蝎 天南星炮各一分 膩粉錢一

幼幼新書

卷三十三

廿五

乳鉢研生蜜和油單紙裹服二九桐子大薄苛汁

化傷寒薑薄苛湯化兒諸疾效

胡黃連丸治驚疝化涎消食

胡黃連 牛黃 朱砂 麝許少

蘆會 青黛 鈞藤炙 管仲

膩粉許少 鶴虱 雷丸 天竺黃

等分羅末麩糊丸如粟服三九取下驚食如無不

動

王氏安脾胃消積滯止吐利除心腹脹滿利胃膈散

滿痞常服消水穀進食丸

丁香錢一

肉豆蔻個二

木香錢半

巴豆生九

五靈脂錢七

細末糊丸如菴豆一歲一二丸食後薑湯下日二

傷飽第八食不知

巢氏兒食勿過飽飽則傷脾脾傷不能磨食兒四肢重身熱面黃腹大又兒嗜食仍不知飽不生肌肉腹亦大大便數而多泄腸胃不守故

聖惠檳榔散治傷飽太過脾氣消壅面色赤黃手足

俱熱腹心脹悶

檳榔

枳殼炒

人參

川大黃各炒

檳榔

枳殼炒

人參

川大黃各炒

甘草炙

赤茯苓

神麩炒

陳橘皮焙

羅散一錢水小盞薑少許葱白二寸煎五分溫服

日三四量與

前胡散治傷飽心腹滯悶不能乳哺

前胡

檳榔

川大黃炒

枳殼炒

赤茯苓

沉香各半

訶梨勒皮三

木香

甘草炙各

羅散一錢水小盞薑少許煎五分溫服日三四意

加減

丁奚第九

巢氏兒哺食過度脾胃尚弱不能磨消則水穀之精減損無以榮氣血致肌肉消瘠其候腹大頸小黃瘦為丁奚若久不差變成穀癥傷飽名哺露三種相似輕重異名

真珠囊吐瀉久不差或病退不能行膝大腸細蹄丁

腎主骨故

奚七歲下蹄跛槌風十五下名雀膝風並風冷傷腎

莊氏疝肚丁奚辨腹大青筋見曰疝肚無青筋曰丁

奚過飽傷食得之

肘後疝氣大腹瘦弱搗磁根猪脂煎服

又炙鼠肉若伏翼肉哺之本草亦治哺露

聖惠雞骨丸治丁奚骨中微熱腹內不調食不為肌

或寒熱腹大

雞骨一具

赤芍藥半

赤茯苓半兩

雄雞骨一具

石膏飛 川大黃炒 紫苑各半兩 嬰

陳橘皮去白半兩 嬰 白礬燒 細辛

附子炮淨各半兩 黃芩 甜葶藶炒 桂心三分 嬰

羅末蜜丸如麻子粥飲下五九日三

麝香丸治丁奚腹大青脉起不生肉四肢乾瘦頭大

髮黃

麝 肉豆蔻 乾蟾醋 夜明砂

地龍並炒 朱砂飛 五靈脂各半 白礬一

幼幼新書 卷二十三 本

蜣螂炙淨 三枚

羅末蜜丸如菴豆空心溫水下五九晚再服

治丁奚腹脹乾瘦毛髮焦黃二聖丸

大蝦蟆一枚端午收 服赤者佳 臭黃二

淨蝦蟇肚腸內臭黃末紙裹泥封乾更泥三遍火

燒煙盡羅末粟米飲丸如粟一歲一丸粥飲下服

後生熟水浴拭乾青衣覆令睡虫出效

嬰孺芍藥丸治食不消丁奚腹大不生肌

芍藥 大黃各五 桂心二 茯苓

柴胡各四

末蜜和杵一歲大豆許二丸不知加食後服

八痞丸治堅痞面黃羸瘦丁奚不食食不生肌心憤

煩悶時發寒熱五藏虛脹腹中疔痛常苦下痢

蜀漆七 細辛六 龍膽五 乾薑二

附子炮 牡丹皮 蚤虫宜 蠶 蝟頭酒

曾青無空 青代 桂心各三

末蜜丸桐子大飲下二九日三知為度忌猪肉魚

生菜等物

幼幼新書 卷二十三 本

荏氏治疳氣腹大氣急不食塌氣丸

青橘皮巴豆各一個麻線繫罾熱麩中炒去巴豆

羅末麩糊丸如菴豆三歲上五七丸不時米飲下

哺露第十

巢氏哺乳不調傷于脾胃脾胃表弱不能飲食血氣

減損不榮肌肉如柴辟羸露藏府之氣不宣則吸吸

苦熱為哺露

寶鑑哺露歌

小兒哺露病疳羸飢飽多傷損在脾藏府不通

身有熱如柴骨立漸枯表

聖惠雞骨丸治哺露傷飽手足煩熱羸瘦

黃雌雞骨一兩炙

赤茯苓

赤芍藥

川大黃炒

柴胡各半

細辛

黃芩

桂心各一

羅末蜜丸如棗豆溫水下五丸早晚各一服量加

治哺露腹堅體熱羸瘦鼈甲丸

鼈甲醋炙

肉蓯蓉酒浸一宿去皮炙各三分

常山兩

羅蜜丸如麻子粥飲下五九日三或下青白黑物

人參丸治哺露失衣當風濕冷水浴若腹大時痢或

寒熱如癰不食食不生肌或不消化四肢羸瘦

人參

麥門冬焙

半夏洗去

黃耆

川大黃炒

白茯苓

柴胡各三

訶梨勒皮煨

甘草炙

鼈甲醋炙各

芩兩

羅末蜜丸如麻子一二歲粥飲下三九日三量兒

寶鑑灸大椎穴又尺澤腕內橫文中尖又九角

幼幼新書卷第二十二 迥然齊刻

幼幼新書卷第二十三 五疳辯治 凡九門

後學古吳陳履端于始輯

崑山張應文茂實校

五疳論第一

聖惠兒託質胞胎成形氣血誕生之後骨肉輕軟腸胃微細哺乳合宜歲府調適若乳母寒溫失理動止乖違飲食無常甘肥過度喜怒氣亂醉飽傷勞便即乳兒致成疳瘵百日後五歲前乳食漸多不擇生冷好食肥膩恣餐甘酸歲府不和並生疳氣其疳有五

幼幼新書

卷二十三

五

一曰肝疳搖頭揉目白膜遮睛流汗遍身面合地卧目中澀痒肉色青黃髮踈頭焦筋青腦熱腹中積聚下痢頻多久而不痊轉甚羸瘦寶童夜汗氣壅亦名風疳二曰心疳渾身壯熱吐利無常面黃一有白頰赤胃膈煩滿鼻乾心燥口舌生瘡痢久不痊多下膿血有時盜汗或乃虛驚喘逆寶童氣喘亦名驚疳三曰脾疳腹多筋脉喘促氣粗乳食不多心腹脹滿多啼一有惡心面色痿黃骨立毛焦形枯力劣胃膈壅悶水穀不消口鼻常乾好喫泥土情意不悅愛暗憎明腸胃不和多

酸臭亦名食疳四曰肺疳咳嗽氣逆皮毛乾焦饒涕
多啼咽喉不利揉臍一作咬甲壯熱增寒口臭生瘡
唇邊赤痒腹內氣脹乳食漸稀大腸不調頻瀉利
糞中米出皮上粟生寶童吐利冷沫腹滿不食喉亦
名氣疳五曰腎疳肌骨消瘦齒斷生瘡寒熱時作口
皸乾燥腦熱如火脚冷如冰吐逆既增乳食減少瀉
痢頻併下部開張肛門不收疳墜痒痛寶童身瘡
如食不消夜多啼哭小便如水亦名急疳一方同療
故名五疳

幼幼新書

卷二十三

二

漢東王先生治五疳宜雞肉煎丸疳勞及消疳蘆薈

丸五疳可治間服調胃氣觀音散胃氣不和并四順散

溫壯門肘后

錢乙肝疳白膜遮睛當補肝主地黃丸虛寒心疳面

黃頰赤壯熱當補心安神丸虛熱脾疳體黃腹大食

土當補脾主益黃散胃氣不和腎疳極瘦身有瘡疥當

補腎主地黃丸肺疳氣喘口鼻生瘡當補脾肺主益

黃散

五疳候第二

茅先生五疳各有所管下藥能通能實能冷能溫依

說調理風疳先勻氣散胃氣不和夾醒脾散胃氣不

肝上被虛涎蓋故眼多白膜通下虛涎則積盡再下

勻氣散醒脾散腹蔽調和後常服鎮心丸夾蘆薈丸

疳一切牛黃膏膈熱驚疳先將勻氣醒脾散朱砂膏驚

活脾散胃氣不和相夾調理二三日漸次精

采蘆黃便下青金丹通積再用勻氣散醒脾散補氣

後常服朱砂膏夾蘆薈丸氣疳先調中飲胃氣不和

醒脾散效嗽龍涎膏熱渴調理二三日漸退

用青金丹通積勻氣散補氣後常服蘆薈丸調中飲

脾疳先勻氣醒脾散調理二三日糞黃檳榔散由動

下疳虫盡再勻氣散補又調中飲夾醒脾散調理二

日青金丹取疳積再勻氣散補後常服蘆薈丸健脾

散胃氣不和急疳先沉香睡驚飲霍亂夾鎮心丸調中

飲龍涎膏朱砂膏服二三日漸精采下青金丹通積

再勻氣散補後常服蘆薈丸金鈴散心痛朱砂膏夫

五疳殊而下藥異莫令有誤如調理不退形候傳遍

唇口生瘡鼻口黑燥瀉出黑血項軟身冷舌卷骨露
惡瘦不治

五疳死候歌

脚心襯着都不覺抱着昏沉手足垂疾狀未除
身體冷無休瀉滑沫青隨項筋舒展全無力五

絕疳勞仔細知

漢東王先生五疳歌

心驚疳

渾身壯熱甚四肢全不任面黃并臉赤怕冷愛

幼幼新書

卷三

四

重衾口鼻常乾燥根源積漸深只因驚撲着此

病本從心

肝風疳

搥頭揉口鼻白膜眼中瞞揩刷常淚出兩目不
曾乾容顏有青色渾身瘡癬斑毛焦并髮立此
病本從肝

脾瀆疳

食物難消化心情愛喫泥腹高青脉起頭髮薄
疎稀喘息饒呵欠無歡只欲啼痢多酸臭氣此

病本從脾
肺氣疳

啼多并嗽逆口鼻脛生瘡昏昏饒愛睡體瘦又
滑腸四肢無氣力容貌不同常瀉膿并吐血此
是肺家傷

腎急疳

瀉痢時頻併吐逆轉加深大腸肛又脫狂熱腹
兼驚乳食全難進肢稍冷似冰急疳難療治此
是腎家興

幼幼新書

卷三

五

五疳可治不可治候第三

聖惠五疳可治候疳在內眼澀腹脹痢色無常或如
泔淀日漸羸瘦可治鼻下赤爛自揉瘡痛痒漸漸流
引透兩耳邊時時目赤頭髮稀疎腦皮光緊頭大頸
細肌體羸瘦可治唇口被蝕齒斷五色或峭盡黑舌
下白瘡上齧有竅口中時真齒斷漸爛亦可治下部
開張爛痒難忍下痢無常亦可治若疳蝕脊脊十指
皆痒咬甲髮穗脊骨如鋸時腹脹時下痢急治亦無
不差

五疳不可治候肝疳目睛常帶青脉左脇下硬多吐涎沫眼角左右黑氣衝不可治心疳愛驚啼好飲水便食辛味耳邊有脉舌上黑麤不可治脾疳肚大唇無血色人中平滿下痢無度水穀不消好喫泥土皮枯骨露不可治肺疳欬嗽氣促多瀉白米身有班如粟米火色若黑者不可治腎疳愛食酸醎飲水無度小便如乳牙齒青黑耳腦乾燥肩竦骨枯不可治又五絕候同茅先生歌

五疳方第四

幼幼新書 卷二十三 顧顛紫霜丸治五疳煩悶兼腹虛脹時燥渴

大黃 黃連 代赭各二 朱砂

麝少許 肉豆蔻 巴豆淨水浸 杏仁各一

細研蜜丸如赤豆空心米飲下一丸五歲十歲五丸量加減忌冷水油膩炙燥

水鑑肥兒蘆會丸治五疳八痢急慢驚風日漸黃瘦

蘆會 白附子 白蕪荑各一 朱砂

胡黃連 雄黃各二 青黛 黃連各七

輕粉錢一 柯子個二 史君子個 麝錢半

巴豆十四個

研如麵熊膽少許湯浸置湯瓶上膽溶瀝滓入麵半匙煮糊丸如小菘豆服五七丸薄苛湯

聖惠治五疳頭熱眼澀胃高脚細頭大腹脹面黃臍乾驚悸盜汗肌肉羸瘦寒熱不定金膽丸

乾蟾酥炙一枚 地黃炒半兩 麝半 天竺黃

朱砂 雄黃 胡黃連 蛇蛻

蟬脫炒各一分 菝葜子半合淘去浮

羅末糯米飯丸如菘豆粥飲下三九量兒

幼幼新書 卷二十三 治五疳頭大項細心腹脹滿皮膚乾皺毛髮焦黃臍下赤爛口舌生瘡瀉不止漸羸四靈丸

大蟾一枚去足腸入胡黃連末一兩線縫濕紙裹沙泥固微火出陰氣熟炭三斤燒赤

蘆會 熊膽 麝各一

研糊丸如麻子粥飲或妳汁下三九日三三歲加五疳保童丸治五疳食不成肌心腹脹滿時下痢壯熱昏沉眼澀口乾愛喫生冷毛髮乾立捺鼻多嚏日羸

青黛 雄黃 麝 蘆會

青黛 雄黃 麝 蘆會

羅末熬積猪膽汁浸蒸餅丸如米薄苛湯化三九	臑粉	熊膽	青黛	殺疳丸治五疳寒熱腹脹四肢羸弱	三歲加	羅粟米飯丸如菜豆粥飲或新汲水下五九日三	青黛	史君子	腹滿悶宿食不消或下痢瘦弱宜常服	史君子丸治五疳面色痿痺頭熱髮乾胃氣不和心	羅粳米飯丸如菜豆粥飲下三九日三意加減	夜明沙	天漿子	夜明沙	苦棟根	熊膽
蟾酥 <small>兩卑葵子許</small>	胡黃連 <small>各一</small>	蘆會	蟬殼 <small>炒五</small>	朱砂	一蟾酥	蘆會 <small>各一</small>	丁香	沒石子	肉豆蔻	史君子丸治五疳面色痿痺頭熱髮乾胃氣不和心	羅粳米飯丸如菜豆粥飲下三九日三意加減	黃連	有物者炒	蟾頭 <small>炙黃一枚</small>	白鮮魚 <small>炙黃</small>	胡黃連
	瓜蒂 <small>二七</small>	麝	朱砂	雄黃	各一分	腦麝 <small>一錢</small>	胡黃連	胡黃連	熊膽	史君子丸治五疳面色痿痺頭熱髮乾胃氣不和心	羅粳米飯丸如菜豆粥飲下三九日三意加減	黃連	各一分	五倍子	蝦蟇 <small>灰</small>	龍膽
	田父 <small>炙黃一枚</small>	蛇蛻 <small>灰</small>	雄黃	蛇蛻 <small>灰</small>	各一分	蟾頭 <small>炙一枚</small>	熊膽	熊膽	熊膽	史君子丸治五疳面色痿痺頭熱髮乾胃氣不和心	羅粳米飯丸如菜豆粥飲下三九日三意加減	黃連	各一分	青皮 <small>焙去白</small>	蝸牛 <small>炒</small>	龍膽

羅蜜丸如菜豆汁研一九點臯中桃柳湯浴青	瓜蒂	蜚蠊	牛黃	蘆會	虫蝕口鼻瀉痢日夜無常體羸無力	羅糯米飯丸如粟粥飲下五九量加	腦麝	熊膽	保童丸治五疳驚熱	青黛	羅粳米飯丸如菜豆沙糖水下三九日三三歲加	青黛	熊膽	青黛	青黛丸治五疳煩熱羸瘦不乳	量加
蟾酥 <small>錢</small>	熊膽	熊膽	蟬殼	朱砂	各一分	蘆會 <small>各一</small>	乾蟾頭 <small>炙黃</small>	蘆會	羅粳米飯丸如菜豆沙糖水下三九日三三歲加	蘆會	羅粳米飯丸如菜豆沙糖水下三九日三三歲加	蘆會	朱砂 <small>各一</small>	訶梨皮 <small>各三</small>	青黛	量加
	胡黃連 <small>各半</small>	胡黃連	胡黃連	胡黃連	各一分	腦麝 <small>各一</small>	黃連	黃連	羅粳米飯丸如菜豆沙糖水下三九日三三歲加	黃連	羅粳米飯丸如菜豆沙糖水下三九日三三歲加	黃連	各一分	麝	青黛	量加
	夜明沙 <small>炒</small>	夜明沙	夜明沙	夜明沙	各一分	腦麝 <small>各一</small>	地龍	地龍	羅粳米飯丸如菜豆沙糖水下三九日三三歲加	地龍	羅粳米飯丸如菜豆沙糖水下三九日三三歲加	地龍	各一分	蘆會	青黛	量加

衣裹虫出粥飲下三九日三三歲加

保生丸治五疳能充肌膚悅顏色宜常服

乾蝦蟆一枚搗內瓦蓋燒勿透氣 蜈蚣淨炒 母丁香

麝 夜明沙炒 苦葫蘆子 胡黃連

熊膽 甜葶藶隔紙炒紫各半兩

羅軟粟米飯丸菜豆大粥飲下三九量加

酒煎乾蟾丸治五疳不生肌肉

乾蟾一枚無灰酒一升煎減半去骨更煎爛研如膏 肉豆蔻二枚

檳榔一枚 甘草一寸 乳香 麻黃去根節

切初新書 卷三十三 十一

胡黃連 黃連各半兩 朱砂 膩粉

麝 牛黃各一錢 丁香 蘆會各一錢

羅蟾膏丸菜豆大粥飲下五九日三四

博濟至聖青金丹治十五種風疾五般疳氣變蒸寒

熱便利棗花糞脚細肚脹青筋髮踈喫土揉眉咬甲

四肢羸瘦疳蛔咬心瀉利頻併饒驚多嗽疳蝕口鼻

赤白瘡疳雀目大效

青黛二分 雄黃二分 龍腦少許 朱砂一分

膩粉一分 胡黃連二分

熊膽良方一錢 白附子錢局方二錢

蘆會方一錢 蟾酥局一字 鉛霜少許 水銀局一字

細研獺猪膽汁熬浸蒸餅丸如黃米曝乾瓷器密

收或旋取服俱二九驚天釣戴眼手足搐搦温水

化溼暈中噴三五遍眼放下搗定薄苛湯服久患

五疳四肢瘦小肚高撮眉喫土咬甲髮踈肚上青

筋粥飲變蒸寒熱薄苛湯久患疳蝕心苦棟湯

鼻下赤爛口齒疳虫并口瘡妳汁研塗患處疳眼

切初新書 卷三十三 十一

雀目白羊子肝竹刀批內藥麻縷縛米泔煮熟空

腹喫乳母忌毒魚大蒜雞骨猪肉等兒隔三兩日

喫一服永無百病

靈苑木香丸治七歲上五疳肚痛腹脹氣喘

木香 厚朴薑汁浸 川大黃炒 人參各一錢

雞心檳榔兩三 芍藥 肉桂 羌活

京三稜 獨活 芫

肉豆蔻六個 大附子淨炮一分 陳皮去白

末瓷罐盛密封臨服生牽牛末二兩藥一兩煉密

九如梧子心腹脹滿一切風勞冷氣臍下刺痛口吐清水醋心痲痺氣塊男腎藏風毒攻刺諸處及脚氣目眩頭痛心間不快臨卧橘皮湯来日微轉為度每夜止服十九覺安止忽渾身壯熱四肢疼痛不可忍口内狂言是陽毒傷寒經三日臨卧温水未轉加數丸女血海不調刺痛積年血塊胃口嘔逆涎沫手足煩熱不思食薑湯轉為度未差每夜服十九差止七歲五疳肚痛腹脹氣喘空心薑湯三五丸飽悶不消泄不止臨卧煖酒一服愈若

幼幼新書

卷之三

三

食毒癰疽發背并半身不遂皆宜並三十九

譚氏治五疳羸瘦毛髮稀疎揉臍咬甲吃土腹大頸

細痢如泔淀乳不消小便濁蝦蟆丸

綠礬斤半

棗肉半

醋五升煮礬棗熟入黃連四兩呵子去核史君子

夜明沙各二兩蝦蟆燒四個擣棗肉九黍大三四

歲乳前米飲下三十九

漢東王先生殺虫蘆會丸治五疳不長肌不思食漸

黃瘦

蘆會

燕蕒

青黛

檳榔

宣連各一

蟬殼廿一

胡黃連兩半

麝少許

末積猪膽二個丸如大麻子飯飲吞五七九十歲

二三十丸

劉氏神效金蟾丸

乾蝦蟆五個

胡黃連

宣連

雀虱

肉豆蔻

苦棟根白皮雷丸

蘆會

燕蕒各半

末麩糊丸菜豆大雄黃水米飲下十五丸

幼幼新書

卷之三

三

王氏治五疳消滯進食長肌肥兒係童丸

胡黃連

草龍膽炒各半兩史君子

木香

蘆會各一

大麥蘗半兩巴豆三

川棟炒一

末醋糊丸如菜豆不時米飲下十粒至十五粒

吳氏治五疳或傷脾腹脹髮黃時壯熱上虛汗漸黃

瘦或泄瀉黃著飲

綿黃著兩一

人參

陳皮炙

白茯苓

大白檳榔

甘草炙各半兩

小肉豆蔻個一

粗末三錢水大盞慢火煎七分時時温服

蕭景仁獻治兒患後不思食

黃連細末獺猪膽丸如菘豆麥門冬湯吞五丸

風疳第五 亦名肝疳 生核附

聖惠風疳者由肝藏壅熱乳食不調所致兒十旬內

三歲間氣血未調骨木輕軟凡動靜易傷若乳母味

寒暄失調渣恣滋味任喜怒或外中風寒內懷驚怒

便即乳兒兒邪氣未除傷兒藏府致成風疳搖頭操

目眼赤多睡腦熱髮焦百脉拘急漸漸黃瘦

龍腦散治風疳漸羸多睡狂熱面青黃或時吐乳

幼幼新書

卷五十三

十四

文

腦麝

牛黃

雄黃

朱砂

熊膽

蚺蛇膽

黃連

蚺蜥

天麻

蝸牛炒黃

藍葉

川大黃炒

五靈脂

馬兜鈴

等分細末溫水調半錢意加減

胡黃連丸治風疳刺鼻揉目不知痒處

胡黃連

人參

地龍炒

代赭

赤石脂各半

蝸牛肉二七枚

猪牙皂莢二挺去黑皮

木香去子

大蜈蚣淨炒

青黛

蟾酥

木香

檳榔

黃連

天麻

當歸炒

犀角

乾蝎

蟬蛻並炒

羌活

史君子

白蕪荑

蛤蚧頭尾全

驢胎耳黃

朱砂

麝

蘆會

牛黃各一

搗羅獺猪膽汁丸菘豆大空心粥飲下三九量加

牛黃丸治一切風疳搐搦

牛黃

朱砂

雄黃

龍腦

黃連

桂心

白附子炮

川大黃炒

膩粉

人參

茯神

巴豆淨丹

幼幼新書

卷五十三

十五

文

羅苦菓瓢丸菘豆大濃葱白湯下三九利惡物

肝肺風熱心脾壅滯體瘦壯熱致成風疳常服解風

熱殺疳蘆會丸

蘆會

天竺黃

青黛

朱砂

蚺蛇膽

胡黃連

蛇蛻

史君子

天麻

丁香

黃連

木香各一

白龍腦

牛黃各一

蟬殼炒

麝各半

羅末蜜丸菘豆大空心及近晚粥飲下三九臨時

加減

胡黃連九治風疝壯熱或吐逆心神煩躁

胡黃連 犀角 蘆會 天竺黃

燕脂 羶羊角各半 麝 牛黃

朱砂 椎黃 天漿子 白殭蚕

乾蝎炒各 蟾酥錢一

羅猪膽汁浸蒸餅丸如麻子不時粥飲下三九意

加減

蛇蛻皮九治風疝癰瘦

蛇蛻燒 天南星炮 乾蝎 朱砂

幼幼新書 卷之三

蟬脫炒各 蘆會 蟾頭炙黃 青黛兩

天漿子炒七 蟻螂淨炒

羅獨頭蒜燒熟并醋飯丸如菜豆空心粥下三九

量加減

譚氏玉合丹

肝疝腹脹體痿黃面色如金形漸傷咬甲掃眉

多喫土爰鹽糟米怕羹湯朝朝瀉瀉吐還逆晝

夜頻添不忍當但取蜜陀僧作末為丸令服號

醫王

寒水石 白礬各二 硫黃各一 黃丹煨

蜜陀僧各半

研蒸餅丸菜豆大冷水下四九甘草湯亦得

撥雲散

稻暈掃眉瀉又青普頭瘡痛怕光明朝朝合面

便涼處不住梳頭屢熱驚

大黃 胡黃連 黃芩各一 丁香

馬牙硝 蘆會各半 天漿子炒各

羅獨頭蒜燒熟并醋飯丸菜豆大空心粥飲下三

幼幼新書 卷之三

九量加減

萬全龍膽九治肝疝體熱煩渴心躁夜不得卧

龍膽 升麻 麝 水銀煎

乾蝎 鐵粉 熊膽 椎黃

朱砂各一 蘆會 胡黃連 天麻各半

羅末棗肉丸菜豆大湯服三九

莊氏治風疝順肝氣進飲食蘆會丸

蘆會一錢 草龍膽一兩

羅不坤阜角三挺水二升按汗瀝滓銀器慢火熬

膏入藥丸如菘豆服三五丸薄苛湯服一字竹葉湯亦得忌毒物

萬全治肝疳羸瘦酸棗仁丸

酸棗仁炒 蘆薈 蟬殼淨 朱砂

乾蝎炒 天南星炮 蛇蛻燒各 青黛兩

龍腦半 蜈蚣淨 天漿子七枚各 蟾頭一枚

羅獨頭蒜燒熟并醋飯丸如菘豆空心粥飲下三九量加減

趙氏治兒稟受不足乳哺失宜膚華浮脆胃犯風冷

正氣微弱客邪在內令兒津液不固自汗自利中寒

氣痞關膈不通嘔吐乳片肌肉不生精神昏塞不欲

啼笑以至龜背鮮顛丁奚無辜邪客心成驚癇邪客

脾成風疳服此令乳哺充肥風消氣伏風疳丹

朱砂 硫黃 丁頭代赭 石蛇黃煨

醋淨七遍 各一分 蜈蚣淨 地龍各三箇 全蝎二箇

大史君子十枚 沒石子一個 蛇蛻頭一枚 天漿子炙

白附子七個 白花蛇浸一寸酒 大附子

烏頭上並向火半夏薑 麝 續隨子

丁香 赤石脂各一錢

細末粟米餅丸如麻子量兒湯飲下十粒

風疳生核附

漢東王先生治風疳氣攻項下生核阜角膏

大阜角一莖 糯米炒黑 草烏生二錢 黃皮炒黑

未并藥水調貼如未安水精丹取後用調氣觀音

人參散等補仍再貼兼疳藥間服

治虫積食積胎積驚積惡物食傷水精丹

滑石生二錢 天南星生一錢 水銀粉半錢 蕪荑百仁一

研巴豆次燕蕪入藥更研攪爛飯丸如梧子空心

米湯泡葱吞三五丸以歲加減膈上食則吐膈下

食方瀉忌生硬果實肉食等物臨卧服尤佳

補虛調胃進食止吐瀉觀音散

白扁豆炒 石蓮肉炒 人參焙各 茯苓焙錢

甘草炙 香白芷 綿黃耆梔蜜 木香炒各

神麩二錢

末孺一字二三歲半錢四五歲一錢水半盞粟半

片煎十沸服人參散參苓
蓮肉薯草

驚疳第六亦多
心疳

聖惠驚疳者心藏實熱所致襁褓兒氣血未調藏府
細微骨木輕軟因哺乳不時致生壅滯內有積熱不
得宣通心神多驚睡卧不穩胃膈煩悶口舌生瘡頰
赤面黃髮枯皮燥多渴喫水乳食漸微久而不痊體
瘦壯熱名驚疳

聖惠龍腦丸治驚疳心神煩躁體熱瘦瘁眠卧不安

龍腦 牛黃 雄黃 薑會

幼幼新書

卷二十三

十一

熊膽 青黛各一錢 麝 膩粉

蟾酥各半 天竺黃 朱砂 雀兒飯甗

胡黃連各一 蝸牛炒三

羅浸蒸餅丸如菜豆不時薄苛湯下三九更量與

龍腦丸治驚疳心熱搐搦胃膈多涎不食

腦麝錢一 蟾酥 膩粉半錢 金箔十四片

天竺黃 乾蝎炒 犀角 胡黃連

甜葶藶隔紙炒紫
各半兩 牛黃 雄黃

熊膽 薑會 朱砂 青黛

真珠 天漿子炒 土蜂窠 田父各

羅糯米飲丸如菜豆大薄苛湯下三九汗并吐涎

效三歲加

青黛丸治驚疳肌膚羸瘦心神煩熱口鼻疳蠟

青黛 牛黃 麝 薑會

朱砂 雄黃 犀角 真珠

琥珀 胡黃連各一 蟾酥杏仁 夜明沙炒

瓜蒂各半 龍腦半錢 乾蟾一枚 蟬殼炒七

虎睛一對酒 母丁香十枚 蜚蠊二枚大 麥

幼幼新書

卷二十三

十一

羅猪膽汁和丸如黍粒化一丸滴臍中一丸灌

虎睛丸治驚疳眼熱澀多瞤心悸不安肌肉黃瘦

常睛一對 山梔子 天竺黃 犀角各半

子芩 川大黃炒各 麝 巴豆霜

真珠 牛黃各一 龍膽 黃礬燒各

羅蜜丸如麻子粒汁下三九更量

治驚疳體熱發歇不定腹中壅悶膩粉丸

膩粉 麝錢一 蟾酥半錢 牛黃

朱砂各一 巴豆廿枚銚內油煎粘
爆者入水去皮油

研浸蒸餅丸如米粥飲下一九日二利為度

治驚疳腹有癖夜啼不止牛黃丸

牛黃 人參 柏子仁 茯神

赤芍藥 羌活各一 柴胡 川大黃炒

蛇蛻灰 大麻仁 鼈甲淨醋炙 檳榔各半

蚱蟬淨炒二

羅蜜丸如菜豆一歲一丸食前粥飲下

醫局殺疳退驚治壯熱昏憤嘔吐痰涎頰赤面黃臍

乾目澀盜汗或虛驚荏苒不除不乳熊膽丸

幼幼新書

卷三十三

廿二

熊膽 胡黃連各二 細墨燒淨 麝一

史君子炮 天漿子炒 寒食麵三

螺兒青錢一

末白麩糊丸如黍不時米飲吞五七丸

譚氏治驚癇黃龍丸

胡黃連兩一 麝 牛黃 朱砂各一

末猪膽丸如麻子薄苛湯下三五丸多淚亦服

錢乙治一切驚疳腹脹虫動喫土生米不思飲食多

睡啞噎蔽府或秘或瀉肌膚黃瘦毛焦髮黃飲水五

心煩熱殺虫進食治瘡癬常服不瀉痢大胡黃連丸

胡黃連 黃連 苦練子各一 白蕪荑去

青黛兩 蘆會 乾蟾頭燒各一分 麝錢一

初三分

前四味為細末猪膽汁和每胡桃大巴豆一粒置

中油單裹米一升許蒸熟為度去豆入後四味不

和加麩糊丸麻子大食後米飲下十九十五九日

三

萬全真珠散治心疳體熱黃瘦

幼幼新書

卷三十三

廿三

真珠 麥門冬各半 金銀箔各五 天竺黃

牛黃 麝 胡黃連 甘草炙

羚羊角 川大黃炒 當歸炒 朱砂

雄黃 茯神 犀角各三

羅茵陳湯調量服半錢

治心疳壯熱睡中多汗神思煩躁多驚鐵粉丸

鐵粉 麝各一 牛黃半 朱砂

天竺黃 青黛 蛇黃 熊膽

人參 茯苓 史君子 黃連各一

未粟米餅丸如麻子一二歲服三九粥飲下三四
歲五九日二

吉氏治驚風疳

麝半

辰砂一

真阿魏半

末湯丸如麻子服三五九金銀薄奇湯下瀕吏吐

瀉妙

鄭愈治驚癇冷瀉霍亂吐瀉痢調中平氣開胃散

人參

藿香

黃橘皮各二

木香一

丁香

胡椒各二

茯苓

良薑各錢

幼幼新書

卷二十三

世

甘草錢三

訶子肉二

末一字或半錢薄奇湯下吐瀉粥飲下

食疳第七亦名

聖惠食疳者由脾胃不調乳食過度傷于歲府所致
百日兒腸胃尚微乳哺猶少三歲外氣血漸盛乳食
則多乳母須適寒溫和飲食省五味令氣血和平則
孩孺無病若飲食不節生冷過多積滯不消致成食
疳其狀面色痿黃肌體羸瘦脚細腹大毛髮乾焦鼻
口常乾好喫泥土腦中大熱肚上青筋口舌生瘡水

穀不化下痢無度漸漸困羸

木香丸治食疳腹痛大腸或痢鼻痒乾瘦體時熱

木香

胡黃連

蟾頭炙

麝

蘆會

青黛

雄黃

香墨

熊膽各一

史君子兩半

羅末蜜丸如菜豆粥飲下五九量加減

治食疳水穀不化心腹脹滿好喫泥土肌體瘦弱訶

梨勒丸萬全多積

訶梨勒皮各三

肉豆蔻一

青黛

幼幼新書

卷二十三

世

蘆會

朱砂

熊膽各一

羅末酒煮粳米飯丸如黍粥飲下三九日三更量

治食疳心腹虛脹妨悶或熱渴大黃丸

川大黃炒

黃連

桂心

代赭各一

朱砂

麝

巴豆霜各一

木香

杏仁炒各

肉豆蔻二

羅末蜜丸如麻子粥飲下三九

博濟治食疳氣頭面虛腫腹內泄瀉面色痿黃頭髮

作穗心腹脹滿肚上青筋蚘蚘黃連丸

疥蝦蟧酒浸 木香 沉香 丁香各一

麝許少 胡黃連 黃連節九 木鼈子烟煨

出各半兩 巴豆霜粒一 乾薑錢一

羅末蒸餅丸蘿蔔子大空心臨卧米飲下一歲一

丸忌黏滑物

張煥史君子丹治脾疳能食不生肌肉或下痢

史君子淨炒二兩 丁香 木香 厚朴薑製

沒石子南蕃者 胡黃連 肉豆蔻各一兩 蘆會

麝各一

幼幼新書 卷二十三 廿七

末粟米餅丸黍大乳前橘皮湯服十粒

莊氏治脾疳冷熱瀉

宣連各一 木香半

微炒羅末米餅丸如粟米飲下五七九日三

氣疳第八亦名肺疳

聖惠氣疳者由乳食不調壅熱傷肺肺主氣氣不榮

則皮毛枯燥欬逆上氣多涕交流壯熱增寒揉臍咬

甲唇邊赤痒臍内生瘡腦熱多啼腹脅脹滿乳食減

少下痢無常皮上粟生糞中米出漸羸

麝香丸治氣疳壯熱增寒腹脹下利皮膚乾燥眼澀

揉臍乳食難化漸羸

麝 熊膽各半錢 赤茯苓錢一 胡黃連

蘆會 京三稜炮 川大黃炒 桂心各一

檳榔一枚 當歸炒 木香各半

羅末蜜丸如菜豆乳前溫粥飲下五丸更量

蘆會丸治氣疳毛立無津或下利多渴不欲乳食

蘆會 牛黃 青黛 熊膽

雄黃 麝 蟬殼炒 人參

幼幼新書 卷二十三 廿七

黃連 蟋蟀淨炒各一 訶梨勒皮三枚 蝦蟧酥炙一枚

羅末軟餅丸如菜豆一歲湯下三丸更加常服悅

澤無病

檳榔丸治氣疳腹脹煩熱大便難

檳榔 木香 青黛各半兩 續隨子各一

麝半 蟾頭酥炙一枚

羅末蜜丸如菜豆溫水下三丸臨時加減

青黛丸治氣疳腹有積惡滯結物

青黛 木香各一 肉豆蔻 檳榔各一枚

麝餅半 黃連兩一 巴豆 川大黃炒

鼈甲醋炙各半兩

黃連巴豆淡漿水三椀煮候乾去巴豆心皮油黃

連曝後與諸藥同羅猪膽汁丸如麻子一二歲空

心粥飲下二九量加三日一服下惡物效訶梨勒

丸補

訶梨勒丸

草豆蔻 人參 白朮

陳皮去白焙 白茯苓各半兩 甘草炙 丁香各一

幼幼新書 卷二十三 十八

羅末蜜丸如麻子一二歲粥飲下三九量加空心

午後各一服

譚氏龍香丸

小兒多熱即為驚口內饒乾面色青咬甲愛塩

仍喫土時時效嗽夜多聲氣疳傳歲心頭痛搯

眼掃眉不轉睛求取旱龍蟾一個丁香頓服便

惺惺

母丁香三個 麝餅少許 青黛一分 蟾一個去肚炙黃

散煮漿水飴丸如粟湯下三九

張漢麝香丹治肺疳皮毛枯燥咳嗽上氣

紫蘇子炒 五味子各一半 半夏洗七遍 胡黃連兩一

乾蟾酥炙一枚 麝 蘆會 朱砂

末糞肉丸如黍飲下五七粒量服

因嗽成疳靈砂丹

人參兩半 甜葶藶 五靈脂 胡黃連

蘆會 杏仁炒各一分 辰砂兩半

細末粳米飴丸如黍人參湯下十粒量加減

萬全麝香丸治肺疳壯熱增寒腹脹下痢皮膚乾燥

幼幼新書 卷二十三 十九

眼澀揉鼻乳食難化漸瘦

麝 熊膽各半錢 赤茯苓錢一 款冬花

杏仁炒 胡黃連 蘆會 京三稜炮

桂心 川大黃炒各一分 木香各半 檳榔二枚

羅末蜜丸如菜豆乳前温粥飲下五九量服

急疳第九亦各腎疳

聖惠急疳者由乳食不調甘肥過度所致凡甘味入

脾而動虫易傷臟府若上蝕齒齦生瘡出血齒色紫

黑下蝕腸胃瀉利無常肛門開張生瘡赤爛皮焦毛

立乳食不消肌體羸瘦不早療便至膏盲

雄黃丸治急疔羸瘦下利口瘡殺虫

雄黃 蘆會 青黛 朱砂

龍膽 黃蘗 黃礬 當歸

白礬 細辛 莨若子 芽出者煮

甘草 麝香 蚌蟬 乾蟾

羅麩糊丸如菜豆不時粥飲下五九量與

熊膽散治急疔虫蝕口齒斷作瘡

熊膽 麝香 雄黃 蘆會

切切新書 卷二十三

硫黃 甜葶藶 莨若子 蝦蟇

人糞 白礬 三味共燒

羅散薄傅瘡處臯痒日吹臯中三兩遍差為度

治急疔痒作瘡瞬息大如錢或在頭面口齒蚰蛇膽

散

蚰蛇膽 黃礬 白礬 蘆會

麝香 錢

研清泔洗臯乾傅一大豆許水出即止如在口齒

宜頻貼

蝸牛及散治急疔瘡累醫不效

蝸牛 白狗糞 蜈蚣 白礬

人糞 蝦蟇 蘭香 蜘蛛

地龍 蘆會 蚰蛇膽

研筆管吹臯中齒斷有瘡蜜和塗紙貼下部有瘡

即內之

治急疔口生白瘡諸疔並治

熊膽 蚰蛇膽 蘆會 腦麝

牛黃

切切新書 卷二十三

細研井華水一盞瓷器盛重湯煎數攪盞四畔勿

令藥乾着盞欲吹臯時孩子及乳母先七日斷生

冷醬豆諸葷辛熱麩魚肉等兼少食鹽然後取二

豆許漸吹臯及塗口瘡亦治腦疔頭髮乾立及口

面疔張渙薄苛湯化下大豆許

天靈蓋丸治急疔瘦弱生瘡

天靈蓋 砒分 胡黃連 人糞

莨若子

黃泥裹燒令赤冷研末入麝半分麩糊丸如黍不

時乳汁研一歲一九三九上不得加又治口鼻瘡

一止砒毒乾傳博濟抄藥油紙貼

治急疔虫蝕口鼻下部

乾蟾一兩半生

銷金銀甘鍋人糞灰

麝各一兩 銀末大豆許

羅虫蝕處即傳三七日勿食膩胎

治急疔口鼻及下部赤爛

大蒜二兩

甜葶藶七兩

乾蝦蟇一兩

乾地龍二兩

亂髮灰一

幼幼新書

卷三十三

三十三

剉入竹筒中置瓦內塘火燒取瀝塗兒口鼻頂穀

道等

又方

精白羊肉二兩

蕪荑仁兩半

豉合

川楝粒二七

醬豆匙一

爛研取棗大傳瘡上日三易

蔓菁花

根陰乾

一握去頭尾大麥麩并醬汁作團裹

炭火中燒煙盡入麝一錢研末貼先以米泔洗故

帛貼後傳藥痛甚少傳嚼油麻傳亦得

譚氏香連散

急疔頻瀉綠和青好睡多饒局綠驚繞覺翻身

還又瀉唇乾焦渴飲煙牛

胡黃連

熊膽各一錢

丁香

麝

蘆會各半錢

五靈脂

赤箭芝

白龍骨各一

末半錢陳米飲下日夜五六服

張漢立聖膏治急疔侵蝕

人乳半

黃鹽大

白礬大

石膽豆大

幼幼新書

卷三十三

三十三

研綿裹內乳汁中浸一宿有味慢火熬膏塗口如

卓瘡滴入有腫處以三稜針刺去血後塗聖惠多青醬升

丁時發治急疔蘆會丸

急疔頻瀉色偏青多睡身黃作怒睛蘆會杵丸

多與服莫交傳久肚膨脝

蘆會

黃蘗

大黃各一錢

朱砂半錢

巴豆霜粒一

末獺猪膽汁調餅上蒸入腦麝少許丸桐子大湯

下三五九

幼幼新書卷第二十三

幼幼新書

卷第二十三

七

幼幼新書卷第二十四 無辜疳痢 凡五門

後學古吳陳履端于始輯

崑山張厚德伯含校

無辜疳第一 亦名無辜病 無辜痢病

巢氏兒面黃髮直時壯熱食不生肌積久致死為無
辜疳天上有烏名無辜晝伏夜遊洗兒衣蓆晒之經
宿此烏飛過尿之將此衣蓆與兒着卧便生此病

寶鑑此烏有雌無雄一名姑獲夜飛見兒衣即立其

上遺其毛羽 玉函毛翅有毒虫如毫末 遺衣上入兒毛孔故作疾 令兒疾死死

後即其冤鬼化為子俗云天疔非也又名疔星鬼

聖惠兒無辜腦後有核如彈捏之皮下轉是也凡兒
有此如禽獸舌下有噤虫若不速去當損命核初生

軟而不痛中有虫如米粉得熱氣漸長長則筋結定

筋定則虫随血氣流散虫相生育侵蝕藏府肌肉作

瘡或便泄膿血兒漸黃瘦頭大手足細從茲夭折

兒腹大泄痢膿血髮膚枯槁肌體漸羸腸胃既虛痢
下無時名無辜疳痢
漢東王先生云古謂烏所致非也饑飽勞役風驚暑

積謂之八邪八邪所傷令漸黃瘦食不長肌夜間多哭或微壯熱多渴食不知飢飽或生瘡癬名無辜朱氏八片錦歌

孩子無辜氣多因母作為驚薄成風疾暄寒作氣痿頃交除病乳莫更着重衣吃食無令早能言不怕遲論中八不許曾起力頻微頭皮光哲哲毛髮薄離離肝擁侵雙眼脾黃入四肢渾身生隱疹遍體是瘡痍瀉痢無休歇增寒少定時白暈眸中現清涎口畔垂鬪牙頃咬甲舉手要

幼幼新書

卷二十四

二

措眉夜夜餐瓜果朝朝食土泥胃傷腸肚脹肺盛喘何疑飲食無休歇眠似醉迷

肘後療無辜疳痢

龍骨

當歸

黃連

人參

甘草炙一兩

篩蜜丸如梧子白飲下兩丸日再五歲五丸

外臺馬齒莧搗絞汁服三合

秘錄治無辜痢赤白兼成疳

胡粉蒸熟熬色變飲服

聖惠鼈甲散治無辜疳項細肚大毛髮作穗

鼈甲醋炙

檳榔三顆

沉香

漏蘆

牛蒡子炒

史君子

赤芍藥

訶梨勒皮

甘草炙各半兩

散一錢水小盞煎五分不時量兒溫服

治無辜疳寒熱積滯不化腹肚脹痛人中白散

人中白一分

麝半

蝦蟇醋炙

蘆會各半兩

細散空心及晚熟酒調半錢下惡物效更量

牛黃丸治無辜疳及諸驚熱

幼幼新書

卷二十四

三

牛黃

麝

朱砂

真珠

牡蠣煨粉各一分

赤茯苓

赤芍藥各三分 虎睛酒炙一對

杏仁炒 甘草炙 巴豆霜各半兩

羅蒸餅丸如麻子百日兒乳汁下一丸二歲粥飲下三丸意加減

蟬殼灰 治無辜疳

蟬殼灰

澱花

蛇蛻灰

附子生

朱砂

麝各一分

乾蝎一枚炒

末湯浸寒食蒸餅丸如麻子粥飲化五丸量服

鼈甲丸治無辜疔腹有癖四肢瘦弱宜常服

鼈甲醋炙 黃連 夜明沙炒 桔梗各一兩

麝分一 雄蝎虎枚一 訶梨勒生一枚

羅末蜜丸如菜豆粥飲下五丸量與日三

治無辜疔腦熱髮立吹臯散

消石分三 熊膽分一 麝大豆許

細末小豆許吹兩臯黃水出效

治無辜疔肚脹或瀉痢冷熱不調漏蘆散

漏蘆末一錢猪肝一兩鹽少許煮熟空心頓服粥

勿勿新書 卷二十四 四

飲下一有猪根白皮丸 又雞肝末服

地膽草末一錢羊肉二兩鹽少許煮熟空腹頓服

胡粉散治無辜疔臯中乾塞眼有白暈黃昏不見

物體熱心煩口乾頂上生瘡

胡粉 胡黃連 白龍骨各二錢

同炒研細雞子清調半錢日三四更量

張漢治無辜疔痢不止二肝丹

地膽草 九節菖蒲 漏蘆各一兩 胡黃連

地榆各半兩 羅末

雞肝 猪肝鹽少許同藥 煮熱各一兩

石臼中搗二百杵成膏丸如黍食前麝香湯下十

粒量與

梅肉散治無辜疔渴利不止眼障腎體浮腫

烏梅肉炒 綿黃耆 乾葛各一兩 川黃連

苦蕒根 乾薑炮 甘草炙各半兩

羅末一錢水一盞煎六分溫時時服

無辜針烙法第二

聖惠兒頭乾髮立身無滋潤頭露骨出腦熱腹脹臯

勿勿新書 卷二十四 五

中多痒好食醬肉數飲水成痢如泔背冷腹熱有塊

漸黃瘦或似邪鬼疔作如閃癖類腦後皮中有筋肉

結小核久不除流腹中遂成前狀須烙破或灸又割

皮挑出稍勝于灸然病者至深兒不任忍痛恐動其

脉往往變癩令定最妙者是烙

尖利鐵針燒頭似火看核大小作紙鑲束定仍捏

住以針當中烙之深二豆許即貼沉香膏

沉香膏

沉香一兩 黃丹六兩

清麻油一升下沉香煎焦黑漉出下黃丹不住攪
慢火熬滴紙上如黑錫無油傍引膏成爛帛攤貼
日一換勿令風入

犀角散烙後服消腫利氣壓驚

犀角 琥珀 蘆會 木香

醋石榴皮 訶梨勒皮各半 龍齒三分

黃連 檳榔 乾薑炮 麝各一分

細散粥飲下半錢日三量服

烙後服青金丹

切切新書 卷二十四

巴豆淨 硫黃各一兩 苦練根皮 醋石榴根

皮各二兩

鐵鼎內滿水煮水耗旋添至七晝夜取巴豆硫黃

研入桂心檳榔木香細辛末各一分馬牙硝橘皮

乾薑藍花末各半不同研飯丸如麻子空心湯下

二九溘利效三歲日一丸

寶鑑無辜丁奚灸眉衝從瞳子直上髮際一寸又五

枕在頂上高骨各三壯

一切疳第三

聖惠兒疳狀多端雖輕重有殊形證各異而細窮根
本主療皆同由乳哺乖宜寒溫失節歲府受病氣血
不榮凡諸疳等一方同療故謂一切疳

錢乙論五疳治法見前五疳惟筋疳瀉血而瘦當補

肝地黃丸然諸疳皆依本歲補其母及辯冷熱肥瘦

初病為肥熱疳久病為瘦冷疳冷者木香丸熱者胡

黃連丸病後虛 冷熱之疳尤互如聖丸府瀉 蓋兒歲

府柔弱不可痛擊凡大下必亡津液而成疳初病津

液少者當生胃中津液主白木散胃氣不和

切切新書 卷二十四

寶鑑兒髮立焦黃肌體瘦劣腹肚疼痛愛喫泥土瀉

痢無常盜汗不止腹大即喘脚細難行洞泄脫肛時

時壯熱而合地卧心喜啼呼腹中虫生糞中有米便

如泔涎嘔吐無時有似瘦勞更加寒顛此即疳狀五

疳外更有十二疳

乾疳雖能食見物即餐最喜酸醎物

瀉痢脫肛糞五色食不生肌睡多盜汗此急疳候

手足顛癡雙目微牽或笑或嗔爪甲青色狀如神果

風疳候

眼澀痛食物不消體羸黃瘦四肢無力腹脹氣喘肉疳候

虫攻脊脊拍背皆痒頭髮焦立皮肉枯燥兩脇脹滿一日數利脊如鋸齒脊疳候

唇反齒黑舌上生瘡齒斷潰爛并虫自出口疳候

車下赤爛自揉身熱體乾目如朱腦疳候

夜潮熱或增寒手足俱冷能乳而瘦有如盜汗食疳候

妳疳病後得之乳母壅毒衝上或喫魃妳初只氣促

幼幼新書 卷二十四

雖能食乳漸加羸瘦瀉久不止三焦壅熱五歲困乏

妳疳候

面合地卧氣急面黃時哭聲高又似心痛或發作時

只在月初頭舉虫 蛔疳候

嘗喫泥土生米及塩心意不悅身黃口多涎瀉痢有

虫脾疳候

或喫熱乳或因重病漸成此患忽然效嗽初時服冷

藥使日夕壯熱脚冷如冰氣喘促目漸昏氣疳候

顛顛保童丸治諸疳或腹內虛脹驚癇髮立咬拍脊

疳疳勞辟脛細弱難立及車下常赤清涕涎流舌上生瘡腦疳口疳腹筋脉

虎睛隻半 朱砂 麝各一 牛黃

龍腦 巴豆 芫 桔梗

羌活 枳殼 檀香 茯神

人參 當歸 代赭 霍亂

白朮各半

朱蜜丸如梧子一歲至五歲日一九十歲日二九

空心清米飲下病甚量加乳母忌生冷油膩炙燥

幼幼新書 卷二十四

毒魚大蒜米醋

治疳痢并十五種病一腹大二皮膚黑黃三骨節粗

四眼赤五口赤六臍中生瘡七頭髮黃八咬指甲九

愛喫土十愛喫甜物十一身熱十二頭大十三臍凸

十四項細十五面無光保童丸

朱砂分半 牛黃 麝 蟾酥各少

阿魏分二 研如粉蒸餅丸忌羊血生冷等藥性乳調灌

水鑑兒髮黃赤漸瘦百中散

水鑑兒髮黃赤漸瘦百中散

黃葵花	白芷	延胡索 <small>各二</small>	橫柳 <small>分十</small>
樽金 <small>分四</small>	蚯蚓 <small>條一</small>	黃鹽 <small>分六</small>	蝦蟇 <small>許少</small>
白米 <small>分一</small>	牛肉脯 <small>分二</small>	蜘蛛 <small>個一</small>	
未煉蜜丸如麻子空心煎骨汁下一丸虫下除根			
紀用治疔瘦面黃髮穗骨立減食肌熱驚癇疔虫麝香丸			
麝	蘆會	胡黃連	
等分研倍水丸黃米大一歲三九量加人參湯下			
日三一方胡黃連倍療疔癩溫瘡一名聖丸癩癩			
切幼新書 卷二十四			
驚風五疔三虫蛇虫作疾枯痺久疔熱藥調護最難得法唯此若神			
聖惠青黛散治一切疔腹脹手脚枯細眼目口鼻瘡			
狂熱痢下泄澀漸瘦面無光澤			
青黛	雄黃	石鹽	朱砂
白礬 <small>枯</small>	薰陸香 <small>各一</small>	麝	蚺蛇膽
細辛	黃連	青礬	黃礬 <small>燒並</small>
鹽綠	黃蘗	苦參	桂心
杏仁 <small>炒</small>	乾薑 <small>炮</small>	梨蘆 <small>各半</small>	附子 <small>淨炮</small>

熊膽	菖若子 <small>油去浮煮芽</small>	石膽 <small>各一</small>
蝦蟇 <small>酥炙焦</small>		
羅末疔在內一歲一字三歲并華水一合調半錢		
量加口疔蒜一片研藥塗自然流涎臯瘡蒜和內		
臯中外疔猪胎和塗		
五膽丸治一切疔		
龍膽	虎膽	熊膽
蘆會 <small>亦名</small>	麝	白礬 <small>枯</small>
研東引石榴根半斤水三大椀煮半椀去滓慢火		
切幼新書 卷二十四		
煎膏下藥末又熬可丸即丸如菖若豆瓷器收有疔		
虫或指卓眼手割指甲荆芥湯化一九候兒睡點		
臯中腦上十指下部虫聞氣皆化水		
治一切疔青金丹一名還命保生丹		
雌膽 <small>肚下白淨者三枚端午午時取繩繫雙脚勿</small>	青黛	蘆會
此膽傷以胡黃連寸許當心繫一半入口倒懸銅		
至黃昏	人糞	
蟬殼	猪牙皂角	雄黃 <small>各一</small>
內藥入甕瓶密蓋口黃泥固候乾炭火燒赤破瓶		
取藥研蟾涎并麝一分和丸如菖若豆銅合收先煖		

漿水浴兒軟帛拭乾溫水下五丸量加若藥乾乳
汁化頃更似醉是藥力

史君子丸治一切疳

史君子 沒石子 木香 胡黃連

黃連 熊膽 蘆會 訶梨勒皮

阿膠炒黃 天靈蓋酥 仙靈脾各半 麝分一

羅浸蒸餅丸麻子大粥飲下三九日三量加減

丁香丸治一切疳長肌肉

母丁香二七 胡黃連 黃連各半 朱砂

幼幼新書 卷二十四 十一

牛黃 麝 燕萸各一 猪膽汁五

蝦蟇一枚酒二升煮爛去
蝦蟇骨八膽汁更熬膏

羅蠟麻膏丸如粟空心粥飲下五丸晚再服

熊膽丸治一切疳肌體乾瘦髮立毛焦心神煩熱

熊膽 蝸牛炒 黑狗膽 黃連

胡黃連 丁香 麝 沉香

鯉魚膽 水銀藥肉研 青黛各一

羅蜜丸如黃米不時冷水或粥飲下五丸量加減

蘆會丸治一切疳面目痿黃髮穗鼻痒口乾愛食泥

土心腹虛脹吐有青筋四肢壯熱

蘆會 丁香各半 牛黃 麝

胡黃連 木香 牛蒡子各一 熊膽錢半

狗膽 猪膽 蟾頭酥炙焦 蝟膽七枚

龍腦錢一 雞膽十枚

羅諸膽汁丸如麻子冷水下一丸二歲加

靈苑治一切疳久服令兒肥壯無疾千金丸

川棟子肉 芫

等分猪膽汁和杵丸如麻子量兒飲吞日二常服

幼幼新書 卷二十四 十三

三五丸張氏用朱砂青黛白定粉光墨蜜陀僧名

五色丸非時米飲下治疳熱下虫用臘月乾猪膽

膏丸如乾湯化肉湯下疳虫如髮稍遲便化

茅先生治疳疾蘆會丸

黃連 木香 檳榔 丁香各半

膩粉錢一 燕萸分一 青黛三錢留 麝少許

末猪膽五枚川巴豆廿粒盞盛飯上蒸三五次去

巴豆將膽拌藥丸如黍服十粒十四粒米飲下

治疳丸

猪膽一個實黃連末一半安不損巴豆中間又以黃連末實滿飯甑蒸熟去巴豆及膽汁為細末陳米飲吞五七丸

嬰孺青黛散治五種疔若在內眼澀腹脹痢色無常或如泔淀日漸羸若臍下赤爛揉臍頭瘡不着痂漸流遠耳生瘡有時目赤髮稀頭皮光緊漸羸瘦頭大項細名頭疔唇口被蝕齒斷作五色或盡峭黑舌下白瘡上齧有孔口臭唇敗爛名口瘡若疔蝕脊脊十指咬甲頭髮焦乾兩脅虛空脊梁如鋸時腹脹下痢

幼幼新書

卷三十四

十四

名脊疔若下部開張痢膿血時赤爛痒不可忍痢無度臭不可堪名急疔五疔一方又須審形依治

青黛二兩

麝

雄黃

朱砂

石鹽

蝮蛇膽

鹽綠

細辛

黃礬枯

薰陸香

黃連

黃蘗

苦參

杏仁炒

桂心

乾薑各一兩

藜蘆燒

菖蒲子炒

附子炮各半兩

散疔在內并華水調三服暫止不減再服杏仁許三歲半錢量加減口瘡酥少許每夜安唇內自至

瘡所鼻瘡赤爛酥和菜豆大二九內鼻中日三頭瘡下部外赤爛並傳脊脊空虛准前服仍酥和摩脊脊野雞痔綿裹內之外有頭搗破傳又無名諸瘡癬疥猪胎和塗大人口瘡綿裹含之兒白禿瘡泔清洗去痂拭乾塗油後傳散差忌漿水熱麩猪魚雞薺蒜滑膩一切動風物

神驗方治疔或頻壯熱眼赤澀揩眼揉臍及頭瘡髮落或視物不明手足心熱時出虻虫或身生肥瘡及痢青黃赤白不定口及下部生瘡齒落無辜兄弟姊

幼幼新書

卷三十四

十五

妹相傳死者

黃連

苦參粉

龍膽各一

木香

丁香

青箱子

犀角各半

朱砂

青黛

麝

髮各一

緋絹燒一

石硫黃

雄黃

礬石灰

臘脂

蝮蛇膽各二

末蜜丸如小豆空腹清米飲下三九日再又半豆許吹鼻中一豆許吹下部亦貼牙斷忌腥臊鮓魚雞猪菘菜芹菜一切毒物

錢乙治疔消癰進食止瀉和胃追虫膽礬丸

膽礬錢一 綠礬兩二 大棗個四十 醋升一

熬棗爛

史君子兩二 枳實兩三 訶梨勒核去 黃連各一兩

巴豆二七個 去皮破

同炒黑略乾

夜明沙兩一 蝦蟇燒半存 苦棟根皮兩半

再同炒焦乾同煎藥杵羅膏和杵干下未成旋入

熟棗肉勿多恐服難化太稠入溫水九如菜豆不

幼幼新書 卷二十四 十一

時未飲下二三十九

良方治瘴及疔氣腹脹氣喘木香丸

青木香 大附子炮 人參 厚朴

官桂 羌活 京三稜 獨活

乾薑炮 甘草炙 芎 川大黃炒

芍藥各半兩 肉豆蔻六枚用 雞心檳榔

陳皮各二兩 牽牛頭末

末麤器密盛臨服牽牛末二兩藥末一兩蜜丸如

梧子心腹脹滿一切風勞冷氣臍下刺痛口吐清

水白沫醋心痙痺氣塊男子腎藏風毒攻刺四體
及陽毒脚氣目昏頭痛心間嘔逆及兩脇堅滿不
消卧時橘皮湯下三十九丸女人血痢下血塊刺痛
積年血塊胃口逆手足心煩熱不思飲食薑湯下
三十九丸並利後每夜服二十九丸兒五歲上疔氣腹
脹氣喘空心溫湯下五七丸小者減凡胃腹胞悶
不消脾泄不止臨卧溫酒下食毒癰疽發背嵐瘴
氣繞覺頭痛背膊拘急宜快利常服不染瘴皆因
脾胃實熱所致常以涼藥解膈上壅熱此藥通利

幼幼新書 卷二十四 十七

彌善本治嵐瘴及溫瘴效凡久瘴服藥訖灸氣海

百壯又中管十壯李學士治疔禦瘴木香附子各

二兩大黃人參厚朴各一兩桂檳榔豆蔻陳皮各

三兩餘皆半兩牽牛一斤

聚寶兒疔常服胡黃連丸

胡黃連兩半 宣連 白蕪荑仁 木香各二兩

末獷猪膽和飯熟蒸兩度丸如粟米飲下廿九

丁左藏肥兒蝦蟇丸

大蝦蟇一個 陳皮去白 胡黃連兩一

鬱金

燕薹仁各半

末陶器盛猪膽汁和飴上蒸熟丸如菉豆陳米飲服五七丸

劉氏蘆會丸治疳

蘆薈

黃連

白朮

史君子

燕薹仁不見火

各一分

巴豆半兩連殼銀器煨存性一分

末飴九粟米大飯湯服五七丸

張氏神麩散治疳

神麩

陳皮

大黃紙裹

芍藥各三

幼幼新書

卷三十四

十八

九

桔梗

芎

厚朴製

枳殼炒

白茯苓各一分

人參錢四

甘草分二

細末薑一片煎一錢不時服

莊氏疳疾二十四候

第一候瀉膿血日漸瘦是冷熱疳宜八香丸

胡黃連錢一

腦麩各半

牛黃分半

蘆薈錢半

蟾酥五捻子

者亦得

白花蛇肉酒浸

半兩

蝎梢一分

細末猪膽調米大飯飲下五九日三患甚生米泔

調半錢服

第二候脚細肚高胃前骨生愛喫泥土酸醜日久通身黃時時吐逆下痢腹內疼痛是脾疳

肅睛焙一

對

牛黃

朱砂

麩各一

桔梗煨半

兩

末蜜九薑湯下三五丸

第三候鼻下赤爛愛揉眼兼血痢是肺疳因喫熱物

或病妳所傷心肺加之咳嗽更服涼藥過度便上熱

下冷漸漸昏沉日夜煩哭

幼幼新書

卷三十四

十九

龍腦

朱砂各一分

釣藤

玄參各一

胡黃連炮半

麩錢一

末蜜九黃米大飯飲下三五丸

第四候皮虛皺面無顏色身上燥痒心煩

治五疳面黃壯熱食不消目澀痛及胃膈痰涎愛喫

酸醜常多瀉痢聖惠

胡黃連

母丁香

黃連炒

蘆薈

熊膽各半

麩一分

蟾頭酥炙

一枚

末牛膽丸菉豆大心疳燕薹甘草湯下三九食疳

瀉血或赤白痢新汲水下三九吐逆水瀉薑湯眼

疳羊肝血與酒和看多少微煎下三九

第五候毛髮稀疎鼻生瘡是肺疳

治一切疳肌瘦瀉痢口鼻生瘡水穀不化

蝦蟆灰

烏賊魚骨炙 蜜陀僧

白礬各一

麝半分聖

末蜜九豆大湯下三九

第六候頭瘡毛髮稀焦是肝疳

肉豆蔻

蟾灰 全各

桔梗炮

茯苓煨

初初新書

卷三十四

二十

大黃煨各

腦麝各一

末軟飯九麻子大粟米飲下三九只可二服

治頭項細心腹滿皮膚乾皺毛髮焦黃鼻下赤爛口

舌生瘡瀉痢不止日漸羸瘦

大蟾

一個用體入胡黃連一兩線縫濕紙三重

麝

熊膽

蘆會各半

末麩糊九麻子大米飲或乳汁下三九三歲加

第七候牙變黃赤不定是腎疳

并治疝氣偏墜寒熱

沒藥炮

甘草各二

硫黃

木香炮

胡黃連各一

末蒸棗肉九麻子大從容湯下三九可兩服

第八候頭髮焦乾鼻下瘡生是肺疳

理五疳八痢腹脹羸瘦頭髮焦乾口鼻生瘡

黃連

白蕪荑同炒

夜明砂淘五次焙

末積猪膽汁九菜豆大不時麥門冬湯下三五九

如無效或腹脹氣促不能食米飲下取疳虫差

第九候咬指甲髮穗肢重是心疳

初初新書

卷三十四

二十一

治五疳八痢心藏熱

蘆會兩半

輕粉

青黛

香墨

飛羅麩各一

史君子一個

蝸牛炒焦

麝半錢

末研細滴水九芥子大生地黄汁化一二九薄苛

湯亦得

治疳渴

大蝦蟆兩個水沈酒

黃連四兩

麝一錢

朱砂半錢

膏和末丸如菜豆陳米飲下十九如疳黃臘茶清

下入酒麪糊不妨

第十候肚上筋生齒斷虫蝕脾骨槽疳

治脾疳手足浮腫

桑皮炮

漢防已

人參

茯苓

胡黃連

麝香各一分

末蜜丸如麻子食前米飲下五丸

第十一候吐逆腹脹是胃疳又名妳疳

治兒喫熱妳次腹痛并驚妳便下痢吐逆

桃仁炒

胡黃連各半兩

朱砂各一分

金箔五片

沉香

朱砂各一分

末飯飲丸麻子大米飲下五丸妳汁亦得

第十二候齒斷臭爛面無顏色心不思食脾疳又名

口疳

口疳

治唇口及齒根宣露牙斷生瘡臭爛

葶藶炒

胡黃連各二錢

黃丹兩半

末半錢貼牙斷勿嚙津

第十三候愛合面卧多睡如醉腹脹氣急是心脾疳

治兒合面卧地多睡或氣急面黃哭聲高叫或心痛

并口乾因曾喫生肉故腹內有虫

霍虱二分

茯苓兩

木香一分

苦楝根兩三

檜株根兩半

水一斗煎根成膏後入三藥末和丸如黍米飲下

三五丸

第十四候鼻內乾痛口中臭氣齒斷鮮血是肝肺疳

治兒腸鳴瀉痢口鼻乾常有鮮血日夜疼

白朮炮

硫黃各一分

枳殼炒

胡黃連

當歸各半兩

末半錢湯調下

第十五候脚細肚高并肚上青脉是脾疳

治兒通身黃瘦大小便澀脾所召也

漢防已炒

甘草各一分

桑白皮

木通

木香

檳榔個一

胡黃連一分

末一錢水七分薑少許煎五六分温服

第十六候非時生瘡愛喫冷水是熱疳

治肝藏風熱眼不見物及有汗

石决明

乳香各一分

龍膽二分

大黃兩半

幼幼新書

卷二十四

十一

幼幼新書

卷二十四

十一

十一

末薄苛湯調二錢

第十七候膚生粟糞中米出是脾冷疳

兒疳氣脾虛冷香連丸

胡黃連 宣黃連

等分末軟餅丸如黍空心夜卧湯下五九

又

蘆會

胡黃連

朱砂

青黛

麝

蟾酥

末餅丸芥子大空心臨卧湯下五七九

幼幼新書

卷二十四

廿四

第十八候氣滿腹脹及口乾是心胃疳

兒疳氣腹虛脹似水氣

肉豆蔻

木香

麝

朱砂

胡黃連

煨半

末飯丸麻子大米飲下三五九

第十九候愛餐生米麩炭埽瓦是胃脾疳

兒驚風五疳蘆會丸

蘆會

胡黃連

牛黃

天竺黃

草龍膽

茯苓

腦麝

人參

川大黃

雄黃

生犀

末蜜丸菜豆大薄苛湯下三九溫酒亦得

第二十候揉鼻揩眼咬甲愛飲水是肝渴疳先止渴

人參

乾葛

黃芩

柴胡

甘草

末一錢水一盞煎五分冷分五服每服更點鉛白

霜寒水石一字

殺疳令肥保真丸

大蝙蝠一個罐內煨存性入麝少許粳米飯丸如

幼幼新書

卷二十四

廿五

黍湯下三九

第二十一候多寒熱愛卧不起骨熱疳

犀角散

銀柴胡

川大黃

甘草

川芎

茯苓

芍藥

麴葛

桑白皮

地骨皮

山梔仁

黃芩

貝母

末一大錢水一盞青蒿一枝小麥十粒煎七分溫

眼入麻黃連翹與前藥等末煎服效

第二十二候愛飲水眼目不開是肝疳

治手足動眼合語笑噴怒無常兼多驚指甲青形似
死妄稱天癆通神丸

茯苓 龍齒煨各半兩 胡黃連 鉛丹各一

銀箔五片 麝錢一 鈎藤煨一兩

末蜜丸麻子大米飲下十九

第二十三候肌體或熱或涼發渴無時是急疳

天竺黃丸治驚熱後生疳

天竺黃 青黛 白附子炮 黃連炒

地龍炒 麝 夜明沙洗 龍膽各一

幼幼新書 卷二十四 廿六

乾蝎炒五個

末糯米粥丸如麻子淡薑湯下三九忌雞肉

第二十四候齒斷黑唇懶開赤則心疳積熱桃花丸

寒水石炭火燒一兩 朱砂半錢

末蒸餅丸如粟大冷水下三五丸旬日安

莊氏蘆薈丸

蘆薈 大蝦蟇酥炙黃一個 青黛

雀虱 黃連

等分末猪膽丸如麻子米飲下五九三歲十九如

治風疳加羌活

毛世顯疳藥

牛膽醱五靈脂研再用膽汁丸米飲下五七九

孔氏無比丸

代赭錢二 燕萸皮去 雷丸 乾漆

神麩各半兩

末粟米糊丸芥子大食前米飲下七至十九日二

麝薰之虫即下

吉氏蚶蚱丸

幼幼新書 卷二十四 廿七

蚶蚱一個酒浸一宿去骨炙 胡黃連 巴豆醋煮

青黛 朱砂衣各一錢 宣連炮一兩 定粉各一

末紅米飲丸米飲下三九乳汁亦可

治一切疳蘆薈丸

蘆薈 朱砂各一錢 胡黃連 燕萸各二錢

熊膽半錢 巴豆霜二七粒 乾蟾一個 麝

末醋酒化蘆薈糊丸如菜豆飯飲下五九

洪州張道人定命丹治十二種疳定生死取疳虫黑

青者死黃者可治

木香 夜明沙 麝 各二 蟬殼 個三

胡黃連 錢二 金銀箔 各五

末軟大米飯丸如麻子空心米飲下三粒日三忌

酸醎油膩

一肝疳兒雖飲乳漸喜肉食尤愛酸醎只眼前定命丹次服此

肉豆蔻 個三 枳殼 各三 胡黃連 茯苓 各半

大黃 甘草 各一 丁香 麝 各二

幼幼新書 卷三十四 末

末服一字米飲下日三服久者五服效

二急疳兒疳痢下赤膿脫肛雖有精神命在頃更沉香丸

香丸

沉香 人參 蝎 胡黃連

乳香 各一 龍骨 甘草 各一

末棗肉丸如麻子米飲下三九日二久患七服效

三風疳兒手足拘拳眼目不開噴笑無時驚叫手足

爪甲青狀似鬼形已似天鈞金箔茯苓散

金箔 片五 茯苓 胡黃連 牛膝 各一

龍骨 各一 木香 麝 各一

末一字米飲下日二忌油膩

四肉疳眼日常痛飲食不下食物不消漸羸調中丸

鼈甲 各一 當歸 黃耆 人參

附片 桂心 胡黃連 各一 雄黃 少許

末棗肉丸如麻子米湯下二九忌魚油物

五脊疳指甲痒痛頭髮焦乾腹肚虛鳴脊骨如鋸時

時下利狀如青淀或膿血朱砂丸

天靈蓋 各一 柴胡 煨 白朮 麝 各二

幼幼新書 卷三十四 末

檳榔 個一

末蒸棗丸麻子大米飲棗湯服三九

六口疳 缺

七腦疳鼻下赤爛身心煩躁鼻瘡髮落日夜痛不休

狀似鬼形安息丸

安息香 丁香 胡黃連 麝

雄黃 各一 肉豆蔻 個二 金銀箔 各五

杵煉蜜丸如麻子米飲下三九

八食疳兒夜壯熱增寒手足冷兼陰汗漸瘦多饒虛

腫往往下利鐵粉丸

鐵粉鐵錫子燒紅醋

朱砂錢各二

木香

桔梗兩各半

胡黃連錢一

青州蝎個五

末白米飴丸如麻子米飲下三五丸

九蛔疳兒合地面無顏色啼聲高狀如心痛口疳時

發醫長呼為崇不知兒喫生肉化虫苦棟丸

苦棟根

雀虱

朱砂兩各一

檳榔個三

麝錢一

末麩糊丸如小豆湯下三九日三忌毒物

幼幼新書

卷二十四

三十

十妳疳由乳母胃氣不足兒喫冷妳便嘔吐漸成妳

疳宜急治莫交腫毒遍身通黃狀似橘皮木香散

黃耆

人參

龍腦錢各一

乾蝎

乾薑

橘皮去白各半兩附

甘草各一寸

末一字乳香湯調日二重者七服效

十一脾疳吃土日久身黃醫呼為陰黃虎睛丸

虎睛個一

牛黃錢二

桔梗

麝

胡黃連錢各一

末蜜丸如麻子米飲下三九日二

十二肺疳兒喫熱食及病妳傷心肺便喘醫不辨

冷熱以藥攻之變成黃腫漸覺昏沉杏仁散

杏仁個二七

甘草

款冬花錢各二麝

胡黃連錢各一半夏湯洗七次半兩

末一字棗湯調下日二

五疳出虫茅四諸疳

聖惠乳哺不調寒温失節故成乳疳若久不差腹內

有虫肌體黃瘦下痢不止服藥則疳漸退虫狀如亂

髮如馬尾多出干腹背及頭項上若虫色黃白赤者

可療

幼幼新書

卷二十四

廿一

願願朱砂丸治疳痢辯虫色定吉凶

朱砂

阿魏並半石

蝙蝠血三兩

看酥少許

末口脂調桃柳枝浴兒後量兒以菜豆大填臍中

貼之青衣蓋虫黃輕青重

聖惠乾蟾丸治五疳及驚風出虫

乾蟾一枚端

大蛇蛻一條

穀精草二兩三味入

燒

胡黃連

瓜蒂

母丁香

牛黃

白龍腦

朱砂

雄黃

蘆薈

天竺黃 麝各一分 青黛兩

研獾猪膽汁調麵糊九菜豆大一二歲温米泔半

合化五九服藥後桃柳枝湯浴青衣蓋虫出眉鬚

邊如細麩片或如摻麩塵青黑難治黃白易治粥

飲下二九日三甚者半月差

田父散治五疳下痢羸瘦羣痒有虫

田父黃 胡黃連各三分 夜明沙炒 蛇蛻灰各半兩

白礬灰 葭苈子淘淨炒黃 牛黃

朱砂 麝各一分

幼幼新書 卷二十四 廿三

末糯米飯丸如菜豆一二歲空心湯下五九浴與

虫色如前量兒加減

乾蟾丸治五疳出虫

乾蟾灰一 天靈蓋灰半兩 麝半 蟬殼淨炒

鼈甲淨酥炙

末燒飯丸如菜豆二歲下蛤粉湯下一九三五歲

二九浴與虫色如前

治五疳手足乾瘦腹脹筋起羣痒昏沉多睡蟾頭丸

蟾頭酥炙 青黛 皂莢廁中浸七日洗淨去黑皮酥炙去子

硫黃各一分 巴豆霜七 麝半

末蜜丸如菜豆空心粥飲下三九虫出量加減

兒五疳體熱乾瘦髮立羣痒不食青黛丸

青黛 蘆薈 人中白各半兩 蟬殼炒

猪牙皂莢生各半兩 麝一分 胡黃連三分

蟾涎 人乳汁各少許

羅端午午時合棕棗蟾涎乳丸如黍桃柳湯浴後

粥飲下三九後着熟青衣虫色如前

錢乙大蘆薈丸治疳殺虫和胃止瀉

幼幼新書 卷二十四 廿三

蘆薈 木香 青橘皮 胡黃連

黃連 白蕪荑去 雷丸 雀虱炒各半兩

麝錢二分

末粟米針丸菜豆大米飲下一二十九不時

張漢治疳瘦盜汗多倦少力大便有虫猪肚丸

黃連 木香 胡黃連各一分 肉豆蔻

白蕪荑 蘆薈 鼈甲酥炙 羌活各半兩

末獾猪肚一個洗淨內白芷二兩蒸極熟去白芷

入藥縫合再蒸如泥搗二三百下成膏丸如黍米

飲下十粒不時量加減

吉氏勝金散治疳虫

丁香

生犀各半兩

川練子

蕪荑

盧會錢各一

末半錢陳米飲下

疳疾吹鼻第五

顛顛青黛散吹鼻

青黛

細辛錢各一

宣連

瓜蒂

盧會

地龍錢各半

朱砂字一

幼幼新書

卷三十四

廿四

末細研吹鼻中入麝少許

保童丸

朱砂

麝

新蟾酥

等分研合盛丸如麻子浸一丸筮頭點鼻中亦名

問命丸病甚即吹或得七噴可治五噴即甚三兩

噴必死勿深着水浸臨時入水不妨一多熊膽乳

汁調塗唇齒甚者水下三丸

聖惠通頂散治一切疳吹鼻

白礬灰

麝

熊膽

藜蘆

丁香

胡黃連

乾蝦蟇灰

黃連各一

赤小豆粒二百

羅散少許吹鼻中虫出

治一切疳腦悶昏沉先吹鼻

青黛

躑躅花各一

瓜蒂

乾地龍炒

麝各半

羅末吹鼻中嚏數如前

灌草丸治一切疳心煩惱熱

青黛

黃連

盧會

瓜蒂錢各一

幼幼新書

卷三十四

廿五

龍腦杏仁

蟾酥杏仁大

末粳米飴丸如菜豆如汁化兩丸灌鼻中日三二

治一切疳髮穗眼腎鼻瘡吹鼻通腦散

蚰蛇膽

犀角

穀精草

等分羅日三兩度吹鼻中菜豆大又新汲水調半

錢服三歲下一字

治一切疳腦熱鼻塞通頂定命散

鴉不食艸

猪牙早莢

盧會

瓜蒂各一

麝

羅吹臯中嘔出疳虫黑危赤白黃易醫

幼幼新書卷第二十四

幼幼新書

卷第二十四

廿六

幼幼新書卷第二十五 諸疳異證 凡十一門

後學古吳陳履端于始輯

崑山張厚德伯含校

走馬疳第一

茅先生走馬疳甚即遍汭作崩沙候牙肉腫爛口內氣臭身微潮熱喫食不得齒縫出鮮血常動搖似欲脫肉爛自漏落此因疳氣盛而奔上焦齒落三個面光淨爪甲黑灰

患眼走馬疳疳蝕之極也五歲蒸熱上攻口齒潰爛

幼幼新書

卷三十五

十一

張

先以淡鹽湯洗次搽紫金散甚即用秋霜散再以天竺黃散地黃膏夾服

並重舌門

若先落齒一個即死相次

面光發顛漏見骨卒

形證歌

疳名走馬意何如急疾生虫胃熱多腎冷又攻牙齒動血腥氣臭不通呵齒斷紫色為深極肺熱殃深事轉多若使齒牙都又黑腎家已絕柰醫何

先退脾肺風熱宜檳榔散五七服

煩熱門

後以大棗

一個去核入砒小塊纏定燒存性臨卧貼斷上數次

水鑑治走馬疳虫透損骨者

天南星一枚當心剉竅安雄黃一塊丁左藏用綠礬大麥

麵煨候碓黃鎔盪合出火毒一宿去麩研末入麝

少許掃瘡

集驗蚕退紙燒存性入麝少許貼患處

靈苑麝香散治走馬疳牙斷腐爛惡血口臭齒脫

麝 銅綠各一 黃連三

幼幼新書 卷二五 二

末棗肉一個水銀一錢研如泥入藥研傳少許蘭

香葉覆差肉消者待肉生

殊聖方

尿涌內白焙末入麝少許研擦牙麝亦佳

又

疥蝦蟬一個端午午時新瓦二口盛 麝少許

膽礬錢二

末去皮柳條桃藥傳

茅先生黑鉛散惠眼名紫金散

黃丹 蛇床子炒黑 地龍炒黑各半兩 青礬錢一

末搗牙斷上日三

秋霜散

好砒兩半 白礬四

水三分煎海眼沸下砒煨水乾入白礬同煨乾入

麝好坯子各少許為末戴毛點一字牙斷上日三

四迴拂即愈

崩沙方

雞內金 蘆會 白礬煨 乳香

幼幼新書 卷二五 三

地龍 麝

等分末候兒睡搽牙斷上

錢乙治口疳走馬疳龍骨散

砒 龍腦 蟾酥各一 粉霜錢半

龍骨錢一 定粉半錢

研砒極細次龍骨次定粉等研傳

良方治走馬疳唇齒瘡爛遠巡狼狽

砒 粉霜 石灰

等分左右轉研各千下極膩雞羽尖搽少許掃瘡

即乾甚驗勿多用恐入腹有大毒衛生綠雲散多
膽凡少許

聚寶蘆會散

蘆會

蟾酥

大麻仁

膩粉

麝

銅青各一

石膽一

末先以穀草茵草鹽漿水煎汁洗搵乾用藥遍塗
若未甚只乳汁或漿水調塗

丁左藏治疔定命散

白礬

綠礬

幼幼新書

卷二十五

四

文

等分研一錢大麥麵五錢薑葱一寸研爛麪和餅
裹藥文武火燒存性地坑出火毒一宿研入鉛霜

二錢一劑耳許揩牙上一二遍

蟾灰散治走馬疔

大蝦蟇一個燒

五倍子各抄麝少許

研蜜調塗齒根

惠眼秋霜散治崩沙齒欲落

粉霜

礞

白礬各一

末北艾一大團裹藥末石灰摻艾上枕盛發火燒

盡細捻少許揩齒上鹽湯嗽口燒時蓋蓋定勿走
藥氣

劉氏

蜂窠

碓黃

礞

等分將礞入蜂房內深一米厚火煨入麝研細候
睡搽牙斷

李琰麝香散治走馬急疔口臭齒爛及攻蝕唇鼻頰

頰

麝一錢

黃藥一兩

青黛半兩

碓黃飛一

幼幼新書

卷十五

五

文

研綿纏筋離藥擦齒上蝕損死肌軟帛拭惡血量
瘡大小乾搽日夜五次或血盛併多不定者加定

粉半兩錢氏多錢

莊氏

麝

碓黃

熊膽

等分研末或貼或喫

又五倍子炒焦黑羅末貼瘡上痛者要止不痛者要

痛聖惠有黃丹并治口齒疔

又

伏翼 小兒寸糞 麝 各少

穰蝦蟇腹內燒灰疔處貼一字

孔氏無以散

麝 各一 蟾酥 綠礬 各半 膽礬

沒藥 各一

大熟鑿作坑內藥週迴用火炭三斤燒過入麝研

雞翎掃齒

口齒疔第二

聖惠兒藏府壅熱乳食不調內有疔虫上蝕口齒其

幼幼新書

卷三五

六

文

候唇口痒痛牙齒峭黑舌上生瘡腦中乾熱斷肉赤

爛頰腫齒疼熱毒薰蒸口多臭氣故口齒有疔

顧頰治疔蝕口齒齒斷宜露臭穢難近

葶藶子 梧桐律

等分研臘月猪胎調微煎作膏柳木筋綿裹微搵

藥時時烙

千金治疔虫蝕齒根

地龍置石上着鹽一撮須臾化水麵展取待凝厚

內病上又去皮草茨塗虫即出

聖惠青黛丸治口齒疔生瘡臭爛

青黛 朱砂 熊膽 蘆薈

胡黃連 瓜蒂 各一 牛黃 腦麝

蟾酥 人中白 雞舌香 蟬殼 淨炒

夜明沙 炒 蟻娘 各

羅末口脂和丸如菜豆乳汁研一九塗口內及瘡

鼻中桃柳湯洗疔虫自出

蘆會散治口鼻齒舌疔

蘆會 鹽綠 胡椒 各一 蝸牛殼 炒

幼幼新書

卷三五

七

真珠 末各 青黛 黃連 末各 麝 半

散甘草湯洗瘡裏乾涎先點少酥後搽藥鼻中

雄黃散

雄黃 朱砂 消石 蚺蛇膽

黃連 石鹽 苦參 各一 麝 半

雞屎礬 豆許大

研極細不問口瘡赤白舌上頰頰中及齒斷並

宜

蘆會散治口齒疔鼻舌頭面生瘡

蘆會 土綠 胡粉各半 蝸牛殼炒

黃芩各兩 麝一 石鹽 真珠

青黛各一

細羅甘草湯洗及嗽口了綿裹藥貼齒上塗亦得有涎旋吐勿嚥

芫若膏治疳疔口齒瘡

芫若子 葶藶生並 硫黃 臭黃

麝 熊膽 蘆會 蚺蛇膽

白礬各

幼幼新書 卷三十五 八

羅臘月猪脂二兩入鈹內慢火鎔和藥末為膏杏仁大綿裹火炙烙齒斷及瘡上

治口齒疔臭爛蝸牛散

蝸牛殼燒 白狗糞 人糞 蝙蝠

蟾頭各燒 麝 青黛各半

研吹鼻中蜜和貼口齒效

又

麝 五靈脂各一 蜜半 蟾酥柳葉

片鐵器上 慢火煨

鈹內慢火鎔成膏去爛肉後塗日夜四五度

乾漆散治口疔蝕齒斷宜露

乾漆炒烟 硫黃 文蛤灰 蘭香灰

蝦蟇灰 沒石子 馬齒莧各半 麝錢一

羅蜡月猪脂四兩同藥鈹內煎熟槐枝綿纏熱蘸烙齒斷令血止每日二上肉生為度

益母草散治疔疔蝕口齒骨出

益母草灰 川升麻 麝 人中白燒

黃柏各一 牛黃半 胡黃連兩半

幼幼新書 卷三十五 九

羅淨楷齒後用藥少許乾搽齒斷日三

白礬散治口齒疔瘡疼痛腫爛

白礬灰 黃礬 人中白各燒 蝦蟇灰

人糞灰 雄黃 益綠 蚺蛇膽

麝各一

研細先以髮裹指清水洗口齒後蜜調散如膏薄塗齒根日三五

治口疔及齒斷生爛肉及口中臭虫蝕作孔宜黃蘗散

散

散

黃蘗

兩一

青黛

兩半

麝

錢一

羅搽瘡上日三四

殊聖牙疳

白礬

膽礬

等分末飛入麝少許揩牙

嬰孺嗽口水治疳堅牙殺虫生齒

菘若子

獨活

各四

甘草

各五

當歸

各二

竹葉

各六

猪樹根

二各即

末一七水八合煎四合候温煖下地黃汁少許晨

幼幼新書

卷二十五

十一

六

夕含并嗽

劉氏治兒口疳下部有虫燒大麻子煙熏

趙氏治口唇齒皆損臭爛

銅綠

錢四

信礬

麝

各三

研帛抹口傳口齒疳瘡勿嚙略吐無妨

安師傳治口齒喉齶疳瘡如白膜者

輕粉黃丹等分乳汁和塗即時如殼退下

聖惠灸勞宮二穴各一壯手心中屈無名指頭掌中

着處是

鼻瘡第三

亦名

巢氏鼻下兩邊赤發時微有瘡而痒名鬣鼻亦名赤

鼻亦名疳鼻然鼻肺氣所通候皮毛氣不和風邪客

皮毛次血氣夫邪在血氣隨虛處入停鼻兩邊與血

氣相搏成瘡

聖惠乳食不調上焦壅滯令疳虫上蝕于鼻其候鼻

中赤痒杜熱多啼皮毛乾焦肌膚消瘦效嗽上氣下

痢無常鼻下連唇生瘡赤爛名鼻疳

寶鑑疳氣攻肺故赤痒而爛

幼幼新書

卷二十五

十二

庚

顯顯治疳蝕唇鼻及諸瘡

硫黃

乾漆

文蛤

等分燒煙盡研入麝少許帛拭膿血用藥搽

千金

燒筋頭醋淬數過取醋傳又入屎灰塗

聖惠雄黃丸治鼻疳羸瘦壯熱多睡昏沉毛髮焦黃

體無潤澤虫蝕口齒

雄黃

熊膽

青黛

蘆會

麝

細辛

乾漆

炒

盡

蛇蛻

灸

蟻娘 地龍 蟬蛻炒 蘭香子

狗頭骨 龍膽 蝸牛殼炒 黃連

等分羅末軟餅丸如菉豆冷水下三九日三量服

蟬殼散治鼻疳痒

蟬殼炒 青黛 蛇蛻 滑石

麝

等分羅用菉豆大吹鼻中疳虫盡出

石膽散治疳虫蝕鼻

石膽 人糞灰各三分 雄黃分一 頭髮灰半

幼幼新書

卷三十五

三

鯽魚一枚長三寸開肚塗鹽燒

研甘草湯洗瘡拭乾後貼日三

麝香散治疳虫蝕兒唇鼻

麝 石膽 莽草炙 地龍各一分

菴若子生 人糞灰各半兩 雄黃半

羅末貼瘡上日三

蘆會散治鼻疳虫蝕鼻痒痛不止

蘆會 黃蘗各一分 青黛 雄黃各半

散日傳三度

治鼻口疳蝕生瘡黃瘦不食

石膽 蘆會

等分散搽蝕處肉化膿頻搽即生肉亦不別損

又

蝦蟇灰一分 人中白半 麝錢一

細研貼鼻內日三

治鼻疳痒

地龍炒二分 瓜蒂一分 蝦蟇頭燒一分 麝錢半

散日吹鼻三二度

幼幼新書

卷三十五

三

治口齒疳宣露膿血不止角蒿散

角蒿炙 細辛 川升麻 杏仁炒各一分

輕粉許少

末芭蕉汁調塗

漢東王先生治肺積鼻瘡及赤爛澤瀉散

川澤瀉 川鬱金生 山梔仁炒 甘草炙各一分

末嬰孺一字三二歲半錢五七歲一錢甘草湯調

日二再傳青金散

青金散

銅青 白礬生

等分末傳單下

吉氏

青黛錢一

麝許少

熊膽錢半

末睡時貼臍下

眼疳第四

龍木論兒疳眼外障因腦頭有瘡或瀉痢多時潛衝疼痛淚出難開隔間伏熱肝風入眼初患時痒澀揉眉咬甲致醫生赤腫疼痛淚出難開臉硬白睛遮滿

幼幼新書

卷二十五

十四

怕日合面卧不喜擡頭此慎燒灸頭面恐損眼切忌點藥宜殺疳散退醫丸

聖惠肝開竅于目兒內有疳氣肌體羸瘦歲府挾風熱壅滯不通乳食過多胸膈痰結邪熱攻目令腦熱目痒或赤爛生瘡或生障醫漸漸遮睛久而不差損眼名眼疳

王訣歌

搖頭揉目熱生疳愛暗增明不柰觀雀目每因風氣盛斑瘡府熱醫侵瞞

先涼膈次瀉肝次淋洗又云宜瀉肝散麩仁膏涼膈退肝熱又疳眼雀目斑瘡入眼者先利膈退熱涼心經後與疳藥

龍木論退醫丸

黑參

防風各一兩

細辛

石決明

車前子

各半兩

桔梗

黃芩

各兩半

末蜜丸桐子大空心茶下十九

聖惠天南星散治眼疳及雀目

天南星炮

穀精草

甘草炙

黃芩

各半兩

幼幼新書

卷二十五

十五

麝

散羊肝一具切入藥末二錢用弗子炙熟空心服用不淘米煮粥半盞壓之

治眼疳史君子散

史君子

五顆

訶梨勒皮

三顆

乾蟾頭

酥炙一枚

甘草

炙一分

羅羊肝一枚砂盆內用生米泔一合爛研絞汁食後調半錢三歲下一字

又

穀精草

川大黃炒

薑石飛

甘草

炙各兩

散羊肝一枚竹刀切內藥末一字線纏醋煮熟任
意食效蛇一無下三味有蒼朮

又

羯羊肝一具 决明子一兩

羅决明搽肝內米泔兩椀煮泣盡不時食前後任

意食

夜明沙散治眼疔漸漸急小多赤

夜明沙炒 芎各一兩 天竺黃 白殭蚕炒

甘菊花 車前子 羚羊角 犀角各半兩

幼幼新書 卷二十五 十一

細羅午時溫水調半錢服更量

又方

决明子 蕤仁浸去赤皮 黃連各半兩

搗碎水大盞入古錢四十文煎五分綿濾澄清日

點三四度

治眼疔夾風生翳不開朱砂散

朱砂飛 雄黃各半兩 川大黃炒 石决明

胡黃連 神麴炒各一兩

羅蜜水調半錢日三意加減

治疔眼生翳遮睛欲失明鈴石散

鈴石 石决明 甘菊花 井泉石

夜明砂炒 黃連各一兩

細羅二錢猪肝一具米泔煮爛熟量服

治眼疔睛腫欲落

生雞子清塗掌中徐徐搨之逐手便差

又紫草花爛搗生油調塗

靈苑羶羊角丸治肝肺壅熱眼生弩肉赤澀痛及赤

眼障睛疼痒羞明及兒風疔爛陽

幼幼新書 卷三十五 十七

羚羊角 甘草生 白何首烏 瓦松炒綿

去土各一兩 生地黄洗 鬱金炮出火氣各二兩

曝乾羅未蠶丸如梧子服十五丸濃煎淡竹葉黑

豆湯冷下食後臨卧兒丸如菜豆服七至十九

張漢治眼疔邪熱攻眼生翳致損睛瞳井泉石散

井泉石一兩 晚蚕沙 夜明砂炒 石决明

甘菊花 黃連各半兩

末一錢米泔一盞生猪肝少許煎五分肝爛為度

溫時時服乳食後

治疳眼雀目黃散子

新牛膽個一 鬱金 青蛤粉各兩 猪膽三個

大黃 黃連各半兩 雄黃錢一

末填滿膽中陰乾為末大人服一錢兒半錢新水

調下赤眼氣眼雀目日三四五日差食後服

王訣瀉肝散

木賊 威靈仙 紫參 家菊

羌活 蟬殼足去 大黃生 甘草炙

石決明 腦子許少

末二錢獾猪肝一兩批開去膜搽藥線纏米泔煮

熟嚼

吉氏撥雲散治疳眼

草決明錢一 土瓜 大黃 玄參

矜矜石 宣連各半兩

末一錢水一盞煎七分食後溫服

治疳眼目昏洗肝飲 青箱子 釣藤 紫胡 山梔子

甘草炙 紫苑 石膏

等不三錢水二升煎六合徐徐服

聖惠灸合谷一壯炷如麥手大指次指間陷中

腦疳第五

聖惠母懷胎時挾風熱兒生熱毒猶在箴府因哺乳

不節胃腸壅滯令頭皮急髮穗腦熱體多汗或頭生

疳或頭虛腫損目漸羸頭大項細名腦疳

水鑑三歲兒多睡卧合面地是腦疳

黃葵花 菊花 釜下墨 消石

柏葉

等不散吹鼻中永不合面卧鼻有惡物似泥泄數

條此殺人之本

乳女宜服

柏葉 松葉 黃葵花 鼓子花

龍甲 犀骨 檳榔 大黃各二兩

生末醋三升煎膏丸如菴豆空心飲下三丸

藥性 蘆會研細吹鼻

聖惠牛黃丸治腦疳身熱髮枯

青黛	羅麪糊丸如黃米溫水下五九日三量加	青黛	龍膽	川升麻	赤茯苓
木香	犀角各一	腦麪	蟾酥各半	黃連各半	藍子
牛黃	蘆會	熊膽	胡黃連	蜀漆各一	甘草炙
末煉蜜丸如麻子一歲乳汁下一九日三稍大量	天竺黃	龍膽	牛黃各一	末蜜丸如菜豆溫水下五九日三	虎睛一對酒浸
加	末煉蜜丸如麻子一歲乳汁下一九日三稍大量	犀角	真珠	虎睛丸治腦疳眼澀多睡驚悸不食黃瘦	川大黃炒
化疳丸治腦疳久不差肌體黃瘦頭面乾枯眼鼻生瘡壯熱多渴	天竺黃	龍膽	牛黃各一	末蜜丸如菜豆溫水下五九日三	子芩各半
蝦蟆	青黛	朱砂飛各半兩	穀精草	末蜜丸如菜豆溫水下五九日三	麝半

朱砂	熊膽	乾蝦蟆灰	蘆會各一	龍腦丸治腦疳羸瘦煩熱	腦麪	雄黃錢各一	胡黃連	牛黃
末酥調塗鼻下等處	黎蘆	蟾	白礬	乾蝦蟆灰	胡黃連	牛黃	胡黃連各一	熊膽
脊疳第六疳附	末酥調塗鼻下等處	乾蝦蟆灰	穀精草各一	細研兩黃米大吹鼻中黃水出效	胡黃連	牛黃	胡黃連各一	熊膽
又鯽魚膽滴鼻中連三五日效	鄭愈治腦疳魚鼻下赤爛人中有瘡	乾蝦蟆灰	穀精草各一	細研兩黃米大吹鼻中黃水出效	胡黃連	牛黃	胡黃連各一	熊膽
又鯽魚膽滴鼻中連三五日效	鄭愈治腦疳魚鼻下赤爛人中有瘡	乾蝦蟆灰	穀精草各一	細研兩黃米大吹鼻中黃水出效	胡黃連	牛黃	胡黃連各一	熊膽
又鯽魚膽滴鼻中連三五日效	鄭愈治腦疳魚鼻下赤爛人中有瘡	乾蝦蟆灰	穀精草各一	細研兩黃米大吹鼻中黃水出效	胡黃連	牛黃	胡黃連各一	熊膽

聖惠乳哺不調甘肥過度虫生攻脊督漸黃瘦時下
利覆地卧毛髮乾焦身體壯熱煩渴不止脊骨如鋸
名脊疔

金蟾散治脊疔頭大項細四肢黃瘦肘大胷高髮乾

大蟾酥大枚 夜明砂炒 桃白皮 樺皮

地榆 黃蘗 訶梨勒皮煨 百合

白蕪荑炒 人參 川大黃 黃連各三

胡椒錢三 丁香粒三七 檳榔个一

細羅粥飲調半錢日三服量加

幼幼新書

卷三十五

廿二

胡黃連丸治脊疔肌羸脊高寒熱面無顏色

胡黃連 青黛... 地龍炒 黃連各半

朱砂 麝 蘆會 牛黃

當歸 乾蝎炒 木香 犀角

蛇蛻灰 獨活 檳榔各一 蜣螂淨炒

蟾酥个一 蝟牛炒黃七枚 猪牙皂莢酥炙黃去

羅末猪膽汁丸如菜豆粥飲下五九量加日三

牛黃丸治心膈久熱成脊疔漸羸

牛黃 朱砂 麝 真珠

杏仁炒 赤芍藥 赤茯苓 甘草炙

牡蠣粉 蝦蟇个各 犀角分半 巴豆霜粒十

羅末糯米餅丸如菜豆早晨荆芥湯下二九量加

蘆會丸治脊疔虫攻脊督脊骨高漸羸

蘆會 青黛 朱砂 麝

熊膽 胡黃連 貫眾 地龍炒

黃連 蟬殼炒 雷丸各半 蝦蟇酥炙

末蝟牛肉研丸如麻子粥飲下五九量加日三

青黛丸治脊疔四肢瘦弱腹脹壯熱頭暈煩渴

幼幼新書 卷三十五 廿三

青黛 朱砂 夜明砂炒 定粉各一

蟾酥 熊膽 羚羊角 犀角各半

黃連兩半 麝錢一 未軟飯丸如菜豆一歲二丸粥飲下

化疔丸治脊疔虫攻脊督脊骨高瘦弱

膩粉 胡椒 胡黃連 雷丸

宦虱 蜣螂淨炒 地龍各一

羅雞子白和竹筒盛炊餅處蒸熟熊膽汁丸如菜

豆清粥飲下三九量加日三

青黛丸治脊疔體熱瘦瘁心煩多渴不食

青黛 蘆會 朱砂 雀蟲

熊膽各一 胡黃連兩半 麝錢一

羅末蜜丸如菉豆溫水下三丸量加日三

朱氏治瘡疔瀉血不止

定粉 好棗枚十 頭髮許少

為團埽襯煨赤研米飲下半錢

又穿山甲米醋浸炙末空心米飲調一錢

妳疔第七

幼幼新書 卷二十五

聖惠乳母恣食生冷油膩甘酸等物傳氣乳中或交

妳傷兒藏府遂致寒熱不調肌體羸瘦哺乳漸少面

色青黃口中生瘡或時吐嘔昏睡髮焦食乳成疔名

妳疔

水鑑治妳疔漸瘦母宜服

杏仁生各七個 犀角灰 羚羊角灰

乾漆熬 雄黃各二 黃鹽八 金芽生

鼈甲生 遠志 太陰玄精石各六

光明沙許少 白羊肉淨生乾十五

搗散牛乳煎膏丸如菉豆空心煎羊骨汁下驗

聖惠牛黃丸治妳疔羸瘦壯熱多睡

牛黃 雄黃 熊膽 朱砂

麝 蘆會 甘松 胡黃連

丁香 膩粉各一 巴豆霜半 水銀兩

研星 龍腦分半

末黑狗膽汁丸如黃米粥飲下三丸量加

朱砂丸治妳疔肚脹四肢瘦弱不欲乳

朱砂 雄黃 檳榔各一 夜明沙炒

幼幼新書 卷二十五

黃連 鼈甲醋炙 乾蝦蟇酥炙各

羅末糯米飯丸如黍粥飲下七九日三意裁

治妳疔壯熱體瘦胡黃連丸

胡黃連兩半 牛黃半 蛇蛻 麝

史君子各一 蝦蟇酥炙一枚

羅末麵糊丸如菉豆飲下五九日三意裁

治妳疔黃瘦體熱心煩

青黛 蟾酥 黃連各半 熊膽

牛黃各一

研猪膽汁丸如菜豆粥飲下五九日三

疳肥第八

殊聖治疳肥瘡多生頭上浸淫久不差及耳瘡等

石碌 白芷

等分生甘草水洗瘡傳

惠眼烏犀丸治疳肥歲府不和頭面疳瘡口鼻乾燥吐逆乳食

阜莢二不坤者燒硫黃

陳皮各一

白薑炮錢

川烏頭炮一巴豆淨十

幼幼新書

卷三十五

十一

末糊丸如芥子早臨睡香湯進三五九量加傷食

潮熱或因積瀉飯飲下二二十九

疳瘦第九

水鑑兒三歲內宜神仙水花丸亦名紫微夫人青黛

長生散治疳氣身如金色瘦瘁不食食不成肌漸漸

黑瘦食即吐時寒時熱

消石各一

波斯青黛

青箱子

青木香

葵花

凌霄花

遠志

柴胡

代赭

金牙石

元精各二

蟻娘二枚

檳榔生一橘皮

水蛭各二

席睛一枚

末作二分一分蜜丸麻子大清水下三兩丸一分米飲調一字二歲外加

錢乙治疳瘦久服消食和氣長肌橘連丸

陳橘皮兩一黃連兩半米泔一日

末研入麝半錢猪膽七個分藥入漿水煮臨熟針

微割破粟米粥九菜豆大米飲下二二十九

張渙金粟丹治腹大疳瘦如吃泥土泄利不調

母丁香

草龍膽

厚朴薑

朱砂飛

幼幼新書

卷三十五

廿

青黛各一

乾蟾酥炙

夜明砂

訶子皮微

蟬殼各半

川黃連冬二兩

麝半

末一半鍊蜜丸一半白麩糊丸黍大米飲下十粒量加不時

萬金雷丸丹治一切疳肚脹腹滿手脚枯細眼目口

鼻生瘡壯熱疳下利淀日羸面無光澤

雷丸生雀蝨生史君子生胡黃連炒

薑會各半

麝半

蟾一枚酒浸一

木香

肉苳菴各一

朱砂二錢留一

蕪荑炒一

末獭猪膽四個傾汁窺盞重湯煮和杵丸如黍麥
門冬湯下五七丸早午臨臥服

張氏治疳瘦痿黃壯熱揉臍喫土蘆會丸

蘆會兩一 胡黃連兩半 宣黃連兩二 麝字一

末猪膽汁拌盛麻繫口放琰內餅甑炊候餅熟研
爛飯丸如麻子一歲三丸量加溫米飲下

莊氏治疳瘦六神丸

丁香 肉豆蔻煨麵 南木香各一兩 蘆會

史君子 訶子皮各半兩

幼幼新書 卷三十五 廿九

細米麵糊丸黃米大空心米飲下卅丸

兒肉疳喫食不肥

鼈小便浸炙 當歸各一兩 黃連 牛黃

桔梗 朱砂各一分 麝許少

末蜜丸麻子大棗湯下三丸

王氏治疳瘦及大人五勞七傷

獭猪膽一個去脂膜黃連末半斤穰入縫合三斗

米內蒸熟爛研丸如粟風乾隨兒加減日三三歲

五七至十九大人服如梧子空心飲下卅丸

蘆會丸治積疳腹脹羸瘦面黃煩渴

蘆會半 蕪荑仁 史君子 肥黃連

胡黃連 青橘去 草龍膽各一分 檳榔

沒石子各二個

末獭猪膽汁煮麩糊丸如晚豆溫湯下七粒量歲
加減不時溫湯下朱砂衣亦可

吳氏蕪荑丸治五疳黃瘦肚急長肌殺虫肥兒

蕪荑淨肉 京三稜 白朮 檳榔

川練子 木香各一分 熊膽 蘆會

幼幼新書 卷三十五 廿九

硃砂飛各一錢 黃連兩一 除蕪荑熊膽硃砂蘆會餘剉焙燥羅末同稚猪膽

汁和丸菜豆大飯飲下一二十九日三

趙氏治肌瘦肥兒消疳猪肚丸

宣連兩二 肉豆蔻 陳皮 人參

苦蕪根 杏仁 胡黃連 檳榔

柴胡各一分

細末獭猪肚一個入藥三分之二麻線縫銀石沙

器煮爛研入所剩藥和丸如梧子兒小丸如菜豆

器煮爛研入所剩藥和丸如梧子兒小丸如菜豆

米飲下十九空心臨睡各一服量加

斧槌丸治疳久服肥白

乾蝦蟆個一

白礬

膽礬

綠礬各半

入罐炭火燒

京三稜

石三稜

雞爪三稜

華蘇

雀蟲

雷丸

淡蕪蕒

黑狗脊

木香各半

沒石子個三

史君子個十

蘆會

熊膽各一

末醋煮棗肉爛入麪糊和藥極熟九菜豆大米飲

下七丸

幼幼新書

卷二十五

三

文

吉氏一切疳瘦夜多盜汗肌熱益兒丸

人參

白朮

茯苓

柴胡

甘草炙

陳皮

鼈甲醋炙

京三稜煨

等分末蜜丸如芡實食後米飲化一九日三

萬全黃帝療兒疳痢脫肛體瘦渴飲形容瘦瘁灸尾

翠骨上三寸骨陷間三壯炷如麥岐伯云蕪三伏內

用桃柳水浴午時當日灸後用青帛子拭有虫隨汗

出效

乾疳第十

聖惠乳食不調心脾積熱其候壯熱增寒舌澀口乾

盜汗膚燥髮立食多肌瘦四肢無力昏睡轉疳

水鑑兒疳氣久不差遂受傍疾此獨治乾疳

天靈蓋

生鼈甲

波斯青黛

黃鹽

研細日服一字空心湯不治濕疳

天竺黃散治心藏煩熱眼目赤澀皮膚乾燥夜多盜

汗羸瘦不食

天竺黃兩半

牛黃

雄黃

朱砂

蘆會

麝

蟾頭炙

胡黃連

幼幼新書

卷二十五

廿二

七

犀角

木香

甘草炙

釣藤各一

龍腦錢一

羅散溫水調半錢服日三量兒

治乾疳體瘦煩熱眠卧不安

牛黃

雄黃

蘆會

青黛

丁香

黃連

熊膽

蛇蛻灰

天竺黃

天漿子炒

犀角各一

胡黃連兩

蟾酥錢半

麝錢一

末蜜丸如棗豆粥飲下三九日三意裁

治乾疔不差骨立形枯青黛散

青黛 朱砂 蘆會 地龍

夜明砂炒並 乾蝦蟆灰 熊膽各一分 麝二分

研空心粥飲調半錢更吹臬桃枝湯浴衣蓋虫出

治乾疔面色痿黃肌羸

蘆會 龍膽 胡黃連 牛黃各一分

青黛兩半 麝錢一

羅末蒸餅丸如黃米粥飲下五丸量加

肉疔第十一

幼幼新書 卷二十五 廿一

聖惠乳哺無常傷于藏府其疾乳食不消心腹虛脹

眼目澀痒體熱皮枯腸胃不調痢下五色漸漸羸瘦

虫食肛腸日月彌深痢轉不止名肉疔

蘆會丸治肉疔羸瘦腹脹臬痒膚燥下痢不常

蘆會 雄黃 沒石子 蟬蛻炒

蛇蛻灰 丁香 熊膽各一分 麝

蟾酥錢各一 黃連兩半

末煉蜜丸如黃米粥飲下三九日三又吹臬中

治肉疔下痢體瘦食少腹痛羸弱殺疔丸

雄黃 蜜陀僧 麝 蘆會

蝸牛殼 母丁香 雀虱 白礬

沒藥 地龍炒 熊膽各一分 肉豆蔻

黃連炒 艾葉炒 定粉半炒各兩 蟾酥錢一

羅麪糊丸兼豆大不時粥飲下三九量加

幼幼新書卷第二十五

幼幼新書 卷二十五 三十五

幼幼新書卷第二十六 諸疳餘症 凡十五門

後學古吳陳履端于始輯

崑山張重德仲服校

疳熱第一

漢東王先生兒發熱刑瘦多渴食不長肌為疳熱
殊聖治熱黃疳

蝦蟇內蛆焙末半錢酒下效

茅先生柴胡散治疳熱四肢如柴不能起止

柴胡 知母 貝母 茯苓

幼幼新書 卷二十六

茯苓 乾葛 甘草炙

等分末小麥藥各一匙水一瓊煎六分服

寶鑑治疳熱大金粟丸

草龍膽 宣連各一兩 蘆會半兩 蕪荑

巴豆霜 大黃各一分 木香二分

未豬膽丸如粟甘草湯下三九

傷寒六物黃芩湯治腹大短氣熱有進退食不安穀

不化

黃芩 大青 甘草炙 麥門冬

石膏各半兩 桂三分

散三錢水一瓊煎七分溫服

莊氏治疳熱青黛丸

青黛一兩 胡黃連 天竺黃 宣連各半兩

朱砂飛一分 麝錢一分 肉豆蔻二個 牛黃錢半

蟾一個 端午酥炙
酒浸去腸肚

末菜豆粉煮糊丸如芥子空心夜湯下三九

玉訣地骨皮散治熱疳進食

地骨皮揀淨粗葛色洗 黃耆焙 柴胡焙各一兩

幼幼新書 卷二十六

人參 白茯苓焙 甘草炙各半兩

末服一錢白湯點服

疳渴第二

聖惠藏府風有疳氣心肺壅熱皆乳母恣食五辛熱
酒多味酸鹹夜餐炙燥心胃氣滯使乳兒致藏府生

熱熱則煩躁令渴不止

天竺黃散治疳多渴體熱煩躁少卧

天竺黃 黃連 馬牙硝 梔子仁

葛根各半兩 甘草赤 牛黃 欵冬花

紫苑 犀角 土瓜根各一

散不時蜜水調半錢量加減服

胡黃連散治疳渴黃瘦壯熱不乳

胡黃連 旱蓮子 龍膽 青黛

烏梅肉微炒 知母各半 牛黃分一

搗羅棗瓠丸如菘豆甘草湯下五九日三意裁

五膽丸治渴疳

猪膽 狗膽 牛膽 鯽魚膽

蝟膽各一枚

幼幼新書 卷二十六 三

四膽汁入牛膽內甕北後懸候乾丸如黍新汲水

下二丸空心午後各一服更量

胡黃連丸治疳熱渴乾瘦

胡黃連 犀角各一 生地黄汁合二 麝錢半

羊子肝一具研 蜜合半

末和汁蜜等竹葉湯調藥汁一匙加減

黃連丸治疳熱煩渴乾瘦

黃連 天竺黃 牛黃 甘草炙

梔子仁 欵冬花 葛根 紫苑

犀角各一 川朴硝研

羅竹瀝二合和更入熟蜜丸如菘莖新汲水研五

丸服更量日四五

又蝟牛子三五十枚合淨盤內令行有似銀泥處臆

粉和楷丸如黍不時湯下二丸

治疳渴飲水不休麝香丸

麝 人中白各一

研藥餅丸如麻子一二歲阜莖湯下二丸更裁早

午各一服

幼幼新書 卷二十六 四

劉氏大猪胞一個甘草一兩寸劈入胞內水一斗煮

三升去甘草胞焙末服三錢湯調下

莊氏活大鮎魚一個蛤粉塗頂上刮下涎入粉同研

丸雞頭大服一丸小鮎魚一個水半瓊浸涎水化

一丸止和氣散一二服補

又

井泉石一名石 太陰元精石馬牙硝

等分末入生硫黃少許服半錢生米泔水調

吉氏

乾葛 胡黃連 甘草 黑參

麥門冬

等分末一錢水半瓊薑一片煎四分

疳勞第三

寶鑑兒胎中受毒熱流骨髓百日後仍有驚服冷藥多則利利則腹冷骨中熱謂疳勞

惠濟歌

好餐時果好餐甜此疾成疳不在占腹有青筋時脹起滿皮黃色病厭厭口瘡眼腫盤為面渴

幼幼新書

卷二十六

五

飲無時瀉作泄那更一身瘦弱試將手觸火

炎炎此患只須先取轉虛中疳積是名談

顧頤治疳勞肺熱咳嗽肢瘦地黃煎

生地黄汁 薑汁

兩五 兩

各一 兩

鹿角膠

兩半

先煎地黃汁慢火熬攪五六沸下酥又沸次蜜次

膠次薑汁煎如飴食後服一匙忌毒物

漢東王先生治十歲上疳勞壯熱形瘦雞肉煎丸

宣連

兩二

銀柴胡

兩一

蕪荑

鶴虱

川各 兩半

秦光淨 知母 史君子 子苓 各一兩

末黃雌雞一隻重一斤專以大麻子飼五日開腎

後去腸肚洗拭乾入藥線縫黑豆鋪甑底厚三寸

安雞四傍及上又以豆裹日出時蒸至晚取藥用

雞淨肉和研如乾入酒糊丸如大麻子如菜豆空

心麥門冬湯一二十九意裁十五外溫酒下忌猪

肉

張氏治三焦膈塞五藏澀滯氣逆痰涎大陽昏痛及山嵐瘴氣吐逆食不美面色浮黃指甲青黑兒疳勞

幼幼新書

卷二十六

六

吐乳久病乍安神氣未復寒熱往來三和飲子

紫團人參

三兩

甘草

兩一

綿黃耆 酒

一宿 五兩

木臼內木杵搗散三錢薑三片水二瓊棗三枚煎

八分不時服

疳嗽第四

患眼防已丸治疳嗽

漢防已

牽牛子

馬兜鈴

甜葶藶

等分末棗肉丸如菜豆糯米飲下十九與溫肺散

間服

疳積第五

茅先生疳積候面黃身瘦肚臃脹髮立身熱肚中微痛因疳盛而傳治先勺氣散胃氣不和醒脾散一胃氣不和一慢脾風門治二日青金丹取門積聚再用勺氣醒脾散補常服保童丸

王訣疳氣腹脹潮熱先調胃後取虛積次服疳藥五積疳候歌

小兒五積病還因乳女生生因傷腹肚以漸面

幼幼新書

卷三十六

七

虛盈多睡頭合地小便帶油清髮黃多滑瀉吐逆亂交橫

靈苑獨聖青金丸治疳積

川巴豆淨三兩

硫黃二兩不研

二味生絹袋盛懸釜

中不着底水煮三日夜水竭

旋添熱湯用巴豆去皮心獨活

柴胡

桔梗

乾薑炮

防風各一兩

青黛二兩

細末糊丸如菜豆服一二丸食傷虛腫橘皮湯霍亂吐瀉赤痢甘草湯白痢乾薑湯赤白痢甘草乾薑湯水瀉冷水小便不通燈心湯大便不通米飲

煩人血氣當歸酒元氣炒茴香酒腰痛茱萸湯疳積米飲氣疾橘皮湯氣塊癥瘕熱酒傷寒頭痛甘草湯並臨卧服藏府實熱意裁

張漢揭九子治疳氣腹脹如鼓及妳癖食癖

雜藟子炒兩黑牽牛炒一兩胡楸分一木香

蓬莪茂濕紙煨各半兩

細末糊丸如黍仙人骨湯下二十九

換骨丹

陳粟米合一陳皮 青皮 黑牽牛各半

幼幼新書

卷三十六

九

兩

巴豆分一

一處炒焦黃去巴豆入木香半兩為末糊丸黍大橘皮湯下十九

劉氏疳積瘦瘵項小肚大脚脛大行不得

青黛 燕莢 青礞石 雷丸

蘆會 史君子 黃連

等分末雄猪膽盛掛當風處乾焙研猪膽丸小豆

大或粟米大量服驚風薄苛金銀湯下十九

莊氏參苓散治因積成疳致脾胃虛弱不食

莊氏參苓散治因積成疳致脾胃虛弱不食

人參	茯苓	芍藥	細末一錢水小瓊煎五分溫服	香甲丸治疳積潮熱盜汗羸瘦煩渴手足心熱服之	輕骨長肌	木香 <small>各一</small>	柴胡	末獷猪膽丸菜豆大服廿九日中臨卧米飲下久發潮熱多汗	幼幼新書 卷二十六 九	王氏蘆會丸治疳積長肌	蘆會	青皮 <small>各一</small>	同炒赤去巴豆末蒸猪膽汁丸菜豆大飲量與	吳氏治疳積有虫常服	蘆會 <small>錢半</small>	除蘆會磨入巴豆二七粒炒焦黃去巴豆羅猪膽糊丸如麻子飲飲下一二十九食後臨卧服
甘草炙	黃耆 <small>各半</small>	青皮 <small>去白</small>				史君子	黃連 <small>各半</small>				胡黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>
芎藭	黃連 <small>各半</small>	黃連 <small>各半</small>				史君子	黃連 <small>各半</small>				胡黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>
黃連 <small>各半</small>	黃連 <small>各半</small>	黃連 <small>各半</small>				史君子	黃連 <small>各半</small>				胡黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>	黃連 <small>各一</small>

趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲
趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲
趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲
趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲	趙氏青蒿丸療久積疳氣日羸面黃髮穗食土咬甲

疳瀉第六

茅先生兒疳瀉候渾身瘦弱肚臃多渴通下讓糞凡一處種糞即移三五處糞內有虫因疳積盛食得物不成腹肚青金丹取疳積疳積取勻氣散和胃氣不香連散乳香散疳瀉門切調理常服保童丸疳門切石壁經疳瀉讓瀉歌

唇白毛乾額上青定因有積又多驚吐高癥瘕同雞子瀉下如糟黃色形莫將熱藥令先止瀉任腸中更作聲渴發急者身又熱虛風腫起更

幼幼新書

卷三十六

七

驚人

不慎飲食或食交乳致然腹中有塊如雞子或如二三指瀉糞如糟髮硬面無光或青黃目多反視當分水穀須溫和藥若藥熱腫死

博濟胡黃連丸治疳疾瀉痢

胡黃連

丁香

蜜陀僧

各半

肉豆蔻個

檳榔

紅雪

呵子

生一枚

細研入麝一分萊豆末少許水丸如麻子三歲下

一丸上五丸腦疳臍痒及赤爛黃連湯脾虛羸瘦

瀉痢四肢虛腫青州棗湯肝疳眼澀生瘡甘草湯骨疳冷地卧愛食土紫蘇茶調常服米飲肺疳上氣喘急橘皮湯筋疳瀉血益湯疳虫及瀉無定生薑湯

錢乙如聖丸治冷熱疳瀉

胡黃連

白蕪荑

川黃連

各二

史君子

兩一

麝

乾蝦蟇

五枚

酒

末膏丸麻子大人參湯下二三歲五七九無時

寶鑑赤虎丸治諸般疳瀉

幼幼新書

卷三十六

三

朱砂

胡黃連

宣連

蘆會

膩粉

肉苳蔻

個炮

巴豆

廿一粒

炒黑

硫黃錢

麝

少許

研粟米糊丸如蘿蔔子甘草湯化一歲一丸朱氏

無絲黃

良方治疳瀉不止日夜無度漸羸吳婆散

桃根白皮

黃蘗

黃連

各一

厚朴

薑

木香

檳榔

丁香

各一

沒石子

錢

棟根白皮

燕荑

和

末服一字三歲上半錢六歲一錢紫蘇木瓜米飲
調下乳食前日三疳瀉無不驗藥性小溫暴熱瀉
或非宜

聚寶治疳瀉及夏末秋初瀉痢香連丸

木香分一 川黃連兩半 沒石子個一 肉豆蔻個二

呵皮個三 胡椒粒四

吳茱萸一合 慢火炒紫色去茱萸為末酒糊丸如

麻子稈草湯下十九空心食前日三四

劉氏治疳腹脹多渴頻瀉腥白膿血或痢四肢疼痛

幼幼新書 卷三十六 十三

黃瘦疳虫咬心常吐清水不食百日至十歲皆宜夏

月疳瀉下惡物立止麝香丸

大活蟾一個巴豆十粒勿損八蟾口養罐中候自

死破取巴豆洗灌蟾裏外去腸胃切數段研巴豆

如麪同水二升蟾入銀鍋文武火煎爛去骨入無

灰酒煎

夜明砂兩一 宣連 大蘇莢各二兩上藥同

藥 朱砂分一 雀鼠紙上 蘆會青

麝各半

末入前膏丸菜豆大白乾一歲兒初服一九五七
漸加至兩丸更量

胡黃連飲治疳熱瀉無時飲食進退面黃髓黑日漸
瘦痺

胡黃連 黃藥子 人參 甘草炙

白朮炒 秦朮 柴胡

等分咬咀服二錢水一瓊嫩桃柳枝各七寸烏梅

少許煎八分澄清作兩分食後卧時各一服小便

赤驗便清止藥便成肌進食大抵十五歲兒宜此

幼幼新書 卷三十六 十四

王氏治疳疔大并瀉無比丸

青橘皮一個巴豆七粒麻皮縛麩炒煙出去巴豆

羅橘皮末醋糊丸如菜豆米砂衣陳米飲下五七

丸數日效

吉氏治疳瀉不食腹脹蘆會丸

丁香 肉豆蔻皮去 木香各半

麪最慢火煨熟入蘆會一兩史君子半兩末稀糊

丸如黍米飲下一二十九

疳痢第七

聖惠兒乳哺不節生冷過度傷于脾胃致成疳府不調
冷熱相搏大腸虛弱水穀不化變為下痢其候面色
痿黃肌體羸瘦盜汗壯熱皮毛乾枯嗜食酸鹹心腹
虛脹泄痢惡物日夜無度名疳痢

宮氣疳痢羸瘦毛焦歌

孩兒襍病變成疳不問強羸女與男恰似脊傍
多變動還如瘦疾困就就

項執毛焦臍口疳皮膚枯槁四肢癱青黃赤白
時時痢泔淀稠膿涕一般眼澀面黃鼻孔赤穀

幼幼新書

卷二十六

十五

道開張不欲看唇焦嘔逆不哺乳壯熱增寒卧
不安用藥必須青黛散孩兒百病服來者

楊大鄴歌

疳痢形容瘦似柴或然如乳吐虫蛔沉沉無力
多饒睡叫哭連聲目不開丁香碎與生犀末調

治三焦恐可回

宮氣解疳熱疳痢殺虫水研青黛服
外臺療疳痢晚夜無度

檮根濃汁粟米泔各一雞子殼許灌亦可作丸

又煮益母草食心鑑葉煮粥食治疳痢痔疾
劉氏三歲兒口瘡壯熱及手足心煩大便極臭即疳
痢

黃連

黃蘗

地榆炙

白頭翁

高良薑

酸石榴皮

薑

當歸各二

白朮分

龍骨分

切水二升煮八合量服口瘡蘆會末赤地麥搗末

塗下部蚘蛇膽黃連麝搗傅兼以竹筒吹亦主疥

瘡

幼幼新書

卷二十六

十六

圖經地榆煮汁如飴服

孟詵檮白皮一握倉米五十粒葱白一握炙甘草二

寸豉二合水一升煮半升頓服意快藥亦可

又席膽水服

經驗治疳痢肚脹

雞子破眼內巴豆一粒去皮膩粉一錢五十重紙

裹飯飯上蒸三度研入少麝添麵糊丸如米食後

臨卧温湯下二三丸

聖惠治疳痢腹大口乾四肢羸瘦下痢不止神聖散

乾蝦蟆端午收去 獨頭蒜一顆 川楝兩半

入蝦蟆腹大麥麩裹燒焦黃

麝錢一 龍腦錢半 蘆會分一 朱砂

雄黃錢各二

與前藥同研散粥飲調半錢日四量服

龍骨丸治疳痢日夜無度羸瘦

龍骨 橡實各半 雄黃 麝

牛黃 白土錢各一 朱砂 訶皮煨

青黛各一分 蝸牛炒微黃

羅麩糊丸如菜豆粥飲下五九日三

黃連散治疳痢不止

黃連炒 白茯苓 阿膠炒 黃蘗炙

人參 訶皮煨 桃白皮炙各半兩 丁香分一

沒石子煨二

羅米飲調半錢量服

治疳痢不食瘦弱肉豆蔻丸

肉豆蔻一枚 木香兩半 人參 訶皮煨

朱砂 麝各一分

羅軟飯和丸如麻子粥飲化三九日三四量服

丁香丸治疳痢不止漸困

丁香 黃連 橡子 白礬各一分

巴豆七枚醋漿水

羅麩糊和丸如黍冷粥飲下三九量加日三

治疳痢羸瘦麝香丸

麝分一 蝦蟆灰一 鐵粉 黃連

鼈甲醋炙淨

羅軟飯丸如麻子溫水下五九日三更量

肉豆蔻丸治疳痢不止

肉豆蔻一枚 胡黃連分一 巴豆十枚油煮

砒分半 末糯米飯丸如黍冷水下一丸忌熱物

治疳痢漸瘦抵聖丸

巴豆霜五枚 硫黃錢一 粉霜錢半 朱砂

沒石子各一分

研糯米餅丸如黃米冷水下二九量服一無霜石

子有蟾頭灰名朱砂丸

養生治脾受濕泄痢不止米穀不化亦治疝氣下痢
苦散一名戊巳丸

吳茱萸 黃連 白芍藥俱到如豆各五兩同炒赤

末煮糊丸如梧子空腹膿米飲下廿九日三未知

加或散二錢水一盞煎七分和滓溫服忌生冷油膩

王氏史君子丸治疝痢

沒石子去殼 史君子麩粟煨各五個 木香

紅芍藥 宣連煨 蘆會 麒麟竭

幼幼新書 卷三十六 十九

麝各一分 乾蟾炙 長檳榔各一個 肉豆蔻二個

散研一二百粟米爛飯丸如麻子不時米飲下廿

九夏秋常服

丁時幾水銀丸疝痢赤白腹撮痛時虛汗

水銀卑子大 墨 乳香各少許 百草霜各一分

青黛錢半 黃明膠炒 五靈脂 輕粉各半錢

巴豆十一粒醋一盞煮乾 末澹水丸如黍乾柿湯吞三丸

治五疳瀉痢蚘蚊丸

蚘蚊一個酒半升炙盡 蕪荑 雀虱

川棟子 史君子 黃連各一兩 夜明砂

朱砂 檳榔 青黛各半兩

猪膽汁丸湯吞五丸

聖惠黃帝療疝痢脫肛體瘦渴飲炙尾翠骨上二寸

骨陷中三壯炷如麥岐伯云蕪三伏內有桃柳水浴

孩子午正時當日灸用青帛子拭見疝虫隨汗出此

法神效

疝痢久不差第八

幼幼新書 卷三十六 二十

聖惠兒藏府宿挾疝氣或乳食不節冷熱相爭腸胃

既虛遂令下痢連滯日月名久疝痢

水鑑聖九子治疝痢經年不定時似白膠

寒水石 白礬枯 水蓼 雄黃

光明砂 黃丹熬 砒 雞子皮灰

各二分 大黃生四分聖惠妙半兩

末蟾酥丸如麻子一月兒二丸更量石榴皮湯薑

湯任下聖惠蟾酥半分麵糊丸如粟新汲水下三丸

千金治疳痢 崔氏晋代地多五疳人五歲見脊骨下膿血手足煩疼無力夜卧煩躁面失色有淨氣或下血死

雄黃 青箱子各二兩 苦參各三兩 礬

雌黃 鐵衣 藜蘆各一兩 麝分二

篩以酸棗許竹管內吹大孔中日一三服效兒大

豆許

聖惠青黛散治疳痢久不差日羸

青黛兩一 麝 雄黃 朱砂

蚰蛇膽 黃蘗蜜炙 苦參 桂心

幼幼新書 卷二十六 廿

白礬枯 杏仁麩炒 附炮裂 葶苈子淘

芽出炒黃 乾薑炮裂 細辛 藜蘆各一

散并華水調半錢日三一歲一字三歲半錢意裁

口瘡鼻痒酥如菜豆大安鼻中頭疔下部赤爛散

傳

黃連散治疳痢久不差肌瘦面黃髮焦啼叫

胡黃連 白礬枯 白龍骨各半兩 胡粉炒一分

研一歲兒米飲調一字二歲半錢量兒量病服

治疳痢不差龍骨散

龍骨 赤石脂各半兩 訶皮煨 蜜陀僧

醋石榴皮炒 麝各一分

散粥飲調半錢日三四意裁

龍膽丸治疳痢久不差體熱心煩不食

龍膽 麝各一分 苦楝根皮 臭樗根皮

史君子 胡黃連各半兩 蟾酥半錢

羅麩糊丸如菜豆一歲一丸粥飲下意加

治久疳痢不差腹脅脹滿麝香丸

麝各一分 巴豆半兩油煎

幼幼新書 卷二十六 廿三

研燒餅丸如黍米粥飲下一丸空心午後服

蕪荑丸

羊子肝一枚切片蕪荑末半兩揅肝內線纏米泔

煮熟糯米飯丸如麻子粥飲下五丸早晚各一眼

量與

疳痢腹痛第九

聖惠痢多而腸胃虛弱冷氣與葳氣相搏真邪交擊

令腹疔痛

白朮散治疳痢腹脹疔痛日夜三二十行

白木炒一兩 當歸 地榆炒 木香

赤芍藥 甘草炙半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫量服

治疳痢腹痛不止胡黃連丸

胡黃連兩半 沒藥 木香各一分

羅末糯米飯丸如菜豆粥飲下五九日三四意裁

治疳痢腹脹疔痛木香丸

木香 肉豆蔻去殼 附子生 青橘皮去白

焙各半兩 朱砂 人參各一分 巴豆淨

幼幼新書 卷三十六 疳

蟾酥各半

末醋糊丸如粟粥飲下二九日二意加

疳濕第十疳痢濕

巢氏疳濕病多因久痢脾胃虛弱腸胃間虫動侵蝕

五藏使人心煩懊悶上蝕者口鼻齒斷生瘡下蝕者

肛門傷爛皆難治或因久痢或因藏熱嗜眠或好食

甘美並令虫動生病

兒乳食不節冷熱相乖傷藏府成疳若脾胃虛弱哺

乳不消大腸虛寒遂變泄痢久痢則腸胃虛為濕所

乘腹内虫動侵蝕下部名疳痢濕膿

肘後穀道濕膿杏仁熬黃搗稀塗

千金艾葉五升水一斗煮升半分三服

又煮地榆汁浴日二

除熱結腸丸斷兒熱下黃赤汁及魚腦雜血肝中瘡

爛坐蠶生虫

黃連 蘘皮 苦參 兔白

獨活 橘皮 芍藥 阿膠各半

藍汁蜜丸如小豆日服五九至十九冬無藍汁搗

幼幼新書 卷三十六 疳

治赤白下濃兒得之三日死此下部有虫

麝 礞石 巴豆 附子炮

真珠 雄黃

等分取桑條如箭幹長三寸綿纏頭二寸唾濡綿

展藥内穀道半日復易

治濕膿薑蜜湯

薑汁合五 蜜合三 黃連兩三

水二升煮黃連取一升去滓入薑蜜更煎取升二

合五歲兒平旦服四合日二

治虫蝕下部

胡粉雄黃等分末着穀道中

外臺下部虫蝕大腸赤爛

水銀一兩漿水煮嚙研安竹筒中吹下部

梅師治疳

蝦蟇灰醋和傅日三五

聖惠方

乾蝦蟇酥炙一枚木香

硫黃各半兩

麝一分

羅散三歲溫水調一字日再意裁

幼幼新書

卷二十六

廿五

又棟株根皮石榴株皮剉水大瓊煎六分量兒溫服

日三四

又青黛研麻油塗次貼日三四

治疳痢羸瘦下部濕蟻丁香散

丁香

胡粉炒各一分

桃白皮炙

黃蘗炙

黃連

白茯苓各半兩

羅粥飲調半錢早晚各一服量兒

治疳痢久不斷體羸昏不睡下部濕蟻食飲不下

蚺蛇膽大豆許煮木通汁研粥飲調早晚各一服

并塗五心下部

錢乙金華散治一切濕瘡癬疔

黃蘗

黃連各半兩

黃丹火飛一兩

輕粉錢一

麝字一

研溫水洗貼

蛔疳第十一

聖惠蛔疳者兒多食甜物油膩生冷在腸胃不消化

成虫其候合面卧覺氣急顏色痿黃肌體羸瘦啼哭

聲高又似心痛發歇無時每月初二三四日其虫盛

幼幼新書

卷二十六

廿六

人不識呼為鬼祟不早治虫蝕藏府必致危篤

玉訣歌

哭惡痰青蛔咬心涎生積冷痛難任每餐甜物

并時果致得虫生病轉深

先下積取蛔疳次溫脾胃

聖惠狼牙草散治蛔疳乾瘦髮立或痢

狼牙草

射干

鼠尾草各一分

史君子

醋石榴皮

貫眾根

槲皮

釣藤

龍膽

粟刺

棠梨根各半兩

故綿灰

髮灰各一兩

羅五六歲兒服一錢水小瓊煎五分早晚各一温

眼意裁

蚘蛇膽丸治蛔疳壯熱眼赤或溼常揉及髮黃禿視物不明手脚心熱時出蛔虫下痢或青黃赤白身體口臭下部生瘡虫蝕齒落項生無辜肌體羸瘦兄弟姊妹相傳至死

蚘蛇膽

丁香

黃連

苦參

青箱子

犀角

木香

朱砂

幼幼新書

卷三十六

七

碓黃

青黛

硫黃

麝

牛黃

臘脂

龍膽

白礬灰

髮灰

緋絹灰

乾蝦蟇灰各一分

羅末蜜丸如麻子粥飲下三丸量服水化二丸吹

鼻中傳瘡處

青黛丸治蛔疳諸疾

青黛

朱砂

蘆會

胡黃連

雀虱各一分

末猪膽汗丸如菘豆空心湯下三丸有虫下

治蛔疳虫出熊膽丸

熊膽一分

狗脊去毛

白燕羹

乾蟾頭焦

黃丹炒

蛇蛻灰各半兩

羅棗肉丸如菘豆粥飲化三丸更以藿香湯浴兒

青熟衣蓋虫出意減

史君子丸治疳蛔出虫

史君子

碓黃

熊膽各一分

牛黃

蟾酥

麝各一分

研軟飯丸如麻子疳極者桃柳湯浴粥飲調三九

幼幼新書

卷三十六

六

又

雀虱

胡黃連

檳榔

熊膽

乾蟾酥灰黃各半兩

散空心湯調一字服後殺虫如馬尾差三歲上半

錢

殊聖治疳蛔却蛔散

苦棘皮有子者良陰乾赤色者殺人

雀虱

蜜陀僧各二

白檳榔一個炮乘熱研

細末米飲下一錢三服虫出

漢東王先生化虫丸治蛔虫攪刺腹痛常服化虫

蕪荑

川霍虱各一錢 檳榔二錢

未獷猪膽丸如大麻子三歲五九量加陳米飲吞

日三

丁左藏治疳蛔咬心乾漆散

狗脊

乾漆

大麻仁

霍虱

等分細末炒香一錢精羊肉湯調

吳氏蛔疳七寶丹

青皮去瓢

乾薑炒

木香麩炒

巴豆淨肉

幼幼新書

卷三十六

十九

一梳煮乾
水洗去油

肉豆蔻生

檳榔

肉桂去粗皮不

見火各
一兩

碾砂半兩湯澄慢火熬如
煎鹽紙蓋收飛者

細末麩糊丸如梧子朱砂衣空心服一二三粒飲

消食食後服酒食傷諸般積胃膈不快或腹痛薑

湯中酒葱薑湯心痛炒薑湯婦人血氣當歸酒瀉

肚陳米飲赤痢甘草湯白痢乾薑湯脾泄瀉煨薑

一塊細嚼湯咽心腹脹滿渾身倦怠溫酒轉筋霍

亂紫蘇藿香湯中毒藥五倍子雄黃湯大小便不

通桐木根湯吐逆檀香湯膈上食毒虛痰薑蜜酒

頭風臘茶清兒急慢驚風金銀薄苛湯疳蛔石榴湯

疳瘡第十二

聖惠瘡生面鼻不痒不痛汁流即成瘡亦生身上兒

多患之亦是風濕搏血氣名疳瘡

千金猪脂和胡粉傅嚼麻子傅日六七度聖惠水研

麻仁汁飲虫出

又方亦治疳羊膽二枚和醬汁灌下部猪脂亦佳

聖惠治面鼻身生疳瘡及近口生濕瘡并赤白瘡等

幼幼新書

卷三十六

三十一

及疳氣入腹漸瘦

白狗糞

蝦蟇

地龍

蝸牛殼

蘭香根

人糞並灰半兩

熊膽

蘆會

麝各一

細研口瘡鹽漿水淨口綿裹藥含鼻瘡次鼻中鼻

外去痂傅疳氣入腹空心新汲水調半錢服

鴿糞散治口中及各處疳瘡

鴿糞

人糞灰

白礬灰

青黛

麝各一

研日三傳

麝香散治面頭生疔口中臭氣

麝

蚰蛇膽

瓜州黃礬

蘆會各一

研洗淨傅口內惡氣貼藥日三

熊膽膏治身口面疔瘡并諸疔疾

熊膽

蚰蛇膽

蘆會

牛黃

龍腦各一

麝半

研并華水三合瓷器盛重湯煮數添水可半日投

糯米三五粒煮爛篦子數攪勿令四畔乾取二豆

幼幼新書

卷二十六

廿一

許漸吹鼻中及塗口瘡頻使藥兩日即停一日兒

髮青止

又狗糞中米燒馬銜虫曬乾並傳

錢乙白粉散

烏賊魚骨七三

白及七二

輕粉各一

細末先口含漿洗不時傳

張渙諸疔羸瘦毛髮焦黃口鼻生瘡四珍丹

乾大礬

一枚去四足內胡黃連半兩在蘆會兩

麝各一

研白麵糊九烈米大服五七粒粥飲下量加減

治疔瘡不差熊膽膏

熊膽

蚰蛇膽

蘆會各半

牛黃各一

龍腦各一

瓜州黃礬各一

研并華水三合銀器盛重湯煮膏塗

莊氏燒錫灰傳

趙氏治疔瘡奪命散

五靈脂

葛菘菜乾陰

地黃花

黃丹炒

白礬飛

染臘脂等

麝少

幼幼新書

卷二十六

廿一

末看瘡大小漿水洗貼

趙舍人治疔瘡年深見骨或乾或濕至聖散

白蜆殼泥中多年色白圓小

蜜陀僧同蜆殼各一兩

無名異兩半

細末入麝半錢研鹽湯溫漿水洗搽藥膏藥蓋不

五七次即生肥肉生六分止不然瘡癩高大如夫

夫婦人有年深不較瘡亦治

鄭愈治疔甜瘡

蚌粉煨

黃蘗

黃丹各二

膩粉半

巴豆三粒 燒

末麻油調塗

疔腫第十三

茅先生疔腫塌氣丸氣腫水腫不用

川巴豆殼 醋熬

青橘皮白去 蘿蔔子

等分末醋糊丸如菜豆中庸赤小豆湯下五七丸

吉氏治疔氣腫滿

陳米半兩 兩巴豆 粒炒焦

木香錢二 陳橘皮

樟柳根一分 焙各 蘿蔔子錢半

幼幼新書

卷三十六

廿三

末半錢赤小豆湯溫調下

疔後天柱倒第十四他病天 柱倒附

漢東王先生治久患疔疾體虛久不進食日久病退

只天柱倒醫不識謂五軟須金靈散生筋散

形證論他病天柱骨倒歌

天柱纜倒非心脾吐瀉失調至疔羸大患傷寒

無汗脉風髓却被傷 寒無浮脉 定應妙藥療他遲無此卒

然生此患又無不辯四肢肥身軟難堪頭似石

面紅唇赤臉如緋此病多因傷腎熱風髓 胎熱 後來

因伏作 熱病又 相隨肝受熱風天柱倒但將涼藥

與維持貼項性熱筋方緩立見溫和請莫疑吐

瀉項軟唯調氣傷寒柱倒不須醫

石壁經云或傷寒或吐或瀉乘虛邪毒透入肝脉熱

邪所侵致筋軟長或手足軟或項頸軟須涼隔若吐

瀉先調胃氣貼項并服涼肝膽藥勿太熱亦恐過冷

漢東王先生金靈散

直白殭蚕去絲炒末薄荷酒調服一錢日三更須

生筋散貼

幼幼新書

卷三十六

廿四

生筋散

木單子個三 蓖麻子個三十

肉研一錢抱指項上津調貼

形證論貼項藥

川烏頭 白芷 地龍 五靈胎

赤小豆

等分末薑汁酒調貼項上更服竹茹散

竹茹散

菊花錢三 黃芩 人參錢各一 大黃兩半

甘草錢二

末竹葉湯下

主訣貼項藥

草烏頭赤小豆等分末薑汁調攤帛上貼經宿項

立起

吉氏狼毒丸治膽熱肝風天柱倒折更藥貼項

狼毒酒浸

白附子

大附子尖

天麻

防風

羌活各一

朱砂

地龍各一

麝半

幼幼新書

卷三十六

廿五

細末法酒煮糊丸如黍黑豆薄苛湯入酒一渣吞

七九十九

疝氣灌入陰第十五

漢東王先生治疝氣灌入陰黃亮色烏金膏

通草

黃皮

大黃

並燒存性末一錢獾猪膽調成膏塗未退煎蛇床

子湯洗後再塗

幼幼新書卷第二十六

幼幼新書卷第二十七

吐噎霍亂 凡十二門

後學古吳陳履端于始輯

爛溪周應愈公謹校

吐逆第一

巢氏兒啼不定氣息不調母遽乳之氣尚逆乳不下
停滯胃膈則胃滿氣急令嘔逆變吐又乳母將息取
冷冷入乳而壞不捏除之仍飲兒冷與胃逆則腹脹
痛氣息喘急亦令嘔吐又解換衣裳及浴露體不避
風冷客膚腠搏氣血則熱入胃亦腹脹痛而嘔逆吐

幼幼新書

卷二十七

方諸先刻

也唯冷乳非直嘔吐腸虛入大腸則為痢

漢東王先生兒吐乳有數般或風疾致吐勿止吐如
夾痰纒吐即風生若止之風無止處更入外風則潮
心閉胃管變驚風胃主四肢被痰涎閉即搐心主神
被外邪干即驚神不定故變驚風是止住吐手足搐
搦口眼翻張頭項強直名藥不療

兒吐如鼻青客風外傷肺鼻肺外應也夜煩躁肺氣
逆也身發熱肺主皮毛外邪傷故發熱也宜傷寒藥
後平胃氣

兒吐妳唇黑多笑唇脾外應被食傷故黑夾痰者脾能生涎故痰衝胃而吐

兒吐妳身熱妳成片胃有熱積久則生風必四肢發瘡多渴面黃

兒吐妳不化夾清水胃冷必面青唇白宜煖胃

兒吐妳早晚發熱是驚吐而不睡宜調驚

乳食不化腹急氣逆瀕塌氣丸二三服下却胃膈進

觀音散二三服和胃氣不但生胃氣藥皆可意與兒喫

冷乳氣逆吐疼或變瀉前藥調理不退用羌活膏

幼幼新書 卷二十七

錢乙吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也悉宜下

患眼兒無故吐乳因乳母冷熱不調啼中餵乳致胃

膈逆舊乳不化故多吐妳辦或帶酸氣謂妳積急用

牛黃丸風熱仍服勻氣平胃湯藥若胃脾虛滑喫食

多吐只服平胃丸嘔逆夾蘆會丸未若正二月間以

鮓湯丸利驚急

小方論熱甚而吐更服熱藥脾胃熱而胃口閉故吐水穀不通凡湯藥乳食只伏在胃管胃膈不上不下

為結腸翻吐歌曰

得患初因是熱傷熱極吐逆也尋常醫人不會

看形候又服熱藥怎生當至今胃閉并脹結莫

服冷藥不須涼若還更取兒當死先須開胃後

通腸

寶鑑歌

風冷吹雙乳乳壞氣瀕凝乳兒成嘔吐氣喘腹

膨脹解脫當風下洗浴向簷前喘中還餵乳氣

逆在胃停皆成嘔逆病醫者貴調停

幼幼新書 卷二十七

石鐸歌

吐乳從來胃氣實妳滿胃中生吐逆吐多遍身

有風生驚邪本是從斯得吐定無過腦後溫吐

出妳來無變色先與定氣後除驚此是醫良不

費力

兒胃氣實乳女或氣不定或交妳或怒未息或行

房了便乳使劃時便吐妳不變色無害若色青黃

或如水或中有虫瀕涼膈以溫物煖腦後避惡風

吹風府既生其氣又涼上焦即止

形證論吐乳青色者驚黃色者風熱有涎者驚如乳
鮮者傷乳成塊者胃冷

本草蘆節中虫如小二枚煮汁飲

千金治吐乳補虛止渴牛乳入薑葱白煎量服

廣利刪木皮水煎服生廣南如桑株

聖惠丁香散治嘔吐不定

丁香 人參 白茯苓 木香

葛根 甘草炙 枇杷葉去毛炙

麝半

幼幼新書 卷二十七

細羅不時薑湯調半錢意裁

丁香散治嘔吐心煩不納乳 茅根 麥門冬

丁香 人參

甘草炙 陳皮去白焙

粗羅一錢水小盞煎五分稍熱服量頻與

人參散 白木 乾薑炮 半夏炮七

人參 白木

桑白皮 陳皮去白焙 粗羅一錢水小盞薑棗煎五分服張漢無乾薑

治兒吐乳乳母服

人參兩 薑焙 陳皮去白焙

篩三錢水中盞煎六分溫二服了乳兒

治吐乳黃色驢乳喫大腸稍利毒氣散

又搗韭根汁灌入口差

醫局療傳尸骨蒸痿躄肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂

吐痢時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘵血月閉瘵癰丁腫

驚癩鬼忤中人兒吐乳大人狐狸等蘇合香丸

蘇合香油入安息香膏 薰陸香 龍腦各一

朱砂飛 白木 丁香 青木香

白檀香 沉香 烏犀 藜蘆

安息香未澄去沙無灰 香附 訶梨勒皮

麝各二

末安息香膏煉蜜和旋丸如桐子并華水溫冷任

意化服四九老小一九溫酒亦得並空心服蠟紙

裹一九如彈緋絹袋盛當心帶一切邪神不敢近

消積滯生冷留飲宿食止痰逆惡心霍亂嘔吐治心

腹脹悶脅肋刺痛胃膈痞滿噎塞不通常服順脾胃

進飲食兒吐逆不定小丁香丸

丁香三兩 肉豆蔻卅個 五靈脂十二兩 木香兩半

巴豆霜二百粒

細末麩糊丸如黍服五七丸溫薑湯下陳皮湯亦

得食後霍亂吐逆桃葉湯冷下兒吐逆三歲三九

量加生薑桃葉湯下

殊聖方

乾薑炭火燒及八分研冷蜜湯調一字至半錢

嬰孺治吐下不止王子湯

幼幼新書

卷二十七

六

赤石脂九銖

黃連

甘草炙

乾薑各六銖

黃芩二銖

膠大指

黃蠟大彈

水三升煮一升內蠟膠洋為三服意裁

漢東王先生羌活膏治吐逆不止

羌活

獨活

人參

白茯苓

防風者蚕頭

肉桂不見火

全蝎炒

水銀各一兩

硫黃同水銀研星盡三錢

末蜜為膏旋與嬰兒黑豆大二三歲龍眼核大量

加薄苛湯化

張漢香參湯消寒痰治嘔吐

藿香葉 人參 舶上丁香皮白茯苓

丁香各一兩

青皮去白

木香

甘草各半兩

羅末一錢水小盞薑二片煎五分溫服

溫膈湯勻氣治嘔吐

丁香

單豆蔻皮去

人參各半兩

青皮

檳榔

甘草各一分

羅末半錢至一錢薑汁少許溫湯調下

香朴散調冷熱治嘔吐

幼幼新書

卷二十七

七

丁香

麥門冬各半兩

人參

細末一錢水小盞薑二片棗一枚煎五分溫服

香葛湯治嘔吐後渴甚津液少

藿香

白茯苓

甘草各半兩

丁香

乾葛

人參各一兩

羅麻一錢研服半錢至一錢薑湯調意裁

寶鑑治只吐不瀉腹中疼痛玉露散

寒水石燒薑水調半錢

衛生療吐逆革金散

爛大梔子三枚草烏頭一個

小瓶盛泥固燒煙盡研細薑汁調一字

寶童治翻胃吐逆腹內虛鳴

天台烏藥醋炙或炒

半夏各半

白薑一分

羊屎十枚內取

文武火炒末鎔蠟丸如麻子紅酒服五七丸

劉氏異功散治胃氣不和藏府泄瀉不思乳食或嘔
妳嘔逆

藿香

白朮炒

人參

白茯苓

幼幼新書

卷二十七

陳皮

木香

肉苳蔻麩裹

甘草

等分服小半錢紫蘇餅飲調

莊氏鎮驚化痰祛風止嗽定逆除一切驚積蝎稍丸

蝎稍炒

半夏洗七次

丁香棟炒

朱砂

白附子炮裂各

末薑汁麩糊丸菜菔大服十九至十五丸不時薑

湯下

治吐妳

蓮子心七個

丁香三個

人參

末綿裹乳汁浸令兒吮

孔氏治兒吐胃虛生風胃氣欲脫醒脾散

人參

天南星

末旋抄服二味各半錢冬瓜子三七粒水盞半煎

兩茶脚許通口服不時胃氣生為度大人倍煎

王氏治久吐玉壺丸

半夏

白麩各一分

大天南星一個天麻兩

末薑汁化柳膠丸黃米大漿水煮四沸服十九十

五丸如無柳枝湯

幼幼新書

卷二十七

九

吉氏豆蔻散治吐妳

肉豆蔻麩裹

草菓子炮各一枚宿砂

甘草炙

肉桂不見火錢陳皮去白半錢

末半錢陳米飲調下

李剛中

川當歸洗

甘草一分

桂心不見火粗皮枳殼炒

北五味子各半

細末一錢水七分煎半錢溫服

丁時發肉豆蔻散治脾胃不和寒熱腹痛嘔吐不食

白豆蔻 肉豆蔻 甘草 芩

陳皮白去 枳椇葉去毛各 黃耆炙

乾木瓜 人參各半

末一錢水五分薑棗煎三分服

鄭愈治吐逆藿香散次加人參陳皮枳殼去藿香麴

藿香 赤麴各二錢 半夏薑製

末半錢南木香湯或木瓜湯下三服

聖惠灸中庭一穴一柱在顛中下一寸陷中如麥炷

寶鑑灸上管中管各三壯

幼幼新書 卷二十七 十一

吐乳第二

巢氏兒哺乳冷熱不調則停膈更新乳哺前後相

觸氣不宣流故吐乳脈輕浮者無咎

本草乳乳飽後嘔出與吐逆不同

茅先生兒吐乳候吃妳不穩從口角自流出身微熱

口鼻微冷面目青黃眼慢因乳母房室溼洩兒叫便

乳陰陽不順胃膈不快乳停胃不消而胃冷所致先

以睡驚沉香飲子霍亂夾丁香散與服吐利夾活脾

散調理愈一胃氣不和恐脾虛受熱狂躁不睡眼

偏微喘傳慢脾風不治

石壁歌

顛陷時時動不停吐中微覺乳生腥眼渾青碧

生白膜汗出津津脚似冰氣細元因傷胃冷氣

粗即是欲生驚是風從早宜醫療暖胃和脾氣

乃平

寒熱相勝使然氣急是胃實當涼則愈若顛門陷

下氣細當生胃氣若渾身熱甚目中白膜甚者氣

出喘粗不急治必作癩癧

幼幼新書 卷二十七 十一

鳳髓氣散宜地黃散霍亂吐氣粗宜葱湯丸取驚積

形證論此驚妳衝胃氣或交妳衝脾或氣妳或病妳

致吐速聞腥氣與蚘蚘丸一切氣細脈沉與調胃散

積熱

肘後治嘔吐下

甘草炙 人參 當歸 乾薑各一

末水一升煮五合分服日三內麝半分佳

嬰孺當歸湯治吐乳

當歸 黃芩 甘草 芩

黃連各一 細辛 乾薑各二

切水二升煮八合溫服半合日三

寶鑑治嘔乳玉真散

白朮兩半 半夏七 枳半 去

細末半字水一呷調下一字

噦逆第三

巢氏兒哺乳冷冷氣入胃與胃氣逆故噦

千金翼胃中虛冷不能食者飲水即噦

千金治兒噦

幼幼新書 卷三十七 十一

薑汁 牛乳

各五合煎五合分二服

聖惠治噦不止丁香散

丁香 藿香 白茅根各一 人參兩半

花桑葉

羅散三四歲服一錢水小盞薑少許煎五分不時

熱服量裁

人參散治噦逆不止心神煩亂

人參 白朮 白茯苓各半 甘草炙

藿香各一

粗羅一錢水小盞煎五分不時稍熱服量裁兼乳

女服訖即乳兒

麥門冬散治多噦心胃煩悶

麥門冬淨焙 甘草炙 人參 陳皮去白

厚朴薑炙 各

粗羅三四歲服一錢水小盞煎四分稍熱頓服更

量

霍亂吐利第四

幼幼新書 卷三十七 十一

巢氏霍亂者陰陽清濁二氣相干氣亂腸胃間為霍

亂兒腸胃嫩弱因解脫逢風冷乳哺不消而變吐利

或乳女觸冒風冷食生冷物冷氣入乳令乳變敗兒

飲之亦成霍亂吐利挾風而挾實者則身熱頭痛體

疼而復吐利也兒霍亂須暫斷乳藥與乳女服令血

氣調遣乳汁溫和若不止血氣變乳即發驚癇

千金翼嘔吐而痢為霍亂

漢東王先生嬰兒霍亂吐瀉往往變作慢脾慢驚宜

竹瀝膏間惺惺散並痢 調胃氣藥并沉香散

揚大鄴將息小兒之道擇乳母精神爽健精神詳慢
 智慧深遠身無疾病脂肉肥潤溫厚淳善能調理乳
 食何疾更生衆疾易愈緣不慎諸味如意恣養孩兒
 或變蒸或寒寒哺乳或蒸熱飼兒或醉後嗔怒或悲
 啼不常驚亂神氣乳食失常即吐瀉可疑
 惠眼忽然吐瀉為霍亂若狂躁夜不睡喘促死
 玉訣霍亂有兩證若胃冷霍亂身無大熱只微溫面
 青黃宜銀白散調氣若腹痛多啼口吐清水面色不
 定乾噦不常宜蘆會丸殺虫霍亂後調氣歌曰
 初初新書 卷三十七 十四
 霍亂皆因胃氣傷冷熱攻脾氣受殃或積或虫
 寒與熱胃虛乾嘔不尋常
 石群經歌
 先以青黃面色看定因風熱在脾間髮如直立
 人多怕開眼無休定有涎胃逆更看風熱搖常
 疑唇白口多乾舌若有瘡為熱極難過二七入
 黃泉
 青白滿面者冷痰在胃間主吐瀉若黃赤胃有熱
 積亦主霍亂此胃虛實看候調治失治則口乾燥

煩渴若搐搦逆候口中瘡如雞子白滿口者不治
 千金治霍亂吐利
 人參兩一 厚朴製 甘草炙各 白朮炙十
 吹咀水升二合煮半升二月兒服一合更量乳母
 忌生冷油膩一加乾薑一分或生薑三分
 聖惠半夏散治霍亂後吐瀉不止煩悶
 半夏湯洗 黃連 乾薑炮 陳皮焙去
 人參七次 雷歸炒各 黃芩 甘草炙各
 粗羅服一錢水小盞煎五分不時量服
 初初新書 卷三十七 十五
 治霍亂吐瀉不定丁香散
 丁香 木香 甘草炙 葛根
 枇杷葉拭毛炙 藿香 人參
 桑黃各半
 細羅不時磨香湯調半錢量服
 治霍亂吐瀉不止食飲不下肉豆蔻散
 肉豆蔻一枚 丁香 枇杷葉去毛 黃耆各半
 桂心 人參 白茯苓 甘草炙各
 陳皮去白焙

切甜不醋漿水升半煎五合不服如渴取曲蘗糞
爛龍骨一兩煎澄清喫差

療霍亂不吐不利肚脹妨滿上下不通

甘草煨四 當歸仁 石鹽分三

切漿水升半煎六合半牛黃麝各半錢研蜜半匙

和灌即通乳母喫漿水粥忌麪肉等

療乾霍亂渴熱壯熱眼色慢四大困悶

烏豆二升薑一兩水三升煎烏豆皮欲爛即濾汁

二合和少許蜜喫即變吐人行六七里又喫大小

並宜

療熱霍亂諸藥不差

蘆葉二兩糯米三合水三升先煮取一升入蜜少

許和服桑葉薑白米為飲亦效

聖惠麥門冬散治霍亂不下乳

麥門冬兩一 白茯苓 人參 陳皮去白

乾木瓜各一 厚朴薑炙 茅香各半

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時溫服

嬰孺半夏湯治心結堅實飲不下嘔逆欲死并霍亂

後吐下不止短氣煩滿

半夏分四 黃苓 甘草各二 乾薑

陳皮 當歸 人參各三

水四升煮升半二百日兒服三合若腹痛加當歸

三分嘔逆甚加陳皮三分

玉訣銀白散取積虫後生胃氣使不霍亂

人參 茯苓 甘草炙 白朮炒

白扁豆皮去 等末末一錢紫蘇湯調一有藿香

幼幼新書 卷二十七 十九

惠眼香參膏治霍亂瀉住吐不佳

人參一指 丁香粒十四 藿香錢一 糯米粒七十

炒黃

未棗肉和膏服一指大盞薑湯下

吐利第六 但吐利而

巢氏兒解脫風冷入腸胃腸胃虛則泄利胃氣逆則嘔吐大體與霍亂相似而少輕不劇悶頓故直云吐

利

錢乙兒初生三日吐瀉壯熱不思乳食大便不化或

色白是傷食用白餅子下後益黃散和胃胃氣不和兒生三日至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便青白乳食不消此上實下虛也更兼見證肺主嚙露睛喘氣心主驚悸飲水脾主困倦饒睡肝主呵欠頓悶腎主不語畏明當瀉兼葳補脾益黃散此多得于秋夏夏秋吐瀉五月廿五日後吐瀉身壯熱此熱也兒葳府十不中九不熱或因傷熱乳食吐乳不消瀉深黃色主玉露散六月十五日後吐瀉身溫似熱葳府六不熱四不冷吐嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食或物幼新書 卷三十一

不食食前少服益黃散食後多服玉露散七月七日後吐瀉身溫涼三不熱七分冷不能食乳多似嚙悶亂噎氣長出氣睡露睛唇白多嚙欲大便不渴食前多服益黃散食後少服玉露散八月十五後吐瀉止冷無陽也不能食乳乾噦瀉青褐水當補益黃散勿下

論吐瀉廣親五太尉病吐瀉不止米穀不化六月中用薑汁調補藥一日加喘錢曰熱傷在內併石膏湯三服衆謂補脾用丁香散三服錢曰服此三日必腹

滿身熱飲水吐逆謂六月熱伏腹中也一如所言衆又行溫藥上焦亦熱喘而引飲三日當死衆不能治復召錢見熱證用白虎湯三服更以白餅子下之一日減藥二不三日以白虎湯各一服四日用石膏湯一服旋合麥門冬腦子牛黃天竺黃茯苓為丸朱砂衣竹葉湯下五九熱退安黃苓有論虛實下藥馮承務子五歲吐瀉壯熱不思食錢曰此子必多病面皸白神怯也黑睛少腎虛也黑睛屬水本怯而虛縱長成必肌膚不壯不奈寒暑易虛易物幼新書 卷三十一

實脾胃亦怯更勿縱酒慾若不保養不過壯年面無精神光澤如婦人失血今吐利不食壯熱者傷食也下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛但以消積丸磨之如傷食甚則可下不下成癖實在內可下下畢補脾隨其虛實無不效

吐瀉問難廣親七太尉病吐瀉時七月證全不食而昏睡睡覺而悶亂硬氣乾嘔大便或有或無不渴衆作驚治疑睡故錢以史君子丸補脾石膏湯退熱次日又下之錢曰凡吐瀉五月內九不下一分補八月

內十分補勿下此脾虛瀉下之死錢留溫胃益脾藥
 止之李醫曰何食而晚錢曰脾虛不能食津少即晚
 逆曰何瀉青褐水錢曰腸胃至虛極冷故也錢治愈
 兒吐瀉當溫補余每用理中丸以溫其中五苓散導
 其逆五苓最連數服蕙異攻散等溫藥調理往往便
 愈若虛損當速生胃氣宜附子理中丸并研金液丹
 末煎生薑米飲調灌多服效無二三四兩候胃氣生手足
 漸暖陰退陽回然猶癩癥即減金液丹一二分增青
 州白丸子一二分同研服漸減金液丹加白丸子蕙
 幼幼新書 卷二十七

異功散羌活膏濕白丸鈞藤飲之類調理仍頻與粥
 雖至危者往往死中得生十救八九
 聖惠白朮散治冷熱不調吐利不止

白朮 木香 丁香 陳皮焙各
 麥門冬焙三

粗羅一錢水中盪煎五分不時稍熱服
 治吐利兼胃脅脹滿草豆蔻散

草豆蔻皮去 木香 五味子 人參
 白茯苓 陳皮炒各 訶梨勒皮 甘草炙各

羅散一錢水小盪煎五分不時稍熱服量加
 錢氏異攻散溫中和氣治吐瀉思食凡治兒虛冷病
 先與數服以正其氣

人參 茯苓 白朮炒 甘草炙
 陳皮

等分末二錢水二盪薑五片棗二枚煎七分食前
 溫服量與張氏多白扁
 玉露散一名甘露散

甘草生 寒水石嫩微青黑 石膏堅白
 幼幼新書 卷二十七

細末一字半錢一錢食後溫湯調下
 治壯熱白餅子又名玉餅子

滑石 輕粉 半夏 天南星味
泡七次 巴豆廿四粒淨水
各一錢 末糯米飯丸如小菘豆捏作餅三歲上三五餅葱
 白湯臨卧服量加

金液丹治兒吐瀉虛實極妙
 治脾胃虛寒吐瀉等及冷痰

齊州半夏七一兩泥 陳米

咳咀三錢水盪半薑十片煎八分食前溫熱服

張煥勻胃散治三焦不調停寒膈上乳哺不消胃膈

痞滿甚則喘逆吐利肌體痿黃

甘草錢一 藿香 白豆蔻 人參各一

木香 乾薑炮 厚朴薑 丁香各半

細末一錢水小盪薑二片煎六分溫服

萬全人參散治脾胃氣虛止吐瀉

人參 白茯苓 白朮 乾葛

幼幼新書 卷三十七 廿四

陳皮白法 厚朴炙

等分末半錢百沸湯點量服

惠眼沉香飲大治吐瀉

沉香 丁香 藿香各半 肉豆蔻二枚

檳榔二個 甘草錢一

末一錢水小盪老薑小指大槌同煎三兩沸溫服

劉氏人參異攻散治瀉痢止嘔逆順氣補虛

人參半錢 白朮兩半 青皮 陳皮

茯苓 甘草各一分 豆蔻三個入

末一錢陳米飲調秋八訶子或紫蘇木瓜煎五七

沸早服兒傷寒以此正氣後以紅綿散寒門治

醒脾散治吐瀉脾困

人參錢二 丁香粒廿 白茯苓 白朮各一

藿香 甘草錢一 天南星一個重七八錢

細末一錢水六分薑三片冬瓜子十四粒煎三分

不時溫服

張氏六神丹定吐瀉

幼幼新書 卷三十七 廿五

丁香 木香 肉豆蔻炮 訶子肉

史君子各一分 薑會二

細末薄麩糊丸如菴豆粥飲吞

治吐瀉紫雙丸

代赭石 陳皮去白巴豆 木香

杏仁錢各一 肉桂去皮不 丁香錢各半 藿香錢二

細末粟米飯丸小菴豆大服七粒藿香湯吞吐瀉

藿香陳皮湯吐棗湯

王氏治吐逆兼吐利不止

丁香

藿香各一分

木香錢一

硫黃兩半

滑石錢二

末錢半米飲調瀉附子一枚重半兩炮淨薑汁搗

成餅白麩裹慢火煨熟將附切焙羅末或吐兼瀉

入附末如藥三之一更因虛實米飲調下吐如激

水者亦定吐利不止成慢驚或已成者兼金液丹

趙氏白朮丸治吐瀉不止溫胃消食

白朮

木香

丁香

肉豆蔻

黃連

幼幼新書

卷二十七

廿六

等分末麩糊丸如黃米米飲下十粒

吉氏治吐瀉不進食溫脾散

蒼朮

二錢油炒赤

陳皮去白

肉桂不見

草果各半錢

桔梗

甘草各一錢

殭蚕許少

末半錢棗湯調下

參苓散治吐瀉

人參

茯苓

山藥

乾葛

麥門冬

黑附子炮淨

桔梗

甘草各半兩

蓮子心

木香不見錢

藿香各一分

末一錢紫蘇米飲調下

朱氏大止吐瀉

鬱金一個刮去心入巴豆一粒麩裹煨末米泔汁

調一字

李剛中治夏秋吐瀉

好黃連一兩炒深黃色冷入蹄丹一兩炒丹焦為

細末麩糊丸如芥子服二三十粒辟土生薑湯吞

更量數服不妨

毛彬治胃氣不和吐瀉不止痰涎不食平胃引行諸

藥銀白散

幼幼新書

廿七

半夏

一兩洗七次

白扁豆炒

鷓粟米

人參

白朮焙

白茯苓

山藥各四錢

細末二錢水八分薑二片棗一枚煎六分溫服

治脾胃虛弱乘冷吐瀉不定不問冷熱可服桃紅散

人參

藿香

麴紅色

等分細末半錢米飲調下不時量服

吐利津液少第七

聖惠治渴不止

筍籜 扁豆藤各半 人參一兩

細劉分六服每水小盞煎五分不時量分稍熱服

張渙三和散治吐利津液燥少

白茯苓一兩 烏梅肉乾 乾木瓜

等分細末一錢水小盞煎五分溫時時服

治霍亂煩渴香豆散

藿香 肉豆蔻各一兩 白扁豆 人參各半

甘草炙

羅末一錢水八分盞薑二片煎四分溫服

切切新書 卷十七

丁時戩人參散治虛熱及吐利煩渴疎轉後服

人參 茯苓 桔梗 乾葛各半

生犀角 甘草炙

末一錢水中盞燈心煎五分煩渴入新竹葉量服

吐痢心腹痛第八

聖惠兒冷熱不調乳哺不節使陰陽清濁之氣相干

而變亂腸胃間則成霍亂而心腹痛者冷氣與真氣

相擊或上攻心下攻腹故痛

外臺療霍亂心腹刺痛吐利

茯苓 桔梗 人參各六分 白朮五分

甘草炙 厚朴炙四分

切水二升煮六合溫服

人參散治霍亂心腹痛不食

人參 白朮 芩藷 草豆蔻

厚朴薑 當歸炒 陳皮去 丁香

桂心各一

羅散不時薑棗米飲調半錢量服

治霍亂乳食不消腹心滿痛

切切新書 卷十七

訶梨勒皮兩半 木香 當歸炒 白朮

霍香 陳皮去白各

細羅不時薑湯調半錢量服

肉豆蔻散治霍亂吐瀉腹痛

肉豆蔻 桂心各一 人參 甘草炙各

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量分服

冷吐第九

張渙溫脾散散寒濕治嘔吐

厚朴薑一兩 丁香 白朮 乾薑各半

肉桂 <small>紅</small>	衛生療胃氣虛冷痰吐嘔逆流星散	粗末半錢水一盞生油七滴煎四分溫服	莊氏丁香九治胃虛寒腹脹吐逆	丁香 木香 藿香 牛黃 <small>各半兩</small>	腦麝 <small>各一錢</small> 膩粉	末麪糊丸小豆大熱湯化下一丸	幼幼新書 卷二十七 三十一	相瀉治胃冷嘔吐肉豆蔻丸	肉豆蔻 <small>麪裹煨半兩</small> 丁香	末麪糊丸如芥子藿香柿蒂湯下三五丸渴飲湯	丁時莢治乳哺飲食溫冷過度傷于脾胃腹脅脹滿	多吐痰涎	人參 丁香 半夏 <small>洗七次</small> 乾薑 <small>各半兩</small>	白朮 陳皮 <small>各一分</small>	粗末麪糊丸如麻子溫湯下十九	熱吐第十
---------------------	----------------	------------------	---------------	---	-----------------------------	---------------	---------------	-------------	--------------------------------	---------------------	----------------------	------	--	-----------------------------	---------------	------

聖惠麥門冬散治嘔吐不止心神煩熱	麥門冬 <small>焙</small> 淡竹茹 <small>各半兩</small> 甘草 <small>炙</small> 人參	茅根 陳皮 <small>去白焙各一分</small>	粗羅一錢水小盞薑少許煎五分稍熱頻服量加	麥門冬散治嘔吐心胃煩熱	麥門冬 <small>焙</small> 厚朴 <small>薑炙</small> 人參 <small>各半兩</small>	粗羅一錢水小盞薑少許煎一分粟米五十粒煎四分溫服量加	治嘔吐心煩熱蘆根粥	幼幼新書 卷二十七 三十一	生蘆根 <small>二兩</small> 粟米 <small>合</small>	水二大盞煎一半去滓投米作粥薑蜜少許食	張渙治胃虛挾熱嘔吐不止丁香益胃湯	丁香 人參 <small>各一分</small> 訶皮 <small>一分</small> 官桂	大黃 <small>炮黑各半兩</small>	細末一錢水小盞薑二片煎五分溫服	保命膏治吐逆不定服熱藥過多不差	川大戟 丁香 大黃 <small>炮</small> 不灰木 <small>燒</small>	甘遂 <small>各一分</small> 朱砂 雄黃 <small>飛各半兩</small> 粉霜
-----------------	---	--------------------------------	---------------------	-------------	---	---------------------------	-----------	---------------	--	--------------------	------------------	---	-------------------------	-----------------	-----------------	--	---

水銀各一錢巴豆淨十粒

黃蠟四兩銀石器溶膏旋丸如黍末周晬一粒十

歲七粒新汲水下

扶驚吐第十一

張漢三香丹治挾驚嘔吐

藿香 丁香各一兩半夏洗七次膩粉各一

龍腦 麝香各一錢

薑汁麩糊丸如黍人參薄荷湯下十粒量加

殊聖歸命丹

切切新書 卷二十七

小兒驚膈吐還頻晝夜連連不輟停綠水槐黃

泔淀汁和虫乳食一時噴

丁香 藿香各一生犀 牛黃各半

猪鯽狗蝟熊膽等分共半兩

末丸如菜豆一歲下苦棟湯研二丸

治驚食胃管不快吐逆乳食或心胃發熱定吐丸

丁香枚三七蝎稍九條半夏三個洗

研煮棗肉丸如黍金銀湯吞七至十九傷暑霍亂

吐瀉香茹散送

良方治久患翻胃兒驚吐諸吐田季散

好硫黃半兩水銀一分研如黑煤薑四兩汗酒一

盞空心服三錢衣覆足指間汗出逆運遍身如膠

腥穢難近差驗此極難調先澆水指緩研增湯令

和否則浮泛不可服

王氏睡驚丸治熱化痰鎮心神治驚悸吐逆

半夏製乳香 犀角

等末薑汁糊丸如菜豆薄荷臨卧服七至十粒

毒氣吐第十二

幼幼新書 卷二十七

粟氏春夏以湯與兒腸胃脆弱不勝藥勢遂吐下不

止藥熏臍府煩懊頓乏為中毒氣吐下

千金藿香湯治毒氣吐下腹脹逆宮乳哺

藿香兩薑三青竹茹 甘草各半兩

咬咀水二升煮八合服一合日三熱加升麻半兩

王氏消妳毒令兒吃乳無毒有毒亦解

升麻兩大麻子破一

酒浸辰與妳子喫一錢臨乳捏去此

幼幼新書卷二十七 遍閱山樓刻

幼幼新書卷第二十八 泄瀉羸腫 凡十五門

後學古吳陳履端于始輯

爛溪周應憲公章校

一切泄瀉第一

養生轉圍瀉者古皆謂利尋常水瀉謂利米穀不化

為米穀利或言下利清穀也 痢謂滯下言所下濡

滯坐團遲久痢有四寒熱疳蟲是也 白多為寒赤多

赤白相雜為 隨證用藥不若今人之妄

茅先生霍亂吐瀉積瀉驚瀉疳瀉渴瀉傷瀉冷瀉熱

瀉形狀別而用藥殊如調一瀉證變眼視口瘡臍口

乾燥瀉久不止并下黑血顛門腫陷不能進食大渴

死兼看三關脉微微青黑腫起亦死

錢乙黃承務子二歲病瀉眾止之十餘日其證便青

白乳不消身涼加硬氣昏睡眾謂病篤錢以益脾散

三服和胃氣不補肺散三服喘嗽上三日身温而不硬

氣後以白餅子微下吐利與益脾散二服利止蓋利

本脾虛傷食十日不止上實下虛脾氣弱引肺亦虛

且便青為下藏冷下必大虛故補脾肺即身温不硬

氣病退而後下所傷食何至虛耶

驚風或泄瀉等諸病煩渴者皆津液內耗不問陰陽

宜儘飲錢氏白朮散彌多彌好和胃氣不

寶鑑乳母有孕氣血不榮于乳飲子則髮立腹急時

瀉胃背皆熱夜啼肌瘦一如積聚

兒飲水時被驚或啼未住而飲水成水痢癉

茅先生諸瀉死候歌

大瀉應難止渾身熱困多緩睛澹泄滑顛陷見

奔波

養生治大小老虛之人不拘冷熱泄瀉

黃連 白芍藥並劉吳茱萸

等分釜內慢火炒赤芍羅服三錢七水盞半煎八

分空腹食前温服日三四兒量與或以水浸蒸餅

丸如桐子或菘豆黃米大兒十五至二十九温米

飲下作散沸湯或温米飲調亦治泄瀉忌生冷魚

肉肥膩一方有木香無

治老虛人下利滑泄

赤石脂 乾薑

等分麩糊丸如桐子空腹溫米飲下廿丸知為度
兒小丸赤石脂河東陝西有真齊州出者延桃花
石

茅先生香連丸治瀉利

木香

黃連同炒煙起

肉豆蔻

訶子炮去核

阿膠炒

朱砂各一錢

末軟針丸如米針飲吞十九丸兒小碎之

乳香散治一切瀉痢

乳香二錢荷葉干炭

肉豆蔻

幼幼新書

卷二十八

三

白薑

甘草炙

草果子各一錢

細劉醋麩暴熱灰煨赤為末入乳香服半錢一錢

陳米飲調

嬰孺治老小一切利及成疳者

白龍骨

白石脂各五錢

雞糞炒

黃連

胡粉炒

茯苓

阿膠炙各四錢

末蜜丸桐子大米飲下十五至廿九日二意裁

增減水藥皇子湯注下三四日服

龍骨

牡蠣煨各一兩

人參

乾薑

甘草炙

赤石脂各三錢

附炮各二錢

黃連各五錢

水四升煮升半為三服日三兒量

張渙丁香黃耆散治脾胃虛弱不食漸損榮衛肌體

羸瘦時下利面青白

綿黃耆

丁香

當歸焙

白朮

鼈甲酥炙

人參各一兩

胡黃連

甘草炙各半兩

末一錢水一盞薑二片棗二枚煎五分食前溫服

人參散治胃氣虛弱泄瀉不止

幼幼新書

卷二十八

四

人參

白茯苓

枇杷葉

甘草炙各半兩

丁香各一兩

肉豆蔻二個

藿香

厚朴薑製各一兩

青皮

當歸

乾薑炮各一兩

末半錢水半盞薑一片煎三分溫服

患眼溪螺散治瀉

船底下溪螺四十九個

乾葛粉兩半

葛粉搽螺上椀盛蓋一宿取螺上粉曬服一錢

退猪湯調

張氏肉豆蔻散理瀉痢

肉豆蔻	大訶子肉	青皮	附 <small>炮去皮</small>
厚朴 <small>薑製炒熟各半兩</small>	未大小加減空心粥調	莊氏治風冷入腸胃腹疼泄瀉虛風胃風湯	人參
天麻	官桂 <small>祛</small>	白朮	芎
等分末二錢水一盞入粟米煎七分溫服	大附子 <small>炮裂</small>	治脾癖乾瀉散	黑三稜 <small>皮去</small>
神麴 <small>炒</small>	鼈甲 <small>生</small>	蓬莪朮	陳皮
蝸牛殼 <small>死者乾</small>	等分細末半錢米飲調不時服	孔氏茯苓丸治久新瀉痢不問冷熱分利水道	白茯苓 <small>五</small>
黃連 <small>兩一</small>	阿膠 <small>炒三</small>	未燒粟飯丸如菜豆米飲下廿九	吳婆散治疳熱冷瀉腹虛脹肉瘦骨存瀉利不止
宣連	白茯苓	阿膠	人參
黃蘗 <small>炙</small>	丁香 <small>各一</small>	訶梨勒皮 <small>煨二枚</small>	桃白皮 <small>仁</small>
沒石子 <small>緊實者一枚</small>			

細散一二字不時白米泔調	王氏白朮散和中益胃散風濕治腸鳴泄瀉米穀不化利下青白腹痛嘔逆脅肋脹滿氣痞不散體熱多睡全不思食	芎藥	當歸	官桂	人參
白朮	茯苓	粟米 <small>炒一</small>	粗末一錢水六分煎三分溫服	溫胃固腸丸	肉豆蔻
縮砂仁	丁香	龍骨	訶子皮 <small>炙</small>	赤石脂	等分白麩糊丸如菜豆服一二十九飯飲下量兒
治歲冷滑泄不止腸鳴腹痛以聖丸	青州棗 <small>廿五個黃丹二錢</small>	肉豆蔻 <small>一</small>	訶子皮	草豆蔻 <small>麩裹燒各半兩</small>	木香 <small>一</small>
未醋糊丸如小黃米米飲下廿九	吉氏銀白散治脾胃氣弱泄瀉不食	人參	茯苓	甘草 <small>炙</small>	藿香
白扁豆 <small>炒微</small>	白朮 <small>炒</small>				

等分末服半錢紫蘇餅飲下量加

朱氏木香散治脾胃不和瀉痢

木香

白朮各一

藿香

益智各半

肉豆蔻

燒煨三個

末半錢或一字量兒木瓜紫蘇湯調

相瀉藥散治泄瀉虛滑頻數不止

人參

白茯苓

藿香

乾薑焙

等分末半錢藥湯調大人瀉一錢

丁時發開胃丸治乳食不消冷熱不調泄瀉頻併進

幼幼新書

卷三十一

七

飲食止吐逆

木香

白朮

人參

當歸各一

肉豆蔻錢半

細末麩糊丸如粟麝香溫米飲下一二十九

積瀉第二夾實瀉并積利附

茅先生兒積瀉面青黃眼微黃上渴肚脹嘔逆遍身

潮熱通下臭穢因食多傷脾先用青金丹下積積聚

勻氣散和胃氣不醒脾散一慢脾風門香連丸泄瀉

門相夾調理

形證論冷瀉有積歌

積傷冷瀉有多般四體平和無熱者瀉終不定

休言止取積為先順氣安

冷食在脾身溫無事阜角膏取調胃散補逆積熱門

嬰孺治發熱腹內不調時下利不消顏色漸黃

厚朴

黃連各三

人參

龍骨各四

切水升八合煮升二合分溫至夜服漸盡乳母忌

油膩果子生冷

治八歲上熱結痰實不能食自利

幼幼新書

卷三十一

八

大黃分三

柴胡分九

升麻

黃芩

枳實分六

竹葉切升

梔子仁

芍藥各八

細辛分二

知母

薑三分一無此有杏仁

水升八合煮升二合分溫至夜漸服盡乳母忌油

膩果子生冷

大黃散治十二三歲結熱痰多壯熱食少結者自下

大黃分二

柴胡

枳殼

升麻

芍藥

梔子仁各十

竹葉升一

薑分三

知母

杏仁淨各八

水六升煮二升為四服十歲外為三服兒小量之
大黃湯治結實壯熱頭痛

大黃 柴胡 甘草 薑

升麻 知母 黃芩 大青

石膏 芍藥 枳實

水四升七合煮升三合為四服量加

吉氏芍藥散治積痢

芍藥 枳殼 甘草 地榆

黃蘗 川烏頭

幼幼新書 卷二十八 七

焙末半錢白楊湯下

驚瀉第三

茅先生兒面青眼微青身微熱瀉青紅水或如草汁

因先驚積後喫冷物衝散為驚瀉用活脾散

一慢脾 鎮心丸 驚門夾香散 勻氣散

調理

石壁經歌

瀉出還如藍靛青目光緊急黑添睛只看眼凸

胞青脈 便是驚傷冷瀉因

冷傷藏府次被驚致目睛青色轉甚眼白亦青目
睛與白睛高甚唇亦青精神不足勿怕先溫脾
次去驚亦分水穀

治驚瀉大餅子

大附子 韶粉 藿香

丁香

末滴水為餅如棋子飯飲化

傷瀉第四

茅先生兒肚臍脹硬身微熱微嘔因父母愛子將粘

滑物與喫兒食噎着五藏停在胃膈不消驚瀉下為

傷瀉醒脾散 勻氣散調二日

瀉漸疎用青金丹下所傷物 再進勻氣建脾散

千金大黃湯治下痢苦熱不食傷飽不乳

大黃 甘草 麥門冬

吹咀水二升煮一升二三歲分三四服

生金牛黃湯主積下不止發癩

生金 牛黃 細辛

幼幼新書 卷二十八 十一

麻黃仁 乾薑有熱生 人參 黃連

甘草各一

咬咀水升六合煮八合臨卧研牛黃湯中

醫局開胃丸治歲府怯弱內受風冷腹脅脹滿腸鳴

泄瀉或青或白乳食不化又治歲冷夜啼胎寒腹痛

木香 蓬萊茂 白朮 人參

當歸炒各半 麝 芍藥各一

羅炊餅丸如黍溫米飲下十五新生兒腹痛夜啼

乳前服五丸

幼幼新書 卷二十八

冷瀉第五

茅先生兒腹虛鳴身微熱腹脹滿為冷瀉因冷食傷

宜乳香散一切泄瀉 調中飲和胃氣不

寶鑑兒冷瀉為脾虛胃冷不消五穀糞不結實腹脹

瀉氣酸乃有積

顛顛治水瀉痢并脾冷食乳不消喫乳頻吐溫脾散

附子 乾薑 甘草各半 白朮一兩

末空心米飲調半錢忌鮮魚毒物

千金溫中湯治夏月積冷洗浴過度及乳母亦冷浴

兒飲冷乳壯熱忽值暴雨兒瀉如水胃虛弱則面青

肉冷眼陷乾嘔先調胃瀉止 乾薑 厚朴薑製各 甘草 當歸

桂心各三 茯苓 人參 白朮

桔梗各二 咬咀水二升煮九合百日内服二合半更裁

張漢兒夏傷濕冷入腸胃泄瀉不止川楝丸

川楝淨慢火炒一兩 肉豆蔻兩

末粳米飯丸如黍米飲下十粒量加

幼幼新書 卷二十八

治泄注不止手足逆冷助胃丹

附子一枚重半 船上硫黃 乾薑炮

肉豆蔻 肉桂 白朮炮各半

末白麩糊丸如黍食前米飲下十九

粟煎湯治腸胃受風冷泄注身熱

白朮炮 當歸洗 川芎 人參

肉桂 芍藥各一

末一錢水小盞薑三片粟米一匙煎五分溫服

孔氏治歲府不調大便青色

白朮 人參 茯苓 甘草

末一錢水小盞煎七分溫服

熱瀉第六

茅先生兒渾身微熱上渴驚地瀉如水為熱瀉因當風日或日下去被暖五歲受虛熱毒忽然喫水過多致不消化乳香散夾三聖丸瀉門切泄龍涎膏與服熱瀉門

嬰孺治三歲兒熱實不脹滿下不止

麥門冬一兩 大黃五錢 甘草三錢 當歸

切幼新書 卷二十八 十一

柴胡 人參 黃芩各四分

水三升煮升二合為三服大利止

張渙清胃散治挾熱瀉痢

川棟子 黃蘗炙 當歸洗 地榆炙

黃連炒各半兩

末一錢水八分煎四分乳前溫服

劉氏木香黃連等分末陳米飴九菴豆大米飲下三五丸

洞泄第七

巢氏春傷于風夏為洞泄兒春時解脫風冷傷肌肉至夏飲食起居不調又被風冷入膈胃先後重沓為邪所乘則下利冷氣盛為洞泄不止為注下又不止多變驚瀾亦變眼痛生障下焦癰冷結熱上焦執重肝故也

聖惠厚朴散治脾胃不和洞泄下利羸瘦食少

厚朴炙 人參 訶皮煨 白朮

黃連炒 地榆炙各一分 甘草炙 乾薑地各半

肉豆蔻一枚

切幼新書 卷二十八 十四

羅散粥飲調半錢日三四量加

張渙厚朴散治洞泄注下

厚朴炙 訶皮炮 肉豆蔻各一分 白朮

乾薑地各半

羅一錢水八分薑粟米各少許煎五分溫服

萬全龍骨丸治冷熱不調時洞泄

龍骨 黃連 白石脂 白礬燒

乾薑 木香各半兩

末醋糊丸如麻子粥飲下五九日四更量

劉氏兒水瀉下注

黃連 石蓮

等分末半錢水瀉新汲水調白瀉粟米飲下

水穀瀉第八

聖惠寒溫失宜乳哺不節或當風解脫血氣俱虛為

風冷所傷留連肌肉因脾胃不和大腸虛弱風邪入

腸胃腸胃既虛不能制水穀故下利

千金治暴冷下水穀或乳冷下青結不消或冷實吐

下乾嘔煩悶及冷滯赤白下者良若已服利藥實去

幼幼新書

卷二十八

十五

胃中虛冷下如水乾嘔眼陷煩擾除大黃若乳女洗

浴水氣未消飲兒為霍亂勿去大黃兒諸霍亂宜利

者用之不消利宜溫中者除之

溫中大黃丸

大黃六分

乾薑炮

桂心

厚朴薑製

甘草一分

當歸

人參

茯苓

白朮二分

桔梗

呖咀水二升半煮八合兩月內服二合量加

治卒大下利熱唇乾口燥嘔逆引飲瀉心湯

人參

甘草炙

黃苓

陳皮

苦蕒根兩各

黃連二兩

半夏洗淨

乾薑炮

呖咀水六升煮二升分三服胡洽治老少利水穀

腹鳴心下痞乾嘔無橘皮苦蕒寒加附渴加苦蕒

嘔加橘皮痛加當歸仲景大棗十二枚

聖惠厚朴散治水穀利羸瘦面黃不食

厚朴薑製

龍骨

黃連炒

白丁香

當歸炒

白朮

肉豆蔻各

木香

羅翬飲調半錢日三四量服

幼幼新書

卷二十八

末

地榆散治水穀日夜無度

地榆炙

厚朴薑製

黃連淨炒

阿膠炒

羅散不時粥飲調半錢量加

醫局胃風湯治風冷瘵虛客腸胃水穀不化泄瀉注

下腹脅滿腸鳴疔痛及腸胃濕毒下如豆汁如瘀血

日夜無度

人參

白茯苓

芎

桂皮

當歸

白芍藥

白朮

等分粗散二錢水大盞粟米百粒煎七分空心稍

熱服量兒

暴瀉第九亦名率利

兼氏腸胃虛暴冷熱氣傷之為率利熱則色黃赤冷則色青白冷熱相交變為赤白滯利

聖惠胡黃連散治冷熱氣不和忽暴下利腹內疼痛

胡黃連

女丁香

桂心

木香

肉豆蔻

當歸炒

麝香各一分

犀角半

細羅粥飲調半錢日三四意裁

龍骨散治暴利

切切新書

卷二十八

十七

龍骨

黃連炒各一兩

枳殼炒

當歸各半

粗羅一錢水小盞煎五分不時量與

張漢阿膠丹治泄利身熱及暴瀉注下

阿膠大

乾薑各一兩

芍藥

當歸焙

川黃連

肉豆蔻各半

羅末蜜丸如黍米飲下十粒量加

補一切虛不熱男女小兒皆可服冷積暴瀉神仙玉

粉丹

精明船上硫黃一斤去沙石盡打碎

獾猪肚七個旋取桑根白皮三斤寸剉猪肚一個

洗淨內硫黃線縫水二斗將桑皮一斤煮一伏時

餘肚慢火養勿令冷煮滿一伏時別換猪肚桑皮

同煮一伏時又換猪肚桑皮過三伏時不換桑皮

只換猪肚水耗添熱湯候滿七伏時已完七肚温

水淘淨研細烈日曬極熱再研煮糯米粉丸如梧

子空心米飲下十粒至十五丸大率驅除宿冷其

效無以老人經久可服

暴瀉第十亦名

切切新書

卷二十八

十八

聖惠秋夏晨朝多中暴冷之氣折其四肢則熱不得

泄入腹變利或赤白小腹脹痛肌體壯熱脉洪大急

數皆由冷熱氣相併連滯不差為暴利

外臺

甘草

茯苓各六分

人參

黃連各四分

厚朴炙

薑各二分

龍骨八分

切水一升煎三合欲卧先取鹽麩麝為小丸肉下

部中服藥忌如常法宜少增水

利久不止第十一瀉利

巢氏春傷于風夏為洞泄兒春時解脫風傷肌肉夏因水穀利久不差腸胃虛易為冷熱冷變白膿熱則變血冷熱相加赤白相雜久則腫滿亦變病重亦令嘔噦

鳳髓經滑腸瀉歌 宜冷熱利門香連丸下利腹痛門紫霜丸並與吉氏同

脾中有積熱遲留至使終年瀉不休項軟見人多硬氣更兼清水臍中流少間有似黃金色若有垂腸更不收形證又看胃膈上胃前深赤汗如油唇赤生瘡眼脈赤若不調脾命即休

切切新書 卷三十八 十九

千金七味散治利久不差

黃連八分 龍骨 赤石脂 厚朴

烏梅肉各二分 甘草一分 阿膠炙三分

篩水服二寸七日二兒一錢七

華陀治老小下利禁立不食入口即出命在旦夕

黃連 亂髮灰 醇苦酒 蜜各半雞子殼

白蠟方寸七分 雞子黃一枚

銅器盛酒蜜蠟雞黃置炭火攪勻內黃連髮灰攪

煎可丸即丸一日夜盡

外臺療久痢無問冷熱疴痢悉主

棗一枚去核勿破皮內滿胡粉燒研米飲和服一

歲下分服三服差驗

聖惠治久利赤白漸羸胃虛不食丁香散

丁香 厚朴炒 黃連炒 當歸炒

訶梨勒煨 白朮炒 伏龍肝各半兩 木香一分

赤石脂兩一

搗散粥飲調半錢日三四更量

聖惠黃連丸治暴利經久不絕增減有時

切切新書 卷三十八 二十

黃連炒 人參 赤石脂 龍骨

甘草炙 黃芩 厚朴薑炙 白茯苓

枳殼炒 烏梅肉炒

羅散蜜丸如麻子粥飲下七九日三四量加

譚氏斗門散

小兒瀉利甚青黃久患時多轉滑腸下部脫肛

頻努嚙朝朝焦瘦漸羸疳

呵子 枳殼 地榆

等分末一錢米飲調一歲下半錢

嬰孺龍骨湯治下利不住

龍骨

甘草

黃連

當歸

乾薑

水四升煮升二合食前溫分三服

龍骨湯治服藥下後不止

龍骨

甘草

乾薑

當歸

黃連

赤石脂

附子

前胡

水四升煮升二合為六服旦至午盡

黃連煎治冷熱利經時不止體羸不堪餘治差而又

發

幼幼新書

卷二十八

三十一

好黃連二兩水七升蜜八合煎升三合百日兒服

半合量加

治下痢久不斷羸瘦脾胃冷弱食不化雞骨丸

宿雌雞

黃連

厚朴

麴炒

甘草

白朮

麥蘖

烏毒肉

赤石脂

黃芩

白龍骨

末蜜丸小豆大白飲下廿五九日二量與

漢東王先生治久瀉脾虛不食食即瀉米穀不化溫

白丸

白朮

半夏

末薑汁糊丸如菘豆半歲三九三五歲五七九淡

薑湯吞早晚各一服

治久瀉脾困不思乳食恐作脾風惺惺散

天麻

全蝎

木香

糯米

人參

茯苓

白扁豆

山藥

甘草

幼幼新書

卷二十八

三十一

末嬰孺一字二三歲半錢水半銀盞棗半片煎十

數沸服

治久瀉脾虛發搐變慢驚慢脾等竹瀝膏

白朮

大附子

全蝎

黃芩

犀角

厚朴

末竹瀝為膏旋丸嬰孩黑豆許二三歲阜子大四

五龍眼核大薄苛湯化量加

張渙治瀉利久不差香礬丹

木香

白礬

訶梨勒

酸石榴皮

炒黑各半兩

羅末蜜丸如黍粥飲下十粒量服

劉氏

人參

白朮

茯苓

甘草

陳皮

藿香

丁香

木香

肉豆蔻

等分末二錢藿香合糯米煮粥飲調服

吉氏治久瀉不食丁黑散

丁香

肉豆蔻

陳紫蘇

陳皮

幼幼新書

卷三十一

十一

鹽木瓜

等分末半錢米飲調下

丁時發治冷熱作瀉熱藥不止

槐花

石榴皮

地榆

黃連

呵子

等分末冷水調半錢

莊氏秋深冷痢不止灸臍下二寸三寸間動脈中三

壯

利渴不止第十二瀉利

葉氏水穀利津液枯竭府藏虛燥則引飲小便快者

利止渴亦止小便澀水不行于小腸滲入腸胃渴亦

不止利不斷此脾弱不能克水身亦浮腫上焦本熱

又利下焦虛上焦熱氣轉盛薰肝眼必痛而生障

外臺麥門冬湯治夏月藥大下後胃中虛熱渴

麥門冬

甘草各四分

枳實炙

黃芩

人參各三分

龍骨分六

切水二升煮九合分溫服

聖惠黃著散治利渴心胃煩悶不欲食

幼幼新書

卷三十一

十一

黃著

麥門冬焙

黃芩各三分

龍骨一兩

烏梅肉炒三分

白朮

黃連炒各兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫量服

黃芩散治利渴不止

黃芩

訶梨勒皮煨

檮株皮各半兩

苦蕒根

黃連

當歸各三分

烏梅肉炒一分

羅散一錢水一瓊煎五分不時溫量服

當歸散治利渴腹痛不止

當歸炒

黃連

黃著各三分

乾薑炮

甘草炙各半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時量溫服

龍骨散治利渴體熱煩悶

白龍骨兩一 胡黃連兩半 茯苓 人參

茅根 麥門冬焙各三分

粗散一錢水小盞煎五分不時溫量服

嬰孺子苓湯治大熱利兼渴增寒

子苓 枳殼炒 黃蘗各四分 石膏十二分

竹葉升一 檉皮分十 人參七分

水五升煮升六合七歲兒三服量與

冬瓜湯治渴利不住

冬瓜合八 苦蕒十二分 茯苓 知母各八分

麥門冬五分 粟米二分

水五升煮升四合新布絞量與

寶鑑竹茹丸

好黃連一兩剉塊 柴黃一兩

末薄糊丸蘿蔔子大竹茹煎飲吞十九

王氏人參白扁豆散治脾胃不和不思飲食吐瀉渴

兒虛熱煩躁

人參 白扁豆炒熟去皮 白朮 茯苓各一兩

鴛粟子 甘草炙 山藥各半兩

末二錢水中瓊薑二片棗半個煎七分通口服如

腹疼加紫蘇兒虛熱加薄荷

下利腹痛第十三瀉利同

聖惠黃連散治久赤白利不止腹痛羸弱不食

黃連炒淨一兩 厚朴薑炙 乾薑 木香

艾葉炒 龍骨各半兩 當歸炒 黃牛角腮

烏梅肉炒一分

細散粥飲調半錢日三四量與

黃蘗丸治久赤白利腹脹疔痛

黃蘗炙 當歸炒各一兩

末煨大蒜丸如棗豆粥飲下七九日三四量與

木香散治久赤白利腹脅疼痛

木香 訶皮煨 臭檮皮炙 木賊

黃連炒各半兩

羅粥飲調半錢日三四量加

肉豆蔻散治久赤白利腹痛全不思食漸瘵

肉豆蔻三枚 青皮去白焙 黃牛角炙 當歸

地榆 厚朴炙 黃連炒各半兩 乾薑炮一分

羅粥飲調半錢日三四量加

下利羸瘦第十四瀉利

巢氏腸胃虛弱受風冷聖惠作秋疝氣則下利利斷後脾胃

尚虛穀氣猶少不能榮血氣故羸瘦

聖惠桔梗丸治利久不斲肌羸食不消

桔梗 神麩炒各一兩 麥蘖 烏梅肉炒

幼幼新書 卷二十八

厚朴薑炙 白朮 人參 赤石脂 黃芩 龍骨 桂心 甘草炙各半兩

黃連炒兩半 黃雌雞骨一具酒浸宿炙黃

末蜜丸如菘豆粥飲下五九日三量加

雄黃散治久利不差羸瘦壯熱毛焦不食

雄黃 蘆會 青黛 朱砂

熊膽 麝 龍膽 黃連

黃蘗炙 當歸炒 白芷 細辛

甘草炙各一分 蚱蟬淨七枚 乾蝦蟇酥炙一兩

細羅并華水調半錢日三四量加

治下利不止瘦弱雞子粥

糯米一合粥臨熟破雞子一枚攪入少醋空腹食

下利浮腫第十五瀉利

惠濟論兒利差後遍身腫歌宜塌氣散

冷利日久失醫治遍身浮腫却如吹脉洪是氣

化為水沉實還因積有之氣順腫消為上法氣

平兩日定多尿莫交食飽還憂滯此疾元因積

幼幼新書 卷二十八

塌氣散 茴香 白牽牛 甘草炒 木香各一分

末半錢紫蘇湯下

王氏止渴聖效散治吐利氣虛津液減耗生疔煩渴

飲水不休面腫脚浮腹大頭細小便利白全不喫食

乾葛 白芷 黃丹生炒各半 細墨各二分

細末半錢倒流水調下

幼幼新書卷二十八

幼幼新書卷第二十九 滯痢赤白 凡十二門

後學古吳陳履端于始輯

爛溪周應懿公美校

八痢第一

茅先生兒生周歲至十歲痢分八種赤痢藏府積熱白痢藏府積冷傷積痢糞內一半似土色因妳食所傷驚積痢糞夾青涕因驚不曾取而致脊瀝痢下五色不定不喫妳又名五花閉口痢五藏積毒孔竅不開藥毒痢下如魚腦久痢而成下藥不對故也瑣口

幼幼新書

卷二十九

一

痢俱不下食常引水秋後脾虛又名調泄痢凡治痢又瀉治瀉又痢是大腸滑脾虛熱藏有積毒也熱毒風毒痢下如青草汁或赤豆汁時自滴瀝乃脾受風熱毒而成此係惡候

八痢不問色數用勻氣散和胃氣不夾醒脾散一胃氣不

和門慢香連散乳香散調日二並瀉門切漸有黃色

脾風門下用禰銀丸積瀉取積三五行再用醒脾勻氣散

常服香連丸瀉門一切夾調中飲和胃氣不如大渴不

食口瘡皴燥肚臃死

漢東王先生八痢因八邪而生或冷熱不調或風邪入藏成痢熱痢赤冷痢白冷熱相加赤白雜食痢酸臭驚痢青脾痢食不化時行痢有血瘕痢暴瀉不時八痢死候歌

痢頻都不食腹脹喘還愈下糞全如墨渾身熱渴俱

一切痢第二

聖惠一切痢者下色無定或水穀或膿血或青黃或赤白雜皆乳哺不調冷熱交互久則脾胃虛弱連滯

幼幼新書

卷二十九

二

不差令肌體羸瘦

寶鑑歌

小兒痢下有多般不得將來一例看冷痢有時青與白或時丹色赤相干熱侵經絡為鮮血盡毒為傷下紫肝腸虛日有如膏血渴甚仍知藏府乾脾弱遍身成腫滿熱衝肝膽腎漫漫更有脫肛爭忍視急求名藥使平安

玉訣瀉痢積熱歌

小兒瀉痢胃家傷冷熱傳脾損大腸胃氣失和

寧化穀邪攻變盡自非常

先調氣次下痢藥若盡毒者虛實取更調胃

肘後徐王神效方三歲兒或赤白穀痢冷熱不調

雞子破頭如粟傾出和胡粉阜子大研極勻內穀

中糊頭蒸熟食差止

痢日夜數十行雞子和醃醋攪煎如稀飴食勿令吐

千金治大冷洞痢腸滑下赤白如魚腦日夜無度腹

痛難忍駐車丸

黃連六兩 乾薑二兩 當歸各三兩 阿膠各三兩

物切新書 卷二十九 三

末大酢八合烱膠和丸如大豆大人三十九百日

兒三九意裁日三

水鑑秋夏痢不止

乾漆 蛟麻各三分 礞石煮一分 黃丹煮

蜀葵花 遠志 黃鹽 滑石各二分

乾蚯蚓生一條

末餅丸如麻子患深者五服冷水下一二丸

孫尚藥治痢

木香方一 黃連兩半

水半升煎乾去黃連薄切木香焙末三服一橘皮

湯二陳米飲三甘草湯調服

孟詵痢柿澀下焦建脾胃消宿血作餅及糕與兒食

治秋痢煮粥欲熟研柿入更三兩沸兒姝女俱喫

聖惠當歸散治痢腹痛羸瘦不食

當歸炒 阿膠炒 黃芩 龍骨各三分

人參兩半 甘草一分

羅粥飲調半錢日三四

人參散治痢腹痛多渴

物切新書 卷二十九 四

桔梗 當歸炒 地榆微炒各三分 人參

艾葉炒 黃耆各半兩 烏梅肉炒一分 龍骨

粗羅一錢水小盞煎五分不時量溫服

治痢諸藥無效

巴豆霜淨七枚 深色臘胎錢三

研細煮棗肉丸如黍冷粥飲下三九意裁忌熱物

治痢日夜數十行漸困黍米粥

黍米合一 雞子一枚 黃蠟兩半

煮粥臨熱下雞子蠟攪空腹食

惠眼治痢胡黃連丸

胡黃連 呵子肉錢二 朱砂錢半

末爛飯丸如雞頭甘草薑湯下七至十九

張氏治大小男婦寒熱歲府之疾金匱丹

朱砂錢五 黃丹兩半 乳香水研紙箱瓦

木鼈子燒黑去皮十枚 白膠香錢四 砒

硝石研瓷合盛赤石脂封鹽泥固燒赤 大巴豆淨

大杏仁淨七枚 研細極黃蠟兩三錢鎔和旋丸如菜豆臨卧漿水

幼幼新書 卷二十九 五

下三丸未效連三服驗

莊氏木香丸治瀉痢

黃連一兩到如大豆吳 肉豆蔻個二 木香分一

末蒸餅丸如梧子水瀉痢赤米飲下廿九白痢厚

朴湯兒如黍丸

如聖丸治冷熱瀉痢腹痛水穀不消膿血赤白

乾薑炮 槐花炒各一兩 宣連兩半

末麩糊丸如菜豆大人三十九兒七八九意裁瀉湯下赤多米飲

阿膠丸治痢

阿膠 茯苓 黃連

等分細末飯丸曝乾空腹米飲下三五十九

孔氏

宣連生 陳米各一兩 木香一分同

末米糊丸如麻子米飲下十五丸

又陳橘皮黃連烏梅肉等分末陳米丸米飲下五十丸

王氏當歸黃連丸治壯熱煩渴赤白痢腹痛後重晝

幼幼新書 卷二十九 六

夜無度小便澀

芍藥 當歸 黃連 黃蘗

等分細末麩糊丸梧子大食後溫米飲下二十九

鄭愈治痢針頭丸

巴豆 杏仁各四十九

鐵線串燈焰上燒灰研黃蠟二錢燈上鎔和丸如

栗新汲水下七丸兒減

冷痢第三

栗氏兒腸胃虛或解脫遇冷或飲食傷冷冷入腸胃

痢色白為冷甚則色青

張漢脾胃久不和食不消冷熱不均氣入腸為痢冷則津液凝而色白

石壁歌

一瀉時時要水漿面珠流出汗火元紅一面上微

騰騰眼慢常如睡燥渴腹內幾同被物傷努咽

大腸多發痛不思飲食面痿黃髮焦眼碧涼浸

耳變色黑一作三朝定必亡脫一作腸

因驚傷寒毒物所致瀉久作渴甚則腹痛面黃或

幼幼新書 卷三十九

青或黑不治治當分水穀調氣止痢

肘後徐王方三歲兒冷痢

附一枚炮水五合煮雞子一枚哺兒

千金擣蒜傳兩足下

廣濟療客冷白痢

人參分六厚朴炙

桔梗分各五梁州檉皮分各八

甘草分各四茯苓

切水三升煮一升量與 聖惠木香散治冷痢腹痛四肢不和食少漸羸

木香 白朮

乾薑炮各一分厚朴炙

龍骨 當歸

訶梨勒皮煨各半兩

粗羅一錢水小瓊棗二枚煎五分不時量溫服

龍骨散治冷痢腹痛不止

黃連微炒甘草微炙

龍骨各一分乾薑炮

當歸炒各三分

羅一錢水小瓊煎五分量服

丁香散治冷痢腹痛面無顏色肢痺不食

丁香 當歸炒各一分人參

白朮

幼幼新書 卷三十九

厚朴炙草豆蔻去皮各半兩

白石脂兩

細羅粥飲調半錢日三四量服

治冷痢下青白如魚腦痛多時不斲吳茱萸丸

吳茱萸浸七遍微炒

乾薑炮附子淨炮

當歸炒木蘭皮

厚朴炙白朮炒

白頭翁 黃連微炒

黃蘗炙石榴皮炒

赤石脂兩

羅末蜜和擣二三百杵丸如棗豆三歲粥飲下五

九日三四量加

又炒當歸半兩細末燒熟蒜一顆九如菜豆粥飲下
七九日三四量加

又炒川楝羅蜜九菜豆大粥飲下五九量服

嬰孺治五六歲冷痢

當歸 黃連 龍骨各四分 赤石脂

厚朴炙 乾薑 醋石榴皮各二分

切水三升半煮升六合為四服相去一炊久

漢東王先生治冷痢金鎖散

官桂薑炙半兩 黃連茶炒一分

幼幼新書 卷二十九

末嬰孺一字二三歲半錢紫蘇木瓜湯調日三

治腸胃虛冷下痢頻併日夜疼痛難忍雄朱散

雄黃飛一分 乳香 白礬枯各一錢

末嬰孺一字二三歲半錢陳米湯調下日三

張渙治冷痢便青甚則有膿玉脂散

白石脂 當歸 丁香 白朮炮各一兩

草豆蔻皮去 厚朴薑製各半兩

末半錢粥飲調量服

治白痢艾湯

艾葉炒 當歸各一兩 乾薑炮 木香

訶梨勒皮炮各半兩

羅一錢水八分粟米少許煎五分食前溫服

養臟湯治白痢頻併

當歸焙 烏梅肉炒 乾薑 黃耆

白朮炮 龍骨各一分

羅一錢水小瓊薑粟米各少許煎五分食前溫服

聖惠秋深冷痢不止灸臍下一寸三寸間動脈中三

壯炷如麥

幼幼新書 卷二十九 十一

熱痢第四赤亦名

巢氏兒本挾虛熱為風所乘風熱俱入大腸為痢非

水穀而色黃為熱痢

兒挾客熱入經絡血得熱則流滲入大腸腸虛則泄

為赤痢

石壁歌

赤痢先看眼不開定知熱發有從來唇紅面赤

瘡穿口紅瘡滿口一日之間痢百回滴瀝腹中

加刺痛難餐胃閉食全垂此時脾熱一作因云

極請細加詳妙藥材

熱積所致當去積涼胃調氣進食治痢勿令藥熱
熱則發汗作腫多困

千金煮木瓜葉飲

梔子丸治熱痢不止

梔子七枚

黃蘗三分

黃連五分

礬石四分

大棗四枚

末蜜丸如小豆服五九日三夜二不知加至十九

外臺子芩湯治熱痢

子芩十二分

知母

女萎各六分

竹葉八分

黃蘗

甘草各四分

切水二升煮一升分服聖惠多赤為藥五分

圖經蜀葵葉煮食

聖惠梔子仁散治熱痢腹痛心煩口乾尿黃不食

梔子仁

當歸各五分

黃蘗

地榆各三分

黃連兩

細羅粥飲調半錢日三四量服

犀角散治熱痢煩悶腹痛面黃體瘦

犀角

黃芩

地榆炙

甘草炙

赤芍藥

黃連炙

葶藶

知母各三分

散一錢水小瓊煎五分量分溫服日三四

治熱痢肌瘦口乾煩躁不食

苦蘘根

白茯苓

知母

黃芩

地榆炙

甘草炙

黃蘗各半兩

人參三分

赤石脂錢

粗散一錢水小瓊煎五分不時量分服

烏梅散治熱利不止壯熱多渴

烏梅炙

黃連炒

藍葉各一分

犀角

阿膠炒

甘草各五分

羅一錢水小瓊煎五分不時量分溫服

治熱痢壯熱不止吐乳熊膽散

熊膽

蚺蛇膽各五錢

黃連炒

沒石子一枚

乾馬齒菜

犀角各一兩

細羅百日兒新汲水調一字二三歲五分空心午

後各一服

嬰孺三味黃連湯治熱痢

黃連分二

黃蘗十五

阿膠大指

水三升煎一升下膠化盡溫服一雞子大日三

大黃湯治痢熱不食傷飽不乳及百病并傷寒下痢

大黃

甘草各一兩

麥門冬雞子大

水二升煮一升量服

形證論開胃散

白朮

茯苓

人參各五分

石蓮淨肉十個

末藿香湯下半錢

治脾毒痢

幼幼新書

卷三十九

十三

陳黑米合一

石榴皮五分

乳香塊一

阿魏少許

呵子錢

龍骨錢三

嚼杏仁汁丸麻子大陳米飲下十九

冷熱痢第五亦名赤白痢

巢氏兒飲食冷氣在腸胃間復為熱傷腸胃宿虛而受熱冷熱交而變痢乍黃乍白或水或穀為冷熱痢聖惠熱乘血血滲入腸則赤若冷氣搏腸津液凝滯則白冷熱交則赤白雜重者如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脈薄血如魚腦亦名魚腦痢

石壁歌

鼻梁色白唇如玉此患本來非藏毒只是當時

愛喫泥一作茶致使病成親手觸鳳髓初因故府受穀不

臉白目胞垂青線莫作常疾一般者只看伊家

手足心點點深紅若斑爛

先正胃氣次去積分水穀定渴

惠濟歌

痢冷為青熱帶紅料因有積更兼風初時患渴

身常熱飲食全妨痢愈膿開胃且教調上膈腹

疼頃與急交攻頻頻熱渴無多日脉息元來浮

大洪

本草乳腐細切如豆麩拌醋漿水煮二十餘沸食

外臺治赤白痢無問久新即愈

香豉心中者熱且好非是去皮取心

博香乾末大兒一大升為四服以酒一大升服兒

小減

療赤白痢腹痛

赤白石脂 龍骨 地榆 黃連各四分

厚朴炙 人參各三分 當歸 乾薑各二分

散飲服半錢日再或蜜乳汁下三九七九意量

秘錄治赤白痢久體弱

宣連濃煎三分減二和蜜頻和

又新櫛皮一斤去黑皮細切水一斗煎五升去滓煎

如錫和酒服

聖惠白朮散治赤白痢腹痛羸瘦不食

白朮 人參 黃連 當歸炒

切切新書 米各五分

地榆 木香 檳枝皮 甘草炙各半兩

散一錢水小盞煎五分量溫服一薑炙厚朴三分

訶梨散治赤白痢腹疼脹不食瘦弱

訶梨勒全煨三分 當歸炒 黃芩 龍骨

地榆炒 乾薑炮 陳皮去白 白朮

甘草炒赤各半兩

散一錢水小瓊煎五分去滓不時量溫服

又

地榆炙 黃連炒 木香各半兩 當歸炒三分

羅一錢水一瓊煎五分不時量分溫服

地榆散治赤白痢不止

地榆 黃連炒各三分 醋石榴皮炒半兩

白龍骨 赤石脂各一兩

羅一錢水一瓊煎五分不時量分溫服

治赤白痢不止三骨散

狗骨羊骨鹿骨等 燒末粥飲調半錢不時更量

治赤白痢努咽腸頭出蚘蛇膽丸

蚘蛇膽一分 烏梅肉炒七分 蕪荑炒 黃連炒各一兩

切切新書 米各五分

羅鍊蜜丸如麻子粥飲下三九日三四意裁

香連丸

木香 訶梨勒皮煨各半兩 黃連炒三分

肉豆蔻仁二枚 丁香一分

羅燒飯丸黍大粥飲下五九日三四量服

又胡椒五十粒入牛膽中寅日于堂屋後檐從東第

七椽懸四十九日擣麵糊丸如菜豆粥飲下五九

日三四量服

犀角散治冷熱痢不止心神煩悶

犀角	白朮	黃連 <small>炒</small>	當歸 <small>炒</small>
地榆 <small>各一兩</small>	木香 <small>兩半</small>		
散一錢水小瓊煎五分不時溫吞服			
又			
黃連 <small>炒二兩</small>	當歸 <small>炒</small>	烏梅肉 <small>炒各一兩</small>	
末蜜丸如菜豆不時粥飲下七九量加			
又			
訶梨勒皮 <small>兩二</small>	地榆 <small>各一兩</small>		
羅鍊蜜丸如菜豆粥飲下五九日三四意裁			
博濟治男婦一切酒食傷取積滯行冷氣保安丸			
巴豆 <small>半兩</small>	青橘 <small>炒色白</small>	黃連 <small>炒</small>	
蓬莖 <small>炒</small>	乾薑 <small>炮裂各一兩</small>		
細末米醋糊丸如麻子朱砂衣常白湯下二九大人三九霍亂吐瀉煨生薑湯下五九心氣痛用醋湯下三九白痢乾薑湯赤痢甘草湯兒減			
譚氏治水瀉赤白痢			
嬰粟殼 <small>炒</small>	肉豆蔻 <small>炒</small>		
細末二錢米飲調			

聖惠黃耆湯治下痢并冷熱	黃耆	芎	乾薑	人參
	黃芩	當歸	甘草 <small>各二分</small>	桂心 <small>一分</small>
	水三升煮升二合為二服內牛黃末五大豆許			
	嬰孺治兩月兒赤白痢日夜五十行			
	乾薑	白朮 <small>各五分</small>	茯苓	甘草 <small>各四分</small>
	附 <small>分三</small>			
	切水四升煮一升為四服此徐王方也檢痢條有			
	芒硝半合牡丹二兩 <small>附後治熱痢外臺治冷痢附子只二分</small>			
切幼新書	卷二十九			
錢乙治泄瀉不拘寒熱陰陽不調腹痛腸鳴豈菴香連丸				
黃連 <small>炒三</small>	肉豆蔻	南木香 <small>各一分</small>		
末粟米餅丸米大飲下一二三十九日夜各四				
寶鑑治赤白痢黑散子				
棗子 <small>去核五</small>	北礬 <small>一塊每棗入</small>			
末半錢水調赤者入好茶半瓊				
治赤白痢宣連丸				
宣連 <small>雞清作餅</small>	木香 <small>炒</small>			

末麩糊丸如蘿蔔子飯飲吞十九聚寶香黃丸直

用萊萸多呵皮白痢艾湯赤痢陳皮湯

張氏治下痢或赤或白不拘新久一服效

瞿粟殼一兩赤痢蜜炙一兩陳橘皮赤炙一兩白

甘草赤炙一兩白焙

末二錢百沸湯浸急蓋忽透氣少時藥微溫服清

者一二刻如法再服忌生冷喫粥五七日痢赤白

二藥合服

治一切酒食傷心腹痛嘔逆惡心不食暑月傷生冷

幼幼新書

卷三十九

十九

果蕪磨遠年積塊并赤白痢丁香丸

丁香

肉荳蔻

五靈脂各一兩

黑豆連皮十兩

巴豆燈上燒存性罐內

煨煙盡去油一兩

細末沸湯調一半豆末和藥搗丸黃米大服五七

至十九湯裁服伏暑傷冷桃枝湯積滯臨卧十九

赤痢甘草湯白痢乾薑湯忌熱物

莊氏治赤白痢薑橘散

乾薑

青橘皮

好臘茶

等分細末一錢米飲不時下

治感陰伏熱瀉痢紫金散

黃連茶黃等炒紫黑

末猪膽丸乳下兒米大一二十九飲下大人伏暑

倍萊萸兒意觀冷熱加減萊萸常服大消疳積遇

急服散

孔氏治赤白痢骨立

地榆一斤水三升煮升半去滓煎如飴空腹服

吉氏治赤白痢腹痛羸弱不食香連丸

木香

宣連

胡黃連

幼幼新書

卷三十九

二十

等分細末糊丸如萊豆服七至十九飯飲吞

治赤白痢

杏仁淨

巴豆霜各七個

百草霜

黃丹

末鎔黃蠟一錢丸隨年服赤艾湯白甘草湯

丁時菽治大小水瀉胃弱食減成赤白痢羸時腹痛

平胃散

丁香錢炒半

陳皮白去

白薑炮一

桂不見火

細末一錢沸湯鹽點意裁服

鄭愈治冷熱痢赤龍丹

大宣連巴豆炒

吳茱萸炒各一兩

末醋麵糊丸萊豆大黃丹衣服一九赤痢甘草湯

白痢白薑湯水瀉痢陳米飲

聖惠灸赤白痢秋末脫肛每廁腹痛灸第十二椎下

節間名接脊灸一壯炷如麥

白膿痢第六

寶鑑兒腸寒下白膿腹痛

顛顛治兒冷毒疳痢白膿疳日瘦不食腹痛

青木香一黃連

幼幼新書 卷二十九

末蜜丸如梧子一歲空心湯下一九量加藥性熱

不宜多忌生冷聖惠等分治冷熱痢

王氏治純膿白痢胎附丸

大附子一枚猪脂搗成油半瓊蘸附裂湧出冷去

皮臍末棗肉丸大人如梧子兒萊豆大服五七至

十九空心米飲下量加

純血痢第七

巢氏腸虛弱腸間脂與血俱下故痢如膏血

聖惠血隨氣循還經絡通行藏府常無停滯若為熱

毒所乘遇腸虛血滲入腸成血痢

外臺治熱毒血痢

犀角十分

地榆六分

蜜三分

地麥草五合

切水三升煮二升量服

又

葱白三兩

香豉三合

梔子七枚

黃連一兩

切水二升煮九合分服

療下鮮血梔子灰一錢水和服量加

療盡毒血痢萊荷湯

幼幼新書 卷二十九

萊荷根

犀角

地榆

桔梗

各二分切水二升煮九合服一合

劉氏療血痢

地榆

黃蘗

黃連

薑半

黃芩各六分

馬蘭子二分

茜根一兩

切水二升煮一升分服

食鑑生馬齒莧絞汁一合和蜜一匙空心服

聖惠茜根散治血痢體黃瘦腹痛不食

茜根一兩

地榆炙

馬蘭子炒

黃連

黃蘗炙 黃芩 當歸炒各三分

粗羅一錢水小瓊煎五分不時量服一方多於

羊角阿膠吳藍赤石脂

治血痢不止沒石子散

沒石子煨 肉豆蔻各半 檉根三分 茜根兩半

茶分

羅一錢水小瓊煎五分量不時服

治血痢身熱

髮灰 鹿角炒微焦 麝一分

初切新書 卷三十九 廿三

細散粥飲調半錢日三四

治血痢腹痛

益母草半兩水一鍾煎五分不時溫服

又露蜂房及不時乳汁調半錢

馬齒菜粥

馬齒菜汁合 蜜半 粟米合

水大瓊煮作粥入二味和食

治痢如膏血藜蘆散

藜蘆炙三 巴豆炒淨十 髮雞子 乾薑五塊

蜀椒合三 鹽豉炒升

末每二分與兒

張漢黃連丹治血痢

黃連兩二 當歸焙一分 白頭翁 葛菁根各

木香 川棟子炒累炮

羅粳米飯丸如黍米飲下十粒量加

厚腸丹治血痢腸虛

黃連 川棟子各一 木香 阿膠炙

吳茱萸炒 當歸焙各

初切新書 卷三十九 廿四

羅粟米餅丸如黍米飲下十粒食前量加

治血痢頻併必效丹

川黃連兩二 大棗升半 乾薑兩一 礬兩半

瓦器盛鹽泥固留一竅木炭火燒煙息羅末麵糊

丸黍大米飲下十粒

患眼治血痢及大腸血

地龍去 甘草炙各 槐花分二

末半錢陳米飲調

豨甲散

吹咀水三升者升二合兩月內一合一歲三合半

治中結腸團澁冷滯下赤白青色如魚腦脫肛腹痛

赤石脂分五 吳茱萸分三 乾薑炮 附炮裂

當歸 厚朴 白朮炮 木蘭皮

白頭翁 黃連 石榴皮 黃蘗各二分

末蜜丸如大豆二歲五丸量加暴下者服少許差

又側柏麻子末各一升水五升煮三沸百日服三合

又髮鹿角並灰牛角鯁灰蜂房灰蝮蟻並可飲服

又生地黃汁白蘘荷根汁煎服

切切新書 卷三十九 十一

聖惠人參散治膿血痢腹痛羸瘦不食

人參 當歸炒 地榆炙 阿膠炒

黃連炒 子芩 黃蘗炙 赤芍藥

燕美炒 厚朴薑炙各半兩

散一錢水小瓊璣白一莖豉五十粒煎五分不時

量溫服

養生黃連阿膠丸治熱痢下重膿血腹痛難忍老人

產婦虛勞小兒並宜

黃連兩 白茯苓 白芍藥 阿膠炒白

兩半

細末酌米醋熬膠入臼杵萬下衆手丸如菘豆食

前來飲服廿九加至五十九日三知為度兒丸如

米

嬰孺治注下及膿血寒熱不絕蠟蜜丸

鹽豉炒香八粒 巴豆淨霜十粒 大豆炒雞子大 黃連三寸

芫花 消石各一寸 白蠟雞子大

末鍊蠟丸四十日至百日兒服黍大二丸量加服

藥後隔三時許病不下再服大人如大豆三丸

切切新書 卷三十九 十八

王允治痢膿血裏急腰重臍腹痛道神丸

沒藥 五靈脂 乳香炒 巴豆淨七

研滴水丸如米末時生木瓜研水服一粒

千金治泄瀉膿血灸菟舍一百壯兒減在俠臍兩邊

相去各一寸翼云相去一寸

五色痢第丸

瀟東王先生治下痢腸虛胃冷或毒蘊積大腸虛者

變血痢瘕如雞肝隨痢下宜鮓湯丸

形證論歌

五色之痢最多端見此方知有五般青色只因驚積聚黃多食積在胃間白色冷虛腸胃患赤為積熱最難安雞肝隱積多成片黑血應知不易安唇搐胃高兼露齒臉紅筋出每居前急安藏府和湯散醫者留心按古賢

五色之痢莫言奇四歲之前始有之青色只因驚積聚黃因食積毒歸脾赤黑已知心腎病白多殘害是脾為肺家寒楊大鄴三七以前無變動休令多睡飲餐遲

和五藏補榮衛漸安如目腫不食楊云是惡疾只調胃

散補積熱

漢東王先生治瀉痢五色膿血如爛魚腦並無大便

腸中疔痛鮮魚湯丸

粉霜 輕粉 硃砂抄一錢

白丁香抄四錢 乳香半錢 巴豆淨七粒

末蒸棗肉丸嬰孩如粟三九二五歲如麻子旋丸

煎鮓湯吞日二間調胃藥

石壁經治下五色惡物心神煩熱

地榆 白茯苓 黃蘗各一兩

末一錢水一錢煎五分分三服

休息痢第十

肘後治痢經時不止成休息

龍骨炙黃焦搗服方寸七日三

又龍骨四兩搗如小豆水五升煮減半冷分五服

係生松焙餅子治一切塊癖滯氣血癥等二十年者

細墨焙半兩 芫花醋浸 青礬石 大戟

乾漆炒 五靈脂 荆三稜 蓬莪朮

蜜陀僧 陳皮去白 牡蠣燒各半兩 巴豆去皮

三虞果 大乾棗燒十個 白丁香 硃砂

蜜虫淨 斑猫各一

細末醋糊丸如阜子捻作餅以所傷物煎湯或麵

湯下一丸齒齧積漸移下再服再移更一九積

出常服麩湯血積塊癖經血閉塞久痢膿血休息

痢皆治

盡痢第十一

巢氏歲時寒暑不調有毒厲之氣兒解脫傷之與血

氣相搏入于腸胃毒氣蘊積值大腸虛變血痢瘕如雞肝片隨痢下是毒氣盛熱食于人藏狀如中蟲名蠱毒痢

石壁脾毒痢歌

脾間有毒號純陽本為醫人熱藥傷致使大腸多結澀多饒滴血在枯腸如風腹閉難開眼身熱頭溫脚轉涼舌赤曾高為此候多啼喘急細消詳形證更如狂

先解熱開胃涼脾去積

幼幼新書 卷三十九

形證風毒痢歌

八痢之中風轉難形如青草汁多般毒風豆汁添邪熱胃敗雞肝片片全加赤不須先下積閉眸食絕不堪看若歸白痢還瀆下藏府頻溫本得源

千金八物茜根湯治血下如雞肝腹痛名蟲毒痢

茜根

升麻

犀角各三

桔梗

黃蘗

黃連各一

黃芩各二

地榆

白蘘荷各四

吹咀水九升煮二升半分三服此蟲痢用之兒減治蠱毒痢藍青汁升二合分四服

圖經側柏葉焙川黃連等分煎汁服治男女小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如淀又殺五藏蠱

祕錄生地黄汁升二合分四服

聖惠黃連散治蠱毒痢血體瘦

黃連炒一

敗鼓皮炙

白頭翁

甘草炙

藍青各半

犀角

白蘘荷根

黃芩

茜根各三

幼幼新書 卷三十九

羅一錢水小蠱煎五分不時分服

犀角散治蠱毒血痢心神煩悶腹脹不食

犀角

白蘘荷根

地榆炙

桔梗

蘇枋木各三

羅一錢水小蠱煎五分不時分服

張渙白頭翁散治蠱毒痢脫肛

白頭翁

黃連炒

茜根焙

蘇枋木

破鼓皮炙各

甘草一分

地榆炙

犀角各半

羅一錢水小蠱煎六分乳前量服

地榆丹消毒止痛

地榆

黃連

乾藍葉

升麻各一兩

川棟子

苦棟根各半兩

羅軟飯丸黍大乳前米飲下十粒

形證論治毒痢宣連丸

宣連

末一錢雞子清和餅塗上燒

肉豆蔻

一個去心以乳香帶裹煨黃

朱砂

木香各半錢

杏仁

連皮燒

巴豆七粒各

末醋糊丸如蘿蔔子陳米飲下七粒赤痢槐花湯

孔氏薺花根搗飲服方寸匕入地榆臭椿根亦佳

幼幼新書

卷三十九

卅三

脫肛第十二

巢氏肛門大腸之候利多大腸虛冷兼因軀氣肛脫

聖惠大腸傷于寒痢而用力氣下衝肛門出

玉訣瀉血脫肛歌

脫肛瀉血本因傷冷熱攻脾損大腸消渴口瘡

添上熱氣浮虛腫面青黃

先調胃次下虛積次和藏府

石壁經番花脫肛歌

本為醫人用藥涼致令冷氣入回腸鼻頭一本六單

根只因多青脉唇白相兼更齒傍黃一初患百

朝常此候若經年月臉生光眉紅好哭唇乾燥

形候分明要審詳

温大腸止渴調氣勿食冷藥

顛顛苦葫蘆并子搗時時水調服忌動風物如瀉血

苦薑一個慢火燒熟研湯下一錢

錄驗治久痢脫肛

鼈頭炙焦一枚

東壁土

聖惠無

五色龍骨各五分

卷柏四分

幼幼新書

卷三十九

卅四

散傳

又鐵精粉傳

圖經天冷及喫冷食即暴痢不止肛脫

春收紫槿或是

花二斤曝搗磁石末七兩研細塗

肛上內入使人喫冷水面上即吸入日一度又熱

酒半升和散空心服方寸匕加至二寸七兒杏子

許忌生冷陳倉米等

聖惠死龜頭一枚酥炙卷柏龍骨各乙兩散傳授入

又枯鼈頭

酒炙三枚

葭若子

半兩

煮粥飲調半錢量加減

又雀糞半兩炮乾薑一分羅服一錢白麩半匙同投
作餅飪煮入鹽醋少許早服意裁

又蒲黃一兩猪脂二兩鍊和膏塗

又赤石脂伏龍肝研傅

又細墨末温酒調一字日三服

又燒桑葉熏一先傅蜘蛛灰又女萎五兩熏

又生鐵二斤水三椀煮一椀洗

黃連丸

黃連

蕪荑炒各一兩

蚶蛇膽半兩

切切新書

卷三十九

十一

羅軟餅丸如菜豆粥飲下五九日三四意裁

茅先生吳茱萸末餅飲調一錢服

又破故紙瓦上焙末飲調半錢服

張渙妙應散

蒼岩油炒

天台烏藥各半兩

白麩一分

龍腦半錢

末食前蜜湯調一字

保生治久病腸風痔痛腸出數寸極楚兒久利多此

五倍子四兩水五升煎湯一兩沸朴硝四兩入之

洗冷即止覺熱痛嚙津調熊膽塗痛止漸収甚者
淋洗三五次朴硝能軟五倍能収相須為用以蜘蛛
末摻乘熱軟帛搨之尤妙一方有龍骨

衛生水聖散

浮萍草末貼

萬全磁石丸治脫肛腹冷肛痛

磁石燒醋淬七

蛻皮炙黃

桂心

鼈甲醋炙黃淨 卷柏各一兩

末鍊蜜丸如菜豆三歲粥飲下七九量加

切切新書

卷三十九

十一

聚寶治諸痢脫肛象豆丸

榿藤子一名象豆出廣南如通州藤紫黑

末二錢血痢熱酒調白痢取仁碾銀器炒褐色

羅末蒸餅湯浸握乾丸豌豆大焙空心服十五至

廿九倉米飲下虫毒五痔脫肛並酒調末

石壁治翻花脫肛良薑散

良薑錢一 白龍骨兩半

末半錢空心飯飲吞

惠眼寬氣湯

腸出二三寸經日者白礬葱湯洗軟打嚏三二次
用五倍子白礬末乾塗急打嚏白絹作兜兜定用
蟻螂糞及艾燒熏

劉氏治脫肛

大附子皮去 龍骨 海螵蛸 臘脂

等分末搽腸上桑葉托或冷水略洗搽

張氏治風濕瘡毒脚氣膀胱小腸氣脫肛一應下部

風濕疾

蛇床子 吳茱萸 荊芥 防風

幼幼新書

卷二十九

世

苦參 蔓荊子 黃皮

等分末一兩水五升煎十餘沸先熏後洗用三五

度後藥貼

王氏葱湯洗次新砂器炒丁香研手爪挑彈上勿犯

手一有

又蓖麻子研塗頂心上即去產後腸出塗頂心催生

塗足心繞效即洗不爾腸出

又龍骨三兩朴硝五倍子各四兩末百沸湯浸溫洗

趙氏方

患兒頂上髮剪二寸許用山茄子貼

吉氏

柏花 萱葖 龍骨 呵子核去

敗龜醋炙

等分末半錢陳米飲下

又蝦蟆皮陰乾火燒熏

丁時發洗方

黃蘗 茯苓 當歸 烏梅

地榆

幼幼新書

卷二十九

世

等分煎湯洗

千金灸頂上旋毛中三壯又灸尾翠骨三壯又灸臍

中隨年壯

聖惠脫肛瀉血每歲府撮痛灸百會三壯頂心陷者

炷如麥

歧伯療脫肛瀉血秋深不效灸龜尾一壯炷如麥大

脊端窮骨

萬全灸第十二椎下節間各接骨穴灸一壯炷如麥

幼幼新書卷第二十九 漱秋齊刊

章禁之刊

幼幼新書卷第三十 血便淋痔 凡十九門

後學古吳陳履端于始輯

長洲徐澹孝升玄校

吐血第一

巢氏熱氣盛而血虛熱乘血血性得熱則流散妄行氣逆則血隨氣上故吐血

錢乙論補下不同段齋即子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血醫以桔梗湯防已丸治不愈涎上攻吐喘

不止錢下編銀丸痰涎復以補肺散補脾散治胃氣不和

幼幼新書 卷第三十

門問段氏肺虛何以下曰有熱故也久即虛痿涎上

潮而吐當下涎蓋吐涎能虛又生驚痰實上攻亦使

痰搖故宜下痰後補肺脾必涎止而吐愈若先補肺

為逆先下痰為順先下後補為良

寶鑑歌

血為榮子氣為衛二氣相隨無任滯忽然血動

氣來衝便是妄行忘本位血隨氣上奔心來吐

出如屠爭忍視便須服藥好看承解熱且令依

次第

簡要蒲黃研半錢生地黄汁調量服

又黃連末一錢水七分入豉廿粒煎五分量溫服

聖惠犀角散治四五歲非時吐血

犀角 梔子仁 生地黄 子芩

紫參 刺薊

等分粗羅一錢水小盞煎五分不時溫服減服

蒲黃散

蒲黃 亂髮灰各一分伏龍肝兩分

研細不時煖生地黄汁調半錢量服

幼幼新書 卷第三十

茜根散治吐血心躁煩悶

茜根兩分 犀角 川升麻 川大黃微炒

黃芩 甘草各一分

粗羅一錢水小盞黑豆卅粒淡竹茹半分煎六分

不時量服

又刺薊自然汁煖調玄明粉半錢服

又亂髮及溫水調一字張銳米飲調

嬰孺欬冬湯治欬嚔中有血

欬冬花 乾薑 阿膠各二兩 吳茱萸升一

桂心五

艾雞子大

鯉魚尺一個長一

杵細酒和置魚肚中銅器中蒸熟取汁大人一升

兒一合意裁

豚肺散治效逆甚者臯劔

豚肺好酒浸一宿旦取汁炙乾為末飲下一撮

升麻湯治熱病臯劔或唾血

升麻分八

淡竹青皮

羚羊角各五分

芍藥分六

生地黄分七

甘草分四

水三升煮一升一歲分三服

幼幼新書

卷三十一

三

張欽治吐血白茅花一錢水一盞煎六分溫服

又新綿燒灰一錢入少麝溫酒調米飲亦可

王氏治肺嗽喘息有音及熱搏上焦血溢妄行效唾

血出咽嗑疼痛煩渴嘔吐寒熱休歇減食羸瘦青金

散

白芨青黛等分研半錢糯米飲調下

嗽血第二

王氏解肌丸治外搏風邪內挾痰飲寒熱往來煩渴

頰赤心忪減食熱在上焦效嗽有血

防風

地骨皮

等分末燒沙糖丸食後紫蘇湯服一九

治嗽血團參丸

阿膠

皂兒黃

人參各半兩

阿膠為細末湯少許洋和如雞頭白湯化

朱氏雞清散治嗽血下涎

鬱金

半兩或酸棗汁煮水一盞

雄黃半兩

滑石生各半兩

細末一字薄苛湯調嗽螺粉水嗽血雞子清

臯劔第三

幼幼新書

卷三十一

四

巢氏兒經脈血氣有熱令劔夫血隨氣循行經脈通

遊巖府冷熱調和行依常度無有壅滯亦不流溢蓋

血性得寒即凝澀結聚得熱即流散妄行兒熱乘于

血血隨氣發溢于臯為劔凡血虛受熱血失常度發

溢漫行至發七竅為大劔

千金翼脈浮發熱口乾臯燥能食即劔

寶鑑兒心熱肺氣貫血隨熱入肺經為臯軌劔

患濟歌

欲劔之疾脈絃洪臯中乾燥響如風氣衝積血

停留肺藏府煩冤邪脉攻數合出紅猶可治更
加升斗命須終明師若欲知調治凉血清胃清肺
始有功

肘後乘耳熬焦擣篩取杏仁大塞臍亦可作丸又水調服
水鑑治百日兒臍衄

葵苓一字急吹之白礬水浴更相宜此是臍風
不消藥莫教虛誤妳頭兒

錄驗綿裹馬矢塞臍中又燒髮灰吹臍
聖惠升麻散治臍衄或嘔血

幼幼新書 卷三十一

川升麻兩半 羚羊角 甘草炙 黃芩

赤芍藥 等分粗羅一錢水小盞淡竹葉七片煎五分入地
黃汁半合更煎一二沸不時溫服

生地黄煎治臍衄不止
生地黄 刺薊並汁 蜜合 杏仁淨

阿膠半兩 黃燥 入銀鋸慢火熬膏不時新汲水調一錢量服

譚氏凝波散

寒水石 貝母 知母 馬牙硝川

亦得各 荷葉一兩水一升 末半錢蜜水調下

芽先生 山梔子半生半微炒 陳槐花分

末湯調半錢 張漢治無疾臍衄抵聖散

盆硝 髮灰 紅藍花 等分末綿纏搵藥塞臍

幼幼新書 卷三十一

張銳石榴花搗臍 大便血第四 聖惠心主血脉心藏有熱熱乘血血性得熱流散長

行不依常度流滲大腸令大便血出 千金鼈頭炙黃黑飲下五分日三外臺用鼈甲

水鑑兒遺血呼胎風人多不識上廁犯之三歲上解
後有鮮血並服

梨一顆去心入琥珀少許并蜜麩裹泥裏煨一伏
時去皮研水調服

秘錄雌雞翅下血服

聖惠羚羊角散治大便出血體熱黃瘦不欲食

羚羊角 黃耆 升麻 黃芩

甘草 地榆各一 生地黄兩半

粗羅一錢水小盞苦竹茹半分煎六分不時溫服

服

槐花散治大便血出腹痛黃瘦不欲食

槐花炒 白朮 熟地黄 芎藭各半

黃耆 甘草炙微 當歸 木香各一

幼幼新書 卷三十一 七

粗羅一錢水小盞煎六分不時溫服

治便血久不止面癢黃肌羸時腹痛不食卷柏丸

卷柏 阿膠炒黃 赤石脂各半 槐花炒

黃牛角炙焦 當歸炒 黃耆

芎藭各一

擣羅鍊蜜丸如麻子三歲粥飲下七九意裁日三

芽先生

枳殼去白 荊芥穗 甘草

等分末一錢陳米飲調

衛生紫參散療下血痛

臭椿根皮 貫衆 酸石榴皮燒 紫參

等分細末一錢米飲調腹痛艾湯

孔氏神效散治大腸血如痢

芍藥 地榆 甘草炙 陳皮

黃連 乾葛

等分末一錢米飲調日三

槐黃散治便鮮血

黃耆兩 當歸 槐花 白朮

幼幼新書 卷三十一 八

人參 芍藥各三

末米飲下一錢兒半錢

吉氏治瀉血不定是脾胃氣冷大腸風毒

大沒石子一枚 肉豆蔻一枚 茶末錢 樺皮錢二

末不時水如茶點服一錢

朱氏兒熱攻大腸病瀉血藏府疼痛漸如茶色難治

此傷寒出汗不盡或瘡出不足熱行大腸先解汗後

下氣攻大腸散

鬱金兩 乾薑兩半 大腹皮兩

末半錢陳米飲下

小便血第五

巢氏血性熱則流散心主血兒心藏有熱乘于血滲于小腸故尿血

千金燒鵲巢及并華水服亦治尿床嬰孺治大便血

聖惠阿膠散治尿血水道中澀痛

阿膠炒一兩黃

黃芩

梔子仁

甘草炙

車前子各一

羅新汲水調半錢日三四意裁

幼幼新書

卷三十

九

又

地榆白皮

生地黄各半

甘草炙赤

劉水小盞煎六分溫服意裁

又

苦楝子兩

鬱金二枚

炮一枚生

細羅葱湯調半錢意裁

又

紫苑

甘草炙

黃連各一

粗羅一錢水小盞豉卅粒煎五分減服

又

葵子

車前菜

甘草炙

朴硝各一

粗羅一錢水小盞煎五分溫服

又

牛蒡根搗絞汁入蜜服半合日三四量服

張渙車前散治熱積小腸盛則尿血

牡蠣半兩

車前子

川朴硝

甘草炙各

羅散一錢水小盞煎五分溫服意裁

吉氏地黄散

幼幼新書

卷三十

十一

菘豆粉

滑石各一

甘草炙半

兒心脾肝積熱如火人脾受病傳腎有三陰三陽

脉兒八歲下只有三陽脉故心脾肝受病不傳腎

傳小腸小腸風熱極故尿血新汲水服二錢忌熱

食酸醎

千金灸第七椎兩傍各五寸隨年壯

大便不通第六

巢氏脾胃為水穀之海水穀之精化為血氣糟粕行

于大腸若三焦五歲不調熱氣歸大腸熱實故大便

燥澀

千金紫雙丸主身熱頭痛食飲不消腹脹滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起兒無異疾准飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱此治不差再服

巴豆熱淨

麩仁各十

麥門冬各十

甘草各五

甘遂

真珠各二

牡蠣各

蠟各八

湯熟洗巴豆研新布絞去油別搗甘遂甘草牡蠣門冬細篩搗巴豆麩仁極熟內諸藥更搗三千杵

幼幼新書

卷三十

一一

三三

藥燥入蜜半歲服如荏子一二歲如半麻子三歲如麻子四五歲如大麻子量加大並雙丸雞鳴服日出不下飲熱粥汁數合丸皆雙出下甚冷粥止

聖惠大黃散治藏府壅熱心神煩躁大便不通

川大黃微炒

紅雪各一

犀角

川升麻各半

兩

當歸

赤芍藥

甘草各一分

粗羅一錢水小盞煎六分三四歲溫服一合更量加日三四利為度

治大便不通心腹壅悶即煩喘通中丸

巴豆霜仁

阜莢皮不炒者去

大黃炒各兩

末煉蜜丸如菴豆四五歲湯下三九意裁

大黃丸治大便不通心腹壅悶

川大黃兩炒

枳殼炒

郁李仁

梔子各三

羅鍊蜜丸如麻子湯下五九意加

桃葉湯治大腸不通臍腹妨悶

桃葉搗

木通兩

燈心五大

川朴硝一兩

葱白七

劉醋漿水二大椀煎十餘沸去滓傾盆中稍溫坐

幼幼新書

卷三十

十三

三三

兒盆內帕裹滓熨臍下冷即出之後喫地黃稀粥半盞

走馬煎治大便不通連腰滿悶氣急困重

羊膽一枚

蜜合

鹽花兩半

煎如錫撚如筋長一寸內下部

治大便不通心腹煩滿

青鹽末內臍中手摩大人亦用嬰孺內下部手摩

茅先生治大便不通目赤瘡癩腫熱毒心熱

大黃一分

黑牽牛半

檳榔半錢

朴硝二錢

末一字半錢蜜湯調

嬰孺猪胎水煮服五合日三

又蜜煎可索索如七柄內下部二寸許

又羊膽汁灌下部

調中利大便牛黃丸

牛黃

大黃

麝

等分末蜜丸如小豆飲下二九日再利為度

張欽方麻子水研汁飲

外臺灸口兩吻各一壯

切切新書

卷三十一

十三

小便不通第七

巢氏小便不通腎與膀胱熱二經為表裏俱主水水

行小腸入胞為小便熱氣在藏府水氣澀故小便不

通

顧願治小便不通

茯苓

通草

冬葵子

車前子

等分水四合藥半兩煎合半作二服忌油

千金車前草小麥各一升水二升煮升二合去滓煮

粥服日三四

水鑑兒百日內忽患陰風疾多殺人尿不利以熱治

疾轉甚蓋兒在胎計父母陰陽毒氣或犯兒生下百

日而有斯疾醫者不辨用冷藥轉之不安長大遂患

陰癥此多尿澀及痛一尿十餘節作淋治與石草犀

角類甚非宜服此

附子燒灰使半枚水精一分力難排父母手煎

添水蛙一功加須得土衣臺向陽瓦

量日數服效

外臺療忽不得小便急悶

切切新書

卷三十一

十四

葱白握

通草兩

冬葵子合

切水二升煮一升量服

滑石湯治熱極病小便赤澀或不通輒大呼

滑石分十六

子芩分四

冬葵子分八

車前草升一

水二升煮一升一歲至四五歲服一合日再

聖惠赤芍藥散小便不通心悶

赤芍藥

瞿麥

木通

陳皮焙

牽牛子炒 冬葵子各一

粗羅一錢水小盞葱白一莖煎五分不時分溫服

梔子仁散治小便不通臍腹妨悶心神煩熱

梔子仁五枚 茅根 冬葵根各半兩 甘草一分

粗羅散一錢水小盞煎五分不時分溫服

治小便不通浸慰湯

木通兩一 薑兩二 葱白七莖 陳皮兩半

川枳兩半

劉水二大椀煎五七沸傾盃內坐兒浸之滓熨臍下

地膚子散治積熱小便不通

幼幼新書

卷三十一

十五

二百七

地膚子 瞿麥 冬葵子 知母

黃芩 川升麻 木通 川大黃炒

猪苓各半兩

羅散一錢水小盞煎六分不時分溫服

車前散治小便不通臍腹急痛嬰孺多滑石

石韋去毛 瞿麥各半兩 小麥一兩

劉水二大椀煎一盞取一合調滑石末半錢

治小便不通小腹妨悶

葱白一斤連須切煮熟綿裹熨臍下

譚氏芥菜子爛研紙花貼臍下

茅先生滑石山梔等分末半錢濃煎燈心湯下

嬰孺泥臍方

滑石一升末車前子汁和泥臍廣四五寸乾即除

別泥冬月水和

滑石湯治熱病小便赤澀不通尿輒啼

滑石斤十六 子苓斤十四 冬瓜子斤八 車前子升

通草斤十二 茯苓斤五

水四升半煮升二合二歲為三服百日一合

幼幼新書

卷三十一

十六

二百五

聚寶方

獨顆大蒜一枚 鹽花許 梔子仁三七枚

爛搗攤紙上貼臍下更塗陰囊

大小便不通第八

巢氏藏府冷熱不調大小腸有遊氣不得宣通故壅

塞不流利

楊大鄴曰兒乳食失度使四大不調滋味有貪遂五

藏受病甘甜聚食鹹酸滯涎留結于胃腸風壅漬癖

于心肺氣脉不順水穀不行雖不逆于上焦即秘結

于下部兒不知疼痛難說因由驚啼以頻頻但怒脹而不乳不知痛刺連臍則面色青黃但按脉與治若不見病源只依外變用藥免效

千金白花胡葵子末煮汁服

外臺蜜酒內下部嚼生葱綿裹少許內小便道中

錢乙郁李仁丸治襁褓兒大小便不通并驚熱痰實

欲得澹動

郁李仁

川大黃

取實者到酒浸半日控乾炒各一兩滑石兩

郁李仁研膏和丸如黍食前乳汁或薄荷湯下

幼幼新書

卷三十

十七

犀角丸治風熱痰實面赤大小便秘澀三焦邪熱

府蘊毒疎瀉穩甚

生犀

人參

枳實

檳榔

黃連

大黃

二兩酒浸切去皮巴豆百粒貼大黃上紙裹餅上蒸三次炒黃

細末煉蜜丸如麻子服一二十九臨卧湯下未動

加孕婦無損

惠眼治大小便用藥不通者為藥散

芍藥

大黃

甘草

當歸

朴硝

等分末一大錢水一盞瓦器中煎服半盞即通

吉氏甘草節炮槐花為末茶點服一錢

千金灸兩口吻各一壯

大便失禁第九

千金治老人小兒灸兩脚大指去甲一寸及大指奇

間各三壯

小便數第十

東氏腎與膀胱為表裏俱主水腎氣下通于陰二經

俱受客熱則水行澀故小便不快而起數

幼幼新書

卷三十

十八

張渙雞腸散治膀胱有熱服冷藥過多小便不禁或

遺尿

雞腸草

牡蠣

龍骨

麥門冬

白茯苓

桑螵蛸

粗散一錢水小盞薑少許棗二枚煎六分量溫服

大便青第十一

聖惠驚氣及脾氣不和大腸虛冷乳食不消冷氣搏

糟粕故大便青

白朮丸治大腸虛冷乳食不消大便青

白朮

白芍藥

木香

當歸一分

麝香

羅末煉蜜丸如菴豆粥飲研五九日三意加減

陳橘皮丸治內冷大便青不欲食是胎寒

陳橘皮焙

當歸炒

人參

白芍藥

芎藭各半

甘草炙

擣羅煉蜜丸如菴豆三歲兒溫粥飲下三九日三

意加減一無陳皮

治胎寒腹痛大便青木香丸

幼幼新書

卷三十

十九

木香

蓬萊茂

白朮

人參

當歸微炒各

麝香

白芍藥各一分

羅末鍊蜜丸如菴豆大三歲粥飲下七九意裁日

三

小便白第十二

莊氏兒尿作白米泔狀未見皆泔乃膈熱

越桃一枝即山梔

燈心廿莖煎湯細呷即尿清

吉氏金露散治心歲熱口瘡目赤尿如米泔

礬金兩半

甘草生二兩

滑石錢

細末一字冷麥門冬湯調下

小便淋瀝第十三

巢氏諸淋者腎與膀胱熱也膀胱與腎為表裏主水

水入小腸下于胞行于陰為小便腎氣下通于陰陰

水液之道路膀胱津液之腑膀胱熱津液內溢而流

于澤水道不通不上不下停積于胞腎氣不通于陰

腎熱其氣澀故水道不利小便淋瀝為淋其狀小便

少起數小腹引臍急痛又有石淋氣淋血淋寒淋諸

幼幼新書

卷三十

二十

淋證隨名具說于後一方同治故謂諸淋

茅先生砂石淋便出沙石腎有客熱冷淋遺下白色

時時滴瀝下焦極冷熱淋澀痛不出腎有客風血淋

如血此五歲甚熱並用滑石散夾羊屎散如調理冷

淋夾溫藥如面黑吐眩不進食惡叫唇縮死

張漢兒淋與大人同甚者臍下妨悶心神煩熱

玉訣歌

小便淋瀝膀胱熱氣滯因風腸裏結聚積胞中

砂石淋熱極氣攻還變血

鮮熱利小腸風毒又利小便心云通氣

石癖歌

五淋之病熱相傳一一瀕不病本源或即叫啼

生水積忽然餐食在脾間次後復還歸腎藏至

今淋瀝小便怯但觀眼尾紅筋見雲一紅有血相

和汗不乾至一青筋垂肚上青筋垂至腹至伏

陰囊定知砂石痛難安兩唇乾燥如皮退形證

米樣如同粟此是風淋定惡瘥下陰不腫氣不急下

陰纒腫氣相煎先與寬腸海金散風髓寬必能

幼幼新書 卷三十

通達使安全

膀胱熱逼水聚結砂若肺氣滯使小腸不示亦為

淋脾積而飲食不足亦為淋去膀胱毒氣次寬胞

脹愈

千金地膚子湯治熱毒入膀胱忽小便不通便則澀

痛出少如血須臾復出

地膚子 瞿麥 知母 黃芩

枳實炒 升麻 葵子 猪苓各六

海藻 陳皮 通草各三 大黃炒十

吹咀水三升煮一升二七日兒一合為三服量加

七歲兒加藥益水

千金車前子冬葵子及蜂房髮灰皆可煮服

又鍊臘月猪脂去滓栗殼許酒一合煖調空心午各

一服

圖經衣魚摩臍及小腹即瀉

聖惠石燕丸治諸淋臍下妨悶心神煩熱

石鸞 瞿麥 梔子仁 滑石

木通 葵子 海蛤

幼幼新書 卷三十

等分羅末鍊蜜丸如菘豆葱白湯下七丸量加日

三四

石韋散治諸淋澀莖中痛臍下痞滿

石韋去毛 葵子 木通 赤茯苓

車前子 瞿麥 榆白皮各半 滑石一

粗羅一錢水小盞葱白五寸煎六分分二服如久

行十里再服量加

又

石韋 赤芍藥 川大黃 麥門冬焙

甘草赤	川升麻	川朴硝各一
粗羅一錢水小盞煎六分不時分減服		
車前子散治諸淋心煩悶亂		
車前子	麥門冬	石鷲
等分羅散一錢水小盞煎五分不時量分溫服		
張漢石韋散治諸淋澀莖中痛臍下悶		
石韋兩一	冬葵子	木通
兩	車前子	瞿麥
滑石	甘草各一	榆白皮
幼幼新書 卷三十		
羅一錢水小盞葱白五寸煎六分量服		
朱砂散治心神煩躁便赤		
朱砂兩一	滑石	犀角各半
兩	車前子各一	黃芩
甘草赤	羅食前竹葉湯調半錢	
寶鑑滑石散治淋		
滑石	瞿麥	葵子炒
甘草炙	山梔仁	海金沙
研燈心葱湯調半錢		鬱金各一

鄭愈通神散治淋		
石鷲子炒一	石韋各一	海金沙
末一錢酸漿草湯下二服效		木通各二
石淋第十四		
巢氏石淋者淋而石出也腎主水水結化為石故腎		
容砂石腎為熱所乘成淋小便莖中痛尿難卒出時		
痛引小腸膀胱裏急砂石從小便道中出甚者水道		
塞痛悶絕		
肘後牯牛陰頭毛燒灰末醬汁服一斗圭日再		
幼幼新書 卷三十		
外臺療		
榆皮	瞿麥各六	
切水一升煮半升分溫服		
聖惠葵子散治石淋莖中痛		
冬葵子	石南	榆皮
木通各半	滑石兩一	石韋去
細羅葱白湯調半錢日三四意裁		
治五七歲兒石淋雞糞白散		
雞糞白一兩炒福黃細羅水大盞露一宿用一合		

調半錢服量加日三下砂石下
又桃膠半兩湯一瓊化去滓不頻服

氣淋第十五

巢氏氣淋者腎虛膀胱受肺熱氣則脹肺主氣氣為熱所乘故流入膀胱膀胱與腎為表裏膀胱熱則氣壅不散小腹氣滿水不宣利故淋其狀膀胱小腹滿尿澀有餘澀亦曰氣癃少陰脉數男子則氣淋集驗抵聖散治氣淋

赤芍藥生一兩 檳榔麩裹煨一枚

切切新書

卷三十一

三

末一錢水一瓊煎七分空心日三

熱淋第十六

巢氏熱淋者三焦熱氣傳腎與膀胱流胞成淋聖惠腎主水膀胱為津液之府二經為表裏而水行于小腸入于脬為小便今歲府有實熱熱入脬故小便赤澀

子苓散治壅熱小便赤澀莖中痛難忍

子苓

冬葵子

車前子

茅根

各一兩

滑石二兩

粗羅一錢水小瓊煎六分不時意不飲

大青散治歲府壅熱心神煩躁小便赤澀

大青

川升麻

瞿麥

甘草炙

黃芩各半兩

川大黃微炒

川朴硝

滑石各三分

細羅不時湯調半錢意裁

又方

生地黄汁合二 牛蒡葉汁 蜜各一合

和服一合滑石細末半錢更量

滑石散治熱極小便赤澀尿氣喘莖中痛

切切新書

卷三十一

三

滑石一兩

子苓

車前子

赤茯苓各半兩

冬葵子

木通各三分

粗羅一錢水小盞煎五分不時手溫服

車前子散治小便赤澀服藥即通無藥即澀

車前子

子苓

赤茯苓

琥珀各一兩

滑石二兩

木通三分

甘草炙赤半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時分溫服

血淋第十七

巢氏心主血行身遍經絡循環府歲熱甚血散失其

常經溢滲胞而成血淋

聖惠犀角散治血淋涇痛心躁體熱

犀角 黃芩 石韋去毛 當歸

赤芍藥各半 蒲黃一兩

粗羅一錢水小瓊生地黃青竹茹各半分煎五分

不時分減服

又車前子茅根等分粗羅一錢水小瓊生地一分煎

五分不時分減服

又榆白皮瞿麥蒲黃等分粗羅一錢水小瓊煎六分

幼幼新書

卷三十一

廿七

二百五十九

不時不溫二服

譚氏通神散

石鷲一個 石韋半兩

末煎酸漿草湯下甚者三服大人半錢兒一字

張渙蒲黃散治膀胱熱甚血淋莖中涇痛

蒲黃 冬葵子 生地黃各半

羅細末一錢水大瓊煎六分溫服意裁

鳳髓薑黃散

薑黃細末半錢酒調下日三利勿服丁時後多輕

調水

寒淋第十八

巢氏寒淋者先寒顛後尿兒取冷過度下焦受冷入

胞與正氣交爭寒氣勝則顛寒正氣勝則顛寒解故

得小便

宋義疴加參八味丸治陰虛小便難并寒淋

熟乾地黃八兩 山藥 山茱萸各四 澤瀉

赤茯苓 牡丹皮各三 桂皮 附

元參 赤芍藥各二

幼幼新書

卷三十一

廿八

二百六十

末煉蜜丸梧子大赤茯苓湯下卅九日二兒小丸

如菜豆量服

痔疾第十九

巢氏痔有牡痔牝痔脉痔腸痔血痔酒痔皆勞傷過

度損動血氣所生兒未有虛損而患痔止是大便血

出腸內結熱故也

聖惠蠶甲散治痔疾肛邊生結按疼痛寒熱

蠶甲淨醋 蝟皮炙黃 各各 蛇各 天各 檳榔各三

露蜂房微炙 麝香分 猪懸蹄甲炙 七枚

細羅食前粥飲調半錢量加

桑木耳散治痔久不差肛邊痒痛

桑木耳炒微 槐耳微 蝟皮炙 當歸微

羌活各半 枳殼一兩

細羅粥飲調半錢日三四量服

槎藤子散治痔下血無時

槎藤子去殼微 牛角鯁一兩 阜莢子百枚

與槎藤子炒一兩 醋石榴皮兩

細羅温酒調半錢日三四意裁

龜甲散治痔結硬揪痛

龜甲醋炙 蛇蛻燒 露蜂房微炙 麝分

猪後懸蹄甲一兩

細羅温酒調半錢日三四量加

治痔下血熱毒流注發歇疼痛槐戴散

槐戴 側柏炙 荆芥穗 機櫚灰

黃牛角鯁燒 牛膝各半

細羅粥飲調半錢日三四量加

治痔下血發歇不定

荆芥 枳殼微炒 薄荷各一兩

細羅粥飲調半錢日三四意裁

坐藥方治痔疼痛腫硬不消

蛇床子 荆芥兩 蝟牛三枚

爛研塗紙上發時白礬湯洗痔頭被褥上安藥紙

坐兩三上

治痔下血肛邊生鼠乳疼痛檉株菌子丸

檉株菌子 黃牛角鯁一兩 葫荽子合

蝦蟇一枚 鰻鱺魚頭一枚

羅水煎白膠香丸如彈子餅內裝香法燒一九熏

下部

治痔下部痒悶熨藥方

枳實微炒 鬼箭羽 木香 鬼臼各一兩

粗羅頭醋和炒熟青布裹熨日二

張漢蝟皮散治痔由勞傷過度損動血氣其裏有虫

微細難見

蝟皮燒 鼈甲微炙 蛇蛻一兩 麝錢

露蜂房微炒

末半錢米飲調量加

櫻櫚散

櫻櫚灰

荊芥

側柏各一兩

牛膝

枳殼

黃耆各半兩

細羅半錢乳前米飲調

王氏治腸風下血或成痔烏金散

槐花銀石一兩炒

荊芥穗半兩

枳殼二錢炒

細羅一錢米飲調兒半錢

下時發治痔下血大腹疼痛蠅皮散

蠅皮各一兩

枳殼炒

當歸

槐花各

木賊各一兩

末半錢米飲調日三

末半錢米飲調日三

幼幼新書卷第三十

幼幼新書卷第三十一

三蟲癩疝 凡九門

後學古吳陳履端于始輯

長洲徐淳友仲仁校

蟲動第一

巢氏三虫者長虫赤虫蛻虫也猶是九虫之數長虫
蛻虫也長一尺動則吐清水而心痛貫心即死赤虫
狀如生肉動則腸鳴蛻虫至細微形如菜虫居洞腸
間多則為痔極則為癩因人瘡處以生諸癰疽癬癩
疔疥齧虱無所不為此九虫內之三者而今別立名

幼幼新書

卷第三十一

三種偏發動成病名三虫

肘後虫有九種蛻虫寸白人多病之寸白從食牛肉
飲白酒所成相連一尺則殺人服藥下之須結裏潰
然出盡乃佳若斷者相生未已更宜速除蛻虫兒多
患之大人亦有令心痛清朝口吐汁煩躁餘種不利
人人胃中無不有者宜藥除之

錢乙虫痛面皸白心腹痛有時口吐沫及清水主安
虫散兒怯者多此積痛食痛虛痛大同小異惟虫痛
口淡而沫自出治宜隨證

兒怯故胃虛冷則虫動而心痛與癩略相似但目不斜手不搐

虫痛訣死辛氏女五歲病虫痛諸醫以巴漆礪砂類治之不效五日外多哭卧不安自按心腹時大叫面無正色青黃白黑無定目無光而慢唇白吐沫至六日曾高卧不安錢用蕪荑散三服目不除青大驚曰病大困若更瀉為逆次夜果瀉下如藥汁攪之有藥丸曰此子肌厚當氣實今證反虛不可治何也脾虛胃冷則虫動冷反目青此肝乘脾又加瀉知氣極虛

藥隨蠶下脾胃已脫蕪形病不相應故知死五日後昏篤七日死

張渙兒胃久不和須虫動令腹痛甚者行來上下痛有休止狀若風候六七歲不因吐瀉而得者多是食甘肥物等若攻心即致夭折

外臺雞子丸療長虫

雞子白三枚 乾漆熟四兩 蠟三兩 粳米粉半斤

銅器中微火煎攪內粉凝可丸置土上纔溫內雞子攪又煎令可丸宿勿食米飲下小豆許百升丸

兒五十九

范汪白飲丸療三虫

白飲 狼牙 藿蘆 桃花

貫衆各三分 橘皮一分 蕪荑一分

篩蜜丸如小豆宿勿食旦以漿水服一劑日中乃食立下甚驗妊婦勿服

圖經主無辜癰寒熱大腹殺虫

苦舩苗子煮汁服生搗絞汁亦研傅兒閃癰生故

整間高二三尺子作角如撮口袋子如珠熟則赤

茅先生取疳虫檳榔散

檳榔 雷丸去皮 史君子肉 畫粉各半兩

膩粉一分

末一錢炙牛肉摻喫不久即便取虫

嬰孺貫衆丸治九虫

貫衆炒五分 藿蘆炒十分 狼牙子 蕪荑炒各四分

石蚕 雷丸 蜀漆 蠶蚕

厚朴各三分

末蜜丸桐子大夜卧晨起苦酒漿服七九日三知

為度貫眾主白虫蠶蚕主弱虫翟蘆主長虫狼牙
子主胃虫蕪荑主肉虫石蚕主虻虫雷丸主赤虫
蜀漆主肉虫厚朴主肺虫夫九虫者一伏虫廣一
寸長四寸二長虫名虻虫長一尺貫心害人三白
虫長一寸四肉虫如爛杏令煩滿五肺虫形如蚕
令欬逆六胃虫如蝦蟇令嘔逆七弱虫如瓜瓣令
多唾煩滿八赤虫如生肉令腹鳴九虻虫如疔虫
令下部痒悉主之驗

錢乙安虫散博濟名霍虱散

幼幼新書

卷三十一

中

胡椒炒

檳榔

川棟子

去皮

鶴虱炒各二兩

白礬

缺器熬一分

細末一字大者半錢温米飲調痛時服

蕪荑散

白蕪荑

去弱

乾漆炒

等分細末半錢一錢發時米飲下杜壬治胃寒虫

治虫咬心痛欲絕

五靈脂

錢二

白礬

枯半

研一二錢水一盞煎五分不時温服吐虫

張漢黃金散治吐利後虫動

乾漆

兩一

白蕪荑

兩半

精明雄黃

水磨三分

肉苳蔻

兩半

研極細半錢葱白湯入油一渾調冷即再温乳前

治久痢虫動傷寒蛔厥烏梅丹

烏梅肉

炒焦百枚

川大黃

兩三

當歸

焙

乾薑

各二兩

附子

炮裂

細辛

桂心

去皮

人參

蜀椒

炒香

黃蘗

各一兩

末煉蜜丸石臼中搗一二百杵丸如黍米飲下十

幼幼新書

卷三十一

五

粒更量

化虫丹治食肥甘過度虫動

雀虱

煉

檳榔

苦棟根

各一兩

胡椒

白礬

飛各半兩

細末麵糊丸如黍不時温漿水入油一點下十粒

醫局云兒病多虫或腑藏虛弱或食甘肥動則腹

痛結聚往來上下痛無休攻心痛叫哭合眼仰身

攢手心神悶亂嘔噦涎沫清水四肢羸困面色青

黃食不生肌或寒或熱沉沉默默不療相生不已

長一尺害人

治虫動啼叫香雷散

雷丸

苦棟根

淡蕪萸

霍亂各半

細末半錢生猪肉淡湯調下不時

奪命丹治虫動攻心危困

狼牙子

篇竹

苦參各一

雷丸

霍亂

薏苡仁各半

細末糯米飯丸如黍生地黄汁下十粒更量

穀精丹治諸病下虫如髮如絲如馬尾甚者天

切切新書

卷三十一

木

穀精草

三兩入餅內
鹽泥固煨赤

瓜蒂

胡黃連

母丁香

各半
兩皂莢三十

乾蟾三枚端午
取酥炙

蘆會

粉霜

麝各一

研猪膽汁和如黍温米泔下十粒量加

劉氏治驚風疳虫

蟾酥

杏仁

青黛

胡黃連

蘆薈

坯子臘脂無油者
各半兩

麝分一

瓜蒂七

天竺黃字一

未獷猪膽丸小豆大一歲一丸妳汁下

莊氏腹痛額有汗即虫

史君子廿個并殼擣水煎温服

退黄去塊殺虫斧碓膏

綠礬斤一

膽礬兩半

京三稜兩二

硃砂兩一

未銅石器內好醋熬醋盡用棗瓤淨石上塗油少

許斧碓成膏丸菜豆大不時温米飲下一九日三

李賓治兒忽不省人事叫喚身向上踊素問謂虫厥

蓋胃寒則虫聚捨心

麝木香各一錢末分兩服煖酒下一服定再服醒

切切新書

卷三十一

七

麝安虫去穢木香温胃

丁時菝治諸蠱化虫

蕪萸

霍亂炒各

檳榔一枚重
二錢

未猪膽丸陳米飲下七粒至十粒量加

鄭愈治諸虫蘆薈丸

蘆薈錢二

輕粉分五

硫黃錢一

丁香三錢

蜜陀僧金色者
兩一

水一椀銀石器煮取蜜陀僧碾末如惡瘦用炙肉

少許藥一二字飭飲下如黑糞是虫化

蛭虫第二 蛭音

巢氏蛭虫九虫之一長一尺有長六七寸者或腑臟
虛弱或食甘肥動則腹痛發作種聚行來上下痛有
住止亦攻心痛吐涎及清水貫傷心死腹痛脉當沉
若弦今反洪大是蛭
寶鑑兒未三歲食雞肉變虫咬心痛
石壁經歌

只為從前喫食粗虫生脾內瘦肌膚愛甜怕苦
一作食多生痛痛便高聲病不除形容但看人中上

幼幼新書

卷三十一

九

從鼻并唇口亦烏乾漆去虫兼定痛蛭虫盡取
痛皆無

脾熱食物粗停久不化感人血氣而化虫形類不
一如馬尾如釵條如瓜子治當調氣血去積毒生
肌肉次去虫定痛行經脉安五歲

形證論虫虫早病盤腸脾氣四候相切磋只人中黑
是虫

顛顛治虫虫咬心面伏地卧吐清水痰涎

檳榔

苦棟根

雀虱

炒各半兩

未空心熱茶下一錢意裁忌粘食

治虫渴杏仁丸

杏仁膩粉各一分末嚙丸空心米飲茶任下二丸

千金擣槐子或棟實內下部 亦治虫

靡蕪丸治蛭虫數發腹痛微下白汁吐悶寒熱食不

生肌痿黃四肢不舉

蕪蕪

貫衆

雷丸

山茱萸

天門冬

狼牙 各八分

甘菊花

藿蘆 各四分

末蜜丸如大豆三歲五丸五歲十丸加藿蘆六分

幼幼新書

卷三十一

九

名藿蘆丸老小婦人腹內冷熱不通急滿痛胃膈
堅滿手足煩熱上氣不食氣腫腰脚不遂腹鳴如
水雞聲婦月經不調悉治

兵部治蛭齧心腹

雀虱細研肥猪肉汁下五歲二分虫出止餘藥以

意增

陶隱居薏苡仁根煮汁糜食

圖經治府蛭鷓鴣屎紫色如花碾末炙猪肉點散

聖惠貫衆散治虫攢心合眼撲手心悶

貫衆 狗脊 狼牙草 葶藶

等分粗羅一錢水小盞煎五分不時量溫服

青箱子散治蛔發心痛多吐

青箱子 苦參 黃連 篇竹

狼牙草各三 雄黃兩半 桃仁炒 雷丸各一

羅一二歲不時稀粥飲調半錢稍大加下部痒綿

裏內日二

苦楝根散治蛔

苦楝根 雀虱 薏苡根 牽牛子微炒

切切新書 糯米炒

檳榔各一 糯米炒

散三歲兒粥飲調半錢日三

桃仁散治蛔咬心

桃仁炒 木香 狗脊 白蕪荑

狼牙草 苦楝根皮 雀虱 檳榔各半

散三歲兒苦楝根湯調半錢日三四量加

治蛔虫咬心疔痛四肢逆冷乾嘔不吐面青

胡粉分 膩粉兩半

細研五歲粥飲下半錢意裁羊子肝一具熟細切

拌藥與食

麝香散治蛔咬心或吐清水

麝香 葶藶 苦楝根各一

細羅獺猪膽三枚汁和曝研末蕪荑湯調半錢意

裁

又東引醋石榴根半兩檳榔一枚切水大盞煎七分

去滓入米半合煮稀粥空心食虫下量加

嬰孺方

巴豆一粒淨 桃仁二枚

切切新書 糯米炒

未丸之先宿不食黍米濃泔半升下一丸大人服

盡五歲兒服其平泔冷飲熱即發

張渙木香桃仁丹治蛔攻心

木香 桃仁炒 黑狗脊 雀虱淨各

檳榔分 苦楝根皮兩半

細羅獺猪膽汁丸如黍點麝湯下十粒不時

萬全雀虱史君子等分末肥猪肉汁調半錢

形證論蛔疳散

史君子分 檳榔枚 輕粉字 定粉錢

茴香 黃丹 苦楝根半錢

末一二錢臨卧肉汁湯調下二三服虫下後調氣

趙氏兒熱後吐逆不止或躁渴飲水即吐稍定或發

驚癇或用手向口探取皆蛔攻心所致醫只止吐治

驚必不驗又蛔三兩日向上攻心吐逆不止五七日

垂頭向下當安虫藥治之未驗服取虫藥兒患傷寒

無汗亦由虫攻仲景謂蛔厥凡有蛔者眼多赤脉

徐助教安虫寸金散

乾漆炒煙盡 雄黃兩半

研新汲水及油一二滴調下一錢

蛻虫第三

巢氏蛻虫者九虫之一形甚細小如痲虫因腑臟虛

弱而致甚者成痔瘻癆疥

聖惠治蛻虫下部中痒大棗膏張漢多雄黃胡粉

大棗肉蒸二枚 水銀分半

研星盡捻作挺長一寸綿裹宿內下部旦虫出

胡粉散治蛻虫蝕下部

胡粉雄黃等分研傳

又

槐根白皮 桃仁 苦楝子

等分羅猪膏丸如棗核內下部更以葱白兩莖去

須煮濃汁温飲半合

寸白虫第四

巢氏寸白九虫之一長一寸色白形小褊因府藏虛

弱而發動或飲白酒或乘枝串牛肉炙并食生栗所

作或食生魚即乳食酪而生動則損人精氣腰脚疼

弱

聖惠寸白者因恣肥甘生冷所致動則傷人府藏食

不成肌子女相生無窮長一尺殺人

青黛散治寸白虫久不除面無顏色體瘦少力

青黛 雀虱各一 苦楝根微炙 檳榔一枚

末喫淡肉脯少許粥飲調半錢意裁日二三

雀虱 雷丸 史君子各三分 巴豆淨十枚

羅糯米飯丸如棗豆沙糖湯下三丸

張漢碧金散治寸白等虫下

苦棟根

兩

猪牙阜角

三根

雀虱

檳榔

史君子仁

各半

青黛

麝香

末淡猪肉湯調一字

癩疝第五

巢氏癩者陰核氣結腫大也兒多因啼怒軀氣不止動陰氣下結不散而成

寶鑑兒疝為腎久冷攻膀胱下入小腹聚流陰中故陰囊腫

幼幼新書

卷三十一

十四

小方論兒疝氣四等一盤疝氣其病元帶白色

按疑肺氣

卧間奔臍下坐却在腹如作先喘粗後臍下痛名疝

氣二瘦氣形如雞子碧色如作先困後喘粗臍下痛

漸作聲名瘦三偏氣一偏腫無頭如作先無力後臍

下痛四小腸氣其病緊實不去如作臍下痛皆因母

月內啼哭閉小腸氣

寶鑑陰疝歌

陰疝因何得邪風在腎經傳流因血聚如此漸

成形

王訣胎積疝氣歌

小兒疝氣每因啼胎積膀胱不散之偏者氣傷或左右結實年深不可醫

小腸積熱調膀胱氣順愈

石僻經內疝氣歌

此病從來有兩般夜啼胎疝在詳觀要知胎氣生紅脉啼哭黃昏青脉連中指只看交脉處須識醫家病本源一枚搐上宜先理兩個雙提抄

藥難

幼幼新書

卷三十一

十五

行心氣利小腸去膀胱毒熱有如李者有稀軟者

有并腎大者有木硬者楚痛難忍

形證論此因啼哭得冷氣衝膀胱又傷寒與胎氣衝

下但手中指面上有紅筋一條者是疝宜抽抱散

兩條者是驚氣宜蚘蛭丸

惠濟歌

與勝金丸偏癩門

氣積膀胱入腎囊疝癩兩種各分張喜怒嘔啼

因滯氣驚撥兒眠氣亦傷幸有小腸通水氣莫

教虛損病難將更有一般胎氣病人言獨腎不

成雙

顧顯青木香散治陰囊如疝腫

狐陰雙

蒺藜炒

地膚子

昆布

枳殼炒

槐子炒

末一二歲空心米飲下一錢

金匱治疝走馬湯

巴豆淨

杏仁淨

綿纏礎熱湯二合捻白汁飲當下老小量與

肘後徐王方兒腹痛大汗名寒疝

幼幼新書

卷三十一

疝

濃煮梨葉汁一服七合兒小量

千金卵腫雞翅六莖燒服隨卵左右取錄驗陰大如

斗聖惠治偏癩陰腫

治癩蜥蜴一枚燒末酒服

治核腫壯熱有熱實

甘遂

青木香

石膏各十

麝三

大黃

前胡各一

黃芩兩半

甘草各十

吹咀水七升煮升九合服三合日四夜二

治狐疝傷損生癩

芍藥

茯苓各十

防葵防風

大黃各半

半夏

桂心

蜀椒汗各

末蜜丸如大豆服一九至三九日三翼有乾薑一

分嬰孺胡椒代蜀椒少防葵

水鑑惠小腸氣疾

東青葉握

防葵子

漢防已

確黃

菘豆各一

猪牙阜角挺

水蛭三

衣水

當門子枚

黃鹽各六

持蜜丸麻子大小豆湯下三九至十九

幼幼新書

卷三十一

疝

肘後療超躍舉重卒得陰癩

狐陰具一

海藻

牡丹各三

桂心分

散蜜丸如桐子兒五九大人增忌胡荽生葱

錄驗治陰癩

狐陰具一

飛生虫十四

桂心

乾薑

蒺藜

消石滑一作

附炮

細辛各二

卷柏

桃仁熬各

散蜜丸大豆許飲下五九加

聖惠薏苡仁散治陰癩或時疼悶嬰孺多蛇銜草

薏苡仁 赤芍藥 土瓜根 黃芩

蛇床子 地膚子 桔梗

等分羅一二歲空心溫酒調半錢午晚再服意裁

治陰癩魁蛤散

魁蛤分三 狗陰炙黃 白朮兩半 桂心分一

細羅一二歲空心粥飲調半錢晚酒下意裁

陰癩腫大不消鵝砂水研塗

譚氏青金丹

兒疝由胎成腎府不療遍身成瘦弱

幼幼新書

卷三十一

六

珍珠分二 石鷲 自然銅 滑石

青黛錢各三 續隨子粒二 蝸牛肉廿七個

膠清丸如黍苗香湯下三粒

治疝車前子根苗乾末紅椹兒酒下一錢

張銳治惡毒腫或着陰卵或偏着疼痛攣急牽引小

腹難忍苗香葉苗或根搗汁空心服一合滓貼腫處

聚寶治疝及少陰受邪冷氣滯荆三稜緊小者一枚

猛火炮心存三分性紙裹埋淨土一宿末煨葱米飲

服一字

小方論治疝

木鼈子 黃蘗 吳茱萸等分

末者日數大小用二錢津調塗囊上後服

朱硃 乾漆 續隨子各一分 木鼈子五枚

棘岡子三枚 石鷲一枚

末蒸餅丸如黍湯服三粒五七歲上七粒意加

玉訣胎腫疝氣勝金丸

龍骨 遠志 牡蠣灰 川大黃

等分末蜜丸麻子大米飲下三五九日三

幼幼新書

卷三十一

六

川棟散治疝

川棟子肉 馬蘭花 船上苗香

等分末葱湯調半錢日三

形證論抽抱散

石鷲錢一個重二 斑猫錢半 淡豉許少

芸薑子合半 川棟子肉錢一 通草許少

末木通湯下半錢天明下毒物如淨後調氣未下

載服

惠眼金鈴散治驚疝及五疝陰腫先服下涎寬氣

青橘皮 <small>白去</small>	蓬莪茂 <small>炮</small>	陳皮 <small>白去</small>	茴香
京三稜	甘草 <small>炙</small>	川棟子肉	
等分末半錢水小瓊煎半瓊入少鹽溫服			
張氏治疝木香丸			
木香	礞砂	金鈴子	茴香 <small>各一</small>
丁香	沉香 <small>各二</small>	青橘皮 <small>錢</small>	
羅末白沙蜜丸如菜豆服三五丸空心鹽湯下			
莊氏疝氣連陰莖中痛沙參散			
沙參 <small>炒</small>	桂心 <small>各一</small>	桃仁 <small>炒四十</small>	
幼幼新書	卷三十一		
末空心溫酒下二錢			
趙氏治疝			
石鷲 <small>醋浸</small>	黑牽牛 <small>少許同巴</small>		
未飯飲調半錢			
千金氣癩灸足厥陰大敦左灸右灸右灸左各一壯			
兒癩將男至碓頭祝曰坐汝令兒某甲陰囊癩故灸			
汝三七十二一枚灸訖便牽兒雀頭下向着囊縫當			
陰頭灸縫上七壯即消艾炷獨簪頭許			
凡癩當騎碓軸以莖伸軸上齊陰莖頭前灸軸木			

寶鑑疝氣陰囊腫灸囊縱十字文上又灸崑崙 <small>崑崙在</small>	陰陵 <small>足大指側</small>	偏癩第六 <small>亦名差癩</small>	巢氏差癩者由啼努臛氣擊下氣偏癩虛而行陰核
偏腫大也			
千金三月上除日取白頭翁根搗傳一宿作瘡十日			
愈			
治陰偏大又卵核堅癩五等丸			
黃蘗	香豉	牡丹	防風
幼幼新書	卷三十一		
桂心			
等分末蜜丸如大豆兒三歲飲服五丸至十九兒			
小乳頭上服小品無黃蘗有鐵精乳調			
聖惠昆布丸治骨疔攻注連腎外囊腫脹或疼或偏			
隆			
昆布 <small>洗三</small>	懷香子 <small>炒半</small>	木香	甘草 <small>炙</small>
黃蘗	丁香	爛牡蠣	銅青 <small>各一</small>
羅棗肉丸如麻子一二歲空心甘草湯下三九量			
加			

裏香子丸治偏墜或氣攻小腹痛

懷香子炒 古錢青 硃砂各一 桃仁九生

研蒸餅丸如麻子二三歲橘皮湯下一丸

又枳殼三兩炒羅漢柏枝汁調厚塗

嬰孺治偏墜狗莖散

狗莖燒 白朮分三 猪苓分二 桂心分一

末米飲若酒服一刀圭日再灸對墜足大指毛上

各二壯

劉氏熏洗法

皂角一寸去黑皮子瑛載燒煙熏槐葉五兩水二

升煎一升溫日熏洗

聖惠灸囊後縫十字紋上三壯炷如麥三月效

陰腫第七

巢氏足少陰腎經氣通于陰兒少陰經虛而受風邪

邪氣衝陰與血氣相搏結則陰腫

千金狐莖炙搗末酒服

又搗蕪菁傳外臺用葉根嬰孺用子

又猪屎五升水煮沸布裹安腫上

聖惠桃仁丸治小腸虛冷因啼氣下腫

桃仁炒 白蒺藜炒去刺 郁李仁三分 黃蘗一分

牡丹 桂心各半

羅鍊蜜丸如菜豆三歲兒食前溫酒下七九意裁

甘遂丸治陰腫壯熱

甘遂煨 麝各一分 川大黃炒 木香各一分

前胡兩二 黃芩兩半

羅鍊蜜丸菜豆大三歲兒食前湯下三九意裁

治陰囊卒腫痒蛇床仁湯

蛇床仁炒 蛇床各一 兩水大椀煎六七沸洗帛裹

津熨

牛蒡膏

生牛蒡汁二大盞

赤小豆兩半 桂分一

和膏塗

又馬鞭草爛搗裹日二

嬰孺治陰卒腫痛如刺汗出

小蒜並楊柳根各一斤燒以酒灌熱氣熏

張渙桃仁丹治足少陰經虛受風邪衝成陰腫

桃仁三 郁李仁一分 牡丹

白蒺藜炒去刺 桂心各半

末鍊蜜丸如黍溫酒下十粒食前意裁

治陰腫生瘡胡黃連散

胡黃連 胡粉各半 白礬灰一

細末少許生油調塗

朱氏外腎腫赤脹痛如聖丸

石鷺二個細末米醋調膏塗

丁時發治外腎赤腫疔痛

江中水螺殼研冷水調拂

肘後陰疔發時腫痛隨左右灸足大指第二節下橫

紋正中五壯姚云足大指本三壯

聖惠灸內崑崙各三壯內踝後五分筋骨間陷中炷

如麥又大鼓七壯

陰瘡第八

菓氏兒下焦熱熱氣衝陰陰頭忽腫合不得小便乃

至生瘡俗云尿灰火所為

千金狼牙濃煮汁洗

又黃連胡粉等分末香脂油和傳

又人屎灰狗屎灰馬骨灰并末並可傳

治歧股間連陰囊生瘡汁出先痒後痛十日五日自

差或半月復發連年不差

灸瘡搔去痂帛拭蜜傳更搜麵作餅燒熟錫塗慰

冷即止再度差

外臺猫骨灰傳

聖惠白礬灰炒胡粉等分研槐枝煎汁塗

又狐陰莖灸微黃羅水調傳

又雄雀糞陳醬汁和傳

茅先生治陰莖生瘡

地龍灰 黃蘗各半 輕粉錢

未乾搽瘡處

嬰孺治核腫壯熱腹中有實

大黃 前胡各五 黃芩 甘草灸

青木香 石膏研綿裹 甘遂二 麝分

水七升煮升九合入麝一服三合日四夜再

平起外腎第九

茅先生兩月兒連笑至百日天明不止驚疝候哭而
早起外腎遇陰疼痛四肢強直急看外腎如一個不
見服桃奴丸二粒兩個不見服四粒後用鐵掬散貼
外腎常服朱砂膏驚積勻氣散胃氣不和如面黑氣少
項軟臍口燥黑死女人看兩腳下上便比外腎

桃奴丸
桃奴枝上白乾者 山藥粉子 苦瓠子各七枚 桃膠

乳香各二錢

末滴水丸如芙蓉若腎上至四更荆芥葱湯下五

九九丸

鐵掬散治疝

天南星 鐵燭粉 甘菊 草烏

等分末二錢葱涎調塗臍并外腎紙貼腎

吉氏桃奴散治疝腎

桃奴各一錢 船上硫黃 木香各二錢

末木香湯下一錢

千金失精筋攣陰縮入腹相引痛灸下滿各五十壯

老少隨年壯

千金翼灸中封五十壯又兩脚一百壯此與下滿亦
主喉腫厥逆五藏所苦彭脹老人加五十以下及兒
隨年壯五十壯下滿

幼幼新書卷第三十一

幼幼新書

卷三十一

七

幼幼新書卷第三十二 水痰鬼症 凡九門

後學古吳陳履端于始輯

倭吾韓與道叔行校

痰飲第一

寶鑑歌

飲水并傷乳為痰結在胃令兒不下乳吐沫與
痼同實即身多熱謔言入睡中早須醫治取久
即變驚風

外臺半夏湯痰飲當以溫藥和之療心腹虛冷遊痰

氣上胃脇滿不下食嘔逆胃中冷

半夏升一 薑片一 橘皮兩四

切水一斗煮三升分三服若心中急及心痛加桂
心四兩腹痛加當歸四兩羸瘦老小服之佳忌羊

肉飭

王氏倍術丸治脾胃受濕心下停飲煩渴嘔吐腸間
瀝瀝有聲胃膈痞滿短氣腹脅脹痛小便不利身面
虛浮全不思食

官桂 乾薑各一兩 白朮兩二

末鍊蜜九菜豆大米飲下十五至廿九兒減
丁香開胃丸治脾胃不調停積痰飲嘔吐吞酸胃膈
痞悶

半夏粗末薑汁 三稜炮 甘草炙各

丁香分三 乾木瓜兩半 薑十二兩切青鹽

細末鍊蜜九雞豆大不時沸湯化一九兒分

腫滿第二

巢氏腎主水其氣下通于陰脾主土候肌肉而刺水
腎虛不能傳水液脾虛不能剋制水故水氣流溢于

皮膚故腫滿挾水腫者即皮薄如熟李若皮膚受風

風搏而氣致腫者但虛腫如吹為風氣腫

茅先生氣大喘不喫食陰腫唇縮死

漢東王先生兒頭面手脚浮腫因疳積久而成或久
患用藥不退發渴喜水變成虛浮二症宜先調胃藥

補如觀音胃氣不和 參散寒食傷 之類如不退宜內

消丸又未退紅粉散取再用補藥

錢乙腎熱傳膀胱熱甚逆施脾胃脾胃虛不能
制腎水反剋土脾隨水行脾主四肢故流走而身面

皆腫若大喘者重何以故腎大勝而剋退脾土上勝心火又勝肺肺為心剋故喘或問心刑肺肺見虛今何喘實曰一者肺大喘此五歲逆一者腎水上行滂浸于肺故大喘皆難治

張渙兒諸病後下痢不差或身體腫滿皆脾腎虛弱故

楊大鄴問兒四肢浮腫喘嗽者何答曰兒寒熱虧盈本是常度一食失節百病來轉何況過有熱壅諸毒

是積小成多壅塞胃管日月深遠積結轉深雜食復

進三焦之氣不通四肢漸腫小便黃赤大便或秘或

通致喘促虛脹從茲食減轉至疳羸先和脾胃次須

通利小腸免致傷枉

寶鑑氣腫水腫歌

小兒腫滿一如吹只為風邪與氣為若見皮膚

一熟李樣此名疔水定無疑脾虛土壤難禁水腫

滿從來只在皮腫若赤時因熱作皆由氣血各

無歸 外臺療體滿氣急不卧

郁李仁一合搗末和麩搜作餅喫微利差亦可煮粥食聖惠有檳榔

茅先生甘遂散治氣腫水腫

甘遂 大戟 黑牽牛 檳榔

陳橘皮白去 木香

等分末每歲一錢五更初葱酒調下不喫酒葱湯

天明下黃水依證調理

塌氣散治腫

中庸樟柳 赤小豆 橘皮紅 蘿蔔子

檳榔 甘草各半 木香一分

末二錢水小瓊薑棗煎六分通口服量與

嬰孺郁李仁湯治通體洪腫腹滿堅脹氣喘急

郁李仁三合 大黃十二分 柴胡 澤瀉各八分

赤茯苓十分 黃芩 麻黃各二分 杏仁

升麻各七分 芍藥 猪苓各八分 鼈甲五分

水二升半煮升六合六七歲為三服隨歲加減

黃芩湯治腫滿 黃芩 澤瀉 通草各八分 柴胡

桑皮各七分 杏仁 猪苓各六分 澤瀉葉四分

水五升煮升半四五歲為三服

葶藶煎治腫滿不消服藥不退

葶藶子三分 防己六分 柴胡八分 茯苓

澤瀉二分 杏仁各十分 澤瀉葉炒 郁李仁各五分

水一斗煮二升半去滓內杏蜜煎至二升二歲兒

一合量與

甘遂丸治腫滿結實治不效

幼幼新書

卷三十一

甘遂炒 芍藥 杏仁 車前子

黃芩 猪苓 葶藶炒各三分 鼈甲醋炙七分

末蜜丸如大豆竹葉飲下二歲五六九日再

漢東王先生治虛浮內消丸

青橘五個巴豆七個炒蒼色 木香錢一 防己錢半

丁香十四粒 末蒸餅丸如大麻子二三歲五九量加男陳皮湯

女艾葉湯日三

張漢治腫滿大小便不利海蛤湯

海蛤 桑皮各一兩 防己 白朮炮

赤茯苓各半兩 甜葶藶隔紙炒紫 川朴硝 木猪苓各一分

細末一錢水一瓊煎五分乳後溫服

吉氏治遍身虛腫棗肉丸

石鷲子一枚 大棗肉七枚 巴豆七粒

入棗內燒研蟾酥丸麻子大以所傷物汁下

莊氏飲水面目黃灸陽綱各一壯在第十椎下兩

傍各三寸陷中

幼幼新書

卷三十二

水氣第三

寶鑑積聚久不治并頓下脾胃虛積散而成水遍身

虛腫如熟李即是水氣若疝氣虛腫而不亮

惠眼水氣浮腫遍體如熟李不消先調氣次日四更

下中庸飲子取膜外浮水即調氣後粥補一月斷益

醋一月又服調氣散治水氣腫滿嗽喘不止

聖惠赤茯苓散治水氣腫滿嗽喘不止

赤茯苓 桑皮 貝母煨黃各半兩 桔梗

甜葶藶炒紫 升麻 杏仁麩炒各一分

粗散一錢水小瓊煎五分溫服日三四更量
桑根白皮散治水氣遍身腫滿喘促小便不利

桑皮 射干 赤茯苓 黃芩

木通 澤漆 防己 澤瀉各半兩

羅赤小豆湯調半錢日三四量服

治水氣面目腫小便澀心腹脹滿

赤茯苓 杏仁麩炒 漢防己 陳皮焙

紫蘇子微炒 甜葶藶隔紙炒紫

羅鍊蜜丸如棗豆桑皮湯下十九日三五歲下減

幼幼新書

卷三十一

七

甘遂散治水氣遍身腫滿大小便難喘促不睡

甘遂煨 檳榔 川大黃微炒 甜葶藶隔紙

炒紫各一分 牽牛子微炒

羅溫水調一字利為效量服

惠眼治水氣腫滿黃疸中庸飲子

海金沙 續隨子各一 薑 中庸各一

蜜兩

研罨一宿五更時絹帛濾汁煖喫食前下黃水勻

氣藥補後樟柳根煮粥喫

聖惠水氣四肢腫腹大灸臍上一寸三壯炷如麥大
分水穴

中惡第四

巢氏兒陰陽順理榮衛調和神守強則邪不干正若
精氣衰弱則無問兒大小鬼毒惡氣卒中之其狀先
無他病卒心腹刺痛悶亂欲死凡中惡腹大而滿脉
緊大而浮者死緊細而微者生餘勢不盡停滯藏府
更致變症

肘後救卒死或先病痛或常居寢卧奄忽而絕皆中
惡

幼幼新書

卷三十一

八

葱黃心刺鼻男左女右入七八寸兒量若目中血
出佳又葱葉刺耳耳鼻中血出當捧兩手忽放之

須臾死人自舉手撈人言痛乃止亦治自縊

又令二人以衣壅口吹兩耳極則易入亦可筒吹並

捧其肩上側身遠之莫臨死人上

又綿漬酒滴死人鼻中并持手足莫令驚

又看上唇裏絃有如粟米以針決去

又小便灌面數迴即語

又小兒灌面數迴即語

又小兒灌面數迴即語

又阜茨如豆大吹兩鼻嚏則氣通

又割雄雞頸血塗面乾再塗并以熱血澆口中

又管吹下部令數人互吹氣通則活

又破白犬以揄心上小雞亦佳

又牛馬濕糞絞汁灌口中若口禁以物強發之不可

強乃扣齒下無新者以人溺解乾者絞汁

千金治卒忤即今謂中惡與卒死鬼擊相顛治叅取

鹽八合水三升煮升半服取吐愈備急治小便不

通筆頭七枚燒灰和服

幼幼新書

卷三十一

九

外臺羸瘦歷年宵滿結疹飲食變吐宿食不下中風

鬼症黃帝護命千金丸

野葛灸七寸

斑猫淨熬廿枚

雄黃

雌黃

丹砂

瓜丁

鬼臼

礬泥裹燒半日

沙參

莽草灸

楸汗各一兩

地膽熬十枚

篩蜜和搗三千杵丸如梧子服五丸日二卒中惡

氣絕不知人服如小豆二丸老小半之牛馬舐踐

癰腫若虫嚙取一丸着掌中嚙和塗元旦以酒率

家中大小各服一九一歲不病若傷寒身熱服一

丸若欲視病服一九與病者共卧不恐忌生血物

聖惠桃奴散治中惡心腹堅脹疼痛頰已青黑大便

不通

桃奴枚五

甘草灸一

麝錢一

杏仁麩炒

桔梗

赤芍藥

黃芩

柴胡

川升麻

川大黃炒

鬼臼各半兩

粗散一錢水小瓊煎五分不時溫服意加減利為

度

鬼箭羽散治中惡心堅強卒痛欲困

幼幼新書

卷三十一

十

鬼箭羽

真珠各一

羚羊角

桔梗

川朴硝

川升麻

赤芍藥

柴胡

黃芩各半兩

桃仁麩炒廿枚

川大黃炒一兩

粗散一錢水小瓊煎五分不時意裁溫服

雄黃丸治中惡心痛辟邪氣

雄黃

真珠各半兩

麝

牛黃各一錢

巴豆霜淨廿枚

末棗瓤及鍊蜜丸如粟薄苛湯下三九量服

肘後以繩圍死人肘腕男左女右畢伸繩從背上大

椎度以下又從此橫行各半繩灸各三即起又爪病
人人中取醒又不起捲其手灸下文頭隨年壯又灸
臍中三壯又灸頤下宛宛中名承漿穴十壯大效又
灸兩足大指爪甲聚毛中七壯一云三七壯又灸臍
中百壯

卒死第五

葉氏兒卒死為三虛乘年衰一也逢月空二也失時
和三也因此虛又傷賊風使陰氣偏竭于內陽氣阻
隔于外而氣壅閉陰陽不通故暴絕而死若歲府未
幼幼新書 卷三十一

竭良久廼蘇亦有兼挾鬼神氣者邪退廼生凡中忤
中惡卒死邪氣未盡停滯心腹久廼發動多變成症
茅先生卒死候眼合噤齒遍身軟如綿面青黑口鼻
冷此因生下遍身熱或有驚醫但退熱不下驚積疔
積又被邪氣致之

右三證一般只要辯元初受患根源急下奪命散

急慢驚風門吐下風涎醒後用勺氣散胃氣不和門二服補

後下朱砂膏驚積疔鎮心丸驚一切如有伏熱下大附

散調理兩日慢驚風門見鷓聲上啼偏搐汗如珠不得

睡眼障淚出死

寶鑑三虛歌

乘年之衰子逢月空失時之和子三虛中中賊
風子成卒死挾鬼氣子候亦同歲腑未絕子治

莫匆匆

全匱救卒死吐利不知何病

馬糞一九絞汁灌無濕者水煮乾者取汁

肘後救急死壯熱

礬石半斤水升半煮消漬脚沒踝

幼幼新書 卷三十一

救急死目閉

用騎牛臨面擣薤汁灌耳中

救卒死四肢不收尿尿

牛洞一升溫酒灌口中洞稀糞也

千金卒死無脉無他候陰陽俱竭也

牽牛臨鼻上二百息牛舐必差鹽汁塗面即舐

又熨斗熨兩脅下

治魘死不自覺

慎燈火勿令久動牽牛臨其上若卒不語酒服東

門上雞頭末

又擣韭汁灌鼻中劇者灌兩耳仲景灌口

又伏龍肝末吹車中

聖惠醋煮苦參汁灌口中水煮亦得酒煮爛棺木板

汁服

又極鹹鹽湯灌

又熱湯和灰厚擁身上遠巡甦

肘後卒死四肢不收屎便者灸心下一寸臍上三寸

臍下四寸各百壯兒隨年

幼幼新書

卷三十三

十三

千金針間使百餘息

灸人中一名鬼客聽肘後治厥

鬼持第六附鬼氣

巢氏兒神氣軟弱精爽微羸神竟被鬼持無他疾候

但痿黃多啼口氣臭

寶鑑歌

小兒氣弱命中衰魂魄多應被鬼持其候痿黃

多哭地不須用藥可求師

鬼氣歌

鬼氣皮膚裏相傳藏府間腫虛如水病癰癧似
驚癇熱散渾身澀心擊痛所攢小兒還有此脈
藥急醫者

圖經

席睛爪指骨毛輒兒辟

外臺深師五邪丸療邪狂鬼魅妄言狂走恍惚不識
人為鬼忤當得殺鬼丸方

丹砂

雄黃

龍骨

馬目毒公

鬼箭各五兩

鬼白二兩

赤小豆三兩

羌青一枚

幼幼新書

卷三十三

十四

桃仁熬百粒

細絹篩蠟和大如彈丸絳囊盛繫辟男左女右兒

繫頭合時避婦人雞犬蜜丸如桐子一服三九日

三忌五辛生血物

疰病第七

巢氏疰住也謂風邪鬼氣留身內也人無大小血氣
虛衰則陰陽失守風邪鬼氣客之住肌肉間滯藏府
內或皮膚掣動遊易無常或心腹刺痛或體熱皮膚
腫沉滯至死死又疰易傍人故為疰兒不觸風邪乳

母解脫不避温涼暑濕或早晚抱持出入神魂軟弱為鬼氣所傷故病

千金太一備急散主卒中惡客忤五尸入卒鬼刺鬼痲及中蠱症吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒熱毒

病六七日

雄黃

芫花

桂心各二兩

丹砂

蜀椒各一兩

藜蘆

巴豆別治如脂各一分

附炮淨五分

野葛三分

末搗和調銅器密貯急疾水服一字加至半錢老

幼幼新書

卷三十五

十五

小半之病在頭當鼻衄在膈上吐膈下利在四肢當汗秘之

治症相染及霍亂中惡客忤

獾肝具一

雄黃

莽草

丹砂

鬼曰

犀角

巴豆各一兩

麝分二

大黃

牛黃各一兩

蜈蚣一條

末蜜丸空腹服如麻子二三丸知為度

尸症第八

巢氏尸症五尸之一人無小大腹皆有尸虫性忌惡

多接引外邪共為惡害兒血氣虛弱精神亦羸故尸症因而為病其狀沉嘿不知病處或寒熱淋瀝涉引歲月遂至于死又症易傍人名尸症

巴豆淨

杏仁各廿粒

綿纏槌碎投熱湯二合捻取汁服未差更服老少

量之通治鬼繫忌野猪肉蘆筍

聖惠木香散治尸症心腹滿脹疼痛難忍

木香

鬼箭羽

桔梗

當歸微炒

幼幼新書

卷三十五

十六

粗散一錢水小瓊薑少許煎五分不時温量服

犀角散治尸症及中惡諸病

犀角

川升麻

木香

檳榔

桑皮

川大黃炒各兩

桃仁炒

細羅湯

下半錢日四五量服

桃仁散治尸症鬼癱心腹疼痛或寒熱恍惚形色多

般

桃仁 <small>三枚</small> 炒黃木香	人參	京三稜 <small>炒</small>
白芥子 <small>炒</small> 檳榔	虎頭骨 <small>酥炙</small> 麝	
桂心 <small>各一</small> 欵冬花	乾桃柳葉	朱砂 <small>飛各</small>
細羅不時溫水調半錢量服		
保童丸治尸症鬼癩驚癇魘三十六種無辜天行急黃		
牛黃 麝	真珠	甘草 <small>炙各</small>
赤芍藥 光明砂 <small>飛</small>	赤茯苓	杏仁 <small>炒</small>
<small>兩半</small> 甘遂 <small>煨黃</small>	虎睛 <small>酒浸炙</small>	巴豆 <small>淨霜</small>
羅鍊蜜丸如麻子三四歲荆芥湯下二九量服		
治尸症勞瘦寒熱		
桃仁廿枚淨研水中瓊煎五分量服如不吐即非		
又雞子生吞搖頭令下		
張漢治尸症雌黃丹		
雌黃 雄黃	川大黃 <small>炮</small>	鬼臼 <small>各一</small>
桃仁 <small>個</small> 白頭翁 <small>兩半</small>	巴豆 <small>淨霜</small>	麝 <small>各一</small>
末羊胎五兩鎔和成膏如黍荆芥湯冷下三五丸		

量服

鹽症第九

巢氏聚虫蛇雜類以器盛之令相噉食餘一存者名

蠱能變化或隨飲食入腹食人五歲兒中之與大人

類心腹刺痛懊悶急者死緩者涉歷歲月漸深羸困

食心藏盡痢血心藏爛死死又症易他人為鹽症

外臺治蠱症百病癥瘕積聚酸削骨肉大小便不利

卒忤遇惡風腫脹滿淋水轉相注殫門盡尸延及

男女外孫醫難療十七物紫參丸

幼幼新書 卷三二

紫參	人參	半夏 <small>洗</small>	藜蘆
代赭	桔梗	白薇	肉苁蓉 <small>各</small>
石膏	大黃	牡蠣 <small>熬</small>	
丹參 <small>各一</small>	蝦蟆 <small>灰一無</small>	烏頭 <small>炮各</small>	狼毒 <small>各</small>
附子 <small>炮五</small>	巴豆 <small>淨七</small>		

篩蜜丸飲下小豆大一丸日三老小意裁蜂蠶螫

塗之良忌猪羊肉冷水

聖惠殺羊角散治中蠱毒腹堅如石面目青黃小便

淋瀝變易無常

殺羊角 蕪荷各一兩 梔子仁七枚 赤芍藥

牡丹 黃連各一兩 犀角兩半

粗羅一錢水小瓊煎五分量溫服日三

治五種蠱毒

馬兜鈴根細散一錢水一瓊煎五分空腹服隨吐

蠱出未快載服

又敗鼓皮灰空心粥飲調一錢服須臾呼蠱主姓名

愈熱炙甘草煮汁服亦佳

又湯調麝赤雌雞翅下血青藍汁並可服

嬰孺雄黃丸治疰病諸蠱昧精氣入心腹刺痛黃瘦

骨立

雄黃 雌黃各四兩 丹砂 野丈人

徐長卿各三分 大黃五分 羚羊角五分 麝三棗大

末青羊脂和丸百日兒酒服黍大三九日二

張渙專治蠱毒雄麝散

雄黃藥水 麝 羚羊角 赤芍藥

敗鼓皮各一兩 馬兜鈴根 薺芫 鬼臼各半兩

研細服半錢濃甘草湯調食前

麝犀湯

犀角 鬼箭 安息香 水磨雄黃

各一兩 苦參 牡丹皮各半兩 麝兩

細研一錢水大瓊煎五分溫服

幼幼新書卷第三十二 壺德堂刊

幼幼新書 卷三十二 十一

幼幼新書卷第三十三 眼目耳鼻 凡二十四門

後學古吳陳履端于始輯

陳湖陸嘉訓明先校

眼赤痛第一 附目腫

巢氏肝氣通于目內有客熱與胃膈痰飲相搏熏漬于肝肝熱衝目故赤痛甚則生翳

外臺目疾所忌有五一房室二麪酒三衝風冷霜雪

向日遠視四矢泣噴怒五終身勿喫生五辛蒼麥菜

菜若因疾犯者疾深難療細意將慎

幼幼新書 卷第三十三 二 五石之

顧顛治赤眼胎熱疳瘵多淚苗香散

苗香 冬青膽 陰乾 生甘草

等分藥一分水一瓊煎十沸溫洗更服後飲

知母 黃芩 青箱子 地蛹子

秦皮 車前子 山梔 獨活

等分水五合煎二合溫服

千金治目熱赤脉侵睛息肉急痛不開如芥在眼礮

痛大棗煎

棗子 去皮核 黃連 二兩 淡竹葉 五合

水二升先煮竹葉取一升澄清內棗肉黃連煎四合去滓洗傳目中

千金翼

雄黃 細辛 乾薑 各二 黃連 四

細篩綿裹嚙嚙內皆必閉目淚出須臾自止手勿近并冷水洗一多礬石

又

杏仁四十九顆末之絹袋裹飯底蒸熟絞脂銅青胡粉各如大豆乾薑鹽各如半大豆熟研雞毛沾

幼幼新書 卷第三十三 二 五石之

掠眼中日二

又礬砂三兩醋漿坩器中浸曝三日藥着器四畔乾者取如粟夜着兩背加石鹽石膽尤佳

又枸杞汁洗日五

外臺謝道人治眼暴腫毒痛生翳

决明子 梔子仁 肥精 地膚子 羌蔚子

乾藍菜 各一 石膏 升麻 各四 苦竹葉 二

芒硝 二 春車前草汁 二 冬瓜子 三

水二斗煮竹葉取七升二合去滓內諸藥煮四升

分四服每服相去間兩食許兒減

又鯉魚膽傳點

又人乳浸黃連點

又黃連三分朴硝燒一分婦人妳汁浸半日點眼

又羊子肝薄切并華水浸貼

聖惠羚羊角散治肝巖風毒衝眼赤痛開張不得頭

額疼痛

羚羊角

甘草炙各半兩

葳蕤

防風

甘菊花

牛黃

元參

赤芍藥

幼幼新書

卷三十三

三

黃芩

梔子仁各一分

粗羅一錢水小瓊煎六分去滓入牛黃一字量兒

服

梔子仁散治眼風熱澀赤痛

梔子仁

黃芩

犀角

龍膽

赤芍藥

黃連

川大黃微炒

甘草炙各半兩

散一錢水小瓊煎五分意裁溫服

决明散治赤眼澀痛不開由隔熱

决明子

子芩

柴胡

川大黃炒

川升麻

梔子仁

羚羊角

甘草炙各半兩

石膏兩一

粗羅一錢水小瓊竹葉七片煎五分不時隨兒溫

服

治熱毒眼疼赤澀多淚

元參

决明子

甘草炙

黃芩

梔子仁

犀角

牛黃各半兩

龍腦錢半

細羅食後蜜水調半錢五歲加

龍腦散治肝巖壅熱兩眼赤痛

幼幼新書

卷三十三

四

龍腦錢一

梔子仁

黃芩

麥門冬焙

地骨皮

川升麻

犀角各半兩

川大黃兩一

炒

甘草炙

牛黃各一分

細羅食後溫水調半錢五歲下一字

羚羊角散治肝巖風熱上注目赤腫痛

羚羊角

犀角

赤芍藥各三分

黃連

馬牙硝

朱砂各一分

牛黃

天竺黃

川升麻

芩

當歸微炒

甘草炙各半兩

散竹葉湯溫調一錢意加減

真珠散

真珠

青箱子各一

牛黃

甘草炙

黃連各半

蔓菁子兩半

羅熟水調半錢意裁

牛黃丸治肝心壅熱衝眼赤痛

牛黃

熊膽各一

朱砂飛

黃連各半

龍腦

膩粉各一

研煉蜜丸如麻子不時溫水下五九意加

黃連水藥煎

切切新書

卷三十三

五

黃連

麩仁

杏仁各卅九枚

黃蘗

青鹽各半

膩粉

龍腦錢一

羅絹袋盛雪水浸二大瓊七日灌竹筒內密封重

湯煮一伏時掘地坑深三尺埋一宿入龍腦瓷餅

盛點

治眼暴赤澀痛

龍腦錢半

秦皮

黃連

甘草生

馬牙硝各半兩

羅水大瓊浸一宿銀鈹煎五分綿濾入龍腦瓷器

盛銅筮點日三

又甘蔗汁三合黃連末半兩銅器中慢火熬養減半

綿濾點日三四

又雞子一枚破頭小竅取清調黃連末半兩復內殼

中蠟紙封青泥坑中浸三兩日不得沒日點三四

度一多麩仁一分

洗方

生地黄

黃芩

決明子各一

竹葉升一

赤芍藥兩半

切切新書

卷三十三

六

細劉水二椀煮一二十沸澄清日三四度洗

治肝藏風熱上攻目痛牛黃膏

牛黃各一

川大黃生一

羅生地黄汁調稀膏紙上貼眼乾即冷水潤

醫局矜羊角散治風熱上衝眼暴赤腫或生瘡疼痛

隱澀羞明

矜羊角

川升麻

黃芩

車前子

甘草各十兩

決明子兩廿

草龍膽

梔子仁各五

末一錢食後溫湯調日三兒減

嬰孺決明湯治肝熱衝眼

決明子 大黃 梔子仁 子芩各七分

升麻 芍藥 柴胡各六分 枳殼各三分

竹葉八合 石膏十分碎 杏仁 甘草各二分

水四升煮升二合為四服二歲內減生醫加地膚

子五分

澤瀉湯治眼赤痛有膿壯熱

澤瀉 升麻 知母 柴胡

切切新書 卷三十三

梔子仁 芍藥各八分 決明子五分 枳殼各四分

竹葉升 杏仁 寒水石各六分

水五升煮升半五六歲為三服

漢東王先生治目赤腫痛洗肝散

芍藥 防風各一分 羌活 大黃紙裹

甘草各半分

末嬰孩一字量加水半盞燈心黑豆各少許煎十

數沸食後服

治赤眼腫痛貼太陽穴清涼膏

秋採芙蓉葉陰乾末并華水調貼

形證論治風毒赤眼通頂散

石膏煨 薄荷花各一錢 川芎各二錢 鵝砂

牙硝各半 甘草各二

末麝香蜜水調一錢

劉氏治赤眼及斑瘡入眼

龍腦薄荷 川黃連

等分末水調塗頂上

張氏治上焦熱牛黃散偏療諸眼疾及兒諸疾

切切新書 卷三十三

肉桂 鬱金各一兩 馬牙硝各四兩 甘草半兩

擣臨卧新汲水調一錢七

聖惠兒忽眼赤灸手大指次指間後一寸五分口陷

者中各三壯炷如麥

熱毒風盛眼痛灸手中指本節頭三壯各拳尖炷如

麥

胎赤眼第二綠日有

東氏風邪客臉背間與血氣相搏挾熱生瘡浸漬目

未有汁時差時發世云兒生時浴不淨使穢露津液

浸漬眼臉睫眥後遇風邪發目即赤爛生瘡難差
後還成疹世謂胎赤

千金槐木枝如馬鞭大長二尺齊頭油麻一匙置銅

鉢中研至瞑卧時洗目傳昔日三

聖惠麥門冬散治兒眼胎赤腫痛上焦壅熱

麥門冬焙 犀角 川芎研 甘草炙

防風各半 旋覆花分

粗散一錢水小盞煎五分量服日四五

牛黃丸治眼胎赤久不差

幼幼新書

卷三十三

九

牛黃 麩仁 决明子各一分 黃連

犀角各半 龍腦錢

羅煉蜜丸如麻子湯下五九日三四

治胎赤普爛黃連丸

黃連兩一分 龍膽 防風 川大黃

細辛各半

羅煉蜜丸如菜豆湯下七九日三

治眼胎赤兼醫杏仁膏

杏仁兩一分 膩粉錢 鹽綠 黃連各一分

研真酥調如膏攤銅枕內熱艾雞子大掘坑內艾
燒覆銅枕裏勿泄氣候煙盡更研取少許綿裹人
乳浸一宿日點三四度

治眼胎赤經久者點銅青散

銅青 膩粉各一分 龍腦 乾地龍條

研極細用半小豆許點目昔日一二

治眼胎風赤爛發歇頻頻視物淚出澀痛難忍黃連

煎

黃連兩一分 蘆薈分

幼幼新書

卷三十三

十

末新綿裹水大瓊銀器中重湯煮候汁三分減二

去綿入龍腦一錢瓷餅收日點三四度

黃連散治肝熱衝眼

黃連兩半 赤芍藥 麩仁 木通

决明子 梔子仁 黃芩 甘草各一分

粗羅一錢水小瓊竹葉七片煎五分溫服日三四

犀角散治眼赤澀痛緣目生瘡難開及有熱淚

犀角 羚羊角 防風 玄參

黃芩 黃耆各一分 柴胡 川大黃炒

馬牙硝各半

粗羅一錢水小盞煎五分溫服日三四

治綠目及普爛作瘡腫痛白礬煎

白礬枯一 黃連兩半 青錢文十 防風

朴硝各三 地黃汁合一 白蜜合三

細羅綿裹內青竹筒中絹油單蓋緊繫筒口炊餅

內蒸候餅熟綿濾日塗三四

治眼赤痛及綠目生瘡黃連煎

黃連兩半 童子吐出虬虫五條 龍腦錢半

切切新書 卷三十三 十一

蜜兩 除龍腦入瓷餅炊飯中蒸候飯熟綿濾入龍腦日

三四點

治熱毒衝眼綠目生瘡熱痰梨汁煎

大戴梨一枚 黃連錢二 龍腦錢一

絞汁綿裹黃連末浸半日入腦日點三五度

治綠目普爛作瘡

青錢廿文青鹽一兩濕紙包數重泥裹炭乾猛火

燒研津調菜豆許塗

張漢治眼臉赤爛二金散

黃連黃柏各一錢羅末如汁浸一宿焙綿裹荆芥

湯浸乘熱洗

張氏治赤眼爛差明

黃連兩半 輕粉錢一 生雞子殼個一

研入大口瓶內布蓋月下露一宿再研津調傳眼

唇

莊氏眼唇赤爛光粉乾摻

吉氏治斑瘡雀目爛眩淚多銅青散

切切新書 卷三十三 十二

銅青 五倍子各半 山梔仁 白縷土

秦皮各一

細末乳汁丸如雞頭百沸湯泡澄清溫洗

莊氏兒忽眼普赤炙手大指次指後一寸五分陷中

各三壯

睛生障醫第三

巢氏眼藏府之精華肝之外候氣通于目兒藏府痰

熱熏積于肝衝發于眼初只熱痛熱積生醫輕者生

白醫小如粟大如麻豆重者醫生兩三重若生白障

是疾重遍覆黑睛滿眼悉白則失明障亦有輕重黑睛邊微有白膜來侵為輕宜急治

張漢兒恣食甘酸今日赤腫甚即生醫或青盲不見

翳童歌

熱氣熏肝眼又昏病存輕重事須令輕即赤疼

多熱淚重生白翳色如銀赤脉背頭成息肉醫

隴睛白似浮雲洗肝散子頻須服障醫還收眼

復明

千金翼真珠散主目醫覆腫

光明朱砂兩半貝子枚燒五白魚枚乾薑分半

研如粉熟帛篩仰卧指甲挑少許傳眼中

七寶散主醫久不愈

琥珀 白真珠 珊瑚 馬珂

紫貝 决明子 石膽各一分 朱砂

麩仁各二分

篩極細傳目中日三

聖惠車前子散治肝熱生醫或血輪脹

車前子 防風 人參 甘草赤

甘菊花 荊實子 青箱子各一分 梔子仁

黃連各半

粗羅一錢水小盞淡竹葉七片煎五分溫服日三

黃芩散治目醫體熱心煩

黃芩 决明 防風 川大黃炒

甘草炙 川升麻各一分

鹿羅一錢水小盞淡竹葉七片煎五分溫服日三

治白醫羚羊角散

羚羊角 川大黃炒 桑皮 真珠

甘菊花各一分 甘草炙半

細羅溫水調半錢日三四更量

旋覆花散治兒生目即有赤膜漫睛

旋覆花 桑皮 羚羊角 赤芍藥

玄參各一分 甘草炙 黃連各半

粗羅一錢水小盞竹葉七片煎五分溫服日三

兔肝丸治赤

兔肝微 梔子仁 黃連 麩仁

羚羊角各半 川升麻 决明子各三分 細辛一分

羅鍊蜜丸如菘豆三歲下湯研三九日三四量加
退醫青箱子丸

青箱子

馬牙硝

蚺蛇膽

熊膽各半兩

龍膽錢半

羅鍊蜜丸如菘豆三歲下湯研三九日三四量加

點眼醫努肉

龍腦

珊瑚

石決明

真珠

各一分研如粉白蜜一合和篋器盛不時點

點眼黑醫覆腫子

切切新書

卷三十三

十五

空青

白礬各一分

貝齒一枝

研細點醫上日再

洗方

露蜂房一兩水二瓊煮五七沸溫洗

博濟治風毒攻眼昏暗赤澀癢肉生瘡醫膜遮睛及

偏正頭疼目漸細小及夾腦風痛視多黑花羌活丸

羌活

川芎

天麻

旋覆花

青橘皮

天南星炮

藁本粗者是各一兩

牽牛子

六兩取末二兩微焙

未薑汁煮麵糊丸如梧子食後溫酒鹽湯米飲任
下廿九日三兒量與亦治內外障及暴赤眼

靈苑洗肝散治醫

白蒺藜一兩半炒去角

羌活

防風各半兩

甘草炙一分 馬牙硝二兩

細末二錢溫湯調食後臨卧服兒及氣實者只牙

硝末一錢

漢東王先生羌菊散治肝藏壅熱眼生浮醫

羌活

山梔炒

防風各一分

甘草半

切切新書

卷三十三

十六

白疾利炒去尖 菊花各半兩

末半錢一錢食後蜜湯調日三

決明丸治肝藏壅熱生醫

決明子

車前子

菊花

川芎

宣連

當歸各一分

大黃

子芩各半

末鍊蜜丸小豆大七歲桑枝湯下意裁麥門冬湯

下亦得

錢乙地黃散治心肝壅熱目腫痛生赤脉或白膜四

邊散湯者易治若暴遮黑睛多致失明亦治瘡疹入

眼

木通

甘草各錢半

黃連

大黃實者炒

防風焙

羌活

生犀

蟬殼

穀精草

沙苑蒺藜

白蒺藜

木賊各錢一

生熟地黃

當歸焙各

元參半錢

細末一字半錢量服羊肝湯食後調日三夜一

寶鑑治眼醫疾痛并暴赤

羌活

蟬殼

蛇脫

防風

穀精草

菊花

木賊

甘草炙

幼幼新書

卷三十三

十七

大黃煨

梔子仁

黃連

白蒺藜

沙苑蒺藜

等分湯調半錢

劉氏治內外障翳并暴赤澀流淚及胎風爛眩退翳

消疹八仙丹

膽礬

川黃連各三錢

通明乳香

青鹽去土

黃丹燒

真腦子各一錢

輕粉三竹筒

蝎梢連尾

研極細沙糖丸桐子大瓷器盛百沸湯浸一九澄

清熱洗眼復以藥水傾澤中經一二時熱洗一丸

可五次忌一切動風熱物并愁惱驗

吉氏治熱盛醫膜上睛青旨兼疼痛

兔肝具一

梔子仁

黃芩各二錢

黃連

升麻

決明子各三錢

細辛一分

麩仁六分

末蜜丸如棗豆一歲五丸湯下

治斑瘡雀目眼醫威靈散

威靈

仙靈脾

甘草炙

茯苓

子芩

青箱子

大青

芍藥

大黃蒸

幼幼新書

卷三十三

十八

等分細末一錢積猪肝二枚批開搽藥縛定米泔

煮喫

點醫麩仁膏

麩仁粒卅

鵝砂大豆許

牙硝煨一分

龍腦許少

研細乳汁調窰合盛點

治眼白膜旬日不開

夜明砂炒烟盡

蟾一枚燒半杏仁淨百粒

末臨用旋飯丸如棗豆米飲下三九量加

聖惠兒春秋忽白醫遮睛疼痛灸第九椎節上一炷

眼痒第四

寶鑑眼爛歌

小兒沿目生瘡爛發歌無時痒更疼毒熱兼風

衝眼臉莫將胎赤一般攻

千金治風眼爛普痒痛

竹葉

黃連各一

柏白皮兩半

吹咀水二升煮五合滴目昔日三四

嬰孺治傷風普赤爛痒久不差青錢散

大青錢百文酒三升煮乾刮屑羅更點昔

幼幼新書

卷三十一

十九

吉氏蕤仁膏治風熱腫赤痒痛

蕤仁油去

青鹽

腦子

臘月豬脂

熊膽

等分研極細外障入川烏頭尖些少乳汁化點

眼暗第五

千金翼决明丸主眼風虛勞熱暗暈內起

石决明燒

石膽

光明砂

芒硝蒸

空青

黃連

青箱子

蕤仁

决明苦酒漬三日暴防風

鯉魚膽

細辛

等分搗密絹篩又研極細魚膽丸如梧子曝更研

銅器密貯取米大內昔中日夜各一

補肝丸主明目

地膚子

藍子

蒺藜子

車前子

兔絲子

青箱子

羌蔚子

瓜子各二

桂心分五

螢

决明子

細辛各五

大黃兩二

黃連兩半

篩鍊蜜丸如梧子飲服十五至廿九慎熱麪生冷

酢滑油蒜雞魚蕎麵黃米兒小減神

幼幼新書

卷三十一

二十

瀉肝湯主歲中痰實熱衝眼暗

苦竹根兩八

半夏洗四

乾地黄

杏仁淨各

乾薑

茯苓

枳實炙

白朮各三

吹咀水斗二升煮二升七合量服一多甘草細辛各二兩

治五歲熱客上焦衝眼外受風寒令眼不明

地膚子兩半

柏子仁合半

大黃兩二

决明子合五

藍子

蕤仁

瓜子

青箱子

蒺藜子

兔絲子

羌蔚子各二

螢合一

黃連兩半

細辛分五

桂心分七

篩煉蜜丸如梧子服五九日三兒減

治眼暮無所見

猪肝細切水一斗煮置小口器藥熱目大開臨上

冷再溫又鯽魚作臙熏

兔肝散主失明

兔肝炙

石膽

貝齒

芒硝

麩仁

黃連

礬燒

松葉

螢

菊花

地膚子

决明子各二分

幼幼新書

卷三十三

十一

散食後服半錢不知加停三日與不服等雖愈服

治風疾滿胃目赤暗

决明子

竹葉

防風

枳實炙

澤瀉

黃芩

杏仁淨炒各三兩

細辛

芒硝各二兩

芍藥

李子仁無一兩

柴胡各四兩

吹咀水九升煮二升半分三服兒減

張漢真珠膏治眼不見物

真珠

甘菊花

井泉石

香豉炒各一分

白蜜一合鯉魚膽一枚同藥慢火熬膏入龍腦一

錢點

千金治肝虛目不明灸肝俞二百壯兒一二七壯

聖惠治妳癰目不明灸肩中俞二穴各一壯在肩甲

內廉去脊二寸陷中

睛高第六

聖惠黃連丸治熱毒攻目睛凸

黃連

犀角

地膚子

决明子

黃芩

苦參

車前子

元參各一兩

朴硝

龍膽各二兩

幼幼新書

卷三十三

十三

羅鍊蜜和杵三五百下丸如菘豆食後湯下一二

十九臨卧再服

睛無故突一二寸

急以冷水注目上數易水須更平復

青盲第七

巢氏兒歲有停飲而無熱飲水積漬肝也目五歲精

華肝外候肝氣通于目飲水漬肝歲氣不和精華不

明故不赤痛亦無障翳而不見物名青盲

龍木論初患青盲時母胎中或受驚邪致生五七歲

便患眼初夜卧多驚嘔吐痰涎黃汁漸失明從一眼相牽俱損宜牛膽丸犀角飲

寶鑑雀目青盲歌
小兒飲水久停肝障醫全無辨物難夜裡不明
為雀目青盲晝夜一般者

千金翼治青盲長尾蛆淨洗曝末內眼中
龍木論牛膽丸

黃牛膽 鈞藤各半 人參 羚羊角
藿香 廣香各一 琥珀少許

初切新書 卷三十三
未鍊蜜丸如梧子薄荷湯下五丸

犀角飲
犀角 防風 黃芩 芍藥各一

羚羊角 知母 人參各兩
末一錢水一瓊煎五分食後溫服

聖惠治青盲羊子肝散
麩仁 防風 香豉炒黃各一分 井泉石半兩

羅羊肝一片同研爛四五歲分二服新汲水下
青盲雀目菊花散

甘菊花 寒水石各一 牯牛膽 雌雞肝陰

羅豬肝血調半錢煎退醫

點眼鼠膽鯉魚膽各二枚和點
又鯉魚膽并腦等分和點昔日三四

又真珠半兩研如粉白蜜一合鯉魚膽一枚和煎一
二沸冷點淚出止

又猪膽微火煎冷點
雀目第八

初切新書 卷三十三
東氏兒目晝而精明瞑不見物為雀目如鳥瞑無所見

聖惠夜明砂散
夜明砂炒 薑石飛各半兩 細辛 羌活各一

細散一錢白羊子肝半枚粟米二百粒水一瓊煮
米熟去肝漸服兒大併肝食

煮肝石决明散治雀目疳眼
石决明 井泉石 穀精州 蛤粉各半

羅一錢白羊子肝一枚劈開入藥米泔一瓊煮

空心量食

治雀目仙靈脾散

仙靈脾根 晚蚕截炒各半兩射干

甘草炙各一分

細羅羊肝一枚切搽藥二錢線繫黑豆一合米泔

一瓊煮熟分二服以汁下

又方

老柏白皮 地膚子各一兩車前子

細辛

烏梅肉炒各半兩

羅粥飲調半錢意裁

幼幼新書

卷三十三

十五

又方

細辛 麥門冬焙 甘草炙

秦皮

蕤仁各一分

羅白羊子肝一枚去筋膜爛研和丸菜豆食後冷

水下五九五歲加

又方

烏梅肉 槐子炒 黃連

防風各一分

末黃牛膽汁一枚拌曝煉蜜丸如菜豆三歲空心

湯下五九量加減

又蒼朮去皮炒羅一錢羊肝一具米泔煮分半具切

拌藥與兒意加減

又夜明砂炒猪膽丸如菜豆不時粥飲下五九

治雀目

大天南星炮一枚

防風

黃芩

黃連

穀精草各半兩 甘草炙一分

羅錢半羊肝一片竹刀批入藥末米泔一瓊瓊合

煮汁盡溫食忌猪肉炙煨熱物

又方

幼幼新書

卷三十三

十六

黃芩

穀精草

羚羊角

蛤粉各半兩

細羅食後湯調一錢

張氏治風氣銀花攀睛努絲瘀肉腎膜侵睛兒雀目

還睛散

蔓菁子半升煮蒸

蓖麻子

旋覆花

菊花各八錢 羌活

防風

甘草炙

沙苑蒺藜炒 青箱子炒

黍黏子炒各四錢 穀精草

石決明

蟬殼

地骨皮

木通草

牡蠣

烏魚骨

淡竹葉

木賊

草龍膽

細辛

蜜蒙花

各十
六銖
白花蛇
兩半

蒼朮

三十二
銖米
泔浸去
粗皮

羅除莠菁單搗和散二錢七丈夫生枳湯或茶婦

人兒米泔調食後服忌瓜魚醬酒腎藏風攻眼入

桃仁炒四兩

聖惠灸手大指甲後一寸內廉橫紋頭白肉際各一

壯炷如麥

疣目第九

巢氏人有附皮肉生色與皮肉等如麥豆謂疣子即

幼幼新書

卷三十三

廿七

疣目有三數相聚生者割破裏狀如筋而強亦微有

血而復生此由風邪客皮膚血氣變化有藥治差者

有法術治者多生于手足

龍木論治兒臉生贅外障此眼初患時因脾胃壅毒

衝眼臉普生肉小如麻米後漸長大摩隱瞳人赤澀

淚出宜鈎割散去瘀血後乃熨烙更服搜胃散補肝

九曾青膏

千金針及小刀決目四面血出取患瘡人瘡中膿傅

莫近水三日即膿潰根動肉脫

龍木論搜胃散

大黃

桔梗

元參

防風

車前子

細辛

芒硝

黃芩

末一錢水一錢煎五分食後溫服

補肝丸

芎

藁本

五味子

細辛

羌活

知母

羌蔚子

兩

末煉蜜丸梧子大空心茶下十九

曾青膏

幼幼新書

卷三十三

廿八

曾青

龍腦

乳頭香

朱砂

琥珀

真珠

兩

末水一錢銀器內熬入蜜半兩熬膏臨臍點

聖惠治疣目

桑葉灰

四升湯淋汁砂
盆內煎如錫

硃砂

分一

附

生淨

羅入膏內調點疣目即落兼治黑痣

又桑皮艾並灰三升水五升淋又淋五色帛內汁中

合煎消點即爛脫

又糯米三十粒濕石及裏埋爛為度針撥破疣鼠傳

經宿自落

又硫黃醋調塗松柏脂末石灰汁調點杏仁燒黑研

塗蜘蛛絲纏並可脫

又七夕以大豆一合拭疣上三遍令病人自種豆于

南屋東頭第二流中豆生四葉熱湯沃差

目中有昧第十目附差

千金目昧不出蚕沙一粒吞

千金翼槌羊粗筋劈之如被筋法內筋口中熟嚼

幼幼新書 卷三十三 十九

眼着腫子臉上以手當臉上輕按之若痛者二

七過眯着筋自出以好審注四首頭黑魚膽亦佳

未出復為瀕平且未日出為若數按目痛可問日

聖惠兒目澀怕明狀如青盲灸中渚二穴各一壯穴

在手小指次指本節後陷者炷如麥

耳聾第十一

巢氏手太陽之經入耳內頭腦有風風邪隨氣入乘

其脉與氣相搏風邪停積即耳聾

寶鑑兒耳聾鳴聾耳痛不痛歌

太陽入耳聽損聰氣滯多時耳必聾鳴是風與

氣相擊痛應腦戶有邪風腎熱鬱蒸聾耳患日

深疼痛出稠膿不有稠膿非此患只緣滴水入

其中

千金治耳聾聾不出

擣自死白頸蚯蚓安葱葉中麵封頭蒸熟化水滴

耳中滿即止數度挑出差後髮裏鹽塞之

又灌三年酢最良綿塞半日許有物出童便亦得

千金翼治耳聾

幼幼新書 卷三十三 二十

生地黃極粗者長寸半 杏仁燒 巴豆熬各七枚

印成益二顆 髮雞子大炙

擣末髮薄裹內耳中一日夜耳中黃水及膿出漸

效若少損勿取出直以髮塞耳未損更內一日夜

去藥一依前法

又硫黃雌一作雄 黃等分末綿裹塞耳數日聞聲

主耳聾齒痛赤膏

丹參五兩 蜀椒二升 大黃 白朮

細辛各一兩 芩各一兩 乾薑二兩 桂心十四

大附炮去皮 巴豆皮去

切淳苦酒漬一宿內成煎猪膏三斤水煎三上下

藥成去滓可服可摩耳聾者綿裹塞齒冷痛着齒

間諸痛皆摩若腹中病酒服棗許咽喉痛吞如棗

核

聖惠治耳聾或因腦熱或水入或因吹着細辛膏

細辛 防風 川大黃炒 黃芩各一分

川楝十五粒 蠟半兩

劉清麻油煎紫色瀝入蠟為膏大豆許點耳中

幼幼新書

卷三十三

廿二

治風熱兩耳聾鳴

遠志 甘草炒 柴胡 菖蒲各一分

磁石三分碎淘去赤汁 麥門冬焙半兩

細羅葱白湯調半錢日二意裁

又

松脂 菖蒲 烏麻油

等分擣熟綿裹如紅豆塞耳中日一易

又葱白糖灰煨熟內耳中日三

張漢通鳴散治耳聾

九節菖蒲十一 遠志各一分 柴胡 麥門冬

防風各半 細辛 甜葶藶各一分 杏仁淨廿七枚

磁石淨淘赤汁一分

研食後葱湯調半錢日二量加

鄭愈麝香散治沉耳

麝許少 礬錢一 五倍子錢二

末擦紙點耳中

耳鳴第十二

葉氏手太陽經脉入耳內兒頭腦有風乘其脉與氣

幼幼新書

卷三十三

廿二

相擊故耳鳴邪氣與正氣相搏久即邪氣停滯成聾

嬰孺菖蒲散治耳鳴日夜不止

菖蒲烏頭綿裹內耳日再

耳中痛第十三

葉氏兒耳鳴及風掣痛皆起頭腦有風風入經脉與

氣相動故掣痛風染與正氣相擊輕者動作幾微故

但鳴風暴至正氣又盛相擊則甚動作病急故掣痛

若不止則風不散津液壅聚熱氣加之則生黃汁甚

者有薄膿

千金翼治耳痛

附子炮去皮 菖蒲

等分裹塞

耳癩第十四

巢氏瘡生兒兩耳時差時發亦有膿汁是風濕搏血

氣世呼為月蝕瘡

千金燒雞屎白筒中吹燒馬骨灰傅集驗雞屎白傅

聖惠白礬散治耳瘡頭瘡口邊肥瘡蝸瘡

白礬燒 蛇床子各一兩

切切新書

卷三十三

世

細散乾搽瘡上張漢有麝聖惠止麝白礬

治因築榼損耳成瘡汁出

胡桃油滴耳內

譚氏治耳上生瘡

柏子葉瓦上焙碾末輕粉麝和瘡乾油調濕乾搽

月蝕瘡第十五

巢氏兒耳鼻口間生瘡世謂月蝕瘡隨月生死故名

又初兒指初生月而生

千金凡日月蝕時忌食飲腹生蠱虫及房室生子不

具足必患月蝕瘡亦不得與兒乳明生後不忌令人

口鼻齒齦宣露常血出舌生瘡日月蝕時須救不救

出行逢暴雨其救月杖須收取治蠱神藥

聖惠月蝕瘡生兩耳鼻面間并下部諸孔竅側侵蝕

乃至筋骨月初瘡盛月末瘡衰故名又兒耳下生瘡

亦名生諸竅中則有虫久不差成癩

肘後俗言兒指月所為

燒蚯蚓屎赤膏和傅又五月蝦蟇屑膏和塗猪脂

亦得又胡粉和酥傅水和亦得

切切新書

卷三十三

卅四

治月蝕惡瘡息肉

硫黃 藺如 斑猫等分聖惠減半糯米炒

篩傅瘡上乾者猪脂和傅日三夜一

洗方

吳茱萸根 薔薇根 地榆根

等分篩鹽湯洗瘡傅日三聖惠投湯中煎溫洗

外臺黃連胡粉散治頭瘡月蝕口邊肥瘡蝸瘡

黃連兩 胡粉 水銀各一兩

等分水銀研相得傅瘡上黃汁引成瘡亦粉之一

有枯礬蛇床子各一两耳至項悉傳

聖惠水銀膏治耳邊出膿

水銀

黃連各二兩

松脂

胡粉與水銀研

星盡各一兩

研粉瘡上瘡乾鍊猪脂和鹽湯洗淨拭乾塗

又敗鼓皮一两蝦蟇一枚並燒灰研鍊猪脂和膏塗

膩粉散

膩粉

黃連

胡粉炒黃

松脂各一兩

研溫鹽漿水洗瘡拭乾傅瘡乾生油調

幼幼新書

卷三十三

廿五

又方

自死青蛙

母猪蹄殼各一枚

救月杖灰

研細蜜調塗

又月望夜取兔糞內蝦蟇腹中燒研傅

聾耳第十六

葉氏耳宗脉所聚腎氣所通兒腎藏盛而有熱氣上

衝于耳津液壅結即生膿汁亦有水入耳內水濕停

積搏血氣蘊結成熱亦令膿出皆為聾耳不差即聾

患濟歌

小兒聾耳腫兼疼兩耳常聞響有聲脉息太陰
傳在耳風停腦後出膿腥或因洗浴水從入又
被君家腎毒蒸

顧顛

白礬煨半兩

龍骨

鉛丹燒各一分

麝少許

末綿裹竹枝探膿水傳別以綿裹塞勿見風

千金治聾耳出膿

礬

烏賊魚骨

黃連

赤石脂無翼

此有龍骨

幼幼新書

卷三十三

廿六

等分末綿裹棗核大塞耳中三日

孫真人蚯蚓糞研傅兼吹耳中

外臺青羊糞曝綿裹塞聖惠多桂心

聖惠黃連散

黃連

白欬

赤石脂

龍骨

烏賊魚骨

等分細散綿裹棗核大塞耳中濕即易一無白欬石脂

花臘脂丸治聾耳出膿

花胭脂

白龍骨

礬枯

白石脂

研如粉棗瓢和丸如棗核綿裹內耳中日三
白礬灰散治聾耳膿血疼痛

白礬末 黃蘗 烏賊魚骨 龍骨各半

細羅綿纏柳枝展去膿摻藥耳內日二三

黃礬散治聾耳膿出

黃礬兩半 烏賊魚骨 黃連各一

羅綿裹棗核大塞耳中日三易

又生薑汁滴耳中

又桑上毒蜂房炙黃羅空腹溫酒調半錢大人二錢

切幼新書 卷三十三 廿七

又杏仁搗爛亂髮裹塞耳中日三

茅先生方

蛭竹屑錢一 礬灰半 坯子 麝各少

未綿拭膿戴毛管吹藥入耳日三五次

嬰孺用生地黃汁綿裹杖頭染汁摩耳中胡粉傅雀

血滲聖惠

甘草膏治耳聾聾耳膿出

甘草 黃芩 黃連 芩

白芷 藁本 當歸各三 附兩一

猪胎四斤煎膏內藥煎三沸白芷黃去滓用棗大
塗耳傅雞骨散

錢乙治膿耳

白礬煨 坯子臘脂各一錢 麝字一

研綿裹杖展淨摻藻東有真珠無白礬

惠眼鷓砂散治風熱攻耳聾或聾耳乾後塞

鷓砂 磁砂 馬牙硝 礬

等分銚內炒研入輕粉臨卧吹

莊氏大蛤蝻草火燒灰研先滴生油乾摻

切幼新書 卷三十三 廿八

又

竹蛭糞錢半 定粉字一 麝少

細末摻

耳有息肉第十七

外臺治聾耳有瘡及惡肉確黃散

白麻楷油一 花臘脂十

篩傅耳令滿一兩度差麻楷

嬰孺

確黃分六 曾青分二 黃芩分一

末綿裹塞耳中汁出良

底耳第十八

千金翼

礬石 石鹽

末紙繩維之展汁乾以鹽末粉耳中令遍次礬末

粉須更卧勿起日再

莊氏治底耳膿耳

寒水石煨麝細末摻耳中

百虫入耳第十九

幼幼新書

卷三十三

耳

千金虫入耳

炒胡麻擣葛袋盛傾耳枕之

又牛酪灌滿耳即出當半消若入腹中空心食酪

一二升即化黃水不盡更服翼牛乳和麩燒餅乘熱坐腫乳亦得

治百虫入耳

蜀椒一撮以半升酢調灌耳中行廿步出

又桃葉火熨卷或桑葉裹鹽炙熱並可塞耳

又車釭脂傳耳猪肉令香掩耳韭汁油亦佳

千金翼銅梳耳邊敲

聚寶治飛虫入耳

金釵石斛去心如筒子紙一邊耳竅中四畔蟻閉

塞燒石斛盡則更添虫從耳內生子熏右左出左

亦然

治虫蛇并虫入耳備急散

芫青 斑猫各廿一枚 柳絮礬錢二 金精石

銀精石錢各一 川狼毒錢一 片青黛半

細研水一合調一字入耳

雞鼻第二十

幼幼新書

卷三十三

鼻

東氏肺主氣而通于鼻氣為陽諸陽氣上榮頭面若

氣虛受風冷客頭腦即氣不和冷氣停滯搏津液膿

涕積聚即不聞香臭謂鼈鼻

寶鑑風傷頤即鼻塞并鼈肺熱加客風老鼻鼈

千金翼

通州 細辛 附一炮各分

篩蜜和綿裹內鼻中聖惠多甘草

聖惠龍腦散治鼻鼈

龍腦錢半 瓜蒂枚十四 赤小豆粒三十 黃連三

研卧時用菉豆大吹鼻中清水出效

鼻塞第二十一

巢氏肺氣通于鼻諸陽榮頭面氣不和而受風冷邪氣入于腦停滯鼻間即氣不宣和結聚不通故塞千金鼻塞不通淨出

杏仁兩半

蜀椒嬰孺用胡椒

附炮

細辛各六銖

吹咀醋五合漬一宿猪脂五合煎附色黃塗絮鼻中孔中日再煎摩頂

千金翼香膏治鼻塞

幼幼新書

卷三十三

四一

當歸

薰草一木香

通草

細辛

麝仁各三分

芎

白芷各半兩

羊髓兩四

切微火煎三上下白芷色黃去滓取小豆大內鼻中日三大熱鼻中赤爛加黃芩梔子去細辛當歸

又

白芷

芎各半兩

通草一分

當歸

細辛

薰草各三分
金莽州

辛夷仁五分

切苦酒漬一宿不中水猪肪一升煎三上下白芷黃去滓綿展棗核大內鼻中日三一加桂心十八銖

外臺細辛膏治鼻塞

細辛

通草各一分

辛夷仁半分

杏仁二分

羊髓猪脂各三合緩火煎膏絞滓取米粒許頻內鼻中

聖惠摩頂膏治鼻塞腦悶喫妳不得

羊髓

野猪脂各三兩

細辛

白芷

木通

當歸炒各三分

碎先下脂髓鑊中內諸藥慢火煎白芷色黃綿濾滓窻合盛令凝摩頂上煎入鼻內嬰孺猪脂

幼幼新書

卷三十三

四二

白芷膏治顛氣虛腫鼻塞

白芷

細辛

木通

當歸各半兩

剉羊髓四兩同藥慢火熬白芷赤絞滓貯篋器日三四傳顛及鼻內

治鼻塞雞乳木香膏

木香

零陵香各半兩

細辛三分

羅醜醜三合和藥銚內慢火煎極香絞滓窻合收日三四塗頭上鼻中麻油細辛蠟亦得
嬰孺治鼻軟及塞

杏仁 葦 葶藶子各四分

和彈丸大摩足踵乾易盡三九右執摩左踵

治鼻塞丹參膏

丹參 細辛 芎 當歸

桂心 防風各一兩 胡楸 乾薑

白芷各二分

猪脂羊髓各五兩去膜煎藥三上下去滓內鼻中

張銳治顛開鼻塞

大南星一枚炮末淡醋調塗緋帛貼顛上熱手頻

幼幼新書

卷三十三

四三

慰

吉氏葱涎膏

葱葉猪牙皂角各七條末爛研成膏貼顛

鼻流清涕第二十二

聖惠肺氣通于鼻肺為風冷所傷隨氣乘于鼻故液

涕不收故津液涕唾得熱則乾燥冷則流溢

聖惠前胡散治肺藏傷冷鼻流清涕

前胡 陳橘皮焙各半兩 白茯苓 桂心

白朮 人參 甘草炙 細辛各一分

羅散一錢水小瓊煎五分溫服日三次意裁

菊花散治腦戶傷風冷鼻多涕精神昏悶

甘菊花 白朮 細辛 白茯苓

甘草炙 防風 人參各一分

羅一錢水一瓊薑少許煎五分不時量服

張漢菊花散治鼻塞多涕

甘菊 防風 前胡各一分 細辛

桂心各半兩 甘草一分

羅半錢乳香少許荆芥湯調乳後服

幼幼新書

卷三十三

四三

聖惠多涕是風拍腦門肺寒也灸顛會一穴三壯炷

如麥直鼻上星上一寸

鼻乾無涕二十三

聖惠肺藏壅滯積熱攻腦則腦熱又肺氣通于鼻主

涕有熱則津液乾燥故無涕

木通 麥門冬焙 川升麻各半兩 知母

犀角 甘草炙 杏仁炒各一分 梔子仁三分

末一錢水一瓊煎五分不時意裁

牛黃散治心肺壅熱腦乾無涕煩躁

牛黃 甘草各一分 赤茯苓 犀角

鉛霜 朱砂 龍腦 川升麻

馬牙硝 子芩各半

羅不時湯調半錢意裁

射干散治肺心壅熱鼻乾無涕咽喉不利少食

射干 川升麻 麥門冬焙 柴胡各半

黃連 犀角 子芩 甘草各一分

粗散一錢水小瓊煎五分服

幼幼新書 卷三十三 四十五

犀角散治肺氣壅腦熱鼻乾心神煩躁大小腸不利

犀角 麥門冬焙 川大黃炒 黃耆各半

赤芍藥 木通 枳殼炒 甘草各一分

散一錢水小瓊煎五分服

吹鼻散

蟾酥大豆 消石 蚺蛇膽各一分

研如粉取少許吹鼻中

萬全麥門冬丸治心肺壅熱腦乾無涕時煩躁

麥門冬焙 龍腦分 甘草各一分 牛黃各一分

黃連 赤茯苓 犀角 粉霜

朱砂 馬牙硝 生乾地黃 子芩各半

羅蜜水調半錢

鼻有息肉二十四

千金翼鼻中肉塞眠食皆不快本州云雄黃主鼻中

息肉生用致困余鍊雄黃日內大棗許十日肉塞自

出即喘息鍊法在千金翼仙丹方中宜尋

千金 通草 細辛各一分

幼幼新書 卷三十三 本

擣末如豆綿纏頭內鼻中日二

千金翼通草散

通草兩半 礬石煨一分 真珠一分

篩展綿如棗核取如小豆內綿頭入鼻日三一有

桂心細辛各一兩

治鼻有息肉不聞香臭

瓜蒂 細辛各半

散絮裹豆大塞鼻須臾通

羊肝散主鼻中息肉梁起

羊肝散主鼻中息肉梁起

羊肝乾一 白朮炮四 茯苓

乾薑炮 芎藭各一兩

散食後粥汁服五分日二加至方寸

幼幼新書卷第三十三 關壽軒刊

幼幼新書卷第三十四 口唇喉齒 凡二十門

後學古吳陳履端于始輯

吳邑顏承奎嗣昌校

口瘡第一

巢氏兒血氣盛兼將養過溫心有客熱熏上焦故口生瘡

千金翼口瘡忌食鹹酸熱麵乾棗等宜純食甜粥勿食鹹菜三日差口中面上生息肉轉大刀決潰去膿愈

幼幼新書 卷三十四

肘後燒葵傳嬰孺用根口瘡並食

支太醫桑白汁生地黃汁赤蜜各半合和細傳

治口瘡不得飲乳

飲羊乳佳食療含殺羊生乳

千金治口瘡難吮乳

大青銖十八 黃連銖十二

吹咀水三升煮升三合日再夜一

又礬石如雞子置醋中塗兒足下二七遍

治口瘡白漫漫

父髮拭口赤汁塗

千金翼治口瘡咽喉不利口燥膏

臘月猪脂 白蜜各一斤 黃連一斤

合煎去滓合相得含如半棗日四五夜二

治積年口瘡蓋微膏

蓋微根一升水七升煮三升去滓含久即吐少入

咽亦佳

蓋微丸治口瘡體熱痲癩 鼠李根 當歸

葛根 白欬 石龍芮 黃蘗

黃著 芍藥 續斷 黃連各一斤

苦蕒根二兩

末煉蜜和服如梧子十九日三

宮氣方主口瘡通白及風疔瘡蝕透

白殭蚕炒晚蚕戴角蒿灰並可傳

圖經故錦灰研末傳

聖惠龍膽丸治口瘡多睡吐乳

龍膽 川大黃炒 茵陳各一斤 人參

梔子仁 川朴硝 郁李仁炒各半兩

羅鍊蜜丸如菜豆一二歲湯研三九稍大加

雄黃散治口瘡爛痛不問赤白或生顛頷或生齒斷

雄黃 朱砂 硝石 蚰蛇膽

黃連 石鹽 苦參各一分 雞屎礬分

麝錢一 細散日三五塗

治口瘡久不差

蝦蟇酥炙 笋灰各半兩 白礬灰 黃蘗

黃連 晚蚕戴炒 川升麻各一斤 蝸牛肉三枚

細羅蜜和如膏塗日三

治口瘡氣臭生虫升麻散

川升麻 黃芩 桑本 甘草生

生地黃 五倍子各一斤 皂莢 訶皮

夏枯草三味燒各半兩

羅散候兒睡乾搽

治口瘡鉛丹膏

金丹分一 鉛霜分半 晚蚕戴少 蛤粉各半

麝錢一 研細蜜二兩熬膏塗

又

銅綠錢一 白芷半兩

末日三搽

石膽散治口瘡赤爛

石膽錢半 蚬蛇膽 龍腦各一分

研塗日三

切勿新書

卷三十四

四

博濟紫霜

黃蘗兩指大兩片 訶子燒一枚 麝

膩粉各少許

羅搽舌上

治骨槽風牙齒宣露腫痒浮動疼痛時作或斷爛生

瘡兼治口瘡地骨皮散

地骨皮 麥蘗各一分 猪牙皂莢兩半 青鹽一分

鍋內炒丹杵鹽漿水嗽口搽擦

譚氏保生丸

小兒心藏不清涼客壅傷神饒口瘡鈞引重舌
言妨當涎流不絕似流漿

大黃 黃蘗 宣連各半 丁香錢一

麝字一 金箔五片水 銀結砂

細研棗肉丸如阜子湯化一粒

茅先生治口熱生瘡

黃蘗蜜炙紫半兩 青黛炒一分

末日三五次搽喫涼心藥

嬰孺治口瘡爛

切勿新書

卷三十四

五

羊乳汁 黃連

浸塗

又為藥當歸黃連等分乳汁浸塗口中

治口瘡白者肺噤赤者心噤

雞糞白棗大一塊綿裹水一合煮二沸分丹服

漢東王先生治戴口重舌及口瘡青液散膏

青黛錢一 腦子少許

研傳舌上

錢乙大南星取中龍眼大為細末醋調塗脚心譚氏

津調貼劉氏多黃柏效塗頂門王氏多烏頭尖

張漢桐律散治口瘡口吻

梧桐律

黃蘗蜜炙

蛤粉各一分

晚蚕一炒

錢

朱砂飛半兩

麝錢一分

龍腦錢半

研搽

劉氏雞內金細末搽

治透舌口瘡及疳

柳木蛀虫燒煙盡如無雜木虫亦得為細末入

麝少許乾貼瘡上

幼幼新書

卷三十四

木

青黛散

青黛

甘草生

黃連

香白芷

蜜陀僧燒

等分末搽

莊氏治未滿月兒口瘡

沒石子末置乳上兒吮即啼取乳三次效

又

鬱金

雄黃

甘草半炙半生

等分末搽有涎吐之又水調蛤粉塗脚心

王氏兩蜜散蜜陀僧蜜調塗唇上

朱氏赤芍藥川大黃宣連等分末獾猪膽調塗顛門

吉氏多黃丹

鄭愈

青黛

黃連各二錢

甜硝

白殭蚕各三

錢

馬屁勃大拳

末乾搽先菜蔓湯洗脚心又醋糊調菜蔓末塗脚

心

寶鑑兒口瘡臭氣炙手心一壯

幼幼新書

卷三十四

土

口臭第二

千金翼濃煮細辛含汁久乃吐三日愈又并華水漱

口吐廁中

又桂心炙甘草等分細末三指撮酒服廿日香一有

蜀椒

千金灸勞宮主口中腫腥臭

口乾第三

千金羊脂若猪胎雞子大擘之內半升酢中漬一宿

絞汁含羊脂一用

治口乾除熱下氣

石膏五合水三升煮取二升內蜜二升煮二升去

滓含如棗核嚙汁盡更含

千金翼含一升梨夜睡當時即定

又

羊脂雞子大

酒半升

大棗七枚

合漬七日取棗食

又夜勿食酸及熱麵

鷺口瘡第四

勿切新書 卷三十四

東氏脾胃有客熱熏發于口兩吻生瘡白色如鷺子

吻名燕口瘡

千金燒髮灰和猪脂傳經年癸根欲腐者燒灰熱傳

白楊枯枝鐵上燒取瀝熱傳

又楸白皮濕貼

又新炊飯甑及熱以唇口向甑唇上熨二七差止

陳巖罷染葉煎如赤糖塗

聖惠胡粉散

胡粉炒黃一分 黃連兩半

細末傳

治鷺口重舌熱瘡

柘樹根水煎濃汁去滓更煎日三四塗

又雞脰黃皮灰乳汁調半錢服日三

又殺羊鬚灰臘月猪脂和傳日三四

又黃連末蜜調蒸一炊久旋與

唇口生瘡第五

千金治口傍惡瘡

髮灰

胡絮灰

黃連

乾薑炮

勿切新書 卷三十四

等分粉瘡上三遍差

治冬月唇乾折血

搗桃仁猪脂和傳

治遠行唇口面皸裂

煎猪脂將夜行常傳面萬里夜宿不損

治唇瘡久不差

八月藍葉十斤絞汁洗三日差

治唇口卒生瘡或痛痒

黃蘗末濃煎薑椒根汁調塗

舌腫第六

巢氏脾之絡脉出舌下心脾俱熱氣發于口故舌腫
千金治舌腫強滿含糖醋滿口

千金翼治舌卒腫起如吹胞滿口塞喉氣須臾不治
殺人

刀鋒决兩邊第一大脉出血勿刺着舌下中央脉
血出不止殺人血出數升燒鐵令赤熨瘡數過以
絕又急以指刮破潰汁

又苦酒一升煮半夏十枚得八合稍稍含漱吐之半

切勿新書

卷三十四

十一

夏戟人咽酒熟洗滑盡加薑一两佳

張銳

百草霜研細醋調傅舌上下針决出血彌佳

舌上瘡第七

巢氏心候于舌心藏熱則舌生瘡

本草白礬和雞子置醋中塗足底二七度

千金染汁塗乳兒羊蹄骨中髓和胡粉傅蜂房燒

灰和屋間塵傅

千金升麻煎泄熱治舌瘡裂破引唇揭赤

蜀升麻

射干各三

柏葉升

大青兩

苦竹葉

地黄汁各五

生玄參汁各三

赤蜜合八

薔薇根白皮生蘆根各五

吹咀水四升煮一升去滓玄參汁煎再下地黄汁

各煎兩沸下蜜煎升七合綿惹汁安舌上含細嚥

外臺烏賊魚骨灰雞子黃和喉咽舌下傳

張銳野薔薇水煎熱含冷吐根用

張氏龍腦半分寒水石煨半兩搽舌上

舌上血出第八

切勿新書

卷三十四

十一

千金翼治舌黑數孔出血如湧泉此心藏熱

戎鹽

黃芩

黃蘗

大黃各三

人參

桂心各二

甘草兩

末煉蜜丸飲服十九如梧子日三仍燒鐵烙

唇腫第九

千金翼治唇黑腫痛痒難忍

四文大錢臘月猪脂石上磨汁塗

又竹弓彈出惡血

外臺療唇腫口白瘡桑木白皮汁塗

緊唇第十

聖惠脾與胃合為足陽明其經脉起臍環于唇其脉入絡于脾脾胃有熱發于唇生瘡重被風邪濕氣搏于瘡則微腫濕爛或冷或熱乍差乍發積月累年名緊唇又名潘唇

千金纏白布作大燈炷如指安斧刃上燃令刃汗出拭傳日三四青布燒灰酒服亦可胎和塗

千金翼髮蜂房六畜毛灰傳猪脂和

秘錄馬芥刺芥濤汗先揩唇血出傳

本草赤苧汗洗

聖惠黃連散治緊唇是五藏熱毒上衝唇腫反粗

黃連 甘草生 寒水石 黃蘗各半兩

檳榔分一

細羅煉蜜調塗

又爛嚼澤蘭心安唇上葵根灰酥調自死螻蛄灰烏

蛇灰鼈甲灰猪脂調松脂點

唇青第十一

巢氏兒藏氣不和血虛為冷所乘即口唇青肥亦有

藏熱唇瘡風冷入瘡差後血不復唇亦青

水鑑神仙方兒百日内無故唇口青不食

太藍乾陰 凌霄花 蜀大黃 牙硝各一

搗散羊髓丸研一九灌便喫乳驗寒者難用

咽喉腫痛第十二附喉瘡

茅先生渾身壯熱耳邊連珠赤腫喉中或結肉瘡為

詐顯風壅因積熱衝上先微下奪命散略吐風涎急

驚門勻氣散補和胃氣不朱砂膏驚悸夾天竺黃散實熱

又葱涎膏貼顯腫處風傷如見惡候忌傳急驚

千金升麻湯治喉痛若毒盛便咽塞

升麻 射干 薑各三兩 橘皮一兩

吹咀水六升煮二升分三服一無薑橘有大黃

又鹽末鮫頭張口拄翼以竹筒內口熱鐵從竹中拄

千金翼治熱病口爛咽喉生瘡水漿不入

當歸 射干 升麻各一兩 附炮淨

白蜜兩四

切猪膏四兩煎着地冷內諸藥微火煎附色黃絞

滓入蜜復上火盛器中凝含杏子大輒嚙日四五

又刺小指爪紋中出血左右刺神秘

聖惠牛蒡根搗汁漸服子亦佳蛇蛻露蜂房灰乳汁

調任下

射干散治脾肺壅熱咽喉腫痛

射干 川升麻 百合 木通

甘草 桔梗 馬牙硝

粗羅一錢水小瓊煎五分不時量服

升麻散治咽喉腫塞疼痛

川升麻 木通 川大黃 絡石葉

幼幼新書

甘草 犀角 川朴硝 石膏

粗羅一錢水小瓊煎五分不時量服

博濟玉芝飲治膈壅熱痰唇口生瘡咽喉腫痛

甘草 吳石膏 藿香

山梔子

杵末二錢新汲水調老幼並服

治風熱咽喉腫疼塞悶生瘡搖頭躁悶及虫咬心痛

龍腦膏

龍腦 白礬 玄明粉 蟬蛻

蛇蛻 長二尺 燒焦

牛黃 少

爛研砂糖少許和丸如桐子冷水化一九服

絳雪散治咽喉腫痛氣息難通

硃砂 白礬 馬牙硝 硝石

黃丹 巴豆

粗瓷罐一個煨熱次第下藥巴豆逐個破候燭盡

更入一個續蛇蛻一條謂七擒火養成汁候硬竹

筒吹少許入患處臘月合忌雞犬婦人見

養生治喉閉舌頰腫咽喉有瘡效嗽膿血如聖湯

幼幼新書

甘草 桔梗

末二錢水一盞煎七分溫服

嬰孺治咽喉不利乳半夏湯

半夏 棘刺 麥門冬 人參

甘草

切水三升煮一升稍稍服

張銑白殭蚕生馬牙硝等分末薑汁調服

韓樞密大聖奪命玉雪無憂散

元參 管仲 白茯苓 縮砂仁

甘草炙 滑石 山豆根 川黃連

荊芥穗各半 寒水石燒水淬 鵝砂錢

羅服半錢此理咽喉塞滯口瘡心腹脹滿脾積癥

塊解百藥毒如纏喉痺風涎兒鯁嗽妳辦不消誤

噉魚骨針錢等並抄半錢新汲水噉百毒硬物立

除如要喫巴豆針刺麥糖粘針瓷瓦子等諸毒藥

毒虫硬物藥半錢與物拌喫水一口下心腹間有

礙服潤三焦消五穀除三尸去八邪辟九虫趨瘟

疫專理渴疾除風涎開牙關尤神

張氏治咽喉腫塞疼痛口舌生瘡上膈壅熱龍石散

寒水石燒一日 生腦子錢 朱砂飛

細末擦患處噉津無妨兒瘡疹攻口齒先用化毒

丹驚熱 次擦

諸病無急于咽喉死入最急急治之

白礬白蠶蚕等分末生薑水調一錢兩服愈如牙

關禁用去皮巴豆七粒擦油在四指大方紙上紅

箸斜卷去箸男右女右簪臬中一半點火即時煙

透喉中牙關隨開白礬少許吹喉中壓下熱涎即

安

丁時發地龍散

鬱金皂角 甘草炙 白蠶蚕 地龍各

蝎 牙硝各一

細末薄苛湯調一錢量兒

尸咽第十三

千金翼治尸咽語聲不出

酒二合酥一匙薑末一錢七和服日三食後服亦

治肺

治尸咽咽中痒痛吐不出噉不下如中虫毒

含生薑

咽中噎第十四

千金翼酥蜜薑汁合一升微火煎二沸兩棗許內酒

中溫服手巾布裹春杵頭糠拭齒亦佳

喉痺第十五

巢氏喉痺是風毒客咽喉與血氣相搏結腫閉塞飲

粥不下乃成膿血若毒入心即悶煩懊懷難忍死

寶鑑喉痺馬痺歌

熱毒喉中結作癭名為喉痺食難通馬痺領間
生腫痛盛即心煩命也終

王訣歌

咽喉腫閉肺家殃積熱于中舌有傷風盛氣攻
丹腫毒却愁生出腦疔瘡

先解利宣洩歲府歷熱調氣即安

千金魚膽二七枚和竈底土塗聖惠鮫魚膽

又桂心杏仁研綿裹棗大含嚙汁

烏翼膏治卒喉痺不語服小續命湯加杏仁一兩喉

嚙者脾胃之候若歲熱喉塞神氣不通

生烏髮兩十 升麻兩三 羚羊角 芍藥

通草兩各二 薔薇根升一 艾葉銖生六 生地黄合五

猪脂斤二

咬咀綿裹苦酒一升浸一宿內猪脂微火煎酒盡
去滓薄裹膏杏仁大內喉中細吞

又荆瀝嚙臘猪尾灰水服牛角灰酒服酒和人乳服

又芥子末傳用水乾則易熬韭傳冷則易

又刺小拍瓜文中出血三大豆許逐左右刺慎酒

毒物翼繩纏大

千金翼半夏破如棊子十四枚雞子一枚扣頭如粟

出黃白內半夏用酢滿極微煎冷飲

又附子去皮蜜塗炙乾再塗含嚙汁

外臺升麻湯主喉痺痛毒盛咽塞與咽喉腫

聖惠犀角散治喉痺腫塞不通壯熱煩悶

犀角 桔梗 絡石葉 梔子仁

甘草炙 升麻各一 馬牙硝 射干各半

粗散一錢水小瓊煎五分不時量服

張漢射干湯

射干 川升麻各一 馬牙硝 馬勃

羅一錢水一瓊煎五分食後熱服

吉氏

鬱金大者 輕粉一錢 巴豆四粒熟霜

先在研四十九遍後順研入輕粉吹一字入喉

奪命散

朴硝 白礬 天南星

等分末半錢水一瓊煎二分大人加至三錢

聖惠灸天突一壯在項結喉下三寸兩骨間炷如麥

馬痺第十六

巢氏馬痺與喉痺相似亦是風熱毒客咽喉頤頰間與血氣相搏結痛從頤下腫連頰下應喉內痛塞水漿不下甚者膿潰毒攻心煩懊死

千金喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺

馬脚一具水二升煮一升分三服馬鞭草根一握

勿中風截兩頭擣汁服

千金翼馬蘭根灰方寸匕燒桑枝澀汁和服

切切新書

纏喉風第十七

醫局解毒雄黃九治纏喉風急喉痺卒仆不語或牙緊不省人事

雄黃飛

鬱金各一錢

巴豆淨霜二七枚

末醋糊丸如菉豆熱茶清下七丸吐頑涎立省未

吐再服亦治走馬喉閉不省人事急以刀尺鐵匙

輪開口灌之藥下喉無不活吐瀉無妨上膈壅熱

痰涎不利咽喉腫痛赤眼癰腫一切毒熱並宜如

兒喉嚨赤腫及驚癇壅熱塞量服二三丸

張氏異攻散治纏喉風詐顯喉閉及咽喉一切患

益硝兩一

甘草錢六

呵子肉

白殭蚕

貫衆

馬勃

蛇蛻點油醋慢火炒黃各半兩

鵝砂

元精石各一錢

細末一字蘆管吹喉內纏風磨刀水調半錢尋常

置舌下

治纏喉風喉閉牙宣牙癰走馬疔口瘡

蚕退紙燒存性入龍腦蜜丸雞豆大含化如牙宣

癰腫楷貼斷上如走馬疔加腐

切切新書

安師傳火炊草春爛水衝汁漱咽中漸寬下小續命

湯如萹荊子何首烏薄荷荊芥各少許與小續命

等嚙下數服腫消

齒痛第十八

千金翼夜向北斗手拓地灸指頭地咒曰蝎虫所作

斷木求風虫所作灸便休疼痛疼痛北斗收差

人定向北斗咒曰北斗七星三台尚書某甲患斷若

是風斷閉門戶若是虫斷盡收取急急如律令再

三拜作

千金翼蒼耳子并莖葉莽草任煮含漱

又藜蘆末門下桃楸燒汁俱可內牙孔中蠟封

又針牙疼針隨左右邊疼手大指次指掌間入一寸

得氣絕補三十九息

又灸牙疼桑東南引枝長一尺餘大如匙柄齊兩頭

口中拄着痛牙上以三姓火灸呪曰南方赤帝子

教我治虫齒三姓灸桑條條斷蝎虫死急急如律

令

含嗽湯

幼幼新書

卷三十四

十一

獨活

黃芩

芍藥

當歸各三兩

細辛

華撥

丁香各一兩

咬咀水五升煮二升半含漱食頃吐一有廿二兩

齒斷宣露第十九

巢氏手陽明足太陽脉並入于齒兒風氣入其經脉

與血相搏血氣虛熱即齒斷血出

千金翼竹茹二兩酢漬令解衣坐別令一人含喫背

上三過并取竹茹濃煮汁勿與鹽含漱

外臺此日月蝕時飲食所致

蚯蚓糞水和丸火燒赤末之臘月猪胎和傳日三

茅先生苦參一兩白礬灰一錢細末日三次搯牙

張銳童便含冷即吐

莊氏治唇口息爛齒斷宣露麝香散

麝

雄黃

白龍骨

蘆會各一錢

蜜陀僧錢

石膽生半兩

乾蟾一枚重半兩燒存性

研極細綿紙纏筋頭貼先用鹽礬漿水輕洗

齒斷腫痛第二十

千金翼生地黃獨活各一兩切酒漬一宿含

幼幼新書

卷三十四

十一

又白鹽封齒斷日三夜一

又扣齒三百下老不病齒

治齒牙根掣欲落

生地黃大者一寸綿裹着牙上嚼嚙汁日三含十

日不發一用火灸熱

齒齲腫

松葉一

鹽一

好酒三升

煎一升含

治齒斷空腫痛困斃無聊

獨活兩 酒升

器中澄糖火煨煖稍沸熱合

又燒松柏槐枝熱拄病齒孔須臾虫緣枝出

齩齒第二十一

巢氏手陽明足太陽脉並入齒風氣入經脉血氣搏

齒即腫膿出名風齩

千金白馬懸蹄可孔塞之聖惠用夜眼

聖惠蝦蟆散治齒痛風齩頭微腫

乾蝦蟆燒一個 青黛 柑子皮 細辛

幼幼新書 卷三十四

白雞糞 萸黃各一 乾薑 麝各半

羅散薄綿裹少許內齩齒孔中日一易

又

白附子 藁本 細辛 芎

莽草

等分羅散薄綿裹少許着齩齒

治齩齒風疼及虫蝕痛

乾蝦蟆燒一枚 青黛一分 蘆會半

研生地黃汁熬膏塗

又卑角灸去皮子末傳

又雞舌香半兩水一瓊煎六分熱含冷吐

齩齒第二十二附 裂齒

千金翼治虫蝕齒痛

閉氣細書曰南方赤頭虫飛來入某姓名裂齒裏

今得蝎虫孔安置耐居上急急如律令小牋紙內

着屋柱北邊蝎虫孔中取水一盃禹步如禁法還

誦上文以水沃孔淨黃土泥之勿泄氣

治虫蝕齒斷肉黑

幼幼新書 卷三十四

燒腐棘取諸塗十遍雄黃末傳若齒黑松木灰指

細末雄黃塗斷百日日再七日慎油猪肉

治齩齒

以檐一枚令病人蹲坐檐橫膝上引兩手尋使極

住手伸中指灸中指頭檐上三壯兩頭一時下火

病人誦咒曰噉牙虫名字鶻莫噉牙莫噉骨灸人

亦念

又死曲鯨末傳

聚寶治齒斷疳虫有窠子不合黃芩散

龍實龍骨中有深黃淡黃土褐色紫探人舌者是 白礬及

蝸牛殼 南粉 牛黃各一錢

細末時時貼竅內

齒落久不生第二十三

千金牛屎中大豆二七枚小開豆頭注齒根數度

又雄鼠糞二七枚每日以一粒拭齒根處用盡即生

雄鼠糞頭尖

經驗黑豆三千粒牛糞火燒煙盡細研入麝針鈹不

生齒處血出用勿見風忌酸鹹物

幼幼新書 卷三十四

聖惠路傍故遺稻粒點三七下齒生

靈苑治齒生雄雌雞糞各十四顆焙研入麝少許針

挑破血出即傳老人二十日少者十日生傷損及

自落並生

頰車蹉閃第二十四牙車急附

千金一人以指牽其頰漸推之復入推當疾出指恐

誤傷人指

千金翼治牙車急口眼相引舌不轉

牡蠣熬 伏龍肝 附炮 礬石燒

等分末白酒和如泥傳乾則易

千金灸背第五椎一日二七壯滿三日未差灸氣衝

二百壯曾前喉下甲骨中是亦名氣堂

灸足內踝上三寸宛宛中或三寸五分百壯三報此

三陰交穴

幼幼新書卷第三十四

幼幼新書 卷三十四

廿五

幼幼新書卷第三十五 一切丹毒 凡三十八門

後學古吳陳履端于始輯

橫塘林元發春芳校

丹候第一

巢氏風熱毒客腠理搏血氣蒸發于外皮熱赤如丹

謂丹候久不差即肌肉爛傷聖惠毒入候死

眼丹眼卒赤腫生翳至有十數翳者

風火丹初發肉黑忽腫

暴火丹帶黑肥色

幼幼新書 卷三十五

遊火丹發兩臂及背如火炙

石火丹發通身突起如細粟色青黑

鬱火丹從背起

赤黑丹毒熱折血氣蘊蒸赤色復有冷氣乘之冷熱

互交更相積滌令色赤黑

厲火丹從髀下起背赤能移走

飛火丹着兩臂及背膝

留火丹一日夜便成瘡如棗正赤色

風冷乘血脉血得冷則結成核皮肉如藍經久不歇

名藍注方從一切丹門求

顛顛黃帝問岐伯曰後生少稚多被惡疾丹毒二品

若分歧伯曰陽解百年一十已上為毒一十已下為

丹丹毒一也隨大小分依方治之萬無一失喻人問

依此枉死者由信邪師語仍被恐之過昧之人忽于

下手今圖于後

伊火丹從兩脇起

燥火丹從背甲起

神氣丹從頭背上起

幼幼新書 卷三十五

朱黃丹赤豆色遍身起

右巢氏顛顛後有專門者並削

寶鑑歌

丹火初成似火燒天火渾身赤轉饒伊火膀邊

青黑色厲從額上起根苗翳弄穀道燥丹毒如

帶驚紅暴火調留火發時一日甚變改無時五

色標家火頰連雙腋乳天竈內腫到陰尻背并

膝赤飛丹病股內臍陰尿竈招

一切丹第二

本草治諸熱丹毒以水銀服生銀少許功勝紫雪
千金擣慎火草汁塗

治丹毒太赤腫身壯熱百治不折聖惠名
藍青十二

寒水石十六 石膏十三 藍青十二
聖惠名

黃芩七 犀角八 柴胡八
聖惠名

杏仁八 知母十 甘草五
聖惠名

羚羊角六 芍藥七 聖惠名
生葛汁四

梔子十二 蜜二 聖惠名
咬咀水五升同竹瀝一升煮三升二合去滓內杏

胎葛汁蜜微火煎二升一二歲服二合量加

麻黃湯治丹腫及風腫風疹瘡

麻黃去根節 甘草炙 獨活 射干

桂心 青木香 石膏 黃芩各一

咬咀水四升煮一升三歲分四服日再

又馬齒莧汁飲滓薄傳飲赤小豆汁大豆汁塗猪胎

和釜下土傳

千金翼澤蘭湯主丹疹入腹殺兒

澤蘭 芎藭 附子 莽草

幼幼新書 卷三五

幼幼新書 卷三五

葉本 細辛 茵芋各半

咬咀水三升煮升半分四服服後洗

塌湯主丹癰疽始發焮熱浸長兼主丹忌近陰

升麻 黃連 大黃 芎

羚羊角 當歸 甘草各二 黃芩三

水一斗煮五升去滓內芒硝三兩再沸貼帛塌腫

上數過腫熱隨消

外臺苦蕒蕎麥麵並醋和并藍葉汁皆可塗

治月內兒護丹

幼幼新書 卷三五

升麻二分 黃芩 犀角 甘草炙

柴胡 大黃別浸五二分 蘭葉三合

梔子仁八分 聖惠一分 石膏三分

切水升二合煮八合下竹瀝四合煎一半分二服

又青藍汁五合竹瀝七合和量服

簡要治丹毒從臍起伏龍肝屋漏水或新汲水調如

糊塗乾即傳

候真錄治爛莖麻子五個去皮研入麵一匙水調塗

幼幼新書 卷三五

幼幼新書 卷三五

陳藏器

萍鐵水飲積雪草東人名連錢草葉團如錢搗絞汁

服旋花鼓子花根汁服

秘錄柳葉煮塌洗桐木皮煎傳蟬螬傳鯽魚肉和小

豆擣傅鯉魚血傳

聖惠治丹遍身赤腫痛大黃散

川大黃微炒 防風各半 川升麻 黃芩

麻黃去根節 秦艽各一 川朴硝各三

粗羅一錢水小瓊煎五分不時溫服

幼幼新書

卷三十五

五

治丹發無常體熱如火升麻膏

川升麻 川大黃 景天草 蛇銜

梔子仁 寒水石 川芒硝 藍葉

生地黄 芭蕉根 羶羊角 梧桐皮

等分細剉竹瀝浸一宿瀝鎔中臘月猪脂一斤慢

火熬一食承熟綿濾滓冷成膏窰合盛旋取摩又

竹瀝調服棗大

又浮萍草研傅藍青韭畦中土水調地龍蠶芭蕉根

汁鼠粘根蒴藿景天花並可各傅

嬰孺丹發卒暴者不治凡養小當察病初尋方觀

視病形像隨用別藥治丹極驗無如水中藥

又

升麻 柴胡 石膏 梔子各五

大黃 生葛各八 子芩各六 犀角

杏仁 芍藥各四 甘草各三 竹瀝各八

切水三升并瀝煮一升一歲分三服

塌方

幼幼新書

卷三十五

六

升麻 犀角 白欬 黃芩

梔子各三 藍葉各一 石膏各四 生地黄各四

水五升竹瀝二升半去滓沾帛塌

又生麻油蔓菁根煩人月水衣洗並傅

張銚大黃朴硝等分水調塗一加麝

土虺第三

養生土虺丹發兩手指作紅線漸行至關節便殺人

並治惡瘡虫咬

大赤足蜈蚣條二 白礬 膽礬各一

麝錢

細末一刺耳許針撥破瘡口安藥醋麵糊紙貼日一換膿血盡好肉生貼膏藥

眼丹第四

集驗方治眼卒赤腫生翳至十數者名眼丹救遲損目

患人仰卧以紅線纏並剪刀刃安患人眼上三姓老嫗各拈艾炷一枚在剪刀上灸仍一人祝云不灸病人只灸眼丹三遍候煙斷將剪刀棄宅後或

幼幼新書

卷三十五

七

無人行路上隔宿收之

五色丹第五

巢氏丹發而變青黃白黑赤無常由風毒熱有盛有衰或冷或熱故名五色丹

千金猪槽下爛泥傅乾即易集驗治卒赤黑丹

又服黃龍湯二合并傳

聖惠方

川大黃

黃芩

川芒硝

梔子仁

乾藍葉

商陸

等分細羅水調塗

浴棗根湯

棗根兩四 丹參兩三

菊花兩半

細剉二兩水五升煎三升避風浴

又苧根葉一斤赤小豆三合水五升煮三升避風浴又青栗棘煮湯浴

伊火丹第六

巢氏丹發于髑骨青黑名伊火丹

顛顛從兩脅起猪糞灰并鐵槽中泥拌調塗日三

幼幼新書

卷三十五

八

熯火丹第七

巢氏丹發解背穀道名熯火丹

顛顛從背甲起生麻油合猪槽下泥塗

嬰孺丹發從背或走兩足赤如火

景天草兩十 真珠兩一

杵為泥封

丹發腹下至卵者不治

麻黃炒 升麻各二分 硝石四分

末并華水服方寸七日三一加大黃半分

茱萸丹第八

東氏丹發從背起遍身如細顯名茱萸火丹
千金一宿成瘡

赤小豆末粉未成瘡者雞子白調傳

赤丹第九

東氏赤丹色純赤是熱毒搏血氣

聖惠由風毒重故赤初發疹起大如連錢小者如麻
豆肉上生粟色如雞冠名赤丹亦名茱萸丹

千金芸薹葉汁服三合滓傳翼雞子白調
芸薹末傳

幼幼新書 卷三十五 九

又嚙和胡粉從外向內傳鐵屎猪胎和屋塵猪胎和

黃米粉雞子白和蕎麥醋和胡荽汁並可傳

張渙升麻膏

川升麻 白欵 漏蘆 川芒硝各一

連翹 梔子仁各半

劉猪胎半斤慢火煎赤窰合盛旋取塗

莊氏

赤脚蜈蚣焙石硫並末新汲水調鷲翎掃頭焦即

止

白丹第十

東氏丹初是熱毒挾風熱搏血積蒸發赤熱輕挾風
多者色微白

聖惠初發痒痛微虛腫如吹疹起不痛不赤白色

酸母草 五葉草

各五兩搗絞汁塗

又川大黃末馬齒莧汁調蘭香葉蓼葉搗爛梁上塵

醋和鹿角灰猪胎和並可傳

嬰孺治風熱毒腫色白或惡核癩癰附骨癰疽節解

幼幼新書 卷三十五 十一

下丹白色遊走遍身白隱疹五香湯

木香 薰陸香 海藻各一 麝半

沉香 枳實炒 升麻 射干各二

大黃分八 竹瀝合三

水四升下瀝煮升二合溫服

黑丹第十一

聖惠風毒傷肌肉故色黑初發痛痒或燥腫起

升麻湯宜塌

川升麻 漏蘆 川芒硝各二 黃芩三

梔子仁兩一 菊蘆兩半

劉三兩水五升煎三升微溫軟帛旋蘸塌

又

風化石灰兩二 屋四角茅草兩三

細研雞子白調塗日三五

又青羊脂熟摩日三五

張渙祛毒散治丹黑色痒痛腫起

川升麻 漏蘆 川芒硝各二 黃芩兩二

梔子仁各一

切幼新書 卷三十五

粗末兩匙水三瓊煎兩瓊去滓微熱軟帛旋蘸塌

瘡上

天雷丹第十二

顧顛天雷丹從頭項起

陰乾葱末拌脂塗又竈下土雞子白調塗

天火丹第十三

東氏丹發遍體班赤如火燒名天火丹

聖惠肉赤如丹大者如手劇者遍身赤痒

顧顛丹從腹背遍身起

樺皮白末和生油調塗又赤石脂羊脂調塗

又

虎脂兩二 黃丹兩一

研膏塗

又小兒埋胞衣餅中水服一二合并塗

張渙治丹發遍身赤如絳痛痒甚丹參散

丹參 桑皮各二 甘菊花 莽草各一

粗末三匙水三椀煎二椀避風浴

殃火丹第十四

切幼新書 卷三十五

東氏丹發兩脅及腋下髻上名殃火丹

千金伏龍肝末和油傅乾即易若入腹及陰慎火草

汁服

聖惠川朴硝散竹瀝調服半錢量服

張渙拔毒散

川朴硝 梔子仁

等分羅半錢醋調塗次用梔子膏

山梔仁兩四 生鯽魚片

搗如泥醋化塗患處

神氣丹第十五

顧顛神氣丹從頸背上起

牯牛骨及羊胎調塗

神火丹第十六

巢氏丹發兩髀一日便赤黑名神火丹

聖惠景天花搗丹上後塗差為度嬰孺先刺丹血出
又梔子仁末醋和塗

神竈丹第十七

顧顛神竈丹從肚起

幼幼新書

卷三十五

十三

土蜂窠膩粉杏仁生油調塗

鬼火丹第十八

巢氏丹發兩髀赤起如李名鬼火丹

顧顛丹從面上起

竈下土雞子白調塗

聖惠

戎鹽

兩

附子

燒

細研雄雞血調塗

野火丹第十九

巢氏丹發赤班如梅子遍背腹名野火丹

千金遍身皆赤

聖惠雄黃戎鹽等分細研雞子白調敷傳

骨火丹第二十

巢氏丹發初髀起正赤若黑謂骨火丹

千金骨火丹瘡見骨擣大蒜厚封着足踝者是
嬰孺刺腫上入二分大黃末牛膽汁和塗

家火丹第二十一

巢氏丹發兩腋下兩髀上名家火丹

幼幼新書

卷三十五

十四

嬰孺丹發如大指日長一寸偏傍兩頰

梓木白皮

兩

參葉

兩

並燒灰雞子白和傳日四五

火丹第二十二

附丹生

巢氏火丹狀往往如傷寒赤着身而日漸大

發赤如火燒酒更燥漿起

嬰孺赤如日出時以從其處又名日丹

水鑑蕎麥麩黃連等分研塗不得入油鹽

嬰孺丹起皮中赤梔子末醋和傳

又鯉魚杵爛或片搗

又不犯水羊脂向火炙傅白粉粉之

螢火丹第二十三

巢氏丹發如灼在脇下正赤初從額起而長上痛是

螢火丹顧顛從耳起

聖惠

赤小豆合一兩半 硝石兩半 寒水石一

細羅冷水調半錢日三量服

嬰孺澤蘭湯治螢火丹走癩疹入腹死

幼幼新書

卷三十五

十五

澤蘭

芎各三

附子炮

莽草

藁本

細辛

茵芋各二

水三升煮升半為四服外用粉

朱田火丹第二十四

巢氏丹發背起遍身一日夜成瘡名朱田火丹

千金丹如棗大正赤色

濃煮棘根汁洗已成瘡赤小豆末傅未成瘡雞子

白和傅凡雞子用破者未破者無力

聖惠藍靛塗

胡吹竈丹第二十五

顧顛胡吹竈丹從陰囊起

水茄窠下泥和苦酒塗

胡漏竈丹第二十六

顧顛胡漏竈丹從臍中起

屋漏水調竈中土塗

土竈丹第二十七

顧顛土竈丹從陰踝起

屋四角茅草竈橫麻及雞子白調塗

幼幼新書

卷三十五

十六

天竈火丹第二十八

巢氏丹發兩髀裏尻間正赤流陰頭赤腫血出名天

竈火丹

千金兒未滿百日犯行路竈君丹從髀間起

伏龍肝末雞子白和傅日三

聖惠

薺葉

青羊脂各三

赤小豆合一

葱白根

煨鑪門上灰兩一

杵膏摩之燥再摩

嬰孺丹發着脚脛間

細辛二兩 白生米二合 景天草二兩

杵如泥傅

又桑根切水煮一沸浴日三

又生浮萍杵如泥傅汁塗多遍良

廢竈火丹第二十九

巢氏丹從足跌起正赤名廢竈火丹

顛顛從曲解起

屋四角茅灰雞子白調塗

幼幼新書 卷三十五 十七

嬰孺起兩脚亦如火燒

五加葉根燒鐵鑪槽中水和塗又桑根煮湯浴

張漢莽草散

莽草 寒水石 硝石

等分羅新汲水調塗

尿竈火丹第三十

巢氏丹發膝上從兩股起及臍間走入陰頭名尿竈

火丹

顛顛從踝起亦用屋角茅雞子白調塗

千金水二升桑根二升煮汁浴又李根灰田中流水

和傅

張漢二根湯

桑白皮根 李子根

等分細剉三匙水兩椀煎一椀避風淋患處

野竈丹第三十一

顛顛野竈丹從背脊起

柔香茸蒴藿赤小豆末塗

大孕丹第三十二

幼幼新書 卷三十五 十八

鄭愈聖塗散治大孕丹并諸般毒

凌霄花 萬州黃各一分 芋根乾半兩

爛研酒蜜調服少許塗丹上

尔朱丹第三十三

嬰孺粉散治尔朱丹及一切丹

牡蠣煨 烏頭燒 麻黃根各三分 石膏一分

真珠二分 麝半

末染米粉二升和散微炒絹袋盛粉遍身丹有瘡

汁粉之愈麻油塗後粉立愈

赤流丹第三十四

聖惠身上一片片赤如臙脂染及熱漸引名丹毒俗名流因熱者赤因風者白皆腫而壯熱用小鉞刀散無去惡血未入腹可療

圖經治遊癰丹毒

冷水調剪刀草化如糊雞翎掃腫便消

又老鷓眼睛草葉醋研治火焰丹消赤腫即天茄子

聖惠升麻散治心熱身上赤流

川升麻 川朴硝 川大黃炒 玄參各半兩

犀角 黃芩 梔子仁 甘草炙

木通各一分

粗羅一錢水小盞煎五分溫不時量服

又

川大黃生 川朴硝各一兩 赤小豆炒紫半合

羅雞子清調塗乾則易

又李子油三兩朱砂一分調塗醬汁雞摩汁蕎麥麵

胡荽汁紅藍花末醋調砒霜濃墨芸薹菜爛擣粟

米粉炒黑嚙調並可塗煮白礬水燒粉家洗羸水

並可洗

譚氏消腫散治五遊利那遍體

清泉消石 白龍骨

等分研淨器盛鐵槽水調一錢塗

張漢木通散治赤流毒漸引

木通兩一 川升麻 川大黃炒 朴硝各半兩

甘草炙 梔子仁各一分

粗散一錢水小盞煎五分不時量服

治赤流熱如火戴毒丹

川大黃生 鬱金 黃藥 膩粉

猪牙皂角去皮

等分細末生油調塗

赤遊腫第三十五

東氏兒肌肉虛為風毒熱氣所乘熱毒搏血氣則皮

膚赤而腫起風隨氣行遊不定故名赤遊腫

本草治赤白遊腫

蝦擣傅蝦無鬚及煮之色白不可食生水田及溝渠中有水毒

願願治赤遊腫或如丹煩渴渾身赤溜壯熱

萊豆粉 鉛白霜

細研芸薑汁調塗

取鉛霜法將鉛石上打薄握地坑可鉛片大以杵搗坑實滿坑着醋鉛蓋經一宿取霜如珠如煩渴服解熱飲子

麥門冬 小蘆根 竹葉 乾葛

木漏蘆 犀角

等分半兩水四合煎一合不時徐服

陳箴器破草鞋和人髮燒灰醋調塗

幼幼新書

卷三十五

十一

聖惠犀角散治赤遊皮膚作赤腫片是風熱

犀角 黃芩 川升麻

梔子仁 瀼防已 川朴各一分 牛黃半分

細羅不時竹葉湯調半錢量服

升麻膏治頭面身體赤毒腫起作片

川升麻兩一 生地黃兩二 犀角 射干

赤芍藥 黃芩 梔子仁 川大黃

大青 藍子 羚羊角 玄參各半兩

細剉猪脂斤半慢火煎候藥色變膏成去滓窰合

盛頰摩腫處

又

黃蘗 川朴硝 川大黃各半兩 馬勃

水銀手內津研星 雞子三枚

研膏先以針鉞破塗

劉氏治走馬胎赤腫入心腹不救

生槐葉握一 生苦蕒去皮二味爛研 赤小豆各半

和塗患處

幼幼新書

卷三十五

十一

身有赤處第三十六血疽

巢氏兒因汗為風邪熱毒所傷與血相搏熱氣蒸發

肉色赤而壯熱

聖惠丹參散治赤遊頰頸或口體眼下赤如臘胎皮

皴剝漸引是心熱血凝治宜刀鋒鎌血出服此

丹參 黃芩 枳殼炒 葛根

犀角各一分 麻黃兩半

羅一錢水小瓊竹葉十片竹茹半分煎五分不時

量服

治身赤煩熱麥門冬散

麥門冬

蘆根

葛根

犀角

甘草

漏蘆

等分一錢水小瓊竹葉十片煎五分溫不時量服

治身赤或癩腫或如火丹煩渴渾身壯熱鉛霜散

鉛霜

萊豆粉

等分研芸薹菜汁調塗

又桃仁面脂塗黃蒿穗入鹽溫洗白礬細研生油調

塗

幼幼新書

卷三

吉氏治兒腿上并座處血瘰色如臙脂漸濶如錢或

如手掌皮膚光緊名血瘰此心熱心主血血得熱即

凝聚不散

石灰炒熱水沃澄清傳

赤白溜第三十七

聚寶牛黃散治初生至二三歲一切風熱發赤白瘰

走痒四肢

牛黃

朱砂

蝸牛肉

乾蝎

白殭蚕直

天麻

白附子

乳香

麝各一

生龍腦錢

螳螂翅

七月採五分

末一字薄荷水調初生兒浴後乳少許調塗口中

胎疾永除

卒腹皮青黑第三十八

巢氏兒因汗腠理開風冷所乘冷搏血隨肌肉虛處

停之則血氣沉澀不能榮皮膚而風冷客之故色青

黑

寶鑑血凝為初生時肌未成肉新綿及厚衣衣之血

被熱而不結變為肌肉故凝其候身上青黯哭無聲

幼幼新書

卷四

不乳

千金醋和胡粉傳不急治須臾死

秘錄治腹皮卒青黑赤不能喘息

女青末酒服亦治大人

聖惠苦參一两剉羅散不時醋湯調半錢量服

又爛棺木半兩醋中燻煎六分量溫服

千金灸臍上下左右去臍半寸并鳩尾骨下一寸五

處各三壯

幼幼新書卷第三十五

幼幼新書卷第三十六 癰疽瘰癧 凡十一門

後學古吳陳履端于始輯

吳郡郁紹賢闕緒校

癰第一

巢氏六府不和寒客皮膚搏于血則壅遏不通稽留
經絡間結腫成癰腫上皮膚薄而澤是也熱氣乘之熱
勝于寒則肉血腐敗化為膿潰後不差曰癰

養生癰疽始發須以大黃等藥極利與其腹背潰爛

藏府枯焦膿血流瀉孔穴穿空備諸惡而死敵若利

切切新書

卷三十六

十一

有生道哉古聖用五香漏蘆連翹等湯道路不及單

煮大黃甘草利之至膿潰服黃耆等排膿止痛千金

外臺備矣世醫不學瘡發于表豈可轉利死者比以

悲夫孫真人云緩急當煮大黃快利要法也

張渙經云五藏不和則九竅不通六府不和則流結

為癰皆寒熱結搏淺為癰甚為疽毒腫挾風又腫及

寸為癰邪熱上衝于頸下成癭病久不差成癭甚則

成疔本根一也兒與大人同

千金漏蘆湯治熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡癤

漏蘆 連翹肘後 白欬 芒硝肘後

甘草各六銖 黃芩 升麻 枳實炒

麻黃去根節各九銖 大黃一兩

咬咀水升半煎五合七日兒一合分三服量加肘後

諸藥二兩大黃三兩若無藥用大黃下之丹毒針

鏡去血經心錄無連翹有知母芍藥犀角等分

五香連翹湯治風熱毒腫色白或惡核瘰癧附骨癰

疽節解不舉白丹走竟身白疹痒不已

青木香 薰陸香 雞舌香 沉香

麻黃去根節 黃芩各六銖 升麻 枳實炒

連翹 海藻 射干各半兩 麝三銖

大黃二兩 竹瀝三合

咬咀水四升煮減半內瀝煮升二合二百日兒服

三合一無麻黃

又生豬腦芥子末湯調傅紙上貼乾則易

千金翼豬膽塗白薑石末和蒜塗

禁癰

咒曰癰非癰瘡非瘡土塊矢癰即滅二七遍取

一土塊摩腫上與病人男左女右

聖惠吳藍葉散治心肺熱毒攻處生癰及項腋下有
結核煩熱疼痛不睡

吳藍葉 犀角 元參 川升麻

梔子仁 甘草 黃耆 連翹各半

大青 黃芩各一分 川大黃三分

粗羅一錢水小瓊煎五分去滓不時分溫服

漏蘆散治癰及丹毒瘡癤

漏蘆 麻黃去根 連翹 川升麻

黃芩 川芒硝 甘草各一分 白欬三分

幼幼新書 卷三十一

川大黃兩一分

粗羅一錢水小瓊煎五分不時溫量服

黃耆散治癰瘡膿潰不止體虛煩熱頭痛昏悶

黃耆 防風 川升麻 羚羊角

白茯苓 甘草 地骨皮 人參各半

芎藭 石膏兩一分

粗羅一錢水小瓊煎五分量不時溫服

大黃散治癰藏府壅熱太過心神煩悶大小便不通

川大黃微炒 川升麻 葵子 朴硝各半

梔子仁一分

粗羅一錢水小盞煎五分溫服利為度更量

大麻仁九治癰藏府澀滯

大麻仁兩二分 枳殼炒 甘草炙 木香各半

川大黃微炒 牛蒡子炒各

羅蜜丸如菜豆湯下十九利為度量加

治癰瘡腫毒熱赤疼痛消腫散

川大黃生 杏仁 藍花各三

細羅新汲水和稀稠得所旋塗乾即易

幼幼新書 卷三十一

又雞羽七枚燒研水調服即潰

茅先生身上腫毒

黃丹 草烏 天南星 白及

等分末冰水調紙貼赤腫處不久破

嬰孺漏蘆湯治熱毒癰疽赤白丹瘡癤

漏蘆 連翹 白欬 芒硝

甘草炙 細辛 升麻 枳實炙

麻黃去 黃芩各三 大黃細

水一升煮五合七日兒一合為三服一歲五合

癰瘡皆可用益母散

益母草燒二兩鹽花炒一兩伏龍肝半兩水調塗

惠眼塗破癰毒白乳散

白丁香兩半 乳香 黃丹 白及各一

末水調塗帛上貼

千金灸兩足大拇指奇中立差仍隨病左右

疽第二

葉氏五歲不調則生疽亦是寒客皮膚折血氣血氣

痞澀結聚所成大體與癰相似但上如牛領皮而硬

幼幼新書

卷三十六

五

為異耳癰則浮淺疽則深變敗膿潰重于癰也傷骨爛筋死

千金治疽瘰

丹砂 大黃各卅 黃連卅六 雌黃

漆頭各卅 雄黃各卅 馬齒礬石 莽草各卅

吹咀猪胎升三合微火煎三上下膏成去滓下諸

石末攪凝傅

治疽極月初即生常出黃水

酢和油煎如粥熱傅二日一易早焚湯洗傅

漏蘆散見癰門多妙赤芍藥二兩

黃耆散治疽腫及瘡癰壯熱口乾心躁

黃耆 連翹 枳殼炒 升麻各半

丹參 露蜂房微炙 甘草赤 玄參各一

粗羅半錢水小瓊煎五分溫量服

犀角散治疽毒腫硬壯熱大渴

犀角三 麥門冬焙 葛根 甘草赤

木香 黃耆 川升麻 黃芩各半

粗散一錢水小盞煎五分溫量服

幼幼新書

卷三十六

六

清膏治疽毒腫硬疼痛攻衝四畔焮赤宜抽熱毒消腫氣

羊桃根 川大黃生各一兩 黃芩 菜豆粉

黃蘗各一 赤小豆合半

細羅芸薹菜汁蜜少許調看四畔腫赤處大小剪

絹攤厚一錢貼乾即換

治疽腫穴後及惡瘡腫膿水雖去肌肉不生蜜陀僧散

蜜陀僧兩一 黃連 檳榔各三

細末搽瘡上日三

治疽瘡久不差松柏餅

松脂薰陸香等分搗鹽少許為餅貼汁盡差

治疽潰黃連散

黃連

黃蘗

地榆

白芷

等分細羅雞子白調塗故細布貼

又蛇蛻唐陸爛搗芫花末水和蟻蟪文鰻鱺膽汁及

血並可塗

附骨疽第三

幼幼新書

卷三十六

七

千金附骨疽者無破作外臺附骨成膿喜着大節解中

丈夫產婦着腔中兒着脊背大人急者先覺痛按之

痛應骨經云便覺皮肉漸急洪腫如肥狀兒手近便

大啼大人緩者先覺皮烘烘然經日便覺痛痺不隨

兒四肢不能動搯亦如不隨節解中肌烘烘處遍身

成腫不潰有青黯大人有呼為賊風腫不知是疽凡

體患熱當風取涼風入骨解風熱相搏便成附骨疽

其候嗜眠沉重忽忽耳鳴又秋夏露卧為冷所折風

熱伏結而作緩者風多熱少急者熱多風少血盛肌

嫩為風折之即凝結初時急服漏蘆湯下之傅小豆

散得消可服五香連翹湯

千金翼瘡上火灸三日夜愈

久不愈差復發骨從孔出名骨疽

死烏雌雞淨骨熬灰取三家牛柏木刮屑三家炊

單各一兩熬灰合藥瘡中碎骨出數十片愈

外臺猪膽和楸葉白楊葉末並傅

又穿地坑口小裏大深三尺乾雞屎五升艾荆葉和

燃火煙出內疽孔衣擁坑口勿泄煙半日許有虫

幼幼新書

卷三十六

八

出 又自死蝦蟇一枚頭髮一抱猪膏片半煎消盡冷內

鹽一合膏着瘡中日一易虫出如髮差

積年骨疽一年一發汁出不差

膠末熬粉勃瘡上及破生鯉魚榆之小虫出便洗

更傅虫盡止

毒腫第四

巢氏風熱濕氣搏皮膚使血氣澀而不行蘊積成毒

腫赤而熱

聖患風腫毒腫同令人吐熱邪毒盛則入腹令人赤
色惡寒心煩悶嘔逆氣急腹滿不速瘵死
顧願治無故腫覺肉色赤熱消石散

消石 大黃 萊豆

等分末隨腫大小若達根車前根葉汁或雞子清
調塗如有惡物即看有點子以膏貼之四面以散
燻之

千金連翹丸治無辜寒熱強健如故身體頸項結核
瘰癧及心脅腹背有堅核不痛名結風氣腫

切勿新書 卷三十六 九

連翹 白頭翁 牡丹

防風 黃蘗 桂心 香豉

獨活 秦艽各一兩 海藻半兩

末蜜丸如小豆三歲飲服五丸至十九意加

又淨巴豆五十水三升煮一升綿拭病上隨手消并

治癰疹

千金翼禁一切腫繞覺陰咒曰上有太山下有大海
內有大魚主食癰疽四獄使者於我何須癰疽小
鬼隨手消除急急如律令七遍

又用紫檀末醋和塗并治遊腫又驢胎和鹽傅醋和
蚯蚓屎并土蒼耳冬用子春用心傅
犀角散治毒腫壯熱煩悶

犀角 黃耆 麥門冬焙 升麻各半兩

露蜂房微炙 連翹 甘草炙 牛蒡子炒

川朴各一分 枳殼三分炒 川大黃炒一分

粗羅一錢水小瓊煎五分不時溫服

漏蘆散治瘰癧熱在臟皮膚毒腫或生瘡癤心神煩躁
大小便不利

切勿新書 卷三十六 十

漏蘆 白欬 黃芩 麻黃去根節

知母 枳實炒 川大黃炒 川升麻

犀角 赤芍藥 川芒硝 甘草各一分

粗羅一錢水小瓊煎五分不時溫服

治熱毒腫恐惡氣入腹利以泄毒麝香散

麝香半兩 木香 沉香 犀角

獨活 甘草炙 射干各半兩 川大黃炒

桑寄生各一分

粗羅一錢水小瓊煎五分不時溫服

治熱毒腫解風熱腫內消大黃散

川大黃 檳榔 川芒硝 黃連

黃蘗 雄黃 赤小豆

等分羅蜜水調塗日三

嬰孺治頭面身體結核瘰癧及背脊裏有堅不痛無寒熱強健如故名結風氣腫

連翹 桑白皮 白頭翁 牡丹

防風 黃葉 桂心 鹽豉

秦朮 獨活各四分 海藻一分

幼幼新書 卷三十六 十二

末蜜丸大豆大三歲飲服五九至十五九

張煥寄生散治毒腫

桑寄生 獨活 川大黃各一兩 朴硝

甘草炙 犀角各半兩

細一錢水一瓊煎五分溫量與

患眼退風毒腫瘡天烏散

天南星 草烏頭 赤小豆 黃蘗

等分末薑汁調入麪少許貼

劉氏藍搗汁塗無生藍青黛傳又雞子清調

癰第五

巢氏腫結長一二寸為癰亦如瘰癧熱痛久則膿潰膿血盡便差亦是風寒客皮膚血氣壅結而成凡瘰癧膿血不盡而瘡口便合惡汁在裏難差更發變漏

聖惠大黃散治瘡癰初生五歲癰熱

川大黃炒 川升麻 黃芩各半兩 梔子仁

甘草生各一分

粗羅一錢水小瓊煎五分溫量服利為度

地黃丸治虛熱消瘡癰

幼幼新書 卷三十六 十三

生地黃 川大黃炒各一兩 桂心 王不留行

赤茯苓 赤芍藥各半兩 甘草生一分

羅煉蜜丸如菜豆湯下七九量加

張煥貼諸瘡癰乳香膏

乳香兩 膩粉 松脂 蜜陀僧各兩

生地黃汁合半兩

好油一兩黃蠟二兩煉蜜下諸藥熬膏入麪一錢

陰一宿攤膏藥貼日兩次換

軟癰第六

聖惠乳香膏與前張漢同無生地

治軟癬赤腫疼痛

天靈蓋酥炙一枚多年麻鞋底燒一

細羅油調塗

治軟癬雖出膿熱毒不止

赤小豆四十九粒乳香半 膩粉半

細羅搽

又石灰生乾薑各半兩末生油調和捏作梳鬚癬上

又方

幼幼新書 卷二十六

百草霜 鹽花 寒食麪各半 黃蘗

乳香各一

細羅醋和塗故帛貼

又生柵麪伏龍肝等分末醋和封乾即易

茅先生治軟癬不生髮不穿破

地骨皮灰輕粉生麻油調塗

莊氏海蝶蛸生末雞子白調傳

安師傅軟癬經年不破

南行猪糞塊鹽菴福黃魚頭個

燒研二錢入輕粉一錢生油調項上先以帛纏定
塗藥汁盡平

惡核第七

葉氏風熱毒氣與血氣相搏結核生頸又遇風寒折
遂不消不潰名惡核

聖惠五香散治風熱項生惡核寒熱腫痛見應

升麻散治項生惡核壯熱

川升麻 射干 連翹 犀角

川大黃炒 川朴消各半

幼幼新書 卷二十六

粗羅一錢水小盞煎五分量溫服

連翹九治忽寒熱項頸生核肩背拘急

連翹 海藻洗 榆白皮 牡丹

桂心 白頭翁 防風 黃蘗

香豉 獨活 秦艽

等分末煉蜜丸如麻子湯下五九日三量加

元參九治胃間積熱毒風氣不散連項生核煩熱不

已

元參 瀝防已 羌活 木香

梔子仁 赤芍藥 牛旁子炒 升麻各半

連翹分三 川大黃兩炒一

末煉蜜丸如菉豆米飲下五九日三量與

惡瘡第八

巢氏身體生瘡是嚴熱衝外外有風濕相搏風濕挾

熱毒瘡則痛痒腫焮久不差名惡瘡

肘後治卒得無名惡瘡

燒竹葉和雞子黃塗

又蛇床子黃連末粉瘡上燥者脂和塗蛇皮亦佳

幼幼新書 卷三十六 十五

又臘月猪膏一升亂髮雞子大生鯽魚一頭煎消又

雄黃苦參末二兩大附末一枚絞凝傳胡洽治癩

瘰癧

聖惠治惡瘡并癰疥癬雄黃膏

雄黃 蘭茹 蛇床子 礬石

黃連各一兩 水銀研為泥

羅臘月猪脂研如膏窰合盛泔洗瘡淨塗仍以黃

蘗末綿搵撲不汙衣日三兩

蘭茹散治惡瘡久不差

蘭茹 桑螵蛸 地龍 乳香

黃丹 黃蘗各一兩 麝 糯米粉

臙粉各一 細羅井水和砂糖調傳

神水膏治惡瘡

蜜陀僧 苦蕒根 澱花 丁香

附子 人參 防風 沙參

朱砂 麝 芫 龍骨

檳榔 桂心各半 皂莢一挺 土花硝紅

幼幼新書 卷三十六 十五

菖若子淘半 清麻油升一 黃蠟二

羅慢火煎三兩沸下蠟次麝膏成窰合盛塗帛上

貼

治惡瘡軟癰未穴作膿攻刺難忍走馬膏

坐挈 黃蘗 菉豆 石榴皮各一

木鼈子仁 白狗糞 甘草各半

羅牛旁根汁調塗日三已破不用

大黃湯

川大黃 黃連 黃芩 澤蘭

白礬 石南各一 戎塩 各一 蛇床子 各三

細劉二兩水大盞煮減半淋洗患處日三

又

乾楸葉 兩一 乾漆 炒煙盡

細羅大麻油調塗日三

又蕪蘆虎頭骨並燒一兩研臘猪脂調塗日三

治沙風水弩甲疽端午收蟻螂末生油調傳

養生治惡瘡及虫咬

蛇滅門草 端午收陰乾種以辟蛇 夜合花葉

幼幼新書 卷三十六 百合 齒根 不拘

即合敷 陰乾 等分生油調塗紙蓋日一換未有頭四面塗留瘡

口如惡瘡纔覺用上三物共四錢膩粉半錢和酒

服吐為度吐後急以水漱口膩粉損齒故忌過河

及食魚酒熱麵有毒物

茅先生方

黃連 黃蘗 皂莢灰 白礬 煨

茱萸 炒烟 雞子殼 燒 獨腳爪 豆豉

等分入輕粉鹽葱湯洗瘡麻油調塗

嬰孺治惡腫瘰癧

男子屎尖燒臘月猪胎和醋汁洗後塗日三

吉氏淨水膏治不識惡瘡

蜜陀僧 苦荬根 麝 阜角 各二

附 防風 菖荖子 朱砂

土硝 紫參 芎 檳榔

桂心 龍腦 黃蠟 芫花 各半

丁香 許

油五兩煎諸藥濾入蠟鎔塗

幼幼新書 卷三十六 安師傳治惡瘡久不差

膽礬及茶末等分研油調塗

瘰癧第九

巢氏寒熱邪氣客經絡使血氣否澀初作細癩癰或

梅核或如箭筈或丸如長者不過一寸或一或兩三

相連時發寒熱仍膿血不止謂瘰癧府氣不和致血

氣不足而受寒熱邪氣有鼠瘻螻蛄蚯蚓蟻螬瘻等

一方通治

千金塚上石灰厚傅桑根灰烏羊角灰和傅

千金翼鯉魚腸切五段先洗瘡火上煖貼冷即易覺

瘰癧開者虫出差
又雞子三顆米下蒸半日取黃熬黑拭瘡汁內藥瘡
中又臘猪脂紙紙沾內瘡孔鯪鯉甲灰猪膏和半

夏末鼻膏和傳
治鼠瘦

死鼠中者一枚 髮雞子大

蠟月猪脂恰浸微火煎消膏成塗瘡上又酒服半
錢鼠從瘡中出

幼幼新書 卷五十六

聖惠夜明砂散治久瘦移易三數處皆生瘡孔

夜明砂兩一 白殭蚕 乳香 臘面茶

雄蚕蛾各半兩

羅傳

治諸瘰久不差烏蛇散

烏蛇肉炒 馬齒莧搗上 蒺藜子各三 曲頭棘針

髮灰 緋帛各半兩 雄黃一

細羅酒調內瘡孔差為度

吉氏方

白及 白欬 斑猫各半 巴豆肉一

蝸牛一個入磨一錢口

和藥丸如菜豆紙摺撰瘡深淺後將津在紙撰頭
點藥入次膏藥封二三次麻子大丸妙

療癰第十

巢氏兒生熱瘡必生癰癰其狀結核皮肉間三兩相
連是風邪搏血氣焮結所生

寶鑑癰癰是肝積熱也衝胃項筋血結聚留停不去
作腫塊于頸項及腋下

幼幼新書 卷五十六

經驗治癰癰內消

斑猫一兩去翅足粟米一升炒斑猫焦黃去米乾

薄荷末四兩同研烏雞子清和丸如菜豆空心臘

茶下一丸加至五丸日減至一丸後每日服五丸

聖惠犀角散治癰癰焮腫疼痛吐熱大腸壅滯小便

赤澀心神煩躁少卧

犀角 牛蒡子微 連翹 丁香各半

木通 元參各三分 麝香一 沉香

川朴硝各一兩

粗羅一錢水小瓊煎五分量温服

木通散治瘰癧發盛壯熱煩躁坐卧不安

木通 大麻仁 元參 川升麻

敗醬 連翹 川大黃炒 川芎硝

犀角各一兩

粗羅一錢水小盞煎五分量温服下惡物筋膜

治瘰癧除根膩粉散

膩粉 黃耆各一 糯米粒三七 斑猫粒二七

糯米炒微黃

初切新書 卷三十六

細羅空腹温酒調一字良久吃少許醋湯病随小

便出量服

治瘰癧不消麝香散

麝香 鴿糞一合

細研温酒調半錢日二量服

治腫結不消成瘰癧麝香丸

麝香 牛黃各一 蝸牛子炒 阜茨子炒

阜茨針灸 乾薄荷 雄鴿糞炒各一兩

羅煉蜜丸如茶豆薄苛湯下七九日三量加

聖惠連翹丸除瘰癧根

連翹 玄參各一兩 糯米 阜茨針灸

川大黃炒各半兩 斑猫微炒淨一分

末鍊蜜丸如麻子空心薑湯下二九利惡物後吃

粥一日

治瘰癧已成外貼

水銀津研如泥 粉霜 砒霜 鷓子糞

斑猫糯米炒黃淨各一分

細研臘月猪脂和取小豆大安瘰上消腫膏藥封

初切新書 卷三十六

六七日當有穴膿水半月瘰出後貼生肌膏

生肌散

顆鹽 白礬各一 黃丹大燒赤半兩 黃蘗

白欬 膩粉各一分

細羅温鹽煤水洗瘡貼日二

治瘰癧五香膏

沉香 雙香 木香 丁香各半兩

熊膽 蘆會各一兩 黃丹 黃蠟各二兩

麝香分半 髮一兩 油斤半

細劉慢火煎油沸下髮煎消下藥煎三上下綿瀝
滓下黃蠟次黃丹麝膏成攤故帛貼

治瘰癧穴後生肌膏

黃丹

黃蠟各半

杏仁

髮各一

蛇蛻一條

菜油六兩

阜莢皮子

碎鈹煎菜油髮消下杏仁等三味煎三上下綿瀝

滓下蠟次丹柳篋攪勻膏成瓷器收故帛塗貼

治瘰癧不穴斑猫膏

班猫淨二

松脂三兩

雄雀糞一兩

巴豆十個

幼幼新書

卷三十六

三十一

煮與班猫同研

松胎入鈹鎔入班猫巴豆熬膏成捏作餅熱貼作

穴貼生肌膏日再

治瘰癧腫硬阜莢刺散

阜莢刺一片燒盛時取牛蒡子半斤撒火中都成

灰細羅井華水調一錢日三三五日內有惡物下

如膠永斷

治瘰癧結硬內消

膩粉兩半

雞子白三枚

調文武火炒急攪着鈹色赤焦入朱砂半兩研如
麵粥飲調半錢五更服腹痛便瀉下如棗核未差
隔日再服

治瘰癧結核腫硬欲穴礪砂丸

礪砂

砒黃

等分研糯米飲丸如小麥先烙破內一九五日內

瘰癧自出貼生肌膏

治瘰癧結塊疼痛腫穿潰膿水不絕

薄荷陰乾

阜莢十挺長尺二不鮮

幼幼新書

卷三十六

三十四

碎酒一斗浸三宿曝更浸三宿酒盡為度焙羅燒

飯丸如梧子食前黃著湯下并丸兒減

茅先生治瘰癧風瘰冷瘻

石灰二兩醋二升

杏仁粉乙兩

膩粉兩半

渣水丸如芡實放窟內紙貼藥鎔肉自生

張漢治瘰癧不消妙聖散

綿黃著

連翹各一兩

川大黃炒

鴿糞灰

糯米七個炒

犀角各半兩

末一錢水八分酒三兩渣煎五分溫時時呷

王氏牛李子一名天茄霜後採根竹刀刮去皮撕開
新丸上烤末二錢活鯽魚一個去鱗鱗內肚中濕
紙裹煨細嚼米飲下未有瘡內消已有瘡津調貼

瘦氣第十一

巢氏頸下皮寬內結突起臃然漸大氣結成瘦兒
啼未止飲之乳冷氣息喘逆不散而成

聖惠商陸散治瘦氣胃膈噎塞咽粗

商陸炒

昆布洗各一兩

牛蒡子分三

射干

木通

海藻洗

羚羊角

杏仁炒各黃

幼幼新書

卷三十六

七

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量服

木通散

木通

海藻

昆布洗並

松蘿

桂心

白飲各半兩

蛤蚧炙黃一兩

琥珀分三

細羅牛蒡子煎湯調半錢不時意裁服

海藻散治瘦氣腫結漸大

海藻

昆布洗並

海帶

海蛤

木香各半兩

金箔片

猪羊廩炙各三個

細羅溫酒調半錢量加日三四

治瘦氣心胃煩悶半夏散

半夏洗去

土瓜根

龍膽

射干

昆布

海藻洗並

小麥麵各一兩

羅薑酒調半錢意加日三四

陳橘皮丸治瘦氣咽嗑噎塞

陳橘皮洗去白

麥門冬焙

赤茯苓

連翹

海藻洗

商陸各半兩

杏仁炒各黃

羊廩炙三枚

檳榔分三

幼幼新書

卷三十六

十六

羅煉蜜丸如菜豆二三歲湯下七九兒大綿裹阜
子大不時含噉津

又

羚羊角

昆布洗

桂心

木通各半兩

川大黃炒乙

末鍊蜜丸如麻子不時粥飲下七九意加減

劉氏昆布散治童男女風土瘦氣及氣結

昆布

蓬莪朮

芎

檳榔

茴香

海藻

京三稜

甘草炙各半兩

木香

丁香

青橘皮各一

細末二錢水中盪猪鬃三枚燈焰止針串燎熟煎七分和滓臨卧温進一服久服漸消

夔州鄧俊民蓬莪散消項氣磨宿滯積氣

蓬莪散

生四

丁香

杏仁

各十粒

羅猪鬃一枚針穿麻油燈焰燒熟破開入藥末一字含嚙津忌油鹽雞魚日三稍退徐服半月除根

幼幼新書卷第三十六

幼幼新書

卷第三十六

七

幼幼新書卷第三十七

瘡燥疥癬凡十七門

後學古吳陳履端于始輯

表弟周恭先帥敬校

一切瘡第一

潔東王先生藏府不調風邪失守而成瘡或積毒或風化為虫或熱氣盛或驚入皮膚大者滯血脈而橫出皮膚間若節其氣血則易破若風纏則生癩疹或外邪入多燥痒食毒滯死血氣久化為膿或作驚瘡者驚本無物蹉其血氣在藏為積在府出皮膚為瘡

幼幼新書

卷第三十七

一

七

發遍身而四肢難轉

食不化在脾為積脾胃主四肢在藏宜轉

風瘡亦發遍身形甚小世呼為疥

風出入毛竅久感外風為氣

熱毒瘡發不定血滯故作瘡

虫窠瘡常發脛後作窠窠內有虫如蠶子蛻虫隨氣

化其瘡即較而再發成片如癬甚有死血作痒若藥

傳歸腹中瀕取虫及殺虫藥

驚瘡發四肢手足腕時亦難差宜驚藥

頭瘡多胎熱腎上衝

鴈過瘡是肺熱

遇秋肺盛則發遇春水旺則發神眼暗上成片

寶鑑瘡是藏府積熱并宿食停胃中毒流十二經絡而生

千金治遍身生瘡

芍藥

黃連

黃芩

苦參

大黃

蛇床子

黃蘗

菴藟

吹咀水二斗煮一斗浴

苦參湯治諸瘡不差

苦參

地榆

黃連

王不留行

獨活

艾葉

竹葉

幼幼新書

卷二十七

吹咀水三斗煮一斗浴訖傳黃連散

嬰孺治無名瘡

水銀

甘草

黃蘗

黃連

松脂

膩粉

土蜂窠

黃連

等分水銀唾研為青泥入坩椀中生麻油和生絹

濾和藥末再研溫水洗瘡塗如黃水出隨塗便乾

瘡痒難忍塗之立止痛不撒者塗之立差

飛鳥膏

輕粉

礬石

黃連

細末甲煎和如脂傳有汁散傳諸瘡黃爛悉效

黃連

胡粉

水銀

末紙裹熟按傳亦治頭垢百瘡

趙氏治秃瘡疔瘡無辜瘡

不艸阜角

鼈甲

豉

膩粉

末漿水洗去瘡上不潔生油調塗

安師傳瘡口久不合者

狗頭骨

雞子殼

乳香

沒藥

幼幼新書

卷三十七

黃連

等分末油蠟成膏塗若水入不合阜子灰入沙糖

和貼水出腫退用前藥合瘡口腫未退取水毒

薦瘡第二

秘錄治口瘡兼薦瘡

端午蝦蟇炙杵傳嚼澤蘭心封燒葵根末封

安師方

炒葶苈焦研

風熱瘡第三

千金五香枳實湯治着風熱瘡癩堅如麻豆瘡痒搔之皮剝汁出或遍身頭面年常發者

青木香銹 麝 雞舌香 薰陸香

沉香 防風 秦艽 漏蘆各半

枳實兩半 麻黃 升麻 黃芩

白欬兩各一 大黃一兩十

吹咀水五升煮升八合五六歲兒服四五合量加

十五六歲加大黃

枳實丸治病風癢痒痛如疥搔之汁出遍身瘡癩年

幼幼新書

卷三十七

四

年喜發面目虛肥手足乾枯毛髮細黃肌不光澤草

氣不利此小時體熱盛當風風熱相搏所得不治成

大風疾

枳實兩半 菊花 蛇床子 防風

白薇 浮萍 蒺藜子各一 天雄淨

麻黃去根 漏蘆各半

末蜜丸如大豆五歲兒飲服十九至廿九兒大加

可散服

嬰孺枳實湯

枳實各六 防風 秦艽 雞舌香

薰陸香各二 麝各一 沉香 黃芩

白欬 升麻各四 大黃 木香各十

水五升煮升八合五六歲服五七合量加

劉氏摩風去毒神異膏治男婦老幼一切風瘡腫毒

氣瘡熱毒瘡癩發背繞覺便點藥擦熱便消頭面風

氣攻注如虫行攻掣眼目睨動種種瘡癬久使得安

最治婦人黑斑粉刺粉靨落粒及草面酒齶鑷瘡塗

時擦熱為妙

幼幼新書

卷三十七

五

綿黃耆兩半 零陵香各一 赤芍藥 防風

川芎 生地 天麻各一 蠟二兩

清油十二

搥摩細清油浸七日文火煎黃色新綿濾滓入

蠟再煎瓷器收

丁時發治胎中風熱生瘡如疥癩

側柏 鬱金 蝟 天南星

地龍 黃芩 大黃

等分末溫酒調

熱毒瘡第四

聖惠陽氣在表盛則表熱兒解脫腠理開為風邪所客風熱相搏留皮膚則生瘡初作燥漿黃汁出風多則痒熱多則痛血氣乘之則多膿血名熱瘡

千金水銀膏

水銀

胡粉

松脂各三

猪胎四升煎松胎水氣盡下二物攪不見水銀後

傅

陳藏器治赤白遊疹火炎熱瘡熱痢止渴

切切新書

卷三十七

木

馬藻紋汁服生水如上

劉禹錫治熱瘡亂髮雞子膏

雞子五枚黃髮如雞子熬液出置瓷椀中塗苦參

末粉又療兒驚熱下痢去痰熱主百病

聖惠黃芩散

黃芩各三

石膏

柴胡

大黃炒

升麻各一

甘草炙

玄參各半

粗散一錢水小瓊煎五分量服

梔子膏

梔子仁

川升麻

蛇蚶

黃芩各一

犀角分三

藍葉合五

生地兩二

劉猪脂斤半微火煎十餘沸瀝滓膏成瓷合盛塗故帛貼

黃芩膏治熱瘡膿出

黃芩兩半

水銀入少水與胡粉研星盡

川大黃各一

兩

黃柏

梔子仁

黃連

胡粉各三

竹葉兩二

生地兩二

劉如豆新綿裹猪脂斤半慢火煎十餘沸藥氣去

切切新書

卷三十七

木

綿布絞候凝下水銀胡粉柳木篦攪膏成瓷合盛

夜三四塗

張漢青砂散治身體頭面熱毒瘡

青黛

朱砂各一

硫黃

水銀研星

盡各半兩

胡粉

赤小豆各一

研生油膩粉調塗

惠眼治丹毒熱瘡芭蕉散

寒水石煨

蚌粉

等分末芭蕉汁調塗鵝翎掃

張氏黑丸治大血泡瘡

烏頭卅二兩半 洗去皮尖切晒

甘草焙

零陵香

藿香

五靈脂淨各四兩 荆芥三兩

沒藥入白瓦盆內 芎

石膏八伏龍各一兩

血竭無用乳香研念玄胡索字二兩

末好酒糊丸如梧子陰乾磨墨染入乳香在墨內

亦陰乾葛布袋盛當風處薰治風頭痛傷寒進食

瘡腫醋磨貼牙痛血風並治妊婦勿服

吉氏治身頭癩癬赤腫先用鎮心散驚風門後貼

幼幼新書

卷三十七

十一

蓖麻子研成膏貼腫自消赤腫結成者破

安師傳治熱毒瘡

生硫黃錢一 檳榔兩一

細末油調傳先搗絲瓜菴一宿次日傳

頭面身體生瘡第五

巢氏嚴府熱盛冲發皮膚外有風濕折之與血氣相

搏則生瘡初起赤瘡癩後生膿汁隨差隨發身體頭

面俱有

千金治二百日兒頭面瘡起身體大熱

升麻

柴胡

石膏各六銖 甘草炙

當歸各十銖 大黃十八銖 黃芩十八銖

咬咀水四升煮二升分服日三夜一量兒用翼用

此洗瘡

又榆白皮曝篩醋和塗綿傳虫自出或猪脂和

千金翼苦參湯主頭面熱瘡

苦參兩八 大黃 芍藥 黃連各三兩

蛇床子升一 黃芩兩二 黃柏兩五 菴藵斤一

切水三斗煮斗半洗日三

幼幼新書

卷三十七

九

外臺

黃連八兩 聖蛇床子 黃蘗各八分 胡粉四兩

半兩 炒黃

散麻油和塗聖惠兼治體生熱瘡面瘡猪脂和

秘錄治面瘡黃水出

鯽魚頭燒和醬清汁傳

聖惠漏蘆散治頭面體生赤瘡濕痒汁出

漏蘆 當歸炒 黃蘗 黃連

麝各一 膩粉錢 五倍子兩一

散煖漿水洗淨生油調塗乾處勿塗乾差為度塗

後勿洗

吳茱萸散治頭面風瘡及身上或如麻豆多痒

吳茱萸

鵝糞並炒

赤小豆

薑黃

白礬飛各半兩

苦蘆子炒

阜角灰

藜蘆各一分

散生油旋調塗

胡粉散治頭面身體平生惡瘡

胡粉黃炒

黃連各一分

水銀一分水胡粉研星盡

散猪胎調塗

初切新書 卷三十七

殺虫蕪蕪散治頭面體瘡久不差瘡痒

蕪蕪各三分

葶藶並炒

白礬枯各一分

吳茱萸炒半

散生油調塗日二

雄黃散治頭體瘡皮膚赤煖瘙痒

雄黃分三

白礬枯

莽草各半兩

井鹽一分

散生油調塗日三

治頭面身瘡胡粉膏

胡粉

水銀二味和水研星盡

白松脂各一分

猪胎二兩

二脂煎膏濾滓入水銀胡粉攪日二塗

黃連散治熱瘡

黃連

黃蘗

胡粉

水銀同研

星盡各一兩

苦參二兩

細羅入粉銀研面瘡面胎和頭身生油和塗

治頭面體瘡苦參湯浴

苦參

王不留行各三兩

地榆

獨活

艾葉

黃連各半兩

竹葉二兩

劉三兩水五升煮三升浴

瘡肉突出烏梅肉炒羅傳

嬰孺治身上惡瘡馬骨灰猪胎和傳

治面瘡蜈蚣灰雞子殼灰蘇枋末並猪胎和傳

又茱萸葉東流水煮筍任洗

又榆白皮炒末酒調塗綿履虫出愈

治逆嘔胃脾脅下滿不思食面目體瘡大便難大

黃乳胃丸

大黃分六

細辛分六

蜀椒

阜角炙

乾薑 厚朴炙 桂心 秦椒

吳茱萸 杏仁淨炒各

末蜜丸小豆大先食飲下三九不知加一多黃芩

葶藶當歸

劉氏面瘡羊脛骨髓調膩粉塗

又淡豆豉燒一兩膩粉搥二錢地灰汁洗搽瘡乾生

油調貼吉氏多白礬

莊氏治頭身生赤肥瘡并如魚子等抓破汁出

桑白皮燒灰乾擦

幼幼新書 卷三十七

治頭面熱瘡并疥癬

黃連 寒水石 定粉各一兩 黃柏二兩

末生油調塗

治頭面生瘡肥黃不乾膿染處即成瘡

豆豉 肥珠和子各半兩

瓦上燒存性末入黃丹一錢輕粉半錢葱湯洗生

油調傅一有白礬膩粉

吉氏治同上梧桐葉焙輕粉少許葱湯洗生油調傅

風瘙癩疹第六

巢氏兒因汗解脫衣裳風入腠理與血氣相搏結聚

成癩疹風在腠理浮淺處故不腫痛但瘙痒耳

顧願治胎風生後滿身生瘡痒如疥癬或如饑飽

痒瘡

葱白 消 臭黃 硫黃

等分油半兩燒熱下少蠟葱白三莖細切澆油上

續下硫臭消更研塗

千金翼無辨升

防風 羊桃 石南

幼幼新書 卷三十七

秦椒 升麻 苦參 茵芋

芫花翼用芫藶 蒺藜 蛇床子 枳實炒

礬石各一兩

吹咀漿水三斗煮一斗去滓內礬令小沸浴

又牛膝末酒服方寸匕漏瘡久不差搗傅亦主骨疽

癩疾瘰癧

治兒患癩疹入腹體腫強而舌乾

蕪菁子末酒服蚕沙二升水二升煮洗車前子末

粉鹽湯洗了藜子搗傅

千金翼巴豆五七粒淨水三升煮一升綿內湯拭病

上隨手滅吳茱萸一升酒五升煮升半拭

外臺竹瀝湯

淡竹瀝升二葛根汁合五牛黃豆粒大

和六歲內服一合至五合意裁

秘錄菰蒲節末傳

聖惠麻黃散

麻黃去根川升麻 葛根各一兩射干

雞舌香 甘草各半兩石膏三分

切切新書 卷三十一 十四

粗散一錢水小瓊煎五分溫量服

犀角散治風癩瘰癧疹壯熱心燥

犀角 川升麻 麥門冬 白蒺藜炒

甘草各三分

粗羅一錢水小瓊煎五分溫量服

黃耆散

黃耆 黃芩各三分 白蘚皮 甘草各半兩

防風 枳殼炒各一分

散一錢水小盞煎五分溫量服

枳實丸治癩疹痛不止

枳實炒 甘菊花 防風 麻黃去根

白蒺藜炒 浮萍各半 蛇床子 天雄淨

白椒 漏蘆各一

末煉蜜丸如菘豆溫水下七丸量加減

治風疹心膈煩悶茵芋湯浴

茵芋 防風 附 牡蠣

莽草

等分劉水一斗煮六升洗避風

切切新書 卷三十一 十五

又方

景天草兩 藍葉五兩

搗絞汁塗腫處熱手摩日三

又川芒硝二兩清酒三瓊煎二瓊溫洗痒處燥復洗

避風又席脂摩肉亦得

嬰孺治風疹及腫枳實膏

枳實各四分 羌蔚子 防已各五 升麻六

行葉七 石膏二 芒硝十二

麻油升四合煎四五沸去滓塗

張漢治癩疹瘡疥防風湯

防風

鼠粘子

荆芥穗

人參各一兩

甘草炙

天麻各半兩

羅一錢水八分薑薄苛煎五分温服

治疹甚者如癩麝香犀角丹

天麻

白附子

白殭蚕炒

烏蛇肉酒浸

淨焙各半兩

犀角一兩

朱砂飛一兩

腦麝各一錢

鍊蜜丸如黍服十粒金銀薄苛湯下

治疹肌肉青黑二聖散

幼幼新書

卷二十七

十六

胡粉苦參等分羅温酒調塗

王允治脾肺風血妄行腠理發疹時心腹疼痛渾身

頑麻手足拘攣或心膈痒悶痰噦逆吃食減少頭

疼目暈一發遍身搔隨手起燥痒千金散

成塊赤土

一名羊肝石細膩者有砂石不用

研如麩冷酒調一錢

日三

傳藥

護火草

景天是大葉者益種以慎大

薑和皮

等分爛研入鹽塗遍身患棟盛處塗手到即消遍

塗尤妙

劉之才甘硝散

土朱二兩

朴硝一兩

細末一錢生薄苛研細冷水調塗

千金治舉體痛痒如虫齧搔之皮脫作瘡灸曲池二

穴隨年壯發即灸

疥第七

巢氏疥瘡多生手足指間漸染身體痒有膿汁九虫

論蛭虫多變亦作疥瘡有細虫兒多因乳養人染着

幼幼新書

卷二十七

十七

治疥及諸瘡苦參湯

苦參

丹參

苦棟根

防風各半兩

薊蘆三兩

剉水一斗煎五升濾滓密室中浴故帛塗前膏

治疥痒

硫黃二兩

白礬枯四兩

散烏麻油調灸疥熱薄塗摩

又硝石羊蹄草根末蛇床子並猪脂和醋磨硫黃任

塗

散麻油和先洗後塗

聖惠蛇床子散

蛇床子

吳茱萸

硫黃

蕪荑各一

膩粉錢

細羅油一合葱一莖煎葱黃黑去葱調散塗

黃連散治疥遍身痛痒

黃連

胡粉

水銀胡粉和水研星盡各二兩

吳茱萸兩一

赤小豆粒百

羅臘猪胎和塗亦治癩瘡

幼幼新書

卷三十七

七

本草傳一切疥癬殺虫

油合

雞子個二

芒硝兩一

攪服少時即瀉治熱毒尤良

千金治頭面瘡疥

麻子末水絞汁和蜜竹葉灰和雞子白髮灰和臘

月猪脂臭酥和胡粉任傅

外臺療疥瘡兒身熱瘡

黃連

黃蘗

赤小豆

真黃各一兩

水銀半兩聖惠與硫黃一分結砂

博濟靈寶丸治瘡疥及風疾并疥癬瘰癧

鄆州天麻

天南星

新羅白附子獨活

白殭蚕

川烏頭炮

羌活

全蠍各一兩

牛黃

龍腦各一

麝半兩

淨洗曬勿近火杵末煉蜜丸如豌豆諸風疾薄苛

溫酒下五九婦血風八當歸末癰瘰用明礬末半

兩葱十莖煎湯浴薄苛汁溫酒下三十九汗出差

兒瘡疥亦常浴一歲一丸忌熱麪猪肉魚毒物

養生治疥

幼幼新書

卷三十七

十九

白蕪荑兩一

檳榔

吳茱萸各半兩

硫黃錢二

末油調搽破擦

張漢雜黃膏治疥癬遍身或頭面如粟浸淫痒痛搔

之汁出

雄黃

雌黃各一兩

川烏頭淨一枚

松脂

髮灰各一分

猪脂六兩鍊油下藥色黑濾滓入二黃瓷器盛塗

惠眼如聖散治疥癬立效

細辛

蕪荑無鹽

剪刀草

梨蘆

白礬 硫黃

等分末面油調入猪筒骨髓和擦

治疥癬頭瘡亦治癩

雄黃錢一 乳香 膩粉各半

巴豆廿粒清麻油四兩慢沸焦黃去巴豆入藥煎

數沸入黃蠟半兩鎔淨器收洗瘡後擦

鄭愈治藏府熱毒瘡壅熱滯瘡疥人參飲子

人參 大黃 荆芥 天竺黃

甘草二錢各 白芷 燈心錢一 梔子仁五

幼幼新書 卷二十七

釣藤釣子枝二七

粗末水一椀煎半碗服

丁時發治諸熱毒瘡疥癩

海螵蛸 硫黃 青礬各一 蛇床

黃連各半

細末油調塗乾用亦得

癬第八附

巢氏風邪與血氣相搏皮膚間不散變癩疹疹上如粟作形郭或邪或圓浸淫長大痒痛搔之汁出名癬

兒面皮如甲錯起乾燥名乳癬乳汁漬汗而生乳汁洗差

寶鑑女風中浴拭未乾和水乳兒及夏月汗出不粉其瘡細星星者是

千金治濕癬

枸杞根末狗屎灰蛇床子臘猪膏和桃青皮末醋

和牛車津任傳煎馬尿洗

聖惠治癬痒痛不止白礬膏

白礬灰 硫黃 膩粉各一 綠礬半

幼幼新書 卷二十七

川大黃分一

末米醋一升熬如黑飴瓷器收塗

附子散

附子兩半 雄黃 白礬各一 吳茱萸半

米粉各半

細羅綿搥撲

雄黃膏 多年莖根 白礬 藥蘆

瓜蒂 胡粉各一 水銀三分與粉

末猪脂調輕擦

雌黃膏治乾濕癬癢

雌黃 黃連 蛇床子 黃柏

消石 蕪荑 莽草 藜蘆

苦參 各半 松脂 三兩 杏仁 一錢

散臘猪脂半斤和松脂煎鎔先下杏仁次諸藥膏

成不津器收泔清先洗塗故帛貼日換

治久癬

獨蓄根 一握 生附子 二個

切切新書 卷三十七 廿三

搗爛好酒和塗先以皂角湯洗

治乾癬水銀半兩胡粉一兩點水研星盡雞窠血和

塗

治濕癬雄黃一分麝一錢細研甲煎油調塗乾蟾灰

猪脂和

癬久不差黃礬乾塗薤根搗醋和醬辦雀糞羊蹄草

根搗蜜和絞汁楮株白汁髮灰猪脂和任塗

惠眼防風飲子治風虛瘡癬

防風 甘草 炙 連翹 各一兩 梔子仁 兩半

末二錢水五分煎三五沸服

莊氏治癬及惡瘡石及黃丹等分炒紫乾傳

吉氏治乾癬巴豆斑猫各一個研極細臘脂調塗

痛瘡第九

巢氏風濕搏血氣成癩瘡多著手足節腕間匝匝然

搔之痒痛浸淫生長內有細虫

聖惠蛇床子散治癩瘡及濕癬

蛇床子 附子 雄黃 吳茱萸

白礬 苦參 各一

切切新書 卷三十七 廿三

細羅傳

螺殼散

爛螺殼 兩 髮灰 龍膽 胡粉 各半

細研油脚調塗

水銀膏治癩瘡及疥癬惡瘡

水銀白礬蛇床子黃連等分羅臘猪脂七兩和水

銀不見星

治濕癩瘡胡鷲窠一枚取大寬抱子處搗羅甘草入

盆煎湯溫洗傳

若惡刺醋和帛裹

莊氏治尾閭骨生瘡痒難忍

猪欄門泥猪擦臂處泥土或門上木屑灰麝少許末濕則乾貼乾

則油塗

標瘡第十

巢氏風熱毒氣客皮膚生標漿潰而成瘡名標瘡

肘後治卒得標瘡一名爛瘡

燒牛糞末粉和熬林米黃黑黃連胡粉和任塗

又燒鐵令赤二七度淬水中日二三次浴

幼幼新書

卷三十七

廿四

徐王方三歲兒頭初起標瘡如釘蓋一二日面及背皆生瘡

背皆生瘡

水銀朱砂胡粉硫黃等分末猪胎和塗禁見狗并

青衣小兒婦女先濃煮桑汁洗傳日三夜一

千金熟搗桃仁面胎和亦治遍身赤腫馬骨灰任傅

聖惠梔子膏

梔子仁

川升麻

犀角

黃芩

各半兩

蛇銜分三

藍葉

生地

川大黃

劉猪胎一斤微火煎藥色變憶滓瓷合盛塗

又

水銀

松脂

土蜂房

黃蘗

川大黃生各一兩膩粉一分與水研

末同鍊成猪脂一斤慢火熬如飴入銀粉攪瓷合

盛塗

尿灰瘡第十一

秘錄伏龍肝和雞子白塗

又黑豆皮熟嚼傅

酢瘡第十二

幼幼新書

卷三十七

廿五

陳藏器兒酢瘡頭小大硬小者或不因藥而自差當

丹毒入腹足危預飲冷藥防之兼用仙人草湯洗

又可搗傅草生庭階間高二三寸葉細有鴈齒似

離隔草北地不生亦明目去翳接汁滴目中

又產死婦塚上草取之勿回頭作湯洗

魚臍瘡第十三

聖惠魚臍瘡者頭黑深破之黃水出四畔浮漿起狹

長似魚臍故名

蛇蛻炙黃一兩水一盞煎五分去滓入雞子清一個

攪更煎三兩沸量服

又

羌花根

兩

猪牙阜角

五

黑豆

三

白礬

兩

三

醋七升浸三日文武火煎二升去滓別鍋中煎一

升入礬攪窰合盛攤故帛上貼

又臘猪脂并髓雞子清調寒食乾飴灰任傳

又白蒿莖汁先刺瘡四畔涸瘡中

又切大蒜片貼瘡上艾炙二七壯遂壯換蒜畢研豆

豉厚糞

幼幼新書

卷三十一

六

張漢雞清散蛇蛻灰雞清調塗

王灼瘡第十四

巢氏府箴有熱熏皮膚外為濕乘生瘡熱偏盛者瘡

亦盛初如麻子須臾汁流潰爛如湯火灼故名王灼

瘡亦名王爛瘡

本草雞羅勒根燒傳

藥性赤小豆汁洗

千金四交道土竈下土傳亦治夜啼艾灰傳乾用土

油調牛糞灰傳滅癩

聖惠赤芍藥散治王爛瘡一身盡有如麻子乍痛乍

痒或壯熱

赤芍藥

甘草

白欬

分

黃芩

黃連

黃蘗

各

兩

羅蜜水調塗嬰孺可作湯洗上四味減下二味半

秫米散

秫米竹篠等全燒灰田中和下水調塗

聖惠黃連散一日肉變二日乾漿出或四畔微赤漿

匝身不治

幼幼新書

卷三十一

七

黃連胡粉等分研生油調塗

又爛桃仁面脂和吳茱萸酒煎赤地利

春夏生蔓繞

高麥七月花如蒿麥根如末酥和任傳

火灼瘡第十五

千金火灼瘡一身盡有如麻豆或有膿乍痛乍痒

甘草

芍藥

白欬

黃芩

黃連

黃柏

苦參

等分末蜜和傳日二夜一可作湯洗

黃肥瘡第十六

巢氏兒涎唾多汁流溢浸漬于頤生瘡黃汁出肥爛
挾熱者汁多

千金殺羊鬚及臘猪脂和傅角亦可熬竈下飢焦傅

浸淫瘡第十七

巢氏五歲有熱熏皮膚外為風濕所折濕熱相搏身
體發瘡初出甚小後汁浸淫漸大各浸淫瘡

千金竈下黃土髮灰等分末猪脂和傅

外臺艾灰牛糞灰任傅

聖惠三寸鯽魚一個豆豉一合搗膏塗亦療馬鞭瘡

幼幼新書

卷三十七

廿八

若或先起四肢漸向頭面難治

又雞翎血煎鯽魚膏胡燕窠灰水和任傅生鯽魚切

片貼

張渙苦瓠散

乾苦瓠兩一

蛇蛻灰

露蜂房

各半兩

梁上塵

半兩

羅生油調塗

幼幼新書卷第三十七

幼幼新書卷第三十八

頭瘡凍痺 凡十八門

後學古吳陳履端于始輯

玉峰張顯德明先校

頭瘡第一

巢氏府藏有熱氣衝于頭風濕乘之濕熱相搏折血
氣而生瘡

寶鑑六陽之脈會在于頭六陽受熱乘于陽不流而
為頭瘡

千金

煎蘆膏治頭瘡久即疽痒不生痂

幼幼新書

卷三十八

廿九

煎蘆

黃連

雄黃

黃芩

松脂各二兩

猪脂半斤

礬石五兩

末煎和先以赤龍皮小天麻湯洗傅

又

松脂

苦參

黃連各一兩半

大黃

胡椒各一兩

黃芩

水銀各兩

礬石兩半

蛇床子十八銖

末臘猪脂和研水銀星盡傅

千金翼

胡粉

白松脂

各二兩

水銀

入水研星盡一兩

猪肪脂

兩四

煎去查內銀粉攪和塗

外臺范汪治傷寒白膏摩體中手千遍藥力延行并

治惡瘡兒頭瘡牛領馬鞍鹽湯洗着膏摩向火千遍

日再

天雄

烏頭

羊躑躅

莽草

各三兩

切苦酒三升漬一宿作東向露竈作十二聚濕土

各一升許成煎猪脂三斤着銅器中加竈上炊以

葦火令沸不着土聚上沸定項上火煎如此令土

切切新書

卷三十八

三

聚遍去滓傷寒頭痛酒服杏核許溫復取汗咽痛

含如棗核嚙之日三勿近目千金忌猪肉等

治頭瘡天麻草湯

天麻草五升水斗半煎一斗洗頭傳飛鳥膏散

飛鳥膏粉

細粉

礬石

燒各三兩

絹篩甲煎和如脂傳有汗自着亦傳諸熱瘡黃爛

浸淫汁瘡蜜瘡丈夫陰蝕痒濕兒疳蝕口邊肥瘡

蝸瘡

天麻草葉如麻冬生夏花如鼠尾

治頭瘡經年不差差而復發

雄黃

雌黃

大黃

聖惠

黃蘗

黃芩

薑黃

白芷

當歸

青木香

各四分聖惠用木香

咬咀苦酒浸一宿猪脂一升煎白芷色黃去滓入

水銀一兩嚙研消入膏攪瓷器收阜角湯洗塗日

夜再換

秘錄治頭瘡髮不生

楸葉汁塗兼治白禿

切切新書

卷三十八

三

治頭瘡耳瘡

竹葉灰和猪脂塗雞子白傳亦妙又雞子黃銅器

中熬和油傳亦治白禿髮不生

陳藏器治頭瘡癰腫陰癩

蒺藜子可作摩粉葉主風痒煮浴

食療馬骨灰和醋傳亦治白禿駁馬不之者尿數數

煖浴

本草生嚼胡麻或嚼白麻油塗

八稜為巨勝四稜為胡麻

聖惠方

狗糞 人糞 猪糞 阜角灰

礬 枯 香豉炒各半兩

散生油調塗

青砂散

水銀小集研星盡 硫黃

川楝去目 膩粉

縮砂仁各一分 竹葉

狗頭骨炙各半兩

散研水銀勻生油調塗

治赤瘡渾頭面及胃上作片人不識者水銀膏

水銀 松脂各一兩 黃蘗 土蜂窠

幼幼新書

卷三八

四

川大黃各兩半 膩粉一分

末鍊猪脂半斤成膏稀麵糊放冷取銀粉掌中嚙

調如青泥後入膏塗

雞子膏

雞子七枚熬次下婦人油髮雞子大令消滯入膩

粉半兩麝一分攪瓷合盛洗淨塗

又檳榔水磨紙襯曬生油調塗雞子殼灰猪胎和烏

梅肉灰生油調吳茱萸炒焦入膩粉口脂調莖蒲

末生油調皆可傳

治疥癬瘡水銀膏

水銀 白礬 蛇床子 雄黃

藜蘆各一兩

鍊猪脂半斤研水銀星盡傳日三煎治頭瘡

嬰孺治遍頭瘡

水銀 松脂 胡粉各二兩 臘月猪胎

鍊油

銅器中糖火熬研候汞消傳更傳散

黃連五兩 水銀一兩 烏賊魚骨炙三兩

幼幼新書

卷三八

五

研汞盡為末付膏上又白欵研汞令消洗瘡用桃

葉湯桃皮狼牙悉佳

寶鑑

髮 竈下土煆九 鱖魚頭 巴豆個各一

諸藥入魚肚內甘草一寸塞口煆末入膩粉油調

傳

張氏兒多言頭瘡不治成白禿有終身無髮者

肥珠子一兩箇獨子者佳燒油脚調塗三兩上除

根

莊氏蛇床子炒焦油調傳

又燕巢一個煨膩粉少許研生麻油調傳

孔氏黃丹膩粉白膠香等分末洗瘡油調傳

吉氏治頭瘡及疔肥禿瘡

豆豉炒焦 白礬煨半 輕粉錢一

末先洗瘡削去髮秤鏈燒六淬小便中洗瘡出血

生油調塗

又

臭橘皮葉一握自

五靈脂

黃蘗各二

物物新書

卷三十八

六

輕粉錢

末調塗黑紙扎頭一周時取下有細白虫

禿瘡第二

千金雜難蠶陳醬汁苦酒和洗瘡後傳又不中水燕

青灰猪胎和傳

陳藏器藍澱澤傳

聖惠治禿瘡及浸淫瘡

苦棟枝皮灰瘡濕乾傳乾猪胎調

莊氏薛荔表灰蚕戴灰並油調陳米灰生油膩粉調

塗

孔氏守宮一枚蛇蛻等分清油煎蠟收塗

白禿瘡第三

葉氏頭上白點斑刺初似癬有白皮屑久則生痂又

成瘡遂至遍頭有膿汁不痛而痒有虫甚細九虫論

蛻虫動而生瘡自小及長不差頭髮禿落名白禿

唐本草注雞窠中草白頭翁花等分燒膩猪胎調塗

酸泔先洗

肘後難子熬汁榆白皮末醋調猪屎灰椿楸葉心汁

物物新書

卷三十八

七

選塗

外臺治頭瘡白禿不生髮汗出無汗燥痛

燒鯽魚末醬汁和塗

聖惠阜角散

阜角二 煨

白芨半

黃芩

朱砂

麝

黃丹炒

檳榔

乾薑燒

羅漢醋脚塗

松脂膏白禿及癬並治

松脂兩

清油兩

天南星

川烏頭淨

千金治蠟螫咬遠腹匝即死

搗蒺藜葉傅子亦得燕巢中土猪胎和殺羊豕灰
臘月猪胎和酢和胡椒燒鹿角苦酒和嚼大麥熟
嚼梨葉水和搗馬鞭草吳茱萸東行根下土酢和
可選傳

又槐白皮半斤苦酒二升漬半日刮瘡處洗日五六
遍赤小豆苦酒和傅燥復易

聖惠敗蒲扇煮濃汁燒道傍樊蒲席及爛搗菹豆葉
生甘草搗末嚼梨汁篇竹汁生白礬葱汁調塗

幼幼新書

卷三十八

十一

自懸瘡第七

王氏兒項生瘡常痒痛不乾漸透項滋長經年不愈
名自懸瘡是自縊鬼為祟透頸使人頸斷求自縊人
墓上土細研隨瘡傅

代指第八

聖惠代指者指腫焮焮熱痛色不黯瓜甲發膿劇者
甲脫亦名代甲亦名糟指亦名土竈夫爪筋之餘筋
骨熱盛氣滯不通故結腫生膿而甲脫
麻黃三兩水二椀煎一椀乘熱蘸日十餘遍

又雜毛和黃土作泥泥指厚五分塘火煖微熱忍泥
乾即易二三度差

又猪胎和曲蟾研傅梁米粉鐵鑊熬赤嚙和塗一寸
梅仁熟搗醅苦酒和傅小便和鹽作泥裹鏡針刺
血出妙

手足皴裂第九

聖惠肌膚軟弱冬時解脫觸冒風寒手足脫肉破名
皴裂

千金翼治手足皴裂血出疼痛

幼幼新書

卷三十八

十二

猪脂着熱酒中洗

聖惠生胡麻爛搗塗煮棗肉研傅一宿後甘草湯洗
脚瘡第十

聖惠脚瘡者兒肉嫩風冷中足涌泉穴也兒脚皮肉
血氣與風邪相感肉硬血氣不通陽氣不達致然
沸蘸方治脚瘡腫硬疼痛

川椒二兩鹽一兩清酒五升煎三升頻蘸冷再煖
之

又附子一兩乾薑二兩羅裝綿襪中著

又濃煎猪脂塗

凍瘡第十一

巢氏兒冬月寒傷肌膚搏血氣燠腫難差至皮肉爛
名凍爛瘡

千金猪後懸蹄夜半燒研猪脂和傅

千金翼治冬月冒涉凍凌面目手足瘰壞及始熱疼
痛

麥窠煮濃汁熱漬手足兼洗三五度

治手足皴凍欲脫

幼幼新書

卷三十八

十三

樹

芎藭各半

白芷

防風

薑各一分

水四升煎濃塗洗三數遍

治凍傷十指欲墮

馬尿三升煮沸漬冷易

秘錄雀兒腦髓塗

孟詵臘日新死牡鼠一枚油一升煎爛絞滓重煎膏

塗兼治拆破瘡

聖惠黃蘗散治耳凍瘡或痒或痛

黃蘗白欬各半兩為末湯洗後生油調塗

白欬散治凍手皴裂成瘡

白欬分三

白芨兩半

白油麻合二

末勻蒸蘿蔔一個爛研酒調稀童便洗後塗張渙
多黃蘗

痂子第十二

聖惠盛夏月兒膚腠易傷風熱搏于皮膚生痂瘡狀
如湯激輕者如粟重者熱浸漬成瘡名痂子

陶隱居兒絲子莖搗汁浴

幼幼新書

卷三十八

十三

聖惠止痛生肌赤石脂散治痂破成瘡疼痛

赤石脂

黃蘗

臘面茶各半

白麴兩二

龍腦分一

研綿搵撲瘡上張渙少赤石脂名龍腦散

滑石散治體熱痂瘡

滑石兩三

礬石兩一

棗葉兩四

羅溫漿水洗後傅

赤痂第十三附黑痣

巢氏赤痂兒血氣不和肌生赤色染漸長大無定或

如錢或濶三數寸

千金馬尿洗日三四

治赤黑痣針父脚血貼狗熱屎傳皮自卷落

千金翼銀指熱漸消癩滅

嬰孺生漆點

白駮第十四

千金翼治白癩白駮浸淫癰瘍着頸及眉前

醋磨硫黃如泥又八角附子截頭平重磨硫黃熟

夜卧先布拭病上熱傳重者三度

切切新書

卷三十八

十四

又硫黃水銀礬竈墨等分篩葱涕和臨卧傳

又硫黃三兩附子去皮鐵精各一兩擣三年醋和瓷

器盛密封七日淨洗醋泅塗慎風

治頭項及面白駮浸淫漸長如癬但無瘡

乾鰻鱺炙脂塗先刮駮上小痛三塗佳

又

白芨一作白欬

當歸

附皮去

天雄去皮

黃芩各一兩

乾薑四兩

躑躅升一

篩酒服五分日三

又桂心末嚙和傳

端午午時灸膝外屈脚當紋頭隨年壯兩處一時灸

勿轉動

漆瘡第十五

巢氏人稟性不耐漆者見漆及新漆器便着毒頭面

身體腫起癢疹色赤痒痛為漆瘡

千金生柳葉三斤水斗五升煮七升洗日三肘後老

柳皮磨石下滓泥塗燥蓮葉水煮洗貫眾末油和

塗羊乳汁塗七姑草或和芒硝塗芒硝湯浸礬湯

切切新書

卷三十八

十五

濃煮鼠查葉任洗

外臺濃煮杉木汁洗

聖惠藍葉散治漆瘡四肢壯熱

藍葉

麥門冬

川升麻

木通

甘草炙

茯苓各半

馬牙硝

犀角各三分

羅一錢水小瓊煎五分服

又

垂柳枝五兩

苦參二兩

黃連一兩

剉水三升煎半升去滓入墨末一合熬膏瓷合盛

塗張煥無黃連有黃芩名柳杖膏

又生蟹爛搗水二合絞汁塗雞峰自死蟹水煎洗

又爛嚼糯米麥麩末雞子白和雞白生搗如泥菜油

任塗

又茅香漬汁馬尿煮薤汁濃煎黃檗湯濃煎新糜葉

湯任洗

張煥化毒散治漆瘡痒痛

木通兩一

麥門冬

藍葉各半兩

犀角

甘草赤

馬牙硝各一

幼幼新書

卷三十八

十六

粗散一錢水小瓊煎五分服

金瘡第十六

巢氏金刃傷為金瘡若傷經脉血出不止乃至悶頓

傷諸歲俞募亦難治餘腹破腸出頭碎腦露並難治

傷肌肉淺成瘡終不慮死金瘡得風則變瘰

千金翼石灰止血大效端午採萋萋葉庶治草天各精

柵葉芍藥地黃葉蒼耳青蒿葉合搗石灰丸如雞

子曝瘡瘡生肌神

治金瘡瘀血桃仁湯

桃仁淨五枚

蜜虫淨

水蛭熱各州枚

大黃五兩

桂心兩半

切酒水各五升煮二升服一合日三明日五更再

服

治金瘡腹有瘀血二物湯

大麻仁升三

葱白二七

數人合搗熟水九升煮取半頓服若血去盡腹有

膿血更令服當吐出

治金瘡內漏血不出

幼幼新書

卷三十八

十七

牡丹為散三指撮五日尿出血

治金瘡出血多虛竭內補散

從蓉

芍藥

當歸

芩

乾薑

人參

黃芩

厚朴炙

桑白皮

吳茱萸

黃耆

桂心

甘草炙各兩

蜀椒仁三

篩飲服方寸七日三

治金瘡不差白楊木白皮熬燥末服方寸七日三末

傳

治金瘡刺痛難忍

葱一把水三升煮數沸漬瘡

治金瘡煩痛大便不利

大黃黃芩等分末煉蜜丸先食飲服如梧子七丸

日三

凡金瘡出血必竭當噉燥食勿飲粥及漿犯即血出殺人凡白血不止方

粉龍骨末割人見着鞋上斷乳十枚布瘡上雄黃

傳瘡汁出差

切切新書

卷三十八

十一

又刮貝子末服煮葛根多食

又桑白皮令汁入瘡或石灰封並炒

凡金瘡深不用早合滑石末粉

金瘡止血散

釣樟根兩三

當歸

芎

乾地黄

續斷各一兩

鹿茸炙半兩

龍骨兩二

篩傳血即止酒服一錢七日五夜三

金創腸出令入方

磁石燒滑石各三兩篩飲服方寸七日五夜二三

日當入

治刀斧傷及冷瘡牛領馬鞍瘡

續斷

松脂各一兩

鹿角

腐牛骨

髮燒各二兩

篩猪脂半斤并松脂合煎下鎊干地令凝瘡有汁

傳

續斷散主金瘡筋骨續絕

續斷三兩

茯苓切酒浸一宿

當歸各兩半

細辛兩半

附子炮

乾薑

川椒

切切新書

卷三十八

十一

桂心各三兩

蛇蚶草

乾地黄各二兩

芍藥

人參

甘草炙各一兩

篩酒服方寸七日三夜一千金有地榆錄驗有杜

蘅

主金瘡內塞澤蘭散

澤蘭

防風

川椒

石膏

乾薑

附皮炮去

細辛

辛夷

芎

當歸

甘草炙一兩

末酒服方寸七日三夜一膿多倍甘草渴加苦薑

半兩煩熱加黃芩半兩腹滿短氣加厚朴三分瘡
中瘀血加辛夷半兩

寶童治諸般傷

花蓋石一斤硫黃一兩窰合盛白芨粉水調固縫

鹽泥固燒一日夜出火氣研用凡猫犬傷損搽之

吉氏金傷血不止

石灰一兩雞子一枚拌作餅燒煙絕研搽

湯湯火燒第十七

聖惠兒被湯潑火燒者初時勿以井下泥及冷物尿

切切新書

卷三十八

二十

泥蜜塗搗熱氣得冷深搏至骨爛入筋中湯火後筋

攣縮者以此

千金治火燒瘡死鼠頭一枚臘猪脂煎消傳乾再傳

不作癩丹參羊胎猪腦髓煎塗新牛糞熱塗

治沃人肉爛壞

杏仁

附各二

甘草

羊胎

松脂

雞子

吹咀不中水猪膏五兩煎塗

千金翼燒桃葉鹽湯洗

又醬汁乘灰和水井底泥青羊髓或白任塗

治灸瘡及湯火損晝夜呼薰滅癩

羊胎

松脂各半

猪脂

蠟各一

松木節上小鈹火燒猪脂等皆消取汁傳

圖經治湯火燒側柏葉搗如泥冷水調如膏塗帛繫

定三兩日瘡斂

瑣言兒落炭火醋泥傳無痕

聖惠大麻子膏治卒被湯火苦劇

大麻子

柏白皮

白芷

甘草

幼幼新書

卷三十八

十一

梔子仁

劉猪脂一斤煎白芷色黃綿濾滓瓷器盛塗

生地黄膏

生地黄

甘草

苦竹葉

柏白皮

劉猪脂一斤煎地黃黑綿濾滓不津器盛日塗三

又死鼠清油熬黑嚼榆白皮水浸梔子仁菰蔣根灰

雞子白和醋調雄黃或大黃湯調浮萍末粟米粉

熬焦水中瀝爛研黍米粥雞子白和水研乳香任

塗

初被湯火取狗毛碎剪消膠和遍塗帛封至痂落更
不易並不痛

養生蛤蚧殼燒末油調塗蛤粉亦可一有草麻子

嬰孺柏皮膏

柏皮 槐白皮_{合三} 生地汁 蛇蚶_{生各}

梳子仁_{分六} 甘草 黃蘗_{各四}

切猪脂升半火煎去滓傳

又柏葉灰水和傅乳母忌口無癩蜜可塗

張銳風化石灰清油調蕎麥炒焦冷水調或入油塗

幼幼新書 卷三十八

聚寶乾牛糞灰研生油調塗

王氏雞子白一枚煨葱一條去皮蛤粉棗大研塗

吳氏醋磨大黃等雜神不若鎔金銀鍋出火次數絕

多者以水石上磨汁重重塗不見赤痕任自脫驗

鄭愈寒水石煨乾山藥螺兒青等分末蜜調塗

瘡中風中水第十八

千金治瘡中風腫

櫟木根皮濃煮內鹽一把漬

破傷風腫厚塗杏仁膏燃麻燭遙灸

凡中水風作腫入腹殺人溫菜汁漬冷復溫常令熱
治瘡中水腫

炭白灰胡粉等分脂和塗水出痛止

幼幼新書卷第三十八

幼幼新書 卷三十八

幼幼新書卷第三十九 鯁刺虫毒 凡十七門

後學古吳陳履端于始輯

弟陳履正于終校

惡刺第一

竹木刺狐尿刺并刺中風水附

千金治惡刺

苦瓠開口內童便煮二三沸浸病上

又菴蓐根火煮浸冷復易

又李葉棗葉絞汁點

治惡刺并狐尿刺

切切新書

卷三十九

十一

烏父驢尿漬白馬尿温漬

因瘡腫痛劇者數日死或中風寒中水中狐尿刺

燒黍穰若牛馬屎若生柴條多煙之物熏汁出

又僕公英根葉莖中斷之取白汁多塗差止神驗蜀

人名耳癩菜關中名苟乳翅翼云塗一寸厚凡諸

螻螂之類盛暑時多有孕育着物上必有精汁乾

久有毒人手觸之不王相處則成疾名曰狐尿刺

日夜砢痛不識眠睡並宜

又刮箭羽下末塗燒魚目灰傅服黑牛熱尿煮並煎

搗蠟炙熱薄裹令水出

千金八九月刺手足犯惡露腫殺人

生柴枝三枚煨灰中令極熱斫斷頭柱瘡上熱盡

即易盡三枚瘡自爛仍取薤白擣綿裹着熱灰中

使極熱去綿取薤白薄瘡上布帛急裹有腫便用

佳

治竹木刺在皮中不出

燥羊屎燒灰和猪脂塗刺上不出重塗一用乾羊

屎末

幼幼新書

卷三十九

十二

又服王不留行兼根末貼

又煮山瞿麥汁飲

又牛膝根莖生擣嚼豉及白梅白茅根灰和膏鹿角

灰和水頭垢塗擣薤并藍青火炙五月蔓青末和

烏牛乳野狐屎灰臘月猪胎和針砂和膠清蛇蛻

或鞍韉旃灰臘猪胎調擣蓼葉擣黃瓜根並可選

傳

又蓋薇灰水鑿柄灰酒和酸棗核灰並服

又桑灰汁熱漬槐白皮湯漬苦瓠湯漬樺皮湯漬

又故鞋網如棗婦人中衣有血者如掌倒鉤棘針二七枚三味合燒臘猪脂和塗虫自出

又募青子五升微熬研重便一升合內瘡中周厚一寸以燭火燒一升投內瘡于中潰

治卒刺手足中水毒

擣薤及藍青置上以火炙熱

治因風水腫

卒刺涉水成腫薤并鹽擣置上火炙藥熱

治肉刺

幼幼新書

卷三十九

五

割頭血出內銘丹如米許好墨亦可塗

簡要兒誤為諸骨及魚骨刺

水煮白梅肉爛研後調象牙厚傅刺軟

勝金治骨鯁或竹木簽刺喉中

臘月鰓魚膽非簷下陰乾取阜子許酒煎化温呷

骨隨頑涎出吐鯁為度鯁在歲府中日久痛甚黃

瘦者服之皆出鯁魚鯁魚鯁魚俱可臘月收

張銳治魚骨鯁

飴糖如雞子黃含化象牙末蜜水調服

聚寶治惡刺入肉

肉桂去皮末鎔黃蠟丸看瘡大小任磨內重濕紙

蓋火煖鎔入肉刺出

骨鯁第二

千金治魚骨鯁

鷓鴣屎服方寸七又口稱鷓鴣則下又橘皮湯沙

糖魚經灰一雀首虎狼屎灰猪膏和雞子可選吞

治食中吞髮繞喉

亂髮及酒調一錢

幼幼新書

卷三十九

四

食土第三

千金肉一片繩繫曳如行人數里勿洗火炙喫妮和

衆候合市時買羊肉一斤水洗火炙未食兒煮食

經驗膩粉一分沙糖和丸如麻子空心米飲下一丸

瀉土愈

妮和衆好土濃煎黃連汁搜日乾服

落水第四

千金竈中灰布地厚五寸甑側灰上令死人伏甑上

頭下垂抄鹽二方寸七內竹管吹下孔中即吐水

水下去既下死人着灰中雍身使出鼻口即活或

埋灰中頭足俱沒惟開七孔一熱灰蓋熱沙亦可

又倒懸死人好酒灌鼻中又灌下部又酢灌鼻

又綿裹皂莢石灰內下部須臾水出

又倒懸解衣去臍中垢極吹兩耳起一灸臍中經宿活

又屈兩脚着生人兩肩上死人背向生人背即負持

走吐水自活

治冬月落水凍四肢直口噤尚有微氣

大器中熬灰煖囊盛傳心上冷即易心煖氣通目

轉口開可溫尿粥稍吞之若不先溫心便持火炙

身冷氣與火爭即死

遺尿第五

巢氏足太陰為膀胱經足少陰為腎經二經為表裏

腎主水氣下通于陰小便者水液之餘膀胱為津液

之府既冷氣衰弱不能約水故遺尿

千金

瞿麥 龍膽 阜莢 桂心
石韋各半兩 雞腸草 人參各一兩 車前子各六兩

錄五 未蜜丸食後服如小豆五九加至六七九日三嬰

孺多染螺蛳炙一錢自死肉雞腸十二分

又小豆葉汁服嬰孺小豆末乳調

外臺失禁不覺尿出

豆醬和竈突墨如大豆許內尿孔中

聖惠雞肚脰散

雞肚脰一具 桑螵蛸炒三 甘草炙一 黃耆

牡蠣燒各半兩

粗散一錢水小盞煎六分量服

牡蠣散治遺尿體瘦心煩不食

牡蠣粉 桑螵蛸炒 龍骨各三 甘草炙一

麥門冬 雞腸草 白茯苓 黃耆各半

庶散一錢水小盞薑少許煎二枚煎六分量服

千金灸臍下一寸半隨年壯又灸大敦三壯

尿床第六

千金羊肚盛水滿線纏兩頭熟煮取中水頓服

又雞肚脰一具并腸燒末酒服男雌女雄

又羊胞盛水滿炭灰燒盡肉空腹食新炊熟餅一瓊
拌屎床處與食勿令知
垂兩手兩髀上盡指頭上有陷處灸七壯又灸臍下
橫文七壯

狐臭第七

巢氏人氣血不和腋下如野狐氣名狐臭此氣能染
易着人兒是母染

千金天生臭者無治人染者易差須三年醋傳礬石
為散勿言暫傳即差并服五香丸

幼幼新書

天卷三十九

七

五香丸治口及耳臭令香止煩散氣

豈菴

丁香

藿香

零陵香

青木香

白芷

桂心各一兩

香附二兩

甘松

當歸各半兩

檳榔二枚

末蜜丸常含一九如大豆嚙汁日三夜一五口
香十日體香二七日夜被香三七日下風人聞香
四七日洗手水落地香五七日把他人手亦香慎
五辛下氣去臭

又

辛夷

芎

細辛

杜蘅

藁本

等分咬咀水和酒浸一宿煎汁隨時傳差為度

石灰散

石灰兩半

青木香

楓香

薰陸香

丁香各二兩

橘皮

陽起石各三兩

礬石四兩

篩綿作篆粗如指長四寸展藥絹袋盛着腋下先
以布指令痛

又檨葉三升水五升煮一升洗腋下即以白苦瓠一

幼幼新書

卷三十九

八

枚燒煙熏之數次差

又馬齒菜少許搗蜜和團絹袋盛濕紙裹厚半寸曝

乾燒熟破更以少蜜和使熱先以生布指夾藥腋

下痛難忍後以手巾勒兩髀

又三年苦酢和石灰傳

千金翼二月社日盜社家 一團猥地摩腋下三

七遍擲五道頭勿令人知

諸虫咬第七

千金治蛇肘後蝎螫

小蒜汁服澤傳又葵汁服

千金治蛇噬

人屎厚塗帛裹即消蝮蠟注瘡上母猪耳中垢傳

肘後牛耳垢

聖惠白礬甘草等分羅如蛇咬心神煩躁眼前暗黑

新汲水調半錢如腫赤白礬鹽漿水蒿苳根等分

煎三五沸淋洗腫消如未及合藥用耳塞入咬處

醃醋渣少許

又合口楸炙蒼耳苗各一两搗傳又去目生楸三兩

幼幼新書

卷三九

九

炒黑豆豉三合搗羅津調傳又嚼遠志爛傳

千金治蝎毒

蝎雄者咬痛止一處雌者痛牽諸處雄者并底泥

塗雌者屋瓦溝下泥傳若值無兩用新汲水屋上

淋下取泥齒中殘餘猪胎射罔砂水和並可傳

若着手足冷水漬水微煖則易餘處冷水浸故帛

搗生烏頭末津和傳

聖惠半夏桂心並水磨嚼乾薑研大蒜並可塗

千金治蜂螫

瓦子嚙摩其上二七遍置瓦故處蜜猪脂各五合

蠟二兩煎如膏冷塗牛屎灰苦酒和蜂房末膏和

聖惠多白礬 肘後蜂房湯洗酥胎淳酢沃地取泥嚼鹽

尿泥手捻地上土可選傳新入尿洗

千金蜘蛛咬

人屎油淀炮薑狗屎糞烏麻油和胡椒如泥皆可

傳

譚氏治蜘蛛咬遍身瘡子葱一枝去尖頭作孔將鮑

引入葱葉中緊埋兩頭勿泄氣頻搖動即化水點

幼幼新書

卷三九

十

咬處

聚寶生油調豉塗

張銳嚼薤白塗

千金治犬噬

杏仁熬黑研膏竈中熱灰粉帛裹沸湯和灰燒犬

尾末燒自死蛇焦末鼠屎臘猪胎和一作熱牛屎

火炙蠟並可傳

又水洗瘡任血出令自止綿裹又于月一日水一升

灌勿令狗主打狗若月盡日三升水灌

聖惠地龍糞傅毛山差乾薑末傅

千金治狂犬咬

生薑汁韭汁任傅外臺治已

千金翼葛根末或飲其汁或葛灰水服方寸匕

千金治猪齧

松柏煉餅貼屋溜中泥塗

聖惠蜈蚣咬

頭垢苦參等分末酒和塗桑白皮汁活蝸牛薑汁

煎膏入礬葉葉端午栢葉生鐵衣等分末油和如

幼幼新書 卷三十九

膏火灸瘡塗雄黃麝藍汁和五加皮一两半夏四

兩灰醋和擣拔葵苗白殭蚕末津和雄黃麝葱白

汁調醋熬白礬任傅

聖惠猫爪并咬

剪刀草擣汁塗

頭多生虱第九身虱

巢氏按九虫論虢虫多變化亦變虱兒頭櫛沐不時

則虱生多嚙頭遂生瘡瘡處虱聚也謂虱窠然人體

性偏多虱者

嬰孺水銀黑豆大油棗大掌中唾研塗頭皮薄遍帛

袋半日除

王氏治頭身多虱

百部嚼頭身遍塗虱自死或焙乾水調塗或乾搽

損撲損瘰第十

巢氏血隨氣行常無停滯若墮落損傷即血行失度

隨傷處即停若流入腹亦積滯不散皆成瘀血瘀血

在內面色痿黃氣息微喘瀯瀯小寒喻喻微熱時或

刺痛

幼幼新書 卷三十九

千金蒲黃湯治隨地有瘀血腹中陰陽寒熱不胃乳

哺但啼哭

蒲黃

大黃

黃芩

門冬各十

甘草各八

芒硝各七

黃連各十二

咬咀水二升煮一升內芒硝分三服羸瘦小之大

小便血愈忌冷食

當歸散治隨地諸傷腕折解痛不止

當歸

桂心

附子

蜀椒各二

芎

甘草各五

澤蘭各一

熬香篩酒服方寸七日三十日愈

千金翼主被打腸中瘀血馬蹄散

白馬蹄燒酒服方寸七日三夜一女人血病消之為水

蒲黃散治同上

蒲黃升一 當歸 桂心

等分篩酒服方寸七日三夜一

聖惠蒲黃散

蒲黃 川大黃炒 當歸炒 琥珀

幼幼新書

卷三十九

十一

生地黃 赤芍藥各半 桂心一分

粗羅一錢水小盞煎五分不時量服

地黃散治墮落傷損青瘀疼痛

生地黃兩半 川大黃 當歸炒 桂心

赤芍藥 蒲黃 瓜仁 桃仁各一分

分

羅不時酒生地汁各半合溫調量服

犀角散治落床體熱疼痛

犀角 赤芍藥 芩 當歸炒

甘草炙各一分 川大黃兩半

羅一錢水小盞煎五分不時量溫服

茯神散治落床體熱驚悸

茯神兩半 龍膽 人參 子芩

犀角 麥門冬焙 甘草炙各一分

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫量服

張渙蒲黃湯治打撲墮地吐氣羸瘦痿黃或刺痛遊走不定與聖惠蒲黃散同少大黃

茯神丹

幼幼新書

卷三十九

十四

茯神 麥門冬 當歸各一分 人參

黃芩 龍膽草各半 桃仁炒香

未鍊蜜丸粟大生地汁同酒下十粒量加減

誤吞銅鐵物第十一

外臺小品論兒誤吞鐵珠經年不為害後瘦嗜食不生肌時下利或寒熱服藥反劇診之云是吞物不消

不去終不差凡鐵得土木濕皆生屑易朽人身中經

數歲因得血氣皆朽

千金治誤吞針

取棗核大磁石吞或含之針立出聖惠磨磁石如棗核鑽竅以絲穿含吞之吸出懸針磁石末飲服

治吞錢 艾蒿五兩水五升煮一升頓服木炭末酒服方寸七服蜜二升

治吞金銀釵鏢拍彊 白糖漸食多益佳雁毛戴毛灰飲服

又曝並令萎蒸熟勿切食一束或生麥葉筋縷多食自消

幼幼新書 卷三十九 十一

又燒銅擊牙赤內酒中飲

治誤吞釘針箭鏃

多食脂肥肉令飽自裹出

外臺療吞梅李

少水灌兒頭盛其水與飲

療吞錢在喉

麩炭末拍彈入喉中當咯出

日華子誤吞鐵針錢

磁石末同筋膜肉莫抹斷同下

藥性治惡瘡兒吞錢

煮冬葵根飲

聖惠治誤吞錢物在喉

南燭根灰湯調下獮齒骨灰磨刀水調服一錢

誤食髮統喉

梳頭梳灰粥飲調半錢

誤吞鈎繩尚在手莫引之以珠璫若穿了意以子

輩就貫着繩稍令推至鈎處小小引之則出常思

草頭一把水一盞絞汁飲琥珀珠穿貫鈎繩上推

幼幼新書 卷三十九 十一

令前入至鈎所又復推以牽引出矣

靈苑玉錯散治一切骨鯁或竹木簽刺喉中

蓖麻仁一兩研膏旋入寒水石末乾成散取一捻

致舌根深處冷水嚥鯁物自不見

嬰孺誤吞錢

泉頭一把水二升灌水中十餘度飲

治鯁若吞錢

半夏仁 白飲

末酒薑汁服方寸七

張渙治誤吞錢物鈎繩之類在喉

象牙燒

戴羽燒

磁石阜子

羅半錢新汲水調

莊氏治誤吞錢神應丸

朱砂錢

大半夏三枚

石腦油和

二味稀

綱得所

研丸如豌豆空心食前酒吞三丸日三物隨大便

下

又羊脛炭研極細砂糖湯調三大錢日五臨睡一

幼幼新書

卷三十九

十七

又舊經穿錢麻索十條完全者熨斗內精炭火燒灰

研細沙糖湯調三大錢不時日五錢索帶青者為

上

王氏治誤吞錢

濕榆白皮搗爛新水調半匙乾者羅

耳中有物不可出第十二

千金弓弦從一頭令散傳好膠柱耳中物上少停相

着徐引出

孔氏治阜子入耳阜內

活蚯蚓一條蘿蔔同搗黏同麻錢貫三五寸剪斷
令散點蚓膏入耳阜黏出

滅癩痕第十三

千金猪脂三斤飼烏雞三日盡取白屎內白芷常歸

各一兩煎色黃去滓內鷹屎白半兩攪傳日三

又禹餘糧半夏等分末雞子黃和新布拭癩令赤塗

勿見風日二十日差十年者亦滅

又方

鷹糞白合

辛夷兩一

白附子

杜若

幼幼新書

卷三十九

十八

細辛各半

吹咀酒五合浸一宿羊髓五兩微火煎三上下小

傷癩上傳日三

又人精和鷹糞白傳日二白蜜亦得

治癩痕凸出

春夏大麥麩秋冬小麥麩細絹篩酥和封又熟瓦

凍凌熨

又臘月猪胎四升大鼠一枚煎消盡生布拭去皮塗

譚氏療痘瘡癩痕面靨

蜜陀僧研水調夜塗旦洗

中食毒第十四

千金治飲食中毒煩滿

苦參三兩咬咀酒二升半煮一升頓服取吐

治食六畜肉中毒

六畜乾屎末水服自死六畜肉毒水服黃蘗末方

寸七頃更復與燒小豆一升末服三方寸七水服

竈底黃土水服

治食生肉中毒

幼幼新書

卷三十九

十九

掘地深三尺下土三升水五升煮五六沸取上清

飲一升

治中牛肉毒

狼肝及或猪肝水服方寸七温湯服猪胎水煮甘

草汁飲

治中猪肉毒

燒猪屎末服犬屎亦佳

治食百獸肝毒

服猪胎一斤亦治陳肉毒

治食野味馬肝肉諸脯肉毒

頭垢如棗核大吞之起死狗屎灰水和絞汁飲猪

骨灰水服

治漏脯毒張文仲云茅簷水沾脯

韭汁大豆汁服

治鬱肉濕脯毒

燒狗屎末水服生肉熟肉皆不用深藏密蓋皆殺

人肉汁密蓋氣不泄亦殺人翼水服犬屎灰

治脯在黍米中毒

幼幼新書

卷三十九

二十

麴一兩水一升鹽兩撮煮服

雉肉作餅臛因食皆吐下

服犀角末方寸七得靜甚良

食鷲鳥肉成病胃滿面赤不下食

服秫米泔若雞子毒溲醋解

治食魚中毒面腫煩亂及中鱸魚毒欲死

煮橘皮停冷飲多飲蘆根汁并治蟹毒

治食魚鱸不消

大黃三兩朴硝二兩酒二升煮一升頓服馬鞭草

汁生薑魚皮灰水服

治蟹毒

食冬瓜并汁

治食菜毒

甘草貝齒胡粉等分篩水服方寸匕兒尿乳汁共

服二升

治食菌毒

人屎汁服一升又地漿

治食百物中毒

幼幼新書

卷三十九

十一

握廁傍地深一尺水滿廁籌七枚燒煙盡投坑中

飲水四五升急者掘地着水飲含貝子一枚吐食

物差

黃帝云猪肉炒豆不得與十歲內兒食食者噉猪肉

必擁氣死

千金翼凡六畜五藏着草自掘得醋益不變色及隨

地不汗與犬不食者皆殺人

凡食飲有毒者澆地地墳起者殺人

本草粟食飼兒齒不生寶鑑腎氣弱行濕

食蕨兒脚弱

越瓜瓜口不益兒天行病後勿食勿與牛乳酪及酢同

餐空心食令心痛食療發諸瘡令人虛弱冷中為

癥痛寶鑑發動多疾

陶隱居食蕨不利人脚恐閉氣故兒食覺脚痛孟詵

久食虛弱損陽氣消精髓蕨似蒿麥蕨赤蔓生濕地南人好生食開謂蕨菜

陳藏器食無鬚蝦主五野雞病煮熟色正赤兒及雞

犬食脚屈不行熱飯盛密器中作酢食殺人

食療雞兎同食成泄痢五歲內未斷乳者勿食雞肉

幼幼新書

卷三十九

十一

楊氏產乳食菜堪令兒心寒

寶鑑慎忌

食黍米飯立無力

食蕨立無力

食雞肉腹中有虫陶作虫

食胡瓜胡瓜滑中生虫

食芡不能行

食蕎麥髮落

食鳧並臍下痛

食鱗魚腹有癥癖

中藥毒第十五

巢氏兒有患腸胃脆弱不勝藥氣致煩毒名中毒
千金甘草解百毒有中烏頭巴豆毒甘草入腹即定
中藜蘆毒宜葱湯中野葛毒土漿驗如反掌要使人
皆知之方稱大豆汁解百藥毒大不及甘草甘豆湯
尤奇有服玉壺丸治嘔不已百藥不止藍汁入口即
定此皆成規

百藥毒

幼幼新書

卷三十九

七

甘草

薺芫

大小豆汁

藍汁實汁

根汁

食藥毒

白烏糞

人參汁

雄黃毒

防已

礬石毒

大豆汁

白戴膏

金銀毒

服水銀數兩即出鴨血及屎汁鷄子汁及屎白燒

猪胎和服水淋雞屎汁煮葱汁

鐵粉毒

磁石

防葵毒

葵根汁

桔梗毒

白粥

甘遂毒

幼幼新書

卷三十九

七

大豆汁

芫花毒

防已

防風

甘草

桂汁

大戟毒

菖蒲汁

野葛毒

雞子清

併吞兩
個即吐

葛根汁

甘草汁

烏頭熱血

猪膏

人屎

雞屎

藜蘆毒

雄黃	煮葱汁	溫湯
烏頭天雄附子毒		
大豆汁	遠志	防風
飴糖		棗肉
射罔毒		
藍汁	大小豆汁	竹瀝
六畜血	貝齒	蚯蚓糞
半夏毒		藕芰汁
生薑汁	煮乾薑汁	
躑躅毒		
梔子汁		
葭若毒又悶亂如卒中風或似熱盛狂病飲藍青汁		
薺菜	升麻	犀角
狼毒毒		蟹汁
杏仁	藍汁	白飲
大占斯		藍汁
巴豆毒		
黃連湯	大豆汁	菖蒲汁
		生薑汁

寒水石湯		
蜀椒毒		
葵子汁	桂汁	豉汁
冷水	土漿	蒜
煙汲水調毛灰服		燒雞毛吸
班猫荒青毒		
猪膏	大豆汁	戎塩
巴豆	塩湯煮猪膏	藍汁
馬刀毒		
清水		
杏仁毒		
藍子汁		
野羊毒		
土漿	人糞汁	
一切毒藥發不問草石覺惡即服		
生麥門冬	葱白 <small>各八兩</small>	豉 <small>三升</small>
咬咀水七升煮二升半分三服		
雞腸草散解諸毒		

雞腸草分三 薺芫 升麻各四 芍藥

當歸 甘草各二分 藍子各一 至土各一

篩水服方寸匕多飲水佳蜂蛇毒虫螫刺血出着

藥小豆許令濕差為射罔箭所中削竹如釵股長

一尺五寸綿纏繞水沾酒取藥內瘡中隨深淺令

至底血出即休若服藥有毒水服方寸匕毒解痛

止

解毒藥散

薺芫各一 藍并花

切切新書 卷三十九 廿七

七夕收藍陰乾搗篩水服方寸匕日三

又奏鷲毛二七枚燒灰服

解一切毒母猪屎水服又水三升二合和米粉飲

解鳩毒及一切毒藥煩滿

水五升煮甘草四分取二升去滓歇火熱內梁米

粉一分白蜜四分更煎如薄粥飲一升

治野葛毒已死口噤

青竹去兩節柱兩脅臍上內冷水注煖即易須臾

口開即服藥翼忌酒

治鈞吻毒欲死面青口噤逆冷身痺鈞吻菜食芥

他草莖有毛誤食殺人

薺芫八兩水六升煮三升冷如人體服五合日三

夜二煮令濃桂汁葱涕藍汁任服

服藥過劑悶亂

吞雞子黃 藍汁 水和胡粉 地漿

藜荷汁 粳米 豉汁 乾薑

黃連 飴糖 水和葛粉

中水毒第十六

切切新書 卷三十九 廿八

千金凡山水有毒虫人涉水覺似射工而無物初得

之惡寒微頭痛目疼煩懊四肢振愀腰背百節強兩

膝痛或翁翁面熱欲睡旦醒夕劇手足逆冷至肘上

二三日腹中生虫食人下部肛中有瘡不痛不痒令

人不覺不急治過六七日下部潰膿虫上食五歲熱

盛毒煩下利不禁八九日不治矣始覺急視下部有

瘡正赤如截肉為陽毒最急如鯉魚齒為陰毒猶小

緩不過廿日死欲知是非小蒜咬咀投五七升湯中

勿太熱去滓浴身發赤班者是如無以他病治

治水毒梅桃葉汁三升或乾水絞汁飲兒傅乳頭喫

服蒼耳汁一升綿滓瀉下部服蓼汁

千金翼藍一把搗水洗面目遍身

又大梅根末飲并瀉下部生虫者用汁夏月用屑入

水浴以方寸七投水上流無所畏又辟射工

百病第十七

巢氏百病者由將養乖節或犯寒溫乳哺失時乍傷
饑飽致血氣腸胃不調或欲發驚癇或欲成伏熱兒
氣血脆弱病易動變證百端若見微證即治不成眾

幼幼新書

卷三十九

九

疾治晚病成凡諸病因汗出如珠着身不流者死如

顛陷唇口乾目皮反口氣冷足與頭相拄卧不舉手

足四肢垂卧正直如縛掌中冷十日死

千金治兒赤白痢及胡臭耳聾鼻塞等一劑三九三

劑萬病悉除故稱萬病以牛黃為主又名牛黃者婆

致方又名者婆丸

牛黃

麝

犀角

朱砂

雄黃

黃連

禹餘糧

大戟

芫花

人參

茯苓

乾薑炮

桂心

當歸

芎

芍藥

甘遂

黃芩

桑白皮

蜀椒

細辛

桔梗

巴豆淨

前胡

紫苑

蒲黃紙上

葶藶

防風各一

芫青七枚

石蜥一

蜈蚣三

搗重絹羅煉白蜜和更搗三千杵密封破除日平

旦空腹酒服三九如梧子微下三升惡水若暴病

不時服吐利為度不知加病強如若發遲投熱飲

吐利不止食醋飯兩三口忌陳臭生冷酢滑黏食

幼幼新書

卷三十九

三

大蒜猪魚雞狗馬驢肉一歲兒乳母服兩小豆亦

吐利為度近病卒病悉宜久積久病少服常微瀉

兒客忤驚癇乳不消心腹脹滿服米大二九塗乳

頭令啣不差更服

千金翼治胃病諸荒邪狂走氣痞冷病歷年黃黑大

腹水腫兒丁奚瘡疾經年霍亂中惡蠶尸暴疾

巴豆淨

斑猫淨

芫青各卅

天雄炮

乾薑各半

烏頭

附炮

細辛

蜀椒汗

躑躅

黃芩

桂心各一

細切絹袋盛酒一斗漬十日服半合日三知為度
曝滓作散酒服半錢強人一錢日三傷寒中溫濕
冷頭痛拘急瘡頭風服一錢覆取汗初服當吐清
汁又主心疝婦人無子服之煩悶飲冷水一升解
外臺深師鎮心丸療老小心氣不足虛弱時苦小語
勞則劇風邪百病

銀屑半斤 牛黃九 丹砂一作參 甘草炙
麥門冬 遠志各五 桂心 乾薑各六

曾蒲 紫苑各三 防葵 人參

切切新書

卷三十九

廿一

附炮 紫石英 防風 細辛

茯苓 楸汗各四分 檉子先食服三九日三不知加忌海

藻菘菜生菜猪肉生葱生血物飴

必效七宣丸

大黃十五兩 枳實炙 青木香 訶皮

柴胡各五兩 桃仁六兩淨熬 甘草炙四兩

篩蜜丸如梧子酒服廿九加至五十九意裁病在
下空腹服病在上食後服宣利為度風氣結聚宿

食不消兼砂石皮毛在腹中服經七八日延下似
牛涎魚腦等若痼疾半月一月專服之不用五補
丸三人所服此更不毒若積年腰膝疼痛寒冷如石脚氣衝
心潰悶將死頭旋暗倒肩背重悶心腹脹滿胃膈
閉塞風毒腫氣連及頭目及大小便或利或澀脾
胃氣不理不食夜卧脚轉筋脈掣痛恍然寢不安
等飲服輕病兼服五補丸循環滋養須量力細察
加減初生兒與三五丸取利禁如常法

絳雪療一切病肺氣積聚欬吐膿血丹石毒天行氣

切切新書

卷三十九

廿三

一切熱病諸疸等心風昏亂忪忡健忘四肢煩熱頭

痛眼赤大小便澀煩悶骨節疼痛赤白血痢熱毒痢

宿食不消心腹脹滿出氣不下一切毒藥脚氣等酒

困驚癇水服產後諸病隨胎酒服

朴硝十斤 升麻三兩 大青 桑白皮

槐花各二兩 犀角 羚羊角各一兩 蘇枋木六兩

竹葉握 訶皮 山梔子廿枚 檳榔廿顆

朱砂半兩 麝

水二斗漬一宿煎斗去滓內朴硝洋候欲凝出盆

中攪量入麝朱砂訖雪成坩器密封量水服以利
病除身輕目明四肢調造
備急丸療心腹諸卒暴百病

大黃

乾薑

巴豆

熬淨各一兩

搗篩密和更搗千杵丸如桐子或小豆量老小與
中惡客忤心腹脹滿卒痛如刺氣急口噤停尸卒
死煖水苦酒服或不下捧頭起灌下咽須臾差未
知更與腹中鳴轉即下口噤折齒灌忌蘆笋猪肉
冷水肥膩

切切新書

卷三十九

廿三

仙經製玄明粉朴硝為太陰之精華水之子也陰中
有陽踰玄明粉兒疳氣陰毒傷寒表證疫癘等疾
悉治久服身輕耳明駐顏延壽急解毒藥補益不
拘男婦老稚不問四時冷熱俱治一兩分十二服
臨時酌量覺壅熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食
不下煩悶急疾要宣瀉用藥一分至半兩桃花湯
為使最上次用葱湯食後隨冷熱服
經驗山豆根一名解毒一名黃結一名中藥患蠱毒
禁聲水研麩瘡水研傳喉痛含一片噤津五痔水

研服齒痛痛處含一片楚痘等瘡水研服頭風搗
末油調塗赤白痢蜜丸空心湯下廿九三服止腹
脹喘喘悶湯調瘡癰臘月猪脂調末塗頭上白屑
油浸塗兒乳汁調半錢患中宿冷寸白虫空心熱
酒調三錢虫出五般急黃空心水調二錢蠱氣酒
下二錢霍亂橘皮湯下三錢熱腫熱酒空心下三
錢卒腹痛水研半瓊蜘蛛咬嚙和塗狗咬虵蟻瘡
蛇咬並水研傳

切切新書

卷三十九

廿四

聖惠治兒百病變蒸客忤驚癇壯熱不解龍膽草散

龍膽

桔梗

人參

柴胡

黃芩

赤芍藥

釣藤

甘草

當歸

茯神

蜈蚣

大黃

羅散一錢水小瓊煎五分去滓分二服日三四

治百病加減四味飲

川大黃

蒸二炊飯久薄切焙兒小便赤少大便多熱則倍用

當歸

體骨多熱

多驚

赤芍藥

炒四肢多熱多驚便瀉青黃倍用

倍用

甘草

熱生用寒多泄多灸倍用

劉等分服一升水中盪煎五分溫量服日三四

牛黃丸治百病驚癇癩癩無辜癰疔濕閃癱天行急黃赤眼

牛黃 麝各半 夜明砂 飛 赤芍藥

杏仁 炒 赤茯苓 各一 真珠 甘遂 煨

巴豆霜 牡蠣燒各一分 虎睛仁 二枚

羅末鍊蜜和搗三五百杵丸如粟三月兒服如黍量加至如菉豆平旦粥飲下二九少時不吐利更

服一九投以飲下惡物

虎睛丸治百病寒熱鬼氣癰癧羸瘦諸痢驚癇腹脹

如幼新書 卷三十九 卅五

喘促痰結胃中滿悶

虎睛人 對 犀角 吳藍 赤芍藥

牽牛子 炒 牡蠣 燒 鼈甲 酥炙淨各半兩 巴豆霜 分

真珠 牛黃 桔梗 漢防已

杏仁 麩炒各一分

羅末鍊蜜和搗五百杵丸如菉豆湯下二九量加

靈苑萬病散一名無憂散諸風瘡腫疥癬藏府積冷

壅滯結為風勞膀胱宿冷藏府衰敗面黃癰癧氣塊

疳蝨攻心痛中寒腦痛狀如山嵐時疫急服宣轉三

五行差或中風口喎語蹇睡後涎出十日一服三服

永差久患腰膝疼痛拜跪艱難坐食不安進一兩服

兒疳痢脫肛量與男女久泄氣痢狀似休息一服搜

出冷痰一二升此藥並不困倦不妨行步服藥一兩

日後便覺身輕目明腰下減重頓思飲食婦人久患

血勞痿黃無力亦宜孕婦或遇癘晦勿服服後疾未

除將息三四日再服

黃耆 木通 桑白皮 陳皮

白朮 木香 胡椒 各半兩作一服別研置

如幼新書 卷三十九 卅六

牽牛子 微炒勿過熱頭末一兩

黃耆散二錢牽牛末二錢天色晴明五更薑湯小

半盞調藥頓服更以湯送平明宣三兩行下多不

妨應臟府百病悉出轉後喫一日白粥補

養生神麩治兒諸疾丙日作麩丁日治藥名丙丁膏

天南星 烏蛇肉 各三錢 麻黃 節去 天麻 各半兩

大附子 炮淨蠟粉一枚 白附子 三錢 白殭蚕 錢四

末水一升浸三日振澤寒食麩一斗和踏麩楮葉

卷七日紙袋懸十四日治兒吐瀉後精神困頓不

乳多睡入龍麝湯服變癩鷓聲面青黃癩痰咽中
不利朱砂龍麝麴服又滑痢麴末蜜丸雞頭大湯
化又麴一兩入朱砂雄黃少許琥珀甘草末各二
錢蜜丸雞頭大名太一丹

嬰孺治八痞積聚溜飲伏熱宿食不化裏急腹痛往
來寒熱羸瘦骨立飲食不為氣力多厭翕翕短氣魂
神不守邪鬼往來恍惚不定醫不能治太一決疑牛
黃雙丸

牛黃大棗 馬目毒公二個 附子一枚 巴豆炒四枚

幼幼新書 卷三十九 廿七

雄黃 丹砂 真珠 甘草

牡蠣煨 蜀椒汗 白蜜各一兩 杏仁炒淨五十粒

研末杵杏仁千下次入巴豆次牛黃真珠並杵又
銅器煎蜜熱灌口中下諸藥杵千下丸如桐子飲
服一丸一宿當和大便出勿復與藥兒一歲內寒
熱在脇結痛嘔乳吐下劇者癰瘕及背不着席手
足皆舉目青嘔沫名風癩為腹癰以小豆大二丸
平旦服日中臨卧各服二丸至十二丸不去服桐

子大二丸又不愈難治大病數年此藥決之破除
日合勿令婦人見一無甘草目毒有甘遂一兩常
山二兩

五參丸治百病熱毒

人參 苦參 丹參 元參

沙參各二分 柴胡 茯苓各四分 巴豆淨

蜜淨各十枚 黃芩三分 葶藶 杏仁淨各半合

末蜜丸飲下小豆大二丸日再不知加若心下食
不消用吐下一無黃芩柴胡茯苓杏仁加乾薑炮

幼幼新書 卷三十九 廿八

附各一分防風半分掛出汗半合

治五癰吐痢寒熱不乳百病大黃湯

大黃五兩 滑石 龍骨 常歸

芍藥 黃芩 桂心 甘草炙

人參 青石脂 牡蠣煨 石膏各二兩

粗末囊盛五歲下棗五枚水八合煮五合撮藥湯
中煮三沸絞滓先食盡服有乳痰即吐宿乳若下
宿乳當止中風汗出疔痛服後安卧衣蓋兒大量
加

治百病驚癇紫芝丸

紫芝 胡黃連 當歸 殺羊角

赤石脂 人參 馬齒炙各一分 川椒

杏仁 炸蟬 烏蛇 雀甕並炒

蜂房 丹參 乾薑 芍藥

龍骨 細辛 黃連 芎藭各二分

丹砂熬上下各五分 牛黃各五分 東門上雞頭炙一分

末一歲兒食前乳汁和丸如大豆二九日三不知加一有蜨娘桂心各三分主病甚多常帶令不病

切切新書

卷五十九

廿九

保童丸治諸疾一歲上無辜疳濕閃癖驚癇癩除天行赤眼面黃等

牛黃 夜明砂 甘草炙 甘遂

牡蠣 真珠 巴豆淨煮五七沸霜各一分

虎睛一分 芍藥 黃芩 杏仁淨各四分

末鍊蜜和杵三千下均器密封飲下三九蓐中兒

米大一丸量兒加利下覺虛喫蒸餅煮生赤棗五

六枚葱薤作羹大炒覺喫冬瓜羹數次及裹頭豉

粥妳毋同忌服藥後熱服炙蠶甲末飲下一錢

張氏太乙金華散

木香 桂心 白薑 陳皮

白蕪荑 當歸 白朮 吳茱萸各一分

大黃半斤 檳榔二枚一煎 黃連

巴豆水浸三宿逐日換淨研各半兩 肉荳蔻一枚 大附子一枚

阜莢一枚浸去黑皮半炮半酥炙無酥醋代

末研五百轉傾藥入鈿盞蓋定塘火灰上坐一茶

久開盞拭汗可五度逐轉以匙抄勺七日後可服霍亂首蒲湯陰毒傷寒發汗麻黃湯血氣當歸酒

切切新書

卷五十九

卅

一切風濕防已湯難產胎橫益母湯胎衣不下酒調腰脚痛薑葱酒產後血痢蘿蔔子酒兒疳氣葱

湯欬嗽桑白皮湯或杏仁湯食癥神麴湯吐逆生

薑湯瀉痢黃連湯脾氣茶下心痛蕪荑酒打撲損

煖酒下兒蛔咬心冷水妊娠氣衝心安胎酒下兒

腸頭出飢帶灰水調大小便不通茶下粥引赤白

帶下赤蜀葵湯脚痛履地不得酒下敗血不散米

飲血刺厚朴湯血汗曾卧竹簾灰湯酒疾酒下肉

疾肉汁下熱麩疾麩湯下脚氣冷茶五勞七傷猪

膽湯或柴胡湯瘰癧准上口瘡棗湯五疳乳汁肺
氣欬逆杏仁湯胃氣陳皮湯一切瘡腫白蜀葵湯
眼昏黑豆湯頭風髮落大黃湯邪氣中心髮灰湯
產後血衝心酒下胎動芎藭湯懷胎心痛蕪荑湯
懷胎痢艾湯大人一字兒量服
治兒驚疳變蒸傷寒瀉痢多嗽口瘡雀目疳虫咬心
至聖青金丹

青黛

雄黃

胡黃連

朱砂

膩粉

熊膽

蘆會

白附子

幼幼新書

卷三十九

中

幼幼新書

卷三十九

中

麝香

蟾酥

水銀

龍膽

鉛白霜

未獷猪膽

或如豆曝乾

九三五

中嚏噴

蒸薄芎湯

塗眼臯下

藥兩

九三五

日進

一服

驚風

天癩眼

上搗

湯化

渣臯

化渣臯

久瀉痢

米飲

疳眼

乳汁

下雀目

批開

羊肝

入

藥兩

九

麻縛

米泔

煮熟

空

心喫

一二

日

進

一服

無別疾一蟬殼二分龍齒一分又以麝香水和糯
米丸

王氏萬安丸

明淨乳香

辰砂

木香

安息香

巴豆

飯丸

先研辰砂次巴豆朱砂木香乳香安息香研勻軟
飯丸真酥潤手如棗豈湯送三五丸

江特草閣刊

幼幼新書卷第三十九

江特草閣刊

車樊之刊

幼幼新書

卷三十九

中

幼幼新書卷第四十 論藥叙方 凡十五門

後學古吳陳履端于始輯

金閭吳道行一之校

玉石部第一

丹砂

一名真朱

雲母

楊楨之云黑者害人

石鍾乳

幼幼新書

卷四十一

本草云不煉服之令人怵

朴硝

本草云黃者傷人赤者殺人

滑石

雷公云色白青似冰畫石上有白膩文者可用餘

者殺人

石膽

一名膽礬

綠青

一名石綠

黃鹽

陶隱居云北海鹽黃草粒粗以作魚鮓及鹹菹

石亭脂

俗以生硫黃中揀色赤黃者

水銀

一名汞陶隱居云燒時飛着釜上及名汞粉俗名

水銀粉

凝水石

幼幼新書

卷四十一

一名寒水石色如雲母可析者良

鐵藝

陳藏器云以竹木藝火于刀斧上燒津出如漆者

是方中云鐵上燒取諸

鐵華粉

一名鐵衣一名鐵焰粉鐵印粉鐵精粉鐵粉

光明鹽

一名石鹽

伏龍肝

一名竈心土或云竈底黄土釜下土釜月下土

礬石
本草云不煉服殺人

錯墨

一名釜底煤亦名釜墨百草霜鍋底煤

粉錫

一名胡粉亦名定粉光粉南粉英粉韶粉或用燒

粉家洗瓮水

戎鹽

切切新書

卷四十一

三

本草云西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南

海赤陶隱居云河南鹽池有凝鹽如石片打破皆

方青黑色今言青鹽或是戎鹽

大鹽

唐本注云即河印鹽

白堊

一名白善日華子云入藥燒用或云白繕土白土

畫粉

金牙

日華子云入藥並燒淬去粗汁用

井泉石

本草云細研為粉不爾使人淋

草部第二

羌蔚子

一名益母草

獨活一名羌活

陶隱居云羌活形細多節軟潤氣息猛烈獨活色

微白形虛大

切切新書

卷四十一

薯蕷

一名山藥

澤瀉

扁鵲云多服病人眼

遠志

本草云葉名小草

赤箭

唐本注云芝類或云赤箭芝

蘼蕪

本草云芎藭苗

黃耆

一名蜀胎

决明子

一名馬蹄决明草决明

旋花

一名鼓子花

蘭草

一名都梁香

幼幼新書

卷四十一

五

蛇床子

日華子云入服食藥按去皮殼取仁微炒殺毒用

地膚子

唐本注云田野人名地麥草

景天

一名慎火又護火草

茵陳蒿

一名山茵陳

杜若

一名杜蘅

菜耳實

一名常思又蒼耳俗呼道人頭

當歸

雷公云頭節破血尾止血止痛

麻黃

陶隱居云根節止汗沫令人煩

蠶寶

一名馬蘭子

幼幼新書

卷四十一

五

白芷

本草云葉名蒿音麻可作湯浴

淫羊藿

一名仙靈脾

黃芩

圓者名子芩

白蘚皮

一名白羊蘚

石韋

本草云去黃毛微炙

惡實

一名牛蒡子鼠粘子

王瓜根

一名土瓜根陳藏器云有小毒宜少進之

防已

本草云文如車輻理解者良唐本注云青白虛軟者名木防已

懷香子

幼幼新書

卷四十一

七

一名茴香子土茴香

補骨脂

一名破故紙俗名蕃韭子

零陵香

一名薰草

續雪草

一名連錢草

烏頭

一名烏喙汁煎之名射罔

草蒿

一名青蒿

鈎吻

一名野葛

射干

一名烏扇烏翼

蛇合

一名蛇衛

蜀漆

幼幼新書

卷四十一

八

本草云常山苗

藿菌

一名藿蘆

澤漆

本草云大戟苗

貫衆

一名管仲

牙子

一名狼牙

商陸

一名章陸章柳方中名中庸唐本注云有二種白入藥赤見鬼神甚有毒可貼腫服之傷人痢血不巳死

菰根

一名菰蔣草

菰蓄

一名扁竹

稀莨

切切新書

卷四十一

九

一名火欬草

白頭翁

一名野文人

鬼臼

陶隱居云馬目毒公如黃精根白處似馬眼而柔潤鬼臼似射干木輩有有二種然二藥實一物

女青

本草云蛇銜根

蛇莓

一名蛇胞子

赤地利

一名山蕎麥

蚤休

一名紫河車

烏蘇莓

一名五葉莓

蒲公草

一名鳧公英又僕公英

切切新書

卷四十一

十

昨葉何草

一名瓦松

屋遊

一名瓦青衣即瓦屋上青苔

草三稜

一名雞爪三稜

木部第三

牡桂

一名桂枝桂條非身幹

松胎松黃

一名松糖又歷青松黃即松香

柏杞

一名地骨又西王母杖

五加皮

一名豺漆

楓香胎

一名白膠香

雞舌香

幼幼新書

卷四十一

十一

一名丁子香

桑根白皮桑耳

本草云皮出土者殺人桑耳一名桑菌又名桑黃

梔子

一名越桃皮薄而圓小者入藥大而長者不堪

紫銚音其騏轔一名竭

本草云二物大同小異別本云二物同條功效全

別

紫葳

本草注云即凌霄花

梧桐淚

一名胡桐律

白棘

一名棘鍼圖經云直者補鈎者入癰腫藥

仙人杖

本草云笋欲成竹時死者色黑如漆

衛矛

一名鬼箭

幼幼新書

卷四十一

十一

大腹

孫真人云鴉鳥多栖此樹酒先洗又大豆汁洗

伏牛刺

一名隔虎刺

救月杖

本草云月蝕時救月擊物木

蜀枲

本草云口閉者殺人

棟實

一名金鈴子川棟子

郁李仁

一名車下李

莽草

本草云用沐勿服

無石子

一名沒石子墨石子

雷丸

本草云赤者殺人日華子云炮用

切切新書

卷四十一

十三

榭皮

葛洪云赤龍皮

鼠李

一名牛李

小蘗

一名山石榴

赤瓜木

一名鼠查

榼藤子

一名象豆日華子云炙用

薯蓣

一名豬薯

人部第四

黃龍湯

陶隱居云別塞空甕口內糞倉中積年得汁甚黑而苦日華子云臘月截淡竹去青皮浸滲取

獸部第五

白膠

切切新書

卷四十一

十四

一名鹿角膠

羚羊角

陶隱居云耳邊聽之集集鳴者良

犀角

本草注云見成犀物皆被蒸煮又有特犀並不堪用特犀文理細膩斑白不明

虎骨虎膏虎膽虎睛

陳藏器云中毒自死者傷人

狸骨狸屎

唐本云家裡亦好一名猫

震肉

本草云畜為天雷霹靂者

脛胛臍

圖經云置睡犬旁忽驚跳若狂者真

禽部第六

雄雀屎

一名白丁香

燕屎

幼幼新書

卷四十一

十五

陳藏器云勿入口毒人

伏翼

一名蝙蝠仙鼠

天鼠屎

一名夜明砂

蟲魚部第七

龜甲

本草云勿中濕日華子曰卜龜鑽遍者名敗龜

乘鰲蛸

本草云蛸蛸蝦子火炙不爾令人泄乘上者良

海蛤

細如巨勝潤光淨又一種名魁蛤形如紡車音小

狹長外有縱橫文理與海蛤異

烏賊魚骨

一名海鰲蛸

白殭蚕

本草云直者佳中暑有毒

石龍子

幼幼新書

卷四十一

十六

一名蜥蜴蝎虎守宮壁宮子

蝦蟇

一名蟾蜍蟾大者名田父

白頸蚯蚓

一名地龍

蚌蛇膽

本草注云取粟大着水中浮游行走者真多則亦

沉散

蛇蛻

藥性云白如銀者良

蟾蜍

一名土蜂

蜈蚣

本草云赤頭足者良日華子云炙用

水蛭

陳藏器云雖火炙得水猶活日華子云細剉微火炒色黃乃熟不爾入腹生子為害

斑猫

物類新書

卷中十

十一

日華子云除足羽熟炒生即吐瀉

地膽

一名虻青青蛙

羌青

斑猫羌青地膽糯米炒米黃黑即熟出去頭足翅羽更以亂髮畏掛屋東祭一宿用毒去

貝子

一名貝齒

雀瓮

一名棘刺子天漿子雀兒飯瓮

白花蛇

圖經云頭尾一尺內有大毒勿用

蜚蠊

本草云炙置水中令人吐

蝟

本草云緊小者名蝟斬良

蝮蛇

陶隱居云腰以前甚澀腰以後甚利

物類新書

卷中十

十一

鯪鯉甲

一名川山甲

鼠婦

一名溼生虫陶隱居云鼠在坎中背則負之又名

鼠負

衣魚

一名白魚衣中白魚今呼鱗魚

果部第八

蔓蕨

一名草豈豈俗呼草葉

枇杷葉

藥性云火炙拭去毛

桃裏

一名桃奴實着枝不落者

杏仁

本草云雙仁者殺人

米部第九

胡麻

幼幼新書

卷四十一

十九

一名巨勝葉名青葉

小麥奴

陳藏器云麥苗上黑蘗

醋

一名苦酒

腐婢

本草云小豈花

嬰子粟

一名御米

米部第十

蕪菁

一名蕪菁

石胡荽

一名戴不食草

香蒿

一名香柔香戎

本草雖無而人可識者第十一

西鮮土

今多用

幼幼新書

卷四十一

二十

夕陽久照受日氣多

胞衣餅中水

餅中久化為水

蟬距

蟬蛻前二足為距

救月蝕鼓皮

月蝕夜搗鼓救月之皮

釜月下灰

釜月釜耳也

勞水

載三揚之力乏為勞水如敗車轄之為勞辛水

苦龍魚

黃姑魚中有頭大而鱗生赤黑斑者

滅杖花

似紅木香生紅花漸白而微香其木有刺人呼為

野薑微

獨角仙

林木上多有之似夾鼓虫而角獨色黑而粗硬可

幼幼新書

卷中十

十一

畏

鴉

翻彼飛鴉集于洋林鴉鴉惡鳥也俗呼木克又禿

崇

遊絲

茲蒂

地尾

車前草按首卷茅管車前也王氏謂能使人有子
國風采芣后妃之美也和平則婦樂而有子

烏牛菴草

烏牛食草而菴之者

土狗子

形似蜈蚣

本草既無而人未識者第十二

皮巾子

托胎或云今托胎

乳雀魚

竈橫麻

幼幼新書

卷中十

十一

花消

海附子

龍骨草根

黃皮

蕪子

鹿活草

山瞿麥

大苺草

狗虫

窮賊子

石地松

獨脚瓜

山槐

土消花

鈴石

靈石

紫金粉

紫龍水

幼幼新書

卷四十

廿三

赤消

羊消花

魚荖子

前代方書第十三

黃帝內經素問

黃帝與岐伯鬼史區革問難之書

顛顛經

世傳為黃帝書至周穆王時師巫得之于崆峒洞

今不可攷

石鐔經

或傳黃帝時書疑未必然得之湘陰士人朱中立不倚

金匱要畧

後漢張機作機字仲景前此其書未出至國朝翰林學士王洙在館閣時于蠹簡中得之

華佗尤疾

後漢華佗誤佗字元化沛國譙人

葛氏肘後

幼幼新書

卷四十

廿四

晉葛洪誤洪字稚川丹陽句容人今書三卷按考

晉史本傳云肘後要急方四卷

此莫究所從出世言龍木王菩薩書

玉訣 三十六種 四十八候今書中稱形証論

玉訣太元真人誤三十六種四十八候皆託神仙

所傳得之長沙諸醫

近世方書第十四

聖惠方

國朝

太宗皇帝太平興國中編

聖濟經

國朝

徽宗皇帝御製

太醫局方

朝奉郎尚書庫部郎中陳師文等編

證類本草

唐慎微纂傳失其邑里族氏

良方

切切新書

卷中十

廿七

眉山蘇子瞻夢溪沈存中所論方

活人書

奉議郎朱肱字翼中撰

養生必用

初虞世紹聖中編

嬰童寶鑑

太湖釣叟栖真子撰

茅先生方

少室山無夢茅先生

博濟方

太原王袞撰

靈苑方

不載立方人姓名

漢東王先生

不載名字

萬全方

劉元賓撰元賓字子儀號通真主邵州邵陽縣簿

錢乙

切切新書

卷中十

廿七

太醫丞乙字仲陽汝上人

保生信效

閻孝忠編孝忠字資欽許昌人

傷寒證治

信陽太守王寔編

張渙

張渙編總方四百二十道長沙兒醫丘松年又得

遺方四十首不載諸門

全生集

宋道方撰道方字義叔拱州人

譚氏殊聖

洪農譚永德撰永德沛國下邳人

旅舍備急方

痘疹論

二書皆隱士董汲撰汲字及之東平人

丁左藏方

西京左藏庫使丁信臣

九箴衛生

幼幼新書

卷四十一

世七

宗室右監門衛大將軍忠州防禦使士紆編

劉沫瘡疹訣

彭城劉沫撰沫字道源

雞峰備急

蜀醫張銳編字子剛

楊太鄴方

翰林待詔楊太鄴方得之今湖北范運使家藏

惠眼觀證

宜黃戴師悞衍翰林醫學梁逢老誤得之前宗正

張蔡衡子周家藏

嬰孺方

得之湖南撫幹向澹伯海云相傳出子秘閣凡十

卷近崇文總目求遺書有兩嬰孺方卷目皆同不

載作者姓名

脈法要略

膏盲灸法

莊氏家傳

三書皆知筠州莊公手集得之其子監潭州都作

幼幼新書

卷四十一

世七

院念祖泉伯

鳳髓經

飛仙論

寶童方

聯珠論

保信論

惠濟歌

吉氏家傳

七書得之前岳州平江令吉撫之謙伯家藏並不

載作書人姓名唯吉氏家藏謙伯手集

聚寶方

不載作書人姓名得之長沙醫工鄭愈

五關貫真珠囊

不載作書人姓名得之長沙醫工毛彬

士大夫家藏第十五

張氏家傳

知撫州張徽猷家藏

陳防禦家傳

切切新書

卷四十一

十一

湖南城路鈴家藏

孔氏家傳

孔恭議家藏歸東家書

吳氏家傳

湖南運幹吳袞魯山家藏

趙氏家傳

江西運幹趙翎季羽家藏

睢陽王氏家傳

前潭州簽判王昇伯陽家藏

董氏家傳

知潭州醴陵縣董瑛堅老家藏

陶氏家傳

知潭州善化縣陶定安世家藏

朱氏家傳

潭州司理參軍朱如山季高家藏

班防禦方

京師醫官

胡氏家傳

切切新書

卷四十一

十一

長沙仕人胡晰然明家藏

朱氏家傳

朱不倚家藏

安師所傳方

建安僧惠安傳

相濡

易忠信

李副中

丁時發

王允

丁安中

劉之才

丘松年

毛彬

鄭愈

蕭景仁

十一家皆長沙醫工或醫者之子傳

劉氏家傳

幼幼新書

卷四十一

十一

旦先公大中所傳并平日所抄方

幼幼新書卷第四十

幼幼新書 附拾遺方

幼幼新書拾遺方

第八卷

瀉青丸治肝熱尋衣捨物

當歸焙

龍膽焙

川芎

山梔

川大黃濕紙羌活

防風焙

等分末蜜丸雞頭大竹葉湯或炒砂糖湯化下量

服

朱砂膏疑即驚積門孔

葱湯丸取驚積食積潮熱煩躁面赤氣喘腹脹

幼幼新書

拾遺方

一

方

南星

白附子

滑石

朱砂各抄

全蝎十個

輕粉抄一錢

粉霜抄半錢

麝少許

巴豆四十個

末稀糊丸如黍服五七丸葱白薄芎湯臨睡下量

加朱砂衣

導赤散治驚熱目窺咬牙

生地黃

木通

甘草

一無此有黃芩

等分末三錢水一盞竹葉同煎至五分食後溫服

軟金丹治驚風積

白附子個共卅 蝎稍四 青黛錢二 麝許少

末取棗肉同研勻薄荷湯磨一皂子大兒七歲量

加

第十卷

一醉膏治慢脾風

花蛇草 蝎尾 大南星心 川烏臍

大附子側 白附子耳 蜈蚣肚

並生各半錢棗肉五十個和研入腦麝渣水丸雞

頭大薄荷汁磨一丸病下用藥調理

幼幼新書 拾遺方

第十一卷

蚱蟬湯治兒壯熱驚癇

蚱蟬淨三個 石膏 柴胡各八分 子芩

升麻 知母 梔子仁各六分 龍齒

蛇蛻各四分 麻黃去節 甘草各二分 生葛二分

大黃十分 釣藤皮半分

水三升半竹瀝升二合為度

蚶蜥丸治癩

全蝎 半夏 京墨煨各半錢 辰砂

鐵粉 人參 真珠錢一 好茶錢

春柳芽錢一

末酒糊丸菜子大薄荷薑湯服七至十粒日三一

月效

第十二卷

雄朱膏疑即雄朱散後有作九者

牛黃 真珠 丁頭代赭石 白殭蚕

麝仁各一分 雄黃兩半

末煉蜜丸雞頭大人參湯化一二丸

幼幼新書 拾遺方

第十四卷

五物甘草生摩膏治新生幼弱喜中風體熱或中大

風手足攣掣

甘草炙 防風各一兩 雷丸二兩半 白朮炮

桔梗各十

吹咀不中水猪肪一斤煎膏入前藥微火熬稠去

滓取彈丸大摩兒頭及手足心寒者更熱熱者更

寒雖無病亦摩甚辟風

觀音散見後十六卷

七寶散治温壯伏熱傷寒煩躁面赤氣喘夜熱曉涼

當歸 芍藥 甘草 大黃各一錢

麻黃去節三分 白朮炒 荆芥穗各二錢

末半錢至一錢水半瓊葱白一寸薄荷一葉煎三

分温併服要瀉熱服

錢乙惺惺散治傷寒時氣風熱痰壅咳嗽及氣逆

桔梗 細辛 人參 甘草

白茯苓 白朮 苦蕒根各一兩

細末二錢水一瓊薄荷五葉煎七分不時温服如

幼幼新書 檢遺方 和氣加薑五片一用防風一分川芎二分

薄荷散治夾食傷寒又夾驚傷寒温壯等

嫩薄荷兩 羌活 全蝎 麻黃去節

直殭蚕炒 天竺黃各一分 甘草炙半 白附子錢

末嬰孩一字量加至一錢水煎服

七寶牛黃丸

珠砂 粉霜 輕粉各一錢 牛黃錢半

腦麝各一

末糯米糊丸如梧子二三歲半丸至一丸金銀薄

苛湯磨下月內兒分四服

茅先生治諸病青金丹

青黛羅平滿抄二錢 滑石 天南星 丁香羅各二錢

輕粉 水銀二錢先以錫二錢銚內

川巴豆淨二片不損者并花水浸一宿風乾研爛

拌和軟飯丸菜豆大傷寒後取積葱湯下取疳虫

牛肉汁卞驚風肚中緊硬面青黑金銀薄荷湯下

傷食肚中腹皮微熱肚脹夜間作熱似疳非疳面

青黃眼微黃此腹中有積阜角子二七粒灰內煨

幼幼新書 檢遺方 水一盞煎半盞下有積瀉魚鮓湯下氣積炒茴香

湯下周歲十四九三歲十八九七歲廿四九大小

加減四更服初下此藥天明下積積盡依證補

茅先生治嗽雌黃丸

雌黃 雞內金雞屎 延胡索 半夏生

等分末棗肉丸如米每服七至十九燈心湯下

茅先生牛黃膏治隔熱及諸熱鎮心解毒

茅先生牛黃膏治隔熱及諸熱鎮心解毒

茅先生牛黃膏治隔熱及諸熱鎮心解毒

川鬱金半兩阜角三寸巴 馬牙硝 甘草各半兩

朱砂錢一 鳩砂 寒水石各一 腦麝隨心

末蜜為膏雞頭大麥門冬湯化一九

茅先生治諸熱天竺黃散

天竺黃 川鬱金阜角 茯苓 麥門冬各半兩

蟬蛻 蝎淨 僵蚕各半兩

甘草炙一兩 朱砂分一 腦麝許少

各洗淨羅每服半錢一錢蜜湯調

錢乙治肺熱手搯眉目車面甘桔湯

幼幼新書 拾遺方

甘草炙二兩 桔梗米泔浸一兩

細末每服二錢水一盞阿膠半片炮煎五分食後

溫服

第廿一卷

茅先生健脾散

白茯苓 人參各一兩 厚朴薑炙三兩 蒼朮米泔浸一兩

陳皮淨五兩 甘草二兩生熟各半 草果去皮二兩

末一錢薑棗煎量服

漢東王先生補虛調胃進乳食止吐瀉觀音散

白扁豆炒 石蓮肉炒 人參各一兩 茯苓炒

神麝錢二 甘草炙 香白芷 木香炒

綿黃耆蜜炙各一錢 末嬰孺一字二三歲半錢四五歲一錢水半盞棗

半個煎十沸服

茅先生活脾散

全蝎四錢 朱砂錢一 白附子錢二 白僵蚕直者

末腦麝少許金銀薄哥湯下一字半錢如嘔楠木

幼幼新書 拾遺方

湯下

第廿二卷

茅先生治痰氣一切氣蓬莖散

蓬莖散 青橘皮 益智各半兩 木香分一

糯米一兩

末一錢陳米飲調日四

第廿七卷

茅先生治吐瀉丁香散

丁香粒二七 肉苳蔻個一 木香錢一

幼幼新書 附拾遺方

研醋麩裹熟灰煨麩赤去麩入藿香桂心各半錢

陳米飲調一字半錢服

茅先生治吐衄霍亂驚沉香飲

沉香 各一 丁香 各一 檳榔 甘草 各半兩

肉荳蔻 兩一 末半錢一錢棗子半個水五分煎三分通口服

惠眼平胃養實胃氣大治乾嘔

馬片子 生 白殭蚕 直 丁香

等分末蜜丸如梧子炙陳皮一片煎湯化下一丸

幼幼新書 拾遺步 十一

諸疾覺胃氣稍怯服

玉訣蘆薈丸治藿亂後乾噦

蘆薈 安息香 胡黃連 枳殼 各一炒

錢 史君子 炒三 燕莢 分一 定粉 半錢

麝 許少

末猪膽糊丸梧子大五七丸米飲吞

第廿八卷

茅先生三聖丸治瀉痢

黃連 木香 茱萸

各一錢銅銚先炒黃連色變下茱萸炒烟起下木香同炒一時取出放冷入礬灰一錢醋麩糊丸如梧子葱湯下十九十五丸

茅先生福銀丸治積痢

輕粉 粉霜 畫粉 白丁香 各二

錢 一時研渚雞子清丸餅子如雞頭一歲一餅多二

歲加半餅更量服時先用灰火炮餅黃赤餅飲灌

半夜服

幼幼新書 拾遺步 十二

幼幼新書古後序

議者曰經籍吾道之筌蹄方論醫道之筌蹄然則然矣使經籍不存學者無所折衷安知夫道之淵源使方論不著醫者無所夷攷安知夫醫之精粗世有盧扁華佗則處劑意解妙通于神何假方論哉柰何盧扁華佗不世有求其不迂不泥不矜不誣者蓋鮮士大夫與其委聽于庸醫之手曷若因方論求古人用心以之衛生濟世耶方論之于世猶五穀之于日用乎孰謂士君子恥言之

幼幼新書 卷後序
二
揭陽劉公帥荆湘嘗命編集古今醫書中小兒方劑之說為一書總四十卷目曰幼幼新書既成三十八卷而疾不起

漕使四明樓公實繼其政乃曰前之美不可不成肆命亟迄其事因合後二卷為一復纂歷代所述求于方論為一卷別其篇首閱月而書成噫可謂盡矣才孺竊嘗聞夫子之言曰父母生之續莫大焉嗣續之道人倫之首詩三百十一篇聖人所取嬾人樂有子采芣美之子孫眾多螽斯美之居然生子生民美之

延生君子斯干美之讀書至此使人三致意焉求子之論古人所以著方書者與今公會萃諸家之說實諸方論之前使成書流布家藏人有真得夫子與詩人之意者也抑嘗謂昔宋苜公因暴雨至水浸蟻穴公折竹為橋以過羣蟻他日有僧謂公曰公丰神頓異如能活數千百萬命者夫折竹為橋之時戲事蟻蟻微生何補于世而陰為功惠如此矧是書之傳利及天下後世則公之弗祿榮延取必于天端可執左契也

幼幼新書 卷後序
二
紹興上章啟 歲十一月哉生明老迪功即新差江陵府司戶叅軍石才孺謹序

庚午秋仲潭帥劉方明以疾不起僕攝帥事問諸府人公治潭久凡所興立不為苟且計得無有肇端既閱偶未就者于是以幼幼新書來告索而觀之則古今醫家之書若方與論為嬰孺設者無不畢取已并總統類聚而條系之如適通窳百貨俱在如開藏室羣玉燦然隨所宜用必厭其求噫昔好事人得一方積歲謹守雖父子誓以不傳方明于此碩能窮探博取萃為成書銀板流通與世共寶則其用心亦仁矣哉因命趣工以成其美又集醫傳宜子諸方列繫

幼幼新書

卷二

于左為第一通云十一月六日右朝散大夫荆湖南路轉運判官權潭州軍州事樓璠謹跋

活幼口議序

青山精堂

壽氏開卷

壽氏開卷

世言醫病與醫國同一源流國以新造之病為難攻人以幼稚之疾為難療新造之國病在於人心之未乎法制之未備故事不厭乎議如周人之於市鄭人之於鄉校是已幼稚之童病在於氣血之未全筋脉之未力既不可以言語求又未易以智巧索諄

論而復辯且未足以究其萬分之一况欲忌魚筌於紙上之塵言其有箕筭而蠡蚳螟者幾希矣茲演翁口議之所由作也翁質直而不華雅朴而實辯如議證議藥議諸氏之方皆鑿鑿乎如老法吏之議刑辟絲髮不可以動移求之文理誠若不足索之義理沛然有餘鳳髓玉訣政亦不容多

遜也或曰輪人之輪庖丁之牛應之於手得之於心蓋非區々口耳所能造今議以口為言其脉莫能教子不見全牛之妙途庭蓋可知已吁有是哉使釋鑿而特以原本為第一議曰乳哺曰食忌曰傷憐不必議可也然且以不絕於口翁之此意豈獨為鑿工計哉有能以幼之為心實有其書

圭復其說宛如省翁之耳提面命將護於震夙之初調理於生育之後於其疾乎何憂其或以豎子之梗為予告亦將語之曰翁有口議在由是幼吾幼以及人之幼挈而同歸壽域中此翁之初心然也然則是議也又當求諸省翁之心謹母曰膝口說時歲在癸未梅月朔且石率熊槐書

新刊濱山省翁活幼口議目錄

卷之一

議明至理二十五篇并序

議原本

議專業

議難易

議同異

議通衷

議參詳

議審究

議根本

卷之二

議虛實

議投藥

議行醫

議脉氣

議下藥

議稟賦

議辨理

議料理

卷之三

議調理

議食忌

議錢氏

議張氏

議明道

議傷憐

議責善

議王氏

議幼幼書

卷之四

議初生牙兒證候二十六篇并序

議呵欠

議噴嚏

議伸舒

議胎風

卷之五

議夜啼

議身熱

議印腫

議鼻塞

議便血

議口瘡

議血眼

議蛆瘡

議聾耳

議發癩

議杜救道

議盤腸

議呢乳

議自利

議撮口

議閉水竇

議咳嗽

議自汗

議啼無聲

議視無情

議乳夫時哺不節

議身及張目上竅

卷之六

形證一訣歌

指下脉訣

三關指要訣

指紋脉總要

脉指訣歌

三脉五脉說

指紋脉訣說

詳解脉紋

卷之七

面部氣色并序

五臟五色本立

五行相剋

五行相生

五行本生相侵

五臟生本相臨

五臟勝伏相交

五臟受敵剋入

五臟畏受

五臟子母生成

心臟部位

脾臟部位

肺臟部位

骨臟部位

肝臟部位

命門部位

五臟伏敵善傷

面部氣色總現

肺部所主

腎部所主

肝部所主

脾部所主

心部所主

卷之八

病證疑難一十八篇 并序

逆證似順

陰證反陽

陰盛強陽

虛極生熱

冷久必寒

熱多作燥

理實致虛

利表傷裏

退熱作渴

療驚發風

風痰隱久

驚熱無時

恐悸喘息

食體軟逆

令子無辜

受氣不足

飯多傷氣

臍腹受熱

卷之九

議胎中受病諸證一十五篇 并序

議鬼胎

議鬼病

議胎氣

議胎病

議胎病作熱

議胎病益熱

議胎病風熱

議胎病驚熱

議胎病風痰

議胎病結熱

議胎病寒邪

議胎病榮熱

議胎病衛熱

議胎病臟寒

議胎病潮熱

卷之十

十種證候發端 并治法畧序

議傷寒

議驚風疾熱

議泄瀉

議痢疾

議疳證

議咳嗽

卷之十二

議急慢驚風等證候總序

議急驚風傳變

卷之十三

真珠天麻圓

切風散

揭風湯

截風丹

青金圓

定搐散

煖金丹

卷之十四

議慢驚風傳變

保命丹

犀角散

此濟丹

四聖立効散

卷之十五

議慢脾風傳變

白礬委圓

黑附湯

七寶妙砂丹

議痲疾證候

化風丹

奪魂散

卷之十六

議十種熱證候

議類證諸熱

八種虛痢作熱

大連翹飲

正氣調胃散

議吐瀉詳證六法所治

觀音全蝎散

醒脾散

定命飲

靈芝圓

附硫圓

辰砂膏

比金丹

分十種熱附諸類

脫甲忘根散

梨漿飲

議潮熱有五

議痢熱

議積証各有治法附其下

卷之十七

濕腫

太虛氣入腹

虛腫

衛俱虛腫

分氣飲子

議脹

疝氣脹

疝積脹

氣積脹

揭圓子

痞氣脹

癥積脹

三枝煎圓

鎖肚脹

中脘脹

大柴連圓

蛔虫脹

小沈香煎圓

食毒氣腫

瀉痢虛氣入腹腫

血虛腫

榮衛飲子

救生丹

疝極脹

疝積脹

又方

癖氣脹

上膈脹

食傷膨脹

下虫圓

卷之十八

議傷寒

人參枳實湯

議驚熱風痰

疎風散

議疳疾証候

史君枳榔圓

肥兒圓

立効散

三黃散

攪榔散

地骨皮散

議痢疾証候

豆蔻散

雞青圓

大艾煎圓

木寇麩圓

議疳熱

人參散

蚶蚬圓

卷之十九

議泄瀉

帶腸散

木附湯

議吐證

八白飲

正胃散

青金丹

半丁圓

塩豉圓

議渴證

二黃圓

大艾灰餅子

麝香圓

議喘急證

八味理中圓

又方

卷之二十

議瘡疹証候

議癩疥痞癬

人參蘿蔔飲

議眼証候

透關散

至妙立消膏

既濟丹

人參溫中圓

煨附圓

豆蔻散

正氣圓

石膏湯

香薷飲

定喘飲

雄黃丹

豆蔻草果飲子

大效點明膏

生熟地黃圓

小防風湯

小流氣飲

小菊石膏

眼患總議

雜方

石葦散

桃紅圓

犀角地黃膏

丹毒至効散

犀灰散

磁石散

菊根湯

木台金絲膏

生肌散

大効金絲膏

天南星圓

通關散

瘡塔方

朱連圓

摩風膏

薑黃散

小牛黃圓

四聖湯 此方一名一氣散

活幼口議總論

按魏氏前序云求之文理誠若不足茲則不敢妄味
姑就議中述其切要一二言之識者幸鑒

撮要

- 一兒在胞胎必須飲食有常起居自若使神全氣和胎氣常安生子必健
- 一懷娠之後最忌食熱毒等物庶兒孩降生兒有胎突瘡癩等患
- 一乳母常須養其血和其氣兼以志愛使乳汁溫平
- 一嬰兒平常無病不必服藥所恐過疾不即為效
- 一初生兒必忌外客所觸庶免致客忤然古人所以忌客一臘
- 一兒孩不宜食肉太早傷及脾胃也致其積疳積
- 一兒孩變蒸作熱非謂其病雖不藥自愈
- 一小兒受病在胎有自愈者故先賢惟理其臟未言其腑病陽臟陰如麻子一證乃是胎病
- 一小兒顧頤未合乃氣虛所致勿視為尋常
- 一兒生殺道無穿多至不救藥無速驗必假物透以通之
- 一驚風發搐手足不定執按恐風癩逆入經絡廢害肢體

一 小兒母容入神廟中恐神情閃爍必生怖畏
一 小兒笑極與和哭極與樂腦思既濃母使吐喘
一 兒患吐瀉女吐男瀉是為急證吐瀉不止脾虛風
即生急宜療之

一 兒患瘡疹發驚不可下驚藥有熱不可用退熱藥
有汗不可止汗或吐不可理吐或下亦有不可不

一 兒患鼻孔黑如煤耳輪麻焦黑目翻指甲黑作鳴
聲或吼叫數聲及手尋父娘衣皆無可治療

一 藥忌肥膩膩粉水銀及用鍼艾已忌砒毒皆不可
輕用

一 食忌甜成疳飽傷冷成積肥生痰如焦苦辛辣酸
酸恐毒尤不可食

辨疑

一 兒患陰癩其脉浮數洪絃是陰中之陽非真陽也

一 兒患慢驚得狀數呼吸大是其證絕非陽回也

一 兒患豆疹作熱非傷寒也但有耳後有赤緯者是

一 兒患身及張非驚風也或投寒涼藥亦愈然非驚
風所傳

一 嬰兒聞響即掣跳者非驚也乃肺肝不足而神有
未安

一 熱在筋脉亦發搐者非真搐也如或過劑則變假
為真

一 議張氏方書南人得病不可以北人處方自是南
北異道不可不辨也

補遺

二 卷云 三才之道各得其九上當有九九者

三字

四 卷云 不陰心上當有血字

正訛

五 卷云 預利利害上利字當作知字

十二 卷心氣不足而生之慚字合當作漸字

已上始舉大槩余亦未能審於是非揭之奉端以俟
今之省翁云

剡刊演山省翁活切口議卷之一

議明至理序

中醫研究
院善本書

竊聞形端表正周公測度之主基意到心明華氏扶持
之旨度方議幼師傳至理為良憑樂活人學造精粹始
妙純乎其道者惟精專誠達乎其識者可行必用夫人
知其難不知其所以難究其學未究其自然學言之難
者莫過乎藥備耽其意參詳審察以盡其善然後可以
知其難易之旨也僕世居江南叨泰醫士極意開陳管
見願彰海宇同聲雖然利鈍從人畢竟因由有自所著
是書悉識幼幼證候誠為學者與覽一悟至理無問不
通捨去補益之為體取洞明之見方行淺揭氣宜探深

淵果世仲聖以服象情者豈不選歟

議明至理二十五篇

議原本

議曰古人有擇婦孕產之文荆公著胎教育子之法數
篇利益萬世規模安得人人而尚之世有君子小人之別
故當述陳利害明智審詳而已夫人立室安家求嗣必純
納婦種子之賢且德然而婦乃賢淑夫又質良生男不
肖者有之非夫婦之失情人倫失序事有不備者良由
公始不能善郵胎胎之氣始理不與矜顧護愛之理氣
胎涵養宜在冲和冲和者同其天地之寬量忘乎四時
之運行妊娠之間懷育之次但常令孕婦樂以忘憂不

你怖畏亦無恐懼飲食有常起居自若此乃以順其中
而全其神以和其氣而益其脉是與調而助之扶而補
之何患胎氣不安生子不偉所謂婦人之性自未鄙窳
因由暴觸以動其氣氣動則傷血血傷則損脉脉損則
胎氣不同胎氣不同其子何宜愛子者宜順保其胎氣
調婦者宜勻和其血脉然後乃曰得其所哉况夫人生
清淨與天地以同原性稟真常合陰陽而做質母懷精
血成形夫抱氣神為子何由聰慧蓋為母性瀟寬所以
智能乃值父精廣愛亦有鄉相起自犁鉏乃是室家相
從意同道合至誠禮貌怡然一婦一夫淳謹慈慈豈在
多嬌多慾雖由拙見亦有至理存乎中矣

議通變

議曰愚謂初生嬰孩至於童稚血氣柔弱疾病危虛夫
疾之在急不可倉皇醫之欲安豈可減裂至於垣午則
可行有其巔檢則防厥醫學得中務令勝善良工進某
某用在人通變為醫醫行存志志若通則醫不繁機能
變則某不素音同也通變者為奇得志者為妙古云心通
方學通愚曰志變作良醫僕報者此書殊無文墨但
實雖則嘔嘔嘖嘖其意乃欲使學者通變而已通者正
理廣博觸受咸知變者定明根源開發胸臆若只按古
調理今人處用率方飲食坐臥不問饑飽勞逸不使然
其天時地利豈可不知大吹雜鳴尤且盡意吞憂秋冬

四時有正邪之令吐利驚疳五臟傳久暴之疾所謂可
以進則進可以止則止猶甚堪行即行不堪行即轉其
意用別是謂通變之道聰慧之施謀機策畧智度攻討
當安誠此乃兵家之權技罰為用審察詳辨診切視聽此乃醫
家之業大概一切所為皆由通變惟有活人用功過於
兵法主治在乎通而知其變此乃良工用心規矩疑其
變且智不通此乃庸夫用心操執常運其通而知其變
見其證而知其病生死預決危困不戕斯乃上工之謂
順逆相投利害相混何由而通何因而變斯乃下客之
謂嗟乎切孩易得候變我即因其證與候而變治之或
輕或重而作我亦隨其輕與重而理之通變之道如是
而已

議難易

議曰天地陰陽尚有益虧世人陰陽自致順逆失其調
度者邪正相干違其安和者患災相及小兒一科古人
云有異於常者為難然長幼受疾自是不同所有難易
之言者非謂陰陽勝伏非謂傳變差殊非謂脈氣參差
非謂臟腑虛實是以迷其證者悉謂之難達其候者總
謂之易無以難證而妄之謂之易無以易候而妄謂之
難難易之功不出至誠窮理盡性為得之矣原夫醫學師
範性參古風是必臆記諸家明文旨歸要說更源端的
審察輕重較量凡觀兒幼傳變又不可執帶於古意亦

不可濫恃於常情搜羅盡善究竟周旋無一證一候留
連於其間方可謂十全之妙道者耶古人云心中
了了指下難明小兒方脈指下易明心用了了其誠不
然悉閉蒙昧純有生疎前功俱喪思之掌切重負利害
不可自逞寸能何堪稱奪家傳三世之業未果彰名蓋
由減裂用醫倉皇太急故有得失嗚呼既無深思遠慮
豈有廣見多聞若求僥倖之功必害平生之福迂哉淺
見寧保無虞性命相投豈可視為容易證候未明萬毋
勉強學者幸詳察之

議參詳

議曰調理嬰孩一科天下之難事也且古從今著載未
詳其議世有醫能之士未嘗廢業蓋此等方脈之術也
然其參習至理妙無它焉所謂審察究詳按考備既
已定矣不為虛設夫苟順然取次應急相投致謬濫
噫審者審契表裏察者察定陰陽究者究竟臟腑詳者
詳悉探本按者按明虛實考者考較輕重推者推詳前
後備者備準端的八法十心十全保命口無泛語意無
濫思脈無虛究藥無虛發凡有嬰兒先以視之為上聽
聲為次察脈又為次且嬰兒所受胎氣未充其色白
其形萎其氣怯其聲濁得頤顙音戶音信同實稍長
不任變蒸既於變蒸不備則形躄萎而不壯情性不舒
疾病無特不有初生之兒所受胎氣充足其色紫其形

緊其氣壯其聲清焉得願願虛曠稍長漸受變蒸既而
變蒸滿足則脉實形因情寬性緩疾病經年不作凡為
醫工專誠守業毋浪游毋泛飲毋傲恣毋就執用之則
專專不以遺之則穩其執而從機行用以審而致執
每依法則難易設意無太過處性莫不及太切過不及凡遇
臨危赴急者候一見使人愴然者勿可徇眾而說但如
前八法明度而已若也視之為常聽之為妄視聽不專
浮泛致亂虛作實冷作熱表為裏壅為通如此倉皇安
得不有踈謬今述總要須當致謹參詳乃謂成全日用
善工者耶

議專業

議曰觀形者候察色聽聲且究陰陽受于邪正皆由一
氣生成之本一氣者先天應運造化鉉基稟賦不常故
把虛怯孩童作疾其在實、虛、損益得中標本無恙
過與不及以意逆之凡為醫工須知表裏復審盈虧不
和則眾疾皆臨稍順則四大悉正世傳小方脈書八十
餘家究竟證候良方妙劑不過五十然其傳變形容諸
證該千述萬各顯其長不得不錄是故醫家明理藥不
繁勞乃知至妙廣博言章欲使學者通變而已大抵小
兒得疾所受無過驚積冷熱療理不致散漫者乃為上
工其候傳散斯為下客傳散者驚即作痾熱即成疔積
成痞癖虛作疳痢冷致吐瀉暖為嘔噦其證泛泛其醫

曉曉若不尋其源流漸入江海愈遠愈深亦聞外大上
士治之未萌傳不待中士治之已行行疾作下士治之縱橫
或或有盲者治之崢嶸法也用藥劇之規矩行道從之精
專嬰孩無隱疾之情藥餌有反功之歎勿致矜哀乃招
慶善矣

議審究

議曰幼幼方脉在乎參審推詳究竟盡善深明其理為
得之矣不以意竟為務不以疑似為怯不以未用試功
不以踈怠為向每一證無不審究古意及師授之因每
一候無不察度準繩手善之理所見至良決定有終無
可疑者方與投藥庶無勉强肆臆之為豈有傷大壞證
之害 或有之蓋其感裂故也初生之兒審其胎氣少
穩斷乳之子究其飲食傷脾胃離母之孩察其暑濕寒邪
非用醫童覺其馳逐關力勞則傷氣動則傷神後則傷形
飽即傷滯母有四意醫工次焉若也順事致敬嬰孩何
疾加之一曰調護謂調適其寒溫護令不受邪觸春不
怯凍秋不乘涼夏知清冷冬覺溫煖二曰保攝謂保嬌
情所欲攝所經任之意乳須及時食無過劑糖無令飲
戲勿令亂坐臥起止惟母當知三曰撫育謂幼則順其
嬌痴長則變其情志撫之乃常存其神而知其寐育之
乃安其形而調其性四曰鞠養謂兒長成宜鞠問之母
令縱恣母令忍暴母令悖逆母令頑慢四者窮理盡性

縱恣母令忽暴母令悖逆母令頑慢四者窮理盡性可謂慈母之道凡兒初生之後出三日氣脈定已脫胎凡之難過七日精神全方離鎖肚之害越百日騰理持不致咳嗽之危十日外胃氣正不瀉青黑之咎又亦有四焉一曰和愛二曰順敬三曰謹訓四曰寬責和愛者不恣兒男口腹順敬者不聽暴虐嬉戲謹訓者至誠禮貌相持寬責者忠怒丁寧舉喻若加鞭笞呵叱不惟驚恐怖畏此之用假彼之亦愚若也父子相尚溫恭相順斯為善矣

議同異

議曰合之則同離之則異水火之設品物之聚皆有同異何可惟哉火之為煙所屬則不明及其燄也由煙而明之水之為坎所壅則不流其滿也由坎以流之萬物有品彙出其境則異於常人事有尊卑合其道則異於眾切之抱疾不作傳變古今皆知言曰疴積吐利及其更也即作驚風痰熱未為恠異可以循其證候而療之稍或更常當審其輕重而理之茲則世醫務學莫執此端可否之意以盡其善殊不知疾作有同異之別其所受之常曰同所作不常曰異前件八證候中皆能傳之俗流不知其所以傳作即曰差異其實因差異所致當知所受在於傳變欲以暴急之間妄投圓散冷熱相互虛實相推表裏相陰陽相反亂於百脉觸於五臟迫

於絲絡過於榮衛是故本證逆作也疾所奈不得其名所療不審其理攻劫無端幸全性命即其所受乃謂恠異積證之中得疾差異甚多差異者是積等証候所治不當而傳更致勿謂証異所文改也疴氣之疾外候頗眾其候但於積病壞證而與調理疴氣亦然詢其源則應其端依其證則療其疾是以圓散不良陳疾病莫延久凡兒所受異疾蓋由失之明察苟或成人往之抱瘵焉之疾者有矣

議根本

議曰夫人之生以氣血為根本人之命以安樂為壽元男即二八衛氣方正女即二七榮血方行天癸至特其氣與血始然父參年既未登即曰小兒然分形其名已載自幼至長次第言之今之世法男年十五女年十三乃適嫁娶其道雖不應古其理在乎通情之動乎中男破陽大早則傷其精氣女破陰大早則傷其經脈雖成胎孕合育必虧兒生偃痿更蒸不備依作依儒又或男子過於八八女人過於七七產誕嬰孩何乏為善又或陰盛陽虧陽盛陰虧又或女因胎寒服藥男以陰蒸餌丹如此為後皆不足與議非正論也前賢著述詳較調理未嘗與究其源遠見分短大利害由斯復見男女長成疾抱虛勞相繼而死者入謂傳尸或曰有鬼所致或曰有虫所作愚謂不然傳尸者傳受骨肉氣血之尸也乃是氣弱不足母氣虛羸而得之何更外有尸而可傳

有思以昧有虫為禍前件意義悉入其候雖則男女長
大勿于勞瘁相承但稟賦受氣如花陽培似木整植策
壯枯謝各由根本所致凡為人子無能自知况又恣妄
於老年忽尔氣虛脉脫惟恨天命病家堅念藥之不良
無自責其根本不充所以然也

新刊活幼口議卷之一終

新刊演山活幼口議卷之二

識虛實

識曰五行之為物各有輕重虛實得共之性生于地任
之地資質自然固壯金之至堅隱生虛土質輕色淡火
之至虛猛發堅木燄烈炎熾土有固消水有盈涸本有
岩石數十年之秀實者不得陽氣亦萎有之人之資質
稟賦父精氣母血脉渾撲胞胎調攝鞠育凡兒變蒸之
後其形可知是以頭顱未合筋骨未弱頭顱青筋脉虛
不榮頭顱常坑滑泄便、頭顱腫起凡痰不止頭顱久
令吐利清青頭顱虛軟癩癩不免頭顱匾闊暴馬易脫
頭顱鳴長風作即三頭顱連額驚風易得頭顱未完怕
熱怯寒頭顱緩收指氣不同頭顱動數神氣昏弱頭顱
寬大受疾恐害頭顱者乃精神之門戶也閃竅之索籛
也上下相貫百會相通七孔而透五臟所籍泥丸之宮
魂魄之穴氣實則合氣虛即閃良由長大不可不合
者一見當知其可否用藥凡兒有頭顱未合受病沉重
者慎勿將作尋常別思究竟恐得共何况膜然妄投
圖散此亦嬰兒慮愚者有曰臣殺之說曷不謹歎

議脉氣

說曰天地造化萬物榮萌之端其來有漸其根悉用其
名則常其用則別夫人之種性所受胞胎含宏隱密生
而未顯長而能利鈍巧醇良狼戾者未與言論亦拙

有自然之理血氣身體假質於父母否泰苦樂稟賦於天地故天地生我以資質相與且仁義在我以古朴淳素壽夭貧富分之以時賢愚貴賤委之以命惟心惟性乃忠乃神通達智慧之者不可得而言之漸矣其所言漸者久矣知乎微妙之道寄乎清淨之室微妙之道乃心脈之所生清淨之室係肺氣之所主初誕牙兒胃氣未全其脈方行於大極五臟之脈心為元首一月之內未有可捉虫形已具且脈氣方與天地同參血肉初共人事相奪真邪離合宛如混沌初分自此乃曰脈氣之漸矣其脈初行太始陰陽未諧自顯之下髮除之前奇鋪三指但按其冷熱察其證候斯可謂脈氣之生漸且微也百日之外脈氣行之大初左右食指三節側看絡故風氣隨所發作輕重攻擊而生至於五百七十四日之外行於大素於脈應動於息有數高骨之間一指分三部取之浮沉察之緩數可知冷熱虛實之理十日之外行之四方遊於五臟外應臍頰耳花準頭唇口眼目五色隱顯一氣盈虧相生則平而善相尅則兇而惡又其危困然後按之大衝大衛之脈在脚面曲陷之間其脈定吉凶休復應指順息則可尚聲指或逆散可謂絕矣切之脈氣分之有五深其究竟其次察之證候輕重審之表裡虛實然後可以設法得虛設醫工之良也試較優劣而後知之

設投藥

設曰水有淺淵而可深山有頽荒而可林地有傾陷而可回物有損益而可琢藥有貴賤人有尊卑心存至理道究弗迷然其貴賤長幼嬰孩所患疾病異端傳變異證者受氣稟賦資質厚薄故也由是根不同而體不備氣不充而志不寧貴者則驕多賤者則勞虛驕多即狂胎而得之勞虛乃孕育而招之凡兒氣受之不定或茫蔭之有餘月期過滿或者承之有虧所襲剛柔而然化抱虛實而已從生成成有別假造亦無違察貴賤各依其根較長幼皆循其理九療小兒非以一脈之謂不可同常之見所言投藥者或用投之于簡也投之久練也

投之窮研精研投之益後投之勝前良工用心之至是謂投藥之專若以重劑投于雛乳小或以峻藥投于貴氣未直不可混殺而設造次而施合以通利者審問扶而下之當用益補者察詳按而調之孰謂恣妄之有耶所謂不可攻擊者曰虛曰幼曰嬌曰重不宜冒致者曰久曰閑所下言曰冗用多曰競爭後加以以母之情辭也父之性急也慈子之意頑不服病之候難得母之殫神父之遺崇如此人事易可勉強而與勞心枉究哉不惟無補而又無恩觀其病家情意相煩禮與相傾謂功歸於我行著於先謂使信醫即愈重藥即症用其湯劑得為之良者誠在彼此母忽之之謂

也

議下藥

議曰凡調理小兒須先觀視氣色察其證候其或氣色有不正者指其而即憑察紋診脈有不定者指其即究證候其或證有壞候作變謂前入以學月法即選良妙方藥以主之不及則無咎切不可大過若以意揣其疾盲投其藥深恐有乎得共古云醫者意也審思前賢載述妙用無慮之意又參詳父兄師長教誨指示取舍可否之意又裁度自己曾經療治輕重量度斟酌成全之意三者既備可謂鑿者意也如此究竟無不令善景大醫家為用憑藥以活人所言下藥皆臨機隨湊是也可以下即下當下不下其候少頃則過矣不當下而下其證反為它疾矣下藥之法慎勿躊躇若也思慮可否之間或反覆再四則疑在中有疑切莫用某須當預察無大過不及之議既而定已投之決效非止利下之謂下又非於投劑之謂下下者有先有後或先利而後補或先補而後利或先扶表次救裡或先救裏後解表如此者衆舉一隅而言之用藥得其中輕重得其所是謂下藥母恣意母致緩母倉皇母競利母勉強母疑惑或得或失利害有之利則僥倖以全其功害則及世不可言也凡為醫士用藥不可妄知不容無知不可執見母徇象見主醫哉某明識俱見按脈對證心無虧弊道副自然

以應上古聖志端的篇章君臣問答語言玄妙至道而已

議行醫

議曰醫之為子任七右八乃言表裏其下九畫乃云九道合之二十四以按二十四氣古人設意義理深奧至象於天地之間以忘人倫之道與其成人之天為契論獨小兒氣脈微弱難以謂之醫蓋是七表八裏未全故云調理愚曰不然苟不知其善用心者則奇妙純粹在其中矣茲說孰是經云醫者意也以意理之為得抗之為失得失之長於人禍福是以純粹之妙良工之能學者究備行則盡心可謂善術之道凡見脈不若議證議証不如識病識病如藥對小兒你疾多是無事歷家輕狂所以有乎得失如病人乞焉但需其藥求速安愈醫者要須得中無有人過不及之害所謂鑿之為功神聖工巧明其標本表裡陰陽參其盈虧經絡榮衛察平升降臟腑腸胃審其盛衰然後可以度其疾之輕重較其方之優劣行醫之功譬如殲弩發矢一視決中十全為工如此準純可謂醫者意也若也覲覲僥倖勿謂醫之良工為福使之然也智者謂宜察戒二者不可偏有供謂良魚福為鑿士者乃醉乎醉者耶

議稟賦

議曰夫人皆知胞胎成形產育共相約以十箇月滿足

而生究竟至理即有二百七十日為定論自古自今豈相間說然而就中虛計一月忘教大抵九九為上八八次之七七又次之人生稟賦天地二儀之氣會合三才之道各得其九三二十七即二百七十日為正血氣九充實精神固平為人具足相與智性俱通八八者三才各得其八三二二十四即二百四十日生血氣蔭之不及精神有虧為人拙謬鄙鈍智慧遺七七者三才各得其七三七十二一即二百一十日所受胎氣不足為人狂愚無志辛勞狼戾故也其間或有太過不及之者皆失其正教太過即氣血蔭之有餘不足則氣血養之無速夫人得中之道以為純粹陰陽得所剛柔兼濟氣

血相和百脉相順所以生人心智益通精神俱備腑臟充實形體固壯醫者一觀嬰孩顛顛斯可知之未周之兒顛顛固合睛圓一作神清口方唇厚骨麓奮滿肝深肚軟莖小卵大齒細髮潤声洪騰捷此乃受氣充足稟賦得中而益之一周三歲之間其顛尚大其顛虛曠顛前作坑口闊神露骨高骨細脣削脣突髮黃齒疎知小莖大氣促声軟皆由受氣不足怯弱得之驚悸易得智性難通父母愛惜良工必憂不以貧富貴賤之所生但賢者當以告之若也愚魯之人寧不投藥指或菜刀不及反言醫殺之大凡初生孩子少具精神者良由夫婦之情未諧適心未綢繆且喜且驚神不和悅將來得其

且樂則情濃動則情興惟則情思交則情極深契其意重其心生男必溫生女必淑斯可知淳和之至如此是故醫家不可一槩用藥宜斟酌輕重比附推詳度究可否不至恣妄友為虛設以成重害參審得失之說盡善盡美忘機而已

說辨理

說曰古今天下同說者貧富貴賤是也所產男女自幼及長總曰小兒然幼幼有牙兒嬰兒孩兒長曰髻童此童稚童昧不究竟富貴之風貧賤之辱二者人情間於中道混而言之蓋胞胎氣血之不同故以辨之貴者富者風化同途貧者賤者門列一等所以禮只相遠日用

致是雖有少殊宜審其偏正安之子有度其親疎也之子因入說生視中之常情之家礼只未虧日用得過者又有太過不及之說夫人之運神奈性惟心不可後心後則氣耗氣耗則血衰血衰則虛自此始腎堂不寒而且德心室不足而且虛原夫精元假之為壯為肥為形為骸胎質藉之乃氣乃血乃乳乃脉貴富生子順養撫育之有餘貧賤生子調核固愛之不足有餘者太過之謂不足者不及之謂也大過則傷之不節不及則復之共時不節共時皆生病疾寒暑冒之或衣或裡冷熱攻之或脾或胃所謂審度淵源醫者必須知之貴富生子食之有傷於不精寒之有傷於大燥暑氣有傷於凡

涼泉流有傷於水令腸胃氣血柔而不剛使之然也貧
賤生子食之有傷於不特寒之有傷於凍饑暑之有傷
於煩躁脾胃有傷於濕臟水殺下分腸胃氣血壯而不
堅使之然也父母不自責受胎稟氣虛謬况貴子

懦弱者耶是故胎氣不足血脈蔭籍之有虧良由男

方剛情興造次共節兒生之後牙嬰兒同將護育平
飢飽寒暑勞逸之不同又於夏蒸之時有傷於氣血及
至立行之時有傷於筋骨由是撫養之共情鞠育之不

意調度之不宜將理之無法故易得共病之易得虛

易得壞之易得失貴富之子疾之反是也未寒先衣未

熱先涼未食先飽小至食時未眠先睡餘食過橋之恣是食之

過陽寒之宜食熱之就濕故易得疾之未虛強食令

之虛秋氣未環強茶為之壞學不究則不精甲不專則
不妙矣若執之得法妄之為要端乎圓散不良智者吁
哉

叙料理

叙曰大凡人處性愚魯用心狠戾者不可以學醫師
不擇善禍難逃跡其或兼志怯率為性懦弱者亦不可
以言茶素問有云人如舟也藥如水也水能濟舟亦能
覆舟一回一散對證盡善起活危困未足為奇一有共
利壞證傷候且過在再其智拙非殫茶也學者讀預
究其純粹施其精研尅效斯時以副規矩不可得而述

者醫之良工也夫醫之用茶將之用兵古人亦有言矣
且如善醫則證良將得策茶能勝病卒能守城若也將
無計策匡共証候病何以瘳厥何以固今人皆知茶茶
殊不究竟表裏臟腑虛實冷熱絳絡榮衛投之不當反
為它害亦不可執用一方一茶且大鑿局四味理中圓
小柴胡湯之類皆大人藥劑所謂意到證見茶無不驗
能者此理證候方茶諸家所載無不心放但究竟不到
有手得共由攻乎異端涉獵繁雜智性不專事在狂
簡確實與言更請思之

演山省翁活幼口訣卷之二

調理

調曰至子調理其意等差參詳虛實之宜究竟緩速之
 理若明疾之輕重當察病之遠邇為其所患得變稍重
 證候稍逆直取其功而全其效者醫之良工可以扶持
 循證解利寬緩服藥次第愈母令加進冠日女姓此
 乃善能調治譬如水流就下逆溜遲疾澄則自清潔則
 自周疾則自滿序則自瀉回瀉流狀瀰瀰奔流者乃自
 然而然不可得使之然也脈氣之流行遇冷熱寒涼風
 溫燥濕亦由水之就坎也調理謂疾作尚未傳變氣行
 在子怯弱將變即循其法度怯弱即緩與扶持是以調
 謂守節理謂有序節者無太過不及序者已得其所宜
 然後謂之理無太過不及可以謂之調者而有度知
 度而在於形容理者須可法正法而全於規矩譬之絲
 不及絡頭不得梳斯皆亂也絡之取其餘直梳之折其
 通解無毫髮之遺有純復之慶者誠謂調理之工也夫
 苟以危而用急見愈而用緩者乃共度也斟酌權衡勿
 偏偏遂先約其輕重察其進退某與病勢相參病與圓
 散相及醫自意設智與醫同某與疾諧疾用某等用之
 無忽何慮疾不瘳病不愈哉嗚呼學者理切勿恃其自
 能執其偏見事有優長須預學問尽心而後已

調傷情

識曰老矣見孫長大方子不惟驕恣之甚復加愛惜傷
 天不仕用也睡思既濃犯令吐嚼火閣既煖犯令欲酌
 卧蓋重衾猶令衣著撫拍顧愛常衣裏作以手掌記衣裏
 指物言虫驚因戲諱莫覩廟貞心情閃爍老坐放手我
 咲渠惡欲令喜咲脇助指數門非仕宦莫與扎脚年不
 及時莫常梳掠表裏無恙莫頻服藥戲諱之物不可恣
 樂刀劍尤具勿可與捉莫近猿猴傷志莫抱鴟雀損脈
 抱男觀書抱女觀作女工男方學行勿令綽略兒方學
 語勿令揮霍會坐莫久腰背却却行莫令早筋骨柔弱
 惡莫與顧善可與學順時調攝自然安樂雷鳴擊鼓莫
 子掩耳眠卧過時須令早起飲食飽饑須當戒止非時
 莫衣常食莫美美蔬宜淡滋味膿屎夜莫停燈畫莫說
 鬼魅莫當凡坐莫近水笑極與和哭極與喜智者當知
 撫育至理

議食忌

議曰溥天之下產育既同將護之因有所不同者貧富
 之謂欣然富與貴飲食卧具有益於兒母貧賤又何以
 言之古人有云病不服菜謂之中醫正如此說外護寒
 邪內節飲食審物順時何疾之有前云富與貴傷其大
 過貧與賤用所不及然不及之意乃與中醫之言得其
 所哉且如麥蒸之候數至其時溫熱有作令兒漸固舒
 展筋骨生長百脉和順絃絡自然之理何必加菜兒兒

漸長必漸飲食東西北地產果蔬田種杭稻山有栗
 麥野有蕨笋魚有溪池木有清濁人之所生隨土地之
 所宜飲食亦隨其所有南人不進食北物以麩為膳以
 東為蔬北人何可食南物以魚為菜以麩為飯唐城近
 海嗽之鹹鹼居山食之野味北果多涼南果多熱東果
 多酸西果多苦宜宜多食五臟六腑強納疾病生焉凡
 小兒心之有病不可食鹹肉肺之有病不宜食焦苦肝
 之有病不宜食辛辣脾之有病不宜食酸甘之有病
 不宜食甘甜益由助其它氣而害於我也蓮子雞頭能
 通心氣石榴餘甘大六腸胃乾柿芡蔗能益肺蒸藕
 炊豆於肝宜利五味唯寒五味脾家可意肺病忌食此
 臟鴨鵝魚蝦蟹鱸腥臘之類脾病忌食生冷甘甜
 包氣之物謂穀頭包子餛飩鴨卵肚臟夾餅皆包氣之
 物心病忌食心血髓腎雞羊炙將燒炒煎熯亦肝病忌
 食肺頭肚豬雀油膩濕麩忘小兒不問有病無病並不
 可與食腰子及肚髓心血令患走馬疳候惡吐蓬蒜荜
 藞亦不可與食令兒心氣壅結水竇不通三焦虛神
 情昏昧飛禽毛雀不可與食令兒生瘡癩癩疥煩燥道
 悶鮭鱉蝦蟹螺蚌蚶之類不可與食令兒腸胃
 不禁或洩或痢或通或閉食甜成疳食飽傷氣食冷成
 積食酸損智食苦耗神食鹹閉氣食肥生痰食辣傷肺
 食味淡薄臟腑清氣乃是愛其子惜其兒故與禁忌若

也恣與飽饌重與滋味乃是惜而不愛憐之有傷以至
 丁美爾露疾作無辜故療無門悔之不及育子之家當
 且知之理宜戒之

議責善

諷曰信夫執術為醫荷術至重其或輕舉有乎得共捕
 共其理如盲索途事致疎虞嗚呼斯不復續死不復生
 哀之誠誰為罹歎當知醫家一門上古聖賢測天微
 道詳氣四時逆順陰陽否通表裏然後察之五藏六腑
 三焦百脉究竟標本盈虧參審絕生變動代謝榮枯流
 行注厥如此知義少契古風然有僥倖侮訛狂暴輕欺
 者衆矣僥倖者恃其特運以誇粉侮訛者以道之亨通

而慢易狂暴者不能務本以從師輕欺者肆意妄執以
 為是四者人事何嘗博古窮經明心盡性者邪匠之務
 業其道有四不可遺其一焉行之惻憫施之存惠存之
 周至受之平等惻憫者每務仁慈消患者常加愛護周
 至者運用無虧平等者勿論高下如此推誠稍入醫學
 之道若也縱恣身心嬉遊妄作及其訪問臨時檢束以
 齊規矩斯乃自敗之端殃積于後野老數年江湖抱術
 活人親見同道公有躬解終不為良或好龍服或貪傳
 奕或網或釣或射或獵或謳或飲或歌或舞倭遊花衢
 狂穿柳陌或習弓弩或縱控韁或樂煙粉恣詞或悅風
 情可意此亦用心不常僻性詭異濫祿醫士得無詎乎

其實非詐其用以証凡百枉究絕涉狂佞須知道家者
流遵九道御伸鑒誠犯者貴己為幸志在前賢聖哲無
時不習者方可謂良匠受道之職也果能守之以道分
之以安天地副焉神明欽焉

說錢氏方

說曰晉制有匠工錢氏諱乙設方用茶明證識候直究
竟嬰孩臟腑令熱表裡虛實傳變頭取其效正所謂醫
孩童之意準絕法則之道如此後世故以其議首蓋
閱如也往、誦錢君之書記錢君之某錢君之意旨未
之聞也愚詳其意往且其說幼且銳其方截而良其
用功而速深達其要廣操其言、世不可掩其妙四方
皆可遵其說凡八十一家者各述精通莫若錢君智意
魁效究竟不勞再三亦無中道而廢門人問公編集未
具錢君心服想計恢洪純粹妙理布奇紙筆不可得而
錄者耶時有高見之士一悟錢君意旨暨之與某規矩
法度無以異錢君運乎中顯乎機而自然造化者莫之
能語也良工妙用信乎野老之言母曰管見後之學者
尽心討論必有源者於胸次且德義於人揚名於後世
之道不亦宜乎

說王氏方

說曰小兒方書世傳有三王氏東漢作方論二十篇今
家宜是其或大同小異往、好事作德君子刊施濟衆

就平增損有有之大抵其言有序自微至著其旨有或
自德至顯話括用通事無繁述參以數十名家比較優
劣始知先生某用淳和方排繼續考之而取其功究之
而效其疾斟酌升降以和為用其意在調理盡善之氣
也雖然後學之士治家之子檢閱技餌或有不當母至
差或致害其書故得家室之稱夫良士用心妙理活人
暨之與某猶若權衡權衡者法之一端也參究均平考
較定論循方以志脈有餘而不紊王氏之書乃切、方
脈之規模習小圓散豈可遁此如大人疾患有叔和脈
訣考五行有玲球子命書學六爻有火珠卦文知貴賤
有人倫風鑒相法如斯小術皆名家所集詳辨以為上
首冠諸妙長得母枉究雖然各有廣要篇章終不遠越
而在總歸非曰副童於蒙之謂也老足欽至妙之道也
已

議張氏方

議曰宋朝徽宗太子壽王聰慧幼時常食痢疾諸大名
醫莫之安愈時有草沢匠士張渙挾盃貸茶于都下召
之入內用茶即效官至翰林匠正張氏北人也留方五
百有餘逐病叙說深參其要近傳于世目曰張氏妙選
四方士夫樂而用之殊不知南人得病以地人處方自
是道地相反意說不同所謂北人水氣以南人瘧疫盛
地氣天時使之然也北人水氣盛、則就濕、即与燥

之南人瘟疫盛、即作熱、宜發散史加燥熱之藥病
熱傳作它證系既不宜疾何能愈夫切重陰陽稍偏表
裏同臟腑性弱豈可以熱制冷以涼止燥其說證候
可以循簡述論頗有俊長然其方藥初使人疑之次復
惑之或不常必與悔之曰南人用北人方藥曷不知
之學者參究其善不必勝方如前有云意與同茶與
疾諧方可投之若也據乎云、而用之者斯謂愚匠不
無妄投其餌在乎得共須當審之宜其茶之

議幼、新書

叙曰調理嬰孩小兒上古黃帝未有言著鬼史述云謂
小兒受疾令是一門故不載入索問始自巫人願願經
篇章三舉自後智者繼述本末世傳諸家之善經述詳
要旨證準絕之者凡八十一家近世湖南潭州周宅廣
收其文專入編集目曰幼、新書四十冊僅數十万字
排列名方似涉繁碎就如元帥要退伏兵欲以一箭救
陣乃定太平役時求選一夫善射急於百萬軍衆皆張
矢矢以待比較優劣臨機對壘就敵之勢不可得而用
之奇正退其潛伏猶豫再三乃非良將者耶臨時檢閱
審較可否考其效驗正由渴而掘井闢而鑄兵不亦晚
乎學匠之士若不究竟胸次了、肘後簡往直截扶危
之功若也取次緩慢智意不速傍徨之久出不得已肆
意而說自不知慙而且愧有如馬服子強戰無不


孫子曰上兵伐謀可以此喻良匠用藥何異良將用兵
匠無智則不可行將無謀則不道者托犬馬之夫難與
言其至理局能以知其道若夫文武匠卜農工商實行
之以禮務之以本識其道者無不貫之矣執匠之士不
明是道妄恣苟簡必有利臨於其間斯乃何亦之流溫
茶無佞直節有規方乃謂匠之士明道而見之達理
而門之良由務學則閱聰、閱須知叙、知則專誠、專
乃通性、通則明道、明則任用以副自然所謂常山
之蛇擊其中則首尾俱忘匠之亦已處用得中無不心
節斯乃謂明道之理如此宜于究竟而已矣

漢山省翁活幼口說卷之三

新刊演山省翁活幼口議

議卷之四

青島精忠堂



議伸舒

議初生牙見證候
夫男女以正夫婦遵乎德義合乎陰陽以運生成之理者順乎天地之性應乎四時之令榮衛流通潛虛得教是故胞胎含蓄血脉造化豈能逃乎玄元綱紀哉所以得其正教者愚魯之為能失其正教者富貴以為懣皆滋養各由本質故賦之有利鈍稟之有虛實賢哲明智庸野鄙陋皆共由之斯可知矣今之孕婦懷胎保以為常飲食不節起居不宣未誕之間勞役衆若男子視胎以為常恣其所欲任其所施頻投觸穢所以兒生之後百脉致虛三焦不順閃竅不通榮衛不和者初生之間便作疾患怪異多端不可得而詳述今舉二十有六證候察而言之智者察之審其可否比附與之療理助其榮衛調順經絡得宜而已

議初生牙見證候二十六篇

議呵欠

議曰呵者即張口而又合之欠者謂神不足故名呵欠非是疾病初生牙見多有此作不足怪訝錢氏有謂呵欠逾悶良由胎氣怯弱榮血不壯衛氣少順即不蔭心血不蔭心則神不守神不守則呵欠逾悶無他愧也古方有朱砂蜜法用煎人參湯調和飲之若不若定志圓五七粒麥門冬湯化開與服至妙也

議曰伸者突其曾堂展其氣脉舒者引其頭頸直其手足舒而作之良久復作初生牙見多有如此亦非病也良由母懷胎胞起坐不得寬展或將絹帛兜束肚皮或繫襁褓勒縛大緊或臥已盤旋或睡不轉側是故偃偻胎囊氣失舒暢降生之後自然如此若偃知與梭揉未知調之百脉宜將五木湯浴之功效謂用桃李槐柳皂莢各取枝煎湯候溫與浴仍與觀音散少少與服效且妙矣

議噴嚏

議曰肺之氣壅脹理不通外感寒邪或已傷風閃竅閉塞鬱鬱于中及至噴嚏方有少解不能發散漸入曾堂逆生痰熱痰熱既有即加之咳嗽輕則氣促短急重則驚風搐搦搐搦之利若在初生尚云不可宜與消風散服之咳嗽宜與金沸草散人參羌活散二藥皆和且順雖則嫩弱服之無恙其劑溫純化痰利膈效之至矣

議臍突

議曰胎乃育形臍乃根本胎氣固則形體壯壯臍深則根命長受氣幸遺形萎臍突凡兒斷臍利益漸長漸深吻乳調和愈固愈實是血脉之相順致形體之相資初生之兒有熱在曾堂則頻頻伸引呃呃作聲努脹其氣抑入根本之中所以臍突腫赤虛大可畏無識之夫將

謂斷臍不利而使之然者非也臍折下盈尺一蹠之內
隨其根蒂自腐實者深之弱者淺之深淺之理以其稟
賦得之此乃良由胎中母多驚悸或因食熱毒之物有
你宜與大連翹飲子其熱自散其臍疝本不必以藥傳
之恐毒傷入為害醫工當知之矣

議夜啼

議曰王氏舉水鏡先生云天蒼蒼地王王小兒夜啼踈
客室又云啼而不哭是煩哭而不啼是躁無辜賦云夜
多啼而似祟凡初生兒日夜煩啼真如有祟或謂熱在
心經藥與踈利或謂寒停臍臍與服溫煖醫者察而治
之乃善也若兒啼哭曾堂仰突首反張嘉灯者心經有
熱宜踈利服三黃圓或洗心散加灯心麥門冬子良若
兒啼哭頭低身曲眼閉肚緊者臍臍留寒宜與溫之胃
風湯加黃耆煎效若不識證候但以蟬蛻二七枚全者
去大脚為末加朱砂一字蜜調吻立效

議口生瘡

議曰嬰孩口古生瘡乃心脾受熱流沫煩啼盛則不乳
妙藥良方已載于後然牙兒吻乳之初口内生白煩躁
駭人者莫知其由將謂神藥使之究竟其理母於未誕
之月恣飲酣醢貪食肥膩熱毒胎氣所受其兒脫胎之
後所襲熱毒之氣悉皆散出于表舌係于心唇于子脾
所言心脾熱是也欲以下其氣未可利臟腑但以吳茱

黃末米醋調薄脚心後夜即愈藥性雖熱能引熱就下
其功至良又有心肺熱者瘡潰頰頰初作數點胭脂紅
漸散斑駁如丹加之身體有熱連翹飲主之但禁火氣
餘無恙矣

議身體熱

議曰嬰孩變蒸作熱按法應期三十二日方初變又三十二日乃作蒸
所受相參有造化之令者脉氣得之煩助也其或太過
不及所發變不應脉蒸不順時榮衛逆之流行臟腑失
之安益胎氣蘊伏誕降傷和兒與母俱勞其神脉共身
總受其熱善調理者循其法度調而理之法以度之七
日之內初生胃弱不食如餌少頃即愈法以父母各呵
兒顛七遍父先呪之曰爾為吾兒順適其宜我精我氣
受大弗迷陰陽綱紀聖力扶持薄有違令隨呵愈之急
急如律令母復呵呪之曰爾為吾子胎氣充汝我血我
脉母艱母阻萬神唱生有福為主稍失調度隨呵而愈
急急如律令次煎葱白玄參湯或五木湯候溫浴立效

議血眼

議曰胎氣充足兒將分降胞囊已破先行清水其兒既
誕血即送下緣由胞氣頗遊轉側差緩其血壓瘀疔皆
遂致濺淚盛則灌注其睛不見瞳人輕則外胞赤腫上
下爛眩若投涼藥必寒臟腑宜與服生熟地黃湯流行
氣血或用杏仁二枚細嚼乳汁三五匙臍粉少許蒸熟

以絹片包蘸頻點功效重盛者加黃連朴消最良

議卵腫

議曰外名膀胱內通腎臟一處承受三經所傳其外腎冷熱皆由心氣主之心經有熱熱入小腸或赤或白或淋或澁心經有寒寒流膀胱或秘或疝或腫或光凡兒初生兩箇石子俱大光浮名曰卵腫一邊差大名曰偏墜蓋由驚氣所行傳受于中或母懷孕驚憂之氣不散胞胎之間兒亦受之所以生下便有卵腫外宜黑散傳之內用清心順之黑散者用黃連黃芩大黃黃蘗等分燒留性為末猪膽汁同蜜調傳之立效清心以犀角地黃青與服若有熱大連翹飲宿夜安定晨朝慶之

議蛆瘡

議曰初生牙兒至於長大三焦四體五臟九竅皆持全功不作瘡癩者元因良婦善護胞胎不貪媠慾從已受胎至于降生更不交侵男女實幸其兒氣血相參榮衛相順臟腑自和皮膚自滑一見兒孩肌膚頭面斯可知之矣嗚呼為人起根成自一點不淨之物處母胎中漸敦形狀臨產之時真智相投以隨業力而生其有匹夫匹婦何以知其至理恣心合意即於臨產之月尚行房事以亂其氣以傷其脈以耗其神以敗其血兒生之後遍身瘡潰滿頭瘡瘍精神不爽啼哭煩躁並是胎內所受以穢觸淨以邪于正賢士明公不言而唯愚魯鄙野

豈可告哉謹書請鑒切幸聽之

議鼻塞

議曰凡兒稟賦胎氣充實三關九竅五臟六腑內外呼吸上下貫通流行百脉正順三焦者皆由所協元命自然之氣也凡產牙兒三朝五日六晨一臘忽然鼻塞吻乳不能開口呼吸者多是乳母安睡之時不知持上兒子鼻中出息吹着兒顛或以水浴洗用水溫冷不避風邪所致兒鼻塞宜與通關膏傳之消風散服之或有驚悸作熱杜薄苛散與服通關膏用白殭蚕猪牙皂角荆芥香附子川芎細辛等分為末

議聾耳

議曰凡兒胎氣不充實閑竅不通利蓋由稟賦不足胞資有虧臟傷腎經腎為根本水之一教也外應耳孔或去水入耳或曰乳汁入耳較之即非兒生氣脉根壯臟腑固實雖水及乳入耳必不此作自是氣不充脉不實使之然也兒無補腎之方但清心肺而已初生之兒而有作尤甚重也卒難療理用藥傳糝少愈愈而後發至于過周與服黃耆白茯苓人參白芍藥川當歸熟地黃甘草等分作湯劑以固其內內若固實不必糝傳亦自差愈糝方用壁上蜘蛛一枚瓦上火乾坯子白礬腦子麝香各少許同研令勻雞羽引入自愈

議便血

議曰兒生七日之內大小便有血出者此由胎氣熱盛之所致也母食濃酒細麵炙煨醃鹹等流入心肺兒在胎內受之熱毒亦傳心肺且女子之臟其熱即入於心故小便有之男子之臟其熱即入於肺故大便有之血出淡淡有似垢水盛則其血加鮮凡遇有此不可它藥盡以生地黄根研取自然汁五七匙一二匙蜜半匙和勻溫溫與服移時安愈男皆効不請醫甘露飲宜莫與服不必地黃黃一無忌勿自忘投圓散徒勞矣

活幼口議卷之四

活幼口議卷之五

議發癰

議曰母患血熱兒在胎中受之其血亦熱母氣壅兒在胎中受之亦壅幼氣壅聚在經絡臟腑之間積滯不散毒氣相交內不通利即從外消外無能消其血與氣壅在一處多是生背癰或脊督脈腫大如拳紅赤似血其兒本軀是一塊腐血又如生塊壅毒卒未能消醫有何法若述之士全不勞苦以鍼灸熨柄取次攻之十不得一外傳用朴消天南星川當歸秋芙蓉葉黃蜀葵花乳香木鱉無名異其壅已熱即研白丁香少許津唾調傳菘豆大良久破潰膿血送出宜先與服托裏排膿消毒散熱藥宜用生甘草瓜蒌根苦梗桔梗北枳積川當歸綿頭漏芦錦紋大黃等分為末服一錢七煎熱與服以利為度剋効万一不可荒亂意欲速消以惡毒草藥致咎難保苦哉

議撮口

議曰兒患諸風疾傳入惡候至於撮口病致危急凡有脐風撮口胎風撮口鎖肚撮口吊腸撮口疔疔撮口應病悉入成風 入心脾俱能發作夫患在撮口者皆由結滯于中于及腸胃閉不得通氣不能化腹中滿脹肚上清筋撮口不乳証狀不急若不速與利不無因救療醫工若將撮口以為常則候傳入豈可投藥應急用以

真珠天魔利之純通疾去氣和兒活者故信而已

議合殼

議曰胎受已滿產降必全一氣而包養開九竅以通連在乎十月之中形骸已具分毫片時之內谷道無穿所緣兒在胎中七孔九竅若不通利如何四体百骸而能生長期由熱壅所致肺經之極結于狀口閉兒不通降生之後無腹滋潤乾燥之合若投寒涼之藥愈閉不通若不溫平之藥而又不通即是兒氣不順腸日月虛泄谷道乾燥閉合可畏方不詳載藥無驗速至於此等定須當以物透而通之金釵為上玉簪次之蘇合香圓內入孔中九孔刺三寸許尿出為快也曾見肚門內合

小便通利大便至死無能通者愚鄙燒火筋刺之事出不得已既內合決無奇方試以金玉重力刺之尤勝火筋智者別有妙法請著其後以濟哀若宜哉又有初生胎熱一二日不通者與服洗心散以通為度四頓飲加荆芥煎亦良

議閉小便

議曰小腸乃心之府也水竇流行隨其氣而利之心氣若壅小便不通心氣若冷小便多酒音謂酒也心氣若寒小便多旋心氣若熱小便艱澀心氣積熱小便白赤赤先而後白所言閉小便者依謂下結腹肚脹緊膨滿不通其結熱盛用力努旋點滴而出乃是閉不通利于心疼

痛精神昏憊速用生大地龍教條蜜少許研傳並印仍燒蠶蛭紙灰留性朱砂腦子麝香同研煎麥門冬燈心湯調與服移時見效

議盤腸

議曰氣和乃升降安樂之由也氣逆則壅結疾病之致也如：有患盤腸非暴所得元由氣鬱積久不散榮壅衛結五臟六腑无一舒暢其氣乘虛發作衄流上下築溢于腸胃之間有聲汨碌連：而設如猫吐惡視之不忍何以所堪差乎一身四大無主又有弟腸一證寒氣壅結內不伸舒雖下引氣鼓動臍臍膏堂與臍上下弟促躬曲區傳就惡疼痛二候既作駭醫驚眾然俱氣所患受發不同盤腸宜以勻氣散加沉香煎服之無不愈弟腸當用真珠圓加以沉香亂香煎釣藤湯送下微通即痊然後更與調氣順助根本方佳勝也

議咳嗽

議曰咳嗽屬肺經所主肺主氣外屬皮毛滕理凡諸牙兒嬰兒日夜切與保持毋令風吹腦顛背膝致便肺受寒邪咳嗽不已作熱多痰若被風吹即曰感受次第傳之五臟虛處即任所入蓋初生兒氣微易得傳變良由頭動五臟有傷和氣五臟不和三焦不順故有傳變是以我生於一腎水也腎主虛邪生我在五脾土也脾主食吐逆虛痰四肢唇口我生於三肝木也肝主風癩癩

眼目剋我即二心火也心主驚恐悸頑涎血脉腫極其
嗽傳受或吐逆或痰涎或厥冷或恐悸至眼目兩眸黑
紫如被物傷成重發癩右人云久嗽成癩謂藥力不及
候已傳過難可調理預當告之

議呢乳

議曰產婦血敗者當下榮者化乳血下不盡母致其疾
乳有不調兒招其病凡兒吻其乳有不到於胃堂氣滯
積隘或冷或饑故以呢出或問之無恙否曰不宜也久
呢令兒神困力乏氣怯肌羸脾家若虛遂作癩疾及至
成疾脾風定矣初生與同醉之兒胃氣未備穀食未登
全藉吻乳快如無恙自然臟腑充百脈順肌体壯神氣
清切、失乳如人絕食、為根本資養性命豈可絕乎
乳幼本只柔弱血氣輕微臟腑淺薄根基危脆豈可失
乎乳之若失非膠甚多乳之若絕性命難保其或母用
性不順則氣血亂氣血亂則乳汁不和乳汁不和令兒
呢逆宜其速與察理若作尋常必致害生小沉香煎及
鹽菟圓魚與服之當飲其驗乳母宜服霍香正氣散加
枳朮至良

議自汗

議曰血不榮則神不備氣不衛則脉不充理其血用和
其氣安其神用調其脉陰陽均平氣血相參百脈順流
三焦五臟自然以益其体凡生至周醉之兒不可自汗

自汗即亡陽亡陽即氣怯氣怯即脉虛脉虛即神散神
散即驚風作驚風已作搐搦施為醫者失之究竟血不
氣不衛作疾不輕為害必大禍生起於微人事何不察
庸夫反笑之曰自汗豈能成風癩耶愚曰渠莫知其所
以然者非我交也幸此一端虛以類之智者應有諸云
觀其瀾而探其海知其末須明其本通變之士審乎得
失是非、非、不離乎中裁度踈謹而後已察礼切自汗
切勿止之方用白朮一分小麥一撮水煎令乾去麥為
末煎黃芩湯調與服以愈為良若以止汗反為開氣作
熱煩躁所謂氣血相參則汗自止矣

議自利

議曰自汗不利者由血不榮虛于表也自利無汗者由
氣不衛虛于裏也其或有自利亦自汗者榮衛俱虛也
凡為其人止藉血榮氣衛扶育身体血既不榮又氣不
衛裏外不相參上下不分降閉竅不開通經絡不調適
榮衛不循環臟腑不充求且醫工何以良餌則性命何
以保持究竟在始醇全幸之良由水穀不分自利腸胃
怯弱自利臟腑不和自利冷熱相制自利陰陽不調自
利榮衛不順自利前件自利皆由氣虛得之初生如切
忽尔自利者與順榮衛平調陰陽制其冷熱和其臟腑
分其水穀生其胃氣則內外充實何泄利有作宜以
參苓白朮散加以車前瞿麥姜朮同煎更量虛實加減

議哭無聲

議曰鍾鴻聲大潤遠流長形處胞胎之中受氣充足水火兼濟心腎不虧耳目兩竅相通大小二腸相佐所以發聲清響洪亮者根固本壯稟賦充實而自然之理也初生啼哭發聲不出呢、而作鬱、而為其或短數上下氣不相兼醫與果訣云此由胎氣不足何更投藥假使成人父母不悅吁哉根本不壯何須藥餌如果木之萎水奚宜也古意速用父母呼呵及以葱熨令聲發越雖然妙理奈緣目無根本產子育兒當知其義理哉

議視无情

議曰天地清明萬物咸明一氣盈通三元克備人之受

胎應教降生之後不以貧富其子皆致精神全氣脉壯視听欣嬉取與喜怒周辟之間於人事情懷意旨憮叱以知其逆順方可謂兒孩性識之本也其或周辟已過不認名不親親常、然顏感容喝臉含啼東喚西向南呼北面其坐若木其臥若尸其行即蹶其立用擬筋骨氣脉柔怯虛弱食不辭飽渴不知飲若也長成慵蠢必有如此胎氣於數不足者難保千日良方妙劑不謂此設醫宜察之學宜究之

議反身張目上竄

議曰此等證候係驚風惡逆所發初生三五日之間便有舉目上竄將身反張然其非疾所作情實駭人凡醫

工必作驚風療之其候非也萬一所由兒在胎中受母飲食熱毒之氣蘊在胃堂誕下三日之前宜與黃連去熱臟粉散毒古人預計利害其又與人參未安湯皆清心肺積毒既化兒腹無恙若不如此所生箇箇反張上竄或有无作之者鄙婦不因食散熱毒之物何可怪哉或投驚風涼藥亦愈但項明其所以用藥智者裁之萬一不由驚風所傳幸與詳悉

議乳失時哺不節

議曰物萌失之灌溉長必萎焦兒誕遺之乳哺壯必怯弱大凡生成之理合乎中道者以應運化之宜也夫人失乎正礼者乃違玄元之教也凡兒在胎則和氣養之食不及乳乳飽即不食無致剝也雖食無乳禍害生焉是故乳不可失時食不可不節乳失時兒不病自衰食失節兒無疾自怯乳者壯其肌膚食者厚其腸胃所謂乳哺二周三歲則益其軀今人未用奪其乳入月恣肥甘豈不致疾傷害熟為吁嗟

演山省翁活幼口議卷之五

新刊演山省翁活幼口議卷之六

小兒形證訣歌

初生牙兒一塊血也無形證也無脉有驚當知是胎驚
有熱當知是胎熱三朝網袍未知安七日一臘古來說
脐風撮口老娘率鎖肚清筋唇口撮又有因邪客忤兒
不乳一宵神自脫只將妙藥保安康良久牙兒命得活
若知難救命須更嫌兒指甲兼唇黑女子初生小便血
正是胎中受熱得男兒兩目閉不開或患丹瘡俱熱極
目閉丹瘡消毒良血出須用生地黃又有初生便發延
或將向火或加綿神情不穩目斜視強直反張深可憐
醫人若作驚風錯但只凉心便安樂須宜以許地黃多

更如些蜜神仙藥牙兒未周不識驚忘他聲響不安寧
目內半周名極祿驚熱須當頓變蒸三十二日為一變

六十四日為一蒸一十八次變蒸足方有脉自寸口生
變蒸木足在面部左眼大陽陰右處眉按上下俱是木
準是中宮鎮星土耳間屬腎常土虛唇口兩畔脾所居
面中臍臉屬心火惟有人中是肺都五行相生重却輕
若還相剋着工夫順候易理逆難療智不通兮性莫寬
心主驚兮肺主氣肺主風兮脾主味胃家不得冷兼虛
吐瀉下止驚風至自古皆言心主驚五臟六腑有驚名
心驚血散氣不復流入虛堂百病生肺驚呖水肺喘細
乾嘔無時脾胃腎候咬牙肝搐眼夜啼腸恐臉紅心

五心熱是脾招悸面青下白膽生驚若在三焦終作渴
或入膀胱即痛聲

脉指訣歌

小兒食指辨三關男左女右一般看皆知初氣中風候
末是命門易亦難要知虎口氣絞脉倒指看形分五色
黃紅安樂五臟和紅紫依稀有損益紫青傷食氣虛煩
青黑之時證候逆忽然純黑在其間好手醫人心膽寒
若也直上到風關粒米短長分兩端如鎗衝射驚風至
分作枝又有數枝弓反裏順外為逆順逆交連病已難
又頭長短猶可救如此醫人子細看男兒兩歲尚為嬰
三歲四歲幼為名五六次第年少長七齡八乳漸論情
九歲為黃十稚子有病開隔辨其因十一痲疾蹄癩風
疳病還同勞病攻痞癖定為沉積候退他潮熱不相同
初看掌心中有熱便知身體熱相從肚熱脚冷傷積定
脚熱額熱是感風額冷脚熱驚所得瘡疹發來耳後紅
小兒有積宜與塌傷寒三種解為宜食瀉之時須有積
冷瀉須用與溫脾水瀉且與滋臟腑先將瑞腸散與之
孩兒無事忽大叫不是驚風是天子大叫氣促長聲驚
誤喫熱毒悶心竅急須吐下却和脾若得驚藥真堪笑
痢疾努氣眉頭皺不努不皺腸有風冷熱不調分赤白
脫肚因毒熱相攻十二種痢何為惡禁口刮一作滑腸大
不同孩兒有病不可下不熱自汗兼自瀉神困頭陷四

肢冷乾嘔氣虛神怯怕吐虫面白毛焦穗疳氣潮熱食
不化鼻塞欬嗽及虛痰脉細腸鳴煩躁訝若將有積與
疎通下了之時必生訖孩兒實熱下無妨面赤睛紅氣
壯強脉大絃洪肚上熱脈顛喉痛尿如湯屎硬腹脹照
助滿四肢浮腫夜啼長過体生瘡肚隱痛下之必愈世
為良

指下脉訣歌

二三歲時看虎口更加中指按高骨浮即風生數主驚
紫是癩癩洪作熱沉細腹痛緩沉虛瀉痢多由此脉初
微遲有積魚虫盛遲墻元來胃腕迂四歲脉不在指端
一指高骨按虛實五六衮轉尋三部平正關上為準則
七八稍移指少許九十次第分位取十一十二也同者
十四十五三指觀小兒有病脉不多先定浮沉遲數音
數音沉遲為陰浮數陽更者面部屬何方青色驚風白
虛瀉赤生痰熱黑難當黃是脾家瘕積作醫人審度療
何方

三脉五脉直說

凡看小兒初生至半晬之間有病即與看額前眉上髮
際下以名中食三指輕手滿曲按之兒頭在左舉右手
在右舉左手食指為上名指為下若三指俱熱感受寒
邪鼻塞氣竈三指俱冷臟寒吐瀉若食中熱上熱下冷
若名中指熱夾驚之候若食指熱胃堂不寬若名指熱

乳食不和

議曰半晬以上方可看虎口周晬以上看虎口兼一
指脉若五百七十四日變蒸滿足只與看一指脉以
食指衮轉分取三部凡言三部者非寸關亦係小兒
三部面看氣色為一部虎口紋脉二部寸口一指脉
三部五脉者上按額前下診大衝併前三部謂之五
脉凡兒有患不屬惡候即不可與診大衝之脉其脉
定生死之要會也其證候危惡故當診之不可看恐
污人情傷於不任用矣

三關指紋要訣

未中初

命風氣

未關命門

中關風候

初關氣候

流珠形

主萬熱三焦不和氣不調順飲食欲吐或瀉作
熱或腸鳴自利煩躁啼哭

環珠形

主氣不和脾胃虛弱飲食傷滯心腹膨滿作熱
夾食虛煩煩悶

長珠形

主夾積傷滯腹肚疼痛或有寒熱脇肋膨緊合
不剋化或虫動不安

來蛇形主中脘不和積氣攻刺飲食不下疝氣欲傳臟腑不寧膨滿乾噦



去蛇卷形主脾虛冷積泄瀉或吐或渴煩躁氣急喘息飲食不化神困多睡



弓反裏形脈內感受寒邪頭目昏重心神驚悸沉沉點點倦怠昏閑四肢稍冷咳嗽多痰赤色小便



弓反外形主痰熱心神不寧睡臥不穩作熱夾驚夾食

風痛證候



鎗形主邪熱痰盛生風神情恍惚睡不安穩欲發搐搦驚風傳授




魚骨形主驚風痰熱證候已定可以截風化痰利驚退熱不作諸惡候若已傳過必作它證



水字形主驚積食積熱煩躁心神迷悶夜啼三焦不順痰涎壅盛涎潮口禁潮加搐搦



針形主心肺受熱極主風驚悸煩悶沉沉默默不食神困四肢垂蹶及驚風暴發痰涎壅盛搐搦等候



透閃射指面主驚風痰熱四證皆聚停在胃膈不能散其候所受雖重證順則可療



透閃射甲主驚風惡候受驚傳入經絡風熱發生併入八候虛痰不下危急惡證難可療治

指紋脈訣說 脈有黃紅青紫黑色

議曰黃色無形者即安樂脈也紅若無形亦安寧脈有前件形者即病之脈次第而變初作一點子氣閃多紅脈至於風閃其色方變紫色病已傳過青色已受之極黑色其病危急純黑分明不可療治三歲已上病重危急指甲口鼻多作黑色蓋見脈絕神困證候惡逆雖有妙藥良方亦用孩童有命

議指紋脈總要

議曰消息指紋脈訣考詳諸家所載參較至理其說不同所以錢氏王氏二家文意並不該載但只言論其證候而已然而證候且幼幼之疾若不定其指端說病是何用意僕留心頗又其故脈述之不繁猶參諸家之善前後所斷龜鑑較其正理醇乎醇故不勞再三乃訣定如此者挺然微妙曲全一家直指明智之士試更考之

必有益諸形容母曰管見可也

詳解紋脈

議曰流珠只一點子紅色環珠其形差火長珠其形圓長以上非謂圈子摠皆紅脈貫氣之如此來蛇即是長珠散一頭大一頭尖去蛇亦如此乃分其上下故曰來去角方又張其裏外向裏為順向外為逆鎗形直上魚骨分開水字即三脈並行針形即過關一二粒米許射甲命脈射外透指命脈曲裏一十三位悉有輕重元由一氣自微至著從漸至總輕重參詳前云五色者曰黃紅紫青黑由其病盛色能如變又博加進即越黃紅之色紅盛作紫又有紅紫之色紫盛作青又有紫青之色青盛作黑又有青黑之色至於純黑之色者不可得而療治之也

新刊演山省翁活幼口議卷之七

小兒面部氣色并序

夫天地有儀故稟賦生成相貌男女方質猶陰陽假合形軀五體之中面目彰乎氣色五臟之內神寓有以災祥形究真邪潛一氣而分部位脈推隱顯洞諸經以測源流剋伏侵臨剛柔升降生我我生即山中獲吉剋他他剋應順裏招殃肝家無氣常宜腎水澄清謂有精他準多光必俱臉瞳火鹹元人有火色土史何况小兒唇紅作渴頰赤鏡驚眉頭露父母寧憂額上赤醫工少樂凡理嬰孩先看面部定氣察色取為要也良由內有疾而形于外是以本位與地位一体和悅易安氣色其神色交參病傳難療先求逆順次較盈虧交侵臨入不逃乎源危寫死生必知乎本輒述于右諸更推詳舉一隅以類衆隅請三索而還再索妙在智遠良用心通醫工善理所謂多智多謀藥效方書宜其廣知廣見深求決定取舍專誠良師致力不昧乎方學者行醫須盡其理至誠壺壺難以述之務學惟精得中為妙

五臟五色本立

心主紅 脾主黃 肺主白 肝主青

腎主黑

五行相生

金生水 水生木 木生火 火生土

土生金

五行相剋

金剋木

木剋土

土剋水

水剋火

火剋金

五行相生相侵

心氣侵黃

脾氣侵白

肺氣侵黑

腎氣侵青

肝氣侵紅

五臟生本相臨

心氣臨青

脾氣臨紅

肺氣臨黃

腎氣臨白

肝氣臨黑

五臟勝伏相交

白色交心

黑色交脾

青色交肺

紅色交腎

黃色交肝

五臟受敵剋入

黑色入心

青色入脾

紅色入肺

黃色入腎

白色入肝

五臟畏愛

肺本辛金

愛巳丁火

腎本癸水

愛辛巳土

肝本乙木

愛庚辛金

心本丁火

愛癸亥水

脾本己土

愛甲子水

五臟子母生成


肺脾是母腎是子

腎肺是母肝是子

肝腎是母心是子 心肝是母脾是子


分定五位所屬

心 臟 部 位




額面臉頰心火所屬氣池之下法令之傍食倉之上高骨取之一寸二分皆屬心之部位

脾 臟 部 位



承漿之上人中之下法令之內食倉之傍其合即唇其開即口合即屬脾開即屬心四方二寸四分撮動之所皆脾之部位

肺臟部位




準頭至山根兩孔并中梁皆頭直下年上壽上裏外通息皆屬肺之部位

腎臟部位




耳花及輪廓文臺山林頭髮際兼地閣四維如海岸皆屬腎之部位

肝臟部位



風池與正眉氣池泡皆頭上下駁動處太陽及太陰連及山根所皆屬肝之部位

命門部位



天中與天庭司空及印堂額角方廣處有病定存亡青黑驚風惡休和滑澤光不可陷兼損純黑病難當青則甚憂急昏黯亦堪傷此是命門地醫人抄較量

五臟伏敵喜傷

肺所伏者心所敵者肝所喜者鍊所傷者焦苦二變七

蒸之臟和則喜懼氣爽神清鬼強疾主喘滿欬嗽傷

風作熱虛痰壅盛

腎所伏者脾所敵者心所喜者鹹所傷者甘甜五變十

蒸之臟和主行坐嬉戲笑語疾主崩砂黑齒齧齒咬

牙停耳膿汁

肝所伏者肺所敵者脾所喜者酸所傷者辛辣初變六

蒸之臟和則魂神壯意智生疾主風李搗搗眼目腫

赤疼痛

心所伏者腎所敵者肺所喜者苦所傷者鹹因三變八

蒸之臟和則情性悅樂疾主驚癇恐悸虛躁啼叫譫

語狂煩涎流口角

脾所伏者肝所敵者腎所喜者甜所傷者酸醜四變九

蒸之臟和則消穀氣美飲食疾主嘔噦疝積虛痢瘡

癖潮熱不思乳食

面部氣色摠現

五位摠作流波泛澱隔懸照藍青色者驚積不散欬發

風候其神彩觀觀不穩上上下下證變風生

五位摠作閃爍射丹妒映火紅色者痰積壅盛驚悸

增進其神彩視物不定恍惚候變驚速

五位摠作混蒙汗漿衣傳土壅黃色者食積癆傷欬作

疝候或痞癖有之其神昏顧散漫昏沉其候寒熱潮發飲食不化氣短短滿困倦喜睡嘔噦有之瀉痢有之

五位摠作濕浮虛野露入谷白色者肺氣不利大腸滑洩水穀不分欬作吐利其眸疑濁失其精神朦朧性情不有尤滑全無五臟少實百脉多虛或吐利之後有失調補

五位摠作漫黯塵灰弥覆黑色者傳不順證變即逆候表裏有虧臟腑欲絕其血不榮其氣不衛榮衛失序絡流注凝帶於脉為疾危惡其神昏暗沉默者為不久也

五位分部定位

肺部所主

鼻孔名并竈夫處名準頭眼尾名大小紫中央坎垣名山根若鼻孔黑如煤即肺經焦或作黑燥如墨者即肺家絕其候難治鼻中赤痒疝盛蛔長或瀉白涕腦寒困寐或流涕涕傷風喜睡肺熱鼻塞因息吹得有妨吻乳閑竅閉阻感風寒邪熱亦如此鼻下生瘡潰爛即疝鼻中常臭積熱為咎

腎部所主

耳穴之前名曰耳花耳聾各輪裏名廊輪廓焦黑腎家虛熱其黑如炭腎絕死且耳門生瘡衛積非常耳中

膿出腎熱痛極臭名聾耳膿汁不止瘡痒如烈其候虛
熱忽聽不聰心腎氣壅常作閃熱氣上攻或如虫刮
榮虛衛熱耳輪如冰麻豆相侵耳輪紅熱傷寒是則熱
極內痛腫氣相攻清心涼隔閉竅通塞兒孩兩腎常虛
無病若有攻擊使令無益

肝部所主

眼睛有穴內藏其神外究五輪眵眊屬脾熱即生眵兩
眦屬心熱痛如針勾屬肺家熱赤生砂黃屬肝臟昏瞶
翳障中心瞳人昏熱不明兒孩眼目痛即便哭良方對
治更與忌毒或患丹瘡從裏為殃經效良藥速療無妨
眼本屬肝怕熱怯寒令有治法極理何難眼忽連眵驚
風交雜忽然窺視驚風已至肝絕定睛或翻無神瞳去
中陷十無一生

脾部所主

唇即口門語言之尊舌居其中飲食之宗齒牙咀嚙咽
喉相約牙質既剛角宮羽商嬰孩未定唇口見病上即
人中下乃承漿上下四方皆屬脾卿口內屬心脾有
熱舌瘡唇裂三焦蘊熱唇紅如血凍紅重渴輕即流沫
驚口暴口木舌色可以有設未兆之功可以預防也

種德書堂校正

善本鼎新刊行

演山省翁活幼口議卷之七

演山省翁活幼口議卷之第八

病證疑難序

觀夫泰岱奚曲累工混沌名山川源取次滿流盤旋到
海天地有自然之理至哲無造化之功醫究一門道通
千聖小方脉者乃衆科出倫議論之要也凡為調理先
裁可否之宜學習篇章首察艱難之屬誰知活人作德
我敢醫道通仙陰陽昭然行功獲矣於戲得師與旨未
契全真識性悟機方為至妙前賢著議後學推誠已述
淵源須窮確實持燈晦夜咨嗟撻植索途捧寶輝晨踴
躍良工與鑿漢輒判疑難事日聊陳管見因由一十八
章幸希同志詎堪品藻非涉狂誕誠詳淺陋之言必展

恢洪之騰一隅再舉三復方欽

病證疑難一十八篇

一 逆證似順

議曰順逆有別陰陽不均證候相如色脉致亂惟是驚
風發作按脉察證以較之陽候證脉俱得其陽陽者順
也陰候證候俱得其陰陰者逆也陽候有陰脉者其證
欲傳陰候得陽脉者其證反是也謂如急驚風乃是陽
痢得脉浮數洪絃陽中之陽又有得脉沉緩陽中有陰
慢驚風乃是陰痢得脉沉細遲弱陰中之陰又有得脉
浮大陰中有陽所言逆證似順乃謂陰中有陽助陽不
醒回陽不生其候偏虧雖則陰中有陽其陽非真脉使

疑貳不可攻理詳而知之察其可否而後已

二 陰證反陽

議曰小兒傷寒惟察表裏而理之不以陰陽證候究竟者蓋無聞前閱後之脉所謂純陽之孩合而言之此既陰候者慢驚是也凡兒吐瀉疾作慢驚其候無反證良由急驚傳來已成陰痢藥用寒涼證入慢脾藥用燥熱其候反陽者反從陽也其脉愈盛其證愈逆故云反也陰陽俱壞實謂難治醫工不知其所以但見其搐搦肆意退熱截風良久却不引搐但只合眼聚痰冥冥如播證候有如此何藥理之請該較之

三 陰盛強陽

議曰慢驚風候謂之陰盛及其欲絕之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸屬大其脉浮數其證強湯得之醫工將謂陽回以得其所宜與下痰藥用太迅痰涎即時隨藥而下兒命即時隨藥而化衆言醫殺之愚曰非也謂渠無智不識證絕而用之雖不下藥亦死之矣

四 虛極生熱

議曰疳候有作斯證初發即謂疳氣次第傳至疳極是謂虛極之候陰陽二氣不勻上下氣不升降榮衛兩虛臟腑滑洩豈可攻療善醫疳者隨順藥餌以助之淡薄飲食以扶之榮衛漸得均勻氣脉方得升降既而陰陽二氣已得調和臟腑已勻充實肌膚已自肥壯醫工已

知疳傳在虛候名作疳極遂與補氣藥服之稍多反生大熱所謂虛極勿補熱盛煩渴疾作疳勞名曰丁真皆由藥助虛極生熱而致之也

五 冷久必寒

議曰癥積已作證候所傳自是孩童飲食不化氣滯中脘再食停氣復傷前積積之為病皆致其冷冷之既久脾胃虛怯虛怯既存陰陽相勝寒熱間發痞癖有加脉氣無定醫工不理陰陽令其均平但作痰鹿治之或投砒或投粉賦粉也利下太速疾不去根為患反重難施和劑良由利動臟腑虛火入腹發作煩燥腹肚脹緊氣喘促難以調治療理此等證候究心毋忽保全是幸

六 熱多作燥

議曰熱分外身藉陰陽一氣受邪三焦致熱三焦者本質無狀隱伏得名所通五臟六腑相干血脉皮毛温平由實燥熱由虛靜則為之一名動則分之三所上焦喉管至臍中焦至于中脘下焦至于丹田以大拇指展中指作一握自咽喉坎分作三停則知上中下三焦所寓也温極即熱熱盛即燥燥盛即焦寄于其中矣大人患此猶尚不可况小兒三焦隱伏熱多作熱寒涼之藥所投不堪畢竟從長何劑調理若不早療疾作無辜

七 理實致虛

議曰虛則作疾實亦是病按實理虛遺病去疾內知其

冷熱外審其證候三寶兩虛神不安者三虛兩實人有
得夫虛之為病其候則速實之為病其候則緩實未致
害虛即作揭迅矣肝心脾肺腎子母相生肺肝脾腎心
五臟相剋且如脾胃虛嘔噦不食又心氣不足驚悸
有作所療子母俱虛小便閉澀利之可乎所以知其內
者母虛葦子實子虛藉母榮其又肺家有熱宜瀉之否
大腸滑利宜溫之可醫工但究母虛理其子實若攻其
子則母亦虛所謂母能令子實子能令母虛脾病瀉心
理實致虛矣

八 利表傷裏

議曰傷寒豆疹皆論表裏二義不同所受反是傷寒所
傳從表入裏豆疹所發自裏出表作熱形證與傷寒頗
似病家不究輕重所受相尚與服升麻葛根湯或過劑
飲餌其表已解其汗不上汗出稍多裏虛作渴且熱乘
熱悉化疹豆自然迥出所緣其熱利其表迥出雖多疹
亦不成豆亦不是比此小赤自其熱力有限裏外不相
續榮衛不加助即於中道而廢漸作黑陷非食毒感風
之咎自是助發大過失其自然之理至死莫知其由是
謂利表傷裏故也使良方妙劑難以助平表哉

九 退熱作渴

議曰小兒發熱一證與大人同熱在三焦方渴肺驚下
利虛煩方渴上盛下虛方渴水火不相濟方渴伏暑蘊

熱方渴津液燥竭方渴渴證本無但有其熱熱在手表
攻動其裏裏自無熱受之以虛表熱傳裏反致其渴表
裏俱虛引飲入脾頭面手足受濕虛浮作腫醫工下之
從增其病宜與表救裏庶幾有命方得獲幸疾證于
此死者多矣

十 療驚發風

議曰有痰者必有熱隨之有驚者必有風繼之利其驚
其風豈有散其熱即痰不生此醫家者流所得其宜調
理證候截風定搐以明其要也如此常見豪貴家兒見
孩童有熱不問元因便投驚藥日輒數粒月既積多雖
則驚悸不作心恐無妨其兒所服寒涼藥多脾胃虛弱
不吐即瀉遂成慢風更與驚藥愈加其疾調理醫工當
究其後免負其重禍害生焉

十一 風痰隱久

議曰風者肝主之肝稍不和則風所由縱痰者脾受之
脾若不壯則痰所由盛痰之與風驚之與熱四證互馳
則流行於經絡之由傳裏它疾所有風痰相襲久而不
化隱在肝脾所由飲食冷熱相于故不自散雖則療理
愈而後作以至長成且風痰常常在牙頰之間吐茹無
盡生發有因其風痰致病或作齟齬或作喘息或硬牙
關或腫頰頰臨於肺則咳嗽于乎心則恍惚善術醫士
未能速與下其痰恐風猖狂若逐其風又疑痰作梗須

是風痰並化炒藥奇方以徐以漸減瘥可也食不禁戒服藥無功若療風痰深意究竟不可致緩久則害發于疾當宜察之

十二驚熱無時

議曰因驚而得熱其熱常發不繫乎心而屬乎血更加氣血榮衛母得指環驚熱時常發作或生疥癬或發瘡痰熱來神困心虛熱去唇焦口苦呻吟求飲恍惚忠飢兒孩受此艱辛藥餌如何救療人參羌活抱不相關蝎尾當歸有芒巴鼻更尋炒餌病下于心說道難醫請誠著意

十三恐悸喘息

議曰驚悸心屬喘息得同而言否愚曰非心王之若心所受其疾不作喘發是知肝臟魂肺臟鼻魂鬼不安恐悸傷乎肝肺受其驚而受其喘須求木飲肝受其驚發喘細細若張口大喘者肝肺俱不利鎮心安神調氣定喘必未盡善當於損益寬鬼圓散瀉心補肝立見功效所述疑難更請探願毋蹶高安

十四食饒咳逆

議曰兒孩睡息奄奄怡遊擊響高聲傷乎其神睡中不穩乃心不寧乳切飢渴飲食宜細撥物觸志傷乎其氣令肺作噎千脾發噎其氣逆不外降其志分不伸舒陰陽左或胃襟鬱悶良久取氣發聲含飯面黑啼哭声焦

輕則咳逆致躁盛則咽塞不通所受之後常作欬逆者良由食饒觸擊悶挫閉竅宣通臟腑即不宜外降榮衛乃利益若不早治欬逆于腸終身致疾而難療矣

十五令子無草

議曰夫人所籍者陰陽而生所宜者氣血而長血氣不順則五臟以連其和陰陽不均則百脉以亂其脉流之於表裏相參注之於經絡致急凡周痺乳兒等悶捉舉又更齊齒身軀檢束頭目搖動此乃陰陽有虧榮衛失正疾名拘縲禁十二種無草疾之一也丹情不識見之喜笑後作寐驚以教令如其然也久而不已愈如其遍次非至喪之所攻無驚熱之致亦當為舒其氣調其脉均其陰陽適其洒浙止解下息裏寒有作休言乳幼無妨曾見父母慟哭

十六受氣不足

議曰三才降氣數成方謂為人万象論功道合始知得志胞胎既備心定神全血脉未充骨髓薄筋力藉乎骨髓智謀出乎心神為人恍惚者斯可知多忘者應由是恒倦者乃如然侏儒者必若此不及數之重者候存五軟大過受之深者身員五硬由其肺心脾肝腎所屬者氣血脉筋骨所受者軀骨項膝其或有疾於證候不及議者往往無草無草形骸必先定受氣不足謂如五硬五軟只許聞名稍有求醫難著方藥後進執謂堪與

療理者野老付之一笑

十七 飯多傷氣

議曰切切未降形處胞胎藉母氣血滋蔭由如養素已
誕之後繼時吻之以乳乳者化其氣血敷養肌膚百脉
流和三焦順順身肢漸舒骨力漸壯三周所迄一生為
幸其或母因產得疾血竭氣耗乳不成汁當召奶子看
顧貧乏之家食不繼口奚能謀比其乳少其食多不益
兒軀其有不產之婦抱切切繼宗終夜號啼惟飼飯食初
傷其氣次傷其形久傷其神重傷其命萎羸声軟躁哭
皮皺項軟足垂唇焦骨露但見眼有睛先將久氣散神
敗凡人生子究乳為上獨以穀食扶持十士未保一二
抑服圓散堪笑強為勉之急假乳蔭庶傳為人死中半
活矣

十八 臍中受熱

議曰初生未及蔭乳洗罷便用斷臍帶留一握綿裹三
重受氣根全者。臍自深成胎數關者其臍自突臍者受
質之根也為人之本也形軀之基也元命之寄也迭月
之前一臘之後其兒臍紅高腫不作水濕亦無風候但
將臍堂仰起呃呃作声闔家無見責之皂嫗有傷臍帶
致之非也百愚一觀察知心氣受之胎熱與利丁火少
項不展臍堂呃声遂止越宿視之臍根復本醫工與傳
及洗總施謬妄故書于楮果其宜哉謾舉願以誚之云

耳

演山省翁活幼口議卷第八終

濱山省翁活幼口議卷第九

議胎中受病諸證序

原夫胚胎血氣本自調順既成胎孕有失將護致使胎氣不安轉動不常胃觸根本初生幼幼邪正相干易得其病今述一十五篇弊而舉之欲使智者察其已身所受輕重所發逆順調治可否鞠育持令產婦以正其神養其血和其氣使乳汁溫平兒得調順雖有疾作而自安平過半矣重則減之為輕輕則去疾之容易勿謂輕之為重重則候變而作禍矣於戲萬物之中所尊貴者惟人肖天地生成之道故難值其安靜猶賦順淳和之脉抱純素渾樸之懷合清湛之淵源納運成之臟腑嗚乎受胎無益於形有傷加之藥誠在出不得已而致之若在胎內失調初生宜其和益若在初生失理則於襁褓之間而療之順乎而愈若也受之變蒸數足其所患猶未除散遂成宿疾終身之咎也其兒所受胎氣不足為患非傷肢害躰者並可與整使其子復獲幸之甚良工盡心斯為妙矣

議胎中受病諸證一十五篇

一 鬼胎

議曰婦人產育有患鬼胎者庸鄙謂婦人納鬼之氣而受之實非也鬼胎者乃父精不足母氣衰羸滋育涵沫之不及護愛安存之失調方及七八箇月以降生又有

過及十箇月而生者初產氣血虛羸降誕艱難所言鬼者即胎氣怯弱榮衛不克致子萎削語猶如果子結實之時有所蔭藉不到灌溉為物褊小其形猥衰無有可愛如此之謂胎氣陰萎常與圓散扶挾乳哺勻調氣血充蔭腸胃固壯即保其靜善蓋由受氣不足稟賦不全忽爾橫殤非可惜耶

二 魃病

議曰小兒有患魃病者非五臟傳變亦非六腑所主也緣兒生後方且周時母復有孕血氣所蔭分之兩端是故胚胎漸傷乳汁成毒虛邪相攻兒吻致疾欬率其氣鬱傷其神鬼令兒疝虛疝痲枯痺煩躁朝昏嘔噦日夜不可得療理但速與斷其乳溫平胃氣和順血脉自然而愈其有萎怯致瘦乃成無辜證候何足恠訝者耶

三 胎氣

議曰初生牙兒三朝之後滿月之前所受諸證作疾輕重不同者蓋由胎氣稟賦有壯有弱其母飲食恣全飽飽起止無忌坐卧不擇令兒得疾不寒即熱不虛即怯熱乃作重寒乃作泄虛則作驚怯則作結寒則溫之熱則涼之虛則壯榮怯則益衛驚用安神結用微利審詳用之不必過劑

四 胎病

議曰牙兒胎病謂月數將滿母失護愛或勞動氣血相

干或坐卧飢飽相役或飲食冷熱相制或恐怖血脉相
乱胎氣有傷兒形無補或因動土興工或由營葺房卧
或移安居或更薦蓆雖不犯凶神惡殺終于礙子胎兒
身有因如此得疾者乃成終身之患重則損根廢枝輕
則奉事跛躄若也胎病由氣之致患者乃尚可療或傳
成風為疾者斷不可醫初生幼幼有被于邪者即時和
順調理大凡生長嬰孩有如長江行舟一向不佞風濤
波浪方為穩當何向胎氣不固或生下作疾所謂萌芽
既傷將來易能榮茂矣

五 胎病作熱

議曰兒在胎中母多驚悸或因食熱毒之物降生之後
兒多虛痰氣急短滿眼目眵淚神困可欠不發神舒呢
呢作声大小便不利或通利即有血水盛則手常拳緊
脚常搐縮眼常斜視身常製跳皆由胎中受熱宜速與
服大連翹飲子解散諸熱次與服消風散數服無恙

六 胎氣蘊熱

議曰兒在胎中母多恚怒鬱悶之情不散又因胎氣燥
濕兒作艱難母生驚悸是致乳汁不和兒吻成毒故能
作熱令兒食即嘔吐眼不定蒂神不安穩聞響即掣苦
不解蘊毒熱如干久作無辜成疾害生先宜順氣次服
四順若不安愈慈根必効

七 胎病風熱

議曰兒在胎中母常喜食動風之物熱毒流傳致兒受
之隱在經絡則手足拳掌注入手脉則肌腠枯槁其兒
眼常喜流血不蔭心神不守含怯人怕物視作定目苦
不早療恍恍惚惚形骸難長情性垂拙為人多荒朝記
久忘雖久受病不無生蓋父母但知惜昔嬌姿安養
其無用之兒如此者凡胎風服藥至用貴細若以常方
難言功效

八 胎病驚熱

議曰兒在胎中母因驚悸驚氣入胎兒當受之降生之
後其兒精神不爽顏色虛白初則溫溫有熱其後頰赤
驚驚物初即恐声響即悸若不網抱安床取次難為調
適既有胎驚將傳胎風之候產母謹謹忌食一切熱毒
之物若作尋常畢竟難極蓋是血脉柔弱臟腑虛怯不
堪重剝何可攻繫是使智者怯懼有之苦也輕受熱已
自散即於項上生瘡其大如拳名曰驚氣須當破之而
後合之勿傳毒藥恐壞肌傷骸不惟傷壞深恐有害及
為無益禍莫大焉

九 胎病風痰

議曰兒在胎中母喜食熱毒之物熱即生風脾肺不利
遂有風痰雖不能損枝傷骸其痰與風相襲痰多風不
散熱感痰復生且風與痰皆能令兒作熱那堪更加燥
被紅爐母火爇醜醜動風之物即時害生藥非不驗

乳汁之咎也如兒或患風痰不必下截風化痰藥但清
心肺涼膈順利三焦則自然安愈亦忽可投大涼恐寒
臟腑所宜者以消風散吞下白圓子至良令小作圓

十 胎病結熱

議曰兒在胎中母失調理恣縱飲食不加將護蘊熱頗
久及至降生熱氣隱蔽傳入于裏遂作閉結其結由熱
極得之大便不通利衝心腹脹胸突撮口努氣停滯急
以三黃圓或四順七寶以通為度不必過劑切不可下
積圓子藥不惟無益恐反為害

十一 胎病寒邪

議曰兒在胎中母因感受寒邪熱氣煩蒸傳入胎臟兒
當受之乃至降生令兒關竅不通精神昏濁作熱如蒸
啼声不響或吐酸人未知之者將謂驚風妄動腦疳或
妄鎖心良由所受寒邪之氣初只在表久則傳裏所謂
邪氣以亂其真故血脈皮毛皆不得其便湊理所拘邪
不得解變蒸有違氣血致傷煩躁益增無能自暢但與
小菽胡湯服之稍輕次以人參危治散然胎中所受未
分表裏既生養庇當議和解為之良也

十二 胎病榮熱

議曰兒在胎中母於食物尤喜噉薑瓜古人有曰修甯
鉄唇食薑餘指蓋薑性至熱又是醃臘攻反血脉傳入
經絡輕則令兒偏躄生蛆瘡延熱毒瘡丹瘡之類經年

發作或於頭額生核重則發大癰癩潰即爛壞皮膚十
死一生何堪忍見初生幼幼毒氣如盛肌內柔弱參朮
托裏枸櫞扶芩 抱即地骨皮 是藥即黃蘗 常與清心平調血脈母慎
其口父抱令餒醫工順理與扶其危

十三 胎病衛熱

議曰兒在胎中母傷和氣飢飽勞役神疲力倦多矣其
有不勞從者即有憂愁思慮役乎其中動之真氣攻之
虛邪于亂神鬼流入胎臟兒乃受之既生之後兒常昏
困腹急氣竄重則喘急睡思不穩狂啼煩哭肌內下滋
亦生瘡癢熱發早晚精神少具良工正醫平調臟腑臟
腑既正熱目散止

十四 胎病臟寒

議曰兒在胎時將順其月母喜食諸生冷物過度令盛
既寒腸鳴泄利時有作降人之後其兒肚上青脉膨脹
虛緊之者乃是虛氣入腹呃呃作声日夜不禁雖則漸
長終是臟腑陰陽二氣受不勻調若不溫平分氣長成
痞結陽結易治冷結難醫仍宜抑母服藥庶得乳温令
子調和不至延病成害為之歎也

十五 胎病潮熱

議曰兒在胎中母曾發作子瘧或是因患瘴氣母或飲
酒無厭或是冒風傷暑熱入經絡有傷榮衛母雖不免
以脫其難兒襲其氣陰陽不解初生微弱血氣不和作

熱漸來先寒閉緊身熱作顛庸工未諳其理即以艾炷灸之經絡未全用之枉究醫士但與調中均其陰陽二氣若是肚緊宜以全條蛇蛻未醋炒令熱手怕盛繫肚脚上即漸安樂

演山省翁活幼口議卷之九

演山省翁活幼口議卷之十

十種證候發端

治法畧序

切聞天地之大惟人之性蓋矣物象之衆惟人之志鑿矣是故人為一物而灵於物氣受一元而妙於元惟智者為能明之然其天地不陷乎人物之根於是人物不逃乎天地之教無情者悉由造化而生有情者皆自交接而養倘諸先王之道君君臣臣父父子子成人人為後連乎上古參同天性順合聖意小人不知其所以愚情反是易足與語哉嗟乎既為醫工調理切切誠為不易須當裁度切切稟賦形骸有壯羸怯弱於脉較之涵蓄情性有寬緩暴急於神察之輕清重濁以氣定之冷熱虛實以色推之若也形骸不壯神全則未為咎色脉不充氣固則無作恙氣與神而有虧藉乎圓散脉共色以無補宜乎療醫氣壯即脉順脉順即神全神全即色正色正即五臟安和百脉調適矣色脉若不正定即與固其真氣真氣若不和則神不悅神不悅則形骸何安觀其脉則知其氣氣若不順則形骸羸察其氣則知其神神若不清則氣濁乱神者五臟之主也氣者一身之權也色者虛實之表也脉者溥變之令也脉之流行不可不察色之變易不可不究神之散漫不可不療氣之盛衰不可不理嬰孩五臟受虛其面白其氣怯其神潰其

脉乱其脉廷竇五臟受熱其唇紅其氣促其神昏其脉
 數其脉枯槁五臟受實其臉赤其氣壅其神劣其脉浮
 其脉煩躁五臟受冷其準黃其氣泄其神困其脉沉其
 脉嗜臥所由冷熱虛實傳受驚痺積痢凡病按其標則
 知其本省其絕則起其危後進攻醫但按圖說執滯湯
 劑不務實效今著是書乃述源流不特贅贅編求一隅
 以別之盡性考定以羨補不足益有餘故也即非調結
 膠柱鼓木亦魚之謂歟熟研其議至理自明無難解
 之意載留斯快好術之士足知可法以備閭閻後世有
 補劑要得無隱蔽當與智者鑒議庶彰不朽云耳

一驚風候醫云陽癎也手足搐搦涎壅大熱驚家一
 之其所用藥往往利以經粉或水銀已互皆有甚毒等既
 已甦省之後精神由尚昏沉未快乳食者或有餘熱其
 候欲得安痊和乎只可用平穩藥調胃氣不可直便與
 服燥熱藥若與服之其候復作何可恠耶

議曰小兒驚風之後胃氣多虛不食沉沉默默或瀉
 尚不止只可助胃生氣須以截風藥移在(平胃散)或
 (觀音散)中謂用全蝎天麻僵蚕白附防風羌活之類
 生薑枣子同煎自然胃壯瀉止諸風不作雖則驚熱
 及搐搦皆去其精神未爽不可便謂無事若用補藥
 助虛乾薑豆蔻硫黃附子之類則熱復來其候又發
 非病不除醫者妄謬病家無見亦不可不告也治急

驚之候正謂醫療宜可速云調理之說用藥乃在一
 時之久若也寬緩證候轉加深重醫者既知當下即
 可量其輕重如病五六分只下三四分許隨通且利
 熱去痰消則病與證次第徐徐而減症若不掃度一
 槩併蕩下之大過傷害臟腑疾傳陰證乃作慢驚風
 候豈可臨時生胃回陽誠為枉究既是醫工莫不知
 之矣

二慢驚風候醫云陰癎也良由急驚用寒涼之藥太過
 轉動深重乃傳作慢驚或因吐利不止而成慢驚或因
 澡浴感風不解而作慢驚或因風食二癎不治而變成
 慢驚或因咳嗽下痰轉虛而成慢驚因由甚衆槩而本
 之病家怕驚不怕瀉良醫怕瀉不怕驚其瀉不止則驚
 風愈盛若與治驚更用寒涼之藥且瀉轉多病加進重
 矣

議曰小兒脾胃虛怯方作吐瀉其證有五有熱吐冷
 吐虛吐痰吐食吐所言熱吐者謂母飲酒喫肥炙燻
 醃醢或冒風傷暑致熱兒吮乳入胃遂成熱吐冷吐
 者謂兒胃冷加以宿冷之物與食即吐虛吐者其兒
 肌弱神困疳積未消胃堂久虛即吐痰吐者其兒胃
 氣本虛復感寒邪生痰作熱留滯胃隔故吐食吐者
 其兒胃弱飲食不節強食傷脾作熱袖困吐後即逆
 病家但知其吐不明其所以吐且吐兼瀉共作名曰

霍亂其吐候又推輕重有五初則乳自流出謂之嘔
嘔之不已即謂之吐吐之不已即作嘔嘔之不已即
傳噁噁之不已即作噁於月自嘔噁噁皆有出聲動
氣嘔者口開而作噁者心胃上下氣逆鬱築噁者無
物可出即膈虛胃寒引氣噁噁作聲此等候惡須更
證變即慢脾風熱吐者先去風痰冷吐虛吐與生胃
氣痰吐下却其痰次與正氣食吐宜與塌氣豈可一
緊理之吐瀉不止脾虛風生眼開慢驚眼合慢脾治
之不當更下驚藥死不旋踵豈可得而救療兒分長
幼病案虛實有吐瀉三五日發風者有一日半日而
死者大抵女孩以吐為急男以瀉為速若氣虛暴瀉
暴吐總作便得之惟有疳瀉不成風候水則患無辜
證終於虛之矣但滯腸止瀉為良吐即生胃為正甚
風之藥加而用之凡驚藥及寒涼之藥切不可用亦
不可用大熱藥其候乃屬陰證醫者裁之勿佞為幸
三小兒熱證古分十種為總例有驚熱疳熱風熱潮熱
傷寒熱瘧熱積熱丹熱瘡疹熱餘毒熱
議曰十種熱證病各不同已有觸類而作潮熱者即
瘧熱也類近積熱證先腹壯熱脚冷者是傷寒熱
與瘡疹熱亦相類且傷寒有三種皆從表入裏且
瘡疹隨五臟所受從裏出表故不同根風熱與驚熱
亦相近疳熱與餘毒熱類疳有五證瘧有五候皆由

脾家陰陽不順若驚熱盛即風熱作丹毒熱有數種
皆五臟熱毒所作自上發下曰毒自下發上曰丹總
名之曰丹毒各隨輕重人有一種名曰龍帶橫腰過
肚上或至胃前相交者重有如火熾其候亦同丹治
病後餘毒熱諸證皆有之須適輕重類諸證而調解
不可越前病用藥如傷寒後有餘毒熱即於傷寒調
理不及而解餘皆倣之太抵驚熱涼之風熱化之疳
熱補之潮熱散之傷寒熱解之瘧熱分之積熱利之
丹熱消之瘡疹熱順表之諸證餘熱皆和之此理雖
則大槩如是言畢竟用之有理乃為醫士善學設有
不遵其理者斯可謂之管見之

四小兒積證王氏有可治不可治其說已載于家寶
議曰古人有言不盡意者非失言也妙用奇功不可
得而著乎紙筆之間且學者初機未可便得純粹廣
見多聞性識開通心智自然運出然後可謂之醫者
意也此科最為難事積證最為要緊今病家將作尋
常醫者不至急切治之若尋常病之有緩速及至傳
變方覺因重久務良工信乎野老不虛云耳東漢王
氏不言疳與浮及痢即述證而已所證治未病之病
凡小兒有自幼及長不患驚風瘧瘧瘧症者有之矣
未聞無患積證者謂五臟之所積名曰積六腑之所
聚名曰聚且小兒只理五臟受病故不有六聚候者

何腑屬陽雖有疾不治而自愈且胃屬脾氣生以漸
 乃脾主食有疾當治之臟屬陰治之尤難調治四季
 有積欲下之理皆可用藥但與究其虛實然後利之
 既有積氣不能全實量其輕重故古人有換積磨積
 消積化積無下積之說是知積之一證不可直便獨
 下若積虛極先和脾調胃令其充實次與推下若積
 證二三併作之者可先下而急與調胃藥服之稍用
 倒置下免為它咎乃計利害所議積證作疾無可與
 之安和一味當下斯為良法有積不可安養久則為
 它病矣惟痞證先宜定去寒熱寒熱已去方可換
 下以通為度下之大過反生重熱雖有重熱即不宜
 用涼藥乃於調理胃氣藥與治之尤宜深究無令得
 矣

廣山省翁活幼口議卷之十

新刊廣山省翁活幼口議卷之十
 ④小兒傷寒正受夾驚
 清山省翁活幼口議卷之十
 所府之記
 議曰正受傷寒所由感受邪冒冷脫者傷於腠理性
 即傷風重即壯熱頭痛鼻塞流涕斯乃正傷寒候又
 有傷風傷者傷於傷熱皆能作熱用之但不咳吐又
 有天驚因驚之時而又傷寒故云夾驚傷寒又有因
 食之時而感受寒邪故曰夾食大抵傷寒或有他證
 似積之類切不可妄下若下之大早表裏俱虛難以
 調理謂之壞證大人壞證由尚可藥小兒壞證故察
 無門表或九傷寒有驚候亦不可下為無確是夾驚
 證亦不可用驚藥幼幼傷寒只可表解雖口用表不
 可令兒汗出如王氏吐薄可散和劑方人參桂活散
 之類石熱在裏議語鄭戶於證當下者只用散未藥
 七寶洗心散四噴飲之類不可用以回子或以取積
 藥下之其熱不去反成無辜夾食者於理用下宜紫
 霜丸下之量其虛實而用瀉兒門先傷寒後夾食或
 先夾食後傷寒然傷寒夾食乃在於食將之間惟母
 覺知其先後多是不覺若知其理以後受者而先調
 理既不明其先後即可表解以候裏證有者方可與
 下尤為善也且下與表二理不可併行有乎得失且
 如家寶有云三日前在表三日後在裏斯乃大藥均
 而言之恐後人傳之下當以為其害尤易寒在表即

解在裏即下不可以日限為拘其或有在表裏之間亦宜和解又不愈小柴胡湯治之又不可愈候傳裏下為良八者編語切不可急急取愈宜在用心明究表裏者也審察每恣用藥不當吁哉

⑤小兒有患驚風痰熱四證如何用藥

議曰小兒有熱熱盛生痰痰盛生驚驚盛作風風盛發搐又盛牙閃緊急又盛又張上竅痰涎擁牙閃緊風熱極閉絃絡即作搐搦涎壅胃口悶亂不省統入中腕手足攣是諸閃竅不通百脈凝滯有退熱而愈者有治驚而愈者有截風而愈者有化痰通閃而愈者皆是依證用藥不可不究其所以治病凡病在熱不可妄治痰病在驚不可妄治風病在痰不可便治驚病在風不可便治搐凡治小兒病在驚驚由熱得只可退熱化痰其驚自止病在風風由驚作只可利驚化痰其風自散病在痰涎急須退熱化痰若也有搐須用截風散驚此乃謂醫工至妙之道若以意急雖治驚痰不化熱亦不退驚如何自止化痰其痰熱若不退風亦不散痰如何去是知不治之治所以治之之謂歟學者深可留心標志於此一端究竟無至得失乃謂之醇全通道而已矣

⑥小兒泄瀉除痔瀉為虛熱瀉餘皆臟腑虛寒弱得之議曰小兒臟寒腑冷大腸不禁總謂之瀉分別輕重

究竟緩速有瀉有泄有滑有利有洞五者不同豈可一槩而理之瀉者糟粕不聚由其尚濃似瀉非瀉泄者無時而作或出不知利者直射濺溜氣從中脫滑者穀食直過腸胃不化洞者頗然下之如柵散潰餘更不留即知其兒臟寒腑冷瀉之作疾其來緩速輕重可知凡兒瀉糞出青色者蓋脾受肝絃所制肝屬乙木能克己土所勝之功故現本質由其臟之虛寒非謂驚也又瀉初黃良久變青色乃臟寒之徵又瀉藥物直過尤為寒滑凡虛滑三五次即困乏若不急與溫其臟調其胃平順三焦和正榮衛不尔即慢驚證候傳變如此之急欲以止瀉藥以第理之往往不

及惟務溫其臟腑臟腑既溫寒何能留於腸胃之間或以熱藥頓止則熱反為它疾須先投殭腸藥然後生胃正氣與服切不可急急過劑投之熱藥稍或臟腑至虛寒孩童困之四肢厥冷者是謂逆證當用黑附子白朮乾薑即量輕重而用化投熱藥瀉止即病作無疑理瀉良方已著在後請意度之為得即妙矣

⑦小兒痢疾醫云五疳八痢究其理種數多端輕重不一豈可定言

議曰痢者利也痢之為疾無積不成及至積化成痢且脾胃亦虛即不可更下善痢者生其胃溫其脾厚其腸和其氣無不愈也若成痢疾故不可下下之反

虛作渴浮腫痞滿脹急不食亦未可便補補則傷熱能令脫肚不收先與禁却一切毒食之物頓與生胃調氣或赤或白即是冷熱不調或受暑致濕即與分陰陽氣利水殺道若裏急即與厚腸胃腹肚痛即與和順氣溫臟腑或純白者乃積冷毒加之即與按去其毒却與溫其脾胃其痢自止凡痢疾能飲食可以治之妙藥調理無不瘥愈稍夫胃氣不能飲食疾名禁口有不食至死又有毒氣侵胃口亦不飲食或患痢疾因食毒物不見腸頭鮮血頻滴肛門寬大深黑可畏腹肚疔痛裏急後重名曰刮腸日夜頓併飯食直過者名曰滑腸此三種痢疾最為惡候乃是一十

一程中皆能傳受而作此候凡言小兒羨飲食者飲謂飲乳食謂食飯若病中能飲水漿喜食果子魚肉之類者亦助其虛不能令臟腑充實是白粽子爛莫飯可笑若以糗糧糗粒不堪將胃之物猶其增因幼者吻乳化漸安五臟平和六腑調貼然後陰陽自均氣脈自壯固散陽劑不必抑之或有餘毒宜以順調緩助不可攻擊又有時氣作痢薰習相染而成而由天氣晴雨不常陰濕之氣冷熱相干腸胃糟粕不聚遂成其疾腹肚疔痛裏急後重他藥莫治者宜與服木香黃連地榆川當歸白芍藥治五菴為末蒸為梅肉圓米子湯下三五十圓心麻子大加減神

④小兒疳疾其證教端其候不同發作不常治療不一方論不等該載不盡輕重斟酌隨宜設方加減審量從長調治必有可理者良工慎證而已

議曰疳者耳也疳因脾家有積虛而所致其積不下復食粘膩甘甜生冷炙烤之物故得名曰疳初作為疾名曰疳氣皆由飲食不節生冷相投積傷久滯不化而得之久則疳氣傳於五臟傳是名疳積候又反傳名疳逆候雖食不生肌肉作渴煩躁名疳虛候時發潮熱盜汗常有名疳勞候腹大喉細手足無肉者名疳矣候自疳穢食吐虫虛熱來去名曰哺露十歲以下名曰疳十歲以上名曰勞治勞之理悉不用疳藥益疾作傳足非常治疳之法理其氣虛其血弱調令狀壯消其虫去疳熱和順三焦詳而後已無用急力攻治亦無勉強投藥只可循候而說不得過劑若冷藥易動臟腑燥藥易損三焦審察端的團散隨其輕重故無得失之歎矣

⑤小兒諸證悉皆著載方藥療理法度惟有咳嗽一證究莫能盡月內牙兒難醫百日嬰孩亦難調理前人既有此言豈不盡心究竟若也輕易有乎得失學者當知之

議曰所言牙兒及嬰兒欬嗽難治之者蓋為初生血

氣微的五臟未充肌體未固應變未周之兒所感
寒邪攻及勝理表裏相干邪正相勝陰陽未和不可
強生攻治妄吐妄下妄汗妄補皆令兒疾轉盛不惟
無益甚有傷害幼幼咳嗽乳母之過圓散狼虎醫人
之罪豈特牙兒及嬰兒難為調理隱小兒有患咳嗽
未敢輕許一二服藥便見安樂雖傷寒傷風證候已
歸平復且咳嗽尚作大抵究竟小兒咳嗽先有有無
熱與痰有熱在表無熱傳過或走未傳逆則未傳
速則傳過痰稠
熱盛痰壅即吐宜服補肺散人參茯苓麻黃白朮杏
仁甘草阿膠呵子地骨皮桑白皮括樓有痰加半夏
風熱加防風天麻服之自然痰化熱散咳嗽漸愈未
可直用鹿洩藥白礬南星石膏雄朱砂粉之類且先
滋潤脾胃次用王氏金華散少少時時與服或以白
圓子如雄朱腦子隨大小作圓丸兒患嗽須究表裏
未可一向攻軟若用金石藥直入胃脘乃成提脾風
候手足勾曲又何所益巴豆輕粉砒霜藥下之腸胃
不禁須更成風亦何所宜只用溫平與表順助其氣
滋潤肺經和順三焦其痰漸化其熱自退不必攻擊
所謂理嗽宜補氣化痰益肺生胃開氣壯即嗽漸
減胃正即痰不生肺滋即嗽不有在乳母當忌食精
長又用安存避風回滋忌毒慎冷然小兒氣弱其嗽
作熱與夫大人一同且用藥調理實不同耳又有特

氣以嗽謂其天時冷熱不調切切虛怯受寒者象其
救日夜不輟或吐或喘痰熱壅盛至重者利之即愈
謂用大黃朴消枳實陳皮半夏人參厚朴紫胡心神
煩悶胃膈不快方宜與服無熱與痰亦不可下伏請
鑒辨毋致得失

演山省翁活幼口議卷之十一

識急驚先當定搐搦由風也風由熱也搐既已作方可下熱透驚熱若不退驚亦不散不移其時搐搦又作所謂過街候乃是醫家不明見搐定便言安樂僕謂急驚風難治有三只有初驚時其風痲發作對酌輕重上風定搐隨而愈之斯恐庸醫或常人熱見妄使下之既下了諸證猶存者一難治也又其兒正搐親人一向執捉不令搐搦且風痲不得縱恣逆入經絡藥力不及雖病減痲根在血脉或注經絡二難治也又兒患候有順有逆順即易理逆即難療惟恐病延既久不得良餌證候傳變越去元由而作它證者三難治也

議治急驚風候用藥非謂難也專至審察病候循其法度不荒不佞次第下藥無不愈之理多是病家倉皇不求善醫信乎山野庸鄙之言病候延久不無傳變傳即證重更即候惡凡經二三手醫藥不效兒受困苦無能安樂士夫之家收方錄證一日兒病證候危惡緊急臨時以何方對治告急無門眾口格格皆言有藥不明端的一向攻擊信乎見識淺陋擔負不起有乎得失用藥不及則無妨事可以療理若也大過即時害生
議療嬰孩宜可以藥有悞投之大過或不及由尚不可况越證候乃為枉究兒童雖分長幼有恙臟腑命法弱易冷易熱易虛易實若攻之相重其不任從藥執言疾不瘳反為它害為不謹歟分者議急慢驚風及慢脾

風方藥即是芫漢指准應備緩急至要剋效之者一符更執可否之理
議患驚風疾熱痲痲痲痲此八種候惟痲痲痲痲少有其者類同驚風發作之狀痲痲于冰冷痲舉身僵仆痲痲不殊目瞪流涎手足搐搦十歲以下常作驚風即謂之痲至十歲以上所發則曰痲

議驚風痲熱已論在前且驚與風其痲與熱各自有本證候受病急風為疾四者併聚有驚有風有痲有熱或因驚而有風生痲作熱或有熱而作驚成風生痲或積痰而發熱熱盛生驚變風或久有風候痲涎常有因驚而發熱調理嬰孩童稚四者形證一不可有善明脈醫上於暴作者亦當知之理驚風退熱化痰久盛二者醫風散熱療痲痲驚四證相須藥宜併理古人處方亦合此意然學醫者不可不究其源遠若見候將作尋常用方輕忽病無少安證傳它候不逆且惡禍不旋踵
議嬰孩急驚風候使須先審察四證四證之中而作八候八候者一搐二掣三掣四顛五反六引七竅八視一搐者臂肘搐縮二掣者十指開合掣之不已即成握拳男子有大梅指其指握在外為順在裏為逆女子反看之三掣者有膊掣或連身跳起四顛者或手或脚或頭或身四休顛面反反者身首反六引者以手有如挽弓狀男反手直有曲為順石直反曲為逆女子反有

之七竅者眼上竅視高男子上竅為喉下竅為逆女子
又有之八視者男子斜目視左為順視右為逆女子又
首之既有四證八候次第隨生若只去得驚風且痰熱
不散未可言安疾與熱聚將來必致痼疾所治之治其
疾與熱須察之可下即下痰熱既下驚風未盡消去則
病依前又有發作所言四證相須不可留一若理得驚
風已定隨便下了痰熱且驚風不復有作此理至為妙
也

議嬰孩有患在痰熱未有驚風者只可退熱化痰不且
妄投驚風藥何也驚風之藥其味多寒涼絲絡本自無
事稍有攻擊透其痰熱入於絲絡却成風痰之疾搖搖
致之

議嬰孩五臟絲絡虛印生風既虛折艾且驚自然而有
作驚風有作八候次第而生所謂兒童無病不可與服
攻擊所治之藥

議嬰孩有小大有壯弱驚風發作有淺深但輕重大者
加分劑重者多與服數乃合其理

議嬰孩開聲即掣跳者乃肝肺不足竟鬼不穩故神有
不安即開聲掣跳者非謂驚也屏前地黃圓主之又兒
心氣虛怯神不安定連併掣跳者宜與四君子湯加衣
砂脾胃氣壯神寬俱清自然不恐
議嬰孩發驚風候先神不定頓左復右腕上及下或

已定其萌疑其神恍惚惚怕物懼人不若常日嬉戲
者急當療之如有熱先退熱有驚散驚熱退不生痰驚
散不作風良久自然安定神情和悅氣脈舒暢若待風
變而理驚痰盛而退熱事由至緩不若四證俱全由可
治療

議嬰孩急驚風發搐手足不可熱捉及以手用力灸之
即傷絲絡絲絡既傷亦無所益則廢服害軀

議腎急驚風候有大有小有輕有重有順有逆有偏有
正詳審久暴次第進藥且病家無不倉皇驚恐醫家須
是正定無自惑

議急驚而曰用醫其驚氣和乎方可調理若以急驚之
謂調理事故緩也慢醫在此消息

議醫急驚初用藥在我則我醫證候遵法度參傳及審
緩緊治之切不可信病家及左右人說其所欲稍順人
情有乎得失主治在我豈可妄信致之危終罪累誰耶
議急驚初無痰而後痰盛初有搐而後不搐者此證所
傳候之至盛人少知之蓋由初醫候恣病家不謹經三
五家用藥或庸士所見不同有太過不及之害如此豈
不謹歟

議醫急驚須量輕重下之得其中為良且驚風頓去痰
熱已化不作後患所下之藥稍多巴霜膩粉為重即傳
慢候無疑

論嬰孩有患風症風中證候皆上竅拳搯曰
大平言載甚多初無痰後有痰初作搯後不搯不拳身
且昏風之惡候已是傳過若作驚風更與下之為害必
也

議急驚欲下之理須在急驚上竅針視及張所作之時
可下若傳過或已搯定少緩之間未可直便緊下有乎
得失

議急驚用藥先與服截風定搯次與下熱熱去則無風
風散散不搯是知以藥之功在我意設不至恣妄為咎
到此頭功方知難易

議急驚有上竅者有搯有掬有引有又有區有什有叫
者有痰者有痰涎潮盛有溢吐發作各隨四證輕重而
受之急驚截風定搯為要風搯既定諸證漸息定搯須
用通閃非搯非截風乃用調給

議凡定上竅尤視乃於男女之順候忽及是則逆也人
抵逆則難治順則易理不以逆證候為不可治古人言
難治謂陰陽相反證候未生須用審究其證詳察其候
以意盡力致之取效而弗疹者為之奈何

議世方有云治急慢驚風候者言之失意急驚乃陽癇
慢驚乃陰癇正恐治陽作陰治陰反陽豈一藥以全內
證又有云治陰陽二證陽寒之說能脫此理可謂通變
議急驚候至為要急在於片時之間若或危殆且有得

夫一時所見見其端的用藥無疑尚在疑情未須投藥
藥發無疑其意靜吉疑在未發藥之前良其妙矣

議急驚頭額心背元被灸了者決定余癩不可常藥僕
嘗謂風癩可灸驚熱不可灸蓋風與癩痰涎壅盛胃觸
胃壅昏亂迷悶不能省知心如所失既灸者穴痰化心
開即漸安愈驚之與熱心神常存聞知被灸必痛不能
驚悸轉盛其疾滋重所以用艾在先藥必未有益

議驚風疾愈未嘗見因灸而活每見老嫗歸婦無術只
投艾炷兒生三五日之間便以艾燒之不惟失穴因痛
增悸絲絡未全如何愈病智者消詳不可枉究

議初生尚為腐血三五七日有患平腸鎖肚世言八帶
鎖匙相衝惡曰非也容忤所致初生氣弱不任其邪壯
繫背筋脇肋脹滿氣從禁口不乳斯證但用真珠天風
圓下之終通即愈屢救初生無不獲安若結患服藥得
痊長大皆肥壯重實未詳其意請較之若曰初生之兒
方離於結分降之後偶被邪氣干亂臟腑微怯不受其
觸故作痰曰平腸撮口鎖肚乃以天麻圓推下惡毒虛
邪之氣悉去血脉順得流行臟腑和調充實自然朋長
氣壯形神俱備體質醇厚誠為可愛

議嬰孩又有驚風同斷胸不如法有傷胸帶受濕寒風
由此成患皆能撮口乳食不下膨脹青筋脚直無力只
依胸風治法

依胸風治法

依胸風治法

議發急驚風吐衄四三聲者難治心受驚觸痛絕于內乃傷其根本之謂

議發急驚風未投藥四證俱全已服藥四版膈痺者難治

議急驚噴藥者難治又藥不下者難治

議急驚搐搦之後四體俱軟者難治

議急驚發作之後脚作擺跳者難治

議急驚搐後日膈翻轉者不可治

議驚風搐搦已住神情緩慢手尋娘衣或尋自身體者亦不可治

議驚風諸證候盡昏已住世神情亦慢氣促者未可保

治

議驚風證候已住其兒拒物不食情性緩緩於中非謂

十全必有再發之理如或再發不可調治矣

議急驚風鼻中出血者易治口中出血者難治鼻中出

血者其熱已散故易治口中出血者心血妄行故難治

議驚風尿尿已遺者難治大小便閉者易治

滇山省翁活功口訣卷第十三

真珠天麻圓

治急驚風請量用之以通為度此方仍治疳積肚撮

口至為妙絕功効無比圓如麻子大初生者三日三

圓五日五圓七日七圓加青黛名青黛圓

天南星炮

天麻

白附子炮右

臟粉詳見

巴霜一字

燕茅炒

全蝎炒

滑石各一

右事治為末水莫細越糊圓如大每服一歲五圓二

歲十圓大小加減薄荷湯煎茶清送下

藏曰此方乃下驚風又去痰熱須先服截風定搐散

與下之功不可以多利之但通為度宜其詢問前久

已未曾下惟恐病家不曉此理遂致踈失若初醫在

我則當循證截風定搐或朱蝎散尚有痰熱宜與下

之免作風候且小兒被驚奈風則不知先有熱在臟

若知有熱在臟甚勿驚着蓋熱盛即心氣虛一驚觸

心氣逆散所以面青唇白良久驚氣却收其或肝

虛入肝肺虛入肺五臟六腑皆由虛厥其驚氣自然

投入因而作疾前歌亦截然急驚之急痰熱相觸

亂神情氣脈互馳絳絡來熱即生風熱不散筋

平脈縮或搐或掣或掣或引各於輕重所通而然若

醫者截風定搐百熱與痰隨而下之其搐掣自定矣

率白舒中縮自寬風熱自散何志氣不馳者神不和暢直言至簡良士當和之矣

却風散

治嬰孩小兒急驚風候方作搐搦熱盛涎潮宜下之

天南星四枚炮去 巴豆四枚出油

大半夏拾枚用甘草水煎熟 白礬壹分去絲炒

全蝎壹分炒去毛

右件和勻每服壹字許煎金銀薄奇湯調下

揚風湯

全蝎壹分炒去毛 天南星壹分炮去 朱砂壹分炒 輕粉壹分炒

天麻壹分炒 麝壹分

腦子壹分

右件為末和勻每服半久煎金銀薄奇湯調以通為度

青金圓

治嬰孩小兒急驚風痰涎壅盛欲下去痰退熱

巴霜壹分 青黛壹分 天南星壹分

輕粉壹分 滑石壹分 全蝎壹分

右為末水煎麩糊為圓麻子大每一歲五圓二歲七圓

三歲十圓大小如減用薄奇茶清送下以通為度

議曰凡有小兒證候不問長幼目視指切心究意到

醫權藥衡準盛疾之輕重所謂斟酌對治已遵其法

藥入腸胃猶合符節者上也按觀之後付及方法思

惟料理良久始逐其源用醫投藥者次也不休全功

何謂眼療非四病之共端乃謂究竟不若是今議驚

風之疾有急有慢鄙夫以搐急謂急搐慢謂慢斯既

未當古人言論陰陽病者是也陽病曰急驚陰病曰

慢驚陽病頰赤休熱唇紅脈數牙關緊口流涎陰病

者吐利作熱生風不有陽證惟有搐搦畢竟脈來散

緩乃是陰候無可疑惟是陽證得陰、速陽虧陰證

作疾速用扶裏如急驚風候陽盛陰虧陰氣剛壯當

用下之使陰陽二氣均平調榮衛二脈和順方乃可

宜前件方藥輕則揚風盛則劫風重則青金或以真

珠元請詳而後已其切察之輕重審以湯劑得中勝

妙莫令違也若或急緩害加禍生醫者主察勿令致從

截風丹

治嬰孩小兒四證已作八候未具者速宜與服

全蝎壹分炒去毛 白姜壹分炒 天麻

白附子壹分 天南星壹分 朱砂壹分

赤脚蜈蚣壹條 麝壹分

右為末煉蜜為圓雞頭實大每服一二粒煎金銀薄奇

湯化下

定搐散

治嬰孩小兒急驚四證八候俱併作者宜服

天麻 白附子壹分 天南星壹分

灼損炒 朱砂分 代赭石一兩
 雄黃一分 乳香一分 白花地頭一分
 腦一分 麝香一分 赤脚蜈蚣一條

右為細末每服半錢煎金銀薄奇湯調下煉蜜如雞頭大亦佳

議曰搐證未作痰熱壅盛故生其風、不自散流入筋脉又入經絡遂發搐搦定其搐搦先用截風、若不加則搐搦自息矣且搐搦已作痰熱有盛疾候傳極其風不可得而截搐不可得而定由如遺漏炎熾猛烈難以撲滅如此患者理宜下之大抵陽痲用下乃良陰痲何以加之兒分長幼用藥惟有發風作搐大小皆然風之為疾得衝衝突乃五臟虛受之邪之在証療之未前曰驚而作或痰熱而為察其原而定其疾首要也有其風即發搐有共搐即因風風定搐其議相續今述截風散不待搐搦總免風痰驚熱有作便與服之令不搐搦故曰截風既已搐搦併作宜與定搐散禦之禦之不散與服煖金丹其勢加重即與下之吐下之法醫家出不得已而為劫風揚風青金三方量其輕重令人直便擬下更不截風定搐之藥得夫之議皆由忽遽昏惑智者良工幸宜考較

定金丹

治嬰孩小兒急驚八候四證未全脫去尚存風熱痰涎其驚風證候欲再發作宜服煖金丹

天麻一分 白花蛇無取肉式
 全蝎二十一个 蜈蚣赤脚者二條
 白附子一分 白殭蚕去絲炒 黑附子一分
 牛黃一分 麝香一分 天南星一分
 辰砂一分 麝香一分

右為末煉蜜為固如皂子大煎金銀薄奇湯磨化下
 議曰所患驚風痰熱四證皆能搐窺斜視及張惟是驚風作搐名曰真搐為其病受不傳即作痰熱所發或因傷寒等疾發作搐名曰假搐為其更有傳變其將親人倉皇那堪醫者昏惑投藥不當發作致久

新刊演山省翁活幼口議卷之十四

慢驚風傳變

治法

凡慢驚風候若是急驚傳來而尚陽症其陽即虧不必回陽又不特治陽只可截風調胃均平陰陽可冷可熱可緩可急是也若直便與服附子流黃之屬使陽歸陽又是急驚學者理宜知之既知陽證傳作陰證即與服保命丹三二服兼前牛黃清心元子其有四症且八候稍緩疾成陰痾者即與服之若已傳過八候不作四症尚在只其真者與服定命飲子若脚手冰冷者乃四逆候方可回陽次弟眠合者即傳作慢脾風候其兒驚風痰涎壅盛搐搦不止不可下者宜與靈脂元其疾短熱

感口角自垂者白卷元功效驚風搐搦身體離煖風痰不化宜服大南星元

議嬰孩所受此等症候別無他疑者只依下項用藥無不避者功不可延久其陽易化陰氣漸盈藥力不及使人難治又不可一向連併服藥每次一二服了須審察症候緩緊有無傳變稍覺寬定其藥放慢或勢漸緊宜以次第緊急藥與服不可就婦一藥又不可便換湯餌連併與之所謂察其輕重審其進止而後已今著妙方不勞檢閱階合如法對症投治冠效萬一

談慢驚若是急驚傳來是知前人不曾截風定搐傷肌而得陰、重陽虧其風與熱隨流縱入經絡又有曾服

大寒涼之藥過多又有下積取瀉致作又有臟腑虛寒洞洩而為其所受多端已載前篇

議理慢驚當知陰痾之說其證屬陰熾寒氣虛或尚泄瀉不止且驚正作多因無識之人一向治驚更不理瀉藥用寒涼投之令氣愈虛洩瀉不止陰證愈重驚搐愈增若用止瀉藥稍熱八候復加四證不退慢驚雖曰難治蓋醫亦不曾究竟病作加進深為重害

議慢驚當察之所視為要服情各定為重窺視為重四版厥冷為重疳疔不脫為重雖脫不左右顛亦重汗出如流亦重口而忽作熱黯色至重感風搐搦慢驚眼在半開半合之間乃知陰氣所盛傳入臟間陽氣已虧脾經為陰次第入脾故言慢脾風候

議醫慢驚與急驚風候自是不同未可一向下定搐搦急驚謂因窺不通故以腦子射香等藥通利定其搐搦慢風陰重陽虧諸經已虛不宜通開又涼其臟易作慢脾風

議醫慢驚不可爭攻急驚陽痾稍易理慢驚陰證最難治服藥已愈而尚虛之未省三五日之間者有之俗謂過街候發無定論不可輕易妄劑投之攻擊則前功俱喪

議慢驚所治之理須究問原因所發若是急驚傳陰為慢驚者乃陽痾所傳陰痾也當察陽證未純其陰證用

觀音全蝎散

治嬰孩小兒因吐而傳慢驚風候宜服觀音全蝎散

黃耆一錢 人參一分 木香一錢

炙草 石蓮肉炒 區豆炒

白茯苓各一 白芷 全蝎

防風 羌活各一 天麻 二錢

右為末每服半錢壹錢者半小水一小盞煎至半與服不拘時候慢脾尤宜服之

議曰觀音散東漢王氏所著調理嬰孩清神固氣補虛益脉開胃止吐醉乎醉善之善者耶所緣用藥截風者何正於危急之際却作兩餌仗之先與生其胃

氣以脈截風定痢如此療理不惟迂曲致緩又且未能藥入脾胃之間悟其至理兩劑一行或加白元子未以半和之乃其妙

犀角散

治嬰孩小兒因吐瀉神困力乏欲傳作慢驚風候

犀角鎊二 白木或水 甘草半錢

陳皮舊者良

右為末每服壹錢水小中盞金銀薄荷同煎三五沸通口無時

議曰此方治小兒因吐瀉神困力乏欲發慢脾風候正謂救急不可令緩若已傳受即風即熱即痰即驚

交相致作神散不定上竅搐搦志由脾虛之所致也脾經既虛次第胃虛其藥白木陳皮預理脾胃犀角退熱去風熱既不作痰無從生醒脾壯胃凡何得有漸見懸省兼與醒脾散及既清丹相間服一向取愈為良其方全不用逐風化痰之藥者蓋是證候欲作慢驚所以未宜先投緊藥改用此方謂之和劑一正其脾氣得無傳變不勞療理簡徑微妙警首智者作之施功利益而已

醒脾散

治嬰孩小兒吐瀉不止痰作驚凡脾困氣沉然不食醒脾散方

木香一錢 全蝎炒半 天麻炒一

人使一分 白茯苓一錢 白木炒一

甘草一錢 白姜炒一 白附子炒一

右為末每服半錢大者加眼水少許冬子同煎至五七沸通口無時服

議曰此良方最為勝善小兒吐瀉脾虛作疾驚風神困氣弱沉然皆脾經虛乏已成凡痰併聚故尔不醒宜多與服仍加既清丹及觀音全蝎散供良其疾復有引掣搐搦無與驚風元散及腦驚寒涼等藥其證愈思其候愈盛不惟驚風未退且痰熱助之令兒疾作得變傳即慢脾變即陰逆慢脾猶載方藥尚

可理之陰逆之候何可醫治陰逆者陰謂陽氣欲絕
逆謂受證不順不順欲絕但增吁嗟使人無所措手
醒脾良方豈可忽區真所謂活人飲子

神保既濟丹

治嬰孩小兒肚瀉或已作風候服之功效

硫黃

硫消

陳橘皮

青橘皮並去

五靈脂川者

半夏麩炒

以上等分硫消二味和研令勻一處用磁器銜汁

傾出候冷細研旋入諸藥和勻

右為末林米粉水蒸粉為元如 大每二歲見服二十
元大者加之並溫飯飲下空心食前此方均分陰陽二

氣多厥有五

議曰陰陽二氣不均冷熱相制驚風已作搐搦已定
或陽虧陰盛或陰虧陽盛或驚風未散吐瀉不止或
嘔逆或發喘或脚手漸冷或眼目欲合或服涼藥太
多或虛煩不定或沉、熱、不省或恍、惚、生驚
但胃氣未脫速與服之若是危急不待作元子只以
末溫飯飲調與服以愈為度若脚手水冷者服之立
溫未止者服之立止雖慢驚慢脾風候並宜與服仍
加薄苛湯使元良智者明理必加欵重愚者蒙昧必
懷猶預此方至良少有知用請敬而行之

治嬰孩小兒吐瀉脾胃虛弱發作慢驚凡候搐搦不已
醫工截風不止取痰不下散熱不退即驚不去其證欲
傳慢脾風候宜服定命飲子

半夏煉羊酥

天麻一分

甘草炙

白茯苓

白朮

老生薑各

右件一處用水一盞於磁器內煮令水乾將半夏天麻
白朮茯苓切焙為細末每服半錢或一盞生薑煮子湯
調與服無時

議曰此方建脾化痰去風散熱功效如神醫工少有
知用初學之士只知有腦麝香麝者方用之俗夫使
言好藥殊不知腦麝乃醫家出不得已用之其物通
利開竅閉塞踈濇理利骨節其藥屬陰能化於陽
只有急驚宜用慢驚慢脾傷寒等患忌宜禁止其或
疳疔藥用之虛者亦禁惟有症瘕癩疔宜用定命飲
子屢經效驗野老處定此方其功造化深智高明往
往欵請痰搦連併脉息虛怯不敢頓下者宜與天芝
元若手足差冷兼進回陽行醫用藥至於此等證候
乃至治治傷之推也

無與腎榮及諸補藥若治腎臟即他病發生故戒上不
可療

誠嬰孩慢候皆由臟虛陽虧陰盛應小兒所患臟病陽
虛陰盛者無不入慢候而驚惟吐瀉痢與積致入慢
候其證速也虛又速也宜用良方治法循其次第無不
獲安然其慢驚肝無令速愈頓膠之理既和且平更用
調肝養胃藥不可過劑用冷熱湯藥若失之即吁哉

白殭蚕圓

治嬰孩小兒慢肝風候痰涎潮盛不化宜用白殭蚕圓
良方

梨牛膽五味者

白殭蚕去絲

錢子地竜

五兵脂川者

全蝎炒

半夏末各一分用
土姜汁浸

右件為末水煮半夏末糊圓如麻子大每服三十元
煎金銀薄苛湯下

設曰肝家有風乃虛所致驚搐所由生也疾逆是
故作也陰癘不暴其實驗醫若也意急從之衝烈
愈見害宜誠為不可所以禁却腦戶通利閑竅之
藥悉無利益治法所宜者今選用妙方頓以治人
白殭蚕圓一味去痰尤能我風既已傳入慢肝則
凡疾混致驚熱交臨醫工看候藥用當權木敢決
之可否候未脫去陽者宜宜與服之若陽虧陰盛

至危至急候變非常精神色脉候於人情者當服
下項良方

附硫圓

治嬰孩小兒慢肝風候附硫圓散方四肢冷厥服之尤
佳

黑附子二个去
皮生用

熟硫黃末一分

蝎梢七个

右件為細末生姜自然汁和圓如菉豆大每一歲二
十圓米飲下

黑附湯

治慢肝痰盛四肢逆冷黑附湯方

黑附子二个取末

白朮一分

南星一分

甘草一分

半夏一分

右件每服二大水小小蓋生姜三小片卷一个煎
至半去滓通口以匙挑與服所覺手足煖其候漸省
茶即止之

辰砂膏

治嬰孩小兒慢驚風傳慢肝風候有冷疾在滿潮作不
散此疾虛久不可頓下其兒搐緩候因至重者宜服此
方

大黑附子一个

辰砂一分

天南星一分

蝎梢七个

朱砂一分

天南星一分

蝎梢七个

右為末以朱砂和勻煉蜜為圓鷄頭子大每服一圓至兩圓煎金銀薄詩湯入酒三五滴煎化子服

議曰此三方皆用黑附子直不可執謂性熱兒在

幼小礙子服之其兒患脾凡脚手冷者有微有聚

審其輕重鞋即用湯盛即以圓重即以膏服之皆

效須候手足煖陽氣四即為之快矣既已溫煖更

以醒脾正胃兼服除是慢驚傳入慢脾候方可

子服之疏黃其功甚速又且逐風化痰醒脾正胃

溫煖臟腑補益腸胃奪命回陽省活危困至使至

驗切不可倉皇妄投固散或爾大過不及之特則

致咎于後方宜字受不至誣誕故也

七室妙砂丹

治嬰孩小兒慢驚風及慢脾候神情昏困帶上有虛痰

不能得化不可服也豆粒粉忌動臟腑只將神仙所留

妙方與服其痰瀆更自下良久神情已定眼目微開漸

與溫平兼調理胃氣兼順理驚風茶子服勿更攻擊其

方乃一文開元通室銅錢名七室妙砂丹 錢樣見後

其錢背上下有兩月子只有一月子者不用錢色淡

黑頗小諸錢將錢頓使起頭於炭火內燒霎時四維

上下各出黃白珠子遍散都是將出候冷傾放茶盞

中入朱砂末少許只作一服煎金銀薄詩湯送下多

枚此錢准備緩急或先燒成珠子收拾亦得此方逐

下小兒虛痰別無它作證候者用之乃保十全功效無可疑訝



此是錢樣

議曰調治嬰孩小兒慢脾風候無過前件茶對證煎

效須審慢脾已傳未傳之理其兒眼開未合尚在慢

驚脚手不冷之時未可便與回陽且與七室妙砂丹

一二服眼合沉困陰證極盛者方可與服回陽丸服

回陽醒脾湯劑手足漸煖仍與觀音全蝎散及醒脾

散兼服九慢脾風候最為惡證只可前方調治至日

緊急不得併雜用之泛泛不惟無益枉勞其功虛延

其候開養其痰此疾傳陰陽至病盛如燈光油只見

次第耗去若不助陽生胃只知截風去驚兒痰轉見

增長且兒陰證未至十分與茶如其寒涼攻瀉陰重

陽虧難以救療若也共其陽氣隨陰而化所謂則之

在始元在於末區慢脾風證候如其所述用茶由可

救活若鄙夫意見不同難以省治唯哉

癩疾證候

右方共述多端王氏者載有三驚癩風癩食癩風癩之

疾由於風熱而作驚癩之疾由於驚積而得食癩由於

食積而得其驚三者各作大抵相類風癩有熱生痰驚

癩神鬼散亂恍惚無定食癩因食而致驚食未起心氣

何開而之間生痰致風由風成痲

痰治風痲先用化痰寬利胃腸開通胃竅安鎮心神定其攝掣然後子治風痲茶服之

痰治驚痲先涼三焦利驚去熱安神定志平調臟腑溫化痰涎然後子治驚痲服之

痰治食痲先用推下開胃俾積驚氣次和順中脘次安臟腑然後子治痲茶服之

識曰驚之與痲風之與熱皆連相襲有熱必恐有風

有驚必慎成痲治風先退其熱治痲先用散驚此乃至要之識字者當明其理所言痲之為疾古述繁矣

或云六畜牛馬鷄羊猪犬其声音相類形跡相尚有若六畜之狀故得其名室鑑載云一百二十種其說

大繁其傳乃執但走痲疾無越三證皆由所生總而言之不必煩求有悞初機枉究遂成艱學如此一病

尚陳羅維向其驚風者于王氏獨之得其詳要以合札法今則看書持示良妙哉治至簡庶幾所定頓漸

瘳瘳靡不快欬字者深詳必無枉究

治小兒食痲先用真珠天麻圓推下次服定痲妙茶

治小兒風痲先用化風丹去其風熱次服定痲妙茶

化風丹

法製黃牛膽 二名

羌活

獨活 各一名

天麻

防風

其中

荆芥穗

人多

川芎

右為末煉蜜為圓如皂子大每服一圓薄荷湯化下

識曰風之為病其狀多端皆由腠理疎弱氣衝虛怯經絡不順開竅閉塞其氣壅滯筋脈其脈凝注

有同天地晦冥日月暈蝕應暴發與精神俱潰者一身四體皆不我有是謂風痲之至也所謂化風化其

所受之風不待久俾迅變化該五臟溫熱三焦伏壅速與流利熱即風生壅即風長開竅不通其風何能

自散若言化之即順助之其榮衛經絡順得流行若也便與截風定搐為己成痲其風不散若更改擊即

衝任百脉全不奈作畢竟隱伏久而再發無能去根此方得名化風不復加進矣

此金丹方

人多

白茯苓

遠志 去心

山茱

辰砂

天麻 各一名

石菖蒲

川芎

甘草 炙

天南星 地二名生

麝香 一

石為細末煉蜜為元皂子大每服一粒煎金銀薄荷湯化下

識曰風行於四時和順於內外長養萬物能生能敗法今至周惟風之德夫人一身亦同天地順則和逆

則害所發之風由其虛而作應其熱而生有其痰與
熱而發其驚閉竅不通氣脈流注逆有傳變於身為
害當用逐之何向童稚幼雖嫩嬌危脆百病摠歸于
可豈可取次疎怠凡治風有法度不可極力施功若
停待即須更而更倉皇即拙膠而失深意審詳隨其
逆順以療之襲逐在後預追不及所載在前執化不
盡者正謂庸工匠之陋也善治驚癇也化其痰和其
氣鎮心神安魂通閉竅順經絡使其榮衛常順流
行調其臟腑長和充實邪自和生凡從何入至有坐
小自然而散此癇由驚為疾豈可見留常令血脈充
肌膚壯頭目清精神備飲食即睡卧穩寒暑知時臟
腑常固其經絡自和榮衛自順比金之名決定不壞
斯乃順調善攝而已

奪魂散

治定癇良方奪魂散

- 白殭蚕 去絲炒令
- 白附子 地各一分
- 牛黃 如無以膽製
- 白茯苓 倍如用之
- 半夏末 二各生薑汁
- 犀角 二各
- 天麻 各二
- 天南星 汁研末一分
- 赤脚蜈蚣 天全條酒浸
- 腦子 麝
- 烏梢蛇頭 許七八寸
- 蛇含石 燒紅用米醋淬
- 生銀 七八次碾碎
- 生金

右為末煎寒肉為元如○大每服十元至十五元二十

元煎金銀薄荷湯下朱砂為火

識曰癇之為疾又是一種證候若言驚凡所傳古人
有謂食風驚三癇者言不于驚風所傳古云驚風三
癇便為癇且癇為疾痰熱壅盛傳入經絡塞于心肺
足致閉竅不通故作癇疾余作有如驚風大乎或因
驚而生痰多或因熱而作風盛大小便不利上下氣
不通心神悶亂若因而復生而復死沉、默、無
由魁者忽尔氣透閉竅漸得開通塊塊稍得安定向
後心被觸腦氣不宜利余作如前是知癇之為疾乃
由虛痰冷涎頑結子胃臆驚風併發于閉高常無精
神心致不寧而存恍惚療理不專呆服不效必自致
害何足怪者耶奪魂散方經秘傳修合如法活
神驗宜非至室之謂也

漢山省翁活切口議卷之十五

新刊演山省翁治幼口議卷之十六

議十種熱證候

醫云熱有十種驚熱疳熱風熱潮熱傷寒熱瘰熱積熱
丹熱瘡疹熱餘毒熱

識曰有驚熱即有凡熱此言驚凡熱又有凡却熱乃感

風感病類同傷寒熱又傷寒熱類同瘡疹熱又瘡疹

麻豆之後有餘毒作熱其傷寒後亦有餘毒作熱

積熱有同瘡熱未滿作又似瘡熱綜曰潮熱五發

作有期

識丹熱疳熱各自歸之不類諸證今將得效所治諸熱

良方有四主治今諸熱證悉有功效非特觸類而分

之乃是所療治其根本而已無不應驗更不兼他藥

只此四方尅效萬不失一載列在下請宜審察提某

隨病瘳愈神莫能冠僕尽心討論以其簡要不悖煩

勞去此就彼檢閱再三若良將用兵奇正攻寇難

有先惡必不能逃竄其病候或有同異其證候無過

於折類為定必不疎遠綜錯矣幸自時退熱之理秘

不可傳道由心悟得之可謂解手解舌之善者耶

議類證諸熱

識血熱即遍身生瘡痲瘋疥癩及重衣作丹毒龍帶

之屬

識骨熱即外冷內熱其病骨蒸候

識實熱即氣壯實五臟六腑氣充大便硬少或閉不

通

識虛熱三焦不順五臟不和欲作疳候啼哭煩躁夜出

虛汗或瀉痢後有熱

識三焦熱即上高虛煩作渴煩赤驚悸夜後啼哭腦中

識語

識五心熱虛煩多驚小便赤赤赤不安搥氣鹿或作癩

癩

識肝經熱眼目赤腫疼痛眵淚益明或筋脈拘急有夾

風痰

識肺經熱鼻塞生瘡不聞香臭或除毒不散

識胎熱兒在胎中受母飲食不順有餘毒之熱矣

作瘳疾或從胎生之後常作熱證

識傷寒後餘毒熱虫曾解表餘熱傳脈或入經絡久而

不散

識瘡疹除毒熱其兒所患瘡疹不甚快速有餘熱留滯

在百脈之間

識項上生核作熱軟大微紅者名驚氣核小三五連

長短相類雜者乃餘毒熱亦名驚瘰初生乳幼者有

患之

識三焦盛毒熱上攻咽喉之外名作顯熱氣血凝滯

終不行熱毒攻注故生癰痛

議麻立作熱類似疹候麻子乃將受病屬陽故易調理
至不服藥亦能自愈只恐吹毒冒風為之逆也

議溫氣熱即是將氣溫熱相襲而成小兒又令有將氣
之溫未經患瘡疹者即重煎大小相傳皆作是疾

議小腸熱心經不利小便淋瀝或筒管內疼痛

議胃熱作氣口臭或吞逆不思飲食亦由胃家虛熱
得之

議脾熱口若昏困舌粘因喫食毒物積聚在脾不化脚
梢水冷

議邪熱肺經感受寒邪陰陽二氣不正痰涎咳嗽

議寒熱謂先寒後熱其狀如瘧乃虛中有積凡兒患瘧

癖瘕瘕皆作寒熱類矣

議傷風熱鼻声重頭痛脚熱類如傷寒候

議傷暑熱煩躁引頸頭目昏重時正盛暑或曾感冒

議寒熱即血熱也

議衄熱即氣熱衄衄不順即氣血不相參虛之致也

議筋熱咬指甲見血

議背熱病作崩砂黑齒爛斷以至走馬疳極候

議煩熱即啼之不已

議躁熱即哭之不已皆由三焦不順心中積熱虛煩躁
悶

議夏煎熱只在五百七十四日之內三十二日一夏六

十四日一煎在其教條作者忘也

議大腸熱乃是肺家有熱在裏流入大腸秘結不通

議癰疹熱乃是肺經有風在表肺主皮毛故生癰疹凡

議疾熱因感風生痰在上高久不化作熱或在吐惡心

議驚氣熱良由小兒受驚其驚氣不散留在上高無得
自化故作熱毒攻在頤項之間

議壯熱即是積熱證若加脚冷當與下之

議客忤熱初生之兒親戚外來兒觸其邪以亂其正故
作熱

議痲熱驚風不散聚在經絡或入臟腑其候常急不省
人事

議瘕瘕熱亦驚之所受入經未得散略作積擊

以上諸證受病治法分類于后

○分十種熱證附諸熱類

驚熱

癰熱 驚氣熱 瘕瘕熱 客忤熱 五心熱

傷寒熱

傷風熱 傷暑熱 夾驚熱 夾食熱

疳熱

虛熱 煩躁熱 筋熱 骨熱 腎熱

以上並宜與服葱根乳甲散

風熱

丹熱 痰熱 夏蒸熱 肝熱 大腸熱 癩疹熱
並宜加麥門冬子去心煎

實熱 血熱 三焦熱 小腸熱 龍帶熱
並宜加大黃及燈心煎

瘡疹熱 麻子熱 溫氣熱 已出證熱 未出證熱
並宜加紫草茸川當歸同煎

除毒熱

胎熱 肺熱 傷寒後餘毒熱 瘡疹後餘毒熱

並宜加薄荷煎
頂上生枝煎熱 作頭熱 癩癩毒熱
並宜加大黃朴消煎
以上宜服大連翅飲子隨證加前件

瀾熱 寒熱 衛熱 瘴氣 兩日一食
三日一食

積熱 脾熱 胃熱 痞癖熱 肚熱

邪熱 寒熱 脾瘧 鬼瘧夜食

單瘧 熱 以上宜服梨漿飲子
八種虛痢作熱

吐熱 瀉熱 霍亂吐瀉熱
以上宜服正氣圓潤胃散用調助胃氣不可
以涼藥退熱胃氣和其熱自然而散愈
虛中積熱 腹痛積熱 虫痛積熱

以上宜推下積
脫甲散亦名葱根煎散

調理嬰孩小兒傷寒熱頭目昏沉不思飲食夾驚夾食寒熱大小便閉澀或赤或白煩躁作渴冷汗妄流夾積傷滯腸滿脹急青黃熱瘦日夜大熱及療傷風傷暑驚痾客忤筋骨腎臟疝氣等熱並宜服之脫甲散良方
柴胡二錢 川當歸二錢 龍膽草三錢
白茯苓二錢 人參二錢 知母三錢
甘草二錢 川芎二錢 麻黃二錢
右件為細末每服一大匙水小匙入小葱白連翹一寸同煎至半溫服不拘時候

按曰此方散熱扶表救裏表虛令汗不妄行裏熱令氣不閉結外即通內即開渠通流經絡開渠不壅臟腑然其知母當歸正陰陽人參甘草和益腸胃柴胡川芎散去寒邪茯苓龍膽止汗

生津麻黃去節留根功全衣裏葱白連鬚出汗效
正盈虧熱在表裏之間施無不可積傳驚病之候
用五見切葱根至良号曰脫甲奇妙還難盡議書
載易詳但專誠用之對證功效罕無見消者耶

大連翹飲治證在前

連翹 瞿麥穗 滑石 車前子
牛旁子 紅芍藥 山梔 木通
川當歸 防風 黃芩 柴胡
甘草 荆芥穗 煇玩
石件 一十五味 吹咀 每服一大匙水小小盞湯使在

前

議曰此方解利心經邪熱心与小腸受盛小腸乃
水竇常宜通利壅則結滑則脫熱則淡盛則淋平
涼心經三焦自順不待疾作而解證成而療者疎
急有之矣一十五味加湯使在前絕蒼蘊熱客熱
寒邪風邪胃入肺經心將受之心不受觸傳于小
腸或閉或淡或赤或白淋瀝不通采衝不順壅之
作疾其發多端以至兩熱眼目腫赤唇口白瘡津
液不生浮啞稠盛或在表裏俱得其宜驚風悉能
散化痰熱亦自消除連翹之功不虛說尔

○梨漿飲治證在前

青蒿 柴胡 人葭
取元頭用童子小便
送一二次日乾為度

新刊演山省翁活幼口議 卷一六

黃芩去心 前胡 秦艽 去土 甘中炙
石木公吹咀每服一歲兒半匙兩歲一匙已水小
盞入生藕生梨亦得薄苛二乘生地黄一寸同煎至
半去滓通口空心食前服兩滓併煎作一服

議曰此方治脾積寒熱其狀如瘧乃由脾氣陰陽
相勝故也其寒在先陰勝於陽其熱在後陽勝
陰以陽循之經絡傳歸于不依前後作不越三日
而止重則頭痛嘔逆久則二三歲不歇左脇有塊
小者如桃李大者似坏環治法下去癥積痞塊自
消然寒熱亦未能自解宜先与服梨漿飲連滓併
二服定去寒熱了方可下積問之茶性寒涼何以
禦之答曰所謂先寒後熱猶陰陽勝伏逆相更變
陰積陽虧逆之致反故寒極熱生熱極陰作反汗
自汗表有少解氣聚復作氣虛愈立所服梨漿飲
以毒攻毒茶用青蒿以寒禦寒其熱不有寒必無
加自然榮与衝陰与陽合寒熱再潮未之有也和
梨漿之功妙哉絕倫稍能知用無不得安若患三
載不過兩服曾經十年只以此方妙用至此使人
欽歎而已

正氣調胃散

治嬰孩小兒八種虛痲作熱或吐或瀉發熱霍亂上下
氣不復常心虛煩悶亦作熱並不可加用寒涼之茶宜

四六九

与服此方正氣調胃散兼生熟飲子如不納食宜服公
氣紫蘇飲子正氣調胃散良方

厚朴 一兩生薑和皮二兩梅在林中一

半夏 滑一兩洗去 白扁豆炒 藿香葉

陳皮 各一兩 甘草 薏苡仁 炒各半兩

白茯苓 白朮

右為末每服一錢匕水小小盞生姜二小片枣子同煎

煎

議曰吐瀉作熱由其陰陽不順邪正相干臟腑不和上吐下瀉又有只吐而熱者又有只瀉而熱者皆是運動真氣上下不升降又吐瀉俱作曰霍亂其見陰陽二氣不正臟腑愈虛且吐且瀉加之盛也不尔凡生你疾候變即慢脾胃病家不知其理医工罔究其詳古人不述其微致後學必招利害今知吐瀉疴痢熱自裏虛者你豈可解利其表若也攻裏由虛生虛循此調理可得其宜大小一同輕重尽善至理之言明智可鑒

議吐瀉詳證六法所治

議曰脾不和即胃不生米不足即氣不正胃乃脾家之本米乃衛室之根本堅固百虛不作表裏充實諸邪不入治法服某有六合久水穀即与五苓散服合身氣即与香薷散服之合均陰陽即

子既濟丹服之合溫脾胃氣調順三焦去濕即与理中圓服之合平正五臟氣散虛溫中即与正氣調胃散服之合溫中既醒脾和胃去虛助氣開胃進食即与合氣紫蘇飲服之以上六證用茶昏和調順臟腑且臟既溫亦和既正且順熱之一亦自然秋散此亦謹候万一不可互便用寒涼茶退熱若將熱茶止吐与瀉攻發陰陽二氣差錯致你風生遂急追風又投涼茶取次施為皆為乖繆由是吐瀉之熱不可用以寒涼或致反誤利害應時矣

議潮熱有五

一因傷寒之後餘毒不解成潮熱宜服脫甲散兼小茶

胡湯

二因痞氣有塊陰陽不均成潮熱先服柴棗飲次三稜

煎圓

三因癥積食傷冷滯脾胃不和成潮熱先服脫甲次搗

氣下之後調胃

四因陰陽不和臟腑虛怯成潮熱或胃暑濕脾瘧成潮

熱單服煨薑散

五因瘡疹後餘毒不解成潮熱宜服大連翹飲子更与

助胃氣

議曰潮熱謂熱來之有期或百一發或兩日一發或三日一發不越三日先寒後熱正定來者易治亂日者

雜理疾起脾胃即是瘧候同出而異名只有單熱潮
發之作瘧長作勞若癥積傷冷積滯痞氣皆脚冷渾
身熱若有虫積其肚亦熱如火凡兒有患脚冷肚熱
者便与下之須量熱輕重以教而利有虫多者取之
少則安之取虫宜在放春旺冬實之時其或兒壯虫
盛不拘此說

○ 議痢熱

凡小兒患痢之時未熱久則氣虛其臟腑虛極作熱此
屬惡候終見痢候作熱此兒臟腑虛弱同於虛熱王治
其或三焦熱引飲不歇四肢浮腫者理宜溫補臟腑散
涼濕氣喘則難治凡痢熱疳熱吐瀉熱並不可發散退
熱不任寒涼茶但理其病源測其臟腑和其氣衝土其
胃氣令進飲食次与痢茶服之參酌赤白多少膿血相
雜裏急後重行血厚腸胃和中腕溫臟腑其熱自然
退愈凡兒患痢不問輕重悉禁葷腥冷熱炙烤醃醢應
毒之物若恣口腹愈而復作若也求安須用戒絕之矣
議曰幼、患痢悉由積毒而受虛熱而發三焦不和
五臟蘊伏冷熱相攻陰陽反逆是以作疾腸胃洞虛
所言正患之時不熱稍愈其体溫壯衆莫能知此等
皆由勞其形役其氣食其毒觸其臟餘毒不化所以
作熱隱伏於百脉經絡之間無由端本若更逐抑何
得而安所用正氣謂胃智者然而唯然疳痢之熱安

自內和若和則上下氣相承表裏相順使飲食以自
然而然行坐以快樂而樂是謂和矣其或感眉垂首
在腹揉臍撼体拘挛無唇煩躁皆由不和也所欲和
者食飼稷粟菜餌參苓葱湯滌卧避風温仍常以旺
調胃散与服虫疾無加惟熱必愈能禁能成且安且
樂而已

○ 議積證

應諸家方書並不言積者蓋所患只因五臟受病從陰
成積其脾主食由食生冷果子甘甜熱毒亦物積在中
腕不化久而成疾故名曰積之為患有輕有重其類
多端病候不一豈可槩舉凡小兒有積熱無不肚熱脚
冷要知輕重但約肚熱為之公教其肚有及七分脹五
分熱亦有三五分脹七八分熱者盛則兩脇膨脹緊滿
既有此證須審其候方可服茶庶不致誤矣

議曰固積病久傳作腫脹小兒腫脹之病下項諸證
皆由積毒患不治而漸變作證候隨其輕重所發是
以不同應小兒食肉太早無不有積因積不化無不
成疳飽飲過度無不氣脹由脹受濕無不發腫頭面
脚手虛浮者濕在肝脾理脾去濕隨手退愈若腹肚
脹腫先膨蓋急至於作喘所謂乘虛入腹為疾難醫
不可容易轉動臟腑須究榮衛虛實若虛及公教先
宜調中理其固實方可疎利若理不能充實則壞證

虛敗豈可轉動不惟無益恐涉深害

新刊演山省翁活幼口議卷之十六

新刊演山省翁活幼口議卷之十六

總論腫脹

青山求精堂
藏書畫之記

再行開萬
冊府之記

醫問天
藏書畫之記

腫脹二證此由虛中有積久患失治漸傳作證候傳化
多端隨虛實按輕重察感衰審表裏主治先固其本後
正其標得無恙矣

腫

受濕腫 脚手面
日虛浮

食毒氣腫 腹肚背
益板急

傷寒虛氣入腹腫

瀉痢虛氣入腹腫

氣虛腫

血虛腫

榮衛俱虛腫

脹

疝氣脹

疝極脹

疝積脹

氣積脹

痞氣脹

癖氣脹

癥積脹

鎖肚脹急

上膈脹

中腕脹

食傷膨脹

蛔虫脹

脾氣脹

冷積脹

虛積脹

以上腫脹虛積並當下之用藥各有法度

○議腫

受濕腫

傷寒虛氣入腹

食毒氣腫

瀉痢虛氣入腹

○議曰此四種所患病不相同皆由虛感而得之受
濕謂脾胃受濕冷久不化氣浮四肢頭面皆腫食
毒氣由脾胃傷之冷積毒氣停留胃腕致虛入腹作

種傷寒由下之大早乘虛入腠作腫瀉痢之久脾氣亦虛是以致腫以上宜平調胃氣補臟充實方可去腫先服四味理中元減半乾薑加白朮桑白皮同煎傷寒虛腫加枳實作喘加淡豆瀉痢虛腫服正氣調胃氣既壯以救生母利之其腫即退再調補臟腑用觀音散良益固平復矣

氣虛腫亦名氣虛 血虛腫亦名血虛 榮衛俱虛腫亦名氣血虛

議曰小兒所患腫脹一門最為要急前人少有究竟然腫脹已作皆由榮衛不順臟腑怯弱壅滯三焦流注百脉表裏俱虛邪正相亂所以致受四大浮盛腹肚膨滿多由食毒得之飲食得之癥傷得之飢飽得之積久不化諸虛所入故成斯病由虛得或則妄亂通下因虛致虛根不能去疾加已盛是謂壞証危候智者怯而為辭庸者暴以攻擊二醫不同誠屬難治原夫智者高之謂高量斟酌輕重良者審之雖曰良工由宜審其可否之意疑者塌之疑其病盛不可利只宜與塌其氣明者起之明其虛實已定良方起活謹遵其理始可調治藥用至真對證剋效即無恙矣

以上先與服榮衛飲子次服分氣飲子

榮衛飲子

調補嬰孩氣血俱虛榮衛不順四肢頭面手足俱浮腫

以至喘急者並宜服榮衛飲子良方

川當歸 熟乾地黃淨人參 白茯苓

川芎 白朮 甘草炙 白芍藥

枳殼炒 黃耆蜜炙 陳皮

右等分咬咀每服二錢匕水小盞煎至半去滓通口不拘時候

議曰榮者血溫流行於脉衛者氣順調和於絡是故榮行脉中衛行脉外陰陽相安循環無正自切至長不離呼吸無少滯礙其脉方調其氣乃順呼吸之間脉不應息氣有遠滯流注經絡隱伏臟腑虛熱則癰疽背脊實熱則患瘡癩癩疥况其榮與衛陰及陽偏枯有作易感寒邪亦易致虛百病皆由茲始此方最良雖兒幼小並可與服以壯其根血榮氣衛順且和矣腑寒臟虛溫且壯矣盈虧自然而平法弱自然而正陰陽調均氣脉充實乃曰妙工

分氣飲子

調理小兒腫脹作喘氣短促急坐卧不任四肢浮腫飲食嘔逆神困喜瞞宜服分氣飲子良方

五味子 桔梗 白茯苓 甘草炙

陳橘皮 桑白皮 草果去殼 大腹皮

白朮 枳殼炒 川當歸 紫蘇

蘇子 半夏麴

右等分以咀每服二大錢匕水小盞生薑二小片煮
子半箇煎至半去滓通口不拘時候煎入味理中元
煎服

以上宜用救生丹通利

議曰清濁無混邪正不干上焦得之清涼下部受之
溫煖氣滯則少升降血虛則多流注雖是乳子呼吸
一息其脈有五徐、應指不遠其數者亦同大人流
行但隨小大受之短淺而已若也留滯其脈遲數於
病大過不及者有作善主療治鬱則分之逆則順之
停則利之滯則降之調理之法先宜以順其氣大抵

嬰孩氣順即易治脈壯亦易理証候稍傳鬱逆
滯當以先明不待傳入而後究竟此方分氣須宜
進益與分水穀之分者不同為用明者察之 致
迂曲

大效神功救生丹

治小兒氣虛喘急四肢浮腫腹脹急衝滿眼赤熱
下寒或瀉或秘皆由久停虛積榮衛不順宜用推去其
惡毒之氣神功救生丹良方

雄黃 分研 朱砂 分研 巴豆 二千一
乾薑 二錢 粒去殼

右用水醋一盞以巴薑就煮令乾去薑不用將巴出

油和推朱研勻雪糕搜元如麻子大每一歲三元並
用酒浸赤芍藥以少許送下

議曰夫幼、受疾其來發端無過驚風痰熱疳積
吐利而已前賢衆多述論證候編者方集究竟推
詳各有確實與見其有無辜疳積異作證候者干
篇集或有罕見其證未詳其理者世世難測難知
如龜胃決助痢繇禁是也又復有壞證惡候自服
諸家元散輕重桐投愈之不得全功疾之加為他
害提脾風之類是也悠、既久方法何宜學醫之
士過此等病未嘗告辭而屈若能此附類調理
雖則未效猶尚庶幾多是肆臆勉強而為稍或得
失利害甚重今議救生丹方載譚氏所療無辜積
議效驗至良晚延後生聞而知之且驚且喜蓋渠
未嘗知用若也參究而又意到即忝功以副全功
然後乃謂神乎微乎其妙至理醫工於此等證候
須當至誠施設活幼起孩十舉十全百發百中矣

○議脹

疳氣脹 疳極脹 疳積脹 氣積脹

議曰小兒患疳證候皆由虛所傳積乃為母積既
已作虛氣傳授遂成疳疾其名數種皆漸所致不
可更與通利尤加重候即宜和益消疳調氣若尚
有虛積便白後重當兼塌氣以去之先與服神功

保童元以至泄氣為快既泄虛氣即散是也不傷其氣功效至良應患疳積便利無度大有功效
楊元子

治小兒陰陽不和臟腑怯弱乳食不消心腹脹滿嘔逆氣急或腸鳴泄瀉頻併腹中冷痛食癥乳癖疝氣痞結積聚腸胃或祗或利或面腫滿不思乳食及療五種疳氣八種痢疾飢內消瘦氣麓獲大神色昏憤情意不樂常服散冷熱氣調和臟腑去疳積止瀉痢進乳食生飢內悅顏色功效非常不能縷述楊元子良方

蘿蔔子

二兩

陳皮

青皮去白各一兩

黑牽牛

一兩半半生炒

京三稜地一兩

蓬莪朮

胡椒

木香二分

又一方加胡黃連半兩香練半兩蘿蔔子只使一兩

右為細末麪糊為元麻子大每服三五丸煎蘿蔔湯下

議曰證候不明醫之過也元散不良士之膠也去醫裁藥審証察候猶若權衡以究標本醫藥純全之道凡調理小兒雜病須究疳証積候乃五臟所傳及至交作他患殊失源流迭而不反所以作疾此方最善寬腸下氣散結去鬱其疳與積已作未作順傳逆傳並皆宜服功蓋常方大厚腸胃充實

臟腑按證所療無不剋效京輩之下作疳藥貨賣名聞四方活幼多效今不隱藏故述詳悉請故用之

痞氣脹

癖氣脹

癥積脹

議曰痞癖之氣同根異名作疾有塊皆在左脇男女亦同然痞者陽證癖者陰證緣小兒脾胃不和陰陽二氣交錯冷熱相制皆由積之所致故先寒後熱一如其雲汗出則息若先下却其積則熱往住不去及增加重而又作腫虛滿頭面凡兒有是疾醫者不可輕易投砒治之其砒有大毒衝胃三焦作瀉引飲水停在脾為四肢亦作浮腫重則致喘煩躁虛悶倦怠不安砒之為藥豈可妄投宜先與服漿漿飲加湯使如法取令寒熱返三五日了却與三稜元磨化積毒以利為度去其根本若未通更服

三稜煎丸

治嬰孩小兒食傷生冷粘膩熱毒等物脾胃積滯久不剋化令兒肚熱脚冷痞癖寒熱及療癥疳中腕不和膨脹上膈氣壅心腹不得宜通所以作疾此藥溫良但是諸積滯食不化並宜與服三稜煎丸方

京三稜

蓬莪朮

並地各一分

鱉甲去裙米醋炙

淡豆豉二分

令焦半兩

巴豆二十一分 川當歸半兩 杏仁去皮尖一
粒去殼 右前六味一處以米醋一椀煮令乾仍就炒起更細
截焙為末次入當歸末又入杏仁巴豆和勻水黃
麩糊為元麻子大每服二十元生薑湯下大小加減
服之

議曰此方亦名消痞元又名化積元其藥破氣行
血和脾開胃應痞癥瘕諸積氣滯並皆療之噫
調理嬰孩之法須究脾胃之源脾胃者乃飲食之
臟腑也古云人無根株飲食為命然飲食之物有
所宜則穀氣消血脈勻則肌膚壯精神爽有所不
利則腸胃虛肢體瘦面日黃疾病作是以藥固臟
腑其胃氣和即穀食自然留之其脾胃壯即穀食
自然磨之若飲食遲化即氣弱飲食不化即氣虛
小兒服此初安臟腑次益肌膚三焦既順百脈俱
調效驗至良醫痞第一

鎖肚脹急

議曰此一證候兒在胞胎中無恙只由初生七日
內有患觸受而成急如水火其作延久漸見加重
以至肚上青筋撮口不乳其候甚速得名脹急其
兒感觸邪氣入腹衝心不能自化遂變風候及至
成風不可更投藥餌雖然鎖肚撮口不乳其色未
變精神未亂者速便下藥以通為度才通便安切

效至聖無可疑者兒已獲安吻乳如法漸次氣肚
內重懼恍可愛宜服真珠天麻圓方在前急
驚証內

附初生鎖肚撮口施藥法

夫人總生下男女忽有一證男在三五七女即二四六
日奇偶之有數陰陽之頭道者遂感客忤邪正相干令
兒肚緊青筋撮口不乳此由容情外來致襲其邪陰陽
不順胃腸其正初生男女氣脈未定精神未全不結邪
邪氣所以古人禁客一環速其此禍
謂婦慾交通殺氣侵臨屬德皆邪屬 上古醫家著述
繁雜難窮至要世俗雖有如文理無灸法血氣方生豈
為虛設既受此厄越日移時母泣父啼痛心待斃或謂
傷嗟誰可與活僕忝執如科傳授四世黃緣回祿之難
海運三紀一日扣遇高明深詰其妙方藥祕傳屢用獲
慶嗚呼天地生萬物惟人尊貴人能藉仰於天地之間
且天地豈特害於人自是事在遇不遇之如此稍有感
傷悔怨執滯於人情者多矣僕輒行小惠普濟初生躬
對神聰選材修合其或高下民戶生兒有被此難無問
輕重不拘早晚施與良餌決定保全頓然甦活豈小補
哉

上膈脹

中沈脹

食傷膨脹

議曰膈與沈上下相承膨與脹輕重自別腕受疾
久則痞悶膈作病停則鬱結是和膈隱胃堂腕臨
脾胃膈者猶隔也有如隔礙腕者猶管也通即流

利二位皆由食傷宿冷眠卧過時停滯氣不順於
三焦怯弱脉虛傳於五臟所謂脾不磨食不化胃
不開食無益所以膨脹若於膨脹之時不與消利
遂致虛滿又於虛滿不為疎補其氣即攻中脘又
於中脘不化即冒上膈既在上膈為疾必作形證
傳即為重腎莫容易取愈食傷膨脹宜服三稜煎
圓中脘痞脹宜服王氏塌氣圓上膈鬱脹宜服大
菜連圓

大菜連圓

治小兒飲食過度膨脹胃膈上下氣不宜通鬱滯迷悶
情思少樂大則作喘強食不化作渴煩躁坐卧不任肢

麻倦急膜積疼痛宜服大菜連圓良方

蓬莪朮

京三稜各二分醋黃

乾薑地

青皮

陳皮正去

木香

丁香各二分

巴豆二十一粒去

殼心鹽出油

緣小細菜莖二錢

右為末醋糊為元麻子大每服七元至十元大者加

服生薑末子湯下

議曰痞鬱結注所因脾胃飲食生冷粘膩積氣不
化滯在胃膈乃摠名上曰三焦下曰三脘上下相
貫來去相侵虛處所受弱處所發致疾乃因久不
剋化成害或由常不宜通癥瘕痞積積之所由至
疝痢吐瀉積之所因作今用此方大寬胃膈平厚

腸胃正氣溫中消痞積能止吐瀉進美飲食藥
有神功尤宜察證

蛔虫脹

議曰此證候作與脾氣冷積虛積大抵相似然小
兒腹肚緊脹天明吐津沫要羹肉與方少安乃蛔
虫候脾氣多噎逆飲食不下虛中有積腹系吊痛
冷積脹緊膨滿心腹不仕坐卧兩股心膈上下攻
刺疼痛內虫痛脹先與下虫元殺虫其虫困次與
水晶元推下餘證各與調胃藥服却推下積宜服
小兒沉香煎元

小兒沉香煎元

乳香

沉香各一分

肉豆蔻一分

杏仁一分

百草霜一分

木香

丁香各一分

巴豆十四粒出

油如霜

右為末黃酒封頭蠟和為元如菜豆大每服三五元淡
生薑湯送下應患肚痛不止服之功效常服以通為度
議曰此方乃感應元如沉乳二藥是也療小兒虛中
積證癥積疝疾冷積食積脾氣乳積腸胃久虛臟腑
中脘不和痞氣鬱結或瀉或痢或嘔或噦腹肚疼痛
兒體虛羸不堪動轉者並與服之其方以真味元等
取積大不同耳只恐服此未能能通利若也通利誠
為之幸乃胃透虛存實和脾生胃之藥功無加諸

下虫丸

治小兒多蛔虫亦名食虫 苗虫亦名府虫 胃虫亦名血虫 並宜服下虫丸方

鶴虱炒一 光粉炒二 臍粉二大

史君子个一 檳榔一分 龍牙根一錢

貫衆方輪 龍膽根二錢

若棟根皮酒炙

右為細末水煮麩為圓如麻子大每服三五十圓空心食前甘草湯下或以猪肉清汁煮與服尤妙

議曰小兒疳積虫積皆由食肉大早脾胃本弱受之不磨腐傷不化何況更加肥膩冷硬之物腸胃虛怯

因積生虫只有二種蛔苗胃也蛔多令兒喜食滋味

內脯之物腹肚紫脹心胃膨滿苗多令兒清瘦神困

肚脹青筋疳氣漸盛腸鳴瀉臭食即嘔噦胃多令兒

喜食酒肉食不生飢常作困道嗔脹眼赤煩躁迷悶

眠不安蒂並宜服此真虫自化盛用利下仍須調胃

和氣助之

演山省翁活幼口議卷第十八

小兒傷寒證候止議三種乃為正要正受夾雜丸食

前述傷寒並用朮散其病既分三種須當究論輕重

鼻塞小便赤欬嗽閉竅不通壯熱面紅頭疼身重渾身

手足俱熱

凡治小兒正受傷寒及感寒邪傷風諸證宜服人參羌

活散小便赤色或心神不寧病在表裏之間或再後發

宜與小紫胡湯一二服

凡治小兒夾驚傷寒神困昏悸頭疼氣粗宜服王氏杜

薄苛及消風散

凡小兒夾食傷寒即先與微利次與朮散或人參羌

活散下之紫霜圓為上取微利為度大抵小兒傷寒不

可重表亦不重下亦不可併行表下之理今兒虛乏困

重即成壞證難療

議曰凡小兒傷寒雖無多事須是認證分明應傷寒

傷風只可表惟有夾食宜用下之凡夾食傷寒脚微

冷似有積證相類但以等傷寒自是不同不可不問

知其端的然後次第進茶仍丁寧病家令避風濕與

忌生冷勿令強力無恣飽食恐勞胃氣其病再復且

醫家調理即須審度無有是瘡疹盛時及左右鄰舍

有無所患之者若或有之亦不妨事但表解藥與服

不可妄投驚茶餘無恙矣惟有壞證蓋由前人用藥

不當挽亂陰陽故致為壞或因觸受風邪故致為壞
或因強力食毒故致為壞或用冷溫傷經絡故致於
為壞之則難極治醫學宜乎疚心而已凡小兒傷寒
候惟有咳嗽一證不為容易若有此證宜服人參枳
實湯尅效萬一勿可攻擊善醫者察此為良

大效人參枳實湯

治嬰孩小兒傷寒後氣不和煩喘急咳嗽胃膈鬱塞日
夜頓悶神困力乏不思飲食仍療虛痰煩滿頭目昏暈
但是傷風感冷咳嗽並宜服此

枳實 肆箇末 泔浸 桑白皮
去穢切 炒
半夏 湯洗七次切 甘草炙
仍以參汁浸

白茯苓

款冬花

五味子

河膠 炙

細辛 各半兩

人參 壹分

麻黃 去節

首梗 各半兩

右以咀每服一小撮水小盞生姜三片棗半箇烏梅少
許同煎至半去滓通口服二滓併煎

議曰小兒傷寒作熱頭痛等證或已各散退熱或已
化痰定喘或已安神定志或已開胃進食兒孩不復
父母忘憂喜也甚善尚有一證日夜咳嗽多方不愈
良由元受邪氣入肺葉內無能得出不堪吐利何由
而安凡兒傷寒後及感風咳嗽不愈者宜服此方湯

使煎分如法梳盛蓋將口就吸徐徐服之不過三
五次疹痊此方為肺補氣寬膈化痰滋潤五臟和益
三焦不惟理嗽調中更善

小兒驚熱凡痰

議曰此名四證已述前篇兼載八候續之今復舉驚
熱或併風痰未發陰陽二癇之前醫者即先與化痰
藥風退熱利驚如此逐病推究不惟繁雜乃無法所
治是故艱於療理若已向病於證何憑凡此四證相
隨不可攻其一也利其驚則風從退其熱則痰壅久
尋理未究盡善忽一日省悟錢氏方宜凡散正為
此等兒孩病設有痰即壅有熱即閉有風即隘有驚

即悶昏之沉之輕藥不能散重則恐傷害但與辰
風散 散之宜風 一服之間風痰驚熱悉皆消去神清
慶悅四肢和安觀其此藥似有狼虎困之即和順
痰利驚散風解熱只與一服不移其時可見功
見醫工調治此等證候多是疑惑進退怯懼若過其
時延其日則候傳變驚目驚作風自風生痰自痰壅
熱自熱聚或急或慢八候相從反覆傳變迤邐各越
出時不可得而進此藥然疎風所療四證相待如脂
方會極力一衝盡使散散不致作害及其聚而自散
者流入諸經或絡或經或脈故作搐搦引掣等候矣
大效疎風散

治嬰孩小兒驚熱風痰四證結聚於胃臆之間令兒昏困沉重閉竅不通諸脉氣閉所以默々欲食不食欲起不起倦伏不知其證候者但不經吐利宜與服之立見效省大效疎風散良方

錦紋大黃 緊實者 三名重

雞心檳榔 重

舊陳橘皮 去白 或入

朴消 重

黑牽牛 重分 半熱

右五味為末每二歲兒服半及七三歲一久七先用生蜜調就次煎薄荷湯點與服不拘時候

議曰風痰在上即吐在下即瀉 諸病上 下也 一服之間決定安樂未可便投他藥恐相致悞常人只和用

腦子麝香麥冬木附子 香附 子 無擔負之藥似此四證如何和順調理

疳疾證候方議

議曰五疳八痢本經所載詳明然究竟疳在五臟五病故有五名及其順逆相傳變動臟腑則病不猶證候而作者豈可以五疳為數八痢為拘疳者始自於疳痢者起自於痢疳以飲食不節過傷脾胃痢即脾胃虛弱而受積毒治疳之藥理脾胃溫中補氣消疳然去治痢之藥理腸胃去濕調中滋血和氣為上

大效史君檳榔圓

治嬰孩小兒食內太早傷及脾胃水穀不分積滯不化疾作疳氣等候宜服大效史君檳榔良方

內豆蔻 兩箇 炮

檳榔 一箇 宣連

胡黃連

陳皮 青皮

川練子肉 炒

蕪荑 炒 去 神麩

麥芽 並炒

木香 夜明砂 炒 去

盧會

川芎 各重 麝 一字

右為末揅猪膽汁薄苛為圓如麻子大每服三五十五圓溫飯飲下

議曰積是疳之母所以有積不治乃成疳候又有治積不下其積存而臟虛成疳尤重大抵小兒患疳泄浮無時不作風候者何惟疳浮名熱瀉其臟腑轉動有限所以不成風候雖瀉不風亦轉它證作渴虛熱燥煩下痢腫滿喘急皆疳候虛證古云疳虛用補虛是知疳之為疾不可更利動臟腑矣作之初名曰疳氣腹大脹急名曰疳虛浮痢頻併名曰疳積五心虛煩名曰疳熱毛焦髮穗肚大青筋好喫異物名曰疳極 受病傳 已極 熱發往來形骸枯槁面無神教肉無血色名曰疳勞手足細小項長骨露尻髻無肉肚脹胸突名曰疳食加吐噦頭骨分開作湯引飲虫從口出名曰疳露此皆疳候又因多食生冷疳粘肥膩積滯中脘不化久亦成

疳治疳之法量候輕重理其臟腑和其中腕順其
三焦使胃氣溫而納食益脾元壯以消化則臟腑
自然調貼令氣脈與血脈相泰壯筋力與骨力具
健神清氣爽疳消虫化漸次安愈若以藥攻之五
臟踈却脾胃下去積毒取出虫子雖曰醫療即非
治法蓋小兒臟腑虛則生虫虛則積滯虛則疳羸
虛則脹滿何更利下若更轉動腸胃致虛由虛成
疳之虛證候乃作無辜之孩難救矣

胡黃連圓

治嬰孩小兒一切證候及一切虛痢他藥無功此藥極
效胡黃連圓方

胡黃連

盧會

草黃連

肉豆蔻

桂

人參

朱砂

麝一字

史君子 去殼

木香

吊藤

龍齒

白茯苓

以上各
一又重

右各生用為細末取獾猪膽兩枚裂汁和末令勻却
入袋內盛之以繩扎定湯煮半日取出切破袋子更
入 芫荽子二枚重 微炒 黃丹一枚重 二味別
研如粉入前藥和勻搗五百杵為圓如棗豆大但是
疳與痢用粥飲下五七圓子幼者三圓不喫粥飲乳
頭令吻能治一十二種疳痢及無辜者功效非常

議曰疳之疾危矣由於漸痢之後逆傳自於延
逆初見其輕言之曰常後知其重告之無門是以
疳痢皆由積毒矯恣口腹因虛以致虛用害而傷
害醫工見有此等自是憂疑病家欲得便甦豈無
性急更料遷取活展轉愈深或疳極而肢下痢或
熱盛而加作渴或煩躁四脈虛浮或飲食一特吧
吐常方不能安愈快劑恐越傷和惟宜服此

肥肌圓

治小兒一切疳氣肌瘦神困力乏常服慈虫消疳
開胃進食肥肌圓方

黃連 一分

川練子肉 兩分 川芎 半兩

陳皮

香附子 各一分 木香 二枚

右為末水煮細麵糊為圓麻子大每服三五十圓溫
飯飲下

議曰驚疳積痢各分證候用藥今有小兒患疳虛
困又作痢疾二候相如最為惡重疳痢併行臟腑
虛乏之極熱毒差重皆係積之及滯雖曰係積無
積可療乃虛受之然謂其虛補之不及所見其證
不得良方以何對治雖獲其方不審其候亦難療
也良由脈與病同藥與證對醫工運功扶而起之
必得安樂胡黃連圓無以加諸肥肌良方亦佐勝
蘭香散

治小兒走馬疳牙齒潰爛以至崩砂出血齒落看蘭香散方

輕粉一又重 蘭香子木 又 寶陀僧牛兩輔 淨為末

獨活飲子

治腎疳臭息候良方

天麻 木香 獨活

防風 麝香少許細為末研和入

右各壹分重為末每服一服匕小者半久麥門冬熟水調下

三黃散

治腎疳崩砂候良方

牛黃 大黃 生地黃

木香 青黛

右等分為末每服一服匕熟水調服

人參散

治腎潰槽候良方

肉豆蔻炮 胡黃連 人參

杏仁炒 甘草炙

右等分為末每服一服匕小者半久溫熱水調服

檳榔散

治腎疳宣露候良方

木香 檳榔 人參

秘方述干後

又方傳齒立效散

鴨鶩膽卷一又重起 麝少許

右研勻每以少許傳牙齒齦上 又一方用蟾酥一字加麝和勻傳之

議曰血之流行者榮也氣之循環者衛也變蒸足後飲食之間深恐有傷於榮衛而作眾疾其或氣傷於毒血傷於熱毒攻之虛臟所受何臟為虛熱蓋小兒腎之一臟常主虛不可令受熱毒攻及腎臟傷乎筋骨惟齒受骨之餘氣故先作疾名曰走馬非徐々而作所宜服藥耳露飲地黃膏化毒丹

黃連

甘草

右等分為末每服一錢小者半錢熱水調服

黃耆散

治腎痺腐根候良方

黃耆

牛黃

人參

天麻

蝎炒

杏仁炒

白茯苓

川當歸

生地黄洗

熟乾地黄洗

右等分為末每服小者半錢已煎天門冬熱水調服
亦得

地骨皮散

治腎痺齟牙齒內爛腐具鮮血常出良方

生乾地黄

真地骨皮

細辛

五倍子

或分黑

右為細末每用少許傳之頻與功效喫不妨

識曰本經所載症證有五謂五臟所受故得其名

今述腎痺一職有五證候者最為要急不可同常

此疾具陳有五種候傳迅疾可畏乃知走馬之號

不誣初發之時兒孩口臭上千胃口氣息臭漸

進損筋斷內生瘡或腫或爛其齒焦黑又進從牙

槽內發作瘡癩破潰膿爛又進熱逼入脈時血

出其熱注之牙斷腐壞槽寬齒脫六七歲孩落盡

不復更生豈可治療今以抄方宜速與隨其傳變
而理不待疾作而後藥也
痢疾證候方議

豆蔻散

治嬰孩小兒腸胃虛弱糟粕不聚瀉痢不止或赤或白
冷熱不調日夜頻併愈而又寒宜服瑞腸豆蔻散良方

肉豆蔻

胡椒

龍骨

白荅

右為末每服壹錢溫飯飲調服不拘時薄糊圓麻子
大五六十圓

議曰胡粉即真鉛粉也以鉛法造出韶州名韶粉

定州名定粉摠名光粉其性瑞故用之以瑞其腸

令不虛滑豆蔻溫臟之藥安和腸胃龍骨白荅滋

腸止痢所患腸虛滑下痢日夜無度者服之隨時

痊瘥應掌腥之物酸鹹之屬悉與禁止亦治秋間

白痢更效

生熟飲子

治嬰孩小兒虛積痢腹肚疔痛下痢裏急後重日夜無
度宜服生熟飲子良方

罌粟殼

大者四個一半天此一味

陳皮

半斤

淮東

生薑

半斤

烏梅

訶子 二个 大者半塊 小者十粒 黃芪 二寸 半尺

白朮 二塊 煨川當歸 半二塊

右件各半生半熟吹咀和勻每服參水小盞入磁瓶內煮去半濾滓任意與服至多勿慮所有生黑豆不要打破只圓全同煎效

議曰病有冷熱藥有生熱病有陰陽藥有造化病有虛實藥有君臣按君臣以理虛實分生熱而均冷熱治療主本之法也平和腸胃之方也頃益三焦之功也安調五臟之至也陰陽既分冷熱既散腸胃既厚三焦既益五臟既順良由藥有造化且水穀自分榮衛自正糧粕自聚飲食自納其瀉與痢何患不愈生熱飲子之功乃盡天下之妙不可忽

神效雞青圓

治嬰孩小兒一切痢疾神效雞青圓良方

木香 一分 土黃連 一分 內豆蔻 一分 芥子 一分

右三味先碾為齏末取雞子青搜藥作餅於慢火上炙過令黃色變紅者稍乾擘破碾羅為末白麵糊圓麻子大每服三五十圓溫飯飲下

議曰木香黃連一陰一陽藥木香善導水利氣脈黃連厚腸胃二味君臣相佐陰陽相順加之豆蔻溫和臟腑止瀉痢功效弥良九兒患瀉與痢不問

證候輕重並宜攪先與服不問臟腑冷熱愈多愈效然雞青為物有毒是以毒氣引藥致效若去此一味其功不作矣

大效至聖千金飲子

治小兒脾積虛痢便下五色先由吧吐後作泄瀉四肢病痛朕助脹滿受濕虛鳴膿血相雜下如豆汁亦如痰血日夜無度食少肌羸宜服大效至聖千金飲子良方

綿黃耆 一分 甘草 一分

聖粟殼 一分 木香 一分

地榆 一分 川當歸 一分

黑豆 一分

烏梅 一分

淮棗 一分

白朮

訶子 地土

黃連

右等分吹咀每服或水小盞煎至半去滓通口與服

議曰臟腑虛中加燥故患熱痢或爾虛寒乃患冷痢或由暑氣胃之水穀不分或受濕氣臨止腸胃有作或因食毒傷脾肺或因宿冷停積臟腑或因因衣裏不解或因冷熱相承或因飲食過多或因飢餓不及多食醃鹹常噉魚鱗或是母懷胞胎恣其口肢積之日久氣不宜通遂令疾患有加發作無度畢竟腸胃虛損日夜呻吟痢下頻併宜服此方效驗若神

大艾煎圓

治小兒虛痢作渴不止大艾煎圓良方

大艾葉燒灰 乾葛粉 胡粉炒

海蝶蛸 龍齒

右件等分為末煉蜜圓雞頭子大每服一粒至二至
飯飲磨化

議曰下部既虛無不作渴也如虛無不成痢瀉
痢轉虛故有上盛三焦不順所以作渴渴若不住
則瀉不止痢不歇又以止渴其藥性涼瀉痢尤重
此方兩獲全功扶救痢疾不致其虛亦不致熱

白餅子

治小兒秋痢號曰毒痢純下白肢肚痛白餅子良方

北荅粉白 戴粉一錢

白麩半兩 胡粉一錢

右件和勻水搜作餅如錢大每服半餅大者一餅飯
飲磨化

議曰秋氣金旺則母虛矣夏月火燥則子困矣夫
人五臟六腑乃循四時而行故曰秋濕脾胃若胃
口有毒禁悶不食輕粉却毒次用豆蔻麩與喫兼
雞青生熟飲閉服閉胃醒脾乃愈

木蔻麩

治小兒禁口痢一粒飯一喫宜服木蔻麩良方

白木半兩 肉豆蔻炮 木香三錢

右為末白麩或兩入藥水搜作劑切作條子水黃令
熟用葱白生薑豉各少許和汁滋味與之香入多少
仍兼雞青圓服

香脯

治小兒刮腸下痢禁口不食閉眼合口至重者香脯妙
方

晶猪肉一兩薄批 臙粉半錢

右將肉於炭火上慢炙旋鋪臙粉令勻炙令成脯每
以少許與喫如未知喫且放鼻頭自然要喫此方治
胃口有毒至奇至妙

痒熱證候方議

議曰小兒痒患乃是五臟所受積氣相傳分議患
痒有患熱者由其候虛也盛積者乃痒之母所有
積不治遂傳成痒又有治積不下其積存而臟虛
其痒傳而脉弱臟腑傳過絡致受由以作熱證
候尤重雖不發作凡痰果竟危困沉重經云痒熱
證謂勞形作渴虛煩煩不食下項良方過其輕
重而與服之仍擇所當勿可縱恣誤致年違便計
利害

人參散

治小兒痒熱虛煩作渴不鬼飲食四肢沉重服人參散

良方

人參 蓬莪朮 川當飯

龜腦草根 甘草 赤芍藥

白茯苓 枳殼 浸去穢如作小片 用麩炒令赤色

右等分為末每服半匙煎麥門冬湯調服無時候

神妙宣氣圓

治小兒疳熱久蒸肌肉消瘦形容憔悴神情不樂飲食雖多不生肌肉宜服此方大有功效神妙宣氣圓良方

蓬莪朮 赤芍藥 川當飯

大黃 地 驚甲 卷醋炙去 裙尾為度

右等分為細末水黃麩糊為圓麻子大一歲二十圓

熟水下大小加減

珂坡圓

治小兒患無辜疳三焦虛熱飲水不歇下痢頻併日夜無度煩躁乾嘔食入即吐如虫惡證服常疳藥分水殺止煩渴治下痢進飲食但無效者宜用此方治之隨藥取安一服虛熱去兩服煩渴止三服瀉痢住不過三服諸證悉應效萬一神聖秘寶珂坡圓良方

蟾蜍一枚夏月取生活者乃是溝渠中肢肚大不能跳又不能鳴者身上多毒蟲是也

右取糞虫一杓放桶中更以屎灌四維令乾即留得其虫却將蟾蜍打殺頓在虫上任其虫咀食兩日間

用新布作袋包裹小麻繩繫於急流中推一宿明日取上淨乾尾上焙為末入麝和勻湯浸蒸餅圓麻子大每小者二十圓大者三十圓溫飯飲下或用麥門冬子去心煎湯空心食煎日進二服功效如神 宜至誠修合

濱山省翁活幼口議卷之十八

池瀉證候方儀

議小兒泄瀉傷積而作瀉者初以補藥治不止之時須當下去其積推積絕下其瀉自止下之宜與小沉香煎圓理虛中積甚良多與服之或以小塌氣圓又不下更與三稜煎服之切不可以宜轉藥恐成滌蕩矣積滯已下與服調胃溫脾藥及既濟丹此乃理積瀉夏月暴瀉由其臟寒虛腸滑利泄速與契聖丹如滑不禁進帶腸散次與契聖既濟丹若洞利其瀉不常發作駭人速與帶腸未子次與木附湯稍與遲緩其候必更療瀉之理豈可相待病家無知醫工當謹

帶腸散

治嬰孩小兒腸胃虛寒臟腑久冷泄瀉不止帶腸散良方

真鉛粉半兩

白石脂二錢

白礬二錢

白龍骨壹錢

右為末每服半錢七次者一錢溫飯飲調下薄糊作小圓多服效

契聖既濟丹

治小兒陰盛陽虧臟腑虛寒瀉不止契聖既濟丹良方

熟地黄壹分

白礬

半夏未浸半日乾

右為末雪糕圓如麻子每服三五十圓溫飯飲下
木附湯

治小兒臟腑虛寒泄瀉洞利手足厥冷木附湯

附子半兩地

白朮壹分

乾薑壹錢

甘草一錢

右咬咀每服一錢水小蓋煎至半去滓與服手足煖止之瀉是洞世半足冰冷方可與服

○小兒吐證方儀

所述證候在前今具良方干復其證又有風擁吐即類痰吐治之文氣吐即類胃寒吐理之驚吐即類熱吐積滯吐即類冷吐氣逆吐即類食吐療之

八白飲

治嬰孩小兒脾胃虛弱膈有風痰水穀入口急皆嘔噦眩氣之飲食不下霍亂吐利神情恍惚心胃膨滿中脘不和八白飲方

沉香

藿香葉

人參

草菓

白川乾薑地

半夏曲

白芍藥

白檳榔

白豆蔻

白茯苓

白朮

白扁豆炒

白芷

右件等分為末瀉後復吐或吐後復瀉每服一錢水小蓋生薑二小片末子半筒煎三五沸通口不拘時

候

人參溫中圓

治嬰孩小兒驚吐熱吐心神稠亂中脘不和漸加恐悸恍惚無定人參溫中圓良方

人參

白朮

白茯苓

半夏湯洗七次

陳皮

肉豆蔻煨

右等分為細末蒸淮東肉為圓麻子大朱砂為衣薑香生薑湯三五十圓不拘時候多服勿慮

調中正胃散

治嬰孩小兒中脘不和冒氣不正胃冷傷熱吐逆煩悶神困力乏飲食不美虛弱思睡性不安穩調中正胃散

良方加木香名木香散

藿香葉

白朮

人參

白茯苓

甘草炙

陳皮去白

山藥

白扁豆炒

半夏曲

川白薑

右等分為末每服一錢水小盞生薑二小片棗子半箇煎三二沸服

煨附圓

治嬰孩小兒積滯吐胃壅鬱結中脘痞悶氣不舒暢開穢嘔逆即吐宜服煨附圓及溫中圓煨附圓良方

黑附子二錢

丁香五箇

右以水搜附末梘丁香再用麩劑包於煨灰中煨熟

去麩為末生薑自然汁圓如麻子大每服三十圓煎薑末湯下

青金丹

治小兒陰陽二氣不均霍亂吐逆青金丹良方

水銀壹錢重

硫黃

右和研令水銀不見星只作墨色取生薑汁作糊圓麻子大每服十圓至二十圓用淡生薑湯下

豆蔻散

治嬰孩小兒虛吐飲食之間便作嘔逆蓋由脾寒或呢無時吐後暈悶胃壅鬱結上下氣逆宜服豆蔻散及香

朴圓豆蔻散良方

肉豆蔻煨一箇

木香

丁香

白朮

白茯苓

甘草炙各錢重

藿香葉壹錢

右為末煎薑香末子湯調一錢半服之必効生薑湯亦得

半丁圓

治嬰孩小兒痰吐風墜所致或因感風痰盛咳嗽作熱煩悶神不安穩睡眠不寧可進飲食或欲飲食食之即嘔蓋由風痰在膈飲食不下先服半丁圓次用正胃散及正氣溫中散半丁圓良方

半夏洗七次 丁香重錢

右將半夏末水搜作劑包丁香再以麩劑裹煨令熟去麩為末生薑自然汁圓麻子大每服三二十圓淡生薑湯下

正氣圓

治嬰孩小兒食傷癥冷逆不升降嘔吐不已胃膈留停積滯不化宜服塌氣圓或一向只作乾嘔噦聲頻作宜服正氣圓良方

藿香葉

厚朴製

陳皮

半夏曲

白朮

白茯苓

甘草炙

乾薑一錢

三稜切

右為末煉蜜為圓如指大每服一圓生薑末子湯化

開與服

益鼓圓

治幼兒乳不上宜服此立效兼小兒沉香煎圓益鼓圓良方

鹹鼓七粒

臙粉一錢

右研圓如麻子大每服三圓至五圓薑香湯下乳頭

吻亦得

渴證方儀

議小兒渴證一見唇紅如丹三五分者即發三五分湯若七八分紅者即七八分作湯其有發渴唇紅焦黑者

即久渴虛盛疾加傳極證候危篤故也凡小兒有疳渴

引飲不歇心肺虛熱唇焦舌裂有渴渴者肌羸弱神

困力乏有痢渴者虛熱積臌眉欬肚痛有傷寒候發渴

者有痞癰虛煩引飲不歇俱在三焦不順五臟蘊熱煩

躁昏悸神情不樂分證所受主治用藥

治小兒三焦虛煩作渴引飲不歇宜服三黃丸如朴消

小許重作小圓子煎麥門冬飲下

治小兒傷寒候發渴唇口焦乾強燥盛者竹葉石膏湯

主之

治小兒痞癰作渴不止大艾灰餅子主之

治小兒熱瀉作渴五苓散如乾葛主之煩熱香薷飲如

黃連治之小便澀閉水實不通煎車前湯主之用草

前末甘草炙二味煎湯

治小兒疳渴蚘子麝香圓主之

喘急證候方儀

小兒有困驚暴觸心肺氣虛發喘有傷寒肺氣壅盛發

喘有惑風咳嗽肺虛發喘有因食鹹齏傷肺氣發虛痰

作喘有食毒熱物胃觸三焦肝肺氣逆作喘喘與氣急

同出異名別之輕重疾究兩端喘即口開溢於胃臍氣

急即取息短滿心神迷悶盛即如之喘促不待傳變宜

速降下寬中補肺利膈化痰固氣即愈惟有驚喘暴急

心肺不亂停積不散金火相剋逆而不實錯亂血脈擊

觸臍、臍速療乃瘳，緩即加重，重即傳變，即八候有作。

八味理中圓

治小兒心肺不和，息數脈急，上下不升降，中膈痞滿，鬱阻胃臆，坐臥煩悶，神情不樂，飲食不下。八味理中圓方。

人參 甘草 白朮

乾薑 枳實 白茯苓

五味子 去梗桑白皮 去赤皮

右等分為細末，煉蜜為圓，小指大，每服一圓，淡豆豉五粒，水小小盞煎至半，去豉，通口服，無時。

大効雄朱化痰定喘圓

治小兒因驚發喘，逆觸心肺，暴急張口，虛煩神困，大効。

雄朱化痰定喘圓方

雄黃 朱砂 蟬蛻

全蝎 地龍 白殭蚕

天南星 白附子 輕粉

右為末，麩糊為圓，麻子大，每服三十圓，薄荷茶清送下，食後服。

天方定喘飲子

天麻 防風 羌活

甘草 人參 苦梗

白朮 川芎 半夏麩

右等分，吹咀，每服二錢匕，水一小盞，入麥門冬子拾

肆粒，同煎去滓，通口服，食後服。

雄黃丹

治小兒齕齶，喘滿欬嗽，心胃煩悶，傷熱觸毒，雄黃丹良。

雄黃 朱砂 杏仁

巴豆 豉 淡黃

杏巴豉三味，用米醋半盞，乾薑一片，指大，黃令乾，研成膏，皂角一寸，蜜炙焦，先去子與皮。

法製牛膽一分，同雄朱與杏膏研令細。

右和入杏膏，麩糊為圓，麻子大，每服一歲兒五圓，壯者七圓，三歲十圓，淡生薑湯下。

○瘡疹證候方議

凡兒所患瘡疹水豆麻子蚊丁火疱等諸家之說或有異同大抵此證出乎五臟肺曰水疱肝曰膿疱心曰血疱脾曰黃疱腎曰黑子小兒不問長幼所出黑子陷者最為惡候或因風吹或由觸毒皮下隱：出而不透名黑陷子死者多矣良由服藥有誤冷冰其內毒不發出為害甚重凡瘡疹之疾證有多端其欲發出之時或有作熱者不作熱者有驚有掣者有狂燥者有叫哭者有煩躁者有自汗者有譏語者有呵欠者有遮閉者有神昏者有嘔吐者乃緣所發於五臟虛實之不同耳或謂耳鼻脚梢中指冷為之驗者屢究之或中或否今得至要妙訣凡兒作熱有如傷寒候疑惑之間不敢直謂者但者耳後有紅脉赤縷定是瘡疹證候更無可疑若驚驚不可下驚藥有熱不可退熱有汗不可止汗或吐不可理吐但順其表溫其中自然而發出或有首尾不可下或曰首尾皆可下衆疑謂之非說愚曰二家所說皆善也且兒氣脉充實宜微下之恐作煩躁若也氣虛直不可下恐瀉易脫如欲利下即用消毒飲子七寶洗心散或四順清涼飲一二服以通為度切不可用真珠圓及有已粉之類並宜禁之如有熱煩躁與順大連翹飲加紫草茸功效但戒黃芩今人絕見瘡疹已出未出便

與升麻葛根湯其性頗寒只宜少少與服其或不當者益用大過反壞其表凡服葛根湯宜加白芍藥糯米人參紫草茸川當歸功效甚良

○議癩癩痞癖

癩音真又傷食得之痛刺服助心胃煩悶飲食不下吐

逆惡心久不醫治漸成癩結又曰食結

癩音取又傷血得之胃膈鬱悶痛引少腹時或攻築上

搶心胃雖不阻食肌肉不生久而不治漸成癩結

又曰血結

痞音甫又音俾傷氣得之心腹膨脹肚大脇滿痛刺往來

注在左肋面黃肌瘦倦怠無力久而不治漸在痞

塊又曰氣塊

癖音僻傷積得之其證如腸癖之疾便利無度滑不成

糞似痢非痢似虫非虫腹肚乾痛上築心胃滿悶

久而不治頑結不散復結成塊有類痞狀

以上四證皆作寒熱有如瘧候一般悉由傷及

五臟惟痞癖左脇肋塊其氣結聚男女皆在左

脇曰證大同小異凡治寒熱先以梨漿飲進一

二服退其寒熱其寒熱已消去三五日後方可

與服磨痞圓即日：類：與服癩癩之疾只與

三稜圓下去積毒以通為度
人參蘿蔔飲

治小兒痞癖因食砒藥圓子作湯煩躁頭面浮腫腹肚
緊脹喘促坐臥不得肌熱羸瘦困乏寒熱尚在宜服人
參蘿蔔飲方

白朮 苦梗 甘草
人參 麥門冬子去心

右等分為末每服一大錢匕取生蘿蔔汁半盞煎至
半候冷與服

豆蔻草果飲子

治小兒痞氣未解重復取利致之虛乏腹肚疝痛不思
飲食面目虛浮強食嘔吐宜服此方豆蔻草果飲子良
方

內豆蔻 椶櫚各
綿黃芪 白茯苓 白芍藥
白朮 甘草 陳皮
半夏曲 一錢

右父咀每服二錢匕生薑三小片烏梅半箇棗子一
箇用麻紙包裹煎濕煨令香熟去紙用水小盞煎
至半去滓通口空心食前兩滓併煎兼與小沉香煎

圓眼之功效

○眼患證候方議

凡小兒患眼皆由熱毒得之方藥甚衆惟有斑瘡眼患
此疾最為惡候若有是疾皆由兒病不謹口腹或斑瘡

方愈便與食毒散熱 毒入肝腎之間便作腫痛羞明
怕日眩淚難開毒者謂其炙燂醃鹹油麪白芨黃牛母
猪米醋鮭魚鯨骨雞羊鵝鴨蝦蟇魚鱉腥腫鮭鰻飛禽
包氣之屬悉為斯飲及至熱退痛止睛中白翳已生或
一隻兩睛隨其輕重得之宜速與療

透閃散

治小兒斑瘡初作眼患痛澁羞明怕日出淚頻多或已
覺漸成白翳子宜用神效透閃散良方

華澄茄 不拘不少

右為細末每以少許吹入鼻中於食後頻敷吹之諸
證皆可用之

大效點明膏

治斑瘡眼患只在百日內治之容易久即氣定難以療
理大效點明膏良方

覆盆根 有史路傍
杜高五七尺者

右掘取土中根淨洗搗取粉澄濾令細日乾每用蜜
和以少許點白丁上令其自消自散日二三次點用

至妙立消膏

治小兒眼患初作粟醫浮醫或來或去漸發差大便睛
減明至妙立消膏良方

雲白食鹽 生研少許須以淨器

右以大燈心點蓋輕手指定浮醫就靨凡三五次點

見效令子勿驚恐不疼痛亦不礙人多投之勿慮藥用剋效

生乾地黄湯

治小兒疳蝕眼患閉合不開羞明怕日及至開眼有如內障樣：夫所宜服生乾地黄湯方

生乾地黄

熟乾地黄各二兩並洗

麥門冬子去心

川當歸一分

枳殼米甘浸一宿

杏仁湯泡去皮尖

防風

甘草炙

赤芍藥各一分

右咬咀每服一大錢水小：蓋以黑豆七粒煎至黑

豆熟去滓通口服

小防風湯

治小兒熱毒眼患小防風湯方

大黃蒸

山梔子

甘草炙

赤芍藥

川當歸洗

防風

羌活

右等分咬咀每服二大錢水小：蓋煎至半去滓通

口服食後

小流氣飲

治小兒風毒眼患小流氣飲方

蟬蛻去大

甘草炙

羌活

天麻

川當歸

赤芍藥

防風

大黃

腦薄苛

杏仁

右件等分咬咀每服大錢水小：蓋煎至半去滓通口服食後服

小菊花膏

治小兒積毒眼患小菊花膏良方

黃連

黃芩

大黃

菊花

羌活

唇木米泔

荆芥穗

防風

右等分為末煉蜜為膏尾指大每服一餅細嚼白湯

下

○總議小兒眼患

議曰除疳蝕斑疹二證外皆由五臟所積熱毒而作又有胎內受氣乘母所食熱毒稍長因毒相觸忽作障膜不由腫赤熱毒積成其候者此等決定難醫若加寒涼之藥壞害尤甚若赤腫眩淚疼痛醫膜謹：與忌其熱毒之物清心涼肝順氣行血解熱散毒認證瀉臟常宜用四順清涼飲隨風熱毒所發輕重加藥與服方一剋效不必執瑞方藥指證攻療蓋小兒無患氣眼所患即與大人不同至重者謂赤腫等俱作宜與利下即便解散若有

痰血眼胞內外四維腫盛即從鼻中取出敗血立愈既無氣眼不作攀努雖有赤脈貫睛亦是熱毒所致即不可鈎鍊鍼割凡當利下並以大黃藥洗心散之屬乃佳

○治諸病雜方

石葦散

治小兒熱淋沙淋石淋石葦散方

石葦去尾 海金沙 木通

滑石

右為末水小盞煎至半通口服

桃紅圓

治小兒齟齬軟痰涎壅盛或作喘急桃紅圓良方

天南星炮 白附子炮 川烏炮

石膏煨 地龍乙 白礬煨

右為末自然薑汁搜圓麻子大朱砂為衣令半紅半

白每服三五十圓淡生薑湯下

犀角地黃膏

天門冬 麥門冬各去心 白茯苓

茯苓 生地黃各洗 前胡

紫胡 人參 玄參

甘草炙 川芎 天麻

防風 羌活

右等分為末殿全墨一挺留性煉蜜圓○大金箔為衣每服一粒薄奇湯化服

丹毒至效散

治小兒一切丹毒及龍帶發作至效散方先服消毒散

黃丹一 朴消一 赤小豆兩頭

右研令勻井水調以雞毛刷立效

屎灰散

治小兒心經虛熱小便澀痛筒管內疼不可忍者屎灰散良方

散良方

蚕蛇紙不拘多少

右燒留性為末入麝每服半錢以燈心湯調

磁石散

治小兒湯火傷磁石散方

景德鎮磁器不拘多少

右打碎埋窰內炭火鋪上經一宿取出放地上出火

毒礮為末入黃丹水調傳湯火傷處

芎根湯

治小兒傷寒後有一證忽然鼻中出血五七歲以上至

大人亦有此作名紅汗謂不曾解表其汗出血故從事

出者自解芎根湯方

生地黄汁 生蜜 酒各小

芎根一握搗煎汁如稠糖

右共煎取一盞相和溫服小小半盞立效

治小兒心肺蘊熱及心血妄行鼻衄出血不止良方

右將故藤紙被一片作燃子包齋燒熏入鼻或吹入鼻中又令志人吸呷尤佳故藤紙被至舊亦得或燒內小瓶中留性每服二錢入麝酒調服極妙

木舌金絲膏

治小兒心脾受熱唇口生瘡仍治暴口唇白舌重 舌硬舌下木舌 以上皆係心脾熱並宜用下項藥傳

脚心次服連翹飲子仍與金絲膏刷口內舌上功效

吳茱萸不拘多少

右為末用醪米醋調塗脚心更以紙貼糊粘傳之立效

效

又有重齶一証於上齶令生一肉如指大小赤腫妨食及吮乳斯由熱極而作速宜下之不尔熱毒流咽喉加其腫塞悶絕而蛇宜服疎風散下之方在前

生肌散

治小兒脚腫生瘡及諸瘡口不合者生肌散方

真地骨皮 五倍子 甘草各生

黃蘗炙 黃連炒

右為細末乾摻瘡上以麈尾用沸湯泡蘼洗乾處津液調傳

大效金絲膏無

治小兒口瘡方

黃丹一錢 生蜜一兩

右相和深甌盛甌內蒸令黑為度每用少許雞毛蘸刷口內

天南星圓

治小兒痰多哮喘急咳嗽天南星圓方

天南星炮 半夏湯洗七次 白礬各一錢 雄黃細研一錢

右為末煎熟皂角膏為圓入少許麩作糊圓如麻子大每服二三十圓淡生姜湯送下

通閉散

治乳幼被母鼻息吹着兒顛令兒鼻塞不能食乳通閉散良方

香附子炒三分 川芎七分 荆芥四分 白殭蚕炒三分 細辛一分 猪牙皂角一分

右為末取生葱白去頭搗調藥塗顛門上

秘傳頭瘡方

吳茱萸鹽醃者佳如無以口鹽浸一二

右為末醪米醋調刷傳頭上大人肩蛆瘡用之立效

茱連圓

治小兒夏月暴瀉注下茱連圓方

土黃連去須 吳茱萸各一兩 陳皮半兩
右為末水煮麪糊為圓如麻子大每服二十圓飲下

摩風膏

治小兒遍身疥癩瘡摩風膏方

苦參 歷青 蕪荑炒

黃蠟各一錢 巴豆三立 輕粉五

真麻油半兩 蝎二立

右同油煎至巴焦濾去所煎物入輕粉和勻傳疥功

效

薑黃散

治小兒血淋方

薑黃為末

右每服半錢用紅酒調下連二三服以通為度

小兒黃圓

治小兒肺熱痰涎稠盛心神不寧睡不安穩煩躁怔忡

四体作熱宜與服之但覺驚風痰熱常服功效

乾葛炒取 甘草錢 黃芩去心

防風半兩 麝半字 山梔子半兩

右為細末入麝和勻如皂子大煉蜜為丸常服薄奇

湯化下

四聖湯治二十一證

白朮 人參 白茯苓 甘草

治久吐胃寒加石連子木香黃芩名生胃散

治嘔、噦 不止加白扁豆薏苡仁並炒霍香名銀白

散

治胃膈煩悶冷熱不調痰涎欬嗽不笑飲食日夜壯熱

加知莊具莊烏梅乾姜名寬中散

治腹肚疼痛加陳皮青皮梔子生薑名溫中散

治夜啼煩躁腹肚冷痛加沉香朱砂名鎮心驚邪散

治表裏虛弱時氣作熱欲傳疹候加細辛瓜蒂名怪

散

治脾胃寒熱陰陽不順溫壯常作加滑石地骨皮名六

神散

治霍亂吐利神不安穩加霍香丁香名霍香散

治脾胃虛弱飲食不進加製厚朴陳皮等分名平胃散

治吐食不納穀氣加丁香半夏麴名益神散

治脾胃久虛不納食頻吐或瀉不止加肉豆蔻青皮天

白烏菜名理中散

治熱瀉水穀不分加瞿麥車前子名導赤散

治虛熱寒躁安神定志加犀角川芎名安神散

治心氣不足神情恍惚加石菖蒲石蓮肉石膏名補心

散

治熱夜啼煩躁加白附子全蝎藏粉名清神散

治脾胃肌瘦神困面無顏色食不化腸胃久寒吐逆

無時如黑附子枳殼吳茱萸麥蘗細辛名溫脾散

治霍亂吐逆或腸鳴自利腹肚疼痛加川白薑名人參

散

治傷寒身熱頭痛煩渴加麻黃乾葛天麻朱砂名解肌

散

治心神不寧驚悸煩赤瘕癥加朱砂羌活防風天麻名

鎮心散

治脾胃虛弱腹肚泄利調中進食加訶子陳皮名益黃

散

治虛積痢腹肚痛裏急頻併加陳皮罌粟殼名調中散

以上二十一證所加藥味並有詳載集著其

善以顯其功樂與聖達理豈可遁諸

理

天麻散

南星 每次水浸香粉五日冬七日夏三日

珠砂 射香 每一字杏仁湯調化下人參湯亦可

演山省翁活幼口議卷之二十終

新刊演山省翁活幼口議 後記

活幼口議二十卷元曾榮世撰見于燕城國史經籍志余家舊藏鈔本僅八卷文理訛舛殆不可句弟陸庭嘗從朝鮮國醫方類聚中錄出成編余謂是書所載自具診視理療之法以至於平素鞠養保攝乳哺悟戲諄諄乎議之甚詳使懷抱中物免為朝菌夏蟲其幼之心可謂篤矣世榮又著有活幼心書楊仲叔序稱衡邑遭災連薨巨棟數千室俱燬燼其書板有好事者納諸池中而得無恙以為天心之使然良有以也乃若是書亦當神物擁護者不宜付于闕如之嘆矣後閱十餘年今秋七月叔父倚園君持竹洞後人人見友雪所藏足本而被借驚異之餘速錄一通以傳家於是乎感世榮慈念之所存果不至湮滅而喜余前言之足以懲矣 記其顛末如右

文政庚辰孟冬二十有二日東都丹波元胤識于柳片精廬

四九七

嬰童百問

〔明〕魯伯嗣撰

據天津圖書館藏明末刻
本影印原書版框高二一
〇毫米寬二八四毫米

人之始。氣猶未定。疾
為易感。保而育之者。願可
不知。既慎哉。苟不疾焉。是
隄而預為之取。則氣之欲
其平也難矣。予一日得焉。

謂嬰童百問者。而讀焉。迺
欣然歎曰。保嬰之道。其盡
是乎。古之人。神睿明哲。予
凡人之所病。無不洞究。而
辨之。故其為書。論辨詳

審製合精。當觀其立名為
問。計目有百。每問下必濟
之以源。表之以證。對之以
療。若將俟問。預為答之者。
叅會衆說。自成一家。病矣

遺載。方有餘奇。開卷昭然。朦是發矣。蓋擴仁之術。不但為已試之案而已。說者謂其出于魯伯嗣學所編。今不復可考。但惜其見之者鮮。遂命工重錄以廣其傳。夫百病是觸。一死用調。人之所以平之者。固無不至。而其所受之天者。未有不復其平矣。是豈益

之談也哉。先儒曰。事親者不可不知醫。子則曰。愛子者不可不知書云。故序

金壇王肯堂字泰題



進嬰童百問疏

太子太保吏部尚書 臣許讚謹

奏為進書事 臣係河南靈寶縣人正德二年 臣

為翰林院編脩之時收得醫書二本名曰嬰

童百問相傳為在昔名人著述乃以嬰童各

證設為百問每問必究其受證之源每證必

詳其治療之方觀形審勢因病投藥極為詳

備誠保護嬰幼之全書也此書原刻於陝西

藍田縣今乃少見伏惟

皇上至仁如天 臣幼幼舉一世而生成之此書

若行未必不為幼科醫藥之助 臣謹將原本

裝潢

進呈伏望

皇上勅付所司再加詳校刻為善本或以廣醫家

之見聞或以備

內府之參用傳衍流行則

皇上仁慈所被者無窮而效之所及者廣矣

嘉靖十八年二月 日具

奏奉

聖旨卿進方書朕覽已着禮部校正刊行

嬰童百問目錄

魯伯嗣學著

明

龍峰熊宗立 校
宇泰王肯堂 訂

卷之一

初誕 第一問

朱蜜法

黃連法

甘艸法

牛黃法

黃連法

茯苓丸

護養法 第二問

消乳丸

噤風撮口 疳風 第三問

千金龍膽湯

天麻丸

定命丹

朱銀丸

紫霜丸

消食丸

控痰散

甘艸湯

益脾散

辰砂膏

葱號散

蠶號散

殭蠶膏

撮風散

瓜蒂散

大連翹湯

安膈散

脈法 第四問。無方

變蒸 第五問

紫霜丸

紫陽黑散

柴胡湯

當歸散

調氣散

五臟所主 第七問。無方

五臟病證 第七問。無方

肝臟 第八問

大青膏

大黃丸 二方

導青丸

瀉白散

益黃散

導赤散

地黃丸

心臟 第九問

導赤散

瀉心散

脾臟 第十問

益黃散

大青膏

卷之三

調中丸

肺臟 第十一問

瀉白散

甘桔湯

阿膠散

地黃丸

腎臟 第十二問

地黃丸

面上證氣色總目 第十三問。無方

發搐 第十四問

瀉清丸

導赤散

涼驚丸

地黃丸

益黃散

通關散

噤關散

開關聖散

至聖保命丹

省風湯

溫膽湯

玉餅子

安神丸

太膏

蘇州白丸

浴

塗顏法

珍

七寶洗心散

聖藥散

天麻防風丸

龍齒散

釣藤散

防風通聖散

大連翹湯

急驚 第十五問

利驚丸

導赤散

至寶丹

琥珀散

慢驚 第十六問

枯婁湯

理中湯

五苓散

朮附湯

調氣散

桂枝湯

葛根湯

太乙保生丹

聚寶丹

蟬蝎散

神保既濟丹

來復丹

王氏惺惺散

醒脾散

大醒脾散

白丸

星香全蝎散

定命飲

四聖散

蝎四君子湯

天南星散	烏沉湯
沉香散	天南星丸
蘇合香丸	礞石丸
靈脂丸	七珍丸
四君子湯	銀白散
釣藤散	琥珀丸
龍齒散	
脾風 <small>第十</small>	
黑附湯	川烏散
金液丹	生附四君湯
異功散	蝎附散
醜脾散	保命丹
陰癩散	
急慢脾風下痰輕重 <small>第十八問</small>	
神保既濟丹	白殭蠶丸
辰砂膏	七寶妙砂丹
定命丹	防風丹
宣風散	枳殼散

小柴胡湯	清金丸
盧昏散	牛黃涼膈丸
青金丹	王監京墨丸
揭風湯	硃砂膏
疎風散	銀白散
柴胡大黃湯	生氣散
異功散	茯苓二陳湯
天麻蘇合香丸	天麻防風丸
參苓白朮散	和中散
醒脾散	鎮心丸
金箔鎮心丸	珍珠丸
驚癩 <small>第十九問</small>	
紫霜丸	南星散
星蘇散	五癩丸
雌黃丸	薄荷散
細辛大黃湯	防風蛇黃丸
錢氏蛇黃湯	養血以川蛇黃丸

斷癩丹	散風散
保安丸	狗活湯
牛黃丸	比金丸
虎睛丸	七寶鎮心丸
清神湯	蜜陀僧飲
妙聖丹	天麻丸
斷癩丸	當歸大黃湯
蝎虎散	代赭石散
日應丹	地龍散
全蝎五癩丸	星珠散
化風丹	鎮驚丸
開牙散	
驚風 <small>第二十問</small>	
辰砂膏	青龍丸
至寶丹	神妙奪命丹
人參羌活散	防風導赤散
蟬蛻釣藤飲	天麻丸
寬熱散	七寶洗心散

神芩丸	化風丹
安神丸	清心丸
卷之三	
天鈞內鈞 <small>第二十一問</small>	
聚寶丸	鈞藤膏
魏香散	鈞藤飲
保命丸	乳香丸
木香丸	
盤腸氣 <small>第二十二問</small>	
鈞藤膏	魏香散
蘇合香丸	當歸散
烏沉湯	沉香降氣湯
胎驚風 <small>第二十三問</small>	
朱銀丸	保命丹
鈞藤散	全蝎散
胎風遍身軟 <small>第二十四問</small>	
鈞藤散	全蝎散 <small>二方</small>
項軟 <small>第二十五問</small>	

瀉肝丸

瀉青丸

地黃丸

五軟 第二十六問

橘連丸

地黃丸

五硬 第二十七問

小續命湯

羌活散

風證風熱 第二十八問

追風毒剉散

省風湯

羌活散

枋風通聖散

化風丹

釣藤散

至寶丹

痙症 第二十九問

小續命湯

葛根湯

桂枝加葛根湯

敗毒散

小柴胡湯

大承氣湯

大柴胡湯

夜啼客忤驚風 第三十問

釣藤散

蘇合香丸

龍齒散

碧霞散

神祿散

花火膏

牛黃丸

理中丸

清神散

卷之四

胎疾 第三十一問

大連翹飲

消風散

生地黃湯

浴體法

解頤 第三十二問

地黃丸

柏子仁散

五苓散

封頤散

桂枝散

顛陷頤填 第三十三問

大連翹飲

柴胡散

封頤散

地黃丸

當歸散

日內證 第三十四問

導赤散

瀉青丸

生犀散

瀉黃散

地黃丸

牛黃丸

地黃散

小防風湯

小流氣飲

小菊花湯

快明散

蜜蒙花散

洋角飲

通項石南散

耳病 第三十五問

龍骨散

龍黃散

金箔散

蔓荊子散

花胭脂膏

鼻病 第三十六問

黃芩湯

清肺飲子

薄荷湯

消風散

通關散

口瘡警口重勝 第三十七問

保命散

吳茱萸散

洗心散

辰砂七寶散

瀉心散

牛黃散

舌木舌弄舌 第三十八問

湯黃散

胡黃連丸

齒遲 第三十九問

子驚散

痺腮腫 第四十問

金星丸

漏蘆連翹湯

連翹湯

清涼飲子

卷之五

遲 第四十一問

首蒲丸

滯頤 第四十二問

張煥溫脾丹

溫胃散

益黃散

背龜胸鶴膝行遲 第四十三問

龜胸丸

地黃丸

五加皮散

松蓋丹

百合丹

疳積 第四十四問

四順清涼飲	七氣湯
指迷七氣湯	異香散
桔梗枳殼湯	釣膽散
芍藥甘艸湯	大柴胡湯
桂枝加芍藥湯	大承氣湯
桂枝加大黃湯	
腹脹 <small>第四十五問</small>	
禍九子	紫霜丸
白餅子	塌氣丸
三稜煎	大承氣湯
五苓散	大柴胡湯
下積丸	五珍丸
腹中有癖 <small>第四十六問</small>	
木香丸	取癖丸
挨癖丸	
痞結 <small>第四十七問</small>	
聖惠甘遂破結散	進食丸
積痛 <small>第四十八問</small>	

消積丸	白餅子
錢氏白朮散	小沉香丸
芍藥甘艸湯	
積滯 <small>第四十九問</small>	
木香丸	木香檳榔丸
神芩丸	推氣丸
檳榔丸	下積丸
五珍丸	
諸熱證 <small>第五十問</small>	
敗毒散	四順清涼散
惺惺散	柴胡散
寬熱散	金粉散
朱之六	
傷寒正受傷寒夾驚 <small>第五十一問</small>	
羌活散	柴胡散
三黃散	掃龍丸
竹葉石膏湯	洗心散
辰砂七寶散	薄荷散

紅綿散	葱白湯
羌活湯	
小兒傷寒	三時氣同異 第五十一問
升麻湯	解肌湯
調中湯	射干湯
半夏桂枝湯	五苓散
萎蕤湯	七寶散
柴胡石膏湯	
傷寒表裏	第五十三問
麻黃湯	葱白湯
解肌湯	葛根湯
柴胡散	桂枝麻黃各半湯
小承氣湯	大承氣湯
四順飲	洗心散
小柴胡湯	五苓散
桂枝湯	桂枝加芍藥湯
桂枝加大黃湯	四逆湯
理中湯	大柴胡湯

陰旦湯	白虎加人參湯
小建中湯	玉露散
脫甲散	
傷寒咳嗽傷風	第五十四問
葶藶丸	麻黃湯
甘桔湯	瀉白散
白餅子	麥煎散
九寶飲	華蓋散
細辛五味子湯	抱龍丸
金星丸	百部丸
生犀散	天麻定喘飲
小青龍湯	柴胡散
柴胡石膏湯	天麻防風丸
惺惺散	化風丹
金沸神散	三方
三拗湯	
和解湯	
百晬內嗽	第五十五問
補脾散	比金丸

大麻散

琥珀散

天麻丸

喘急

第五十六問

大效雄朱化痰定喘丸

天麻定喘飲

小青龍湯

麻黃杏子甘艸石膏湯

三拗湯

總治十六般哮喘方

葛根黃芩黃連湯

葶藶丸

千金射干湯

又方

潮熱

第五十七問

梨漿飲子

大柴胡湯

大承氣湯

地骨皮散

犀角飲

鱉甲飲

靈犀飲

秦艸飲

生犀飲

青蒿散

柴胡散

壯熱溫壯

第五十八問

理中湯

四君子湯

五苓散

白虎湯

柴苓散

三黃犀角散

牛黃散

地骨皮散

黃龍湯

牛黃膏

羚羊角湯

梔子仁湯

大連翹飲

六物黃芩湯

五物人參飲

龍膽湯

紫霜丸

黃疸

第五十九問

茵陳湯

梔子蘆皮湯

犀角散

連翹赤小豆湯

茵陳五苓散

當歸散

當歸丸

小半夏湯

消食丸

嘔證吐乳證

第六十問

消食丸

楊氏消乳丸

和劑觀音散

異攻散

香朴散

香薷散

五苓散	竹茹湯
蘇合香丸	青州白丸子
溫膽湯	紫霜丸
卷之七	
熱吐 第六十一問	
香薷散	五苓散
竹茹湯	大柴胡湯
大承氣湯	玉露散
寒冷嘔吐噦逆 第六十二問	
理中湯	釀乳法
消乳丸	異攻散
香朴散	茯苓半夏湯
二陳湯	人參散
麝沉散	
霍亂吐瀉 第六十三問	
白餅子	益黃散
大青膏	白朮散
釣藤飲	玉露丸

五苓散	香薷散
車前飲	定命飲
理中湯	不換金正氣散
二順散	釀乳法
魁病 第六十四問	
紫霜丸	益黃散
消乳丸	異功散
龍膽湯	
瀉痢 第六十五問	
調中湯	五苓散
車前散	潑火散
葛根湯	四逆散
冷瀉 第六十六問	
益黃散	沒石子丸
人參散	理中湯
來復丹	不換金正氣散
觀音散	銀白散
藿香散	

驚瀉 第六十九問

錢氏白朮散

大柴胡湯

五苓散

黃連丸

四逆散

調中湯

黃芩湯

四順清涼飲

傷食瀉 第六十八問

紫霜丸

香橘餅

全蝎觀音散

調中湯

進食丸

異功散

四君子湯

益黃散

生薑瀉心湯

香朴散

白朮散

調中散

保安丸

感應丸

杏霜丸

驚瀉 第六十九問

至聖保命丹

釣藤飲

消乳丸

進食丸

辰砂五苓散

定命丹

朱君散

睡驚太乙丹

諸色痢 第七十問

石蓮散

香肺散

胃風湯

香連丸

黃連香薷散

五苓散

茅花湯

水浸丹

敗毒散

地榆散

芍藥栝皮丸

寬腸枳殼散

三黃熟艾湯

神芎丸

黃連解毒湯

潑火散

湯氏異功丸

卷之八

脫肛并痔證 第七十一問

瀉腸散

丹石散

勝雪膏

黃連解毒湯

苦參湯

便血臟毒 第七十二問

甘露飲

聚金丹

犀角地黃湯 千金地黃湯

桃仁承氣湯

大便不通 第七十三問

西順清涼飲 柴胡散

大柴胡湯 承氣湯

神芩丸 輕號散

小便不通 第七十四問

木通散 八正散

葱號散 梔子仁散

神芩丸

大小便不通 第七十五問

脫甲散 大連翹湯

神芩丸 掩臍法

五淋 第七十六問

金砂散 立效散

木通散

遺尿 第七十七問

破故紙散 共三方

白濁 第七十八問

代苓散 三稜散

分清散

疳積散 九問

蘆薈丸 肥兒丸 二方

胡黃蓮丸 二方 吳希亮疳方

地黃丸 生熟地黃丸

脾積丸 集聖丸

噎痺散 脂連丸

五疳良方

神效換肌丸 天麻丸

地黃清肺飲 化蟻丸

靈脂丸 下蟲丸

龍膽丸 黃連丸

香薷丸 木香丸

禍丸子 黃芪湯

隨血煎 阿嫂丸

君朴丸

疝傷 第八十一問

肥兒丸 蘆薈丸

五疳丸 胡黃連丸

至聖丸 天麻丸

地黃丸 茯神丸

十全丹 湯氏十全丹

香薷丸 褐九子

消石丸 龍甲丸

蒸雞丸 下蟲丸

集聖丸 加味經驗黃雞煎丸

梅肉丸

卷之九

虛羸 第八十一問

木香丸 胡黃連丸

竹葉湯 四君子湯

異攻散 參苓白朮散

橘連丸 肥兒丸

保孺丸 快活丸

胃氣不和虛冷 第八十二問

益黃散 平胃散

觀音散 銀白散

食積冷熱 第八十三問

消食丸 木香丸

白餅子 丁香丸

虛實腫脹 第八十四問

分氣飲 五疳保童丸

楊氏塌氣散 塌氣丸

塌氣散 三稜煎丸

三稜丸 珍珠天麻丸

大棗連丸 下蟲丸

沉香煎 推氣丸

遇仙丹

蛟蟲 第八十五問

史君子丸 檳榔散

化蟲丸 烏梅丸

陰腫疝氣 第八十六問

桃仁丸	五苓散
青木香丸	湯氏化生丸
牡丹散	三黃丸
盜汗骨蒸 <small>第八十七問</small>	
團參湯	撲汗方
牡蠣散	龍膽湯
通神丸	生犀散
自汗 <small>第八十八問</small>	
小柴胡湯	白虎湯
葛根黃芩黃連湯	
渴證 <small>第八十九問</small>	
三黃丸	竹葉湯
白虎湯	五苓散
香薷飲	車前散
小柴胡湯	黃連解毒湯
七物黃連湯	
煩躁 <small>第九十問</small>	
黃連解毒湯	玉露散

導赤散	至寶丹
琥珀散	青黛解毒丸
小柴胡湯	白虎湯
大柴胡湯	金箔鎮心丸
七物黃連湯	
卷之十	
駒齡 <small>第九十一問</small>	
梅花飲子	吳子玉方
半夏丸	保壽散
小歸命散	解肌散
白玉丸	
瘧證 <small>第九十二問</small>	
桂枝麻黃各半湯	白虎加桂湯
小柴胡湯	柴胡桂枝湯
鬼哭散	清脾湯
四獸飲	胡黃連散
養胃湯 <small>二瀉</small>	經效瘧湯
大柴胡湯	木香丸

五苓散

白虎湯

柴胡石膏湯

葱白湯

知母麻黃湯

癰毒腫痛 第九十三問

天烏散

漏蘆散

青黛解毒丸

玄參劑 二方

五福化毒丹

連翹湯

青露散

驚毒掩

驚毒諸般腫痛掩子

涼膈散

无

惡核瘰癧 第九十四問

清涼飲

連翹丸

千金龍膽湯

大聖散

發斑 第九十五問

葛根橘皮湯

黃連橘皮湯

玄參升麻湯

化斑湯

羌活散

丹毒赤遊腫 第九十六問

冰黃散

葛根白朮散

惺兮散

敗毒散

升麻湯

防已散

白玉膏

大連翹湯

消毒飲

瘡癰 第九十七問

金華散

摩風膏 四方

羌活散

大連翹飲

升麻湯

爛瘡 第九十八問

羊

牛黃散

三黃真珠散

瑩肌散

麻證水痘 第九十九問

黃連杏仁湯

黃芩知母湯

升麻湯

柴胡升麻湯

化斑湯

羌活散

蟬退散

消毒飲

麥煎散

大連翹湯

黃連橘皮湯

瘡疹 第一百問

惺惺散

參蘇飲

抱龍丸

升麻湯

升蘇散

香蘇散

木香散

至寶丹

四聖散

加味四聖散

紫艸木香湯

四君子湯

快斑湯

活血散

龍腦膏

豬尾膏

胡荽酒

芍藥甘艸湯

附露飲

犀角地黃湯

消毒飲

四物湯

大連翹湯

導赤散

羌活散

小柴胡湯

白虎湯

宣風散

異攻散

決明散

紫貝散

滅癩藥

獨聖散

牛李膏

調解散

參苓白朮散

扁鵲油劑法

三方

紫艸木通湯

蟬退膏

安斑散

如聖麥門冬散

大和散

去瘡疹癩方

龍膽丸

疳積丸

治嗽含膏丸

畫眉膏

治小兒乳嗽

大連翹飲

化風丹

玄參煎

四聖散

紅綿散

天麻丸

辰砂七寶散

常用藥方括

小續命湯

紅錦散

大連翹飲

知母葛根湯

治眼方

治心痛方

備急經驗方

嬰童百問目錄 終

嬰童百問卷之一

初誕 第一問

天機

嬰童在胎稟陰陽五行之氣以生成五臟六腑之體悉具必藉胎液以滋養之受氣既足自然分娩初離母體口有液毒啼聲未出急用軟綿裹指拭去口中惡汁雖是良法然倉卒之際或有不及如法者古人有黃連法朱蜜法甘草法用之殊佳免使惡物嚥下伏之於心遇天行時氣久熱不除乃乘於心心主血脉得熱而散流溢於胃而胃主肌肉發出於外故成瘡疹之候世之長幼無有可免者若依初生拭口之法得免痘疹之患或有時氣侵染只出膚瘡細疹易為調理亦孩童之幸也楊氏云初生拭口不前惡穢入腹則腹滿氣短不能飲乳者宜用茯苓九加減治之又法下胎毒臨產落草時濃煎淡豉汁服極好不可與辰砂黃連輕粉等

朱蜜法 楊氏胎後方

小兒初生先用黃連甘草法拭口吐其惡汁稍時更與末蜜定魄安神

朱砂 一大豆許

右細研以蜜一規殼許和朱砂抹口中非獨鎮心安神能解惡毒之物一生免痘瘡之患

黃連法

臨月用黃連細切搗碎綿裹百沸湯拭口

甘草法

預以甘草細切少許產臥時以綿裹沸湯泡煮內蓋定收生之際急以軟綿裹指蘸甘草汁拭其口次用黃連法朱蜜法

又牛黃法

與朱蜜同少加牛黃益肝膽除熱定精神止驚邪辟惡氣除小兒百病

茯苓九 直指方

治嬰兒初生其聲未發急拭其口令惡血淨盡不得下咽則無他病稍遲惡穢入腹則腹滿氣短不能飲乳或胎中受寒則令兒腹痛不乳

赤茯苓 黃連 冷澄去此 枳殼炒

右等分為末煉蜜丸如桐子大每丸乳汁調下

護養法 第二回

巢氏云小兒始生。肌膚未實。不可煖衣。煖甚則令筋骨緩弱。宜頻見風日。若不見風日。則肌膚脆軟。易行損傷。當以故絮著衣。勿加新綿。天氣和煖之時。抱出日中嬉戲。數見風日。則血凝氣剛。肌肉硬密。可耐風寒。不致疾病。若藏於帷帳之內。重衣溫煖。譬如陰地草木。不見風日。軟脆不任風寒。又當薄衣。但令背暖。薄衣之法。當從秋習之。不可以春夏幸減其衣。否則令中風寒。所以從秋習之者。以漸稍寒。如此則必耐寒。冬月但著兩薄襦。可耐寒。若不悉見其寒。當浴加耳。若愛而煖之。適所以害之也。又當消息。無令出汗。如汗出則表虛。風邪易入也。晝夜寤寐。常當慎之。其乳哺之法。亦當有節。不可過飽。或宿滯不化。當用消乳丸。化積溫脾等劑治之。陳氏所謂忍三分寒。喫七分飽。頻揉肚。少洗澡。及要背煖。肚煖足煖。要頭涼。心胸涼。亦至論也。

消乳丸 又名消食丸

治宿食不消。巢氏云宿食不消。脾胃冷故也。

兒乳哺飲食生冷過度。冷氣積於脾胃。胃為水穀之海。脾氣磨而消之。胃氣調和。則乳哺消化。脈沉者傷食不化故也。

縮砂仁 陳皮 京三稜 煨蓬莪朮

神麴 炒 麥蘖 炒各半兩 香附子 炒一兩

右為末。麩糊丸。如麻子大。食後白湯送下。

噤風撮口臍風 第三節

初生噤風撮口臍風三者一種病也。噤風者眼閉口噤啼聲不出舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫大小便皆通蓋由胎中感受熱氣流毒於心脾故形見於喉舌間也。抑亦生下復為風邪擊搏所致。自滿月至百二十日見此名曰犯風噤依法將護防於未然則無此患。撮口者面目黃赤氣息喘急啼聲不出蓋由胎氣挾熱兼風邪入臍流毒心脾之經故舌強唇青聚口撮面飲乳有妨若口出白沫而四肢冷者不可救其或肚脹青筋弔腸卵疝內氣引痛皆腸胃鬱結不通致之治法貴乎疎利撮口最為惡候一臍內見之尤急。臍風者斷臍之後為水淫風冷所乘風淫之氣入於臍而流於心脾遂令肚脹臍腫身體重着四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發為風搐若臍邊青黑撮口不開是為內搐不治瓜甲黑者即死其或熱在胸堂仰引努氣亦令臍腫可與千金龍膽湯如前三者受病之源非一朝一夕大抵裏氣鬱結壅閉不通並用所卜胎毒天麻丸定命丹朱銀

丸之類可量與之千金論云小兒始生其氣尚盛若有微患即須下之若不時下即成大疾疾成則難療矣紫霜丸可量與之治風噤用控痰散吐風痰不若用甘草湯吐痰極穩然後和胃益脾散加減用又用辰砂膏利驚即愈或手握拳禁口不開者不治又撮口用殭蠶膏傅唇口中或甘草湯撮風散臍風用瓜蒂散湯氏治嬰兒因剪臍傷於外風致臍瘡不乾用白礬龍骨為末少許傅之又用舊綿少許燒灰為末乾摻之效議曰斷臍不盈尺一臍之內隨其根蒂自腐實者深之弱者淺之淺深之理以其稟賦得之初生之兒有熱在胸堂則頻伸引呃呃作聲努脹其氣抑入根本之中所以臍突腫赤虛大可畏無識之者將謂斷臍不利而使之然者非也此乃由胎中母多驚悸或因食熱毒之物所作宜與大連翹飲子其熱自散其臍歸本不必以藥傅之此證亦宜早治久則難療也又有一法小兒臍風撮口初生七日內患此證者百無一生如坐視其斃者良可憫焉此法極險世罕有知者凡患此證看兒齒齦上有小泡子即

米狀以溫水蘸熟帛裹指擦破即開口便安不用服藥亦良法也安臍散治臍中汁出或赤腫用白石脂末日三度傅之或油髮灰或當歸末傅亦佳

千金龍膽湯

治胎驚月內氣盛發熱臍風撮口壯熱血脉盛

實四肢驚掣發熱大吐及變蒸不解中客人鬼

氣并諸驚癇悉皆治之十歲以下皆可服之及

有瘵氣者加人參當歸如龍膽數一百日音加

三銖一歲加五錢

龍膽草

釣藤

柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓

甘草各五錢

蜣螂

二枚去翅足炙

大黃

煨二錢半

右剉散每服二錢水一盞煎半盞服之以漸加服得利即止直指方加防風麥門冬以導心熱黃芩減半北棗煎服去蜣螂亦可

天麻丸

治因斷臍後為水溼風冷所乘入於臍流於心脾遂令肚脹臍腫四肢柔直日夜多啼不能吮

此藥利驚化痰凡釣腸鎖肚撮口宜服之

南星

炮一錢

白附子

炮

牙硝

天麻

五靈脂

全蝎

焙各一錢

輕粉

五分

巴霜

右末糊丸麻子大每服三九薄苜生薑煎湯下

定命丹

治急驚天鈞撮口通利痰熱

全蝎

七箇

天麻

南星

炮

白附子

朱砂

青黛

各一錢半

輕粉

麝香

各五分

片腦

一字

右為末粟米糊丸茶豆大每服一九荆芥薄荷湯化下先研半丸吹入鼻中一方無片腦

朱銀丸

治濟風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎中蘊受之毒亦治驚積但量情用之一方無積字

水銀

一錢蒸棗肉研如泥

白附子

一錢五分

全蝎

一錢

南星

朱砂

一錢

天漿子

去殼

牛黃

蘆薈

各一錢二分

鉛霜

五分

水銀

研

片腦

一字

麝香

五分

直殭蠶

炒七

右為末粟米糊丸芥子大每服一九薄荷湯下
如未通利加至二二三九

紫霜丸

治變蒸發熱不解并傷寒溫壯汗後不歇胸中
有痰癖乳哺不進乳則吐哕先寒後熱者又治
食積乳哺失節宿滯不化或因食而發癩火傳
酸臭並宜服之

代赭石

煅醋淬七次

赤石脂

各一錢

杏仁

五十枚去皮尖

巴豆

三十枚去皮膜心出油

藥道百問

卷九

紫風口疳風

批

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代
赭石脂末研勻以湯浸蒸餅為丸如粟米大一
歲服五九米飲吞下。一二百日內見三九乳汁
下更宜量其虛實加減微利為度此藥兼治驚
痰諸疾雖下不致虛人

消食丸

常服寬中快氣消乳食正顏色

宿砂

陳皮

三稜

蓬朮

神麴

麥蘖

炒各兩

丁香

一分

香附子

米泔

枳殼

炒 檳榔

烏梅

各半兩

右為末麩糊丸如菉豆大空心紫蘇湯下二十
九至三十九

控痰散

治風噤先用控痰散吐風痰次與益脾散和胃
又與辰砂帝利驚即愈或手握拳禁口不開者
不治

蝎尾

各五分

朱砂

一錢

膩粉

一錢

麝香

少許

藥道百問

卷九

風口疳

批

右為末每服一字茶清調下或用後甘艸湯吐
痰亦可

甘艸湯

治撮口取吐風痰

甘艸

生一錢

右剉煎服令吐出痰涎却以猪乳點人口中瘥
益脾散

白茯苓

人參

草果

煨 木香

甘艸

陳皮

厚朴

薑製 蘇子

炒

右等分爲末。每二錢薑棗煎服。

辰砂膏

治眼閉口噤啼聲不出吮乳不得口吐白沫大便小便皆通。

辰砂 三錢 礞砂 一錢 馬牙硝 一錢 玄明粉 二錢

全蝎 五分 真珠末 五分 麝香 一字

右爲末。和畢。用好油紙封裹。自然成膏。每服一

豆粒許。諸驚。金銀箔薄。苛煎湯下。潮熱。甘柳湯

下。或用乳汁調傅乳上。令兒吮下。

葱號散

治初生小兒七日不小便。

葱白 三四寸 大乳 不拘多少

右同搗如泥。抹兒口內。卽嚙乳。

蠶號散

治初生小兒七日不食乳名撮口。

僵蠶 四箇去嘴略炒 茯苓 少許

右爲末。蜜調。抹兒口內。

蠶號膏

治撮口

赤脚蜈蚣 半海 鈞藤 一錢 朱砂 錢

直殭蠶 錢 全蝎 稍 麝香 一字

右末。每服一字。取竹瀝調下。竹瀝解熱。

撮風散

治撮口

直殭蠶 二枚去嘴略炒

右爲末。蜜調。傅唇口中。

瓜蒂散

治小兒三歲。忽發心滿。堅硬。脚手心熱。則變爲

黃。若不急治。害人甚速。臍風撮口。吹入鼻內。啼

則可醫。

瓜蒂 七箇 赤小豆 七粒 秫米 七粒

右爲末。用一豆許。吹兩鼻內。令黃水汁出。殘藥

未盡。水調服之。得吐黃水。卽瘥。一方瓜蒂一兩

赤小豆四兩爲末。每服一錢。溫水調下。藥下便

臥。卽當有吐。以吐爲度。吐出黃水爲妙。

大連翹湯

治瘡疹壯熱小便不通諸般瘡癩丹毒疔瘡

連翹 瞿麥 荆芥 木通

當歸 防風 赤芍藥 柴胡

滑石 蟬蛻 甘艸各一錢 山梔仁

黃芩各五分

右剉細每服二錢加紫草煎溫服熱甚加大黃更詳證加減

安臍散

小兒斷臍後便傳之

赤脚蜈蚣一十

乳髮一團燒

射香少許

羚羊角一錢略

雀甕三枚

右為末斷臍後傳於臍上

定命散

活幼方採入

治初生兒口噤不開

蟬蛻十四箇

全蝎十四箇

右為細末入輕粉少許和勻用乳汁調乳前服

少許

脉法第四問

仲陽云小兒脉法脉亂不治氣不和弦急傷食流緩虛驚促急風浮冷沈細水鏡訣夫以陰陽運命男女成形已分九竅四肺乃生五臟六腑位分三部逆順難明若憑寸口之浮沈必乃橫亡于孩子須明虎口辨別三關消詳用藥必無差誤未至三歲看男左女右虎口第二指根第一節名初關一名風關若脉見初交病第二節為中關又名氣關脉見病深重第三節為末關又名命關脉見死不治三關青是四足驚三關赤是水驚三關黑是人驚紫色瀉利黃色雷驚三關有通度脉是極驚之證必死餘病可治或青或紅有紋如線一直者是乳食傷脾及發驚熱左右一樣者是驚與積齊發有三條或散是肺生風痰或似鶉卵之聲有赤是傷寒及嗽如紅火是瀉有黑相兼主下痢紅多白痢黑多赤痢有紫相兼加渴不虛虎口脉紋亂乃氣不和也青驚積青黑發慢驚脉入掌內平指紋曲裏風盛驚外食積上蒸此論三歲已上脉法小兒一歲至三歲看虎口更用指按高節

指分三關定其息數呼吸八至為平脉九至不安十至危困短長大小各有邪干浮主風生數主有驚沈遲主虛冷實主有熱緊是癩癩洪主熱盛沈細主腹痛沈緩主虛瀉微遲有積有蟲遲澀主胃脘不和沈主乳化難沈細主乳食結緊弦主腹痛熱痛牢實主大便秘沈而數者骨中有熱弦長是鬲肝有風緊數驚風四肢掣戰浮洪胃口有熱沈緊主腹痛不歇虛濡有氣又兼慢驚乳多痢大便有血四歲用一指按虛實五歲六歲用一指滾轉尋三部平正關上為準七歲八歲稍移指少許尋三部九歲十歲次第依三關部位尋取十一十二歲亦同十歲看十四歲十五歲方依大方脉部位診視凡看脉先定浮沉遲數陰陽冷熱皆依大方也沉遲為陰浮數為陽更兼看面部青色主驚風白色主虛瀉赤色主痰熱黑色病勢難當黃色是脾家疳積以此相參察其病源審度治療必無疎失矣

變蒸 第五問

巢氏云小兒變蒸者以長氣血也變者上氣蒸者體熱巢氏云上仲陽云變者易也又生變蒸者自內而長自下而上又身熱故以生之日後至三十二日一變每變畢即覺性情有異於前何者長生臟腑意智故也何謂三十二日長骨添精神人有三百六十五骨以象天數以應蕃歲以分十二經絡故初生至三十三日一變生癸屬足少陰經腎臟藏精與志至六十四日二變一蒸生壬屬足太陽經膀胱腑其發耳與魄令腎與膀胱合俱主于水天一生水地六成之至九十六日三變生丁屬手少陰經心臟藏神其性為喜至一百二十八日四變二蒸生丙屬手太陽經小腸腑其發汗出而微驚心與小腸合主火地二生火天七成之至一百六十日五變生乙屬足厥陰經肝臟藏魂喜哭至一百九十二日六變三蒸生甲屬足少陽經膽腑其發目不閉一本作開而赤肝與膽合主木天三生木地八成之至二百二十四日七變生庚屬手太陰肺臟藏魄主聲至二百五十六日八變生辛屬

蒸生庚屬手陽明經大腸肺其發膚熱而汗或不汗
 肺與大腸合主金地四生金天九成之至二百八十
 八日九變生巳屬足太陰經脾臟藏意與智至三百
 二十日十變五蒸生戌屬足陽明經胃腑其發不食
 腸痛而吐乳脾與胃合主土天五生土地十成之又
 手厥陰經心包絡為臟手少陽經三焦為腑此一臟
 一腑俱無形狀故不變而不蒸也前十變五蒸乃人
 地之數以生成之此後始生齒能言知喜怒故云始
 全也太倉云氣入四肢長碎骨于十變後六十四日
 為一大蒸計三百八十四日長其經脈手足手受血
 故能持物足受血故能行立經云變且蒸謂蒸畢而
 足一歲之日有餘也師曰不汗而熱者發其汗大吐
 者微止不可別治又六十四日為二大蒸計四百四
 十八日又一百二十八日為三大蒸共計五百七十
 六日變蒸既畢兒乃成人也變者變生五臟也蒸者
 蒸養六腑也所以成人變者上氣蒸者體熱存經一
 變一蒸情態即異輕則發熱微汗其狀似驚重則壯
 熱脈亂而數或吐或汗或煩啼燥渴極者五日之內

者七八日解其候與傷寒相似亦有變蒸之餘續
 寒邪者但變蒸則耳冷體冷上唇發泡狀如瀉珠若
 寒邪搏之則寒熱交爭腹中作痛而啼叫之聲日夜
 不絕變者易也蒸于肝則目眩微赤蒸于肺則噎嗽
 毛聳凡五臟六腑筋脈骨節皆循環各有證應其治
 法和平之劑微表實熱者微利之或不治亦自愈可
 服紫霜丸一九或二九并黑散子柴胡湯變蒸者有
 寒無熱并吐瀉不乳多啼者當歸散調氣散主之變
 蒸之外小兒如常體貌情態自然端正鼻內喉中絕
 無涎涕頭如青黛唇似朱鮮臉腮如花映竹情意若
 天淨月明喜引方笑似此平安議曰人得中之道以
 為純粹陰陽得所剛柔兼濟氣血相和百脈相順所
 以心志益通精神俱備臟腑充實形體固壯凡觀嬰
 孩顛顛固合睛黑神清口方背厚骨粗脊滿臍深肚
 軟齒細髮黑聲洪睡穩此乃受氣充足稟賦得中而
 無疾也

紫霜丸
 治證詳見第三問

代赭石煨醋沖

赤石脂各一錢

杏仁五十粒

巴豆三十粒

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代

赭石脂末研勻以湯浸蒸餅為丸如粟米大一

歲服五丸米飲湯下一二百日內兒三九乳汁

下更宜量其虛實加減微利為度此藥兼治驚

痰諸疾雖下不致虛人

紫陽黑散

治變蒸解利熱氣

麻黃一兩

去節

大黃五錢

杏仁二錢

右三味同一處搗和略燒存性再以杏仁少許

研膏和之密器盛貯每用一豆許乳汁調下

柴胡湯

治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參

甘艸微炙

麥門冬去心各

龍膽艸

防風各一錢

柴胡三錢

右剉散每服三錢煎服

當歸散

治變蒸有寒無熱

當歸二錢

木香

官桂鍊者

人參各一錢

右剉散每服二錢薑棗煎服

調氣散

治變蒸吐瀉不乳多啼慢驚欲發

木香

香附子

人參

橘皮


藿香

甘艸炙各一錢

右為末每服二錢薑棗煎服

五臟病證 第七則 ○ 無方

肝病哭叫目直呵欠頓悶項急心病多叫哭驚悸手足動搖發熱飲水脾病困睡泄瀉不思飲食肺病惡亂哽氣長出氣喘氣急腎病目無精光畏明體骨重治療之法大抵肝病以疎風理氣為先心病以抑火鎮驚為急脾病當溫中消導肺病宜降氣清痰腎病則補助真元斯得其治法之大要也



原缺

肝臟 第八問

肝外主感風呵欠頷悶口中氣熱當發散大青膏主之若能食飲水不止當大黃九微下餘不可下肝熱手尋衣領及亂捻物瀉青九主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之肝病勝肺肝病秋見肝強勝肺肺怯不能勝肝當補脾治肝益脾者母令子實故也補脾益黃散治肝瀉青九肝有風目連眨不搖得心熱則搖治肝瀉青九治心導赤散主之肝有熱目直視不搖治同上法肝有風甚身反張強直不搖心不受熱也當

嬰童百問

卷一 肝臟

三

五

大青膏

治傷風痰熱發搐百日左右并二三歲亦可

天麻 一錢 白附子 一錢 蝎尾 半錢 朱砂 一錢

青黛 一錢 天竺黃 一錢 麝香 一字 烏蛇 一錢 酒浸 肉焙 乾

錢

右為末生蜜為丸如芡實大月中兒粳米大同牛黃膏薄苛湯化下五歲以上同甘露散服之

大黃九

治小兒無辜疳疾急疳壯熱疳勞骨蒸頭髮作穗身上生瘡癩癰核塊多要啞煎食物不成肌膚腹大頸細

嬰童百問

卷一 肝臟

三

五

大黃 三錢 木香 半兩

右為末米醋一升相和置銅確中下于鑊內浮水上炭火煮用竹篋子攪藥候可丸即丸入稠糊丸如小豆大二歲二十九米湯下加減與之當下青膿為效一方治無辜疳疾肚大或時瀉痢冷熱不調漏蘆為末每服一錢猪肝一兩鹽少許煮空心服之

大黃九 錢氏方

治風熱裏實口中氣熱大小便秘赤飲水不止

有下證者宜服之

黑牽牛 半生半炒五錢 川芎 半兩 甘艸 一錢

大黃 兩酒洗過蒸熱切片曬乾

右為細末稀糊和丸如麻子大二歲每服十九

溫蜜水下乳後服以瀉利為度未利加丸數再

服量大小加減用之

瀉青丸

治小兒赤眼多泪睛疼心躁并消熱翳急驚發搐

嬰童百病 卷一 附錄

當歸 川芎 防風 龍膽艸

大黃 羌活 山梔仁 各等分一方加甘艸赤芍藥

右為末煉蜜丸如芡實大每服一九沙糖湯下

瀉白散

治小兒痰壅咳嗽寬氣進食

地骨皮 桑白皮 炒各一兩 甘艸 錢

右剉散入粳米一撮水二小盞煎七分食前服

益黃散

治小兒吐瀉脾虛不食米穀不化困倦力少

腸夜起并疳虛盜汗并涎唾不收領下常濕

名曰滯頤

陳皮 去白一兩 丁香 二錢一方用木香 訶子 炮去核

青皮 去穢 甘艸 各五錢

右為末每服二錢水一盞煎三分食前服

導赤散

治小兒心驚內虛邪熱

生地黃 生甘艸 木通 各等分

右剉散竹葉七片再加黃芩赤芍藥羌活燈心

嬰童百病 卷一 附錄

各等分水一盞煎三分食前服

地黃丸

治腎疳腦熱肌削手足如冰滑泄肚痛

熟地黃 山茱萸 去核 乾山藥 各四錢

澤瀉 牡丹皮 白茯苓 去皮各錢

右為末煉蜜和丸如梧桐子大二歲以下一二

丸至三九溫水空心化下

膝五加皮

心臟 第九問

心熱視其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙皆心熱也導赤散主之心氣熱則心胸亦熱欲言不能而有就冷之意故合面卧心氣實則氣上下行澀阻滯則不得通故喜仰卧則氣得上下通也瀉心散主之心病見冬大旺心強勝腎當補腎治心輕者病退重者下竄不語腎怯虛也

導赤散

治心驚內虛邪熱

瀉心散

嬰童百問

卷一

生地黄

生甘州

木通

黃芩

赤芍藥

羌活各五分

竹葉三片

燈心二分

右判一劑水一盞煎五分食前服

瀉心散

治心中痰氣實則氣行澀合卧則氣不通故喜

仰臥則上下通也

黃連一兩

去鬚

右為末每服半錢或一錢臨時時溫水下

脾臟 第十問

脾胃不和面皖白無精光口中氣冷不思食吐水當補脾益黃散主之脾胃虛冷面皖白色瘦弱腹痛不思食當補脾益黃散下利者調中丸主之傷風手足冷脾臟怯也當和脾後發散和脾益黃散發散大青丸主之脾病見四旁皆倣此治之順者易治逆者難治脾怯當面赤黃五臟相反隨證治之

益黃散

治證詳見第八問

嬰童百問

卷一

脾

陳皮去白

一兩

丁香二錢

用木香一方

訶子炮去

核

青皮去穢

甘州炙各

五錢

右為末每服二錢水一盞煎三分食前服

大青膏

治傷風痰熱發搐

天麻一錢

白附子半錢

蝎梢半錢

朱砂一字

天竺黃半錢

烏虵酒浸取肉

焙乾半錢

麝香一字

青黛一錢

右為末生蜜為丸如芡實大月中兒便米

牛黃胃薄荷湯化下五歲以上同甘露散服之
理中丸 或作湯同

治脾胃不和中寒止衝胸脇逆滿心腹疔痛痰
逆惡心嘔吐心下虛煩痞滿脘寒不通飲食減
少短氣羸困溫中逐水止邪汗去溼洩瀉注下
水穀不分腹中雷鳴傷寒時氣內寒外熱霍亂
吐利手足厥冷胸痺心痛逆氣短氣寒多不飲
水吐者

人參 去蘆 白朮 乾薑 炮各 甘艸 炙減

右咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓帶熱服
空心食前或研細末白湯調下腹痛者加人參
一兩半寒多加乾薑一兩半渴者加白朮一兩
半臍上築者腎氣動也去白朮加桂四兩吐多
者去朮加生薑三兩下多者還用朮悸者加茯
苓二兩或四肢拘急腹滿下利轉筋者去朮加
附子一箇生用未之蜜丸如雞子黃大名理中
丸又名調中丸治厥陰臟寒蛇上入膈吐長蟲
或胃中虛冷因發汗故吐蟲先服理中丸或加

枳實茯苓丸治傷寒結胸欲絕心膈高起實
滿作痛手不得近並用熱湯化下

嬰童百問卷之二

肺臟 第十一節

肺盛復有冷風胸滿短氣氣急喘嗽上氣管痛

後發散風冷散肺瀉白散主之肺只傷寒則不胸滿

肺熱則手掐着眼鼻而甘桔湯主之肺虛熱唇深紅

色治之散肺虛熱少服瀉白散肺臟怯唇白色當補

肺阿膠散主之若悶亂氣粗喘促哽氣者難治肺虛

損故也脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母也母

皆虛不能相營故曰怯肺主唇白而光澤者吉自如

嬰童百問 卷二 肺臟

枯骨者死肺病春見肺臟勝肝當補腎肝治肺臟肝

怯者受病也補肝腎地黃丸治肺瀉白散主之肺病

見春旺肺勝肝當瀉肺輕者肺病退重者目淡青色必

發驚更有赤者當瀉為肝怯當目淡青色也

瀉白散

地骨皮 桑白皮 炒各一兩

右剉一劑梗米一撮水二盞煎一盞食前服

甘桔湯

治風熱毒氣上攻咽喉疼痛喉閉腫塞妨礙

肺壅咳嗽咯唾膿血胸滿振寒咽乾而渴時

濁沫氣息腥臭久久吐膿狀如米粥又治傷寒

咽症

桔梗 二兩 甘艸 一兩

右為粗末每服二錢水一盞煎至七分去滓食

後溫服加荊芥防風名如聖湯熱甚加羌活黃

芩升麻

阿膠散

治嗽肺無津液喘急肺虛者咳而哽氣有聲

阿膠 一兩半 炒

馬兜鈴 半兩 焙

杏仁 七箇去皮尖

糯米 一兩

右為末每服二錢水一盞煎六分食後溫服

地黃丸

熟地黃 山茱萸 乾山藥 各四錢

澤瀉 牡丹皮 白茯苓 各三錢

右為末煉蜜丸如桐子大三歲以下一二九空

心白湯化下行遲鶴膝加鹿茸牛膝五加皮

腎臟 第十二問

腎虛兒本虛怯由胎氣不成則神氣不足目中白睛多其顛即解顛開面色恍白此皆難養縱長不過八入之數若恣于色慾多不過四旬而亡或有因病而致腎虛者非也又腎氣不足則下竅蓋骨重惟欲下而縮身也腎水陰也腎虛則畏明皆宜補腎丸主之腎病見夏水勝火腎勝心也當重腎輕心退重者悸動當搐也

地黃丸

嬰童百問

卷二

腎臟

主

治腎疳即急疳腦熱肌削手足如米滑淺腹痛

熟地黃 山茱萸肉

乾山藥 各四錢

澤瀉 牡丹皮

白茯苓 去皮各三錢

右為末煉蜜和丸如梧桐子大三歲以下一二九至三九溫水空心化下。行遲鶴膝加鹿茸牛膝五加皮。

面上證氣色總見 第十三問 〇無方

左腮為肝右腮為肺額上為心鼻上為脾下頰為腎赤者熱也隨證治之此仲陽之至論也口議所謂五位氣色總見者其藍青色者乃驚積不散欲發風候其火紅色者痰積壅盛驚悸增進其黃土色者食積癥瘕欲作疳疾痞癥其色白者大腸滑洩水穀不分欲作吐利其黑色者臟腑欲絕其疾危惡其兒不久也又有面部形色額有青色主驚風欲發紅主大熱印堂青色初入驚并瀉紅主大驚夜啼黑主客忤山根青至主三次驚青色主瀉後發躁黑色及黃其主死年壽平陷者主夭青主發熱生驚黑主利死紅主燥死微黃曰平黃甚主霍亂死鼻準微黃曰平黃甚為土動死候黑赤危甚人中黑主蛔蟲咬患久唇反者死短縮者困利死邊旁黃主胃逆青色主下利正口紅者平乾燥脾熱自主失血死黃有積青因驚風死黑氣遠口者死承漿青因飲食時被驚黃主吐逆赤主血痢赤黑主驚風兩眼黑睛黃有熱白睛黃食積不化疳蛔白睛青肝風驚黑睛黃傷寒上青

忽紅主煩燥夜啼黃主霍亂久病紅者死風氣二池
青主風候紫主吐逆又發熱黃吐逆紅主煩躁夜啼
兩額赤色肺有客熱兩太陽青主二次受驚青自太
陽入耳者死紅主血淋兩臉青主客忤黃主痰溢赤
風熱兩頰赤主傷寒左赤心熱口瘡右赤肺熱黃
主有積紅主血淋兩頰青主吐蟲兩金匱青主第二
次驚生風黑遠口二日死青連目入耳七日死兩風
門紅主風熱黑主疝青水驚黑從眉入耳當日死
黑不食者死又面青眼青肝之病而赤心之病面白
肺之病而黃脾之病而黑腎之病五臟各有所主看
稟受盈虧胎氣虛實陰陽補瀉當救其失臟腑表裏
若能辨其標本則神聖工巧自然得矣

嬰童百問

卷二

五

發搐 第十四

仲陽云驚癇發搐男發搐目左視無聲右視有聲女
發搐目右視無聲左視有聲相勝故也早晨發搐因
潮熱寅卯辰時身體壯熱上視手足動搖口内生涎
項頸急此肝旺當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青
丸主之日午發搐因潮熱巳午未時發搐心神驚悸
目上視白睛赤色牙關緊口内生涎手足動搖此心
旺也當補肝治心治心導赤散涼驚丸補肝地黃丸
主之日晚發搐因潮熱申酉戌時不甚搐而喘目微
邪視身體似熱睡露睛手足冷大便淡黃水是肺旺
當補脾治心治肝補脾益黃散治肝瀉青丸治心導
赤散主之夜間發搐因潮熱亥子丑時不甚搐而臥
不穩身體溫壯目睛緊邪視喉中有痰大便白色乳
食不消多睡不省不納津液當補脾治心補脾益黃
散治心導赤散涼驚丸主之凡急驚欲發先看握拳
指內陰順指外陽順男左女右搐須令全用藥通關
大忌悶涎入肺逆入心經某能語言即與涼心鋪驚
下痰藥始安如逆搐者便不可救若因吐瀉後發

嬰童百問

卷二

六

却難調治大凡此證要看握拳逆順若搐...
 理搐逆恐其復潮先用通關勝撚兒保命丹省風濕
 後用疎風化痰退熱等藥便可無事又有驚風搐搦
 吐瀉多啼急搐眼後有淚面紅則難瘥愛哭心中聚
 涎臉有紅筋乃是癩疾指亂青紋疾病又傳下驚風
 驚風鎮墜太過風疾不散與氣相逆搐不能定當下
 轉氣疎風藥溫膽湯加酸棗仁服次省風湯化蘇青
 九又有急驚偏頭面青背冷男左女右不妨男右女
 左難治如待心冷汗搐着搐肚終日終夜不定者名
 嬰蓮百調 卷二 發搐 七
 真搐兩肩都動此乃掣證不惟定搐亦要順氣當下
 參湯平其胃氣却進川烏全蝎等藥并順氣藥亦要
 幹旋伸陽論傷風後發搐若傷風後得之口中氣出
 熱呵欠頓悶手足動搖當發散大青膏主之傷食後
 發搐若傷食後得之身體溫多睡多唾或吐不思飲
 食而發搐當先定搐搐退白餅子下之後服安神丸
 入百日内發搐真者不過三兩次必死假者頓發不
 為重真者內生驚癩假者外傷風冷蓋血氣未實不
 能勝任乃發搐也欲知假者口中氣出熱也治宜發

散大青膏主之仍用塗顛浴體法珍珠丸下痰即定
 有熱不大便者七寶洗心散寬熱散下之即效却用
 截風定搐天麻防風丸龍齒散釣藤散等劑調理有
 熱瘡疥或不語防風通聖散大連翹湯皆可服
 瀉青丸
 當歸 龍膽艸 川芎 防風
 大黃 羌活 山梔仁 等分一方加
 右為末煉蜜丸雞頭大每服一九沙糖湯下
 導赤散
 生地黃 甘艸 木通 各等
 右以咀竹葉煎加黃芩赤芍藥羌活燈心煎
 涼驚丸 潮熱口內涎手足動搖此心旺也
 治驚疳有熱發搐心神驚悸上視赤色牙關緊
 黃連 末五分 龍腦 一錢 龍膽 三錢 防風 三錢
 青黛 三錢 釣藤 二錢 牛黃 一字 麝香 一字
 一右同研麪糊丸粟米大每服三五丸至一二十
 丸煎金銀湯送下
 地黃丸

熟地黃 山茱萸 乾山藥 各四錢

澤瀉 牡丹皮 白茯苓 去皮各三錢

右為末。煉蜜丸如梧子大。空心溫水化下。三九

益黃散

陳皮 去白一兩 丁香 二錢一方 訶子 炮去核

青皮 法白一兩 甘艸 炙各半兩

右為末。三歲兒一錢半。水半盞煎三分。食前服。

通關散

治諸風搐搦。關竅不通。皆由痰塞中脘。留滯百

節所致。痰之所為。潮寒者。氣實使之。

南星 炮一錢 麝香 一字 猪牙皂 一錢 麝香 燒存性

赤蜈蚣 一條 直殭蠶 一錢

右為末。以手點薑汁。蘸藥少許。擦牙。或用物引

滴入藥兩三點。涎自出。

嚏關散

生半夏 一錢 皂角 半錢

右為末。用一豆許。用管子吹入鼻。立醒。

開關如聖散

嬰童百問 卷二

赤蜈蚣 一條 中分為兩片各

全蝎 一箇 亦中分為兩片各記左

右各為末。左眼翻。左手搗。以左藥末搗入左鼻

孔。右眼翻。右手搗。以右藥末搗入右鼻孔。雙眼

翻。雙手搗兼之。

至聖保命丹

治小兒胎驚。內釣。腹肚緊硬。眠睡不安。夜多啼

哭。及治急慢驚風。目眼上視。手足抽掣。不省人

事。悉皆主之。冷證用此。

全蝎 十四箇 防風 二錢 白附子 一錢

炮南星 一錢 有熱 蟬蛻 一錢 殭蠶 去絲

天麻 二錢 朱砂 一錢 麝香 半錢 金箔 十片

有熱證加牛黃 冰片 硼砂 各少許

右為末。粳米糊丸。每兩作四十九。常服鎮心安

神化痰除一切驚風。諸證湯。臨時換一方。加人

參白茯苓二錢。

省風湯

治驚風口噤。筋脈攣急。抽掣疼痛。風盛痰

五三七

暈墮仆頭目眩胸膈煩滿恍惚不定神志昏憒

天南星生川防風去蘆各四兩 甘艸生五

半夏水泔浸一宿 黃芩去粗皮各一兩

右咬咀每服二錢生薑一片煎去滓不拘時服

溫膽湯

治驚悸煩躁不得眠

半夏 枳實各二錢半 茯苓半兩 橘紅

甘艸各一錢半 酸棗仁去殼二錢半 腹疼加芍藥

右咬咀每服一錢入竹茹少許薑棗煎服

嬰童百病 卷二 發熱 七

玉餅子

治小兒夾食傷寒其證發熱嘔吐亦有肚疼者

噉氣辨得分曉先用此藥一服推下食積却用

平和藥發散調治如惺惺散加減參蘇飲皆妙

滑石末一錢 輕粉半錢 半夏末一錢 南星末一錢

巴豆甘四箇去皮膜用水一升煮乾研細

右三味搗羅爲末入巴豆粉次入輕粉又研勻

却入餘者藥末如法令勻糯米粉丸如菉豆大

量小兒虛實用藥三歲已下每服三五丸

空心紫蘇湯下忌熱物若三五歲兒壯實者不以此拘加至二十九丸以利爲度

安神丸

人參 茯神 麥門冬 乾山藥

龍腦各二錢 龍齒一錢 朱砂 甘艸

寒水石末各半錢 金箔二片

右爲末蜜丸雞豆大燈心湯調下

大青膏

天麻一錢 白附子半生半錢 蝎尾半錢

朱砂一字 青黛一錢 天竺黃一字 麝香一字

烏蛇酒浸取肉焙乾半錢

右爲末生蜜丸如芡實大月中兒粳米大全牛

黃膏薄苛湯化下五歲以上同甘露散服之

奇州白丸子一名蘇青丸

治一切風小兒驚風

天南星五兩 白附子二兩 川烏頭去皮臍半兩

半夏浸洗過白好者七兩

右用井花水浸晒過次日早再換新水浸五日

夏三日月秋七日冬十日晒乾爲細末以糯米粉煎粥清爲丸如菉豆大小兒驚風薄芎湯調下和蘇合香丸服名蘇青丸

浴體法

天麻末錢二全蝎錢二朱砂錢二烏蛇肉錢二

白礬錢二麝香錢一青黛錢二

右同研勻每用三錢水三椀桃枝一握葉五七枝同煎至十沸溫熱浴之勿浴背

塗額法

麝香一字蝎尾錢一薄荷葉半錢

蜈蚣末半錢牛黃末半錢青黛末半錢

右同研用熟棗肉劑爲膏新綿上塗勻貼額上四方可出一指許火上炙手頻熨百日内外小兒可用此塗浴法

珍珠丸

治小兒急驚風涎潮壯熱痰氣上壅

白明子半錢滑石半錢輕粉半錢巴豆半錢

右爲末糊丸如小豆大三歲一丸二九葱湯下

七寶洗心散原係二方合成者詳見二十七問內

白朮半錢甘艸炙當歸炙荆芥穗

麻黃節芍藥各六錢大黃切焙

前胡各四錢生地少許薄荷

右爲末每服一錢水一盞入生薑一片煎服

寬熱散詳五十四問中

枳殼去白一兩以水潤之以巴豆四兩

大黃一兩朴硝半兩甘艸半兩

右爲末以瓶器收之每服一字薄荷湯調下

天麻防風丸詳五十四問中

天麻防風人參辰砂

雄黃麝香甘艸炙全蝎炒

雄雞兩牛黃一字一方有膽星無麝香

右爲末煉蜜丸如桐子大每服一丸薄荷湯下

惺惺散詳五十四問中

天花粉人參細辛白茯苓

白朮甘艸桔梗各等

右到每服一錢水煎服

龍齒散

龍齒 蟬蛻 鈞藤 羌活

茯苓 人參 等分

右為末每服半錢薄荷湯下。

鈞藤散 詳十六問中

鈞藤 三錢 蠟蚘 天麻 防風

蝎尾 人參 各半 麻黃 去節 燂蠶 炒

甘艸 川芎 各一錢 麝香 一字

右為末白水煎寒多加附子末半錢

防風通聖散 詳二十八問中

防風 去蘆 荆芥 半錢 川芎 當歸

薄荷葉 大黃 錦紋 芍藥 麻黃 去根

連翹 去蒂 芒硝 各半 石膏 細紋 黃芩

桔梗 各一兩 滑石 六兩 甘艸 二兩 白朮

梔子 各二錢半

右到每服二錢水一盞薑二片煎七分去滓

大連翹湯

治瘡疹壯熱小便不通諸般瘡癩丹毒臍風

連翹 瞿麥 荆芥 木通

赤芍藥 當歸 防風 柴胡

滑石 蟬蛻 甘艸 炒各一錢 山梔仁

黃芩 各半

右到每服一錢加紫艸煎溫服熱甚加大黃更詳證加減為佳

急驚者因聞大聲及大驚而發搐發過則如故此無陰也當下利驚丸主之小兒急驚者本因熱生于心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤劇則搐也蓋熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚丸主之以除其熱痰不可與巴豆及溫藥大下之恐搐虛熱不消也小兒熱痰客于心胃因聞聲非常則動驚搐矣若熱極雖不因聞聲及驚亦自發搐急驚之候牙關緊急壯熱涎潮窺視反張搐搦顛指開合動唇口指開合看眼取引頻井口中熱氣頰赤唇紅大小便黃赤其脉浮數洪緊蓋由內有實熱外挾風邪心經受熱而積驚肝經生風而發搐治法大要用藥有序通關以後且與截風定搐痰熱尚作乃下之痰熱一洩又須急與和胃定心之劑如搐定而痰熱少者則但用輕藥消痰除熱可也蓋急驚須當下切不可過用寒涼及銀粉巴消輩蕩滌太驟此等重劑醫家不得已而用之僅去疾即止或不當用而用或當用而過焉往往由此而成慢驚矣此證亦用搐鼻通關打噴嚏牙

開關後用疎風化痰退熱藥導引散柴胡天麻等劑便可無事琥珀散通治諸經驚壯之要藥至寶丹亦可服

利驚丸

治小兒急驚風痰盛發熱潮搐

青黛 輕粉各一錢 牽牛末半兩 天竺黃 二錢

右為末白麩糊丸如小豆大二十九薄苧湯下

一法煉蜜丸如茯苓大一粒化下

導赤散

生地黃 生甘艸 木通各等分 竹葉 三片

右咬咀加黃芩赤芍藥羌活燈心煎服

至寶丹

詳二十問中

生犀屑 生瑤瑁屑 琥珀研細

雄黃細研水飛 金箔五十片

銀箔五十片 片腦研 麝香研 牛黃研

安息香一兩半為末以無灰酒濾去

右和勻以安息膏丸如梧子大每歲一九入水

湯化下

琥珀散

治小兒急慢驚風涎潮昏目日瞪搐搦驚吊肚
疼及和順痘瘡小可驚哭服臥不安入口立效
驚癇時攻發作常服永除病根

辰砂一錢 琥珀 牛黃 天麻

殭蠶剉去絲嘴 全蝎去毒 白附子 乳香

蟬蛻各一錢 麝香半錢 代赭石煨研淨七次一錢

片腦一字 牛膽南星一字

右為末三歲一錢薄苧湯下慢驚加附子一分

直百問 卷二 急驚

七

慢驚 第十六訓

慢驚者因病後或吐或瀉脾胃虛損遍身冷口鼻氣
出亦冷手足時時痺痲昏睡露睛此無陽也枯莖湯
主之凡慢驚之候或吐或瀉痰鳴微喘眼開神緩睡
則露睛驚跳搐搦乍發乍靜或身熱身冷四肢熱口
鼻冷氣面色淡白淡青或唇青唇青其脈沉遲散緩
蓋由急驚過用寒涼或轉下太驟傳變成之又有吐
利不止而成者有氣虛暴吐瀉而成者有臟腑虛洞
泄而成者有久利氣脫而成者有取瀉下積而成者
嬰童百問 卷二 慢驚 子
有吐血下血而成者有感風不解傷寒傳變而成者
有久嗽作癇不已者有蟲積衝心者有疝氣腹痛者
或日夜汗出脾困多睡煩躁引飲四肢浮腫大小便
閉丹瘤腫毒龍帶纏腰走馬急疝並傳慢候惟吐瀉
積利成虛致之則證變甚速治法須當審問源流不
可一槩用藥曰慢候如吐瀉得之則理中湯加木香
以溫其中五苓散以導其水如臟寒洞洩得之則先
與朮附湯下積取轉得之則先與調氣散調和脾胃
如外感風寒則可與桂枝湯葛根湯輩其他可以類

推矣然慢驚雖屬陰亦須準較陰陽虧盛淺深如何
不可純用溫藥及燥烈大熱之劑惟于生胃氣中加
以截風定搐如全蝎花蛇殭蠶白附天麻南星輩為
良方傳慢候而尚有陽證者不必回陽但與截風調
習可冷可熱惟均平陰陽而已太乙寶生丹聚寶丹
蟬蝎散神寶既濟丹來復丹王氏惺惺散醒脾散大
醒脾散溫白丸可選而用之若陽虧陰盛病已傳過
純屬慢驚無搐掣反引窺視之證而但昏沈者與星
香全蝎散定命飲子四聖散烏蝎四君子湯天南星

嬰童百問 卷二 慢驚 三

散烏沉湯沉香散之屬若手足冰冷者方可回陽用
硫黃附子慢驚下痰身煖者天南星九蘇合香丸白
丸子痰盛者神寶既濟丹礞石散虛甚不可下痰者
靈脂丸七珍丸如腦麝巴霜寒涼通開利腸之輩一
切禁止如未發慢驚先要睡吐舌搖頭面青毛髮豎
吐乳作腥額上有汗此證乃吐後胃虛生風當下截
風醒脾散或四君子湯加全蝎防風銀白散或釣藤
飲去麻黃更宜多方走變藥餌不可輕忽又有慢驚
正必洩瀉吐乳冷汗雙眼閉唇紅舌出搖頭暴亂而

腦動心間氣粗口瘡常用南星末貼脚底心常進參
湯尤好少間口瘡不納乳食名曰鎖隔却難救凡小
兒病證見口如魚口作鴉聲者不治聖濟經有琥珀
丸南星煎等劑皆可服論曰心藏神而惡熱小兒體
性多熱若感風邪則風熱搏于腑臟其氣鬱憤內乘
于心令兒神志不寧故發為驚若驚甚不已則悸動
不寧是為驚悸之病紫金散牛黃散大丹砂丸治之
其急驚則有龍齒散巨勝散等劑可選而用之

括蕒湯 治慢驚

嬰童百問 卷二 慢驚 三

括蕒根 錢二 白甘遂 一錢按本草白甘遂乃
右用慢火炒焦黃色研勻每服一字煎麝香薄
苛湯調下無時凡藥性雖冷炒焦用之乃溫也
理中湯 詳五十三問內

人參 炮各 白朮 乾薑 炮各 甘艸 炙減

右剉散每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎服

五苓散

治霍亂吐瀉燥渴飲水小便不利

澤瀉 一兩 官桂 一兩 猪苓 白茯苓

白朮 各一兩半

右爲細末每服一錢白湯調下燥渴新水調服

大小以意加減不拘時候加辰砂一兩治驚熱

朮附湯

治風溼相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴大

便堅硬小便自利及風虛目眩甚則口不知味

白朮 四兩 附子 炮去皮臍 甘艸 各二兩

右剉每服三錢水盞半薑三片棗一個同煎服

調氣散 詳第五回中

卷二 假驚 至

木香 香附子 人參 橘皮

藿香 甘艸 各一錢 薑棗煎服

桂枝湯

治太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱

者汗自出惡寒惡寒者發熱鼻鳴乾嘔者

桂枝 去皮 芍藥 生薑 各一兩 甘艸 一兩

右剉每服三錢棗二個水一盞煎八分服須臾

啜粥一盞以助藥力溫覆令一時許通身熱散

汗出爲佳減法桂枝自西北二方居人

行之無不應驗江淮唯冬及春可行之自春來

及夏至已前桂枝證可加知母石膏各半兩或

加升麻一分若病人素虛寒者正用古方

葛根湯

治太陽病項強几几惡風無汗無惡寒剛痺

葛根 西兩 麻黃 三錢 桂 一兩 甘艸 二兩

芍藥 二兩

右剉每服五錢水一盞半生薑五片棗二個煎

一盞服取微汗

卷二 假驚 至

太乙保生丹 治慢驚尚有陽證

全蝎 十四個 白附子 生 僵蠶 牛膽南星

蟬蛻 琥珀 各一錢 麝香 半錢 防風

朱砂 各一錢 金箔 二片 作衣

右爲末每服二九薄荷湯下

聚寶丹 治慢驚風

人參 茯神 琥珀 天麻

僵蠶 防風 南星 生白附子

全蝎 烏蛇 各一錢 朱砂 半錢 麝香 少許

右爲末煉蜜九桐子大每服一九薑蒲湯調
蟬竭散 治方傳慢驚

全蝎 七个 蟬退 二十个 甘艸 二錢 南星 一个

右爲末每服半錢煎服

神寶既濟丹

分陰陽平冷熱定吐瀉豁痰涎

硫黃 鎔汁 五靈脂 青皮

陳皮 去白 半夏曲 炒等分

右爲末粟米糊丸麻子大每服三九米飲送下

嬰童百問 卷二 慢驚

來復丹

此藥配類二氣均調陰陽奪天地冲和之氣有

水火既濟之功補損扶虛妙難盡述

硝石 同硫黃爲細末微火略炒用柳篋子不住手攪令陰陽氣相入不可火太過

硫黃 船上 太陰玄精石 研細水飛

陳皮 去白 五靈脂 水澄去砂 青皮 去穰各

右用靈脂二度爲細末次入玄精石末及前二

藥末拌勻以好醋打和爲丸如豌豆大每服三

十粒空心粥飲下甚者五十粒小兒三粒新產

生嬰兒一粒小兒慢驚風或吐痢不止變成虛

風搐搦者非風也胃氣欲絕故也用五粒罌下

王氏惺惺散

人參 茯苓 木香 天麻

白扁豆 陳皮 全蝎

右爲末每服半錢薑棗略煎服

醒脾散

全蝎 焙半 白附子 炮 天麻 焙 甘艸 炙

人參 白茯苓 石菖蒲 木香

嬰童百問 卷二 慢驚

石蓮肉 白朮 各一錢 有熱者去木香

右到每服三錢薑二片棗一个水二小盞煎服

大醒脾散

南星 白茯苓 橘紅 各一錢 全蝎 焙

甘艸 炙 白附子 炮 石蓮子 人參

木香 各半錢 揀倉米 二百粒

右到每服三字薑棗煎服驅風醒脾兩方通用

溫白丸 驅風豁痰定驚

人參 防風 生白附 麝香

全蝎 焙各一錢 南星 湯泡焙 天麻 各二錢

右爲末，麩糊丸，桐子大，每服一丸，薑湯調下。

星香散 治慢驚風

南星 煨二錢 木香 人參 橘紅 各一錢

全蝎 炙三錢 甘艸 炙半兩 有熱加防風

右剉每服一錢，入紫蘇薑棗濃煎，旋以時送下。

定命飲

半夏 茯苓 木香 生薑 各一錢

白朮 甘艸 炙 天麻 各五分

右爲末，每服半錢，薑棗煎湯調下。

四聖散 治慢驚吹入鼻中

全蝎 七个 僵蠶 十四个 南星 七錢 川烏 二錢

右將南星爲末，水調作餅，裹蠶蝎川烏，外用溼

紙重包，慢火中煨，令赤色，頓地上一伏時，每服

一字，煎金銀湯，點好茶清，少許調下。

烏蝎四君子湯

人參 白朮 甘艸 白茯苓 等分

川烏 全蝎 各少許

右爲末，每服半錢，薑棗煎服，如再服，卽去川烏。

天南星散 驅風豁痰

南星 一个重九錢 以上者，就地土作小坑，深

入坑中，卽納星于內，次以火炭密蓋之，

右末，每半錢，入琥珀全蝎各一錢，生薑湯調下。

烏沉湯 治慢驚祛風助胃

天麻 二錢 人參 生川烏 全蝎 焙

南星 炮 木香 沉香 各一錢 甘艸 炒半錢

右剉每服三字，薑三片煎服。

沉香散

茯苓 二錢 沉香 丁香 木香

藿香 厚朴 製 甘艸 炙一錢

右爲末，每服一字，米飲調下。

天南星丸

天南星 一斤 每一斤，重一兩，上下者，用溫湯

柴蒸，不任添湯，蒸滿，內氣透，更不住

酒，酒常令藥潤，伏時，滿取出，用銅刀切

開一个，大者，嚼少許，不麻，舌爲熟，未即

再炊，以熟爲度，然後用銅刀切細，每

麝香 研 丁香 各一兩 龍腦 研 辰砂 各一兩

右爲末煉蜜并酒九朱砂爲衣薑湯下一

礞石丸

礞石一兩 煨碎 焰硝半兩 同合礞石入窩內
川炭火煨令通紅候冷

右爲末雪糕薄糊丸棗豆大每服二九急風薄

苛荆芥泡湯調下慢風慢脾風木香煎湯下礞

石焰硝古文錢輩雖能利痰然其性非胃家所

好故以木香佐之

靈脂丸

五靈脂 白附子煨 木香 直殭蠶炒

嬰童百問

卷二 慢驚

无

无

全蝎錢 朱砂一錢 大南星淨紙包火

右末米醋煮生半夏糊丸麻子大薑湯下三九

七珍丸 治頑痰壅盛

細辛 川靈芝 直殭蠶一錢

白附子一錢 朱砂半錢 全蝎四个

右末大南星煮糊爲丸麻子大薑湯下每五九

四君子湯 治榮衛氣虛臟腑怯弱

人參去蘆 茯苓去皮 甘艸 白朮各等

銀白散

糯米二兩 扁豆二兩 薑香一分 白朮一分

丁香二錢 甘艸三錢

右爲末紫蘇米飲調下加天麻砂仁白茯苓快

脾正色直指方加炮白附全蝎木香石蓮生薑

釣藤散二十一問二十一問有

釣藤三錢 蟬蛻 天 防風

蝎尾 八參各半 麻 去節 僵蠶炒

甘艸多 川芎各一 麝香不拘

右爲末白水煎寒多加附子末半錢

嬰童百問

卷二 慢驚

无

琥珀丸詳十五問

辰砂一錢 琥珀 牛黃 僵蠶炒去

南星製 全蝎去毒 白附子 代赭石

天麻 乳香 蟬蛻各一 麝香半錢

冰片少許

右爲末三歲半字薄苛湯下慢驚加附子

龍齒散

龍齒 蟬蛻 釣藤 羌活

茯苓 人參等分 爲末厚一錢薑湯

脾風 第十七

慢脾風之候。面青舌短頭低。眼合不開。困睡中。搖頭吐舌。頻嘔腥臭。禁口咬牙。手足微搐。而不及收。或身冷。或身溫。而四肢冷。其脉沉微。陰氣極盛。胃氣極虛。十救一二。蓋由慢驚之後。吐瀉損脾。病傳已極。總歸虛處。惟脾所受。故曰脾風。若逐風則無風。可逐。若療驚則無驚。可療。凡間痰涎虛熱往來。其眼合者。脾困氣乏。神志沉。痰涎凝滯。然爾世所謂慢風難療者。慢脾風是也。然慢脾風一名虛風。凡小兒或吐或瀉之後。面色虛黃。大勢虛損。若因虛而發熱。繼此必得慢脾風。纔見搖頭直視。以手摸人。昏困喜睡。額上汗多。身亦黏汗。其聲沉小而焦。即是脾風之症。不必皆由急慢傳風。治法大要。生胃回陽。黑附湯。川烏散。金液丹。白丸子各一半。生附四君子湯可斟酌。胃氣漸復。則異功散。輩溫平而調理之。如蝎附散。陰癩散等亦可參用。若其眼半開半合。手足不冷。症候尚在。慢驚則不必用回陽。或已入慢脾。而陽氣未盡脫者。亦不可用硫黃附十九服。回陽湯劑。手足漸暖。宜以

以醒脾散等繼其後以調之。不可輕易用極劑。

黑附湯 治慢脾風虛四肢厥冷者。手足暖而熱者即止。後劑。

附子 炮三錢 木香 半錢 白附子 錢 甘艸 分

右剉散。每服三錢。薑五片。煎取其半。以匙送下。

川烏散 祛風回陽

川烏 錢 全蝎 木香 各半 嘔吐加丁香

右末。每三字。薑三片。煎取其半。旋滴入口中。

金液丹 治吐利日久。脾胃虛損。手足厥逆。精神昏。睡寒多。露睛口鼻氣冷。欲成慢驚。風者。

船上硫黃 十兩。先飛抹去砂石。稱研為細末。入罐內。再入赤石脂。封縫。鹽泥固。

嬰童百問 卷二 脾風 三 生

濟炭火煎三晝。夜取出候冷。用。

右以柳木槌研為細末。每服二錢。生薑湯下。

生附四君子湯

助胃回陽。即前四君子湯。加生附子末四分之一。

一厥冷者對加。每服半錢。水煎以匙送下。

異功散

人參 茯苓 白朮 甘艸

橘紅 木香 等分

右為末。每服三字。薑棗煎服。

附散 附陽氣 附風痰

全蝎 一个 附子 炮 二 南星 炮 白附子 炮

木香 各一錢

右為末。每服半錢薑三片煎服。

醒脾散

全蝎 焙半錢 白附子 炮 天麻 焙 甘艸 炙

人參 白茯苓 石菖蒲 木香

石蓮肉 白朮 各一錢

右為末。每服三字薑棗煎服。

嬰童百問

卷二 附風

又至

陰癆散 祛風豁痰回陽正氣

白附子 黑附子 南星 半夏 並生各一分半

右為末。井水浸七日。逐日換水。浸訖。控乾。次入

全蝎末二錢。每服一字。生薑湯下。

急慢脾風下痰輕重 第十八問

慢驚下痰輕者。神寶既濟丹。白僵蠶丸。重者神砂膏。

甚則七寶妙砂丹。灸慢脾慢風驚逆惡症候。諸藥不

效者。如有太衝脈。則取百會穴灸之。此治慢脾風之

大要然也。急驚亦下劑有三。輕下則用定命丹。利驚

丸。防風湯。宣風散。枳殼散。小柴胡湯。重下則用青

金丸。天麻丸。蘆薈散。牛黃涼膈丸。青金丹。王監京墨

丸。葷。稍重下則用揭風湯。朱砂膏。疎風散。柴胡加大

黃湯。葷下之後宜和氣助胃。如生氣散。銀白丸。茯苓

二陳湯。異功散。天麻蘇合香丸。參苓白朮散。和中散

醒脾散之類。皆可選用。凡急驚。眼睛翻轉。口中出血

兩足擺腹。肚搐。摸體循衣。氣促。噴藥。口中痛絕。大叫

者。難治。慢驚。四肢厥冷。吐瀉。咳嗽。面黑唇慘。鴉聲。兩

脇動氣。口生白瘡。髮直。搖頭。眼睛不轉。涎鳴。喘噎。口

眼手足。一邊牽引者。難痊。慢脾身冷。黏汗。直臥。如尸。

喘嗽頭軟。大小便不禁。口噤。頭搖者。最難為力。若急

驚甚者。服鎮心丸。化痰鎮心。或金箔鎮心丸。亦可服

珍珠丸。下痰亦效。熱甚大便閉者。寬熱散下之。可也。

神寶既濟丹

硫黃 煅硝 五靈脂 青皮

陳皮 半夏麴 炒等

修合法詳十六問中每服三九食前米飲下

白殭蠶丸 方傳世界陽氣未甚脫者可川亦能截風

膽星 直殭蠶 五靈脂 錢子地龍乾

全蝎 焙各

右末水煎生半夏糊丸麻子太每五九薑湯下

辰砂膏 治後脾冷痰壅滯手足冷而微痛

嬰童百問

卷二

三

黑附子 一個八錢重者去皮臍頂上刻一孔入辰砂末三錢仍用附子末塞之以炭火燒存性為度

南星 炮半 白附子 焙

五靈脂 蝎梢 各一分

右為末煉蜜丸如桐子太每服一九薑汁湯下

七寶妙砂丹

治痢疾毒効慢驚慢脾通以木香佐之開元通

寶錢皆背後上下有兩月片者其色淡黑頗小

諸錢以一個放鐵匙于炭火內燒少須四圍上

下各出黃白珠子將出候冷入入盞中只作一

服南木香煎湯送下人參湯尤妙

防風丹 治風熱痰壅大便不通

羌活 防風 枳實 川芎

甘艸 炒 大黃 溼紙裹煨 各一錢半

右到每服三字薑棗煎服或加赤芍藥

宣風散 疎風導熱

雄檳榔 个 甘艸 橘紅 各兩 牽牛 生半炒

右為末每服半字錢密湯調下

枳殼散 治小兒疳積腹脹喘急

嬰童百問

卷二

三

枳殼 炒 巴豆 炒黃去之

右為末三歲小兒半錢砂糖湯調下

小柴胡湯 詳見二十九問

人參 甘艸 各三錢 黃芩 一錢 柴胡 八錢

半夏 湯泡七次焙乾二錢五分 加枳實防風能利血執

右到每二錢薑棗煎服

青金丸 治風痰壅盛

巴霜 一字 青黛 南星 炮各滑石 二錢

全蝎 焙一錢

右爲末。稀麩糊丸。麻子大。每一丸。薄荷湯下。
天麻丸

南星 炮二錢 白附子 炮 牙硝 天麻

川靈芝 全蝎 焙各一錢 輕粉 半錢 巴霜 一字

右爲末。每服一字。煎金銀薄荷湯調下。

蘆薈散 治驚風痰盛發搐

全蝎 五个 巴霜 一字 輕粉 半錢 蘆薈

南星 炮 朱砂 各一錢 冰片 麝香 各一字

鬱金 一分 皂角 一分

右爲末。每服一字。煎金銀薄荷湯調下。

牛黃涼膈丸 治熱盛涎潮

牙硝 寒水石 煨 石膏 甘艸 各半兩

膽星 二錢 紫石英 一錢 牛黃 片腦

麝香 各半分

右末。甘艸膏丸。菉豆大。每服一丸。橘皮湯調下。

青金丹 疎風利痰

蘆薈 牙硝 青黛 各一錢 史君子

剛砂 輕粉 半錢 蝎梢 十個

右爲末。香墨水丸。麻子大。每服一丸。薄荷湯下。

王監京墨丸 治痰熱驚積楚州王

青黛 史君子 炒 蘆薈 膽星 各二錢

川墨 二錢 臙粉 麝香 半錢 冰片 一字

右末。飛麩糊丸。桐子大。每服一丸。薄荷湯調下。

揭風湯 治利下痰熱

青黛 蘆薈 全蝎 各一分 南星 半兩 爲餅包裏煎項

朱砂 一錢 牙硝

輕粉 各三字

右爲末。每服一字。煎金銀薄荷湯調下。

朱砂膏 治驚風痰盛

朱砂 一錢 牙硝 一錢 川靈芝 一錢 蘆薈 一錢

麝香 一字 冰片 一字

右末。甘艸膏丸。菉豆大。金箔衣。薄荷湯下一丸。

疎風散 治驚風痰熱俱盛

檳榔 陳皮 各二錢 牽牛 大黃 煨各三錢

右爲末。每服半錢。生蜜調下。

銀白散

糯米炒二兩 扁豆蒸二兩 藿香分 白朮分

丁香二錢 甘艸錢

右爲末。紫蘇米飲調下。

柴胡加大黃湯

柴胡一兩 黃芩炙 人參 半夏製

生薑各三錢半 甘艸炒一錢半 大黃少許

右剉散每服一錢入棗煎服

生氣散治諸風疎利以此調氣

丁香七分 白朮 青皮 甘艸炙

續修四庫全書 卷二 急慢風下 藥類

木香 人參各二錢

右爲末。每服半錢。沸湯點服。

異功散

人參 茯苓 白朮 甘艸

橘紅 木香各等分

右剉散。每服二錢。薑棗煎服。

茯苓二陳湯和胃氣化痰涎

半夏五錢 陳皮二錢 茯苓四錢 甘艸半錢

右剉。每服三錢。薑三片煎服。

天麻蘇合香丸

天麻 防風 人參 辰砂

雄黃 麝香 甘艸炙各一分 全蝎炒

薑蠶炒各半兩 牛黃少許 星一錢 蘇合油

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服一九。薄荷湯下。

參苓白朮散一名和中散

扁豆炒 人參 茯苓 白朮土炒

甘艸炙 山藥各二錢 米仁 砂仁

蓮肉 桔梗各一錢 天麻 藿香各五分

續修四庫全書 卷二 急慢風下 藥類

右末。每二錢。棗湯下。

醒脾散 全蝎炒半錢 白附子炮 天麻焙 甘艸炙

石菖蒲 白茯苓 人參 木香

石蓮肉 白朮各一錢

右剉。每二錢。薑棗煎服。

鎮心丸

朱砂 龍齒 牛黃各一錢 麝粉

琥珀 人參 茯苓 防風

全蝎 七个

右末煉蜜丸如桐子大每服一九薄荷湯下

金箔鎮心丸

朱砂 一兩 白茯苓 半兩 人參 半兩 麝香 半錢

甘艸 半兩 片腦 一錢 紫河車 二錢半

牙硝 五錢 山藥 一兩 金箔 十二貼

右為末蜜丸桐子大薄荷湯下

珍珠丸

白附子 滑石 巴豆 十五粒

嬰童百問 卷二 驚風下痢

南星 各一錢 全蝎 半錢

右末蜜丸小豆大葱白湯下

驚癇 第十九

發癇者小兒之惡病也。幼小血脈不斂，骨氣不聚，為風邪所傷，驚悸所觸，乳哺失節，停滯經絡而得之。其候神氣怫鬱，瞪眼直視，面目牽引，口噤涎流，腹肚膨脹，手足搐掣，似生似死，或聲或默，或項背反張，或腰脊強直，但四肢柔軟，發而時醒者為癇。若一身強硬，終日不醒，則為瘖瘖矣。癇曰五癇，病關五臟。面赤目暈，吐舌噴齒，心下煩燥，氣短息數者曰心癇。而唇俱青，其眼上竄，手足拳攣，抽掣反折者曰肝癇。面黑而睛，振目視人，口吐清沫，不動如尸者曰腎癇。面如枯骨，目白直視，驚跳搖頭，口吐涎沫者曰肺癇。面色痿黃，眼睛直視，腹滿自利，四肢不收者曰脾癇。此五臟之證然也。調理之法，惟以驚風食三種陰陽二證，別而治之。風癇者，汗出解脫，風邪乘虛，其初屈指數有熱生痰是也。驚癇者，震駭恐怖，打墜積驚，其初驚叫大啼，恍惚失魂是也。食癇者，食時得驚，停宿結滯，其初吐乳不哺，大便酸臭，或結成乳癥，先寒後熱，其別之以陰陽。始者身體有熱，抽掣啼叫，是食癇也。

病脉浮面色光澤病在六腑肌膚此猶易愈始者身
體無熱手足清冷不抽掣啼叫是為陰癇陰病脉沉
面色黯晦病在五臟骨髓此最難痊或以仰臥屬陽
覆臥屬陰亦可參驗蓋陽證不可用溫陰證不可用
寒風癇先為之散風驚癇則為之利驚食癇則先為
之消積續以定癇等劑主之大蓋血滯心竅邪氣在
心積驚成癇通行心驚調和心血順氣豁痰又其要
也繼令小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安時常驚
悸此皆發癇之漸即以紫霜丸導之時間量與紫霜
丸減其盛氣則無驚風癇癇之患其證方萌耳後高
骨間必有青紋紛紛如線是之急為抓破須令血出
啼叫尤得氣通澣濯兒衣不可夜露恐為無辜鳥羽
糞所落汗染未有不為癇也挾邪怪者其色變易不
常見人怕羞諸癇瘖不能言者蓋咽喉為氣之道路
風傷其氣以掩其道路之間抑亦血滯於心心竅不
通所致耳南星調雄豬膽汁少許各星蘇散啖之取
效若錢氏五癇丸并南星散以菖蒲煎湯調下牛黃
猪心湯以和蘇合香丸若治癇之要藥也故

之許叔微治小兒顛癇欲發眼暗瘳瘳聲啞
黃丸主之治風癇宜服薄荷散有熱宜服細辛大黃
湯又有蛇黃丸養生必用方斷癇丹散風丹保安丸
獨活湯牛黃丸比金膏虎睛丸七寶鎮心丸清神湯
蜜陀僧飲食癇通用妙聖丹天麻丸斷癇丸當歸大
黃湯蝎虎散代赭石散日應丹地龍散全蝎五癇丸
星珠散可選而用之輕者化風丹亦可服

紫霜丸

代赭石 煅醋碎 七次

赤石脂 各六錢

聖童百問

卷二 驚癇

聖

杏仁 五十枚 去皮尖

巴豆 三十枚 去皮

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代
赭石脂末研勻以湯浸蒸餅為丸如粟米大一
歲服五丸米飲吞下二三日內兒三丸乳小
下更宜量其虛實加減微利為度此藥兼治驚
痰諸疾雖下不致虛人

星蘇散

與第十六問天 南星散通用

治諸風口噤不語

天南星

每服一錢

本藥片紫蘇五葉煎取其半却
許溫和服凡不語者大小便須要疎導治慢厚
不語只用南星以人參石菖蒲為佐

五癩丸

治食癩

硃砂 半兩 水銀 二錢 雄黃 一兩 真珠 一兩
細研

右為末煉蜜為丸麻子大每服二九金銀煎湯

送下

雌黃丸

治顛癩搖掣惡聲嘔古

雌黃 黃丹 麝香
微炒各半兩 半錢

右為末拌和用牛乳汁三合熬成膏入藥末杵

三百下丸如麻子大每服二九溫熱湯下

薄荷散

薄荷葉 羌活 全蝎 甘艸
半兩 兩

麻黃 去節 殭蠶 炒去絲 天竺黃 白附子
各半兩

右為末薄荷湯下熱極生風加竹瀝少許

又一方有柴胡台芎桔梗茯苓無全蝎

黃白附子

細辛大黃湯

治風癩內熱

天麻 防風 細辛 大黃
各半兩 兩

川芎 甘艸
各二錢 錢半

右剉散每服一錢入犀角少許煎服

楊氏蛇黃丸

治諸癩

蛇黃 鬱金 雄黃
一箇 七次研細

硃砂 青礞石 鐵粉
各錢 各錢 研細

右為末粳米飯丸如桐子大每服一九人參煎湯

調下

錢氏蛇黃丸

治驚癩

蛇黃 鬱金 麝香
三箇火 七分 另研

右為末粳米飯丸如桐子大每服二二九煎

銀磨刀水化下

為生必用蛇黃丸

蛇黃 一枚火 青礞石 辰砂

雄黃 各二錢 鐵錘粉 四錢研極細

右末化蒸餅為丸用金銀剪刀股湯五歲已上吞下。幼小化下。如麻子大丸。

斷癩丹

治癩差後復作。證候多端。連綿不除。

黃芪 家水 藤勾 細辛 去根 甘艸 炙各

蟬蛻 四箇洗 蛇退皮 三十酒

牛黃 一字

嬰童百問 卷二 驚癇

右末煮棗肉為丸如麻子大。煎人參湯下。一歲十九。大小加減。

散風散

治風癩先用此

牛膽南星 一錢 羌活 獨活

防風 天麻 人參 六虛 荊芥

川芎 細辛 各一錢

右為末。煉蜜為丸。桐子大。每服二丸。薄荷紫蘇湯調下。

湯調下

保安丸

治諸風癩久遠亦驗

川烏 生去皮尖 五靈脂 生

右為末。猪心血丸。如桐子大。每服一丸。薑汁泡湯調下。

獨活湯

獨活湯

治風癩解表通裏

獨活 麻黃 去節 川芎 各一錢 大黃 焙

甘艸 炒各半錢

嬰童百問 卷二 驚癇

右剉散。每服二錢。薑二片煎服。

牛黃丸

治風癩迷悶。搐掣涎潮。

牛膽南星 麝 五分 全蝎 各二錢半

防風 白附子 生 天麻 蠶蠶 炒各一錢五分

右為末。以棗去皮核取肉。和水銀半錢研極細。入藥末丸。如菉豆大。每服二丸。荊芥生薑湯調下。

比金丸

調下

治驚癇先用此

人參 琥珀 白茯苓 硃砂

遠志薑製焙去心 天麻 石菖蒲細節

川芎 南星 青黛各一錢 麝香一

右為末煉蜜丸桐子大每服一九薄荷湯調下

虎睛丸

治驚癇邪氣入心

虎睛細研 遠志薑製 犀角 石菖蒲

大黃濕細 麥門冬各一錢半 蟻蛭去足翅炒三枚

嬰童百問 卷二 驚癇 嬰

右為末粟米糊丸桐子大每服一九竹葉煎湯

調下或金銀煎湯下

七寶鎮心丸

治驚癇心熱

遠志肉薑製 雄黃 鐵粉

琥珀 硃砂各一錢 金銀箔二十片

麝香少許

右為末棗肉丸桐子大每服一九去心麥門冬

湯送下

神湯

治驚癇

犀角 遠志薑製去心 白蘇皮 人參

石菖蒲 甘艸炙各一錢

右為末每服一錢去心麥門冬煎湯調下

蜜陀僧飲

治驚癇入心不語神效諸驚失音大人通用

右蜜陀僧為末每服一字米醋湯調下大人用

一錢熱酒調下

嬰童百問 卷二 驚癇 嬰

妙聖丹

治食癇通用

代赭石煅醋淬五分 雄黃 蝎稍

硃砂各一錢 輕粉 麝香各一

巴豆三箇去心膜出油 杏仁去皮尖微炒二錢

右為末蒸棗肉丸桐子大每服一九木通煎湯

調下

天麻丸

南星炮 白附子炮 牙硝 天麻

五靈脂 全蝎焙各一錢 輕粉五分 巴霜

右為末稀糊為丸麻子大每服三九薄荷薑煎湯送下

斷癩丸

治諸癩痰盛

皂角

盈尺者三挺出皮挺碎用水一升浸取汁濾過銀器內熬成膏

白礬

假林研細一兩半 南星濕紙炮熱一兩

硃砂

直薑蘇炒 雄黃另研 白附子各半兩

烏蛇

酒浸取肉焙二錢半 麝一錢

製章百問

卷二 驚癩

赤蜈蚣

一條去頭尾酒浸炙

右為末同水煮半夏糊和皂角膏為丸桐子大

每服一九薑湯調下

當歸大黃湯

治諸癩壯熱利下心中惡血

大黃

濕紙裹

甘艸

當歸各三錢

赤芍藥

二錢五分

半夏

川芎各一錢

右為末每服一錢薑棗煎服

蝎虎散

治驚癩屢効

褐色生蝎虎

一箇連血紅研

右入硃砂末并麝少許同研薄荷湯調下作一

服數年顛癩亦効益癩疾皆心血虛滯生蝎當

以官守其血繼是以二陳湯與之若無生蝎當

取帶性雄猪心血代用入代赭石散中亦効

代赭石散

治陰陽癩通用

代赭石

假醋淬研為末水飛過日乾

製章百問

卷二 驚癩

右為末每服半錢以金銀煎湯和金銀箔調下

連進二服良久小兒脚脛上自有赤斑即邪氣

發出其病隨瘥若無赤斑即難治也

日應丹

治顛癩連年不瘥

黑錫

硫黃

水銀

鐵粉

研各半兩

金銀箔

右水銀鐵粉金銀箔夾和一處先將黑錫於銚

內鎔開次入硫黃不住手就銚內碎攪候硫黃

烟氣欲息。次入餘藥。就火上同攪。少頃時。傾出。地上一宿。出火毒。再研細。粳米飯丸。麻子大。每服三九。食後人參湯下。

地龍散

治諸癩發熱無時

乾地龍焙半兩

虎睛

人參

天竺黃

代赭石煨醋

硃砂

鐵粉各二錢半

輕粉五分

雄黃一分

金銀箔三十片

右為末。每服五分。紫蘇湯調下。

嬰童百問

卷二

五

全蝎五疳丸

治小兒五疳

赤蜈蚣一條去頭足酒浸炙

南星炮二錢半 麝香一字

全蝎

防風

硃砂細研 遠志薑製焙去心

白附子生 蘆薈

延胡索各一錢

金銀箔三十片

右為末。入麝糕糊丸。桐子大。每服一九。苜蓿紫蘇湯調下。

蘇湯調下。

星珠散

定痢利痰

南星濕紙裹炮香熟一兩

硃砂一錢

右為末。帶性。豬心血為丸。桐子大。每服一九。防風調下。

風調下

化風丹

涼風化痰退熱定搐

膽南星

羌活

獨活

防風

天麻

人參去蘆

川芎

荆芥

粉草

全蝎各等分

嬰童百問

卷二

五

右為末。煉蜜丸。芡實大。薄荷湯下。一方加辰砂麝香少許。

鎮驚丸

治一切驚癇

紫石英燒醋

鐵粉

遠志薑製焙去心

輕粉各七分

茯神

人參

琥珀

滑石

南星炮

龍齒

蛇黃醋淬

熊膽各二錢半

右為末。煉蜜丸。如桐子大。硃砂為衣。每服一九。

蘇湯調下。

銀湯下或用猪乳調抹入口中

開牙散

細辛

南星

朴硝各錢

麝香

五分

蝎稍

七筒

右末以少許用烏梅肉揉和擦牙兼用細辛皂角荆芥末吹入鼻中治諸風搐搦驚癇用此
開竅與前十四問開散通用

卷二 驚癇

驚風 第二十四

驚者虛惕怔忡氣怯神散痰涎來去其瀉必青漸至風而未至風也驚邪入心則面紅臉赤惕惕夜啼驚邪入肝則面目俱青眼睛窳視驚邪入腎則面黑惡叫囓齧咬牙驚邪入肺則面目淡白喘息氣乏驚邪入脾則嘔吐不食虛汗多睡面色淡黃據脉觀之虛則散而濇實則數而駛治法鎮驚化痰安神定志亦須究竟何臟受病之處而調理之然有所謂溫驚有所謂利驚有所謂涼驚虛者溫之實者利之熱者涼之是謂治法腫中驚啼聲浮者易治沉者難治不響難痊又有驚積者受驚日久積而成之其狀額上有汗喘息煩渴潮熱往來肚腹有熱睡中覺腹內有物跳動瀉下如白脂豆沙是也治法量輕重而疎導之仍與調氣和胃取愈大凡小兒腹中或熱或脹或硬皆為內實法當疎利辰砂膏青龍丸主之凡疎利之劑皆可隨證用之熱甚心經煩渴者至寶丹解之羌活散防風導赤散蟬蛻釣藤飲天麻丸等劑皆可服大便秘澀者七寶洗心散加辰砂治之大小便不利

神芎丸寬執微極效輕者化風丹可服安

辰砂膏

辰砂 三錢 蓬砂 一錢 馬牙消 錢 玄明粉 錢

全蝎 一箇 真珠末 一錢 麝香 一字

右為末和畢用油紙封裏自然成膏每服一豆粒許諸驚金銀箔薄荷湯下潮熱甘艸湯下用內用乳汁調傅乳上令兒吮下

青龍丸

治驚積有熱

嬰童百問 卷二 驚風

藥

青黛 茯苓 蘆薈 南星 炮 各 錢

麝香 少許 輕粉 巴霜 各 一 全蝎 錢 三

右先將巴豆研如泥次入諸藥研極細丸如梧

桐子大珠砂為衣每服一九薄荷湯下

至寶丹

治諸癇急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦及傷寒狂語伏熱嘔吐並宜治之

生犀屑 生玳瑁屑 琥珀 研 小 飛

雄黃 研 細 水 飛 金箔 五 片 小 飛

銀箔 五十片 麝香 研 一 錢

牛黃 研 兩 安息香 兩 半 為 末 以 無 灰 酒 煎 去 沙 石 取 一 兩 浸 火 熬 膏

右生犀玳瑁屑搗羅為細末研入諸藥令勻將安息香膏以重湯煮化和搜為劑如乾即入少熟蜜盛瓷器中旋丸如桐子大二歲兒服二丸人參湯化下大小以意加減又治大人卒中不語中惡氣中諸物毒中熱暗風產後血暈死胎不下並用童子小便一合生薑自然汁三五滴同溫過化下五丸立效

嬰童百問 卷二 驚風

藥

神妙奪命丹

七月取青蒿節內蟲入珠砂麝香為丸加片腦人參羌活湯

治傷寒驚熱或中風體硬加麻黃乾葛薏苡仁

川羌活 獨活 前胡 柴胡

白茯苓 川芎 桔梗 枳殼

人參 地骨皮 天麻 各 等 分 甘艸 減 半

右剉散生薑薄荷煎服加蟬蛻治驚熱

防風導赤散

治小兒初驚

生地黄 木通去節 防風 川艸各等分

有熱加黃芩赤芍藥羌活

右剉散每服三錢水一盞竹葉少許同煎

蟬蛻釣藤飲

治肚疼驚啼又十六間有釣藤散可兼看對

釣藤 天麻 茯苓 川芎

白芍藥各二錢 甘州 蟬蛻各一錢

右剉散燈心煎加木通麥門冬防風羌活

嬰童百問 卷二 驚風

天麻丸

南星炮二錢 白附子炮 牙硝 天麻

五靈脂 全蝎焙各一錢 輕粉五分 巴霜一字

右爲末糊爲丸麻子大每服三九薄荷薑湯服

寬熱散

石膏 黃芩 甘州 赤芍藥

葛根各二錢 麻黃去節 柴胡半兩

右剉散三歲兒每服二錢水一小盞生薑少許

葱白一寸 豉一撮

七寶洗心散

治小兒煩熱生瘡兼治驚風

生地黄 荆芥穗 防風 甘州

黃芩 羌活 赤芍藥各等分

右爲末入辰砂減半加當歸尤妙每服一錢燈

心薄荷湯下空心食前服又三十七間洗心散

可兼看對

神芩丸

治風熱壅滯頭目昏眩口舌生瘡牙齒疳蝕或

嬰童百問 卷二 驚風

遍身瘡疥咬牙驚惕怔忡煩躁多瀉或大小便

澀滯或積熱腹滿驚風潮搐並皆治之

大黃生 黃芩各二兩 生牽牛末一兩

滑石四兩 黃連 薄荷葉 川芎各半兩

右爲細末滴水丸桐子大每服四五十九食後

溫水下一方加蒲黃止血證用

化風丹

膽南星 羌活 獨活 防風

大麻 人參 川芎 荆芥

粉草 全竭 等份

右為末煉蜜九艾實大薄荷湯下。一方加麝香

反砂

安神丸

人參 茯苓 麥門冬 山藥 各二錢

龍腦 龍齒 寒水石 甘艸 各一錢 五分

硃砂 五分 金箔 二片 錢氏方有馬牙硝龍腦

右為末煉蜜九如艾實大每服一九燈心湯下

清心丸

嬰童百問 卷二 驚風

治驚熱煩躁

人參 茯苓 防風 硃砂

柴胡 各二錢 金箔 三十片

右為末煉蜜九桐子大每服一九竹瀝調下

嬰童百問卷之二

嬰童百問卷之三

天鈞內鈞 第二十一問

天鈞腸內鈞

天鈞者壯熱驚悸眼目翻騰手足抽掣或啼或笑喜怒不常甚者瓜甲皆青如祟之狀蓋由乳母酒肉過度煩毒之氣入乳乳兒遂使心肺生熱痰鬱氣滯加之外挾風邪致有此耳治法解利風熱則愈又有內鈞者腹痛多啼唇黑囊腫偏癩反張眼內有紅筋斑血蓋寒氣壅結兼驚風而得之經云內鈞胸高時復漸安眼尾紅脉是也此乃胎中有風有驚故有此

嬰童百問 卷三 天鈞內鈞

聚寶丸

人參 茯苓 琥珀 天麻

直僵蠶 炒 全蝎 炙 朱砂 防風

天南星 烏蛇肉 酒浸一晝夜晒乾焙 白附子 生各

麝香 少許

右為末煉蜜丸如桐子大每服一九菖蒲湯下

蟬蝎散

全蝎 七個 去尾 蟬退 二十個 甘州 二錢 半炙 南星 一個

右到散每服二錢水一盞煎五分不拘時候服

神寶既濟丹 詳第十六問

硫黃 銹汁 冷用 硃砂 銹汁 冷用 五靈脂 青皮

陳皮 半夏 麩分 各等

右為末粟米糊丸麻子大每服三九米飲送下

嬰童百問

卷三 天鈞內鈔

三

釣藤膏

治小兒腹中極痛乾啼後腹名盤腸內釣

乳香 沒藥 木香 薑黃 各一錢

木鼈子 去油 三個

右為末蜜丸芡實大釣藤湯磨半丸入蜜服光

用此藥定痛後服魏香散

魏香散

蓬朮 五錢 阿魏 二錢

右先將溫酒化阿魏浸蓬朮一晝夜焙乾為末

紫蘇米飲誦下

釣藤飲

治小兒夜啼乃臟冷也陰盛於夜則冷動冷動

則為陰極發躁寒盛作疼所以夜啼不歇也釣

藤散主之治驚啼加蟬退防風天麻煎十六問

有釣藤散又二十問蟬蛻釣藤飲可兼看

釣藤勾 茯神 茯苓 川芎

當歸 木香 甘州 白芍藥 各一錢

右為末每服一錢薑棗略煎服其或心熱而煩

嬰童百問

卷三 天鈞內鈔

三

啼必有臉紅舌白小便赤澀之症釣藤飲去木

香加朱砂末一錢研和每服一錢木通湯調下

或到散煎服亦可

保命丸

治小兒胎驚內釣腹肚緊硬眠睡不安夜多啼

哭及治急慢驚風眼目上視手足抽掣不省人

事悉皆主之冷症用此

全蝎 十四個 去毒 防風 二錢 礬石 炒去

天麻 各二錢 南星 炮 白附子 麝香 五分

金箔 十片 蟬蛻 朱砂 各一錢

有熱症加牛黃片腦珊瑚

右為末。粳米糊丸。每兩作四十九。常服鎮心安

神化痰除一切驚風諸症。湯臨時換一方加入

參白茯苓二錢

乳香丸

治驚風內釣腹痛驚啼

乳香 半錢 沒藥 沉香 各一錢 蝎梢 十個

雞心檳榔 一錢

嬰童百問

卷三 天鈞內釣

四

三

右為末。煉蜜丸。如桐子大。每服二丸。菖蒲釣藤

湯下

木香丸

乳香 沒藥 全蝎 各半 釣藤

船上茴香 木香 各一錢

右先將乳香沒藥另研。次入諸藥末。和畢。取大

蒜少許研細。和九桐子大。每服二丸。釣藤湯下。

盤腸氣 第二十二問

盤腸氣者。痛則腰曲。乾嘔。口上有汗。是小腸為冷氣

所搏。然耳。其口閉。脚冷。上唇乾。是也。此是生下洗遲

感受風冷。或青糞不實。却有此症。當服釣藤膏。魏香

散。蘇合香丸。當歸散。乳母服烏沉湯。或沉香降氣湯

便定

釣藤膏 詳二十一問

釣藤 芍神 茯苓 川芎

當歸 木香 甘州 白芍藥 各一錢

嬰童百問

卷三 盤腸氣

五

五

右為末。每服一錢。薑棗煎服

魏香散

蓬朮 五錢 阿魏 二錢

右先將溫酒化阿魏。浸蓬朮一晝夜。焙乾為末。

紫蘇米飲調下

蘇合香丸

治傳屍骨蒸。癩疔。肺痿。疰忤。鬼氣。卒小痛。霍亂

吐利。疰氣。瘴瘧。赤白暴利。瘀血。月閉。瘧。瘧。瘧。瘧。

驚瀉。惡忤。中人。小兒吐利。

蘇合油 入安息膏內 黃陸香 別龍腦一兩

木香 白朮 白檀香 丁香

朱砂 研水飛 沉香 香附子 炒 烏犀屑

蘇發 安息膏 別為末用無灰

麝香 研 訶黎勒 各二兩

右為細末入研藥勺用安息香膏并煉白蜜和

劑每服旋丸如梧桐子大早朝井花水溫冷任

意化服四九老人小兒服一九溫酒化下亦得

竝空心服用蠟紙裹一九如彈子大緋絹袋盛

當心帶之一切邪神不敢近去龍腦名麝香蘇

合丸治一切邪神胸膈噎塞腸中虛鳴宿飲不

消餘症竝同

當歸散

治小兒夜啼者臍寒而腸痛也面青手冷不吮

乳是也宜用此方

當歸 去蘆 白芍藥 人參 各二錢半 甘州 炙

桔梗 橘皮 去白各一錢

右為末水煎半盞時時少與服又有熱痛亦

叫不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃丸人

參湯下

烏沉湯 治慢驚祛風助胃

天麻 二錢 人參 真川烏 生用 木香

全蝎 焙 南星 炮 沈香 各一錢 甘州 半錢

右劉散每服二錢薑三片慢火煎取其半用之

沉香降氣湯

治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿喘

促短氣乾咳煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜臥不

安減食

香附子 二兩半 沉香 一錢 砂仁 三錢

甘州 七錢

右為末每服一錢入鹽少許沸湯點之清晨霧

露空心服之去邪惡氣使無瘴疫

胎驚風 第二十三節

胎驚風者以胎婦調適乖常飲酒嗜欲忿怒驚撲母有所觸胎必感之或外挾風邪有傷于胎故子乘母風生下即發也其候月內溫壯翻眼握拳噤口身股強直涎潮嘔吐搐掣驚怖啼哭腮縮顙開眼合莫誤作慢脾妄用溫藥視其眉間氣色紅赤鮮碧者可治若色黯青黑者不治虎口指紋曲入裏者可治反出引者不治其治法解散風邪利驚化涎調氣貼顙甚則以朱銀九利之面青拳搐者當服保命丹釣藤散

聖童百問 卷三 胎驚風 八

朱銀九

治臍風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎中蘊受之毒亦治驚積但量情用之一方無積字

水銀 一錢 蒸棗子 肉研如泥 白附子 一錢

全蝎 一錢 南星 一錢 朱砂 一錢 天漿子 一錢

牛黃 一錢 蘆薈 一錢 片腦 一錢 鉛霜 一錢

麝香 一錢 直殭蠶 一錢 炒七

右為末粟米糊丸芥子大每服一九薄許

如未通利加至二三九

至聖保命丹

治小兒胎驚內釣腹肚緊硬眠睡不安夜多啼哭及治急慢驚風眼目上視手足抽掣不省人事悉皆主之冷症用此

全蝎 十四個 防風 二錢 殭蠶 炒去絲

天麻 二錢 南星 炮二錢 白附子 二錢 麝香 五分

金箔 十片 蟬蛻 一錢 朱砂 一錢

有熱症加牛黃腦子研砂

聖童百問 卷三 胎驚風 九

右為末粟米糊丸每兩作四十九丸常服鎮心安神化痰除一切驚風諸症湯臨時換一方加人參白茯苓二錢

釣藤散

治吐利脾胃氣虛生風慢驚後二十問有彈足

釣藤飲又二十一問有釣藤飲可兼看對症用

釣藤 三錢 蟬蛻 一錢 天麻 一錢 防風 一錢

蝎尾 一錢 人參 各半 麻黃 去

甘艸 炙 川芎 各二錢 麝香 不拘

右劉散白水煎寒多加附子末半錢

全蝎散 治方傳段驚

全蝎 七个 去尾 蟬退 二十个 甘艸 二錢 炙 南星 一个 炮

右劉散每服二錢水一盞煎五分不拘時溫服

抱龍丸 治小兒諸驚

抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍木水生火謂生我者父母也肝為母心為子母安則子安况心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰抱龍丸理嬰孩諸驚四時瘟疫邪熱致

嬰童百問 卷三 胎驚風

煩燥不寧痰嗽氣急疹疹欲出發搐宜投此其藥性溫平不借不燥常服驅風化痰鎮心解熱和脾胃益精神

琥珀 人參 天竺黃 檀香

白茯苓 各七錢 甘艸 炙 兩半 枳殼 炒 五錢

枳殼 炒 五錢 辰砂 水飛 二兩 山藥 炒 半斤 膽星 炒 一錢

金箔 五十片

右為末蜜丸芡實大每服一九薄荷薑湯下

胎風遍身軟 第二十四問

此症生下如湯火潑因胎熱母肥如腦額生瘡難治乃胎內失于扶持如脚上有瘡爛此兒不滿五年如未滿臘前便撮口兩拳相握腰項如隨便知臟腑中生邪毒此只三朝定不可療男指向裏女指向外皆可醫治逆候則不須投藥餌矣更看眉中有青筋碧色應須有命若眉紅斷不可治如有可治之症但用全蝎散釣藤散等劑

釣藤散

嬰童百問 卷三 胎風遍身軟

治吐利脾胃氣虛生風慢驚後二十問有蟬退釣藤飲又二十一問有釣藤飲可兼看對症用

釣藤勾 三錢 蟬蛻 天麻 防風

蝎尾 人參 各半兩 麻黃 去節 僵蠶 炒

甘艸 炙 川芎 各二錢 半 麝香 不拘 多少

右劉散白水煎寒多加附子末半錢

全蝎散 治諸癩胎癩

全蝎 一个 琥珀 硃砂 各少許

右為末每服一錢麥門冬煎湯調下

1481000 丹黃卷四庫全書 5

又方

亦名全蝎散治急
慢風大能定搐

全蝎

大者七个薄苛葉
包炙黃色為度

殭蠶三个
炒

辰砂

麝香各少
許

右為末石榴皮煎湯下直指用蟬蛻甘艸南星

醉紅散

治小兒急慢驚風涎潮搐盛口眼偏斜諸惡症

天南星

大者一个酒浸淫
紙裏煨熟焙乾

蜈蚣一條
酒炙

白殭蠶

七條炒
去絲青

全蝎七个
去毒 天仙子一字

朱砂

一錢
別研 紫苑一錢 杏仁一錢 龍骨一錢
煨

嬰童百問

卷三

三

防風

一錢 龍膽艸一錢 蟬蛻一錢 百合一錢

牛黃

一錢
別研 白芷一錢 麝香一錢 升麻三錢

大黃

煨四錢 乳酥一兩 白蜜三兩

右件藥先以牛黃麝香朱砂各研為末除酥蜜

外十五味搗為粗末用水一升入銀鍋內煎至

三合以新綿濾去滓却入鍋內入牛黃麝香朱

砂末及酥蜜等以柳篋不住手攪慢火熬如稠

錫方止封固瓷瓶內聽用周歲兒每服一茶匙

大沸湯化下日二三服量兒入小加減

項軟 第二十五問

項軟者乃天柱骨倒也極難調治其患不在心脾此

因曾吐瀉之後亦傷寒無汗失表而然本非久病疔

羸四肢不收卒然而成此疾項軟頭似石面紅唇赤

只因肝膽有熱致令項軟肝受熱風者速與祛風退

熱風者然後用強筋之劑貼項立見安和如此症若

生下便如此乃胎氣不足或驚風後得此乃是寬後

不收名曰五軟果難得藥胎風并病後軟可服錢氏

地黃丸補腎若辛暴如此者只是肝經有熱當服瀉

肝丸貼項常用附子南星末以生薑自然汁調貼項

上可也

瀉肝丸

治肝熱生風眼目上視搖擗急驚可服亦退熱

疎風又名瀉青丸

當歸

龍膽艸

川芎

梔子仁

大黃

羌活

防風

各等分

右為末煉蜜丸如芡實大朱妙竹葉湯化下

地黃丸

治腎疝即急疝腦熱肌削予足如水滑洩腹

熟地黃

山茱萸

去核乾山藥各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

去皮各三錢

右為末煉蜜和丸如梧桐子大三歲以下一二

丸至三九溫水空心化下行遲鶴膝加鹿茸牛

膝五加皮

五軟 第二十六問

五軟者頭軟項軟手軟脚軟肌肉軟是也無故不舉頭腎疝之病項脈軟而難收治雖暫瘥他年必再發手軟則手垂四肢無力亦懶擡眉若得聲陽還進飲食乃慢脾風候也尚堪醫治肌肉軟則肉少皮寬自離弊食不長肌肉可服錢氏橘連丸莫效瀉利頻併却難治療脚軟者五歲兒不能行虛羸脚軟細小不妨榮衛但服參芪藥等味併服錢氏地黃丸長大自然肌肉充滿又有口軟則虛舌出口陽盛更須隄防

橘連丸

治疝瘦久服消食和氣長肌肉

陳橘皮

一兩去髮米

右為細末別研入麝香五分用猪膽七箇分藥

入膽內漿水煮候臨熟以針微割破以熟為度

取出以粟米粥和丸如菉豆大每服至二三十

丸米飲下量大小與之無時

地黃丸

方見前廿五問項軟條下

重訂明 卷三 項軟

五

重訂明 卷三 五軟

五

三

五硬 第二十七問

五硬則仰頭取氣難以動搖氣壅疼痛連胸膈脚
手心如冰冷而硬比為風症難治壯大青筋急而不
寬川去積之劑積氣消即安恐而青心腹硬者此症
性命難保如風症只依中風治之必有回生之理小
續命湯加減治之尤良羌活散等劑皆可用

小續命湯

治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷

麻黃 去節 人參 黃芩 川芎

嬰童百問

卷三 五硬

芍藥 甘艸 炙 杏仁 去皮炒 漢防已

官桂 各一兩半 防風 七錢半 附子 炮去皮臍七錢半

右除附子杏仁外並搗為粗末次入二味夾和

每一錢薑棗煎食前服有熱去附子官桂減半

羌活散

治傷寒驚熱或中風體硬可加麻黃乾葛米仁

川羌活 川獨活 前胡 柴胡

川芎 白茯苓 桂枝 枳殼

人參 地骨皮 天麻 各等分 甘艸 減半

風症風熱 第二十八問

小兒中風者以其血氣未定寒溫失調內則盛熱蘊
蓄外則腠理開虛故風邪乘其外虛而暴中之其狀
昏不知人壯熱狂躁搐掣氣粗口噤涎潮是也心中
風則僵臥不能傾側發熱失音其舌焦赤若汗流唇
赤者可治灸心俞或唇間白黑青黃乃心壞為水或
面目青黑時時竦動者並不治肝中風則踞坐不得
低頭左脇疼痛諸筋攣急頭目轉動上視多怒其目
青若連兩目連額微青唇青面黃者可治灸肝俞大

嬰童百問

卷三 風症

五

段青黑其目黃白不治腎中風則踞坐而浮腰
脊痛引小腹其耳黑若兩脇未有黃色起者可治灸
腎俞或脇間如黃土髮直而齒黃赤者不治肺中風
則僵臥胸滿喘息咳嗽躁汗出其鼻白若目下至
鼻四圍及唇口皆白色可治灸肺俞或色帶黃乃肺
壞為血不治脾中風則踞坐腹滿皮肉攣動四肢不
收其唇黃若一身通黃口吐鹹涎者可治灸脾俞
手足青而厥冷者不治凡人為風邪所中皆宜灸
五臟俞而入風入于頰頰之間則口渴而牙痛

于喉聲音之間則語不出而失音風與氣搏氣逆痰隔則喉間如鼾胎之聲響是風也始入于膚脈次達于經絡而搏于經脈筋得寒則拘急攣痛得熱則緩弛不隨風挾寒邪即攣急也風挾熱氣即緩弛也拘攣脈必浮緊緩弛脈必浮洪寒者小續命湯熱者追風毒利散之類脈浮者病在表脈實者病在裏脈促者病在上在表者散之在裏者利之在上者瀉之若虛而寒者則烏附之類又不可缺古人治法雖以灼艾之類為本亦當消息權度而投劑焉雖然風寒暑溼皆能中人況又有因氣而中風者人之驟病莫急于中風倉卒之際若未能精審且與下氣豁痰益中風皆因痰鬱氣滯而作先用通關散以疏之急以南星生薑木香煎湯調蘇合香丸灌下牙緊者南星細辛末入麝香烏梅肉點擦牙自開進藥之後痰消氣下病勢稍蘇即詳審五臟外症而調理之宜首風湯羌活散勢甚者防風通聖散化風丹牛黃散約藤散至寶丹等劑可選而用之

通關散

治卒暴中風不省人事牙關緊急藥不得嚥下。
細辛 薄荷 牙消 雄黃各等分
右為末每用少許吹入鼻中候嚏然後進藥或用白梅擦牙更以薑蒲末著舌下牙關即開
小續命湯

治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷。
麻黃 人參 黃芩 川芎 芍藥 杏仁 防已 肉桂

甘艸各半兩 防風七錢 附子炮二錢半
搜毒利散治中風內外皆熱
大黃二錢 郁李仁炒二錢 桑白皮炒半兩
檳榔半兩 防風半兩 羌活一兩

右劉散每服二錢黑豆三十粒同煎乳食後服
省風湯治驚風口噤筋脈攣急抽搐疼痛風感痰實旋暈僵仆胸膈煩滿恍惚不定等症
天南星生 防風各四兩 甘艸生用二兩 半夏湯浸一宿二兩
黃芩去粗皮二兩

右劉散每服二錢生薑一片去滓溫服不拘時
羌活散治傷風寒驚熱或中風

川羌活 川獨活 前胡 柴胡

川芎 白茯苓 桔槔 枳殼

人參 地骨皮 天麻各等分 甘艸減半

右剉散生薑薄芎煎不拘時服加蟬蛻治驚熱

防風通聖散

治小兒熱甚驚風或斑疹出不快者更熱劇黑

陷將欲死者或風熱瘡疥久不愈者諸般風熱

防風去蘆 荆芥二錢 川芎半兩 錦紋大黃半兩

當歸半兩 薄荷葉半兩 芍藥半兩 麻黃去根節

芒硝半兩 石膏一兩 黃芩一兩 桔梗一兩

滑石六兩 甘艸二兩 白朮二錢 山梔子二錢

右剉每二錢薑二片水一盞煎七分不拘時服

化風丹祛風化痰退熱定搐

羌活 獨活 防風 天麻

瞻星 人參去蘆 川芎 荆芥

粉艸 全蝎等分 一方加辰砂麝香

右爲末煉蜜丸如芡實大薄荷湯調下一二丸

釣藤散治吐利脾胃氣虛生風

釣藤鈞三錢 蟬蛻 天麻 防風

蝎尾 人參各半兩 麻黃去節 白直殭蠶炒

甘艸各二錢 川芎半兩 麝香不拘

右剉散白水煎寒多加附子末半錢

至寶丹

治諸病急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風

涎搐搦及傷寒狂語伏熱嘔吐並皆治之

生犀屑一兩 生瑤瑁屑一兩 琥珀研細水

雄黃細研 金箔五十片 銀箔五十片

片腦研一錢 麝香研一錢 牛黃研一錢 安息香半兩

未以無灰酒濾去沙石約取一兩慢火熬成膏

右件將生犀瑤瑁屑搗羅爲細末研入諸藥全

調勻將安息膏以重湯煮化和搜爲劑如乾即

添入少熟蜜盛磁器中旋丸如桐子大二歲兒

却服二九人參湯化下大小以意加減又治大

人諸卒中不語中惡氣中諸物毒中熱暗風產

前後血暈死胎不下並用童子小便一合生薑

搗自然汁三五滴同溫過化下五丸立效

痲症 第二十九問

夫發痲之候先傷于風又感寒溼致之此虛極生熱熱極生風之甚者也傷風發熱頭痛汗出又自嘔逆汗之必發痲溼家發汗稍多亦發痲此症項強直腰身反張搖頭瘡癢口噤不語發熱腹痛不惺惺其狀可畏病在足太陽經剛痲無汗柔痲有汗其面紅眼赤牙緊手張痰涎壅盛昏瞶煩渴小便赤澀先譫語而發者此剛痲也無汗當發汗其大便滑洩不語不渴先手足冷而發者此柔痲也有汗當解並以小

續命湯加減剛痲去附子用麻黃柔痲用附子去麻

黃大便利厥逆者則以熟附佐之其間一症身體壯熱譫語口乾手足反微寒大便反滑洩此為剛柔不分之痲無汗葛根湯主之有汗桂枝加葛根湯主之要知無汗則用麻黃有汗則謹勿用也此古方之所禁其若痰塞氣盛則南星半夏茯苓以消其痰枳實陳皮紫蘇以順其氣痰消則風止氣順則神清然後審其熱之輕重而解利之熱輕者敗毒散熱盛者柴胡湯解之壯熱有汗胸滿口禁咬牙而六

是為內實大承氣湯下之後用大柴胡湯解之症最難痊十救其一過三日難治請早圖之

小續命湯 治中風不省人事涎鳴反張失音厥冷

麻黃 人參 黃芩 川芎

芍藥 杏仁 防己 肉桂

甘草 各半 防風 七錢 附子 炮二錢半

右除附子杏仁在外俱為粗末入杏附夾和每

服三錢薑三片棗一枚煎服有熱去附子官桂

減半

續命湯 治中風病項強兀兀惡

葛根湯 治中風病項強兀兀惡

葛根 四兩 麻黃 三錢 肉桂 一兩 甘草 二兩

芍藥 二兩

右剉每服五錢水一盞半加生薑五片棗子二

枚同煎至一盞去滓服取微汗

桂枝加葛根湯 治明瘰項背強兀

桂枝 芍藥 甘草 各六錢 葛根 一兩

右剉散每服三錢生薑棗子煎服

敗毒散

治傷風濕疫風溼頭目昏眩四肢疼痛骨寒壯
熱項強目睛疼尋常風眩拘倦風痰及寒壅咳
嗽鼻塞聲重並治之

柴胡 去蘆 前胡 川芎 枳殼 炒

羌活 獨活 茯苓 桔梗

人參 各一兩 甘草 半兩

右爲粗末每服二錢生薑薄苜煎加地骨皮天
麻或剉散加蟬蛻防風治驚熱可加芍藥乾葛
黃芩無汗加麻黃

小柴胡湯

治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急胸脇滿痛
嘔吐噦逆煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利
大便秘澀或過經不解或潮熱不除及瘥後勞
復發熱疼痛煩熱經血適來適斷寒熱如瘧

人參 去蘆 三錢 甘草 炙 三錢 黃芩 三錢 柴胡 去蘆 八錢

半夏 湯泡七次焙乾 二錢半

右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎
去滓溫服不拘時

大柴胡湯

治剛痊胸滿內實口噤咬牙大熱發渴大便秘

大黃 芒硝 各半兩 厚朴 一兩 枳實 一兩

右剉散每服三錢薑三片水一盞煎半盞溫服

大柴胡湯

治傷寒十餘日邪氣結在裏往來寒熱大便閉
澀腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不
便五六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日
晚發熱兼臍脈有力者可服

柴胡 去蘆 八錢 黃芩 三錢 枳實 去穢 三錢 芍藥 各三錢

半夏 湯泡七次焙乾 一錢半 枳實 去穢 三錢

右剉散薑棗煎加減服之欲下加川大黃三錢

夜啼客忤驚啼 第三十問

夜啼者臟冷也。陰盛于夜則冷動。冷動則為陰極發躁。寒盛作疼。所以夜啼不歇也。鈞藤散主之。或心熱煩啼必有臉紅舌白。小便赤澀之症。鈞藤散去當歸木香加朱砂木通煎湯調下。又有觸犯禁忌而夜啼者。用醋炭熏可服蘇合香丸客忤者。小兒神氣嫩弱外邪客氣獸畜異物暴觸而忤之。其候驚啼口出青黃白沫水穀鮮雜而面色變易喘息腹痛及側辨癢狀似驚癇但眼不上竄脈來弦急而數視其口中懸癰

三夜啼客忤驚啼

左右若小有腫核即以竹針刺潰之。或以爪甲摘破亦佳。治法辟邪正氣散驚定心為上。延久則難為功也。凡客忤中惡急作醋炭或降真香皂角併用熏之。仍服蘇合香丸即自痊愈。治驚啼拘哭。本事方龍齒散主之。又有花火膏亦卒急可用也。論曰心驚神神安則臟和。故小兒晝得精神安而夜得穩睡。若心氣不和邪氣乘之則精神不得安定。故暴驚而啼也。也安神散等劑治之。又有軀啼之症。小兒驚風母將養失宜傷于風冷則邪氣入于胞絡

冷氣停留復因乳哺不節邪氣與正氣相搏故腹痛軀脹。感是氣而啼也。牛黃丸等劑主之。冷甚者理中丸主之。

鈞藤散

治小兒夜啼及臟冷也。陰盛于夜則冷動冷動則為陰極發躁寒盛作疼所以夜啼不歇也。鈞藤散其之。滑驚啼加蟬蛻防風天麻前十六問

有鈞藤散加十問蟬蛻鈞藤飲可兼看對症用。

鈞藤飲

茯苓 茯苓 川芎

蘇合香丸

香為末。每服一錢。薑棗略煎服。其或心熱而煩啼必有臉紅舌白小便赤澀之症。鈞藤飲去木香加朱砂末一錢研和。每服一錢。木通湯調下。或劉散煎服亦可。

蘇合香丸

治傳屍骨蒸。死痰肺痿。疰忤鬼氣。卒心痛。霍亂吐利。時氣瘴癘。赤白暴利。瘀血。月閉。痲痺。驚癇。鬼忤。中太。小兒吐亂。

蘇合香油 入安... 龍腦 別研 薰陸 香

木香 二兩 白朮 二兩 白檀香 二兩 丁香 二兩

沉香 二兩 香附 炒 二兩 烏犀屑 二兩 朱砂 研 水

葶藶 二兩 麝香 研 二兩 安息膏 二兩 別為末 煎

訶梨 取皮 二兩 煨

右為細末 入研藥 勻用安息香膏并煉白蜜和

劑 每服 旋丸如梧桐子大 早朝并花水溫冷 任

意化服 四九溫酒化下 亦得 竝空心服 老人小

兒服 藥丸用蠟紙裹 一丸如彈子大 緋絹袋

當心 藥之 一切邪神不敢近 去龍腦 名麝香 蘇

合丸 治一切邪神 胸膈噎塞 腸中虛鳴 宿飲不

消

龍齒散 治拘攣 肚痛 驚熱

龍齒 蟬蛻 鈞藤 羌活

茯苓 人參 各等分

右剉散 每二錢 薑棗煎服

碧霞散 治小兒 疳身壯 熱夜啼

栝菜 牛兩 南星 僵蠶 全蝎

鐵金 雄黃 各一錢

右為末 和勻 每服一錢 用薄荷蜜水調下

六神散

治腹痛 啼哭 面青 口中冷氣 四肢亦冷 曲腰而

啼 或大便泄瀉 及不吮乳

人參 山藥 白朮 各半 甘艸 二錢

白茯苓 白扁豆 炒 各一兩

右為末 每服二錢 薑二片 棗一枚 煎服 一方用

當歸 白芍 藥人參 各二錢 半 甘艸 桔梗 陳皮 各

一錢 為散 每服二錢 水煎時時服

花火膏 治夜啼 脾臟冷 而痛

燈花 一類 百一選 加硃砂 一

右取塗乳上 令兒吮乳

牛黃丸 治風癩 迷悶 搐掣 涎潮

膽星 全蝎 蟬蛻 各二錢 防風

白附子 生 天麻 直僵蠶 炒 各二

右為末 以煮棗去皮核 取肉和水 銀半錢 研

細入藥末。丸如菽豆大。每服一丸。荆芥生薑湯送下。

理中丸

人參 白朮 乾薑 炮各 甘草 炒 減

右為末。蜜丸。雞子黃大。每服一丸。白湯化下。

安神散

治嬰孩夜啼

蟬蛻 四十九个。只用後一截。除去前一截併脚。

右為極細末。作四服。用釣藤湯調下。不拘時服。

金箔鎮心丹

安神止小兒夜啼

嬰童百問

卷三

手

全蝎 七個。用薄荷包。慢火上炙乾。 天麻 防風

羌活 去蘆 牛黃 赤茯苓 去皮 犀角

甘草 炙各二錢 辰砂 一錢 麝香 半錢 金箔 二十片

右為細末。煉白蜜丸。如皂角子大。薄荷煎湯。不拘時服。

嬰童百問卷之三

嬰童百問卷之四

治疾 第三十一問

胎疾謂月數將滿。母失調護。或勞動氣血相干。或坐臥飢飽。相役或飲酒食肉。冷熱相制。或恐怖血脈相傷。胎氣有傷。兒形無補。有胎熱胎寒。胎黃胎肥。胎弱等症。胎熱則兒在胎中。母多驚悸。或因食熱毒之物。既生之後。兒多虛痰。氣急喘滿。眼目眵泪。神困呵欠。及側伸舒。呃呃作聲。大小便不利。或通利即有血水。寢驚手常拳緊。脚常搐縮。眼常邪視。身常掣跳。皆由胎中受熱。宜速與木蓮翹飲子。解散諸熱。次與消風散。數服無恙。其胎驚胎風。自見本症。茲不贅述。胎寒則兒在胎中。母因感受寒邪。或喜食生冷。過度寒盛。則腸鳴洩利。邪氣以亂其真氣。治寒邪。當用和緩。治胎寒。則溫。胎寒甚。則有盤腸內釣。皆因寒而得之。大便青者是也。各有本症。見之。胎黃候。則小兒生下。遍體面目皆黃。狀如金色。身上壯熱。大便不通。小便如梔子汁。乳食不思。啼叫不止。皆因母熱受而傳于胎也。凡有此症。乳母可服生地黃湯。仍忌熱毒之物。

肥則生下肌肉厚。遍身色紅。滿月以後。漸漸羸瘦。目
 白睛粉紅色。五心煩熱。大便難。時時生涎。浴體法主
 之。胎弱則生下面無精光。肌肉薄。大便白水。身無血
 色。時時哽氣多噎。目無精采。亦當浴體法治之。凡胎
 氣稟賦。有壯有弱。其母飲食恣令飢飽。起止無忌。令
 兒得疾。不寒即熱。不虛即怯。熱乃作壅寒。乃作洩。虛
 則作驚。怯則作結。寒則溫之。熱則涼之。虛則壯。驚怯
 則益衛。驚用安神丸。結用微利。詳審用之。可保無虞。
 不若古人胎教之法。決無諸症。生子必形容端正。爲

嬰童百問 卷四
 世之英傑也

大連翹飲

治瘡疹壯熱。小便不通。諸般瘡癩。丹毒。臍風。

連翹 瞿麥 荆芥 木通

當歸 防風 赤芍藥 柴胡

滑石 蟬蛻 甘艸炙各一錢 山梔仁

黃芩各五分

右剉。每服二錢。加紫艸煎溫服。熱甚加大黃。

消風散

治諸般上攻。頭目昏痛。項背拘急。肢體煩燥。此
 肉蠕動。目眩。旋暈。耳作蟬鳴。眼澀。好睡。鼻塞。多
 嚏。皮膚頑麻。癢瘡。癰疹。小兒虛風。目澀昏困。

白茯苓去皮 羌活去蘆 荆芥穗

防風去蘆 藿香葉 蟬蛻去上 白僵蠶炒去絲

甘艸炙 陳皮去白 厚朴去皮薑汁製

右爲細末。每服半錢。余清調下。薄荷湯亦可。又

治急慢驚風。用乳香。荆芥湯調下。或加雄黃名

雄風散

生地黃湯

治小兒生下。遍體面目皆黃。狀如金色。身上壯

熱。大便不通。小便如梔子汁。乳食不思。啼叫不

止。此胎黃之候。皆因母受熱邪而傳于胎也。凡

有此症。乳母宜服。仍忌酒麪五辛之物。

生地黃 赤芍藥 川芎窮 川當歸酒洗

右剉散。每服五錢水一盞。煎至六分。去滓。產後

亦可服。抹些少入兒口中。

消風散

天麻 二錢 蝎尾 五分 不砂 五分 青黛 三錢

烏梢蛇肉 三錢 酒浸焙 白礬 二錢 麝香 一字

右同研勻。每用三錢水三升。桃枝一握。葉五七枝。同煎至卜沸。溫熱浴之。勿浴背。

之亦良法也。栢子仁散三辛散等劑。傳之尤妙。

辨頰 第三十二問

仲陽謂解頰生下而頰不合。腎氣不成也。表必少笑。發見目白睛多。眇白身瘦者。多愁少喜也。餘見腎虛。國楊氏曰。小兒年大頭縫開解而不合者。腎主髓腦。生於腎。腎氣有虧。腦髓不足。所以頭顱開而不能合。人無之。腦髓如木無根。凡得此者。不遠千里。其間亦多。乃成廢人。設有此症。不可束手待斃。宜與錢氏黃丸。仍用南星微炮為末。米醋調敷于緋帛烘。之亦良法也。栢子仁散三辛散等劑。傳之尤妙。

防風栢子仁等分為末。乳汁調塗頰門上。

地黃丸

熟地黃 山茱萸 去核 乾山藥 各四錢

澤瀉 牡丹皮 白茯苓 去皮各三錢

右為末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服三九。溫湯下。

二辛散 一名封頰散 一名桂枝散 治嬰孩小兒腦顛大開

制辛 桂心 各半 乾薑 一錢

右為末。乳汁調塗頰上。乾時再塗。面赤為效。

顛陷顛填 第三十二則

顛陷者始因臟腑有熱渴飲水漿致成洩利久則血氣虛弱不能上充腦髓故顛陷如坑不能平滿用狗頭骨炙黃為末雞子清調傅之顛填者顛門脈起也脾主肌肉乳哺不常飢飽無度或寒或熱乘于脾家致使臟腑不調其氣上衝為之填脹顛突而高如物堆起毛髮短黃自汗是也若寒氣上衝則牢斬熱氣上衝則柔軟寒者溫之熱者涼之劑量輕重兼與調氣小兒肝盛風熱反攻亦然此症未易退差或熱症鼻大連翹散以消之有表熱症柴胡散主之又有封翹散掩之論曰小兒胃氣冲和則腦髓充盛顛頂漸高若胃氣熱薰蒸臟腑則渴而引飲因致洩利令臟腑虛熱血氣虛弱不能上充腦髓所以顛陷也聖濟總括當歸散地黃丸

大連翹散 治瘡疹壯熱小便不通 諸般瘡癩丹毒疔風

- 連翹 瞿麥 荆芥 木通
- 當歸 防風 赤芍藥 柴胡
- 滑石 蟬蛻 甘艸 山梔仁

黃芩 各五分

右剉每服二錢紫草煎溫服熱甚加大黃五分

藥閉散 治小兒傷寒無汗有表症壯熱頭疼身體痛口乾煩渴小便赤大便燥澀火鬱頭昏

- 石膏 黃芩 甘艸 赤芍藥

葛根 各二錢半 麻黃 去節 柴胡 半兩

右剉散三歲兒每服二錢水一盞生薑一片葱

白三寸煎半盞不拘時服

封顛散 治小兒腦角骨大顛開不合

- 細辛 桂心 各半 乾薑 一錢

右為末乳汁調塗顛上乾時再塗面赤為效

地黃丸 治腎虛腦熱肌削手足如水滑洩肚痛

- 熟地黃 山茱萸 乾山藥 各四錢

澤瀉 牡丹皮 白茯苓 各三錢

右為末煉蜜丸如梧子大每用白湯送下三九

當歸散 治小兒顛門陷下

- 甘艸 炙半 桔梗 陳皮 當歸 各錢

右剉水一盞煎六分服不拘時候

右剉水一盞煎六分服不拘時候

目內症 第三十四問

目內赤者心熱導赤散主之。淡紅者心虛熱生犀散主之。清肝熱瀉青丸主之。淺淡者補之。黃者脾熱瀉黃散主之。無精光者腎虛地黃丸主之。龍木論小兒以關睛候皆因失誤築打損着頭面額角兼倒撲令兒肝受驚風遂使兩眼關睛宜服牛黃丸。口譏血眼宜服生熟地黃散。流行血氣熱毒服小防風湯。風毒服小流氣飲。積毒服小菊花膏主之。斑瘡入眼。决明散。蒙花散主之。又有犀角散石楠散通頂為妙。或瀉後眼如上膜或痘疹入腹眼不能開及諸症眼定無精光難治。

導赤散 治心驚內虛邪熱

生地黃 生甘艸 木通 各等分

石剉散竹葉煎加黃芩赤芍藥羌活燈心煎

瀉青丸 治小兒赤眼多泪睛疼心珠

當歸 川芎 防風 膽草

大黃 羌活 山梔仁 各等分一方用

為末煉蜜丸如芡實大每服一九沙糖湯下

生犀散 治目內淡紅者心虛熱

生犀 錢二 地骨皮 赤芍藥 柴胡

乾葛 兩 各一 甘艸 半兩

右剉每服二錢水一盞煎至七分濾去滓溫服

瀉黃散 淺淡者補之黃者脾熱

藿香葉 七錢 山梔仁 兩 石膏 五錢 甘艸 五錢

防風 四兩 去蘆

右剉散同蜜酒微炒每服二錢水煎服不拘時

地黃丸

熟地黃 山茱萸 乾山藥 各四錢

澤瀉 牡丹皮 白茯苓 去皮各三錢

右為末煉蜜丸如桐子大每用溫湯送下三九

生熟地黃散

治小兒疳蝕眼患閉合不開羞明怕日及內障

生地黃 洗 熟地黃 洗 麥門冬 去心各一兩

川當歸 枳殼 炙炒 甘艸 炙 防風

杏仁 湯泡去皮 赤芍藥 各半兩

右剉每服二錢黑豆七粒煎豆熟為度去滓服

地黃散

治小兒心肝蘊熱目赤腫疼內生赤脈或白膜遮睛四邊散漫者猶易治若暴遮黑睛多致失明宜速用此方亦治瘡疹入眼

生地黃 熟地黃 蟬蛻去頭 木賊艸

穀精艸 生犀末 當歸各二錢半 防風去蘆

羌活 白疾藜去刺 甘艸 沙苑蒺藜

木通各一錢半 黃連去鬚 大黃一錢 玄參半錢

右為細末每服一字或半錢量大小加減煎羊

嬰童百問 卷四 目內症

肝湯食後調下日三忌口將息亦治大人

小防風湯 治小兒熱毒眼患

大黃蒸 山梔子 甘艸炙 防風

赤芍藥 川當歸洗 羌活各等分

右剉每服二錢水一盞煎五分去滓通口溫服

流氣飲 治小兒風毒眼患

蟬蛻去足 甘艸炙 羌活 天麻

當歸 赤芍藥 防風 大黃

薄荷 杏仁各等分

右剉散每服二錢水煎去滓食後通口服
小菊花膏 治小兒積毒眼患

黃連 黃芩 大黃 菊花

羌活 蒼朮米泔浸 荆芥穗 防風各等分

右為細末蜜丸芡實大每服一丸白滾湯化下

決明散 治小兒疹痘瘡入眼

天花粉兩 決明子 赤芍藥 甘艸炙各二錢半

右為細末每服半錢蜜水調下日三

蜜蒙花散 治小兒疹痘并諸毒入眼

蜜蒙花錢一 青箱子 決明子 車前子

右末用羊肝一令破開縫三條摻藥令入

以溼紙七重裹炭火中煨熟空心含之

犀角飲 治眼疾

犀角一兩 射干 龍胆艸 黃芩各等分

鈞藤七錢 人參二兩 茯苓 甘艸炙

右剉散每服二錢水一盞煎至五分

溫服

牛黃丸 治肝受驚風遂使眼目赤腐

牛黃 白附子 肉桂 全蝎

川芎 石膏各二錢半 白芷 藿香各半兩

辰砂 麝香各少許

石為細末煉蜜為丸如梧桐子大臨臥時薄荷湯化下三丸乳母忌食辛辣熱物并溼麪等物

耳病 第三十五問

耳者腎之候小兒腎經氣實其熱氣上衝于耳遂使津液壅滯為膿為汁者也亦有澡浴水入耳中水溼停留梅干而氣醞釀成熱亦令耳膿久而不瘥變而聾耳龍骨散主之又湯氏有五般停耳候停耳者常有黃膿出是也膿耳者常有紅膿出是也纏耳者常有白膿出是也底耳者裏面腥臭囊耳者裏面虛鳴時出膿然五般病源一也皆由風水入耳內有積熱之毒而成若不早治久則成聾胭脂膏等治之仍化痰退熱等劑即愈

龍骨散 治膿耳

明礬 煨

龍骨煨各二錢 黃丹炒一錢半 胭脂 一錢

麝香 一字

右為細末先以綿擦拭去膿汁次以鷲毛管吹藥入耳本方加海螵蛸末尤妙

龍黃散 治小兒聾耳汁出不止

枯礬 龍骨煨 黃丹炒各半兩 麝香研一錢

右同研細先以綿杖子擦却耳中膿水用一字

摻在耳內但用之勿令風入

乾胭脂膏

治小兒時耳常出膿水不止

乾胭脂

白龍骨

白礬

白石脂

研等分

右研如粉用棗肉和丸棗核大以綿裹一丸納

耳中日三換之

金箔散

枯礬

胭脂

各半兩

金箔

七片

右同研令勻為細末日三四度摻少許于耳內

蔓荊子散

治內熱耳出膿汁

升麻

木通

赤芍藥

桑白皮

生地黃

麥門冬

去前胡

甘菊花

赤茯苓

蔓荊子

甘州

炙各等分

右剉散每服三錢薑一片棗二枚水一盞煎六

分食後臨臥服

鼻病

第三十六問○鼻病者黃芩湯

凡牙兒三朝五日六晨一臘忽然吻乳鼻塞不能開

口呼吸者多是乳母安睡之時鼻中出息吹著兒顛

或以水浴洗用水溫冷不避風邪所以致兒鼻塞宜

與通關膏傅之消風散服之或有驚悸作熱薄荷散

與服生者亦佳又有鼻衄是熱搏于氣而乘于血也

肺主一身之皮毛口氣開竅于鼻蘊寒先客皮膚搏

于氣而成熱熱乘于血血得熱而妄行從鼻中出者

名鼻衄也或未及發汗而鼻燥喘息鼻氣鳴即衄治

嬰童百問

卷四

鼻病

七

七

法皆依大方而分劑略輕耳黃芩湯犀角地黃湯

黃芩湯

治下利而頭痛胸滿口苦咽乾或吐或泄

黃芩

一兩

芍藥

一兩

甘州

炙半兩

右咬咀每服三錢棗子一个水一盞煎七

滓瀉服嘔者加半夏一兩二錢生薑三

薄荷湯

治乳下嬰兒鼻塞不通及治夾驚

薄荷葉

半兩

羌活

全蝎

甘州

麻黃

去節

僵蠶

炒去絲嘴

大竺黃

白附子

右為末薄荷湯下。熱極生風。加竹瀝少許。與服。一方有柴胡。白芍。桔梗。茯苓。無全蝎。僵蠶。天竺。黃白附子。

消風散

治諸風上攻。頭目昏痛。項背拘急。肢體煩疼。肌肉蠕動。目眩。旋暈。耳作蟬鳴。眼澀。好睡。鼻塞。多嚏。皮膚頑麻。癢瘡。癩疹。小兒虛風。目澀昏困。

白茯苓 去皮 一兩

川芎 一兩 羌活 去蘆 一兩

荆芥穗 一兩 防風 去蘆 一兩 藿香葉 一兩 白殭蠶 炒 一兩

百問

卷四

六

蟬蛻 去土 一兩 甘草 炙 一兩 厚朴 薑炒 一兩 陳皮 去白 一兩

右為細末。每服半錢。茶清調下。

風搐

風搐。關竅不通。皆由痰塞中脘。留滯百。痰之所以潮塞者。氣實使之。

麝香 一兩 猪牙皂角 略燒存 性二錢

赤 一兩 直僵蠶 炒 去絲 一錢

右為末。以十點薑汁。蘸藥少許。擦牙。或用物引。

右為末。以十點薑汁。蘸藥少許。擦牙。或用物引。

口瘡 鵝口重膠 第三十七問

鵝口。口候者。小兒初生。口裏白屑。滿口。舌上如。鵝之口。故曰鵝口也。此乃胎熱。而心脾最盛。薰發于。口。易氏用髮。纏指頭。蘸井花水。揩拭之。睡時以黃。丹。燻出火氣。搽于舌上。小兒初出腹。有連舌。舌下有。膜。如石榴子。中隔連其舌。下後。令兒言語不發。不。也。可以瓜甲。摘斷之。微有血出。無害。若血出不止。可。以髮作灰末。傅之。血便止也。用保命散。枯白礬。一錢。三。齒牙。硝半錢。硃砂一分。同研細。取白鵝糞。以水攪。調塗舌上。頰內。先用髮纏指。揩拭舌上垢了。然後用藥傅之。口瘡。候乃小兒血氣盛。兼將養過溫。心臟積熱。薰蒸于上焦。故成口瘡也。宜用南星末。淡。醋調貼兩脚心。乳母宜服洗心散。却用洗心湯。傅口。之法。用黃連末。以蜜水調抹口中。黃蘗。青黛。冰片。皆。可。又以牛黃少許末之。竹瀝調塗口內。治鵝口。以馬。牙。硝如豆許塗亦好。或口如魚口。不能合。或作鴉聲。者難治。又有小兒初生。上腭有物。脹起如懸。或如。瘡。瘡。溢水之狀者。名曰重膠。此乃脾胃挾熱。血氣不。

能收飲頰中...或在腮頰如吹小脬速宜以綿纏
長針微露鋒銳刺腫處決出惡汁即消若再生宜再
刺不爾則脹滿口中有妨乳食呼吸也。

保命散

治小兒口裏白屑滿舌上如瘡。

枯礬 一錢 牙硝 半兩 朱砂 半錢

右同研細每服一字。取白鵝屎以水攪取汁調
塗舌上頰頰內未用時先以手指纏亂髮拭去
上垢然後使藥傳之。

吳茱萸散

治初生兒啼乳後口內即生白屑頰頰

百問

卷四 口瘡口重唇

太

吳茱萸不拘多少醋調傅兒脚心內退即去之
心有客熱口生瘡以南星末醋調傅脚心茱萸
散亦治口瘡即洗去之。

蓋心散

治風壅壯熱頭目昏痛痰涎壅滯涕唾稠黏心
神不寧眼澀睛疼及鼻塞聲重咽乾多渴五心
燥熱小便黃赤大便秘澀宜服之。

白朮 一錢

甘艸 炙

當歸

荆芥穗

麻黃 節 不去

芍藥

大黃 切焙各六錢

右劉散每服四錢生薑薄苧湯去滓乳母服或

兒服加前胡生地黃辰砂名辰砂七寶散為末

治小兒口瘡積熱夾驚傷寒生薑薄苧調下一

錢二十問內有七寶洗心散可兼看對症用

辰砂七寶散

治小兒壯熱傷風壅熱治夾驚傷寒解諸般熱

亦治疹痘熱治驚風定搐搦

麻黃 去節 白朮 當歸 大黃

赤芍藥 荆芥 前胡 生地黃

百問

卷四 口瘡口重唇

太

右為末傷風發散用生薑薄苧前急驚加辰砂
薄苧調下兩局方洗心散亦可。

瀉心散

治心中痰氣實則氣行澀合臥則氣不通故喜
仰臥則上下通也用黃連一兩去鬚為末每服

半錢或一錢臨臥時溫水下。

牛黃散

治小兒疳積重腫腫痛口中涎出。

牛黃 龍腦 丹砂 各二錢半 鈔霜 半兩

太陰玄精石 一兩

右爲末。每服半錢。先于腫處針破出血。鹽湯拭口。搽藥在內。

一捻金散 治小兒驚口口瘡

雄黃 三錢 硼砂 一錢 甘艸 半錢 片腦 少許

右爲細末。乾搽患處。或用蜜調塗。

爲氏方 治小兒驚口

黃丹 味炒黑水飛研細。搽舌上。卽愈。仍服消

毒飲。

犀角消毒飲

治嬰孩小兒風毒赤紫丹瘤壯熱狂燥睡臥不安。胸膈滿悶。咽喉腫痛。九道有血妄行。遍身丹

毒。

牛旁子 炒一兩半 荆芥穗 五錢 甘艸 二錢半 防風 二錢半

犀角 一錢半

右剉散。用水煎。不拘時服。

重舌木舌弄舌 第三十八回

巢氏云小兒重舌者。心脾俱有熱也。心候于舌而主血。脾之絡脈出于舌下。若心脾有熱。則血氣俱盛。附于舌根。重生壅出如舌而短小是也。有者頰裏及上腭者。名曰重腭。若齒齦者。曰重齦。皆當刺去其血。用真蒲黃傅之。或髮灰或馬牙硝。或硼砂。或焰硝。傅之。或竹瀝浸黃藥點之。亦好。又木舌症。舌者心之候。脾之脈絡于舌也。臟腑壅滯。心脾積熱。熱氣上衝。故令舌腫。漸漸脹大。塞滿口中。是爲木舌。若不急療。必致

重舌木舌弄舌 第三十八回

辛

害人。用朴硝二分。紫霜一分。白鹽半分。同研。每半錢。竹瀝并花水調傅。不用朴硝及鹽亦可。又方用黃藥花研細。黃丹伴之。同研點七次。又舌脹滿口。單用水片點之。亦妙。又弄舌者。脾臟微熱。令舌絡微緊。時時舒舌。治之勿用冷藥。下之當少。與瀉黃散漸服之。亦或飲水。醫疑爲熱。必冷藥下之。非也。飲水者。脾胃虛津液少也。又加面黃肌瘦。五心煩熱。卽爲疳瘦。宜胡黃連丸輩。大病未愈。用藥後弄舌者。凶。又有舌上白胎。并黑色者。用硼砂爲末。搽之。熱甚者。加冰片。或單

用黃丹如豆許以按舌下尤妙

馮黃散

藿香葉七錢 山梔仁兩 石膏五錢 甘艸五錢

防風四兩

右剉散同蜜酒微炒香每服二錢水煎服

胡黃連丸

川黃連兩 胡黃連兩 朱砂一分

將二連為細末入朱砂末填入猪膽內用淡水煮以杖子銚子上用綿鈞之勿著底候一炊久

嬰童百問

卷四

五

取出研入蘆薈麝香各一分飯和丸如麻子大每服五七丸至一二十九食後米飲下一作食

前治痲症有熱者

液散

治嬰孩小兒驚口重舌口瘡

青黛一錢 朴硝一錢 冰片少許

右為細末蜜調以鷺翎少許傅上

字散

朱砂冰片各少許蜜調鷺翎刷口內嚥下無妨

齒痛 第三十九問

聶氏云稟受腎氣不足者即髓不強蓋骨之所絡而為髓髓不足故不能充于齒所以齒生遲也宜用芎藭乾地黃山藥當歸芍藥甘艸各等分研末用熟水調服或時以藥末擦齒齦齒即生也

芎黃散 治齒生遲此方主之

川芎五錢 山藥 當歸炒 芍藥炒

甘艸各二錢半

右為細末用白湯調化食後服將乾藥末擦齒

嬰童百問

卷四

五

喉痺腮腫 第四十節

巢氏云。此二症乃風毒之氣。客于咽喉與血氣相搏。而結腫成毒。熱入于心。即煩亂不食而死。此候急用金星丸下之。治小兒咽喉腫疼。當用升麻馬牙硝礪砂牛黃等劑。連翹湯不可缺也。連翹漏蘆湯亦可服。

金星丸

治小兒風熱壅盛。喉中痰鳴。嗽喘氣粗。面頰紅。

腮赤腫疼。咽喉壅塞。目閉不開。多眠發熱。狂言。

嬰童百問

卷四

喉痺

五

煩燥多渴。則生驚風。大便不通。小便如血。諸般。

熱壅瘡瘻。煩燥。宜服之。

鬱金

雄黃各二錢 膩粉半錢 巴豆七粒

右為末。調勻。醋糊為丸。麻子大。薄荷湯下。

連翹漏蘆湯

治小兒癰瘡丹毒瘡癤。咽喉腫痛。腮腫。

漏蘆

麻黃去根 連翹 升麻

黃芩

白欬各一錢 甘艸 枳殼各半錢

右為粗末。每服一錢。以水一小盞煎。

浮量兒大小不拘時溫服。熱甚加大。

連翹湯

治瘡疹壯熱。小便不通。諸般瘡癤。丹毒。臍風。

連翹 瞿麥 荊芥 木通

當歸 防風 赤芍藥 柴胡

滑石 蟬蛻 甘艸各一錢 山梔仁

黃芩各五分

右剉細。每服二錢。加紫艸煎。溫服。熱甚加大黃。

更詳症加減。

嬰童百問

卷四

喉痺

五

清涼飲子

治小兒百病。變蒸客忤。驚癇壯熱。痰涎壅盛。煩。

悶。頰赤。口乾。煩渴。項頸結熱。頭面瘡癤。肚中熱。

痛。更四十四問。有。四順清涼飲。可詳症通用。

大黃 連翹 芍藥 羌活

當歸 防風 甘艸 山梔仁各等分

右剉散。每服二錢。水半盞。煎三分。去滓。不拘時。

服。

嬰童百問卷之四

嬰童百問卷之五

語遲 第四十一問

巢氏云小兒四五歲不能言蓋人之五臟以心之聲為言所不能言者由在胎時其母卒有驚怖內動于兒臟邪氣乘于心故令心氣不足而不能言也宜服錢氏葛蒲丸以意加減入服取效

葛蒲丸

治小兒心氣不足五六歲不能言心之聲為言

兒稍長合語而遲由妊娠時其母驚怖內動于

兒臟邪氣乘于心使心氣不足舌本無力故令

語遲

石菖蒲

丹參

天門冬去心焙各一錢

赤石脂

人參去蘆半兩

右為末煉蜜丸如麻子大食後溫水下二十九

聖濟總錄有黃連

帶頤 第四十二問

巢氏云小兒帶頤者涎流出而漬于頤間也此由脾冷涎多故也脾之液為涎脾胃虛冷不能收制其津液故流出漬于頤也張氏溫脾丹主之一法百藥煎含嚙其涎自不出亦截法也益黃散亦治此症溫脾散亦可服

張漢溫脾丹 治帶頤

半夏麴

丁香

木香各一兩

乾薑

白朮

青皮

陳皮各半兩

右為末糊丸如黍米大二歲十九二歲二十九

大小加減米湯下

溫胃散

治帶頤者涎流出積于頤上此由脾冷涎多故也

半夏泡

人參

甘艸

乾薑

肉豆蔻

白朮各半兩

丁香一兩

右為末每服二錢生薑三片煎食前溫服

益黃散

治小兒吐瀉脾虛不食米穀不化困倦力少

腸夜起并疳虛盜汗并治涎唾流頤下常連名

滯頤

陳皮

去白 一兩 丁香 二錢 用木香

訶子 炮去核

青皮

去穢 五錢 甘艸 炙各

右為末每服二錢水煎二分食前服

龜背龜胸鶴膝行遲

第四十三問。於羊角九治五六歲不步

仲陽云龜胸者乃肺熱脹滿攻于胸膈即成龜胸又乳母多食五辛而成此疾龜背者兒生下客風吹脊入于骨髓即成龜背治以龜尿點其背上骨節取尿之法當放龜于荷葉上候龜眼四顧急用鏡照之其尿自出聖惠論小兒龜胸者緣肺熱氣脹滿而成此疾乳母多食辛辣之物亦成此候或乳母有宿乳孔兒亦成此疾常捏去宿乳則無此症也當用聖惠龜背丸治之聖惠論龜背者小兒初生未滿半周強令早坐遂使客風吹脊故令背高如龜之狀也有灸法可療當灸第三椎骨下兩傍各一寸半肺俞穴又第五椎骨下兩傍二寸半心俞穴又第七椎骨下兩傍各一寸半膈俞穴以小兒中指節為一寸艾炷如小麥大粗三五壯而止又有鶴膝證小兒稟受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節三露如鶴之膝抑亦腎虛而得之錢氏地黃丸加鹿茸以補腎氣又有行遲之症乃血氣不充則髓不滿骨故軟弱而不能行抑亦肝腎俱虛而得之肝主筋筋弱而不能束也地黃丸

第1009冊 續修四庫全書

加牛膝五加皮及酒炙鹿茸又有五加皮散治之
治龜胸有龜胸丸以散其熱松蘿丹百合丹治龜胸
龜背尤佳

龜胸丸

治小兒龜胸龜背緣肺熱氣脹滿而漸成此疾
乳母多食辛辣之物亦能成此症

大黃煨一錢 天門冬去心 百合 杏仁去皮尖炒

木通去節 枳殼麩炒 桑白皮蜜炙 甜葶藶炒

朴硝各五錢

嬰童百問

卷五

五

右為細末煉蜜丸如芡實大每用一九溫湯化

服食後

枳殼防風丸

枳殼麩炒 防風去蘆 獨活去蘆 大黃煨

前胡去蘆 當歸 麻黃去節各一錢

右為細末麩糊丸如黍米大每服十九米飲食
後服

腹痛

夫腹痛者多因邪正交攻與穢氣相擊而作也
而痛者必面赤或壯熱四肢煩手足心熱見之
而痛者必面色或白或青手足冷者見之冷甚而變
症則面黯唇口俱黑爪甲皆青矣熱症四順清涼飲
加青皮枳殼冷症七氣湯加辣桂調蘇合香丸若邪
正交攻冷熱不調桔梗枳殼湯加青皮陳皮木香當
歸為妙若內吊等症則釣藤散其餘則芍藥甘艸湯
為要藥也實痛有熱者大柴胡湯主之心腹痛甚有
實熱者大承氣湯下之腹痛桂枝加芍藥痛甚桂枝
加大黃也

四順清涼飲

治小兒血脈壅實臟腑生熱頰赤多渴五心煩
燥睡臥不安四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失
度令兒血氣不順腸胃不調小便少大便澀或
溫壯連滯欲成伏熱或壯熱不歇欲發驚癇又
治風熱結核頭面瘡癩目赤咽痛瘡疹毒一切
壅滯並宜服之治挾熱瀉不止加木香大黃

赤芍藥 當歸 甘草 大黃各等分

右剉散三歲以上每服二錢水一盞煎至七分

作兩服欲利小便用赤芍藥虛熱加甘草不利

減大黃冒風邪加去節麻黃中風體強眼睛上

視加獨活量兒大小虛實加減微瀉利為度可

加荆芥更四十問內有加味清涼飲子可詳症

通用

七氣湯

治七氣所傷痰涎結積心腹亦痛不能飲食

嬰童百問

卷五 腹痛

七

半夏

製五兩

人參

辣桂

各二兩

甘艸

半兩

三

右剉每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎六分

食前服

指迷七氣濕

治七情相干陰陽不升降氣道壅滯攻衝作

青皮 陳皮 桔梗 蓬朮

辣桂 益智仁各一兩 香附子一兩

甘草 半夏製各七錢半

右剉每服三 水一盞薑三片棗一枚煎七分

不拘時服

異香散

治小兒諸般吊症角子反張胸高臍凸用透明

沒藥一味為末薑湯調下一錢七

桔梗枳殼湯 治諸氣痞結滿悶腹脇疼痛

枳殼炒 桔梗各二兩 甘艸半兩

右剉散每服四錢水一盞薑五片煎至半盞服

釣藤散

治小兒夜啼乃臟冷也陰盛于夜則冷動冷動

嬰童百問

卷五 腹痛

八

則為陰極發躁寒盛作疼所以夜啼不歇也釣

藤散主之治驚啼加蟬蛻防風天麻煎十六問

有釣藤散又二十問蟬蛻釣藤飲可參看兼用

釣藤鈞 茯神 茯苓 川芎

當歸 木香 甘艸 白芍藥各一錢

右為末每服一錢薑棗略煎服其或心熱而煩

啼必有臉紅舌白小便赤澀之症釣藤飲去木

香加朱砂末一錢研和每服一錢木通湯調下

或剉散煎服亦可

保命丸

治小兒胎驚內吊腹肚緊硬眠睡不安夜多啼哭及治急慢驚風眼目上視手足抽掣不省人事悉皆主之冷症用此

全蝎十四个 去毒 防風二錢 僵蠶炒六分

天麻各二錢 南星炮 白附子 麝香五分

金箔十片 蟬蛻 朱砂各一錢 如有熱症加

牛黃 冰片 硃砂

右為末。梗米糊丸。每兩作四十九丸。常服鎮心安

嬰童百問 卷五 腹痛 九

神化痰除一切驚風諸症湯臨時換一方加人

參白茯苓各二錢

芍藥甘草湯 治出疹肚疼腹滿小便不通

芍藥 一兩 甘草 二錢

右剉散每服三錢水一盞煎至七分不拘時服

大柴胡湯

治傷寒十餘日邪氣結在裏往來寒熱大便秘澀腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大便五六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日

晚發熱兼臍膈實脈有力者可服

柴胡去蘆八錢 黃芩 赤芍藥各三錢

半夏湯泡七次切片 枳實去穢炒一錢

右剉散薑三片棗二枚水一盞煎七分加減服

之欲下加大黃半兩

桂枝加芍藥湯

治太陽病反下之因腹痛是有表復有裏宜服

桂枝半兩 芍藥三兩半利者先煎三四沸 生薑一兩

大棗 六个 甘草 炙一兩

嬰童百問 卷五 腹痛 十

右哎咀水煎加減服痛甚者加大黃大實者加

一兩半贏者減之

大承氣湯

治剛痙胃滿內實口噤咬牙大熱發渴大便閉

瀝腹中痞痛結硬如石轉矢氣者用此湯下之

大黃半兩 芒硝半兩 厚朴一兩 枳實二枚

右剉散每服三錢薑三片水一大盞煎至七分

不拘時或空心服以利為度未利再投

桂枝加大黃湯

治太陽病反下之因腹滿痛屬太陰桂枝加芍

藥主之。大實痛者桂枝加大黃湯主之。

桂枝

三錢

芍藥

一兩

甘草

炙半兩

大黃

半兩 虜

加咬咀薑三片棗二枚每服五錢水一大盞煎

至七分溫服

腹脹 第四十五調

腹脹有虛有實皆由脾胃氣攻所作也實者悶亂滿滿可下之紫霜丸白餅子其不喘者虛也不可下若誤下致脾虛氣上附肺而行肺與脾子母皆虛脾主胃胞臍腹腫也脾主四肢母氣虛甚即黃也治之用塌氣丸漸消之未愈漸加丸數然脾虛氣不運動故腹脹而不喘可以散藥治之使上下分清其氣即愈也又有疝氣積脹用枳九子治之又有癥瘕痞脹三稜丸主之有實熱脹滿者大承氣湯主之一法用五更散吞紫霜丸量虛實用丸數亦妙熱輕者大柴胡湯治之

枳九子 治小兒疝積腹脹

蘿蔔子

一兩 微炒

陳皮

青皮

檳榔

五靈脂

蓬朮

煨

赤茯苓

黑牽牛

取半末牛生半炒

木香

二錢

右為末麩糊丸如棗豆大每服十五丸蘇葉泡

湯送下

紫霜丸

治變發熱不解并傷寒瀉壯汗後不歇胸中
有痰癰乳哺不造乳則吐呢先寒後熱者又治
食積乳哺失節宿滯不化或因食而發癰大便
酸臭並宜服之

代赭石 煅醋淬 七次

赤石脂 各一錢

杏仁 五十枚 去皮尖

巴豆 三十枚 去皮 膜心出油

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代

赭石脂末研勻以湯浸蒸餅為丸如粟米大一

歲服五九米飲吞下一二百日內兒三九乳汁

嬰童百問

卷五 腹脹

三

下更宜量其虛實加減微利為度此藥兼治驚

痰諸疾雖下不致虛人

白餅子

治小兒夾食傷寒其症發熱嘔吐亦有肚疼者

暖氣辨得分曉先用此藥一服推下食積却用

平和藥發散調治如惺惺散加減參蘇散皆可

服却不可服冷藥

滑石

南星

半夏 各一錢

輕粉 五分

巴豆

二十四個 去皮膜用 片煮乾研細

右三味搗羅為末入巴豆霜次入輕粉又研勻
却入餘藥末令勻糯米飲丸如棗豆大量小兒
壯瘦虛實用藥三歲已下每服三九至五九紫
蘇湯空心下忌熱物若三五歲兒壯實者不以
此拘加至二十九以利為度

塌氣丸

治小兒疳氣腹脹喘急并目浮腫

丁香 一錢

胡椒 一錢

子 炒

白牽牛 生各二錢

右為末麩糊丸如小豆大二歲三九米湯下

嬰童百問

卷五 腹脹

七

三稜煎丸

治小兒嬰孩食傷生冷糊膩毒熱等物脾胃積

滯久不化令兒壯熱脚冷痞癰寒熱及療癥

瘕中脘不和膨脹上膈氣壅心腹不得宣通所

以作疾此藥溫良但是諸積滯食不化並宜服

京三稜 煮蓬水 各半兩

芫花 一分 醋炒

醋炙焦

淡豆豉 二錢

巴豆 二粒

川當歸 半兩

杏仁 炒三錢 去皮尖

右將三稜蓬水芫花醋煮令乾剉碎炒為

細末次入當歸末又入杏仁巴豆淡豉和勻水

煮白麩爲丸麻子大每服二十九生薑湯下大
小加減服之

大承氣湯

治剛痊胸滿內實口噤咬牙大熱發渴大便澀

大黃 芒硝各半兩 厚朴一兩 枳實二枚

右剉散每服三錢薑三片水一盞煎七分溫服

五苓散

治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾

煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表

嬰童百問

卷五

腹瀉

五

解煩渴不止又治霍亂吐利躁渴飲水不徹

澤瀉二兩 猪苓一兩 白朮一兩 茯苓一兩

肉桂一兩

右爲細末每服二錢熱湯調下不拘時服訖多

飲熱湯有汗出即愈又治瘧熱在裏身發黃疸

濃煎茵陳湯下食前服疸病發汗發渴及中暑

引飲亦可用米調服小兒加白朮末少許如發

虛加綿黃芪人參末少許

大柴胡湯

治傷寒十餘日邪氣結在裏往來寒熱大便秘

澀腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大

便五六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日

晚發熱兼臍腹實脈有力者可服

柴胡去蘆八錢 黃芩三錢 赤芍藥三錢 枳實去穢一錢

半夏湯泡七次切片

右剉散薑棗煎加減服之欲下加大黃半兩

下積丸

治乳食傷積心腹脹滿氣粗壯熱或瀉或嘔

嬰童百問

卷五

腹瀉

六

丁香二十粒 砂仁二十粒 史君子五粒 烏梅三個

巴豆三粒不

右爲末爛飯丸麻子大每服三九陳皮湯下

五珍丸 治酒食積通用

青皮 乾薑燒存性 蓬朮 五靈脂各一兩

巴豆肉去牛油

右爲末粳米飯丸麻子大每服三五丸米湯下

腹中有癖 第四十六

癖者血膜包水側僻于脇旁時時作痛也惟癖為能發潮為能生寒熱故瘧家多畜黃水日久而復結癖于中皖寒熱不已有是疾者以此小兒臟腑和平禁衛調暢則津液自然流通縱使多飲水漿不能為病惟失哺失調三焦關格以致水飲停滯腸胃不能宣通如冷氣搏之則結聚而成癖輕者用積滯木香丸重者用取癖丸仲陽云腹中有癖不食但飲乳是也當漸用白餅子下之如不蚤治則不能食脾胃虛弱嬰童百問 卷五 腹中有癖 五

木香丸

治吐乳瀉乳其氣酸臭由啼叫不已以乳與兒停滯不化是為乳積肚硬熱渴吐瀉由飲食無度過飽即睡是為食積腹痛啼叫利如蟹渤由觸忤其氣榮衛不和淹延日久是為氣積瘧後肚內結癖成塊

- 木香 二錢 蓬朮 二錢 砂仁 二錢 青皮 去蘂 二錢
- 硃砂 二錢 代赭石 二錢 大丁香 二錢 豆 二錢 去油

右為細末和勻飛白麩糊和九麻子大每服二

三九乳傷乳汁下食傷米飲下

取癖丸 治小兒癖塊大痛用之如應

甘遂 二錢 芫花 二錢 黑牽牛 半炒半生磨 二錢 收末 二錢

辣桂 二錢 蓬朮 二錢 青皮 去蘂 二錢 木香 二錢

桃仁 二錢 五靈脂 二錢 巴豆 去油 一錢

右為末研和十分細嫩飛白麩糊丸麻子大每

服一二九葛蜜煎湯灌下洩後冷粥補仍和

挨癖丸 治乳癖殺癆腹中塊

青皮 去蘂 三錢 木香 三錢 蓬朮 三錢 生地黃 三錢

代赭石 大煨醋研 三錢 巴豆 壓去油 一錢

右為細末醋麩糊丸麻子大每服二九食後

湯下

檳榔丸 治小兒傷食得之痛刺胸膈心胸煩悶欲食不下吐逆惡心久不醫治漸成痞癖

檳榔 五錢 木香 炒裹煨 三錢 青皮 五錢 去蘂 三錢

三十粒去殼 陳米 半合炒法亦用 一

右為細末蒸餅丸如黍米大用米飲食前服丸

數多少量兒大小虛實加減

北柴胡散 治小兒因傷血得之胸膈悶痛引小

北柴胡 三錢 人參 三錢 木香 三錢 枳殼 三錢

京三稜 三錢 檳榔 三錢

右為細末，陳皮煎湯調食，遠服。

褐九子 治小兒因傷氣得之心腹膨脹肚大腸痛

陳皮 五錢 青皮 五錢 三稜 五錢 蘿蔔子 炒五錢

蓬莪朮 五錢 木香 一錢 胡椒 一錢 黑丑 炒取頭末三錢

右為細末，麩糊丸如黍米大，生薑三片泡湯送

下二三十丸

嬰童百問 卷五 腹中痛 九

七香丸 治小兒因傷積得之其症如腸瀉之疾便

木香 一錢 丁香 一錢 八角茴香 炒一錢

枳殼 一錢 三稜 一錢 青皮 一錢 蓬莪朮 一錢

用巴豆七粒去殼同炒赤色不用巴豆

右為細末，煮糊丸如黍米大，每用三十九米飲

空心服

痞結 第四十七訓

痞者寒也，結者實也。熱氣蘊于胸膈之間，留飲聚于腹脇之內，于是榮衛不能流行，臟腑不能宣通，由脹滿而致痞結，勢使然耳。此實熱之症也。時或發為壯熱，聖惠甘遂散主之。此藥治小兒痞結，雖服湯藥，時暫得利而滯實不去，心下堅脹，按之即啼，內有伏熱，諸候併成，此疾宜疎利大便，破結散氣，後宜常服進食丸。

聖惠甘遂破結散

治小兒心膈痞結，難聚痰火

嬰童百問 卷五 痞結 十

甘遂 麩裹煨令黃 青皮 半兩 黃芩 半兩

川大黃 煨半兩

右為粗末，每服一錢，水一盞，煎至六分，去滓，溫

和服，量大小加減，得通利則止，後以冷粥補之

進食丸

治乳食不消，心腹脹滿，壯熱喘相，嘔吐痰逆，腹

鳴泄瀉，米穀不化，或下痢赤白，腹痛後重，及食

癥乳癖，疔氣痞結，並皆治之。小兒胸膈熱實，復

內有留飲，致冷榮衛痞塞，臟腑之氣不得宣通。

其病腹內氣結脹滿或壯熱凡有此疾當疎利
大便破結散氣宜常服之

巴豆霜

硃砂 五錢 枳殼 炒 五錢 常歸 米泔浸

代赭石

水香 五錢 麝 少許

右為末麩糊為丸如麻子大一歲兒一九溫米
飲下更量虛實加減食後服治食積發熱羸瘦
肚大青筋疳積肚疼哺露

四
卷五

七

積痛 第四十八

仲陽云積痛口中氣溫面色黃白目無精光或白睛
多及多睡畏食或大便酸臭者膏糜積而痛自除宜
消積丸甚者白餅子下之後胃氣不和用白朮散小
沉香丸感應丸治之又有食積肚痛有熱者芍藥甘
湯湯加乾葛吐者加半夏生薑或加枳實亦效
消積丸

治乳食傷積心腹脹滿氣粗壯熱或瀉或嘔

丁香

砂仁 二十粒 史君子 五粒 烏梅 三個

嬰童百問

卷五

七

右為末爛飯丸麻子大加巴豆三粒去盡油同
丸每服三九陳皮湯下

白餅子

治小兒夾食傷寒其症發熱嘔吐亦有肚疼者
暖氣辨得分曉先用此藥一服推下食積却用
平和藥發散調治如惺惺散加減參蘇飲皆可
服却不可服冷藥

滑石

南星

半夏

輕粉 五分

巴豆

二十四粒去皮膜用
酒煮乾研細如泥

右三味搗羅為末入巴豆霜次入輕粉又研勻却入餘藥末令勻糯米飲丸如菉豆大暈小兒壯瘦虛實用藥三歲已下每服三九至五九紫蘇湯空心下忌熱物若三五歲兒壯實者不以此拘加至二十九以利為度

錢氏白朮散 治瀉瀉兼吐瀉

人參 二錢 白茯苓 半兩 白朮 半兩 藿香葉 兩
木香 二錢 甘艸 一錢 乾葛 半兩 湯者加一兩

右剉水煎發熱甚渴者去木香肚痛加白芍藥

聖童百問 卷五 積滯 三法

小沉香丸 和中順氣嗜食消痰

砂仁 煨四錢 蓬朮 煨四錢 香附 炒一兩 甘艸 炙一兩
沉香 六錢 甘松 三兩 益智 炒一兩 舶上丁香皮 二兩

右為細末湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服三十

九或四十九食後溫生薑湯下或嚼破更妙

芍藥甘草湯 治傷寒脈浮自汗出小便頻數微惡寒脚掣急拘疼及治肚腹胸膈大瀉

白芍藥 兩 甘草 一兩

右剉散每服三錢水二盞煎至八分不拘時服

積滯 第四十九問

小兒有積滯而目黃腫肚熱脹痛覆睡多困酷啼不食或大腸閉澀小便如油或便利無禁糞白酸臭此皆積滯也然有乳積食積須當明辨之吐乳瀉乳其氣酸臭此由啼叫未已便用乳兒停滯不化而得之是為乳積肚硬帶熱瀉瀉或嘔此由飲食無度多餐過飽飽後即睡得之是為食積腹痛啼叫利如蟹勃此由觸忤其氣榮衛不和淹延日久得之是為氣積合用木香丸主之檳榔丸亦可用大小便閉者神芩聖童百問 卷五 積滯 三法 九妙甚是齊推氣亦佳冷症下積五珍丸亦可用

木香丸

治吐乳瀉乳其氣酸臭由啼叫不已以乳與兒

停滯不化是為乳積肚硬熱瀉吐瀉由飲食無

度過飽即睡是為食積腹痛啼叫利如蟹勃由

觸忤其氣榮衛不和淹延日久是為氣積瘧後

肚內結癖成塊

木香 二錢 蓬朮 三錢 砂仁 二錢 青皮 去白

硃砂 研細 代赭石 二錢 大丁香 錢一 巴豆 壓去注

右爲細末和勻。飛白麩糊和丸。麻子大。每服二三丸。乳傷乳汁下。食傷米飲下。

木香檳榔丸

疎導三焦。寬利胸膈。破痰逐飲。通潤大腸。

郁李仁去皮 皂角去皮 半夏麩炒 枳殼麩炒

青皮去穢 杏仁麩炒 木香不見火 檳榔各一錢

右爲細末。別用皂角四兩。用漿一椀。搓揉熬膏。更入熟蜜少許。丸如梧桐子大。每服十九。小兒服可丸如菜豆大。食後生薑湯送下。

嬰童百問

卷五 積痛

三五

神芩丸

治風熱壅滯。頭目昏眩。口舌生瘡。牙齒疳蝕。或偏身瘡疥。咬牙驚惕。怔忡煩躁。多渴。或大小便澀滯。或積熱腹滿。驚風潮搐。並皆治之。

大黃生 黃芩各二兩 滑石四兩 生牽牛末一兩

滑石四兩 黃連 薄荷葉 川芎各半兩

右爲細末。滴水丸。桐子大。每服四五十九。食後溫水下一方。加蒲黃。止血症用。

是齊推氣丸

治三焦痞塞。氣不升降。胸膈脹滿。大便閉澀。小便赤少。

大黃 陳皮 檳榔 枳實小者去穢

黃芩 黑牽牛各等分

右爲細末。煉蜜丸。如菜豆大。臨臥溫熱水下。三十九。量虛實加減。

檳榔丸

治小兒疳氣。腹脹。胸膈痞悶。喘急不安。

青皮去穢同巴豆 蘿蔔子 香附子炒

嬰童百問

卷五 積痛

三五

木香各一兩 黑牽牛牛兩

右爲末。生薑自然汁煮麩糊丸。黍米大。每服十九。米飲下。

下積丸

治乳食傷積。心腹脹滿。氣粗壯熱。或瀉或嘔。

丁香二十粒 砂仁二十粒 史君子五十個 烏梅三個

巴豆不去油

右爲末。爛飯丸。麻子大。每服三九。陳皮湯下。

五珍丸

治酒食積通用

青皮

乾薑

燒存性

蓬朮

五靈脂

各一兩

巴豆肉

去牛油一錢

右為末。粳米飯團。麻子大。每服三五丸。米湯下。

快膈消食丸

治小兒宿食停滯。腹脹疼痛。

三稜

蓬朮

煨

揀縮砂

去殼

橘皮

去白

神麴

麥蘖

炒各五錢

香附子

炒一錢

右為細末。蒸餅丸。如黍米大。生薑煎湯。或白湯。

食遠服。或作餅子磨服。

香稜丸

治小兒積氣發熱。肚腹膨脹。肢體瘦弱。飲食不

滋肌膚。

木香

丁香

檳榔

去臍

枳殼

炒

甘松

史君子

去殼

神麴

炒

麥蘖

炒各二錢

京三稜

煨

蓬朮

青皮

陳皮

香附子

炒各五錢

胡黃連

一錢

右為細末。蒸餅丸。如黍米大。用米飲食遠服。

諸熱症 第五十問

小兒之病。其熱惟多。夫熱有虛有實。實則面赤。體黃。氣沮。口熱。燥渴。唇腫。大小便難。掀揭露衣。煩啼暴叫。虛則面色青白。恍惚神緩。口中清冷。噓氣軟弱。泄瀉多尿。夜出虛汗。其或乍涼乍溫。怫鬱驚惕。上盛下虛。泄水穀不分。此則冷熱不調之症。虛則敗毒散加水。香當歸。然小兒表裏俱熱。面黃。頰赤。唇燥。口乾。小便赤澀。大便焦黃。先以四順清涼飲為之。疎利其熱。即去。或表未解也。當先用惺惺散。少加麻黃。去節。以取發出其汗。或用柴胡散。則表熱已除。又當和解其熱。百平。若驚熱。風熱。積熱。可服寬熱散。下之。保壽散。金粉散。以退餘熱可也。

敗毒散

治傷寒溫疫。風溼。頭目昏眩。四肢痛。憎寒壯熱。

項強。目睛疼。尋常風眩。拘倦風痰。身體項疼。及

寒壅。咳嗽。鼻塞。聲重。寒熱。並治之。

柴胡

洗去蘆

前胡

川芎

枳殼

炒

羌活

獨活

白茯苓

桔梗

炒

人參各一兩 甘草各一兩

右為粗末每服二錢生薑薄荷煎加地骨皮天

麻或剉散加蟬蛻防風治驚熱可加芍藥乾葛

黃芩無汗加麻黃

四順清涼飲

治小兒血脈經實臟腑生熱煩赤多渴五心煩

燥睡臥不安四肢驚利及因乳哺不時寒溫失

度令兒血氣不順腸下不調小便少大便澀或

溫壯連滯欲成伏熱或壯熱不歇欲發驚癇又

嬰童百問

卷五

五

治風熱結核頭面瘡癩目赤咽痛瘡疹毒一切

壅滯並宜服之治袂熱瀉不止加水香用煨大

黃

赤芍藥

當歸

甘艸

大黃

各等分

右剉散三歲已上每服二錢水一盞煎至七分

作兩服欲利小使用赤芍藥虛熱加甘艸不利

減大黃冒風邪加去節麻黃中風體強眼睛上

視加獨活量兒大小虛實加減微瀉利為度可

加荆芥更十四問內有加味清涼飲子可詳症

通用

惺惺散

治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭疼壯熱目澀

睡咳嗽喘粗鼻塞清涕

天花粉

人參

細辛

去葉

茯苓

去皮

白朮

甘草

桔梗

各等分

右剉散每服五錢水一小盞入薄荷三葉同煎

至四分溫服如要氣即入生薑煎服不拘時

柴胡散

嬰童百問

卷五

五

治小兒傷寒無汗有表症壯熱頭疼身體痛口

乾煩渴小便赤大使秘澀夾驚腮腫

石膏

黃芩

甘草

赤芍藥

葛根

各二錢半

麻黃

去節

柴胡

半兩

右剉散三歲兒每服二錢水一小盞生薑少許

葱白三寸豆豉一撮煎六分溫服

嬰童百問卷之五

百問卷之六

傷寒正受傷寒夾驚 第五十一問

小兒傷寒初得。渾身發熱無汗。多啼哭。看眼急。有如驚風。但用發散退熱。莫令發渴。如渴便欲飲水。不飲當發散。羌活散。三黃散。柴胡散。抱龍丸。或虛煩可用竹葉湯。如嫩小兒。當服洗心散。薄荷散。紅綿散。四肢發汗。自然精神喜悅。感傷寒之重者。當依仲景之法。治之。又有傷寒夾驚。先要發散。其乃退熱。化痰截驚。乳下嬰兒。抱龍丸。羌活散。加荆芥。防風。三黃散。痰熱。次用柴胡。黃芩。藥調理。管取。向安。葱白湯。亦服。

羌活散

治傷寒風驚熱。或中風體硬。可加麻黃。乾薑。薤仁。

羌活 獨活 前胡 柴胡

川芎 白茯苓 桔梗 枳殼

人參 地骨皮 天麻 甘草

右到散。生薑。薄荷。煎。加。蟬蛻。治驚熱。

柴胡散

治小兒傷寒無汗。有表症。壯熱。頭疼。身體痛。口乾。煩渴。小便赤。大便秘澀。夾驚。腮腫。

石膏 黃芩 甘草 赤芍藥

葛根 麻黃 柴胡

右到散。三歲兒。每服二錢。水一盞。生薑少許。葱白三寸。豆豉一撮。煎至七分。不拘時溫服。

三黃散

解傷風熱症

白朮 大黃 赤芍藥 黃芩

麻黃 桂枝

抱龍丸 右咬阻。生薑一片。棗二枚。水一盞。煎七分。溫服。

治傷風溫疫。身熱。氣粗。痰實。壅嗽。常服安神鎮驚。亦治疹痘。壯熱。小兒宜時與服。

膽星 天竺黃 雄黃 辰砂

麝香 氣喘有痰加杏仁

右為末。煮甘草汁。九嬰桃。大陰。乾。薄荷。湯吞下。

治傷寒表裏俱虛。偏身胸煩悶。或得汗已解。而無津液。虛羸少氣。氣逆欲吐。及諸虛煩。傷寒解後。傷寒未解。切不可服。

石膏四兩 半夏六錢 人參半兩 甘草半兩
麥門冬去心

右咬咀。每服三錢。生薑一片。粳米五十粒。煎米熟為度。去滓溫服。嘔者加生薑三片。竹葉數片。洗心散

治風壅壯熱。頭目昏痛。痰涎壅滯。涕唾稠黏。神不寧。眼澀睛疼。及鼻塞聲重。咽乾多渴。煩熱。小便黃赤。大便秘澀。並宜服之。

白朮一錢 甘草炙六錢 當歸六錢 麻黃不去節
荆芥穗六錢 芍藥六錢 大黃麩裏煨去麩

右剉散。每服四錢。生薑薄切。煎去滓。乳母服。或見服。加前胡。生地黃。辰砂。名辰砂七寶散。為末。治小兒口瘡。積熱夾驚。傷寒。生薑薄切。泡湯調。下一錢。二十問內。有七寶洗心散。可兼看。參用。辰砂七寶散

治小兒壯熱。傷風壅熱。治夾驚。傷寒解。諸般熱。亦治疹痘熱。治驚風。定搐搦。

麻黃去節 白朮半兩 當歸半兩 赤芍藥半兩
大黃生半兩 荆芥兩 前胡半兩 生地黃酒洗
甘草生半兩 急驚加辰砂。薄芎調下。

右為末。每服三錢。傷風發散。用生薄芎泡湯下。薄芎散

治乳下嬰兒。鼻塞不通。及治夾驚。傷寒。變蒸熱。

薄芎葉兩 羌活半錢 全蝎半錢 甘州一錢

麻黃去節 殭蠶炒 天竺黃錢 白附子半兩
右為末。每服三錢。薄芎湯下。熱極生風。加竹瀝少許與服。一方有柴胡。台芎。桔梗。茯苓。無全蝎。殭蠶。天竺黃。白附子。

紅綿散

治傷風咳嗽。鼻塞。或流清涕。

全蝎五個 麻黃去節 殭蠶炒 白芷一錢
川芎二錢 天麻二錢 甘草一錢 蘇木一錢
右剉綿少許。煎服。有熱加荆芥。一方有大黃。

葱白湯

治頭疼不止身疼渴發熱小便赤黃脉浮數無汗

葛根半兩芍藥半兩知母半兩川芎一兩

右咬咀每服二錢水一小盞生薑二片葱白三枚煎至七分去滓熱服出汗如有汗溫服加甘草治小兒夾驚傷風并治發瘧頭疼加石膏服嘔者加半夏半兩

羌活湯

嬰童百問

卷六

傷寒正氣傳變論

解利邪氣傷風

羌活一錢人參一錢防風一錢川芎一錢

右剉一劑生薑三片薄荷七葉木一盞煎至七分不拘時服加芍藥甘草

小兒傷寒與時氣同異第五十二問

小兒傷寒得之與大人無異所異治者兼驚而已又有因夾驚食而得治法與大人一同但小其分劑使藥性稍差耳仲景云春氣溫和夏氣炎熱秋氣清涼冬氣冷冽此則四時正氣之序也冬時嚴寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷于四時之氣皆能為病冬受寒毒之氣其即時而病者頭痛身疼肌膚熱而惡寒名曰傷寒其不即時病者寒毒藏于肌膚之間至春夏陽氣發生則寒毒與陽氣相搏于榮衛之間

嬰童百問

卷六

傷寒與時氣同異

本

與冬時即病無異但因春而發名曰溫病至夏而發名曰熱病陽熱未盛為寒所制病名為溫陽熱已盛寒不能制病名為熱故太醫均謂之傷寒也然熱病傷寒溫病時氣傳變無異也凡時氣者四時之間有不正之氣也為春應暖而反寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反溫非其時而有其氣氣之中人則頭疼壯熱咳嗽氣粗煩渴心躁恍惚驚悸傳變與傷寒無異故一歲之中病無長少率相似者此則時行之類也謂之天行是也治法三四月或有暴寒

其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕升麻湯解肌濕
 主之五六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七八月
 陽氣已衰為寒所折病熱亦微調中湯射干湯半夏
 桂甘湯可選用也秋溫冬溫治溼則利小便治冬溫
 亦宜解利其利小便也則以五苓散輩其解利冬溫
 宜葳蕤湯蓋冬溫者感溫氣而作寒疫者暴寒折人
 非觸冒之過其治法不同所施寒熱溫涼之劑亦異
 不可拘以日數發汗吐下隨症施行要之治熱以寒
 溫而行之治溫以清冷而行之治寒以熱涼而行

嬰童百問 卷六 傷寒與時氣同異 七

治清以溫熱而行之以平為期不可以過此為
 湯氏有七寶散加減服之併與乳母尤好有熱者加
 升麻湯加柴胡黃芩等劑治之柴胡石膏湯極效
 升麻湯
 治小兒時行瘟疫頭痛發熱肢體煩疼及瘡疹
 已發未發疑似之間治傷寒中風憎寒壯熱肢
 體疼痛鼻乾不得睡兼治寒暄不時人多疾疫
 乍煖脫着及暑熱之忽變陰寒身體疼痛頭重
 如石者亦可加柴胡無汗加麻黃

升麻 一錢 葛根 一錢 白芍藥 一錢 甘草 一錢
 右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服
 瘡疹亦準此服藥已身涼止藥加紫蘇茯苓川
 芩名升麻蘇葉散有熱加黃芩咽喉痛加桔梗
 發丹加玄參效

解肌湯

治傷寒溫病時行寒疫頭痛項強畏寒肢體拘
 急骨節煩疼腰脊強痛胸膈煩悶無汗惡風

嬰童百問 卷六 傷寒與時氣同異 八

葛根 一兩 麻黃 去節 半兩 芍藥 半兩 甘草 半兩
 桂枝 二錢 半兩 方無此一味
 右咬咀每服三錢水一盞棗一枚煎至六分去
 滓稍熱服以汗出為度夏月加石膏升麻各一
 錢

調中湯

治夏末秋初忽有暴寒折于盛暑熱結于四肢
 則壯熱頭疼寒傷于胃則下利或血或赤或白
 壯熱迷悶脈數宜下之

大黃 七錢 桔梗 炒 半兩 藜蘆 半兩 茯苓 半兩
 甘草 半兩 乾葛 半兩 黃芩 半兩 芍藥 半兩

白朮 半兩

右咬咀白朮煎量大小加減服得快氣利壯熱便歇去大黃加黃連枳殼止利尤妙或加地榆或加當歸皆可感風加荆芥秋宜下當下大黃射干湯

治初秋夏月暴雨冷及天行暴寒其熱喜伏于內咳嗽曲折不可得氣息喉啞失聲乾嗽無唾喉中如硬

半夏 湯泡五錢 生薑 炮四錢 射干 二錢 杏仁 去皮

嬰童百問 卷六

甘草 炙二錢 紫苑 二錢 肉桂 二錢 枳實 錢

當歸 二錢 橘皮 二錢 獨活 二錢 麻黃 去節二錢

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服半夏桂甘湯

治伏氣之病謂非時有暴寒中人伏于少陰經始不覺病旬月乃發脈便微弱咽痛似傷寒非喉痺之病次必下利始用半夏桂甘湯主之次用四逆散此病一二日便差古方謂之腎傷寒

半夏 洗二兩 桂心 二兩 枳實 炙二兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至六分放冷少含細嚥之入生薑三片煎

五苓散

治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止又治霍亂吐利燥渴引飲

澤瀉 二兩 猪苓 二兩 白朮 一兩 茯苓 一兩 桂 一兩

右為細末每服二錢熱湯調下不拘時服

嬰童百問 卷六

飲熱湯有汗出即愈又治痧熱在裏身

濃煎茵陳湯下食前服痘病發渴及中暑引飲亦可用水調服小兒加白朮末少許如發虛加綿黃芪人參末少許十六問辰砂五苓散參用

歲時湯

治風溫冬溫及春月中風傷寒發熱頭疼咽乾舌強胸腹滿腰脊強

葛根 半兩 萎蕤 三錢 石膏 一兩 白薇 半兩

羌活 半兩 麻黃 半兩 川芎 半兩 杏仁 去皮尖

1000 升 黃 4 年 第 0

甘草炙半兩 木香半兩

右以咀。每服三錢。水一盞。煎至八分。去滓。溫服。

七寶散

治時氣頭昏體熱。此藥大人可服。小兒乳母服。

紫蘇三兩 香附炒三兩 陳皮二兩 甘州炙一兩

桔梗去芦一兩 白芷一兩 川芎一兩

右以咀。每服二錢。水半盞。薑一片。棗一枚。煎三分。

去滓。服。有熱加葛根。升麻。荆芥。

柴胡石膏湯

治時行瘟疫。壯熱惡風。頭痛體疼。鼻塞。

胸煩滿。寒熱往來。痰熱咳嗽。涕唾稠黏。竝療之。

桑白皮三兩 黃芩三兩 升麻二兩 石膏五兩

前胡去芦五兩 赤芍藥五兩 乾葛五兩 柴胡五兩

荆芥穗三兩 無汗加麻黃半。夏北五味。

右為粗末。每服二錢。水一盞。生薑二片。淡豉十

粒。煎至七分。去滓。稍熱服。小兒分作三服。量太

小加減。不拘時候。

傷寒表裏第五十三

凡治小兒傷寒。須辨表裏。表裏不分。汗下差誤。古人

云。桂枝下咽。陽盛即斃。承氣人胃。陰盛以亡。傷寒有

表症。有裏症。有半在表。半在裏。有表裏兩症。俱見。然

在表者宜汗。在裏者宜下。在半表半裏者宜和解。表

裏俱見。隨症施治。無表裏症。用大柴胡湯下之。其表

症者。發熱惡寒。身體痛而脈浮無汗。頭疼項強。腰脊

痛。此足太陽膀胱經受病也。宜汗之。然傷寒發表。當

隨病輕重而汗之。頭疼發熱。兼驚。亦只用葱

嬰童百問卷六

之。甚則麻黃湯各半湯解。肌湯葛根湯。柴胡湯。

選而用之。其裏症者。惡熱不惡寒。手掌心并腋下。濇

汗出。胃中乾咽燥。糞結聚。潮熱大便鞭。小便如常。

腹滿而喘。躁渴。脈沉而滑。內熱而譫語。此屬足陽明

胃經也。宜下之。小承氣湯。大承氣湯。四順飲。洗心散。

斟酌輕重用之。其在半表半裏者。心下滿。口不欲食。

大便鞭。脈沉細。是裏症當下。其人頭汗出。微惡寒。手

足冷。即當汗。此兩症俱見者。仲景所謂半在表半在

裏也。小柴胡湯主之。太陽病不解。傳入少陽。脇下

清乾嘔不能入飲食往來寒熱尚未吐下診其脈弦緊者小柴胡湯主之此屬少陽膽經也宜和解其表裏兩症俱見者病人脈浮而大是表症常汗其人發熱煩渴小便赤是裏症當下是表裏症俱見五苓散下之又傷寒不大便六七日頭痛有熱者是也裏症當下其人小便清者知不在裏仍在表當須發汗此是兩症俱見即未可下宜與桂枝湯又太陽病醫反下之因亦腹痛是有表復有裏仲景用桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝加大黃湯或腹滿時痛尺寸

嬰童百問 卷六 傷寒表裏

洪者此足太陰脾經也自利不渴當溫之四
中湯其無表裏者傷寒四五日以後以至過經無表裏症又于裏症未可下者既非下症亦非汗症皆可
用小柴胡湯隨症加減用之以至十餘日外用小柴胡湯不愈者若大便鞭者可汗則用大柴胡湯下之
仲景云六七日目中不了了睛不和無表裏症大便難身微熱此為實也當下宜大承氣湯若不渴口不燥舌乾而目沉者急溫之宜四逆湯此足少陰腎經也其表熱裏寒者身大熱而反欲得衣熱在皮膚寒

在骨髓也宜先與陰旦湯寒已次以小柴胡湯加桂以溫其表又身大寒而反不欲近衣寒在皮膚熱在骨髓也宜先與白虎加人參湯熱除次以桂枝麻黃各半湯以解其外又厥陰症脈浮緩者必囊不縮外症必發熱惡寒似瘧為欲愈宜桂枝麻黃各半湯若脈尺寸俱沉短者必囊縮毒氣入臟宜承氣湯下之厥陰病其脈微浮為欲愈不浮為未愈宜小建中湯此足厥陰肝經也然以表裏症內近似三陰三陽之症而疎于各症之下非可以盡備六經之大

嬰童百問 卷六 傷寒表裏

以活人書傷寒論為主其瘧症與大方治
本條夏傷于暑秋必瘧瘧其暑症玉露散主之其
亦與大方同其治法但用分劑輕耳口議有脫甲散大能除熱扶表救裏真良方也

麻黃湯

治傷寒頭疼發熱身痛惡風無汗而喘又治太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表症仍在此當發其汗服藥已微除其人煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也

甘草 半兩 麻黃 二兩 桂枝 一兩 杏仁 去皮尖

右咬咀每服三錢水一盞煎八分去滓大小加減服衣覆取汗夏至後須加知母一兩石膏一

兩黃芩一兩蓋麻黃性熱夏月溫之必有發黃生斑之失凡傷寒熱病藥性須涼不可太溫惟

冬及春或病人平素虛寒乃用正方不在加減

葱白湯 治頭疼不止身痛發渴發熱小便赤黃脉浮數無汗

葛根 半兩 芍藥 半兩 知母 半兩 川芎 一兩

右咬咀每服二錢水一小盞生薑二片

嬰童百問 卷六 傷寒表裏

个煎至七分去滓熱服出汗如有汗溫

草治小兒夾驚傷風并治發瘧頭疼加石膏服

嘔者加半夏半兩

解肌湯

治傷寒濕病時行寒疫頭痛項強畏寒肢體拘

急骨節煩疼腰脊強痛胃膈煩悶無汗惡風壯

熱

葛根 一兩 麻黃 去節 芍藥 半兩 甘草 半兩

桂枝 二錢

嬰童百問 卷六

右咬咀每服三錢水一盞棗一枚煎至六分去

滓稍熱服取汗為度夏月加石膏知母

葛根湯

治太陽病項強兀兀惡風無汗不惡寒剛症

葛根 四兩 麻黃 一兩 肉桂 一兩 甘草 二兩

芍藥 二兩

右剉每服五錢水一盞半入生薑五片棗二枚

煎七分去滓服取微汗為度金匱方芍藥三錢

柴胡散

治小兒傷寒無汗有表症壯熱頭疼身體痠

乾煩渴小便赤大便秘夾驚顛腫

石膏 二錢 黃芩 二錢 甘草 二錢 赤芍藥 二錢

麻黃 去節 柴胡 半兩

右剉每服三錢葱白三个薑一片水一盞煎服

桂枝麻黃各半湯

治太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多

寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脉

微緩者欲愈也脉微而惡寒者此陰陽不升更

發汗更吐下也。面赤色者未欲解也。以其不能得少汗出身必痒。

桂枝 八錢 芍藥 半兩 生薑 半兩 甘草 二兩

麻黃 半兩 杏仁 十四個 大棗 二個

右咬咀每服三錢水一小盞煎八分去滓溫服小承氣湯

治太陽病吐下後發汗而微煩小便數大便堅宜陽明病若出汗多而微惡寒為外未解無潮熱不可與之若腹滿不大便可少少與之

嬰童百問 卷六 傷寒表裏

大黃 一兩 厚朴 半兩 枳實 一兩

右咬咀煎陽明病潮熱大便微硬可與大承氣湯不硬者不可與之若不便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯腹中轉屎氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉矢氣者必先破後攻不可攻之攻之必腹滿不能食也欲飲水者與水則噉其後發熱者必大便硬而少也以小承氣湯和之不轉矢氣者不可攻也

大承氣湯

治剛瘧胸滿內實口噤咬牙大熱渴大便秘澀大黃 半兩 芒硝 半兩 厚朴 一兩 枳實 一兩

右剉每服三錢薑三片水一盞煎七分空心服四順飲

治小兒血脈壅塞臃腫生熱頰赤多渴五心煩燥睡臥不安四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失度令兒血氣不順腸胃不調小便少大便澀或溫壯連滯欲成伏熱或壯熱不歇欲發驚癇又治風熱結核頭面瘡癩目赤咽痛瘡疹毒一

嬰童百問 卷六 傷寒表裏

壅滯宜服之治挾驚瀉加木香用煨熟大

赤芍藥 一兩 當歸 一兩 甘草 一兩 大黃 一兩

右剉散三歲已上每服二錢水一盞煎至七分作兩服欲利小便加白茯苓虛熱加甘艸不利減大黃冒風邪加去節麻黃中風體強眼睛上視加獨活量兒大小虛實加減微瀉利為度四十問內有加味清涼飲子可詳症通用洗心散

治風壅壯熱頭目昏痛痰涎壅滯涕唾稠粘

神不寧。眼游睛疼。及鼻塞聲重。咽乾多渴。五心煩熱。小便黃赤。大便秘澁。宜服之。

白朮 一錢 甘草 六錢 當歸 六錢 荆芥穗 六錢

麻黃 六錢 不去節 大黃 六錢 麩去麩切

芍藥 六錢

右剉散。每服四錢。生薑薄切煎。去滓。乳母服。或

兒服。加前胡。生地黃。辰砂。名辰砂七寶散。為末。

治小兒口瘡。積熱。夾驚傷寒。生薑薄切調下一

錢。二十問內有七寶洗心散。可兼看對症用。

嬰童百問

卷六

傷寒表裏

七

小柴胡湯

治傷寒溫熱病。身熱惡風。頸項強急。胸脇滿痛。

嘔吐噦逆。煩渴寒熱往來。身面皆黃。小便不利。

大便秘澁。或過經不解。或潮熱不除。及遷後勞。

復發熱。疼痛煩熱。經血適來。適去。寒熱如瘧。

人參 二錢 去芦 甘草 二錢 黃芩 三錢 柴胡 八錢

半夏 二錢 湯泡七次 炒

右剉散。每服二錢。水一盞。生薑三片。棗一枚。煎

七分。去滓。溫服。不拘時。

五苓散

治傷寒溫熱病。表裏未解。頭痛發熱。口燥咽乾。

煩渴飲水。或水入即吐。或小便不利。及汗出表

解。煩渴不止。又治霍亂吐利。燥渴引飲。

澤瀉 二兩 猪苓 一兩 白朮 一兩 茯苓 一兩

桂 一兩

右為細末。每服二錢。熱湯調下。不拘時。服訖。宜

飲熱湯。有汗出即愈。又治痰熱在裏。身發黃。意

濃煎茵陳湯下。食前服。痘病發渴。及中暑引吐。

嬰童百問

卷六

傷寒表裏

七

亦可用水調服。小兒加白朮末少許。

桂枝湯

治太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮熱自發。陰弱者

汗自出。膏背惡寒。翕翕發熱。鼻鳴乾嘔者。

桂枝 二兩 去皮 芍藥 二兩 甘草 一兩 炙

生薑 半兩 棗子 六個

右為散。每服三錢。水一盞。煎至八分。去滓。大

小加減。服須臾。啜熱粥一盞。以助藥力。溫覆令

一時許。通身熱微。微似有汗者。加減桂枝湯。自

西北二方居人四時行之無不應驗江淮間惟
 冬及春可行自春末及夏至已前桂枝症加黃
 芩一分謂之陽旦湯夏至後有桂枝症可加知
 母半兩石膏一兩或升麻一分若病素虛寒者
 正用古方不在加減也戒曰桂枝最難用雖用
 云表不解可發汗宜桂枝湯須是病人常自汗
 出小便不數手足溫和或手足指梢作微冷少
 須却溫身雖微似煩而又憎寒始可行之若病
 人身無汗小便數或手足冷不惡寒或飲酒
 不喜甘者慎不可行桂枝也仍有桂枝症服
 已無桂枝症者尤不可再與

桂枝加芍藥湯

治太陽病反下之因腹痛是有表復有裏宜服

桂枝一兩芍藥三兩半利者生薑一兩
先煎三西沸

大棗六個甘草兩

右咬咀水煎加減服痛甚者加大黃大實者加

一兩半羸瘦虛弱者減之

桂枝加大黃湯

治太陽病反下之因腹滿痛屬太陰桂枝加芍
 藥主之。大實痛者桂枝加大黃湯主之。

桂枝去皮一兩芍藥半兩甘草兩大黃半兩煎服

右咬咀每服三錢水一盞薑一片棗一枚煎服

四逆湯

治陰症傷寒自利不渴嘔噦不止吐利俱作小
 便或澁或利脈微欲絕腹痛脹滿手足厥冷或
 咳或悸內寒外熱下利清穀四肢沉重或汗出
 熱不出內拘急身疼痛而惡寒者用此方治

乾薑一兩附子一個生用甘草一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分不拘時冷服

理中湯

治脾胃不和中寒止衝胃腸逆滿心腹疔痛痰

逆惡心嘔吐心下虛煩痞滿膈塞不通飲食減

少短氣羸困溫中逐水止邪汗去濕洩瀉注下

水穀不分腹中雷鳴傷寒時氣裏寒外熱霍亂

吐利手足厥冷胸痺心痛逆氣短氣寒多不飲

水吐者

人參去芦 白朮 三兩 乾薑炮 三兩 甘草炙 一兩

右以咀。每服三錢。水一盞。煎六分。去滓。帶熱服。

空心食前。或研細末。白湯調下。腹痛者。加人參

一兩半。寒多加乾薑一兩半。渴者加白朮一兩

半。臍上築者。腎氣動也。去白朮。加桂四兩。吐多

者。去朮。加生薑三兩。下多者。還用朮。悸者。加茯

苓二兩。或四肢拘急。腹滿下利。轉筋者。去朮。加

附子一個。生用。末之。蜜丸。如雞子黃大。名理中

丸。又名調中丸。治厥陰臟寒。虵上入。兩吐長

嬰童百問

卷六

三

或胃中虛冷。因發汗。故吐蟲。先服理中丸。或

枳實茯苓蜜丸。治傷寒結胸。欲絕。心高起。實

滿作痛。手不得近。並用熱湯化下。

大柴胡湯

治傷寒十餘日。邪氣結在裏。往來寒熱。邪實太

盛。大便秘澀。腹滿脹痛。譫語。心中痞硬。飲食不

下。或不大便五六日。遶臍刺痛。時發煩躁。及汗

後如瘧。日晚發熱。兼臍脈有力者。可服。

柴胡去芦 黃芩 三錢 赤芍藥 三錢 枳實去穢 五錢

半夏泡七片 炮乾半兩

右剉散。薑棗煎。加減服之。欲下加大黃半兩。

陰旦湯

治傷寒肢節疼痛。內寒外熱。虛煩。

桂二兩 芍藥 一兩 甘草 兩 乾薑炮 一兩

黃芩 一兩

右以咀。每服三錢。水一盞。棗一個。同煎。去滓。溫

服。覆令少汗。

白虎加人參湯

嬰童百問

卷六

三

治傷寒若吐若下後。七八日不解。熱結在裏。山

外俱熱。時惡寒。大渴。大汗。煩渴不解。脈洪大者。

石膏四兩 知母 一兩 甘草 兩 粳米 一合

人參 半兩

右以咀。每服三錢。水一盞。煎六分。米熟為度。服

小建中湯

治傷寒陽脈澀。陰脈弦。法當腹中急痛。先與小

建中湯。

桂枝 一兩 芍藥 三兩 甘草 二兩 膠飴 半斤

右咬咀每服三錢水一盞生薑二片棗一枚煎六分去滓下膠飴兩匙許再煎化溫服日三夜二服尺脉尚遲再作一劑加黃芪末一錢

玉露散

涼心經解諸熱治口燥咽乾煩渴躁啼小便閉

寒水石一兩石膏一兩甘草三錢

右為末每服半錢麥門冬泡湯化下湯使隨意

加辰砂金箔名桃紅散亦治急驚入梳子仁名

金蓮散加滑石半兩名玉真散湯氏方治小兒

嬰童百問

卷六

嬰童百問

三五

秋夏伏暑多煩熱吐黃涎頭額熱五心熱小兒

赤少或乾嘔無物宜服香薷散又宜服玉露散

生薑汁和白湯調下獨用薑汁一服而止

脫甲散

治嬰孩小兒傷寒體熱頭目昏沉不思飲食夾

驚夾食寒熱大小便閉澀或赤或白煩燥作渴

冷汗妄流夾積傷滯膈滿脹急青黃體瘦日夜

大熱及療傷風傷寒傷暑驚癩客忤筋骨腎臟

疳氣等熱竝宜服之

柴胡二錢當歸三錢白茯苓三錢龍膽州三錢
人參二錢知母二錢甘草二錢川芎二錢

右為末每服一錢水一盞連翹葱白一寸煎至半盞溫服不拘時此方散熱扶表救裏表虛令汗不妄行裏熱令氣不閉結外即通關內即開渠通關流行經路開渠不壅臟腑熱在表裏之間施無不可

問

卷六

嬰童百問

三五

傷寒咳嗽傷風 第五十四問

仲陽云咳嗽者肺感微寒。八九月間肺氣大旺。病嗽者其病必實非久病也。其症面赤身熱痰盛。法當以葶藶丸下之。若久嗽不可下也。冬月嗽乃傷風咳也。當以麻黃湯汗之。有熱症而赤飲水。涎痰濃疾咽喉不利者。宜甘桔湯。有肺盛者。咳而後喘。而腫欲飲水。有不飲水者。其身即熱。以瀉白散瀉之。有嗽而吐涎。痰乳食者。以白餅子下之。然肺主氣。應于皮毛。肺為五臟華蓋。小兒感于風寒。客于皮膚。入傷肺經。微斯咳嗽重者。喘急肺傷于寒。則嗽多痰涎。喉中鳴。傷于燥。則嗽聲不通壅滯。傷于寒者。必散寒邪。傷于燥者。必泄壅滯。發散屬以甘辛。即桂枝麻黃細辛。是也。瀉泄係以酸苦。即葶藶大黃是也。更五味子烏梅。之酸。可以飲肺氣。亦治咳嗽之要藥也。久嗽不已。必主驚悸頑涎。血脉灌臉。其嗽傳受五臟。或吐逆或痰涎。或厥冷或恐悸。甚而至于眼目兩眶紫黑。如被物傷。損眼白紅赤如血。謂之血眼。治之之法。常用生地黃及溼黑豆研成膏。掩眼上。而眼腫黑自消。其血皆

嬰童百問

卷六

傷寒咳嗽傷風

五

自眼目而出。其良方也。兼服麥煎散而嗽自止。久嗽或癰。當服散劑等劑。凡治嗽先要發散寒邪。然後服寬氣化痰止咳之藥。即得痊癒。先服九寶丸。華蓋散。葶藶丸。抱龍丸。或細辛五味子湯。如有熱。可服涼肺之藥。柴胡黃芩等劑。并瀉白散。痰多氣喘。用金星丸。利痰了。却服前藥。後服百部丸。生犀散。天麻定喘飲。調理而安。冷症咳嗽。小青龍湯。加杏仁。去麻黃。亦可。服有熱及時氣咳嗽。柴胡散。加杏仁。五味子。柴胡石膏湯。亦可。錢氏生犀散。加減亦佳。有驚咳。嗽天麻防風丸。治之。惺惺散。化風丹。皆可服。金沸草散。三拗湯。加減。及治傷風咳嗽之常劑也。和解湯。治四時感冒。可加減服。

嬰童百問

卷六

傷寒咳嗽傷風

天

葶藶丸

治食乳衝膈咳嗽傷風而赤。痰盛身熱喘急。促化痰寬氣進食。

葶藶子

略炒

防已

黑牽牛 略炒

杏仁

去尖。雙仁者同。乾炒。黃別搗各一兩。

右為末。研入杏膏。拌勻。取蒸棗肉。和再搗為劑。

尤如麻子大每服五九至七九淡生薑湯下乳食後或臨夜服量大小加減

麻黃湯

治傷寒頭疼發熱身痛惡風無汗而喘又治太陽病時浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表症仍在此當發其汗服藥已其人煩日瞑劇者必刺頭乃解所以然者陽氣重故也

甘草

半兩

麻黃

去節二兩

桂枝

一兩

杏仁

去皮尖三十個

右咬咀每服三錢水一盞煎八分去滓大小

澤瀉百問

卷六

无

減服被覆取汗夏至后須加知母石膏各一兩

黃芩八錢蓋麻黃性熱夏月溫之必有發黃發

斑之失凡傷寒熱病藥性須涼不可太溫惟冬

及春或病人素虛寒者乃用正方不在加減例

甘桔湯

治風熱毒氣上攻咽喉咽痛喉癭腫塞妨悶及

肺癰咳嗽咯吐膿血胸滿振寒咽乾而渴時出

濁沫氣息腥臭久久吐膿狀如米粥

指撥

甘草二兩

右為粗末每服二錢水一盞煎至七分去滓食

後溫服加荆芥防風名如聖湯熱甚加黃芩

瀉白散

化痰止咳寬氣進食

地骨皮

兩

桑白皮

炙一兩

甘草

炙半兩

右剉每服二錢水一盞粳米一撮煎米熟為度

白餅子

治小兒夾食傷寒其症發熱嘔吐亦有肚疼者

噯氣辨得分曉先用此藥一服推下食積却用

平和藥發散調理如惺惺散加減參蘇飲皆

嬰童百問

卷六

手

服却不可服冷藥

滑石

一錢

南星

一錢

半夏

一錢

輕粉

五分

巴豆

廿四個去皮膜用

水一升煮乾研細

右三味搗羅為末入巴豆霜次入輕粉又研勻

却入餘藥末令勻糯米飲丸如棗豆大量小兒

壯瘦虛實用藥三歲已下每服三九至五九紫

蘇湯空心下忌熱物若三五歲兒壯實者不以

此拘加至二十九以利為度

麥煎散

治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣粗喘

急面赤自汗或狂語驚叫或不語無汗及癩疹

遍身亦痒往來潮熱時行麻豆痲子餘毒未盡

渾身浮腫痰涎咳嗽或變急慢驚風手足搐搦

眼目上視及傷風頭疼並治一方無地骨皮赤

芍藥滑石知母有釣藤桔梗川芎亦可

滑石 半兩 地骨皮 半兩 赤芍藥 半兩 石膏 半兩

白茯苓 半兩 杏仁 半兩 知母 半兩 甘艸 半兩

葶藶子 半兩 人參 半兩 麻黃 去節 一兩 有熱加大黃

嬰童百問 卷六 傷寒發熱

右為末每服一錢麥子煎湯調下如初生牙風

感冒風冷鼻塞身熱噴嚏多啼每字用麥子

煎湯調下

九寶飲

治小兒嗽是肺藏感寒須是表散了却服嗽藥

麻黃 去節 薄芎 一兩 大腹皮 一兩 紫蘇 一兩

陳皮 一兩 杏仁 一兩 肉桂 半兩 桑白皮 半兩

枳殼 半兩 甘艸 二錢

右咬咀生薑烏梅煎冷症去薄芎熱症去肉桂

華蓋散

治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩滿項背拘急聲

重鼻塞頭目昏眩痰氣不利呀呷有聲

麻黃 去節 蘇子 炒 半兩 桑皮 蜜炙 半兩 杏仁 炒 半兩

赤茯苓 半兩 陳皮 半兩 甘艸 炙 一錢

右為末每服一錢水一盞煎五分去滓食後服

細辛五味子湯

治肺經不足胃氣怯弱或冒風邪或停寒有飲

咳嗽喘息不得安卧胸滿迫塞短氣減食乾嘔

作熱咳唾結痰或吐涎沫頭目昏眩身體疲重

語聲不出痛引胸脇不問新久並宜服之

細辛 去節 半兩 夏 湯泡 一兩 烏梅 去核 半兩

鴛粟殼 去蒂 炒 一兩 五味子 三兩 桑白皮 炒 二兩

右咬咀每服二錢水一盞生薑一片煎六分服

抱龍丸

治傷風痘疫身熱氣粗痰實壅嗽常服安神鎮

驚亦治疹痘壯熱小兒宜時與服

膽星 一兩 天竺黃 二錢 雄黃 二錢 辰砂 二錢

麝香 少許 氣喘有痰加杏仁

右為末。煮甘艸汁丸。嬰桃大陰乾薄苜湯吞下。

金星丸

治小兒風熱壅盛喉中痰鳴喉喘氣粗面頰紅
腮赤腫疼咽喉壅塞口開不得多淚發熱狂言
煩燥多渴則生驚風大便不通小便如血諸般
熱壅瘡癩煩燥竝宜服之。

鬱金 二錢 雄黃 二錢 膩粉 半錢 巴豆 七粒
半 半 去油

右為末調勻醋糊為丸麻子大薄苜泡湯吞下

嬰童百病

卷六

三

百部丸

治小兒肺寒壅咳微喘有痰幼幼方加甘草

百部 三兩 麻黃 三錢 杏仁 四十個
炒 去節 炒 去皮尖微

右為末煉蜜丸如芡實大熱水化下仲陽加松

子仁肉五十粒胡桃仁十個丸含化。

生犀散

治咳嗽解時氣痰逆喘滿心忪驚悸風熱。

杏仁 二錢 桔梗 二錢 茯苓 一錢 前胡 一錢
炒 半

人參 一錢 半夏 一錢 杜五味 一錢 甘艸 一錢

右咬咀生薑薄苜煎有熱加羌活或加麻黃

天麻定喘湯 治小兒喘咳驚風

天麻 一兩 防風 一兩 羌活 一兩 甘艸 一兩

人參 半兩 桔梗 一兩 白朮 半兩 川芎 半兩

半夏 一兩

右咬咀每服二錢水一盞麥門冬十四個煎至
七分食後服有熱去白朮加芍藥枳殼。

小青龙

治傷寒表不解惡寒體熱水停心下乾嘔發熱

嬰童百病

卷六

三

咳嗽喘急又主肺脹胸滿鼻塞涕涕咳逆上

喘鳴怕寒仲景曰治表不解心有水氣乾區發

熱而嗽或渴或利或小便不通或噎小腹喘滿

麻黃 一兩 赤芍藥 三錢 半夏 三錢 細辛 半兩
去節 錢 錢 錢

乾薑 三錢 甘草 三錢 桂枝 三錢 五味子 半兩
錢 錢 錢 錢

右咬咀每服三錢水一盞煎七分溫服○微利

者去麻黃加葶花如彈子大炒令赤色○若噎

者去麻黃加附子半錢炮○若小便不利者去

麻黃加茯苓一兩○如喘者去麻黃加杏仁半

兩去皮尖。○若渴者去半夏加瓜蒌根 兩半
柴胡散

治小兒傷寒無汗有表症壯熱頭疼身體痛口
乾煩渴小便赤大便秘澀夾驚腮腫

石膏 二錢 黃芩 一錢 甘草 二錢 赤芍藥 二錢

葛根 二錢 麻黃 半兩 柴胡 半兩

右剉水一盞每服三錢薑一片葱白二寸煎服
柴胡石膏湯

治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心
胸煩滿寒熱往來痰實咳嗽涕唾稠粘

白桑皮 三兩 黃芩 三兩 升麻 二兩 石膏 五兩

前胡 五兩 赤芍藥 五兩 乾葛 五兩 柴胡 五兩

荆芥穗 三兩 無汗加麻黃半夏杜五味

右剉每服二 水一盞生薑二片淡豆豉十粒

煎至七分去滓稍熱服小兒分作三服不拘時

天麻防風丸

治一切驚風身體壯熱多睡驚悸手足抽掣精
神昏憤咳嗽痰涎不利及風溫邪熱並宜服之

天麻 一錢 防風 一錢 人參 一錢 辰砂 一錢

雄黃 一錢 川艸 一錢 麝香 一分 全蝎 半兩

僵蠶 一分 牛黃 一分 一方有膽南星無麝香

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服一丸至二丸
薄苛湯下不拘時

惺惺散

治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭疼壯熱目澀多
睡咳嗽喘粗鼻流清涕

天花粉 一兩 人參 一兩 細辛 一兩 茯苓 一兩

白朮 一兩 甘草 一兩 桔梗 一兩

右剉散每服五錢水一小盞入薄荷三葉同煎

至四分溫服如要和氣即入生薑煎服不拘時

化風丹 涼風化痰退熱定搐

膽星 一兩 羌活 一兩 獨活 一兩 防風 一兩

天麻 一兩 人參 一兩 川芎 一兩 荆芥 一兩

粉艸 一兩 全蝎 一兩 一方加辰砂麝香 各半

右為末煉蜜丸如芡實大每服二丸薄苛湯下

金沸草散

治傷風痰盛頭目昏痛頸項強急往來寒熱肢體煩疼胸膈滿痛咳嗽喘逆涕唾稠粘及時行寒疫壯熱惡風。

荆芥穗

四兩 去芦 麻黃 三兩 旋覆花 三兩

甘草

炙 三兩 半夏 一兩 赤芍藥 一兩

右剉每服二錢水一盞生薑二片棗一個煎六分去滓溫服不拘時有寒邪則汗出惡風加杏仁杜五味

又方 亦名金沸神散

醫學百問

卷六

傷風痰盛

三七

治傷寒中脘有痰令人壯熱頭疼脈緊急時發寒熱皆類傷風但不頭疼為異耳。

前胡

三兩 旋覆花 三兩 荆芥穗 四兩 赤茯苓 一兩

細辛

一兩 甘艸 一兩 半夏 一兩 洗淨薑汁浸

右為末每服一錢水一盞生薑一片棗二個煎六分去滓熱服未愈再服。

三拗湯

治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風傷冷頭疼目眩四肢拘急咳嗽多痰胸滿氣短

麻黃

不去 杏仁 皮尖 甘草 生用各等分

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服取汗為度一方加荆芥桔梗嗽甚加

五味子紙辛各減半又方麻黃去節杏仁去皮尖甘艸炙名三和湯治喘嗽尤妙加減在乎活

和解湯

法有熱加前胡傷風加荆芥有痰加半夏。治小兒四時感冒寒邪壯熱煩燥鼻塞多涕驚悸自汗肢體疼痛及瘡疹已發未發皆可服。

醫學百問

卷六

傷風痰盛

三五

羌活 一兩 防風 一兩 川芎 一兩 人參 一兩 乾葛 半兩 升麻 半兩 甘艸 半兩 芍藥 半兩

右咬咀每服三錢水一盞生薑一片棗一個煎至六分不拘時服無汗加麻黃咳嗽者加杏仁五味子桔梗。

百醉內嗽 第五十五問

此名乳嗽實難調理亦惡症也當審虛實而施治焉
實者散之虛者補之其症氣粗痰盛口瘡眼熱發散
後可利之比金丸等藥主之散其實也其症嘔吐後
驚悸困倦汗當用補肺散益黃散天麻散補其虛
也。大抵治驚嗽琥珀散主之天麻丸乃要藥也用天
麻蟬退僵蠶人參川芎甘艸礪砂天竺黃牛膽南星
白附子雄黃末之煉蜜丸如芡實大金箔為衣每服
一丸薄芎湯化下。治未滿百醉咳嗽不止遠勝諸藥

聖童百問

卷六

完

補脾散 治小兒久患咳嗽氣逆有痰惡心可服

阿膠炒一兩 鼠黏子一兩 馬兜鈴半兩 杏仁七個去皮尖

糯米一合 甘艸半兩

右咬咀三歲一錢水半盞煎至三分去滓溫服

比金丸 治驚癇先用此

人參一兩 琥珀一兩 白茯苓一兩 遠志薑製去心一兩

硃砂水飛一兩 天麻一兩 石菖蒲一兩 川芎一兩

牛膽南星一兩 青黛一兩 麝香半錢

右為末煉蜜丸桐子大每服一丸薄芎湯調下

天麻散 治嬰兒咳嗽有痰氣壅面紅

南星水浸春秋五日冬七日夏三日半兩 天竺黃三錢

硃砂一錢 麝香一字

右為末每服一字用杏仁湯調下人參湯亦可

琥珀散 治小兒急慢驚風痰涎潮昏胃呆驚悸不安

辰砂半錢 琥珀一錢 牛黃一錢 僵蠶炒去絲一錢

全蝎去毒一錢 白附子一錢 乳香一錢 蟬蛻一錢

代赭石煅醋淬七次一錢 牛膽南星一錢

麝香一字 水片一字

右為細末每服一錢薄芎湯下慢驚加附子

天麻丸 治小兒未滿百醉咳嗽不止名曰乳嗽

天麻一兩 蟬退一兩 僵蠶一兩 人參一兩

川芎半兩 甘艸二兩 礪砂半兩 辰砂一兩

天竺黃兩 膽星二錢 白附子一兩 坯一兩

雄黃一兩 金箔五片

右為末煉蜜丸如芡實大金箔為衣每服一

薄芎湯下

喘急 第五十六

議曰小兒有因驚暴觸心肺氣虛發喘者有傷寒肺氣壅盛發喘者有感風咳嗽肺虛發喘者有因食鹹鹹傷肺氣發虛痰作喘者有食熱物毒物冒觸三焦肺肝氣逆作喘者喘與氣急同出而異名別之輕重耳痰火兩端喘即口開隘于胸臆息短促急心神迷悶其因驚發喘逆觸心肺暴急張口虛煩神困者大效雄殊化痰定喘丸主之佐以天麻定喘飲乃效其傷寒肺氣壅盛發喘者是表不解以小青龍湯麻黃杏子甘草石膏湯辨其冷熱而施治焉其感風咳嗽肺虛發喘者則三拗湯加減治之其食鹹而喘者啗以生腐有熱治之以涼肺定喘之劑又有哮喘者以許叔微十六般哮喘之法治之無不愈又有汗下之後而喘急者葛根黃連黃芩主之喘甚者加葶藶子又有葶藶丸寬氣進食千金麝香湯治咳逆喘急大效

大效雄殊化痰定喘丸 治小兒因驚發喘逆觸心

雄黃一兩 礞砂一兩 蟬蛻一兩 全蝎一兩

地張龍一兩 白僵蠶一兩 天南星一兩 白附子一兩 輕粉半兩

右為末麩糊丸如麻子大每服三十丸薄荷茶清送下食後服

天麻定喘飲 治小兒喘嗽驚風

天麻一兩 防風一兩 羌活一兩 甘草五錢

人參五錢 桔梗五錢 白朮五錢 川芎五錢

半夏麴五錢

右剉每服三錢水一盞麥門冬十四粒煎至七分

要童百問 卷六 喘急

分食後服有熱去白朮加芍藥枳殼

小青龍湯 有加減法詳五十四問中

治傷寒表不解惡寒體熱水停心下乾嘔發熱

咳嗽喘急及主肺脹胸滿鼻塞涕涕咳逆上氣

喘鳴怕寒仲景曰治表不解心有水氣乾嘔發

熱而嗽或渴或瀉小便不利或噎小便滿喘者

麻黃三錢 赤芍藥三錢 半夏三錢 細辛三錢

乾薑三錢 甘草三錢 桂枝三錢 五味子半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分不拘時服

麻黃杏子甘州石膏湯

治傷寒發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無

大熱者下後不可行程桂枝湯汗出而喘無大

熱者

麻黃

三兩去節湯泡
去黃汁焙乾稱杏仁 二十五個
去皮尖

石膏

四兩
研甘州 一兩
炙

右咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓溫服

三拗湯 加減詳五十四問中

治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風傷冷

嬰童百問

卷六

急

聖

頭疼目眩四肢拘急咳嗽多痰胸滿氣短

麻黃

節 不去
杏仁 不去
皮尖 甘草 生用各
等分

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片煎至七分

去滓溫服取汗為度

總治十六般哮喘出本草方

阿膠

一兩剉碎
粉炒成珠馬兜鈴 一兩
炙甘草 一兩
炙

半夏

一兩剉碎
浸三出炒杏仁 一兩
去皮人參 半兩

右為末每服一錢水一盞隨病有湯使煎至七

分臨臥食後服湯使開後

心嗽面赤或汗流加葛根煎

肺嗽眼中淚出加烏梅一個糯米十四粒煎

脾嗽不思飲食一兩時惡心入生薑二片煎

胃嗽吐逆嘔酸水入蚌粉煎

膽嗽冷人不睡用藥半錢茶清調下

肺嗽上氣喘急入桑白皮煎

膈嗽出痰如圓塊入生薑自然汁調藥嚥下

勞嗽痰素流沫同煎

冷嗽痰晚嗽甚加葱白三寸同煎

嬰童百問

卷六

急

聖

子

血嗽連頻不住加當歸棗子同煎

暴嗽涕唾稠粘入烏梅生薑同煎

產嗽背甲痛加甘州三寸黃蠟少許煎

氣嗽肚疼脹滿入青皮去白煎

哮喘聲如拽鋸入半夏三枚同煎

腎嗽時復三兩聲入黃芪白飴糖煎

已上十五般嗽依法煎服無不效驗

葛根黃芩黃連湯

治太陽病反下之遂不止脈促者喘而汗出

葛根 二兩 黃芩 七錢 黃連 七錢 甘州 半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓加減服喘甚加葶藶子

葶藶丸

治食乳衝脾咳嗽傷風面赤痰熱喘促氣逆

葶藶子 隔紙略炒一兩 防已 剉碎一兩 黑牽牛 略炒一兩

杏仁 去皮尖及雙仁者麩炒黃別研成膏一兩

右爲末研入杏膏拌勻取蒸棗肉和再搗爲劑

九如麻子大每服五九至七九淡生薑湯下乳

嬰童百問

卷六

疳

食後或臨臥服量大小加減

千金射干湯 治小兒咳嗽喘息如水雞聲

射干 半兩 麻黃 半兩 紫菀 半兩 甘州 半兩

生薑 半兩 細辛 半兩 阿膠 半兩 半夏 五个

桂心 五寸 大棗 二十个

右咬咀水七升煎取一升五合去滓入蜜五合

煎一沸分溫服二合日三服

潮熱 第五十七問

竹陽云潮熱者時間發熱過時即退來日依時發熱此欲發驚也發來潮熱又似瘧熱總曰潮熱蓋發作有期其熱有五榮熱衛熱瘴氣熱兩日一發或三日一發竝川梨漿飲治之王氏云潮熱乃是血氣壅實五臟生熱薰發于外故令發熱傷寒論云潮熱者實熱也當利大便大柴胡湯承氣湯等劑治之虛熱者地骨皮散主之犀角飲鼈甲飲靈犀飲秦艽飲生犀散聖濟經用地骨皮飲羌活餅等劑

嬰童百問

卷六

疳

梨漿飲子

治潮熱榮熱衛熱瘴氣熱兩日一發三日一發

積熱脾熱痞熱胃熱癰熱瘧熱邪熱寒熱脾瘧

鬼瘧夜發單瘧獨熱

青蒿 童便浸一日曬乾 柴胡 法芦 人參 去芦

黃芩 炒 前胡 去芦 秦艽 去芦 甘州 各等分

右咬咀每服一歲半錢一歲一錢水一小盞入

生藕生梨薄苛生地黃同煎至半去滓通口空

心食前服

大柴胡湯

治傷寒十餘日。邪氣結在裏。往來寒熱。大便秘

澀。腹滿脹痛。譫語心中痞硬。飲食不下。或不大

便五六日。繞臍刺痛。時發煩躁。及汗後如瘧。日

晚發熱。兼臍實脈有力者。可服。

柴胡去芦八錢 黃芩 三錢 赤芍藥 三錢 枳實去穢三錢

半夏湯泡七次切片 一錢半

右剉散。薑棗煎。加減服之。欲下加大黃半兩。效

大承氣湯治剛症胸滿內實口噤 齒大熱發渴大便閉澀

嬰童百問

卷六

三十七

大黃半兩 芒硝半兩 厚朴一兩 枳實一兩

右剉散。每服三錢。水一盞。煎六分。不拘時熱服。

地骨皮散治虛熱亦治傷寒壯熱

知母一兩 柴胡半兩 甘草半兩 人參半兩

地骨皮一兩 茯苓半兩 半夏湯泡七次切片 三錢

右咬咀薑水煎服。每用三錢。有驚熱加蟬退大

麻黃芩。全嬰方加秦芫。名秦芫飲子。

犀角飲治小兒骨蒸潮熱盜汗肌瘦

犀角鎊碎 鱉甲酥炙 柴胡去芦 知母去毛

地骨皮一兩 胡黃連一兩 大黃半兩 桃枝半兩

右咬咀。每三歲一錢。水一盞。煎三分。去滓溫服。

鱉甲飲治小兒骨蒸潮熱盜汗咳嗽 多渴心燥多驚面黃消瘦

鱉甲酥炙 地骨皮一兩 秦芫一兩 柴胡一兩

枳殼一兩 知母去毛 當歸一兩

右咬咀。三歲一錢。水半盞。桃柳枝各三寸。烏梅

一個。煎三分。去滓服無時。

靈犀飲治小兒骨蒸潮熱盜汗咳嗽可食 多渴面黃肌瘦腹急氣粗等症

犀角鎊碎 胡黃連半兩 茯苓一兩 人參去芦

嬰童百問

卷六

三十八

川芎一兩 秦芫一兩 甘草一兩 羌活一兩

柴胡一兩 桔梗一兩 地骨皮一兩

右咬咀。三歲一錢。水半盞。烏梅竹葉少許煎服。

生犀飲

治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾。日夜潮熱。夜有盜

汗。五心煩熱。四肢困倦。飲食雖多。不生肌肉。及

大病差後餘毒不解。或傷寒病後。因食羊肉體

熱不除。

地骨皮一兩 秦芫一兩 人參去芦 羚羊角鎊碎

大黃蒸一兩 麥門冬一兩 枳殼一兩 柴胡一兩

白茯苓一兩 赤芍藥一兩 桑白皮一兩 龍甲一兩 蘇炙黃

右剉每服二錢水一盞入青蒿少許煎溫服食

後兒小分爲二服治疳勞

青蒿散 治小兒室女肌瘦潮熱

青蒿三錢 甘艸一寸 烏梅一個 小麥五十粒

右咬咀河水一椀煎至三分去滓服

柴胡散 治小兒骨蒸潮熱面黃瘦弱

柴胡半兩 地骨皮半兩 甘草炙半兩

右咬咀水盞每用二錢煎七分去滓服不拘

時

壯熱溫壯 第五十八

仲陽云壯熱者一向熱而不已甚則發驚癇也溫壯者但溫而不熱也巢氏云小兒壯熱者是熱氣盛薰發於外故令身體壯熱其發無漸大體與溫熱相似少有異者熱加甚也此候宜服輕藥惺惺散羌活散皆可甚則黃芩柴胡乾葛之劑散之夫溫壯者絲小兒臟腑不調內有伏熱或挾宿寒皆搏于胃氣故令不和氣行壅滯故積體熱名曰溫壯大便黃而臭者內有伏熱其大便白而臭酸者則挾宿寒故也宜溫之服理中四君子輩加桂治之伏熱宜五苓散并白虎湯二藥俱效其腹中有伏熱溫壯柴苓散主之其心神不安大膽秘熱二番犀角散主之溫壯常熱不止牛黃散主之凡解後餘熱不退可服地骨皮散黃龍湯牛黃膏亦治壯熱直指羚羊角湯治諸驚壯熱治下後熱不退身壯熱百骨節疼梔子仁湯大連翹飲六物黃芩湯五物人參飲對症選用之古法去伏熱則用龍膽湯去宿滯則紫霜丸甚效其法而治之聖濟經用升麻芍藥等劑治之

中湯

治脾胃不和中寒上衝心腹疔痛痰逆惡心嘔吐心下煩悶痞滿膈塞不通飲食減少短氣羸困温中逐水止汗去濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴傷寒時氣裏寒外熱霍亂嘔吐瀉利手足厥冷

人參去蘆 白朮 乾薑炮各等分 甘草炙減半

右剉散每服二錢水一盞薑三片棗一枚同煎腹痛加人參渴加白朮寒多加乾薑附子吐甚

嬰童百問

卷六 熱濕壯

五

去白朮加生薑瀉多還用朮悸者加茯苓四肢厥冷下利轉筋方可加附子為末蜜丸名理中

丸治厥陰臟寒虻上入膈吐出長蟲胃虛冷故先服理中丸或加茯苓枳實

四君子湯

治榮衛氣虛臟腑怯弱心腹脹滿全不思食腸鳴泄瀉嘔噦吐逆

人參去蘆 茯苓去皮 甘草 白朮各等分

右為末每服二錢水一盞煎七分通口服不拘

時雖少許白湯點服温和脾胃進益飲食辟寒邪障霧氣

三苓散

治傷寒温熱病表裏未解頭疼發熱口燥咽乾煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止又治霍亂吐利躁渴引飲

澤瀉二兩 猪苓 白朮 茯苓各一兩

右為末每服二錢熱湯調下不拘時多飲熱湯

嬰童百問

卷六 熱濕壯

五

有汗出即愈又治濕熱在裏身發黃疸濃煎茵陳湯下食前服疸病發渴及中暑引飲亦可用水調服小兒加白朮末少許如發虛加綿黃芪人參末少許服之前十六問辰砂五苓散參用

白虎湯

治傷寒大汗出表症已解心胸大煩渴欲飲水及吐或下後七八日邪毒不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲數升者宜服又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱而渴

知母 三兩 甘艸 一兩 石膏 八兩 粳米 三合
右咬咀。每服三錢。水一盞。煎六分。米熟為度。去滓。溫服。聖惠方加乾葛。

柴苓散

治小兒腹中有伏熱。溫壯來去。

柴胡 七錢半 麥門冬 去心 人參
赤茯苓 甘草 各半 黃芩 一兩

右剉散。每服二錢。水一盞。入小麥一撮。竹葉一片。煎五分。去滓。溫服。量大小加減與之。

二黃犀角散

治小兒身體溫壯。心神不安。大腑秘熱。

犀角屑 大黃 酒浸 鈞藤 梔子仁
甘艸 黃芩 各五錢

右為末。每服五分量。大小加減。熱湯調下。牛黃散。

治小兒溫壯。身體常熱不止。

牛黃 研 甘艸 各五錢 柴胡 去毒 梔子 炒
龍膽艸 各二錢半

右為末。每服五分。以金銀湯調下。無時。地骨皮散。

治虛熱。亦治傷寒壯熱。

知母 柴胡 甘艸 人參
地骨皮 茯苓 半夏 各等分

右剉散。生薑煎。有驚熱。加蟬退。天麻。黃芩。全蝎。方加秦芫。各秦芫飲子。

黃龍湯

治傷寒身熱不退。

柴胡 五錢 黃芩 甘艸 各二錢 赤芍藥 三錢

右咬咀。每服二錢。薑一片。棗一枚。水一盞。煎至五分。去滓。溫服。無時。

牛黃膏

治小兒天弔驚風。手足搐搦。面唇紅赤。咽喉痰響。渾身頭額壯熱。喚問不知。不醒人事。或只左手左腳偏搐。或只右手右腳偏搐。或只唇口眼。

鼻顫。搐此疾。則多肚腹脹熱。極則胸膈久積。驚涎。忽被風邪所觸。故作是候也。此患大忌。不

得鍼灸若鍼灸過悞矣凡中此疾須辨認有前項形證宜服此劑

蝎尾

四十枚 去殼一錢 九枚 半不去油

梅花腦

半字

辰砂

研二錢 以是角水煮過

牛黃

少許

麝香

一字

右六味為末每遇小兒中前項證候周歲半字三四歲一字仍觀孩兒身體肥瘦臟腑虛實及病勢輕重則加藥用蜜熟水一二分調勻灌下或薄荷湯亦可服藥後良久壓下痰涎疎去風

嬰童百問

卷六

五

氣當宜瀉兩三行其瀉出如雞子白是應效或

胸膈痰涎壅盛痞滿服此藥宜吐風痰亦為美

也下藥後或吐或瀉手足搖擗稍定喉嚨不響

頭額腹肚漸涼眼目不到記得人事面紅赤色

但時時有少溫壯驚潮風熱來未退便續下保

壽散三兩服金粉散一二服晝晨更可下均氣

補虛進乳哺白朮散一日晝晨與一服或服此

數件藥後或只覺得腹肚至夜微熱不進乳食

宜空心與進一服寬熱散微微通去腹中餘熱

風濕或有是疾服藥稍退忌兩日不可見風一

方加粉霜三錢各硃砂膏

羚羊角湯

治諸驚壯熱

羚羊角

蟬蛻

茯神

麥門冬

去心

柴胡

地骨皮

黃芩

右剉散每服二錢薑棗煎服

梔子仁湯

嬰童百問

卷六

五

治陽毒傷寒壯熱百節疼痛下後熱不退者

梔子仁

赤芍藥

大青

知母

各一兩

川升麻

黃芩

石膏

柴胡

各二兩 去苗

甘艸

杏仁

生薑

三片

煎六分去

浮不拘時溫服

大連翹湯

治瘡疹壯熱小便不通諸般瘡癩丹毒疥風

連翹

瞿麥

荊芥

木通

赤芍藥 當歸 防風 柴胡

活石 蟬蛻 甘艸炙各一錢 山梔子

黃芩各五分

右剉細每服一錢加紫艸煎溫服熱甚加大黃

更詳症加減為佳。

六物黃芩湯

治小兒天行壯熱少小腹大短氣熱有進退飲食不化。

黃芩 大青 甘艸 麥門冬去心

嬰童百問 卷六 六一

石膏各半兩 肉桂 三錢

右剉散每服三錢白水煎去滓溫服

五物人參湯

治天行壯熱咳嗽心脹滿。

人參 甘艸各半兩 麥門冬去心 生地黃各一兩半

茅根半握

右剉散每服三錢白水煎服。

龍膽湯

治胎驚月內氣盛發熱凡臍風撮口壯熱皆可

用治嬰兒出腹血脉盛實寒熱溫壯四肢驚掣

發熱大吐現者若已能進哺中食實不消壯熱

及變蒸不解中客入鬼氣并諸驚癇方悉主之

十歲已下小兒皆服之小兒龍膽湯第一。此是

新出腹嬰兒方若日月長大者以次依上為例

若必知客忤及有魘氣者可加人參當歸各如

龍膽多少也。一百日兒加三銖。二百日兒加六

一歲加半兩。

龍膽艸 釣藤皮 柴胡 黃芩

嬰童百問 卷六 六一

桔梗 芍藥 茯苓 甘艸各六錢

蟻蛭二枚去翅炙 犬黃一兩

右咬咀以水一升煮取五合為劑也服之如後

節度有藥虛實宜足數合水也兒生一日至七

日分一合為三服兒生八日至十五日分一合

半為三服以漸加服皆得下即止勿再服也直

指方為末每服一錢非東煎服或加防風麥門

冬以導心熱黃芩減半去蟻蛭亦可。

紫霜丸

治食積亦是傷寒之藥治乳哺失節宿滯不化胃腹脹滿嘔吐惡心便利不調乳食減少又治傷寒溫壯挾熱實大便酸氣食不消化或已得汗熱不止或變蒸發熱多目不解或因食而發癩片寒後熱並宜服之

代赭石 取用辭 一斤七火

赤石脂 各一斤

杏仁 五十粒去皮尖麩炒

巴豆 三十粒去皮膜出油炒過研

右先將杏仁巴豆入乳鉢內細研如膏却入代赭石脂末研和勻以湯浸蒸餅丸如粟米大一

嬰童百問

卷六

堯

歲兒五九米飲下一二百日見三九亦要看肥瘦加減微瀉為度人凡變蒸與傷寒調理一同

此藥並治之此仍是瀉食積之劑量虛實用

黃疸 第五十九問

傳陽云身痛背轉強大小便澀一身皆黃面目爪甲俱黃小便如屋塵汁色着物皆黃褐者難治此黃疸也別有一症生下百日及半年不因病後身微黃者胃熱也大人亦同又有面黃腹大食吐渴者脾病也又有初生而身黃者胎疸也諸疸皆熱色深黃者是也若淡黃兼白者胃怯不和也茵陳湯梔子蘗皮湯犀角散連翹赤小豆湯主之通治黃疸茵陳五苓散尤為穩也又有脾弱痿黃小便清者治以溫劑當歸膠童百問

茵陳湯

治陽明病發熱汗出者此為熱越不能發黃也但頭汗出身無汗齊頸而還小便不利渴十水漿者此為痰熱在裏身必發黃傷寒七八日身黃如橘色小便不利腹微滿者

茵陳蒿 嫩者一兩 大黃 三錢 梔子 大者三枚

右剉散以水一斗煮取五升先煎茵陳減半次用二味煎八分去滓溫服日三服小便當利如皂角汁

狀色正赤。一宿腹減黃從小便中去也。量大小加減。

梔子蘗皮湯

治傷寒身黃發熱。

梔子 八枚 黃蘗 一兩 甘艸 炙半兩

右剉散。每服二錢。水一盞。煎六分。去滓。溫服。

犀角散

治小兒黃疸。一身盡黃。

犀角 一兩 茵陳 乾葛 升麻

嬰童百問

卷六 黃疸

龍膽草 生地黃 各半 寒水石 七錢

右剉散。白米煎。一方治小兒忽發黃。面目皮肉

須盡黃。乾葛根汁和蜜服。

連翹赤小豆湯

治小兒傷寒。發黃身熱。

麻黃 去節 連翹 甘艸 生薑

赤小豆 生梓白皮 各二兩 杏仁 四十粒

大棗 十二枚

右剉散。白米煎。一方小麥苗搗汁服之。立效。

茵陳五苓散

五苓散加茵陳湯十分。五苓散五分。

右二件。拌勻。每服一錢。溫水調下。日三服。

當歸散

治小兒夜啼者。臟寒而腹痛也。面青。手冷。不吮

乳。是也。宜此方用。

甘艸 炙 桔梗 陳皮 當歸 各一錢

右為末。水煎半盞。時時少與服之。又有熱痛。亦

啼。叫不止。夜發。面赤。唇焦。小便赤。與三黃丸人

嬰童百問

卷六 黃疸

參湯下。

當歸丸

治小兒冷熱不調。大便青黃。心腹多痛。或腹中

氣滿。或時嘔逆。不吮乳食。加枳殼尤妙。

當歸 白芍藥 人參 川芎 各三錢

甘艸 炙 白朮 各半兩

右為末。煮麪糊為丸。如麻子大。三歲小兒。每服

十丸。粥飲送下。日三服。更量大小。加減。冷甚者

加陳皮。

小兒夏湯

治黃疸小便色不異欲日利腹滿而喘者不可除熱熱去必噤

半夏 湯洗七次

右剉散每服三錢水一盞薑十片煎七分溫服

消食丸

治常服寬中快氣消乳食正顏色

縮砂 炒 陳皮 炒 三稜 煨 蓬朮 煨

神麴 炒 麥蘖 炒 香附子 米泔浸宿炒用

嬰童百問 卷六

枳殼 檳榔 烏梅 各半 丁香 二錢

右爲末麩糊丸如菜豆大食後紫蘇湯下二十

或三十九

嘔證吐乳證 第六十問

仲陽云初生下拭掠小兒口中穢惡不盡嚥入喉中

故嘔吐及多生諸病嘔者有聲也吐者吐出乳也凡

小兒乳哺不宜過飽若滿則溢故令嘔吐胃中納乳

如器之盛物杯椀之小不可容巨椀之物兩驟則溢

溢酒暴則厄翻理之必然乳母無知但欲速得乳兒

長大更無時度或兒睡着而更嘔乳豈有厭足受病

之源自此漸至日深導其胃氣之虛慢驚自此而得

可不慎乎此候但令節乳爲上甚者宜令斷乳先此

嬰童百問 卷六

乳母可服調氣之劑兒服消食丸化乳壯胃爲上謹

曰吐乳呢乳此症有數般有冷有熱當自辨認若吐

自口角出此是乳多消化不出滿而則溢此非病也

常服消乳丸異攻散當令乳母節乳爲上冷吐可服

觀音散香朴散快脾等藥熱吐則頭額溫有黃涎而

渴小便赤少此是熱吐多是傷暑熱者有此症乳母

同服香需散五苓散又有風痰吐乃是傷風不解吐

乳夾痰若經久必然生風仍宜下疎風化痰藥竹茹

湯去桂五苓散青州白丸子溫膽湯又當留心調治

六氣丸亦可服

消乳丸

治溫中快膈止嘔吐消乳食脈沉者乃傷食不化故也

香附炒一兩 甘艸炙 陳皮各半兩 縮砂仁

神麴炒 麥蘖炒各一兩

右為末泡雪糕丸如黍米大七歲以上菜豆大三十丸食後薑湯下

又治百疳內嘔吐乳汁或大便青色

嬰童百疳

卷六

疳積乳疳

奎

右用小婦人乳汁一盞入丁香十粒去白陳皮一錢於器內同煎三十沸去丁陳稍熱與兒服

消食丸

治小兒飲食乳哺取冷過度冷氣積於脾胃胃為水穀之海脾氣磨而消之胃氣調和則乳哺消化脾傷于冷則宿食不消此藥寬中快氣消乳食正顏色

縮砂 陳皮 三稜煨 蓬朮煨

神麴炒 麥蘖炒各半兩 香附炒

右為末麩糊丸菜豆大食後紫蘇湯下二十丸和劑觀音散

治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳食久則漸至羸瘦大抵脾虛則瀉胃虛則吐脾胃俱虛則吐瀉不已此藥大能溫養脾胃進美飲食

石蓮肉去心 人參 神麴炒各三錢 茯苓 二錢

甘艸炙 木香 綿黃芪炙 白扁豆炒去皮

白朮各一錢

嬰童百疳

卷六

疳積乳疳

奎

右到散每服二錢水一盞棗一枚薑香三葉煎溫服

異攻散

治溫中和氣治吐瀉不思飲食凡治小兒虛冷病先與數服以正其氣

人參 白朮 茯苓 甘艸

橘紅 木香等分

右為末每服三字薑棗煎服一方去木香

香朴散

治嘔吐泄瀉

藿香

陳皮

厚朴

薑汁炒 各七錢

半夏

湯泡七次一兩

甘艸

炙一錢

右剉散每服三錢水一盞薑五片棗一枚同煎如瀉甚加木香肉豆蔻

香薷散

治臟腑冷熱不調飲食不節寒暑風冷之氣所

傷致令真氣相干腸胃虛弱心腹疼痛霍亂氣

逆及吐利發熱頭疼或嘔或瀉或轉筋拘急

嬰童百問

卷六

霍亂吐乳症

三七

香薷

一兩

白扁豆

炒厚朴

薑製各半兩

右剉散每服三錢水一盞薑三片煎服一方加

黃連治瀉痢一方加芫芷香蘇散治霍亂吐瀉

暑月感冒傷暑之症

五苓散

治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾

煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表

解煩渴不止又治霍亂吐利躁渴引飲

澤瀉

二兩

猪苓

白朮

茯苓

各一兩

桂

右為末每服二錢熱湯調下不拘時多飲熱湯

有汗出即愈又治濕熱在裏身發黃疸濃煎茵

陳湯下食前服痘病發渴及中暑引飲亦可用

水調服小兒加白朮末少許如發虛加綿黃芪

人參末少許服之前十六問辰砂五苓散參用

竹茹湯

治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不止

葛根

七錢

半夏

半兩

甘艸

一錢

嬰童百問

卷六

霍亂吐乳症

柒

右咬咀每服三錢水一盞入竹茹棗少許生薑

五片煎七分去滓取清汁微冷細細服不拘時

加茯苓三錢尤妙

蘇合香丸

治傳屍骨蒸諸項勞瘵順氣化痰卒暴心痛鬼

魅瘧疾霍亂吐瀉赤白下痢小兒驚搐

蘇合香油

五錢

安息香

一兩

沉香

半兩

未用

丁香

青木香

白檀香

沉香

草撥

香附米

訶子

烏犀

鎊屑

硃砂 研水飛 各一兩

薰陸香 片腦 研各五錢

麝香 七錢 半

右為末用安息香膏入蜜和丸如芡實大空心用沸湯化下小兒一丸老人四丸酒下亦可用蠟紙裹一丸彈子大用緋絹袋盛常帶之一切邪神不敢近去腦各麝香蘇合香丸治一切邪及胸膈噎塞腸中虛鳴宿食不消餘症並同

青州白丸子

治一切風痰小兒驚風

嬰童百問

卷六

驚風吐乳

完

天南星 生 各

白附子 生 各 三兩

川烏頭 生 各 皮

半夏 生 七 兩

右用子花水浸次蚤另換新水春五日夏三日秋七日冬十日曬乾為細末以糯米粉煎粥清為丸如芡豆大小兒驚風薄荷湯下和蘇合香丸服各香青丸。

溫膽湯

治小兒心經虛怯夜臥不寧

枳實

陳皮

茯苓

甘艸

半夏 泡 各 竹茹 少許 等分

右剉散白水煎加薑二片棗一枚空心服

紫霜丸

治食積亦是傷寒之藥治乳哺失節宿滯不化胃腹痛滿嘔吐惡心便利不調乳食減少又治傷寒溫壯挾熱實大便酸氣食不消化或已得汗身熱不除或變蒸發熱多日不解或因食而發癩先寒後熱並宜服之。

代赭石 服 用 醋 煎 七 次

赤石脂 各 一 兩

嬰童百問

卷六

驚風吐乳

三

杏仁 五 十 枚 去 皮 尖 麩 炒

巴豆 三 十 粒 去 皮 微 出 油 炒 過 研

右先將杏仁巴豆入乳鉢內細研如膏却入代赭石脂研和勻以湯浸蒸餅丸如粟米大一歲兒五丸米飲下。一二百日兒三丸亦要看肥瘦微瀉為度大凡變蒸與傷寒調理一同此藥並治之此藥仍是瀉食積之劑要辨虛實用丸。

嬰童百問卷之六

嬰童百問卷之七

熱吐 第六十一問

小兒秋夏伏暑多有熱吐何以別之或有黃濁頭額
溫五心熱小便赤而少或唇乾而煩渴先令乳母服
香薷散五苓散兒服竹茹湯五苓散熱甚者大柴胡
湯去大黃服或小柴胡湯亦可熱極者可服大承氣
湯其效如神玉露散亦可服

香薷散

治陰陽不順清濁相干氣射中焦名為霍亂

嬰童百問

卷七 熱吐

由飽食豚膾復啖乳酪海陸百品無所不食
飲寒漿眠臥冷席風冷之氣傷于脾胃諸食結
而不消陰陽二氣壅滯不得流行陽氣欲降陰
氣欲升陰陽交錯變成吐利不已臟腑昏亂榮
衛俱虛冷搏于筋令轉筋宜服此劑大有神效

厚朴

一兩

薑炒

香薷

一兩

白扁豆

一兩半

炒黃

右咬咀每服三錢水一盞酒半盞同煎七分

去滓用新汲水頻頻浸換令極冷頓服之藥冷
則速效也煎時不得用鐵器慢火煎之兼治非

時吐利霍亂腹中撮痛大渴煩燥四載逆冷汗
出如雨兩脚轉筋疼痛不可忍須臾中洗令
極冷頓服之乃有神效

五苓散

治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾
煩渴引飲或水入即吐或小便不利及汗出表
解煩渴不止又治霍亂吐利燥渴飲水

澤瀉

二兩

猪苓

一兩

白朮

一兩

茯苓

一兩

桂

一兩

嬰童百問

卷七 熱吐

右為細末每服二錢熱湯調下不拘時服訖
飲熱湯有汗出即愈又治痰熱在裏身發黃疸
濃煎茵陳湯下食前服疸病發渴及中暑引飲
亦可用水調服如發虛浮腫加綿黃芪人參末
少許

竹茹湯

治胃受邪熱心煩喜冷

葛根

半兩

半夏

一兩

甘艸

四錢

右咬咀每服三錢水一盞入竹茹棗許大薑五
片煎至七分不時服

大柴胡湯

治傷寒十餘日邪氣結在裏往來寒熱大便秘澀腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大便五六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱兼臍實脈有力者可服。

柴胡去芦 黃芩 三錢 枳實去穢 炒三錢

半夏湯泡七次切片 枳實炒 三錢

右剉散薑棗煎加減服之欲下加大黃半兩。

大承氣湯

治剛痊胸滿內實口噤咬牙大熱發渴大便秘

大黃 半兩 芒硝 半兩 厚朴 一兩 枳實 二枚

右剉散每服三錢薑棗三片煎服。

玉露散

涼心經解諸熱治口燥咽乾煩渴躁啼小便澀

寒水石 二兩 石膏 二兩 甘艸 三錢

右爲末每服半錢門冬湯調下湯使隨意加辰砂金箔名桃紅散亦治急驚入梔子仁名金蓮散加滑石半兩名玉真散。

寒冷嘔吐噦逆 第六十二問

小兒感受風冷或食生冷瓜果過多胃口停寒以致吐食吐乳並用理中湯主之或釀乳法消乳丸異攻散香朴散茯苓半夏湯二陳湯人參散磨沉散俱可服。

理中丸

治脾胃不和中寒上衝胸膈心腹逆滿疔痛痰逆惡心嘔吐心下虛煩痞滿胸塞不通飲食減少短氣羸困溫中逐水止汗去溼泄瀉注下水

嬰童百問 卷七 寒冷嘔吐噦逆 四

穀不分腹中雷鳴傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利手足厥冷胃痺心痛逆氣短氣寒多不飲水而吐。

人參去芦 白朮 二兩 乾薑 炮 三兩 甘艸 炒 減

右咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓帶熱服空心食前或研細末白湯調下腹痛者加人參一兩半寒多加乾薑一兩半渴者加白朮一兩半臍上築者腎氣動也去白朮加桂四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者還用朮悸者加茯苓

苓二兩或四肢拘急腹滿下利轉筋者去朮加

附子一个生用末之蜜丸如雞子黃大各理中

丸又名調中丸治厥陰臟寒虵上入鬲吐長蟲

或胃中虛冷因發汗致吐蟲先服理中丸或加

枳實茯苓蜜丸治傷寒結胃欲絕心隔高起實

滿作痛手不得近並用熱湯化下

釀乳法

治初生嬰兒以表用藥凡有胎熱症當令乳母

服藥不可求效之速治法當釀乳令兒嚼漸次

嬰童百問

卷七

嬰童百問

五

解之有無一失若遽以冷藥攻之必損脾胃加

以嘔吐必成大患

澤瀉

二兩

去黑

赤茯苓

天花粉

各一兩

生地黃

二兩

山茵陳

甘艸

各一兩

右咬咀每服五錢水一盞煎六分食後捏却服

消乳丸

治小兒乳哺飲食取冷過度冷氣積于脾胃胃

為水穀之海脾氣磨而消之胃氣調和則乳哺

消化脾傷于冷則宿食不消脉沉為食不化故

砂仁

炒半兩

橘皮

半兩

京三稜

兩

蓬莖

半兩

神麴

炒半兩

麥蘖

炒半兩

香附子

炒

右為末麴糊丸麻子大食後白湯加減下

異功散

治吐瀉不思飲食溫中和氣及脾

人參

一兩

茯苓

一兩

白朮

炒

甘艸

炒

橘紅

一兩

木香

一兩

右到散每服二錢一棗煎服一方無木香

香朴散

治嘔吐冷症

藿香葉

八分

陳皮

八分

厚朴

八分

半夏

六分

嬰童百問

卷七

嬰童百問

六

甘草

一分

右咬咀水一盞生薑二片棗子一个煎七分服

茯苓半夏湯

治諸嘔噦心下堅痞

茯苓

二兩

半夏

五錢

湯

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片煎六分服

二陳湯

治痰飲為患嘔吐惡心或頭眩心悸或

半夏

五錢

橘紅

五錢

白茯苓

三錢

甘草

錢半

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片烏梅一个

煎至七分去滓溫服

人參散

治小兒臟腑冷。若纔嘔乳食。即又吐出。或因
嘔乳為驚。觸犯。令小兒外症。面唇青黑。手足心
熱。口多清涎。吐逆不住。或作瀉候。青黃紫白。或
如鼻涕。雞子清者。並宜服之。

人參

半兩

白朮

半兩

白茯苓

半兩

沉香

半兩

烏藥

半兩

甘艸

半兩

右為細末。以瓶貯之。遇小兒有前項形症。半歲

一字。二三歲半錢。大者一錢。煎棗子米飲調下。

嬰童百問

卷七

寒冷嘔吐瀉

一

或陳紫蘇湯亦可。或吐瀉并作。煎丁香湯下。陳

皮湯尤妙。

麝香散

又名沉香散。生胃氣。止吐瀉。

茯苓

二錢

沉香

一錢

丁香

一錢

木香

一錢

藿香

一錢

厚朴

製一錢

甘草

多一錢

麝香

一錢

右為細末。每服一錢。米飲調下。

霍亂吐瀉

第六十三問

小兒吐瀉。有身溫者。有身熱者。有身涼者。有吐瀉成
驚風者。有夏秋傷暑吐瀉者。有初生三日內吐瀉者。
仲景云。小兒初生三日內吐瀉。壯熱不思乳食。大便
青白。乳食不消。或白色是傷。當下之。後和胃。仍用白
餅子。和胃用益黃散主之。三日以後。至十日吐瀉。身
溫涼。不思乳食。大便青白色。乳食不消。此上實下虛
也。用益黃散加減治之。又傷風吐瀉。身溫。乍涼乍熱。
多氣。兼大便黃白色。嘔吐乳食不消。時時咳嗽。更有
嬰童百問 卷七 霍亂吐瀉 八

五臟兼見症。當服入臘君臣藥。先大青膏。後益黃散
主之。又吐瀉身熱。多睡能食。乳飲水不進。吐痰。大便
黃水。皆為胃虛熱渴吐瀉也。當生胃中津液。以止其
渴。止後用發散藥。止渴多服白朮散。發散太青膏。鈎
藤飲主之。又吐瀉身涼。吐沫。瀉青白色。悶亂不渴。嘔
氣長出氣。睡露睛。此傷風荏苒輕快。因成吐瀉。當補
脾後發散。補脾益黃散。發散大青膏。鈎藤飲。夏至後
吐瀉。身壯熱。熱症也。或因傷熱乳食。嘔吐不消。瀉深
黃色。玉露散主之。五苓散亦佳。香薷散。車前子散。可

選而用之。若面色青黃。知風熱在脾。髮直怕人。眼不合。是心中有毒。涎更胃逆。風搐可服定命丹。

白餅子

治小兒夾食傷寒。其症發熱嘔吐。亦有肚疼者。噯氣辨得分曉。先用此藥一服。推下食積。却用平和藥發散調治。如惺惺散加減。參蘇飲皆可。服却不可服冷藥。

滑石 一錢 南星 一錢 半夏 一錢 輕粉 十錢

巴豆 二十四個 去皮膜用 水一升 煮乾研細

嬰童百問

卷七

九

右三味搗羅為末。入巴豆霜。次入輕粉。又研勻。却入餘藥末。令勻。糯米飲丸。如菉豆大。量小兒壯瘦虛實用藥。三歲已下。每服三丸。至五九。紫蘇湯空心下。忌熱物。若三五歲兒壯實者。不以此拘。如至二十九。以利為度。

益黃散

治小兒吐瀉脾虛。不食米穀。不化。

陳皮 去白 一兩 丁香 二錢 木香 一兩 訶子 炮去核 半兩

青皮 去穢 半兩 甘草 炙 兩

若為末。每服二錢。水一盞。煎三分。食前服。

大青膏

治傷風熱發。出牙。

天麻 一錢 白附子 半錢 蝎尾 半錢 硃砂 一錢

青黛 一錢 天竺黃 一錢 麝香 一字 烏蛇 酒浸焙 乾半錢

右為末。生蜜為丸。如芡實大。月中兒。梗米大。同

半黃膏。薄荷湯化下。五歲以上。同甘露散服之。

白朮散 治小兒吐瀉

人參 二錢 白茯苓 半兩 白朮 半兩 藿香葉 半兩

木香 二錢 甘草 一錢 乾葛 半兩 湯者 加至一兩

右散。咀。每服三錢。水煎。甚發渴。去木香。

嬰童百問

卷七

十

釣藤飲 治吐瀉脾虛

釣藤 釣 三錢 蟬蛻 半兩 天麻 半兩 防風 半兩

蝎尾 半兩 人參 半兩 僵蠶 炒 二錢 麻黃 去節 二錢

甘草 炙 二錢 川芎 二錢 麝香 不拘 多少

右剉。每服三錢。水一盞。煎服。寒多加附子半錢。

玉露丸 治心經解諸熱。治口燥咽乾。煩渴。嘔吐。小便不利。

寒水石 一兩 石膏 一兩 甘肅 三錢

右為末。蜜丸。桐子大。每服十九。白湯下。

五苓散 治霍亂吐瀉。渴引飲。小便不利。或水入即吐。及汗出表解。煩渴不止。並皆治之。

澤瀉二兩 猪苓一兩 白朮一兩 白茯苓一兩
桂一兩

右為細末，每服二錢，熱湯調下，不拘時。服訖多飲熱湯，汗出即愈。又治痰熱在裏，身發黃疸，濃煎茵陳湯下，食前服。迫病發渴及中暑引飲，亦可用。水調服。小兒加白朮末少許，如發虛加綿黃芪人參末少許。

香薷散 治霍亂吐瀉轉筋

香薷一兩 白扁豆一兩 厚朴一兩

嬰童百問 卷七 霍亂吐瀉 十一

右剉，每服三錢，水煎，井中浸冷，連進二三服效。

車前子 治暑月伏熱霍亂吐瀉煩悶引飲

白茯苓一兩 猪苓一兩 香薷一兩 車前子一兩

人參五錢

右末，燈心湯調下，肚疼加芍藥，瀉不止加石蓮。

定命飲子 治慢驚吐瀉困重欲傳慢脾風

生半夏一兩 茯苓一兩 木香一兩 生薑一兩

右為末，每服半錢，薑棗煎湯調下。

理中湯 治霍亂吐利

人參三兩 白朮三兩 乾薑三兩 甘草一兩

右咬咀，每服三錢，水一鍾，煎六分，去滓，帶熱服。

空心食前，或研細末，白湯調下，腹痛者，加人參。

一兩，半寒多加乾薑一兩，半渴者加白朮一兩。

牛膈上築者，腎氣動也，去白朮，加桂四兩，吐多。

者，去朮，加生薑三兩，下多者，還用朮，悸者，加茯苓二兩，或四肢拘急，腹滿下利，轉筋者，去朮，加。

附子一個，生用末之，蜜丸如雞子黃大，名理中。

九，又名調中九，治厥陰臟寒，虬上人鬲，吐長蟲。

嬰童百問 卷七 霍亂吐瀉 三

六，胃中虛冷，西發汗，故吐蟲，先服理中九，或加。

枳實，茯苓，蜜丸，治傷寒結胸，欲絕心，鬲高起，實。

滿作痛，手不得近，並用熱湯化下。

不換金正氣散 治山嵐瘴氣寒熱往來五瀾

厚朴去皮薑汁炒一兩 藿香一兩 陳皮一兩

半夏皂莢白礬薑汁同煮一兩 甘草炙一兩 蒼朮米泔浸一兩

右咬咀，每服三錢，水一盞，生薑三片，大棗二枚。

煎七分，絞去滓，食前帶熱服。

二順散 治伏熱中暑霍亂吐瀉煩悶

治伏熱中暑霍亂吐瀉煩悶，小便赤色，腹血肚疼。

猪苓 一兩 澤瀉 一兩 茯苓 一兩 白朮 一兩

甘艸 一兩 桂 一兩 乾薑 一兩 杏仁 一兩 去皮尖

右爲末每服半錢或一錢新汲水調下

又釀乳法

治胃虛吐瀉睡中吐舌搖頭吐乳作腥氣額上

汗流多驚啼哭面黃凡有此疾宜暫斷乳令胃

乾饑甚用藥令乳母釀乳

人參 一兩 木香 一兩 藿香 一兩 沉香 一兩

陳皮 一兩 神麴 一兩 麥芽 一兩 丁香 半兩

嬰童百問

右咬咀每服四錢薑三片紫蘇十葉棗三個

乳母食後捏去奶汁盡方服半盞許臥少時却

與兒乳

疝病 第六十四問

巢氏云小兒被疝病者婦人懷胎孕有鬼神導其腹

中胎嫉妬小兒致合此病其狀微微下利寒熱往來

毛髮擊擊情思不悅也千金論疝者小兒鬼也凡婦

人先有小兒未能行而母繼有胎維令兒漸漸羸瘦

骨立毛髮稀黃不長時作壯熱大便不勻乃疝病也

又曰繼病法當用紫霜丸下疝乳以益黃散補之令

小兒斷乳即安消乳丸異攻散亦妙劑也其或他婦

人有姪而抱他人嬰孩者亦有此症同此治法有熱

者龍膽湯

紫霜丸 治小兒因母復胎致有寒熱羸瘦日繼病

代赭石 煅醋淬七 赤石脂 一兩 杏仁 五十個 去皮尖

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代

赭石脂末研勻以湯浸蒸餅爲丸如粟米大一

歲服五丸米飲吞下一二百日內兒三九乳汁

下更宜量其虛實加減微利爲度此藥兼治驚

痰諸疾雖下不致虛人

益黃散 治小兒吐瀉腹虛不食米穀不化困倦

少滯腸夜起并疝虛汗背脊汗出

陳皮 去白 丁香 二分 訶子 炮去油

青皮 去穢 甘草 炙半

右為末每服二錢水一盞煎三分食前服

消乳丸 治小兒乳哺飲食取冷過度冷氣積于脾

砂仁 半兩 橘皮 半兩 三稜 炒半 蓬朮 炒半

神麴 炒半 麥芽 炒半 香附子 炒

右為末麩糊丸麻子大食後白湯送下

異功散 治吐瀉不思飲食濕中和氣及脾胃虛冷

人參 一兩 白茯苓 一兩 白朮 一兩 甘草 炙一兩

嬰童百問 卷七 瀉利

橘紅 一兩 木香 一兩

右剉散每服二錢薑棗煎服一方去木香

龍膽湯 治小兒因乳母復受胎孕令見漸漸銷瘦

龍膽艸 半兩 鈞藤 半兩 柴胡 半兩 黃芩 半兩

白芍藥 半兩 茯苓 半兩 甘草 半兩 蜣螂 二枚 去足炙

大黃 錢半

右剉散每服二錢水一盞煎半盞服之以漸加

服得利即止直指方加防風麥門冬以導心熱

黃芩減半比棗煎服去蜣螂蟲亦可

瀉利 第六十五問

子金論小兒春秋月晨夕中暴冷冷氣折其四肢熱

不得泄則壯熱冷氣入胃變下利或赤白滯起數去

小兒腹脹痛極壯熱氣脈洪大或急熱數者宜調中

湯下之熱便歇利亦瘥也但壯熱不吐下者亦宜服

之又夏月秋初急有暴寒折于盛熱無可發散客搏

肌中發外則為瘧發于內則為痢內外俱發則瘧痢

俱作皆由榮衛不和腸胃虛弱冷熱之氣乘虛客于

腸胃又因飲食所傷冷熱不調夾冷則白夾熱則赤

嬰童百問 卷七 瀉利

冷熱交攻則膿血相雜亦因沉積所作赤痢積熱白

痢積冷赤白相雜冷熱之積若脾胃氣虛不能消化

水穀則糟粕不聚或春間解脫風冷所傷腸胃虛弱

卒被風寒所折便為下利多矣經云春傷于風夏必

飧泄故也調中湯去大黃加枳殼更利不止則加黃

連治之其暴下利者車前子末之米飲調下亦效暑

月用五苓散車前子散燈心湯調服瀉火散加減服

陽陽明合病者必下利葛根湯主之嘔者加半夏

連散亦可服

調中湯 治夏末秋初有暴六折于感暑熱者

大黃 七錢 桔梗 半兩 藥本 半兩 茯苓 半兩

甘草 半兩 乾葛 半兩 黃芩 半兩 芍藥 半兩

白朮 半兩

右咬咀白水煎量大小加減服得快氣利壯熱

便歇去大黃加黃連袂殼止利尤妙或加地榆

或加當歸皆可感風加荆芥

五苓散 治傷寒濕熱病發熱口渴燥咽乾煩渴飲水

澤瀉 二兩 猪苓 半兩 白朮 半兩 白茯苓 半兩

嬰童百問 卷七 瀉利 七

肉桂 一兩

右爲細末每服二錢白湯調下不拘時服訖多

飲熱湯有汗出即愈又治痧熱在裏身發黃疸

濃煎茵陳湯下食前服疸病發渴及中暑引飲

亦可用水調服小兒加白朮末少許如發虛加

綿黃芪人參末少許

車前子散 治暑月伏熱霍亂吐瀉煩悶引飲

白茯苓 一兩 猪苓 一兩 香薷 一兩 車前子 一兩

人參 半兩

右爲細末每服一錢燈心泡湯調下腹痛加芍

藥瀉不止加石蓮

潑火散 治中暑煩燥發渴口乾及治血痛

青皮 去白一兩 赤芍藥 一兩 黃連 去對一兩 地榆 一兩

右爲細末冷水調下一錢如血熱妄行加甘草

葛根湯 治太陽病項強兀兀惡風無汗不惡寒

葛根 四兩 麻黃 三兩 肉桂 一兩 甘草 一兩

白芍藥 二兩

右剉每服五錢水一盞生薑三片棗子二枚同

嬰童百問 卷七 瀉利 六

煎至七分去滓服取微汗

四逆散 治少陰病其人或咳或悸或小便

甘草 炙一兩 枳實 炒一兩 柴胡 一兩 白芍藥 炒一兩

右搗篩爲細末水飲調下二錢日進三服○如

咳者加五味子乾薑各半兩下利悸者加桂半

兩小便不利者加茯苓半兩泄利下重先濃煎

薤白湯內藥末三錢匕再煮一二沸溫服

冷瀉 第六十六

湯氏云此乃脾虛受冷致令水穀不化泄瀉注下。仲陽云小兒不能食乳瀉褐水身冷無陽也。當脾益黃散主之。古今不同當依加減法用之始為穩當。冷積瀉沒石子丸極效。人參散理中湯加減服尤佳。更加肉豆蔻則止。來復丹不換金正氣散皆可。觀音散銀白散加減調治乃平和之劑也。

益黃散

治小兒受寒瀉利青白脾虛不食米穀不化困倦力少滑腸夜起并治涎唾流頰下

陳皮

去白一兩丁香二錢一方

訶子

炮去核五錢

青皮

去穢五錢甘草炙五錢

右剉每服二錢水一盞煎至七分去滓食前服

沒石子丸

治小兒嬰孩先因冷瀉或作赤白利候久而變作諸般異色不止一端外症面或青或白唇舌乾焦手微冷渾身溫壯肚內刺痛啼叫睡臥不安若有是候當服沒石子丸

沒石子

錢木香一兩黃連一兩當歸一兩

青皮

一錢

石五件為末阿膠一錢酒一盞浸化人麩少須令勻煮糊為丸如粟米大二歲兒服如椒目大者四五六歲兒服每服五十九赤痢甘艸湯下白痢乾薑湯下或用五倍子湯下。一方用沒石子一個白豆蔻五個訶子肉二個木香黃連各一錢為末粳米糊丸麻子大每服十五丸米飲下。

人參散

治小兒臟腑冷若纔喫乳食即又吐出或因纔

嬰童百問

卷七

三

喫乳為驚所觸令小兒外症面唇青白手足心

熱口多清涎吐逆不住或作瀉候青黃紫白或

如鼻涕雞子清者或乳食不化宜服之。

人參

半兩白朮半兩茯苓半兩沉香半兩

烏藥

半兩甘艸半兩

右為細末以盒收之遇小兒有前項形症半歲一字二三歲半錢大者一錢煎棗子米飲調下

理中湯

治小兒脾胃虛冷

人參

去芦三兩白朮三兩乾薑三兩甘艸三兩

右到每服三錢水煎服

來復丹 治小兒虛寒洩利詳見十六問

硝石 硫黃 太陰玄精石 各一兩

陳皮 五靈脂 青皮 各二兩

右方修製及服法俱詳十六問中茲不多贅

不換金正氣散 治山嵐瘴氣寒熱往來五膈氣噎霍亂吐瀉胸膈虛寒

厚朴 去皮 藿香 去土 陳皮 去白 半夏 皂莢白

同煮 蒼朮 米泔浸炒 甘草 炙各等分

右吹咀每服三錢水一盞生薑三片棗子二个

嬰童百問 卷七 冷瀉

煎去滓食前帶熱服

觀音散 治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳食久成羸弱大抵脾胃虛則瀉利嘔吐

石蓮肉 兩 人參 一兩 神麴 炒半兩 茯苓 半兩

甘草 炙半兩 木香 炮半兩 綿黃芪 半兩 白扁豆 炒去皮

白芷 各三錢

右為末每服一錢水一盞棗一枚藿香三葉煎

四分去滓溫服大小加減

銀白散 治冷瀉兼青壯胃氣

糯米 炒二兩 扁豆 炒二兩 藿香 兩 白朮 炒一兩

丁香 錢 甘艸 三錢

右為末紫蘇米飲調下加天麻砂仁白茯苓快

脚正色直指方加炮白附全蝎木香石蓮肉薑

一片煎

藿香散

治小兒臟腑不調作瀉青黃黑白乳食不消糞

中有凍如雞子青兼暴瀉如水其症腹痛微熱

而唇黃白若慢驚或偏墜紅腫內釣紫蘇湯調

下三五服

嬰童百問 卷七 冷瀉

陳皮 半兩 藿香葉 半兩 厚朴 製半兩 枳殼 炒半兩

甘艸 炙半兩

右為末紫蘇湯下三錢糞中有黃白凍子木瓜

并白梅去鹽煎湯下如痢止用棗子煎湯下大

能和胃進乳食此是小兒常服之藥 朱君輔方

熱瀉 第六十七

湯氏云小兒熱瀉者大便黃而赤或有沫乃臟中有積或因乳母好飲酒或嗜熱物或生下傷濕熱者不明但用豆蔻訶子等藥服之如水澆石既不識其症故不辨其冷熱用藥又不得其法焉得取效此症當以小便赤少口乾煩燥為驗治法當用錢氏白朮散去木香用之五苓散去桂亦可服其熱甚者四逆散大柴胡湯去大黃服之殊驗也更用黃連尤等劑亦佳調中湯去大黃加黃連枳殼如夾熱而瀉太

舉童百問

卷七 熱瀉

七

白朮散

治小兒熱瀉小便赤少口乾煩燥

人參 二錢

白茯苓 半兩

白朮 半兩

藿香葉 半兩

木香 二錢

甘草 一錢

乾葛 半兩

加至一兩

右剉散水一盞煎七分食前服熱甚渴者去

木香肚痛加芍藥

大柴胡湯

治小兒挾熱瀉

桑榆 八錢 黃芩 三錢 赤芍藥 半兩 湯泡

枳實 炒半錢

右剉散薑棗煎加減服之欲下加大黃

五苓散

治傷寒濕熱病表裏未解頭痛發熱口渴痰

澤瀉 二兩

猪苓 一兩

白朮 半兩

茯苓 一兩

桂 一兩

右為細末每服二錢熱湯調下不拘時服訖多

飲熱湯有汗出即愈又治瘧熱在裏身發黃疸

濃煎茵陳湯下食前服疸病發瀉及中暑引飲

亦可用水調服小兒加白朮末少許如發虛加

綿黃芪人參末少許

黃連丸 治小兒挾熱瀉利

黃連 半兩

淨洗猪膽

瓜蒌根 半兩

烏梅肉 半兩

杏仁 雙仁者半兩

石蓮子 半兩

右為末牛膽汁浸糕糊丸麻子大每十五丸煎

烏梅薑蜜湯下

四逆散

治少陰病其人或咳或悸或小便不利或

甘草 一兩

枳實 炒一兩

柴胡 一兩

芍藥 炒一兩

如咳者加五味子乾薑各半兩下利悸者加桂
半兩小便不利者加茯苓半兩泄利下重先濃
煎薤白湯內藥末三錢七再煮一二沸溫服。

右持篩為細末水飲調下二錢日三服

調中湯治夏月秋初忽有暴寒折于盛暑熱結于
四肢則壯熱頭疼寒傷于胃則下利赤白

大黃七錢 桔梗半兩 藜蘆半兩 茯苓半兩

甘草半兩 葛根半兩 黃芩半兩 白芍藥半兩

白朮半兩

右咬咀白水煎量大小加減服得快氣利壯

嬰童百問 卷七 熱毒 三十一

伊欬去大黃加黃連枳殼止利尤妙或加地榆

或加當歸皆可感風加荆芥秋宜下當用大黃

疎利

黃芩湯治下利而頭痛胸滿口苦咽乾或往來寒
熱而嘔其脈浮大而弦專治協熱而利者

黃芩一兩 白芍藥一兩 甘草炙一兩

右咬咀每服三錢棗子一个水一盞煎至七分

去滓溫服嘔者加製半夏生薑汁

四順清涼飲

治小兒血脈壅實臟腑生熱煩赤多渴心煩

燥睡臥不安四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失

度令兒血氣不順脾胃不調小便少大便澁或

溫壯連滯欲成伏熱或壯熱不歇欲發驚癇又

治風熱結核頭面瘡癩目赤咽痛瘡疹毒一切

壅滯並宜服之治挾熱瀉不止加木香用煨大

黃

赤芍藥一兩 當歸一兩 甘草一兩 大黃一兩

右剉散三歲已上每服二錢水一盞煎至七分

作兩服欲利小便用赤芍藥虛熱加甘草不利

嬰童百問 卷七 熱毒 三十二

減大黃冒風邪加去節麻黃中風體強眼睛上

視加獨活量兒大小虛實加減微瀉利為度可

加荆芥更十四問內有加味清涼飲子可詳症

通用

傷食瀉 第六十八回

湯氏云。凡此瀉不宜便補。先用消食藥。或用紫霜丸取其積盡。然後可補。經云。食瀉重當取疴。虛用補虛。治食瀉與香橘餅子。加減觀音散。調中湯散。以意加減。凡傷食瀉。不可即止。宜節飲食。常用進食丸。取下食積令盡。次以錢氏加減益黃散。只一服可止。此乃切要治法。然後異功散。四君子湯。調理必取全安。有腹中雷鳴下利者。生薑瀉心湯主之。如冷症積釀瀉。用香朴散止之。白朮散以和氣調胃。調中散保安丸。能止傷食瀉。感應丸。沉香煎。三稜煎。皆可服。

紫霜丸

治變蒸發熱不解。并傷寒溫壯。汗后不歇。胸中有痰癖。乳哺不進。乳則吐現。先寒后熱者。又治食積。乳哺失節。宿滯不化。或因食而發癩。大便酸臭。並宜服之。

代赭石 煨醋淬七次一兩

赤石脂 一兩

巴豆 三十枚 去皮

杏仁 五十枚 去尖

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏。却入代

赭石脂丸。以湯浸蒸餅為丸。如粟米。歲服五九。米飲吞下。一二百日內兒。三九乳下。更宜量其虛實加減。微利為度。此藥兼治痰諸疾。雖下不致虛人。

香橘餅 治傷冷瀉利

水香 一錢 青皮 一錢 陳皮 一錢 厚朴 薑汁炒

神麴 半兩 麥芽 半兩

右為末。蜜丸為餅。紫蘇米飲調下。今竭觀音散 止吐瀉截虛風

傷食瀉 卷七

天

黃芪 一兩 人參 一兩 木香 一兩 大粉艸 一兩

石蓮 去心 扁豆 炒黃 白芷 七錢 白茯苓 去皮

全蝎 七錢 羌活 八錢 防風 八錢 天麻 八錢

右剉。每服二錢。水一盞。煎至七分。服。加薑棗煎調中散

治傷食瀉。凡此瀉不宜便補。先用食藥。或紫霜丸取其積盡。然後可補。經云。食瀉重當取疴。虛用補虛。良醫明妙理。何慮疾難除。

人參 去片 白茯苓 兩 白朮 一兩 木香 一兩

乾薑兩 藿香葉兩 香附子炒去毛
砂仁炒 甘草炙 丁香一兩

右為末。每服一錢。薑棗湯平。肚痛白湯。大小以意加減。

進食丸

治乳食不消。心腹脹滿。壯熱喘粗。嘔吐痰逆。腸鳴洩瀉。米穀不化。或下利赤白。腹痛后重。及食

滯乳癖。疝氣痞結。並皆治之。小兒胸膈熱實。腹內有留飲。致令榮衛痞塞。臟腑之氣。不得宣通。

嬰童百問 卷七 傷食治

其病腹內氣結。脹滿或壯熱。是凡有此疾。當疎利大便。破結散氣。宜常服之。

巴豆霜錢 當歸五錢 米泔浸 硃砂五錢

代赭石錢 枳殼錢 木香五錢

麝香一分

右為末。麩糊為丸。如麻子大。一歲兒一丸。溫米

飲下。更量虛實加減。食後服。治食積發熱。羸瘦

肚大青筋。疝積肚疼。嘔露。

異功散 治吐瀉不思飲食。中氣反脍。

人參一兩 茯苓一兩 白朮一兩 甘草一兩
橘紅一兩 木香一兩

右剉散。每服二錢。薑棗煎服。一方去木香。

四君子湯

治榮衛俱虛。臟腑怯弱。心腹脹滿。全不思食。腸鳴洩瀉。嘔吐逆。

右為末。每服二錢。水一盞。煎七分。通口服。不拘

時。鹽少許。白湯點服。溫和脾胃。進益飲食。辟寒

邪瘴霧氣。

益黃散 治小兒吐瀉脾虛。不食米穀。不化。困倦力少。滑腸。夜起。并治涎唾。流頰。下名曰滯頰。

嬰童百問 卷七 傷食治

陳皮去白 丁香二錢 方

青皮去穢 甘草炙 半

右為末。每服二錢。水煎三分。食前服。

生薑瀉心湯 治傷寒汗出。解後胃中不和。心下痞硬。脇下有木氣。腹中雷鳴。下利者。

黃連一兩 甘草一兩 人參一兩 乾薑一兩

黃芩半兩 半夏一兩 湯

右剉散。每服三錢。水一盞。生薑三片。棗一枚。煎

七分。去滓溫服。

香朴散 治嘔吐洩瀉。

藿香葉 七錢 陳皮 七錢 厚朴 七錢 半夏 半斤 湯煎

甘草 錢

右剉每服三錢水一盞薑五片棗一枚同煎如

瀉甚加水香肉豆蔻

保安丸 治小兒瀉瀉傷食瀉

香附子 一兩 白薑 兩 炮半 青皮 兩 炮半 陳皮 兩 炮半

三稜 兩 炮半 蓬朮 兩 炮半 甘草 兩 炮半 砂仁 兩 炮半

右為末麥蘖麩糊丸棗豆大每服三九白湯下

沉香煎 治脾氣冷積

嬰童百問 卷中 傷食瀉

乳香 一錢 沉香 一錢 丁香 一錢 杏仁 錢 炒

百草霜 一錢 木香 一錢 肉豆蔻 一錢 巴豆 十四粒 去油

右為末酒煮蠟和丸棗豆大每服三五丸淡生

薑湯送下應患肚痛不止服之效以通為度

三稜丸 治小兒疳積腹脹滿

三稜 兩 炮半 木香 一兩 神麩 一兩 陳皮 一兩 去白

半夏 兩 炮半 丁香 半兩 桂 半兩

右為末麩糊丸如黃米大二十九丸乳食後溫生

薑湯下

杏霜丸 治小兒食積作瀉并痢疾

杏仁 三兩 去皮 炒 巴豆 一兩 去殼 炒

黃蠟 二兩 酒 百艸霜 炒 為末 二兩 川

右將杏仁巴豆研極細却入百艸霜令勻溶蠟

和丸如棗豆大赤痢甘艸湯白痢生薑湯先進

三四服服服者十餘服效驗如神

用 卷中 傷食瀉

驚瀉 第六十九問

仲陽云慢驚病後或吐瀉胃虛或氣弱因驚眼白如淡墨下糞青黃此瀉合溫補至聖保命丹鈞藤飲主之或乳隨糞下消乳丸進食丸主之或微渴心脾喘燥狂熱此瀉尤難治辰砂五苓散主之冷者定命飲子主之後與溫驚朱君散睡驚太乙丹

至聖保命丹

治小兒胎驚內吊腹肚緊硬眠睡不安夜多啼哭及治急慢驚風眼目上視手足抽掣不省人事

事悉皆主之冷症用此

全蝎 十四个

防風 二錢 覆盆子 炒去絲

天麻 二錢 南星 炮二錢

白附子 二錢 麝香 五分

金箔 十片 蟬蛻 二錢 硃砂 一錢 有熱症加

牛黃 一分 冰片 一分 硼砂 一錢

右為末粳米糊丸每兩作四十九常服鎮心安

神化痰除一切驚風諸症湯臨時換一方加人

參白茯苓各二錢

鈞藤飲

治小兒夜啼乃厥冷也陰盛于夜則冷動冷動

則為陰極發躁寒盛作疼所以夜啼不歇也鈞

藤散主之治驚啼加蟬蛻防風天麻前十六問

有鈞藤散又二十問蟬蛻鈞藤飲可兼看對用

鈞藤 鈞 一錢 茯神 一錢 川芎 一錢 當歸 一錢

茯苓 一錢 木香 一錢 甘草 一錢 白芍藥 一錢

右為末每服一錢薑棗略煎服其或心熱而煩

啼必有臉紅舌白小便赤澀之候鈞藤飲去木

香加硃砂末一錢研和每服一錢木通湯調下

或剉散煎服

消乳丸 濕中快膈止嘔吐消乳食

香附 炒一兩 甘艸 炙半兩 陳皮 去白半兩 縮砂仁 一兩

神麩 炒一兩 麥蘖 炒一兩

右為末泡雪糕丸如黍米大七歲以上菜豆大

三十九食後薑湯下○治百晬內嘔吐乳汁或

大便青色用乳汁一盞入丁香十粒去白陳皮

一錢于器內同煮三小沸去丁陳稍熱兒飢

時服

進食丸

治乳食不消心腹脹滿壯熱喘粗嘔吐痰逆腹鳴泄瀉米穀不化或下利赤白腹痛后重及食廢乳癘疰氣痞結並皆治之小兒胸膈熱實腹內有留飲致令榮衛痞塞臟腑之氣不得宣通其病腹內氣結脹滿或壯熱是凡有此疾當疎利大便破結散氣宜常服之。

巴霜一錢二分 當歸五錢 硃砂五錢 代赭石五錢

枳殼五錢 木香五錢 麝香少許

藥重百兩 卷七 姜

右為末。麩糊為丸如麻子大一歲兒一九溫米飲下。更量虛實加減。食後服。治食積發熱羸瘦。

肚大青筋疳積肚疼嘔露。

辰砂五苓散 治霍亂吐瀉燥渴飲水小便不利

澤瀉二兩 官桂一兩 猪苓一兩 白茯苓一兩

白朮一兩 辰砂一兩

右為細末。每服一錢。白湯調服。燥渴新水調下。

大小以意加減不拘時。

定命飲子 治慢驚吐瀉困重欲傳慢脾通用

圓白半夏生二錢 茯苓二錢 木香二錢

老生薑切片日乾二錢 白朮炒二錢 甘草炙一錢

天麻二錢

右到散。每服二錢。薑散泡湯調下。

朱君散 治吐瀉后有此症并糞清者宜服之

人參去芦一兩 白朮炒一兩 白茯苓一兩 甘州炙一兩

辰砂水飛半兩 燈心三錢 鈎藤半兩 麝香半錢

右為細末。每服一錢。用白湯調下。不拘時服。

睡驚太乙丹 常服安神鎮驚止夜啼瘳青

藥重百兩 卷七 姜

桔梗炒一兩 藿香葉半兩 扁豆炒半兩 白芷三錢

川芎三錢

右為末。煉蜜丸如芡實大。辰砂麝香為衣。每服

半丸。薄荷湯磨下。正糞色。棗湯下。夜啼燈心鈎

藤湯磨下。加白朮茯苓白芍藥尤妙。

諸色痢 第七十劑

湯氏云小兒痢候皆因飲食無節或餐果食肉物不知厭足乃脾胃尚弱不能消化停積于臟故成痢也熱搏則赤風寒之氣入于腸胃致令津液凝滯則成白痢或夾青者有驚積或如魚腦肚中疼甚者大抵入痢但冷熱赤白藥性同治法不相遠矣又有赤白相雜者當先去其熱積須用大黃枳實朴消之劑以去其熱毒然後以黃連黃芩黃柏解而清之其熱自止疼自定此妙法也如痢不止則用地榆熟艾等劑

嬰童百問

卷七

毒

調理自然平復脾虛者不可輕用罌粟澁滯等劑必致危困須用沒石子黃連阿膠地榆以止之方為盡其枳殼芍藥皆要藥也噤口痢不能食者石蓮散主之香脯散亦可冷痢如豆汁肚疼者胃風湯主之脾毒痢臟熱常服香連丸黃連香薷飲去桂五苓散茅根湯當歸芍藥枳殼地榆川芎等劑先與解毒退熱却與開胃進食分水穀寬腸定痛先與水浸丹視局敗毒散地榆飲寬腸枳殼散有熱而利不止者三黃熟艾湯主之滯不通者神芩亦可用熟甚煩躁者

連解毒湯解之潑火散亦效

石蓮散 治小兒噤口痢喉通不食止而復作

連肉去心炒為末米飲下一錢一方用山藥為末米飲調服亦妙

香脯散 治小兒利腸下痢噤口不食開服合口危急之症

精猪肉 批一兩薄 膩粉 一錢

右將肉于炭火上慢炙旋鋪膩粉炙令成脯每以少許與喫如未知噤且放鼻間自然要喫此方治胃口有毒至奇至妙

嬰童百問

卷七

毒

胃風湯

治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化瀉注下腹脇虛滿腸鳴疼痛及腸胃溼毒下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服之

白芍藥 炒 白朮 炒 肉桂 去粗皮 人參 去芦

當歸 去苗 白茯苓 去皮 川芎 各等分

右為粗末每服二錢水一盞粟米同煎七分去滓空心熱服小兒量力加減

香連丸 治濃積瀉亦治痢

黃連 一兩同吳茱萸 木香 二錢同訶子肉

右為末，麩糊丸如麻子大，空心米飲下三十九。

黃連香薷飲 治暑熱所傷下痢赤色

香薷 一兩 扁豆 兩炒半 厚朴 半兩薑炒 黃連 一兩薑汁炒

右剉每服三錢，水薑煎服。

五苓散 治中濕下痢煩渴飲水

澤瀉 二兩 豬苓 一兩 白朮 一兩半炒 白茯苓 一兩

桂 此味去之

石為細末，每服二錢，熱湯調下。

嬰重百問 卷七 諸色痢 姜

茅花湯 治身熱不止吐血下血

茅花一大把，水三盞，煎濃汁一盞，分二服，即瘥。

無花根梗代之，兼治血痢黑痢。

水浸丹 治瀉利先鋒之藥

黃丹 研細 巴豆 廿五個去皮

右研勻，用黃蠟半兩溶化，拌勻，量大小旋丸，水

浸吞下，湯使更臨病隨意用。一方黃丹一兩，巴

豆四十九個，乳香二錢，麻油二錢，蠟半兩溶化

和丸，名頓止丹，又冷症加木香二錢半。

敗毒散 治傷寒時氣頭項強壯熱惡寒

人參 一兩去芦 茯苓 一兩去皮 甘艸 一兩前胡

川芎 一兩羌活 獨活 一兩去苗 桔梗 一兩

柴胡 一兩去芦 枳殼 一兩水浸法 覆盆 一兩

右剉散，每服二錢，水一盞，生薑薄荷各少許，止

瀉痢，用陳倉米前，糲米亦可。

地榆散 治瀉痢血痢

地榆 一兩 訶子 一兩 甘艸 一兩

右為末，鹽米湯調下，有熱加黃芩。

嬰重百問 卷七 諸色痢 果

芍藥 一兩 黃芩 一兩 當歸 半兩 黃連 半兩

右為末，滴水丸如小豆大，每服二三十丸，白湯

下加枳殼。

寬腸枳殼散 順氣止痛

甘草 六錢 枳殼 四錢炒二兩

右為細末，每服一錢，空心沸湯點服。

三黃熟艾湯 治下利赤白及治傷寒四五日而大

黃芩 七錢 黃連 七錢 黃蘗 七錢 熟艾 半雞

下熱利時作諸藥不效，宜服此湯。

右到每服三錢小一盞煎六分去滓服

神芳丸 治小兒利

大黃 生 黃 今各一兩 生牽牛末 一兩

滑石 四兩 黃連 薄荷葉 川芎各半兩

右為末滴水丸 桐子大每服五十九溫水下食
食後一方加蒲黃止血症用

黃連解毒湯 治熱痢如神之劑

黃連 三錢 黃柏 半兩 梔子 四合 黃芩 一兩

右到每三錢水煎服

嬰童百問 卷七 諸病

發火散 治血痢

青皮 一兩 赤芍藥 一兩 黃連 一兩 地榆 一兩

右為細末每服一錢冷水調下如畜熱而氣血
妄行加甘草

湯氏異功丸 治渴止瀉清暑生津

澤瀉 一兩 猪苓 七錢 桂 二錢 茯苓 半兩

人參 半兩 白 半兩 辰砂 半兩

右末蜜丸茨實大燈心竹葉湯二三十九

嬰童百問卷之七

嬰童百問卷之八

脫肛并痔症 第七十一問

湯氏方治脫肛大腸自糞門出宜用蔥湯薰洗令軟
款款送上此因瀉利得之者亦可服瀉利之藥然後
用槐花等藥又有用一味五倍子煎湯入朴硝薰洗
而縮者又有用真蒲黃碾極細以猪膽拌勻傅肛門
上而入者全嬰方用澁腸散兼有痔症腫痛者用黃
丹滑石等分研水調塗即消并用銚白霜半錢片腦
半字好酒調傅腫處甚佳黃連解毒湯亦可服用若
參湯洗亦效亦有蜜陀僧白礬片腦末傅上更用煎
芥防風等項洗之用杜松葉根者效

一澁腸散

治小兒久痢大腸脫出不收

訶子 炮 赤石脂 龍骨

右為末臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛搽入天

治痢米湯調又方治脫肛五倍子焙為末入茶

依前方用
丹石散 治外痔如神

黃丹 滑石 等分

右為細末新汲水調塗口三五上

勝雪膏

治隨腸番花鼠疥等痔熱癢不可忍或已成瘡者並皆治之

片腦 鉛白霜

右件各半字用好酒少許研成膏子塗之隨手輒愈

黃連解毒湯

治痔漏下血大腸火症

嬰童百問 卷八 疳積

黃連 三錢 黃蘗 半兩 梔子 四個 黃芩

右剉散每服三錢水一盞煎六分去滓服

苦參湯 治脫肛并痔

枳殼 黃連 大黃 甘草

荆芥 苦參 赤芍藥 黃芩 各等分

右剉散每用五錢以車前子茅草同煎薰洗

又方

用生括蕒根研粉猪油溫煖按入又用草麻子貼頭頂上腸即入便去草麻

便血臟毒 第七十二問

議曰兒生七日之內大小便有血出者此由胎氣熱盛之所致也母食酒麪炙煖物流入心肺兒在胎內受其熱毒亦傳心肺且女子熱入心故小便有之男子熱入肺故大腸有之血出淡淡有似坯水盛則其血加鮮凡遇有此不可以他藥只以生地黄根取自然汁入蜜少許和勻溫溫與服移時自安男子皆效甘露飲宜兼與服茅根茅花煎濃湯服亦妙犀角地黃湯亦可服臟毒聚金丸用之效地黃丸亦可用

甘露飲

治小兒胃中客熱牙宣口氣齒齦腫爛時出膿

血常欲合閉或饑煩不欲飲食及赤目腫痛不

任涼藥口舌生瘡咽喉腫疼瘡疹已發未發皆

可服之瘡身面皆黃腫體微腫胸膈氣滿大便

不調小便黃澀或時身熱並皆治之

熟地黃 麥門冬 去心 枳殼 去穢 甘艸 炙

山茵陳 枇杷葉 地 石斛 去蘆 黃芩

生乾地黄

天門冬各半斤

右剉散每服二錢水一盞煎七分去滓食後服

臥溫服小兒一服分作二服仍量歲數加減服

聚金丸

治大便下血發熱煩燥腹中熱痛作渴脈來弦數或驚熱目赤昏澁或有酒毒去血並治之。

黃連

四兩一兩水浸曬乾一兩黃芩兩炒一兩炮一兩生川

防風

去蘆各一兩

右件為細末煮麩糊丸桐子大每服五十丸量

嬰童百問

卷八

四

二十七

意加減以米泔浸枳殼水下不拘時候夏月人

大黃一兩三時不須用或枳殼為末入前藥為

末亦效小兒九菉豆大亦治血痢

犀角地黄湯

治傷寒及溫病應發汗而不發汗內有瘀血吐

血鼻衄面黃大便黑此方主消化瘀血兼治瘡

疹出得太盛以解之

生犀屑如無以升麻代之

牡丹皮去骨各一兩

生地黃半斤

芍藥七錢

右剉散每服三錢水一盞煎服

千金地黄丸

治心熱腸風臟毒去血

黃連

四兩生地黄半兩研取汁連津二味拌今日中晒極乾

右末蜜丸桐子大每三十九食後麥門冬湯下

量大小加減

桃仁承氣湯

治大便瘀積下鮮血或黑

川大黃

四兩桂皮

甘肅

芒硝各二兩

嬰童百問

卷八

五

五十五

桃仁五枚去尖雙仁

皆同惟外書用一兩五士

右剉散每三錢米煎服以快利為度末利再投

大便不通

第七十三

議曰小兒大腸熱乃是肺家有熱在裏流入大腸以致秘結不通乃實熱也當以四順清涼飲加柴胡熱甚者加山梔黃芩流利之其表裏俱熱者而黃頰赤唇燥口乾小便赤澀大便焦黃無汗者先解表以柴胡散汗之解後大便秘或肚疼者以清涼飲大柴胡湯承氣湯皆可下之積熱者神芩尤妙

四順清涼散

通順大腸令無壅閉

赤芍藥

當歸

甘州

大黃

各等分

嬰童百問

卷八 大便不通

六

右吹咀三歲已上每服一錢水一盞煎七分作

兩服欲利小便用赤芍藥虛熱加甘州不利減

大黃冒風邪加去節麻黃中風體強眼睛上視

加獨活量兒大小虛實加減微溼利為度可加

荆芥

柴胡散 治大便不通

石膏

黃芩

甘州

赤芍藥

葛根

各一

麻黃

去節

柴胡

半兩

右吹咀三歲兒每服一錢水一小盞生薑少許

蔥白三寸豉二十粒煎五分去滓溫服不拘時出汗為效治熱嗽加杏仁五味子各二錢
大柴胡湯 治大便閉結蓄熱于內

柴胡

去蘆

黃芩

赤芍藥

各三錢

半夏

湯泡

七次

切片

枳實

去穢

炒半錢

右吹咀薑棗煎加減服之欲下加大黃半兩

大承氣湯

治邪熱結于胃中及宿積不去

大黃

芒硝

各半兩

厚朴

一兩

枳實 二枚

右剉散每服三字薑三片煎服

嬰童百問

卷八 大便不通

七

神芩丸

治熱積于內大便閉塞

大黃

黃芩

各二兩

生牽牛末

一兩

黃連

薄荷葉

川芎

各半兩

滑石 四兩

右為細末滴水丸桐子大每服四五丸食後

溫水下。一方加蒲黃止血症用

輕瀉散

治兒初生大便不通

輕粉

一分

蜜

少許

右以熱湯調開蜜糊輕粉點兒口即通與一二

次再不可與

小便不通 第七十四

湯氏云凡小兒小便不通皆因心經不順或伏熱或驚起心火上攻不能降濟腎水不能上升故使心經愈熱而小腸與心合所以小便不通木通湯主之甚者八正散又小便不通臍腹脹悶心神煩熱梔子仁散主之積熱者神芩丸效

木通湯 治小便不通小腹疼痛

木通 滑石 各兩 黑牽牛 炒

右咬咀燈心蔥白煎去滓大小加減以意

八正散

治小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴引

飲心忪面熱煩燥不寧目赤睛疼唇焦鼻衄口

舌生瘡咽喉腫痛及治小便赤澀不通熱淋血

淋之症

車前子 瞿麥 滑石 大黃 濕紙

山梔 扁蓄 木通 甘艸

右剉散每二錢水一盞入燈心煎七分去渣溫服食後臨臥小兒量力少少與服

蔥白散 治七日小便不通

蔥白 三四寸 人乳

右件同搗如泥付兒口內即與乳下

梔子仁散

治小兒小便不通臍腹脹悶心神煩熱

梔子仁 五枚 茅根 剉 冬葵子 各半

甘艸 減半

右剉散每服立錢米一小盞煎五分去滓不拘

時候溫服

嬰童百問

卷八

神芩丸 治症見前大便不通并治小便不利

大黃 生 黃芩 各二兩 生牽牛末 各兩

滑石 四兩 黃連 薄荷葉 川芎 各半

右為細末滴水丸桐子大每服四五丸食後

溫水下。一方加蒲黃止血症

大小便不通 第七十一問

議曰調理嬰孩傷寒體熱頭目昏沉不思飲食夾驚
夾食寒熱大小便閉澀不通煩燥作渴冷汗妄流夾
積傷滯膈滿脹急青黃體瘦日夜大熱及療傷風傷
暑驚癇客忤腎臟疝氣等熱並宜脫甲散主之亦可
服大連翹湯加大黃神芫治小兒驚風積熱大小便
澀滯其效尤速又掩臍法用連根蔥一根不洗帶泥
王生薑一片豆豉二十一粒鹽二匙同研爛捏餅烘
熱掩臍中以綿扎定良久氣透自通不然另換一劑
小便不通亦可前一問通用

脫甲散 治大小便不通

柴胡 去蘆 當歸 洗 龍膽 土產

白茯苓 各二錢 人參 二錢 知母

甘艸 各三錢 川芎 各三錢

右判散每服三錢水一小盞連翹蔥白三寸煎
至半盞溫服不拘時此方散熱扶表救裏表虛
令汗不妄行裏熱冷氣不閉結外即通關內即
開渠通關流行經絡開渠不壅臟腑熱在表裏

之間施無不可積傳驚之痼用立見功

大連翹湯 治二便閉結

連翹 瞿麥 荆芥 木通

赤芍藥 當歸 防風 蟬蛻

柴胡 活石 甘艸 炒各 山梔仁

黃芩 各五分

右判細每服一錢加紫草煎溫服熱甚加大黃

史詳症加減為佳

神芫丸 治二陰疝別

大黃 生 黃芩 各二兩 生牽牛末 二兩

滑石 四兩 黃連 薄荷葉 川芎 各半

右為細末滴水丸桐子大每服四五十丸食後

溫水下。一方加蒲黃止血症用

掩臍法 治大小便不通

海螵 四十粒 蔥根 帶土 七個 黑豆 七個 搗 少許

右同研爛捏成一餅烘熱放臍上以帛扎定久

則自通

五淋 第七十六問

張氏云。小兒諸淋者。腎與膀胱熱也。膀胱與腎為表裏。俱主水。水入小腸。下于胞。行于陰。為小便也。膀胱熱。則津液內溢。水道不通。停積于胞。腎氣熱。則蒸故令水道不利。小便淋瀝。故謂之淋。其狀小便出少而數。其小腹急痛引臍是也。又有石淋。氣淋。熱淋。血淋。寒淋。五淋形症。各有說焉。其石淋者。淋而出砂石也。習與熱所乘。則化為石。小便莖中痛。尿不能卒出。時自痛引膀胱。裏急。砂石從小便而出也。其氣淋者。腎與膀胱受肺之熱氣。則脹氣為熱所乘。故流入膀胱。則氣壅不散。小腹氣滿。水不宜利。故小便澀而成淋也。其熱淋者。三焦有熱氣。得于腎與膀胱。故熱氣流入于胞。而成淋也。其血淋者。是熱之盛。甚則尿血。滲之血淋。心主血。其熱甚者。血則散漫。失其常經。滲入胞。而成血淋矣。若熱淋者。其病狀先寒。戰然後尿是也。小兒取冷過度。下焦受之。冷氣入胞。于正氣交。正氣相勝。則戰寒氣解。故得小便也。治淋之散。立效。五苓散。木通散。等劑。機變用藥。必可。

求痊導赤散亦效。與大方脉相參用藥。不亦可乎。

金砂散 治小便淋瀝不通

鬱金 海金沙 滑石 甘艸 各等分

右為末。三歲兒一錢。煎落蒂湯調下。燈心木通

湯亦可。冬瓜最治小兒小便不通。淋瀝并渴。

立效散

治小兒諸淋不通。莖中疼痛。

木通 甘艸 白孩兒花 各王不留行

胡荽 滑石 海金沙 山梔

嬰童百問 卷八 五淋 圭

檳榔 各等分

石剉散。每服二錢。水半盞。煎三分。去滓服。

木通散

治小兒小便不通。小腹疼痛。

木通 滑石 各兩 黑牽牛 炒半兩

右為粗末。燈心蔥白煎去滓。大小加減以意。

遺尿 第七十七問

巢氏云遺尿者此由膀胱有冷不能約于水故也腎主水腎氣下通于陰小便者水之餘也膀胱為津液之府既冷氣衰弱不能約水故遺尿也楊氏云小兒尿床由膀胱冷夜屬陰小便不禁睡裏自出宜破故紙散治之益智之劑亦不可闕

破故紙散

治小兒夜間尿床由膀胱冷夜屬陰小便不禁睡裏自出

聖童百問 卷八 遺尿

破故紙

右一味炒為末熱湯調下

又方

益智生

白茯苓去皮

茯神去皮

右為細末空心清茶調下亦治白濁

又方

五倍子一半生一半燒存性

右為末雪糕為丸每服三十粒米飲下

尿白濁 第七十八問

湯氏曰小兒尿白者由乳哺不節過傷于脾故使清濁不分而尿白如米泔也久則成疳亦心脾伏熱兼而得之宜疎脾土消食化積通利小腑也茯苓散主之三稜散消食丸可選而用之分清飲亦可服

茯苓散

治小兒尿白如米泔因乳哺失節有傷于脾致使不分清濁而色白也久則成疳亦心脾伏熱兼而得之

聖童百問 卷八 遺尿

三稜

蓬朮煨

縮砂仁

赤茯苓各半

青皮

陳皮

滑石

甘艸微炒各二錢

右為末每服一錢麥門冬燈心煎湯調下

三稜散

治小兒尿白者由乳哺不節過傷于脾故使不分清濁而白也久則成疳宜疎土消食化積

三稜

蓬朮煨

益智各半

甘艸

神麴炒

麥蘖炒

橘皮各半

右為末每服一錢白湯調下

分清飲

治通心氣補漏精治小便餘瀝并赤白濁

益智仁 川草薢 石菖蒲

天台烏藥各等分

右爲細末入些子鹽空心服或燈心煎湯調下可加茯苓白芍藥

百問 卷八

去

疳症 第七十九問

仲陽云諸疳皆脾胃之病內亡津液之所作也因大瀉或吐瀉後以藥吐下致脾胃虛弱內亡津液且小兒病疳皆庸醫之所壞病如潮熱是脾臟虛一臟實而內發虛熱也法當補母而瀉木臟則愈假令中日發潮熱是心虛熱也肝爲心母則宜先補肝肝實而後瀉心心得母氣而內平而潮熱愈也醫見潮熱妄謂其實乃以大黃牙硝輩諸冷藥利之既利多矣不能禁約而津液內亡卽成疳也又有病疳其疾發作

嬰童百問 卷八

寒熱飲水腸下有形硬痛治疳之法當漸消磨醫反以巴豆礪砂輩下之小兒易虛易實下之既過胃中津液耗損漸以疳瘦楊氏曰小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺飲食一或失常不爲疳者鮮矣則疳以傷得恣食甘肥粘膩生冷鹹酸以滯中脘則疳因積成或乳母寒暄失理飲食乖常喜怒房勞卽與兒乳則疳因母患傳氣而入此非疳家不能調適之過半疳之爲候頭皮光急舌髮焦稀腮縮鼻乾口饒唇白兩眼昏爛揉鼻持眉目昏體黃鬪牙咬甲焦渴自汗尿白

海酸肚脹腸鳴結潮熱酷嗜瓜果鹹酸炭米泥土
 而飲水飲者皆其候也。夫疳曰五疳病關乎五臟以
 別之心疳即驚疳外症身體壯熱臉赤唇紅口舌生
 瘡胸膈煩悶小便赤澀五心煩熱盜汗發渴咬牙虛
 驚是也。肝疳即風疳外症搖頭揉目白膜遮睛眼青
 多淚頭焦髮立筋青腦熱躁渴汗多下利瘡癬是也
 腎疳即急疳外症腦熱肌削手足如水寒熱時來滑
 泄肚痛口鼻乾渴齒齦生瘡爪黑面黃身多瘡疥是
 也。肺疳即氣疳亦名疳蠶外症咳嗽逆壯熱惡寒
 寒重百問 卷八 疳症 其
 皮膚粟生鼻痔流涕咽喉不利頭爛唾紅氣脈毛焦
 泄利頻併是也。脾疳即食疳亦名疳疔外症身面俱
 黃肚大脚細吐逆中滿水穀不化泄下酸臭合面困
 睡減食喫泥是也。諸疳宜大蘆薈丸肥兒丸胡黃連
 丸地黃丸生熟地黃湯皆要藥也。集聖丸噎疳散脂
 連丸五疳良方至聖丸通神丸天麻丸地黃清肺飲
 化蠶丸靈脂丸下蟲丸龍膽丸黃連丸香薷丸木香
 丸福丸子黃耆湯髓血煎蚶蚶丸厚朴丸等劑對症
 詳明施治。

大蘆薈丸	治疳殺虫和胃止瀉	胡黃連	黃連	白蘆薈	去蘆薈
木香	青皮	雷丸	破開白住赤	者殺人勿用	
鶴虱	微炒各	麝香	二錢	另研	
右為細末粟米飯丸菜豆大米飲下一二十九					
不拘時服					
肥兒丸					
治疳多因缺乳食肉太早或患臟腑胃虛癆諸					
般疳化虫治黃瘦肚急消疳可常服退疳熱					
寒重百問 卷八 疳症 其					
黃連	局方加	陳皮	去白局方去		
神麴	炒局方有	麥蘖	炒各一兩加		
白蘆薈	半兩局方	川練子	一兩去		
右為末神麴糊丸麻子大每服三十九空心米					
飲吞下					
又方					
三稜	煨	蓬朮	煨	川練子	龍膽草
黃連	各四錢	紫胡	地骨皮	各十	
枳殼	炒	麥蘖	當歸	各三	白蘆薈

蘆薈 木香 各一錢

右為末神麩糊丸麻子大每服三十九米飲下

胡黃連丸 治痢如神

胡黃連 黃連 各半 硃砂 二錢半 另研

右土物為細末研入硃砂末却填入猪膽內用

漿煮以杖于於銚子上川線釣之勿令着底候

一炊久取出研入蘆薈麩香各二錢半飯和丸

麻子大每服五七九至一二十九米飲食後一

作食前治疳症有熱

嬰童百問 卷八 疳積 主

又方 治嬰孩一切疳疾及一切虛痢他藥無功此藥極效

胡黃連 黃連 蘆薈 肉豆蔻 煨

桂心 人參 硃砂 麝香

史君子 木香 釣藤 龍齒

白茯苓 各等分

右為末取臍猪膽兩枚裂汁和末令勻却入袋內盛之以繩扎定湯煮半日取出切破袋子更

入葛若子二錢微炒黃丹一錢一味別研如粉

入前藥和勻搗五百杵為丸如菜豆大但是疳

與痢用粥飲下五七九切者三九不喫粥飲乳

頭含吻能治一十二種疳痢及無事疳之症功

效非常

吳希亮疳方 治一切疳

三稜 煨 蓬朮 煨 神麩 炒 麥蘖 炒 各半兩

青皮 陳皮 烏梅肉 蕪荑仁

胡黃連 百草霜 雷丸 各三錢 玄胡索 炒

甘艸 各二錢 巴豆 五十粒 加川練子史君子亦可

右為末合了先用一兩入巴豆五十粒丸如麻

子大每服五七九米湯下大小以意增減

地黃丸 治腎疳

熟地黃 錢八 赤茯苓 山茱萸肉

當歸 川練肉 牡丹皮 山藥

澤瀉 史君子肉 各錢

右為末蜜丸如桐子大每服三九溫水化下 生熟地黃湯 疳眼閉

治疔眼閉合不開內有朦霧

生地黃 熟地黃 各半 川芎

赤茯苓 枳殼 炒 杏仁 水浸 川黃連

半夏麩 天麻 地骨皮 甘艸 炙

常歸 各二錢半

右判散每服二錢薑三片黑豆十五粒水一盞煎至六分空心溫服

脾積丸 治疔極妙

山查子 青者多川 香附子 烏藥

嬰童百問 卷八 疔症

紫金皮 砂仁 甘艸 各等分

右為末山查子生用搗碎成末米糊丸桐子大。米飲下三五十九大人小兒皆可服。

集聖丸 治諸疔通川

蘆薈 五靈脂 夜明沙 焙 縮砂

橘皮 青皮 去穰 蓬朮 煨 木香 各二錢

黃連 史君子 蝦蟇 炙焦各三錢

右為末雄豬膽二枚取汁和藥入糕糊丸麻子大每服十五丸米飲下疔勞瘦弱本方加當歸

一錢半川芎三錢

噀疔散 治疔

蘆薈 黃連 各一錢 瓜蒂 豬牙皂

蝦蟇灰 各半兩 麝香 少許

右末吹入鼻內噀出可療

疔連丸

治五疔潮熱肚脹髮焦

胡黃連 五靈脂

右為末積豬膽汁九麻子大每服十五丸米飲

嬰童百問 卷八 疔症

下五疔潮熱慎勿用大黃黃芩

五疔良方 治疔

川黃連 蕪荑仁 神麩 炒 麥蘖 炒

陳皮 木香 蝦蟇 燒存性

史君子 三十個 肉豆蔻 生

雞心檳榔 二個 麝香 一字

右為細末雄豬膽二箇取汁入好酒打清麩糊

丸芥子大每服十五丸米飲下

侯苓丸 治心疔與驚疔

茯神 蘆薈 琥珀 黃連

赤茯苓 各三錢 釣藤皮 遠志肉 薑製

蝦蟇灰 各二錢 石菖蒲 麝香 少許

右爲末。粟米丸。麻子大。每服十九。薄荷湯下。

神效換肌丸

治小兒脾疳。肌瘦潮熱。盜汗。飲食。易傷臟腑。不調。泄瀉。糟粕不化。頭大腹急。

川黃連 炒 龍甲 酒炙 肉豆蔻 煨 史君子

神麩 炒 麥芽 炒 各半錢 訶子肉 一錢

嬰童百問

卷八

五

右爲末。麩糊丸。如芥子大。米湯下。量大小加減。

天麻丸 治肝疳風疳疳

青黛 川黃連 天麻 五靈脂

夜明沙 微 川芎 盧薈 各二錢 龍膽草

防風 蟬蛻 去足 各一錢 全蝎 二枚

麝香 少許 乾蟾頭 炙

右爲末。猪膽汁浸糕糊丸。如麻子大。每服十九。薄荷湯送下。

地黃清肺

治脾熱疳。腹脹。咳嗽。氣逆。嘔吐。熱。惡寒。

桑白皮 兩 炒 紫蘇 北訶胡

防風 赤茯苓 黃芩 天門冬 去心

當歸 連翹 桔梗 生地黃

甘艸 各五分

右判散。每服二錢水煎。食後服。

化膿丸 殺毒虫聖方

蕪荑 蘆薈 青黛 川芎

白芷稍 胡黃連 川黃連 蝦蟇灰 各等分

嬰童百問

卷八

五

右爲末。猪膽汁浸糕糊丸。麻子大。每服二十九。食後臨臥。杏仁煎湯下。其鼻常用熊膽泡湯小。

筆蘸洗。像前藥各進數服。却用青黛當歸赤小。

豆瓜蒂地榆黃連蘆薈等藥均分。雄黃少許。細末入鼻。欬瘡。

靈脂丸 治脾疳食積

白豆蔻 麥蘖 炒

蓬朮 煨 五靈脂 縮砂仁

青皮 史君子 橘紅

蝦蟇 炙 焦 各一錢

右爲末。米糊丸。麻子大。每服十九米湯下。
下蟲丸 治疳痢諸毒

苦練根皮 焙 酒浸 綠色貫衆

木香 蕪荑 焙 桃仁 浸去 檳榔 各二

鶴虱 炒 輕粉 各半 乾蝦蟇 炙焦 三錢

史君子 五十個 取肉用

右爲末。飛麩糊丸。麻子大。每服二十九。天明清
肉汁下。內加當歸川黃連各二錢半。治脊疳兼
疳勞。

龍膽丸 治疳疔腫熱餅癩

龍膽艸 川升麻 苦練根皮

赤茯苓 蘆薈 防風 油髮灰 各二

青黛 黃連 各三錢

右爲末。猪膽汁浸糕丸。麻子大。每二十九。薄荷
湯下。食後仍以蘆薈末入鼻。

黃連丸 治疳勞疳渴乾疳

黃連 半兩 淨猪膽汁 括蕒根 烏梅肉

杏仁 浸去 石蓮子 各二

右爲末。猪膽浸糕糊丸。麻子大。每服十五丸。煎
烏梅薑蜜湯下。又療虛後附消渴方論式藥可

治疳渴及五乾疳。

香薷丸 治疳瀉

黃連 三錢 肉豆蔻 生 木香 訶子 煨

縮砂仁 茯苓 各二錢

右爲末。採飯丸。麻子大。每十五丸。食前米飲下。
木香丸 治疳痢

治疳痢。冷熱不調。五色雜下。裏急後重。

櫻蓮百問 卷八 疳疔

黃連 淨三錢 木香 紫厚朴 薑 縮砂仁

夜明沙 隔紙炒 訶子肉 煨一錢半

右爲末。粳米飯丸。麻子大。每十五丸。乾艾葉生
薑煎湯食前溫服。

揭丸 治疳腫脹

萊菔子 炒一兩 陳處 青皮 去白

檳榔 黑牽牛 取淨半生半炒 北五靈脂

赤茯苓 蓬朮 煨各半兩 木香 二錢

右爲末。麩糊丸。如菜豆大。每服十五丸。紫蘇葉

151000 子 黃連丸 4 文之日

白湯送下。

黃耆湯

治疔勞咳嗽不定。虛汗骨蒸。渴而復瀉。乳食遲進而不化。

黃耆 當歸 川芎 白芍藥

生地黄 去足 歸田 各三錢

人參 白茯苓 陳皮 半夏麩

柴胡 史君子 甘艸 炙各一錢

右剉散。每服二錢。薑棗煎食前服。

嬰童百問

卷八

疔勞

龍血煎 治疔勞

蕪荑 柴胡 川芎 各一兩 人參 半兩

史君子 二十一个 胡黃連 川黃連 各兩

右用龍血一盞。吳茱萸一兩。拌和二黃連。淹一

宿。次早炒乾。煉出茱萸并血。只用二黃連。夾塗

藥。拌末。粟米糊丸。麻子大。每二十九食前服。

阿坡丸

治無辜諸疔。一服虛熱退。二服煩渴止。三服寫

疔佳

蟾蜍 一枚。夏月。溝渠中。取腹大不

右取蟾蜍一杓。置桶中。以尿浸之。桶上要乾。不

與蟲走。却將蟾蜍打死。頓在蟲中。任與蟲食。一

日一夜。次以新布袋包繫定。置之急流水中。浸

一宿。取出。瓦上焙為末。麝一字。採飯糊丸。麻子

大。每二三十丸。米飲下。

君朴丸

治小兒諸疔。小便白濁。久則黃瘦。不長肌肉。

史君子 深厚朴 製 黃連 各一兩 木香 三錢

嬰童百問

卷八

疔勞

右為米糊丸。如小豆大。廿九。米湯下。二

五服效。

疔傷 第八十問

楊氏云五疔出蟲五臟疔也其餘曰餽疔曰脊疔曰腦疔曰乾疔曰疔渴曰疔瀉曰疔痢曰疔腫脹曰疔勞曰無辜疔曰丁奚曰哺露其狀非一不可不撮其要而條析之五疔出蟲者疔傷之源雖起于乳哺不調然臟腑停積已久莫不化而為蟲其蟲或如絲髮或如馬尾多出于頭項腹背之間黃白或赤者可治青黑者難療也蝨疔者矢孔飯蚤食肉太蚤或傷胃停畜而膩化為蝨蟲皺眉多啼嘔吐清沫腹中作痛

嬰童百問 卷八 疔傷 辛

肚脹青筋唇口紫黑搖頭齒痒是也脊疔者蟲食脊脊身熱羸黃積中生熱煩渴下利拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆瘡頻嚙爪甲是也腦疔者胎中素挾風熱生下乳哺越常頭皮光急滿頭餅瘡腦熱如少髮結如穗遍身多汗頭腫顛高也乾疔者瘦悴少血舌乾其病在心目不轉睛乾啼少淚其病在肝身熱尿乾手足清冷其病在腎聲焦皮燥大便乾結其病在肺搭口癡眠胸脘乾渴其病在脾總為五疔也

清濁者臟中風有骨氣加之乳母恣食五辛酒麪炙

燻使兒心肺壅熱日則煩渴飲水乳食不進夜則泄止是也疔瀉者毛焦唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下精粕是也疔痢者挾受風寒暑濕或冷熱不調或停積宿滯水穀不聚須下惡物是也疔腫脹者虛中有積其毒氣交併故令腹肚腫脹由是脾復受濕故令頭面脚手虛浮是也疔勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胸前熱而發瘧盜汗骨蒸嗽喘枯悴是也或渴而復瀉飲水惡食肚硬如石面色如銀斷不可治無辜疔者腦後項邊有核如彈丸按之轉動軟而不嬰童百問 卷八 疔傷 辛

疼其間有蟲如米粉不速破之則蟲隨熱氣流散淫食臟腑以致肢體癱瘓便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是也針刺破用膏藥貼或澣濯兒衣露于簷下為雌烏落羽所惡汚兒著此衣蟲致皮毛亦致無辜之疾兒衣已曬須微火烘之其若手足極細項小骨高尻削體瘦腹大臍突號哭胸陷或生殺瘰是為丁奚虛熱往來頭骨分開翻食吐蟲煩渴嘔噦是為哺露皆因脾胃久虛不能消化水穀以致精神減損無以榮其血氣故肌肉銷燬腎氣不足復為風冷所傷使

形骨枯露亦有胎中受毒臟腑血少致之此皆無辜
 疔傷數種之疾病而至此不幾殆哉宜肥兒九大蘆
 蒼九五疔九胡黃連九至聖九扶神九天麻九地黃
 九十全丹香薷九褐九子消食九鼈甲九下蟲九集
 聖九黃雞煎九等藥及早治之方為全美又有疔傷
 久利腸胃受濕得之狀如狐惑傷寒齒蝕之症或以
 走馬命名蓋齒屬腎腎虛纔受熱邪疔氣直奔上焦
 故以走馬為喻初作口氣名曰臭息次第齒黑盛則
 齩爛熱血迸出曰宣露甚者齒皆脫落治之之法用
 嬰童百問 卷八 疔傷 三

銅綠生蜘蛛細研入麝少許合和擦齒如無蜘蛛用
 其殼亦可

肥兒九 治疔多因缺乳食肉太早患臟腑虛化
 虫治黃瘦肚急消瘡可常服之退身熱

黃連 肉豆蔻 方加
 神麩 炒局方用
 史君子 麥蘖 炒各一兩加
 白蕪荑 半兩局方 川線子 去核
 用稍榔 一兩

右為末神麩九麻子大每三十九空米湯下
 大蘆蒼九 治疔殺虫和胃止瀉

胡黃連 黃連 白蕪荑 蘆蒼

木香 青皮 雷丸 破開白者佳
 者殺人勿附

鷓鴣 炒各 麝香 二錢
 半兩 另研

右為末粟米飯九蕪荑大豆卷湯下三十九無結
 五疔良方 治疔

川黃連 蕪荑 取作神麩炒 麥蘖炒
 陳皮 木香 蝦蟇 燒存性
 各一兩

史君子 三十個 肉豆蔻 二雞心檳榔 二
 煨去殼 右為末入麝少許雄 膽二枚取汁入好酒打
 清麩糊九芥子大每十五丸米飲下

嬰童百問 卷八 疔傷 三
 胡黃連九 治疔

胡黃連 黃連 各半 朱砂 二錢半
 另研

右上方物為細末研入朱砂末却填入猪膽內用
 漿煮以杖子於銚上用綫釣之勿令着底候一
 炊久取出研入蘆蒼麝各二錢五分飯糊九如
 麻子大每服五七九至一二十九米飲食後一
 作食前治疔症有熱

集聖丸 治疔通用

蘆蒼 五靈脂 夜明沙 煨縮砂

仙皮 青皮 蓬朮煨 木香各二錢

黃連 史君子煨川肉 蝦蟇炙焦各三錢

右為末雄豬膽二枚取汁和藥入糕糊丸麻子大每服十五丸米飲下疝勞瘦弱本方加當歸一錢川芎三錢

天麻丸 治肝疝風疝疝眼

青黛 川黃連 天麻 五靈脂

夜明沙微炒 川芎 蘆薈各二錢 龍膽艸

防風 蟬退去足各一錢半 全蝎二枚焙

嬰童百問 卷八 疝傷 麝香少許 乾蟾頭炙焦三錢 素

右為末豬膽汁浸糕糊丸如麻子大每服十九丸

薄荷湯下

地黃丸 治腎疝

熟地黃八錢 赤茯苓 山茱萸肉

當歸 山藥 川練肉 牡丹皮

澤瀉 史君子肉各三錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服三丸溫水化下

淡神丸 治心疝驚疝

茯神 蘆薈 琥珀 黃連

赤茯苓各三錢 釣藤皮 遠志肉焙乾

蝦蟇灰各二錢 石菖蒲一錢 麝香少許

右為末粟米糊丸麻子大每服十九丸薄荷湯下十全丹 治丁奚爾露

青皮 陳皮 川芎 五靈脂

蓬朮 白豆蔻 檳榔 蘆薈各半

史君子焙 蝦蟇灰 木香各三錢

右為末豬膽汁浸糕糊丸麻子大每服二十九丸

嬰童百問 卷八 疝傷 湯氏十全丹 飲下有熱薄荷湯下 素

治丁奚爾露夫哺露者因乳哺不調傷於脾胃致令脾胃虛弱漸不能食血氣減損肌肉不榮而柴骨癯露其臟腑之氣不宜則汲汲苦熱謂之哺露也宜服麝香進食丸

檳榔 枳殼湯浸去穢 青皮去穢

陳皮 三稜煨 蓬朮煨 砂仁炒各

丁香 木香二錢 香附一兩

右為末神麩糊丸黍米大空心食前下一百丸
香豆寇丸 治舟瀉

黃連 肉豆蔻 生木香 訶子

縮砂仁 茯苓 各二錢

右為末揉飯丸麻子大每十五丸食前米飲下

褐九子 治舟瀉

羅漢子 一兩 微炒 陳皮 青皮

檳榔 黑牽牛 取淨牛 半兩 炒 北五靈脂

赤茯苓 蓬朮 各半兩 木香 二錢

嬰童百問 卷八 疳傷 藥

右為末麩糊丸菜豆大每服十五丸紫蘇湯下

消食丸

治小兒乳哺飲食取冷過度冷氣積于脾胃

為水穀之海脾氣磨而消之胃氣調和則乳哺

消化脾傷於冷則宿食不消此藥寬中快氣

乳食正顏容 縮砂仁 橘皮 三稜 蓬朮

神麩 麥蘖 炒各三錢 香附 炒一兩

右為末麩糊丸菜豆大食後紫蘇湯下二十九

嬰童百問 卷八 疳傷 藥

治小兒無辜疳腹中毒氣四肢瘦弱宜服

龍甲 醋塗炙令 黃連 枳殼

夜明沙 炒各一兩 訶藜勒 二枚一熟

麝香 一字 蝎虎 一枚 推

右為末煉蜜丸菜豆大每以粥飲下五九日三

服量兒大小加減服之

蒸雞丸

治小兒疳勞骨蒸潮熱盜汗瘦弱腹急面黃食

嬰童百問 卷八 疳傷 藥

不生肌肉日夜啼多渴少食

黃連 二兩 鶴虱 蕪荑 各半兩 柴胡

秦艽 知母 丹參 史君子 去殼

右為末黃雄雞一隻約斤餘籠之專以火麻子

飼之至五日後去毛令淨於背上開孔去腸肚

淨拭乾令前藥入雞腹內以綫縫之小甌先以

黑豆鋪甌底厚三寸安雞在甌中四旁將黑豆

圍裹上以黑豆蓋之自日出蒸至晚候溫冷取

雞淨肉研和得所如硬入酒麩糊同藥末為丸

如小豆大二歲二十九以意加減米湯下無時
如十五歲以溫酒送下忌食猪肉黃雌雞肉
下蟲丸 治疳積諸蟲

苦練根皮 焙 貫衆 綠色 木香

蕪荑 焙 桃仁 浸去 宿榔 各二錢 鶴虱 炒

輕粉 各五分 蝦蟇 炙焦 史君子 五十個 煨用肉

右為末飛麩糊丸麻子大每二十九天閉清肉

汁下內加當歸黃連各二錢半治春疔兼疔勞

集聖丸 治諸疔通用

嬰童百問 卷八 疳積

蘆薈 五靈脂 夜明沙 焙 陳皮

青皮 蓬朮 煨 縮砂 木香 各二錢

黃連 史君子 煨取 蝦蟇 炙焦 各三錢

右為末雄豬膽二枚取汁和藥入糕糊丸麻子

大每服十五丸米飲下疔勞瘦弱本方加當歸

一錢半川芎三錢

經驗黃雞煎丸

柴胡 知母 秦尾 洗淨 川練肉 炒

宜黃 兩 胡黃連 蘆薈 鶴虱

蕪荑 檳榔 丹參 川芎

神麩 炒 麥蘖 炒 青皮 五靈脂 各二錢

史君子肉 一兩 水銀粉 一錢 麻子 五兩

黑豆 五升

右藥依前方修合

梅肉丸 治小兒諸疔煩渴飲水不止

艸龍膽 定粉 烏梅肉 炒 黃連 各三錢

右為末煉蜜丸黍米大每二十九溫水送下

嬰童百問卷之八

嬰童百問卷之九

虛羸 第八十一問

仲陽云。虛羸者。脾胃不和。不能乳食。致使肌膚瘦弱。亦因大病。或吐瀉後。脾胃尚弱。不能傳化穀氣也。有冷者。時時下利。唇口青白。有熱。溫壯。身熱。肌肉微黃。此冷熱虛羸也。冷者。木香丸主之。夏月不可服。如有此症。則少服之。熱者。胡黃連主之。冬月不可服。如有此症。則少服之。傷寒後虛羸者。竹葉湯主之。常服四君子湯。異攻散。參苓白朮散。主之。劑皆可服也。橘連丸。久服充肥。兼服肥兒丸。

木香丸

治疳痢冷熱不調。五色雜下。裏急後重。

黃連

淨二錢

木香

紫厚朴

製縮砂仁

夜明沙

隔紙炒各二錢

訶子肉

煨二錢

右為末。粳米飯丸。麻子大。每十五丸。乾艾葉生薑煎湯。食前溫服下。

薑煎湯食前溫服下。

胡黃連丸

治疳勞疳渴乾疳

黃連

半兩淨指膽汁

括蕪根

烏梅肉

杏仁

浸去尖石蓮子各二錢

右為末。牛膽汁浸糕糊丸。麻子大。每十五丸。煎烏梅薑蜜湯下。又療蟲後附消渴方論式藥可

治疳渴及五乾疳

竹葉湯

治傷寒表裏俱虛及諸煩不安

石膏

兩半夏四錢人參

甘艸各二錢

麥門冬

六錢

右剉散。每服二錢。水一盞。青竹葉生薑各四片。粳米七十粒。同煎。嘔加竹葉生薑。

嬰童百問 卷九 虛羸

四君子湯

治勞傷俱虛。臟腑怯弱。不食泄利

人參

去蘆 茯苓 去皮 甘艸

白朮 各等分

右為末。每服二錢。水一盞。煎七分。通口服。不拘

時。鹽少許。白湯點服。溫。和脾胃。進益飲食。辟寒

邪障霧氣

治吐瀉不思飲食。濕中和氣。及脾胃虛冷

人參

茯苓

白朮

甘艸

橘紅

木香 等分

右為末。每服二錢。薑棗煎服。一方去木香。

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進多困少力煩滿痞噎心

忪氣喘嘔吐泄瀉及傷寒咳嗽此藥中和不熱

久服養氣育神醒脾悅色順正辟邪

白扁豆 斤半薑汁浸去皮微炒 人參 去蘆 白茯苓

白朮 斤 甘草 炙 山藥 各二斤 蓮肉

桔梗 薏苡仁 縮砂仁 各一斤

右為末每服二錢棗湯調下小兒量大小加減

藳陳皮

治瘦久服消食和氣長肌肉

黃連 各一兩去鬚

右為末別研入麝半錢用猪膽七箇分藥入膽

內將水煮候臨熟以鍼微割破以熟為度取出

以粟米粥和丸如菜豆大每服二三十丸米飲

下量大小與之無時

肥兒丸

治疳多因缺乳食肉太厚以致肌肉消瘦

黃連 局方加刺豆蔻 陳皮 去白局方去此用木香

神麩 炒局方有 麥蘖 炒各一兩加三稜蓬蘽

白蕪荑 半兩局方用檳榔 川練子 一兩去核炒

右為末神麩糊丸麻子大每服二十九空心米

飲吞下

快活丸

治脾胃虛弱雖進乳食則遲化而中滿嘔吐肚

急面黃肚疼臑膈不調寬中快膈亦治大人十

噎五膈並宜服之

檀香 益智 蓬朮 各五錢 三稜 一兩

砂仁 薑黃 甘松 白豆蔻

嬰童百問

卷九 虛虛

四

甘州 各一斤 陳皮 七錢 香附子 三兩

右為末滴水丸麻子大每服三五十丸薑湯白

湯任下

胃氣不和虛冷 第八十二問

仲陽云胃氣不和面光白無精光口中氣冷不思食吐水肌瘦虛弱腹痛當補脾益黃散主之凡人以胃氣為本惟治病亦然胃氣有實有虛實者則有痞滿內熱之証虛則有嘔吐不食之証虛者益之實者損之欲得其平則可矣平胃散觀音散銀白散壯胃之劑不可缺也

益黃散 治小兒吐瀉脾虛不食米穀不化困倦力少滑腸夜起并疳虛泄汗并涎唾流下

陳皮 去白 丁香 二錢一方 訶子 去白

嬰童百問 卷九 五

青皮 去白 甘艸 炙各半兩

右為末三歲一錢半水半盞煎三分食前服

平胃散

治脾胃不和不思飲食心腹脇助脹滿刺痛口

苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噯氣吐酸面色痿

黃體弱肌瘦怠惰嗜臥體重節痛常多自利霍

亂痞噎隔氣翻胃並宜服之

厚朴 去粗皮水浸一宿剉 甘艸 炙十兩

陳皮 去白 蒼朮 去粗皮水浸一

右為末每二錢水一盞薑二片棗二箇煎七分

去薑棗熱服食前入鹽一捻沸湯點服亦得常

服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒暑濕四時

非節之氣

觀音散 治小兒胃氣不和嘔逆吐利

石蓮肉 去心 人參 神麩 白茯苓 二錢

甘艸 炙 木香 續黃耆 白扁豆 炒

白朮 各一錢

右到散每服二錢水一盞棗一枚藿香三葉煎

嬰童百問 卷九 六

空心溫服

銀白散

治止吐瀉壯胃氣治糞毒

糯米 炒二兩 扁豆 炒二兩 藿香 一分 白朮 炒一分

丁香 二錢 甘艸 炙三錢

右為末紫蘇米飲調下加天麻砂仁白菝菹快

脾正色加炮白附全蝎木香石蓮薑煎服

食積冷熱 第八十三問

巢氏云。夫宿食不消者。脾胃冷故也。小兒乳哺飲食。取冷過度。冷氣積于脾胃。胃為水穀之海。脾氣磨而消之。胃氣調和。則乳哺消化。脾傷於冷。則宿食不消。脉沉者傷食不化故也。亦有傷乳傷食而身熱者。惟肚腹之熱尤甚。人之傷積。肚熱糞極臭酸。而夜間有熱。傷積之明驗。人所未曉也。冷者消食丸。木香丸。夜間有熱。天明復涼。乃是傷寒夾食失解故也。當服白餅子。先與微利。次與參蘇飲。發熱地骨皮飲。秦艽散。嬰童百問 卷九 食積冷熱 七

消食丸 常服寬中快氣消乳食正顏色

縮砂 陳皮 三稜 蓬朮

神效炒 麥蘖炒 香附子 米泔浸

枳殼 檳榔 烏梅 各五錢 丁香 二錢五分

右為末。麩糊丸。如菜豆大。食後紫蘇湯送下。二

三十九。

木香丸 常服治吐乳瀉乳食積停滯不化

木香 蓬朮 砂仁 青皮 去白

朱砂 研細 代赭 研各二錢 大丁香 一錢 川巴豆肉 去油

右為末和勻。飛白麩糊丸。麻子大。風乾。每服二

三九。乳傷乳汁下。食傷米飲下。

嬰童百問 卷九 食積冷熱 八

丁香丸

丁香 砂仁 二十粒 史君子肉 五兩

烏梅肉 巴豆肉 各三箇 去油

右為末。爛飯丸。麻子大。每服二三九。陳皮湯下。

虛實腫脹 第八十四問

議曰腫脹二症此由虛中有積久患失治日漸傳變
症候多端隨輕重察盛衰審表裏以主治先固其本
後正其標斯無急矣有濕腫有毒氣腫傷寒虛腫瀉
痢虛腫氣血虛腫有肝脹氣脹癥積脹鎖肚脹腕膈
脹食膨脹蛔氣脹虛冷積脹以上腫脹虛積竝當下
之各有其法其受濕於脾胃久不剋化氣浮四肢頭
面皆腫食毒氣由脾胃傷之冷積毒氣停留于腕膈
致虛入腹作腫傷寒下之太蚤乘虛入腹作腫瀉利
嬰童百問 卷九 九

通利腫脹必然平復矣如有熱者必以葶藶子牛黃等
葷以治之推氣丸劑亦可服

分氣飲

治小兒腫脹喘急而氣短

桔梗 赤茯苓 陳皮 桑白皮

大腹皮 枳殼 半夏麩 真蘇子

紫蘇 甘艸 草菓仁

右剉散每服一錢半薑棗煎服

五疳保童丸 治五種疳疾

嬰童百問 卷九 十

五倍子 青黛 夜明沙 洗苦練根皮

蘆薈 熊膽 黃連 龍膽艸

乾蟾 麝香 蕪荑

蟬退 等分

右為末粟米糊丸麻子大一歲兒二十九飯飲

下二三服

楊氏塌氣散

治小兒腹脹氣喘體腫面浮

陳皮 青皮 去穢巴豆二十一粒

甘州炙各半兩黑牽牛二錢半炒肉豆蔻二錢半炒
右末半錢米飲調下加檳榔一箇

場氣丸
治小兒疳氣腹脹喘急并面浮腫

丁香 胡椒炒各五錢萊菔子炒白牽牛各七錢半

右為末麩糊丸小豆大三歲三十九米湯下

場氣散

治小兒腹脹氣粗并疳疾相攻面目浮腫

木香一錢青皮五錢巴豆三十粒同炒豆黃色去巴豆用

嬰童百問

卷九

七

右為末三歲半錢米湯下食前連進即效

三稜煎丸

治嬰孩食傷生冷甜膩毒熱等物脾胃積滯久不剋化令兒壯熱脚冷痞癥寒熱及癆癥瘕中皖不和膨脹上膈氣壅心腹不得通宣所以作疾此藥溫涼但是諸積滯食不化竝宜與服

京三稜成塊而煑半兩蓬朮竝炮半兩芫花二錢半醋浸炒

龜甲去裙米醋煑焦半兩淡豆豉二錢半巴豆粒去殼

川當歸半兩杏仁去皮尖二錢半炒令赤

右前四味一處以米醋一碗煮令乾仍用炒起更細剉焙為末次入當歸末杏仁巴豆淡豉和勻水煮麩糊丸麻子大每服二十九薑湯下大

三稜丸

治小兒停積腹脇脹滿乾噎惡心全不入食

三稜煨木香 神麩炒陳皮去白

半夏薑製各半兩丁香 桂各五錢

右為末麩和丸如黃米大每二十九乳食後溫

嬰童百問

卷九

七

生薑湯下

真珠天麻丸

治急驚風請量用之以通為度此方仍治帶腸鎖肚撮口至妙丸如麻子大初生患者三日三九五日五九七日七九加青黛各青黛丸

天南星炮天麻 白附子炮各二錢半

膩粉半錢巴霜一字蘇莢炒全蠍

右為末煮細麩糊丸如麻子大一歲每服五丸

二歲十九大小加減薄荷湯點茶清送下

大柴連丸

治小兒飲食過度胸膈膨脹上下氣不宣通鬱滯迷悶情思少樂大則作喘飲食不化作渴煩躁坐臥不任肢體倦怠腹脇疼痛

蓬朮

京三稜

各二錢

乾薑

陳皮

去白

木香

丁香

各三錢

巴豆

二十一粒去膜心出油用

綠細小茱萸

二錢

右為末醋和為丸麻子大每服七丸至十九大

者加服生薑棗子湯下

下蟲丸

治疳疔諸蟲

苦練根皮

酒浸

綠色貫眾

木香

蕪荑

桃仁

浸去

雞心檳榔

鶴虱

炒

輕粉

各錢半

乾蝦蟇

錢三

史君子

五十個煨取肉用

右為末飛麩糊丸麻子大每服二十九天明清肉汁下內加當歸川黃連各二錢半治積疳兼

疳勞之症

沉香煎 治脾氣冷積

乳香

沉香

丁香

杏仁

百草霜

木香

各錢

肉豆蔻

一個

巴豆

十四粒出油如霜

右為末酒煮蠟和丸棗豆大每服三五丸淡生薑湯送下應患肚痛不止者服之效常服以通

為度

推氣丸

治三焦痞塞氣不升降大便秘澀

大黃

陳皮

檳榔

枳實

嬰童百問

卷九

七

黃芩

黑牽牛

各等分

右為細末煉蜜丸棗豆大每服二三十丸臨臥

溫熱水下量虛實加減

退僊丹

治諸蟲取諸積

牽牛

三斤

大腹子

二兩

錫灰

二兩

大黃

四兩

雷丸

四兩

青木香

鶴虱

乾漆

四條

右後四味煎水用粟米煮粥初用牽牛末六兩

大腹末三兩錫灰四兩大黃五兩雷丸六兩

木香和劑丸如梧桐子大每服五七丸用薑湯
熟水送下。

此藥專治男子婦人積蟲氣塊五勞七傷赤白
痢疾便血注下皮黃水腫十般氣十一般惡蟲
又進飲食除病悅顏色不與他藥相反四季可
服細末三四錢量大小加減服時不喫晚飯三
更用清茶下。次蚤桶子內蟲積及粒米盡方可
洗面溫粥補之傷寒孕婦不可服

蛇蟲 第八十五問

巢氏云蛇蟲者九蟲之內一蟲也長一尺亦有長五
六寸者或因臟腑虛弱而動或因食甘肥而動其動
則腹中痛發作脰聚行來上下痛有休止亦攻心痛
口喜吐涎及清水貫傷心者則死診其脈腹中痛其
脈法當沉弱而弦反脈大則是蛇蟲也此痛因食物
太早愛甜怕苦痛時便高聲啼叫只看人中上鼻頭
唇口一時黑色即是此症當服史君子丸檳榔散化
蟲丸藥取下便無事仲景云蛇厥者其人當吐蛇今
巢氏百問 卷九 蛇蟲 去
病煩此為臘寒烏梅丸主之其蛇蟲穿心者用薏苡
根煎湯治之即安。

史君子丸

治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹時復疔痛不
進飲食漸至羸瘦宜服之。

白芍藥 厚朴 陳皮 川芎

甘艸 各二錢半 史君子肉 湯浸去黑皮一兩

右為末煉蜜丸如芡實大每服一九陳米飲化
下大治小兒腹痛。

驚風散

治腎疳宜露候良方去蟲後服此。

木香 檳榔 人參 黃連

甘艸炙各等分

右為末每一錢小者五分熱水調服。

化蟲丸

治小兒蟲咬心痛來去不定不思乳食。

鴉虱炒 檳榔 胡粉 練根皮各等分

白礬二錢

嬰童百問

卷九

七

右為末麩糊丸棗豆大三歲三十九溫漿水入

油三五滴吞下。食前有蟲皆化為水大蟲自下

且初服甚妙。

烏梅丸

治吐厥其人當吐蛭今病者靜而復煩此為

寒蛭蟲上入其膈故須臾復止得食而嘔又

者蛭聞食自出其當自吐蛭又治久痢

烏梅七十 乾薑二兩 黃連四兩 獨椒五斤

當歸各 細辛 人參 附子各

桂枝去皮 黃蘗各一兩半

右為末用酒浸烏梅肉一宿去核蒸飯杵成泥

和藥勻丸麻子大每服十九食後米飲下日三

服忌生冷等物

陰腫疝氣 第八十六節

巢氏云。足少陰為腎之經。其氣下通於陰。小兒有少陰之經虛。而受風邪者。邪氣衝於陰。與血氣相搏。結則陰腫也。然兒有大小壯弱。起止中節可也。苟腎經氣虛。或坐石不起。冷氣凝之。或近地經久。風邪濕氣傷之。不為陰腫者。幾希矣。問有啼叫怒氣。閉擊於下。結聚不散。加以水竇不行。亦能發為此疾。治法。桃仁丸。如小兒外腎腫大。莖物通明。牡蠣粉研極細。雞子清調傅為佳。又有疝氣名偏墜。急宜下藥。小兒生下。亦有如此者。不疼不痛。此皆不須攻擊。不治而自愈。若腫痛甚急。當服藥。宜五苓散。青木香丸。湯氏化生丸。并疎氣藥。濟生方。牡丹皮。防風為末。酒調服。極效。五苓散。加防風。牡丹皮亦效。此症有熱甚者。三黃丸治之。

桃仁丸

治腎經氣虛。或坐石不起。冷氣凝之。或近地經久。風邪濕氣傷之。而成陰腫。問有啼叫怒氣。閉擊於下。結聚不散。加以水竇不行。亦能發此疾。

桃仁

去皮尖微

辣桂

黑牽牛

白蒺藜

炒香

牡丹皮

大黃

右為末。煉蜜丸。麻子大。每服五丸。或七丸。青皮

木通。蔥白。人鹽少許。煎湯灌下。或煎大流氣飲

研青木香。灌下亦可。

五苓散

治水道不分。以成疝氣。

澤瀉

半兩

猪苓

白朮

茯苓

桂

茯苓

半兩

桂

一兩

右為細末。每服二錢。熱湯調下。不拘時服。多飲

嬰童百問

卷九 疝氣

三

熱湯有汗。山即愈。又治濕熱在裏。身發黃。疽膿

煎茵陳湯下。食前服。疽病發渴。及中暑引飲。亦

可用水調服。小兒加白朮末少許。如發虛。加綿

黃耆。人參末少許。服之前十六問。辰砂五苓散

參用。

青木香丸

治寬中快膈。腹脇痛。心丁堅痞。腸中水聲。及陰

黑牽牛

兩半

米香

補骨脂

炒

葶澄茄 檳榔 各四錢

右先將粟米飯包檳榔仍用濕紙包裹煨焦去

飯用檳榔同煎藥為末滴水丸棗豆大每服二

十九白湯送下。

楊氏化生丸

治疝氣心腹痛上引腰脊飲食不節面色痿黃

身不能直百藥俱試經涉年歲已在膏盲宜服

此藥灸脊俞三壯痊

木香 一兩 三稜 煨 莪朮 溫紙裹煨 檳榔 分

嬰童百問 卷九 陳皮 炒 川練子 去核

青皮 巴豆炒 去巴豆

元花 各半兩 末 醋浸炒

右為細末麩糊丸如黍米大熟水下日進三服

牡丹皮散 治小兒癩卵偏墜

防風 去蘆 牡丹皮 去骨 等分

右為末每服二錢溫酒調服如不飲酒鹽湯點

服亦可加入五苓散木通湯下尤妙

三黃丸

三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫

痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩燥不美飲食下

焦有熱小便赤澀大便秘結五臟俱熱即生背

瘡癩毒及治五般痔疾糞門腫痛或下鮮血治

疝氣效。

黃連 去蘆 黃芩 去蘆 大黃 煨各十兩

右為末煉蜜丸桐子大每三十九滾湯下如麻

腑壅實加服九數小兒積熱可服。

盜汗骨蒸 第八十七

云盜汗出者乃睡而自汗出肌肉虛也團參湯

治小兒盜汗虛汗或心血液盛亦發為汗此藥收斂

心氣湯氏云汗者血也血虛亦能自汗作熱宜服團

參湯牡蠣散龍膽湯治小兒一切盜汗又有通神丸

治通身多汗小兒精氣未盛體性多熱若衣裘傷厚

過食熱物或犯時氣大病之後重亡津液陽氣偏盛

不勝火腑臟積熱薰灼肌體甚則銷燬骨髓是為

骨熱之病久而不已變成骨蒸日晚發熱肌瘦頰赤

口乾日夜潮熱夜有盜汗五心煩熱四肢困倦飲食

減少瘥後餘毒不解生犀散主之

團參湯

治小兒虛汗盜汗或心血液盛亦發為汗此藥

收斂心氣

新羅人參 川當歸各五

右剉散用雄猪心一箇切三片每服一錢猪心

一片水一盞煎六分食前兩次服

撲汗方 治長虛汗

黃連 牡蠣粉 貝母 米泔

右末傅於身上

牡蠣散

治血虛自汗或病後暴虛津液不固自汗

牡蠣散 黃芪 生乾地黄

右剉散每服二錢水半盞煎五分去滓不拘時

服或為末米湯下或加小麥煎

龍膽湯 治小兒血虛自汗

龍膽草 鈞藤 柴胡 黃芩

桔梗 芍藥 茯苓 甘艸各六

蟬蛻 二枚 大黃 兩

右十味咬咀以水一升取五合為劑也服之如

後節度藥者有虛實藥宜足數合水也兒生一

日至七日分一合為三服兒生八日至十五日

分一合半為二服以漸加服皆得下即止勿再

服也直指方為末每服一錢其棗煎服或加防

風麥門冬以導心熱黃芩減半去蟬蛻亦可

通神丸

治小兒白日精神歡悅至夜臥通身多汗。

龍膽草 不拘多少

右爲末。米醋煮糊。丸如椒目大。每服五七丸。用飯飲下。一方加防風等分。水煮糊丸。

生犀散

治小兒骨蒸潮熱。盜汗肌瘦。

犀角屑 鼈甲 酥炙 柴胡 知母

地骨皮 胡黃連 各兩 大黃

桃枝 各半錢

右剉散。每服二錢。水一盞。煎五分。去滓服。無時。

嬰童百問

卷九

五

自汗 第八十八問

議曰。凡初生至周晬之兒。不可自汗。自汗則亡陽氣。性脈虛神散。驚風有作。凡乳幼自汗。切勿止之。宜用白朮二錢半。小麥一撮。煮令乾。去麥爲末。煎黃耆湯。調與服。以愈爲度。有傷寒熱症。自汗當以小柴胡加龍膽治之。夏月自汗多。宜白虎湯主之。熱多自汗而喘者。葛根黃連黃芩湯主之。

小柴胡湯 治小兒傷寒潮熱少陽汗出

人參 去蘆 甘草 炙各三錢 黃芩 二錢 柴胡 去蘆八錢

嬰童百問

卷九

五

半夏 湯泡七次。干二錢半

右剉散。每服二錢。水一盞。生薑三片。棗一枚。煎去滓。溫服。不拘時。

白虎湯 治夏月自汗及陽明風邪不解

知母 三兩 甘草 一兩 石膏 八兩 粳米 二合

右剉散。每服三錢。水一盞。煎六分。米熟爲度。去滓。溫服。聖惠方加乾葛。

葛根黃連黃芩湯

治太陽病。桂枝症。下之利遂不止。脈促者。

未解也。喘而汗出者。

葛根 二兩 黃芩 黃連 各七錢 五分

甘草 五錢

有即

右剉散每服三錢水一盞。煩七分去滓加減服。喘甚加葶藶子。

紅蓮白開 卷九 渴症

渴症 第八十九問

議曰小兒渴症一見唇紅如丹三五分即發三五分渴若紅甚即渴甚唇紅焦黑者即久渴虛盛疾加轉極症危篤故也凡小兒三焦虛煩作渴引飲不歇宜服三黃丸小兒傷寒後發渴唇口焦乾煩燥盛者白虎湯主之竹葉湯亦可服小兒瀉利作渴者五苓散去桂加乾葛尤妙香薷飲車前子散皆可服小柴胡湯加天花粉亦佳加乾葛尤穩大熱煩躁而渴者黃連解毒湯亦可服七物黃連湯亦可服極穩大抵小兒本自盛實易為生熱熱氣薰蒸故渴而引飲也

三黃丸 治小兒三焦虛煩大渴引飲

黃連 去蘆 黃芩 大黃 各十兩

右為末煉蜜丸桐子大每三十丸熱水下如臍

臍壅實加服丸數小兒積熱可服

竹葉湯 治傷寒發渴

石膏 二兩 半夏 四錢 人參 甘草 各二錢

麥門冬 六錢 去心

右剉散每服二錢水一盞青竹葉生薑各四片

粳米七十粒同煎嘔加生薑竹葉

白虎湯 治陽明經口渴欲死

知母 三兩 甘草 一兩 石膏 八兩 粳米 三合

右剉散每服三錢水一盞煎六分米熟為度去

滓溫服聖惠方加乾葛

五苓散

澤瀉 二兩 猪苓 白朮 茯苓 各一兩

桂 一兩

右為末每二錢熱湯調下不拘時服多飲熱湯

嬰童百問 卷九 疳積

有汗出即愈又治濕熱在裏身發黃疸濃煎茵

陳湯下食前服疸病發渴及中暑引飲亦可用

水調服小兒加白朮末少許如發虛加綿黃耆

人參末少許服之前十六間辰砂五苓散參用

香薷飲 治夏月中暑下咽即眩

香薷 一兩 白扁豆 炒 厚朴 薑製各半兩

右剉散每三錢水一盞生薑三片煎服一方加

黃連治瀉痢一方加芫花香蘇散治霍亂吐瀉

暑月感冒傷暑之症

車前子散 治暑月伏熱霍亂吐瀉

白茯苓 猪苓 香薷 車前子 各等分

人參 減半

右為末每一錢用燈心湯調下吐疼加芍藥瀉

不止加石蓮肉

小柴胡湯 治小兒少陽寒邪不解口渴

人參 去蘆 甘艸 炙 黃芩 二錢 柴胡 去蘆

半夏 湯泡七次 乾薑 五分

右剉散每服二錢水一盞生薑三片梔二枚煎

嬰童百問 卷九 疳積

去滓溫服不拘時

黃連解毒湯 治大熱煩燥而渴

黃連 三錢 黃芩 五錢 梔子 四個 黃芩 一兩

右剉散每服三錢水一盞煎六分去滓溫服

七物黃連湯 治症同前

黃連 茯苓 芍藥 各七錢 黃芩

甘艸 乾薑 各一兩 小麥 三合

右剉散白朮煎止瀉加枳實半兩

煩燥 第九十問

論云噉煎不安是煩噉嗟不定是燥噉煎者心經有熱精神恍惚內煩不安心煩則滿自然生驚噉嗟者心經有風邪精神恍惚心燥生風熱多不安煩久而驚風多不定燥久而搐治法涼心經退熱通利小便為佳熱甚者黃連解毒湯輕者導赤散玉露散風熱者至寶丹琥珀散解毒丸皆可服有傷寒症者小柴胡湯白虎湯大柴胡湯去大黃加乾葛治之有驚熱者金箔鎮心丸七物黃連湯尤妙

嬰童百問

卷九 煩燥

三

黃連解毒湯 治煩悶欲死下咽即生

黃連 三錢 黃蘗 半兩 梔子 四個 黃芩 一兩

右剉散每服三錢水一盞煎六分去滓溫服

玉露散 治噉嗟煩躁不安

寒水石 石膏 各二兩 水飛 甘艸 三錢

右為末每服半錢麥門冬湯下湯使隨意加辰

砂金箔各桃紅散亦治急驚入梔子仁名金蓮

散加滑石半兩名玉真散湯氏方治小兒秋夏

伏暑多有熱吐黃涎頭額溫五心熱小兒赤少

或乾嘔無物宜服香薷 又宜服玉露散生薑汁和白湯調下獨用薑汁一服而止

導赤散 治心驚內虛邪熱

生地黃 甘艸 木通 各等分

右噉咀竹葉煎加黃芩赤芍藥羌活燈心煎服

至寶丹 治精神恍惚心燥生風

生犀屑 玳瑁屑 琥珀 研 朱砂 研

雄黃 各一兩 金箔 五十片 一

嬰童百問

卷九 煩燥

三

安息香 一兩半為末以無灰酒煎去沙石約取一兩慢火熬膏

右生犀屑玳瑁搗羅為細末研入諸藥令勻將

安息香膏以重湯煮凝成和搜為劑如乾即入

少熟蜜盛不津器中旋丸桐子大二歲兒服二

丸人參湯化下大小以意加減又治大人卒中

不語中惡氣中諸物毒中熱暗風產後血暈死

胎不下並用童便少許生薑自然汁三五滴同

溫過化下五丸立效

琥珀散 治煩躁不安消風豁痰

辰砂 一錢 琥珀 牛黃 僵蠶 各半

南星 水浸夏三日春秋五日 全蝎 去毒

白附子 代赭石 天麻 乳香

蟬蛻 各一錢 麝香 五分 片腦 一字

右為末三歲半字薄荷湯下慢驚加附子

青解毒丸

治小兒五臟積熱毒氣上攻胸臆煩悶咽喉腫

痛赤眼癰腫頭面發熱唇口乾燥兩頰生瘡精

神恍惚心忪悶亂坐臥不寧及傷暑毒而赤身

熱心煩燥而渴飲食不下

寒水石 石膏 研各八兩 青黛 四兩

右研如粉入青黛和勻蒸餅七箇水調丸如實

大每服一丸食後新汲水化下或細嚼生薑湯

下亦可中諸毒竝宜服及小兒驚風潮熱痰涎

壅塞心胸煩燥頰赤多渴坐臥不穩每三歲兒

可服半粒量大小加減

小柴胡湯 治少陽傷寒煩燥不眠

人參 去虛 甘艸 炙 黃芩 錢 柴胡 去蘆

半夏 湯泡七次 乾二錢半

右剉散每二錢水一盞生薑三片棗一枚去滓

溫服不拘時

白虎湯 治陽明煩躁

知母 三兩 甘艸 一兩 石膏 八兩 粳米 三合

右剉散每三錢水一盞煎六分米熟為度去滓

溫服聖惠方加乾葛

大柴胡湯 治腹中結硬煩躁下之即愈

柴胡 去蘆 八錢 黃芩 赤芍藥 各三錢

半夏 湯泡七次切片 枳實 去穢 炒五分

右咬咀薑棗煎加減服之欲下加大黃五錢

金箔鎮心丸 治驚悸痰聚上脫煩躁久安

朱砂 一兩 白茯苓 人參 甘艸 各半

山藥 一兩 腦子 一錢 牙硝 一錢 麝香 五分

紫河車 黑豆煮 金箔 十二帖 為衣

右為末煉蜜丸每兩半作五十九丸以金箔為衣

每服一九薄荷湯下含化亦可臥時常服安心

鎮神祛邪熱涼咽膈止驚啼

七物黃連湯

治夏月傷寒四肢煩疼發熱其人喜煩嘔逆或滿劇如禍崇寒熱相搏故令喜煩

黃連

茯苓

芍藥

各一錢半黃芩

甘艸

乾薑

各一兩

小麥

三合

右剉散白水煎欲止瀉加枳實半兩

嬰童百問卷之九

嬰童百問卷之十

胸胎 第九十一

經濟論胸證肺經受風寒因咳嗽肺停冷血生痰致使肺臟有熱睡臥不安故成胸胎咽喉間如拽鋸之聲小兒若有此候可服通關梅花飲子并半夏丸及保壽散小歸命散解肌散三兩服自安若見胸胎如痰証喉間若拽鋸聲者乃肺感風邪上氣喘急面唇青色項下有深凹陷痰涎粘如膠漆口生腥臭惡氣舌縮者皆不可治也

梅花飲子

治嬰孩驚熱潮熱虛熱積熱五臟蘊熱上焦壅熱手足心熱喉中多痰面色或紅或白變蒸啞呀鼻流清涕氣急肝肺壅熱目赤咳嗽或被人物所驚夜啼睡臥不安心中驚怖情緒不快或傷寒漸安尚有餘熱未除亦宜進此三兩服常服鎮心壓驚化痰退熱安神可除未來之患通關

南礪砂 馬牙消 研 芒硝 研 甘草 各半兩

人參 一兩 辰砂 二錢 片腦 麝香 各一

右八味爲末。以磁器收之。遇有此證服一匙。麥

門冬湯調下。氣喘咳嗽。桑白皮湯調下。常服薄

苛湯下。

吳子玉方

日色信石 生兩星

枯礬 雄黃 各一

雄黃 各一

右爲末糊丸如蘿蔔子大。臨臥用冷茶清吞下

五九

半夏丸

治肺氣不調。咳嗽滿。痰涎壅塞。心下堅滿。短

氣煩悶。風壅痰實。頭目昏眩。咽隔不利。嘔吐惡

心。神思昏憤。心忪面熱。涕唾稠粘。並皆治之。

白礬 半夏 各一

右爲細末。生薑自然汁爲丸。梧桐子大。每服十

九。或二十九。食後臥時。生薑湯下。小兒丸如麻

子大

保壽散

治證詳見五十問

白茯苓 新羅參 川雄 牙硝

甘草 片腦 麝香 牛黃 各一

右八味細研入錫合內收之。湯使如後。金粉散

小歸命散

治小兒變蒸。傷寒潮熱。驚熱。嘔吐。鼻流清涕。咳

嗽。渾身溫壯。咽喉有涎。兼前項傷寒等證。及

驚熱。墜涎。安神百病不生。

白茯苓 人參 白朮 甘草 各一

辰砂 片腦 麝香 各一

右七味爲末。每服半錢。薄苛湯調下。

解肌散

治嬰孩傷寒。風面部紅赤。咳嗽。渾身壯熱。有前

項等形。證兼服人參散。後得熱退。可觀。患勢輕

重。若患稍輕。脈候不洪。數而不大。赤亦加煩燥

然。須神昏。譫語。此爲輕可之候。但只進此。

人參 鈞藤 桔梗 甘艸

川芎 三錢 白芷 二錢

杏仁 四十九箇 石膏 煨 麻黃 去節 各

右剉散每服二錢東一枚水一盞煎半盞服如

初中傷寒先下此藥是須要仔細辨認形證若

是麻痘瘡疹便不得下此藥蓋麻痘之證則面

赤白耳珠脚膝尻骨俱冷如水身體溫壯亦狂

躁驚語夢中驚笑乃是此候也若小兒傷寒等

服此解肌散漸得熱退次第可服大歸命散保

壽散輕粉白朮散等調理

嬰童問 卷下 四

白玉丸

利膈下痰涎去心胸噎塞不止并咳嗽多痰

南星 煨 半夏 僵蠶 白礬 生各二

合為末杏仁七箇去皮尖巴豆一粒同研勻再

用去皮生薑汁為丸如粟米大每服一二十丸

薑湯送下不拘時

瘧語 第九十二問

巢氏云瘧疾者由夏傷於暑熱結皮膚至秋因勞動

血氣勝理虛而邪氣乘之動前暑熱正邪相擊陰陽

交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽更感更虛故發寒熱

陰陽相離則寒熱俱歇若邪動氣至交爭復發小兒

未能觸冒於暑而亦病瘧者乃乳母持抱解脫不避

風寒者也夫風邪所傷客於皮膚而痰飲積於臟腑

致令血氣不和陰陽交爭若真氣勝則邪氣退邪氣

未盡故發瘧也邪氣雖退陰血尚虛邪干於真氣臟

腑熱氣未散故餘熱往來也其病正發寒熱交爭之

時暑氣乘臟則燥而渴飲停滯成癰結於腸下故

瘧後膈下結硬也若引飲不止小便澀者則變成癰

也寒熱往來而熱乘五臟氣積不泄故煩滿寒熱相

搏而擊於臟氣故腹痛也寒多熱少無汗者桂枝麻

黃各半湯有汗多者柴胡桂枝湯汗多渴者白虎加

桂湯小便赤熱多而渴者小柴胡湯瘧未散者鬼哭

散止之寒少熱多者可服清脾湯養胃湯治脾胃冷

弱者四獸飲亦可服其散瘧九子切不可用砒霜者

但可服有常山者有阿魏者真能散痞瘕也熱多汗
出而渴腹疼者大柴胡湯加葛根可也其瘧後加之
冷證痞瘕結塊者木香丸主之煩渴者五苓散有熱
甚者白虎湯或加桂或加人參時行壯熱者柴胡石
膏湯亦可服頭疼甚者蔥白加甘草亦可服知母麻
黃湯亦治瘧之奇劑也

桂枝麻黃各半湯

治證詳見五十三問

桂枝

芍藥

生薑

甘草

嬰童百問

卷一

麻黃

去節各半兩

杏仁

去皮尖十二箇

大棗

二箇

右剉散每服三錢水一小盞煎八分去滓量六

小加減溫服

白虎加桂湯

治證詳見五十八問

知母

三兩

甘草

一兩

石膏

八兩

粳米

三合

右剉散每服三錢水一盞煎至六分米熟為度

去滓溫服聖惠方加乾葛

小柴胡湯

治證詳見三十九問

人參

未置

甘草

三錢

黃芩

二錢

柴胡

八錢

半夏

湯泡七次

洗去

乾土

錢半

右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎

去滓溫服不拘時

柴胡桂枝湯

柴胡

八錢

黃芩

二錢

半夏

二錢

芍藥

甘草

桂枝

各三錢

右剉散每服三錢水一盞煎食前服

鬼哭散

治正瘧疾

常山

大腹皮

白茯苓

龍甲

酸炙

甘草

等分

右除龍甲甘草炙外三件不得見火用槌研枝

各七寸同煎臨發畧吐涎不妨用常山白茯

苓同煎亦效

清瘧散

治瘧瘧脈來弦數但熱不寒或熱多寒少膈滿不能食。口苦舌乾煩渴飲水小便黃赤大便欠利。

青皮 厚朴薑製 白朮 草菓去

柴胡 茯苓 半夏湯洗 黃芩

甘草炙各等分

右剉散每服三錢水一盞薑七片烏梅二片煎六分去滓溫服不拘時

四獸飲

身重而倦 卷十 瘧疾 八

治五臟氣虛喜怒不節勞逸兼并致陰陽相勝結聚痰飲與衛氣相搏發為瘧疾兼治瘧瘧最
有神效常服溫中快膈

半夏 茯苓 人參 白朮

草菓 橘紅各等分 甘草炙半

右剉散每服三錢烏梅薑棗各一水一盞煎服

胡黃連散

治小兒瘧

人參 胡黃連 草菓 檳榔

甘草 柴胡各等分
剉散水一盞煎三分服

養胃湯

治外感風寒內傷生冷溫中快膈能辟山嵐瘴氣寒瘧脾胃虛寒。

厚朴 蒼朮製 半夏湯洗 藿香

艸菓仁 茯苓 人參各半 甘草炙

橘紅各二錢半

右剉散每服三錢水一盞薑七片烏梅一箇煎

身重而倦 卷十 瘧疾 九

六分去滓熱服兼治冷飲傷脾發為瘧疾或中脘虛寒嘔逆惡心寒瘧加桂

又方

陳皮去白三錢半 甘草炙 厚朴製

半夏錢三 人參 草菓各二錢 白茯苓四錢

藿香七錢 青皮去穢 三稜煨 蓬朮煨

大腹皮各一錢半 蒼朮 烏梅各五錢

右剉散每服三錢薑棗煎服

經效瘧丹

治瘡母結癥寒熱無已。

真阿魏 雄黃 各二錢 硃砂 一錢

在沸湯泡阿魏研散雄硃和之稀麩糊丸梧桐

子大每服一九人參湯候冷空心服瘡癰桃枝

煎冷服臨發磨一九傳鼻頭口畔

大柴胡湯加乾葛

治證詳見二十九問

柴胡 去蘆八錢 黃芩 各三錢 赤芍藥 各三錢

半夏 湯泡七次切片 枳實 去穢 炒半錢

小兒疳積 卷十雜證 十

右咬咀薑棗煎加減服之欲下加大黃半兩

木香丸

治證詳見四十六問

木香 蓬朮 砂仁 青皮 去白

朱砂 細研 代赭石 研各二錢 大丁香 一錢

川巴豆肉 紙壓去油

治為細末和勻飛白麩糊和丸麻子大風乾每

服二錢乳傷乳汁下食傷米飲下

五苓散

治證詳見五十二問

澤瀉 二兩 猪苓 白朮 茯苓 各一兩

桂 一兩

右為細末每服二錢熱湯調下不拘時服多飲

熱湯有汗出即愈又治濕熱在裏身發黃疸濃

煎茵陳湯下食前服痘病發湯及中暑引飲亦

可用水調服小兒加白朮末少許如發虛加綿

黃著人參末少許服之前十六問辰砂五苓散

參用

嬰童百問 卷十雜證 十一

白虎湯

治證詳見五十八問

知母 三兩 甘肅 一兩 石膏 八兩 粳米

右剉散每服三錢水一盞煎至六分米熟為度

去滓溫服聖惠方加乾葛

柴胡石膏湯

治證詳見五十二問

柴白皮 黃芩 荆芥穗 各三兩

石膏 前胡 法煎 赤芍藥 乾葛

柴胡各五兩 升麻二兩

右為粗末每服二錢水一盞生薑二片淡豉十粒煎至七分去滓稍熱服小兒分作三服量大小加減不拘時候無汗加麻黃五味子半夏

蔥白湯

治頭疼不止身痛熱渴小便赤黃脉浮數無汗

葛根 芍藥 知母各半兩 川芎一兩

右到散每服二錢水一盞生薑三片蔥白三寸

煎至七分去滓熱服出汗如有汗溫服加甘州

舉者下問 宋十 麻黃

治小兒夾驚傷風并治發癩頭痛加石膏服嘔者加半夏

知母麻黃湯

治傷寒差後或十數日或半月二十日終不惺

惺常昏沉似失精神語言錯繆又無寒熱醫或

作鬼祟或作風疾多般治之不瘥或朝夕潮熱

頰赤或有寒熱似瘧都般發汗不盡餘毒心胞

絡間所致

知母 麻黃去節 甘草炙 芍藥

黃芩各半兩 桂枝去皮半兩

右到散每服三錢水一盞煎七分去滓溫服令微汗若心煩不眠欲飲水當稍稍與之令胃氣和即愈未汗須再服大小加減

舉者下問 宋十 麻黃

癰毒腫癰 第九十三問

湯氏云此四者皆由血氣凝滯而有熱毒之氣乘之故結聚成癰癰腫毒也備急神驗方未結之初微見有頭紅痛起隱痛者急用不語唾夜半頻頻塗之即消散若已結成當用天烏散貼方治小兒癰瘡驚毒癰腫皆可服漏蘆散真良方也熱甚者青解毒丸四順清涼飲加防風連翹玄參劑亦可服五福化毒丹尤良連翹湯可服青露散掩之留小孔後用驚毒掩子收瘡口取効熱甚者涼膈散亦可服

嬰童百問

卷十

十四

天烏散貼方

天南星 赤小豆 草烏 黃蘗

右等分爲末生薑自然汁調貼患處用米醋調

尤佳

漏蘆散

治小兒癰瘡及丹毒瘡癰

漏蘆

麻黃

去根

芒硝

連翹

黃芩

川升麻

甘州

各二錢半

川大黃

炒

白欬

七錢半

右剉散每服二錢米一盞煎五分去滓量大小加減不拘時候加減溫服可加羌活荆芥川芎防風枳殼

青解毒丸

治證詳見九十問

寒水石

石膏

研各

青黛

四兩

右研如粉入青黛和勻蒸餅七箇水調丸如芡

實大每服一九食後新汲水化下或細嚼生薑

湯下亦得如中諸毒宜服及小兒驚風潮熱

嬰童百問

卷十

十五

痰涎壅塞心胸煩燥頰赤多渴坐臥不穩每三

歲兒可服半粒量大小加減

玄參劑

解諸般熱消瘡癰

生地黃

玄參

各一兩

大黃

煨半兩

右爲末煉蜜九桐子大每服十九煎燈心竹葉

湯化下入沙糖少許亦可加羌活川芎赤芍藥

連翹防風

又方

治疹痘後餘毒不散。遍身生瘡不止。大能解毒。

玄參 赤芍藥 生地黃 赤茯苓

荆芥 防風 木通 桔梗

黃芩 朱砂 青黛各等分

右爲細末。煉蜜。充芡實大。每服一丸。薄荷湯下。大寒加減服之。

五福化毒丹

治小兒蘊積毒熱。驚惕狂躁。頰赤咽乾。口舌生瘡。夜臥不寧。謔言煩燥。頭面身體多生瘡癩。

聖藥百問 卷十

末

玄參 桔梗各二兩 茯苓二兩 人參

牙硝 青黛各二兩 甘草七錢 麝香一分

金箔 銀箔各十片

右爲末。煉蜜和劑。如芡實大。每服一丸。薄荷湯下。

下不拘時。及治瘡疹後餘毒上攻。口齒涎。鼻臭。

氣以生地黃汁化下一丸。及用雞翎刷在口內。

連翹湯

治瘡疹壯熱。小便不通。諸般瘡癩。丹毒麻風。

連翹 瞿麥 荆芥 木通

赤芍藥 當歸 防風 柴胡

活石 蟬蛻 甘草炒各一錢 山梔仁

黃芩各半錢

右剉細。每服一錢。加紫草煎溫服。熱甚加大黃。更詳證加減爲佳。

青露飲

治背疽一切惡瘡。圍藥不胤開。

白芨 白欬 白薇 白芷

白蘚皮 朴硝 青黛 黃蘗

聖藥百問 卷十

末

大黃 天花粉 青露葉即美蓉葉

老龍皮即老松木皮各等分

右爲細末。生薑自然汁調塗。留小孔。如乾再用生薑汁潤。

驚毒掩

一治瘡癩初發。掩上卽退。已成速破。

蔥根七箇 木別七箇 白芷二箇 巴豆十四箇

黃丹二兩 油四兩

右先用油入前四味。武火熬用柳木篋攪。以白

正焦黑爲度用綿濾去滓再入銚用文火熬却
入黃丹熬令紫黑色成膏爲度治諸般瘡癩去
膿收瘡口

驚毒諸般腫痛淹子

蒲黃 大黃 黃蘗 真粉

連翹 白芷 白芨 白欬

牡礪 丹參

右爲末水調塗腫處

涼膈散

嬰童百問

卷十

六

治小兒腑臟積熱煩躁多渴頭昏唇焦咽燥舌
腫喉閉目赤鼻衄頰頰結硬口舌生瘡痰實不
利涕唾稠粘睡臥不寧謔語狂妄腸胃燥結便
溺赤澁一切風腫並宜服之

川大黃 朴硝 甘艸各二兩 連翹二兩

梔子仁 黃芩 薄荷葉去土各半兩

右剉散每服二錢水一盞入竹葉七片蜜少許
煎四分食後溫服大小加減

惡核瘰癧 第九十四問

巢氏云小兒惡核者乃風熱毒氣與血氣相搏結成
頑核生於項頸遇風寒所折不消結成瘰癧久而潰
膿成瘡者也凡有此證宜服清涼飲子及升麻湯等
藥湯氏貼惡核瘰癧各有妙方千金連翹丸千金龍
膽湯皆可服之

清涼飲子

治證詳見四十問

大黃 連翹 芍藥 羌活

當歸 防風 甘艸 山梔仁各等分

右爲飲子每服一大錢水半盞煎三分去滓不
拘時候

連翹丸

治小兒無故寒熱強健如故而身體頸項結核
瘰癧及腸脇背裏有堅核不痛名爲結風氣腫

連翹 桑白皮 白頭翁 牡丹皮

防風 黃蘗 桂心 香豉

獨活 秦艸各半兩 海藻二錢

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十九或二十九燈心湯下。

千金龍膽湯

治證詳見第三問

龍膽草 鈞藤 柴胡 黃芩

桔梗 芍藥 茯苓 各六錢 去 蠅眼 二枚 去

甘艸 六錢 直 大黃 二兩 直 指 半兩 精 二錢 半

右十味咬咀以水一升煮取五合爲劑也服之

如後節度藥者有虛實藥宜足數合水也兒生

嬰童百問 卷十 嬰童 三

一日至七日日分一合爲三服兒生八日至十五

日分一合半爲三服以漸加服皆得下卽止勿

再服也直指方爲末每服一錢北棗煎服或加

防風麥門冬以導心熱黃芩減半去蠅眼亦可

大聖散

治瘰癧消風毒腫上壅內熱多生癩疹風丹風

證食煎博多致此疾

羌活 荆芥 升麻 薄荷

防風 甘草 大黃 黃芩

玄參 各等分

右各等分爲末每二錢水二盞煎六分溫服又方用牡蠣二兩火煨爲末玄參一兩甘艸半兩爲末每二錢清茶調下

槲皮散

治嬰童小兒解瘰癧作疼痛

槲皮 去粗皮此樹在處處有卽包槲皮葉也

若不拘多少切碎用水煎溫湯頻洗

白芨散

治瘰癧濃汁不乾

白芨 貝母 去心各五錢 輕粉 二錢

右爲細末先用槲皮散洗過後用清油調傅

嬰童百問 卷十 嬰童 三

發斑 第九十五問

百問云發斑有兩證有溫毒發斑有胃爛發斑也溫毒發斑者為冬月溫暖人感華火之氣未即病發至春或被積寒所折毒氣不得泄。天氣暄熱溫毒始發則肌內斑爛癢疹如綿紋其用葛根橘皮湯黃連橘皮湯主之若胃爛發斑者。寒未下即發斑下早亦發斑蓋不當下而下之熱。寒未入胃當下夫下則胃熱不得泄所以皆發斑也凡發斑不可用表藥蓋表虛裏實若發其汗重令開洩更增斑爛表虛故也玄參升麻湯化斑湯主之傷寒發斑只是熱氣在臟腑先攻腸胃裏蘊成瘡方發出外赤者易治黑者難治蓋毒氣入胃之深故也羌活散加蟬退治斑亦可

葛根橘皮湯

治冬溫未即病春被積寒所折不得發泄至天氣暄熱其溫毒始發肌中斑爛癢疹如綿紋咳嗽心悶但嘔吐清汁服此藥即靜兼治小兒痘豆瘡

葛根 陳皮 杏仁 麻黃
知母 黃芩 甘艸 各半

右剉散白水煎有熱不吐去陳皮冷證去黃芩知母

黃連橘皮湯

治溫毒發斑兼治癩證泄瀉并去血

黃連 一兩 陳皮 杏仁 枳實 炒

麻黃 去節 葛根 各半 厚朴 薑 甘艸 炙各一

右剉散每服二錢白水煎服亦治煩渴或不用

厚朴甘草

入參升麻湯

治傷寒發汗吐下後毒氣不散表虛裏實熱發于外故身斑如綿紋狀甚則煩燥譫語兼治喉閉腫痛

玄參

升麻 甘艸 炙各半

右剉散每服二錢水一盞煎六分去滓服又煎

升麻湯內加玄參亦可

化斑湯

人參 石膏 姜絲 知母

甘艸 各二錢半

右到散每服二錢水一盞入糯米半合煎六分米熟為度溫服

羌活散

川羌活 獨活 前胡 柴胡

川芎 白茯苓 桔梗 枳殼

人參 地骨皮 天麻 各等分 甘艸 減半

右咬咀生薑薄荷煎加蟬蛻治驚熱

丹毒赤遊腫 第九十六問

仲陽云熱毒之氣客于腠理搏于血氣發于外皮上赤如丹熱毒與血相擊而風氣乘之所以赤腫遊走而遍體也此由乳母食酒麪煎炙過度與夫烘衣與兒不候冷而即穿著多成此證或潑汗頭面胸背令兒燥悶腹脹如火之熱痛不可言有入腹入腎之證便不可救又方小兒一週之內皮毛肌肉筋骨髓腦五臟六腑榮衛血氣皆未堅固譬如草木萌芽之狀未經寒暑嬌嫩軟弱今嬰孩稱為芽兒故也一週之內切不可頻頻洗浴恐濕熱之氣鬱蒸不散遍身生赤遊丹毒俗為之癩片片如胭脂塗染皆腫而壯熱若毒入腹者則腹脹硬氣以致殺兒此因洗浴而得也若肌肉寬緩腠理開泄包裹失宜復為風邪所乘而身生白癩皆腫而壯熱也或增寒壯熱鼻寒腦悶或上氣痰喘咳嗽吐逆種種之疾皆因洗浴脫著而得也治赤癩丹毒可用小刀子疏去癩頭赤暈惡血毒汁次以水黃散為想白水散怪毒散主之敗毒散及升麻湯防已散皆可選而用之又丹熱實熱龍帶

竝用大連翹湯加木黃及癩心煎服殊驗

水黃散

土消 大黃細末各二條

右二味相合新汲水調攪勻用雞羽蘸藥塗刷

毒上

葛根白朮散

治赤白丹腫毒

白朮二錢 茯苓去皮二錢 木香 甘艸各二錢

枳殼去穢 枳實各三錢 枳殼去穢 枳實各二錢五分

右剉散每服三錢水一盞煎七分去滓熱服

惺芳散

治赤遊腫不可服冷藥

白朮 人參 甘艸

枳殼 細辛去前 川芎各等分

右剉散每服三錢水一盞煎七分去滓熱服

敗毒散

柴胡去土 前胡 川芎 枳殼炒

羌活 獨活 茯苓 桔梗炒

人參各一兩 甘草半兩

右為末每服二錢生薑薄荷煎加地骨皮天麻

或咬咀加蟬蛻防風治驚熱可加芍藥乾葛黃

芩無汗加麻黃

防風散

治丹毒候乃熱毒之氣與血相搏而風氣乘之

故赤腫及遊走遍體者又名赤遊風入腹入腎

則殺人

漢防已半兩 朴硝 犀角 黃芩

黃芪 川升麻各二錢

右剉散加竹葉煎大小隨病加減一方去朴硝

有澤瀉

白玉散

治赤遊丹毒

滑石 寒水石各一兩

右為末米醋調傅患處或腫至外腎有破處只

用水調

大連翹湯

連翹 瞿麥 荆芥 木通

赤芍藥 當歸 防風 柴胡

活石 蟬蛻 甘艸炒各一錢 山梔子

黃芩各分

右剉細每服一錢加紫草煎溫服熱甚加大黃更詳證加減迺妙

消毒飲 水煎

治丹毒疥癩已出毒氣壅遏壯熱狂躁腫臥不安太便秘澁咽喉腫痛胸膈不利痘疹消破却

可服之

牛旁子炒江 荆芥穗 甘草炙各半兩

右剉散水煎自利及瘡痘未破不可輕服或加防風連翹升麻蟬退赤芍藥有熱加黃芩防風犀角消毒飲

瘡癬 第九十七門

湯氏云小兒傷濕血氣壅滯則生瘡多由父母并慈子不好潔淨衣褥不與頻換洗濯或尿屎穢汚連日不洗亦能浸漬而成瘡天氣溫和頻與澡洗更衣多口外宜亦不須服藥小兒不得已而服藥此迺下策將養合宜何病何侵更令乳哺有節勿令過飽其身乃如蔣樹此調養之理也浴方春用柳條荆芥夏用桑葉槐枝秋冬用苦參頻浴身安外宜無病金華散又傳瘡癬等方皆可用也摩風膏傳瘡癬極妙兼服

金華散 治乾濕瘡癬

黃丹散一兩 輕粉一錢 黃礬 黃連各半兩

麝香少許

右為末先洗次乾搽之如乾癬瘡用麻用猪脂和傅如無用麻油亦可加黃芩大黃

摩風膏

治小兒遍身疥癬癢瘡

苦參 瀝青 蕪荑炒 黃各一錢

巴豆三粒 輕粉五分 全蝎二枚 麻油二兩

右用麻油煎至巴豆焦濾去所煎物入輕粉和勻傳瘡疥效

一方

治惡癬以紫貝草根生白礬少許同搗爛塗患處兩次可斷根

又方

用砒少許滴醋同熬為膏塗之

又方

嬰童百問

卷十 疥癬

疥

以肉搗去頭尾糯米炒黃去米以淮棗煮熟去

皮取肉為丸唾津調搽之尤妙

羌活散

川羌活 獨活 前胡 柴胡

川芎 白茯苓 桔梗 枳殼

人參 地骨皮 天麻各等分 甘艸減半

右咬咀生薑薄荷煎加蟬蛻治驚熱

天連翹湯

連翹 瞿麥 荆芥 木通

赤芍藥 當歸 防風 柴胡

活石 蟬蛻 甘艸炒各一錢 山梔仁

黃芩

右剉細每服一錢加紫艸煎溫服熱甚加大黃更詳證加減為佳

升麻湯

升麻 葛根 白芍藥 甘艸各等分

右剉散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服服藥身涼即止加紫蘇陳皮香附子各升藥散

嬰童百問

卷十 疥癬

疥

有熱加黃芩咽痛加桔梗發斑丹毒加玄參乃效

癩瘡 第九十八門

蘇氏云夫小兒癩瘡者為風熱毒氣所乘搏於皮膚乃生癩漿潰而成瘡故名曰癩瘡也湯氏牛黃散淋洗方治之又有癩疽之發有數種先作點而後露骨小者如粟如豆劇者如梅如李赤黑青白色變不常或生口齒或肚臍或臂骨發無定處大槩多見於手指之間根深入肌走貫遊腫毒血流注貫串筋脉爛肉見骨出血極多令人狂言煩躁咬悶皆毒氣攻心之候也南星半夏白芷末傳之用藥先洗而後傳之

牛黃散

牛黃 龍腦 丹砂各一分 鈴霜半兩

太陰玄精石一兩

右為末每服半錢先於腫處鍼破出血鹽湯試口了搽藥口內

三黃真珠散

治疔疔壯熱生以淫瘡俗呼為瀉膿水腫處便

濕爛成瘡此證皆內服消食退疳之藥後用此

松香 五味子 黃連 黃丹

海鯨鱗各三錢 輕粉 雄黃各少許

右七味並為細末瘡乾則以香油調傅濕以乾

搽先以瑩肌散煎洗然後用此藥


瑩肌散洗瘡

赤芍藥 防風 苦參 薄荷

甘艸身 劉寄奴 黃蘗

右等分煎湯洗去患處宿膿後以前三黃散末

搽瘡上二三度即成痂而愈或以只服化毒丹



麻症水痘 第九十九問

湯氏云凡小兒斑瘡之候乃天行時氣熱不能解纏積於胃而胃主肌肉毒氣薰發於肌肉狀如蚊于所嚙乃成斑毒也赤者十生一死黑者十死一生此症與斑症不同發斑乃如錦紋有空缺處如雲頭之狀麻症乃遍身無空缺處但疎密之不同分輕重耳黃連杏仁湯治嬰孩受邪熱其作麻疹之症其瘡漸出咳嗽煩悶嘔逆清水眼赤咽喉口舌生瘡宜服此以解之又有黃芩知母湯治小兒麻症僅出得瘡斑爛癢疹如錦紋或白膿者腥臭不能乾心胸悶嘔吐清水身體溫熱不時宜進此以治之起初疑似之間可服升麻湯頭痛熱甚者服柴胡升麻湯化斑湯羌活散蟬退散皆可又有發熱一二日而出水泡即消者名為水痘但用輕劑解之即便痊可羌活散升麻消毒飲主之麥煎散亦可服又可服大連翹湯以解利之活人書黃連橘皮湯治溫毒發斑可治出麻作瀉服此下利當先止與黃連杏仁湯同但多製厚朴甘艸耳

麻症宜服麻黃湯表

斑症可下不可表

痘症表下俱不可

黃連杏仁湯

治孩童受邪熱候作成麻痘之症其瘡漸出咳

嗽煩悶嘔逆清水眼赤咽喉口舌生瘡作瀉

黃連 一兩 陳皮 杏仁 去皮 麻黃 去節

枳殼 去穢 葛根 各半

右剉散每服二錢水煎服作瀉者加厚朴甘艸

嬰童百問 卷十

黃芩知母湯

治小兒五臟邪熱作成麻症瘡色癢爛癢疹如

錦紋或白膿水腥臭不乾心胸閉悶嘔吐清水

身體溫壯不時宜服之

葛根 陳皮 杏仁 去皮 麻黃 去節

知母 黃芩 甘艸 各半

右剉散每服二錢水一盞煎半盞去滓服不嘔

逆去陳皮加芍藥如吐則用之

升麻湯

治小兒時行瘟疫頭痛發熱肢體煩疼及瘡疹已發未發疑似之間及傷寒傷風頭痛憎寒壯熱肢體疼發熱畏寒鼻乾不得睡兼以寒暄不時人多疫癘乍暖脫着及暑熱忽變陰寒身體疼痛頭重如石者可加柴胡無汗加麻黃

升麻 葛根 白芍藥 甘艸各半

右剉散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

服藥身涼即止加紫蘇陳皮香附子各升蘇散

有熱加黃芩咽痛加桔梗發癩丹毒加玄參散

朱胡升麻湯 朱胡升麻湯

化斑湯

人參 石膏 姜棗 知母

甘草各二錢

右剉散每服二錢水一盞入糯米半合煎六分

米熟為度溫服

羌活散

川羌活 川獨活 前胡 柴胡

川芎 白茯苓 桔梗 枳殼

八參 地骨皮 天麻各等分 甘草

蟬退飲

鈞藤 天麻 茯苓 川芎

白芍藥各二錢 甘草 蟬退

右咬咀燈心煎加水通麥門冬防風羌活各錢

消毒飲

牛蒡子炒二兩 荆芥穗 甘艸各半兩

右剉散白水煎自利及瘡痘未破不可輕服或

加防風連翹升麻蟬退赤芍藥有熱加黃芩防

風犀角消毒飲

麥煎散

滑石 地骨皮 赤芍藥 石膏

白茯苓 杏仁 知母 甘艸

薄荷子炒 人參各半兩 麻黃去節一兩半

右為末每服一錢麥子煎湯調下如生牙兒

感冒風冷鼻塞身熱噴嚏多啼每一字用麥子

煎湯調下。一方去地骨皮滑石加羌活川芎薄

原缺

瘡疹

百問

仲陽云瘡疹候面燥腮赤目胞赤呵欠頓悶午涼午熱咳嗽噴手足稍冷夜臥驚悸多睡煩躁發熱臉赤唇紅身痛頭疼痰涎傷寒症類有之並瘡疹症此天行時氣之病始發之時因傷風傷寒而得者有因時氣傳染而得者有因傷食嘔吐而得者有因跌撲驚怒蓄血而得者或為霍亂禁牙驚搐如風之症或為口舌咽喉腹痛疼痛之狀或為煩躁發熱臉赤狂悶昏睡識語之形或自汗或下利或發熱或不發熱

嬰童百問

卷十

瘡疹

堯

症候多端卒未易辨方論所載以耳冷鼈冷足冷驗之蓋謂瘡疹屬陽腎臟無證耳與鼈足俱屬于腎故腎所部獨冷然疑似之間或中或不若不若視其耳後有紅脈赤縷者為真于此可驗其脈洪大而弦數診脈之際身略戰動是症也調護之法首尾俱不可汗下但溫涼之劑兼而濟之解毒和中安表而已凡熱不可驟遏但輕解之若無熱則瘡又不能發也虛者益之實者損之冷者溫之熱者平之是為權度借喻而言亦如庖人籠蒸之法但欲為鬆耳如苟妄汗則

開轉增瘡爛如荷妄下則正氣內脫變而歸
 腎身體振寒耳能反熱眼合肚脹其瘡黑壞十無一
 生舌黑者尤難療何者隨瘡五臟見症未發則五臟
 之症悉具已發則歸於一臟受毒多者見之故肝臟
 水疱淡出如水小而疱青肺臟膿疱其涕稠濁色白
 而大心臟發斑血疱色赤而小脾臟發疹色黃微赤
 有小斑瘡惟歸腎則變黑紫乾陷瘡疹屬陽本
 無腎症腎在腑之下不受微毒故無疔陽取火也腎
 取水也以火用事為本所製皆不殆哉朱氏云瘡疹
 已發未發不可疎轉此為大戒瘡疹首尾皆不可
 下及輒用利藥毒氣入裏即殺人以此觀之瘡疹症
 狀雖與傷寒相似而疹瘡治法實與傷寒不同傷寒
 所傳從表入裏瘡疹所發從裏出表蓋毒根於裏若
 下之內氣一虛毒不能出而反入焉由是土不能勝
 水黑陷者有之毒發于表若汗之則榮衛一虛重令
 開泄轉增瘡爛由是風邪乘虛變症者有之汗下二
 說古人之所深戒也調解之法將如何曰活血調氣
 安表和中輕消毒溫涼之劑二者得兼而已濕如

黃耆當歸木香輩涼如前胡乾葛升麻輩佐之以川
 芎芍藥枳殼桔梗羌活木通紫草甘艸之屬則可以
 調適矣凡小兒覺身熱症似傷寒但未經瘡痘疑似
 未明且與惺惺散參蘇飲抱龍丸升蘇散熱甚則先
 與升麻湯或加川芎紫蘇茯苓嘔吐者香蘇飲加半
 夏茯苓白芍藥泄瀉者香蘇飲加白朮茯苓吐瀉胃
 虛者陳氏木香散渴者升麻湯加紫蘇茯苓發搐及
 譫語熱甚者至寶丹抱龍丸和服瘡疹未出透者可
 服如出已透膚者不可服也或用防風天麻丸亦可
 嬰童百問 卷十 瘡疹 四
 如一二日疹出紅點如麻子大小不一等者輕一齊
 竝出密甚者重竝服四聖散及泄瀉者紫草木香湯
 或四君子湯加木香丁香如冷戰出不透者加官桂
 有驚熱出未透者快斑散治之內有蟬退者也三四
 日瘡疹出不快者四聖散皮膚冷者加木香肉桂更
 須活血散溫酒紫草湯調下以助藥力則出快如欲
 止痛用溫熱水調下如紫色黑陷內熱者大便秘者
 用龍膽膏猪心血辰砂腦子研細木香湯調下可也
 或用猪尾膏亦可如內無大熱不可輕服也常用胡

姜酒噴幃帳及身上爲佳。不可噴而。以辟惡氣耳。又燒蒼朮降真香亦佳。五六口。痘瘡熾甚但服芍藥甘艸湯定痛多服不妨。却服甘露飲數服。或口內有膿瘡咽喉腫痛不能乳食者。並皆治之。七八日瘡爛透略爛方可服地黃湯。大便秘者可服消毒飲。凡痘根窠紅活光澤明淨者。輕如損陷稠密灰白色瀉湯者重。無熱者可服四物湯。用麥門冬防風蟬退等劑。九日十日有熱甚可服犀角地黃湯。消毒飲便利者不可服。小便不通者大連翹湯加減服。以小便利爲度。導赤散羌活散皆可服。熱甚者小柴胡湯。渴甚者白虎湯。大便秘甚數日不通者宣風散。一服便可開服前藥。痘瘡長足肥滿蒼膿色者。輕寒戰悶亂腹脹煩渴喘急咬牙者重。十一日十二日痘瘡官醫瘡。如欲落而欲愈也。若痘瘡未磨之間。或不能磨或腹脹煩渴或泄瀉氣促者。不可與密木瓜菓等冷物食之。卽死當與木香散異功散加減服之。凡小兒先發搐而後發瘡者。生如瘡已瘥而後發搐。或吐或瀉者死。先發熱而後出瘡者。存瘡已發而後泄不止者亡瘡。

嬰童百問

卷十 瘡疹

聖

六

瘥而忽瀉膿血痂皮者。順腹中有瘡也。瀉血而水穀不消者。逆脾胃虛也。或瀉血而瘡壞無膿者。亦不可救。胃爛也要知陽明主肌肉。胃氣不可一日不強也。凡出瘡疹。須護眼。或用辰砂。或用胭脂。以塗眼眶。內有紅花。以活血爲妙。如痘瘡入眼。宜與決明散。紫貝散。瘡癩。落不落。則用酥油。或白蜜。時時潤之。可揭則揭去。若失潤。揭遲。痂才硬。則成癍痕。仍用滅癍藥傳之。切不可與雞鴨卵與食。食則卽時目盲。瞳子如卵。白色。其應如神。亦不可再食猪肉。不可不戒也。嬰童百問 卷十 瘡疹 聖 六

中間錢氏有百祥丸。下之。及有用人牙齒之藥。切不可輕服。甚以爲戒也。不若用獨聖散。與牛李膏爲愈。或痘瘡已發。爲風冷所傷。榮衛不和。或爲宿食所傷。內氣壅遏。以致水硬者。調解散主之。如瀉不止。用參朮白朮散。加木香可也。四君子湯。加水香豆蔻亦妙。雖然瘡黑。本爲惡症。治之有方。猶有幸而生者。至於調衛之際。乳母不能謹口。流毒於小兒。或粥食乳哺不時。使之饑虛。或衣被不周。致傷風冷。以致闔房有

嬰童百問

卷十 瘡疹

聖

六

各耶能調衛者以溫散湯劑釀乳飲之謹護風寒使
之氣體通和其於粥飢則勿令飽而氣實饑而氣虛
斯為得矣然瘡曰聖瘡七日熱而發七日瘡而乾又
七日平復如 矣若實實虛虛損不足而益有餘則
瘡出甚難如調順血氣溫和平冷熱則瘡出
甚易調解之法無逾於此故備論之疹症初感未出
而發熱者扁鵲油劑法治之則出疹甚稀或即消解
而瘡疹不發者有之自然解散而安泰必矣。

惺惺散

嬰童百問

卷十 瘡疹

驚

天花粉

人參

細辛

去葉

白茯苓

去皮

白朮

甘草

桔梗

各等分

右件同杵羅為末每服一錢水一小盞入薄荷

三葉同煎至四分溫服如要和氣即入生薑煎

服不拘時

參蘇飲

陳皮

半夏

茯苓

甘草

各

桔梗

乾葛

前胡

枳殼

木香

右剉散水煎服

抱龍丸

牛膽南星

一兩

天竺黃

五錢

雄黃

辰砂

各二錢

麝香

少許

氣喘有痰加枯礬

右為末煮甘艸汁丸如芡實大薄荷化下

升麻湯

升麻

葛根

白芍藥

甘艸

各等分

右剉散每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

服藥身涼即止加紫蘇陳皮香附子各升蘇散

嬰童百問

卷十 瘡疹

驚

有熱加黃芩咽痛加桔梗發斑丹毒加玄參效

升蘇散

治小兒出疹發熱疑似之間以此解之

升麻

葛根

赤芍藥

紫蘇

茯苓

川芎

甘艸

各等分

右剉散白水煎服如嘔者加半夏茯苓白芍藥

生薑煎

香蘇散

治小兒出疹症作瀉

香附子 陳皮 紫蘇 川芎

甘草 白芷 各等分

右剉散生薑蔥白煎或白水煎。瀉症加白朮茯苓。

苓嘔症加茯苓白芍藥。

沐香散 治疹痘冷症

木香 二錢 前胡 訶子肉 陳皮

丁香 官桂 大腹皮 人參

半夏 甘艸 赤茯苓 各三錢

右剉散每三錢水一盞煎六分去滓帶熱空心

嬰童百問 卷十 瘧疹 吳

服量大小加減藥性溫平扶陰助陽治腹脹瀉

渴如虛加糯米一撮煮著三錢同煎。

至寶丹

生犀屑 生玳瑁屑 琥珀 研

朱砂 細研水飛 雄黃 細研水飛 金箔 三十片

銀箔 五十片 腦 一分 麝香 一錢 牛黃 半兩

安息香 兩半為末以無灰酒飛過

右生犀屑玳瑁搗羅為細末研入諸藥令勻將

安息香膏以重湯煮凝成和搜為劑如乾即入

少熱寒盛不津斃中旋丸如桐子大二歲兒服

二九人參湯化下。大小以意加減。又治大人卒

中不語中惡氣中諸物毒中熱胎風產後血暈

死胎不下。並用童子小便一合生薑自然汁三

五滴同溫過化下五九立效。

四聖散

治小兒痘子已透皮膚未透用此藥發痘。

紫草 木通 黃耆 甘艸

枳殼 各等分

嬰童百問 卷十 瘧疹 吳

右剉散煎服得痘嫩却任服且服芍藥甘艸湯

甘露飲。

加味四聖散

治痘出不快及變陷冷症適可。

紫草 木通 木香 黃芪

川芎 甘艸

右剉散每服三錢水煎不拘時服。大便秘澀加

枳殼少許大便如常加糯米百粒解毒能釀而

發之。

紫草木香湯

治痘疹出不快大便洩利

甘艸許炙少 紫艸 木香 茯苓

白朮各等分

右入糯米煎。蓋紫艸能利大便。木香白朮所以佐之也。

四君子湯

人參去蘆 茯苓去皮 甘艸 白朮各等分

右為末每服三錢米一盞七分通口服不拘時。

嬰童百問 卷十 痘疹

痘少許白湯點服溫和平胃進益飲食辟寒邪

瘡毒氣

快斑湯 治瘡疹不快

紫艸 蟬退 人參 白芍藥各等分

木通一錢 甘艸炙五分

右剉散每服三錢煎服。

活血散 治痘疹出不快

白芍藥

右為細末每服一錢以溫酒調服。如欲止痛用

溫熟地

龍腦膏

治時疾發碗豆瘡及赤瘡于未透心

喘妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜

爾毒氣入臟必死。

生龍腦 一錢

右研細旋滴猪血和丸如芡實大每服一

頰狂躁者用紫艸湯下。若瘡子陷伏者用酒

下少時心神便完得睡痘瘡發透依常將息

嬰童百問 卷十 痘疹

取安也

猪尾膏

治瘡子倒靨心神不安用小猪尾尖刺血一兩

點入生腦子少許同研用新汲水調下立效。人

辰砂一錢木香湯調下亦效。

胡荽酒

治痘瘡初發時可服。透房噴之以辟穢惡之氣

胡荽 一兩

右細切以酒盞大盞煎數沸從頂以下含酒噴

之背脊胸腹及兩脚通勿噴面。

芍藥甘州湯

治出疹肚疼腹滿小便不通。

淮芍藥一兩 甘州二錢

右咬咀水煎服。

甘露飲

熟地黃

麥門冬去心

枳殼炒

甘州

山茵陳炒 枇杷葉炮去毛

石斛

黃芩去蘆 生地黃各等分 天門冬各等分

嬰童百問

卷一

李

右劉散每服二錢水一盞煎七分去滓食後臨

臥溫服小兒一服分作三服仍量歲數加減服

犀角地黃湯

犀角屑如無以升麻代之

牡丹皮去骨各一兩

生地黃

芍藥七錢

右劉散每服三錢水一盞服

消母飲

牛蒡子炒

荆芥穗

甘州各等分

右劉散白水煎自利及瘡痘未破不可輕服或

加防風連翹升麻蟬退赤芍藥有熱加黃芩

風犀角消毒飲

加減四物湯

當歸

芍藥

川芎

蒼朮

白菊花

乾葛

羌活各等分

右劉散每服二錢水一盞煎服。

大連煎湯

連翹

瞿麥

荆芥

木通

嬰童百問

卷一

李

赤芍藥

當歸

防風

柴胡

活石

蟬蛻

甘州各等分

山梔子

黃芩各五分

右咬咀每服一錢加紫草煎溫服熱甚加大

更詳症加減為佳

導赤散治心驚內虛邪熱

生地黃

甘草

木通各等分

右咬咀竹葉煎加黃芩芍藥羌活燈心煎服

羌活散

川羌活 川獨活 前胡 紫葳

川芎 白茯苓 桔梗 枳殼

人參 地骨皮 天麻 各等分 甘艸 五分

右吹咀。生薑薄荷煎加蠅蛻治驚熱。

小柴胡湯

人參 去蘆 甘艸 炙 黃芩 柴胡 去蘆

半夏 湯泡七次焙乾

右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎

去滓溫服不拘時

白虎湯

知母 三兩

甘艸 一兩 石膏 八兩 粳米 三合

右剉散每服三錢水一盞煎至六分米熟為度

去滓溫服聖惠方乾葛

宣風散

治風痰壅盛或大便緊澀吐急諸般疔氣肚急

驚風痰潮皆可服熱症便秘並宜服之此乃宜

利之藥

檳榔 一箇 陳皮 半兩

黑牽牛 四兩半生半炒

右為末食前蜜湯調下一服。

異功散

治小兒出疹冷症此藥能除風寒濕痺調和陰

陽滋養血氣使痘瘡易出易靨不致痒塌

木香 當歸 人參 陳皮

厚朴 丁香 肉豆蔻 各二錢五分

桂 茯苓 白朮 各二錢五分 半夏

附子 各一錢

白濁散

右剉散每服二錢水一盞薑三片棗三箇煎六

分去滓稍熱服出疹瀉不止冷者可服

決明散 小兒痘疹入眼

括蕁根 決明子 赤芍藥 各一錢五分

甘艸 一錢

右搗羅為末每服半錢水調下日二服。

紫貝散

紫貝 一個生用 用羊子肝批開摻藥末一錢線 粳米泔

煮熟入小瓶內盛乘熱熏候冷取出用刃下

韶粉散

治小兒痘疹纒愈而毒尚未盡盡如難落其紅
猶黯或凹或凸肉起當用此塗之

韶粉 一兩 輕粉 一錢

右為末入豬脂油調勻塗瘡癩上欲落不落當

減癩痕或用羊骨髓一兩入輕粉一錢研成白

膏塗瘡上如痘癩全好如痒甚俱搽成瘡癩不

落用上等蜜塗之其瘡癩落亦無赤黑癩痕最

為神效

獨聖散

治痘瘡陷入不發色黑而氣欲絕當用此漸毒

紅潤

穿山甲 湯洗淨炒令焦黃色甲

右為末每服半錢入麝少許南本香湯調下或

紫艸煎湯入酒少許調下

十李膏 又名必勝膏

牛李子 不以多少一名鼠李子牛詩子楮李烏罌子隨地呼其名

右取汁石器中熬成膏牛李野生道邊過秋結

實黑圓成穗或無生者市肆中買乾者為末水

熬成膏每服皂子大煎杏仁湯化下

調解散

治痘瘡已發或為風冷所折榮衛不和或為宿

食所傷內氣壅遏以致水硬並主之

香皮 陳皮 桔梗 枳殼 炒

半夏 川芎 木通 乾葛

甘艸 紫蘇 各等分 人參 減半

右到散每服二錢薑棗煎服

參苓白朮散

白扁豆 一斤半薑汁浸去皮微炒 人參 去蘆 白茯苓

白朮 甘艸 炙 山藥 各二斤 蓮肉

桔梗 薏苡仁 縮砂仁 各一斤

右為細末每服二錢棗湯調下小兒大小加減

扁鵲調油法

治小兒發熱恐成痘癩以此止之

生麻油 童便 各半

右逐旋夾和以柳枝攪令如蜜每服二蜆殼許服畢令臥少時但三四服大小便利身體熱退即不成瘡痘之症若形迹已露則不可服也

又方

治小兒臍腑伏熱未成疹子疾候四肢微覺有熱食物似減頭髮乾直或時額上微熱宜生油湯劑法扁鵲及倉公用謂之神劑

生油 一匙

嬰譜有問

卷十 瘡疹

七

右冷如人體溫將熱水一盞旋旋入油盞內不住手以筋打攪候入熱水盡令勻如蜜即止夜臥時服三歲至百晬兒每服二蜆殼許十五歲每服三大蜆殼許五歲至七歲每服三蜆殼許至大人服五蜆殼或三大合每日飲後良久與服服畢令臥少時如三五服大小便利四肢熱退則疹痘不復發當自安也

又方以手蘸麻油摩其背脊開直至尾骨亦驗也

紫艸木通湯 治瘡疹出不快

紫艸 大參

糯米 各等分 甘艸 減半

右剉散每二錢煎服內虛大便利下入南木香去紫艸

蟬退膏

禦風邪辟惡氣透肌表快瘡疹

蟬退 當歸 防風 甘艸

川芎 荆芥穗 升麻 各等分 加芍藥

右為末煉蜜丸芡實大每服一九煎荆芥湯下

嬰譜有問

卷十 瘡疹

七

安斑散

升麻 赤茯苓 黃芪 羌活

人參 枳殼 炒 桔梗 甘艸 各半

右剉散每二錢紫草少許薄荷一葉煎溫服

如聖麥門冬湯

治小兒瘡疹毒氣上攻咽喉口舌生瘡故不能吮乳

桔梗 牛蒡子 炒 麥門冬 去心 鱉 各半

右剉散每服二錢淡竹葉煎服活人書云為末

太和散

服二匙，沸湯調細細呷入口內

治小兒瘡疔及傷寒時氣病後餘邪不盡

生地黃 當歸 人參 地骨皮

赤芍藥 甘艸各等分

右剉散每二錢白水煎服

去瘡疹癩方

蜜陀僧

右為細末水調塗其妙

龍膽丸

治小兒五疳潮熱面色痿黃乳食遲化日漸羸

瘠虛弱

龍膽 蘆薈 肉豆蔻 黃連

木香 神麩 麥藥炒各等分

亦可檳榔史君子加入

右末麩糊丸如黍米八三二十九溫米飲送下

加胡黃連等藥

百劑散

百劑霜 雷光 蕪荑各三錢

巴豆去殼一兩淨去心膜不去油

右為末飯上飯丸如粟米大一丸黃丹衣每服

一丸空腹米飲下一方青黛衣每服一丸空心

米飲下

治嗽會膏方

葶藶炒微 知母

貝母各一兩為末二味同巴豆七粒炒去巴豆不用

右先將葶藶子搗成膏次入二味以棗肉半兩

搗勻入沙糖同糊如芡實大每一丸綿裹嚥津

甚者三丸

畫眉膏

山梔十五個炒存性 雌黃 辰砂

輕粉各少許

右另為末和勻香油調成膏伺兒睡着時畫上

眉間便不思乳汁分難斷者不過再傳即不思乳矣

治小兒乳嗽

杏仁 桑白皮 桃核肉 半夏
甘艸 各等分

右生薑薄荷同煎此方仲德抄吳氏方
大連翹飲

連翹 羌活 瞿麥 荆芥

木通 赤芍藥 當歸 防風

柴胡 活石 蟬蛻 甘草 各
一分

山梔仁 黃芩 各五分

受重百問 卷十 瘧疾 本

右劉細每服一錢加紫草煎溫服熱甚加大
更詳症加減為佳

化風丹

荆芥 黃芩 防風 羌活

獨活 天麻 膽南星 川芎

辰砂 甘艸 俱減半

右末蜜丸如芡實大每服一九薄荷湯

方加白附子全蝎殭蠶豆味

玄參劑

芍藥 黃芩 升麻 地黃

甘艸 黃芩 龍腦葉 山梔

連翹 各等分

右末蜜丸辰砂為末丸如芡實大每服一九薄
荷湯送下

四聖散

黃芪 羌活 當歸 加桔梗

紅綿散 合有甘艸

全蝎 天麻 蘇木 麻黃

受重百問 卷十 瘧疾 本

荆芥 蘇砂 殭蠶 南星

乾葛 胭脂 熱加防風

右各等分綿包生薑薄荷煎服

大麻丸 治乳毒

天麻 辰砂 防風 膽星 各錢

天竺黃 白附子 煨 雄黃

蟬退 殭蠶 各五分 川芎 礞砂 各七分

右為末蜜丸金箔末加牛黃片腦丸如芡實大

每服一九薄荷湯化下

常用藥方歌括

敗毒羌柴獨活前芎苓參桔及甘煎疹加風苛
并蟬退腰痛桃仁任意添

五積六蒼三桔梗兩半麻陳枳殼并一兩朴薑

三分夏歸芍芷桂及甘苓薑煎加入柴芫貝參

朮同成輕骨名調中苓葛藜甘苓芍梗仍兼白

朮平壯熱惡風并入利或時脈數此為靈

參蘇苓夏葛前芷枳梗陳甘呆二參薑棗煎來

隨意服大能發散更消痰去却參呆芎用四前

嬰童百問

卷十

全

柴互換亦相堪各香蘇散

平胃甘三陳朴膏八蒼薑棗或鹽調不換金須

加藿夏養胃參苓果莫饒

消風百解芷陳荆蒼朮麻甘薑便成

金沸麻前各用三芍甘夏一四荆參或除麻葛

換辛荑同治傷風嗽有痰

梔子仁知芍大青四芎高杏及苓九八兼柴六

甘須二陽毒傷寒薑豉成

解肌甘一芍苓二桂一甘三同葛前壯熱惡風

身體痛脈浮無汗此為先

香蘇四分陳皮二甘一或加芍芷煎更入麻黃

升芍藥十神只要葛多添

柴胡石膏須用四葛芍柴胡元不異升一苓桑

荆芥三薑豉同煎吉賢置

萎茹三分高須四葛二微羌和杏芍甘與青呆

同葛數水煎對症有神功

縮脾砂果梅甘二豆葛祇消一分參水煎暑傷

還取症來看兒童花豆成

嬰童百問

卷十

全

小續命湯

朮參芍藥同防已麻桂甘苓一分童防一風三

薑棗黃剛桑二瘧並能攻

八解胃君四同去蒼加藿

五苓猪茯苓皆三瀉五還將桂二參

乾葛二芍餘並一參朮苓呆甘藿參此是小方

白朮散渴兼吐利變風癩

薄荷四芍羌蝎麻甘薑一分亦同加竹葉白附

還須二薄荷湯調驚熱差或去蝎蠶天竹附柴

芩芩梗代尤佳。

紅綿散

麻錢芩芷天麻二蘇木甘全蝎一科綿煎對症

明加減愈却傷風咳嗽驚

大連翹飲

連翹荆芥通車芍歸活風柴蟬共廿等分梳苓

還減半煎須柴艸正相堪

知母乾葛湯

知母三錢乾葛八六高麻四五萎荊甘苓風活

星骨二呆杏升參芩不殊

排風三味先為主獨活麻苓三分同杏煎當歸

甘桂芍蘇皮二分共防風薑錢作使煎來服五

臟風傷盡解攻

木香流氣念三般十六陳皮夏獨單通四若加

檳菓藿丁皮呆桂腹蓬三朴蘇甘附青皮八餘

藥皆同二分參苓朮麥瓜葛與芷棗薑作使藥

方完滑利米煎蔥解表婦人艾醋血癥安一方

去藿沉香代枳換背同必妙乾增大黃能治

細應念四請詳看

加眼方

黃蘗 黃連 黃芩

右四味搗為細末貼在碗底上用艾火燻之取

起稍加水用紙蓋水上取清水點眼內立效

治心痛

白烏雞糞五錢曬乾研細羅成麩 松粉五錢研細

右用蔥根汁將前二味合勻為丸如桐子大黃

為衣每服五九溫醋送下忌腥冷硬物等件

第四日立效

備急經驗方

治破傷風極有神效

余昔閱本縣大尹張公會言吾有一妙方專治

破傷風單只一味極有神效用人家糞內蟬蟻

蟲一箇爛草房上亦有之將他脊背用手捏住

持他口中吐水就擦抹在瘡口上覺麻身上汗

出無有不活者及今余家第四子忽於額上跌

破一處七日成風急尋此蟲治之時間汗出就

好余有感於此不敢隱昧恐損陰陽就刊此傳
之將與用過還埋糞內

治搭背瘡極有神效

用生蜂蜜和生麩為餅貼于瘡上待餅乾再換
三五次即愈瘡有口者將麩餅亦口上貼之

治小兒痘疔

珍珠生為豌豆燒為頭髮燒灰濕胭脂生用

右量疔瘡多少加減為用將四味和為一處先
用簪尖撥疔口次將此藥貼入疔內即時大小

嬰童百問

卷十

五

五

皆變為紅白色而無有不活者大凡人家小

兒出痘瘡若灰黑頂者十八九死為鄉人者不

識內有痘疔又不曉治法故也余昔日曾訪問

諸多良醫皆言痘瘡未出全者有藥可表及瘡

出後有灰黑色塌頂者皆無方可治之今要認

出黑色內有瘡大者為疔或瘡內有疔縫者為

疔又有瘡內臭氣者為疔亦有數等若依此方

治之立有神效此方治好多人倘有好事君子

為四方貼于街市而共治之則福慶延長子

孫保安矣

又方治小兒出痘

穿山甲剉細用蚌粉入銚內炒令色存性研
細入麝少許每半錢一錢溫酒調服其效若神
雖過身黑而欲絕亦能甦省而發紅色

治小兒瘡疹不透陷伏危困者

人牙齒三五箇炙令黃為末乳香湯送下燒過
為末溫酒調下亦可服諸片時其便發透

治痘瘡後眼方

嬰童百問

卷十

五

羌活 防風 川芎各二錢 甘艸二錢

木賊 菉豆殼 荆芥各三錢 蟬退一錢

谷精草二錢 蛇退 雞子殼薄皮各一錢

右為末清茶調下日三服一應瘡疔皆可磨退

治小兒夜啼

燈芯七個 珊瑚二分 硃砂少許

右研極細末蜜調成膏候小兒困時以少許抹

口唇上

附葵菜治痘神方

S
Z121.5
150(1009)

ZW 21181000784597

葵一名甜菜一名女菜一名滑菜一名蒼蓬蓋
 百菜之主也四時可種為蔬秋種者更佳故冬
 葵子尤為藥品所尚嘗閱本草綱目李氏開載
 葵菜療痘之功萬不失一而歷代流傳疑信相
 貿遂從菜部改入草部且因葵性寒滑恐傷脾
 胃不敢輕試遂令對病妙藥棄置不用而惡毒
 流染坐致痿頓心甚憐之久有此疑無從辨識
 十數年間廣詢博訪乃知為甜菜無疑問令童
 稚何之雖無傷害而功效未顯未敢輕傳比年
 以來數經此症盛行見不治者十有八九而嘗
 食此菜者百無一失乃知相傳之訛致神功之
 久濫也可勝慨哉方敢形之諸著以廣其傳嗟
 乎因慎重而坐令陸沉因未廣而猶然背溺火
 今不傳後悔奚及乃開列其方以公諸天下後
 世蓋其寒滑者性也洩利者毒也與脾胃根本
 何與且未病而先藥病受之病去本完能為上
 策即見點而後食猶將收大半之効不猶愈於
 坐觀薪盡者乎又豈若俗醫見危迫而進葶連

慘均割刃者乎噫是在信不信試不試之間耳
 安敢以人命為等閑而冀其術之必售乎其法
 采此菜熟之以供蔬食愈久愈佳余所為懇懇
 款款祈人之必信必傳者聊以道通慢之愆而
 為不可復生者志痛耳余何慕焉
 天啓乙丑歲三月吉旦慈溪松梁山人姜應麟
 筆記

解胎毒免小兒痘疹
 或除夕或立春前一夜將小鯽魚二三寸長者
 用竹刀去鱗去腸以芫荽納入魚腹中在瓦器
 中煖煮令小兒食之終身不出痘

又方
 以雞子在糞清中夏月三日冬月七日浸過取
 起令小兒空心熟食七枚亦免出痘

聖童百問卷之十