


# 醫方約說

利

漢書門類			
一	二	三	四
九	四	九	
函	架	冊	冊

內閣文庫			
三	二	三	漢
函	四	九	書
架	冊	號	類

內閣文庫			
番號	漢	12409	
冊數	4 ( 3 )		
函號	301	15	



新刊醫方約說卷之下

武義

浩

龐

暉

汝和

醫

心痛

附心脾疼

夫心痛者在心之分而名也若夫真心痛病則至足  
青至節且發夕死不可治矣蓋因胃脘作痛者多要  
分新又明知身受寒氣口傷寒物初病之時宜用溫  
散或可吐之稍久則成鬱熱亦有可下者不宜溫散  
由是古方多以山梔為主加執藥為向導則邪易伏  
病易退正氣復而愈矣切勿可用參朮諸痛不可補

氣故也此病脉多沉痛甚者脉必伏不可與穀食丹  
谿云雖日久不食亦不死若治而痛止即食必復痛  
勿歸咎於醫也

主方

陳皮 一錢 甘草 多五分 白茯苓 一錢 半夏 湯泡去皮

川芎 一錢 山梔 去皮姜汁炒三分 蒼朮 米泔浸炒

○痛輕者加麻黃 去根節六分 桂枝 六分 桔梗 五分 菲汁 許

○痛甚者加附子 泡二分 乾姜 八分

○氣實者加牡蠣粉 二錢

○手按之而痛止者加乾姜 一錢

○三四日不大便者加大黃 一錢 枳實 一錢

○有因平日食熱物而後作痛者加棗仁 去皮尖 一錢半

玄胡 研一錢 牡丹皮 去心五分

○或因心膈大痛者加柴胡 去芦八分 桔梗 五分

○心膈大痛攻走腰背發厥嘔吐諸藥不納者就  
吐中以鵝翎探之出痰積碗許而痛自止

○山梔并劫藥止之又發前藥不効玄明粉服 立止

○一方用蘭葉搗細取汁以姜汁和服

○一方用海粉佐以香附末川芎山梔煎湯入姜汁調服

○胃脘有濕飲而痛宜用小胃丹有食積急痛用備急丸

○凡久痛或時痛時止及心脾痛者可用年久螺螄壳燒存性為末每服三錢白湯下妙

蓋心脾痛者皆因飲食不節傷飢過飽思鬱而成

治宜調脾行氣陳皮一錢甘草六分白茯苓一錢半夏湯泡川芎八分蒼朮六分山查一錢紅花一錢薤仁皮

五分生薑片三錢水一鍾煎至半鍾溫服

附方

小胃丹 上可取胸膈之痰下可利腸胃之痰

芩遂 麩裹煮令透晒乾一云麩裏水浸冬七夏三春秋五 大戟 水煮一時

芫花 醋拌經宿炒令黑勿焦各一兩 大黃 酒炒 黃柏 炒褐色三

右末粥丸麻子大每服一十九丸溫湯下此藥能損胃氣惟實者可用

備急丸 治胃停滯寒冷之物大便不通心腹痛

大黃 乾姜 巴豆 去油各一兩

右為末煉蜜丸搗千丸小荳大每服三丸

腹痛 附腹鳴

腹痛有寒有積熱有食積有痰有死血有蟲有火有癯亂有絞腸沙

主方

○寒者脉沉伏而遲戴氏謂綿綿痛而無增減者是也從中寒門治

○積熱者脉洪數而實腹中常有熱而痛宜以調胃承氣湯下之

○食積者脉必弦而氣口大於人迎也戴氏謂欲大便去後則痛減者是也從傷飲食門治

○痰者脉滑戴氏謂痛則小便不利者是也蓋痰因氣滯而聚阻碍道路氣不得通而痛宜導痰

鮮薑二陳加川芎香附蒼朮連翹枳實之類

○血者脉當芤瀋痛有常處而不移動亦有多在左者宜行氣消血當歸川芎肉桂許乾姜莖仁

玄胡沒藥炙甘草青皮山查木香之屬

○蟲者痛必面上白斑唇紅又痛後便能食時痛

時止者是也方見蟲門

○火與癰亂絞腸沙俱有門類茲不復贅矣

○凡腹痛必用溫散以其鬱結不行阻氣不運故

○白芍藥能止血虛腹痛其餘不治以共酸寒收斂無溫散功

○腹痛以手可重按者屬虛宜參朮姜桂之類手

不可按者是實硝黃下之

○肥白人腹痛多氣虛兼濕痰半夏人參二朮類之

○小腹實痛用青皮行氣小腹因寒氣宜桂枝芎藭

○臍下忽大痛人中黑者多死

腹中鳴乃火擊動其水也蓋水欲下火欲上相觸

而然用二陳湯加黃連梔子有臟寒有水而鳴

者宜分三陰部分而治中脘太陰臍腹少陰小

腹厥陰

附方 調胃承氣湯見傷寒門 二陳湯見痰門

○**第三八** 腰痛附腎着

丹谿論腰痛有腎虛有瘀血有濕熱有挫閃有痰夫

諸腰痛者多由房勞過度腎經虛損精血虧少客邪

乘位而然也大法滋腎行氣和血蕪從所來而治之

考一 包元 醫方句解卷二 五

主方

陳皮一錢 乾姜微炒五分 甘草炙五分 沉香二分另磨和藥汁

川芎八分 川歸六分 黃柏酒炒六分 杜仲去皮酒炒斷絲一錢

知母酒炒六分 白芍藥酒炒八分 川牛膝酒洗六分

○腎虛者脉浮而瀆腰乃腎之府經曰動搖不能

腎將憊矣戴氏謂疼之不已者是腎虛宜加真

枸杞子二錢 五味子七粒 生地黄一錢 天門冬去心八分

節齋補陰丸可用

○瘀血者脉當芤瀆戴氏謂日輕夜重者是也加

菝仁去皮尖一錢 紅花撮一錢 蘇木一錢 沒藥八分

○濕者脉緩戴氏謂遇天陰或久坐而發者是也

宜加蒼朮米泔浸一錢 防己八分 防風去芦三分 木瓜八分

○挫閃者當從瘀血條治

○痰者脉滑腰間重痛加南星炮一錢 半夏湯泡一錢

○委中在脘中央約橫紋中動脉 出血以其血滯於下也

○諸腰痛不宜補氣亦不宜峻用寒涼兼氣虛非補不可者

不能不用但有監制耳痛雖屬火得寒則閉過而痛故各條云順氣行氣快氣主温散也

○腰曲不能轉者針人中妙

腎着病體重腰冷如冰飲食如故小便自利腰下冷痛如帶五千錢治宜流濕兼用溫散

附方 節齋補陰丸 見虛損門

摩腰丹 治寒濕腰痛 附子尖

烏頭尖 南星 各二錢半 硃砂 乾姜 各一錢

麝香 五粒 雄黃 樟腦 丁香 各一錢五分

右為末蜜丸圓眼大每一丸姜汁化開如粥厚烘熱置掌中摩腰上令盡粘着肉烘綿衣縛定腰熱如火間二日用一丸妙或加茱萸桂

煨腎丸 治腎虛腰痛

杜仲 三錢 為末猪腰子一枚批五七片蓋椒淹

去腥糝藥末在內包以荷葉外加濕紙煨熟酒

腎着湯 甘草 炙 白朮 各二兩

乾姜 炮 茯苓 各四兩 右剉每服四錢水煎空服

脇痛

脇痛者厥陰肝氣實也蓋因惱怒者多亦有挾痰與死血外感與鬱證皆能作痛

主方 青橘葉 六片

川芎

一錢

蒼朮

一錢 泔炒

青皮

八分 醋炒

黃連

一錢 猪胆汁炒

柴胡

去芦 八分

甘草

炙 六分

芍藥

酒炒 八分

香附

童便浸炒 六分

○人乏力氣弱脇痛因勞力或多怒者脉細或弦

加川歸

八分

木香

二分 另磨

八物湯

加木香

青皮

亦可

○痰者兩脇走痛脉弦滑加陳皮八分白茯苓八分

夏

八分

白芥子

一錢

○死血者左脇下痛手不可按脉芤而澹加菀仁

去皮尖 一錢

蒲黃

六分

紅花

一分 酒洗

減黃連

○外感者屬少陽耳聾脇痛寒熱嘔而口苦脉浮

弦小柴胡湯可照

○鬱者胸脇痛脉沉澹從鬱門治之

○肝火盛用當歸龍薈丸瀉火要藥

○左金丸瀉肝火行濕為熱甚之反佐

○痰流注用二陳湯加南星蒼朮川芎

○咳嗽痛者二陳湯加南星香附青皮青黛姜汁

○去滯氣用青皮乃肝膽二經之藥人多怒脇下

有鬱積固宜以解二經之實若二經氣不足者

先當補血小加青皮可也

○肥白人氣虛發寒熱脇下痛用參芪補氣柴胡

黃芩退熱木香青皮調氣如瘦人寒熱脇痛多

怒者必有瘀血宜莖仁紅花柴胡青皮大黃

○解痛外以琥珀膏貼之又方芥菜子水研付又

方以茱萸醋研付又方以韭菜炒熨

附方 八物湯見虛損門小柴胡湯見傷寒門二陳湯見痰門

琥珀膏見積塊門左金丸見火熱門

當歸龍薈丸 木香二錢五分麝香五分另研

當歸 龍胆草 梔子仁 黃連

黃芩各一兩 大黃 蘆薈 青黛各五錢

右末炒神麩糊丸每二十九丸姜湯下一方加柴

胡五錢青皮一兩如熱甚者炒熱服之

推氣散 治右脇疼脹滿不食 甘草炙三錢

片姜黃 枳殼麩炒 桂心各五錢 右末服二錢姜湯調下

枳芩散 治左脇痛不可忍 枳實炒

川芎各五錢 粉草各一錢 右末服二錢姜棗湯或酒調下

○第四十一 諸氣

夫人之生者氣也蓋運乎一身順則行而冲和百脉

逆則滯而為病諸氣皆氣之動而為火也故曰諸動  
屬火丹黔謂氣有餘便是火世俗執以冷生氣之語  
遂用香燥之藥以火濟火殊不知肺主氣屬金而畏  
火肺受火迫而奔氣也可謂之冷乎治法固宜降火  
必源佐以調氣順其性而散之惟陰火不可調氣

主考

○氣從左邊起者肝火也宜小柴胡湯加川芎黃  
連白芍藥之類久者可從陰虛條治

○氣從臍下起者陰火也宜四物湯加黃柏知母

山梔黃芩玄參甘草之類

○氣在脇下痛者宜二陳湯加川芎柴胡香附蒼

木橘葉枳殼木香之類脇下不移動手不可按者從血積條治左邊是

○氣從右邊作痛手不可按者從食積條治

○氣周身走痛者正氣天香散加當歸川芎之類

○稟受壯氣刺痛者二陳湯加枳殼烏藥木香之類

○五臟結氣痠痛者四物減地黃加梔子枳實香附之類

○調氣用木香然木香味辛氣能上升諸氣鬱而

不達固宜用之若陰火衝上用之反助火邪矣

故必用黃柏知母少用木香佐之

附方

二陳湯

見痰

小柴胡湯

見傷寒

四物湯

見婦人

蘇子降氣湯

四磨飲

俱見喘門

清膈丸

治因濕熱氣虛

黃芩

黃連

各五錢炒

香附

一兩五錢

蒼朮

二兩

右為末取瓜蒌去皮搗爛和丸葉豈大

每五十濕湯下

正氣天香散

香附

八錢

陳皮

烏藥

紫蘇葉

各二錢

乾姜

一錢

甘草

一錢

右剉水煎服

蘇合香丸

治卒暴心痛順氣化痰小兒驚風

吐痢

沉香

麝香

訶子

丁香

青木香

安息香

香附

葶藶

白朮

白檀

各二兩

薰陸香

蘇合油

龍腦

各一兩

硃砂

烏犀角

各製

右末研極勻用安息香膏并煉蜜

丸梧子大濕湯下四九

蟠葱散

治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺

心腹痛連胸脇膀胱腎氣婦人血氣刺痛

並皆治之

乾姜

炮二錢

甘草

炙三分

玄胡

研一錢

茯苓

八分

肉桂一錢五分砂仁一錢檳榔八分三稜八分

青皮各八分莪朮各八分丁皮六分蒼朮六分  
米泔浸炒

右剉一貼姜三片連根葱頭二枚水一鍾煎服

沉香降氣散家傳秘方治諸氣痰癆胸脇走痛痞塞閉

格嘔吐鬱結噎膈痰喘七情等證並皆治之

沉香二錢砂仁七錢甘草五錢香附五錢  
鹽水炒六分五分五分

右各為細末和勻每服一錢用淡姜湯送下

沉香化氣丸家秘專攻赤白青黃黑等色痢疾諸般

腹痛飲食傷積酒積痰積血積跌撲損傷五積

六聚胸膈氣逆痞塞胃中積熱中滿腹脹瘧痞

茶癖及中諸毒惡氣傷寒大便不通下後遺積

未盡感時疫氣瘴氣并諸般惡腫瘡瘍腫毒及

食諸般牛畜等物中毒不問婦人男子小兒並皆治之

大黃錦紋者一兩黃芩條實者一兩人參去芦官揀者三錢

白朮去芦肥壯者三錢沉香上好角沉散水者四錢另為末

右將前四味剉碎用雷竹瀝七浸七曝曬乾為

極細末和沉香末再搗勻用竹瀝入姜汁少許

為丸如葶藶大用硃砂為衣曬乾不見火每服

一錢用淡姜湯送下小兒六分

第四

疝氣

疝氣屬厥陰肝經與腎經無干多屬濕熱為因寒氣外束不得疏散所以作痛雖有詳辯致病之由總不出於濕熱也當分濕熱多小而治疏肝氣養脾土緩以調之庶可取效

主方

陳皮一錢 醋炒 青皮大分 醋炒 白茯苓一錢 姜汁炒 半夏錢 姜汁炒

川芎八分 蒼木一錢 白木八分 山查子一錢 枰一分

山梔錢 芍藥八分 甘草五分 香附一分 鹽水炒 八分

○濕多則腫加荔枝核一錢 橘核炒 枰六分

○熱多則痛加黃連八分 酒炒 黃芩八分 酒炒 棗仁去皮尖 枰八分

○痛甚倍香附加橘核棗仁各八分 荔枝核一錢 炒 枰

○疝病若非斷房慾薄滋味雖藥不能成功也

附方

治疝方 蒼朮 香附各鹽水炒 黃芩已上為君

青皮 玄胡 益智 棗仁已上為臣

茴香為佐 附子鹽水炒 甘草為使

右剉水煎服後一痛過則不再作矣

五葉湯 枇杷葉 椒葉 野紫蘇葉

蒼耳葉 水晶葡萄葉 右以水煎洗

○第四

脚氣 附轉筋

脚氣為病多感於勞苦之人涉水履濕得之傷於肌肉復感復作而為寒熱之病似類傷寒積久而成腫大遂為痼疾南方卑濕人多感之飲酒之人亦有得之者蓋酒能發濕故也治宜流濕清熱隨氣血而藥

主方

紫蘇 六分 芍藥 木瓜 八分 黃柏 鹽水炒八分

澤瀉 八分 木通 去皮八分 防己 八分 蒼朮 泔炒八分

枳殼 炒八分 檳榔 八分 甘草 五分

○痛多加木香 六分 山梔仁 炒六分

○腫多加大腹皮 黑芷湯洗炙六分 滑石 研一錢 半夏 湯泡八分

○發熱加黃連 炒八分 痛除腫退即罷藥

○脚氣衝心宜四物湯加炒黃柏丹於湧泉穴用附子津拌貼以艾炙泄引其熱

○有食積流注蒼朮防己黃柏南星川芎白芷犀

角換柳血虛加牛膝龜版酒糊丸服  
轉筋皆屬血熱四物湯加酒苓紅花煎服筋動於  
足大指上至大腿近腰皆因奉養厚因風寒而  
作又加蒼木南星

附方

防已飲 黃栢酒炒 蒼木鹽水炒 甘草節稍

白木 防已 換柳 生地黄

川芎 犀角 黃連 木通

右判水煎服有熱加黃芩熱甚及天令熱加石

膏痰加竹瀝姜汁或南星便秘加棗仁小便瀉加牛膝

健步丸 桂枝二錢 條黃芩五錢

蒼木 歸尾各一兩 陳皮 生地黄

芍藥各一兩半 牛膝五分 大腹子三錢 茱萸五錢

右為末蒸餅丸每服百丸白木通草煎湯食前

○ 第四 痛風

痛風者骨節走痛之謂也蓋因血虛而不及氣血行  
遲氣行速血氣沸騰液濁而為濕為熱為痰為瘀疑  
塞道路又得風寒外束所以作痛行於陰則夜痛尤

甚治宜疏氣流濕舒風導滯血生新血降陽升陰血  
行氣和而愈矣此病不可食肉肉屬陽大能助火須  
斷厚味錐魚麪醬醋酒之類皆宜禁絕

主方

白朮

去芦一錢

川芎

六分

白芍藥

酒炒八分

蒼朮

泔炒一錢

陳皮

八分

甘草

六分

半夏

湯泡一錢

茯苓

八分

白芷

八分

歸身

六分

黃芩

酒炒八分

○痰盛者脉必滑加貝母

去心八分

天花粉

八分

羌滑

四分

竹瀝姜汁

少許

○濕盛者多腫脉沉倍白朮加竹瀝姜汁

少許

○濕有成鬱者周身走痛或關節痛遇陰寒則發

當從濕鬱條治

○感風者脉浮加麻黃

去根節六分

防風

去芦六分

小續命湯可用

○血虛者脉緊澹加生地黃

八分

牛膝

六分

菴仁

去皮尖并

三紅花

酒洗少許

黃柏

酒炒六分

知母

酒炒六分

○肥人多是濕與痰流注經絡脉滑加天花粉

南星

湯泡一錢

滑石

一錢研

○瘦人多是血虛與熱脉澹加防已

八分

生地黃

八分

紅花少許 桃仁去皮尖 牛膝去芦 換柳八分

○下部有濕腫痛加防已八分 龍膽草六分 黃柏鹽酒炒六分

分牛膝酒洗六分 木瓜六分

○上中下痛風加黃柏酒洗六分 南星湯泡六分 神麩炒六分

○台芎六分 防已六分 白芷五分 桃仁去皮尖 葶靈仙酒洗

分薄桂三分 羌滑三分 紅花酒洗

○手臂腫痛及上體痛風加南星湯泡六分 白朮錢一 香

附八分 桂三分 葶靈仙酒洗三分 虛弱人葶靈仙勿用

○氣血兩虛有痰濁陰火痛風人參山藥海石南

星各一兩白朮熟地黃黃柏炒 龜版酒炙 各一兩

乾姜燒灰 瑣陽各五錢為末酒糊丸

○肢節腫痛屬火腫屬濕兼風寒而發動於經

絡之中濕熱流注肢節之間而無已也用麻黃

去根 赤芍藥各一錢防風荆芥羌滑獨滑白芷

蒼朮葶靈仙片苓枳實桔梗葛根川芎各五分

甘草歸鬚升麻各三分下焦加酒炒黃柏婦人

加酒炒紅花腫多加換柳大腹皮澤瀉更加沒

藥定痛尤妙一云脉瀆數者有瘀血宜桃仁紅花芎歸及大黃微利之

○臂痛是上焦濕橫行經絡用半夏酒苓白朮南

星香附各一錢陳皮茯苓各五分蒼朮一錢半

歲靈仙二錢甘草少許煎服一方二陳湯加酒

○世人多用草藥取効者殊不知性熱而燥不能

養陰却能燥濕受病之淺元氣尚壯用之庶或

見効若病深而虛者用之取禍尤速慎之戒之

○薄桂味淡能橫行手臂歲靈仙治上體痛風虛

附方 小續命湯 見中風門

二妙散 治筋骨疼痛因濕者

黃柏 炒 蒼朮 米泔浸炒

右為末沸湯入姜汁調服二味皆雄壯之氣表

實氣實者加酒少許佐之有氣加氣藥血虛加

補血藥痛甚者加生姜汁熱服之

潛行散

黃柏酒浸為末入湯藥調服

○第四四 痿

內經論諸痿起於肺熱又謂治痿獨取陽明何也蓋

緣濕熱為病陽明屬土惡濕肺屬金畏熱濕熱相干

則血液燥而宗筋枯不能束骨為痿矣故曰肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能為用此至言也治宜行濕以清肺生血以養筋少佐舒風之劑必須遠色慾斷厚味齋心自養而病無不愈矣

○大率屬濕熱有痰有血虛有氣弱有死血有食積妨碍不降者

主方

防已 一錢 澤瀉 六分 蒼朮 一錢 黃柏 一錢  
酒炒 八分 津炒 鹽水炒 一

黃芩 八分 甘草 六分 紅花 少許 川歸身 五分  
酒炒 八分 少許 八分

○痰者加半夏 湯泡 一錢 竹瀝姜汁 少許

○血虛者倍當歸加川芎 一錢 白芍藥 一錢 生地黃 一錢  
湯泡 一錢 少許 一錢 汁

○氣弱者加黃芪 蜜炙五分  
炒一錢 知母 酒炒八分

○死血者加桃仁 去皮火 杵一錢 玄胡 研八分 牛膝 五分

○食積者加香附 鹽水炒 八分 山查子 一錢 大麥芽 一錢  
鹽水炒 八分 炒一

○濕熱東垣健步丸加燥濕降火黃柏黃芩蒼朮

○黃柏蒼朮治痿要藥也 虎潛丸補腎丸治痿可

附方 補腎丸 見虛損門

東垣健步丸 治膝中無力屈伸不得腰背腿脚沉重行步艱難

羌滑 柴胡 滑石 甘草炙

瓜蒌根酒洗 肉桂各五分 防風 澤瀉各三錢

防已酒洗 川烏 苦參酒浸各一錢

右為細末酒糊為丸梧子大每用七十九空心

○第四 手麻木

丹谿論麻是氣虛木是濕痰死血又謂十指麻木胃中有濕痰死血蓋麻木屬濕痰者多兼死血者有之

亦有平人屈而不伸氣頓則血不運而麻氣行則已

據此則濕痰死血阻碍明矣蓋木則氣血不貫非

主方

南星炮八分 蒼木一錢 蘇木八分 枳壳炒八分

陳皮一錢 甘草炙五分 白茯苓一錢 半夏湯泡一錢

川歸尾八分 白芷三分 薄桂三分 桃仁去皮尖并

右剉一貼姜三片水一鍾煎服痰盛加竹瀝姜

汁少有火再加黃芩酒炒 氣虛加人參一錢

○第四 耳病

耳聾與耳鳴不同聾則常窒而無聞鳴則有聲而或  
息皆屬於熱少陽之火為之也亦有腎虛者又有大  
病後而聾者

主方

木通去皮八分 甘草 一錢 升麻 六分 麥門冬去心八分

生地黄一錢 赤芍藥七分 甘菊花八分 茯苓八分

前胡八分 黃芩酒炒八分 川芎八分

○腎虛鳴者其鳴不甚加川歸八分 黃柏酒炒六分 知母六分

酒炒 玄參八分 枸杞子八分

○大病後聾者餘熱未盡因虛而聾也加玄參八分

連翹六分 黃柏酒炒六分 知母酒炒六分 川歸六分

○痰因火動者加貝母去心一錢 天花粉八分 青黛六分

○耳痛及出膿汁者加石膏一錢 天花粉一錢 防風六分

○飲酒人耳聾者從痰火條治

○治聾用草麻子四十九粒棗肉十枚入人乳搗

膏石上晒乾丸如梧子大綿裹塞耳中又方用

雄鼠膽汁滴入耳中尤妙仍開痰散風熱

○耳鳴宜當歸龍薈丸多飲酒人宜木香檳榔丸

○耳痛以茱萸烏尖大黃爲末置湯泉心足又方枯  
白礬吹入耳中青箬燒灰吹入尤妙

○治蟲入耳香油灌入即出或驢牛乳鷄冠血皆

附方 當歸龍薈丸 見脇痛門

蔓荊子散 治上熱耳出膿汁

甘草炙 升麻 木通 赤芍藥

桑白皮微麥門冬去心前胡 生地黄

甘菊花 赤茯苓 蔓荊子 等分

右剉每服三錢加姜棗水煎服

○**第四七** 目病

目病屬風熱血少神勞腎虛盖肝火動而腎水不制也凡暴發赤腫羞明渣痛翳膜眵淚皆在表也當除風散熱涼血如昏暗不欲視物內障見黑花瞳散昏在裏也當滋腎養血清熱少佐風藥盖肝屬木主風故也

主方

川歸酒洗 川芎八分 黃連酒炒 白芍藥酒炒

黃芩酒炒 菊花八分 草決明六分 羌活四分

防風二分 甘草五分 玄參一錢 龍膽草六分

吉川抱元 卷之六 三

○在表者加柴胡一錢枳壳八分薄荷六分白茯苓八分

木賊六分山梔仁八分痛甚加大黃洗肝散

○在裏者加生地黄一錢天門冬去心枸杞子二錢

黃柏酒炒瞳散加五味六分知母酒炒有痰加貝

母去心天花粉八分連翹六分

○勞後飲食不節內障昏暗用蔓荊子人參黃芪

甘草炙黃柏酒炒白芍藥酒炒又用四物加酒苓連柏

○肥人風熱上壅目痛宜防風羌滑荊芥酒苓以

散其熱瘦人眼痛是血少與熱宜養五當歸川

附方

滋陰地黃丸

熟地黃 生地一兩柴胡八錢天門冬去心

甘草炙 枳壳 地骨皮 黃連

五味各三錢 人參二錢 歸身酒洗 黃芩各五錢

右為細末煉蜜為丸菴荳大每服百丸茶清下

羊肝丸 治一切目疾不問障育

白乳羊肝一具以竹刀去膜 黃連一兩 甘菊花

防風 去芦 薄芎 去芦 荆芥穗 羌活

當歸 酒洗 川芎 各三錢

右為細末羊肝搗丸白滾湯下茶清亦可

地芝丸 治不能遠視能近視此除大風熱

生地黄 四兩 甘菊 二兩 枳壳 炒二兩 天門冬 去心四兩

右為末煉蜜丸梧子大每服五六十九 茶酒任意下

○第四八 口病

丹谿謂脾熱口甘宜三黃丸膽熱口苦及謀慮不決亦口苦小柴胡湯加麥門冬酸棗仁地骨皮遠志

○口瘡服涼藥不愈者乃中氣不足虛火泛上無

制用理中湯甚者加附子或用官桂噙之亦妙

○口瘡用西瓜水時時飲之無瓜以瓜皮燒灰噙

又方細辛黃栢 炒 等分為末糝舌上吐涎愈又

方好酒煮黃連呷之立愈

○口瘡實者涼膈散甘桔湯主之

○小兒口瘡不下食以狐惑治之必死用礬湯於

脚上浸半日頃寬以黃栢蜜炙姜蚕炒為末 付安

○唇緊燥烈生瘡用青皮 燒灰 猪膽汁調付 夜卧頭好

卷之六 口病 三十五

○口糜野薔薇根煎湯一云白薔薇根汁嗽之良

○**四九** 喉病

喉痺為病皆因火盛炎上血壅痰滯而有輕重之分重而甚急者非藥可及必用針刺出血立愈乃上策也輕者其桔湯可服水煎徐徐呷之効亦可刺少商在手大指端內側去爪甲角如韭菜出血尤妙喉腫隨處刺之無害惟懸鐘不可傷耳須當謹慎必付諸能者為之亦有陰血虛甚遊火泛上而咽痛者又有傷寒小陰經病咽痛者但不腫耳各從其類治之

主方

桔梗去芦 四錢 甘草四錢 黃芩酒炒 二錢 用瓢枯者

○陰血虛者加玄參去芦 一錢 貝母去心 一錢 乾姜炙 二分 可從陰虛條治

○傷寒咽痛從傷寒門治

○又方用番木鱉并花水磨含妙治喉痺

○喉乾燥痛四物湯加桔梗荆芥黃栢知母服効

○喉瘡并痛多屬虛火遊行無制陽虛火用四君

子湯加黃栢炙 荆芥竹瀝姜汁許 陰虛火用四

物湯加黃栢酒炒知母酒炒玄參桔梗甘草竹瀝姜汁少許  
附方 四君子湯見虛損門四物湯見婦人門

○第五十 牙病

牙病腫痛多屬陽明溫熱有挾風寒而作者有蟲蛀痛者腫處亦可刺出血妙

主方

升麻 六分 白芷 六分 防風 六分 荊芥穗 六分  
薄荷 六分 陳皮 八分 甘草 六分 茯苓 八分  
半夏 八分 桔梗 六分 黃芩酒炒 八分 黃連酒炒 八分

石膏研一錢 木通去節六分 山梔仁酒炒一錢

右剉一貼姜三片水一鍾煎至半鍾服挾風寒作者倍風藥蟲痛者亦宜服之溫熱生蟲故也去蟲則愈

○又治蟲方用韭菜子紙裹燒將竹筒引烟薰之又方用藤藜梗搗細付患處又方用山中葉下紅形似銅錢大俗呼為馬蹄香是也連根葉着鹽少許搗付痛處効又方用山中黃躑躅根三月開黃花形似鍾樣而長者是以根剉碎水濃煎含之効不可嚙下能殺人

○實熱腫痛調胃承氣湯加黃連煎服調胃承氣見傷寒門  
○治走馬牙疳用乾姜棗燒存性白礬枯末付之  
○治小兒走馬牙疳一時腐爛即死用婦人溺桶中白垢火煨一錢入銅綠三分麝香一分五厘付之立愈

第五

鼻病

附翳鼻息肉

鼻淵

酒齶鼻

鼻為肺之竅因感寒熱氣不利而閉塞矣蓋熱則壅其清道寒則閉其毛竅所以肺氣不得通暢而為病也治宜熱則清而開之寒則表而散之

主方

○肺熱者屬裏或開或塞或不聞香臭宜用節齋化痰丸

○肺寒者屬表外感風寒是也宜用參蘇飲之類

○肺虛者宜四物湯加馬兜鈴瓜蒌仁天門冬貝母知母桔梗甘草黃芩之類

面鼻紫黑面為陽中之陽鼻居面中一身之血運

到面鼻皆為至清至精之血多酒之人酒氣薰

蒸面鼻得酒血為極熱熱血得冷汚濁凝結而

不行故色紫黑治宜化滯血生新血四物加片

苓酒炒紅花酒炒茯苓陳皮甘草生姜煎調五靈脂

末服氣弱加黃芪 酒浸

艷鼻息肉乃肺氣盛用枯礬研為粉脂綿裹塞鼻

數日自消瓜蒂末綿裹亦可木通細辛附子 炮

蜜和綿裹納鼻中防風通聖散加山稜山茱萸

肉海藻並用酒炒末每服一錢白湯調下

鼻淵膽移熱於腦則辛頰鼻淵通聖散一兩加薄

苛黃連各二錢半煎服

酒鱸鼻乃血熱入肺也有一奇方用枇杷葉 去毛大

山梔苦參蒼朮 米泔浸炒 各剉等分為末每服一錢

半酒調白滾湯嚥下晚服之去右邊赤早服之

去左邊赤其効如神此方乃得之方上至人不

易泄者今錄出以濟諸人此病雖不為害蓋人

之鼻為面之首相也可不重乎

附方 四物湯 見婦人門 通聖散 見中風門

參蘇飲 見傷寒門 節齋化痰丸 見咳嗽門

○第五二 吐血 諸血併入惟下血 瀉血另立篇名

夫血為氣之配隨氣升降者也蓋血從上出皆是陽

盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑

陽氣降則血歸經此丹谿論之至也

○大率有吐血嘔血有衄血咳血有嗽血痰血有咯血唾血又有經謂怒則氣逆甚則嘔血丹谿謂暴吐紫血成塊者是熱傷血結於中吐出為好各從其所出而治之

主方

川歸去芦七分 川芎七分 白芍藥一錢 生地一錢 黃柏酒炒八分 甘草六分 白朮去芦八分 知母去毛酒炒八分 蒲黃炒五分 牡丹皮六分 韭汁半銀 姜汁少許

○吐血嘔血者出於胃脉大而衄加山梔仁酒炒八分

黃連酒炒八分 乾葛五分

○衄血咳血者出於肺脉浮而衄加桑白皮蜜炙六分

山梔仁酒炒七分 瓜蒌仁去壳杵一錢 貝母去心一錢 枯黃芩

酒炒八分 真阿膠一錢 葱白三枚

○嗽血痰血者出於脾脉訖而緩加貝母去心八分 瓜

蒌仁去壳杵一錢 黃連去芦炒八分

○咯血吐血者出於腎脉訖而瀋加桔梗去芦六分 玄

參去芦八分 側柏葉炒八分 童便半銀 薑

○怒氣逆嘔血者加山梔仁酒炒乾姜炒五分柴胡三分

○暴吐紫血者加黃連酒炒山梔仁酒炒

○有瘀血內積肺氣壅遏不能下降用天門冬麥

門冬知母貝母桔梗黃柏熟地黃遠志或加乾

○舌上無故出血如線用槐花炒為末糝之

○大抵衄血與吐血同涼血行血為主犀角地黃

湯入鬱金

○吐血大法四物湯加炒梔子童便姜汁一本有竹瀝

○有先吐血後見痰者是陰虛火盛四物為主加

藥火藥有先吐痰後血多者是積熱降痰火為急

○山梔子最清胃腕之血

○大吐血後昏倦脉微細者宜用獨參湯服之醒

後再不可服動火故也

○凡吐衄血盛大者必有瘀於胸膈不先消化之

則止之涼之不應也

不治證內經謂諸見血身熱脉大者難治脉訣衄

吐血脉沉細忽浮大者死

附方

獨參湯 治大吐衄血等證昏悶不醒出葛可久

人參去芦 右剉作一服水一鍾煎半鍾服醒則不可服

犀角地黄湯 治血積胸中上焦諸般血證

犀角鎊 赤芍藥 牡丹皮 生地黄等分

右剉每服四五錢水煎服

四生散 治凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行

生荷葉 生艾葉 生地黄 生栢葉

右研細為丸鷄子黃大每服一丸或煎或溫湯化下

藕汁飲 治吐血衄血不止

生藕汁 大薊汁 生地黄各三 生蜜一匙

右件藥汁調和令勻每服一小盞不拘時服

○第五三 便血附瀉血 小兒尿血

便血者俗謂之下血也蓋因腸胃有熱虛則下血也亦有風邪下陷者有溫熱傷血者有積熱下血者有腸風痔漏下血者有上吐衄不盡停留腸胃下血者有怒氣傷肝下血者各從其因而治之

主方 天門冬去心六分

川歸八分 川芎八分 白芍藥一錢 生地黄一錢

○虛下血者加乾姜炒五分升麻五分阿交炒五分

○風邪下陷者加柴胡八分升麻三分條黃芩八分秦

○濕熱傷血者加蒼木八分白木六分陳皮八分秦

○積熱下血者加山梔八分黃連八分升麻三分

○蒼木六分連翹三分黃芩六分黃栢六分桃仁六分

○腸風下血者倍芍藥加黃芩一錢枳壳八分槐

○吐衄不盡下血者加桃仁去皮尖一錢牡丹皮去心四分

山梔仁酒炒一錢

○惱怒下血者加柴胡六分升麻三分黃連八分蒸芫

三分香附鹽水炒四分

○凡用血藥不可單行單止不可純用寒涼藥必加辛溫升藥如酒煮酒炒涼藥之類

○脉經謂下血先見血後見尿是近血先見尿後見血是遠血

瀉血屬熱用梔子炒水煎服之或用小蘗琥珀小蘗治下焦結熱血淋又方生地黃四兩小蘗滑

石通草炒蒲黃炒淡竹葉藕節當歸酒浸山梔炒

甘草各五錢溺血因血虛者四物湯加牛膝

小兒尿血用甘草升麻煎湯調益元散服

附方 益元散 見暑門

槐花散 治便血 槐花 微炒 一兩 紅花 酒炒 二錢

右為細末每服二錢白滾湯下

○第五十四 汗

夫汗者未有不由勞役房慾而得也蓋勞役則傷氣而為自汗屬氣虛房慾則傷血而為盜汗屬血虛又有痰病與胃中濕熱皆能作汗

主方

○氣虛自汗大泄者脉大無力宜四君子湯加黃

芪少佐以桂枝虛甚加附子

○血虛盜汗者脉緊瀦而無力宜當歸六黃湯亦

可滋陰降火亦有自汗者

○痰病有汗者清肺湯主之

○胃中有濕熱者涼膈散主之

○撲法用牡蠣粉麩皮麻黃根糯米藁本防風白

芷為末撲之

○小兒盜汗不須治小兒陰血本未足故云不須治然汗固非小兒所當必有者且久不愈血耗而益虛亦宜治之為良

○忌法汗家禁半夏以其用姜故也

附方 四君子湯見虛損門 四物湯見婦人門

涼膈散見火熱門

當歸六黃湯

當歸 黃連 黃栢 黃芩

生地黄 熟地黄等分 黃芪倍加

右剉每服五錢水煎小兒減半

正氣湯 治盜汗

黃栢 知母各一錢五分 甘草炙五分

四製白朮散 治盜汗

白朮四兩一兩以黃芪炒一兩以石斛炒一兩以牡蠣粉炒一兩以麩皮炒止取白朮為末每服三錢粟米煎湯調服

清肺湯 山梔酒炒八分 貝母去心八分 天門冬去心八分

黃芩酒炒二錢 黃芪蜜炙一錢 甘草八分 麥門冬去心一錢

右剉一貼水煎服

○第五十五 瘧

冊谿論瘧與癘相似蓋癘則口噤出沫身軟僵仆瘧則口噤身強反張仲景傷寒論辯剛柔二瘧詳矣惟產後痰火濕熱怒氣所因不同治各迥異皆由血虛不能養筋而致者與風無干決不可以風藥治之

主方

○剛柔二瘧從仲景傷寒法治

○產後因血虛或亡血者宜四物湯加乾姜炮少

佐肉桂白茯苓甘草炙 藜蘆童便之類新產一二日減

地黃與芍藥加牛膝桃仁若去血過多而悶運者宜白朮為主少佐以陳皮茯苓大麥芽之類

○痰火者宜二陳湯加川歸川芎黃芩酒炒 貝母天

花粉枳殼黃連酒炒 天麻竹瀝姜汁少 之類

○濕熱者二陳湯加白朮蒼朮山梔酒炒 少佐以藜

朮防風之類

○怒氣者從中氣條治

○第五十六 厥

夫厥者手足逆冷也有陽厥有陰厥陽厥者煩渴譫語身熱脉數而滑為陽證也陰厥者身涼不渴脉遲

而微為陰證也蓋陽厥者多而陰厥者少殊不知非  
極熱則不能發厥故原病或謂熱極似水陽亢陰微  
然亦有氣虛而發厥者為陰厥屬寒血虛而發厥者  
為陽厥屬熱又有氣逆痰逆而發厥者皆屬陽證

主方

○傷寒發厥者從仲景法治

○氣虛者屬寒宜四君子湯加乾姜附子炮之類

○血虛者屬熱宜四物湯合黃連解毒湯之類

○氣逆者脉沉或伏宜蘇合香丸或姜汁之類

○痰逆者脉滑宜二陳湯加竹瀝姜汁之類

○瓜蒂散吐之口噤者先用搐鼻法

○蘇合香丸治卒暴厥不知人未辯風痰氣厥宜

與此化濃湯灌之醒後擬脉證用藥

附方 四逆湯 白虎湯 二陳湯 俱見傷寒門

四君子湯見虛損門 四物湯見婦人門 蘇合香丸見諸氣門

黃連解毒湯見傷寒門

第五七 癩病 附癩狂

癩之為病諸書因風驚食為二癩又以病象馬羊鷄

猪牛為五癩者丹谿謂大率屬痰與驚不必分五等  
蓋因驚與痰火治極是

主方

陳皮一錢 甘草五分 白茯苓一錢 半夏湯泡一錢

南星炮一錢 黃連酒炒一錢 枳壳炒六分 瓜蒌仁去壳杵一錢

遠志去心八分 麥門冬去心八分 牛黃六分另磨入藥

右剉一貼生姜三片水一鍾煎至半鍾入竹瀝

一銀盞姜汁少許和服

○有痰者必用吐法吐後用東垣安神丸及平肝

之藥青黛柴胡川芎之類

癩狂者丹谿謂神不守舍狂言妄語皆屬於熱素

問論云多喜為癩多怒為狂五志所發皆火實

制金不能平木則肝盛而多怒也肝盛而復生

火干及陽明而為妄言也難經有云重陰者癩

重陽者狂蓋陰火盛而為癩陽火旺而為狂雖

有陰陽之分而總歸於熱也又謂服膏梁芳草

石藥則熱氣慄悍發為癩狂則是證若熱明矣

主方

白茯神錢一甘草六分半夏湯泡錢一天花粉八分

貝母去心錢一黃芩酒炒八分黃連酒炒八分山梔仁酒炒八分

遠志去心六分歸身三分牛黃三分另磨辰砂三分藥汁研入

右剉一貼姜三片水一鍾煎半鍾入荆瀝一盞

自然姜汁少許和服火盛加童便一銀盞

○有中邪者則從邪治之秦承祖灸鬼法即鬼哭穴以兩

手大指相並縛定用大艾炷騎縫灸之務令兩甲角及甲後肉四處着火一處不着則不効徒

灸可用自哀告求去矣

○經年不愈心經蓄熱當清心除熱如痰迷心竅

當去痰寧心又謂宜大吐下則愈

附方

東垣安神丸

黃連一錢五分酒炒辰砂水飛錢一酒生地黃五分

酒當歸身五分炙甘草五分

右爲細末湯浸蒸餅丸如黍米大每服十五丸津嚥下

牛黃清心丸 治諸風緩縱不隨語言蹇澀痰涎

壅盛怔忡健忘或發癩狂並皆治之

羚羊角末一兩人參去芦二兩半白茯苓去皮一兩二錢

芎藭 一兩二分 防風 去苗一兩 乾姜 炮七錢五分

阿膠 錢五分 白木 一兩五分 牛黃 研一兩二分

麝香 研一兩 犀角末 二兩 雄黃 研水飛二錢

龍腦 研一兩 金箔 一千一百箔內四百箔為衣

白芍藥 一兩半 柴胡 去苗一兩 甘草 剉炒五兩

乾山藥 七兩 麥門冬 去心一兩 桔梗 去芦一兩

黃芩 一兩五分 杏仁 去皮尖雙仁麩炒黃一兩

大荳 七錢半炒 大棗 一百箇蒸熟去皮核研成膏

神麩 研二兩半 白欬 七錢五分 蒲黃 二錢半炒

肉桂 去皮一兩 當歸 去芦一兩五分

右除棗杏仁金箔二角末及牛黃麝香雄黃龍

腦四味別為末入餘藥和勻煉蜜棗膏為丸每

兩作十九丸以金箔為衣每服一九食後溫水下

○第五八 邪崇

冊谿云血氣者身之神也神既衰乏邪因而入理或

有之若夫血氣兩虛痰客中焦妨碍升降不得運用

以致十二官各失其職視聽言動皆有虛妄以邪治

之其人必死外臺秘要有禁呪一科乃移精變氣之

小術耳可治小病而謂內有虛邪外有實邪悉能治之乎

○愚謂邪崇之病甚少蓋因氣血虛脫者然后見之至此則難為矣難經云脫陰者見鬼脫陽者

目盲其此之謂與

○第五九 怔忡 附驚悸

戴氏論怔忡者心中不安惕惕然如人將捕者是也

○大率有血虛有痰火思慮便動者屬血虛時作時止者屬痰火又有時覺心跳者屬血少

主方

○血虛者宜四物湯加白木茯苓去木員眼肉酸東

仁去殼人參許少甘草多之類

○痰火者二陳湯加黃連黃芩俱酒炒川歸身許少白

芍藥酒炒竹瀝姜汁許少之類

○心跳者川歸身川芎白芍藥酒炒黃連酒炒貝母去心

白朮紅花許少甘草遠志之類

○治勞後太虛心跳者用硃砂白芍藥歸身側柏

葉各三錢川芎甘草陳皮各一錢黃連半炒為末猪

心血丸服○瘦人多是血少肥人多是痰

驚悸屬血虛用硃砂安神丸有痰迷心竅用治痰

附方 四物湯 見婦人門 二陳湯 見痰門

硃砂安神丸

黃連 酒炒二錢五分 生甘草 五分 硃砂 水飛一錢

右末湯浸蒸餅丸黍米大每服十五丸津嚥下

溫膽湯 治心膽怯易驚

半夏 竹茹 枳實 各二兩 生姜 四兩

陳皮 三兩 甘草 一兩 右剉每服一兩水煎服

健忘

健忘者易忽而失記也丹谿謂精神短少亦有痰者

主方 白木 去芦一錢 人參 去芦八分 白茯神 去皮八分

圓眼肉 十箇 甘草 六分 遠志 去心八分 酸棗仁 去壳八分

黃連 酒炒八分 蓮子 去心七箇 貝母 去心八分 石菖蒲 九箇者佳八分

紅花 酒洗少許 川歸身 酒洗四分 麥門冬 去心八分

右剉一貼水一鍾煎至半鍾溫服

附方

歸脾湯 治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白木 去芦 茯神 去皮 黃芪 蜜炒 酸棗仁 炒各一兩

圓眼肉一人參去芦五分木香五錢甘草炙二錢半

右剉每服四錢姜三片棗一枚水煎服

定志丸 治心氣不足恍惚多忘

人參三兩白茯苓三兩遠志去心二兩石菖蒲二兩

右為末煉蜜丸硃砂為衣

○第六一 消渴

消渴者有上中下三消之名也蓋上消者屬肺多飲水而少食大便如常中消者屬胃多飲食而小便赤黃下消者屬腎小便濁淋如膏之狀法當養肺降火

生血為主

主方

○上消者宜蘭香葉白葵花苗平澄茄升麻黃栢滑

石天花粉麥門冬甘草黃芩今之類東垣謂高消者舌上赤烈

大渴引飲心移熱於肺傳為膈消者以人參白虎湯治之

○中消者宜黃芩黃連石膏山梔天花粉知母甘

草麥門冬之類和謂口乾乳飲水多食即虛成消中者調以承氣三黃丸治之

○下消者宜五味子知母黃柏玄參生地黃天花

粉黃連甘草之類東垣謂下消煩燥引飲耳輪焦乾小便如膏以六味地黃

大司馬印

車

丸治之又謂能食者必發癰疽背瘡不能食者必傳中蒲鼓脹皆為不治之證潔古分而治之能食而渴者人參白虎湯不能食而渴者錢氏白朮散倍加乾葛治之

○大法黃連天花粉二味為末藕汁人乳汁生地黃汁佐以蜜姜汁為膏和二末徐徐留舌上以白湯少許送下能食者加石膏

○一方縲絲湯飲之吐之一日此物屬火有陰之用能瀉膀胱中相火引氣上潮于口如無縲湯以蠶殼絲綿煮湯代之 天花粉治消渴之聖藥也 一忌治法禁半夏不宜汗

