




Handwritten Chinese characters in a vertical column, possibly a title or a list of items. The characters are arranged from top to bottom: 一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八, 九, 十. The characters are written in a cursive style and are enclosed within a rectangular border.



軍中醫學方

備要

侯官林氏

銅擺本

軍中醫方備要目錄

卷上

金瘡急救方

又敷方

整骨紫金丹

復元通氣散

腹破腸出

又方

腦破骨損

傷重痛悶欲絕

中鎗砲傷

凡被鎗砲傷鉛子在內命危旦夕



中鎗砲血出不止

中鎗砲傷腹裂腸出

中箭傷

出箭頭

又方

中毒矢

箭頭或竹木刺在咽喉胸隔諸隱處不出者

金瘡敷藥

七釐散

內服整骨麻藥開取箭頭鎗砲彈子不知疼

痛

外敷麻藥

玉真散

去腐散

蓋蝟斂口生肌散

花乳石散

止血定痛生肌散

太乙膏

花乳石

敷方定痛膏

敷方定痛散

八僊逍遙湯

內治補損接骨僊方

外治補損接骨仙方

折傷筋骨疼痛不止

筋骨已斷

骨節脫離

腕折骨損

腕折四肢骨碎及筋復蹉跌

頭破腦出中風口噤

敷傷無癥

金瘡血出不止

又方

又方

金瘡內漏

金瘡痛不可忍百治不愈者

打破肢體血出不止

急救跌打損傷

跌打損傷藥酒方

又方

跌打損傷敷方

又方

又方

又方

跌打吐血不止

墜馬血瘀胸腹

墜落損傷欲死

墜落車馬及車輾木打死者

損傷吐血

閃拗手足

各種跌磕傷

面目漢丁青紫

磕撞青腫

火傷

又方

又方

湯火傷

火傷成瘡而腫痛或中風寒或中水

又方

解毒蠟礬丸

食自死六畜肉中毒

食百獸肝中毒

食野菜馬肝肉諸脯肉毒

茅屋漏水沾脯上有毒

中猪肉並六畜肉毒

中諸毒生漆惹入成毒

邪氣入腹腫毒

解酒食毒

解果菜毒

解蟹毒

中禽魚河鮑毒

又方

解野菌毒

卷下

解砒霜毒

解百藥毒

服藥過劑毒並中附子毒頭腫如斗唇裂目

流淚者

飲酒中毒

凡飲食中毒

中惡及蠱毒

水毒

又方

又方

又方

又方

水毒先解後飲方

又方

解麻蒙迷藥

解瘴癘方

又方

人口咬傷

蜈蚣咬

蝎子咬

蛇咬

虎咬

又方

又方

癩犬咬

顛犬及平常犬咬

馬咬及踏傷

狼虎蛇蝎六畜所傷並一切瘡毒

竹木刺入目

竹木刺皮中不出

凍瘡

手足凍指欲墮

脚折裂

遠行脚底成泡

趾腫不能行路

耳鼻既落復安

辟瘟疫

瘟疫瘴氣

除瘟疫救苦丹

五瘟丹

菩提丸

霍亂吐瀉

水瀉

水瀉不止

立止水瀉

又方

噤口痢

瀉痢

又方

紅白痢

又方

又方

凡腹痛不吐不瀉者

紅白痢水瀉仙方 痧烏脹

絞腸痧方

治傷寒不出汗大小便不通風寒胃氣心氣

腸腹疼痛病目等證

傷寒無汗頭痛發熱身痛口乾

一切傷風傷寒頭目不清或被疫氣所侵頭

腦昏悶

偶然吐血

又方

吐血不止

吐血成斗

吐血立愈

化痰

中痰

墜痰方

又方

玉霜膏

骨鯁咽喉

百生方

咽喉腫痛不能食

咽喉結塊不通水食危困欲死

治喉閉悶氣欲死者

治暴喘欲死方

治心痛不可忍者

再生圓起厥死猶暖者

起卒死

又方

又方

又方

治暴熱毒心肺煩而嘔血者

熱暈卒死 又飲方

凍死四肢僵直口噤而有微氣者

溺死 又方

又方 又方

治縊死方 又方

又方 驚死

魘死 禳瘧法

止瘧靈符 呪語

值日神將 各種疔瘡

如發熱口渴便閉 金銀散

拔毒散 千金膏

定痛生肌散 又方

諸瘡因風致腫 又方

諸瘡久不瘥 諸瘡奇方

各樣腫毒 又方名一筆勾

避兵法

又法

又法

避兵符

呪語

避兵物

助威勇法

起息風法

軍中醫方備要卷上

金瘡急救方

辨金瘡色白而微紅者易治

紫紅色者百無一生金瘡屬金主肺患金瘡

者忌肺部之證如咳嗽嘔噦翻胃之類宜避

風風屬巽木風入瘡口肺金反尅則瘡口浮

腫瘡痲穢爛而成破傷風變生餘證甚者不

救治法宜辨瘡口淺深六脈虛貫所喜者胃

氣旺飲食如常脾胃屬土胃氣旺則元氣壯

氣血生切戒嗔怒色慾怒則迸裂慾則腐爛
又忌言笑思想行動作勞食酸醜酒果煎炙
出血既多必渴當強忍之慎勿多飲粥與漿
犯則血動溢出殺人愈後猶須如此出百日
半年乃可復常凡服湯藥必以助胃補血爲
主卒不及救非預設妙藥多至危殆彙方於
後宜審擇焉

大豆二升水五升煮取汁二升和醇酒六七升服

之一日盡小豆亦可或麻葉三十二兩水三升煮
取汁升半爲一服或飲麻子汁數升亦治毒箭傷
或蚯蚓屎水調服每日三次

又數方

梅乾燒作炭搗末敷之一宿愈亦治被打傷或磁
石末敷之止痛斷血或桑白汁塗桑白皮裏或石
灰封之或杏仁石灰研細末豬脂和封或搗穀子
敷之

整骨紫金丹 止痛散瘀此方神效

大熟地四兩 丁香 木香 瓜兒血竭 兒茶

紅花酪一 當歸頭 白茯苓 白芍 蓮肉酪三

丹皮五錢 甘草三錢

共研細末每服三錢黃酒調下不飲酒者用滾

水加酒為引若平時備用煉蜜為丸

復元通氣散 瘀血散去再服此方

廣木香 小茴香 青皮 陳皮 穿山甲 白

芷 甘草 貝母 漏蘆各等

共研細末每服一錢酒調下同前

腹破腸出

人屎曬研糝腸上即入或濃煎小麥待冷覆臥以

汁噴背上

又方

大麥粥汁洗腸納入研米粥飲之二十日稍稍作強糜百日後乃可瘥

信甲

腦破骨損

蜂蜜蔥白搗爛和勻厚敷立效

傷重痛悶欲絕

打傷跌撲或砲矢所傷血

流滿體胸膈悶絕皆用此方

破牛腹納人其中熱血浸之可醒又搗開口熱童

便灌之即醒再用血竭研末黃酒冲服俟血出愈

中鎗砲傷

如鉛子在內以水銀灌入少時傾出再換水銀鉛

子自化以化盡為度若鐵子用好磁石吸之若銅

子難出必用利刀割而取之取盡方無後患再用

童便洗傷處洗淨敷藥外用太乙膏護之

凡被鎗炮傷鉛子在內命危旦夕

天竹黃三錢如無真者雄黃二錢劉寄奴

紅芽大戟 麒麟竭各三錢歸尾一錢硃砂

兒茶各一錢乳香三錢琥珀 麝香分三輕粉

水銀各三分研

共研細末每服一錢酒數杯調飲睡一週時出汗愈

中鎗砲血出不止 亦治金瘡

原蠶蛾 炒為末調敷立止 血出如箭者亦效

中鎗砲傷腹裂腸出

黃耆

當歸

川芎

白芷

續斷

鹿茸

黃芩

乾薑

附子

白芍藥略二

細辛五錢

共研細末每服五錢先飲酒後服藥 二日三服

七日而愈

中箭傷

用鹽貼瘡上以艾炷鹽上炙三五十壯俟痒愈

出箭頭

陳醃肉却取肥碎象牙銼屑人指甲以研末入肥

肉攪勻搗爛厚敷傷處四圍箭頭自出然後用藥

敷之

又方

蜣螂三箇 芭豆粒四五

共搗如泥敷傷處先定痛後作癢至骨少刻簇
出再用生肌散敷之

中毒矢

搗藍靛汁一升飲之并敷瘡上若無藍靛取青布
絞汁代之或煮蘆根汁飲三升或多飲葛根汁並
治一切金瘡葛白屑熬黃敷瘡止血或煎地黃汁
作丸服之百日矢當出或貝齒研末服之或雄黃

敷之或用鹽置臍中炙之

箭頭或竹木刺在咽喉胸膈諸處不出者

用蜷蛄蟲杵爛塗傷處四圍或苦瓜薑汁塗之自
出或用薏麥酒調服每日三次或燒婦人月經布
酒調服亦愈

金瘡敷藥

乳香 一兩 沒藥 三錢 天靈蓋 五錢 壓邪 血竭 五錢

黃連末 五錢 袍蓋石 五錢 微黃 金芮 五片 鎮壓 去腐 止

硃砂末散一兩止肺家症黃丹飛七錢水

又金瘡血出不止以精塗之 又真降香止血解

痛 又冬瓜或松枝噍爛服並敷瘡口 又人指

甲燈火燒焦研末乾糝

七釐散 專治金刃跌打損傷骨斷筋折血

流不止食喉割斷能定痛止血立時見效

並治一切無名腫毒

硃砂二錢麝香二厘冰片二厘乳香五錢

血竭一兩兒茶四錢紅花五錢

共研細末以五月五日午時製合磁瓶收貯黃

蠟封口貯久更妙無論受傷輕重先以七釐冲

燒酒服之量傷之大小復用燒酒調敷若食喉

割斷不須雞皮包紮急用此藥乾糝立時血止

痛定視鐵扇為更捷但不可多服孕婦忌之

內服整骨麻藥開取箭頭彈子不知疼痛

胡麻子 麻黃 薑黃 川烏 草烏 各等

鬧楊花用倍

共研細末每服五分解法用甘草煎湯服一盃

外敷麻藥

川烏尖 草烏尖 生南星 生半夏

華菱各五錢 蟾酥四錢 胡椒 細辛各一兩

共研細末燒酒調敷

玉真散 治刀傷入風癩腫疼痛及破傷風

體發寒熱

南星一兩 防風一兩

各研細末敷瘡口再以香油潤之如瘡口似角

弓反張者用藥末二錢老酒入童便少許灌服

立效不愈再服有驗

去腐散

黃丹淨一兩 微炒水飛 天一石煨一兩 紅兩

取置地上出火毒共研細末入磁罐收貯敷此

藥者待腐肉化為黃水去盡視肉肌淡紅色方

換蓋蝸斂口生肌散務戒七情慎之

蓋蝸斂口生肌散

真花乳石 一兩 真乳香 真沒藥 各一兩

先將花乳石用炭火煨紅火筋取出在二味藥

末內蘸令起烟再煨再蘸以藥末盡為度復置

地上去火毒待用口不合者用此須看瘡口加

減推牛觸馬踢傷不用

花乳石散 治金瘡血出不止

花乳石 五錢 童便 南星 草烏 白芷 煨龍骨

羌活 檀香 紫蘇 輕粉 乳香 沒藥

細辛 當歸 蘇木 降香 蛇含石 錢童便 煨

次 麝香 三分 共研細末 磁瓶收貯

止血定痛生肌散

乳香 沒藥 龍骨 各三錢 血竭 二錢 黃丹 飛淨 水

白芷 五錢 熟石膏 一兩 共研細末 合勻 糝于患處

太乙膏 凡皮肉破用前藥糝再以此膏收

生麻油四兩 當歸 生地黄 生甘草各一

黃丹飛過白蠟 黃蠟各八 乳香 沒藥各三

先以當歸生甘草切片入滾油內煎汁去渣濾

極淨再入淨鍋熬至滴水不散再以黃丹炒過

和入再用緩火熬至滴水成珠取起加入黃白

蠟又用微火再熬取起少定入乳香沒藥攪勻

用磁罐收貯退火氣用此神方也

花乳石

此石出陝州閩鄉縣體至堅重色如硫黃合硫黃

同煨研末敷金瘡其效如神倘倉卒不及煨合但

取細末敷之亦效

敷方定痛膏

芙蓉葉時用 楓葉 天南星 白芷 紫荊皮

獨活各五 共為細末用蔥汁老酒調炒熱敷如

有馬齒莧菜加一兩搗和更妙

敷方定痛散 凡皮肉未破此方敷止痛消

腫 共藥十味研末用老蔥搗爛和藥調敷

當歸 川芎 白芍 官桂 升麻 防風 錢各一

紅花 紫丁香 根錢各五 山奈 三錢 麝香 三分

共藥十味研末用老蔥搗爛和藥調敷

八僊逍遙湯 凡皮肉未破腫硬疼痛此方

洗之

防風 荆芥 川芎 甘草 錢各一 蒼朮 丹皮

川椒 錢各二 當歸 黃柏 錢各二 苦參 五錢 水煎薰洗

內治補損接骨仙方 凡肉破骨碎筋斷者

通用此方

當歸 川芎 白芍 熟地 防風 骨碎補

五靈脂 廣木香 地骨皮 錢各五 爪兒血竭

乳香 沒藥 錢各一

共藥十二味用夜合花樹根皮五錢同藥入壺

內用水煮加燒酒隨便多少同煮一炷香取汁

溫服效

外治補損接骨仙方

胡椒 黃蜡錢各三

用一嫩公雞去毛腹中之物勿去將椒蜡研碎入雞腹內連雞生搗爛敷患處越一晝夜如癢甚去之立愈

折傷筋骨疼痛不止

用雄鷄一隻刺血入酒內和飲一二碗其痛立止

或鼠糞燒灰研末敷立效

筋骨已斷

龍眼核剝去黑皮搗為細末篩過敷之即愈

骨節脫離

生蟹搗爛熱酒冲服連飲數杯渣敷患處愈

腕折骨損

大麻根葉搗汁飲一升無鮮麻即煮乾麻汁服之

腕折四肢骨碎及筋絡蹉跌

生地黄不限多少熟搗敷所損處或搗爛以裹傷處以竹編夾裏令遍縛緊勿任轉動一日可十易三日瘡若血聚在折處以刀破去血用黑豉三升水三升漬取汁服之

頭破腦出中風口噤

大黑豆一升熬去腥勿使太熟搗末熟蒸之氣徧合甑下以酒一斗淋之溫服一升覆被取汗敷杏仁膏于瘡上

敷傷無癥

皮肉初破時以熱馬屎敷之無癥

金瘡血出不止

桑根煮十沸服一升即止或飲人尿三升

又方

柳絮封之或以蜘蛛膜貼之或搗車前草汁敷之連根搗用立效

又方

霜桑葉用陰陽瓦二片合桑葉在內燒灰存性研末糝三日愈此灰藏久更驗

金瘡內漏

取瘡中血和水服一盞卽愈

金瘡痛不可忍百治不愈者

蔥一把水三升煮數沸洗瘡止痛 又楊柳木白皮去外皮焙燥研末敷口服方寸三次 打破肢體血出不止

生半夏研末糝患處血止青腫者敷之亦消

急救跌打損傷

凡跌打已死之人只要身

體綿軟皆可救活切忌多人嘈雜喧鬧以致驚魂不伏急要親人扶坐地上先灣曲兩手足徐徐移靠懷中抱緊用腿膝抵住糞門勿令洩氣急取童便乘熱灌之如急促不得則不拘人馬溺亦可俱去頭尾但取中間灌下三碗隨卽用藥

當歸三錢 川芎二錢 熟地黃七錢 桃仁去皮尖

白芍一錢 紅花一兩 南山楂一兩 生大黃一兩

童便盃一 大夏月加黃連五分

同水煎乘熱灌下若不能吞用竹管吹入待胸中藥行有聲更要抵住糞門恐洩氣遂致不救越一炊許時方可聽其大便便多痰紫便後方可睡下如痰紫未盡再服前藥視其大便如平時方可用補藥調理

跌打損傷藥酒方 一切刀斧重傷立刻畢

命者止用一服即可回生如骨已斷者用夾板夾之再服此藥今日服之明日即接成矣服藥後聽有響聲則不必用夾板矣

上好白沙蜜半觔 濾淨再取黃琪虫條二百 入蜜罐

內其虫食飽而死九蒸九曬以陰陽瓦焙乾為末仍入原罐內攪勻油紙封固埋土內四十九日取出存用每服三大匙用好陳酒調勻送下以醉為

度綿被覆睡出臭汗而愈

又方

爛席草或舊蒲扇燒灰酒冲加童便服

跌打損傷敷方

生半夏 松香 各一 爲末水調敷

又方

五倍子炒一兩 研切 枳陳醋八兩 熬成膏敷患處 腫消痛止 接續神效

又方

梔子 斫數 楸加飛羅麵少許 陳醋調敷 患處如骨折者 再用萬莖子炒香爲末 每服二錢 黃酒下

又方

大米煮爛飯乘熱包傷處即愈 又熟麻油與酒煎服

跌打吐血不止

乾荷葉爲末 每服一茶匙 黃酒調連服數次即止

墜馬血瘀胸腹

用藕節為末每服一茶匙黃酒調一日二服愈瘀血衝心欲絕者用豆豉濃煎服若取葯不及急以熱小便灌之

墜落損傷欲死

淨土五升蒸之合溜分半以故布數重裹之以熨所傷處勿令太熱恐破皮肉冷則易之痛止則已凡有損傷以此法治之神效已死不能言者亦活

三年者亦瘥

墜落車馬及車輾木打已死者

以死人安著以手補掩其口鼻眼上一食頃即活眼開與熱小便二升或大豆五升以水一斗煮取二升去豆一服令盡

損傷吐血

白芨研末米飲調服

閃拗手足

生薑 蔥白同搗爛和麵燒熱敷

各種跌磕傷

乾黃牛糞炒熱封裏之或用松節煎酒服或蘇葉搗爛敷之或薑汁和酒調白麵貼之

面目撲打青紫

半夏磨汁塗之如舊

磕撞青腫

極大老黃茄切片一指厚新瓦焙乾研末臥時溫

酒調服二錢七分消盡青腫無跡或猪肝切片炙貼或生梔子同白麵搗勻敷之

火傷

一團粉即菜焙紅黃色放冷處一夜去火氣燈草藏在磁罐內火點著即蓋不可燒成灰各等分爲末將燈窩油調塗患處如火氣入內食生黃豆汁或蘿蔔汁即解火毒

湯火傷 凡被湯火切勿以冷水激之其熱

氣過冷則入愈深火毒攻心愈速宜急糝以鹽然後敷葯

用蜂殼燒灰存性為末入冰麝少許從四面掃之漸入於中此急救之方 又用鷄蛋五枚煮熟取黃久炒有油出將夜明砂 黃丹 水粉 鎔 和入同炒退火氣貼敷傷處如乾再換數次肉白即愈 又梔子末和雞蛋清調敷或生蘿蔔搗塗之或蘿蔔子或生大黃末或生芝麻末或麻油或桐

油俱可調敷

火傷

初被火燒急更向火炙雖大痛強忍之一食久即不痛

又方

梔子仁研末麻油和熬塗厚為佳已成瘡者燒白糖灰粉之即燥立瘥

火傷成瘡而腫痛或中風寒或中水

黍穰或牛馬屎或生桑條燒取多煙燻之汗出愈
如無生桑條取得多煙之物燒熏汗出愈

又方

取蒲公英草根莖內白汁塗之多塗爲效此草蜀
中名耳廩菜關中名苟苟

解毒蠟礬丸

辟一切毒氣暑氣卽與患楊

梅結毒人共浴同眠不致沾染凡中諸毒

得自酒中難治酒性行諸血脈頃刻遍身

故難治也因食得者易治食入胃胃能容

毒或逐大腸泄出毒氣不流于血脈故易

愈也凡解毒諸藥宜冷服不可熱飲

白礬二錢

雄黃五分

黃蠟一錢五分

先將黃蠟燉開再取白礬雄黃研末入蠟攪勻
爲小丸瓶貯隨身每吞三九

食自死六畜肉中毒

小豆一升燒研末服三方寸或服灶底黃土方寸

或黃柏末一茶匙入肉食之

食百獸肝中毒

猪脂一觔燉服

食野菜馬肝肉諸脯肉毒

取頭垢如棗核大吞之可起死人

茅屋漏水沾脯上有毒

韭菜搗汁服之

中猪肉並六畜肉毒

東壁上陳土一錢水調服 燒白扁豆末 黃柏

末 生韭菜汁並解 狗肉毒用杏仁三兩和皮

研熱湯溫服三盞吐出 牛肉毒用猪牙燒灰水

調服又猪脂溫湯服又甘草濃煎和人乳服又飲

井水亦解 馬肉毒用蘆根搗汁服作湯浴亦解

又甘草濃煎或酒煎取吐或下亦解 鴨肉毒用

糯米泔溫服一鍾愈 鷄肉毒用醇醋飲數鍾愈

中諸毒生漆惹人成毒

生椒葉煎湯洗 鷄蛋黃塗 白松菜亦解

誤食桐油飲熱酒解 瘴氣毒用犀角羚羊角雄

黃麝香並解

邪氣入腹腫脹

升麻射干犀角共為細末水調服 飛絲毒噍蘇

葉愈

解酒食毒

大黑豆一升煮汁二升服吐即愈 生螺螄肉

茄葛花並解 酒食之後覺中心煩悶者是中毒

無疑苦參煮汁服吐即止

解果菜毒

甘草 貝母 各等分為末水調服 童便亦解

瓜毒瓜皮湯鹽湯 柑毒柑皮湯鹽湯

解蟹毒

紫蘇 濃煎服一二盞又生藕汁蒜汁煮乾薑俱

可

中禽魚河豚毒

梅花腦子末水調灌 五倍子 白礬各等分為

末水調下 藍青汁 青黛水調服 煑橘皮候

極冷 馬鞭草汁 煑大黃汁 煑黑豆汁

生蘆根汁 煑朴硝並解 食鴿鳥毒生扁豆末

溫水下 葛粉水調

解野菌毒

桑椹煎汁服 生梨或梨葉漿三盞 地漿一二

盞令搗地澄清飲之水沃地漿之加冬草煎服 中菌

毒卒死者防風一兩剉碎水煎候冷灌之或白水

濃煎石首魚頭灌之皆愈

