

大德重校聖濟總錄卷第七

十四

泄痢門

水瀉

滯寫

殄泄

洞泄寒中

鶩溇



泄痢統論

論曰脾與胃合俱象土外榮肌肉腐熟水穀風寒暑濕
 襲於外則留連肌腠傳於脾胃食飲不節害於內則腸
 胃乃傷不化糟粕皆能為病所得之源不一故立名多
 端且久風入中則為飧泄濕勝則為濡瀉寒中則為洞
 泄暑勝則為毒痢而又或冷或熱或赤或白或色雜或
 腸垢或滯下或休息或疴或蠱之類種種不同悉由將
 攝失宜飲食不慎致腸胃不調邪氣交攻施治之方則
 有宜調補宜攻化宜收斂宜滲泄各隨所宜以用之

水瀉

論曰內經謂諸厥固泄皆屬於下暴注下迫皆屬於熱
 蓋為冷熱不調氣不相濟也脾胃怯弱水穀不分濕飲
 留滯水走腸間禁固不能故令人腹脹下利有如注水
 之狀謂之注泄世名水瀉如蠱之注射射不同悉由脾
 治水瀉不止木香散方
 青木香中用 黃連去須炒 訶梨勒皮微炒
 龍骨兩半 厚朴去蠹皮生薑汁 一姑立
 右五味搗羅為散每服三錢七空心以粥飲調下日
 午再服以差為度小兒以意加減服之
 治一切水瀉及冷痢厚朴散方

甘厚朴去蠹皮生薑汁 乾薑半生半炮
 陳橘皮湯浸去白 白米壹兩
 甘草半生半兩 豆豉將麻人醬藥同煎 米
 右五味搗羅為散每服三錢七空心米飲調下如霍
 亂吐瀉新汲水調下日晚再服
 治水瀉腸鳴臍腹撮痛代赭丸方

代赭煅 乾薑炮 龍骨略
 附子炮裂去皮 右四味搗羅為末研饒飯和丸如梧桐子大每服三
 十丸空心米飲下日午再服

治水瀉無度腸鳴腹痛肉豆蔻散方

肉豆蔻去殼為末生薑汁白麵貳大粳米三

右三味將薑汁和麩作餅子裹豆蔻末煨令黃熟研

為細散每服二錢七空心米飲調下日午再服

治水瀉不止礪砂洗方外散

礪砂研石硫黃研鉛丹研

右巴豆去皮心出油三錢空心米煨不破雷

右四味先將巴豆霜研細入諸藥同研細用糯米飯

為丸如小豆大水瀉新汲水下一丸赤白痢煎乾薑

甘草湯放冷下一丸吐瀉煎生薑木瓜湯放冷下一

丸白痢煎乾薑湯放冷下一丸不拘時候

治暴注水瀉日夜無度跣門散方米甘草蘇蘇蘇蘇蘇

橡子刺梨勒核黃連須酸味

右三味等分搗羅為散每服一錢匕米飲調下食前

治水瀉不止木香丸方木

木香生草烏頭生肉豆蔻生者去煨

胡椒研巴豆大者柴核去皮

右五味搗羅為細末合研勻糯米軟飯和丸如黍米

大每服三丸小兒一丸並用冷茱萸湯下

治水瀉不止黑神丸方

杏仁入尖去

巴豆黃衣去皮心
膜不出油

杏仁染衣去雙
人皮尖炒

錯墨錢

右三味同研極細以糯米粥和丸如秫米大每服一

丸冷水下立止甚者再服一丸

治水瀉不止立效丸方

遠志半斤 附子 豆豉 去心

鉛丹炒手香式車烏頭壹枚炮裂
去膜皮

巴豆參粒去皮心
膜出油盡研

右三味先搗烏頭為末與三味同研極勻以麵糊和

丸如菉豆大每服一丸煎陳粟米甘草為梅湯放溫

冷下

治水瀉杏仁丸方白朮 黃連 甘草 芍藥 枳實 茯苓 澤瀉 木香 丁香 芩實 甘草 粳米

杏仁湯浸去雙尖
皮尖尖粒砒霜末大以代

錯墨錢巴豆霜各壹

右四味同研葷肉和丸如粟米大臨卧新汲水下

丸錢治水瀉白痢小腹痛疼玉霜丸方豆末 一半 再得 一百

砒霜研細如
粉煎兩黃蠟壹斤 入 水 煮 令 乾

右二味以瓷碗盛重湯煮鎔開以東南柳枝二七莖

各長七寸纏細如筋每用兩莖攪藥又轉一頭攪候

兩頭并黑黃色乃已又取兩莖依前攪七次了將出

藥趁輒作條子收遇病旋於火土烘輒丸如梧桐子
大小兒菉豆大空心新汲水下一丸又轉一重煎熟
治水瀉腸鳴鉞頭丸方養滋開以東南時妹一十莖

巴豆壹枚去皮膜 杏仁壹枚去皮尖二味皆

右二味同細研約三百轉入大豆末一字再研一百
轉麵糊和丸如鉞頭大每服一丸新汲水下

治水瀉並亦白痢如聖丸方米大調恒液芫木下

烏頭端正大者炮 薑豆

右二味等分搗羅為末新水和丸加菉豆大以丹砂
為衣每服五丸白痢煎乾薑湯下赤痢煎甘草湯下

赤白痢煎乾薑甘草湯下水瀉用新汲水下小兒一
兩丸不計時候

治水瀉方西 薑末 陳皮末 蘇合末 蘇合末 蘇合末

右用胷州乾薑十枚去核入莢荇子填滿以麻繩却
用炭火燒令烟盡研令細每服一錢半匕煎陳粟米
稀粥飲調下

治水瀉滑腸氣虛久冷如聖丸方天 蘇合末 蘇合末

乾薑 高良薑 胡椒

蜀椒去目并閉 蘇合末 蘇合末

右四味等分搗羅為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大

每服三十九早辰空心食前粥飲下
治水瀉不止傷冷虛極黃蠟丸方

硫黃壹兩

右一味研細先鎔黃蠟入硫黃末打勻丸如梧桐子
大每服五丸新汲水下

治水瀉訶梨勒丸方

右取訶梨勒不拘多少以麩裹灰火內炮令赤黃剝
去麩取訶梨勒皮搗羅為末軟飯和丸如梧桐子大
每服二十九米飲下空腹食前

治暴水瀉不止厚朴散方

厚朴

去薑皮生薑汁炙

訶梨勒皮

各壹兩

甘草炙

黃連

去須微炒

肉豆蔻

去殼

白朮

剉

乾薑炮

赤茯苓

去黑皮各參分

石八味搗羅為散每服二錢匕溫米飲調下

治脾胃虛冷腸滑水瀉如休息痢不止木香丸方

木香

剉米泔下

白朮煨

肉豆蔻人

丁香

各半兩

乾薑炮

煨

訶梨勒

煨取

龍骨各壹兩

黃連去須

參

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心

米飲下三十九日晚再服

治水瀉蕪荑丸方

蕪荑炒

黃連去須炒

吳茱萸湯洗焙乾炒各參兩

乾薑炮壹兩

枳殼去瓤炒半兩

縮沙蜜貳兩

右六味搗羅為末煮漿水飯和丸如梧桐子大每服

二十九溫米飲下

治水瀉腸滑不禁訶梨勒丸方

訶梨勒取兩以麩裏煨去核取皮并麩為末

乾薑炮

龍骨

赤石脂各壹兩

右四味搗羅為末以稀麩糊丸如梧桐子大每服空

心以米飲下二十九

治水瀉吐噦徧身疼痛訶梨勒丸方

訶梨勒煨去核

鹿茸酥炙去毛

桑根白皮剉

地榆

赤石脂

天雄炮裂去皮臍

龍骨各壹兩半

白芷

黃連去須

桂去麩皮

厚朴去麩皮薑汁炙

白茅根

當歸切焙各壹兩

黃芩去黑心

乾薑炮裂各半兩

肉豆蔻去殼肆枚

右一十六味搗羅為末爛飯為丸如梧桐子大每服

三十九溫米飲下

治水瀉腹痛日夜不止正氣散方

縮沙蜜

去皮

附子

炮裂去皮臍

赤石脂

肉豆蔻

去殼

龍骨

石榴皮

焙

甘草

炙

人參

地榆

白朮

吳茱萸

湯浸焙乾炒

乾薑

炮

右一十二味搗羅為散每服三錢匕煮粳米飲調下

不拘時以止為度

治水瀉米穀不化晝夜不止白聖丸方

白聖

壹兩火煨過

乾薑

炮

楮葉

貳兩生細研

右三味搗研為末麩糊和丸如菉豆大空心米飲下

二十九

又方

取黃荆葉不限多少陰乾搗羅為散每服以米飲調

下三錢匕

又方

取羊蹄根曬乾刮去皮搗羅為散每服以米飲調下

三錢匕

又方

取熟艾半斤慢火炒令熱布裹坐之冷再炒坐

濡寫

論曰內經曰濕勝則濡寫甲乙經曰寒客下焦傳為濡

寫夫脾為五藏之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣內客於脾則不能坤助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡瀉

治腸胃受濕濡瀉不止肉豆蔻散方

肉豆蔻去殼

黃連去須

訶梨勒炮去核

甘草炙

白朮

乾薑炮

赤茯苓

去黑皮厚朴去鹽皮生薑

右八味搗羅為散每服二錢匕空心食前米飲調下

日三

治脾胃傷濕濡瀉不止豆蔻散方

肉豆蔻

去殼炮甘草炙

厚朴去鹽皮生薑

右三味搗羅為散每服二錢匕米飲或湯調下食前

溫服

治腸胃寒濕濡瀉腹內疝刺疼痛當歸散方

當歸切

木香

乾薑

肉豆蔻

去殼炮訶梨勒炮

黃連去須

右六味搗羅為散先用水四盞入甘草生薑各一分

黑豆一合並半生半炒同煎至二盞去滓分作三服

每服用調散三錢匕空心日午服

治濡瀉水痢久不止桂附丸方

桂皮

附子炮裂去皮

乾薑炮

赤石脂各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸

空心食前米飲下日三本國諸人皆主黃芩一合

治腸胃寒濕濡寫無度嗜臥不食豬苓丸方

豬苓

去黑皮半兩

肉豆蔻

去殼炮貳枚

黃蘗去蘆壹分

右三味搗羅為末米飲和丸如菉豆大每服十九食

前熟水下

治寒濕傷脾濡寫訶梨勒散方

訶梨勒

炮去核

吳茱萸湯浸

木香

去粗皮

試

蕪荑

各壹兩

黃連

去須炒

貳分

右五味搗羅為細散每服二錢匕空腹陳米飲調服

自再和健成豆黃蘗五錢木香壹分煎至一盞

治腸胃受濕濡寫無度腹痛飲食不化白豆蔻湯方

白豆蔻

去皮

訶梨勒

炮去核

陳橘皮

湯浸去白焙炒

乾薑

炮各半兩

厚朴

去蘆皮生薑汁炙參分

右五味搗篩每服五錢匕切菹白三寸水一盞半

煎至七分去滓空心溫服日再

治濡寫暴下不止枳殼湯方

枳殼

去瓤炒參分

黃連

去須炒

厚朴

去蘆皮生薑汁炙各壹兩

甘草炙

阿膠炙 煉各半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕木一盞半煎至一盞去

滓空心溫服日再

治腸胃寒濕濡寫不止及冷痢色白食不消化附子湯

方

附子炮裂去皮臍

甘草炙

阿膠炙 煉各半兩

黃連去須炒 壹兩

右四味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至一盞

去滓空心溫服日再

治脾胃受濕濡寫不止建脾白朮丸方

白朮

乾薑炮各參分

厚朴去麤皮生薑汁炙壹兩

人參參

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸

空心米飲下日再

治寒濕濡寫久不差附子丸方

附子炮裂去皮臍壹兩

甘草炙 兩

右二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸

空心生薑湯下日再

治傷濕濡寫不定厚朴湯方

厚朴

去麤皮生薑汁炙壹兩半

黃連

去須炒 壹兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半大聚二枚擘
破煎至一盞去滓空心溫服日再如腹痛加當歸三

分

治濡瀉不止或冷痢無度附子丸方

附子炮裂去

高良薑各壹兩

甘草炙剉壹分

右三味搗羅爲末陳米煮糊丸如梧桐子大每服二
十九米飲下不拘時服

治濡瀉裏急後重數走圍枵根散方

枵根皮剉壹兩

枳殼去瓢麩炒半兩

甘草炙剉壹分

右三味搗羅爲散每服二錢匕粥飲調下食前一服

止

治胃虛泄瀉老人冷瀉建脾湯方

烏頭炮裂去皮厚朴去蘊生

甘草炙剉壹分乾薑炮各壹分

右四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑二片煎

至七分去滓熱服併二服止

治人患脾泄瀉薑連散方

薑連各壹兩

黃連去須又曰入風名銀斯夫

右二味咬咀如麻豆一處慢火炒令薑赤色去薑取
黃連爲細散每服二錢匕空腹臘茶清調下不過二

服差

殄泄

論曰內經曰清氣在下則生殄泄又曰久風為殄泄夫脾胃土也其氣沖和以化為事今清濁交錯風邪之氣得以干胃故沖氣不能化而食物完出夕食謂之殄以食之難化者尤在於夕故食不化而泄出則謂之殄泄此俗所謂水穀痢也

和風冷入中殄泄不止脉虛而細日夜數行口乾腹痛

白朮湯方

白朮

厚朴去麤皮生薑汁炙當歸切焙

龍骨各壹兩

熟艾炒半兩

右五味麤搗篩每服四錢匕水一盞入生薑兩片同煎至七分去滓空心日晚溫服

治腸胃受風殄泄無度或下黃水腹脇痛悶地榆湯方

地榆

厚朴去麤皮生薑汁炙當歸切焙各

艾葉炒

吳茱萸湯浸焙乾炒高良薑各半兩

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去滓空心日午溫服

治腸胃風冷殄泄注下腹痛不止乾薑丸方

乾薑炮

厚朴去麤皮生薑汁炙當歸切焙各

阿膠炙

龍骨各壹兩

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九空心棗湯下日午再服

治殮泄米穀完出茯苓湯方

茯苓去黑皮

厚朴去麤皮

黃連去須炒

乾薑炮半兩

右四味麤搗篩每服四錢匕以水一盞半煎至八分去滓空心日午溫服

治殮泄水穀不化及諸色痢茱萸湯方

吳茱萸湯浸焙

黃連去須炒

右二味麤搗篩每服四錢匕以水一盞半煎至八分

去滓空心溫服未止再服

治殮泄色白食不消化乾薑丸方

乾薑炮

黃連去須炒

右二味搗羅為末先以酒一升微火煎候可丸即丸如梧桐子大空心米飲下三十九日午再服

治殮泄氣痢腹脹滿不下食華撥散方

華撥兩

肉豆蔻去殼半生

乾薑炮半兩

訶梨勒半生半炮

白朮參

甘草半生半炙

木香半生半炙

右七味搗羅為散每服二錢匕空心米飲調下日晚再服

治脾胃氣虛飧泄不止飲食不消雷鳴腹內疔痛桂心

丸方

桂去麩

赤茯苓去黑皮

赤石脂各五分

黃連去須

麥蘖炒

陳麴炒

石斛去根

乾薑炮

當歸切

人參

附子炮裂去皮臍

蜀椒去目并閉口炒出汗

龍骨各半

右二十三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三

十九空心煖酒下日午再服米飲亦得了剉米泔

治泄痢無問老少地榆湯方用地榆洗藥散入內飲

地榆剉

蒼草去白

酸石榴皮各半

阿膠半斤

厚朴去粗皮生薑汁炙令乾

白石脂研赤芍藥洗金龍骨洗

右八味搗篩每服五錢匕水一盞半前至一盞去

滓空心日午溫服其水一盞半至入公

治腸胃受風久為飧泄下痢嘔逆腹內疔痛高良薑湯

方

高良薑洗

木香去

赤茯苓去黑皮

高良薑

木香

赤茯苓

檳榔

人參各參

肉豆蔻殼

吳茱萸湯浸炒

陳橘皮湯浸去

霜沙蜜去皮各

乾薑炮

右一十味搗羅每服四錢匕水一盞半煎至八分

去滓不拘時日三服正鹽水一盞半煎至一盞去

治發泄水穀不分溫脾止腹痛進食豆蔻散方

厚豆蔻皮

乾薑湯浸去

甘草

高良薑

陳橘皮湯浸去

白

右五味等分到礬都作一處用胡餅劑裏煨灰內炮令黃熟取出藥去麩鳩羅為散每服二錢匕陳米飲

調下食前服

治泄痢無度訶梨勒散方

訶梨勒

母丁香各伍枚

肉豆蔻殼

甘草炙

右四味搗羅為散米飲調下半錢匕食前服

治腸胃冷氣發泄不止木香散方

木香

阿膠炒

訶梨勒殼

黃連去須炒

乾薑炮

吳茱萸湯浸炒

龍骨各壹分

石七味搗羅為散每服三錢匕空心米飲調下日晚

再服

治脾胃氣虛腹脹飧泄困劣服煖藥即嘔逆食飲不下
薑米散方

陳米量升用生薑貳斤取汁浸米焙搗篩為末炒令黃肉豆蔻參枝

草豆蔻拾枚煨陳橘皮去白甘草炙

燒鹽各壹兩研

右六味搗研為散每服二錢匕沸湯點服不拘時候

洞泄寒中

論曰內經謂長夏善病洞泄寒中洞泄謂食已即泄乃
飧泄之甚者此因春傷於風邪氣留連至夏發為飧泄

至長夏發為洞泄蓋當春之時陽氣在表為風邪所中
入客于經未至府藏風者陽氣也東方木也木能勝土
脾胃受之仲夏則陽盛之時以陽邪之氣逢陽盛之時
重傷必陰病在脾胃故為飧泄陰生於午至未而盛是
為長夏之時脾土當王脾為陰中之至陰則陰氣盛陰
盛生內寒故令人府藏內洞而泄是為洞泄寒中之病
治洞泄寒中注下水穀或痢赤白食入即出食物不消
附子丸方

附子炮裂去皮臍日烏梅肉炒乾各壹兩半

黃連去須炒木香剉碎大黃剉碎干姜剉碎

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五

丸空心米飲下日晚再服

治洞泄冷痢熟艾湯方

熟艾炒 附子炮裂去 甘草炙

乾薑炮 赤石脂各半 黃連去須中

阿膠炙 附子炮裂去 甘草炙

重右七味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分

即去滓空心食前溫服之

治洞泄不拘冷熱注下不止如神散方

附子炮裂去 白朮推碎用漿水煮

乾薑炮 甘草炙

右四味搗羅為散每服一錢匕空心溫米飲調下如

熱瀉新水調下

治寒中洞泄不止及年高久瀉建脾湯方

烏頭炮裂去 厚朴去 甘草炙

乾薑炮

右四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片煎

至七分去滓連併熟服

治大腸積冷洞泄不止天仙子丸方

天仙子 乾薑炮 陳橘皮湯浸去

訶梨勒皮

各壹兩

剉碎

白紙去

右四味先為麤末用醋拌勻一宿炒令黃色再為細末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十九食前米飲下丸送服

治洞泄不止兼治霍亂附子湯方

附子

壹枚重柒錢者

甘草

右中味細到分二服每服以水一盞鹽半錢匕煎至六分去滓溫服

治洞泄寒中注下不禁不思飲食紅豆散方

紅豆

揀

附子

大者炮裂去皮臍

乾薑

炮

硫黃

細研各壹兩

右四味搗研為散和勻每服一錢匕空心溫粥飲調下再服當愈

治洞泄不止豆蔻湯方

肉豆蔻

柒錢

烏頭

白木

右三味用油四兩先煎後二味候白木黃色烏頭外

裂裏黃取出烏頭去皮臍入肉豆蔻三味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓空心食前稍熱

服

治脾胃虛寒洞泄不止四肢逆冷心腹疔痛溫中丸方

肉豆蔻人去殼 硫黃研 乾薑生

附子炮裂去皮臍 龍骨各二兩

右五味為細末用麩糊和丸如梧桐子大每服三十丸食前艾湯下

治脾胃虛寒洞泄注下腹脹腸鳴肉豆蔻丸方

肉豆蔻去殼 木香分 蠟梢炒

陳橘皮去白 附子炮裂去皮臍 乾薑

胡椒各半

右七味搗羅為末麩粥和丸如豌豆大每服十五丸食前米飲下

治脾胃虛冷洞泄不止厚朴乾薑丸方

厚朴去蘊皮生薑汁炙 乾薑炮

附子炮裂去皮臍 白木各 訶梨勒皮參

右五味為細末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服二十丸至二十九空心食前熟米飲下日三

治脾胃久寒大腸虛滑洞泄豆蔻附子散方

肉豆蔻人 附子炮裂去皮臍 縮沙去皮各

木香分

右四味搗羅為細散每服一錢匕食前米飲調下

治脾冷洞泄丁香散方

丁香 貳

厚朴 去麤皮生薑汁炙半兩

肉豆蔻 去麤皮生薑汁炙半兩

檳榔 壹枚 剉

右四味為細散每服二錢匕熱粥飲調下

治脾胃氣寒大腸虛滑日夜不止火輪散方

附子 貳枚

炮裂去皮

肉豆蔻 去麤皮生薑汁炙半兩

炮裂

乾薑 壹分

右三味為細散每服二錢匕陳粟米飲調下

治脾胃虛寒洞泄不止橘皮散方

陳橘皮 貳斤

去白

白朮 貳斤 剉

訶梨勒皮 壹斤

乾薑 壹斤

炮裂

枳殼 壹斤 剉

桂皮 壹斤

木香 炮

人參

甘草 貳斤

炙到各壹兩

草豆蔻 伍枚

煨去皮

檳榔 柒枚 剉

半夏 壹斤

湯洗柒遍生薑汁製參分

厚朴 壹斤

去麤皮生薑汁炙兩半

右一十三味為細散每服二錢匕煎生薑棗湯調下

治脾寒洞泄黃連飲方

黃連 壹斤

去須炒

訶梨勒 壹斤 剉

地榆

芍藥 壹斤

炒各兩

木香

當歸 壹斤

切焙各參分

甘草 貳斤

炙

右七味細剉每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓

溫服日三

治洞泄寒中二黃丸方

黃連去須炒

黃蘗去蘗皮炙

附子炮裂去皮刺

烏梅肉炒

乾薑炮各半兩

甘草炙分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸空心米飲下

治藏府冷極或久冷傷億洞泄下痢穀米不化飲食無

味肌肉瘦瘁心多嗔恚及婦人產後虛冷下痢一切水

瀉冷痢木香散方

木香

補骨脂各壹兩

高良薑

縮砂人

厚朴去麤皮生薑汁炙各參分

陳橘皮去白焙

桂去麤皮

白朮各半兩

胡椒

吳茱萸湯洗參伍分

赤芍藥兩

肉豆蔻肆枚去殼

檳榔剉壹兩

右一十三味搗羅為散每服三錢匕用不經水豬肝

四兩去筋膜批為薄片重重糝藥置一鼎中入漿水

一椀醋半合蓋覆煮肝熟入鹽一錢葱白三莖細切

生薑彈子許拍破同煮水欲盡空心為一服冷食之

初服微瀉不妨此是逐下冷氣少時自止渴即飲粥

湯

治洞泄大腸切痛腸鳴食不化木香訶梨勒丸方

木香半生半炒

訶梨勒參去核

白木壹兩

式式

桂去麩

蕪荑炒各壹兩半

附子炮裂去皮

厚朴去麩皮生薑汁炙

高良薑炒

肉豆蔻去麩各壹兩

甘草炙

乾薑炮

右十一味搗羅為末用陳麴末煮糊為丸如梧桐

子大每服三十九煨生薑鹽湯下置一器中入藥水

治因傷水飲後變成暴泄白芷黃連湯方不詳

白芷壹兩

黃連去須

地榆壹兩

當歸剉焙

附子炮裂去麩

木香壹兩

赤石脂壹兩

黃芩去黑心

芍藥壹兩

訶梨勒皮煨壹兩

肉豆蔻壹枚煨

白木壹兩

桂壹兩

右一十三味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎生

薑五片煎至八分去滓空心溫服日三半兩

治大腸洞泄水穀入即注下烏梅丸方可散

烏梅肉炒

附子炮裂去皮

乾薑炮

黃連伍兩

肉豆蔻伍枚

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸米飲下

治洞泄水穀注下黃連阿膠湯方

黃連壹兩

黃連去黃阿膠去馬梅肉各

山梔子人參拾黃蘗去鹿皮剉

右五味廬搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去

滓溫服空心食前日二

治五泄痢訶梨勒丸方

訶梨勒並生半張肉豆蔻去

木香各乾薑炮心溫甘草炙各兩

右五味搗羅爲末煮醋糊和丸如梧椰子大每服二

十九至三十九米飲下

治洞泄寒中水穀不化黃連當歸湯方

黃連去當歸切甘草炙

酸石榴皮剉炒兩

右四味廬搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服空心食前

驚瀉

論曰脾氣衰則驚瀉蓋陰中之至陰脾也爲倉廩之官

若脾胃氣虛弱爲風冷所乘則陰氣盛陰氣盛則絀寒

糟粕不化故大便色黑狀如驚瀉也又大腸有寒亦曰

驚瀉

治脾氣不足驚瀉青黑茱萸丸方

吳茱萸湯浸

乾薑炮

赤石脂

陳麴炒

當歸切焙各分

厚朴去麩皮生薑汁炙到香兩

右六味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十日空心食前米飲下日三

治大便秘狀如鴛溇龍骨散方

龍骨

黃連去須炒各壹兩

白礬熬令汁枯

阿膠炙

乾薑炮

白石脂研

當歸切

胡粉炒

赤石脂研

牡蠣煨各參分研

甘草炙

附子炮裂去皮臍各半兩

右一十二味搗研爲散每服三錢匕食前米飲調下

日再

治大便秘泄色如鴛溇龍骨黃連湯方

龍骨碎壹兩

黃連去須炒參分

當歸切

乾薑炮

甘草炙到各半兩

右五味搗篩每服五錢匕赤一盞半煎至八分去

滓食前溫服日再

治鴛溇所下瘀黑木香丸方

木香

烏頭生去麩

當歸切焙各分

馬梅肉炒乾

半兩

右四味搗羅爲末用粟米一合醋一升半慢火煎調

和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸食前米飲下

日三

治大便驚澹滑利不止附子散方

附子

炮裂去皮臍參分 乾薑

龍骨

各壹兩

右三味搗羅為散每服三錢匕食前煎烏梅湯調下

日再

治腸胃久寒大便秘澹草撥丸方

草撥

附子

炮裂去皮臍

乾薑

厚朴

去蘆皮生薑汁炙

肉豆蔻人

各壹兩

龍骨

訶梨勒皮

縮沙人

各半兩

右八味搗羅為末麩糊和丸如梧桐子大每服二十

丸食前米飲下日再

大德重校聖濟總錄卷第七十四

大德重校聖濟總錄卷第七十四

泄痢門

泄痢門

白滯痢

冷痢

熱痢

赤痢

鱗鱗

朱陳

白藤陳

合陳

世麻門

大瀉軍對聖神藥錄卷之十五

白滯痢

論曰白滯痢者冷痢之類蓋腸虛受冷留而不去與津

液相搏結滯如膿或如凝脂腹痛而下故為白滯痢

治曰滯痢及小便白人參湯方

人參

龍骨

雷歸切

乾薑炮

白茯苓

去黑皮各半兩甘草炙

厚朴

法鹽皮塗生薑汁炙

右七味廬掃篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓空心服日晚再服如小兒患量大小以意加減

治白滯痢及食不消化黃蘗丸方

黃蘗

黃藥去麤皮烏梅肉炒乾熟艾微炒

甘草炙別

右四味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服一十五丸空心米飲下日午再服

治白膿痢赤石脂散方

赤石脂研壹乾薑炮叁

右二味搗羅爲末每服兩錢匕空心米飲調下日晚再服

治白膿及諸痢當歸丸方

當歸切黃連去須炒烏梅肉炒乾

阿膠炙燥各半兩

右四味搗羅爲末鎔蠟和丸梧桐子大每服空心溫粥飲下二十九日午再服

治白滯痢及腹痛不止陳麴湯方

陳麴炒黃黃連去須厚朴去麤皮壹兩

附子炮裂去皮臍乾薑炮各半兩

右五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空心服日晚再服

治白滯痢心腹脹滿不下食豆蔻湯方

肉豆蔻去殼甘草炙別各半兩厚朴去麤皮壹兩

壹兩 乾薑炮半

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

空心溫服日午再服

治白帶痢及水痢日夜一二十行心下痛白朮湯方

白朮 參 甘草 炙 厚朴 去蘊皮塗生薑汁炙令紫

兩 乾薑 黃蘗 去蘊皮炙 龍骨 各半

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片同

煎至八分去滓空心溫服日晚再服

治冷白帶痢及腹痛附子湯方

附子 炮裂去皮臍 赤石脂 兩 乾薑 兩半

白芍藥 兩 甘草 炙 當歸 切

十龍骨 各兩 白朮 兩 人參 分

右一升味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓空心溫服日晚再服有膿加厚朴一兩去蘊

皮薑汁塗炙紫色若嘔加陳橘皮一兩湯浸去白焙

治白帶痢龍骨丸方

龍骨 壹兩 乾薑 兩 附子 炮裂去皮臍

右三味搗羅為末醋煮麩糊丸如梧桐子大食前米

飲下十五丸

飲下十五丸

治脾胃氣虛滑泄下痢白膿厚朴湯方

厚朴兩去皮塗薑汁炙令紫

乾薑兩

右五味麤搗篩每服三錢匕漿水一盞煎至六分去

淨溫服食前

治丈夫婦人久患白帶痢如魚腦阿魏丸方

阿魏別研壹分

桂去盡皮為末半兩

木香為末兩

安息香壹分

獨頭蒜貳顆煨熟去皮研爛

一盞半煎至八

右五味再同研極細溫酒和丸如梧桐子大每服三

十丸空心陳米飲下日午再服

治白帶痢腹藏撮痛豆蔻丸方

縮曰肉豆蔻麩裏煨熟為末

草豆蔻麩裏煨熟為末

縮沙人乳因罈

母丁香各壹兩

木香

沉香製

其人素有

弊墨號紅為末各半兩

地榆貳兩

枇杷葉去毛炙兩

右九味搗羅為末麩粟米飲和丸如櫻桃大每服三

丸米飲化下食前服林氏云各服兩

治白痢多膿腹中疝痛黃芩丸方

黃芩去黑心

黃連去心

黃蘗去皮

吳茱萸湯洗焙乾炒壹兩

訶梨勒皮炒貳兩半

右五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服四十

丸食前橘皮湯下日再煎薑州酒

陷藏寒下痢白膿心腹疼痛盡附散方

水乾薑

炮

附子炮裂 訶梨勒炮 礞石四

龍骨

各壹

同棗擘 枳實兩

右四味搗羅爲散每服三錢匕煎烏梅湯空心調下

治白滯痢久不差黃連湯方

大黃連

去頭

黃蘗厚 朴去 薑皮 生薑兩

右二味搗篩每服五錢匕水六盞余煎至三盞去

滓食前服

飲

木香

兩

胡椒

半

冷痢

各

木香

兩

胡椒

半

論曰下痢其色或青或白或黑者皆冷痢也此因腸胃

虛弱寒氣乘之故令人大便痢下青黑若其痢色白而食不消者寒中也當診其脉沉則生浮則死其人素有積寒卽成久冷痢有膿也

治冷痢肉豆蔻湯方

肉豆蔻

去

甘草

各

人參

兩

右二味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓空心日午溫服

黃薑

兩

治寒冷痢枳殼湯方

枳殼

炒

甘草

各

厚朴

去

薑皮 薑汁

水乾薑

炮

赤茯苓

各

厚朴

去

薑皮 薑汁

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服空心日午二服

單林黃芩兩半
法羅文薑水

治冷白帶痢腹痛牡蠣湯方

牡蠣煨參煨赤石脂煨

乾薑煨

當歸切龍骨煨木一白未煨參煨人參

附子炮裂去

甘草炙

人參

治冷芍藥各半

右一十味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓空心食前溫服日三服或下腹加厚朴去麤

皮以薑汁炙一兩或嘔逆加陳橘皮湯浸去白焙

兩兩各半

甘草炙

黃連炙

治冷痢不調水痢不止黃連散方

合合黃連去

無食子燒令煙

黃藥去麤

明醋石榴皮炒田龜薑炮

右五味搗羅為散每服三錢匕空心日午米飲調服

治冷痢及赤白滯下附子湯方各白去薑一盞

附子炮裂去

黃連去須

阿膠炙

甘草炙

乾薑炮

赤石脂入

治冷厚朴去皮薑汁黃

右七味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服空心食前日三

治冷痢疔痛腸滑不差黃連湯方

黃連去須炒 阿膠炙令燥 鼠尾草洗淨慢火焙乾

當歸切半炒 乾薑炮各 阿膠炙令燥

右五味麤搗篩每服四錢匕若冷甚白多以酒一盞

半煎至八分去滓空心溫服日午再服若熱及不痛

即去乾薑當歸用永煎依前服

治冷痢熟艾湯方 熟艾切半炒 附子炮裂去皮 黃連去須炒

兩阿膠炙令燥 甘草炙 乾薑炮

赤石脂各半 右七味到如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓空心食前溫服日三

治冷痢厚朴飲方

厚朴去蘊皮薑 肉豆蔻去殼 龍骨去鱗炙

白朮各半 白芍藥

右四味到如麻豆每服四錢匕水一大盞入生薑三

片同煎至七分去滓空心食前溫服日三

治冷痢下色白食不消甘草湯方

甘草炙 黃連去須 附子炮裂去皮

白朮炙 黃連去須 附子炮裂去皮

甘草炙 黃連去須 附子炮裂去皮

甘草炙 黃連去須 附子炮裂去皮

甘草炙 黃連去須 附子炮裂去皮

阿膠采令燥

右四味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓空心日午溫服日二

治冷痢訶梨勒湯方

訶梨勒炮去核 高良薑

白芍藥

板殼去炒

白茯苓去黑皮厚朴去粗皮薑

有六味咬咀如豚豆每服五錢匕水一盞半入生薑

三片煎至八分去滓空心食前溫服日二如腹脹加

人參半兩甘草半兩炙

治冷白滯痢腹痛龍骨湯方

龍骨壹兩

當歸切

厚朴去粗皮薑汁

赤石脂壹兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓空心食前溫服日三或熱加白頭翁三分水洗曬

乾牡蠣一兩燒令赤

治一切冷痢附子丸方

附子炮裂入水少

乾薑炮

大熱艾各壹兩 熟艾各壹兩

右三味擣羅為末以新汲水調麩拌和為丸如彈子

大每服二丸用麩一錢匕以水一盞半化開煎三五

沸空心服之服後覺熱以飯壓之或患冷病尤如梧
桐子大空心米飲下三十九至五十九

治大腸積冷下痢不止裏急後重疼痛五神散方

附子炮裂去皮乾薑炮

訶梨勒炮去核

延胡索各壹兩烏梅去核

右五味為麤散和白麩裏慢火內燒令麵熟為度去
麵焙乾搗羅為細散每服一錢匕空心食前米飲調

治冷極泄瀉久作腸滑不禁不欲飲食玉粉散方

附子炮裂去皮紅豆

乾薑炮各壹兩同搗羅為

右四味入不銹薄羅疏黃研如粉

右四味再同研令極細每服一錢匕稀粟米粥調候

溫冷得所服之

治大腸虛滑冷痢日夜不止火輪散方

附子炮裂去皮肉豆蔻去殼乾薑炮

右三味搗羅為散每服一錢匕陳粟米飲調下空心

食前服

治脾胃虛冷下痢滑泄不思飲食和一切冷氣訶梨勒

湯方

訶梨勒炮去核厚朴去蘊皮甘草炙

白朮

去水

草豆蔻

去水

陳橘皮

湯浸去白

各壹兩

右六味搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片棗

三枚擘破同煎至七分去滓食前溫服

治脾藏谷滑不止腹痛疔刺和陰氣進食烏頭湯方

烏頭

生去

破

子

一錢

以

明

益

智

去

乾薑

生

去

青橘皮

湯浸去

白

壹

兩

大腹香子

兩

日

交

不

出

火

煎

方

右五味剉如麻豆每服二錢匕水一盞入鹽少許煎

至六分去滓溫服如小腸氣攻刺急煎一兩服熱服

治冷痢久不差乾薑丸方

乾薑

兩

附子

生去

赤石脂

黃連

去須各

右四味搗羅為末麩糊和丸如梧桐子大米飲下二

十九加至三十九日三服

治冷痢不消化食已腹中脹痛氣滿地榆丸方

地榆

兩

赤石脂

龍骨

各壹兩

厚朴

去

麩皮生

烏梅肉

炒

乾薑

炮各壹

黃連

去須各

白朮

當歸

切

艾葉

炒各壹

甘草

炙兩

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九米飲下空心食前日二服

治冷痢久不差臍腹疔痛時下白膿食物不消茱萸人

參丸方

食茱萸炒

人參

芎藭

桔梗炒

枳實炒

甘草炙剉各

乾薑炮

陳麴炒各

附子炮剉去皮

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸米飲下空心食前

治冷痢下膿血臍腹疔痛脹滿食不消化吳茱萸丸方

吳茱萸湯洗焙乾炒

乾薑炮各壹

赤石脂

陳麴炒兩

厚朴去薑皮生當歸切焙各

右六味搗羅爲末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九

米飲下空心食前日二服

治冷膿痢腹痛不止黃連散方

黃連去須炒

厚朴去薑皮生薑汁炙各壹兩

乾薑炮

木香壹兩半生

甘草炙

阿膠燥

陳麴炒各

訶梨勒皮壹兩半生

壹兩

右八味搗羅爲散每服二錢匕米飲調下

治遠年冷痢食物不化或青或黃四肢沉重起卽目眩

兩足逆冷時苦轉筋赤石脂丸方四兩或重或明目翳

赤石脂

艾葉炒各壹兩

木乾薑炮叁兩

蜀椒

去目并閉口者炒出汗叁佰粒

烏梅肉炒伍兩

右五味搗羅爲末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十丸

米飲下空心食前日三服

治冷痢四白散方

龍骨

白石脂各壹兩

胡粉各壹兩

白礬

燒成灰而日二服

右四味搗研爲散每服二錢匕米飲調下服三十次

熱痢

論曰凡痢色黃色赤并熱也甚則下血汁此由腸胃虛

弱邪熱之氣乘虛入客於腸間故其證下痢黃赤或血

雜下腹間熱痛小便赤澀身熱煩渴故謂之熱痢

治熱痢不止生地黃湯方

生地黃兩半

甘草炙壹兩

地榆叁兩

右三味咬咀如麻豆大水二盞煎至一盞去滓分溫

二服空心日晚再服

治熱毒痢注下赤黃苦參丸方

苦參

陳橘皮湯浸去白焙

獨活去蘆

阿膠生用

藍青

黃連去須

鬼臼

黃蘗去蘗皮

甘草炙

右九味等分除阿膠外爲末以水煮阿膠和併手搗如梧桐子大每服十九米飲下日三服治卒下痢大

夏

治諸熱痢不差烏梅丸方

烏梅肉炒

黃連去須各

右三味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸米飲下日二夜一服

治熱痢無度黃連散方

黃連去須

雞子一枚

右三味搗羅黃連爲散取雞子白和藥爲餅子燒令

黑再搗羅爲細散每服三錢七空心粥飲調下日晚

再服

治一切熱痢黃連丸方

黃連去須

羚羊角銹

黃蘗去蘗皮各

赤茯苓去黑皮

右四味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服二十

丸薑蜜湯下暑月下痢用之尤驗

治挾熱痢多下赤膿黃連散方

黃連去須

黃連去須

竈突中黑塵各

右三味搗羅爲粗末每服二錢匕溫酒調空心服日

再

治夏月暴下熱痢甘草湯方

甘草

炙切

生薑

切

芍藥

切

黃連

右三味用漿水五合同煎至四合去滓空心溫分二

服

治熱痢腹內疝痛日夜百行氣欲絕黃連湯方

再黃連

去須

附子

炮裂去皮

龍骨

黑白朮

各鼠

阿膠

炙

乾薑

切

白朮

切

白朮

切

赤石脂

兩

白朮

兩

白朮

兩

白朮

兩

白朮

兩

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服

治熱痢蒲根湯方

蒲根

兩

粟米

兩

右二味以水三盞煎取一盞半去滓分溫二服空心

日午再服

赤痢

論曰熱痢之甚者爲赤痢本由腸虛爲風邪所傷又挾邪熱血得熱而妄行乘虛必溲滲入腸中與痢相雜其色純赤名爲赤痢若腸虛不復則爲久赤痢變成嘔噦

疳蠱之候矣

治痢下黃赤水或黃赤膿四肢煩皮膚冷者黃蘗丸方

黃蘗去麤皮壹兩

黃連去須炒貳兩

熟艾半兩切下炒

黃芩去黑心壹兩

右四味搗羅為末用白蜜三兩鍊熟入蠟一兩鎔化

入前藥末和搗丸如梧桐子大每服二十九空心米

飲下日晚再服

治諸熱毒痢下黃汁及如赤爛豆汁如赤帶狀又如魚

腦壯熱牡蠣湯方

牡蠣煨過研

白頭翁煨研

當歸切焙

正犀角鎔

艾葉炒

甘草炙

桑寄生剉各半兩黃蘗去麤皮炙黃連去須炒

黃芩去黑心

升麻

酸石榴皮炙各參分

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一

盞去滓空心溫服日午再服

治赤痢腹痛四肢羸困伏龍肝丸方

伏龍肝

艾葉炒

木香三十分

地榆

阿膠炙令燥

當歸切炒

黃連去須炒

赤芍藥

黃芩去黑心各壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

溫粥飲下不拘時

治暴赤痢如鷲鳴肝其痛不可忍黃連湯方

黃連去須 黃芩去黑心 當歸

右三味廔搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

熱服不拘時

治赤痢腹內疼痛無食子丸方

無食子和蠟 地榆各半 黃連去須炒

黃藥去鹽皮蜜 酸石榴皮兩 硝石各

右五味廔羅爲末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服十

五丸食前溫米飲下

治赤痢及赤白等痢茯苓丸方

赤茯苓去黑皮 黃連去須炒

黃藥去鹽皮 茯苓各 茯苓各

右四味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

空心米飲下赤白痢加阿膠末一兩

治熱痢香連丸方

木香 黃連去須炒 甘草炙

肉豆蔻去 黃連去須炒 甘草炙

右四味等分搗羅爲末沙糖和丸如梧桐子大每服

中五丸空心米飲下更以意加減

治諸痢久不差黃連丸方以意減減

黃連去須炒

烏梅肉炒乾

亂髮灰汁洗淨

燒灰參兩

右三味搗羅為末用蜜二兩半鍊熟入蠟一兩醋二

合羊脂一兩煎令蠟化入前藥求於銅器中重湯熬

令可丸即丸如梧桐子大每服三十九空心米飲下

日再米酒下赤白痢吐瀉藥末一兩

治一切痢一黃丸方

黃蘗去麤皮

黃連去須炒

羚羊角燒

赤茯苓去黑皮

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

空心米飲下日再薑湯亦得

治赤痢兼大腸下血黃連散方

黃連去須炒

黃蘗去麤皮

厚朴去麤皮生薑汁炙

木香各壹兩

右四味搗羅為散每服三錢匕空心粥飲調下日午

再服

治一切痢疾地榆湯方

地榆

樗皮去麤皮炙

黃連去須炒

當歸切炒

陳橘皮湯浸去白炒

枳殼去麤皮炒

桂皮去麤皮

桔梗參分

大腹皮壹兩

甘草炙剉

半兩

右一十味廔藥篩每服五錢匕水一盞半生薑五片煎至一盞去滓空心溫服

治赤痢不止枳殼散方

枳殼

胡桃各柒

皂莢不蛀者壹挺

右三味就新瓦上以草火燒令烟盡取研極細分為八服每臨卧及二更五更時各一服荆芥茶調下

治赤痢腹痛紫參散方

紫參參

肉豆蔻去殼壹兩

烏賊魚骨去甲貳兩

右三味為細散每服一錢匕食前溫米飲調下

治因冷飲食變成赤痢黃連湯方

黃連去須壹兩

桂去麤皮壹兩

白芷壹兩

赤石脂壹兩

肉豆蔻壹枚煨去殼

地榆壹兩

訶梨勒皮煨壹兩半

黃芩去黑心壹兩

附子炮裂去皮壹兩半

當歸焙壹兩

黃耆壹兩

吳茱萸洗炒壹兩

右一十二味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至一盞去滓空腹溫服日三

治赤痢腹痛或下純血六神湯方

番連去須

車前子各貳兩

地榆

山梔子人

甘草炙剉各半兩

陳橘皮湯浸去白壹兩

右六味麻搖篩每服五錢匕以漿水一盞半煎至八

分去滓空心服 車前子 細切 服餘

諸症 淋瀝 血不凝 血大 喘急

實白子煎至一盞去滓空心服服日三

次一十二次使成麻豆許煎至五錢匕水一盞半入生

黃芩 黃連 黃蘗 黃耆 黃精 黃連 吳養黃 黃芩 黃連

黃連 黃芩 黃蘗 黃耆 黃精 黃連 吳養黃 黃芩 黃連

黃連 黃芩 黃蘗 黃耆 黃精 黃連 吳養黃 黃芩 黃連

黃連 黃芩 黃蘗 黃耆 黃精 黃連 吳養黃 黃芩 黃連

大德重校聖濟總錄卷第七十五

大德重校聖濟總錄卷第七十六

泄痢門 行流 腸

血痢 膿血痢

赤白痢

赤白痢

血痢

甄血痢

新陳血

大醫心方卷第十六

血痢

論曰邪熱客於血脉之中腸胃虛弱血隨熱行流滲腸間因便血下故名血痢其脉見虛小者生身熱疾數者

難治

治痢下鮮血茜根湯方

茜根

黃連去須

地榆各壹

山梔子入

拾肆枚

犀角屑

分

右五味搗篩每服五錢匕入薤白香豉各少許以

水一盞半煎至六分去滓不拘時溫服日再

治血痢腹痛芍藥湯方

赤芍藥

黃蘗 去麩皮炙

地榆 各壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕以漿水一盞煎至七分去滓不拘時溫服

治血痢不止地榆湯方

地榆 貳兩

甘草 貳兩

右二味麤搗篩每服五錢匕以水一盞煎取七分去

滓溫服日二夜一

治血痢晝夜不止黃蘗湯方

黃蘗 去麩皮炙

黃連 去須各貳兩

木香 壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕以水一盞煎至七分去

滓食前溫服日三

治血痢茜根散方

茜根

貫衆

槐花 陳者

椿根 剉

甘草 炙

右五味等分搗羅爲散每服一錢匕米飲調下食前

日再服

治一切血痢腹痛人參散方

人參 分

肉豆蔻 去殼

烏賊魚骨 去甲各貳兩

右三味搗羅爲散每服一錢匕溫米飲調下食前

治熱血痢不定日夜頻滑地榆散方

地榆兩 酸石榴皮分 黃芩半兩 去黑心

枳殼去穢分 赤石脂兩 甘草壹兩

右六味搗羅為散每服二錢匕以米飲調下食前

治血痢不止枳殼散方

枳殼柒 胡桃柒 皂莢半挺 不

右三味都盛一新瓦上炭火燒令烟盡研每服一錢

匕臨卧時用荆芥茶下二更三更各一服

治血痢腹中疴刺日夜無度通聖散方

大棗壹枚 烏梅各柒 乾薑參塊 如

甘草壹尺 各

右四味搗篩為散每服一錢匕水一盞生薑半棗大

拍破同煎至六分去滓溫服

治血痢久患醋石榴皮散方

醋石榴皮壹兩 枳殼壹兩 麩壹分 當歸壹分 微炒

右三味搗羅為細末每服二錢粥飲調下

治血痢不止黃連丸方

黃連去須 黃蘗炙 黃芩各壹 微炒

右三味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食

前粥飲下十五丸

治血痢裏急後重腸中疼痛當歸散方

當歸參分剉 微炒 黃連壹兩 須微炒 龍骨貳兩

右三味搗羅為細散每服二錢匕粥飲調下不拘時
候日二

治血痢久不差臍腹刺痛肉豆蔻丸方

肉豆蔻壹兩 陳米壹兩 檳子壹兩

右三味先二味搗篩為麤散同米拌令勻同炒黃色
去米一分單炒一分生用同焙搗為末研粟米粥和
搗為丸如梧桐子大每服五十九空心溫陳米飲下
一二服效

治血痢及婦人產後血痢莖子散方

冬莖子不以多少

右一味搗羅為散每服二錢匕入臘茶末一錢以沸

湯七分一盞調服併三兩服差

治瀉血血痢烏金丸方

烏藥不以多少 炭火燒存性

右一味搗羅為末陳粟米飯丸如梧桐子大每服三
十九米飲下

治丈夫婦人便血下痢地榆散方

地榆壹兩 燒 礬石壹兩 研半兩 細

右二味搗羅為散用生豬肉二兩批開搽藥一錢匕

在肉上用炭火炙熟細嚼米飲下併兩服立効

治血痢不止方

木耳半兩燒作灰研細

右一味以井華水一盞調空腹頓服之

治腸胃虛熱血痢地榆散方

地榆不炙 酸石榴皮焙 木賊各壹

右三味搗羅爲散每服一錢匕煎訶梨勒湯調下食

前服

治久虛撮痛後重下血不止烏頭丸方末一錢以水

烏頭生用去皮 蛤粉各半

右二味搗爲細末用麩糊爲丸梧桐子大用鹽豉湯

下十五丸食前

治血痢腹中疔痛犀角丸方

犀角鎊 地榆 黃芩去黑心

黃蘗去麩皮 甘草炙到各壹兩半 茜根貳兩

栝葉貳分

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸米飲下食前服

治藏毒下血藏府疔痛日夜五七十行及血痢甚者黃

連飲方

黃連須去

阿膠燥

當歸焙切

赤石脂各肆兩

附子炮裂去皮龍骨兩

白朮各兩

右七味咬咀如麻豆每服五錢匕水二盞煎至一盞

去滓溫服空心食前

治血痢黃連丸方

黃連須去

龍骨

禹餘糧煨研

伏龍肝各貳兩

代赭煨研

乾薑炮各壹兩半

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米飲下空心食前日二服

治血痢不止少腹痛痛艾葉飲方煎茶飲之不空則服

艾葉焙切

當歸焙切

黃連去心

龍骨

訶梨勒皮各壹兩半

右五味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治久患血痢訶梨勒散方

訶梨勒壹枚不核炮

乾薑炮壹塊

高良薑壹指節

甘草炙壹寸

白礬壹塊燒灰如

右五味搗羅為散先喫好茶一盞後用烏梅一枚椎破以水一盞煎至六分調藥二錢匕微利即差

治血痢不止及積毒瀉血地榆湯方地榆 焙去

地榆剉 樗根剉 醋石榴皮半兩

右三味麤搗篩每服三錢匕漿水一盞煎至七分去

滓溫服不拘時候

治痢血方

右取鹽水梅除核研一枚合臘茶加醋湯沃服之一

服差

治痢血三物散方

胡黃連 烏梅肉焙 鼈下土各等分

右三味搗羅爲散每服二錢匕臘茶清調下空腹服

治血痢日夜數寸行葛粉飲方

葛粉大 白蜜各隨 香青各 葛粉各 香青各 葛粉各 香青各

右二味相和新汲水四合調空腹服之相

治痢下膿血裏急後重腸中疼痛磨化虛積丹砂礞石

丸方

丹砂研末 礞石研末 砒霜研末

黃連搗末 肉豆蔻搗末 烏頭炮裂去皮

巴豆霜壹錢

右七味同研勻煮糯米粥和丸如麻子大每服十丸

溫熱水不暈寢服妊婦不宜服

治血痢不止蛇含散方散不宜服

蛇含兩枚 白蒸糯米微炒 瓜露未煎

右一味煨醋淬十數度研如麩每服三錢匕陳米飲

調下兼止腸風瀉血婦人血傷等起

膿血痢利

青雞心微炒 瓜露未煎

論曰春傷於風邪氣留連夏為洞泄若遇熱氣乘之則

血隨熱行滲入腸中又與腸中津液相搏積熱蘊結血

化為膿膿血相雜故成膿血痢秋冬診脾脉微澹者是

也其脉滑大或微小沉細虛遲者皆生若懸絕或實急

或數大身熱者皆死身熱者皆死

治下痢膿血羸瘦黃連丸方

黃連須去 龍骨

厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

白礬熬汁枯 甘草炙

赤石脂 乾薑炮各半兩

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如梧椰子大每服三十

丸空心米飲下

治膿血諸痢及痢後腹痛阿膠散方

阿膠炙 龍骨炙 無食子各參兩

桃葉炒 柏葉去梗焙 甘草炙

肉豆蔻去殼各半兩

右七味搗羅為細散每服三錢匕米飲調下不拘時

治下痢膿血腸胃虛滑米穀完出黃連湯方

黃連去須壹兩

乾薑炮

熟艾炒

附子炮裂去皮臍

阿膠炙令燥

蜀椒

去目并開口炒出汗各半兩

兩

右六味判如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一

盞去滓食前溫服

治久痢膿血木香散方

木香炮半兩

阿膠

炙令燥兩半

訶梨勒

炮去核

黃連

去須壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕空心用冷粥飲調服

治伏熱下痢膿血貫衆丸方

貫衆剉壹兩

黃連去須壹兩

板藍根

木香酪淨

胡黃連壹兩

訶梨勒皮

肉豆蔻去殼各半兩

右七味搗羅為末煮麩糊丸如梧桐子大每服十五

丸煎甘草湯下不拘時

調藏氣止便泄下痢膿血臍腹疔痛虛氣痞滿腸鳴裏

急香連丸方

黃連去須

地榆剉

赤石脂各貳

龍骨剉碎 阿膠炙

木香

赤芍藥不艾葉

黃芩去黑心

肉豆蔻去殼 無食子炒

右十一味搗羅為末煮麩糊丸如梧桐子大每服

三十九米飲下不拘時

治膿血久痢腹內疼痛相葉丸方

相葉去

黃連去

阿膠炙

地榆剉 當歸焙

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

溫米飲下不拘時

治膿血痢茶黃湯方

吳茱萸湯浸 訶梨勒皮

當歸炒

黃連去須 乾薑炮

右五味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服

治膿血痢食入即注下不安烏梅丸方

烏梅肉炒

黃連去須

附子炮裂

乾薑炮

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

食前米飲下

治膿血痢下腹痛龍骨丸方

龍骨

赤石脂

黃連

犀角

附子

羚羊角

當歸

白礬

龍膽

甘草

熟艾

乾薑

右一十二味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二

十九溫米飲下空心食前

治膿血痢日久不差乾薑丸方

乾薑

黃連

黃蘗

熟艾

附子

烏梅肉

甘草

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

食前米飲下

治膿血下痢不禁女萎丸方

女萎

半夏

附子

藜蘆

右四味搗羅為末陳醋煮沸和藥末為丸如梧桐子

大每服三丸陳米飲下日午再服未止加至五丸

治久痢膿血日夜不止白礬丸方

白礬研 鉛丹研 礞砂研

大硫黃研各 右四味先入礬於瓷合子內次入硫黃礞砂鉛丹覆

之用瓦片蓋面文武火煨赤傾地上候火氣絕再為

末蒸餅丸如梧桐子大每服十九丸米飲下

治下痢膿血不止茱萸丸方

吳茱萸湯浸焙 乾薑炮

訶梨勒皮各半

胡椒各壹 白礬各壹 右五味搗研為末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服十

丸食前米飲下

治新久膿血痢橡實散方

橡實貳枚滿殼入蜜陀僧

末炭火煨赤為末 訶梨勒皮為末與

右二味其研細分作五服每服用溫米飲調下空心

食前服

治痢下膿血黃連湯方

黃連去須 厚朴去麩皮生薑

右二味麩搗篩每服五錢匕水一盞半生薑二片煎

至八分去滓溫服不拘時

治膿血痢二宜散方

黃連去須 吳茱萸湯浸焙炒

右二味各搗羅為末每赤膿多用茱萸末一錢匕黃連末倍之白膿多即黃連末一錢匕茱萸末倍之空心食前米飲調下

治膿血痢借氣散方

黃連去須

生薑並細剉各壹兩

右二味同用銀石器炒焦赤色去薑取黃連為細散每服二錢匕空心食前陳米飲下

治膿血痢困極木香散方

木香一塊方一寸

黃連並須細剉壹兩

右二味先將木香一塊置銀石器中次下黃連蓋之

以水二盞同熬水盡取木香切焙為散分三服第一服甘草湯下第二服陳米飲下第三服臘茶清下並食前服大妙其黃連別搗末專治赤痢每服二錢匕

陳米飲下

治膿血痢通神丸方

五靈脂研末

乳香研末

麝香研末

十巴豆去皮心膜研碎

右四味合研合勻滴水丸如粟米大每服六丸生木

瓜湯下不拘時

治膿血痢腹痛滑泄胡粉丸方

胡粉研末

胡粉

阿膠炙令

烏賊魚骨去甲各

半兩

龍骨

白礬熬令汁枯

蜜陀僧壹

各壹兩

右六味搗研為細末粟米粥丸如梧桐子大每服二十丸空心食前粟米飲下

治膿血痢後重裏急日夜頻併赤石脂湯方

赤石脂

白芷

天雄炮裂去

皮臍

龍骨

當歸切焙各

肉豆蔻去

皮

黃連去

厚朴去

地榆去

二錢

白朮

檉柳去

訶梨勒煨取

二錢

木香兩

吳茱萸湯洗

黃芩去

心

右十五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓溫服空心食前

赤白痢

當歸

黃連

各壹兩

論曰赤白痢者由腸胃虛弱冷熱相乘客於腸間變而為痢也蓋熱乘於血流滲腸內則赤冷氣入搏津液凝滯則白其候裏急後重數至圍而不能便膿血相雜故謂之赤白痢重者狀如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脉薄血狀如魚脂腦世謂之魚腦痢也
治赤白痢腹中痛口乾或作寒熱黃連散方

黃連去

白朮半

黃芩半

兩

當歸參分剉

烏梅兩半兩

乾薑半兩炮

阿膠

壹兩搗碎炒令黃燥

甘草半兩炙

微赤剉

右八味搗篩為散每服三錢七水一中盞煎至五分

去滓不計時候稍熱服

治赤白痢日夜不絕赤石脂散方

赤石脂兩壹

龍骨兩壹

阿膠壹兩搗碎炒令黃燥

地榆兩壹

苦山

厚朴壹兩半去蘊皮炙

訶梨勒

壹兩煨用皮

當歸壹兩剉

乾薑壹兩炮

黃連壹兩去須微炒

右九味搗羅為細末每服二錢匕以粥飲調下不計

時日二

治赤白痢及水穀冷熱氣痢白朮丸方

白朮分參

赤石脂分參

犀角屑分參

乾薑半兩炮

厚朴壹兩去蘊皮炙

生薑炙令香熟

龍骨參分剉

黃連壹兩去須微炒

烏梅兩壹

當歸參分剉

甘草半兩炙微赤剉

右二十味搗羅為細末鍊蜜和搗五百杵丸如梧桐

子大每於食前粥飲下三十九丸以粥飲調下不計

治痢白多赤少沒石子散方

沒石子兩壹

黃連壹兩去須微炒

乾薑壹兩炮

白茯苓兩半

厚朴壹兩去麩皮塗

當歸壹兩到

生薑炙令香熟壹兩

右六味搗羅為細散每服二錢匕粥飲調下不計時

治赤白痢日夜不止橡實散方

橡實壹兩

醋石榴皮壹兩黃牛角臑燒灰

右三味搗羅為細散粥飲調下二錢日三

治赤白痢冷熱相攻腹中疔刺疼痛龍骨阿膠散方

龍骨

赤石脂

厚朴去麩皮

楮皮炙

地榆炙

阿膠炙令燥

右六味搗羅為散每服二錢匕陳米飲調下日三服

治氣虛冷熱不調臍腹疼痛下痢膿血日夜頻滑四肢

少力裏急後重不進飲食赤石脂丸方

赤石脂

龍骨

白礬灰

胡粉研壹兩

蜜陀僧研半兩

阿膠炙令燥

烏賊魚骨各壹兩

右七味搗研為末再同研勻以粟米飯和丸如梧桐

子大每服二十九至三十九丸溫米飲下食前服

治赤白痢久不止腹中疔痛及下血脫肛烏梅散方

烏梅肉焙

檮根皮炙

赤石脂

當歸切焙

地榆炙

黃連去須

乾薑炮各參分 甘草炙分壹

右八味搗羅為散每服二錢匕溫米飲調下空心食前服

治一切赤白冷熱下痢腹內疼痛赤地利丸方

赤地利心各壹 阿膠炙令 赤石脂各壹

當歸切各壹 乾薑炮各壹 地榆炙

茜根各壹 木香半兩 黃連去須炒

右九味搗羅為末以米醋二升入藥末一兩同熬成膏和丸如梧桐子大每服二十丸食前溫米飲下

治赤白痢訶梨勒丸方

訶梨勒煨去核 附子切作片用生薑汁煮令汁盡

蕪荑入瓦上炒熟 黃連吳茱萸少許同炒

陳橘皮湯浸去白米醋浸壹宿焙

右五味等分搗羅為末用漿水煮粟米飯和為丸如梧桐子大每服三十九空心生薑湯下日二三

治赤白痢諸藥無効麝香丸方

麝香分壹 菉豆粉分壹 朱砂分半

巴豆壹分去皮心研爛出油

右四味搗羅為細末粟米餅和丸如菉豆大食前冷粥飲下二丸當日忌熱食物

治赤白痢內補散方

黃連

量兩去須微炒

甘草

半兩炙微赤剉

乾薑

半兩炮裂

煎令

紫葺茶

半兩微炒

右四味搗羅爲細末每服二錢匕粥飲調下不計時

候日三

治赤白痢日夜無度攻臍腹痛桃花丸方

赤石脂

壹兩

乾薑

壹兩

木

蒸栗木

煨

以爲丸

右二味搗羅爲細末白麩糊爲丸如梧桐子大每服

三十九食前日二服若血痢甘葷湯下白痢乾薑湯

下

兩

壹兩

壹兩

壹兩

壹兩

壹兩

壹兩

壹兩

壹兩

治冷熱赤白痢瀉血加減薑黃丸方

乾薑

炮

黃連

去須炒

右二味等分各搗羅爲末各用水煮麩糊和丸如梧

桐子大陰乾兩處收貯白痢冷瀉每服乾薑三十九

黃連十五丸同用溫米飲下赤痢瀉血黃連三十九

乾薑十五丸亦用米飲下赤白相雜者黃連乾薑各

二十九共服同用米飲下空心食前服未愈加丸數

取差爲度

治大人小兒赤白痢滑腸不止綠白散方

綠礬

白礬

石灰

鉛丹肆味同入罐子內燒通赤放冷研

龍骨

赤石脂縮沙人各半

右七味搗研為散更合研勻每服一錢匕小兒半錢匕或一字匕並米飲調下治腸滑極有效作丸服亦得

治赤白痢久不差臍腹痛丹硫丸方

丹砂研

硫黃研各

烏頭末炒

巴豆壹錢半去皮心膜出油

砒霜研半

麝香研少

蛤粉錢貳

右七味合研為細末用棗肉為丸如黍米大米飲下

一九

治赤白痢腸胃虛滑龍骨散方

龍骨兩半

黃連去須

牡蠣煨各兩

烏梅肉焙乾

右四味搗羅為散每服二錢匕溫米飲調下食前服

治赤白痢腹痛不止鉛丹丸方

鉛丹半錢

丹砂研貳錢

巴豆柒枚去皮心出油盡

杏人柒枚湯退去皮尖雙人研

乳香研壹錢

砒霜半錢如秋後不用砒入砒黃末半錢

右六味合研令勻細鎔黃蠟和丸如黃米大每服三

九至五九煎乾薑甘草湯下食前臨卧

治赤白痢臍腹疼痛腸滑後重妙功散方

大黃濕紙裹煨半兩 莨菪子炒令黑

右二味搗羅為散每服一錢匕米飲調下

治赤白瀉痢腹藏疼痛裏急後重并治疝氣萬靈湯方

薺子粟炒赤半斤 甘草炙兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓臨臥腹空溫服

治赤白痢橡實湯方

橡實殼炒 甘草炙 荔枝殼

石榴皮

右四味等分細剉每服半兩水一盞半煎至八分去

滓溫服

治赤白痢止瀉烏金丸方

巴豆貳拾壹枚去皮 大棗青州者貳拾壹枚去核

右二味每一枚棗入巴豆一枚燒令煙出絕以器覆

之後搗研為細末更入輕粉二錢黃連末三錢燒取

粟米飯丸如菘豆大每服五丸煎獨掃湯下

治赤白痢礬石丸方

白礬肆兩 消石壹兩

右二味搗爲末米醋拌和入罐子內埽頭閣起罐底
將瓦片蓋口慢火燒熟置令地上出火毒一夜研細
用米醋浸炊餅心丸如梧桐子大每服十九空心米
飲下夜起頻鹽酒下

治赤白痢赤石脂丸方

赤石脂

桑根白皮剉

桔梗炒

訶梨勒皮煨

天雄炮裂去

龍骨各壹兩半

白芷

黃連須去

地榆

當歸切

桂去

厚朴生薑汁炙去

木香各壹兩

黃芩去黑心

乾薑炮裂各

肉豆蔻去殼

黃芩各壹兩

右一十九味搗羅爲末麩糊和丸如梧桐子大每服

三十九米飲下

治赤白痢阿膠丸方

阿膠炙

枳殼去瓤炒

訶梨勒煨去

甘草剉

乾薑炮

芍藥炮

黃連去須

木香一半生一半

芍藥炮

當歸切

地榆剉各壹兩

右一十九味搗羅爲末用陳苦酒和丸如梧桐子大每

服二十九米飲下食前

治赤白痢疼痛不止當歸湯方

當歸切焙

厚朴去麩皮生薑汁炙 阿膠炙

芍藥炒各兩

甘草炙各兩

黑豆炒各壹

乾薑炮

赤茯苓去黑皮各參分 烏梅去核炒貳兩

右九味細剉每服三錢匕水一盞煎取七分去滓溫

服

治赤白膿血痢黃連散方

黃連去須

龍骨各貳兩

赤石脂壹兩

厚朴去麩皮生薑汁炙各兩

人參參十六兩

乾薑炮

地榆

黃芩去黑心各壹兩

右八味搗羅為散空心粥飲下二錢匕日再服

治赤白痢久不差取虛積輒紅丸方

丹砂研半兩

粉霜壹錢

砒霜研半錢

硫黃研

礞石飛研

消石研各壹錢

輕粉貳錢

龍腦研半錢

右八味再同研勻細入去皮心膜巴豆半兩研勻用

黃蠟半兩鑿作汁同和旋丸如棗豆大每服三五至

五光溫漿水下

治赤白痢裏急後重黃連丸方

黃連去須炒

龍骨

地榆焙

訶梨勒煨去核 赤石脂各半兩 草豆蔻去皮壹分

右六味搗羅為末水浸炊餅為丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下空心食前日三服

治赤白痢臍腹痛及久水瀉白濁如米泔馬蘭子飲方

馬蘭子合參 地榆兩 艾葉炒各貳兩

赤石脂 當歸切焙各肆兩 龍骨壹兩

白茯苓去黑皮各貳兩半

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓空腹溫服

治赤白痢血多痛不可忍艾葉丸方

艾葉炒 黃連去須炒 木香一半生

肉豆蔻去殼各參分 地榆剉壹兩 阿膠壹兩

當歸切焙各半兩

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米飲下

治赤白痢疼痛不止甘草湯方

甘草炙 地榆 當歸切

黃連去須炒 芍藥炒各半兩

右五味細剉每服三錢匕漿水一盞煎取六分去滓

溫服

治赤白痢龍骨黃連丸方

龍骨

黃連去須

白石脂各壹兩半

胡粉炒黃

白礬各壹兩 熬令汁枯

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九米飲下日三

治赤白痢香連散方

黃連壹兩 須炒

木香壹兩

丁香

乾薑炮

訶梨勒皮各半兩

右五味搗羅為散每服三錢匕陳米飲調下日再

治赤白痢腹痛不止阿膠丸方

阿膠炒參兩

黃連去須兩

雷歸切

胡粉研各壹兩

右四味搗研為末稀糊丸如梧桐子大每服二十九食前米飲下

治赤白痢無間遠近黃連丸方

黃連去須

黃蘗去麩

雷歸切

赤茯苓去黑皮等分

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服四十九空腹飯飲下以差為度

治赤白痢萬全茯苓散方

赤茯苓去黑皮

黃連去須

阿膠炙

黃蘗去蘗皮

右四味搗羅為散每服二錢匕空腹甘草湯下日再

以差為度如三歲以下小兒每服半錢匕五歲至十

歲每服一錢匕

治赤白痢肉豆蔻散方

肉豆蔻去殼

鹿角屑炙

胡粉燒

蜜陀僧各半分燒通於冷地止出火毒

右四味搗羅為散每服二錢匕米飲調下

治赤白痢後重腸痛四神散方

乾薑炮

黃連去須

當歸切

人參去

黃蘗去蘗皮切

黃連去須

當歸切

人參去

右四味為散每服二錢匕以烏梅三箇煎湯調下水

瀉等分赤痢加黃蘗白痢加乾薑後重腸痛加黃連

腹中痛加當歸各一倍並空心食前服大凡泄痢宜

食酸苦蓋酸收苦堅故也

治下痢赤白木香散方

木香

肉豆蔻去殼

檳榔燒

各壹兩

乾薑炮

肉豆蔻去殼

檳榔燒

各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢半匕米飲調下

治赤白痢腹痛駐車丸方

黃連去須炒壹兩半 乾薑炮

當歸切

阿膠剉炒研末再炒

右四味各為細末以好醋調阿膠和丸如梧桐子大

每服四十九空心陳米飲下日再服重服愈

治冷熱赤白痢疾吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗焙 黃連去須炒

赤芍藥各壹兩

右三味羅搗篩每服三錢匕水一盞煎至八分去滓

溫服食前

治冷熱痢腹痛裏急和中散方

附子炮染度水浸 黃連去須各壹兩

乳香研壹斤

右三味如患冷熱痢取黃連附子各半錢乳香一字

以陳米飲調下未止再服以青橘皮湯調下如患赤

痢附子末半錢黃連末一錢乳香一字如患白痢黃

連末半錢附子末一錢乳香一字米飲調下未止以

黑豆七粒煎湯止之

治冷熱痢甘草飲方

甘草大者貳寸許壹兩

烏梅伍枚拍碎

商梨勒皮伍半斤

無味

右三味細剉用水一盞煎取五分去滓一平冷服一

平熱服

治赤白痢并血痢梔子湯方一字米煎兩平末土心

山梔子人牌梁煎末一錢良香一字吸患日麻黃

右一味以漿水六升半煎至五合法淨空心食前分

溫二服

治赤白痢橋皮散方

陳橋皮湯浸去白焙

零瓜汁金

生薑汁合

右三味合調令勻每服一匙如赤多增瓜汁白多增

薑汁和白湯調下

治赤白痢不止豆蔻散方

肉豆蔻去殼訶梨勒皮取皮代去空心瓜絲

右三味搗羅為散每服二錢七米飲調下

治赤白痢久不止白礬丸方

白礬一鉛丹各兩味拌勻用瓷瓶子

候壹兩次久方可取出放冷

右二味研令極細用粟米飲和泥如梧桐子大每服

三九空心米飲下

治赤白等痢巴豆丹砂丸方

巴豆伍粒去皮

杏仁柒粒去皮

炒黃

陳米伍升

右二味入丹砂一錢同研極細以蒸餅爲丸如菽豆大每服一丸至二丸空心陳米飲下

治赤白痢服諸藥不差者黑豆湯方

黑豆

半升炒去皮揀淨者肆合爲末

甘草

兩半炙

右二味綿裹以漿水三升煎至一升去滓空心分溫

二服

治赤白痢香蓮丸方

黃連伍須

木香

各壹分

右二味搗羅爲末以麩糊和丸如梧椰子大每服五十九空心陳米飲下日再