

近世內科國藥處方集

西湖伊南書

葉橘泉著

第五集神經
系統病篇

近世內科國藥處方集

虞荃著



上海千頃堂書局印行

一九四一年四月發行
一九五〇年七月再版

近世
內科
國藥處方集
第五集

基價拾六元

有

著

著者 葉 橋 泉

作

權

發行人 謝 祖 芳
千頃堂書局代表

發行者 千 頃 堂 書 局
上海漢口路二九六號

近世內科國藥處方集

第五集神經系統病篇

目錄

- (一) 腦貧血 舊稱暈厥、失神、類中等…………… 一——二〇
- (二) 腦充血 舊稱肝火上升、類中、大厥等…………… 二一——三七
- (三) 腦出血 舊稱真中風、中臟、中腑等…………… 三八——六〇
- (四) 腦梅毒…………… 六一——七八
- (五) 腦性痙攣性小兒麻痺(小兒偏癱)…………… 七九——九一
- (六) 腦水腫 舊稱小兒解顛…………… 九二——一〇三
- (七) 麻痺狂(麻痺性癡呆)…………… 一〇四——一二一
- (八) 慢性進行性球麻痺——慢性進行性下部腦灰白質(舌唇咽頭麻痺)——延髓性癱瘓(舌咽喉癱瘓) 舊稱中風、中經絡、中血脈、風癱等…………… 一二二——一三五

(九) 急性延髓球麻痺 舊稱中風	一三六——一三七
(十) 脊髓出血(脊髓卒中・脊髓血腫・跌打損傷性類中)	一三八——一五二
(十一) 脊髓炎	一五三——一七四
(十二) 脊髓癆	一七五——一九七
(十三) 進行性肌萎縮(甲) 脊髓性進行性肌萎縮(乙) 肌病性進行性肌萎縮(丙) 神經性進行性肌萎縮	一九八——二一一
(十四) 神經痛 舊稱風氣痛等	二一二——二三一
(十五) 神經炎	二三一——二四九
(十六) 偏頭痛	二五〇——二六〇
(十七) 癩癩	二六一——二八〇
(十八) 神經衰弱	二八一——三〇三
(十九) 希司忒利阿 舊稱癡躁、心風等	三〇四——三二四

近世內科國藥處方集

第五集

神經系統病篇

(一)腦貧血

舊稱暈厥失神類中等

病原 本病之病原不止一端。如下例各點皆可引起本症。(一)急劇之多量失血。例如外傷。手術時出血。齒齦。胃腸。子宮出血等。(二)亡液。例如胸腔。腹腔之液體穿利後。或下利劇甚時。(三)內臟神經麻痺。則腹腔內臟血管擴張。血壓減少。多量血液充盈其間。故腦減血。或受糞塊壓迫之腸管。一旦排便後。而血管擴張則容多量之血液。(四)慢性貧血。如十二指腸蟲病。萎黃病。惡性貧血。白血病。化膿。亡液等。(五)心臟衰弱。于脂肪心。大動脈孔狹窄。熱性病及衰

弱時見之。蓋心臟不能輸送適量之血液于腦髓。故往往于起立時發此障害。
(五)腦血管之壓迫。如腫瘍則由外方壓迫。腦室內水腫則由內方壓迫。(六)
頸動脈之變化或壓迫。(七)精神感動。如喜悅驚愕。畏怖時則血管運動神經
痙攣。而腦貧血。

病理 本病之解剖的徵狀甚奇特。諸腦膜之色淡而白。僅大動脈之血管充
滿。腦回上小血管空。而腦脊髓液大增。切視之則灰白二質皆色淡。切面濕潤。
症狀 因疾病發生之狀態及經過。可區別爲急性與慢性二者。(一)急性
腦貧血 急劇腦貧血。多由血管痙攣所致。其初心臟部有苦悶之感。心悸亢
進。繼則顏面蒼白。四肢厥冷。重聽。冷汗。耳鳴。視力障害。眩暈。惡心嘔吐。至于卒
倒。此名失神(Ohnmacht)持續約數秒或數分時後徐徐覺醒。或竟至于死。(神
經性卒中 Apoplexianervoza) 失神中反射機能消失。瞳孔散大。脈搏細數不

正呼吸淺表。蓋失神之原因于精神感動及疼痛者。以腦血行之急受障害故也。(腦血管收縮或心臟機能障害)(二)慢性腦貧血。于各種貧血及反復之出血後發生。其症狀與急性症相似。而發生較緩。如頭痛。眩暈。耳鳴。重聽。眼花閃發。弱視不眠。記憶力減退等症。有時于急劇起立時失神卒倒。此外如小兒久患腹瀉後。貧血及身體虛弱之際。有時顯一羣奇特之症狀。即所謂腦積水樣病 *Hydrocephaloid* 者。病兒作半昏迷狀。眼開而瞳縮。腦門塌陷。早期或顯驚厥。繼則昏迷或增重。瞳孔展大。更有顯眼之斜視。及頭仰縮者。此等症狀與腦底性腦膜炎酷似也。

治法 (一)失神時命患者平臥。頭部低位。冷水灌注面部。嗅入阿莫尼亞或醋。(二)心臟衰弱。宜速注射樟腦。(三)精神安靜。注意營養。(四)西藥內服可與亞砒酸劑。或鐵劑。其他藥劑療法。用葡萄酒 *Brandy* 濃厚之茶。及咖啡。或用

樟腦麝香內服及注射。因出血過多而貧血者。則用生理食鹽水皮下注射。緊縛四肢。使血液循環于腦髓。慢性腦貧血者。須警戒急劇之起立。而多與以營養物。鐵。砒石等補血劑。

中藥治法 因急劇失血而起之急性腦貧血。用醋炭熏法。酒萆熏法等急救。內服麝香人參附子等。

因精神感動血管運動神經痙攣而失神時。用惹激劑。嗜鼻取嚏。並內服川芎當歸芍藥地黃等。

慢性腦貧血。頭痛。眩暈。耳鳴。重聽。眼花閃發。弱視不眠。記憶力減退等。用當歸。黃芪。人參。山萸肉。龍眼肉。杞子。滁菊等。

小兒腦積水樣昏迷。用乾蟾。全蠍。黃芪。附子等。

其他一般藥物。如天麻。胡麻。山藥。羚羊角。銀杏。鷹頭。五味子。菴蓉。桂枝等。皆可。

選用。

要藥略釋

醋爲米麥類澱粉或酒類加醋母使發酵變酸而釀成者。入藥須用米醋。陳者更良。本品古稱苦酒。其主要成分爲醋酸。是酸味收斂藥。內服少量能助胃消化。入腸後能刺激腸粘膜。使腸之斂性增加。由腸壁吸入血中。能令血管收縮。汗液減少。外用塗癰腫。有收斂消炎作用。本草衍義用爲產婦房中。以火炭沃醋氣。令產婦嗅之。以防治血暈者。蓋卽防救出血過多之急性腦貧血也。用量內服一〇・〇——二〇・〇。西西（一小匙至二小匙）外用不拘分量。

萼爲菜蔬類植物。入藥用其根及葉。古稱散瘀活血。用于大腸炎之下列。與噎膈反胃及諸種出血等症。有興奮及強壯作用。食醫心鏡方治卒然中惡（失神）用汁灌鼻中便醒。丹溪方治產後血暈。用韭菜切搗放瓶中。沃以熱醋。或

熱酒令氣熏入鼻中即醒。用量內服一〇・〇——二〇・〇（三錢至六錢）外用不拘分量。

麝香爲雌性麝鹿臍中之分泌物。色棕黑而狀如沙泥之細粒。中央之顆粒較粗者名當門子。入藥爲尤佳。味苦辣而有可憎強烈之香竄臭氣。古來用作回蘇藥。主治中風。中氣。中惡。驚癇。謂能辟惡魅。殺鬼精。開達關竅。通諸經絡者。蓋以其具有芳香竄透性與奮強心激腦回蘇等作用故也。考卒中狀昏倒諸症之原因不一。如腦部充血或出血之卒中。則本品當在禁忌之例。而腦貧血之卒然昏仆。顏面蒼白。手足厥冷等。虛性症狀。則本品可謂恰合。即藥效以推斷於以知古人所謂中惡中氣等病者。其爲急性腦貧血之卒倒無疑也。至謂通關竅利經絡等。則無非認識本品之激腦強心與奮血行等功用故也。用量

○・二——○・五（半分至一分半）吞服或配入丸藥中服（不入煎劑）

人參用作興奮性強心強壯藥。與附子伍用。能救急性虛脫之顏面蒼白。四肢厥冷。脈搏微弱等症。與黃芪當歸等伍用。於大失血後之急性的貧血。能補血提神。使血液恢復迅速。 用量一〇・〇——二〇・〇（二錢至六錢）

附子爲興奮強心藥。能鼓舞全身細胞。興奮神經。古稱治中風中寒。痰厥氣厥。小兒慢驚。風濕麻痺。頭痛脚氣等者。其對於全身衰弱性之腦貧血及小兒腦積水樣昏迷等。均可用之。 用量三・〇——一〇・〇（九分至二錢）

川芎原名芎藭。爲繖形科植物之根。名醫別錄云。「主治腦中冷動。面上遊風去來。目淚出。多涕唾。忽忽如醉。諸寒冷氣中惡。」何間宣明方治首風旋暈。用川芎一斤。天麻四兩。爲末。蜜丸服。似均係貧血性腦症狀疾患耳。本品能使血液循環增速。與其他滋養性強壯藥伍用。治腦貧血之眩暈頗效。 用量三・

〇——七・〇（九分至二錢）

當歸古稱調氣養血使氣血各有所歸故又有引血歸經之語蓋本品能弛緩神經促進血運使血液氧化迅速血壓增高以增進貧血部分之充血 用量

一〇・〇——一五・〇（二錢至四錢半）

芍藥與川芎當歸地黃伍用爲四味湯對於血液不足及貧血衰弱諸症有調整循環營養神經之功蓋芍歸通經地黃補血芍藥則鎮痙而弛緩局部貧血性神經之拘攣 用量五・〇——一〇・〇（錢半至二錢）

地黃入藥用有生熟之分四物湯內以乾地黃爲相宜生地黃卽鮮地黃多汁有清涼清血之功熟地黃則多入滋補藥中乾地黃藥肆名稱乾生地大生地有滋養強壯性補血作用 用量一五・〇——二〇・〇（四錢半至六錢）

黃芪爲緩和性滋養強壯藥能強壯肌細胞增進新陳代謝加速血液產生與當歸人參等伍用于貧血衰弱諸症甚佳 用量一〇・〇——二〇・〇（

三錢至六錢)

山萸肉爲滋養強壯藥。有收斂作用。用于貧血性頭暈目眩等症有特效。用量一〇・〇——一五・〇(三錢至四錢五)

龍眼肉爲滋養性鎮靜藥。用于貧血神經衰弱。失眠。耳鳴。頭暈等症。用量六枚至十枚

枸杞子爲滋養強壯藥。唐甄權曰補精氣諸不足。易顏色變白明目安神。據此可知本品于貧血性神經衰弱有良效。用量七・〇——一五・〇(二錢至四錢半)

滁菊爲腦鎮靜藥。賞用于頭暈。目眩。耳鳴等症。與枸杞子伍用。對於腦貧血之眩暈頗佳。用量五・〇——一〇・〇(錢半至三錢)

乾蟾卽蟾蜍之乾者。其皮中含有蟾酥。有強心及解毒作用。賞用于小兒疳積。

而呈心臟衰弱時有良效。 用量三・〇——七・〇（九分至二錢）

全蠟爲鎮痙藥。用於小兒諸腦病。如昏迷。痙攣。搖擻。驚癇。等症。有平腦鎮痙之功。 用量二・〇——三・〇（六分至九分）

天麻爲蘭科植物赤箭之根。有鎮痙鎮痛作用。古人用于風痺眩暈。並稱利腰膝。強筋骨。通血脈。似于鎮痙之外。兼其滋養強壯作用。 用量二・〇——七

・〇（九分至二錢）

胡麻屬胡麻科植物之種子。取其黑色者。入藥爲良。本品俗名黑芝麻。近時藥肆胡麻有數種。所謂三角胡麻者。卽茺蔚子。又有大胡麻。一名巨勝子。又有所謂壁蝨胡麻者。不知係何科屬。恐俱非胡麻之正路貨。蓋真正胡麻當屬黑芝麻也。其有效成分爲胡麻油。有滋養作用。古稱主治傷中虛羸補五內益氣力。長肌肉填腦髓。明耳目云云。蓋爲神經系統之滋養藥也。 用量五・〇——

一〇・〇（錢半至二錢）

山藥一名薯蕷。爲薯蕷科纏繞植物之地下塊根。有滋養強壯及收斂作用。主補神經。用于衰弱性頭暈目眩。耳鳴盜汗。遺精等症。 用量一〇・〇——二

〇・〇（二錢至六錢）

羚羊角爲強壯性鎮痙鎮靜藥。對於神經性痙攣頭暈。抽搐。癲癇等症。得賞用之。 用量二・〇——三・〇（六分至九分）

銀杏爲公孫樹科銀杏之果仁。有收斂性滋養強壯作用。可用于衰弱性眩暈。耳鳴。喘息。咳逆。遺精。帶濁等症。 用量一〇・〇——二〇・〇（三錢至六錢）

鷹頭係猛禽類鷂鷹鳥之頭腦。此爲民間藥。治頭風眩暈。用本品焙燥沖酒服極驗。此亦爲臟器療法之一種。蓋因此鳥常盤旋於高空。而腦髓獨健。取以補

腦亦是合理耳。用量一具至二具

五味子爲強有力之收斂藥。且有滋養強壯作用。取其斂攝神經。制止分泌。故於衰弱患者之眩暈心悸盜汗自汗喘息咳逆等症。得實用之。用量一・〇

——二・〇（三分至六分）

菝蓉屬列當科之寄生植物。多寄生於榛木之根。高約六七寸至尺餘。爲肉質柱狀。葉鱗集如松球。本品爲興奮性強壯藥。能強壯性神經。古稱滋腎補精血。益髓悅顏色。大補壯陽云云。腦貧血之因性腺衰弱而來者得實用之。用量七・〇——一〇・〇（二錢一至三錢）

桂枝氣味芳香。中含揮發油。古稱溫經通脈。蓋本品能使血液循環亢進。故對於末梢貧血諸症。頗賞用之。用量二・〇——四・〇（六錢至一錢二）

處方一

當歸四逆湯（仲景）

當歸一〇・〇（三錢）

桂枝四・〇（一錢二）

白芍七・〇(三錢) 細辛二・〇(六分) 甘草三・〇(九分)

木通四・〇(二錢) 大棗四枚

右六味對作兩百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 手足厥寒脈細陽虛血弱能益血脈云(四肢末梢性貧血)

處方二 黃芪桂枝五物湯(仲景) 黃芪七・〇(三錢) 白芍五・〇(錢

半) 桂枝三・〇(九分) 生薑五・〇(錢半) 大棗四枚

右五味對作二百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 血痺脈微身體不仁麻木者(貧血性神經麻痺)

處方三 鍼砂湯(南陽) 鍼砂一〇・〇(三錢) 牡蠣二〇・〇(六錢) 茯

苓一〇・〇(三錢) 桂枝二・〇(六分) 人參四・〇(一錢) 甘

草二・〇(六分) 蒼朮五・〇(錢半)

右七味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 主治眩暈虛悸短氣虛煩(歇斯的列而呈貧血症狀者)

處方四

聯珠飲(棗軒) 茯苓一〇・〇(三錢) 桂枝二・〇(六分) 白朮

七・〇(二錢) 甘草二・〇(六分) 當歸七・〇(二錢一) 地黃一

〇・〇(三錢) 芍藥七・〇(二錢一) 川芎五・〇(錢半) 蒼朮

五・〇(錢半) 木瓜五・〇(錢半) 米仁一〇・〇(三錢) 葶藶一

〇・〇(三錢)

右十二味剉作三百西西煎劑去渣一日分三次服。

適應症 主治血虛眩暈心下逆滿(慢性腦貧血而兼消化不良者)

處方五 白薇湯(本事) 白薇一〇・〇(三錢) 當歸七・〇(二錢一) 人參

四・〇(一錢二) 甘草二・〇(六分)

右四味剉作二百西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 人平居無疾苦忽如死人氣過血還陰陽復通移時方醒名曰血厥者(腦貧血之猝然發作者)

處方六

補腦丸(古今醫澈) 人參四〇・〇(一兩二) 麥門冬七〇・〇(三

兩一) 茯苓一〇〇・〇(三兩) 杜仲鹽水炒七〇・〇(三兩一) 肉

蓯蓉酒淨一〇〇・〇(三兩) 山藥一〇〇・〇(三兩) 熟地黃一

〇〇・〇(三兩) 山菜肉七〇・〇(三兩) 黃芪五〇・〇(兩半)

枸杞子七〇・〇(三兩一) 菟絲子一〇〇・〇(三兩) 鹿茸酒漿微炙切片

五〇・〇(兩半) 五味子二〇・〇(六錢)

右九味除蓯蓉杞子熟地麥門冬餘研極細末篩去渣另搗餘四味略添煉蜜為丸如梧桐子大每服四錢白開水下每日早晚各一次

適應症

治鼻淵久不愈者神效。(按古人誤認鼻淵爲腦漏而漏下之物亦誤以爲腦中來所以處此方以治之實則本方可治腦貧血能滋補強壯腦髓及腦血管貧血衰弱者之慢性鼻炎用之亦有效也)

處方七

補肝營養湯(準繩) 當歸七・〇(三錢) 川芎五・〇(錢半) 白

芍七・〇(三錢) 熟地黃一〇・〇(三錢) 陳皮五・〇(錢半)

甘菊花一〇・〇(三錢) 甘草二・〇(六分)

右七味剉作二百西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 肝火上升頭目暈眩耳鳴能清肝養血云(此亦營養性平腦劑也)

處方七

川芎散(本事) 山茱萸一〇・〇(三錢) 川芎五・〇(錢半) 人

參四・〇(一錢二) 山藥一〇・〇(三錢) 茯神一〇・〇(三錢)

甘菊花一〇・〇(三錢)

右共爲細末。每服二錢。酒調下。每日二次。

適應症 治肝風眩暈。

處方八

歸脾湯(濟生)

當歸七・〇(三錢一)

白朮七・〇(三錢一)

茯苓

一〇・〇

(三錢)

黃芪五・〇(錢半)

龍眼肉四枚

酸棗仁五・

〇(錢半)

遠志五・〇(錢半)

木香二・〇(九分)

人參四・〇

(二錢二)

甘草二・〇(六分)

右十味。剉作二百西。煎劑。去渣。一日分二次服。

適應症

主治思慮過度。勞傷心神。血虛健忘。怔忡失眠等症。(貧血神經衰

弱方也)

處方九

保元湯(東垣)

黃芪一〇・〇(三錢)

人參四・〇(二錢二)

甘草

二・〇(六分)

肉桂一・〇(三分)

右四味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 主治氣血虛弱營衛不足（機能衰弱之貧血方也）

處方十

益陰腎氣丸（東垣）

澤瀉

茯苓

以上各

八・〇（二錢四）

生地黄

酒洗

丹皮

山茱萸

當歸酒洗

五味子

乾山藥

柴胡

以上各

二〇・〇（六錢） 熟地黄七〇・〇（二兩一）

右十味共爲細末篩去渣煉蜜爲丸大如梧桐子硃砂爲衣每服五十九淡鹽湯下每早晚空心服。

適應症 腎臟虛虧神水寬大初覺昏暗漸覩空中有黑色物成二體久則光

不收及內障神水淡綠色淡白色者（貧血衰弱性視神經障礙病）

處方十一

通關散（準繩）

細辛

皂角

薄荷

雄黃各三〇・〇（九錢）

右四味共研細末每用少許吹入鼻中取嚏。

適應症 治卒中風口禁氣寒不省人事（腦貧血卒然倒仆失神可用此散吹鼻刺激其神經使其回蘇此爲急救法之一種也）

處方十二 芎歸湯（千金） 川芎五・〇（錢半） 當歸一〇・〇（三錢）

右二味剉作一百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 主治去血過多以致眩冒困悶者（去血過多而致眩冒者卽是急性貧血之症也）

處方十三 加味左歸飲（景岳） 熟地一〇・〇（三錢） 山茱萸七・〇（二錢）

一 淮山藥一〇・〇（三錢） 茯苓一〇・〇（三錢） 枸杞七・〇

（三錢） 肉蓯蓉_{酒洗切片}一〇・〇（三錢） 細辛二・〇（六分） 炙草

三・〇（九分） 川芎五・〇（錢半）

右九味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 治肝虛頭痛如神並治眩暈目痛。

處方十四

補肝散(滑伯仁) 黃肉一〇・〇(三錢) 當歸一〇・〇(三錢)

五味子三・〇(九分) 山藥一〇・〇(三錢) 黃芪七・〇(二錢一)

川芎四・〇(二錢二) 木瓜五・〇(錢半) 熟地黃一〇・〇(三)

錢) 白朮五・〇(錢半) 獨活五・〇(錢半) 酸棗仁七・〇(二

錢二)

右十一味共研細末篩去滓每服五錢清水煎澄去渣服每日二次。

適應症 主治肝腎氣血虧損頭暈目昏脇痛等症。

處方十五

地黃飲子(河間) 山茱肉一〇・〇(三錢) 石斛一〇・〇(三

錢) 麥冬一〇・〇(三錢) 五味子三・〇(九分) 菖蒲七・〇

(二錢一) 遠志四・〇(一錢二) 茯苓一〇・〇(三錢) 菴蓉五・

○(錢半) 肉桂二・○(六分) 附子二・○(六分) 巴戟天五・

○(錢半) 薄荷三・○(九分) 生姜五・○(錢半) 大棗三枚

右十四味剉作三百西西煎劑去渣一日分三次服。

適應症 腎水虛弱心火暴盛水不制火面赤煩渴口噤身冷四肢不收等。
慢性衰弱性腦貧血及全身衰弱虛性興奮一時性之腦充血均可用之。

(二)腦充血 舊稱肝火上升類中大厥等

病原 腦充血有急性慢性動脈性靜脈性之別動脈性充血之原因(一)身體過勞(疾走登山負重暴飲暴食則心肌動作旺盛)(二)心臟左室肥大(大動脈瓣閉鎖不全大動脈硬化特發性心肌肥大)(三)精神興奮(奮怒)(四)腦部加熱(日射病暖室中居住等)(五)中毒(酒精 Nitroglycerine

中等中毒則血管運動神經麻痺（六）身體他部血液減少時（冷浴則皮膚貧血腹部腫瘍鼓腸宿便等壓迫動脈則腦充血）（七）常習出血閉止時（月經痔出血之閉止）

靜脈性充血多爲慢性其原因（一）右心肌衰弱（則收縮期血液不能十分排出而右心房鬱血波及兩大靜脈由上大靜脈及於內頸靜脈及硬腦膜竇與腦靜脈如心臟瓣膜病心肌心囊之疾患及廣大之肋膜愈着時有此現象）（二）努力作用（吹奏者咳嗽患者便秘者嘔嚏）（三）上大靜脈或其末梢枝之壓迫如大動脈瘤縱膈膜腫瘍甲狀腺腫頸部淋巴腺腫時發生靜脈性腦充血（四）窒息亦爲靜脈性腦充血之一原因

病理 本病解剖之所見腦之白質呈潮紅色灰白質呈赤褐色血管內有血液多量往往見多數毛細管出血蓋因小血管破裂故也於軟腦膜見靜脈怒

張呈蛇行狀。於硬腦膜竇。則多量凝血。硬腦膜強度緊張。其表面有出血性沉着物。

症狀 (一) 急性腦充血時。眩暈頭痛。痙攣發作而卒倒。人事不省。顏面潮紅。

瞳孔縮小。顛顛動脈及頸動脈搏動強盛。脈搏強大。呼吸深大而發鼾聲。(二) 慢性腦充血時。頭重頭痛。眩暈不眠。眼花閃發。耳鳴。惡心嘔吐。精神過敏。或異常。有時運動麻痺。而知覺異常。或謂凡頸短而肥者。易發腦充血。蓋此等體格。於多食少運動者見之。靜脈性腦充血其症狀與動脈性者無大差。惟於後者則見動脈搏動旺盛。於前者則靜脈過於充盈。呈蛇行狀。顏面呈紫藍色。

治法 本病之治療。務去其原因。若多血者。則節減食物。爲適當運動。易上衝者。則慎房事。節烟酒。避身體及精神之過勞。若腦充血既發作時。則命其安靜。高舉頭部。貼以冰囊。強壯者可行刺絡法。虛弱者則於耳後貼用水蛭。其他誘

導法則與以下劑。或用芥子泥貼於胸部及腓腸部。或置患者於廣闊閑靜空氣流通之室。食物宜取無刺激性流動物。若慢性充血時。則使精神安靜。調整便通。禁吸烟酒。取易消化之食物。及新鮮空氣。頭痛不眠。則與以臭剝 Sulfo-nal 然鴉片 Chloralhydrate 則宜少用。

中藥治法 急性腦充血而身體壯實者。可用大黃。蘆薈。龍膽草。元明粉。等瀉下誘導劑。或用丹皮。牛膝。桃仁。芍藥。萸肉。地黃。等降輯劑。

慢性腦充血頭重頭痛。眩暈不眠。眼花閃發。耳鳴。惡心嘔吐。精神過敏。等症時。可用石決明。滁菊。天麻。羚羊角。桑葉。貝齒。玳瑁。青黛。地龍。等清涼鎮靜劑。

靜脈性腦充血。顏面呈紫藍色者。可用川芎。牛膝。川鬱金。丹皮。赤芍。等平血通經劑。

癱攣發作。卒倒時之急救。可用艾炳灸足底。或用刺激發泡劑如大蒜。芥子泥。

等塗足底心。取其反射性誘導血液之下行。其他如蠍尾、蟬衣、白芷、胡麻、龜板、鼈甲等鎮靜鎮痙劑均得應用。

要藥略釋

大黃內服能使腸部充血而奏瀉下及誘導血滯下行之作用。

用量一〇・〇——一五・〇（三錢至四錢半）

蘆薈爲通經藥。有瀉下作用。古稱瀉肝火實卽降血逆平血壓。因本品內服骨盆臟器起充血。故妊婦絕對禁用也。用量二・〇——三・〇（六分至九分）

元明粉應用之目的與大黃相同。如因腹部腫瘍鼓腸宿便等壓迫動脈而起之腦充血時。用本品與大黃等瀉下劑。最爲合理。且事實上腦充血之因於飽食及便秘等而起者最多。故壯實者以通便爲惟一之急救法。用量一〇・

〇——一五・〇（三錢至四錢半）

龍膽草爲苦味消炎藥。古稱瀉肝火。降胃熱。有消退上部急性充血發炎諸症。

如目赤頭痛、頭痕等之功。 用量五・〇——一〇・〇（錢半至三錢）

丹皮爲清血通經藥。對於血分有熱及炎性充血諸症。往往用之。 用量五・

〇——一〇・〇（錢半至三錢）

牛膝爲強壯性通經鎮痛藥。有降低血壓作用。古稱強腰膝、利脚氣。蓋本品有使下部充血之功能。故妊婦忌服。防其墜胎耳。 用量一〇・〇——一五・

〇（二錢至四錢半）

桃仁古稱破血行瘀、通月經、及癥瘕血閉。本品是清血變質通經藥。有鎮靜及輕性瀉下作用。與大黃伍用對於上部諸壯實性充血。如頭痛、牙痛、目赤、腫痛等能奏著要。 用量一〇・〇——二〇・〇（三錢至六錢）

石決明屬單壳類中前鰓類。如鮑魚之貝壳。古稱潛陽熄風、清熱明目。因本品有鎮靜神經作用。用於血壓過高、腦神經興奮、頭暈、目眩、目赤、翳障等症。用

量二〇・〇——三〇・〇（六錢至九錢）

桑葉爲鎮靜鎮痙藥。治頭痛。清涼解熱。兼有祛痰鎮咳作用。古稱祛風清熱涼血明目云。用量一〇・〇——二〇・〇（三錢至六錢）

貝齒屬腹脚類。爲貝子之壳。產於熱帶之海中淺岩礁石上。本品之種類頗多。小者如豆。大者長至三四寸。兩頭狹。一面作球形。一面稍扁平。自左右卷向內方。有一長孔。其左右邊緣排列如鏤刻之齒。外面滑澤。有光滑而美麗之斑痕。壳則極堅硬。入藥須火煨。研細。其作用與石決明相似。蓋取其鎮靜之作用也。用量二〇・〇——三〇・〇（六錢至九錢）

玳瑁屬象龜類。玳瑁之背甲。質透明而呈琥珀色。兼有深黑色斑紋。入藥須用其生者。古時用作解毒藥。並清熱熄風。潛陽日華諸家本草云。破癥結。消癰毒。止驚癇。嘉佑圖經本草云。磨汁服。解蠱毒。李時珍曰。解痘毒。鎮心神。急驚客忤。

傷寒熱結狂癇。蓋以其有清熱解毒鎮靜鎮痙之作用故也。 用量一〇・〇

——二〇・〇（三錢至六錢）

青黛卽靛青。爲蓼科植物蓼藍汁酵醱而成之藍素粉。爲有效之清涼解熱鎮靜解毒藥。古人用於小兒諸熱驚癇。大行頭痛發熱吐血。謂大瀉肝經實火。及散火鬱。蓋具有清涼性鎮靜消炎之作用故也。 用量一・〇——二・〇（

三分至六分）

地龍卽蚯蚓。爲有效之解熱利尿藥。且蟲類藥之通性。對於神經有弛緩作用。蓋本品用於血壓過高而動脈血管壁有硬化傾向時之腦神經麻痺有良效。陳藏器本草拾遺曰。主治天行之熱。小兒熱病癩癇。日華諸家本草治中風癇疾。李時珍治小兒急慢驚風。頭風齒痛。風熱赤眼。王清任醫林改錯補陽還五湯。內用本品治中風（腦出血）偏癱。據著者之經驗。於高血壓症時用之作預

防中風藥。頗具良效。西醫對於高血壓症之預防。血管破裂。有脈管皮製劑之注射。本品爲動物性類之。近於臟器療法者。殆與脈管相同。或有理想的特別作用。亦值得研究之一藥物耳。 用量一〇・〇——二〇・〇（二錢至六錢）

川芎有通經作用。在婦人內服時。能使子宮充血。與牛膝。赤芍等降血藥並用。對於腦充血爲理想之藥物耳。 用量二・〇——五・〇（九分至錢半）

鬱金爲藁荷科鬱金之地下莖。古稱解鬱行氣。涼血破瘀。爲通經鎮痛藥。對於靜脈血液之回流障礙。如門靜脈病之心痛。微背。並古人所謂之血氣心痛等。均可用之。 用量七・〇——一二・〇（二錢一至三錢九）

蟬衣爲清涼性鎮痙藥。實用於熱病痙攣。眩暈耳鳴。頭痛失音。喉頭及腦神經痙攣性諸疾患。 用量二・〇——四・〇（六分至一錢二）

白芷屬繖形科白芷之根。有芳香性鎮痙鎮痛作用。古稱發表解肌散風消腫。

破宿血補新血。用於頭齒痛、鼻淵鼻衄、婦人血風眩暈、血瀝腰痛等。據此則本品似有通經行血之功耳。用量四〇——七〇（一錢二至二錢）

龜板爲滋養強壯藥。古稱介類潛陽。蓋有滋養血液、鎮靜神經、緩慢循環等作
故也。用量一〇〇——二〇〇（二錢至六錢）

鼈甲亦滋養強壯藥也。其作用與龜板相似。其通經之效更著。所以古稱消癥
癥惡血、墮胎云。用量一〇〇——二〇〇（二錢至六錢）

處方一 三化湯（潔古） 厚朴五〇（錢半） 大黃一〇〇（三錢） 枳壳

一〇〇（三錢） 羌活五〇（錢半）

右四味剉，作兩百西西煎劑，去渣，一日分二次服。

適應症 治中風內有糞便之阻隔者。

處方二 涼膈散（方方） 大黃一〇〇（三錢） 芒硝一〇〇（三錢） 連

翹五・〇(錢半) 黃芩七・〇(二錢一) 甘草二・〇(六分) 山

梔七・〇(二錢一) 薄荷三・〇(九分) 竹葉一〇・〇(三錢)

右八味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次服。

適惡症 治溫病表裏實熱及心火上盛心膈熱壅中焦燥實煩躁多渴頭昏

目赤面發毒熱唇焦咽燥舌腫喉閉吐血衄血頰結硬口舌生瘡痰實不利

涕唾稠粘大小便閉諸風癰疽胃熱發斑譫語狂妄小兒急驚等症。

處方三 清火滋陰湯(沈氏錄注) 天門冬七・〇(三錢一) 麥門冬七・〇

(三錢一) 生地黃一〇・〇(三錢) 丹皮七・〇(二錢一) 赤芍七

・〇(三錢一) 山梔七・〇(三錢一) 川連二・〇(六分) 山藥一

〇・〇(三錢) 山萸肉七・〇(三錢一) 澤瀉七・〇(三錢一) 甘

草二・〇(六分) 赤苓一〇・〇(三錢)

右十二味剉作三百西煎劑去渣一日作二次服。

適應症 主治陰虛火旺能滋陰清火。

處方四 清心導痰丸(淮繩) 白附子 天花粉各二二。(二兩) 陳膽星

姜半夏各六七。(三兩) 白僵蠶炒 天麻 羌活各二二。

○(六錢) 川烏鹽製一〇〇。(三錢) 川連炒 鬱金各二二。(〇

(九錢)

右十味共研細末篩去滓姜汁糊爲丸如梧桐子大每服五十九白開水下。

日二服。

適應症 主治肝風。

處方五 瀉青赤湯(沈氏尊生) 龍膽草五。(錢半) 青黛二。(九分)

羌活五。(錢半) 防風七。(二錢) 梔子七。(二錢)

生地黃一〇・〇(三錢) 黃芩七・〇(二錢) 川連二・〇(六分)

木通四・〇(二錢) 甘草二・〇(六分)

右十味剉作兩百四煎劑去渣一日分二次服。

適應症 瀉心肝火。

處方六

清心滾痰丸(沈氏方) 製天黃黃 芩各一三〇・〇(四兩) 青礬

石 犀角 犀角 硃砂各一五・〇(四錢五) 沉香二・〇(六分)

麝香〇・三(二分)

右七味研極細末篩去滓水泛爲丸如梧櫨子大以硃砂爲衣每服六七十丸
開水送下一日二次。

適應症 治心熱痰結。

處方七

瀉青丸(張乙) 當歸 龍膽草 川芎 山梔 大黃 羌活 防

風各等分

右七味共研細末，煉蜜爲丸。如芡實大，每服二錢至三錢，竹葉煎湯送下，一日三次。

適應症

治肝膽實熱，多驚多怒，不能安眠，目斜視狀，黑睛紫小，白睛青赤，腫痛，大便不通，腸風便血，陰汗，臊臭，小兒急驚，抽搐，痰熱，目直竄視。

處方八

當歸龍薈丸（錢乙） 全當歸酒洗炒 龍膽草炒 山梔炒 黃連炒

黃柏炒 黃芩炒 各二三錢 大黃酒浸炒 蘆薈 青黛水飛

各二〇・〇（六錢） 木香一〇・〇（三錢） 麝香〇・三（二分）

右十一味共研細末，篩去滓，煉蜜爲丸，如小豆大，每服二三十丸，開水送下，一日二次。

適應症

治肝經實火，頭暈目眩，耳聾耳鳴，神志不寧，驚悸搖擲，躁擾狂越，咽

膈不利。大便閉結。小便澀滯。或胸脅作痛等症。

處方九

涼膽丸(瘍醫大全)

黃連

黃芩

荆芥穗

龍膽草各二〇・〇

〇

(六錢)

蘆薈

防風各三三・〇

(二兩)

黃柏

地膚子各一〇・〇

(三錢)

右八味共研細末。篩去滓。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二三十丸。開水送下。一日二次。

適應症

治眼狀青色。兩眦澀痛。昏花生翳。淚下口苦。不思飲食。

處方十

鎮心丸(準繩)

牛黃

鉛霜

鐵粉

俱另研

各二〇・〇(六錢)

硃砂水飛

龍齒另研

龍膽草

天竺黃另研

遠志

生乾地黃各

一五・〇(四錢半)

金箔五十九

人參

犀角

茯神各三三・〇

(二兩)

右十四味研爲細末，篩去滓，煉蜜爲丸，如小豆大，每服七丸，不拘時，竹葉湯送下。

適應症 治心風狂言多驚迷悶恍惚。

處方十一 清心湯（沈氏曾生） 生甘草二〇（六分） 連翹七〇（二錢）

山梔七〇（二錢） 黃芩七〇（二錢） 黃連二〇（六分）

大黃二〇（三錢） 薄荷二〇（九分） 朴硝一〇（三錢）

竹葉一〇（三錢）

右九味剉，作兩百西西煎劑，去渣，一日分二次服。

適應症 治上焦積熱。

處方十二 清肝導赤湯 生地一〇（三錢） 丹皮七〇（二錢） 澤

瀉七〇（三錢） 赤苓一〇（三錢） 山梔七〇（二錢）

人中黃 〇・〇 (三錢) 赤芍七。〇 (三錢) 木通五。〇 (錢半)

右八味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 主治目衄。

處方十三 滌痰湯(準繩) 製膽星四。〇 (二錢) 半夏七。〇 (三錢)

枳實一〇。〇 (三錢) 茯苓一〇。〇 (三錢) 橘紅五。〇 (錢半)

石菖蒲七。〇 (三錢) 人參四。〇 (二錢) 竹茹一〇。〇 (三

錢) 生甘草三。〇 (九分)

右九味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 治類中風痰迷心竅舌強不能言。

(三) 腦出血

舊稱真中風中臟中腑等

病原 腦出血之主因，乃由動脈病變而破裂之故。動脈變化之原因，有下列

種種：(一)年齡。血管與年齡共變化，故本病發於老人四十歲以上者。(二)酒精及鉛中毒。(三)梅毒痛風等病，常損害動脈而為本病之誘因。(四)心臟肥大及血壓亢進。(五)慢性腎炎(萎縮腎)。(六)不適當之生活法及肥胖者。

本病發生之動機有三：(一)血管壁之變化，如脂肪變性、粉瘤變性、動脈瘤形成。(二)血行之關係，如靜脈血行之障礙，全血管系血壓之亢進。(三)血管周圍腦實質之抵抗力減少，如炎症軟化、老衰性萎縮等。動脈病變則血壓亢進而破裂，其症狀恰如長堤遇洪水，決則潰而破壞，故憤怒、身體勞動、飽食、飲酒、交接溫浴(使血行旺盛)、冷水浴(皮膚血管收縮而深部充血等)實為誘起本病之原動力。他如萎縮腎動脈硬化時，則心臟左室肥大，大動脈血壓亢進，亦為本病之誘因。有時因靜脈系統鬱血而發本症，如上廁、分娩、提舉重物。

咳嗽、噴嚏、哄笑時遇之。又於事實上本病似有遺傳關係。一說因腦動脈抵抗微弱，或易罹心臟腎臟疾病之素因，遺傳於其子孫，或自父母直接遺傳梅毒及酒精之害故云。而體格佳良，肥胖多血，頭大頸短者，易罹本症。此名中風素質 *Hæmispoplecticus*。大抵男子較女子易罹此疾，而冬夏之時為多。某醫研究患此病者二十三人，其中以過用肌力為病原無一人。

病理 因出血之多少不同，可別為點狀出血（毛細管出血）及灶狀出血（集合出血）二者。點狀出血 *Punctiforme od. papillare Blutung* 於臨床上無甚價值。其最大者如帽針頭，若以手指擦過其表面，仍不能拭去此血點。此與血管橫斷面區別之點也。當腦動脈之小血管壁破壞時，其血液先逸出於血管外膜淋巴腔，而呈動脈瘤狀。其後淋巴腔亦破裂，血液遂溢出於隣近之腦實質。然此時並無障害發生。惟點狀出血多數密集時，乃現集合出血之症狀。即

竈局症候是也。竈狀出血 Herdod. massadlutu^{os} 之部位雖不一定。然大多數在 Sylvii 氏窩動脈之一定分枝內。此動脈之在腦基底部者。其分枝直達於大腦神經節。其中分佈於尾狀核。水晶核內囊及視神經狀之動脈枝。更易破裂。蓋此部與頸動脈幹最接近。故距心臟亦較近。且爲終末動脈。少吻合之枝流。故受血壓亦較大。而血液溢出時。內囊視神經牀半卵圓中樞。每被侵襲。其臨床上症候。卽爲反對側之腦性偏癱。是因內囊後脚中央三分之一部出血故也。蓋運動性錐狀體徑路。乃由腦皮質發端。通過冠狀房束。經內囊後脚三分之一部。而達末梢。故易被侵害。腦出血部稍巨大者。當頭蓋骨剖開時。見其半球之硬腦膜強度緊張。迴轉亦平坦。溝淺而貧血。出血竈之大小。種種不同。有時甚狹小。有時侵及半球大部。然以榛實大或胡桃大者爲多數。出血竈之形狀有種種。圓形長形或不正形。然白質內之出血常微細。是因白質之

抵抗力較灰白質爲強也。新鮮之出血竈呈糜粥狀。由碎裂之腦實質及溢出之血液而成。血液漸漸凝固。經時既久。則赤血球崩壞。血色素分解後。遂被吸收。僅透明粒漿樣之液充盈其部。是名中風性囊腫 *apoplectic cyst* 或囊腫萎縮成癍痕。是名中風性癍痕 *Apoplectic Haem* 出血竈多存於中心神經節及內囊附近部。而皮質大腦脚 *corpora striata* 氏橋及小腦部次之。蓋內囊附近常多粟粒動脈瘤。其受血壓較他處爲多故也。

症狀 本症可分爲數期。然各期非必完備。如前驅症或隱或現是也。依常例而論。每在康健之際。或執行常務時。突然發作。然間亦有在執行略爲勞力之動作時發作。大腦出血之起也。大有異動。或猝然意識（知覺）喪失。而四肢完全弛緩。此可名爲猝中風 *Apoplectic stroke* 或病起較漸。須病者跌倒後數分鐘。或四肢顯癱後。意識始喪失。然間或有頭內充血。眩暈頭痛。眼花閃爍。耳

鳴不眠。言語澀滯。精神興奮。半身之知覺運動障害。及偏側蟻走感覺之前驅期者。此即腦髓內小出血之症也。卒中發作時。患者卒然人事不省而昏睡。卒倒。運動知覺及反射俱廢絕。除呼吸及心働外。殆與死者無異。往往有即死者。是名電擊中風 *Apoplexia fulminans*。其昏睡中。顏面潮紅。頸動脈及顳顬動脈。強度搏動。呼吸深長而發鼾聲。脈搏緊張。瞳孔散大。或左右不同。而反應缺如。有時或嘔吐及兩便失禁。若昏睡持續時。則呼吸疾速不正。喉頭及氣管之粘液積聚而發喘鳴。呼吸時頰部陷沒。眼球角膜亦混濁。體溫先降後昇。遂至於死。亦有數度發作。漸就恢復者。蓋出血歇止。病竈收縮。其崩壞之內容漸漸吸收。附近之壓迫減退。則患者自醒。然醒後漸就恢復。而再被中風侵襲。至於死者有之。當患者人事不省時。欲珍知其身體何側陷於麻痺。頗屬難事。然大抵患側之上下肢體緩軟弱。其皮膚對於外界刺激。無反射運動。試提舉其上肢。

或下肢而放擲之。則不麻痺側之肢必漸漸墜下。麻痺側者急劇墜下。是死物然。於此可推知其麻痺側也。卒中症狀有徐徐現出而非急發者。其初僅精神異常及偏側上下肢萎弱之感。後乃陷於人事不省而完全麻痺。所謂緩慢性卒中發作是也。卒中發作後第三四日。出血灶之周圍發生炎性現象。此名炎症反應。此時體溫升進（攝氏二度以上）脈搏頻數。發汗頭痛。譫妄嗜眠。轉輾牀上。如此持續至一兩日間。發作期及反應期雖爲腦出血之主徵。然時或缺如。僅輕度之神識障害。或絕無障害。而卽呈墜廢症候。蓋廢作狀態有種種輕重不同者。因出血之範圍遲速多少位置有不同也。卒中反應症候漸退。則墜廢症候顯著。若出血在內囊附近。則他半側運動麻痺。此名腦性偏癱。如顏面神經舌下神經四肢之麻痺是也。惟顏面神經中。僅其下枝（頰鼻口肌）麻痺。而上枝（前頭肌。皺眉肌。眼輪匝肌）之所以免侵襲者。其理由尙未明。一說上

枝主宰於大腦兩側。一側大腦障害時，則他側可代償其機能。一說顏面神經上下之枝中樞及纖維實分划二區，故二說未知孰是。舌下神經麻痺，則舌挺出時，因健則頰舌肌偏勝，故傾斜於麻痺側。四肢麻痺中，下肢較上肢為甚，且因斜方肌麻痺，而偏側肩胛骨下降。因胸肌麻痺，而一側呼吸運動微弱。腹壁之努力作用減退。其麻痺肌肉因廢用之結果，進成不動性萎縮。其麻痺肢厥冷色白，或現浮腫。患側之臀部初現潮紅，繼生水泡，而變壞疽者有之。是名急性惡性褥瘡。本病常見共同運動症 *Mitbewegung*。其麻痺側之筋肉，雖不能為隨意運動，而於嘻笑啼泣噴嚏時，則現不隨意的運動。如觸動其健康側，則胃側亦隨之而動。試舉其肱或屈曲其股關節，則足亦向背面屈曲。故麻痺發生後，其部常見一種異樣之不隨意運動。所謂偏癱後半身舞蹈病。上下肢之運動麻痺，倘能恢復，則其上肢常較下肢為遲，且恢復程度亦不及下肢為良。至

於續發性短縮症狀。係由於脊髓錐狀體經路之續發變性。故其手指屈曲而牽縮。上臂向胸廓內轉。前臂回前而屈曲。下肢則伸展而牽縮。足尖向下方迴轉（微向內方）步行之際。賴骨盆之迴轉運動。以下肢向外方划圓。方能前進。半身不遂性麻痺症之恢復期。大概於發病後半年以內見之。惟腦動脈變未消失時。則有再發之虞。內囊附近出血時。其知覺機能略有害。或毫無障害。然中風發作之直後。或見知覺脫失者。因出血竈之壓迫知覺纖維故也。若知覺纖維被刺激時。則發生知覺過敏。及知覺異常症。但內囊最後部出血時。則完全半身知覺脫失。與運動性半身不遂常相併發也。

治法（一）預防法 凡發生粟粒動脈之原因。如濫用酒精。梅毒。不適當之生活法等。皆須慎避。凡易使動脈瘤破裂之誘因。如身體勞動。精神感動。飲酒冷浴便秘等。亦須戒慎。（二）發作時之處置 靜臥患者於廣闊閑靜之

室避強烈之光線。高舉頭部。置冰囊於出血部（推測）若脈搏充實。頸動脈強盛。心悸亢進。顏面潮紅者。則行刺絡法。Aclerlass（瀉血約五百立方仙米）患者往往因此而醒。（以前多用此法。然現今學者多非難之）胸部腓腸部足蹠等處。可貼以芥子泥。昏睡劇甚。則與以樟腦 Aether 痙攣則以抱水格魯兒灌腸。且注意於患者臥位。及身體清潔與否。以防褥瘡發生。（二）發作後之處置 勿談話。應接守安靜。避精神刺激。若不安不眠。則用臭剝嗎啡 Cod. sin 阿片 Sulfordl 等調整便通。與以容易消化之滋養劑。如牛乳粥。肉汁鷄卵等。發作二週後。則用沃剝使溢血易吸收。（但除梅毒性腦出血外無大效）發作後一二月於頭部或頸部通以平流電氣。其法以大導子置於病灶存在之頭部。以小導子貼於下顎隅之下後部。或以積極導子於兩下顎隅及項部間移動貼置。以消極貼於胸骨上。每週通電。四至五回。每回時間。不宜超過五

至六分間。其電流之強度則以 2-3 m.a.p. 若以刺激之目的。則用感傳電氣。或以平流電氣之消極。貼於麻痺部。以防不働性萎縮。以上乃西醫之療法。

中藥治法 電擊性中風。不論中西。皆無辦法。若較輕性者。在氣管粘液積聚。而發喘鳴時。與竹瀝。礞石。天竹黃。南星。半夏等。

身體一側陷於麻痺。而呈半身不遂時。姑用全蠍。天蟲。白花蛇。蜈蚣等。

發作後。出血病灶。發現炎症反應。而體溫增高。唇舌殷紅。脈搏頻數時。可用鮮生地。丹皮。赤芍。山梔。石膏。犀角等。

舌下神經麻痺。而言語蹇澀。涎分泌過多時。可用白附子。遠志。石菖蒲。半夏。南星。貝母等。

如呈汗出厥冷等。衰脫症狀時。急用黃芪。附子。黃肉。龍骨。牡蠣等救之。

或呈高熱。目赤。頭痛。便閉。脈大等。充實性症狀時。可用大黃。芒硝。龍胆草。柴胡。

山梔、黃芩等。

要藥略釋

竹瀝卽以鮮竹截去節用炭火燃燒逼出之油樣液汁爲極清涼

之鎮靜消炎制泌藥。本草衍義治中風失音不語養血清痰痰在經絡四肢皮

裏膜外非此不達不行云。本草求真謂竹之與瀝猶人之與血也極能補陰長

於清火性滑流利走竅逐痰故爲中風要藥且中風莫不由於陰虛火旺煎熬

津液成痰壅塞氣道不能昇降服此流利經絡使痰熱去氣道通而症自愈故

火熱之痰宜之而寒溫食積之痰不可用也云云觀本草求真王氏宮繡之論

則本品之具有清涼性平降血壓鎮靜消炎制止氣管粘液之分泌等作用彰

彰明甚也。用量一〇〇西西至二〇〇西西（半杯至一杯）

礞石爲巖石類之一種。人藥以色青者爲佳。故有青礞石之名。古稱瀉痰熱破

癥積。治積痰驚癇咳嗽喘急。本品有鎮靜及瀉下作用。實用於小兒急慢驚風。

痰涎壅塞及中風體壯實痰潮上湧之際爲急救藥因其質堅硬入藥須經火煅透用之。用量一〇・〇——一五・〇（三錢至四錢半）

天竹黃卽嶺南大竹節中液汁凝結之石樣塊大明諸家本草用治中風痰壅卒失音不語小兒客忤癇疾具有清涼鎮靜鎮瘳解熱化痰之功。用量五・

〇——一〇・〇（錢半至二錢）

南星卽天南星入藥多用牛膽製成者名膽星因生南星有毒入口令舌麻木故須以薑汁饌湯泡浸或研粉漬入膽囊中愈陳則愈佳故又名陳膽星開寶重定本草主治中風麻痺除痰下氣利胃膈攻堅積消癰腫散血墮胎因其有鎮靜祛痰等作用故也。用量二・〇——五・〇（六分至錢半）

半夏爲天南星科半夏之塊根其功效與南星相似而力較遜生半夏入口亦令舌麻木故須用水泡浸去滑涎並漬以薑汁處方用名姜半夏有鎮嘔及祛

痰作用。用量五・〇——一〇・〇（錢半至二錢）

天蟲係用蠶蠶爲蠶患絲狀菌寄生性傳染病而自斃者。屍體白硬。強直者良。爲有效之鎮瘳藥。用於驚癇抽掣中風失音。古稱治風化痰散結行經。故關於神經性類之所謂風病。古人往往用之。用量五・〇——一〇・〇（錢半至二錢）

白花蛇卽蕘蛇之一種。因其背有花紋而色白故名。古來用於中風濕痹不仁。筋脈拘急。口眼喎斜。半身不遂等症。蓋本品有強壯性。恢復神經麻痺之功。對於腦出血之頽廢期。神經陷於麻痺。而呈半身不遂時頗合。入藥用其風乾之肉。用量五・〇——一〇・〇（錢半至二錢）

蜈蚣亦爲強力之鎮瘳藥。似有恢復神經麻痺作用。根據古代記載。主治口眼喎斜。小兒天吊。口噤不開。以及急慢驚風。角弓反張。臍風撮口等症。則鎮瘳之

功可知也。 用量二・〇——四・〇（六分至一錢二）

鮮生地卽生地黃爲清涼性清血解熱藥專用於血熱吐血衄血頭痛目赤舌質鮮紅兩唇殷紅等症。凡血分有熱諸症。用本品能沉靜循環平降血壓減退燃燒。使體溫降低降神經輕快之效。 用量一・〇——三・〇（三錢至九錢）

由梔爲清涼解熱藥。有清血消炎鎮靜等作用。古稱瀉三焦之火。解五志之鬱。治心中煩悶。懊憹不得眠。心火口赤吐血衄血熱厥頭痛等症。 用量一・〇

〇——二・〇（三錢至六錢）

石膏爲清涼解熱藥。能沉靜循環。鎮靜神經。故對於因高熱而來之神經疾患。如狂躁讖妄頭痛煩渴等症有特效。 用量二・〇——五・〇（六錢至一兩五錢）

犀角卽西牛之角。其成分內含碳酸石灰及磷酸石灰膠質與硫化乳酸等爲一種強壯強心解熱解毒藥。用於急性熱病之頭痛發熱。狂言妄語吐血衄血發斑發疹等。血中燃燒作用過盛而高熱侵腦時。頗具良效。 用量一。○

——三。○（三分至九分）

白附子爲毛茛科。白附子之根。色白。乾者皺紋有節。又名竹節白附子。與黑附子不同。古來用於中風失音及一切冷風血痺。面上百病。並謂能逐寒濕。祛風痰補肝虛。引藥勢上行。此蓋對於顏面神經麻痺等痛。殆有相當之作用耳。 用量二。○——五。○（六分至錢半）

遠志爲祛痰藥。但古稱能補不足。除邪氣。益智慧。聰耳目。定驚悸。據此則本品於祛痰作用之。如尙有鎮靜鎮痙安腦等功用耳。 用量三。○——五。

○（九分至錢半）

石菖蒲入藥用其根。本品有健胃祛痰作用。並能刺激神經。興奮神經。對於腦病而呈神經麻痺狀態時得賞用之。 用量二・〇——五・〇（六分至錢半）

貝母藥市有川貝母。象貝母之分。功效則二種相同。均屬百合科。貝母之地下球根。有祛痰鎮咳作用。用於痰多氣逆胸膈妨悶等症。能使痰易驅出。同時又使氣管分泌減少。可免多量痰沫之釀成。 用量五・〇——一〇・〇（錢半至三錢）

龍骨爲古代之象類動物骨骼。入土化石者。用爲強壯藥。有收斂及鎮靜作用。古稱斂心神。潛浮陽。固精鎮驚。對於汗多氣逆滑脫下利等症之有虛脫傾向時能奏急救之功。 用量一・〇——二・〇・〇（三錢至六錢）

牡蠣屬瓣鰓類中單柱類。牡蠣之貝壳。產於熱帶及溫帶之海岸。尤於有淡水

流注弱鹹性之海中岩礁或沙泥上多產其成分爲碳酸鈣、磷酸鈣、珪酸等有鎮靜強壯制酸制泌作用。古稱軟堅潛陽化痰消癥癰結核治崩帶遺泄。蓋本品入胃後能中和鹽酸入血使血液凝固力增強減少分泌而對於腦神經尤有顯著之鎮靜作用。 用量二〇・〇——四〇・〇（六錢至一兩二錢）

柴胡爲清涼藥。賞用於頭痛發熱胸脇苦悶嘔逆等症。用作解熱消炎清腦劑。 用量二・〇——四・〇（六分至一錢二分）

黃芩屬玄參科。黃芩之根。用作清涼解熱消炎藥。張元素珍珠囊云。瀉心肺火。療上焦熱。目中瞳赤。瘀血壅盛。上部積血。養陰退陽。本品與柴胡龍膽草伍用。對於充實血之中風發熱。可收頓挫之效。 用量三・〇——六・〇（九分至一錢八分）

全蠍。丹皮。赤芍（卽芍藥）黃耆。附子。黃肉。大黃。芒硝（卽元明粉）龍膽草等均

見前。

處方一

強神湯（本朝經驗）

紅花二・〇（六分）

殭蠶一・〇（三錢）

棕

櫚葉一三・〇（三錢九） 甘草三・〇（九分）

右四味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 主治中風口眼喎斜半身不遂喜欠流涎者。

處方二

解語湯（永類吟）

桂枝一・〇（三分）

防風五・〇（錢半）

獨活

四・〇（二錢二分）

附子一・〇（三分）

羚羊角二・〇（六分）

甘

草二・〇（六分） 酸棗仁一〇・〇（三錢） 天麻七・〇（三錢一）

右八味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 主治心脾經受風言語蹇澀舌強不轉涎唾盛溢神昏鬱塞心脈閉

滯暴不能言。

處方三

定搖散(準繩) 天麻七・〇(二錢) 白附子五・〇(錢半) 製膽

星三・〇(九分) 蠍尾三・〇(九分) 白花蛇頭酒炙五・〇(錢半)

硃砂二・〇(六分) 雄黃四・〇(二錢) 乳香四・〇(二錢)

代赭石二・〇(六錢) 赤脚蜈蚣酒炙一條 龍腦〇・二(六厘)

麝香〇・二(六厘)

右十二味共研極細末篩去滓每服五分開水冲服

適應症 治急驚四症八候併作

處方四 定風餅(沈氏尊生) 天麻 川烏 南星 半夏 殭蠶 川芎

茯苓 生甘草 各等分

右八味研為細末姜汁為丸如芡實大捏作餅子硃砂為衣每服一餅細嚼生

姜湯送下

適應症 治中風並預防風疾再發。

處方五

青雲散(準繩) 石蓮四・〇(二錢) 製膽星 殭蠶 全蠍 麝

金 各一・〇(三錢) 雄黃三・〇(九分) 粉霜一・〇(三分)

右七味研極細末，篩去渣，每服五分，開水沖服。

適應症 治中風口眼喎斜。

處方六

天麻散(衛生寶鑑) 天麻七・〇(三錢) 半夏七・〇(三錢)

甘草二・〇(六分) 茯苓一・〇(三錢) 白朮七・〇(三錢)

右五味剉，作兩，西煎劑，去渣，一日分二次服。

適應症 治中風涎盛，半身不遂，言語艱澀，不省人事，急慢驚風。

處方七

資壽解語湯(沈氏尊生) 羚羊角二・〇(六分) 桂枝二・〇(六分)

羌活五・〇(錢半) 甘草二・〇(六分) 防風七・〇(三錢) 附

子一・〇(三分) 酸棗仁七・〇(二錢一) 天麻一〇・〇(三錢)

竹瀝五西西(一兩三錢) 姜汁三滴

右八味剉作兩百西西煎劑去渣沖入竹瀝姜汁一日分二次服。

適應症 治風中心脾舌強不語。

處方八 犀角地黃湯(千金) 犀角二・〇(六分) 生地黃一〇・〇(三錢)

牡丹皮一〇・〇(三錢) 芍藥七・〇(二錢一)

右四味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 治傷寒溫病熱傷血分吐血衄血蓄血瘀血溺血婦人倒經血崩赤

淋妊娠吐血產後衄血等症。

處方九 犀角丸(準繩) 犀角屑 羚羊角屑 天麻 防風 羌活 沙參

遠志 茯苓 川升麻 天門冬 萎蕤 元參 各二〇・〇(六

錢) 牛黃另研 麝香另研 各五・〇(錢半) 龍齒另研 鐵粉另研

硃砂水飛 各四・〇(一錢二) 金箔 銀箔俱另研各二十片

右十二味共研極細末篩去滓與另研藥和勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸開水送下

適應症 治心臟中風言語顛倒神思錯亂頭面心胸煩熱或時舌強語澀驚不安

處方十 犀角防風湯(統旨) 犀角磨沖二・〇(六分) 防風五・〇(錢半)

甘草三・〇(九分) 天麻七・〇(二錢一) 羌活五・〇(錢半) 滑

石一・〇(三錢) 石膏一・〇(三錢) 麻黃一・〇(三分)

獨活五・〇(錢半) 生山梔五・〇(錢半) 荆芥五・〇(錢半)

連翹五・〇(錢半) 當歸五・〇(錢半) 黃芩七・〇(二錢一)

全蠍炒二・〇(九分) 薄荷三・〇(九分) 桔梗四・〇(一錢二)

白朮七・〇(二錢一) 細辛二・〇(六分)

右十八味剉作三百西煎劑去渣冲入犀角汁一日分二次服。

適應症 治一切諸風口眼喎斜手足躄拽言語蹇澀四肢麻木者。

處方十一 犀角散(聖惠) 犀角 石膏 各三三・〇(二兩) 羌活 羚羊

角屑 各二五・〇(七錢五分) 人參 川獨活 黃芪 當歸

防風 甘菊花 川芎 白朮 黃芩 天麻 酸棗仁 枳壳

白芷 各一六・〇(四錢八) 甘草八・〇(三錢四)

右十八味研極細末每服五錢用水五十西煎劑去滓分溫服。

適應症 治肝膽中風流注四肢上攻頭面疼痛言語蹇澀及上焦風熱口眼

喎斜脚膝痛無力。

(四) 腦梅毒

病原 本病爲第三期梅毒。傳染後經過數年而發本症。亦有遺傳梅毒之發病。與後天性梅毒相似者。而頭外傷。精神過勞。酒精中毒。亦能增加本病素因。

病理 (一) 護謨腫性腦底腦膜炎 Basale Gummosse Meningitis 多發於視神經交叉部。蔓延於腦底。患部呈膠樣或豚脂樣。或生結締織性胼胝。而與腦底愈着。腦底神經遂被浸潤或壓迫。視神經及動眼神經被害最多。(二) 分划性護謨腫多發於腦後。(三) 梅毒動脈炎。亦常侵襲腦底動脈。此時動脈內層增殖肥厚。管腔狹小。或直接間接發生血塞。致管腔閉塞。其他發生肌層炎及外膜炎者亦多。顯微鏡下見新生物爲富有細胞及血管之肉芽組織。其一部分已呈乾酪變性。及結締織變化。然決無化膿之狀態。腦梅毒所固有者。新生

物與血管神經之關係是也。其圓形細胞滲潤。速移行於血管外層及神經外膜。於是此肥厚之外膜發生結締織束。富有血管而繁殖於神經纖維羣之間。致神經增大至四五倍。然固有之神經纖維。却以壓迫而萎縮也。

症狀

(A) 蔓延性腦底腦梅毒 *Bittuse, basale, Himsyphilis* (1) 一般症候

其主要症即為頭痛。往往於夜間增劇。或發嘔吐。眩暈。失神。痙攣發作等症。通常患者精神障礙或遲鈍。記憶力減少而成無慾狀態。其甚者嗜眠昏睡。或精神發揚而發躁狂。(二) 病灶症候 以病灶之壓迫。致腦底腦神經麻痺。其中以視神經及動眼神經最易被害。其他嗅神經。面神經。聽神經。舌下神經。迷走神經等。亦有被害者。然此病灶症候。非腦梅毒所固有者。於他之腫瘍及結核性腦膜炎亦見此症。惟本病有特異之點。即其症候之強度。常變換而不固定。或隱或現是也。蓋神經周之肉芽組織。增殖死滅。互相遞嬗。故對於神經

之壓迫亦有增減。本症經過多爲慢性。久時頭痛之後。遂發麻痺症狀。一進一退。綿亘數年。

治法 嚴行驅梅毒療法。西藥內服沃剝。及塗擦水銀軟膏。或行溫泉療法。水治法及規則整嚴之生活法。亦爲有效。

中藥治法 腦梅毒主要以驅梅毒療法作原因之治療。本病之治療藥物。中藥確不若西藥之效確而迅捷。如「六〇六一九一四」等之注射。然慢性而頑固之腦梅毒。注射療法而不瘳者。用中藥之驅梅毒療法。如土茯苓。忍冬藤。輕粉。生甘草。金銀花。皂角核等。多服久服。亦能奏著效。

其他對症療法。如頭痛甚。則用羚羊角。蔓荊子。滁菊。羌活。獨活。白芷。防風等。失眠用棗仁。茯神。柏子仁。石決明。夜交藤等。

記憶力減退。而呈無慾狀態時。黃芪。鹿角。益智仁。牛膝。川斷等。均可選用。

兼呈麻痺症狀時。得用皂角刺。全蠍。白花蛇。赤芍。桃仁等。又大黃。木通。葶藶。米仁。滑石。澤瀉。黑豆。赤豆等。利尿性排毒藥劑。亦可臨時選用。

要藥略釋 土茯苓屬百合科葶藶類。土茯苓之塊根。又名仙遺糧。一名土葶。

蘇李時珍云。味甘平。無毒。健脾胃。強筋骨。去風濕。利關節。治拘攣骨痛。梅毒惡瘡。解汞粉銀珠毒。荷蘭藥鏡曰。本品之根含粘液。味帶甘。乾則其質如粉。氣味淡薄。能緩和酷厲毒。且能發汗。利小便。有排毒清血之效。又治梅毒。冒寒傷冷毒之肢節痛。歷節遊走痛。及經久污穢之潰瘍瘰癧。有瘡毒之水腫。小兒潛帶瘡毒之肢節痛等。用此煎湯。日服五六碗。發汗利小便。能排除其毒云。蓋本品爲緩和性利尿排毒藥。須多服久服方有效。 用量三〇〇——七〇〇。

(九錢至二兩一錢)

忍冬藤卽金銀花之籐。本品凌冬不凋。故名忍冬。爲有效之解毒解熱藥。古來

用於一切風濕氣及諸腫毒。癰疽疥癬。楊梅諸惡瘡。散熱解毒云云。肘後方治五種尸疰。一飛尸。一遊走皮膚洞穿臟腑。每發刺痛變動不常。一遁尸。一附骨入肉。攻擊血脈。每發不可見。一死尸。一聞哀哭便作。一風尸。一淫躍四末。不知痛之所在。每發恍惚得風雪便作。一沉尸。一纏結臟腑。冲引心脇。每發絞切。遇寒冷便作。一尸疰者。舉身沉重。精神錯雜。常覺昏廢。每節氣至則大作。並是身中尸鬼。引接外邪。宜用忍冬莖葉剉數斛。煮取濃汁煎稠。每服鷄子大許。溫酒化下。一日二三服。按此之所謂五種尸疰者。以症狀推之。不外乎潛伏性神經梅毒等疾患也。用量三〇・〇——七〇・〇（九錢至二兩）

輕粉化學上稱之謂甘汞。爲梅毒之主要藥。有攻毒及瀉下作用。外用直接撲滅細菌及其他寄生蟲之功。對於局部粘膜且無刺激性。故梅毒潰爛及皮膚癬瘡等。往往用之。內服每每發生齟齬糜爛流涎等副作用。如與重量生甘草

並用則可免此弊。下疳梅毒、關節毒、神經毒、或腦梅毒、諸惡毒痼疾用本品○
○二五和入白糖半瓦，或和生甘草及其他緩和藥物爲丸投與。如患者齒齦發現紅腫，則暫停數日可也。用量○·○六——○·一○（一厘八至三厘）一日量。

生甘草爲緩和性解毒藥。古稱和百藥。解百毒。因其含有緩和粘滑性之樹膠糖類。大量內服有緩下作用。同時能滋潤粘膜組織。奏祛痰鎮咳之效。用量作緩和解毒用。一○·○——二○·○（三錢至六錢）祛痰鎮咳用。二·○——四·○（六分至一錢二）

銀花卽忍冬藤之花。爲一種解熱解毒藥。古來專用於諸瘡痒及赤利。本草綱目治飛尸遁尸風尸沉尸尸症鬼擊一切風濕氣及諸腫毒。癰疽疥癬楊梅諸惡瘡。散熱解毒云。用量一○·○——二○·○（三錢至六錢）

皂角核卽皂莢之核仁。或用圓肥皂之核尤佳。二者之功效相同。其作用有瀉下及解毒之功。千金方治腰脚風痛。不能履地。李時珍治風熱大腸虛祕瘰癧腫毒瘡癰外科金鑑。用治梅毒頭痛使祕。用量三・〇——六・〇（九分至一錢八）

蔓荊子屬馬鞭草科蔓荊之子實。爲清涼性強壯藥。古稱散風熱。治頭痛。去筋骨間寒熱濕痺拘攣。利關節。治癩疾。明目堅齒。久服輕身。此蓋有排毒清血變質鎮靜清涼強壯之功耳。用量五・〇——一〇・〇（錢半至三錢）

羌獨活卽羌活與獨活。二物之作用相同。均爲鎮痛鎮痙藥。賞用於頭痛關節痛。一切神經痛。古稱去風濕。治濕痺。蓋神經痛性諸疾患。均得採用爲對證之治療。用量單用羌活或獨活五・〇——一〇・〇（錢半至三錢）羌獨活並用一〇・〇——一五・〇（二錢至四錢半）

防風爲繖形科防風之根。有鎮痛及鎮痙作用。神農本草經主治大風頭眩痛惡風風邪。目盲無所見。風行週身骨節疼痛。久服輕身云。 用量三・〇——六

・〇（九分至一錢八分）

酸棗仁屬鼠李科酸棗之子仁。爲收斂性之滋養藥。有鎮靜安神之功。本經主治心腹寒熱邪結氣滯。四肢酸痛濕痺。別錄主治心煩不得眠。臍上下痛。久泄虛汗。補中益肝氣。堅筋骨。助陰氣。令人肥健。以其有滋養性。強壯神經及鎮靜之功故也。 用量一〇・〇——一五・〇（三錢至四錢半）

茯神卽茯苓之中心抱松根而生者。爲緩和性鎮靜安神藥。用於驚悸失眠。風虛頭眩。記憶力減退。善忘等症。 用量一〇・〇——一五・〇（三錢至四錢半）

柏子仁屬松杉科側柏之子仁。爲滋養強壯藥。有潤滑緩和鎮靜安神作用。實

用於血虛大便燥結精神興奮驚悸不眠頭暈耳鳴腰痛肢節痠楚等症。

用量七・〇——一四・〇（二錢一分至四錢二分）

夜交藤屬蓼科何首烏之莖葉有滋養鎮靜作用並能和血脈治痺痛對於血液枯耗之肢節痠痛及心悸不眠等症用之頗合 用量一〇・〇——一五

・〇（二錢至四錢半）

黃耆爲緩和性滋養藥主治癰疽久敗瘡生肌長肉之外荷蘭藥鏡謂治梅毒及痢疾頗有功效蓋以其有緩和粘滑性而能中和酷厲毒若用其煎水作嗽藥能刷淨齧顎腐爛使之治癒又梅毒慢性經過而體氣呈弱衰之狀者用之更宜 用量生黃芪一〇・〇——二〇・〇（二錢至六錢）

鹿角卽牡鹿之角本品內含磷酸鈉碳酸鈣膠質軟骨質等爲強壯性活血散瘀藥有治瘡解毒消腫癆之功主用於惡瘡癰腫神經衰弱之陽痿惡夢鬼交。

遺精及留血血瘀少腹痛腰脊痛等症 用量一〇・〇——一五・〇（三錢至四錢半）

益智仁爲蕁荷科植物之子仁能溫興胃腸神經促進消化及治遺精小便餘瀝大便溏洩等慢性無慾狀態諸症之功蓋本品含有芳香性揮發油而能興奮神經健胃助消化也 用量三・〇——一〇・〇（九分至三錢）

川續斷簡稱川斷蓋續斷之產自川省者屬唇形科入藥係用其根古稱能補肝腎續筋骨通血脈利關節爲筋骨跌折藥又爲金瘡瘡瘍藥用於關節筋骨諸病有滋養強壯活血鎮痛之功 用量六・〇——一四・〇（一錢八分至四錢二分）

皂角刺卽荳科皂角莢之棘刺本品善竄透古人以爲追風驅毒藥主療惡瘡潰瘍毒入筋骨等症 用量二・〇——一〇・〇（九分至三錢）

木通爲苦味清涼消炎性利尿藥。古稱行水瀉火下乳通淋。能通利九竅血脈關節。散癰腫。諸結惡瘡浮腫等。對於沉着諸濕毒。有使小便排泄之功用。

用量三・〇——一〇・〇（九分至三錢）

萆薢古稱瀉血分濕熱。療淋濁水瀉。治風利溼。及諸瘡溼毒。寒濕痲痺骨節痛。惡瘡不瘳等症。蓋本品有排毒利尿之功。用量五・〇——一〇・〇（錢半至三錢）

米仁爲滋養強壯藥。亦有利尿作用。本經主治筋急拘攣不可伸屈。久風濕痺。時珍謂健脾益胃補肺清熱去風勝濕兼治熱淋者。對於神經麻痺性疾患有效也。用量一〇・〇——二〇・〇（三錢至六錢）

滑石古稱有清熱降火通竅利便滲濕之功。別錄云。通九竅六腑津液。去留結止渴。蓋本品有緩和潤滑及利尿之功耳。用量一〇・〇——二〇・〇（三

錢至六錢

澤瀉係澤瀉科。水澤瀉之根。別錄主補虛損。五臟痞滿。起陰氣。止洩精。消渴淋瀝。逐膀胱三焦停水。張仲景主治小便不利。眩暈。蓋本品有強壯性利尿及鎮靜腦筋之功也。 用量七・〇——一五・〇（二錢至四錢半）

黑荳係荳科。黑大荳之種子。古稱祛風濕。解諸毒。逐水腫。下瘀血。散五臟結積。治風痺癱瘓。口噤。產後頭風。中風脚弱。風毒脚氣筋攣。膝痛脹滿。調中下氣。通關脈。制金石藥毒……等。蓋本品有緩和酷厲毒及利尿作用。故賞用於血液不潔。發熱有毒之症。 用量一・〇——四・〇（三錢至一兩一錢）

赤荳一名赤小荳。即荳科。菽類。赤荳之較小者。古人記載。主下水腫。排癰腫膿血。蓋亦有排毒利尿作用也。但近市藥肆。另有一種爲非菽類。半紅半黑。俗名蟹眼荳者。實即相思子。乃荳科相思樹之種子。而藥肆則誤以爲赤小荳。此宜

鑑別吾人處方時須註明杜赤豇方不爲誤否則以相思子作赤豇服之反有害本品作用與黑豇相仿 用量三〇・〇——七〇・〇（九錢至二兩一錢）

羚羊角 滁菊 白芷 石決明 牛膝 全蠍 白花蛇 赤芍 桃仁 大黃等均見前

處方一 仙遺糧湯（說約） 七茯苓三〇・〇（九錢） 阜莢子一三・〇（三錢

九） 當歸五・〇（錢半） 白蘚皮一〇・〇（三錢） 川芎五・〇

（錢半） 米仁一〇・〇（三錢） 木通三・〇（九分） 威靈仙五・

〇（錢半） 防風五・〇（錢半） 金銀花一〇・〇（三錢） 木瓜一

〇・〇（三錢） 蒼朮五・〇（錢半） 甘草三・〇（九分）

右十三味 剉作三百西煎劑去渣一日分三次服

適應症 楊梅瘡初起筋骨疼痛延綿不已及楊梅風毒癱瘓骨疼不能動履

者。

處方二 廿四味風勝飲(說約) 防風五・〇(錢半) 荊芥五・〇(錢半)

白芷五・〇(錢半) 連翹七・〇(二錢一) 苦參四・〇(一錢二)

赤芍七・〇(二錢一) 黃連一・〇(三分) 地骨皮一〇・〇(三錢)

白蘚皮一〇・〇(三錢) 黃芩五・〇(錢半) 山梔五・〇(錢半)

歸尾七・〇(二錢一) 木瓜一〇・〇(三錢) 金銀花一〇・〇(三

錢) 蟬蛻二・〇(六分) 米仁一〇・〇(三錢) 黃柏七・〇(二錢

一) 僵蠶一〇・〇(三錢) 五加皮五・〇(錢半) 甘草三・〇(九

分) 白蒺藜五・〇(錢半) 皂角刺五・〇(錢半) 土茯苓三〇・

〇(九錢)

右廿四味剉作五百西西煎劑去渣一日分三次服。

適應症 主治楊梅瘡。(按腦梅毒係梅毒引起之腦病。故治法亦當於驅梅之中兼顧腦症。本方藥味雖繁。而治效可以兩顧。所以腦梅毒症。可以本方參用。視見症而加減之可也。

處方三 胰子湯(說約) 米仁一〇・〇(三錢) 川芎五・〇(錢半) 金銀

花一五・〇(四錢半) 牛膝一〇・〇(三錢) 木通四・〇(一錢二)

胡黃連五・〇(錢半) 當歸七・〇(二錢二) 川黃連二・〇(六分)

防風七・〇(三錢二) 甘草二・〇(九分) 白殭蠶一〇・〇(三錢)

土茯苓七〇・〇(二兩二) 肥皂子七粒

右十四味。剉入水約五百西西。煎濃去渣。入猪胰子一副(去油淨)再煎。去胰飲湯。每日空腹時服。

適應症 治楊梅瘡體虛氣弱不能汗下者。腦梅毒之兼營養不良。呈衰弱狀

態者。

處方四

二皂飲(沈員嶠) 肥皂子十粒 皂莢子二十粒 苦參一〇・〇

(三錢) 金銀花四〇・〇(二兩二錢)

右二味入水兩百西西煎去渣一日分二次服。

適應症 主治楊梅瘡(按中藥之驅梅在於間接如利尿通便中和毒素等

法是也。本方適用於腦梅毒之便通欠順者)

處方五

忍冬湯(瘍醫大全) 金銀花四〇・〇(二兩二錢) 黑料豆七〇・

〇(二兩一錢) 土茯苓一〇〇・〇(三兩) 生甘草一〇・〇(三錢)

右五味剉作三百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 主治楊梅瘡(神經及關節梅毒均可用)

處方六

安神補心湯(沈氏尊生) 當歸七・〇(二錢一) 生地一〇・〇(三

錢) 茯苓一五・〇(四錢半) 黃芩五・〇(一錢半) 麥門冬一〇
 ・〇(三錢) 白芍七・〇(二錢一) 白朮五・〇(錢半) 遠志四・
 〇(二錢二) 川芎四・〇(二錢三) 元參七・〇(三錢一) 甘草三
 ・〇(九分)

右十二味，剉作二百西煎劑，去渣，一日分二次服。

適應症 安神補心。(按腦梅毒之顯失眠症狀者，宜與此湯。)

處方七

鹿角散(證治準繩) 鹿角片一〇・〇(三錢) 原方係鹿角屑與鹿角茸合用 茯苓一〇

・〇(三錢) 人參 無力者可以太子參代 一〇・〇(三錢) 川芎五・〇(錢半)

當歸七・〇(二錢一) 桑螵蛸一〇・〇(三錢) 補骨脂一〇・〇

(三錢) 龍骨一〇・〇(三錢) 韭子一〇・〇(三錢) 柏子仁一

〇・〇(三錢) 甘草三・〇(九分)

右十一味。剉作兩百西西煎劑。去渣。一日分二次服。

適應症 治色慾耗傷及陰虛諸證。(按腦梅毒而呈記憶力減退及無慾狀態者。可與本方。

處方八

愈風丹(張子和) 甘草四・〇(二錢二) 赤芍一〇・〇(三錢) 川

芎四・〇(二錢二) 桔梗七・〇(三錢二) 白殭蠶一〇・〇(三錢)

細辛二・〇(六分) 羌活五・〇(一錢半) 南星姜製四・〇(一錢)

二) 麻黃二・〇(六分) 白芷五・〇(錢半) 防風五・〇(錢半)

天麻五・〇(錢半) 全蠍五・〇(錢半)

右十三味。剉作兩百西西煎劑。去渣。一日分二次服。

適應症 治諸痺寒熱交作。筋骨疼痛。手足拘攣。麻木不仁。及諸風癱瘓。口眼歪斜。半身不遂。風濕等症。(按腦梅毒而兼呈麻痺證狀時。可參用本方)

(五)腦性痙攣性小兒麻痺(小兒偏癱)

病原 患此病者一百三十五人中。男佔六十。女佔七十五。右側偏癱五十六。先天性類十五。此病之發端。大多數起於小兒生後一二歲之時。二歲以前患之者。佔全數之九十五。五歲以後者少見。父母嗜酒。或患梅毒。與此病似無關。係難產有時致此病。而尤以受助產鉗之傷者爲然。至由傷害如跌倒或刺傷而起者。較少見。曾有一病兒。因縛總頸動脈。致繼起此患。傳染病係一重要原因。上述之一百三十五病人中。病起在患特種熱病之時。或恰在其後者十九人。脊髓前灰白質炎之細胞亦能致此癱。此病起時大多數先顯驚厥。驚厥持續數小時或略久。迨退去方察見偏癱。

病理 歐司勒曾剖驗屍體九十具。其損害可分爲三羣。(甲)栓塞。血栓形

成及出血之類。共十六案。其中屬大腦中動脈被塞者七。出血者九。此類之特異點係患者之年歲較長。此十六案中。過六歲而起者有十案。(乙)萎縮及硬化之類。共五十案。其消瘦在數回或一葉。或半球不定。患處之腦膜常與腦粘着甚密。而有時腦膜之外觀如常。腦回萎縮而堅硬。與尋常之回異。其硬化或係瀰散性而布滿半球。或腦上顯結節形隆凸(此名肥大性硬化)有時顯昭著之腦半球。一側性萎縮。有時腦組織或僅似一壳包裹擴張之腦室而已。

(丙)腦穿通畸形(大腦窩症) *Porencephalus* 剖驗該九十屍體。其屬此類者二十四。此係腦組織外面成窩及囊腫。其窩及囊腫與蛛網膜相通。或為蛛網膜所包。且有時深入腦組織。有時達腦室。就實際言之。小兒偏癱以腦外質硬化及腦穿通畸形為最常見之解剖改變。原發性改變。大都尚未查明。腦穿通類。或由於發育不健全。或產時出血。若於此血栓塞及血栓形成之類。其病

原固甚明瞭。然此外之一大羣。其最後之改變。係硬化。其萎縮者。則尙不知因何而致。依臨診之歷史論。幾盡皆病起驟突。顯驚厥。且多兼輕熱。或以爲此情況係大腦灰白質發炎。Polioencephalitis 所致。間有顯流行性腦脊髓灰白質炎 Epidemic polio-myeloencephalitis 之大腦性散發性類者。

症狀 病起或驟突而無痙攣及知覺喪失狀。然大多數發作時。顯部分的或全身性驚厥及知覺喪失。知覺喪失之期。或歷數點鐘。或持續至數日之久不等。此係此病最昭特之狀。發熱常顯。所顯之偏癱（每在知覺復原時察見）大抵屬完全性。有時其癱初不完全。迨再驚厥。始成完全性。右側受累者較左側多。面尋常不受累。有時癱逐漸退去。而患者逐漸發育之際。毫無病迹留存。常例腿之痊愈較臂速而完全。有時其癱一似完全退去。不易看出。但多數顯有殊特之偏癱性步態。癱處以臂爲常昭著。該臂常消瘦。肘屈成正角。手屈而

指亦屈。運動功用完全喪失。然亦有能抬臂過頂者。迨晚期則臂強硬。故此病又或名之爲大腦痙攣性偏癱 *Hemiplegia spastica, cerebralis* 但亦有不顯此狀者。病發後數年。其臂或仍弛緩。反射常增。但亦曾見數患者。其反射喪失。惟感覺常不受擾。再如 (一) 無語言能。此不爲罕見。凡患者一百三十五人。無語言能者有十六人。 (二) 精神不健全。精神發育不健全係小兒偏癱最可憂慮之後患。可分三種。(甲) 癡愚如偏癱由產時而得者。此最常見。(乙) 遲鈍。此類每加重而常兼癲癇。(丙) 腦力薄弱。此乃腦力發育遲緩而非停止。

(三) 癲癇。歐氏所檢查諸案中。顯驚厥者四十一。並知此係一最困苦之後患。此等發作或爲暫時之小癲。卽外質性癲癇。起於損害之同側。且限於該側或爲尋常之驚厥。(四) 偏癱後性運動。上所述一百三十案中。有此者三十四。只顯於受累之肌。所顯爲微顫或舞蹈病類運動。又或爲下述之手足

徐動。(五)手足徐動病(阿退妥司) Athetosis 癱肢之端有非常之痊攣最常見於手指及足趾。間或顯於口腔。其運動係不隨意性。而如乎有節律。在手則外展內收。及旋後旋前。依次遞顯。或指過伸而指與指離開。此狀在小兒較多。若係成人。或與偏身麻木兼顯。而其損害。非外質性而係腦底性。卽近視丘之處。有時其運動因情感而增加。雖在眠睡時亦持續而動。

治法 偏癱初起。與尋常驚厥相似。但此則或略久而且重。當速用溴化鉀或冷熱敷。或有力之瀉藥設法阻止。在驚痾時。可吸哥羅芳。雖初生嬰兒。吸之亦無礙。倘癱已顯。則藥無大效。此類罕見完全復原者。果癱患略癒。其所剩之癱狀。乃與他類上運動段性癱無異。故在下肢則腿及足背之屈肌。最常有恆久之癱。對於病兒之營養。必須注意。以助其自然復原。又宜用揉捏法。及被動性運動。減輕其強硬及攣縮。倘有畸形。可用外科學術。或機械治之。果能合用揉

捏法及機械可見功效。所兼之無言語能得痊癒。癩癩係困苦而難療之症狀。然長久之病。間歇期不爲罕見。若係外質性癩癩類。服溴化鉀無效。惟顯劇烈之煩躁者。服之可稍見效。對於此類癩癩。如能用外科術。常能減少其驚厥次數。且減輕其抽搐力。但盡退而不再發者罕見。腦力薄弱。係小兒腦性偏癱最可憂之後患。多至成癡呆。若忍耐教練並注意看護。才智與自信力每能漸進步。而達有用之程度。

中藥治法

驚厥初起時用全蠍。羚羊角。純鈎。蟬衣等。

便秘發熱用龍膽草。蘆薈。大黃。黃芩。地龍。黑山梔。青黛等。

呈偏癱現象時則用蜈蚣。麝蛇。白附子。當歸。川芎等。

無語言能而有痰者可用菖蒲。遠志。貝母。膽星。竹瀝。姜汁等。

精神不健全。營養不良。腦力薄弱時可用黃芪。人參。當歸。川芎。肉桂。胡麻。天麻。

鹿茸。鹿角等。

要藥略釋

純鈎屬茜草科。爲鈎藤之鈎棘。古稱定驚。舒筋。寬中。下氣。平肝風。治頭旋目眩。客忤。小兒寒熱。十二驚癇。驚啼。瘖瘕。胎風。內鈎等。蓋取其有鎮靜鎮痙之功也。 用量一〇・〇——二〇・〇（三錢至六錢）

薑汁卽用生薑搗榨所得之汁。含有刺激性之揮發油及黃色素等。古人主治噎膈反胃。救暴卒。與竹瀝並用。有爽利神經。清醒頭目。而治言語蹇澇。舌動不靈等證。對於類似中風。痰迷舌強等。往往用之。

肉桂屬樟科植物之一種。藥用爲桂木之樹幹及根皮。爲活血強壯藥。李時珍云。主治寒痹風瘡瀉利驚癇等。故對於腦性痙攣性小兒麻痺之呈精神不健全。營養不良。腦力薄弱時與黃芪。鹿茸。人參等伍用。可奏興奮強壯之功用。 用量 一・〇——三・〇（三分至九分）

全蠍、羚羊角、蟬衣、龍膽草、蘆薈、大黃、黃芩、地龍、黑山梔、青黛、蜈蚣、蕪蛇（即白花蛇）、白附子、當歸、川芎、菖蒲、遠志、貝母、膽星、竹瀝、黃芪、人參、胡麻、天麻、鹿茸、鹿角等，均見前。

處方一

定命丹（證治準繩）

全蠍七隻

天麻

南星（炮）

白附子各一〇

• 〇（三錢）

硃砂

青黛各五 • 〇（錢半）

輕粉

麝香各一 • 〇

（三分）

龍腦 〇 • 二（六厘）

右九味研爲細末，米糊爲丸，如綠豆大，每服一丸，荆芥薄荷湯調下，並先研半丸吹入鼻中。

適應症

通利痰熱，治急驚，天吊撮口。

處方二

疎風散（證治準繩）

檳榔一〇 • 〇（三錢）

陳皮五 • 〇（錢半）

牽

牛七 • 〇（二錢一）

大黃一〇 • 〇（三錢）

牽

右四味。剉作兩百西煎劑。去渣。一日分二次服。

適應症 治驚風痰熱四證俱盛。(按小兒腦性痙攣而便秘發熱者可用本

方)

處方三 截風丹(沈氏尊生書) 白附子(炮) 全蠍(去頭足炒) 殭蠶(炒) 南

星(炮) 天麻各八・〇(二錢四) 硃砂三・〇(九分) 蜈蚣(酒炙)

一條 麝香〇・一(三厘)

右八味共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三丸。一日二服。薄荷湯化下。

適應症 古時主祛風。(按小兒腦性痙攣驚厥初起時可用本方)

處方四 鎮驚丸(證治準繩) 人參無力者可以太子參代 一〇・〇(三錢) 甘草 茯苓

白殭蠶 枳壳(麸炒微黃)各一七・〇(五錢二) 白附子 白茯苓

製南星 硼砂 牙硝 硃砂(水飛)各八・〇(二錢四) 全蠍十枚

(去尾尖) 麝香〇・一(三厘)

右除牙硝、硼砂、麝香、硃砂四味用乳鉢細研，餘九味焙爲末，入乳鉢內和勻，入前四味，用糯米粉清水煮糊爲丸，如梧桐子大，銀箔爲衣，每服三丸至五丸，或七丸，開水送下，每日三次，小兒遞減研沖。

適應症 治小兒急慢二驚，風痰上壅，手足抽掣，口眼喎斜，煩躁生嗔，精神昏悶，常服寧心鎮驚，疎風順氣。(按本方可適用於腦性癱瘓小兒麻痺症之精神不健全者。)

處方五 定搖散(證治準繩) 天麻七・〇(二錢一) 白附子五・〇(錢半)

製南星三・〇(九分) 蠟尾四・〇(一錢二) 白花蛇頭(酒炙)一〇

・〇(三錢) 硃砂二・〇(六分) 雄黃三・〇(九分) 乳香四・〇

(二錢二) 代赭石一〇・〇(三錢) 赤脚蜈蚣(酒炙)一條 龍腦〇

• 一(三厘) 麝香〇•一(三厘)

右十二味共研爲細末每服五分開水送下一日三服

適應症 治急驚四證入候併作(按腦性痙攣性之呈偏癱現象時可採用本方)

處方六 大黑龍丸(六科準繩) 膽星 礞石(硝煨)各三〇•〇(九錢) 天竺

黃 青黛各一六•〇(四錢八) 蘆薈八•〇(二錢四) 辰砂 蜈

蚣(燒灰)各七•〇(二錢一) 殭蠶二•〇(六分)

適應症 治小兒急慢驚風(按本方適用於腦性痙攣性小兒麻痺症之痰多及大便祕結者)

處方七 青金丸(淀山) 巴豆霜二〇•〇(六錢) 青黛八•〇(二錢四) 南星一

五•〇(四錢半) 輕粉三•〇(九分) 全蠍(炒) 滑石各六•〇(一錢八)

右六味研爲細末，稀糊爲丸，如麻子大，一歲每服五丸，二歲七丸，大小依此加減，開水送下，以便通爲度（按巴豆霜原方用六錢應改爲六分）

適應症 治小兒驚風痰熱壅盛（按本丸可治大便不通痰熱結祕之腦性痙攣性小兒麻痺症）

處方八

蛇頭丸（證治準繩）

蛇頭一個（炙）

赤足蜈蚣三條

硃砂一〇

〇（三錢）

鉛白霜

輕粉各七

〇（二錢一）

龍腦

麝香各三

〇（九分）

鐵液粉

百草霜各一六

〇（四錢八）

蛇含石三〇

〇（九錢醋淬）

右十味共研爲細末，米糊爲丸，如芡實大，三歲兒每服半丸（依此遞推）薄荷湯磨飲，一日三次。

適應症

治急慢驚風。

處方九

消風化痰湯(沈氏尊生書)

白附子五・〇(錢半)

木通四・〇(二錢)

錢二

天南星三・〇(九分)

半夏七・〇(二錢)

赤芍七・〇

(二錢)

連翹五・〇(錢半)

天麻七・〇(二錢)

殭蠶一・〇

(三錢)

天門冬七・〇(二錢)

桔梗七・〇(二錢)

金銀花

一・〇(三錢)

蒼耳子四・〇(一錢)

白芷四・〇(一錢)

防風五・〇(錢半)

羌活四・〇(一錢)

皂角〇・五(一分半)

全蠍三・〇(九分)

陳皮五・〇(錢半)

甘草二・〇(六分)

右二十味剉作五百西西煎劑去渣一日分三次服。

適應症

古稱消風化痰。(按腦性痙攣性小兒麻痺而痰多痙痛者可參用)

本方)

處方十

補虛湯(沈氏尊生)

黃芪七・〇(二錢)

白朮七・〇(二錢)

當

歸五・〇（錢半） 陳皮五〇（錢半） 竹瀝三・〇（九錢） 薑汁五

・〇（錢半）

右四味剉作兩百西西煎劑。去渣沖入兩汁溫服。日二次。

適應症 治舌強（按無語言能而精神不健全者可參用本方）

（六）腦水腫 古稱小兒解顱

病原 有先天性及後天性兩種。先天性之原因未明。而兩親中之酒狂、梅毒、妊娠時母體之外傷及子宮疾患。似與本病有關係。一家族中多數小兒發生本病。故有遺傳之疑。後天性者。常有炎症性原因。而來自化膿性結核性腦膜炎者爲多。鬱血症狀。如心臟疾患之全身鬱血。及腦髓限局性鬱血時。亦能誘發本病。是因腫瘍壓迫腦神經及直竇。或淋巴管及血管因腦膜炎而愈着閉

塞故也。惡液質及水血症。如癌腫。腎炎。肺癆。白血病等。則發惡液質腫水腫 Kachektischer. Hydrocephalus 因炎症及軟化而腦髓萎縮。其真空部分有液體瀦留。是名真空性腦水腫 Hydrocephalus ex vacuo 其他梅毒。酒狂。日射病。精神過勞。亦有爲本病原因者。而佝僂病性小兒。則有易罹本病之傾向。腦水腫發於幼年者最多。

病理 先天性腦水腫。常爲腦室水腫（即腦內水腫）Hydrocephalus internus 而腦膜間水腫（即腦外水腫）Hydrocephalus externus 則甚稀。其瀦留之液體。大抵 Liqueur 內外。然亦有多至二十七磅者。其液爲透明粘漿樣。含有少量之蛋白質及鹽類。大量瀦留時。腦室擴張成大腔房。腦底大腦神經節因受壓迫成扁平狀。其甚者腦髓全部菲薄。包容腦液如一大囊腫。頭蓋骨甚廣大。顙門縫合亦互相離開。本病常併發他種畸形。如腦膜脫。兔唇。曲足。狼咽等是。後

天性者。頭蓋增大。液體積聚。與先天性腦水腫同。液體或爲透明。或因炎症性原因而呈混濁絮片狀。有時或呈血性。本病之腦變化。較前者爲著明。側脈絡叢亦變肥厚。現顆粒狀。

症狀 先天性者。因頭蓋增大妨害分娩。則非截腦術不可。或分娩之時頭蓋易受外傷。腦水液流出。故胎兒多早產死亡者。然多數於出產後數日或數週。其頭部漸漸增大。(初生兒頭圍二十五至四十二cm。生後一年四十五cm。春機發動期則爲五十二cm。在本病有大至四倍者)而縱經較橫經爲甚。故頭成長形。故本病以大頭小面爲特異之點。頭蓋縫離開成指頭大之空隙。顳門擴大。迨日後化骨時。見無數之間插骨存於縫之間。頭蓋骨異常菲薄。加以指壓則留壓痕。且呈半透明。可透視對側之燭火。往往於頭蓋部能聽取血管之雜音。其顳顬部皮膚靜脈怒張呈蛇行狀。頭髮稀疏。眼球被壓成扁平。其他有眼球

振盪鬱血乳頭視神經萎縮黑視等症。或呈癲癇發作。筋肉短縮。痙攣。腱反射亢進等症。且患兒因頭部過大。不能直立。常取仰臥位。故精神發育障害。運動障害。言語步行之習熟亦遲滯。後天性者。其重要症候即爲運動性障害。如麻痺（咽下困難。膀胱麻痺。四肢麻痺。及言語障害等）。痙攣振顫。共同機障害等症。其他有發生頭痛。眩暈。知覺異常。知覺失亡。精神障害等症狀者。

治法 西藥療法在先天性者用沃剝內服。沃度軟膏。或沃度丁。幾塗布於頭蓋。或以伴創膏繃帶壓迫其頭部。或用利尿劑。下劑。誘導法。腦室穿刺。及護膜管插入等。俱無確實之奏效。腰椎穿刺法。可使一時輕快。然非根治療法也。後天性者。與先天性者同。近時有試用電氣光線療法者。Sennel 氏日光療法。每日三十分間。使太陽光線直射於局部。其他外科的壓迫療法。或腰部穿刺法。亦有行之者。然未著大效。

中藥療法

按本病在中國古時名爲解顱，並謂由稟受父母精血不足，腦髓虧少所致。患此者必難養育，卽能長大，亦成廢人。此蓋由經驗所知，故除聊以盡責之外，敷藥外，而內服療法甚鮮也。茲將古人曾經應用之內服和外敷諸藥列後，以便學者有所參考而已。

內服強壯藥：鹿茸、熟地、狗腦、肉桂等。

利尿藥：茯苓、澤瀉、車前、白朮等。

誘導藥（體質強壯可用）：牽牛、大黃、芒硝等。

又外用如狗頭骨、白朮、防風、乾姜、肉桂、半夏、細辛、蛇蛻、草烏頭等。

要藥略釋

狗腦爲狗之腦髓。古人之經驗，用治頭風痺症、鼻中瘻肉。考腦髓內服爲臟器療法。揆之現代學理，知腦髓中有腦下垂體，爲如豌豆大之物。又分前葉、中葉、後葉三部。其前葉中刺激素，對於身體之發育及造形有絕大關

係中葉與生殖器及新陳代謝頗有影響。後葉之刺激素有收縮血管及利尿等功用。用量一個製爲丸藥或焙燥研粉。

茯苓爲寄生於松根之地下菌塊屬芝櫛科。別錄云：止消渴好睡……調臟器。伐腎邪長陰益氣力保神氣。本品蓋有強壯性利尿之功也。用量一〇・〇

——二〇・〇（二錢至六錢）

車前草爲利尿藥與茯苓澤瀉等伍用可構成利尿方劑以奏其誘道的排除腦積水之功耳。用量三棵至五棵。

白朮屬菊科白朮之根。名醫別錄主治大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫治心下急滿等。神農本經主治風寒濕痹死肌瘰癧止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不飢蓋以其有滋養強壯性促進吸收排除水毒之功也。用量五・〇——一〇・〇（錢半至三錢）

牽牛屬旋花科喇叭花牽牛之種子。有黑白二種。故又名黑白丑。古人恆用作下氣。療脚滿水腫。除風利小便之用。本品施於腦水腫患者。乃爲瀉下誘導療法之一種也。 用量二・〇——五・〇（六分至錢半）

狗頭骨爲狗之腦顱骨。外用須燒灰調敷。李時珍本草綱目云。治癰疽惡瘡。解顱甄權藥性本草曰。燒灰治久痢。癆痢。則知本品有吸收水分作用。故外敷或能將組織中之水液吸收。自此以下係外用藥。 用量不拘。

蛇蛻屬爬蟲類之蛇族。爲其鱗退脫之皮膜。李時珍本草綱目云。辟惡去風。殺蟲。燒末服。治婦人吹奶。大人喉風。退目翳。消木舌。傅治小兒重舌。重齶。唇緊。解顱千金方治小兒解顱。蛇蛻熬末。以豬頰車髓和塗之。日三四易。此乃古人之經驗。至其爲何種之作用。今尙未得其詳也。

草烏頭屬毛茛科。爲烏頭之球根。內服爲具有麻醉性之鎮痛藥。外用亦有刺

激性促進循環吸收之功。故楊清叟有凡風寒濕痺骨內冷及損傷人骨年久發痛或陰疽腫毒並宜草烏頭南星等分少加肉桂爲末姜汁熱酒塗未破者能內消久潰者能去黑爛云。

半夏屬天南星科藥用半夏之塊根內服須依法炮製外敷則以生者爲宜因其有辛辣刺激之氣及粘滑之膩液似可奏促進皮膚肌肉組織間吸收之功。白朮外用與內服之功用相仿古稱白朮氣味芳香能通脈絡走肌肉故主風寒濕痺而治死肌此乃組織間水分沉着白朮能促進其吸收故也。

防風內服古云主大風頭眩痛惡風風邪周身骨節疼痛脇痛頭風去來四肢攣急等若外用其功效亦當與內服近似養生主論方有治小兒解顛防風白芨柏子仁等分爲末以乳汁調塗一日一換此乃古人之經驗足供吾人參考者也。

乾薑外用爲有刺激性之促進局所循環及吸收藥。肉桂氣味香烈。其作用與乾薑相似。而効力有過於乾薑也。細辛本經主咳逆上氣。頭痛腦動。百節拘攣。風濕痹痛。死肌。故外用藥。亦能鎮痛。促進血行。以其有辛烈刺激之性故也。鹿茸。熟地。澤瀉。肉桂均見前。

處方一

六味地黃丸(錢乙)

熟地黃三〇〇〇(九兩砂仁酒拌九蒸九晒杵膏)

山茱萸肉(酒潤炒)

乾山藥(炒)各一四〇〇(四兩二錢) 牡丹

皮(酒洗微炒)

白茯苓(人乳汁製焙)

澤瀉(淡鹽酒拌炒)各一〇〇〇

〇(三兩)

右六味。研爲細末。和地黃膏。加煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服七八十九。(三錢)
空腹食前。淡鹽湯。或白開水。送下。

適應症

治腎精不足。虛火炎上。頭目眩暈。咽喉燥痛。口舌瘡裂。耳聾齒搖。腰

膝痿軟……小兒虛損腎疴腦熱等（按此據古人之論述，謂本病係先天不足，服藥當取滋補，則本丸可以服用，最好以本方作煎劑，分量作十分之一計，或再加入鹿茸肉桂等頗佳）。

處方二 四君子湯（局方） 人參一〇・〇（三錢） 白朮一〇・〇（三錢） 茯

苓一四・〇（四錢） 炙甘草三・〇（九分）

右四味剉，作兩百西西煎劑，去渣，一日分二次服。

適應症 治嘔吐泄瀉，氣短面白，聲微肢困，食少不化，口舌生瘡……凡屬於脾胃虛弱細軟脈象者，皆可用。

處方三 四味鹿茸丸（張氏醫述） 鹿茸一〇・〇（三錢） 五味子二・〇（六

分） 當歸身七・〇（二錢） 熟地黃一〇・〇（三錢）

右四味剉，作兩百西西煎劑，去渣，一日分兩次服。

適應症 治肝腎腎脈皆虛。脈虛無力。上熱下寒。按小兒先天不足。腦水腫症。

可用此方。

處方四 狗腦丸（嬰孺方） 狗腦一個 五加皮 甘草（炙） 白朮 防風

鍾乳石 乾地黃各〇・三三（二分） 牛黃〇・七（二分）

右六味共研爲細末。以狗腦爲丸。如小豆大。一歲兒每服二丸。米飲送下。一日一次。

適應症 治小兒喜搖頭解顱。

處方五 三味細辛敷藥方（千金） 細辛 桂心各二・〇（六分） 乾薑六・

〇（二錢八）

右三味剉爲細末。以汁和勻。塗於顱上。乾復塗之。待兒面赤卽愈云。

適應症 小兒解顱。

處方六 范汪熨藥方(外台) 半夏 芎藭各一〇〇〇・〇(三兩) 細辛七〇

・〇(三兩二) 桂心二〇〇・〇(六錢) 烏頭十枚

右五味剉細末以布包之置爐上候溫熨兒顛門上時時行之。

適應症 小兒顛陷及解顛。

處方七 封顛散(聖濟總錄) 柏子仁(炒) 細辛 防風 白芨各三三・〇

(二兩) 草烏頭(炮) 一七・〇(五錢二)

右五味共研爲細末乳汁調塗顛開處。

適應症 小兒解顛顛門開解。

處方八 合顛散(聖濟總錄) 防風 白芨 柏子仁各三三・〇(二兩)

右三味共研爲細末用乳汁調少許塗顛上。

適應症 治小兒顛門不合。

處方九

半夏散（聖濟總錄）

半夏（湯洗七遍去滑焙）

芎藭

桂（去粗皮）各三

三・〇（二兩）

草烏頭（炮製去皮臍）十枚

細辛七〇・〇（二兩一）

右五味細剉以酒四升漬一宿。煮令微熱。漉出綿裹溫熨顙上。朝二十遍良。

適應症

小兒腦長髮大顙不合。臂脛小不能勝頭者。

處方十

塗傅膏方（聖濟總錄）

蛇蛻（燒灰）

豬頰骨髓各少許

右二味調和爲膏塗傅上日再易。

適應症

小兒解顙顙縫不合。

（七）痲痺狂（痲痺性癡呆）

古稱癩癩

病原

本病之主徵爲精神作用異常及才能之進行性頹廢。屬於精神病學。

然亦侵及神經系統而神經機能受障害。故特編入於內科學。世界日進於文。

明本病之發生益繁。蓋萬事萬物日趨於複雜綿密。而吾人不得不勞其精神以競爭生存。遂至焦心苦慮。感動興奮。精神過勞。而釀生本病。且酒色沉溺。與文明奢侈相伴而行。故本病發生之傾向益夥。而本病與梅毒又有密切之關係。或以本病與脊髓癆相對照。謂爲腦之 Tades (腦癆) 者有之。其梅毒感染與本病發生之期間。大約五年至二十年。且不獨後天性梅毒爲然。卽先天性梅毒亦足以喚起本病。頭蓋外傷亦使本病容易發生。然既往無梅毒之感染。又無遺傳之關係。僅以外傷而感發本病者。則絕無之。男子較女子易罹本病。蓋以本病之病原。於男子爲易犯也。但世界文明日進。女子亦不能安居閑處。其所遭遇亦漸與男子相同。故近來女子之罹本病者亦漸多。上流社會較下流社會易罹本病。而荒於酒色。富於名譽心者尤多。故軍人。技術家。官吏。投機商等。易罹此疾。年齡則自三十歲至五十歲之間爲最多。六十以上則罕見。觀

上述之原因。即可知其關係。然幼年亦非絕無罹本病者。故本病或有區別爲幼年性症與壯年性症者。

病理 硬腦膜多增厚。膜內面或顯各種過長性硬腦膜炎。其軟膜濁而厚。且粘着於腦外質。腦膜間隙之顱脊髓液加增。尤以軟膜之羅孔內爲然。有時加增之量甚大。致與囊腫相似。腦小。其重率較常度低。腦回萎縮。尤以前中二葉爲然。在此病之急性期類。則腦或充血而腫。或呈水腫狀。腦外質常紅。除在晚期外。或不萎縮。半球之萎縮係在白質。腦側室擴張。以補償腦之萎縮。而室管膜或有顆粒。第四腦室之擴張更爲常見。而其室底之槽處兼發顆粒。此狀實爲他病所罕有。此病有許多病案。顯脊髓及團圍神經之改變。此卽標準的脊髓癆性改變。有時大腦脊束纖維繼外質之改變。而顯變性。最常見之病案此二種病變合併發生。對於各種改變之性質。醫界之理論頗多。或以爲係血管

之改變。例如炎始於小動脈之鞘，而繼以腦細胞及神經膠質之主質性變性，及萎縮。或以爲梅毒性毒致腦組織變性，兼血管系統及神經膠質之繼發性改變。腦組織內有時或有梅毒密螺旋體可以察見。

症狀 本病主要症候有四：進行性精神機障害，言語書字之障害，麻痺狂性發作，及瞳孔變化是也。（一）精神障害 初呈神經衰弱症，即頭眩暈，嫌惡作業，不眠健忘，食慾不振等症。其後漸次發生精神症狀，其中性質之變化及靈智之減弱二者爲最著。自來儉省者，一變而爲浪費，謹慎者，一變而爲粗放無禮。對於社會喪公共之道德，對於家族無慈愛之感情，或放縱自恣，精神過敏而易刺激。因小事而憤怒，對於精神的職務漸覺困難，判斷力減却，記憶力障害。然近事則較遠事爲易忘，其甚者，一日中所行動之事項，所飲之餐膳，亦不能記憶。或詢以年月日時，則不知所對。課以簡單算術，則顛倒而錯誤。問以

三乘五則知爲十五。而五乘二則不知爲幾何。此腦力減退而進行性才能頹廢之症也。若靈智減退。觀念呈病變時。則發生妄想。其妄想多誇大性（癱瘓狂誇大妄想 Paralytischer Grosswahn）患者自視爲大富豪大發見者。或自視爲帝王。自擬於神怪。有時患者爲鬱憂性觀念所支配。居恆鬱鬱不樂。自疑頭腦空虛。手足斷脫。或以爲胃腸不具。而不敢飲食。或疑他人將加害於己。而拒絕飲食。然有時又呈躁狂發作之狀。號泣咆哮。破壞器物。無所不至。如此漸達於完全癡呆（癱瘓狂）（二）瞳孔變化 反射性瞳孔強直（Reflexo-vischepupillenstare）及瞳孔左右不同是也。此症候常發現於早期。對於光線之明暗。不變其大小。有時瞳孔呈不正多角形。不呈圓形。且眼肌及調節肌發生麻痺。而於前額部發生劇痛。（三）言語書字之障害 言語障害爲本病診斷上重要之點。一名癱瘓狂性言語障害 Paralytische Sprachstörung

換字錯誤或脫落不能爲單音連續之發語。不僅於難澀之語爲然。卽普通之答語亦能發見其症候。發語之時。口唇振顫。言語肌之共同運動障害。或發鼻調而擧蹙其顏。手指及舌亦呈振顫。舌挺出時。其振顫增劇。反覆出入而不已。偏側筋肉或全身筋肉發生間代性痙攣樣運動（卽振顫之狀）其上肢之運動亦甚拙劣。（四）麻痺狂發作 本症經過中常現此症或爲卒中樣或爲顛狂樣。其持續一分時或數分時（甲）卒中樣發作於少時間精神朦朧或失神之後而發生偏癱單癱及失語等症如此數時間或一二日卽消散。有時僅發單純性眩暈。或摔倒後乃繼發一時性麻痺。其最輕症則僅發一時性失語症。而無精神障害之症。癲癇樣發作其程度亦有種種。或如輕症癲癇。惟僅微失神及眩暈發作。或如重症癲癇。失神後痙攣發作。或爲皮質性癲癇。限局處之筋肉痙攣。本症或有脈管運動性及營養性障害。如特發性骨折足穿孔。

症關節畸形等症是。

治法 西藥之治法與梅毒有關係者則行驅梅毒法沃剝 Jodipin 等內服或注射其他避身心過勞禁用咖啡茶酒廢交接調整便通然抗梅毒療法曾經有人報告完全無效或謂不應施之此病之治法特與治脊髓癆之法同患此病者大多數須在瘋癲院內施以嚴密的看護及規則的起居對於不眠及癲癇性發作可用溴鹽此病時有長而且久之病間退期多誤認爲治療之功效實則不然在病之早期盡量施用濕布裹背法冷頭法系統的按摩法等每能收暫時之功效。

中藥治法 神經衰弱精神障害而呈頭痛眩暈厭惡作業健忘失眠食慾不振時得用人參黃芪茯神棗仁杞子萸肉菊花等。

若靈智減退變常躁狂發作或癡呆妄想則酌予硃砂犀角遠志龍骨牡蠣琥

珀、羚羊角、石決明、紫貝齒等。

若瞳孔變化、反射性强直、或左右孔不同、或呈角形、眼肌調節機能麻痺、而前額發劇痛時、與虎睛、白附子、全蠍、殭蠶等。

言語障礙、目脣振顫者、得用菖蒲、膽星、竹瀝、貝母、半夏等。

卒中樣發作時、精神朦朧、或發生偏癱等、得用烏蛇、皂角、麝香、防風、鉤藤等。

有梅毒性嫌疑者、得以烏蛇、皂角、土茯苓、忍冬藤、輕粉、牛黃等驅梅毒劑。

有瘀血症狀時、可與桃仁、琥珀、鬱金、大黃等。

有營養不良症狀時、可用地黃、當歸、參、芪、白芍等。

要藥略釋 「硃砂」化學名爲「硫化汞」係由汞八十六分、硫十四分而成。天

然產品質中多夾有雜土質。古稱「辰砂」以辰洲產者爲上品。舊時稱其醫治功効謂「安魂魄、定驚痛、殺精魅、邪惡鬼、治中惡、腹痛、毒氣、疥癩、瘦諸瘡、鎮心」。

主屍疰。抽風。久服通神明。一云。蓋實有驅微。鎮靜。鎮痙。等作用也。故實用於神經性癲癇。驚狂。抽攣。等諸疾。患。尤其於梅毒性神經病。更較合理而有効也。

用量 一・〇——二・〇（二分至九分）研細沖服。或爲丸服。

琥珀卽松柏科植物之樹脂。埋沒土中經久之化石。爲透明如松脂而光澤之塊。質頗脆弱。破碎。面作貝壳狀。磨擦之則發生電氣。燃以火。則膨脹而發白烟。氣芳香。乾餾之。則可得琥珀油。其成分則爲樹脂。揮發油。琥珀酸。司可企。涅。及硫黃等。據此古代之經驗。謂一安五臟。定魂魄。殺精魅。邪鬼。消瘀血。通五淋。止心痛。癩邪。療蠱毒。破結瘕。此蓋屬之利尿通經鎮靜之功也。

用量 一・〇——二・〇（二分至九分）研細沖服。或爲丸服。

虎睛爲哺乳獸中食肉類。貓屬。猛虎之睛。宋日華諸家本草謂「虎睛治驚啼。客忤。鎮心安神。」李時珍曰。千金治狂邪。用虎睛湯。及虎睛丸。並主治癩疾。此

殆古人偶然之經驗。而虎睛之治癩狂。驚悸者。現尙不明其原理。或以腦病而及視覺瞳孔起變化時。以本品作臟器療法。或有相當關係耳。用量一具至一對。酒浸炙焙乾用。

烏蛇又名烏梢蛇。產於江蘇鎮江常棲息於山野蘆枝間。全體漆黑色。腹部灰黑色。頭圓尾尖。背有三稜。眼有赤光。雖枯死眼不陷。如活者。主治諸風頑痹。皮膚不仁。熱毒風癩。癩疥。紫白癩風。破傷風等。細菌性毒性神經系疾患。用量

五・〇——七・〇（錢半至二錢）

皂角又名皂莢。藥用其最小者。名「豬牙皂角」爲衝動藥。殺蟲藥及噴嚏藥。古稱「宣通竅。搜風痰。主治風痺。積死肌。邪氣。頭風。淚出。利九竅。殺精物。通關節。治咽喉鼻塞。痰氣喘咳。風癩疥癬」。蓋本品有強烈之刺衝性。善竄透。驅風排毒。祛痰催吐等。故於頑固之梅毒沉潛筋骨。麻痺神經。以及頑痰膠固等。方可

用之 用量一・〇——三・〇（二分至九分）製爲丸劑用之。

牛黃卽牛之膽石爲解熱鎮驚藥。又用作解毒藥。神農本草經主治一驚癇寒熱。熱盛狂癡。除邪逐鬼。一名醫別錄「療小兒百病。諸癇熱。口不開。大人狂癲。」

甄權藥性本草則謂「安魂定魄。辟邪魅。卒中惡。小兒夜啼。」孫思邈千金翼論

本品曰「益肝膽。定精神。除熱止驚。辟惡氣。治百病。」卽此可見本品之有解熱鎮驚解毒鎮靜等作用。照然矣。 用量一・〇——二・〇（二分至六分）

研細沖服或爲丸。

處方一 五癇丸（楊氏） 白附子（炮）一七・〇（五錢） 半夏（湯洗） 皂角

各七・〇・〇（二兩）（搥碎清水五合浸透揉汁去渣與白礬一處

熬乾爲度） 天南星（姜製） 生白礬 烏蛇各三三・〇（二兩）

全蠍七・〇（二錢）（炒） 蜈蚣半條 白殭（炒）五〇・〇（二兩）

半) 麝香○・五(分半) 硃砂(水飛)八・○(二錢四) 雄黃(水飛)

五・○(錢半)

右十二味。研爲細末。生薑汁煮麵糊和丸。如梧桐子大。每服三十九。食後溫生薑湯送下。

適應症 主治癲癇。(本方適用於麻痺狂發作時呈偏癱麻痺諸現象者)

處方二 引神歸舍丹(證治準繩) 大膽南星二二・○(二兩) 附子一枚(重

七錢以上炮去皮臍) 硃砂(水飛)二二・○(二兩)

右三味。研細末。猪心血爲丸。如梧桐子大。(如不稠粘用麵糊少許)每服一錢。開水送下。一日兩服。

適應症 治心氣心風陰癇。(本方對於衰弱性麻痺狂症。較爲相宜。古人之所謂陰癇者。乃呈有衰弱之現象故也。)

處方三 五色丸(錢乙方) 硃砂一七・〇(五錢一) 水銀〇・四(二分二)

雄黃三三・〇(二兩) 鉛一〇〇・〇(三兩)(同水銀熬結砂子) 真珠

三三・〇(二兩)

右五味研爲細末煉蜜爲丸如棗豆大每服二十九食後溫酒送下

適應症 治五癩(本方適於梅毒性癲癩狂症)

處方四 虎睛丸(河間) 虎睛一對 犀角屑 遠志(去心) 梔子仁 川大

黃各三三・〇(二兩)

右五味共研爲末煉蜜爲丸如棗豆大每服二十九食後溫酒送下

適應症 治癩疾潮搖恍惚煩亂口乾譫語

處方五 定志丸(千金) 石菖蒲(炒) 遠志 甘草(炮去心)各七〇・〇(二

兩) 白茯苓 人參各一〇〇・〇(三兩)

右四味，研細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，硃砂爲衣，每服十九至三十九丸，食後米飲或滾湯送下，或將用量減至十分之一，作湯劑煎服亦佳。

適應症 補心強志，治一切神志不足，驚悸健忘，言語失倫，喜笑發狂，色傷泄

精，及能近視不能遠視者（麻痺狂之屬營養不良，呈衰弱性者可用本方）。

處方六 五生丸（李仲南） 天南星 半夏 川烏頭 白附子各三三三〇

（二兩） 大豆（去皮）三〇〇（九錢）

右五味，生研爲末，滴水和丸（一作薑汁煮米糊爲丸），如梧桐子大，每服三丸至五丸，不得過七丸，薑湯送下，每日二次。

適應症 治陰癰。

處方七 芩連清心丸（沈氏尊生） 黃芩七〇（二錢二） 黃連二一〇（六分）

天花粉一〇〇（三錢） 茯神一五〇（四錢五） 麥門冬一〇〇

○(三錢) 丹參五・○(錢半) 牛黃○・二(六厘) 菖蒲一○・

○(三錢) 遠志五・○(錢半)

右九味剉作三百西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 治心熱(麻痺狂發作時精神變常躁狂發熱者可用本方)

處方八 金箔鎮心丸(沈氏曾生) 膽星二三・○(二兩) 硃砂 西琥珀 天

竺黃各一七・○(五錢) 牛黃 雄黃 珍珠各七・○(二錢)

麝香二・○(六分)

右八味研細末煉蜜爲丸每兩作二十九丸金箔爲衣每服一丸薄荷湯送下。

適應症 治癲癇驚悸怔忡氣鬱一切痰火之證。

處方九 甘遂散(證治準繩) 甘遂三・二(一錢)

右研爲末用猪心取三管血三條和甘遂末將心批作二片入藥在內合之線

縛外用皮紙裹溼慢火煨熟。勿令焦。取藥細碾入辰砂末一錢。和勻分作四丸。每服一丸。將所煨猪心煎湯化下再服。用別猪心亦可。過半日大便下惡物則佳。

適應症 治癩癩及婦人心風血邪。

處方十 歸脾湯(濟生) 當歸身(酒洗)五。(錢半) 人參四。(錢二)

茯神一。(錢半) 黃芪五。(錢半) 白朮(土炒)五。(錢半)

龍眼肉四枚 酸棗仁七。(錢二) 青木香五。(錢半)

炙甘草二。(錢半) 遠志五。(錢半) 生薑二片 紅棗兩枚

右十二味。剉作三百西。煎劑。去渣。一日分兩次服。

適應症 治豪思傷脾。血虛發熱。食少體倦。或脾虛不能攝血。致妄行吐下。或

健忘怔忡驚悸。少寐。或心脾作痛。自汗盜汗。或肢體腫痛。大便不調等症。(麻

癲狂因營養不良，精神不健全者，可用本方。

處方十一

琥珀壽星丸（局方）

琥珀三三〇〇（一兩另研）

天南星五〇〇

〇（二斤）（先掘坑深二尺，用炭火五升於坑內燒紅，取出炭掃淨，用好酒一斤澆

將南星乘熱下坑內，用盆急蓋訖，泥壅合經一宿，取出再焙乾爲末） 硃砂七〇〇

〇（二兩）（研飛一半爲衣）

右三味，研爲細末，生薑自然汁打麵糊攪令粘和，入藥末爲丸，如梧桐子大，每服四十九丸，參湯送下，每日三次。

適應症 安神定志，去風化痰，治心膽被驚，神不守舍，或痰迷心竅，恍惚健忘，妄見妄言。

處方十二

清神湯（證治準繩）

茯神一〇〇〇（三錢）

黃芪二〇〇（六分）

酸棗仁（炒）一〇〇〇（三錢） 柏子仁（去壳）一〇〇〇（三錢） 遠

志肉(甘草同煎)五・〇(錢半) 石菖蒲一〇・〇(三錢) 生甘草二

・〇(六分) 生薑汁兩滴 竹瀝七〇・〇(二兩一)

右七味到作三百西煎劑去渣沖入薑瀝二汁溫服一日二次。

適應症 治心肺虛熱痰迷膈上胞絡。(麻痺狂痰多或言語障害者可用本方)

處方十三 歸神丹(沈氏尊生) 硃砂七〇・〇(二兩一) (人猪心內燈草紫酒蒸二

次久取出另研) 酸棗仁 茯苓 人參 當歸各七〇・〇(二兩一)

西琥珀 遠志(薑汁製) 龍齒各四〇・〇(二兩二) 金箔 銀箔

各二十片

右十味研爲細末酒糊爲丸如梧桐子大。金銀箔爲衣。初服九丸漸至二九丸開水送下。一日二次。

適應症 寧神治癩癩。

處方十四

六味地黃湯(錢乙)

熟地一〇〇・〇(三錢)

黃肉七〇〇(二錢)

乾山藥一〇〇

〇・〇(三錢)

茯苓一〇〇

〇・〇(三錢)

澤瀉一〇〇

(三錢)

丹皮七〇〇(三錢)

右六味剉作兩百西煎劑去渣一日分二次服。

適應症

治腎精不足虛火炎上頭目眩暈咽喉燥痛口舌瘡裂耳聾齒搖腰

膝痿軟骨熱痠痛……水泛爲痰自汗盜汗亡血消渴等(按本湯爲營養強

壯劑故麻痺狂之呈營養不良神經衰弱者可用本方)

(八)慢性進行性球麻痺——慢性進行性下部腦灰白質(舌唇咽

頭麻痺)——延髓性癱瘓(舌咽喉癱瘓)舊稱中風中經絡中

血脈風癱等

病原 延髓之運動神經核。最先受累及。早受累之類。然此非獨立性病。而其真正原因不明。感冒精神感動。外傷。舌唇。腭肌過勞。吹奏者。歌唱者。爲其誘因。四十歲以上之男子。罹病較多。女子爲稀。與遺傳無關係。

病理 本病解剖變化。與脊髓進行性肌痿縮相似。延髓及橋部內之腦神經核。如舌下神經。顏面神經。舌咽神經。迷走神經。副行神經。三叉神經核。呈變性或消失。其神經節細胞。漸次萎縮消削。呈色素變性。突起消失。成一種圓形體。而自核發出之神經纖維。并被侵襲。有時且蔓延於椎體道。

症狀 本病因舌唇腭咽喉嚼肌之進行性麻痹及萎縮。故發生言語。咽下。咀嚼。發音諸障礙。其麻痹症狀之順序。每先自舌。以次及於口唇。軟腭諸肌。故最初發現者。卽爲言語障害。凡舌音之D T L S。唇音之B P O M等發音。俱困難。或不能。有時語帶鼻聲。蓋言語障害故。且因舌之消削及麻痹。故舌之挺出。

及舌尖上下左右之運動。或送食物於咽。更自咽送於食管。俱呈困難。（咽下困難。咽下不能。）若食物漏於齒頰之間。必入指於口腔。或自外方壓迫。始能移動其食物。其舌弛緩菲薄狹小。呈纖維性肌肉攣縮。表面富有皺裂及溝。其口舌亦消削麻痹。而運動障害。尖嘴長嘯（口笛）敗皮米梅破派等發音。俱呈困難。因口裂開張。食物及液體常溢出口外。唾液不能咽下。每自口角流出。（流液症）故患者常以手巾置口前。或以流涎之故。致頸部發生炎症。蓋分泌唾液之神經核。在延髓內。延髓麻痹。則唾涎增加。而發流涎症。若腭咽陷於麻痹。則兩者反射缺如。軟腭底下。不能上舉。致發聲之際。鼻咽腔閉鎖不全。空氣之一部。自鼻腔逃逸。而語帶鼻調。不能發B P之音。然閉塞鼻孔。則發音如舊。且因鼻咽腔之閉鎖不全。食物易逆流。而入鼻腔。更以喉鏡檢查。見聲音閉鎖不密。咳嗽喀痰。俱呈困難。若喉及嚼肌食管肌陷於麻痹。則咽下作用更增障

碍喉之上口開放。食物易入喉腔。更侵入氣管及肺。而發異物性肺炎。肺膿瘍等症。食物常充盈於食管。壓迫迷走神經。回歸神經。而發呼吸困難。心悸亢進等症。咬肌之運動微弱。顎骨之閉鎖及運動俱受障礙。迨疾患末期。因聲帶麻痹。發聲及呼吸兩者被其影響。聲音微弱。失抑揚疾徐之度。甚至嘶啞失音。呼吸淺表不正。或窒息發作。因以致死。疾病進行時。患者呈一種特別之顏貌。下唇弛緩。口裂稍開。口角向下方牽引。鼻唇溝深凹。頰部頰部筋肉瘦削。麻痺。呈涕泣之狀。然其顏面上半部。因前額肌未陷於痿縮。而橫紋顯著。故呈驚悸之狀。本病惟運動性腦神經麻痺。故其知覺無變化。凡萎縮麻痺之筋肉。俱呈電氣變性反應。器械興奮性亢進。每發痙攣症狀。而腱反射消失。

治法

西醫謂本病爲不治之疾。亦無特別療法。內服可用沃剝硝酸銀 *Strychnin* 亞砒酸等。咽下困難。及預防誤咽。則以消息子輸送飲食物。且注意於

營養。窒息症狀強烈時。行氣管切開術。或插管法。其他神經劑。浴治法。電氣法。亦可試用。然無大効。

中藥治法 發音困難。姑與全蠍。天蟲。南星。半夏。菖蒲。遠志等。

口角流涎。則與白芷。防風。白附子等。

其他如強壯劑之地黃。萸肉。附子。肉桂。巴戟天。烏蛇。人參。菴蓉。石南葉。鷄血藤。等。均可用作聊盡人事之應付。然恐亦無濟於事耳。

要藥略釋 巴戟天。係屬茜草科植物。巴戟天之根形如連珠。故又名連珠巴

戟。入藥以肥厚多肉者爲勝。處方用名。故往往稱爲巴戟肉。本品爲滋養強壯藥。古人主治大風邪氣。陰痿不起。強筋骨。安五臟。療頭面遊風。補中增志。益氣去風益精。蓋係興奮性神經系統之滋養強壯藥也。 用量一〇・〇——二

〇・〇（二三錢至六錢）

石南葉係石南科常綠灌木石南樹之葉爲強壯藥有鎮靜鎮痙之功古人用本品浸酒或代茗飲能愈頭風故又名風藥並稱養腎氣療腳弱利筋骨去五臟邪氣除精滑清冷痺弱不能行等蓋取其強壯強精振奮機能之功也。

用量一〇・〇——二〇・〇（二錢至六錢）

雞血藤係產於雲南山中木質藤屬之一種其莖長達數十里粗如椴櫟細如蘆葦中空如竹剖取液汁汁赤如血名「雞血藤膠」均入藥用爲補血行血通經活絡藥能暖腰膝已風癱健筋骨除酸痛其藤功遜於膠 用量藤每日一

五・〇——三〇・〇（四錢半至九錢）膠每日一〇・〇——一五・〇
（二錢至四錢半）

全蠍天蟲南星半夏菖蒲遠志白芷防風白附子地黃黃肉附子肉桂烏蛇人參菴蓉等均見前。

處方一

地黃飲(音明論方) 熟地黃一〇・〇(三錢) 巴戟天七・〇(二錢)

一 山茱萸一〇・〇(三錢) 肉蓯蓉七・〇(三錢) 金石斛一

〇・〇(三錢) 附子(泡)四・〇(一錢三) 白茯苓一〇・〇(三錢)

石菖蒲一〇・〇(三錢) 遠志五・〇(錢半) 肉桂心一・〇(三

分) 麥門冬七・〇(三錢) 五味子三・〇(九分)

右十二味剉作三百西煎劑去渣一日分兩次服。

適應症 治心腎不交舌瘖足痹。

處方二

烏頭湯(證治準繩方) 川烏頭二・〇(九分) 赤芍藥七・〇(二錢)

一 乾薑二・〇(六分) 桂心一・〇(三分) 細辛二・〇(六分)

熟地黃一〇・〇(三錢) 當歸七・〇(二錢) 吳茱萸四・〇(一

錢) 甘草三・〇(九分)

右九味剉作三百西煎劑去渣一日分兩次服。

適應症

治八風五尸惡氣遊走腹中絞痛流入四肢來往不定。

處方三

三痹湯(張氏醫通) 人參五・〇(錢半) 黃芪(酒炒)七・〇(二錢一)

白朮七・〇(二錢一) 當歸八・〇(二錢四) 川芎五・〇(錢半)

白芍七・〇(二錢一) 茯苓一〇・〇(三錢) 炙甘草二・五(七分

半) 桂心一・〇(三分) 防己七・〇(二錢一) 烏頭(泡)三・〇

(九分) 細辛二・〇(六分) 生薑三片 紅棗二枚

右十四味剉作五百西煎劑去渣一日分三次服。

適應症

治風寒濕氣合病氣血凝滯手足拘攣。

處方四

小續命湯(千金方) 麻黃二・〇(六分) 桂枝二・〇(六分) 炙甘

草二・〇(九分) 杏仁一〇・〇(三錢) 白芍七・〇(二錢一) 川

芎五・〇(錢半) 防風五・〇(錢半) 人參五・〇(錢半) 黃芩

七・〇(二錢一) 防己七・〇(二錢一) 大附子(泡)二・〇(九分)

右十一味。剉。作三百西西煎劑。去渣。一日分二次服。

適應症 治中風不省人事。喘斜癱瘓。麻木。眩暈。涎鳴。反張。痞癰厥冷。及風痺

脚氣等。

處方五 蠲風飲(正傳方) 防風五・〇(二錢半) 杜仲七・〇(二錢一) 羌

活五・〇(錢半) 白芷五・〇(錢半) 川當歸七・〇(二錢一) 生

地黃一・〇(三錢) 白芍七・〇(二錢一) 川牛膝一・〇(三

錢) 川芎五・〇(錢半) 秦艽五・〇(錢半) 何首烏一・〇(〇

(三錢) 萆薢七・〇(二錢一) 蒼朮(米泔浸一宿)五・〇(錢半) 白

朮五・〇(錢半) 木通四・〇(二錢一) 大楓子肉七・〇(二錢一)

威靈仙五・〇(錢半) 雞血藤一〇・〇(三錢) 防己七・〇(二錢)
 一 丁公藤(一名南藤即石南藤)一〇・〇(三錢) 荆芥穗一〇・〇
 (三錢) 海桐皮一〇・〇(三錢) 五加皮一〇・〇(三錢) 南星
 (煨)五・〇(錢半) 半夏七・〇(二錢) 橘紅五・〇(錢半) 赤
 茯苓一〇・〇(三錢) 桑寄生一〇・〇(三錢) 天麻七・〇(二錢)
 一 殭蠶一〇・〇(三錢) 鈎藤一〇・〇(三錢) 肉桂一・〇
 (三分) 草烏頭四・〇(一錢) 甘草節四・〇(一錢) 炮川烏
 四・〇(二錢) 猪牙皂角一・〇(三分) 兩頭尖五・〇(錢半)
 陰地蕨五・〇(錢半) 大薊五・〇(錢半) 小薊五・〇(錢半)
 省風藤五・〇(錢半) 桑絡藤(即桑寄生)七・〇(二錢) 生姜三
 片

右四十三味。剉細。用無灰好酒一千二百西(二斤)以磁罐或玻璃盛酒浸藥皮紙十數層封口。冬半月夏七日。秋春十日。每清晨午前午後臨臥各服一小杯。

適應症 治中風癱瘓。口眼喎斜。及一切手足走注疼痛。肢節攣急。麻痺不仁等症。

處方六

八仙湯(沈氏曾生)

人參五・〇(錢半)

茯苓一〇・〇(三錢)

白

朮七・〇(二錢)

甘草三・〇(九分)

川芎五・〇(錢半)

當歸

七・〇(三錢)

白芍七・〇(三錢)

地黃一〇・〇(三錢)

羌

活五・〇(錢半)

半夏七・〇(二錢)

陳皮五・〇(錢半)

秦艽

七・〇(二錢)

牛膝一〇・〇(三錢)

桂枝三・〇(九分)

柴胡

五・〇(錢半)

右十六味剉作四百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 治身體麻木。

處方七

桑尖湯(沈氏尊生)

嫩桑枝尖三〇・〇(九錢) 漢防已一〇・〇

(三錢) 當歸七・〇(二錢一) 黃芪五・〇(錢半) 茯苓一〇・〇

(三錢) 威靈仙五・〇(錢半) 秦艽五・〇(錢半) 川芎五・〇

(錢半) 升麻三・〇(九分)

右九味剉作三百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 治指尖作痛。

處方八

人參益氣湯(六科準繩方) 人參五・〇(錢半) 生甘草四・〇(一

錢二) 黃耆五・〇(錢半) 升麻二・〇(六分) 炙甘草二・〇(六

分) 五味子三・〇(九分) 柴胡五・〇(錢半) 芍藥七・〇(二

錢一)

右八味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 治暑濕傷氣手麻肢倦怠惰嗜臥。

處方九

五痹湯(沈氏尊生)

人參五・〇(錢半) 茯苓一〇・〇(三錢)

當

歸七・〇(三錢一)

白芍八・〇(三錢四)

川芎四・〇(二錢一)

白朮五・〇(錢半)

細辛二・〇(六分)

甘草二・〇(六分)

五

味子三・〇(九分)

右九味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 治風寒濕氣內襲手足緩弱麻痺。

處方十

除濕補氣湯(東垣)

綿黃芪一〇・〇(三錢)

升麻梢七・〇(二錢)

一) 甘草梢四・〇(一錢二)

五味子二・〇(六分)

當歸七・〇

(二錢) 柴胡梢五・〇(錢半) 澤瀉一〇・〇(三錢) 紅花三・

〇(九分) 陳皮五・〇(錢半) 青皮五・〇(錢半)

右十味剉作三百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 治腿足濕痹。

處方十一 順風勻氣散(蘇沈良方) 白朮五・〇(錢半) 人參五・〇(錢半)

天麻七・〇(二錢) 沉香三・〇(九分) 白芷五・〇(錢半) 紫

蘇葉五・〇(錢半) 木瓜一〇・〇(三錢) 青皮五・〇(錢半)

甘草二・〇(六分) 烏藥五・〇(錢半)

右十味剉作三百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 治中風中氣半身不遂口眼喎斜及風氣腰痛。

(九)急性延髓球麻痺 舊稱中風

病原 本病之原因甚夥，茲分條述之於后。

(一) 因椎骨動脈基礎動脈之栓塞及血塞而延髓軟化。

(二) 延髓出血。

(三) 延髓炎。

(四) 外傷及壓迫。

(五) 延髓球神經炎。

(六) 急性傳染病。

症狀 出自延髓之神經及通過延髓之神經(如四肢之神經)急劇陷於麻痺。其麻痺之先，每以後頭痛及知覺異常爲前驅，繼發眩暈嘔吐頭痛等症。而

咽下困難。言語障害。喉麻痺。循環呼吸障害。四肢麻痺等。亦急劇併發。(一)
運動麻痺。舌唇軟腭咬肌。顏面下部眼肌。(動眼神經。外旋神經)俱呈麻
痺。四肢之麻痺爲偏癱。或爲交叉性。且於麻痺肢續發緊張及拘攣。又因聲帶
麻痺而發聲音嘶嘎或失音。其瞳孔散大或縮小。往往見共同運動障害症。
(二)知覺異常或脫失。(三)反射。軟腭及嘔吐反射俱消失。腱反射始則
減退。後乃亢進。(四)血管運動及分泌障礙。發汗唾液分泌增進。(因口裂
開張唾液不能咽下故)。(五)呼吸困難。尤以呼吸中樞麻痺爲患者死因。
治法。本病不易治愈。每經數日卽死。西醫於此病症。原因於梅毒者。行驅梅
療法。水銀軟膏塗擦(一日三)。○沃剝內服(一日一)。○奎尼。○後頭
部兩側貼以冰囊。滋養灌腸。或食道消息子輸送食物。以維持體力。
中藥治法。參閱前腦出血腦梅毒……等。

(十) 脊髓出血

(脊髓卒中·脊髓血腫·跌打損傷性類中)

病原 此病因外傷而致者最多。故脊髓內出血。爲男子在少壯時期所患者亦最常見。此外如因受寒、受濕、或破傷風及其他驚厥性病而起者亦有之。又出血或與腦脊髓空洞病、或脊髓炎相伴而起。總言之。因跌打等而脊髓直接受傷害。係最普之病原。頸突然受劇烈之屈折(多數不兼骨折及脫臼)係致出血最常見之先驅損害。因是之故。受損之平段最常在脊髓之下頸部。大戰中此類病症最多。

病理 出血多在灰白質(富於血管。抵抗力較白質爲弱)沿脊髓之長軸而發。所爲管狀出血 Rohrendutung 是也。依橫斷面脊髓出血。或在全面。或在偏側(偏側出血 Halbseitenlutng)其出血部微細者。爲局限性出血。多發於

脊髓灰白質出血竈上方及下方之脊髓陷於續發變性。若出血竈之血液漸次吸收。內容成漿液體。周圍以增殖之神經纖維間質構成。是名卒中性囊腫。或形成黃褐色癍痕。名卒中性癍痕。本症出血之廣狹大有異同。自一小竈局性血外瀦以至於柱形之出血。延之損害之上及下頗遠者皆有之。原發之出血在灰質。而受患最甚之處。亦每在此。而其周圍之白質徑或因出血而薄並破裂。

症狀 突起發生脊髓症候。(卒倒而發截癱爲本病特徵。然因出血部位及大小而有差異。) 橫斷面出血。在腰髓或胸髓。則突然兩下肢發生截癱。知覺亡失。腱反射初則減弱。(因出血時脊髓震盪) 繼乃亢進。或以反射弓斷絕而消失。膀胱直腸麻痹。(病在胸髓。則於一定時期之後始發生) 而發腎盂炎。膀胱炎。尿腐敗等症。出血在頸髓上部。則於前症外。兼發上肢截癱。或球症狀。體

溫多無變化。或數日間輕度上升。偏側出血。則呈脊髓偏側損傷症。患側運動麻痺。他側知覺亡失。限局性出血。發於脊髓前角。則呈前角炎症候。發於後角。則呈局部知覺亡失及溫覺消失。又本症因脊髓一側之受累。常較他一側重。故李郎碎卡耳氏症狀羣 *Brown-Sequard Syndrome* 常見。病起時症狀甚驟突。病者患感覺過敏及癱癱。逐漸變成痙攣性。而在身之一側最昭顯。感覺之喪失。大抵係痛覺及溫度覺二者。而以體之偏側為最昭顯。甚困苦之感覺過敏（常感覺微刺）或持續發顯多日。但顯急性神經根痛（放射性痛）者甚少。又此病既以在下頸部者為最常。故除以上所述症狀外。常顯臂類癱瘓而兼脊最下頭段及第一胸段所管轄之肌弛緩而發萎縮之癱。有時出血在較下之脊髓段。腰膨大為最多數。下頸段之次多數的受患處。所顯之癱。依受患之脊髓段而異。此病或致命甚速。苟其出血屬雙側性。而上延頗高。並累及膈中。

樞者則尤然。然完全復原者終較多。更有上肢略留癱及不完全性感覺喪失者。此等遺留之患。依原來損害之局部而異。故有爲腿痠硬者。

治法 宜完全靜養。務以少擾病者爲至要。又須留意看護皮膚及膀胱。使不至成臥瘡及膀胱炎。療癱肌之法如電療。按摩。或被動性運動法。必須在出血後六星期始可施用。又防止出血。及脊髓組織之反應性炎症。則以冰囊貼於脊柱部。或用水枕。而安靜身體。若止血藥及沃剝內服。多無大效。其他膀胱直腸麻痺之處置。褥瘡預防等療法。與脊髓炎相似。

中藥治法 本病殊無有效療法。祇有作對症姑息處治。因跌打損傷脊髓出血。用地鼈蟲。童便。自然銅。骨碎補。療傷止血。

四肢截癱而不能轉動時。用川斷。牛膝。木瓜。桂枝。當歸。川芎。赤芍。杜仲等。活動血脈。強壯筋節。

疼痛甚者。用川草烏頭。乳香。沒藥。白附子。秦艽。落得打等。麻醉鎮痛藥。
發痙攣症者。用蜈蚣。全蠍。白花蛇。地龍。蟬衣。純鈎。天麻。白芍等。弛緩神經以鎮
痙。

直腸麻痹便秘。膀胱麻痹尿閉等。用推車蟲。螻蛄。蟋蟀等。利尿通便藥。
其他如活血。弛筋。營養強壯之地黃。人參。黃芪。當歸。枸杞。萸肉。山藥。巴戟。菟蓉
等。均可應用。

要藥略釋 地鼈蟲原名蠶蟲。係生於竈脚陰濕處之化生類爬蟲。色灰褐。形
橢圓而扁如蟹。故又名灰蟹蟲。古來經驗。爲跌打損傷最效之良藥。主治瘀血
乾血。血積癥瘕。腹痛。腰痛。折傷。續筋骨。消瘀止痛。活血止血。凡有瘀血諸症。本
品均能治之。驗方新編回生第一丹。治跌打損傷。有起死回生之功。以本品爲
主藥。蓋本品不僅消瘀止痛。且有活血及促進損傷部瘀血之吸收。而恢復神

經之麻痺歟。用於扭捩挫損之腰痛背痛。以著者之經驗確具特效耳。用法焙燥研粉黃酒沖服。用量每回一。○——三。○（三分至九分）爲散劑或丸劑。童便宜選取十二歲以下無病之男童小便。清澈無混濁物者去頭尾用。古來主治血悶熱狂撲損瘀血在內暈絕止吐血鼻衄杖瘡腫毒癥瘕積聚外科發揮方云。凡一切傷損不問壯弱及有無瘀血俱宜服此。蓋本品內含有尿酸鈣及尿酸鹽能使損傷部之瘀血滲出物吸收之而回復正常。故跌打損傷用爲特效藥。用量一杯至二杯乘溫頓飲之。

自然銅乃不經提煉而出自然礦之天然銅類故名。本品形狀如銅片或成塊。新出礦者色若紅銅。久則面生斑爛之彩色。性極柔韌。可展薄延長。古來經驗主治折傷散血止痛破積聚。本草求真云。本品與蠶蟲乳沒藥五銖古錢麻皮灰血竭胎骨作丸煎當歸地黃續斷牛膝丹皮紅花濃湯送下。治跌撲損傷接

骨續筋最效。蓋本品有收斂鎮痛及促進瘀血吸收之功耳。 用量五・〇——

——〇・〇（錢半至三錢）醋煨透研水飛過用

骨碎補原名猴姜又名毛姜爲隱花植物石草類骨碎補之根古人用爲補腎
治骨傷破血療風痛脚軟膝腫蘇頌云蜀人治閃折筋骨傷損取根搗篩煑黃
米粥和裹傷處有效蓋本品具有緩和滋養性强壯之功也。 用量五・〇——

——〇・〇（錢半至三錢）

木瓜屬薔薇科藥用木瓜之果實古人用治脚氣轉筋強筋骨健腰膝解攣急
蓋本品味極酸有收斂鎮痙及弛緩神經拘攣以興奮強壯筋骨之功也。

用量五・〇——〇・〇（錢半至三錢）

杜仲係大戟科杜仲之樹皮本經主治腰脊痛益精氣堅筋骨脚中酸痛又云
補腰補腎者殆有滋養性强壯之功耳。 用量五・〇——二〇・〇（錢半

至六錢)

乳香係橄欖科。乳香樹屬之樹幹。刺傷其皮。使滲出津液而凝結者。古來用作活血定痛劑。爲癰疽瘡傷之要藥。蓋有行血鎮痛之功耳。 用量三・〇——五・〇 (九分至錢半)

沒藥屬橄欖科之蜜兒拉。鑽刻其樹皮。卽有一種樹脂滲出。乾者成塊。卽爲本品。攷甄權本草主治金刃所傷打損踉跌墜馬筋骨疼痛。心腹血瘀。推陳致新。能生好血云云。此乃有收斂性鎮痛強壯之功也。 用量二・〇——五・〇 (六分至錢半)

秦艽屬爵狀科。秦艽之根。應用於風痹攣急諸症。古稱散風濕。治痹痛。寒濕風痹。肢節痛。利大小便。及手足不遂之瘳。去風治濕。養血營筋。蓋本品有營養作用。而恢復神經之麻痺故也。 用量五・〇——一〇・〇 (錢半至三錢)

落得打爲山草類之一種。入藥係用其根。形如玉竹。搗爛有粘性。爲跌打損傷。金瘡出血之特效藥。不拘內服外用。均有卓效。內服用酒煎。以渣外敷。

用量七・〇——一四・〇（二錢一至四錢二）

推車蟲。原名蜚螂蟲。爲甲壳蟲之一種。用爲鎮痙藥。用於驚癇。及大小便不通。痔漏脫肛。疔腫疽瘡。出血不止。搗敷出箭簇。本品蓋有止血。強壯神經。鎮痛鎮痙之功也。用量一・〇——三・〇（三分至九分）焙剉研末沖服。

蝮蛄屬直翅類。蟋蟀科之昆蟲。凡平澤卑濕之地均有產生。用治癩癧腫。生搗塗敷。潰癩毒。除惡瘡。難產胞衣不下。水腫。癰淋（腎臟炎。膀胱炎）蓋本品有強壯神經性利尿排毒之功。用量兩只至四只。

蟋蟀爲化生蟲類之一種。全體黑色。長約六七分。雄者能鳴。善鬪。能穿地穴居。產原野陰濕諸地。用作通小便。發痘瘡。焙乾爲末。沖服。亦有強壯神經。利尿排

毒之功耳。用量一對至三對。

川斷、牛膝、桂枝、當歸、川芎、赤芍、川草烏、白附子、蜈蚣、全蠍、白花蛇、地龍、蟬衣、純鈎、天麻、白芍、地黃、人參、黃芪、杞子、黃肉、山藥、巴戟、菴蓉等均見前。

處方一 丹參煑散(外台) 丹參七・〇(二錢) 芎藭五・〇(錢半) 杜仲

七・〇(二錢) 續斷七・〇(二錢) 地骨皮一〇・〇(三錢)

通草三・〇(九分) 當歸七・〇(二錢) 乾地黃一〇・〇(三錢)

麥門冬五・〇(錢半) 禹餘糧一〇・〇(三錢) 麻黃一・〇(三分)

甘草二・〇(六分) 桂心一・〇(三分) 牛膝七・〇(二錢) 生

姜二・〇(六分) 牡蠣二〇・〇(六錢) 升麻三・〇(九分)

右十七味剉作三百西煎劑去渣。一日分二次溫服。

適應症 筋實極。兩脚下滿而痛。不得行。脚心如割。筋斷折痛。不可忍。(外傷)

性下肢截癱類)

處方二 十物獨活湯(外台) 獨活七・〇(二錢一) 桂心一・〇(三分) 生

葛根五・〇(錢半) 甘草二・〇(六分) 防風七・〇(二錢一) 當

歸七・〇(三錢一) 生姜二・〇(六分) 芍藥七・〇(二錢一) 附

子四・〇(二錢二) 半夏七・〇(二錢一)

右十味剉作三百西西煎劑去渣一日分兩次溫服。

適應症 半身不遂口不能言(偏癱)

處方三 錄驗續命湯(外台) 麻黃三・〇(九分) 防風七・〇(二錢一) 石

膏一〇・〇(三錢) 黃芩七・〇(二錢一) 乾地黃一〇・〇(三錢)

芍藥四・〇(二錢二) 當歸七・〇(二錢一) 甘草二・〇(六分)

杏仁一〇・〇(三錢) 桂心一〇・〇(三分)

右十味剉作二百西西煎劑去渣一日分兩次溫服。

適應症 大痺一身不隨或半身一手一臂口不能言習習不知人不覺痛癢。

脊髓出血之神經痲痺半身不遂或截癱均適用。

處方四 腰腎膿水湯(外台) 牛膝一〇・〇(三錢) 檳榔七・〇(二錢一)

防己七・〇(三錢二) 牽牛子三・〇(九分)

右四味剉作二百西西煎劑去渣一日分三次溫服。

適應症 按本方出自必效方云療腰腎病膿水爲消炎利尿劑。脊髓出血而

發腎盂炎膀胱炎腐敗尿身體強壯者可應用本方。

處方五 續斷湯(本事方) 續斷七・〇(三錢一) 杜仲七・〇(三錢一) 肉

桂一・〇(三分) 防風七・〇(二錢一) 牛膝一〇・〇(三錢)

白茯苓一〇・〇(三錢) 細辛二・〇(六分) 人參四・〇(一錢二)

甘草二・〇（六分） 當歸七・〇（二錢一） 白芍七・〇（二錢一）

川芎五・〇（錢半） 秦艽五・〇（錢半） 川獨活五・〇（錢半）

熟乾地黃一〇・〇（三錢）

右十五味剉作三百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 中風肝膽筋骨諸風（按本方係強壯性鎮痛通經劑適用於脊髓出血有活潑循環恢復麻痺之功耳）

處方六 木瓜煎（本事方） 宣木瓜一〇・〇（三錢） 沒藥七・〇（二錢一）

乳香七・〇（三錢一）

右三味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 治筋急項強不可轉側者（強壯鎮痛消瘀）

處方七 地黃圓（本事方） 熟乾地黃一〇・〇（三錢） 牡荊七・〇（二錢一）

山茱萸五・〇(錢半) 黑狗脊一〇・〇(三錢) 地膚子一〇・〇
(三錢) 白朮七・〇(二錢二) 乾漆一・〇(六分) 鱗蝟五・〇
(錢半) 天雄四・〇(二錢二) 車前子七・〇(二錢二) 萆薢一〇
・〇(三錢) 山羊脛骨一〇・〇(三錢) 澤瀉七・〇(二錢二) 牛
膝七・〇(三錢二)

右十四味剉作三百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 主治筋極養血。(蓋本方爲強壯性通經利尿劑對於脊髓出血癱
痺尿閉腎炎腰痛等症最爲相宜。

處方八 鐵彈圓(本事方) 乳香七・〇(二錢二) 沒藥七・〇(二錢二) 五

靈脂一〇・〇(三錢) 川烏五・〇(錢半)

右四味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 主治一切癱瘓風。(按本方爲消瘀通經鎮痛劑。對於出血性神經麻痺癱瘓症。於鎮痛之外。或有促進其吸收。恢復其麻痺之功。)

處方九

當歸補血湯(張三錫治法彙)

黃芪七・〇(二錢一) 當歸七・〇(二

錢一) 防風五・〇(錢半) 羌活五・〇(錢半) 荆芥穗五・〇(錢

半) 甘草二・〇(六分)

右六味。剉作兩百西西煎劑。去渣。一日分二次溫服。

適應症 治一切去血過多。因無血養筋。令人四肢攣急。口噤如瘓。(按本方

爲鎮瘓劑。脊髓出血而發瘓攣可酌用。)

處方十

強神湯(本朝經驗)

紅花三・〇(九分) 殭蠶一〇・〇(三錢) 棕

櫚葉七・〇(二錢一) 甘草二・〇(六分)

右四味。剉作兩百西西煎劑。去渣。一日分二次溫服。

適應症 主治中風口眼喎斜半身不遂喜欠流涎者（收斂消痰緩利鎮痙）

處方十一 壯原湯（赤水） 人參五・〇（錢半） 蒼朮七・〇（二錢） 茯苓

一・〇・〇（三錢） 破故紙一・〇・〇（三錢） 桂枝二・〇（六分） 附

子一・〇（三分） 縮砂仁一・五（四分五）

右七味判作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 主治下焦虛寒中滿腫脹小便不利等（按本方爲強壯性促進吸收劑脊髓出血之呈腰部腫大小便不利者可斟酌與之）

（十一）脊髓炎

病原 本病可知急性與慢性二者惟其症狀相似故並述之。

本病原因爲分裂菌而感冒外傷傳染病則爲分裂菌傳染之補助原因但以

菌之侵入脊髓抑以毒素之作用而發病。則尙未明。其他中毒（中毒性脊髓炎 Torisbenyellitis）神經炎之傳播（上行性神經炎 Neuritis ascendens）精神感動、恐怖、脊髓出血。每于月經後。往往誘發本症。脊柱疾患（癌腫結核）常與本病相併發。酒類濫用及梅毒（梅毒性脊髓炎）則發傳染性慢性脊髓炎。急性脊髓炎之累及脊髓。或有限。或瀰散不定。或以灰白質一併受累。就所見者而論。則有以下之區別。（一）爲一獨立性病症。隨受寒或過勞而起。致精力迅速喪失。而顯與急性上行癱瘓相同之症狀。有若於病案常爲脊髓前灰白質炎之廣布的急性類。又有爲急性出血類兼高熱者。其與他類之關係則無定。（二）爲傳染病之繼發性病症。如隨痘症、腸熱、麻疹或淋病之後而起者。是（三）爲外傷之結果。如脊骨折及用肌力十分過度而致者。是脊髓受震盪而未致骨折。亦或能致此。惟甚罕。例如因火車遇險受傷而致此病者。實罕有也。

(四)因脊骨病如骨瘍或癌而致。但此爲局部的急性橫截性脊髓炎之病原者。較爲彌散性類之病原者多。(五)脊髓本身之病如癌或梅毒所致。梅毒性病有二類。(一)則與樹膠樣腫伴顯。此係晚期性類。(二)則在原發性傳染病發顯後一年至一年半之間卽死。

病理 本病變化多發於脊髓灰白質。蓋灰白質富於血管。故分裂菌容易傳達。其限局於灰白質者。名蔓延性中心性脊髓炎 *Myelitis centralis diffusa* 白質之原發性炎症甚稀。僅發於白質者。名脊髓白質炎 *Leukomyelitis* 脊髓全橫經被害者。名橫經性脊髓炎 *Myelitis transversa* 炎症。彌蔓於周圍者。名脊髓周圍炎 *Perimyelitis* 續發於脊髓膜者。名脊髓性脊髓膜炎 *Myelomeningitis* 脊髓之病變。因其硬度色澤之變化。及脊髓橫斷而紋彩之不明或消失而知之。然有時肉眼上不呈著明之病變。大抵急性脊髓炎之病竈爲軟化。以時

期不同而有赤色黃色灰白色之異。慢性症爲硬化。灰白色帶光澤。且萎縮。試以 *Wright* 氏液固定硬化後（八週至十週間）則見炎竈呈淡黃色。與健康部容易區別。顯微鏡下見血管及膠樣組織之增殖。神經纖維及細胞之膨大。凝結消滅及脂變化等狀。炎竈多發於胸髓。腰髓及頸髓次之。凡屬部急性脊髓炎之累及灰白兩質者（例如在受外傷及急性受壓後所致者）脊髓腫而軟膜充血。腦質較常軟。用刀切腦膜時。有半溶解髓質流出。而病勢較輕之類。苟切開患處。則或灰白二質之區別喪失。或其區別極不明顯。有顯急性出血性脊髓炎之徵象者。

症狀 突然戰慄發熱。至攝氏三十九度或四十度以上。或發前驅症。如背部牽引感覺。脊柱強直感覺。四肢知覺異常等症。（慢性脊髓炎。熱候多缺。如或有一時性體溫升騰。以脊髓炎症之增進也。其前驅症亦爲脊柱疼痛。四肢知

覺異常。膀胱障害等。遂發脊髓麻痹症狀。尤以橫斷性脊髓炎爲甚。患者下肢呈無力衰弱感。倉皇就褥。而於下肢發生知覺異常。如蟻行感覺。衝刺。灼熱。寒冷感覺。或發疼痛性攣縮。漸次知覺亡失。於短時間。下肢陷於完全弛緩性麻痹。慢性症之知覺及運動障害。亦自脚部發生。惟症狀較緩。試列舉其重要症候於次。

- (一) 運動性麻痹症候 隨意運動徑路。在脊髓前索及側索。若斷絕時。則斷絕部以下發生運動性截癱。其斷絕在頸髓部。則兩肱以下俱成截癱。
- (二) 運動性刺激症狀 發現於本病初期及經過中。於下肢爲多。蓋此種症候與脊髓側索之運動性徑路有關係也。
- (三) 共同障礙 後索被害時。此症候著明。但往往爲痙攣症狀及麻痹候所隱蔽。
- (四) 知覺機障害 本病初期有蟻走。搔痒。鈍麻。隔紙等輕度刺激症候。及疼痛之感。其後遂發麻痹。
- (五) 反射 下肢皮膚反射。及膝蓋腱反射中樞。俱在腰髓部。

氏腱反射中樞在薦骨髓。當腰髓炎時。腰髓內反射弓破損。故反射減衰或消失。胸髓及頸髓炎時。反射弓無害。而反射制止纖維斷絕。故反射亢進。反射制止纖維依脊髓錐體道而行。若下肢腱反射亢進時。可知脊髓炎在腰髓上部。且侵及錐體道也。(六)膀胱及直腸之麻痺。屢發於脊髓炎。若腰部附近炎時。于疾病初期即現此症。尿閉 *Retentio* 或淋瀝 *Uncontinentiaurinae* 便秘或失禁 *Uncontinentia, urinae*。蓋膀胱壓縮肌先蒙其害。故患者不能排尿。膀胱脹滿達於臍部以上。其後膀胱括約肌陷於麻痺。則發尿淋症。此時空氣中分裂菌。易由尿道侵入膀胱致尿成 *Alkali* 分解發不快之臭氣。且此分解尿常誘發膀胱炎。腎盂炎。遂起尿毒症而致死。(七)生殖機能減退或消失。(八)營養障害。下肢肌肉中樞在腰髓部。故腰髓炎時。呈肌肉消削及電氣之變性反應。然腰髓以上之炎症。則僅不發不働性萎縮。往往因皮

膚營養障害而發皮膚乾燥。表皮剝離。爪甲肥厚及破折。匍行疹及蕁麻疹發生。麻痺肢蒼白厥冷。或呈赤色及斑點狀漸紅。（脈管運動障害）浮腫（淋巴循環緩徐）患部多量發汗。或全身發汗。而脚部乾燥（汗分泌障害）等症。患者薦骨及臀部易發褥瘡。或發於大轉丘足踝足踵等處。蔓延深入。有連於脊柱管者。褥瘡發生固與營養障害有關係。然尿尿之污染。體重之壓迫。亦爲重要原因。（九）腦神經障害 本病停止性者。症狀不增惡。進行性者。炎症由脊髓上行。則麻痺症狀。亦漸自下肢達於胸腹。及於延髓腦部。則以呼吸困難。咽下困難。心臟麻痺而死。其皮膚知覺麻痺。亦自下及上。故每日檢其麻痺界限。即可推知炎症之部位也。頸髓炎時。往往有瞳孔變化。如左右不同。及瞳孔性瞳孔縮小等症。（十）帶狀症候 *Guertelersc einungen* 胸髓部神經後根之刺激症候是也。身體周圍有疼痛。緊張。知覺異常。絞榨性感。覺壓迫成敲打

其脊柱則發疼痛。因罹病之部位而區別其症候。(一)胸髓炎 *Myelitis dorsa*
(二)下肢之運動性及知覺性截癱。緊張性麻痺。膀胱直腸障害。肌肉無變性的
消削。腱反射亢進。而發著明之痙攣症狀。(肌肉緊張痙攣)(三)腰髓炎 *Myelitis lumbalis* 下肢之運動性及知覺性麻痺。膀胱直腸麻痺。下肢之皮膚及腱
反射消失。下肢肌肉弛緩。而發變質性消削。易發褥瘡。若薦骨髓被侵害時。則
於坐骨神經之區域。發生運動麻痺。大腿內面。會陰陰部。有知覺障礙。(二)頸
髓炎 *Myelitis Cervicalis* 上肢運動障礙(萎縮性麻痺)呈變質性反應)及知
覺障礙。下肢截癱(緊張性麻痺)而無肌肉變性反應。腱反射亢進。而發痙攣
狀。呼吸肌及項肌被害而瞳孔縮小。

鑑別診斷

(一)脊髓出血 症狀突然發生。本症則徐徐現出。(二)急性
脊髓膜炎 疼痛顯著。項肌強直。本病則不然。(三)脚氣 有心悸亢進腓

腸肌握痛等症。

治法 西醫療法於梅毒性者。行原因療法。急性症於脊柱貼以冰囊。或塗擦水銀軟膏。以解熱及防遏血液進入脊髓之目的。則用撒曹（一日四五爲水劑）食餌宜取富滋養易消化之液體物。牛乳最良。咖啡茶。葡萄酒。酒精類。宜禁忌。每日注意於便道。以促便之目的。可食煮熟之果實。如蘋果。梅。荸薺。梨等。便秘者。施以灌腸法。既發膀胱炎者。則用利尿劑。或以硼酸水洗滌膀胱。本病療法中。看護爲最要。臥床被褥。勿使生皺裂。每日常變更其體位。以防恆久性壓迫。晝間以微溫湯清拭全身一度。壓迫之部。置氣枕或橡皮輪。若皮膚以壓迫潮紅。則以酒精。或枸櫞汁塗布。發褥瘡時。則以硼酸軟膏。撒酸軟膏。水銀膏塗擦。或以沃度仿謨 Xeroforn, Dermatol 等散布。內服藥可用沃剝。硝酸銀。麥角。鐵。亞砒酸。規銀等。然其效不著。慢性症則通交流電氣於脊髓。（弱電流

之兩極交互貼於脊柱。一週間使用二三回。一回五分時。通感傳電氣於麻痺肌。然亦無著效。惟按摩療法能維持肌肉之營養。防止肌肉短縮。其他入浴療法時亦有效。溫浴熱浴或食鹽浴。富裕者則往溫泉場（硫黃泉鐵泉泥浴）或海濱。

中藥治法 運動麻痺者。用全蠍。蜈蚣。天蟲。地龍。白花蛇。烏梢蛇。川草烏等。營養障礙者。用人參。地黃。當歸。黃芪。枸杞。芡肉等。

膀胱括約肌及壓迫機麻痺。而尿失禁。及尿閉。可用螻蛄。蟋蟀。車前。琥珀等。急性脊髓炎發高熱時。可用天花粉。葛根。荊芥。石膏。鉤藤。羚羊角等。

下肢無力衰弱。可用牛膝。川斷。狗脊。木瓜。石斛。山藥等。

知覺異常刺痛或灼熱者。用防風。天麻。全蠍。石膏。知母。赤芍。當歸。羌獨活。細辛。白芷等。

發疼痛性攣縮時。可用川草烏。鈍勾。白芍。甘草。木瓜。天麻等。

膀胱炎腎盂炎。可用黃柏。不通。知母。茯苓。車前。牛膝。山梔。丹皮等。

若因於梅毒性者。須用驅梅劑。如輕粉。土茯苓。忍冬藤。萆薢。生甘草。連翹。黃芪等。

要藥略釋 天花粉屬葫蘆科。爲括萋之根。古來主治消渴身煩熱。排膿生肌。

肉。潤枯燥。通津液。通經行水。時熱狂躁。痰凝咳嗽。煩滿身黃。蓋本品主要成分爲 *Bryonia*。次爲澱粉。有清涼解熱。滋養鎮痙之功。 用量一〇・〇——二

〇・〇（二錢至六錢）

葛根屬荳科。爲葛藤之根。富含澱粉。本經主治消渴身大熱。嘔吐諸瘕。起陰氣。解諸毒。別錄療傷寒中風。頭痛。解肌發表出汗。開腠理。療金瘡。止脇風痛。蓋亦取其清涼解熱。滋養鎮痙之功也。 用量五・〇——一〇・〇（錢半至三

錢)

狗脊屬薔薇科。藥用狗脊之根。狀如狗之脊骨。被有黃褐色綿毛狀爲膜。故又名金毛狗脊。古來用爲強背。續筋骨。治脚膝痿軟。俯仰不利。周痹痠疼。屈伸不靈等。蓋本品有強壯腰脊神經及緩和鎮痛之功也。 用量五・〇——一〇

・〇(錢半至三錢)

石斛屬蘭科。藥用石斛之莖幹。用治腰脚軟弱。傷中痿痺。生津補虛。益腎強陰。本經謂補五臟。厚腸胃。此乃緩和強壯滋養神經之藥也。 用量七・〇——

一四・〇(二錢至四錢)

知母屬百合科。藥用知母之根。本經主治消渴熱中。除邪氣。肢體浮腫。下水補不足。益氣別錄。療傷寒。久瘧。煩熱。脇下邪氣。應用於熱渴。小便赤。大便難。津澗心煩者。蓋本品係(一)爲解熱藥。用於熱病之亢進期。及虛性骨蒸熱。(二)有

鎮靜作用。用於性神經勃起過度。遺精等。(二)小便熱閉不通。有利尿之效。
用量七・〇——一四・〇(二錢至四錢)

黃柏屬芸香科。藥用其樹之幹皮。古來主治黃疸腸痔。血痢。陰痿。口乾心熱。小便不通。消渴。便閉。吐衄。尿血。腰膝痿軟。口舌生瘡。退熱止遺精等。蓋本品有清涼性。解熱消炎之功耳。 用量五・〇——一〇・〇(錢半至二錢)

連翹屬木犀科。藥用連翹之果實。本經主治寒熱鼠瘻。瘰癧。癰腫。惡瘡。癭瘤。結熱。甄權云。治五淋。利小便。賞用於急性炎症熱。及熱毒性疾病。蓋本品有清血變質。解毒利尿之功也。 用量七・〇——一〇・〇(二錢至三錢)

全蠍。蜈蚣。天蟲。地龍。白花蛇。烏梢蛇。川草烏。人參。地黃。當歸。黃芪。枸杞。萸肉。車前。琥珀。荆芥。石膏。鈎藤。羚羊角。川斷。木瓜。山藥。防風。天麻。赤芍。羌獨活。細辛。白芷。甘草。木通。茯苓。牛膝。山梔。丹皮。輕粉。土茯苓。忍冬藤。葶藶等。均見前。

處方一

星附散(本事方) 天南星四・〇(二錢二) 半夏七・〇(二錢一)

川烏四・〇(二錢二) 白附子三・〇(九分) 黑附子三・〇(九分)

白茯苓一・〇・〇(三錢) 人參四・〇(一錢二) 白僵蠶七・〇(二

錢二) 沒藥七・〇(二錢二)

右九味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 治中風雖能言口不喎斜而手足暈曳(按本方爲鎮痛鎮瘳劑)

處方二

拒風丹(本事方) 川芎四・〇(一錢二) 天麻一・〇・〇(三錢) 甘

草二・〇(六分) 防風五・〇(錢半) 萆撥三・〇(九分) 細辛

一・五(四分五)

右六味剉作兩百西西煎劑去渣一日分兩次服。

適應症 治一切風(按本方爲鎮靜鎮瘳鎮痛劑)

處方三 防風湯(本事方) 石斛七・〇(二錢一) 乾地黃一〇・〇(三錢)

杜仲七・〇(二錢一) 丹參五・〇(錢半) 防風五・〇(錢半) 川

芎四・〇(二錢三) 麥門冬七・〇(二錢一) 桂心一・〇(三分)

川獨活五・〇(錢半)

右九味剉作兩百西西煎劑去渣每日分兩次溫服。

適應症 主治中風內虛脚弱語蹇(按本方爲神經系滋養強壯劑)

處方四 竹瀝湯(本事方) 威靈仙七・〇(二錢一) 附子三・〇(九分) 桔

梗七・〇(二錢一) 防風七・〇(二錢一) 蔓荊子五・〇(錢半)

枳殼五・〇(錢半) 川芎四・〇(二錢二) 當歸七・〇(二錢一)

生姜二片

右九味剉作兩百西西煎劑去渣沖入竹瀝一小杯一日分二次服。

適應症 主治中風入脾肝經年四肢不遂舌強語蹇（按本方爲強壯性祛痰劑神經麻痺而兼痰多熱不高者可用。）

處方五 烏頭湯（本事方） 大烏頭三・〇（九分） 細辛一・〇（三分） 川椒

一・〇（三分） 甘草一・〇（三分） 秦艽七・〇（二錢二） 附子四

〇・〇（二錢二） 官桂一・〇（三分） 白芍七・〇（二錢二） 乾姜一

〇・〇（三分） 白茯苓一〇・〇（三錢） 防風七・〇（二錢二） 當歸

七・〇（二錢二） 川獨活五・〇（錢半）

右十三味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 主治寒冷濕痺留於筋脈攣縮不得轉側（按本方爲強壯性鎮痙

鎮痛劑用於因細胞生活力減退（寒冷濕痺）之貧血性拘攣症頗合）

處方六 寶風餅（本事方） 天麻七・〇（二錢二） 川烏四・〇（一錢二） 天

南星四・〇（二錢三） 半夏七・〇（二錢一） 川姜二・〇（六分） 川芎
四・〇（二錢三） 白茯苓一〇・〇（三錢） 甘草二・〇（六分）

右八味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 主治小兒風痰驚積至危篤者如神。（按凡發瘳攣抽搐之神經系
病內有痰積食滯者無論小兒大人皆可服用。蓋本方爲驅梅毒之鎮瘳劑。梅
毒性脊髓炎大便不暢者甚宜。）

處方八 羚羊角丸 羚羊角二・〇（六分） 犀角一・〇（三分） 羌活五・

〇（錢半） 防風五・〇（錢半） 薏苡仁一〇・〇（三錢） 秦朮七

〇（二錢一）

右六味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 主治中風手顫蹻言語澀（鎮瘳劑用於瘳攣症）

處方九

荆瀝方(外台)

荆瀝

竹瀝各三三

〇(一兩)

生姜汁一〇

〇

(三錢)

右三味相和勻乘溫服。

適應症

古人謂凡患風人多熱宜服此方。(清涼鎮靜化痰用於急性脊髓

炎發熱而痰多者)

處方十

金牙散(外台)

金牙〇・二(一分)

蜈蚣三

〇(九分) 蜥蜴四

〇(一錢二)

附子三

〇(九分) 人參四

〇(一錢二) 蜚螂四

〇(一錢二)

徐長卿五

〇(錢半) 芫青二

〇(六分) 斑貓二

〇(六分)

雄黃一

〇(三分) 桂心一

〇(三分) 鬼臼二

〇(六分)

野葛(即鉤吻)二

〇(六分) 毒公(即草烏頭)〇・二(一分)

芎藭五

〇(錢半) 石長生四

〇(一錢二) 椒二

〇(六分) 大

黃四・〇(一錢二) 甘草二・〇(六分) 蛇蛻二・〇(六分) 露蜂
 房二・〇(六分) 曾青二・〇(六分) 真珠一・〇(三分) 丹砂
 四・〇(一錢二) 鬼督郵二・〇(九分) 烏頭二・〇(六分) 狼毒
 二・〇(六分) 石膏五・〇(錢半) 菖茹二・〇(六分) 蕪荑二・
 〇(六分) 鬼箭二・〇(六分) 藜蘆一・〇(三分) 鶴首四・〇
 (一錢二) 雷丸三・〇(九分) 乾漆一・〇(三分) 龜甲五・〇(錢
 半) 狼牙四・〇(一錢二) 亭長四・〇(二錢一) 貝母五・〇(錢
 半) 凝水石五・〇(錢半) 牛黃〇・三(二分) 胡鷲屎二・〇(六
 分) 桔梗四・〇(一錢二) 鐵精〇・三(二分) 硝石五・〇(錢半)

右四十五味，剉作八百西西煎劑，去渣，一日分三次溫服。

適應症 療鬼疰風邪鬼語尸症或在脊脅流無常處，不喜見人，意志不定，而

目脫色。目赤。鼻脹。脣焦。爪甲黃方。（按本方藥味繁複。彙集強壯鎮痙攻毒通經清涼瀉下等諸種藥物。用於頑惡之慢性脊髓炎身體強壯者。）

處方十一 歸荊湯（易簡方） 當歸七・〇（二錢一） 荊芥一〇・〇（三錢）

右二味剉。作一百西西煎劑。去渣。一日分二次溫服。

適應症 主治風痙昏迷。吐沫抽掣。背脊強直。產後發痙者。均可通用之。（按本方爲補血鎮痙劑。輕性脊髓炎之貧血痙攣者。最宜。）

處方十二 解語湯（永類鈐方） 桂枝二・〇（六分） 防風七・〇（二錢一）

獨活五・〇（錢半） 附子二・〇（六分） 羚羊一・〇（三分） 甘

草二・〇（六分） 酸棗仁五・〇（錢半） 天麻五・〇（錢半）

右八味剉。作兩百西西煎劑。去渣。一日分二次溫服。

適應症 主治心脾經受風。言語蹇澀。舌強不轉。涎唾盛溢。神昏鬱塞。心脈閃

滯暴不能言（按本方爲鎮痲劑並能促進吸收用於脊髓炎而引發神經麻痺障礙及神經痲攣而多涎睡者）

處方十三

薏苡仁湯（明醫指掌）

薏苡仁一〇・〇（三錢）

當歸七・〇（二

錢）芍藥七・〇（二錢）

麻黃二・〇（六分）

桂枝二・〇（六

分）甘草二・〇（九分）蒼朮五・〇（錢半）

右七味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 主治手足流注疼痛痲痺不仁難以屈伸（本方爲緩和痲急及利

尿劑）

處方十四

三黃湯（千金）

麻黃二・〇（六分）

獨活五・〇（錢半）

細辛

二・〇（六分）黃芪五・〇（錢半）黃芩五・〇（錢半）

右五味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 主治中風手足拘急。百節疼痛。煩熱心亂。不欲飲食。（按本方爲解

熱鎮痛劑。）

處方十五 加味四物湯（正傳） 當歸七・〇（二錢一） 麥冬七・〇（二錢一）

黃柏七・〇（二錢一） 蒼朮五・〇（錢半） 地黃一〇・〇（三錢）

芍藥七・〇（二錢一） 川芎四・〇（一錢二） 五味子二・七（八分）

人參四・〇（二錢二） 黃連一・〇（三分） 知母七・〇（二錢一）

牛膝一〇・〇（三錢） 杜仲七・〇（二錢一）

右十二味。剉作兩百。西西煎劑。去渣。一日分二次溫服。

適應症 主治諸痿。四肢軟弱。不能舉動。（按本方爲滋養強壯劑。因營養障

碍。所引發之四肢軟弱無力症。最爲相宜。）

(十二) 脊髓癆

病原 本病與梅毒有極大關係。徵之統計越明（大約六十二%）然其關係如何，則尙未明瞭。蓋脊髓癆不得謂爲梅毒。徵之解部變化，及驅梅毒療法之無效而知其然也。一說梅毒後發生脊髓癆，恰與白喉後麻痺相似。因其毒素而發神經性後貽病云。通常梅毒感染後數年或十數年，有時二三年之後，卽發本病。驅梅毒法之不完全，使本病容易發生。且不獨後天性梅毒爲然。卽先天性者，亦爲本病原因。麥角、腐敗玉蜀黍中毒、過度吃烟等，亦發類似本病之症。所謂中毒性脊髓癆是也。其他傳染病（肺炎、白喉、傷寒、天然痘）外傷（脊髓挫盪）感冒、身體過勞、房事過度、頻回分娩、久時授乳、津液亡失，亦爲本病之誘因。本病每見於中年（三十至四十歲）之男子，女子爲稀，而以都會之

商民官吏技師上流社會者爲多。

病理 脊髓硬化雖爲最明顯之變異。然不足以完全表示此病之情性。故現

今不用之以爲此病之名稱。本病主要之解剖變化。在脊髓後索。狹小扁平。呈灰白色而硬化（灰白色變性）。此病變實因神經實質（傳導纖維及神經細胞）之原發性變性。及間質之續發性增殖而成。故本病爲脊髓神經纖維之變性的變化。非炎症之變化也。但神經變性之起始。非自脊髓。實自椎間神經等細胞始。蓋細胞之突起分兩枝。一枝至末梢神經。一枝連脊髓後索。因細胞之病的作用。其脊髓枝亦變性萎縮。故脊髓後索呈變化。當脊髓硬膜切開時。即見灰白色之腺條。自脊髓下方面上。漸次狹小。隱現於軟膜下。但軟膜後方肥厚時。則其纖維不能透見。試檢脊髓橫斷面。見後索呈灰白色而稍透明。脊髓後根亦狹小。呈灰色。其甚者。此灰白線條出現於第四腦室及四疊體等處。

顯微鏡下見後索神經纖維消失。間質增殖。呈纖維索性構造。或包含脂肪細胞及澱粉樣體。血管肥厚。而處處閉塞。醫家一般之意見。以爲患脊髓癆者。比較粗之纖維最先受害。然而對於此初起損害之部位及性質則意見甚相歧異。或謂脊髓後根甫離脊髓神經節而出爲硬膜圍繞之處之橫截性間質性神經炎。係脊髓癆之原發損害。或謂脊髓後面之軟膜之炎。每累及由此膜處經過之後根纖維。在此處（指被軟膜圍繞之處）之後根纖維最早受損。蓋幾全無髓鞘也。或謂脊髓癆之早期。脊髓軟膜神經根等之血管皆顯改變。或又進而陳述脊髓之改變。實因脊髓後面之淋巴系統（系統位在脊髓後索及索外之腦軟膜。脊髓神經後根諸處）患梅毒所致。此病之損害間。或蔓延至脊髓之感覺系統之外。其在晚期者。前灰白柱（即角）之細胞或變性。而與肌萎縮伴發。大腦脊索（椎體索）之纖維亦有輕重不等之改變。或以爲

此係大腦外質改變之證據。

症狀 本病有種種不同，因患部之廣狹及強壯而異，惟其主要病變在後索。

故有特異之症候。本病可區別有三期：(一)第一期 (神經痛期) 共同機變調前期 *Neurilgi-schne. od. praeticti-Schestadien*) 其緊要症候為神經痛樣疼痛。

及膝蓋反射消失、瞳孔變化、視力障害 (視神經萎縮) 知覺障害 (帶上感覺知覺異常鈍麻) 膀胱直腸機能之障害、關節變形、胃病發作等症。此期之經過為數週或數年。(二)第二期 (共同機變調期 *Atactische Stadien*) 漸於下

肢發生共同機變調之症。經過亦數年。(三)第三期 (截癱期 *Paralytische*

Stadien) 患者步行不能，常就臥褥，而發癱瘓、膀胱炎、膀胱麻痹等症。試例舉

其症候：(1) 反射障碍 膝蓋腱反射消失為本病初期必要之症。若此反射

存在時，則本病之診斷不確。(惟頸髓癆，則此反射存在，蓋本症之現出，以神

經後根變性而反射之斷絕故也。其檢查時須周密注意。使患者緊握兩手。或以他法誘導其意向。俾膝部完全弛緩。則檢查正確。(2) 眼之變化 瞳孔狹小如帽針頭大。是名脊髓性瞳孔縮小症。Myosis。其瞳孔對於光線不呈反應。卽無論明暗。不變其大小。是名反射性瞳孔強直症。Reflexive papilledatare 爲本病初發時緊要之症候。且於他病不常見者。但其瞳孔調節作用。則依然存在。對於遠視則擴大。對於近視則縮小。據 Weber 氏之說。健康者頰部皮膚與以疼痛刺激。則瞳孔散大。而本患者則無反應。以瞳孔知覺反應消失也。有時瞳孔不呈正圓。或左右不同。或瞳孔廣經左右互相交換。所謂變換瞳孔 Springendepupillen 是也。往往動眼神經。外旋神經。滑車神經。發生麻痺。而呈眼瞼下垂。斜視複視等症。或以視神經消削。而現視野狹小辨色力障礙之症。(腦性脊髓癆 Cerebrale Jades) (3) 共同障害 爲本病必發

之症。初視於下肢。其步行特異。是謂共同機障害性步行。Ataclischer gaus 患者展開兩足。以踵投地而闊步。呈蹣跚狀。(一名鷄步 Talmehrit) 使步行一直線上。則運動拙劣。或至不能旋轉身體昇降階級。及閉目步行時。其共同機障碍更形顯著。臥位閉目之際。使足尖畫圓。則呈不正多角形。若使閉目以偏側之足踵置於他側膝蓋上。(膝踵試法 Knöchelknuppel) 則踟蹰難行。病機更進。使患者閉目直立。並其兩足。則身體動搖。呈傾倒之勢。其上肢亦發共同機障碍症。使患者閉目以兩手之指尖相連接。則不能遇合。或使患者穿絲於針孔。或以手指觸耳鼻。亦能發見其運動異常。蓋共同機變調。即爲知覺障害之結果。足蹠之皮膚。深部之筋肉。腱筋鞘關節。俱呈知覺異常。遂不能監視筋肉之運動。斯不能維持身體之平均。而脊髓反射經路之障碍。亦爲其一原因也。其共同機障碍。而筋肉之力。絕無損害。亦無電氣變性反應。有時末梢神經

或脊髓前角。被其侵襲。則發麻痺。一肩骨神經爲多。而筋肉瘦削。電氣興奮性異常。(4)皮膚及筋肉之知覺障礙。知覺異常爲本病固有者。蓋本病之機轉多在脊髓知覺部也。其中知覺性刺激症候。卽神經痛樣疼痛。每發於本病初期。其疼痛劇甚。爲發作性。或爲電擊樣。此處彼處。倏忽變換。胸圍或腹圍時發疼痛性帶狀感覺。其皮膚之知覺過敏。對於寒熱爲甚。故患者不耐溫浴。皮膚知覺亡失。於下肢足蹠最著。步行之際。其履毛氈或襪皮靴之感。於尺骨神經領域內。第四及五指亦現此症。此時尺骨神經對於壓迫無感覺。是名尺骨神經現象 *Volarisphaugenen*。其知覺脫失。初爲一部性。時期漸進。則呈完全性。試以針刺其皮膚。於瞬間毫無感覺。數秒之後。始感刺激。是名痛覺傳導徐緩 *Verlaugsamteitung*。或 *Schmerzempfindung*。又以針尖刺激其皮膚。其初僅感觸接。或輕度之疼痛。數秒之後。更呈強度之痛覺。是名重複感覺 *Doppel-*

empfindungen 或使患者閉目。以一針刺激其皮膚。則感多數之刺激。是名多感症。Polyaesthetic 疾病進行。則壓神溫神俱呈障害。其最著者爲肌神。患者瞑目。而移動(他動的)其四肢。則不知運動之大小及手足之方向。以肌神障碍故也。(5)膀胱直腸及生殖器之障碍。膀胱及直腸之求心性纖維。經過脊髓後索。故本病常發糞尿排泄之障碍。便秘或失禁。尿閉或淋瀝。此膀胱麻痺。或發於本病初期。而誘起尿腐敗褥瘡等危險症候。生殖機能之障碍。多發於男子。疾患初期。往往色慾亢進。其後陷於陰萎。而女子則無此症。(6)內臟發症 Visceralkrise 爲內臟之刺激症狀。如臟器突然發生疼痛及機能障碍。其最著者爲胃臟(Magenkrise 胃臟發症)發生強烈之胃痛及嘔吐。持續數日間。若反覆發作。則患者體力衰弱。有時僅發胃痛。或無痛性嘔吐。故不知者往往誤診爲慢性胃疾患。而加以胃病之療法。逮後始知其原因在脊髓癆。

也。其他有腸發症（疝痛下痢）咽發症 *Stimmkränkung*（咽下困難發作）喉發症（呼吸困難、咳嗽發作、狀如疫咳、或喉頭瘰癧）腎臟發症（腎石痛樣疼痛、蛋白尿）心臟發症（狹小症、心悸亢進）陰核發症 *Kriornkränkung*（色慾異常亢進）等症。視神經痙縮亦爲內臟變狀之一症。檢其眼底見視神經乳頭呈陶器樣白色。而患者漸次失明（7）營養障害。骨及關節爲多骨質脆弱而易破折。關節病多發於膝及股關節。所謂脊髓癆性關節變狀 *Jalische* (*Je-len Kvergrdung* 是也。其初僅大量之漿液性滲出物。積蓄於關節內。漸次關節端消削。關節囊肥厚。外觀呈關節腫脹之狀。而疼痛缺如。此關節病後。腫脹消散。則遺留膝後彎症 *Genurecurvatum* 其足背肥厚隆起。而足蹠平坦。是名脊髓癆足。足蹠之趾球或足踵。易生圓形潰瘍。或發足穿孔症。其他有爪甲肥厚。齒牙爪甲及毛髮之脫落。偏側舌萎縮等症。若血管運動及分泌障礙時。則

皮膚之色澤溫度呈變化而發多汗症。唾液及淚液分泌過多症。(8)腦症候
本病經過中或併發癱瘓狂 Ascendierendform (上行型)或於癱瘓狂經
過中併發本症。(9)脊髓液之淋巴球較健康者均增加至十倍。(健康者鏡
下一視野中淋巴球三至四個)

治法 停止病勢之進行及救濟症狀係療治之目的。起居之安靜且有規則
係一要事。苟病者能行動而營尋常之事業則除有精神變異之證據外似乎
不必拋棄其素來之職業。有病者患此多年而仍能經營絕大之事業者。飲食
宜注意。各種過度的行爲(尤以酒色爲然)務宜小心禁忌。對於停止病勢曾
經西醫試用之藥頗多。施特殊治療宜使其脊髓呈正常狀況。其法在初用薩
伐散小劑量(○・二至○・三克)注射於靜脈。一星期一次。經六星期繼用
汞劑治之。或抹擦。或注射。復施薩伐散。倘施治後病者之脊髓較有進步。則或

可停止治療。經一休息期，倘無改變，或僅微獲愈，則宜用受薩伐散人自身血清 *Auto-Salvanized Serum* 注射。次數可因脊髓液之檢查所得的情況而定。此法當恆久施行。病人有經施用汞血清 *mercurial serum* 或有助力。碘化鉀足劑量並可用為輔助藥。對於治病，則宜臥床靜養。脊柱反感刺激（外惹內效）法如起炮藥或火刀藥等，均可用。至於繼各種過度而起之劇烈痛陣，常可以熱浴或土耳其浴止之。對於劇烈之再發性閃痛，可試用麻脊法。印度麻有時有效。科第印彈劑（一厘。○。○六克）及貝拉朵那膏劑（半厘。○。○三克）亦或有效。在極重之痛陣內，必須用空針注射嗎啡或可卡印。電療法不甚見功。劇烈之胃痛亦須用嗎啡。此外如腸胃吻合術、腹腔神經發扯伸術、第七八九十脊髓神經割術等，皆曾試用。而時獲佳效。在發作時可敷可卡因，或略吸哥羅方或亞硝酸澱粉基。凡脊髓勞之兼脈壓增高者，則久用硝酸

甘油逐次增加之劑。以生理的應効呈顯爲度。每對於免神經性痛及減少克來息之再發有大功。倘有主動脈瓣閉鎖不全。則此藥不甚相宜。須慎用。總言之。宜用此藥之指徵爲脈壓增高。膀胱症狀須時常注意。如小便時不能罄盡。宜用導尿管。並宜授病人以用法及消毒法。

中藥治法 本症一般之用藥。以黃芪。當歸。川芎。牛膝。木瓜。五加皮。海桐皮。絡石藤。川斷。等。

發神經痛時。可用川草烏。羌獨活。白芍。白芷。細辛。威靈仙。虎骨等。

共同機變調。可用蟬衣。全蠍。烏梢蛇。白花蛇等。

發劇烈之胃痛及嘔吐時。可用半夏。乾姜。沉香。甘松。烏頭。姜黃。芍藥。罌粟壳等。關節變狀或蓄有漿液性滲出物者。可用白朮。防己。桂枝。茯苓。松節。澤瀉。半夏。白芷。白芥子。

知覺麻痺用藥見前。

膀胱炎膀胱麻痺用藥見前。

驅梅毒法見前。

若併發麻痺狂者參閱麻痺狂篇。

要藥略釋

五加皮屬五加科藥用五加之根皮。本經主治心腹疝氣腹痛。益

氣療臂。小兒三歲不能行走。疔瘡陰蝕。別錄療男子陰痿。囊下濕。小便餘瀝。女人陰痒及腰脊痛。兩脚疼痺。風弱。五緩虛羸。補中益精。堅筋骨。強志意。甄權謂破逐惡風。血四肢不遂。賊風傷人等云云者。不外乎強壯鎮痛之功也。用量五・〇——一〇・〇（錢半至二錢）

海桐皮爲落葉喬木。屬海桐花科。海桐之木皮。古來用治腰脚不遂。血脈頑痺。腿膝疼痛。蘇頌引劉禹錫傳信方。以此藥合牛膝。芎藭。羌活。地骨皮。五加皮。甘

草薺苳仁。生地。浸酒服。治腰膝痛不可忍有驗。蓋本品亦有強壯鎮痛之功也。
用量 五・〇——一〇・〇（錢半至三錢）

絡石藤係屬夾竹桃科。爲絡石之莖葉。用治風熱死肌癰腫不消。養腎治腰髖痛。堅筋利關節。產後血結。通達肢節。蓋賴通經強壯之力。而奏舒筋活絡。宣通痹痛之功。
用量五・〇——一〇・〇（錢半至三錢）

虎骨屬哺乳獸中食肉類貓族。藥用虎之骨。甄權謂治筋骨毒風。攣急屈伸不得。走注疼痛。孟詵食療本草主去骨節風毒腫。和醋浸。止脚膝痛腫。用虎骨浸酒名虎骨酒。治一切歷節痛風。脛臂痠疼。蓋本品爲健骨強壯藥。且有鎮痛之作用故也。
用量一〇・〇——三〇・〇（三錢至九錢）

威靈仙屬毛茛科。爲鐵脚威靈仙之根。占來主治諸風。宣通五臟。去腹中冷滯。心膈痰水久積。癥瘕疝癰氣塊。膀胱宿膿惡水。腰膝冷疼。療折傷等。蓋有通經

利尿鎮痛之功也。 用量 四・〇——七・〇（一錢二至二錢一）

沉香乃瑞香科之沉香樹木質中偶然有黑色芳香性之脂膏凝結木質因之變化而增加重量者。即名沉香。古來主治心腹痛。霍亂中惡邪鬼疰。暖腰膝。補五臟。益精。壯陽。止轉筋吐瀉。破癥瘕。冷風麻痺。骨節不任。氣痢氣淋。降氣納腎。調中平肝。蓋本品爲芳香性衝動藥。有鎮痛健胃通經之功也。 用量二・〇

——四・〇（六分至一錢二）

甘松屬敗醬科。藥用甘松之地下莖。古人用惡氣卒中心腹痛滿開鬱醒脾脚氣膝腫煎湯淋洗。攷荷蘭藥鏡。以本品爲揮發性衝動藥。鎮靜神經及強壯之主藥。凡腦神經及心胃運動衰弱者。此藥能使其健連。失氣昏迷者。能令其蘇醒。諸脈管之營連虛弱懈弛者。能揮發衝動之而復其強健。治遷延性之神經病。與神經運動失常之熱病有特效。用於虛憊之熱病。能使其精力活潑。充盛。

鎮定癱瘓之運動。故凡神經易受感觸動。發搖掣諸病之人。或虛憊特甚。搖掣頻發之人。用之尤驗。云云。則本品對於神經系疾患。似有特著的功效也。

用量五・〇——一〇・〇（錢半至二錢）

薑黃屬薑科。爲薑黃之根莖。古來用治癰瘰血塊。通月經。治撲損瘀血。止暴風痛。一切積氣痹臂痛等。蓋本品爲通經鎮痛藥。脊髓癆引發劇烈之胃痛時。可選用之。用量三・〇——五・〇（九分至錢半）

罌粟壳一名御米壳。屬罌粟科爲罌粟之果壳。古來用治瀉痢脫肛。遺精久咳。止心腹筋骨諸痛。蓋本品爲收斂性鎮靜鎮痛藥也。用量三・〇——五・

〇（九分至錢半）

防己屬防己科。藥用防己之根。本經主治風寒溫瘧熱氣諸癩。除邪。利大小便。別錄療水腫。去膀胱熱。傷寒邪氣。中風手脚攣急。通腠理。利九竅。止洩。散癰腫。

惡結諸癆疥癬蟲瘡。蓋本品爲僂麻質斯神經痛之鎮痛藥。又可作爲利尿藥。用量五・〇——一〇・〇（錢半至三錢）

松節卽松樹之枝節。主治百邪。久風。風虛脚痺。疼痛。蓋本品爲強壯性之鎮痛藥。對於四肢骨節之神經痛有獨特之功效。用量一〇・〇——三三・〇

（三錢至一兩）作煎劑或浸酒服。

白芥子係十字花科芥屬。藥用白芥子之子實。能散腫止痛。痺木氣筋骨腰節諸痛。利肺豁痰。和中通竅。若外用爲引赤發泡藥。內服爲鎮痛藥。用量一・〇——三・〇（三分至九分）

黃芪。當歸。川芎。牛膝。木瓜。川斷。川草烏。羌活。獨活。白芍。白芷。細辛。蟬衣。全蠍。烏梢蛇。白花蛇。半夏。乾姜。白朮。桂枝。茯苓。澤瀉。均見前。

處方一 玉聖散（和漢藥考） 當歸七・〇（三錢） 肉桂一・〇（三分） 延

胡索七・〇(二錢一)

右三味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 治中風手足拘攣口眼喎斜脚弱行步不正(促進血行強壯活血鎮痛劑)

處方二

羌活散(和漢藥考)

茯苓一・〇(三錢) 羌活五・〇(錢半) 菊

花一・〇(三錢) 川芎四・〇(二錢三) 前胡七・〇(三錢一)

黃芩七・〇(二錢一) 細辛一・〇(三分) 枳殼五・〇(錢半) 蔓

荊子五・〇(錢半) 麻黃一・〇(三分) 防風五・〇(錢半) 石

膏一・〇(三錢) 甘草二・〇(六分)

右十三味剉作兩百西西煎劑去渣一日分兩次溫服。

適應症 治風邪寒壅頭目昏痛肢節煩疼天陰風雨預覺不安(解熱利尿)

鎮痙劑

處方三

牛膝木瓜湯(和漢藥考)

牛膝七・〇(二錢)

木瓜一〇・〇(三錢)

芍藥五・〇(錢半)

杜仲七・〇(二錢)

枸杞子七・〇(二錢)

天麻五・〇(錢半)

黃松節一〇・〇(三錢)

兔絲子七・〇(二錢)

甘草二・〇(六分)

右九味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症

治肝虛遇歲氣燥濕更勝脇連小腹拘急疼痛耳聾目赤肩背連尻

陰股膝脾皆痛(強壯鎮痛劑)

處方四

虎骨散(和漢藥考)

虎骨一〇・〇(三錢)

當歸七・〇(二錢)

赤芍藥七・〇(二錢)

川斷七・〇(三錢)

白朮五・〇(錢半)

槁本五・〇(錢半)

烏蛇肉一〇・〇(三錢)

右七味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 主治半身不遂肌肉乾瘦名曰偏枯（本方可應用於消削萎縮性神經麻痺症）

處方五

桃靈丹（和漢藥考）

延胡索七・〇（二錢一）

桃仁一〇・〇（三錢）

五靈脂七・〇（二錢一）

乳香七・〇（二錢一）

沒藥七・〇（二錢一）

一）

右五味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 治心腹疼痛及陰證或絞腸痧等症（按脊髓癆而發劇烈之胃痛時可與本方蓋通經鎮痛之作用也）

處方六

除痛解毒飲（和漢藥考）

羌活五・〇（錢半）

木通三・〇（九分）

忍冬一〇・〇（三錢）

地骨皮一〇・〇（三錢）

大黃七・〇（二錢一）

錢一) 防風五・〇(錢半) 甘草二・〇(六分)

右七味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 治痛風走注骨節疼痛。(按本方爲解毒利便劑於梅毒性之脊髓

癆頗宜)

處方七 木防己湯(外台) 木防己七・〇(二錢一) 黃芪四・〇(一錢二)

桂心一・〇(三分) 茯苓一・〇(三錢) 甘草二・〇(六分)

右五味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 療皮水如腫水氣在皮膚中四肢集集動(強壯性利尿劑)

處方八 石斛酒(外台) 石斛一・〇(三錢) 丹參五・〇(錢半) 防風

五・〇(錢半) 側子三・〇(九分) 桂心一・〇(三分) 乾姜二・

〇(六分) 羌活五・〇(錢半) 秦芫五・〇(錢半) 芎藭三・〇(九

分) 杜仲七・〇(二錢一) 薏苡仁一〇・〇(三錢) 五加根皮五
・〇(錢半) 山茱萸七・〇(二錢一) 橘皮五・〇(錢半) 椒二・
〇(六分) 黃芪七・〇(二錢一) 白前五・〇(錢半) 茵芋二・〇
(六分) 當歸七・〇(二錢一) 牛膝一〇・〇(三錢) 鍾乳四・〇
(二錢二)

右二十一味剉作三百西煎劑去渣一日分二次服。

適應症 療風虛氣滿脚疼冷痺攣弱不能行。(消劑性神經麻痺之強壯鎮
痛劑)

處方九

八風湯(外台) 防風五・〇(錢半) 芍藥五・〇(錢半) 茯苓一〇
・〇(三錢) 黃芪五・〇(錢半) 獨活七・〇(二錢一) 當歸七・
〇(二錢一) 人參四・〇(二錢一) 乾姜二・〇(六分) 甘草二・

○(六分) 大豆一〇・〇(三錢) 附子四・〇(一錢二)

右十一味。剉作兩百西西煎劑。去渣。一日分二次溫服。

適應症 療五緩六急不隨身體不仁下重腹中雷鳴小便不禁(強壯神經

之利尿劑。膀胱麻痺症用之)

處方十 血痹方(外台) 葶藶七・〇(三錢一) 薯蕷七・〇(二錢一) 牛膝

一〇・〇(三錢) 澤瀉七・〇(三錢一) 蟾蜍五・〇(錢半) 天雄

三・〇(九分) 車前子五・〇(錢半) 乾漆一・〇(三分) 白朮七

・〇(二錢一) 地膚子五・〇(錢半) 山茱萸四・〇(一錢二) 狗

脊七・〇(三錢一) 茵芋二・〇(六分) 乾地黄一〇・〇(三錢)

右十四味。剉作二百西西煎劑。去渣。一日分二次服。

適應症 療風痺遊走無定處。名曰血痹。(強壯神經利尿排毒。腎臟炎。膀胱

炎等用之。

(十二) 進行性肌萎縮 (甲) 脊髓性進行性肌萎縮 (乙) 肌病性進行性肌萎縮 (丙) 神經性進行性肌萎縮

病原 (甲) 脊髓性進行性肌萎縮 未詳。爲稀有之疾患。三十歲以上之男子罹病較多。因一定之肌簇過勞而發。故多見於勞動者。始發於右手。若左手過勞者。則從左手起。始。未幾即蔓延於他側。爲對側性進行。或以外傷感冒。荒色。傳染病爲本病之原因。幼時曾患脊髓性小兒麻痺者。易罹本病。但遺傳及血族的關係較少。(乙) 肌病性進行性肌萎縮 本病竈在筋肉。其結果爲所屬肌肉萎縮。故一名進行性肌肉營養不良症。爲遺傳性及家族性疾患。多發於二十五歲以前之男子。前驅之傳染病。外傷感冒。爲其誘因。(丙) 神經性進行性肌萎縮 因末梢神經變性而發。爲遺傳性或血族性。多見於男子。

小兒或春機發動期。

病理 (甲) 脊髓性進行性肌萎縮 脊髓前角之運動營養性節細胞萎縮。

爲其特徵。細胞始以黃褐色顆粒狀色素充盈其間。漸致萎縮。突起消失。成圓形小體。是名神經節細胞之色素變性 *Pigmentde Generation der Gangli-*

zellen 細胞完全消滅。則神經纖維間質占領其部位。同時脊髓前根末梢神經及所屬之筋肉亦變性而萎縮。所患之筋肉強度瘦削呈淺褐色。尤於筋肉之橫斷面。可洞見各筋纖維之消失。或殘留褐色黃色之色素顆粒。纖維間結締組織增殖。血管擴大而管壁肥厚。

(乙) 肌病性進行性肌萎縮 脊髓及末梢神經無變化。而於筋肉則著明。在假性肥大症。見間質性結締組織增殖。其脂細胞增加。筋肉纖維漸次消失。橫紋顯著。或呈顆粒狀混濁。纖維性崩壞。及脂變性。在少年性症。其結締組織無變化。在小兒性症。結締組織稍稍增殖。而肌纖維肥

大及脂形成則缺如。(丙)神經性進行性肌萎縮 未詳髓鞘崩壞及消失爲主徵。近時之研究。脊髓及末梢神經。俱無變化。惟肌肉呈瘦削。

症狀 (甲)脊髓性進行性肌萎縮 筋肉萎縮及麻痺。每自右上肢發生。侵襲拇指球小指殊等短肌。患者右手指倦怠。及動不便之感。審視之。則見魚際消削爲平。拇指常伸展而接近示指。呈猿手狀。Vassalhand 骨間肌亦消削。故手背骨間腔陷沒。指末節之伸屈甚難。蟲樣肌亦消削。故手背掌扁平。伸指節筋肉露出於手掌皮下。若骨間肌萎縮增加。則其對抗之總伸指肌收縮。而呈鷺爪手 Krallenhand (抓攫手) 筋肉無力。指節之動作障礙。更形顯著。若伸前臂肌萎縮。則該部瘦削而扁平。尺骨及撓骨之骨間腔陷沒。其甚者。可觸知兩骨之內緣。若萎縮波及於三角肌。則肩胛部突起消失。肱骨頭與肩峯間凹沒呈深溝。且以三角肌力萎弱。上肢以自己之重量而下垂。關節臼互相離隔。遂

成懸垂關節。若命患者擊舉上肢，則困難或不能。但肱部諸肌中，三角肌被侵害最遲。纖維性肌肉萎縮 *Myofibrilarmuskelschwund* 常見於本病。發於各肌簇。忽隱忽現。有時以冷水灌溉其皮膚，或打撲局部，則發攣縮。其理由未明。蓋健康肌肉，亦有以寒冷而攣縮也。電氣性興奮，因肌肉萎縮之度而異。若肌纖維有變化時，興奮性減弱，或呈變性反應。皮膚及腱反射減退或消失。往往皮膚厥冷，呈紫藍色。多見於手指及前臂。以血管運動障礙故也。或見皮膚肥厚及皸裂。毛髮繁生。時發匍行疹。天疱瘡。筋腱及關節之肥厚，以營養障礙故也。皮膚及深部知覺膀胱直腸障礙。如小兒性遺傳性進行性脊髓性肌萎縮 *Infantile hereditäre Form der progressiven spinalen Muskelatrophie* 為稀有之小兒病。生後無特別原因。而於股關節及大腿發生。肌肉消削。及弛緩性麻痺。漸蔓延於背腹。上下肢肌肉。腱反射消失。電氣興奮性亦減弱。然無纖維性

肌肉攣縮也。(乙)肌病性進行性肌萎縮 因所患之部位及形狀變化可分爲三種。(一)假性肌肉肥大 *Pseudohypertrophicamuskulorum* 本病多發於十歲以前之小兒。或於初生已見徵候。筋肉容積增大。腓腸肌、大腿肌及臀肌爲著明。步行之時容易疲勞。按之如觸脂之感。故筋肉力弱。不勝勞動。反之其他之下肢肌、背部、上肢肌則菲薄瘦削。腹部突出於前方。脊柱彎曲。足呈內翻馬足。步行之時。振搖臂部呈蹣跚狀。(鴨步 *Entengang*) 使患者自臥位起立。則先以四肢支持身體。次以上肢加於膝部。漸漸起立。膝蓋腱反射因伸大腿肌萎縮故減退或消失。筋肉電氣興奮性減退。然無變性反應。纖維性肌肉攣縮。知覺膀胱直腸障礙俱缺如。患部皮下脂肪組織增殖。皮膚厥冷。呈紫藍色。或變色如大理石然。本病持續十數年之久。肢體漸成畸形。多發肌肉短縮。因衰弱或偶發疾患而致死。(二)小兒性進行性萎縮 *Infantileprogressivemus-*

Kelatrophie (Landauzy 型 Form Landauzy-Dejerine) 發於小兒時。以顏面肌消削爲特徵。眼瞼口裂肌初發萎縮。則閉目困難。眼球一部常露出外方。口唇開大。突出於前方。談話。口笛。俱難運動。頰部陷沒。上唇弛緩。前額皺裂消失。狀貌魯鈍。是名肌病性顏貌。 *Facie amyopathique* 四五年後疾病漸進。波及於胸背。(胸大肌。胸小肌。斜方肌) 肩胛。上肢。脚部諸肌發生種種形態異常。及機能障礙。筋肉肥大。纖維性筋肉攣縮。及電氣變性反應。俱缺如。(二) 少年性進行性肌萎縮。 *Atrophia musculorum progressiva juvenilis-Juvenile Muskelatrophie* 肩胛定型 *Typus scapulo-humerale* 發於春機發動後。爲遺傳性。或家族性。女子被害者亦不尠。肩胛及胸廓肌纖維極萎縮。筋肉萎弱爲其特徵。骨盆。下肢。筋肉次之。其中大小胸肌。斜方肌(卽僧帽肌)闊背肌。前大鋸肌(此肌麻痺則兩側肩胛骨與胸廓離隔)菱形肌。腸腰肌。及長背肌爲著明。背肌萎縮。則

患者起立困難。直立之時。腰椎前彎。胸椎後屈。且以前大鋸麻痺。兩側肩胛與胸壁離隔。上肢上舉時。肩胛易聳峙達耳側。而頭部嵌入雙肩之間。呈奇異狀態（弛緩肩）。上下肢筋肉中被侵襲者爲肱二頭肌。內臂肌。旋後長肌。肱三頭肌。伸前臂肌。長外轉肌。臂肌四頭肌。前脛骨肌等。故患者步行益形困難。身體上半部。偏倚於後方。骨盆不能固定（臂肌薄弱故）。步行呈蹣跚狀。筋肉中不被侵襲者。爲胸鎖乳頭肌。提肩胛肌。胸骨三角肌。喙突肱肌。腓腸肌。縫匠肌。及手之小肌等。其中胸骨三角肌。腓腸肌。棘上肌。棘下肌等。更呈肥大。故與肱部筋肉。及大腿臀部之萎縮相對照。呈特異狀態。患部筋肉硬固。興奮性減退。然筋肉攣縮。電氣變性反應。知覺直腸膀胱障礙俱缺如。（丙）神經性進行性肌萎縮。兩肢末端之對側。徐徐發病。始於腓骨肌。伸總趾肌。及足小肌。萎縮消削。呈鷺足之狀。又 *Foot-drag*（蹄足）更以脛骨前肌及伸踮長肌萎縮。而呈內

翻馬足。步行困難。（或僅足部小肌萎縮。不呈顯著之馬足）一二年後。蔓延於上肢。魚際（拇指球）對魚際（小指球）骨間肌。亦消削萎弱。呈鷺爪手。數年之後。復蔓延於前臂。及肩胛。大抵伸肌較屈肌被害爲速。甚。但軀幹及顏面肌。多無變化。亦無延髓球症狀。消削之筋肉。呈纖維性痙攣。及電氣變性反應。腱反射消失。或見知覺障礙。（知覺異常肌壓痛）然膀胱及直腸無異常。

治法（甲）脊髓性進行性肌萎縮 西醫謂內服藥無效。患部筋肉之按摩法。爲最良。適宜之體操法。次之。電氣療法。浴治療法。（單純浴。食鹽浴。硫黃浴）無著效。（乙）肌病性進行性肌萎縮 西醫謂無預防法。無特效藥。施行按摩療法。浴治療法。矯正法。能稍輕快。（丙）神經性進行性肌萎縮 與肌病性萎縮同。

中藥治法 按本病中醫古代混稱瘋病。伸指肌萎縮之鷺爪手。似卽古稱鷄

脚瘋脂肪組織增殖。筋肉短縮。閉目困難。口唇開大。上唇弛緩。前額皺裂消失。狀貌魯鈍。皮膚肥厚及皸裂者。古時或稱癩瘋。攷外台論癩曰。夫癩病初覺。皮毛變異。或淫淫若痒。如蟲行（脊髓性知覺失常）或眼前見物如垂絲（視神經變壞）言語無定。心常驚恐。皮肉之中。或如桃李隱癰。赤黑（發匄行疹斑或皮膚呈紫藍色）手足頑痹。針刺不覺痛（知覺麻痺）脚下不得踏地（行動神經麻痺）云云。則與本病症狀頗相類似。至於治法。西醫既無內服藥物之療法。中藥則亦祇有營養強壯之對症療法。本病之於營養障礙似屬一絕大原因。則中藥治法。當與以黃芪。當歸。烏梢蛇。白花蛇。人參。川斷。綿杜仲。巴戟。菟蓉。肉桂。附子。鹿角。虎骨。木瓜……等。尤其原因於荒色而起者。初起時用此類營養強壯藥較爲有效。如神經性及脊髓性者。均參照脊髓炎。脊髓出血等治法。

要藥略釋 俱見前

處方一 廣濟療癱瘓風方(外台) 豔皮膠一七〇・〇(五兩)

右一味先煮葱鼓粥一升別貯。又香淡鼓二合以水一升煮鼓去滓。內膠更煮六七沸膠烱如錫頓服之。及煖喫前葱鼓粥。任意多少。每日晨一次。

適應症 療癱瘓風及諸風手足不隨腰脚無力者。(滋養強壯劑)

處方二 文仲療癱瘓方(外台) 生地黃汁三三三・〇(一兩) 淡竹瀝三三三

・〇(一兩) 防風五・〇(錢半) 獨活七・〇(二錢一) 附子四・

〇(二錢二) 荆瀝三三三・〇(一兩)

右六味。三味剉。作一百西西煎劑。去渣。沖入三汁。一日分兩次溫服。

適應症 療癱瘓風(強壯解熱鎮痺劑)

處方三 癱瘓神驗方(外台) 側子四・〇(一錢二) 五加皮七・〇(二錢一)

磁石一〇・〇(三錢) 甘菊花一〇・〇(三錢) 漢防己七・〇

(三錢) 羚羊角一・〇(三分) 杏仁一〇・〇(三錢) 乾薑二・〇

〇(六分) 芍藥七・〇(二錢) 麻黃二・〇(六分) 薏苡仁一〇

・〇(三錢) 風防五・〇(錢半) 芎藭四・〇(二錢) 秦艽七・〇

〇(二錢) 甘草二・〇(六分)

右十五味剉作兩百西西煎劑去渣一日分兩次溫服。

適應症 主療癱瘓風。(按本方爲強壯性鎮痙劑適用於脊髓性及神經性

進行性肌萎縮症)

處方四 獨活葛根湯(外台) 羌活七・〇(二錢) 桂心一・〇(三分) 乾

地黃一〇・〇(三錢) 葛根五・〇(錢半) 芍藥七・〇(二錢)

生薑二片 麻黃二・〇(六分) 甘草二・〇(六分)

右八味剉作兩百西西煎劑去渣一日分兩次溫服

適應症 療柔風身體疼痛四肢緩弱欲不隨（強壯解熱恢復神經麻痹）

處方五 桑枝煎 桑枝一七〇・〇（五兩）

右一味剉作兩百西西煎劑極濃去渣一日分兩次溫服

適應症 療偏風及一切風（滋養強壯恢復神經肌肉麻痺萎縮）

處方六 十九味丸（外台） 防風五・〇（錢半） 羌活七・〇（二錢一） 五加

皮七・〇（二錢一） 芍藥五・〇（錢半） 人參四・〇（一錢二） 丹

參七・〇（二錢一） 慧苡仁一〇・〇（三錢） 元參七・〇（三錢一）

麥門冬七・〇（二錢一） 乾地黄一〇・〇（三錢） 大黃七・〇（三

錢一） 青木香四・〇（一錢二） 松子仁一〇・〇（三錢） 磁石一

〇・〇（三錢） 檳榔七・〇（二錢一） 枳實七・〇（三錢一） 牛膝

一〇・〇(三錢) 茯神一〇・〇(三錢) 桂心一〇・〇(三分)

右十九味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 主治一切風(按本方爲滋養強壯劑對於肌病性進行性肌萎縮。

因於肌肉營養不良者頗宜)

處方七

五粒松酒方(外台) 五粒松葉一〇・〇(三錢) 麻黃二・〇(六

分) 防風五・〇(錢半) 黃芪七・〇(二錢) 獨活七・〇(二錢)

一 秦艽七・〇(三錢) 牛膝一〇・〇(三錢) 生地黃一〇・

〇(三錢) 芎藭四・〇(二錢)

右九味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 療一切風(營養神經強壯劑)

處方八

療風方(外台) 牛蒡根七・〇(二錢) 生地黃一〇・〇(三錢)

牛膝一〇・〇(三錢) 枸杞子七・〇(三錢)

右四味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 療一切風十年乃至二十年不差者(按本方亦爲營養強壯劑適

用於肌病性進行性肌萎縮假性肌肉肥大及纖維性肌肉攣縮等症)

處方九 腎氣丸方(外台) 羊腎一具 細辛二・〇(六分) 石斛七・〇(二

錢) 菴蓉七・〇(三錢) 乾地黄一〇・〇(三錢) 狗脊七・

〇(三錢) 桂心一・〇(三分) 茯苓一〇・〇(三錢) 牡丹皮五

・〇(錢半) 麥門冬七・〇(二錢) 黃芪七・〇(三錢) 人參

四・〇(二錢) 澤瀉七・〇(三錢) 乾薑二・〇(六分) 山茱

萸七・〇(二錢) 附子四・〇(二錢) 薯蕷七・〇(三錢)

大棗四枚

右十八味剉作三百西西煎劑去渣一日分兩次溫服。

適應症 療丈夫腰脚疼腎氣不足陽氣衰風痹虛損憊憊諸不足腰背痛耳鳴小便餘瀝風虛勞冷（按本方爲營養強壯劑適用於因荒色而起之肌癢縮症最宜）

（十四）神經痛

（古稱風氣痛等）

病原 本病之真因未詳其原因不能證明者曰真性神經痛 *Echte Neuralgie* 因神經徑路之刺激而發者曰假性神經痛或症候性神經痛 *Ursacheosymptomatische Neuralgie* 本病之素因如下（一）年齡 多發於中年者老人及小兒爲稀（二）性別 坐骨神經痛、肱神經痛常發於男子三叉神經痛多見於女子之春機發動期、月經、妊娠產褥、月經閉止期（三）有神經病素質者易

罹本病(四)貧血衰弱。

本病之誘因如下(一)感冒性 因感冒濕潤急劇冷卻而發(二)神經或其附近疾病如骨骨膜之腫瘍動脈瘤疝氣妊娠子宮疾病(反射性神經痛)(外傷性神經痛)時而發(三)因中毒(水銀鉛砒石酒精烟草毒等)而發(四)因新陳代謝疾病而發(痛風糖尿病)(五)傳染病性神經炎(傷寒流行性感冒慢性關節 Rheumatis 尤以瘧疾梅毒爲多)(六)因腦脊髓之神經疾患而本病爲其一症。

病理 解剖多無變化或呈神經炎變狀故本病可區別爲神經性神經痛 *Neurotische neuralgie* 及神經炎性神經痛 *Neuritische neuralgie* 二者。

症狀 其主徵爲疼痛痛之性質如鑽如裂如燒灼如電擊但其疼痛之發作性發現乃本病固有者發作時疼痛劇烈間時絕無疼痛痛之持續爲數分或

數時間。痛多突然發作。無原因可證明。或有神經之壓迫運動。精神感動。寒冷等誘因。如三叉神經痛。多因咀嚼談話咳嗽噴嚏而發。坐骨神經痛。多因起立步行而發。其神經經過中之一點。對於壓迫甚銳敏。壓之則疼痛發作或增劇。是名Valleix氏壓點。各神經俱有此壓點。其位置多在皮下表面。而與骨質接近之部。或自筋鞘出口部。故可以手指壓觸。此壓點即神經痛與炎性或其他性疼痛相異之點。但多數神經痛。此壓點缺如。發作劇甚時。不僅於本神經分佈區域發生疼痛。且放散於他神經區域。此時區別何者爲本病。何者爲彌散。乃診斷之緊要者。蓋本病未治。疼痛亦不能快愈也。例如因齲齒而發顏面疼痛時。必齲齒治而顏面痛亦治。所患神經之範圍內。往往發生皮膚知覺障礙。初期呈過敏。後期則知覺亡失。時或現副症候。因運動神經之刺激而發痙攣。（是筋肉之反射痙攣。或因所患神經有運動纖維混存故）及麻痺或發血管

運動神經障礙（如二又神經痛時。顏面皮膚及粘膜異常蒼白或漸紅）分泌亢進（淚液。鼻汁。唾液。尿及汗）營養障礙（所患神經經過部發生尋麻疹。帶狀匍行疹）持續性組織變化（皮膚及毛髮之變化。深部組織之變化。如筋肉骨及骨膜之消削或肥大）等症。患者一般營養多無變化。但因疼痛妨礙睡眠及飲食時。則營養障礙。精神異常。本病在發痛之部位。而分有三又神經痛。後頭神經痛。肱神經叢痛。肋間神經痛。腰神經叢痛。坐骨神經痛。精系神經痛。尾神經痛。及關節神經痛等。

治法 西藥論治本病。謂以緩解疼痛或消滅之爲目的。而原因療法。尤爲緊要。感冒性者。與以發汗劑。溫罨法。棉塊纏絡法。撒曹安替必林等內服。貧血家。則宜注意於食餌。內服鐵劑及砒石。神經質者。行一般強壯神經法。中毒性者。宜防止毒物之持續進入。梅毒性者。行驅梅法。瘧性者。與以規寧或砒石（鹽

規一瓦發作前四五時間頓服）因腫瘍異物之壓迫而發者宜以外科手術除去之。又用電氣療法。積極能使疼痛輕快。故貼於神經幹或疼痛點。消極則置於神經經過中。或其他部分。每日通電二分間。二至五次。感傳電氣時亦奏效。再如誘導療法。則用芥子泥。沃度丁幾。嘒囉仿謨。刺激性軟膏（瑞香丁幾。吐酒石。巴豆油等混和物）發泡膏。烙鐵。樟腦。丁幾。蟻酸。丁幾。冰片。摩擦局部。溫罨法。水蛭。吸角等。按摩法。神經壓迫法。神經侵襲爲之皮下注射（ Al 嘒囉仿謨。1%石灰酸水。酒精（ mullin 酸）亦可試用。或使患者皮膚充血。則疼痛緩解。或使皮膚冷卻。則疼痛消失。藥劑療法。則規寧。不僅於瘡性神經痛。卽他之神經痛亦有效。初用一瓦。其後以半量持續用之。砒劑則用亞砒酸加里液。或與鐵劑混爲丸服用。沃剎則於梅毒性及感冒性者有效。臭素劑用於疼痛及神經質者。的列並油（一日數回。五滴至二十滴）多用於坐骨神

經痛疼痛則或以嗎啡皮下注射。若因疼痛妨害睡眠致衰弱時。則用催眠藥。頑固之神經痛。痛苦劇甚者。行外科療法。卽神經伸展術。神經切除術。神經截斷術。近時蠟子纏絡神經而抽出法。常爲外科推用。但外科療法。僅得一時輕快。或完全無効者有之。蓋手術不達神經痛之部位。不能奏効。欲知其部位。頗不易。且切除後之神經。更行再生。則神經痛亦再發。故外科療法。不能期其必治也。

中藥治法 感冒性神經痛者。可與荆芥。防風。薄荷。羌獨活。藁本。蔓荊子。白芷。桑葉。菊花等。

貧血性者。用當歸。地黃。桂枝。黃芪。川芎。杞子。甘菊。阿膠。甘草。蒺藜。胡麻。豨薟草。首烏。鐵粉等。

中毒性者。可參用甘草。金銀花。連翹。黑大豆。紫草。萊豆。山慈姑。貫衆。蒲公英。犀

角等。

神經性神經痛者。用桑枝。細辛。威靈仙。牛膝。川草烏。天麻。側子。晚蠶沙。罌粟壳。延胡。乳香。沒藥等。

神經炎性神經痛者。用石膏。知母。山梔。丹皮。丹參。川柏。秦艽。桑葉等。
外治法可用白芥子。斑蝥。大蒜等。

梅毒性者。痙攣狀或麻痺狀者。營養障礙者等。用藥均參閱前。

要藥略釋 荆芥屬唇形科。藥用荆芥之花穗與莖葉。古人用治口面喎斜。遍

身瘡癩。發汗。治項強。清頭目。利咽喉。吐血衄血。身背疼痛等。蓋爲鎮痛鎮痙藥。用於感冒性神經痛。最爲相宜。 用量五。○——一。○。○（錢半至三錢）

薄荷屬唇形科。薄荷之莖葉。主治賊風。傷寒惡氣。能發汗。通利關節。療頭痛。頭風。咽喉。口齒諸病。蓋本品內含揮發油。爲清涼性。鎮痙鎮痛藥。兼有發汗解熱。

之功也。 用量四・〇——七・〇（一錢一至二錢一）

阿膠係用驢皮與阿井水煎熬而成之動物性膠。本經主治心腹內崩勞極。洒洒如瘡狀。腰腹痛。四肢酸痛。女子下血。安胎。別錄療丈夫小腹痛。虛癆羸瘦。陰氣不足。脚酸不能行走。蓋本品本爲滋養強壯藥。用於貧血性之神經痛。

用量七・〇——一七・〇（二錢一至五錢一）

蒺藜屬蒺藜科。入藥用其果實。古人主治身體風癢。頭痛。破癥結積聚。補腎益精。主腰痛。遺洩。外台祕効方。治腰脊引痛（貧血性腰脊神經痛）蒺藜子搗末。蜜和丸。酒服。極有效。蓋本品爲腰脊神經之滋養強壯藥也。 用量七・〇

——一〇・〇（二錢至三錢）

胡麻屬胡麻科。藥用其種子。須選其黑色者。本經主治傷中虛羸。補五內。益氣力。長肌肉。填髓腦。別錄云。堅筋骨。明目。療金瘡。止痛。及傷寒溫瘧。亦爲神經

之滋養強壯藥。 用量四・〇——一〇・〇（一錢一二至二錢）

豨薟草屬菊科。藥用豨薟之嫩苗。李時珍云。治肝風腎氣。四肢麻痺。骨痛膝弱。風濕諸瘡等。蓋本品對於神經性痹痛有卓效。古人云。散風燥濕者。良以本品。不僅有強壯神經之功。而似有促進炎性滲出物之吸收。恢復神經之麻痺等作用也。 用量五・〇——一〇・〇（錢半至二錢）

何首烏苗一名夜交。藤屬蓼科。何首烏係其根。主治癩癧。消癰腫。療頭面風瘡。治五痔。止心痛。益血氣。黑髭髮。散風活血。經驗方治骨軟腰膝疼。行履不得。遍身癢痒。（貧血性神經痛）首烏同牛膝酒浸或爲丸服。有特效。蓋本品有佳良之強壯補血功效也。 用量五・〇——一三・〇（錢半至四錢）

鐵粉係金屬。爲鋼鐵鍊成之粉末。古人用爲安心神。堅骨髓。除百病。變黑云云。蓋人體生理上鐵與蛋白質化合即變爲血及血色素。故本品爲補血強壯藥。

尤於貧血性疾患用之最宜。 用量二・〇——四・〇（六分至一錢二）

紫草屬紫草科。入藥用其根。古來用治心腹急痛。血熱毒閉。水腫不消。五癩。癩癬。惡瘡。及痘瘡。血熱毒盛。二便閉澀等。用作解熱解毒藥。可應用於中毒性神經痛疾患。 用量五・〇——一〇・〇（錢半至二錢）

菜豆屬豆科。菜豆之種子。主消腫下氣。解熱毒。生研絞汁服。治丹毒。煩熱。風癩。藥石發動（中水銀砒石鉛毒）熱氣奔豚等。蓋亦爲有效之解熱解毒藥。

用量七・〇——三三・〇（二錢至一兩）

山慈菇屬百合科。爲山慈菇之球根。本草求真云。瀉熱解毒。治癰疽。無名疔毒。癰疹。惡瘡。蛇虺咬傷。瘰癧結核等症。蓋本品亦爲解熱解毒之藥也。

用量四・〇——七・〇（一錢二至二錢一）

貫衆屬水龍骨科。貫衆之根。本草經疏主治腹中邪熱氣諸毒。破癥瘕。治風熱。

止頭風殺三蟲。作解毒殺蟲藥。 用量五〇——一〇〇。(錢半至三錢)

蒲公英屬菊科。爲蒲公英之葉莖及根。本草衍義主解食毒。散滯氣。化熱毒。消惡腫。結核疔腫。癰疽瘡毒等。蓋本品有解熱解毒變質利尿健胃之功也。

用量五〇——一〇〇。(錢半至三錢)

藁本屬繖形科。爲藁本之根。本經主婦人疝瘕。陰中寒。腫痛。腹中急。除風頭痛。張元素主太陽頭痛。巔頂痛。大寒犯腦痛。連齒頰。蓋本品爲鎮痛藥。對於頭部神經性疼痛有卓效。 用量三〇——七十。(九分至三錢)

桑枝係桑科桑屬之嫩枝。古來用治偏體風痺。四肢拘攣。偏風臂痛。濕痺流注。蓋本品有滋養性鎮痛作用。爲使麻質斯神經痛之要藥。 用量一〇〇。

——三三〇。(三錢至一兩)

側子屬毛茛科。爲附子根旁之小塊根。古人用治癰腫風痹。歷節。腰脚疼冷。蓋

本品爲麻醉性之鎮痛藥。 用量二・〇——四・〇（六分至一錢二）

晚蠶沙一名原蠶沙屬昆蟲類中鱗翅族爲夏蠶排泄之糞陳藏器主去風緩諸節不遂皮膚頑癬腹內宿冷冷血瘀血腰脚冷疼用作風癩之（神經性麻痺症）利尿鎮痛藥。 用量五・〇——一〇・〇（錢半至二錢）

延胡索屬罌粟科爲延胡索之根主破血婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後諸血病血暈暴血衝上時珍云活血止痛和氣利小便蓋本品有通經鎮痛之功效耳。 用量七・〇——一〇・〇（二錢一至三錢）

防風羌獨活蔓荊子白芷桑葉菊花當歸地黃桂枝黃芪川芎杞子甘草金銀花連翹黑大豆犀角細辛威靈仙牛膝川草烏天麻罌粟壳乳香沒藥等均見前。

處方一 秦艽散（外台） 秦艽七・〇（三錢一） 白朮七・〇（三錢一） 桔梗

- 七。○(二錢一) 乾薑二。○(六分) 附子一。○(三分) 牡蠣二。○(六錢) 防風五。○(錢半) 人參四。○(一錢二) 茯苓一。○(三錢) 椒子一。○(三分) 黃芩五。○(錢半) 桂心一。○(三分) 細辛二。○(六分) 甘草一。○(六分) 杜仲七。○(二錢一)

右十五味剉作兩百西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 療風冷虛勞腰脚疼痛。(按本方爲強壯性鎮痛劑用於營養不良貧血衰弱等神經痛。)

處方二 外台冷痛方(外台) 檳榔七。○(二錢一) 當歸七。○(二錢一)

牛膝一。○(三錢) 芍藥五。○(錢半) 枳壳五。○(錢半)

人參四。○(二錢二) 白朮五。○(錢半) 桂心一。○(三分) 芎

藟五。○(錢半) 吳茱萸二。○(九分) 橘皮五。○(錢半)

右十一味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 療腹中冷氣食不消腰膝冷痛者(健胃強壯劑適用於營養障礙消化不良等神經痛)

處方三 石斛酒(炙) 生石斛一。○(二錢) 牛膝一。○(三錢) 杜

仲七。○(三錢) 丹參五。○(錢半) 生地黃一。○(三錢)

右五味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服

適應症 主治癱瘓家腰膝疼冷利關節堅筋骨 營養強壯劑應用於消劑性神經肌肉痿癱症)

處方四 杜仲酒方(炙) 杜仲七。○(三錢) 丹參七。○(三錢) 芎

藟四。○(錢半) 杜心一。○(二錢) 細辛二。○(六分)

右五味剉，作兩百西西煎劑，去渣，一日分二次溫服。

適應症 主療腰卒然痛（強壯性鎮痛劑）

處方五 經心錄方（外台） 桑寄生一〇・〇（三錢） 丹皮七・〇（二錢一）

鹿茸四・〇（一錢二） 桂心一・〇（三分）

右四味剉，作兩百西西煎劑，去渣，一日分二次溫服。

適應症 療腰痛（強壯神經劑，應用於貧血衰弱性患者）

處方六 外台骨極方（外台） 芍藥七・〇（二錢一） 生地黃一〇・〇（三錢）

虎骨一四・〇（四錢二）

右三味剉，作兩百西西煎劑，去渣，一日分二次溫服。

適應症 療骨髓中疼（按本方爲滋養強壯劑）（原書爲酒漬劑，法以酒一

斗漬三宿，暴乾，復入酒，如此取酒盡爲度，搗篩後，酒服方寸匕，日三次，該法亦

可採用，非僅限於煎劑也。

處方七

石膏湯方（外台）

石膏生用三三〇

〇（一兩）

麻黃二〇〇（六分）

杏仁一〇〇（三錢） 鷄子一枚攪爛 甘草二〇〇（九分）

右四味剉，作一百西西煎劑，去渣，沖入鷄子，一日分兩次溫服。

適應症

主逐風毒。（按本方爲滋養性清涼消炎劑，適用於神經炎性神經

痛症）

處方八

療風方（外台）

生天門冬一〇〇

〇（三錢）

生地黃一〇〇〇（三

錢）

右二味剉，作一百西西煎劑，去渣，一日分兩次溫服。

適應症

主治風癩，引脅牽痛（滋養緩和強壯劑）

處方九

防己黃芪湯（仲景）

防己七〇〇（三錢一）

甘草三〇〇（九分） 白

朮七・〇(二錢一) 黃芪七・〇(二錢一)

右四味剉作兩西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症

風濕脈浮身重汗出惡風者。(強壯利尿緩和鎮痛劑應用於衰弱

性患者)

處方十

桂枝芍藥湯(湯) 桂枝五・〇(錢一) 芍藥七・〇(二錢一)

甘草二・〇(五分) 麻黃二・〇(五分) 生薑兩片 白朮七・〇

(二錢一) 知母一・〇(錢一) 防風五・〇(錢半) 附子四・〇

(二錢一)

右九味剉作兩西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症

主諸肢節疼痛身體尪癯脚腫如脫頭眩短氣。(本方爲利尿消炎

鎮痛劑用於亞急性神經痛)

處方十一

烏頭湯(和原) 麻黃一。(二錢) 芍藥七。(二錢) 黃芪

七。(二錢) 甘草二。(九分) 川烏五。(錢半)

右五味剉作兩百西西煎劑去渣一日分兩次溫服。

適應症 主歷節不可屈伸疼痛(營養性利尿鎮痛劑)其他請參閱脊髓炎

脊髓勞及偏頭痛諸方。

處方十二

黃芪桂枝五物湯(合價) 黃芪七。(二錢) 芍藥五。(錢

半) 桂枝二。(六分) 生薑二片 大棗四枚

右五味剉作二百西西煎劑去渣一日分一次溫服。

適應症 治血痺及身體不仁如風痺(營養強壯劑)

處方十三

舒筋飲 片薑黃四。(一錢) 赤芍七。(二錢) 當歸

七。(二錢) 海桐皮一。(三錢) 白朮七。(二錢)

羌活五・〇(錢半) 炙甘草二・〇(六分)

右七味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服(腰以下食前服腰以上食後服)

適應症 治臂痛不能舉由氣血凝滯經絡不能行所致(通經鎮痛劑)

處方十四 獨活寄生湯(千金)獨活七・〇(二錢一) 桑寄生一〇・〇(三錢)

秦艽五・〇(錢半) 細辛二・〇(六分) 歸身七・〇(二錢一) 生

地一〇・〇(三錢) 白芍七・〇(二錢一) 川芎四・〇(一錢二)

桂心一・〇(三分) 茯苓一〇・〇(三錢) 杜仲七・〇(二錢一)

牛膝一〇・〇(三錢) 人參四・〇(二錢三) 甘草二・〇(六分)

防風五・〇(錢半)

右十四味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服

適應症 治風寒濕痹偏枯脚氣（強壯性鎮痛劑）

處方十五 史國公酒方 當歸 虎脛骨 羌活 鱉甲 萆薢 防風

秦艽 牛膝 松節 晚蠶沙 以上各六七・〇（三兩） 枸杞子

一七〇・〇（五兩） 薤根二七〇・〇（八兩）

右十二味剉作爲粗末絹袋盛浸無灰酒兩千西西經十日取飲每日臨臥服
上西四。

適應症 治血虛風痛四肢痠痛舉動不利者（強壯性鎮痛劑）

（十五）神經炎

病原 神經炎或僅限於一神經而爲限局性或爲全身性而累及許多神經。
後者名多數性神經炎。限局性神經炎因（甲）受寒 此係甚常見之原因。
例如面神經受寒是（乙）外傷 神經受跌打或直接受壓或因壓節脫臼或

骨折致神經扯破或受扯以及因皮下注射醚致神經受損皆能致神經炎。又職業性輕癱亦歸此類。(丙)鄰處之炎蔓延 例如顱骨瘍所致之面神經炎。或骨之梅毒或關節病所兼顯之神經炎是。癌亦能致此。多數性神經炎原因極複雜。可分述如下。(甲)傳染病之毒 例如麻瘋白喉腸熱痘症等之毒素是。(乙)有機毒 例如酒醚 硫化炭 鉛 砒 汞 石油精等是。(丙)惡病質 例如貧血 癌 結核及因他故之衰弱等是。(丁)地方病性多數性神經炎 即脚氣 (Beriberi) 是也。(戊)未曾有以上各原因而突然在過勞或受寒後起者。

原理 因炎性變化之部位而區別為實質性神經炎 (Neuritisparenchymatosa) 及間質性神經炎 (Neuritisinterstitialis) 其混合性者曰混合性神經炎 (Neuritismixta) 又因經過不同而區別為急性神經炎 慢性神經炎 急性症者可以肉眼證明其變狀神經肥厚發赤 富於血液或現小血線或腫脹 富於水分 其橫

紋 (Fontana 氏索條 Fontanasche Bänderung) 消失。顯微鏡下見血管擴張呈蛇行狀。管臂肥厚膨脹而帶光澤。間質性結締組織增殖。結締組織內細胞及圓形細胞亦增加。慢性症者神經呈褐色或暗褐色。是因出血後色素殘留故。其神經鞘增殖肥厚。而與近傍愈着。其質硬固。有時炎症部呈結節狀。名結節性神經炎 *Neuritis nodosa*。若多數病竈散在者曰散發性神經炎 *Neuritis disseminata*。慢性症持續既久。則其神經成結締索。或成神經腫。神經炎有漸漸蔓延之傾向 (進行性神經炎 *Neuritis migrans*)。或向中心端。或向末梢端。故名上行性神經炎 *N. m. ascendens* 及下行性神經炎 *N. m. descendens*。神經炎病竈之好發部爲關節部之神經徑路。及神經回轉部。或潛行於骨管內之部。有時自局部病竈沿神經徑路蔓延之骨髓。一名遊走性神經炎。少數神經幹變化者曰單發性神經炎 *Mono-neuritis*。多數變化者曰多發性神經炎 *Poly-neuritis*。

三三云實質性神經炎。以顯微鏡下可診斷之。

症狀 (一) 限局性神經炎 尋常全身症狀甚輕微。最要之狀。係病者覺該神經所供給。及通過之處。有被鑽或被刺之痛。而神經本身亦顯觸痛。此蓋因神經鞘之神經受激惹也。炎處之皮或略紅。或顯水腫。或謂患處之溫度或增高。並出汗。而關節有滲出液。且發疱疹。該發炎神經所分布之肌之官能受擾。一動卽痛。且或顯顫搖及攣縮。患處之觸覺或略鈍。卽在疼痛大作時亦然。較爲慢性之限局性神經炎之隨眩骨脫臼而起者。其所顯之局部痛初或劇烈。後則漸止。惟臂神經叢之易受激惹。或纏綿甚久。而該神經幹或腫且硬。痛狀不一。有時劇烈難忍。有時無甚大妨害。患處或顯麻刺感覺。及蟻走感覺。而觸覺攪。運動性受擾甚昭著。終則患處之肌顯劇烈之萎縮。手指或攣縮。患處之皮或顯紅色。或光滑。或皮下組織起水腫。指甲之營養或欠缺。少數病案。皮下

或生纖維性結節(筋疣) 有一種神經炎先以一周圍神經爲限。後或向上蔓延。名上行性神經炎或游走性神經炎 *Ascending migratory neuritis* 累及較大之神經幹。甚或延至脊髓。致亞急性脊髓炎。此類於受寒及患熱病後罕見。其常見者乃外傷所致。較大之神經最易受患。而其炎或上行或下行不定。但上行者較常見。繼內臟病如膀胱而起之癱。或係上行性神經炎所致。有時一側之神經炎或延至他側之神經。其蔓延也由脊髓或其膜以通過彼側。更有不累及神經中樞。而彼側之神經亦或相隨發炎者。此卽所謂交感性神經炎。限局性神經炎之電性改變大有異同。此蓋因該神經受損之廣狹不同故也。若有時損害極輕。則該神經及其所分布之肌皆有常度之法拉兌電及賈法尼電反應。若損害極重。數目之內卽有變性反應 *Reaction of degeneration*。此蓋指該神經不應以上所述二種電激。而其肌對於賈法尼電激顯特

殊之反應。例如肌縮緩慢。不似常肌之速而且強。而陽極閉縮 MOC 較陰極閉縮 KCC 強。此輕重二類之間。尚有許多等級不同之損害。故精細之電診法爲診斷及判定結局最重要之手續也。病程自數日。以至於數星期。數月不定。輕微之外傷性神經炎。或於一二日後即退去。而較重之類。例如隨未復位之關節脫白而起者。或纏綿數月。或且始終不能完全復原。(二)多數性神經炎。最常見之類。可條列如下：(甲)急性發熱性多數神經炎 Acute febrile polyneuritis。此類之發作。或隨受寒或過勞而起。間或自起不定。病之起也與急性傳染病相似。或顯明定之寒戰及背腿或關節之痛。熱度速升。或達百零二四度 (39.5—40°)。頭痛厭食。且顯急性感染之全身狀。四肢及背痠痛。惟神經之劇痛則不甚常見。手指與足趾有微刺感覺及蟻走感覺。而神經幹或一肢顯感覺過敏。肌之失力。或先顯於腿。逐漸增劇而延闊。與急性上行癱瘓之情

狀相似。然亦有癱由臂起者。伸腕肌及屈踝肌受累最早。故有手足下垂之患。病重者。甚或全身之肌力俱喪失。而致弛緩性癱。且或延至面肌及肋間肌。致呼吸僅持膈之動作而施行。肌鬆弛而速萎縮。或顯感覺過敏。痠痛及四肢僵硬諸狀。有時或顯敏感性增加及麻木。更有感覺受擾輕微者。阿該氏瞳孔及兩瞳大小不勻。兩者亦或呈顯。但腦經受累者罕。而動眼神經與第五神經。則有受累者。迷走神經亦爲受累。脈搏增加之原因。大抵係此神經受累。膀胱及直腸受累者不多。僅間有之。但其受累非脊髓受累之徵。此病之臨診症狀。多與急性上行癱瘓無法區別。且或與亞急性脊髓炎不能區別。病程長短不一。最劇烈者。或在七至十日之內。因呼吸肌受累或心癱而致命。而不甚重之類。則常例五至六星期之後。症狀卽不進行。繼則漸行減退。若干肌之癱或纏綿至數月之久。且或因肌漸短而成攣縮。但雖如此。其結局尙佳。蓋纏綿年餘之

癱。亦能復原也。(乙)再發性多數神經炎 *Recurring multiple neuritis* 據某醫師報告此類患者二人。一人右臂之神經受累。其他一人則兩腿之神經受累。一人再發三次。一人則二次。每次患炎皆在同一神經。(丙)醇中毒性多數神經炎 *Alcoholic neuritis* 此或係多數性神經炎中最要之類。女較多於男。沉靜不間斷之好飲者。最易患之。有時此病之發顯。係醫士或家人第一次發見病者之有祕密酒癖。病起常徐漸。或在病起之前數星期或數月先有神經痛及手足之微刺痛感覺等。驚厥不罕見。發熱者則少。癱徐漸而成。先在足及腿。繼則達手及肘。伸肌之受累較屈肌重。故有手足下垂狀。有時癱不上升。只限於手足。又有只限於下半身(截癱)者。最重者。則四肢皆受累。惟累及面肌及括約肌者甚罕。感覺症狀。大有異同。或僅顯麻刺感覺及微刺痛感覺。而不兼劇痛。或顯劇烈之燒灼痛或鑽痛及神經幹觸痛。而肌受壓亦覺痛。手足多腫

而充血。尤以在手足向下垂時爲然。常例。皮之淺反射無恙。惟深反射則常喪失。中酒性神經炎常能復原。數星期或數月後。卽漸減而肌力漸復。卽最重者。亦能復原。但足伸肌之癱或纏綿頗久。故其步態顯周圍神經炎之特徵。卽所謂跨國步態(Steppage gait)者是也。酒精性神經炎之各昭著症狀中。尤以精神症狀爲昭特。譫妄常見。或有幻覺及矜跨之妄想。略與全身性麻痺相似。有時或與尋常之震戰性譫妄相似。但其最有殊性者。乃係辨別時間及地方之能力喪失。且喜向人詳述其新近經歷之路程。或初相見面之人。(丁)傳染病之多數性神經炎。Multiple neuritis in the infectious diseases 此類爲白喉所兼患者最常見。此等損害之屬周圍性。係剖驗所證明。除因白喉病而起者外。結局不惡。少有死者。至其因結核。糖尿及梅毒所致之多數性神經炎。大約因毒質被吸入血內而致。又此病或因敗血病性咽喉痛。或其他任何部之化膿病而

起。(戊)金屬中毒性多數神經炎 *Mental Poisons* 砒毒所致神經炎。或隨以下各情況而起。(一)因服砒藥類而起。尤以否硫氏溶液 *Higronicollis* 爲最易致此患。患者之指甲改變。最常見者。係甲上成橫紋凸。(二)意外之飲食毒。有時製糕點在所用之色素含砒。英國前曾有數處地方發生流行性神經炎。其原因係該處發售之啤酒略含砒質。而其砒則係由製葡萄糖時所用之硫酸而來。或云若常飲酒者。患神經炎。原因大抵屬砒性。然病勢輕微者。則或係酒精所致。皮積色素係砒中毒之要徵。鉛中毒所致之神經炎。尤常見。因用汞抹膏致起。此患者亦有之。更有因用鋅致患此病者。惟甚罕。(己)地方病性多數性神經炎。(卽脚氣病類)

治法 西醫謂本病宜施以原因療法爲要。感冒性者。溫浴。發汗。撒曹等內服。急性症。則行局部消炎法(瀉血。冰囊)必杯劑內服。慢性症。則用水銀軟膏發

泡膏、沃度丁幾等多發性神經炎。則內服解熱劑、神經劑、疼痛則以嚼囉仿謨樟腦等混和塗布於局部。急性症消散而殘留肌肉麻痺時。則用按摩法。感傳電氣療法。平流電氣積極療法。若筋肉對於感傳電氣興奮性消失時。則用電氣消極療法。若砒鉛中毒者。則宜內服沃剝。對於麻痺。則行硫黃浴。硝酸注射。能使經過縮短。

中藥治法 按急性神經炎。似係古稱之白虎歷節風等類。又遊走神經炎。似與俗稱之紅筋線相似。古醫籍或混稱流火風毒等。中藥治法。感冒及梅毒性者。與以原因療法。發汗解熱。則荆芥、防風、菊花、連翹、羌獨活……等。驅梅以輕粉、土茯苓、萆薢、忍冬藤、生甘草等。

因中毒而發者。則宜與以利尿解毒藥。如生甘草、滑石、銀花、赤豆、黑豆、木通等。至一般的清涼解熱消炎劑。如石膏、知母、葛根、甘草、川柏、芍藥、絲瓜絡、竹葉、犀

角竹茹 桑葉 天花粉 金銀花 牛黃 菊花 山梔 丹皮等

又營養強壯劑如生地 米仁 天麥冬 石斛 地骨皮 桂枝 桑枝 牛膝 川斷 杜仲等
其他如外治法用野菊花 或蒲公英 地膚子 等煎湯洗或罨敷或製成之消炎
散腫劑如如意金黃散……等

要藥略釋 絲瓜絡屬胡蘆科 蘇果類 藥用絲瓜之筋膜 相傳主涼血解毒 通
經絡 行血脈 治血氣作痛 癰疽瘡腫等 蓋本品有清涼性 消炎解毒之功
用量四・〇——七・〇（一錢二至二錢一）

竹葉係禾本科 竹屬爲竹類之葉 入藥以淡竹之葉爲勝 古來主治吐血 熱毒
風 止消渴 壓丹石毒（砒酸類中毒）能除頭痛 頭風等症 蓋本品亦有清涼鎮
靜之功也 用量五・〇——一〇・〇（錢半至二錢）

天門冬屬百合科 藥用天門冬之根 古人主治諸暴風濕 偏痹 強骨髓 能去寒

熱利小便。蓋本品有滋養強壯神經解熱利尿之功也。 用量五・〇——一

〇・〇（錢半至三錢）

地骨皮屬茄科。藥用枸杞之根皮。本經主治五內邪氣。熱中消渴。周痹風濕。久服堅筋骨。別錄下胸脇氣。客熱頭痛。補內傷大勞。噓吸強陰。利大小腸。蓋本品有滋養強壯性解熱鎮靜之功也。 用量五・〇——一〇・〇（錢半至三錢）

地膚子係屬藜科。地膚之種子。本經主治膀胱熱利小便。補中益精氣。別錄去膚中熱氣。散惡瘡。疝瘕。強陰。蓋本品有利尿解熱之作用。煎湯外洗。可治皮膚瘡瘍。諸疾患。亦取其清涼消炎之功耳。 用量內服五・〇——一〇・〇

（錢半至三錢）外用不拘。

石膏。知母。葛根。甘草。川柏。烏藥。犀角。竹茹。桑葉。天花粉。金銀花。牛黃。菊花。山梔。

丹皮、生地、米仁、石斛、桂枝、桑枝、牛膝、川斷、杜仲、蒲公英等，均見前。

處方一 五補七宣丸(外台) 人參四・〇(二錢二) 茯苓一〇・〇(三錢)

地骨皮一〇・〇(三錢) 乾地黃一〇・〇(三錢) 牛膝一〇・〇

(三錢)

右五味剉，作兩百西西煎劑，去渣，一日分兩次溫服。

適應症 安七魂、鎮五藏、堅骨髓、養神明。(按本方為營養強壯劑，適用於營

養不良、貧血衰弱、肌肉萎縮性神經炎)

處方二 廣濟療白虎方(外台) 犀角二・〇(六分) 當歸七・〇(二錢一)

芍藥七・〇(三錢二) 牛膝一〇・〇(三錢) 沉香二・〇(六分)

青木香四・〇(二錢二) 虎頭骨一〇・〇(三錢) 麝香〇・一(三

厘) 櫛葉五・〇(錢半)

右九味剉作兩百西煎劑去渣一日分兩次溫服。

適應症 主治白虎病。晝靜夜發。發即撒髓疼痛。乍歇其病如虎之嚙。〔鑽刺痛〕（強壯解熱鎮痛劑）

處方三 近效療白虎方〔外台〕 炭灰一〇・〇（三錢） 蚓糞一〇・〇（三

錢） 水藍花五・〇（錢半）

右三味研末和勻。入鍋炒令熱。取好醋潑入少許。勿令如糊。以布三四重裹之。熨患處。冷者重炒之。凡二三次。

適應症 主療白虎瘋痛。〔按本方爲外用劑。似能促進血行。及滲出物之吸收。適用於皮下組織起水腫之神經炎。及慢性限局性。因脫白而起之外傷性神經炎。〕

處方四 療丹方〔外台〕 水苔 生蛇銜 生地黃 生菘葉 蒴藿葉 五

葉藤 慎花草 浮萍草 豆豉 大黃 梔子 黃芩 芒硝

右十三物搗爛和鷄子清調勻罨貼一日換二次。

適應症 療諸丹毒（按本方各藥搗罨俱有局部消炎解毒之功）

處方五 麝香圓（本事方） 麝香〇・五（二分半） 川烏四・〇（二錢二） 全

蠹二・〇（六分） 黑豆一〇・〇（三錢） 地龍一〇・〇（三錢）

右五味剉細糯米粉糊爲丸如菉豆大每服七粒一日三次空腹溫酒下。

適應症 治白虎歷節諸風疼痛遊走無定狀如蟲嚙晝靜夜劇及一切手足

不測疼痛（按本方爲麻醉神經性鎮痛劑適用於神經炎之顯麻痺截癱及

顫搖等現狀者宜）

處方六 牛蒡子散（本事方） 牛蒡子七・〇（二錢二） 羌活五・〇（錢半）

生地黃一〇・〇（三錢） 新豆豉一〇・〇（三錢） 黃芪七・〇

(三錢一)

右五味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 治風熱成歷節攻手指作赤腫麻木甚則攻肩背及兩膝。(滋養性鎮靜解毒劑)

處方七

知母湯(本事方) 知母七・〇(三錢) 麻黃二・〇(六分) 黃芪五

・〇(錢半) 甘草二・〇(六分) 羌活五・〇(錢半) 白朮七・

〇(三錢一) 枳殼五・〇(錢半)

右七味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 治遊風攻頭面或四肢作腫塊(清涼性利尿緩和鎮痛劑)

處方八

烏頭圓(本事方) 川烏頭五・〇(錢半) 草烏頭四・〇(一錢二)

天麻七・〇(三錢一) 地龍七・〇(三錢一) 白附子四・〇(一錢

二)

右五味剉細爲丸。每服一錢。日三次鹽湯下。或作兩白西西煎劑。去渣。一日分兩次溫服。

適應症

治腎臟風上攻。下注。生瘡并癩。(麻醉性鎮痛鎮痙劑)

處方九

葛花解醒湯(歌訣) 葛花七・〇(三錢一) 木香四・〇(一錢二)

砂仁二・〇(六分) 茯苓一・〇・〇(三錢) 豬苓一・〇・〇(三錢)

人參四・〇(一錢二) 白朮七・〇(二錢一) 豆蔻二・〇(六分)

青皮五・〇(錢半) 陳皮五・〇(錢半) 神曲一・〇・〇(三錢) 乾

薑二・〇(六分) 澤瀉七・〇(二錢一)

右十三味剉。作三百西西煎劑。去渣。一日分二次溫服。

適應症

酒傷(按本方爲健胃利尿劑。對於酒精中毒性諸症有卓效)

處方十

龍膽瀉肝湯(薛氏)

龍膽三・〇(九分)

黃芩七・〇(三錢一)

當

歸七・〇(三錢二)

澤瀉七・〇(三錢一)

山梔子七・〇(三錢一)

木通四・〇(二錢二)

車前子七・〇(三錢一)

甘草二・〇(六分)

地黃一・〇・〇(三錢)

右九味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次溫服

適應症

主治肝經濕熱玉莖患瘡或便毒下疳懸癧腹痛小便澀滯陰囊腫

脹(按本方為消炎利尿劑用於充血性神經炎或小便不利者為宜)

處方十一

桂枝加白虎湯(金匱)

石膏三三・〇(一兩)

知母七・〇(二錢

一) 甘草三・〇(九分)

粳米一・〇・〇(三錢)

桂枝二・〇(六

分)

右五味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次溫服

適應症 主治骨節煩疼，邪風散漫於肌肉之間（急性神經炎關節痛）

處方十二 桂枝芍藥知母湯 見前（神經痛二二八）

處方十三 防己黃芪湯 見前（神經痛二二七）

處方十四 烏頭湯 見前（神經痛二二九）

處方十五 石膏湯 見前（神經痛二二七）

（十六）偏頭痛

病原 此係一種陣發性病，其特殊性狀為劇烈之頭痛，常係一側性，且多與視覺紊亂相伴，或謂此病百分之九十屬遺傳性，婦女及易患神經病性家族之人最常患者，此病之性質尙未知，而醫界之意甚多，有如下述。

（甲）以為係一種血中毒之因腸性消化紊亂，或本身所生毒而致。

(乙)以爲係一種血管運動性病之兼動脈痙攣者。此一理論之證據爲(一)凡頭痛發顯之際。患側之顛動脈。捫之似較常時小。(二)驗視網膜動脈。有時可見其痙攣。(三)有時患之動脈硬化。而其尤足爲確鑿之證據者。卽頭痛發顯之際。或兼暫性獨癱或偏癱。

(丙)以爲係反射性來源之由眼屈光差誤。或由鼻內或生殖器之弊病而起者所致。

(丁)以爲係大腦室間孔(通管)暫時被塞而兼腦室內壓力過大所致。此病大多數在少年時卽發端。甚或有在幼穉時已患之者。許多情事皆能激之使發作。例如各種情感過甚。精神或身體勞。消化受擾。食若干特別之物皆是也。其陣發之特徵。係最昭着之情狀。或在每星期內之同一日發顯。或在每十四日或一月內之同一日發顯。頭痛之屬偏頭痛類者。或與慢性腎炎相伴。

而顯數年之久。且其發作或與腦底生瘤。或腦底之他種損害有關係。

症狀 此病之有前驅徵者頗多。而病者能預知病之將發。此等前驅徵。有其

奇特者。而尤以與視相關者爲然。有幼見怪物如鼠或犬。或他獸類等者。有患偏盲或暫時或暗點（盲點）者。有患側之瞳孔顯痙攣動作。而輪替舒縮（名虹膜痙攣）者。其視覺之擾亂。常僅係視物不清。或見光球現於目前。或見光線往復不斷。或見有大光一片（有時此光片內有極華美之彩色）其四周參差不齊等等。他種感覺之紊亂罕見。然舌或面。聞或手有麻刺感覺。及微刺痛感覺。患側之肌顯痙攣者。則尤爲少見。此外更或顯暫時性無語言能。而時發時歇。若干患者。顯昭著之精神紊亂。或爲慄動。或爲昏亂。或爲重憂鬱眩暈者。亦有之。此。前驅徵顯後。不久頭痛即發端。此痛屬加增性及擴張性。初起於局部之一小點。此點大約恆常在顳額。或眼球諸部。痛之特性。常係尖利鑽刺之

類。繼則痛漸延闊。而布滿頭一側之全部。有時或延至頸間。或延至臂。亦間有頭之兩側俱受累者。惡心及嘔吐。係常見之症狀。若頭痛發作在胃飽之際。則嘔吐後痛每減輕。血管運動症狀。或亦呈顯。例如面色發白。或兩側之面色甚不相同。是後則因血管舒張之勢力。而患者之面及耳變赤色。脈搏或遲緩。患者之顫動脈。或堅而硬。而與動脈硬化之情狀相同。他病之能破壞人生之康健如是之甚者甚少。當發作之間。病者甚或不能抬頭離枕。微響或微光。皆或致痛之加增。發作之久暫。大有等差。較重之類。至少使病者三日不能理事。其他則在一日之內。或即退去。或於數年之中。屢屢再發。若有昭著之遺傳性。或終身不瘳。女子在經絕期之後。不復發作者頗多。男子則多在五十歲以後止息。

治法

病者多半自知致病發之原因。免激惹。按時進食。飲食適度。諸項係要

件。病人有因禁用葷食而病勢大減者。治法以除去致病發作之原因爲要務。凡小兒則其母之保持其大便有常規及飲食常適度。每有大益。眼之屈光錯亂。宜用眼鏡矯正之。此類小兒。切不可任使爭考學校。獎勵久服溴鹽或見效。若兼貧血。宜服鐵及砒類藥。血壓加增。則宜試服硝酸甘油數日。至於預防之法。則不必可憐。有時雖用各類防法。而頭痛仍再發也。或主張病者一顯預兆。卽用白零五度(四〇・五)之溫水洗胃。並服瀉鹽足劑量。有時在將發作時。用熱鹼溶液灌洗大腸。有效。病者宜多飲鹼性水類。發作之際宜安臥。若覺發暈及惡心。則飲熱濃咖啡。或茶一小杯。皆有效。久服印度大麻。或可試行之。醋柳酸。安替派林。阿司坦。尼利。斐那。昔汀。及辟拉密洞 Pyramidon (・五至・七克) 用者頗多。若在發作之前服之。間或見效。連服小劑較佳。他如咖啡素。Calcium 枸橼酸鹽。以五厘爲一劑。番木鱉及麥角。亦有可用。電療法不甚効。

中藥治法 偏頭痛之一般療法當予以鎮靜鎮痛劑如槲木白芷細辛川草
烏雞攔干羌獨活純勾桑葉天蟲防風荆芥蟬衣天麻等
急慢性則呈炎症者用菊花丹皮山梔石膏淡芩龍膽草黃連等清涼性消炎
劑。

本病用瀉下的誘導療法常奏着効如大黃元明粉蘆薈龍膽草等
滋養強壯劑如牛膝生地白芍胡麻當歸川芎桂枝等
麻木刺痛肌肉痙攣全蠍蜈蚣地龍赤芍等

要藥略釋 俱見前

處方一 川芎散(本車方) 川芎四・〇(二錢三) 柴胡七・〇(二錢二) 半
夏麩五・〇(錢半) 甘草二・〇(六分) 甘菊花七・〇(二錢一)
細辛二・〇(六分) 人參二・〇(六分) 前胡五・〇(錢半) 防風

七・（二錢一）

右丸味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症

風盛高壅鼻塞清涕熱氣攻眼下淚多眵齒間緊急作偏頭痛（清

涼鎮靜鎮痛劑）

處方二

羌活散（和漢藥考）

羌活五・〇（錢半）

蔓荊子七・〇（二錢一）

甘草二・〇（六分）

甘菊花一〇・〇（三錢）

芎藭五・〇（錢半）

防風七・〇（二錢一）

黃芩七・〇（二錢一）

石膏二〇・〇（六錢）

右八味剉作兩百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症

治眼睛疼痛連頭偏痛（按本方爲清涼消炎鎮靜劑偏頭痛之屬

於充血炎症狀者用之較宜）

處方三

羌活附子湯（和漢藥考）

防風七・〇（二錢一）

黃芪四・〇（二錢二）

麻黃一・〇(三分) 蒼朮五・〇(錢半) 升麻四・〇(一錢二)

草二・〇(六分) 附子四・〇(二錢二) 羌活五・〇(錢半) 白芷

五・〇(錢半) 殭蠶七・〇(三錢一) 黃柏七・〇(三錢一)

右十一味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 治冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰腦風(利尿解毒鎮靜鎮痛劑)

處方四 溫風散(和漢藥考) 當歸七・〇(二錢一) 川芎五・〇(錢半) 細

辛二・〇(六分) 白芷七・〇(三錢一) 萸撥三・〇(九分) 露蜂

房四・〇(一錢二)

右七味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 治風冷齒痛(貧血性神經性偏頭痛用之)

處方五

敗毒散(活人書) 柴胡五・〇(錢半) 前胡五・〇(錢半) 獨活五・〇

(錢半) 桔梗七・〇(三錢) 川芎四・〇(一錢) 枳實七・〇(二錢)

羌活五・〇(錢半) 甘草二・〇(六分) 茯苓一・〇(三錢) 生薑二片

右十味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次服。

適應症

治傷寒瘟疫風痰頭痛目眩項強睛疼(發散性鎮痛劑)

處方六

鈎藤散(本事方) 鈎藤一・〇(三錢) 橘皮五・〇(錢半) 半夏

七・〇(三錢) 麥冬七・〇(三錢) 茯苓一・〇(三錢) 八

參四・〇(一錢) 菊花一・〇(三錢) 防風五・〇(錢半)

石膏一・〇(三錢) 甘草二・〇(六分) 生薑二片

右十一味剉作二百西西煎劑去渣一日分兩次溫服。

適應症

主治肝厥頭暈(清涼性鎮靜健胃劑)

處方七

芎辛圓(本事方) 川芎五・〇(錢半) 防風七・〇(二錢一) 殭蠶

七・〇(二錢一) 獨活五・〇(錢半) 桔梗五・〇(錢半) 天麻七

・〇(二錢一) 細辛二・〇(六分) 白附子四・〇(二錢二) 羌活

五・〇(錢半) 甘草二・〇(六分)

右十二味剉爲細末，煉蜜爲丸，如彈子大，每服一粒，清茶吞下，或作二百西西

煎劑，去渣，一日分兩次溫服。

適應症 治頭痛，面赤，煩悶，咽乾。(鎮靜鎮痙祛痰鎮痛劑)

處方八 白芷散(東垣) 鑄金七・〇(二錢一) 香白芷七・〇(二錢一) 石

膏一〇・〇(三錢) 薄荷五・〇(錢半) 芒硝一〇・〇(三錢)

右五味剉，作兩百西西煎劑，去渣，一日分二次溫服。

適應症 主治頭痛。(按本方爲誘導解熱消炎劑，偏頭痛，大便不通，而呈充

血性現象者頗宜)

處方九

芎藭湯(外台)

芎藭四・〇(二錢二)

當歸七・〇(二錢二)

獨活

五・〇(錢半)

細辛二・〇(六分)

白芷七・〇(二錢二)

右五味剉作兩百西西煎劑去渣一日二次溫服。

適應症

療風齒口氣臭(鎮靜鎮痛劑)

處方十

玉女煎(景岳)

生石膏二〇・〇(六錢)

熟地黃一〇・〇(三錢)

麥冬七・〇(三錢二)

知母七・〇(二錢二)

牛膝一〇・〇(三錢)

右五味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症

治水虧火盛六脈浮洪大頭痛牙疼失血等症。(按本方爲清涼性

滋養強壯劑用於營養障礙貧血虛性興奮之偏頭痛最宜)

處方十一

太陽丹(奇效方)

天南星

川芎等分

右二味爲細末。同蓮鬚葱白作餅。貼太陽痛處。

適應症 治各種頭痛（爲外治鎮痛劑）

木病兼見麻痺偏癱等現狀者。處方均請參閱以前各篇。

（十七）癲癇

病原 全身間代性肌肉痙攣。發作性出現。同時人事不省者。曰癲癇。約分三種。（一）特發性（原發真正性）癲癇 *Idiopathische (eyimaregenuine) Epilepsie* 其神經系無解剖的變化。故真因未詳。或以腦皮質運動中樞及精神中樞之一時性充血而發。本病比較的多數存在。無男女之別。至於年齡則此病顯於發身之前者。居大多數。高耳氏曾檢查患此病者一千四百五十人。其中未及十歲者四百二十二人。統計四分之三顯於二十歲以前。歐司勒氏曾檢查小兒患此病者四百六十人。其中四百二十七人。初顯此病之年齡分列於下。

歲者七十四。二歲者六十三。三歲者五十一。四歲者二十四。五歲者十七。六歲者十八。七歲者十九。八歲者二十三。九歲者十七。十歲者二十七。十一歲者十七。十二歲者十八。十三歲者十五。十四歲者二十一。十五歲者三十四。而按五年統計。一至五歲之間者。二百二十九。五至十歲之間者。一百零四。十至十五歲之間者。九十五。由此觀之。則知此病之早起者居大多數。至於壯年始顯者。多數係起因於局部性損害。又遺傳爲本病之必要原因。約三十五至四十%。可證明其爲遺傳性。一家庭中累世被其侵襲者。厥例不尠。兩親之酒狂。酪酊時交接。妊娠時母之精神感動。爲小兒癩癩之素因。傳染病及全身病。(梅毒。結核。痘瘡。麻疹。痛風。糖尿病。)精神及身體過勞。分娩障礙。(分娩時過長。鉗子分娩。)外傷。(神經中樞震盪) 中毒。酒精。鉛。阿片。安知必林。(OASIN) 爲本症原因。(二)反射性癩癩 Rolorexpsic 實際上爲緊要之原因。與腦髓遠隔之部分。

發生疾病。因反射作用而感應於腦髓。致起本病。如末梢神經。因異物或癩痕。愈着而發癩癇。若除去其刺激。則症狀消失。其他耳炎。耳內異物。鼻茸。喉異物。齧齒。腸寄生蟲糞。使積滯。包莖。包皮。結石。子宮轉位。初回之交。接。妊娠。心臟病。大動脈孔窄狹。及靜脈孔狹窄等。亦能引起本症。(一)症候性癩癇 *Symptomatische Epilepsie* 因腦腫瘍出血。膿瘍。寄生蟲。骨片等。刺激腦皮質運動中樞。而發全身性痙攣。或限局痙攣。(限局性者名皮質癩癇 *Rind epilepsie*) 本病特有之點。即當痙攣發作時。其神識非完全亡失。且其全身痙攣。每自同一肢部起始。本病多於七歲至二十歲之時起始。其發於大人者。多因外傷。酒毒。梅毒。及反射性癩癇。發於四十歲以上者。曰遲發性癩癇 *Epilepsia tarda*。病理 其特有之變化未詳。大抵因大腦皮質運動中樞。(前後正中回轉)之充血而發。意識中樞。亦與關係。蓋本病之筋肉痙攣。與腦皮質運動中樞之部。

位。全然符合。而內囊之運動性錐狀體徑路斷絕時。其麻痺肢不發筋肉痙攣故也。試以家兔打擊其頭部。或截斷坐骨神經則生癲癇樣發作。但癲癇有時爲遺傳性之理由。尙未詳細。一說癲癇爲自腸管發生之自家中毒云。

症狀 各症完備者曰重症癲癇 *Pilepsiagraviorhauimal* 突然發作。或現前驅症。有時以精神身體過勞。酒精濫用。房事過度爲誘因。第一期前驅症。有遠隔性與直達性之別。遠隔性者於發作數日前。有頭重。頭痛。神思不安。易興奮。身體違和。健忘。痴鈍等症。直達性者。名癲癇前兆 *Aura epileptica* 於發作前數秒時見之。約分五種。(一)知覺性前兆 *Denside* 於身體之一定部位。有知覺異常。搔痒。寒冷。(清風掠肌之感) 心窩苦悶。腹部膨脹。噯氣腹鳴。生殖器異常等感覺。(內臟性前兆 *Viscerale aura*) (二)感覺性前兆 *Sensorielle aura* 五官有異常感覺。眼花閃發。幻視。幻聽。味覺嗅覺異常。(三)精神性前兆 *Psyc*

blische aura 精神異常。往往昏朦錯亂。興奮狂暴。而有犯罪之行爲。發作終止後。每不能記憶其前狀。是名癲癇前期狂。 *Praepileptisches Irressein* (四) 血管運動性前兆。 *Vasomotorische aura* 血管痙攣。皮膚蒼白厥冷。或潮紅。有溫感。

(五) 運動性前兆 *motorische aura* 筋骨痙攣。或麻痺。每於同一肢部起始。順次波及於他部。前兆發現時。可以一定之方法。抑止其癲癇發作。如於四肢發前兆。即緊縛其四肢。胃發前兆。則頓服食鹽。但以人工抑制其發作。其後却有不快之感。第二期癲癇發作。於前兆後。或突然失神。卒倒。大聲號叫。(是因呼吸肌強直性痙攣所致) 感覺忘失。完全人事不省。患者不擇地而顛倒。受劇甚之外傷火傷。亦不自知。發作之始。皮膚蒼白。全身筋肉起強直性痙攣。 *tonischer Kra mpf* 頭部向後方牽引。眼瞼開張而固定。眼球直視。顏面筋肉緊張。牙關緊急。因呼吸肌痙攣而呼吸靜止。如此持續十數秒間。遂發間代性

癲癇 *Klonischer Krampf* 全身筋肉伸展運動。頭部動搖。顏面歪斜。鬥牙。輪眼。因咽喉舌腭之癲癇。唾液不能咽下。故口吐泡沫。或因舌之咬傷而吐血沫。瞳孔初期縮小。後乃散大。反應消失。呼吸不正。或結滯。或鼾聲雷鳴。體溫有時上升。脈搏增加。全身發汗。或有大小便失禁。遺精等症。若頸部筋肉癲癇。強度時。阻礙頸靜脈之血流。而外頭靜脈呈青色。指頭大之索狀物。或以鬱血故而皮下及結膜呈溢血狀。此癲癇持續數秒或五分間。患者漸漸醒覺。第三期癲癇後期 *Postepileptisches Stadium* 癲癇既終。發暖氣。長太息。而熟睡。半時間。或數時間。後覺心神爽快。遺留頭重。頭痛。倦怠。心神不安者有之。或興奮。易怒。視力障礙。麻痺。失語。其甚者精神障礙。爲無意識之暴行。放火。毀物。自殺人。是名癲癇後狀態 *Postepileptische Zustände*。然其後患者神識完全恢復時。於前事毫不記憶。癲癇發作後尿中。或含蛋白及精液。磷酸排泄增加。或續發多尿。蔗糖

尿症。癲癇發作。無晝夜之別。然有僅於日中發作者。曰晝間癲癇 *Epilepsia diurna*。僅於夜間發作者。曰夜間癲癇 *Epilepsia nocturna*。頑固不易治。發作回數不定。或一日數回。或一年二三回。或一發作未終。即繼以第二發作。是名持續的癲癇 *Datus epilepticus*。此症頗爲危險。每以體溫升騰至四十二度。因中樞神經障礙衰弱而死。罹病既久。往往呈身體精神之變化。如顏面痴鈍。耳垂變形。頭骨歪斜。精神機能減退。思考力。記憶力薄弱。成著明之精神病。然古來英雄豪傑。罹本病者。其例不少。如拿破崙。盧梭。默德等是。本病之合併症。如舌咬傷。皮膚出血。蛋白尿等。已詳前症。其他生重篤之外傷。癩痕。耳血瘤。或窒息死。（因呼吸肌麻痺。食物誤入氣管。或物體衝入口鼻。閉塞而死。）上述完全發作外。又有異型者。數種。（一）不全發作 *rudimentare*。Anfa I 神識消失。其癱攣或爲強直性。或爲間代性。（二）頓挫性發作 *Ahovive Anfalle* *Potit mal* 患

者突然面貌蒼白。數秒間神識亡失。閉眼昏朦。若當寫字步行等運動之間。則卒然停止運動。惟痙攣多缺如。(或神識不消失而發痙攣)漸呈深息或欠伸。而神識回復後繼續運動。但發作時之症狀不自覺。故此症又名虛神 Absence 或以眩暈為前驅。身體憑几椅上略呈神識消失。是名癲癇性眩暈。Vertigoepi-
Ioptica 此種發作。一日數回。終身不增減其度。或漸漸加劇。而成重症癲癇。

(11) 類似癲癇症 Epileptioide zustande 其形狀各異。故不易診斷。或呈精神障礙。發生忘想及譫妄症。而為罪惡行為。於醒覺後。絕不知已往之事。或突然遠航外國。達其目的地。始醒覺。或運動機變調。繞室疾走。終不自知。(疾走性癲癇 Epilepsiaprocursiva) 或現發作性偏側知覺亡失。神經痛。振顫。過度發汗等症。

治法 (一) 總論 凡小兒患癲癇。醫士宜於起初時即以癲癇不能癒告其

父母俾不至因此病而使該兒不受教育也。對於此類小兒之管束宜恩威兼用。倘對於該兒之任性縱慾等不加嚴厲之管束將來必致道德上之自制力薄弱。蓋此自制力爲患癲癇者所萬不可少也。此病不定致營業之能力完全喪失。抑患者苟有一定之事業則更爲合宜。患此病而仍能出類拔萃者固時有之。例如博撒 *Julius Caesar* 及拿破崙 *Napoleon* 及其尤著也。病人宜經營一種戶外職業。或作相宜之手工。此最好即令在救濟院或教養局爲之。長期施行心理解析療法 *Psychoanalysis* 而重行教育。或有益。癲癇最困苦之情狀係許多患者之逐漸的精神變壞。倘患者顯劇烈之易怒性或兇暴之徵兆。即宜送入瘋癲院。患癲癇者不宜婚娶。當驚厥時宜以橡皮塊或軟木塞牙間。以免咬傷其舌。又宜寬鬆衣服而使之躺臥。發作大抵速退不必用治法。然間有歷時甚久者。在西藥則使吸哥羅仿或亞硝酸澱粉少許。或注射嗎啡四分之一。

厘亦可。(二)飲食 宜禁食不易消化物。飲食宜清淡而有定時。切不可多食肉食。最宜每日一次。間有食肉似有損者。或謂素食甚佳。食後不宜即睡。必俟胃內食物盡消化方可就寢。腸道宜常開通。行大腸灌洗漸有益。(三)藥物 惟瀉藥治此病有効。但因其作用在抑制運動。故使用之前。非先按各病詳加研究不可。其鈉鹽或鉀鹽 Sodium or potassium byornid 俱可用。大抵鈉鹽之激惹力較小。故宜久服。可補牛乳腸膠之。苟同服。則藥味幾不能覺。溶液之稀薄度宜酌定。成人每食之。當食之至九十厘(100%)。食後宜禁食食物。以助消化。其須服之藥。宜於餐後之六小時為最。宜於餐後之六小時者。於晚飯後一至二小時(100%)。發作在早晨者。其發作在早晨者。宜於晨後二小時。固以飯後之為宜。蓋此時少致若胃中病。

之毒效，係應驗。但此非溴中毒之指徵，若以多量鹼性水與溴劑調和，且時或與足劑量之砒藥同服，每能減發瘡之趨向。醫士宜將用藥之法，詳細寫明，交病兒之母，或其戚友，病者不宜親自經理服藥，或謂溴藥內加貝拉朵那，頗佳。盧不那（Luna）曾經證明，時有效。服法初用〇。〇六五克，繼則逐漸增加其劑量，至於頑梗之病，每可用鴉片五或六厘（ $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{4}$ ）連用二月之久，惟此為極難之藥，如氫醌（*Hydroquinone*）及大麻及硝酸甘油（*Nitroglycerin*）等，有時對於小癩癩有效，而對於大癩癩不甚見效，須用足劑量，約百分之一之濃度，每次五滴，又須漸增其劑量，直至顯生理的效果為止，每日服乳酸鈣二十片，其見效，反感刺激法不甚宜用，若病兆甚明定，而且恆顯，例如由

手或趾而起者，則在該指或趾處敷起麴藥，或用線縛緊，或能阻止發作。對於小兒，宜細查是否有周圍性刺激之來源。男小兒間有因包皮粘連而致此者。

(四) 外科治法 對於乍克森氏癲癇，其宜用外科治法，為醫界所公認。但偏癱後性癲癇，則外科治法之是否有效，甚可疑。對於自發性癲癇，苟其發作發端于一定處，且其顛狀恆不改變，則將管轄該定處之中樞除去，或見效。外傷性癲癇，例如隨顛骨折而起者，外科手術之功用較大。間有因用手術而間接得功效者，其手術不必專係施於顛骨者，方能見效。如縛頸動脈，截除羣丸，切除頸上神經節，就顛皮剖口環截包皮諸手術，有時亦能治止癲癇。

中藥治法 癲癇前兆期，頭重頭痛，神思不安時，急用羚羊角、石決明、龍骨、牡蠣、茯神、硃砂、全蠍、膽星等，或可制止及減小其發作。

有時用瀉下的誘導法較有著效。如礞石、大黃、桃仁、芫花、甘遂、芒硝等。

一般的用藥。如：蘇合香丸、南星、半夏、白附子、菖蒲、遠志、天竺黃、純勾、真珠、鉛丹、蓖蓉子、琥珀、茯苓、玳瑁等。

要藥路釋：凡化腐生肌、香料、藥用是花之花蕾。本經治咳逆上氣、喉鳴喘、咽腫、短氣、熱毒、惡毒、疔毒、癰腫、別錄：療胸中痰水、喜唾、水腫、五水在五臟、皮膚及腰痛。蓋本品爲祛痰、利尿、瀉下劑。用於癰腫症之顯多痰、便閉者。 用量一・〇

三・〇（三分至九分）

甘遂：大戟科。葉片甘遂之根。李時珍云：瀉腎經及隧道水濕。脚氣陰囊腫墜。痰逐癰癩。疔腫瘡毒。蓋本品爲瀉下逐水劑。實用於胸膈蓄水、痰涎停積等症。服是花大戟之其根。仿。 用量一・〇——三・〇（三分至九分）

馬兜鈴：名兜鈴。爲多年生植物之結石。由生病或食物等關係而生者。大小不一。外觀作灰白色。有白粉。其味苦。其有黃文。輕虛者。中有褐色或黃色毛。謂

之毛毯。古人專用作驚瀾毒瘡藥。蓋本品之成分內含無機質之磷酸鎂、碳酸鈣、碳酸鎂等。有解熱鎮靜鎮痲解毒等作用。 用量〇・三——一。〇（一分至三分）研末沖服。

真珠係貝類之壳內生成的一種病之分泌物。就中有雙壳類中屬於異柱類之真珠介所產者為最佳。古來用為安眠藥。小兒驚風痲癩。解疔毒。止遺精。蓋本品之成分為有機鈣。有強壯性鎮靜鎮熱之功。 用量〇・一七——〇三（五厘至一分）研末沖服或入丸。

鉛丹即黃丹。一名東丹。係全屬礦石類。為黑鉛煉成之丹。本經治吐逆胃反。驚癩癩疾。除熱下氣。別錄止小便。除毒熱。疔毒。金瘡。血溢。蓋本品有鎮靜解毒之功也。 用量二。〇——五。〇（六分至錢半）。

芫蓉屬茄科。入藥用其子或根與葉。本經主治齒痛。出蟲。肉瘡拘急。別錄療癩。

狂風癩頭倒拘攣等。考西藥亞篤羅必用開其病。又名阿刀便。西名 *Trichinosis*。日本藥局方揭載其功效曰。本品用於劇甚之咳嗽。刺激。(略痰甚少而咳嗽頻發者) 例如慢性喉頭及氣管枝加答兒。哮喘。喘息。夜咳。胃痛。三叉神經痛。坐骨神經痛。及攣攣性狹窄。因肌肉裂傷之肌收縮。子宮頸收縮。腦疝。慢性便閉。及癩癩舞踏病等。均有效。蓋本品爲驅除胃中之貧蟲病藥也。

用量○・〇三——○・二(九毫至六厘)

極量○・二——○・六(六厘至一分八厘)

羚羊角、石決明、龍骨、牡蠣、茯神、硃砂、全蠍、膽星、礞石、大黃、桃仁、芒硝、牛黃、南星、半夏、白附子、菖蒲、遠志、天竺黃、純勾、琥珀、茯神、玳瑁均見前

處方一 風癩方(外台) 葶藶子七○・〇(二兩) 鉛丹三三・〇(二兩) 括

萎七○・〇(二兩) 虎掌(南星)三三・〇(一兩) 烏頭一七・

○(五錢) 白朮七。○(三錢) 鴟頭(鳶頭)炙一枝 鐵精三三。

○(一兩) 藷茹三三。○(二兩) 椒五。○(錢半) 大戟炙一。

○(三錢) 甘遂一。○(三錢) 天雄炮一。○(三錢)

右十三味，研極細末，羅去滓，以蜜和丸，如梧子大，每服二丸，一日二次，開水下。或作一百西噶煎劑，各藥用原量減十分之一，去渣，一百分兩次溫服。

遺癩症 主治風癩，按本方為經驗法，寒劑癩症而痰多者較宜。

處方二 又癩風癩方(各重) 茯苓一。○(三錢) 白龍骨一。○(三錢)

洗瘰七。○(二錢) 龍石七。○(二錢) 龍膽草三。○(九分)

蔓菁子(即燕菁)五。○(錢半) 鐵精四。○(二錢) 乾薑二。○

(六分) 人參用。○(二錢) 遠志五。○(錢半) 黃連二。○(六分)

白芷七。○(二錢)

黃芩七。○(二錢) 當歸七。○(三錢) 桂心一。○(三分)

右十七味。研極細末。雜去渣。蜜和。丸如梧子大。每服十五丸。日服二次。開水下。
或作二百兩。西國煎劑。(各藥用量減去十分之五)去渣。一日分兩次溫服。

適應症 治療風癩(強壯性鎮靜劑)

處方三 葇若子散(外台) 豬卵一具 葇若子○。三(一分) 牛黃○。五

(二分五) 鯉魚膽二。○(六分) 桂心一。○(三分)

右五味。剉細去渣。每酒二分。開水沖服。日三回。

適應症 療五癩。癩反射。羊鳴。目翻。吐沫不知痛。(適用於癩癩)

處方四 雄黃丸(外台) 鉛丹六七。○(二兩) 真珠三。二(一錢) 水銀

一。○(三分) 雌黃一○。○(三錢) 丹砂二○。○(六錢) 雄

黃二七。○(六錢)

右六味研極細末，羅去渣，以蜜爲丸，如棗豆大，每服三丸，日服二次，開水下。
又有名五癩丸者，卽本方去雌黃，茲不重載。

適懸症 療五癩發則癩瘰吐沫，不識人，久而得蘇，按本方爲驅梅毒靜劑，適用於腦梅毒性之癩痢症。

處方五 遠志圓(本事方) 遠志三三・〇(一兩) 硃砂一〇・〇(三錢) 南

星五〇・〇(一兩半) 白附子五〇・〇(一兩半) 白茯苓一〇〇

・〇(三兩) 酸棗仁六七・〇(二兩) 人參二二・〇(一兩) 金

箔五片 麝香〇・二二(三厘)

右八味共研極細末，羅去渣，硃砂爲衣，如梧子大，每服三丸，薄荷湯送下，食後臨臥時服。

適應症 治因驚言語顛錯(祛痰鎮靜劑)

處方六

辰硃遠志圓(本事方) 石菖蒲 遠志 人參 茯神 川芎 山

芋 鐵粉 麥門冬 天麻 半夏麴 天南星(麩炒黃) 白附子

細辛 辰硃砂各一七。○(五錢)

右十四味研爲細末。生薑一七。○(五錢)搗取汁和水煮糊爲丸。如菉豆大。

別以硃砂爲衣。每服二十粒。臨臥生薑湯送下。小兒減半。

適應症 安神鎮心。治驚悸。消風痰。止眩暈。(強壯性鎮靜劑)

處方七 抱膽丸(類方) 水銀 硃砂(細研)各六七。○(二兩) 黑鉛五○。

○(二兩五錢) 乳香三三。○(一兩)

右將黑鉛入鍋內。下水銀結成砂子。次下硃砂。乳香。乘熱用柳木搗研勻。丸如

芡實大。每服一丸。井水吞下。病者得臥。切莫驚動。覺來即安。再服一丸。除根。

適應症 治一切癩癩風狂。(驅梅鎮靜劑)

處方八

控涎丹(類方)

川烏炮生

半夏湯洗

白殭蠶

炒生薑汁浸一縮

各一七〇

(五錢)

鐵粉研一〇

〇(三錢)

全蠍

甘遂

麵裹煨

各八〇

〇(二錢四)

右六味共研細末生薑自然汁爲丸如棗豆大硃砂爲衣每服十五丸食後生薑湯下忌食甘草

適應症

治諸癲久不瘳或涎聚散無時變生諸證者(祛痰鎮靜瀉下劑)

處方九

琥珀散製法

琥珀製法五五〇

〇(一斤)

〇(二斤)

琥珀另研一

四〇

〇(八兩)

〇(一斤)

〇(二斤)

〇(三斤)

〇(四斤)

〇(五斤)

〇(六斤)

〇(七斤)

右三味研細末生薑自然汁打糊糊攪令稠粘將心血和入藥末丸如梧子大每服五十九丸入參湯下一日三次

適應症

治心膽被驚神不守舍(祛痰鎮靜劑)

處方十

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡五〇

〇(錢半)

龍骨一〇〇

〇

(三錢) 人參四・〇 (二錢二) 茯苓一〇・〇 (三錢) 鉛丹七・〇
(二錢一) 黃芩七・〇 (三錢一) 桂枝二・〇 (六分) 半夏七・〇
(二錢一) 大黃七・〇 (三錢一) 牡蠣一七・〇 (五錢) 生薑二片

大棗四枚

右十二味剉作二百西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 傷寒下之驚煩小便不利譫語身重不能轉側。(強壯及瀉下之複

方鎮靜鎮痙劑用於歇斯的列性悸動驚癇忽作忽輟者據編者經驗確有特效)

(十八) 神經衰弱

病原 本病係神經系統之一種虛弱或衰竭而致許多精神的及身體的薄

弱之病。此病名包括許多範圍不確定之散亂症狀羣。此等症狀羣。或係普遍性。或係全身性。或係紊亂之現象。或爲局部性而限於若干器官。故又有腦性。脊髓性。心性。或官能性神經衰弱之各種名稱。本病之病原。可分爲兩大羣。卽遺傳（先天）及獲得（後天）二者是也。

（一）遺傳（先天）原因 人生腦力之稟賦。各不相同。苟爲父母者。生活不正當。或沉溺於各種過度之行為。或怠神經官能病。或精神病。則或以所謂腦力不全（欠缺）之一種構造傳其子女。此等人初生卽具有神經病性素質。故其子孫。亦在病之中。此等人。雖多。此等腦力稟賦欠缺之人。祇可量力而行。稍有過度。則成疾病。可以比諸小資本家。特以小經營自限。照本營業者。或無恙。然因經營之故。一旦插足於時式之大商業。則必破產矣。

（二）後天原因 官能之顛倒紊亂。雖爲有遺傳之虛弱稟賦者所最易得。然

而無神經病性素質者。苟用之過於其所有之力之度（如過勞）亦能得之。緊
念及慮慮。苟能得均等之歡樂以相償或不致病。然有許多人。則其勞患漸過
度。其勞患之程度。病者之判別重要與不重要之能力喪失。無關緊要之小事。
亦因勞患過度。一受微激。卽顯不應當之反動。故昔日醫界辨此情狀爲煩
躁。或虛弱。或早養息。則其腦力之勢。可迅速恢復。故本病於學者。學生。技術
家。政治家。商業。投機者爲多。近世生活競爭益劇。本病亦日增。凡春機發動期
之學生。每多本病。一因學事過勞。一因手淫。或房事過度也。各種疾病。使精神
易衰弱者。亦使本病易生。如急性及慢性傳染病後。（傷寒。流行性感冒。瘧疾。
梅毒。淋病。白濁。慢性多臟器疾病。（內臟下垂。慢性腸胃病。生殖器病。耳鼻
部諸病。）及煙草毒。可卡因。）外傷等。又神經質者。與本病者互相往
來。日久必致。而發病。所謂神經性傳染是本病多見於男子二十歲至五十

歲之間。蓋荒淫酒色。身心過勞。及其他害因。較女子易犯故也。發於小兒期者。則因教育不適當故。(熱心智育。蔑視體育)。

症狀 症狀極有異同。或屬全身。或屬局部性。而尤以二者兼併為較常見。病

者之外容。每有患此病之徵兆。有時。或且有特殊性狀。然不易描述。醫士苟在病者入診室時。仔細審視。例如觀察其穿着之情形。持身之態度。談吐之風彩等。每可得若干重要消息。病者有時。或顯體重減輕。及輕度貧血。身體之虛弱。或劇烈。而不復能起床。精神常鬱悶。在婦女則多情感過度。有時局部症狀。或佔主要之地位。故有分此病為腦類。脊髓類。心血管類。胃類。及生殖器類者。無論何類。其主要症狀。大抵與病理的感覺。及其所致之精神效果。相關涉。又病者多數自謂不能安睡。大腦類(Cerebral) or psychic form 病者所顯之狀。以精神之運用欠缺為主。例如不能計算簡單之數。作日記或寫信。每為彼之難

事處理尋常小事亦須費力專注之能力喪失等是。間或無頭痛。食慾如常。而睡眠亦安。但依常例論。則雖無真頭痛。亦必有脹重潮紅諸感覺。不安睡常爲大腦類所顯。且或爲初狀。感覺過敏。幾係各類精神衰弱之主要特殊性狀。而尤以痛覺過敏爲然。此等過敏之感覺。每關係體之一特部。如皮。眼肌。關節。血管或內臟不定。身體表面每有若干觸痛點。患者間或顯昭着之眩暈。且或與耳病眩暈相似。若此等病理的感覺持續甚久。則病者之態度及品性漸變。恆致易怒。無論對於何事。均不稱意。彼以爲人皆當因彼患病而多加寬諒。苟其願望不立即達到。卽自覺受侮甚。彼雖欲人之諒己而已之對人。則不寬。病重者甚。或破壞他人之快樂。方覺稱意。此類人常謂人不知其用意。病者多數逐漸呈顯所謂憂慮情況。Anxiety Conditions 有在神經衰弱之晚期。不顯若干憂慮者。最單純之憂慮。或僅係自懼將成癩。將死或將中風。而較爲常見者。

則其憂慮之感覺。在體之若干局部。例如心全部。頭內。腹內。或胸內是。亦有在四肢者。惟較少。有時其憂慮漸至非常劇烈。病者躁動不寧。自言百無聊賴。竟不知如何自處。或倒臥床上。且哭且訴。手足作驚厥樣運動。際此或且有自殺之傾向。甚或在無可如何之際。竟自殺。不隨意的精神動作。或甚可厭。病者自言爲不能自止之思想所困。該思想在腦內一一經過。迅速如電。連續不可制止。有時或毫無思想。而病者之精神。因對其所記憶的印象。易於受激。而被充滿。故受外來之刺激時。乃不能使其所提起之觀念。有正當之綜合而成思想。有時病者。自謂某言。或有某名。或某數目。或某歌曲。或某音調。或某詩句。時常往覆腦內。無法可制止。病之重者。常有畏懼性。最常見之類。爲畏市場性（又名畏廠處性）。際此。病者一入廣衆之廠處。卽被一種恐慌之感覺所擾。一似畏懼欲死。而全身戰抖。胸前覺壓。而心悸動。或更大汗淋漓。且自覺兩腿似

被鎖於地不能前進一步。尤可奇者。有時苟有他人伴行（甚或小兒或手杖或洋傘等亦可作伴）即能通過此廠處。又有畏獨處者。名畏獨處性 *monophobia*。尤以在緊閉之室內爲然。此名畏窄處性（又名畏隘處性）*Claustraphobia*。至於畏見多人及大庭廣衆者。名畏廣衆性 *anthropophobia*。此外尙有許多畏懼性。例如畏高處性。畏患病性。畏大車性。畏雷性。畏閃電性等皆是也。更有無論何物及何人。皆爲病人所畏懼者。特別覺或受擾。而尤以視覺爲然。例如看書數分鐘。則眼球即覺凌痛及發閃光等是也。易惹性眼 *iritidiosis*。即所謂神經衰弱性視力疲勞 *neurasthenic amblyopia* 者。爲行醫者所常見。聽覺或受擾。或聞聲即覺耳痛。亦有時顯聽覺過敏。頭內覺壓。係一最常見之狀。此狀人各不同。或屬瀰散性。但在一處如額。顛。囟門或枕者。較常見。有時脊髓症狀。或佔主要之地位。此名脊髓受惹或脊髓性神經衰弱。如此則病者除顯若

干以上所述之症狀外，略一用力即甚疲乏，背虛弱而痛，肋間有神經痛性之痛，腿痠痛，脊柱或有局部觸痛點，該病點或自顯，或須受按或運動方顯，間或感覺受擾，而尤以麻刺及微刺痛感覺爲常見，反射或增加，內臟性神經痛（尤以與生殖器官相關連者爲然）亦多見，背或頸之痠痛，係脊柱神經衰弱病最常之狀，若在婦女，則此等情況究屬歇斯的里亞，抑爲神經衰弱，極難判斷，凡此類病，肌之動作之受擾最昭著，其症狀或係激惹性，或係癱性，或二者兼有，劇烈之類，或顯共濟運動失調狀，此尤以眼肌之聯合運動爲最易受患，致顯視力疲勞性調視功用受擾，上瞼下垂極常見，此或係交感神經所供給之腦力不足所致，而非動眼神經癱所致，間或顯閉眼難立狀，致病者或醫士擬爲脊髓癆之發端，至於文思和動，如書寫言語等之受擾，則較罕見，此與全身麻痺初起時所顯者頗相似，此等症狀每屬可驚，故醫者必須十分詳審，始

可定診斷。蓋此可爲單純的神經衰弱之症狀。非必爲脊髓癆初起所顯者也。凡患神經衰弱。反射常增。深反射必不喪失。淺反射雖不如此恆定。然亦常增。瞳孔多開大。而反射每如常。兩瞳或大小不均。屈光差誤者頗多。若戴合宜之眼鏡。或大有效。尙有一種神經衰弱病。其肌力之虛弱。或至極度。或致毫不能運動。必須十分詳審。始可定診斷。蓋誤斷者頗多也。所謂無起立能及無行走能 (Incapable) 者。卽屬此類。又有一類。以心及血管症狀爲最困苦。或僅兼輕微之腦脊官能受擾。然以合併呈顯者爲最常見。心悸。心動不規則。心動急速 (神經衰弱性心動急速) 心部作痛及不舒適。係最常見之症狀。微受刺激卽或至心動立增。間或兼眩暈及憂慮。故病者多自以爲心部有重病。更有顯假心絞痛者。有許多神經衰弱病。以血管運動受擾爲一特別情狀。突顯皮之熱陣 (尤以在頭者爲常見者) 及皮之暫性充血。或爲極苦之症狀。大汗或顯於

局部或全身間有在夜間顯之者。因周圍小動脈非常弛緩，故脈搏或異常動脈之跳動或在體之各處可以察見。幾與主動脈瓣閉鎖不全所顯者無異。脈搏亦或略顯陷落狀，而毛細血管之搏動，或可在指甲內、唇上或額上划紋處窺見。有時腹主動脈之搏動，係一殊性症狀。此搏動有時甚有力，而與腹動脈瘤相似。隨此搏動而得之主觀感覺或甚困難，而尤以胃空時爲然。周圍血管或縮小，四肢冷，鼻色紅或青，面容枯瘦。此多見於婦人。男子有時如是。凡患此類病者，皮下血管若擴張，則甚覺安舒。故可設法使之脹大（如多著衣服或飲酒）。腸胃性神經衰弱之症狀（見消化系統病神經性消化不良篇）患男女性神經衰弱者，其生殖器患易惹性虛弱而致男人夜間遺精，房事後每顯異常之不舒適及自懼陽萎。此等病者之精神症狀最爲可憫。每易受庸醫及僞醫之愚弄。此狀在男子多起於輸尿管深處有病，而尤以在輸精阜及前列

腺二處者爲然。精溢係多數病者所懼而常自慮者。病者自言時常遺精。而遺時毫無快覺。大小便後亦或遺精。用顯微鏡察驗遺出物。有時亦有精子。真實之神經性陽萎不罕見。睪丸痛有時係神經衰弱之一常狀。在較重之病。顯變性特徵者尤然。或有男女性顛倒之證據。凡在婦女。卵巢常痛。經期不規則。或患痛經。

治法 本病當以精神療法爲要原因。療法次之。精檢其身體。使知強健無疾。驅除其病的觀念。戒手淫。禁用有害之嗜好品。及刺激神經之食物。（烟酒茶咖啡）宜身心安靜。適當運動。使神經強固。瘦弱者行肥胖療法。Masturb（身心安靜。與多量之食餌。牛乳最良）兼用全身按摩法。然電氣療法。及溫泉療法。有增進疾病之虞。故不宜濫用。內服藥於對症療法。或誘念之目的用之。然無著效。大抵強壯劑及鎮靜劑。（鐵劑。臭素劑。纈草劑。砒劑。規寧。磷等）爲常

用。遺精則用臭素樟腦。神經或偏頭痛則用安知必林劑。不眠則用催眠劑。有時飲用少量之麥酒。能促睡眠。然嗎啡宜用。近時多用臟器療法。卽以罌丸液注射。內服 Spermin 或犢牛腦髓等。

中藥治法 腦及脊髓神經衰弱性者。可用茯神。鹿茸。狗腦。鹿角膠。豬脊髓。龍骨。川斷。杜仲等。

心血管類神經衰弱性者。用龍眼肉。酸棗仁。桂枝。芍藥。甘草。當歸。黃芪。山藥。遠志。潞黨參。浮小麥。柏子仁。大棗。五味子等。

性神經衰弱用雀卵。菟絲子。蒺藜。桑螵蛸。益智仁。蓮肉。覆盆子。仙茅。菴蓉。鎖陽。巴戟。淫羊霍。韭子。蘿藦。羊腎。雄蠶蛾等。

胃及消化系神經衰弱症。請參閱第二集消化系統病篇。一般的用藥如川斷。杜仲。人參。胡桃。茯神。硃砂。牡蠣。地黃。麥冬。胡麻。當歸。甘草。浮小麥。大棗。石斛。牛

膝。杞子。黃肉等滋養強壯鎮靜劑。

要藥略釋 狗腦係脊椎動物。哺乳類犬之腦髓各種物之腦髓均可用。古人主治頭風痺。鼻中瘻肉。下部蠱瘡。蓋本品爲臟器療法之一種。卽以腦補腦之意。大凡動物之腦髓中皆含有內分泌刺激素。能增進人體腦部神經發育及功能。故本品應用於腦脊髓性神經衰弱。頗爲合理。用量三分至五分（低溫乾燥。研細之粉末沖服。或如日常調味法煮食之。

猪脊髓爲脊椎動物。猪。獾。脊柱骨中之骨髓（各種動物之脊髓均可用）爲補益滋養之品。用於脊髓性神經衰弱。腰背痠痛。足膝痿弱。失眠。遺精盜汗等症較爲相宜。用量內服每日約一條。生用取出其中之髓漿沖服。或配合他藥爲丸劑。

浮小麥係禾本科植物之小麥。經水淘汰浮起者。因其祇有麥皮富含乙種維

他命。古來相傳用爲益氣除熱。止自汗盜汗。骨蒸虛熱。婦人癆熱。蓋本品並含麥芽糖。有營養神經。具滋養緩和之作用。 用量一〇・〇——二〇・〇

(二錢至六錢)

松子仁係松杉科。松屬。爲海松之子仁。古來主治風痹寒熱。虛羸少氣。補不足。潤皮膚。肥五臟。王士雄隨息居飲食譜論本品曰。補氣充飢。養液息風。耐飢溫胃。通腸辟濁。下氣香身。最益老人云。蓋本品有滋養強壯之功也。 用量五・

〇——一〇・〇(錢半至三錢)

雀卵係脊椎動物鳥類鳴禽類雀科。雀所產之卵。主下氣。男子陽痿不起。強之令熱。多精有子。蓋本品對於性神經有滋養性強壯之功也。 用量一枚至二枚

菟絲子屬旋花科爲菟絲之子實。本經續絕傷。補不足。益氣力。肥健人。別錄養

肌強陰堅筋骨。主莖中寒。精自出。溺有餘瀝。口苦燥渴。寒血爲積。蓋本品爲性神經之滋養強壯藥。用量五・〇——一〇・〇（錢半至二錢）

桑螵蛸係屬昆蟲類中直翅類螳螂之卵。秋日產卵桑樹上。經日堅凝而成螵蛸。古來用爲固腎益精補虛治遺精陽痿腰痛。用作強壯藥。用量五・〇——一〇・〇（錢半至二錢）

蓮肉屬睡蓮科所結蓮蓬之子。李時珍云。能交心腎。厚腸胃。固精氣。強筋骨。補虛損。和耳目。除寒溼。止脾泄久痢。赤白濁。女人帶下。崩中。治諸血病。蓋本品爲收斂性滋養強壯藥也。用量五・〇——一〇・〇（錢半至二錢）

覆盆子屬薔薇科。覆盆子所結之果實。古來主補虛。續絕。強陰。健陽。益腎臟。縮小便。養精強志。起陽治痿。用爲收斂性之性神經強壯藥。用量五・〇——

一〇・〇（錢半至二錢）

仙茅屬石蒜科。藥用仙茅之地下莖。古人主治心腹冷氣不能食。腰脚風冷攣痹不能行。丈夫虛勞。老人失溺無子。能益陽道。助筋骨。益肌膚。長精神。蓋本品爲興奮性之神經強壯藥。對於性神經似有特著之效能。 用量五・〇——

一〇・〇（錢半至二錢）

鎖陽爲菌類生化之一種。能補陰。益精。潤燥。養筋。治腰膝軟弱。通便。起陰。用作滋養強壯藥。 用量五・〇——一〇・〇（錢半至二錢）

淫羊藿係小蘗科葶草之葉。本經主治陰痿絕傷。莖中痛。利小便。益精氣。強志。別錄堅筋骨。消癭癰。赤瘡。下部有瘡。洗出蟲。丈夫久服令人有子。蓋本品亦爲興奮性之強壯藥。對於性神經衰弱用之有卓效。 用量五・〇——一〇・

〇（錢半至二錢）

韭子屬百合科韭菜之子。陳藏器云。溫中下氣。補虛益陽。止泄血膿。胸膈噎氣。

打撲損傷。止盜汗。遺尿。久痢不止。吐血衄。蓋本品有興奮強壯及收斂消瘀之功也。 用量五。○——一○。○（錢半至二錢）

蘿蘼係屬蘿蘼科。藥用蘿蘼之葉及種子。治虛勞。補益精氣。強陰道。亦用作性腺強壯藥。 用量五。○——一○。○（一錢半至二錢）

羊腎係反芻動物羊屬之罌丸。日華本草云。補腎虛。耳聾。陰弱。壯陽。益胃。止小便。治虛損。盜汗。蓋本品對於生殖器官衰弱疾病之治效。亦爲藏器療法之一種。以腎（外腎精腺）補腎（外腎精腺）之意也。 用量每回一。六——三。三（五分至一錢）用低溫乾燥之粉末或煮食之。

雄蠶蛾卽原蠶蛾。能益精強陰。使交接不倦。亦能止精。蓋本品之性交力甚強。其性腺似特別發達。故用於性神經衰弱。其刺激素甚旺盛。似與其他罌丸卵巢等製劑有同樣之作用也。 用量二具或四具。取蛾之尾部焙乾研末沖服。

或爲丸劑

胡桃屬胡桃科胡桃樹所結之果核。李時珍云。補氣養血潤燥化痰。利三焦。益命門。溫肺潤腸。治虛寒咳嗽。腰脚重痛。心腹痠痛。血痢腸風。損傷氣喘。蓋本品有緩和滋潤營養強壯之功。用量一〇・〇——三三・〇（三錢至一兩）
潞黨參。茯神。鹿茸。鹿角膠。龍骨。川斷。杜仲。龍眼肉。酸棗仁。桂枝。芍藥。甘草。黃耆。當歸。山藥。遠志。柏子仁。大棗。五味子。蒺藜。益智仁。菴蓉。巴戟。硃砂。牡蠣。麥冬。胡麻。石斛。牛膝。杞子。黃肉等均見前。

處方一 甘麥大棗湯（金匱） 甘草一〇・〇（三錢） 大棗四枚 小麥三三三

・〇（二兩）

右三味剉。作一百西煎劑。去渣。一日分兩次溫服。

適應症 婦人臟躁。凡右腋下脅邊拘急有結塊者。（滋養神經緩和鎮靜劑）

處方二 炙甘草湯(傷寒論) 甘草五・〇(錢半) 生薑二片 桂枝二・〇

(六分) 人參五・〇(錢半) 地黃一〇・〇(三錢) 阿膠七・〇

(三錢) 麥冬七・〇(三錢) 麻仁一〇・〇(三錢) 大棗四枚

右九味剉作兩白西西煎劑去渣一日分兩次溫服。

適應症 主治心動悸脈結代肺痿少氣血氣衰弱。(按本方爲滋養強壯劑)

凡心血管性之神經衰弱用之較宜)

處方三 茯苓桂枝甘草大棗湯(傷寒論) 茯苓一〇・〇(三錢) 桂枝二・

〇(六分) 甘草三・〇(九分) 大棗四枚

右四味剉作一百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 主治發汗後臍下悸欲作奔豚者(強壯性緩和鎮靜劑)

處方四 八珍湯(局方) 川芎五・〇(錢半) 芍藥七・〇(二錢) 鱉甲一

○・○(三錢) 茯苓一〇・○(三錢) 人參四・○(一錢二分) 地黃一〇・○(三錢) 當歸七・○(二錢) 白朮七・○(二錢) 甘草四・○(二錢二分)

右九味剉作兩百西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 主治肝脾傷損血氣虛弱惡寒發熱或煩躁作渴或寒熱昏瞶或胸膈不利大便不實或飲食少思腹脹等症(營養強壯劑)

處方五 酸棗仁湯(金匱) 酸棗仁一〇・○(三錢) 甘草三・○(九分)

知母七・○(二錢) 茯苓一〇・○(三錢) 川芎五・○(錢半)

右五味剉作一百西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 主治虛勞煩躁奔氣在胸中不得眠(滋養鎮靜劑)

處方六 歸脾湯(濟生) 當歸七・○(二錢) 白朮七・○(二錢) 茯苓一

○●○三錢 黃耆七●○三錢 龍眼肉四枚 酸棗仁一○●

○三錢 遠志五●○(錢半) 木香四●○(二錢二) 人參四●○

(二錢二) 甘草三●○(九分)

右十味剉作二百西西煎劑去渣一日分二次溫服。

適應症 主治思慮過度勞傷心神健忘怔忡(神經系之營養強壯劑)

處方七

牛髓補虛丸(外方) 牛髓 鹿髓 羊髓 酥即牛羊乳合煉取之油

棗肉研爲脂 各三三二●○(一兩) 生地黄一七○●○(五兩) 切酒二百

西酒清三宿出暴還內酒中取盡暴乾 人參四●○(二錢二) 桂心○●○(二分) 茯苓

三三二●○(一兩) 乾薑一○●○(三錢) 白朮一七●○(五錢)

芎藭一七●○(五錢) 甘草五●○(錢半)

右十四味研搗細內五髓中微火煎攪糊爲丸如梧子大初服二十九加至四

十九日再服開水下。

適應症 療脾氣勞損。消瘦。四肢不舉。毛悴色夭。（按本方爲藏器療法之補腦強壯劑。用於腦脊髓性之神經衰弱症較宜）

處方八 安肝定驚丸（外台） 茯苓一〇・〇（三錢） 遠志七・〇（二錢）

防風五・〇（錢半） 人參四・〇（一錢二） 柏子仁一〇・〇（三錢）

龍骨一〇・〇（三錢） 牡蠣一〇・〇（三錢） 大棗肉四枚 甘草

二・〇（六分）

右九味剉。作二百西西煎劑。去渣。一日分兩次溫服。（若作丸藥則各藥用量宜十倍之。以蜜和丸如梧子大。每服三十九丸開水下。日再服）

適應症 療肝勞熱。恐畏不安。精神不守。悶怒不能獨臥。感激惆悵。志氣錯越。不得安（滋養強壯性鎮靜劑）

處方九

香茸圓(本事方)

鹿茸二〇・〇(六錢)

熟乾地黃六七・〇(二兩)

附子 菴蓉

破故紙

當歸各三三・〇(一兩)

沉香一七・

〇(五錢) 麝香

研勻煉蜜杵圓如梧子大每服五十丸空心鹽湯

下

適應症

補腎(興奮強壯劑)性神經極度衰弱者可用

處方十

正心湯(醫統)

當歸七・〇(二錢)

茯苓一〇・〇(三錢)

地黃

一〇・〇(三錢)

羚羊角二・〇(六分)

甘草三・〇(九分)

棗仁

一〇・〇(三錢)

遠志七・〇(二錢)

人參四・〇(二錢二)

右八味剉作二百西煎劑去渣一日分二次溫服

適應症

主治七情五志久逆心風妄言妄笑不知所苦(營養強壯鎮靜鎮

瘵劑)

(十九) 希司忒利阿 舊稱藏躁心風等

病原 本病係多青年女子所患之一種病症。病者以一時之情感操縱其身體。而致精神感覺運動。分泌諸官能俱紊亂。又精密言之。此係感應性(受倡導性) Suggestibility 過強或顛倒所致。之人性的擾亂。性質改變。並具某種精神上及身體上。因自動的或被動的倡導所致之病象。而得因勸導治癒之病。自希臘人臆側此病係子宮之遊行(浮動)及不甚明瞭之他患所致。而據之以名為希司忒利阿(希司忒利克司即子宮之義)以來。醫界對於此病之病原頗有互相對之理論。夏科氏 Charcot 與其生徒以為此病係精神病。而其病情係自己之意思所致。病者之有應從倡導 Suggestion 之能力。即係精神作用之確據。蓋係人性之一種擾亂。即其情感對於感覺運動及分泌諸官能。有格外激動之勢力也。巴斌司克氏 Binns 之理論。略與上述者不同。彼以

爲此病係一種精神情狀之有若干原發現象及若干繼發性意外的症狀者。前者之要素卽係該現狀可由倡導（又可曰擬摹）而使之發生。又可由勸導（又可由勸誘）Persuasion 使之消滅。原發症狀例如偏身麻木、偏癱、攣縮等是。繼發狀例如肌萎縮是。係直接由原發現狀所致。而非倡導所能使之發生者。至於弗羅伊德氏 Freud 之理論之要旨。則係以爲此病之來源皆由幼稚時代。男女性慾之顛倒。惟此性慾之顛倒。不至發育之際。大抵不致明定之神經系統官能病。男女性慾之經驗似乎與尋常他種經驗有異。後者有逐漸消滅之趨向。而前者則因男女發育成熟而增生。於是因時時增生之反動力而於不知覺之間。成一種不均式的能力。此卽致病之原因也。質言之。弗氏之理論卽昔日希臘人之意見之一種新解說。而以爲希司忒利阿畢竟是一種男女性紊亂之病也。此病婦女最多患之。當在發育之際發端。而其發顯或持續。

至經絕期。更有持續至老年者。男人亦難免患此。因男子患希司忒利阿者。固非罕見也。無論何民族。均有患之者。而拉丁人尤盛行之。其劇烈之類。尤然在英美中三國。輕類較多。至於重類。則較法國爲少。十二歲以前之小兒。不常患此。然間有在五六歲之際。已甚昭着者。至於素因。則有二要端。(一)遺傳。(二)教育。前爲使小兒有易動而過敏之神經系統組織。有昭着之神經系統病趨向之家族。最多見此病。而其家人每每患各種神經系統官能病。後者則其惡因在家庭之教育。每每不能反復教導自制之習慣。蓋兒童每因是。迨垂髫之年。而其交際之觀念完全誤謬。一舉一動。皆須順一己之意。稍有失望。亦望飽受他人之同情。及至發育以後。則其道德力。竟不能與每日應受之思慮憂勞相抵抗。至於在學校內。當十二至十五歲間。全身之生活力。專注於身體發育。而爲一生最要之時期。乃爲預備考試之故。致每日跼促於教室。六或八句鐘。

之久。其結果遂致內具活潑明敏之精神。而外被孱弱之身體。對於應盡之能力。既不能有相配之應用。又易於受擾。且對於人生尋常之激刺。亦有生過度的反動力之趨向。至於較直接之勢力。則係各種情感。卽如驚恐（此較少見）愛情。憂慮。或家事煩勞等是。體格上的原因之激起。希司忒利阿發作者較少。然有時或直接隨受外傷而起。或在急性病之漸癒期內發顯。或與生殖器病伴發。

症狀 本病症狀可分爲驚厥類及非驚厥類二者。

(一)驚厥性希司忒利阿 Convulsivellystexia (甲)輕類 Minor forms 此其發作常繼情感受擾而發。或突起。或先顯症狀。如乍哭乍笑。或頸部有收窄感覺。或咽喉內覺有球上行等是。間或驚厥之前。骨盆腹胸諸部。或作痛。據病者之陳述而論。此等感覺頗似癩癩兆。此等感覺及咽喉內之球上升及呼吸艱難。

漸增重。於是病者遂忠或輕或重之驚厥。病者跌倒時。不似癲癇者之驟突。常能自擇狀榻或大椅等。合宜之處倒下。且驚厥時之舉動。似能知自防受傷。但同時其知覺。似乎完全喪失。動狀屬陣痙性而不規則。頭及臂亂動。數分鐘後。驚厥陣緩緩退去。而病者又入情感勃發（交拚）之境。知覺逐漸復原。苟加詢問。病者或自認略知驚厥時之經過。但常不靈清。當驚厥時。腹或充氣。繼則或下清尿甚多。此等發作。其特殊性。大有異同。有時四肢幾不蠕動。在神經系統暴亂後。顯懶慢相。病者入一種昏沉而知覺半失之境。甚難喚醒。有時由此狀態而成所謂強直性昏厥情況（*Cataleptic condition*）（*N*）重類又名癲癇性希司忒利阿（*Major forms Hystero-epilepsy*）在英美二國罕見。此病的標準類發作時。每先有若干前驅狀。此則大抵係輕希司忒利阿之呈顯。即愚笨或不規則之行爲。燥動。或顯消化不良及氣膨。小便頻數等是。際此身體之感覺過

敏區或甚顯著。此區常係對稱性。後面者在上段脊椎背。而前面則在胸及腹。而其最昭著者。則在卵巢之上。驚厥之先。常自覺痛或覺壓。並覺咽喉內有球上行。此驚厥陣可分四期。(一)癲癇樣期 Epileptoid stage 此與真癲癇極類似。顯強直性。猝斃磨牙。面充血。而繼以陣痙性驚厥。逐漸弛緩。以至於昏迷。

(二)醜態期 Clownism stage 病者情感勃發。而身體作捧曲或強直(僵厥)之姿勢。(三)感情期 Stage of passions 若係標準類。則由第二期而入此期。病者故作若干態度。以表明心內之情感。如狂喜。恐怖。慶幸。愛慕等。是病者際此。每自述其幻覺之事。似頗莊重。且以惡事責備他人。此甚可虞。蓋病者不僅在發作時。自信其所述之幻覺為真。有時發作退去後。其幻想仍持續也。有時發作之後。病者或持續昏迷數日。

(二)非驚厥性希司忒利阿 Non-convulsive Hysteria 希司忒利阿之臨診狀

非常複雜而且各異。今就受擾之系統而論。其呈顯如下。(甲)運動受擾。

癱瘓。此爲偏癱或截癱或單癱不定。希司忒利阿性兩側癱瘓罕見。癱之發端或驟突。或徐漸。間有須數星期之久始完全發生者。凡各類機質病性癱瘓。皆有與希司忒利阿相似之處。患側之感覺或減少。或喪失。希司忒利性截癱。較其偏癱多。然其肌力之喪失非完全。其腿大抵能動。惟不能支撐病者而使之站立耳。反射或加增。而膝反射多如常。有時或顯假踝陣痙。足常直伸而轉向內。肌不萎縮。電性反應亦不異常。他種情狀。例如膀胱癱及無發音能。每與希司忒利阿性截癱伴顯。希司忒利阿性單癱或顯於面或股或肱不定。其濟失調情況。有時隨癱而顯。且或甚昭著。感覺症狀亦常有。下列諸點爲區別。偏癱屬於官能性抑或機質性之要項。凡無腹上部反射及提舉丸反射而有巴彬斯奇氏徵者。可認機質病。倘病人斂手於胸際而欲自仰臥姿勢變作坐勢。

則患側之股腕處屈曲而全肢舉起。繼則落下。此亦非官能性病所有之病象。其他試驗宜令病人仰臥而爲之。使病人舉起。其不受患之腿肘。對側隨意動作力已癱之腿。必猛然下壓。攣縮及痙攣 *Contractures and spasm* 無論何羣。隨意肌類。幾盡能受希司忒利阿性攣縮之累。屬僞癱性或截性或單癱性。不定。發端或驟突或徐漸。更有持續數月甚至數年。而後迅速退去者。最常攣縮之處爲臂。卽肘關節及肘腕關節。屈而四指緊握。其拇指手掌內。間或指之本節過伸。腿之受累。或一側或兩側不定。但一側者較多。踝陣痙每呈顯。足內向而趾甚屈。此類或誤認爲脊髓側柱硬化。有時極難區別。患希司忒利阿者之痙攣性步態。甚有標準性。加以膝反射及踝陣痙之加增。可認爲特殊性狀。他類攣縮或顯於髓肩或頸之肌。而顯於頷及股諸肌者較少。而其奇特者。則爲膈肌及腹肌之局部性攣縮。致成一假瘤。位於臍下附近之處。而堅硬與真

瘤相似。高耳氏以爲此係腹直肌弛緩。膈之痙性攣縮。腸充氣。脊柱前凸諸狀合併所成。四五十歲之婦女。當月經將絕之際。有患此假瘤之趨向。且多與假孕之症狀伴顯。有時此瘤酷似真癌。故卽極有能力之診斷家。亦或誤認爲真瘤。唯一可靠之診斷法。係使病者完全麻醉。則瘤卽自行消退。震顫。此或係單純的希司忒利阿性症狀。或獨顯。或與癱及攣縮伴顯。最常顯於手及臂。頭及腿顯之者較少。顫狀微而速。(乙)感覺受擾。感覺喪失係最常見之狀。而常以體之一側爲限。此等麻木病者或不自知。常以體之中線爲界。昭然有定。不竄過中線之他側。而累及粘膜面及深組織。然結合膜多不受累。眼或顯偏盲。此或徐漸呈顯。或隨驚厥發作而起。有時各類感覺或分離而喪失。而其喪失者。或僅痛覺及觸覺。患側之皮常色白而冷。以針刺之。或無血隨之而出。有時肌力之喪失。或隨感覺喪失而顯。有時此等感覺喪失。或痛覺喪失。可

因施行金屬療法（即敷某種金屬）此非該物實有遷移之効。蓋因倡導之感使之然也。感覺過敏。體之各處皆或能顯感覺過敏或痛覺。其最常見之患係頭痛。此痛常在囟縫處。在枕處者較少。病者每自謂酷痛。彷彿如被釘。極難忍受。神經痛亦常見。感覺過敏區乃在胸及腹之皮上。若此區受捫。或致顯輕希司忒利阿狀。甚或致驚厥發作不定。卵巢部亦或感覺過敏。但此非希司忒利阿病之特狀。背痛幾常爲希司忒利阿性病者所有。其敏感性或限於數脊骨後突。或汎佈。希司忒利阿性女子之腹痛。或與胃神經痛或胃潰瘍頗相似。且更有與腹膜炎幾無異者。而其病狀與闌尾炎酷似者。則較少見。特別感覺。味覺及嗅覺之受擾。不爲罕見。或致頗受困苦。眼症狀以視網膜之感覺過敏爲最常見。而病者每喜居暗室。視野減小亦常有。每隨驚厥發作後而起。此或纏綿數年。辨色力或如常。即使顯完全性麻木者亦或然。希司忒利阿性

聾。或屬完全性。而或與希司忒利阿性盲輪替發顯。或與之同顯不定。希司忒利阿性黑矇。有時小兒患之。對於此類病者。必須辨明其爲官能性失力。抑爲僞病。(丙)內臟症狀 (一)呼吸器 呼吸節律受擾。其最常見者大約係深呼吸過度。常例每五或六次呼吸之中。有一次過度之深呼吸或激吸。(例如突然被冷水淋背時之噉然深吸是也) 有時喉肌或瘳攣而兼吸氣必大用力而甚困苦。甚或致皮發紺。呃逆及或作呃逆樣聲者有之。或纏綿數星期或數月。最奇異之呼吸狀。爲希司忒利阿性喊叫。此或有效獸聲者。如犬吠貓叫。豕哼等是。又有頻頻呵欠。或噴嚏者。希司忒利阿性咳嗽。係常見之狀。而在少女尤然。此咳或屬陣發性。然以乾而纏綿與蛙聲相似者爲多。有一類希司忒利阿性咯血。或致誤認爲肺癆。咳出之痰作紅色液。不似尋常咯血者之鮮紅。內有食物碎塊。鋪磚狀上皮。赤血球及球菌等物。然無圓柱狀上皮及細毛上

皮。此大約係由口及咽而出。(二)消化器 食慾受擾。消化不良及胃痛係此病所常有。病者或吞咽困難。似因食管痙攣而致。亦有食物在未達胃時即被逼出者。更有乾嘔不休者。凡希司忒利阿性嘔吐。其食物之嘔出。既不須用力。亦無惡心。此狀或纏綿數年而不致滋養大受擾。希司忒利阿所顯奇特之消化受擾即神經性厭食 *anorexia nervosa* 其患之者食慾盡失。似永久不能再食者然。由是漸成一種厭惡食物之心。而其較劇烈者甚至一見食物即發痙攣。乃此等病人有不進食物頗久而能生存者。神經性厭食有三特狀。(一)一種精神情狀 此最重要。常係憂鬱。間或躁動不寧。然此非希司忒利阿必有之狀。(二)胃症狀 此係食慾喪失。迴食嘔吐及神經性消化不良所顯之各狀。(三)消瘦 除癌痢二患外。無如此消瘦之甚者。曾見一少女。死時體重竟剩四十九磅。剖屍檢驗。絕無損害可以察見。希司忒利阿性氣臟。係一

常見之狀。大抵因膈之強直性攣縮及他腹肌之縮短所致。有時或兼腸蠕動不寧。大便自遺。多因大腸或小腸受擾而致。若干希司忒利性病人患一種頑梗之腹瀉。甚難療治。而尤以一進食物立即泄瀉者爲常見。此或係許多神經薄弱者所顯。一受情感或一進食物即行作瀉者之劇烈之類。另有一類。與上述者迥異。係因直腸之易受激惹性而致。病人頻瀉糞團。有時極兇烈。惟大便祕結者尤爲常見。此或因對於排糞失注意。或痙攣而致不定。極重之類。甚或有經二三期之久而無大便秘者。此外則肛門痙攣或直腸內大痛亦時有之。但此痛非因腸裂而致。(丁)關節病患。常例此痛每在膝或髓。或繼輕微之傷害而起。受累之關節常患固定不動。易覺痛。且腫脹。皮之表面冷。然有時局部之溫度增加。觸痛甚昭著。運動時每致大痛。病起既久。則關節周圍之肌消瘦。於是外觀反似關節過大。痛多在夜間。痛時皮之溫度大增。此等神經官

能性關節病雖大抵可用合宜之治法療愈。然機質性改變之繼。此官能性受擾而起者。固亦有之也。間發性關節水腫或爲希司忒利阿病之一狀。(患此除膝關節或他關節不定)有兼顯暫性癱者。(戊)精神症狀。希司忒利阿性病人之患各種精神顛倒或錯亂者常見。故對於病者之所陳述。無論關於自己或他人者。皆不可過信。有時此類病者因欲激動他人之同情。乃致有各類可駭可笑之行爲。幻覺及譫妄或與甚劇烈之情感陣替而顯。有一種情況。可名爲希司忒利阿狀。病人或數星期或數月昏睡不起。對於各事毫不知覺。所顯之譫妄與震顛性譫妄相似。而尤以其幻見可厭惡之蟲獸爲然。滋養或不受擾。但口臭常惡劣。苟靜養並細心看護。三四月之內。常可治癒。當此情況發作時及漸癒期內。病者之看護。必須日夜注意。蓋有自殺之趨向者不少也。

治法 本病之療法。有三大要項。(一)催眠術。大多數病人可受催眠術。

但用催眠術治癒此病者不多見。僅有時有效。(1)倡導法 Suggestion 倡導法者。係使病者之精神情況或聯合成改易。以至於改良之紹介法也。苟用之適當。功效非常偉大。且尤以病者一心信賴時爲有效。例如施詳細而具同情之察驗。並試驗癱肢之電性反應畢。卽對病者倡導曰。「汝之肢已能動」或不必更用他法。病者卽或能動其肢。有時用嚴重有威之命令。亦能使有同樣之效果。(2)重行教育法 Re-education 凡對於希司忒利阿性病人或神經衰弱者。宜以此法爲療治之目的。然須知此法有時不易辦到。苟醫士能耐性按序行之。多能獲效。其要點在使病者離開家族戚友。而由一靈敏之看護者看護。病者之身體情況。須詳細研究。每日之起居。必須有嚴厲之定則。最初僅宜飲牛乳。每日六或八水磅。逐漸增至十至十二水磅。迨病者漸漸進步。而體重加增。依次漸換用他類食物。此後則體重或速增。而腹內各症狀亦退。

按摩、沐浴及電療法俱宜佐用。但療法之功用，每有恃乎醫士之機變。（知趨）忍耐及性格，醫士之性格較所用之治法尤要。病者之精神情況，必須詳細研究，然後用文字、書籍、言論、講解等開導其思想，以期改良病者之缺點。其他又有一種水療法。此法大有裨益，而尤以濕布裹法、鹽水浴及灌溉諸法爲有效。砒鐵等補藥類或效，而尤以對於病人之神經薄弱及貧血者爲然。鎮靜藥類少見效，間或須用溴鹽以治不寐，但宜先試各類治法，苟無效，始可用藥。尋常睡時用濕布裹法，無論在熱在常有效。

按本病之症狀及病原，頗與癩癩及神經衰弱症相類似，故中藥之對症療法，亦不能出該項範圍之外。可參閱前兩篇之治法。至於本病所激發之呼吸系病及消化系病者，均請參閱第二集消化系及第三集呼吸系病篇。又本病若呈驚厥性狀症候者，可用龍骨、牡蠣、茯神、硃砂、琥珀、玳瑁、鉛丹、桂枝、白芍、龍齒。

石決明、甘松、柴胡等。

一般的滋養性安神鎮靜劑，如菟絲、山藥、當歸、棗仁、柏子仁、遠志、龍眼、巴戟天、菴蓉、阿膠、蓮肉、合歡皮等。

要藥略釋 柴胡屬繖形科。藥用柴胡之根與莖葉。別錄療傷寒心下煩熱。諸痰熱結實胸中邪氣。五臟間遊氣。大腸停積。水脹及濕痺拘攣等。蓋本品爲清涼性解熱消炎藥。能疎導淋巴並緩解生理機能之亢進。間接而使神經興奮歸於沉靜。 用量五・〇——一〇・〇（錢半至三錢）

合歡皮屬荳科。藥用合歡樹之幹皮。主安五臟和心志。令人和合歡樂無憂。本草經疏治脾虛心氣躁急。能補心脾生血脈云。蓋本品爲緩和強壯藥。對於神經之虛性興奮有滋養而兼鎮靜之功。 用量五・〇——一〇・〇（錢半至三錢）

龍骨、牡蠣、茯神、硃砂、琥珀、玳瑁、鉛丹、桂枝、白芍、龍齒、石決明、甘松、菟絲子、山藥、當歸、棗仁、柏子仁、遠志、龍眼肉、巴戟、菴蓉、阿膠、蓮肉等均見前。

處方一

桂枝加龍骨牡蠣湯(傷寒論)

桂枝二・〇(六分)

芍藥七・〇(二

錢)

生薑二片

大棗四枚

龍骨一・〇

・〇(三錢)

牡蠣二・〇

〇(六錢)

甘草二・〇(六分)

右七味剉作兩百西西煎劑去渣一日分兩次溫服。

適應症

主治因燒針煩躁胸腹有動氣者(緩和鎮靜劑)

處方二

茯神散(和漢藥考)

茯神一・〇

・〇 柏子仁一・〇

・〇(三錢)

酸

棗仁七・〇

・〇(二錢)

黃耆七・〇

・〇(二錢)

人參四・〇

熟

地黃一・〇

・〇(三錢)

遠志五・〇

・〇(錢半)

五味子二・〇

・〇(六分)

右八味剉作兩百西西煎劑去渣一日分兩次溫服。

適應症

治膽虛不得睡。神志不足。(滋養強壯鎮靜劑)

處方三

茯菟丹(局方) 茯苓一〇〇・〇(三兩) 菟絲子一七〇・〇(五兩)

蓮肉六七・〇(二兩) 五味子六七・〇(二兩) 山藥一七〇・〇

右五味研細末酒糊丸如梧子大。每服三十九。淡鹽湯送下。日再服。

適應症

治思慮太過。心神虛損。真元不固。便溺餘滴。白物夢遺。(強壯性滋

養神經劑)

處方四

鉞砂湯(原南陽) 鉞砂七・〇(二錢) 牡蠣三三・〇(二兩) 茯苓

一〇〇・〇(三錢) 桂枝二・〇(六分) 人參四・〇(一錢三)

三・〇(九分) 蒼朮五・〇(錢半)

右七味剉。作兩百西西煎劑。去渣。一日分兩次溫服。

適應症

主治虛悸短氣眩暈虛煩並黃胖。(強壯補心鎮靜劑)

處方五

奔豚湯(金匱) 半夏七・〇(二錢) 葛根五・〇(錢半) 芍藥七・

〇(三錢) 當歸七・〇(三錢) 川芎五・〇(錢半) 李根白皮一〇

・〇(三錢) 黃芩七・〇(三錢) 甘草二・〇(六分) 生薑二片

右九味剉，作兩百西西煎劑，去渣，一日分兩次溫服。

適應症 主治奔豚氣(用於歇斯的里性腹內動悸衝逆症)

處方六 治肝虛內熱湯(彙言) 羚羊角一・〇(三分) 半夏七・〇(二錢)

當歸七・〇(二錢) 防風五・〇(錢半) 天麻七・〇(二錢) 茯

苓一〇・〇(三錢) 酸棗仁一〇・〇(三錢) 人參四・〇(二錢二)

白朮五・〇(錢半) 鉤藤一〇・〇(三錢)

右十味剉，作兩百西西煎劑，去渣，一日分兩次溫服。

適應症 主治肝虛內熱、時驚惕夢魘、狂怒搖擗、或大人中風、小兒驚風、及五

癩、人事狐惑、一切精神昏亂、失靈等症治之。(本方爲鎮痙鎮靜劑。適用於驚厥性之希斯忒利亞症)

處方七

竹茹溫膽湯(壽世)

柴胡五・〇(錢半)

橘皮五・〇(錢半)

半

夏七・〇(二錢)

竹茹五・〇(錢半)

茯苓一〇・〇(三錢)

莎

草(卽香附)七・〇(二錢)

枳實七・〇(二錢)

黃連二・〇(六分)

人參四・〇(一錢三)

桔梗七・〇(二錢)

麥冬七・〇(二錢)

甘草三・〇(九分) 生薑二片

右十三味。剉作兩百西西煎劑。去渣。一日分兩次溫服。

適應症

主治傷寒日數過多。其熱不退。夢寢不安。心神恍惚。煩躁痰多不解。

者。(本方爲祛痰健胃劑。用於神經衰弱性兼病痰飲者)

近世內科國藥處方集第五集終

