

包氏醫宗

第二集 第一卷
雜病論章節

雜病論章節目錄

- | | |
|---------------|--------------|
| 第一篇 藏府經絡先後病 | 即內外婦人科診斷治法總論 |
| 第二篇 痰溼喝病 | 即軀壳三陽病 |
| 第三篇 百合狐惑陰陽毒病 | 即藏府三陰病 |
| 第四篇 瘧病 | 即陰陽氣血病 |
| 第五篇 中風歷節病 | 即衛氣病 |
| 第六篇 血痺虛勞病 | 即營血病 |
| 第七篇 肺痿肺癰咳嗽上氣病 | 即肺藏病 |
| 第八篇 奔馳氣病 | 即腎藏病 |
| 第九篇 胸痺心痛短氣病 | 即心藏病 |
| 第十篇 腹滿寒疝宿食病 | 即脾藏病 |
| 第十一篇 五藏風寒積聚病 | 即全體病 |

第十二篇 痰飲咳嗽病	卽上焦病
第十三篇 消渴小便不利淋病	卽下焦病
第十四篇 水氣病	卽中焦病
第十五篇 黃疸病	卽膽府病
第十六篇 驚悸吐衄下血胸滿瘀血病	卽肝藏病
第十七篇 嘘吐噦下利病	卽胃腸病
第十八篇 瘡癰腸癰浸淫病	卽皮膚肌肉外科血潰病
第十九篇 跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲病	卽經絡筋骨外科氣結病
第二十一篇 婦人妊娠病	論五藏血氣病
第二十二篇 婦人產後病	論六經三焦病
第二十三篇 婦人雜病	論五藏特殊病

雜病論章節

漢醫聖張仲景先師原文

男天白參校

閩杭包一虛識生氏分例

孫應申校字

臟腑經絡先後病脈證篇第一

第一章 雜病治法總論

第一節 脏腑病治法總論

問曰。上工治未病。何也。師曰。夫治未病者。見肝之病。知肝傳脾。當先實脾。四季脾旺不受邪。卽勿補之。中工不曉相傳。見肝之病。不解實脾。惟治肝也。夫肝之病。補用酸。助用焦苦。益用甘味之藥調之。酸入肝。焦苦入心。甘入脾。脾能傷腎。腎氣微弱。則水不行。水不行。則心火氣盛。則傷肺。肺被傷。則金氣不行。金氣不行。則肝氣盛。則肝自愈。此治肝補脾之要妙也。肝虛則用此法。實則不在用之。經曰。虛虛實實。

補不足。損有餘。是其義也。餘臟準此。

第二節 經絡病治法總論

夫人稟五常。因風氣而生長。風氣雖能生萬物。亦能害萬物。如水能浮舟。亦能覆舟。若五臟元真通暢。人卽安和。客氣邪風中人多死。千般疢難。不越三條。一者、經絡受邪。入藏府爲內所因也。二者、四肢九竅。血脈相傳。壅塞不通。爲外皮膚所中也。三者、房室金刃蟲獸所傷。以此詳之。病由都盡。若人能養慎。不令邪風干忤經絡。適中經絡。未流傳藏府。卽醫治之。四肢纔覺重滯。卽導引吐納。鍼灸膏摩。勿令九竅閉塞。更能無犯王法。禽獸災傷。房室勿令竭乏。服食節其冷熱。苦酸辛甘。不遺形體有衰。病則無由入其腠理。腠者是三焦通會元真之處。理者是皮膚藏府之文理也。

第二章

望色

問曰。病人有氣色見於面部。願聞其說。師曰。鼻頭色青。腹中痛。苦冷者。死。鼻頭色微黑者。有水氣。色黃者。胸上有寒。色白者。亡血也。設微赤非時者。死。其目正圓者。瘡。不治。又色青爲痛。色黑爲勞。色赤爲風。色黃者。便難。色鮮明者。有留飲。

第三章 聞聲

第一節 辨腎氣

師曰。病人語聲寂寂然。喜驚呼者。骨節間病。語聲喑喑然。不徹者。心隔間病。語聲啾啾然。細而長者。頭中病。

第二節 辨肺氣

師曰。息搖肩者。心中堅。息引胸中上氣者。欬。息張口短氣者。肺痿吐沫。

第三節 辨三焦之氣

藥病章節
師曰。吸而微數。其病在中焦實也。當下之。則愈。虛者不治。在上焦者。其吸促。在下焦者。其吸遠。此皆難治。呼吸動搖振振者。不治。

第四章 切脈

第一節 辨四時脈

師曰。寸口脈動者。因其王時而動。假令肝王色青。四時各隨其色。肝色青而反色白。非其時色脈。皆當病。

第二節 辨氣候遲早不及太過

問曰。有未至而至。有至而不至。有至而不去。有至而太過。何謂也。師曰。冬至之後甲子夜半少陽起。少陽之時。陽始生。天得溫和。以未得甲子。天因溫和。此爲未至而至也。以得甲子。而天未溫和。爲至而不至也。以得甲子。而天大寒不解。此爲至而不去也。以得甲子。而天溫如盛夏五六月時。此爲至而太過也。

第三節 辨前表後裏

師曰。病人脈浮者在前。其病在表。浮者在後。其病在裏。腰痛背强不能行。必短氣而極也。

第四節 辨陰厥陽厥

問曰。經云厥陽獨行。何謂也。師曰。此爲有陽無陰。故稱厥陽。

問曰。寸脈沉大而滑。沉則爲實。滑則爲氣。實氣相搏。血氣入藏卽死。入府卽愈。此爲卒厥。何謂也。師曰。唇口青身冷。爲入藏卽死。如身和汗自出。爲入府卽愈。

問曰。脈脫入藏卽死。入府卽愈。何謂也。師曰。非爲一病。百病皆然。譬如浸淫瘡。從口起流向四肢者。可治。從四肢流來入口者。不可治。病在外者。可治。入裏者。卽死。

第五章 問症

問曰。陽病十八。何謂也。師曰。頭痛項腰脊臂脚掣痛。陰病十八。何謂也。師曰。欬上氣喘噦咽腸鳴脹滿心痛拘急。五藏病各有十八。合爲九十病。人又有六微。微有十八病。合爲一百八病。五勞七傷六極。婦人三十六病。不在其中。清邪居上。濁邪居下。大邪中表。小邪中裏。穢飪之邪。從口入者。宿食也。五邪中人。各有法度。風中於前。寒中於暮。溼傷於下。霧傷於上。風令脈浮。寒令脈急。霧傷皮腠。溼流關節。食傷脾胃。極寒傷經。極熱傷絡。

第六章 治法

第一節 治表裏之先後

問曰。病有急當救裏救表者。何謂也。師曰。病醫下之。續得下利清穀不止。身體疼痛者。急當救裏。後身疼痛。清便自調者。急當救表也。

第二節 治舊疾新病之先後

夫病痼疾。加以卒病。當先治其卒病。後乃治其痼疾也。

第三節 治病當審病人之喜惡

師曰。五藏病各有所得者愈。五藏病各有所惡。各隨其所不喜者爲病。病者素不應食。而反暴思之。必發熱也。

第四節 治病當究其源

夫諸病在藏。欲攻之。當隨其所得而攻之。如渴者。與猪苓湯。餘皆倣此。

痙溼渴病脈證篇第二

第一章 痉 痘

第一節 剛痙

太陽病。發熱、無汗、反惡寒者。名曰剛痙。

第二節 柔痙

太陽病。發熱、汗出、而不惡寒者。名曰柔痙。

第三節 辨傳經

太陽病。發熱、脈沉而細者。名曰痙。爲難治。

第四節 發汗傷表致痙

太陽病。發汗太多。因致痙。

第五節 攻下傷裏致痙

太風病。下之則痙。復發汗。必拘急。

第六節 汗傷營致痙

瘡家。雖身疼痛。不可發汗。汗出則痙。

第七節 汗傷衛致痙

病者。身熱、足寒、頸項強急、惡寒、時頭熱、面赤、目赤、獨頭動搖、猝口噤、背反張者。痙病也。若發其汗者。寒溼相搏。其表益虛。卽惡寒甚。發其汗已。其脈如蛇。暴腹脹大者。爲欲解。脈如故。反伏弦者。痙。

第八節 痙病順脈

夫痙脈。按之緊如弦。直上下行。

第九節 痙病逆症

痙病。有灸瘡。難治。

第十節 痙病營虛治法

太陽病。其證備。身體強。几。然。脈反沉遲。此爲痙。括樓桂枝湯主之。

第十一節 痘病衛實治法

太陽病。無汗。而小便反少。氣上衝胸。口噤不得語。欲作剛痙。葛根湯主之。

第十二節 痘病營衛俱實治法

痙爲病。胸滿。口噤。臥不着席。脚攣急。必齦齒。可以大承氣湯。

第二章 溼病

第一節 溼病內症

太陽病。關節疼痛。而煩。脈沉而細者。此名中溼。亦名溼痺。溼痺之候。小便不利。大便反快。但當利其小便。

第二節 溼病外症

溼家之爲病。一身盡疼。發熱。身色如熏黃也。

第三節 溼病誤下傷陰壞症

溼家。其人但頭汗出、背強、欲得被覆向火。若下之早、則嘔。或胸滿、小便不利、舌上如胎者。以丹田有熱。胸上有寒。渴欲得飲。而不能飲。則口燥、煩、也。

第四節 溼病誤下傷陽死症

溼家。下之。額上汗出、微喘、小便利者、死。若下利不止者、亦死。

第五節 治溼宜微汗

風溼相搏。一身盡疼痛。法當汗出而解。值天陰雨不止。醫云。此可發其汗。汗之病不愈者。何也。蓋發其汗。汗大出者。但風氣去。溼氣在。是故不愈也。若治風溼者。但微微似欲汗出者。風溼俱去也。

第六節 衛溼

溼家病。身疼、發熱、面黃、而喘。頭痛、鼻塞、而煩。其脈大。自能飲食。腹中和無病。病在頭中寒溼。故鼻塞。內藥鼻中。則愈。

第七節 營溼

溼家。身煩疼。可與麻黃加朮湯。發其汗爲宜。慎不可以火攻之。

第八節 實溼

病者。一身盡疼、發熱、日晡所劇者。此名風溼。此病傷於汗出當風。或久傷取冷所致也。可以麻黃杏仁薏苡甘草湯。

第九節 虛溼

風溼。脈浮、身重、汗出、惡風者。防已黃芪湯主之。

第十節 表溼

傷寒八九日。風溼相搏。身體疼、煩、不能自轉側。不嘔、不渴、脈浮虛、而濇者。桂枝附子湯主之。若大便堅、小便自利者。去桂枝加白朮湯主之。

第十一節 裹溼

風溼相搏。骨節疼煩、掣痛。不得屈伸、近之則痛劇。汗出、短氣、小便不利、惡風不欲去衣、或身微腫者。甘草附子湯主之。

第三章 暑病

第一節 喝病脈證及禁誤
太陽中喝。發熱、惡寒、身重、而疼痛。其脈弦細芤遲。小便已、洒洒然毛聳。手足逆冷。小有勞、身卽熱。口開、前板齒燥。若發其汗、則惡寒甚。加溫鍼、則發熱甚。數下之、則淋甚。

第二節 燥喝

太陽中熱者。喝是也。汗出、惡寒、身熱、而渴。白虎加人蔘湯主之。

第三節 溼喝

太陽中喝。身熱、渴重。而脈微弱。此以夏月傷冷水。水行皮中所致也。一物瓜蒂湯主之。

百合狐惑陰陽毒病脈證篇第三

第一章 百合病

第一節 百合病總論

論曰。百合病者。百脈一宗。悉致其病也。意欲食、復不能食。常默然、欲臥不能臥。欲行不能行。飲食或有美時。或有不欲。聞食臭時。如寒無寒。如熱無熱。口苦。小便赤。諸藥不能治。得藥則劇。吐利、如有神靈者。身形如和。其脈微數。每溺時頭痛者。六十日乃愈。若溺時頭不痛。漸浙然者。四十日愈。若溺快然。但頭眩者。二十日愈。其證或未病而預見。或病四五日而出。或二十日。或一月後見者。各隨證治之。

第二節 百合病汗後治法

百合病。發汗後者。百合知母湯主之。

第三節 百合病下後治法

雜病論章節

百合病。下之後者。百合滑石代赭石湯主之。

第四節 百合病吐後治法

百合病。吐之後者。百合雞子黃湯主之。

第五節 百合病未經誤治治法

百合病。不經吐、下、發汗、病形如初者。百合地黃湯主之。

第六節 百合病見陰攻陽治法

百合病。一月不解。變成渴者。百合洗方主之。

第七節 百合病見陰陽治半表裏法

百合病。渴不差者。括囊牡蠣散主之。

第八節 百合病見陽攻陰治法

百合病。變發熱者。百合滑石散主之。

第九節 百合病總治法

百合病。見於陰者。以陽法救之。見於陽者。以陰法救之。見陽攻陰。復發其汗。此爲逆。見陰攻陽。乃復下之。此亦爲逆。

第二章 狐惑病

第一節 狐惑氣病實證治法

狐惑之爲病。狀如傷寒。默默、欲眠。目不得閉。臥起不安。蝕於喉爲惑。蝕於陰爲狐。不欲飲食。惡聞食臭。其面目乍赤、乍黑、乍白。蝕於上部。則聲嘔。甘草瀉心湯主之。蝕於下部。則咽乾。苦棗湯洗之。蝕於肛者。雄黃薰之。

第二節 狐惑血病虛證治法

病者。脈數、無熱、微煩、默默、但欲臥、汗出。初得之三四日。目赤如鳩眼。七八日。目四眴黑。若能食者。膿已成也。赤豆當歸散主之。

第三章 陰陽毒病

第一節 陽毒

陽毒之爲病。面赤斑斑如錦紋。咽喉痛。吐膿血。五日可治。七日不可治。升麻鼈甲湯主之。

第二節 陰毒

陰毒之爲病。面目青。身痛如被杖。咽喉痛。五日可治。七日不可治。升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒主之。

升麻一錢
生地黃一錢
白芍一錢
甘草一錢
大黃一錢
桔梗一錢
薄荷一錢
升麻一錢
生地黃一錢
白芍一錢
甘草一錢
大黃一錢
桔梗一錢
薄荷一錢

升麻一錢
生地黃一錢
白芍一錢
甘草一錢
大黃一錢
桔梗一錢
薄荷一錢

瘧病脈證篇第四

第一章 瘧 病

第一節 新瘧總治法

師曰。瘧脈自弦。弦數者多熱。弦遲者多寒。弦小緊者下之差。弦遲者可溫之。弦緊者可發汗。鍼灸也。浮大者可吐之。弦數者風發也。以飲食消息止之。

第二節 久瘧治法

病瘧以月一日發。當十五日愈。設不差。當月盡解。如其不差。當云何。師曰。此結爲癥瘕。名曰瘧母。當急治之。宜鼈甲煎丸。

第三節 溫瘧治法 一名癰瘧

師曰。陰氣孤絕。陽氣獨發。則熱而少氣。煩冤。手足熱而欲嘔。名曰癰瘧。若但熱不寒者。邪氣內藏於心。外舍分肉之間。令人消爍肌肉。

卷之三

溫瘡者。其脈如平。身無寒。但熱。骨節煩、疼、時嘔。白虎加桂枝湯主之。

第四節 寒瘡治法

瘡多寒者。名曰牡瘡。蜀漆散主之。

見前瘡之文

此瘡久發。則瘡口微黃。或赤。皆大苔。可扣之。並避晝。風鬱身。以待
晴日。斷髮止熱。燒艾止寒。蒙頭膏。止寒。薰小梁膏。止火。薰腰膏。
禁一寒。薄暮寒散。

卷之三

寒瘡治法

中風歷節病脈證篇第五

第一章 中風病

第一節 重風輕痺論

夫風之爲病。當半身不遂。或但臂不遂者。此爲痺。脈微而數。中風使然。

第二節 外風寒證總論

寸口脈浮而緊。緊則爲寒。浮則爲虛。虛虛相搏。邪在皮膚。浮者血虛。絡脈空虛。賊邪不寫。或左或右。邪氣反緩。正氣卽急。正氣引邪。喎僻不遂。邪在於絡。肌膚不仁。邪在於經。卽重不勝。邪入於府。卽不識人。邪入於藏。舌卽難言。口吐涎。

第三節 外風寒證治法

侯氏黑散。治大風。四肢煩重。心中惡寒不足者。

第四節 內風熱證總論

寸口脈遲而緩。遲則爲寒。緩則爲虛。營緩則爲亡血。衛緩則爲中風。邪氣中經。則身癢而癰疹。心氣不足。邪氣入中。則胸滿而短氣。

第五節 內風衛熱治法

風引湯除熱癰癩。

第六節 內風營熱治法

防己地黃湯治病如狂狀。妄行、獨語不休。無熱、其脈浮。

第七節 頭風外治法

頭風摩散。

第二章 歷節病

第一節 寸關尺脈陽沉陰浮致病綱

寸口脈沉而弱。沉卽主骨。弱卽主筋。沉卽爲腎。弱卽爲肝。汗出入水

中。如水傷心。歷節痛。黃汗出。故曰歷節。

趺陽脈浮而滑。滑則穀氣實。浮則汗自出。

少陰脈浮而弱。弱則血不足。浮則爲風。風血相搏。卽疼痛如掣。

第二節 歷節外因總論

盛人脈濶小。短氣。自汗出。歷節疼。不可屈伸。此皆飲酒。汗出當風所致。

第三節 歷節外因營實治法

諸肢節疼痛。身體尪羸。脚腫如脫。頭眩。短氣。溫溫欲吐。桂枝芍藥知母湯主之。

第四節 歷節內因總論

味酸則傷筋。筋傷則緩。名曰泄。鹹則傷骨。骨傷則痿。名曰枯。枯泄相搏。名曰斷泄。營氣不通。衛不獨行。營衛俱微。三焦無所御。四屬斷絕。

身體羸瘦。獨足腫大。黃汗出。脛冷。假令發熱。便爲歷節也。

第五節 歷節內因衛虛治法
病歷節不可屈伸。疼痛。烏頭湯主之。

第六節 歷節外治法

礬石湯。治脚氣衝心。

人無病少腹冷。或寒出刺。或不寒無熱。其頭面
四肢。或冷或熱。或冷於前。熱於後。
如知其刺。或不知其風。則用附子。或知其風。
而不知其刺。則用附子。或不知其風。而不知其刺。
或不知其風。而不知其刺。或不知其風。而不知其刺。

血痺虛勞病脈證篇第六

第一章 血痺病

第一節 血痺病因總論

問曰。血痺之病。從何得之。師曰。夫尊榮人。骨弱肌膚盛。重因疲勞汗出。臥不時動搖。加被微風。遂得之。但以脈自微濇在寸口。關上小緊。宜鍼引陽氣。令脈和、緊去。則愈。

第二節 血痺治法

血痺。陰陽俱微。寸口關上微。尺中小緊。外證、身體不仁。如風痺狀。黃芪桂枝五物湯主之。

第二章 虛勞病

第一節 勞脈總綱

夫男子平人。脈大爲勞。脈極虛。亦爲勞。

第二節 陰虛勞證

男子面色薄。主渴、及亡血、卒喘、悸、脈浮者。裏虛也。

第三節 陽虛勞證

男子脈虛沉弦、無寒熱、短氣、裏急、小便不利、面色白、時目瞑、兼衄、少腹滿、此爲勞使之然。

第四節 脾勞脈證

勞之爲病。其脈浮大。手足煩。春夏劇。秋冬差。陰寒精自出。瘦削不能行。

第五節 肺勞脈證

男子脈浮弱而濇。爲無子。精氣清冷。

第六節 腎勞脈證及治法

夫失精家。少腹弦急、陰頭寒、目眩、髮落。脈極虛芤遲、爲清穀、亡血、失

精脈得諸芤動微緊。男子失精。女子夢交。桂枝龍骨牡蠣湯主之。天雄散亦佳。

第七節 心勞脈證

男子平人。脈虛弱細微者。喜盜汗也。

第八節 肝勞脈證

人年五六十。其病脈大者。痺、俠背行。若腸鳴、馬刀俠癰者。皆爲勞得之。

第九節 氣勞脈證

脈沉小遲。名脫氣。其人疾行。則喘喝。手足逆寒。腹滿甚。則溏泄。食不消化也。

第十節 血勞脈證

脈弦而大。弦則爲減。大則爲芤。減則爲寒。芤則爲虛。虛寒相搏。此名

爲革。婦人則半產漏下。男子則亡血、失精。

第十一節 脾勞治法

虛勞裏急、悸、衄、腹中痛、夢失精、四肢痠疼、手足煩熱、咽乾、口燥、小建中湯主之。

第十二節 肺勞治法

虛勞裏急諸不足。黃芪建中湯主之。

第十三節 腎勞治法

虛勞腰痛、少腹拘急、小便不利者。八味腎氣丸主之。

第十四節 肝勞治法

虛勞諸不足。風氣百疾。薯蕷丸主之。

第十五節 心勞治法

虛勞虛煩。不得眠。酸棗仁湯主之。

第十六節 五勞七傷實證總治法

五勞虛極。羸瘦。腹滿。不能飲食。食傷。憂傷。飲傷。房室傷。饑傷。勞傷。經絡營衛氣傷。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。緩中補虛。大黃䗪蟲丸主之。

立之。一月，有司奏：「比聞大黃、蜀藥、桔梗等，皆是良藥，而所用者多以爲毒藥，請停用。」上曰：「卿等不知醫道耳。」

初，宋人李昉，字公擇，號東陽先生，子之

肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證篇第七

第一章 肺痿肺癰欬嗽上氣病總論

第一節 肺痿肺癰脈證總論

問曰。熱在上焦者。因欬爲肺痿。肺痿之病。從何得之。師曰。或從汗出。或從嘔吐。或從消渴。小便利數。或從便難。又被快藥下利。重亡津液。故得之。曰。寸口脈數。其人欬。口中反有濁唾涎沫者何。師曰。爲肺痿之病。若口中辟辟燥欬。卽胸中隱隱痛。脈反滑數。此爲肺癰。欬唾膿血。脈數虛者。爲肺痿。數實者。爲肺癰。

問曰。病欬逆。脈之何以知此爲肺癰。當有膿血。吐之則死。其脈何類。師曰。寸口脈微而數。微則爲風。數則爲熱。微則汗出。數則惡寒。風中於衛。呼氣不入。熱過於營。吸而不出。風傷皮毛。熱傷血脈。風舍於肺。其人則欬。口乾、喘、滿、咽燥、不渴、多唾濁沫。時時振寒。熱之所過。血爲

之凝滯蓄結癰膿、吐如米粥、始萌可救。膿成則死。

第二節 上氣肺脹總論

上氣面浮腫、肩息、其脈浮大、不治。又加下利、尤甚。

上氣喘而躁者、此爲肺脹。欲作風水、發其汗、則愈。

第二章 肺痿肺癰欬嗽上氣病治法

第一節 肺痿治法

肺痿吐涎沫而不欬者、其人不渴、必遺尿、小便數、所以然者、以上虛不能制下故也。此爲肺中冷、必眩、多涎唾。甘草乾薑湯以溫之。若服湯渴者屬消渴。

第二節 邪欬上氣治法

欬而上氣、喉中水雞聲、射干麻黃湯主之。

第三節 痰欬上氣治法

欬逆、上氣、時時吐濁、但坐不得眠。皂莢丸主之。

第四節 氣欬在表治法

欬、而脈浮者。厚樸麻黃湯主之。

第五節 血欬在裏治法

欬、而脈沉者。澤漆湯主之。

第六節 火欬治法

火逆、上氣、咽喉不利。止逆、下氣。麥門冬湯主之。

第七節 肺癰實證治法

肺癰。喘、不得臥。葶藶大棗瀉肺湯主之。

第八節 肺癰虛證治法

欬、而胸滿、振寒、脈數、咽乾、不渴、時出濁唾腥臭、久久吐膿如米粥者。爲肺癰。桔梗湯主之。

第九節 肺氣脹治法

欬而上氣。此爲肺脹。其人喘、目如脫狀、脈浮大者。越婢加半夏湯主之。

第十節 肺水脹治法

肺脹。欬而上氣。煩躁而喘。脈浮者。心下有水。小青龍加石膏湯主之。

奔獥氣病脈證篇第八

第一章 奔獥氣總論

第一節 奔獥氣原因

師曰。病有奔獥。有吐膿。有驚怖。有火邪。此四部病。皆從驚發得之。

第二節 奔獥氣證象

師曰。奔獥病。從少腹起。上衝咽喉。發作欲死。復還止。皆從驚恐得之。

第三節 奔獥氣上衝上焦治法

奔獥氣。上衝胸、腹痛。往來寒熱。奔獥湯主之。

第四節 奔獥氣上衝中焦治法

發汗後。燒鍼令其汗。鍼處被寒核起而赤者。必發奔獥氣。從少腹上至心。灸其核上。各一壯。與桂枝加桂湯主之。

第五節 奔獥氣上衝下焦治法

發汗後。臍下悸者。欲作奔豚。茯苓桂枝甘草大棗湯主之。

胸痺心痛短氣病脈證篇第九

第一章 胸痺心痛短氣總論

第一節 胸痺心痛之虛證

師曰。夫脈當取太過不及。陽微、陰弦，卽胸痺而痛。所以然者。責其極虛也。今陽虛、知在上焦。所以胸痺、心痛者。以其陰弦故也。

第二節 短氣之實證

平人無寒熱。短氣不足以息者。實也。

第二章 胸痺心痛短氣治法

第一節 氣閉短氣治法

胸痺之病。喘息、欬唾、胸背痛、短氣、寸口脈沉而遲、關上小緊數、括樓薤白酒湯主之。

第二節 水閉心痛治法

胸痺。不得臥。心痛徹背者。括樓薤白半夏湯主之。

第三節 肝氣上逆心痛治法

胸痺。心中痞。留氣結在胸。胸滿。脇下逆擔心。枳實薤白桂枝湯主之。
人蔘湯亦主之。

第四節 肺氣上逆胸痺治法

胸痺。胸中氣塞。短氣。茯苓杏仁甘草湯主之。橘枳生薑湯亦主之。

第五節 脾氣上逆胸痺治法

胸痺。緩急者。薏苡附子散主之。

第六節 心氣不宣心痛治法

心中痞。諸逆心懸痛。桂枝生薑枳實湯主之。

第七節 腎氣上逆心痛治法

心痛徹背。背痛徹心。烏頭赤石脂丸主之。

腹滿寒疝宿食病脈證篇第十

第一章 腹滿寒疝宿食總論

第一節 腹滿病因

趺陽脈微弦。法當腹滿。不滿者必便難。兩胠疼痛。此虛寒欲下上也。當以溫藥服之。

第二節 腹滿虛實證辨

病者腹滿。按之不痛爲虛。痛者爲實。可下之。舌黃未下者。下之黃自去。

第三節 腹滿寒熱證辨

腹滿時減復如故。此爲寒。當以溫藥。

第四節 心寒疝

病者瘞黃燥而不渴。胸中寒實而利不止者死。

第五節 肝寒疝

寸口脈弦者。卽脇下拘急而痛。其人嗰嗰惡寒也。

第六節 肺寒疝

夫中寒家喜欠。其人清涕出。發熱色和者。善嚏。

第七節 脾寒疝

中寒。其人下利。以裏虛也。欲嘔不能。此人肚中寒。

第八節 腎寒疝

夫瘦人。繞臍痛。必有風冷。穀氣不行。而反下之。其氣必衝。不衝者。心下則痞。

第二章 腹滿治法

第一節 肺腹滿

病腹滿。發熱。十日。脈浮而數。飲食如故。厚樸七物湯主之。

第二節 腎腹滿

腹中寒氣。雷鳴切痛。胸脇逆滿。嘔吐。附子粳米湯主之。

第三節 肝腹滿

痛而閉者。厚樸三物湯主之。

第四節 心腹滿

按之心下滿痛者。此爲實也。當下之。宜大柴胡湯。

第五節 脾腹滿

腹滿不減。減不足言。當下之。宜大承氣湯。

第三章 寒疝治法

第一節 太陰寒疝

心胸中大寒痛。嘔不能飲食。腹中滿。上衝皮起。出見有頭足。上下痛而不可觸近者。大建中湯主之。

第二節 少陽寒疝

脇下偏痛。發熱。其脈緊弦。此寒也。以溫藥下之。宜大黃附子湯。

第三節 少陰寒疝

寒氣厥逆。赤丸主之。

第四節 陽明寒疝

腹滿。脈弦而緊。弦則衛氣不行。卽惡寒。緊則不欲食。邪正相搏。卽爲寒疝。寒疝。繞臍痛。若發則白津出。手足厥冷。其脈沉緊者。大烏頭煎主之。

第五節 厥陰寒疝

寒疝。腹中痛。及脇痛。裏急者。當歸生薑羊肉湯主之。

第六節 太陽寒疝

寒疝。腹中痛。逆冷。手足不仁。若身疼痛。灸刺諸藥不能治。抵當烏頭

桂枝湯主之。

第七節 寒疝總治法

其脈數而緊。乃弦狀加弓弦。按之不移。脈數弦者。當下其寒。脈緊大而遲者。必心下堅。脈大而緊者。陽中有陰。可下之。

第四章 宿食病

第一節 少陰宿食

問曰。人病有宿食。何以別之。師曰。寸口脈浮而大。按之反濶。尺中亦微而濶。故知有宿食。大承氣湯主之。

第二節 厥陰宿食

脈數而滑者。實也。此有宿食。下之愈。宜大承氣湯。

第三節 太陰宿食

下利不欲食者。此有宿食。當下之。宜大承氣湯。

第四節 陽明宿食

宿食在上脘。當吐之。宜瓜蒂散。

第五節 少陽宿食

脈緊如轉索無常者。宿食也。

第六節 太陽宿食

脈緊頭痛風寒。腹中有宿食不化也。

五臟風寒積聚病脈證篇第十一

第一章 肺臟病

第一節 肺中風證

肺中風者。口燥而喘。身運而重。冒而腫脹。

第二節 肺中寒證

肺中寒。吐濁涕。

第三節 肺死臟脈

肺死藏。浮之虛。按之弱如葱葉。下無根者。死。

第二章 肝臟病

第一節 肝中風證

肝中風者。頭目瞞。兩脇痛。行常僵。令人嗜甘。

第二節 肝中寒證

肝中寒者。兩臂不舉。舌本燥。善大息。胸中痛。不得轉側。食則吐。而汗出也。

第三節 肝死臟脈

肝死臟浮之弱。按之如索。不來。或曲如蛇行者。死。

第四節 肝着證

肝着。其人常欲蹈其胸上。先未苦時。但欲飲熱。旋覆花湯主之。

第三章 心臟病

第一節 心中風證

心中風者。翕翕發熱。不能起。心中飢。食則嘔吐。

第二節 心中寒證

心中寒者。其人苦病。心如噉蒜狀。劇者。心痛徹背。背痛徹心。譬如蟲注。其脈浮者。自吐乃愈。

第三節 心傷證

心傷者。人勞倦。卽頭面赤。而下重。心中痛。而自煩。發熱。當臍跳。其脈弦。此爲心臟傷所致也。

第四節 心死臟脈

心死臟浮之實。如麻豆。按之益躁疾者死。

第五節 精神病（一名神經病）

邪哭使魂魄不安者。血氣少也。血氣少者。屬於心。心氣虛者。其人則畏。合目欲眠。夢遠行。而精神離散。魂魄妄行。陰氣衰者。爲顛。陽氣衰者。爲狂。

第四章 脾臟病

第一節 脾中風證

脾中風。翕翕發熱。形如醉人。腹中煩重。皮目瞞瞞。而短氣。

第二節 脾死臟

脾死臟浮之大堅。按之如覆盆。潔潔狀如搖者。死。

第三節 脾約證

趺陽脈浮而濇。浮則胃氣強。濇則小便數。浮濇相搏。大便則堅。其脾爲約。麻仁丸主之。

第五章 腎臟病

第一節 腎着證

腎着之病。其人身體重。腰中冷。如坐水中。形如水狀。反不渴。小便自利。飲食如故。病屬下焦。身勞汗出。衣裏冷濕。久久得之。腰以下冷痛。腹重如帶五千錢。甘薑苓朮湯主之。

第二節 腎死臟脈

腎死臟浮之堅。按之亂如轉丸。益下入尺中者。死。

第六章 六腑病

第一節 三焦竭部

問曰。三焦竭部。上焦竭、善噫。何謂也。師曰。上焦受中焦氣未和、不能消穀。故能噫耳。下焦竭、即遺溺、失便、其氣不和、不能自禁制。不須治。久則愈。

第二節 三焦寒熱

師曰。熱在上焦者。因欬爲肺痿。熱在中焦者。則爲堅。熱在下焦者。則尿血。亦令淋閼不通。大腸有寒者。多驚濤。有熱者。便腸垢。小腸有寒者。其人下重。便血。有熱者。必痔。

第七章 脍腑積聚病

第一節 積聚證

問曰。病有積、有聚、有繫氣、何謂也。師曰。積者、臟病也。終不移。聚者、腑

病也。發作有時。展轉痛移。爲可治。繫氣者。脇下痛。按之則愈。復發。爲繫氣。

第二節 積聚脈

諸積大法。脈來細而附骨者。乃積也。寸口。積在胸中。微出寸口。積在喉中。關上。積在臍旁。上關上。積在心下。微下關。積在少腹。尺中。積在氣街。脈出左。積在左。脈出右。積在右。脈兩出。積在中央。各以其部處之。

痰飲欬嗽病脈證篇第十二

第一章 痰飲欬嗽總論

第一節 痰飲種類之名稱

問曰。夫飲有四。何謂也。師曰。有痰飲。有懸飲。有溢飲。有支飲。

第二節 痰飲種類之病狀

問曰。四飲何以爲異。師曰。其人素盛。今瘦。水走腸間。瀝瀝有聲。謂之痰飲。飲後水流在脇下。欬唾引痛。謂之懸飲。飲水流行。歸於四肢。當汗出。而不汗出。身體疼重。謂之溢飲。欬逆。倚息。不得臥。其形如腫。謂之支飲。

第二章 痰飲病源

第一節 水在心

水在心。心下堅築。短氣。惡水。不欲飲。

第二節 水在肺

水在肺。吐涎沫、欲飲水。

第三節 水在脾

水在脾。少氣、身重。

第四節 水在肝

水在肝。脇下支滿、嘵而痛。

第五節 水在腎

水在腎。心下悸。

第三章 五藏飲

第一節 心臟留飲

夫心下有留飲。其人背寒、冷如掌大。

第二節 肝臟留飲

留飲者。脇下痛引缺盆。欬嗽則輒已。

第三節 脾臟留飲

胸中有留飲。其人短氣而渴。四肢歷節痛。脈沉者有留飲。

第四節 肺臟留飲

膈上病痰滿喘。欬唾發則寒熱背痛。腰疼目泣自出。其人振振身瞶劇必有伏飲。

第五節 腎臟留飲

夫病人飲水多必暴喘滿。凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣。脈雙弦者寒也。皆大下後喜虛。脈偏弦者飲也。肺飲不弦但苦喘短氣。支飲亦喘而不能臥加短氣其脈平也。

第四章 痰飲治法總論

第一節 痰飲治法總論

病痰飲者。當以溫藥和之。

第二節 上焦痰飲治法

心下有痰飲。胸脇支滿。目眩。苓桂朮甘湯主之。

第三節 下焦痰飲治法

夫短氣、有微飲。當從小便去之。苓桂朮甘湯主之。腎氣丸亦主之。

第四節 中焦痰飲治法

病者脈伏。其人欲自利、利反快、雖利、心下續堅滿。此爲留飲欲去故也。甘遂半夏湯主之。

第五章 懸飲治法

第一節 热飲脈

脈浮而細滑。傷飲。

第二節 寒飲脈

脈弦數。有寒飲。冬夏難治。

第三節 懸飲治法

脈沉而弦者。懸飲內痛。病懸飲者。十棗湯主之。

第六章 溢飲治法

第一節 溢飲治法

病溢飲者。當發其汗。大青龍湯主之。小青龍湯亦主之。

第七章 支飲治法

第一節 肝支飲虛實治法

膈間支飲。其人喘滿。心下痞堅。面色黧黑。其脈沉緊。得之數十日。醫吐下之不愈。木防己湯主之。虛者。卽愈。實者。三日復發。復與不愈者。宜木防己湯。去石膏加茯苓芒硝湯主之。

第二節 腎支飲利水治法

心下有支飲。其人苦冒眩。澤瀉湯主之。

第三節 心支飲瀉火治法

支飲胸滿者。厚朴大黃湯主之。

第四節 肺支飲瀉肺治法

支飲不得息。葶藶大棗瀉肺湯主之。

第五節 脾支飲降逆治法

嘔家本渴。渴者爲欲解。今反不渴。心下有支飲故也。小半夏湯主之。

第八章 水氣治法

第一節 中焦水氣治法

腹滿口舌乾燥。此腸間有水氣。己椒蘚黃丸主之。

第二節 上焦水氣治法

卒嘔吐。心下痞。膈間有水。眩悸者。小半夏加茯苓湯主之。

第三節 下焦水氣治法

假令瘦人。臍下有悸。吐涎沫。而顛眩。此水也。五苓散主之。

第九章 喘嗽治法

第一節 喘脈攻裏治法

欬家。其脈弦。爲有水。十棗湯主之。

第二節 喘證攻裏治法

夫有支飲家。欬、煩、胸中痛者。不卒死。至一百日。或一歲。宜以十棗湯。

第三節 喘脈虛實生死法

久欬數歲。其脈弱者。可治。實大數者。死。其脈虛者。必苦冒。其人本有支飲在胸中故也。治屬飲家。

第四節 喘嗽攻表治法

欬逆、倚息、不得臥。小青龍湯主之。

青龍湯下已。多唾。口燥。寸脈沉。尺脈微。手足厥逆。氣從小腹上衝胸咽。手足痺。其面翕熱如醉狀。因復下流陰股。小便難。時復冒者。與茯苓桂枝五味甘草湯治其氣衝。

衝氣即低。而反更欬。胸滿者。用茯苓桂枝五味甘草湯去桂加乾薑細辛。以治其欬滿。

欬滿卽止。而更復渴。衝氣復發者。以細辛乾薑爲熱藥也。服之當遂渴。而渴反止者。爲支飲也。支飲者。法當冒。冒者必嘔。嘔者復內半夏以去其水。

水去嘔止。其人形腫者。加杏仁主之。其證應內麻黃。以其人遂痺。故不內之。若逆而內之者。必厥。所以然者。以其人血虛。麻黃發其陽故也。若面熱如醉。此爲胃熱上衝熏其面。加大黃以利之。

先渴後嘔。爲水停心下。此屬飲家。小半夏加茯苓湯主之。

消渴小便不利淋病脈證篇第十三

第一章 消渴病

第一節 消渴證總論

厥陰之爲病。消渴、氣上衝心、心中疼熱、飢而不欲食、食則吐、下之不肯止。

第二節 消渴脈總論

寸口脈浮而遲。浮卽爲虛。遲卽爲勞。虛則衛氣不足。勞則營氣竭。趺陽脈浮而數。浮卽爲氣。數卽消穀而大堅。氣盛則溲數。溲數則堅。堅數相搏。卽爲消渴。

第三節 腎寒消渴治法

男子消渴、小便反多。以飲一斗、小便亦一斗。腎氣丸主之。

第四節 膀胱熱消渴治法

脈浮、小便不利、微熱消渴。宜利小便發汗。五苓散主之。

第五節 消渴宣陽治法

渴欲飲水、水入則吐者、名曰水逆。五苓散主之。

第六節 消渴納陰治法

渴欲飲水、不止者、文蛤散主之。

第二章 淋 病

第一節 淋病證狀

淋之爲病。小便如粟狀。小腹弦急痛引臍中。

第二節 淋病脈象

趺陽脈數、胃中有熱。卽消穀、引飲、大便必堅、小便則數。

第三節 淋病禁誤

淋家不可發汗。發汗則便血。

淋家不可發汗。發汗則便血。

第四節 淋病利水法

小便不利者。有水氣。其人若渴。括樓瞿麥丸主之。

第五節 淋病中焦有熱小便不利治法

小便不利。蒲灰散主之。滑石白魚散。茯苓戎鹽湯並主之。

第六節 上焦有熱小便不利治法

渴欲飲水、口乾舌燥者。白虎加人蔘湯主之。

第七節 下焦有熱小便不利治法

脈浮發熱。渴欲飲水、小便不利者。猪苓湯主之。

題管仲傳
煙水小東不曉參寥答

歌之清涼不孤音無小可不諱詔

酒為流冰日暮否
醉作白旗頭大夢僞生衣

相之卷六
復加土新市蝶小更不曉詔

小到石林浦水端
之立者自爲造次暮天豐

歌正尋牛也
稍識中和音
終少耳不曉詔

公更不時竟
大笑其人各醉
醉舞置臺大生衣

此歌四體
一曰橫頭
二曰小步

水氣病脈證篇第十四

第一章 水氣病總論

第一節 水病種類之名稱

師曰。病有風水。有皮水。有正水。有石水。有黃汗。

第二節 風水脈證

風水。其脈自浮。外證骨節疼痛、惡風。

第三節 皮水脈證

皮水。其脈亦浮。外證胷脢、按之沒指、不惡風、其腹如鼓、不渴、當發其汗。

第四節 正水脈證

正水。其脈沉遲、外證自喘。

第五節 石水脈證

雜病論章節

石水。其脈自沉、外證腹滿、不喘。

第六節 黃汗脈證

黃汗。其脈沉遲、身發熱、胸滿、四肢頭面腫。久不愈、必致癰膿。

第二章 水在表脈證

第一節 表熱致水法

脈浮而洪、浮則爲風、洪則爲氣、風氣相搏。風強則爲癰瘍、身體爲癰瘍者爲泄風、久爲癥癩。氣強則爲水、難以俛仰。風氣相繫、身體洪腫、汗出乃愈。惡風則虛、此爲風水。不惡風者、小便通利、上焦有寒、其口多涎、此爲黃汗。

第二節 裹熱致水法

寸口脈沉滑者、中有水氣、面目腫大有熱、名曰風水。視人之目窠上、微腫如蠶、新臥起狀、其頸脈動、時時欬、按其手足上、陷而不起者、風

水。

第三節 裹寒致水法

太陽病、脈浮而緊。法當骨節疼痛、反不疼、身體反重而痠。其人不渴、汗出卽愈。此爲風水。惡寒者、此爲極虛、發汗得之。

第四節 表寒致水法

渴而不惡寒者、此爲皮水。身腫而冷。狀如周痺。

第五節 中焦寒結致水法

胸中窒、不能食、反聚痛、暮躁不得眠。此爲黃汗。

第六節 上焦寒結致水法

痛在骨節、欬而喘、不渴者、此爲肺脹。其狀如腫、發汗則愈。然諸病此者、渴而下利、小便數者、皆不可發汗。

第七節 下焦寒結致水法

裏水者、一身面目黃腫、其脈沉、小便不利、故令病水。假令小便自利、此亡津液。故令渴。越婢加朮湯主之。

第三章 水在裏脈證

第一節 中寒致水脈證

趺陽脈當伏。今反緊、本自有寒。疝瘕、腹中痛。醫反下之、卽胸滿短氣。

第二節 中熱致水脈證

趺陽脈當伏、今反數、本自有熱。消穀、小便數。今反不利、此欲作水。

第三節 上熱致水脈證

寸口脈浮而遲、浮脈則熱、遲脈則潛、熱潛相搏、名曰沉。趺陽脈浮而數、浮脈卽熱、數脈卽止、熱止相搏、名曰伏。沉伏相搏、名曰水。沉則絡脈虛、伏則小便難、虛難相搏、水走皮膚、即爲水矣。

第四節 上寒致水脈證

寸口脈弦而緊、弦則衛氣不行、即惡寒。水不沾流、走於腸間。

第五節 下寒裏水脈證

少陰脈緊而沉。緊則爲痛、沉則爲水、小便即難。

第六節 下熱表水脈證

脈得諸沉、當責有水。身體腫重水病脈出者死。

第七節 水病下治法

夫水病人、目下有臥蠶、面目鮮澤、脈伏。其人消渴病水。腹大、小便不利。其脈沉絕者、有水可下之。

第八節 水病發汗利水法

問曰。病下利後、渴飲水、小便不利、腹滿因腫者。何也。答曰。此法當病水。若小便自利、及汗出者、自當愈。

第四章 五藏水病脈證

第一節 心水

心水者。其身重而少氣。不得臥。煩而躁。其人陰腫。

第二節 肝水

肝水者。其腹大。不能自轉側。脇下腹痛。時時津液微生。小便續通。

第三節 肺水

肺水者。其身腫。小便難。時時鴨溏。

第四節 脾水

脾水者。其腹大。四肢苦重。津液不生。但苦少氣。小便難。

第五節 腎水

腎水者。其腹大。臍腫腰痛。不得溺。陰下溼如牛鼻上汗。其足逆冷。面反瘦。

第六節 五臟水總治法

師曰。諸有水者。腰以下腫。當利小便。腰以上腫。當發汗乃愈。

第五章 血氣致腫病

第一節 血寒致水

師曰。寸口脈沉而遲。沉則爲水。遲則爲寒。寒水相搏。趺陽脈伏。水穀不化。脾氣衰則鶩溏。胃氣衰則身腫。少陽脈卑。少陰脈細。男子則小便不利。婦人則經水不通。經爲血。血不利。則爲水。名曰血分。

第二節 血熱致水

師曰。寸口脈沉而數。數則爲出。沉則爲入。出則爲陽實。入則爲陰結。趺陽脈微而弦。微則無胃氣。弦則不得息。少陰脈沉而滑。沉則爲在裏。滑則爲實。沉滑相搏。血結胞門。其瘕不寫。經絡不通。名曰血分。

第三節 血水致腫難易治法

問曰。病有血分水分。何也。師曰。經水前斷、後病水。名曰血分。此病難

治先病水後經水斷名曰水分此病易治何以故去水其經自下。

第四節 氣寒致水法

問曰病者苦水面目身體四肢皆腫小便不利脈之不言水反言胸中痛氣上衝咽狀如炙肉當微欬喘審如師言其脈何類師曰寸口脈沉而緊沉爲水緊爲寒沉緊相搏結在關元始時尙微年盛不覺陽衰之後營衛相干陽損陰盛結寒微動腎氣上衝咽喉塞噎脇下急痛醫以爲留飲而大下之氣繫不去其病不除復重吐之胃家虛煩、咽燥欲飲水小便不利水穀不化面目手足浮腫又與葶苈丸下水當時如小差食飲過度腫復如前胸脇苦痛象若奔豚其水揚溢則欬喘逆當時先攻擊衝氣令止乃治欬欬止其喘自差先治新病病當在後。

第一節 風水表虛治法

風水脈浮、身重、汗出、惡風。防已黃芪湯主之。腹痛者加芍藥。

第二節 風水表實治法

風水惡風、一身悉腫。脈浮、不渴、續自出汗、無大熱。越婢湯主之。

第三節 皮水治法

皮水爲病四肢腫。水氣在皮膚中、四肢聶聶動者。防己茯苓湯主之。

第四節 正石水從陰從陽治法

裏水越婢加朮湯主之。甘草麻黃湯亦主之。

第五節 正石水從表從裏治法

水之爲病。其脈沉小、屬少陰。浮者爲風。無水虛脹者爲氣。水發其汗卽已。脈沉者、宜麻黃附子湯。浮者、宜杏子湯。

第六節 皮水血分治法

厥而皮水者。蒲灰散主之。

第七節 黃汗營虛治法

問曰。黃汗之爲病。身體腫。發熱。汗出。而渴。狀如風水。汗沾衣色正黃。如棗汁。脈自沉。何從得之。師曰。以汗出入水中浴。水從汗孔入得之。宜芪芍桂酒湯主之。

第八節 黃汗衛虛治法

黃汗之病。兩脰自冷。假令發熱。此屬歷節。食已汗出。又身常暮盜汗。出者。此榮氣也。若汗出已。反發熱者。久久其身必甲錯。發熱不止者。必生惡瘡。若身重汗出已。輒輕者。久久必身瞞。瞞卽胸中痛。又從腰以上汗出。下無汗。腰臍弛痛。如有物在皮中狀。劇者。不能食。身疼。重煩躁。小便不利。此爲黃汗。桂枝加黃芪湯主之。

第七章 血氣致水總論治法

第一節 血氣寒冷致水總論

師曰。寸口脈遲而濇、遲則爲寒、濇爲血不足。趺陽脈微而遲、微則爲氣、遲則爲寒。寒氣不足、卽手足逆冷。手足逆冷、則營衛不利。營衛不利、則腹滿脹鳴、相逐。氣轉膀胱、營衛俱勞。陽氣不通、卽身冷。陰氣不通、卽骨疼。陽前通則惡寒、陰前通則痺不仁。陰陽相得、其氣乃行。大氣一轉、其氣乃散。實則失氣、虛則遺溺。名曰氣分。

第二節 氣水發表治法

氣分心下堅大如盤、邊如旋盃、桂甘薑棗麻辛附子湯主之。

第三節 氣水攻裏治法

心下堅大如盤、邊如旋盃、水飲所作、枳朮湯主之。

萬物皆有裂隙，此乃天地自然之理。故玉衡以成其明，金鑿以成其麗，木節以成其體，水脈以成其流，火竈以成其焰，風輪以成其轉，雲氣以成其變，雷聲以成其響，山石以成其形，人形以成其神，萬物皆然。故曰：「天地萬象，無往不鑿。」

故知萬象皆有鑿處，無往不鑿。故玉衡以成其明，金鑿以成其麗，木節以成其體，水脈以成其流，火竈以成其焰，風輪以成其轉，雲氣以成其變，雷聲以成其響，山石以成其形，人形以成其神，萬物皆然。故曰：「天地萬象，無往不鑿。」

黃瘴病脈證篇第十五

第一章 潤病總論

第一節 上焦有熱致酒瘴脈法

寸口脈浮而緩。浮則爲風、緩則爲瘴。非中風。四肢苦煩。脾色必黃。瘀熱以行。

第二節 中焦有熱致穀瘴脈法

趺陽脈緊而數。數則爲熱、熱則消穀。緊則爲寒、食卽爲滿。

第三節 下焦有熱致女勞瘴脈法

尺脈浮、爲傷腎。趺陽脈緊、爲傷脾。

第四節 穀瘴證象

風寒相搏、食穀卽眩。穀氣不消、胃中苦濁。濁氣下流、小便不通。陰被其寒、熱流膀胱、身體盡黃。名曰穀瘴。

第五節 女勞瘴證象

額上黑、微汗出、手足中熱、薄暮卽發、膀胱急、小便自利。名曰女勞瘴。腹如水狀。不治。

第六節 酒瘴證象

心中懊惱、而熱、不能食、時欲吐。名曰酒瘴。

第七節 穀瘴虛寒不可下

陽明病。脈遲、食難用飽。飽則發煩、頭眩、小便必難。此欲作穀瘴。雖下之、腹滿如故。所以然者。脈遲故也。

第八節 酒瘴胃熱下流利水法

夫病酒黃瘴。必小便不利。其候心中熱、足下熱。是其證也。

第九節 酒瘴胃熱在中吐下法

酒黃瘴者。或無熱、靖言了了。腹滿、欲吐、鼻燥。其脈浮者、先吐之。沉弦

者先下之。

第十節 酒癰胃熱在上宜吐法

酒癰心中熱欲吐者吐之愈。

第十一節 黃癰強下傷表法

酒癰下之久久爲黑癰目青面黑心中如噉蒜虀狀大便正黑皮膚爪之不仁其脈浮弱雖黑微黃故知之。

第十二節 黃癰誤汗傷裏法

師曰病黃癰發熱煩渴胸滿口燥者以病發時火劫其汗兩熱所得然黃家所得從溼得之一身盡發熱而黃肚熱熱在裏當下之。

第十三節 陽黃

脈沉渴欲飲水小便不利者皆發黃。

第十四節 陰黃

腹滿、舌痿黃、躁不得睡、屬黃家。

第十五節 治黃瘴宜緩法

黃瘴之病。當以十八日爲期。治之十日以上差。反劇爲難治。

第十六節 陽黃陰黃難易治法

瘴而渴者、其瘴難治。瘴而不渴者、其瘴可治。發於陰部、其人必嘔。陽部、其人振寒、而發熱也。

第二章 黃瘴治法

第一節 穀瘴治法

穀瘴之病。寒、熱、不食。食卽頭眩。心胸不安。久久發黃、爲穀瘴。茵陳蒿湯主之。

第二節 女勞瘴治法

黃家。日晡所。發熱。而反惡寒。此爲女勞得之。膀胱急、少腹滿、身盡黃、

額上黑、足下熱、因作黑瘧。其腹脹如水狀、大便必黑、時溏、此女勞之病、非水病也。腹滿者、難治。硝石礬石散主之。

第三節 酒瘧治法

酒瘧。心中懊懨、或熱痛。梔子大黃湯主之。

第四節 黃瘧解表治法

諸病黃家。但利其小便。假令脈浮、當以汗解之。宜桂枝加黃芪湯主之。

第五節 黃瘧導大便法

諸黃。猪膏髮煎主之。

第六節 黃瘧利小便法

黃瘧病。茵陳五苓散主之。

第七節 黃瘧裏實治法

黃。癰。腹滿。小便不利而赤。自汗出。此爲表和裏實。當下之。宜大黃硝石湯。

第八節 黃。癰。裏虛治法

黃。癰。病。小便色不變。欲自利。腹滿而喘。不可除熱。熱除必嘔。嘔者。小半夏湯主之。

第九節 血實黃。癰。治法

諸黃。腹痛而嘔者。宜柴胡湯。

第十節 氣虛黃。癰。治法

男子黃。小便自利。當與虛勞小建中湯。

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證篇第十六

第一章 驚悸吐衄下血胸滿瘀血總論

第一節 驚悸原因

寸口脈動而弱。動卽爲驚。弱則爲悸。

第二節 吐衄之原因

師曰。尺脈浮、目睛暈黃、衄未止。暈黃去、目睛慧了。知衄今止。

第三節 吐衄之出處

又曰。從春至夏衄者、太陽。從秋至冬衄者、陽明。

第四節 吐衄之治法

衄家不可汗。汗出必額上陷、脈緊急。直視不能眴、不得眠。

第五節 衛寒致血

病人面無色、無寒熱。脈沉弦者、衄。脈浮弱、手按之絕者、下血。煩欬者、

必吐血。

第六節 衛熱致血

夫吐血、欬逆、上氣、其脈數而有熱、不得臥者、死。

第七節 營熱致血

夫酒客欬者、必致吐血。此因極飲過度所致也。

第八節 營寒致血

寸口脈弦而大。弦則爲減。大則爲芤。減則爲寒。芤則爲虛。虛寒相搏。此名爲革。婦人則半產漏下。男子則亡血。

第九節 亡血禁汗法

亡血不可發其表。汗出卽寒慄而振。

第十節 血寒成瘀

病人胸滿、唇癟、舌青、口燥、但欲漱水、不欲嚥。無寒熱。脈微大來遲。腹

不滿其人言我滿爲有瘀血。

第十一節 血熱成瘀

病者如有熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此爲陰伏是瘀血也當下之。

第二章 驚悸吐衄下血治法

第一節 驚治法

火邪者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。

第二節 悸治法

心下悸者半夏麻黃丸主之。

第三節 吐血治法

吐血不止者柏葉湯主之。

第四節 下血遠血治法

下血先便後血此遠血也黃土湯主之

第五節 下血近血治法

下血先血後便此近血也赤豆當歸散主之

第六節 吐衄血治法

心氣不足吐血衄血瀉心湯主之

嘔吐嘔下利病脈證篇第十七

第一章 嘔吐嘔總論

第一節 血壅作嘔法

夫嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈。

第二節 水積作嘔法

先嘔却渴者此爲欲解。先渴却嘔者爲水停心下。此屬飲家。嘔家本渴今反不渴者心下有支飲故也。此屬支飲。

第三節 陽虛作吐法

問曰。病人脈數數爲熱。當消穀引飲而反吐者何也。師曰。以發其汗令陽氣微。膈氣虛。脈乃數。數爲客熱。不能消穀。胃中虛冷。故也。脈弦者。虛也。胃氣無餘。朝食暮吐。變爲胃反。寒在於上。醫反下之。令脈反弦。故名曰虛。

第四節 陰虛作吐法

寸口脈微而數。微則無氣。無氣則榮虛。榮虛則血不足。血不足則胸中冷。趺陽脈浮而濇。浮則爲虛。濇則傷脾。脾傷則不磨。朝食暮吐。暮食朝吐。宿穀不化。名曰胃反。脈緊而濇。其病難治。

第五節 吐逆不可下法

病人欲吐者不可下之。

第六節 嘈逆可下法

嘔而腹滿。視其前後。知何部不利。利之愈。

第二章 嘔治法

第一節 衛氣嘔

嘔而胸滿者。吳茱萸湯主之。

第二節 水氣嘔

乾嘔、吐涎沫、頭痛者。吳茱萸湯主之。

第三節 風氣嘔

嘔、而腸鳴、心下痞者。半夏瀉心湯主之。

第四節 火氣嘔

乾嘔、而利者。黃芩加半夏生薑湯主之。

第五節 溼氣嘔

諸嘔、吐、穀不得下者。小半夏湯主之。

第六節 燥氣嘔

嘔、吐、而病在膈上。後、思水者、解急與之。思水者。猪苓散主之。

第七節 寒氣嘔

嘔而脈弱、小便復利、身有微熱、見厥者。難治。四逆湯主之。

第八節 热氣嘔

嘔、而發熱者。小柴胡湯主之。

第三章 吐治法

第一節 胃虛作吐

胃反、嘔、吐者。大半夏湯主之。

第二節 胃實作吐

食已卽吐者。大黃甘草湯主之。

第三節 利下焦水止吐法

胃反、吐、而渴。欲飲水者。茯苓澤瀉湯主之。

第四節 發上焦汗止吐法

吐後、渴欲得水、而貪飲者。文蛤湯主之。兼主微風脈緊頭痛。

第五節 溫中焦寒止吐法

乾嘔、吐逆、吐涎沫。半夏乾薑散主之。

第四章 嘘治法

第一節 輕嘘治法

病人胸中似喘不喘似嘘不嘘似嘘不嘘。微心中憤憤無奈者。生薑半夏湯主之。

第二節 不輕不重嘘治法

乾嘘、曦。若手足厥者。橘皮湯主之。

第三節 重嘘治法

噦逆者。橘皮竹茹湯主之。

第五章 六經五臟下利總論

第一節 下利總綱

夫六腑氣絕於外者。手足寒、上氣、脚縮。五臟氣絕於內者。利不禁、下甚者、手足不仁。

第二節 厥陰化熱法

下利。脈沉弦者、下重。脈大者、爲未止。脈微弱數者、爲欲自止。雖發熱、不死。

第三節 陽明化熱法

下利。手足厥冷、無脈者、灸之不溫、若脈不還、反微喘者、死。少陰負趺陽者、爲順也。

第四節 太陰化熱法

下利。有微熱、而渴。脈弱者、今自愈。

第五節 太陽化熱法

下利。脈數、有微熱、汗出、今自愈。設脈緊、爲未解。

第六節 少陰化熱法

下利。脈數、而渴者、今自愈。設不差、必圊膿血。以有熱故也。

第七節 少陽化熱法

下利脈反弦、發熱、身汗、愈。

第八節 肺利

下利氣者。當利其小便。

第九節 肝利

下利寸脈反浮數、尺中自濇者。必圊膿血。

第十節 脾利

下利清穀。不可攻其表。汗出、必脹滿。

第十一節 腎利

下利脈沉而遲。其人面少赤、身有微熱、下利清穀者。必欬冒、汗出、而解。病人必微厥、所以然者、其面戴陽。下虛故也。

第十二節 心利

下利後。脈絕。手足厥冷。時脈還。手足溫者。生。脈不還者。死。

第六章 下利治法

第一節 太陽作利治法

下利後。腹脹滿。身體疼痛者。先溫其裏。乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。

第二節 少陰作利治法

下利。三部脈皆平。按之心下堅者。急下之。宜大承氣湯。

第三節 厥陰作利治法

下利。脈遲而滑者。實也。利未欲止。急下之。宜大承氣湯。

第四節 太陰作利治法

下利。脈反滑者。當有所去。下。乃愈。宜大承氣湯。

第五節 少陽作利治法

下利已差。至其年月日時復發者、以病不盡故也。當下之、宜大承氣湯。

第六節 陽明作利治法

下利譖語者、有燥屎也。小承氣湯主之。

第七節 厥陰寒利治法

下利便膿血者、桃花湯主之。

第八節 厥陰熱利治法

熱利下重者、白頭翁湯主之。

第九節 少陰熱利治法

下利後更煩、按之心下濡者、爲虛煩也。梔子豉湯主之。

第十節 少陰寒利治法

下利清穀、裏寒外熱、汗出而厥、通脈四逆湯主之。

第十一節 太陰熱利治法

下利。肺痛。紫葛湯主之。

第十二節 太陰寒利治法

氣利、柯黎勒散主之。

瘡癰腸癰浸淫病脈證篇第十八

第一章 瘡癰論

第一節 癰之脈證

諸浮數脈、應當發熱、而反洒淅惡寒、若有痛處、當發其癰。師曰。諸癰腫、欲知有膿無膿。以手掩腫上。熱者、爲有膿。不熱者、爲無膿。

第二章 腸癰病

第一節 腸癰虛證治法

腸癰之爲病。其身甲錯、腹皮急。按之濡、如腫狀。腹無積聚、身無熱、脈數。此爲腸內有癰膿。薏苡附子敗醬散主之。

第二節 腸癰實證治法

腫癰者。少腹腫痞、按之卽痛如淋。小便自調、時時發熱、自汗出、復惡寒、其脈遲緊者。膿未成可下之。當有血。脈洪數者。膿已成不可下也。

雜病論草稿

大黃牡丹湯主之。

第三章 金瘡病

第一節 金瘡脈證

問曰。寸口脈浮微濇。法當亡血。若汗出。設不汗出者。云何。曰。若身有瘡。刀斧所傷。亡血故也。

第二節 金瘡證治

病金瘡。王不留行散主之。

第三節 陽瘡癰治方

排膿散。

第四節 陰瘡癰治方

排膿湯。

第四章 浸淫病

十八

第一節　　浸淫瘡總論

浸淫瘡。從口起、流向四肢者、可治。從四肢流來入口者、不可治。

第二節　　浸淫治法

浸淫瘡。黃連粉主之。

口譯此詞到處皆可詣。對四初而來人口齊不復詣。

卷一
序

高麗書賈歌詩主文

卷二
歌

卷三
歌

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲病脈證篇第十九

第一章 跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲病治法

第一節 跌蹶

師曰。病跌蹶。其人但能前。不能卻。刺腨入二寸。此太陽經傷也。

第二節 手指臂腫

病人常以手指臂腫動。此人身體瞞瞞者。藜蘆甘草湯主之。

第三節 轉筋

轉筋之爲病。其人臂脚直。脈上下行微弦。轉筋入腹者。鷄屎白散主之。

第四節 狐疝

陰。狐疝氣者。偏有小大。時時上下。蜘蛛散主之。

第五節 蛇蟲病總論

問曰。病腹痛有蟲。其脈何以別之。師曰。腹中痛。其脈當沉。若弦。反洪大。故有蛦蟲。

第六節 蛸蟲甘緩治法

蛦蟲之爲病。令人吐涎、心痛、發作有時。毒藥不止者。甘草粉蜜湯主之。

第七節 蛸蟲酸收治法

蛦厥者。其人當吐蛦。今病者。靜而復時煩。此爲臟寒。蛦上入膈。故煩。須臾復止。得食而嘔。又煩者。蛦聞食臭出。其人當自吐蛦。蛦厥者。烏梅丸主之。

婦人妊娠病脈證篇第二十

第一章 總論

第一節 妊娠脈證總綱

師曰。婦人得平脈。陰脈小弱。其人渴。不能食。無寒熱。名妊娠。桂枝湯主之。於法六十日。當有是證。設有醫治逆者。却一月加吐下者。則絕之。

第二章 血病

第一節 心血瘀

婦人宿有癥病。經斷未及三月。而得漏下不止。胎動在臍上者。此爲癥痼害。妊娠六月動者。前三月經水利時。胎也。下血者後斷三月。歸也。所以血不止者。其癥不去故也。當下其癥。桂枝茯苓丸主之。

第二節 腎血寒

婦人懷妊六七月。脈弦、發熱、其胎愈脹。腹痛、惡寒、少腹如扇。所以然者。子臟開故也。當以附子湯溫其臟。

第三節 肝血虛

師曰。婦人有漏下者。有半產後、因續下血、都不絕者。有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛、爲胞阻。膠艾湯主之。

第四節 脾血熱

婦人懷孕、腹中疔痛。當歸芍藥散主之。

第三章 氣病

第一節 胃氣寒

妊娠、嘔吐不止。乾薑人蔘半夏丸主之。

第二節 腎氣藏

妊娠、小便難、飲食如故。當歸貝母苦蔞丸主之。

第三節 肺氣閉

妊娠有水氣、身重、小便不利、迺浙惡寒、起卽頭眩。葵子茯苓散主之。

第四節 肝氣熱

婦人妊娠宜常服。當歸散主之。

第五節 脾氣虛

妊娠養胎。白朮散主之。

第六節 心氣實

婦人傷胎。懷身腹滿。不得小便。從腰以下重。如有水狀。懷身七月。太陰當養不養。此心氣實。當刺瀉勞宮。及關元。小便微利。則愈。

細雨潤不透。此亦是實。陳國參官人補元本源。據此得
知大抵也。對喪事。說本源。小聲。非過以不重。故耳。本源。對喪事。凡大

舉。六禮。皆取實。

此張楚城。自棄。建主之。也。其後。無復

舉。亦如前。所。執。理。更。一。

缺人。無。者。立。當。照。治。執。事。主。之。

此張。楚。城。固。辟。立。所。用。及。續。事。主。之。

缺。頭。持。衣。殊。良。重。本。源。不。解。既。述。經。事。故。與。之。建。主。之。

此張。楚。城。固。辟。立。所。用。及。續。事。主。之。

婦人產後病脈證篇第二十一

第一章 總 綱

第一節 產後六經病總論

問曰。新產婦人有三病。一者病癰。二者病鬱冒。三者大便難。何謂也。師曰。新產血虛。多汗出。喜中風。故令病癰。亡血。復汗。寒多。故令鬱冒。亡津液。胃燥。故大便難。

第二章 產後六經病治法

第一節 少陽病

產婦鬱冒。其脈微弱。嘔不能食。大便反堅。但頭汗出。所以然者。血虛而厥。厥而必冒。冒家欲解。必大汗出。以血虛下厥。孤陽上出。故頭汗出。所以產婦喜汗出者。亡陰血虛。陽氣獨盛。固當汗出。陰陽乃復。大便堅。嘔不能食。小柴胡湯主之。病解能食。七八日更發熱者。此爲胃

實。宜大承氣湯主之。

第二節 太陰病

產後腹中痀痛。當歸生薑羊肉湯主之。併治腹中寒疝。虛勞不足。

第三節 少陰病

產後腹痛、煩滿、不得臥。枳實芍藥散主之。

第四節 厥陰病

師曰。產婦腹痛。法當以枳實芍藥散。假令不愈者。此爲腹中有瘀血。着臍下。宜下瘀血湯主之。亦主經水不利。

第五節 陽明病

產後七八日。無太陽證。少腹堅痛。此惡露不盡。不大便。煩。燥。發熱。切脈微實。更倍發熱。日晡時。煩躁者不食。食則譖語。至夜即愈。宜大承氣湯主之。熱在裏。結在膀胱也。

第六節 太陽病

產後風續數十日不解。頭微疼、惡寒、時時有熱、心下悶、乾嘔、汗出。雖久陽旦證續在者可與陽旦湯。

第三章 三焦病

第一節 上焦病

產後中風發熱、面正赤、喘而頭痛。竹葉湯主之。

第二節 中焦病

婦人乳中虛、煩亂、嘔逆。安中益氣。竹皮大丸主之。

第三節 下焦病

產後下利虛極。白頭翁加甘草阿膠湯主之。

子厚與裴度爲張公而嘗奉西廬爲主客

張三清

石鼎詩

唐人以李斯陳勝項羣爲中華漢室大氏主矣

張三清

石鼎詩

唐人以李斯陳勝項羣爲中華漢室大氏主矣

張三清

石鼎詩

唐人以李斯陳勝項羣爲中華漢室大氏主矣

張三清

石鼎詩

唐人以李斯陳勝項羣爲中華漢室大氏主矣

張三清

石鼎詩

婦人雜病脈證篇第二十二

第一章 肝藏病

第一節 少陽邪入血室

婦人中風。七八日續來寒熱。發作有時。經水適斷者。此爲熱入血室。其血必結。故使如瘡狀。發作有時。小柴胡湯主之。

第二節 陽明邪入血室

婦人傷寒發熱。經水適來。晝日明了。暮則譫語。如見鬼狀者。此爲熱入血室。治之無犯胃氣。及上下焦。必自愈。

第三節 太陽邪入血室

婦人中風。發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除。脈遲。身涼和。胸脇滿。如結胸狀。譫語者。此爲熱入血室也。當刺期門。隨其實而取之。

第四節 燥邪入血室

陽明病。下血譫語者。此爲熱入血室。但頭汗出。當刺期門。隨其實而瀉之。濺然汗出者愈。

第二章 肺藏病

第一節 肺氣實

婦人咽中如有炙欖。半夏厚樸湯主之。

第二節 肺液虛

婦人藏躁。悲傷欲哭。象如神靈所作。數欠伸。甘麥大棗湯主之。

第三節 肺積水積火

婦人吐涎沫。醫反下之。心下卽痞。當先治其吐涎沫。小青龍湯主之。涎沫止。乃治痞。瀉心湯主之。

第三章 心藏病

第一節 血病經帶總論

婦人之病。因虛積冷結氣爲諸經水斷絕。至有歷年血寒積結胞門。寒傷經絡凝堅。在上嘔吐涎唾。久成肺癰形體損。冷在中盤結繞臍。寒疝或兩脇疼痛與藏相連。或結熱中痛在關元脈數無滯肌若魚鱗時着男子非止女身。在下寒多經候不勻令陰掣痛少腹惡寒。或引腰脊下根氣街氣衝急痛膝脛疼煩奄然眩冒狀如厥嶺。或有憂慘悲傷多嗔此皆帶下。非有鬼神久則羸瘦脈虛多寒三十六病千變萬端審脈陰陽虛實緊弦行其鍼藥治危得安。其雖同病脈各異源子當辨記勿謂不然。

第二節 血瘀之經帶

問曰婦人年五十血病下利數十日不止暮則發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其證唇口乾燥故知之當以溫經湯主之。

第三節 血實之經帶

帶下。經水不利。少腹滿痛。經一月再見者。土瓜根散主之。

第四節 血虛之經帶

寸口脈弦而大。弦則爲減。大則爲芤。減則爲寒。芤則爲虛。寒虛相搏。此名曰革。婦人則半產漏下。旋覆花湯主之。

第五節 血寒之經帶

婦人陷經漏下。黑不解。膠薑湯主之。

第六節 血挾水之經帶

婦人少腹滿。如敦狀。小便微難。而不渴。生後者。此爲水與血俱結在血室也。大黃甘遂湯主之。

第七節 血閉之經帶

婦人經水不利。下抵當湯主之。

第八節 血乾之經帶

婦人經水閉不利。藏堅。癖不止。中有乾血。下白物。礬石丸主之。

第四章 脾藏病

第一節 血實腹痛

婦人六十二種風。腹中血氣刺痛。紅藍花酒主之。

第二節 血虛腹痛

婦人腹中諸疾痛。當歸芍藥散主之。

第三節 氣虛腹痛

婦人腹中痛。小建中湯主之。

第五章 腎藏病

第一節 陰閉

問曰。婦人病。飲食如故。煩熱。不得臥。而反倚息者。何也。師曰。此名轉

胞不得溺也。以胞系了戾。故致此病。但當利小便則愈。腎氣丸主之。

第二節 陰寒

婦人陰寒。溫陰中坐藥。蛇床子散主之。

第三節 陰熱

少陰脈滑而數者。陰中卽生瘡。陰中蝕瘡爛者。狼牙湯洗之。

第四節 陰吹

胃氣下泄。陰吹而正喧。此穀氣之實也。以膏髮煎主之。

雜病論章節終

▲內科學瘡科婦人科學附

中華民國十九年一月出版

包氏醫宗第二集目錄

卷之一

雜病論章節

卷之二

雜病方法 附歌括

一冊

卷之三

雜病表 附表式

一冊

卷之四

雜病論講義

二冊

卷之五

雜病方講義

一冊

(第二集售銀伍圓)

包氏醫宗第二集第一卷

雜病論章節一冊

著作者 閩杭包識生

出版者 包氏醫宗出版部

總發行 包氏醫宗出版部

上海北泥城橋新聞路
口鴻祥里二一四五號

代售處 各大書局

◆印翻准不有所權版◆

▲內科傳染病學

包氏醫宗第三集

診斷學

四冊

印刷中

傷寒論章節

包氏醫宗第四集

解剖學附圖

二冊

編輯中

傷寒方法 附歌括

一冊

生理學

二冊

編輯中

傷寒表 附表式

一冊

病理學

二冊

編輯中

傷寒論講義

一冊

包氏醫宗第六集

治療學

一冊

編輯中

傷寒方講義

二冊

包氏醫宗第七集

藥物學

一冊

編輯中

(第一集售銀陸圓)

▲函索樣本附郵票二十分