

仲景傷寒補亡論卷第九

河 南 郭 雍 謨 次

汗後四十四條

不可吐五條

可吐十條

汗後四十四條

仲景曰二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可下下之爲逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不

足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人煩躁不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈濇故知之常氏云可柴胡桂枝湯龐氏云用麻黃

湯

又曰未持脈時以手冒心師因教試令欬而不欬者此兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此常氏云可小柴胡湯雍曰先宜小建中湯

又曰發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘常氏云治

喘可麻黃杏子石膏湯雍曰傷水者五苓散

鈞匡曰宜小青

龍湯

又曰發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必吐下
不止常氏云可小半夏加橘皮湯雍曰可類要四味

橘皮湯

又曰陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尙微煩
不了了者此必大便輒故也以亡津液胃中乾燥故
令大便輒當問其小便日幾行若本小便日三四行
今日再行故知大便不久出今爲小便數少以津液

當還入胃中故知不久必大便也常氏云可小柴胡湯雍曰小便少者津液還入胃則不須服藥也

又曰發汗多若重發汗者亡其陽讐語脈短者死脈自和者不死常氏云可小柴胡湯

又曰傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之常氏云可五苓散雍曰黃芪加茵陳湯

又曰病人有寒復發汗胃中冷必吐衄常氏云可理

中丸烏梅丸

又曰太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢
微急難以屈伸者屬桂枝加附子湯龐氏曰小便難
爲有津液可作汗若小便數不可誤認爲桂枝證也

又曰服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法

謂刺風池風府若形似瘧一日再三發者汗出必解屬桂枝

二麻黃一湯

又曰服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者屬

白虎加人參湯

又曰傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚癉急

反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚卽伸若胃氣不和讝語者少與調胃承氣湯

又曰若重發汗復加燒鍼者與四逆湯雍曰此證首尾都無四逆證恐是字誤今詳重發汗復加燒鍼恐是火劫亡陽驚狂者則當與桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯若止是火逆因燒鍼煩躁則當與桂枝甘草龍骨牡蠣湯亦救逆也故恐四逆本是救逆

湯字校正曰誤書入四逆一方也

又曰傷寒發汗已解半日許復煩脈浮數與桂枝湯
又曰發汗後身疼痛脈沈遲者屬桂枝加芍藥生薑
各一兩入參三兩新加湯

又曰發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者
可與麻黃杏子甘草石膏湯

又曰發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者
屬桂枝甘草湯

又曰發汗後其人臍下悸者欲作奔豚屬茯苓桂枝

甘草大棗湯

又曰發汗後腹脹滿者屬厚朴生薑半夏甘草人參湯

又曰發汗後病不解反惡寒者虛故也屬芍藥甘草附子湯

又曰發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣屬調胃承氣湯脈經作小承氣湯仍二證通爲一

又曰太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲

得飲水者少少與飲之令胃中和自愈若脈浮小便不利微熱消渴者屬五苓散

又曰發汗已脈浮數煩渴者屬五苓散

又曰傷寒汗出而渴者宜五苓散不渴者屬茯苓甘

草湯

又曰太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞶動振振欲擗地屬真武湯

又曰傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者屬生薑瀉心湯

又曰傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者屬大柴胡湯

又曰陽明病自汗出若發汗後小便自利者此爲津液內竭雖鞭不可攻之須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根大猪膽汁皆可爲導

又曰太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也宜調胃承氣湯

又曰大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者屬四逆湯也

又曰發汗後不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯
又曰發汗多亡陽讞語者不可下與柴胡桂枝湯和
其榮衛以通津液後自愈

問曰古所謂陰陽交者何也素問三十三篇曰有病
溫者汗出輒復熱而脈躁疾不爲汗衰狂言不能食
病名陰陽交交者死也岐伯曰人所以汗出者皆生
於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪
却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣
也汗出者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不

能食者精無俾也汗而熱留者其壽可立而傾也
問曰素問言汗出而脈尙躁盛者死何也雍曰此則
陰陽交也靈樞二十三篇曰熱病已得汗而脈尙躁
盛此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生熱病脈盛
躁而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗靜者
生

又問曰何以謂之交也雍曰陰極則交陽陽極則交
陰交則爭而亂矣故不可極也有生者何如曰靜則
生交則死也陰脈脈靜陽脈人靜皆生之證也

問曰何以謂之盛躁雍曰靈樞九篇所謂人迎一盛
二盛三盛脈口一盛二盛三盛者此之謂盛也一盛
而躁二盛而躁三盛而躁此之謂躁也極者何也人
迎脈口四盛皆爲極矣人迎四盛名曰溢陽爲外格
脈口四盛名曰溢陰爲內關內關外格死不治卽陰
陽交也人迎不爲衰陽交也脈口不爲衰陰交也脈
口卽氣口也

問曰有躁而不盛者何如雍曰靈樞二十三篇曰熱
病已得汗出而脈尚躁喘且復熱勿膚刺喘甚者死

是也此雖不盛而喘亦非其宜故喘甚則死也

問曰有煩滿不爲汗解者何也雍曰素問三十三篇曰有熱病身熱汗出煩滿不爲汗解岐伯曰汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥巨陽主氣故先受邪少陰與其爲表裏也得熱則上從之從之則厥也治之者表裏刺之飲之湯劑雍曰仲景言傷寒感異氣變爲壞病如風溫溫毒之類則此風厥亦其類也宜刺太谿崑崙服茯苓桂枝甘草

大棗湯

問曰汗後脈洪者何也雍曰洪大者非不爲汗衰而而未得盡去非若躁盛全不爲汗衰也故仲景以爲可治之疾然洪大亦有輕重如一盛二盛之說若洪大而無他證者刺風池風府却與桂枝湯是也洪大而大煩渴不解者白虎加人參湯除其裏熱也其餘逐證不同者皆依仲景之法治之

問曰汗後飲水多者必喘而治熱病飲之寒水何也雍曰素問三十二篇曰諸治熱病以飲之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處身寒而止也此謂治五藏熱

病各刺手足諸經證治與傷寒有異詳刺熱終篇可見故傷寒不可多飲水

問曰素問言熱病已愈時有所遺何也雍曰此謂勞復非汗後證勞復本證詳之

問曰汗後之證或治或不治何也雍曰汗後之證多矣動於脈者重見於證者輕如汗後脈盛躁是邪之會不退也脈洪大者刺之如汗後尚發熱心下痞喘滿吐利小便或利或不利之類皆正病已衰餘毒未退依仲景隨證治之則愈

于金翼曰發汗後身熱又重發其汗胃中虛冷必反吐也雍曰宜小建中湯四味橘皮湯

又曰發汗後重發其汗亡陽讞語其脈反和者不死服桂枝湯汗出大煩渴不解若脈洪大者與白虎湯不可吐五條

仲景曰太陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱關上脈細數者以醫吐之過也若得病一二日吐之腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲飲冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此爲小逆常氏云

可小半夏加橘皮湯溫中湯

又曰太陽病吐之者但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣者此爲吐之內煩也常氏云可金匱竹皮湯竹葉石膏湯雍曰大橘皮湯四味橘皮湯皆可服又曰少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之常氏云可小半夏加橘皮湯溫中湯

又曰諸四逆厥者不可吐之虛家亦然龐氏曰諸四

逆脈微弱細或弦遲雖中滿悶不可吐宜橘皮湯枳實散又曰虛家當吐而不敢吐者宜以枳實散壓氣毒痰水過日毒氣入胃乃可微下之

龐氏曰不可吐而強之吐氣築心則死矣

可吐十條

仲景曰大法春宜吐

又曰凡用吐湯中病則止不必盡劑也

又曰病如桂枝證頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞
鞶氣上衝咽喉不得息者此爲胸有寒當吐之一云此以

內有久痰常氏云可瓜蒂散
當吐之

又曰病胸上諸實

一云作寒

胸中鬱鬱而痛不能食欲使

人按之而反有涎唾

一作濁唾

下利日十餘行其脈反遲

寸口脈微滑此可吐之吐之利則止常氏云可瓜蒂

散

又曰宿食在上脘者當吐之常氏云可瓜蒂散

又曰少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能

吐者宜吐之常氏云宜瓜蒂散

又曰病人手足厥冷脈乍結

一作緊

以客氣

一作邪結

在胸

中心下滿而煩欲食不能食者病在胸中當吐之常
氏云可瓜蒂散

龐氏曰胸膈痞悶痰壅塞礙脈得浮滑並宜瓜蒂散
吐之產後六七日內下瀉諸藥不效得此脈者吐之
瀉立止

千金傷寒論曰得病無熱但狂言煩躁不安精采言
語不與人相當者勿以火迫之但以猪苓散一方
寸匙服之當逼與新水一升若二升強飲之令以物
刺喉中吐之病隨吐愈若不能吐者勿強與之水水

停則結心下也當更以餘藥吐之若此病輩不將猪苓散吐解之者其死殆速有水飲漏竇者皆難治此三死一生也雍曰心下停水難治之疾須早吐也

病源曰寒多熱少可吐者此謂痰多也治瘧亦如之

仲景傷寒補亡論卷第九終

仲景傷寒補亡論卷第十

河 南 郭 雍 謨 次

不可下四十七條 可下四十八條

不可下四十七條

仲景曰脈濡而弱弱反在關

龐云關下三分也

濡反在巔

開上

三分微反在上

寸脈也

濇反在下

尺部也

微則陽氣不足

濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩濇則無血

厥而且寒陽微不可下下之則心下痞鞭龐氏以氣血俱不足用小建中湯常氏云下後心下痞鞭用增

損理中丸

又曰動氣在右不可下下之則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也龐氏以咽燥鼻乾宜竹葉湯

又曰動氣在左不可下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖有身熱臥則欲踴龐常皆云先服乾薑甘草湯後服小建中湯

又曰動氣在上不可下下之則掌握熱煩身上浮冷熱汗自泄欲得水自灌常氏云宜小建中湯
又曰動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食

則下清穀心下痞也龐氏云心下痞宜半夏瀉心湯
又曰咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿不下
臥則欲跪身急痛下利曰數十行常氏云咽中閉塞
可烏扇煎下利宜四逆散

又曰諸外實者不可下下之則發微熱亡脈厥者當
躋握熱雍曰宜服去白术理中湯以术利腰臍間血
故也

又曰諸虛者不可下下之則大渴求一作引水者易愈
惡水者劇雍曰宜小建中湯

又曰脈濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反
在下弦爲陽運微爲陰寒上實下虛意欲得溫微弦
爲虛虛者不可下也微則爲欬欬則吐涎下之則欬
止而利因不休利不休則胸中如蟲齧粥入則出小
便不利兩脇拘急喘息爲難頸背相引臂則不仁極
寒反汗出身冷若冰眼睛不慧語言不休而穀氣多
入此名除中一云
消中口雖欲言舌不得前雍曰此不治
之證故諸家無治法龐氏云諸脈濡弱微虛細相搏
俱不可下

又曰脈濡而弱弱反在關濡反在巔浮反在上數反
在下浮爲陽虛數爲亡血浮爲虛數爲熱浮爲虛自
汗出而惡寒數爲痛振寒而慄微弱在關胸下爲急
喘汗而不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相搏形
如瘡狀醫反下之故令脈數發熱狂走見鬼心下爲
痞小便淋瀝小腹甚鞭小便則尿血也常氏云可小
柴胡湯鵲石散延胡索散

又曰脈濡而緊濡則微氣微緊則榮中寒陽微衛中
風發熱而惡寒榮緊胃氣冷微嘔心內煩醫爲有大

熱解肌而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒起而頭眩客熱在皮膚悵怏不得眠不知胃氣冷緊寒在關元技巧無所施汲水灌其身客熱應時罷慄慄而振寒重被而覆之汗出而冒巔體惕而又振小便爲微難寒氣因水發清穀不容間嘔變反腸出顛倒不得安手足爲微逆身冷而內煩遲欲從後救安可復追還常氏云可灸關元雍曰仍服通脈四

逆湯

又曰脈浮而大浮爲氣實大爲血虛血虛爲無陰孤

陽獨下陰部者小便當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗出法應衛家當微今反更實津液四射榮竭血盡乾煩而不得眠血暴肉消而成暴液暴液一作黑液

醫復以毒藥攻其胃此爲重虛客陽去有期必下如汚泥而死常氏云可小建中湯已經下者不治

又曰脈浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗而不可下也常氏云可桂枝麻黃各半湯雍曰仲景可汗證中只用

麻黃湯

又曰趺陽脈遲而緩胃氣如經也趺陽脈浮而數浮則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所爲也榮衛內陷其數先微脈反但浮其人必大便鞭氣噫而除何以言之本以數脈動脾其數先微故知脾氣不治大便鞭氣噫而除今脈反浮其數改微邪氣獨留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴數脈當遲緩脈因前後度數如法病者則飢數脈不時則生惡瘡也常氏云可小柴胡湯惡瘡漏蘆湯

又曰脈數者久數不止則邪結正氣不能復正氣

却結於藏故邪氣浮之與皮毛相得脈數者不可下
下之必煩利不止常氏云可柴胡桂枝湯

又曰少陰病脈浮不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈
弱濇者復不可下之雍曰宜建中湯

又曰脈浮大應發汗醫反下之此爲大逆雍曰誤下
宜四味理中丸誤下則中氣受傷故用是湯

又曰脈浮而大心下反鞭有熱屬藏者攻之不令發
汗屬府者不令洩數洩數則大便鞭汗多則熱愈汗
少則便難脈遲尙未可攻常氏云可小柴胡湯雍曰

此一證中有誤字脈經云攻之不令微汗屬府洩數則堅汗多則愈汗出小便難文皆有誤不能通

又曰二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷者不可下下之爲逆常氏以太陽證不罷宜柴胡桂枝湯

又曰結胸證脈浮大者不可下下之則死常氏云可小陷胸湯增損理中丸聖餅炙法

又曰太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下常氏云

可麻黃杏子甘草石膏湯

又曰太陽與少陽併病心下鞭頸項強而眩者不可
下常氏云可小柴胡湯雍曰仲景刺大椎肺俞肝俞
見太陽證中

又曰諸四逆厥者不可下之虛家亦然常氏云可當
歸四逆湯龐氏云若下證悉見四逆者是失下後氣
血不通使然但手足微厥掌心常溫時復指稍溫卽
可下之勿拘忌也

又曰病欲吐者不可下常氏云可半夏加橘皮湯

又曰太陽病有外證未解不可下下之爲逆常氏云
可桂枝麻黃各半湯雍曰依可汗證中用桂枝二麻
黃一湯

又曰病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰
而反下之一作汗之官本及脈經皆作下之因作痞常氏云結胸可
大陷胸湯痞可半夏瀉心湯

又曰病脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞常氏
云可小陷胸湯瀉心湯雍曰宜半夏瀉心湯
又曰夫病陽多者熱下之則輕常氏云可小柴胡湯

又曰其人本虛攻其熱必嘔雍曰宜半夏生薑湯類
要四味橘皮湯

又曰無陽陰强大便鞭者下之必清穀腹滿常氏云
可蜜煎導之

又曰太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹
自痛若下之必胸下結鞭常氏云可桂枝加芍藥湯
胸下結鞭者增損理中丸

又曰厥陰之爲病消渴氣上撞心心中疼熱飢不欲
食食則吐蚘下之利不止常氏云下之利不止宜四

逆湯餘見厥陰本證

又曰少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也常氏云飲食入口則吐可瓜蒂散餘見少陰本證

又曰傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下此亡血下之死常氏云可小建中湯已下不治

又曰傷寒發熱頭痛微汗出發汗則不識人熏之則喘不得小便下之則短氣小便難頭痛背強加溫針則効常氏云可小柴胡湯已汗者桂枝加附子湯汗

出而喘者麻黃甘草杏子石膏湯已下者五苓散加溫針者芍藥地黃湯

又曰傷寒脈陰陽俱緊惡寒發熱則脈欲厥厥者脈初來大漸漸小更來漸大是其候也如此者惡寒甚者翕翕汗出喉中痛若熱多者目赤脈多睛不慧醫復發之咽中則傷若復下之則兩目閉寒多便清穀熱多便膿血若熏之則身發黃若熨之則咽燥若小便利者可救之若小便難者爲危殆常氏云初證宜桂枝麻黃各半湯喉中痛桔梗湯熱多小柴胡湯便

清穀理中丸便膿血桃花湯身發黃茵陳蒿湯小便
難者猪苓湯

又曰傷寒發熱口中勃勃氣出頭痛目黃劙不可制
貪水者必嘔惡水者厥若下之咽中生瘡假令手足
溫者必下重便膿血頭痛目黃者若下之則兩目閉
貪水者若下之其脈必厥其聲嚶咽喉塞若發汗則
戰慄陰陽俱虛惡水者若下之則裏冷不嗜食大便
完穀出若發汗則口中傷舌上白胎煩躁脈數實不
大便六七日後必便血若發汗則小便自利也常氏

曰若熱効不可制者芍藥地黃湯水逆者五苓散便
膿血桃花湯咽中生瘡白礬甘草散陰陽俱虛小建
中湯裏冷不嗜食理中湯發熱身黃梔子蘢皮湯餘
證小柴胡湯汗出小便數甘草乾薑湯

又曰得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下輒
至四五日雖能食以小承氣湯少少和之令小安至
六日與大承氣一升若不大便六七日小便少者雖
不能食但初頭輒後必溏未定成輒攻之必溏須小
便利屎定輒乃可攻之龐氏曰尺下弱小便不利或

尙少皆未可攻

又曰藏結無陽證不往來寒熱或寒而不熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也常氏云可刺關元穴在臍下又曰可刺大赫在腹部第二行雍曰灸尤奇

又曰傷寒嘔多雖有陽明證不可攻之雍曰不可攻之恐厥逆也可小半夏加茯苓湯生薑橘皮湯

又曰陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃

可攻之若不轉失氣者此但初頭輒後必溏不可攻
之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後
發熱者大便復輒而少宜小承氣湯和之不轉失氣
者慎不可攻也

又曰傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不
化腹中雷鳴心下痞輒而滿乾嘔心煩不得安醫見
心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以
胃中虛客氣上逆故使輒也屬甘草瀉心湯

又曰下利脈大或浮大者虛也以強下之故也設脈

浮革因爾腸鳴屬當歸四逆湯

又曰陽明病面合色赤不可攻之攻之必發熱色黃
小便不利也常氏云可五苓散

又曰陽明病心下鞢滿者不可攻之攻之利遂不止
者死利止者愈常氏云心下鞢滿者可半夏瀉心湯
已攻而利者四逆湯

又曰陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液
內竭雖鞢不可攻之當須自欲大便宜蜜導而通之
若土瓜根及猪膽汁皆可爲導

龐氏曰不當下而強下之令人腸胃洞泄不禁而死
可下四十八條

仲景曰大法秋宜下

又曰凡服下藥宜用湯勝丸散中病便止不必盡劑
也

又曰陽明病發熱汗多者急下之宜大柴胡湯龐氏
云發熱不惡寒汗多

又曰少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之宜大
承氣湯

又曰陽明少陽合病必下利其脈不負者順也負者失也互相尅賊名爲負也龐氏曰陽明土其脈大少陽木其脈弦若合病土被木賊加之以利則胃已困矣若脈不弦爲土不負弦者爲土負必死雍曰此合病一證下至名爲負也而終按本論原誤錄宿食一證相連非也脈經以宿食別作一證爲當蓋脈滑數有宿食故仲景可用承氣湯若胃爲木尅因而下利安有用承氣之理令依脈經離而爲二宿食證依仲景用承氣湯惟合病下利闕治法今以負爲不治不

負宣理中丸厥者宜四逆湯仍瀉邱虛陽陵泉補三里穴龐朱二氏依舊本合爲一證疑其非大抵讀仲景論仍須以脈經參校之

又曰少陰病下利清水色純青心下必痛口乾燥者可下之宜大柴胡湯大承氣湯餘見少陰本證更詳之

又曰下利三部脈皆平按之心下鞭者急下之宜大承氣湯龐氏曰凡脈沈細數爲熱在裏又兼腹滿咽乾或口燥舌乾而渴者或六七日不大便小便自如

或目中瞳子不明無外證者或汗後脈沈實者或下利三部脈皆平按之心下堅者或連發汗不惡寒者或已經下其脈浮沈按之有力者皆宜大承氣湯

又曰下利脈浮而滑者內實也利未欲止當下之宜

大承氣湯

雍曰常氏疑本論之誤故欲以葛根黃芩治下利殊不思仲景以承氣下宿食而合病下利原無治法也葛根黃芩湯以太陽表未解誤下之利不止者既有協熱下利之表證未退故可用今合病下利胃氣傷

困只當救胃宜用溫藥故雍以四逆理中補其法胃氣已負而又加以寒藥則胃穀絕矣仲景於此一證特論脈負不負蓋欲後人當思陽明少陽土木尅賊之理而治之可謂盡善矣以是知合併病之論雖二陽俱受病邪氣俱當去又須審二經五行之氣毋令相尅賊抑強扶衰以致和氣不使復生一秦助桀爲虐也如是則胡越可同舟而共濟矣此證和二經退邪氣與人事不少異非天下至精孰能與於此然生胃氣制少陽木亦用金石藥嘗見名醫治少陰自汗

自利不止用金液丹取大效旣非古藥不敢以爲然
必不得已而用亦須七鍊九煉火力重者用之其一
煉火力輕者復可下宿食以虛人老人不敢用承氣
也

仲景問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脈浮而
大按之反濇尺中亦微而濇故知有宿食當下之宜

大承氣湯

又曰下利不欲食者以有宿食故也當下之宜大承

氣湯

又曰下利差至其年月日時復發者以病不盡故也
當下之宜大承氣湯

又曰病腹中滿痛者此爲實也當下之宜大承氣湯
大柴胡湯

又曰下利脈反滑當有所去下之乃愈宜大承氣湯
又曰腹滿不減減不足言當下之宜大柴胡湯大承
氣湯雍曰減不足言者言不甚減也論言太陽發汗
不徹不足言與此同意俗語所謂不濟事者是也
又曰傷寒後脈沈沈者內實也下之解宜大柴胡湯

雍曰須沈數有力可下之雖沈而微弱遲皆不可下也

又曰傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此爲實也急下之宜大承氣湯大柴

胡湯

又曰太陽病未解脈陰陽俱停必先振慄汗出而解

但陰脈微

一作脈實

尺者下之而解宜大柴胡湯

一法用調胃承

氣脈經云但陰微者先下之而解

陰實

龐作雍曰文當從

脈經及龐氏當作但陰脈微而尺脈實者先下之而

解

又曰脈雙弦而遲者必心下鞶脈大而緊者陽中有陰也可下之宜大承氣湯

又曰結胸者項亦強如柔痓狀下之則和龐氏云宜大陷胸丸

又曰病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之宜大柴胡湯

又曰太陽病六七日表證仍在脈微而沈反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞶滿而小便自利

者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也宜下之以抵當湯

又曰太陽病身黃脈沈結少腹鞭滿小便不利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也屬抵當湯又曰傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也當下之宜抵當丸

又曰陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗剗頸而還小便不利渴飲水漿者以瘀熱在裏身必發黃宜下之以茵蘚蒿湯雍日先服

茵陳五苓散黃退則不須更下

又曰陽明證其人喜忘者必有蓄血所以然者本有
久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑宜抵
當湯

又曰汗出而譏語者以有燥屎在胃中此爲風也須
下者過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏
實故也下之愈宜大柴胡湯大承氣湯

又曰病人煩熱汗出則解復如瘧狀日晡所發熱者
屬陽明也脈實者可下之宜大柴胡湯大承氣湯

又曰陽明病譏語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞢耳屬大承氣證

又曰下利譏語者有燥屎也屬小承氣湯初一服譏語止若更衣者停後服不爾盡與之

又曰得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心下鞢至四五日雖能食以小承氣湯小小與微和之令小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不能食但初頭鞢後必溏此未成鞢也攻之必溏須小便利屎定鞢乃攻之宜大承氣湯

又曰太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱
熱汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脇下痛乾嘔
短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也屬十棗湯

又曰太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈
其外未解尙未可攻當先解其外外解已但少腹急
結者乃可攻之宜桃核承氣湯龐云不惡寒爲外解
又曰傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿
者屬茵陳蒿湯

又曰傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而利者屬

大柴胡湯

又曰傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者屬大柴胡湯

又曰但結胸無大熱者以水結在胸脇也但頭微汗出者屬大陷胸湯

又曰傷寒六七日結胸熱實脈沈而緊心下痛按之石鞭者屬大陷胸湯

又曰陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必
鞭鞭則譖語屬小承氣湯

又曰陽明病不吐不下心煩者屬調胃承氣湯

又曰陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濶然汗出者此大便已鞶也大承氣湯主之若汗出多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者與小承氣湯微和其胃氣勿令大泄下

又曰陽明病潮熱大便微鞶者可與大承氣湯不鞶者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法

少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞚後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者大便必復鞚而少也宜小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻之雍曰不轉失氣者勿服藥待一晝夜熱氣不發泄定成鞚屎然後可攻

又曰陽明病讞語發熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣者勿更與之明日又不大便脈反微濇者裏虛

也爲難治不可更與承氣湯常氏云可人參黃芪建

中湯

又曰二陽併病大陽證罷但發潮熱手足熱熱汗出
大便難而讞語者下之則愈宜大承氣湯

又曰病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒
不能臥者有燥屎也屬大承氣湯

又曰大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有
燥屎也所以然者本有宿食故也屬大承氣湯
龐氏曰脈朝夕駛者實癥也可下之朝平夕駛者非

痺也不可下駛謂數脈六七至者也若脈數一息八九至切不可下若下之則煩躁下利不止而死脈數與皮毛相得亦不可下也雖數爲虛客熱

又曰合下不下令人腹脹滿通身浮腫而死雍曰凡汗下皆不宜大過故汗下後易將理若汗下太過則病人虛難將理易勞復凡用大承氣亦宜消息用調胃承氣代之蓋仲景自有承氣之戒故也

仲景傷寒補亡論卷第十終