


外科集成



三十九

内閣文庫	
番號	和 45027
冊數	50 (39)
函號	196 50



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007. TM: Kodak



大學東
校典藉
局之印



外科集成卷三十九目錄

雜傷第三十九

雜傷總論

湯火傷證治論

灸瘡證治論

人齧證治論

虎傷證治論

牛傷證治論



外科集成卷三十九

修澤舍活板

馬傷證治論
熊傷證治論
猪齧證治論
狼齧證治論
犬齧證治論
猫傷證治論
鼠傷證治論
蛇螫證治論

蜂螫證治論
蜘蛛傷證治論
壁鏡齧證治論
蜈蚣螫證治論
蠍蝮傷證治論
蝸牛傷證治論
螺蝨傷證治論
蚯蚓齧證治論

外科集成卷三十九

蠶齧證治論

蝮螫證治論

蜂螫證治論

蟻螫證治論

刺虫螫證治論

射工毒證治論

蚋蟻螫證治論

沙蟲螫證治論

蚊子螫證治論
諸虫螫證治論

外科集成卷三十九

修澤合治板

外科集成卷三十九

官醫瘍科 栗崎道樞正弘編輯

雜傷第三十九

雜傷總論

夫諸瘡瀉疽疔癰口內營氣不
從逆乎內理故生疽疹疔癰
瘡癰亦無不由此余將慎傷于物之
瘡癰亦無不由此余將慎傷于物之
瘡癰亦無不由此余將慎傷于物之
瘡癰亦無不由此余將慎傷于物之
瘡癰亦無不由此余將慎傷于物之
瘡癰亦無不由此余將慎傷于物之
瘡癰亦無不由此余將慎傷于物之
瘡癰亦無不由此余將慎傷于物之
瘡癰亦無不由此余將慎傷于物之

猛獸之毒經管受禁氣所
 禁息存神術云到山
 五息存神術云到山
 肺中有毒氣自通冠
 部又乃吐肺氣自通
 於走良久又閉氣三
 都監目作三歩首以
 祝日季耳李耳圖汝
 黃帝之季耳李耳圖
 何畢便行一黃帝我
 之者目向立大張左
 勢跳乎上下去虎御
 北乎君汝去虎御走
 迎此又燒半去虎御
 搗雄黃紫石絳囊貯
 書日凡見一切螫毒

此推之非尋類而治者乎
 蝸牛一筒搗爛塗之俱
 手打馬的雞皮鞭內
 及其肺畏骨類是也
 骨關虫之類是也何
 如人非粉犀骨黃破
 推治正宗一黃石公
 必自知其惡世凡有
 惡蛇以其舌螫入骨
 勿觸其惡且如解蠱
 惡蟲乃各稟陰陽毒
 生者豈非神術之祕
 血後罷救如刺瘰癧
 蛇傷降叮蝎蟻毒瘡
 死立見功火油烹痛

湯火傷證治論

淋瀝之其熱冷物及并下泥屎泥及蜜
 爛人筋也所以人中人湯火後喜擊縮
 者良由此也痛源●論曰火所傷毒
 當因其勢而利導之夫湯火所傷毒
 熱五熾通而洩其氣可也苟救目
 前痛楚遠以冷物淋則熱毒氣
 內搏致有爛骨傷筋之患非熱氣本
 然也湯火之傷本非氣血之切生病
 故治不及干湯液特在干塗傳膏汁
 專治其外而巳聖濟●初被火燒急
 向火更炙雖大痛強忍之食久即
 不痛神驗治火燒悶絕不識人以新
 尿飲之及冷水和蜜飲之●火燎
 與之然後以下方匠心●火燎

惡念回之亦不得殺之如動此除後
 必遭毒治亦難愈慎之慎之慎之
 凡蚊蝎蜈蚣咬傷雖有疼痛不可
 呼狙可毒狗咬人之後聞人號痛彼
 其七益毒狗咬人之後聞人號痛彼
 反為喜蜈蚣咬人之後聞人號痛彼
 動一不咬處即雖痛一下但門大笑
 彼即氣殺曾遇被蝎蟄即發大笑
 處果不痛此亦妙法也問傷者知
 日虫傷一法一切虫傷即問傷者知
 何虫傷答云某虫傷一師即問傷者知
 德星君無熱相吹氣一師即問傷者知
 痛立止●大毒●諸獸傷用雄黃未傳
 之眼黑細●毒●射玉沙●等傷著人
 甘艸等分為末服二錢不調下●

可揭動就火藥燒壞亦可救之內服
 泄火毒藥亦治湯毒如神凡痰
 瀉油熱藥成癩瘡人常遺毒則全
 反致肉爛成瘡人常遺毒則全
 有焦池沐浴其輕重有花爆之
 驗萬不失一或燒輕而不至身黑者
 其色者難救或燒輕而不至身黑者
 損可療也然而皮焦肉捲疼痛難
 有百計方用之而不及者以火毒
 內攻而治之不得法也收治火燒之
 症必須內治外治同治則火毒易
 湯盪瘡乃百沸湯滾油與滾油
 等物忽然猝傷因而遭毒遂至一
 皮爛肉爛成瘡也此等之瘡正所謂
 意郊之變非氣血內損也輕則隔在

瓜瀉炒火細入死子仁末和油傳之
 來也湯有火燒此極過毒內症皆
 傷寒涼極毒入裏外皮損爛者以
 承管聚散者四項之毒氣煩燥口
 珠散搽之目愈正涼飲下之泡破
 最急能燒萬物頃刻為灰何况人
 重則至此輕則為瘡皮焦肉捲苦
 難熬百計方難免下苦余社驗一
 方難出千書嘆人未得其傳制度
 法內宜服世火毒之藥外上此藥
 止瀉黃蜀葵花小拘多令均雖數
 不用手取真香油浸之令均雖數
 更勿逐羊油皮漆花漆上
 立止痛生肌冰涼自在他結痂不

痛止生肌時須黃連膏貼之收斂火
 毒攻裏者宜四順清涼散服之
 二便通利則毒熱必解外花砲火藥
 烘燥者宜法同煎金鑿●凡為湯火
 所傷者宜法同煎金鑿●凡為湯火
 先用溫湯洗之輕者宜法同煎金鑿●凡為湯火
 兼用內服黃連解毒湯不壞者宜法同煎金鑿●凡為湯火
 雖危如心脾生但此皆卒然遭遇未
 有不為之耗散元氣不可不先也選湯
 中安用之藥所不元氣不可不先也選湯
 火傷飲冷藥所不元氣不可不先也選湯
 至骨全水者必死浸盆中必爛
 輪迴或溫水內全被傷之長則以酒
 重熟入浴上內全被傷之長則以酒
 血不和木醋●凡遇湯火所燒先以

皮膚重則毒在肌肉尤甚者也
 藏府者多至殺人然內得法亦
 救內用此藥則火毒不致外以
 蚌津散汁敷之即應驗如响
 赤潰爛用歸蠟膏拔毒止痛尤
 肌皮者●此證係好肉暴傷湯火
 燒出毒水便毒輕也其證雖屬外因
 然形勢必分輕重者施治應而
 愈重者防火毒熱氣攻裏全人傾
 作嘔便秘甚則神昏悶絕初起
 燒酒一鍾不無意中望一吸一
 淡菽吃一驚其氣必一吸一
 之熱毒隨可而出矣仍作一
 新童便灌之而初用清涼膏塗
 毒止痛不致臭烟次以罌粟膏塗之

不昂上點之止痛重上
 銀翹子細赤油調傳之
 傷蛤蚧小拘多散人如
 禾用生查油調膏敷不
 斑又加蜜湯調疾止不
 等分各炒焦勿未難者
 細亦可用力煎●●湯吹
 泥塗之●●●●●●●●
 捺朱和油●●●●●●●●
 上者用艾自退之●●●●
 如成用白蠶封之●●●●
 且三丹心●●●●●●●●
 孟清濃掃之●●●●●●●●
 黑石入碾粉油調塗之●●

之竹用醃塗不起暫救痛苦一面急
 搗生地黃醋調敷若一用冷物冷木
 厚至數寸亦不功則却深燭入筋
 骨泥熬氣得冷氣則却深燭入筋
 燻欲死以好酒獨水羅亂●●●●●
 火燒以好酒獨水羅亂●●●●●
 皮塌者以酒熬生皮膠傳之●●●●
 以淋過第二次灰查傳立安若熟酒
 傷糯米粉炒黑末酒調傳之治湯火
 灼未成瘡者用艾白根燒之雞子黃
 和傳之如瘡用白蜜封之皮竹中
 膜貼上日三丹●●●●●●●●●●
 黑灰為末傳上神妙此火瘡以性始
 終首可不用細目●●●●●●●●●●
 中燥過焦黃土研細如粉以生薑調

搗塗之休調又方
搗羊髓和生薑之
油調塗之
不調者仍避風
和涼水浸之其
方醋調黃十塗之
不可忍石骨未
灼爛日飲末傳
石黃相末加油
脂生肌丹參
凡煎三上三下
取煎三上三下
取煎三上三下
取煎三上三下

修澤合活極


白反丹末未同未灰和塗之酒能煖丞致
反方丹油候油粉雞之易調聖焦水爛
丹葵子傳傳調調調子子愈傳痛投和圓
葵菜●●●●●即白亦可無之減水傳止
熟菜●●●●●之●●●之●●●之●●●●
塗為未傳之●●●●●之●●●●●
之千●●●●●湯又火傷印及焉
●●●●●黃當歸油芙蓉
●●●●●本歸油芙蓉
●●●●●又龍舌草

豆粉一兩炒黃輕粉一錢同為細末
 油調塗之正痛滅毒霜
 已破者先用膠水掃之
 貼之毛落不用復掃
 屎塗之亦可
 掃塗之
 並以此醋泥塗之
 又方羊髓和膏塗之
 又方女人精汁頻塗之
 方竹蠶蛙傳之
 骨者百草霜三錢輕粉一錢五分乳
 細麻油調搽
 切片浸麻油搽
 方冷燒酒淋洗止痛同上
 又

泥次以老薑汁麻油十分之一共研
 令勻搽傷處亦愈
 雞子黃置銀石器內熬油調胡粉任
 之手同洗之
 用赤石脂寒水石大黃各等分
 新木調塗傷處
 二分水一分攪勻
 禾敷之柳條
 筆分以柳條
 黃末石骨末
 開外用
 真金箔貼傷處
 止痛生肌
 此方

灸瘡證治論

凡著灸瘡病數足得瘡瘻出
 所患即差如不得瘡發膿出
 其疾不愈知者局方●夫灸之法中
 病則正病已則瘡瘻若病未除或
 中風冷故不瘡中瘡●灸火瘡用
 艾火灸完治病而成者●灸火瘡用
 不可然過發亦不可過發必至疼痛
 宜用太乙膏貼之如無太乙膏春月
 用柳絮夏月用竹膜秋月用新棉冬
 月用壁土貼之亦能止瘡也若灸
 瘡血出不止者莫妙用黃芩寫末酒
 調服二錢無不效者●凡貼灸
 瘡春用柳絮夏用竹膜秋用新綿冬
 用兔腹下白細布或兔腹下毛夏佳
 瘡瘻●凡著瘡瘻病總任火燭用赤
 皮厚薄荷前湯淋洗灸瘡瘻令膿涿風



若瘡甚則氣衝擊於凡血其
 相隨而行故風乘於氣而動於血而
 從於源處出氣盛則血不止名爲發
 洪疾源處出氣盛則血不止名爲發
 內鮮肉片子灸飛蝶因處飛去瘡
 不可言其血肉俱怪疾也利印
 大黃各年兩爲末水調下微利即
 本細灸瘡久不合牛屎灰付之
 同上●又方芙蓉花研末傳之同
 ●又方黃連甘草節白芷黃丹香油
 同煎膏貼之丹心●又方烏賊骨石
 凡等分爲末日灸塗之千金●灸
 腫痛電中黃末灸塗之千金●灸
 灸瘡血出不用灸用蠶絲研油
 和塗同止●灸火瘡米出不止治
 炒黃連一兩石五錢爲末攪百

氣於瘡口內出兼令經脈往來不滯
 於下若灸瘡後而東南挑枝
 及青嫩柳枝等灸瘡內黑爛潰者加
 護灸瘡中諸風若瘡內黑爛潰者加
 胡荽煎洗自能生好肉若瘡內黑爛潰者加
 忍加黃連煎洗立有神效●夫
 灸瘡後立有神效●夫
 風冷故也●灸瘡後立有神效●夫
 而股生瘡汁水淋●灸瘡後立有神效●夫
 頭塗立愈●灸瘡後立有神效●夫
 尤則著艾薄荷煎湯洗之灸瘡後立有神效●夫
 用蔥艾薄荷煎湯洗之灸瘡後立有神效●夫
 百草霜卷之灸瘡後立有神效●夫
 印煎湯流之瓦松陰干爲末參之灸
 膏宜類換膠而用多而疾速愈
 夫針灸皆起於命募之處

人齧證治論

生元來此凡瘡經此無不爛下咽
 又飲食天燭之毒無不爛下咽
 是感牙之毒也生真膿腐痛徹由心
 受其傷則腫痛臭爛異於尋常初齧
 時用熱童便浸傷處去形黃汚血
 貼藥餅以萬應膏蓋之出微膿即
 愈若失市則爛痛發腫仍用童便浸
 先火油紙擦點火於患處上萬
 久抽蟾酥條如傷口大作上萬
 應膏蓋之候腫消時厚二兩甘
 州五錢米煎日洗一次換生肌膏紅
 膏萬應膏取口愈

●灸瘡久不差宜用內托
 痛生肌散生肌散生肌散
 為細末縮筋脂和令相傳微火上
 煎數沸以煖湯洗之
 髮瘡上炙之又為藥膏之
 方蠟三兩於脂五兩以二味合煎
 塗紙貼之日三日止
 脂塗上之
 向火炙之看得熱則發
 至痛止日六七十愈

指以瓶盛熱尿浸一夜即愈
 各一虎燒研油調付日
 灰傳之木●氣●咬吞方龜板骨
 劫途鑿●人咬吞方龜板骨
 久中雷●熟湯洗較諸治法
 咳後用重覆流之較諸治法
 滋以反難連也其燭至一千
 盤甲亦妙萬勿聽其燭至一千
 板燒灰為末吞油調搽無口
 痊方用醋洗其傷破之未深
 即為施治則毒氣尚未深
 潰爛耳故身毒氣一破無毒
 心既憤激口齒安得無毒
 以口咬人其忿怒之氣亦甚
 大何如天乙重乎不知兩入
 瘡皮破血流往石有漢爛者
 以何咬人其忿怒之氣亦甚

虎傷證治論

延惡氣積入之補人如過
 憤失神即自視其衣以謝
 其悔罪而吞酸矣凡入遇
 自解其衣若不解衣者虎
 有所傷必可救也非虎不
 血人所傷者血必出其傷
 口正時潰爛其痛不可當
 牙最毒一石傷損則毒侵
 必爛肉矣急用豬油貼之
 用豬肉立可隨貼化之無
 疼痛少緩急用榆根散之
 摻而必止矣一止血而疼
 ●油凡遇虎一不成必傷而
 香油灌之虎一不成必傷而

外科集成卷三十九

修澤舍治板

又方用石糖水調塗併服一
 日三碗
 消忍冬藤嫩楓葉鴉掌葉
 春自相石靈犀燧水朱黃後
 方又方用柳葉研服之末
 三月經未灰和酒服之日
 耳三內症●虎爪傷人刺
 傅之●虎咬蟬蟻攪爛塗之
 傳之內●虎咬蟬蟻攪爛塗
 上之●虎咬蟬蟻攪爛塗
 處有●虎咬蟬蟻攪爛塗
 入內取●虎咬蟬蟻攪爛塗
 取法服●虎咬蟬蟻攪爛塗

香油洗其瘡內服安神益氣
 用至眞散乃生肌等散治之
 虎牙內傷一入反肉成瘡在
 濃煎內隔一洗之●青布急
 汪餘有味者洗之又用青布
 繩燃着細竹筒甲注瘡口
 水次宜獨野生藥搗爛塞所
 滿不●虎咬蟬蟻攪爛塗
 人●虎咬蟬蟻攪爛塗
 葉●虎咬蟬蟻攪爛塗
 者●虎咬蟬蟻攪爛塗
 研末●虎咬蟬蟻攪爛塗
 研末●虎咬蟬蟻攪爛塗

外科集成卷三十九

牛傷證治論

牛傷證治論

合吐皮縫正膠血而末或百州霜沫
 血止正活勿封卷恐內作膿如瘡乾
 以津液潤之然後洗入但飲采糜百
 腸出以大便麥粥汗流入但飲采糜百
 日乃可呵金●手觸腸破腸出息穢
 急以香油抹腸送入取不出又入
 參狗杞子煎湯之自合
 喫猪腎粥汁且愈全書

牛爾腸出不損者悉送入以
 桑白皮及光或生白麻為線縫

熊傷證治論

熊傷證治論
 熊傷人反肉毒痛
 毒根令濃以熏瘡口毒即出仍煮
 葛根方寸七日五夜一則佳
 根汁服方寸七日五夜一則佳
 ●又方嚼粟塗之
 ●又煮生鉄今有味
 以洗瘡上包上
 ●熊傷瘡萌糞到水
 潰取汁飲查
 付傷處不

腹中屎塗之即瘡
 內女陰瘡即愈
 墮同止 ●馬皮益母
 炒封之 準 ● 又苦
 醋炒之 千 ● 獨
 灰敷之 亦妙得 ● 人
 傷取其尿流瘡以蠶塗之
 亦佳 痔即出 ● 毒氣
 調搽即 追出 ● 毒氣
 毒汁塗之 同上 ● 馬
 復非汁 同上 ● 馬
 砒敷傷 處旬 月自愈
 石

猪齧證治論

猪	若無用	猪	猪	猪	猪	猪	猪	猪	猪	猪	猪	猪	猪	猪	猪	猪	猪	猪	猪	猪
齧	用	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬	咬
證		成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成	成
治		痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰	痰
論		從	從	從	從	從	從	從	從	從	從	從	從	從	從	從	從	從	從	從

猪咬成痰從屋上必下取泥
 猪咬成痰從屋上必下取泥
 猪咬成痰從屋上必下取泥
 猪咬成痰從屋上必下取泥
 猪咬成痰從屋上必下取泥
 猪咬成痰從屋上必下取泥
 猪咬成痰從屋上必下取泥
 猪咬成痰從屋上必下取泥
 猪咬成痰從屋上必下取泥
 猪咬成痰從屋上必下取泥

外科集成卷三十九

狼咬證治論

煮生銑有味者洗之又用青布急捲
 為繩燃著納竹筒中注瘡口熏之出
 毒水次宜獨窠果子生鹽塗傷口効
 金盞●又方以鉄漿服之瘡不入內
 也並解諸毒入腹●根濃煮汁服亦
 毒入可取世莖上●又方乾薑末傳
 生取汁服之●又方葛根●傳
 之●又方●又方●又方●又方
 ●又方●又方●又方●又方
 月經赤衣燒為灰和酒服方寸七

外科集成卷三十九

修澤會活板

外科集成卷三十九

犬齧證治論

自然者今人治風犬咬傷反以巴豆
 班之形狀殊不以熱劑熱血被傷
 而然非犬之毒也切宜慎之奈見吳
 中凡被犬傷或出血發熱者輒服班
 中巴豆等藥或至發熱牙即以為焉
 痛甚服之益堅致發經妨主屬木
 被傷受驚之症皆肝經妨主屬木
 木生火火生風故發搖咬之疾被
 大驚傷所發為多不發必風天為然也
 若為風邪所襲牙關緊急腰背反張
 宜用定風散童便調服或以燈草
 洗淨傷處搽之若用破傷風法丹溪
 貼之其有他症從破傷風法丹溪

外科集成卷三十九

修澤舍活板

之戒不可不
 班猫巴豆之藥亦當
 毒理吐自然毒既內
 去即止便與調補可
 服耳大凡狗犬之狀
 全此赤誠為易辨其
 立作犬吠亦公同不
 其尾直下不捲口中
 是狂犬若被其傷乃
 急用針刺去血以人
 桃殼平邊以填滿掩
 灸之發糞乾則易之
 日又灸百壯灸三五
 及尋常忽鼻跟爛眼
 赤不食避人藏

身皆狂狂狂狂狂狂
 即其狂狂狂狂狂狂
 至風犬乃朝露臥非
 所感故心受之其外
 目昏朦脾受之其自
 音不吐腎受之其下
 毒成爲風犬乃陰陽
 經此致傷人隨咬即
 冲行吐血片忌諸口
 等俱不可見百中乃
 大而小難出必攻藏
 腹脹必急人聲若犬
 鳥不消有愈後復犯
 正泉凡狗咬人七日
 三七日必無苦地要

一人用此得活親見有類
 大醫者犬免狂疾跑躑入
 命入者痛不止發狂如犬
 之亦能殺犬男于過三日
 身兩足併腿上前湯洗之
 結黃州王真散或搽或服
 也惟瘋犬傷天毒最其急
 髮頂內細犬看有紅髮如
 去女內地骨散一把約一
 去身肉赤服之又用龍糞
 傷咬處對好狗狀大小俱
 人日發在如狗狀大小俱
 急痛腹脹甚前功不能解
 活命仙丹解其熱毒斷不

木免耳當終禁食犬肉及
 此發則此不可救矣未食
 食生魚豬雞臚過一禁之
 於或下飯蒸臭及於肥器
 人曾食落葵得天咬者中
 產十數年後食落葵便發
 破狗咬瘡食落葵者必重
 二羊狙食此者必重發者
 核咬不殊其狗咬者必重
 狂亂如狗發三七日不
 于無風一發冷水洗淨即
 益滿七日又發四九日共
 益身百日忌食酸戲一季
 方得保全否則子有丸或
 此肘台方出有風犬一日

遲大毒以心煩亂脹口世白沫者
 用虎頭骨虎牙虎脛骨為末酒調二
 錢服之若發狂時人聲似犬吠
 神露白者通終始把緊忌者不救
 人癩狗傷者人必發癩有狂症如
 發狂有生如狗於腹中此誤傳也
 非狗生腹中不宜有脚象况二便
 癩狗傷二便必難且外勢急痛腰
 刀虛癩似生產艱難腹中狗豈不
 腹作脹而似生人腹中狗豈不
 產而此乃毒氣染傳於人狗豈不
 可笑此乃毒氣染傳於人狗豈不
 一咬人則毒氣染傳於人狗豈不
 可畏之證也然治之得法全人但
 犬醫地榆一兩水二升煮汁一升飲

一犬因五臟受毒而灰瀝伏散經其
 敵必致傷人九死一生之證初被
 敵時急就咬處刺令出血而後以
 漿水吮洗傷處或以拔法拔之或用
 核桃殼灸法後以玉真散吹之或用
 次日再灸漸灸至三五百壯為度於
 功灸時即服扶危散逐惡毒而從
 亦木中出若毒物血片諸塞莖甲致
 小水滯若淋者即服琥珀碧玉散
 以通利之若常用豆豉研末香油調
 編丸如彈子大常用豉研末香油調
 看取丸內若有狗毛茸然此係毒
 氣已出易再措至無茸毛食狗肉
 效如紫忌再當慎重終身忌食狗肉
 及及毒未豆百仁以防其毒若治
 及房事可常吞杏仁以防其毒若治

苗同炒 茄色變去 又入 七箇同炒
 米出 烟去 茄取 米研 為粉 冷水入
 清油 少許 空心 調服 少頃 又進 一服
 以心 瘦利 下惡 物為 度否 則再 用一
 服利 後腹 痛急 冷則 黃五 錢不 可
 便食 黃連 湯以 解其 毒則 有傷 不
 香二 錢為 末下 正二 服黃 五錢 麝
 方腫 燈心 末下 正二 服黃 五錢 麝
 取湯 調心 一托 黑豆 一合 水煎 豆熟
 毛等 介子 秘法 也灸 畢用 吹口 水之
 此以 貫子 秘法 也灸 畢用 吹口 水之
 淨以 玉其 散敷 之灸 畢用 吹口 水之
 犬咬 齧以 其散 敷之 灸畢 用吹 口水
 屋簷 取滴 下屋 漏水 洗傷 處無 膿
 法毒 血以 木汁 洗淨 紙上 以黃 丹亦

修澤舍治板

之兼 瀉未 傳瘡 上每 服未 三錢 白湯
 下日 三服 忌酒 若瘡 已差 者搗 生非
 汁飲 三升 連酒 若瘡 已差 者搗 生非
 自然 毒汁 以滓 煎灸 寒熱 速以 艾灸 死
 犬傷 毒汁 以滓 煎灸 寒熱 速以 艾灸 死
 允三 壯壯 又灸 用艾 灸之 虛七 壯立 愈
 壯五 癩狗 咬子 末用 艾灸 體切 壯立 愈
 為風 狗咬 子末 用艾 灸之 體切 壯立 愈
 可將 尿缸 盛清 水令 必從 小便 便中 出
 半且 見濁 氣凝 結如 狗形 則無 狗已 出
 如不 見濁 氣凝 結如 狗形 則無 狗已 出
 乃不 再發 狗形 須服 七次 方無 狗已 出
 未一 不再 發狗 形須 服七 次方 無狗 已出
 猫七 箇同 炒不 合米 赤去 猫再 入七

煩亂者亦治丹心●犬咬破傷風腫
 以人參於桑柴力上●燦成灰末傳之
 安同上●狗咬用紫蘇葉口嚼碎塗
 之●月上●狗咬入鴉地黃汁飲之
 余塗瘡口●狗咬小兒胎髮炒香附
 野菊●研細末酒調服盡醉●
 狗咬●乾葛●研末酒調服盡醉●
 又方●甘●木仁二●高●蘇五●錄●水●四●
 升煎●法●溫服●以三●味●末●傳●所●處●
 圓煎●法●溫服●以三●味●末●傳●所●處●
 疎洗之●同上●生鐵不拘●多●皮●煮●令●有●
 洗至血止●綿裹之●咬●用●而●以●并●聚●不●
 酒和冬灰●傷●鳥●梅●未●酒●服●二●錢●同●上●
 狗咬●傷●鳥●梅●未●酒●服●二●錢●同●上●
 又方●紫●刺●反●末●砂●糖●調●塗●留●廿●退●腫●


色貼上立妙●上●天●南●星●防●風●末●又●
 小洗淨用綿乾貼●天●南●星●防●風●末●又●
 以溫水調下一錢●使●調●下●關●緊●急●前●
 以破用藥二錢●童●便●調●下●關●緊●急●前●
 或瑤重●殺●者●以●頭●垢●少●許●納●瘡●世●
 蝮牛屎●到●之●守●金●服●一●風●狗●咬●傷●瘡●
 之●同●上●分●燒●灰●水●服●一●風●狗●咬●傷●瘡●
 月三服●無●又●燒●灰●水●服●一●風●狗●咬●傷●瘡●
 方●三●服●無●又●燒●灰●水●服●一●風●狗●咬●傷●瘡●
 中●目●金●蛇●一●放●蛇●它●蛇●亦●日●水●服●五●分●
 木●鏢●瘡●上●聖●方●鼠●屎●二●為●未●刺●入●瘡●孔●
 小咬●天●取●腦●敷●之●後●不●再●發●用●五●仍●殺●
 風狗咬●即●用●腦●敷●之●後●不●再●發●用●五●仍●殺●
 髮木●狗●咬●即●用●腦●敷●之●後●不●再●發●用●五●仍●殺●
 方●不●治●以●人●骨●燒●不●水●下●方●寸●七●

猫傷證治論

人爲猫傷取薄菴葉取
 汁塗之有劫細目●猫咬成
 蒼雄鼠屎燒灰油和得之曾經驗
 本綱●又方川椒水計甘丹一錢各
 爲末煎薄符汁調服鹽●又方
 骨虎毛燒灰爲末塗之寶

鼠齧證治論

鼠齧傷人手足及肉最難愈
 何也蓋其齒細血長上有毒
 黃能傷筋常故也牙用滿咬處為妙
 去其血不或以捕鼠殺傷者鼠
 膽鼠性豈敢咬人因捉其急不
 得已故傷人皮肉因捉其急不
 心害平不交傷亦重危其有限何
 足况鼠涎原有毒也筋肉所破必透
 骨况鼠涎原有毒也筋肉所破必透
 入鼠涎其性毒烈穿筋全况用貓
 尿孫其傷處其毒散後用禁鼠丹
 敷之數日即愈也
 鼠也形小而甜故名鼠
 痛云其口甜故人名鼠
 痛原其口甜故人名鼠



酒食狸肉本謂
鼠能毒所致他
治痛及鼠喘人
玉其穴皆而其
鼠咬傷痛者
為度用土
調敷用
燒灰用
又方用麝香包之

蛇螫論

凡中野不
之類甚多而毒
中青蛙三角
月蚌三角艾
白蚌三角艾
即消多外又有
六七種而方不
者名公獨川中
蝮水又有釣蛇
傷人及有釣蛇
人象耳亦有
乃兔耳有抱
毒人必取
瘰但蛇御

四脚能跳來咬人竟即跳上樹作聲云人必
 成然其咬人竟即跳上樹作聲云人必
 木者可治吳音呼藥為救也
 蚊蛇錦文亦有與地同色者足斷
 足著手斷平不爾食身糜爛七入月
 毒盛時嚼樹以渡其毒樹使死又吐
 延沫毒草木上者成瘡身腫名蛇
 瘡瘡毒難治瘡方與此瘡同不
 腫形短而扁瘡身亦青黑色山路自不
 甚多每六七月月中多時出路上喜入
 車轢車行車者每傾破而于出人侵晨
 及眉昏行若者原意看之其蝥入不
 往人有死若者原意看之其蝥入不
 色喜綠樹及作上自掛與竹樹色一
 種人看亦覺若入林甲行有落人項

頸艾蝥其毒尤劇大者中人不可治
 一得二三日也凡被蛇蝥者一第
 可藥無此二日也凡被蛇蝥者一第
 二藥無此二日也凡被蛇蝥者一第
 預辨故山居者宜令知禁法也
 蛇蝥者人即頭解散言此蛇名惡不
 其瘡若如神凌此大毒惡不流一
 即死若頭不散此蛇名惡不流一
 輕瘡上冷不治故得七日成其毒亦
 未熱禁熱食便發治之依初被
 整法也者原●蝥中人不石一用灰
 若不早治之縱不疾者多殘斷人
 足斑此形刀長頭禰口尖頭班身亦
 艾斑色青黑入犯之頸腹惟著地者
 不可不慎又有一其毒最烈草行
 不可不慎又有一其毒最烈草行

鐵約內化時而頭點藥處冷則
 易之連點七次遂愈毒氣入
 毒紫金丹磨服一錢蓋汗即愈
 延毒走腫痛者麻油煎黑之亦
 ●蛇咬瘡最毒不吐爬也或在足
 止或頭面或身腹之間或盤腹
 常重者必至腫如真五日陰毒
 腫如真五日陰毒內攻于腹而
 死矣蓋蛇力陰毒內攻于腹而
 其毒益熾須用陰毒內攻于腹而
 而解毒之藥分之神者取法
 遺蓮開之藥分之神者取法
 毒散飲之藥分之神者取法
 蜈蚣散亦神效也
 莫急用麻繩或頭髮緊食階用雞
 莫急用麻繩或頭髮緊食階用雞

肯上者然自不甚醫人醫人必死
 蛇無正形太者小過四寸世人
 皆呼為青條蛇言其與枝條同色
 有難覺其尾二三寸色黑者名
 毒最猛烈中人立死
 蛙射螫人雄黃麝香乾薑
 以射螫人雄黃麝香乾薑
 用射螫人雄黃麝香乾薑
 諸蛇螫人如青竹赤練虺蛇
 級人也有毒備中火不虺蛇
 甚急但即時以刀割去
 其沸如火須臾焦盡人乃得
 ●七寸如火須臾焦盡人乃得
 看毒輕青口者毒重以舌
 最惡物驚時用雄黃末一錢生
 最惡物驚時用雄黃末一錢生

有人被毒此所已因有老僧
 以酒調藥二錢灌之遂鞋及以藥
 塗患處敷藥一兩苦者下
 之乃五靈脂一兩雄黃半兩
 止此耳後有以五靈脂末
 毒此治一切毒用之無不效
 小毒此治一切毒用之無不效
 研細末以酒調敷患處立愈
 此如旋痛腫消調一萬以高
 雄黃末作餅子候乾為末酒
 貼瘡口立效每用少許
 水磨服許傳毒處又為細末
 之磨服許傳毒處又為細末
 此飲之兼清之月地榆根爛
 搗爛傳之即出同土●●方
 以火淨洗濁水以黃蘗處差

蛋研些口於砂處引毒氣其
 隨黑若再采愈口換必望蛋
 方止又用生烏藥葉爛酒一
 服其渣以貼患處若一●●
 經其用勤艾鋪咬處一●●
 再無後毒百敷●●路行卒
 急氣不聚帶邪●●傷處下
 毒氣不聚帶邪●●傷處下
 刀頭火上溶去瀉則毒隨處
 長寬子速挑去瀉則毒隨處
 尚米退夏滴之履退為度隨
 居山僻及途甲夜行平被此
 求白凡扁速作艾炷灸五壯
 塩塗之如黯腫尚未消釋常
 搽毒延自然流出且不透裏

流病全調錢所咬封其更噤海八虛 ● 治一切蛇咬用香白芷嚼研傳思
 出候人盡量飲之頃久酒自傷處為調服為不細辛五錢香少每服五錢雄黃二
 水盡却外藥澤傳濟上即愈
 藥酒自傷處為調服為不細辛五錢香少每服五錢雄黃二
 藥酒自傷處為調服為不細辛五錢香少每服五錢雄黃二
 藥酒自傷處為調服為不細辛五錢香少每服五錢雄黃二
 藥酒自傷處為調服為不細辛五錢香少每服五錢雄黃二

亦 ● 龍模日入終忠末重塗同潰良細 ● 蝮蛇傷急令癢以尿干藥上
 亦 ● 龍模日入終忠末重塗同潰良細 ● 蝮蛇傷急令癢以尿干藥上
 亦 ● 龍模日入終忠末重塗同潰良細 ● 蝮蛇傷急令癢以尿干藥上
 亦 ● 龍模日入終忠末重塗同潰良細 ● 蝮蛇傷急令癢以尿干藥上

羊肚一箇帶囊割一口將手入其內
 將痛止腫消外塗之同
 搗汁飲之公英三壯爛貼之同
 腫痛蒲公英三壯爛貼之同
 喉痛塗之公英三壯爛貼之同
 用豬耳垢塗之取垢傳之同
 烏龜板灰摻之取垢傳之同
 以閉口椒及葉搗之取垢傳之同
 月中諸蛇毒旺不得傷之同
 枯死名鴉馳此物傷之同
 即依地之蟻法療之同
 芫木毒盛不泄皆齧之同
 草木上入誤犯者其毒如被蛇著
 螫不殊人誤犯者其毒如被蛇著
 以此別之俱瘡腫建有痛源●被惡蛇

脚等疥癩末谷水服二錢同上●蛇
 咬戒瘡暖酒淋洗瘡止日三次黃為末
 傳之同生●以薰雞子白大黃上溶
 蟻灌之效●葉傳之方赤地利末醋
 摩傳之亦為莖葉傳之方赤地利末醋
 汁飲之亦為莖葉傳之方赤地利末醋
 咬虞備下●水同●蘭出●葉搗傳
 汁傳之或上蛇●合●厚●升●傳●之●莖●菜●馬●蛇●母●搗●傳
 入塗之同或上蛇●合●厚●升●傳●之●莖●菜●馬●蛇●母●搗●傳
 壽傳之同或上蛇●合●厚●升●傳●之●莖●菜●馬●蛇●母●搗●傳
 銅青傳之同或上蛇●合●厚●升●傳●之●莖●菜●馬●蛇●母●搗●傳
 搗塗之同或上蛇●合●厚●升●傳●之●莖●菜●馬●蛇●母●搗●傳
 摩●此●咬●其●汁●同●攻●入●腹●以●兩●刀●不●中●相

蟻 毒 酸 此 蟻 蟻 毒 氣 即 止 必 大 痛 癢 咬 人 甚 引
 毒 勿 液 水 子 犯 之 必 大 痛 癢 咬 人 甚 引
 冠 存 不 作 法 殺 蜈 蚣 前 已 隨 後 渡 若 乘
 然 渡 不 作 法 殺 蜈 蚣 前 已 隨 後 渡 若 乘
 雖 多 唯 以 武 都 龍 雷 為 上 帶 一 塊 石
 稱 五 兩 於 腦 間 則 諸 地 毒 莫 敢 犯 坵 石

蜂 螫 證 治 論

蜂 類 甚 多 而 亦 家 不 貝 頭 其
 名 唯 地 中 大 江 蜂 最 有 毒 一
 蟻 毒 酸 此 蟻 蟻 毒 氣 即 止 必 大 痛 癢 咬 人 甚 引
 毒 勿 液 水 子 犯 之 必 大 痛 癢 咬 人 甚 引
 冠 存 不 作 法 殺 蜈 蚣 前 已 隨 後 渡 若 乘
 然 渡 不 作 法 殺 蜈 蚣 前 已 隨 後 渡 若 乘
 雖 多 唯 以 武 都 龍 雷 為 上 帶 一 塊 石
 稱 五 兩 於 腦 間 則 諸 地 毒 莫 敢 犯 坵 石



蜂蟻人用等酥傳之即愈
 黃蜂蟻用熟油洗之清油擦之亦
 或中頭垢敷用鹽搽入門
 刺齒垢塗之破脚之煎蜂房塗
 之燒牛角灰苦酒和塗之末
 傳之牛金又用牛屎燒灰苦酒
 敷之方以酥傳之接薄荷貼之
 敷麝香性研末之塗之味
 馬齒莧搗熟封之油
 接目上之同熟封之油
 老目上之同熟封之油
 方蛇吞草汁傳之洗
 方蛇吞草汁傳之洗

毒蜂窠土作窠者一種獨蜂作窠
 木其窠天如小石燕人馬被螫立
 亡也一入種足輒斲心胃其
 毒倍常中入毒刺入肉即須
 裂非藥可療惟禁術可制不
 凡蜂好黃酒洗之則瘡不
 去紙燈熏亦妙刺瘡不
 油紙封之煎安肘
 塗之即止痛
 王劉陽隱居王屋山會見一犬蜂蟻處
 落蛛網為蜂所螫屋墜地俄頃腹脹
 欲裂徐公行入腹中咬開芋梗以傷
 就咬處磨之良久腹漸消輕走如
 自便

蜘蛛傷證治論

蜘蛛傷證治論
 蜘蛛品多皆有毒多在
 人家簷角雜頭陋巷之
 中作圓網大腹深灰者
 遺尿者入令
 人至痛中出絲屢百
 疔者二赤脈入為
 疔至心前頭面腫如
 一醫以藍汁入辟香
 投大隨化●有不遂以
 愈同此●有人被蜘蛛
 婦有僧教飲羊乳數日
 蜘蛛咬入遍身疥癩不
 別蟲於肉中伏小采自
 赤水兌城有蠱物等中
 飲水了死惟飲葡萄酒
 吐夏秋間草王

研打塗並以生者按
 艾里蜂毒宅英鑽可
 艾灸孔吐三五壯即安

壁鏡齧證治論

人脚為壁鏡一名壁鏡
八尺而長亦時蟻而形益斑色
煎其蠱有盡改人至灰惟以桑柴灰
鏡毒人必死凡未傳之末塗之
黃研煮水塗
之甚妙

土蜂燒油
取其相伏油
汁應俗傳同
之立愈又
月王愈又
力之同泥
塗之同封
羅厚日搗上
濃也日搗上
取和欄蒜
蒲般虫
蒲般虫
●●

疥放咬處腫痛者以患毒如神效
 未苦參末百齒霜二味酒調傳心
 方霜即與垢膩同止●商燻之
 桑印茂牛者取泔和●地傳之
 ●天方麻履底炙熟●里●安
 ●又五頭髮燒烟熏之●方取
 馬齒黃汁塗之●藥雞口內
 倒控少時以手蘸雞口內
 虞其痛立止●甚香生雞口內
 立效金立止●又方絲瓜根
 立止齊世●艾方用墨筆一
 蚰蝥爛搽●咬處痛立止●脚
 嚼人參塗之●艾方用墨筆一
 痛之同症●艾方用墨筆一
 痛之同症●艾方用墨筆一

傷處其痛自止雖毒方不及此法之
 效以艾灸之即令毒氣入於
 過世之物能令毒氣入於
 吞吐之即令毒氣入於
 咽喉中咬之令毒氣入於
 雞血乘熱灌之令毒氣入於
 良莖也●用紙然蘸麻油點於
 濃塗傷處用紙然蘸麻油點於
 咽焮熏之●即愈●酒正長●又
 塩緘倉上●即愈●酒正長●又
 得此方鹽熱清之●桑樹白汁●
 嚼大蘇耆小毒或桑樹白汁●
 以麻履底炙熟●桑樹白汁●
 人痛不展底炙熟●桑樹白汁●
 ●又方燒雞屎酒和傳之●取活
 和醋傳之●雞屎酒和傳之●取活

蠍傷證治論

此虫所螫然發起細瘡癩作癢如芥
 粟粒亦多令人皮膚肉拘急惡寒壯熱極
 者連起多著腰脇及胃若繞腰匝偏
 者重也痛原●腰脇及胃若繞腰匝偏
 器物下長不及寸狀如小蜈蚣青黑
 色二鬚六足赤腹前尾有叉岐能
 夾人物谷名搜夾至溺射人影令
 人生瘡果作寒熱古方用犀角汁雞
 腸草汁馬鞭草汁梨葉茶葉未紫
 草未鬚水鹿角末燕巢土得一八脚
 塗之百效本細●蠍毒一八脚
 蟲隱心壁間以尿射人遍體生瘡如
 劫火傷虫烏雞翎燒灰為末雞子白

●又加地蜈蚣草搗欠端
 太劫同上●又方塗之或都管
 凡搗煉亦炒同玉耳方畫地作王
 守內取土參之即愈同正

蝸牛傷證治論


冷弱也
藏器

蝸牛蟲毒行遍集者
蓼子水浸之立愈不可近

蜈蚣傷證治論
蜈蚣咬人用石灰醋加
 之厚敷●又方用礬葉燻
 灰細研以沸水浸搨葉取
 滅之納灰煎灰於瘡中
 同上


蚯蚓齧論

凡被蚯蚓毒或腫大或身
 上蚯蚓鳴其狀不一用鵝蛋
 皆効選落以石灰水浸身亦良
 眉髮皆落以石灰水浸身亦良
 ●治蚯蚓咬濃作瑞湯浸身數遍
 浙西軍張韶為此蟲所咬其形如
 風眉鬚皆落每日夕蚯蚓鳴於
 散以此方愈上●主蚰蟥咬人
 凡雞屎得之思●蚰蟥吹入老
 茶葉細末油調傳蚰蟥即止
 ●又方竹鴨血塗之即愈
 萬煇退西筒燕木洗再用
 煇通寫未日地調敷百劫



蠶齧證治論

憎參壯熱經時不瘰亦有人者非毒
 藥新力一入時之怪共救腫之因此而致
 又方用芫汁塗之研蜜調傳丹愈
 飲之芫汁塗之研蜜調傳丹愈
 萬屋山爛毒如釘研付國日●芫汁
 搗月土●木類又取田父查肯仁搗
 和蟻子灰塗之方取田父查肯仁搗
 ●又上方灰塗之方取田父查肯仁搗
 食咽上方灰塗之方取田父查肯仁搗
 腹益爾●灰塗之方取田父查肯仁搗
 搗汁傳丹心●金蚕咬其狀如蚕其色



如金故以爲名醫學正傳載蘇桑
 人被咬腹中疔痛欲死用樟木屑
 濃煎湯與服即大吐出金絲如髮
 者一塊腹痛減十之七八與
 湯連進二三盞而發毒料
 金蚕更進二金食以蜀
 置飲食中以外毒人灰
 財便人果富遣之性難
 不龍害人必多以金銀
 路偶人收之吞蠶以
 蚕本綱●入中金蠶
 味甘不濕皮嚼黑生豆
 吐石瑠根即愈得飲之
 吐石瑠根即愈得飲之

蝟螫證治論

蝟螫中五月六月毒最盛云有
 始定原●牽弘四股皆痛造一
 不龍的辨正日是燬子或曰是
 馬出尾有而岐者然皆恐非也
 是蝟尾如蠶同止●蝟傷最毒以
 人吐拳髮如蠶同止●蝟傷最毒以
 蝟得淫陰之惡氣也凡一蝟人痛至
 雞鳴乃止即以冷水清指並手即不
 痛水微暖便痛即易涼水再漬以膏
 布指之實驗蝟有雄雌者再漬以膏
 處雌者痛牽諸處以山茱萸一粒嚼
 以封之立愈取人參嚼敷妙
 ●蝟有雌雄蝟在屋溝下泥付
 之雌者痛牽諸處取瓦屋溝下泥付

之無雨時新水從屋下取泥用
 若以香油煎之少刻即入筆筒叩
 定痛處以烟葉之少刻即入筆筒叩
 如此也取汁傳之即差人用活脚
 放爛研取汁傳之即差人用活脚
 温湯漬之按馬莧太蒜又禱花
 塗之佳五五方蜀葵花石榴花
 艾公芋並五月五日立定二花
 命獨執水塗之整處立定二花
 又鬼趾按汁傳之正差又黃丹
 塗之生烏頭未唾傳之射南封
 酒頂之即愈同上凡以石一
 兩醋淨先煎之投凡未許醋中
 處本上又方鳥頭未許醋中
 之月上天方取草夏水研塗之立

止同方又方以脂糜附子使
 又方驢耳垢傳之同上
 人滿不止用楮樹白汁塗之立
 等分爲小瓶調塗之痛止人門
 方地磨生薑塗之痛止人門
 米醋調擦之同上
 黃各一字巴豆一箇石同研付之
 止毒出用漆也又加取熟滴傷處
 爛塗之立

蛭證治論

裏名爲山蟻在木裏名馬蟻蟻蟻者
 五下許黑身滑入行涉山水即者
 人肉不其痛而痒兩頭皆能晒人血
 滿腹便自脫地無甚毒害蝨者無不
 背作文理粗澀多者龜螺殼上若著
 人肉即於肉裏生子乃至十數枚經
 日瘦脾痺隱軫起久乃成瘻腫
 ●山蟻川蛭入肉中亦以竹筒
 盛浸之預帶一筒取一蛭入中並持
 蜘蛛也預帶一筒取一蛭入中並持
 乾海苔一形赤辟諸一蛭入中並持
 山人目有瘰癧法蓋此法也
 中肌行入肉中浸滌起瘡灸斷其

刺虫證治論

而帶毛者皆須忌人勿使之刺火之
屬也若一把之則皮膚腫脹之類凡有
瘡矣以淡豆豉搗敷之但有之亦出
即不痛如毛未出力搗之再搗之須毛
出始安如無虱或醋或鹽適芝蔴
油洗乙者效真色去春夏月樹下
墮者則放毛入人手止自反至肉
自因手背其仇皮因微痒以漸至
經數日痒在外用牛而痛亦內抓
或痒或痛必致骨肉皆爛有生疥之
憂此名中射工毒諸藥不効用好豆
豉氣透竟則土中煎香白芷煎洗痛

處如肉已爛用海鹽煎即為賊魚
 為未傳之愈海鹽煎即為賊魚
 上此毒耳以不毛刺能螫人故名
 蟲作軫起者長也瓦刺由人觸者
 周雜名射也初深火痛勢如刀割
 能放毒射入骨肉皆爛處少時即
 即外痔內痛數日正煎湯洗之即
 豈或香油搗敷痛痒之處少時即
 出可去荳蔻用白正煎湯洗之即
 愈金鑿治刺毛虫取補公英根
 白竹傳之細嚼傳之刺發傷無
 艸妙下內家者以種植樹木為
 十里內無刺登乃時用
 甘草汁灑樹故也進煎

射工毒證治論

亦中聞入聲其虫無且刺耳能聽
 之射工又含源射人甲影改謂之
 工入少至不龍入竹頭目僕有射
 如中燕一行名短狐一名域常在
 工毒中人及水浴此蟲則病且診
 水申人即射水形影則病且診
 初得或效傷寒或似中寒或口不
 留五惡寒壯熱四肢不舉劇
 困有二三日齒間血出不療即死
 人有四種物覺則偏身視之其一
 種黑如黑子而一縷四邊赤久即
 犯之如刺狀其一種如石礪狀其
 陷其一種突起如石礪狀其

外科集成卷九

修澤合活板

火灼人肉燔起作瘡此種最急並皆
火灼人居此處之天穴雨或遂又行
瘡流大入家而射下又常養鷺見
即食之穴行將紙角以屏之白鵝
亦善帶好生金犀角住不新見身中
有此四種瘡一處百壯露亦
去此瘡邊一寸輒灸一處百壯露亦
便病欲渡米光以石投之口邊角
桑一矢言以息兩角能屈伸冬月即
有一長角礮在口前考擔臨其角端
曲如之上墻以氣為矢用木射其
入中之便不能語餘飛如葛氏所說
同射工相似狙有瘡為射工無瘡
與射工相似狙有瘡為射工無瘡
溪溫又門軒工溪溫皆能殺入石

法取湯數斛以麻五升投湯中溫浴
之身腫發赤上香木毒又消水毒
毒方赤莧莖葉搗取汁飲之或以
傳之萬葉搗取汁飲之或以
又刀刮上麻令傳以日鷄矢白者二枚
壯少傷和調以塗瘡止者二枚
以少傷和調以塗瘡止者二枚
鼠婦蟲散各七合巴豆三枚去心
猛脂但以此藥塗之置月印便差
水此疔走或母蟲一浮置月印便差
云此疔走或母蟲一浮置月印便差
酒一升煎取皂莢一棗人三石龍
●又方馬齒如節去滓傳之
●四又五扁則良驗同上
●又方馬齒如節去滓傳之


鳥爰谷二兩水三升煮取一升盡服
 之深傳唇上不成更作同上
 兼辟邪工芟日出行取知母為末自
 隨欲入木先取心許投上流和取服
 門入

蝮螫證治論

蜀中數名蝮子又小
 黑者為蝮平微不可見與
 塵相浮至下者為浮塵子皆巢于
 蛇鱗甲能透衣入肌膚齧其毒
 人極苦之惟搗楸葉傅之則瘡本
 覺漸痒為瘡疥但以此蝮之類
 鹽少許即不為瘡此亦蝮之類也

沙蟲證治論

沙蟲乃毒此鱗中虫也其
 日之發令石節強疼寒熱赤上發
 豆黍米粟粒以手摩赤上痛如刺三
 皮裏其診法初得之反上正赤布小
 身及陰天雨水行脚中亦著人便鑽入
 水浴及以水濯浴蟲在不可見入
 水間多有沙風甚細略不可見入
 小肉即愈不然三四日死公須刺去
 如針孔粟粒四面有五色文須刺去
 刷其虱虱人沙中行入中其毒如瘡
 沙風乃毒此鱗中虫也其




蚊子螫證論

咬毒爾齒汗以竹筒盛
之浸咬處即愈
山蚊手入肉中海蝦餘之

已深者針桃取蟲子正郊疥蟲著爪
上映光方見行動也若挑得便疏上
灸三四壯則蟲身病除若賢雅惜々
見是其口太深應依土俗作方術
柳出乃用諸湯藥以浴皆一二分出
都盡乃止亦依此五雜及射
工法急救七日中直差不爾則仍
飛蟲咬人心藏便死喉不可輕用
●療沙虱毒方以大蒜十著熟灰
用溫之令熟蒜及熟在脂上盡十
方復以艾灸瘡主七飛則良風上
入方生屬奇大需合擒以半脂和著
小筒子中帶之行奪東開木無不有
此洛竟巾拭燥之行奪東開木無不有
見則以竹葉抄
桃去之同上

諸蟲螫證治論

諸蟲傷人巢穴黃等介
 木新汲水服二錢分
 凡為未傳之月紅又
 嚼鹽塗之凡月上未傳
 入肉也凡月上未傳
 不取尿坑泥塗之
 又方百食窠及糞研末
 又方百食窠及糞研末
 用蛇蠍魚湯洗出水同
 煎成膏用油塗之惡虫
 咬心酥和鹽塗之制吐
 取心酥和鹽塗之制吐
 不表再傳晝夜絕見毛
 諸般惡虫咬以油浸紫
 又加猪膏燕搗汁傳之



外科集成卷三十九

終



