


大正時代文庫 序目


|      |         |
|------|---------|
| 庫文閣内 |         |
| 三    | 漢       |
| 内閣文庫 |         |
| 番號   | 漢 12635 |
| 冊數   | 4 ( 1 ) |
| 函號   | 300 220 |

300-220





醫學館寄宿  
寮書之記



序

醫者意也。古人多不肯著書。然  
時後禁方。又無不神驗者。書果  
可盡廢乎哉。歷攷載籍以來。藝  
文所志。軒岐家言。無慮數十百  
種。要皆通人畸士。卓然有傳世  
之識。而後發為文章。按部就班。

養安院藏書



處方立案嘉惠來學其道與六  
經相表裏近世學者狃於所聞  
守師承執一之見其言固陋而  
不能以相通自誤誤人弊至莫  
可記盍無他讀書不博見道不  
真用心不廣坐是玉者而醫道  
或幾於熄余戚友程雲來氏鄣

玉當作三

山世曹也少從其叔祖敬通先  
生講越人之術先生道高望重  
名滿天壤雲來與之遊處者十  
餘年盡得其真傳秘授又其先  
明初有松厓公者以名進士起  
家一代偉人精星象奇門岐黃  
術著有醫案等書雲來皆宗法



之哉於方書無所不讀研窮考  
究殫精竭思以與古遇出而仁  
民利物稱國工鉅手焉歲辛酉  
余遊維揚邂逅雲來於廿四橋  
頭蓋方以校訂聖濟總錄一書  
畱此者幾一載既而向余曰是  
書始末甚異幸為我序而傳之

個

余覽其發凡而觀其用心雲來  
之不朽無疑也夫雲來以名家  
子負才個儻博奧多竒間以餘  
情溢為圖篆繪事得人授內養  
眸穆顏如渥丹至生平醫道所  
入輒梓所著諸書不名一種散  
布人間藏之者若寶籙然挾此



寸技安往不足以垂名立教而  
顧以是書為斤斤其立心誠欲  
利濟天下如范文正所云不為  
良相即為良醫是宜不朽者一  
雲來得讀是書刻本於敬通先  
生所又三十餘年之久始從及  
人江子郢上再觀抄本遂慨然

推

有剗剗之志而不欲自專其美  
(推)原究盍詳著師及之淵源是  
宜不朽者二且是書自宋徽宗  
政和年間詔集海內名醫出御  
府所藏禁方秘論纂輯成編非  
人世所恆見閱年既久漉漫隨  
之再刻於金大定三刻於元大

閱




德重以耶律楚材之論定頒行  
終無解於若滅若沒之數非雲  
來孰能表章及之者是宜不朽  
者三雲來以三不朽之盛心又  
慮卷帙之繁重於是刪訂收束  
以便行笈之可攜知古今之不  
一其宜也於是酌損裁成以定

規條於可守鴻編鉅典恃有雲  
來為之發皇矣雖然醫者意也  
書不可盡廢而亦不可徒泥陳  
言顧用之何如耳如或守一偏  
之見而不知變通雖日誦是書  
復將奚益又當進求雲來自著  
之心傳而後可也



康熙辛酉年八月既望同邑年

家眷弟吳山濤頓首拜題



*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '書', '不', '取', '盡', '意', '高', '於', '心', '何', '封', '其', '新', '未', '改', '公', '益', '生', '其', '能', '然', '營', '古', '意', '之', '然', '利', '益', '而', '不', '損', '其', '德', '則', '其', '德', '自', '新', '以', '成', '其', '道']*

造

序

醫之道在隱顯而功侔造化始

於神農黃帝之世其後學若相

師延其術無生書唐虞三代

二子有餘蘊大和保合民不疾

札物無於傷及手秉袂戰國五

迹寢衰人與之地正幸隔闕而



風寒暑濕熱相運行於營衛經  
絡之中。秉情鬱含欽。若此罷勞  
而為之疾。於是越人。奚公扁鵲。  
淳于意者。各以其術顯。而素問  
靈樞甲乙之書。固以此崇。然其為  
者。終為導引吐納。治之末始。亦  
病之先。蓋人之身。陰陽合象。而

為氣清者曰氣。濁者曰血。血之  
大隧。謂之經。絡之者曰衝。其次  
曰督。曰任。其次躡。皆先天隧道。  
知而通之。可以長生。左者手足  
之陰。右者陽。諸經皆後天隧道。亦  
而補之。可以已病。平橋者。腰而  
約束一肉者。帶也。是為氣統。又



後天之隧道。而行之。可以出  
入生死。亦華衝督任。躋五經者。  
石為生。病。必。身。足。經。病。經。病。乃  
稱。注。五。經。而。陰。陽。十。二。經。又。有  
系。結。之。數。之。百。六。十。有。七。其。後  
亢。六。為。四。十。有。七。能。通。此。道。而  
治。之。則。醫。之。神。秘。矣。宋。政。和

省。乃。聖。濟。總。錄。景。祐。禁。方。秘。傳。  
以。二。為。考。再。刻。於。金。文。實。醫。學  
之。河。海。為。寸。才。所。掩。者。迄。今。湮  
沒。四。百。餘。年。矣。吾。以。程。子。雲。素  
說。此。從。相。敬。通。先。生。繙。閱。是。書  
有。年。因。思。全。書。浩。澣。有。三。切。於  
治。者。遂。纂。其。精。要。以。二。十。六。卷。



詳在公例中、刻之廣陵、以行世、  
而公序於余、乃作而歎曰、是皆  
道在隱見、而功侔造化者乎、昔  
老萊希興、游丘公、鍊丹黃山、其  
處卽名、誦丹臺、雲萊之先、有松  
崖先生、瀆書其上、獲遇至人、洞  
抉道奧、用之醫藥、人皆謂神、丘

文莊公嘗以異人稱之、今雲萊  
生長黃山、而僑居武林、又從敬  
通先生遊、其者、乃於古、古之出  
興、夫至又之所、口授而函之於  
世者、無不勦見於後、用之機、其  
瞬然、面背、類有遁志、著釋甚多、  
此其一也、雖然、醫之道、有要焉、





逆與順是也。升降浮沈，則順之。  
寒熱溫涼，則逆之。如操舟者，去  
江河之險，易與風水之動靜，而  
順逆其道，數不克濟。余友以翁  
人之兩著書，如李時珍之本世  
綱目，王肯堂之說治準繩，張景  
岳之類經，袁詒業是也。皆有功

於天地人物，真醫學之河海也。  
顧世之能用變化，而道以方者，  
鮮矣。方也者，方脈也。註丹謂之  
方，所以濟川者，也。然劉雲東氏  
之所以纂聖濟總錄之要者，其  
不石為醫學之方，每以濟人於  
河海也哉。是為序。



康熙辛酉夏月... 後同里年序

眷弟洪琮拜撰



聖濟總錄纂要序

士君子不能得志於當時而欲以有用之才建無窮之業不得已著書立言以傳後世然揆藻雕蟲無關物命猶之宋人楮葉終歸無益已耳范文正公有言不能作良相濟天下亦須作良醫濟生民醫固有相之遺哉雖然投之餌施之石



起彼冠羸，曆之康強，而東西朔南，  
勢難偏及。故活人之術，莫如集古  
人遺編，公之天下，為用力勤而施  
濟溥也。此聖濟總錄一書，余於是  
不敢棄，且不忍秘也。書故為先君  
子鶴誠公增纂手錄，先君子生平  
著書不下數十萬言，如纂序四書  
說約、春秋宗旨、學者咸津津焉。然

負才未遇齋志長逝，當時亦必以  
天下為已任，而因感於范公之言，  
不作良相，須作良醫，以岐黃術救  
諸疾痛患。若於天下，於是殫精異  
智，揆微索隱，參考是書，且集近代  
驗方，以補其所闕，猶謂襁褓提攜，  
口不能宣，手不能筆，其急切較倍，  
而醫治尤難，故幼科五卷，葺遺增



略不惜餘力先君子之志可謂切  
矣豈意棗梨未登而松楸實泣也  
嗚呼先君子之志不亦可悲哉余  
因是益不敢棄且不忍秘也於今  
三十餘年矣鴛湖程雲來先生見  
而惜之惜其書久秘而恐終於棄  
置也乃為刪繁撮要得二十六卷  
剞劂之工計一載而成此先君子



志哉余何幸遇之粵稽是書輯於  
宋政和間歷金至元耶律楚材復  
加纂訂元以後久無刻本計元至  
今已四百年余曰思是書之傳得  
先君子而世守之先君子之志得  
程先生而闡發之由是仲景外感  
東垣內傷河間表熱丹溪陰虛諸  
家之言莫不咸備九州千載按形



證以尋病源、察脉候以酌治方、雖  
人俞跗而家業扁可也、又奚事於  
隔垣之見、剗腹破臂之詭乎、至原  
本有鍼灸、有符禁、有乳石發動、有  
食治、槩從刪削、謂素問可以養生、  
古法不盡、掌錄奇隱之證、少而食  
性或未宜、勾漏之砂亦不易得也、  
然是書傳、亦可以見先君子之志

悲且切、而程先生之切、真足與醫  
國等也、若余什襲有年、保守無斁、  
實不敢墜先君子遺緒云、爾詎敢  
貪天之功、以為世業也、與

康熙二十年歲次辛酉長至日古  
歙江湘郢上氏謹書於貊其堂  
中









可以反照天閔神慮息之可以名和去土符書全格鍊丹  
却粒御氣凌虛不假於物而裕然自足嗟夫達士可以神  
解昧者且不能養其形而况於了其心乎內之五藏六府  
外之九竅四關著之於色發之於声寓之於三部九候一  
失其平則疾病隨神聖治於未兆工巧抹其已然非天下  
之至精孰能探天下之至頤非天下之至粗孰能祐天下  
之至神朕憫大道之爵滯流俗之積習斯民之沉痾痛醫  
之妄作學非精博識非悟解五行之數六氣之化莫索其  
隱莫擬其遠曰寒曰熱曰寒熱之相搏差之毫釐矢以千  
里而有余者益之不足者損之率意用法草石雜進天枉  
者半可勝嘆哉萬幾之餘著書四十二章發明內經之妙

曰聖濟經其意精微其旨邁遠其所言在理所以探天下  
之至頤又詔天下以方術未上拜御府所藏頌之為補遺  
一卷治法一卷卷凡二百万幾二萬以病分門門各有論  
而序統附焉首之以風疾之變動終之以神仙之服餌詳  
至於俞穴經絡祝由符禁無不患備名之曰政和聖濟總  
錄其所載在事所以祐天下之至神蓋聖人之誠世本在  
於上未在於下無見於上則治之道不立無見於下則治  
之其不行經之所言者道也醫得之而窮神總錄之所載  
者具也醫用之而已疾漢張仲景作傷寒論而雜之以方  
唐孫思邈作千金方而繼之以翼以謂不如是則世莫能  
用其術然之二人者游於方術之內者也彼超然獨見於



方術之外下顧岐伯之流而與之議始可謂知道朕作總  
錄於私意也用而抹民疾亦斯道之筌蹄去耳天下後世  
宜致思於忘筌蹄而自得者俯仰之間嘖笑之度御五行  
之數運六氣之化以相天地以育萬物至於反宮魂而起  
當生者豈細事哉蓋將有來者焉

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

大德重校聖濟總錄序

臣聞天地以溥生為大德所以曲成萬物而不遺聖人贊  
天地之化育故歛時五福以敷錫於庶民夫民之為物也  
智者寡愚者衆起居失常食飲無節外為寒暑燥濕風以  
賊其形內為喜怒思憂恐以亂其氣形氣乃傷疾所由作  
聖人有憂之謂祝由不可以盡已也遂制茱石鍼艾以攻  
八風六氣之邪為湯液醪醴以佐四時五行之正防其未  
然救其已病然後物各遂其生民不失其命矣又謂非立  
憲言不可以福萬世也於是上法天道下因地宜究陰陽  
之本明生死之由考於古而驗之今取諸已而施之人定  
為成書著之五版藏之金匱宜之於布政之堂秘之於靈



蘭之室以俟來哲以施無窮其為仁民受物之心斯可謂  
極矣然其言至簡其論至要其理至深後世學者雖有上  
智非研精覈慮則亦未易窺其奧也故曠代之中能以斯  
術鳴世者時固有之若夫神聖工巧獨得先世不傳之秘  
如和緩越人亦不過十人而已况去聖已遠支分派別  
折而為衆科業而為專門所以人各拘其偏而莫肯究其  
全則益不逮於古矣積習成常流弊茲甚懼大道將遂於  
湮微故聖濟總錄由是作焉上下凡二百余卷始終幾二百  
萬言逐病分門門各有方揔經立論論皆有統蓋將使讀  
之者觀論以求病因方以命藥則世無不識之病病無妄  
投之藥唯法有逆從治有先後在乎智者取其所當從其

所宜而已究而言之實醫經之會要學者之指南生民之  
司命也惜其始成於政和重刊於大定既綿歷百年之久  
不能無三豕之訛

今主上神極御天

修能制度治其畢張

以謂是書所載雖先聖之緒餘其所以康濟斯民亦致治  
之一物也廼

詔江浙行者刊於有司布之天下其或繆戾隨加釐正復  
降

德音俾下臣為之序引臣誠愚陋竊不自量仰惟

聖德如天



甄陶萬類爰自

卽位以來于今七年

恩浹飛沈

仁及草木然猶

夙夜孜孜

廣求民瘼或一物不得其所則必

為之惻然臣謂此書復出則上可以輔相天地之宜下可

以永底蒸民之生物無所癘咸濟於仁壽之域矣

大德四年二月一日集賢學士嘉議大夫典瑞少監臣焦

養直謹序

方技之書尚之久矣聖人治世亦所不能後者也若夫黃

帝內經神農本草素越人之八十一難經仲景之三百九

十七法王叔和之脉訣朱奉議之活人固在所勿論其餘

千方萬論歷世所傳誠不為不多然得其全者或寡矣故

近代諸書獨不若聖濟總錄之詳且備也

聖主以至仁為心

勤卹民隱所以首

命板行之於天下非惟重下民今日之命蓋將有闕於先

而覺於後也書曰贊贊裒哉夫是書之行也雖本於

上意之所注其所以始而終之者亦近臣有以贊裒之也

故凡與斯議者拜附於左

醫愈郎諸路醫學副提舉臣申甫



醫効郎御藥院副使臣王希逸

承直郎大醫院判官臣和思誠

奉訓大夫大醫院判官臣隋有

朝列大夫大醫院副使臣王佐

集賢直學朝列大夫太醫院副使臣政陽懋孫

中順大夫大醫院使臣韓公麟

少中大夫同提點大醫院事臣汪斌

嘉議大夫提點大醫院事臣麻惟錄

正議大夫同簽樞密院事左衛親軍都指揮使提點大醫

院事臣鄒忙古仄

昭文館大學士正奉大夫提點大醫院事臣李邦寧

榮祿大夫平章政事六都護提點大醫院事臣脫因納

江浙等處行中書省大德三年九月

內欽奉

聖旨刊造大德重校聖濟總錄至大德四年二月內畢工

今具在局提調官於後

正議大夫杭州路總管兼管內勸農事臣梁會

中順大夫江南浙西道肅政廉訪副使臣高晦

嘉議大夫江南浙西道肅政廉訪使臣田滋

中奉大夫前江南浙西道肅廉訪使臣徐琰

嘉議大夫簽江浙等處行中書省事臣奪兒只哥

正奉大夫江浙等處行中書省叅政事臣安祚







反領

一大德重校聖濟總錄元朝奉詔頒行者大板大字每卷首篇署元耶律楚材五字明朝武林高相國家抄本用綿紙硃格繕寫精工亦依內府式大板大字今刻小板密字以便行笈可攜檢方療病也

一是書方法深奧博學究心者方能領會如虛勞紫雪方有追撰義霍亂青金散有劫奪義熱痢黃連湯有及佐義用之皆取効如神至若調七傷平五志攻六氣理三因方中有參附而用硝黃者有桂附而用芩連者必須熟讀古人方經庶幾領會方法之妙也

一書中婦人門選其胎前產後帶漏崩中小兒門選其急慢諸風五疳吐瀉若一切雜症與大人治法不殊於大

讀領

人方中推類酌量用之

一書中運氣集定六十年每年可按素問稽查茲不刻

一書中鍼灸四卷符禁三卷古法不易行乳石發動二卷今人罕此患又食治三卷茶食不合宜俱不刻

一方中難得藥品如金牙銀牙卷石葶草之類不刻難合之方瘵時日而不能應倉卒急需者亦不刻


一方中藥名仍從原本如天麻為赤箭牛旁為惡實又為鼠粘甜桔梗為薺芫山柰為越桃紫胡為訖胡土茯苓為菽蕒香附為莎州根薄芎為鷄蘓砂仁為縮砂薑花粉為括婁根輕粉為膩粉如此之類不能更改一方中分兩古法難用今欲更改又失古人之意大約方



中一兩今用一戈方中一分去聲係二戈五分今用一字二分  
 一七有半幾至五幾者在人以意消息加減可也  
 一是書成於北宋其時四大家未生劉河間李東垣張子和朱丹溪無一  
 切活套應時方法補中益氣道遙歸脾醫家遇沉痾痼  
 疾疑難奇異等證用時方而不奏效良工亦束手者是  
 書有神方也

一聖濟經四十二章發明靈素精微鈞玄索隱補聖經之  
 未備家有藏本嗣刻行世

康熙辛酉桂月 靜觀居士程林雲來氏識於淮陰俞順  
 堂中



聖濟總錄纂要目錄

卷一

諸風門 統論

甲集

- |          |                        |         |
|----------|------------------------|---------|
| 中風       | 卒中風                    | 肝中風     |
| 心中風      | 脾中風                    | 肺中風     |
| 腎中風      | 攤緩 <small>俗名癱瘓</small> | 風躄曳     |
| 四肢拘攣不得屈伸 | 風瘓                     |         |
| 角弓反張     | 中風失音                   | 中風舌強不語  |
| 風口噤      | 風口喎                    | 破傷風     |
| 偏風       | 風偏枯                    | 肉苛即肌肉不仁 |
| 歷節風      | 中風百節疼痛                 | 風走注疼痛   |



卷二

諸風門

白虎風

風瘖癩

風不仁

風癢癢疹

風癢痒

蠱風

肌肉掣動

風癩

風癩

風狂

腦風

風頭眩

風頭痛

偏頭痛

漏風

勞風

風頭旋

風痰

胃風

風秘

歷癆風

白駁

白癩風

紫癩風

惡風

大風眉髮墮落

大風出虫

大風癩疾

烏癩

白癩

諸痺門 統論

痛痺

著痺

行痺

皮痺

肌痺

血痺

脉痺

筋痺

骨痺

腸痺

周痺

痺氣

熱痺

卷三

傷寒門

統論

傷寒可汗

傷寒可下

傷寒可吐



傷寒可溫

傷寒過經不解

中風傷寒

傷寒濕溫

傷寒時氣

傷寒疫癘

傷寒結胃

傷寒譫語

傷寒潮熱

傷寒煩渴

傷寒煩躁

傷寒厥逆

傷寒頭痛

傷寒喘

傷寒上氣

傷寒咳嗽

卷四

傷寒門

丙集

傷寒乾嘔

傷寒嘔噦

傷寒心悸

傷寒痞滿

傷寒霍亂

傷寒小便不通

傷寒大便不通

傷寒下利

傷寒陰毒

傷寒陽毒

傷寒發斑

傷寒發黃

傷寒發碗豆瘡

傷寒發狂

傷寒剛瘕

傷寒柔瘕

傷寒壞病

傷寒狐惑

傷寒百合

傷寒陰陽易

傷寒鼻衄

傷寒吐血

傷寒瘀血

傷寒口舌生瘡

傷寒舌腫脹

傷寒咽喉痛

傷寒毒攻手足

傷寒後夾勞

傷寒後勞復

傷寒後骨節煩疼

傷寒後虛煩

傷寒後盜汗

傷寒後驚悸

傷寒後失音不語

傷寒後咽喉閉塞不通







氣痢

休息痢

蟲痢

久痢

下痢裏急後重

痢後脫肛

疝蟲

溫蟲一證皆文痢所成

卷七

咳嗽門論

咳嗽

暴嗽

久嗽

中冷嗽

熱嗽

呷嗽

五臟諸嗽

咳嗽上氣

咳嗽吐膿血

咳嗽失聲

風冷聲嘶

諸氣門統論

諸氣

上氣

上氣喉中如水雞聲

短氣

陽厥

積聚門統論

積聚

肥氣

伏梁

痞氣

息賁

賁豚

諸瘕

結瘕

瘕氣

酒癖

卷八

失血門統論

吐血

吐血不止

嘔血

唾血

舌上出血

汗血

鼻衄

衄不止

大衄







水病門 統論

水腫

十水

風水

石水

大腹水腫

水腫欬逆上氣

水氣偏身腫滿

水蠱

膜外氣

卷十一

黃疸門 統論

黃疸

急黃

陰黃

酒疸

穀疸

胃疸

黑疸

女勞疸

黃汗

三十六黃

胸痺門 統論

胸痺

胸痺噎塞

胸痺心下堅痞急

胸痛

卷十二

心痛門 統論

卷十二

卒心痛

久心痛

肝心痛

脾心痛

胃心痛

腎心痛

厥心痛

九種心痛

停飲心痛

虫心痛

冷氣心痛

中惡心痛

惡注

心掣

心腹門 統論

心腹痛

腹痛

久腹痛



腹脹腸鳴切痛

腹脹

息積

腰痛門 統論

腰痛

腰痛強直不能俛仰

卷十三

虛勞門 統論

肝勞

肺勞

熱勞

腹內結強

脊痛

卒腰痛

腰脚冷痺痛

卒腰痛

心勞

腎勞

氣勞

脾勞

冷勞

急勞

風勞

虛勞寒熱

虛勞嗽唾膿血

虛勞不得眠

白淫

脉極

精極

虛勞咳嗽

虛勞潮熱

虛勞嘔吐血

虛勞失精

筋極

肉極

虛勞痰飲

虛勞盜汗

血

虛勞使濁

氣極

骨極

卷十四

骨蒸傳尸門 統論

虛勞五蒸

傳尸勞

骨蒸肺痿

傳尸骨蒸



諸疝門

寒疝

普寒疝心腹痛

陰疝

控暈

卷十五

大小便門 統論

大小便關格不通

小便不禁

大便秘澀

諸淋門 統論

心疝

七疝

陰疝腫滿

厥疝

蟲病

陰疝卒腫痛

小便不通

小便出血

結陰便血 詳痔門 腸風下血

卒淋

氣淋

石淋

九蟲門 統論

九蟲

蛟蟲

諸尸門 統論

諸尸

諸注門 統論

諸注

冷淋

血淋

勞淋

蛇蟲

五臟

遁尸

飛尸

風注

走注

熱淋

膏淋

三蟲

飛尸

走注

走注



卷十六

鬼注

中惡

鬼魅

氣注

卒死

鬼擊

卒魘不寤

尸厥

九

臟腑虛實明

肝臟

肝脹

膽腑

膽虛

膽熱多睡

心臟

肝氣逆面青多怒

膽實

膽瘴口若

膽虛不眠

心中寒

小腸府

小腸虛

心健忘

小腸實

善笑

脾臟

脾瘴口甘

穀勞

胃府

食亦

噫醋吞酸

胃反

胃寒腸熱

胃熱腸寒

肺臟

肺消

肺痿咽燥

膈消

肺痿小便數

肺痿

肺癰



肺癰喘急眩滿

大腸府

肺腸垢

伏瘕

腎藏

腎虛

腎實

腎脹

解休

瘖俳

腎虛陽痿

腎虛多唾

骨虛實

髓虛實

膀胱府

胞痺

胞轉

卷十七

面體門

面黥黥

面黥胞

面皴胞

面皴

面體疣目

狐頰

滅瘢痕

鬚髮門

統論

烏鬚

榮養鬚髮

鬚髮黃白

白禿

赤禿

眼目門

統論

肝虛眼

肝實眼

目胎赤

目赤痛

目熱疼痛赤腫

目赤爛

目血灌瞳人

赤脈衝貫里睛

墜睛

蟹目

目珠突出



目見黑花飛蠅息肉淫膚

目生贅肉

目内生瘡

目生珠管

省目

目驗腫硬

倒睫拳孪

卷十八

眼目門

目生膚翳

目生花翳

目青盲

將變內障眼

目眇膜

昧目

鐵眼 即偷鍼

耳病門

統論

耳聾

風聾

勞聾

五聾

耳聾有膿

耳虛鳴

耳聾

聾耳

百虫入耳

鼻病門 統論

鼻寒氣息不通

鼻息不聞香臭

鼻臭

鼻中生息肉

鼻淵

鼻流清涕

鼻中生瘡

痒虫食鼻生瘡

卷十九

口齒門 統論

口瘡

口臭

口吻瘡

口舌生瘡

口糜

唇瘡

唇生核

重舌

舌腫強



牙齒歷蠱

牙齒疼痛

齒蠱

虫蝕牙齒

腎虛齒風痛

齒風腫痛

齒斷腫風附

風牙

齒門出血

齒齲

牙齒動搖

咽喉門統論

咽喉閉塞不通

喉痺

走馬喉痺

咽喉生癰

尸咽喉

咽喉中如有物妨悶

骨鯁

誤吞諸物

癭瘤門統論

五癭

諸瘡

癩癧門

癩癧結核

癩癧寒熱

癩癧久不差

卷二十

癰疽門統論

附骨癰

附骨疽

乳癰

腸癰

胃脘癰

瘡腫門統論

諸瘡

諸惡瘡

反花瘡

浸淫瘡

下注瘡

冷瘡

月蝕瘡

凍爛腫瘡

痛瘡即濃窠瘡

漆瘡

湯火瘡

卷二十一

壬集



瘡腫門 統論

丁瘡

諸疥

癬瘡

代指 即天蛇頭

丹毒

痲瘡

肉刺 即雞眼睛

金瘡門 統論

金瘡血不止

金及傷傷中筋骨

金瘡中風水瘡

金及腸出

毒箭所傷

箭鏃金及入肉

狐尿刺 惡刺

竹木刺傷肌肉不出

痔瘡門 統論

諸痔

牡痔

牝痔

脉痔

血痔

腸痔

氣痔

痔痿

腸風下血

傷折門 統論

從高墜下傷損腫痛

傷折惡血不散

筋骨傷折疼痛

傷折風腫

卷二十二

傷折門

打撲損傷

被傷絕筋

諸骨蹉跌

傷撲止痛生肌

傷折胎疳并膏藥

雜療門

中藥毒

食毒

食諸菜草菌中毒



飲酒中毒及大醉不解 牛馬猪犬魚蟹毒

解金銀銅鐵石毒 中盡毒

狗咬 蛇螫 蠍螫

蜂螫 蜘蛛咬 蜈蚣咬

溺水死

卷二十三

婦人門 統論

月水不通 月水不斷 月水不來腹痛

室女月水不通 帶下 漏下

經血暴下 即血崩 經血暴下兼帶下

血分 水分 無子

妊娠門

妊娠惡阻 妊娠漏胎 妊娠胎動下血

妊娠胎萎燥 妊娠胎不長養

妊娠吐逆不下食 妊娠咳嗽

妊娠傷寒 妊娠下痢 妊娠子淋

妊娠浮腫 妊娠小便不通

妊娠大小便不通 妊娠半產

妊娠數墮胎

卷二十四

產難門

逆產 難產

子死腹中



息胞 即胞衣不下

產後門

產後血暈

產後語言妄亂

產後中風

產後中風口喎

產後中風角弓反張

產後辱勞

產後大便不通

產後乳汁不下

產後妬乳

產後乳結核

產後乳癰

卷二十五

小兒門

小兒初受氣法

小兒相法

小兒浴法

小兒口禁

小兒撮口

小兒鵝口

小兒重脬

小兒臍風

小兒解顛

小兒顛陷

小兒急驚

小兒慢驚

小兒天癩

小兒門

小兒諸疳

小兒哺露下痢

小兒噦吐覘

小兒洞泄注下

小兒無辜疳

小兒吐逆

小兒泄瀉



小兒語遲  
小兒涎液不收

小兒齒不生

卷二十六

神仙服餌門

小神仙服草木藥石

補益門

平補

補虛益精髓

補虛壯元陽

峻補

補虛益氣  
補虛固精

聖濟總錄纂要目錄終

聖濟總錄纂要卷之一

△諸風門

中風  
脾中風

卒中風  
肺中風

肝中風  
腎中風

心中風

諸風統論  
論曰易曰撓萬物者莫疾乎風夫以吹噓鼓舞巽而易入  
枯者榮者成物之功實在於是然而分四時位八方適應  
其時則為正邪循其方則為邪人惟萬物之靈能察諸此  
觀冬至之日有從南方來必曰賊風其他可類推矣感之  
淺者留於肌膚感之深者達於骨髓而况倉卒頃刻之間

新安

吳汝漸非止較

許承家師六閱

程林雲來纂

黃家珮鏘鳴

江湘郢上閱



大可笑懼因有治療所不迫考蓋禍患之機藏於細微非  
常人所豫見及其著也雖智者不能善其後是以上古聖  
人之教下皆謂之虛邪賊風避之有時不然何以言風者  
百病之始風者百病之長風者善行而數變先聖之言可  
深思之

論曰風邪中人以春甲乙得之為肝風以夏丙丁得之為  
心風以季夏戊己得之為脾風以秋庚申得之為肺風以  
冬壬癸得之為腎風若中其五臟六府之俞則各隨其證  
而治之人生自幼穉至於老耄率多因風而致疾或嗜食  
傷飽或不食失飢或湯而失飲或飲而過量或因五味之  
傷或胃熱衝風或大寒近火或暴露寒濕或刺損肌膚撲  
傷肢體或失節宣或多嗜慾緣此風趨諸竅或留一偏遂  
使手足不隨言語蹇澁或痛連骨髓或痺襲皮膚瘙痒如  
異行癢痺如鐵石或多疼好睡或健忘多噴血脈不行肉

色乾瘦久在牀赤起便須人語淡面浮精神困耗皆其證也

附子湯方治中風欲死身體緩急目不得開舌強語澁

附子破去皮 白朮去 桂枝去 芍藥去 甘草炙 附子炮製 黃芩去

右十三味剉如大豆每服五錢匕水一盞半入生姜

半斤切煎至八分去滓空心日午夜臥各溫服如人

行五里以熟生姜粥投之微汗出慎外風

麻黃湯方治中風肢體弛緩言語蹇澁精神昏憤

麻黃去根節 桂枝去 芍藥去 杏仁去 甘草炙 麻黃去根節 桂枝去 芍藥去 杏仁去 甘草炙

右十一味麩搗篩每服五錢

已水一盞半煎至八分去滓溫服如人行五里再

服用熱生姜稀粥投汗出慎外風

薏苡仁湯方治中風肢體緩縱精神恍惚言語蹇澁

薏苡仁去 白朮去 桂枝去 芍藥去 甘草炙 薏苡仁去 白朮去 桂枝去 芍藥去 甘草炙

右七味剉如大豆每服五錢匕水一盞半入生姜

半斤切煎至八分去滓空心日午夜臥各溫服如人







風之人由陰陽不調府藏大虛氣血衰弱榮衛之竭故風之毒邪尤易乘間致仆倒悶亂語言蹇澁痰涎壅塞肢麻痺痺不識人事者此證也

奪命散方 治中風卒倒不省人事口面喎斜失音不語

但吐涎沫或口噤不開目味垂死一切風痰

黑豆合烏雞糞 馬牙硝 研 龍膽碎 馬牙硝拌

共四味先將雞糞及豆同炒熟次入龍膽馬牙硝

勻以酒三盞煎二盞去滓分三服不拘時候溫服

救生散方 治卒中風

白礬 半復 天南星三味

同為末散每服以好酒一鍾茶末二錢七生薑三片

煎七分通溫灌之當吐涎扶令正坐經一復時不得

令臥如臥則涎難出良久再依法前茶一錢後常服

只羊莖

篋竹瀝飲方 治卒中風倒悶口噤不能語昏不知人鍼

不知痛

篋竹瀝合 防風 甘草 桂各 防己 廣黃

白木 人多 黃芩 細辛 茵芋 秦艽去 附子

去皮兩 生薑焙乾 除竹瀝外剉廣豆每服五錢匕

水一鍾半竹瀝一合同剪至一盞去滓溫服不拘時

羗活湯方 治卒中風悶亂語言蹇澁牙關緊急

羗治 桑根白皮 廣黃 天雄去皮 當歸各二

桂 旋復花炒 遠志略 大腹皮 杏仁湯浸 芎藭

威靈仙 枳壳去 葛蒲各 一 杏仁二十 片剪至八

分去滓溫服不拘時

阿膠丸方 治府藏久虛氣血衰弱卒中風邪及攤緩等

阿膠炙 蟬殼去 犀角屑 麝香三 白花蛇分

桂一 白鮮皮 白僵蚕炒 天南星 半夏酒浸 炒

天一 桔梗 黃耆 當歸 羗治 虎頭骨炙

天一 桔梗 黃耆 當歸 羗治 虎頭骨炙



海桐皮 白芷 白茯苓 附子 去皮 防風 芎藭

廣黃 兩各一 乾蠍 炒去尾用 糯米 二枚 人參 沒藥 兩各半

木香 兩一 羚羊 兩一 羊角 兩一 兩半 乾姜 兩一 烏蛇 酒浸 三分

共細剉焙乾搗為末鍊蜜為丸如彈子大每服一九

生薑酒嚼下中風甚者拗開口或先以茶噉化茶灌下立省

牛黃九方 治卒中風仆倒悶亂語言蹇澁涎痰壅盛

牛黃 盧會 天竺黃 血竭 沒藥 丹砂 研俱 續隨

子 皂夾灰 兩各半 丁香 木香 乾蠍 炒去土 粉霜

雄黃 甘遂 各一 麝香 二 肉豆蔻 二 枳椇 二

龜腦 字

共搗研為末每抄茶末四錢入輕粉三錢再研勻麪

糊為丸如黍米大每服五九金銀薄苛湯下隨大小

加減一方漆天廣一兩酒浸灸為末研勻九如小彈

子大凡中風用冷水化下一九立效些小風寒每服

半九小兒驚風一九分作六服並用冷水化下與後

肝中風 黃九并局方牛

論曰內經謂以春甲乙中風為肝風肝風之狀多汗惡風

善悲嗌乾善怒時憎女子者有頭目暈兩脅痛行常偃僂

嗜耳如阻婦狀者有但踞坐不得低頭兩目連額色微青

唇青面黃者治法宜灸肝俞後以茶治之

排風羗活散方 肝藏中風筋脉拘攣疼痛

羗活 去芦頭 天廣 芎藭 酸棗仁 兩半

薏苡仁 兩一 鹿角膠 兩一 芍藥 兩一 牛膝 兩一

蔓荊實 兩一 羚羊 兩一 白附子 兩一 地骨皮 兩一

烏蛇 兩一 犀角 兩一 白鮮皮 兩一 人參 兩一

剉一 栝子仁 兩一 右一十七味搗羅為散以豆

林酒調下 漸如至二錢匕日三夜一

升廣湯方 治肝虛中風頭痛目眩胸中客熱氣壅衝煩

升廣 前胡 一兩 五錢 玄參 兩一 地骨皮 兩一 羚羊

一兩 五錢 玄參 兩一 地骨皮 兩一 羚羊

一兩 五錢 玄參 兩一 地骨皮 兩一 羚羊

一兩 五錢 玄參 兩一 地骨皮 兩一 羚羊

一兩 五錢 玄參 兩一 地骨皮 兩一 羚羊

一兩 五錢 玄參 兩一 地骨皮 兩一 羚羊



角屑 葛根各二 酸枣仁一

右七味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至八分去滓入竹瀝半合重煎三兩沸放溫食後服如人行五六里更進一服

心中風

論曰心中風之狀多汗惡風焦燥善怒赤色病甚則言不快診在口其色赤夫心受風風盛則生熱熱甚則汗不止心之液為汗故也汗多則腠理疎則真邪相薄是以惡風久心惡熱熱極則唇焦內燥多怒心之聲為言病甚則言不快心氣通於舌故也又其證胸背拘急不可傾側面赤頭痛熅熅發熱不能安臥以心生血脈其風日久隨榮衛行內外相搏蘊積而然也

脈

辰砂天九方鎮養心神擒截諸風和流榮衛滋潤筋丹砂兩通關腸即蜜表膝天南星各半

蠟稍炒一分白附子兩半白殭蚕炒牛黃兩各蓬砂研入麝香研入共為末水煮麪糊為丸如梧桐子大每服三十九荆芥湯下計時候

烏犀散方治心中風精神冒悶語聲錯誤恍惚多驚烏犀角兩鎊二丹砂炒獨活去芦丹少遠志心去

人參丹砂丸方治中風恍惚驚悸安神志化痰涎共搗羅為散每服二錢匕食後酒調下日三

細辛去枝赤箭天門冬焙去心遠志去心生乾地黃焙菖蒲切九節者未泔浸白茯苓三兩犀角鎊沙多防風兩各麝香研半共搗研為末鍊蜜丸如小雞頭大每服一丸溫酒嚙下不拘時候

脾中風論曰脾風之狀多汗惡風身軀怠惰四肢不欲舉色薄微



黃不嗜食診在鼻上其色黃又曰踞而腹滿身通黃吐酸  
汗又曰燭之癸熱形如醉人腹中煩重皮肉潤動短氣脾  
裡諸藏淮四旁者也所至四肢故脾中風則身躄怠惰四  
肢不欲動脾者倉廩之官故病則不嗜食診在鼻中央之  
位也其色黃黃土之色也煩重癸熱風之候也形如醉人  
者邪氣之甚也

獨活湯方 治脾藏中風肢躄緩弱言語不利燭之癸熱

獨活 六黃 去節 皮煎 掠 防風 去 又 各 白茯苓 皮

人多 羚羊角 鑄 前胡 去 芦 沙 多 去 芦 旋復花

黃芪 半夏 湯浸 七 焙 附子 炮 製 三 分 去 皮 甘 州 兩 炙 半

共剉 如 廣豆 每服 三 錢 匕 以 水 一 盞 半 入 生 薑 汁 半

合切 同 煎 取 七 分 去 滓 溫 服 不 拘 時 日 三

秦朮湯方 治脾藏中風身躄拘急舌強不能語

秦朮 去 苗 廣 黃 去 根 節 沸 湯 石 羔 兩 各 炙 獨 活 赤

茯苓 皮 去 山 萸 芎 藭 去 沫 防 風 桂 白 木 人 多

防己 附子 炮 製 杏 仁 去 皮 炒 各 三 錢 乾 姜 甘 州

細辛 去 苗 葉 共 剉 如 廣 豆 每 服 五 錢 匕 水 一 盞 半 煎

取 八 分 去 滓 溫 服 不 拘 時 候

羚羊角丸方 治脾藏中風口面偏斜語言蹇澀虛煩手

臂腰脚不隨 防己 白芍藥 獨活 去 芦 白茯苓 去 黑

皮 羚羊角 屑 防風 酸 棗 仁 炒 微 杏 仁 去 皮 炙 麥 門 冬 去 心

焙 各 三 分 人 多 芎 藭 柏 子 仁 炒 熟 乾 地 黃 一 焙 各 兩

當歸 半 切 焙 各 半 兩 附子 蕙 以 仁 熟 乾 地 黃 一 焙 各 兩

共 搗 羅 為 末 鍊 蜜 丸 如 梧 桐 子 大 每 服 空 心 溫 酒 下 九

肺中風 論曰肺中風之狀多汗惡風色皎然白時欬短氣晝日則

差暮則甚診在眉上其色白又曰燥而喘身運而重冒而

腫脹偃臥則胸滿短氣冒心肺出大熱生風風盛則熱勝

理開多汗名熱甚故也風薄於內所以惡風皎然而白金



之色也在變動為效又肺主風故時效短氣也風陽也陽  
盡則在表暮在裏陽裏而風應之故暮則甚也診在眉上  
其色白肺之色也身運而重風使然也喘而腫脹偃臥而  
胸滿短氣以肺主氣故也

羚羊角丸方

治肺中風氣急背項強鞭語聲嘶敗  
羚羊角二兩 白鮮皮五兩 升麻 蔓荊實 惡實炒

枳壳

天广者

秦艽

共搗羅為末鍊蜜和丸如

梧桐子

大食後煎桑白皮湯下十五丸日三服

薺芫湯方

治肺中風項強鼻塞語聲不出喘鳴肩胸滿氣

防風

人多

獨活

細辛

赤箭

芎藭

羚羊角

各五

廣黃

二

桔梗

劉炎

前胡

去

蔓荊實

白鮮皮

各五

甘

石

馬

各

二

煎

腎中風

論曰腎風之狀多汗惡風脊痛不能正立其色灼隱曲不

此所叙腎風說得甚精

利診在肌上其色黑夫身之本在腎受五藏六府之精氣  
以養百骸九竅腎受風則諸陽之氣不上至於頭面故有  
面癭然臍腫之證陽氣虛者則多汗惡風腎主骨骨不強  
則脊痛不能立精神衰弱則隱曲之事不利肌上黑如始  
色又踞而腰疼不可俛仰或為冷痺或為偏枯耳鳴聲濁  
志意昏沉善恐多忘皆腎風證也

海桐皮散方

治腎中風踞而腰痛脚腫疼重耳鳴面黑  
志意不樂

海桐皮

劉

五加皮

去粗

草薺

炒

薏

以仁

各一

浸

虎骨

真酥炙

枳壳

赤芍

茱萸

牛膝

焙

各一

酒

浸

惡實

炒

防風

統

杜仲

劉

炒

郁李

仁

去

熟乾

地黃

一

二

爇

溫

酒

調

下

漸

共搗羅為散

每服

二

爇

溫

酒

調

下

漸

加

空腹食前各一服

杜仲丸方

治腎中風腰脚不隨骨節痠疼筋脉拘急行



履艱難兩脅牽痛

杜仲去皮剉

牛膝去苗酒浸

草薢半兩

酸棗仁

當歸三分

防風一分

丹參三分

赤芍藥三分

桂兩

肉蓯蓉酒浸切

石斛三分

附子五分

郁李仁湯浸三分

換根煨

共擣羅為末鍊密契如梧桐子大每服空服用溫酒下三丸

防風湯方治腎中風腰脚痛痺不仁骨髓痠疼不能久立漸覺消瘦

防風五兩

羌活兩

黃芪三兩

五加皮五兩

桂一兩

牛膝去苗酒浸切

丹參一分

酸棗仁一分

五加皮五兩

桂一兩

赤芍藥五兩

廣黃去節煎掠去沫焙

換根煨

當歸焙切

木通五兩

共麩擣篩每服三匙匕水一盞至七

分去滓

水一盞至七

石斛去根共

石斛去根共

頭面遊風補虛勞益氣力

石斛浸酒方治腎中風注腰脚痺弱利關節堅筋骨除

黃香五兩

丹參兩

牛膝去苗

石斛去根共

參五兩

杜仲去粗

五加皮

白茯苓兩

防風五兩

枸杞子

山朱去心焙

山茱萸

草薢兩

防風五兩

天門冬三兩

共細剉如大豆用生絹囊盛以酒五斗於淨瓷器

中浸七宿初溫服三合日三夜一漸加至六七合一

升計常有酒氣不至大醉

風痺曳

中風失音

攤緩俗名癱瘓

風痺曳

角弓反張

四肢拘挛不得屈伸

中風舌強不語

論曰攤緩之辨推則懈惰而不能收搯緩則弛縱而不能

制物故其證四肢不拳筋脉開節無力不可收搯者謂之

攤緩其四肢雖能拳動而肢節緩弱憑物不能運用者謂之

緩或以左為推右為緩則非也但以左得之病在左右得

之病在右耳推其所自皆曰氣血內耗肝腎經虛陰陽偏

攤緩

攤緩

攤緩

攤緩

攤緩

攤緩



瘵而得之或有始因他病服吐下之藥過度亦使真氣內  
動榮衛失守一身無所稟養而致然也  
紫金天九方 治中風推緩手足彈曳

天九 沒藥 研 乳香 研 牛膝 酒浸 白朮

當歸 各半 牛黃 研三 犀角 兩一 附子 去皮臍

五靈脂 兩二 共十味為末取三家井華水九如櫻桃

大每服一九先用生姜汁化開次用酒調下如中風

推緩手足彈曳蹇澁口眼喎斜不省人事口吐涎沫

或手足搐掉骨筋疼痛皮肉大痺並宜服之

天九浸酒方 治推緩風不計深淺久在牀枕

天九 半兩 松節 兩一 龜骨 虎骨 酒浸 骨碎補 兩半

敗龜 醋炒 烏蛇 酒浸去 白花蛇 酒浸去

惡實根 各半 附子 一枚 羌活 獨活 去蘆

牛膝 酒浸各 當歸 芎藭 各一 天九 仁 二兩

熟干地黄 兩焙半 茄子根 二兩 原蠶 炒 二

共十九味吹咀如大豆用酒二斗浸密封春夏三日

秋冬七日每服一盞不拘時候溫服

虎骨丸方 治推緩風手足不隨口眼喎斜頭目昏重腹

膝少力及風氣凝滯筋骨疼痛

虎骨 兩半 酢炙 當歸 兩一 赤箭 兩半 安息香 酒研

海桐皮 獨活 牛膝 酒浸各 肉蓯蓉 酒浸

金毛狗脊 去皮 續斷 各半 草薺 烏頭 臍皮

芎藭 各一 胡瓜子 仙靈脾 乳香 研各 防風

天九 石斛 去根各 酸棗仁 研 黃松節 炒酒

細辛 各半 共二十二味除別研外為末酒煮麩精丸

如梧桐子大每服十五丸酒下或荆芥湯不拘時

天九方 治風氣推緩等疾

天九 玄參 防風 地榆 乾浮萍 洗焙

乾薄芎 烏頭 牛膝 酒浸 及諸藥 牛黃

不虫肥皂莢 合五定候冷用半兩細研入諸藥



龍腦各一錢 共十一味 除別研外為細末和勻鍊蜜

和杵百餘下丸如雞頭大每服一九溫酒下

牛黃九方 治一切風及推緩言語蹇澁搜風鎮心

牛黃一分 龍腦一錢 麝香一錢 雄黃一分 丹砂五分

天方 烏犀 乾蠍炒去土 羚羊角鎊 羌活味同

獨活 防風 細辛 白芷 赤茯苓

蟬蛻 大黃去根 牛膝酒浸 芎藭 五加皮各半

白附子炮 烏蛇酒浸去皮 共二十二味 研

為末鍊蜜和杵一千下丸如雞頭大每服一九嚼破溫

沉香煎丸方 治推緩不收躄重無力肢節緩弱運動不能

沉香 丁香 葫蘆巴炒 附子去皮 牛膝去苗

補骨皮炒 懷香子 石斛剉 芎藭 木香

青橘皮湯浸 桂皮粗 肉蓯蓉酒炒 共十三味

擣羅為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九生薑湯下酒亦可

風痺曳 論曰人假水穀之精化為血氣周流一身使四肢相隨筋

脉相統猶挈裘領無所不從若脾胃虛弱水穀不化筋脉

無所稟養復遇風邪外搏層滕流傳筋脉縱緩則收躄痺

曳其躄則偏而不舉曳則弛而不隨是皆不能收攝也

獨活湯方 治中風手足躄曳不能言

獨活二兩 甘草中 桂 生葛根 芍藥

括樓根實 右六味剉如大豆每服五錢生薑三

片同煎溫服日三夜一

敗龜丸方 治中風手足脚顫掉躄曳

敗龜五兩 一味為細末研飯為丸如梧桐子大每

服二十九酒下

附子湯方 治風痺曳手足不隨身躄不能俛仰

附子去皮 干姜 甘草炙 防風 獨活各一

石羔碎 白茯苓 白朮 芎藭 柴胡







乾每用一餅以葱白裹安手足節上以手帛擊注  
在一朽木桶上用熱湯淋之候覺骨中熱極方解去  
帛子後看手足未得舒展時再用熱湯淋之每一餅  
可用三次如用菜單且著衣服蓋之不得透風

酸枣仁剪方

治筋骨拘急及軟疼痛行履不得

酸枣仁生三兩半炒

虎骨酒

海桐皮

羌活

各二

仙靈脾

赤箭

草薢

杜仲

去粗皮

敗龜

酒炙

蔡

茯苓子

石斛

牛膝

浸酒

巴戟天

附子

各四

木香

熟乾地黄

酥

桑枝

尺一握

白蜜

西

共十九味搗羅十七味為末細研勻用清酒七升先

煎桑枝令黃色去桑枝後下菜末更煎一二十沸次

下酥蜜煎成膏看香氣得所用瓷盆盛每服一匕頭

溫酒調下日三服

風痙

論曰風痙者以風傷太陽之經復遇寒濕故也其狀口噤

此麻黃湯宋附湯  
之變方

不開腰背強直如癉蓋風邪肉薄於經則榮衛凝泣筋

脈緊急故令口噤不閉卒然倒仆不知所以風發極則復

甦甦則復作其或耳中策策而痛身背直而不屈者不治也

天廣湯方

治風痙身如板直偏身鞭強

天廣

羌活

人參

桂

去粗

白木

廣黃

掠去沫

杏仁

炒

各一分

附子

去皮

一枚

廣豆每服五支五服生薑一朶大同煎再入酒半盞

煎熱服後以生薑稀粥投之取汗日三

甘中

羌活

一分

防風

兩

附子

兩

甘中

羌活

一分

防風

兩

附子

兩

每服四錢入地黃汁一合煎再入荆瀝竹瀝各半合

同煎溫服日夜各一

角弓反張

論曰風角急及張之狀腰背反折不能俛也中風邪客於

諸陽之經邪正相搏風氣勝則筋脈縮急腰背反折如



六黃飲方 治中風身如角弓反張四肢不隨煩亂口噤

六黃去根節 防風 桂 白木 人參 芎藭 杏仁去皮尖

當歸湯方 每服五匙水煎溫服不拘時 治中風身如角弓反張口噤不開

當歸 細辛各三 防風 獨活各一 附子一 廣黃去根節

急風散方 治中風身如角弓反張狀 若口噤即乾開口灌之

附子一枚 烏頭一枚 天南星一枚 藿香一枚 防風 白芷各半 乾蠍土者去 白附子各半

中風失音 論曰喉嚨者氣之所上下也會厭者聲音之門戶其氣宜通則聲音無所阻礙若風邪搏於會厭則氣道石宜故令

人失音入藏則不能言語也 羌活湯方 治中風失音不語

羌活去根節 甘草炙 人參各半 附子一枚 獨活去根節 附子一枚

荊瀝 竹瀝 生干地黄 共七味先將四味剉如大豆每服五匙入三件汁瀝同煎溫服日三夜一

地黄湯方 治中風失音不語 生地黃汁 淡竹瀝各半 獨活去根節 附子一枚

羚羊角湯方 治中風失音手足不隨 同煎溫服空心日午夜臥各一

羚羊角鎊 芎藭 細辛去苗 木香 防風去根節 廣黃 獨活 羌活 當歸酒浸 附子去皮 桂去粗 天麻

竹瀝湯方 每服三匙水煎溫服不拘時候 治中風失音不語昏沉不識人

竹瀝 荊瀝 梨汁各二 陳醬汁各半 四味相和微

竹瀝 荊瀝 梨汁各二 陳醬汁各半 四味相和微



煎一二沸再濾一徧令温細紳灌入口中口噤幹閉

竹豆湯方 治中風失音不語 烏頭升 二味以水八升相和煮

新青竹 碎如等子 烏頭升 二味以水八升相和煮 令豆爛去滓再煎取一升每服二合灌之或口噤不

羗治湯方 治中風舌強不得語手足拳動不得 羗治 羚羊角 獨活 大黃 防風 旋復

花 獨活 大黃 防風 旋復 當歸 麥門冬 杏仁 湯浸去皮尖 每服一兩

竹瀝湯方 治中風舌強不得語心神煩悶 淡竹瀝 人乳汁 三年醬汁 三味相和調

陳醋方 治中風不得語舌根澀 陳醋 人乳汁 三年醬汁 三味相和調

陳醋 三年醬汁 人乳汁 各五 三味相和研以 生絹濾絞取汁分為三服日夜服之服盡能語

三聖散方 治中風舌強不語 三味研為末每 沒藥 琥珀 乾蠍 七枚全

服三棧用鵝梨汁半盞皂莢末半棧濃煎湯一合與 梨汁相和調下須臾吐出涎毒便能語

雄黃丸方 治心脾中風舌強不語涎潮昏塞不省人事 雄黃 丹砂 牛黃 天南星 白姜

研香同 天南星 麝香 金箔 銀箔 每服一丸 温薄荷汁化下不拘時 破傷風

風口噤 風口噤者風寒客於三陽之筋使筋脉拘急口噤不 論曰風口噤者風寒客於三陽之筋使筋脉拘急口噤不

開牙開緊急若不速治恐致他病以風者善行而數變也

破傷風 風口噤 風口噤者風寒客於三陽之筋使筋脉拘急口噤不



關開散方

治中風目瞑口噤不能下菜者用此散以中  
指點散子措齒三二十次在大牙左右其口自開始得下菜

天南星

生精為

鼈腦

研別

各等分研細五月五日午

時合患者共使一字

不若急用亦

烏梅飲方

治中風不語口噤吐痰頭項筋急

烏梅二十枚

并子槌碎

菘菜一碎到

兩半

白礬生用

一兩

先以水

一升煎菘菜根取三合去滓別盛又以水五合煎白礬取三合

烏梅至三合去滓別盛又以水五合煎白礬取三合

別盛以物幹開口先灌菘菜湯次下烏梅湯又次下

白礬湯旋消停服之良久即吐惡痰毒涎如不吐

以鵝毛攪喉口取吐

附子散方

治中風牙關緊急偏身強鞭

附子一枚

炮製去皮有

白附子

共末為細散每服一

海帶散方

治風口噤牙關不開

海帶炒半

烏梅肉

天南星

生各

麝香

二分

別入

為細末入瓷盆內勿令透氣如患急以半爻匕於顯

裏牙關上措便自開口立效

治牙關緊急方

甘中

比中指節截作五截於生油內

以物幹開牙關

今咬定甘中可知人行五里時候又換甘中一截後灌菜極效

白神散方

治中風或吐瀉牙關緊噤下菜不能

白梅末

多不拘

將措牙立開蓋酸能收斂自然牙骨易

開也

風口喝

論曰足陽明脈循頰車手太陽脈循頰土頰二經俱受風

寒筋急引頰令人口喝僻言語不正目不能平視又云風

入耳中亦令口喝蓋經絡所繫然也診其脈浮而遲者可治

治中風口面喝斜葛根湯方

葛根

防風

附子

大黃

各一兩半

獨活

三兩

杏仁

湯

如



去皮四  
十枚  
松實去壳 兩半  
共剉如大豆每用茶十錢以

防風湯方 治中風口面喎斜痰出失音  
水二盞酒一盞入生姜三片煎一盞半去滓分三服旦夜一

防風 防已 升升 桂 廣黃 芎藭各一 羚羊  
角一兩 剉如大豆每服三錢以水一盞煎取六分

去滓入竹瀝半合更煎三二沸熱服空心日午及臨  
臥各一服

治賊風吹著口眼喎斜一字散方  
烏頭用 青礬各半 共為散每用一字搐入鼻內取出涕涎

治風口喎方  
蓖麻油 巴豆油 二味等分並相和如右喎即點在  
口角如左喎即點右口角仍急覩纔正當急搯去茶

治中風口面喎斜青松葉浸酒方  
青松葉如一 剉細 木石臼中杵令汗出用生絹囊貯以清  
酒一斗浸二宿近火煨一宿初服半升加至一升頭汗出即止

治中偏風口面喎斜石灰塗方  
石灰并 炒乘熱以醋調以泥塗於一邊緩處纔正急  
用溫水洗去

人參丸方 治中風口眼喎斜手足無事語不謇澆止緣  
坐臥處對耳有竅為風所中筋牽過一邊連眼皆紫  
睡着一眼不合者服此茶二十日內眼口皆正矣

人參 草烏皮去 牛膝去苗 酒浸焙 乾各一 兩  
搗羅為細末水煎麩糊丸如梧桐子大每服十九粒按

黑豆淋酒下一日三服  
治一切風口眼偏邪假蘇散方

生假蘇梗去 生薄荷用葉 二味並沙盆內研生絹絞  
取汁瓷碟內看厚薄日煎成膏餘滓三分去一分粗

滓不用將二分滓晒乾杵為末將膏和為丸如梧桐  
子大每服二十九溫酒下

破傷風

破傷風

破傷風



論曰破傷風者因卒暴傷損風邪襲之傳播經絡致使寒熱更作身軀反張口噤不開甚者邪氣入藏則不可治諸瘡久不差榮衛虛弱肌肉不生瘡眼不合者風邪亦能外入為破傷風之候

羌活湯方治破傷風身如鍼石或如角弓反張口噤不開宜幹薑灌茶

羌活 防己 羚羊角 升 廣 黃芩 蔓荊實 各一

犀角 茯神 葛根 甘草 各一兩 防風

廣黃 麩搗篩每服三錢匕水一盞入地黃汁

半合薤白二寸煎至八分去滓空心日午臥溫服如

病急不拘時候服蓋覆出汗即愈挑毒灸瘡狗咬等中風

羚羊角散方治打擊破瘡或洗頭挑毒灸瘡狗咬等中風

芷 曲棘 鍼 用 生 甘 州 炙 芍 藥 紫 苑 天 雄

防風 牛膝 枳實 蔓荊實 石南葉 酒醋

杏仁 浸去 皮尖 廣黃 龜骨 土 黃芩 防己 白木

草薺 乾蔓青 花 葛根 赤茯苓 羌活 蒼耳心

車前子 桑白皮 菊花 酸棗仁 當歸 丹

參 烏蛇 酒浸去皮骨 陳橘皮 湯浸 共四十味搗

羅為散每服一錢半至二錢匕空心午時夜臥溫酒

調下要丸即鍊蜜丸如梧桐子大每服十九丸豆淋酒下

治破傷風獨聖散方 蘓枋木 不拘 共為細散每服三錢匕酒調服之宜效

治破傷風身腫牙關不開白善蚕散方 白僵蚕 真者少 生研為末每用生薑自然汁調以鷄

翎於瘡口掃之勿令乾斯須腫塌皮離為效仍用生

薑汁調半錢匕服

治破傷風打撲內損飲銀花散方

天南星 大者半 炮 白附子 半生 炮 防風 等分 為細末



每服二錢匕重者童子小便調稍輕熱酒調下如外  
傷用此茶貼瘡口仍依法服之如破傷風先以小便  
溫洗瘡口次用茶乾貼追出風毒立愈熱稍惡口噤  
者以童子小便調幹開口灌之如刺打至死但心頭  
微煖者併灌三服即治常須合下以備急用  
偏風 風偏枯 肉苛

偏風

論曰人身所養者惟血與氣血氣均等則無過不及之害  
稍至衰微則所運不周遂致體有偏復因風客身一邊者  
謂之偏風其狀半身不知痛痒或痺痺不仁或縱緩或痺痛是  
荆瀝湯方 治偏風不隨心中煩悶言語謇澁

荆瀝湯方

治偏風不隨心中煩悶言語謇澁

防已湯方 治偏風半身不隨口眼喎斜不能言語筋脉  
拘挛不得轉側

防已

治偏風半身不隨口眼喎斜不能言語筋脉拘挛不得轉側

防已

芎藭 桂 黃芩 芍藥 人參 甘草  
附子 防風 杏仁 去皮尖

廣黃

每用十錢生薑十片同煎分溫三服日二夜一

生地黄湯方 治偏風手足一邊不收口目喎戾言語謇澁

生地黄汁

竹瀝 荆瀝 各一升

三味別作羗活防風各一兩去芦頭并又剉附子一  
枚重半兩者去皮臍生用作八九片入前三汁中慢  
火煎取一升半每用醇酒三合調化茶汁三合煖服  
之日二夜一無間冬夏並得服之

廣子仁湯方

治偏風手足不隨口面喎斜

廣子仁

黑豆 二合 炒 紫 鵲 糞 炒 二 壘 柎 枝 剉 二 握

豆等令黃乘熱便投柎枝酒內須臾去滓令淨每服  
旋取溫服二合至三合空心臨臥各一服



續命獨活湯方 治偏風半身不隨 熱悶語澆

獨活 防風 人參 芍藥 防己 桂

羚羊角 吹咀如大豆 每服五錢 入竹瀝 半合同煎 溫服

安息香丸方 治偏風半身不仁 縱緩不收 或時痺痛

安息香 乳香 廣黃 胡椒仁

乾浮萍草 治偏風半身不隨 不知痛痒

右五味 先搗黃浮萍中為末 與研葉拌勻 鍊蜜和

擬金丸方 治偏風半身不隨 不知痛痒

草烏頭 馬蘭花 骨碎補 狗脊 乳香

五靈脂 楓香脂 草薺 地龍

九味 搗羅為末 入研煮 二味和勻 醋煮 麩糊和丸 如

小豆大 每三九至五九 荆芥湯下 空心臥 臨各一服

風偏枯

論曰 氣血不足 腠理開 疎風溫容於分肉之間 久而不差

真氣虛 邪氣獨留 乃為偏枯之疾 其狀肢躄不隨 肌肉偏

枯 細小而痛 言語不更 神智不亂 乃可治也 宜溫臥取汗

益不足而損有餘 診其胃脈沈而大 心脈小而牢 急皆偏

枯之脈也

當歸湯方 治中風手足偏枯 口面喎斜 痛疼一日不能合

當歸 白芷 防風 白鮮皮 白朮 芍藥 杏仁

每服五錢 生姜半分 同煎 溫服

磁石湯方 治中風偏枯 骨痠無力

磁石 附子 防風 五味子 甘草

每用五錢 入黑豆三十五粒 同煎 空心日午夜臥服

沒藥丸方 治中風偏枯 手足不隨 言語蹇澀 口眼過斜

沒藥 天麻 烏頭 地龍

酒浸 焙乾 二宿 烏頭 去皮 有



煨一 乳香 兩研半 羚羊角 一鎊屑  
 玄參 一分 人參 兩半 丹砂 兩研一  
 十四味 搗研為末 鍊蜜和丸 櫻桃大 每服一九 溫酒  
 下食前服  
 犀角 一鎊屑  
 龍腦 一分  
 丁香 一分  
 麝香 一分  
 木香 一分

肉苛  
 論曰 內經謂人之肉苛者 雖近衣絮 猶尚苛也 以榮氣虛  
 衛氣實 夫血為榮 氣為衛 氣血均得 通流則肌肉無不仁  
 之疾 及榮氣虛 衛氣實 則血脈凝澁 肉雖如故 而其證痛  
 重為苛也

苦參丸方 治榮虛衛實 肌肉不仁 病名肉苛  
 苦參 二兩 搗粉 又 丹 多 灸 沙 多 皮 去 兼 人 多 兩 五加  
 皮去白 防風 剉 又 疾 藜 子 角 炒 去 烏 蛇 酒 浸 蔓 荆 實  
 皮去白 敗龜 鱗 酥 虎 骨 炙 醋 玄 參 兩 者 各 蔓 荆 實  
 右十二味 搗羅為末 別以水三升 煎取一升 以水三升

按取汁去滓 於無油鐵器內煎成膏 鍊蜜四兩 拌

和為末 如梧桐子大 每食後良久 及夜臥 共三服 各

天九方 治榮虛衛實 肌肉不仁 偏身痛重  
 牛膝 酒浸 切 天 廣 酒 浸 切 麝 香 研 桂 各 一 乾  
 蠟 土 炒 去 一 兩 白 花 蛇 肉 半 兩 各 獨 活 各 三

防風 兩 一 共九味 鍊蜜和丸 如梧桐子大 每服十九 薄芎酒 荆

防風酒方 治榮虛衛實 肌肉不仁 病名肉苛  
 防風 二兩 又 白 木 半 兩 山 茱 萸 一 兩 子 用 山 茱 萸 乾 者

附子 去皮 兩 秦 朮 兩 天 雄 一 兩 皮 去 細 辛 兩 葉 輕 獨 活 兩 半

紫巴戟 兩 秦 朮 兩 天 雄 一 兩 皮 去 細 辛 兩 葉 輕 獨 活 兩 半

磁石 粒 生 浸 槌 去 碎 汁 如 半 斤 巨 薏 苡 仁 兩 炒 三 煎 生 地 黃 焙 二 兩 半 切 焙



枸

共十八味判如六豆生絹袋盛以無灰酒三斗浸六

五味子酒方治榮虛衛實肌肉不仁病名肉苛

知母 白芷 五加皮 黃芩 白木 當歸 澤瀉

肉蓯蓉 牡丹 狗杞子 白木 當歸 澤瀉

細辛 桂枝 枳殼 厚朴 牡丹 澤瀉

共十九味到如大豆生絹囊盛用好酒二斗密封浸

經七日每空心日午夜臥各溫服五合久服加至七

合及一升勿令醉吐

歷節風 中風百節疼痛 風走注疼痛

白虎風

歷節風

論曰歷節風由氣血衰弱為風寒所浸血氣凝澁不得流

通開節諸筋無以滋養真邪相薄所歷之節悉皆疼痛故

侵

謂歷節風也病甚則使人短氣汗出肢節不可屈伸

防風湯方治歷節風周身百節疼痛脚痿弱

防風 白木 白鮮皮 桂 黃耆

薏苡仁 右六味搗篩每服四匙生姜三片同煎

沒藥散方治歷節風百骨疼痛晝夜不可忍

沒藥 虎胫骨

二味搗研為末每服三匙溫酒調下日三服

透開散方治歷節風四肢卒急疼痛難忍短氣汗出

廣黃根 天南星 炮威靈仙 革鮮 當歸

人多 天 赤小豆 焙 溫酒調下

獨活散方治歷節風

獨活 玄參 生犀角 升 廣

惡實根 豉 生乾地黃 兩 升 廣

共七味搗羅為散每服三匙空腹米飲調下



乳香大丸方 治血氣衰弱風毒攻注歷節疼痛

乳香 研 沒荊 一研各 五靈脂 四兩 烏頭 一兩 皮 奇

共四味 搗研為末 再和勻 滴水 和丸 如小彈子 大以 丹砂為衣 每服 一丸 薄苛酒 化下 日三服

中風百節疼痛

論曰 中氣百節疼痛者 由躰虛受風 風邪中於關節 故今 百節筋脉拘急 疼痛寒熱更作 不可屈伸 此皆真氣虛弱 不勝風邪 真氣相薄 所以痛也

白花蛇散方 治中風肢節疼痛 言語蹇澁

白花蛇 酒浸 去皮 何首烏 皮 去黑 牛膝 三兩 用酒浸

蔓荊實 各四兩 威靈仙 荊芥穗 旋復花 各二兩

共七味 搗羅為末 每服 一匙 溫酒調下 空心 臨臥服

羗活散方

治中風百節疼痛 寒熱更作 不可俛仰

羗活 去芦 以 天大 用 芎藭 兩 酸棗 仁 炒 三 鹿角膠 半兩 炒 蔓荊實 皮 去 一兩 羚羊角 三兩 人參

兩半 白附子 兩半 牛膝 三兩 桂 兩半 薏 以 仁 炒 一兩

蛇 酒 炙 用 犀角 一兩 白鮮皮 兩半 地骨皮 及

栝子 仁 生 用 右十七味 搗羅為末 每日 空心 及 夜

白頭翁酒方 治諸風痛攻四肢百節

白頭翁 草 一味 爛研 以醇酒 投之 頓服

又方 生惡實 根 摩酒 服 痛止 即 住

又方 黑豆 半升 威靈仙 兩 桑根 白皮 兩 一

又方 杏仁 酒 浸 去 皮 尖 雙 虎骨 取 半 兩 為 末 黃

二味 用醇酒 一升 熱調頓服

風走注疼痛

論曰 風走注疼痛之病 其痛無常 處是也 氣血流通 筋脉 和同 則骨肉 滑利 一有不調 風邪乘虛 與血氣 偕行 使榮 衛凝澁 隨所注 處 悉為疼痛 故謂之 注痛也 虎骨散方 治風毒走注 疼痛 不定



虎脛骨酥炙 敗龜酥炙 麒麟竭研 赤芍藥

當歸沒茶研 防風 白附子桂皮去粗 白芷酒浸

骨碎補毛 蒼茸炒 自然銅煨 牛膝酒浸

苗去 天方 棋柳五加皮 羌活各一兩

芸薹散方 治風毒走注疼痛如虎噬

芸薹子 天南星 草烏頭並生用 共十八味為散每服二錢溫酒調下

三味為散五錢量入生麩以醱醋生薑汁生油各少

消毒膏方 治風毒走注疼痛筋脉拘急

馬牙硝一兩燒 烏頭存性三分研 二味同研令勻每用三錢白麩三錢生薑汁一盞同

熬成膏 推於帛子上熱貼日二換之

乾地黄九方 治走注疼痛 沒茶 烏頭去皮 防風

木香 赤小豆 共八味等分搗研為末水浸蒸餅心和丸如梧桐子大

每服五丸冷酒下空心食前服日二

白虎風

忘當作安下同

論曰白虎風之狀或在骨節或在四肢其肉色不變晝靜而夜發則痛徹骨髓或忘言忘有所見者是也蓋風寒暑濕之毒乘虛而感播在經絡留於血氣播聚不散遇陽氣虛弱陰氣隆盛則痛如虎噬故以虎名焉

羌活湯方 治白虎風痛甚如齧

羌活 防風一兩 秦艽 芎藭 當歸各一兩 牛膝酒浸

附子去皮奇 大腹連皮用 桃仁酒浸去皮尖

九味到如大豆每服五錢入生薑一朶大筒煎溫服夜

牛膝散方 治白虎風疼痛難忍 赤芍藥一兩

芒硝別研 當歸各一兩 桃仁去皮尖

一味不足



七味為散每服空心用溫酒調下一錢至二錢

抵聖散方 治白虎風骨髓疼痛至夜轉甚  
虎胫骨酒不計多少打破酒浸 一味為散每服半錢入薄荷末一錢人參末 香酒調下

神散方 治白虎風晝靜夜發痛徹骨髓狂言忘見  
屏風酒浸一宿 桂皮去粗 地骨皮 芍藥 細辛

烏頭散方 治白虎風走注疼痛  
烏頭有皮 地龍 羌活 虎骨酒浸 延胡索 當歸

風不仁 治風癢癢 風瘡癩 風瘡癢 風瘡癢 風瘡癢

命曰風不仁之狀皮膚搔之如隔靴是也由氣虛衛氣

實寒風入於肌肉血氣不相與凝痺結滯皮膚癢痺厚無

所覺如內經曰皮膚不榮故不仁此之謂也

烏鷄丸方 治風虛皮膚不仁頭目昏痛利咽膈解昏倦  
烏鷄一隻燒 麝香別研 虎骨酒浸 白僵蚕炒 乾

蠟去土 防風去 白附子 烏蛇酒浸 藿香葉

桐子大每服十九至十五丸溫酒下茶清亦得

羌活湯方 治風不仁手足癢痛麻痺  
羌活 獨活俱去 防風 蔓荊實 人參 茯苓子

芍藥 白茯苓 枳殼 芎藭 天葵木 阿

膠炙令 威靈仙各半兩 每服二錢空心豆淋酒下或鍊蜜丸如梧桐子大豆

五參散方 治風不仁皮膚癢麻繞膝偏身似蛇皮黑癩  
旋生旋沒通身癢痺

人參 丹砂 沙參 苦參 去參 聖者 白花蛇  
酒浸去皮 右六味為末散每服二錢食後溫酒調下加至三錢



風瘙痒

命曰風瘙痒者表虛衛氣不足風邪乘之血脉留滯中外鼓作變而生熱熱即瘙痒久不差淫邪散溢搔之則成瘡

五白散方 治皮膚風瘙晝夜不止  
白附子 白僵蚕炒 白蒺藜 白鮮皮 白花

枳壳散方 治風皮膚瘙痒麻痺  
右五味為散每服一匙空心臨臥溫酒調下

枳壳 去瓢 二兩 苦參 去根 蒺藜子 炒去 蔓荆实 各一  
荆芥穗 去根 羌活 去芦 獨活 各半

天丁散方 治熱毒風致偏射瘙痒癢疹皮膚癩痺肢節  
每服二匙臘茶溫酒調下食後臨臥各一服

天丁 炙 防風 羌活 甘菊花 杏仁 炒去尖 復仁 各二兩  
天丁 炙 防風 羌活 甘菊花 杏仁 炒去尖 復仁 各二兩  
甘草 炙 一兩 每服三匙空心蜜酒調下日再服

傳

天門冬丸方 治風熱皮膚癢疹痒生瘡如水疥或如粟

天門冬 去心 焙 枳壳 去瓢 炒 白朮 炒 大參 各一兩  
獨活 苦參 各一分 為末蜜為丸如梧桐子大每服

八味散塗傳方 治偏身瘡疥皮破肉痛或瘙痒濃水

蜀椒 目 吳茱萸 湯洗 焙 青塩 研 石硫黄 研  
膩粉 研 白僵蚕 炒 壁皮 各一 麝香 研

防風湯淋洗方 治瘙痒如虫行或癩痺不仁

防風 益母草 苦參 各三 蒺藜子 炒 五 荆芥穗  
蔓荆实 枳壳 各三 煎至八升乘熱淋洗患處

風痞癩

命曰風痞癩者由腠理不密三陽氣外泄癸而為汗汗出未已為風邪所搏風熱相併不得流行故結為痞癩狀如

搏疑当作搏



麻豆甚者斯長瘡之成瘡  
獨活九方 治風癩疹瘡癰腫起時痒或痛  
獨活去芦 天門冬 防風 蒺藜子炒去 桔梗炒

獨活一分 薏苡仁炒 黃連去鬚各 桂半 枳實半  
為細末 鍊蜜丸 如梧桐子大 每服二十九 空心臨臥

菊花湯下  
景天花散方 治脾肺風毒 偏身癩瘡 瘡痒煩躁  
景天花燬火 煨火 煨火 紅麴半

同研為細末 每服二錢 食後臨臥 服溫水下  
胡广散方 治肺脾風毒 攻注皮膚 瘡痒手足生瘡及偏

身瘡癩癧 癩赤黑 鬻子肌 熱疼痛  
胡广香 枳壳熟 防風 蔓荆實 威靈仙  
何首烏米泔浸透 芎藭 荆芥穗 甘中

苦參 薄芎用葉 為散 每服二錢 溫酒下 或鍊蜜丸  
枳壳酒方 治風癩痒癧疹皮膚生瘡癰如虫行  
枳壳炒 秦朮 獨活 肉蓯蓉各四 丹參

酒二斗 浸六宿 每服半盞 日三夜四  
蒺藜子炒 荒蔚子 羊桃 蒟蒻根苗 漏芦去芦

去滓 溫至中 淋浴 仍先飽食 而即入浴 久浸最良 可  
陽夜一浴 乾衣 蓋取汗 慎外風  
桃仁塗方 治毒赤疹 浮時成瘡 瘡  
桃仁法 蝦蟆 雙 杏仁研各 胡广研 凝水石

入前研 菜攪為稀膏 用塗患處 乾則易之  
風癩癧疹 其狀有二 皆緣肌中有熱 若涼溫之氣折  
命曰風癩癧疹

浴

菟

各研如粉 右四味 各研細 別研去 薑菜絞汁 和以白蜜

風癩癧疹 其狀有二 皆緣肌中有熱 若涼溫之氣折

命曰風癩癧疹

入前研 菜攪為稀膏 用塗患處 乾則易之

風癩癧疹 其狀有二 皆緣肌中有熱 若涼溫之氣折

命曰風癩癧疹



之熱結不散則成赤疹若因風邪所折風熱相搏則成白疹赤疹得熱則劇得冷則減蓋熱氣鬱結於肉故惡熱宜冷白疹得陰雨則甚得晴暝則消蓋熱氣散釋於外故惡冷宜熱冷熱之証異其為癩疹則一盡身軀風瘙而痒搔之隱々而起是也

秦光九方 治風瘙癢疹搔之愈甚

秦光 防己 松脂鍊成者 枳壳 蒺藜子炒去角

半 苦 白木 芎藭 防風 附子 蒴藿

乾姜炮 共研為末 鍊蜜和丸如梧桐子大每服二

十九酒下 加至三十九早食前各一服

蔓荆實散方 治風瘙癢疹手足麻木

蔓荆實 何首烏各二 羌活 威靈仙 荆芥穗

防風各一 苦參各一 為散每服二匙溫酒調下日三

茵陳蒿散方 治風瘙癢疹皮膚腫痒

茵陳蒿 荷葉半 為散每服一匙蜜水下食後服

蒺藜子散方 治風瘙皮膚癢疹痒痛或有細瘡

蒺藜子炒去角 枳壳 荆芥 羌活 防風一

蒼朮河水浸 共為散每服一匙溫酒或茶調下

石南酒方 治風瘙癢疹經旬不解

石南葉去粗 一味搗羅為末每服半匙至一匙

用酒三合煎一沸空心溫服

白蜜酒方 治風癢疹痒不止

白蜜合 酒合 二味相和煎溫食前服 一方用松葉

煎三升 夜服出汗 一斤酒一斗

枳實丸方 治風熱頭面身軀瘙痒癢疹

枳實去瓤 天門冬 獨活 黃連 防風 蒺藜

子炒去 桔梗各一 薏苡仁一 桂分 共為末

鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九空腹米飲下日二

塗茶方

慎火草大葉青厚 生姜和皮 不洗 塩重少



三味塗瘡痒如偏身癢疹塗完處日再  
芎藭粉摩方 治風癢疹痒痛难止

芎藭 白芷 麻黄根<sub>各二</sub> 藿香<sub>一</sub> 米粉<sub>升</sub>  
五味搗羅為粉瘡病立效

枳實熨方 治風白疹

枳實<sub>生用</sub> 一味搗碎以醋浸令呖呖炒熟用熟帛包  
裹熨疹止冷即易分作二包子更相炒熨尤佳

疑当作上

聖濟總錄纂要卷二終

聖濟總錄纂要卷之二

程林雲來纂

新安 汪朝周曼思較

黃家珣藍孕閱

諸風門

蠱風 肌肉攣動

蠱風

論曰蠱風之狀在皮膚間一身盡痛若割若刺淫淫躍躍  
如中蠱毒故名蠱風皆由軀虛受風侵傷正氣也

天麻丸方 治蠱風如皮膚刺割

天麻 躑躅花 獨活 附子 白附子

防風 蒼耳 蒺藜子 烏頭<sub>去皮</sub> 麻黄<sub>去根</sub>

烏蛇肉 麝香 除研者外搗羅為末入麝香再研勻

鍊蜜和搗三二日下丸如梧桐子大每服二十九温酒



下不拘時候如有汗出即宜避風  
石南湯方治六十四種風注走皮膚中如蠱行痛如刺  
劃狀似蠱毒及卒風面目腫起手不及頭口噤不能  
言

石南 乾姜 黃芩 細辛 人參 桂 廣黃  
去根 當歸 芎藭 兩各一 乾地黄 分三兩 甘草 兩各二

何首烏散方治蠱風  
何首烏 威靈仙 各一 苦參 兩半 麒麟竭 分二

並生搗為散入乳鉢內研三五百遍每服一錢用荊  
芥湯調下每日三服酒服尤妙

薄荷丸方治蠱風皮膚苦盡痛若刀劃狀及頭目不利  
風痰等疾  
薄荷葉 天麻 威靈仙 羌活 山梔子

仁 蔓荊實 白芷 桔梗 炒 防風 各二  
大黃 紙乾 累煨 令 人參 赤茯苓 兩各三 龍腦 兩研半  
後細嚼茶酒任下 鍊蜜丸如鷄頭實大每服一九食

肌肉潤動命曰微風蓋邪薄分肉衛氣不通陰陽氣  
論曰肌肉潤動然風之入脈善行數變亦為口眼潤動  
內鼓故肌肉潤動也

偏喎之病也  
虎骨丸方治風虛肌肉潤動手足顫掉  
虎骨 酥 松節 剉酒 天麻 牛膝 酒浸 赤箭 海

相皮 獨活 石斛 根去 防風 烏蛇 酒浸 去 酸棗  
仁 當歸 仙靈脾 甜瓜子 炮 乳香 研 五加皮

一十六味先以十五味搗羅為細末入研者乳香再  
和勻酒煮麩糊丸如梧桐子大每服十五丸至二十



旋

丸荆芥酒或茶酒任下不拘時候  
天麻丸方治循經絡肌肉脚動頭目昏眩手足麻痺

天麻 各半  
荆芥穗 各一  
雞蘆葉 各三  
白附子 各一

右六味為末鍊蜜丸如櫻桃大每服一九茶酒任下

荆芥湯方治風氣肌肉脚動頭目昏眩四肢煩疼  
荆芥穗 施復花 各四  
前胡 甘草 各一  
廣黃 節 各一

芍藥 芎藭 半夏 各一  
每服三錢葱白三寸雞蘆二葉同煎溫服

風類 命曰風癩之狀發無常時每發則外吐涎沫無所覺知  
蓋由血氣皆虛精神雖散魂魄失守風邪入于陰經故也  
又以胸胎之初其母卒大驚精氣併居能令子發癩其證  
與風癩大率相似

離

丹

砂煎方治風癩疾時發時省涉歷年月  
生地黄 研如粉三過後  
石羔 研五兩  
黃連 去鬚一兩

共四味以清水一斗先煮石羔黃連取五升淨去滓  
次下生地黄汁又煎之如稠錫始下火取丹砂粉投  
入勻攪百餘遍貯於不津器中更攪待冷即住手每  
日兩度以溫水調服約如半彈丸大服茶後只吃淡  
飯蔓菁菜等

雄

黃丸方治五積谷有聲牛癩若牛鳴馬癩若馬鳴狗  
癩若狗鳴羊癩若羊鳴雞癩若雞鳴凡此五癩皆宜

雄黃 丹砂 雌黃 各三  
雄黃 引線為度取菜囊出河內重湯煮待蜜赤色滴  
如珠入乳鉢中研如粉搗去塵垢用酒于熱鐵蓋內待  
淨大乳鉢中化銀同搗去塵垢用酒于熱鐵蓋內待  
冷先將前次入鉛內研取勻  
鉢內研次入鉛內研取勻



共五味各如前修製畢便將前煮丹砂雄黃雌黃餘  
蜜再重湯煮散少點入茶中斬和勻為丸如大  
粒每用桃柗栳桑木嫩條各長七寸剉以水一升  
煎至六合去滓分溫下丸茶空心午時臨卧下三丸  
至五丸小兒一九至二丸

羚羊角丸方治風癩癩

防風 三分 犀角 遠志 人參 山茱 茯苓 各一  
冬 鐵粉 五件 天冬 各三 金箔 研 銀箔 研 各一  
水銀 無星子為度 研 兩 龍齒 兩 水銀 金銀箔

共十五味先將十味搗羅為末入別研者相拌令勻  
鍊蜜丸和如菜豆大用桃柗枝湯下二十九日二夜  
一或人參茯苓湯亦可

命曰風癩病者由心氣不足胸中蓄熱而又風邪乘之病

間作也其候多驚目童子大手足顫掉夢中呬呼身熱癩  
搖頭口噤多吐涎沫無所覺知是也然病發於陽者易差  
發於陰者難治故經曰藏病難治府病易治又曰大人曰  
癩小兒曰癩

靈烏散方

治風癩多驚手足顫掉口吐涎沫  
烏鴉 一隻 臘月取干瓷瓶內盛以塩泥固濟令  
分研 烏鴉 一隻 臘月取干瓷瓶內盛以塩泥固濟令  
細辛 兩 乾蠍 四枚 炒 丹砂  
共四味將二味研末與別研二味同羅每服半錢匕  
午前溫酒調下

安息香丸方治男婦暗風癩病

安息香 通明 礬石 鉛丹 二味為細末入白羊心中血研  
勻丸如梧桐子大每服十九丸空心溫水下

神聖丸方治風癩涎潮等疾

雌黃 鉛丹 各一 細研以醋一觔熬稠丸和梧桐子  
大與惡實末同收每服十九丸臨卧煎惡實末湯下







水銀丸方 治風癩

水銀兩半

雄黃研 龜腦研

牛黃一研各

丹砂

研一

再同研勻用糯米飲和丸如菉豆大每服五丸至七丸熟水下空心臨臥日再服

風狂

命曰風狂之狀始發則少卧不飢自高自賢自辨自貴蓋人之榮衛周身循環晝夜不窮一失其平則有血并於陰而氣并於陽者有血并於陽而氣并於陰者陰陽二氣虛實不調風邪乘虛而入并於陽則謂之重陽故其病妄笑好樂妄行不休甚則棄衣而走登高而歌或至數日不食故曰狂也又肝藏魂魄則隨神往來悲哀動中有傷於魂則為狂妄是亦血氣俱虛風邪乘之陰陽相并也

真珠散方

治風狂

妄語心熱狂走不知人

真珠研

鐵粉研

天竺黃

金箔研

銀箔研

龜腦研

黃芩

防風

犀角

羚羊

茯神

麥門冬

胡黃連

甘菊花

白附子

除研外

薄苛温水

或梨汁調下

研茶拌勻

每服一匙加至二匙

茯神湯方

治風狂失神

少卧不飢笑藥

節棄衣登高

生麥門冬

石膏

杏仁湯去皮尖隻

升廣

石膏

沙參

白茯苓

凝水石

白鮮皮

煎成入竹瀝半合再煎服

生麥門冬

石膏

沙參

白茯苓

凝水石

白鮮皮

煎成入竹瀝半合再煎服

自

腦風

論曰內經謂風氣循風府而上則為腦寒夫風生高遠始自陽經然督脉陽維之會白風府而上至腦戶腦戶者督脉足大陽之會也又大陽之脉起於目內眥上額交巔上入絡腦今風邪容搏其經替而不行則腦髓內弱故項背



怯風而腦戶多風冷也

石羔散方 治腦風邪氣留連頭痛不已

石膏火煨

天南星炮

白僵蚕炒

葱白二寸 臘茶

三味等分

持研為散 每服二錢匕 葱白二寸 臘茶

穀精散方 治腦風頭痛吹鼻

穀精炒

銅線研

硝石研

一匙吹入鼻內

或偏頭痛 隨病左右吹鼻中

通關散方 治腦風鼻息不通 不聞香臭 或鼻流清涕多

嚏肩項拘急 頭目昏痛 風府怯寒

原蠶炒

白附子炮

苦參 益智皮 蒺藜

子炒

乾薄荷各

白附子炮

共為散 每服一錢匕 溫酒調下 日三服

點頭散方 治腦風頭痛吹鼻

細辛 高良姜 瓜蒂各

硝石各

共研為細散

用新水滿含 一口搗菜半匕入鼻中 良久即定

遠志散方 治腦風頭痛不可忍

遠志拍去心

為細末 每用半匕 先含水滿口 即搗菜

入鼻中 仍搽痛處

羌活丸方 治腦風氣鼓 或膈痰氣逆 上冲於頭 令頭

羌活去芦切

白僵蚕炒

白蒺藜炒

芎藭 乾鷄

子大

何首烏丸方 治腦風鼻息不通 清涕流出 及諸風疾

何首烏三

甘草研

縮砂蜜二

蜜和丸 如櫻桃大 每服一丸 薄芎葱酒嚼下 不計

芎藭湯方 治腦風鼻息不通 或流涕清多 嚏

芎藭二

細辛 黃芩各

荆芥穗二

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻

荳蔻



甘州多到每服三匙水一盞入薄荷七葉同煎至七

吹鼻散方 治腦壅頭痛

盧會研 龜齒研 瓜蒂搗 硝石研

四味等分為末每用一豆許吹之

勝金散方 治腦風頭痛鼻塞不通或流清涕多嚏不已

荆芥穗 薄荷各四 木賊去節 蛇蛻二條炙

四味搗羅為散每服二匙清茶調下食後日三服

風頭眩

命曰風頭眩之狀頭與目俱運是也五藏六府之精華皆

見於目上注於頭風邪鼓於上腦轉而目系急使真氣不

能上達故虛則眩而心悶甚則眩而倒仆也

枳實湯方 治風頭運倒眼旋腦項急痛

枳實去瓤 防風去粗 芎藭各一

此血氣虛而受風者

杏仁去皮尖 半夏為末 細辛各二

獨活湯方 治風頭眩仆地屋轉吐痰涎惡聞人聲

獨活去芦 茯苓去木 甘草炙 當歸酒洗 牡蠣煨

白木附子 肉蓯蓉酒浸切焙 黃耆半兩 防風

遠志三分 人參半兩 劉如大豆 每服五匙水一盞半生薑三片棗一枚

菊花湯方 治風頭眩悶起即欲倒頭痛眼疼視屋轉動



甘菊花 細辛 各半兩  
防風 前胡 茯苓 白朮  
廣黃 各一兩 芎藭 杏仁 湯浸 去皮尖 各三分

煎沸食前溫服 每服五錢 水一盞半 煎至一盞 去滓 入竹瀝半合 更

山藥散方 治風頭目眩 眼痛耳聾

山茱 甘艸 五味子 甘菊花 擇各  
山朱更 升 廣 蔓荆實 各三 防風 半兩

為細散 每服三錢 匕 空心溫酒下

附子膏方 治風頭眩 摩頭 為細末 以麻油 和如稀 餵洗

附子 臍皮 鹽花 各半 兩

守中丸方 治風頭眩 腦轉 目系急 忽然倒仆

白茯苓 去根 黑 麥門冬 去心 白朮 人參  
甘菊花 擇各 山茱 枸杞子 酪 生地 黃 取汁 入

共八味 將七味 搗羅為末 先用生地汁 於銀器內 入

酥三兩 白蜜三兩 同煎 逐旋 掠取 汁上 金花 令盡 得

五升 許於銀器內 拌炒 前七味 茶 漸令 盡候 乾入

白蜜 同搗 數千杵 丸如 梧桐子 大 每日 空心 或食後

清酒 下五十九 丸 服百日後 五藏 充滿 肌膚 潤滑 修合

風頭痛 須擇 四季 旺相 日 或甲子 日 此藥 亦名 五芝地 僊金

命曰 風頭痛之病 由風邪 容於 陽經 循風 府而上 至於 頭

腦 令人 頭重 疼心 隔煩 熱上 焦壅 滯頭 面虛 汗診 其脈

石膏散方 治風壅 頭痛 眉骨 疼 白附子 炮 細辛 去

石羔 研 芎藭 旋復花 各一 兩 共搗 羅為散 每服 半錢 匕 臘茶 調下

清氣香芎湯方 治頭痛 不拘時候







天南星 酸漿水煮透心  
防風 水半兩 益為度 去一挑 同菊  
芎藭 兩一 五味 除二味 不用外 擣羅為細散 每服半匙  
七臘茶 清少許 調只作一口 呷盡 分作三嚥 每嚥點

草撻散方 治偏頭痛  
草撻 一味 為細末 每用一匕 先令病人含滿口 溫水  
隨病左右 搐入鼻中  
勞風

漏風  
論曰 內經曰 飲酒中風 則為漏風 漏風之狀 或多汗 不可  
草衣食 則汗出 甚則身寒 喘息惡風 衣裳濡 口乾善渴 不  
能勞事 又曰 身熱解惰 汗出如浴 惡風 少氣 亦名漏風 夫  
酒以養陽 酒入於胃 與穀氣相薄 熱盛於中 其氣慄悍 與  
陽氣俱泄 使人勝理 虛而中風 故其證多汗 惡風 不可草

衣其喘息而少氣者 熱薰於肺 風客於毛皮也 其口乾善  
渴者 汗出多而亡津液也 其解惰而不能勞事者 精氣耗  
不能營其四肢也 謂之漏風 以汗出不止 若器之漏久而  
不治 轉為消渴  
沃渥散方 治漏風 身熱解惰 汗出如浴 惡風 少氣  
沃渥 白朮 各二兩 羊麋銜 兩一  
為散 每服二匙 沸湯調 食後服

黃耆湯方 治風虛多汗 夜臥尤甚 牀席衣被並濕  
黃耆 人參 各二兩 廣黃根 牡蠣 煨 各三兩 地骨皮  
二兩 龜骨 兩四 每服三匙 大棗 二枚 同煎 空心服 二日

防風散方 治風虛多汗 惡風  
防風 一兩 沃渥 牡蠣 煨 各三兩 桂 各三兩  
為細散 每服二匙 溫酒調 下 空心服 日再

杜仲散方 治風虛多汗 夜臥尤甚  
杜仲 煨 兩二 黃耆 牡蠣 煨 各兩二 廣黃根 兩五



慄 若

勞風 為細散每服二匙煎敗扇湯調下食後服日二

命曰內經曰勞風在肺中其為病也使人強上冥視唾  
出谷涕惡風振寒夫勞風之病腎勞則根勞於下經所謂  
根弱則莖葉枯矣故目視不明而背反強腎之脉入肺中  
故因皮毛感風而振慄也腎主唾故津液凝結唾如涎涕  
治之以救其俛仰者戒其勞動也  
廣黃湯方 治勞風胸膈不利涕唾稠粘上焦壅滯喉中  
不快

廣黃 去根 荊芥穗 杏仁 去皮尖 木香 當歸  
黃芩 去心 羌活 芍藥 柴胡 大黃 炮熟各一分  
半夏 湯洗七遍 牽牛子 半兩  
芎藭 圓方 治勞風強上冥視 每服二匙生薑一片同煎食後溫服  
芎藭 窮西 枳壳 去穢 為末鍊蜜丸如梧桐子大每服

十九 食後溫水下

萎蕤飲方 治勞風項強急痛四肢煩熱  
每半兩入豆豉三合  
葱白一握以水煎分溫空服二服  
風頭旋 風痰 胃風 風秘

風頭旋 命曰風頭旋者以氣虛怯所稟不克陽氣不能上至於腦  
風邪易入與氣相鼓致頭運而旋也又有胸膈之上痰水  
結聚後犯大寒陰氣逆上風痰相結上衝於頭亦令頭旋  
松香散方 治風頭旋  
白芷 當歸 芎藭 甘草 炙各二兩 甜瓜子

茶調下 同搗羅為細散每服二匙食後以荊芥薄荷清

荊芥丸方 治風頭旋目痛眩暈體拍急手足少力  
荊芥穗 四兩 細辛 芎藭 白姜 蚕 一兩 天麻 一兩



羌治 防風 茯苓子炒去角 同為末 鍊蜜丸如鷄

頭大每服一丸 食後細嚼 荊芥湯下 茶酒亦得

人參丸方 治風頭眩目眩 痰逆惡心 胸膈痞滯 咳嗽痰

涎 喘滿嘔逆 不欲飲食 旋復花炒各 麥門冬 前胡

枳壳兩各二 木香半兩 同搗羅為細末 以湯浸 炊餅

和丸 如梧桐子大 每服二十九丸 食後生薑湯下

祛 桂痰丸方 治風頭旋痰逆 惡心 咽膈不利 陳橘皮湯

天南星 生 半夏 生 赤茯苓 乾姜 炮 十九丸 溫米飲下

各亦分 稀麩糊丸 如梧桐子大 每服三十丸 如至四

羚羊角湯方 治熱毒風上攻 頭面目旋運 耳內虛鳴 身

躄癰疹麻痺 羚羊角兩二 菊花兩三 防風兩五 羌活 前胡 藁本

玄參 黃芩 杏仁去皮尖 菖蒲 甘州各灸

治頭旋腦悶 鼻塞眼運 貼膏項方 食鹽 芎藭 搗 松脂 研

每服五錢 水煎 食後溫服 者先灸百會三壯 訖將蠟紙茶於灸處貼之 日一易

得膿血出效 風痰 命曰風痰之病 得於氣脉閉塞 水飲積聚 其狀雖有冷熱

之異 至於心胸痞隔 飲食不化 則一也 蓋風壅氣滯 三焦

不和 則水飲易至 停積風能生熱 壅亦成痰 是故有頭目

不利 神思昏濁 之候 其或嘔逆不納 飲食者 則因於胃冷

而得之 其治固不可一藥也 半夏飲方 治風痰心腹煩滿 嘔逆不欲飲食

半夏湯浸 大腹皮 麥冬 赤茯苓 白木 桔梗

前胡各三 青橘皮去 厚朴姜汁灸 防風 枇杷

風痰 命曰風痰之病 得於氣脉閉塞 水飲積聚 其狀雖有冷熱

之異 至於心胸痞隔 飲食不化 則一也 蓋風壅氣滯 三焦

不和 則水飲易至 停積風能生熱 壅亦成痰 是故有頭目

不利 神思昏濁 之候 其或嘔逆不納 飲食者 則因於胃冷

而得之 其治固不可一藥也 半夏飲方 治風痰心腹煩滿 嘔逆不欲飲食

半夏湯浸 大腹皮 麥冬 赤茯苓 白木 桔梗

前胡各三 青橘皮去 厚朴姜汁灸 防風 枇杷



葉拭去毛灸

每服三錢入生姜一匙大同煎稍熱服

澤瀉湯方

治風痰壅滯胸膈不利頭目昏眩不思飲食

澤瀉七度切

白朮赤茯苓

甘草

陳橘皮

湯浸去白

枳殼炒去穢

煨乾

煨各一兩

煨各三分

每服二錢半

生薑半分同煎溫服不拘時候

缺刷湯方

治風痰胃中有寒嘔吐痰涎胸滿氣逆

附子五枚

炮令微乾

半夏湯洗七遍

去

木香兩

煎空心食前溫服

天南星九方

治風痰胸膈煩滿頭目昏眩

天南星一兩

每服二錢入生姜一匙大三枚同

天南星

治風痰胸膈煩滿頭目昏眩

用湯浸洗刮去浮皮

并虛軟處令

浮用法酒浸一宿以桑柴蒸不住添批湯令全滿

浮用法酒浸一宿

以桑柴蒸不住添批湯令全滿

取出用銅

刀切開揀大者微嚼者不麻人口即是熟未熟即便

蒸候熟用銅刀子細切入石柏內木杵爛持如泥入

丹砂一兩

水飛過者麝香一兩

細研羅過丁香末一

兩為衣每服一丸嚼破用薄荷茶或酒任下小兒驚

前胡丸方

治風痰不散食逆嘔吐

前胡白朮枳殼

半夏湯洗七遍

去滑

赤茯苓

前胡

白朮枳殼

半夏湯洗七遍

去滑

赤茯苓

人參各三

白朮枳殼

半夏湯洗七遍

去滑

赤茯苓

梧桐子大每服二十九

煎生薑竹茹湯下食後服

遂痰丸方

治風痰壅盛每日早時多喜嘔吐

人參赤茯苓

為末以粟米飯和丸

如梧桐子大每服二十九

空心

生薑湯下日午再服

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

頭多汗惡風

飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

頭多汗惡風

飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

頭多汗惡風

飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

頭多汗惡風

飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

頭多汗惡風

飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

頭多汗惡風

飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

頭多汗惡風

飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

頭多汗惡風

飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

頭多汗惡風

飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

頭多汗惡風

飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

頭多汗惡風

飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

頭多汗惡風

飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

頭多汗惡風

飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿

頭多汗惡風

飲食不下膈塞不通腹善滿

胃風

命曰胃風之狀

頭多汗惡風飲食不下膈塞不通腹善滿







晴當作暗

木香丸方

治腸胃風熱津液燥少大便秘澀

木香兩

煨榔

大黃煨

牽牛子末

郁李仁湯浸

子大每服

二十九丸

溫米飲下

食前

威靈仙散方

便一次頭旋目睛

治老人風氣壅盛大腸秘澀五六日方大

威靈仙浸

羌活頭

芎藭各半

香枳散方

治大腸秘澀風煩氣

枳殼炒

防風各一

甘草炙

引飲導秘丸方

三味搗

羅為散每服

二錢沸湯點服

引飲導秘丸方

治風熱大腸秘澀不通心煩腹滿躡熱

枳殼炒

防風各一

甘草炙

枳殼炒

防風各一

甘草炙

郁李仁湯浸

木香各一

芎藭各半

紫癩風

大風出患

癩瘍風

白駁

白癩風

大風出患

惡風

大風鬚墮落

白癩

大風出患

大風癩病

烏癩

白癩

癩瘍風

命曰癩瘍風之病其狀斑駁點々相連而大圓概似門駁

而稍微也

皆由風邪熱氣搏於脾肺二經流散肌肉使然

烏地散方

治癩瘍風頭面班駁

烏地酒浸

秦艽

芎藭各半

桂

羌活

人參

山梔子

枳殼

丹參

沙參

一鎊各

升廣

防風

木通

白鮮皮

子炒

苦參二

木通

白鮮皮

黃芩

共為散

每日溫酒調下

三錢

食後臨臥服

其狀如癬

雄黃散塗方

治癩瘍風面頰頸忽生班駁其狀如癬

雄黃

硫黃

白礬

雄黃

雄黃散塗方 治癩瘍風面頰頸忽生班駁其狀如癬

雄黃

硫黃

白礬

雄黃

雄黃散塗方 治癩瘍風面頰頸忽生班駁其狀如癬

雄黃

硫黃

白礬

雄黃



醱

附子散塗方

治瘰癧風身躄班駁

附子一枚大者

硫黃研半

蒼耳苗

乾者

三味搗碎為末

以米醋調先以布巾揩瘡上即以某

塗之乾再塗

巴豆塗方

治瘰癧風面頰項忽生班駁如癬

巴豆一枚

醱醋合

先以新布揩令赤於故沙盆

內用醋磨巴豆如掃膏塗於患上

白駁

命曰白駁之病其狀駁班如癬過於瘰癧但不成瘡爾皆

由風熱搏於層腠脾肺二經不和也

治白駁傳方

雌黃

石硫黃各一兩

蛇蛻皮

一條大者燒灰

同研細用醋調膏成先以巴豆一粒中截以平處磨

治頭項及面上白駁漸長如癬但不成瘡宜用此傳方

釣

桂去粗皮

研為末每用半錢或一錢以津唾和傳於

白駁上

治面項身躄白駁傳方

鮎魚一頭

鮎魚重半斤

去腸肚淨

後依鮎魚法用鹽椒

擊更用荷葉裏今大息爛先以布拭白駁令赤

次灸鮮包熱熨令汁出以綿衣包無令風冷所傷

蛇蛻皮方

治周身白駁漸長似癬但成瘡

蛇蛻皮一條

炒熱按摩白駁時：啜唾數百遍弃之

蛇蛻皮一條

治頸項及面上白駁浸淫漸長如癬狀但

鰻鱺魚塗方

不成瘡

鰻鱺魚一條

灸令脂出先將白駁用物揩拭之令小

痛然後用魚脂塗

大蛇皮塗方

治面項身躄白駁風

蛇蛻皮大者

燒

石硫黃研

擗皮

燒作灰



三味令研極細以清熟漆調和勿令稠薄塗白駁  
處款塗茶時先以巴豆中截用平心摩令皮微起然  
後傳茶

白癩風

命曰白癩風之狀皮膚皴起生白斑點是也由肺藏壅熱  
風邪乘之風熱相并傳流榮衛壅滯肌肉久不消散故成  
此疾也

烏蛇散方

治白癩風身軀癢麻

烏蛇酒浸去皮 白僵蚕炒 胡廣子 獨活 天  
各二 烏頭去皮 細辛 防風又 桂 枳實  
兩 蟬蛻 白附子半炮 天南星分

治白癩風方

杏仁皮去 夜臥皮去 再用  
每日早晨爛嚼二七粒於白點處

治白癩風方

鷄子二枚 和壳以米醋浸七日取 石硫黃研半 附子去皮  
兩者一枚重半 粟米一 共四味將後三味搗羅為末以前  
雞子白調如稀糊臨用茶先以葛布揩患處令赤塗之

苦參膏方

苦參 鹽各一 研為末先以酒一升煎至四合入茶  
二味攪勻慢火再煎成膏每用先以生布揩患處令  
赤塗之

紫癩風

命曰紫癩風之狀皮膚生紫點撥之皮起而不痒痛是也  
此由風邪挾濕客在腠理榮衛壅滯不得宜流蘊滯皮膚  
致令色紫故名紫癩風

烏蛇散方

治癩麻紫癩風

烏蛇酒浸去 防風 羌活 人參 玄參 沙參  
苦參 丹參 白附子 茯苓子各一兩



為散每服一棗溫酒調下

附子硫黃散方

治紫癩風斑點

附子生用一枚

石硫黃別研

共研為細散入胡粉一分臧粉少計同繁桺汁和勻

臨臥楷三五偏早晨溫漿水洗不三五夜差

牡蛎散方

治紫癩風

二味生用為散醃醋調摩患處

胡桃塗方

治紫癩風并白癩風

初結青胡桃

外取

石硫黃一皂子

二味先取胡桃皮切研如膏入硫黃末和勻塗之

羊蹄根塗方

治紫癩風

羊蹄根

生薑汁自然

石硫黃四錢

三味將二汁些硫黃末同研令粘塗患處一日不得

洗不過兩上瘡

惡風

命曰惡風者皆五風屬氣所致也風有青白赤黑黃之異其毒中人五藏則生蟲亦有五種蟲生息滋蔓入於骨髓五藏內傷形貌外應故食肝則眉睫墮落食肺則鼻柱倒塌食脾則語聲變散食腎則耳鳴如雷鼓之聲心不受食食心則為不可治是故謂是惡風

人參

沙參

丹參

玄參

苦參

烏蛇浸去皮

乾蝎

天麻

赤箭

何首烏

陳橘

皮各一

黃芩

原蠶

蟻分

並生用為散每服二棗熱茶調下服及半料即減服

二棗初服三日後先覺頭項脊脊身上疼痛乃芟力

與病相擊也當安臥兩復時許即無事如或身上有

瘡腫服芟一日後便覺漸減

何首烏丸方

治脾肺風并惡風等疾

何首烏

石菖蒲

荊芥穗

蒼耳

胡

一

兩



玄參 沙多 苦多 白花蛇 酒浸去皮  
共搗研為末 鍊蜜和丸 如梧桐子大 每服十九茶酒  
任下 如要作散 每服二錢 溫酒調下 不許時候 計

威靈仙散方 治惡風

威靈仙 二兩 丹參 六兩 羌活 二兩 獨活 一兩 蒼耳 四兩

仙靈脾 二兩 玄參 二兩 人參 二兩 沙多 二兩 紫參 二兩 甘草 二兩

生用 黃芩 二兩 為散 食後臥 臨溫水調下 三錢 若身

體無瘡 眼腫 人不斷 鼻梁不塌 服之一料 可瘥

蔓荆實方 治肺藏風毒 癩作如癩 變成惡風 証

蔓荆實 去白皮 生用 四兩 胡廣 熟研 半兩 天廣 二兩 菊花

未開者 良用 四兩 天南星 四兩 枸杞 四兩 苦參 四兩 取粉

為散 每服 溫酒調下 二錢 日三夜 一每服 宜去食 稍

遠 恐某食相犯

大風眉鬚墮落

命曰 大風眉鬚墮落者 蓋癩病也 皆由惡風 染著 榮衛不

清風濕毒氣 浸漬肌肉 致淫邪散溢 痒癢成瘡 皮膚瘍潰

鼻柱倒塌 鬚眉墮落

枳壳散方 治大風癩病 眉鬚墮落 熱毒風入 五藏 身體

頭面生瘡

枳壳 去瓤 炒 黃芪 蒼耳 白木 蒴藿 白蒺藜 炒

防風 生用 升 廣 生 梔子仁 研 三 漏芦 黃連

人多 天門冬 防己 乾姜 芎藭 丹多 廣黃

去根節 白芷 甘草 炙 葛根 各半 玄參 三兩 堅者

煮去沫 烏蛇 骨 炙 一兩 皮

共為末 散 每服 溫酒調下 三錢 至二錢 空心 夜臥 服

梔子散方 治大風癩疾 眉鬚墮落 偏身 癢摩 癢手 縮

山梔子 半兩 芎藭 半兩 蒿本 三兩 當歸 蔓荆實

各一 桔梗 三兩 羌活 白蒺藜 白茯苓 防風

各一 側子 天廣 各半 每日 空心 溫酒調下 二錢

加至 三錢 夜臥 時再服 服至 一料 眉鬚 再生







狀

噫  
王疑  
作五

命曰癩者內經為癩疔者榮氣熱其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚癢潰其證不同其始則乍寒乍熱膝理壅塞血氣精髓耗竭久而不治令人癢痺汗不流泄手足痠疼面目習習變赤胸頭間拔如蟲行身軀偏痺搔之成瘡或身軀錐刺不痛青赤黃黑如腐水形或痛無常處流移非一或似繩縛拘急不可俛仰眼目浮腫小便黃赤餘瀝心神恍惚而善吟也日月浸久其風化生毒蟲既與變動外先食氣血膚革不沃其內則食王藏食肝則眉睫墮落食肺則鼻柱損壞食脾則語聲散亂食腎則耳聞雷鼓之音食心則死推是癩病率皆風與蟲之為害也

羚羊角散方 治大風癩疾  
羚羊角 鎊 犀角 鎊 吳茱萸 湯洗焙炒 羌活 獨活 各半 廣黃 去根 烏蛇 酒浸去骨 蔓荊實 去曲 當歸 黃芪 防風 附子 杏仁 去皮 蒺藜子 炒 羊角 散每服一匙空心服食前溫酒調下

烏蛇丸方 治大風癩疾若眼脈斷指節冷落脚下有瘡語聲喎為不可治如未有此證宜服

烏蛇 骨一條酒浸去皮 檀香 丁香 葛根 紫葛 防風 苦參 獨活 沙參 梔子仁 酸棗仁 生用 槐子 白芷 附子 蒿木 防己 羚羊角 蒼朮 犀角 鎊 萆薢 秦艽 桃膠 生 葶苈仁 炒 栝樓根 烏菜 各三 桑白皮 兩 木通 半 共搗羅為末鍊蜜如赤小豆大每服空心溫酒下十丸至十五丸日二如不飲酒薄苛槐白皮湯下如要速差宜用後湯菜下

桑枝湯方 治大風癩疾下菜  
桑枝 栝枝 槐枝 枸杞根 黃荊根 羚羊角 鎊 兩 六味並生用剉如大豆大每服用菜五匙次水一盞半煎七分下煎丸菜服一月必覺四肢皮膚痒痛不可忍但宜飲酒不得撻抓仍頻飲食避外風如有

以



塵

三

汁必腥臭及有臭從皮膚中出如麪廬或馬尾頭髮  
尖或如線竿尖或如麩皮片頭黑身白形色不足但  
痒之後仔細看之或從小便中出或從泄瀉中出者  
大効此疾稍退終身禁房室又忌動風物時以苦參  
湯洗浴須換新衣其旧衣并牀薦等並焚之  
艾蒿醞酒方 治大風癩病 身體面目俱有瘡癩惡汗自出  
白艾蒿十束每束如升許 一味煮取濃汁拌麴米一  
如常醞法酒熟去糟取清稍温飲之令常醞然

天門冬丸方 治大風癩病

天門冬去心生用 五味內瓷器中蜜蓋口以蠟

封勿失氣於淨室中經一年取開其色赤如沙糖  
即入苦沙參粉及乾地黄末為丸如梧桐子大每服

百花煎方 治大風癩病

白蜜二十斤 石櫛七顆 甜者生薑 去皮細 西

苦沙二字一字  
必衍

身體生瘡兩肘如縛此名黑癩皆由惡風日漸傷損血氣  
不榮所致也

馬先蒿散方 治烏癩

馬先蒿多謝石中 細切焙乾用 搗羅為散每服一匙

治烏癩浸酒方

苦參根白皮斤五 細剉如大豆生絹袋貯好酒三斗冬

露蜂房酒方 治烏癩

露蜂房斤五 苦參斤四 二味剉細用水三斗煮取一斗

五升去滓浸麴四觔半炊黍米二斗如常醞法酒熟  
每服三合至五合日二夜一稍增無妨

雌黃散塗方 治烏癩

雌黃兩半 以米醋和鷄子清如膏塗瘡上乾即便塗

白癩



論曰白癩之狀語聲嘶喎目視不明四肢癢痺開節熱痛  
如火燔灼脊脊拘急肉如力劈手足緩弱身體癩疹鼻生  
息肉目生白珠肉色班白故謂之白癩也  
元文作癩亦似誤字

烏蛇散方 治白癩語聲嘶喎四肢癢痺瘡生瘡

烏蛇 酒浸去皮骨炙 葛根 各一分 苦參 紫參 沙參

人參 芎藭 天廣 黃芩 木通 地骨皮 防風

防己 白木 菟藿 黃連 莽草葉 木蘭皮 附

子炮去 烏頭 炮去 牛膝 萎蕤 楨榔根 熟

乾地黄 芍藥 桂 玄參 龜骨 研 石羔 研

升廣 菊花 未用 蒺藜子 煎去 秦艽 細辛 去苗

天雄 炮去 皮奇 當歸 甘草 炙 遠志 已戟 天

蒼耳花 三炒 乾各 吳茱萸 洗湯 麝香 研各 右四十

二味 搗研 細羅 為散 每服 二錢 空心 溫酒 調下 如至

三錢 晡時 服 治白癩語聲嘶喎目視不明四肢癢痺

白花蛇散方 治白癩語聲嘶喎目視不明四肢癢痺

節熱痛身體癢瘡生息肉  
白花蛇 酒浸去皮骨 天廣 槐子 羌活 防風 晚蠶沙

炒 蔓荆實 白鮮皮 威靈仙 枳壳 各一 甘草  
灸羊 搗羅為散 每服一錢 溫酒調下 不拘時候

諸痺門 痛痺 著痺 行痺 皮痺 肌痺

血痺 脈痺 筋痺 骨痺 腸痺 周痺 痺風 熱痺

諸痺統論

命曰飲天和食地德皆陰陽也然陽為氣陰為血氣為衛  
血為榮氣衛血榮通貫一身週而復會如環無端豈爵閉  
而不流哉夫惟動靜居處失其常邪氣乘間曾不知覺此  
風寒溫三氣所以雜至合而為痺淺則客於肌膚深則留  
於骨髓陽多者行流散從而摩常陰多者凝泣滯礙而有  
著雖異狀殊態然即三氣以容之則所謂痺者可得而察  
矣且痺害於身其為病也初若無足治至其蔓而難閣則

濕 溫 疑 當



偏廢弗拳四躰不隨皆自詒伊戚者也可不慎哉

命曰寒氣勝者為痛痺夫宜通而寒則為痛痺之有痛以寒氣入經而稽遲泣而不行也痛本干寒氣偏勝則陽氣少陰氣多與病相益治宜通引榮衛溫潤經絡血氣得溫則宜流自無壅闕矣

茯苓湯方 治風濕痺四肢痛痺拘攣浮腫

赤茯苓 桑根白皮 防己 桂 芍藥 芎藭

廣黃 去根節各二兩 甘草 各一兩 每服五錢 一枚去核

水煎溫服連三服後以姜粥投之汗出為度

天雄丸方 治風濕痺皮肉不仁骨髓疼痛不可忍

天雄 附子 去皮 各一兩 桂 半兩 乾姜 炮三

防風 去毛 為細末 鍊蜜丸如梧桐子大 每服二十九溫

酒下日三夜一

當歸摩膏方 治諸風寒濕骨肉痺痛

當歸 細辛 桂 生地黃 絞取汁切研 天雄

十枚 去皮 芎藭 半兩 白芷 分三 丹砂 研取汁

烏頭 生用 一兩 松脂 兩四 豬脂 兩四 別

共十二味 先將八味 剉如大豆粒 以生地汁浸一宿

共豬脂 松脂 同慢火煎候煎白芷黃色 以厚綿濾去

滓 瓷盆盛入 丹砂末不住攪至凝即止 每用菜用火

灸千摩病處千偏

著痺

命曰內經謂濕氣勝者為著痺地之濕氣感則害人皮肉筋脉蓋濕土也土性重緩榮衛之與濕俱留并以濕勝則著而不移也其證多汗而濡者以陰氣勝也治宜除寒濕通行經絡即差

天雄酒方 治寒濕著痺皮肉不仁至骨髓疼痛

天雄 附子 去皮 防風 獨活 當歸 白朮

五加皮 芎藭 桂 乾姜 二兩



劉如麻豆以夾絹囊盛用無灰清酒一斗浸春夏五日秋冬七日溫飲任性加減以醉為度

茯苓湯方 治風濕痺自著不去四肢痺麻拘牽浮腫

赤茯苓 桑根白皮 防已 桂 芍藥 甘草 芎藭 當歸 廣黃 各一兩半

同 每服六錢 三枚 劈破 開水煎 溫服 如欲出汗 以生

治風濕著痺 服藥雖多 肌肉猶痛 痺摩風膏 摩之方

防風 羌活 芎藭 細辛 蜀椒 附子 烏頭 皂莢 莽草 杏仁 苦參 白欬 躑躅花 白芩 丹參 黑參 桂 當歸

細剉如大豆 以米二升 拌勻 浸三宿 熬乾 同蠟月豬

脂二觔 以文武火煎 一日 綿濾 去滓 瓷餅貯 每用火

許點 摩痺處 兼治一切風毒 其膏年歲深久者 尤

龜骨 虎骨 當歸 桂 皂莢 肥者 子 共為末 先別用好肥皂 夾十挺 以苦酒三升 按取

汁 去滓 入鐺中 煎減半 即入前藥 同煎 如稀 錫入 瓷

行痺

命曰內經 謂風寒濕三氣 雜至 合而為痺 其風氣勝者 為

行痺 夫氣之在人 本自流通 所以痺者 風寒濕三氣 合而

為病 然三氣之中 各有陰陽 風為氣 善行 數變 故風氣勝

則為行痺 其證 上下左右 無所留止 隨所其至 氣血不通

是也 治法 雖通行血氣 宜多以治風之劑

防風湯方 治行痺 行走無定 防風 甘草 黃芩 當歸 赤茯苓 秦艽 葛根 桂 杏仁 廣黃 各一兩半

溫服 每服五錢 棗二枚 生姜五片 酒一鐘 水一鐘 同煎



山茱萸丸方 治風痺遊走無常處亦治血痺

山茱萸一分 生乾地黃二兩 山茱萸 牛膝 沢瀉

草薢一分 天雄 蜻螬 車前子 乾漆 狗脊毛

白木 地膚子各三 茵芋兩 共為細末 鍊蜜丸如

梧桐子大每服温酒下二十九加至三十九

皮痺

命曰風寒濕三氣雜至合而為痺以秋遇此者為皮痺蓋

肺主皮毛於五行為金於四時為秋當秋之時感於三氣

者皮膚不營而為不仁則其證然也

防風湯方 治肺中風寒濕項強頭昏胸滿短氣噓吸顫

掉言語声嘶四肢緩弱皮膚癢痺

防風 芎藭 獨活 桂 前胡 五味

子 杏仁 人參 茯神各三 甘菊花 黃耆

甘中各半 每服四匙生姜五片水煎温服

蔓荆實丸方 治皮痺不仁

蔓荆實法碎皮 防風 羌活 桔梗 白附子

枳壳 蒺藜子炒去角 皂莢半斤 新水浸一宿縮瀝

膏 七味為末膏中和搗丸梧桐子大每服二十九食

後熱水下

天麻丸方 治皮痺癢痺

天麻二 玄參 沒藥 地榆 烏頭各一 麝香研

分 四味為末與二味研者和勻鍊蜜丸如梧桐子大

每服二十九空心食前温酒下

肌痺

命曰風寒濕三氣雜至合而為痺以至陰遇此者則為肌

痺其狀皮膚弗營肌肉痛痺而不仁是也

西州續命湯方 治肌痺津液開泄時復不仁或四時急痛

麻黃去根節煎 當歸切 石羔研 芎藭 桂

甘艸 黃芩 防風 芍藥各二 杏仁湯浸去皮尖

每服四匙生姜一片棗二枚水煎温服不計時候



細辛湯方 治肌痺淫々如虫行或腠理開踈汗出皮膚  
肉色不澤唇鼻黃

細辛 防風 白朮 附子 桂 石膏 研  
黃芪 廣黃 沫去根節煮棉去 枳實 去白 甘草 各半  
當歸 一 每服四錢 生姜五片 水煎温服

血痺

命曰血痺之狀 形体肌膚如彼微風所吹者是也 盖血為  
陰邪入於血而痺 故謂之血痺 宜先鍼引陽氣 後以芎藭之  
芎藭湯方 治風血痺 身體不仁 肉冷

赤芍 側子 桂 廣黃 葶藶 當歸 丹參 各一  
細辛 甘草 各半 每服三錢 生姜五片 水煎温服  
黃芪湯方 治風血痺 陰陽俱微 寸口關上微 或尺中小  
堅其狀 身體不仁 如賊風所中  
黃芪 芍藥 各一 桂 各一 每服五錢 束二枚 生姜三  
片 水煎 早晨 日午 晚 每各一服

葶藶丸方

治風邪遊走無定處 名曰血痺

葶藶 山茱 牛膝 澤瀉 白朮 地層子  
兩半 山萸 兩一 狗脊 三分 茵芋 一分 熟乾 地黄 兩三  
共為末 鍊蜜和丸 如梧桐子大 每服十九丸 温酒下 不  
拘時 稍加至五十九丸

脉痺

命曰血性得温則宣流 得寒則凝澁 凝澁不行 則皮毛萎  
悴 肌肉癢痺 內經謂風寒濕三氣雜至 合而為痺 又曰夏  
遇此者為脉痺 痺則血凝不流 可知也

人參 麥門冬 茯神 菴藟 遠志 黃芪 菖蒲  
赤石脂 各一 熟乾 地黄 二 為末 鍊蜜丸 如梧桐子  
大 每服食後良久 以清粥飲下 三十九丸  
防風湯方 治脉痺 秦朮 赤茯苓 茵芋 乾 甘草 各



桂皮粗

杏仁去皮尖隻 獨活各一 每服五錢以酒水各半生薑半分同煎服

筋痺 骨痺 腸痺 周痺 痺氣

筋痺

命曰經曰風寒濕三氣雜至合而為痺又曰以春遇此者為筋痺其狀拘急屈而不伸是也筋痺不已復感於邪內舍於肝是為肝痺其狀夜臥則驚飲多飲小便上為別如懷蓋淫氣之竭痺聚在肝治法以筋痺為先筋痺既平則邪弗入於肝矣

天麻丸方 治筋風四肢痺

天麻 細辛 芎藭 木香 赤箭 地榆 人參 苦參 牛膝 附子 陳橘皮 當歸 酸棗仁 威靈仙 葛本 防風 獨活 赤芍 酸棗仁

共為細末鍊蜜和杵為丸如梧桐子大每服溫酒下

牛膝湯方

治筋痺以筋虛為風所傷故筋牽縮腰背不伸強直時痛

牛膝 秦艽 丹參 前胡 石解 桂 炙酥 除火 續斷 陳橘皮 火麻 仁合 外 每服五錢煎熟別下 仁末

防風湯方

治肝脾頭目昏塞四肢不利胸膈虛煩

防風 芎藭 黃耆 五味子 人參 茯神 獨活 羚羊角 前胡 細辛 酸棗仁 甘草 每服三錢大棗三枚水煎溫服

骨痺

命曰經謂人有身寒湯火不能煖厚衣不能溫然不凍燥是人者素腎氣勝以水為事大陽氣衰腎脂枯不長一水



燥

不能勝兩火，腎者水也，而生於骨。腎不營則髓不能滿，故寒甚至骨也。所以不能凍慄，肝一陽也，心二陽也，腎孤藏也。一水不能勝二火，故不能凍慄。病名曰骨痺，是人當寧節也。夫骨者腎之餘髓者精之所充也。腎水流行則髓滿而骨強，迨夫天癸虧凝，法則腎脂不長，腎脂不長則髓涸而氣不行，骨乃痺。而其證內寒也，雖寒不為凍慄，則以肝心二氣為陽火，一水不能勝之，恃為骨寒而已。外證當寧節則以髓少而筋燥，故率縮而急也。

小便滑數

治腎虛骨痺，肌体羸瘦，腰脚痠疼，飲食無味。

- 石斛根 牛膝酒 續斷 各三
- 肉蓯蓉 附子 鹿茸 各一
- 白茯苓 熟乾地黄 各三
- 防風 桑螵蛸 芎藭 各半
- 子 補骨脂 草澄茄 各三
- 五味子 山茱萸 覆盆子 各一
- 石龍 杜仲 巴戟天 各半
- 鬼節子 酒浸 鹿茸 炙一毛
- 石龍 杜仲 巴戟天 各半

沉香 藜香子 各三 薏苡仁 共為末，鍊蜜和杵數百下，丸如梧桐子大，每服空心。

熟乾地黄丸方 治腎虛骨痺，面色萎黑，足冷耳鳴，四肢

- 羸瘦脚膝緩弱，小便滑數，補腎。
- 熟乾地黄 肉蓯蓉 磁石 煨醋淬 山茱萸 各三
- 桂皮粗 附子 各半 山茱萸 半 膝酒浸 石南
- 白茯苓 沃瀉 黃芪 各三 鹿茸 去毛 五味子
- 石斛 覆盆子 遠志 分三 補骨脂 兩炒 一
- 萆薢 巴戟天 各三 杜仲 兩 兔筋子 浸三兩 酒 白
- 龜骨 兩 共為末，鍊蜜和杵數百下，丸如梧桐子大。

腸痺 痺下效之 每服空心，以溫酒下三十九日，三服。命曰內經曰：腸痺者，數飲而不得中氣，喘急時，恐泄。夫大腸者，傳導之官，其所以傳導者，皆沖和之氣。今風寒



濕三氣乘虛容於腸間則邪留而和氣閉矣故其證數飲  
而出不得中氣喘爭時澀澀泄大小腸氣痺水道不通故  
雖多飲而不得澀便并氣於大腸使糟粕不化故中氣喘  
爭時澀澀泄也

草豆蔻散方 治腸濕寒濕內攻腹痛澀泄

草豆蔻 陳橘皮 湯浸去白 桂 木香 白木

當歸 煨 白豆蔻仁 丁香 肉豆蔻 良姜 各半

為散每服一錢生薑棗湯調下食前服

訶梨勒丸方 治腸胃澀泄腹脹滿

訶梨勒 煨用皮 乾姜 當歸 煨 黃連 去鬚

白朮 木香 厚朴 生薑 為末鍊蜜和杵二

三百下丸如梧桐子大每服三十丸粥飲下不拘時候

周痺 命曰黃帝鍼經謂周痺者在於血脉之中隨脈以上隨脈  
以下不能左右各當其所夫風濕寒之為痺本痺而不通

今乃能周身上下者以其邪中於血脉之間與脈流通隨  
氣上下升降無礙也

黃芩湯方 治周痺身體不仁

黃芩 甘草 防風 各半 秦艽 葛根 杏仁 煨炒

桂 當歸 赤茯苓 各半 為散每服六錢水酒

各半 各半 各半 各半 各半 各半 各半 各半 各半 各半

續命湯方 治八風十二痺

羌活 茯苓 薏苡仁 炒 各

每服六錢別入竹瀝一匙更煎數沸溫服日二夜一

醍醐方 治寒溫周痺

醍醐 無眼空心以溫酒五合和一匙服之

大豆蘄方 治周痺除五臟留滯胸中結聚益氣止毒潤

皮毛 補腎 大豆蘄 令舂炒 為末每服空心溫酒調下一匙再加

野駝脂方 治周痺



野駝脂鍊了濾別入好酥四兩同鍊攪勻每服半匙  
以契酒半盞和化服之加至一匕空心食前各一服

痺風  
命曰內經謂人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者  
何是人多痺氣也陽氣少陰氣多故寒如從水中生夫陽  
虛生外寒陰盛生內寒人身陰陽偏勝則自然生寒熱不  
必外傷於邪氣也痺氣內寒者以氣痺而血不能運陽虛  
而陰自勝也血凝泣而脈不通故其証身寒如從水中出也

溫補鹿茸丸方 治陽氣虛陰氣盛痺氣內寒如從水中出

鹿茸酥炙 人參 天雄 五加皮 五味子 牛膝  
浸酒防風 遠志 石斛 山茱 狗脊 肉蓯  
蓉切酒浸 熟乾地黄各三 草薢 石南 蛇牀子  
白木各二 巴戟天 天門冬 杜仲各一 乾姜  
吳茱萸炒 桂 附子去皮 細辛 蜀椒去目并合  
白茯苓 兔筴子酒浸另持各 覆盆子 石菴芮各

兩 除兔筴子別持外持羅為末再拌勻鍊蜜丸如梧  
桐子大每服溫酒下二十九丸如至三十九丸空心食前日三

補益黃耆丸方 治陰盛陽虛痺氣身寒如水中出

黃芪 鹿茸酥 白茯苓 烏頭去皮 乾姜各三  
桂 芎藭 當歸 熟乾地黄各一 白木 兔筴子  
酒浸一 宿另持 五味子 枸杞根各半 大棗去核 柏子  
仁半一兩 鍊蜜丸如梧桐子大每服空心溫酒下十五丸日三

熱痺  
命曰內經於痺論有云其熱者陽氣多陰氣少陽遭陰故  
為熱痺蓋府藏壅熱復遇風寒濕之雜至容搏經絡留而  
不行陽遭其陰故癘痺瘡熱而悶也

升麻湯方 治熱痺  
升麻 射干 甘中 芎藭 人參各二 赤小豆炒  
合 麥門冬 生薑 葶藶各三



每服四錢生地黄汁半合青竹葉十五片水同煎温服不拘時候

犀角升麻湯 治熱痺  
升廣二 茯苓 人參 防風 犀角 鎊 羚羊角  
羌活 各二兩 桂 兩半  
每服四錢生薑一塊竹瀝少許水同煎温服

聖濟總錄纂要卷之二終

聖濟總錄纂要卷之三

新安 程 林雲來 纂  
閔母璋象南 較  
吳慈蔭蓮士

江 湘 鄂 上 閱

傷寒門

傷寒可汗 可下 可吐 可温 傷寒過經不解

傷寒統論

命曰風寒暑濕飲食勞倦皆能為病是謂五邪冬傷於寒者春必病温春傷於風者夏必殮泄夏傷於暑秋必痲瘧秋傷於濕者冬必欬嗽是乃四時之氣也然五邪所中雖不同本皆外邪大率同類唯多冬時嚴寒其毒厲尤甚人或中之病在冬時則正名傷寒若邪毒藏於肌膚至春之時乘温而發者温病若留連日久至夏之時乘盛暑而發者為暑病所謂先夏至一日為病温後夏至一日為病暑



是也其病之傳次先客於大陽其病令人頭項痛腰脊強其脉尺寸皆浮大陽不已傳於陽明其病體熱目疼鼻乾不得臥其脉尺寸皆大陽明不已傳於少陽其病胸脇痛而耳聾其脉尺寸皆強少陽不已大陰受之其病腹滿體重其脉尺寸俱微大陰不已少陰受之其病口燥舌乾而渴或背微惡寒其脉尺寸俱沉少陰不已厥陰受之其病煩滿舌卷囊縮其脉寸尺俱緩病之所傳不過三陰三陽而已其未滿三日者邪在陽經未入於裏其病在表宜汗之而愈若經四日者邪入陰經其病在裏宜下之而愈特其大略爾蓋有一日而傳之數經者亦有數日而尚在太陽者陽病雖宜發汗陽明之病反宜下之陰病雖宜下少陰之病或宜溫之由人之稟受虛盛其傳有遲速又有不傳經者當審其脉証凡此六經受病五邪脉証各不同傷風必惡風其脉浮緩傷寒者必惡寒其脉浮緊以至傷暑脉虛傷濕脉濡人迎緊盛為傷寒氣口緊盛為傷食診得

五邪知其本也診得六經知其標也有病雖在表而不可汗者或裏而不可下也或若汗之太多則津液燥竭遂致亡陽下之太早則邪氣動膈乃成結胃清濁相干則變為霍亂熱毒內瘵則變為瘵血又或為發黃者濕熱相蒸也或為發斑者陽毒太盛也陽盛之人得之於熱乃為陽毒陰盛之人得之於寒乃為陰毒動則為狐惑壞病之甚則為百合若勞復陰陽易之類雖差後猶宜節慎變態多端不可備舉當以類求之皆以適當為良唯兩感之病表裏皆受邪為難治其他或陰證似陽陽證似陰或陰盛陽陽傷寒可汗

命曰傷寒病汗之而愈者以初得病一日至三日陽經受邪未傳諸陰其邪在表故常發汗此大約也然病數日脉浮大陽証不罷者亦可汗之當以脉証為準凡頭痛發熱惡風振寒是為可汗之証其脉浮者為可汗之脉陽虛則



惡寒脈浮為在表或浮而弱或浮而緊或浮大而數皆宜汗之

麻黃湯方 治傷寒大陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼

麻黃二兩 桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 杏仁七枚 大青龍湯方 治傷寒大陽中風脈緊發熱惡寒身痛不

汗出而煩躁 須啜粥餘如桂枝法將息 大青龍湯方 治傷寒大陽中風脈緊發熱惡寒身痛不

麻黃六兩 桂枝四兩 芍藥六兩 甘草六兩 杏仁六十枚 石膏一斤 麻黃湯方 治傷寒大陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼

麻黃二兩 桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 杏仁七枚 大青龍湯方 治傷寒大陽中風脈緊發熱惡寒身痛不

汗出而煩躁 須啜粥餘如桂枝法將息 大青龍湯方 治傷寒大陽中風脈緊發熱惡寒身痛不

麻黃六兩 桂枝四兩 芍藥六兩 甘草六兩 杏仁六十枚 石膏一斤 麻黃湯方 治傷寒大陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼

麻黃二兩 桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 杏仁七枚 大青龍湯方 治傷寒大陽中風脈緊發熱惡寒身痛不

汗出而煩躁 須啜粥餘如桂枝法將息 大青龍湯方 治傷寒大陽中風脈緊發熱惡寒身痛不

麻黃六兩 桂枝四兩 芍藥六兩 甘草六兩 杏仁六十枚 石膏一斤 麻黃湯方 治傷寒大陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼

麻黃二兩 桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 杏仁七枚 大青龍湯方 治傷寒大陽中風脈緊發熱惡寒身痛不

汗出而煩躁 須啜粥餘如桂枝法將息 大青龍湯方 治傷寒大陽中風脈緊發熱惡寒身痛不

麻黃六兩 桂枝四兩 芍藥六兩 甘草六兩 杏仁六十枚 石膏一斤 麻黃湯方 治傷寒大陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼

麻黃二兩 桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 杏仁七枚 大青龍湯方 治傷寒大陽中風脈緊發熱惡寒身痛不

汗出而煩躁 須啜粥餘如桂枝法將息 大青龍湯方 治傷寒大陽中風脈緊發熱惡寒身痛不

麻黃六兩 桂枝四兩 芍藥六兩 甘草六兩 杏仁六十枚 石膏一斤 麻黃湯方 治傷寒大陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼



兩 每服三錢生薑二片棗一枚同煎熱服總覺傷風  
併三兩服汗出立差

羌活湯方 治傷寒表不解頭痛眩疼發汗  
羌活 獨活 柴胡 前胡 人參 白茯苓 桔梗

芎藭 甘草 枳殼 炒 芍藥 每服三錢生薑二

片薄苛少許同煎溫服不拘時

葱豉湯方 治傷寒一日至三日以前身熱脈大肢體疼

痛汗不出

蒼朮 米泔浸去 皮 炒 黃 廣黃 去根節湯煮 甘草 炙 桂 各一

每服三錢葱白三寸 鹽豉二十粒同煎熱服不拘時候

傷寒可下

命曰凡傷寒邪入於陰其病在裏法當下之諸腹滿不大

便或口燥舌乾而渴或潮熱譫語皆為可下之證諸診得

脈沉而實即為可下之脈但脈證已具不必拘以日數急

宜攻裏若病雖過經而裏證未備者未可下也故經曰陽

盛陰虛下之則愈其法謂此

陽明病不吐不下心煩者可與調胃承氣湯大陽病三日

發汗不解蒸熱者可與調胃承氣湯傷寒吐後腹脹

滿者可與調胃承氣湯

調胃承氣湯方

甘草 炙 二 大黃 洗以清酒 三兩 枳實 五枚 芒硝 一

錢 更煎一二沸溫服

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘

有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濇然汗出者此大便

已鞭也矣大承氣湯若汗多微發熱惡寒者外未解也其

熱不潮未可與大承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣

湯微和胃氣勿令至大泄下大承氣湯

大承氣湯方

大黃 酒洗 四兩 厚朴 炙 半斤 枳實 五枚 芒硝 一

錢 同煎溫服



陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則謔  
語小承氣湯主之若一服謔語止者勿再服  
小承氣湯方

大黃<sup>四兩</sup>厚朴<sup>二兩</sup>枳實<sup>大者炒</sup> 咳吐每服五錢水煎

柴胡湯方 溫服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服  
治傷寒四日以後煩熱不解大小腸澀

柴胡<sup>苗去</sup>黃芩<sup>一兩</sup>犀角<sup>鎊</sup>芍藥<sup>各三兩</sup> 山梔子仁

竹葉三斤同煎空腹服大小腸通為度如未效再服

大柴胡湯方 治傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者  
枳實<sup>四枚炒</sup>黃芩<sup>二兩</sup>芍藥<sup>各三兩</sup>半夏<sup>二兩</sup>

柴胡<sup>半斤</sup>枳實<sup>四枚炒</sup>黃芩<sup>二兩</sup>芍藥<sup>各三兩</sup>半夏<sup>二兩</sup>

七半湯洗半斤 大黃<sup>二兩</sup> 咳吐每服五錢入生姜十斤 棗<sup>三</sup>

調胃承氣湯方 治傷寒發汗不解蒸<sup>三</sup> 發熱  
陳橘皮<sup>半兩</sup>枳實<sup>二兩</sup>大黃<sup>一兩</sup> 醋炒 甘草<sup>兩</sup>

每服四錢入芒硝一錢同煎溫服  
大青散方 治陽盛發狂有班大小便閉澀  
大青<sup>一兩</sup>知母<sup>一兩</sup>黃芩<sup>一兩</sup>大黃<sup>一兩</sup> 煨 山梔子仁<sup>一兩</sup> 升<sup>廣</sup>

黃連<sup>各一兩</sup> 甘草<sup>兩</sup> 共為散每服三錢入朴硝一

承氣丸方 治傷寒時氣溫熱病大便不通  
大黃<sup>三兩</sup>郁李仁<sup>皮湯浸去</sup>枳實<sup>炒</sup>朴硝<sup>研各</sup>

共研為末勻煉蜜丸如梧桐子大每服二十九 生薑

傷寒可吐 論曰諸病吐之而愈者邪在胸中也傷寒大法謂四日以

上若入陰經其傳未深邪氣高而裏空容於胸膈下之則

動胃汗之則亡陽惟宜吐而出之然亦不必拘此凡寒邪

熱毒痰實在胸中及有宿食有胃脘者皆當吐之但診其

脈寸口或浮或滑或數或緊與諸部不同者其證必胸痞

有疑當  
在字



滿爵而痛不能息多涎唾飲食入則吐欲吐復不能出或手足厥冷及心下滿而煩餓不能食吐下後心中憤懣者是也內經所謂其高者因而越之即其法也

瓜蒂散方治胸有寒病如桂枝證頭不痛項不強寸脈

微浮胸中痞鞭氣上衝喉咽不得息當吐之

瓜蒂熬赤小豆各二升搗篩再和勻每服一棗豉一

合湯七合先漬之須臾煮作稀糜取汁調散放溫頓

服不吐少加之快吐為度亡血虛家不可與

瞭隔湯方治傷寒三四日胸中痰壅寒壯熱頭痛

桃仁一握東到柳枝一握取指甘艸一分生用烏梅三枚

山梔子仁一分各細剉同用漿水一大盞半煎至一盞

空心分為二服相次再服取吐為度

三物湯方眼前撩隔湯吐後頭痛壯熱未退即服此三

薄芎藭一握人參兩半生薑一分水煎空溫服晚再服

苦參散吐方為細散每服三棗溫酒五合調服之即吐

人參湯吐方治傷寒出汗後心胸妨悶煩熱未退

人參兩半燈心一束枳殼一分大腹皮一枚茶末

至一盞下茶末攪勻分溫二服以紙捲子於咽喉中

取吐為度

傷寒可溫

命曰傷寒病雖有三陰三陽然在陽則大陽病多在陰則

少陰病多以二經為表裏故也至於陽明大陰病頗稀少

而少陽厥陰病又少也然究觀古人治陽明則多下於少

陰則多溫蓋陽明者胃也胃受病則不惡寒及惡熱澀反

汗出大便秘譫語潮熱須下之乃愈若乃氣弱本虛人初

中病暎理寒邪氣更不經三陽而便見少陰証蓋少陰者

腎也腎受病則身冷惡寒四肢厥逆脈微細心煩但欲寐



或自利而渴須溫之乃愈雖然三陰病大約可溫而古人  
時於少陰詳言之者則少陰病尤宜溫故也  
附子湯方 治傷寒少陰病得之一二日口中和其背惡  
寒者當灸之

附子 三兩 去皮 人參 一兩 白朮 四兩 芍藥 三兩 白茯苓 三兩

四逆湯方 治傷寒少陰病脈沉者急溫之  
每服五錢水煎溫服日二

甘草 二兩 乾姜 半兩 附子 一枚 生用 剉如大豆每服五錢

四逆湯方 治傷寒少陰病下痢清穀裏寒外熱手足厥  
冷脈微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾  
嘔或咽痛或利止脈不出者通脈加減四逆湯

甘草 二兩 附子 一枚 乾姜 二兩 各剉如大豆大每  
服五錢水煎溫服其脈即出者愈面色赤者加葱九  
葉服中痛去葱加芍藥二兩吐者加生姜二兩咽痛

者去芍藥加桔梗一兩利止脈不出者去桔梗加人  
參二兩病皆與方相應者乃服也

生姜湯方 治傷寒手足厥冷脈細欲絕其人內有久寒  
者宜當灸四逆湯加吳茱萸生薑湯

當歸 芍藥 桂枝 細辛 吳茱萸 湯洗  
甘草 炙 木通 剉如大豆每服五錢入生薑分

通關飲方 治厥陰傷寒脈弦長者生沉細不足者死  
東三枚水酒同煎溫服

附子 乾姜 羌活 桔梗 甘草 五加皮 各半  
桂枝 黃耆 防風 剉如大豆每服五錢水

迴陽湯方 治傷寒陰盛手足厥冷身寒脈微  
煎食前溫服

延胡索 炒 半夏 切生薑 甘遂 炒各  
白附子 去皮 桂枝 剉如大豆每服二錢酒煎溫服服後二

天南星 一枚 剉如大豆每服二錢酒煎溫服服後二



次項患人頭面渾身覺熱時便與衣服蓋覆令出汗  
溫白丸方 治傷寒面青心下堅鞭開口出氣身不熱

半夏湯浸白附子炮 硫黃一研各 共研為末用梗

米飯去湯搗和為丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下吐

白木飲方 治傷寒伏陰胸膈妨悶吐逆不定手足厥冷

白木去皮附子去皮 高良姜炮 桂去粗 人參

乾姜一炮 藿香一分 剉如大豆每服三錢水煎溫服

吳茱萸散方 治傷寒渾身手足厥冷面青唇口無色心

中寒中寒 吳茱萸湯浸 硫黃研 桂去粗 附子去皮 芎藭

黑龍湯方 治傷寒陰盛隔陽身冷煩躁脈沉細緊

附子一枚及半兩者燒存 搗羅為散煎艾葉湯調下三錢陰盛者兼灸氣

返陰丸方 治傷寒陰盛手足多冷脈沉細助陽消陰

硫黃各半 消石 陽起石 大陰玄精石 白朮 石羔

傷寒過經不解 命曰傷寒為病六經受邪始傳於三陽病在表者可汗其

滿三日傳於三陰病入裏者可下其不兩感於寒更不傳

經不如異氣者至七日大陽病衰頭痛少愈八日陽明病

衰身熱少微九日少陽病衰耳聾微聞十日大陰病衰腹

加



寒愈者皆在十二日若過此經病猶不解者為邪熱結于裏其或譫語妄語或爵之微煩或腹滿吐下皆綠治之失綠宜邪氣替留故病過經不能解也當隨其證以治若更感異氣變為他疾者當依壞病法療之

犀角湯方

治傷寒過經不解熱結在裏往來寒熱煩渴

犀角

兩

犀角

柴胡

苗

吳藍

各三

大青

升

廣

各一

烏梅

核

黃芩

各三

甘草

兩

兩

木通湯方

治傷寒十三日過經不解胸腹脹滿小便淋

木通

每服五錢

葛根

青橘皮

湯浸去

煨

根

滑石

柴胡湯方

治傷寒發汗下之後過經不解胸腹滿結渴

柴胡

兩

桂

黃芩

各兩

牡蛎

生

甘艸

各半

兩

枯樓根

半

木通

兩

牡蛎

生

甘艸

各半

兩

中風傷寒

中風傷寒

中風傷寒

中風傷寒

中風傷寒

中風傷寒

中風傷寒

中風傷寒

元文  
禮

命曰中風傷寒三陽三陰候各不同大陽中風其脈陽浮陰弱其證發熱自汗蓋陽浮熱自發陰弱汗自出當惡寒折之惡風煽之發熱鼻鳴乾吧又曰大陽病發熱汗出脈緩者名為中風不可燔灸若以火發其汗邪風為火熱所劫血氣洪溫榮衛失常兩陽薰灼其身發黃陽盛即衄陰虛即小便難陰陽俱虛竭其身軀枯燥但頭汗出刺頭而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾擔衣摸床其小便利者可治陽明中風即陽明病能食為中風其證口苦咽乾腹滿微熱惡寒脈浮而緊



下之則腹滿小便堆少陽中風兩耳無聞目赤胸中滿而煩不可吐吐之則悸而驚大陰中風四肢煩疼其脈陽微陰洪而長為欲愈少陰中風其脈陽微陰浮為欲愈厥陰中風其脈微浮為欲愈不浮為未愈凡此六經之病其狀雖異大抵其脈皆浮經所謂浮為風是也  
大青龍湯方治傷寒大陽中風脈浮緊發熱惡寒身痛不汗出躁煩  
麻黃湯方治傷寒太陽中風脈浮發熱惡寒身痛無汗  
石膏如雞子大碎  
桂枝湯方治中風傷寒陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出惡寒發熱鼻鳴乾嘔等疾  
桂枝湯方治中風傷寒陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出惡寒發熱鼻鳴乾嘔等疾  
生薑稀粥投之以助藥力

石羔湯方治中風傷寒頭痛四肢痠痛身軀沉重

石羔 每服五錢 入生薑一塊 同煎空心溫服

廣黃桂心湯方治中風傷寒脈浮緊發熱惡寒身軀疼痛汗不出而煩

廣黃 每服五錢 入生薑二枚 同煎食前溫服

桂枝湯方治中風傷寒初得其外證頭項疼痛腰背強壯語澀恍惚唾涕稠粘遍身拘急

桂枝湯方治中風傷寒初得其外證頭項疼痛腰背強壯語澀恍惚唾涕稠粘遍身拘急

廣黃細辛丸方治中風傷寒頭痛惡寒四肢煩疼心燥

廣黃細辛丸方治中風傷寒頭痛惡寒四肢煩疼心燥



白朮各半 括樓根分三 共研為末 鍊蜜和搗丸如雞頭大每服一九薄苧蜜湯研下

傷寒濕温

論曰傷寒有五其一為中濕蓋風濕之氣中人為病發熱與寒病相類故曰濕温也此因汗出當風或因取冷過度致陰濕氣襲入肌膚流傳經絡其證喜汗出關節疼痛熱而煩小便不利大便反快是謂中濕若風濕相搏則一身盡疼日晡所劇微熱相承則身必重黃凡治風濕者欲其微汗即風氣解而濕自去濕甚者當利其小便不可大

蒸

止

汗大汗則風去濕在其病不去亦不可下之可之早則下噦下之而利不亟即死診其脉當沉而細難經曰濕温之脉陽濡而弱陰小而急是也

六黃杏仁薏苡仁甘中湯方 治濕温病一身盡疼發熱

日晡即劇此病傷於汗出當風或久傷取冷所致

甘草 咬咀每服五錢水煎温服

桂枝附子湯 治傷寒八九日風濕相搏身軀痛疼不能自轉側不吐不渴脉浮虛而嗇者桂枝附子湯主之

若其人大便堅小便自利者木附子湯主之

桂枝去粗皮 附子三枚 甘草炙二

木附子湯方 咬咀每服五錢入生姜五片棗二枚同煎熱服

附子 炮製去皮 白朮兩四 甘草兩二 剉如大豆每服五錢入生姜五片棗二枚同煎温服初服其人

身如痺半日許復之三服後其人如昌狀勿怪此以附子木併走皮中逐水氣未得除故使之然耳法當

加桂四兩此本一方二法以大便堅小便自利故去桂也

也虛弱家反產婦宜減服之 治風濕相搏骨節疼煩製痛不得屈伸



近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者

甘草二附子二白朮三桂枝四杏仁七大棗十每服五錢水煎溫服初服得微汗則能食汗止復煩者少減服之千金方云身腫者加防風四兩悸氣小便不利者加茯苓三兩既有附子今加生姜三兩

治濕家身煩疼大黃湯加木四兩既其汗為宜慎不可火攻之方

廣黃三桂枝二甘草一杏仁七大棗十防風黃耆湯方主之治風濕脈浮身腫汗出惡風者

防風四黃耆五甘草二白朮三杏仁七大棗十每服五錢水煎溫服取微汗則解

豆大每服五錢入生姜半兩大棗二枚水煎溫服日下有三喘者加廣黃胃中不和者加芍藥氣上衝者加桂下有陳寒者加細辛服後當如蟲行皮中腰以下如

冰後坐被上又以一被遠腰下溫令微汗差

杏仁湯方治風濕身體疼痛惡風微腫

杏仁去皮尖桂枝去粗皮廣黃去根節芍藥去心天門冬去心生薑半分同煎溫服

及率

傷寒時氣論曰春溫夏熱秋冷冬寒是為四時正氣非其時有其氣人或感之病無分少長率相似者謂之時氣如春應溫而必寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反溫是也其候與傷寒溫病相類但可汗可下之証比傷寒溫病療之宜輕爾

葛根湯方治時氣二三日不解頭痛壯熱惡寒

葛根一廣黃去根節陳橘皮湯浸甘草炙黃芩知母杏仁去皮尖每服三錢入生姜二片同煎溫服

每服三錢入生姜二片同煎溫服



七聖湯 治時氣頭痛壯熱收體煩痛

廣黃去根節 蒼朮炒 橘皮湯浸 木通各一兩

桔梗半兩 山茵陳兩 甘草兩

八神湯方 治時氣一二日頭痛壯熱心神煩悶

廣黃一兩 大黃當飯 甘草白朮 山梔子仁

芍藥各一兩 荊芥穗各一兩 每服三錢入薄荷三葉

葱白湯方 治時行表不解壯熱惡寒

葱白一寸 生薑二片 同煎熱服

人參乾葛湯方 治時行表不解壯熱惡寒

人參乾葛 白芍藥桔梗 枳實各一兩 赤茯苓各三錢

五苓散方 治時氣解表出汗

赤茯苓桂 沃渾白朮 豬苓去黑皮 為散每服五錢以新汲水調頓服以葱豉粥投之

蓋取汗

葱白湯方 治時氣傷寒 桑汗

葱白研一 生薑一 豉合 細茶末二 先以水二

蓋煎葱生薑至一盞半次下豉煎少時即入茶末去

解表湯方 治初得傷寒時氣壯熱頭痛

厚衣蓋取汗

附桂散方 治傷寒時氣

附子去皮 桂各半 為散每服三錢熱酒調頓服厚

衣蓋汗出為度

萬靈湯方 和養三焦調順陰陽升降痞滿祛遺寒邪溫

中散寒暖胃和脾滋助氣血思美飲食虛寒痼冷痰

癰動氣心膈疼痛噎悶一切氣疾不日全愈

前胡紫胡 秦艽 甘草半斤 藜香子炒 木香

桂去粗皮 煨榔十枚 白豆蔻半斤 芍藥半斤 青橘

皮半斤 芫薺半斤 甜葶藶微炒 桔梗兩

脫藥品



率候

每服三錢 大棗二枚 同煎食前溫服

傷寒疫病

論曰人居天地間稟氣於陰陽氣和則安氣盪則病故一歲之內節氣不和寒暑乖候皆為疫病之氣感而為病故各疫病其狀無問長少章皆相似俗又名天行其病與時氣瘟熱等病相類各隨其証以方利之

前胡湯方 治時行疫病壯熱欬嗽頭痛心悶  
前胡 升廣 麥門冬 貝母 紫苑 杏仁  
去皮尖雙仁 研各半兩 甘草 一分 石羔 一分 每服三錢行

葛根湯方

治時行疫病兼風熱目疼心中妨悶  
葛根 芍藥 葱白 豉 水煎溫服再服

石羔湯方

治時行疫病壯熱頭痛唇乾  
石羔 葛根 芍藥 貝母 百合 升廣

梔子仁

每服三錢 豆豉五十粒 葱白三寸 同煎服

柴胡湯方

治時行疫病一二日頭痛壯熱  
柴胡 芍藥 梔子仁 黃芩 石羔

葛根 每服五錢 葱白三寸 豉三寸 粒 同煎溫服

不計時候

傷寒結胃

鞭

論曰傷寒病發於陽下之早邪毒之氣結聚於胸膈故名結胸其証心下堅鞭按之則痛項強如柔瘕狀或從心下至少腹堅滿而痛其痛不可近其脉寸口浮關上自沉是其候也若正在心下按之即痛而脉浮滑亦名結胃凡此本太陽病脉浮而動數反下之胃中空虛容氣動膈令人短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下堅滿則為結胸又或因得病三二日不能臥但欲起者心下必結若脉微弱者此素有積寒而反下之利止作結胃但下之而脉浮者必結胃皆當下之脉促者不為結胸也脉若浮即不可下



下之則死然胃証悉具煩躁者亦死又有水結在胸腹者  
又有藏結者結胃無大熱為水結似結胃狀飲食如故時  
時下利陽脈浮開脈小細沉緊者為藏結台上白胎滑者  
為堆治若心下痞堅按之不痛者非結胃乃痞也宜審察  
而各依其法治之

陷胸丸方 治傷寒結胃心下堅實大便不利

大黃 炒 芒薤子 炒 杏仁 二各 朴硝 一各 研細  
如研令 共為末再同研勻入少鍊蜜和更杵三五百下

煎溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效

大陷胸湯方 治傷寒結胃頭項強心下痛按之實鞭

大黃 二醋 兩 甘遂 煨 一各 朴硝 二各 研  
每服用水一鍾入大黃末二匙次下朴硝末一匙同

煎一二沸次下甘遂末一匙攪勻溫服取快利為度  
小陷胃湯方 治傷寒小結胸病正在心下按之則痛脈

浮滑者

黃連 一兩 半夏 湯洗七遍 枳實 一枚 各細剉

先以水五盞煎枳實取三盞去滓入黃連半夏各  
一半煎取一盞分溫三服

治傷寒實結胃無熱證者與三物小陷胃湯用前方白  
散亦可服之

桔梗 炒 巴豆 去皮心熬黑 貝母 去心 除巴豆

外搗羅為散入巴豆合勻每服強人半匙弱羸之人  
減之並溫熱水調服病在膈上必吐在膈下必利不

利進熱粥一杯利不止進冷粥一杯身熱皮粟不解  
欲引衣自覆若以水溼之洗之益令熱却不得出當

汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三如上法  
葶薤湯方 治傷寒結胸心下痛如石堅鞭小便不利

葶薤子 隔布炒 枳殼 兩 桑根白皮 三 杏仁 去皮  
仁 大黃 羊醋炒 各 朴硝 三 每服五匙水煎食前溫服



增損理中丸 治傷寒下後虛氣不理毒復上攻毒氣相

搏結於胃中縱不下者毒已入胸胃中不通毒還攻

上心中結滿厥逆欲絕心起高胸中不可近當先理其

人參 白朮 甘草 枳實 乾姜 梔子 搗羅為末鍊

赤茯苓 去黑皮 牡蠣 煨各二兩 蜜丸如彈子大每服一丸

五六丸胸中豁然 陷胸青龍湯方 治傷寒結胃毒氣內盛手足逆冷腹脹

喘急大便不通 牽午子 微炒二兩 人參 三分 陳橘皮 浸去白

桂 換柳 各一兩 大黃 醋炒二兩 朴硝 一兩 每服五錢入生姜半分同煎食前溫服

傷寒譫語 傷寒潮熱 傷寒厥逆 傷寒煩躁 傷寒厥逆

論曰傷寒不應汗而汗之遂至亡陽津液內竭胃中燥

實則令譫語此病或由津液不和內有燥屎或三陽合病

或痰熱蓄血在裏或婦人挾入血室皆便譫語也然譫語

屬胃胃者足陽明經也陽明為病主身熱故譫語妄語則

身當有熱脈當洪大洪大亦陽脈也故其病為煩滿譫語

若手足厥脈反沉細而微者為逆也然又有鄭色者取其

鄭重之意與譫語相類蓋古人以此分虛實醫者當以脈者

澱

小承氣湯 治傷寒陽明病人多汗津液外出胃中燥大

便必硬則譫語宜此陽 大承氣湯 治傷寒陽明下血譫語此為挾入血室但頭

汗出者刺期門隨其氣而泄之澱然汗出則愈汗出



大黃兩四 紫朴併 枳實五枚 水煎五錢去滓入芒硝末一錢再沸溫服日二

白虎湯 治傷寒三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上汗出手足厥冷若自汗出者宜此湯

柴胡湯 治傷寒熱實得汗不解腹滿脹痛煩燥譫語

柴胡兩一 大黃炒 片苓 白芍 半夏分三 枳實 知母兩六 石羔併 甘中兩二 粳米合六 水煎五錢溫服

犀角湯 治傷寒邪熱在胃譫語妄言身熱壯熱

犀角二 大青 人參兩二 遠志 升麻兩 片苓 柴胡兩二 甘中五 姜水煎五錢入芦根各五寸 溫

人參柴胡湯 治傷寒經六七日不解熱向煩腹乾

白愈方 治傷寒病汗多亡陽譫語妄言不可下與柴胡桂枝湯以和榮衛以通其津液

柴胡兩四 白芍 人參 桂心 片苓 半夏 甘草兩一 姜水煎五錢空心溫服日一

傷寒潮熱 論曰傷寒潮熱者謂潮作有時由邪氣入裏故病日晡發潮熱已而微利者有微發潮熱而大便溏者有潮熱而咳

逆者有結胃而潮熱者大凡潮熱皆以邪氣內實制方宜酌其輕重

小柴胡湯詳謔 柴胡加芒硝湯 治傷寒十三日不解胸腹滿而嘔日晡

潮熱已而微利此大柴胡症下之而不得利今反利者知匡以丸藥下之非其治也夫潮熱者實也先宜

柴胡 半夏 芒硝兩二 人參 片苓 甘中兩二



姜枣水煎五苓去渣入芒硝一钱沸服

大小兼氣湯詳論

柴胡石羔湯治傷寒十日以上潮熱不退

柴胡石羔 白朮 赤茯苓 山梔 姜蕪

桑白皮分三水煎五苓温服

鼈甲湯治傷寒過經潮熱不解或作寒如瘧狀

鼈甲 柴胡 赤茯苓 片苓 甘中 知母

桑白皮分二姜枣水煎五苓服

秦艽湯治潮熱不退

秦艽 鼈甲兩一 甘草五 生姜水煎五苓入豆百粒

葱白三寸空心温服日二

傷寒煩渴

論曰腎者水藏膀胱者津液之府二經相為表裏傷寒熱入于藏流于少陰之經則腎受病矣腎水惡燥熱盛則燥故渴而引飲又傷寒邪氣非發汗吐下則不能除若發汗

吐下過甚則亡津液耗少熱氣内生亦令病人煩渴也

白虎加人參湯治傷寒用桂枝湯大汗出大煩渴不解

脈洪大者

知母兩三 人參兩半 石膏兩八 甘草兩壹 粳米合三

水煎五苓至米熟温服日二

五苓散治發熱六七日不解煩渴引飲水入則吐此為水逆

猪苓 赤茯苓 白朮 圭心 沢瀉兩一

共末熟水下二钱日二汗出乃愈

猪苓湯治傷寒脈浮發熱渴欲飲水小便不利水入則吐

猪苓 赤茯苓 阿膠 滑石 沢瀉

水煎五苓空心温服以差為度

八味知母湯治傷寒病數日不解心躁煩乱小腹脹急

脐下疼痛大渴喘急

知母 白芍 麥冬 柴胡 沢瀉分三 片苓

甘草錢二 石羔兩半 姜枣作葉水煎五苓服

茯苓



葛根湯 治傷寒躁渴頭痛不得眠四肢痛

葛根 片苓 大青 石羔 人多 甘草

水煎 三匙温服日二

人參湯 治傷寒下後餘熱止煩渴

人參 麥冬 五味 石羔 甘草

水煎 五匙服日二

黃芩 治傷寒吐下後內外有熱煩渴

片苓 芦根 赤茯 桂心

姜枣 水煎 五匙服

竹茹湯 治傷寒吐下後煩渴不止

竹茹 烏梅肉 水煎 三匙服日二

茯苓地黃湯 治傷寒胃熱引飲煩渴不止

赤茯 生地 樓根 知母 麥冬

水煎 五匙入小麦白粒竹葉二七片枣二枚煎服

知母 犀角湯 治傷寒煩渴欲水無度日漸消瘦

知母 犀角 升 石羔 水煎 五匙入竹葉

三七片 小麥五十粒 土瓜根汁 括樓根汁 各半合服

傷寒煩躁

論曰傷寒陽氣多陰氣少病發于陽經者故今煩躁其候

身熱而煩渴引水漿若胃中乾燥者必譫語亦有少陰經

煩躁者當辨之

大青龍湯 治傷寒太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛

不可服 汗出而煩躁者此湯主之若服微弱汗出惡風者

不可服 服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆

廣黃 甘草 桂心 杏仁 炒

石羔 姜枣 水煎 五匙温服 出汗止後服

五苓散 煩躁不得眠

白虎加人參湯 大渴舌乾燥欲飲水數升二方俱詳煩渴

茯苓四逆湯 治汗下後病仍不解煩燥

白茯 人參 附子 甘草 乾姜

元文作陽



水煎 五支服

吳茱萸湯 治少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者

吳茱萸湯 治少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

附子 治傷寒手足厥冷脈細欲絕

歸

論曰傷寒厥逆其名曰厥此因陽氣衰陰氣盛陰

勝則陽脈逆而不通于四肢所以逆冷其症令人惡寒不



乾姜姜 水煎五苓服日二  
葱熨方 治傷寒病後氣虛陽脫身冷無脈氣息欲絕不  
省人事及陰厥服百法不效者

葱 洗淨水 以廣縷扎如蓋許大切去根及葉惟存白  
二寸許如大餅燄先以火燄一面令通契乃以契處  
放在病人胸中連騎下其葱上以熨斗滿貯火熨之  
令葱餅中契氣透入肌肉中須預作三四箇餅子一  
餅壞不可熨又易一餅良久病人漸醒手足俱溫有  
汗出更服四逆湯以溫其內其病即差  
傷寒頭痛 傷寒喘 傷寒上氣  
傷寒咳嗽

傷寒頭痛  
論曰傷寒頭痛者邪氣循陽脈上攻于頭也是以傷寒傷  
風溫病熱病風溫病皆有頭痛者蓋頭痛乃陽症也故  
大陽頭痛必灸契惡寒陽明頭痛不惡寒反惡契少陽頭

渴病

痛脈弦細而發熱至于三陰脈從足至胸皆不至頭惟厥  
陰脈挾胃屬肝給膽循喉嚨上頰頰連目系上出額故伸仲

景止有厥陰頭痛一症治以吳茱萸湯是也  
桂枝湯 治大湯痛頭痛發熱汗出惡風  
桂枝 白芍 甘草 芍藥 生姜 大棗 水煎五苓空

小承氣湯 治傷寒六七日不大便頭痛有契  
大黃 枳實 芍藥 水煎五苓溫服

廣黃湯 治傷寒大渴頭痛發熱身疼腰痛一身骨節俱  
痛惡風無汗而喘者

廣黃 桂枝 甘草 杏仁 水煎五苓溫服

連鬚葱白湯 治傷寒已發汗或未發汗頭痛如破  
葱白 連鬚 生姜 水煎五苓溫服

葱白 連鬚 生姜 水煎五苓溫服

葱白 連鬚 生姜 水煎五苓溫服



葛根葱白湯 治頭痛不止

葛根 白芍 知母 川芎 姜朮水煎五支溫服

小柴胡湯 治脉弦細頭疼發熱屬少陽少陽不可汗

柴胡 片苓 人參 甘草 半夏

姜朮水煎五支空心溫服日二

吳茱萸湯 治傷寒厥陰乾嘔吐涎沫頭痛

吳茱萸 人參 姜朮水煎五支空心溫服

茶調散 治頭痛不止

石羔 桂心 茵陳蒿 蒼朮 甘草 荊芥穗

石羔湯 治頭痛不可忍 共末用臘茶末一匙同煎湯下二匙

石羔 廣黃 葛根 何首烏 水煎三匙溫服日二

瓜蒂散 治頭痛胸滿發熱惡寒脉緊而不大是膈上有涎

瓜蒂 為末熱水下二匙吐痰涎愈

前胡湯 治頭痛壯熱

前胡 生地 姜水煎五支服

前胡 半夏 桂心 玄參 甘草 桔梗炒旋復花

四白散 治頭痛身熱百節疼痛

白芷 白附子 白殭蚕炒 白蒺藜炒各

傷寒喘 共末茶酒任下二匙

論曰傷寒喘其症不一有邪氣在表表未解無汗而喘者

有邪氣在裏汗出不惡寒腹滿而喘者有潮熱者有心下

有水氣而喘者古人各亦求其本故在表者當汗在裏者

宜下至于心下有水而喘又當利其小便若乃陰症發喘

是為無陽非灸之不可

小青龍加杏仁去廣黃湯 治心下有水氣咳而發喘

白芍 甘草 桂心 杏仁 五味 細辛 乾姜

半夏 水煎五支服

廣杏中羔湯 治下後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱



廣黃湯 水煎 五匙服 石羔 兩八 甘草 兩二 杏仁 十枚

廣黃湯 治大渴與陽明合病喘而胸滿不可下

廣黃湯 水煎 五匙服 取微汗 圭心 兩二 甘草 兩一 杏仁 枚二十

大承氣湯 治傷寒陽明病脈遲雖汗出不惡寒其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足

大承氣湯 治傷寒陽明病脈遲雖汗出不惡寒其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足

大承氣湯 治傷寒陽明病脈遲雖汗出不惡寒其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足

大承氣湯方 詳謹語

傷寒上氣 論曰傷寒上氣者肺主氣午太陰是其經也病人肺氣凡有不調又遇寒熱邪氣傷于其經則脹而氣逆不下故令上氣

竹茹湯 治上氣喘滿客氣在臧乾吐口生瘡不得飲食

竹茹 葛根 半夏 麥冬 甘草 陳皮

天門冬丸 治心肺熱上氣喘逆

天門冬 白茯苓 杏仁 生地 貝母 甘草

葶藶湯 治上氣喘粗身面腫小便澀

葶藶 烏梅肉 炒人參 共末蜜丸彈子大含化一九日可三五

貝母丸 治心肺有熱咳嗽上氣喉中作聲痰涕口乾

川貝母 杏仁 天門冬 葶藶復花

傷寒咳嗽 論曰傷寒咳嗽者寒氣客于肺也肺受虛寒微則咳嗽然又有邪熱客于上焦其人必欲飲水水停心下水氣乘肺而咳者當熟察之



六黄汤 治咳嗽日夜不止

六黄 去根 赤茯苓 桑白皮 葛根 五味子

紫菀 炙甘草 紫苑 石羔 圭心

小青龙汤 治心下有水气咳而微喘蜜热或利或噎

广黄 去根 白芍 半夏 水煎 五钱服 日二

炒乾姜 五味子炒 甘中 水煎 五钱服 日二

五味子 治伤寒咳嗽

杏仁 炒去皮尖 广黄 去根 阿膠 陳皮 炒 甘中

姜水煎 三钱服

加减小柴胡汤 治五六日往来寒热或微热咳嗽

柴胡 片苓 半夏 甘草 里乾姜

地黄 治毒气攻肺后咳嗽咽喉主瘡

生芩 二 大黄 升 贝母 麥冬 甘草 一

射干汤 治春冬月傷寒夏秋月中冷咳嗽喉鸣舌嘎乾

射干 杏仁 广黄 桑皮 半夏 甘草 桔梗

陈皮 紫苑 姜枣 水煎 五钱服

前胡 治肺盛寒痰嗽不止心膈烦满不能飲食常多

前胡 桔梗 玄参 生地 甘草 旋復花

桂心 半夏 紫朴

姜水煎 五钱服

聖濟總錄纂要卷三終







