

大

中

小

日

本草綱目穀部目錄第二十三卷

穀之二

稷粟類一十八種

稷別錄

黍別錄

蜀黍食物

玉蜀黍綱目

粱別錄

粟別錄

秫別錄

參救荒

稗綱目

狼尾草拾遺

東廕拾遺

菰米綱目

蓬草子拾遺

芮草子拾遺

茆草子海藥

薏苡本經

瞿子粟開寶

即御米

麗春花

阿芙蓉綱目

右附方舊二十七新五十五

本草綱目穀部第二十三卷

穀之二

稷粟類一十八種

稷

別上品錄

釋名

穄

音咨時珍曰稷從禾從叟叟音卽諧

是矣種稷者必叟叟進力也

謂其米又進力也南人承北音呼稷爲

穄謂其米可供祭也禮記祭宗廟稷曰明粢爾雅

云粢稊也羅願云稷穄粢皆一物語音之輕重耳赤者名糜白者名芑黑者名秬註見黍下

集解

弘景曰稷米人亦不識書記多云黍與稷相

似又註黍米云穄米與黍米相似而粒殊大

食之不宜人言發宿病詩云黍稷稻粱禾麻菽麥

此八穀也俗猶莫能辨證況芝英乎蘇恭曰呂氏

春秋云飯之美者有陽山之穄高誘註云關西

之穄音糜冀州謂之穄音牽去聲廣雅云穄穄也謂

穀長田正也此乃官名非穀號也先儒以稷爲  
穀類或言粟書之上者皆說其義而不知其實也  
穀勝之種植有黍不言稷本草有稷不載穀按爲  
稷也楚人謂之稷關中謂之糜呼其米爲黃稷  
苗與黍同類故呼黍爲秈陶言與黍相似者得  
之矣藏器曰稷穄一物也塞北最多如黍黑色  
曰稷在八穀之中最爲下苗黍乃作酒此乃作飯  
用之殊塗頌曰稷米出粟處皆能種之今人不  
珍用此惟祠事用之農家惟以備他穀之不熟則爲  
糧耳宗奭曰稷米今謂之穄米先諸米熟其香可  
愛故取以供祭祀然發故疾只堪作飯不黏其味可  
淡時珍曰稷與黍一類二種也黏者爲黍不黏者  
爲稷器獨指黑黍爲稷亦偏矣黍稷之苗似粟而低  
小藏器可作飯黍可釀酒猶稻之有梗與糯也陳者  
黃下種五六月可收亦有七八月收者其色有赤白  
黑數種黑者禾稍高今俗通呼爲黍子不復呼白

稷矣北邊地寒種之有補河西出者顆粒尤硬稷熟最早作飯疎爽香美爲五穀之長而屬土故祀穀神者以稷配社五穀不可遍祭祭其長以該之上古以厲山氏之子爲稷主至成湯始易以后稷皆有功於農事者云

### 正誤

吳瑞曰

稷苗似蘆粒亦大南人呼爲蘆穄

孫正義云稷卽粟也時珍曰稷黍之苗雖頗

似粟而結子不同粟穗叢聚攢簇稷黍之粒疎散成枝孫氏謂稷爲粟誤矣蘆穄卽蜀黍也其莖苗高大如蘆而今之祭祀者不知稷卽黍之不黏者往往以蘆穄爲稷故吳氏亦襲其誤也今並正之

### 稷米氣味

説

曰多食發二十六種冷病但氣不與瓠子同食發冷病

飲黍稷汁卽瘥又不可與附子同服

### 主治益氣補不足

別錄治熱壓丹

### 石毒發熱解苦瓠毒

日華

作飯食安中利胃宜脾心

# 涼血解暑

時珍曰  
生生編

## 發明

時珍曰  
按孫真人

云稷脾之穀也  
脾病宜食稷則瓠死此物性相制也

稷米黍穀

能解苦瓠之毒淮南萬畢術云  
家之黍啖兒令不思母此亦有所厭耶

## 附方

新補中益氣

羊內一腳熬湯入河西稷米  
葱鹽煮粥食之飲膳正要卒

## 惋不止

粢米粉井華水

肘后癰疽發背  
雞子白和塗練以穄米爲

上翦孔貼之乾則  
葛氏方辟除瘧疫

令不相染以穄米爲  
末頓服之肘后方

## 根主治

心氣痛產難

時珍曰

## 附方

新心氣疼痛

高粱根煎湯

溫服甚效

橫生難產

重陽日取高粱

研末酒服二錢卽

下

根名瓜龍陰乾燒存性

黍

別錄中品

校正

別錄中品丹黍

釋名赤黍曰穀

音門

穀音糜

白黍曰芑

音起

黑黍曰秬

音秬

秬

秬

集解

弘景

日黍荆

郢州

及江北

皆種之

其苗如蘆

秬

秬

秬

秬

一秤二米曰秬

音距

也魏子才六書

精蘊云禾下從

秬象細粒散垂之

形汜勝之云秬者暑也待暑而生暑後乃成也詩

郭璞以秬爲粱粟以秬卽黑黍之二米者羅願

以秬爲來牟皆非矣

而異於粟粒亦大今人多呼秬粟爲秬非矣

人作秬飯方藥釀秬米酒皆用秬秬也別錄丹黍

宜多入補藥用又有黑秬名秬釀酒供祭祀用秬

日黍有數種其苗亦不似蘆雖似粟而非粟也

頌

黍米卽赤秬米也亦出北閔江東時有而非土所

入

補藥用又有黑秬名秬釀酒供祭祀用秬

秬

秬

秬

秬

秬

秬



**正誤**

頌曰 黏者爲穢 可以釀酒 北人謂爲黃米 亦時珍曰 此誤以黍爲穢 以稷爲黍 可食如稻之有梗 穰也 爲黍粟之黏者爲穢 穰之性味功用甚明 而註者不諳 往往謬誤如此 今俗不知分別 通呼穢與黍爲黃米矣

**黍米**

此通指諸

**氣味**

**甘溫無毒久食令人多熱煩**

別錄○詵曰 性寒有小毒 發故疾 久食昏五臟 令人好睡 緩人筋骨 絶血脈 小兒多食令久不能行 小貓犬食之其腳跘屈合 葵菜食成痼疾 合牛肉白酒食生寸白蟲 李廷飛曰 五種黍米多食閉氣

**主治**

**益氣補中**

別錄 燒灰和油塗杖瘡止痛 不作癰

**孟詵**

**嚼濃汁塗小兒鴟口瘡有效**

時

**發明**

思邈曰 黍米肺之穀也 肺病宜食之 主益氣

時珍曰 按羅願云 黍者暑也 以其象火爲南

方之穀蓋黍最熟與糯米同性其氣溫暖功能補肺而多食作煩熱緩筋骨也孟氏謂其性寒矣非

## 附方

舊二  
新二

## 男子陰易

黍米二兩

煮薄粥

和酒飲

汗即愈

聖濟總錄

未成瘡者

心

## 痛不瘥

四十年者

黍米淘汁

溫服隨意

經驗方

湯火灼傷

黍米女麴

未成瘡者

黑腫痛

心

等分各炒焦研末

雞子白調敷

肘後方

同炒存性研末

醋貼之

少醋研末

黍米粉

鐵漿粉各半斤

葱一斤

水調入少醋

貼之

存性研末

以集而成

## 丹黍米

別錄中品○卽赤黍也

爾雅謂之蕡

瑞曰

江南多白黍間有紅者

穗熟色赤故屬火

北人

呼爲赤鰯米

宗奭曰丹黍皮赤其米黃惟可爲糜

不堪爲飯黏着難解原曰

穗熟色赤故屬火

北人

以之釀酒

作糕

原书缺页

煮汁入藥更佳

主治煮汁飲之解苦瓠毒浴身

去浮腫和小豆煮汁服下小便

孟說

燒灰酒服方寸

匕治妊娠尿血丹黍根莖煮汁服利小便止上喘

珍時

附方

舊新

一通身水腫

以黍莖掃帚煮湯浴之

腳氣衝心

黍穰一石

煮汁入椒目一升更煎十沸

漬腳三四度愈

外臺秘要升

人畜

天行豌瘡

不拘人畜用黍穰濃

燒烟熏令汗出愈

煮汁洗之一莖者是

外臺秘要升

人畜

瘡腫傷風

中水痛劇者用黍穰濃

燒烟熏令汗出愈

穄不可用千金

蜀黍

物

金方

千

**釋名**

**蜀黍**

俗名蘆穄

**木稷**

廣雅

**荻梁**

同上

**高粱**

時珍曰蜀黍不甚經見而今北方最多按廣雅荻梁木稷也蓋此亦黍稷之類而高大如蘆荻者故俗有諸名種始自

蜀故謂之蜀黍

**集解**

穎曰蜀黍北地種之以備缺糧餘及牛馬穀

地

春月布種秋月收之

莖高丈許狀似蘆荻而

苗下

實葉亦似蘆穗

大如帚粒大如椒紅黑色

米性堅

實黃赤色有二種黏者可和糲

粥可以濟荒可以養畜稍可作

糴可和糲酒作餌不黏

者可以作糕煮粥可以濟荒可以養畜稍可作

糴可供饗最有利於民者今人祭祀

博用以代稷者誤矣其穀殼浸水色紅可以紅酒

物志云地種蜀黍年久多蛇

**米氣味甘澀溫無毒主治溫中澀腸胃止霍亂黏**

者與黍米功同

時珍

根主治羹汁服利小便止喘滿燒灰酒服治產難

有效

時珍

附方新小便不通

止喘紅穉散用紅穉黍根二兩扁蓄一兩半燈心百莖每服各

半兩流水煎服

張文叔方

玉蜀黍

綱目

釋名玉高粱

集解

時珍曰

玉蜀黍種出西土種者亦罕其苗葉俱似蜀黍而肥矮亦似薏苡苗高三四尺六

七月開花成穗如秕麥狀苗心別出一苞如櫻魚形苞上出自白鬚垂久則苞折子出顆顆攢簇子

亦大如櫻子黃白色可燂炒食  
之炒拆白花如炒拆糲穀之狀

**米氣味甘平無毒主治調中開胃**

時珍

**根葉氣味主治小便淋瀝沙石痛不可忍煎湯頻**

**飲時**

**粱**

別錄中品

**釋名**

時珍曰

梁者良也穀之良者也或云種出自

梁州或云梁米性涼故得梁名皆各執已見

一

**校正**

別錄中品有青梁米黃

也  
梁卽粟也考之周禮九穀六穀之名有梁無粟  
可知矣自漢以後始以大而毛長者爲梁細而毛  
短者爲粟今則通呼爲粟而梁之名反隱矣今世  
俗稱粟中之大穗長芒粗粒而有紅毛白毛黃毛  
之品者卽梁也黃白青赤亦隨色命名耳郭義恭  
廣志有解梁貝梁遼東赤梁之名乃因地命名也

集解

弘景曰凡云梁皆是粟類惟其牙頭色異

梁出冀州東閒不見有白梁處處有之襄陽也  
根者爲佳青梁江東少有又漢中一種枲梁粒粗  
粟而皮黑可食釀酒甚消玉恭曰梁雖粟類俱粗  
則別黃梁出蜀漢商浙閒穗大毛長穀米  
號白梁而收子少不耐水旱食之香美勝於諸多梁  
且長而穀粗扁長不似粟圓也米亦白而大食之  
香美亞於黃梁青粱殼穗有毛而粒青米亦早熟  
而細於黃白梁其粒似青稞而少粗早熟而微  
夏月食之極爲清涼但味短色惡不如黃白  
人少種之作餚清白勝於餘米頌曰梁者粟類  
粟雖粒細而功用則無別矣今汴洛河陝閒多種也  
白梁而青黃稀有因其損地力而收穫少也宗奭  
白梁西洛農家多種爲飯尤佳餘用不甚相宜

**黃粱米**

別錄中品

**氣味**

甘平無毒主治益氣和中止洩

別錄

**去客風頑癆**

日華

止霍亂下痢利小便除煩熱

時珍

**發明**

宗奭曰平

青梁白粱性皆微涼獨黃粱性味甘

非得土之中和氣多耶頌曰諸粱比之

他穀最益脾胃

**附方**

舊四新一

**霍亂煩躁**

黃粱米粉半升水

升半和

外臺方

霍

**亂大渴**

不止多飲則

殺人

黃粱米五升

水

外臺方

霍

**乾**

無涕每以一錢水

熱也調貼

顱上

日二次

各一兩

普濟

**小兒生瘡**

滿身面如火

燒以黃粱米

**丹**

用土番黃米粉

和雞子

上日二次

各一兩

普濟

**小兒赤**

研粉和蜜水

以瘥爲度水調之

外臺之

兵部手集

各一兩

普濟

**小兒生瘡**

滿身面如火

燒以黃粱米

**白粱米**

別錄  
中品

**氣味**甘微寒無毒主治除熱益氣

別錄

除胸膈中客熱移五臟氣緩筋骨凡患胃虛并嘔

吐食及水者以米汁二合薑汁一合和服之佳

孟詭

炊飯食之和中止煩渴

時珍

**附方**

舊二

**霍亂不止**

白粱米和煮粥食

五合水一升

干金方

**手足生疣**

取白粱米粉鐵銚炒赤研末以眾人唾和塗之厚一寸卽消

肘後

**青粱米**

別錄  
中品

**氣味**

甘微寒無毒

主治

胃脾熱中消渴止洩痢利小便益氣補中輕身長年煮粥食之

別錄  
健脾治洩精大

# 發明

時珍曰今粟中有大而青黑色者是也其穀

人說

曰青粱米可辟穀以純苦酒浸三日百蒸

曬藏之遠行日一餐之可度十日若重

餐之四百九十九日不飢也又方以米一斗赤石脂三斤水漬

置暖處一二日上青白衣搗爲丸如李大

日服丸亦不飢也按靈寶五符經中白鮮米九蒸

九暴作辟穀糧而此用青粱米未見出處

# 附方

新

## 補脾益胃

羊內湯入青粱米葱鹽煮粥食

正要脾虛泄痢

青粱米半升神麴

一日煮食卽愈

養老書

冷氣心痛

桃仁二兩去皮水研絞汁

入青粱米四合煮

粥常食

養老書

五淋澀痛

青粱米四合入醬水煮粥下上蘇末三兩

每日空心食

老人血淋

車前五合綿裹煮汁入青

之同上

梁米四合煮粥飲汁亦能

熱下行引乳石發渴

青粱米煮汁外臺

一切毒藥

煩瀉不毒

明目引乳石發渴

青粱米煮汁飲之

熱下行引乳石發渴

青粱米煮汁外臺

粟

中別品錄

釋名

時珍曰

粟古文作穉象穗在禾上之形

而春秋題辭云粟乃金所立米爲陽之形

續故西字合米爲粟此鑿說也許慎云粟之爲言

續也續於穀也古者以粟爲黍稷粱秫之總稱而

今之粟在古但呼爲粱後人乃專以粱之細者名

粱也大抵黏者爲粱不黏者爲粟而近世皆不識粟

穉粟以別穉而配穉南北人謂之小米也

穉穉類多種而並細於諸粱北土常食與粱

米恭曰粟江南西北閒所種皆是其粟或呼爲粢

粢乃稷米陶註非矣説曰粟顆粒小者是今

有別粢人多不識之其粢米粒粗大隨色別之南方多畲田種之極易春生細香美少虛怯祇於灰中種之

止用甘草三兩水五升煮取二升去滓入黍

一兩白蜜三兩煎如薄粥食之外臺

集解

弘景曰粟江南北閒所種皆是其粟或呼爲粢

粢乃稷米陶註非矣説曰粟顆粒小者是今

米恭曰粟江南北閒所種皆是其粟或呼爲粢

粢乃稷米陶註非矣説曰粟顆粒小者是今

又不鋤治故也北田所種多鋤之卽難春不鋤卽草鷦死都由土地使然爾時珍曰粟卽粱也穗大而毛長粒粗者爲粱穗小而毛短粒細者爲粟苗俱似茅種類凡數十有青赤黃白黑諸色或因氏地名或因形似時令隨義賦名故早則有趕麥苗黃百日糧之類中則有八月黃老軍頭之類晚則有鴈頭青寒露粟之類按賈思騶齊民要術云粟強之成熟有早晚苗稈有高下收實有息耗質性有弱米味有美惡山澤有異宜順天時量地利則用効少而成功多任性返道勞而無穫大量地利則栗皮薄米實晚栗皮厚米少

## 粟米

卽小米

## 氣味鹹微寒無毒

時珍曰鹹淡宗奭曰生者難化熟者滯氣

隔食生蟲

藏器曰胃冷者不宜多食粟浸水至敗人瑞曰與杏仁同食令人吐瀉鴈食粟足重

不能飛者損人

主治養腎氣去脾胃中熱益氣陳者苦寒治

胃熱消渴利小便

別錄

止痢壓丹石熱

洗

水煮服治

孟

水煮服治

熱腹痛及鼻衄爲粉和水瀝汁解諸毒治霍亂及

轉筋入腹又治卒得鬼打

藏器

解小麥毒發熱

良

治

反胃熱痢煮粥食益丹田補虛損開腸胃

時珍

生生編

發明

弘景曰

陳粟乃

三五年者

尤解煩悶

服食

家

震亨曰栗屬水與土陳者最硬難化得漿水乃化

也時珍曰栗之味鹹淡氣寒下滲腎之穀也腎病

宜食之虛熱消渴洩痢皆腎病也滲利小便

所以洩

腎邪也降胃火故脾胃之病宜食之

附方

舊五新四

胃熱消渴

以陳粟米炊飯乾食

之良

醫方心鏡

反胃吐

食

脾胃氣弱

食不消化

湯飲不下用

粟米半升杵

水丸梧子大七枚

煮熟入少鹽空心

和汁吞

或云納醋中吞之鼻衄不止栗米粉水煮  
得下便已心鏡服之普濟嬰孩

## 初生

七日助穀神以導達腸胃研粟米煮

姚和眾方

孩子赤

## 丹

嚼粟米傳之兵部手集

小兒重舌

嚼粟米哺

雜物昧目不出

用生粟米七粒

嚼爛取汁洗之卽出

湯火灼傷

粟米炒焦投水澄取汁煎稠如

糖頻傳之能止

痛滅瘢痕一方半生

炒研末酒調傅之崔行功纂要

熊虎爪傷嚼粟

塗之

葛氏方

## 粟泔汁

主治霍亂卒熱心煩渴飲數升立瘥臭泔

## 止消渴尤良

恭蘇酸泔及澱洗皮膚癩疥殺蟲飲之

## 主五痔和臭樗皮煎服治小兒疳痢

藏器

**附方**

新二

**眼熱赤腫**

粟米泔濃極酸者生地黃等分研勻攤絹上方

圓二寸貼目上

**熨之乾卽**

**易**

**總錄**

**痘瘡月蝕**

寒食泔濃傳

**之良**

**千金**

**之乾卽**

**疳瘡月蝕**

寒食泔濃傳

**之良**

**粟糖**

**主治**

**利小腸除煩惱**

**時**

**粟奴**

**主治**

**利小腸除煩惱**

**時**

**粟奴**

**主治**

**利小腸除煩惱**

**時**

**發明**

時珍曰粟奴卽粟苗成穗時生黑煤者古方不用聖惠治小腸結澀不通心煩悶亂有粟

奴湯用粟奴苦竹鬚小豆葉炙甘草各一兩燈心

十寸葱白五寸銅錢七文水煎分服取效乃止

粟廩米

**粟廩米**

**主治**

**利小腸除煩惱**

**時**

**粟蘖米**

**主治**

**利小腸除煩惱**

**時**

**粟糗**

**主治**

**利小腸除煩惱**

**時**

穢

音朮○別  
錄中品

釋名

眾

穢

粟

唐

黃糯

時珍曰

穢字篆文象其禾體柔

弱之  
黃糬

亦形

俗呼糬

粟是矣

北人呼爲

集解

恭曰

穢是稻穢也

今人呼粟糬爲穢

北土多

穀皆有

穢糬也

禹錫曰穢米似黍米

凡黍稷粟穢梗糬三

酒穀

宗奭曰

穢米初搗出

淡黃白色亦如糬

不堪作飯

最黏故

宜作酒

時珍曰

穢卽粱米粟米之黏者

圖經謂

穢爲黍之黏者

許慎說文

謂穢爲稷之黏者

皆誤也惟蘇頌

者崔豹古

今註謂穢爲稻之黏者

皆誤也惟蘇頌

恭以

謂穢爲黏

孫炎註爾

穢爲黏

粟者得之

穢米

卽黃

氣味

甘微寒無毒

沈括曰性平不可常食

壅五臟氣動風迷悶

壅五臟氣動風迷悶

性平不可常食

壅五臟氣動風迷悶

壅五臟氣動風迷悶

人時珍曰按養生集云味酸性熱  
黏滯易成黃積病小兒不宜多食

# 主治寒熱利大

腸療漆瘡

別錄

治筋骨攣急殺瘡疥毒熱生搗和雞

子白傳毒腫良

孟詵

主犬咬凍瘡嚼傳之

日華

治肺瘡

汁

時珍

發明

弘景曰北人以此米作酒煮糖肥軟易消方藥不正用惟嚼以塗漆瘡及釀諸藥醪爾時

珍曰穉者肺之穀也肺病宜食之故能去寒熱利

大腸

大腸者肺之合而肺病多作皮寒熱也千金

治肺瘡方用之取此義也靈樞經岐伯治陽盛陰

虛夜不得眠半夏湯中用之取其益陰氣而利大

腸也大腸利則陽不盛矣方見半夏條又異苑云

宋元嘉中有人食鴨成癥瘕醫以穉米研粉調水

服之須臾煩躁吐出一鴨雛而瘥也千金方治食  
鴨肉成病胸滿面赤不能食以秫米湯一盞飲之

## 附方

舊新三

## 赤痢不止

穉米一把鮆魚鮓二隻葱白普濟方虎口煮粥食之

## 筋骨攀急

陳蒿炙黃半斤依釀酒法服之良

## 肺瘡寒熱

痰聚胸中病至令人寒甚乃熱善驚如有所見恒山三錢甘草半錢秫米水煎未發時

三十粒分作三次服

水煎千金小豆汁秫米黃色如膠或如黃

芪各一兩水七升煎

梅師有汁多發於心不黃

熬秫米令黃黑杵末傳之

久泄胃弱早治周身則殺人

## 根主治羹湯洗風

孟詵

穆子

彩參二音○教荒

釋名龍爪粟鴨爪稗

時珍曰穆乃不黏之稱也亦不實之貌也龍爪鴨爪象其

穗岐

之形

集解

周憲王曰穆子生水田中及下溼地葉似稻但差短稍頭結穗彷彿稗子穗其子如黍粒

大茶

褐色擣米煮粥炊飯磨麵皆宜時珍曰穆子山東河南亦五月種之苗如黍八九月抽莖有

三棱

如水中藨草之莖開細花簇簇結穗如粟穗而分數岐如鷹爪之狀內有細子如黍粒而細赤

色其稃甚薄

其味粗澀

氣味甘澗無毒主治補中益氣厚腸胃濟饑

稗

音敗綱目

○

釋名

時珍曰稗乃禾之卑賤者也故字從卑

集解

弘景曰稗子亦可食又有烏禾不生野中如种荒年可代糧而殺蟲煮以沃地螻皆死藏

器曰

稗有二種一種黃白色一種紫黑色紫黑者似芑有毛北人呼爲烏禾

時珍曰稗處處野生最

能亂苗

其莖葉穗粒並如黍稷一斗可得米三升

故曰五穀不熟不如稊稗

稊苗似稗而穗如粟有

紫毛卽烏禾也

爾雅謂之迭音迭周憲王曰稗有

水稗旱稗

水稗生田中旱稗苗葉似穄子色深綠

根下葉帶紫色稍頭出扁穗結子如黍粒茶褐

色味微苦性溫以煮粥炊飯磨麵食之皆宜

稗米氣味辛甘苦微寒無毒

穎曰辛脆主治作飯食益

氣宜脾故曹彬有芳菰精稗之稱

珍時

苗根主治

金瘡及傷損血出不已搗傅或研末摻

之卽止甚驗

時珍

狼尾草

拾遺

釋名

稂

音董郎

童梁

爾雅作狼茅

雅

爾

宿田翁

詩

疏

守

田

詩疏時珍曰不成

嶷然在

田故有宿田

守田之稱

集解

藏器曰

狼尾生澤地似茅

作穗

廣志云子可

時珍曰

狼尾莖葉穗粒並如粟

而穗色紫黃

有毛

並如粟

而穗色紫黃

有毛

時珍曰

狼尾似茅可

以覆屋

是也

荒年亦可采食

許慎說文云禾

穀之穗

生而不成

者謂之董郎其秀而不

實者名狗尾草見草部

附錄

薊草

藏器曰薊草

苗似茅可織

米氣味

甘平無毒

主治

作飯食之令人不饑

藏器

東腐

音牆

○

釋名沙蓬米

物格登相子

保德州志

沙米

同上

登粟

遼史

集解

藏器曰

東廬生河西苗似蓬子似葵九月十

月熟可爲飯食

河西人語曰貸我東廬償爾

田梁廣志云東廬子粒似葵青黑色并涼閒有之

時珍曰相如賦東廬彫胡卽此魏書云烏丸地宜

東廬似穄可作白酒又廣志云梁禾蔓生其子如

葵子其米粉白如麪可作餧粥六月種九月收牛

食之尤肥此

穀似東廬者

子氣味甘平無毒主治益氣輕身久服不饑堅筋骨能步行

器藏

菰米

目綱

釋名菱米

文選

彫蓬

爾雅

彫菰

說文○唐韻作蕩

胡彫胡

時珍曰

菰本作菰

菰茭草也其中生菌如瓜形可食故謂之菰其米須霜彌時采之故謂之凋菰或訛爲彌胡枚乘七發謂之安胡爾雅齧彌蓬薦黍蓬也孫炎註云彌蓬卽茭米古人以爲五飯之一者鄭樵通志云彌蓬卽茭米可作飯食故謂之齧其黍蓬卽茭之不結實者惟堪作薦故謂之薦楊慎卮言云蓬有水陸二種彌蓬乃水蓬彌菰是也黍蓬乃旱蓬青科是也青科結實如黍羌人食之今松州有焉珍按鄭楊二說不同然皆有理蓋蓬類非一種故也有

### 集解

弘景曰

菰米一名彌胡可作餅食藏器曰彌

皆水物也曹子建七啟云芳菰精稗謂二草之實可以爲飯也頌曰菰生水中葉如蒲葦其苗如莖梗者謂之菰蔣草至秋結實乃彌胡米也古人以爲美饌今饑歲人猶采以當糧葛洪西京雜記云漢太液池邊皆是彌胡紫籜綠節蒲叢之類蓋菰之有首者謂之綠

節葭蘆之未解葉者謂之紫籜也(宗奭曰)菰蔣花  
如葦結青子細若青麻黃長幾寸野人收之合粟  
爲粥食之甚濟饑也(時珍曰)彫胡九月抽莖開花  
如葦芽結實長寸許霜後采之大如茅殼皮黑褐  
色其米甚白而滑膩作飯香脆杜甫詩波漂菰子米  
沉雲黑者卽此周禮供御乃六穀九穀之數管子  
書謂之鴈膳故收米入此

蓬草子

拾遺

氣味甘冷無毒主治止渴

藏器

解煩熱調腸胃

時珍

釋名

集解

時珍曰陳藏器本草載蓬草子不具形狀珍按蓬類不一有彫蓬卽菰草也見菰米下有

黍蓬

指果卽青科也又有黃蓬草飛蓬草不識陳氏所有何蓬也以理推之非黃蓬卽青科爾黃蓬草

不立

繢

幕部

三

二

生湖澤中葉如菰蒲秋月結實成穗子細如彫胡  
米饑年人采食之須浸洗曝春乃不苦澀青科西  
黍而細其稈甚薄曝春秋月結實成穗有子如赤  
八棱青科麥類有青稈黃稈皆非此類乃物異名  
同也其飛蓬乃藜蒿之類末大本小風易拔之故  
號飛蓬子如灰蘿菜子亦可濟荒又魏畧云鮑出  
遇饑歲采蓬實日得數斗爲母作食西京雜記云  
宮中正月上辰出池邊鹽濯食蓬餌以祓邪氣此  
皆不知所采乃何蓬也大抵三種蓬子亦不甚相  
遠

子氣味酸澀平無毒主治作飯食之益饑無異梗

米

器藏

茵草

音冈  
拾遺○

釋名

爾雅

守田

同上

守氣

同時珍曰

皇

音相近也

集解

藏器曰

芮草生水田中苗似小麥而小

四月

熟可作飯

時珍曰

爾雅

皇守田

郭璞云一名

守氣生廢田中似燕

麥子如豚胡可食

米氣味

甘寒無毒

主治

作飯去熱利腸胃益氣力

久食不饑

藏器

篩草

海藥

釋名

自然穀

海藥

禹餘糧

集解

藏器曰

博物志云東海洲上有草名曰篩有

實食之如大麥七月熟民斂穫至冬乃訖呼

爲自然穀亦曰禹餘糧此非石之禹餘糧也

珣曰

篩實如越子八月收之彼民常食中國未曾見也

呼

也

時珍曰按方孝孺集有海米行蓋亦茆草之類也  
其詩云海邊有草名海米大非蓬蒿小非葦婦女  
擣籃晝作羣采摘仍於海中洗歸來滌釜燒松枝  
煮米爲飯充朝饑莫辭苦澀咽不下性命聊假須  
臾時

子氣味甘平無毒主治不饑輕身藏補虛羸損乏

器

溫腸胃止嘔逆久食健人

李珣

薏苡仁

本經上品

校正

據千金方自草部移入此

釋名解蠡

音禮本經

芑實

音起別錄

贛米

別錄音咸陶氏作

回回米

救荒本草

薏珠子

圖經

時珍曰

薏苡名義未詳

芑黍之苗故有解蠡芑實葉而解散又似有  
有賴強之意苗名屋葵救荒本草云回回米又呼

名草蜀兒俗

## 集解

氣珠簋處實別錄曰薏苡仁生真定平澤及田野八月郡近道采  
飯梗采穗有餈珠處實多采根無時弘景曰真定縣屬常山郡  
及尖芭珍穀其薏五六年春乾於真重擾之出交趾者子最大彼士呼爲珍  
磨芽曰是實子月生苗援在交趾還爲種人讒以爲珍  
麪食也薏苡曰凡使勿用染漢使大無味九月故人花所  
亦可同食人多種之小兒實青白色形如貫珠子而稍長故人呼十人花  
五六月抽莖開紅白花也其米結實有二種根自生葉人呼十人花  
圓而糯米可黏人齒呼十人花也其米結實有二種根自生葉人呼十人花  
而殼米厚可堅作硬粥牙初也爲月呼作在氣者珍

者卽菩提子也其米少卽梗穀也但可穿作念經數珠故人亦呼爲念珠云其根並白色大如匙柄糾結而味甘也

薏苡仁

數

曰凡使每一兩以糯米一兩同炒熟去糯米用亦有更以鹽湯煮過者

洗平

主治筋急拘攣不可屈伸

久風溼痹下氣久服輕身益氣

本經除筋骨中邪氣

不仁利腸胃消水腫令人能食

別錄炊飯作麵食主

不饑溫氣養飲止消渴殺蛇蟲

藏器錄治肺痿肺氣積

膿血欬嗽涕唾上氣煎服破毒腫

甄權去乾溼腳氣

大驗

孟詵

健脾益胃補肺清熱去風勝溼炊飯食治

# 冷氣煎飲利小便熱淋

時珍

## 發明

宗奭曰：薏苡仁本經云：微寒，主筋急拘攀。

攀急不伸，此是因熱而拘攀也。故可用薏苡若短，故拘攀緩急，受溼則筋急者不可更用。蓋受寒使人筋急緩受溼，則又引長無力也。此藥力勢和緩，凡用於堅強縮，因於短促，若受溼則弛弛，則筋縮急。凡用於溼，未嘗不挾熱，三者皆因於溼，然外溼非內寒，因人之體，久燒炙並辛香，皆致溼之因也。時珍曰：薏苡甘溼，能勝水除溼，故泄痢本補其母，故扶脾抑肝之義。又後漢書語云：遲馬脈用攀故。

援在交趾嘗餌薏苡實云能輕身省慾以勝瘴氣也又張師正倦游錄云辛稼軒忽患疝疾重墜大薏服數服卽消程沙隨病此稼軒授之亦效本草之藥乃上品養心藥故此有功頌曰薏苡仁心肺並多用之故范汪治肺癰張仲景治風溼胸痹生方治肺損咯血以熟豬肺切蘸薏苡補肺引經也趙君猷曰有效言屢用薏苡仁末空心食之薏苡仁飯乃佳或有方法

附方

舊五  
新九

薏苡仁飯

治冷氣用薏苡仁春熟炊爲飯食氣味欲如麥飯乃佳或

羹粥

亦好

薏苡仁粥

治久風溼痹補正氣利腸胃消水腫除胸中邪氣治筋脈

拘攣

廣濟方

薏苡仁爲末同梗米

日食之良

風溼身疼

景麻黃杏仁甘草薏苡仁

各一兩

以水四升煮取二升分再服

甘草薏苡仁

要畧

# 水腫喘急

用郁李仁二兩研以水瀝汁煮薏苡仁飯日二食之

獨行方

# 沙石熱

## 淋

痛不可忍用玉穉卽薏苡仁也

子葉根皆可用

## 消渴飲水

薏苡仁煮粥食之并煮粥飲

## 周痹緩急

偏者薏苡仁十五兩大附

子十枚炮爲末每服方寸七日三○

張仲景方肺痿飲

## 肺癰欬唾

心胸甲錯者以滄苦酒兩杵被水三升

煎一升酒少許

梅師服之

## 肺癰欬唾

心胸甲錯者以滄苦酒兩杵被水三升

服肺有血當吐

范汪方肺癰咯血

## 肺癰咯血

薏苡仁三合濃微溫頓

分二服

生喉卒癰腫一枚良

## 喉卒癰腫

吞薏苡仁二兩外臺

之僧坦方

孕中有癰之姚生

## 孕中有癰

薏苡仁煮汁吞頻頻飲

## 牙齒齧

一枚吞

痛不拘大人小兒

永類方

薏苡仁研末點服

根氣味甘微寒無毒主治下三蟲經煮汁糜食甚

香去蛇蟲大效弘景煮服墮胎藏器治卒心腹煩滿及

胸脇痛者剉煮濃汁服三升乃定蘇頌○出肘后方擣汁

和酒服治黃疸有效時珍

附方

舊二新二

黃疸如金

薏苡根煎湯頻服

蛔蟲心痛

薏苡根一兩水煎一斤切

水七升煮盡也

蟲死盡出也

煮三升服之

經水不通

薏苡根一兩水煎服之不過數服效

上方海

牙齒風痛

薏苡根四兩水煮含漱冷卽易之

延年秘錄

葉主治

作飲氣香益中空膈

蘇頌

暑月煎飲暖胃益

氣血初生小兒浴之無病

時珍○出瑣碎錄

# 穀子粟

宋開寶

## 釋名米囊子

開寶

## 御米

同上

## 象穀

時珍曰其實狀如穀子其米如粟乃象乎

穀而可以供御故有諸名

## 集解

藏器曰嵩陽子云穀粟花有四葉紅白色上處處有淺紅暈子其囊形如鴉頭箭中有細米須氣其實形如餅子有米粒極細圃人隔年糞地九月布子涉冬至春始生苗極繁茂不爾則不生生者一穀俟餅焦黃乃采之宗奭曰其花亦有千葉亦不茂俟餅焦黃乃采之宗奭曰其花亦有千葉曰穀粟秋種冬生嫩苗作蔬食甚佳葉如白苣三葉如白苣四月抽薹結青苞花開則苞脫花凡四瓣大如仰蓋蓋在花中鬚藥裹之花開三日卽謝而穀在莖頭長一二寸大如馬兜鈴上有蓋下有蒂宛然如酒罷中有白米極細可煮粥和飯食水研瀘漿同

綠豆粉作腐食尤佳亦可取油其殼入藥甚多而  
爲麗春花或謂是罌粟別種蓋亦不然其花變態  
本自不常有白者紅者紫者粉紅者杏黃者半紅  
者半紫者半白者豔麗可愛故曰麗春又曰賽牡丹  
曰錦被花詳見游默齋花譜

### 米氣味甘平無毒

宗奭曰性寒多食利二便動膀胱氣

### 主治丹石發

動不下飲食和竹瀝煮作粥食極美

開寶寇曰服石人研此水

煑加蜜作湯飲甚宜行風氣逐邪熱治反胃胸中痰滯

頌治

### 瀉痢潤燥

時珍

### 附方

舊一

### 反胃吐食

參瞿粟粥用白瞿粟米三合人

切研三物以水二升三合煮取六合入生薑汁及  
鹽花少許和勻分服不計早晚亦不妨別服湯丸

圖泄痢赤白

瞿粟子炒瞿粟殼炙等分爲末  
蜜丸梧子大每服三十丸米飲下

有<sub>人</sub>經驗

百一選方

殼脩治

時珍曰凡用以水洗潤去蒂及筋膜取外  
薄皮陰乾細切以米醋拌炒入藥亦有蜜

炒蜜  
炙者

氣味酸濤微寒無毒

時珍曰得醋烏梅橘皮良

主治止瀉痢固

脫肛治遺精久嗽斂肺潤腸止心腹筋骨諸痛

發明

果曰收斂固氣能入腎故治骨病尤宜震

瘍者用之止澀其治病之功雖急殺人如劍宜  
戒之又曰治嗽多用粟殼不必疑但要先去病  
此乃收后藥也治瘍亦同凡瘍須先散邪行滯  
可遽投粟殼龍骨之藥以閉塞腸胃邪氣得補  
而豈根深泄亨

而濕故初病不可用之泄瀉下痢既久則氣散不收而肺脹無積痛當止濕者固矣然下痢日久腹中神但性緊濕多令嘔逆人畏而不敢服若用醋則有輔佐耳又王碩易簡方云粟殼治痢如治制加以烏梅則用得法矣或同四君子藥尤不致閉胃妨食而獲奇功也

### 附方

新

### 八熱痢便血

粟殼

醋炙一兩

陳皮一兩

大黃一錢

烏梅湯

普濟方

### 久痢不止

瞿粟殼

水一盞

醋炙爲末

蜜丸

彈子大

每服一

方

粟殼十兩去膜分作三分一分醋炒一分蜜炒一錢米飲下

厚朴薑制各小兒下

冷忌生冷

粟殼十兩爲細末每散用粟殼蜜炙下

米飲下

○集要百中散用蜜丸

芡子大每服三十丸米湯下

○兩爲細末每服一錢

**痢**

神仙救苦散治小兒赤白痢下日夜百行不止  
用瞿粟殼半兩醋炒爲末再以銅器炒過檳榔

半兩

炒赤研末各收每用等分

赤痢蜜湯

全幻心鑑

**止**

瞿粟殼一枚去蒂膜

烏梅肉大棗肉

經驗水

一盞煎七分溫服

久嗽不止

穀氣素壯人用之卽效

粟殼去筋蜜

危氏方

久嗽虛嗽

賈同

知百勞散治

欬多年自汗用瞿粟殼二兩半去

蒂膜醋炒取一兩烏梅半兩焙爲末每服二錢臥

時白湯下

宣明方

**嫩苗氣味**

甘平無毒主治作蔬食除熱潤燥開胃

**厚腸**

時珍

**阿芙蓉**

目綱

# 釋名 阿片

(時珍曰)俗作鴉片。名義未詳。或云阿方音稱我。也以其花色似芙蓉而得此名。

## 集解

(時珍)

曰阿芙蓉。前代罕聞。近方有使用者。云是

針刺其外面青皮勿損。裏面硬皮或三五處次早

津出以竹刀刮收。入瓮器陰乾用之。故今市者猶

有苞片在內。王氏

醫林集要言。是天方國種紅瞿粟花。不令水淹頭七八月花謝後刺青皮取之者

案此花五月實枯安得七八月

後尚有青皮或方土不同乎

氣味酸澀溫微毒。主治瀉痢脫肛不止能澀丈夫

## 精氣

(時珍)

## 發明

(時珍)

曰俗人房中術用之。京師售一粒金丹云通治百病皆方伎家之術耳

## 附方

(新)

久痢(阿芙蓉小豆許空心溫水化下日服忌葱蒜漿水若渴飲蜜水解之)

要集

# 赤白痢下

鴉片木香黃連白朮各一分研末  
丸小豆大壯者一分老幼半分空心飯

米飲

下忌醋物生冷油膩茶酒

麵無不止者口渴

畧飲米湯○一方

罌粟花未開時外有兩片青葉

錢包

真神效之花開卽落收取爲末

每米飲服一米飯搗作三丸未

再進阿芙蓉一粒

不可多服忌醋令人腸斷風癱熱酒

一丸每服一粒金丹

口活淋

湯下偏頭羌活

川芎湯下百節痛獨活湯下正頭風

薑黃阿酒

湯下瘧疾桃柳枝

湯下眩運防風湯下陰毒

木黃連膠

湯下勞嗽欬

湯下久嗽乾豆羌下效

下兒下腸痛

痢氣木香連

湯下熱痛厄子湯下噤口痢白朮湯下諸氣

慢脾食川香連

湯下下熱

白朮湯下人血崩五靈脂湯下小酒

糞

阿芙蓉

雲林砂仁湯

醫鑑

本草綱目穀部第二十三卷終

本草綱目穀部目錄第二十四卷

穀之三

菽豆類十四種

大豆

本經

大豆黃卷

本經

黃大豆

食鑑

赤小豆

本經

腐婢

本經

綠豆

開寶

白豆

嘉祐

稽豆

拾遺

豌豆

拾遺

蠶豆

食物

豇豆

綱目

蘂豆

別錄

刀豆

綱目

黎豆

拾遺

卽  
狸豆

右附方舊五十一新一百



本草綱目穀部第二十四卷

穀之三 菽豆類一十四種

大豆

本經中品

校正

禹錫曰原附大豆黃卷下今分出

釋名

俗作菽時珍曰豆未皆莢穀之總稱也篆文未象莢生附莖下垂之形豆象子在莢

中豆之形廣雅云大菽也小豆荅也

角曰莢葉曰藿莖曰萁

集解

別錄曰大豆生太山平澤九月采之頌曰今處處種之黑白二種入藥用黑者緊小者爲雄用之尤佳

宗奭曰大豆有綠褐黑三種有大小兩類大者出江浙湖南湖北小者生他處入藥力更佳又可礮爲腐食時珍曰大豆有黑白黃褐青

斑數色黑者名烏豆可入藥及充食作豉黃者可作腐榨油造醬餘但可作腐及炒食而已皆以夏至前後下種苗高三四尺葉團有尖秋開小白花

成叢結莢長才餘經霜乃枯按呂氏春秋云得時之豆長莖短足其莢二七爲族多枝數節大菽則圓小菽則團先時者必長蔓浮葉疎節小莢不實後時者必短莖疏節本虛不實又犯勝之種植書云夏至種豆不用深耕豆花憎見日則黃爛而根焦矣知歲所宜以囊盛豆子平量埋陰地冬至後十五日發取量之最多者種焉蓋大豆保歲易得可以備凶年小豆不保歲而難得也

## 黑大豆

## 氣味甘平無毒久服令人身重

岐伯曰生溫熟寒藏

器曰大豆生平炒食極熱煮食甚寒作豉極冷造醬及生黃卷則平牛食之溫馬食之冷一體之中用之數變○之才曰惡五參龍膽得前胡烏喙杏仁牡蠣諸膽汁良說曰大豆黃屑忌豬肉小兒以上炒豆豬肉同食必壅氣致死十有八九十歲以上不畏也時珍曰服朮麻子者忌炒豆犯之脹滿致死服厚朴者亦忌之動氣也

主治生研塗癰腫煮汁飲殺鬼毒止痛本經逐水脹

除胃中熱癥傷中淋露下瘀血散五臟結積內寒  
殺烏頭毒炒爲屑主胃中熱除癥去腫止腹脹消

穀別錄

煮食治溫毒水腫唐本調中下氣通關脈制金

石藥毒牛馬溫毒日華

煮汁解礬石砒石甘遂天雄

附子射罔巴豆芫青斑蝥百藥之毒及蠱毒入藥

治下痢臍痛衝酒治風瘡及陰毒腹痛半膽貯之

止消渴時珍

炒黑熱投酒中飲之治風癆癰緩口噤

產後頭風食罷生吞半兩去心胸煩熱熱風恍惚

明目鎮心溫補久服好顏色變白不老煮食性寒  
下熱氣腫壓丹石煩熱消腫藏器主中風腳弱產後

諸疾同甘草煮湯飲去一切熱毒氣治風毒腳氣

煮食治心痛筋攀膝痛脹滿同桑柴灰煮食下水

鼓腹脹和飯搗塗一切毒腫療男女陰腫以絲

裹納之孟詵治腎病利水下氣制諸風熱活血解諸

毒時珍

發明

頌

曰仙方

脩治末

服之可以辟穀

度饑然多

食令人體重久則如故也甄權曰每食後磨

拭吞三十粒令人長生初服時似身重一年以後

便覺身輕又益陽道也穎曰陶華以黑豆入鹽煮

可治久病

人體虛寒者勿服

人體虛寒者勿服

人體虛寒者勿服

人體虛寒者勿服

人體虛寒者勿服

人體虛寒者勿服

人體虛寒者勿服

人體虛寒者勿服

人體虛寒者勿服

常時食之云能補腎蓋豆乃腎之穀

其形

又黑色通腎引之以鹽所以妙也

時珍曰按養老

書云李守愚每晨水吞黑豆二七枚謂之五臟

到老不衰夫豆有五色各治五臟惟黑豆屬水

寒爲腎之穀入腎功多故能治水消脹下氣制風

熱而活血解毒所謂同氣相求也又按古方稱大

甘草其驗乃奇如此之事不可不知

## 附 方

舊三十二新三十四

## 服 大 豆

令人長肌膚益顏色填骨髓加氣力補虛能食

不過兩劑

大豆五升如作醬法取黃搗末以豬肪

煉膏和丸梧子大每服五十丸至百丸溫酒下

驗秘方也肥人不

救荒濟饑

博物志云左慈荒年神肪食

可服之延年秘錄

一切魚肉菜蔬不得復經口渴卽飲冷水頓調

困十數日後體力壯健不復思食也○黃山谷初

訖一切魚肉菜蔬不得復經口渴卽飲冷水頓調

黑豆一升煮熟去眾曬乾每日空谷心救小服勻年神肪食

荒法黑豆貫眾各一升煮熟去眾曬乾每日空谷心救小服勻年神肪食

啖其十臣法則書啖  
斗其十臣法則書啖  
午作斗其十臣法則書啖  
時圍浸方餘遇也懷云五  
太昔金辟七  
晉立穀粒食  
之食方未見於石葉皆有味可飽  
惠帝永子炊骸爲水旱蟲荒國也。  
鵠易子炊骸爲水旱蟲荒國也。  
大更白晉立穀粒食  
山隱帝永子炊骸爲水旱蟲荒國也。  
豆不食五食  
山惠帝永子炊骸爲水旱蟲荒國也。  
不食五食  
太頌取潤紅永百得乾拳宿大更白晉立穀粒食  
平教下臟白不日七爲大亦豆不食五食  
興民藥腑永饑不日末入蒸五斗別民永甯傳  
國用如若不也饑不乾餶三斗別民永甯傳  
寺之金要憔不第饑服內遍淘物若濟年黃門父母者  
○有色重悴問四第之蒸令淨蒸不饑辟穀門仙侍郎者  
又驗任喫口老頓二以從口開三遍斯穀門仙侍郎者  
方序與物渴少得頓飽爲至取去臣仙侍郎者  
用其諸用卽但二得爲至取去臣仙侍郎者  
黑首物葵研依于四度子仁皮一方劉景不可代王  
豆尾並子大法四十不時各皮一方劉景不可代王  
五勒無三麻服百九得止搗用家臣先知有氏  
斗石所合子食日日食寅爲大甘家  
淘於損研湯令不不一時未麻受大先知有氏  
淨漢前末飲人饑饑切出和子刑小表知此甚農  
蒸陽煎之強更第物餶搗三戮七奏此甚農

三遍曬乾去皮爲末秋麻子三升浸去皮曬研  
米三斗作粥和搗爲劑如拳大入甑中蒸一宿取  
再曬爲末用紅小棗五斗煮去皮核和爲劑如拳大  
不臟腑也脂麻亦可但

### 炒豆紫湯

破血去風除氣防湯

頌曰

古方有紫湯

水便滋潤

度如渴飲麻子

水

便

宿

取

熱產後兩日尤宜服之用烏豆五升清酒一斗炒

豆

火

令烟絕投酒中待酒紫赤色去豆量性服之可日

豆

火

雞夜三盞神驗中風口噤加

豆

火

屎白二升和炒投之

豆

火

煩熱覺有餘血水氣或中風困篤或背強口噤或但

豆

火

手足頑痹頭旋眼眩此皆虛熱中風也用大豆三

豆

火

升熬熟至微烟出入瓶中以酒五升沃之經一日

豆

火

以上服酒一升溫覆令少汗出身潤卽愈口噤者

豆

火

新加獨活半斤微微搥破同沃之產後宜常服以防

豆

火

消風氣又中風口喝卽上方日服

豆

火

密封七方

豆

火

頭風頭痛卽上

豆

火

本草綱目 卷二十九 大豆

日溫服

# 破傷中風

口噤

千金方

用大豆一升

熬去

腥氣勿使太熟

杵末蒸令氣遍

取下

飴以酒一升

淋之溫服一升

取汗傅膏瘡上

卽愈。

○經驗方

用黑豆四十枚

硃砂二十文

同研

蓋未以酒半

調服之

頭項強硬

不得顧視

大豆一升

蒸得

風疾

四肢攀縮

不能行

醋二升

傾入瓶中

鋪於地上

設席豆上

令病

人臥之仍重

蓋五六層衣

豆冷漸漸卻

衣仍令一

人於被內引挽

攀急處更蒸

豆再作併飲

荆懸湯

如此三日

崔氏纂要

卽

風入臟中

治新久

腫風入臟中

以大豆一斗水五斗

煮取一斗

二升

淘淨去滓

入美酒

斗半煎

千金翼

卒風不語

大

豆煮

恍惚

取九升

大豆半升

淘淨

以水二升

卒風不語

大

豆煮

如飴

取七合

食後服

之

心鏡

千金翼

卒風不語

大

豆煮

汁

如

飴

取

并飲

後

方

喉痹不語

同上

法

卒然失音

用生

四大豆一升

青竹算子

四十九枚長

熱毒攻眼

赤臉浮

寸闊一分水

煮熟日夜二服

瘥

湯中蒸

大

豆

七

用黑豆一升分

作十袋沸

湯中蒸

普濟方

卒然中惡

大

豆

過更互熨之三遍

則愈

危篤者用黑豆炒

乾投酒熱飲或酒灌

枚雞子黃一箇酒半

千金

陰毒傷寒

危篤者用黑豆炒

升和勻頓服

居家必用

腸痛如打

大豆半升熬焦入酒灌

爲度之吐則復飲汗出

則復飲汗出

升煮沸飲取醉

肘後

腸痛卒痛

大豆炒二升酒三升

升頓服

肘后

卒然腰痛

大豆六升

張文仲所處方也

延年秘錄

冷卽易乃

腳氣衝心

煩悶

人以大豆一升水

汁煎未定再服

廣利方

濃煮身

面浮腫

千金用烏豆一升水

五升煮汁三升入酒

五升更煮三升分溫三服

升

水

不

識

末

每服再合王璆百

選方用烏豆

煮至皮乾爲

末

吳內翰女孫

立效新久水腫

不

忽發腫凸

吳米飲下建炎初

吳內翰女孫

立效新久水腫

不

識

末

瘡再合王璆百

選方用烏豆

煮至皮乾爲

末

吳內翰女孫

立效新久水腫

不

每服再合王璆百

選方用烏豆

煮至皮乾爲

末

吳內翰女孫

立效新久水腫

不

每服再合王璆百

選方用烏豆

煮至皮乾爲

末

吳內翰女孫

立效新久水腫

不

大豆一斗清水上豆入薄酒八升再煎取八升服之再三服水當從小便中出范

汪方煎一升已來頓夏秋之交露坐夜久腹中痞如群石在腹用大豆半升生薑八分水三升

腹中痞硬方每服一升經驗方霍亂脹痛方寸七研水服普濟水痢不

止大豆一升炒白朮半兩爲末每服三錢米飲下指南方赤痢臍痛黑豆茱萸子二

件搓摩吞嚥之去豆飲酒一切下血雄黑豆緊小者以

神效活人之心統去皮爲末煉豬脂和丸梧子大每服阜角湯微浸炒熟

三十丸陳米飲下華陀中藏經小兒沙淋黑豆

一百二十箇生甘草一寸新水煮熱全幼心鑑普濟妙方消

人滑石末乘熱飲之良全幼心鑑普濟妙方消

者黑豆炒天花粉等分爲末糊丸梧子大每服

黑豆湯下七十丸日二名救活丸普濟妙方消

# 渴飲水

烏豆置牛膽中陰乾百晝夜不眠

以新布  
日吞盡卽瘥

附後方

火灸熨

目并蒸大

豆更番囊盛

附後方

冷卽愈

易終夜常枕之卽愈

合炒熟炙甘草一錢水一盞煎汁時時飲之

夷堅志云靖康二年春京師大疫有異人書此方於壁

閒用之立驗也

乳石發熱烏豆二升水九升銅器煮五升

汁熬稠一升飲之外臺秘要

# 解譽砒毒

大豆煮汁飲之良

酒食諸毒大豆一升煮汁

# 解諸魚毒

大豆煮汁飲之衛生方

解巴豆毒下利不止大豆一升

飲之

惡刺瘡痛卽瘥

大豆煮汁潰之千金方

飲之

斑子母秘錄打頭青腫

豆黃末傅之千金方

升在腹氣短

大升頓服劇者不過三作

大豆五升水一千金方

煮

汁飲之佳

痘瘡溼爛

黑大豆研末傅之

小兒頭瘡

黑豆炒存

性研水調

濟方傳身面疣目

七月七日以大豆拭疣上三過使本人種豆於南向

屋東頭第二溜中豆生葉以

沃殺卽愈外臺秘要染髮令烏

豆去豆煎三十粒牛糞火內燒令烟盡研

稠染之

千金牙齒不生

不拘大人小兒年多者用黑豆

少許先以鍼挑破血出以少許

醋煮黑豆去皮研

入麝香少許先以鍼挑破血出以少許

揩之不得見風忌酸鹹物

經驗方

用前紫湯

牙齒疼痛

黑豆

煮酒頻頻漱之

月經不斷

用前紫湯

妊娠腰

良周密治然齋抄

大豆一升酒三升煮七

子死腹中

月數未足母

欲閼絕者用

痛合

空心飲之

心鏡

欲閼絕者用

大豆三升

以醋煮濃

升煮一升半分

升豆半升醇酒三

汁頓服立出

產乳胞衣不下

升煮一升半分

升豆半升醇酒三

服書辟禳時氣

以新布盛大豆一斗納井中一

菜

每服七粒佳

領要

**中蛇蠱**

蛇毒入茱萸中食之令人得病名

**身如蟲**

**行**

大豆水漬絞漿旦旦洗之或

**小兒丹毒**

濃煮大豆汁塗

之甚良

風疽瘡疥

千金方

豆一升在內以馬屎糠火燒薰

以器兩頭取汁

千金方

**肝虛目暗**

迎風下淚用臘月牛膽盛黑豆

懸風龍

木論小兒胎熱

黑豆二錢甘草一錢入燈心七寸

全幼心鑑天

**蛇頭指**

痛臭甚者黑

豆生研末濟急方

**大豆皮**

主治生用療痘瘡目醫嚼爛傅小兒尿灰

**瘡珍時**

豆葉主治搗傅蛇咬頻易卽瘥

時珍○廣利方出

發明

時珍曰接抱朴子內篇云相國張文蔚莊內有鼠狼穴養四子爲蛇所吞鼠狼雌雄情切乃於穴外坋土壅穴俟蛇出頭度其回轉不便當

腰咬斷而劈腹銜出

四子尙有氣置於穴外銜豆

葉嚼

而傳之皆活後人以

豆葉治蛇咬蓋本於此

附方

新

止渴急方

大豆苗嫩者三十

莖塗酥炙

五十

大豆葉一

把水二升

煎

聖濟總錄

小便血淋

大豆葉二升

頓服

聖惠方四升

花主治

主目盲醫膜

時珍

大豆黃卷

本經中品

釋名豆羹

弘景曰黑大豆爲羹牙生五寸長便乾

之名爲黃卷用之熬過服食所須

時珍

曰一法王癸日以非華水浸  
大豆候生芽取皮陰乾用

氣味甘平無毒

普曰得前胡杏子牡蠣烏喙天雄鼠屎共蜜和良惡海藻龍膽

主治溼痹筋攣膝痛

本經五臟不足胃氣結積益氣

止痛去黑肝潤肌膚皮毛

別錄破婦人惡血孟詭頌

摹婦藥中多用之

宜腎思邈除胃中積熱消水病脹滿

時珍

附方新四大豆羹散

治周痹邪在血脉之中水痹不痛上下周身故名此藥主五臟

留滯胃中結聚益氣出毒潤皮毛補腎氣用大豆

粟一斤炒香爲末每服半錢溫酒調下日三服

宣明方頭風溼痹筋攣膝痛胃中積熱大便結澀黃

卷散用大豆黃卷炒一升酥半兩

爲末食前溫水服一二服

普濟方水病腫滿喘急大小便澀大黃

炒等分爲細末  
錢平明以利爲度

葱橘皮湯服二  
度聖濟總錄

小兒撮口初生豆

芽研爛

絞汁和乳灌少  
許良普濟方

## 黃大豆食鑑

### 集解

時珍曰大豆有黑青黃白斑數色者惟黑入藥而黃白豆炒食作腐造醬笮油盛爲時用

不可不知別其性味也周憲王曰黃豆苗高一二尺葉似黑大豆葉而大結角比黑豆角稍肥大其

莢葉嫩時可食甘美

### 氣味

甘溫無毒

時珍曰生溫炒熱微毒多食壅氣生痰動嗽令人身重發面黃瘡疥

主治寬中下氣利大腸消水腫腫毒原研末熟水

### 和塗痘後癰

時珍

附方

新

痘後生瘡

黃豆燒黑研  
末香油調塗

豆油

氣味辛甘熱

微毒

主治

燒灰入點

瘻去惡肉藥

時珍

稽

主治

燒灰入點

瘻去惡肉藥

時珍

赤小豆

本經中品

校正

自大豆

分出

釋名

赤豆

恭

紅豆

俗

荅

廣雅

葉名藿

時珍曰案詩云

菽麥

此卽八穀也

董仲舒註云

菽是大豆

有兩種

王禎云今之

赤豆白豆綠豆

黍稷稻粱禾麻

豆

入藥用

赤小豆者也

集解

頌曰赤小豆今江淮閒多種之

宗奭曰關西

河洛多食之

時珍曰此豆以緊小而赤

色者入藥其稍大而鮮紅淡紅色者並不治病

俱于夏至後下種苗科高尺許枝葉俱豇豆葉微

圓嶠而小至秋開花似豇豆花而小淡銀褐色有  
腐氣結莢長二三寸比綠豆莢稍大皮色微白帶  
紅三青二黃時卽收之可煮可  
炒可作粥飯餛飩餡並良也

**氣味**甘酸平無毒

思邈曰甘鹹冷合魚鮓食成消渴作醬同飯食成口瘡藏器曰

驥食足輕人食身重

**主治**下水腫排癰腫膿血

本經療寒熱熱中消渴止

洩痢利小便下腹脹滿吐逆卒澼

別錄治熱毒散惡

血除煩滿通氣健脾胃令人美食擣末同雞子白

塗一切熱毒癰腫煮汁洗小兒黃爛瘡不過三度

權縮氣行風堅筋骨抽肌肉久食瘦人良散氣去

關節煩熱令人心孔開暴痢後氣滿不能食者煮食一頓卽愈和鯉魚煮食甚治腳氣訛解小麥熱

毒煮汁解酒病解衣黏綴

日華

辟瘟疫治產難下胞

衣通乳汁和鯉魚鱈魚鯽魚黃雌雞煮食並能利水消腫

時珍

發明

弘景曰小豆逐津液利小便久服令人肌膚枯燥頌曰水氣腳氣最爲急用有人患腳氣

以袋盛此豆朝夕踐踏展轉之久久遂愈好古曰治水者惟知治水而不知補胃則失之壅滯赤小

豆消水通氣而健脾胃乃其藥也藏器曰赤小豆

和桑根白皮煮食去溼氣痹腫和通草煮食則下氣無限名脫氣丸時珍曰赤小豆小而色赤心之

穀也其性下行通乎小腸能入陰分治有形之病之

解故行津液利小便消腫除腫止泄而治下痢腸澼  
所產難皆病之有形者久服則降令太過津血滲洩  
所以令人肌瘦身重也其吹鼻瓜蒂散及辟瘟疫  
才用子以冬至死爲疫鬼而畏赤豆故子共工氏有不  
方豆粥厭之亦取其通氣除溼散熱耳或言共工氏有不  
此得而痊謾赤豆一升煮粥食之當夜遂行服藥不效偶  
方云予婦食素產后七日乳脈不行服藥不效偶  
黏赤家某醫以藥愈中貴人任承亮后患惡瘡近十粒在東宮時患  
乾腫則不拘用此活善治之甚驗承亮曰得赤豆也近死尚書郎傳  
揭善治惡但口根水如願勿復言非予苦脇疽爲末草載人良  
神即塗此藥治有無不發一切瘻疽如耶既至傳永之  
佳但瘻疽其瘻爛醫謝五之

# 附方

舊十八  
新十九

## 水氣腫脹

頌曰用赤小豆五合大蒜一顆生薑五錢商陸根一條並碎破同水煮爛去藥空心食豆旋旋啜汁令

盡腫立消也○韋苗獨行方治水腫從腳起入腹則殺人赤小豆一斗煮極爛取汁五升溫漬足膝

若已入腹但食小豆勿雜食亦愈○梅師治水腫以東行花桑枝燒灰一升淋

汁煮赤小豆一升以代飯良

## 水蠱腹大

動搖有聲

用赤小豆三升白茅根一握

## 辟禳瘟疫

五行書云正月朔旦

及十五日以赤小豆二七枚麻子七枚投井中辟

## 瘧疫

正月朔旦

瘟疫甚效○又正月七日新布囊盛赤小豆置井中辟

## 辟厭疾病

正月元旦面

吞中三日取出男吞七粒女

## 辟厭疾病

東以薑水吞

吞赤小豆三七枚一年無諸疾○又七月立秋日面西以井華水吞赤小豆七枚一秋不犯痢疾

## 寒狐惑

張仲景曰狐惑病脈數無熱微煩默默但

欲臥汗出初得三四日目赤如鳩七八日傷

## 寒狐惑

本草綱目卷之四

## 寒狐惑

赤小豆

目四眞黃黑若能食者膿已成也赤豆當歸散  
之赤小豆三升水浸令芽出當歸三兩爲末漿水

服方寸七日

金匱要略

下部卒痛

如鳥喙之狀用小豆大

更互坐之卽

水穀痢疾

小豆一合鎔蠟三兩

頓服取效必效方熱毒

下血

或因食熱物發動

赤小豆

腸痔下血小豆三升苦酒

爲末酒服一錢日三服

肘后方

梅師方

舌上出血孔小豆二合慢炒爲末

豆一升杵碎

水三升熱淋血淋

不拘男女用赤小豆二合

豆三升熱調慢炒爲末

和絞汁服

肘后方

熱淋血淋

不拘男女用赤小豆二合慢炒爲末

煙葱一莖擂酒熱調

重舌齧口

赤小豆

塗之普濟方和小豆未醋和

二錢服修真秘旨

重舌齧口

赤小豆

塗之普濟方和小豆未醋和

兒不語四五歲不語者

赤小豆

千金

牙齒疼痛紅豆未擦牙吐

涎及吹鼻中一方入銅青少許

家寶方

中酒嘔逆

赤小豆煮汁徐

徐飲之

食鑑本草

頻致墮胎

赤小豆末酒服方寸

千金方

妊娠行

經

上方同

婦人難產

產寶

用赤小豆生吞七枚佳。

豆一升以水九升煮取汁入炙過黃明膠

兩同煎少時

一服五合不過三四服卽產

集驗治難產日久氣乏用赤小

不下

用赤小豆男七枚女二七枚

救急方

產後目閉

赤小

心悶

豆一升以水九升煮取汁入炙過黃明膠

水頓服佳

肘后方

產後悶滿

不能食用小豆

二七枚燒研冷

豆一升以水九升煮取汁入炙過黃明膠

研溫服以澤

千金方

乳汁不通

飲之

產書

婦人吹嫋

赤小

研溫服以澤

千金方

乳汁不通

飲之

產書

婦人吹嫋

赤小

初作

赤小豆末水和塗之

研有

效

小品方

石癰諸癰

赤小

苦酒中五宿炒研以苦酒

加桔梗根等分

范汪方

痘後癰毒

赤小

子豆末雞子豆

納豆

白調塗赤小豆末和蜜塗之一夜  
傅之即消或加芙蓉葉末尤妙

### 如火

赤小豆末和雞子白時時塗

即消

小品方

### 風癩癰瘍

赤豆荊小

即消或加芙蓉葉末尤妙

丹毒

芥穗等分爲末

逐手即消

每服

千金方寸

### 金瘡煩瀉

赤小豆一升苦酒浸一日熬燥再浸滿三日令

升燒研水

升燒研水

升燒研水

升燒研水

小兒

雞子清調塗之

黑色爲末

每服

千金方寸

### 六畜肉毒

赤小豆一升燒研水

升燒研水

升燒研水

升燒研水

升燒研水

小兒

金

方干

### 葉主治

去煩熱止小便數

別錄

華食明目

日華

### 發明

黃時珍曰

小豆利小便而藿止小便與麻

### 附方

舊新

一

### 小便頻數

小豆葉一斤入豉汁中

煮和作羹食之

心鏡中

小兒

### 遺尿

小豆葉搗汁

干金

**芽主治妊娠數月經水時來名曰漏胎或因房室**

**名曰傷胎用此爲末溫酒服方寸匕日三得效乃**

**止時珍。**

**腐婢**

本經下品

**集解**

別錄曰腐婢生漢中小豆花也七月采之陰乾四十日弘景曰花與實異用故不同品方

家不用未解何故有腐婢之名本經不言是小豆花別錄乃云未審是否今海邊有小樹狀如巵莖葉多曲氣似腐臭土人呼爲腐婢療瘻有效以子酒浸皮服療心腹疾此當是真此條應入木部也

恭曰腐婢相承以爲葛花葛花消酒大勝而小豆全無此效當以葛花爲眞禹錫曰按別本云小豆病相合陶蘇二說並非甄權曰腐婢卽赤小豆豆花亦有腐氣與葛花同服飲酒不醉與本經治

也頌曰海邊小樹葛花赤小豆花三物皆有腐婢之名同物異也  
宗奭曰腐婢既在穀部豆花爲便治熱中下氣止渴與腐婢主療相同其爲豆花無疑但小豆有數種甄氏藥性論獨指爲赤小豆今姑從之

氣味

辛平無毒

主治瘧瘧寒熱邪氣洩痢陰不起

止消渴病酒頭痛

本經。心鏡云上證用花同豉汁五味煮羹食之

消酒

毒明目下水氣

治小兒丹毒熱核散氣滿不能食

煮一頓食之

藥性治熱中積熱痔瘻下血

時珍。宣明葛花丸

中用

附方

二飲酒不醉

小豆花葉陰乾百日爲末水服方寸匕或加葛花等分千金

疔瘡惡腫小豆花未傳  
之普濟方

綠豆宋開

釋名

時珍曰綠以色名也

集解

舊本作名植豆圓小者佳粉作餌炙食之良大者

有官綠油綠主療則一時珍曰綠豆處處種之三月下種苗高尺許葉小而有毛至秋開小花莢三如赤豆莢粒粗而色鮮者爲官綠皮薄而粉少早種者呼爲多粒莢小而色深者爲油綠皮厚而粉多遲種呼爲拔綠一拔而已北人用摘粒莢甚廣可頻摘也遲種呼爲拔綠一拔而已北人用摘粒莢水滌取粉可以作豆粥豆飯豆酒燉食炒食磨而爲麵糊索爲食中要物以澄之真濟世之良穀也

**氣味**甘寒無毒

藏器曰用之宜連皮去皮則令人

子

殼

害人

合

鯉魚

鮮食

少壅氣

蓋皮

寒而肉

平也

○反榧

久則令人肝黃成渴病

主治煮食消腫下氣壓熱

解毒生研絞汁服治丹毒煩熱風疹藥石發動熱

氣奔豚

開寶

治寒熱中止泄痢卒澼利小便脹滿

邈思厚腸胃作枕明目治頭風頭痛除吐逆

華日補益

元氣和調五臟安精神行十二經脈去浮風潤皮

膚宜常食之煮汁止消渴

孟詵

解一切藥草牛馬金

石諸毒原治痘毒利腫脹

時珍

發明

時珍曰

綠豆肉平皮寒解金石砒霜草木一

切諸毒宜連皮生研水服按夷堅志云有人

皮寒解金石砒霜草木一

切諸毒宜連皮生研水服按夷堅志云有人

皮寒解金石砒霜草木一

切諸毒宜連皮生研水服按夷堅志云有人

皮寒解金石砒霜草木一

切諸毒宜連皮生研水服按夷堅志云有人

服附子酒多頭腫如斗唇裂血流急求綠豆黑豆各數合嚼食並煎湯飲之乃解也

## 附方

新

## 扁鵲三豆飲

治天行痘瘡預服此飲疎解熱毒縱出亦少用綠豆赤小豆黑大豆各一升甘草節二兩以水八升煮極熟

任意食豆飲汁七日乃止。一方加黃大豆白大豆名五時時掃塗卽消

## 痘後癰毒

初起以三豆膏治之神效綠豆赤小豆黑大豆等分爲末醋調

豆飲醫學正傳防痘入眼用綠豆七粒令兒自投井中頻視七遍乃還

## 小兒丹腫

綠豆五錢大黃二錢爲末用生薄荷汁入蜜調塗全幼心鑑

止以大麻子水研瀘汁煮綠豆食

橘皮二兩煮豆粥下麻子汁一升空心漸食之併飲其汁甚驗

食普濟方心氣疼痛

綠豆廿一粒胡椒十四粒同研白湯調服卽止

多

養老書

消渴飲水

綠豆二升

豆

食易饑

綠豆黃麥糯米各一升炒熟磨粉

十種水

氣

用綠豆二合半大附子一隻去皮臍切作兩片水三碗煮熟空心臍時食豆次日將附子兩片

綠豆

作四片再以綠豆二合半如前煮食第三日別以

綠豆

附子如前煮食第四日如第二日法煮食水

從小便下腫自消未消再服忌生冷毒物

鹽酒六十日無不效者朱氏集驗方

綠豆粉

氣味甘涼平無毒原曰其膠黏者脾胃虛人不可多食○瑞曰勿

近杏仁則爛

不能作索主治解諸熱益氣解酒食諸毒治發

背癰疽瘡腫及湯火傷灼

吳瑞痘瘡溼爛不結痂癰

者乾撲之良

甯新水調服治霍亂轉筋解諸藥毒

死心頭尙溫者

時解菰菌砒毒汪穎

# 發明

時珍曰

綠豆色綠

豆之屬

木者也

雖同赤豆

或無

於厥

經脈

通於

人體

也

於人體

也

於人體

也

而偏久而  
以偏服壓  
綠於熱枯人  
其色熱解毒  
人之忌但以  
過之力過之  
且消腫治痘  
粉益氣厚腸胃  
豆酒或偏於冷  
豆之咎也

時珍曰綠豆色綠  
豆之屬木者也  
雖同赤豆或無  
於厥經脈通於  
人體也

人體也

於人體也

於人體也

於人體也

於人體也

於人體也

於人體也

於人體也

於人體也

## 附方

二新

十

護心散

又名

疽

疾

一

日

至

三

日

之

宜

連

進

而翹者爲佐寒攻要極以偏久而  
此行湯體服甘能能言綠於熱枯人  
則經亦虛丹草補內臟腑謂其色熱解  
人之忌但以作涼粉益氣厚腸胃  
人之忌但以作涼粉益氣厚腸胃

時珍曰綠豆色綠  
豆之屬木者也  
雖同赤豆或無  
於厥經脈通於  
人體也

人體也

於人體也

十餘服方免變證使毒氣出外服之稍遲毒氣內攻漸生嘔吐或鼻生瘡菌不食卽危矣四五日後研亦宜閒服之用真綠豆粉一兩乳香半兩燈心同研和勻以生甘草濃煎湯調下一錢時時呷之心若瘡孔中真聖藥也瘡氣嘔吐蓋緣豆壓熱下氣消腫解毒乳香消諸癰腫毒服至一兩則香徹李嗣立外科方瘡氣嘔吐綠豆粉三錢乾胭脂研半錢各二兩新汲水調下此葢緣豆壓熱下氣消腫解毒乳香消諸癰腫毒服至一兩則香徹  
止一服立普濟霍亂吐利綠豆粉白糖各二兩新汲水調服卽愈生生編  
燒酒毒綠豆粉盪皮解鴆酒毒綠豆粉三合水調服解砒石  
者用綠豆粉寒水石等分以藍根解諸藥毒已死但  
陳氏夢傳定其效如神此汀人杜劑方  
木皮縛定其效如神此汀人杜劑方  
杜劑方打撲損傷用綠豆粉新汲井水調傅以杉紫子炒研以雞子炒

白和塗之妙

生生編

## 外腎生瘡

綠豆粉蚯蚓糞等分研塗之

暑月癰瘍

綠豆粉

二兩滑石一兩

加蛤粉二兩

簡易方

一切腫毒

初起用綠豆粉

和勻撲

一切腫毒

炒黃黑色

豬牙臙莢一兩

爲末用米醋調

敷之皮破者油調之

邵真人經驗方

豆皮氣味

甘寒無毒

主治解熱毒退目翳

時珍

## 附方

新通神散

治癩瘡目生翳

綠豆皮白菊花穀

餅一枚粟米泔一盞同煮

乾食柿日三服淺

精草等分爲末每用一錢以乾柿

日三服淺

豆莢

主治赤痢經年不愈蒸熟隨意食之良

時珍

濟普

豆花

主治解酒毒

時珍

**豆芽氣味甘平無毒主治解酒毒熱毒利三焦**

時珍曰

**發明**

時珍曰諸豆生芽皆腥勒不堪惟此豆之芽

但受溼熱鬱浥之氣故頗發瘡動氣與綠豆之性稍有不同

**豆葉**

**主治霍亂吐下絞汁和醋少許溫服**

開寶

**白豆**

宋嘉祐

**釋名飯豆**

**集解**

詵曰白豆苗嫩者可作菜食生食亦妙穎曰浙東一種味甚勝用以作醬作腐極佳北方

水白豆相似而不及也原曰白豆卽飯豆也粥飯皆可拌食時珍曰飯豆小豆之白者也亦有土黃飯豆而畧大如綠豆而長四五月種之苗葉似赤小豆可食莢亦似小豆一種莢豆葉如大豆小豆

可作飯作腐  
亦其類也

**氣味甘平無毒**

原曰  
鹹平

**主治補五臟調中助十二經**

**脈**

孟說

**煖腸胃**

日華

**殺鬼氣腎之穀腎病宜食之**

思邈

**葉**

主治

**煮食利五臟下氣**

日華

**稽豆**

拾遺  
音呂

**釋名**

時珍曰稽乃自生稻名也此豆原是野生故名今人亦種之于下地矣

**集解**

藏器曰稽豆生田野小而黑堪作醬爾雅一名驢豆古名蕡豆是也瑞曰稽豆卽黑豆中最細者時珍曰此卽黑小豆也小科細粒霜後乃熟陳氏指爲戎菽誤矣爾雅亦無此文戎菽見菜部竝四月熟

乃胡豆

豐豆

乃鹿豆

見菜部竝四月熟

氣味甘溫無毒主治去賊風風痹婦人產後冷血  
炒令焦黑及熟投酒中漸漸飲之

藏器

豌豆

拾遺

釋名

胡豆

遼志。飲膳正要作回回豆

回回豆即回鶻

故得豌名種出胡

宛宛故得豌名種出胡

麻累

珍

國也畢豆

唐史○崔寔月令作蹕豆

青小豆

千金

青斑豆

別錄

麻累

時珍

曰胡豆

時青色老則斑麻故有胡戎青斑麻累諸名

陳氏所云苗似豆生田野間米

中往往有之然豌豆之粒小故米中

天下並註云即陳氏所云

謂之荳菽

管子山戎出荳菽布之

天下並註云即

張揖廣雅

畢豆也

唐史畢豆出自西戎回鶻地面張揖廣雅

大者

丸藥如胡豆大者

卽青斑豆也孫思邈千金方云青小豆一名胡豆  
一名麻累鄴中記云石虎諱胡改胡豆爲國豆此  
數說皆指豌豆也蓋古昔呼豌豆爲胡豆今則蜀  
人專呼蠶豆爲胡豆而豌豆名胡豆人不知矣又  
鄉人亦呼豌豆大者爲淮豆蓋回鶻音相近也

### 集解

時珍曰豌豆種出西胡今北土甚多八九月

下種苗生柔弱如蔓有鬚葉似蒺藜葉兩兩

對生嫩時可食三四月開小花如蛾形淡紫色結

莢長寸許子圓如藥丸亦似甘草子出胡地者大

如杏仁煮炒皆佳磨粉麪甚白細膩百穀之中最

爲先登又有野豌豆粒小不堪惟苗可茹名翹搖

見菜部

爲先登又有野豌豆粒小不堪惟苗可茹名翹搖

見菜部

### 氣味

甘平無毒

思邈曰

甘鹹溫平

瑞曰多食發氣病

平濁

主治消渴淡

### 煮食之良器

藏器治寒熱熱中除吐逆止泄痢澁下利

思邈曰

甘鹹溫平濁

瑞曰多食發氣病

平濁

主治消渴淡

小便腹脹滿思調營衛益中平氣煮食下乳汁可

作醬用

瑞

煮食殺鬼毒心病解乳石毒發研末塗

癰腫痘瘡作澡豆去黴令人面光澤

時珍

發明

時珍

曰豌豆屬土故其所主病多係脾胃元

中益氣今爲日用之物而唐宋本草見遺可謂缺

典矣千金外臺洗面澡豆方盛用畢豆麵亦取其

耳白膩

附方

新

四聖丹

治小兒痘中有疔或紫黑而大或黑壞而臭或中有黑線此症十死

八十九惟牛都御史得秘傳此方點之最妙用豌豆四十九粒燒存性頭髮灰三分真珠十四粒炒研爲末以油燕脂同杵成膏先以簪挑疔破去惡血以少許點之卽時變紅活色服石毒

**發**

胡豆半升搗研以水八合

外臺

**霍亂吐利**

豌豆三合  
香菜三兩

爲

未水三盞

煎一

分二服

普濟

**蠶豆**

物食

**釋名** 胡豆

時珍曰豆莢狀如老蠶故名王禎農書謂其蠶時始熟故名亦通吳瑞本草以

此爲豌豆誤矣此豆種亦自西胡來雖與豌豆同名同時種而形性迥別太平御覽云張騫使外國

得胡豆種歸指此也今蜀人呼此爲胡豆而豌豆不復名胡豆矣

**集解**

時珍曰蠶豆南土種之蜀中尤多八月下種

冬生嫩苗可茹方莖中空葉狀如匙頭本圓

末尖面綠背白柔厚一枝三葉二月開花如蛾狀

紫白色又如豇豆花結角連綴如大豆頗似蠶

形蜀人收其子以備荒歉

人收其子以備荒歉

人收其子以備荒歉

人收其子以備荒歉

人收其子以備荒歉

人收其子以備荒歉

人收其子以備荒歉

人收其子以備荒歉

人收其子以備荒歉

**氣味甘微辛平無毒主治快胃和臟腑**

汪穎

**發明**

時珍曰蠶豆本草失載萬表積善堂方言一女子誤吞針入腹諸醫不能治一人教令煮出此亦可驗其性之利臟腑也

**苗氣味**

**苦微甘溫主治酒醉不醒油鹽炒熟煮湯**

**灌之效**

穎

**豇豆**

綱目○江絳二音

**釋名**

**荳雙**

音絳雙時珍曰此豆紅色居多莢必雙生故有荳雙之名廣雅指爲胡豆誤

矣

**集解**

時珍曰豇豆處處三四月種之一種蔓長丈餘一種蔓短其葉俱本末尖嫩時可茹其

花有紅白二色莢有白紅紫赤斑駁數色長者至  
二尺嫩時充菜老則收子此豆可菜可果可穀備  
用最多乃豆中之上品而本草失收何哉

**氣味甘鹹平無毒**主治理中益氣補腎健胃和五  
臟調營衛生精髓止消渴吐逆泄痢小便數解鼠

## 莽毒時珍曰

時珍曰

**發明**時珍曰豇豆開花結莢必兩兩並垂有習坎  
宜以此當之昔盧廉夫教人補腎氣每日空心煮  
豇豆入少鹽食之蓋得此理與諸疾無禁但水腫  
忌補腎不宜多食耳又袖珍方云中鼠莽毒者以  
豇豆煮汁飲卽解欲試者先刈鼠莽苗以汁潑之  
便根爛不生此則物理然也

藕豆

音扁。別錄中品

時珍曰

蘿本作扁莢形扁

釋名

沿離豆

俗蛾眉豆

時珍曰

蘿蔓延也沿離蔓延也

象豆

奇白路

集解

弘景曰

蘿豆人家種之于籬垣其莢蒸食甚美

頌曰蔓延而上大葉細花花有紅白二色

莢生花下其實有黑白二種白者溫而黑者小冷

入藥用白者黑者

名鵲豆蓋以其黑閒有白道如

鵲羽也時珍曰扁豆二月下種蔓生延纏葉大而

圓而有尖其花狀如小蛾有翅尾形其莢

盆圓而有長或團或如龍爪虎爪或如豬耳刀

種不同皆纍纍成枝白露后實更繁衍嫩時可鏗種

種不一物

蔬食茶料老則收子煮食子有黑白赤斑四色一

種莢硬不堪食惟豆子粗圓而色白者可入藥本

草不分別亦缺文也

白扁豆脩治

時珍曰凡用取硬殼扁豆子連皮炒熟入藥亦有水浸去皮及生用者從

本方

氣味甘微溫無毒

洗曰微寒患冷人勿食弘景曰患寒熱者不可食

主治和中下氣

別錄補五臟主嘔逆久服頭不白孟

療霍亂吐利不止研末和醋服之

蘇恭行風氣治女子帶下解酒毒河豚魚毒

及煮汁飲取效

甄權止泄痢消暑暖脾胃除溼熱止渴

消渴

時珍

發明

時珍曰硬殼白扁豆其子充實白而微黃其氣腥香其性溫平得乎中和脾之穀也入太

陰氣分通利三焦能化清降濁故專治中宮之病  
消暑除溼而解毒也其軟殼及黑鵲色者其性微  
涼但可供食亦調脾胃

附方

新九霍亂吐利

扁豆香薷各一升

水六升

煮二升分服

千金霍亂轉

筋

白扁豆爲末

醋曾濟方

消渴飲水

金豆丸

用白扁豆浸

花粉同蜜和丸梧子大金箔爲衣

每服二三十丸

天

方存堂

赤白帶下

白扁豆炒爲末

用米飲每服二錢

用藥墮胎

女入

藥墮胎

服草

研水

諸

藥墮胎

腹痛者

生白扁豆去皮爲

末米飲服方寸

匕灑煎汁飲亦可

丸服若胎氣已

傷未墮者或口

一生醫多自汗頭低似乎中風九死無疑

研水

事林廣記

研水

絞汁飲

六畜肉毒

白扁豆燒

存性研塗

水

並永類方

研水

諸

**鳥肉毒**

生扁豆末冷水服之

**惡瘡癩癧**

作痛以扁豆搗封瘡落卽愈

后肘

**花**

**主治**女子赤白帶下乾末米飲服之

蘇頌

**焙研服**

**治崩帶作餛飩食治泄痢擂水飲解中一切藥毒**

**垂死功同扁豆**

時珍

**附方**

新二

**血崩不止**

白扁豆花焙乾爲末每服二錢空心炒米煮飲入鹽少許調下

卽效良方

**奇一  
切泄痢**

白扁豆花正開者擇淨勿洗以滾湯淪過和小豬脊脴肉

一條葱一根胡椒七粒醬汁拌勻就以淪豆花

汁和麵包作小餛飩炙熟食之必用食治方

**葉主治**

**霍亂吐下不止**

別錄

**吐利後轉筋生搗一把**

入少酢絞汁服立瘥

蘇恭

醋炙研服治痕疾

孟诜

杵傅

蛇咬

大明

藤主治霍亂同蘆薈人參倉米等分煎服

時珍

刀豆

綱目

釋名挾劒豆

時珍曰以莢形命名也案段成式西陽雜俎云樂浪有挾劒豆莢生橫斜

如人挾劍卽此豆也

集解

穎曰刀豆長尺許可入醬用時珍曰刀豆人

葉多種之三月下種蔓生引一二丈葉如豇豆近尺微似阜莢扁而劒脊三棱宛然嫩時煮食醬

頭食蜜煎皆佳老則收子子大如拇指淡紅色同豬肉雞肉煮食尤美

氣味甘平無毒主治溫中下氣利腸胃止飢逆益

腎補元

時珍

發明

時珍

刀豆本草失載惟近時小書載其暖家或令取刀豆子燒存性白湯調服二錢卽止此亦取其下氣歸元而逆自止也

黎豆

拾遺

釋名

猩豆

綱目

虎豆

藏器

曰豆子作猩首文故名

時珍曰黎亦黑色也此豆莢老則

有

黑色有毛點如虎猩之斑

露筋如虎猩指爪

如虎猩指爪其子亦有

集解

藏器曰黎豆生江南蔓如葛子

人炒食之別無功用陶氏註

謂蛇膽

云如黎豆者卽此也爾雅云

諸慮一名虎涉

郭璞註云江東呼

註

云如黎豆者卽此也爾雅云

云如黎豆者卽此也爾雅云

謂蛇膽

云如黎豆者卽此也爾雅云

謂蛇膽

云如黎豆者卽此也爾雅云

謂蛇膽

云如黎豆者卽此也爾雅云

謂蛇膽

爲藤似葛而粗大纏蔓林樹莢有毛刺一名豆莢  
今虎豆也千歲纏是矣時珍曰爾雅山纏卽猩豆莢  
也古人謂藤爲纏后人訛纏爲猩矣爾雅山纏卽猩豆莢  
以纏原是人謂二種陳氏合而爲一謂諸慮一名虎涉又  
人亦有千歲纏並誤矣千歲纏見草部猩豆野生山  
文理偏斜六七月開花成簇紫色狀如扁豆花葉生山  
枝結莢十餘長三四寸大如拇指有白茸毛老花子則一  
黑而露筋宛如乾熊指爪之狀其子大如刀豆再煮子則一  
淡紫色有斑點如猩文煮去黑汁同豬雞肉再煮子則一  
乃佳

氣味甘微苦溫有小毒

多食令人悶

主治溫中益氣

時珍

本草綱目穀部目錄第二十五卷

穀之四 造釀類二十九種

大豆豉

別錄

豆黃

食療

豆腐

日用

陳廩米

別錄

飯

拾遺

青精乾石餽飯

圖經

粥

拾遺  
諸藥粥附

麪

拾遺

米糕

綱目

糉

綱目

寒具

綱目

蒸餅

綱目

女麴

拾遺

黃蒸

拾遺

麴

嘉祐

神麴

藥性

紅麴

丹溪補遺

羹米

別錄

卽麥芽

飴糖

別錄

醬

別錄

榆仁醬

食療

蕪荑醬

食療

醋

別錄

酒

別錄  
諸藥酒附

燒酒

綱目

蒲萄酒

綱目

糟

綱目

米粬

食物

春杵頭細糠

別錄

右附方舊八十新一百

本草綱目穀部第二十五卷

穀之四 造釀類二十九種

大豆豉

別錄 中品

釋名

時珍曰 按劉熙釋名云 豉嗜也 調和五味可甘嗜也許慎說文謂豉爲配鹽幽菽者乃鹹

豉也

集解

弘景曰 豉出襄陽錢塘者香美而濃入藥取中心者佳藏器曰蒲州豉味鹹作法與諸豉

不同

其味烈陝州有豉汁經十年不敗入藥並不

如今之豉心爲其無鹽故也

詭曰 陝府豉汁甚勝

常豉其法以大豆爲黃蒸每一斗加鹽四升椒

兩春三日夏二日卽成半熟加生薑五兩旣潔淨四升

且精也 時珍曰 豉諸大豆皆可爲之以黑豆者方入淨方

藥有淡豉鹹豉治病多用淡豉汁及鹹者當隨

豆者當隨方

法其豉心乃合豉時取其中心者非剝皮取心也此說見外臺秘要造淡豉法用黑大豆二三斗六月溫蒿覆每三日一看候黃衣上遍不可太過取曬微簸淨以水拌乾溼得所以汁出指聞爲準安甕中築實桑葉蓋厚三寸密封泥於日中曬七日取出曝一時又以水拌入甕如此七次再蒸過攤去火氣甕收築封卽成矣造鹹豉法用大豆一斗水浸三日淘蒸攤署候上面黃取出簸淨水淘灑乾斤入鹽一斤薑絲半斤椒橘蘇茴杏仁拌勻入甕上白鹽一斗搗和以湯淋汁三四斗清麻油熬令煙造豉斷以一升汁法十月至正月用好豉三斗曬一月乃成也葱橘絲同煎三分減一貯於不津器中香美絕勝薑以煙造豆豉瓜豉醬豉諸品皆可爲之但充食品不勝薑以煙造豆豉

**淡豉氣味**苦寒無毒

思邈曰苦甘寒濁得鹽良果曰陰中之陰也

**主治**傷寒頭痛寒熱癰氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘

吸兩腳疼冷殺六畜胎子諸毒別錄治時疾熱病發

汗熬末能止盜汗除煩生搗爲丸服治寒熱風胸

中生瘡煮服治血痢腹痛研塗陰莖生瘡藥性治瘧

疾骨蒸中毒藥蠱氣犬咬大明下氣調中治傷寒溫

**毒發癰嘔逆**

時珍○千金治溫毒黑膏用之

**蒲州豉氣味**鹹寒無毒

**主治**解煩熱熱毒寒熱虛

勞調中發汗通關節殺腥氣傷寒鼻塞陝州豉汁

亦除煩熱

器藏

發明

弘景曰鼓食中常用春夏之氣不和蒸炒以酒漬服之至佳依康伯法先以醋酒溲蒸曝

燥麻油

和再蒸曝之凡三過末椒薑治和進食大勝

今時油鼓也患腳人常將漬酒飲之以滓傅腳

皆瘥

頌曰古今方書用鼓治病最多江南人善作

鼓

凡得時氣卽先用葱鼓湯服之取汗往往便瘥

也

時珍曰陶說康伯鼓法見博物志云原出外國

中國謂之

康伯乃傳此法之姓名耳其鼓調中下

氣最妙黑豆性平作鼓則溫既經蒸署故能升能

散得葱則發汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則

能治瘧得蒜則止血炒熟則又

能止汗亦麻黃根節之義也

附方

舊三十一傷寒發汗

頌曰葛洪肘后方云傷寒有數種庸人卒不能

分別者

今取一藥兼療之凡初覺頭痛身熱脈洪一升

二日便以葱鼓湯治之用葱白一虎口鼓一升

綿裹水三升煮一升頓服不汗更作加葛根三兩  
入鹽豉食之取汗○又法用豉一升小男溺三升煎一升分服取汗○又法用葱湯煮米粥  
升解已三四日胸中悶惡者用豉一升鹽一合水  
四升煮一升半分服取吐此秘法也

### 傷寒不解

傷寒粥

### 辟除溫疫

常服之

### 傷寒懊憹

懊憹大下後心

身熱不去心中痛者並用卮子豉湯吐之肥卮子

十枚水二盞煮一盞入豉半兩同煮至七分去

滓服得吐止後

### 傷寒餘毒

傷寒後毒氣攻手足及身體虛腫用豉五合微

炒以酒一升半同煎

### 傷寒目翳

研末吹之

任性飲之

### 傷寒目翳

研末吹之

### 傷寒暴痢

藥性論曰以豉

一升薙白一握水三

肘後

簡要濟眾

研末吹之

### 血痢不止

用豉大蒜等分杵丸梧子大每

王氏博濟血痢

服三十丸鹽湯下

大豆散

研末吹之

**如刺**

藥性論曰以豉一升水漬相淹

**赤白重下**

氏葛

用豆豉煎兩沸絞汁頓服不瘥再作

服亦驗○外臺用豉心炒爲末一升分四服酒下

入口卽斷也

**臘毒下血**

烏犀散用淡豉十文大煎香菜湯服

水同搗丸梧子大煎香菜湯服

彭大祥云此藥甚妙但大蒜九蒸乃佳仍以冷齋

服此數十年之疾更不復作也

子楫提刑皆甯原方

**小便**

子得效方

水送下昔朱元成言其姪及陸子楫提刑皆

服安乃止永絕根本無所忌○盧州

水送下昔朱元成言其姪及陸子楫提刑皆

服安乃止永絕根本無所忌○盧州

水送下昔朱元成言其姪及陸子楫提刑皆

服安乃止永絕根本無所忌○盧州

水送下昔朱元成言其姪及陸子楫提刑皆

**瘧疾寒熱**

飲數升豉湯

**血條**

或入酒服

危氏得效方

子大吐卽愈

子大吐卽愈

子大吐卽愈

**瘧疾寒熱**

飲數升豉湯

得大吐卽愈

子大吐卽愈

子大吐卽愈

**小兒寒熱**

子大吐卽愈

子大吐卽愈

**瘧疾寒熱**

飲數升豉湯

得大吐卽愈

子大吐卽愈

子大吐卽愈

**瘧疾寒熱**

飲數升豉湯

**不止**

取汁冷暖任服不瘥者

以豉一升炒香清酒三升漬三日

有細毛棄道中卽便瘥也

更作三兩劑卽止

六七遍又摩心臍上旋旋呴之了破豉丸看

食醫心鏡研丸雞心

以摩腮上及手足心

**盜汗**

# 喘痰積

凡天雨便發坐臥不得飲食不進乃肺竅久積冷痰遇陰氣觸動則發也用此一服

卽愈服至七八次卽出惡痰數升藥性亦隨而出

卽斷根矣用江西淡豆豉一兩蒸搗如泥入砒霜末一錢枯白礬三錢丸綠豆大每用冷茶冷水送

下七丸甚者九丸小兒五丸卽高枕仰臥忌食熱

物等皆以酒一斗浸經宿空心隨性溫

飲物等皆

風毒膝攣骨節痛用豉三升九蒸九暴

飲心鏡手足不隨

豉三升水九升煮三升分三服

酒中三宿溫服常

又法豉一升微熬囊貯漬三升

令微醉佳

肘後頭風疼痛

豉湯洗頭避風取

末于舌下嚥

之干金方咽生瘻肉

鹽豉和搗塗之先刺破出桂

口舌生瘻

胸膈疼痛者用焦豉末

含一宿卽瘥聖惠方

舌上血出

如者鍼灸

不得語

煮豉汁加入美

酒服之肘后喉痹不語

煮豉汁一升服

之

鹽豉和搗塗之先刺破出桂

血乃用神效

聖濟總錄

本草綱目卷四百四十一

大豆豉

卷四百四十一

五

或三升水三升煮沸服

葛氏方

墮胎血下

煩滿用或一升水

三升煮沸三升沸

調鹿角末

方寸七

妊娠動胎

或汁炒服華陀

婦人

難產

乃兒枕破與敗血裹其子也

以勝金散逐其順矣用鹽或一兩以舊青布裹了燒

赤乳細入麝香一錢爲末取秤錘燒

紅淬酒調服一大盞郭稽中方

小兒胎毒

淡

煎濃汁與三五口其毒自下

又能助脾氣消乳食

聖惠

小兒頭瘡

以黃泥裹煨熟取研以

粉一錢同研丸

黍米大每服三全幼心鑑

小兒丹毒

作瘡出

煙盡爲末油調傅之姚和眾方

小兒頭瘡

以黃泥裹煨熟取研以

發背癰腫已潰照腫處

大小作餅厚三分瘡有孔勿覆

肉如熱痛卽易之患當減快

孔上鋪或餅以艾列於上灸之但使溫溫勿令破

先有孔以汁出  
爲妙 千金方 一切惡瘡

熬或爲末傅之不遇

陰

莖生瘡

痛爛者

以豉一分蚯蚓溼泥二分水研

三四次出楊氏產乳

和

藥性

論 蠻螋尿瘡

杵豉傅之良

千金方

蟲刺蟄人

豉心嚼敷少頃

瘡若不見再傅晝夜勿

傳畫夜勿

蹉跌破傷

筋骨用豉三升

飲之止心絶

見毛爲度外臺

腹中閼滿豉一升水

三升漬濃汁

解蜀椒毒

豉汁飲之

千金方 中牛馬毒

豉汁之效

小蝦蟆毒

小蝦蟆有毒食之令人小便秘澀臍下

衛生易簡

半盆浸濃汁頓飲之

閼痛有至死者以生豉一合投新汲水

投新汲水

半升頓服

卽愈 千金方 服藥過劑

閼亂者豉汁飲之

二升煮一升頓服

不出用豉

浸

荳亭客語

不

用豉

水洗目視之卽

刺在肉中

嚼破塗之

干金方

小兒病淋

方

出

總錄方

刺在肉中

嚼破塗之

干金方

小兒病淋

方

蒸餅發明下

腫從腳起

豉汁飲之以

滓

豆黃

食

校正

原附

大豆

下今分出

釋名

時珍曰造法用黑豆一斗蒸熟鋪席上以蒿

覆之如盦醬法待上黃取出曬乾搗末收用

氣味甘溫無毒

諺曰忌豬肉

主治溼痹膝痛五臟不足

脾胃氣結積壯氣力潤肌膚益顏色填骨髓補虛

損能食肥健人以鍊豬脂和丸每服百丸神驗祕

方也肥人勿服

詒○出延年祕錄方

生嚼塗陰癢汗出

時珍

附方

新二

脾弱不食

餌此當食大豆黃二升大麻子

三升熬香爲末每服一合飲下

大豆黃二升大麻子

一合飲下

日四五服任打擊青腫大豆黃爲末水和千金方塗之  
外臺祕要

豆腐用

集解

時珍曰豆腐之法始於漢淮南王劉安凡黑豆黃豆及白豆泥豆豌豆綠豆之類皆可爲

之造法水浸礮碎濾去滓煎成以鹽鹵汁或山礬葉或酸漿醋漬就釜收之又有入缸內以石膏末

收者大抵得鹹苦酸辛之物皆可收斂

爾其面上凝結者揭取眼乾名豆腐皮入饌甚佳也

氣味甘鹹寒有小毒

原曰性平

頌曰寒而動氣瑞

曰發腎氣

瘡疥頭風

杏仁可

解時珍曰按延壽書云有人好食豆腐中

能治作腐家言

菜菔入湯中則腐不

成遂以

菜菔

湯下藥而愈

大抵暑月

恐有人汗尤宜慎之

主治寬中益氣和脾胃消脹滿下大腸濁氣

甯原清

本草綱目卷一百一十一

熱散血

時珍

附方

新四

休息久痢

白豆腐

醋煎食之

赤眼腫痛

普濟方

數

種皆

肝熱

血凝也

用消風熱藥

服之夜用鹽

普濟方

證治要訣

拔萃方

燒酒煮

杖瘡

青腫

豆腐切片

貼之頻易

一法以燒酒

拔萃方

燒酒煮

死

心頭熱者

用熱豆腐細切

遍

換之甦省乃止

陳廩米

別錄下品

釋名

陳倉米

古俗

老米

時珍

火米

有屋曰廩無屋

倉圓曰固皆私積也

治成者有火燒

治成者又有畬

田火米與此不

同

集解

弘景曰陳廩米

卽粳米久入倉

陳赤者以廩

軍人故曰廩爾

方中多用之人

以作醋勝於

新粳米也藏器曰廩米吳人以粟爲良漢地以粳爲善亦猶吳紂鄭縞貴近賤遠之意確論其功粟當居前宗奭曰諸家註說不言是粳是粟然二米陳者性皆冷煎煮亦無膏膩粉食令人自利與經說稍戾時珍曰廩米北人多用粟南人多用粳及秕並水浸蒸曬爲之亦有火燒過治成者入倉陳久皆氣過色變故古人謂之紅粟紅腐陳陳相因也

### 氣味鹹酸溫無毒

藏器曰廩米熱食卽熱冷食卽冷假以火氣也體自溫平同馬

肉食發痼疾時珍曰廩米年久其性多涼但炒食則溫爾豈有熱食卽熱者乎

主治下氣

### 除煩渴調胃止洩

別錄補五臟澀腸胃日華暖脾去憊

### 氣宜作湯食

良效飯食止痢補中益氣堅筋骨通

### 血脈起陽道以飯和酢搗封毒腫惡瘡立瘥

北人

以飯置甕中水浸令酸食之暖五臟六腑之氣研

末服去卒心痛

孟詭

寬中消食多食易饑

原甯

調腸胃

利小便止渴除熱

時珍

發明

時珍

曰陳倉米煮汁不渾初時氣味俱盡故沖淡可以養胃古人多以煮汁煎藥亦取其

調腸胃利小便

去溼熱

之功也千金方治洞注下利炒此米研末飲服者亦取此義曰華子謂其潤

腸胃寇氏謂其

冷利皆非中論

附方

新

霍亂大渴

能殺人

以黃倉米三升水一斗煮汁澄清飲良

反胃膈氣

不下食者

太倉散用倉米或白米日西時以水微拌溼自想日氣如在米中次

日曬乾袋盛掛風處每以一撮水煎和汁飲之卽時便下○又方

陳倉米炊飯焙研每五兩入沉香

末半兩和勻每米飲

服二三錢

普濟方

諸般積聚

太倉丸治脾胃饑

飽不時生病及諸

病

及諸

般積聚

百物所傷

陳倉米四兩以

巴豆二十一粒

去皮同炒

至米香豆黑勿令

米焦擇去豆不用入

薑去白橘皮四兩爲末

糊丸梧子大每

日二服

百一選方

暑月吐瀉

陳倉

米二升麥芽四兩黃連四兩切同蒸熟焙

研爲末水丸梧子大每服

百丸白湯送下

## 飯

拾遺

## 釋名

### 集解

時珍曰

飯食

諸穀皆可爲之

各隨米性詳見

本條然有入藥諸飯不可類從者應當別出

大抵皆取梗

稻粟米者爾

新炊飯主治人尿牀以熱飯一盞傾尿牀處拌與

食之勿令病者知又乘熱傅腫毒良

時珍

寒食飯

饋飯也

主治減癩痕及雜瘡研末傅之

藏器思邈

灰酒服治食本米飲成積黃瘦腹痛者甚效

孫思邈

傷寒食復用此飯燒研米飲服二三錢效

時珍

祀竈飯主治卒噎取一粒食之卽下燒研搽鼻中

瘡

時珍

盆邊零飯主治鼻中生瘡燒研傅之

時珍

齒中殘飯主治蠍咬毒痛傅之卽止

時珍

飧飯

飧音水飯也卽

主治熱食解渴除煩

時珍

# 荷葉燒飯主治厚脾胃通三焦資助生發之氣

時珍

## 發明

李杲曰易水張潔古根尤丸用荷葉裹燒飯爲丸蓋荷之爲物色青中空象乎震卦風木

在人爲足少陽膽同手少陽三焦爲生化萬物之根蒂用此物以成其化問氣何由不上升乎更以燒飯和藥與白朮協力滋養穀氣令胃厚不致再傷其利廣矣大矣時珍曰按韓悉醫通云東南人不識北方炊飯無甑類乎爲燒如燒菜之意遂訛以荷葉包飯入灰火燒煨雖丹溪亦未之辯但以新荷葉煮湯入粳米造飯氣味亦全也凡粳米造飯用荷葉湯者寬中芥葉湯者豁痰紫蘇湯者行氣解肌薄荷湯者去熱淡竹葉湯者辟暑皆可類推也

## 青精乾石餕飯

宋圖經

## 釋名

烏飯

領曰按陶隱居登眞隱誤載太極眞人

青精乾石餕飯法餕音信餕之爲言飧

青精乾石餕飯

也謂以酒蜜藥草輩溲而曝之也亦作硇凡內外諸書並無此字惟施於此飯之名耳陳藏器本草名鳥飯

### 集解

領曰登真隱訣載南燭草木名狀註見木部本條下其作飯法以生白梗米一斛五斗春

可治浙取一斛二斗用南燭木葉五斤燥者三斤亦可雜莖皮煮取汁極令清冷以溲米米釋炊之從四月至八月末用新生葉色皆深九月至三月用宿葉色皆淺可隨時進退其斤兩又采軟枝莖皮用於石臼中搗碎假令四五月中作可用十許斤漬過便一熟皮復蒸以斛二斗湯浸染得一斛也比來只以水漬斤漬過便一熟皮復蒸曝每蒸輒以葉汁作正青色乃止高格汁漬之灑過便一熟皮復蒸血食填胃補髓消滅三蟲上元寶命不經可服曝乾當三升勿服草之

謂也今茅山道士亦作此飯或以寄遠重蒸過食  
之甚香甘也藏器曰烏飯法取南燭莖葉搗碎清  
汁浸梗米九浸九蒸九曝米粒緊小黑如鑿珠袋  
盛可以適遠方也時珍曰此飯乃仙家服食之法  
而今之釋家多於四月八日造之以供佛耳造者  
又入柿葉白楊葉數十枝以助色或又加生鐵一  
塊者止知取其上色不知乃服食家所忌也

氣味甘平無毒主治日進一合不饑益顏色堅筋  
骨能行藏器益腸胃補髓減三蟲久服變白卻老

蘇頌

○出太極真人法

粥

拾遺

釋名

糜時珍曰粥字象米在釜中相屬之形釋名  
云煮米爲粥使糜爛也粥濁於糜育育然

也厚曰醴  
薄曰酏

小麥粥主治止消渴煩熱

時珍

寒食粥

用杏仁和諸花作之

主治咳嗽下血氣調中

藏器

糯米○秫米○黍米粥

氣味甘溫無毒

主治益氣

治脾胃虛寒洩痢吐逆小兒痘瘡白色

時珍

粳米○稻米○粟米○梁米粥

氣味甘溫平無毒

主治利小便止煩渴養腸胃

時珍

發明

時珍曰按羅天益寶鑑云淡陽中之陰也所以淡滲下行能利小便韓

悉醫通云一人病淋素不服藥子令專啖粟米粥

絕去他味旬餘減月餘痊此五穀治病之理也又

張來粥記云每日起食粥一大盃空腹胃虛穀氣便作所補不細又極柔膩與腸胃相得最爲飲食之妙訣齊和尚說山中僧每將旦一粥甚繫利害如不食則終日覺臟腑燥涸蓋粥能暢胃氣生津液也大抵養生求安樂亦無深遠難知之事不過寢食之間爾故作此勸人每日食粥勿大笑也又蘇軾帖云夜饑甚吳子野勸食白粥云能推陳致新利膈益胃粥既快美粥後一覺妙不可言也此皆著粥之有益如此諸穀作粥詳見本條古方有用藥物粳粟粱米作粥治病甚多今略取其可常食者集於下方以備參考云

赤小豆粥治反癆利水便消水腫腳氣辟邪癟綠豆粥解熱毒止煩渴

御米粥治反癆利大腸

薏苡仁粥除溼熱利腸胃

蓮子粉粥健脾胃止洩痢

芡實粉粥固精氣明耳目

菱實粉粥益腸胃解內熱

栗子粥補腎氣益腰腳

薯蕷粥補腎精固腸胃

芋粥寬腸胃令人不饑

百合粉粥潤肺調中

蘿蔔粥消食利膈

胡蘿蔔粥寬中下氣

馬齒莧粥治癆消腫

油菜粥調中下氣

莙�蓬菜粥健胃益脾

菠菜粥和中潤燥

薺菜粥明目利肝

芹菜粥去伏熱利大小腸

芥菜粥潤燥寬腸

葵菜粥潤燥寬腸

韭菜粥溫中暖下

葱豉粥發汗解肌

茯苓粉粥清上實下

松子仁粥潤心肺調大腸

酸棗仁粥治煩熱益膽氣

枸杞子粥補精血益腎氣

薤白粥治老人冷利

生薑粥溫中辟惡

花椒粥辟瘴禦寒

茴香粥和胃治疝

胡椒粥 茄萸粥

幹米粥並治心腹疼痛

麻子粥 胡麻粥

郁李仁粥並潤腸治癆

蘇子粥下氣利膈

竹葉湯粥止渴清心

豬腎粥 羊腎粥

鹿腎粥並補腎虛諸疾

羊肝粥 雞肝粥並補肝虛明目

羊汁粥 雞汁粥並治勞損

鴨汁粥 鯉魚汁粥並消水腫

卷之二十一

三

# 牛乳粥補虛羸

酥蜜粥養心肺

鹿角膠入粥食助元陽治諸虛

炒麪入粥食止白痢○燒鹽入粥食止血痢

麪

尺沼切  
○拾遺

校正

原附粟下  
今分出

釋名

糗去九切時珍曰麪以炒成其臭香故糗從

臭麪從炒省也劉熙釋名云糗齧也飯而

磨之使  
齧碎也

集解

恭曰麪蒸米麥熬過磨作之藏器曰河東人

炒乾飯磨成也  
粗者爲乾糧糧

米麥麩氣味甘苦微寒無毒

藏器酸寒

曰

主治寒中除

熱渴消下氣

蘇頌

和水服解煩熱止洩實大腸

藏器

炒

餅

綱目

米湯止煩渴

時珍

釋名

時珍曰餅以黍糲合粳米粉蒸成狀如凝膏也

單糲粉作者曰粢米粉合豆末糖蜜

蒸成者曰餌釋名云粢慈軟也餌而也相黏而也

揚雄方言云餌謂之餅或謂之粢或謂之餈音令

或謂之餚音混沌亦微有分別不可不知之也

氣味

甘溫無毒

時珍曰粳米餅易消導粢餅最難化損脾或積小兒尤宜禁之

主治粳餅養脾胃厚腸益氣和中○粢餅益氣暖

中縮小便堅大便效

時珍

發明

時珍曰晚粳米餳可代蒸餅丸脾胃藥取其易化也糯米粢可代糯米糊丸丹藥取其相黏

也九日登高米餳亦可入藥按聖惠方治山瘡瘍

有餳角飲九月九日取米餳角陰乾半兩寒食飯

二百粒豉一百粒獨蒜一枚

恒山一兩以水二盞浸一夜五更煎至一盞頓服當下利爲度

附方

新

老人泄瀉

乾餳一兩薑湯泡化代飯

簡便方

糓

目綱

釋名角黍

時珍曰糓俗作粽古人以菰蘆葉裹黍米煮成尖角如櫻榔葉心之形故曰櫻

曰角黍近世多用糯米矣今俗五月五日以爲節物相餽送或言爲祭屈原作此投江以飼蛟龍也

氣味甘溫無毒主治

五月五日取糓尖和截瘧藥

良

珍時

寒具

目綱

釋名 捻頭

錢 環餅

要術 飴

時珍曰 寒具冬春可畱數月及寒食禁煙用之故名

寒具 捻頭 捻其頭也

環餅 象環鉶形也

易消散謂之餳張揖廣雅謂之粧梳楚辭

也 服虔 通俗名謂之餳

張揖 廣雅謂之粧梳楚辭

謂之粧

謂之膏

謂之環

集解

時珍曰 錢乙方中

有捻頭散葛洪肘後有捻頭湯醫書不載按鄭玄註周禮云寒具米食

也 賈思勰要術云環餅一名寒具以水搜入牛羊

脂和作之入口卽碎林洪清供云寒具捻頭也以

糯米粉和麵麻油煎成以餳食之可畱月餘宜禁煙

用觀此則寒具卽今饊子也以糯米粉和麵入少鹽

牽索紐捻成環鉶之形油煎食之劉禹錫寒具詩

云纖手搓成玉數尋碧油煎出嫩黃深夜來春睡

無輕重壓褊  
佳人纏臂金

氣味甘鹹溫無毒主治利大小便潤腸溫中益氣  
時珍

附方

新

錢氏捻頭散

治小兒小便不通用延胡索苦棟子等分爲末每服半錢

或一錢以捻頭湯食前調下如無捻

頭滴油數點代之

錢氏小兒方

血痢不止

地研爲末每服二錢摻在羊血上炙熟

食之以捻

榆頭煎湯送下或以地榆煮汁熬如飴狀

一服三合

捻頭湯化下

蒸餅

目綱

釋名

時珍曰按劉熙釋名云餅者并也溲麵使合并也有蒸餅湯胡餅索餅酥餅之屬皆隨形

命名

集解

時珍曰小麥麵條治食品甚多惟蒸餅其來最古是酵糟發成單麵所造丸藥所須且能治疾而本草不載亦一缺也惟臘月及寒食日蒸之至皮裂去皮懸之風乾臨時以水浸脹擂爛瀝過和脾胃及三焦藥甚易消化且麵已過性不助溼熱其以果菜油膩諸物爲餡者不堪入藥

氣味

甘平無毒主治消食養脾胃溫中化滯益氣

和血止汗利三焦通水道

時珍

發明

時珍曰按愛竹談敷云宋寧宗爲郡王時病

琳用蒸餅大蒜淡豆豉三物搗丸令以溫水下三十丸日今日進三服病當減三之一明日亦然

日病除已而果然賜以千緝或問其說琳曰小兒

何緣有淋只是水道不利三物皆能通利故爾若

琳者其可  
與語醫矣

## 附方

新六

## 積年下血

寒食蒸餅烏龍尾各一兩阜角

七挺去皮酥炙爲末蜜丸米飲

米飲

每服

二

十九

## 下痢赤白

治營衛氣虛風邪

裏急後重煩渴脹滿

不進飲食用乾蒸餅蜜拌

胃之閒便痢赤白膍腹病

入腸

炒

二兩

御米殼蜜炒四兩爲末

煉蜜丸芡子大每

水一盞煎化熱

崩中下血

陳年蒸餅燒存每

性米飲服二錢

出

聖惠方

服

一丸水一盞煎化熱

崩中下血

陳年蒸餅燒存每

性米飲服二錢

出

## 盜汗自汗

每夜臥時帶饑喫蒸餅

一枚一切折傷

研末油調塗

傳

寒食蒸餅爲末

附後方

二湯火傷灼

研末油調塗

傳

錢酒下甚驗

附後方

一切折傷

研末油調塗

傳

之後之方

後之方

之方

後之方

後之方

後之方

後之方

後之方

後之方

後之方

女麴

拾遺

校正

原附

小麥

**釋名** 麵子

音桓

**黃子**

時珍曰此乃女人以完

麥卷成黃子故有諸名

**集解**

恭曰女麴完小麥爲飯和

成罨之待上

黃衣取曬

**氣味**

甘溫無毒

**主治**

消食下氣止洩痢下胎破冷

**血**

蘇頌

**黃蒸**

拾遺

**校正**

原附小麥

下今分出

**釋名** 黃衣

蘇恭

**麥黃**

時珍曰此乃以米麥粉和罨

待其薰蒸成黃故有諸名

**集解**

恭曰上黃衣取曬藏器曰

黃蒸磨小麥粉拌水和成餅麻葉裏待

藏器曰黃蒸與麰子不殊北人

以小麥南人以梗米六七月作之生綠塵者佳時

珍曰女麴蒸麥飯罨成黃蒸磨米麥粉罨成稍有

不同

也

氣味主治並同女麴蘇恭溫補能消諸生物器藏溫中

下氣消食除煩

華日

治食黃黃汗

珍時

附方

新

癰黃疽疾

或黃汗染衣涕唾皆黃用好黃蒸二升每夜以水二升浸微暖

於銅器中平旦絞汁服半升極效必效方

麴

宋嘉祐

釋名酒母

時珍曰麴以米麥包罨而成故字從麥從米從包省文會意也酒非麴不生故

劉熙釋名書云若作酒醴爾惟麴蘖是矣

集解

藏器曰麴六月作者良入藥須陳久者炒香

用時珍曰麴有麥麯米造者不一皆酒醋所

須俱能消導功不甚遠造大小麥麴法用大麥米或小麥連皮并水淘淨曬乾六月六日磨碎以淘

麥水和作塊楮葉包紮懸風處七十日可用矣造  
麵麴法三伏時用白麵五斤綠豆五斤以蓼汁煮  
爛粹蓼末五兩杏仁泥十兩和踏成餅楮葉裹懸  
風處候生黃收之造白麴法用麵五斤糯米粉一  
斗水拌微溼篩過踏餅楮葉包掛風處五十日成  
矣又米麴法用糯米粉一斗自然蓼汁和作圓丸  
楮葉包掛風處七七日曬收此數種麴皆可入藥  
其各地有入諸藥草及毒藥者皆有毒惟可造酒  
不可入藥也

**小麥麴氣味**甘溫無毒

震亨曰麴皮麴涼入大腸經

**主治消穀**

**止痢**

別錄

**平胃氣消食痔治小兒食癟**

蘇恭調中下氣

**開胃療臟腑中風寒**

藏器

**主霍亂心膈氣痰逆除煩**

**破癥結**

孟诜

**補虛去冷氣除腸胃中塞不下食令人**

有顏色

吳瑞

落胎并下鬼胎

日華

止河魚之疾

梁簡帝勸醫文

大麥麴氣味

前同

主治消食和中下生胎破血取五

升以水一斗煮三沸分五服其子如糜令母肥盛

珍時

麵麴米麴氣味

前同

主治消食積酒積糯米積研末

酒服立愈餘功同小麥麴

時珍○出千金

附方

舊新四

米穀食積

炒麴末白湯調服

二錢日三服

三焦滯氣

陳

炒萊菔子炒等分每用

水煎入麝香少許服

普濟小腹堅大

如盤胸滿

食不能消

化用麴末湯服

六月六日炒黃馬

寸七日三干金

飲

用

日華

水煎

入麝香少許服

普濟小腹堅大

如盤胸滿

食不能消

化用麴末湯服

六月六日炒黃馬

飲

服方寸匕無馬蘭子用

水穀不消以麴

牛骨灰代之普濟方

赤白痢下水穀不消以麴

熬粟米粥服方

寸匕日四五服

肘後方酒毒下血

麴一塊溼紙包

煨爲末

傷寒食復

之良

餅煮汁飲

類要方胎動不安

或上捨心下血

者生麴餅研末

水和絞汁服

三升

肘後方狐刺尿瘡

麴末和獨頭蒜杵

如麥粒納瘡孔中

蟲出愈古今

## 神麴

藥性論

### 釋名集解

時珍曰昔人用麴多是造酒之麴後醫

乃造神麴專以供藥力更勝之蓋取諸醫  
神聚會之日造之故得神名賈思勰齊民要術雖  
有造神麴古法繁瑣不便近時造法更簡易也葉葉  
氏水雲錄云五月五日或六月六日或三伏日用  
白麴百斤青蒿自然汁三升赤小豆末杏仁泥各用

驗錄

三升蒼耳自然汁野蓼自然汁各三升以配白虎  
青龍朱雀玄武勾陳臘蛇六神用汁和麵豆杏仁

作餅麻葉或楮葉包署如造  
醬黃法待生黃衣曬收之

氣味甘辛溫無毒

元素曰陽中之陽也入足陽明經凡用須火炒黃以助土氣陳

久者良主治化水穀宿食癥結積滯健脾暖胃藥養

胃氣治赤白痢

元素消食下氣除痰逆霍亂泄痢性

滿諸疾其功與麴同閃挫腰痛者煅過淬酒溫服  
有效婦人產後欲回乳者炒研酒服二錢日二卽

止甚驗

時珍

發明

時珍曰按倪維德啟微集云神麴治目病生用能發其生氣熟用能斂其暴氣也

**附方**

舊一  
新六

**胃虛不尅**

神麴半斤麥芽五升杏仁一升各炒爲末煉蜜丸彈子大

丸每食後嚼化一

普濟方

**壯脾進食**

療痞滿暑泄  
神麴炒蒼朮泔制炒等

分爲末糊丸梧子大每米飲服五十丸冷

者加乾薑或吳茱萸王璆百一選方

健胃思

**食**

養食丸治脾胃俱虛不能消化水穀胸膈痞悶

腹脇膨脹連年累月食減嗜臥口無味神麴六兩

兩麥蘖炒三兩乾薑炮四兩烏梅肉焙四兩爲末

蜜丸梧子大每米飲服五十丸日三服

和劑局

方同

**虛寒反胃**

暴泄不止

神麴炒二兩茱萸湯泡炒半兩爲末醋糊

丸梧子大每服五十九

米飲下一百一選方

產後絕

神麴炒爲末寸匕

方金食積心痛

陳神麴一塊燒紅淬酒

二大盃服之摘玄方

**紅麴**

丹溪遺

集解

時珍曰紅麴本草不載法出近世亦奇術也其法用粳米一石五斗水淘浸一宿作飯分

作十五處入麴母三斤搓揉令勻併作一處以帛密覆熱卽去帛攤開覺溫急堆起又密覆次日日

中又作三堆過一時分作五堆再一時合作一堆又過一時分作十五堆稍溫又作一堆如此數次

第三日用大桶盛新汲水以竹籬盛麴作五六分薰溼完又作一堆如前法作一次第四日如前又

薰若麴半沉半浮再依前法作一次又薰若盡浮則成矣取出日乾收之其米過心者謂之生黃入

酒及鮓醢中鮮紅可愛未過心者不甚佳入藥以陳久者良

氣味

甘溫無毒

瑞曰釀酒則辛熱有小毒發腸

風痔瘻腳氣哮喘痰嗽諸疾

主治

消食活血健脾燥胃治赤白痢下水穀

震亨釀

酒破血行藥勢殺山嵐瘴氣治打撲傷損

吳瑞治女

# 人血氣痛及產後惡血不盡擂酒飲之良

時珍

發明

時珍曰人之水穀入於胃受中焦溼熱薰蒸

是爲營

此造化自然之微妙也

造紅麴者以白米飯受

人蒸變而爲紅卽成真色久亦不渝此乃人

窺造化之巧者也故紅

麴有治脾胃營血之功得同氣相求之理

附方

新

溼熱泄痢

丹溪青六丸用六一散加炒紅

麴五錢爲末蒸餅和丸梧子大

每服五七

十九

白湯下

丹溪心法

小兒吐逆

頻頻

不進乳食手足心熱用紅

日三服○

年久者三錢半白朮炒一錢半甘草炙

一錢爲末每服半錢煎棗子米湯下

經濟小兒

頭瘡

因傷溼入水成毒濃汁不止用

百一選方心腹作痛赤

香附乳

香等分爲

末酒服摘要方

穀米

別錄中品

釋名

弘景曰此是以米作穀非別米名也

恭曰穀生之取其穀中之米入藥按食經用稻穀稻卽穡

穀之總名陶謂以米作穀非矣米豈能更生乎

集解

宗奭曰穀米粟穀也

時珍曰別錄止云穀米不云粟作也蘇恭言凡穀皆可生者是矣有

粟黍穀麥豆諸穀皆水浸脹候生芽曝乾去鬚取

其中米炒研麪用其功皆主消導今併集於左方

日華子謂穀米爲作醋黃子者亦誤矣

粟穀

一名粟芽

氣味苦溫無毒

宗奭曰今穀神散中用之性溫於麥

主治寒中下氣除熱

別錄除煩消宿食開胃

日華子爲末和脂傅面令皮膚悅澤

末和脂傅面令皮膚悅澤

別錄中品

陶弘景曰

稻穀一名穀芽氣味甘溫無毒主治快脾開胃下氣和中消食化積時珍

附方

新

啟脾進食

穀神丸

用穀

穀藥四兩爲末入薑

汁鹽少許和作餅焙乾入炙甘

草砂仁白朮炒各一兩爲末

白湯點服之或丸服

澹寮方

穀麥穀一名麥芽氣味鹹溫無毒主治消食和中

別錄

破冷氣去心腹脹滿

藥性

開胃止霍亂除煩悶消痰飲破癥結能催生落胎

華日

補脾胃虛寬腸下氣

腹鳴者用之

元素

消化一切米麪諸果食積

時珍

發明

好古曰

麥芽

神麴

二藥

胃氣虛人宜服之以

代戊己腐熟水穀豆蔻縮砂烏梅木瓜芍藥

好古曰

麥芽

神麴

二藥

胃氣虛人宜服之以

代戊己腐熟水穀豆蔻縮砂烏梅木瓜芍藥

好古曰

麥芽

神麴

二藥

五味子爲之使時珍曰麥蘖穀芽粟蘖皆能消導  
積者能消化無積而久服則消人元氣也但有  
知若久服者須同白朮諸藥兼用則無害也矣不有

## 附方

舊新

## 快膈進食

麥蘖四兩

神麴一兩

蒸餅丸梧子

白朮橘皮各一兩

神麴二兩

令臥

大每

人參湯

下丸效

## 穀勞嗜臥

飽食便臥得

穀勞病

人四肢煩重

嘿嘿欲臥

食畢

輒甚用大

麥蘖一升

椒一兩並炒乾薑

一日三

肘後方

升

## 虛冷

小麥麵半斤或

五合杏仁二升

皆熬黃香搗

百疾大麥蘖五升

篩糊丸彈子大

每服一丸白湯下

肘後方

一合

初傳與崔郎中

方也通轉神驗

此乃供奉輔

李絳兵部手集方

此乃供奉輔

產

乃血水積也乾漆

太初傳與崔郎中

方也通轉神驗

此乃供奉輔

李絳兵部手集方

此乃供奉輔

產

## 後青腫

中鋪漆

乃血水積也乾漆

太初傳與崔郎中

方也通轉神驗

此乃供奉輔

李絳兵部手集方

此乃供奉輔

產

米麴諸果食積觀造餬者用之可以類推矣但有

煅赤研末熱酒調服二錢產

後諸疾並宜婦人經驗方

通不宜妄

服藥丸宜用大麥芽炒黃爲末每服三

錢沸湯調下與粥閒服婦人良方

外臺治妊娠欲去胎麥蘖一升蜜一升服之卽愈

○小品用大麥芽一升水三升煮二升分三服神效

### 產後回乳

產婦無子食乳

不消令人發熱惡

寒用大麥蘖二兩炒爲末每服五錢

白湯下甚良

丹溪纂要方

### 餡餪

別錄上品

### 釋名

餳音徐盈切時珍曰按劉熙釋名云餪之清

者曰餳形怡怡然也稠者曰餳強硬如錫

也如錫而濁者曰餳方言謂之餳餳音長皇楚辭

云秬粃蜜餳用餳餳是也嘉謨曰因色紫類琥珀

方中謂之膠餳

乾枯者名餳餳

集解

弘景曰方家用餘乃云膠餘是溼餘如厚蜜者其凝結及牽白者餘餘不入藥用韓保昇

日餘卽軟餘也北人謂之餘糯米粳米秫粟米蜀秫米大麻子枳椇子黃精白朮並堪熬造惟以糯餘用麥蘖或穀芽同諸米熬煎而成古人寒食多食餘故醫方亦收用之

氣味甘大溫無毒

入太陰經宗奭曰多食動脾氣震亨曰餘餘屬土而成於火大

發溼中之熱寇氏謂其動脾氣言末而遺本矣時珍曰凡中滿吐逆秘結牙齦赤目疳病者切忌之生痰動火最甚甘屬土腎病母多食

甘甘傷腎骨痛而齒落皆指此類也

主治補虛乏止渴去血

別錄

補虛冷益氣力止腸鳴

咽痛治唾血消痰潤肺止嗽

思邈

健脾胃補中治吐

血打損瘀血者熬焦酒服能下惡血又傷寒大毒

嗽於蔓菁薤汁中煮一沸頓服之良

孟诜

脾弱不思

食人少用能和胃氣亦用和藥

寇宗奭

解附子草烏

頭毒

時珍

發明

弘景曰古方建中湯多用之餽與酒皆用米葉而餽居上品酒居中品是餽以和潤爲優

酒以釀亂爲劣也成無己曰脾欲緩急食甘以

之膠飴之甘以緩中也好古曰飴乃脾經氣分

也甘能補脾之不足時珍曰集異記云刑曹進

朔健將也爲飛矢中目拔矢而鏹留于中鉗之藥緩

動痛困俟死忽夢胡僧令以米汁注之必愈廣

于人無悟者一日一僧丐食宵所夢者叩之僧云不河

但以寒食餳點之如法用之清涼頓減酸

楚至夜瘡癢用力一鉗而出旬日而瘥

**附方**

舊二  
新十

**老人煩渴**

寒食大麥一升水七升煎五升入赤鶲二合渴卽飲之

奉親書

**蛟龍癥病**

凡人正二月食芹菜誤食蛟龍精者爲蛟龍病發則似癟面色青黃

每服寒食鶲五合

兩頭可驗吐蛇者勿用

金匱要略

**魚臍疔瘡**

寒食鶲塗之良乾

干金方

**癰疽毒瘡**

臘月鶲餌畫夜塗之日則愈千金方

**誤吞稻芒**

白鶲頻食簡便方

**魚骨哽咽**

不能出用鶲餌丸子黃大吞之不

下再吞

肘後誤吞錢釵及竹木取

漸食盡便出餌

餌一斤漸外臺箭鏃不

**出見發明**

**服藥過劑**

悶亂者餌餌漸食盡便出

外臺及天雄附子毒

**並食餌**

**總錄**

**手足癰瘡**

炒臘月餌傳火燒成瘡白

**易瘞**

**粉之即燥**

**小品方**

醬

下別品錄

釋名

時珍曰按劉熙釋名云醬者將也

集解

時珍曰麵醬有大豆小麥豌豆及豆油之屬豆油法用豆

大豆三斗水煮糜以麵二十斤拌罨成黃

每十斤入鹽八斤井水四十斤攪罨成油收取之大

黃豆醬法用豆炒磨成粉一斗入麵三斗和勻切片入

鹽五斤以臘水淹過罨成收之小罨黃次年再磨每十斤入

浸蒸軟乾去皮每一斗入小麥一斗磨麵和切片入

鹽五斤水二十斤罨成黃豆醬法用豆水入

蒸過盦黃曬乾每十斤入鹽五斤水二十斤罨成

熟麥麴法用小麥蒸熟罨黃曬乾磨碎每十斤入鹽三斤熟湯二十斤罨成收之甜麴醬用小

熟水和劑切片蒸熟盦黃曬成收之小麥麴醬用生

麵水和布

收之麴醬法用小麥蒸熟罨黃曬成收之甜麴醬用小

麥麴和劑切片蒸熟盦黃曬成收之甜麴醬用生

包踏餅罨黃曬鬆每十斤入鹽五斤水二十斤曬成收之大麥醬用黑豆一斗炒熟水浸半日同煮

燭以大麥麵二十斤拌勻篩下麵用煮豆汁和劑切片蒸熟罨黃曬搗每一斗入鹽二斤井水八斤

曬成黑甜而汁清又有麻滓醬用麻枯餅搗蒸以麵和勻罨黃如常用鹽水曬成色味甘美也

氣味鹹冷利無毒

時珍曰 麵醬鹹豆醬甜醬豆油 大麥醬麩醬皆鹹甘○說曰 多

食發小兒無生痰動氣妊娠合雀肉食之令兒面黑頌曰麥醬和鯉魚食生口瘡

主治除熱止煩滿殺百藥及熱湯火毒

別錄殺一切

魚肉菜蔬葷毒并治蛇蟲蜂蠍等毒日華醬汁灌入

下部治大便不通灌耳中治飛蛾蟲蟻入耳塗猘犬咬及湯火傷灼未成瘡者有效又中砒毒調水

服卽解

珍時

發明

弘景曰醬多以豆作純麥者少入藥當以豆  
醬陳久者彌好也又有魚醬內醬皆呼爲醯

不入藥用

說曰小麥醬殺藥力不如豆醬又有麋鹿兔雉及鱠魚醬皆不可久食也

得醬不食

意欲五味和五臟悅而受之此亦安樂之一端也

時珍曰不得醬不食亦兼取其殺飲食

百藥之毒也

附方

舊六

手指掣痛

醬清和蜜溫熱浸之愈乃止

和石硫黃細末日日指之

外臺祕要

七日三

妊娠下血

豆醬一大盞熬乾生地黃二升去汁取豆炒研酒服方寸

古今錄驗

妊娠尿血

兩爲末每服一錢米飲下

普濟方

浸淫瘡癬

醬瓣和人尿塗千金翼

解輕粉毒

服輕粉口破者

以三年陳醬化水頻漱之瀨湖集簡方

榆仁醬食

校正

原附醬下今分出

集解時珍曰造法取榆仁水浸一伏時袋盛揉洗去涎以蓼汁拌曬如此七次同發過麴如

水五斤崔寔月令謂之醤輪是也音牟豆

蟲不宜多食

孟詭

氣味辛美溫無毒主治利大小便心腹惡氣殺諸

蕪荑醬食

校正

原附醬下今分出

集解時珍曰造法與榆仁醬同

氣味辛美微臭溫無毒多食落髮主治殺三蟲功力強

於榆仁醬

孟詭

發明

張從正曰北人亦多食乳酪酥脯甘美之物皆生蟲之萌也而不生蟲者蓋食中多胡荽

薰蕎鹵汁殺九蟲之物也

醋

別錄下品

釋名

醋 醣 醋

苦酒

弘景曰醋酒爲用無所不入愈久愈良亦謂之醯以有苦味俗呼苦酒丹家又加餘物謂爲華池左味時珍

曰劉熙釋名云醋措也能措置食毒也古方多用

醉字

集解

恭曰醋有數種有米醋麥醋麴醋糠醋糟醋

鷀醋桃醋蒲萄大棗蔓等諸雜果醋會意

者亦極酸烈惟米醋二三年者入藥餘止可啜不

可入藥也詭曰北人多爲糟醋江河人多爲米醋

也

小麥醋不及糟醋爲多妨忌也大麥醋良藏器曰蘇言蒲萄大棗諸果堪作醋緣渠是荆楚人土地時珍曰米醋三伏時用倉米一斗淘淨蒸飯攤冷以水淹過密封暖處三七日成矣糯米醋秋社日用糴米一斗淘蒸用六月六日造成小麥大麴和匀用水二斗入甕封釀三七日成矣粟米醋用陳粟米一斗淘浸七日再蒸熟入甕密封日夕攬陳和之七日成矣小麥醋用小麥水浸三日蒸熟盦黃浸入甕水淹七七日成矣大麥醋用大麥米一斗水入甕飯盦黃曬乾水淋過再以麥飯二斗和勻入水黃入白麴末二兩瓶封曬成其餘糟糠等醋皆不入水化入水

米醋氣味酸苦溫無毒

說曰大麥醋微寒餘醋並同弘景曰多食損人肌臟並盡紀也

藏器曰多食損筋骨亦損胃不益男子損人顏色

醋

發諸藥不可同食時珍曰酸屬木脾病毋多食

酸

傷脾胃而唇揭○服茯苓丹參人不可食

醋

鑑源曰米醋煮制四黃丹砂膽礬常山諸藥也

**主治消癰腫散水氣殺邪毒**

別錄理諸藥消毒鵲治

**產後血運除癥塊堅積消食殺惡毒破結氣心中**

**酸水痰飲**

藏器

**下氣除煩治婦人心痛血氣并產後**

**及傷損金瘡出血昏運殺一切魚肉菜毒**

日華醋磨

**青木香止卒心痛血氣痛浸黃藥含之治口瘡調**

**大黃末塗腫毒煎生大黃服治痃癖甚良**

孟試

**散瘀**

**血治黃疸黃汗**

好古曰張仲景治黃汗有黃芪芍桂枝苦酒湯治黃疸有麻黃醋

酒湯苦酒清酒  
方見金匱要略

王解菜抵也卿上以魚鱠又一婢抱兒落炭火上燒灼以醋泥傅之旋愈  
戢毒及醋觀云君甄芥奉候及期延至從容久之少年餓甚見臺晨愈  
自之諸瘡此二事可證別錄治癰腫殺邪毒之驗也大疾見臺晨愈  
幼功蟲毒氣無非取其酸收之義而病有散瘀肉

爲佳酸益血也以磨雄黃塗蜂蠭毒亦取其收而  
不散之義今人食酸則齒軟謂其水生木水氣弱而  
木性收斂故如是造鞶皮者須得醋而紋皺故知其弱而  
言云魚鱠又一婢抱兒落炭火上燒灼以醋泥傅之旋愈  
無痕少兒眼中常見一鏡趙卿謂之曰來晨愈  
以魚鱠旋啜之遂覺胸中豁然眼花不見臺晨愈  
也卿上以魚鱠又一婢抱兒落炭火上燒灼以醋泥傅之旋愈  
王解菜抵也卿上以魚鱠又一婢抱兒落炭火上燒灼以醋泥傅之旋愈  
戢毒及醋觀云君甄芥奉候及期延至從容久之少年餓甚見臺晨愈  
自之諸瘡此二事可證別錄治癰腫殺邪毒之驗也大疾見臺晨愈  
幼功蟲毒氣無非取其酸收之義而病有散瘀肉

附方

舊二十三

身體卒腫

醋和蚯蚓屎

傳之千金

白虎風毒

以

年醃醋五升煎

五沸切葱白三升煎

一沸濾出

以布染乘熱裹

之痛止乃已

外臺祕要

霍亂

吐利鹽醋煎

服甚良如宜方

以故綿浸醋中

甑蒸熱裹之

未得吐下

以好苦酒

冷卽易勿停

取瘥止

外臺

出汗不滴

足上轉筋

以故綿浸醋中

甑蒸熱裹之

冷卽易勿停

取瘥止

外臺

出汗不滴

瘦郤腰腳并耳聾者米醋浸荆三稜夏四日冬腋

六日爲末醋湯調下二錢卽瘥

經驗後方

外臺

出汗不滴

下胡臭灰

傅之外臺

癰瘍風病

之

酢和硫黃末傳

外臺祕要

出汗不滴

癰疽不潰

苦酒和雀屎如小豆大傳

之下脫

肘後方

舌腫不消

以

和金底墨厚傅舌

之上卽穿也

千金方

木舌腫強

餽醋時時含漱

普濟

半升含漱卽瘥

肘後方

鼻中出血

牙齒疼痛

米醋煮枸杞白皮一升取

敷時時

則更傅須臾卽消

普濟

半升含漱卽瘥

肘後方

鼻中出血

醋和胡粉半棗許服○又法用醋  
和土塗陰囊乾卽易之 千金方

## 塞耳治聾以醋

火灸附子削尖 塞之 千金方

## 面黯雀卵拭之

苦酒漬布常

## 中砒石

## 毒

飲醋得吐卽愈

不可飲水

## 服硫發癰

酢和豉研膏傅之

燥則易

## 食雞子毒

飲少許卽

消廣記方

## 渾身蟲出

方見石部鹽石

## 毒蜂傷

## 螯

清醋急飲一二盃令毒氣

不散然後用藥濟急方

## 蠍刺螯人

酢磨附子

汁傅之

## 醫學

蜈蚣咬毒

醋磨生鐵傅

## 心鏡

諸蟲入耳

上

之以醋和胡粉傅

千金方

## 蜘蛛咬毒

凡百節蚰蜒蟻入耳以苦酒注入起

## 尿瘡

以醋和胡粉傅

之

## 狼煙入口

以醋少許飲

行卽出相公篋中方

## 湯火傷灼

卽以酸醋淋洗

塗之甚妙亦無瘢痕也

## 足上凍瘡

以醋洗足

## 胎死

研藕傅之

**不下**

月未足者大豆煮醋服三升立便分解未下再服

子母秘錄

**胞衣不下**

腹

則殺人以水入

神效

少許

吹醋少許入

鼻中

千金乳

**癰堅硬**

以罐盛醋燒熱石投之二次溫漬之冷

**腫初起**

則更燒石投之不過三次卽愈

千金

疗

**酒**

別錄

中品

**校正**

拾遺糟筍酒

今併爲一

**釋名**

時珍曰按許氏說文云酒就也所以就人之

善惡也一說酒字篆文象水在卣中之狀飲

舊標題云酒之

醇重釀曰酌清者曰濁者曰益厚曰醃薄曰

白綠曰醸

日酒有黍穢粳糯粟麴蜜蒲萄等色凡作

**集解**

恭曰酒有黍穢粳糯粟麴蜜蒲萄等色凡作

醴須麴而蒲萄蜜等酒獨不用麴諸酒醃

白日醸

藥米尊作飲酒入藥社秫方酒之酒牛酒能醸  
所以酒疾酒中眾麴壇黍用名於俱勞桑候不  
以清糲者惟國藥酒餘酒酒素禹說有豆酒潮惟  
功水爲蓋取不和鹿胙蒲有問豆酒潮惟  
力白上此其可爲頭酒葡萄醸亦文方枸葱而米  
和麴稷物味取麴酒今酒酒有云宗杞豉轉酒  
厚麴爲損不以曰羔人地春酒少奭通酒此入  
皆所中益顧爲餅兒所黃酒漿康曰戰仙葡萄合  
勝造粟兼入法子等用酒白則造酒國策云帝  
餘爲行藥今酒酒有蜜酒自酒卽酒靈脾狗肉及  
酒正下可何醫至江穀酒清酒黃杜云帝女等  
古今不如家於浙湖煮灰美帝康始也女儀皆黃酒酒  
人人入慎爾所官湖南酒酒新糟下酒猶也  
又造藥歟然用務南北小豆熟無儀狄本草造酒進  
以麴佐漢久正中北又以麴酒灰梗矣  
蘖未使賜之宜亦有以麴酒灰梗香酒古著  
造見專丞未斟酌四糲粉香酒古著進  
者入用相者蓋諸糲上不但夷粉香酒古著進

止是醴體則非酒也書云遼治療爾惟麴蘖酒則用  
之假醴法用東陽酒最佳其味甚若作酒醴廣記所  
至醉不頭痛不口乾皆解其水性復金黃飲造載  
之辛薺亦用藥今其酒相若作酒醴廣記所  
之鹽邑所造俱以其水性復金黃飲造載  
南瓶味麴於水水和鹽邑所造俱以其水性復金黃飲造載  
曰南瓶味麴於水水和鹽邑所造俱以其水性復金黃飲造載  
成秦薦陵曰南瓶味麴於水水和鹽邑所造俱以其水性復金黃飲造載  
以蜀州美東綠酒太有東和鹽邑所造俱以其水性復金黃飲造載  
簡吸咂芬鬱酒酒有多能金陵瓶不浮然皆解其水性復金黃飲造載  
飲嘛酒金卽麴有聚及紅綠瓶不浮然皆解其水性復金黃飲造載  
穀酒皆清烈卽華山酒及紅豆山酒及浮然皆解其水性復金黃飲造載  
既稻烈此酒豆豆山酒及浮然皆解其水性復金黃飲造載  
雜麥但常古能川東麴也飯也水不毒清惟用名事  
酒黍麴飲解烏秋米江造水不毒清惟用名事  
不秫中入蘭陵毒之露無嫌而水酒以泉得色香  
清藥亦藥亦類白姑美也處州金盆於他  
美麴有俱李亦飲色而水酒以泉得色香  
並小藥良太有之純味鹹且用名事  
不罌物山白灰頭味鹹且用名事  
可封黃西詩不痛烈美口蘇州得色香  
入釀酒襄所謂時渴州得色香  
藥而有陵謂時渴州得色香  
灰酒蘭珍淮小灰而劣露他

# 米酒氣味苦甘辛大熱有毒

詵曰久飲傷神損壽

當風則成癱風醉浴冷水成痛痹服丹砂人飲之頭痛吐熱士良曰凡服丹砂北庭石亭脂鍾乳諸石生薑並不可長用酒下能引石藥氣入四肢滯血化爲癰疽藏器曰凡酒忌諸甜物酒漿照人無影同牛肉食令人人生蟲酒後臥黍穠食豬肉患大風時珍曰酒後食芥及 辣物緩人筋骨酒後飲茶傷腎臟腰腳重墜膀胱冷痛兼患痰飲水腫消渴攀者水制火也酒性上而鹹潤下也又畏枳椇葛花赤豆花綠豆粉者寒勝熱也

## 主治行藥勢殺百邪惡毒氣

錄別通

血脈厚腸胃潤皮膚散溼氣消憂發怒宣言暢意  
藏器孟詓解馬肉桐油毒丹石  
養脾氣扶肝除風下氣

發動諸病熱飲之甚良

時珍

糟底酒

三年臘糟下取之

開胃下食暖水臟溫腸胃消宿

食禦風寒殺一切蔬菜毒

華日止嘔噦摩風癩腰膝

疼痛

孫思邈

老酒

臘月釀造者可經數十年不壞

和血養氣暖胃辟寒發痰動

火

時珍

春酒

清明釀造者亦可經久

常服令人肥白

孟诜

蠻蠻螺屎瘡飲

之至醉須臾蟲出如米也

李絳兵部手集

社壇餘胙酒

拾遺治小兒語遲納口中佳又以噴屋

四角辟蚊子

藏器

飲之治聾

時珍曰

按海錄碎事云

李濤

有社翁今日沒心情爲寄治聾酒一瓶之句

糟筍節中酒

氣味

鹹平無毒主治飲之主噦氣嘔

東陽酒

氣味甘辛無毒

主治用制諸藥良

發明

弘景曰

大寒凝海

惟酒不冰明其性熱獨冠

昏是其有毒故也博物志云王肅張衡馬均三人冒霧晨行一人飲酒一人飽食一人空腹空腹者死飽食者病飲酒者健此酒勢辟惡勝於他食之效也好古曰酒能引諸經不止與附子相同味之辛者能散苦者能下甘者能居中而緩用爲導引可以通行一身之表至極高分味淡者則利小便

而速下也。古人惟以麥造麴釀黍已爲辛熱，和損精之毒。  
神類今之速下者加以烏頭巴豆砒霜薑桂石灰竈灰。  
言酒涸大之藥以增其氣味，豈不傷冲和。  
振言榮衛竭天癸而天人壽耶？震亨曰：本草止。  
肺病或脾病，溺濁寒戰熱，有大熱之藥，以增其氣味。  
戒得肺熱，痔瘻或可見矣。又性喜溼，中發熱，必熱，隨近於相火。  
脾擁或得寒入飲者，爲難名之病，或失明，其久也，病或瘡疥內鬱，肺必熱。  
胃傷早恣飲中之溫，可微養溫，然後自覺非具眼，或哮也。病或鼻齰，肺必熱。  
停心飲而生目夜澆動，氣夜不自覺，其久也，病或瘡疥內鬱，肺必熱。  
心傷而不知夜，則不自覺，其久也，病或鼻齰，肺必熱。  
火收飲，然圖養溫，肺也。勞或鼓氣，久則生瘡疥，內鬱，肺必熱。  
慾酒甚，取冷得理，眼未明，或喘，病或鼻齰，肺必熱。  
因以既快酒溫，宜冷，易冷處或深，或鼻齰，肺必熱。  
而發醉喉行中冷，致之既舌遲，意有也。勞或消，或大痰，火必熱。  
致之亂飽焉，傳意有也。夫療消，或渴泄，傷瘴者，其睡爾化可三益，或渴泄，傷瘴者，其清而穎，以益焉，酒癲或利其鬱，火必熱。  
多矣。明就漸補，人氣過性癟，內或始于醉草止。朱勞枕人氣過性癟，內或始于醉草止。子其熱知不次于大，或疽心也。

云潰以醉爲節可也。機曰：按扁鵲云過飲腐腸爛胃，穿顎而死矣。豈非犯扁鵲之戒乎？時珍曰：酒天之美物，當以興神，不可致疾敗行。禹所以疏儀狄，周公所以著酒誥，爲常者輕世勝，爲害者重身敗。此大禹所以喪邦，周公所以隕軀，皆醉之禍也。

## 附方

新六十

## 驚怖卒死

溫酒灌

## 鬼擊諸病

卒然着

刺狀胸脇腹內切

殺人多飲醡酒

入瘡或馬汗

入瘡皆致腫痛

入瘡則虎

入瘡則虎

入瘡則虎

入瘡則虎

入瘡則虎

入瘡則虎

入瘡則虎

# 傷人瘡

但飲酒常令大醉當吐毛出

# 蛇咬成瘡

暖酒淋洗瘡上日三次

# 廣利

方 蜘蛛瘡毒

同上

毒蜂蟄人

方同上

咽傷聲破

酒一

合酥一七乾薑末二七和

服日二次十便良方

三十年耳聾酒三升清

酒三升清

升七日去滓任性

千金方

天行餘毒

手足腫痛欲斷作坑深三尺燒熱灌酒着

屐居坑上以衣壅之

勿令泄氣類要方

下部痔瘡

掘地作小坑燒赤以酒沃之納吳茱萸

萸在內坐之不過

三度良外臺方

產後血悶

清酒一升和生地黃汁煎服

面疣目

盜酸酒

醉洗你頭急急如律令咒七遍自愈

外身

臺斷酒不飲

酒七升硃砂半兩瓶浸緊封安豬圈

方內任豬搖動七日取出頓飲○又方

正月一日酒五升淋碓頭

千金方

丈夫腳冷

不隨不能行者用滻酒

斗水三斗入瓮中灰火煜之漬腳至膝常着灰火勿令冷三日止

干金方

海水傷裂

凡人爲海水鹹物所傷及風吹裂痛不可忍用蜜半斤水酒三十斤防風當歸羌活荆芥各二兩爲末煎湯浴之一夕

卽愈使琉球錄

### 附諸酒方

時珍曰本草及諸書並有治病釀酒諸方今輯其簡要者以備參攷藥品多者

不能盡錄

### 愈瘡酒

治諸瘡疾頻頻溫飲之四月八日米一石麴一斤爲末俱酸水中待醉煎之一石取

七斗待冷入麴四斤一宿上生白沫起炊穢

一石冷酸三日酒成

賈思勰齊民要術

### 屠蘇酒

陳延之小品方云此華陀方也元旦飲之辟疫癘一切不正之氣造法用赤木桂心

七錢五分烏頭二錢五分赤小豆十四枚以三角絳

七錢五分防風一兩菝葜五錢蜀椒桔梗大黃五錢

囊盛之除夜懸井底元旦取出置酒中煎數沸舉家東向從少至長次第飲之藥滓還投井中歲飲此水一世無病○時珍曰蘇魄鬼名此藥屠割鬼爽故名或云草菴名也

### 逡巡酒

補虛益氣去一切風痹溼氣久服益壽耐老好顏色造法三月三日收桃花三兩

錢五月五日收馬蘭花五兩五錢六月六日收麻花六兩六錢九月九日收黃甘菊花九兩九錢陰乾十二月八日取臘水三斗待春分取桃仁四十九枚好者去皮尖白麵十斤正同前花和作麵紙包四十九日用糯米飯一升白水一瓶麪一丸

### 五加皮酒

去一切風溼痺痹壯筋骨填精髓用五加皮洗刮去骨煎汁和麵米釀成飲之

或切碎袋盛浸酒煮飲或加當歸牛膝地榆諸藥

### 白楊皮酒

治風毒腳氣腹中痰癖如石以白楊皮切片浸酒起飲

**女貞皮酒**

治風虛補腰膝女貞皮切片浸酒煮飲之

**仙靈脾酒**

治偏風不遂強筋堅骨仙靈脾一斤袋盛浸無灰酒二斗密封三日飲之 聖

方惠

**薏苡仁酒**

去風溼強筋骨健脾胃用絕好薏苡仁粉同麴米釀酒或袋盛煮酒飲之

**天蠶冬酒**

潤五臟和血脈久服除五勞七傷癩癍惡疾常令酒氣相接勿令大醉忌生冷吹也冬月用天蠶冬去心煮汁同麴米釀成初熟三十日乃已五十日不知風

微酸久乃味佳

千金方

**百靈藤酒**

治諸風百靈藤十斤水一石煎汁三斗入糯米三斗神麴九斤如常釀成三五

日更炊糯飯投之卽熟

聖惠方澄清

# 白石英酒

治風溼周痹肢節溼痛及腎虛耳聾用白石英磁石煅醋淬七次各五兩絹袋

盛浸酒中少更添之

五六日溫飲

聖濟總錄

# 地黃酒

補虛弱壯筋骨通血脈治腹痛變白髮用生肥地黃絞汁同麴米封密器中五七日

啟之中有緣汁

真精英也宜先飲之乃濾

汗藏貯加牛膝汁效更速亦有加羣藥者

# 牛膝酒

壯筋骨治痿痹補虛損除久瘧用牛膝煎汁和麴米釀酒或切碎袋盛浸酒煮飲之

# 當歸酒

和血脈堅筋骨止諸痛調經水當歸煎汁或釀或浸並如上法

# 菖蒲酒

治耳目聰明石菖蒲煎汁或釀或浸並如上法

# 枸杞酒

補虛弱益精氣去冷風壯陽道止目淚健腰腳用甘州枸杞子煮爛搗汁和麴米釀

法上

酒或以子同生地  
黃袋盛浸酒煮飲

人參酒

補中益氣通治諸虛用人參末同  
米酒或袋盛浸酒煮飲

薯蕷酒

治諸風眩運益精髓壯脾胃用薯蕷粉同  
米酒或山茱萸五味子人參諸藥

浸酒煮飲

茯苓酒

治頭風虛眩暖腰膝主五勞七  
傷用茯苓粉同米酒飲之

菊花酒

治頭風明耳目去瘡癥消百病用甘菊花  
煎汁同米酒或加地黃當歸枸杞諸藥

佳藥亦

黃精酒

壯筋骨益精髓變白髮治百病用黃精蒼  
朮各四斤枸杞根柏葉各五斤天蠶冬三

斤煮汁一石同米酒飲

糯米一石如常釀酒飲

**桑椹酒**

補五臟明耳目治水腫不下則滿下之則虛入腹則十無一活用桑椹搗汁煎過同

醸酒飲  
麴米如常

**朮酒**

治一切風溼筋骨諸病駐顏色耐寒暑用朮三十斤去皮搗以東流水三石漬三十日取

汁露一夜浸

麴米釀成飲

**蜜酒**

孫真人曰治風疹風癬用沙蜜一斤糯飯一斤麵麴五兩熟水五升同入瓶內封七日成

酒尋以蜜入

酒代之亦良

**蓼酒**

久服聰明耳目脾胃健壯  
以蓼煎汁和麴米釀酒飲

**薑酒**

洗曰治偏風中惡疰心腹冷痛以薑浸酒緩服一盃卽止○一法用薑汁和麴造酒如

常服  
之佳

**葱豉酒**

說曰解煩熱補虛勞治傷寒頭痛寒熱及冷痢腸痛解肌發汗並以葱根豆豉浸酒

**飲煮**

**茴香酒**

治卒腎氣痛偏墜牽引及心腹痛茴香浸酒煮飲之舶茴尤妙

**縮砂酒**

消食和中下氣止心腹痛砂仁炒研袋盛浸酒煮飲

**莎根酒**

治心中客熱膀胱下氣鬱常憂不樂以莎根一斤切熬香袋盛浸酒日夜服之常

**令酒氣相續**

**茵陳酒**

治風疾筋骨攣急用茵陳蒿炙黃一斤秫米一石麴三斤如常釀酒飲之

**青蒿酒**

治虛勞久瘧青蒿搗汁煎過如常釀酒飲

**百部酒**

治一切久近咳嗽百部根切炒袋盛浸酒頻頻飲之

**海藻酒**

治癰氣海藻一斤洗淨浸酒日夜細飲之

**黃藥酒**

治諸癰氣萬州黃藥切片袋盛浸酒煮飲

**仙茆酒**

治精氣虛寒陽痿膝弱腰痛痹緩諸虛之病用仙茆九蒸九曬浸酒飲

**通草酒**

續米釀酒飲通草子一名燕覆子卽木通子

**南藤酒**

治風虛逐冷氣除痹痛強腰腳石南藤煎汁同麴米釀酒飲

**松液酒**

治一切風痹腳氣於大松下掘坑置甕承取其津液一斤釀糯米五斗取酒飲之

**松節酒**

治冷風虛弱筋骨攀痛腳氣緩痹松節煮汁同麴米釀酒飲松葉煎汁亦可

**柏葉酒**

治風痹歷節作痛東向側柏葉煮汁同麴米釀酒飲

**椒柏酒**

治風痹一切疫癘不正之氣除夕以椒三七粒東向側柏葉七枝浸酒一瓶飲

竹葉酒

治諸風熱病  
竹葉煎汁如常釀酒飲

槐枝酒

治大麻瘧病  
槐枝煮汁如常釀酒飲

枳茹酒

治中風身直口僻眼急  
枳殼刮茹浸酒飲之

牛蒡酒

治諸風毒利腰腳  
牛蒡根切片浸酒飲之

巨勝酒

治風虛羸弱腰膝疼痛  
香薷苡仁二升生地黃半斤袋盛浸酒飲

麻仁酒

治骨髓風毒痛不能動者  
麻子中仁炒香袋盛浸酒飲

桃皮酒

治水腫利小便  
煎汁同秫米釀酒飲

紅麴酒

治腹中及產後瘀  
血紅麴浸酒煮飲

神麴酒

治赤淬腰痛  
燒神麴酒飲

**柘根酒**

治耳聾方  
具柘根下

**磁石酒**

治腎虛耳聾用磁石木通  
菖蒲等分袋盛酒浸日飲

**蠶沙酒**

治風緩頑痹諸節不隨腹內宿  
痛用原蠶沙炒黃袋盛酒浸酒飲

**花蛇酒**

治諸風頑痹癱緩攀急疼痛惡瘡疥癩用  
白花蛇肉一條袋盛同麴置於缸底糯飯

**花蛇酒**

治諸風頑痹癱緩攀急疼痛惡瘡疥癩用  
白花蛇肉一條袋盛同麴置於缸底糯飯

**烏蛇酒**

治療法同上

**蚺蛇酒**

治諸風痛痹殺蟲辟瘴治癩風瘡癬惡瘡  
用蚺蛇肉一斤羌活一兩袋盛同麴置於

**缸底糯飯**

蓋之釀成酒飲亦可浸酒詳見本條○  
穎曰廣西蛇酒罐上安蛇數寸其麴則采山中草

**無藥不能**

耳聾也能

**蝮蛇酒**

治惡瘡諸瘻惡風頑痹癱疾取活蝮蛇一條同醃酒一斗封埋馬溺處周年取出蛇

**身體**

**消化**每服數盃當習習而愈也

**紫酒**

治中風口偏不語及角弓反張煩亂欲死及鼓脹不消以雞屎白一升炒焦投酒中待紫

**色去滓**

頻飲之

**豆淋酒**

破血去風治男子中風口渴陰毒腹痛及小便尿血婦人產後一切中風諸病用黑

**豆炒焦**

以酒

淋之溫飲

**霹懸酒**

治癥氣偏墜婦人崩中下血胎產不下以鐵錘燒赤浸酒飲之

**龜肉酒**

治十年咳嗽釀法詳見龜條

**虎骨酒**

治臂脛疼痛節風腎虛膀胱寒痛虎脛具炙黃梔碎同麴米如常釀酒飲亦

可浸酒詳  
見虎條

### 麋骨酒

治陰虛腎弱久服令人肥白麋骨煮汁同麴米如常釀酒飲之

### 鹿頭酒

治虛勞不足消渴夜夢鬼物補益精氣鹿頭煮爛搗泥連汁和麴米釀酒飲少入葱

椒

### 鹿茸酒

治陽虛痿弱小便頻數勞損諸虛用鹿茸山藥浸酒服詳見鹿茸下

### 戊戌酒

說曰大補元陽穎曰其性大熱陰虛無冷病不宜飲之用黃狗肉一隻煮糜連汁

和麴米釀  
酒飲之

### 羊羔酒

大補元氣健脾胃益腰腎宣和化成殿真方糯米一石如常浸蒸嫩肥羊肉七斤麴

十四兩杏仁一斤同煮爛連汁拌飯入木香一兩

同釀勿犯水十日熟極甘滑○一法羊肉五斤蒸

爛酒浸一宿入消梨七箇同  
搗取汁和麴米釀酒飲之

臘脯臍酒助陽氣益精髓破癥結冷氣大補益人

臘脯臍酒浸擂爛同麴米如常釀酒飲

## 燒酒

目綱

## 釋名火酒

目綱阿刺吉酒飲膳正要

集解時珍曰燒酒非古法也自元時始創其法用濃酒和糟入瓶蒸令氣上用器承取滴露凡或酸壞之酒皆可蒸燒近時惟以糯米或梗米或黍蒸熟和麴釀甕中七日以瓶酒以燒酒取其黍復燒煙薰二次味大麥蒸熟和麴釀甕中七日以瓶酒以燒酒取其黍清如水或稱寶異香其鑪每個以檀香數斤酒其鑪也穎曰暹邏酒以燒酒取其黍親醉去燒酒氣薰令入極麥蒸熟和麴釀甕中七日以瓶酒以燒酒取其黍人數次用漆珍寶異香其鑪也穎曰暹邏酒以燒酒取其黍打下積病飲人有蟲飲一攜至船埋土中二寸許卽愈且殺蟲子云云

**氣味**辛甘大熱有大毒

時珍曰過飲敗胃傷膽喪心損壽甚則黑腸腐胃而

死與薑蒜同食令人生痔○鹽冷水綠豆粉解其毒

**主治**

消冷積寒氣燥溼

痰開鬱結止水泄治霍亂瘧疾噎膈心腹冷痛陰

毒欲死殺蟲辟瘴利小便堅大便洗赤目腫痛有

**效**

時珍

**發明**

時珍曰燒酒純陽毒物也面有細花者爲眞

之南人止暑月飲之

與火同性得火卽燃同乎焰消北人四時飲

熱勝溼祛寒故能開佛鬱而消沉積通膈噎而散

痰飲治泄瘧而止冷痛也辛先入肺和水飲之則

抑使下行通調水道而小便長白熱能燥金耗血

大腸受刑故令大便燥結與薑蒜同飲卽生痔也

若夫暑月飲之汗出而膈快身涼赤目洗之淚出

而腫消赤散此乃從治之方焉過飲不節殺人頃  
之是假盜以方矣善攝生者宜戒之按劉克用病  
機賦云有入病赤目以燒酒入鹽飲之而痛止腫  
消蓋燒酒性走引鹽通行經絡使鬱

結開而邪熱散此亦反治劫劑也

### 附方

新冷氣心痛

燒酒入飛

鹽飲酒卽止

汲井水

瀕湖

寒溼泄瀉

小便

燒酒溫飲

汗出卽止

清者

酒滴入仰

之半時

即可籍出

### 嘔逆不止

真火酒一盃和服

甚妙

新汲

頭燒酒

如棗核

大痛不可動者

以火

飲之卽止

酒滴入仰

之半時

即可籍出

### 李樓風蟲牙痛

燒酒浸花椒

頻頻漱之

寒痰咳嗽

燒酒四

兩豬脂

### 奇方蜜香油茶末各四

兩同浸酒

內煮

**集解**

說曰

蒲萄可釀酒，藤汁亦佳。

時珍曰

蒲萄酒有大毒。

釀者取汁同麴如常釀糯米飯法無汁用乾蒲萄末亦可。魏文帝所謂蒲萄釀酒甘於麴米醉而易醒者也。燒者取蒲萄數十斤同大麴釀酢取入甑蒸之以器承其滴露紅色可愛。古者西域造之唐時破高昌始得其法。按梁四公記云：高昌獻蒲桃乾凍酒，杰公曰：蒲桃皮薄者味美，皮厚者味苦。八月至太行山辨其真偽，於冀窯等路造蒲桃酒。八月至太行山辨其真偽，一真者下水卽流偽者得水卽冰凍矣。久藏者中有正要云：酒有數等，出哈喇火者最烈。西番者次之。飲之令人透腋而死。酒至二三年亦有大毒，飲膳亦平陽太原者又次之。或云蒲萄久貯亦自成酒，芳甘酷烈。此真蒲萄酒也。

**釀酒氣味甘辛熱微毒**

時珍曰有熱疾、齒疾、瘡疹人不可飲之。

**主治暖腰腎駐顏色耐寒**

時珍

**燒酒氣味辛甘大熱有大毒**

時珍曰大熱大毒甚於燒酒北人習而不

覺南人切不可輕生飲之

**主治益氣調中耐饑強志**

正要

**消痰破癩**

汪穎

## 糟

綱目

**釋名粕**

綱目

**集解**

時珍曰糯秫黍麥皆可蒸釀酒醋熬煎餳飴化成糟粕酒糟須用臘月及清明重陽造者

漚乾入少鹽收之藏物不敗揉物能軟若榨乾者無味矣醋糟用三伏造者良

**酒糟氣味甘辛無毒主治溫中消食除冷氣殺腥**

去草菜毒潤皮膚調臟腑

恭蘇

署撲損瘀血浸水洗

# 凍瘡搗傅蛇咬蜂叮毒

華日

## 發明

時珍曰酒糟有麴蘖之性能活血行經止痛故治傷損有功按許叔微本事方云治腕折

傷筋骨痛不可忍者用生地黃一斤藏瓜薑糟一斤生薑四兩都炒熱布裹罨傷處冷卽易之曾有一人傷折醫令捕一生龜將殺用之夜夢龜傳此方

用之而愈也又類編所載只用藏瓜薑糟一物入赤小豆末和勻罨於斷傷處以杉片或白桐片夾之云不過三日卽痊可也

## 附方

新

### 手足皸裂

紅糟臘豬脂薑汁鹽等分研爛炒熱擦之裂內甚痛少頃卽合

再擦數次卽

### 鶴膝風病

酒醋糟四兩肥阜一箇去袖珍方子芒消一兩五味子一兩

安砂糖一兩薑汁半瓢研勻日塗之加入燒酒尤妙也

暴發紅腫者臘糟糟不可忍

之  
翁試談  
如蟻行  
卽散簡便  
方

上升

# 杖瘡青腫

用溼綿紙鋪傷處以燒過酒  
糟搗爛厚鋪紙上良久痛處

大麥醋糟氣味酸微寒無毒主治氣滯風壅手背  
腳膝痛炒熱布裹慰之三兩換當愈孟詭

乾餳糟氣味甘溫無毒主治反胃吐食暖脾胃化  
飲食益氣緩中時珍

發明時珍曰餳以藁成暖而消導故其糟能化滯  
緩中養脾止吐也按繼洪澹寮方云甘露湯  
治反胃嘔吐不止服此利胸膈養脾胃進飲食用  
乾餳糟六兩生薑四兩二味同搗作餅或焙或曬  
入炙甘草末二兩鹽少許點湯服之常熟一富人  
病反胃往京口甘露寺設水陸泊舟岸下夢一僧

持湯一杯與之飲罷便覺胸快次早入寺供湯者乃夢中所見僧常以此湯待賓故易名曰甘露湯予在臨汀療一小吏旋愈切勿忽之

附方

新

脾胃虛弱

平胃散等分末

一斤入乾糖糟

二斤半生薑

一斤半紅棗

三

百箇煮取肉焙乾

通爲日點湯服

摘玄

米

粄物

釋名米皮糠

時珍曰粄薄之義也

集解

穎曰米粄即精米上細糠也

昔陳平食糠覈

而肥也時珍曰糠諸粟谷之殼也其近米之

細者爲米粄味極甜儉年人多以豆屑或

草木花實可食者和劑蒸煮以救饑云

氣味甘平無毒主治

通腸開胃下氣磨積塊作糗

本草綱目穀部

卷二十五米粄

七

食不饑充滑膚體可以頤養

汪穎

春杵頭細糠

別錄中品

校正

禹錫曰自草部移入此

集解

時珍曰凡穀皆有糠此當用粳稻粟秫之糠也北方多用杵南方多用碓入藥並同丹家

言糠火鍊物

力倍於常也

氣味辛甘熱

震亨曰穀殼屬金糠之性則熱也

主治卒噎刮取含

之

煎湯呷之亦可

燒研水服方寸匕令婦人易產

時珍

母祕錄

出子

發明

弘景曰治噎用此亦是春搗義爾天下事理多相影嚮如此

附方

舊

一膈氣噎塞

飲食不下用碓觜上細糠蜜丸彈子大時時含嚥津液

聖惠咽喉妨礙如有物吞吐不利者頭糠人參各一錢石蓮肉炒一錢水煎服日三次

總錄

聖濟

本草綱目穀部第二十五卷終