

古今醫鑑

中風氣性機訣
脉病藥運中

己巳
76
共8冊

龍雲林先生原本

增補古今

醫鑑

文盛堂梓行

訂補古今醫鑑序

余於醫卷望洋興嘆乎第識其涯涘也友人以懿共雲林先生醫鑑久為嘉之秋毫今十易利未刻將發問序於余余未解醫安能序醫謹然竊有說焉幾者斯姪畢照也故物無遁情曰

懸鑑惟鑑有以覽。復見閔孜其名義。
諸其情狀。亦生憂。適嘗失滌來
國家治義人。物減一空。莫不有錢然後
勝。其所以生之。叔父。而竊於府施。不
棄於所行。而况醫。以。高生。不有錢
焉。脉何以切。左何。察聲。所以聽形。

何以審何以使至東與受病者而相
印而參較然後何以割斬葉術以
謂割醫鑑之有裨於人自當垂諸不
朽也固也又閔前以爲立鑑地上古
岐黃倉扁類皆神靈純德故能開物
創制以為來鑑澤之以不代不乏賢

求其可以為鑑者以惟憐長沙李東垣
劉河間朱丹溪數君子而已而龔雲
林先生又該數君之子而集其成不補
千秋龜鑑哉或曰心之靜始止水莫
虛而能照者非鑑乎且醫安竟也烏
用此區區故偏為余曰否上吾心固

具奉然立鑑矣使每已熟之鑑以於
之不幾謂法人之道可以靜心自固
乎然則醫鑑之斗易梨棗也是使暇
隙猶撫遠谷窮岩良醫之難迅巨
展毫披闇神貽而斟酌之以能因病
下藥審症檢方當不至如此案之涯海

新刻增補古今醫寶鑑目錄

第二卷

金集

脉訣

病機

藥性

運氣

中風

傷寒

中寒

瘟疫

中暑

中濕

火證

內傷

傷食

傷酒

鬱證

痰飲

咳嗽

哮吼

喘急

第三卷

絲集

癰疾

痢疾

泄瀉

霍亂

嘔吐

恶心

翻胃

欬逆

吞酸

嘈雜

諸氣附青

痛癟

脹滿

水腫

積聚

五疸

發熱

第四卷

竹集

補益

痼冷

虛勞

失血

自汗

盜汗

眩暉

麻木

癲狂

五癆

健忘

怔忡

驚悸

虛煩

不寐

便濁

遺精

淋閉

閉結

痔漏

懸癰

腸澼

脫肛

腋氣

諸虫

第五卷
匏集

頭痛

鬚髮

面病

耳病

目翳

口舌

牙齒

眼目

咽喉

結核

核

癰瘍

心痛

腹痛

腰痛

脇痛

脛痛

癰瘍

脚氣

癰瘍

廻痛

消渴

口渴

癰瘍

第六卷
土集

婦人

虛勞

經閉

崩漏

帶

求嗣

東坡先生集

卷之三

乳病

第七卷

董集

小兒

驚風

諸痺

癰疾

諸熱

感冒

傷食

吐瀉

痢疾

痰嗽

氣喘

瘧疾

盜汗

蟲痛

脇風

夜啼

丹毒

口病

牙疽

眼疾

頭瘡

發斑

痘瘡

麻疹

第八卷

水集

配合癰疽

癰癰

疔瘡

便毒

楊梅

臘瘡

陰阻癰瘡

癰瘡

疔瘡

諸瘡

杖瘡

折傷

金瘡

破傷

湯火

田獸

中毒

補古今醫鑑

目次

分門骨鈕

膏藥

通治

救荒

東增補古今醫鑑卷之一

太醫院醫官金谿龔信編

男廷賢續編

書林蘊古堂余元聲重刻

金集

脉訣

脉學大要

凡診脉之法先要定得三部位分明白又要曉得十二經絡五臟六腑及五臟配合五行四時生克之理又要知得脉之息數分別浮沉遲數滑濶及諸脉陰陽主病之原也何謂三部謂人兩手俱有寸關尺也凡診脉先以中指揣摩掌後有小高骨就是關脉然後下前後二指關前至魚際得周身一寸故名爲寸口爲陽關後至尺澤穴得同身之一尺故名爲尺部爲陰又寸脉六分閔脉六分其上三分入于寸內是陽得寸內九分陽數九也寸內七分閔

下三分入一尺內是陰得尺內一寸陰數十也終始一寸九分此也又長人
脉長當疎排指短人脉短當密排指人瘦小則輕取之人肥大則重取之性
急人脉急性緩人脉緩又有反閔脉在三部之後或臂側若過寸口上魚際
者名曰魚際脉有左大右小者有左小右大者有貴人兩手清微而無脉者
有兩手俱洪大者須用心診視凡診脉先須調乎自己氣息男左女右初輕
按消息之次中按消息之再重按消息之推而上消息之上郎閔之前也推
而下消息之下郎閔之後也推而內消息之內即臟之脉也推而外消息之
外即腑之脉也 徒自寸閔尺逐部尋究一呼一吸之間要以脉行四至爲
率閏以太息脉五至是爲平脉也其有太過不及則爲病脉也凡人十二經
動脈循環一晝夜五十週朝於寸口會於平旦內經凡診平人之脉常以平
旦至診病脉則不以晝夜拘也唯經獨取寸口者郎手太陰之經也上古診
法有三其一各於十二經動脈見處分爲三部天地人以候各臟腑以下

定其身形斯叔和所取以爲寸口臟腑之位也

何謂五臟六腑蓋五臟者心肝脾肺腎也六腑者膽胃大腸小腸膀胱三焦也左手閔前一分爲人迎右手閔前一分爲氣口左手寸口心與小腸之脉所出君火也左手閔部肝與膽之脉所出風水也左手尺部腎與膀胱之脉所出寒水也右手寸口肺與大腸之脉所出燥金也右手閔部脾與胃之脉所出濕土也右手尺部命門與三焦之脉所出相火也蓋五臟者藏精氣而不能滿而不能實六腑者傳化物而不藏實而不能滿故脉始於中焦飲食入口藏胃精微之化注於手太陰肺手陽明大腸足陽明胃足太陰脾手太陰心手太陽小腸足太陽膀胱足少陰腎手厥陰心胞手少陽三焦足少陽胆足厥陰肝復還注於手太陰肺循環灌漑朝於寸口人迎以處百病而決死生也

然以對待之位言之則左手寸火冠右手寸金左手閔木冠右手閔土左尺水冠右尺火

左剛右柔有夫婦之別也然左手屬陽右手屬陰左寸君火以尊而在上右尺相火以卑而在下有君臣之道也又以循環之序言之蓋以右寸金生左尺水水又生左閔木木又生左寸火火復通右尺相火相火又生右閔土土又生右寸金而金復生水此五行更相生養循環無端有子母之親也蓋子能令母實母能令子虛是也治法云虛則補其母實則瀉其子如水生木是水爲母木爲子木復生火是木受竊氣故水怒而尅火所謂子逢竊氣母乃力爭火又生土是火爲母土爲子土見火被水尅故怒而尅水所謂母被鬼傷子乃力救假如肝木有餘是肺金不足金不能尅木故木無所畏其氣有餘反薄激肺金而乘其脾土也故曰薄所不勝而乘其勝也此五臟之氣內相滌併爲疾也又如肝木氣少不及則不能以制土土無所畏而遂妄行乃凌其腎水矣故曰所勝妄行而所生者受病也肝木之氣不平則肺金之氣自薄故曰所不勝薄之也蓋木氣不平土金交薄相迫爲疾故曰氣迫也相

生相尅相勝展轉無窮舉一以例其餘也

何謂五臟配合五行四時五音蓋五行者金木水火土也四時者春夏秋冬也五音者宮商角徵羽也肝主筋其華在爪其藏魂其聲呼其液泣應角音弦而直屬木應乎春令其色青其味酸心主血脉其榮在色其藏神其養益其候音其聲言其液汗應徵音和而長屬火應乎夏令其色赤其味苦肺主華皮毛其充在皮其藏魄其主聲其聲哭其液涕應商音輕而勁屬金應乎秋令其色白其味辛腎其華在髮其充在骨其藏精與志其主液其侯耳其聲呻其液溼應羽音沉而深屬水應乎冬令其色黑其味鹹脾其華在唇肆白其充在肌其藏意與志其聲歌其液涎應宮音大而和屬土應乎四季月其色黃其味耳是五臟配合五行四時五音也何謂四時之脉謂春弦夏鈞秋毛冬石然春脉弦者謂正月寅二月卯木旺春日脉浮如魚遊在波雖出猶未全浮故其脉弦而長以應東方肝木之氣也夏脉鈞者謂四月巳五月午

火上炎夏月在膚陽氣大盛故其脉來有力浮大而散以應南方心火之氣也秋月毛者謂七月申八月酉金旺而金性輕浮秋月下膚隨陽氣漸降將欲藏去故其脉來浮清而短以應西方肺金之氣也冬脉石者謂十月亥十一月子木旺而水性下流冬日在腎陽氣伏藏故其脉沉濡軟滑以應北方腎水之氣也辰戌丑未四季月脉遲緩者謂土性厚重其脉來和緩而大以應中央脾土之氣也四季之脉雖有弦鈞毛石之分然春三月六部中俱帶弦夏三月俱帶洪秋三月俱帶浮冬三月俱帶沉六部內按之又兼和緩爲有胃氣此無病之脉也若但見弦鈞毛石而無和緩此是真臟之脉人不病而死也大抵脉者氣血之先也氣血盛則脉盛氣血衰則脉衰氣血熱則脉數氣血寒則脉遲氣血壯則脉大氣血微則脉小氣血和則脉平試以脉之大綱言之初持脉輕手候之脉見於皮膚之間者陽也腑也心肺之應也蓋心肺在上故其脉皆浮若浮大而散者心也浮濶而短者肺也重手按之脉

附於肌肉之下者陰也臟也肝腎之應也蓋肝腎在下故其脉皆沉若弦而長者肝也沉而軟滑者腎也不輕不重中而取之脉應於肌肉之間陰陽相適中和之應脾胃之候也蓋脾居中州故脉緩而大此五臟不病之平脉也診視者必熟知平脉然後可以辨病脉也若短小而見於皮膚之間者陰乘陽也故大而見於肌肉之下者陽乘陰也寸尺皆然

又以脉之十二經絡分之脉有浮沉診有輕重也左寸先以輕手得之是小腸屬表後以重手如六菽之重得之是心屬裏心在肺下主血脉心脉循血脉而行按至血脉而得爲浮稍加力脉道粗大爲大又稍加力脉道潤軟而散此乃浮大而散不病之脉也若出於血脉之上見於皮膚之間是其浮也入於血脉之下見於筋骨之分是其沉也左關先以輕手得之是肝屬表後以重手如十二菽之重取之是肝屬裏肝在脾下主筋肝脉循筋而行也至筋平脉道如筩絃者爲弦次稍加力脉道迢七爲長此弦長不病之脉也若出

於筋上見於皮膚血脉之間是其浮也入於筋下見於骨上是其沉也左脉先以輕手得之是膀胱屬表後以重手取之度如十五菽之重而得之是腎屬裏腎在肝下主骨腎脉循骨而行按在骨上得之爲沉又重手按之脉道無力者爲濡舉指來疾流利者爲滑此乃沉濡而滑不病之脉也若出於骨上見於皮膚血脉筋肉之間是其浮也入而至骨是其沉也右寸先以輕手得之是大腸屬表後以重手取之如三菽之重得之是肺屬裏肺居最上主皮毛肺脉循皮毛而行按至皮毛而得者爲浮稍加力脉道不利爲濁又稍加力脉道稍大閔中上半指不動下半指微動者爲短此浮濁而短不病之脉也若出於皮毛之上見於皮毛之表是其浮也入於血脉筋肉之分是其沉也右關先以輕手得之是胃屬表後以重手取之如九菽之重得之是脾屬裏脾在心下主肌肉脾脉循肌肉而行按至肌肉脉道如微風輕颺柳梢之狀爲緩又稍加力脉道敦實者爲大此爲緩大不病之脉也若出於肌肉

之上見於皮毛之間者是其浮也八於肌膚之下見於筋骨肉分者是其沉
也右尺先以輕手得之是三焦爲表後以重手得之是命門屬裏爲相火氣
與腎通也

又有三部九候之訣三部者寸陽尺也九候者浮中沉也凡三部每部各有浮
中沉三候三而三三爲九候也浮主皮膚候表及腑中主肌肉以候胃氣沉
主筋骨候裏及臟也寸爲陽爲上部法天爲心肺以應上焦主心胸以上至
頭之有疾也尺爲陰陽之中爲中部法人爲肝脾以應中焦主膈以下至臍
之有疾也尺爲陰爲下部法地爲腎命以應下焦主脾以下至足之有疾也
此三部診候之法也

又脉有上下來去至止此大字不明則陰陽虛實不別也上者來者至者爲陽
下者去者止者爲陰上者自尺部止於寸口陽生於陰也下者自寸口下於
人部陰生於陽也來者自骨肉之分出於皮膚之際氣之升也去者自皮膚

之際還於骨肉之分氣之滯也應曰至息曰止也

何謂生尅之理謂五行有相尅相生也相生首謂金生水水生木木生火火生土土生金是也相尅者金尅木木尅土土尅水水尅火火尅金是也凡脉遇相生者吉相尅者凶何也蓋心若見沉細脉見短濶腎見遲緩肺見洪人脉見弦長皆遇尅也爲鬼賊相侵危証也又心若見緩肝見洪肺見沉之類是子扶養於母遇我之所生也雖病易瘥至而腎病傳肝肝病傳心之類此母來如子病雖不死亦延綿日久矣又我尅者爲妻假如春屬木脉見脾土是夫得妻脉也妻來乘夫雖非正尅然春中獨見脾脉土乘木衰土乘之則生金來尅木耳若肝脉弦緩而本體何存脾土雖乘之爲微邪亦不足慮也若本體全無而獨見脾緩之脉爲害必矣脉賦去假今春得肺脉爲鬼得心脉則爲肝元腎爲其母脾則爲妻故春得脾而莫療冬見心而不治夏得肺而難瘳秋得肝亦可疑此即四時衰旺以例生尅之義雖然人脉之息數由氣

爲呼八氣爲吸爲之一息一息之間脉來四至或五至爲平和不大不小弛緩舒暢此無病之脉也至於三遲二敗冷而危也六數七極熱生多也八脫九死極於十二二至與夫奄奄兩息一至則又散而爲變也如六數七極熱也脉中有力爲有神矣當洩其熱三遲二敗寒也脉中有力爲有神矣常去其寒若脉無神而無冒氣豈可輕洩而輕去之哉

然脉理大要元人又謂不出於浮沉遲數滑濶六脉也浮脉輕手取之沉脈重手取之遲數之脉以已之呼吸而取之滑濶之脉則又察乎往來之形也浮者陽也脉在肉上行也輕手乃得而芤洪散大長濡弦皆輕手而得之類也沉者陰也脉在肉下行也重手乃得而伏石短細牢實皆重手而得之類也遲者脉不急也一息二三至而緩結微弱皆遲之類也數者脉頻急也一息六七至而疾促皆數之類也至於滑濶之脉則以往來察其形狀也浮爲陽在表爲風爲虛沉爲陰在裏爲溫爲實數則在腑爲熱爲陽爲燥遲則在臟

爲寒爲冷爲陰滑爲血多氣少濇爲氣多血少滑爲血有餘牆爲氣獨滯是沉浮遲數滑濇脉之大要也

男子左手脈常大於右手者爲順女子右手脈常大於左手者爲順男脈在關上女脈在閏下男子尺脈常弱寸脈常盛女子尺脈常盛寸脈常弱是其常也反者男得女脈爲不足女得男脈爲太過是以男子不可久渴女子不可久吐上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死上部無脈下部有脈病雖重不死何也蓋人有尺脈謂有元氣猶樹之有根也凡人左手屬陽右手屬陰又關前屬陽關後屬陰汗多亡陽下多亡陰諸陰爲寒諸陽爲熱

至於疾病爲證又有陰陽表裏之辨蓋六淫之邪襲於經絡而未入於臟胃如左手人迎脈盛大於氣口一倍爲外感風與寒也皆屬於表爲陽也腑也七情之氣鬱於心腹之內不能越散飲食五味之傷留於腸胃之間不能通洩如右手氣口脉大人迎一倍脉盛爲傷食爲勞倦皆屬於裡爲寒也臟

也若人迎氣口俱緊盛此爲夾食傷寒爲內傷外慮也又陽經取決於人迎陰經取決於氣口左脉不和爲病在表爲陽主四肢右脉不和爲病在裏爲陰主腹臟

至於諸脉又有表裏陰陽主病之異何也蓋謂脉有七表八裏九道凡二十四種是也自六朝以前診視固無此說然此起於高陽生之論義雖未得其統要然智者緣此而進亦足以察病之原委焉七表者何謂浮芤滑實弦緊洪也歌曰浮脉不足舉有餘芤脉中空兩端居滑体如珠中有力實形偏偏與長俱弦如始按弓弦狀緊若牽繩轉索初洪舉按之皆極大此名七表不同途其見於病曰浮爲中風芤失血滑吐實下分明別弦爲拘急緊爲疼洪大從來偏主熱八裏者何微沉緩濶遲伏濡弱也歌曰微來如有又如無沉舉都無按有餘遲緩息間三度至濡來散止勢乃虛伏須切骨沉相類弱脉沉微指下圓濡脉如万輕刮竹分明八裏坦如途其見於病曰遲寒緩結微爲

痞濱因血多沉氣滯伏爲積聚濡不足弱則筋痿少精氣九道者何長短虛促結伏牢動細也歌曰長脈流利通三部短脉本部不足些虛脈遲大無力軟促脈來數急促歟結脈時止而遲妥代脈不還真可吁牢脉如弦沉更實動脈鼓動無定居細脈雖有但如線九道之形乃白殊具見於病曰長爲陽毒三焦熱短氣壅鬱未得倡促陽氣拘時兼滯虛爲血少熱主驚代主氣耗細氣少牢氣滿急時主疼結主積氣悶兼痞動是虛勞血瘀崩然七表屬陽八裏屬陰九道有陰有陽各隨寸關尺及臟腑診之若在寸口屬以上病在關中胃以下病在尺內腎以下病大抵元氣之來力和而緩邪氣之至力強而峻凡尺脉上而至關爲陰絕寸脉不至關爲陽絕陰陽相絕人何以依脉之大槩如斯而已

脉體捷法

浮脉按之不足輕舉有餘滿指浮上曰浮爲風虛運動之候爲病在表爲風應

人迎爲氣應氣口爲熱爲痛爲嘔爲脹爲痞爲喘爲溌不食浮大爲傷風胃
塞溌滑疾爲宿食浮大長爲風弦癲疾浮細而滑爲傷飲食

芤脉浮大而軟按之中空傍實如按葱葉中心空虛曰芤爲失血之候大抵氣
有餘血不足血不能充氣故虛而大若芤之狀

滑脉往來流利應指圓滑如珠隱指曰滑爲血實氣壅之候蓋不勝於氣也爲
嘔吐爲痰逆爲宿食爲經閉滑而不斷絕者經閉也其有斷絕者經閉也上爲吐逆下爲氣結滑

數爲熱結

實脉浮中沉三字皆有力曰實爲三焦氣滿之候爲熱爲嘔爲痛爲氣塞爲氣
聚爲食積爲利爲伏陽在內

弦脉端直以長如弦隱指曰弦爲氣血收歛不舒之候爲陽中伏陰或經絡間
爲寒所滯爲痛爲飲爲瘧爲疝爲拘迫爲寒熱爲血虛盜汗爲寒凝氣結爲
冷痺爲勞倦弦數爲勞瘧弦緊爲惡寒雙弦脇急痛弦長爲積隨左右上下

緊脈舉按急數指下如牽繩轉索之狀曰緊爲邪風激搏伏於營衛之間爲寒爲痛浮緊爲傷寒身痛沉緊爲腹中有寒爲風癟緊數爲寒熱

洪脈極大在指下來大去長而濶指曰洪爲榮衛大熱血氣燔灼之候爲表裏

皆熱爲煩爲滿爲咽乾爲大小便不通洪實爲癲洪堅爲癰疽喘急亦爲脹

微脉極細而軟無浮沉之別曰微爲血氣俱虛之候爲虛爲熱爲呕爲洩爲虛

汗爲拘急爲崩漏敗血不止微弱爲少氣浮而微者陽不足主臟寒下痢

沉脈輕手不見重手乃得曰沉爲陰逆陽離之候爲氣爲水爲寒爲喘爲停飲

爲癥瘕爲脇脹爲厥逆爲洞洩沉細爲少氣脅不能舉沉遲爲痼冷沉滑爲

宿食沉伏爲霍亂沉而數主內寒沉而遲主內寒沉而弦主心腹冷痛

緩脈舉按大而慢一息四至曰緩爲風爲虛爲痺爲弱爲疼在上爲項強在下

爲脚弱浮緩沉緩氣血弱

濇脉按之則散血復來舉之則細而不足曰濇爲氣多血少之候爲血渾爲亡

汗爲傷精女人有孕爲胎病無孕爲敗血病

遲脉呼吸之間脉僅三至隨浮沉而見曰遲爲陰盛陽虛之候爲塞爲痛浮而遲表有寒沉而遲裏有寒居寸爲氣不足居尺爲血不足氣寒則縮血寒則凝

伏脉輕手取之絕不可見重手取之亦不得必推開筋附著於骨乃見曰伏爲陰陽潛伏閑格閉塞之候爲精聚爲疝瘕爲霍亂爲溏洩爲停食爲水氣爲榮衛氣閉而厥逆閑前得之爲陽伏閑後得之爲陰伏

濡脉極軟而浮細輕手乃得不任尋按曰濡爲血氣俱不足之候爲虛爲痺爲少氣爲無血爲自汗爲下冷

弱脉極軟而沉細按之欲絕指下曰弱由精氣不足故脈痿弱而不振也爲元氣虛損爲瘦弱不用爲痼冷爲閑熱爲洩精爲虛汗

長脉按之則洪大而長出於本位曰長氣血俱有餘也爲陽毒內蘊三焦煩鬱

爲壯熱若傷寒得長脉欲汗出而自解也

短脉兩頭無中間有不及本位曰短爲氣不足以前導其血也爲陰中伏陽爲三焦氣壅爲宿食不消

虛脉按之不足遲大而滿輕舉指下豁然而空曰虛爲血氣俱虛之候爲暑爲煩滿多汗爲恍惚多驚爲小兒驚風

促脉按之來去數時一止復來曰促陽獨盛而陰不能相和也或怒逆上亦令脉促爲氣猶爲狂悶爲瘀血發狂又爲氣血飲食痰蓋先以氣熱脉數而五者或一有流滯乎其間則用之而爲促

結脉按之往來遲緩時一止而復來曰結陰獨盛而陽不能相入也爲癥結爲七情所鬱浮結爲寒邪滯經沉結爲積氣在內又爲氣血飲食痰蓋先以氣寒脉緩而五者或一有流滯於其間則因之而爲結故張仲景謂結促皆病脉然漸加卽死漸退卽生

代脈動而中指不能自還因而復動出是復止尋之良久乃復起曰代主形
容羸瘦口不能言若不因病而人羸瘦其脉代止是一臟無氣他臟代之真
危亡之兆也若因病而氣血驟損以致元氣不續或風家毒家脈見代止只
爲病脈故傷寒家亦有心悸而脈代者心腹痛亦有結滯止代不勻者蓋凡
痛之脉不可準也又妊娠亦有脈代此必二月胎也

牢脈沉而有力動而不移曰牢爲裏實表虛胸中氣促爲勞傷痰極大抵近乎
無胃氣故諸家皆以爲危殆亦有骨間疼痛氣居於表

動脈狀如豆大厥厥搖動尋之有舉之無不徃不來不離其處多於關部見之
爲痛爲驚爲虛勞體痛爲崩爲洩痢陽動則汗出陰動則發熱

細脈按之則索索如蛛絲如欲絕舉之如熱而似有且微曰細蓋血冷氣虛不
足以充故也爲元氣不足乏力無精內外俱冷痿弱洞泄憂勞過度爲傷溫
爲積爲病在內及在下

效脉一息六至過平脉兩至曰數爲煩滿上爲頭疼上熱中爲脾熱口臭胃翻
嘔逆在閏爲肝熱目赤右尺爲小便赤黃大便閉澁浮數裏有熱沉數裏有
熱

散脉舉之則似浮而散大無方按之則滑指散而不聚來去不明謾無根柢爲
氣耗散臟腑氣絕在病脉主陽虛不歛又主心氣不足

諸脉相類

微與濡弱相類極軟而浮細曰濡極軟而沉細曰弱極細而軟無浮沉之別者
微脉也微與濶結何以別細而短又遲於微來往蹇滯曰濶細而稍太常有
曰細細稍長似有似無曰微

緩與遲二脉相類緩脉大而慢遲脉小而衰緩者衛有餘而榮不足遲者陰氣
盛而陽氣衰一脉不同遲脉一息三至緩脉一息四至是也

止脉

諸脉有止者濶促結代也脉細而遲往來難時一止者爲濶脉來數時一止者爲促脉來緩時一止者爲結

分人迎氣口脉訣

脉賾白闕前一分人命之主左爲人迎右爲氣口神門決斷兩在闕後故曰人迎緊盛則傷於寒氣口緊盛則傷於食此人迎氣口所以有內傷外感之辨也

左爲人迎以候天之六氣風寒暑濕燥熱之外感者也人迎浮盛則傷風緊盛則傷寒虛弱則傷暑沉細則傷濕虛數則傷熱皆外所因法當表散滲洩則愈

右爲氣口以候人之七情喜怒憂思悲恐驚內傷之邪其喜則脉散怒則脉激憂則脉濶思則脉結悲則脉緊恐則脉沉驚則脉動皆內所因看與何部相應即知何臟何經受病方乃不失病机法當溫順以消平之其如胗按表裏

名義情狀姑如後說但經所述謂神者脉之主脉者血之腑氣者神之御脉
者氣之使長則氣治短則氣病數則煩心大則病進文凜雖雅義理確明動
靜之辭有博有約博則二十四字不濫終毫約則浮沉遲數總括紀綱辭理
粲然浮爲風爲虛沉爲濕爲實遲爲寒爲冷數爲熱爲燥風寒湿熱屬於外
虛實冷燥屬於內内外既分三因俱別學者宜詳覘覽不可憚煩也

內因脉

喜怒憂思悲恐驚內應氣口

喜則傷心脉必虛思傷脾脉結中居因憂傷肺脉必濶怒氣傷肝脉便濡恐則
於腎脉沉是綠驚傷胆動相須脉緊因悲傷胞絡七情氣口內因之

外因脉

風寒暑溫燥火外應人迎

緊則傷寒腎不移虛因傷暑同胞推濶綠傷燥須觀肺細緩傷濕要觀脾浮則
傷風肝部應弱爲傷火察心知六部合脉須審審使將寒作熱

不內不外因脉

勞神役慮定傷心虛濶之中仔細尋勞役陰陽傷腎部忽然聚脉必相侵爲能
任意傷心絡微濶之中宜忖度疲極筋力便傷肝損下尋之脉弦虛飲食飢
飽並傷脾未可輕將一例推飢則緩弦當別議若然渾實飽無疑呴呼損氣
因傷氣燥弱脈中宜熟記能通不內外中因生死吉凶都在是

死絕脈

雀喙連來三五啄屋漏半日一點落彈石硬來尋郎散捲指散亂直解素魚翔
以有亦似無鯁遊靜中跳一躍寄語医家仔細看六脉一見休下藥

動止脉

一動一止兩日死兩動一止四日邇三動一止六日亡四動一止八日事五動
止只十日十動一止一年去春草生時卽死期二十一動二年生清明節
後始傾亡三十動止三年次立秋節後病則危四十動止四年生小麥一孰
是死期五十一止五年訣草枯水寒時死矣此爲水人脉之秘

諸脉宜忌類

傷寒熱病宜洪大忌沉細主有痰○咳嗽宜浮濡忌沉伏○腹脹宜浮大忌虛小○下痢宜微小忌大浮洪○狂疾宜實大忌沉細○霍亂宜浮洪忌微遲○消渴宜數大忌虛小○水氣宜浮大忌沉細○鼻衄宜沉細忌浮大○心腹痛宜沉細忌浮大弦長○頭痛宜浮滑忌短濶○中風宜遲浮忌急實大數○喘急宜浮滑忌濶脉○唾血宜沉弱忌寢大○上氣浮脹宜浮滑忌微細○中惡宜緊細忌浮大○金瘡宜微細忌緊數○中毒宜洪大忌微細○婦人帶下宜遲滑忌浮虛○吐血衄血宜沉小忌寢大墜墮○腸澼下膿血宜浮小沉遲忌數疾及大熱○婦人已產宜小宜忌虛浮又宜沉細緩滑微小忌大弦急牽緊○內傷宜緊弦忌小弱○風痺痿弱宜虛濡忌緊急疾○溫病發熱甚忌脉反小○下痢身熱脈忌散腹中有積脉忌虛弱○腹痛宜虛小遲忌堅大疾○病熱忌脉靜○洩忌脉大○脫血而脉实病在中脉

虛病在外脉濶皆所忌視

驗諸死證脉

溫病穰七大熱脉細小者死○頭目痛卒視無所見者死○溫病汗不出出不至足者死○瘧病久腰脊強急痙攣者不可治○熱病得汗脉安靜者生燥急者死及大熱不去者亦危○廩脫形發熱脉堅急者死皮肉着熱者死形瘦脈大胸中多氣者死○熱病七八日當汗反不得汗脉絕者死○真臟脉見者死○黑色入耳目鼻漸入口者死○張口如魚出氣不及者死○循衣摸床者死○妄語錯亂及不能語者不治熱病不在此例○尸臭不可近者死○面無光牙齦黑者死○髮直如麻者死○遺尿不知者死○舌捲卵縮者死○面腫色蒼黑者死○五臟內絕神氣不守其聲嘶者死○目直視者死○汗出身骨不涼者死

歸空十法

第一法天鼓不鳴叩齒不響命終○二法天柱倒上燈後用左手按已額上觀
臂許大命終○三法樓頭鼓響兩手掩耳次將指彈不響昔命終○四法神
光不在燈後不見黑影暗處用手搘眼皮睛中不光起命終○五法曹溪神
水乾舌津液不出者若無味命終○六法釣罷竿腎子縮入腹左三右四命
終○七法地獄閥動忽然左脚有似針刺命終○八法已影向燈後見影命
終○九法丹府水火相推腹中腎痛寒毛豎起命終○十法神明不在遍身
如蟻子行胸前蛇走命終

病機

雜病賦

病機玄蘊脉理幽深雖聖經之備載匪師授而固明處百病而決死生須探陰
陽脉候訂七方而施藥石當推苦樂志形邪之所客標本莫逃手六氣病之
所起樞机不越乎四因一辨色二辨音乃医家神聖妙用三折肱九折臂原

病者感受輿情能窮浮沉遲數滑濶大緩八衄之輿便知表裏虛實寒熱邪
正八要之名八衄爲諸衄綱領八要是衆病權衡濶爲血少精傷責七然往
來滯滯如刀刮竹之狀滑爲痰多氣盛替替然應指圓滑似珠流動之形遲
寒數熱紀至數多少浮表沉裏在舉按重輕緩則正復和若春風舞柳大則
病進勢如秋水潮生六衄同等者喜其勿藥六衄偏盛者憂其采薪表宜汗
解裏即下平救表則桂枝著芍救裏則葛附參苓病有虛實之殊虛者補而
實者瀉邪有寒熱之異寒者溫而熱者清外邪是風寒暑濕燥之所客內邪
則虛實賊微正之相乘正乃胃之真氣良由國之鯁臣驅邪如逐寇盜必亟
攻而盡勦養正如待小人在修己而正心地土厚薄究有餘不足之稟賦運
氣勝復推大過不及之流行衄病既得乎心法用藥奚患乎不靈

原夫中風當分眞僞眞者現六經形證有中臟腑血衄之分僞者遵三子發揮
有屬溫火氣虛之謂中臟命危中腑肢廢在經絡則口眼喎斜中血衄則半

身不遂僵仆卒倒必用補湯瘀氣壅塞可行吐刮手足癓癰曰搐背項反張
曰痙或爲風痙偏枯或變風痙風懿癱瘓痿易四肢緩而不仁風濕寒并三
氣合而爲痙雖善行數變之莫測皆木勝風淫之所致雪霜凜冽總是寒邪
酷日炎蒸皆爲暑類傷寒則衄緊身寒中暑則脉虛熱熾暑當飲補而清寒
可溫散而去諸痙強直体重附腫由山澤風雨湿蒸諸澀枯涸乾勁皺揭皆
天地肅清燥氣溫則害其皮肉燥則枯其腸胃西北風高土燥嘗苦渴閉瘡
瘍東南地卑水溫多染疽腫泄痢其邪有傷有中蓋傷之淺而中之深在人
有壯有怯故壯者行而快者劇天人七火君相五志爲工者能知直折順性
之理而術可通神善医者解行反治求屬之道而病無不治虛火實火補瀉
各合乎宜溫熱鬱熱攻發必異乎削既通六氣之機可垂千古之譽

管闈血屬陰不足則生熱斯河濶之確論氣屬陽有餘便是火佩丹溪之格言
氣盛者爲喘急爲脹滿爲否塞兼降火必自愈血虛者爲吐衄爲煩蒸爲勞

察匪清熱而難痊理中湯治脾胃虛冷澗下丸化胸膈痰涎暴嘔吐逆爲寒所致久嗽咯血是火之愆平胃散療脈濡泄瀉不止益崇湯治怔忡恍惚無眠枳殼散達生散令孕婦東胎而易產麻仁丸潤腸丸治老人血火而便難定驚悸須索生黃琥珀化丸積必仗鶴虱雷丸通閉以葵菜波蘿取其滑能利竅消癰以貝布海澡因其鹹能軟堅斯先賢之祕妙知後進之無傳

所謂夏傷於暑秋必作瘧近而暑者即時可療遠而疾者三日一發若瘧瘧但

用清肌在陰分勿行截藥人參補胃治寒多熱少而虛柴胡清脾理熱多寒少血渴自汗陽虧盜汗陰弱嗽而有声有痰兮脾受濕侵咳而有声無痰兮肺由火燥霍亂有寒有暑何局方泥乎辛溫積聚有虛有實豈世俗偏乎峻削當木鬱吐達金鬱泄而土鬱奪水鬱折而火鬱發泄發即汗利之稱折奪是攻抑之別倒倉凥而去陳莝中州蕩滌良方開鬼門潔淨府上下分消妙法如斯瞑眩反掌生殺輒有一失悔噬脐之莫追因而再逆耽方成之弗約

大抵暴病匪熱火病匪寒譬皆生道良由熱積所致心腹卒痛却乃暴寒所子
五泄五疳因溫熱惟利水爲上三消三衄爲燥火若滋陰自安嘔吐痰逆答
歸於胃陰癲疝瘕綻統屬於肝液喘心而作汗歟之者黃耆木一熱肉致而發
疹消之者人參化斑身不安令爲燥心不寧令爲煩忽然寒彊起栗昏冒者
名爲尸厥卒爾跌仆涎延時醒者號曰癲癇暝滿吞酸此是胃中留飲胸膨
脹氣蓋緣膈上停痰欲挽回春之力當修起死之丹

竊謂陰陽二證療各不同內外兩傷治須審別內傷外傷辨口鼻呼吸之情陰
証陽証察尺寸往來之衄既明內外陰陽便知虛實冷熱曰濁曰帶有赤有
白或屬痰而或屬火白于氣而赤于血本無寒熱之分但有虛寔之說刺亦
同然瘀積溫熱勿行淡滌丸瀉湯丸可用汗下寒溫洞泄導赤散通小便癃
閉溫白丸解大腸痛結地骨皮散退勞熱偏宜青礞石丸化結痰甚提火鬱
若必捫其肌胎死可驗其舌玄明苦練醫寒症控引於二丸當歸龍骨瀉溫

熱痛攻於兩脇謂曉陰陽虛實之情便是醫家玄妙之法

當以諸痛爲實諸痺爲虛七者精氣不足實者邪氣有餘泄瀉有腸垢驚瘧若滑脫則塊爲當腹痛有寢積鬱熱倘陰寒則薑附可施厥心瘡客寒犯胃手足和者溫散卽已眞頭痛者人連於腦爪甲黑者危篤難醫結陽則肢腫有準結陰則便血無疑足膝屈弱曰脚氣腫痛者溫多熱盛腰痛不已曰腎虛挫閃者氣滯血瘀癲頂苦疼葉尊橐本鼻淵不止方選辛夷手麻有溫痰死血手本緣風溫氣虛淋瀝似欲通不通氣虛者清心蓮子便血審先糞後瀉陰結者平胃地榆蓋聞溲便不利謂之閼飲食不下謂之格乃陰陽有所偏乘故嘔息因而痰溢咳血與嘔血不同咳血嗽起嘔血逆來吞酸與吐酸各別吞酸刺心吐酸湧出水停心下曰飲水積心下曰癖行水以澤瀉茯苓消癆以芫花大戟控涎舟雖云峻利可逐伏瘀保和丸性味溫平能消食積溺血則血去無痛有痛者自是赤淋短氣乃氣難佈息粗息者却爲喘急胃膈

當心而痛要分客寒客遍身歷節而疼須辨屬風屬溫通聖散專察諸風
越鞠丸能開六鬱虛弱者目眩頭暉亦本痰火而成溫熱者精滑夢遺或爲
思想而得緣雜病諸繁無據機要雖明非傷寒經絡有愚形証可識臨病若
能三思用藥終無一失畧舉聚疾之端俾爲後學之式

病机賦

竊謂醫雖小道乃寄死生最要變通不宜固執明葉脉病治之理悉望聞問切
之情渠推寒熱溫涼平和之氣辛甘淡苦酸鹹之味升降浮沉之性宣通補
瀉之能劖究浮沉遲數滑濁之形表裏寒熱虛實之應阿阿嫩柳之和弦鈞
毛石之順藥用君臣佐使劖分老幼瘦肥藥乃天地之精藥宜切病劖者氣
血之表劖貴有神病有外感內傷風寒暑溫燥火之机治宜宣通補瀉滑濁
燥溫重輕之劑外感異乎內傷寒証不同熱証外感宜瀉而內傷宜補寒証
可溫而熱証可清神瀉得宜須臾病愈溫清失度頃刻人亡外感風寒宜分

經而解散內傷飲食可調胃以消鎔胃陽主氣司納受陽常有餘脾陰足
司運化陰常不足胃乃六腑之本脾爲五臟之原胃氣弱則百病生脾陰足
則萬邪息調理脾胃爲医中之王道節戒飲食乃卻病之良方病多寒令鬱
氣氣鬱發熱或出七情動火火動生痰有因行藏動靜以傷暑邪或是出入
雨水而中溫氣亦有飲食失節而生溫熱倘或房勞過度以動相火制伏相
火要滋養其真陰祛除濕熱雖燥補其脾胃外溫惟表散內溫宜淡涼陽暑
可清熱陰暑可散寒尋火尋痰分多分少而治究表究裏或汗或下而施痰
因火動治火爲先火因氣生理氣爲本治火輕者可降重者從其性而升消
理氣微則宜調甚則究其源而發散寔火可瀉或瀉表而或瀉裏虛火宜補
或補陰而或補陽暴病之謂火怪病之謂痰寒熱溫燥風五疾有異溫清燥
潤散五治不同有因火而生痰有因痰而生火或鬱久而生病或病久而成
鬱金木水火土五鬱當分洩折疎發奪五法宜審鬱則生火生痰而成病七

則耗氣耗血以致虛病有微甚治有逆從微則逆治其則從攻病有本標急
則治標緩則治本法分攻補虛而用補寔而用攻此壯新邪專攻是則老衰
久病兼補爲規久病兼補虛而兼解鬱陳穀或蕩滌而或消鎔積在胃腸可
下而愈塊居經絡宜消而痊女人氣滯於血宜開血而行氣男子陽多乎陰
可補陰以配陽從蓉山藥男子之佳珍香附縮砂女人之至宝氣病血病二
者宜分陽虛陰虛兩般勿紊陽虛氣病晝重而夜輕血病陰虛晝輕而夜重
陽虛生寒匕溫溫生熱陰虛生火火生燥匕生風陽盛陰虛則生火火逼
血而錯經妄行陰盛陽虛則生寒匕滯氣而周身浮腫陽虛畏外寒陰虛生
內熱補陽補氣用甘溫之品滋陰滋血以苦寒之流調氣貴乎辛涼和血必
須辛熱陽氣爲陰血之引道陰血乃陽氣之依歸陽虛補陽而陰虛滋陰氣
病調氣而血病和血陰陽兩虛惟補其陽匕生而陰長氣血俱病只調其氣
氣行而血隨藏水發冰以節陽氣之燔滋水養水以制心火之亢火降水升

斯人無病陰平陽秘我体長春小兒純陽而無陰老者多氣而少血肥人氣虛有痰宜豁痰而補氣瘦者血虛有火可泻火以滋陰膏梁無厭發癰疽熱燥所使淡薄不堪生腫脹寒濕而然比地聳高宜清熱而潤燥南方髒下可散溫以溫寒病症既明用藥勿忒以方加減存乎人要審病而合宜用藥補瀉在於味須隨時而換氣奇偶復七方須知初中末三治要察寒因熱用熱因寒用通因通用塞因塞用高者抑之下者舉之外者發之內者奪之寒則堅凝熱則開行風能勝溫七能潤燥辛能散結甘能緩中淡能利瘀苦以洩逆酸以收耗鹹以軟堅升降浮沉則順之寒熱溫涼宜逆也病有淺深治有難易初感風寒乍傷飲食一藥可愈舊存痃癖久患虛勞萬方難療復霜之疾亟療无妄之藥勿試病若挾虛宜半攻半補醫稱多術或用灸而用針針有刲病之功灸獲回生之論針能去氣病而作漏灸則消血瘀以成形臟寒虛脫者治以灸炳衄病壅滯者治以針刺血竇當結腫熱者宜從砭石氣壅

痰厥寒熱者當倣導引經絡不通病生於不仁者須覓酸醣血氣凝泣病生於筋衄者可行尉藥病懶悼者按而收之乾霍亂者刮而行之医素十二科宜精一派病情于萬變仔細推詳姑據碑言以陳管見後之學者庶達逐津病机抄畧

病本十形風寒燥溫暑火二分內傷外傷內積外積之氣四因病机以明氣固形實形虛中風或爲寒熱或爲熱中或爲寒中或爲偏風或爲偏枯半身不遂此率多痰或屬血虛在左死血在右屬瘀七壅盛者口眼喎斜不能言語皆用吐法氣虛卒倒降痰益氣火熱而甚燥熱潮熱治經隨之陰虛補陰勿驟涼治輕可降散實則可瀉重者難瀉從治可施中寒感寒陰毒陰逆四肢厥冷腹痛喜退陰正陽急可溫中復氣所致痓病有一發熱惡寒頭頸項強腰脊反張口噤面赤瘡癰如漏有汗柔痙無汗名剛春傷於風夏必發泄要傷於暑秋必咳瘧秋傷於溫冬必咳嗽冬傷於寒春必溫病夏月身汗熱

出惡寒身重脉微渴乃中暒春時病溫溫疫溫毒溫風溫瓠証分異五種
疾因中溫風溫暑成溫溫三種可別溫熱可分寒痰脚氣食積亦煩要知四
証乃似傷寒傷寒之病見中風瓠中風之病得傷寒瓠大小青龍治劑必識
調衛調榮斯須兩得瘧本傷暑或瘧或食老瘧七母火則羸瘦三日一發病
經一歲間日發者受病半年一日一發新病所以連二日發住一日者氣血
但病或用截法或隨經治嗽多感寒當分六氣六本一標病机所秘風熱與
寒隨証治之暑燥清金溫則利水有声無痰有痰咳止痰可除蠲咳隨本治
喘有氣虛或有痰壅或因氣逆或倚息便痢本溫熱或因食致腹痛下血後
重不利治可通散勿便溫住溫熱未治或休息利泄濶多溫熱食氣虛如本
脾洩腫而嘔吐洞洩不禁則寒痰實不便後重者痛胃憲色黃飲食不
化太素分五塘洩養津分五塘洩去陰陽相合言對証泊乃溫熱合她相似
消渴熱因水腫氣數自汗之而益汗全症更宜有法對証可施頭風頭痛有

痰者多血虛與熱分經可治頭寒腹熱火種其痰或木氣虛治痰爲元腫病
溫熱或本腎虛或兼惡血喘漏多氣或肝火盛或有死血或瘀流注勞瘵陰
虛癲狂陽氣嘔吐略歸氣虛腰膝火載血土錯經妄行濁血側血病同所因
夢遺精滑溫熱之乘便濁本無有瘀或虛白濁屬衛赤濁屬榮熱極成淋氣
滯不通血虛鬱悽氣虛耳聾噦因胃病疝本肝經痰唯溫熱氣弱少榮厥多
痰氣虛熱所乘手麻氣虛手木濕痰或死血病霍亂吐瀉感風濕渴心偏脾
寒陰寒之說氣熱煩勞令人煎肺氣逆太甚使人薄厥濁氣在上則生膜脹
清氣在下則主飧泄陰火之動發爲喉痺陽水交病飧泄方是三陽病結乃
發寒熱下生壅脹及爲痿厥二陽之病病發心脾男子少精女子不月一陽
發病少氣嗽洩寒客在上胃寒陽熱水穀不化痞脹而洩熱氣居土腸寒胃
熱消穀善机腹脹便瀉溫熱怫鬱乃生諸風風寒與溫合而成癰膏梁之變
餌生大疔榮氣不從逆於內神乃生癰腫瘡瘍濕麻治乃不惑身重瓠緩溫

脈陰溫身熱衄大躁熱發腫退熱涼柴眩量動無痛而衄弦降瘀去風氣溢
衛滯躁渴衄澀補血瀉氣食少惡寒衄來緊細宣瀉寒水辨經部分詳審爲
治溫熱生虫水積瘀飲目痛赤腫精散榮熱牙痛斷宣寒熱亦別五臟本病
熱爭重疽六腑不和留結爲癰五臟不和九竅不通臟腑相移傳變爲病不
可勝紀聞藏者存傳其所生七傳者死傳其所制五臟有積肝曰肥氣在左
脇下大如覆杯或有頭足久則变病咳逆痰癰通藏不已心橫伏梁病起膺
上其大如臂上至心下如火不愈令人煩心脾積痞氣其在胃脘覆大如盤
久而不愈四肢不舉乃發黃疸雖食而瘦脯積息贲在右脇下覆大如杯久
而不愈令人喘急骨瘦少氣鼓脹發盜中滿鬱瘈開提其氣升降是宜人身
之本脾胃爲主頭痛耳鳴丸竅不利腸胃所生胃氣之虛七極亥病五亂五
作東垣所論王道之學一虛一實五實五虛五勞七傷六極乃矮五鬱七情
九氣所爲怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣不寒則氣收暑則氣欲營

則氣亂勞則氣耗思則氣耗憂愁思慮甚則傷心形寒飲冷過則傷肺喜怒逆七則傷肝飲食勞倦甚則傷脾坐以溫地強力入水故乃腎傷皆因氣動形神自病喜怒不節勞形無氣氣血相勝陰陽相乘陽乘陰病陰乘陽病陽乘則熱陰乘則寒重寒則熱重熱則寒上則傷形熱則傷氣七傷則痛形傷則腫先痛後腫氣傷形也先腫後痛形傷氣也陰陽變病標本寒熱如大寒其熱之不熱是無火也熱來伏去晝見夜伏晝見時節而動是無火也當助其心如熱如甚寒之不寒是無水也熱動復止候忽往來時動時止是無水也當助其腎內格嘔逆食不得入是有火也病嘔而吐食入反出是無火也暴逆注下食不及化是又有水也溏洩而人止發無常是無水也心盛生熱腎盛生寒又熱不寒是無火也寒不得熱是無水也寒之不寒責其無水熱之不熱責其無火熱之不久責心之虛寒之不久責腎之少審察病机無失氣宜紀於水火餘氣可知室婦病多帶下赤白癰瘕癩疝氣血爲病經

閉不行或漏不止經過作痛虛中有熱行而痛者血實之証如不及期血熱乃結過期血少閉或血枯淡者瘀多者熱故則黑調榮降火調理妊娠清熱養血一當產後如無惡阻氣血雖虛可証以未治之大凡小兒

過暖生熱上極生風上痰積熱隨元氣治生有月裏生驚生赤生嘔生黃不便臍風撮口交蒸發熱風癟顙癟急慢驚風瘧癰驚浮虛胃暴急吐噃腹脹齁嗽中惡天爭驚目重舌木舌弄舌客忤夜啼膿耳鼻瘡眉凜丹瘤陰腫便濁舌爛口真斷餌牙疳虫痛吐沫瘦解顱便青頰赤食吐飲水吐瀉青白昏睡露睛呵欠面黃呻牙咬齒瀉痢脫肛癟瘻癰疹瘡痘發狂驚瘡得積大率爲病肝與脾經血治憑尤錢氏方論男女病情飲食起居暴寒累苦始棄後苦皆傷精氣先富後貧病曰失精先貴後賤雖不中邪病從內生名曰脫營身體日減氣虛無精良工勿失血病証治知微可已舉腹痛經陰証治例海藏所云玄机之秘

藥性歌括

諸藥之性各有奇功溫涼寒熱補泻宜通

君臣佐使運用于衷相反畏惡立見吉凶

人參味甘大補元氣止渴生津調榮養衛

去皮用反者

黃芪性溫收汗固表托瘡生肌氣虛莫少

續故如前幹者瘡湯
生用酒虛蜜水炒用

白朮甘溫健脾強胃止瀉除湿兼祛痰石

硝子去芦油米泔水洗薄切
土炒

白茯苓味淡涉濕利竅白化痰涎赤通水道

去黑皮中有赤筋
要去淨不損人目

甘草甘溫調和諸藥久則溫中生則渾火

一名國老能解百毒反
甘遂海螵大戟芫花

當歸甘溫生血補心扶虛益損逐瘀生

新酒浸洗淨切片補肥瘦盛姜汁

白芍酸寒能收能補潤刺腹痛虛寒勿與

有生用者有
酒炒用者

赤芍酸寒能溟能散破血通經產後勿犯

宜生用

生地微寒能消溫熱骨蒸煩勞兼治瘀血

一名赤芍生處者酒
洗竹刀切片晒干

熟地微温滋肾補血益髓填精烏鬚黑髮

用懷慶生地黃酒浸蒸至黑色竹刀切片勿犯鐵器忌食白葱蒜用

姜汁炒

除隔閡

麥門甘寒解渴祛煩補心清肺虛熱自安

水浸去心用
不令人煩

天門甘寒肺痿肺癰消痰止嗽喘熱有功

水浸去心皮

黃連味苦瀉心除痞清熱明眸厚腸止痢

去鬚下火童便痰火姜汁伏火益
湯氣滿火吳萸肝胆火猪胆火

不硝虛火
醋炒

黃芩苦寒枯瀉肺火子清大腸溫熱皆可

去皮桔梗或
土或酉炒

黃柏苦寒降火滋陰骨蒸溫熱下血堪任

去粗皮或生或酒或蜜或
童便或亂汁炒一名黃藥

梔子性寒解鬱除煩吐衄胃痛火降小便

生用清三焦实火炒黑清上
焦鬱火又能清曲屈之火

連翹寒苦能消痘毒氣聚血凝溫熱甚逐

火去梗

石羔大寒能瀉胃火發渴頭疼解肌立安

或生或炒
一名解石

滑石沉寒滑能利竅解渴除煩溫熱可療

細膩潔白者佳龐頑清黑者
勿用研爛以水瓶過

知母味苦熱渴能除骨蒸有汗無故皆舒

宜去毛生用潤胃火酒炒煑者佳

貝母微寒止嗽化痰肺癰肺癰開竅除煩

去心黃白色

大黃苦寒寃熱積聚蠲痰潤燥疎通便閉

柴胡味苦能潤肝火寒熱往來癥疾均可

去芦夢比者佳

前胡微寒寧嗽化痰寒熱頭疼痞悶能安

去芦葉軟者佳

升麻性寒清胃解毒升提下陷牙痛可逐

去根青綠者佳

桔梗味苦療咽痛腫載瘡上升開胸利壅

去芦潔白者佳

紫蘇葉辛風寒發表梗下諸氣消除脹滿

葉背圓並紫者佳

麻黃味辛解表出汙身熱頭痛風寒發散

去根節宜陳久止汙消根

葛根味甘傷風發散溫瘧往來止渴解酒

白粉者佳

薄荷味辛最清頭目祛風化痰骨蒸宜服

名炙毒用姑酥龍腦者佳

防風甘溫能除頭暈肩節痺疼諸風口噤

忌諾

荆芥味辛能清頭目表汗祛風治瘡消癰

一名僵蒿
用使

細辛止溫少陰頭痛利竅通關風濕香用

華明者佳
反藜芦

羌活微溫祛風除濕身痛頭疼舒筋活骨

一名
羌青

獨活甘苦頸項難舒兩足濕痺諸風能除

一名
獨草

白芷辛溫陽明頭痛風熱瘡痒排膿通用

一名
芬草

藁本氣溫除頭顛頭風邪可屏寒溫可祛

去
苦

香附味甘快氣開鬱止痛調經更消宿食

即莎草根
名天台島
忌臘腸

鳥藥辛溫心腹痛脹小便滑數順氣通用

一名轉其一
名天台島

枳實味苦消食除痞破積化瘀冲劑倒壁

如鵝眼色黑瘦者能
水浸去穰切片燒

枳殼微溫快氣寬腸胸中氣結脹滿堪嚼

水浸去穰切片燒妙
切片燒妙

白蔻辛溫能去癥醫益氣調元止嘔和胃

水浸去壳仁
切片燒妙

青皮苦寒能攻氣滯削堅平肝安胃下食

水浸去壳仁
切片燒妙

陳皮甘溫順氣寬膈留白和胃消痰去白溫水畧洗刮去

看又名柏紅

蒼朮甘溫健脾燥濕發汗寬中更甚

黑皮切片炒干米泔浸透撈去

厚朴苦溫消脹泄溼痰氣瀉痢其功不緩

要厚如茶油者佳去粗皮姜汁炒

南星性熱能治風痰破傷強直風搐自安

姜湯泡透切片用或為末姜水入牛胆內名曰牛胆南星

半夏味辛健脾燥濕痰癥頭疼噃嘔堪入

一名守田反鹽或用姜水泡透切片姜汁炒

藿香辛溫能止嘔吐發散風寒霍亂爲主

或用葉或用梗去梗葉兼用者

枳榔辛溫破氣殺虫祛痰逐水專除后重

類鷄心者佳

腹皮微溫能下隔氣安胃健脾浮腫消去多有

黑豆湯洗淨葉青用

香菇味辛傷暑便澁霍亂水腫除煩解熱

陳久者佳

扁豆微涼轉筋吐瀉下氣和中酒毒能化微炒

蕷漬苦寒消腫止渴除濕通淋陰汗自渴

削去黑皮切片

楂令味淡利水通淋消腫除濕多服損腎

微炒去尾

木通性寒小腸熱閉利竅通經最能導滯

去皮切片

車前子寒瀉澁眼赤小便能通大便能實

去壳

地骨皮寒解肌退熱有汗骨蒸強陰涼血

去骨

木瓜味酸溫腫腳氣霍乱轉筋足膝無力

酒洗

歲靈苦溫腰膝冷痛消瘀痃癥風濕皆用

去芦酒洗

牡丹苦寒破血通經血分有熱無汗骨蒸

去骨

玄參苦寒清無根火消腫骨蒸補腎亦可

紫色者佳
反藜芦

沙參味苦消腫排膿補肝益肺退熱除風

去芦反
藜芦

丹參味苦破積調經生新去惡祛除帶崩

及藜芦

苦參味苦瘡腫瘍疥下血腸風眉脫赤癩

及藜芦

龍胆苦寒療眼赤疼下焦溫腫肝經熱煩

五加皮寒祛痛風痺健步堅筋益精止瀝

皮浸酒敷身延壽寧神一把五加不用金玉燭車

防已氣寒風溫脚痛熱積膀胱消癰散腫去皮酒浸洗

地榆沉寒血熱堪用血痢帶崩金瘡止痛如瘻寒水瀉

菝葜補心善鎮驚悸恍惚健忘兼除怒恚木

遠志氣溫能駁驚悸安神鎮心令人多記

甘早陽浸去毛一宿

酸棗味酸飲汗悶煩多眠用生不眠用炒取仁

菖蒲性溫開心利竅去廯除風出声至妙

去毛一千九節者佳忌鐵器

柏子味甘補心益氣飲汗扶陽更療驚悸去壳取仁

益智辛溫安神益氣遺溺遺精嘔逆皆治

玄壳取仁研碎

甘松味香善除惡氣治肺香肌心腹痛已

小茴性溫能除疝氣腹痛腰疼調中暖胃鹽酒炒

大茴味辛疝氣腹痛膀胱寒氣止嘔聞胃即懷

乾姜味辛表解風寒炮苦逐冷虛熱尤堪紙包水浸火燬切片慢火

炒至極黑亦有生用者

附子辛熱性走不守四肢厥冷回陽功有

皮黑項正圓一兩一枚者佳此畏火燒去皮剝童便浸一宿湯火煮

油于密封旋切片用亦有該用生者

川烏大熱搜風入骨溫痺寒疼破積之物

頂歪斜裂同附子

木香微溫散滯和胃諸風能調行肝潤肺形如桔骨苦

味如桔子者佳

沉香降氣暖胃道邪通天徹地衛氣爲佳

丁香辛熱能除寒嘔心腹疼痛溫胃可曉

推丁香如針子良附子核大

砂仁性溫善進食止痛安胎通經破滯

取仁去壳

草澄茄辛除脹化食消瘀止噦能逐鬼氣

保和胡椒青時摘取者是

肉桂辛熱善通血脉腹痛虛寒溫補可得

去粗皮不見火姪姪用要則炒厚者肉桂散者官桂

桂枝小梗橫行手臂止汗舒筋治手足痺

吳茱辛熱能調疝氣臍腹寒疼酸水能治

去枝蕩泡微炒即玄明索

延胡氣溫心腹卒漏通絡活血跌撲血崩

薏苡味甘專除濕痺筋節拘挛肺癰肺瘻

一名穿谷
去壳取仁

肉蔻辛溫脾虛虛冷渴痢不休功可立等

切片名肉裹麵包煨熟
至有淡紅花內

草寇辛溫治寒犯胃作痛嘔吐不食能食

建業色子是真的

訶子味苦泄陽止痢痰嗽喘急降火歛肺

火氣詞黎勒六陵黑色者佳火煨去核

草果味辛消食除脹截瘻逐痰解瘧辟瘧

取仁去壳

常山苦寒截瘻除瘀解傷寒热水脹能寬

切酒浸

良姜性熱下血溫中轉筋霍亂酒食能攻

結寢秋取名紅豆蔻
善解酒毒餘治同

山楂味甘磨消肉食癥疝催瘗消膨健胃

一名糖楂子俗呼
山楂汗蒸去核用

神曲味甘開胃進食破結逐瘀調中下氣

要六月六日製造
方可用要炒黃色

麥芽甘溫能消宿食心腹膨脹行血散滯

炒孕婦勿服
恐墮胎尤

蘇子味辛歐痰降氣止欬定喘更潤心肺

炒前有蘇葉

白芥子辛專化脇癰瘻瘡塊服之能安

微炒

甘逐苦寒破癥消瘀而浮鹽脹利水能安

反甘草

大戟甘寒消水利便腹脹癥堅其功瞑眩

反甘草柳

芫花寒苦能消脹鹽利水渴溫止欬痰吐

反甘草

商陸辛甘赤白各異赤者消腫自利水氣

一名焯

海藻鹹寒消癰散瘻除脹破癥利水通閉

或海藻昆布散結
滑堅
同反甘草

牽牛苦寒利水消腫鹽張痃癖散滯除壅

黑者屬水力速白者屬金
通並
未用任脈忌服

葶苈辛苦利水消腫瘀軟癥瘕治喘肺瘡

隔紙
署炒

龜參辛寒專治淋病且能墮胎通經立應

三稜味苦利血消癥氣滯作痛虛者當忌去毛火煅

切片醋炒
另片醋炒

五靈味甘血痢腹痛止血用炒行血用生

莪木溫苦善破痃癖止渴消瘀通經最宜

去根火煅
切片醋炒
另片醋炒

乾漆辛溫通經破瘕追積殺虫效如奔馬生動瀕人傷胃

搗砂炒令烟尽
人傷胃

蒲黃味甘逐瘀止崩補血須炒破血用生

蘇木甘鹹能行積血產後月經兼医撲跌

桃仁甘寒能潤大腸通經破瘀血痕堪嘗

湯浸去皮
尖研如泥

薑黃味辛消瘀破血心腸結痛下氣最捷

姜黃
小者為大者為

鬱金味苦破血生肌血淋溺血鬱結能舒

鬱金
小者為大者為

金銀花甘療瘡無對未成則散已成則潰

一名忍冬
一名黃綠藤

漏芦性寒祛惡毒補血排膿生肌長肉

一名
金奴
老翁須
野蘭

蒺藜味苦療瘡癩痒白癩頭瘡翳除目明

白芨味苦功專收斂腫毒瘡瘍外科最善

虻床辛苦下氣溫中惡瘡疥癩逐瘀却風

天麻味辛能敵頭眩小兒驚癇拘挛癇癥

一名
赤箭
草附子

白附辛溫治百病血癆風瘡中風痰症

全鵝味辛却風痰毒口眼喎斜風癇發搐

去

只一塊去頭則

通身有頭

通身無頭

蟬退甘平消風定驚殺甘除熱退翳侵睛或

去頭足

風健足

健足

姜參味鹹諸風驚癇溫痰喉痺瘡毒癰痕

哩

足赤色者

新鮮人頭指

頭指

蜈蚣味辛蛇虺惡毒殺鬼除邪墮胎逐瘀

逐瘀

木鳖子溫能追瘡毒乳瘡腰疼消腫最速

去壳

黃去頭足

頭指

蜂房鹹苦驚癇瘍牙疼腫毒瘻瘍陽瘻

而鼻孔四擦牙頭帶二十四朵花

星上青個佛指甲是出斷州者

佛指甲

槐花味苦痔漏腸風大腸熱痢更殺蟲虫

一名牛蒡子一名

大力子一名惡寒

惡寒

鼠粘子辛能除瘡毒癰疹風熱咽疼

一名牛蒡子一名

惡寒

紅花辛溫最消瘀熱多則通經少則散血

蔓荆子苦頭疼能医拘挛濕痺濕眼堪除

微炒研碎

去隔膜根名

兜鈴苦寒能薰痔漏定喘消痰肺熱久嗽

清木香散氣

百合味甘安心定胆止嗽消浮瘧痘可啖

秦艽微寒除溫藥筋肢節風痛下血骨蒸

新好羅紋者佳

紫苑苦辛痰喘欬逆肺瘡吐膿寒熱並清

去頭

款花甘溫理肺消痰肺瘡喘欬補劣除煩

要嫩革
去木

金沸草寒消痰止嗽明目祛風逐水尤妙

一名旋覆花

桑皮甘辛止嗽定喘瀉肺火邪其功不淺

風寒新發生用虛勞久嗽蜜水炒用去紅皮

杏仁溫苦風寒喘嗽大腸氣閉便難功要

單仁者泡去皮尖炒入
藥双仁者有毒殺人勿用

烏梅酸溫收欬肺氣止渴生津能安癲痢

去核

天花粉寒止渴祛煩排膿消毒善除熱痢

去壳用仁重紙包磚壓
捲之只一度去油用

瓜蔞仁寒寧嗽化痰傷寒結胸解渴止煩

密蒙花甘主能明目虛翳青盲服之効速

酒洗蒸
过晒干

菊花味甘除熱祛風頭暈眼赤口瘡殊功

家園內味甘黃
小者良去梗

木賊味甘益肝退翳能止月經更消積聚

決明子甘能祛肝熱目疼收淚仍止鼻血

星角酸寒化毒辟邪解熱止血消腫毒蛇

羚羊角寒明目清肝却驚解毒神智安

龜甲味甘滋陰補腎逐瘀續筋更醫顛顛

即敗龜板

鼈甲酸平勞嗽骨蒸散瘀消腫去痞除崩

法
醋
研

海漂味咸破血除癥通經水腫目翳心疼

一名烏
醋
研

火麻味甘下乳催生潤腸通結小水能行

微炒
研
去壳取仁

山豆根苦療咽痛腫敷蛇虫傷可救急用

俗名金
鎖匙

益母草甘女科爲主產後胎前生新去瘀

一名茺蔚子
一名茺蔚
名犯鐵器

紫草苦寒能通九竅利水消膨痘瘍最要

紫葳味酸調經止痛崩中帶下癥瘕通用

即凌霄花
一名鍊子

地膚子寒去膀胱熱皮膚瘙痒除熱堪捷

掃蕎子

練根性寒能追諸風寒立止積聚立通

樗根味苦泻痢帶崩腸風痔漏燥濕澁精

去粗皮取白
皮切片酒炒

澤蘭甘苦療腫能消打撲傷損散體虛浮

牙皂味辛通關利竅散腫痛消吐風痰妙

上枝子皮
用不此者

蕪荑味辛破邪殺虫療瘧疥化食除風

田

雷丸味苦善殺諸蟲癩蟲疊毒治兒有功

赤者殺人白者殺蟲
甘草煎水泡一宿

胡麻仁甘疗腫惡瘡熟補虛損筋壯力強

黑者殺人白者殺蟲
一名巨勝

蒼耳子苦涼細瘡破風溫痺瘙痒墮噏

一名枲耳
少刺

桃仁味甘風膿爛弦熱賾掣肉眼淚立痊

青葙子苦肝臟熱毒暴發赤瘡毒盲可服

即白鶴花子

穀精草辛牙齒風痛口瘡咽痺眼翳通用

一名穀

白薇大寒療風治瘻人事不知鬼邪堪却

白蘇微寒兒癆驚癇女陰腫癟瘍疔可啖
青蒿氣寒童便熬膏虛寒盜汗除骨蒸勞

茅根味甘通閑逐瘀止吐衄血客熱可去

枇杷葉苦偏理肺臟吐穢不已鮮酒清上布拭去毛

木律大寒口齒聖藥瘧癰能医心煩可却

一名胡柳

射干味苦逐瘀通經喉痺口臭瘡毒堪憑

一名胡蘋

鬼箭羽苦通經墮胎殺虫破結駁邪除乖

一名蕘茅

夏枯草苦療癰癰瘡破癥散結濕痺能瘳

冬至後發生
蔓至時枯掉

馬鞭草苦破血通經癰瘡活塊服之最良

鶴風味苦殺虫追毒心腹李痛蛇虺堪逐

旱蓮草甘生鬚黑髮赤癩堪止血流可截

慈菰辛苦疗腫瘍疽惡瘡癰瘍蛇虺並施

榆皮味甘通水除淋能利閏節敷腫痛定

取裏面白皮切片嚼干

鉤藤微寒療兒驚癇手足瘓瘍抽搐口眼

齒類鉤藤故曰鉤藤酒浸九服

蓀花味甘帶刺兩功赤治赤者自洽白同

辛夷味辛鼻塞流涕香臭不聞通竅之劑

去心毛

續隨子辛惡瘡蠱毒通經消積不可過服

一名千金子一名金子一谷推冬實去壳取仁蒸包壓去油

海桐皮苦霍亂久痢癬疥癬牙疼亦治

右楠藤辛腎衰脚弱風淫濕痺堪爲妙藥

一名鬼目女人不可久服犯則切切思房

鬼臼有毒辟瘧除惡蟲毒鬼疰風邪可却

大青氣寒傷寒熱毒黃汗黃疸時疫宜服

側柏葉苦吐衄崩漏能生鬚眉除溫之劑

槐實味苦陰瘡濕痒五痔腫疼止涎極恭

即槐角黑子也

瓦塹子鹹婦人血塊男子瘀癥癰瘕可瘥

即研子殼火煅醋淬

棲間子苦禁洩溢痢帶下崩中腸風堪治

冬青子寒滑胎易產癩利小便普通乳難

即葵菜子一名女真貢

淫羊藿辛陰起陽興堅筋益骨志強力增

即仙靈脾俗呼三枝九葉少也

松脂味甘滋陰補陽駁風安臍膏可貼瘡

一名松脂去青

覆盆子甘腎損精竭黑鬚明眸補虛續絕

去核枝去紅

合歡味甘利人心志安臟明目快樂無慮

即交枝樹

金櫻子甘夢遺精滑禁止遺尿寸白虫殺

霜后核去核

楮實味甘壯筋明目益氣補虛陰痿當服

郁李仁酸破血潤燥消腫利便閑格通導

碎核取仁湯
泡去皮研碎

沒食子苦澀血生精染鬚最妙禁痢極靈

卽無食子

蜜蛇僧鹹止刺醫痔能除白癩諸瘡可治

伏龍肝溫治疫安胎吐血欬逆心煩妙哉

取年深馬

變褐者佳

穿山甲毒痔惡瘡吹奶腫痛鬼魅潛藏

用甲剉碎

蚯蚓氣寒傷寒瘧病大熱狂言投之立應

蜘蛛氣寒孤痴偏痛蛇虺咬瘻疔腫敷用

度大蟲

色者佳

蟾蜍氣涼殺瘡蝕癬瘧疫能碎瘡毒可祛

刺鷁皮苦主五痔陰腫疝痛能開胃氣

蛤蚧味鹹肺痿血咯傳尸勞疰邪魅可却

蠅蛆味鹹治十水腫上下左右效不旋踵

蜗牛味鹹口眼渴僻篤瘤拘挛脫肛咸治

桑螵蛸鹹淋濁精泄除疝腰痺虛損貧缺

田螺性冷利大小便消腫除熱醒酒立見

渴酒者熟桃肉食之

象牙氣平雜物刺喉能通小便諸瘡可瘳

水蛭味鹹除積瘀堅通經墮胎折傷可痊

即馬蠅

海粉味鹹大治頑痰婦人白帶鹹能軟堅

即海石火煅研細無以蛤粉代之

石蟹味鹹點目腫翳鮮鹽脹海催生落地

無名異甘金瘡折損去瘀止漏生肌有準

青蒙石寒硝煅金色墜瘀消食神妙莫測

用硝同入罐內火燄如金色者佳

磁石味鹹專殺鐵瘻若吞針繫線即出

花蕊石寒善止諸血金瘡血流產後血洩火燄

代赭石寒下胎崩帶兒疳渴利驚癇鬼怪

黑鉛味甘止嘔反胃鬼疰癆

即安神定智

銀屑味辛語謹恍惚定志

鎮心明目

金屑味甘善安魂魄癲狂

調和血脉

狗脊味甘酒蒸入劑腰背

疼風寒濕痺

根猶金毛狗脊去尾卽胡

骨碎補溫折傷骨節風血頑疼最能破血

無良姜

茜草味苦蟲毒吐血經脈崩漏損傷虛熱

預知子貴綴衣領中遇

每声作誅蟲殺虫

王不流行調經催產除風癰瘍乳瘡常啖

卽剪金子花取酒蒸火焙干

狼毒味辛破積瘕癰惡瘡瘍瘻殺毒鬼精

藜芦味辛最能發上眼

月經瀉痢殺虫消蟲反芍藥細辛人參沙參玄參丹參苦參勿同用

草麻子辛吸出滯物

頂肚收全足胎出

取仁

百部味甘骨蒸勞嗽殺瘧蛇虫久嗽功大

黃荆子苦善

通骨節寒熟能下肺氣又名荆實

瓜蒂苦寒
晉能吐痰消身腫脹并治黃疸

卽北方甜瓜蒂也一名苦丁香散用則吐丸用則瀉

粟壳性溫油
痢噦却劫病如神殺人如劙不可輕用

蜜水炒

巴豆辛熱除
寒積破癥消痰大能通瀉

一名江子一名巴牽牛去角晉症製用

又

夜明砂糞能下
化胎小兒無害癰瘍堪裁

一名伏翼蟲一名燒烟屎

一

班狗有毒破血通經諸瘡癰瘍水道能行

去頭翅足米炒熟用

一

蚕沙性溫濕潤癩
珍癰風腸鳴消渴可飲

胡黃連苦治夢遺
小兒瘡盜汗虛驚

抓斷一塊烟出者佳忌猪肉

一

史君甘溫消癰消澀
鴻刺諸虫總能除却

微火煅去壳取仁

一

赤石脂溫保固腸胃
煩渴生肌滋精鴻刺

形赤祐舌爲良火煅醋淬研碎

一

青黛鹹寒能平肝木
療癰瘍瘧痢兼除熱毒

即龍葵花名枯丸

阿膠甘溫止欬膿血吐衄胎崩虛羸可啜

要金井者佳蛤粉炒成珠

一

白礆味酸化瘀解毒治癰多能難以尽述

火煅過

五倍苦酸療齒痺瘡瘍

碧膾兼除風熱

一名文蛤一名百亟
倉百葉煎即比造成

玄明粉辛能燭宿垢化積治痰諸熱可療

同朴硝以夢葡萄
同製過者是

通草味甘善治膀胱消瘡堅腫能醫乳房

枸杞甘溫添精補髓明目心風陰火陽起

紫熟味甘膏
開者佳去梗

黃精味甘能安臟腑五勞七傷此藥大補

典鈎吻畧同切勿誤
用洗淨九蒸九晒

何首烏甘添精種子黑髮顏長生不死

赤白兼用酒浸
遇一宿搗碎

五味酸溫生津止渴久嗽

芳金水枯竭損勞傷用比去梗

山茱萸性溫滋精益髓腎虛耳鳴腰膝痛止

風寒咳嗽用南虛
酒蒸去核取肉其
換勿用滑精確治

石斛味甘却驚定智壯骨補虛善敵冷痺

去根如黃色者佳

破故紙溫腰膝酸痛與陽固止鹽酒炒用

一名補骨脂
鹽酒洗炒

薯蕷甘溫理脾止渴益腎補中諸虛何怕

一名山藥一毫
山羊杯慶者佳

旋容味甘峻補精血若驟用之更動便滑

酒洗去鱗用除心
內膜筋忌犯錄罷

鬼絳甘平夢遺滑精腰痛膝冷

添髓壯筋

水洗淨熱酒研確效

膚千染同磨末力不堪作湯

牛膝味苦除湿痺瘦腰膝酸疼

小便淋瀝

去苦酒洗

懷慶者住

巴戟辛甘大補虛損精滑夢遺強筋固本

肉厚連珠者佳酒浸過宿

追去骨髓千俗名二蔓草

咀禁鐵器製米泔十斤

仙芋味辛腰足痺虛損勞傷陽道火起

咀石不及一斤山茱萸

左頑大者佳

壯蛎微寒滋精止汗帶崩脇痛老痰祛散

火煅紅研

卽金龜子酒

浸蒸去皮核

練子味苦勝肥疝氣中濕傷寒利水之劑

白者爲勝

酒浸切片

萆薢甘苦風寒湿痺腰背冷痛添精益氣

寄生要系

寄生

續斷味辛接骨續筋跌撲折損且固遺精

酒洗切片如

鷄脚者佳

龍骨味甘夢遺精泄崩帶腸癰瘍風熱

火煅

人之頭髮補陰甚捷吐衄血暈風癆驚熱

血餘一名

天靈蓋鹹傳屍勞瘵溫瘡血崩殺之立瘥

卽人腦蓋施

宜熟存性

卷之三

三三

鹿茸甘溫益氣滋陰泄精止血崩帶墮任

去毛或酒浸微火
或鹽水浸微火

鹿角膠溫吐衄虛羸跌撲傷損崩帶安胎

腽肭脐熱補益元氣駁邪辟鬼疰癆勞傷

酒浸微火
又令香

紫河車甘療諸虛損勞瘵骨蒸滋培根本

一名混油皮一名湯元交口
也長流水滑洗或封瓦燒子水

蒸嚼忌
銚器

楓香味辛外科要藥療瘡癰瘍漏亦可

一名白
膠香

檀香味辛升胃進食霍亂腹痛中惡鬼氣

安息香辛辟邪厭惡逐鬼消蟲鬼胎能落

黑黃色燒香
鬼惧神散

蘇合香甘誅惡殺鬼蟲毒癰疽癰能起

熊胆味苦熱透黃疽惡瘡虫痔五痔驚癇

硇砂有毒潰瘍爛肉除翳生肌破癰消毒

水飛去土石生用
擦肉火煅可用

硼砂味辛療喉腫痛咽上熱痰噙化立中

火塊光
塗皆佳

硃砂味甘鎮心養神却邪殺鬼定魄安魂

生餽无害
驅眼驚人

硫黃性熱掃除疥瘡壯陽逐冷寒邪敢當

龍膽味辛苦頭瘡頭瘡狂燥妄語真爲良劑

即水
俗名
象胆片

蘆薈氣寒殺虫消痘癩癧驚搐服之立安

出天
象胆

天竺黃甘急慢驚風鎮心解熱

支
三国

射香辛暖善通關竅伐鬼安驚解毒甚妙

火
不見
去砂石用

乳香辛苦療諸惡瘡生肌止痛心腹尤良

打心同所
火

沒藥溫平治瘡止痛跌打損傷破血通用

阿魏性溫除癥破結却鬼殺虫傳尸可滅

水銀性寒治疥殺虫斷絕胎孕催生立通

輕粉性燥外科要藥楊梅諸瘡殺虫可托

靈砂性溫能通血脉殺鬼辟邪安魂定魄

係水銀硫黃水
火煅煉成形者

砒霜大毒風痰可吐截瘧除噬能消沉痼

一名人言一名信所畏蓋豆粉水米醋羊肉悞中毒服中用一味郎盤

雄黃甘辛辟邪解毒更治蛇虺喉瘡肉

珍珠氣寒鎮驚除癇開聾磨翳止渴墜痰

朱砂者初如粉

牛黃味苦大治風痰定魄安魂竅潤靈丹

琥珀味甘安魂定魄破瘀消癥利水通濱

拾芥者佳

血竭味鹹跌撲傷損惡毒瘡瘍破血有準

一名麒麟竭斷有頭者佳

石鍾乳甘氣乃標恒益氣固精明目延年

陽起石甘腎氣乏絕陰痿不起其効甚捷

火煅酒淬七次再酒煮半日研細

桑棋子甘解金石燥清除熱渴染鬚髮皓

梅公草苦潰堅消腫結核能除食毒堪用

一名黃化地丁草

石韋味苦通利膀胱遺尿或淋癃背瘡瘍

篇蓄味苦瘀癰疽小兒臤歪女人陰蝕

赤箭用苦原號定風殺鬼蟲毒除疝療瘻

卽夫麻苗也

鱉鰐魚甘勞瘵殺虫癆漏瘡疹崩疾有功

白蛤肉平解諸藥毒能除疥瘡味勝猪肉

鯽魚味甘和中補虛理胃進食腸澼濕痢

驴肉微寒安心解煩能發痼疾以動風淫

鱈魚味甘益智補中能却狐臭善散溫風

血余日眼咽喉斜左
患癥右右患癥左

白鵝肉甘大補臟腑最治瘡毒痼疾勿與

犬肉性溫益氣壯陽炙食作渴陰虛禁嘗

不可與蒜同
食項須人

鱠肉性冷涼血補陰癥瘕勿食孕婦勿侵

合鵝子食殺人合莧菜
食卽生鱠頭切忌多食

芡實味甘能益精氣腰膝酸疼皆主溫痺

一名鷄頭

石逆子苦療噤口痢白濁遺精心良劑

藕味甘苦鮮酒清熱消煩逐瘀止吐衄血

龍眼味甘歸脾益智健忘怔忡聰明廣記

蓮須味甘益腎烏鬚滋精固髓悅顏補虛

右榴皮酸能禁精漏止痢滋腸榮鬚尤妙

陳倉谷米調和脾胃解渴除煩能止渴利

愈陳愈佳卽邦米陳粟米功同

萊菔子辛喘欬下氣倒壁衝牆脹滿消去

卽蘿蔔子

麻油性冷善解諸毒百病能除功難悉述

白果甘苦喘嗽白濁點茶壓酒不可多嚼

一名銀杏

胡桃肉耳補腎黑髮多食生痰動氣之物

梨味甘酸解酒除渴止嗽消痰善敵煩熱

勿多食令人寒中作渴
產婦金瘡屬血虛切忌

桂實味甘主療五痔蟲毒二虫不可多食

竹茹止嘔能除寒熱胃熱欬嗽不寐安歇

竹葉味甘退熱安眠化瘀定喘止渴消煩

味淡者佳

竹瀝味甘陰虛痰火汗熱渴煩効如開鎖截片余直劈數片兩磚架起火烘
燈草味甘通利小水降閉成淋濕腫爲最

艾葉溫平除邪逐鬼漏血安胎心痛卽愈

宜陳久者佳極
燭醋浸炒之

川椒辛熱祛邪逐寒明目殺虫溫而不猛

去目
燭炒

胡椒味辛心腹冷痛下氣溫中跌撲堪用

石蜜甘平入藥煉熟益氣補中潤燥解毒

馬齒莧寒青盲白翳利便殺虫癰瘍咸治

胡荽味辛止頭疼內消穀食痘疹發生

韭味辛溫祛除胃熱汁清血瘀子医夢泄

大蒜辛溫化痰消穀解毒散瘡多用傷目

酒通血脉消愁遣興少飲壯神過多損命

用無灰者凡煎藥
入酒葉熟方入

醋消腫毒積瘕可去產後金瘡血量皆治

一名苦酒
用朱酸者

蓮子味甘健脾理胃止瀉澁精清心養氣

全不去心恐成卒暴霍亂者

大枣味甘調和百藥益氣養脾中滿休嚼

人乳味甘補陰益陽悅顏明目羸劣仙方

要壯盛婦人香膿者惟病婦勿用

童便味涼打撲瘀血虛勞骨蒸熱嗽尤捷

一名波溺名輪回一名還元湯要七八歲兒清白者惟赤黃不可用夫皮即熱

生姜性溫通暢神明痰嗽嘔吐開胃極靈

留皮即冷

運氣

五運主病

諸風掉眩皆屬肝木○諸病癆瘍皆屬心火○諸溫腫滿皆屬脾土○諸氣
贍鬱病痿皆屬肺金○諸寒收引皆屬腎水

六氣爲病

風

諸暴強直支痛續戾裏急筋縮皆屬於風厥陰風木乃肝膽之氣也

小氣大變

熱

諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便澀濁腹脹大鼓之如鼓癰疽瘍瘡氣結核吐丁霍亂督鬱腫脹鼻塞鼽衄血溢血泄淋閉身熱惡寒戰慄驚厥悲笑譖妄衄衄血污皆屬於熱少陰君火之熱乃真心小腸之氣也

溫

諸痙攣直積飲痞膈中滿霍亂吐下体重肺腫肉如泥按之不起者皆屬於濕太陰溫土乃脾胃之氣也

火

諸熱瞀瘡暴瘡冒昧燥擾狂越罵詈齷齪附腫酸痛氣逆衝上禁慄如喪神守嚏嘔瘍渴耳鳴及聾嘔漏泄食不下目昧不明暴生瞞瘡暴病暴死皆屬於火少陽相火之熱乃心包絡三焦之氣也

燥

諸濕枯涸乾痙皴揭皆屬於燥陽明燥金乃肺與大腸之氣也

寒

諸病上下所出水液澄澈清冷癥瘕癰疝堅癥腹滿急痛下痢清白食已不飢吐利腥穢屈伸不便厥逆禁固首屬於寒足太陽寒水乃腎與膀胱之氣也中風

脈風邪中人六脉多沉伏亦有脉墮氣奔指下洪盛者○挾寒則脉帶浮挾暑則脉虛挾溫則脉浮濇○脉經曰脉微而數中風使然○寸口沉大而滑沉則爲實滑則爲氣匕寔相搏入於臟則死入於腑則愈此爲卒厥不知人昏青身冷爲大臟死身溫和汗自出發入腑而復自愈○脉陽浮而滑陰濡而弱者宜吐或浮而滑或沉而滑或微而虛者皆虛與痰也○大法宜浮遲不宜強大急救○若脾脉緩而無力者最爲難治蓋風喜歸肝肝木克脾土則大便洞泄故不治也

病夫風中於人也曰卒中曰暴仆曰暴瘡曰蒙昧曰喝辟曰癰癧曰不省人事
曰語言蹇澀曰瘻延壅盛或死或不死皆以爲中風之候也內經曰風者百
病之長也至爲變化乃爲他病無當方又曰風者善行而數變又曰風之陽
人也或爲寒熱或爲熱中或爲寒中或爲厲風或爲偏枯千金云岐伯所謂
中風大法有四一曰偏枯謂半身不遂也二曰風痳謂身無痺痛四肢不收
也三曰風瘽謂奄忽不知人也四曰風痺謂諸痺類風狀也金匱要略曰寸
口脈浮而緊七則爲寒七虛相搏邪在皮膚浮者血虛脉絡空虛賦邪不瀉
或左或右邪氣反緩正氣卽急正氣引邪喟僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪
在於經卽克不勝邪入於腑卽不識人邪入於臟舌卽難言口吐痰沫是以
古之名醫皆以外中風邪立方處治及近代劉河間李東垣朱丹溪三子者
出始與古人異矣河間曰中風難瘳者非謂肝木之風實甚而卒中之亦非
外中外風良由將息失宜心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱

氣拂鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也多因喜怒思悲愁五志有所過極皆爲熱甚故也俗云風者言未而忘其本也東垣曰中風非外來風邪乃本氣自病也凡人年逾四旬氣衰之際或因憂喜忿怒傷其氣者多有此證壯歲之時無有也若肥者則間而有之亦是形盛氣衰故如此耳丹溪曰有氣虛有血虛有痰盛又曰西北氣塞爲風所中者誠有之矣東南氣溫而地多濕有風者非風也皆是溫生痰生熱生風也三子之論河間主乎火東垣主乎氣丹溪主乎濕反以風爲虛象若以三子爲是古人爲非則三子未出之前固有從古人而治愈者若以古人爲是三子爲非則三子已出之後亦有從三子而治愈者大抵古人與三子之論皆不可偏廢蓋古人之論言其證也三子之論言其因也因則爲本證則爲標其所謂外中風邪者未必不由元精虛弱榮衛失調而後感之也其所謂因火氣燄者亦未必絕無外邪侵侮而作也

治風之法全在活變若重於外感者先驅外邪而後補中氣重於內傷者先
補中氣而後驅外邪或以散風藥爲君而以補損藥爲臣使或以滋補藥爲
君而以散邪藥爲臣使量重輕而處之也內經曰有取本而得者有取標而
待者有本而標之者有標而本之者又曰急則治其標緩則治其本若夫初
病暴仆昏悶不省人事或痰涎壅盛舌強不語而寸口脉浮大而實者急宜
瓜蒂藜蘆等藥吐之以遏其勢或人迎脉緊盛或六脉俱浮弦者急用小續
命湯表之益風氣太盛心火暴盛而痰涎壅遏於經絡之中醞釀於肺膈之
內煽動四肢百骸勝沸皆由心火之盛也不可不慎不可不辨于斯時也
尋常藥餌所能拔孟浪庸医所能療此必須疏通諸肺桂之驅之乃能達于
上下也或本方加附子以其腎雄壯之資而有斬閼奪魄之勢能引人參之
並行於十二經絡之間殊可追復其散失之元陽又能引麻黃杏仁輩發之
開腠理以祛散其在表之風寒則萬病乃除惟人血分行血養血以滋養之

虧損之真陰或加石膏知母以降胃火或加黃芩以清肺金看所挾見証與
夫時月寒溫加減施治病勢稍退精神稍復輒當改用丹溪之法而以補氣
補血消痰之劑以調其本氣而安此急則治其標與夫標而本之之治也凡
人手足漸覺不隨或臂膊反髀股指節麻痺不仁或口眼喎斜語言蹇澀或
胃膈迷悶吐痰相續或六竅浮滑而虛軟無力雖未至于倒仆其爲中風暈
厥之候可指日而定矣早當從丹溪之法調治其左手脈不足及左半身不
遂者以四物湯補血之劑爲主治右手脈不足及右半身不遂者以四君子
湯補氣之劑爲主治痰盛者二陳導痰等湯兼用氣血兩虛而挾痰者八物
湯加南星半夏桔實竹瀝薑汁之類若夫真元漸復痰飲漸治或覺有風邪
未退者仍以羌活愈風湯防風通聖散之類出入加減調治而安此緩則治
其本與夫本而標之上治也抑古先哲有云其證有中臟中腑之分證各不
同中腑者多着四肢故面加五色脉浮而惡風寒四肢拘急不仁或中身之

前或中身之側皆曰中腑也其治多易中臟者多滯九竅故喜緩穴肯耳譬
鼻塞目瞀大小便閉結皆曰中臟其治多難大法中腑者小續命以發其表
中臟者二化等湯以通其裏臟腑兼曰者又不可拘泥或一氣之微汗或一
旬之通利又曰治須少汗亦須少下多汗則虛其衛多下則損其榮斯又不
可不謹或外無六經之形証內無便溺之阻隔但手足不隨語言蹇澀者此
和中於經又當從乎中治而不可以標本論也是以養血通氣大秦艽湯羌
活愈風之類治之外有痺瘡氣厥脾虛傷食及乎土太過令人四肢不舉之
候皆似中風又當審察明白各從其類以治之

不治證凡中風但見髮直搘頭吐沫上眞面赤如粧汗縱如珠或頭面青黑瘀
響如拽鋸者皆不治若眼開手散鼻虧口張遺尿不知此五者爲五臟絕五
臟俱絕亦皆不治但見其一猶當施治心腎絕尤難治也若動止筋痛是無
血滋筋故痛曰筋枯不治

一初若中風中氣昏倒不知人事牙關緊急涎潮壅塞口眼喎斜半身不遂精神恍惚倉卒之際急以手大指搘刻人中即省或急令人將病者兩手兩足從上而下頰上趕出四肢痰氣即散免至攻心即醒或急以三棱針刺手中指甲角十井穴將去惡血就以氣針刺合谷二穴人中一穴皆是良法如或未効用通幽散吹鼻即提起頭項髮有嘔可治無噬不可治如口噤不開破閉散擦之口即開即多灌香油或少加麝香一二分或用姜汁亦可或太白散化風丹搗生飲之類當隨証選而用之如風痰頑結諸藥不効者奪命散一服立效

痰涎壅盛者口眼喎斜者不能言語者皆當用吐法定獨聖散吐之或口噤用黎盧末少加麝香灌入鼻內吐之一吐不已再吐之亦有氣血虛而不可用吐法者

一肥人多有中風以其氣盛于外而歟也肺爲氣出入之道人胖者氣營

急氣急則肺邪盛肺金尅不膽爲肝之腑故痰涎壅盛所以治之必先理氣爲急中後氣未盡順痰未盡除調理之劑惟當以藿蕡正氣散加南星木香防風當歸此藥非特治中風之証而中惡中氣尤宜

一氣虛卒倒參耆補之夾痰則濃熱入參湯加竹瀝薑汁血虛四物湯補之夾痰者四物湯以薑汁炒過更加竹瀝薑汁

一左癰右瘍者因氣血虛而痰火流注也血虛則痰火流注于左而爲左癰宜四物湯加白芥子竹瀝姜汁兼有死血加桃仁紅花氣虛則痰火流注於右而爲右瘍宜四君湯合二陳湯加白芥子竹瀝薑汁能食者去竹瀝加荆瀝在妙肥人多濕少加附子行經難矣初起急治則可久則痰火鬱結而難治也

一中風飲食坐卧如常但失音不語俗呼爲啞風小續命去附子加石菖蒲一錢或柯子清音湯亦可然不語昏眩一端有舌強不語神昏不語口噤不語

舌縱語濶舌麻語溫其間治痰治風安神養氣各從活法又難拘續命柯子而已

中氣亦似中風但風中多痰延氣中口中無涎又風中身溫氣中身冷風中脈浮洪氣中脉沉伏此七情內傷氣逆爲病治當順氣烏藥順氣散八味順氣散主之或藿香正氣散亦可經云無故而瘡脉不至不治自己謂氣暴逆也氣復則已審如是雖不服藥自可

中風中氣口眼喎斜言語蹇濶或口噤牙關緊急筋脈牽縮骨節風腫手腳

方見通治

痳痛行步艰辛一應風氣疼痛太乙紫金丹月余方愈

中風不語癱瘓初起宜導痰小腹丹用葛根湯送三五十丸少時即能說話方見通治

痰飲

中風頭痛如破語言蹇濶小續命湯加羌活

中風口眼喎斜頭疼發熱惡風初作者羌活沖和湯加獨活藁本

方見傷寒

一中風一身俱麻烏藥順氣散加入參白朮川芎當歸各

一中風面目指俱麻乃氣虛也補中益氣湯加木香附子羌活防風鷺粟附

內傷

一中風滿身刺痛四物湯加荆芥防風蔓荆子薄退表門冬

方目
補益

一中風半身不遂羌活愈風湯加天麻荆芥葛根各一錢

方通關散

秘方

治中風不語不省人事牙關緊急湯水入

天南星

半夏

牙皂

名五味

右爲末每用少許吹鼻有嚏可治無嚏不可治

○按右方治不省人事者吹鼻通關之劑

破棺散

治中風牙關已禁無門下藥

天南星

半冬

龍腦

步詩

右五月五日午時合每半錢細研令藥牙自開

○接右方治口噤者擦牙開闔之劑

奪命散

治卒暴中風涎濁氣閉牙關緊急眼目上視破損傷風搐搦

及小兒急驚風並治

天南星

甜葛歷

半夏

炒泡去滓不去油

巴豆

去壳不去油各等分生用

右爲細末每服半錢用生薑自然汁一呷調下牙關緊急湯剉灌不下道
藥輒能治之小兒以利痰或吐痰愈

○按右方治風痰頑結者宜此猛烈之劑

獨聖散

治中風痰迷心竅狂癲煩亂人事昏沉痰壅盛及五癟心風等

醉瓜蒂爲末每五分重者一錢熟水調下即吐如不吐須再進一服倘不
以白湯止之或怒湯亦妙或麝香小許研水飲之即解
如吐風痰加金
五分微炒如有虫者加雄黃一錢猪油五六點甚者加芫花五分立止
此
如湿腫滿加赤小豆末一錢凡吐令人眼痛時令閉雙目

○按右方治痰壅盛者吐痰之剂

太白散

秘方

治中風痰氣厥絕心頭尙溫喉中微響此藥下痰如神于生
古石灰刮去土爲細末水飛過每三錢水一碗煎至三分溫服

太玄湯

秘方

治證同前

染布活龍缸水一盞溫而灌之即能說話○已上二方下痰之劑

化風丹

治一切中風痰厥風癇牙關緊急不省人事及小兒驚風搐搦用
弓反張發熱痰嗽喘促並皆治之累經良驗

天南星

牛胆製
过二系

天麻

蜜

防風

去芦

荆芥穗

穗

羌活

獨活

去苦

人參

生芻

細辛

川芎

各一兩

甘草

右爲細末練蜜爲丸加芡實大硃砂爲衣薄荷煎湯研化服因氣鬱用紫蘇

湯化下

如牙閼口噤用少許擦牙即開

一方加木香五分尤神

攝生飲

治一切平中不論中風中寒中暑中濕及痰厥氣厥之類不省人

事者初作即用此方神效

蒼木

生

南木香

生

南星

生

半夏

生

遼細辛

生

石菖蒲

生

甘草

生

右剉生薑七片水煎溫服痰盛加全蝎炙二枚

二生飲

治中風昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作声痰氣上壅無問

外感風寒內傷喜怒或六腑沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及

氣虛暈眩

生

若真氣虛而風邪所乘加人參一兩大效

南星

一兩

川烏

去皮尖

附子

去皮尖

木香

半錢

右剉生薑十片水煎溫服。如氣盛人只用南星五錢木香一錢生薑十四片煎服。○如痰涎壅盛者如牽鉗服藥不下者宜灸關元氣海穴。

○按右方治一切風痰氣厥不省人事初作首連治之劑

烏藥順氣散

治男婦一切風氣攻注四肢骨節疼痛遍身麻痺手足癱瘓。

語言蹇澀筋脉拘挛及脚氣步履艰辛腰膝軟弱婦人血氣老人冷熱兩膈
脹滿心腹刺痛吐瀉腸鳴凡治風先理氣上順則瘀消除理其風庶可收功
理氣者氣滯氣鬱之類此七情也皆效

麻黃

去節

陳皮

去白

烏藥

各二錢

川芎

三分

白芷

三錢

姜益

炒

枳殼

去穰炒

桔梗

一錢

乾姜

炮五分

甘草

三分

右判一劑生薑東煎增寒壯熱肢體倦怠加葱白心遍身癰癧加薄荷○手
足拘挛加木香石斛○溫氣如蒼木白木楂榔○足浮腫加牛膝五加皮獨
活○遍身疼痛加當歸肉桂乳香沒藥○有虛汗加黃耆麻黃根去麻黃乾
薑○胸膈脹滿加枳實義木○頭眩加細辛細茶腳不能舉動加羌活防風
麝香○心腹刺痛加小茴○手足不能舉頭不能起加川續斷威靈仙陰襄
浮腫合五積散四肢冷痺加川烏附子官桂秦艽○久患左癱石瘻矣麻黃
乾薑加天麻防風羌活半夏南星木香當歸○癥瘕作痛加天雄細辛防風

○婦人血風加防風荆芥薄荷○臂痛加羌活防風薄桂蒼木紫蘇○氣滯腰痛加桃仁入酒同服○皆心痛合行氣香蘇散加葛本半夏枳芩○口眼喎斜加菖草黃連羌活防風荆芥竹瀝蜜汁○麻痺亥痛極者合和三五七散○日夜疼痛午間輕夜又重合和神祕左經湯○二三年不能行者合和獨活寄生湯

八味順氣散 治中風之人先服此藥順氣次進治風之劑

白朮

白茯苓

青皮去穢

白芷

陳皮去白

烏藥

人參各二分

甘草炙一錢

右剉分二剗每一剗用水二鍾煎至八分去渣食遠服 或加南星木香以甦痰氣 或盛加半夏二錢生薑三片

○按右方治中風中氣者先宜此順氣之劑

小續命湯 治卒暴中風不省人事半身不遂口眼歪斜手足攬掉語冒寒

濕肢體麻痺神情昏亂眼目眩暎涎壅盛筋鈍拘挛及脚氣緩弱不能動
復屈伸治外有六經之形証則從此方加減以發其表

麻黃

去節

杏仁

泡去皮尖

官桂

白芍藥

川芎

芍巴

黃芩

人參

去芦

耳草

炙各二分

防風

一錢

附子

泡去皮尖七分

右判作一劑

每劑用生薑五片水二

鍾煎至一鍾

二直通口服

凡中風不審六經之形證加減用藥雖治之不能去邪也內經曰開則漸然而寒閉則熱而悶知暴中寒邪宜先以續命湯隨証治之○太陽中風無汗惡寒倍麻黃杏仁防風○太陽中風有汗惡風倍桂枝杏仁芍藥○陽明中風身熱有汗不惡風倍乾薑桂枝黃芩○太陰中風無汗身涼倍附子乾薑○少陰中風有汗無熱倍桂枝附子耳草○中風無此四經六証混雜繫於少陽厥陰或肢節掣痛麻杏不仁倍羌活連翹○大抵春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥○有熱加白附子去附子亦可○角急拘挛語遲

脉弦加薏苡仁。若筋急加人參去黃芩芍藥以避中寒服後稍輕再加當歸○煩燥不大便去附桂倍芍藥竹瀝○大便三日不出胸中不快加枳實大黃○語言蹇澀手足戰掉加石菖蒲竹瀝○發渴加麥門冬葛根天花粉○熱而渴加秦艽○身體痛加羌活搐者亦加之○煩燥多驚加犀角羚羊角○多怒加羚羊角○恍惚錯語加茯神遠志○不能言加竹瀝○失音不語加石菖蒲○中風頭痛如破加羌活○骨節痛此有寒濕倍附子官桂○嘔逆腹脹加半夏人參○脚膝弱加牛膝石斛○腰痛加桃仁去皮尖杜仲姜汁炒○不得睡加酸棗仁○痰多加南星○肥人多濕加烏附行經用童子加白朮○或歌或笑或服語言無所不妄加白不倍麻黃人參桂枝○自汗去麻杏加白朮

○按右方治風中腑者發表之劑

三化湯 治中風外有六經之形証先以加減葛根湯隨証治之內有便溺之阻隔復以此藥導之

川厚朴

姜汁炒

羌活

大黃

枳實

薑

右剉薑煎服不利再服以微利則已如內邪已除外邪已盡當從愈風湯以行中道久服大風悉去縱有微邪只從愈風湯加減治之然治病之法不可失於塞或一氣之微汗或一旬之通利如此爲常治之法也久之則清濁自分榮衛自和矣

○按右方治風中臟者通裏之劑

大棗羌活湯

治中風外無六經之形証內無便溺之阻隔知血脉不能養於

筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自榮

大棗

一升

羌草

一升

當歸

二升

川芎

二升

白芍藥

一升

細辛

三分

羌活

防風

黃芩

各五分

石膏

一升

白芷

五分

白朮

五分

獨活

一升

生地黃分白茯苓和熟地黃分 心下痞滿加枳實一錢

右細剉一劑生薑三片水五鍾不拘時溫服或加竹瀝薑汁同服
羌活愈風湯 治肝腎虛筋骨弱語言蹇澀精神昏憊風濕內弱風熱体重

或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂大抵心勞則自病生心靜則萬邪息此
藥能安心養神調理陰陽使無偏勝治中風內外無邪此藥以行中道

蔓荊子

防風

去芦細辛去苗

枳殼

慈母

熟地黃

人參

去芦

川芎

麻黃

薄荷

甘菊花

當歸

去芦

地骨皮

去骨知母

知母

黃耆

杜仲

枸杞子

桑杞

柴胡

去芦

半夏

厚朴

姜製

羌活

獨活

甘草

白芷

前胡

防已

白茯苓

黃芩

白芍藥

已上各四分

石膏

蒼朮

生地黃

各六分

桂枝

一分遇天

陰雨加生薑三片

右細剉作一劑水二大盞煎至一盞去渣溫服

○按有方治風中經者調血養血之劑

防風通聖散 治中風一切風熱大便閉結小便赤澀頭面生瘡眼目赤痛
或熱極生風舌強口噤或鼻生紫赤風刺癰瘍而爲肺風或成風厲而世呼
爲大風或腸風而爲痔漏或腸鬱而爲諸疝語謇驚狂並皆治之

防風

川芎

當歸

白芍藥

大黃

芒硝

連翹

薄荷

麻黃

不去節

石膏

桔梗

黃芩

去芦各

白朮

山楂子

荆芥穗

各二分

滑石

二分

甘草

三分

大黃

八分

白朮

山楂子

右剗作一劑

生薑三片

水煎溫服

勞汗當風汗出爲皺鬱乃坐勞出於玄府脂液所凝去芒硝倍加芍藥當歸
發散玄府之風當調甘藥備俗云風刺○生瘡或赤或白麻黃葛根葱白
出其汗麻黃去節并去芒硝鹹走血而血凝故不發汗還依前方中加四物
湯黃連解毒湯三藥合而服之日三服故內經曰以苦發之謂熱在肌表連

內也○小便淋閉去麻黃加滑石連翹煎藥湯調木香末二錢麻黃主表不宜裏故去之腰脇痛走注疼痛加芒硝石膏當歸甘草一服各二錢調車前子末海金沙末各一錢內經曰腰者腎之府○若破傷風者如在表則辛以散之在裏則苦以下之兼散之汗不後通利血氣祛逐風邪者母一兩內加荆芥穗大黃各二錢調全蝎末一錢羌活末一錢諸風潮搐小兒急慢驚風大便閉結邪熱暴甚腸胃乾澀寢汗咬牙上竄睡語筋轉驚悸肌肉蠕動每一兩加大黃一錢枳子二錢調茯苓末二錢○肌肉蠕動者調羌活末一錢經曰肌肉蠕動命曰微風風傷於肺咳嗽喘急每一兩加茯苓半夏各二錢○打撲傷損肢節疼痛腹中惡血不下每一兩加當歸大黃各三錢半調乳香沒藥各二錢○解利四時傷寒内外所傷每一兩內加益元散一兩葱白十莖豆豉一合生薑半兩水一大碗煎至七沸或煎一小碗溫冷服一半以筋探之即吐罷服一半煎熟服汗出立解○飲酒中風身熱頭痛如破加黃

連須一錢葱白十莖依法煎愈慎勿用桂枝麻黃湯解之○頭旋腦熱鼻塞
濁涕時下每一兩加薄荷黃連各二錢半內經曰膽移於腦則辛額鼻淵濁
涕下不已也○王汪曰膽液下澄則爲濁涕下不已如水泉故曰鼻淵也此
謂足太陽竅與陽明竅俱盛也血逆者調木香末一錢服之○癰疽節毒一
切惡毒腫瘍本方二兩倍連翹當歸加黃連茯苓木香人參白芷金銀花生
礦粉黃耆各半兩名勝黃飲子如瘡在止加當歸用酒浸發班熱本方加黃
連五錢○此方最治痢後鶴膝風良驗

祛風至寶丹

治諸風熱等證

防風半
荆芥穗五分
獨活一兩
羌活一兩
全蝎去毒五分
天麻一兩
當歸二兩
熟地一兩
川芎二兩
芍藥一兩
人參一兩
白朮一兩
桔梗一兩
黃連五分
黃柏五分
滑石三分
麻蕡五分
大黃五分

芒硝 五分

硃砂 二兩
蕩衣

甘草 二兩

砂砂 二兩

右爲末練蜜爲丸如彈子大每一丸細嚼茶清任下臨臥服有熱去人參自
术川芎加苦參細茶鹽梅薄荷湯下疼痛甚倍苦參

○按右方治諸風燥熱者發表攻裏之劑

大烏藥順氣散 治諸風左癱右瘓疎風化痰順氣神效

當歸 川芎 白芍

生地

紫蘇

陳皮

香附

烏藥

枳殼

砂仁

桔梗

黃芩

半夏

防風

龍骨 等量

甘草 各一兩

乳香

沒藥

沉香

各五分三味爲末煎熟藥加入內同服

右剉生薑二片棗二枚煎服

防風至寶湯

劉尚書方

治中風痰涎壅成口眼喎斜四肢癱瘓瘡瘍未不知

痛痒不能動展身若無骨者

當歸

川芎

白芍

防風

羌活

天麻

白芷

僵蚕

青皮

烏藥

牛膝

南星

半夏

二味用白凡牙皂土
姜煎水浸三昼夜

黃芩

梔子

連翹

甘草

麻黃

去之久病

右剉一兩五錢生薑煎服早晚各一服忌葱蒜

愈風潤燥湯

孫尚書方

治半身不遂手足欠利語言費力呵欠噴嚏面白

口眼喎斜寬弛頭目眩暈痰火熾盛筋骨時疼痛頭或痛心腫

川芎

一分

當歸

一分

生地黃

八分

姜炒

熟地黃

八分

姜炒

紅花

四分

酒洗

牛膝

八分

酒

南星

一分

姜炒

羌活

六分

防風

六分

天麻

一分

半夏

一分

姜汁炒

橘紅

八分

鹽

白朮

半分

其草

一分

蜜

仁

八分

炒

白芍

二分

桂枝

六分

黃柏

三分

酒炒

右剉水煎入淡竹瀝姜汁一茶匙溫服

○按右方治中風雜癥口眼喎斜者半攻半補之制

古今醫錄
祛風除溫湯 鄭中山方

治中風症筋骨疼痛

當歸

酒洗一錢

川芎八分

赤芍一錢

陳皮去白一分

半夏姜炒一錢

白茯苓

一錢水洗製

蒼朮八分

白朮一錢

梔子一錢

枳殼一錢

黃連

酒炒一錢

黃芩酒炒一錢

桔梗八分手有病方用

白芷九分

防風八分

羌活

一錢

甘草五分

身痛加姜黃一錢

腳痛加牛膝防已威靈仙

右剉

一剉生姜五片水煎服

天台散

治中風手足癱瘓或寒痛

烏藥

陳皮

麻黃

薑茶

川芎

枳殼

楚炒桔梗續斷

白芷

乾姜

防風

羌活

威靈仙

天麻

續斷少許甘草炙

當歸

乳香

沒藥

麝香少許

甘草炙

右剉

生姜煎服

三聖散

治半身不遂口眼喎斜骨筋疼痛遍身盡痛一切風疾血瘀凝滯

筋絳拘牽

行步難進

玄胡索

炒

當歸

酒洗

官桂

各等分

右爲末每服二錢早晚各一服

如腰痛加杜仲茴香炒

○按右方治中風癱瘓筋骨痛者蠲痛之劑

精神解語湯

雲林製

治中風痰迷心竅不省人事舌强不能言語痰涎壅

盛口眼喎斜半身不遂

當歸

川芎

白芍藥

生地黃

麥門冬

遠志

去骨草水泡

石菖蒲

南星

同下製

半夏

牙皂煎水浸三日

陳皮

白茯苓

烏藥

枳實

炒

黃連

姜汁炒

防風

羌活

葛草

右剉生薑三片竹茹一團水煎入童便薑汁竹瀝同服○頭痛加蔓荆細辛
自芷

清心散

秘方

治舌強不能言語

青黛二錢

硼砂二錢

冰片三分

牛黃三分

薄荷二錢

右爲末先以蜜水洗舌上後以薑汁擦之將藥蜜水調稀擦舌根上

遠志膏

秘方

治中風舌不能言

遠志不拘多少甘草水泡不去骨爲末雞清調敷天突咽喉前心三處

○按右方治中風舌強不能言語者清心豁痰之劑三方並立效

加味轉舌膏

賈蘭秘方

治中風痰癥舌塞不語神效

連翹

一兩

梔子

炒五分

黃芩

酒炒五分

薄荷葉

一兩

吉更

五分

川芎

一分

遠志泡

一兩

玄明粉

五分

大黃

酒炒五分

犀角

五分

桔梗

一分

甘草

五分

防風

五分

桔霜

一兩

石菖蒲

六分

甘草

五分

防風

五分

桔梗

一分

川芎

一分

遠志泡

一兩

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大硃砂五錢爲衣每用一丸細嚼薄荷湯下

後陰附服

○按右方治中風舌塞不語者清火除風之劑

嗣子清奇湯

治諸風失音不語

桔梗

一兩半
生半炒

訶子

四十九個
半生半泡

甘草

二兩半
生半炒

石爲細末每服七錢用煎熟童便一大碗調服甚者三四服効

○按右方治失音不語專攻之劑

加減排風湯

林白楚方

治口眼喎斜

天麻

二兩
防風

八分
羌活

獨活

川芎

各五分
白蘚皮

當歸

白芍藥

白术

半夏

茯苓

黃芩

杏仁

各三分
麻黃

蒼朮

一兩半
甘草

四分

右剉作一剗生姜煎服

理氣祛風散

秘方

治口眼歪斜

青皮

陳皮

枳殼

桔梗

南星

半夏

烏藥

天麻

川芎

白芷

防風

荆芥

羌活

獨活

白芍

甘草

右剉生薑五片煎服

貝母瓜萎湯

治肥人中風口眼歪斜手足麻木不分左右皆作痰治

貝母

瓜萎仁

南星

荆芥 防風

去黃柏

羌活

黃芩

威靈仙

黃連

半夏

泡七次

白朮

陳皮

桂

甘草

天花粉

○按右方治中風口眼喎斜者調理之劑

秘傳順氣散

孫鑑塘傳

治諸風口眼歪斜半身不遂左癱右瘓遍身腫痛

麻木或成風毒瘡出膿水服三五劑後進藥酒

青皮

陳皮

枳殼

桔梗

烏藥

人参

白朮

茯苓

半夏

川芎

白芷

細辛

麻黃

防風

乾姜

殼

甘草

右剉生姜煎服

神仙風藥酒

應圓傳

荆芥

防風

蒼朮

麻黃

細辛

天麻

白朮

川芎

當歸

半夏

茯苓

殼

川烏

草烏

洛陽花

白花蛇

名等分

右共爲粗末每蒸三錢用小黃米燒酒一斤東三枚蜜五錢同入瓶內上蓋
蓋和麵封同麻繩扎左右上下入鍋懸起重湯煮香一炷半冷定取出每服

一小鍾疾在上食後服疾在下食前服指日見效不可輕忽

○按右方治諸風癱瘓腫痛頑麻者祛風敗毒之劑

仙傳史國公浸酒良方臣謹沐

聖恩叨居相職節宣弗謹遂染風疾半体偏枯手足拘挛不堪行步宣醫診治
良剗屢投今越十載並無寸效乞歸故里廣訪名医途至奉先驛獲遇異人
臣陳病狀蒙授一方臣依方浸酒未服之先非人扶不能起及飲一升使手
能梳頭服二升手足屈伸有力服三升語言行步如故服四升肢體通緩百
節遂和舉步如飛其効如神言之不及盡述乞

賜額行天下使黎庶咸臻壽域謹錄是方隨表拜進以聞

防風去芦二兩治四肢骨節疼痛身拘急

秦艽去芦四兩治四肢拘急

華芻二兩酥炙治頭痛

羌活

二兩治風濕
百節疼痛

川牛膝

去芦酒洗二兩治手足痺痛
腰膝疼痛

虎脰骨

二兩酥炙退骨
節中毒云壯筋

骨鱗甲

一兩九肋者
作治癰瘍

當歸

二兩補血主血
四兩搘碎去頭

蒼耳子

濕骨節頭瘡

瘧疾百節不遂
皮肉頑麻

枸杞子

五兩炒治五藏風邪
油松節

二兩搘碎此筋節

乾茄根

八兩飯上蒸熟
治諸毒氣湿在

骨節不

能屈伸

加白术

二兩

去芦川杜仲

三兩姜汁炒去絲

晚蚕沙

二兩黃色治

右細剗用好酒三十五斤將生絹袋盛藥懸浸于內封固過十四日將壘入
鍋懸空著水煮令壘滾響出埋入土內三日去火毒每開壘取酒不可以
面對壘口恐藥力冲傷眼目每飲二三鍾毋令藥力斷絕忌動風之物
神仙延壽藥酒丹

專治男子婦人遠年近日諸虛百損五勞七傷左癱右

瘻半身不遂語舌蹇澀筋脈拘挛手足渾身瘡疥腸風痔漏紫白癰風七寒
暑溫脚氣心氣走氣痰氣膀胱疝氣十膈五噎十氣身體羸瘦腰膝疼痛四肢
肢皮膚無力皮膚生瘡且龍眼昏下部虛冷諸般淋漓及婦人經衄不調腰
腹疼痛兩肋膨脹面黃肌瘦口苦舌乾嘔吐惡心飲食無味四肢無力眼目

昏花神思驚怖夜出盜汗時發熱因月事或多或少或前或後淋泄不止
閉塞不通結成癖氣氣塊時時作痛或子宮積冷血氣虛敗赤白帶下漸成
勞疾並皆治之此酒互相等製其性和緩其味其香能追萬病常服和胃养
丹田和血氣壯筋骨益精髓輕身健体明目安五臟定神魂潤肌膚長顏色
返老還童延年益壽其効難以舉述

當歸去尾

人參去芦

白芍藥去皮

砂仁

川椒

烏藥

川烏去皮

草烏員者泡何首烏

米泔浸竹刀刮去皮

何首烏

五加皮

枸杞子

虎脰骨酥炙

乾薑泡二冬肉蔻

蔻

酒洗焙乾

牛膝

去芦三冬白芷

枳殼去穰炒

香附子炒

厚朴

姜汁炒

陳皮

去皮白术炒

獨活

羌活

半夏

薑汁炒

官桂

白芍藥

麻黃

生地黃

熟地黃

天門冬

麥門冬

商芝

鹽酒炒

五味子

細辛

酒洗

荳米

沸製破故紙酒洗

防風

沉香

甘草

紅棗去核

酥油

蜂蜜

核桃仁

湯泡去皮各半斤

右剉一處絹袋盛之用燒酒一大壺浸三日放鍋中重湯煮三個時辰取出
掘坑埋之三日出火毒每日清晨一二錘病在上食後服在下空心服飲酒
盡將渣晒干爲末燒酒打糊爲丸如梧桐子大每服三十丸空心酒下

鹿角霜丸

治虛損半身委弱或二三年不能動履者

黃芪

炒去蜜木二兩

人參二兩

白茯苓二兩

白朮二兩

當歸酒洗三兩

白芍藥

酒炒二兩

川芎

熟地黃酒蒸二兩

蒼朮各二兩

肉桂一兩

破故帛

酒炒二兩

小茴

炒一兩

肉蓯蓉酒洗二兩半

木瓜兩半

川烏兩半

大附子

童便和麵包煨二兩

牛膝

續斷一兩

烏藥五分炒一兩

檳榔一兩

木香二分

杜仲

姜汁炒去絲二兩

續斷半

防風半

羌活一兩

獨活一兩

虎脰骨

酥水兩半

甘草

生五分

鹿角霜一斤

右爲細末

好酒煮米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心米湯黃酒任下

○按右方治諸風癱瘓屬虛寒者溫補之劑

健步虎潛丸

治中風左瘫右瘓手足不能動舌強蹇於言

黃耆

鹽水炒一兩半

人參一兩

白术二兩

白茯神去皮水當歸酒洗一兩半

虎脰骨

酥炙一兩半

白芍

鹽酒炒二兩

牛膝去芦酒洗

杜仲姜酒炒二兩

破故紙

鹽酒炒二兩

虎脰骨

龜板

酥炙一兩半

生地黃

酒洗一兩熟地黃

二兩

枸杞子

酒洗一兩半

五倍子

黃柏

人乳伴鹽同上炒

知母

酒炙二兩知母同上炒

麥門冬

去心二兩遠志

去心二兩

石菖蒲

一兩

酸棗仁

炒一兩

沉香

五分

木瓜

一兩

薏苡仁

炒一兩

羌活

酒洗一兩

獨活

酒洗一兩

防風

酒洗一兩

大附子

童便浸三日廻吳煨去脂切四片

童便浸乾五分

右爲細末煉蜜加猪脊髓五條和爲丸如梧桐子大每服百丸空心鹽湯酒

任下

○按右方治諸風癱瘓口喎舌強屬虛熱者滋補之劑

竹瀝枳朮丸
化痰消火健脾中風於未病之先宜服此藥但人必知此理

至妙若與搜風順氣丸相間服之何中風之有也

枳實

麸炒一兩

白术

去芦二兩

蒼术

米泔浸鹽水炒一兩

南星

生姜牙皂用一兩

半夏

同南星製一兩

白茯苓

去皮一兩

黃連

姜汁炒五兩

黃芩

酒炒一兩

當歸

酒洗五兩

陳皮

去白一兩

白芥子

炒一兩

山楂

肉三兩剥去核取

右爲細末以神麃六兩生薑汁一盞竹瀝一碗煮糊爲丸如梧桐子大淡鹽湯送下一百丸食遠服

搜風順氣丸

治三十六種風七十二般氣上熱下冷腰脚疼痛四肢無力

多睡少食日漸羸瘦顏色不完惡瘧下注口苦無味增生毛疎積癰癬氣塊
丈夫陽氣斷絕婦人久無嗣息久思寒瘈嘔吐瀉痢腸胃積熱以致脇間痞
悶大便結燥心便赤澀腸氣痔漏肢節頑麻手足癱瘓步履艰辛譁言寒溫
不問大人小兒皆可服之

錦紋大黃

五兩酒浸九蒸九曬

火麻仁

微炒去殼二兩

仁

去皮壳二兩

枳殼

麸炒二兩

乾山藥

酒蒸一兩

獨活

一兩

山茱萸

酒蒸去核二兩

楨榔

一兩

兔絲子

用爭酒者火爛搗成餅研

車前子

二兩半炒

牛膝

酒浸晒乾二兩

右爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。每服七八十九粒，茶酒任下。百無所忌。早晚各一服。覺臟腑微動，以手壯肺，兼補之。久患腸風，便血。服之除根確。換語溫服之，平復酒後能進。一服宿酒盡消。中年以後之人，過用厚味，酒肉多有痰火，且不能遠。上致陰虛火動，七則生風。所謂一水不能勝五火也。故以此方，疎風降火爲主。不必問年高氣弱，雅俗婦人並皆服之。俱見大效。孕婦勿服。

骨

天麻丸

一兩

牛膝

酒洗去皮二兩半

川芎

一兩半

玄參

一兩

杜仲

酒炒兩半

大附子

一兩半

羌活

三兩半

當歸

二兩半

生地黃

四兩

加獨活

半兩半

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服七八十九空心溫酒送下良久則食凡人初覺大指欠指麻木不仁或手足少力或肌肉微掣此中風之先兆也三年內必有中風之疾宜先服愈風湯天麻丸各一料此乃治未病之先兆也○又云於未病之先先服竹瀝枳术丸可却去之若與搜風順氣丸間服何中風之有

○按右方皆預防中風之劑

附諸風

方消風散 治諸風上攻頭目眩暎項背拘急鼻塞聲重耳聾蟬鳴并皮膚頑麻瘡痒痛疹婦人血風頭痛腫庠並治

防風

荆芥

川芎

灰本

人參

霍香

羌活

各一兩

羌活

兩蟬退

姜桑

陳皮

厚朴

各等分

右爲末每服三錢頭痛鼻流清水茶清送下遍身瘡癩酒送下

蠅退散

治飲酒後遍身皮膚癩痒抓至血出而又痛

蟬退去頭尾

薄荷葉

各等分

右爲末每服二錢食後酒調下 又有一方用消風散一兩蟬退一兩和細茶調服

胡麻散

治肺脾風毒攻衝遍身皮膚癩痒或生瘡疥或生癰疹用手搔時浸淫或瘡久而不瘥而作面上道風狀如重行紫斑白癰頑麻等風或腎臟風攻法脚膝生瘡者並皆治之

胡麻

苦參

何首烏

荆芥

各二兩

威靈仙

甘草

各一兩

右爲細末每服二錢薄荷湯食後服或酒調此藥後頻洗浴得汗效

苦參丸

治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚時生疥癩癩痒難忍時出黃水

及生大風手足爛壞眉毛脫落一切風痰並皆治之

苦參

四兩

荆芥穗

一兩