

遠西方彙

九

○卷之九

痔疾

血尿

血斑病


子宮出血

月經不調

十武9

237

9



門 七 九
番 237
卷 9



遠西方彙卷之九



獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑婆婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲 重譯

南洋伊東 健夫 參校

痔ハルロイモルダルロイシテス羅ハイモ

痔ノ療法二般ニ分ツ曰ク根治法曰ク姑息法是ナリ其症

根治法ニ宜シキ者ハ之ヲ用フルコト固ヨリ論ナシ然レモ

痔既ニ深ク宿根シテ其全治ヲ望ムベカラズ而メ諸見證

痔既ニ深ク宿根シテ其全治ヲ望ムベカラズ而メ諸見證

二 適當ナリ ○粘液痔ハ強壯藥九百四十方至ヲ處スルヲ
 常トス ○膀胱痔ノ治法大概直腸痔ニ同シ唯僅ニ斟酌ア
 ルノニ即解釋劑ヲ用ヒテ素因ヲ除クヲ務メ以テ根治
 ヲ圖ルベシ然レ根治ノ効ヲ收ムルヲ罕ナルガ故ニ其
 畜血ヲ直腸ニ導引スルヲ常トス四週毎ニ肛門ニ鍍銀四
 條乃至六條ヲ施シ或ハ刺戟藥ヲ用ヒテ灌腸シ又管ヲ以
 テ緩和藥ノ蒸氣ヲ攝シ直腸ニ送入スレハ能ク其効ヲ達
 スルナリ此症ハ衝動藥ヲ坐藥ニ作リテ用フルモ亦適當
 ナルベシ又膀胱ノ部位及ヒ陰部ニ冷水ヲ灌クニ宜シ内
 服ハ荅麻林度五百七十五方至孕礪酒石酒酸加里曹達十五

四方五十五方孕礪酒石九百四方至
 七百三十三方等ノ如キ緩性瀉藥ニ
 宜シ瘰癧証ハ油性乳劑ニ菲阿斯越幾斯ヲ伍スル者五百
 五百十老利兒結爾私水八百八十五方至
 三方小量吐根百廿五
 六十一方等佳ナリ此他尿道漏血太多カラサル者ハ慢
 止血藥ヲ用フルヲ勿レ若其血過多ナルハ停止セザ
 ルヲ得ス即粘汁ニ硫酸ヲ伍セル者二百明礬八百廿或ハ
 明礬乳清七百廿桂丁幾ヲ阿芙蓉丁幾葛私カス儂ト儂ト儂ト幾或
 ハ老利兒結爾私水ト配伍スル者此症の當ノ方トス蓋之
 ニ兼テ膀胱ノ部ニ寒罨法ヲ行フベシ ○膀胱粘液痔即所
 謂膀胱聖京促症ノ治法ハ直腸粘液痔ト一般ナリ上ニ載

謂膀胱聖京促症ノ治法ハ直腸粘液痔ト一般ナリ上ニ載

スル所ノ強壯藥ノ外烏萃ウケル烏爾失ウエルシハ奇特ノ効アリ鑛泉ノ
 中ニ就テサレバ惠爾順傑兒泉ハヒル穢歇蘭度氏稱用セシヨリ膀胱
 ノ粘液痔ニ嘉稱ヲ得タリ他ハ膀胱粘液流出症條下ニ詳
 説スル所ノ方法ヲ參照スベシ

○第九百二方〔落優〕

孕驗酒石各一 蒲公英越幾斯各一 或濱瞿麥越幾斯各一 或蘆根

越幾斯各半 默栗薩水各六

右和勻朝夕服ニ食匙

主治 諸種ノ痔ニ宜シ

○第九百三方〔穢歇蘭度〕

蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯 孕驗酒石各半 蒸餹

水 薄荷水各三

右調勻每服一食匙日四次

主治 痔脈閉塞症ニ用ヒテ微利ヲ持續セシムルニ宜シ

○第九百四方〔肝爾姪蒲蘭突土〕

孕驗酒石 麻爾羅歇越幾斯各二 默栗薩水各三 溶

解

右調勻朝夕服半劑

主治 上方ニ同シ

○第九百五方〔穢歇蘭度〕

蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯 孕驗酒石各半 蒸餹

純精酒石一 硫黃華半

右和勻為散每服一茶匙日一二次

○第九百六方

精製硫黃一錢至 孕驗酒石六錢 茴香油糖一錢 白糖

半

右調和為散每服一茶匙日三四次

主治右二方痔脈ノ閉塞ヲ通暢シ大便ヲ導泄スルニ宜

○第九百七方穢歌蘭度

硫黃乳 麻偃涅失亜 純精酒石 枸櫞油糖各一

右調勻為散晡時冷水一小盞和服

主治神經質人ノ痔疾ニ宜シ

○第九百八方過傑栗屈的兒

純精酒石 麻偃涅失亜 沈澱硫黃 茴香各二錢 龍

腦八

右調和為散等分十六包每一時半取一色著草浸劑和服

主治痔疾家甚虛弱ノ者之ニ宜シ

○第九百九方 結列印依朴昆姪兒散

孕驗酒石 橙皮黃 大黃 茴香各二錢 加耶普的油

八

右調勻為散早晚服一茶匙強

○第九百十方 設兒列名疎釋散

純精酒石錢三 麻屈涅失亞 加密列 硫黃萃 大黃

錢各一 苗香油滴十

右調勻為散每服一茶匙日二三

〔主治〕右二方九百九方門脈系閉塞胃腸虛衰風氣鬱畜大

便不利依朴昆姪兒等二偉効アリ

○第九百十一方〔室卒德〕

精製護謨安沒尼亞幾 白石鹼各一 大黃末各

右調和三入為一九衣伊里斯弗魯連底那根末每服六九

乃至八九日三次

○第九百十二方

精製護謨安沒尼亞幾 白石鹼各一 蒲公英越幾斯

白屈萊越幾斯各一

右調勻二入為一九衣石松粉每服五九乃至八九日三次

〔主治〕右二方腹中閉塞殊二肝系門脈系ノ閉塞ニ宜シ○

或ハ水製蘆薈越幾斯半錢ヲ加フベシ

○第九百十三方〔私傳福傳兒〕

蒲公英越幾斯 睡萊越幾斯 纈草越幾斯各一 勿

搗祭亞石鹼半 大黃末一 過爾托末適

右二匹為一九衣伊里斯弗魯連底那根末每服十九日三次

主治諸般ノ腹臍閉塞。膽液分泌ノ障碍。粘液鬱滯等ノ症
ニ宜シ

○第九百十四方〔餘拂〕

蒲公英越幾斯 薯草越幾斯 葛兒儒別越幾斯 亞

兒尼加越幾斯各二錢 醋酸加里 精製硃砂各半錢 大

黃赤二錢

右調和二匹為一九衣伊里斯弗魯連底那根末每服十五丸乃至三十九日一二次

主治腹内諸器粘液鬱滯或ハ閉塞アル症及ヒ痔疾等ニ
宜シ

○第九百十五方

薯草穗二錢

右細剉水煎供飲料

主治痔疾ニ宜シ早晚一小盞ヲ取リ冷服セシム但シ累
月連進スベシ

○第九百十六方〔剉曹松〕

薯草葉一錢半

瀉利鹽一錢

過子泥子一錢

右細剉水ニ此浸漬安熟所四分時玻璃壺收貯每服取半

遠石 藥 卷九 七 黃 非 堂

小盞乃至半小盞餘濾過飲服日二三次

主治腹内諸分泌遲鈍ノ症粘液鬱積痔疾等ニ宜シ

第九百十七方 〔附爾姪蒲蘭度〕

精製瀉利鹽 水製大黃丁幾各一 默栗薩水二

右調勻朝夕服二食匙

主治痔疾殊ニ盲痔便秘ヲ兼ヌル者ニ宜シ

第九百十八方 〔瀉爾爾倨名地試母布列屈篤〕

弗蘭白刺皮半勺或六錢或一勺

右常水適宜煮濾取液六勺每一時服一食匙以每日得粥

樣便三四行為度

〔主治〕帝ニ白母布列屈篤氏之ヲ稱用セシノミナラズ密

優憫見名地噎魯蘭件尉魯寺瀉爾爾倨等ノ病院ノ碩學

及ヒ其他ノ醫家モ亦痔疾及ヒ他ノ少腹痛ニ此方ヲ好

トス蓋此煎劑數週連用スルニ宜シ白母布列屈篤氏病

者ニ命マル所ノ用法左ノ如シ弗蘭白刺皮一勺半水一

瓶半ヲ以テ煮テ一瓶ヲ取り午前午後一盞強ヲ服セシ

メ一食匙半二食匙以テ効ヲ得ルニ至ル○多血畜積症生

カ充進セル者或ハ血脈系ノ感觸過敏ナル者ハ更ニ芒

硝或ハ孕鹼酒石ヲ加フ○又屢胡蘿蔔ヲ兼用スルヲ大

ニ稱賛ス○白母布列屈篤氏或ハ胡蘿蔔ヲ播爛シテ米

廣勝堂

飲若クハ肉羹汁ニ加ヘ。或ハ生根ヲ用ヒ。或ハ洋芥些ノ
酪砂糖及ヒ些ノ食鹽ヲ合メ搗爛シ或ハ之ヲ冷浸シテ
飲料トス冷浸法生根ヲ播爛シテ桶ニ入レ冷水ヲ注キ
テ蓋覆シ冷所ニ安スルヲ六時後絞リ濾シテ砂糖ヲ和
ス或ハ此液更ニ味佳ナルヲ要セハ洋芥根ヲ研爛シテ
胡蘿蔔ト俱ニ浸出スルモ亦可ナリ此液半瓶乃至一瓶
ヲ取テ一日ニ服盡セシム風氣鬱閉ヲ兼ヌル者ハ過
炭酸曹達一刃乃至半錢砂糖水甘味一麥酒蓋強ニ和シ
之ヲ上ノ煎方ト兼用スルヲ日ニ三四次シテ良効ヲ得
タリト云フ○此煎方ハ弗蘭白刺ノ幹皮乾枯セル者ヲ

用フベシ嫩枝ノ皮ヲ用フル勿レ生皮ヲ用フルハ嘔
ヲ發ス

○第九百十九方別連杜

蒲公英葉根俱 麥糠一 井水十六勺煮耗至八勺兼

沸加後藥

加密列 續草各二

右濾過二分灌腸

備考此方ハ弁拂氏小腹閉塞ヲ治スル灌腸藥ノ變方ナ
リ○弁拂氏ノ説ニ據レハ多般ノ小腹病殊ニ依朴昆姪
兒黑膽液病及ヒ痔疾ハ唯夫ノ灌腸法ノミヲ以テ癒ル

ト云ヘリ此論偏固ニシテ形器説ニ原ツクト雖然_レ正當
 今之ヲ廢棄スルモ亦甚シトス高醫落優_人ハ_名弁拂氏ノ
 療法ニ拘泥セシ者ニアラスト雖亦夫ノ灌腸法ヲ以テ
 諸種頑固ノ小腹病肝臟虛衰メ膽液減耗シ之カ為ニ便
 秘常習トナレル症黃疸腸間膜腺ノ腫脹盲痔等ヲ全治
 セリト云フ

○第九百二十方 〔穢 歌蘭度〕

蒲公英根 濱瞿麥根 歌爾拔斯屈謨花 加密列_各

右割合供灌腸劑每用取二茶匙強加小麥糠一握煎

主治所謂小腹閉塞及ヒ閉塞ニ係ル諸患ニ宜シ○蓋每
 次少量_六ニ射注シテ務メテ藥汁ヲ内ニ留メシムルヲ
 要トス之ヲ留ムルハ灌腸後四分時間患者ヲシテ右側
 臥セシムヘシ頑固ノ閉塞或ハ粘膠液蓄積セル者ハ石
 鹼石灰水ノ如キ峻烈ノ解釋劑及ヒ新鮮牛胆一食匙ヲ
 加フ

○第九百二十一方

蒲公英根 濱瞿麥根 纈草 黥_イ失_シ刺_ラ護_ゴ_各

右割合合供灌腸

○第九百二十二方

蒲公英根 濱瞿麥根 蒼草葉 葛爾儒別葉 加密

列各一

右細劉合供灌腸

主治右二方上同シ○此方症ニ隨テ種々加減ス珊篤

里葉麻兒羅歇等モ亦加ヘテ可ナリ

○第九百二十三方

祇種人奇効水アリケロノテ

麻偃涅失亞錢三 井水二北

右和勻徐々加稀硫酸九錢每服一麥酒盞強日三次

主治痔疾ヲ根治スルニ宜シ護私篤人 同友福傑兒氏

ト俱ニ此藥液ヲ歴驗シテ實ニ偉効ヲ得タリト云フ○

○方中ノ稀硫酸ハ醇硫酸一分水六分トス○蓋安頓人ハ

未此水藥ヲ熟試セサルガ故ニ實ニ未其効ヲ知ラズト

雖痔疾ヲ根治スルハ攝養ヲ節シ解釋劑及ヒ硫酸ヲ用

ヒ小腹頑固ノ閉塞アル者ハ浴法葛爾泉浴ヲ 施メ更

ニ偉効ヲ奏セリ

○第九百二十四方護私德落兒

複方大黃越幾斯 水製蘆薈越幾斯各一 過泥子油

十六 開達格碌屈斯十二

○右調勻二丸為一丸衣石松粉每晚服一丸乃至三丸

主治小腹内閉塞症便秘ヲ兼ヌル者及ヒ上症ニ因テ發

スル所ノ諸症ニ傳効アリ

○第九百二十五方 秘歌蘭度 忽弗滿 名人 拔爾撒謨丸

沒藥 蘆薈 黑列僕里越幾斯 各二 葛爾儒別越幾

斯 亞爾鮮越幾斯 紫堇越幾斯 珊篤里越幾斯

著草越幾斯 各半 底列並的那 安息香 杜松子脂

常春藤脂 各二 雜腹蘭 東方產 半錢

右丁寧調和上沙火二匁為一九夜石松粉隨症每朝服二

丸乃至六丸

主治 痔血ヲ促スニ宜シ

○第九百二十六方 設兒 名人 拔爾撒謨丸

雜腹蘭 未半 阿芙蓉 未五 精製礪砂 蘆薈 透明者

黑列僕里越幾斯 各一

右加水製大黃丁幾適宜調和一匁為一九夜甘草末玻璃

器收貯每服八九丸乃至十二丸

主治 痔血及ヒ經血ヲ促スニ宜シ ○毛皮ヲ以テ肛門ヲ

摩シ痔血ヲ促スノ法ハ益アルヲ稀ナリ唯患者感觸遲

鈍多血肥胖ニシテ粘液質ノ者ニ適當ニ感觸銳敏ノ者

ハ脚浴ヲ行ヒ肛門ニ蒸氣浴ヲ施シ肛内ニ衝動藥ヲ射

注シ肛圍ニ放蟻スベシ

○第九百二十七方 檀蒲丸 名丸

蘆薈錢二 蘆薈透明 鐵屑各一 拔爾撒

謨舍利別適

右三瓜為一九衣石松粉早朝服一二九晚間二九乃至四九

主治閉止セル痔血ヲ挑起スルニ福傑兒名大此方ヲ稱賛セリ○又經閉症ニ弗陽名人之ヲ用フ

○第九百二十八方暹傑栗屈的兒

黑列僕里越幾斯 阿魏 透明蘆薈 撒兒未爾扶斯 雜腹蘭東方產 各一錢 越栗失爾布魯布利篤適

右二瓜為一九衣桂末每晚服八九

○第九百二十九方同上

甲方

黑列僕里越幾斯二 沒藥水製越幾斯 硃砂 桂油

糖各一 桂水三勺溶解加橙皮舍利別半勺

右調勻早午晚服一食匙

主治右二方九百廿三方痔血及ヒ經血ヲ挑起スルニ宜シ○蓋此ノ如キ破血峻劑ヲ用フルハ最慎重スヘシ但

感覺遲鈍ノ者ニ適當タルハ固ヨリ論ナシ

○又有名ノ秘方二三ヲ掲テ左ニ示ス痔疾及ヒ依依朴 昆昆堙堙兒兒有形ノ因ニ係ル者其他慢性諸病小腹閉塞ニ因

スル者ニ在テハ屢誤用シ易シト雖効ヲ奏スル症モ亦
往々之アリ即葩私ス人ノ說ニ據ルニ所謂上帝丸ルケイゼ
ンル一名噦涅爾名清血丸ノ方左ノ如シ

乙方

格碌堇篤錢六 蘆薈 蘇甘沒尼各半 益智錢一

右調勻取一八半加甘朮半作一丸

○寄束弗名越仙祭ハ密憂名地憫見名地合藥家ノ一方タリ

其方悅乾名地合藥家噦蛭名人ノ說ニ據ルニ左ノ如シ

丙方

大黃謹秘格 健質亞那 雜腹蘭歐私天辰幾 山奈

落葉松耳 上好沒藥 勿擲祭亞的里亞各四 上

○好蘆薈十六

右細割加拂郎斯燒酒三十六北飽熟

○越爾涅兒名健身拔爾撒謨或ハ噦涅爾健身拔爾撒謨

ハ噦蛭名人ノ言ニ據ルニ左方ヲ蒸餾シテ製スト云フ

丁方

枝爾撒謨露者 同上白色者 蘇合香乾 同上

各流動者 錢二 安息香錢三 桂皮 府利各六 護謨安沒尼

亞幾 上好蘆薈各一 上好沒藥錢二 乳香半 酒石

鹽錢二 乙切草花握一 良姜 白芷 亞爾加那根各一

送 實久耽尼 鵝栗拔奴謨 雜腹蘭各半 瘡瘡木
油 龍涎香 麝香各二十 迷迭香 茉沃刺那 刺
賢堙兒花各半

右細判調勻

○第九百三十方〔設兒列〕

酒石酸一刃至二刃 菩草油糖一

右調勻為散等分六裹每服一裹日三次乃至四次

主治痔血過多ノ症ニ宜シ

○第九百三十一方〔落優〕

鹿琥精一錢 葛私篤樓謨丁幾一錢 阿芙蓉丁幾半錢

右調和每四分時服十二滴一和半更蘇

主治痔血過多血シテ瘰癧性ヲ帶ル者之ニ宜シ

○第九百三十二方〔弗陽攸弗瓜隣〕

著草越幾斯一錢 鐵粉二錢

右調勻加桂末三人為一九衣桂末每服三九乃至五九日

三次

主治虛性ノ痔疾失血最甚シキ者之ニ宜シ

○第九百三十三方

里那利膏附一

主治結核痔疼痛ヲ帶フル者之ヲ塗擦ス

○第九百三十四方 〔痲歇蘭度〕

里那利膏 菲阿斯油煮製者 各半 鉛糖半

右調勻作軟膏塗擦盲痔

○第九百三十五方

雜腹蘭末一 龍腦二 菲阿斯油煮製者 二錢 鉛糖膏六錢

右丁寧調勻塗擦

○第九百三十六方 〔遊詩爾〕

菲阿斯油煮製者 斯百兒末攝多 各二錢 葛加阿酪半

龍腦二 雜腹蘭一

右調勻作軟膏攤麻布貼每二時半更換

〔主治〕第九百三十三方 〔痲歇蘭度〕 第九百三十六方 至結核痔疼痛

云帶ヌル者 宜シ又單味ノ葛加阿酪 雞卵油 過兒托軟

膏及新其他 緩和藥モ亦適當ナリ 肝爾姪蒲蘭突土名

ハ果實ヲ油燻シテ之ヲ搗爛シ赤葡萄酒ヲ和シ尻間ニ

貼スルヲ稱譽ス 接骨木汁ヲ麻布ニ塗リ結核上ニ貼ス

レバ破潰出血シテ能ク緩解ス若焮痛スル者ハ會陰ニ

放蟻シ又結核上ニ寒罨法ヲ施シテ効アリ

○第九百三十七方 〔依過叔密士〕

明礬末半 新鮮無鹽酪一

右調勻塗撒絲貼之日數次

主治痔疾痛ヲ帶ト稀液滲出スル者之ニ宜シ

○第九百三十八方律私篤

明礬末一錢半 阿芙蓉末半錢 鉛糖軟膏半

右調和塗麻布貼之

主治痔核箱窄ヲ治スルニ宜シ

○第九百三十九方骨布

甘汞一至六分 亞刺毘亞護末半 加纈草水一弓半

徐々搗和

右為灌腸劑

主治直腸内ノ痔疾痙攣疼痛ヲ帶フル者及ヒ直腸ノ腫

起ニ宜シ蓋水節ニ之ヲ裝スル前先重湯ヲ以テ暖ムベシ

○第九百四十方

大黃末 白糖各一錢

右調勻為散等分六裏早晚服一裏

主治粘液痔ニ宜シ○直腸ニ焮衝性血積ヲ兼ヌル者ハ

先清涼劑或蟻鍼ヲ施シテ以テ之ヲ制スベシ然レ粘液

痔ハ多ク虚性ナルガ故ニ強壯ノ諸藥殊ニ著草九百十

百十連錢草洞庭藍睡菜括矢亞依蘭苔幾那五方九 擦子九 製九 喜九

刺達尼亞鐵劑鐵泉等ヲ用フルヲ要トヌ○又大黃ヲ用

フベシ腸衰弱弛緩シテ粘液ヲ漏ス_レ過多ナル者最驗
アリ若此散藥ヲ飲クハ大黃小塊ヲ齧_ルスル_レ日_ニ
一二次或ハ次方ヲ用フルモ亦可ナリ

○第九百四十一方

大黃半錢 菖蒲根半錢 熱湯適宜浸漬濾取_三弓加橙

皮舍利別三錢乃至四錢

右調勻每服一食匙日四次

○主治 胃腸衰弱症。粘液痔等ニ宜シ

○第九百四十二方

格倫僕一錢半 大黃一錢 常水六弓煮濾取_四弓後加橙

皮舍利別半弓

右調和每服一食匙日四次

○主治 胃腸衰弱。酸敗液。風氣鬱畜。慢性泄瀉。粘液痔等之ニ

宜シ

○第九百四十三方

撒兒茶爾秩斯 牛胆凝固者 蒲公英越幾斯 蘆薈越

幾斯各半錢

右調勻二_二為一九衣桂末隨症朝暮服二九乃至六九

○主治 噶刺弗氏粘液痔ヲ治スルニ甚之ヲ稱贊セリ但小

腹内諸器感觸過敏ノ者ハ蘆薈越幾斯ニ代_テ水製大

黃越幾斯ヲ撰用セリ○落優名ハ水制蘆薈會越幾斯半ハ至ヲ用フルヲ日ニ三四次兼テ蒼草浸葛私カ栗刺浸及ヒ大黃加椶皮浸或ハ未熟橙ノ浸劑ヲ服セシメ又沒藥的列並底那或ハ拔爾撒謨骨コッ拜ハ用ヒテ効ヲ得タリ感觸甚遲鈍ノ症ハ越栗失爾布魯布利篤ニ薩毘那ビ丁幾ヲ加ヘ或薩毘那末ニ鐵粉雜腹蘭大黃等ヲ伍用シテ良効ヲ得タリ蓋此ノ如キ症ハ兼テ胡椒五粒乃至八粒ヲ嚥下スルヲ日ニ二三次補益ノ食餌及ヒ葡萄酒或ハ健胃酒ヲ用フ飲酒常習ノ者ハ落優氏時々燒酒少許ヲ與ヘリ燒酒ハ珊篤里健質安那未熟橙薄荷等ニ優レリト

云フ弛緩甚シキ者ハ薦骨ノ部位ニ芫菁丁幾ヲ塗擦シ或ハ芫菁硬膏ヲ貼シ脊椎ニ越列エ機的爾若クハ瀉水浴ヲ施シ内服ニ別私ビ黠ヒ變ヒ名ノ神經強壯丁幾カ葛刺布呂篤ラ名神經丁幾ヲ用フベシ

○第九百四十四方依過秘密土

土木香越幾斯錢三 幾那越幾斯錢二 阿魏 鐵粉各一

右調勻二ハ為一九衣桂末每服五九日三次

主治粘液痔ニ用フ又萎黃病及ヒ白帶下ニ宜シ

○第九百四十五方

沒食子一 井水一匕半煮濾取一匕

主治膀胱痔並總テ虚性ノ出血及ヒ粘液流出症ニ宜
シ○孤刺密私_名人ハ烏華烏爾失ヲ實阿私麻_附ト配合シ
與ヘリ_{膀胱麻痺條ノ方ヲ見ルベシ}

○第九百四十八方_{設倚迷謁爾}

烏華烏爾失 連錢草葉_{各三錢} 常水適宜煮八分時加

橙皮黃二錢蓋閉浸漬八分時濾取八_弓再加後味

亞刺毘亞_亞蕪謨漿 過兒托舍利別_{各一_弓}

右調勻每服半小_盞日四次

主治膀胱痔血或ハ粘液ヲ流出スル者ニ宜シ又白帶下
ニ用フベシ

○第九百四十九方_{鑿護私_可}

烏華烏爾失_{一_弓} 茴香油糖_{五_人}

右調勻為散等分十二裹每服一裹日三次乃至四次

○第九百五十方_{越過_脩設}

烏華烏爾失_{一_弓} 井水十二_弓煮濾取八_弓

右每一時服半小_盞

○第九百五十一方_{速別倫_歇慳}

烏華烏爾失_{一_弓} 井水適宜煮濾取六_弓溶化葛私_加栗

刺越幾斯二錢再加後味

拔爾撒謨_字露舍利別_{一_弓}

遠西方書 卷九 廣 疔 堂

右調和每一時服一食匙臨服宜振盪

○第九百五十二方〔秘〕〔屈〕〔私〕

石松粉二 雞子黃一 加烏華烏爾失煎煮三三 取液 五三

搗爛加後藥

橙皮舍利別錢六

右調和每一時服一食匙

〔主治〕第九百四十九方ヨリ九百五十二方至腎及ヒ膀胱

ノ虚性粘液流出症ニ宜シ

○第九百五十三方〔福〕〔屈〕〔列〕〔爾〕

吐根末三 麻偃涅失亞錢一 白糖錢七 拘橈油或 過 泥

子油六滴至 十滴

右調勻為散玻璃壺貯每服一乃至四茶匙強日三次乃至四次

〔主治〕膀胱粘液痔。小便難澀。久麻。白帶下。ニ宜シ又吞酸及

ヒ百日效ニ用フベシ

血尿ハチユマチユリア〇ミユクチユスクリユエ

此症原因多クハ痔ノ存スルニ係ル故ニ治法膀胱痔ト一

般ナリ燉衝性ノ者ハ放血シ且答麻林度製清涼瀉劑ヲ用

フベシ九方五百七十五五 瘵癩性ノ者ハ小量吐根五百五世

五百七方八 油性乳劑ニ阿芙蓉液或菲阿私越幾斯ヲ

百六十一方

加フ者五百八方。五老利兒結爾私水八百八十一方至等二
宜シ弛緩ニ因ル者ハ著草葉浸九百十烏華烏爾失煎九百
方明礬乳清八百廿幾那八百九十六方刺達尼八百卅二方至
等ヲ用フ此他甘扁挑油若クハ罌粟子油ヲ取り早晚一食
匙ヲ用ヒテ諸種ノ尿血症ニ甚偉効アリトス

○第九百五十四方〔春姪隣〕

刺達尼越幾斯六錢 桂水五ヲ溶化加後藥

硫酸密幾私生爾〔附一〕 橙皮舍利別一ヲ

右調勻每半時服一食匙

主治尿血太過ノ症ニ宜シ

○第九百五十五方〔蒲列剌〕

大麻子一ヲ 井水適宜煮耗至一匕加三色堇菜花〔不詳〕半

少頃浸漬濾過加後藥

過兒抱舍利別一ヲ

右調勻每服半小盞

主治經久尿血ニ宜シ

血斑病モルビユス。マキロシユス。ウエルホヒ。〇ビユルピユ
フエルホフ蘭

治法猛烈收斂ヲ要トス是故ニ鑛酸及ヒ幾那ヲ最トシ其
他明礬刺達尼ヲ用ヒ冷水及ヒ醋ヲ以テ全體ヲ洗ヒ又櫛

透可石膏
血斑病
廣勝堂

皮煎ニ浴スヘシ
失血症ノ條ニ載スル所
ノ方法ヲ参照スヘシ

○第九百五十六方

鹽酸一錢至二錢 過兒托煎六錢以過兒托根ニ錢製 覆盆子舍利別

右調勻每一時服一食匙

○第九百五十七方

稀硫酸一乃至半錢 幾那煎四錢 覆盆子舍利別一錢

右調和每一時服一食匙

○第九百五十八方刺曹私

硫酸規尼捏六錢至八錢 加密列水或 覆盆子水五錢 覆盆

子舍利別或 黑櫻實舍利別一錢 稀硫酸半乃至一錢

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

主治右三方血斑症ニ用ヒテ諸液ノ腐敗ヲ防止シ且生

カヲ挑起スルニ宜シ

子宮出血メトドルフラギア羅バール

實性子宮出血症多血ノ婦人ニ在ル者之ヲ抑遏スルヲ早

キニ過レハ危險ヲ致スヲアリ宜ク自然ノ良能ニ從事ス

ベシ設令藥劑ヲ與フルモ緩方ノ消石飲純精酒石等ノ如

キ清涼品ヲ處シ又清涼下藥ヲ用ヒテ毎日瀉ヲ促スニ宜

シ尺澤放血ヲ要スル症ハ甚罕ナリ出血痙攣性ノ者ハ小

蘇西一第
蘇西
蘇西

量吐根十一百六殊ニ之ヲ阿芙蓉ニ配スル者九百五十實+菱

荅利斯九百五十葛カ私カ篤カ儂カ謨カ幾カ良カトカスカ等佳ナリ但血

脈系ノ興奮機盛ナル者ハ鑛酸九百六十妙トス外用其症

痙攣性ノ者ハ胸上乾角法ヲ行ヒ下肢蒸餅母ヲ貼スルヲ

稱譽セリ兼テ下肢ヲ温水ニ浸スベシ○弛緩ニ因ル症ハ

出血發作ノ時ニ當テ桂丁幾ヲ以テ醫藥ノ魁トス蓋之ヲ

鑛酸及ヒ阿芙蓉丁幾ニ配スルヲ最妙トス九百六十一

方後麥奴九百六十五方カ緋カ百カ設カ木カ四カ方カ九カ百カ六カ十カ七カ方カ刺カ達カ

尼八百六十八方カ至カ九カ百カ七カ十カ方カ篤カ爾カ面カ室カ兒カ刺カ百カ七カ十カ方カ九

等ヲ用フベシ○弛緩甚シクシテ危篤ニ臨ム者ハ薩カ毘カ那カ

九百七十三方至明礬八百七十六方至八百七十九方九及ヒ撒

兒末爾扶斯九百八ヲ稱用ス○外用小腹ニ亞ア的テ兒ルヲ塗擦

シ或ハ點滴シ。諸種ノ軟膏硬膏及ヒ射注劑ヲ施シテ効ア

リ九百八十九方又冷水ヲ以テ直腸或ハ陰門ニ射注シ或

ハ水雪若クハ冰屑ヲ取テ子宮上ニ寒罨法ヲ行フベシ蓋

此等猛劇ノ法ハ出血過多ノ為ニ生命危險ニ臨ミ前ニ舉

ル所ノ方法功用ヲ逞シクセザルニ至テ方ニ之ヲ試用ス

ベキノミ何トナレバ慢ニ之ヲ用ヒテ時宜ヲ得ザレバ却

テ之カ為ニ子宮煖衝。腹膜煖衝。腸煖衝其他困難ノ諸症ヲ

發スレバナリ小腹及ヒ腰部ニ冷水ヲ灌クハ偉効ヲ得ル

者多シ形器法ノ此ニ施スベキ者ハ手掌ヲ以テ小腹ヲ摩
擦シ。下肢ヲ纏絡スルヲ卑キヨリ高キニ至ル及ヒ栓ヲ挿
ム等是ナリ但其絡纏挿栓ノ二法ハ子宮内ニ畜血ノ懼レ
ナキ者ニシテ之ヲ施スベキノミ

○第九百五十九方〔謨私篤〕

甲方

上好葛私篤ト 吐根ニ 精製阿芙蓉一 桂油

糖二

右調勻為散等分十二裹每八分時四分時若半時取一裹
冷水和服

主治子宮出血感覺過敏症脈縮小シテ不齊。面色慘澹。皮
膚冷エ且乾キ體質甚柔脆ナル者之ニ宜シ○此方ト更
換シテ左ノ散方モ亦用フベシ

乙方

實芟荅利斯一 純精酒石 白糖各半

右調和為散分十二裹每服一裹日二次乃至三次冷水送
下

○第九百六十方〔過傑栗屈的兒〕

越栗失爾蔑印失屈篤半 葛私篤ト 儂丁幾二 舍電

阿芙蓉液一

右調勻每半時二十滴乃至三十滴冷水或粘汁和服

主治 痙攣性子宮出血 宜シ

○第九百六十一方 弗陽

桂丁幾 錢三 收斂亞的兒 錢一 阿芙蓉液 刀一

右調勻每四分時取二十滴冷水或粘滑煎汁少許和服

○第九百六十二方 傑過栗屈的兒

硫酸密幾 私生爾 錢一 舍電阿芙蓉液 刀一 桂丁幾 錢二

右調勻每半時取二十滴甘味燕麥粘汁和服臨服宜振盪

○第九百六十三方 護私篤

收斂亞的兒 半 錢 舍電阿芙蓉液 錢半 桂丁幾 刀一

右調和每四分時取二十五滴三十滴乃至五十滴燕麥粘汁和服

○第九百六十四方 私澆爾達弗

精製磷酸 錢一 桂丁幾 錢二

右調勻每半時取三十滴沙糖水和服

主治 第九百六十一方ヨリ九百六十四方至虛性子宮出血 宜シ

○第九百六十五方 祿溫顯爾毒土

麥奴 六八至 刀十 白糖 半 刀

右調勻為散分六裹每十密扭篤服一裹

主治 子宮出血ニ宜シ ○咩私溼兒名ノ歴驗ニ據レハ麥
 奴ハ孕胎ノ子宮ニ在ルニアラザレバ効アラス故ニ妊
 娠中若クハ分娩ニ臨テ失血スル症ニアラザレバ全ク
 功用ナシト云フ

○第九百六十六方 布列私骨篤名地叔泥姪爾

麥奴錢一 井水適宜煮濾取四勺

右分三服 每十二密扭篤一服

○主治 分娩後ノ子宮出血ニ宜シ

○第九百六十七方 春姪隣

紺百設木井水三斗煮耗至二斗加橙皮半勺濾過

加後藥

精製磷酸錢二 桂舍利別子

右調勻 每服一小錢 日三四次臨服宜振盪

○主治 子宮出血弛緩ニ因ル症ニ宜シ

○第九百六十八方 筋布

刺達尼錢六 井水二十四勺煮濾取八勺加後藥

刺達尼錢三 幾斯錢至

右調和 每一時服二食匙

○主治 虛性子宮出血 白帶下ニ宜シ

○第九百六十九方 設倚迷謁爾

刺達尼搗碎一錢半

常水適宜煮四分時濾取六勺加後藥

桂丁幾一錢

刺達尼丁幾一錢半 砂糖舍利別一

右調勻每一時乃至一時半服一二食匙強

主治虛性子宮出血宜シ

○第九百七十方春姪隣

刺達尼越幾斯六錢

桂水五勺溶化加後藥

硫酸密幾斯一錢半

橙皮舍利別一

右調勻每半時服一食匙

主治子宮出血過多ノ症宜シ又尿道出血頑固ノ症

妙トス

○第九百七十一方別連杜

篤爾綿點刺

井水十勺煮濾取六勺加後藥

桂丁幾一錢

橙皮舍利別一

右調和每一時服一食匙

主治子宮出血弛緩ニ因ル者宜シ

○第九百七十二方弗除爾姪蒲蘭突土

赤石脂 大黃 麻偃涅失亞各一錢

右調和為散等分十二服日三服

主治同上

○第九百七十三方骨布

薩毘那葉 半 桂皮 錢二

右熱湯適宜浸漬濾取六勺每半時服一食匙

主治子宮出血及ヒ子宮脫ニ宜シ○咩私涅爾名ハ薩毘

那ヲ用ヒテ出血増加スルヲ歷驗セルガ故ニ廢メ用ヒ

ズト云フ

○第九百七十四方 同上

薩毘那葉 赭色幾那 各三錢 熱湯適宜浸漬濾取六勺

冷定加後藥

桂舍利 六錢

右調和每一時服一食匙

主治子宮出血弛緩ニ因ル者ニ宜シ症ニ應メ收斂重的

兒半錢若クハ一錢ヲ加フ

○第九百七十五方 弗。越。姪。僅。度。瞎。倚。秘。土。

薩毘那葉 末三錢 薩毘那越幾斯 錢二 薩毘那油 一

右調和三人為一九衣石松粉每服四五丸乃至十九日三

次

主治子宮出血定期アリテ太多ク而ノ平常モ亦稀淡ニ

シテ惡色惡臭ノ血ヲ漏下シ面色慘憺ノ者之ニ宜シ

○第九百七十六方 弗陽

精製阿芙蓉 八錢 桂皮 一 生明礬 錢一

右調和為散等分四裹每半時服一裹

主治子宮出血弛緩ニ因ル者ニ宜シ○明礬ハ其人筋織維強實ニシテ多血ノ者ニハ適當セス唯虛弱弛緩ノ症ニ良トス腹臑壅閉スル所アル者モ亦之ヲ禁スベシ

○第九百七十七方拂連幾

生明礬二 桂丁幾 地亞格實温各一 薄荷水二

右調和每半時或一時服一食匙乃至二食匙

○第九百七十八方阿西安姪爾

水楊皮越幾斯一錢半 明礬半錢至一錢 桂水五 覆盆子

主舍利別一

右調勻每四分時服二食匙

○第九百七十九方福爾樂

明礬末 礪鐵華 芳香散 幾那越幾斯各半錢 桂油

十二滴

右調和二為一九衣桂末朝夕服五丸乃至十九

主治第九百七十七方ヨリ九百七十九方至虛性子宮出血ニ宜シ

○第九百八十方瓶歐蘭度

桂皮半 撒兒末爾秩斯 白糖一

右調和為散分四服每一時一服或隨症數服

主治子宮出血危險ニ臨ム者之ヲ遏止スルニ宜シ○或ハ其症ノ要スル所ニ從ヒ撒兒末爾秩斯ノ量漸次ニ倍加シテ可ナリ

○第九百八十一方護秘篤

桂油半錢 亞的兒半錢

右調勻每八分時服二十五滴乃至三十滴

主治臨産ノ虚性子宮出血ニ宜シ之ニ兼テ小腹ニ龍腦精。礪砂揮發膏等ヲ塗擦スベシ

○第九百八十二方柳陽

蒼草越幾斯一錢 桂水三勺溶化加後藥

桂丁幾一錢 舍電阿芙蓉液一 橙皮舍利別三錢

右調和每一時服一食匙

主治虚性子宮出血小腹ニ經久ノ血積ヲ兼子又歇倚私的利性ノ感覺過敏衰弱及ヒ痙攣証ヲ狭ム者之ニ宜シ

○第九百八十三方護秘篤

失鳩苔越幾斯 蜀羊泉越幾斯各一錢 老利兒結爾斯

水一 吐酒石二

右調勻每服二十滴乃至三十滴日三次

主治子宮出血腹臍ノ胃寒ニ因ル者之ニ宜シ

○第九百八十四方抄割秘

遠西方書 卷九 子宮出血 三三 廣 膠 堂

硫酸規尼^十至^{十五} 乾燐酸^二 過兒托末^或大黃

末^四 珊篤里越幾斯^二

右調和為六十九衣伊里斯弗魯連底那末玻璃壘收貯每服三四丸乃至六丸日二三

次 主治半產後ノ神經衰弱症出血セントスル者ニ宜シ

○第九百八十五方 緞歐蘭度

王幾那^{末一} 橙皮^{末二} 井水十二^ヲ煮耗至八^ヲ濾

過加後藥

收斂亞的兒^{錢半} 桂丁幾^{錢二} 橙皮舍利別^一

右調勻每一時半服二食匙

○第九百八十六方 同上

收斂亞的兒^{錢二} 越乙土幾那丁幾^一 橙皮丁幾^{錢一}

右每服八十滴水一小盞和服日三次

主治右二方月經過多症子宮ノ衰弱及ヒ弛緩ニ起因セ^ル者或ハ同因ノ子宮出血ヲ根治スルノ功用アリ

○第九百八十七方

蒲刺實爾收斂皮^{一^ヲ合散木} 井水適宜煮濾過取^八

一^ヲ

右每一時服一食匙

主治麻痺性子宮出血後ニ用ヒテ再發ヲ預防ス

遠西方書 卷九 子宮出血 三三 廣 膠 堂

○第九百八十八方〔穢歌蘭度〕

幾那越幾斯 刺達尼越幾斯 水揚皮越幾斯 阿仙

藥各二錢 撒兒末爾秩斯二

右調和二以為一九衣桂末每服十九乃至十五九日三次

〔主治〕月經太過或人子宮出血後虛憊甚シキ者之ニ宜シ

○第九百八十九方〔骨布〕

幾那越幾斯二錢 阿芙蓉越幾斯十 薩毘那油半一錢

菲阿斯軟膏一

右丁寧調勻朝夕取二小匙哥喜匙塗擦小腹

〔主治〕子宮出血並ニ子宮衰弱弛緩ニ宜シ

○第九百九十方〔同上〕

香竄硬膏一 薩毘那油一 薩毘那末二錢

右調和外敷

〔主治〕子宮弛緩及ヒ其レニ起因セル出血症ハ小腹ニ之

ヲ貼ス

○第九百九十一方

麥奴細割一弓至一弓半 熱湯三斗乃至四斗浸少頃煮沸濾過

右冷定射注

〔主治〕子宮出血並ニ衄血過多ニ用フ

月經不調レメンストリニオ。アノマラ 羅オン 蘭ゲ

此症四種ニ分ツ一ハ婦女已ニ嫁時ニ及テ月經不來ニハ
月經痛三ハ月經方ニ來テ卒然閉止ス四ハ月經太過是ナ
リ第一嫁時ニ及テ月經不來ノ症其原或ハ多血畜積ニ係
リ或ハ痙攣ニ因リ或ハ弛緩ニ感動遲鈍ナルニ因リ或ハ
陰門閉鎖等ニ在リ○其多血畜積ニ因ル者ハ足ノ絡ヲ刺
テ放血シ陰部ニ放蟻シ内股ニ吸角法若クハ蒸餅母ヲ貼
シ刺戟藥脚浴ヲ行ヒ沸騰散ニ方三方孕礪酒石七十八方
三茜根九百九十三方等ヲ用フベシ○痙攣ニ因ル者ハ續
草阿魏九百九十五方葛私篤儂護吐根百世五方八百六
七方九百九十六方等ヲ用ヒ之ニ兼テ陰部ニ放蟻シ全身温浴脚湯及ヒ

其他ノ誘退法ヲ施スベシ○弛緩ニ因ル者ハ鐵劑九百九
至方千麥奴方千二 礪砂九百九十七方雜腹蘭九百九十六方沒
藥方千一方十五 瓦爾拔奴方千一方十六 歐羅巴方千一方十八
九 蘆薈方九百九十七 薩昆那方千一方十八 等ニ宜シ蓋此諸藥ハ
其成方ニ就テ見ルベキが如ク種々配合スベシ此他黃胖
參照ス所ノ方ヲ第二月經痛モ亦鎮痙劑九百九十六方十油
性乳劑ニ阿芙蓉丁幾ヲ加ヘ五百十或ハ菲阿私越幾斯ヲ
加ヘ五百十陰部及ヒ子宮ノ部位ニ温暖ノ鎮痙法ヲ施
シ微温半身浴等ヲ行フベシ第三經時ニ方テ經血遽ニ遏
止スル者ハ激衝証ヲ啓發スルヲ徃々之アリ此症其機變

ニ從フテ適當ノ治法ヲ下スベシ設令焮衝ヲ發セザルモ亦足ノ絡ヲ刺テ放血シ或ハ陰部ニ放蟻シ若クハ内股ニ吸角法ヲ施シ以テ局處ヨリ放血スルヲ要ス又之ニ兼テ蒸餅母ヲ貼シ小腹及ヒ陰部ニ罨法ヲ施シ刺戟衝動ノ脚浴等ヲ施スベシ内服ハ礪砂或ハ沸騰散ヲ與ヘ而ノ唯感觸甚遲鈍ノ症ノミ上ニ列載セル破血藥ヲ與フベシ第四月經太過症ハ子宮出血ノ治ニ同シ

○第九百九十二方別連杜

加密列 接骨木花各一 五分

右浸出供坐浴

主治陰部及ヒ利尿諸器ノ痙攣痛並ニ痔血經血ノ閉止ニ宜シ

○第九百九十三方

茜根細剉半斤 至一斤

右井水二十六弓煮耗至八弓濾過每一時服ニ食匙

主治經閉及ヒ月經痛等ニ宜シ未熟ノ醫輩茜根ヲ以テ古藥ト稱シ全ク功用ナシト云フ者多シト雖訶墨名入取同弗陽同福偃列爾同阿西安姪爾同過係栗屈的兒同等ノ先哲經閉症ニ茜根ノ効アルヲ主張シ殊ニ其症小腹ノ壅塞ニ因ル者ニ稱用セリ

○第九百九十四方 福佩列爾

孕礬酒石_三半 茜根末 白糖各二錢

右調和為散每服一刃尖

主治 經閉症熱ヲ帶フル者之ニ宜シ ○穢歌蘭度_{名ハ}茜

根末每服半錢日ニ三服セシムト云フ

○第九百九十五方

阿魏 纈草越幾斯 勿擲祭_チ亞石_ア 凝固牛膽 大

黃_未各一錢

右調勻二_二為一九衣石松粉朝夕服五丸

主治 瘰癧性經閉症大便秘結スル者ニ宜シ

○第九百九十六方 速別倫歇情

雜腹蘭_二 吐根_五 至井水適宜浸漬濾過取五_三

溶化孕礬酒石二錢更加後藥

加密列舍利別_六錢

右調和每一時服一食匙臨服宜振盪

主治 瘰癧性ノ經閉及ヒ月經痛ニ宜シ

○第九百九十七方 依設私託爾結

礬砂_二 黃橙皮 茴香油糖_{各一} 白糖_三錢

右調勻為散每服二食匙日三次

主治 經閉ニ宜シ

○第九百九十八方 玃歌蘭度沸騰散 ビニルヲキス。アロホ

ヘラン 麻偃涅失亞 錢 純精酒石 半 鐵酒石 附

右調勻為散每服一茶匙棄沸騰飲服日二三次

主治感觸遲鈍ノ婦女經閉及ヒ虛弱ノ症ニ宜シ

○第九百九十九方 玃歌蘭度

亞兒尼加根 半 錢 井水五勺煮耗至三勺濾過加後藥

加密列越幾斯 芸香越幾斯 各 鐵酒石 附

薄荷水 橙皮舍利別 半

右調勻每服二食匙日三四次

主治少女虛弱ニノ皮膚慘澹且微冷シ脈遲ニメ弱ナル者慾火亢盛ノ年期ニ及テ月經不來ノ症ニ宜シ

○第一千方 篤姪

硃鐵華 細末 桂皮 半 白糖 適宜

右作扁圓錠 四十個 每服二三個日二次

主治經閉弛緩ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千一方 弁拂 紅頰丸

撒兒末爾秩斯 錢 沒藥越幾斯 末 瓦爾拔奴謨 各

橙皮舍利別 宜

右為二百十九衣桂末玻璃壘收貯每一時半服六丸乃至

六九餘

主治少女皮膚灰白感覺遲鈍ノ者月經閉止セル症ニ宜

シ○又弗陽名ハ人此症ニ橙蒲名ハ人九九百廿ヲ與フ

○第一千二方弗胎爾姪蒲蘭突

麥奴 白糖各半

右調勻為散等分三服朝夕一服

主治經閉症子宮ノ神経系感覺遲鈍ニ因テ來ル者之ニ

宜シ

○第一千三方同上

薯草越幾斯錢一

硼砂一

加密列水六

右調勻每一時服ニ食匙臨服宜振盪

○第一千四方穢歌蘭度

硼砂半

雜腹蘭八

硫黃華

薄荷油糖各一

右調勻為散分三服早午晚一服

主治右二方月經閉止ニ宜シ

○第一千五方過傑栗屈的兒

雜腹蘭末

沒藥

硫黃華各一

凝固牛膽適

右為百五十九衣雜腹蘭末玻璃壘收貯每服十二丸日一

二次

主治經閉及ヒ小腹内閉塞症ニ宜シ

○第一千六方 秘歌蘭度 沒藥 瓦爾拔奴謨 黑列僕里越幾斯 蘆薈

錢各一 葛私篤儂謨 錢一

右調勻二八為一九衣石松粉每服十九日二三

主治感覺遲鈍ノ婦女經閉ノ症ニ宜シ

○第一千七方 秘刺律松 利布西煙斯 名 病院常用通經丸

瓦爾拔奴謨 錢五 雜腹蘭越幾斯 錢一 沒藥越幾斯 錢二

黑列僕里越幾斯 錢四

右調勻二八為一九衣石松粉早晚服六丸

主治經閉及ヒ萎黃病ニ宜シ

○第一千八方 秘刺律松 葡萄酒汁 新絞者 燒酒 分等

右飽熟二十四時濾過每一時取三十滴温麥酒和服

主治經閉ニ宜シ經期前十四日ヨリ始メテ用フベシ

○第一千九方 同上

葡萄酒汁 一千八方 鹽酸鐵丁幾 錢二

右調勻每服三十滴日二次

主治經閉症體質大ニ弛緩スル者ニ宜シ

○第一千十方 秘刺律松

水製蘆薈越幾斯 錢一 水製沒藥越幾斯 雜腹蘭越幾

斯各一錢

硫鐵華二錢

瓦爾拔奴三錢

右調和二為一九衣桂末早晚服五丸

主治經閉ヲ治ス最妙トス然レ此方慎重シテ用フル

ヲ要ス但感觸遲鈍ノ者ニ適當ナリ

○第一千十一方骨布

薩毘那葉半

熱湯適宜浸漬濾過取四ヲ溶化後藥

礪砂二 白糖半

右調勻每服一食匙日三次

主治月經痛子宮ノ虚弱弛緩ニ因ル者ニ宜シ

○第一千十二方同上

薩毘那葉半

纈草一

熱湯適宜浸漬濾過取八ヲ放

冷加桂丁幾三錢

右調和每半時服一食匙

主治經閉子宮ノ衰弱痙攣ニ因リ或ハ子宮ノ血絡弛緩

ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千十三方穢歌蘭度

加密列

默栗薩

薄荷各二錢

薩毘那葉一錢

右細判熱湯二小盞泡出分二服朝夕一服

○第一千十四方同上

麻偃涅失亞一

純精酒石十六

薩毘那葉末

白糖

右調和為散分三服早午晚一服冷水半小盞送下

○第一千十五方

薩毘那葉

末二錢

薩毘那越幾斯

隨

右加達刺侃篤越謨漿少許為六十九夜石松粉每服四五
九日二三次

○第一千十六方

薩毘那葉

末二錢

鐵粉

錢一

水製蘆薈越幾斯

錢一

達刺

右調和二氏為一九夜桂末每服三四九日二三次

附考一九中薩毘那一氏鐵半氏蘆薈六分氏一ヲ含畜

○第一千十七方

薩毘那葉

末半錢

格碌屈斯末兒秩斯

錢一

薩毘那油

三十滴

薩毘那越幾斯

各二錢

右調和為二百九玻璃壘收貯每日已牌申牌酉牌及臨卧
服用每服七丸

○第一千十八方

穢屈秘

薩毘那油

錢半

再餽的列並油

錢一

右調和塗擦內股

主治第一千十三方ヨリ一千十八方至經閉症弛緩ノ甚
シキニ因ル者ニ宜シ

○第一千十九方甲 評兒地維爾

纈草 黙栗薩葉 綿苔幾里私布 加密列各一 甘

草半

右細剉毎日取一食匙常水三小盞浸出服

○第一千十九方乙 同上

甘永 葛私篤儂各半 葭苈葉一 毘私繆篤二

纈草三 加密列六 過泥子油糖半

右調勻為散分十二包每一時半服一包

主治右二方處女月經痛ニ宜シ二方皆經期前四日ヨリ
始メテ之ヲ用ヒ經血來レハ乃チ散方ヲ廢シ唯浸劑ヲ
連進メ月事ノ過ギ去ルニ至ルベシ

○第一千二十方 散劑

甘永一 葛私篤儂三 雜腹蘭東方產 白糖一

右調和為散分三裹每夜臨卧取一裹加密列泡劑和服

主治月經痛ニ宜シ○之ニ兼テ每晚脚湯ヲ施シ又全體

殊ニ兩足ヲ温覆スルヲ切要トス

遠西方彙
卷九
月經不調
四三
月經

遠西方彙卷之九

月經不調
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十

書肆

江戸芝神明前

和泉屋吉兵衛

