

內景三篇卷五 亨

五臟六腑

肝臟

心臟

脾臟

肺臟

腎臟

膽腑

胃腑

小腸腑

大腸腑

膀胱腑

三焦腑

胞

蟲

小便

大便

五攻

五鑑

訂正東醫寶鑑內景篇卷之三

御醫忠勤貞亮 聖功臣崇祿大夫賜平君臣許俊泰 教撰

五臟六腑

醫書識五臟六腑 先儒嘆世人務窮天地萬物之理不知我之一身

臟腑陰陽 內經曰言人身之臟腑中陰陽則臟者為陰府者為陽肝心

臟腑異用 靈樞曰五臟者所以藏精神血氣魂魄者也六腑者所以化水穀而行津液者也○內經曰五臟者藏精氣而不瀉也故滿而不實六腑者傳化物而不藏故實而不滿所以然者水穀入口則胃

實而腸虛食下則腸實而胃虛○脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本營之居也名曰器能化糟粕轉味而出入者也

臟腑有合 靈樞曰肺合大腸大腸者傳道之腑心合小腸小腸者受盛之腑肝合膽膽者中正之腑脾合胃胃者五穀之腑腎合膀胱膀胱者津液之腑也少陰屬腎腎上連肺故將兩歲三焦者決瀆之官

水道出焉屬膀胱是孤之腑也是六腑之所與合者也

五臟通七竅 靈樞曰五臟常內閱於上七竅也故肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣心氣通於舌心和則舌能知五味矣肝氣通於目肝和則目能辨五色矣脾氣通於口脾和則口能知五穀矣腎氣

通於耳腎和則耳能聞五音矣五臟不和則七竅(七一作九)不通六腑不和則留結為癥

五臟有官 靈樞曰鼻者肺之官也肺病則喘息鼻張目者肝之官也肝病者皆青口唇者脾之官也脾病者唇黃舌心之官也心病者舌卷短頰赤耳者腎之官也腎病者頰黑耳焦枯

五臟有小大 靈樞曰五臟皆小者苦焦心多愁憂五臟皆大者緩於事難使以憂五臟皆高者好高舉措五臟皆偏傾者邪心而善盜不

可以為人平反覆言語也

臟又有九也一頭角二耳目三口齒四胸中以其如器外去虛而不屈以處於物故曰形藏四也

腑又有六內經曰腸胃脾膽女子胞此六者地氣之所生名曰奇恒之府註謂奇異於恒常之氣

腸胃之長水穀之數靈樞曰腸胃之長凡五丈八尺四寸受水穀九斗二升一合合之大半此腸胃所受水穀之數也

五臟中邪黃帝問曰邪之中人臟奈何岐伯對曰憂愁恐懼則傷心形寒飲則傷肺難經寒飲作飲冷

下則傷肝有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾有所用力器重若入房過度汗出浴水則傷腎靈樞

五臟正經自病難經曰正經自病者憂愁思慮則傷心形寒飲冷則傷肺悲怒氣逆上而不

脈辨臟腑難經曰何以知臟腑之病也然數者肺也遲者脾也數則

臟腑火證難經曰病有欲得溫者有欲得寒者有欲得見人者有不欲得見人者而各不同其病在何臟

陽病欲得寒又欲見人陰病欲得溫又欲閉戶獨處惡聞人聲故以別知臟腑之病也

臟腑病有難易難經曰臟病難治腑病易治何也然臟病所以難治者傳心一歲不再傳故言次傳者既

傳其子者假令心病傳脾脾病傳肝肝傳脾脾傳腎腎傳心一歲不再傳故言次傳者既

臟腑相傳內經曰五臟不平六腑閉塞之所生也五臟穿竅論曰心與膽相通心病征神宜溫膽為主

通脾病宜瀉小腸火小腸病宜瀉脾土為主肺與膀胱相通肺病宜清利膀胱水膀胱病宜

五臟病問其內經曰夫邪氣之客於身也以勝相加至其所生而愈至其所不勝而甚至其所生而持自得

準饒仲陽淡得其理學者宜究心焉(綱目)○釋曰如肝病愈於夏甚於秋持於冬起於春餘倣此

五臟死期 內經曰五臟受氣於其所生傳之於其所勝氣含於其所生死於其所不勝病之且死必先傳行舍於腎(生己之母)至肺而死(勝己鬼)心受氣於脾傳之於肺氣含於肝至腎而死脾受氣於肺傳之腎氣含於心至肝而死肺受氣於腎傳之於肝氣含於脾至心而死腎受氣於肝傳之於心氣含於肺至脾而死此皆逆死也一日一夜五分之此所以占死者早暮也

臟腑氣絕候

詳見氣門

單方凡二十三種

粳米

平和五臟煮白粥早晨常服暢胃氣生津液(本草)

小麥

和五臟可常食之(本草)

大麥

實五臟作飯作麵作粥皆佳(本草)

蕎麥

能鍊五臟滓穢作粥作粥食之佳(本草)

黑豆

散五臟結積○水漬生芽名大豆黃卷主五臟胃氣結積可煮食(本草)

胡麻

潤五臟作飯作麵常服最佳即黑佳子也(本草)

人乳

補五臟可常服之(本草)

牛肚

補五臟儲和爛煮食之(本草)

牛髓安五臟以酒和服之(本草)

鹿肉強五臟燻煮食之瘠肉亦補益五臟可常食(本草)

狗肉安五臟和五味燻煮空腹食之黃狗肉最勝(本草)

葷雌雞補益五臟燻煮和五味食之(本草)

雀肉續五臟不足氣作煎食之佳(本草)

蜜和藥長服佳(本草)

牛乳卽酪也補五臟作粥常服佳(本草)

鯽魚益五臟或煮或煎或蒸常食佳(本草)

蓮子主五臟不足氣爲末作粥常服其根曰藕蒸食甚補五臟(本草)

海松子肥潤五臟作粥常服其佳(本草)

大棗補五臟煎湯飲之佳(本草)

葵菜通五臟壅氣每月一食葵通利臟腑又是菜之主也(本草)

生薑開臟腑常食不可闕也

葱白調和臟腑煮食之佳(本草)

芥子 通利五臟微蒸研作醬食之其嫩莖煮為茹食之亦佳(本草)

二臟

肝臟

肝 臟 圖



肝形象

肝有二布葉一小葉如木甲拆之象各有支絡脈居中以宣發陽和之氣魂之宮也(內經註)○肝有二大葉一小葉左三葉有四葉分兩如木甲拆之多葉也(入門)○肝重四斤四兩左三葉右四

葉凡七葉主臟魂(難經)

肝部位

肝生於左(內經)○肝之系者自膈下着左脇肋上貫膈入肺中與膈膜相連也(入門)○期門二穴肝之募也在兩乳直下一寸半在背則肝俞在九傾下是肝之分也(銅人)

肝主時日

肝主春足厥陰少陽主治其日甲乙○東方生風風生木水生酸酸生肝○肝為陰中之少陽通於春氣(內經)

肝屬物類

在天爲風在地爲木在體爲筋在臟爲肝在色爲蒼在音爲角在聲爲呼在變動爲握在竅爲目

在味爲酸在志爲怒其液爲淚其榮爲爪其臭爲臊其封爲震(生數三成數八)其穀爲麻(作麥)其畜爲犬(一作雞)其蟲爲毛其數爲八其果爲李其菜爲韭(內經)其脈爲足厥陰(內經)

肝臟大小

肝者主爲將使之候外欲知堅固視目大小○青色小理者肝小羸理者肝大廣胸以散者肝高合膈鬼教者肝下胸膈好者肝堅膈骨弱者肝脆膈背好相得者肝端正膈骨偏舉者肝偏傾也

○肝小則臆安無膈下之病肝大則通胃迫膈苦膈中且膈下痛肝高則上支實切脇挽爲息資肝下則通胃膈下空易受邪肝堅則臆安難傷肝脆則苦病消痺易傷肝端正則和利難傷肝偏傾則膈下

痛也(靈樞)

肝傷證

有所墜筋惡血留內有所大怒氣上不下積於膈下則傷肝又曰大怒氣逆則傷肝(靈樞)○悲怒氣逆上而不下則傷肝(難經)

肝病證

邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內(靈樞)○肝病者兩脇下痛引小腹令人善怒○肺傳之肝病名曰肝痹一名曰厥膈痛出食○肝熱者色蒼而小枯(內經)○外證善潔而青善怒內證臍左有

動氣按之牢若痛其病四肢滿閉淋瀝便難轉筋有是者肝也無是者非也(難經)○大骨枯槁大肉陷下胸中氣滿腹內痛心中不便肩項身熱破爛脫肉目眶陷真臟見目不見人立死其見人者至其

所不勝之時則死註曰此肝之臟也所不勝之時謂庚辛之月也(內經)

肝病虛實

肝藏血血含魂肝氣虛則恐實則怒○肝實則兩脇下痛引小腹善怒虛則目眩眩無所見耳無聲則血歸於肝臟肝

主血海故也(入門)

肝病間

病在肝愈於夏夏不愈於秋秋不死於冬起於春○肝病者愈在丙丁丙丁不愈加於庚辛庚辛不死持於壬癸起於甲乙○肝病者平朝慧晡甚夜半靜(內經)

肝病治法

肝苦急急食甘以緩之甘草宜食粳米牛肉棗葵註曰肝苦急是其氣有餘也肝欲散急食辛以散之川芎肝虛以生薑陳皮之類補之(內經東垣)○肝病宜食甘粳米牛肉棗葵取其甘能緩

急也(內經)○肝病宜食麻犬肉李韭皆酸取本味也(甲乙經)○肝虛宜四物湯(方見血門)清肝湯或肝丸肝實宜瀉青丸洗肝散當歸龍薈丸(海藏)○肝病禁當風(內經)

清肝湯 治肝經血虛有怒火白芍藥一錢半川芎當歸各一錢
柴胡八分山梔仁牡丹皮各四分右剉水煎服(入門)

補肝丸 治肝虛即四物湯加
訪風羌活蜜丸也

瀉青丸 治肝實當歸草龍膽川芎梔子大黃煨羌活防風各等分右爲末蜜
丸交實大每一丸竹葉湯同砂糖溫水化下○一名涼肝丸(綱目)

洗肝散 治肝實羌活當歸薄荷防風大黃川芎梔子炒甘草
炙各一錢右剉水煎服加草龍膽一錢尤妙(海藏)

當歸龍薈丸 治肝臟實熱脇痛當歸草薈山梔子黃連黃柏黃芩各一兩大黃蘆薈青黛
各五錢木香二錢半麝香半錢右爲末蜜丸小豆大薑湯下二三十九(綱目)

肝絕候 足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本也故脈不榮則筋
急筋急則引舌與卵故唇青舌卷卵縮筋先死庚日爲辛日死○厥陰終者中熱噤乾善尿心煩

其則舌卷卵上縮而終矣(靈樞)○唇吻反青四肢掣習(伸縮也)汗出者此爲肝絕也(仲景)

肝臟修養法 常以正月二月三月朔且東面而坐叩齒三通吸
震宮青氣入口九吞之閉氣九下息(養性書)

肝臟導引法 可正坐以兩手相重按膝下作緩身左右各三五度又可正坐兩
手拽相又翻腹向胸三五度此能去肝家積聚風邪毒氣(騰仙)

單方凡二十一種

草龍膽 益肝膽氣(本草)煎
服治肝藏濕熱(湯液)

空青 益肝氣法木故色青而入肝細
末水飛點眼或入藥服(本草)

黃連 鎮肝去熱毒末服
煎服皆可(本草)

細辛 益肝胆煎服末
服皆可(本草)

决明子

除肝家熱助肝氣又治肝毒熱爲未服又取嫩葉作菜食(本草)

車前子

養肝爲末服或炒煎服又取嫩葉作羹茹佳(本草)

薺子

卽薺子也主肝虛明目爲末服又取嫩根和米煮粥服能引血歸肝(入門)

覆盆子

補肝明目爲末服生食之亦可(本草)

青精

鎮肝主肝藏熱毒爲末服之(本草)

酸

益肝氣末服煮服皆佳(本草)

山茱萸

溫肝末服煮服佳(本草)

沙參

養肝氣煮服或作茹常食之(本草)

菘耳子

主肝家熱明目煮服末服並佳(本草)

芍藥

補肝緩中損其肝者緩其中卽此也末服煮服皆可(湯液)

苦參

養肝胆氣煮服之(本草)

青皮

疎肝氣肝氣不達用青皮以疎之末服煮服皆佳(丹心)

木瓜

入肝故益筋與血煮服之(本草)

小麥

養肝氣煮飲服之(本草)

葱白除肝邪氣煮湯飲
或取汁飲(本草)

韭能充肝氣作菹
常食佳(本草)

李肝病宜食
(本草)

心 臟 圖



心形象

心形如未敷蓮華中有九空以導引天眞之氣神之字也(內經注)○心重十二兩中有七孔三毛盛精汁三合主藏神(難經)○上智人心有七竅三毛中智人心有五竅二毛下智人心有三竅一

毛常人心有二竅無毛愚人心有一竅下愚人心有一竅甚小無竅則神無出入之門○心有七孔三毛七孔以應北斗七星三毛以應三台故心至誠則天無不應也(入門)○心包絡實乃裹心之膜包

於心外故曰心包絡也(正傳)○心形如未開蓮花上大下銳倒懸着肺(類聚)

心部位

心居肺下肝上(入門)○五臟系通於心心通五臟系心之系與五臟之系相連故五臟有病先干於心其系上系於肺其別者自肺兩葉之中向後通者腎自腎而至於膀胱與膀胱膜絡並行而

至瘦尿處乃下極部分也(入門)○巨闕穴乃心之募也
也在背則心俞在脊五頰下是心之部位也(銅人)

心主時日

生心○心者生之本也神之變也爲陽中之太陽通於夏氣(內經)

心屬物類

在天爲熱在地爲火在卦爲離在體爲脈在竅爲舌在味爲苦在志爲喜其液爲汗其榮爲色其臭爲焦其數爲七其穀爲麥(一作黍)其

畜爲羊(一作馬)其蟲爲羽其果爲杏其菜爲薤(內經)其脈爲手少陰(內經)

心臟大小

五臟六腑心爲之主缺盆爲之道膈骨有餘以候鬲髂(上音曷下音干卽心蔽骨也)○赤色小

脆鬲髂直下不舉者心端正鬲髂倚一方者心偏傾也○心小則易傷以憂心大則憂不能傷心高則滿於肺中悅而善忘(悅與悶同)離開以言心下則易傷於寒易恐以言心堅則藏安守固心脆則善

病消難熱中心端正則和利難傷心偏傾則操持不一無守司也(靈樞)

心傷證

憂愁思慮則傷心(難經)○邪客使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者其人多畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者爲瀰陽氣衰者爲狂○心傷者其人勞倦則頭

面赤而下重心中痛而自煩發熱臍上跳其脈弦此爲心穢傷所致也(仲景)

心病證

邪在心則病心痛喜悲時眩仆(靈樞)○腎傳之心病筋脈相引而急病名曰瘰○心熱者色赤而絡脈溢也(內經)○外證而赤口乾善笑內證臍上有動氣按之牢若痛其病煩心心痛掌中熱而

喉有是者心也無是者非也(難經)○大骨枯槁大肉陷下胸中氣滯喘息不便內痛引肩項期一月死真藏見乃與之期日註曰此心之藏也期後三十日內死(內經)○健忘決記驚悸不安心內懊憹

不樂皆心血少也(入門)

心新虛

心臟脈脈舍神心氣虛則悲實則笑不休○心實則胸中痛脇支滿脇下痛膺背肩胛間痛兩臂

經(內)

內痛心虛則胸腹大脇下與腰背相引而痛(靈樞)○心臟神神有餘則笑不休神不足則悲

心病問甚

病在心愈在長夏長夏不愈甚於冬冬不死持於春起於夏○心病者愈在戊己戊己不愈加於壬癸壬癸不死持於甲乙起於丙丁○心病者日中禁夜半其平且靜(內經)

手少陰無輪

黃帝曰手少陰之脈獨無輪何也岐伯曰少陰者心脈也心者五臟六腑之大主也為帝王精神之所舍其臟堅固邪不能容容之則傷心心傷則神去神去則死矣故諸邪在於心者皆在

心之包絡包絡者心主之脈也故少陰無輪也帝曰少陰無輪心不病乎岐伯曰其外經病而藏不病故獨取其經於掌銳骨之端即神門穴也○靈樞

心病治法

心苦緩急食酸以收之註曰心苦緩是心氣虛也心欲栗(與飲同)急食鹹以栗之用鹹補之甘瀉之(內經)○心苦緩宜五味子又心虛以炒鹽補之心欲栗宜芒硝補之甘草瀉之是心氣實也(東垣)○心病宜食酸小豆犬肉李韭皆酸取其能收也(內經)○心病宜食麥羊肉杏蕪取本味也(甲乙經)○心虛宜錢氏安神丸朱砂安神丸(方見神門)醒心散心實宜瀉心湯導赤散十味導

赤散(綱目)○心病禁溫食熱衣(內經)

錢氏安神丸

補心虛朱砂水飛一兩麥門冬馬芽礬白茯苓山藥寒水石甘草各五錢龍腦二分半右為末蜜和一兩作三十九丸每一丸砂糖水化下(錢乙)

醒心散

治心虛熱入參麥門冬五味子遠志茯苓生地黃石菖蒲各等分右對水煎服

瀉心湯

治心熱黃連不拘多少為極細末每服一分半或五分或一錢溫水調下(錢乙)一名黃連瀉心湯

導赤散

治心熱實小腸之藥也方見下

十味導赤散

治心臟實熱口舌生瘡驚悸煩渴黃連黃芩麥門冬半夏地骨皮茯神赤芍藥木通生地黃甘草各五分右剉作一貼薑五片水煎服(活人書)

一方

黃連生用為君佐官桂少許煎百沸湯入蜜空心服能使心腎交於頃刻(丹心)

心絕候

手少陰氣絕則脈不通脈不通則血不流血不流則色不澤故其面黑如漆紫者血先死壬日為癸日死(靈樞)○形體如烟煤直視搖頭者此為心絕(仲景)○心絕一日死何以知之之眉息回視立

死(脈經)

死(脈經)

死(脈經)

心臟修養法

常以四月五月朔望清旦面南端坐叩金梁九漱玄泉三靜思注想毀離宮赤色氣入口三吞之閉氣三十息(養生書)

心臟導引法

可正坐以兩手作拳用力左右互相築各六度又可正坐以一手按腕上一手向下拓空如石又以兩手相叉以腳踏手中各五六度能去心胸間風邪諸疾閉氣爲之良久閉目三嚙津

三叩齒而巳(曜仙)

單方九二十二種

朱砂

法火故色赤而入心能鎮養心神(本草)心熱非此不除水飛入藥或點服(湯液)

赤石脂

養心氣火煨水飛入藥或未服之(本草)

金箔銀箔

皆鎮心入藥服之(本草)

黃丹

鎮心安神水飛入藥用之(本草)

石菖蒲

開心孔益心智令聰明或末服或煮服皆佳(本草)

麥門冬

清心熱補心氣不足去心煎服最佳(本草)

遠志

定心氣去心或未服或煎服並佳(本草)

生地黃

補心血又治心熱取汁服或煎服(本草)

黃連

瀉心熱能去心中惡血或煎服或作末點服亦可(本草)

茯苓

開心末服煎服皆佳(本草)

龜甲

補心龜靈物故補心甚
驗作末點服良(丹心)

蓮子

助心安心能通心氣末服煎服皆佳一方蓮子一斤帶黑皮炒極爛搗爲細末其黑皮不可
擗則去之甘草微炒一兩爲末每取二錢沸鹽湯點服之大能補心虛益氣(居家必用)

杏

心病宜食
(本草)

小麥

養心氣心病
宜食(本草)

犀角

鎮心神作末入藥或
水磨取汁服(本草)

雞子

鎮心又白蛋心下伏
熱生吞一枚(本草)

苦菜

安心神
常食之(本草)

赤小豆

開心孔煮粥服或
煮汁飲之(本草)

竹葉

涼心除心煩煎
湯飲之(本草)

薄荷汁

去心熱飲
(本草)

連翹

涼心家客熱煮
湯飲之(本草)

梔子

去心中客熱又去心中懊憤
煩躁可煮湯飲之(本草)

脾臟

脾臟圖



脾形象

脾形象馬蹄內包胃腕象土形也經絡之氣交歸于中以營運真靈之氣意之舍也（內經註）○脾形扁以馬蹄又如刀鐮（入門）○脾重二斤三兩扁廣三寸長五寸有散膏半斤主裏血溫五臟主

臟意（維經）○脾者俾也在胃下俾助胃氣主化水穀也胃主受納脾主消磨（綱目）

脾部位

脾長一尺掩太倉太倉者胃之上口即中腕穴也（東垣）○脾居中腕一寸二分上去心三寸六分下去腎三寸六分中間一寸二分名曰黃庭在天爲太陽在地爲太陰在人爲中黃祖氣道家以脾

爲黃庭黃者中央之色庭者四方之中也脾居一身之中央故曰黃庭（入門）○脾與胃以膜相連耳（內經）○章門穴乃脾之募也直脾傍季肋端在背則脾俞在十一顛下是脾之部位也（銅人）

脾主時日

脾主長夏足太陰陽明主治其日戊己○中央生溼溼生土土生甘甘生脾○脾屬土主長夏（內經）

脾屬物類

在天爲溼在地爲土在卦爲坤在體爲肉在臟爲脾在色爲黃在音爲宮在聲爲歌在變動爲噦在竅爲口在味爲甘在志爲思其液爲涎其榮爲唇其臭爲香其數爲五其穀爲稷其畜爲牛其

蟲爲蟻其果爲棗其菜爲葵（內經）其脈爲足太陰（內經）

脾臟大小 脾者主爲衛使之迎糧視唇舌好惡以知吉凶○黃色小理者脾小粗理者脾大揭唇者脾高唇

則臍安難傷于邪脾大則苦溲眇而痛不能疾行脾高則眇引季脇而痛脾下則下加于大腸臍

苦受邪脾堅則臍安難傷脾脆則善病消瘴脾端正則和利難傷脾偏低則善滿善脹也(靈樞)

脾傷證 有所擊仆若醉飽入房汗出常風則傷脾(靈樞)○飲食勞倦則傷脾(難經)○脾爲

脾病證 邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛(靈樞)○外證黃善噎善思善味內證當臍有動氣按之牢若痛其病腹脹滿食不消體重節痛

意嗜嗜臥四肢不收有是者脾也無是者非也(難經)○大骨枯槁大肉陷下胸中氣滿喘息不便內

痛引肩項身熱脫肉破面真驗見十月之內死注曰此脾之臟也期後三百日內死○肝傳之脾病名

曰脾風○脾腹中熱煩心出黃○脾熱者色黃而肉蠕動(內經)

脾病虛實 脾臟營養含意脾氣虛則四肢不用五臟不安實則腹脹溼洩不利注曰溼大便也洩小便也(靈樞)○脾實則身重善肌肉痿足不收行善癢腳下痛虛則腹滿腸鳴滯泄食不化○脾有餘

則腹脹溼洩不利不足則四肢不用(內經)

脾病問 病在脾愈在秋秋不愈甚於春春不死持於夏夏起於長夏○脾病者愈在庚辛庚辛不

愈加於甲乙甲乙不死持於丙丁起於戊己○脾病者日昃慧日甚下晡靜(內經)

脾病治法 脾苦溼急食苦以燥之脾欲緩急食甘以緩之(內經)○脾若溼是有餘宜白朮脾欲緩是不足

宜用益黃散補脾湯脾實宜瀉黃散調胃承氣湯(方見傷寒)○東垣○脾病宜食鹹大豆豕肉栗藿

皆鹹取其所勝之味也○內經○脾病宜食糲米牛肉棗葵(取本味也)○甲乙經○脾病禁溫食

飽食濕地濡衣(內經)

益黃散 治脾臍虛冷腹痛泄利陳皮一兩青皮訶子肉甘草炙各五錢丁香二錢右

爲末每二錢或三錢水煎服或到五錢作一貼亦可一名補脾散(海藏)

補脾湯 治脾臍虛冷嘔吐泄瀉飲食不消麥芽炒甘草炙各一兩半人參白茯苓

果乾薑炮各一兩厚朴陳皮白朮各七錢半右到五錢水煎服(二因方)

瀉黃散

一名瀉脾散治脾熱口嗜口臭梔子一錢半藿香甘草各一錢石
膏末八分防風六分右到作一貼酒沖微炒水煎服(海藏)

脾絕候

足太陰氣絕則脈不榮肌肉唇舌者肌肉之本也脈不榮則肌肉軟肌肉軟則舌痿人中滿
則唇反唇反者肉先死甲日篤乙日死○太陰終者腹脹閉不得息氣噎善噦噦則逆逆則面赤不

逆則上下不通上不通則而黑皮毛焦而終矣(靈樞)○脾絕十二日死(云五月)何以知
之口冷足腫腹熱腫脹泄利不覺出時無度(脈經)○環口紫黑柔汗發黃者此為脾絕(仲景)

脾臟修養法

常以季夏之月朔且並四季之末十八日旭且正坐中宮禁氣五息鳴
天鼓十二通收坤宮之黃氣入口十二噦之閉氣五十息(養生書)

脾臟導引法

可大坐伸一脚屈一脚以兩手向後反擊各三五度亦可跪坐以兩
手拒地回顧用力虎視各三五度能去脾虛積聚風邪喜食(臈山)

單方凡二十四種

雄黃益脾

○雄黃法土故色黃
而入脾水飛用(本草)

菘市

健脾燥濕米泔浸一宿剉乾末服煎服皆佳(本草)
○山精丸菘市泔浸為末神麴糊和丸服(丹心)

白朮

補脾服法同
蒼朮(丹心)

升麻

脾病非此不除到
水煎服之(丹心)

縮砂

溫脾胃末服煎
服並佳(本草)

馨香

助脾溫脾煎服末
服皆佳(本草)

丁香

溫脾治脾冷氣不和煎
服末服並佳(本草)

通草

發脾宜常欲眠
水煎服(本草)

厚朴 溫脾行脾氣
水煎服之

橘皮 主脾不能消殺煎服
末服並佳(本草)

大棗 養脾安中煮湯飲之又煮熟取
肉和脾胃丸藥尤佳(湯液)

乾柿 健脾氣和酥蜜煎食主脾
虛薄食不消化(本草)

飴糖 健脾即黑糖也可
常食之(本草)

稷米 脾之穀也可
常食(本草)

粟米 益脾作粥飯常食佳
諸粟亦同(本草)

陳倉米 粃脾宜作湯
飲之(本草)

糯米 味甘脾之穀脾病宜
食作湯飲之(本草)

大麥芽 補脾消食煮服末
服皆佳(本草)

神麩 健脾消食末服煮
服皆佳(本草)

蜜 養脾氣和脾藥最佳和
粥飲可常服之(本草)

牛肉 養脾氣牛肚尤佳煮
爛宜常食之(本草)


鯽魚 補脾此魚食泥故有補脾養胃之
功作羹作蒸作胎皆佳(本草)

鯁魚補脾此魚亦含泥故與鯽魚同功(本草)

葵能充脾氣作羹作蔬食之佳(本草)

肺臟

肺臟圖



肺形象

肺之形似人肩二布葉數小葉中有二十四孔行列以分布諸臟清濁之氣主歲魄(內經註)○肺重三斤三兩六葉兩耳共八葉(難經)○肺形似人肩又如磐懸於五臟之上而為華蓋(入門)

肺部位

肺藏於右(內經)○肺有二三葉上通喉嚨其中與心系相通一系自心入於肺兩大葉之間曲折向後(入門)○中膈二穴肺之募也在乳直上三肋間在背則肺俞在第三頸下是肺之部位也

(銅人)

肺主時日

肺主秋手太陰陽明主治其日庚辛○西方生燥燥生金金生辛辛生肺○肺為陽中之太陰通於秋氣(內經)

肺物類

肺在天爲燥在地爲金在卦爲兌在體爲皮毛在藏爲肺在色爲白在音爲商在聲爲哭在變動

殺爲稻其畜爲雞(一作馬)其蟲爲介其果爲李其菜爲韭(內經)其經爲手太陰(內經)

肺臟大小

五臟六腑肺爲之蓋○白色小理者肺小粗理者肺大巨肩反膺陷喉者肺高合液張脇者肺下

好肩背厚者肺堅肩背薄者肺脆背膺厚者肺端正脇偏踈者肺偏傾也○肺小則少飲不病喘

肺傷證

形寒飲冷則傷肺(靈樞)○肺傷者其人勞倦則效唾血其脈細緊浮數皆吐血此爲躁擾喘怒得

寒也若口中辟辟燥咳則胸中隱隱痛脈反滑數此爲肺痿也(仲景)

肺病證

邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出咳動肩背(靈樞)○風寒入舍於肺名曰肺癰發咳上氣○

肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝脾膈足皆痛虛則少氣不能報息耳聾啞乾○肺熱者色白而毛敗(內經)外證面白善噎悲愁不樂欲哭內證臍右有動氣按之牢若痛其病喘咳洒淅寒熱(難經)○大骨枯槁大肉陷下胸中氣滿喘息不便其氣動形期六日死真藏脈見乃予之期日此

肺之藏也一百八十日內死(內經)

肺病虛實

肺氣虛則鼻息不利少氣實則喘喝胸愆仰息(靈樞)○肺藏氣氣有餘則喘咳上氣氣不足則息利少氣○肺實則令人逆氣而背痛愠愠然虛則令人喘呼吸少氣而咳上氣見血下聞病音

(內經)

肺病問甚

病在肺愈在冬冬不愈甚於夏夏不死持於長夏夏起於秋○肺病者愈在壬癸子癸不愈加於丙丁丙丁不死持於戊己起於庚辛○肺病者下喘慧日中甚夜半靜(內經)

肺病治法

肺苦氣上逆急食苦以泄之註曰肺氣上逆是其氣有餘也肺欲收急食酸以收之用酸補之辛瀉之(內經)○肺苦氣上逆宜訶子皮一作黃芩肺欲收宜白芍藥以酸補宜五味子以辛瀉宜

桑白皮(東垣)○肺病宜食黍雞肉桃葱取本味也(甲乙經)○肺病宜食麥羊肉杏薤取苦能下氣(內經)○肺病禁寒飲食寒衣(內經)○肺虛宜補肺散獨參湯(方見氣門)肺實宜瀉白散人參瀉

肺湯

補肺散

一名阿膠散治肺虛阿膠珠二錢鼠黏子糯米炒各一錢二分馬兜鈴炒七分甘草炒五分杏仁麩炒九個右剉作一貼水煎服一作秫米○錢乙

瀉白散

一名瀉肺散治肺實桑白皮地骨皮各二錢甘草一錢右剉作一貼水煎服或加知母貝母桔梗梔子麥門冬生地黃亦可入門

人參瀉肺湯

治肺實熱黃芩梔子枳殼薄荷連翹杏仁桑白皮大黃酒蒸桔梗甘草各七分右剉作一貼水煎服丹心

肺絕候

手太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫于皮毛者也故氣不榮則皮毛焦皮毛焦則津液去皮節傷皮節傷則爪枯毛折毛折者則毛先死丙日篤丁日死○肺絕三日死何以知之口張一云口鼻

虛張短氣但氣出而不返脈經汗出髮潤喘不休者此為肺絕仲景

肺臟修養法

常以七月八月九月朔望旭旦西面坐鳴天鼓七飲玉漿三然後眼目正心思免宮白氣入口七吞之閉氣七十息養性書

肺臟導引法

可正坐以兩手據地縮身曲脊向上五舉去肺家風邪積勞亦可反拳槌脊上左右各三五度此法去胸臆間風毒閉氣為之良久閉目嚥液三叩齒為止靈仙

單方凡二十二種

雲母

補肺○雲母法金故色白而入肺水飛為粉服之本草

人參

補肺中陽氣○卒上氣喘鳴肩息氣欲絕此將肺絕之候人參膏調參湯或作末日五六服本草

天門冬

保定肺氣煮服或作末服酒使服皆佳本草

麥門冬

治肺熱○麥門冬人參五味子為生脈散治肺中伏火氣欲絕湯液

五味子

收肺氣作茶作丸常服本草

沙參

益肺氣能補肺中陰氣煮服作齏常服佳(本草)

片黃芩

治肺熱丸服煮服末服皆佳(本草)

紫苑

益肺清肺羹服之佳(本草)

貝母

潤肺作末和砂糖作丸含化或煮服之並佳(本草)

桔梗

理肺氣又治肺熱氣促末服煮服並佳(本草)

馬兜鈴

補肺去熱治喘急煮服之(本草)

桑白皮

瀉肺去肺中水氣煮服之(本草)

葶藶子

治肺壅喘急取子炒五錢大棗五枚同煎服

橘皮

利肺氣治氣逆上或煮服或末服(本草)

枳殼

泄肺氣或煮或末服(本草)

胡桃

欬肺止喘常服之(湯液)

烏梅

收肺氣作茶飲之(湯液)

杏仁

治肺潤燥散結作粥服甚佳(本草)

桃

肺病宜食(本草)

黍米

肺病宜食作飯食(本草)

牛乳


潤肺養肺作酪粥常食之佳(本草)

雞子白

潤肺清熱生吞之(本草)

腎臟

圖 臟 腎



腎形象

腎臟有二形如紅豆相並而曲附於腎筋外有脂裹裏白表黑主藏精(內經)○腎有兩枚重各九兩共一斤二兩左屬水而右屬火男以左腎為主女以右腎為主○腎形如紅豆相並如環貼脊

腎膜中裏白外紫兩腎二系相通下行其上則與心相通而爲一所謂坎北離南水火相感者也(入門)

腎臟有二

處各有一腎獨有兩者何也然腎兩者非皆腎也其左爲腎其右爲命門命門者精神之所舍元氣之所係也男子以藏精女子以繫胞故知腎有一也(難經)○命門非正癸二焦非正府也(

門入

腎部位

腎與臍相對與腰相應○腰者腎之外候○腎爲列女在後宮有兩枚(聚類)○京門二穴腎之募也在腰中挾脊季肋下一寸八分在背則腎俞在脊十四頰下兩傍命門穴在脊十四頰下與臍相

對乃腎之部位也(銅人)○命門之系卽心包絡其經手厥陰其府三焦其部分在心下橫膈膜之上堅斜膈膜之下與橫膜相黏其處黃脂漫包者心也其漫脂之外有細筋膜如絲與心肺相連者此包

絡也

入門

腎主時日

腎主冬足少陰太陽主治其日壬癸○北方生寒寒生水水生鹹鹹生腎○腎爲陰中之少陰通於冬氣(內經)○腎主受水穀之精而至靜惟子時濁氣一動而已(入門)

腎屬物類

腎在天爲寒在地爲水在卦爲坎在體爲骨在藏爲腎在色爲黑在香爲羽在聲爲呻在變動爲慄在竅爲耳在味爲鹹在志爲恐其脈爲足少陰其液爲唾其榮爲髮其臭爲腐其數爲六其穀

爲豆其畜爲雉其蟲爲鱗其果爲栗其菜爲養(內經)其經足少陰(內經)

腎臟大小

腎者主爲外使之遠聽視耳好惡以知其性○黑色小理者腎小蠹理者腎大耳高者腎高耳後陷者腎下耳堅者腎堅耳薄不堅者腎脆耳好前居牙車者腎端正耳偏高者腎偏傾也○腎小

則藏安難傷腎大則善病腰痛易傷於邪腎高則苦背脊痛不可以俛仰腎下則腰尻痛或爲瓠疝腎堅則不病腰背痛腎脆則善病消痺腎端正則和利難傷腎偏傾則苦腰尻痛也(靈樞)

腎傷證

有所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎(靈樞)○久坐溼地強力入水則傷腎(難經)

腎病證

邪在腎則病骨痛除痹陰痺者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩(靈樞)○脾傳之腎病名曰疝瘦少腹鬱熱而痛出白一名曰蠱註曰出白謂溲出白液也○腎熱者色黑而齒枯○

大骨枯槁大肉陷下肩髓內消動作益衰真藏見期一歲死見其真藏乃予之期日註曰此腎之藏也期後三百六十五日內死(內經)○外證面黑善恐數欠內證臍下有動氣按之牢若痛其病逆氣小

腹急痛澀如下重足脛寒而逆(難經)

腎病虛

腎氣虛則厥實則脹○腎實則腹大脛腫喘咳身重寢汗出憎風虛則胸中痛大腹小腹痛清厥意不樂(靈樞)○腎虛則心懸如飢善恐(入門)

腎病間甚

病在腎愈在春春不愈甚於長夏長夏不死持於秋起於冬○腎病者愈有甲乙甲乙不愈甚於戊己戊己不死持於庚辛起於壬癸○腎病者夜半慧四季其下哺靜(內經)

腎病治法

○腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣也腎欲堅食苦以堅之用苦補之鹹瀉之(內經)○腎病宜食辛黃黍雞肉桃蔥取其辛潤也(內經)○腎病宜食大豆豕肉栗菴取本味也(甲乙經)○腎病

禁犯焮埃熱食溫炙衣(內經)○腎水無實不可瀉錢氏只有補腎地黃丸無瀉腎之藥(綱目)○左

腎屬水水不足則陰虛宜補腎丸六味地黃丸滋陰降火湯
右腎屬火火不足則陽虛宜八味丸加減八味丸溫腎散

補腎丸

治腎水不足陰虛龜板酒炙四兩知母黃柏並酒浸炒各二兩
乾薑一兩右爲末粥丸梧子大空心鹽湯下五七十九丸(東垣)

六味地黃丸

治同上熟地黃八兩山藥山茱萸各四兩澤瀉牡丹皮白茯苓各三兩右爲末蜜丸梧子大
溫酒鹽湯空心吞下五七十九丸(正傳)○血虛陰衰熟地黃爲君精滑山茱萸爲君小便或

多或少或赤或白茯苓爲君小便淋瀝澤瀉爲君心
氣不足牡丹皮爲君皮膚乾澀山藥爲君(綱目)

滋陰降火湯

治腎水不足陰虛火動白芍藥一錢三分當歸一錢二分熟地黃天門冬麥門冬白朮各一
錢生地黃八分陳皮七分知母黃柏並蜜水炒甘草炙各五分右剉作一貼薑三片漿二枚

水煎服
(回春)

八味丸

治命門火不足陽虛熟地黃八兩山藥山茱萸各四兩牡丹皮白茯苓澤瀉各三兩肉桂附子炮
各一兩右爲末蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯下五七十九丸若加五味子名曰腎氣丸(仲景)○

又治老年水火俱虧腎氣虛乏下元冷憊腰
痛脚軟夜多瀝尿而黑口乾耳焦枯(入門)

加減八味丸

專補腎水兼補命門火熟地黃二兩山藥微炒山茱萸各一兩澤瀉酒蒸牡丹皮白茯苓各
八錢五味子略炒一兩半肉桂五錢右爲末蜜丸梧子大五更初未言語時鹽湯或溫酒下

五七十九丸又晚間空腹再服(得效)○
或以此材細剉煎服夕日加減八味湯

溫腎散

治腎與命門虛寒腰脊重痛熟地黃一錢半牛膝肉苁蓉五味子巴戟麥門冬甘草炙
各八分茯苓神乾薑杜仲炒各五分右剉作一貼水煎服或爲末溫酒調二錢服(丹心)

兩臟同一腑

小便清利脉沈遲是冷氣歸腎小便赤澀脈沈數是熱氣歸命門是腎與命門脈同者謂其所受之病同歸於膀胱一府也(入門)

腎絕候

少陰終者而黑齒長而垢腹脹閉塞上下不通而終矣(內經)○足少陰氣絕則骨枯少陰者冬脈也伏行而濡骨髓者也故骨不濡則肉不能著也骨肉不相親則肉軟却肉軟却故齒長而垢髮無

澤髮無澤者骨先死死戊日篤己日死(靈樞)○溲便遺矢狂言目反直視者此為腎絕也脈浮而洪身汗如油喘不休水漿不下形體不仁乍靜乍亂者此為命門絕也(仲景)腎絕四日死何以知之齒為

暴枯而為正黑目中黃色腹中欲折自汗如流水一云人中平十日死(脈經)

腎臟修養法

常以十月十一月十二月朔望旭且北面平坐鳴金梁七飲玉漿三吸玄宮黑色氣入口五吞之閉氣六十息(養性書)

腎臟導引法

可正坐以兩手上從耳左右引脇三五度亦可以手著胸膈射左右同緩身三五度亦可以足前後踰左右各十數度能去腰腎膀胱間風邪積聚(羅仙)○擦腎俞穴法臨臥時坐於床垂

足解衣閉氣舌柱上臍目示頂仍提縮穀道以手摩擦兩腎俞穴各一百二十次以多為妙舉叩齒臥專治腎元虛冷小便滑數(養老書)

單方凡二十三種

磁石 養益腎氣腎虛耳聾目昏皆用之○磁石法水故色黑而入腎為末水飛入藥用(本草)

陽起石 補腎氣治腎氣虛冷為末水飛入藥用(本草)

鹽 接藥入腎和鹽炒入鹽服之皆此意也(本草)

兔絲子 補腎中陽氣治腎冷酒侵為末和酒服或入藥用(本草)

肉苁蓉 命門相火不足以此補之酒浸蒸入藥(湯液)

五味子 暖水藏補腎逆類象形者也或丸服或煮服(本草)

熟地黃 假火力蒸九數故能補腎精八味丸以此爲君天一所生之源也(湯液)

知母 補腎陰不足治腎熱澀水妙或丸服或煮服(本草)

栝子仁 潤澤腎藏治腎冷或丸服或入藥服(本草)

杜仲 治腎冷又治腎勞腰脚冷痛或煮服或丸服妙用(本草)

沉香 補命門火不足爲末入藥或水磨取汁服之(本草)

山茱萸 補腎添精煖水藏澀精氣或丸服或煮服(本草)

牡蠣 補腎煖爲粉入丸藥用其肉亦可煮食(本草)

桑螵蛸 主腎衰漏精酒洗略蒸入丸藥(本草)

覆盆子 益腎藏又煖腎酒浸焙入丸藥用或末服之(本草)

破故紙 溫補腎藏能引氣歸腎妙爲末入藥或末服(本草)

鹿茸 補腎虛治腰腎虛冷酥炙爲末入丸藥或作末服(本草)

鹿角膠 主腎藏氣衰虛損炒爲珠作末服(本草)

服膈脂 益腎主腎精衰損多色成勞瘁能煖腎酒浸炙令香爲末服或入丸藥用之(本草)

狗陰莖 補腎主陰痿不起令強然大炙爲末服或入丸藥(本草)

牛腎補腎可常食
之(本草)

粟補腎病宜食宜
根常食之(本草)

黑豆入鹽煮能補腎宜
常食之(食療)

膽腑

膽形象

其色玄其形如懸瓠附肝之短葉間重二兩(一作三兩)三錄盛精汁三合無出入竅(入門)○肝之餘氣溢入於膽聚而成精由是內藏精而不泄外視物而得明為清淨之府能通於眼目(脈訣)

膽部位

膽主臟膽腑膽缺益著膽之路(入門)○日月二穴膽之募在乳下三肋端期門下五分在背則膽命在脊第十頤下兩傍此膽之部位也(銅人)

膽主決斷

膽生於金主武故為中正之官決斷出焉(入門)

膽外候

目下裸大其胆乃橫○胆應爪爪厚色黃者胆厚爪薄色紅者胆薄爪堅色青者胆急爪濡色赤者胆緩爪直色白無約者胆直爪惡色黑多紋者胆結也(靈樞)

膽傷證

胆者敢也驚怕則胆傷矣○面青脫色胆受怖也(子和)

膽病證

胆病者善太息口苦嘔有苦汁心中澹澹恐如人將捕之噓中吟吟然數唾(靈樞)○痛悶左逸五肋之中血脈生瘦馬力又胆候咽門故熱壅則生疔腫痛(入門)○胆病多寒熱(入門)

膽病虛實

胆虛則恐畏不能獨臥胆實則怒○胆實則怒而勇敢胆虛則善恐而不敢也○胆虛則不眠胆實則多睡(入門)

膽病治法

胆虛宜仁熱散胆實宜半夏湯○小柴胡湯治寒熱往來乃少陽經主藥也(方見寒門)水煎清溫服則能入胆(入門)

仁熟散

治胆虛恐畏不能獨臥柏子仁熟地黃各一錢人參枳殼五味子桂心山茱萸甘菊茯神枸杞子各七分半右對作一貼水煎服或為末溫酒調二錢服之(入門)

半夏湯

治胆實熱煩悶生地黃酸棗仁炒各五錢半夏生薑各三錢遠志赤茯苓各二錢黃芩一錢黍米一合右對每一兩長流水煎澄清服(入門)

膽絕候

胆爲足少陽其終者耳聾百節皆縱目震(音輕直視如驚說)絕系絕系者一日半死矣其死也色先青白乃死矣(靈樞)○胆絕七日死何以知之眉爲之傾(脈經)

膽腑導引法

可平坐合兩脚掌仰頭以兩手挽脚腕起搖動爲之三五四度亦可大膽腑導引法坐以兩手招地舉身努腰脊三五度能去胆家風毒邪氣(扁鵲)

單方凡五種

柴胡

治胆病寒熱足少陽經主藥也又曰胆瘵非此不能除到水煎澄清飲(湯液)

乾地黄

助心胆氣或煎服或丸服之(本草)

黃連

益胆或煎服或丸服或未服(本草)

細辛

添胆氣水煎服之(本草)

白百合

定胆水煎服之(本草)

胃腑

胃形象

胃長一尺二寸胃軒曲屈伸之長二尺六寸大一尺五寸徑五寸受水穀三斗五升其中之穀常留二斗水一斗五升(靈樞)○胃重二斤十四兩(難經)○胃爲之市註曰水穀所歸五味皆入如市

雜故爲市也(內經)○胃號太倉俗呼爲肚受水穀三斗五升平人日再圍一行二升半一日五升七日則三斗五升而水穀盡矣故平人不飲食七日而死者胃中水穀津液俱盡也(入門)

胃部位

咽門至胃長一尺六寸胃居心蔽骨與脾之中上下各四寸(難經)○中脘一次胃之募也在心蔽骨與脾之中上下各四寸在背則胃俞在脊第十二頰下兩傍胃之部位也(銅人)

胃爲水穀之海

人之所受氣者穀也穀之所注者胃也胃者水穀氣血之海也海之所行雲氣者天下也胃之所出氣血者經隧也經隧者五藏六府之太絡也○胃者五藏六府之海也水穀皆入於

胃藏府皆稟氣於胃五味各走其所喜酸先走肝苦先走心甘先走脾辛先走肺鹹先走腎穀氣津液日行榮衛大通乃化糟粕以次傳下(靈樞)○胃爲水穀之海脾爲消化之器水入於經其血乃成穀

入於胃脈通乃行血不可不養衛不可不溫血溫衛和得盡天年(入門)○飲食入胃則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛胃滿則腸虛腸滿則胃虛更虛更實故氣得上下而無病矣(靈樞)

胃腑大小 則胃大不及則胃小(靈樞)

胃外候 胃爲之海廣骸大頸五穀乃容○脾應肉肉剛堅大者胃厚肉脆脆者胃薄肉脆小而脆者胃不堅肉脆不稱身者胃下胃下者下腕約不利也肉剛不堅者胃緩肉脆無小裸累者胃急肉脆多

少裸累者胃結胃結者上腕約不利也(靈樞)○腸謂附脾(肉如塊者)

胃傷證 飲食自倍腸胃乃傷(內經)○胃傷之證不思飲食胸腹脹痛嘔噦惡心噯氣吞酸面黃肌瘦怠惰嗜臥多自利(東垣)

胃病證 胃病者腹脹脹胃脘當心而痛上支兩脇膈噎不通飲食不下○飲食不下膈塞不通邪在胃脘也○胃中寒則手魚際之絡脈多青胃中熱則手魚際之絡脈多赤○而熱者足陽明病兩跗之上脈

際堅者足陽明病此胃脈也(靈樞)

胃病虛實 胃脈實則脹虛則泄(內經)○胃中元氣盛則能食而不傷過時而不飢脾胃俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不能食而瘦或少食而肥雖肥而四肢不舉(東垣)

胃病治法 人無根本水食爲命蓋脾胃屬土主納水殺人之根本也○(丹心)五味淡薄令人神爽氣清(回春)○胃病治法調其飲食適其寒溫澄心息慮從容以待真氣之復常也(東垣)胃實宜平

胃散胃虛宜異功散補中益氣湯(方見內傷)不進飲食宜養胃進食湯

平胃散 治脾胃不和不思飲食心腹脹痛嘔噦惡心噯氣吞酸面黃肌瘦怠惰嗜臥常多自利或發霍亂及五噎八痞嘔氣反胃等證蒼朮二錢陳皮一錢四分厚朴一錢甘草六分右剉作一貼薑三片

棗二枚水煎服或爲末取二錢薑湯煎服(入門)○平胃散決烈耗散之劑實非補胃之藥能瀉土氣之敦阜使之平耳用之而胃氣和平則便止不可常用也(丹心)

異功散 治脾胃虛弱不思飲食腹痛自利人參白朮白茯苓陳皮甘草各一錢右剉作一貼薑二片棗一枚同煎服(東垣)

養胃進食湯 治脾胃虛弱飲食不進面黃肌瘦胸膈痞悶食不消化或噯氣吞酸蒼朮一錢人參白朮各一錢陳皮厚朴白茯苓甘草各七分神麴炒麥芽炒各五分右剉作一貼薑三片棗二枚

同煎服或爲末蜜和作丸梧
子大每二錢米飲下(必用)

胃絕條 胃爲足陽明其終者口目動作善驚妄言色黃其上下極盛不仁則終
矣(內經)○胃絕五日死何以知之脊痛腰中重不可反覆(脈經)

單方凡二十七種

石膏

除胃熱專瀉胃中之火研水煎一
兩服或水飛二錢和水服(本草)

葛根

開胃下食解酒毒水煎服或
水飛澄取粉和水服(本草)

人參

補胃氣能開胃消食煎
服末服皆佳(本草)

白豆蔻

主胃冷能消磨水穀研水
煎服或末服皆佳(本草)

蒼朮

強胃去胃中濕或煎或
丸或末服皆佳(本草)

白朮

補胃服
如上述法

大豆

除胃中熱瘳○大豆黃卷理胃氣
或煮或末和水服二錢(本草)

丁香

治胃寒能溫胃或
煮或末服(本草)

縮砂

溫胃消化水穀煎服
末服皆佳(本草)

乾薑

開胃溫胃煎服末服
丸服並佳(本草)

生薑

開胃煎湯服
之(本草)

大麥 平胃氣開胃作飯作粥皆可當食○大麥芽開胃消食(本草)

粳米 補胃氣作白粥可常服(本草)

稷米 利胃作飯作粥並佳(本草)

青粱米 主胃脾作飲飲之佳(本草)

牛肚 補胃煮爛食之○酪粥除胃中熱可常服之(本草)

羊肉 開胃煮爛食之作羹亦可○羊肚補胃(本草)

黃狗肉 補胃厚腸胃煮爛食或作脯炙食(本草)

黃雌雞 補胃煮爛作羹食(本草)

鯽魚 平胃氣補胃作蒸作羹作脍食並佳(本草)

鱖魚 開胃作羹作脍並佳(本草)

石首魚 開胃可常食(本草)

芋 開胃又寬腸胃作羹當食佳(本草)

橘皮 開胃作茶飲之或作末煎湯熱服(本草)

大麥 平胃氣厚腸胃可常食之(本草)

乾柿開胃厚腸胃可
常食之(本草)

韭除胃中熱可
常食(本草)

小腸腑

小腸形象

小腸長三丈二尺廣二寸半徑八分分之少半重二斤十四兩常廣左迴疊積十六曲盛殺二斗四升水六升三合合之太半(靈樞)

小腸部位

小腸後附脊常臍左環迴周葉積而下(靈樞)○胃之下口即小腸上口名曰幽門臍上一寸水分穴即小腸下口也(入門)○關元一穴在臍下三寸小腸之募也在背則小腸俞在脊十八

下兩傍此小腸
部位也(銅人)

小腸傳

凡胃中腐熟水穀其滓穢自胃之下口傳入於小腸上口自小腸下口泌別清濁水液入膀胱上口滓穢入大腸上口難經曰小腸大腸會謂之闌門言由闌門分隔也(入門)

小腸外

唇厚人中長以候小腸○心應脈皮厚者脈厚脈厚者小腸厚皮薄者脈薄脈厚者小腸薄皮緩者脈緩脈緩者小腸大而長皮薄而脈衝小者小腸小而短諸陽經脈皆多紆屈者小腸結也(靈樞)

靈樞

小腸病證

中氣不足腸鳴之苦鳴○小腸病者小腹痛腰脊控墨而痛(墨陰丸也)時窘之候當耳前熱○小腸控墨引腰脊上衝心邪在小腸也(靈樞)○小腸爲泄(內經)○小腸有氣則小腹痛小腸

有血則小便澀小腸有
熱則壅中痛(入門)

小腸病治法

小腸者心之府也有病宜通利用導赤散赤茯苓瀉

導赤散

治小腸熱小便不利生地黃木通甘草各一錢右剉入青竹葉七片同煎服(錢乙)

赤茯苓湯

治小腸熱面赤多汗小便不利木通赤茯苓檳榔生地黃黃芩赤芍藥麥門冬甘草各一錢右剉作一貼入生薑五片同煎服(必用方)

小腸絕候 小腸絕六日死何以知之髮直如
乾麻不得屈伸自汗不止（脈經）

單方九種

澤瀉 通小腸利小便水煎服之（本草）

木通 通小腸下水水煎服之（本草）

瞿麥 通心經利小腸爲最要水煎服之（本草）

連翹 通小腸水煎服之（本草）

茯苓 治小腸不利水煎服或未服（本草）

黑豆 煮汁飲除腸中淋露又治腸痛然浸酒飲之（本草）

梔子 療小腸熱水煎服之（本草）

冬瓜汁 利小腸可飲之（本草）

煮葵汁 滑小腸作羹作茹食之（本草）

大腸腑

大腸形象 大腸一名迴腸又名廣腸長二丈一尺（一作二尺）廣八寸徑二寸寸之大半重二斤十二兩右迴疊積十六曲盤殺二斗水七升半（難經）腸胃自所入至所出長六丈四寸四分迴曲環皮三

十二曲也凡腸胃合受水穀八斗七升六合八分合之一（難經）

大腸部位

大腸後附脊以受小腸滓穢當臍右迴疊積上下辟大大腸下口連於肛門○(入門)天樞二穴大腸之募也在臍傍各三寸在背則大腸俞在脊第十六傾下兩傍之大腸部位也(銅人)

大小腸連系

大小腸之系自臍下與脊脊連心腎膀胱相系脂膜筋絡散布包裹然各分紋理羅絡大小腸與膀胱其細脈之中乃氣血津液流走之道也(入門)

大腸外候

鼻隱以長以候大腸○肺主皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏大者大腸大而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結○天樞以下至橫骨長六寸半過則週腸

廣大不滿則
狹短(靈樞)

大腸病證

大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感于寒即泄當臍而痛不能久立○腹痛腸鳴氣上衝胸噤不能久立邪在大腸也○腸中寒則腸鳴泄腸中熱則出黃如糜(靈樞)○大腸小腸爲世

○腸痹者數飲而出不得中氣喘爭時發殮泄(內經)○大腸有寒者多
驚濡有熱者便腸垢(仲景)○腸虛則鳴又寒氣相搏則爲腸鳴(入門)

大腸病治法

黃帝問曰胃惡熱而喜清冷大腸惡清冷而喜熱兩者不和何以調之岐伯對曰調此者飲食衣服亦欲適寒溫寒無淒淒暑無出汗飲食熱無灼灼寒無淒淒寒溫中適故氣將持乃不致

邪歸也(靈樞)大腸熱宜瀉白湯大腸寒宜實腸散

瀉白湯

治大腸實熱臍腹痛腹脹不通生地黃一錢赤茯苓芒硝各一錢陳皮竹茹黃芩梔子黃柏各五分右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服(入門)

實腸散

治大腸虛寒腹痛瀉瀉厚朴肉豆蔻煨訶子皮縮砂研陳皮蒼朮赤茯苓各一錢木香甘草炙各五分右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服(直指)

大腸絕候

大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死(脈經)

單方凡二十四種

訶子皮

瀉腸止泄或煎或末服(本草)

黃狗頭骨

止泄利能固大腸滑脫炙黃爲末米飲調服或作丸服(本草)

五倍子 治腸虛泄利能澀腸固脫爲末和水服或丸服(本草)

石榴 澀腸止泄或煎服或末服之(本草)

陳倉米 澀腸胃又調胃作飯作粥作飲服(本草)

粟米糗 實大腸和水服之(本草)

烏梅 澀腸作茶飲之(本草)

椴木 厚腸胃澀腸爲末和米飲服之或丸服皆佳(本草)

牡蠣粉 澀大小腸取末和米飲服或丸服(本草)

郁李仁 治腸中結氣爲末和水服(本草)

大黃 利大小腸煎服丸服皆佳(本草)

續隨子 利大小腸爲末和水服或丸服之(本草)

桑白皮 利大小腸水煎飲之(本草)

梔子 療大小腸大熱水煎服或爲末煎服之(本草)

桃花 利大小腸花落時拾取和麵作餅食之良(子和)

脂麻油 即香油也通大小腸單服之或和水作粥服之(本草)

麻仁 治大腸風熱大便結澀水
研取汁作粥服(本草)

水芹 利大小腸取莖葉搗絞汁飲
之或作菹茹常食之(本草)

綵草 補大小腸虛氣作羹
作鹽食之佳(本草)

葱白 通大小腸取汁飲煮
汁飲之並佳(本草)

冬瓜 利大小腸作羹作
鹽常食之(本草)

菘菜 通利腸胃作羹作
鹽常食(本草)

牛乳 利大腸作粥常服或
生飲之亦佳(本草)

童尿 利大腸和薑汁或和甘
草末少許飲之(本草)

膀胱腑

膀胱形象 膀胱以虛受水為津液之府有上口而無下口得氣海之氣胞化則溲便注瀉氣海之
氣不足則泌澀不通○上口廣二寸半中廣九寸盛尿九升九合重九兩二銖(難經)

膀胱部位 膀胱在小腹之內(靈樞)○中極二穴膀胱之募在臍下四寸
在背則膀胱俞在脊第十九頸下兩傍此膀胱部位也(銅人)

膀胱傳受 水液自小腸泌別汁滲入膀胱之中胞氣化之而為尿以泄出也(內經)○膀胱雖為
津液之府至於受盛津液則又有胞而居膀胱之中額竅曰膀胱者胞之室也(東垣)

膀胱外候 鼻孔在外膀胱漏泄(靈樞)○腎應骨密理厚皮者三焦膀胱厚魚理薄皮者三焦膀胱薄疎膜
理者三焦膀胱緩皮急而無毫毛者三焦膀胱急毫毛美而麤者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱

膀胱結也
(靈樞)

膀胱病證

膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之卽欲小便而不得肩熱若脈陷及足小指外廉脛蹠後皆熱(靈樞)○膀胱不利爲癰不約爲遺尿(內經)○膀胱病者熱結下焦小腹苦滿胞轉小便不利令人發狂治則濕痰上溢而爲

多睡小便淋瀝或遺尿(入門)

膀胱病治法

膀胱虛則小便不禁宜既濟丸加減八味湯倍山茱萸加烏藥益智仁破故紙(方見腎藏)實則小便不通宜益元散(方見暑門)葵子湯○五苓散膀胱主藥也(方見寒門)

既濟丸

治膀胱虛小便不禁芫絲子酒製益智仁炒白茯苓韭子炒肉蓯蓉酒洗當歸熟地黃各五錢黃柏知母並鹽炒牡蠣煨山茱萸酒蒸去核各三錢五味子一錢右爲末酒麪糊和丸梧子大空心

鹽湯下百丸(醫鑑)

葵子湯

治膀胱實熱小便不通葵子赤茯苓豬苓枳實瞿麥滑石木通黃芩車前子甘草各一錢右剉作一貼薑五片同煎服(濟生)

膀胱絕候

遺尿狂言目反直視此爲膀胱絕也○膀胱之脈爲足太陽其終也戴眼反折癰癢其色白絕汗乃出絕汗出則死矣(內經)

單方凡十七種

澤瀉

利膀胱熱宜通水道水煎服(本草)

茴香

溫膀胱去冷氣或炒爲末煎服或煎服(本草)

防己

去膀胱熱對水煎服之(本草)

石菖蒲

治膀胱熱滿水煎服之(本草)

地膚子

主膀胱熱小便或水煎服或爲末服(本草)

瞿麥

逐膀胱邪通小便水煎服之(本草)

栝子仁

去膀胱冷膿宿水或木服或丸服皆佳(本草)

威靈仙

去膀胱宿膿惡水或末服或煎服(本草)

郁李仁

治膀胱急痛爲末服或丸服(本草)

青橘皮

除膀胱留熱停水或煎服或末服(本草)

黃栢

瀉膀胱之熱利下竅或煎服或丸服之(本草)

烏藥

主膀胱腎間冷痛或煎服或爲末煎服(本草)

椒目

主膀胱急或未服或爲丸服(本草)

猪腎

通利膀胱又補膀胱水煮并汁服猪胞尤佳(本草)

毛茛

能變膀胱水煎

昆布

療膀胱急妨下水氣切四兩八枚白三莖煮爛下莖椒末調和服之(本草)

魚膾

除膀胱水以薑醋蒜蘆食之(本草)

三焦腑

三焦形象

上焦如霧中焦如漚下焦如瀆(靈樞)○上焦主出陽氣溫於皮膚分肉之間若痿痺之瀉焉故曰上焦如霧○中焦主變化水穀之味其精微上注於肺化而爲血行於經隧榮五藏○身故

曰中焦如漚○下焦主通利溲便以時傳下出而不納開通秘塞故曰下焦如瀆(入門)○三焦指腔子而言包含乎腸胃之總司也胸中膈膜之上曰上焦膈膜之下臍之上曰中焦臍之下曰下焦總名

曰三焦

(正傳)

三焦部位 上焦者在心下下膈在胃上口主內而不出其治在膻中玉堂(穴名)下一寸六分直兩乳間陷者是○中焦者在胃中脘(穴名)不上不下主腐熟水穀其治在臍傍○下焦者在臍下當膀胱

上口主分別清濁主出而不納以傳導也其治在臍下一寸(難經)○頭至心為上焦心至臍為中焦臍至足為下焦(海藏)○三焦之府在氣衝(穴名)氣衝乃陰陽道之府發主腐熟水穀之

氣三焦發用貫通十二經絡往來上下營運氣血是知氣衝為三焦行氣之府也(入門)○上中下三焦通為一氣衝於身也三焦非正府也無形而有用(東垣)

三焦傳受 上焦出於胃上口並咽以上貫膈而布胸中走腋循太陰之分而行還至陽明上至舌下足陽明常與榮俱行於陽二十五度行於陰亦二十五度為一周而復大會於手少陰命曰衛氣也○中

焦亦並胃中出上焦之後此所受氣者泌精粕蒸津液化其精微上注於肺脈乃化為血而為血以奉生身莫貴於此故獨得行於經隧命曰榮氣○下焦者別迴腸於膀胱而滲入焉故水穀者常並居於胃

中成精粕而俱下於大腸而成下焦滲而俱下濟泌別汁循下焦而滲入膀胱焉(靈樞)○上焦如霧者氣下焦如瀆者血也中焦者氣血之分也(東垣)○心肺若無上焦何以宗主榮衛脾胃若無中焦

何以腐熟水穀肝腎若無下焦何以疎夫津液無形而有

用主持諸氣三焦者水穀之道路氣之所終始也(入門)

二焦外候 鼻柱中央起三焦乃約(靈樞) 樞三焦外候詳見膀胱府

三焦病證 三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急澀則水留即為脹○小腹痛腫不得小便邪在三焦約也(靈樞)○上焦如霧霧不散則為喘滿此出而不納也中焦如瀆瀆不利則為留飲留飲不散久為中滿此上不能納下不能出也下焦如瀆瀆不利則為腫滿此上納而下不出也

(海藏)○下焦溢為水(內經)○三焦為丙火之府故其發也為無根之相火(入門)

三焦病治 內經曰三焦者決瀆之官水道出焉蓋三焦為上中下水穀之道路其病宜通利大小便○宜用枳殼丸木香檳榔丸三和散(方見氣四)

枳殼丸 治三焦約大小便不通枳殼二兩陳皮一兩檳榔五錢木香二錢半黑牽牛子四兩一分半生用一斗炒熟搗取頭末一兩半餘不用右為末蜜丸梧子大薑湯下三五十九(河間)

木香檳榔丸 疎導三焦快氣潤腸半夏麴皂角酥炙去皮葶子郁李仁去殼別末各二兩木香檳榔枳殼杏仁青皮各一兩右為末別以皂角四兩浸藥水揉揉熬膏去滓入蜜少許和丸梧子大空

心驚湯下五七
十九(局方)

單方凡十三種

黃芪

補三焦實衛氣是上中下內外
三焦之藥也水煎服之(湯液)

燕覆子

味三焦各熱取熟
者食之(本草)

牛髓

平三焦以酒
和服(本草)

益智仁

安三焦末服丸
服並佳(本草)

脂麻油

下三焦熱毒氣單
取飲之(本草)

甜瓜

通三焦間壅塞氣
熱者食之(本草)

人參

補上焦元氣煎服末
服丸服並佳(湯液)

黃狗肉

實下焦煮爛和五
味食之(本草)

鵝肉

同酥煎食偏令人
下焦肥(本草)

青橘

治下焦冷氣煎服
末服並佳(本草)

藕

蓮根也蒸食實
下焦(本草)

豬腸

補下焦虛竭煮爛食
或作羹食之(本草)

經安下焦作羹
食之(本草)

胞

胞形象

胞者一名赤宮一名丹田一名命門男子藏精施化婦人繫胞有孕俱爲生化之原非五行也非水亦非火此天地之異名也象坤土之生萬物也(東垣)○內經曰胞者藏於陰而象於地名曰奇恒

之府註曰奇異於恒常之六府也

○此胞非膀胱中盛尿之胞也

胞部位

婦人胎之所居名曰子宮亦曰胞門(東垣)○胞一名丹田一名關元(穴名)在臍下三寸方圓四寸著脊梁兩腎間中央赤是也左青右白上黃下黑三寸法三光四寸法四時五色法五行兩腎間

名大海而貯其血氣亦名大中極言取人身之上下四向最爲中也(黃生)○胞一名子宮胞有寒則無子(仲景)

胞爲血室

衝脈任脈皆起於胞中上循腹裏爲經絡之海(靈樞)○內經曰女子二七天癸至任脈通大衝脈盛月事以時下故有子註曰癸謂壬癸北方水干名也任脈衝脈皆奇經脈也衝任流通經血

漸盈應時而下天眞之氣降與之從事故云天癸也然衝爲血海任生胞胎二者相資故能有子所以謂之月事者平和之氣常以三旬而一見也故愆期者謂之有病(良方)○血室者血之所居也榮衛

停止之所經脈流會之處衝脈是矣○衝脈爲血海諸經朝會男子則運而行之女子則停而止之男既運行故無積而不滿女既停止故有積而能滿滿者以時而溢謂之信卽月水也以象月盈則虧也

(綱目)

脈法

脈微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利爲可否者此爲居經三月一來○少陰脈微而遲微則無精遲則陰中寒遲則血不來此爲居經三月一來(脈經)○婦人漏下赤白日下血數升脈急疾者死遲

者生○婦人漏下赤白不止脈小虛滑者生大緊實數者死(脈經)○寸關調如故而尺脈絕不至者月水不利○尺脈來而斷絕者月水不利○肝脈沈主月水不利○尺脈滑血氣實也婦人經脈不利

○脈來至狀如琴絃若小腹痛主月水不利乳竅生疔(脈經)○帶下之脈宜遲滑忌浮虛(醫案)

經行有異

婦人年二七天癸至七七天癸竭行早性機巧行遲性魯鈍通行則陰陽和合始能生子行年十四歲當時二十歲不行命如風燭有病發則死間有不死百中無一亦令一生多病未嘗一日安

格然有四季行亦可又有一年一次者亦不甚佳或一生不循正道而行者晚年有辭疾則難治(得效)

月候形色

經水者陰血也陰必從陽故稟火色也血爲氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁往往見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也行後作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也而有水渾之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但見其紫者黑者作痛者成塊者率指爲風冷而行溫熱之劑禍不旋踵矣(丹心)○心主血故以色紅爲正月候雖不對期而色正者易調(入門)

和血治法

經色紫者風也四物湯(方見血門)加防風白芷荆芥○黑者熱甚也成塊色紫黑者血熱也四物湯加黃芩黃連香附子○淡白者虛也芎歸湯(方見婦人)加人參黃芪白芍藥香附子○淡者有水渾之也二陳湯(方見痰飲)加川芎當歸一云色淡者氣血俱虛宜八物湯(方見虛勞)○如烟塵水者如屋漏水者如豆汁者或帶黃者溼痰也二陳湯加秦艽防風蒼朮一云如黑豆汁者四物湯加芩連○成塊色不變者氣滯也四物湯加香附子玄胡索枳殼陳皮○通用百子附歸丸(方見婦人)琥珀調經丸

琥珀調經丸

治胞冷無子能令經正香附米一斤分作二包用童尿米醋各浸九日和淨熟艾四兩拌勻再加醋五碗入砂鍋內同煮乾爲度入川芎當歸白芍藥熟地黃生乾地黃沒藥各二兩琥珀一兩右爲末醋糊和九梧子大每百丸空心艾醋湯下(入門)

月候不調

婦人經水少不如前者何也師曰曾經下利若汗出小便利亡其津液故令經水反少也設經下多於前者有所苦困當言恐大便難身復無汗也(脈經)○月候不調之由或前或後或多或少凡行後作痛者虛也小而淡者血虛也多者氣虛也其將行作痛及凝塊不散者滯也紫黑色者滯而挾熱也(丹心)○月候不調之中有兼疼痛者有兼發熱者其不調之中有證前者有退後者則證前爲熱退後爲虛也疼痛之中有常時作痛者有經前經後作痛者則常時與經前作痛者爲血積經後爲血虛也發熱之中有常時發熱者有經行發熱者則常時爲血虛有積經行爲血虛有熱(丹心)

調血治法

治經水或前或後或多或少或逾月不至或一月再至皆不調之故宜調經散一云經候不調當以四物湯爲主治(丹心)○臨經行腹痛此血滲故也宜清熱調血湯又四物湯加玄胡索苦楝根蓬朮香附子桃仁紅花黃連○經行後腹痛乃虛中有熱八物湯加減服(方見虛勞)○先期而來乃氣血俱熱宜清經四物湯又四物湯加柴胡黃芩黃連○過期不來是血虛宜通經四物湯又四物

湯加黃芪陳皮升麻人參○月候不調通用煮
附丸墨附丸四製香附丸七製香附丸(入門)

調經散一名溫經湯治月候不調麥門冬二錢當歸一錢半人參半夏製白芍藥川芎牡丹皮各一錢阿膠珠甘草炙各七分半吳茱萸肉桂各五分右剉作一貼薑三片水煎服(入門)○千金調經湯

治同上當歸川芎白芍藥各一錢麥門冬半夏各七分人參阿膠珠牡丹皮吳茱萸肉桂各五分甘草三分右剉服如上法(回春)

清熱調血湯治經水將來腹中陣痛乃氣血俱實也當歸川芎白芍藥生地黃條芩香附子各一錢白芍藥黃連香附子桃仁紅花蓬朮玄胡索牡丹皮各七分右剉作一貼水煎服(醫鑿)

清經四物湯治經水不及期而來乃血虛有熱當歸一錢半生地黃條芩香附子各一錢白芍藥黃連薏汁炒各八分川芎阿膠珠黃柏知母各五分艾葉甘草各三分右剉作一貼煎服(醫鑿)

通經四物湯治經水過期不行乃血虛有寒當歸一錢半熟地黃白芍藥香附子蓬朮蘇木各一錢木通八分川芎肉桂甘草各五分紅花三分桃仁二十個右剉作一貼空心水煎服(醫鑿)

煮附丸治經候不調臍腹疼痛面色萎黃飲食減少或崩漏帶下香附子擦去毛好醋煮半日焙為末醋糊和丸梧子大米飲下五七十丸(綱目)○一名香附丸又名醋附丸治婢妾氣鬱經多不調

墨附丸治婦人經水不調久無子四製香附子一斤淨熟艾四兩用醋一碗煮至乾入石臼內搗爛捏作餅子於新瓦上焙乾入白茯苓當歸人參川芎熟地黃京墨火煨紅醋淬各一兩木香五錢右為末糊和丸梧子大溫酒吞下七八十丸(入門)

四製香附丸治月候不調能調和經脈香附米一斤分作四製○一用鹽水加薑汁浸煮略炒主降痰○一用米醋浸煮略炒主補血○一用山梔仁四兩同炒去梔主散鬱○一用童便洗過不炒

主降火○右為末入川芎當歸各二兩同為末酒麵糊和丸梧子大每五七十丸醋證作湯使吞下(種杏)○入門香附米一斤四包用酒醋童便鹽水各浸七日焙乾搗末醋糊和丸鹽酒吞下

七製香附丸治月候不調結成癥瘕或骨蒸發熱香附米十四兩分七包○一包同當歸二兩酒浸○二包同蓬朮一兩童便浸○三包同杜丹皮艾葉各一兩米泔浸○四包同烏藥二兩米泔浸

○五包同川芎玄胡索各一兩水浸○六包同三稜柴胡各一兩醋浸○七包同紅花烏梅各一兩鹽水浸○右各浸春五夏三秋七冬十日晒乾只取香附為末以浸藥水打糊和丸梧子大臨臥酒下八

十九(入門)

入門

血

月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡於胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也(內經)○小腸移熱於大腸為伏瘕為沈註曰血調不利則月事沈滯而不行(內經)○經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月蓋衝任為經絡之海與手大腸小腸手少陰心為表裏衝任氣盛則血依時下若憂思傷心則不能生血脾者心之子脾失所養則食少絕生化之源經閉不調矣須知心為氣血之主脾胃為氣血之本也(入門)○經閉不行有三一者胃弱形瘦氣血衰津液不生而致經水斷絕名曰血枯經絕此中焦胃熱結也○二者心已脈數時見躁作大小便不利而經水閉絕乃血海乾枯此下焦胞脈熱結也○者或因勞心心火上上行月事不來者胞脈閉也此上焦心肝熱結也(東垣)○世有室女童男積想在心思慮過度多致勞損男子則神色先散女子則月水先閉蓋憂愁思慮則傷心而逆竭故神色先散月水先閉且心病不能養脾故不嗜食脾虛則金虧故發嗽矣(良方)

通血治

胞脈閉月事不來先服降心火之劑宜三和湯玉燭散(方見虛勞)後以衛生湯補脾養血○二陽之病月事不來先瀉心火血自下亦用上藥(潔古)○氣上迫肺月事不來宜導

痰降火則心氣下通而月事來宜通經湯(丹心)○先賢治血閉之法皆主於補血瀉火補血者四物湯瀉火者調胃承氣湯即玉燭散也(綱目)○胃弱血枯經斷宜補中益氣湯(方見內傷)加川芎生

地黃天花粉○正半產後失血多經閉宜十全大補湯(方見虛勞)○入門○淫痰黏住經閉者導痰湯(方見痰飲)加川芎當歸黃連不可服地黃(入門)○室女勞心血閉宜栝子仁丸澤蘭湯(良方)

○氣血盛實經血退閉者宜萬痛丸血極膏(入門)○血海疼痛宜烏藥湯(東垣)血閉通用增味四物湯導經丸瑞金散六合湯○脾胃鬱火耗血不通宜歸脾湯(方見神方)肝脾鬱怒血傷不通宜加味歸脾湯(良方)

(良方)

三和湯 治熱結血閉生乾地黃白芍藥川芎當歸連翹大黃朴硝薄荷黃芩梔子甘草各七
分右到作一貼水煎服(丹心)○此方乃集四物湯調胃承氣湯涼膈散三方也

玉燭散 治月候凝滯不通漸成癥瘕當歸白芍藥川芎熟地黃大黃芒
硝甘草各一錢右到作一貼水煎服大便泄者不可用(丹心)

衛生湯 補脾養血黃芪二錢常歸白芍藥甘草
各一錢右到作一貼水煎服(元素)

通經湯 治月閉當歸川芎白芍藥生乾地黃大黃官桂厚朴枳殼枳實黃芩蘇木紅花各七分右到作一
貼入烏梅一個薑三片棗二枚水煎服(醫鑑)○心氣不得下通故月事不來宜用黃連厚朴之

類導痰降火則月事來矣
此藥是也宜加黃連七分

栝子仁丸

治勞心月閉澤蘭二兩栝子仁炒別研牛膝酒焙菴栝
各一兩右爲末蜜丸栝子大空心米飲下五七十九

澤蘭湯

治同上澤蘭葉二錢當歸白芍藥炒甘
草各一錢右剉作一貼水煎服(良方)

菴痛丸

治月經瘀閉臍腹疼痛乾漆碎炒令烟盡牛膝酒浸一宿焙乾各一兩右爲末入生地黃汁一
升盛銀器內慢火熬成膏丸如栝子大每服二三十丸空心米飲下(拔粹)○一名萬病丸

血極膏

治月閉不通大黃爲末醋熬成膏丸如雞頭大二云雞子黃大每一丸熱酒和開瀉臥溫服大便
利一二行紅脈自下是婦人之仙藥也加當歸頭一名單大黃膏(謙甫)○一方治月閉不通

服補藥無效危篤者大黃酒蒸九次曬四兩血竭沒藥
各五錢右末水丸以四物湯煎水下七八十九(醫鑑)

烏藥湯

治婦人血而疼痛香附子二錢烏藥一錢半當
歸一錢木香甘草各五分右剉水煎服(東垣)

導經丸

治經閉不通腰腹疼痛大黃二兩當歸川芎白芍藥官桂桃仁甘草各一兩血竭
二錢半紅花一錢斑貓糯米同炒二十個右末蜜丸栝子大酒下三十九(丹心)

瑞金散

治月經不行血氣凝滯痛黃一錢半牡丹皮蓬朮紅花當歸赤芍藥
川芎玄胡索官桂各七分右剉作一貼水一盞酒半盞煎服(丹心)

六合湯

治月經不行結塊疼痛四物湯加
蓬朮官桂各等分對煎服(丹心)

加味歸脾湯

治肝脾怒鬱月經不通即歸脾湯加柴胡
山梔仁各一錢右剉水煎服之(良方)

室女月經不行

女子十四歲前任脈盛而血自下若過期不通則宜紅花當歸散血極膏(方見上)三
神丸牡丹皮湯通經丸或四物湯(方見血門)加蓬朮桃仁牡丹皮玄胡索紅花酒焙

紅花當歸散

治室女月經不通或積瘀血腰腹疼痛赤芍藥二兩劉寄奴一兩二錢半紫葳當歸尾牛膝
蘇木甘草各五白芷桂心紅花各三錢半右爲末酒調二錢服紅花酒下尤佳(雲岐)

三神丸

治室女經候不調腹痛橘紅二兩玄胡索醋製當歸酒炒
各一兩右爲末酒糊和丸栝子大艾醋湯下百丸(丹心)

牡丹皮湯 治室女經閉咳嗽發熱當歸牡丹皮各一錢半白芍藥生乾地黃陳皮白朮香附子各一錢川芎柴胡黃芩各七分甘草四分右剉作一貼水煎服之(回春)

通經丸 治室女月候不通或成血瘕桂心青皮大黃乾薑川椒蓬朮乾漆炒當歸桃仁紅花各五錢右爲細末先取二兩和醋熬膏乃入餘末和勻作丸梧子大醋湯下五七十九(入門)

血結成瘕 衝脈任脈皆起於胞中爲血之海血凝不行則成瘕作痛○任脈爲病男子爲七病女子爲瘕聚(難經)○月事不行血結成瘕宜歸朮破癭湯增味四物湯四物調經湯立效散地黃通經丸無

極丸桃仁煎

歸朮破癭湯 治月經不通腹中有積塊疼痛香附子醋炒一錢半三稜蓬朮並醋煮赤芍藥白芍藥當歸尾青皮各一錢烏藥七分紅花蘇木官桂各五分右剉作一貼入酒少許煎服(集略)

增味四物湯 治血瘕疼痛四物湯料入三稜蓬朮並醋炒乾漆炒官桂各一錢右剉煎服(車垣)

四物調經湯 治經閉有積塊動痛香附醋炒一錢當歸川芎白芍藥酒炒柴胡黃芩枳殼各七分熟地黃陳皮白朮三稜蓬朮並醋炒白芷茴香鹽水炒玄胡索各五分青皮縮砂紅花甘草各三分

右剉作一貼入生薑三片蔥白三莖水煎服(回春)

立效散 治經年積血腹中常痛青皮陳皮烏藥乾薑香附子蓬朮三稜各等分右剉醋煮焙乾爲末空腹陳皮煎湯調下二錢(濟陰)

地黃通經丸 治血瘕如盃在臍下作痛熟地黃二兩蠶蟲炒水蛭糯米同炒去米陳仁各五十個右爲末蜜丸梧子大空心溫酒下七八十九(正傳)

無極丸 治經閉有血塊苦痛錦紋大黃四兩一兩酒煮一兩醋煮一兩重便煮一兩鹽水煮各七次有合一處又七蒸七曬爲末用當歸熟地黃各一兩半濃煎汁煮糊和丸梧子大紅花湯下三十九(鑿)

鑿)

千金桃仁煎 治血瘕血經候不通桃仁大黃朴硝各二兩蠶蟲五錢右爲末好醋二升半銀石器中慢火煎取一升半下桃仁大黃蠶蟲攪十下次下朴硝更熟攪良久出之丸如梧子大前一日

不吃晚飯五更初溫酒下五丸取下惡物未下再服見鮮血即止藥(良方)

血枯 黃帝曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先開腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名爲何何以得之岐伯曰病名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不

來也治之以烏賊丸(內經)○治血枯宜烏賊骨丸八物湯(方見虛勞)○良方

烏賊骨丸 烏賊骨、芎藭、芍藥、各等分、右爲末、雀卵不拘數和丸、小豆大、每十九煎、鮑魚湯吞下、日三服、壓以善鑊(良方)○血枯經閉四物湯(方見血門)加桃仁紅花(丹心)

血崩血漏 內經曰陰虛陽搏謂之崩註曰陰脈不足陽脈盛搏則內崩而血流下也○悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數溲血也(丹心)○蓋悲哀則心系急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故胞絡絕而陽氣內鼓動發則心下崩數溲血也心下崩謂心內崩而下血也(入門)○非時血下淋瀝不止謂之漏下忽然暴下若山崩然謂之崩中(入門)○崩漏不止有三一

者脾胃虛損下陷於腎與相火相合溼熱下迫經漏不止其色紫黑如夏月腐肉之臭中有白帶脈沈細疾數或沈弦洪大其熱明矣或腰痛或臍下痛宜大補脾胃而升舉血氣○二者或故貴勢或先富後貧心氣不足其火大熾旺於血脈之中又飲食失節其容顏似不病者此心病者不行於診其經水不時而下或適來適斷或暴下不止皆先說惡死之言令心不動以大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥補陰瀉陽經自止矣○二者悲哀太甚則胞絡絕云云見上(東垣)

崩漏治法 血崩乃經血錯亂滲溢妄行遽止則便有積瘀凝成窠臼不止則又恐昏暈必先服五靈脂末(獨行散)一錢溫酒調下其性能行血止血然後用五積散(方見寒門)加防風荆芥入醋煎服一二貼後再服五靈脂散去故生新如更不止乃用五灰散十灰丸(方見血門)○悲哀太甚而崩漏宜歸金散四製香附丸(方見上)○經行犯房損傷衝任經血暴下宜溫經湯(方見上)○溼熱下迫而爲崩漏其色紫黑臭臭宜解毒四物湯涼血地黃湯固經丸○憂鬱及先富後貧而爲崩漏宜開鬱四物湯○胃氣下陷經水暴下宜升陽調經湯益胃升陽湯(方見內傷)升陽除濕湯柴胡調經湯

(已上入門)○血崩急則治其標白芨湯調百草霜末服甚者棕櫚灰或狗頭骨灰或五靈脂半生半炒末俱以酒調服後用四物湯加芩連參芪香附乾薑調理(丹心)○婦人四十以上悲哀太甚血走而崩慎不可服燥熱之藥先用黃連解毒湯(方見寒門)後以三和湯(方見上調治醫鑿)○室女思男以致血崩成勞十分難治宜四物湯加柴胡黃芩或加味逍遙散(方見婦人入門)○凡崩漏有

寒伏龍肝散丁香膠艾湯有熱涼血地黃湯解毒四物湯通用當歸芍藥湯奇效四物湯煮附丸(方見上)○四物湯加荆芥條芩止血神效(正傳)○黑藥能止血宜五灰散十灰丸(並見血門)如聖

散立效散○崩漏過多昏暈宜生地
苓連湯方見血門全生活血湯

備金散治血崩不止香附子炒黑四兩當歸尾一兩二錢五靈脂炒一兩右爲末每二錢醋湯調空心服○一名備金散綱目入門

解毒四物湯治崩漏面黃腹痛黃芩黃連黃柏梔子生乾地黃當歸白芍藥川芎各一錢右剉作一貼水煎服入門○此方乃黃連解毒湯與四物湯合劑也

涼血地黃湯治血崩是腎水陰虛不能鎮守包絡相火故血走而崩光活防風柴胡各一錢生地黃當歸各五分知母黃柏荆芥細辛蔓荊子黃芩川芎藥本黃連升麻甘草各三分紅花一分右剉

作一貼水煎服之入門

固經丸治經水過多黃芩白朮龜版各一兩椿根白皮七錢黃柏炒三錢香附子童便浸焙二錢半右爲末酒糊和丸梧子大白湯下五七十九入門

開鬱四物湯治崩漏多因心氣所使而下故貴輕勢先富後貧皆是也香附米炒當歸身白芍藥酒炒熟地黃白朮各一錢川芎黃芪蒲黃炒地榆人參各五錢升麻三分右剉作一貼煎服正傳

升陽調經湯治內傷中氣下陷暴崩不止柴胡羌活蒼朮黃芪各一錢當歸防風升麻各七分蔓荊子五分獨活三分右剉作一貼水煎服以飯壓之入門

益胃升陽湯治血塊暴下並水泄俱作是前後二陰有形血脫竭於下也血脫益氣古善人之法此陽生陰長之義也方見內傷

升陽除溼湯治崩漏不止因脾胃虛而心胞束之故血漏而下黃芪蒼朮羌活各一錢柴胡升麻防風藥本甘草炙各七分蔓荊子五分獨活當歸各三分右剉作一貼水煎服東垣

柴胡調經湯治同上蒼朮一錢半柴胡一錢羌活獨活藥本升麻各七分葛根當歸甘草各五分紅花二分右剉作一貼水煎服東垣

方乃大舉大升助春夏二溼之久陷下之至治也綱目

伏龍肝散治衝任經虛崩漏不止臍腹冷痛川芎艾葉各一錢半伏龍肝一錢赤石脂麥門冬各七分當歸乾薑熟地黃肉桂甘草各五分右剉作一貼入棗二枚煎服或爲末米飲調二錢服入門

丁香艾膠湯治崩漏不止間有如茅屋漏水或下白帶臍下如沐當歸一錢半生艾葉一錢二分阿膠珠七分川芎丁香各五分熟地黃白芍藥各四分右剉作一貼水煎服東垣

當歸芍藥湯 治經漏不止氣弱困倦此中氣虛弱下陷之甚者尤宜當歸芍藥各一錢半黃芩一錢陳皮熟地黃各五分炙甘草生地黃各三分柴胡二分右剉作一貼水煎服(東垣)

奇效四物湯 治血崩神效四物湯加阿膠珠艾葉黃芩共七錢右剉作一貼薑五片煎服(得效)

如聖散 止血崩棕櫚烏梅各一兩乾薑一兩半右並燒存性為末每二錢烏梅湯酒調下空心(丹心)

立效散 治血崩當歸蓮花藥白綿子紅花芽花各一兩右剉紙包鹽泥固濟火煨存性為末入麝香少許每二錢溫酒調下空心(東垣)

全牛活血湯 治崩漏太多昏胃不省眼目無所知覺蓋因血暴亡也血去則心神無所養暴損血豈能久活今當補而升舉之助其陽則目張神不昏迷矣今立一方補血養血生血益陽以補

手足厥陰之不足白芍藥升麻各一錢防風羌活獨活柴胡當歸身葛根甘草各七分藥本川芎各五分生地黃熟地黃各四分麩荊子細辛各三分紅花一分右剉作一貼水煎服(東垣)

赤白帶下 脾傳之腎病名曰疝瘕小腹寬然而痛出白一名曰蠱註曰出白者溲出白液也蓋白帶白濁之類也(內經)○任脈為病女子帶下瘕聚註曰任脈自胞上過帶脈貫於臍上故為帶下帶脈起

于季肋章門(穴名)似束帶狀今溼熱寬結不散故為病也寬者結也屈也屈滯而病熱不散也○赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本皆溼熱結于脈故津液滲溢是為赤白帶下臍下痛陰中綿綿而

下也(保命)○小腹寬熱結於任脈自胞上而過帶脈出於大小腸之分溲出白液淋瀝以下故曰帶下與赤白濁一般但不痛耳(入門)○婦人帶下是病一病令人不產育宜急治之扁鵲過邯鄲聞

貴婦人所以專為帶下醫也綱目○婦人帶下脈浮惡寒漏下者不治(脈經)

帶下治法 帶與漏俱是胃中痰積流下滲入膀胱出於大小腸宜升提之甚者上必用吐下用二陳湯(方見痰飲)加蒼白朮升麻柴胡或香稻糲皮丸丹心○婦人月事不調暮則發熱小腹裏急手掌

煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶下所以故曾經孕產瘀血在小腹不去何以知之其證唇乾燥故知之溫經湯(方見上)圭之(仲景)○帶下是濕熱為病赤屬血白屬氣主治燥濕為先(丹心)○赤

白帶宜伏龍肝散(方見上)苦練丸白芍藥散○肥人白帶是溼痰宜若栝糲皮丸瘦人是熱宜芩柏糲皮丸通補經固真湯白斂丸補宮丸四神丸清白散○久帶下陽氣虛極下流白滑如涕腥臭多

悲不樂宜酒蒸當歸丸真丸桂附湯(入門)○孕婦白帶宜芩朮糲皮丸○室女帶下宜琥珀朱砂丸○帶下必須斷厚味(入門)

蒼栢楞皮丸 治肥人白帶是濕痰者此黃栢楞根白皮海石半夏製南星炮川芎香附子乾薑各等分右為末醋糊和丸梧子大白湯下五七十九丸夏月去乾薑代滑石(入門)

苦練丸 治熱入大小腸為赤白帶下最妙苦練子碎酒浸茴香炒當歸各等分右為末酒糊和丸梧子大每取三五十九丸空心溫酒下(保命)

白芍藥散 治赤白帶久不止白芍藥二兩乾薑五錢右各炒黃色為末米飲調下二錢日二(綱目)

芩栢楞皮丸 治瘦人帶下是熱黃芩黃栢楞根白皮滑石川芎海石青蘆當歸白芍藥各等分右為末醋糊和丸梧子大白湯下五七十九丸(入門)

補經固真湯 治白帶脈訣曰崩中日久為白帶漏下多則骨木枯言始病血崩久則血少復亡其陽故白帶之物下流不止血海將枯乾薑細末人參各二錢郁李仁泥柴胡甘草炙陳皮不去白

黃芩生各一錢白葵花七朶右到黃芩以水二盞煎藥至一盞七分再入黃芩煎至一盞空心熱服以美膳壓之(東垣)

白斂丸 治衝任虛寒帶下純白鹿茸煨去毛醋蒸焙二兩白斂並毛狗脊各一兩右為末艾煎醋湯打糯米糊和丸梧子大空心溫酒下五七十九丸(得效)

補宮丸 治白帶及白淫鹿角霜白茯苓白芷白朮烏魚骨白散白芍藥杜蘅粉山藥各等分右為末糊丸梧子大每飲下五十九丸(丹心)

四神丸 治白帶香附米八兩以酒醋鹽水童便各浸二兩過三日乃出炒蒼朮四兩米泔浸杜蘅粉炒細砂炒樺根白皮蜜水炒各二兩右為末以黃米蒸飯和丸梧子大空心酒下五七十九丸(醫鑿)

清白散 治白帶常歸川芎白芍藥生地黃酒洗黃栢鹽水炒貝母樺根白皮酒炒各一錢乾薑炒黑甘草各五分右到作一貼薑三片水煎服(醫鑿)

酒煮當歸丸 治白帶長流不止腰以下如在冰雪中面白目青肌肉消瘦此上中下三陽真氣俱虛也當歸一兩良薑附子炮各七錢茴香五錢右到以好酒一盞半同煮至酒盡焙乾乃入炒黃鹽

全蝎各三錢柴胡二錢炙甘草川棘子丁香木香升麻各一錢玄胡索四錢右同為末酒糊和丸梧子大空心淡醋湯下五七十九丸(東垣)

固真丸 治白帶久不止脾胃冷痛乾薑四兩龍骨當歸各二兩柴胡白石膏脂各一兩黃栢白芍藥各五錢右為末糊和丸梧子大白湯下二三十丸以飯壓下(入門)

桂附湯 治白帶腥臭多悲不樂大寒之證子炮三錢肉桂一錢黃柏知母各五分右到作一貼水煎服(東垣)

苓朮樗皮

治孕婦白帶黃芥白朮各三錢樗根白皮白芍藥山茱萸各一錢半白芷黃連各二錢黃柏一錢右爲末酒糊和丸梧子大白湯下五十九孕婦帶下專是溼熱也(入門)

琥珀朱砂丸

治室女經水初下一時驚悸或感風冷以致經水止而卽患帶下琥珀木香當歸沒藥各四錢乳香一錢麝香朱砂各二分半右爲末水丸芡實大每一丸溫酒磨服(入門)

吐下療白帶

婦人病白帶如水漏下臭穢不可近戴人曰此帶濁水本熱乘太陽經其寒水不禁固故如此也夫水自高趨下宜先絕其上源乃以瓜蒂散涌痰二三升次日服導水丸下污水十餘行三遍汗出周身至明朝病人云汚已天下矣(用寒涼之藥服及半載生一男(子相))

一方名曰白芷丸治帶下腸有敗膿淋漓露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此爲敗膿血所致須以此排膿單葉紅蜀葵根二兩白芷一兩白芍藥白礬各五錢右爲末蠟丸梧子大空心米飲下十五丸(蘇木節代之)(入門)(本草)

五色帶下

五崩何等類師曰白崩者形如涕赤崩者形如絳黃崩者形如爛瓜青崩者形如藍色黑崩者形如衄血也(脈經)○五色帶下由傷肝則青如泥色傷心則赤如紅津傷肺則白如鼻涕傷脾則黃如爛瓜傷腎則黑如衄血(入門)○所下五色各應五藏五藏俱虛五色併下是皆血之爲病也(得效)○五色帶下宜胃風湯(方見大便)五積散(方見寒門)去麻黃加荊芥穗伏龍肝散(方見上)

溫清飲地榆散香附散

溫清飲

治崩漏不止五色相雜面黃腹痛寒熱往來一名解毒四物湯(方見上)

地榆散

治漏下五色黃瘦虛竭地榆三兩剉醋一升煮十餘沸空心熱服一合(入門)

香附散

治五色崩漏香附子去毛搗碎醋煮半日焙爲末每二錢米飲調下空心神效(本事)

寒入血室

月經不通達臍寒痲痛其脈沈緊此由寒氣客於血室血凝不行所以作痛宜桂枝桃仁湯

桂枝桃仁湯

桂枝芍藥生乾地黃酒洗各二錢甘草炙一錢桃仁三十個右剉作一貼入生薑三片棗二枚水煎溫服(丹心)○瑞金散亦良(方見上)

桂枝赤芍藥生乾地黃酒洗各二錢甘草炙一錢桃仁三十個右剉作一貼入生薑三片棗二枚水煎溫服(丹心)○瑞金散亦良(方見上)

桂枝赤芍藥生乾地黃酒洗各二錢甘草炙一錢桃仁三十個右剉作一貼入生薑三片棗二枚水煎溫服(丹心)○瑞金散亦良(方見上)

桂枝赤芍藥生乾地黃酒洗各二錢甘草炙一錢桃仁三十個右剉作一貼入生薑三片棗二枚水煎溫服(丹心)○瑞金散亦良(方見上)

桂枝赤芍藥生乾地黃酒洗各二錢甘草炙一錢桃仁三十個右剉作一貼入生薑三片棗二枚水煎溫服(丹心)○瑞金散亦良(方見上)

熱入血室

婦人傷寒發熱經水適來適斷晝日明了夜則譫語如見鬼狀此為熱入血室宜用柴胡破瘀湯或調經湯（仲景）

柴胡破瘀湯

治熱入血室及畜血證柴胡二錢黃芩半斤夏赤芍藥當歸生地黃各一錢桃仁五靈脂甘草各五分右剉作一貼水煎服（入門）

調經湯

治熱入血室柴胡生地黃各一錢半赤芍藥當歸黃芩各一錢半夏人參川芎甘草各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服（海藏）○此方乃小柴胡湯與四物湯合劑也

經斷復行

婦人四十九歲已後天癸當住每月却行或過多不止宜芩心九子芩丸常歸散加味四物湯（綱目）

芩心丸

治婦人天癸過後復行或漏下不止條黃芩二兩泔浸（一作醋浸）一日炙乾又浸又炙如此七次為末醋糊和丸梧子大每七十九丸空心溫酒送下日二服（瑞竹）

子芩丸

治同上條黃芩四兩剉醋浸透紙裏煨七次當歸酒洗香附米醋炒各二兩右為末醋糊和丸梧子大空心酒下五七十九丸（醫心方）

當歸散

治婦人天癸已過期經脈不勻或三四月不行或一月再至腰腹疼痛內經云七損八益謂女子七數盡而經不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛為善當歸川芎白芍藥炒條黃

芩炒各一兩白朮五錢右為末服二錢空心酒調下日二（本事）○良方有山茱萸一兩半

加味四物湯

治經斷後多年忽然再行遂成崩漏腹痛寒熱四物湯四錢加人參吳茱萸各一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服得效

單方九四十一種

伏龍肝

即龍心土也主婦人崩中帶下為止血之聖藥蓋燥可去濕也（湯液）○治血露蠶沙阿膠各一兩伏龍肝半兩同為末溫酒調下二錢（本草）

百草霜

治血崩○百草霜末二錢狗胆汁拌勻分作兩服以常歸酒調下（本草）

芒硝朴硝

並治月候不通血閉瘕瘕取末一錢醋湯下空心（本草）

乾地黃

治胞漏下血或煎服或丸服並佳（本草）

益母草 治赤白帶下花開時採搗爲末
空心酒調二錢日三服(本草)

蒲黃 止崩漏及赤白帶下炒取二
錢溫水調服或丸服(本草)

宮歸 主崩漏及月水不利煎服末服並佳(本草)○血積
當歸四錢乾漆三錢爲末蜜丸酒下十五丸(良方)

黃芩 下血閉治淋露下血(本草)○血崩黃芩爲
末二錢以燒稱鍾淬酒調下空心(良方)

芍藥 治血閉不通煎服末
丸服並佳(本草)

白芷 治崩漏及赤白帶下煎服末服皆佳(本草)○赤白帶白芷一兩
烏賊魚骨二個燒胎髮一團煨石爲末空心酒下二錢(良方)

酸漿草 治赤白帶下陰乾爲末
空心酒下二錢(本草)

地榆 主帶下十二病一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏墜六曰子門僻七曰合陰
腸患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定又治崩漏不

止煎服末服並佳(本草)○赤白帶骨立者地
榆一斤剉水熬成膏空心服二合日二(良方)

芎藭 治崩漏煎服末服並佳(本草)○治血崩取一兩剉酒五盞煎
至一盞去滓下生地黃汁一盞再煎二三沸分三服(良方)

艾葉 主崩漏及帶下煎服之○血崩熟艾鷄子大
阿膠珠五錢乾薑炮黑一錢同煎服(本草)

大蓀小蓀 並主崩漏及赤白帶搗取汁服(本草)血
崩取根五兩茅根三兩酒煮服(良方)

牡丹皮 主月經不通煎服
末服並佳(本草)

三稜 通月經破血癥煎服末
服丸服並佳(本草)

玄胡索

主月經不調崩中淋露煎服未服丸服並佳(本草)

大黃

主血閉脹及諸老血置結成(本草)

桑木耳

主月水不調崩中帶下月閉血凝酒煎服或燒為末酒服二錢(仁木耳亦同)(本草)

蕎麥麵

治赤白帶下不拘多少以雞子清和丸白湯空心下三五十丸即愈(回春)

榜根白皮

治崩漏及赤白帶取白根切一大握水一升煮分二服或為末蜜丸服亦佳(回春)

橡子

主崩中帶下燒灰和米飲服(取殼與若耳燒為末以加白芷乾薑炮四物湯調下(正傳)

棕櫚皮

治崩漏帶下燒灰與白礬枯為末酒服一錢又與絲瓜燒灰等分為末鹽湯調下(本草)

牡蠣

治崩漏及赤白帶下取粉湯調作丸再煨研細却用艾醋湯熬膏和丸艾醋湯下五十九(綱目)

蠶屎

治漏下五色鼠瘦炙黃為末酒下錢又取蠶肉作羹常食之佳(本草)

蠶退紙

主崩漏帶下燒為末米飲調服(本草)

烏賊魚骨

治血枯又通月經療血崩血漏為末丸服或末服皆佳(本草)

鰾鱮魚

療婦人帶下百病作羹食或燒食皆佳(本草)

牡鼠屎

治室女月水不通燒灰為末酒下一錢神效勿令知(本草)

蠶絲

主室女月水不通逐瘀血散積血破血閉去翅足炒為末醋湯調下或丸服之(本草)

水蛭

治同上破血最良須切斷同石灰再
三炒爲末或未服或丸服(本草)

五靈脂

行經血有功治血崩不止及赤白帶下
生半炒爲末酒下一錢或丸服之(丹心)

荆芥穗

治崩漏不止燒存性爲末
每二錢童尿調下(良方)

蜀葵花

赤花治赤帶白花治白帶爲末温酒下二錢
單葉紅蜀葵根治帶下排膿血極驗(本草)

水芹

療崩漏帶下作鹽豉或
煮或生食並佳(本草)

鹿角膠

主崩漏赤白帶下炒爲末酒下
二錢或丸服或煎服良(本草)

鹿茸

治崩漏赤白帶下炙爲末酒服一錢或
丸服之(本草)○鹿角燒灰服亦佳

雀肉

治血崩帶下或燒食
或作煎食之(本草)

牛角總

止血崩不止及赤白帶下燒灰
酒下二錢或作丸服(本草)

黃狗頭骨

主崩漏及赤白帶下燒爲末酒下一錢或作丸服之○陰莖
及陰卵主帶下十二疾燒作末酒服一錢或丸服之(本草)

鍼灸法

月經不調取陰獨中極三陰交腎俞氣海(綱目)○月經斷絕取中極三陰交腎俞合谷四滿三里
(綱目)○崩漏不止取血海陰谷三陰交行間大衝中極(綱目)○赤白帶取中極腎俞氣海三陰

交章門行間

○赤白帶帶脈穴灸之奇一女患此灸此穴鬼附身云灸著我即去俄而卽差(資生)

斷久忽大崩下

門天樞中脘氣海(綱目)

蟲

東醫圖書集成醫部全錄卷三十一

二十一

三尸蟲

中黃經曰一者上虫居腦中二者中虫居明堂三者下虫居腹胃名曰彭蠡彭蠡也惡人進道喜人退志上田乃元神所居之宮惟人不能開此關彼尸虫居之故生死輪迴無有了期若能握元

神棲於本宮則尸虫自滅真息自定所謂一竅開而萬竅齊開大關通而百骸盡通則天眞降靈不神之神所以神也(養生書)

去三尸蟲丸

尺內瓜子汁三升復移一尺納大黃末三兩微火煎勿令焦丸如梧子大空心下一丸三日

濁血下鼻中三十日諸虫皆下五
十日百病皆愈而有光澤(得效)

又方

生漆二升蕪菁子三升爲末大黃六兩爲末酒一升半右以微火合煎令可丸丸如梧子大空心下二丸十日濁血下鼻中三十日虫皆爛下五十日身光澤一年行及奔馬(得效)

九蟲

諸虫皆因飲食不節或過癯胎生冷以致積久成熱濕熱熏蒸痰涎結隨五行之氣變化而爲諸般奇怪之形其名有九○一曰伏虫長四寸許爲諸虫之長(卽長虫也)二曰虺虫長尺許貫心卽殺

入(卽食虫也)三曰白虫長一寸母孳相生其形轉大而長亦能殺人(卽寸白虫)四曰肉虫狀如蠟杏令人心煩滿悶五曰肺虫其狀如蠶令人咳嗽六曰胃虫狀如蠟蟻令人嘔吐噦逆嗜雜愛吃泥炭

生米茶鹽薑椒等物七曰腸虫又名腸虫狀如瓜瓣令人多唾八曰赤虫狀如生肉令人腸鳴九曰燒虫狀如菜虫形至細微居腸多則爲痔劇則爲癰癩疥癩宜貫丸外臺)

貫衆丸

去三尸虫雷丸一兩半殺赤虫貫衆一兩二錢半殺伏尸虫狼牙殺胃虫白蠶蠶殺腸虫各一兩白養蘆殺尸虫乾漆殺白虫厚朴殺肺虫雄黃殺尸虫各七錢半右爲末蜜丸梧子大新汲水

下五丸三服後漸加至十九至二十日三尸虫盡滅而下(正傳)

五臟蟲

人勞則生熱熱則生虫心虫曰蠅脾虫曰寸白腎虫如方截絲縷肝虫如爛杏肺虫如蠶皆能殺人惟肺虫爲急肺虫居肺葉內蝕肺系故成癆疾咯血聲嘶藥所不到爲難治也(千金)○宜服蠟瓜

散(方見下)

溼熱生蟲

溼熱鬱積則生虫藏府虛則侵他(丹心)○溼熱生虫正如今人俗驗禾苗雨酒日照禾節生虫此說明矣人患虫積者或飢餓失攝或腥膻白酒或炙食牛羊或啖菓籃中皖氣屬濕熱少運故

生寸白蠅蠟諸虫形如蚯蚓又相以團魚曰血髓小兒最多(回春)

脈法

關上脈緊而滑者蛔毒○脈沉而滑者寸白虫○關上脈微浮積熱在胃中嘔吐蛔虫心健忘(脈經)諸虫脈沉實者生虛大者死○尺脈沉而滑者為寸白虫○虫脈常沉弱而弦今反洪大即知蛔蟲甚也(正傳)○勞瘵脈數或澹細加潮汗發血肉脫者死(回春)○蠱蝕除肛脈虛小者生勁急者死(正傳)

蟲外候

肘後脈以下三四寸熱者腸中有虫○胃中有熱則蟲動虫動則胃緩胃緩則廉泉開故涎下(靈樞)○凡蟲痛之證腹中有塊起以手按之不見鍾聚往來痛無休止五更心嘈牙關強硬嘔吐涎沫或吐清水夢中喘齒面青黃飲食難多不生肌膚(得效)○凡蟲證眼眶鼻下青黑面色萎黃險上有幾條血絲如蟹爪分明○面上白斑唇紅能食心嘈顏色不常臉上有蟹爪路者便有蟲也(入門)蟲痛之證時作時止痛則咬心吐清水人中鼻唇時時青黑者是也○腹痛肚大青筋者蟲痛也(醫案)○小兒腹痛口中出清水者蟲痛也(回春)○三蟲之證皆口流涎也(綱目)

諸物變蟲

山澗中蛇蝎水蛭遺精誤飲其水或果菰蕪菜蟲聚其下人誤食之則心腹刺痛時作時止諸藥不效宜雄砂丸(入門)○夜間飲水誤吞水蛭而入腹能食人肝血腹痛不可忍而目黃瘦全不以田中冷水吞下十九須臾大小蛭皆出却以四物湯(方見血門)加黃芪煎服調補(得效)○李道念有疾褚澄診之曰非冷非熱當是食白淪雞子過多所致取蒜一升煮食之吐一物大如升涎裏之開看則是雞雛羽翅爪足皆具既而病差(本草)○一人患腰痛牽心每至輒氣欲絕徐文伯視之曰此髮癭也以油投之即吐物如髮稍引之長三尺頭已成蛇能動掛門下滴盡惟一髮而已○一道人心腹煩滿瀰二葉孰立言診曰腹有蟲誤食髮而然令何雖黃一劑少頃吐一蛇無目燒之有髮氣乃愈(醫說)○春秋二時蛟龍帶精入芹菜中人偶食之得病發則似癩手足青腹滿痛不可忍取寒食餅(云餉糖)三升日三服遂吐出蛟龍有兩頭三五枚乃差(仲景)○誤飲蛇交水成腹脹滿痛

雄黃服之(入門)○通用七

轉靈應丹(方見下)萬應丸

雄砂丸

善殺諸蟲貫衆礮石榴皮各五錢鶴虱蕪荑乾漆白蠟謹各三錢朱砂雄黃雷丸甘遂各一錢半右為末米粉煮糊和丸麻子大每十九五更時粥飲下加麝香少許尤佳(入門)

萬應丸

善下諸蟲大黃八兩檳榔五兩黑牽牛頭末四兩並為末以皂角十錠若棟根皮一斤同煎汁熬膏和丸梧子大先用沉香末為衣次用雷丸末為衣又用木香末為衣五更時以砂糖水吞下二

丸(入)

蛔厥吐蟲 心痛靜而復煩須臾復止得食而嘔又煩吐蛔蟲為蛔厥○蛔厥者當吐蛔病者靜而復時煩此為癰寒蛔上入膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蛔聞食臭出其人當自吐蛔烏梅丸主之○

病人有寒復發汗胃中冷必吐蛔先用理中湯(方見寒面)入烏梅三個煎服次服烏梅丸(仲景)○蛔厥者胃寒所生經曰蛔者長蟲也胃中冷則吐蛔不可用冷藥宜理中湯加炒川椒檳榔煎水吞下

烏梅丸最效(丹心)○經云蟲貫心則殺人欲驗之心腹大痛不可忍或吐青汁黃綠水出涎津或吐蟲出發有休止宜蕪荑散化蟲丸(得效)○小兒蟲痛欲絕宜靈馨散(回春)○蛔厥心痛宜安蟲散

化蟲散追蟲取積散蟲不療則子母相生無有休止○小兒口鼻中出黑色蟲不治(得效)

烏梅丸 治蛔厥心痛烏梅十五個黃連七錢半當歸川椒細辛附子炮桂心人參黃栢各三錢右為末醋浸烏梅取肉和藥末搗極細勻丸如梧子米飲下一二十九丸(得效)

蕪荑散 治蛔絞心痛蕪荑雷丸各五錢乾漆炒烟盡一錢右為末溫水調二錢服小兒調半錢(得效)

化蟲丸 治蛔厥心痛胡粉炒白礬半生手枯檳榔苦楝根各五錢鶴虱三錢右為末麪糊和丸梧子大者二九小兒五丸以淡米飲入香油二三點攪勻吞下蟲小者化為水大者自下(局方)

化蟲散 治蛔厥心痛口流涎雷丸二個檳榔二個鶴虱二錢使君子肉七個右為末入輕粉一字分作兩服當晚取猪肉一兩切片以皂角汁浸一宿至曉微火炙熟又以香油塗肉取一服藥末移肉

上空心咽下至午間蟲自下(得效)

靈變散 治小兒蛔厥心痛五靈脂二錢枯白礬五分右為末每二錢水煎服當吐蟲即止(醫鑿)

安蟲散 治蟲痛右以化蟲丸材為細末每一錢米飲調下(局方)

追蟲取積散 治蟲積蕪荑雷丸錫灰使君子檳榔黑牽牛子頭末大黃鶴虱木香各等右為末蜜丸麻子大茶清下二三十丸或為末以蜜水或砂糖水調一匙服(醫鑿)

溫胃安蟲 一女患惡心吐蟲累治不差每用殺蟲藥則吐愈多孫兆診之曰六脈皆細非蟲脈也乃臟寒而蟲不安因而吐出復用殺蟲藥蟲為藥所苦不能自安所以吐愈多也取硫黃附子炮各一

兩為末米糊和丸麻子大米飲下三十丸遂不吐後不復作(綱目)

酒蟲心痛

楊仲臣病心痛此人常好飲酒初飲二三盃必奔走頓兩足三五六次其酒稍散方能復席飲至前量一醉必五七次至明啣青黃水數日後變魚腥臭六七日始安戴人曰酒蟲也宜涌之

乃吐蟲一條赤黃色長六七寸口目鼻皆全狀如蛇其疾即愈(子和)

寸白蟲

寸白蟲色白形扁居腸胃中時或自下乏人筋力耗人精氣宜碧金散

碧金散

治寸白蟲苦棟根一兩鶴虱檳榔使君子肉青黛各五錢麝香二錢半右爲末大人一錢小半錢空心以猪肉煮湯調下(得效)

一方

療寸白蟲錫灰蕪荑檳榔爲末每二錢空心取米飲調下極佳○予每覺心中多嘈雜疑是蟲淺服此藥翌日下寸白一囊中有長蟲二條長二尺五寸一則皆寸斷矣(本事方)

又方

下寸白蟲當晚勿食飯五更空心時取東引石榴根皮一握濃煎湯調檳榔末一錢先取炙猪肉一塊細嚼嚥汁去肉却取藥頓服午間蟲盡下(得效)

應聲蟲

人每言語時喉中有物作聲相應名曰應聲蟲昔有人患此病醫者教誦本草隨物皆應至雷丸則無聲遂服數丸而愈(入門)○腹中有物作聲隨人言語名曰應聲蟲用扳藍汁一盞分三次服之

即愈(得效方)

狐惑蟲

見傷寒門

消渴有蟲

見消渴門

痔瘻有蟲

見後陰門

諸瘡有蟲

見諸瘡門

齒痛有蟲

見牙齦門

勞瘵蟲

勞瘵又名傳尸病人死後復易家親一人故曰傳尸亦名傳疰其病自上注下與前人相似故曰疰有屏傳服傳食傳之異死後又傳易傍人乃至滅門是也(綱目)○瘵蟲之形或以繞蠅或似紅絲

馬尾或似蝦蟇或似刺蝟或似鼠形或似蠟鈔或有足無頭或有頭無足或化精血歸於元陽之內種
種形狀實難辨之若傳至三人則如人形如鬼狀(得效)○瘵疾之因多有少年時血氣未定酒色傷
損其熱毒鬱積生異物惡蟲蝕人臟腑精血變生諸般奇怪之物其侍奉之人垂陶日久受其惡氣
多遺傳染是以氣虛腹脹最不可入勞瘵之門弔喪掛疾衣服器用中皆能乘虛而染觸焉(直指)

驗瘵法

勞瘵傳尸皆有蟲先將安息香令烟出病人吸之不嗽非傳尸也若烟入咳嗽不止乃傳尸也宜服
太乙明月丹(方見下)○又法用乳香燒熏病人之手乃仰手掌以扇覆其上熏良久手背二出平

長寸許白而黃者可治紅者稍難青黑者死最
驗若瘵之良久無毛者即非此證也(綱目)

勞瘵病證

瘵有六證潮熱盜汗咯血痰嗽遺精泄瀉也輕者六證間作重者六證兼作蓋火炎於上則為潮
熱咯血火動於下則為遺精泄瀉(入門)○瘵病初得半臥半起號為瘵瘵氣急痰嗽名曰肺痿

骨蒸中熱釋為骨蒸內傳五臟名為復速因虛損而得名為勞瘵男子自腎傳心心傳肺肺傳肝肝傳
脾女人自心傳肺肺傳肝肝傳脾脾傳腎腎傳盡則死(入門)○病證大槩令人寒熱盜汗夢與鬼交遺

精白濁髮乾面聾或腹中有塊或腦後兩邊有小結核心胸滿悶肩背疼痛兩目不明四肢無力膝股
痠疼多臥少起狀如佯病每至平旦精神尚好日午向後四肢微熱而無顏色喜見人過常懷忿怒行

立脚脚睡臥不安夢見先亡或多驚悸有時咳嗽痰涎稠黏或咯膿血如肺痿狀或時下痢羸瘵困乏
口燥鼻乾臉紅唇赤雖思飲食不能多餐死在須臾精神尚好猶若瀾魚不覺死矣(得效)○勞瘵主

陰虛蓋自子至巳屬陽自午至亥屬陰陰虛則熱在午後子前寤屬陽瘵屬陰陰
虛則汗從窠時盜出也升屬陽降屬陰陰虛則痰涎上逆而連綿吐出也(丹心)

瘵不治證

身瘦厲火因火燒燥也肉脫盡者難治(丹心)○瘵疾至於骨痛骨疼聲沉聲啞
色枯而驚斷不可治(直指)○勞瘵咽喉失音者死虛勞泄不止者亦死(入門)

殺諸蟲服藥法

道藏經中載諸蟲頭者向下行至初一日至初五日以前頭上行故服藥多取月朧以前蓋
為此也(綱目)○上半月蟲頭向上易治下半月蟲頭向下難治先以肉汁及糖蜜食下引

蟲頭向上然後用藥打出(得效)○瘵蟲靈異所用藥物永不得與病人知之(直指)○三尸九蟲種
種靈異用藥及灸莫令病人知之恐蟲覺悟永難取下也蓋此蟲性已通靈務宜精審勿令有悟可也

(得效)○凡服取蟲藥前日勿食晚飯明朝極
飢時先嚼燒肥肉一片嚥汁後乃服藥(綱目)

治諸蟲藥

凡取蟲作藥之法禁聲勿語道作藥則蟲便不驗(本草)○諸蟲在人腹中子母相生漸至滋盛
當破積殺蟲宜木香三稜散下虫散追虫取神散(方見上)妙應丸七轉靈應丹萬應丸(方見

當破積殺蟲宜木香三稜散下虫散追虫取神散(方見上)妙應丸七轉靈應丹萬應丸(方見

上) 遇仙丹追蟲丸萬病解毒丹(方見解毒)五仙丸○治察之法一則殺其蟲以絕其根本一則補其虛以復其真元若病勢已劇元氣已脫雖依法取蟲亦無一生只可絕後人之傳注耳(正傳)○勞瘵至陰虛痰與血病四物湯(方見血門)加炒黃柏竹瀝重便薑汁(丹心)○勞瘵傷尸寒熱交攻久嗽咯血日漸羸瘦先服三拗湯(方見咳嗽)次與蓮心散萬不失一(丹心)○勞瘵殺蟲宜太乙明月丹天靈蓋散紫金錠子五枝散神授散○勞瘵補虛宜瓊玉膏茶河車丸凝神飲子(入門)○古人云勞瘵三十六種惟陰德可以斷之人患此疾或入山林或居靜室清心靜坐叩齒焚香節食斷慾專意深養庶乎可免若不遵此禁忌雖服藥無效(入門)○勞瘵傷尸之疾靈治之藥非一而鮮有驗者惟取末後死者焚之可以無傳矣(其類)

木香三稜散

治腹中有虫而色萎黃黑赤牛子半生半炒取頭末五錢大黃三錢大腹子檳榔雷丸錫灰醋炒三稜煨蓬朮煨木香各二錢右爲末每三錢空心蜜水調下先嚼肉汁乃服藥(瑞芝)

下蟲散

治腹內諸虫使君子肉檳榔各一錢大黃五分右爲末以苦楝根煎湯調下(醫案)

妙應丸

治虫積檳榔一兩二錢黑牽牛頭末三錢大黃雷丸錫灰蘇莢木香使君子各一錢右爲末用葱白煎湯露一宿和丸粟米大每四錢五更葱湯吞下取寸白虫以石榴根皮煎湯下小兒服一錢

或五分天明取下虫物此藥不動真氣有虫即下虫有積即下積有氣即消氣一服見效(入門)

七轉靈應丹

治諸般虫積即妙應丸除使君子一味也服如上法(丹心)

遇仙丹

治虫積黑牽牛子半生半炒取頭末四兩三錢蓬朮茵陳檳榔俱生用各五錢右爲末無藥末四兩白麪一兩皂角五錢浸揉汁蒸糊和丸梧子大每三錢五更茶清送下病淺者一服見效病深

者再服必候惡物下盡爲度所下之虫曰浮心虫曰血虛虫曰傷尸虫曰肺虫曰疾心虫曰馬尾虫曰積血虫曰細虫長虫寸白虫其狀不一或作五色或如魚凍此乃王經路赴廣東得沾山嵐瘴氣肚腹

脹滿百藥無效偶得一道人付此藥服之下虫一條狀如蛇長三寸餘病乃愈(醫案)

追蟲丸

下虫積黑牽牛子頭末一兩大黃三錢使君子肉二錢木香檳榔蘇莢錫灰各一錢二分右爲末先將皂角與苦楝根皮濃煎二大碗熬成膏和丸梧子大將沉香末爲衣又以雷丸末爲衣每五

十九空心砂糖水下下虫乃愈(回春)

五仙丸

治諸虫如神大黃四兩皂角雷丸苦楝根各一两木香二錢右為末酒糊和丸梧子大茶清下三四十九回春

蓮心散

治勞瘵當歸黃芪甘草鹽甲醋炙前胡柴胡獨活羌活防風防己茯苓半夏黃芩陳皮阿膠珠官桂芍藥麻黃不去根節杏仁蓮花藥兩星川芎枳殼各五分芫花醋炒黑色一撮右剉作一貼薑

三片棗二枚水煎服須待吐有異物芫花漸減少蓋芫花反甘草所以殺虫炒之所以斷熱去寒妙在此處丹心

太乙明月丹

治傳尸勞瘵更尿二兩天靈蓋蘇炙鹽甲酥炙各一两雄黃木香各五錢輕粉二錢半右為末以好酒一升大黃末半兩熬膏和丸彈子大朱砂為衣五更初重便和酒化一丸服勿令

人知必吐虫物未效次日再服
(綱目)○得效方名雄黃丸

紫金錠

治傳尸勞瘵○一女久患勞瘵為尸虫所噬磨一錠服之一時吐下小虫十餘條後服蘇台香丸半月如常此藥廣施療病無不驗(入門)○一家兄弟五人並患傳尸勞已死者三人有方

士教令服紫金錠遂各服一錠一人下惡物如膿狀一人下死虫皆愈(醫鑿)○一名萬病解毒丹(方見解毒)

天靈蓋散

下瘵虫天靈蓋兩指大以檀香湯洗過酥炙檳榔五個阿魏甘遂麝香安息香各二錢朱砂一錢右為末每服三錢別以蘆白蘆白各十四莖青蒿二握甘草桃枝柳枝梅枝俱東引者各五

寸桑白皮石榴根皮各一片以童尿四升於磁器內文武火煎至一升分作二服每取一服調煎藥末五更初服男患女煎女患男煎服藥後如欲吐用白梅含之五更末須下勞虫或惡物黃水黑糞如未

下又進一服天明更進一服如瀉不止用龍骨黃連等分為末三錢白水調服白粥補之(入門)○有一婦人兩男子俱患勞瘵服此藥婦人下一虫如蜈蚣狀一男下赤小虫數十中有一虫色微紫大於

衆虫頭有細毛一男下一物如烏梅之狀撥之有足正賴蜘蛛(類聚)

五枝散

取下傳尸勞虫桃枝李枝梅枝桑枝石榴枝並取東向小枝各七莖長三寸青蒿一小握苦楝根七寸生藍青七葉蔥白連根洗七個切右以童尿二升半煎取其半去滓人安息香蘇台香川魏

各一錢煎至一盞濾清入朱砂雄黃雷丸枯白礬硫黃各半錢為末檳榔末一錢麝香二分半調和分作二服月初旬五更空心一服若未下早朝再服或吐或下虫物惡積如出大虫急用鐵鉗取烈火焚

之收入磁瓶中埋深山中病人衣服床席並皆火燒埋僻處(直指)

神授散 殺傳尸瘵虫紅椒二斤去子及合口者妙出汗右爲末每一錢（一作二錢）空心米湯調下如暈

遇一異人云勞氣已入藏令急服二斤其病當去如言服之幾盡大便出一虫狀如蛇遂愈後人服亦驗（得效）

瓊玉膏

治勞瘵滋血補氣固元氣之聖藥本方云以一料分十劑可救十人勞瘵正謂此也（方見身形）

紫河車丸

治傳尸勞瘵兩月皆可愈其餘勞怯一月半復紫河車焙乾一具鼈甲醋炙五錢桔梗胡黃連大黃苦參黃柏知母貝母敗鼓皮心人中白各二錢半草龍胆甘草各二錢犀角蓬朮芒硝各

一錢半辰砂一兩水飛石爲末蜜丸梧子大辰砂爲衣
溫酒下二三十丸腸熱食前服隔熱食後服（入門）

凝神飲子

治勞瘵寒熱自汗咯血瘦劇人參當歸白芍藥白茯苓黃芪白朮半夏麩五味子熟地黃蓮肉麥門冬桔梗甘草各七分右到作一貼入烏梅一紅棗二水煎服（得效）

辨瘵蟲形色

取下之後先看虫色自知輕重蓋虫先食藏府脂膏故其虫色白次食血肉故其虫色黃赤次食精髓故其虫紫色精髓盡故其虫黑色傳入腎中病人方思死其虫白色可三十日服補藥

其虫黃赤色可六十日服補藥其虫紫黑色此疾已極可百二十日服補藥十中可活一二〇云虫頭赤食人肉其病可治蟲頭白食人髓其病難治（得效）〇蟲皆青赤黃色可瘵黑色與白色乃食精

髓不可瘵也又云蟲紅色可治肚下黑色者難治肚下白色者萬不一差（聖效）〇瘵蟲皆黑則已入腎藏不可治（醫鑿）

諸蟲畏忌藥

凡蟲病忌用甘草蓋蟲聞甘則起聞酸則止（一作靜）聞苦則定聞辣則頭伏而下（入門）〇治蛔不可用甘草甜物蓋蛔得甘則動於上得酸則靜見苦則安得辛辣則頭伏於下（回春）

〇蛔聞酸則靜見苦則安（醫鑿）〇甘謂甘草飴糖蜂蜜砂糖之類酸謂醋烏梅石榴之類苦謂熊胆豬胆黃柏苦參之類辣謂芥子川椒生薑之類也

單方九四十二種

黃精

久服下三尸蟲或未服或丸服上尸好實百日下中尸好五味六十日下下尸好五色三十日下皆爛出（本草）

雷丸

殺三蟲及蛔蟲寸白蟲水浸去皮切焙爲末每一錢月初五更調米飲服之（本草）

天門冬 殺三尸蟲去伏尸末
服丸服並佳(本草)

胡粉 殺三蟲療尸蟲尤良○治寸白蟲取胡
粉炒一錢空心和醴中服大效(本草)

石硫黃 殺腹藏蟲金液丹服之
良(方見寒門○本草)

黑銕灰 治有積自吐蟲者取銕炒成灰同檳榔末米飲調下二錢○治寸白
蟲銕灰四錢空心先咽肥肉少許却以砂糖水調服蟲盡下(綱目)

白蠟 大殺瘵蟲可入丸散藥中用之○鷄子
炒白蠟膠酒糊丸服治寸白蟲(正傳)

石菖蒲 殺腹內諸蟲煎服末
服丸服並佳(本草)

薤苳根 下三蟲又治蛔蟲心痛取根煮汁作
糜食之又濃煎服一升大效(本草)

苦參 殺惡蟲酒漬
飲之(本草)

蕪荑 去三蟲逐寸白蟲能殺諸蟲取二兩和
麪炒黃色爲末米飲調二錢服(本草)

艾汁 殺蛔蟲取一升空心
飲當下蟲(本草)

青黛 殺惡蟲化爲水此是以藍葉
作靛者作末和水服(本草)

藍青汁 殺諸蟲折化爲水飲一升良○殺瘵蟲化爲水生藍青汁一大盞入雄黃枯
白礬安息香降真香末各半錢磨香一分研和月初五更空心調服(直指)

白衆 殺三蟲及寸白蟲空心煎
服或末服之良(本草)

狼牙 殺腹內一切蟲○殺寸白蟲取爲末蜜
丸麻子大空心米飲下一二錢(本草)

使君子 殺蟲治小兒蛔蟲尤良取七個火煨去皮空心熱水嚼下蟲盡出(回春)

葛薺 殺三蟲及蝨蟲止蟲痛煮取濃汁空心服一升蟲即下(本草)

鶴虱 殺五藏蟲殺蟲藥此爲最要又主麩繞蟲○蛔厥心痛取爲末蜜丸梧子大空心蜜湯下四五十丸○蟲痛取末二錢空心溫醋調下蟲當出(本草)○大腸蟲出不斷之復生鶴虱末水調服(得效)

生地黃 治蟲心痛搗取汁搜麩作饅餠或冷淘食之忌用鹽當利出蟲水差○一女患心痛氣垂絕作地黃冷淘食之使吐一物如蝦蟆狀其病頓愈(本事)

槐木耳 治蛔蟲心痛取槐上木耳燒存性爲末和水服若不止飲熱水一升蟲即下(本草)

川椒 殺瘵蟲及諸蟲煎服丸服皆佳(本草)○治瘵紅椒二分苦棟根一分作末丸服尸蟲盡從大便泄出煎服亦良(正傳)

乾漆 殺三蟲及傳尸勞蟲碎炒令中盡爲末蜜丸梧子大溫水下十五丸或爲末溫水調一錢服亦治蛔厥心痛(本草)

檳榔 殺三蟲伏尸及寸白諸蟲赤色味苦者殺蟲炮爲末每二錢空心以葱蜜湯調下即效(本草)

權實 去三蟲又治寸白蟲去殼常食七枚久則其蟲自下盡一斤乃塗根(回春)

苦棟根 殺諸蟲及蛔蟲寸白蟲○治五種蟲取根白皮爲末米飲下二錢(本草)○蛔厥心痛取白皮細切濃煎汁一盞徐徐飲之或以汁煮米作粥服之○下寸白蟲及諸蟲取白皮細切一兩入黑豆

二十粒水煎臨熟入砂糖二錢調服蟲即下(入門)

鰻魚 殺傳尸勞瘵蟲又諸蟲久病疲瘵人和五味煮熟常食之或曬乾炙之令香常食亦良○昔有女子病瘵家人取魚信中流之於江漁人取視猶活多煮此魚食之病愈遂爲漁人之妻(本草)

白頸蚯蚓 去三蟲伏尸殺長蟲蚘蟲取乾煮作末和米飲服或作汁服(本草)

金線蛙殺尸疰瘵蟲及蠅蟲或燒或煮常服之去毒

石榴東引根皮療蠅蟲寸白蟲取皮一握濃煎空心服諸蟲盡下(本草)

櫻桃棗行根療蠅蟲及寸白蟲濃煎空心服(本草)

桃華汁治三蟲除尸蟲搗葉取汁一升飲之(本草)

脂麻油殺一切蟲取油一合鷄子二個芒硝一兩攪勻服之蟲即下(種杏)

馬齒寬殺諸蟲及寸白蟲生搗絞汁服或煮熟和鹽醋空腹食之蟲自下(本草)

野鴨殺腹中一切蟲消十二種蟲煮熟食肉飲汁良(本草)

熊膽殺蟲又治蠅心痛取大豆許溫水和服(本草)

貓肝殺瘵蟲黑貓生取肝曬乾為末月首五更空心溫酒調服(直指)

啄木鳥殺瘵蟲啄木鳥一隻活取朱砂四兩為末精猪肉四兩細切拌勻喂禽一晝夜肉盡為度取禽以鹽泥固濟火煨一夜來日不見太陽取出不得打破埋入地中二尺許經一晝夜取出去鹽泥銀

石器內研為細末以好酒入麝香少許作一服調下置病者帳中緊閉候之其蟲必從口鼻中出急以鐵錐鉗入沸油中煎殺之(正傳)

童子尿治勞瘵取飲之極效古人云服涼藥百無一生飲溲尿萬無一死惟脾胃虛及氣血弱者必以滋補藥中量入以代降火之藥服時入薑汁或甘草末少許和服尤佳(入門)

獺肝治傳尸勞瘵沈頓羸瘵急取獺肝一具陰乾為末溫水調一錢日三服神效(本事)

獺爪療蟲居肺葉內蝕肺系故咯血聲嘶最難治細爪為末溫酒調下神效(本事)

針灸法

骨蒸傳尸勞瘵宜早灸崔氏四花穴（詳見鍼灸）晚則無及矣（入門）○瘵蟲居肺間蝕肺系故略

血聲嘶此所謂膏之上膏之下針之不到藥之不及宜早灸膏肓膈肺輪四花穴爲佳（入門）○治

勞瘵癸亥夜三更六神皆聚之時解去上體衣服於腰上兩傍微陷處謂之腰眼直身平立以筆點定

然後上床合面而臥每約小艾炷灸七壯蟲或吐出或瀉下卽安名曰遇仙灸（得效）○先一日點定

腰眼穴至半夜子時交癸亥日期便灸七壯或九壯或十一壯尤妙其蟲從大便出卽焚之（醫案）○

骨蒸勞瘵灸膏肓三里○勞瘵骨蒸或板齒乾燥大頸鳩尾各灸二七壯又膏肓膈肺四花大頸等穴

若灸之早百發百中○傳尸勞瘵涌泉鍼三分瀉六吸有血可治無血必危

豐隆治痰針入一寸瀉十吸丹田治氣喘針入三分補二呼（已上入門）

訂正東醫寶鑑內科篇卷之三終

訂正東醫寶鑑內景篇卷之四

御醫忠勤貞亮

聖功巨崇 祿大夫 陽平君 臣 許浚 奉

教撰

小便

小便原委

靈樞曰水穀者常並居胃中成精粕而俱下于大腸而成下焦滲而俱下濟泌別汁循下焦而滲入膀胱焉○內經註曰水液自通腸泌別汁滲入膀胱之中胞氣化之而為尿以泄出○難經

註曰水穀自小腸盛受於闔門以分別也其水則澹灌入於膀胱上口而為澹便詳此三說則小便之泌別之水液滲入膀胱以出者也內經曰飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱則小便又似水飲精微之氣上升脾肺運化而後成者也夫溲尿者水也水之下流其性則然也飲入於胃其精氣雖上升其本體固不能上升則豈可謂小便獨為氣化所成哉內經曰膀胱者津液藏焉氣化則能出矣且水者氣之子氣者水之母氣行則水行氣滯則水滯或者謂小便純由泌別不由運化蓋不明此理故也(東垣)

脬為尿器

膀胱雖曰津液之府至於受盛津液則又有脬而居膀胱之中焉故內經曰脬移熱於膀胱盛則於脬無由自出必因乎氣化而後能漸漬浸潤於胞外積於脬下之空處遂為尿以出於前陰也若曰脬下無空處則人尿急時至屢安能即出乎夫惟積滿脬下之空處而不可再容故急則至屢即出矣(東垣)

辦尿色

水液渾濁皆屬於熱○小便黃者小腹中有熱也○肝熱病者小便先黃○足陽明之脈病氣盛則尿色黃(內經)○恒證小便如黃柏汁(仲景)○小便有五色惟赤白色者多赤色多因酒得之白色乃下元虛冷(養生)○下焦無血小便澀數而黃

(正傳)○小便不禁赤者有熱白者氣虛(丹心)

脈法

少陰脈數婦人則陰中生疔男子則氣淋○腎脈滑實為寤瘕(仲景)○遺精白濁常驗於尺結扎與緊二證之的(脈訣)○便血則芤數則赤黃實脈癢閉熱在膀胱(脈訣)○兩尺脈洪數必便濁遺精

(正傳)○淋脈盛大而實者生虛細而澀者死(脈經)○癰病脈細不治(綱目)淋病之脈細數何妨少陰微者氣閉膀胱女人見之陰中生疔大實易愈虛澀則亡(醫鑑)

小便難外候 候其鼻頭色黃者小便必難(仲景)○候其鼻色黃者知其小便難也(正傳)

小便不利 陰虛則小便難(仲景)○小便澀者血因火燥下焦無血氣不得降而澀澀之令不行也宜補陰降火四物湯(方見血門)加知母黃柏(丹心)○下焦無血小便澀數而黃四物湯加知母黃柏

牛膝甘草梢(丹心)○小便難者出不快也經曰陽入陰分則膀胱熱而小便難惟陰分虛而陽熱乘之若小便黃赤則萬全木通散利之(入門)○小便數而不利者有三若大便澀瀉而津液澀少者一也宜利而已若熱搏下焦津液不能行者二也必澀瀉乃愈若脾胃氣澀不能通調水道下輸膀胱而化者三也可順氣分施化而出宜茯苓琥珀散(綱目)○上盛下虛小便赤澀或欲成淋宜清心蓮子

飲(方見消渴)導赤散(方見五藏)得效○腎虛小便數而澀如欲澀之狀宜平補丸(直指)

萬全木通散 治膀胱有熱小便難而黃滑石二錢木通赤茯苓車前子炒瞿麥各一錢右為末水煎服或取末三錢水調服(入門)

茯苓琥珀散 治小便澀數宜澀泄分利之澤瀉一兩滑石七錢赤茯苓白朮琥珀猪苓各五錢肉桂甘草炙各三錢右為末每三錢以長流甘爛水一盞調下以美臍壓之(綱目)

平補丸 治小便數而澀如欲澀瀉或遺尿不禁更絳子酒製山茱萸酒浸焙當歸益智仁各五錢川棟肉牛膝胡蘆巴炒杜仲黃汁炒巴戟肉菴蓉酒浸各三錢半乳香二錢右為末糯米糊和丸梧子大

黃湯或鹽湯下五十九(直指)

一方 治心經蓄熱小便赤澀梔子仁大黃煨連翹甘草各等分右到五錢水煎服(湯液)

小便不通 胞移熱於膀胱則癃尿血(內經)○膀胱不利為癃(內經)八正散加木香主之(丹心)○足厥陰之脈過陰器所生病遺尿閉癃昏脈者女子入繫挺孔其孔尿孔之端也其生病癃痔遺尿三

焦者足太陽之別也入絡膀胱約下焦實則癃閉虛則遺尿(綱目)○閉癃合而言之病非分而言之有暴久之殊蓋閉者暴病為尿點滴不出俗呼小便不通是也癃者久病為尿澀淋瀝點滴而出一日數十次或百次名為淋病是也(綱目)○熱在下焦填塞不便其證小便閉塞而不渴則見躁者是也(元素)○小便不通有氣血之異如渴而小便不通者熱在上焦氣分宜清肺散如不渴而小便不通者熱在下焦血分宜滋腎丸(東垣)○小便不通臍下狀如覆碗痛悶難堪治法有二如氣不能化

而不通則陳皮茯苓湯調木香沉香末二錢空心服兼用吐法以提之如血汚於下而不通則用桃仁

承氣湯之類（方見寒門）以破之（綱目）○夫熱則不通冷則不禁其熱盛者小便閉而絕無其熱微者小便難而僅有（直指）○小便不通乃血滯致氣不通而竅澁宜導氣除燥湯（東垣）○小便不通

宜五苓散（方見傷寒）導赤丸地膚子湯宜氣散通關丸猪苓湯加味五苓散透泉散

八正散 治膀胱熱積小便癱閉不通大黃木通瞿麥蓄滑石梔子車前子甘草各一錢右剉作一貼入燈心一錢空心水煎服（局方）

清肺散 治渴而小便閉猪苓通草各一錢半赤茯苓澤瀉燈心車前子各一錢藜蘆木通瞿麥各七分琥珀五分右剉作一貼空心水煎服（東垣）

滋腎丸 治不渴而小便閉黃柏知母並酒洗焙各一兩肉桂半錢右爲末水丸梧子大空心白湯下百丸（東垣）一名泄腎丸○一人病小便不通腹脹脚腫雙睛凸出晝夜不眠苦痛不可言且苦嘔噦

衆醫無效東垣曰膀胱者津液之府氣化則能出矣小便閉是無陰而陽氣不化者也此人奉養太厚膏粱積熱故膀胱者腎之府久而乾涸小便不化今內關外格之病悉具死在朝夕但治下焦其疾

自愈遂處此方服之須臾尿出如涌泉即差

導氣除燥湯 治小便不通赤茯苓一錢半黃柏一錢二分滑石知母澤瀉各一錢右剉作一貼入燈心一錢空心水煎服（東垣）

導赤丸 治膀胱有熱小便不通大黃一兩半炒梔子一兩二錢木通生乾地黃各八錢赤芍藥赤茯苓滑石各四錢右爲末蜜丸梧子大以導赤散（方見五藏）煎水空心吞下三五十丸（直指）

地膚子湯 治下焦熱結小便不通地膚子一錢知母黃芩猪苓麥枳實升麻通草冬葵子海藻各七分右剉作一貼空心水煎服○女人房勞後小便不通脈沉細用猪腎半隻同煎服最效（得效）

宣氣散 治癰閉急痛甘草梢木通各三錢梔子二錢葵子滑石各一錢右末二錢燈心湯調下（丹心）

通關丸 治小便不通黃柏知母並酒炒滑石各二兩木通一兩肉桂三錢右爲末水丸梧子大空心白湯下百丸（醫鑑）

猪苓湯 治熱結小便不通猪苓木通澤瀉滑石枳壳黃柏酒浸牛膝麥門冬瞿麥藜蘆車前子各一分甘草三分右剉作一貼入燈心一錢空心水煎服（回春）

加味五苓散 治虛寒小便不通五苓散料等分加常歸枳壳牛膝木通甘草梢亦等分右剉入燈心一撮空心同煎服（回春）

透泉散 治小便赤澀不通滑石一兩芒硝甘草各五錢琥珀二錢半右細末每二錢空心以燈心煎服調下(總錄)

老人癱閉 虛小便不通多是氣短血虛四物湯加黃芪煎水吞下滋腎丸(正傳)○老人虛人小便不通琥珀末以人參赤茯苓煎湯調

空心服(丹心)

癱閉宜吐 小便不通屬氣虛血虛有實熱有痰氣閉塞皆宜吐之以提其氣氣升則水自降蓋氣承載其水也氣虛用參朮升麻血虛用四物痰多二陳皆先服後探吐之實熱當利之用八正散(方見上)○一人病小便不通諸藥無效丹溪曰此積痰病也積痰在肺肺為上焦而膀胱為下焦上焦閉則下焦塞比如滴水之器必上竅通而後下竅之水出焉乃以二陳湯先飲大吐之病如失(丹溪)

○痰多阻滯水道不通二陳湯加香附子木香木通煎之先服一盞以餘渣探喉中吐之以提其氣氣升則水自降○實熱不通砂糖水調黑牽牛一二錢服探吐之(入門)

癱閉宜瀉 實熱癱閉用八正散蓋大便動則小便自通矣(丹心)○水道不行其本在腎合用牽牛澤瀉其末在肺合用葶藶桑皮更以木通滑石佐之又能透達雖然大便小便脈絡相貫人有多患

小便不通但用神保丸(方見氣門)俾大瀉數行小便自通(直指)○實熱尿閉宜用導水丸三花神祐丸(並見口門)

轉脬證 轉脬證候胸下急痛小便不通凡強忍小便或尿急疾走或飽食忍尿或飽食走馬或忍尿入房使水氣上逆氣迫於脬故屈尻而不得舒張也脬落即刎(直指)○轉脬證候孕婦多有之患在忍縮

小便或醉飽入房使小腸之氣逆而不通大腸之氣與之俱滯外水不得入膀胱內水不出膀胱淋瀝急數每欲尿時痛不可言大便亦裏急頻併似痢非痢必以手按臍下庶可立出小便者因此腹脹脬腫治法用涼藥疎利小腸中熱仍與通瀉大腸迨其腹中攪痛大便天下則尿脬隨即歸正(便自然順流(直指)○胎婦轉脬之病稟受弱者憂悶多者性急躁者其味厚者大率有之古方用滑利

疏導藥鮮有應效因思脬為胎所墮展在一邊脬系了尿不通爾胎若舉起懸在中央脬系得疏水道自行一婦患此診之兩手以滿重取則絛此得之受患瀆為血少氣多故為有欲遂以四物湯加參朮

半夏陳皮甘草生薑空心煎服以指探喉中吐出藥汁少頃又與一貼次早亦然如是與一貼而安此法恐偶中後屢用數人皆驗(丹溪)○轉脬宜二石散加木通車前子等分煎服仍施陰陽熨法

(入門)○轉脬用蒲黃散滑石散葱白湯○老人脬轉困篤欲死六味地黃丸倍澤瀉服之效(方見虛勞)○孕婦脬轉宜參朮飲

二石散 治肝轉八九日不得尿滑石寒水石葵子各一盞水十盞煎至五盞空心分二服(入門)

蒲黃散 治肝轉不得尿蒲黃滑石各等分爲末每二錢雞子清調下(總錄)

滑石散 治肝轉不得尿寒水石二兩滑石亂髮灰車前子木通各一兩葵子一合右到水一斗煮取五升每服一升日三次即通(得效)

葱白湯 治小便卒暴不通小腹膀胱氣上衝心悶絕欲死此因驚憂暴怒氣乘膀胱鬱閉而脬系不正陳皮三兩葵子一兩葱白三莖右到水五升煮取二升分三服(得效)

參朮飲 治孕婦轉胎小便不通四物湯料加人參白朮半兩陳皮甘草各一錢右到作一貼入生薑三片大棗二枚水煎空心服後探吐之(丹溪) 一方葵子梔子炒滑石各五錢木通三錢右到作

一貼水煎空心服外以葵子梔子滑石爲細末入田螺肉搗膏或生葱汁調貼臍中立通(正傳) 一孕婦九月轉胎尿閉脚腫形瘁脈左稍和而右澀此必飽食氣傷胎系弱不能自舉而下壓膀胱故閉

而不通以人參白朮當歸芍藥陳皮半夏甘草煎服四貼次早煎渣頓服探吐小便大通皆黑水(丹溪) 一孕婦轉胎脈細氣弱胎壓膀胱下口用補藥忍加急滿令產婆以香油抹手入產門托起其

胎尿出如注(丹溪) 又法將孕婦倒置起胎自墜轉其尿注出勝於手托(丹溪)

關格證 邪在六府則陽脈不和陽脈不和則氣留之氣留之則陽脈盛矣邪在五臟則陰脈不和陰脈不和則血留之血留之則陰脈盛矣陰氣太盛則陽氣不得相營故曰格陽氣太盛則陰氣不得相營故

曰關陰陽俱盛不得相營故曰關格關格者不得盡其命而死矣(靈樞) 關則不得小便格則吐逆關者甚熱之氣格者甚寒之氣無出曰關無入曰格寒在胸中過絕不入熱在下焦填塞不便(潔古)

○陰陽易位病名關格寒在胸中水漿不下故曰格熱在丹田小便不通故曰關(雲岐) 關者不得小便格者吐逆上下俱病也(綱目) 內經曰人迎脈大於氣口四倍名曰格氣口脈大於人迎四倍

名曰關 兩寸俱盛曰關格其證嘔逆而小便不通者是也(正傳) 此證多死寒在上熱在下死也(丹心) 大小便不通亦謂之陰陽關格乃三焦約之病也凡大小便不通內經謂之三焦約約者

不行也長流水煎入正散服之(類聚) 胸格者謂膈中覺有所碍欲升不升欲降不降欲食不食此爲氣之橫格也(醫鑑) 關格宜芒硝大承氣湯(方見寒門) 中虛者補中益氣湯加檳榔以升降之

痰格者枳殼二陳湯

芒硝湯

治關格不通芒硝二兩半滑石三兩冬葵子炒三合右以滑石莖子爲蠶末取五錢水煎至半入芒硝一錢再一沸空心服(總錄)

枳縮二陳湯

治關格上下不通此痰隔中焦也服此出痰枳實一錢川芎八分縮砂白茯苓貝母陳皮蘇子瓜蒌仁厚朴便香附子各七分木香沉香各五分甘草三分右除二香剉作一貼薑三片

同煎入竹瀝及沉香木香
濃磨水調和服之(醫鑑)

關格宜吐瀉

關格必用吐以提其氣之橫格不必在出痰也有痰者二陳湯方見痰飲探而吐之中氣虛而不運者補中益氣湯加木香檳榔以升降之(丹心)○陰陽關格前後不通大便快利

則小水自行(鈞玄)

○關格死在朝夕但治下焦可愈宜大承氣湯方見塞門○入門○一婦人忽吐逆大小便不通煩亂四肢漸冷無脈與大承氣湯一劑至夜半漸得大便通脈漸和翌日乃安此關

格之病極爲難治垂死而活只此一人耳(孫兆)

○關格忌用淡滲利小便之藥(入門)○一小兒小便不通號跳旋轉下則成砂石大便滯肛門脫出一二寸藏人曰此下焦塞也不吐不下則下焦何以

開不令飲水則小溲何以利以調胃承氣湯一兩加牽牛子頭末三錢河水煎服又用瓜蒂末糊丸芥子許六十丸吞下上吐下瀉一時齊出有膿有血涌泄既定合飲薪水二三十次每次飲一匙其病如

失(子)

洗熨法

陰陽熨法又名冷熱熨法治疝轉及二便不通先以冷物熨小腹幾次後以熱物熨如前數又以冷物熨之自通(入門)○治疝轉小便不通生薑葱白紫蘇葉各一握煎湯密室內熏洗小腹外

腎肛門等處再溫再洗拭乾於綿襖仰坐垂腳自舒其氣次用赤茯苓赤芍藥白芍藥各五錢蜀葵子

二錢半右到一兩煎水調蘇合香丸方見氣門三九并青鹽末半錢空心溫服即效(得效)○小便

難小腹脹不急治殺人葱白三斤細剉炒熱以帕子包分兩裏更替熨臍下即通(得效)○又炒鹽半

斤薑盛裝臍下亦通(得效)○產後小便不通腹脹如鼓悶亂不省此由產時尿管運動不順用鹽填

臍中葱白十餘根細切厚鋪臍上用大艾炷灸之覺熱氣直入於腹內即通神驗(得效)

掩臍法轉臍一證諸藥不效失救則死以甘遂末水調敷臍下內以甘草節煎湯飲之及藥汁至臍二藥相反臍自轉矣小水來如泉涌此救急之良方也但二藥須兩人各置各處劑之不可一處同置

爲妙(鈞玄)○小便閉大田螺生搗細封臍上即通(綱目)○治小便不通磨香半夏末填臍中上用葱白田螺一味搗成餅封臍上用布線縛定下用皂角烟入陰中自通女人用皂角煎湯洗陰戶內

回春○治小便不通通膀胱法以白磁瓶滿盛水以有字紙七重密封瓶口於患人臍內用鹽一捻填之倒置瓶口覆在臍上假臥如覺冷小便即通(類聚)○治小便癱閉不通宜貼臍膏(方見大便)通

散

通關散治小便不通白礬生白鹽各二錢半右研勻以紙團圍臍抄藥在內滴水藥上即通(類聚)

難治不治證嘔噦而小便不通者難治中滿鼓脹病小便不通者亦難治(回春)○老人氣虛(短作)小便不通為下焦血氣乾者死(正傳)○關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死(仲景)○頭

汗內外關格小便不通此為陽脫不治(得效)○凡關格見頭汗者死(入門)○傷寒熱病及風溫狂言直視遺尿者死(入門)

小便不禁遺尿者尿出不自知覺也(綱目)○膀胱不約為遺尿(內經)○水泉不止者是膀胱不藏也註曰水泉者前陰之流注也(內經)○腎與膀胱俱虛內氣不充故臍中自滑所出多而色白焉是以遇夜而陰盛愈多(直指)○下焦蓄血與虛勞內損則便尿自遺而不知(直指)○下焦虛寒不能溫制水液則便尿欲出而不禁(直指)○肺氣虛則尿色變卒遺失無度(甲乙)○內經曰水之本在

腎其末在肺則知天一之水自上而下相為貫通也(直指)○經曰下虛則遺尿下虛謂膀胱下焦虛也(仲景)○曰下焦竭則遺尿失使其氣不能自禁制也又云下焦不歸則遺洩世用桑螵蛸難脫脛

之類是也(綱目)○小便遺失者肺氣虛也宜安臥養氣禁勞役以參芪補之不愈則當貴有熱用黃柏生地黃(綱目)○小便不禁色赤為熱色白為虛(入門)○小便無度或淋瀝不禁乃陰挺痿癯也

六味地黃丸(方見虛勞)去澤瀉加益智仁(回春)○小便不禁屬熱屬虛熱者五苓散合解毒湯(方並見寒門)虛者五苓散合四物湯(方見血門)加山茱萸五味子(丹心)○下虛內損而不禁宜

補膀胱陰血瀉火邪為主加減八味丸六味地黃丸加知母黃柏五味子補陰丸最妙(方見虛勞)○虛冷不禁遇夜愈多宜縮泉丸祕元丹老人虛人宜五子丸家韭子丸參芪湯產後遺尿宜補脾飲諸

茸湯小兒遺尿宜雞腸散雞臍散通用大芫絲子丸(並見各門)

縮泉丸治脾氣不足小便頻數一日百餘次烏藥益智仁等分為末酒煮山藥糊和丸梧子大臨臥鹽湯下七十九(入門)

祕元丹治虛損小便不禁危

急者(方見精門)

五子丸

治小便不禁遇夜愈多頭眩脚弱老人虛人多有此證大能耗人精液令人卒死更絲子酒製子略炒益智仁茴香炒蛇床子炒各等分右爲末酒糊和丸梧子大糲米飲下五十九丸得效

家韭子丸

治腎陽衰敗尿冷遺尿不禁家韭子略炒六兩鹿茸煨去毛四兩肉蓯蓉酒浸牛膝酒浸熟地黃當歸酒洗各二兩更絲子酒製巴戟各一兩半杜仲炒石斛酒洗乾薑炮桂心各一兩右爲

末酒糊和丸梧子大空心溫酒或鹽湯下百丸得效

參芪湯

治氣虛遺人參黃芪蜜炒白茯苓當歸熟地黃白朮陳皮各一錢益智仁研八分升麻肉桂各五分甘草三分右剉作一貼薑三片棗二枚水煎空心服老人加炮附子同春

補脬飲

治婦人因產傷脬小便不禁或漏瀉不乾或小便不利黃絲絹生者一尺剪碎白杜丹根皮末二錢千葉者他無效白芨末一錢右水一椀同煎至稠爛如鶴空心頓服服時不得作聲作聲無

效得

豬脬湯

治婦人因產脬破小便不禁人參白朮各二錢桃仁陳皮黃芩白茯苓川芎當歸各一錢右剉作一貼入豬脬或羊脬同煎空心服丹溪○一婦人難產因收生者不謹以致尿脬損破得小便

淋瀝病遂爲廢人子思之肌肉破傷在外者尚可補完脬雖在腹恐亦可治診其脈虛甚試與峻補以此方煎以豬羊脬湯極飢時飲之一月而安蓋是血氣驟長其脬自定恐稍遲則難成功也丹溪

雞腸散

治小兒遺尿不禁多因脬寒或稟受陽氣不足故也雞腸燒杜羅粉白茯苓桑螵蛸各五錢辣桂龍骨各二錢半右剉每二錢薑三片棗二枚水煎空心服或爲末一錢米飲調服得效

雞臍散

治小兒遺尿雞臍一具雞腸一具燒存性豬脬一個炙焦右爲末一錢酒調下同春

大兔絲子丸

治脬氣虛寒小便不禁兔絲子酒製肉蓯蓉酒浸各二兩杜蠟煨五錢子附子炮鹿茸酒炙各一兩桑螵蛸酒炙雞臍各五錢右爲末酒糊和丸梧子大空心溫酒或鹽湯下七十

丸得效

茸香丸

治虛損遺尿不禁或虛冷尿多雞內金炙七錢半鹿茸酥炙肉蓯蓉酒浸當歸酒洗各五錢龍骨煨杜羅粉巴戟赤石脂禹餘糧煨醋淬研白薑益智仁乳香各二錢半右爲末糯米糊和丸梧子

大空心鹽湯下七十九丸直指

既濟丸 治腎氣不足有陰火小便不禁鬼絲子酒製益智仁炒白茯苓韭子炒肉苁蓉酒洗當歸熟地黃各五錢黃柏知母並鹽水炒牡蠣粉山茱萸肉酒蒸各三錢五味子一錢右爲末麪糊和丸梧子

大空心鹽湯下
百丸(醫鑑)

諸淋證 淋之爲病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中(仲景)○諸淋所發皆腎虛而膀胱有熱也心腎氣鬱蓋在下焦故膀胱裏急膏血砂石從小便道出焉於是有欲出不出淋瀝不瀝之狀甚者窒塞其間則令人悶絕矣(直指)○大凡小腸有氣則小便脹小腸有血則小便澀小腸有熱則小便痛痛者爲血淋不痛者爲尿血收精結者爲砂精結散者爲膏金石結者爲石(直指)○最不可用補藥氣得補而愈脹血得補而愈澀熱得補而愈發水道不行加之殺道閉遏未見其能生者也(直指)○淋者小便便淋瀝澀痛欲去不去而又來曰淋(醫鑑)○淋皆風熱間有冷者由心腎氣鬱小腸膀胱不利或忿怒房勞忍尿酒肉淫熱下流干於肝經挺孔鬱結初則熱淋血淋久則火燥爲砂石淋如湯蠶煎久而生蠶(入門)○腎虛極而淋者當補腎精而利小便不可獨用利水藥正傳○五淋者膀胱蓋熱也(回春)○淋而小腹脹滿甚者宜瀉腎湯(入門)○諸淋皆屬于熱雖有冷淋蓋千百之一也(綱目)

○淋雖有五皆屬於熱取滋腎丸百丸以四物湯加甘草梢是杖根木通桃仁滑石木香煎湯吞下兼灸三陰交(穴名)累試累效(丹心)○

淋病不可發汗發汗則便血(仲景)

淋病有五 一曰勞淋二曰血淋三曰熱淋四曰氣淋五曰石淋(本草)

勞淋 苦倦虛損小便不出小腹急痛(本草)○勞淋者遇房勞即發痛引氣衝(穴名)痛墜及尻(正傳)○勞傷虛損則發宜四物湯(方見血門)加知母黃柏滑石琥珀(入門)○酒慾過傷膀胱之氣虛損滯

而成淋宜補中益氣湯(方見內傷)升補真氣(醫鑑)○

益元固真湯 治疑慾強固不泄淫精液下作淋甘草梢二錢山藥澤瀉各一錢半人參白茯苓蓮藥巴戟升麻益智仁黃柏酒炒各一錢右剉作一貼水煎空心服(醫鑑)

血淋 小便不出時下血疼痛滿急(本草)○遇熱則發其則尿血熱結壅痛宜四物湯加知母黃柏澤瀉赤茯苓(入門)○色鮮者心與小腸虛熱導赤散(方見五癰)去甘草加黃芩色如黑豆汁者腎與膀胱

火也宜五淋散(方見下)○血淋宜增味導赤散金

黃湯小蘗飲子○死血作淋牛膝膏最妙(方見下)

增味導赤散 治血淋澀痛生乾地黃木通黃芩車前子梔子仁川芎赤芍藥甘草各一錢右對作一貼薑三片竹葉十片空心水煎服(直指)

金黃湯 治小便出血水道澀痛鬱金瞿麥生乾地黃車前子滑石芒硝各五錢右為蠶末每取五錢空心水煎服(類聚)

小菊飲子 治下焦結熱尿血淋痛生地黃二錢小菊根滑石通草蒲黃炒藕節竹葉當歸山梔仁甘草炙各七分右對作一貼空心水煎服(濟生)

熱淋 小便熱赤色淋瀝不快臍下急痛(本草)○暴淋痛甚尿赤淋瀝宜入正散(方見上)導赤丸(方見上)○滋腎丸(方見上)百丸以加梔子導赤散煎水吞下空心○益元散(方見醫門)二錢加木香

檳榔茴香各一錢為末
空心白湯點服(入門)

氣淋 小便澀滯常有餘瀝不盡小腹脹滿宜沉香散通淋散或益元散加木香檳榔茴香為末如
上法點服(入門)○氣虛而淋入物湯(方見虛勞)加黃芪虎杖根黃芩牛膝煎服(丹心)

沉香散 治氣淋小腹脹滿莢子赤芍藥各七錢半沉香石草滑石王不留行當歸各五錢陳皮青皮木香甘草各二錢半右為末每二錢空心以大麥煎湯調下(入門)○對取一兩煎服名沉香飲

通淋散 治氣淋痛不可忍香附子陳皮赤茯苓各等分右對五錢空心水煎服(得效)

石淋 莖中痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕(本草)○莖中痛努力出砂石(正傳)○沙淋凝脂而易散石淋結塊而難消攻療石淋以枳殼散(即六一枳殼散)煎水吞來復丹(方見氣

門)為妙久服則關絡開通忽而大便通泄石塊自小便出(直指)
○益元散偏主石淋(丹心)○石淋宜石燕丸滑石散鹽砂散

石燕丸 治石淋石燕子燒赤醋淬三次研水飛焙乾滑石石草瞿麥穗各一兩右為末糊丸梧子大空心以瞿麥燈心煎湯下三十九丸日二(綱目)

滑石散 治沙石淋痛割滑石石膏各五錢石草瞿麥木通獨葵子各三錢右為末每取三錢以葱白二莖燈心一握蜜一匙煎湯空心調下(直指)

鵬砂散 治沙石淋急痛鵬砂琥珀赤茯苓蜀葵子陳橘皮各三錢右為末取二錢以葱白二莖麥門冬二十一粒蜜一匙煎湯空心調下(直指)

淋病有八 五淋之外又有膏淋沙淋冷淋合為八也

膏淋 尿出如膏莖中澀痛(入門)○尿濁如膏浮凝如脂(正傳)○膏淋宜鹿角霜丸秋石丸海金沙散香膏淋兒散○一少年患膏淋三年藥餌鍼灸無少減戴人見之曰惑蠱之疾也亦曰白淫實由小腹熱非虛

也以藥滌痰三升又瀉積穢
數行尋覺病去矣(子和)

鹿角霜丸 治膏淋或黃赤白黯如脂膏狀淋澀作痛鹿角霜白茯苓秋石煉

秋石丸 治濁氣干清精散而成膏淋黃赤白黯如肥膏油蜜之狀白茯苓一兩桑螵蛸炙鹿角膠珠秋石各五錢右為末糕糊和丸梧子大空心人參湯下五十九(直指)

海金沙散 治膏淋海金沙滑石各一兩甘草二錢半右為末每一錢麥門冬燈心煎湯調下(入門)

香兒散 治血淋及沙淋膏淋如條痛如刀割真麝香五分葱白一根同搗取汁孩兒茶三錢半琥珀二分半為末調百沸湯入葱汁空心同服如神(種杏)

沙淋 陰莖中有砂澀痛尿不得卒出砂出痛止(正傳)○小便出細砂沉在缸底膀胱陰火煎熬津液凝結輕則為砂重則為石○沙淋宜二神散魚石散苦杖散琥珀散

二神散 治砂石淋急痛海金沙七錢半滑石五錢右為末取二錢以木通麥門冬車前草煎湯入蜜少許調下(丹心)

魚石散 治砂石淋莖中作痛石首魚頭中骨五對火煨為末滑石五錢右為末分二錢木通湯調下砂出盡乃安(正傳)

苦杖散 治沙石淋每尿時器中刺刺有聲痛楚不堪杜牛膝(即虎杖根)細到每一合(即一兩)水五錢煎耗其四留其一去滓以麝香乳香各少許研調服之(得效)

琥珀散 治沙石淋琥珀滑石各二錢木通常歸木香鬱金篇蓄各一錢右為末每三錢以煎菴葉煎湯空心調下無菴葉則代竹葉(丹心)

冷淋 必先寒懷小便澀數竅中腫痛(入門)○亦有挾冷而淋者其證先寒戰而得洩便蓋冷氣與正氣交爭冷氣勝則寒戰成淋正氣勝則寒戰解而得便尿也(直指)○冷淋宜八味丸(方見虛勞)生附湯

木香湯

生附湯 治冷淋小便澀痛增寒凜凜附子生滑石各七分木通半夏製罌粟各一錢二分右到作一貼入生薑七片燈心二十莖蜜半匙空心水煎服(得效)

木香湯

治冷淋小便淋澀身體清冷木通木香當歸白芍藥青皮茴香檳榔澤瀉
陳皮甘草各七分肉桂三分右剉作一貼入薑五片空心水煎服(直指)

諸淋通治

淋證所感不一或因房勞或因忿怒或因醉酒或因厚味蓋房勞者陰虛火動也忿怒者氣動生
火也醉酒厚味者釀成溼熱也積熱既久熱結下焦所以淋瀝作痛初則熱淋血淋久則煎熬水
液稠濁如膏如砂如石也夫散熱利小便只能治熱淋血淋而已其膏淋沙淋石淋必須開鬱行氣破
血滲陰方可也古方用鬱金琥珀開鬱也青皮木香行氣也蒲黃牛膝破血也黃柏生地黃滋陰也東
垣治小腹痛用青皮黃柏夫青皮疎肝黃柏滋腎蓋小腹乃肝腎之部位也(丹心)○諸淋通用瀉腎
湯鬱金黃連丸三因琥珀散石韋散五淋散通草湯琥珀散(方見上)二神散(方見上)必效散海金

沙散澤察方五淋散婦人
白茅湯小兒藥毒成淋

瀉腎湯

諸淋小腹脹急甚者宜用此大黃二錢剉密器水浸一宿磁石碎一錢六分石高蒲生地黃各一
錢玄參細辛各八分芒硝赤茯苓黃芩各六分甘草四分右剉水二盞煎至一盞半入大黃煎

至七分去滓下芒硝
攪勻空心服(入門)

鬱金黃連丸

治小腸膀胱積熱或癱閉不通或遺尿不禁或白濁如泔或膏淋如膿或(梔子水或如沙
石米粒或如粉糊俱熱證也悉主之滑石白茯苓各四兩黑牽牛頭末三兩黃芩大黃琥珀

各二兩鬱金黃連各一兩右爲末水
丸梧子大沸湯下五七十丸(丹心)

三因琥珀散

治五淋澀痛小便出膿血琥珀海金沙沒藥蒲黃各等
分右爲細末每三錢空心以萱草根煎湯調下(綱目)

石韋散

治諸淋滑石二錢白朮芩麥赤芍藥冬葵子石韋木通各一錢當歸王不留行甘草
各五分右爲末每二錢空心以小麥煎湯調下(局方)○或剉一兩水煎服亦可

五淋散

治五淋赤芍藥山梔仁各二錢當歸赤茯苓各一錢條
黃芩甘草各五分右剉作一貼空心水煎服(醫鑑)

通草湯

治五淋通草麥子芽根桃膠瞿麥當歸黃滑石王不留行各
一錢甘草五分右剉作一貼入薑五片空心水煎服(濟生)

必效散

治一切淋當歸生地黃赤茯苓滑石牛膝山梔仁麥門冬枳殼黃芩木通知母黃
柏二並酒炒各七分甘草五分右剉作一貼入燈心一團空心水煎服(醫鑑)

海金沙散治五淋一服如神當歸酒洗大黃酒浸牛膝酒洗木香雄黃海金沙各五錢右爲末每二錢臨臥好酒調下（醫案）

澹寮五淋散治五淋梔子仁一錢半赤茯苓赤芍藥各一錢木通滑石甘草各八分竹葉茵陳各五分右對作一貼空心水煎服（得效）

一方治諸淋四苓散四錢益元散二錢梔子仁一錢右對作一貼水煎空心服（丹心）

白茅湯治婦人產後諸淋無問膏石冷熱皆治之白茅根五錢瞿麥白茯苓各二錢半葵子人參各一錢二分半蒲黃桃膠滑石各七分甘草五分紫貝二個煨石首魚頭中骨四個煨右對分二貼入薑

三片燈心二十莖空心水煎服（入門）○或爲末每一錢木通湯調下

小兒藥毒成林一年少自初生七個月患淋病五日七日必一發其發也大痛捫地叫天水道方行狀如漆如粟者約一盞然後定診其脈輕則瀉重則投視其形瘦而積長其色青而蒼意其父必因多服下部藥遺熱在胎留於子之命門而然遂以紫雪和黃柏細末丸梧子大晒十分乾而與二百丸作一服經二時又與三百丸作一服率以熱湯下以食物壓之又經半日痛大作連腹水道乃行下如漆如粟者一大碗許其病減十分之八後以陳皮一兩粘梗木通各半兩作一貼與之又下漆粟者一合許遂安（丹溪）

赤白濁小便出赤濁或白濁其狀流面如油光彩不定凝脚澄下凝如膏糊或如米泔或如粉糊或如赤膿皆是溼熱內傷也猶如天氣熱則水渾濁渾濁之病溼熱明矣（回春）○先賢有言夏則土燥而水濁冬則土堅而水清此其理也水火既濟則土自堅其流清矣小便白濁蓋脾有虛熱而腎不足土邪干水也（得效）○內經曰水液渾濁皆屬於熱○便濁之證因脾胃之熱溼下流滲入膀胱故使溲便或白或赤而渾濁不清也血虛而熱甚者則爲赤濁此心與小腸主病風火故也氣虛而熱微者則爲白濁肺與大腸主病屬金故也（正傳）○赤白濁皆因脾胃溼熱中焦不清濁氣滲入膀胱爲濁（入門）○赤者心虛有熱由思慮而得之白者腎虛有寒因嗜慾而致也（醫鑑）○小便濁主溼熱有痰有虛赤屬血白屬氣與痢疾帶下同治（丹心）○赤白濁肥人多溼痰二陳湯加蒼朮白朮升麻柴胡

或星半始粉丸瘦人是虛火四物湯加知母黃柏或珍珠粉丸（方見補門）襍柏丸（入門）○思慮勞心宜辰砂炒香散（方見神門）金蓮丸房勞傷腎者草薢分清飲小兒絲子丸（方見虛勞）脾精不斂

成漏濁宜蒼朮雞名丹四炒固真丹頓吞丸腎氣下陷宜補中益氣湯（方見內傷）○凡便濁必兼服加減珍珠粉丸（入門）○治法宜燥溼降火兼升舉之二陳湯加一朮升麻柴胡白芍藥丹心○白濁

加減珍珠粉丸（入門）○治法宜燥溼降火兼升舉之二陳湯加一朮升麻柴胡白芍藥丹心○白濁

加減珍珠粉丸（入門）○治法宜燥溼降火兼升舉之二陳湯加一朮升麻柴胡白芍藥丹心○白濁

加減珍珠粉丸（入門）○治法宜燥溼降火兼升舉之二陳湯加一朮升麻柴胡白芍藥丹心○白濁

加減珍珠粉丸（入門）○治法宜燥溼降火兼升舉之二陳湯加一朮升麻柴胡白芍藥丹心○白濁

加減珍珠粉丸（入門）○治法宜燥溼降火兼升舉之二陳湯加一朮升麻柴胡白芍藥丹心○白濁

加減珍珠粉丸（入門）○治法宜燥溼降火兼升舉之二陳湯加一朮升麻柴胡白芍藥丹心○白濁

宜四君子湯(方見氣門)合五苓散(方見寒門)煎服(直指)又秘精丸固本丸半苓丸導赤湯皆宜
○赤濁宜加味清心飲清心蓮子飲(方見消渴)○赤白濁通用交實丸(方見精門)炒應丸辰砂炒
香散(方見神門)水火分清飲桑螵蛸散○赤白濁小腹疼痛
不可忍宜作寒治東垣酒煮當歸丸最妙(方見婦人)○正傳)

星半蛤粉丸 治溼熱白濁蛤粉二兩南星半夏並薑製蒼朮青黛各一兩右爲末薑汁煮神麴作糊和丸梧子大空心薑湯下五七十九(入門)

樗柏丸 治溼熱痰火小便濁黃栢(降火)三兩楊根白皮(認腸)一兩青黛(解鬱)乾薑(斂肺下氣)各三錢滑石(利竅)蛤粉(入腎)神麴(燥溼)各五錢右爲末神麴糊和丸梧子大空心白湯下五

七十九(入門)

金蓮丸 治思慮傷心小便赤濁石蓮肉白茯苓龍骨天門冬麥門冬柏子仁當歸酸棗仁紫石英遠志乳香龍齒各一兩右爲末蜜丸梧子大朱砂爲衣空心溫酒或薑湯下七十九(入門)

草薺分清飲 治小便白濁凝脚如糊石菖蒲烏藥益智仁草薺白茯苓各一錢甘草五分右剉作一貼空心入鹽一捻水煎服(正傳)

蒼朮難名丹 治脾精不禁小便瀉濁淋瀝不止手足力乏腰背痠疼蓋用蒼朮等劑以斂脾精斂脾謂何精生於穀也蒼朮製四兩茴香炒川楝子肉各七錢半川烏炮破故紙炒白茯苓龍骨各一兩右爲末酒鈣糊和丸梧子大朱砂爲衣空心米飲下五七十九(直指)

四炒固真丹 治元氣久虛遺精白濁五淋七插婦人崩帶等證蒼朮一斤剉作四分一分以茴香青鹽各一兩同炒一分以烏藥川楝子各一兩同炒一分以川椒破故紙各一兩同炒一分以酒醋

同炒俱以朮黃色爲度只取朮爲末以煮藥酒醋打糊和丸梧子大空心每取三五十九男子酒下婦人醋湯下(入門)○醉飽後色慾不節傷脾損腎脾來尅腎土尅水也小便黃濁其脈脾部洪數腎部

微澀其證尿下如梔子汁澄下桶底如石灰脚或如血點凝結在內法當補養脾胃宜此藥(醫鑑)

蠟苓丸 一名威喜丸治腎有邪溼精氣不固小便白濁淋瀝不止及婦人白淫白帶小便如泔等證雪白茯苓四兩剉以猪苓剉二錢半同放於磁器中用水煮二十餘沸去猪苓取出焙爲末將黃蠟四

兩熔化和丸彈子大空心細嚼以薑湯徐

徐徐送下以小便清爲度(得效)○(入門)

加減珍珠粉丸 治赤白濁及白淫通用黃栢(半生半炒)蛤粉各三兩滑石二兩獨根白皮一兩青黛乾

降陰火除濕熱蛤粉鹹補腎滑石利竅梲根白皮大燥溼熱青黛

祕精丸 治下虛脾寒小便白濁牡蠣煨鬼絲子酒製龍骨生五味子韭子炒白茯苓白石脂煨桑螵蛸

固本丸 治小便濁甘草炙三兩猪苓二兩半蓮花葉黃連各二兩白茯苓縮砂益智仁半夏

半苓丸 治白濁即精門猪

導赤湯 治尿如米泔色不過二服愈木通滑石黃栢赤茯苓生地黃梲子仁

加味清心飲 治心熱小便赤濁蓮肉白茯苓各一錢半益智仁麥門冬遠志人參各八分石當蒲

妙應丸 治赤白濁莖絲子酒製桑螵蛸酒炙川棟肉各五錢牡蠣煨三錢龍骨長砂石當蒲白茯苓益智

下五十九
(丹心)

雞清丸 小便濁通用大半夏生爲末以雞子清和丸梧子大稍乾以猪苓夾和慢火同炒

水火分清飲 治赤白濁赤茯苓一錢益智仁草薢石當蒲猪苓車前子澤瀉白朮陳皮

桑螵蛸散 小便白如稠米泔日數十次心神恍惚瘦瘠此以女勞心也桑螵蛸鹽水拌蒸過志薑製石

以人參茯苓桑白皮煎湯調下蓋桑皮

蠱病白淫 內經曰脾傷之腎病名曰疝瘕小腹寬熱而痛出白一名曰蠱疝曰腎脹貫脊屬腎絡膀胱故小

風邪傳於腎經邪熱內鬱故其證小腹冤熱而痛澀出白液病名曰蠱蓋邪熱內鬱真精不守故也
肉痿蓉丸（類聚）○內經曰思想無寤所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為肉痿及為白淫
謂白物淋淫如精之狀也宜半苓丸（方見上）○戴人曰遺尿閉癰陰痿疝瘕精滑白淫皆男子之病
也血滯不月腰膝上熱足澀噎乾癢閉小腹有塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之病也但女
子不謂之疝而謂
之瘕也（子和）

肉痿蓉丸

治蠱病肉痿蓉白茯苓黃芪澤瀉牡蠣粉五味子龍骨當歸各一兩右為末蜜丸梧子大空心酒下二十九（類聚）

脬痹證

內經曰脬痹者小腹膀胱按之內痛若沃以湯澀于小便上為清涕○夫膀胱者津液之府氣化則能出今風寒溼邪氣客于脬中則氣不能化出故脬滿而水道不通也足太陽之經從臍入絡腦

氣下灌出於鼻為涕也（綱目）○脬痹即寒淋之類也屬風寒溼宜巴戟丸溫腎湯（入門）

巴戟丸

治脬痹小便澀而不通巴戟一兩半桑螵蛸麩炒遠志薑製生乾地黃酒洗山藥附子炮續斷肉蓯蓉酒浸各一兩杜仲炒石斛鹿茸龍骨兔絲子酒煮五味子山茱萸官桂各三錢右為末蜜丸

梧子大空心酒下
五七十九（綱目）

溫腎湯

治脬痹小便不利赤茯苓白朮澤瀉乾薑炮各一錢二分半右剉作一貼空心水煎服（類聚）

莖中癢痛

童兒精未盛而御女老人陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗莖中痛澀而為淋八味丸料加車前子牛膝煎服（入門）○若精已竭而復耗之則大小便道牽疼愈疼則愈欲大小便愈

便則愈疼八味丸（方見五藏）倍附子救之凡此當滋化源不可誤用知栢淡滲之劑既瀉真陽復損真陰（入門）○肝經氣滯有熱玉莖引脇刺痛宜參苓琥珀湯（入門）○病淋而莖中痛不可忍六君

子湯（方見痰飲）加知母黃柏滑石石韋琥珀煎服（丹心）○莖中痛出白津小便閉時作癢小柴胡湯（方見寒門）加梔子澤瀉黃連炒木通龍胆草赤茯苓煎服兼服六味地黃丸（方見五藏）為妙（

回春）○小便淋澀莖中作痛屬肝經溼熱用龍胆瀉肝湯（回春）○方見前陰）○精竭不痛莖癢者八味丸熱盛莖中澀痛導赤散（方見五藏）加梔子大黃（入門）○莖中癢出白津多因脾土不足不

能滋生金水以致肝經血虛火燥宜補中益氣湯與清心蓮子飲間服蓋脾胃為肝腎之源心實土之（入門）○陰莖痛乃厥陰經氣滯兼熱用甘草梢盃欲緩其氣耳（正傳）

參苓琥珀湯 治淋濕莖中痛不可忍 川陳肉甘草梢各一錢 玄胡索七分 人參五分 赤茯苓四分 琥珀澤瀉柴胡當歸尾青皮黃柏各三分 右剉作一貼 入燈心一團 空心水煎服(入門)

一方 治淋莖中痛 甘草梢木通各二錢 青皮黃柏澤瀉各一錢 右剉作一貼 空心水煎服(丹心)

交腸證 婦人小便中出大便 名交腸 證服五苓散效 如未愈 舊儀頭燒灰 酒調服之(得效) ○一婦人病愈後 小便出尿 此陰陽失於傳送 名爲大小腸交也 先服五苓散(方見寒門) 二劑 又用補中益氣湯

而愈(回春) ○一婦人性嗜酒 常痛飲 不醉 忍精 稍出 前竅 溲尿 出後 竅六脈皆沉 調與四物湯 加金沙木香 檳榔木通 桃仁 服之 而愈 此人酒氣升 不降 陽極 虛又酒淫 積久 生熱 煎熬 其血陰亦太

虛 陰陽俱虛 而暫時活者 以其形實 酒中 穀氣尚在 故也 三月後 必死 果然(丹溪)

小便多寡 老人與壯年 飲水無異 多寡 壯年小便甚少 而老者 小便甚多 何也 曰 壯者如春 夏之氣 升者多 而降者少 老者如秋冬之氣 降者多 而升者少 故不同耳(正傳)

飲後卽小便 內經曰 飲入於胃 游溢精氣 上輸於脾 脾氣散精 上歸於肺 病人飲入 胃速覺 臍下便欲小 便 由精氣不輸於脾 不歸於肺 故心火上攻 使口燥 咽乾 宜補中益氣湯(東垣) ○靈樞曰 人

飲酒 酒入胃 穀未熟 而小便獨先下 何也 蓋酒者 熟穀之液 其氣悍 以清 故後穀而入 先穀而液出焉

單方 凡四十八種 有 錢膈散 牛膝膏

滑石 能利竅 以通水道 爲至燥之劑(湯液) ○利小便 治淋 證多 單使滑石 卽益元散(方見暑門) 是也(本草)

硝石 治五淋 及小便不通 雪白硝石 細研 每二錢 勞淋 葵子湯下 血淋 熱淋 並冷水調下 氣淋 木通湯下 石淋 隔紙炒 溫水調下 小便不通 小麥煎湯下 並空心服 名曰透膈散 諸藥無效 服此 立愈(本草)

海金沙 通利小腸 治沙淋 尿閉 每取一兩 入臘茶末 五錢 和勻 以生薑甘草煎湯 調三錢服(本草)

浮石 治砂淋 認痛 右爲末 取二錢 空心以甘草湯調下(直指)

淋石 患石淋 入尿中 出小石也 主石淋 水磨服之 當得碎石 隨尿出也 出時 收貯用之(直指)

甘草梢 味淡者主壅中刺痛同木通空心煎服○
治尿管痠痛取味淡不甘者用之(湯液)

葶藶 治夜多小便或遺尿又治尿數日夜無度到水煎
服或爲末酒糊丸空心鹽湯下七十丸(得效)

牛膝 療老人遺尿○小便澀壅中痛欲死酒煎空心服(本草)○牛膝膏治死血作淋最
妙牛膝一兩到水五盞煎至一盞入麝香少許空心服蓋牛膝治淋聖藥也(丹心)

車前草 利小便通五淋及癰閉不通採根葉搗取汁一盞入蜜一匙調服○沙石淋取汁
寒水石末調服血淋取汁單服空心車前子與根葉同功煎服末服並佳(本草)

澤瀉 治五淋止小便澀數○去胛中留垢止小便淋瀝以味鹹
能泄伏水去胛中久陳積物也煎服末服並佳(湯液)

地膚草 利小便又主小便不通取汁服即通有通生起
死之功○子與莖葉同功水煎服之(本草)

木通 治五淋開關格又主小便數急痛
到煎空心服○通草同功(本草)

瞿麥 主五淋及諸癰閉關格水煎服之○治石
淋開麥子爲末酒服一錢石卽下(本草)

黃芩 治五淋又治熱淋血
淋水煎服(本草)

益智仁 主小便頻數不禁又止滑數入
鹽水煎服或丸服亦佳(醫鑿)

酸漿草 治諸淋澀痛利水道搗取汁一合
酒一合空心服立通(本草)

石葦 治五淋癰閉及疝瘻結熱不
通利水道水煎服之(本草)

牽牛子 主癰閉小便不通利水道取頭末二
錢以木通梔子煎湯調下(本草)

燈心草 主五淋能利水道空
心水煎服之(本草)

菖菴 治五淋及小便不通生水邊開紫花嵩
菖根搗取汁一盞空心服即通(經驗)

菖草 主五淋利小便搗汁服或水煎服○膏淋取
汁二升和醋二升空心服一盞即愈(本草)

葶草 根治小便澀痛下沙石淋取
根搗汁空心服(丹心)

榆白皮 治五淋又主石淋水煎空
心服滑能利竅也(本草)

茯苓 治五淋主小便不通利水
道煎服末服並佳(本草)

琥珀 通五淋又治諸般沙石淋能利小便為末一
錢空心以葱白煎湯調下一服立效(綱目)

虎杖根 通五淋利小便到取一兩水煎入麝香乳香末
各少許調服空心即效俗名杜牛膝(本草)

梔子 通五淋利小便又治血滯小便不利熱淋血淋尤效○梔子實非
利小便乃清肺也肺氣清而膀胱得此氣能化而出尿也(湯液)

猪苓 利小便通水道到煎服之(本草)○五苓散
有猪苓能利水道諸湯劑無若此缺(湯液)

山茱萸 止小便滑數又療老人尿不
節煎服丸服並佳(本草)

桑螵蛸 止小便滑數療遺尿治白濁酒
蒸為末薑湯下一錢鈔(丹心)

牡蠣粉 止小便滑利或丸
服或末服(本草)

石首魚頭中骨 主石淋火煨為末空心
和水服一錢(本草)

石龍子 主五淋利水道下石淋取一枚
火炙為末空心和水服(本草)

蚯蚓汁療小便不通空心服

蜈蚣下石淋下水道取七枚鹽二兩新瓦上拌焙爲末溫酒調一錢服卽愈（本草）○治

桃膠破石淋取如壺子許夏冷水冬溫

獼猴桃下石淋取熟者食之○藤中汁至滑下

冬葵子治五淋利小便○根亦療淋利

冬瓜治五淋利小便取

紅蜀葵根莖治淋利小便花與子亦

亂髮灰主五淋又療轉脬小便不通取髮灰末二錢醋湯調服（綱目）○血淋取灰

人爪治轉脬尿閉自取爪甲

豬膽主小便不通取胆納熱酒中調服（本草）○小便閉澀生豬胆龍

豬脬治遺尿洗炙熟空心

羊肚主小便數取肥肚作羹食之（本草）○治遺尿羊肚

牛尿利小便療小便不通取

雞腸主遺尿小便不禁取烏雄雞腸治如食法作臍溫

雄雞肥脰裹黃皮

主遺尿及小便滑數不禁取燒灰每一錢溫酒調下男用雌女用雄并腸燒服尤良(本草)

鍼灸法

三陰交(三分)

即透陰谷

陰陵泉

氣海

太谿

陰交(綱目)

石淋取關元

氣門大敦(東垣)

血淋

取氣海關元(東垣)

熱陰陵泉

關元

氣衝(東垣)

小便滑數中極(灸)

腎俞

陰陵泉

氣海

陰谷

三陰交(綱目)

遺尿不禁

取陰陵泉

陽陵泉

太敦

曲骨(東垣)

莖中痛行間(灸二十壯)

又取中

極太谿

大便

大便原委

難辨曰

夫腸小腸會為闌門

蓋胃中水穀屬熱自胃下口傳入於小腸上口自小腸下口泌別清濁水液入膀胱為溲尿

滓穢入大腸為大便

由闌門而分別闌門分兩故名為闌門也(綱目)

內經曰大腸者傳導之官化物出焉

注曰化物謂大便也

物出焉注曰化物謂大便也

大便病因

犯賊風虛邪者陽受之

食飲不節起居不時者陰受之

陽受之則入六府

陰受之則入五藏

入六府則身熱不時以食飲不節起居不時者陰受之

陽受之則入六府

陰受之則入五藏

入六府則身熱不時以食飲不節起居不時者陰受之

春傷於風夏必痲泄

春傷於風邪氣留連

為洞泄

久風入中則為腸風

痲泄

清氣在下則生

痲泄

溼勝則溼泄

注曰溼勝則內攻於脾胃脾胃受溼則水穀不分故大腸傳導而生瀉也(內經)

內經

倉廩不藏者是門戶不要也

注曰是大腸之門戶不得斂也(內經)

大腸有寒則多糞泄

有熱則

便腸垢(仲景)

腸垢者腸間積汁垢膩也亦曰滯下

言濕火滯於腸中故謂之滯下(入門)

痲因

有二一者暑月煩渴恣食生冷二者夜臥失被風濕外侵二者皆令水穀不化鬱而生熱熱與濕合傷

氣分則成白痢

傷血分則成赤痢

氣血俱傷則成赤白痢(丹心)

古人云無積不成痢

皆由暑月多

食生冷不能消化飲食

積滯而成痢也(類聚)

積滯而成痢也(類聚)

積滯而成痢也(類聚)

辨便色

腸中寒則腸鳴

泄瀉腸中熱則出黃如糜(靈樞)

瀉白為寒

青黃紅赤黑皆為熱也或以痢色青

為寒者誤也

傷寒少陰病下痢純青水者熱在裏也

小兒急驚痢色多青為熱

明矣痢色黃者脾熱

也痢色紅者為熱

心火之色或赤者熱之甚也

色黑者由火熱元極則反兼水化故色黑也(原病)

血寒則凝痢色必紫黑

成塊或凝膿血蓋膿為陳積也

血為新積也(入門)

濕多成五泄如水

傾下

傾下

血寒則凝痢色必紫黑

成塊或凝膿血蓋膿為陳積也

血為新積也(入門)

濕多成五泄如水

傾下

傾下

傾下

傾下

傾下

血寒則凝痢色必紫黑

成塊或凝膿血蓋膿為陳積也

血為新積也(入門)

濕多成五泄如水

傾下

傾下

傾下

傾下

傾下

(入門) ○熱痢紫黑色寒痢白如鴨溇濕痢下如黑豆汁風痢純下青水氣痢狀如蟹溺積痢色黃或如魚腦虛痢色白如鼻涕凍膠蠱瘕痢黑如雞肝(入門)

脈法

泄瀉脈緩時小結者生脈大數者死(正傳) ○病泄脈洪而大為逆(靈樞) ○泄而脫血脈實者難治(內經) ○泄瀉脈多沉傷風則浮傷寒則沉細傷暑則沉微傷濕則沉緩(醫鑿) ○瀉脈自沉沉遲寒

者死(脈經) ○下痢脈微弱數者為欲自止雖發熱不死(仲景) ○下痢脈大者為未止(仲景) ○下痢數十餘行脈反實者死(仲景) ○下痢宜微小不宜洪大(得效) ○下痢微小却為生脈大浮洪無

差日(脈訣) ○無積不痢脈宜滑大浮弦急死沉細無害(脈訣) ○凡痢身涼脈細者生身熱脈大者死(丹心) ○下痢脈微小吉浮洪者難治(濟生) ○大便閉結脾脈沉數下連於尺為陽結二尺脈虛

或沉細而遲為陰結右尺脈浮為風結(醫鑿) ○燥結之脈沉伏勿疑熱結沉數虛結沉遲若是風燥

右尺浮肥(回春) ○老人虛人閉結脈雀啄者不治(醫鑿)

泄證有五

有胃泄脾泄大腸泄小腸泄大瘕泄 ○胃泄者飲食不化色黃宜胃風湯 ○脾泄者腹脹滿泄注食則吐逆宜胃苓湯 ○大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛宜五苓散(方見寒門) ○小腸

泄者澀澀而使膿血小腹痛宜芍藥湯 ○大瘕泄者裏急後重數至而閉而不能使莖中痛宜大黃湯(醫林)

胃風湯

治腸胃濕毒腹痛泄瀉下如黑豆汁或下瘀血人參白朮赤茯苓當歸川芎芍藥桂皮甘草各一錢右剉作一貼入粟米一撮水煎服(得效)

胃苓湯

治脾胃濕盛泄瀉腹痛水穀不化者尤厚朴陳皮猪苓澤瀉白朮赤茯苓白芍藥各一錢肉桂甘草各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服(醫鑑)

泄瀉諸證

有濕泄瀉風泄寒泄暑泄火泄熱泄虛泄滑泄積泄澀泄食積泄脾泄腎泄泄瀉瀉瀉暴泄洞泄久泄 ○凡泄皆兼濕初宜分利中焦滲利下焦久則升舉必滑脫不禁然後用瀉藥止

之(入門) ○治泄補虛不可純用甘溫太甘則生濕清熱亦不可太苦苦則傷脾惟淡劑利竅為妙(入門) ○治瀉之法先當分利水穀車前子煎湯調五苓散(方見寒門) 次則理正中焦理中湯治中

湯(方見寒門) 理中治不效然後方可斷下固腸丸是也(濟生) ○治瀉須先中焦理中湯丸是也次分利水穀五苓散是也治中不效然後斷下赤石脂禹餘糧湯(方見寒門) ○治瀉諸藥多作丸子

服之(正傳) ○凡泄瀉小便清白不澀為寒赤澀為熱(原病) ○手足寒為冷證手足溫為熱證(直指) ○大便完穀不化而色不變吐利腥穢小便清白不澀身冷不渴脈微細而遲者皆寒證也凡穀

肉消化無問色及他證使斷爲熱夫寒泄而殺消化者未之有也(原病)○或火性急速傳化失常完穀不化而爲殭泄者亦有之仲景曰邪熱不殺穀然熱得濕則爲殭泄也(原病)暴瀉非陽久瀉非陰

(機要)○通治用三白湯燥溼瀉益元散(方見暑門)

固腸丸

治泄病日久滑數瘦弱以此瀉之龍骨附子炮枯白礬訶子皮各一两丁香良薑赤石脂白豆蔻縮砂各五錢木香三錢右爲末醋糊和丸梧子大粟米飲下三十九(入門)

三白湯

治一切泄瀉白朮白茯苓白芍藥各一錢半甘草炙五分

燥溼湯

治諸泄瀉白朮二錢白茯苓白芍藥炒各一錢半陳皮一錢甘草炙五分右對作一貼水煎服(必用)○此三白湯加陳皮一味也○一名朮芍芍藥湯

溼泄

即濡泄也亦名洞泄其證如水傾下腸鳴身重腹不痛(入門)○左傳曰雨淫腹疾是也○寒濕傷於脾胃不能腐熟水穀故洞泄如水謂之濡泄胃谷湯加草豆蔻主之(綱目)○溼瀉身痛五苓散加羌

活蒼朮(得效)○水穀不化清濁不分是溼泄也(回春)○凡瀉水腹不痛是溼泄宜麴芍丸(本事)○大瀉引飲因致水穀一時併下宜五苓散(易老)○洞泄宜瀉濕湯衛生湯萬病五苓散

麴芍丸

治風濕泄瀉神麴芍藥白朮附子炮各等分右爲末麴糊和丸梧子大空心米飲下三五十九○左傳云麴麴芍藥能除濕若脾濕而泄者萬無不中亦治殭泄(本事)

瀉溼湯

治洞泄白朮炒三錢白芍藥炒二錢陳皮炒一錢半防風一錢升麻五分右對作一貼水煎服之○此劉草憲治洞泄要方也(丹心)

衛生湯

治洞瀉人參白朮白茯苓山藥陳皮薏苡仁澤瀉各一錢黃連甘草各五分右對作一貼空心水煎服(入門)

萬病五苓散

治濕泄瀉水多而腹不痛腹響雷鳴脈細赤茯苓白朮猪苓澤瀉山藥陳皮蒼朮縮砂炒肉豆蔻煨訶子煨各八分桂皮甘草各五分右對作一貼入薑二片梅一個燈心一團空心水

煎服之(回春)

風泄

惡風自汗或帶清血由春傷風夏感溼而發動故其瀉暴(入門)○風邪入於腸胃故大便不聚而瀉(直指)○瀉而便帶清血宜胃風湯(回春)○風邪內滯宜桂枝麻黃湯汗之(方見寒門)○綱目

寒泄

惡寒身重腹脹切痛雷鳴鳴漉清冷完穀不化宜理中湯加赤茯苓厚朴或治中湯(方見寒門)加縮砂(入門)○協寒自利不渴曰鴨瀉亦曰意瀉所下清白如鴨屎狀也(入門)○寒泄一名鷺瀉大便

如水宜附子溫中湯或平胃散(方見五藏)合理中湯(入門)○寒泄宜四柱散六柱散○寒泄須早晚服藥蓋平朝服煖藥到夜藥力已盡無以敵一夜陰氣所以無效故臨臥再服可也(丹心)

附子溫中湯 治中寒腹痛泄瀉水穀不化附子炮乾薑炮各一錢半人參白朮白茯苓白芍藥甘草炙各一錢厚朴草豆蔻煨陳皮各六分右對作一貼水煎空心服(綱目)

四柱散 治元歲虛冷臍腹痛大便滑泄耳鳴頭暈木香白茯苓人參附子炮各一錢二分半右對作一貼入薑三片棗二枚鹽少許水煎空心溫服(局方)

六柱散 治元歲虛冷臍腹痛泄瀉不止四柱散本方加訶子肉豆蔻等分對水煎服(三因)

暑泄 煩渴尿赤暴瀉如水宜薤苳湯加白芍藥車前子或桂苓甘露飲(入門)○夏月暴瀉如水而垢脈虛煩渴自汗香薷散(方見暑門)合異功散(方見五藏)加白芍藥車前子入陳米炒百粒烏梅一個燈心一團同煎服(回春)○暑泄宜麴朮丸清六丸通

心散益元散六和湯清暑益氣湯三方並見暑門)

薤苳湯 治夏月泄瀉欲成痢澤瀉一錢二分豬苓赤茯苓白朮香薷黃連薑汁炒白藟豆厚朴製各一錢甘草三分右對作一貼水煎服(集略)

桂苓甘露飲 治傷暑煩渴泄瀉或霍亂吐瀉滑石二兩赤茯苓澤瀉石膏寒水石甘草各一兩白朮肉桂猪苓各五錢右爲細末每二錢熱湯冷水任下入蜜少許尤好薑湯尤妙(丹心)

麴朮丸 治傷暑暴瀉神麴炒蒼朮製各等分右爲末麴糊和丸梧子大空心米飲下三五十丸(局方)

清六丸 治濕熱泄瀉益元散(方見暑門)三兩加紅麴半兩炒右爲末陳米飯和丸梧子大空心白湯下五七十九(丹心)

通苳散 治暑濕泄瀉分水穀解煩熱澤瀉白朮猪苓赤茯苓朮通苳茵陳置麥車前子各一錢右對作一貼入燈心一團麥門冬十粒同煎服(得效)

火泄 卽熱泄也口乾喜冷痛一陣瀉一陣其來暴速稠粘宜黃連香薷散(方見暑門)合四苳散加白芍藥梔子炒(入門)○腹中痛痛一陣瀉一陣所下如湯後重如滯瀉下赤色小便赤澀煩渴脈數宜萬病

四苳散(回春)○腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣者是火四苳散加木通滑石黃芩梔子(丹心)

萬病四苳散 治熱瀉赤茯苓白朮猪苓澤瀉蒼朮炒山藥白芍藥炒梔子炒陳皮各一錢甘草炙五分右對作一貼入烏梅一個燈心一團同煎服(回春)

四苓散即五苓散去肉桂

虛泄困倦無力遇飲食即瀉或腹不痛四君子湯方見氣門加木香補便瀉肉陳糯米爲末砂糖湯調下空入胃即瀉水空入胃即瀉水

穀不化脈微弱宜參苓蓮水散同春○虛泄養元散加味四君子湯皆佳得效

升陽除濕湯治氣虛泄瀉不思飲食困弱無力蒼朮一錢半升麻柴胡羌活防風神麴澤瀉

參苓蓮朮散治氣虛泄瀉人參白朮白茯苓山藥蓮子陳皮各一錢縮砂養香訶子肉豆蔻

養元散治泄瀉少食糯米一升水浸一宿瀉乾慢火炒極熟爲細末入山藥末一兩胡椒末少許和勻每

加味四君子湯治氣虛泄瀉四君子湯加肉豆蔻煨訶子炮各一錢

滑泄滑泄不禁瀉久不止大孔如竹筒直出無禁氣陷下者補中益氣湯方見內傷加白芍藥訶子肉豆

丸木香散實腸散○大腸滑泄

八桂散治滑泄不禁人參白朮肉豆蔻煨乾薑炒訶子炮附子炮罌粟殼蜜炒甘草

禹餘糧丸治虛寒滑泄不禁禹餘糧煨赤石脂煨龍骨草撥訶子炮乾薑炮肉豆蔻

木香散治藏寒滑泄米穀不化上熱下冷口瘡瘦瘁木香破故紙各一兩良薑縮砂厚朴各七錢半赤

肝四兩批開重藥漿水一椀入醋少許蓋覆煮熟入鹽煎白三莖生薑彈子大同煮水

實腸散治虛冷泄瀉厚朴薑製一錢半肉豆蔻煨訶子炮縮砂研陳皮蒼朮赤茯苓

萬全丸 治久痢及泄瀉寒滑不禁赤石脂乾薑炮各一兩胡椒五錢右爲末醋糊和丸梧子大空心米飲下五七丸(入門)

殞泄 殞泄者米穀不化而泄出也(綱目)○夕食謂之殞以食之難化者尤重於夕故食不化泄出者謂之殞泄(聖濟)○內經曰清氣在下則生殞泄註曰清氣陽氣也陽爲熱熱氣在下則穀不化故爲殞泄也○又曰久風入中則爲腸風殞泄夫脾胃沖和之氣以化爲事今清氣下降或風邪久而干胃是木賊土也故沖和之氣不能化而令物完出謂之殞泄或飲食太過腸胃受傷亦致米穀不化俗呼爲水穀痢也加減木香散主之(衛生)○殞泄之證奪食則一日可止夫奪食之理爲胃弱不能尅化食則爲泄如食不下何以作泄更當以藥如養元散八仙糕之類滋養元氣候泄漸止少與食胃勝則安矣(東垣)○殞泄宜防風芍藥湯若北防風湯○一人病殞泄腹中雷鳴泄注米穀不化小便澀滯以桂枝麻黃湯(方見寒門)加薑椒煎大劑連進三服汗出終日而即愈(子和)

加減木香散 治殞泄水穀痢木香良薑升麻檳榔人參白朮各二錢半神麩炒二錢肉豆蔻煨吳茱萸湯洗乾薑炮陳皮縮砂各五分右麩末每五錢空心水煎服之○亦治腸風殞泄(綱目)

八仙糕 治脾胃虛損泄瀉不止最益老人小兒枳實炒白朮土炒山藥各四兩山查肉三兩白茯苓陳皮炒蓮肉各二兩人參一兩右爲末粳米五升糯米一升半打粉蜜三斤入藥末和勻入甑蒸熟焙乾取食之以湯漱口送下(回春)

防風芍藥湯 治殞泄身熱脈弦腹痛而渴防風白芍藥各二錢黃芩一錢右到水煎服(東垣)

蒼朮防風湯 治久風爲殞泄不飲水而發完出蒼朮六錢麻黃二錢防風一錢右到作一貼入薑十片水煎服(東垣)

痰泄 或瀉或不瀉或多或少或一二陳湯(方見痰門)加乾葛白朮神麩實苦海青丸虛者六君子湯(方見痰飲)○入門○痰泄脈沈滑宜萬病二陳湯(回春)

海青丸 治痰積泄瀉海粉一兩青黛三錢黃芩二錢神麩五錢右爲末別以神麩作糊和丸梧子大空心白湯下三十九丸(入門)

萬病二陳湯 治痰溼泄瀉半夏陳皮赤茯苓白朮蒼朮山藥各一錢縮砂厚朴木通車前子炒甘草炙各五分右到作一貼薑三片烏梅一個燈心一團水煎服(回春)

食積泄 泄而腹痛甚瀉後痛減臭如抱壞雞子噯氣作酸平胃散(方見五藏)加香附縮砂草果山查子麥芽煎服(入門)○腹痛甚而瀉瀉後痛減脈弦而滑宜香砂平胃散(方見內傷)去枳實加白朮白

茯苓(回春)○傷食積而泄糞白可驗(得效)○凡積滯瀉腹必脹痛方泄者是也或肚腹滿按之堅者亦是也宜用神效麥芽山查之類以消之(丹心)○有停飲食數日乃瀉名曰瀉泄宜枳朮丸(方見內)

酒泄

飲食過傷遂成酒泄骨立不能食但飲一二盃經年不愈宜香茸丸(得效)○患酒泄或酒後特甚平加生薑乾葛煎水酒蒸黃連丸(方見血門)○空心吞下一錢為妙(丹心)

香茸丸

治酒泄乳香三錢鹿茸煨去毛酥炙黃五錢肉豆蔻一兩每個切作兩片入乳香在內麪裏煨麝香二錢另研右為末陳米飯和丸梧子大米飲下五十丸(入門)

脾泄

脾泄者肢體重著中脘有妨面色萎黃腹肚微滿宜用者白朮厚朴木香乾薑生肉豆蔻(直指)○脾泄者食後到飽瀉去即寬脈細宜香砂六君子湯(回春)○脾泄多老人腎虛謂之水土同化宜吳茱萸湯(得效)○脾泄久傳腎為腸澼經年不愈者宜調中健脾胃丸(入門)○脾泄已久大腸不禁此脾氣已脫宜急證之用赤石脂肉豆蔻乾薑之類(丹心)○脾泄宜服固中丸(綱目)○老人奉養太過飲食傷脾常泄瀉亦是脾

泄宜用山查朮丸(入門)

香砂六君子湯

治脾泄香附子縮砂研厚朴陳皮人參白朮白芍藥炒蒼朮炒山藥炒各一錢甘草炙五分右剉作一貼入薑三片烏梅一個水煎服(回春)

吳茱萸湯

治脾泄吳茱萸揀淨每五錢白水煮去滓入鹽少許通口服蓋茶葉能緩腸脫水道既清大腸自固餘藥雖熱不能分辯清濁也得效)

調中健脾胃丸

治脾腎氣虛早晚清瀉白朮破故紙炒訶子炮肉豆蔻煨各一兩赤茯苓陳皮各八錢黃連以吳茱萸煎水炒過七錢神麴六錢木香厚朴茴香炒縮砂山藥蓮子各五錢右為末粥丸

梧子大空心以蓮子煎湯下七十九(入門)

固中丸

治脾久泄蒼朮肉豆蔻煨各一兩右為末粥丸梧子大空心米飲下五十七丸○若加破故紙炒一兩名曰固下丸治腎久泄(綱目)

山查枳朮丸

治老人奉養太過飲食傷脾常泄瀉白朮炒二兩神麴炒山查肉炒各一兩半黃芩炒白芍藥酒炒半夏薑製各五錢右為末以青荷葉煨飯和丸梧子大白湯下五十九(丹心)

腎泄一名晨泄一名瀉泄每五更泄一次世腎虛或陰氣而然宜五味子散（本事）○每日五更初洞泄

服他藥無效此名脾腎泄宜二神丸（入門）○老人脾腎虛泄宜猪藏丸（入門）○腎虛色慾

所傷多足冷久則肉削五鼓臍下較痛或只微響溇泄一次宜二神丸四神丸五味子散（入門）○腎

泄者腹痛無定處似痢骨弱色驚脚下時冷尺脈虛弱者也是也當以破故紙生乾薑肉桂木香當歸主

之（直指）○脾腎虛晨泄宜三神丸
調中健脾丸六神湯香薷散木香散

五味子散治腎泄每於五更天明洞泄一次謂之晨泄五味子二兩吳

二神丸治脾腎虛泄破故紙炒四兩肉豆蔻生二兩右爲末肥粳四十九枚生薑厚兩切片同煮

四神丸治脾腎虛泄病又治晨泄經年者破故紙酒浸炒四兩肉豆蔻煨五味子炒各二兩吳茱萸湯

猪藏丸治老人脾腎虛泄瀉吳茱萸不以多少鹽水浸透積猪藏頭一截去脂膜洗淨入茱萸於藏中

三神丸治脾腎虛泄瀉即二神丸一料加木香一兩劑法服法同本方（瑞竹）○孫真人云補腎不若補

六神湯治脾腎俱虛泄瀉肉豆蔻煨破故紙炒白朮白茯苓各一錢半木香甘草炙各

香薷散治晨泄生薑四兩切如豆大黃連二兩到右同掩一宿慢火炒盡紫色去盡不

木香散治脾腎泄肉豆蔻破故紙白朮白茯苓各一錢半木香

暴泄太陽神太陰下痢爲數澇大腸不能禁固卒然而下大便如水其中有小結糞硬物欲起而又下欲了

而不了小便多清此寒也宜溫之理中湯（方見寒痢）藥水散（易老）○有暴下無聲身冷自汗小便

清利大便不禁氣難布息脈微嘔吐此為寒泄急以重藥溫之宜漿水散易老○暴泄宜漿水散朝奠丹

漿水散

治暴泄一身冷汗脈沉弱氣少不能語甚者加吐此為緊病半夏製二兩乾薑炮肉桂附子炮甘草炙各五錢良薑二錢半右為末每服五錢水二盞煎至一盞空心熱服易老

朝奠丹

治寒盛泄瀉不止腸鳴腹痛手足厥冷脈微弱黃生研三兩白礬煨七錢半右為末水浸蒸餅和丸梧子大朱砂二錢為衣米飲下三十九局方

久泄

厥陰經動下痢不止其脈沉遲手足厥逆涕唾膿血此證難治法曰風邪縮於內宜散之用桂枝麻黃湯方見寒吧汗之易老○凡久瀉之由多因真陰虛損元氣下陷遂成久泄若非補中益氣湯方

見內傷四神丸滋其本源則後必胸痞腹脹小便淋漓多致不起回春○久泄是風邪內縮宜發其汗此證係風邪縮於內宜麻黃升麻湯以發之散邪於四肢布於經絡外無其邪則藏氣安矣丹

溪○虛滑久不愈多傳變為痢宜厚朴枳實湯保命○久泄不止用破故紙肉豆蔻山藥則止丹心○久泄潤泄屬於肝經木剋土而成亦是腸澼者腸中有積水也子和○久泄宜參朮健脾

丸除濕健脾胃溫脾散訶子散○飲食不節起居不時損其胃氣則上升精微之氣反下降泄久則太陰傳少陰而為腸澼東垣

麻黃升麻湯

治風邪內縮久泄不止宜以此發之方見血門

厚朴枳實湯

虛滑久不愈多傳變為痢太陰傳少陰是為鬼賊宜以此防其傳變厚朴薑製訶子皮半生半熟枳實麩炒各二錢木香一錢大黃六分黃連甘草炙各四分右剉作一貼煎服保命

參朮健脾丸

治久年泄瀉臍腹冷痛以此溫補脾胃者朮八兩二兩鹽水浸二兩醋浸二兩白朮炒入參白朮白茯苓山藥炒破故紙酒炒枸杞子更絲子酒製蓮肉各二兩川棟肉五

味子牛膝各一兩半川椒炒茴香鹽炒陳皮木香遠志各五錢右為末酒糊和丸梧子大空心鹽湯下百丸回春

除濕健脾胃湯

治久瀉色蒼面齒疎倦怠食減白朮一錢半若朮炒白茯苓白芍藥炒各一錢當歸陳皮各八分猪苓澤瀉各七分厚朴防風各六分升麻柴胡各五分甘草四分右剉作一貼入薑三

片薑二枚空心水煎服回春

溫脾散

治久瀉米穀不化水穀入口即時直下元虛冷滑脫黃芪蜜炒人參白朮土炒白茯苓山藥炒乾薑炮訶子炮肉豆蔻煨薑棗殼蜜炒草果丁香肉桂附子炮黃連薑汁炒縮砂陳皮厚朴甘草

各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服(回春)

訶子散

治久泄不止訶子皮一兩半生半熟木香五錢黃連三錢甘草二錢右爲末每取二錢以白朮白芍藥煎湯調下(保命)

泄瀉宜用升陽之藥

暑月霖雨時人多病泄瀉乃濕多成五泄故也內經曰在下者引而竭之又曰治濕不利小便之藥則是降之又降復益其陰而重竭其陽也茲以升陽之藥是爲宜耳光活潑調升麻各六錢半防風甘草炙各一錢右剉水煎服即愈大法曰寒濕之勝助風以平之又曰下者舉之正謂此也

東垣

瀉與痢不同

泄瀉之設水穀或化或不化並無勞責惟覺困憊若滯下則不然或膿或血或膿血相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相雜雖有痛不痛之異而皆裏急後重逼迫惱人赤白交下爲異(丹心)

久泄成痢

太陰經受溼而爲水泄虛滑身亦微滿不知穀味久則傳變而爲膿血痢(機要)○夫痢者皆由榮衛不和腸胃虛弱冷熱之氣乘虛客於腸胃之間泄而爲痢也(類聚)○飲食不節起居不時損其胃氣則上乘精微之氣反下降是爲

飧泄久則太陰傳少陰而爲腸澼(東垣)

痢疾

諸證滯下之證內經所載有血溢血泄血便注下古方則有清膿血及泄下近世並呼爲痢疾其實一也(三因)○痢有赤痢白痢赤白痢水穀痢膿血痢噤口痢休息痢風痢寒痢濕痢熱痢氣痢虛

痢滑痢積痢久痢疫痢養瘧痢五色痢

赤痢

赤痢自小腸來溼熱爲本(丹心)○赤痢即血痢也○下痢赤積身熱益元散(方見醫門)加木通芍藥炒陳皮白朮煎湯吞下保和丸(方見醫門)○赤痢宜導赤地榆湯加減平胃散地榆散固腸丸清

六九方見上

導赤地榆湯

治赤痢及血痢地榆當歸身清洗各一錢半赤芍藥炒黃連酒炒黃芩酒炒槐花炒各一錢阿膠珠荊芥穗各八分甘草炙五分右剉作一貼空心水煎服(集略)

加減平胃散

治血痢赤痢夫脾胃虛則血不流於四肢却入於胃而爲血痢白朮厚朴陳皮各一錢二分桃仁人參黃連阿膠珠赤茯苓各七分甘草九分木香檳榔各五分右剉作一貼入薑三片

棗二枚空心水煎服(易老)

地榆散 治血痢赤痢地榆赤芍藥黃連青皮各等分右爲末每三錢空心以淡米飲調下(丹心)

固腸丸 治血痢赤痢去腸胃陳積之後用此以燥下濕樗根白皮焙乾爲末粥九梧子大空心米飲下此藥性涼而燥須炒用(丹溪)一方樗根白皮四兩滑石二兩爲末粥丸(丹溪)

白痢 白痢屬氣自大腸來淫熱爲本(丹心)○痢爲濕熱甚於腸胃佛鬱而成其病皆熱證也俗以痢白爲寒誤也如熱生瘡爛而出白膿可以白爲寒乎若以白爲寒赤爲熱則發赤白者乃寒熱俱甚於腸胃

之間而爲病乎况下迫窘痛小便赤澀而痢白者亦多有之爲熱明矣(河間)○凡泄痢無已變作白膿點滴而下爲之溫脾不愈法當溫腎蓋腎主骨髓白膿者骨髓之異名也其證面色微黑骨力羸弱

的見腎虛當用破故紙當歸木香乾薑肉桂之屬(直指)○白痢宜益元散(方見暑間)溫六丸水煮木香丸瀉白安胃飲

溫六丸 治白痢益元散一劑加乾薑一兩右爲末飯丸梧子大白湯下五七十九丸(丹心)

水煮木香丸 治白痢及淡紅痢乾薑二兩黨參殼一兩訶子肉三錢當歸白芍藥各二錢半木香青皮陳皮甘草各一錢半右爲末蜜丸彈子大熱水化下一丸(得效)

瀉白安胃飲 治白痢蒼朮炒白芍藥酒炒蓮肉各一錢白朮七分半人參陳皮白茯苓黃芪蜜炒當歸酒洗各五分木香乾薑炮甘草炙各三分右到作一貼空心水煎服

赤白痢 治熱不調赤白各半宜薑墨丸乍濟乍調似痢非痢宜萊連丸(入門)○或赤或白冷熱不調宜小駐車丸(入門)○赤白痢宜黃連阿膠丸固腸湯真人養藏湯萊連丸

薑墨丸 治赤白痢及盛疔痢乾薑炒松烟墨煨右等分爲末醋煮麪糊和丸梧子大空心米飲下三十五丸日三服(入門)

萊連丸 治赤白痢吳茱萸黃連各二兩右以好酒同浸三日乃各揀取焙乾爲末醋糊和丸梧子大赤痢則黃連丸三十粒以甘草湯吞下白痢則萊萸丸三十粒以乾薑湯吞下赤白痢則各取三十粒以甘草乾薑湯下(丹心)○一名黃連丸

小駐車丸 治赤白痢黃連三兩阿膠珠一兩半當歸一兩乾薑五錢右爲末醋糊和丸梧子大空心飲下三十五丸(入門)

黃連阿膠丸

治赤白痢及熱痢黃連三兩赤茯苓二兩右爲末水調阿膠炒末一兩和丸梧子大空心米飲下三十九(局方)

固腸湯

治赤白痢各五分人參木香各三分右剉作一貼空心水煎服(丹心)

真人養臟湯

治赤白痢及諸痢芩朮各一錢甘草九分白芍藥八分木香七分訶子六分肉桂人參當歸白朮肉豆蔻各三分右剉作一貼空心水煎溫服(入門)

水穀痢

脾胃氣虛則不能消化水穀精粕不聚變而爲水穀痢(神巧)○瀉泄亦曰水穀痢宜參看

膿血痢

如煩躁或先便膿後見血非黃連不止此上部血也○如惡寒脈沈或腰痛臍下痛非黃芩不除此中部血也○如惡寒脈沈先見血後便膿非地榆不除此下部血也(易老)○膿血稠厚裏急後重

皆屬於火內經曰澁澁而便膿血知氣行而血止也蓋澁澁而便膿血者言病因也氣行而血止者言治法也故曰行血則便膿自愈調氣則後重自除芍藥湯主之(易老)○澁澁而便膿血宜大黃湯下

之是謂重劑黃芩芍藥湯和之是謂輕劑(易老)○膿血稠粘皆屬於火夫太陰溼主瀉少陰主痢是先泄亡津液而火就燥腎惡燥居下焦血分其受邪者故便膿血所謂瀉瀉屬脾而痢屬腎也(綱目)○

熱鬱紫黑色者瘀血也腹痛後重異常桃仁承氣湯(方見寒門)下之要知諸痢皆血瘀惟黑爲瘀甚耳(入門)○膿血痢宜桃花湯(方見寒門)導氣湯黃連阿膠湯導滯湯地榆散解毒金花散芍藥栝

皮丸赤石脂丸人參散

芍藥湯

治痢澁澀而便膿血令行血則便膿自愈調氣則後重自除此藥是也白芍藥二錢黃連一條芩當歸尾各一錢大黃七分木香檳榔桂心甘草各五分右剉作一貼水煎服(易老)

大黃湯

治熱痢膿血稠粘裏急後重日夜無度大黃一兩剉好酒二盞浸半日煎至一盞半去渣分二次頓服以利爲度又服芍藥湯以和之此滌蕩邪熱之劑也酒煎者欲上至頭頂外徹皮毛也(易老)

老)

黃芩芍藥湯

治下痢膿血身熱腹痛脈洪數黃芩白芍藥各二錢甘草一錢右剉作一貼水煎服腹痛甚加桂心三分(丹心)○一名黃芩湯

導氣湯

治下痢膿血裏急後重當歸二錢半大黃黃芩白芍藥各一錢黃連木香檳榔各五分右剉作一貼水煎服(東垣)

黃連阿膠湯 治熱毒下痢膿血或如爛肉汁黃連阿膠珠黃栢
梔子各一錢二分半右剉作一貼水煎服(海藏)

導滯湯 治下痢膿血裏急後重腹痛作渴日夜無度白芍藥二錢當歸黃芩黃連各一
錢大黃七分桂心木香檳榔甘草各三分右剉作一貼空心水煎服(入門)

地榆散 治熱毒下痢膿血地榆犀角黃連炒葛根黃芩各一錢
梔子五分右剉作一貼入雞白五莖同煎服(活人)

解毒金花散 治熱毒膿血痢黃連黃栢各二錢白朮黃芩赤茯苓
赤芍芍藥各一錢右剉作一貼水煎服(丹心)

芍藥栢皮丸 治溼熱惡痢下膿血白芍藥黃栢皮各一兩當歸黃連
各五錢右爲末水丸小豆大溫水下三四十九(子和)

赤石脂丸 治下痢膿血腹痛赤石脂乾薑各一兩黃連當歸各二
兩右爲末蜜丸梧子大米飲下三五十丸空心(入門)

人參散 治酒毒挾熱下痢膿血腹痛久不差百藥無效槓根白皮人參各二
兩右爲末一錢空心米飲調下忌酒麪雞魚果菜等物(本事)

噤口痢 痢疾不納飲食者俗謂之噤口痢如頭痛心煩手足溫熱此乃毒氣上衝心肺敗毒散(方見寒門)
五錢加蓮肉一錢陳米百粒薑二葉二煎服如過飲苦澀涼藥以致開食先嘔山藥到如小豆銀石

器曰搗半炒半生共爲末米飲調下即效(綱目)○噤口痢胃口熱甚故也宜參連湯發臍法人不知
此多用溫熱藥及甘味此以火濟火以滯益滯也(丹心)○下痢噤口不食亦由脾虛宜以參苓白朮

散(方見內傷)去山藥加石菖蒲爲末粳米飲調下二錢或人參赤茯苓石蓮子入些菖蒲煎服胸次
一開自然思食(直指)○凡治痢早用鴛粟殼則令毒氣閉塞心絡合噤口不食宜以御米煮稀粥溫

噤解之(類聚)○噤口痢宜食煖
湯開噤湯石蓮散解噤丸德臍膏

參連湯 治噤口痢胃口熱甚黃連三錢人參石蓮肉各二錢右剉作一貼水煎
取濃汁細細呷之如吐再吃但得一呷下咽便開仍用發臍法(回春)

發臍法 引熱合下行田螺二個入麝香少
許搗爛臍臍中以帛包定(丹心)

倉廩湯 治噤口痢心煩手足熱頭痛此乃毒氣上衝心肺所以嘔而不食人參散毒散(方見寒門)
加黃連一錢石蓮肉七枚陳食米三百粒入薑三片薑二枚同煎服(醫鑿)○亦治熱痢

開喉湯

治喉口痢砂糖七錢細茶五錢細砂礪一錢生薑五片右剉作一貼水煎露一宿
次早面北溫服○外用木甌子去殼三錢麝香二分共搗鬆胸中卽思食(回春)

石蓮散

治喉口痢石蓮子搗去殼置心併肉研爲末每二錢陳米飲調下此疾由毒氣上衝心
肺借此以通心氣便覺思食仍以東壁上炒橘皮爲末入薑棗略煎服佐之(綱目)

解噤丸

治噤口痢黃連八兩剉生薑四兩切同炒令焦去薑只取黃連爲末陳米飲和丸梧
子大每服七八十九赤痢陳米飲下白痢橘皮湯下赤白痢陳米橘皮湯下(丹心)

納臍膏

治噤口痢危重者用之立愈王瓜藤連殼葉經
霜者晒乾燒灰香油調納臍中卽效(醫鑑)

休息痢

凡痢乍發乍止者名休息痢(類聚)休息痢經年不差以致氣血虛而不斂八物湯(方見虛勞)加
陳皮阿膠珠黃連黃芩各少許脾胃虛者補中益氣湯參苓白朮散(並見內傷)○入門○休息痢

宜加味養藏湯三根
飲訶黎勒丸神效丸

加味養藏湯

治休息痢真人養藏湯(方見下)加附子青皮
烏藥茯苓右剉薑三片棗二枚煎服(得效)

三根飲

治休息久痢如神五倍木根若耳草根臭樗木根剉取白皮各等分右剉每服七
錢入生薑三片大棗二枚黑豆三十六粒糯米四十九粒空心同煎服(正傳)

訶黎勒丸

治休息痢百藥不效搗根白皮二兩訶子肉五錢母丁香三十粒右
爲末醋糊和丸梧子大陳米飲入醋少許吞下五十九日三(本事)

神效丸

治休息痢膿血不止疼痛困弱當歸烏梅肉黃連阿膠珠各等分右
爲末蜜丸梧子大空心厚朴湯下三五十丸病甚者續丸(入門)

風痢

風痢惡風鼻塞身重色青或純下清水宜若水防風湯(方見上)○入門○風痢所下
似痢非痢似血非血宜倉廩湯(方見上)得效○風痢宜胃風湯(方見上)露宿湯

露宿湯

治風痢純下清水杏仁去皮尖七個苦木一掌大(即樗根白皮)烏梅一個草果一個酸
石榴皮半個青皮二個甘草一寸右剉作一貼入薑三片煎露星一宿次早空心服(得效)

寒痢

寒痢白如蝦濇腸鳴痛墜不甚宜理中湯(方見寒門)加訶
子肉豆蔻日久者黃連補腸湯(入門)○寒痢宜赤石脂散

黃連補腸湯

治大腸虛冷痢下青白黃連四錢赤茯苓川芎各三錢酸石榴皮五
片地榆五錢伏龍肝二錢右剉八錢作一貼空心水煎服(入門)

赤石脂散 治冷痢赤白腸滑肉豆寇煨一兩縮砂五錢赤石脂甘

草炙各二錢半右爲末分二錢粟米飲調下(得效)
利溼痢腹脹身重下如黑豆汁或赤黑渾濁此危證也宜當歸和血散(方見後陰)加味除溼湯戊己丸
(下痢如豆汁者溼也蓋脾胃爲水穀之海常兼四臟故有五色之相雜當先通利此迎而奪之之義

也丹
心)

加味除溼湯 治傷溼下痢如黑豆汁半夏厚朴蒼朮各一錢一分藿香陳皮赤茯苓各七

戊己丸 治溼痢黃連與萊菔白芍藥各等分右爲末麩

糊和丸梧子大空心米飲下五七十九丸(局方)
熱痢 熱痢與暑痢同○大凡痢疾多因伏暑而得但青寒而垢或面如塗油齒乾煩冤燥渴引飲皆暑證也
不宜輕用附子等熱藥宜酒蒸黃連丸(方見血門)○得效○其冷熱纏積腸胃間滑澀垢膩者名腸

垢即熱痢也(類聚)○偏熱純赤見暑證輕者黃芩芍藥湯重者導滯湯日久者黃連阿膠湯(入門)
○挾熱下痢者身熱口渴小便澀少大便急痛所下黃赤色(入門)○熱痢黃芩芍藥湯最妙(入門)

○下痢壯熱須用倉廩湯(直指)○下痢欲飲水有熱故宜白頭翁
湯(方見寒門)○仲景○熱痢宜烏梅丸寧胃散加常歸(方見下)

烏梅丸 治熱痢腹痛下純血黃連一兩半烏梅肉當歸枳殼

各一兩右末醋糊和丸米飲下七十九空心(丹心)
寧胃散 治赤白熱痢白芍藥二錢黃芩黃連木香枳殼各一錢半陳皮一

錢甘草炙五分右剉作一貼水煎服一名芩連芍藥湯(必用)

氣痢丸 治氣痢狀如蟹渤河子皮橘皮厚朴各一兩右

爲末蜜丸梧子大空心米飲下三十九丸(入門)
牛乳湯 治氣痢導散二錢剉牛乳半升右同煎減半空心服(得效)○

唐太宗苦氣痢方不差有衛生進此方服之即愈(醫說)
虛痢 氣弱困倦穀食難化腹微痛或大痛並無勞責(入門)○滑痢與虛痢同虛滑不禁甚則氣血俱脫血
虛四物湯加人參白朮地榆檉白皮氣虛真人養臟湯(入門)○氣虛色白如皂涕凍膠理中湯加木

香肉桂厚朴赤茯苓(入門)○如方倦自覺氣少惡食此為挾虛證宜用補氣血之藥虛迴而痢自止
(丹心)○痢疾日久氣血虛弱宜用八物湯(方見虛勞)補中益氣湯(方見內傷)○回春○痢積久
者不可下胃虛故也調中理氣湯加味香連丸擇用之(醫鑑)○久痢五虛證危困者宜大斷下丸五
虛者脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入是也如藥粥入胃灌注止則虛者活矣(得效)○虛寒痢脫
肛宜訶子皮
散(東垣)

調中理氣湯

治虛弱氣弱困倦白朮枳殼白芍藥檳榔各一錢蒼朮陳皮各八分厚
朴七分木香五分右剉作一貼水煎服此治痢調理之劑也(醫鑑)

加味香連丸

治虛弱及久痢一切諸病黃連四兩以吳茱萸煎水浸炒木香一兩陸英蓉二錢右為
末陳米糊和丸著豆大每二三十丸以蓮肉煎湯吞下被蓋就睡奏效神矣(入門)

大斷下丸

治久痢滑數消瘦困弱附子炮白礬枯肉豆豉煨牡蠣煨訶子皮酸石榴皮各一兩良薑
乾薑赤石脂各七錢半細辛三錢七分半右為末醋糊和丸梧子大粟米飲下三十九(入門)

訶子皮散

治虛寒赤白痢脫肛御米殼蜜炒橘皮各五分乾薑炮六
分訶子皮七分右為末作一貼水煎空心服(東垣)

積痢積痢色黃或如魚腦腹脹痛惡食(入門)○無積不成痢(直指)○痢出於積滯積物積也滯氣滯
也物積欲出氣滯而不與之出所以以下墜裏急乍起乍止日夜凡百餘度人有此證不論色之赤白脈

之大小一皆以通利行之(直指)○飲食傷飽者注下酸鼻諸有積者以肚熱經痛推之(直指)
(○)傷積滯則黃白有效(得效)○食積痢宜保和丸(方見積門)感應丸蘇感丸生熟飲子

感應丸

治積痢久痢赤白膿血相雜肉豆豉煨白蠟炮百草霜各二兩半香一兩半葶藶茄三稜炮丁香
各一兩巴豆百粒去皮心膜去油為霜杏仁百粒去皮尖雙仁熟炒另研酒煮蠟四兩清油一兩

右七味為細末入巴豆杏仁末先將油煎蠟令熔化拌和藥末成劑每一
兩分作十錠每一錠米飲調服或作丸菘豆大白湯吞下十九(得效)

蘇感丸

治積痢腹內緊痛麝香蘇合丸(方見氣門)四分威
應丸六分研勻丸菘豆大米飲下三十九(得效)

生熟飲子

治大人諸痢及小兒虛積痢日夜無度鶯粟殼大者四個去瓢帶半炙半生陳皮二片半生半
炒甘草二寸半生半炙烏梅二個半生半煨大棗二枚半生半煨生薑二塊半生半煨木香一

錢作兩片半生半煨訶子大者二個半生半煨黑豆六十粒半生半炒黃芩二寸半生半炙白朮一塊
半生半煨當歸二寸半生半煨右剉和勻每服五錢水一盞半同入磁瓶內煮至半去滓溫服小兒服

一二合此方分生熟均冷熱冷熱既散腸胃既厚則水穀自分何患瀉痢哉（省翁）

久痢痢已減十之七八穢積已盡糟粕未實當以炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒

然此丸性燥若滯氣未盡不可遽用（丹心）○久痢體虛氣弱滑泄不止當以訶子肉豆蔻白礬半夏等藥調之甚者添牡蠣須以陳皮爲佐恐大溫亦能作疹也（丹心）○久痢不止服理中湯益甚此痢在下焦赤石脂禹餘糧湯主之（方見上）理中者理中焦用此以固其下焦故也（仲景）○久痢宜大

附下丸萬全丸（二方見上）真人養藏湯木香散實腸散加減益氣湯樗白皮散

木香散治久痢及血痢甘草炙一兩木香黃連各五錢同炒爲末入麝香少許空心米飲調下二錢（本事）

加減益氣湯治久痢疲弱甚不能起床白朮白芍藥陳皮各一錢當歸七分黃芪人參澤瀉縮砂地榆各五分升麻木香白豆蔻御米殼醋炒甘草炙各三分右剉作一貼空心水煎服（醫鑑）

樗白皮散治久痢諸藥不效樗根白皮一握粳米一合蔥白一握甘草一寸豉二合右水一升煮取半升頓服（得效）

實腸散治久痢不分赤白用此藥換出黃蘗來山藥炒一兩炒黃米一合右爲末用砂糖調熱湯和勻藥末適稀稠漸服後用清米湯漱口最效（回春）

疫痢一方一家之內上下傳染長幼相似是疫毒痢也當察運氣之相勝以治之（良方）○一方長幼相似名曰疫病人參敗毒散（方見寒門）加陳皮白芍藥煎服或益茶湯以助之（入門）

薑茶湯治痢疾腹痛老生薑春茶葉等分同煎服（醫鑑）○薑能助陽茶能助陰况暑毒酒食毒皆能解之不同赤白冷熱疫痢腹痛通用之（直指）○熱痢留薑皮冷痢去薑皮（本草）

蟻瘡痢久痢不已毒氣蝕於臍府下血如雞肝雜膿痰者名曰蟻瘡痢（類聚）○蟻瘡痢下黑血如雞肝發渴五內切痛此因服五石湯丸所致其血自白脈經絡而來以茜根丸救之（入門）○蟻瘡痢宜合

羊角丸蠶蠶丸（方見上）

茵根丸治蠱疰痢茜根犀角升麻地榆當歸黃連枳殼白芍藥各等分右爲末醋糊和丸梧子大米飲下五七十丸（濟生）

羚羊角丸治蠱疰痢黃連二兩黃栢羚羊角鎊各一兩半白茯苓一兩右爲末蜜丸梧子大茶清下五七十九（得效）

五色痢 痢疾五色俱下乃脾胃食積及四氣相併以茶連丸救之(入門)○脾胃為水穀之海無物不受常

兼四臟故痢有五色之相雜當先通利(丹心)○溼毒甚盛下痢腹痛大便如膿血或如爛肉汁宜

地榆散黃連阿膠湯(二方見上)○活人○五
色痢宜服秘方養藏湯絲瓜散神效參香散

秘方養藏湯 治五色痢為粟殼蜜炒一錢半陳皮枳殼黃連木香烏梅厚朴杏仁甘
草炙各七分右對作一貼入黑豆三十粒大棗二枚煎服立效(得效)

絲瓜散 治五色痢及酒刺便血腹痛乾絲瓜一枚
連皮燒灰為末酒調二錢空心服(集驗)

神效參香散 治下痢五色及噤口疳瘡時疫諸痢陳皮為粟殼各一兩二錢肉豆蔻赤茯苓
各四錢白扁豆人參木香各一錢右為末每三錢空心米飲調下(正傳)

八痢危證 一曰熱赤二曰冷白三曰冷熱相和赤白四曰食積酸臭五曰驚青六曰脾虛不化七曰時行有
血八曰疳即瀉瀉(類聚)○一曰冷痢白積二曰熱痢赤積三曰冷熱不調積下赤白四曰疳痢
黃白積或見五色五曰驚痢青積不臭六曰休息痢黃黑如魚腸七曰膿痢腹痛便臭肛痛
八曰蠱注痢下紫黑血如猪肝(入門)○通用小駐車丸真人養藏湯(二方見上)○類聚

痢疾腹痛 下痢腹痛者肺經之氣鬱在大腸之間實者下之虛者以苦梗發之(丹心)○下痢腹痛不可用
參芪(丹心)○凡痢腹痛以白芍藥甘草為君當歸白朮為佐惡寒者加桂惡熱者加黃柏(丹心)

○或食粥及肉稍多作痛宜以白朮陳皮煎湯服之且宜奪食奪食者減其粥食絕其肉味也(丹心)
○下痢膿血腹痛不止調胃承氣湯加薑棗煎服(方見寒門)瀉訖以五苓散煎水益元散調下○痢
疾腹痛宜香連丸薑茶湯

(方見上)神效越桃散

香連丸 治赤白膿血下痢腹痛及一切諸痢黃連一兩吳茱萸五錢水浸一宿同炒去
茱萸木香一錢半右為末醋糊和丸梧子大空心米飲下二三十丸(直指)

神效越桃散 治下痢腹中滿痛不可忍此名陰陽反錯不和之甚大
梔子仁良薑各三錢右為末米飲調下二三錢(綱目)

痢疾裏急後重 裏急窘迫急痛是也後重者大腸墜重而下也其證不一有因火熱者謂火性急速而能燥
物是也有因氣滯者此大腸之氣壅而不宣通也有因積滯壅盛者是有物結墜也有氣虛

者此大腸氣降而不能升也有血虛者所謂虛坐努責是也治法火熱者清之氣滯者調之積滯者去
之氣虛者升之血虛者補之(玉機)○後重者本因邪壓大腸而墜下故大腸不能升上而重用大黃

橫擲輩爲其所壓之邪今邪既瀉而其重因在者知大腸虛滑不能自收而重用御米殼等藥劑固其滑收其氣亦愈也丹心○下墜異常積中有紫黑血而又痛甚此爲死血用桃仁泥滑石行之丹心○後重窘迫當和氣宜木香檳榔易老○自古治裏急後重但用木香檳榔調氣及大黃下積至丹溪始用桃仁滑石活血其效如鼓應桴綱目○氣行血和積少但虛坐勞責此爲亡血證倍用當歸身尾却以生地黃生芍藥生桃仁佐之陳皮和之血生自安血虛則裏急故用當歸身丹心○裏急者腹中不寬快也虛坐而大便不行者血虛也後重者虛氣墜下也回春

痢疾大孔痛

下痢大孔痛因熱流于下用木香檳榔芩連加炒乾薑煎服綱目○下痢大孔痛宜溫煖之

宜清之丹心○作痛熱流於下也醫鑑○下痢大便不禁大孔開如空洞用蔥椒末攪搗塞穀道中併服酸澀固腸之劑如御米殼詞子皮之類收之綱目○下痢大孔痛此大虛也瓦片圍如銅錢大燒紅投重尿中急取令乾紙裏安痛處以人參當歸陳皮濃煎飲之綱目○又炙枳實煨之炒鹽炙之又熟艾黃蠟詞子燒烟薰之抄綱目

痢疾宜下

痢初得一二日間元氣未虛必推瀉之此通因通用之法用大承氣湯或調胃承氣湯下後看氣血調理五日後不可下脾胃虛故也丹心○此亦大概言之氣血者雖一二日不可下實者

十餘日後亦可下之正傳○下痢腸滿爲實當下之脈經○下痢脈反滑者當有所去下之乃愈仲景○下痢已差至其年月日時後發者以病不盡故也當下之宜大承氣湯仲景○仲景治痢可下者悉用承氣等湯加減下之大黃之寒其性善走佐以厚朴之溫善行滯氣緩以甘草之甘以湯液滋滯腸胃滋潤輕快積行即止局方例以熱藥爲主溫藥爲佐用之於下痢清白者猶可其裏急後重經所謂下迫者皆屬火熱所爲加以濕熱非殺之而何丹溪

治痢要訣

行血則便膿自愈調氣則後重自除河間○下痢治法曰後重者宜下木香檳榔又木香檳榔丸方見積聚○腹痛者宜和芍藥陳皮又芍藥甘草湯方見腹門○身重者除溼茯苓澤瀉

又五苓散方見寒門○脈弦者去風秦羌防風又敗毒散方見寒門○膿血稠粘者以重藥竭之大黃芒硝又大黃湯○身冷自汗者以熱藥溫之附子乾薑又漿水散○風邪內蘊者宜汗之麻黃白芷乾葛又麻黃升麻湯方見血門○驚濤爲病者宜溫之肉桂木香又水菹木香丸已上易老○又曰在裏者發之在裏者下之在上者瀉之在下者竭之身表熱者內疎之小便澀者分利之易老

○又曰盛者和之去者逐之過者止之易老○治病藥法色黑大黃色紫地榆色紅黃芩色淡生薑色白肉桂色黃山查水泄粟殼疝菘木香梔子入門○凡痢之初宜立效散服即愈或木香導氣

湯以徹其毒善良法也（醫鑿）○治病者必用寒以勝熱苦以燥溼微加辛熱佐之以爲發散開通之用固無不效矣（河間）○痢疾宜以河膠珠當歸赤皮赤茯苓黃連作劑入烏梅濃蜜同煎最能瀉惡穢積滯既去則瀉散自疎矣（直指）○大要以散風邪行滯氣開胃脘爲先不可遽用豆蔻阿膠子白朮輩以補住邪氣及粟殼龍骨牡蠣輩以閉澀腸胃必爲日久淹延之疾待其腹痛後重皆除然後乃用藥下

立效散

治赤白膿血痢腹痛裏急後重一服立止黃連四兩以吳茱萸二兩水拌同炒去茱萸枳殼麩炒二兩右爲末每三錢空心黃酒送下此治熱積氣滯之痢黃連清熱枳殼破氣（醫鑿）

木香導氣湯

治痢初起腹痛裏急後重赤白相雜發熱噤口大黃一錢半白芍藥枳殼黃連各一錢二分厚朴檳榔各一段當歸尾赤茯苓各八分右剉作一貼水煎服（醫鑿）

痢疾通治藥

痢疾諸證臍腹疼痛或下鮮血或下瘀血或下紫黑血或下白膿或赤白相雜或如黑豆汁或如魚腦或如茅屋漏水皆裏急後重頻欲登廁日夜無度通用水煮木香膏六神丸香連丸（方見上）加味香連丸白朮安胃散百中散和中飲易簡兩

下湯導胃散（方見上）救命延年丸○瘧後痢黃連木香湯

水煮木香膏

治一切諸痢蠶屎炒三兩福砂肉豆蔻煨乳香各七錢半木香丁香訶子藿香當歸黃連厚朴陳皮青皮白芍藥甘草炙各五錢枳實乾薑炮各二錢半右爲末蜜丸彈子大水一

蓋棗一枚同煎至七分去棗和渣服（袖珍）

六神丸

治諸痢要藥黃連木香枳殼赤茯苓神麩炒麥芽炒各等分右爲末神麩糊和丸梧子大每五七丸赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢乾薑甘草湯下（入門）

加味香連丸

治諸痢之總司也黃連炒二兩吳茱萸炮炒一兩木香一錢白豆蔻煨一錢半加乳香沒藥各一錢右爲末烏梅水浸取肉和丸梧子大每三十九丸服如上法（醫鑿）

白朮安胃散

治一切瀉痢無問臍腹血爲藥殼蜜炒二錢赤茯苓白朮車前子各一錢五分烏梅肉五分右剉作一貼水煎服（丹心）

百中散

治一切痢無問赤白二三服便愈爲藥殼蜜炒赤色厚朴薑製各二兩半右爲末每二三錢空心米飲調下忌生冷毒物（得效）

和口欲治痢無問赤白久近無不效但發熱噤口者不可服爲藥殼蜜炒一錢半陳皮白朮赤茯苓赤芍藥各一錢陳倉米二錢草果仁七分甘草二分砂糖三錢烏梅一個右剉作一貼薑三片棗二枚

水煎服

(正傳)

易開斷下湯

治一切痢尤治虛滑痢鴛葉殼十四枚去筋膜帶芎對醋淹炒搗爲麤末白朮赤茯苓各一錢甘草炙五分草果一個連皮對右作一貼水一椀薑七片棗梅各七個煎至一盞分二服

(海藏)

黃連木香湯

治瘧後痢疾白芍藥炒二錢白朮一錢半黃連炒木香縮砂研黃芩炒陳皮當歸酒洗各一錢甘草五分右到作一貼薑三片水煎服(醫林)

救命延年丸

治男女一切重痢黃連乾薑當歸阿膠珠各等分右三味爲末以醋煮阿膠令消化和丸梧子大每三五十丸米飲吞下甚妙(本事)

泄痢易治雜治辨

太陰脾經受溼而爲水泄久則傳變而爲膿血痢是脾傳腎謂之賊邪故難愈若先痢而後瀉是腎傳脾謂之微邪故易愈(易老)○瘡泄脈大手足寒難已脈小手足溫易已(脈經)

未止(脈經)

○下痢有微熱而渴脈弱者自愈○下痢脈數有微熱汗出今自愈(脈經)○下痢脈大者爲未止(脈經)○下痢手足溫易治手足寒難治(直指)○下痢嘔噦發死煩躁身熱者難治(醫鑑)

泄痢吉凶證

下痢如魚腦髓者半生半死○身熱脈大者半生半死○下痢如塵腐色者死○下痢血者死○下痢如茅屋漏水者死○大孔開如竹筒者死○唇如朱紅者死(已上丹溪)○內經曰腸澼

使血身熱則死身寒則生○內經云身熱則死寒則生此是大槩言之必兼證詳之方可豈無熱生而寒死者乎(丹心)○下痢手足厥冷無脈者灸之灸之不溫若脈不還反微喘者死(仲景)○下痢脈

絕手足厥冷時時脈還手足溫者生脈不還者死(仲景)○腹鳴而滿四肢清而泄其脈大是逆也不過十五日死(靈樞)○腹大而脹四末清脫形泄甚逆也不及一時死(靈樞)○下痢之證身涼能

食小便通易安若體熱多汗渴甚小便不利或手足厥冷灸之不溫兼微喘不食者死(得效)○凡下痢諸語直視及驚躁不得眠汗不止無脈及自利不禁身熱脈實者皆死(入門)○泄瀉久不止手足

寒脚虛脫煩躁發死氣短目直視昏冒不識人皆死證也(回春)○痢不治證○脈大○身熱○嘔屎○發渴○咳逆○五色○噤口○紅水○唇紅○手足冷○氣喘○痢後煩渴欲飲爲心絕○小便絕

不通爲胃絕○下痢小便不通或絕無者此毒氣併歸一竅胃乾者死(永類)○小兒之痢重傷胃氣全不飲食名曰噤口肛門寬大深黑可畏腹肚疼痛裏急後重鮮血點滴名曰刮腸日夜頻併飲食直

過名曰滑腸皆爲惡候(省翁)○小兒痢殺道不閉黃汁長流者不治(得效)○病人臥遺尿不覺者死(扁鵲)

飯後隨即大便

飯後隨即大便者蓋脾胃交濟所以有水穀之分脾氣雖強而腎氣不足故飲食下咽而大便為之殮泄也治法取二神丸空心鹽湯送下使脾胃之氣交通則水穀自然造化此所謂

妙合而凝者也（直指）

大便秘結

主五液津液潤則大便如常若飢飽勞役或食熱物火邪伏於血中耗散真陰津液虧少故大便結燥又有年老氣虛津液不足而結者經曰腎惡燥念食辛以潤之者是也（東垣）○脈有陽

結除結者何以別之曰脈浮而數能食不大便此為實名曰陽結也期十七日當劇脈沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰結期十四日當劇（仲景）○有熱燥風燥陽結陰結經曰結者散之治法陽

結者散之陰結者溫之陳結宜大黃牽牛散陰結宜半硫丸（東垣）○燥結者大便秘澀不通也燥屬少陰津液不足以辛潤之結屬太陰有燥裏以苦泄之（入門）○藏府之秘不可一概論有實秘有虛

秘實秘者物也虛秘者氣也胃實而秘者能飲食小便赤脾約丸（方見下）七宣丸主之胃虛而秘者不能飲食小便清利厚朴湯主之（易老）○秘結之證有虛有實實則宜瀉瀉腸胃開結軟堅如大黃

芒硝枳實厚朴承氣湯之類是也（方見寒門）虛則宜滋養陰血潤燥散結如當歸地黃桃仁麻仁蘇

芩潤燥湯之類是也（丹心）○桃杏仁俱治大便秘當以氣血分之畫則便難行陽氣也宜用杏仁夜

則便難行陰血也宜用桃仁老虛人大便秘秘脈浮注氣杏仁陳皮脈沉在血桃仁陳皮所以俱用陳

皮者以手陽明與手太陰俱為表裏也（海藏）○血燥以桃仁酒大黃通之氣燥以杏仁俱實通之風燥以麻子仁加大黃利之氣澀而不通者以郁李仁皂角仁潤之（東垣）○風燥宜疎風潤腸丸皂角

丸活血潤燥丸○血燥宜潤腸丸潤麻丸從沉九五仁丸小麻仁丸通幽湯和血潤腸湯當歸潤燥湯

○氣滯參仁丸搜風潤腸丸三和湯四磨湯六磨湯○婦人秘結宜通神散大麻仁丸

大黃牽牛散治相火遊走藏府大便秘結大黃一兩黑牽牛子頭末五錢右

為末每三錢手足冷者酒調下手足熱者蜜湯調下（保命）

半硫丸

治老人痰結大便秘澀半夏製為末硫黃研極細以柳木槌殺過

七宣丸

治熱留腸胃大使秘結大黃一兩木香檳榔訶子皮各五錢

厚朴湯

治大便虛秘白朮一錢厚朴一錢三分陳皮甘草各一錢半夏麩

當歸潤燥湯

一名潤燥湯治血燒大便秘澀當歸大黃熟地黃桃仁麻仁生甘草各一錢生地黃升麻各七分紅花二分右剉先取七味作一貼煎將至半乃入桃仁麻仁煎至半空心服(丹心)

疎風潤腸丸

治風熱鬱滯大便秘澀乾燥須潤燥和血疎風則自然通大麻子仁二兩半桃仁二兩皂角燒存性一兩三錢大黃羌活各一兩防風當歸各三錢右爲末蜜丸梧子大白湯下五七十

九(東垣)

皂角丸

專治風人大便秘澀羌活防風猪牙皂角枳殼桑白皮檳榔杏仁麻仁白芷陳皮各等分右爲末蜜丸梧子大溫湯下三五十丸有熱加大黃(得效)

活血潤燥丸

治風秘血秘大便秘澀結此與潤腸丸同但皂角用仁(東垣)

潤腸丸

治大便秘澀杏仁枳殼麻仁陳皮各五錢阿膠珠防風各二錢半右爲末蜜丸梧子大溫湯下(直指)

潤麻丸

治血燥大便不通能潤之麻仁桃仁生地黃當歸枳殼各一兩右爲末蜜丸梧子大白湯下五十九(丹心)○正傳名潤體丸

菴朮丸

一名菴蓉潤腸丸治津液大便常秘結肉菴蓉二兩沉香一兩右爲末用麻仁汁打糊和丸梧子大每七丸空心米飲吞下(入門)

五仁丸

一名滋腸五仁丸治津液枯竭大便秘結婦人產後便秘尤宜橘紅四兩另爲末桃仁杏仁各一兩右爲末蜜丸梧子大溫湯下五十九(丹心)○正傳名潤體丸

七十九(得效)

小麻仁丸

治血燥大便秘結此方與上潤麻丸同(入門)

通幽湯

治幽門不通大便難宜以辛潤之升麻桃仁泥當歸身各一錢半生地黃熟地黃各七分炙甘草紅花各三分右剉作一貼水煎去滓調檳榔細末半錢服(東垣)

和血潤腸湯

治大便燥結不通升麻桃仁麻仁各一錢半大黃熟地黃當歸梢各七分生地黃生甘草各五分紅花三分右剉作一貼水煎服(東垣)

參仁丸

治氣壅大便秘麻子仁大黃各三兩當歸身一兩人參七錢半右爲末蜜丸梧子大空心熱水下三十九(入門)

搜風潤腸丸 治三焦不和氣不升降胸腹痞滿大便秘澀郁李仁一兩木香檳榔青皮陳皮沉香羅漢子炒槐角枳殼枳實三棱煨大黃各五錢右爲末蜜丸梧子大空心米飲下五七十九(丹心)

三和湯 治氣滯大便秘澀即氣門三和散也

四磨湯 治氣滯大便秘澀大檳榔沉香木香烏藥右四味等分各濃磨水取七分煮煎三五沸微溫服(心)得效)

六磨湯 治大便秘澀有熱者四磨湯加大黃枳殼如上法濃磨汁服(得效)

通神散 治婦人大便不通大黃芒硝桃仁郁李仁各一兩木香五錢右爲末每二錢米飲調下(丹心)

大麻仁丸 治婦人風秘木香檳榔枳殼各一兩麻仁大黃炒各三錢右爲末蜜丸梧子大空心白湯下三十九(丹心)

老人秘結 老人藏府秘澀不可用大黃緣老人津液少所以秘澀若服大黃以瀉之津液皆去定須再秘甚於前只可服滋潤大腸之藥更用槐花煎湯淋洗肛門亦效(得效)○老人秘結宜疎風順氣丸

小皂角丸 二仁丸 橘杏丸 黃芪湯 膠漆湯 麻粥 三仁粥 ○常食乳酪血結脂麻汁爲妙

疎風順氣丸 治腸胃積熱一便燥澀諸風秘氣皆治之老人結秘尤宜大黃酒蒸晒七次五兩車前子炒二兩半郁李仁檳榔麻子仁微炒鬼絲子酒製牛膝酒洗山藥山茱萸各一兩枳殼防風

獨活各一兩右爲末蜜丸梧子大每五七十九空心茶酒米飲任下○此藥專治大便秘澀真良方也久服精神康健百病不生尤宜老人(得效)

小皂角丸 治風秘尊年人宜服皂角末枳殼各等分右爲末蜜丸梧子大每飲下七十九(得效)

二仁丸 治老人虛人風秘杏仁麻仁枳殼詞子肉(各)等分右爲末蜜丸梧子大溫水下五十九(得效)

橘杏丸 治老人虛人風秘服之大便自無澀滯橘皮杏仁各等分右爲末蜜丸梧子大每飲下七十九○此治晝便難若夜便難去杏仁用桃仁(濟生)

黃芪湯 治老人大便秘澀黃芪陳皮去白各五錢右爲末另取麻子仁汁一盞於銀石器煎候有乳起即入白蜜一大匙再煎令沸調前藥末三錢空心服之不過兩服效常服即無秘澀(患)得效)

膠蜜湯 治老人虛人大便秘澀連根大蔥白三莖新水一盞煎蔥爛熟去之入明阿膠珠二錢蜜二匙攪令溶化空心服（直指）

蘇麻粥 順氣滑大便治老人虛人風秘血秘大便艱澀婦人產後便秘皆宜服之蘇子麻子不拘多少等分同搗爛和水適取汁粳米末少許同煮作粥食之久服尤佳（本事）○一老婦忽爾腹痛頭痛

惡心不食正是老人風秘藏府壅滯氣聚胸中則腹脹惡心不欲食上至於顛則頭痛神不清服此粥兩啜而氣泄下結糞十餘枚藏府流暢諸疾自去矣（本事）

三仁粥 治大便秘結老人虛人皆可服桃仁海松子仁各一合郁李仁一錢右同搗爛和水適取汁入碎粳米少許煮粥空心服（俗方）

脾約證 傷寒陽明病自汗出小便數則津液內竭大便必難其脾為約脾約丸主之（方見下）○仲景○成無己曰胃強脾弱約東津液之得四布但輸膀胱故小便數而大便難調脾約丸以下脾之結燥丹

溪曰既云脾弱脾約則土虧肺金受火之剋肺耗則津竭脾失轉輸之令肺失傳送之職宜大便秘而難小便數而無藏蓋也理宜滋養陰血使陽火不熾則肺金行清化脾土清健而運行津液則腸潤而自通矣今此丸用之於熱甚而氣實與西北人壯實者無有不安若用於東南人與熱雖盛而氣血不實者將見脾愈弱而腸愈燥矣須知在西北以開結為主在東南以潤燥為功（丹溪）

脾約丸 一名麻仁丸治小便數大便難名為脾約證大黃蒸四兩枳實厚朴各二兩麻子仁一兩半杏仁一兩二錢半右為末蜜丸梧子大空心溫湯下五十九丸（局方）

大便不通 大便秘結者常常乾燥而難難放下也不通者累日不得通閉塞脹滿也○熱邪入裏則胃有燥之挾冷然也腹脹痛悶胸痞欲嘔此宿食留滯也腸胃受風瀉燥秘證此風氣燔灼也若氣不下降而穀道難通逆泛滿必有其證矣然者三黃湯（方見火門）冷者半硫丸宿食宜脾積丸風秘宜麻仁丸

（即脾約丸）氣不下降則枯槁積殺湯（方見胸門）大腸與肺為表裏大腸者諸氣之道路關焉孰知流行肺氣為治法之樞紐乎（直指）○久病腹中有實熱大便不通調腸丸微利之不可用峻利之藥（正傳）○大便閉服承氣湯之類不通者四物湯（方見血門）加檳榔枳殼桃仁紅花（醫案）○古方

通大便皆用降氣之劑蓋肺氣不降則大便難於傳送用杏仁枳殼沈香阿膠等是也若妄以峻劑逐之則津液走氣血耗難暫通而津液少而秘者宜以藥潤之用麻仁脂麻阿膠等是也若妄以峻劑逐之則津液走氣血耗難暫通而即復秘或更生他病矣（丹心）○大便不通宜靈寶丹蘇麻丸（方見上）調腸湯大黃飲子老人虛人宜調腸丸宜潤腸湯婦人宜通神散（方見上）調導飲○外治宜宣積丸提益散

脾積丸

治飲食停積腹脹吞酸大便結蓬水一兩半三棧一兩青皮五錢良薑以醋煮切片焙乾木香百草霜巴豆霜各二錢半右為末鈣糊和丸麻子大橘皮湯下五十七丸得效

靈寶丹

治大便不通推下積滯木香沈香乳香各半錢巴豆去皮心油二錢右為末大蜜三枚取肉和勻搗作丸如菉豆大每服一丸涼水送下如欲利三行先吃涼水三口然後用涼水送下如五

行六行依數吃水(臘仙)

潤腸湯

治大便秘澀久不通麻子仁一錢半細研水浸瀝去皮取汁脂麻半錢細研水浸絞取汁桃仁一兩研為泥荆芥穗一兩搗為末右和合入鹽少許同煎代茶飲之以大便通利為度(丹心)

大黃飲子

治熱燥大便不通生地黃二錢人黃煨杏仁梔子升麻枳殼各一錢人參黃芩甘草各五分右到作一貼入薑五片或二十一粒烏梅一個同煎服(直指)

潤腸丸

治老人血少腸胃乾燥大便閉結甚至七八日難下色如豬糞少如羊糞者當歸生地黃枳殼桃仁麻仁各等分右為末蜜丸梧子大空心米飲下四五十丸(醫鑿)

潤腸湯

治老人虛人大便閉結蜂蜜一兩香油五錢朴硝一握右合水一鍾煎數沸溫服(醫鑿)

調導飲

治婦人產前後大便不通當歸川芎防風枳殼各一錢二分半甘草三分右到作一貼入薑三片棗二枚空心水煎服(直指)

宣積丸

治大便閉塞巴豆去殼炒黃芩子良薑硫黃甘遂白檀榔等分右為末飯丸如雞子黃大早服以椒湯洗手麻油塗手掌握藥一粒移時便瀉欲止則以冷水洗手(本事)

提益散

治大便不通草烏為極細末蔥白一枚切去根其頭上有汁溼煎草烏末納肛門中即通(即齋靈箭能治大小便不通(丹心))

大小便不通

凡大小便不通內經謂之三焦約者不行也又曰大小便不通者陰陽關格乃三焦約之病也(病源)○三焦約大小便不通宜枳殼丸(方見五藏)推氣丸○大小便不通宜三一承氣

湯車狗散腫脚丸腫倒散倒換散蜈蚣散甘遂散貼

推氣丸

治氣不升降大便秘澀小便赤黃黑牽牛頭末大黃檳榔枳實陳皮黃芩各等分右為末薑汁煮糊和丸梧子大滾薑湯下三十九丸(得效)

三一承氣湯

治傷寒及雜病熱盛大小便不通胸腹滿痛(方見寒問)○芒硝以大黃引之直入大腸潤燥軟堅溼熱均在下言之便尿俱陰以前後言之則前氣後血以腎言之總主大小便難夫

尿管便稀俱爲水少經曰熱淫于內治以鹹寒
佐以苦故用芒硝大黃相須爲便也(東垣)

車狗散

治大小便久不通煩滿欲死推車客七個土狗七個如男子病推車用頭土狗用身女子病土狗用頭推車用身右二物新瓦上焙乾爲末以虎目樹皮向東南者濃煎湯調服即通如神(本事)

○推車卽燒蝦也土狗卽螻蛄也虎目樹一云樗木一云虎杖恐樗木爲正

甘蓬散

治大小便不通赤皮甘蓬二兩煉蜜一合和勻
每一兩分四服日進一服蜜水調下(得效)

鐵脚丸

治大小便不通大皂角燒存性爲末酒
麪糊和丸梧子大酒下三十九(回春)

類倒散

治大小便不通或小便不通或大便不通皆治之大黃滑石皂角各三錢如小便不通滑石加三錢如大便不通大黃加三錢如大小便俱不通大黃滑石各加三錢右爲末每取三錢空心溫酒

調下
醫鑿

貼臍膏

治大小便不通甘遂爲末麪調作糊貼臍中及
臍下硬處別煎甘草湯服之以通爲度(類聚)

倒換散

治大小便不通如大便不通大黃一兩杏仁三錢如小便
不通大黃三錢杏仁一兩右對分二貼水煎服(類聚)

螯蝦散

一名二抄散治大小便不通六七月間得牛馬糞中螯蝦不以多少用線串起陰乾收貯用時取
個要全者放淨塲上四面以灰火烘乾以刀從腰切斷如大便閉用上半截小便閉用下半截

二便俱閉全用爲細末新
汲水調服即通(回春)

迴生神膏

治陰證大小便不通數日危急者用之非急勿用牡蠣陳粉乾薑炮各一兩右爲細末男病用
女人唾調手內擦熱緊掩二卵上得汗出愈女病用男子唾調手內擦熱緊掩二乳上得汗出

愈蓋卵與乳乃男女之根
薄坎離之分屬也(海藏)

丁香散

治大小便不通如神苦丁香五錢川烏炮草烏炮白芷猪牙皂角炮細辛各
三錢胡椒一錢麝香少許右爲細末用竹筒將藥吹入肛門內即通(回春)

醫法

治大小便不通以白雲末一匙及中冷水滴之令冷透腹內即通(丹心)○治大小便不通連根

葱一二莖帶土生薑一塊淡豆豉二十一粒鹽二匙同研作餅煨熱掩臍中以帛繫定良久氣透自

通不通再換一餅(丹溪)○治大便閉結至極昏不省人生大田螺一二枚鹽一匙和殼生搗置病人

臍下一寸三分用帛包繫即大通(得效)○又方田螺連殼搗爛入罈少許貼臍中以手揉按立通

(入門)○治大小便不通巴豆肉杏仁皂角右為末作餅掩臍上火炙自通(綱目)○蝸牛膏治大小

便不通蝸牛三枚連殼搗為泥加麝香少許貼臍中以手揉按之立通無蝸牛則用田螺歷試殊效(春)

導便法

諸大便不通老人虛人不可用藥者用蜜熬入皂角末少許捻作錠子納肛門即通(丹心)○蜜煎

導法取蜜七合微火煎如飴捻作錠如車核樣納穀道中用手按住欲大便將去之(仲景)○治大

便不通取大猪胆一個瀉汁和醋少許灌入穀道中須臾大便自通(仲景)○蜜豆法治大便不通

三合入猪胆汁兩枚煎如飴候凝捻作小指頭大沉冷水中取入肛門立通一方入皂角末和勻作錠

尤好入薄荷末亦佳(得效)○蜜方治大便不通皂角用碗燒紅搗碎內煎下部自通(得效)○蜜導法

火煉蜜稠厚黃色傾入冷水中急捻如指大隨用皂角末勝香共為衣將油塗抹大腸內納入穀道大

便即通(回春)○猪胆汁導法猪胆一個傾去汁少許入醋在內用竹管相接套入穀道中以手指捻

之令胆汁直射入內少時即通(回春)○香油導法用竹管蘸葱汁深入大腸內以香油一半溫水一

半同入猪尿脬內摻入竹管將病人倒放脚向上半時立通(回春)○大便不通多日百方不效令人

口含香油以小竹筒一個套入肛門吹油入肛內病者自覺其油如蚯蚓漸漸上行片時下黑糞而安

(正傳)○俗方以清營香油和灌肛內即通或以生枯

梗浸油醬搽入肛內亦通○蜜導非皂角則不通(入門)

單方凡七十種

硫黃 治冷瀉暴瀉所下如水硫黃滑石等

分爲末溫水調下三錢立止(得效)

焰硝 治關格大小便不通蜜一鍾糖二錢

白湯一鍾空心調服即通(回春)

好黃土 治泄痢赤白腹痛下血好黃土水煮三五沸去滓服一二升(本草)

百草霜 治暴瀉痢取細末二錢米飲調下(本草)○
久瀉不止百草霜末粥丸白湯吞下(綱目)

蒼朮 治傷溼泄瀉或合茯苓或合芍藥每五錢水煎
服之若傷風泄瀉合防風水煎服之(湯液)

白朮 治一切泄瀉煎服末服丸服並佳或合白
芍藥白茯苓同煎服止泄尤佳(湯液)

車前草 治熱泄取莖葉搗取汁一盞
入蜜一合溫分二服(本草)

車前子 治一切泄瀉炒爲末空心取二錢米
飲調下最妙或水煎服亦良(得效)

木香 治諸泄瀉痢疾皆佳煎服末服並良或
合黃連爲丸治赤白諸痢甚佳(本草)

白芍藥 治泄瀉痢疾煎服末服丸服皆佳酸
收甘緩下痢必用之藥也(湯液)

黃連 治赤白痢腹痛或下膿血黃連三錢酒蒸服或爲末葱子白和丸服並
佳黃連治痢蓋以苦燥之義若熱痢血痢則佳冷痢則不可用(本草)

乾薑 主冷泄冷痢煎服末服並佳若血痢則
燒存性爲末每一錢米飲調下(本草)

土瓜根 治大便不通搗取汁以竹
管吹入肛內即通(綱目)

馬藹子 治水痢熬黃爲末同白麩
等分米飲下二錢(本草)

蒼草根 治大便不通取一握同生薑
搗取汁服之立通(綱目)

黃芩 主腸澼赤白痢腹痛身熱與芍藥
同用煎服丸服末服並佳(湯液)

艾葉 主赤白痢及膿血痢醋
煎空心服之(本草)

地榆 治病性沈寒入下焦赤白痢及膿血痢水煎
空心服三合如水瀉及白痢不可用本草

肉豆蔻 主泄瀉如暴水泄不止取三箇麩殼爲末作一服米飲
調下神效若冷痢腹痛不能食取末一錢米飲下綱目

縮砂 治冷泄及休息痢取末一
錢空心米飲調下丹心

大黃 通利大小便又治熱痢下膿血欲通
大便水煎服熱痢酒煎服之綱目

黑牽牛子 通利大小便如大便不通半生半炒爲末每二錢薑湯調下如未通再以熱茶清調下
○風秘結澀微炒爲末一兩麩炒桃仁末五錢蜜丸梧子大溫水下三十九本草

藟薺 主大小便不通開紫花水邊生者爲佳採
根搗取汁一盞服之得通即止綱目

榆白皮 主大小便不通水
煎空心服本草

檳榔 通利大小便又治大便不通取
細末二錢空心蜜水下綱目

五倍子 治腸虛泄瀉取爲末以白
湯調二錢服立止本草

訶子皮 主泄瀉及赤白諸痢訶子三個兩枚炮一枚生用同爲末溫
水和服○氣痢久痢煨取皮爲末二錢和米飲頓服本草

檳榔白皮 主赤白痢及久痢腸滑不禁取皮一握陳米一合葱白三莖甘草三
寸鼓二合水煎空心頓服血痢尤神效爲末作丸 固腸丸本草

橡寶 膠腸止泄瀉作細末
和米飲常服本草

槿花 主赤白痢作末和米飲服或
和麩作煎餅食之本草

蜜 治痢爲最靈與薑汁各一
合溫水和頓服本草

蠟主下痢膿血黃嫩不拘多少用銀篋挑於香油燈上燒熏落下水碗內如
蠟此七次爲丸羅淘子大每三十九白痢甘草湯下赤痢烏梅湯下(綱目)

牡蠣粉止大小便治遺尿不覺牡蠣粉白礬枯等
分爲末酒服二錢日三亦治遺尿(綱目)

鹽治痢後脫肛○一人患痢月餘精枯不實晝夜五六次又脫肛取鹽一個治如食法用生薑米糯作羹
入砂糖一小塊不用鹽醬熟煮吃一二碗三日而愈蓋鹽乃介蟲屬金而補肺與大腸故有效焉(正

傳)

鯽魚膽主久赤白痢腸澼和醋醬蒜薑食之(本草)○血痢及噤口痢魚肚
鱸白礬燒灰爲末米飲調下或入白礬蒸熟和鹽醋吃即效(得效)

露蜂房療赤白痢亦治大小便不通取房蒂爲末溫
酒調一錢服之即效一名紫金砂(類聚)

糞蛆治噤口痢甚效取蛆焙爲末
清米飲調下一錢(正傳)

蓮子肉止痢又治噤口痢去皮留心
爲末米飲下二錢(百一方)

烏梅 澀腸止痢○血痢白梅肉一個合臘茶加醋湯沃服之一啜而差○赤痢
及久痢烏梅水煎和蜜服○休息痢合建茶乾薑爲丸服之大驗(本草)

桃花 利大小便花落時拾取陰乾爲末水調服或
作煎餅吃治大小便不通即效(子和方)

桃葉 主大小便不通搗取汁
服半升即通(本草)

桃仁 治大便血結血秘血燥秘澀不
通研取汁作粥服之(湯液)

酸石榴殼 止赤白痢燒赤爲末米飲下二錢亦治暴瀉不止○冷熱不調或下赤白青黃者
石榴五枚合殼杵絞取汁每取一合數服即斷或取殼爲末飯丸服亦得(本草)

大麻仁 治大小便不通及風熱熱血就研取汁作粥
食之或與蘇子取汁作粥名蘇麻粥(本草)

生脂麻油 治熱秘大便不通每服一合取利爲度(本草)

赤小豆 止泄痢作粥食之○赤白痢作粥和蠟一兩頓服差(本草)

糯米 止泄瀉半生半炒煮粥食甚效(醫鑿)

神麩 止泄痢熬爲末粟米飲調下二錢日三(本草)○暑熱暴泄神麩炒香麩麩製等分爲末麩糊和丸梧子大米飲下二十九丸麩丸(綱目)

嬰粟 主一切痢若日久腹中無痛當證腸則去麩帶醋炒爲末米飲調一錢服(直指)○此物治痢如神但用早則性緊澀多令人嘔逆或成噎口痢(綱目)○久痢虛滑一日百行取殼薑汁浸一宿炒乾爲末每二錢米飲調

下即效名百中散(入門)

冬葵子 治大小便不通腹痛欲死取二升水四升煮取一升人猪脂一合調服即通(本草)

雞腸草 主小兒赤白痢取汁一合和蜜服之良(本草)

薺菜 主赤白痢取根葉燒灰爲末和米飲服極效(本草)

葱白 治大小腸不通取白搗爛和醋封小腹上即效○赤白痢葱白一握細切和米煮粥食之(本草)

韭菜 治諸痢如赤痢韭汁和酒溫服一盞如水殺痢作羹粥或煨炒任食之白痢則煮食之(本草)

薤白 止久痢冷瀉常煮食之○赤白痢取白和米作粥食之(本草)

獨頭蒜 治大便不通取一枚煨熟去皮綿裹納下部冷則易即通(本草)

馬齒莧 利大小便和米穰五味作羹食之○赤白痢搗取汁三合和薤子白一枚和勻溫服再服即愈或取莧煮熟入鹽薑蒜醋拌勻食之○小兒血痢取汁一合和蜜一匙服(本草)

白蘿菔治久痢取汁一鍾蜜一鍾煎勻溫服立止（回春）

亂髮

主大小便不通燒為灰取一錢調溫水一日三服○赤白痢服如上法或作丸服（本草）

黃雌雞

治赤白久痢取一隻治如食法作羹常食之○腸滑下痢取一隻治如食法火炙鹽醋刷之又炙令燥空腹食之名矣雞散（本草）

雞子

治久赤白痢醋蒸熟空心食之或取一個打破用蠟一錢焙化拌勻炒食之又取黃和胡粉燒成末酒服一錢（本草）

烏骨雞

治小兒噤口痢取一隻治如食法蒸取清汁和與服之痢止胃開（省翁）

家鴨

止痢治如食法蒸爛飲汁食肉或作羹食之（本草）

雉

主久痢腸滑不下食治如食法善橘椒葱鹽醬調和作饅飽食之（本草）

牛肝

治痢醋煮食

牛角

主赤白痢及冷痢瀉血燒存性為末溫酒或米飲調下二錢或蜜和作丸服之（本草）

黃雄狗頭骨

主久痢勞痢休息痢取腦骨炙黃為末米飲調二錢服或蜜和作丸服之（本草）

狗肝

治下痢臍腹痛狗肝一具細切米一升和煮粥著葱椒鹽醬吃之（本草）

豬肝

主冷泄泄瀉泄瀉取肝薄切搗塗煨詞子皮末微火炙盡末五錢空心細嚼米飲送下（本草）○暴泄瀉泄瀉豬肝漿水煮熟食之（得效）○氣虛下痢瘦乏豬肝一具切片入醋一升煮乾空心食其妙

（入門）

豬膽

治大便不通詳見導便法

本草綱目卷之...

鍼灸法

大渴飲水多爲滑泄水入即泄泄而後飲此無藥當灸大顛三五壯（易老）○泄瀉三五年不愈灸百會五七壯即愈（醫案）○久泄痢灸天樞氣海大能止泄（丹溪）○泄痢不止灸神闕七壯（一

云三七壯）

關元三十壯（得效）○濕泄灸臍中爲第一三陰交次之（資生）○泄痢灸脾俞隨年壯

臍中二十壯關元百壯三報二七壯（得效）○冷泄取陰陵泉然谷巨脛上廉大衝（綱目）○泄瀉如水手足冷脈欲絕臍腹漸縮氣灸氣海百壯（得效）○下痢腹痛便膿血取丹田復溜小腸俞天

樞腹哀（東垣）○冷痢關元竅谷各灸五七壯（東垣）○裏急後重取合谷外關（東垣）○痢不止取

合谷三里陰陵泉中脘關元天樞神闕中極（綱目）○諸下痢皆可灸大都五壯商丘陰陵泉各三壯

（綱目）○大便秘澀取照海（鍼入五分補一呼瀉六吸立通）支溝（鍼半寸瀉三吸）太白（瀉之）

綱目）大便不通取三間承山太白太鍾三里涌泉崑崙照海章門氣海（綱目）○大小便不通取大

都環崗水道（綱目）○關格吐逆而小便不通先灸氣海天樞各三七壯吐止然後用益元散以利小

便（正傳）○婦人產後腹脹大小便不通取氣海足三里關元三陰交陰谷（綱目）

訂正東醫寶鑑外形篇卷之一

御醫忠勤貞亮 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

頭

頭爲天谷以藏神

谷者天也神者一身之元神也天之谷含造化容虛空地之谷容萬物載山川人與天地同所稟亦有谷焉其谷藏真一宅元神是以頭有九宮上應九天中間一宮謂之泥丸

又曰黃庭又名崑崙又謂天谷其名頗多乃元神所住之宮其空如谷而神居之故謂之谷神神存則生神去則死日則接於物夜則接於夢神不能安其居也黃帝內經曰天谷元神守之自具言人身中上有天谷泥丸藏神之府也中有應谷時宮藏氣之府也下有虛谷關元藏精之府也天谷元宮也乃元神之室靈性之所存是神之要也(正理)

頭有九宮

頭有九宮腦有九竅一曰雙丹宮二曰明堂宮三曰泥丸宮四曰流珠宮五曰大帝宮六曰天庭宮七曰極真宮八曰玄丹宮九曰太皇宮各有神以主之謂元首九宮真人也(黃庭)○問泥丸

宮正在何處答曰頭有九宮中曰泥丸九宮羅列七竅應透泥丸之宮魂魄之穴也(正理)

腦爲髓海

腦爲髓之海髓海有餘則輕勁多力不足則腦轉耳鳴脛痠眩胃目無所見(靈樞)○腦者髓之海諸髓皆屬於腦故上至腦下至尾骶皆髓髓升降之道路也(入門)○髓者骨之充也髓盡則

腦髓消壞體解依然不去也註曰不去者不能行去也(內經)○腦者頭之蓋骨也百會穴分是也

頭部度數

頭之大骨圍二尺六寸○髮所覆者顛至項二尺二寸髮以下至頤長一尺○耳後當完骨者廣九寸耳前當耳門者廣一尺三寸(靈樞)

頭痛外候

頭者精明之府頭傾視深精神將奪矣(內經)○傷寒頭重不能舉有二證太陽病深頭重不能舉陰陽易病亦頭重不能舉皆危證也(入門)○傷寒陽脈不和則頭爲之搖有心虛絕者亦搖頭

痺病風盛則搖頭皆凶證也(入門)○有寒痛而搖頭者亦重證也(入門)

脈法

痛若頭痛目痛脈急短澀者死(綱目)○頭痛浮滑易除短澀不食(得效)○頭痛短澀應須死浮滑脈法風寒必易除(脈訣)○弱脈注者頭痛無憂(脈訣)○肝脈溢大必眩暈宜預防之(入門)○寸口脈

中短者頭痛也(正傳)寸口緊急或浮或短或弦皆主頭痛(醫鑑)○頭痛陽弦浮風緊寒風熱洪數
濕細而堅氣虛頭痛難痊必瀉痰厥則滑腎厥堅實(脈訣)○風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而
眩風浮寒緊濕細者虛涎而滑虛脈則無(脈訣)○腎厥頭痛其脈象之則弦按之則堅
(丹心)○頭痛左手脈數熱也脈澁有死血也右手脈實有痰積也脈大是久病(丹心)

頭風證頭風之證素有痰飲或極淋取涼或久臥當風以致賊風入腦入項自頸以上耳目口鼻眉稜之間
有麻痺不仁之處或頭重或頭暈或頭皮頑厚不自覺知或口舌不仁不知食味或耳聾或目痛或

眉稜上下掣痛或鼻中聞香極香聞臭極臭或口呵欠而作眩胃之狀熱者消風散冷者追風散通用
川芎茶調散(方見下)祛風通氣散(方見風門)○入門○頭風發時悶痛必欲綿帕包裹者熱鬱也

二陳湯(方見痰飲)加酒芩荆芥川芎薄荷石膏細辛或消風百解散(方見寒門)○
入門○頭風宜白芷散天香散加減芎辛湯菊花茶調散○婦人頭風宜養血祛風湯

消風散治諸風上攻頭目昏眩鼻塞耳鳴皮膚麻痺及婦人血風頭皮腫痒荆芥甘艸各一錢人參茯苓
白殭蠶川芎防風養香蟬殼羌活各五分陳皮厚朴各三分右剉作一貼入細茶一椀同煎服或

爲末每二錢以茶清
或溫酒調下(入門)

追風散治偏正頭風及面上遊風狀如蟲行川烏炮石膏煨白殭蠶炒川芎防風荆芥甘艸各五錢南星
炮白附子炮羌活天麻全蝎地龍白芷各二錢半艸烏炮沒藥乳香雄黃各一錢二分半右爲末

每半錢臨臥茶清或
溫酒調下(直指)

白芷散治頭面諸風及風眩白芷以蘿蔔汁浸
晒爲末每二錢沸湯調下食後(入門)

天香散治久近頭風發則頑癢麻痺不勝爬搔或生瘡癩停痰嘔吐飲食不入兩服可斷根南星半夏並
湯洗七次川烏生白芷各一錢右剉作一貼水煎入薑汁半盞調服頭上塊子銀之效(丹心)

加減芎辛湯治頭風或攻目川芎細辛白芷石膏桑本皂角羌活防風荆芥桔
梗蔓荊子甘菊薄荷甘艸各五分右爲剉作一貼水煎服(醫鑑)

菊花茶調散治頭風鼻塞或偏正頭痛甘菊川芎荆芥羌活白芷甘艸各一兩防風七錢半細
辛五錢蟬殼白殭蠶薄荷各二錢半右爲細末每取二錢茶清調下食後(丹心)

養血祛風湯治婦人頭風十居其半每發必掉眩如立舟車之上蓋因肝虛風襲故也當歸川芎生乾地
黃防風荆芥羌活細辛桑本石膏蔓荊子半夏旋覆花甘艸各五分右剉作一貼入薑三片

棗二枚水煎服

眩暈

上虛則眩又曰上氣不足目爲之眩（此言虛而眩暈）○藏府筋骨血氣之精與脈并爲目系上屬於腦後出於項中故邪中於項者因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉腦轉則引

目系急目系急則目眩以轉矣（此言風入而眩暈）○靈樞○內經曰頭痛癱瘓下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎○尙蒙招尤目眩耳聾下實上虛過在足少陽厥陰其則入肝○下虛者腎虛也腎

虛則頭痛上虛者肝虛也肝虛則頭暈尙蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀也肝厥頭暈腎厥癱瘓不同如此（綱目）○內經曰諸風掉眩皆屬於肝河間曰掉搖也眩昏亂旋運也風主

動故也所謂風氣動而頭目眩運者由風木旺必是金衰不能制木而本復生火風火皆屬陽多爲兼化陽主乎動兩動相搏則頭目爲之眩暈而旋轉矣火本動也焰得風則自旋轉入或乘舟車及作環

舞而眩暈者其動不止而左右紆曲故經曰曲直動搖風之用也眩暈而嘔吐者風熱甚故也○眩暈或云眩胃眩言其黑暈言其轉胃言其昏其義一也（入門）○眩暈者中風之漸也肥白人四君子湯

（方見氣門）倍竇炙黃芪加半夏陳皮少加川芎荊芥以清頭目黑瘦人二陳湯（方見痰飲）合四物湯（方見血門）加片苓薄荷入竹瀝蔗汁意便服（正傳）○眩暈皆稱爲上盛下虛蓋虛者氣與血

也實者痰涎風火也（醫隱）○眩暈者痰因火動也蓋痰不能作眩雖因風者亦必有痰（丹心）○痰在上火在下火炎上而動其痰二陳湯加酒苓梔子黃連蒼朮光活（丹心）○眩暈有風有熱有痰

有氣有溼

風暈

傷風眩暈惡風自汗或素有頭風而發作宜川芎散芎藭散

川芎散

治風證眩暈山茱萸肉一兩山藥甘菊人參川芎茯苓神各五錢右爲末每二錢酒調下（本事）

芎藭散

治頭風眩暈兼治肝虛而暈尤宜婦人川芎一錢當歸七分半羌活旋覆花蔓荊子細辛石菖蒲本制芥穗半夏麴熱地黃防風甘艸各五分右剉作一貼薑三片煎服（本事）○與上養血去風

湯同而分數異

熱暈

火熱上攻煩渴引飲或暑月熱盛宜大黃散刺黃湯

大黃散 治眩暈不可當此火炎上也大黃酒浸炒三
次爲細末茶清調下一錢至二錢(丹心)

荆黃湯 治風熱眩暈大黃酒炒荆芥穗防風各
二錢右剉水煎服以利爲度(丹心)

痰暈 痰盛嘔吐頭重不舉○眩而昏是飲宜半夏茯苓湯(卽茯苓半夏湯方見
痰飲)澤瀉湯○痰暈宜白附子丸天麻半夏湯人參前胡湯清暈化痰湯

澤瀉湯 治心下有支飲其人苦眩胃澤瀉二兩半白朮
一兩半右剉水二升煎取一升分二服(仲景)

白附子丸 治風痰眩暈或頭痛白附子炮大南星炮半夏薑製旋覆花甘菊天麻川芎橘紅白煨薑炒乾
薑各一兩全搗炒五錢右爲末生薑半斤取汁打糊和丸梧子大荆芥湯下五十丸(丹心)

天麻半夏湯 治風痰眩暈欲吐大半夏製各一錢橘皮柴胡各七分黃芩酒炒白茯苓
前胡甘草炙各五分黃連三分右剉作一貼入薑三片水煎服(綱目)

人參前胡湯 治風痰頭暈目眩半夏夏麴一錢紫蘇葉枳殼赤茯苓南星炮前胡橘紅甘
草炙各八分木香人參各三分右剉作一貼入薑五片水煎服(丹心)

清暈化痰湯 治風火痰眩暈陳皮半夏製白茯苓各一錢枳實白朮各七分川芎黃芩白芷羌活人參南
星炮防風各五分細辛黃連甘草各三分右剉作一貼入薑三片水煎服或爲末薑汁打麪

糊和丸服之
亦佳(醫鑑)

氣暈 七情過傷氣鬱生涎痰涎迷塞心竅腦眩
暈眉稜骨痛眼不可開宜玉液湯補虛飲

玉液湯 治氣鬱生涎眩暈怔忡眉稜骨痛半夏薑製四
錢薑十片同水煎入沉香麪水一呷服(入門)

補虛飲 治氣鬱涎盛而熱燥伴及風虛眩暈人參麥門冬山藥各一錢白茯苓伏神各八分半夏製黃芪
各七分前胡熟地黃各五分枳殼遠志薑製甘草炙各三分右剉入薑五片秫米一撮水煎溫服

(入門)

虛暈 內傷氣虛而暈宜補中益氣湯(方見內傷)失血過多而暈宜芎歸湯(方見婦人)○虛暈宜香橘飲
滋陰健脾湯○老人每早起眩暈須臾自定此是陽虛宜黑錫丹(方見寒門)腎虛氣不歸元宜十全

大補湯 方
見虛勞

香橘餅

治氣虛眩暈半夏製二錢陳皮白茯苓白朮各一錢木香丁香
治氣虛研甘草各五分右到作一貼入薑五片水煎服(丹心)

滋陰健脾胃湯

治臨事不寧眩暈難此心脾虛怯也此治氣血虛損有痰飲作形量之仙劑白朮一錢半
陳皮鹽水洗去白半夏製白茯苓各一錢當歸白芍藥生乾地黃各七分人參白茯苓神麥門

冬遠志製各五分川芎甘草各三分右到
作一貼入薑二片棗一枚水煎服(回春)

濕聲

冒雨傷濕鼻塞聲
重而最宜芎朮湯

芎朮湯

治胃雨中暑頭重身寒眩暈川芎白朮半夏製各二錢
甘草炙五分右到作一貼入薑七片水煎服(入門)

頭目不清利

此由風溼禁痰涎鬱于精明之府故頭目不為清
爽宜川芎丸防風散川芎散沃雪湯清神養榮湯

川芎丸

清頭目止旋暈消風化痰桔梗五兩川芎薄荷各三兩二錢半細辛防風甘
草各一兩二錢半右為末蜜和每一兩半作五丸每一丸茶清嚼下(丹心)

防風散

治頭目不清去風明目防風川芎白芷甘菊甘
草各一兩右為末二錢茶清調下(丹心)

清神養榮湯

清頭目聰耳竅助精神麥門冬當歸各一錢二分川芎一錢白芷七分薄荷甘菊
羌活梔子各五分甘草四分升麻一分右到作一貼薑三片茶一撮煎服(集略)

沃雪湯

治頭目昏眩精神不爽咽乾鼻塞薄荷葉三兩甘草一兩四錢荆芥穗白
蘆各一兩二錢天花粉二錢七分縮砂一錢末右每一錢湯點服(類聚)

川芎散

治頭目不清利酒炒黃連酒炒片苓各一兩生乾地黃甘草炙各七錢半羌活防風蘆本
升麻生甘草各五錢柴胡三錢半川芎二錢半右為末每二錢食後茶清調下(正傳)

正頭痛

凡手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足是手與足六陽之脈俱上于頭而也(靈樞)○三陽有
頭痛三陰無頭痛厥陰脈與督脈會於顛故有頭痛少陰亦有頭痛但稀少耳(活人)○頭痛多

主於痰痛甚者火多也有可吐者亦有可下者諸經氣滯亦作頭痛(丹心)○頭痛連眼痛此風痰上
攻須用白芷開之(丹心)○頭痛通治宜川芎茶調散一字輕金散如聖餅子七生丸○頭痛須用川

芎如不愈各加引經藥太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮少陰細辛厥陰吳茱萸〔丹心〕○頭痛有正頭痛偏頭痛風寒頭痛濕熱頭痛厥逆頭痛痰厥頭痛熱厥頭痛濕厥頭痛氣厥頭痛真頭痛醉後頭痛○婦人頭痛宜養血祛風湯〔方見上〕四神散○又腦風證首風證別見于下○炭氣薰人亦作頭痛〔治法見羅補條下〕○足太陽之脈上額交巔直入給腦別下項其病衝頭痛具似脫項似拔即正頭痛也〔靈樞〕

川芎茶湯散

治偏正頭痛及頭風鼻塞聲重薄荷二兩川芎荆芥穗各一兩羌活白芷甘草各五錢防風細辛各二錢半右爲末每二錢茶清調下食後或到取七錢作一貼入茶少許煎服亦佳○偏頭痛取細末以蔥涎調貼兩太陽穴特效〔得效〕

一字輕金散

治偏正頭痛夾腦風眉稜骨痛牽引兩眼抽掣疼痛進出或生醫膜視物不明川芎白芷藜香荆芥旋覆花石膏防風各五錢南星川烏生各二錢半草烏一錢半右剉日晒搗爲末每一字茶清調下神效〔得效〕

如聖餅子

治風寒伏留陽經氣厥痰厥一切頭痛南星乾薑川芎川烏甘草各一兩防風半夏製天麻細辛各五錢右爲末薑汁麪糊和丸夾實大捏作餅子每五餅細嚼茶清溫酒任下〔丹心〕

七生丸

治男女八般頭風及一切頭痛痰厥傷寒傷風頭痛並治川芎川烏草烏南星半夏二味冷水洗去滑白芷石膏俱生用各等分加細辛全蝎各減半右細末研取韭菜自然汁和丸梧子大嚼生蔥茶清送下七丸或九丸〔回春〕

四神散

治婦人血風眩暈頭痛甘菊當歸旋覆花荆芥穗各等分右爲末每二錢蔥白三寸茶末一錢煎水調下〔良方〕

偏頭痛

偏頭痛者頭半邊痛者是也〔丹心〕○如頭半寒痛者偏頭痛也〔丹心〕○偏頭痛在右屬痰屬熱痰用蒼朮半夏熱用酒製片芩在左屬風屬血虛風用荆芥薄荷血用芎歸芍藥酒黃栢〔丹心〕○偏頭痛在右二陳湯加川芎白芷防風荆芥薄荷升麻在左二陳湯合四物湯加防風荆芥薄荷細辛

蔓荊子柴胡酒芩〔正傳〕○頭風之甚者久則目昏偏頭痛者屬少陽相火久則目東小大便秘澀皆宜出血而大下之〔子和〕○偏頭痛年久大便燥目赤眩暈者此肺氣乘肝氣鬱血腫而然宜大承氣湯〔方見寒門〕下之外用大黃芒硝爲末井底泥調貼兩太陽穴乃愈〔入門〕○偏頭痛宜川芎茶調

散一字輕金散川芎散芎犀丸噀鼻法(入門)足少陽之脈起目眇眇上抵頭角其病頭角額痛此偏頭痛也(靈樞)

川芎散

治偏頭痛神效甘菊石膏川芎白朮露生各六錢右細末每三錢茶清調下(綱目)

芎犀丸

治偏頭痛川芎石膏各一兩人參赤茯苓細辛甘草各五錢麥門冬七錢半阿膠珠四錢梔子仁龍腦犀角各二錢半朱砂五錢半爲衣右爲末煉蜜和丸芩實大朱砂爲衣每服一九至二九細

嚼茶清溫酒任下(得效)○偏頭一邊痛鼻塞不聞香臭服此藥數次噴出一滴稠膿即愈(得效)

風寒頭痛

風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛或風寒之邪伏留陽經爲偏正頭痛宜三五七散芎辛湯芎芷香蘇散(方見寒門)如聖餅子(東垣)

三五七散

治風寒入腦頭痛目眩防風一兩山茱萸乾薑炮赤茯苓各一兩半附子炮細辛各七錢半右爲末每二錢溫酒調下或到七錢入薑三片棗二枚水煎服(局方)

芎辛湯

治風寒濕在腦頭痛眩暈嘔吐川芎三錢細辛白朮各一錢半甘草一錢右剉作一貼入生薑五片茶芽少許水煎服(濟生)

溼熱頭痛

心煩頭痛者病在腦中乃溼熱頭痛也宜清空膏小清空膏又用吐法(方見下)

清空膏

治風溼熱偏正頭痛黃芩三兩內半生半酒炒甘草炙一兩半防風羌活黃連酒炒各一兩柴胡七錢川芎五錢右爲末每二錢茶清調成膏臨臥抹口內少用白湯送下○此膏治諸般頭痛皆

效惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治(東垣)

小清空膏

治同上片芩細切酒拌晒乾爲末茶清調下二錢酒亦可(丹心)

厥逆頭痛

當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛乃厥逆頭痛也宜羌活附子湯○厥者逆也邪氣逆上陽經而作痛甚則發厥頭痛齒亦痛宜白附子散○厥頭痛即腎厥顛頂

痛不可忍宜玉真丸(本事)

羌活附子湯

治大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰腦風麻黃附子防風白芷白朮露炒各一錢黃芩羌活蒼朮各七分黃芩升麻甘草炙各五分右剉作一貼食後水煎服(東垣)

白附子散 治風寒入腦令腦逆頭痛齒亦痛或牽引兩眼遂至失明白附子一兩麻黃不去節川烏兩星各五錢全蠍五個乾薑朱砂麝香各二錢半右爲末溫酒調五分服服訖去枕臥少時(得效)

○頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒留於骨髓者以腦爲主腦逆故頭痛齒亦痛宜服白附子散天曲鬻穴(資生)

玉真丸

內經曰頭痛齒疾下虛上實過在足少陰巨髀甚則入腎許學士曰腎厥頭痛也此藥主之硫黃二兩石薺煨半夏製硝石各一兩右爲末薑汁糊和丸梧子大陰乾每二三十丸薑湯或米飲下

(綱目)○頭痛筋變骨重少氣噦噎腹痛時驚不嗜臥咳嗽煩冤其脈舉之則鼓按之石堅由腎氣不足而內著其氣逆而上行謂之腎厥宜服此藥更灸關元百壯(資生)

痰厥頭痛

每發時兩頰青黃眩暈目不欲開懶於言語身體沉重兀兀欲吐此厥陰太陰合病名曰痰厥頭痛宜服局方玉壺丸及半夏白朮天麻湯(東垣)○痰厥頭痛宜上清白附子丸定風餅子

芎辛導痰湯(得效)○淫痰發則痛密無間宜三生丸或二陳湯加南星蒼朮川芎細辛(入門)

玉壺丸

治痰厥頭痛眩暈白麪三兩半夏生南星生各一兩天麻白朮各五錢雄黃水飛三錢半右爲末薑汁和丸梧子大每三十九丸水一盞先煎沸下藥煮至五十沸候藥浮灑出放溫別以生薑湯吞

下食後局方(入門)

半夏白朮天麻湯

治脾胃虛弱痰厥頭痛其證頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷嘔吐眩暈目不敢開如在風雲中半夏製陳皮麥芽炒各一錢半白朮神麴炒各一錢蒼朮人參黃芩天麻白

茯苓澤瀉各五分乾薑三分黃柏酒洗二分右剉作一貼薑五片水煎服(東垣)○頭痛苦甚謂之足太陰痰厥頭痛非半夏不能療黑頭旋風虛內作非天麻不能除黃芪甘溫瀉火補元氣實及虛止自汗人參甘溫瀉火補中益氣二朮俱苦甘溫除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中神麴消食瀉胃中滯氣大麥蘗寬中助胃氣乾薑辛熱以滌中寒黃柏大苦寒酒洗以療冬天小火在泉發燥也(東垣)

上清白附子丸

治風痰盛頭痛目眩旋暈欲倒嘔噦惡心神思昏憤常服除風化痰清利頭目白附子炮半夏製川芎甘菊南星炮白殭蠶炒陳皮去白旋覆花天麻各一兩全蠍炒半兩右爲末

薑汁浸蒸餅和丸梧子大薑湯下三十九丸(得效)

定風餅子 治痰厥頭痛嘔吐眩暈川烏川芎南星半夏乾薑天麻白茯苓白附子甘艸各等分生用右爲末薑汁糊和丸大棗作餅子朱砂爲衣每一餅細嚼薑湯下(得效)

辛導痰湯 治痰厥頭痛半夏夏製二錢川芎細辛南星炮陳皮赤茯苓各一錢枳殼甘艸各五分右剉作一貼薑七片水煎服(得效)

三生丸 治痰厥頭痛半夏白附子天南星各等分右爲末薑汁浸蒸餅和丸棗子大食後薑湯下四五十丸(得效)

氣厥頭痛 氣血虛而邪氣逆上爲頭痛○頭痛耳鳴耳竅不利兩太陽穴痛甚乃氣虛頭痛也宜順氣和中湯黃芪益氣湯○血虛頭痛白魚尾上攻而爲痛宜當歸補血湯加味四物湯眉尖後近髮際曰魚尾○氣血俱虛頭痛宜加味調中益氣湯安神湯○大病後氣虛頭痛四柱散(方見大便)加茶一撮煎服○如氣上不下厥而爲痛宜芎烏散(入門)

順氣和中湯 治氣虛頭痛宜升補陽氣黃芪蜜炒一錢半人參一錢白朮當歸芍藥陳皮各五分升麻柴胡各三分蔓荊子川芎細辛二分右剉作一貼水煎服(綱目)

黃芪益氣湯 治氣虛頭痛黃芪蜜炒一錢人參白朮半夏製陳皮各七分當歸酒洗川芎薑本甘草各五分黃柏酒炒升麻細辛各三分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服(回春)

當歸補血湯 治血虛頭痛生乾地黃酒炒白芍藥川芎當歸片芩酒炒各一錢防風柴胡蔓荊子各五分荆芥薑本各四分右剉作一貼水煎服(醫案)

加味四物湯 治血虛除火上衝頭痛當歸川芎生乾地黃酒炒黃柏酒炒知母酒炒黃芩酒炒黃連酒炒蔓荊子梔子炒各七分右剉作一貼水煎服(回春)

加味調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛其效如神黃芪蜜炒一錢人參蒼朮甘草各七分陳皮當歸川芎各五分木香升麻柴胡細辛蔓荊子各三分右剉作一貼水煎服(東垣)

安神湯 治氣血虛而有火頭痛頭眩眼黑黃芪一錢半羌活黃柏酒浸各一錢柴胡升麻生地黃知母並酒浸各五分防風二分半生甘草炙甘草各二分右剉水煎數沸入川芎蔓荊子各三分再煎至

半食後溫服(東垣)

芎烏散 川芎烏藥各等分右爲末每一錢以燒稱鍾淬酒調服亦治產後頭痛(入門)

熱厥頭痛 治頭痛煩熱雖冬天大家猶喜風寒其痛暫止略來緩處或見烟火則其痛復作宜清上瀉火湯防風散(東垣)

清上瀉火湯

治熱厥頭痛柴胡一錢羌活八分酒黃芩酒知母各七分酒黃柏炙甘草黃芪各五分生地黃酒黃連各本各四分升麻防風各三分半薤荊子當歸身蒼朮細辛各三分荊芥穗川芎

生甘草各二分酒紅花一分
右對作一貼水煎服(東垣)

防風散

治積熱上衝頭痛如火羌活防風當歸大黃川芎梔子薄荷各一錢蟬殼
甘艸各五分右對作一貼入燈心二十莖苦竹葉十片水煎服(得效)

瀝厥頭痛

胃兩傷溼頭重眩痛遇陰雨則甚宜芎
辛湯(方見上)芎朮除眩湯(入門)

芎朮除眩湯

治感寒溼眩暈頭極痛川芎二錢白朮附子生各一錢桂皮
甘艸各五分右對作一貼入薤七片棗二枚水煎服(入門)

異頭痛

詳見下
不治類

○醉後頭痛

詳見內
傷門

頭痛當分六經

凡頭痛皆以風藥治之者高巖之上惟風可到故總其大體而言之也然亦有三陽三陰之
異焉○太陽頭痛惡風寒脈浮緊宜羌活獨活麻黃川芎之類○少陽頭痛往來寒熱脈弦
面細宜柴胡黃芩之類○陽明頭痛自汗發熱脈緩長實宜乾葛升麻石膏白芷之類○太陰頭痛必
有痰身重脈沉緩宜蒼朮半夏南星之類○少陰頭痛三陰三陽經不流行足寒氣逆為寒厥其脈沉
細宜麻黃附子細辛湯(方見寒門)○厥陰頭痛或吐痰沫厥冷其脈浮緩與茱萸湯(方見寒門)○
二陽合病為頭痛宜三陽湯(東垣)○三陽熱鬱頭痛不敢見日光置於冰頂上宜汗吐下三法並行

乃愈
子和)

三陽湯

治三陽合病為頭痛羌活活風石菖柴胡白芷川芎各一錢荊芥升麻
葛根芍藥細辛各五分右對作一貼入連根蔥白三莖水煎服(海藏)

腦風證

風氣循風府(穴名)而上則為腦風(內經)○其證
項背怯寒腦戶(穴名)極冷神聖散太陽丹(河間)

神聖散

治腦風麻黃細辛葛根半生半炒薑香葉各等
分右為末每取二錢荊芥薄荷酒調下(河間)

太陽丹

腦寒之病皆因邪攻於上焦令人頭痛晝夜不甯此藥主之石膏二兩川芎川烏炮白芷甘艸各
一兩龍腦二錢右為末煉蜜同麴糊和勻每一兩作十八丸黃丹為衣每取二三丸食後以煎茶

煎湯咽下

(得效)

首風證 新沐中風則爲首風其證頭面多汗惡風當先風一日則病甚頭痛不可出內至其風

日則病少愈(內經)○大川芎丸主之(河間)○沐浴後眩暈頭痛宜白芷丸(入門)

大川芎丸 治首風川芎四兩天麻一兩右爲末蜜和一

兩作十九丸每一丸細嚼茶酒送下(河間)

白芷丸 治沐浴後眩暈頭痛或頭風眩痛服之令人目明凡暴寒乍緩神思不清頭目昏暈並宜服之新

白芷不拘多少對以蘆薈汁浸晒乾爲末蜜丸彈子大每一丸細嚼以茶清或荆芥湯下(本事)

○一名
都梁丸

眉稜骨痛 眉心并眉梁骨痛者痰也二陳湯(方見痰飲)煎水吞下青州白丸子(方見風門)○得效○眉

稜骨痛連目不可開晝夜劇或因淫痰眉眶骨痛身重者宜芎辛導痰湯(方見上)加川烏白

朮(入門)○眉稜骨痛宜選奇湯上清散○眉眶痛屬風熱與痰白芷酒片芩等分爲末茶清調下二

錢溫酒亦可(丹心)○眉輪骨痛痰火也眉眶痛亦痰火之徵也(回春)○因風寒眉骨痛川烏草烏

各一錢童尿俱浸二宿炒用細辛羌活酒片芩甘草

炙各半錢同爲末分二貼茶清調下食後(正傳)

選奇湯 治眉稜骨痛不可忍羌活防風半夏製各二錢酒片芩一

錢半甘草一錢右剉作一貼入薑三片水煎服(回春)

上清散 治風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍川芎鬱金芍藥荆芥薄荷芒硝各二錢

半乳香沒藥各五分龍腦二分半右爲末每取一字鼻內搗之(丹心)

頭痛不治難治證 眞頭痛者頭痛甚腦盡痛手足寒至節死不治(靈樞)○眞頭痛者其痛上穿風府陷入

泥丸宮不可以藥愈朝發夕死夕發朝死蓋頭中人之根氣先絕也(得效)○頭連腦

痛甚手足俱寒者不治(得效)○頭沉痛入泥丸手足冷爪甲青者謂之眞頭痛其連齒痛甚者屬少

陰厥證俱不治(入門)○診頭痛目痛久視無所見者死(綱目)○頭目痛卒視無所見者亦死(醫

鑿)○泄瀉多而眩暈時時自胃者難治(回春)○凡

眩暈言亂汗多下利時時自胃者虛極難治(入門)

風頭旋 風頭旋者別無疾痛不自覺知常常頭自搖者是也○肝風盛則搖頭(綱目)○治法同頭風○有

一子患七年搖頭三年下血百方無效予思之乃肝血液盛外有風熱乘之肝屬木木盛而脾土爲

木所冠脾與肺是子母俱爲肝所勝而血遂漬於大便故便血不止遂處一方但損肝祛風而益脾只
數服而愈後十餘日血止而下白膿遂得安○防風三兩瓜蒌根黃芪蜜炒羌活白芍藥各五錢厚
角屑甘草各二錢半蛇蛻炙赤鈎藤鈎子見黃各一錢右爲末棗肉和丸
梧子大食後薄荷湯下五七丸只二服頭搖卽止便血隨愈(綱目)

腦縫開裂 人大熱發頭熱者令腦縫裂開取
黑虱三五枚搗碎附之(本草)

頭生白屑

頭生白屑肺之證也肺王皮毛故因風熱而頭皮燥痒生白屑消風散主之(方見上)○綱目○
燥痒如不效再用之先以藜蘆煎湯沐頭然後糝藥尤妙(入門)○又方白芷零陵香爲末糝頭候三
五日筥去白屑附一二三次效(綱目)○頭風白屑瓦松曬乾燒灰淋汁熱洗頭六七度差(本草)熊

腦髓作油摩頭可
去白屑(本草)

嗜鼻

治風涎偏正頭痛尋殺末三錢以豬膽汁再入膽內候乾入川芎白芷藥本青黛玄胡索各二錢爲
末水和爲丸如交實大令病人臥用一丸水化灌入鼻中覺藥味至喉少酸令病人坐之口咬銅錢

一個當涎出益益卽愈名一附金(入門正傳)○偏正頭痛硝石末少許吹入鼻中立愈左痛吹右
痛吹左立愈雷公云腦痛欲亡鼻投硝末者是也(本草)○偏頭痛絕妙藥撥爲末令患者口中含

溫水如左邊疼左鼻吸一字右邊疼右鼻吸一字又粥清調半錢服(本草)○卒頭痛皂角末吹少許
入鼻中令嚏則止(本草)○偏頭痛取生薑薄荷汁一椀殼仰臥注鼻中左痛注左右痛注右左右痛俱

注之神效數十年患者一二注而愈(本草)○
嗜鼻又用不臥散上清散(方見上六聖散)

不臥散 治頭痛不可忍玄胡索七枚青黛二錢猪牙皂角二兩右爲末用水調成小餅子如杏仁大令病
人仰臥以水化開以竹管送入男左女右鼻中覺藥味至喉少酸令病人坐口咬銅錢一個涎出

盈盆卽愈(丹心)○子和方
一名青黛散皂角用二片

六聖散 諸頭痛總治之藥也治頭風牙痛赤眼腦瀉耳鳴偏正頭風頭疼鼻塞聲重乳香沒藥川芎雄
黃白芷各二錢芒硝五錢右爲末令病人仰臥口含涼水取藥少許嚙入鼻內卽效(回春)

吐法 風頭痛若不吐涎久則瞽目而不治瓜蒂散(方見吐門)吐之三吐而差(保命)○頭風後有眼疾眼
有半明可救者防風散吐之(方未詳)○保命)○頭風眩暈可用獨聖散(卽瓜蒂散)吐之吐訖可用

清上降火之劑防風通聖散(方見)風門加半夏南星(子和)痰涎頭痛難當胸膈煩悶欲吐瓜蒂散吐之(入門)○濕家頭痛鼻寒聲重令病人先噀水一口將瓜蒂散末一字嚥鼻內出黃水爲度(入門)

門)○卒頭痛如破非冷非風是胸膈有痰氣上衝所致名爲厥頭痛吐之卽差單煮茗飲一二升須臾吐吐畢又飲如此數過須吐痰汁盡乃止不損人待渴卽差(本草)

下法三陽熱鬱頭痛不敢見日光香冰頂上宜汗吐下(子和)○頭風之甚者久則目昏偏頭痛久則目東小大便秘澀皆宜大承氣湯(方見寒門)下之(子和)○脈動作頭重痛熱氣潮者屬胃宜調胃承

氣湯(方見寒門)下之卽愈(綱目)

單方凡二十

硝石治偏正頭痛取硝末少許吹入鼻中尤痛吹右右痛吹左卽愈(趙詒同)○(本草)

石膏治熱厥頭痛陽明頭痛爲主藥白虎湯(方見寒門)是也(本草)○治陽明頭痛大效石膏川芎白芷等分爲末每三錢茶清調下名石膏散(綱目)

甘菊治風眩頭痛取花爲末酒調服一錢日再或多取釀酒或浸酒服之(酒方見雜方)○又取嫩莖葉作羹作菜食亦良白菊尤佳(本草)

羌活治賊風頭痛眩暈乃太陽頭痛主藥也又主風毒頭連齒痛到煎服之(本草)

細辛主風頭痛腦動治頭面風不可闕也(本草)○治足少陰腎經苦頭痛煎服未服皆佳(綱目)

芎藭主風邪入腦頭痛治頭面風不可闕也(本草)○治偏正頭痛常服除根川芎二兩香附子四兩爲末每二錢茶清調下名芎藭散(得效)○治熱厥頭痛川芎石膏等分對水煎服名川芎石膏湯(綱目)○川芎治厥陰經頭痛在腦(綱目)○偏

頭痛細到酒浸服之或煎服或未服並佳(本草)

防風主大風頭眩痛又主頭面去來風煎服未服皆佳(本草)○治上部風邪之仙藥也(湯液)

決明子治頭風明目作枕枕之勝菟豆(本草)○偏頭痛作末水調貼太陽穴甚妙(本草)

蒼耳 主風頭寒痛○婦人血風攻腦，忽暈倒，取嫩心陰乾，爲末，酒服一錢，名

葛根 主傷寒中風，頭痛，煎服之○(本草)
○陽明經頭痛藥也○(湯液)

當歸 治血虛頭痛，細劉

麻黃 主風寒頭痛云

白芷 主熱風頭痛，又主風，按作丸服，名都梁丸○(本事)
○治陽明頭痛，在頰，煎服末服亦佳○(湯液)

藜蘆 主風頭痛，去頭風○(本草)
○治顛頂痛，腦齒痛，引諸藥至頂上，煎服末服並佳○(丹心)

半夏 主頭眩○(本草)
○呈太陰痰厥頭痛，非此不除，煎服之○(東垣)

蔓荊子 主風頭痛，腦鳴，煎服之○(本草)
○太陽經頭痛之藥，散風邪，除頭昏目暗○(丹心)

山茱萸 主頭風，腦骨痛，又治肝虛眩暈，乃肝歲藥也，煎服之○(本草)

皂莢 除頭風，頭痛，作末吹鼻，中又可爲沐藥○(本草)

茶 臘茶也能清利頭目，煎湯常飲之，茗葉同功○(本草)

荊芥 主頭旋目眩，又治頭風，爲要藥，煎服末服皆佳○(本草)
○治頭風，荊芥，礮石膏，煨等分，爲末，每二錢，以薑蔥煎水調下，名荊芥散○(綱目)

鱧白 連鬚者，治傷寒頭痛，煎服出汗，卽效，太陽經藥也○(本草)

萊豆 治頭風，頭痛，作枕枕之佳○(本草)

蘿蔔 治偏頭痛取汁嚙鼻中(詳見嚙鼻條)○炭烟熏人致頭痛
生蘿蔔取汁飲之無則蘿蔔子研爛取汁服亦佳(得效)

薄荷 治頭風又治風熱頭痛爲清上要
切之藥煎服末服並佳(本草)

黃牛腦髓 治偏正頭痛取髓一個入白芷川芎末各三錢同入磁器
內加酒煮熟乘熱服之盡量一醉醒後其疾如失(入門)

鷓鴣頭 主頭風眩顛倒燒
灰酒調服(本草)

鍼灸法

眩暈取神庭上星額會前頂後頂腦空風池陽谷大都至陰金門申脈足三里(綱目)○眩暈怕寒
春夏常著綿帽暫去即發取百會上星風池豐隆(綱目)○偏正頭痛取絲竹空風池合谷中脘解

諸足三里(綱目)○正頭痛取百會上星神庭太陽合谷(綱目)○腎厥頭痛灸關元百壯(資生)○
厥逆頭痛齒亦痛灸曲發七壯(資生)○痰厥頭痛取豐隆(綱目)○頭風頭痛鍼百會立愈又灸額

會前頂上星百會(丹心)○腦痛腦旋腦瀉腦熱冷皆灸額會(資生)○眉稜骨痛取撥竹合谷神庭
頭維解額(綱目)○醉後頭痛取印堂擗竹足三里風門膈中(綱目)○一老婦久患頭痛因視其手

足有血絡皆紫黑遂用鍼刺出血如墨汁後刺受病之經
得全愈(綱目)○偏頭痛及正頭痛取阿是穴鍼之即愈

位 部 堂 明

面



自鼻直上髮際曰天中
 天中之下曰天庭
 印額也
 天庭之下曰司空
 司空之下曰印堂
 印堂在兩眉中
 印堂之下曰承漿
 穴名
 承

額為天庭屬
 心頰為地閣
 屬腎鼻居而
 中屬脾左頰
 屬肝右頰屬
 肺此五臟部
 位也察其色
 以辨其病

漿之下曰地閣卽頰也兩頰角曰方廣亦曰太陽穴○天中與天庭司空及印堂額角方廣處有病存亡此是命門地醫人鮮較量○天中天庭司空印堂額角方廣皆命門部位以占吉凶也(入門)五色獨決于明堂明堂者鼻也明堂之色青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒(靈樞)○切脈動靜而視精明察五色觀五臟有餘不足六府強弱形之盛衰以此參伍決死生之分註曰精明穴名在明堂左右兩目內眥也(內經)○明堂占法詳見審病門

面爲諸陽之會

靈樞曰手之三陽從手走至頭○手太陽之脈從缺盆貫頸上頰至目銳眥手少陽之脈從缺盆上耳上角以屈下頰至頰手陽明之脈從缺盆上頸貫頰交人中上挾鼻孔此從下而上于面也(銅人)○靈樞曰足之三陽從頭走至足○足太陽之脈起於目內眥上額交頰上足少陽之脈起於目銳眥上抵頰角足陽明之脈起於鼻交頰中此從面而走至足也(銅人)○此手足六陽之脈俱會於面也

人面耐寒

黃帝問曰首面與身形也屬骨連筋同血合於氣耳天寒則裂地凌冰其卒寒或手足解惰然而其面不衣何也岐伯答曰人之十二經脈三百六十五絡其血氣皆上於面而走空竅其精陽氣上走於目而爲睛其別氣走於耳而爲聽其宗氣上出於鼻而爲臭其濁氣出於胃走唇舌而爲味其氣之津液皆上熏於面而皮又厚其肉堅故大熱甚寒不能勝之也(靈樞)○人而獨能耐寒者何也蓋人頭者諸陽之會也諸陰脈皆至頸項中而還獨諸陽脈皆上至頭故令而耐寒也(難經)

面病專屬胃

手足六陽之經雖皆上至頭而足陽明胃之脈起於鼻交頰中入齒挾口環唇倚頰車上耳前過客主人(穴名)維絡于面上故面病專屬於胃其或風熱乘之則合入面頰或面鼻色紫或風刺癢疹或面熱或面寒隨其經證而治之(醫鑿)

面部度

兩頰之開相去七寸(靈樞)

面熱也

面熱者足陽明病(靈樞)○面赤如醉者胃熱上熏也(仲景)○面熱因鬱熱(丹心)○面熱者胃病也(東垣)○飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時頭火上行獨燎其面(東垣)○一(人患面熱脈洪大而有力量此乃陽明經多血多氣因鬱積熱而致先以調胃承氣湯(方見寒門)十錢加黃連三錢犀角一錢疎下三兩行次以升麻黃連湯治之而愈(寶鑑)

升麻黃連湯

治面熱升麻乾葛各一錢白芷七分白芍藥甘草各五分黃連酒炒四分犀角屠川芎荆芥穗薄荷各三分右剉先用 waters 盞浸川芎荆芥薄荷外都作一貼水二盞煎至一盞入浸三

味再煎至七分去滓食後溫服忌酒麪五辛(寶鑒)

兩寒

面寒者胃虛也(丹心)○胃中有寒溼則不能耐寒先以附子理中湯(方見寒門)次用升麻附子湯(入門)○一老尼患面寒不敢當風行諸治不效此係年高素食茶果陽明之氣不能上榮故也先以

附子理中湯溫其中氣次用升麻附子湯治之而愈(入門)

升麻附子湯

治面寒升麻附子炮葛根白芷黃芪蜜炒各七分人參草豆蔻甘草炙各五分益智仁三分右剉作一貼入連殼蔥白三莖同煎服食前(入門)○升麻葛根湯乃陽明經主藥也加黃

連犀角白芷川芎荆芥薄荷以治而熱加附子白芷黃芪人參草豆蔻益智仁以治而寒蓋而熱而寒皆本於胃故也(入門)

面見五色

肝外證面青善怒心外證面赤善笑脾外證面黃善噫肺外證面白善噎腎外證面黑善恐欠(難經)足厥陰之脈病而虛脫色足少陽之脈病而微塵手厥陰之脈病而赤足少陰之脈病而

黑如炭色足陽明之脈病而黑(靈樞)○寸口脈微而澁微者衛氣衰澁者榮血不足衛氣衰則面色黃榮血不足則面色青又曰陰陽具虛則面色青白(仲景)而唇紫黑宜白芷麻湯(醫案)一婦人因憂思飲食失節得面色黑不澤環唇尤甚心懸如飢此心肺之陽氣虛不能行榮衛而光澤於外肝腎陰氣

上溢於陽中故黑色顯於面又脾之華在唇今水來侮土故黑色見於唇以沖和順氣湯助陽明生發之氣數服而愈(寶鑒)○一人忽黑色滿面孫兆診之曰非病也此為臭氣所熏穢氣畜於面部不散

故有此色問曰汝一月前聞甚一陣非常臭氣不能避耶曰一日登瀛其廁臭不可聞良久下廁明日遂有此疾孫曰去至臭無過至香可用沉檀各一兩碎焚爐中安帳中以熏被蓋定勿令香散可端坐

香邊瞑目靜坐候香氣散方可出帳其人依言聞香黑色漸幾旬日如舊蓋腎臭屬脾臭香脾能尅腎故如是(孫兆)

沖和順氣湯

葛根一錢半升麻白芷防風各一錢黃芪八分人參七分甘草四分白芍藥蒼朮各三分右剉作一貼入薑二片棗二枚水煎服早飯後午飯前(寶鑒)○醫陸升麻白芷湯同

面戴陽證

諸病面赤雖伏火熱禁不得攻裏為陽氣拂鬱邪氣在經宜發表以去之經曰火鬱則發之是也瘡瘍亦然(東垣)○面戴陽者浮火所衝也又曰面戴陽者面雖赤而不紅活乃下虛也醫者不

寒誤用涼藥則氣消而成大病矣(入門)面赤色者陽氣佛鬱在表當解之發汗(仲景)○傷寒少陰面陽證而戴陽者下虛故也宜通脈四逆湯(方見寒門)加蔥白九莖煎服(仲景)○面赤色為

陽氣佛鬱在表故用蔥白以通陽氣也(綱目)

胃風證胃風為面腫(入門)○面腫曰風(內經)○初飲食訖乘風涼而致其證飲食不下形瘦腹大惡風頭多汗膈塞不通脈右關弦而緩帶浮(東垣)○虛風麻木牙關緊急目內蠕動胃中有風獨而腫

宜升麻胃風湯(東垣)○一人患鼻頰角痛或麻痺不仁唇口頰車髮際連牙腫痛口不得開額與頰車常如糊稠手觸則痛此陽明經絡受風熱毒氣而然宜犀角升麻湯(本事)

升麻胃風湯治胃風而腫升麻二錢白芷一錢二分當歸葛根蒼朮各一錢甘草一錢半麻黃不去節五分柴胡薄荷羌活黃柏草豆蔻各三分薤白子二分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

食後東垣

犀角升麻湯治陽明胃經風熱毒犀角一錢半升麻羌活防風各一錢川芎白附子白芷黃芩甘草各五分右剉作一貼水煎食後臨臥各一服(本事)

腎風證黃帝曰有病腎風者而勝巔然壅塞於法可刺否岐伯曰虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至必少氣時熱時熱從胸背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難以行註曰

塊然腫起說壅謂目下壅如臥蠶形也(內經)○面塊然浮腫疼痛其色紫黑多汗惡風者屬腎風證治法(二因)

搭頰腫腫亦名疔腮因風熱或膏粱積熱而作宜升麻黃連湯或升麻胃風湯或荆防敗毒散(方見寒

牙齒)加石膏(入門)○搭腮腫宜加味消毒飲(醫林)○腮腫赤小豆為末雞子清調貼之醋調貼之亦效(綱目)○又方石灰炒熱地下窰如此七次醋調附立消(醫鑑)○又方細辛草烏等分為末

人蚌粉豬脂調附腫處口含白梅置腮邊良久腫退涎患消矣(丹心)○小兒毒氣攻腮赤腫可畏皂角二兩南星生二錢糯米一合右為末薑汁調塗立效(本事)

加味消毒飲治搭腮腫疔疔風惡實甘草連翹羌活各一錢右剉作一貼水煎服(醫林)○醫鑑一名賜明經也氣血供多風腫宜汗先與通毒散去硝黃入葷

葱豉同煎服微汗以葷葷刺鼻中出血其腫立消(子和)

面上雜病

風刺粉刺野雞痘痲酒癩肺風疔(痘瘡詳見鼻門)皆面上之病(入門)○風客皮膚痰漬腐府

毒瘡癩毒癩宜栢連散硫黃膏白附子散清上防風湯○面生一切風刺粉刺雀卵斑野雞子宜玉容散連翹散紅玉散玉容西施散皇帝塗容金面方玉容膏○滅面上癩痕方衣中白魚三七枚白右

脂三錢半鷹黃白七錢半白附子二錢半白蠟五錢爲末猪脂調和每夜塗癩上朝洗之(類聚)

栢連散

治面上熱毒惡瘡黃栢炙黃連胡椒炒各等分右爲細末猪脂調勻類塗癩上(得效)

硫黃膏

治面上生瘡或鼻臉赤紫及風刺粉刺諸藥不效生硫黃白芷瓜蒌根膩粉各半錢全蠟三個蠟殼五枚莞青七枚去翹足右爲末另以香油黃蠟和合如而油法火上熔熬取下乃入藥末在內

和勻每用少許臨臥洗而後塗面上勿近眼數日赤自消風刺粉刺一夕見效(得效)

白附子散

治面上熱瘡或斑點白附子密佗僧白茯苓白芷官粉各等分右爲末羅蔔煎湯洗而後羊乳調成膏附患處明早洗去無羊乳則代人乳(醫案)

清上防風湯

清上焦火治頭面生瘡癬風熱毒防風一錢連翹白芷桔梗各八分酒炒片芩川芎各七分荆芥梔子黃連酒炒枳殼薄荷各五分甘草三分右到作一貼水煎入竹瀝五匙服(醫案)

玉容散

治面上粉刺或生小瘡或生瘰癧粉刺之類並皮膚癩痒能去垢膩皂角一斤升麻二兩六錢半楮實子一兩六錢半白芷白芨天花粉菜豆粉各三錢二分半甘松縮砂白丁香各一錢六分半

細米三合半右爲末和勻常用洗面一方加樟腦二錢(醫案)

連翹散

治面生殺嘴瘡俗名粉刺連翹川芎白芷片芩黃連沙參荆芥桑白皮梔子貝母甘艸各七分右到作一貼水煎食後服○一名清肺散(回春)

紅玉散

治面上一切酒刺風刺黑靨斑白芷藿香牙皂各二錢甘松三乃子木澤白丁香細辛杏仁密佗僧各一錢天花粉白茯苓各一錢半樟腦五分白芨三分右爲末臨臥用津唾調或乳汁調

敷面上明早溫水洗去其面如玉(木澤未詳)(醫案)

玉容西施散

治同上燕豆粉二兩白芷白芨白欒白殭蠶天花粉各一兩甘松三乃子芽香各五錢零陵香防風藜本各二錢肥皂角二錠右爲細末每洗面時用之面色如玉(醫林)

皇帝塗容金面方

朱砂二錢乾胭脂一錢官粉三錢烏梅肉五個小腦五錢川芎少許右爲細末
臨睡時津唾調搽面上天明溫水洗面美如童顏乃神仙妙用之法（醫鑑）

玉容膏

治面上燥瘡及斑靨
諸劑（方見雜方）

又方

治粉刺枯白礬一兩生硫黃白附子各二錢右爲末津唾調搽臨臥上藥明早洗去（醫鑑）
治刺及鼻瘡雄黃鉛粉各一錢硫黃五分右爲末臨臥乳汁調塗明早溫水洗去（回春）

按摩法

熱摩手心頻拭額上謂之修天庭連髮際二三七
遍而上自然光澤所謂手宜在面是也（養性書）

面部凶證

病人面無光齒齲黑者死（扁鵲）○面腫色蒼黑者死（扁鵲）○病人榮衛竭絕面浮腫者死
扁鵲○病人面腫色蒼黑者死（扁鵲）○面黑唇青者死面青唇黑者亦死（華佗）○病人黑

色出於天中天庭者死（華佗）○人
有病面上忽見紅點者多死（丹心）

單方

凡二十五種
有綠雲散

鹽湯

治面上五色瘡溫鹽湯綿浸
擗每日五六度自差（本草）

白礬

治粉刺白礬末酒調塗之（得效）○面生紫赤刺瘡
疹白礬硫黃等分黃丹少許爲末津唾調附（入門）

蜜佗僧

治面上野黧斑點細研爲末入乳調塗每夜
用之亦令面生光華又治面鼻赤庖（本草）

石灰

去面上黑子瘰肉及粉刺○去膩子方石灰末水調如稠粥搗糯米粒經宿米如水
精先以針尖微動膩子置糯米於其上經半日膩汁自出剝去藥勿著水（本草）

漿水

酸者白人膚體如粉帛去野黧黑子以漿水洗面以布揩黑子令
痛水研白檀取汁塗之（本草）○卽粟米粥取清留置味酸者也

朱砂

好顏色水飛爲末并華
水點少許服之（本草）

藥灰

去面上黑痣鬻子取灰和
水熬以點之（本草）

兔絲子苗

去而對及粉刺斑點搗苗取汁常塗之(本草)

益母草

入面藥令光澤五月五日採根葉曬乾搗水水和作團如雞子大火燒一炊久經一伏時取出磁器中再研篩收之使如溲豆法能去風粉刺令面悅澤(本草)

瓜蘖根

悅澤人面療手面皴作粉常塗之妙(本草)

白芷

去對難斑癩潤澤顏色可作面脂常用(本草)

生薑汁

治指爪破面取汁調輕粉傅之更無癩痕(得效)

靛本

去對癩酒盞粉刺潤澤顏色可作沐藥面脂(本草)

土瓜根

去面上痞癰子爲細末漿水和勻入夜藥水洗面附藥朝復洗之仍得光潤皮急百日光華射人(本草)

白附子

主面上百病去對癩癩疵可入面脂或作澡豆用(本草)

白茯苓

去對癩及產婦黑皰如雀卵色爲細末蜜和常塗面良(本草)

桑柴灰

能滅痣癩黑子與藜灰淋取汁熬點之佳(本草)

桑葉

治面上肺毒瘡如大風瘡取葉淨洗蒸熟日乾爲末水調二錢服日三名綠雲散(本草)

蜜

常服面如花色久服之佳(本草)

真珠

除對癩斑照令面潤澤好顏色研爲粉和乳汁常塗之(本草)

白蘆葦

滅對癩癩痕令面色好爲末常塗之又與去魚鷹屎白等分爲末和乳汁塗癩痕便滅(本草)

覆盆子

令人好顏色久食之佳蓬蘽同功(本草)

烏梅肉

去黑點黑痣蝕惡肉和諸藥以點之(本草)○面生雀子斑取梅肉櫻桃枝豬牙皂角紫背浮萍等分爲末如常法洗面其斑自去(入門)○白梅同功

粟皮

粟上薄皮多扶搗爲末和蜜塗面令粟皮肉急縮可展老人肉皺(本草)

桃花

好顏色悅澤人面可酒漬卽之○而上瘡出黃水桃花爲末水服一錢日三(本草)

杏仁

去面點搗爲末有雞子白夜以塗面明早溫酒洗之○傷風面腫杏仁攪搗附之(本草)

蔓菁子

取油入面脂用去黑點又細研入面脂常用極去面皺(本草)

冬瓜仁

令面光澤好顏色去黑斑黑點可作面脂常用○取仁三五升去皮搗爲末蜜丸空心服三十九丸久服令人白淨如玉(本草)

蔥白

主傷風面目浮腫煎湯飲之洗之(本草)

鷓鴣屎

去面上點黧癩癩疵皴疥雀卵斑取屎白豬脂調塗(本草)

熊脂

主面上點黧黑斑悅澤人面可塗之兼食之(本草)

麩羊膽

主面多黧點如雀卵色取膽和酒煮沸以塗拭之日三卽差(本草)

大豬蹄

令老人面光澤豬蹄一具理如食法煮漿如膠夜以塗面曉以漿水洗卽面皮急矣(本草)

鹿角

炙爲末酒服二錢日二久服面色如花○以漿水濃磨如泥塗面令不皺兼去雀斑光華可愛○年少氣盛面生皴瘡糜脂塗之卽差(本草)

一方

被打頭面青腫羊肉牛肉或猪肉炙令熱貼腫上卽愈(本草)

五輪之圖

眼


眼為臟腑之精

五藏六府之精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精為約束顯筋骨血氣之精而與脈系上屬於腦後

出於項中故邪中於項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦入於腦則腦轉睛則引目系急目系急則目眩以轉矣(即因風眩暈也)邪中其精其精所中不相比也則精散精散則視歧視歧見

兩物也(視一物為兩也)目者五藏六府之精也榮衛魂魄之所常營也神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脈法於陽也故陰陽合傳而為精明也目者心之使也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑也(靈樞)○是以五藏六府十二經脈三百六十五絡其血氣皆稟受於脾土上貫於目而為明故脾虛則五藏之精氣皆失

所使不能歸明於目矣(綱目)



白睛屬肺

氣之精為氣輪(得效)

黑睛屬肝

筋之精為風輪(得效)

上下險屬脾

肉之精為肉輪(得效)

大小眇屬心

血之精為血輪(得效)

瞳人屬腎

骨之精為水輪(得效)

八廓之圖



氣輪

病因凌寒胃暑受飲寒漿肌體虛疎寒邪入內其候或痛或昏傳在白睛筋

風輪

病因喜怒不常作勞用心晝視遠物夜讀細書其候背頭

肉輪

病因多食熱物好吃五辛遺道奔馳食飽耽眠風積痰壅其候

血輪

病因七情煩勞內動於心外攻於目其候赤筋纏皆白膜侵睛

水輪

病因勞役過度嗜慾無厭又傷七情加之多殮酒麪好噴鹹辛因動腎經通於黑水其候冷淚

天廓

肺大腸

傳道(得效)

地廓

脾與胃

水穀(得效)

火廓

心命門

抱陽(得效)

水廓

腎

會陰(得效)

風廓

肝

養化(得效)

雷廓

小腸

關泉(得效)

山廓

膽

清淨(得效)

澤廓

膀胱

津液(得效)

天廓病因雲中射膈月下看書多食腥膻使胃寒暑

其候視物生烟背疼難開不能辨認(得效)

地麻病因溼瀆頭上冷灌睛時其候
眼弦緊急瘀血生瘡(得效)

火麻病因心神恐怖赤脈侵皆血灌瞳人其候
臉頭紅腫睛內偏疼熱淚如傾(得效)

水麻病因努力爭鬪擊棒開弓驟騎強力生
病其候常多昏睛眩淚多(得效)

風麻病因枕邊窻穴有風不能遮閉坐臥當之腦中風
邪其候黑睛多痒兩臉常爛或昏多淚(得效)

雷麻病因失枕睡臥酒後行房血脈滿溢風邪內聚其候
皆頭赤腫睛內生瘡倒睫拳毛遮睛勞肉(得效)

山麻病因撞刺破損致令肉生兩臉昏閉雙睛
若不早治永沉昏暗瘵血侵睛(得效)

濁麻病因春不宜解冬聚陽毒多食熱物致令脂凝
聚血淚攻潮有如霧龍飛蜂黑花常見(得效)

眼睛屬五臟首尾赤皆屬心滿眼白睛屬肺其烏睛圓大屬肝其上下肉胞屬脾而中間黑腫一點如漆者
腎實主之(直指)○白睛屬肺名曰氣輪赤者屬心行血脈也再於黑睛上分飛微青者屬肝

也次黑者屬腎也中間一
點瞳人屬膽也(入門)

眼有內外皆目皆外決於面者為銳皆在內近鼻者為內眥上為外眥下為內眥(靈樞)○足太陽為目上
網足陽明為目下網(靈樞)皆謂四際險瞳之本也(內經註)○目之內眥太陽經之所起血

多氣少目之銳眥少陽經也血少氣多目之上網太陽經也亦血多氣少目之下網陽明經也血氣俱
多此三經俱會于目惟足厥陰經連於目系而已故血太過者太陽陽明之實也血不及者厥陰之虛

也放出血者宜太陽陽明蓋此二經血多故也少陽一經不宜出血血
少故也刺太陽陽明出血則目愈明刺少陽出血則目愈昏矣(子和)

諸脉屬目心合脈諸脉者皆屬於目(內經)○五藏六府精華皆稟於脾注於目故理脾胃則氣上升而神
清也肝之系雖總於目而照微光彩實腎精心神所主故補精安神者乃治眼之本也(入門)○

因心事煩冗飲食失節勞役過度故脾胃虛弱心火太盛則百脈沸騰血脈逆行邪害孔竅所謂天明
則日月不明是也脾者諸陰之首也目者血脈之宗也故脾虛則五藏之精氣皆失所司不能歸明於

目矣心者君火也主人之神宜靜而安相火代行其令相火者包絡也主百脈皆榮於目既勞役運動損其血脈故諸病生焉醫者不理脾胃及養血安神是治標不治本不明此理也(東垣)

脈法左寸脈洪數心火炎也關脈弦而洪肝火盛也右寸關俱弦而洪肝木挾相火之勢侮肺金而乘脾土也(醫鑿)○眼本火病心肝數洪右寸關見相火上衝(回春)○眼見黑花者從腎虛而起診左手尺

脈當沉而數者是也(類聚)

目者肝之竅肝在竅為目(內經)○東方青色入通於肝開竅於目藏精於肝(內經)人臥則血歸於肝

受而能視(內經)○肝氣通於目肝和則能變五色(難經)肝虛則目眩眩無所見(內經)○目瞶者肝氣不治也(海藏)○目者肝之外候肝取木腎取水水能生木子母相合故肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣乏則昏蒙眩心者神之舍又所以為肝腎之副焉蓋心主血肝藏血血能生熱

凡熱衝發於眼皆當清心涼肝(方塔)肝藏血熱則目赤腫虛則眼前生花(詳見眼花)赤腫宜地黃粥(入門)

地黃粥治睡後目赤腫須臾漸白良久則無此血熱非肝病也蓋人以則血歸於肝因血熱到肝故睡起而目赤良久無事者血復散於四肢也宜食此粥以涼肝血生地黃不拘多少搗取自然汁浸粳

米半升浸透晒極乾再浸再晒三次每用磁器煎湯一升令沸入前米一合熬作稀粥食遠吃之即睡立效(入門)

眼病無寒歷考眼科之病無寒而有虛與熱豈寒溢血而不上攻歟(入門)

眼無火不病目不因火則不病何以言之白輪變赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神光被瞽火乘肝與腎也亦脈貫目火自甚也能治火者一句了故內經曰熱勝則腫凡目暴赤腫起羞明隱濕

淚出不止暴寒目瞶皆火熱之所為也治火之法在藥則鹹寒吐之下之在鍼則神庭上星顙會前頂百會血之醫者可使立退痛者可使立已味者可使立明腫者可使立消矣(子和)○大凡眼之為患

多生於熱治法以清心涼肝調血順氣為先(直指)

眼病所因生食五辛○接熱飲食○燥頭出血多○極目遠視○夜讀細書○久處烟火○博奕不休○夜問讀書○飲酒不已○熱濃麪食○抄寫多年○離鑊細作○泣淚過多○房室不節○飲向日

月輪看○月下讀書○夜視星月○極目瞻視山川草木皆喪明之由也○又有馳騁駁獵○胃涉風霜○迎風逐獸日夜不息皆傷目之由也(千金)○眼病處風熱與血少神勞腎虛(丹溪)

月輪看○月下讀書○夜視星月○極目瞻視山川草木皆喪明之由也○又有馳騁駁獵○胃涉風霜○迎風逐獸日夜不息皆傷目之由也(千金)○眼病處風熱與血少神勞腎虛(丹溪)

內障者肝病也○回春○內障在睛裏昏暗與不患之眼相似唯瞳人裏有隱隱青白者無隱隱青白者亦有之○綱目○內障先患一眼次為兩目俱損者皆有醫在睛內遮瞳子而然夫通睛之脈

者目系也目系屬足厥陰足太陽手少陰三經三經虛則邪從目系入黑睛內為翳以鍼言之則當取三經之命穴如天柱風府大衝通里等穴是也○綱目○內障者不疼不痛無淚無眵細觀如薄霧之

形久視如輕烟之狀飛蠅散亂懸虫虛空日漸月增腦脂下結於烏輪腎障漸生於黑水○類聚○內障昏蒙外無醫膜因腦脂下凝烏珠轉白或如金色或茶豆色或如雲烟或見五色治比外障更難如

腦脂凝結瞳人反背者不治○入門○屬血少神勞腎虛也宜養血補水安神以調之○丹心○凡昏弱不欲視物內障見黑花瞳子散大皆裏病也○丹心○內傷色慾腎精虛者宜益腎氣九肝血虛者養

肝丸生熟地黃丸肝腎俱虛者宜駐景丸加減駐景丸明目壯水丸○入門○血少神勞腎虛宜滋陰地黃丸滋腎明目湯○內障宜補肝散壓腎丸羊肝丸本事方羊肝丸補腎丸枳荅丸五退散密蒙花

散沖和養胃湯當歸湯還睛丸○方見通治○發雲退還睛丸○內障有圓醫永醫滑醫蓋醫散醫橫開醫浮醫沉醫偃月醫棗花醫黃心醫黑花醫胎患五風變雷頭風驚振綠風烏風黑風青風肝虛雀

目高風雀目肝虛目
睛共二十三得效
益陰腎氣丸 經曰壯水之主以鎮陽光滋陰是也熟地黃二兩生乾地黃酒焙山茱萸各一兩五味子山藥杜丹皮柴胡當歸尾酒洗各五錢茯苓神澤瀉各二錢半右為末蜜丸梧子大朱砂為衣空

心鹽湯下五七十九○正傳○一
方無朱砂○一名滋陰腎氣丸

養肝丸 治肝藏不足眼目昏花或生眵淚婦人血虛目疾當歸川芎白芍藥熟地黃各一兩防風楮實子炒車前子酒炒熟仁湯浸去皮各五錢右為末蜜丸梧子大白湯下七十九食遠時○醫鑑○

生熟地黃丸 治血虛眼昏生乾地黃熟地黃玄參石薺各一兩右為末蜜丸梧子大空心茶清下五七十九○入門○

駐景丸 治肝腎俱虛多見黑花視物昏暗或生翳障兔絲子酒製五兩車前子炒熟地黃各三兩右為末蜜丸梧子大空心溫酒下七十九○局方○一方加枸杞子一兩半尤佳

加減駐景丸 治肝腎俱虛兩眼昏暗兔絲子八兩枸杞子五錢子車前子楮實子川椒炒各一兩熟地黃當歸身各五錢右為末蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯下五七十九○簡易○

明目壯水丸 治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多下冷淚此壯水之主以鎮陽光補腎養肝生血明目黃栢知母並乳汁拌晒乾炒各二兩半熟地黃生乾地黃酒洗天門冬麥門冬山茱萸酒蒸甘

菊各二兩枸杞子酒洗一兩六錢牛膝酒洗一兩三錢人參當歸酒洗五味子兎絲子白茯苓山藥
栝子仁炒澤瀉牡丹皮酒洗各一兩白豆蔻三錢右爲末蜜丸梧子大空心鹽湯下百丸(醫鑿)

滋陰地黃丸

治血少神勞腎虛眼目昏暗子散大視物昏花法當養血涼血散火除風熱地黃一兩柴
胡八錢生乾地黃酒焙七錢半當歸身酒洗黃芩各五錢天門冬地骨皮五味子黃連各三

錢人參枳殼甘草炙各二錢右爲末蜜丸蒸豆大每百丸茶清送下(丹心)○一名熟地黃
丸凡眼視漸昏乍明乍暗此失血之驗也宜服此與定志丸(方見神門)兼服尤佳(保命)

滋腎明目湯

治血少神勞腎虛眼病當歸川芎白芍藥生地黃熟地黃各一錢人參桔梗梔子黃連白
芫荽刺子甘菊甘草各五分右剉作一貼入細茶一盞燈心一團水煎食後服(回春)

補肝散

治肝風內障不痛不痒眼見五花或一物二形羚羊角防風各一兩人參赤茯苓各七錢半羌活
車前子細辛玄參黃芩炒各三錢半右爲末每二錢米飲調下食後○羚羊角行厥陰經玄參細

辛行少陰經羌活防風車前子行太陽經
如筋脈枯澀加夏枯草嘗試有驗(綱目)

墜腎丸

治內障有翳青羊膽青魚膽鯉魚膽各七個熊膽二錢半牛膽五錢麝香三分石決明水飛末一
兩右末麪糊和丸梧子大空心茶清下十九丸無青魚膽則獺胆三枚代之無則代豬胆一(綱目)

羊肝丸

治眼目諸疾及障翳青黃連另爲末白羊子肝一具去膜砂盆內同研細衆手作丸如梧子大
空心溫水下三十九丸連作五劑差青羊肝尤佳○有一官活出一死囚其囚數年病死官人得內

障甚苦獨坐憂嘆聞階除響聲問爲誰曰我昔所活囚
也今公得疾故感而來告遂傳此方服之果愈(局方)

本事方羊肝丸

治內障青盲白翳羊肝只用子肝一葉薄切新瓦上焙熟地黃一兩半兎絲子決明子車
前子地膚子五味子枸杞子菟蔚子苦薺麻子青箱子麩仁麥門冬澤瀉防風黃芩白茯苓

蒼桂心杏仁細辛各一兩爲末蜜丸梧子大溫水下三五十九丸日三服○一人患內障失明得服此藥
一夕燈下語家人曰適偶有所見如隔門障見火者及朝視之眼中醫膜俱裂如線遂得差爲末茶清

點服二錢亦
驗(綱目)

補腎丸

治腎虛目昏漸生內障磁石火煨醋淬七次研水飛兎絲子酒製各二兩熟地黃肉蓯蓉酒浸焙
石斛五味子枸杞子楮實子覆盆子酒浸車前子酒蒸各一兩沉香青鹽各五錢右爲末蜜丸

子大空心鹽湯下
七十九(濟生)

杞苓丸

治腎虛眼目昏暗漸成內障茯苓四兩(半赤半白)枸杞子酒浸二兩鬼絲子酒

五退散

治內障蠅退蛇退蠶退烏雞卵殼男子髮各等分右燒存性爲末豬肝煎湯調下一錢(入門)

蜜蒙花散

治十六般內障多年昏暗蜜蒙花二兩羌羊角螬(卽李蠶也)人參覆盆子地膚子枸杞子甘草各一兩羌藟子蒼葵子甘菊槐花各五錢右爲末每二錢米飲調下(得效)

沖和養胃湯

治內障眼得之脾胃虛弱心火興三焦俱盛上爲此疾黃芪羌活各一錢人參白朮升麻乾葛當歸甘草炙各七分柴胡白芍藥各五分防風白茯苓各三分五味子二分乾薑一分右

到作一貼水煎至半入黃芩黃連各五分再煎數沸去滓溫服食遠(東垣)

當歸湯

補肝腎益瞳子光明柴胡一錢生地黃一錢半當歸白芍藥各一錢黃芩黃連並酒浸各七分半甘草炙五分右到作一貼水煎空心服(醫林)

撥雲退翳還睛丸

治內障常服則終身眼不昏花黑脂麻五兩蜜蒙花木賊白蒺藜蟬退青鹽各一兩薄荷白芷防風川芎知母荆芥穗枸杞子白芍藥生甘草各五錢甘菊六錢當歸酒洗三

錢右爲末蜜丸彈子大每細嚼一丸茶清下食後(回春)

圓膏

在黑珠上一點圓日中見之差小陰處見之卽大視物不明轉見黑花此由肝腎俱虛而得宜補肝散補腎丸(得效)

冰醫

如冰凍堅實傍觀自透於瞳人內陰處及日中看之其形一同疹而淚出此肝膽病宜通肝散(得效)

滑醫

有如水銀珠子但微含黃色不疼不痛無淚遮瞳人(得效)

凝醫

微如赤色或聚或明兩傍微光瞳人上如凝脂色時復澀痛無淚出(得效)

散醫

形如鱗點或臉下生粟日夜痛楚瞳人最珍常下熱淚此三證皆肝肺相傳宜入味還睛散(得效)

橫開醫

上橫如劍脊下面微微其薄不痛不痛此病稀少(得效)

浮醫

上如冰光白色環遮睛人生自小皆頭至黑珠上不痛不痒無血色相翳(得效)

沉醫

白點歲在黑水下向日細視方見其白眼睛疼痛晝輕夜重間或出淚宜空青丸(得效)

偃月醫

膜如藥脂一邊厚一邊薄如缺月其色光白無瑕疳前四證並皆難治(得效)

粟花醫

周回如蠶齒四五枚相合赤色刺痛如蟻視物如烟查則痛楚多淚昏暗(得效)

黃心醫

四邊皆白但中心一點黃團團在黑珠上時下溢淚此兩證肝肺風熱宜還睛散(得效)

黑花醫

其狀青色大小皆頭流痛頻頻下淚口苦蓋胆受風寒宜涼胆丸(得效)

胎患

初生觀物轉睛不快至四五歲瞳人潔白昏蒙不見延至年高無藥可治由胎中受熱致損也(得效)

五風變

五色變為內障頭痛甚却無淚日中如坐暗室常自憂嘆此毒風腦熱所致(得效)

雷頭風

此熱毒之氣衝入眼睛中牽引瞳人或微或大或小黑睛全不見物(得效)

驚振

因病目再被撞打變或內障日夜疼痛不能視三光前四證俱不可治不過服還睛散(得效)

綠風

初患頭旋兩頰角相牽瞳人連鼻鼻皆痛或時紅白花起肝受熱則先左肺受熱則先右肝肺同病則齊發先服羚羊角散羚羊角丸後服還睛散(得效)

烏風

眼雖癢痛而頭不旋但漸漸昏暗如物遮定全無醫障或時生花此肝有實熱宜瀉肝散(得效)

黑風

此與綠風相似但時時黑花起乃腎受風邪熱攻於眼宜涼腎(得效)

青風

此眼不痛不癢瞳人儼然如不患者但微有頭旋及生花轉加昏蒙前二證宜服還睛散(得效)

肝虛雀目

雀目者日落即不見物也。綱目○因肝虛血少時時花起或時頭疼年深則雙目暗小兒因疳得之宜蛤粉丸(得效)○小兒肝疳雀目宜風疳丸(入門)○晝明晚暗謂之雀目言如鳥雀之腹便無所見也(類聚)○雀目宜雀目散(直指)雀頭取血點眼中即效羊肝淡煮食之亦佳(本綱)○治雞盲雀目用鮮地黃炒猪肝食之(種杏)○牛肝作膾食之妙(保方)

高風雀目

與前證雖同但纔至黃昏便不見物經年眸子如金色名曰黃風不治(得效)○雀目之證暮而晚復明者何也曰木生於亥而旺於卯絕於申至於酉戌之時木氣衰甚故眠至於卯之分木氣稱盛而目復明矣曰雀目終變為黃膜而死何也曰木絕於申乃木土長生之地木衰而土盛故變為黃膜宜平胃散(方見內傷)以平土氣四物湯(方見血門)以補肝虛(正傳)○高風雀目宜還睛丸(類聚)

肝虛目暗

遠視不明眼前花子頻起皆目赤痛有時

補肝散

治圓翳在黑珠上昏花柴胡一錢半白芍藥一錢熟地黃白茯苓甘菊細辛甘艸各七分柏子仁防風各五分右剉作一貼水煎服(得效)

補腎丸

治同上肉苁蓉枸杞子各一兩巴戟山藥破故紙炒茴香牡丹皮各五錢青靈二錢半右為末蜜丸梧子大空心鹽湯下三五十丸(得效)

通肝散

治冰醫山梔子白朮桑椹殼荆芥甘草各五錢車前子鼠粘子炒各二錢半右為末每二錢苦竹葉煎湯調下(得效)

八味還睛散

治內障諸般障翳昏花草決明一兩白蒺藜防風木賊梔子仁甘草各五錢蟬殼青葙微炒各二錢半右為末每二錢麥門冬湯調下菊花湯亦可(得效)

空青丸

治沉翳細看方見其病最深防風生乾地黃知母各二兩五味子車前子石決明細辛各一兩空青二錢右為末蜜丸梧子大每十九丸茶清下空心(得效)

涼膈丸

治黑花醫乃胆受風寒而作防風薄荷各一兩黃連黃芩荆芥穗草龍胆各五錢地膚子黃柏各二錢半右為末丸梧子大空心薄荷湯下三十九丸(得效)

羚羊角散

治綠風內障昏花甘菊防風川芎羌活車前子川烏細辛各五錢半夏蟾蜍羊角薄荷各二錢半右為末每二錢生薑荆芥煎湯調下或剉取七錢薑三片煎服(得效)

羚羊角丸

治綠風內障羚羊角屑一兩石決明草決明車前子犀角屑各七錢半獨活防風蔓荊子甘菊藍實梔子甘草各五錢右為末蜜丸梧子大溫水下三十九丸(類聚)

瀉肝散 治鳥風昏暗大黃甘草各五錢郁李仁荆芥穗
各二錢半右剉分二貼空心水煎服(得效)

蛤粉丸 治雀目蛤粉黃蠟等分焙蠟搜粉爲丸如棗大豬肝一片二兩許剖開裹
藥一丸麻線纏水一椀煮熱取出乘熱熏眼至溫吃肝以愈爲度(綱目)

風疔丸 治小兒肝疔雀目青黛黃連天麻五靈脂夜明砂川芎蘆薈各二錢草龍胆防風蟬殼各
一錢半全蝎二枚乾蟬頭三錢右爲末豬胆汁浸燥和丸麻子大薄荷湯下十九(入門)

雀盲散 治雀目夜不見物雄豬肝竹刀割開納夜明砂乳縛煮米泔中至七分熱取
肝細嚼以汁送下(直指)○治雀目猿猴肝蒸熟和夜明砂作丸服(入門)

還睛丸 治高風雀目漸成內障石決明煨研水飛覆盆子菟藟子各二兩槐實炒人參細辛
防風白茯苓甘菊栝子仁川芎各一兩右爲末蜜丸梧子大溫水下三十九(類聚)

外障 外障者肺病也(回春)○在睛外遮睛(綱目)○靈樞曰診目痛赤脈從上下者太陽病從下上者
明病從外走內者少陽病○凡赤脈皆初從上而下屬太陽主表必眉稜骨痛或腦項痛或半邊頭腫

痛治法宜溫之散之溫則臘茶飲散則夏枯草散選奇湯(方見頭部之類)○赤脈皆初從下而上者
或從內皆出外者皆屬陽明主裏故其證多熱或便實治法宜下之寒之則明目流氣飲黃氏瀉青丸

(方見五藏)局方溫白丸(方見積聚)加黃連黃柏之類累用有驗寒則一味黃連羊肝丸之類○赤
脈皆初從外皆入內者爲少陽主半表半裏治法宜和解之神仙退雲丸之類(綱目)○外障有肝藏

積熱混睛勞肉攀睛兩臉粘睛淚入水輪釘管根深黑翳如珠花翳白陷水瑕深管玉管浮滿順逆生
醫難冠冕肉瞼生風粟胞肉膠凝滿睛膜出翳睛疼痛突起睛高風起喎偏倒睫拳毛風牽臉出神祟

疼痛旋蝶尖起瞼眼凝睛轉睛翳關被物撞打撞刺生翳血灌瞳入瞳目飛塵絲天行赤目暴赤眼後
生翳胎風赤爛風赤疔疔疾衝風淚出暴風客熱臉硬睛痛痛如鉞刺癢極難任睡人乾缺黃膜上衝赤

膜下垂小皆赤脈偷針小兒通睛
小兒胎中生翳小兒青盲(得效)

肝臟積熱 眼先患赤腫疼痛怕日羞明淚溢難開忽生翳膜初患一目不見以致兩目齊患此肝藏積熱
宜石決明散(得效)○風眼腫則軟熱眼腫則硬(直指)○眼赤而痛者肝實熱也(回春)○

眼赤腫而足寒者必以溫湯頻洗其足甚妙(綱目)○肝藏風熱宜撥雲散局方密蒙花散蟬花散洗
肝明目湯散熱飲子○肝藏積熱宜洗肝散(方見五藏)瀉肝散(方見上)瀉青丸(方見五藏)柴胡

湯四物龍胆湯洗以
湯泡散(方見下)

混睛 白睛先赤後癢痛淚下閉澁難開年深則睛變成

碧色滿目如凝脂赤脈橫貫宜地黃散(得效)
努肉攀睛 或眼先赤爛多年肝經風熱所衝血成或用力作勞而得或癢或痛目兩眦頭努出筋膜心

氣不寧憂慮不已遂乃攀睛宜二黃散定心丸(得效)○兩眦呈露生努肉者心熱血旺也(直指)○攀睛努肉者心熱也○大眦赤紅肉堆起者心經實熱也小眦赤紅絲血脈者心經虛熱也(回春)○努肉宜速效散(醫案)○洗努肉侵睛當歸尾荆芥穗黃連防風薄荷朴硝鹽砂等分煎

湯溫洗(入門)○梨汁浸黃連又初男
乳和雄雀屎點之皆效(詳見單方)

兩臉粘睛 此乃爛弦風也雙目赤爛或癢或痛經年不愈(得效)○目眶赤爛歲久俗呼為赤睛是也當

以三稜針刺目眶外以瀉濕熱即愈(東垣)○爛弦風者風沿眼系上隔有積熱自飲食中挾

怒氣而成積而久也眼沿因膿潰而腫其中生細小虫絲遂年久不愈而多癢者是也(用還睛紫金丹

以銀釵股點之若癢者又當去虫以絕根本又與防風通聖散去硝黃(方見風門)為細末酒拌晒乾

依法服之禁諸厚味(綱目)○點以爐甘石散洗以驅風散廣大重明湯○去虫宜聖草散○小

兒初生雙目紅而眶邊赤爛至三四歲不愈宜消風散(方見頭部)以桑白皮煎湯調下(入門)

膜入水輪 此因黑珠上生稍安其痕不沒浸

釘醫根深 心肝留熱致使眼疼痛生醫膜經久其色如銀釘入黑睛不可治(得

效)○睛上生醫如銀釘子頭故謂之釘醫宜石決明散隔之(類聚)

黑醫如珠 此起在黑水上如小黑豆疼痛淚出不可用點藥乃醫

虛受風熱而得宜先服羚羊角散後服補腎丸(得效)

花醫白陷 白醫旋透睛人點點如花白麟者此因肝肺伏藏積熱宜點醫膏後服羚羊角

散(得效)○花醫者睛上忽生白醫如梨花之刺魚鱗相似宜點龍腦散(類聚)

水瑕深醫 黑水內橫深環藍青色沉沉深入痛楚無

時此五歲俱受熱宜服清涼散(得效)

玉醫浮滿 黑珠上浮玉色不疼痛醫根青紅不宜針

刺但服還睛散點醫膏即愈(得效)

順逆生醫 凡醫自下生上者為順自上而生下者為逆順則

易安逆則難治宜服車前散點醫膏(得效)

雞冠蜆肉 醫生藏內如雞冠蜆肉或青或黑須翻出看之阻碍痛楚怕日羞明蓋脾經先受熱後有所傳
胆)每日輕輕刮去毫蓋血出用單匙挑洗風毒藥

水按止之刮後不時將藥水點入則不復腫(入門)

臉生風粟 兩臉上下初生如粟米大漸大如米粒或赤或白不甚疼痛此肝壅熱血所成宜服清毒飲(得效)○臉生風粟者眼痛狀如眯名曰粟眼其眼驗皮肉上下有肉如粟粒淚出痛痛可翻

眼皮起以針撥之兼服湯散宜其風熱(類聚)○眼上下胞或目唇間如疥點者熱在脾宜加味荊黃湯(入門)

胞肉磨凝 眼胞皮肉有似雲凝腫高如桃李時出熱淚乃風毒所注宜服消風散(方見頭部)點花草膏(得效)○上下胞腫如桃者脾熱也(回春)○熱氣毒聚而傷胞所以胞合(直指)○宜羚羊

角散洗

漏睛膿出 皆頭結聚生瘡流出膿汁無醫障不疼痛因心氣不寧并風熱在眼中宜白薇丸(得效)○風熱客於臉皆之間令皆內結聚津液乘之故成膿出不止俗呼為漏睛或因患瘡出膿血後

大眇頭常出膿涎亦名漏睛若不早治日久則眼生黑點侵損於目即難治宜黃芩散及點藥(類聚)

蟹睛疼痛 如大豆子出黑珠子疼不可忍又名損醫宜石決明散(得效)○肝有積熱上衝於目令目痛甚當黑睛上生黑珠子如蟹之目以為名或有如豆者名曰損醫極難治宜服羚羊角散及點

藥(類聚)

突起睛高 風毒流注五臟不能消散忽然突起癢痛乃熱極所致宜瀉肝散(方見上得效)○風熱痰飲積於藏府蘊積生熱熱衝於目故令眼珠子突出是名睛脹宜服涼藥瀉肝丸(類聚)

輪眼也(類聚)○烏輪突起裏刺熱痛謂之熱眼(直指)○井水灌眼中(詳見下)○黑睛宜龍膽散白睛眼宜清肺散

風足睛偏 偏風牽引雙目喎斜淚出頻頻却無醫候不瘥不痛宜消風散(方見頭部)荆芥湯調下或蟬花無比散(得效)○眼偏視者風邪攻肝牽引瞳人故令偏視宜服槐子丸(類聚)

倒睫拳毛 淚出涓涓醫膜漸生眼效漸急睫倒難開睡人如刺樣痛此脾受風熱先服瀉肝散(方見上)後服五退散(得效)神效明目湯明目細辛湯(東垣)○倒睫拳毛即眼睫毛倒入眼中央是

也(綱目)○眼榜緊急縮少者倒睫拳毛之漸也蓋陽虛則眼榜緊急陰虛則眸子散大(綱目)○倒睫拳毛由目緊急皮縮之所致也蓋內伏熱攻陰氣外行當去其內熱并火邪使眼皮緩則毛立出醫自退用法舉出內眦向外刺以三稜針出熱血以左爪甲迎住針鋒立愈(綱目)○治法無名異石藥也○爲末糝掩在紙中作燃子點火吹殺以烟薰之其毛自起又摘去拳毛用風子血點入眼內數次即愈(綱目)○又法木鷲子一個去殼搗爛綿裹塞鼻中左目塞右右目塞左一二夜其睫自正(正傳)

風牽臉出

上下臉俱赤或翻出一臉在外此脾受風毒宜五退散若年深臉內俱赤則不治(得效)

神崇疼痛

舊無根因忽然疼痛或如鍼刺或如火灸兩太陽穴掣痛早輕晚重先宜求福却服石決明散(得效)○犯上傷眼痛點三光膏(醫鑑)

旋螺尖起

目痛生醫膜尖起而赤似旋螺先服通肝散次服石決明散(得效)

鶴眼凝睛

輪硬而不能轉側此爲風眼凝睛不可治(得效)

轉轆轉關

睛凝上下臉不能歸中所以言之爲轉轆也亦難治且服天門冬飲子及瀉肝散(得效)○風寒入貫睛人攻於眼帶則睛人牽曳向下名曰墜睛眼亦轉轆轉關之類若日數漸多即損破

睛人兩眼俱陷則不見物宜服犀角散(類聚)

被物撞打

○被撞打疼痛無時睛人被驚昏暗遠視眼眶停留瘀血宜貼地黃膏次服石決明散(得效)○眼被物撞打善睛出眼帶未斷即推入眼中勿覺觸於四畔以生地黃細搗厚付之兼生地

黃散若有瘀血以針刺出且用眼點藥如眼帶漸損卽不可治(類聚)

撞刺生翳

因撞刺生翳疼痛或兼風熱轉加痛楚昏暗不見宜先服經效散次服石決明(得效)

血溜瞳人

睛人爲血灌注痛如錐刺皆無醫膜視物不明由肝氣閉血無所歸而得宜引血歸肝宜服通血丸車前散(得效)○又恐生花再服涼睛散(入門)○若生醫障生地黃汁和大黃末成膏

帛鋪二寸許覆眼上久則易之(得效)

眯目飛塵 飛絲塵埃入目粘睛不脫或被飛絲所侵或被砂石所苦疼痛隱澁揩碎不開宜用罌麥散（得效）○飛絲落眼確痛不開好墨濃磨新筆蘸入目中閉少時開看其絲自成塊着在

眼睛上却以絲輕輕惹下即愈未盡再點（綱目）○飛絲入眼大麻子一合碎碎井水一椀浸攪却將
舌浸水中涎沫自出神效一方茄子葉碎碎如麻子法尤妙（綱目）○飛絲入目刮取人指甲上細屑
以筋頭點津唾蘸瓜屑入眼中其絲自聚拔去又取人頭垢點入眼中絲即出（綱目）○諸物眯
目牛筋槌擊如絲着睛上輕揉之自出又以新筆蘸出之又好墨磨汁點眼中立出（綱目）

天行赤目 目忽赤腫晨昏痛澁長幼相似此天行時疾宜服瀉肝散洗以五行湯（得效）

赤眼後生翳 此證輕則無妨重則疼痛而白睛紅花乃生翳膜此由五藏積熱宜貼地黃膏次服瀉肝散
治如赤膜從上生下遮覆黑睛名曰垂
籠膜難治（入門）○宜服觀音夢授丸

胎風赤爛 小兒初生便有此證至三四歲雙目紅而弦邊赤爛時復癢痛先
服消風散（方見頭部）以湯泡散洗之以龍腦膏點之（得效）

風赤瘡疾 眼兩瞼似朱砂塗而生瘡黑睛端然無所染此因脾藏風
熱久不治則生醫膜宜服五退散洗以湯泡散（得效）

衝風淚出 至冬月尤甚此因肺虛遇風冷而發宜白蠟蠶散（得效）○衝風淚出俗言作冷淚者非也風
衝于內火發于外風熱相搏由是淚出宜服常歸飲子（方未詳）外以貝母大而白膩者一枚

加胡椒七粒不犯銅鐵研為細末臨臥點眼妙（子和）○眵淚熱而交流兩瞼赤者屬肝熱之甚食後
吞當歸龍薈丸（方見火門）肝虛客熱迎風冷淚者歸萎湯木賊散（入門）○眼出冷淚虛則四物湯
加木賊防風甘菊白芷
實則用蒼朮散（類聚）

暴風客熱 眼為暴風熱所攻白睛起障覆黑珠
腫癢痛宜服瀉肝散清肺散（得效）

瞭硬睛痛 瞭中紅赤而堅硬眼睛疼痛而淚出怕日羞
明宜通肝散若有醫障點春雪膏（得效）

痛如針刺 睛忽然疼痛如針刺雙目根緊急坐臥不安此熱毒在
心宜先服洗心散（方見火門）次服還睛散（得效）

癢極難任 眼癢極甚腫子連眇頭皆癢不能收斂此因胆受風熱得之宜服驅風一字散(得效)

瞳人乾缺 眼睛乾澀全無淚液始則疼痛後來稍定或白或黑不見物此證不可治(得效)

黃膜上衝 黑睛從下生黃膜上衝疼痛甚至閉澀難開此脾受風食毒而作宜服犀角飲(得效)

赤膜下垂 眼中有膜自上垂下遮黑睛名垂簾膜望風淚出怕日羞明此客邪上衝用百點膏點之次服通肝散(得效)

小眥赤脈 小眥中生赤脈漸漸衝眼急早治此三焦積熱宜服犀角飲忌熱毒物及房事(得效)

小兒通睛 嬰兒雙眼睛通者欲觀東邊則見西邊若振掉頭腦則睛方轉此肝受驚風宜服牛黃丸(入門)

小兒胎中生翳 眼瞼中生贅子初生如麻子大日漸如豆懸斑斕內此脾經風熱所攻宜服五退散加減(得效)

小兒青盲 胎中受風五臟不和嘔吐黃汁兩眼一同視物不明無治法(得效)○青盲者瞳子黑白分明直物而不見者也(回春)

偷針 目皆翳俗謂之偷針(綱目)○眼皆生小泡細紅點如瘡以針刺破即差故名爲偷針實解太陽經之結熱也(醫林)○脾間積熱兼宿食不消則生偷針桑皮剉和砂糖煎水調大黃末一錢服利之

即消(直指)○治偷針生南星生地黃同研成膏貼兩太陽穴腫自消(綱目)○拔去睫毛即自消(俗方)

臘茶飲 治赤脈臉從上而下此屬太陽宜溫散之芽茶附子白芷各一錢細辛川芎防風羌活荆芥各半錢右剉作一貼入鹽一撮水煎服(綱目)

夏枯草散 治肝虛目睛痛冷淚不止怕日羞明(方見下)

明目流氣飲 治肝經不足風熱上攻視物昏暗常見黑花多淚澀或生翳障蒼朮一兩草決明七錢半大黃川芎細辛惡實甘菊防風白蒺藜荆芥穗蔓荊子玄參木賊黃芩梔子甘草各五錢右

爲末每二錢臨臥冷酒或蜜水調下(入門)

神仙退雲丸

一名撥雲退醫丸治一切醫膜內外障昏無睛者服之累效其妙方也當歸酒洗一兩半川芎木賊去節量便浸焙密蒙花荆芥穗地骨皮白蒺藜甘菊羌活各一兩川椒炒七錢半瓜

連根枳實蔓荊子薄荷艸決明炒甘草炙各五錢蛇蛻蟬蛻黃連各三錢右爲末密和每一兩作十九茶清或湯飲下一丸(正傳)

石決明散

治肝熱眼赤腫痛忽生醫膜或脾熱臉內如雞冠蝦肉或蟹睛疼痛或旋螺共起石決明草決明各一兩羌活梔子木賊青箱子赤芍藥各五錢大黃荆芥各二錢半右爲末每二錢麥門冬

湯調下(入門)○
一名大決明散

撥雲散

治風毒上攻眼目昏暗醫膜遮睛癢痛多淚柴胡二兩羌活防風甘草各一兩右爲末每二錢以薄荷湯或茶清調下或劉取五錢水煎服亦效(入門)

局方密蒙花散

治風眼昏暗多淚并暴赤腫密蒙花白蒺藜炒羌活木賊甘菊石決明各等分右爲末每一錢茶清調下(局方)

蟬花散

治舟經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫生醫多淚草龍胆甘菊密蒙花蔓荊子荆芥穗川芎蟬殼青箱子草決明梔子防風木賊白蒺藜甘草各等分右爲末每二錢茶清或荆芥湯調下(入門)

洗眼明目湯

治一切風熱眼目赤腫疼痛當歸尾川芎赤芍藥生地黃連黃芩梔子石膏連翹防風荆芥薄荷羌活蔓荊子甘菊白蒺藜草決明桔梗甘草各五分右對水煎食後服(回春)

散熱飲

治眼暴赤腫疼痛防風羌活黃芩黃連各等分右對五錢水煎服(易老)

柴胡湯

治肝火盛目赤腫痛柴胡芍藥川芎當歸青皮草龍胆梔子連翹各一錢甘草五分右對作一貼水煎食後服(回春)

四物龍膽湯

治目赤腫痛暴作雲醫川芎當歸赤芍藥生乾地黃各一錢三分羌活防風各八分草龍胆防己各六分右對作一貼水煎服(海藏)

羚羊角散

治兩臉腫硬如桃李開目不得羚羊角屑防風羌活人參赤茯苓升麻大黃車前子玄參黃芩各七分梔子細辛各三分右對作一貼水煎服(類聚)

羚羊角散

治蟹睛疼痛羚羊角屑黃連赤芍藥蘆根木通旋覆花桑白皮各一錢大黃七分甘草三分右對作一貼入竹葉七片水煎食後服(類聚)

地黃散

治混睛生地黃一兩赤芍藥當歸甘草各五錢右對五錢水煎服(得效)

二黃散 治勞肉攀睛大黃黃芩防風薄荷各一錢二分半右對蜜少許同煎服(得效)

定心丸 治同上麥冬一兩石菖蒲枸杞子甘菊各五錢遠志二錢半右為末蜜丸梧子大熱水下三十九(得效)

連效散 治勞肉紅絲紅白翳障及白珠上有死血紅筋或上瞼胞腫如桃日夜疼痛昏瞶黃連黃芩黃柏梔子連翹薄荷荆芥柴胡當歸生地黃地骨皮天花粉蔓荊子甘菊惡實白蒺藜草決明石決明

枳殼甘草各五分右剉作一貼水煎食後服(醫鑿)

爐甘石散 治爛弦風爐甘石不以多少先用童便煨淬七次以黃連煎湯煨淬七次又以雀舌茶清煨淬七次三汁合置一處再煨三次放冷研細入麝香各少許點眼弦神妙(綱目)○又方綠色

爐甘石煨淬童尿凡三次出火毒一日夜研細細夾黃連末用童尿浸取清汁點眼胞(直指)

聖草散 治爛弦風虫癢覆盆子葉搗取汁以皂紗蒙眼上將筆蘸藥汁畫兩眸於紗上然後以汁滴之常有虫出(得效)○又法取覆盆子軟葉入初男兒乳汁研勻為丸置皆頭上引虫自出(直指)

清涼散 治水瑕深腎青色蔓荊子荆芥穗苦竹葉甘草各一錢半梔子七分半右剉作一貼入薄荷七葉水煎服(得效)

車前散 治肝經熱毒逆順生醫血灌瞳人羞明多淚密蒙花甘菊白蒺藜羌活草決明車前子黃芩草龍胆甘草各等分右為末每二錢米飲調下(得效)

消毒飲 治臉生風粟大黃煨荆芥穗各二錢惡實甘草各一錢右對水煎服(得效)○一名加味荆黃湯(入門)

白薇丸 治漏睛膿出白薇五錢防風羌活白蒺藜炒石榴皮各二錢半右為末米粉糊和丸梧子大白湯下三十九(得效)

黃芪散 治漏睛膿山黃芪防風子芩大黃煨各一錢地骨皮遠志人參赤茯苓漏蘆各五分右剉作一貼水煎食後服朝夕(類聚)

龍膽散 治肝熱烏睛浮腫赤暈昏疼草龍胆梔子仁各二錢防風川芎玄參荆芥茵陳甘菊楮實子甘草各一錢右為末每二錢食後茶清調下(指直)

清肺散 治肺熱上攻白睛腫脹日夜疼痛桑白皮片芩甘菊枳殼防風荆芥柴胡升麻赤芍藥當歸尾玄參苦參白蒺藜木賊旋覆花甜葶藶子甘草各五分右剉作一貼水煎食後服(醫鑿)

蟬花無比散

治風眼氣眼昏淚癢或頭風牽引眼小胞爛蒼朮童尿浸二宿切晒乾白芍藥各一兩白
茯苓炒八錢白茯苓四錢石決明製當歸防風羌活各三錢蟬殼甘草各二錢蛇蛻皂角水

洗焙荆芥細辛各一錢右爲末每二
錢茶清或米泔調下食後(得效)

槐子丸

治風邪牽引瞳人令眼偏視槐實二兩覆盆子酸棗仁炒栝子仁車前子蔓荊子
羌蔚子鼠粘子炒白蒺藜炒各一兩右爲末蜜丸梧子大酒下三十九(類聚)

五退散

治脾受風毒倒睫拳毛刺痛穿山甲炒川烏炮甘草炙各五錢蜈蚣退蠶退蛇
退醋煮猪蹄退炒荊芥穗各二錢半爲末每二錢鹽湯調下食後(入門)

神效明目湯

治眼榜緊急致倒睫拳毛上下險皆赤爛睛痛流淚隱澀難開甘草二錢葛根
一錢半防風一錢蔓荊子五分細辛二分右到作一貼水煎食後服(東垣)

明目細辛湯

治同上羌活麻黃根各一錢半防風一錢荊芥七分藜蘆白茯苓當歸梢各五分生地黃蔓
荊子川芎各三分桃仁五個川椒四個細辛紅花各二分右到作一貼水煎服(東垣)

天門冬飲子

治眼睛不能歸中名曰轉轉關天門冬羌蔚子知母各一錢人參赤茯
苓羌活各七分五味子防風各五分右到作一貼水煎食後服(入門)

犀角散

治墜睛失明車前子枸杞子一兩槐子五味子青柏子牛蒡子炒羌蔚子胡黃連各七錢半
犀角屑羚羊角屑各五錢兔肝一具微炙右爲末每二錢食後以槐子煎湯調下(類聚)

地黃膏

治眼被物撞打腫痛昏暗生地黃一合取汁黃連一兩黃柏炙水石各五錢右三味
爲末和地黃汁成餅以紙攤貼眼上非但撞打凡風熱赤目熱淚出皆可用(得效)

生地黃散

治眼被撞打腫痛生乾地黃川芎羚羊角大黃赤芍藥
枳殼木香各一錢右到作一貼水煎食後服(類聚)

經效散

治眼被撞刺生醫昏痛不見物柴胡二錢大黃當歸赤芍藥
犀角各一錢甘草五分右到作一貼水煎食後服(入門)

通血丸

治血灌瞳人刺痛無障翳川芎當歸尾防風荆芥各一兩生乾地黃赤芍藥
甘草各五錢右爲末蜜丸彈子大每一丸以薄荷荆芥湯咽下食後(入門)

瞿麥散

治塵砂眯目確痛攪麥炒黃色爲末鷓
鴒調和逐時塗皆即開而愈(得效)

救苦湯

治眼暴赤腫苦痛不可忍蒼朮草龍胆各一錢四分當歸甘草各一錢川芎六分生地黃黃柏黃
芩知母各五分羌活升麻柴胡防風藜蘆木黃連各三分桔梗連翹細辛紅花各二分右到作一貼

水煎食後服(正傳)

五黃膏

治目赤腫痛黃栢一兩黃連黃芩黃丹大黃各五錢右為末每一錢

觀音夢授丸

治內障因病赤眼或實鹹物而得者夜明砂當歸蟬退木賊各三兩右為末白

白殭蠶散

治肺虛遇風冷淚出冬月尤甚黃桑葉一兩木賊旋覆花白殭蠶荆芥穗甘草各

歸葵湯

治視物昏花流淚隱澁目中溜火惡日與火光升麻一錢黃芪酒芍防風羌活各七分蔓荊子

木賊散

治眼多冷淚木賊木耳燒存性等分

蒼朮散

治肝藏風熱盛眼出冷淚不止蒼朮木賊白朮各防風羌活

驅風一字散

治眼癢極甚川芎荆芥川烏炮各五錢羌活防風各

犀角飲

治黃膜上衝睛痛閉澁犀角鎊屑二錢羌活黃芩車前子各一

牛黃丸

治小兒通睛犀角屑二錢牛黃一錢金箔銀箔各五片甘草

醫膜

醫膜者風熱重則有之或癩瘡後亦生醫此肝氣盛而發在表也宜發散而去之若反疎利則邪氣內

善為醫益深邪氣未定謂之熱醫而浮邪氣已定謂之冰醫而沉邪氣牢而深者謂之陷醫常用熨發

之物使其邪氣再動醫膜乃浮佐之以退醫之藥而能自去也病久者不能速效宜以歲月除之(綱

目)○凡醫起於肺家受熱輕則腫重則生醫雖醫自熱生然治法先退醫而後退熱者謂熱極生

醫若先去赤熱則血為之朱而醫不能去矣(直指)○醫膜輕重詳見內障○黑睛有醫皆用知母黃

栢宜益本滋腎丸明目地黃丸(丹心)○勞慾過度或涼藥過多以致九竅不利青白醫見大皆乃陽

氣衰少也宜補陽湯連栢益陰丸菊睛丸經曰益火之源以消陰醫是也(東垣)○新醫所生宜表散

光活退醫湯血虛有熱宜神仙退雲丸若冰醫久不去宜羚羊角散欲欲陷醫亦羚羊角散兼服神

仙退雲丸(綱目)○因眼病漸生醫膜宜決明九蟬花散菊花散地黃散○醫膜通用雲退醫丸正傳羊肝丸五秀重明丸退雲散磨光散道人開障散補肝散決明散撥雲湯兼用點藥○膚醫者眼睛上有物如蠅翅者是也烏賊魚骨龍腦各一錢爲細末日點三四度妙(類聚)

益本滋腎丸

治黑睛生醫膜或陰虛睛散大黃柏知母並酒洗炒各等分右爲末滴水和丸梧子大空心鹽湯下五七十九(東垣)

明目地黃丸

生精補血補腎益肝退醫膜遮睛除翳多淚并暴赤熱眼生乾地黃酒洗熟地黃各四兩牛膝酒洗白茯苓炒各三兩知母鹽水炒黃柏酒炒兔絲子酒裏獨活枸杞子各二兩右爲

末蜜丸梧子大空心鹽湯下百丸(回春)

補陽湯

治膀胱肝腎經鬱遏不通於目青白醫見大皆柴胡一錢半羌活獨活人參甘草熟地黃白朮黃芪各五分深瀉陳皮防風白芍藥生地黃白茯苓知母當歸各三分肉桂一分右對作一貼空心

水煎服清晨服補陽湯臨臥服連柏益陰丸(東垣)

連柏益陰丸

治同上草決明條芩黃連酒炒黃柏知母並鹽酒炒各一兩羌活獨活五味子當歸防風甘草各五錢石決明煨三錢右爲末蜜丸菘豆大茶清下百丸多服補陽湯少服此丸(東垣)

菊睛丸

治右腎及肝腎不足眼見黑花昏暗生青白醫甘菊四兩枸杞子三兩熟地黃肉蓯蓉各二兩巴戟一兩右爲末蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯吞下五七十九(直指)

羌活退醫湯

治太陽寒水醫膜遮睛不見物羌活一錢半防風一錢荆芥薄荷蘆本各七分酒知母五分酒黃柏四分川芎當歸身各三分麻黃酒生地黃各二分川椒細辛各一分右對作一貼水

煎服食後(東垣)

羚羊角散

治冰醫久不去羚羊角屑升麻細辛各二兩甘草一兩右爲末一半蜜丸梧子大一半爲散每取一錢以米泔水煎以此吞下五十九(保命)

決明丸

治熱眼病後毒氣攻目生醫膜遮障麥門冬當歸車前子各二兩青箱子防風枳殼各一兩羌蔚子細辛枸杞子澤瀉生乾地黃石決明黃連各五錢右爲末蜜丸梧子大空心以麥門冬湯吞下

五七十九(得效)

蟬花散

治風眼熱昏澁腫痛漸生醫膜蟬殼甘菊川芎防風羌活梔子白蒺藜炒草決明炒荊芥穗

地黃散

治心肝熱目赤腫痛生赤醫或白膜遮睛四邊散漫者易治若暴遮黑睛多致失明熟地黃當歸各五錢生乾地黃木通甘草各三錢黃連大黃防風羌活犀角屑蟬殼木賊穀精草玄參白茯苓各二錢右爲末每二錢煎羊肝湯下食後

日三亦治小兒痘疹餘毒入眼生醫(海藏)

菊花散

治肝受風毒眼目赤腫多淚痛漸生醫膜甘菊四兩蟬殼木賊羌活白蒺藜各三兩荊芥甘草各二兩右爲末每二錢茶清調下(入門)

撥雲退醫丸

消醫膜甘菊川椒木賊白蒺藜密蒙花蛇退蟬退川芎荊芥石燕子蝦黃連薄荷瓜

正傳羊肝丸

治醫障青盲黃連一兩甘菊防風薄荷荊芥羌活當歸川芎各三錢右爲末白羊肝一具蒸熟同搗作丸服(正傳)

五秀重明丸

治醫膜遮睛隱澁昏花甘菊花開頭五百個荊芥五百穗木賊去節五百節楮實五百枚川椒開口者五百粒右爲末蜜丸彈子大每取一丸茶清咽下(綱目)

退雲散

治外障醫膜覆睛子常歸生乾地黃穀精草白菊木賊羌活石決明煨大黃酒炒蔓荊子白芷黃柏連翹草龍胆各一錢蟬退七個右剉作一貼水煎食遠溫服(回春)

慶光散

治風眼消醫障白蒺藜炒防風羌活石決明煨甘菊草決明蟬殼退川芎甘草鹽水炙各五錢右爲末每二錢麥門冬湯調下食後(直指)

道人開障散

治諸障醫蛇退洗焙蟬退黃連各五錢甘艸生二錢葶豆皮一兩右爲粗末每二錢水煎服食後(直指)

補肝散

治肝腎虛黑珠上生醫柴胡一錢八分白芍藥一錢三分熟地黃白茯苓甘菊細辛各九分栝子仁防風甘草各五分右剉作一貼水煎空心服(入門)

決明散

治風熱毒氣上攻兩目腫痛或生醫膜或赤脈努肉澁癢昏花漸成內障石決明草決明黃芩甘菊木賊石膏赤芍藥川芎羌活蔓荊子甘草各七分右剉作一貼入生薑五片水煎服(得效)

撥雲湯

治眼生黑白醫障離開無疼痛乃足太陽膀胱爲命門相火煎熟通行作寒水醫羌活防風黃柏各一錢荊芥藥本升麻當歸知母生甘草各七分柴胡五分川芎黃耆葛根細辛生薑各三分

右剉作一貼水煎食後服(東垣)

眼花

眼見黑花乃肝腎俱虛也(局方)○上虛屬肝虛必頭暈目眩耳聾下虛屬腎虛必眼花睛痛耳鳴(入門)○昏花者傷氣昏暗者傷血熱毒亦有蒙明怕日但內虛者全不敢近陽光(入門)○黑花者

腎虛也五色花為腎虛客熱也青花胆虛也紅花火盛也散香者瞳人散大視物昏冥也(入門)陽主散陽虛則眼務急而為倒睫拳毛陰主欲陰虛不欲則瞳子散大而為目昏眼花(東垣)○或見飛蠅

散亂懸蟻虛空皆內障腎虛之證也(類聚)○腎主骨骨之精為瞳子瞳子散大者因腎水虛骨枯而心包絡之火得以乘之也治法宜苦宜酸宜涼大忌辛熱之物除風熱涼血益血以收耗散之氣滋陰

地黃丸最妙(方見上東垣)○眼花宜服熱地黃丸三花五子丸還睛丸椒目丸駐景丸(方見上)補腎丸(方見上)醫鑑還睛丸(方見下)益本滋腎丸(方見上)明目壯水丸(方見上)點淚五胆膏

熟地黃丸治腎虛眼見黑花熱地黃石斛兔絲子酒製防風黃耆車前子芫蔚子覆盆子肉蓯蓉酒浸磁石煨製地膚子各一兩兔肝一具炙乾右為末蜜丸梧子大空心鹽酒下五十七丸(類聚)

三花五子丸治眼見黑花飛蠅或生翳障蜜蒙花旋覆花甘菊花決明子枸杞子兔絲子酒製鼠鬚子地膚子石決明煨甘草各等分右搗為末蜜丸梧子大食後麥門冬湯下五十九丸(醫林)

還睛丸治眼見五色花細辛五味子各二兩半人參桔梗黃芩熟地黃防風知母芫蔚子車前子各二兩玄參五錢右為末蜜丸梧子大空心茶清下三十五丸(入門)

椒目丸治久年眼生黑花昏暗蒼朮二兩椒目炒一兩右為末醋糊和丸梧子大茶清下五十九丸(入門)

五膽膏治眼昏常見黑花成內障青羊胆一枚黃牛胆汁一合熊胆二錢半鯉魚胆七錢半烏雞胆五枚牛黃五錢右為末先將諸胆相和次入牛黃末攪勻銀石器內慢火熬成膏食後溫酒調下字錢仍將少許點

眼中(類聚) 眼疼目疼有二一謂目皆白眼疼二謂目珠黑眼疼也目皆白眼疼屬陽故晝則疼甚點苦寒藥則效經所謂白眼赤脈法於陽故也目珠黑眼疼屬陰故夜則疼甚點苦寒藥則反劇經所謂瞳子黑眼法於陰

故也(綱目)○一人目珠疼連眉稜頰角皆痛遇夜則甚點苦寒藥則反甚諸藥不效灸厥陰少陽則痛止半月復作遂以夏枯草散茶清調下初服減太半四五日良愈後試亦驗(綱目)○目赤而痛者肝實熱也(回春)○睛疼難忍當歸防風細辛薄荷等分為末每二錢麥門冬湯調下日三(本舉)

○黑睛疼知母黃柏瀉腎火當歸養陰水(丹心)○目赤痛脈實大便祕者以瀉青丸(方見五藏)洗肝散(方見五藏)微利之即愈或救苦湯(入門)○湯火傷眼腫痛不可用冷藥點之以五行湯

溫洗地黃膏付之(方見上)○入門)○若讀書針刺過度而眼痛名曰肝勞但須閉目調護(入門)

夏枯草散一名補肝散治肝虛目睛疼冷淚不怕日羞明夏枯草二兩香附子一兩甘草五錢右爲細末每二錢食後茶清調下夏枯草治黑睛疼至夜甚者最效蓋黑珠連目系屬厥陰之經此物有

補養厥陰血脈之功故其效如神(本事)

救苦湯治眼暴赤腫苦痛(方見上)

眼昏五藏精明聚於目目精全則目明(得效)夫精明者所以視萬物別白黑審長短以長爲短以白爲黑如是則精衰矣(內經)○足少陰之脈病目既眩無所見(靈樞)○肝虛則目眩無所見(內經)○

靈樞曰氣脫者目不明難經曰脫陰者目盲夫陰陽合傳而爲精明氣血不足則目昏○視物不明見黑花者腎氣弱也(保命)○目昧不明熱也然支府者無物不有人之藏府皮毛肌肉筋膜骨髓爪牙靈皆有之乃氣出入升降之道路門戶也有所閉塞不能爲用者悉由熱氣拂鬱支府閉密而致氣液血脈榮衛精神不能升降出入故也各隨鬱結微甚而爲病之輕重故知熱鬱於目則無所見也或目昏而見黑花者由熱氣甚而發之於目也(河間)目昏者熱甚也傷寒熱極則目盲不識人目微昏者至近則轉難辨物或如隔簾視或視如蠅翅或見黑花皆目之支府閉密而榮衛精神不能升降故也(入門)凡人目暴不見物皆是氣脫用人參膏(方見氣門)以補之血藥以行之(丹心)久病昏暗者腎虛真陰之虛也(回春)眼昏宜駐景丸加減駐景丸(方並見上)滋陰地黃丸(方見上)加味磁朱丸(方見上)○傷寒熱病後目昏或生翳膜宜服石決明散(方見上)○點春膏(方見下)○婦人眼昏宜服抑青明目湯

加味磁朱丸治眼昏久服能明目百歲可讀細書磁石煨醋淬七次細末水飛二兩朱砂研水飛一兩沉

香五錢右爲末神麴末二兩作糊和丸梧子大鹽湯或米飲下三五十丸空心磁石法水入

腎朱砂法火入心沉香升降水火(直指)一名神麴丸一方加夜明砂一兩

四物五子丸治眼昏當歸川芎熟地黃白芍藥枸杞子覆盆子地膚子兔絲子車前子各等分右搗作末蜜丸梧子大空心鹽湯下五十七丸

蔓菁子丸治眼昏蔓菁子五味子枸杞子地膚子青箱子決明子楮實子菟絲子兔絲子各一兩右爲末丸梧子大空心酒下五十七丸(集成)

抑青明目湯治婦人怒氣傷肝眼目昏暗如雲霧中當歸白芍藥生乾地黃白朮赤茯苓陳皮半夏草龍胆柴胡黃連梔子牡丹皮白豆蔻甘草各七分右剉作一貼入薑三棗二水煎(醫鑑)

老人眼昏 人年老而目昏者血氣衰而肝葉薄胆汁減而目乃昏矣(脈訣)○童子水在上故視明瞭老人

火在上故視昏眊(入門)老人眼昏宜還睛丸(方見通治)夜光育神丸明眼地黃丸滋陰地黃丸(方見上)呂仙翁方勞傷昏暗宜益氣聰明湯

夜光育神丸

治老人眼昏熱地黃生乾地黃遠志牛膝兔絲子枸杞子甘菊枳殼地骨皮當歸各等分右爲末蜜丸梧子大空心酒下五七十九(養老)

明眼地黃丸

治老人冷淚昏暗熱地黃生乾地黃各四兩石解甘菊防風枳殼各一兩牛膝七錢半杏仁五錢右爲末蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯下五七十九(得效)

呂仙翁方

治老人內障昏暗熱地黃川椒微炒甘菊各等分爲末蜜丸梧子大空心鹽湯下五七十九○昔有老人常供雲水遇一道人款延數日臨別見老人目昏多淚因寄此方服之神效(醫說)

益氣聰明湯

治老人勞傷虛損耳鳴眼昏久服無內障昏暗耳鳴耳聾之證又令精神爽快飲食倍增耳

妙各二分右剉作一貼水煎朝夕服得睡更妙(丹心)

不能遠視不能近視

能遠視不能近視者陽氣有餘陰氣不足也乃血虛氣盛氣盛者火有餘也能近視不能遠視者陽氣不足陰氣有餘乃氣虛血盛也血盛者陰火有餘也氣虛者元氣衰弱

也此老人桑榆之象也(東垣)○目能遠視責其有火不能近視責其無水法當補腎宜服地芝丸或六味地黃丸(方見虛勞)加牡蠣(海藏)目能近視責其有水不能遠視責其無火法當補心宜定志丸(方見神門)加茯苓(海藏)○不能近視

晨服地黃丸不能遠視臥服定志丸(東垣)

地芝丸

治能遠視不能近視熱地黃天門冬各四兩枳殼甘菊各二兩右爲末蜜丸梧子大空心茶清下百九(東垣)

目不得開合

足太陽之筋爲目上綱足陽明之筋爲目下綱然則筋縱目不開(綱目)○眼不得開羞明怕日乃風熱牽閉所致芍正香蘇散(方見寒門)加前胡連翹白三聖煎服(得效)○一乳婦

因大恐目張不得眠公煮郁李仁酒飲之使醉則愈所以然者目系肝胆恐則氣結胆橫不下惟郁李仁去結隨酒入胆結去胆下則目能眠矣(入門)○上氣不足目爲之瞑(靈樞)

眼生眵

凡眼有血紅或有紅絲及生眵此是熱眼宜服經效散(方見上)○得效○多結硬者肺實也眵稀不結者肺虛也(同心)○凡眼疾痛不生眵此元氣虛腎經虛夜間小便二三次耗傷氣

致生內障或腦脂流下或睡人開大此皆腎遺黑水散也宜服八味丸(方見虛勞)或十全大補湯加枸杞子甘菊(方見虛勞)得效

視

一物爲兩 有人視一物爲兩醫作肝氣盛服瀉肝藥不驗予記靈樞云目之系上屬於腦後出於項中邪中其精精散則視歧故見兩物合服驅風入腦藥得愈宜驅風一字散(方見上)保肝散(本

保肝散

治風邪入腦石一或二成內障川芎當歸地骨皮蒼朮白朮密蒙花羌活天麻薄荷柴胡蘆本石膏木賊連翹細辛桔梗枳殼防風荆芥甘草各五分梔子白芷各三分右對水煎服食後(回春)

讀書損目

內經曰目得血而能視然久視傷血亦能損目(綱目)○久視傷血血主肝故動書則傷肝肝傷則自生風熱熱氣上騰致目昏不可專服補藥宜服益血鎮肝明目藥自愈宜服地黃丸(綱目)

讀書之苦傷肝損目(普慈)目疾就張滿求方漢數曰損讀書一誠思慮二專內視三簡外觀四宜起曉五宜早眠六凡六物熬以神火下以氣籛蘊於胸中七日然後納諸方寸修之一年近能數其目睫

遠視尺鏡之際長服不已洞見墻壁之外矣雖是嘲戲亦奇方也(本事)○古人云讀書之苦傷肝損目誠然其讀書博奕等過度患目者名曰肝勞若欲治之非三年閉目不視則不可得差徒自瀉肝及

諸治終是無效(養生)○讀書針刺過度而眼痛名曰肝勞但須閉目調護(入門)

地黃丸

經云久視傷血血主肝故傷肝而目昏肝傷則自生風熱當益血鎮肝而目自明熟地黃一兩半黃連決明子各一兩防風甘菊羌活桂心朱砂水飛沒藥各五錢右爲末蜜丸梧子大空心熱水

下五七十丸(得效)

哭泣喪明

黃帝問曰人之哀而涕泣者何氣使然岐伯對曰心者五臟六府之主也目者宗脈之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀憂則心動心動則五臟六府皆搖搖則宗脈感宗脈感

則液道開液道開故涕泣出焉液者所以灌濡空竅者也故上液之道開則泣不止泣不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見矣命曰奪精(靈樞)

眼病當分表裏虛實

眼之爲病在府則爲表當除風散熱在竅則爲裏當養血安神(保命)○如暴失明昏

血補水安神以調之(入門)○聖人雖言目得血而能視然血亦有太過不及也太過則目壅塞而發

痛不及則目耗竭而失明故年少之人多太過年老之人多不及不可不察也(子和)○眼疾所因不

過虛實二者而已。虛者眼目昏花，腎經真水之微也。實者眼目腫痛，肝經風熱之甚也。實則散其風熱，虛則滋其真陰。虛實相因，則散熱滋陰兼之。此內治之法也。至於日久熱寒血凝而為癆，睛肉昏膜赤爛之類，不假點洗外治之法，則何由而得痊乎？(丹心)

眼病易治難治辨

外障易治，內障難治。○暴發者為表，易治。久病者為裏，難治。(保命)○真珠管狀如碎米者，易散。梅花管狀如梅花葉者，難消。(直指)○瞳人乾缺，痛澁無淚者，或白昏，藏在黑水

下，向日細視方見者，或兩眼相傳，疼痛晝夜重者，或內障五色相間，頭痛無淚，日中如坐暗室者，或雷頭風熱毒氣衝入睛中，或微或大，昏暗不見者，皆不治。(入門)

眼中生火

惟除陽易病及婦人臨產時有之。(入門)

眼病禁忌

酒色七情最宜痛斷。○凡眼疾忌雞魚酒麪糯米鹹酸熱油諸般毒物，眼乃一身之主，不能忘口藥亦無功。自陷此身也。每日白煮精猪肉曬飯，或山藥蘿蔔菜果皆可啖。(得效)

眼病調養

養目力者常眠。(養生)○讀書博奕過度，患目名曰肝勞，非三年閉目不可治。(養生)○古人治肝勞有養之之法，彭真入患目疾，不許晝夜，豎目注視，閉之少頃，依法再行，積功而視秋毫。徐真

人亦患目疾，暗室正坐，運睛旋還，八十一數，閉目集神，再運不數年而神光自現。狀如金輪，永除昏暗。施真人歌曰：運睛除目暗，皆養之之法也。(養生)○熱摩手心，熨兩眼，每二七遍，使人眼目自無障翳。

明目去風，無出於此。(養生)○常以手按兩眉後小空中三九過，又以手心及指摩兩目下，額上以手提耳四十過，摩令微熱，輒以手逆乘額三九過，從眉中上行入髮際，以口嚥唾無數，如此常行，目即清

明一年可夜讀書。(養生)○五色皆損目，惟皂糊屏風可養目力。(延壽)

目視凶訟

病人目直視者死。(扁鵲)○瞳子高者，太陽不足，戴眼者，太陽已絕。此決死生之要，不可不察也。(內經)○太陽之脈其終也，戴眼又曰足太陽氣絕者，死必戴眼。(內經)○目內陷者，死。太陽之

脈起於目內眥，目內陷者，太陽絕也。故死。(內經)○眼胞忽陷，定知亡。(脈訣)○戴眼者，目直視不能轉動也。(綱目)○藏府精華皆上注於目，目直視者，反目倒置，轉上騰乃死證也。(入門)○足少陽終

者百節皆縱，目實絕。系註曰：目系絕，故目不轉，而直視。謂直視如驚，說變音環。(內經)○直視者，視物而目睛不轉動者是也。若目睛動者，非直視也。傷寒直視者，邪氣壅盛，藏府之氣不上榮於目，則為

之直視多難治。藏家不可發汗，發汗則目直視不能瞬，不能眠，猶未甚也。逮狂言反目直視，與直視搖頭者，藏府氣奪絕也。即死。(綱目)

點眼藥 凡點洗之法若暴赤腫血壅氣滯者一時連點三五次如氣血稍虛者宜服藥以塞其源藥水洗之

生有雲膜方可用點若無翳膜但可洗之即忌過用涼藥及冷水洗滌至如針刀火烙古人忌用如

金篦刮撥另是一家傳授不可妄施(入門)○點藥有磨醫膏春雪膏百點膏還睛紫金丹點醫膏三

光膏龍腦膏點仁膏明鏡膏二百味花草膏五磨膏楓窩石決明散龍腦散點爛弦風藥點漏睛膠出

藥點蟹眼疼痛藥點撞打
傷眼藥點眼生肉醫藥

磨醫膏 消醫膜 麩仁口含去皮殼一兩片腦三錢空青二錢右
合於乳鉢內研極細盛盒內旋取少許點眼中(得效)

春雪膏 治目赤腫痛淚出皆爛麩仁去皮殼研壓去油二兩龍腦二錢半生蜜六
錢右研勻以銅筋蘸少許點之治爛弦風歲久連眶赤爛者最效(局方)

春雪膏 治眼目赤腫生翳障腦砂三錢龍腦一錢朴硝五錢右合研極細
每用少許點口中津液沾入眼中閉塞時方開眼淚出效(得效)

還睛紫金丹 治爛弦風白蜜二兩爐甘石一兩火煨十次淬水中浸半日黃丹水飛六錢烏賊魚骨一錢
砂石器內慢火熬去沫下甘石末次下黃丹以柳枝攪次下餘藥

以不粘手爲度作丸如芡實大每一丸溫水化開常點之(東垣)

百點膏 治醫膜黃連一錢剉水一椀煎至半入防風八分當歸身甘艸各六分麩仁泥三分右剉同熬滴
水中不散絞去滓入煉蜜少許再熬少時令靜心點之日五七次臨臥點尤疾效有人病醫六年

以至瞶人覆雲氣之狀
用此藥而得效(東垣)

點醫膏 治醫膜朱砂水飛二錢鵝砂一錢半麩仁二十一粒爲泥真珠爛石膏各半錢熊胆二分半麩香
一分右爲細末用好蜜研和於鏡內蒸得粘磁器收貯用黍皮煎湯調少許以銅筋蘸點皆頃淚

出爲效
(直指)

三光膏 治犯土傷眼朱砂雄黃麩砂各等分右細末乳乳汁調塗盛碗內覆地上以艾
葉燒烟熏之至黃色爲度帶碗收貯用時以香油少許調勻點眼角(醫案)

龍腦膏 治小兒胎風赤爛龍腦一錢麩仁泥二錢半杏
仁七個爲泥右入人乳研爲膏點之(醫林)

麩仁膏

去醫障如神麩仁泥一兩鴈砂一錢二分龍腦五分熊胆三錢右爲末入生蜜四兩調勻盛磁罐取少許點之(入門)

明鏡膏

治眼目昏花努肉雲翳腫痛神效黃丹水飛一兩官粉乳香硃砂各五分鴈砂銅綠各三分沒藥二分右爲末煉蜜入水些少調藥令勻燒艾葉薰之以香油少許調勻點眼此神方也(醫鑿)

二百味花草膏

治火眼及爛弦風痒痛流淚獨羊膽一枚以蜜滿灌入朱砂末少許搗起陰乾每取一粒水和點眼以蜜採百花羊食百草故以爲名也(入門)

五臚膏

治眼昏常見黑花欲成內障(方見上)

楓膏

治爛弦赤腫流淚楓葉多取濃煎汁去滓熬成膏取以點眼又楓葉細切和燒酒蒸絞取汁點眼亦效(俗方)

石決明散

治眼生丁醫根脚極厚久不差石決明真珠琥珀各七錢半烏賊魚骨五錢龍腦一錢右爲細末以銅筋蘸取大豆許點眼日三(類聚)

龍腦散

治花醫龍腦一錢朴硝五錢右研如粉以銅筋點眼中(類聚)

點爛弦風藥

薄荷荊芥細辛爲末以火燒之以碗塗蜜少許於內覆烟上取煤點眼奇效(入門)

點漏睛膿出藥

雄黃石決明馬牙硝各一兩青鹽五錢蜜三合青羊胆三個右爲細末浸蜜胆汁中兩伏時盛磁器日點三四次(類聚)

點蟹目疼痛藥

獾猪膽如棗大杏仁七個爲泥朴硝一錢龍腦二錢右末取少許點之(類聚)

點撞打傷眼藥

羊胆二個雞胆三個鯉魚胆二個右摘破合勻頻點之(類聚)

點眼生肉醫藥

治目中生息肉醫滿目閉瞳子及生珠管具齒七個燒爲末真珠等分右細研如粉點醫肉上五度差(千金)

洗眼藥

洗眼宜湯泡散洗眼湯驅風散廣大重明湯五行湯秦皮散

湯泡散

治風毒赤眼腫痛花醫多淚黃連赤芍藥當歸各一錢右剉水煎藥熱熏洗冷則再溫洗頻洗最佳雪水煎之尤妙凡眼目之病皆以血脈凝滯使然故行血藥合黃連治之血得熱即行故乘熱

洗之神效(局方)○一方當歸赤芍藥黃連防風杏仁各五錢薄荷三錢銅綠二錢右到取三錢水煎沸乘熱先熏後洗冷則再溫洗之亦名湯泡散(得效)

洗眼湯 治暴赤眼赤芍藥防風各五分當歸黃連各一錢杏仁四箇右對水半鍾入人乳少許蒸過澄清乘溫熱洗日四五次(丹心)

驅風散 治爛弦風浮翳肉攀睛溢淚草龍胆防風各五錢銅綠三錢五倍子二錢竹葉一握右為粗末每一錢熱湯二合泡澄清洗即效(得效)

廣大重明湯 治兩臉赤爛腫痛爬癢生瘡隱澁難開草龍胆甘草(生不對)防風細辛各一錢右對水一大碗半先煎龍胆至一半乃入三味煎至小半碗去渣帶熱洗一日五七次(東垣)

五行湯 洗暴赤眼及時行眼疾腫痛黃柏一味為末以溼紙包裹黃泥固濟火煨候乾取出每用一彈子大紙包浸一盞水內飯上蒸熟乘熱熏洗極妙此方有金木水火土製過故名為五行湯(門入)

門入

秦皮散 治兩目赤腫疼痛流淚生青白翳秦皮黃連滑石各一錢右粗末煎湯溫洗日三次(局方)

通治眼病 脾家受熱則眼胞赤腫神勞則眼睛痛心熱則血灌瞳人傷風則淚出虛煩則眼昏勞力則皆赤其生瘡乃風熱侵肺黃乃酒傷於脾最宜活變(入門)○先醫治目昏見花如羊肝丸用羊

肝引黃連等藥入肝解肝中熱鬱肝鬱解則目之支府通利而明矣故黃連之類解熱鬱也椒目之類解溼鬱也芫薺子之類解氣鬱也芎藭之類解血鬱也木賊之類解積鬱也羌活之類解經鬱也磁石

之類解頭目鬱邪氣使下行也蔓菁子下氣通中理亦同也凡氣血鬱則目昏河間之言信不誣矣(綱目)○內外障翳證通治宜還睛丸神仙退雲丸(方見上)撥雲退翳還睛丸(方見上)固本還

睛丸大明復光散石高羌活散速效散(方見上)石決明散(方見上)加減撥雲散通垂散加減法○凡補腎治眼之藥必須於五更初腎氣開未言語前服之乃效(直指)

還睛丸 治遠近一切目疾內外醫膜翳睛勞肉爛弦風眼及年老虛弱自昏多眵迎風冷淚視物昏花久成內障此藥最能降火升水可宜久服夜能讀細字天門冬麥門冬生乾地黃熟地黃各三兩知

母酒炒二兩人參地骨皮肉蓯蓉酒浸牛膝杜仲酒炒石斛杏仁各一兩半當歸酒洗白茯苓山藥蒸兔絲子酒製黃柏酒炒枳殼甘菊酒洗青箱子神決明白蒺藜羚羊角屑各一兩防風犀角各八錢川

芎五味子黃連甘草各七錢右為末
蜜丸梧子大空心鹽湯下百丸(醫案)

固本還睛丸

治一切目疾內外醫膜遮睛風眼爛弦及老弱人目眇多糊迎風冷淚視物昏花等證天門冬酒浸搗如泥麥門冬生乾地黃酒浸熟地黃各三兩人參白茯苓山藥枸杞子各一兩半

牛膝酒洗石斛酒洗草決明微炒杏仁甘菊兔絲子酒製枳殼各一兩羚羊角屑犀角屑防風青柏子各八錢五味子甘草黃連白茯苓川芎各七錢右末蜜丸梧子大空心鹽湯下五七十九(正傳)

大明復光散

治一切眼疾內外障翳當歸尾酒洗生乾地黃酒浸黃柏酒炒黃連酒炒黃芩酒炒柴胡白茯苓煨穀光活防風荆芥石膏甘菊蟬退車前子炒密蒙花白蒺藜炒木賊青箱子炒石決

明煨羚羊角屑甘草各五分石劉
作一貼水煎食後溫服(醫案)

石膏羌活散

治遠近內外醫障風熱昏暗爛弦赤眼倒睫拳毛一切目疾石膏(清醫障疹)羌活(腦熱

頭目) 羌活(黃芩)洗心退熱(藜蘆)頭風頭疼(密蒙花)羞明怕日(木賊)退醫障(白芷)清利去風(荆芥)目中生疔(甘菊)解毒(各等分)右爲末每二錢蜜湯調下或第二洗泔水調下(入門)

加減撥雲散

治諸般眼病羌活二兩二錢半甘菊一兩九錢木賊白蒺藜各一兩一錢半防風柴胡各一兩一錢半川芎甘草各一兩一錢荆芥薄荷各一兩蟬殼七錢半石決明煨製密蒙花各四錢右

爲末每二錢薄荷湯
調下食後(醫林)

通聖散加減法

治眼目赤腫風熱爛弦內外障翳羞明怕日倒睫出淚赤眼赤爛紅筋瘀血等證通聖散(方見風門)去硝黃加甘菊細辛羌活獨活白蒺藜木賊蔓荊子草決明玄參蟬退(回

春)

單方

凡五十種有白龍散立消散喉中散

牙疳

去眼赤腫生醫障淚滯痛爲末點眼良(本草)○白龍散明目退醫馬牙疳厚紙裹在淚內著肉養一百二十日取研如粉入龍腦少許取兩米許點目中治眼昏生醫障人不破者更尋(本草)

空青

法水故色青而入肝主青盲明自去醫膜障人破者再得見物其殼入磨醫膏神效(本草)

煎湯乘溫洗眼去昏赤蓋鹽能散血故也(直指)○立消散治浮腫眼昏霧膜遮睛雪白鹽研極細以燈心草煎湯輕輕點上屢效(直指)○早起以鹽湯漱齒吐以洗眼最能明目固齒(本草)

青鹽 明目煎湯洗眼良(本草)○目澁以鹽精揩目而愈鹽精尚爾况青鹽乎煎湯洗入藥服並佳(養生)

白礬 治目昏及努肉取明礬黍米大納眼中淚出拭之日久自消(本草)

銅青 卽銅綠也明目去腐赤息肉又治爛弦風白礬煨一兩銅青三錢同研細每取半錢以熱湯一合泡澄溫洗眼初必澁但閉目坐待澁止自然眼開有效一日洗四五次(得效)

井華水 洗目赤去腐翳○眼睛無故腫脹突出一二寸以井華水灌漬眼中頻爲之睛自入新汲水亦可仍以麥門冬桑白皮梔子仁水煎服(本草)

鵬砂 治努肉瘵突鵬砂一錢龍腦半分爲末以燈心草蘸點肉上日三(入門)

爐甘石 治風眼流淚不止爐甘石烏賊魚骨等分入龍腦少許爲細末點眼中其淚卽止(入門)

石菖蒲 治飛絲入眼腫痛以菖蒲槌破如入左目塞右鼻中如入右目塞左鼻中卽效(得效)

甘菊 去翳膜明目養目血治內障止風淚末煎服並佳(本草)

蒼朮 治內外障者朮四兩剉青鹽一兩同炒黃去鹽木賊二兩童便製同爲末每一錢溫米泔調下日二服三最驗名觀朮散(直指)○治雀目蒼朮末三錢豬肝二兩批開穆藥麻線縛定粟米一合水一碗

煮熟取以熏眼後噴之大效(綱目)

草龍膽 治兩目赤腫睛脹生翳膜瘵肉高起痛不可忍服疾必用之藥丸服煎服皆佳(湯液)

細辛 明目得草決明鯉魚胆青羊肝共療目痛(本草)

黃連 明目主青盲障翳熱氣目痛皆爛淚出煎服末服並佳○黃連浸乳汁點眼治目中百病○苦傷淚出黃連煎汁漬綿紙拭眼抄(本草)

決明子

主青盲及目中淫脂雲翳赤白膜腫痛淚出除肝家熱每朝取一匙按令淨空心吞之百日夜見物○久年失明決明子一升搗末每一錢食後米飲調下妙○決明葉作菜常食最明目(本草)

○治雀目決明子一兩地膚子五錢爲末粥丸服之(千金)

青葙子

治肝藏熱毒衝眼生赤障翳青盲及腫又治內障炒爲末每一錢米飲調下(本草)

木賊

益肝膽明目治目疾退翳膜並便浸一宿晒乾去節爲末點服或煎服並佳(本草)

夏枯草

治目睛痛至夜則甚夏枯草五錢香附子一兩爲末每一錢茶清調下(本草)○此草三四月開花迺夏至陰生則枯稟純陽之氣有補養厥陰血脈之功故治黑睛疼如神者以陽治陰故也(綱目)

槐實

明目去昏暗十月上巳日採槐角納缸中漬牛胆汁封口經百日取出初服一枚空心吞下再服二枚三日三枚十日服十枚遠從一枚始久服良(本草)

楮實子

治肝熱生翳亦治氣翳細點又治拳睛翳膜研爲細末蜜湯調下一錢食後(直指)

黃柏

治目熱赤痛多淚洗肝明目煎湯洗眼甚效(本草)○栝皮拌乳汁煨絞取汁點眼甚妙(綱目)

桑枝煎湯

治青盲令視物如鷹隼正月八日二月八日三月六日四月六日五月五日六月二日七月七日八月二十五日九月十二日十月十二日十一月二十六日十二月晦日每遇上件神日用

桑柴灰

一合以沸湯沃之磁器中令澄清稍溫洗之如冷再溫洗神效(本草)○迎風冷淚冬桑不凋葉銅器煎湯溫洗眼(綱目)

竹瀝

治目赤皆痛不得開或生翳障竹瀝浸黃連一宿取汁點眼(本草)

秦皮

主目中青翳白膜去兩目赤腫痛淚不止秦皮一升水煎澄清冷洗極效益睛明目○赤眼及睛上翳或生翳暈秦皮一兩水一升浸之看碧色出以綿纏子仰臥點眼中微疼不妨良久瀝去熱汗更

點新者每日十度不

過春日差(本草)

五倍子

治風毒上攻眼腫癢痛兩輪赤爛浮腫肉侵睛五倍子一兩葶藶子一兩半爲末每二錢水二盞銅石器煎至一盞澄熱淋洗日二三大能明目去澁癢(本草)

石決明

主青盲障翳取殼水漬洗眼明目火焮研水飛點眼磨去翳膜○肉刺鯨魚喫之明目(本草)

鯉魚膽

主目然赤痛青盲障翳點眼最良○雀目胆及腦點之燥痛卽明(本草)

蟬蟬

主目中淫膚青翳白膜又去翳障療青盲取汁滴目中又焙乾作末眼盛產母食之眼復明雖是孝感亦物性宜然○稻麥芒入眼不出以新布覆目上取蟬蟬從布上摩之其芒出著布上良(本草)

烏賊魚骨

主目中浮翳及赤白翳研水飛和蜜點之入少龍腦尤佳(本草)

夜明砂

蝠蝠屎也治內外障明目去昏花淘洗焙爲末或丸服或散服良(本草)

田螺汁

主肝熱目赤腫痛大田螺水養去泥擊去掩入黃連末一錢麝香少許在內仰置地上露一宿次日以雞羽蘸螺中汁刷病眼上卽差(綱目)

蛇頭

沙塵入眼不可取出取蛇頭一枚手持其背於眼上影之沙塵自出(本草)

梨汁

卒患赤目生努肉好梨一個搗絞汁黃連二枝對綿裹浸之候色黃取以點目中(綱目)

大麥汁

麥芒入目不出煮大麥取汁洗之卽出(本草)

蔓菁子

主青盲能明目洞視但瞞子不壞者十得九愈取子六升蒸之以釜中熱湯淋之曬乾又淋如是三遍乃搗爲末食後酒服二錢日再○蔓菁子三升醋二升煮熱日乾搗末并華水服一二錢日

三次服盡夜能

視物(本草)

薺菜子

一名薺菜子主青盲不見物明目去翳障搗爲末散服丸服皆佳○根療目疼作癢常食作翳亦佳○暴赤眼痛礮取薺菜根汁點目差(本草)

首生男子

乳療目赤痛多淚點之佳○乳汁治目之功多可也人心生血肝藏血肝受血則能視蓋水入於經其血乃成故曰上爲乳汁下爲月水故知乳汁則血也用以點目豈不宜哉(本草)

人尿 主明目去赤腫昏瞶童子尿服之洗之佳(本草)○余平生有赤眼之患用之如神凡眼目赤澁

蟬殼 去目昏障翳去翳足末服煎服皆佳(本草)

蛇蛻 主明目去障翳醋浸炙乾末服丸服並佳○蛇蛻時從口翻出眼睛亦退去醫藥取此意也(本草)

烏雄雞膽汁 療眼目昏暗臥時常服(本草)

雄雀屎 主目中生努肉赤脈貫瞳子及腐翳赤白膜取屎和首生男乳點之即消神效(本草)○去白膜雄雀屎龍腦各少許乳汁研勻點之(類聚)○小兒雀目取雀頭血頻點之(本草)

熊膽 治目疾赤爛生翳多淚取真熊胆水研常點神效(食生)

牛肝 明目作胎食之煮食亦可小兒雀目生食之○烏牛胆明目可點之(本草)

青羊肝 主青盲能明目去昏暗翳○殺羊肝一具薄切鋪瓦上焙乾草決明半升麩子一合並炒香同搗為末蜜漿下一錢食後日三加至二錢不過二劑目極明夜見細字(本草)○目赤暗痛羊肝薄切以五味和食之神效(本草)○熱病後失明羊肝薄切付貼眼上又生食之尤妙(本草)○青羊胆主青盲明目點眼中去赤障白膜風淚○熱病後失明羊胆汁點之妙(本草)○眼目諸疾羊胆一枚入蜜一錢線札封口鍋內煮蒸候冷點眼效(得效)○自疾青羊肝最佳黑羊白羊次之(丹心)

犬膽 明目去眼中膿水六月上扶日探胆以酒調服○眼癢赤澁取胆汁點之(本草)

猪肝 明目又治肝熱目赤痛翳猪肝一具薄切以五厘酒煮食之(本草)○猪肝發肝米甜煮煎病眼因食之(本草)○療青盲猪胆一枚微少煎之丸如黍米納眼中良(本草)○治外障醫猪胆一枚

銀石器煎成膏入龍腦少許點眼中仍取猪胆白皮曬乾

搽作蠟釵股大燒一頭作灰冷點醫上三五度差(得效)

獺膽 主眼生障醫黑花飛蠅上下視物不明取汁點目中亦入點眼藥中用良(本草)

兔肝

明目治昏暗和草決明作丸服之○熱毒上衝眼昏取肝生食之如服羊肝法○眼昏眼疼取生肝絞汁入人乳相和點目中良(本草)

鍼灸法

眼睛痛取風府風池通里合谷申脈照海大敦察陰至陰(綱目)○目赤腫醫者明證取上星百會攢竹絲竹空睛明瞳子膠太陽合谷又以草莖刺鼻孔出血數升即愈(子和)○眼暴赤腫痛取

神庭上星顯會前頂百會出血即愈又取光明地五會(綱目)○諸障醫取清明四白太陽百會商陽厲兌光明各出血合谷三里命門肝愈光明各灸之(綱目)○內障取足厥陰足少陰陽降(綱目)○

去翳法以鵝翎切之近黑睛及當白睛蓋之膜自聚上以針鈎挽之翳去即明見物以綿著眼斷血三日差(千金)○努肉攀睛取睛明風池期門太陽出血(綱目)○爛弦風取大骨空灸九壯以口吹火

減小骨空灸七壯亦吹火滅又以三稜針刺眶外出血即愈(綱目)○迎風冷淚眵翳黑花取大骨空小骨空灸之吹火滅又取臨泣合谷(綱目)○青盲灸巨髎取肝俞命門商陽(得效)○目昏暗灸三

里針承泣又取肝俞瞳子髎(綱目)○雀目神庭上星前頂百會睛明出血即愈又取肝俞照海(綱目)○暴盲不見物針攢竹及頂前五穴又刺鼻中大出血立明(子和)○眼腫痛睛欲出須入關大

刺手十指間出血(即愈)易老○眼戴上不能視灸脊第二頸骨第五頸骨上各七壯一齊下火立愈(寶鑑)

訂正東醫寶鑑外形篇卷之二

御醫忠勤貞亮 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚 奏子 教撰

耳

耳目受陽氣以聰明 人之耳目猶月之質必受日光所加始能明耳目亦必須陽氣所加始能聰明是故耳目之陰血虛則陽氣之加無以受之而視聽之聰明失耳目之陽氣虛則陰血不能自

施而聰明亦失然則耳目之聰明必須血氣相須始能視聽也(綱目)

耳者腎之竅 內經曰腎主耳又曰腎在竅為耳○腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣(難經)○內經曰腎藏精靈樞曰精脫者耳聾夫腎為足少陰之經乃處精而氣通于耳耳者宗脈之所聚也若精

氣調和則腎藏強盛耳聞五音若勞傷氣血兼受風邪損於腎藏而精脫者則耳聾無聞也(資鑿)

脈法 病耳聾脈大者生沉細者難治(脈經)○左寸洪數心火上炎兩尺洪數相火上炎其人必遺精夢泄兩耳或鳴或聾(正傳)○腎脈浮而盛為風洪而實為熱細而高為虛(醫鑿)○耳病腎虛遲濕其脈

浮大為風洪動火賊沉濡氣凝數實熱寒久病聾者專於腎責暴病浮洪兩尺相同或兩尺數陰火上衝(回春)

耳鳴 黃帝曰人之耳中鳴者何氣使然岐伯曰耳者宗脈之所聚也故胃中空則宗脈虛宗脈虛則下流脈有所竭故耳鳴(靈樞)○上氣不足耳為之苦鳴○髓海不足則腦轉耳鳴(靈樞)○內經曰一陽獨

少陽厥也註曰鳴謂耳中鳴如喘聲也一陽胆與三焦也胆及三焦脈皆入耳故氣逆上則耳中鳴○耳鳴乃是聾之漸惟氣閉者多不鳴便聾(入門)○凡人嗜慾無節勞役過度或中年之後大病之餘

餘腎水枯涸陰火上炎故耳癢耳鳴無日而不作或如蟬噪之聲或如鐘鼓之聲早而不治漸至聾聵良可嘆哉(正傳)○虛鳴者耳觸風邪與氣相擊其聲嘈嘈宜芎芷散或腎氣不足宗脈虛風邪入耳

為鳴先用五苓散(方見寒門)加枳殼酒熱皮紫蘇生薑同煎吞青水香丸(方見氣門)散邪疎風下氣續以芎歸飲和養(直指)○風熱酒熱耳鳴用通聖散(方見風門)加枳殼柴胡南星桔梗青皮刺芥

酒炒製煎服(丹心)○痰火上升兩耳蟬鳴漸欲聾宜加減龍香丸針砂酒通明利氣湯復聰湯(醫鑿)○耳鳴皆是腎精不足陰虛火動也痰火者鳴其腎虛者微鳴宜補腎丸黃芪丸大補丸滋腎通

氣湯或六味地黃丸(方見虛勞)以全蝎四十九枚炒黃爲末每二
錢溫酒調和吞下百丸(得效)○耳內開闔然是陰虛也(丹心)

芎藭散 治風入耳虛鳴川芎一錢半白芷蒼朮陳皮細辛石菖蒲厚朴半夏木通紫
蘇葉辣桂甘草各七分右剉作一貼入薑片連殼蔥白二紫煎服(入門)

芎歸飲 治風邪入耳虛鳴川芎當歸細辛各一錢辣桂石菖蒲白芷各七
分右剉作一貼入薑三片棗二枚紫蘇七葉水煎食後服(直指)

加減龍蒼丸 治痰火上升耳鳴草龍胆酒洗當歸酒洗梔子炒黃芩青皮各一兩大黃酒蒸青黛柴胡各
五錢蘆薈牛胆南星各三錢木香二錢半麝香五分右爲末神麴糊和丸蒸豆大薑湯下二

十九日三服後用針砂
酒以通其氣(醫鑑)

針砂酒 針砂一兩穿山甲末一錢拌針砂養一晝夜揀出山甲將針砂以酒一
碗浸三四日噉酒口內外用磁石一塊綿裹塞耳忌怒戒色(醫鑑)

通明利氣湯 治虛火痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛痞滿煩躁貝母一錢二分陳皮一錢黃連黃芩
並酒浸豬胆汁拌炒黃栢酒炒梔子炒參酒洗各七分蒼朮鹽水炒白朮香附子便炒生

乾地黃薑汁炒檳榔各五分川芎四分木香二分半甘草
二分右剉作一貼入薑三片水煎入竹瀝五匙服(醫鑑)

復聰湯 治痰火上攻耳鳴耳聾半夏赤茯苓陳皮甘草藹蓋木通瞿
麥黃栢鹽炒各一錢石剉作一貼入薑三片水煎服(丹心)

補腎丸 治陰虛火動耳鳴熱地黃兔絲子酒製各八兩當歸身三兩牛肉蓯蓉五兩山茱萸二兩半黃栢
知母並酒炒各一兩破故紙酒炒五錢右爲末酒糊和丸梧子大空心鹽湯下五七十九(丹心)

黃芪丸 治腎虛耳鳴夜間睡者如打鼾黃芪一兩白蒺藜炒光活各五錢大附子一個炮
鴉羊腎一對焙乾右爲末酒糊和丸梧子大空心煎鹽湯下三五十九(寶鑑)

大補丸 治耳鳴欲聾黃栢八兩對人乳拌勻晒乾再用鹽水炒褐色右
搗爲末水丸梧子大空心鹽湯下百丸○一名獨勝丸(醫鑑)

滋腎通耳湯 治腎虛耳鳴欲聾當歸川芎白芍藥生乾地黃酒炒各一錢知母黃栢並酒
炒黃芩酒炒柴胡白芷香附子各七分右剉作一貼空心水煎溫服(回春)

耳聾 耳聾者屬於熱然有左耳聾者有右耳聾者有左右耳俱聾者不可不分夫左耳聾者足少陽火也怒
怒之人多有之龍首丸主之(方見上)右耳聾者足太陽之火也色慾之人多有之六味地黃丸主之

（方見虛勞）左右俱聾者足陽明之火也。醇酒厚味之人多有之。通聖散（方見風門）滾痰丸（方見痰飲）總此三者而言之。則忿怒致耳聾為多。厥陰少陽火多故也。丹心○腎水竅耳而能聞聲音者水生於金也。肺主氣一身之氣貫於耳。故能聽音。凡治諸聾必先調氣。開鬱間用磁石羊腎丸以開關竅。蓋鬱者痰火鬱結。非磁石鎮墜烏桂椒辛藹蒲辛散流通。則老痰鬱火何由而開。愈益以通聖散和之可也。入門○左耳聾婦人多有之。以其多忿怒故也。右耳聾男子多有之。以其多色慾故也。左右俱聾。聲之家多有之。以其多肥甘故也。齋案○新聾多熱久聾多虛（入門）○耳聾有風聾濕豐虛對勞聾厥聾卒聾○左耳聾宜龍胆湯右耳聾宜滋陰地黃湯左右耳俱聾宜酒製通聖散清聰化痰丸（回春）

磁石羊腎丸

治諸般耳聾補虛開竅行壅散風去濕磁石二兩煨再用蔥白木通各三兩對同水煮一伏時取石研水飛二兩川芎白朮川椒棗肉防風白茯苓細辛山藥遠志川烏木香當歸鹿茸

兔絲子黃芪各一兩肉桂六錢半熟地黃二兩石菖蒲一兩半右為末羊腎兩對酒蒸爛和酒糊和丸梧子大空心溫酒或鹽湯下五十九丸（入門）

龍膽湯

治忿怒動胆火致左耳聾黃連黃芩梔子當歸陳皮牛胆兩星各一錢草龍胆香附子各八分玄參七分青黛木香各五分乾薑炒黑三分右剉作一貼入薑三片水煎入玄明粉三分服（回春）

磁陰地黃湯

治色慾動相火致右耳聾熟地黃一錢半山藥山茱萸當歸川芎白芍藥各八分牡丹皮澤瀉白茯苓石菖蒲遠志知母黃柏並鹽酒炒各六分右剉作一貼水煎服空心亦治大病後

耳聾（回春）

清聰化痰丸

治飲食厚味挾怒氣以動肝胃之火致耳聾耳鳴壅閉不開聲香橘紅去白鹽水洗赤茯苓錢刺子各一兩片芩酒炒八錢黃連酒炒白芍藥酒浸煨生地黃酒洗柴胡半夏薑製各七

錢人參六錢青皮醋炒五錢生甘草四錢右為末蔥湯浸蒸餅和丸菘豆大茶清下百丸（回春）

風聾

風聾者風邪入耳必耳中癢或頭痛風熱鬱者宜酒製通聖散（入門）○耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多宜開痰散風熱通聖散（方見風門）倍入酒煨大黃再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒水煎

食後服（丹心）○風虛耳聾宜桂香散（入門）

桂香散

治風虛耳聾南星炮白芷各一錢辣桂川芎當歸細辛藹蒲木香木通白蒺藜麻黃甘草各七分右剉作一貼入紫蘇七葉薑三片蔥白二莖水煎服（入門）

濕聾 濕聾者因雨水入耳浸漬必耳內腫痛涼膈散(方見火門)倍入酒炒大黃又黃芩酒浸炒加羌活防風荆芥水煎服或五苓散(方見寒門)加陳皮枳殼紫蘇入生薑煎服○黃龍散入龍腦少許吹

入耳中抄(入門)

黃龍散

治沐浴水入耳中成膿耳亦治小兒聾耳枯白攀龍骨煨黃丹水飛胭脂燒灰海螵蛸煨各一錢麝香少許石爲末先以紙擦拭乾膿水乃以綿擦藥入耳日日易之(回春)

虛聾

因久瀉或大病後風邪乘虛入耳與氣相搏嘈嘈而鳴或時眼見黑花宜四物湯(方見血門)加知母黃柏並鹽酒炒菖蒲遠志水煎服或腎氣(丸方見虛勞)加磁石破故紙菟絲子黃柏空心鹽湯

吞下○若勞役脫氣者補中益氣湯(方見內傷)加菖蒲白茯苓黃柏知母並鹽水炒煎服(入門)

勞聾

經曰精脫者耳聾其候頰頰色黑耳輪焦枯受塵垢者是也因房勞脫精者人參養榮湯(方見虛勞)加知母黃柏並鹽水炒煎服或補骨脂丸益腎散(入門)○腎虛耳聾宜六味地黃丸(方見

虛勞)加遠志菖蒲黃柏知母並鹽水炒亦治陰虛火動而聾(回春)○腎虛耳聾宜燒腎散腎虛久聾宜黃鳴散開之(三因)

補骨脂丸

治勞損耳聾磁石煨淬一兩二錢半熟地黃當歸川芎肉桂兔絲子川椒破故紙白蒺藜胡蘆巴杜仲白芷菖蒲各二錢右爲末蜜丸梧子大空心煎白湯下五十九(入門)

益腎散

治腎虛耳聾磁石煨淬巴戟川椒各一兩石菖蒲沉香各五錢右爲末以豬腎一枚細切和以蔥并藥末用濕紙十重裹煨令氣空心細嚼以酒下(直指)

燒腎散

治腎虛耳聾磁石火煨醋淬七次附子炮川椒炒巴戟各一兩右爲末用豬腎一枚細切葱白韭白各一錢入藥末一錢鹽一匙和勻濕紙裹煨熟取出空心細嚼酒送下十日見效(保命)

螞蟥散

治耳聾因腎虛所致十年內者一眼愈全螞蟥四十九個去梢洗焙(去風熱)生薑切片如蟻大四十九片(開張)右二味銀石器內炒乾爲細末向夕勿食夜臥酒調作一服至二更以來徐徐盡

量飲五更耳中聞百十響(量飲五更耳中聞百十響) 筆響自此聞聲(三因)

厥聾

暴厥而聾偏塞閉不通內氣暴薄也(內經)○五藏六府十二經脈有絡於耳者其陰陽經氣有相併時併則藏氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之脈則令聾名曰厥聾氣逆耳聾有三肝與手太陽

少陽也經云肝氣逆則頭痛耳聾是也手太陽氣厥而聾者其候耳內氣滿熱壅手少陽氣厥而聾者其候耳內渾渾焯焯一云焯焯焯焯皆宜四物湯吞下龍膏丸或燒腎散以通之(寶鑑)○因藏氣厥

逆入耳痞塞不通必兼眩暈宜當歸龍薈丸方見火門
兼用塞耳丹塞耳入門○熱氣閉塞者耳不鳴丹心

卒聾卒聾者腎氣虛風邪傳於經絡入於耳中正氣與邪氣相搏故令卒聾宜芎芷散方見上清神散
方見下綱目○暴聾者是厥逆之氣經云少陽之厥暴聾是也綱目○暴聾宜蒲黃膏龍腦

齊塞耳方見下○甘遂爲末作丸塞耳內服甘草煎湯令兩人各製卅不可
一處安頓又巴豆二十粒爲泥松香五錢入蔥汁搗作丸綿裹塞耳中入門

耳重聽耳重聽宜清神散

清神散治風氣壅耳常重聽頭目不清白蠶蠶甘菊各一兩羌活荆芥木通川芎香附子防風各
五錢石菖蒲甘草各二錢半右爲末每二錢食後茶清調下或對水煎服亦可入門

聰耳湯治耳重聽不清黃柏酒炒一錢當歸酒洗白芍藥酒炒生地黃酒洗川芎知母酒炒陳皮烏藥白
芷防風羌活酒洗獨活酒洗薄荷蔓荊子蒿本酒洗各五分細辛三分右剉作一貼水煎食後服

服後低頭睡
一時膏塗

地黃湯治腎經熱右耳聽事不真每心中恍惚則轉覺重虛鳴疼痛磁石煨淬爲末二兩生乾地黃酒洗
一兩半枳殼羌活桑白皮防風黃芩木通各一兩甘草五錢右粗末每四錢水煎日二服本草

聾耳謂之聾耳綱目○人耳中有津液若風熱搏之津液結硬成核塞耳亦令暴聾謂之聾耳熱氣乘虛
隨脈入耳熱聚不散脂汁出焉謂之膿耳直指○耳中津液結核塞耳暴聾而爲聾耳宜
服柴胡聰耳湯外用豬脂地龍鍋底煤等分葱汁和丸棗核大綿裹入耳令潤挑去丹心

柴胡聰耳湯治聾耳耳中乾結耳鳴而聾連翹三錢柴胡二錢人參當歸甘草各一錢右剉作一貼入薑
三片水二盞煎至一盞去滓入水蛭末五分蜜三枚末磨香一分再一沸食遠服東垣

耳痛成膿耳風邪乘少陰之經入於耳內熱氣聚則痛而生膿或膿上壅腫痛且夕膿汁流出皆謂之膿
耳膿不去則塞耳成聾入門○耳內作痛宜鼠粘子湯蔓荊子散犀角飲子刺芥連翹湯東

垣鼠粘子湯○去膿汁宜紅綿散抵聖散黃龍散方見上明礬吹耳散○耳痛以白龍散
塞耳○耳熱出汗滑石石膏天花粉防風各一錢龍腦一分右爲細末搽耳中卽止綱目

鼠粘子湯治耳內生腫紅如櫻桃極痛連翹片芍酒炒玄參桔梗梔子酒炒鼠粘子炒草龍胆酒
炒板藍根卽鼠粘子生甘草各一錢右剉作一貼水煎食後服隨飲酒一二盞膏塗

鼠粘子湯治耳內生腫紅如櫻桃極痛連翹片芍酒炒玄參桔梗梔子酒炒鼠粘子炒草龍胆酒
炒板藍根卽鼠粘子生甘草各一錢右剉作一貼水煎食後服隨飲酒一二盞膏塗

蔓荊子散

治腎經有風熱耳中熱痛出膿汁或鳴或聾蔓荊子赤茯苓甘菊前胡生地黃麥門冬桑白皮赤芍藥木通升麻甘草各七分右剉作一貼入葦三片棗二枚水煎食後服(正傳)

犀角飲子

治風熱耳聾腫痛及出膿水犀角屑木通石菖蒲玄參赤芍藥赤小豆甘草各一錢甘草五分右剉作一貼入葦五片水煎服(濟生)

荆芥翹湯

治兩耳腫痛由腎經有風熱荆芥連翹防風當歸川芎白芍藥柴胡枳殼黃芩梔子白芷桔梗各七分甘草五分右剉作一貼水煎食後溫服(回春)

東垣鼠粘子湯

治耳內痛生瘡桔梗一錢半黃芪柴胡各七分鼠粘子連翹生乾地黃酒炒當歸尾黃芩甘草炙甘草各五分昆布蘇木黃連清黃龍胆各三分桃仁三個紅花一分右剉作一

貼水煎食後服(東垣)

紅綿散

治耳枯白髻海螵蛸各一錢乾胭脂五分麝香一字右研勻先以綿子拭去耳中膿水盡却以紙捲藥入耳中即乾(丹心)

抵聖散

治耳中膿出經年不愈烏賊骨三錢乳香二錢枯白礬乾胭脂輕粉各一錢麝香五分右細末或抄入或糝入耳中(東垣)

明礬散

治腎經有熱上衝於耳使津液凝滯為稠膿清汁亦有沫浴水入耳停滯為濃但不疼若不差變成膿枯白礬龍骨各三錢黃丹二錢乾胭脂一錢麝香少許右為末先去膿水吹藥入(丹心)

吹耳散

治腎經風熱耳內出膿汁乾胭脂海螵蛸枯白礬龍骨赤石脂密陀僧煨胆礬青黛鵬砂黃連各一錢龍腦二分麝香一分右為細末先去膿水吹藥入(回春)

白龍散

治耳中卒然大痛寒水石煨四兩烏賊魚骨滑石各一兩鵬砂三錢輕粉一錢右為末香油調如糊以紙捲藥入耳中痛立止(東垣)

耳癢

有人患耳癢一日一作可畏直挑剔出血稍愈明日復然此乃腎癢虛致浮毒上攻未易以常法治也宜服局方透米丹(方見風門)忌酒麪雜豬辛熱之物能盡一月為佳不然無效(得效)○宜服玄參

貝母湯

玄參貝母湯

治耳熱出汁作癢乃痰火也防風貝母天花粉黃柏鹽水炒白茯苓玄參白芷蔓荊子天麻半夏製各一錢甘草五分右剉作一貼入葦三片水煎食後服(醫鑿)

透關通氣藥

邪氣閉塞為聾聵當用透關通氣之藥宜塞耳丹通神散針砂酒(方見上)清黃膏龍腦膏甘遂散透耳筒透鐵關法

塞耳丹

治氣塞塞聾聵石菖蒲一寸巴豆肉一粒全蝎一個爲末葱涎和如棗核大綿裹塞耳(得效)

通神散

大治耳聾全蝎全者一個土狗二枚地龍二條雄黃白礬半生半煨各半錢麝香二分半右爲末葱白煎藥入耳閉氣而墜坐一時三日一用(直指)

蒲黃膏

治耳卒聾細辛蒲黃各五錢杏仁神麩各七錢半右爲末杏仁膏和捻如棗核大綿裹塞耳日一易(寶鑑)

龍腦膏

治同上龍腦一分椒目五錢杏仁泥二錢半右爲末和捻棗核大綿裹塞耳日二易(寶鑑)

甘遂散

治耳聾甘遂末葱汁和丸綿裹塞耳中口含甘草湯兩藥須各兩處修製妙(入門)

透耳筒

治腎氣虛耳鳴如風水聲或如鍾磬響或辛暴聾椒目巴豆肉石菖蒲松脂各半錢爲末以蠟熔化和勻作筒子樣綿裹納耳中日一易神效(得效)

透鐵關法

治耳聾好活磁石二塊到如棗核大捺麝香少許於磁石尖上塞兩耳竅中口內寄生鐵一塊候一時兩耳氣透風焔有聲爲度動用三五次即愈(醫鑑)

修養法

以手摩耳輪不拘遍數所謂修其城郭以補腎氣以防聾聵也(養性)○養耳力者常飽(養性)

不治證

久聾腎虛氣虛絕不聞者難治(入門)

諸蟲入耳

諸蟲入耳不出將兩刀於耳門上相磨敲作聲虫聞自出又將鏡子敲之亦出(本草)○取車紅脂塗耳孔虫自出(本草)○藍青汁滴入耳中虫自死出(得效)○川椒末醋浸良久取汁灌耳

中虫自出(本草)

○諸虫及蠶入耳白膠香燒燻熏入耳耳內暖虫自出(綱目)○虫入耳痛者蠶鱗魚膏塗入耳中(本草)○諸虫入耳桃葉熱按塞耳中即出(本草)○惡虫入耳桃葉作枕枕之虫自

鼻出(得效)

○飛虫入耳好醋滴入耳內虫必死而出(綱目)○飛蛾入耳醬汁灌耳中即出又擊銅器於耳傍亦出(本草)○百虫入耳韭汁葱汁薑汁麻油雞冠熱血隨所得灌耳中即出(本草)

合香掩耳蜈蚣自出(本草)

○蜈蚣入耳生薑汁或韭汁灌耳中即出(得效)○又豬脂肉炙龍一條納葱葉中化水滴耳中虫化爲水(本草)○鼠婦虫研如泥攤紙上燃作條納耳中自出又

蝸牛滴水滴耳中亦出(綱目)

○脂麻油作煎餅枕臥須臾出(本草)○小蒜汁滴入耳即出

諸虫皆同(本草)○牛酪或髓乳灌耳中當消成水(本草)○蟻子入耳穿山甲燒末水調灌之即出(本草)○豬脂或牛脂或肉炙令香安耳孔虫自出(本草)○耳中有物不可出用弓弦或麻繩打令頭散塗好膠粘著其物徐徐引出妙(本草)○取葱管合於耳門內極力吸之即出(本草)○一切虫物入耳不出以竹管入耳內用口氣盡力吸出最妙(丹心)

單方凡二
十種

白礬 治膿水出耳中煨爲末入麝香少許綿裹塞耳中(本草)

鹽 治耳卒痛鹽三五升蒸熱裹以青布枕之冷復易立效(綱目)

磁石 治久聾取堅磁石如豆大穿山甲燒爲末二分半右新綿裹了塞耳口中含小生鐵覺耳內如風雨聲即愈(綱目)○又磁石生研細綿裹兩耳中別用針砂末納不聾耳中自然通聽(直指)

菖蒲 治耳聾石菖蒲一寸巴豆肉一粒合搗作丸綿裹塞耳目一易○耳痛取自然汁灌耳神效(本草)

生地黃 治耳鳴耳聾生地黃灰火煨綿裹塞耳數易之以差爲度(本草)

薄荷 治水入耳取汁點入立(經驗)

草麻子 治耳聾耳鳴草麻子去皮四十九粒大棗肉十個和人乳和搗合勻每取作棗核大綿裹塞耳中覺熱爲度一日一易名棗子錠(得效)

甘蔗 治久聾甘蔗半寸綿裹塞耳內甘草半寸嚼口中即通(綱目)○又甘蔗末吹入左耳甘草末吹入右耳亦效須兩人各處修製乃效(丹心)

巴豆 治耳聾久聾耳痛巴豆肉一兩松脂二兩同搗勻作棗核大綿裹塞耳日一易(本草)○巴豆一粒去皮蠟裹針刺一孔透塞耳中(本草)○巴豆肉十四個研爛搗脂半兩熔化作丸綿裹塞耳中

(丹心)

龜尿 治久聾取得尿盛青葱管中滴入耳中取尿法以明鏡照龜龜淫發放尿又艾灸其尻亦放(丹心)

鯉魚膽治耳聾取汁滴入耳中(本草)○取鯉魚髓綿裹塞耳亦治聾(直指)

鼠膽治久聾取胆汁令病人側臥瀝汁入耳令盡須臾胆汁從下耳出初灌益聾半日乃差能治三十年老聾但鼠胆難得鼠糞死胆便消矣或云月初三日前有之(入門)○鼠腦髓綿裹塞耳亦治聾

(直指)

蛇膏治耳聾取蛇膏塞耳中神效(千金)○耳內忽大痛如有虫在內奔走或血水流出痛不可忍蛇退皮燒存性爲末吹入耳中立愈(正傳)

蚯蚓汁治耳聾取地龍納葱葉中化水熱之(本草)

杏仁治耳痛出膿水熬赤爲末葱涎和丸綿裹入耳中(日三易)(本草)

芥子治耳聾搗爲末入乳汁和丸綿裹塞耳(日三易)(本草)

雞抱卵殼治耳內有膿痛不可忍取卵殼皮炒黃爲末香油調灌耳內痛即止(種杏)

雄貓尿治耳聾取尿滴入耳中左滴右滴如貓不放尿取生糞擦其齒即放尿(綱目)

麝香治氣閉耳聾真麝香爲末以葱管吹入耳內後將葱塞耳內耳自聰(回春)

驢生脂治積年耳聾取脂和生椒熬搗綿裹塞耳妙不可言(本草)

針灸法耳鳴取液門耳門中渚上關完骨臨泣陽谷前谷後谿陽谿偏歷合谷大陵大谿金門○耳聾取中諸外關和聽會聽宮合谷商陽中衝○暴聾取天牖四瀆○灸耳暴聾者尤長七分一頭切平一

頭削尖將尖頭插耳中於平頭上灸七壯重者二七壯覺耳內熱即效(綱目)

鼻

鼻白神唐

黃庭經曰神虛之中當修治呼吸虛間入丹田神虛者鼻也乃神氣出入之門也(類聚)

鼻爲玄牝之門戶

老子曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門爲天地根絡繹若存用之不勤何謂玄牝之門答曰鼻通天氣曰玄門口通地氣曰牝戶口鼻乃玄牝之門戶也(正理)

鼻爲肺之竅

內經曰西方白色入通於肺開竅於鼻○肺在竅爲鼻(正理)○五氣入鼻藏于心肺脈法左寸脈浮緩爲傷風鼻寒流涕右寸脈浮洪而數爲鼻燥鼻熱(正理)

鼻淵

內經曰胆移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳爲蝦蟇眼目註曰胆液下注爲濁涕下不

已如水泉故曰鼻淵

也久而不已必成衄血失血多故目視眩暗也○鼻淵者外寒內束熱之證也(正傳)○鼻流濁涕者屬風熱也(回春)○鼻淵宜黃連通聖散防風湯蒼耳散荊芥連翹湯○一人

鼻流濁涕有穢氣脈弦小右寸滑左寸澀

先灸上星三里合谷次以酒芩二兩者尤半夏各一兩辛夷

細辛川芎白芷石膏人參葛根各五錢

右到分七貼服之全愈(丹溪)○鼻中常流臭黃水甚者脈亦痛俗名挖腦砂有虫蝕腦中用絲瓜藤近根三五尺許燒存性爲末酒調服即愈(正傳)

黃連通聖散

治鼻淵蓋即風門防風通聖散加酒炒黃連薄荷葉煎服(醫案)

防風湯

治鼻淵濁涕下不止防風一兩酒炒片苓人參川芎麥門冬甘草炙各一兩右細末每三錢沸湯煎服食後日三或到取七錢水煎服亦可(河間)

蒼耳散

治鼻淵白芷一兩辛夷五錢蒼耳子炒三錢半薄荷一錢右末每二錢葱茶清調下食後(二因)

荊芥連翹湯

治鼻淵荊芥柴胡川芎當歸生地黃赤芍藥白芷防風薄荷梔子黃芩桔梗連翹各五分甘草三分右到作一貼水煎服(回春)

鼻斂

斂者鼻流清涕也(入門)○鼻中水出曰斂(內經)○傷風則決然鼻流清涕(綱目)○鼻流清涕者屬肺寒也(回春)○鼻流清涕宜川椒散○鼻斂二陳湯(方見痰飲)加川芎當歸細辛白芷防風羌活

活桔梗薄荷生薑煎服外以細辛齊塞鼻中(入門)○老人鼻斂

不止用獨頭蒜四五個搗爛貼脚底心用紙貼之斂自止(糧杏)

川椒散

治鼻斂紅椒炒河子肉白薑生桂心川芎細辛白朮各等分右爲末每二錢溫酒調下(得效)

細辛膏 治鼻塞腦冷涕不止細辛川椒乾薑川芎吳茱萸附子各七錢半皂角屑五錢桂心一兩猪油六兩右煎猪油成膏先一宿以苦酒浸前藥取入油煎附子黃色止以綿裹塞鼻孔中(入門)

鼻衄 詳見血門

鼻塞 鼻塞皆屬肺(綱目)○寒傷皮毛則鼻塞不利火鬱清道則香臭不知新者偶感風寒鼻塞聲重流涕噴嚏宜光活沖和湯參蘇飲(並見寒門)久則略感風寒鼻塞便發宜清金降火涼膈散(方見火門)

加川芎荆芥白芷(入門)○鼻塞甚者細寒湯葶藶散九不知香臭者麗澤通氣湯內有硬物者宜兩星飲外用藥撥餅貼顛門且以菖蒲皂角末綿裹塞鼻(入門)○鼻腫者肺為風冷所傷津液冷滯鼻氣不宜香臭不知宜芎藭散(直指)○鼻塞不開香臭宜清肺湯溫衛湯通竅湯菖蒲散又一方

禦寒湯 治感寒鼻塞黃芪一錢蒼朮七分陳皮人參升麻各五分防風白芷佛耳草

葶藶丸 治鼻塞不通薄荷葉三錢荆芥穗一錢半葶藶五分右末蜜丸櫻桃大常含化(綱目)

麗澤通氣湯 治鼻不開香臭此肺經有風熱也黃芪一錢蒼朮光活獨活防風升麻葛根各七分甘草炙五分麻黃川椒白芷各三分右剉作一貼入薑三片棗二枚蔥白三寸水煎服(河間)

南星飲 治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物窒塞腦氣不宜逐流髓涕大白天南星切片沸湯泡兩次焙乾每服二錢入大棗七枚甘草少許同煎食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉髓涕自收仍

以藥撥餅貼顛門髮斗火製之令熱透(得效)

葶藶餅 治鼻塞流濁涕單撥香附子大蒜同搗作餅紗襯貼顛門上以髮斗火製之(入門)

芎藭散 治鼻塞為腫芎藭檳榔麻黃肉桂防己木通細辛白芷菖蒲各七分木香川椒甘草各三分半右剉作一貼入薑三片紫蘇葉五片水煎服(直指)

溫肺湯 治鼻不開香臭麻黃二錢黃芩升麻各一錢半防風葛根光活甘草炙各一錢木香二分右粗末水二盞煎白三根同煎至一盞食後溫服(東垣)

溫衛湯 治鼻不開香臭口中溜火陰冷足痿當歸身一錢半黃芪蒼朮升麻知母柴胡光活各一錢人參防風白芷黃柏澤瀉甘草各五分陳皮青皮黃連木香各三分右剉作一貼水煎服(東垣)

通竅湯 治感風寒鼻塞聲重流涕不聞香臭防風羌活桑本升麻乾葛川芎蒼朮各一錢白芷五分麻黃川椒細辛甘草各三分右剉作一貼薑三片蔥白二莖水煎服(醫鑑)

菖蒲散 治鼻塞不通不得息菖蒲皂角等分搗爲末每用一錢綿裹塞鼻仰臥少時(綱目)

鼻不聞香臭方 薄荷三錢細辛白芷防風羌活當歸川芎半夏桔梗陳皮赤茯苓各一錢右剉作一貼水煎服(回春)

鼻痔 輕爲鼻痔重爲鼻痔皆肺熱也(入門)○鼻痔者肺熱極日久凝濁結成瘻肉如棗大滯塞鼻竅甚者亦名鼻鼈防風通聖散(方見風門)加三稜海藻末調服外用辛夷膏塞鼻即愈(入門)○瘻肉因胃

中有食積熱痰流注宜以南星半夏蒼朮神麴細辛白芷甘草酒炒芩連煎服外用瓜蒂散自愈(綱目)○鼻中贅肉臭不可近痛不可搖以白礬末加礪砂少許吹其上頃之化水而消與勝濕湯(方見濕門)瀉白散(方見五藏)此厚味壅滯濕熱蒸於肺門如雨

霧之地突生芝菌也(醫鑑)○鼻痔宜瓜丁散白黃散羊肺散

辛夷膏 治鼻中瘻肉壅塞疼痛辛夷二兩細辛木通木香白芷杏仁各五錢右以羊髓豬脂三兩和藥于石器內慢火熬成膏取赤黃色放冷入龍腦麝香各一錢爲丸綿裹塞鼻中數日脫落即愈(御

院)○小兒鼻流清涕取此貼額門上又塗鼻中(丹心)

瓜礬散 去鼻痔瓜蒂四錢甘遂一錢枯白礬礬殼灰草烏尖各五分右爲末麻油調作丸如鼻孔大每日一次以藥納鼻內令達痔肉上其痔化爲水肉皆爛下即愈(入門)

瓜丁散 治鼈鼻有瘻肉不聞香臭鼻中瘻肉俗謂之鼻痔瓜蒂細辛等分爲末綿裹如豆許塞鼻中即化黃水點滴至盡不三四日遂愈一名細辛散(得效)

白黃散 治鼻瘻瘻肉鼻痔白礬雄黃細辛瓜蒂等分爲末以雄犬胆汁和丸綿裹塞鼻中(丹心)

羊肺散 治肺瘻生瘻肉不聞香臭羊肺一具白朮四兩肉蓯蓉木通乾薑川芎各一兩右五味爲細末以水量打稀糊灌肺中煮熟焙乾爲細末食後米飲下二錢(三因)

鼻瘡 鼻中生瘡乃肺熱也宜黃芩湯洗肺散(回春)○鼻瘡宜瀉白散加酒炒片芩梔子桔梗薄荷(方見五藏)○鼻瘡杏仁油和鹽塗之(入門)○鼻瘡黃柏苦參檳榔等分爲末豬脂調和或青黛槐花杏

仁研付鼻中(得效)○大風瘡天庖瘡皆鼻中生瘡鼻梁塌壞並見(本門)

黃芩散 治肺火盛鼻孔乾燥或生瘡腫痛片芩酒炒梔子連皮酒炒桔梗赤芍藥桑白皮
麥門冬荆芥穗薄荷連翹各一錢甘草三分右剉作一貼水煎食後服(回春)

洗肺散 治鼻中生瘡片芩酒炒二錢五味子天門冬麥門冬杏仁各一錢甘草五分右剉作一貼入薑五片水煎食後服(回春)

鼻精 鼻痛者因風邪與正氣相搏鼻道不通故為痛宜人參順氣散通氣驅風湯(並見風門)
如痰火衝肺鼻痛隱痛二陳湯(方見痰飲)加片芩梔子桔梗麥門冬煎服(入門)

鼻臄 鼻臄者鼻之準頭紅也甚則紫黑酒客多有之因血熱入肺鬱久則血凝濁而色赤或有不飲酒而紅
者名曰肺風瘡亦是血熱入肺俱宜清血四物湯兼服梔子仁丸外用硫黃散(入門)○肺之為藏其

位高其體脆性惡寒又惡熱是故好飲熱酒者始則傷于肺藏鬱熱久則見於外而為鼻臄準赤之候
得熱則紅得寒則黑(正傳)○酒齆鼻乃熱血入肺(正傳)○酒齆鼻及肺風瘡以白龍丸逐日洗面

常服龍虎丹半月靈潔(直指)○酒影宜凌雪花散
參歸丸○肺風瘡宜肺風丸升麻湯清肺飲子一方

清血四物湯 治酒臄川芎當歸赤芍藥生地黃片芩酒炒紅花酒焙赤茯苓陳皮各一錢
生甘草五分右剉作一貼入薑二片煎水調五靈脂末一錢食後服(回春)

梔子仁丸 治酒臄老山梔子仁為末黃蠟等分密化和
丸彈子大茶清嚼下忌熱物半月效(得效)

硫黃散 治鼻臄生硫黃五錢杏仁二錢半輕粉一錢
右為末酒調臨臥塗之明早洗去(回春)

白龍丸 治酒臄滿面紫黑川芎蒿本細辛白芷甘草各等分右末四兩入煨石膏
末一斤水丸彈子大逐日用此藥洗而如澡豆法或夕塗晨洗之(丹心)

凌雪花散 治酒臄鼻不三次可去根凌雪花山梔子
等分為末每二錢食後茶清調下(得效)

參歸丸 治酒臄乃血熱入肺苦參四兩當歸二兩右末
酒糊和丸梧子大熱茶清下七八十九(醫鑿)

肺風丸 治面鼻風瘡及臄臄細辛旋覆花羌活各二兩晚蠶蛾天苦參
各一錢右末軟飯和丸梧子大食後茶清下五七十九(東垣)

升麻湯 治肺風瘡陳皮甘草各一錢蒼朮乾葛桔梗升麻各七分赤芍藥大黃酒蒸各五分半夏赤茯苓
各三分枳殼乾薑各二分右剉作一貼入薑三片燈心一撮同煎服(丹心)

清肺飲子

治鼻紅肺風痘毒荷一兩山茶花胡麻仁片芩酒炒梔子芫花苦參甘草各七錢連翹荆芥芍藥防風各三錢右爲末每二錢茶清調服後用探藥(醫鑿)

搽鼻去紅方

白礬水銀京墨各一錢杏仁四十九個輕粉七分白楊葉十個大風子四十九個五味子四十九粒核桃七個右爲末雞子清調搽患處(醫鑿)

面鼻紫黑

面爲陽中之陽鼻居面之中一身之血運到面鼻者爲至清至精之血多酒之人酒氣熏蒸而鼻得酒血爲極熱熱血得寒汚濁凝滯而不行故色爲紫黑治宜化滯血生新血服清血四物湯

方見上(氣弱者加酒黃芪正傳)

鼻涕

詳見津液門

鼻噓

詳見言語門

鼻色占病

靈樞曰鼻頭色青爲痛色黑爲勞色赤爲風色黃者便難也色鮮明者有留飲也○鼻色青腹中痛苦冷者死(正傳)鼻頭微白者亡血也赤者血熱也酒客多有之(三因)

修養

常以手中指於鼻梁兩邊指二三十遍令表裏俱熱所謂灌漑中熾以潤於肺也(養性)○常去鼻中毛謂神氣出入之門戶也(養性)

單方

凡十五種

白鹽

治酒毒和津常擦之爲妙(得效)

白礬

治鼻中瘰肉取枯礬末和豬脂綿裹塞鼻中甚妙(本草)

硫黃

治鼻紅如神硫黃化開入燒酒內淬二次爲末茄汁調敷三次即效(種杏)

雄黃

療鼻中瘰肉取雄黃核大塞鼻中瘰肉自落(本草)

輕粉

治酒毒輕粉硫黃爲末和津唾擦之又輕粉硫黃乳香細辛爲末唾調付之(綱目)

細辛 除腥臭瘰肉與瓜蒂同用爲瓜丁散有人患瘰肉垂出外用此卽消盡(綱目)

芎藭 治鼻多涕或煎或末服並佳(本草)

乾薑 治鼻塞爲末蜜和丸塞鼻中(本草)

辛夷 通鼻塞爲末蔥茶清點服一錢又綿裹塞鼻中(本草)

皂角 治鼻塞夾爲末取少許吹入鼻中又食物入鼻不出以末吹鼻取嚏卽出(本草)

百草霜 治久患鼻痔膿極臭細研爲末以冷水調下二錢(綱目)

瓜蒂 去鼻中瘰肉爲末綿裹塞之或和羊脂或和細辛皆佳(本草)

胡蔓 治瘰肉癢爛塞鼻瘰肉自落(丹心)

犬膽 主鼻齕及鼻中瘰肉取瓜蒂細辛末和胆汁塞鼻卽效(本草)

狗頭骨灰 和網砂少許搗鼻中瘰肉自化(丹心)○歌曰狗頭灰一錢木香半錢上細研吹鼻中瘰肉化爲水(類聚)

針灸法 鼻流清涕濃涕灸上星二七壯又取人中風府不愈又取百會風池風門大頰(綱目)○鼻塞不聞香臭取迎香上星合谷不愈灸人中風府百勞前谷(綱目)○鼻流臭穢取上星曲差合谷人中迎

香(綱目)○鼻中瘰肉取風池風門風府人中和中(東垣)○鼻涕多宜灸頰會前頂迎香(資生)

口舌

口曰玉池 黃庭經曰玉池清水灌靈根註曰玉池者口也清水者津液也靈根者舌也

舌屬心 內經曰心在竅爲舌又曰心氣通於舌心和則舌能知五味矣○舌者心之苗也(入門)○舌爲心

之津液出於舌端分布五臟心實主之三經爲四氣所中則舌卷不能言七情氣鬱則舌腫不能語至如心熱則舌破生疔肝壅則出血如湧脾閉則白胎如雪此舌之爲病也(得效)

口昇脾 內經曰中央黃色入通於脾開竅於口故病在舌本又曰脾主口又曰脾在竅爲口○羅經曰脾

氣通於口脾和則能知五味矣○心主舌脾主唇口心脾二氣恆相通也(入門)○唇屬脾風則

則動寒則振縮熱則乾裂血虛則無色氣鬱則疔腫唇有病

脈法 左寸洪數心熱口苦右寸浮數肺熱口辛左關弦數胆虛口苦洪實則肝熱口酸右關沉實脾熱

口舌主五味 心氣通於舌能知五味脾氣通於口亦能知五穀之味○口之味熱勝則苦寒勝則鹹宿食則

乎口(得效)○傷胃陽虛則口中無味傷腎陰虛則口中有味(入門)○龍腦雞蘇元

口酸 肝熱則口酸木乘脾口亦酸小柴胡湯(方見寒門)加

草龍胆青皮甚者宜當歸龍薈丸(方見五藏入門)

口苦 心熱則口苦或生疔宜涼膈散(方見火門)瀉心湯(方見五藏)肝移熱於胆則口亦苦宜小柴胡湯

上溢而口爲之苦○又曰肝氣熱則胆泄口苦筋脈乾釋曰肝主謀慮胆主決斷盛汁三合胆或不

決爲之急怒則氣上逆胆汁上溢故口苦宜龍胆瀉肝湯主之(綱目)○口苦宜益胆湯(正傳)

口甘 脾熱則口甘或臭宜瀉黃散(方見五藏)三黃湯(入門)○內經曰有病口甘者

病名爲何此五氣之溢名曰脾瘿瘰者熱也○胃熱則口甘胃虛則口淡(入門)

口辛 肺熱則口辛宜甘桔湯(方見咽喉)瀉白散

口鹹 腎熱則口鹹宜滋腎丸(方見小便)

龍腦瀉肝湯 治口苦柴胡一錢黃芩七分生甘草人參天門冬黃連草龍胆山梔仁麥門冬知母各五分五味子七粒右剉作一貼水煎空心服忌辛熱物(綱目)

益膳湯

治謀慮決胆虛氣上溢口苦黃芩人參甘草各一錢遠志七分官桂五分苦參茯苓各三分右到作一貼水煎服(河間)

三黃湯

治脾熱口甘黃連黃芩梔子石膏芍藥枳椇陳皮茯苓各八分白朮甘草各三分右到作一貼入烏梅一個水煎服(同春)

加減瀉白散

治肺熱喉腥白皮二錢桔梗一錢半地骨皮甘草炙各一錢黃芩麥門冬各五分五味子十五粒知母七分右到作一貼水煎服日二忌酒麪辛熱之物○一人膏梁喜飲因勞心過度肺氣有傷以致氣出腥臭唾稠

枯口苦舌乾服此而愈(寶鑑)

口臭

口臭者胃熱也○虛火鬱熱結於胸中乃作口臭宜芩芷膏(入門)○口臭一證乃熱氣蘊積胸膈之間挾熱而衝發於口也(直指)○心勞味厚氣出腥臭宜加減瀉白散方見上○多食肉人口臭不可

近且神功丸

(方見牙齒)○胃熱口臭宜龍腦難蘇丸(方見血門)加減甘露飲升麻黃連丸○吐膿血如肺癰狀口臭他方不應宜消風散(方見風門)入男子髮灰清米飲調下兩服可除(丹)○一

人病口臭如登則雖成莫肯與對語戴人曰肺金本主腥金爲火所乘火主臭肺便如是也久則成

腐腐者肺也此亢極則反兼水化也病在上宜涌之以茶調散(方見吐門)吐之去其七分夜以舟車

丸(方見下門)下五七

行比朝而臭斷(子和)

芎芷膏

治口氣熱臭川芎白芷等分爲末蜜丸炎實大每一丸臨臥嚼和(得效)

加減甘露飲

治胃熱口臭口瘡牙宜熟地黃生地黃天門冬黃芩枇杷葉茵陳枳殼石斛甘草各一兩犀角三錢右爲末每二錢水煎服此方有犀角一味甚有道理有奇效(本事)

升麻黃連丸

治口臭穢惡人不得近黃芩酒洗二兩黃連一兩生薑取汁蓮花青皮升麻各五錢生甘草三錢白檀香二錢右爲末蒸餅和丸彈子大每一丸細嚼白湯下(正傳)

口糜

口糜者口瘡糜爛也(入門)○內經曰勝脫移熱於小腸隔腸不便上爲口糜宜移熱湯柴胡地骨皮湯○藏府積熱口舌生瘡宜局方涼膈散(方見火門)回春涼膈散亦可○口舌生瘡宜玉芝飲子升

及天花粉末移之白者肺熱宜沒藥散青金散及黃柏菴撥爲末移之良久以水漱口(入門)○口舌

疔瘡藥見下

可擇而用之

移熱湯

治口糜心胃壅熱口瘡糜爛導赤散(方見五藏)合四苓散(方見大便)各等分煎服內經曰勝脫移熱於小腸上爲口糜好飲酒人多有此疾(綱目)

紫胡地骨皮湯治勝熱小腸上爲口糜柴胡地骨皮各二錢半右剉作一貼煎服(河間)

回春涼厥散治三焦火盛口舌生瘡連翹一錢二分黃芩梔子桔梗或連薄荷當歸生地黃枳殼赤芍藥甘草各七分右剉作一貼水煎服(回春)

玉芝飲子治服熱口舌生瘡咽喉腫痛甘草炙二兩藿香葉石膏煨梔子仁各一兩右爲末每一錢新水調下(東垣)

升麻散治心脾有熱口舌生瘡破裂升麻立參川芎生地黃麥門冬各一錢大黃黃連黃芩甘草各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服(直指)

鵬砂丸治口舌生瘡口臭寒水石二兩半鵬砂五錢馬牙硝一錢龍腦麝香各五分右爲末以甘草五錢浸汁熬膏搜和作丸奕實大合鹽津下或取末搽之(直指)

黑參丸治口舌生瘡連年不愈玄參天門冬麥門冬右等分爲末蜜丸彈子大每嚥化一九(丹心)

虛火口瘡口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛上先用理中湯(方見寒門)甚者加附子(丹心)陰虛者四物湯(方見血門)加知母黃柏虛火泛上甘草乾薑爲末細嚼之(入門)

腎腫腎瘡宜瀉胃湯慧苡仁湯芍藥湯○唇舌焦燥口破生瘡蓋心脾受熱所致也水浸黃連重湯挑而飲之若大瀉少飲竹葉石膏湯(方見寒門)○直指)唇瘡久不差八月藍葉搗取汁洗不過三日差

(丹心)○又白荷花瓣貼之神效如開裂出血者即止(丹心)

瀉胃湯治胃實熱唇口乾裂煩渴便祕大黃二錢半葛根一錢桔梗枳殼前胡杏仁各五分右剉作一貼入生薑三片水煎服(入門)

慧苡仁湯治風腫在脾唇口動動慧苡仁防己赤小豆炒甘草炙各一錢半右剉水煎服(得效)

芍藥湯治脾火口唇生瘡或多食易飢亦芍藥梔子黃連石膏連翹薄荷各一錢甘草五分右剉作一貼水煎服(回春)

寶唇方見五藏)瀉黃飲子腫者慧苡仁湯(方見上)兼用黃柏散白灰散傳之(濟生)○外用青皮燒灰

豬脂調搽仍將青皮灰末每一錢酒調服之(入門)○亂髮驚蜂房六畜
毛燒灰豬脂調搽(得效)○又蛇蝎皮或蟻蟻燒為灰豬脂調搽(得效)

瀉黃飲子

治風熱蘊於脾經唇燥潰裂無色升麻白芷枳殼黃芩防風半
夏石斛各一錢甘草二分右剉作一貼入薑五片煎服(濟生)

黃相散

治唇重黃柏二兩以五倍子密陀僧各二錢甘草二分為末水調塗黃柏上炙
乾再塗再炙藥盡為度然後將拍作薄片臨臥貼唇上天明即愈(入門)

白灰散

治唇上白布作燈炷如指大安斧刃上燃炷令汗出拭取
付唇上日二三度故青布亦佳豬脂調付尤佳(得效)

舌腫

滿口氣不得吐者名曰木舌(入門)○木舌心脾熱藥也(入門)○木舌者舌腫大漸漸腫硬
滿口不急治即塞殺人也(綱目)○木舌者舌腫硬不和軟也百草霜芒硝滑石為末酒調搽之(丹

心)○木舌治法用紫雪二錢(方見火門)竹瀝和勻頻抹口中自消(綱目)○諸般舌腫脹取龍腦
破毒散(方見咽喉)半錢以指蘸藥擦舌上下嚥津下(丹心)○一老人舌根腫起漸至滿口勢甚凶

戴人曰血質者宜決之以鐵針日破八九次出血約二三盞漸覺腫消痛滅夫舌者心之
外候心主血故血出而愈(子)和○舌腫宜黃連湯清熱如聖散琥珀犀角膏霜鹽散

黃連湯

治心火舌上生疔或舌上腫燥裂或舌尖出血或舌硬黃連酒炒梔子炒生地黃酒洗麥
冬常歸酒洗赤芍藥各一錢犀角薄荷汁各五分右剉作一貼水煎食後服(回春)

清熱如聖散

治舌下腫如核大破出黃痰後復發者連翹一錢半惡實黃連各一錢天花粉梔子仁各七
分枳殼柴胡荆芥薄荷各五分甘草三分右剉作一貼入燈心一團水煎稍冷服(回春)

琥珀犀角膏

治咽喉口舌生疔菌其效如神酸棗仁茯神人參各二錢犀角琥珀朱砂各一錢龍
腦一字右細末蜜丸彈子大每一丸以麥門冬煎湯化服一日用三五丸(入門)

霜鹽散

治舌忽腫大百草霜青鹽等分為末井水
調塗舌上無青鹽則白鹽亦可(入門)

重舌

附舌根而重生小舌謂之重舌針刺去黑血即愈(入門)○舌根下生形如舌而小謂之重舌其著煩
裏及上腭如此者名曰重聘其著齒銀上如此者名曰重銀皆刺之去血可也(綱目)○重舌者心脾

熱盛也宜青黛散(入門)○舌腫滿口不能飲食不通名曰重舌蒲黃頻繆思慮調竹瀝尤妙黃連
煎湯頻呷之以瀉心火(入門)○黃柏末以竹瀝調塗又百草霜焙硝滑石末酒調搽之(入門)○重

舌用如聖勝金錠(方見咽喉)以開關竅(得效)○
重舌紫雪(方見火門)和竹瀝塗之嚥其汁(綱目)

青黛散

治重舌黃連黃柏各三錢青黛馬牙硝朱砂各六分雄黃牛黃麝香各三分龍腦一分右爲末先以薄荷汁拭口中以藥末摻之咽喉腫亦佳(入門)

重舌擦法

重舌極證用指去爪先於舌下筋上擦至根漸漸深擦入如此三次又用指蘸水取頂後燕窠小坑中筋自上趕下至小屈深擦入亦二次小兒若飲乳勝前則病去矣(得效)

木舌 與舌腫

同治

舌衄 詳見

舌長 舌短 舌吐不收名曰陽強舌縮不能言名曰陰強(醫鑑)○傷寒熱病後犯房得病名曰陰陽易舌出數寸而死(仲景)○傷寒熱病後舌出寸餘累日不收以片腦爲末摻舌上應手而縮須用五錢

方愈(醫說)○一婦因產子舌出不能收周真見之以朱砂傅其舌令作產子狀以兩女扶掖之乃于壁外置瓦盆墮地作聲聲聞而舌收矣(入門)○足厥陰氣絕則舌卷而短厥陰者肝也肝主筋聚于

陰器而絡于舌本故肝絕則舌卷即縮(靈樞)

舌上生胎

舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒邪氣在表者舌即無胎及邪氣傳裏津液結滯則舌上生胎矣(明理)○舌上胎滑者以丹田有熱胸中有寒邪氣初傳入裏也(仲景)○寒變爲熱則

舌上之胎不滑而澀是熱耗津液而滑者已乾也若熱聚於胃則爲之舌黃金匱曰舌黃者下之黃自去若舌上黑色者又爲熱之極也靈樞曰熱病口乾舌黑者死心開竅於舌黑爲腎水水火相刑故知

必死(明理)○腎虛有火是爲無根虛火舌色淡黑一二點用補腎降火之藥(入門)○舌胎用擦舌法○凡舌黑俱系危證惟冷而滑如淡墨然者乃無根之火也(入門)

擦舌法

舌胎白而滑生黃蘗蜜擦之或以生薑蜜水洗之若舌胎黃赤燥澀者取新青布裹指蘸冷水頻頻擦之輕者易脫重者難脫必須大下之津液還而胎自退矣(入門)

舌生芒刺

舌生芒刺結熱甚也(入門)○舌生紅粟紫雪(方見火門)和竹瀝塗之(入門)○勞心舌生瘡菌宜琥珀犀角膏(方見上)○脾熱舌胎乾澀如雪宜薄荷蜜水稻丸(入門)○舌燥澀如楊梅

刺者生薑切厚片蘸蜜於舌上搽之其刺立消神效(東垣)

薄荷蜜

治舌上生瘡或白胎乾澀如雪語話不真薄荷自然汁與白蜜等分調勻傅之良先以生薑厚片蘸蜜水措洗後付藥(三因)○生薑蜜水措洗後用朱砂雄黃麝腦各少許爲末傅亦良(

得效

冰藥丸

治口舌生瘡粟黃柏薄荷腦砂各等分龍腦減半右爲末蜜丸彈子大噙化(入門)

口舌寸數

唇至齒長九分口廣二寸半齒以後至會厭深二寸半大容五合舌重十兩長七寸廣二寸半(靈樞)

失欠股頰

凡欠伸頰車蹠跌但僕不能合以酒飲令大醉睡中吹皂角末搗其鼻令嚏即自正(三因)○因欠輔車蹠不得張口一人以兩手牽其頰以漸推之則復入矣當疾出其指恐咬傷(得效)○輔

車開不可合南星爲末薑汁調付以帛縛合二宿而愈去風也(得效)○頰骨脫令患人坐定用手揉臉百十遍將患人口張開用兩大梅指入患人口內拿定牙外用兩手指將下頰往上兜即入口正矣

(醫林)○治人呵欠口不能閉及卒然牙關緊急水不能入以致不救即取鹽梅二取個肉擦牙即當口開若不能合再用鹽梅肉擦兩牙注候開合當止却服治風藥(十三方)

自嚼舌頰

靈樞曰帝問人之自嚼舌者何氣使然岐伯曰此厥逆走上脈氣皆至也少陰氣至則嚼舌少陽氣至則嚼頰陽明氣至則嚼唇○神聖復氣湯(方見胸部)治咬頰咬唇咬舌舌根強硬如神(垣)

東垣

口流涎

詳見津液門

口噤不開

詳見風門

視腎舌占病

脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母母子皆虛不能相營故名曰怯肺主唇唇白而光澤者吉白如枯骨者死(錢乙)○血氣虛怯爲冷所乘則唇青又額黑唇青爲寒(錢乙)○足太陰氣

絕則唇反唇反者死唇者肉之本唇反者肉先死也(靈樞)○舌卷而短若唇青卵縮者必死肝絕故也(綱目)○傷寒熱病口如魚口不能復閉而氣出多不反者死(扁鵲)○病人口張者三日死(扁鵲)

○病人唇反人中滿者死(扁鵲)○舌本爛熱不止者逆(得效)○唇口俱腫赤者是熱極也唇口俱青黑者是寒極也(回春)

小兒口舌病

小兒口瘡難用藥以大南星取中心龍眼大爲末醋調塗兒腳心甚妙(綱目)○白礬或吳茱萸爲末鹽調塗心亦效(綱目)○小兒口瘡黃柏青黛等分片腦少許爲末竹瀝調付之(一)

入門) ○乳母宜服瀉心湯方(見五藏) 涼膈散(方見火門) ○小兒口瘡薄荷汁拭口內西瓜水徐徐飲之(入門) ○巴豆肉一粒搗爛黃丹少許和捏作餅外用紙護貼眉心字刻許去之立效(丹心) ○重舌木舌依上法治之 ○小兒弄舌者脾藏有微熱令舌絡微緊故時舒舌出也瀉黃散(方見五藏) 徐徐服之若大病後弄舌者凶(錢乙)

口舌瘡糝付藥宜赴宴散兼金散黃白散綠袍散碧雪換金散龍石散乳香散沒藥散青金散

赴宴散治口瘡五倍子一兩黃柏蜜炙紫色滑石各五錢右為末每取半錢糝口內奇效(滯寮) ○又方治赤白口瘡黃柏青黛密陀僧等分為末糝之(丹心) ○又方治口瘡癢痛黃連黃柏黃芩梔子

細辛乾薑各等分為末先以米泔漱口後○之(回春) ○又方細辛黃柏炒等分為末糝口內吐涎即差(丹心)

兼金散治熱毒生口舌瘡黃連細辛等分為末先以布巾蘸水拭淨患處乃糝藥吐涎即愈(三因)

黃白散治口瘡并口中瘡瘡如神黃柏孩兒茶枯白礬各等分為末先以冷米湯漱口乃○之(回春)

綠袍散治口瘡黃柏蜜炙一兩青黛三錢片腦二分右為末糝患處吐出涎即愈(醫案)

碧雪散治口舌生瘡舌強腮腫喉閉蒲黃青黛鴨砂焙焙甘草各等分為末以手指摩於口中嚥津下(得效)

換金散治毒熱口瘡乾薑黃連等分為末○瘡上初若不堪應手即愈(得效)

龍石散治口舌生瘡咽喉腫塞寒水石三兩朱砂一錢半片腦二分右為末糝患處日三五次

乳香散治赤口瘡乳香沒藥各一錢白礬半錢銅綠少許右為末糝之(綱目)

沒藥散治白口瘡乳香沒藥雄黃各一錢輕粉半錢巴豆霜右少許為末糝之(綱目)

青金散治白口瘡急惡狀如木耳五倍子青黛各四錢為末油調貼瘡上喉中瘡爛以竹管吹入有涎吐之(丹心)

口舌瘡外治法 宜茶葉散如聖散

茶葉散 治口瘡及咽喉與茶葉地龍等分爲末米醋入生麴調塗足心神效(得效)○或只用茶葉爲末水調付足心亦愈(得效)○治滿口生瘡草烏兩星各一個生薑一塊每爲末每二錢醋調塗臥

時貼手足心 便愈(本事)

如聖散 治小兒口瘡不能吮乳巴豆一粒或二粒去皮研爛不去油入朱砂黃丹各少許付紙上剝開兒顛上髮貼在顛門上如四邊起粟米泡使用溫水洗去藥更用薑蒲水洗之便安如神(簡見)

濯足法 治下虛上壅口舌生瘡白礬二三兩爲末用熱湯化以浸足半日即效(丹心)

化毒法 凡口瘡無間新久夜臥將自己兩丸以手左右交揉三五遍睡覺行之三五度便差(東垣)

酒客喉舌生瘡 詳見內傷

諸蟲入口 詳見救急

補舌斷方 治大人小兒偶含刀在口割斷舌頭已垂落而未斷用雞子白軟皮袋了舌頭用破血丹蜜調塗舌根斷血却以蜜調蠟稀稠得所敷在雞子皮上蓋性軟能透藥性故也常動添敷三日舌接住

方去雞子皮只用蜜蠟敷七日全安(醫林)○自行被跌仆穿斷舌心血出不止以鴉翎蘸米醋頻刷斷處其血即止仍用蒲黃杏仁鵬砂少許爲末蜜調成膏噀化而安(入門)○治舌頭被人咬去取

粉鷓砂五味方也(回春)○補唇舌方用鮮蟹燒灰每二錢同乳香沒藥各二錢半塗之即生肉如多去唇舌用川烏草烏爲末攤紙一條以涼水調合貼之即不覺疼可用刀

取如流血以陳石灰塗之即止愈後舌硬用白雞冠血點之即軟(醫案)

破血丹 天花粉三兩赤芍藥二兩薑黃白芷各一兩右爲末每用少許乾綿或蜜調塗之(醫林)

單方 凡三十種

白礬 治口瘡熱水半碗入白礬一撮待溫漱口數次
愈(種杏)○生白礬爲末付之亦效(丹心)

膽礬 治口瘡取礬火煨爲末付瘡上吐涎便差(本草)
○胆礬一塊百沸湯泡開含漱即差(綱目)

百草霜 舌卒腫如猪泡狀滿口不治即死以霜細研醋調塗之立差(丹心)○治舌忽然腫
破釜底墨研細醋調塗舌上下脫去更付入鹽尤佳先針快出血付藥尤妙(綱目)

井華水 治口臭正朝取水含口吐
置刷牙數度即差(本草)

鵬砂 治舌腫脹出口鵬砂爲末生薑片蘸藥揩腫處即退(綱目)○
口瘡鵬砂焙焙含口中以南星爲末醋調貼足心神效(正傳)

馬牙硝 治重舌取硝爲末付
舌下日三(本草)

升麻 治口瘡及口氣疳惡濃煎
湯入鹽類類含漱(本草)

細辛 治口臭及齒齒腫痛煮取濃
汁熱含冷吐即差(本草)

黃連 治口舌生瘡以好酒煮黃
連取汁呷下立愈(丹心)

蒲黃 治重舌及舌生瘡微炒糝之即差(本草)○舌腫大
滿口真蒲黃類糝舌上且呷黃連湯瀉心火(正傳)

益智 治心氣不足口臭益智去殼加甘草
爲末乾嚥下或沸湯點服(得效)

茴香 除口臭臭取苗莖煮作羹
飲及生食並得(本草)

射干 療老血在心脾間咳唾言語
氣臭取根煮湯飲之(本草)

香薷 治口臭甚搗丁香不及焉煮
取汁或飲或漱爲妙(丹心)

五倍子 治口瘡爲末糝之便可飲食(本草)○口瘡癢痛五倍子一兩蜜炙黃柏滑石各五錢銅綠二錢麝香二分半爲末糝之極效(正傳)○治緊唇五倍子阿子肉等分爲末付貼唇上立效(丹心)

薔薇根 治口舌生瘡爛久不差濃煎汁稍積含漱溫
含冷吐即效冬取根夏取莖葉用(本草)

白楊樹枝 治口瘡取枝漿水煎
和鹽含漱(本草)

檳榔 治口吻生瘡白爛者燒灰入
輕粉少許乾糝之(得效)

黃柏 治口瘡如神蜜炒爲細末塗之(湯液)○黃柏醋漬含之亦愈(本
草)○心脾熱舌頰生瘡蜜炙黃柏與青黛爲末糝之差(本草)

苦竹葉及瀝 治口瘡煎葉湯漱口
取瀝塗之(本草)

蜜 療唇口瘡常
含之(本草)

蠅 治口瘡以好墨研蠅蝻細付之立效蓋
蠅蝻走小腸膀胱其效甚速(綱目)

蛇蛻 治緊唇及重脣重皸燒
爲末先拭後付(本草)

白梅 治口臭常含之可
以香口(本草)

柚子 治飲酒人口臭可啖
之又煎湯飲(本草)

甜瓜 主口臭甜瓜子作末蜜丸櫻桃大每朝淨
漱含化一丸○口瘡嘔瓜中汁(本草)

西瓜 治口瘡取瓜中漿徐飲之冬
月則取皮燒灰含之(丹心)

人乳汁 老人患口瘡不能食飲
人熱乳甚良(本草)

亂髮灰 治口臭不可近亂髮灰一錢并花水調下空

羊乳 主小兒口瘡爛取乳常常含

草麻子 治舌腫脹出口取油煎紙

紫蘇葉 治飛絲入口舌間生泡取葉

針灸法 口瘡取承漿合谷人中長強又取金津玉液各出血(綱目)○又取委中瀉後谿此二穴乃心火腎

液各以三稜出血又取天突少商然谷風府(綱目)○舌卷取液門二間(綱目)○舌縱涎下取陰谷

泉穴禁針(回春)○緊唇不能開合灸手虎口男女左右又灸承漿三壯(得效)○凡舌腫舌下必有

傍太脈血出即消切勿刺中央脈血不止則死若誤刺以銅筋火燒烙

之或醋調百草霜塗之須臾自消此患人多不識失治則死(得效)

牙齒

齒者骨之餘 齒者骨之餘腎主營養呼吸之門戶也(得效)○齒者骨之所終髓之所養腎實主之

上下齟齬手足陽明 止而不動下齟齬物動而不休手陽明大腸之脈所貫絡也(東垣)

齒病惡寒惡熱 靈樞曰胃惡熱而喜清冷大腸惡清冷而喜熱○足陽明胃絡脈入齒上縫其病喜寒飲而

疼怕熱水不怕冷熱乃風牙痛(入門)○胃有實熱上齒痛尤甚宜涼膈散(方見火門)大黃酒蒸為

下片牙痛屬手陽明虛熱有風宜白芷湯(醫

鑒)○微惡寒飲大惡熱飲宜立效散(東垣)

細辛湯 細辛一錢半 蔓刺子鼠粘子各一錢 升麻黃連防己各七分 黃柏知母並酒炒各五分 薄荷二分 葶藶一分 右剉作一貼 水煎服(醫鑿)

白芷湯 防風荆芥連翹白芷薄荷赤芍藥石膏各一錢 右剉作一貼 水煎服(醫鑿)

立效散 治牙齒痛不可忍 微惡寒 飲大惡熱 飲草龍胆酒洗三錢 防風一錢 升麻七分 甘草五分 細辛三分 右剉作一貼 水煎去滓 以匙抄在口中 漱痛處少頃 卽止 如多惡熱 飲加龍胆一錢(東垣)

牙齒盛衰 內經曰 女子七歲腎氣盛 齒更髮長 三七腎氣平均 故真牙生而長 極丈夫八歲腎氣實 髮長齒更三八腎氣平均 故真牙生而長 極五八腎氣衰 髮墮齒枯 八八則齒髮去去 謂落也 ○兒生八

月板齒始生 真牙謂牙床 窮處最後生者也(類聚)

牙齒異名 口前兩大齒謂之板齒 其兩傍長者謂之牙通 謂之齒 其牙齒之根謂之齦 亦曰牙床(類聚)

脈法 右關脈洪數或弦而洪 腸胃中有風熱 牙痛尺脈洪大而虛者 腎虛主齒動 疎裕相火上炎而痛(醫鑿) ○齒痛腎虛尺濡而大火炎尺洪 疎搖搖壞 右寸關數或洪而弦 此屬腸胃風熱多涎(回春)

牙齒痛有七 牙齒之痛 因胃中濕熱 上出於牙齦之間 適被風寒 或飲冷所鑿 則濕熱不得外達 故作痛也 寒是標 故外用辛溫擦漱之藥 熱是本 故內服辛涼散熱之劑(丹心) ○通用擦牙方 謝傳笑

去散(方見下) ○手陽明之支脈入齒 壅則齒浮 虛則宜薰 挾風則上攻 頭面疔腫 則變成齶脫(直指) ○齒病有開口 呷風則痛甚 者胃中有風邪 也有開口 則臭穢 不可近者 腸胃中有積熱 也有齒

根腫而痛者 胃熱也 有痛而動搖者 腎元虛也 有孔而痛者 虫蝕也(醫鑿) ○呷風痛甚 開口臭穢 俱宜當歸連翹飲(回春) ○寒者堅牢而痛 熱甚則齒動 齒齦袒脫 作痛不已(東垣) ○得清涼痛甚者

爲寒口吸涼風 痛止者 爲熱(綱目) ○齒痛有風熱 風冷熱痛 寒痛 毒痰 瘀血 虫蝕

風熱痛 風熱者 外風與內熱相搏 齒齦腫痛 膿汁臭穢 宜犀角升麻湯(方見面門) 兼以荆芥湯含漱(入門)

風冷痛 風冷者 齒齦不腫 不蛀 日漸動搖 宜溫風散 兼以開笑散含漱(入門)

熱痛 熱痛者 腸胃積熱 齒齦腫爛 口氣臭穢 宜涼驅散(方見火門) 加知母石膏升麻爲佐 酒蒸大黃爲君 熱痛 噤噤卽愈(東垣) ○如濕熱被風冷鬱 而作痛 宜當歸龍胆散(入門) ○久年齒痛 黑爛脫落 必吸涼

積止乃膏梁濕熱之火調胃承氣湯(方見寒門)加黃連下之(入門)○胃熱齒痛喜冷惡熱宜清胃散
散高胃湯滋陰清胃丸○一婦人齒痛極苦須騎馬外行吸涼風則痛止至家則痛復作此陽明濕熱

之盛調胃承氣湯加黃連下三五行外用鐵鬼散擦
牙即愈(東垣)○酒客牙疼以冷水類含漱(入門)

寒痛客寒犯腦頭連齒痛宜羌活附子湯(方見頭部)蠟梢散細辛散○冷證齒痛宜香椒散
方見下)○寒熱皆痛者為寒熱痛宜當歸龍胆散(東垣)○此證與厥逆頭痛同當參看

毒痰痛熱則生痰毒氣上攻灌注經絡最能發痛外證痰盛咳嗽(直指)○宜二陳湯(方見痰飲)加細
辛枳殼生薑大棗烏梅煎服仍以薑黃華蓋等分煎湯候溫以舌浸湯內涎自流出效(直指)

瘀血痛風熱挾攻鐵間令血出瘀滯不消掣痛鑽刺宜犀角地黃湯(方見血門)或加減甘露飲(方見上)
加升麻(入門)○取五靈脂醋煎汁含嚥即效(得效)○齒痛頻數年不愈當作陽明蓄血治之桃

仁承氣湯(方見寒門)細末蜜丸梧子大服
之好飲過多者多得此疾屢服有效(海藏)

蟲蝕痛凡人飲食不能潔齒腐臭之氣淹漬日久齒齦有孔虫蝕其間蝕一齒盡又度其餘至如疔瘻皆其
種類必殺虫而後痛止(直指)○齒病變成骨槽風出血骨露者宜玉池散(入門)○齲者齒齲也

明齒虫蝕而痛也(本事)○虫痛宜一笑散
椒鹽散蜂窩散定痛散)兼用取牙虫法

當歸連翹飲治齒痛呷風痛甚開口臭穢當歸生地黃川芎連翹防風荆芥白芷羌活黃
芩梔子枳殼甘草各七分細辛三分右到作一貼水煎服不拘時(回春)

溫風散治風冷齒痛常歸川芎細辛白芷薑椒薑本露
蜂房各一錢右到水煎服仍含漱吐之(入門)

清胃散治胃熱上下齒痛不可忍牽引頭脹滿面發熱其痛喜冷惡熱升麻二錢牡
丹皮一錢半當歸生地黃黃連各一錢右到作一貼水煎服冷服(東垣)

瀉胃湯治牙痛如神此胃熱也當歸川芎赤芍藥生地黃黃連牡丹皮
梔子防風荆芥薄荷甘草各一錢右到作一貼水煎服(回春)

滋陰清胃丸治陽明經血熱上下牙床腫痛紅爛肉縮齒根露者石膏煨醋淬二兩當歸酒洗生地黃酒
洗梔子鹽水炒牡丹皮各一兩黃連酒炒知母葛根防風各七錢升麻白芷各五錢生甘草

節四錢右為末蒸餅和丸
豆大米飲下百丸(回春)

定痛散 治虫牙痛甚當歸生地黃細辛乾薑白芷連翹苦參黃連川椒
桔梗烏梅甘草各一錢右剉作一貼水煎噙漱後嚥下(回春)

牙齒動搖 齒齦宜露動搖者腎元虛也宜入味丸(方見虛勞)滋陰補腎(入門)○牙齒宜露動搖宜白牙
散香鹽散漱擦(方見下)○齒根動搖宜服還少丹(方見虛勞)獨活散○固齒羊脛骨灰二錢

當歸白芷猪牙皂角青鹽各
一錢爲末擦牙上(得效)

獨活散 治陽明風熱攻注齒齦宜露動痛獨活羌活川芎防風各一錢六分
生地黃荆芥薄荷各一錢細辛七分右剉作一貼水煎服(丹心)

牙齒脫落 牙床腫痛動搖黑爛脫落皆屬手足陽明二經石膏末二匙梔子炒連翹牡丹皮條芩各一錢
羌活散兼用固齒散玉池散(二方見下)

清胃湯 治牙床腫痛動搖黑爛脫落皆屬手足陽明二經石膏末二匙梔子炒連翹牡丹皮條芩各一錢
生地黃酒洗黃連炒各八分升麻白芍藥煨桔梗各七分藜香五分甘草三分右剉作一貼水煎

食遠服
(回春)

神功丸 治多食肉入口臭不可近牙齒疥蝕脫落升麻一錢半藜香葉當歸身藜香木香各一錢黃連
縮砂各五分生地黃酒洗甘草生各三分右爲末蒸餅和丸藜豆大白湯下一百丸(東垣)

羌活散 治風寒濕犯腦痛牙齒齦動搖相脫柴胡五錢廣黃防風各三錢羊脛骨灰二錢羌活一錢半草
豆蔻一錢當歸身六分蒼朮升麻各五分桑本白芷桂枝各三分細辛少許右爲末溫水漱口淨

擦之其痛立
止(東垣)

塞耳鼻止痛方 宜用雄黃定痛膏殺虫丸塞
耳藥哭來笑去散治牙疼方

雄黃定痛膏 治牙痛大蒜二枚細辛煨硝各三錢雄黃一錢猪牙皂角四錠右爲末蒜膏搗爲丸梧子
大每一丸將綿子裹藥左邊牙疼放在左耳中右邊牙疼塞右耳良久痛止神效(綱目)

殺虫丸 治虫牙痛好破爛不拘多少量加黃丹少許以黃蠟熔成一塊旋用旋丸如黃豆大用白綿包裹
留尾如右牙疼則塞右耳左牙疼則塞左耳兩邊疼則塞兩耳必深入耳孔一夜其虫即死永不

復疼矣
(醫案)

塞耳藥

治牙疼取鹽包胡椒末如左邊痛塞右耳右痛塞左耳手掩枕之側臥少頃額上微汗即愈(醫案)

哭來笑去散

治牙齒痛神效雄黃乳香胡椒麝香藜蘆良薑細辛右等分爲末每用少許吹男左女右鼻中立止如牙痛臉腫用紙捲藥末在內作條蘸香油點著燎牙痛處條燒盡痛即止(醫案)

治牙疼方

雄黃沒藥各一錢細辛半錢右爲末若左邊痛用少許搽入左鼻又吹入右耳若右邊痛搽右鼻又吹入左耳(得效)

出牙蟲殺蟲法

治蛀牙小瓦片上置油拌韭子燒烟開在水碗上恰用漏斗覆之以蛀牙受漏斗口中烟其牙內虫如針者皆落水碗中累效(綱目)○治虫牙痛韭菜頭連根洗淨搗爛同人家攤板

上泥和勻搽痛處膠上用紙貼之一時頃取出細細虫在泥上出可以絕根(得效)○治積年虫齒麥草以苦瓠葉三十枚洗露一宿平朝取草屈長二寸廣一寸厚五分以瓠葉裹縛作裹子取醋浸之

至日中取兩裏炮令極熱貼口內齒外裝之冷則易取銅盤盛水洗之得虫多至三四十少則一二十枚老者黃赤色少者白色(千金)○又方黃若子三合盛瓶內將青銅錢十文燒令赤投瓶中候

黃管子作聲有烟出以筆管引烟氣熏於痛齒虫出痛即止無黃若則用葱子韭子亦可出虫(千金)

韭子丸

治虫牙痛韭子全端各一兩乳香雄黃各二錢半右爲末密黃蠟和丸彈子大磁瓶內燒一九以紙蓋口以筆管引烟熏牙孔其虫盡出將藥瓶安於水中其虫撲在水中(千金)

一笑散

治虫牙疼不可忍神效川椒爲末巴豆一粒研成膏和飯作丸綿裹安於蛀孔內即愈(隱仙)

牙齒疔瘻瘡

宜血竭散神功丸(方見上)麝香散玉池散(方見下)治牙疔瘻○天庖疔後牙疔詳見(瘡類)

血竭散

治牙疔惡瘡久不差蒲黃二錢龍骨枯白礬各一錢寒水石煨四錢血竭五分右爲末取少許粉瘡上以紙封貼(丹心)

麝香散

治疔瘻牙齦臭爛出膿水枯白礬青黛胡黃連蘆蒼各二錢半蟻蝦灰半錢麝香二分半右爲末每半錢糝付患處加胡桐淚二錢半尤妙(直指)

治牙疔藥

信硫青黛輕粉各一錢麝香五分右爲末香油攤紙上用木槵槌實收起臨臥以漿水漱淨可瘡口大小以藥紙封之至曉去藥紙漱淨勿嚥三次必效(東垣)

齒黃黑

牙齒黃黑不整淨石膏細末砂鍋細末各二兩零陵白芷青鹽升麻各二錢半細辛一錢麝香半錢右爲細末每早晨取少許擦齒上溫水漱口吐出名白牙藥(丹心)

消齒癰法 眼間勞肉漸長此乃齒壅取生地黃汁一鍾皂角數片火上炙熱淬地黃汁內再炙又淬以汁盡為度晒為末傅之即縮(入門)○一婦人平日好食動風物尤嗜蟹一日齒間塞出肉漸大不能

開口有一道人傳此方即愈或朴硝為末付之亦消(集驗)

牙齒漸長 牙齒逐日漸長開口難為飲食蓋髓液溢所致只服白朮末和水服乃煮水灌漱自愈(得效)

開齒 牙齒被傷打欲落點椒五錢天靈蓋紅內消白芷各二錢右為末齒動移上即安或已落有血絲未斷者亦可搽藥齒齦間之(入門)○治打傷搖動牙齒莖葉根燒灰貼動牙即牢名莖葉散(瑞竹)

齒衄 詳見血門

斷齒 凡人睡中上下齒相磨切有聲謂之齧齒亦曰憂齒亦曰咬齒治法取患人臥席下壓一捻納口中勿令知即差(順聚)○傷寒熱病咬齒及小兒咬牙並見各門

去痛齒不犯手方 取疹牙落不犯手川椒細辛各一兩草烏畢撥各五錢右為細末每少許搽齒自落(本事)○取蛙牙法鴈砂朱砂各一錢礪砂二錢川烏尖七個附子尖十四個煨酥七個

信砒二錢右五月五日合為末取少許搽牙上牙落後以防風荆芥甘草煎湯漱吐(本事)○落牙方馬肉到十兩信砒巴豆肉各五錢為末右拌勻用石器盛候出虫焙乾研末於牙疼處出些血點上隨

落妙(綱目)○取牙方能肝乃藥中陳石灰也鴈膽一個收龍肝納胆內陰乾為末用時宜些少點牙根上即落切忌墜入口中(種合)

落齒重生方 雷公曰長齒生牙賴雄鼠之骨末牙齒若折年多不生取雄鼠脊骨作末搽折處齒立生如故(本草)○牙落重生方雄鼠一部取骨法取鼠剝去皮用硃砂擦上三日肉爛化盡取骨瓦上

焙乾用香附子一兩白芷川芎桑白皮地骨皮蒲公英川椒旱蓮草青鹽川檉皮各三錢右為細末擦百日其牙復生良驗(醫案)○又方取末開眼嫩老鼠三四個外用白芨白芷青鹽細辛當歸熟地黃

各五錢先將五味研為末入地黃搗爛如泥和勻作一餅回老鼠在內外用濕紙包裹文武火燒盡煙絕取出研為末擦上即生牙(醫案)○又方雄雞糞雌雞糞各十四顆右焙乾研末入麝香少許先於

齒不生處以針刺令血出糞藥老人二十日少者十日當出不拘傷損及自落者皆生(千金)○烏雞雄雞各畜收之舊麻鞋底三物燒存性為末入麝香之一月生齒名雄雞散(千金)

食酸齒齕 人老食酸則齒軟謂其水生木水氣弱木盛故如是(本草)○齒齕細嚼胡桃肉解之(本草)

齒病塗擦方 齒痛宜謝傳笑去散香椒散鹹鬼散鴨梢散細辛散當歸龍胆散擦牙方擦牙止痛方腎虛胃熱牙疼方固齒散

謝傳笑去散 治牙齒痛乳香沒藥雄黃胡椒兩頭尖烏藥右等分爲末擦患處吐涎即愈(入門)

固齒散 大鼠一個去肉取骨川椒炒乳香各二兩香附子炒白堊藜炒青鹽各一兩右爲末每月擦牙永無齒病(回春)

香椒散 治冷證齒痛香附子川椒破故紙各二錢單撥一錢右爲末入炒鹽二錢擦牙上(得效)

鹹鬼散 治胃熱齒痛黃連胡桐淚刺芥穗薄荷升麻羊脛骨灰等分麝香少許爲末擦之神妙(東垣)

蝎梢散 治大寒犯腦牙痛羊脛骨灰二錢半麻黃一錢半草豆蔻皮一錢羌活五分桂枝升麻防風藜本黃芪各三分白芷當歸身柴胡各二分全蝎梢少許右爲末擦牙上(東垣)

細辛散 治大寒犯腦頭連齒痛麻黃三錢桂枝羊脛骨灰各二錢半羌活草豆蔻各一錢半當歸四分藜本蒼朮各三分防風柴胡升麻白芷各二分細辛一分右爲末先以溫水漱口以藥擦之(東垣)

當歸龍膽散 治寒熱齒痛升麻麻黃草龍胆黃連草豆蔻各一錢生地黃白芷當歸稍羊脛骨灰各五分右爲末擦之(東垣)

擦牙方 凡牙齒痛必用胡椒搗散能散其中浮熱監以升麻寒水石佐以辛涼薄荷荆芥細辛之類牙痛用清涼藥便痛甚者宜從治之單撥細辛川椒荆芥薄荷樟腦青鹽爲末擦之(丹心)○又方荆

芥薄荷細辛胡桐淚等分麝香少許爲末擦牙熱加馬牙硝冷加川椒(入門)

擦牙止痛方 黃蠶蜂窠一個以川椒填滿其窠更以白鹽一錢封口燒存性入白芷羊脛骨灰各一錢同研爲末先以茶清漱口乃擦之有孔則以藥塞其孔立愈(正傳)

腎虛胃熱牙疼方 羊脛骨灰四兩石膏五兩升麻生地黃各五錢黃連一錢胡桐淚三錢龍胆草半錢右爲末擦牙以水漱去(入門)

齒病含漱方 宜用玉池散荆芥湯開笑散椒鹽散蜂窩散牙疼噙漱藥

玉池散 治風虫牙痛動搖潰爛或變成骨槽風出膿血骨露地骨皮白芷細辛防風升麻川芎當歸槐花蘆本甘草各一錢右到作一貼入生薑三片黑豆百粒煎熱漱冷吐(丹心)

荆芥湯 治風熱齒痛荆芥薄荷升麻細辛各三錢
右爲末每二錢沸湯點含漱吐之(直指)

開笑散 治風冷齒痛白芷細辛良薑車撥川椒香附子露蜂
房各等分右爲末每三錢水煎含漱或擦之(直指)

椒鹽散 治虫牙痛川椒白鹽露蜂房各一錢右
到入葱白三莖煎水熱漱冷吐(直指)

蜂窩散 治風牙虫牙痛不可忍露蜂房白蕤菜川椒艾葉葱根荆
芥細辛白芷各一錢右到水醋同煎熱漱冷吐(回春)

牙疼噙漱藥 蜂房一個每一孔內納胡椒川椒各一粒用碗盛之入水令滿加黃柏如指大三
片於內以碟蓋住用紙封固重湯煮一炷香盡取出候溫噙漱良久吐之(醫案)

修養固齒法 百物養生莫先口齒不漱不洗損齒之媒凡暑毒酒毒常伏於口齒之間莫若時時洗漱之爲
愈也晨興洗畢灌漱一口吐出掌中就草蘸眼自覺光明終身行之可爲妙法(直指)○齒宜

朝暮叩以會神一云以集身神若辛遇凶惡常叩左齒三十六名曰打天鍾若辟邪穢叩右齒名曰龍
天磬若存念至真叩中央齒名曰鳴天鼓(養性)○凡人患齒不能食果菜者皆齒露也爲鹽湯含漱

叩齒神效(類聚)○每晨起以一捻鹽納口中以溫水含措齒及叩齒百遍爲之不絕不過五日齒即
牢密(千金)○凡飲食訖輒以淡茶漱口煩膩既去而脾胃不知凡肉之在齒得茶漱漱不覺脫去而

不煩挑剔也蓋齒性便苦緣此漸堅牢而齒蠹且自去矣(延壽)○食畢漱口數過齒不蛀養生家晨
興叩齒永無齒疾(延壽)○附齒有黃黑色物似爛骨之狀者名爲齒牀治齒者先看有此物即用指

刀掠去之否則齒不著銀也(千金)○一人中乍得風疾上
下齒常磨切相叩甚有聲響緣此得壽一百二十歲(抱朴)

齒病禁忌 齒病勿食油及乾棗(千金)○患齒者忌脂麻油乾棗及桂心若犯之即重發(千金)
○凡人好患齒病多由月蝕夜飲食之所致也所以日月蝕未平時特忌飲食(千金)

視齒色占病 病人唇腫齒焦者死(醫方)○病人齒忽變黑者十三日
死少陰絕也(扁鵲)○病人陰陽俱竭其齒如熟小豆者死(扁鵲)

單方 凡二十七種
有如神散

白礬 治牙齒腫痛枯白礬露蜂房等分爲末
每二錢水煎熱深痛處冷吐之(本草)

雄黃 殺齒虫取爲末和棗肉
作丸塞蛀孔(本草)

膽礬 治虫牙痛○齒痛落盡胆礬末和人乳汁擦病齒
上及孔中日三痛止齒復生百日如故(本草)

白鹽 治齒根宜露動搖以鹽末擦之熱湯含漱百遍不過五日齒即牢固
(本草)○齒鹹鹽湯漱即止(本草)○百荷鹽末擦牙固齒尤良

青鹽 入腎入骨能固齒強喉並佳(得效)○治一切牙疼青鹽二兩白鹽四兩用川
椒四兩煎汁拌炒二鹽爲末擦牙上仍用溫水含漱吐之洗眼尤妙(入門)

升麻 治口齒風腫痛牙根浮爛出
膿血煎服之仍頻含漱(本草)

白堊 治風牙痛及疳蝕爲末二錢入鹽一匙
水煎帶熱含漱大能止痛固齒(入門)

骨碎補 治牙齒痛動搖血出取二兩到炒令黑色爲末鹽漱後揩齒根良久吐之(綱目)○骨碎補銅刀
切片銅鑄炒以槐枝攪至微黑色住火停冷又炒至老黑色研爲末無時擦牙極能堅骨固齒痛

不復作如牙動搖將落頻用
之立住再不復動搖(醫鑿)

細辛 治風冷齒痛又治蛀牙痛細
辛白芷煎湯含漱(綱目)

苦參 治齲齒痛煎湯日漱三升五
六日愈仍灸列缺穴(漢史)

天仙子 卽莨菪子也王齒痛出虫(本草)○虫牙痛當孔咬之虫出(本草)○
虫牙痛天仙子燒烟以竹筒抵牙引烟薰之其虫卽死永差(綱目)

巴豆 治牙疼巴豆一粒煨熟去殼大蒜一瓣剖其中安巴豆合定綿裹隨患處塞左右耳中(本草)○虫
牙痛巴豆肉一粒川椒末一錢右末飯丸麻子大綿裹塞孔中(直指)○治虫牙痛巴豆肉一枚香

油燈上燒過填
入孔中(綱目)

胡桐淚 治風疳齲齒牙疼痛骨槽風勞爲末擦之(本草)○
治口齒爲最要之物(本草)○寒牙痛勿用(綱目)

川椒 堅齒髮除齒痛(本草)○齒痛醋煎含漱吐之(本草)○凡齒痛惟藉川椒麻將熱痛勿用(直指)○牙齒痛川椒露蜂房等分為末每二錢入鹽一匙水煎含漱吐之名如神散(局方)

郁李根 治齒痛堅齒(本草)○齒腫痛郁李根白皮切水煮濃汁含漱冷即易吐出虫即愈(本草)

白楊樹皮 治牙痛醋煎含漱吐之(本草)○齒痛白楊樹皮或葉煎湯含漱吐之(類聚)

露蜂房 治牙齒痛煎湯含漱(本草)○虫痛有孔蜂房細辛煎湯含漱(本草)

啄木鳥 斷木愈齧(淮南)○蛙牙有孔痛啄木鳥舌尖綿裹當痛處咬之立差(本草)○牙齒痛藍啄木鳥燒為末納孔中不過三度差(本草)

蟾酥 主虫牙痛取少許入孔中涎出吐之勿嚥(本草)○牙齒痛蟾酥用銀珠摻和為丸如蘿蔔子大搽上患處便不疼至三九吐濃涎數口便愈(綱目)

蜘蛛指 治牙痛臭脚蛛殼為末入胭脂麝香付之(直指)○又大蜘蛛燒為末麝香付之(直指)

杏仁 牙銀痛杏仁百枚鹽一錢水一升煮令沫出含漱吐之三度差(本草)○杏仁燒研如泥綿裹納齒孔中能殺虫(本草)○風虫牙痛針刺杏仁清油燈上烟熏乘熱搽病齒上連用七個水絕不痛

(得效)

絲瓜 蛙牙痛先以溫水醋含漱出虫又以絲瓜燒存性為擦之(綱目)○風虫牙痛霜殺老絲瓜燒存性為末擦痛處立止(得效)

雜雀屎 主齧齒取屎綿裹塞孔內日一易(本草)

鹿茸 能生齒固齒令不老末服丸服皆佳(本草)

羊脛骨灰 能堅齒治腎虛齒搖動常擦之妙(入門)○牙齒疎豁須用之(丹心)

牛齒 固牙齒取殺牛齒三十枚火煨為末取二錢水煎熱漱冷吐且以末擦之搖動者皆堅牢(本草)

馬夜眼 治風虫牙痛馬夜眼以刀刮起如米大投孔中
或咬在痛處灑出涎勿嚥即差斷根(得效)

鍼灸法

靈樞曰齒痛不惡清飲取足陽明上齒痛亦如之齒痛惡清飲取手陽明下齒痛亦如之○手陽明有入口徧齒者名曰大迎下齒齧取之足太陽有入口徧齒者名曰角孫上齒齧取之(得效)○手

陽明之別名曰偏歷主齒寒痛宜取此(內經)○牙痛牙槽取太谿灸之治上牙齒痛二間灸之治下牙痛委中針之又足內踝兩尖灸之治上牙痛龍玄在列缺上青脈中灸之治下牙痛承漿風府(谷

內庭治上牙痛(綱目)○齒痛灸列缺七壯永不移又灸肩髃七壯又灸耳垂下牙盡骨上三壯(得效)○齒痛以絛量手中指至掌後橫紋折爲四分去二分將一分於橫紋後臂中灸三壯隨左右(得效)

陽谿穴也左疼灸右右疼灸左(賈生)○牙疼百藥不效灸兩耳當三壯立止(回春)○口齒蝕生槍

灸承漿(正傳)

咽喉

咽與喉各異

靈樞曰咽喉者水穀之道也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者音聲之戶也懸雍者音聲之關也○內經曰喉主天氣咽主地氣又曰地氣通於嗑註曰嗑謂咽喉下接連胸中肺兩葉之

間也嗑即咽之低處也咽即嗑之高處也○喉者候也咽者嚥也咽接三脘以通胃故以之嚥物喉通五藏以系肺故以之候氣氣喉殺咽皎然明白(得效)○咽者胃之系喉者肺氣之所通咽以嚥物喉

以候氣理一而分殊也(直指)○咽者嚥物之門戶也(綱目)

咽喉會厭與舌其用不同

咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其用各異喉以納氣故喉氣通於天咽以納食故咽氣通於地會厭管乎其上以司開闔掩其喉則其食下不掩之則其喉

錯必舌抵上齶則會厭能開其喉矣四者交相爲用關一則飲食廢而死矣(子和)

咽喉度數

靈樞曰咽門重十兩廣二寸半至胃長一尺六寸○喉嚨重十二兩廣二寸長一尺二寸(子和)○仙經曰絳宮重樓一二級人之喉嚨管有十二節(養生)

脈法

兩寸脈浮洪而溢者喉痹也脈微而伏者死(正傳)○咽喉之脈兩寸洪溢上盛下虛脈急微伏(回春)

咽喉之病皆屬火內經曰一陰一陽結謂之喉痹

（痹與閉同）註曰一陰謂心主之脈一陽謂三焦之脈也三焦心主脈並絡喉氣熱內結故爲喉痹○一陰肝與心包一陽胆與三焦四經皆有相

火火者痰之本痰者火之標也（入門）○少陰君火少陽相火二脈並絡咽喉君火勢緩則熱結而爲

瘡爲腫相火勢速則腫甚不仁而爲痹痹甚不通而痰塞以死矣（入門）咽喉之疾皆屬火熱雖有數

種之名輕重之異乃火之微甚故也微而輕者可以緩治甚而急者惟用砭刺出血最爲上策（正傳）

咽喉病名

咽喉之病有單乳蛾雙乳蛾單喉閉雙喉閉纏喉風急喉痹喉垂垂梅核氣尸咽殺賊骨硬咽痛

單乳蛾雙乳蛾喉痹

會厭之兩傍腫者俗謂之雙乳蛾易治會厭之一邊腫者俗謂之單乳蛾難治古方通謂之喉痹皆相火之所衝逆耳（正傳）○皆因熱氣上行搏於喉之兩傍近外腫

作以其似乳蛾一爲單二爲雙（醫案）○單乳蛾者其形圓如小筋頭大生於咽喉關上或左或右關下難治雙乳蛾者有兩枚在喉關兩邊亦圓如小筋頭大關下難治（得效）○其乳蛾之羞小者名

曰喉閉（醫案）○喉痹多是痰熱（丹心）纏喉風喉閉之證皆由熱間素有痰涎或因酒色七情不節而作火動痰上壅塞咽喉所以內外腫痛水漿不入可謂危且急矣（丹心）○喉痹者謂喉中呼吸不

通言語不出而天氣閉塞也（綱目）○宜用如聖勝金錠解毒雄黃丸牛黃涼膈丸七寶散胆礬散雞內金散備急丹龍腦膏青龍胆吹喉散實火宜清涼散虛火加味四物湯

如聖勝金錠 治咽喉急閉并單蛾雙蛾結喉重舌木舌等證硫黃川芎臘茶薄荷荷川烏硝石生地黃各等分爲末生蔥汁和一兩分作十錠每取一錠先以涼水灌漱次嚼薄荷五七葉却用藥同

嚼以井水嚥下甚者連進三服（局方）

解毒雄黃丸 治喉閉口噤水漿不下危急者雄黃水飛金各二錢半巴豆十四粒去皮油石爲末醋麪

牛黃涼膈丸 治咽喉腫痛口舌生瘡頰頰赤腫熱痰壅塞馬牙疳寒水石煨石膏煨各二兩甘草炙一兩

每一丸薄荷湯嚼一（局方）

七寶散 治喉閉及單雙蛾猪牙皂角一錠全搗十個去毒風砂雄黃白

參胆礬各一錢右爲細末每取一字吹入喉中即愈（丹心）

東醫寶鑑外形篇 卷二 十九

膽礬散

治咽喉腫塞胆礬半錢全蝎二個右爲末以雞羽蘸藥入喉中須臾破開聲出次用生荷葉研細并水調下吐出毒涎卽愈未吐再服(直指)

雞內金散

治喉閉單雙蛾腫月雞胓腫黃皮陰乾細末一錢菜豆粉三錢右生蜜和作三丸噙化神效(必用)

備急丹

治咽喉閉青黛芒硝白礬各一兩甘草四兩右爲末臘月牛胆有黃者盛藥四十九日爲末吹入喉神效(綱目)

龍腦膏

治喉痹腫痛薄荷葉一斤甘草三兩防風川芎桔梗各二兩煇硝一兩白豆蔻三十粒縮砂五粒片腦一錢右爲末蜜丸彈子大噙化嚥下(別方)

青龍膽

治咽喉閉塞腫痛并單雙蛾神效胆礬盛於青魚胆內陰乾爲末吹入喉中立效無青魚則鱸魚胆代之臘月者甚佳(活人)

吹喉散

治咽喉腫閉塞胆礬五錢無胆礬則代以綠礬入青魚胆內風乾無青魚則代鱸魚胆巴豆七個去殼煇硝二錢半另研銅青一錢輕粉五分青黛一字右將胆礬同巴豆於銅鏡內飛過去巴豆

合煇硝等四味再入麝香少許每用一字吹入喉中吐出痰血立愈(綱目)

清涼散

治實火咽喉腫痛桔梗一錢半梔子連翹黃芩防風枳殼黃連當歸生地黃廿草各七分薄荷白芷各三分右剉作一貼燈心一團細茶一撮水煎服(回春)

加味四物湯

治虛火喉痹喉痛喉疔最能降火桔梗甘艸各一錢半熟地黃白芍藥各七分當歸川芎黃柏蜜水炒知母天花粉各五分右剉作一貼水煎入竹瀝一鍾(回春)

急喉

靈樞曰瘡發咽喉名曰猛疽此痰治遲則咽塞咽塞則氣不通氣不通則半日死○喉閉而暴發暴死者名曰走馬喉痹(醫鑿)○夫喉之爲會厭者經謂之吸門是也以其可呼吸主升降爲人身緊

關之橐籥門戶也若夫卒然腫痛水藥不入言語不通死在須臾試可驚駭(正傳)○宜速用針法吐法以救之藥不得下當以曲竹管灌藥入喉爲妙(類聚)○急喉閉其聲如鼾有痰在喉嚨者此爲

肺絕之候宜用人參膏救之用薑汁竹瀝放開頻頻服之如未得參膏先煎獨參湯救之早者十全七八次則十全四五遲則十不全也(綱目)孫兆治潘元從急喉以藥半錢吹入喉中少頃吐出膿血

立愈潘謝曰大急之患非明公不能救非藥不能療贈金百兩願求其方孫曰猪牙皂角白礬黃連等分瓦上焙爲末耳既授以方不受所贈(回春)○牙關緊者須開關用一字散二仙散毒結宜如聖勝

金錠解毒雄黃丸(方並見上)龍腦破毒散奪命散玉鑰匙金鎖匙巴豆烟○挫喉氣不通冷水徐灌之(山居)

金錠解毒雄黃丸(方並見上)龍腦破毒散奪命散玉鑰匙金鎖匙巴豆烟○挫喉氣不通冷水徐灌之(山居)

龍腦破毒散 治急慢喉閉腫塞不通芒硝四兩青黛白僵蠶甘草各八錢蒲黃五錢馬勃三錢龍腦麝香各一錢右爲末每一錢并水調膏細嚥即破出血使愈如不是喉痹自然消散也無芒硝代

以煇硝
(御院)

一字散 治急喉腫喉風咽喉堵塞水穀不下牙關緊急不省人事猪牙皂角七錢雄黃一錢生白礬藜蘆各一錢嗎榴七枚右爲末每一字吹入鼻吐痰(入門)

二仙散 治急喉閉及纏喉風危急胆礬一錢白礬二錢右爲末吹少許入喉中(入門)

奪命散 治急喉閉粘白礬白礬炒鵬砂皂角各等分右爲末吹少許入喉○痰出即差(丹心)

玉鑰匙 治急喉閉及纏喉風煇硝七錢半鵬砂二錢半白礬一錢二分半龍腦一字右爲末以竹管吹半錢入喉中神效(直指)

金鎖匙 治急喉閉纏喉風朱砂三分二釐枯白礬胆礬各一分六釐鵬砂一分二釐熊胆煇硝片腦麝香各一分右爲末吹半錢入喉中(醫鑿)

巴豆煙 治喉閉危急宜開關巴豆肉以紙壓取油用紙作捻子點燈吹滅以煙熏鼻中一時口鼻流涎牙關自開(經驗)○又方巴豆肉綿裹隨左右塞鼻中左右俱患則左右俱塞立通(入門)○巴豆

乃斬關奪門之將熱則流通之
理以熱攻熱不妨碍也(丹心)

纏喉風 熱結咽喉腫透於外且麻且癢腫而大者名曰纏喉風(醫鑿)○纏喉風自耳邊過頤下亦兎者是也大概內外皆腫者爲纏喉風(得效)○纏喉風之證先兩日胸膈氣緊出氣短促忽然咽喉腫痛

手足厥冷氣閉不通頃刻不治(丹心)纏喉風感熱其咽喉裏外皆腫者是也(丹心)○宜用解毒雄黃丸如聖勝金錠龍腦破毒散一字散二仙散玉鑰匙巴豆煙(七方皆見上)雄黃散佛手散白礬

散水梅丸(方見下)
兼用針法吐法乃效

雄黃散 治纏喉風危急巴豆七粒三生四熟生者去殼生研熟者去殼燈上燒存性研乾桑黃茄二片雄黃一塊細研鬱金一枚研右再研細每服半字茶清少許調下如口噤咽塞以竹管吹入喉中須

臬吐利即安
矣(得效)

佛手散

治癰喉風神效芒硝一兩白礬五錢甘草二錢半青黛一錢右爲末取少許糝喉中如閉甚以竹管吹入(類聚)

白礬散

治癰喉風及急喉閉白礬三錢巴豆三個去殼分作六片右鏡器同炒候礬枯去豆取礬爲末水調灌下或吹入喉中或烏雞子清調灌入喉中(類聚)

懸雍垂

懸雍生於上腭雖不關於咽喉所以暴腫者抑亦熱氣使然也(直指)○懸雍謂之帝鍾懸雍腫而垂下有長數寸者謂之帝鍾風宜用礬散不可鍼破針則殺人(得效)○懸雍者音聲之關若感

府伏熱上衝咽喉則懸雍或長而腫也宜吹喉散立參散礬砂散(類聚)○腎傷寒咽痛及帝鍾腫者忌針以蛇床子於瓶中燒烟令病人吸入喉中立愈(入門)

鹽礬散

治懸雍垂長咽喉妨悶鹽化白礬枯右爲末以筋頭煎藥塗其上即差(本草)

吹喉散

治懸雍下垂腫痛及一切咽喉疾膽礬白礬煇硝片腦山豆根辰砂雞內金煇右爲極細末以竹管吹少許入喉中即效(回春)

玄參散

治懸雍腫痛垂長玄參一兩升麻射干大黃酒洗各五錢甘草炙二錢半右剉五錢水煎微溫時含嚥(類聚)

鵬砂散

治同上鵬砂馬牙硝滑石寒水石各五錢龍腦白礬各三錢右細末新水調半錢服(類聚)

梅核氣

七情氣鬱結成痰涎隨氣積聚堅大如塊在心腹間或塞咽喉如梅核粉絮樣咯不出嚥不下每發欲絕逆害飲食宜四七湯(得效)○方見氣門○男女或有胸喉間梅核作恙者觸事勿怒飲食勿

冷(直指)○梅核氣者窒礙於咽喉之間咯不出嚥不下如梅核之狀是也始因喜怒太過積熱繼隆乃成厲痰鬱結致斯疾耳宜加味四七湯加味二陳湯(醫案)

加味四七湯

治梅核氣妙不可述紫蘇葉半夏厚朴赤茯苓陳皮枳實南星縮砂神麩各一錢青皮七分白豆蔻六分檳榔益智仁各三分右剉作一貼薑五片水煎服(醫案)

加味二陳湯

治同上二陳湯加枳殼桔梗黃芩梔子白豆蔻各七分右剉作一貼入薑三片水煎服(醫案)

尸咽

尸咽者陰陽不和脾肺寒盛風熱毒氣不能宣通故令尸虫發動上蝕於喉或癢或疼如蠶之候也(直指)○與傷寒狐惑同當參考

穀

穀賊者殺芒強盜藏於米而誤食之滯於腸門不能傳化故風熱併聚與血氣搏遂令腫刺也不急治亦能殺人(直指)○誤吞稻麥芒在期間不下急取鵝口中涎灌之卽下蓋鵝涎能化穀也(綱目)

治癰賊方琥珀松脂各五錢明砂二錢半乳香一錢二分半右為末熔黃蠟和丸夾實大含化嚙津

類聚

咽喉痛咽喉痛云咽喉痛者謂咽喉不能納唾與食而地氣閉塞也云喉痹咽隘痛者謂咽喉俱病天地之氣並閉塞也蓋病喉痹者必兼咽喉痛病咽隘痛者不能兼喉痹也綱目○咽喉者風邪客於喉間氣鬱而熱故為咽喉痛直指咽喉乾枯常如毛刺吞嚥有碍者風燥也荆防敗毒散方見卷前加薄荷黃芩半夏倍桔梗入生薑煎服入門○咽喉痛明砂或和胆礬白礬白梅肉和嚙又必用荆芥玄參丹心○咽喉痛宜上清丸加減薄荷煎丸龍腦膏方見上劑黃湯必用方甘桔湯金消丸清火補陰湯綠手散

上清丸治咽喉腫痛口舌生瘡能爽神薄荷葉一斤縮砂四兩甘草二兩防風黃芩桔梗各一兩右為末蜜和兩作二十九丸每一丸當含化嚙之奇效

加減薄荷煎丸治風熱咽喉腫痛薄荷葉八兩防風川芎白豆蔻各一兩縮砂甘草各五錢龍腦五分桔梗二兩右為末蜜和兩作三十九丸每一丸當含化嚙之御藥

荆黃湯治風熱結滯咽喉腫痛大便秘澀荆芥四錢大黃一錢右對水煎空心服入門

必用方甘桔湯治風熱咽喉腫痛或喉痹神效桔梗二錢甘草荆芥防風黃芩薄荷各一錢右到作一貼水煎徐徐服加玄參一錢尤妙必用

金消丸治咽喉腫痛黃柏荆芥射干黃芩各等分右為末蜜丸櫻桃大每一丸含化簡易

清火補陰湯治虛火上升喉痛喉閉或生瘡玄參二錢白芍藥熟地黃各一錢當歸川芎黃柏童便炒知母生天花粉甘草各七分右到作一貼水煎入竹瀝三匙溫服醫鑿○喉乾燥痛四物湯方見血門加桔梗荆芥黃柏知母煎服立已正傳

絳雪散治咽喉熱腫寒水石煨五錢鵝砂馬牙硝朱砂各一錢龍腦半錢右為細末每一字移入口中嚙津直指

傷寒咽痛傷寒陽毒陰毒皆有咽痛詳見本門仲景○伏氣之病謂非時暴寒中人伏於少陰經始不得旬月乃發先發咽痛次必下利脈微弱古方謂之腎傷寒宜用半夏桂甘湯活人○少陰客寒

其醫藥外形篇

傷寒咽痛傷寒陽毒陰毒皆有咽痛詳見本門仲景○伏氣之病謂非時暴寒中人伏於少陰經始不得旬月乃發先發咽痛次必下利脈微弱古方謂之腎傷寒宜用半夏桂甘湯活人○少陰客寒

傷寒咽痛傷寒陽毒陰毒皆有咽痛詳見本門仲景○伏氣之病謂非時暴寒中人伏於少陰經始不得旬月乃發先發咽痛次必下利脈微弱古方謂之腎傷寒宜用半夏桂甘湯活人○少陰客寒

其醫藥外形篇

咽痛宜甘桔湯桔梗
湯荆芥湯(方見下)

半夏桂甘湯

治腎傷寒咽痛半夏煎製桂枝甘草各二錢右到作一貼入薑五片同煎候冷徐徐呷之(活人)

甘桔湯

治少陰客寒咽痛桔梗三兩甘草一兩右到五錢水煎徐徐服之加鼠粘子竹茹各一錢治咽痛尤妙(海藏)

桔梗湯

治同上桔梗一兩甘草二兩右到五錢水煎如上法服之(海藏)○二味等分名如聖湯(直指)

咽喉瘡

咽瘡者胃院實熱熏炙上焦發爲白頭赤根宜發聲散(直指)○咽喉生瘡痛多屬虛火遊行無制客於咽喉宜入參荆芥蜜黃栢(綱目)○咽喉生瘡勿用生薑辛辣反甚故也(綱目)○楊梅天

瘡瘻服輕粉毒氣流注多作咽瘡潰爛詳見諸瘡門○喉咽瘡宜用利膈湯牛蒡子湯清火補陰加味四物湯(方見上)通隘散(方見下)佛手散發聲散治喉痹生瘡方

利膈湯

治咽喉生瘡薄荷荊芥防風桔梗人參鼠粘子炒甘草各一兩右爲末每二錢湯點服咽痛加白僵蠶(本事)

牛蒡子湯

治咽喉腫痛牙關緊急或生瘡癰或愈後復攻胸脅氣促身熱不能坐臥牛蒡子二錢玄參犀角升麻黃芩木通桔梗甘草各一錢右到水煎食後服(入門)

佛手散

治風熱咽喉腫痛生瘡薄荷葉二兩芒硝七兩甘草七錢桔梗蒲黃各五錢青蘆二錢右爲末取少許乾搽或以竹管吹入喉中(丹心)

發聲散

治咽痛生瘡妨悶黃瓜蘆大者一個桔梗七錢半白僵蠶炒五錢甘草炒二錢右爲末每取少許乾搽如咽喉腫痛左右有紅或一邊紅紫長大此藥加朴硝一錢和勻搽之如喉中有小白頭瘡

前藥入白礬末半錢和粳(綱目)

治喉痹生瘡方

喉痹乳蛾腫痛生瘡潰爛水漿不入死在須臾用巴豆肉細辛等分爲末用紙捲藥在中兩頭捻緊從中剪斷塞入兩鼻中一時頭頂冰涼咽喉即開(種杏)

喉痹失音

喉痹生瘡令閉聲不出者祕傳降氣湯(方見氣門)去陳皮加黃芩服之曾服涼藥自利聲音有壞者亦用祕傳降氣湯救之(入門)○咽痹失音宜用通隘散增損如聖湯荆芥湯通關飲桔梗

湯神效散○喉閉生瘡失聲音服紫雲神效(方見火門)

通隘散治喉痛生疳聲啞白爛砂二錢孩兒茶青黛滑石寒水石各一錢蒲黃馬牙硝枯白礬各六分黃連黃柏各五分片腦二分右細末煉化白糖和丸芡實大臥時舌壓一丸自化入喉神效一方以葦

筒吹少許入喉中亦神效(醫案)

增損如聖湯治咽喉腫痛妨悶語聲不出桔梗二兩甘草炙一兩半枳殼防風各五錢右末三錢煎水入酥如棗許攪服(綱目)

荆芥湯治咽喉腫痛語聲不出嚙之甚妙桔梗二兩甘草一兩荆芥穗五錢右爲粗末每取四錢入薑三片水煎呷服(三因)

通關飲治喉痹腫痛不能言語此從治之法無不愈桔梗二錢甘草炙一錢半人參白朮赤茯苓各一錢防風七分荆芥薄荷乾薑炮各五分右剉作一貼水煎服(正傳)

桔梗湯治咽喉腫痛聲破難語杜梗甘草各一錢半當歸馬勃各一錢麻黃五分白殭蠶黃芩各三分桂枝少許右剉作一貼水煎服(東垣)

神效散治喉痹語聲不出荆芥穗麻肉等分爲末蜜丸皂子大綿裹云化○又方猪牙皂角和霜梅爲末爲之二因)

天行喉痹時行咽喉痛宜用普濟消毒飲子(方見瘟疫)○喉痹一鄉皆相似者屬天行運氣之邪大忌酸藥點之寒藥下之鬱其邪於內不得出也(綱目)○天行喉痹取鴨嘴膽末半錢吹入喉中吐痰

立愈如無膽礬以透明綠礬代之(正傳)

咽喉急閉宜針咽喉急閉皆屬相火惟疑刺出血最爲上乘(正傳)○喉痹因惡血不散故也凡治此疾暴刺出血并給吐痰涎爲要若遲緩不救則死(而春)○火鬱則發之疑刺出血即汗之之義也血出多則愈有針者薑汁調熱水時時呷之凡關上血池最宜針關下不見者令病人含水一口用蔗管尖

刺鼻孔出血妙(入門)○一婦人患喉生蛾不肯針危九思云我有一藥須新筆點之乃藏針在筆頭內刺血出即愈(入門)○咽喉腫痛惟腎傷寒及帝鍾風者忌針(入門)

咽喉急閉宜針凡喉痹勿論大人小兒非吐不可如膽礬石綠之類爲末薄荷汁入醋同調以鷄翎蘸藥送

搽法去涎方或用好醋噙漱吐痰亦妙

東醫寶鑑外形篇卷二 二十一

吹喉散 治喉閉腫痛綠礬五錢入青魚膽內風乾巴豆七個去殼朴硝二錢半另研銅青一錢經粉五分青黛少許右將胆礬同巴豆於銅鉢內飛過去巴豆合朴硝等四味再入麝香少許每用一字吹

入喉中吐出痰血立愈（正傳）

引痰直捷法 治喉痹冬月青魚胆用白礬入內臨用加百草霜炒鹽少許醋調以鴨毛蘸引吐痰出如無魚胆用白礬半兩巴豆肉十枚同枯過去巴豆用礬如上法吐痰神效吐後用金鎖匙（

方見上）吹之常服必用方甘桔湯最妙（方見上○入門）

去涎方 治喉痹猪牙皂角五錢胆礬一錢半青黛五分右爲末醋糊和丸櫻桃大每一丸以熟絹裹在筋頭上用好醋潤透將藥點在喉壁上咬著筋其涎如水即解後服防風通聖散（方見風門○丹心）

咽喉閉通治

火性急速故病發則暴悍或針或吐以宜其毒此急則治標之法也必須兼以內經從治之法以桔梗甘草玄參升麻防風羌活荊芥人參白朮茯苓之類少加乾薑附子爲嚮道徐徐頻與

不可頓服此爲治之大法也切不可驟用寒涼之藥殊不知上熱未除中寒復生至於發喘發脹皆爲不治之證（正傳）○喉痛必用荊芥陰虛火炎必用玄參（丹心）○咽喉腫痛諸證皆用清涼散（方

見上）加減用之（回春）○通用冰梅丸龍腦川芎丸清咽利膈散必用方甘桔湯（方見上）龍腦破毒散（方見上）金鎖匙（方見上）琥珀犀角膏（方見口舌）

冰梅丸 治十八種喉痹俱效又治喉風腫痛如神大南星三十五個大半夏白礬防風朴硝各四兩桔梗二兩甘草一兩揀七分熟大梅實一百個先將硝鹽水浸一伏時然後將各藥碾碎入木拌

勻方將梅實置於水中其水淹過梅子三指爲度浸七日取出晒乾又入水中浸透晒乾藥水乾爲度方將梅子入磁罐密封密如霜衣白愈佳用時綿裹喉在口中徐徐嚥汁下痰出即愈（回春）○入門

有皂角四兩無甘草

龍腦川芎丸 治咽喉諸病通利七竅爽氣清神除熱消痰消風化滯薄荷葉五兩三錢桔梗一兩半川芎防風甘草各一兩白豆蔻五錢片腦三錢縮砂仁二錢右爲末蜜和每兩作二十九每一丸

細嚼茶清下嚥化亦可（御院）○此與加減薄荷煎丸同而分兩異

清咽利膈散

通治乳蛾喉閉喉疔連翹各一錢大黃芒硝惡質荊芥各七分片苓梔子薄荷枳殼
參黃連金銀花甘草各五分其大黃芒硝連翹子並酒炒右剉作一貼水煎溫服食後

咽喉不治證

凡咽喉閉毒氣歸心胸前腫滿氣促下部洞澀不止者死(得效)○凡喉癰初發胸膈氣促
咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通即死(入門)○凡咽喉癰不可純用涼藥草藥目前取效上熱

未除中寒復起毒氣乘入腹胸前高腫上喘下瀉手
足爪甲青紫七日後全不食口如魚口者死(入門)

魚骨

凡骨鯁在咽不下用玉屑無憂散(三因)○凡治硬之法皆以類推如鯽魚治魚鯁磁石治針鯁
髮灰治髮硬虎骨治骨硬各從其類也(三因)○諸魚胆皆下骨硬鯽魚鱗魚鱗魚胆皆可用鹽

月收者尤佳取一皂子許溫酒化呷之若得吐便出未吐更飲溫酒但以吐爲妙未出更服(本草)○
南鵬砂噴化其骨脫然而失(得效)○貫衆濃煎一盃半分三服連進片時一啗而骨出(得效)○

砂甘草末綿裹含嚙即吐出(丹心)○野苧根洗淨搗如泥取櫻桃大如雞骨以雞羹化下如魚骨
以魚羹化下立出(丹心)○魚骨橫喉中鯉魚鱗皮燒作屑和水服即出(本草)○魚骨在肚中刺痛

煎吳茱萸汁一盞飲之骨軟而出(綱目)○葦草根汁飲之即下(綱目)海細皮煮汁飲水雞亦可又
鱸或魚狗鳥燒灰和飲服即下(本草)○鳳仙花子水研取汁以匙送入咽呷下勿犯齒無子用根

(醫鑑)○皂角末吹
鼻得嚏即出(類聚)

獸骨

更在咽不下象牙磨水嚥下梳笏皆可用(得效)○桑木上虫屑米醋煎灌漱自下(得效)○將狗倒
骨吊起涎出盛碗徐徐嚥下其骨化爲水如神以狗善食諸骨也(回春)○諸肉骨硬雞足一對燒灰

水調服(類聚)獸骨硬虎骨爲末水調服理骨亦可煮汁服亦佳(本草)○雞骨魚骨
硬白梅肉槌成大丸子綿裹用線穿在內冷茶送下扯住線頭在手一嚼即出(回春)

玉屑無憂散

治諸骨硬不下及喉喉風寒水石煨鵝砂各三錢玄參貫衆滑石綿砂山豆根
黃連甘草赤茯苓荊芥穗各五錢右爲末每一錢抄入口以新水嚥下(得效)

引繩法

硬在咽不下聚牛筋或鹿筋漬之索緊令大如彈丸持筋端吞之候至硬處徐徐引之硬著筋即
出(本草)○又法綿絮一小塊以蜜煮用如上法即出(得效)○咽喉白令柔以繩繫中吞薤到

硬處引之硬即隨出(本草)○一方用韭白如上法以茶嚥
下引之亦出(醫鑑)○弓弦槌令頭散吞引之亦出(秘方)

呪法

治諸硬不下以淨器盛新汲水一盞捧之面東默念云謹請太上東流順水急急如南方天帝律令勅
一氣念七遍即吹一口氣入水中如此七次以水與患人飲立下或云用此呪水可以食針并竹刺

醫

法治鱗不下另取魚骨一根插於患人頭髮內不必言須臾即下(種杏)

誤吞諸物

誤吞金銀物在腹中取水服之令消悍出也(綱目)○金見水銀則如泥故吞金銀物者服半兩即消出(本草)○誤吞金銀及銅鐵鑄砂濃煎湯飲之其銅自下又葶藶研爛服之其銅自化

又堅炭爲末米飲調服從大便瀉出如烏梅狀(入門)○誤吞銅錢鐵物葶藶食須臾自化去試將一錢并葶藶四五枚同嚼其錢立碎(類聚)○多食胡桃其銅自爛(回春)○胡粉一兩水調分再服

亦出(本草)○誤吞錢服煉蜜二升即出又估糖一斤漸漸盡食之便出誤吞環及釵者服之亦出(本草)○誤吞銀釵簪或竹木不得出多食白糖至數斤當裹物自出(類聚)○小兒吞錢不出煮葵

汁冷飲即出根葉子同功(本草)○誤吞釵薤白暴令萎黃煮熟勿切食一大束釵即隨出(本草)○誤吞針磁石如棗核大磨令光鑽作窠絲穿令含針自出(本草)○又方用豇豆煮熟同韭菜吃之針

與菜從大便而出一方用豌豆(入門)○誤吞竹木拍喉不下故燒燒赤滓酒中熱飲之一法鐵斧磨水灌下亦效(本草)○誤吞釘并箭鏃針錢等物多食豬羊肉肥肉必自裹出(本草)○誤吞銅鐵等

物多食肥猪肉葵菜自出(類聚)○誤吞鈎連線者莫引之急以珠璣或琥珀珠水晶珠懸以子靈貫著線推至鈎處引之自出(類聚)○誤吞桃李櫻喉不下狗頭煮湯摩頭上差(本草)○誤吞髮繞喉

不出亂髮灰水調一錢服又舊木油梳燒爲末酒調服(本草)

誤吞諸蟲

誤吞蜈蚣在喉悶甚急取生豬血令病人吃須臾以清油灌口中其蜈蚣滾在血中即吐出繼以雄黃末水調服解其毒(綱目)○誤吞水蛭入腹久而必生育食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦

能令人死用田中乾泥一小塊小死魚三四個將豬脂磨勻用巴豆十枚去皮研爛入泥內爲丸菜豆大用田中冷水吞下十九須臾大小水蛭皆下却以四物湯(方見血門)加黃芪煎服調補(入門)○

水蛭入腹濃茶多服自下(種杏)○誤吞水蛭宜食蜜即化爲水又田中泥作丸櫻桃大白水和下一丸碎即下(回春)

單方凡二十八種有

白礬

治咽喉閉明白礬末一錢巴豆肉一粒同熬乾取礬爲末吹入喉中涎出自愈(綱目)○繩喉風白礬末半錢烏雞子清一個調勻灌入喉中立效如神(綱目)

朴硝 治喉癆神驗含口中細細嚥汁立差馬牙硝煨硝同功(本草)○咽

中瘡腫朴硝一錢草麻子去皮一粒同研新水和服即效(綱目)

鵬砂 治咽癆最爲要切含化嚥津(本草)○治殺賊

升麻 治咽癆癆痛到煎取汁含之(本草)

馬蘭根 治喉閉垂死取根搗絞取汁稍稍嚥之口噤者灌下葉及子同

功子則取四十九枚爲末水調服葉則取二兩水煎服(本草)

牛蒡子 治喉癆取子一合半生半炒爲末熱酒調下一錢又牛蒡

桔梗 治喉癆及喉癆桔梗甘草等分水煎細呷之○喉癆深腫連類

射干 治喉閉水漿不入探根搗取汁細呷之治喉癆

草麻子 治喉癆及咽腫生疔取子去皮一個朴硝一錢新水同研服連進即效(丹心)

馬勃 治喉閉咽痛以蜜揉拌小以水調呷(本草)○又同

皂莢 治急喉閉搗碎去皮子按水一盞灌下或吐或不吐即安(得效)

鱖魚膽 治急喉閉取少許點患處藥至即差病

壁錢 治喉癆雙乳蛾壁錢窩一個取患者腦後髮拔一根綁定錢窩燈上以銀簪挑而燒之存性爲末吹入患處立消(回春)○又壁錢燒存性白礬枯髮灰等分爲末吹入喉中治喉閉名吹喉散(醫鑿)

蟾蜍 治喉癆取汁點在喉中即喉開(本草)

蚯蚓治喉閉取汁吞之
喉閉即開(本草)

白殭蠶治急喉閉爲細末薑汁調灌下立愈(本草)○又殭蠶炒白礬生等分爲末白梅肉和丸皂子大綿裹含化嚙汁差(直指)

蠶帖治咽喉哽噎又治諸物不下取腦吞之(本草)

石鹽治咽喉腫塞搗絞取汁灌之即開(本草)

雄雀糞治咽喉閉塞口噤取糞細研溫水調灌半錢(本草)

雞子開咽喉又治咽喉塞生雞卵一枚去黃留白著米醋煑火沸起就熱飲醋盡一二次即差(綱目)

瓠花上飛蛾治咽喉腫痛閉塞燒爲末吹入喉中神效(俗方)

梨汁治喉痹熱痛上好消梨杵取汁頻飲之多服爲良(正傳)

蘿蔔汁治喉癆水殺不下取汁徐徐嚥之即愈(綱目)

飴糖治魚骨鯁不下作丸如雞子黃大吞之若不大大作丸嚥下之爲妙(本草)

米醋飲咽喉治喉癆用好醋噲嗽吐痰爲妙(回春)

大麥麩治纏喉風食不能下取麩作稀粥令嚥之既滑膩容易下咽以助胃氣(本草)

脂麻治殺賊炒爲末湯點服之(直指)

針灸法喉閉少商合谷尺澤皆針之(丹心)○喉痹因惡血不散故也砭出血最爲上策(綱目)○咽喉肺痹針風府主咽喉諸病及毒氣歸心等項惡證無不效又針少商咽喉腫痛皆治之又針合谷又

針上星治頰腫喉風等證又針足三里(得效)○喉痹刺手少陰即神門穴(綱目)○喉閉刺手足少陽井即關衝竅陰(東垣)○喉痹乳蛾取少商照海大街(東垣)○咽喉閉塞取照海(靈樞)○牙關不開取陽靈穴出血即愈(得效)○喉痹取豐隆涌泉關衝少商隱白少衝(綱目)○累年喉痹男左女右手大指甲第一節灸二三小壯(丹心)○根脚咽喉常發者耳垂珠下半寸近腮骨灸七壯二七尤妙(得效)○足陽明之別名曰豐隆其病氣逆則喉痹卒瘕宜取之(靈樞)

頸項

頸項寸數 結喉以下至缺盆中長四寸項髮以下至背骨長二寸半(靈樞)

頸項部位 前曰頸後曰項○缺盆之中任脈也名曰天突一次任脈側之動脈足陽明也名曰人迎二次手陽明之脈名曰扶突三次手太陽之脈名曰天窗四次足少陽之脈名曰天容五次手少陽之脈

名曰天膈六次足太陽之脈名曰天柱七次項中央督脈名曰風府(靈樞)

項強 諸瘧項強皆屬於溼(內經)○項強辛口噤背反張為瘧(仲景)頸項乃足太陽膀胱之經足少陰腎經與膀胱經為表裏故太陽感風濕為頸項強痛身腰反張為瘧(本事)○項強宜木瓜煎椒附散回

首散羌活勝溼湯○一人項強不能回軀動則微痛脈弦數實作痰熱容太陽經治用二陳湯(方見痰飲)加酒芍羌活紅花一服愈(丹心)○傷寒項強結胸項強瘧病亦項強並見本問

木瓜煎 治筋急項不得轉側木瓜兩個取蓋去瓢沒藥五錢乳香二錢半並研右二味入木瓜中用蓋蓋了竹簽簽定飯上蒸三四次研爛成膏每服三五匙地黃酒化下酒法地黃汁半盞好酒二盞相

和用溫服○有人患此證自午後發至黃昏時定予曰此患必從足起蓋足太陽之筋自足至項弱者肝之合也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶舉法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受陰氣故發

於是時授此方三服而愈(本事)

椒附散 治腎氣上攻項背不能轉移大附子一個炮去皮臍末之右末每二錢好川椒二十粒白鈣填滿椒附散水一盞半薑七片煎至七分去椒入鹽空心溫服○一人患項筋痛連背脚不可轉移服諸風藥

皆不效予盪千金髓有腎氣攻背強一證與此方一服差蓋腎氣自腰挾脊上至曹溪穴然後入泥丸宮曹溪一穴非精於搬運者不能透今逆行至此不得通用椒以引歸經則安矣氣上通椒下達故服

之即愈
(本事)

回首散 治頭項強急筋急或挫枕轉項不得者烏藥順氣散(方見風門)加羌活獨活木瓜水煎服(醫案)

羌活勝溼湯 治太陽經中寒溼項強或似拔不得回顧羌活獨活各二錢薑本防風甘草各一錢川芎蔓荊子各五分右剉作一貼水煎服(東垣)

項軟 項軟者天柱骨倒也宜用健骨散生筋散(方並見小兒)小兒久患疳疾體虛不食及諸病後天柱骨倒醫者不識謂之五軟(綱目)○小兒困風頸起軟項不得正或去前或去後宜用天柱丸五加皮散

風熱項軟合用涼肝丸
(方見小兒○得效)

天桂丸 治項軟蛇含石一大塊火煨醋淬七次鬱金末少許右研細入麝香少許飯丸芡實大每一丸荊芥湯入薑汁二三點化下(得效)

五加皮散 治同上取皮爲末酒調傅項骨上乾則易溼者(得效)

風府宜護 風府穴名也在膈後○內經曰巨陽者諸陽之屬也其脈連於風府故爲諸陽主氣也然則固傷寒之所自起也北人皆以毛裏之兩人怯弱者亦以帛護其項俗謂三角是也凡怯弱者須護其

項後可也
(資生)

單方 凡四種

黑豆 治頭項強不得顧視豆蒸熟納袋中枕之(本草)

桃葉 治風項強不得回顧生桃葉蒸熟入袋著項上熨之(本草)

活鼠 項強身中急者取活鼠破腹去五臟就熱傅之即差(本草)

葶麻葉 治風溼項強常傅之爲妙(俗方)

針灸法項強取承漿風府(綱目)○頸項痛強取通天百會風池完骨極門大杼(甲乙)○頸項痛取後髎(綱目)○頸腫取足陽明手陽明兩經(綱目)

背

背脊骨節有數管骨以下至尾骶二十一節長三尺(靈樞)○上七頤每頤一寸四分一釐共九寸八分七釐中七頤每頤一寸六分一釐共一尺一寸二分七釐下七頤每頤一寸二分六釐共八寸

八分二釐(神應)○二十一頤長三尺按之則上七頤共九寸八分七釐中七頤下七頤共二尺一分三釐合爲三尺(養生)

背有三關問背後三關答曰腦後曰玉枕關夾脊曰曉關水火之際曰尾閭關乃精氣升降之道路也(正理)○人之脊骨二十四節節之末名曰尾閭穴又名龍虎穴又名曹溪路又名三岔路又名

河車路又名朝天嶺又名上天梯○尾閭穴之骨頭圓如盞金上有九竅內外相連卽泥丸宮也○脊骨兩傍三條運路上衝直至頂門泥丸宮下降復至丹田復連至尾閭穴○尾閭穴乃下關也從下至

上十八節乃中關也泥丸宮爲上關此三關也(正理)

脈法靈樞曰腎脈緩甚爲折脊○內經曰寸口脈中手促上擊者曰肩背痛○脈大者心有留飲其人背寒冷(仲景)○凡背惡寒甚者脈浮大而無力是陽虛也(丹心)

背爲胸府背者胸中之府背曲肩隨胸將壞矣(內經)○元本胸作府誤也

背寒內伏寒痰則寒從背起冷如掌大(直指)○背惡寒是痰飲仲景云心下有留飲其人背惡寒冷如冰伏苓丸(方見痰飲)主之(綱目)○背心常一片冰冷者痰飲也導痰湯(方見痰飲)合蘇子降氣湯

(方見氣門)服之(入門)○凡人每日背上一條如線而寒起者痰也宜吐下之(丹心)○背寒有陰有陽傷寒少陰證背惡寒者口中和陽明證背惡寒者口中乾燥此寒熱之辨也(入門)○背寒宜貼

禦寒膏

禦寒膏治體虛人背上惡寒或夏月怕脫衣及婦人產後被風冷手足冷痛至骨又治腰痛生薑半斤取

椒末少許再攪勻用皮紙攤貼患處用鞋底烘熱熨之候五七日脫下或起小疔不妨(醫鑿)

背熱 背熱屬肺肺居上焦故熱應於背(入門)

背痛 肩背痛屬肺分野內經曰西風生於秋病在肺愈在肩背故秋氣者病在肩背又曰秋脈太過則令人逆氣背痛愠愠然(綱目)○肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出又曰邪在腎則病肩背頸項痛(靈樞)○

肩背痛宜用通氣防風湯脊痛項強腰似折項似拔宜羌活勝濕湯(方見頸項)○背心一點痛宜三合湯(醫鑿)○脊骨脚眼痛宜蒼朮復煎湯(丹心)○腎尖痛者陰虛而膀胱有火也四物湯(方見

血門)加知母黃柏及桂少許有痰合二陳湯(方見痰飲)加澤瀉前胡木香爲引痛甚加乳香沒藥(入門)○背疼乃作勞所致技藝之人與士女刻苦者多有此患色勞者亦患之惟灸膏肓穴爲妙(資生)○一男子患背脚癢有一線痛起上肩跨至胸前側脇而止其痛晝夜不歇診其脈弦而數重

取箭大左大於右予意背脚小腸經也胸脇胆經也此必思慮傷心心虛未病而小腸府先病故痛從肩脚起及慮不能決乃歸之胆故痛至胸脇而止乃小腸火乘胆木子來乘母是爲實邪詢之

果因謀事不成而病人參四分木通二分煎湯吞龍香丸(方見五藏)數服而愈(丹溪)

通氣防風湯 治大陽經中寒濕肩背痛不可回屈又云肩背痛乃風熱乘肺肺氣鬱甚也黃芪升麻柴胡各一錢防風羌活陳皮人參甘草各五分青皮三分白豆蔻黃柏各一分右到煎服(東垣)

三合湯 治背心一點痛烏藥順氣散(方見風門)合二陳湯(方見痰飲)香薷散(方見寒門)加羌活蒼朮水煎服(醫鑿)

蒼朮復煎湯 治寒溼相合腦痛脊骨脚眼痛膝痛蒼朮四兩水二碗煎至一碗去滓入羌活升麻澤瀉柴胡藥本白朮各五分黃柏三分紅花少許右到入蒼朮湯內再煎至半去滓服(丹心)

脊強 督脈之別名曰長強其病實則脊強(靈樞)○足大陽之脈病腰脊強痛(靈樞)○膀胱腎間冷氣攻衝背脊腰脊強俯仰不利宜烏沉湯(方見氣門)○背痛項強背痛不可回屈此足大陽手大陽經中

濕氣鬱不行也宜羌活勝濕湯(方見頸項)

背僵 中溼背僵是擊成廢甘遂一錢爲末入猪腰子內煨食之上吐下瀉即愈(入門)○一人背僵僕足變脈沉弦而細以煨腎散與之上吐下瀉凡三服乃愈(方見三法)○丹心○腰脊間骨節突出

亦是中溼內經曰濕熱不攘大筋緩短小筋弛長經短爲拘弛長爲痿註曰大筋受熱則縮而短小筋得溼則引而長是故背僵僕而骨節突出也依上法治之(綱目)○老人僵僕乃精髓不足而督脈虛

也宜用補腎益精髓之劑(類聚)

龜背詳見小兒門

單方凡四種

羌活

治風溼脊痛項強不可回
顧對水煎服之(湯液)

獨活

治中溼頸項難舒對
酒水煎服(本草)

烏藥

治膀胱腎間冷氣攻衝背脊
對水煎服或末服之(湯液)

臘臍

主治背膊勞悶或痛酒
炙末服或丸服(本草)

針灸法

脊骨強痛取人中(綱目)○肩背疼取手三里(綱目)○背痛連脾取五樞崑崙鍾臑井及脾經
穴在背端骨下直腋縫尖及臂取二寸半瀉六吸(綱目)○背疼乃作勞所致惟膏肓爲要穴或背

上先疼遂牽引肩上面疼者乃膏肓爲
患當灸膏肓愈及肩井可愈(資生)

訂正東醫寶鑑外形篇卷之二終