

木葉部

穀菜部

金石部

禽獸部

祛寒之劑

清暑之劑

利湿之劑

潤燥之劑

謂
考

喜黃鸝

喜黃鸝
未曉字体無見帖規謨

喜黃鸝之始來悲秋蟬之哀鳴

拙筆

作書於西草堂

肆意 故影

朱彌見洒拙筆偽書
初學故影 習字

鵠聲鵠鳴

蓮子 甘溫而清脾之藥也。脾者黃宮。故

醫方集解卷之四

能交水火而媾心腎。安靖上下君相火

邪。

古方治心腎不交。勞傷白濁。有益子清心飲。補心腎。有瑞蓮丸。

益十

二經脉血氣。濡精氣厚。腸胃除寒。熱治

脾泄久痢。白濁夢遺。女人崩帶。及諸血

病。大便燥者勿服。去心皮蒸熟。焙乾

用得茯苓山藥白朮枸杞良。黑而沉水

者爲石蓮。清心除煩。開胃進食。而治療

口痢。淋濁諸症。

石蓮入水則沉入幽。則浮。煎鹽人以之試。鹹蓮

浮至頂。鹹乃可煎。落田野中者。百年不壞。人得食之。髮黑不老。肆中石蓮產廣

祛寒之劑。寒中于表宜汗。寒中于裏宜溫。益人之七
其所。則折壽而不彰。寒者陰慘肅殺之氣也。陰盛則
陽衰。迫至陽竭。陰絕則死矣。仲景著書。先從傷寒以
立論。誠欲以寒病爲綱。而明其例也。其在三陽者。則
用桂麻柴葛之辛溫以散之。其在三陰者。非假薑附
桂萸之辛熱。參朮甘草之甘溫。則無以祛其陰冷之
邪。滲而復其若天與日之元陽也。諸傷寒濕者。皆視
此爲治矣。

理中湯

仲景

治傷寒太陰病。自利不渴。寒多而嘔。腹痛甚。
濁脉沉無力。或厥冷拘急。或結胸吐衄。及感寒霍亂。

太陰

脾經也。腹滿而吐。食不下。自利腹痛。爲太陰病。自利渴
者。爲熱。不渴者。爲寒。喜嘔。腹痛便溏。皆虛寒所致。寒徹
于外。則手足厥冷。拘急。寒凝于中。則結胸泄瀉。吐衄霍
亂者。陰陽不和。而揮霍撩亂。或吐或瀉。亦有寒熱二症。

中樹上其味大苦不宜入藥。蓮心爲末米飲下療產後血渴。

蓮蕊鬚 甘溫而清。清心通腎。益血固精。

烏鬚黑髮止夢泄遺精。吐崩諸血略與

蓮子同功。

藕節 滯平解熱毒。消瘀血。止吐衄淋痢。

一切血症。和生地汁童便服良。 藕生甘寒涼血散。

癩。宋大官作血衄。誤落藕皮。血遂涣散不凝。一人病血淋痛。脹欲死。李時珍以髮灰二錢。藕汁調服。三日而愈。 止渴。

除煩。聖惠方。藕汁蜜和服。治時氣煩渴。 解酒毒。蠅毒。搗

若陰寒所致者。宜此湯。三陽傳陰經而下利者。爲協熱利。陰寒直中陰經而下利者。爲寒利。外邪傳裏而腹痛者。其痛不常。陰寒在內而腹痛者。痛無休止。時欲作利。大腹屬太陰。少腹屬少陰。臍下屬厥陰。亦有脾食積與痰火者。三陽下利身熱。太陰下利手足溫。少陰厥陰下利身冷。其大較也。下利雖有表症。不可發汗。以下利爲邪氣內攻走津液而胃虛也。

白术 陳壁土炒二兩 人參 乾薑 炮炙一兩 甘草 炙一兩

每服四錢。自

利腹痛者。加木香。不痛利多者。倍白术。渴者倍白术。白

益氣燥濕。踴臥沉重。利不止。加附子。此兼少陰症。 腹滿去甘

草。甘草人滿嘔吐。去白术。加半夏薑汁。 白术甘壅。人滿嘔吐。去白术。加半夏薑汁。白术甘壅。人滿嘔吐。去白术。加半夏薑汁。 薑夏散逆。臍下動氣。

去木加桂。白术補氣。桂泄奔豚。悸加茯苓。 飲停則悸。茯苓利水寧心。陰黃加茵

陳寒結胸。加枳實。本方等分。竈丸名理中丸。仲景曰。大病瘥後喜

熱酒調服。煮熟甘溫益胃補心。多孔象心止瀉。

能實

寒宣理中丸。溫之。

大腸止怒。久服令人懽。益心生搗畢金瘡。

傷折熟搗塗折裂凍瘡。

附後方卒中毒箭煮藕汁飲多

多益善。孟詭曰。產後忌生冷。獨藕不忌。爲能散瘀血也。

澄粉亦佳。

安神益胃。

荷葉苦平。其色青。其形仰。其中空。其象

震。震仰。感少陽甲膽之氣燒飯合藥。裨

助脾胃而升發陽氣。潔古枳术丸用荷葉燒飯爲丸痘

瘡倒蠶者用此發之。殭蚕等分爲末。胡荽湯下。聞人規曰。

勝于人。能散瘀血。留好血。治吐衄崩漏。牙龍腦。

此足太陰藥也。人參補氣益脾。故以爲君。白朮健脾燥濕。故以爲臣。甘草和中補土。故以爲佐。乾薑溫胃散寒。故以爲使。以脾土居中。故曰理中。王海藏曰。上吐下瀉。不北當渴而反不渴。醫以理中與之。利益甚。理中者。理中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘糧湯主之。復利不止者。當利其小便。○宋徽宗食冰太過。病脾疾。國醫不效。召楊介進大理中丸。上曰。服之屢矣。介曰。疾因食冰。臣請以水煎此湯。是治受病之源也。果愈。

本方三兩。加附子一枚。名附子理中湯。

亦可作丸。即四逆湯。加參木。

治中寒腹痛。身痛四肢拘急。漸傷曰。傷卒中曰。史有中藏。中府中經絡皮肉筋脉之殊。治之當分微甚。微則不換。金正氣散。加附子。附子五積散。甚者。臍腹痛。四肢厥。附子理中湯。薑附湯。入肝

損傷產瘍末服一切血症洗腎囊風東垣

加木瓜入肺加桑白皮。本方加枳實茯苓蜜丸名枳實入脾加木入心加茯苓。

曰。雷頭風症。頭面疣瘡腫痛。憎寒壯熱。狀如傷寒。病在三陽。不可過用寒藥。重劑誅罰無過處。清震湯治之。荷葉一枚。升麻蒼朮各五錢。煎服。鄭真一曰。荷葉研末酒服三錢。

治遺精極驗。

芡實

一名雞頭子

甘瀉固腎益精補脾去濕。

烏梅名理中安丸陶仲文

治胃寒吐

丸得甘則動故

加椒梅

本方加桂枝倍甘草名桂枝人參湯仲景治

吐得辛則伏

故加椒梅

本方加桂枝倍甘草名桂枝人參湯仲景治

太陽表症不除而數下之協熱而利心下痞鞕表裏不

解者

欲解表裏之邪全藉中氣爲敷布故用理中以和

裏而加桂枝以解表不名理中而名桂枝者到底

先表之意也。大抵陽熱爲邪則腹滿

而咽乾陰寒爲邪則腹滿而吐利

本方加黃連茯苓

生冷者非此不可

本方加

李惟熙云。菱寒而芡暖。

菱花背日。芡花向日。

治泄瀉帶濁小便不禁夢遺滑精同金櫻膏爲丸名水腰膝痺痛吳子野曰。人之食陸二仙丹。腰膝痺痛。芡必枚齒而細嚼之。使華液流通轉相灌溉。其功勝于乳石也。經驗後方煮熟研膏合粳米煮粥食。益蒸熟搗粉用瀉精藥或連毅用。精氣。

蒸熟搗粉用瀉精藥或連毅用。

加木瓜入肺加桑白皮。本方加枳實茯苓蜜丸名枳實入脾加木入心加茯苓。

曰。雷頭風症。頭面疣瘡腫痛。憎寒壯熱。狀如傷寒。病在三陽。不可過用寒藥。重

劑誅罰無過處。清震湯治之。荷葉一枚。升麻蒼朮各五錢。煎服。鄭真一曰。荷葉研末酒服三錢。

治遺精極驗。

芡實一名雞頭子

甘瀉固腎益精補脾去濕。

烏梅名理中安丸陶仲文

治胃寒吐

丸得甘則動故

加椒梅

本方加桂枝倍甘草名桂枝人參湯仲景治

吐得辛則伏

故加椒梅

本方加桂枝倍甘草名桂枝人參湯仲景治

太陽表症不除而數下之協熱而利心下痞鞕表裏不

解者

欲解表裏之邪全藉中氣爲敷布故用理中以和

裏而加桂枝以解表不名理中而名桂枝者到底

先表之意也。大抵陽熱爲邪則腹滿

而咽乾陰寒爲邪則腹滿而吐利

本方加黃連茯苓

生冷者非此不可

本方加

李惟熙云。菱寒而芡暖。

菱花背日。芡花向日。

甘庶

甘寒和中助脾除熱潤燥止渴治消渴

渴

消痰解酒毒利二便

外臺方嚼藥或搗汁治發熱口

乾便

治嘔噦反胃

梅師方薑汁薑汁和服

大便燥

吉簇汁熬之名石蜜即白霜糖唐大曆間有鄒和尚始傳造法性味甘溫補脾緩肝潤肺和中消痰治嗽多食助熱損齒生蟲紫砂糖功用畧同

華臍

一名烏牛一名地栗

甘微寒滑益氣安中開

四逆湯仲景四逆者四肢厥逆也再加乾薑二兩耶通脉四逆湯爲少陰主藥然三陰通用之

本方加黃耆白芍陳皮藿香名黃耆湯海藏亦出理中例法本方加青皮陳皮名治中湯治前症腹滿痞悶兼食積者

胃消食飯後宜除胸中實熱治五種噎食之

膈憂膈恚膈氣膈熱膈寒膈噎亦

五種氣噎食噎勞噎憂噎思噎消渴

黃疸血症蠱毒未服能毀銅注機曰合

辟蠱能毀銅銅錢食之則錢化可見爲消堅削積之物故能開五膈消宿食治誤吞銅也

故能開五膈消宿食治誤吞銅也

陳皮茯苓名補中湯治泄瀉不己者加附子惡食食不化加砂仁本方加當歸白芍陳皮厚朴川椒入薑煎名溫胃湯治憂思鬱結肺氣凝脹滿上衝飲食不下本方加黃耆白芍陳皮藿香名黃耆湯海藏亦出理中例法本方加青皮陳皮名治中湯治前症腹滿痞悶兼食積者

太陽症脉沉亦有用此者身痛腹痛下利清穀惡寒不渴四肢厥冷或反不惡寒面赤煩燥裏寒外熱或乾嘔或咽痛脉沉微細欲絕腹痛自利裏寒也三陰自利居多身涼脉靜者順身熱脉大者逢內寒故惡寒不渴四肢者諸陽之本寒則血脉凝滯陽氣不能敷布故一身盡痛而手足厥冷也反不惡寒

凌

一名芟音芟
俗名菱角

甘寒安中消暑止渴解

酒

有兩角三角四角老嫩之殊

武陵記以

三

角四角者爲芟兩角者爲凌

凌花隨月而轉猶葵花之向日

西瓜

甘寒解暑除煩利便醒酒名天生

白虎湯

西瓜甜瓜皆屬生冷多食傷脾助濕衛生歌云瓜桃生冷宜少

食免致秋來成瘧痢瓜性寒曝之尤寒稽含賦云瓜曝則寒油煎則冷物性之異

也。

穀菜部

粳米

粳硬也
糯濡也

甘涼得天地中和之氣和

胃補中色白入肺除煩清熱煮汁止渴

面赤發躁者陰盛格陽于外也寒留胸中故食入即吐。膈有寒飲故逆而乾嘔虛火上炎故咽痛脾沉者寒則伏藏也按少陰脉有沉有緊有數而仲景統以微細言之蓋沉必重按始得緊數亦在沉細中見不似陽症浮大而緊數也薛慎齋曰人知數爲熱不知沉細中見數爲寒甚真陰寒症脉嘗有七八至者但按之無力而數耳宜深察之

附子

一枚生用乾薑一兩甘草炙二兩

冷服面赤者格陽於上

也加葱九莖以通陽喻嘉言曰陽虛之人雖有表症其汗仍出其手足必厥纔用表藥立至亡陽不用表藥外邪不除故用表藥立服故用前湯加葱爲治。腹痛者真陰不足也加芍藥

二兩以斂陰咽痛陰氣上結也加桔梗一兩以利咽利

止脉不出加入參二兩以助陽補氣血嘔吐加生薑二兩以散逆氣

以上皆通脉四逆湯加減法也。

仲景白虎湯。桃花湯。竹葉石膏湯。並用之以清熱補不足。張文潛粥記。粥能暢胃氣生津液。每晨空腹食之所補不細。昂按今人終日食粥。不知其妙。迨病中食之。覺與藏府相宜。尚非他物之所能及也。

粳乃稻之總

名。有早中晚三收。晚者得金氣。多性涼。

尤能清熱。北粳涼。南粳溫。白粳涼。
紅粳溫。新米食之動氣。

陳

糜米冲淡可以養胃。煮汁煎藥亦取其

調腸胃利小便去濕熱除煩渴之功。

集

云。陳米飯緊作團。火煅存性。麻油

膩粉。調傅一切惡瘡。百藥不效者。

糯米本草名稻米。按詩黍稷稻粱禾麻。菽麥名八穀。此稻與禾所以異乎。

甘溫補肺。虛寒堅大便縮小便。收自

此足少陰藥也。寒淫于內治以甘熱。故以薑附大熱之劑。伸發陽氣。表散寒邪。附子生用。甘草亦補中散寒之品。又以緩薑附之上僭也。甘草爲君。乾薑爲臣。附子爲佐。必冷服者。寒

附子生用。

品又以緩薑附之上僭也。甘草爲君。乾薑爲臣。附子爲佐。必冷服者。寒盛於中。熱飲則格。拒不納。經所謂熱因寒用。又曰治寒

以熱涼而行之是也。此奇制之大劑也。用腎位遠。非大劑不能達。仲景云。傷寒醫下之續

得下利清穀。腹滿身痛者。急當救裏。宜四逆湯。清便自

調身痛者。急當救表。宜桂枝湯。蓋身痛尚屬表症。急則

先救裏。而後解表也。厥陰篇曰。大汗出。熱不去。內拘急

四肢痛。又下利厥逆而惡寒者。四逆湯主之。按厥逆症

四肢厥冷。指甲青脈沉疾。按之有力者爲陽厥。當下之。湯更須速灸之。凡傳經熱邪。則爲陽厥。溺赤而四肢熱

旨中真寒。謂之陰厥。陰縮而四肢冷。程郊倩曰。世言傳

經爲熱厥。直中爲寒厥。斯言甚謬。三陽之厥。多得于失下。此爲熱厥。少陰之厥。悉属于寒厥。陰之熱厥。仲景書

汗。同龍骨牡蠣發痘瘡解毒。然性粘滯。
爲粉能摸汗爲粉能摸汗爲粉能摸汗爲粉能摸汗
病人及小兒忌之。穉米釀酒則熱。熬餳
和脾化痰止嗽。仲景建中湯用之。取其甘以補脾緩中。多食發濕熱動痰火損齒。

穀芽 甘溫開胃快脾下氣和中消食化積炒用。

大麥芽 鹹溫能助胃氣上行而資健運
補脾寬腸和中下氣消食除脹散結祛痰。鹹能化一切米麵菓食積通乳下胎軟堅。

外臺方大麥芽一升。蜜一升服下胎神驗。
薛立齋治一婦人喪子乳脹幾欲成癰。

僅有傷寒。二日至四五日而厥者必發熱一條果如傳邪之謠則在四五日固得矣論中何云一二日不知何經之邪而神速若此其曰厥應下之者下其熱非下厥陰與少陽一府一藏少陽在三陽爲盡陽盡則陰生故有寒熱之往來厥陰在三陰爲盡陰盡則陽接故有寒熱之勝復凡遇此症不必論其來自三陽起自厥陰只論熱與厥之多少熱多厥少知爲陽厥厥多熱少知爲陰厥熱在後而不退則陽過勝而陰不能復遂有瘧病便血等症厥在後而不退則陰過勝而陽不能復遂有除中亡陽等症仲景所以調停二治法須合陰陽進退之機陽勝宜下小承氣湯中已去芒硝之寒而有厚朴之溫在厥陰中破陽以行陰陰勝宜溫。縱有陽邪一見厥利便宜烏梅丸聚辛熱之品而加苦寒之佐在厥陰中破陰以行陽雖有上熱如篇首消渴氣上衝心之症亦不慮其爲扞格也扶陽抑陰之旨微矣又曰烏梅丸于辛酸入肝藥中微加苦寒竊逆上之陽邪而順之使下也名曰安蛔實是安胃故併主下利見陰陽不相順接而下利之症皆可以此方括之也經曰凡陰陽不相順接便爲厥手足逆冷是也方時行曰三陰三陽之

單用麥芽一二兩炒煎服立消其破血散氣。如此良方云神龜亦善下胎皆不可輕用。

久服消腎氣

王好古曰麥芽神龜

用。戊己腐熟水穀李時珍曰無積而服之以伐胃人元氣與白朮諸藥消補兼施則無害也。

炒用豆蔻砂仁烏梅木瓜芍藥五味爲使

小麥

味甘微寒養心除煩利溲止血

時珍

曰素問麥屬火心之穀也鄭玄屬木許慎屬金別錄云養肝與鄭說合思邈云

養心與素問合當以素問爲準按麥秋種夏熟備受四時之氣南方地暖下濕不如北產之良仲景治婦人藏燥症悲傷欲哭狀若神靈用大棗湯大棗十枚小麥一升甘草一兩每服一兩亦補脾氣聖惠方小麥飯治煩熱少睡多渴

脉俱相接于手足陰主寒陽主熱陽氣內陷不與陰氣相順接則手足厥冷也附喻嘉言論桂附丸曰藏爲陰可勝純陽之藥府爲陽必加陰藥一二味制其僭熱經絡之淺又當加和營衛併宣導之藥。

本方加白朮大棗名朮附湯

金匱治風濕相搏身體煩疼

及中寒發厥心痛

本方除甘草名乾薑附子湯

仲景治下

後復汗晝躁夜靜不嘔不渴無表症脉沉微無大熱者

晝日煩躁虛陽擾亂外見假熱也夜安靜不嘔渴脉沉微無大熱陰氣獨治內係真寒也凡陰虛之極陽必厥陽虛之極陰必躁薑附直從陰中回陽不當以晝日煩躁而疑之矣

又治中寒厥逆眩仆

無汗或自汗淋漓

中寒之症身強口噤眩運無汗或自

汗者腠理素虛而陽微也傷寒發熱中寒不發熱以此爲異仲景于傷寒則詳之而中寒未之及何也曰陽動陰靜陰寒既鬱而成熟遂從乎陽傳變不一靡有定方故極推其病不得不詳也不變者陰邪一定而不移則不變故不必詳也不及外熱

麵甘溫補虛養氣助五藏厚腸胃然能

壅氣作渴助濕發熱陳者良。

寒食日紙袋盛懸風處名寒食麵年久不熟人藥尤良。

處名寒食麵年久不熟人藥尤良。

浮小麥

即水淘咸浮起者。鹹爲心穀浮者。

涼止虛汗盜汗勞熱骨蒸

汗爲心液。麥爲心穀浮者。

心麥慙同功。無肉故能涼。

麥醋拌蒸能散血止。

痛慰腰脚折傷風濕痺痛寒濕脚氣丘

易至汗出良

表之涼在皮故麵去皮即熱凡瘡瘍痘瘡滑爛不能

着席者用麥慙裝褥也。

稷甘平益氣和中宜脾利胃。

陶弘景曰。稷米大亦

不識書記多云黍與稷相似又註黍米亦

病禁殊無殊大而

梁水麻皮及

煩躁陰盛格陽

似陽

薑附湯加當歸肉桂人蜜和服名

薑附歸桂湯

喻嘉言曰。服薑附湯後繼服此湯因薑附桂逐營分之邪始得藥病相當也。

再加入參甘草名薑附歸桂參甘湯

本方除甘草加葱四莖名

加薑煎

喻氏曰。服前湯後繼當服此兼補氣血。

本方除甘草加葱四莖名

白通湯

復陽通脉再加入尿猪膽汁名白通加入尿猪膽汁

湯

仲景見後本方加入參一兩名四逆加入參湯。仲景治惡寒

脉微復利利止亡血

惡寒脉微復利陽虛陰勝也。利止則津液內竭故云亡血。與四逆溫

經復陽加入參生津益血

再加茯苓六兩名茯苓四逆湯

仲景治汗下

後病不解而煩躁

過汗則亡陽而表虛誤下則亡陰而裏虛陰陽表裏俱虛乃生煩躁故用

茯苓入參入心以除煩。

本方除乾薑加芍藥三兩名芍

宜人發宿病。詩云：黍稷稻梁，禾麻菽粟。此八穀也。俗猶不能辨證。况芝英乎？按黍稷辨者頗多，皆無確義。時珍曰：黍稷一類二種，粘者爲黍，不粘者爲稷。昂謂詩人既云八穀，何必取一類者？強分二種，是仍爲七穀矣。蓋穄稷同音，故世妄謂穄爲稷。不知穄乃黍類似粟而粒大，疎散，乃北方下穀，南方全無。北方亦不之重安，能越度梗壤而高踞。穀之上也。乎陶氏所說，因是穄黍，所以疑也。若稷當屬高大，如盧世之所謂蘆稷者，實既否。美姓復中和幹，又高大，所以能爲五穀之長。而先王以之名官也。況穄黍所生不偏，而蘆稷薄海蕃滋。本草乃指蘆稷爲蜀黍，其名義亦不倫矣。此實從來之誤，敢爲正之。以質明者，又蘆稷最能和中，前湯溫服治霍亂，吐瀉如神。昂嘗病腹中啾唧，經兩月，有友人見招飲以蘆稷燒酒一醉，而積病暢然，性之中和，又可見矣。

藜甘草附子湯仲景治傷寒發汗不解反惡寒者虛故也

仲景

汗出表不解而惡寒，獨曰：反其爲過。汗陽弱可知。汗出爲營虛，惡寒爲衛虛，若重補其陰，則惡寒愈甚。但回其陽，則陰愈劫矣。故用附子以回陽，而加芍藥以斂陰。此營衛兩虛之救法。李梴曰：汗後亡陽，惡寒者，表虛也。芍藥附于甘草湯，下後惡寒者，裏虛也。四逆湯，其有表邪未盡者，必兼發熱，柴胡加桂湯，又有裏實熱伏于內陽，微于外，而惡寒便堅者，猶須下之。傷寒百問曰：汗後惡寒人必虛，下後發熱人必實是也。

本方除附

子用甘草四兩乾薑二兩，名甘草乾薑湯。仲景治傷寒脉

仲

浮自汗小便數，心煩微惡寒，脚攣急，用桂枝湯誤攻其表得之，便厥，咽中乾煩躁吐逆，以此湯以復其陽。脈浮自汗

便數惡寒，陽不足也。攻表重虛其陽，得湯便厥，胃之津液傷也。故以甘草益氣，乾薑助陽。尤虛，辛熱有傷其陰，雖與白芍甘草湯益其陰血，復其津液，故症雖瘳，子少陰，而不敢用四逆也。若厥愈，足溫者。

粟

甘鹹微寒。養胃益氣。治胃熱消渴。止

霍亂利小便。

千金方。粟米粉水丸梧子大煮七枚。內醋中細吞之。

治反胃。吐食。

即梁米。有青黃赤白黑諸色。

陳者良。

蕎麥麵

甘寒降氣。寬腸。治腸胃沉積。

孟說

曰。能鍊五藏垢穢。昇按亦能解酒積。泄痢。帶濁。傅痘瘡潰。

爛湯火灼傷脾胃虛寒人勿服。

黑大豆 甘寒。色黑屬水。似腎腎之穀也。

豆有五色。各八五藏。故能補腎鎮心。腎水足則明。

目。腎水足。則目明。利水下氣。古方治水腫每交單用。或加他藥散。

當歸四逆湯

仲景

治厥陰傷寒。手足厥冷。脉細欲絕。

成氏曰。手

甚者嘔吐。此爲急病。

漿水者。泄利漿水。澄澈清冷也。又曰。加漿水煎之。

加官桂良薑半夏名漿水散。治虛寒水瀉。冷汗。脉微。

本方加生脉散。陳皮。名回陽返本湯。治陰盛格陽。本方

能通血脈。仲景當歸四逆湯見後。本方加茵陳。名茵陳四逆湯。治陰黃。

細欲絕。及男婦寒疝。臍下冷。引腰膀而痛。

寒傷營血。故加當歸木通。

本方加當歸木通。名當歸四逆湯。治感寒手足厥冷。脉

別見本方加吳茱萸。名茱萸四逆湯。治厥陰少陰腹痛和門。本方加吳茱萸。名茱萸四逆湯。治厥陰少陰腹痛。

更作芍藥湯以和其陰。其脚即傳芍藥甘草各四兩。

熱祛風

炒熱酒沃飲其汁。治產後中風危篤。及姪娠腰痛。兼能發表。千金云。一以去風。

當歸

桂枝 茵藥 細辛

三兩

甘草

即木通二兩

通草

即木通二兩

大

金云。

一以消血結。

活血

產書云。熬令烟絕。酒淋服。下產後餘血。

解毒

蘇頌曰。古稱大豆解百藥毒。試之不然。又加甘草。其驗乃奇。

消腫止痛。搗塗一切腫毒。煮食稀痘瘡。

緊小者良

小者名馬料豆。每晨鹽水吞。或鹽水煮食。補腎。

畏五參龍胆猪肉。忌厚朴。犯之得前胡動氣。得前胡杏仁牡蠣石蜜諸胆汁良。

赤小豆

甘酸

思邈

色赤心之穀也。性下。

行通小腸利小便

心與小腸相表裏。

行水散血。消腫排膿。清熱解毒。治瀉痢脚氣。

昔有患腳

此足厥陰藥也。成無己曰。脉者血之府也。諸血皆属于心。通脉者必先補心益血。苦先入心。當歸之苦。以助心血。心苦緩急。食酸以收之。芍藥之酸。以收心氣。肝苦急急。食甘以緩之。大棗甘草通草。以緩陰血。四逆之名多因熱之不同。此則因風寒中血脉而逆。故以當歸辛溫。血中之氣藥爲君。通脉散逆。必先去血中之邪。故以桂枝散太陽血分之風。細辛散少陰血分之寒。爲輔。未有營衛不和。而脉能通者。故以芍藥甘草大棗。調和營衛。通草利九竅。通血脉關節。諸藥藉之。以破阻滯。而厥寒散矣。周揚俊曰。四逆湯全從回陽起見。四逆散全從和

氣者。用赤小豆袋盛。朝夕踐踏之。遂愈。
同鯉魚煮食。汁能消水腫。煮粥亦佳。

傳一切瘡疽

雞子白調末。籠之性極粘。乾則難揭。入苧根末則不粘。宋仁宗患痄腮。道士贊能取赤小豆四十九粒。呪之雜他藥傅之而愈。中貴任承亮親見。後任自患惡瘡。傅永投以藥立愈。問之。赤小豆也。承亮始悟。道士之呪偽也。後遇豫章。見醫治瘡疽甚捷。任曰。莫非赤小豆耶。醫驚拜曰。用此活三十餘口。止渴解酒。通乳下胎。然滲津

液久服令人枯瘦。

四逆散

仲景此和解之寒劑。因名四逆。附次于此。

治傷寒少陰症

陽邪入裏。

四逆不溫。或歟或悸。或小便不利。或腹中痛。或泄利下重。

陽邪傳裏。熱結于裏。故四肢逆而不溫。氣逆挾痰。故歟。氣虛挾飲。故悸。裏有結熱。故小便不利。腹痛下利。

○傷寒邪在三陽。則手足必熱至太陰。則手足溫。至少陰。則熱邪漸深。四肢逆而不溫。至厥陰。則手足逆冷。經曰。熱深厥亦深。熱微厥亦微。與此湯以散傳經之熱。

柴胡 芍藥 炒枳實 炒甘草 等分爲末。水調飲歟

加五味子乾薑。併主下利。

五味收逆氣。乾薑散肺寒。肺與大腸相表裏。上歟下利治。

故本集改熱藥爲燥劑。而以行水爲通劑。

綠豆 甘寒。行十二經。清熱解毒。

一切草木金石

自內達外足矣。

解表裏起見。當歸四逆全從養血通脈起見。不欲人受熱之味。恐劫其陰也。蓋少陰藏中。重見真陽。陽不回。則邪不去。厥陰藏中。職司藏血。不養血。則脉不起。即遇久寒之人。亦不用乾薑附子。止用吳茱之走肝者。自上而下。生薑之辛散者。

砒霜毒。皆治之利小便。止消渴。治瀉痢。

連皮

法師同。博加桂枝引導。

陽氣小便不利。加茯苓。

甘淡腹痛。加附子。

滲泄腹痛。加附子。

其涼

在皮。粉撲痘瘡潰爛良。

一市民誦觀音經甚誠出

子以補虛散寒。

泄利下重加薤白。

能通大腸。以泄氣帶。

行折一足。哀叫苦薩。夢僧授一方。綠豆粉新銚炒紫色。井水調厚敷紙貼。杉木扎定其放如神。

白扁豆

甘溫腥香。色白微黃。脾之穀也。

調脾緩胃。通利三焦。降濁升清。消暑除

濕。能消脾。胃之暑。止渴止瀉。專治中宮之病。

土強。

濕去正解酒毒。河豚毒。備急方。新汲水氣自旺。解酒毒。

調未服能解砒。

多食壅氣。子粗圓色白者入藥。連

皮炒研用亦有浸去皮及生用者。

淡豆豉

苦泄肺寒勝熱。

陳藏器曰。豆性生平炒熟熱煮

食寒作發汗解肌調中下氣治傷寒頭
鼓冷發汗解肌調中下氣治傷寒頭

痛煩燥滿悶懊憹不眠發斑嘔逆

凡傷寒嘔逆

可勝數量必一皆直中之邪乎。陽明少陽二經並無

熱劑。豈直中者獨不中此。二經乎。况仲景書中說傳經者有矣。並無直中字面。何所據而以寒熱分之。故程郊倩以直中寒邪傳經熱邪。二說雖古來相傳之語。要未

可爲定論也。

真武湯仲景

治少陰傷寒腹痛小便不利四肢沉重疼痛

自下利者此爲有水氣或欬或嘔或小便利

傷寒脉沉細微吐不

吐心煩但欲寐五六日利而渴者爲少陰症凡人寤則

氣行于陽寐則氣行于陰然必自少陰始故少陰症但

欲寐陰氣勝也一有陽擾則反是矣周易後曰但欲寐

非能寐也昏昏如夢耳六經中惟少陰症難辨少陰屬

腎腎病不能制水水飲停爲水氣腹痛者寒濕內甚也

四肢沉重疼痛寒濕外甚也小便不利自下利者濕勝

而水穀不別也或

及太陽病發汗汗出不解仍發熱心

水拌乾濕得所安甕中築實桑葉厚蓋

過煩悶宜引吐不宜用下藥以通之。

淡豆豉合厄子名厄子豉湯能吐虛煩血

痢虛瘧時珍曰黑豆性平作豉則溫既

經蒸晝故能升能散得葱則發

汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則治

痢得蒜則治血炒熟又能止汗孟說治

盜汗炒香瀆酒服肘後合葱白煎名葱

豉湯用代麻黃湯通治傷寒發表亦治

病。

造淡豆豉法用黑大豆水浸一宿淘

淨蒸熟攤勻蒿覆候上黃衣取晒簸淨。

悸頭眩筋惕肉瞤振振欲擗地氣虛惡寒

心悸汗爲心

汗出過多則

泥封晒七日。取出曝一時。又水拌入甕。如此七次。再蒸去火氣。甕收用。

刀豆

甘平溫中止呃。煅存勝子。柿蒂。

胡麻

即脂麻。一名巨勝子。種出大宛。故曰胡麻。

甘平補肺氣。

益肝腎潤五臟。填精髓。堅筋骨。明耳目。奈飢渴。可以辟穀。但滑腸。

烏髮髮利大
小腸逐風濕氣。
劉河間曰。麻本穀而治。風又云。治風先治血。血活則風散。胡麻入肝益血。故風藥中不可闕也。鄭奠一用鼈虱胡麻佐苦參疾瘡。

藜治大癩。濟入肝益血。故風藥中不可闕也。鄭奠一用鼈虱胡麻佐苦參疾瘡。

麻油滑胎療瘡。熬膏多用之。涼血解毒。

瘡。麻油滑胎療瘡。熬膏多用之。涼血解毒。

液汗去心虛如魚失水則躍也。水停心下亦心悸。心屬火。火畏水。故悸也。虛陽內動。故頭眩。汗多則液少。不能榮養筋肉。故筋惕惕而跳。肉瞤瞤而動也。振振欲擗地者。亡陽無奈欲擗地而入也。程郊倩曰。汗多亡陽。夫人知之然有衛外之陽為周身營衛之主。此陽虛遂有汗漏不止。惡寒身痛之症。有膻中之陽為上焦心肺之主。此陽虛遂有叉手胃心及奔豚之症。有腎中之陽為下焦。真元之主。此陽虛遂有發熱眩悸。瞤振擗地之症。有胃中之陽為中焦。水穀生化之主。此陽虛遂有腹脹滿。胃不和而成心下痞之症。救誤者須觀脈症。知犯何逆。以法治之。腎之真陽盛則水皆內附。而與腎氣同其收藏矣。腎之陽虛不能制水。則泛濫為病。故上凌心而爲眩悸。中侮脾而致嘔瀉也。

方名真武。益取固腎為義。

附子一枚

白术二兩炒

茯苓一兩

白芍三兩炒

生薑三兩

水寒相

搏咳者加五味子。細辛乾薑。

五味斂肺氣。細辛乾薑散水寒。小便利去

乾薑辛熱。嘔去附子。加

茯苓。茯苓下利去芍藥。加乾薑。

為藥酸寒。嘔去附子。加

乾薑辛熱。嘔去附子。加

止痛
生肌

皮肉俱黑者良。栗色者名鱉。

腎栗色者名鱉。

生薑一倍。

附子補氣。
生薑散逆。

鵝胡麻更佳。九蒸九晒可以服食。

陶弘景曰。

八穀之中惟此爲良。昴按若云自大宛來則非八穀之麻明矣。又按月令仲秋之月天子以犬嘗麻則其爲八穀之麻又可見矣。大宛之謫何以稱焉。豈白者產中原黑者產中原黑者。

產大宛乎。

大麻仁

即作布之麻。
俗作火麻。

甘平滑利脾胃大

腸之藥緩脾潤燥治陽明病胃熱汗多

而便難三者皆燥也。汗出愈多則津枯

而大便愈燥。仲景治脾約有麻仁丸成無已曰脾欲緩急食甘以緩之

皆三陽病破積血利小便通乳催生又木穀

此足少陰藥也。茯苓白朮補土利水能伐腎邪而療心悸。生薑附子回陽益衛能壯真火而逐虛寒。芍藥酸收

能斂陰和營而止腹痛。補陽必兼和陰不欲偏勝。經曰。

寒淫所勝治以辛熱濕淫所勝

佐以酸平。真武北方之神一龜一蛇司水火者也。腎爲象之

此方濟火而利水故以名焉。

程郊倩曰水氣惟太陽與少陰有之。以二經同司夫

水也然太陽從表得之膚腠不宣水氣爲玄府所遏故以小青龍發之。少陰有之而動其本氣緣胃陽衰而隄防不及也故用真

武湯溫中鎮水收攝其陰氣按青龍主太陽表水十棗主太陽裏水真武主少陰裏水。喻嘉言曰陽明少陽絕

無用附子法惟太陽經有不得不用之症蓋太陽膀胱爲腎之府腎中陽虛陰盛勢必傳出于府以故纔見脉微惡寒漏汗惡風心悸頭眩筋惕肉瞤躁擾等症纔有

也亦能治風。極難去殼。帛裹置沸湯待冷。懸井中一夜晒乾。就新瓦上授去。

殼搗用畏夜苓白微牡蠣

薏苡仁 甘淡微寒而屬土陽明藥也

胃

甘益胃土勝水淡滲濕瀉水所以益土

故健脾治水腫濕痺脚氣疝氣泄痢熱

淋益土所以生金故補肺清熱色白入

清治肺痿肺癰咳吐膿血

以猪肺蘸扶

土所以抑木故治風熱筋急拘攣

厥陰風木

主筋然治筋骨之病以陽明爲本。陽明主潤宗筋宗筋主束骨而利機關者也。

傳經熱邪不得不用薑附以消陰而回陽也。昂按觀嘉言此論亦謂傳經熱邪難以執泥緣仲景書中本無此說也。

本方去生薑加入參二兩名附子湯。仲景治少陰病身體

仲

痛手足寒骨節痛脉沉者

腎主骨寒溼則痛此一身骨節盡痛乃陽虛陰盛而生內寒所致非外感也若以外感之痛治之則殺人矣故

用參附助陽而勝腎寒加芍藥斂陰以爲陽之附也及

少陰病得之一二日口中和背惡寒者

背爲胸中之府諸陽受氣于胸中轉行于背背爲陽腹爲陰陽氣不足陰寒內盛則背爲之惡寒若風寒在表而惡寒則一身盡寒矣昂按背

爲太陽部分然少陰腎脉亦貫脊與太陽相表裏又背居北方與腎同位故寒傷少陰而背惡寒亦其義也又有陰氣不足陽氣乘虛內陷陰寒表陽新虛背微惡寒

者經所謂傷寒無大熱口渴心煩背微惡寒是也白虎加人參湯主之一爲陰寒內盛一爲陽氣內陷何以明之蓋陰寒爲病內無燥熱則口中和陽氣內陷則消燥

陽明虛則宗筋縱弛。故經曰：取廢獨取肺。則肺熱葉焦氣無所主而失其治節。相傳之官治節出焉。陽明濕熱上蒸。肺則肺熱葉焦氣無所主而失其治節。故廢竈。意苡理脾而兼清熱補肺。筋寒則急。熱則續。濕則縱。然寒濕久留亦變爲熱。又有熱氣薰蒸水液不行。久而成濕者。薏苡去濕要藥。因寒因熱皆可用也。衍義云：因寒筋急者不可用。恐不然。但其力和緩。用之須倍于他藥。殺蛇臚胎炒熟微研。

津液口燥舌乾而渴也。欲辨陰陽寒熱之不同。當以口中燥潤詳之。一法看小便之清赤。清者爲寒。赤者爲熱也。

白通加人尿猪膽汁湯

仲景

治少陰病。下利脉微者。與白

通湯利不止。厥逆無脉。乾嘔而煩。服此湯後。脉暴出者死。微續者生。客之則不能禁。固故下利也。與白通湯復陽散寒。服後利不止。厥逆無脉。乾嘔煩者。寒氣太甚。內爲格拒。陽氣逼亂也。服此湯後。脉暴出者。正氣因發泄而脫也。故死。脉微續者。陽氣漸復也。故生。

即墨
栗毅

酸瀉微寒。斂肺瀉腸而固

即墨
栗毅

死。脉微續

者。陽氣漸復也。故生。

葱白

四
莖
乾薑
一
枝

人尿

五
五
合

猪膽汁

一
合

脰痛者。

真陰不足也。去葱加芍藥二兩。以斂陰。嘔者。加生薑二

兩。以散逆。咽痛者。加桔梗一兩。以利咽。利止脉不出者。

用。

丹溪曰：此是收後藥。要先除病根。

一名麗春花紅。

腎治久嗽。瀉痢遺精。脫肛心腹筋骨諸

痛

東垣曰：收滯固氣能收。入腎故治骨病尤宜。

嗽。瀉痢。初起者忌。

用。

丹溪曰：此是收後藥。要先除病根。

黃紫白艷麗可愛

凡使殺洗去蒂

加入參二兩以助陽

及筋膜取薄皮醋炒或蜜炒用

性緊渴
不製多

令人得醋烏梅陳皮良。瞿中有米極細。

吐逆得醋烏梅陳皮良。瞿中有米極細。

甘寒潤燥煮粥食治反胃

加參
尤佳

神麴辛散氣甘調中溫開胃化水穀消

積滯醫餘云有傷粽子成積用麴末少加木香鹽湯下數日口中聞酒香

積遂治瘀逆癥結瀉痢脹滿回乳

炒研酒服

散亦治目病啟微集云生用能發其

二錢

日亦治目病生氣熟用能斂其暴氣

下胎產後血量末服亦良。造麵法以五月五日

六月六日用白麴百斤赤豆末杏仁泥

此足少陰藥也葱白之辛以通陽氣薑附之熱以散陰寒此白通湯也服而不應者乃陰盛格拒乎陽藥不能達于少陰故加入尿猪膽汁爲引取其與陰同類苦入心而通脉寒補肝而和陰下咽之後冷體既消熱性便發情且不違而致大益經曰逆而從之從而逆之正者正治反者反治此之謂也以熱治寒以寒治熱爲正治以熱治熱以寒治寒爲反治亦曰從治謂從其性而伏之也按厥有陰陽二症陰厥者身涼不渴脉遲細而微陽厥者陽熱極而反厥雖厥而煩渴譖妄身復時溫而脉數也若陽厥極深至于身冷脉微欲絕爲熱極而將死矣急以大承氣下之則厥愈所謂寒藥反能生脉而令身暖也若以熱藥助其陽則陰氣暴絕陽亦絕而死矣若陰已先絕而陽亦將絕

青蒿蒼耳紅蓼汁各三升以配青龍白虎朱雀元武驟蛇勾神六神通和作餅

署生黃衣晒收陳者良炒用

紅麵 甘溫色赤入營而破血燥胃消食活血和血治赤白下痢跌打損傷產後惡露不盡

李時珍曰人之水穀入胃中焦濕熱薰蒸游溢精氣化爲管血此造化自然之妙也紅麵以白米飯雜麵母濕熱蒸署即變爲真紅此人窺造化之巧者也故治脾胃營血得同氣相求之理

紅入米心

陳久者良

昂按紅麵溫燥能腐生物熟故魚肉鮓用之不特取其色也

于此時而後下之則陰陽俱竭而亦死矣陰厥用白通四逆亦須急投緩則無及

附葱熨艾灸法

治陰毒手足厥冷腹痛暴絕服白通湯或四逆湯後用葱一大握以繩纏束切去兩頭留白

寸許以火炙熱安臍上先將麝香半分填臍中次放葱餅用熨斗盛火熨令熱氣從臍入腹痛甚者連熨二三

餅身溫有汗即瘥否則不治或用艾灸關元氣海臍下五分爲氣海二寸名

丹田三寸名關元各二三十壯內外協攻務令一時

之內陰散陽回得汗而解

葱能通中艾能溫熱麝能開竅助之以火故有回陽之功

或曰用釀醋拌麩皮炒熟袋盛蒸熨比前法尤捷

吳茱萸湯仲景治陽明症食穀欲嘔若得湯反劇者則屬

苦酒

酸溫散瘀解毒下氣消食

食敏

蕉

食穀欲嘔胃寒也。得陽反劇則爲太陽熱嘔矣。

少陰症吐利手足厥冷煩

消矣。

開胃氣

令人嗜食。

散水氣治心腹血

氣痛

磨木香服

產後血運

以火淬醋使聞其氣癥結瘀

痺疽黃癰腫腫

外科敷藥多用之

取其斂

性散而斂瘡口益能散所以能斂

醋性

酸收而散癰腫益消則內散

潰則外散

收處即是散處

兩者一義也

口舌生瘡入漱損傷積血

兩者一義也

口舌生瘡入漱損傷積血

氣不得暢而爲痛也。

頭痛上顱頭痛寒氣上逆也。

按三陽皆有頭痛太陰

少陰二經之脉不上循頭故無頭痛惟厥陰與督脈會

于顱亦有頭痛然風溫在少陰濕溫在太陰而頭反痛

是又不可拘拘者李東垣曰太陰頭痛必有痰也少陰

頭痛足寒而氣逆也益太陰少陰二經雖不上頭然痰

與氣逆壅于膈中頭上

氣不得暢而爲痛也。

吳茱萸

一升

人參

三兩

大棗

十二枚

生薑

六兩

能散之殺魚肉菜蕈諸蟲毒多食傷筋

收縮大過酒醋無所

不入故製藥多用之。

米造陳久者良

寇宗奭曰食酸則齒軟者齒屬

智酸寓肝木氣強水氣弱故也。

辛者能散苦者能降甘者居中而緩

酒

辛者能散苦者能降甘者居中而緩

厚者熱而毒。淡者利小便。用爲嚮導可。

則屬胃寒。與太陽之惡寒。隔。原爲熱症者不同。火熱上衝

而恐誤以寒藥治寒嘔也。若服吳茱萸湯。反劇者。則仍

屬太陽熱邪。而非胃寒明矣。

宜葛根加半夏湯。小柴胡湯。君子豉湯。黃芩湯。

飲傷肺溫。飲和中少飲。則和血行氣壯。神禦寒。遣興消愁。辟邪逐穢。緩水藏。行藥勢。過飲則傷神耗血。亦能亂血故飲之身面俱赤。媒人是色損胃。燦精動火。生痰發怒。助慾酒。致生濕熱諸病。

過飲則相火昌炎。肺金受燦致生痰。噉脾因火

少陰症。吐利厥逆。至于煩躁欲死。腎中之陰氣上逆。將成危候。腎中陰盛。上格乎陽。而爲吐逆。故用吳茱萸散。寒下逆人參薑棗。助陽補土。使陰陽不得上干。溫經而兼溫中也。吳茱萸爲厥陰本藥。故又治肝氣上逆嘔涎頭痛。

本方加附子。名吳茱萸加附子湯。治寒疝腰痛。牽引掣

而困急。胃因火而嘔吐。胆因火而忘懼。心因火而昏狂。肝因火而善怒。腎因火而精枯。以致吐血。消渴。勞傷。蠶膈。癰疽。失明。爲害無窮。汪穎曰。人知戒早飲。而

不知夜飲更甚。醉飽就床。熟壅三焦。傷心。損目。夜氣收斂。酒以發之。亂其清明。

丸尺脉沉遲。

大建中湯金

治心胸中大寒痛嘔。不能飲食。腹中寒氣。

勞其脾胃停濕動火因而致病者多矣。朱子云以醉爲節可矣。

醇而

無灰陳久者良。畏枳椇葛花赤豆花綠

豆粉鹹鹵得鹹則解水制火也

韭辛溫微酸肝之菜也入血分而行氣

歸心益胃助腎補陽一名土鍾乳言溫補也除胃

熱充肺氣散瘀血逐停痰治吐衄損傷

一切血病搗汁童便和服噎膈反胃能消瘀血停痰在胃

口致反胃及胃脘痛丹溪曰有食熱物及鬱怒致死血留胃口作痛者宜加菲

汁桔梗入藥開提氣血有腎氣上攻致心痛者宜韭汁和五苓散爲丸空心苟

香湯下治反胃宜用牛乳加韭汁薑汁細細溫服蓋韭汁散瘀薑汁下氣消痰

上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近者。陽受氣于胸中

陽虛則陰邪得以中之陰寒之氣逆而上衝橫格于中焦故見高起痛區不可觸近之症。心爲陽寒爲陰寒乘于心冷熱相激故痛寒乘于脾脾冷弱不消水穀心脾爲子母之藏爲邪所乘故痛而嘔復不能飲食也。

蜀椒合乾薑兩人參兩煎去滓內飴糖一升微煎溫

服。

此足太陰陽明藥也蜀椒辛熱入肺散寒入脾緩胃入腎命補火乾薑辛熱通心助陽逐冷散逆人參甘溫大補肺脾之氣飴糖甘能補土緩可和中益人之一身以中氣爲主用辛辣甘熱之藥溫健其中藏以大補下焦之陰而復其上焦之陽也易按俗云諸痛無補法此症至于不可觸近痛亦甚矣

和胃。牛乳解熱潤燥補虛也。車方總錄曰。食不得入。是有火也。食久反出。是無火也。治法雖有寒熱虛實之別。要以安其胃氣爲本。使陰陽升降平均。嘔逆自順而解。藥毒食毒。狂犬蛇蟲毒。多食昏神。

忌蜜牛肉。昂按今人多以韭炒牛內。其味甚佳。未見其害。經曰。毒藥攻邪。五穀爲養。五畜爲益。五菜爲充。五菓爲助。氣味合而服之。以補精益氣。五菜韭薤葱葵。藿也。五菓桃李棗杏栗也。華子辛甘。

而溫補肝腎。助命門。緩腰膝。治筋痿遺尿。洩精溺血。白帶白淫。經曰。足厥陰病則遺尿。思想無

窮。入房太甚。發爲筋痿。及爲白淫。華子同龍骨桑螵蛸能治諸病。以其入厥陰。補肝腎。命門。命門者藏精之府也。蒸裹炒研用。牙蟲燒烟薰。

景乃用人參飴糖大補之藥。將以仲景爲信歟。抑以後人爲然歟。

十四味建中湯 治氣血不足。虛損勞瘠。短氣嗜臥。欲成勞瘵。及陰症發斑。寒甚脉微。陰症發斑者。或因汗吐下傷腎氣。或因過服涼藥。遂成陰症。寒伏于下。逼其無根失守之火上獨薰肺而發斑。點其色淡紅。隱隱見于肌表。與陽症發斑色紫赤者不同。此胃氣極虛。若服寒藥立見危殆。吳鶴泉曰。以參耆桂附而治斑。法之變者也。醫不達權。安足語此。

黃耆蜜人參 白朮土炒茯苓 甘草蜜半夏 菖蒲製當歸 酒白芍酒熟地 川芎 麦冬 肉蓯蓉 附子 肉桂 加薑棗煎

此足三陰。陽明氣血藥也。黃耆益衛壯氣。補中首藥。四

想

生辛散熟甘溫

陶弘景曰。白冷青熱。
傷寒湯中。不得用青。

外實中空肺之藥也。肺主皮毛。其合陽

明。故發汗解肌。以通上下陽氣

仲景
白通

陽通脈四逆湯並
加之。以通脈回陽。

益目睛。白睛屬肺。利耳鳴。

通二便

時珍曰。葱管吹鹽入玉茎中治小便不通及轉脬。危急者極效。

治傷寒頭痛。時疾熱狂。陰毒腹痛。

陰症
厥逆。

用葱白安。臍上熨之。氣通則血活。

氣爲血帥。故治吐血。

衄血。便血。痢血。食醫心鏡。葱煮粥食。

治赤白痢。癰瘍亦良。

傷血出。火煅研封。

止痛無瘢。乳癰風癰。通乳安胎。

婦人妊娠傷寒。葱白一物湯發汗而安胎。加生薑亦佳。刪繁方。台香豉阿膠治

君補陽。所以益氣

參木
苓草

四物補陰。所以養血

芎歸
芍地

陰陽

調和。則血氣各安其位矣。半夏和胃健脾。麥冬清心潤肺。從營補命門相火之不足。桂附引失守之火而歸元。於十全大補之中。而有加味。要以強中而戢外也。

本方除茯苓。白术。麥冬。川芎。熟地。從營名八味大建中湯。沿同。本方除川芎。熟地。白术。附子。從營。加柴胡細辛

陳皮。名樂令建中湯。治藏府虛損。身體羸瘦。潮熱自汗。將成勞瘵。大能退虛熱。生氣血。

喻嘉言曰。樂令建中湯。柴胡細辛爲君。意在退熱。而陰虛之熱。則不可退。十四味建中湯。用桂附從營。意在復陽。而陰虛之陽。未必可復。又在用方者之善。爲裁酌耳。又曰。二方治藏氣素虛。以之兩建其脾胃之陽。蓋虛勞之病。多本脾胃。故引伸建中之法。乃後人超出。

胎動通氣故能解毒。殺藥毒魚肉毒。蚯蚓

之方

小建中湯

仲景

治傷寒陽脉滯陰脉弦腹中急痛

邪氣入裏與正

相搏則腹痛滿者血不足也。弦者木克土也。太陽在表無腹痛少陽在半表半裏有胸脇痛而無腹痛陽明腹滿急痛者裏實也。宜下之。大柴胡湯。小承氣湯。三陰下利而腹痛者裏寒也。宜溫之。四逆湯。附子理中湯。腸鳴泄瀉而痛者裏虛有寒也。宜小建中湯溫中散寒。

傷寒二三日心悸而煩

陽氣

悸者陰血虛也。氣血內虛與此湯先建其裏。倍芍藥者酸以斂陰。陰收則陽歸附也。加飴糖者甘以潤土。土潤則萬物生也。仍不去薑桂以散邪也。通治虛勞悸衄裏急腹痛夢遺失精。

精四肢酸痛手足煩熱口乾虛勞黃疸

黃疸小便利而色白

者是無熱也。不可除熱當作虛寒治之。喻嘉言曰虛勞病。

至于亡血失精。精血枯槁難為力矣。急宜建其中藏使飲食增而陰血旺。故但用稼穡作甘之味。生其精血。而酸辛酸苦在所不用。舍是無良法也。

地漿鼻衄不止。搗貼足心能溫服。引血下行。關格不通。

和

積化肉食殺蛇蟲蠱毒。治中暑不醒。擣破癥。

搏

擣納肛中敷臍能達下焦消水利大小
能通幽門敷臍能達下焦消水利大小

便切片藥艾灸

音九

一切癰疽惡瘡腫核

獨頭者尤良

李迅曰。癰疽着灸勝于用藥。緣熱毒中膈。上不下通。

必得毒氣發泄。然後解散。初起使用獨頭大蒜切片灸之。三壯一易。百壯爲瘥。

但頭項以上切不可灸。恐引氣上更生大禍也。

史源曰。有灸至八百壯者。終不起一篩。初壞肉不痛。直灸到好肉方痛。至夜火熑滿背高阜。頭孔百數則毒外出。

否則內逼五藏而危矣。綱目曰。精要謂頭上毒不歸於此言過矣。頭爲諸陽所聚。艾宜小如椒粒。炷宜三五壯而已。又

拔凍瘡灸元好問。腦疽艾大如兩核許灸至百壯。始覺痛而痒。由是推之。頭

毒若不痛者。艾大壯多亦無妨也。

頭

其氣薰。多食生痰。動火散氣耗血損

桂枝 生薑

三兩

芍藥

六兩

甘草

一兩

大棗

十二枚

入飴糖

一升微火解服

嘔家不可用建中以甜故也。此即桂枝加芍藥湯。但桂有厚薄耳。昂按此湯

以飴糖爲君。故不名桂枝芍藥而名建中。今人用建中者。絕不用飴糖。失仲景遺意矣。吳鶴皋曰。桂枝當是桂枝味薄。嘗用桂枝味厚故用以建裏。

桂枝味薄。嘗用桂枝味厚故用以建裏。

此足太陰陽明藥也。準繩曰。脾居四藏之中。生育營衛。通行津液。一有不調。則失所育所行矣。必以此湯溫建中藏。故名建中。脾欲緩急。食甘以緩之。故以飴糖爲君。甘草爲臣。桂枝辛熱。辛散也。潤也。營衛不足。潤而散之。芍藥酸寒。酸收也。泄也。津液不通。收而行之。故以芍藥爲佐。生薑辛溫。大棗甘溫。胃者衛之源。脾者營之本。鍼

目昏神。

五葷皆然而蒜尤甚楞嚴經云。

氏戒之。釋氏以大蒜小蒜興渠葱薑答

葱爲五葷葱也。薑蕷山葱也。興

渠西域菜云即中國之薑道家以韭

薤蒜胡荽芸薹爲五葷芸薹油菜也。

忌蜜

薤一名藠子音叫 辛苦溫滑調中助陽散血生

肌泄下焦大腸氣滯治泄痢下重。

王好古曰

下重者氣滯也。四逆散加此以泄滯。按後重亦有氣虛血虛火熱風燥之不同。

胸痺刺痛。仲景用活葉酒湯肺氣喘急安胎。

利產塗湯火傷。和蜜搗用卒死者用薤汁灌鼻中亦可。

葉似韭而中空根如蒜取白用韭汁

經曰營出中焦衛出上焦是已衛爲陽益之必以辛榮爲陰補之必以甘辛甘相合脾胃健而榮衛通故以薑

棗爲使。李東垣曰傷寒論云陽脉盛陰脉弦當腹中急痛以芍藥之酸土中瀉木爲君飴糖炙草甘溫補脾養胃爲臣水挾木勢亦來侮土。喻桂大辛熱佐

芍藥以退寒水薑棗辛甘而溫發散陽氣行于經脉皮毛爲使或謂桂枝湯解表而芍藥少建中湯溫裏而芍藥多何也皮膚爲近則制小其服心腹爲遠則制大其服所以不同也。昂按此即表微其散裏微其收之義。

小建中治腹痛者以木來尅土取芍藥爲君土中瀉木也理中湯治腹痛者以水來尅土取乾薑爲君土中瀉水也平胃散治腹痛自利者取蒼朮爲君瀉土除濕也。雲岐子曰建中爲補能補中焦之虛而不能補上焦下焦之虛調胃爲瀉能瀉中焦之實而不能瀉上焦下焦之實。

本方加黃耆兩半名黃耆建中湯。金匱治虛勞諸不足。

遺治虛勞諸不足。

忌牛肉。其葉光滑露亦難啖。故云薤露。

胡荽 辛溫香竄。內通心脾。外達四肢。辟

一切不正之氣。沙疹痘瘡不出。煎酒飲

之心脾之氣得芳香而運行。含噴遍身。

勿啜頭面痘疹家懸掛辟邪惡。胡荽久食令人多忘。病人

不宜食。胡荽黃花菜。

生薑

辛溫行陽分而祛寒。發表宣肺氣。而鮮鬱調中。暢胃口而開痰下食。治傷

寒頭痛傷風鼻塞

辛能入肺
通氣散寒

欬逆嘔噦

有聲有物爲嘔。有聲無物爲噦。有物無聲爲吐。其症或因寒。因熱。因食。因痰。氣逆上冲而然。生薑能散逆氣。區家聖藥

東垣曰。辛藥生薑之類治嘔吐。但治上。

曰。血不足而用黃耆。黃耆味甘。加以甘草。大能生血。此仲景之妙法。蓋稼穡作甘。甘能補胃。胃爲氣血之海。氣血所從生也。經曰。無陽則陰無以生。以甘益胃而生血旨哉。今人但知參耆爲氣藥。故特表而出之。昂按補血湯黃耆五倍于當歸。亦云補血即此義。亦治傷寒。汗後身痛。表虛惡寒。脉遲弱者。身痛乃六經俱有之症。有表有裏。有寒有熱。有氣血少。不能榮養筋骨。故痛陽虛故脉遲。汗後故脉弱。用黃耆甘草之甘。以補中氣。芍藥之酸。以收陰氣。桂枝辛熱外以益衛。而實表內以和營而補虛。使中氣建立。則能生育營衛。通行津液。表不虛而身痛自汗皆止。虛勞不足可愈矣。

曲附子湯

近效方

治風虛頭重眩。苦極食不知味。用此

緩肌補中益精氣

白术

二兩

甘草

一兩

附子

一枚

每眼五錢。薑五片。棗一枚。

焦氣壅表。實之病。若胃虛。穀氣不行。胸

中閉塞而嘔者。惟宜益胃。推揚穀氣而已。分作表實用。辛藥。瀉之。丹溪曰。陰分咳嗽者。多屬陰虛。宜用貝母。分用生薑。以其辛散也。只按人特知陳皮生薑能止嘔。不知亦有發嘔之時。以其性上升。如胃熱者。非所宜也。藿香亦然。胸壅痰膈。寒痛濕瀉。消

水氣行血痺。

產後血上冲心。及污

通神

明去穢惡救暴卒。

凡中風。中氣。中暑。中惡。暴卒等症。薑汁和童便飲效。薑汁開

療狐臭。

薑汁頻塗。搽凍耳。童便降火也。

前

此足太陰少陰藥也。喻嘉言曰。腎氣空虛。外風入之。風挾腎中陰濁之氣。厥逆上攻。頭間重眩極苦。難耐。兼以脾虛。不知食味。此脾腎兩虛。風已入藏。方中全不用風藥。但用附子。煖其水藏。白朮。煖其土藏。水土一煖。則濁陰之氣盡趨于下。而二症自止。製方之義精矣。

本方加桂枝。不用薑棗。名甘草附子湯。

仲景治風濕相搏。

一身煩痛。汗出惡風。小便不利。或身微腫。

風則上先受之。殆至兩相搏結。注經絡。流關節。入肌膚。無處不到。之濕則下先

故有毒。生辟霧露山嵐瘴氣。早行食半夏。薑能解之。辟霧露山嵐瘴氣。舍之搗汁。

和黃明膠敷貼。風濕痺痛久食兼酒。則

殺南星半夏。薑。野禽毒。野禽多食半夏。

熬膏。

患目發痔積熱使然瘡癰人食之則生惡肉

薑皮辛涼和脾行水治浮腫脹滿

以皮

行皮五皮散用之成無己曰薑棗辛甘能行脾胃之津液而和營衛不專于發散也東垣曰夜不食薑者夜主合而薑主闢也秋不食薑者秋主收而薑主散也姪婦多食薑令兒岐指象形也

秦椒爲使惡黃連黃芩

夜明砂糟薑內入蟬蛻雖老無筋

乾薑黑薑

生用辛溫逐寒邪而發表炮

則辛苦大熱除胃冷而守中辛則散炮之稍苦故止而不移非若溫經止血炮黑止吐衄附子走而不守諸血紅見黑

定嘔消痰去藏府沉寒痼冷能去也

益元湯活人

治面赤身熱不煩而躁飲水不入口名戴陽

成氏曰煩躁者先煩漸至躁也躁煩者先躁而逆運之謂此爲陰盛格陽也雖大躁欲于泥水中臥但飲水不得入口是也此氣欲脫而無譬如燈將滅而復明矣按內熱曰煩謂心中鬱煩爲有根之火故但煩不躁及先煩後躁者皆可治外熱曰躁謂身體手足動擾欲裸衣入井爲無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不治

附子

炮

乾薑

艾葉 黃連

知母

人參

麥冬

五味子

甘草

加薑棗葱白煎入童便一匙冷服

此足少陰藥也附子乾薑艾葉回陽之藥協以人參甘草補其陽虛退其陰火所謂甘溫能除大熱也黃連以

惡生新使陽生陰長故吐衄下血有陰

無陽者宜之亦能引血藥入氣分而生

血故血虛發熱產後大熱者宜之

此非有餘

之熱乃陰虛生內熱也忌用表藥寒藥乾薑能入肺利氣能入肝引血藥生血故與補陰藥同用乃熱因熱用引以黑從治之法故亦治目睛久赤引以黑

附能入腎而祛寒濕能回脉絕無陽

仲景

四逆白通薑附湯皆用之同五味利肺氣而治寒嗽肺惡寒燥脾濕而補脾濕通心助陽而

補心氣苦入心開五藏六府通四肢關節

宣諸絡脈治冷瘻寒瘞反胃下痢多用

折之上之火知母以滋在下之陰王海藏曰煩出于廉躁出於肾成無己曰煩陽也以靜其躁益陽無陰則孤陽無所附麗故扶陽亦兼和陰也麥冬五味補肺清心合人參以生其脉加童便而冷服者熱因寒用也戴氏曰煩躁陰陽經皆有當下之太陽經已得汗而煩者五苓散少陽亦有煩宜小柴胡湯接先賢治煩躁俱作有屬熱者有屬寒者治獨煩不躁多屬熱惟悸而躁者爲虛寒治猶躁不煩者多屬陰惟火邪者屬熱陰煩者少陰爲多由陽氣傳入陰經陰得陽而煩自利而煩渴不眠者辰砂五苓散若非是陽氣傳陰陰氣犯陰經吐利手足厥冷而煩經云陽虛陰乘之故煩又云陰盛發躁欲坐井中吳茱萸湯甚者四逆湯加葱白外有虛煩一症乃病愈後陰陽未復時發煩熱竹葉石膏湯痰多睡不寧者溫胆湯嘔者橘皮湯

回陽救急湯節卷自註云即四逆湯

治三陰中寒初病身不熱頭

損陰耗氣孕婦忌之。

辛熱能動血。王好古曰。服乾薑以治中者必僭上。宜大棗輔之。

不痛惡寒戰慄。四肢厥冷。引衣自蓋。踴臥沉重。腹痛吐

東垣曰。宜甘草以緩之。

母薑晒乾

者爲乾薑。炮黑爲黑薑。

山藥

古名薯蕷。

色白入肺。味苦歸脾。入脾肺

二經。補其不足。清其虛熱。陰不足則內熱。補陰故能

清熱。固腸胃。潤皮毛。化痰涎。止瀉痢。

滲濕故化。

痰止瀉百一方。山藥半生半炒。米飲下。治噤口痢。

肺爲腎母。故

又益腎。強陰。治虛損。勞傷。

王履云。八味丸用之以強

陰。脾爲心子。又能益心氣。

子能令母實。治健忘。遺精。

昂按山藥性滑。故治遺精。而諸家俱未言滑。

生搗

附子

炮乾薑

肉桂

人參

白术

茯苓

錢半夏

陳皮

七分

甘草

三分

五味子

九分

加薑煎。入麝三厘。調服。無

脉加猪胆汁。

苦人心通脉。

泄瀉加升麻黃耆。嘔吐加薑汁。吐

涎沫加鹽炒吳茱萸。

不痛惡寒戰慄。四肢厥冷。引衣自蓋。踴臥沉重。腹痛吐

無力。

初病無身熱頭痛。是無表症。邪不在陽也。惡寒厥逆。見寒中于裏。陽氣不宣于四肢也。引衣自蓋。踴

臥沉重。是寒中少陰也。腹痛吐瀉不渴。是寒中太陰也。指甲唇青。口吐涎沫。是寒中厥陰也。至于沉遲無脉。陰寒爲已甚矣。戰慄有屬陰者。陽微陰勝。邪氣內爭。而正不勝。故心寒足踴鼓額厥冷。而一身戰搖也有屬陽者。真陽來復。正氣鼓動。外爭而勝。故身爲振搖。遂大汗而解也。

敷癰瘍消腫硬。山藥能消熱腫益補其
補陽氣生者能消腫硬是也。

色白而堅者入藥。

百合

甘平潤肺寧心清熱止嗽益氣調

中止涕淚。

涕淚肺肝熱也。經曰：肺爲涕，肝爲淚，心爲汗，脾爲涎，腎爲唾。

利二便治浮腫臘脹痞滿寒熱瘡腫

乳癰傷寒百合病。

行住坐臥不妄。如有鬼神狀，蘇頌曰：病名

百合而用百合治之，不識其義。李士材曰：亦清心安神之效耳。朱二允曰：久嗽

之人，肺氣必虛，虛則宜斂百合之甘斂，勝于五味之酸收。

花白者

入藥。

萊菔

俗作蘿蔔

辛甘屬土生食升氣熟食降

味合人參可以生脉加麝香者通其竅也。

四神丸

治腎瀉脾瀉。

腎瀉者五更時瀉也。經曰：腎者，胃水之關也。前陰利水後陰利穀，腎屬

水。水旺于子。腎之陽虛不能鍛閉，故將交陽分別水穀。不痛而瀉也。兩病皆由腎命火衰，不能上生脾土故也。楊仁齋曰：腎命之氣交通木穀，自然化。

破故紙

四兩酒浸一宿炒

五味子

二兩炒

肉荳蔻

二兩裹煨

吳茱萸

一兩鹽湯泡

用大棗百枚生薑八兩切片同煮，薑爛去薑。

取聚肉搗丸每服二錢臨臥鹽湯下。

若平旦服之，至夜藥力已盡，不能敵。

一夜之陰

寒故也。

氣寬中化痰散瘀消食。丹溪曰。氣升則食自降。

治

吐血衄血咳嗽吞酸利二便解酒毒制

麵毒豆腐積。昔有入病夢紅裳女子。引

入宮殿。小姑娘歌云。五靈樓

閣曉玲瓏。天府由來是此中。惆悵閑懷

言不盡。一丸菜菔火吾宮。道士云。此

犯大麥毒也。女子心神。小姑娘脾神。醫經

菜菔制麵毒。遂以藥併菜菔治之。果愈

腐漿見菜

菔則難收。生搗治噤口痢止消渴。塗跌

打湯火傷多食滲血故白人鬚髮

服何首烏

地黃者忌之。生薑能制其毒。夏月食

其菜數斤。秋不患痢。冬月以菜葉攤屋

瓦上。任霜雪打壓。至春收之。煎湯飲治

痢。得效方。人避難入石洞。屯賊燒烟薰

之。口含菜菔一塊。烟不能毒。嚼汁搗水

飲之亦可。王荊公患偏頭痛。搗菜菔汁

此足少陰藥也。破故紙辛苦大溫能補相火。以通君火。火旺乃能生土。故以爲君肉。蕤辛溫能行氣。消食。緩胃。固腸。五味鹹能補腎。酸能潛精。吳茱辛熱除濕燥脾。能入少陰厥陰氣分而補火。生薑煖胃大棗補土。所以防水。蓋久瀉皆由腎命火衰。不能專責脾胃。故大補下焦元陽。使火旺土強。則能制水。而不復妄行矣。

本方單用破故紙肉。荳蔻名二神丸治同。

火乃土之母。破故紙補腎爲癸水。肉荳蔻厚腸胃。爲戊土。戊癸化火。同爲補土母之藥。

許學士曰。有全不進食者。服補脾藥皆不效。予授二神丸。頓能進食。此病不可全作脾治。蓋腎氣怯弱。真元衰弱。是以不能化食。如鼎釜之下。無火物終不熟也。

本方單用五味子吳茱萸名五味子散治同。本方除五

仰臥。左痛注右鼻。右痛注左鼻。或兩鼻齊注。數十年患二注而愈。

萊

菔子辛入肺。甘走脾。長于利氣。生能升。

熟能降。升則吐風痰。散風寒。寬胸膈。發

瘡疹。降則定痰喘。欬嗽。調下痢後重。止

內痛。皆利氣之功。丹溪曰：萊菔子治痰有衝墻倒壁之功。食醫心鏡研湯

煎服。治氣嗽。炒用。

白芥子 辛溫入肺。通行經絡。溫中開胃。發汗。散寒。利氣豁痰。消腫止痛。痰行則腫消。氣行則痛止。爲末。醋調敷消癰腫。治咳嗽反胃。痺木脚氣。筋骨諸痛。氣滯久咳。肺虛人禁用。

丹溪曰：痰

感應丸 治新舊冷積。瀉利等症。

木香 肉荳蔻 丁香兩半 乾薑炮 百草霜一兩 杏仁四十粒去心 巴豆七十粒去心皮尖 皮膜研去油。巴豆杏仁另研。同前藥末和勻。用好黃蠟六兩溶化。重絹濾去滓。好酒一升。于砂鍋內煮數沸。令蠟浮。用清油一兩。挑內熟取蠟四

味子吳茱萸。加茴香一木香錢。薑煮棗丸。亦名四神丸。
濟治同。茴香亦緩急之藥。木香行氣而實大腸。用以疎肝和脾。又使木盛。尅土也。薛氏醫按云：脾胃虛寒下陷者。補中益氣湯。加木香肉蔻。補骨脂。脾氣虛寒不禁者。六君子湯。加炮薑肉桂。命門火衰。脾土虛寒者。宜八味丸。脾腎氣血俱虛者。十全大補湯。送四神丸。大便滑利。小便秘滯。或肢體盡腫。喘嗽吐痰。爲脾腎虛損。宜金匱加減。腎氣丸。

在腸下及皮裏膜外。此非不能達行。古方控涎丹用之。正此義。韓愈三子養親

湯白芥子主癆。下氣寬中。紫蘇子主氣

定喘止嗽。菜菔子主食。開痞降氣。各微

炒研。看病所主爲君治。

老人痰嗽喘滿。頗食。

北產者良煎

湯不可過熟。熟則力減。芥菜子豁痰利

氣主治畧同。

蔓菁子

即蕷
菁

苦辛瀉熱解毒利水明目

古方治目

治黃疸

搗腹脹

搗研瀝汁飲。或吐或利。腹

用之最多。中自寬得汗愈。癥瘕積聚。小兒血痢。一切

瘡疽。凡瘡疽搗敷皆良。醋調敷尤。敷蜘蛛咬毒。

陳藏器曰。蔓菁園中無蜘蛛。李時珍曰。蔓菁子可升可降。能汗。

兩同化成汁。就飴內和前藥末。乘熱拌勻。丸如豆大。每

服三十丸。空心薑湯下。

此手足陽明藥也。肉蔻逐冷消食。下氣和中。丁香煖胃。助陽宣壅除癖。木香升降諸氣。和脾疎肝。杏仁降氣散寒。潤燥消積。炮薑能逐錮冷。而散痞通闢。巴豆善破沉寒。而奪門宣帶。寒積深錮。非此莫攻。百草霜和中溫散亦能消積。治痢爲佐也。醫貴曰。此方神妙不可言。雖有巴豆。不令人瀉。其積自然消化。李時珍曰。一婦年六十餘。溏瀉五載。犯生冷油膩肉食。即作痛。服升濤藥瀉反甚。脉沉而滑。此乃脾胃久傷。積冷凝滯。當以熱下之。用蠟邊巴豆丸五十粒。服二日。遂愈。自是每用治瀉痢。愈者近百人。

氣湯 治寒疝疼痛。陰氣積于內。復爲寒邪所襲。營衛不調。則成疝病。囊今結硬如石。或

能吐能下。能利小便。明目解毒。其功甚偉。世罕知用何哉。

根搗敷

陰囊腫大如斗。末服。解酒毒。和薑臺根油菜。搗汁。雞子清調塗諸熱毒。單鹽搗用。不用

亦可。

薑臺

辛溫散血。消腫。搗貼乳癰丹毒。

孫思邈曰

搗貼丹毒隨手即消。其效如神。

動疾發瘡。即油菜

道家五子與葉同功。治難產。葷之一。

馬齒莧

一名九頭獅子草

酸寒散血。解毒祛風。

殺蟲。治諸淋疳痢。海上方。搗汁合雞血。多年惡瘡敷兩三遍即瘥。小兒癬惡瘡。燒灰煎膏塗。瘡濕癩。

引導丸而痛。名寒病。病有七種。寒病。水疝。筋疝。血疝。氣疝。狂病。癲病也。症雖見于腎。病實本乎肝。以厥陰肝脉絡于陰器故也。此方乃治疝之通劑。以疝病多因寒濕所致也。女子陰菌亦同此類。張子和曰。凡遺尿癃閉。陰瘻胞溼。精滑白淫。皆男子之疝也。並涸不月。足蹠咽喉乾癰。細小腹有塊。前陰突出。後陰痔核。皆女子之病也。但女子不名。

疝而名痕。

川練子

四錢

木香

三錢

茴香

二錢

吳茱萸

一錢湯泡

長流水煎

此足厥陰少陰藥也。川練苦寒能入肝舒筋。使無拘攣之苦。又能導小腸膀胱之熱。從小水下行。爲治疝之主藥。

木香升降諸氣通利三焦。疏肝而和脾。茴香能入腎除寒。三者皆辛溫之品。用以宣通其氣。使小便下利。則

丹毒搗汁飲以淨敷之。利腸滑產葉如馬齒。

葉如馬齒。

寒去而濕除也。

有大小二種小者入藥性至難燥去壅用亦忌與。

鹽同食。

苦瓜蒂

苦寒陽明

胃

吐藥能止風熱痰

涎上膈宿食

吐去上焦之邪經所謂其高者升而越之在上者涌

之木鬱達之是也。越以瓜蒂淡豉之苦涌

以赤小豆之酸吐去上焦有形之物則木得舒暢天地交而萬物通矣當吐

而胃弱者代以參蘆朱丹溪曰吐中就有發散之義張子和曰諸汗法古方多

有之惟以吐發汗世罕知之故予嘗曰吐法兼汗以此夫昂按吐汗下和乃治

療之四沫仲景瓜蒂散厄跛湯並是吐藥子和治病用吐尤多丹溪治許白雲

大吐二十餘日治小便不通亦用吐沫良薑茴香散寒而煖腎檳榔性如鐵石能下水潰堅已

厥陰肝脉絡于陰器上入

天台烏藥散治小腸疝氣牽引脅腹疼痛

△厥陰肝脉絡于陰器上入

少腹疝病乃肝邪也肝主筋故牽引疼痛小腸經絡並于厥陰寒邪客于小腸少腹痛引罩丸上而不下痛入

脾腹甚則上衝心胸故俗亦名

少腹氣古人治法往往相類。

烏藥

水香

茴香

炒鹽良薑

炒青皮

五錢檳榔

二川練子

十巴豆

七十粒

先以巴豆微打破同川練子麩炒黑去

麩及巴豆同餘藥爲末酒下一錢

此足厥陰手太陽藥也烏藥散膀胱冷氣能消腫止痛川練導小腸邪熱因小便下行木香青皮行氣而平肝良薑茴香散寒而煖腎檳榔性如鐵石能下水潰堅已

甚至用四物四君以引吐成法。具在今人惟知汗下和而此法絕置不用。遇邪在上焦及當吐者不行。涌越致結塞而成壞症輕病致重。重病致死者多矣。時醫背棄古法。枉人生命可痛也夫。

治風眩頭痛。懊憹不

眠癲癇。喉痺頭目濕氣水腫。或合

立煎或吹鼻水。濕熱諸病。上部無實邪者

禁用。能損胃耗氣。語曰。大吐亡陽。大下

亡陰。凡取吐者。須天氣清明。巳午

以前。令病人隔夜勿食。卒病者不拘。類

編云。一女子病齁喘不止。遇道人教取

瓜蒂七枚爲末。調服其汁。即

止。瘧如膠粘。三進而病如掃。

冬瓜

一名白瓜

寒濕熱甘益脾利二便。消水

腫

冬瓜

止消渴

苗葉皆治消渴

散熱毒癰腫

豆斬關奮鬥。破血瘕寒積。皆行氣祛濕散寒之品也。
疝氣方升 治疝氣疼痛

吳茱萸

枳殼 桔子

唐毬子

即山楂核。俱炒用荔枝核

等分爲末。空心長流水下三錢。

此足厥陰藥也。吳茱入厥陰氣分。溫肝逐寒。山楂瀉三

焦火熱。由膀胱出。枳殼行氣而破瘀。山楂散瘀而磨積。

荔枝雙結形類罩丸。能入肝腎。辟寒散滯。故假之以爲

引也。

丹溪曰。疝病自素問以下。皆以爲寒。世有寒而無

經。鬱遏至久。又感外寒濕熱。被鬱而作痛。作寒論。恐

有未盡。古方以烏頭梔子等分作湯。其效亦速。後因此方。腹痛加減。無有不應。須分濕熱多少而治之。又有挾虛而發者。當以參术爲君。而佐疎導導。其脉沉緊而訛

切片敷之丹溪曰冬瓜性急而走火病
陰虛者忌之昂按冬瓜日食常物于諸
瓜中尤覺宜人且味甘而不
辛何以見其性急而走乎

子補肝

之寒危子治內鬱之寒

明目。凡藥中所用爪
子皆冬瓜子也。

橘核丸

濟生。治四種癩。△
橘囊翠丸腫硬不痛不癢爲癩

絲瓜。甘平。蘇頌曰冷涼血解毒除風化痰通

癩。亦有引臍腹絞痛者。四種腸
癩。卵癩水癩氣癩
也。皆寒濕爲病。

經絡行血脉。老者筋絡貫串。象人經
脉故可借其氣以引之。消

橘核

川練子

海藻海帶昆布

桃仁二元胡
兩

浮腫稀痘瘡。△
出不快者燒存性。
入硃砂蜜水調服治腸風

索

厚朴枳實水通桂心

木香五錢酒糊丸

崩漏痔瘻疽滑腸下乳。

鹽湯或酒下

茄根。散血消腫煮汁潰凍瘡。△
史國公藥酒用白茄

根爲君。茄科以馬尿浸三日。晒炒爲末。點牙即落。

茄子甘寒

此足厥陰藥也。疝病由于寒濕或在氣或在血。症雖見
乎腎。病實本乎肝。厥陰肝脉絡陰器。橘核木香能入厥陰氣分
而行氣。桃仁延胡能入厥陰血分而活血。川練木通能

散血寬腸動風發病。

大者是也。按疎導藥即桃仁。川練。枳實。黑梔。川練。吳茱
萸。丁香。木香之類。山危附子酒煎加鹽服。名危附
湯。丹溪曰烏頭治外寒。

導小腸膀胱之熱。由小便下行。所以去濕。官桂能平肝
煖腎。補腎命之火。所以祛寒。厚朴枳實。並能行結水。而
破宿血。昆布藻帶。鹹潤下而軟堅。寒行水以泄熱。濕久爲熱
寒久亦爲熱。同爲散腫消堅之劑也。朱丹溪曰。癩疝不痛非
痛斷房事與厚味不可。
若蒼朮。神麃。山楂。白芷。川芎。枳實。半夏。皆要藥。又宜隨
時月寒熱加減。有熱加卮子。堅硬加朴硝。秋冬加吳茱萸。

金石水土部

金

辛平有毒。生金屑服之殺人。昂按金

性堅剛重墜與血肉之體不相宜故服之致死非其性有毒也。

人被金銀灼者並不潰爛無毒可知矣精

金粹玉世之寶

金制木重鎮怯故鎮心

器豈有毒氣哉。金制木重鎮怯故鎮心

肝安魂魄雖云重墜亦藉其寶氣也古

方有紅雪紫雪皆取金銀煮

汗亦假其氣耳。治驚癇風熱肝胆之病用經風

熱則爲

驚癇失志魂魄飛揚肝屬木而畏金

與心爲子母之藏故其病同源一治。

九散用箇爲衣煎劑加入藥煮畏錫水

銀遇錫則碎五

金皆畏水銀銀功用畧同

銅綠青酸平微毒治風爛淚眼惡瘡

醫方集解卷之四

清暑之劑

暑爲陽邪心屬離火故暑先入心從其類

已月六陽盡出于地上此氣之浮也經

曰夏氣在經絡長夏氣在肌肉表實者裏必虛入熱

則氣泄故經曰脉虛身熱得之傷暑外症頭痛口乾

面垢自汗嘔逆泄瀉少氣倦怠其大較也有餘症者

皆後傳變也傷暑有兼傷風者有兼傷寒者有兼傷

濕者有兼傷食者有冒暑飲酒引暑入內者有納涼

巨室暑不得泄反中人內者有手足擣拗名暑風者

有手足逆冷名暑厥者有昏不知人爲中暑者累占

曰中熱爲陽症爲有餘中暑爲陰症爲不足蓋肺主

氣夏月火盛灼金則肺受傷而氣虛

故多不足凡中暑者不可作中風治

四味香薷飲

治一切感冒暑氣皮膚蒸熱頭痛頭重

汗肢倦或煩渴或吐瀉

暑爲陽邪故蒸熱暑必兼濕故

自汗暑濕于心則煩干肺則渴

千脾則吐利上蒸于頭則

重而痛暑能傷氣故倦怠

日木香膏

瘡瘍婦人血氣心痛吐風痰。合金瘡止。

血殺蟲

治皆肝膽之病。亦金勝木之義。用醋制銅刮用。

自然銅

辛平主折傷續筋骨散瘀止痛

折傷必有死血。瘀滯經絡。然雖審虛實。佐以養血補氣溫經之藥。銅非煅不可用。火毒金毒相煽。復挾香藥。熟毒內攻。雖有接骨之功。然多燥散之禍。用者慎之。

產銅坑中火煅醋淬七次細研甘草

水飛用

昔有銅折翅鷹者。鷹飛去故治折傷。

鉛

甘寒屬腎。稟壬癸之氣。水中之金。金

中之母。八石之祖。

丹灶家必用之。

安神解毒墜

瘻殺蟲烏鬚

制爲梳鬚。以梳鬚明目。

鉛丹即黃丹用

服者經所謂治溫以清涼而行之也。熱服作瀉。

香薷

兩厚朴薑汁炒

扁豆錢

黃連薑炒三錢

冷服

香薷辛熱必冷

此手少陰手足太陰足陽明藥也。香薷辛溫。散能入

肺脾氣分發。越陽氣以散皮膚之蒸熱。厚朴苦溫除濕。散滿以解心腹之凝結。扁豆甘淡能消脾胃之暑濕。降濁而升清。黃連苦寒能入心脾。清熱而除煩也。

李時珍曰。有處

高堂大廈而中暑者。緣納涼太過。飲冷太多。陽氣爲陰邪所遏。反中入內。故見頭痛惡寒之症。用香薷以發越陽氣。散水和脾。則愈。王履曰。此非中暑。蓋亦傷寒之類耳。玉機微義曰。東垣論暑症。同冬月傷寒傳變爲症。不斂者。與傷寒陰毒。頃刻害人。實同。故是病例大開。後人聲嘆活人書云。脉虛身熱。謂之中暑。乃不足之症。頭痛惡寒。形而拘塞性。宜用溫散之劑。脉盛身熱。謂之中熱。

黑鉛加硝黃。鹽礬鍊成。鹹寒沉重。味兼鹽礬。內用

墜痰去怯。消積殺蟲。治驚癲瘧痢。外用

解熱拔毒。去瘀長肉。熬膏必用之藥。

用
水

漂去鹽硝砂石。微火炒。鉛粉主治暑同
紫色撒地上。去火毒用。鉛粉亦可代
亦名胡粉。錫粉。李時珍曰。鉛粉亦可代
鉛丹熬膏。然未經鹽礬火煅。又有豆粉
蛤粉雜之。只入氣

分不能入血分也。

鐵

辛平重墜。鎮心平肝。定驚癲狂。消癰

解毒諸藥皆忌之。李時珍曰。補。腎藥尤忌之。

畏磁

石皂箇。皂箇木作薪。則釜裂。燬時砧上打落者。名

鐵落。素問。用治怒狂。如塵飛起者。名鐵精器物。

乃有餘之症。頭痛。口渴。大渴引飲。宜清涼之劑。薛氏曰。中暘。乃陰寒之症。法當補陽氣爲主。少佐以解暑。先哲用乾薑附子。此推內經。舍時從症之法也。香薷飲乃散陽氣導真陰之劑。若元氣虛。犯房勞。而用之者。適所以

招暑也。李士材曰。香薷爲夏月發汗之藥。其性溫熱。只

宜于中暑之人。若中熱之人誤服之。反成大害。李時珍曰。

香薷乃夏月解表之藥。猶冬月之用麻黃。氣虛者尤

不可多服。今人謂能解暑。槩用代茶誤矣。張載善曰。風

寒濕皆地之氣。係濁邪。所以俱中足經。暑乃天之氣。係

清邪。所以中手少陰心經。其症多與傷寒相似。但傷寒

初病。未至煩渴。暑初病。即渴。傷寒脉必浮盛。暑脉虛弱

爲不同耳。吊按張氏之辨症是也。如風亦陽邪。屬天氣。嘗中于頭。未可言濁。又傷寒中足六經。雖係內經原之

然。麻黃桂枝皆肺藥。瀉心數湯皆心藥。未可執言。傷足不傷手也。○暑有冒。有傷。有伏。有中。四者輕重之分。

本方除扁豆。名貢連香薷飲。治中暑熱盛。口渴心煩。或

口鮮血。本方除黃連。名三物香薷飲。治傷暑。嘔逆泄瀉。

生衣者名鐵繡鹽醋浸出者名鐵華。

時珍

曰大抵借金氣以平木。針砂消水腫黃
墜下解毒無他義也。

金石消水腫黃

疽散癰瘤烏鬚髮

烏鬚方用之

蜜陀僧 辛鹹小毒感銀鉛之氣而結墜

痰鎮驚止血散腫消積殺蟲療腫毒愈

瘻。熟桐油解狐臭

油調搽腋以鰻頭
蒸熟劈開搽末夾腋下染鬚髮

出銀坑中難得今用者
乃傾銀鑪底入藥煮一伏時

丹硃 體陽性陰內含味甘而涼色赤屬

火性反涼者離中虛有陰也。味不苦而甘者火中有土也。

瀉心經

再加茯苓甘草名五物香薷飲驅暑和中再加木瓜名六味香薷飲治中暑濕盛熱盛則加黃連以瀉心火濕盛則加茯苓木瓜以去脾濕

再加人參黃耆白朮陳皮名十味香薷飲治暑濕內傷

頭重吐利身倦神昏

加參耆者所以補肺益氣加苓朮利濕收脫能于土中瀉木平肝而和脾此外感而兼內

傷之症故用香薷清暑解表而以諸藥專調中唐此

三物香薷飲加羌活防風治中暑兼中風僵仆搐搦或

再加黃耆芍藥

暑月得病手足搐搦如驚風狀名暑風

三物香薷飲加乾

葛名香薷葛根湯治暑月傷風咳嗽

昂按此方當治傷暑泄瀉本方

加蒺藜神治癰瘡

獨熱不寒曰癰瘡當責之暑非暑先入心故加蒺藜以寧心

本方用

香薷扁豆厚朴木瓜甘草加香附陳皮蒼朮紫蘇名二

邪熱心經血滯。主驚。鎮心清肝明目。發汗。

汗爲心液

香散益氣湯

東垣

治長夏濕熱炎蒸。四肢困倦。精神減少。

傷暑

葛根

葛根煎

定驚祛風辟邪

胡玉少卿多惡夢。遇推官胡問之。胡曰昔常患

此有道士教戴靈砂而驗。遂解毒。胎毒。解鬚中絳囊授之。即夕無夢。痘毒。

宜

止渴安胎

博救方水煮一兩研酒服。能下死胎。李時珍曰同遠志龍骨之類。養心氣同丹參當歸之類。

川椒之類。養脾同南星川烏之類。祛風。多服反令人癡呆。

辰產明

如箭簇者良。名箭頭砂。細研水飛三次用。生無毒火煅則有惡磁石畏鹹水忌一切毒。服餌常殺人。

鄭康成註周禮以丹砂石胆雄黃。礬石磁石爲五毒。古人用以攻瘍。

水銀

辛寒陰毒功耑殺蟲治瘡疥蟻蝨

香散益合香薷飲香蘇飲爲一方。治外感內傷身熱腹脹。

葛根

葛根煎

此手足太陰足陽明藥也。熱傷氣參耆益氣而固表濕。

黃耆 人參 白朮

炒

蒼朮 神麩

炒

青皮

熟

陳皮

留白

升麻

白

甘草 夏麥冬 五味

當歸

酒洗

黃柏

酒

澤瀉

白

升麻

胸滿氣促身熱心煩口渴惡食自汗身重肢體疼痛小便赤澀大便溏黃而脉虛者

暑濕蒸入脾土受傷故肢

心煩口渴便赤喘氣在上則小腹脹故胸滿惡食暑先

入心汗爲心液故自汗濕盛故身痛身重寒傷形表邪

外盛故脉大而有餘暑傷氣元氣耗傷故脉虛而不足。

性滑重直入肉頭瘡切不可用。恐入經絡令人筋骨拘攣。解金銀銅

錫毒。

能殺五金墮胎絕孕

能殺五

金墮胎絕孕

從丹砂燒燬而

出畏磁石砒霜得鉛則凝得硫則結並
棗肉入唾研則碎散失在地者以花椒
茶末收之。

輕粉

辛冷時珍曰殺蟲治瘡去痰消積
燥有毒。

十棗湯加大黃能消滯積

善入經絡

牽牛輕粉名三花神祐散

不可遇服常用。

時珍曰水

銀陰毒用

火煅月殊而出再加鹽礮鍊爲輕粉輕

揚燥烈走而不守今人用治楊梅毒瘤

雖能刲風癰瘍

然毒氣竄入經絡筋骨血液耗亡筋失

性滑重直入肉頭瘡切不可用。恐入經絡令人筋骨拘攣。解金銀銅
錫毒。

能殺五金墮胎絕孕

從丹砂燒燬而

出畏磁石砒霜得鉛則凝得硫則結並

棗肉入唾研則碎散失在地者以花椒

茶末收之。

傷脾二木燥濕而強脾火盛則金病而水衰故用麥冬
五味以保肺而生津。肺爲水之上源火旺耗金則金不能生水麥味合入參生脉生津

用黃柏以瀉熱而滋水青皮平肝而破滯當歸養血而
和陰。神麃化食而消積升葛解肌熱而升清。清氣上升能生津液

又風能勝濕澤瀉瀉濕熱而降濁陳皮理氣甘草和中合之

以益氣強脾除濕清熱也。

李東垣曰脾虛肺氣先絕故用黃耆開腠理止汗益氣脾胃既虛陰火傷其生發之氣營衛大虧血虛以人參補之陽旺自能生陰血也更加當歸和血又加黃柏以救腎水蓋甘寒瀉火火減則心氣得平而安也心火乘脾故用炙草瀉火而補脾少用恐滋滿也中滿者去之若腹中急痛急縮者却宜多用咳者去人參爲清濁相干故以橘皮理之長夏濕勝故加二木澤瀉上下分消其濕熱也濕勝則食不化炒麵辛甘青皮辛溫消食快氣五味參甘微酸寒瀉火熱而益肺氣救庚金也

所養變爲筋骨。骨痛癰腫漏遂成廢
瘡。胎害無窮。○上下齒齦屬手足陽明
腸胃經。毒氣循經上行。至齒齦薄嫩之處而出。
土茯苓 黃連

黑鉛鐵茶陳醬能制其毒。

石膏 甘酸而寒。益肝明目。通竅利水。
產銅坑中大塊中空有水者良。

雲母 甘平屬金色白入肺下氣補中堅。
肌續絕治勞傷瘧痢瘡腫癰疽。
同黃丹熬膏貼 之千金翼用敷金瘡。青城山人。
康道豐有雲母粉方能治百病。有五
色以色白光瑩者爲上古人亦有鍊服
者。雲母入火經時不焦入土不腐故云服之長生使澤瀉惡羊

醫貫曰。有傷暑吐衄者。暑傷心心虛不能生血。不宜過
用寒涼以瀉心。宜清暑益氣加丹皮生地犀角之類。蓋
暑傷心亦傷氣。其脉必虛。以參
耆補氣使能攝血斯無弊也。

本方除毒皮澤瀉乾葛名黃耆入參湯

東垣

治暑傷元氣

生夏倦怠胸滿自汗。時作頭痛。
時痛時止爲內傷症 本方除白朮

青皮麥冬五味加茯苓猪苓柴胡羌活。防風連翹知母

名補肝湯

東垣

治陰汗如水。陰冷如冰。脚痠無力。

生脉散

金匱

治熱傷元氣。氣短倦怠口渴多汗。肺虛而咳。

肺主氣火熱傷肺。故氣短金爲火制。不能生水。故口渴
氣少。故倦怠。肺主皮毛虛故汗出。虛火乘肺。故咳。李東
垣曰。津者。庚大腸所主。三伏之時。爲庚金受囚。若亡津
液。汗大泄。濕熱亢甚。燥金受囚。風木無制。故風濕相搏。
骨節煩痛。身盡痛也。

肉

石膏 甘辛而淡體重而降足陽明經胃

大寒之藥色白入肺兼入三焦諸經氣分之藥

寒能清熱降火辛能發汗解肌甘能緩

脾益氣生津止渴治傷寒鬱結無汗陽

明頭痛發熱惡寒日晡潮熱肌肉壯熱

小便赤濁大渴引飲中暑自生外熱

汗能發汗又舌焦胎厚陽明經熱能止自汗無津牙痛爲末擦牙固

齒又胃主肌肉肺主皮毛爲發斑發疹

之要品色赤如錦紋者爲斑隱隱見紅點者爲疹斑重而疹輕率由胃

人參 麥冬

五味子

七

此足太陰少陰藥也肺主氣肺氣旺則四藏之氣皆旺虛故肺絕短氣也人參甘溫大補肺氣爲君麥冬甘寒潤肺滋水清心瀉熱爲臣五味酸溫斂肺生津收耗散之氣爲佐益心主脉肺朝百脉百脉皆而肺清心則氣朝于肺則氣充而脉復故曰生脉也人有將死脉絕者服此能復生之其功甚大夏月炎暑火旺克金當以保肺爲主清晨服此能益氣而祛暑也

李東垣曰手陽明大腸手太陽小腸皆屬足陽明胃大腸主津小腸主液大腸小腸受胃之陽氣乃能行津液于上焦灌溉皮毛充實腠理若飲食不節胃氣不充大腸小腸無所稟氣故津液涸竭焉又曰脉者元氣也人參之甘補元氣瀉火熱麥冬之苦寒補水源而清燥金五味之酸以瀉火補庚大腸與肺金又曰夏月加

熱然亦有陰陽二症。陽症宜用石膏。又

黃耆甘草服之令人氣力湧出。○經疏曰：麥冬實足陽明胃經之正藥。

胃氣極虛。逼其無根之火游行于外。當補益氣血。使中有主則氣不外游。血不

外散。若作熱治死。

但用之渺少。則難見生反掌。醫者宜審。

功白虎湯以之爲君。或自一兩加至四

兩。竹葉、麥冬、知母、粳米亦加四倍甚

者。加芩連柏石膏湯。然能寒胃。虛者。加入參名入參白虎湯。

胃弱血虛。及病邪未入陽明者禁用。成無己解大青龍湯曰：風陽邪傷衛。寒陰邪

傷營。營衛陰陽俱傷。則非輕劑所能獨散。必須重輕之劑同散之。乃得陰陽之邪俱去。營衛俱和。石膏乃重劑。而又專達肌表也。東垣曰：石膏足陽明藥。偏景

用治傷寒。陽明症身熱目痛。鼻乾不得

臥。邪在陽明肺受火制。故用辛寒以清肺氣。所以有白虎之名。肺主西方。按

本方加陳皮炭。甘草名五味子湯。蒸餅爲丸。名補氣丸。

治肺虛少氣。咳嗽自汗。本方加黃耆爲君。甘草桔梗爲佐。名補氣湯。治氣虛自汗。怔忡。再加茯神遠志木通。名換神湯。治肺虛欬則心痛。喉中介介或腫。

六一散

河間一名天水散

治傷寒中暑。表裏俱熱。煩燥口渴。小便不通。瀉熱。霍亂吐瀉。下乳滑胎。解酒食毒。偏主

石淋。暑熱皆陽邪。在表則發熱。在裏則瀉痢。霍亂發瘧。在此則煩渴。在下則便秘。或熱瀉火氣煎灼。精結成石。則

滑石六兩甘草一兩

爲末。冷水或燈心湯調下。丹溪曰：泄及嘔吐。

陽明主肌肉故身熱脈交額中故目痛
脉起于鼻循鼻外金燥故鼻乾胃不和
則臥不安故不得眠然亦有陰虛發熱

及脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外熱
類白虎湯症誤投之不可救也按陰盛

格陽陽盛格陰二症至爲難辨蓋陰盛
極而格陽于外熱而內寒陽盛極而

格陰于外冷而內熱經所謂重陰必
陽重陽必陰重寒則熱重熱則寒是也

當于小便分之便清者外雖煩熱而中
實寒便赤者外雖厥冷而內實熱也內

晉口中之燥潤及舌胎之淺深胎黃黑
者爲熱宜白虎湯然亦有胎黑屬寒者

舌無芒刺口有津液也急宜溫之誤投
寒劑則殆矣

亦名寒水石時珍曰古方所用寒水石
是凝水石唐宋諸方用寒水石即石膏凝水石乃
鹽精滲入土中年久結成青瑩有稜八
水即化辛鹹大寒治渴瑩白者良研細甘
時氣熱盛口渴水腫瑩白者良研細甘

生薑中寒者加硫黃少許

此足太陽手太陰藥也滑石氣輕能解肌質重能清降

火退則肺氣下降故能生水而利小便

火心爲丁火其數六一者取天一生水地六成之之義也

故爲丙

草水飛用近人因其寒或用火煅則不
傷胃味淡難出若入煎劑須先煮數十
沸雞子爲使忌巴豆鐵

滑石 滑利竅淡滲濕甘益氣補脾胃寒

瀉熱降心火色白入肺上開腠理而發
表肺主皮毛下走膀胱而行水通六府九竅

津液爲足太陽經本藥膀胱主水治中暑積熱
嘔吐煩渴黃疸水腫脚氣淋閉偏主石淋水
瀉熱痢六一散加紅麴治赤痢加乾薑治白痢吐血衄血
諸瘡腫毒爲湯熱除濕之要劑消暑散
此足太陰陽明藥也暑必兼濕而濕屬脾土暑濕合邪

散加青黛少許。清名碧玉散治同。本方加紅麴五錢。名

肝

清六丸治赤痢

赤屬熱傷血分

紅

丸治白痢

白屬熱傷氣分

乾

能散濕熱之氣

本方加生柏葉生車前生

丸治白痢能散濕熱之氣本方加牛黃治虛煩不得
睡。本方除白草加吳茱萸一兩。名茱萸六一散治濕熱
舌苔。本方除滑石加黃耆六兩。大棗煎熱服。名黃耆六
一散治諸虛不足盜汗消渴。凡渴症。防。發癰疽。宜黃

耆六一散。忍冬九

砂仁 莎草根去皮 烏梅 甘草炙四兩 扁豆炒 乾葛二兩
縮脾飲 清暑氣除煩渴止吐瀉霍亂及暑月酒食所傷。

結通乳滑胎。時珍曰。滑石利竅。不獨小便也。上開腠理而發表。是

除上中之濕熱。下利便溺而行水。是除中下之濕熱。熱去則三焦寧。而表裏和。

濕去則關門通。而陰陽利矣。河間益元散。通治上下表裏諸病。蓋是此意。益元散一名天元散。一名六一散。取天一生水地六成之之義。滑石六錢。甘草一錢。

或加辰砂。○滑石止渴。非實止渴。資其利。竊滲去濕熱。則脾胃中和。而渴自止耳。若無渴。小便利。而渴者。內有燥熱。宜滋潤。或誤服此。則愈亡其津液。而渴轉甚矣。故好古以爲至燥之劑。

使宜甘草。走泄之劑。宜甘草以和之。

白而潤者良石韋爲

朴硝芒硝。朴硝即皮硝。辛能潤燥。鹹能軟堅。苦能下泄。大寒能除熱。朴硝酷滯性急。

脾胃病矣。故治暑必先去濕。砂仁。草果。辛香溫散。利氣快脾。消酒食而散濕。扁豆專解中宮之暑。而參濕。濕盛不生。葛根能升胃中清陽而生津。葛根能生津。烏梅清而渴。葛根多燥。惟葛根能生津。烏梅清

熱解渴。甘草補土和中。

消暑丸

海藏

治伏暑煩渴。發熱頭痛。脾胃不利。

半夏

一斤醋五

茯苓

甘草半斤生用

薑汁糊九勿見生

水熱湯

下有痰。生薑湯下。

此足太陰太陽藥也。長夏炎蒸濕土司令。故暑必兼濕。症見便秘煩渴。或吐或利者。以濕勝則氣不得施化也。此方不治其暑。耑治其濕。用半夏。茯苓。行水之藥少佐

芒硝經鍊稍緩能瀉除三焦腸胃實熱推陳致新。按致新則瀉亦有補與大黃同。蓋邪氣不除則正氣不能復治。陽強之病傷寒也。必病熱。蓋寒鬱而爲熱也。疫癆積聚結癖留血停痰黃疸淋。

閉癰癰瘡腫目赤障翳通經障胎。

豐城尉家

有猫子死腹中啼叫欲絕醫以硝灌之死子即下後有一牛亦用此法得活。本用治人治畜亦驗。經疏曰：硝者消也。五金八石皆能消之。况藏府之聚積乎？其直往無前之性。所謂無堅不破。無熱不蕩者也。病非熱邪深固閉結不通不可輕投。恐誤伐下焦真陰故也。成無己曰：熱淫于內治以鹹寒。氣堅者以鹹軟之。熱盛者以寒消之。故仲景大陷胸湯。大承氣湯。調胃承氣湯。皆用芒硝以軟堅。

甘草以和其中。半夏用醋煮者。昔能開胃散水斂熱解毒也。使暑氣濕氣俱從小便下降。則脾胃和而煩渴自止矣。局方取此名消暑丸。意甚深遠。傷暑而發熱頭痛者服此尤良。

本方一兩加黃連二錢。名黃連消暑丸。治伏暑煩渴而多熱痰。

大順散

治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕。水穀不分。清濁相干。陰陽氣逆。霍亂吐瀉。藏府不調。

乾薑 桂 杏仁去皮 甘草 等分。先將甘草用白砂炒次入薑杏炒過去砂合桂爲末。每服二錢。

去實熱結不至堅者。不可用也。佐之以苦。故用大黃相須爲使。詳譽卿曰。芒硝

消散破結軟堅。大黃推蕩走而不守。故

二藥相須同爲峻下之劑。

王好古曰。本草言芒硝墮胎。然妊娠傷寒可下者。

兼用大黃以潤燥軟堅。瘺熱而母子相安。

經曰。有故無殯亦無殯也。此之謂歟。

謂藥自病。當之故母與胎俱無患也。

硝能柔五金化七十二種石爲水。生子

齒地刮取煎鍊在底者爲朴硝。在上有

芒者爲芒硝。有牙者爲馬牙硝。置風日

中消盡水氣輕白如粉爲風化硝。大黃

爲使。本經別錄朴硝硝石雖分二種而氣味主治畧同。後人辨論紛然。究

無定指。李時珍曰。朴硝下降屬水性寒。硝石爲造炮焰硝上升屬火性溫。昂按

此足太陽藥也。

從仲景太陽例藥變用

夏月過于飲冷食寒。陽氣

不得伸越故氣逆而霍亂吐瀉也。脾胃者喜燥而惡濕。

喜溫而惡寒。乾薑肉桂散寒燥濕。杏仁甘草利氣調脾。

皆辛甘發散之藥升伏陽于陰中亦從治之法也。如傷

暑無寒症者不可執泥。

中傷暑毒陽外陰內故治之多用緩劑如大順散香薷飲之類

大蒜辛熱通竅故亦治之。然有陰陽二症寒熱不同。治當審慎。吳鶴臯曰。此方非治暑乃治暑月飲冷受傷之

脾胃

耳。

五苓散 治暑毒入心發熱大渴小便不利及暑濕相搏。

自汗身重。

方見燥門

渴者肉桂加黃連。

朱丹溪滑伯仁每疑暑病不當發汗。

蓋暑傷心熱傷氣。汗爲心液。汗多必致亡陽。惟用香薷飲五苓散利水之藥。使暑氣從小腸膀胱下降。則病易

世人用硝從未有取其上升而溫者。李氏之說恐非確論。

愈而元氣無損矣。

玄明粉 辛甘而冷。去胃中之實熱。瀉腸

中之宿垢潤燥破結消腫。明目。血熱去則腫消

而明目。昂按瀉痢不止。用大黃玄明粉以推蕩之。而瀉痢反止。蓋宿垢不淨。痰終不除。經所謂通因通用也。

朴硝煎化同萊菔煮。

再同甘草煎入罐火煅。以去其鹹寒之性。陰中有陽。性稍和緩。大抵用代朴硝。若胃虛無實熱者禁用。俱忌苦參。

太陰玄精石 太陰之精鹹寒而降。治上盛下虛。救陰助陽。有扶危拯逆之功。正陽

人參白虎湯 治太陽中暎身熱汗出。足冷惡寒。脈微而

渴。方見火門

竹葉石膏湯

治傷暑發渴脉虛。方見火門

丹用治傷寒壯熱來

復丹用治伏暑熱瀉。

鹽處鹹鹵所生。青白瑩徹。片皆六稜者。

出解池通泰積。

良今世用者多是絳石。

醇
漸
緩

赤石脂 甘而溫。故益氣生肌而調中。酸

而澀。故收濕。獨行方。煅末敷小兒臍中。汁出赤腫。止血而

固下。經疏云。大小腸下後虛脫。非濇劑無以固之。其他濇藥輕浮。不能達

下。惟赤石脂體重而濇。直入下焦陰分。故爲久痢泄澼要藥。仲景桃花湯用之。

加乾薑。粳米。療腸澼泄痢。崩帶遺精。癰瘍。痔瘻。特潰

收口長肉。催生下胞。經疏云能去惡血。惡血化則胞胎無阻。東垣曰。胞胎不出。濇劑可以下之。又云。固腸胃有收斂之能。下胎衣無推蕩。

細膩粘舌者良。赤入血分。白入之峻。細膩粘舌者良。赤入血分。白入

氣分。五色上研粉水飛用。惡莞花畏

大黃

醫方集解卷之四

利濕之劑。濕爲陰邪。經曰。地之濕氣感。則害皮肉筋

脉。又曰。諸濕腫滿。皆屬於脾。濕者。土之氣。土者。火之子。故濕每能生熱。熱亦能生濕。如夏熱則萬物潤澤也。濕有自外感得者。坐臥卑濕。身受水雨也。有自內傷得者。坐冷酒麵。縱恣無度。又脾虛腎虛

不能防制也。有傷風濕者。有傷熱濕者。有傷寒濕者。有傷暑濕者。有中濕而悶邪不遂。舌強語澁。昏不知人。狀類中風者。濕在表在上。宜發汗。在裏在下。宜滲泄。裏虛者。宜實脾。挾風而外感者。宜解肌。挾寒而在半表半裏者。宜溫散。凡中濕者不可作中風治。

五苓散。仲治太陽病。發汗後。大汗出。胃中乾煩躁。不得

眠。欲飲水者。少與之。令胃氣和則愈。若脉浮。小便不利。微熱。渴濁者。此湯主之。脉浮爲表症。仍在便秘。熱渴。及中風。發熱六七日不解。而煩。有表裏症。渴欲飲水。水

禹餘糧 甘平性濁。手足陽明。胃大腸血分。

重劑治欬逆。下痢血閉。癥瘕崩能固下。

瘻

李先知云。下焦有病人。又能催生。

石

中黃粉。生于池澤。無砂者良。牡丹爲使。

浮石

一名海石

鹹潤下寒降火。色白體輕入

肺清其上源。肺爲水止渴止嗽通淋軟

堅除上焦痰熱。消癰瘤結核。頑痰所結。鹹能軟堅

俞琰席上腐談云。肝屬木。當浮而反沉。

肺屬金。當沉而反浮何也。肝實而肺虛也。故石入水則沉。而南海有浮水之石。

本入水則浮。而南海有沉水之香。虛實之反如些。水沫日久結成海中者。味鹹更良。

入即吐。名曰水逆。表以外症未罷言。裏以煩渴屬府言。邪熱據積飲。上逆故外水格而不入。滋燥導飲生津。故亦爲消痞良方。程郊清曰。邪在上焦而治在下焦者。使濁陰出下竅。而清陽之在上焦者。自能宣化矣。心邪不從心瀉。而從小腸瀉。又一法也。昂按此乃正治。非又一法也。乃藏實而瀉其府也。通治諸濕腹滿水飲水腫嘔逆泄瀉水寒射肺。或喘或咳。中暑煩渴。身熱頭痛。膀胱積熱。便祕而渴。霍亂吐瀉。痰飲濕瘡。身痛身重。此皆傷濕之見症也。濕勝則脾不運。土不能制水。溢于皮膚則腫脹。併于大腸則泄瀉。水停心下。則嘔逆水寒射肺。則喘咳。暑先入心。則煩渴五苓利小水。降心火。故兼治中暑煩渴。肺病則金不能生水。膀胱熱則陽不能化陰。故便祕而渴。陰陽不和。則霍亂吐瀉。濕勝則身痛身重。大抵下不通利。則陰陽不能升降。而變症多矣。

蓬砂 甘微鹹涼色白質輕故除上壅胸

膈之痰熱生津止嗽治喉痺口瘻諸病
初覺喉中腫痛含能柔五金而去垢膩
化瘀津則不成瘻能柔五金而去垢膩

故治噎膈積塊結核努肉目翳骨哽鹹

軟堅含之燉汁出西番者白如明礬出南番

者黃如桃膠能制汞啞銅逢砂硝砂並可作金銀錠

硝砂硝音鏡鹹苦辛熱有毒消食破瘀治

噎膈癰瘕去目翳努肉燉子宮助陽道

性大熱能爛五金本草稱其能化人心爲血亦甚言不可多服耳凡煮硬肉投少許即易爛哉治噎膈癰瘕肉積有殊功雞峯方云人之藏府多因觸冒成病

猪苓 桔梗 白朮

炒十株 漏半株

桂半兩按雜病當用桂傷寒

症中表未解者仍當用桂枝兼取解表

爲末每服三錢服後多飲熱水

汗出而愈傷暑者加硃砂燈心煎

此足太陽藥也太陽之熱傳入膀胱之府故口渴而便不通經曰淡味滲泄爲陽二苓甘淡入肺而通膀胱爲

君水無當于五味故淡能利水桔梗走氣分猪苓咸味走血分然必上行入肺而後能下降入膀胱也鹹味涌泄爲陰澤瀉甘鹹入腎膀胱同利水道爲臣益土所以制水故以白朮苦溫健脾去濕爲佐膀胱者津液藏焉氣化則能出矣故以肉桂辛熱爲使熱因熱用引入膀胱以化其氣使濕熱之邪皆由小水而出也若汗下之後內

而脾胃最易受觸。飲食過多，則停滯難化。冷熱不調，則嘔吐瀉痢。而膏粱者爲尤甚。口腹不節，須用消化藥。或言飲食既傷于前，難以毒藥反攻其後，不使砕砂巴豆等，只用麵糰之類。不知古今立法用藥，各有主對。麴蘖止能消化米穀，如傷肉食，則非硇砂阿魏不能治也。如傷魚蟹，須用橘葉紫蘇生薑。傷菜葉，須用丁香桂心。傷水飲，須用牽牛芫花。必審所傷，之因，對用其藥，則無不愈。其間多少，則隨患人氣血，以增損之而已。又有虛人沉積，不可直取。當以蠶匱其藥，蓋蠶能久留腸胃，又不傷氣，能消磨至盡也。又有脾虛飲食遲化者，正宜助養脾胃，自能消磨，更不須用剋化藥耳。病久積聚成癥瘕者，須用三棱鼈甲之類。寒冷成積者，輕則附子厚朴，重則舉石硫黃，瘀血結塊者，則用大黃桃仁之類。用者詳之。

出西戎乃鹵液結成狀如鹽塊

亡津液，而便不利者，不可用五苓散。重亡津液，而益屬其陰也。勿治之，便利自愈。亦有大熱如狂，小便不利，而用此湯者，欲使太陽隨經之邪，直達膀胱，由溺而出也。大熱利小便，亦釜底抽薪之義。陳來章曰：治秘之道有三。一曰肺燥不能化氣，故用二苓澤瀉之甘淡，以泄肺而降氣。一曰脾濕不能升精，故用白朮之苦溫，以燥脾而升精。一曰膀胱無陽不能化氣，故用肉桂之辛熱，以溫膀胱之化陰，使水道通利，則上可以止渴，中可以去濕，下可以泄邪熱也。李東垣曰：五苓散，太陽裏之下藥也。太陽高則汗而發之，下則引而竭之。渴者，邪入太陽本也。當下之，使從膀胱出也。小便利者不宜用。然太陽病，熱而渴，小便雖利，亦宜五苓下之。又曰：邪在營衛之間，謂之半表半裏。五苓散分陰陽，膀胱經之半表半裏也。理中湯治吐瀉，上下之半表半裏也。活人云：脉浮大是表症，當汗。其人發熱煩渴，小便赤，却當下。此是表裏俱見，五苓散主之。○五苓利水，何以能止渴？生津，蓋濕熱壅于中焦，則氣不得施化，故津竭而小便不通也。用五苓利其小水，則濕熱下消，津回而渴止矣。亦內經通用之意。李東垣曰：傷飲者，無形之氣也。宜發汗，利小便，以導其濕。傷食者，有形之物也。輕則消化，或損耗者詳之。

冷濕處即化白淨者良水飛過醋者

乾如霜用畏酸忌羊血

慈石 辛鹹色黑屬水能引肺金之氣入

腎補腎益精除煩祛熱通耳明目

耳爲腎氣

腎水足則目明治羸弱周痹骨節痠痛

腎主骨

痛重鎮腫核堅誤吞鐵服末止金瘡

性

十劑曰重可去怯慈石鐵粉之屬是也。經疏云石藥皆有毒獨慈石冲和無悍猛之氣又能補腎益精然體重濟酒優于丸散時珍曰一士病目漸生翳珍以慈石勝濕湯加減而以磁朱丸佐之兩月而愈蓋磁石入腎鎮養真陰使神水不外移砂入心鎮養心血使邪火不上侵佐以神曲消化滯氣溫養脾

重則方
可吐下。

本方去桂名四苓散

李東垣曰無惡寒症不可用桂揚俊曰五苓爲渴而小便不利者

設若不渴則茯苓甘草湯足矣若但渴則四苓足矣

本方加辰砂名辰砂五苓散

並治小便不利本方加蒼朮名蒼桂五苓散治寒濕本

方加茵陳名茵陳五苓散治濕熱發黃便秘煩渴本方

加羌活名元戎五苓散治中焦積熱本方加石膏滑石

寒水石以清六府之熱名桂苓甘露飲宣明別見火門本方去桂澤瀉名猪苓散金匱治嘔吐病在膈上思飲水者本方單用肉桂菝葜等分蜜丸名桂苓丸治冒暑煩渴引飲過多腹脹便赤本方單用澤瀉五兩白术二兩名澤瀉湯

遺

謂生發之氣。乃道家黃婆媒合嬰兒之
理。方見孫真人千金方。但云明目。而未
發出用藥。微義也。

色黑能吸鐵者真火煅醋
淬碾末水飛或醋煮三日夜用柴胡爲
使。鍛鐵消金懸牡丹。

礞石 甘鹹有毒體重沉墜色青入肝製

以硝石能平肝下氣爲治驚利痰之聖

藥。吐痰水上以石末摻之。痰即隨下。王
隱君有礞石化痰丸。能治百病。礞石

焰硝各二兩。研水飛淨一兩。黃酒
蒸八兩。黃芩酒洗八兩。沉香五錢爲末

水九量虛實服。時珍曰。風木火過。制
脾土。氣不運化。積滯生痰。壅塞上中二
焦。變生諸病。礞石重墜。硝性

疎快。使痰積通利。諸症自除。氣弱脾虛

治心下支飲常苦眩。本方單用茯苓白术等分。名茯
苓白术湯。治脾虛不能制水濕。盛泄瀉。再加郁李仁。

薑汁服。名白茯苓湯。治水腫。本方加川棟子治水泄。
方加入參。名春澤湯。再加甘草。合四君子。亦名春澤湯。治無

病而渴與病瘥後渴者。本方去桂。加蒼朮。甘草。芍藥。梔

子。黃芩。羌活。名二术四苓湯。通治表裏。兼清暑熱。

本方倍桂。加黃耆。如术之數。治傷暑大汗不止。本方加

甘草。滑石。梔子。入食鹽。燈草煎。名節菴導。亦散治熱暑。

肺脾便秘而渴。如中濕發黃。加茵陳。水結胸。加木通。本

方合益元散。治諸濕。淋。再加琥珀。名茯苓琥珀湯。謙

者禁服。堅細青黑中有白星點硝石

礞石等分打碎拌勻入坩鍋煅至硝盡

石色如金爲度如無金星者不入藥研

末水飛去硝毒用

代頰石 苦寒養血氣平血熱入肝與心

包耑治二經血分之病吐衄崩帶胎動

難產小兒慢驚
頰石半錢東瓜仁湯調服金瘡長肉

仲景治傷寒汗吐下後心下痞鞕噫氣
用代頰旋覆湯取其重以鎮虛逆亦以
養陰血也今人

用治膈噎甚效。蝦紅醋淬水飛用乾

薑爲使畏雄附

治小便數而久小便頻而短也本方合單胃散名胃苓湯一名

對金飲子治中暑傷濕停飲夾食腹痛泄瀉及口渴便

秘此上下分消其濕也按機要論泄瀉有屬風屬濕屬

寒屬火此因于外感者也三因言七情感動藏氣不平亦致溏瀉此因于內傷者也外則當調六氣內則當調

五藏又有因飲食所傷而泄者法當消導因風食泄者當解散因痰積上焦致大腸不固而泄者當除痰有脾胃氣虛而泄者當補中益氣使胃氣升騰而泄自止。

本方合黃連香薷飲名薷苓湯治傷暑泄瀉本方合小

柴胡湯名柴苓湯治泄瀉發熱口渴瘧疾熱多寒少口

燥心煩以上三方並加薑蜜煎深師用本方治髮白及

禿落术一斤桂半斤二苓澤瀉各四兩更名茯苓末散

猪苓湯仲景治陽明病脉浮發熱渴欲飲水小便不通成氏

花乳石 酸澁氣平。耑入肝經血分能化。

瘀血爲水止。

金瘡出血。刮末敷之即合。

治損傷諸血。胎產惡

血。血運有花乳石散。

下死胎胞衣。化則

無阻。

出陝華代地體堅色黃。煅研水

飛用。

爐甘石 甘溫。陽明胃經藥。受金銀之氣。

金勝木。燥勝濕。故止血消腫。收濕除爛。

退赤去翳。爲目疾要藥。產金銀坑中。

金銀之苗也。狀如羊腦。鬆似石脂。能點

赤銅爲黃。今之黃銅皆煅紅。童便淬七

曰。脉浮發熱上焦熱也。渴欲飲水中焦熱也。小便不利。熱結下焦。津液不通也。準繩曰。此浮字誤也。是脉字下。脫一不字也。活人云。脉浮者。五苓散脉沉者。猪苓湯。按太陽篇五苓散。乃猪苓茯苓澤瀉加桂术。陽明篇猪苓湯。亦前三味加滑石阿膠。桂木辛甘爲陽。主外。阿膠滑石。甘寒爲陰。主內。但陽明爲表之裏。不當言脉沉。又詳少陰篇。下利六七日。咳而嘔渴心煩不得眠者。猪苓湯主之。雖不言脉沉。然少陰之脉必沉也。以此推之。成氏隨文誤釋明矣。昂按猪苓湯味淡氣輕。雖三焦通用之藥。其實太陽藥也。成氏註釋深爲當理。仲景列之陽明篇。亦用治少陰渴利。取其降火行水。則利自止。煩渴自退。乃瀉少陰之府。以安少陰之經。非正治少陰藥也。若謂其治少陰病。便爲少陰藥。太陽亦有用四逆者。豈四逆便爲太陽藥乎。且改脉浮爲不浮。方書中無此文法。

少陰病。下利六七日。欬而嘔渴心煩不得眠。

下利不渴者。裏寒也。

渴者。陽邪入裏。心煩不眠。知挾熱也。欬而渴嘔。有停飲也。渴而下利。知小便必不利。是熱邪已入膀胱也。宜利小便。則熱通治渴。黃疸口渴溺赤。

次研粉水飛用

陽起石 滷溫補右腎命門治陰痿精乏

子宮虛冷腰膝冷痺水腫癰瘕

寇宗奭曰凡石藥發

藥冷熱皆有毒宜酌用按經曰石藥發癩方草發狂芳草之氣美石藥之氣悍

二者相遇

出齊州陽起山雲母根也

雖大雪遍境此山獨無以雲頭雨脚鷺

鷺毛色白滋潤者良

真者難得

火煅醋淬七

次研粉水飛用亦有用燒酒樟腦升煉

取粉者桑螵蛸爲使惡澤瀉菌桂畏兔

絲子忌羊血

猪苓 濚瀉 袋苓 滑石 阿膠

各一兩

此足太陽陽明藥也熱上壅則下不通下不通熱益上

壅又濕鬱則爲熱熱蒸更爲濕故心煩而嘔渴便秘而

發黃也淡能參濕寒能勝熱袋苓甘淡渗脾胃之濕猪

苓甘淡澤瀉鹹寒瀉腎與膀胱之濕滑石甘淡而寒體

重瀉火氣輕解肌通行上下表裏之濕阿膠甘平寒滑

以療煩渴不眠要使水道通利則熱邪皆從小便下降

而三焦俱清矣吳鶴皋曰以諸藥過燥故又加阿膠以

存津液

按徐之才曰燥可去濕桑白皮赤小豆之類是

也王好古曰滑石爲至燥之劑蓋皆以行水之藥爲燥而不以燥熱之藥爲燥也故陶隱居欲于十劑之外加寒熱二劑愚所著本草備要則以熱藥爲燥劑

鍾乳

甘溫陽明氣分藥。

胃

木石之精強。

而以行水屬通劑矣。○五苓瀉濕勝。

故用桂枝。猪苓瀉熱勝。故用滑石。

陰益陽通百節利九竅補虛勞下乳汁。服之令人陽氣暴充飲食倍進形體壯盛。然其性慄悍須命門真火衰者可偶用之若藉以恣慾多服久服不免淋渴癰疽之患出洞穴中石液凝成下垂如冰柱通中輕薄如鵝翎管碎之如爪甲光明者真練合各如本方蛇床爲使惡牡丹畏紫石英忌參术羊角葱蒜葫蘆。

茯苓甘草湯

仲景

治傷寒水氣乘心厥而心下悸者先治

其水却治其厥不爾水漬入胃必作利也。○太陽症飲水下必悸火畏水故心惕惕然動不自安也亦治傷寒汗出不渴者。○五苓散主之不渴者此湯主之汗而不渴爲邪熱未入裏故但解表利水而兼和中亦治膀胱府欬欬而遺溺。

茯苓

桂枝

二兩

甘草

一兩

生薑

三兩

兩

此足太陽藥也淡能滲水甘能寧心助陽故用茯苓辛能散飲溫能發汗解肌故用薑桂益土可以制水甘平能補氣和中故用甘草按悸症有過汗而悸者有吐下而悸者有氣虛而悸者惟飲之

白石英 甘辛微溫肺大腸經氣分之藥。

潤以去燥利小便實大腸治肺痿吐膿

欬逆上氣俱係石類祇可暫用

十劑曰
濕可去

枯白石英紫石英之屬是也。按潤藥頗多。石藥終燥而徐之才取二石英爲潤劑。在其意可也。

白若水晶如紫石英而差大。

紫石英 甘平性溫而補重而去怯濕以去枯入心肝血分故心神不安肝血不足女子血海虛寒不孕者宜之

衝爲血海任主

胞胎經疏云女子系胞于腎及心包絡虛則風寒乘之故不孕。紫石英辛溫走二經散風寒鎮下焦。

爲緩子宮之要藥。 色淡紫瑩微五

爲博甚于他邪。以水停心下無所不入。侵于肺則咳。傳于胃則嘔。溢于皮膚爲腫。漬于腸間爲利。战經曰。先治其水後治其厥。厥爲邪之深者。猶先治水。况病之淺者乎。

本方去生薑加白朮名茯苓桂枝白朮甘草湯

仲景治傷

寒吐下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脉沉緊發汗

則動經身爲振搖者。

逆滿氣衝寒邪伏飲上搏于膈也故令頭眩沉爲在裏且既經吐下

復發其汗則陽益虛而津液耗故振搖也與此湯導飲和中益陽固衛

金匱用治心下有痰飲胸脇支滿目眩

小半夏加茯苓湯

金匱三因名

治卒嘔吐心下痞膈間

有水眩悸

水氣上逆則嘔水停閼膈則痞上干于頭則眩凌于心則悸

半夏一升薑半斤茯苓三兩

棗火煅醋淬七次研末水飛用二英俱

畏附子惡黃連

五色石英各入五藏

雄黃

辛溫有毒得正陽之氣入肝經氣

分搜肝強脾散百節大風殺百毒辟鬼

魅治驚癇痰涎頭痛眩運暑瘧僻痢泄

瀉積聚

虞雍公道中冒暑泄痢連月夢至仙居延之坐壁有詞云暑毒在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘧獨

別作治療醫家大藥雄黃蒸餅和藥甘草作湯食之安樂錯如方服之遂愈

又能化血爲水燥濕

殺蟲治勞疳瘡疥蛇傷赤似雞冠明

徹不臭重三五兩者良

孕婦佩之轉女成男醋浸

則悸眩止而痞消矣

本方除茯苓名小半夏湯

金匱治支飲嘔吐

不渴亦治黃疸

金匱云嘔家本渴渴者爲欲解令反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之○嘔吐津液去必渴不可因渴而遽

以爲熱本方除茯苓生薑加入參白蜜名大半夏湯

金匱

治反胃食入即吐

李東垣曰辛藥生薑之類治嘔吐但治上焦氣壅表實之病若胃虛穀氣不行胸中閉塞而嘔者惟宜益胃推揚穀氣而已勿作

表實用辛藥瀉之故服小半夏湯不愈者服大半夏湯

立愈此仲景心法也

加味腎氣丸

金匱腎氣丸即附桂八味丸

治脾腎大虛

入萊菔汁煮乾用生山陰者名雌黃功
用略同劣者名畫黃燒之則臭只堪熏
瘡疥殺蟲藥

石硫黃 味酸有毒大熱純陽

硫黃陽精
極熱與大
號將軍

黃極寒並補命門真火不足性雖熱而

疏利大腸與燥滯者不同

熱藥多秘惟
硫黃煥而能
通寒藥多泄惟
黃

連肥腸而止瀉若陽氣暴絕陰毒傷

寒久患寒瀉脾虛胃寒命欲垂盡者用
之亦救危妙藥也治寒癰冷癖足寒無

力老人虛秘
局方用
牛硫丸婦人陰蝕小兒慢

肚腹脹大四肢浮腫喘急癥盛小便不利大便濁黃已
成糞症亦治消渴飲一溲一

經曰腎者胃之關也關門
上下溢于皮膚故爲附腫腎消者腎水衰竭龍雷之火
不安其位上炎于肺消渴引飲飲入于胃下無火化直
不利用聚水而從其類也

歸元地黃純陰壯真水滋腎爲治下焦之劑
入膀胱故飲一溲一也用桂附辛熱引真火

熟地黃

四兩
雨衣
三兩

乳拌
炒

丹皮

酒洗
潤澤瀉酒

浸澤瀉酒

川牛膝

酒
浸車前子
微

炒肉桂
一
附子
五錢
製熟

蜜丸

此足太陰少陰藥也土爲萬物之母脾虛則土不能制

水而洋溢水爲萬物之源天一
生水腎虛則水不安其位而

妄行以致汎濫皮膚肢體之間因而攻之虛虛之禍不

待言矣
經曰毋盛盛毋虛虛人禍殃附桂八味丸滋陰而能行水

驚。燒。精。壯。陽。殺。蟲。療。瘡。辟。鬼。魅。化。五金。

王好古曰。太白丹來復丹。當用硫黃佐以硝石。至陽佐以至陰。

與仲景白通湯。佐以人尿。諸胆汁意同。

所以治內傷生冷。外冒暑濕霍亂諸病。

能除扞格之寒。兼有伏陽不得不爾。如

無伏陽。只是陰虛。更不必以陰藥佐之。

夷堅志云。唐與正亦知醫能以意治病。

吳巡檢病不得溲。臥則微通。立則不能

涓滴。遍用通藥不效。唐問其平日自製

黑錫丹常服。因悟曰。此必結砂時。硫飛

去鉛不死。鉛砂入膀胱。臥則偏重。猶可

溲。立則正塞水道。故不通。取金液丹三

百粒分十服。瞿麥湯下。鉛得硫則化。

水道遂通。家母舅童時。亦病溺濇。服通淋

藥。固效。老醫黃五聚視之曰。此乃皮外

桂附皆能行水。補命火。因以強脾。桂附補命門火。火能陽能化陰。陰化。則便溺通。加重前利小便而不走氣。加牛膝益肝腎。藉以下行。故使水道通而腫脹已。又無損于真元也。喻言曰。按此方。濟生以附子爲君。此薛新甫重訂。以茯苓爲君。然腎之關門不開。必以附子回陽。蒸動腎氣。其關始開。胃中積水始下。以陽主開故也。闔閉即不用茯苓。牛膝車前。而水亦下。闔閉則車前茯苓用至無算。苟莫之如何矣。用方者。將君附子乎。抑君茯苓乎。○何栢齋曰。造化之機。水火而已。宜平不宜偏。宜交不宜分。火宜在下。水宜在上。則易交也。交則爲既濟。不交則爲未濟。分而離則死矣。消渴症不交。而火偏盛也。水氣症不交。而水偏盛也。乾始坤成。至其交合變化之用。則水火二氣也。大旱物不生。火偏盛也。太澇物亦不生。水偏盛也。入之藏府。以脾胃爲主。然脾胃能化物。與否實。由于水火。二氣非脾胃之能也。火盛則脾胃燥。水盛則脾胃濕。皆不能化物。乃生諸病。水腫之病。蓋水盛而火不能化。水導火使。二氣和平。則病去矣。醫貫曰。火爲陽之

非一端也。○硫能化鉛爲

水修煉家尊之爲金液丹。番舶者良難取色黃堅如石者以藜菔剜空入硫合定糠火熾熟去其臭氣以紫背萍萍煮過消其火毒以皂莢湯淘其黑漿一

法絹袋盛酒煮三日夜一法入猪大腸爛煮三時用畏細辛諸血醋土硫黃辛熱腥臭止可入瘡藥不可服耳。

石蠅鹹寒治青盲目翳天行熱疾解一

切金石藥毒醋磨敷癰腫出南海身全是蠅而質石也細研水飛用

根水爲陰之根而水興火之總根兩腎之間動氣是也余于五行之中獨重水火而其生尅之妙用又與世論不同世人皆曰水尅火而余獨曰水養火世人皆曰金生水而余獨曰水生火世人皆曰土尅水而余獨于水中補土世人皆曰木尅土而余獨升木以培土若此之論誰則信之詎知君相二火以腎爲宮水尅火者後天有形之水火水養火者先天無形之水火也今之言補肺者人參黃耆清肺者黃芩麥冬鍼肺者五味訶子瀉肺者葶藶枳殼病之輕者豈無一效若本原虧損者當不相干蓋肺金之氣夜臥則歸藏于腎水之中肺名嬌火則水冷金寒而不敢歸或爲喘脹爲噦咳爲不寐爲不食疊疊若喪家之狗惟收斂之僅似有理然不得其門從何而入仁齋云肺出氣腎納氣肺爲氣之主腎爲氣之本腎虛不能納氣歸元必壯水之主或益火之原水向火中生矣混沌之初何嘗有土自天一生水而水之凝結處始爲土此後天卦位艮土居坎水之次也堅者爲石最堅者爲金可見水土金先天一原也肺爲土之子先補其子使不食母之氣則母不衰亦見金生土之義矣至于本能尅土舉世欲伐之余謂木藉土以生

無名異。鹹入血。甘補血。治金瘡傷折。

疽腫。

謂金。止痛生肌。人受杖時須服三五錢。不甚痛。

傷。

生川廣小黑石子也。一包數百枚。

譽石

辛熱。有大毒。治堅癥痼冷。寒濕風

痺。

蘇恭曰。攻積冷之病最良。別錄云。不鍊服殺人。此石生于山無雪。入水不冰。時珍曰。性氣與砒石相近。博物志言鶴伏卵時取此石煖足誤也。

有蒼

白數種。火燒但解散。不能脫其堅。置水

不凍者真惡羊血。

砒石。辛苦而鹹。大熱。大毒。砒霜尤烈。耑

能燥痰。可作吐藥。療風痰在胸膈。截瘧。

豈有反。冠。之。理。木乃生生之氣。始于東方。春升之氣也。陽氣也。元氣也。胃氣也。同出而異名也。譬之種樹。雨以潤之。風以散之。日以暄之。使得遂其生發長養之天而已矣。及其生意將竭。則又當斂其生生之氣于水土之中。以爲來春生發之本焉。有伐之之理乎。此東垣脾胃論用升柴。以疏木氣。諄諄言之也。但未及雨潤風散。及歸根復命之理耳。余特申五行妙用。耑以水火爲重也。

又曰。人身水火原自均平。偏者病也。火偏多者。補水。配火。不必去火。水偏多者。補火。配水。不必去水。譬之天平。此重則彼輕。一邊重者。只補足輕者之一邊。決不鑿去法馬。今之欲瀉水降火者。鑿法馬者也。難經曰。陽氣不足。陰氣有餘。當先補其陽。而後瀉其陰。陰氣不足。陽氣過度。當先補其陰。而後補其陽。其要也。

越婢湯

金匱

治風水惡風。一身悉腫。脈浮。不渴。續自汗出。

無大熱者。

經曰。肝腎并沉爲石水。并浮爲風水。水在皮

惡風無大熱者。

熱未盡退也。

除哮外用蝕敗肉殺蟲枯痔出信州

故名信石衡州次之錫之苗也

故錫壺亦云有

生者名砒黃鍊者名砒霜畏綠豆令

水羊血

炭辛溫性烈能堅物散血定痛生肌

止金瘡血

臘月用黃牛胆汁殺瘡蟲和納胆中陰乾用

脚肚生一瘡久遂成漏百藥不效自度

必死一村人見之曰此鰐濁也以石灰

溫泡薰洗覺痒即是

也洗不數次遂愈

蝕惡肉滅瘢痕

和藥有灰之酒傷人內用止瀉痢

瘀解酒酸

酒家多用之然後玉門不閉熬黃水泡澄

崩帶收陰挺

陰肉挺出亦名陰菌或產其本也

麻黃

六兩

石膏

八兩

生薑

三兩

甘草

二兩

大棗

五枚

惡風者加附子

此足太陽藥也風水在肌膚之間用麻黃之辛熱以瀉肺石膏之甘寒以清胃

肺主通調水道胃主分別水穀

甘草佐之使風

水從毛孔中出又以薑棗爲使調和營衛不使其太發

散耗津液也

胃爲十二經之主脾治水穀爲卑藏若脾經曰脾主爲胃行其津液是方名越婢者

以發越脾氣通行津液外

暎一名越婢湯即此義也

防己黃耆湯

金匱

治風水脉浮身重汗出惡風

解見前及諸

風諸濕

木身痛

按東垣曰麻木爲風三尺童子皆知之細核則有區別如久坐亦麻木繩

繩之人亦麻木非有風邪乃氣不行也當補肺氣麻木

自去矣愚謂因其氣虛故風邪入而踞之所以風爲虛

清煖脫肛消積聚結核。風化者良。廣
洗。

灰火毒已出主頑瘡膿水淋漓妙瘡口
尤妙。

白礬 酸鹹而寒性濇而收燥濕追延化

瘀墜濁解毒生津除風殺蟲止血定痛。

通大小便蝕惡肉生好肉除濁熱在骨

髓。髓爲熱所刼則空故骨痿而齒浮。治驚癇黃疽血痛

喉痺齒痛風眼鼻中癰肉崩帶脫肛陰

蝕陰挺陰肉挺出肝經之火疔腫癰疽癰疥癬

虎犬蛇蟲咬傷時珍曰能吐風熱瘀滯瓦其酸苦涌泄也治諸

防己

黃耆

七錢兩半

甘草

五錢一錢

每服五錢加薑

裏煎腹痛加芍藥喘加麻黃有寒加細辛氣上衝加桂枝熱腫加黃芩寒多掣痛加薑桂濕盛加茯苓芩木氣滿堅痛加陳皮枳殼蘇葉

此足太陽太陰藥也防己大辛苦寒通行十二經開竅瀉濕爲治風腫水腫之主藥黃耆生用達表治風注膚

痛溫分肉實腠理白术健脾燥濕與黃耆並能止汗爲

臣防己性險而捷故用甘草甘平以緩之又能補土制

水爲佐薑棗辛甘發散調和營衛爲使也

本方去白术薑棗加茯苓爲桂枝名防己茯苓湯金匱治

血痛。陰挺脫肛。瘡瘍。取其酸澀而收也。
治風眼。痰飲。泄痢。崩帶。取其收而燥濕也。

也。治喉痺。癰蟲。蛇

傷。取其解毒也。

多服損心肺。傷胃。寇

夷曰。却水故也。書紙上水不能濡故知

其性却水也。李迅曰。凡發背當服蠅礬

九。以護膜。防毒氣內攻。礬一兩。黃蠟七

錢。溶化和丸。每服十九。漸加至二十九

日。服百丸則有力。此藥護膜托裏解毒

化。膿之功甚大。以白蓼芽。茅根末。冷水

服。解一切毒。

取潔白光瑩者。煅用。又法以

火煅地酒。水于上。取礬布。地以盤覆之。

四面灰擁。一日夜。攀飛盤上。掃收之。爲

礬精。未盡者。更如前法。再以陳苦酒。醋

化之。名攀華。七日可用。百日彌佳。有草

本。五。白蓼。一。白蓼。桂枝。甘草。大黃。善

水在皮膚。四肢重。而動。名皮水。

防己行經絡。茯苓善參泄。黃耆達皮膚。桂

枝走肢節。按五水脉浮惡風。骨節疼痛。名風水。脉浮附腫。按之沒指。其腹如鼓。不惡風。不渴。名皮水。當發其汗。

又云惡寒不渴。名風水。不惡寒而渴。名皮水。假令皮水

不渴。亦當發汗。脈沉遲自喘。名正水。脈沉腹滿不喘。水

積胞中堅滿如石。名石水。脉沉遲。發熱。胸滿。身腫。汗如桶升。名黃汗。

本方加人參一兩。生薑二兩。

防己白朮各增三倍。名防己湯。

活人治風濕脉浮。多汗。

身重。

中風之脉。陽浮而滑。陰濡而弱。風來乘熱。

變爲風溫。忌發汗。誤汗者。以此湯救之。

晝着湯。金匱一名甘草苓木湯。

治傷濕。身重。腹痛。腰冷。不渴。小便

自利。飲食如故。病屬下焦。胃主水濕性下流。必舍于其

乏處。冷濕之邪。着而不移。故腰冷。身重。是着

之處也。此由身勞汗出。衣裏冷濕。久得之。宣明用治

胞脢。膀胱。熱痛。澁于小便。上爲清溼。風寒濕邪客于胞

中。氣不能化。故水

爲使畏麻黃惡牡蠣生用解毒
蝦用生肌

膽礬一名石胆 酸澁辛寒入少陽胆經性微

而能上行涌吐風熱痰涎發散風木相

火治喉痺醋調嚥吐痰涎立效 欲逆逕潤崩淋能

殺蟲治牙蟲瘡瘍陰蝕 產銅坑中乃

銅之精液故能入肝膽治風木磨鐵作銅色者真

形似青鴨嘴色爲上市人多以醋揉青礬偽之 畏

桂光花辛夷白薇

皂礬一名峻涌澁收燥濕化痰解毒殺蟲 綠礬酸涌澁收燥濕化痰解毒殺蟲

之功與白礬同而力差緩主治畧同白

道不通。足太陽經上額絡腦。太陽經氣不得下行。上入腦而流于鼻。則爲清涕。

乾薑

炮

茯苓

甘草

白朮

炒二兩

甘草

白朮

炒二兩

有寒者加附子經

心錄加肉桂澤瀉杜仲牛膝治同

此足少陰太陽藥也。乾薑辛熱以燥濕。白朮苦溫以勝濕。茯苓甘淡以滲濕。甘草和平和中而補土。此腎病而皆用脾藥益土正所以制水也。

喻嘉言曰。腰冷如坐水飲食如故。便利不渴。且與腸胃之府無預。况腎藏乎。故但用甘溫從陽。淡滲行水之藥足矣。昂按此乃外感之濕邪非

腎虛也。

舟車丸河間倣仲景十乘例製此湯治一切水濕 治水腫水眼形氣俱實

腫者。水道壅遏也。形氣俱實。口渴面赤。氣粗腹堅。大小便秘也。○陽水先腫上體。肩背手脣。手三陽經。陰水先腫

礬利小便消食積 同健脾消食藥爲丸散喉痺

調和藥爲丸散喉痺

體腰腹腫脹足三陰經腫屬脾。脹屬肝。腫則陽氣猶行如單脈而不腫者名虛脹爲木橫冠土難治。腫脹朝

晚急爲血虛暮寬朝急爲氣虛朝暮俱急爲氣血兩

虛勞黃疸方女勞黃疸方

中變化而來深青豐潤者良煅赤用

煅赤名絳礬能入血分伐肝木燥脾濕

張三丰治腫滿有伐木丸。蒼术二斤。米

泔浸黃酒麴四兩炒絳礬一斤。醋拌

晒乾入瓶火煅爲末。醋糊丸酒下。或云

皂礬乃銅之精液用醋製以平肝勝于

針鐵不必忌鹽後亦不發多服令人渴

鹽即戎

甘鹹而寒入腎經助水藏平

血熱治目痛赤澁吐血溺血齒舌出血

堅膏固齒擦牙明目烏鬚鯛同食鹽

良

出靈龜不假煎鍊方極明營色青者良

虛勞急爲血虛暮寬朝急爲氣虛朝暮俱急爲氣血兩虛脹由心腹而散四肢者吉。由四肢而入心腹者危男自下而上女自上而下者皆難治。腫脹唇黑則傷肝缺盆平則傷心脾出則傷脾足心平則傷腎背平則傷肺皆不可治腹脹身熱脉大者是逆也多死。

黑牽牛

四兩炒

大黃

二兩酒浸

甘遂

麴裏

大戟

麴裏

芫花

醋炒

青皮

炒橘紅一兩

木香

五錢輕粉一錢

水丸

此足太陽藥也牽牛大黃大戟芫花甘遂皆行水之厲劑也能通行十二經之水然腫屬於脾脹屬於肝水之不行由于脾之不運脾之不運由于木盛而來侮之是不行由于脾之不運脾之不運由于木盛而來侮之是以不能防水而洋溢也青皮木香疏肝泄肺而健脾與

食鹽鹹甘辛寒鹹潤下故通大小便鹹

走血而寒勝熱故治目赤癰腫血熱熱

疾鹹補心故治心虛以水制火取既濟之義故補心藥用

鹽炒一人病笑不休用鹽煅赤煎沸飲

之而瘳經曰神有餘則笑不休神心火也用鹽水制火也一婦病此鹹入腎而

半年張子和亦用此法而愈

主骨故補腎藥用鹽湯下故堅肌骨治骨病齒痛

擦牙亦佳清火固齒齒縫出血夜以鹽

厚傅齦上瀝延盡乃臥或問鹹能軟堅

何以堅肌骨不知骨消筋緩皆因濕熱熱淫于內治以鹹寒譬如生肉易潰得

鹽性鹹寒則能堅久不壞也鹹潤燥而辛泄肺

煎鹽用皂

角收故治痰飲喘逆本經治喘逆惟哮症忌之鹹味微辛

陳皮均爲導氣燥濕之品使氣行則水行脾運則水消也輕粉無礙不入能去積痰故少加之然非實症不可輕投

本方減芫花大戟青皮陳皮木香加芒硝郁李仁名瀉川散薑湯下五分治同

疏鑿飲子

治遍身水腫喘呼口渴大小便秘

上症爲濕熱甚而氣

尚實也此爲陽水○陽水見陽症脉必沉數陰水見陰症脉必沉遲

羌活 秦艽 檳榔 商陸

椒目 大腹皮 茶芩

皮 木通 澤瀉 赤小豆 等分加薑皮煎

此足太陽手足太陰藥也外而一身盡腫內而口渴便

軟堅故治結核積聚又能涌吐醒酒勝

水

火解毒

火熱即毒也。殺蟲。浙西將軍中能散火涼血殺蟲。浙西將軍中

鳴于一體。一僧教以鹽湯浸身數次而愈。

定痛止癢。體如蟲也。鹽湯浴三四次佳。亦治一切風氣。

凡湯火傷急以鹽末掺之。護肉不壞再用藥敷多食傷肺走血滲津發渴。經曰鹹走

行風熱。行皮商陸檳榔豆去張攻堅所

以行水于皮膚。以皮商陸檳榔豆去張攻堅所

以行水于皮膚。以皮商陸檳榔豆去張攻堅所

勝邪由汗出而升之于上腹皮苓皮薑皮辛散淡滲所

鹽湯浸身數次而愈。定痛止癢。體如蟲鳴于一體。一僧教以鹽湯浴三四次佳。亦治一切風氣。

凡湯火傷急以鹽末掺之。護肉不壞再用藥敷多食傷肺走血滲津發渴。經曰鹹走

行風熱。行皮商陸檳榔豆去張攻堅所

以行水于皮膚。以皮商陸檳榔豆去張攻堅所

實瀉火也。

上下內外分消其勢亦猶

腎之水通于膀胱

二藥瀉水實瀉火也。

上下內外分消其勢亦猶

神禹疏江鑿河之意也

經曰腎何以主水。腎者至陰也。至陰者盛水也。肺者太陰也。少

陰者冬脉也。故其本在腎。其末在肺。皆積水也。腎何以

聚水而生病。腎者胃之關也。關門不利故水聚而從其

類也。故水病下爲脹。腫大腹。上爲喘呼。不得臥者。標本

俱病。故肺爲喘呼。腎爲水腫。肺爲逆不得臥。喻嘉言曰

胃爲水穀之海。五藏六府之源。脾不能散胃之水精于

肺而病于中。肺不能通胃之水道于膀胱。而病于上。腎

晶鹽石鹽生于石。水鹽生于樹。蓬鹽生于土。光明鹽或生于階成山崖或產于五原鹽池狀如水晶不假煎煉一名水

于草造化之

不能司胃之關。時其輸泄而病于下。以致積水浸淫。無

所底止。王好古曰水者。脾肺腎三經所主。有五藏六府

妙誠難窮矣。

急流水 性速而趣下通二便。風癥之藥

宜之。昔有病小便秘者衆不能瘥。張子和易以急流之水煎前藥一飲而溲時珍曰天下之水滅火濡枯則同。至于性從地變質與物遷未嘗同也。

逆流迴瀾水 性逆而倒上中風卒厥宣

吐痰飲之藥宜之。

甘瀉水 用流水以瓢揚萬遍亦曰勞水

水性鹹而重。勞

之則甘而輕。仲景用煎傷寒勞傷等藥

取其不助腎氣而益脾胃也。

井泉水 將旦首汲曰井華水。山甃未放

曰無根水。無時初出曰新汲水。解熱闊

十二經之部分。上頭面中四肢下腰脚外皮膚中肌肉內筋骨脉有尺寸之殊浮沉之別。不可輕瀉。當知病在何經何藏方可。用之。按水腫有痰阻食積血瘀致清升濁不降而成者。有濕熱相生隧道阻塞而成者。有燥熱衝激秘結不通而成者。症屬有餘有服寒涼傷飲食中氣虛衰而成者。有大病後正氣衰憊而成者。有小便不利。水液妄行。脾莫能制而成者。症屬不足宜分別治之。然其源多因中氣不足而起。醫貫曰治腫滿先以脾土爲主。宜補中益氣湯。六君子湯或疑水脹喘滿而用純補之劑不益脹滿乎。曰肺氣既虛不可復行其氣腎水既衰不可復利其水。純補之劑初覺不快。過時藥力得行漸有條理矣。歸按此即內經塞因寒用之義。

實脾飲

嚴氏

治肢體浮腫色慄聲短口中不渴二便通利

脾胃虛寒土不能制水故水妄行而浮腫以無鬱熱故口不渴而便不秘此爲陰水。嚴氏曰治陰水發腫用此

脾土

白朮

土炒

茯苓

甘草

炙

厚朴

薑

大腹子

草豆蔻

木

煩渴。凡熱病不可解者。新汲水浸青衣飲。互熨之妙。心悶汗出。新汲水蜜和妙煎補陰之藥。宣之。井以有地脉山泉來者次之。其城市近溝渠污穢者。鹹而有酸。煮粥煎茶。味各有異。以之入藥。其可無擇乎。

百湯湯 助陽氣行經絡。汪穎曰。湯須百沸者佳。寇宗奭曰。患風冷氣痺人。以湯淋脚至膝。厚覆取汗。然別有藥。特假陽氣而行耳。四時暴瀉痢。四肢脣腹冷。坐深湯中。浸至膝上。生陽之藥無速于此。張從正曰。凡傷風寒酒食。初起無藥。便飲太和湯。或酸瀉水。揉肚探吐。汗出即已。昂按感冒風寒而以熱湯澡浴。亦發散之一法。故內經亦有可湯熨。可浴。及摩之。浴之之文。備急方治心腹卒脹痛欲死者。熱湯以潰手足冷。即易之。

香木瓜附子黑薑加薑棗煎

此足太陰藥也。脾虛故以白朮苓草補之。脾寒故以薑附草冠溫之。脾濕故以大腹茯苓利之。脾滯故以木香厚朴導之。木香行氣平肝實腸。厚朴散滿行水平胃。然土之不足由于木之

有餘。木瓜酸溫。能于土中燉木。兼能行水。與木香同爲平肝之品。使木不尅土。而肝和則土能制水。而脾實矣。

經曰。濕勝則地。沉瀉水正所以實土也。

朱丹溪曰。治水腫宜清心火補脾土。

火退則肺氣下降。而水道通。脾旺則運化行。而清濁分。其清者復回爲氣爲血。爲津爲液。濁者爲汗爲溺。而分消矣。又曰。水病當以健脾爲主。使脾實而氣運則水自行。宜參苓爲君。視所挾症加減。苟徒用利水藥。致不救。喻嘉言曰。治水以實脾爲先。不但陰水爲然。然陰水者少。陰腎中之真陽衰微。不能封閉而泛溢無制。

陰陽水

一名生熟水

治霍亂吐瀉有神功

陰陽

不和而交爭故上吐下瀉而霍亂飲此輒定者分其陰陽使和平也按霍亂有

耳。方中不用桂而用厚朴木香尚有可議耳。○按治水有三法實土者守也泄水者攻也兼之發汗爲三治。二治備舉者廣略以取勝也。

五皮飲

澹寮

治水病腫滿上氣喘急或腰以下腫

脾虛不能制水

故傳化失常。腎水汎濫反瀆脾土壅塞經絡散溢皮膚半身以上宜汎半身以下宜利小便。

五加皮

地骨皮

茯苓皮

大腹皮

生薑皮

一方五加皮易陳皮羅氏五加易桑白皮治病後肺

腸沙其死甚速古方用鹽熬熱童便調

飲極爲得治勿與穀食即米湯下咽亦死

以沸湯半鐘井

水半鐘和服

黃芩水酸鹹吐瀉飲宿食酸苦涌泄爲

陰也

氣虛而致腫滿

此足太陽太陰藥也五加祛風勝濕地骨退熱補虛生

薑辛散助陽

水爲

陰邪大腹下氣行水茯苓滲濕健脾于散

瀉之中猶寓調補之意。胃用皮者水溢皮膚以皮行皮也

露水 甘平止消渴宜煎潤肺之藥。秋露

造酒最清冽。百花上露令人好顏色。

霜殺

物露滋性隨時異也。露能解暑故白露降則處暑矣。瘧必由于暑故治瘧藥

宿服一

臘雪水 甘寒治時行瘟疫宜煎傷寒火

渴音謁傷暑之藥抹瘡良。

冰 甘寒太陰之精水極似土傷寒陽毒

熱甚昏迷者以一塊置臍中良。

兩乳中間解

燒酒毒

陳藏器曰盛夏食冰與氣候相反冷熱相激却致諸疾宋徽宗

食冰太過病脾疾國醫不効召楊介進大理中丸上曰服之屢矣介曰疾因食

此手太陰藥也吳鶴皋曰肺非無爲也飲食入胃游溢

麥門冬湯

治水溢高原肢體皆腫。

經曰三焦者決瀆之

治水溢高原中焦不治水停中脘下焦不治水畜膀胱

官水道出焉上焦不

經曰三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢

創水留則爲脹下焦少陽經氣當相火之化相火有其

經無其府藏游行于五者之間故曰少陽爲游部其經

脉上布膻中絡心包下出委陽絡膀胱豈非上佐天施

下佐地生與手厥陰相表裏以行諸經者乎故腎經受

邪則下焦之火氣鬱矣鬱則水精不得四布而水聚矣

火鬱之久必發則與衝脈之屬火者同逆而上衝爲十

二經脉之海其上者出項頸滲諸陽灌諸精其下者並

少陽下足滲三陰灌諸絡由是水從火溢上積于肺而

爲喘呼不得臥散陰陰絡而爲附腫隨五臟之虛者入

而聚之爲五藏之脈皆相火沉濫其水而生病者也非

相火則水不溢而止爲積水。昇按經曰諸腹脹大皆

屬於熱諸病附腫皆屬於火傳而爲水其是之謂歟

麥門冬

五十枚薑炒

粳米

五十粒

水。臣請以水煎此藥。是治受病之源也。果愈。

地漿。甘寒治泄痢。冷熱赤白。腹內熱毒。

絞痛解一切魚肉菜菓藥物諸菌毒。

菌音
郡生

朽木濕地上亦能生。

名蕈音
子爲患用

地漿下之。中暎。暑熱卒死者。

取道上熱
土圍臍令

人尿臍中。以熱土大蒜等分搗水去渣灌之即活。

以新水沃

黃土攬濁再澄清用。

凡跌打損傷。取淨
土蒸熟以布裹更

互熨之勿大熱。恐破肉雖瘀血凝積氣絕欲死者。亦活。

宋神宗皇子病癰癰。國

醫不能治。召錢乙進黃土湯而愈。帝問其故。對曰。以土伏水。水得其平風自止矣。

精氣上輸于脾。脾氣散精上歸于肺。通調水道。下輸膀胱。肺熱則失其下降之令。以致水溢高原。淫于皮膚而爲水腫。醫學明乎。此實脾導水。豈不能愈。故用麥冬清

肺。開其下降之源。粳米益脾。培平生金之母。此治病必求其本也。或問此證何以辨之。曰。肢體皆腫。少腹不急。初起便有喘滿。此其候也。

羌活勝濕湯局方

治濕氣在表。頭痛。頭重。腰脊重。或

一身盡痛。微熱。昏倦。

濕熱在表。外傷于濕也。濕之爲邪着而不移。着于太陽。則頭項腰脊

痛。着于太陰。則肩背痛。着于陰陽之經。則一身盡痛。惟着。故痛且重也。濕鬱則爲熱。然乃陰邪。故但微熱而昏倦也。李東垣曰。頭痛脊強。乃太陽之經氣不行也。此湯主之。昂按此湯雖名勝濕。實傷風頭痛通用之方。

孩兒茶 苦澑清上膈熱化痰生津止血

收濕定痛生肌。塗瘡口瘡。

蓬砂等分陰疳

痔瘻。出南番云是細茶末緣竹筒埋

土中日久取出搗汁熬成塊小潤澤者
上大而枯者次之

百草霜 辛溫止血。

鼻衄者水調塗之紅
見黑則止。水竈火也

消積治諸血病傷寒陽毒發斑痘瘡
瘡咽喉口舌白疎諸瘡。

時珍曰。皆兼取
火化從治之義

灶突上烟煤。

墨 辛溫止血。生肌飛絲塵。入目濃磨

羌活 獨活 川芎 藁本 防風 甘草

炙五分荆分

子 分 如身重腰中沉沉然中有寒濕也。加酒洗漢防

己附子。此足太陽藥也。經曰。風能勝濕。如物之濕。

獨防藁本。皆風藥也。濕氣在表六者辛溫升散。又皆

解表之藥。使濕從汗出。則諸邪散矣。

藁本專治太陽寒
濕荆防善散太陽

風濕。二活祛風勝濕兼通關節。川芎能升厥陰清氣上

治頭痛。甘草助諸藥辛甘發散爲陽氣。味甘平。弱中有

補。

若水濕在裏。則當用行水滲洩之劑。

喻嘉言曰。經曰。
濕上甚爲熱表

之則易下。之則難。故當變常法而爲表散。吳鶴臯曰。脾

弱濕傷者。二陳平胃之類。主之。濕盛濡泄者。五苓六一

之類。主之。水腫發黃者。五皮茵陳之類。主之。今濕流關

節。非前藥所宜矣。無窮不入。惟風爲能。故凡關節之病。

非風藥不能到也。三因用此湯。加柴胡五分。治臥而多

驚悸。多覺渙者。邪在少陽厥陰也。如淋。加澤鴻五分。經

點之。點鼻止衄。猪胆汁磨塗諸癰腫。

人腎之病同治。此下焦風寒。結合病。非風藥行經不可也。

亦可酒磨服。治胞胎不下。

伏龍肝 辛溫調中止血去濕消腫。治瘀

逆反胃吐衄崩帶。尿血遺精。腸風癰腫。

醋調膾瘡。

研。傅丹毒。臘月猪脂或雞子白調傅。

催生下

胞。傳救方。子死腹中。水調三錢服。其土當兒頭上戴出。

益心多

年黃土。一云竈內火氣積久結成如

石外赤中黃。研細水飛用。

驗一作
瞼

辛苦澀溫。消食磨積去垢除痰。

治反胃噎膈點痣。翳疣。贅。

與礦灰等分。用小麥稈灰。

中滿分消丸

東垣

治中滿鼓脹氣脹水脹熱脹。

諸病有聲鼓之如鼓

爲鼓脹氣不通利爲氣脹。血不通利爲血脹。但氣分心下堅大而病發于上。血分血結胞門而病發于下。氣血不通則水亦不通而尿少。尿少則水積而爲水脹。濕熱相生則爲熱脹。○金匱曰。病有血分水分何也。師曰。經水前斷後病水名曰血分。此爲難治。先病水後經水斷名曰水分。此病易治。水去其經當自下。水分即氣分。

汁煎乾爲末。挑發。麵浣衣多用之。取破瘡三點即瘥。

厚朴炒一枳實炒黃連炒薑芩炒半夏。薑製五錢陳皮知

葛蓼之屬浸晒燒灰。以原水淋汁每百

觔入粉麵二三斤則凝淀如石。

禽獸部

雞屬巽屬木。故動其肉甘溫補虛溫中。

風

日華曰。黑雌雞補產後虛勞。馬益卿曰。妊娠宜食牡雞。取陽精之全于天也。崔

行功曰。婦人產死多是富貴擾攘致產婦驚亂故耳。屏人靜產更爛煮牡雞沫

作粳米粥與食。自然無恙。雞性滑而濡。不食其肉恐難化也。俗家每產後即

食雞啖卵。壯者幸無事。弱者因而致疾矣。龔雲林曰。四五年老母雞取湯煮粥

固胎。雞冠居清高之分。其血乃精華

母炒四錢澤瀉錢夜交砂仁乾薑。二薑黃人參。厚朴炒一枳實炒黃連炒薑芩炒半夏。薑製五錢陳皮知

錢

澤瀉錢夜交砂仁乾薑。二薑黃人參。

錢

蒸餅九焙熱服。寒因熱用。東

垣立中滿分

白朮炒甘草。炙猪苓一

消九治熱脹。分消湯治寒脹。二者詳而用之。

此足太陰陽明藥也。厚朴枳實行氣而散滿。二藥兼能破宿血。

黃連黃芩瀉熱而消痞。薑黃砂仁燥胃而快脾。乾薑益

陽而燥濕。陳皮理氣而和中。半夏行水而消痰。知母治

陽明獨勝之火。潤腎滋陰。芩瀉脾腎妄行之水。升清

降濁。少加參术芩草以補脾胃。使氣運則脹消矣。按此

合六君四芩瀉心二陳平胃而爲一方者。但分兩有多寡。則所治有主客之異矣。朱丹溪曰。脾具坤靜之德。而

食能

雞冠居清高之分。其血乃精華

所聚雄而丹者屬陽。故治中惡驚憚。

以熱

血滴口塗面吹鼻良本乎天者親上故塗口眼喝

邪用老者取其陽氣充足也。能食百蟲

故治蜈蚣蚯蚓蜘蛛咬毒。雞子甘平

鎮心安五藏益氣補血清咽開音散熱

定驚止嗽止痢。醋煮食治赤白久痢。利產安胎。

胎衣

不下者。吞卵黃二三枚。解髮刺喉令嘔即下。多食令人滯悶

哺雞蛋殼細研。麻油調搽痘毒。神效難

勝皮。一名雞內金。一名膀胱。昔皮鴟。甘平性溫。雞之脾

也能消水穀除熱止煩通小腸膀胱治

有乾健之運故能使心肺之陽降。肝腎之陰升而成天。地之泰是爲平人。今也七情內傷。六淫外惑。飲食失節。房勞致虛。脾土之陰受傷。轉輸之官失職。故陽升陰降而成天地不交之否。清濁相混。隧道壅塞。鬱而爲熱。熱留爲濕。濕熱相生。遂成脹滿。經曰：鼓脹是也。以其外雖堅滿中空無物。骨似于鼓。以其膠圓難治。又名曰蠱。若蟲之侵蝕而有盡之義焉。宜補其脾。又須養肺金以制木。使脾無賊邪之患。滋腎陰以制火。使肺得清化之令。却鹹味斷妄想。無有不安。醫者急于取效。病者苦于脹滿。妄行利藥。以求通快。不知寬得一日半日。其脹滿甚而病邪甚矣。元氣傷矣。

中滿分消湯東垣治中滿寒。脹寒。二便不通。四肢厥逆。食入反出。腹中寒心下癉。下虛陰躁。奔豚不收。原文曰。或多食寒涼。及脾胃久虛之人。胃中寒則

脹滿或藏寒。生脹滿。此湯主之。

川烏 乾薑 黑澄茄 生薑 黃連 人參 當歸

瀉。便數遺溺。溺血崩帶。腸風膈消。反

胃小兒食瘧。男用雌女用雄。雞矢醴。

微寒下氣。消積利大小便。內經用治蠱。

脹。臘月取雄雞矢白收之。醋和塗蚯蚓蜈蚣咬毒。合米炒治米癩。

烏骨雞。甘平。雞屬木。而骨黑者屬水。得

水木之精氣。故能益肝腎。退熱補虛。治

虛勞消渴。下痢噤口。煮汁益胃。帶下崩中。肝

腎血分之病。鬼卒擊死者。用其血塗心

下效。賈車志夏侯弘捉得一小鬼問所持何物。曰殺人以此矛戟。中心腹者無不輒死。弘曰治此有方否。

鬼曰以烏骨雞薄之即瘥。

骨肉俱

澤瀉 青皮 麻黃 柴胡 二錢 吳茱萸 草蔻仁

厚朴 黃耆 黃柏 五分 益智仁 木香 半夏 茶芩

升麻 三分 热服。

此足陽明太陰藥也。川烏二薑。吳茱萸。茹。益智草。蔻。除

濕。開鬱。緩胃溫腎。以祛其寒。青皮。厚朴。以散其滿。升麻

柴胡。以升其清。茯苓。澤瀉。以瀉其濁。人参。黃耆。以補其

中。陳皮。以調其氣。當歸。以和其血。麻黃。以泄其汗。半夏

以燥其痰。黃柏。黃連。以去濕中之熱。又熱因寒用也。

李東垣曰中滿治法。當開鬼門。潔淨府。開鬼門者。發汗也。潔淨府者。利小便也。中滿者。瀉之于內。謂脾胃有病。令上
下分消其滿。下焦如瀆。氣血自然分化。如或大實。大滿。大小便不利者。從權以寒熱藥下之。

黑者良舌黑者骨肉俱黑男用雌女用

雄女科有烏雞丸治百病。

鴨

甘冷入肺腎血分滋陰補虛除蒸

嗽利水道治熱痢

白毛烏骨者爲虛

勞聖藥取金肅水寒之象也

葛可久。有白鳳膏

老者良酒或童便煮熱血解金銀丹

石砒霜百毒及中惡瀉死者卵甘鹹

微寒能滋陰除心腹膈熱鹽藏食良

五靈脂甘溫純陰氣味俱厚入肝經血

分通利血脉散血和血閉能通

生經用

大橘皮湯治濕熱內攻心腹脹滿小便不利大便滑瀉

及水腫等症

小水併入大腸故小便不利而大便滑瀉。

滑石

六錢甘草一錢

赤茯苓一錢

猪苓一錢

澤瀉一錢

白朮一錢

土炒桂五分

陳皮

半錢木香

檳榔

三錢分

加薑煎每服五錢

此足太陽藥也亦扶猪苓滯瀉火行水白朮補脾胃化氣此五苓散也滑石清熱利濕甘草瀉火調中此

六一散也濕熱內甚故加檳榔峻下之藥陳皮木香行氣之品使氣行則水行以通小便而實大便也

茵陳蒿湯

仲景

治傷寒陽明病但願汙出腹滿口渴二便

不利濕熱發黃脉沉實者

經曰陽明病發熱汙出此爲熱甚則不發黃若但頭汙身

多能止。妙治血瘤、血積、血眼、血痢、腸風。

用治血瘤。

圖經云。

血量者半。

心腹。

炒半生。

水服一錢。

心腹。

下滲則不內存。

今便既不利。

身又無汗。

故鬱而爲黃。

內有實熱。

故渴熱甚。

則津液內竭。

故小便不利。

凡瘀血在

裏熱入血室。

及水結胸。

皆有頭汗之症。

乃傷寒傳變故

與雜病不同。

濕在經。

則日晡發熱。

鼻塞在關節。

則身

痛在藏麻。

則濡泄小便反濁。

腹或脹滿。

濕熱相搏則發

黃。

乾黃熱勝。

色明而便燥。

濕黃濕勝。

色晦而便溏。

又黃

病與濕病相似。

但濕病在表。

一身盡痛。

黃病在裏。

一身

不

痛。

崩中一切血病。

圖經云。

血量者半。

心腹。

炒半生。

水服一錢。

心腹。

血氣一切諸痛又能除。

風化痰殺蟲消。

積諸痛皆属于木。

治驚瘧瘧瘧蛇蠍吳。

蛇蠍吳。

五靈脂一兩雄。

黃五錢酒調服。

滓傳患處治毒蛇咬傷李仲南曰五靈。

脂治崩非正治之藥乃去風之劑。

衝任經虛被風襲傷營血以致崩中暴下。

與荆芥防風治崩意同方悟古人識見。

深遠如此時珍曰此亦一謠但未及肝。

虛血滯亦自生風之意按衝爲血海任。

主胞胎任脉通衝脉盛則月事以時下無崩漏之患且易有子。

此地。

茵陳六 大黃二兩 酒浸

梔子十四枚炒

此足陽明藥也成無己曰小熱涼以和之大熱寒以微之發黃者濕熱甚也非大寒不能微其熱故以茵陳爲君。茵陳發汗利水以泄太陰陽。君明之濕熱故爲治黃主藥。梔子爲臣大黃爲佐分。

鳥名寒號蟲矢也。

即易旦鳥夜鳴求旦夏月毛采五色鳴曰。

五畫指

鳳凰不如我。冬月毛落忍寒而號曰。得過且過。高士奇曰。月令仲冬之月鵠鳴。不鳴似與寒號之名未協。黑色氣甚臊惡。糖心潤澤者真研末酒飛去砂石用行血宜生止。

血宜炒惡人參。

夜明砂一名天鼠矢。辛寒。肝經血分藥。活血。

消積治目盲翳障。加石决明夜靈散治鷄眼。

瘡蛻音奇小兒鬼。辛寒。治癰瘍癰癧。陰陽之病。

血氣腹痛能除血熱氣壅。目之外餘經疏曰。辛能散內外滯氣。寒治血積以其善吮血耳。若天鼠矢乃食

皆可畧。吳鶴臯曰。古人每用蠅蟲水蛭。稱其下死胎。則其能攻血塊也。何疑。同

泄前後。則腹得利而解矣。茵陳梔子。能導濕熱由小便出。大黃能導濕熱由大便出。

本方大黃易黃連。名茵陳梔子湯。治同。本方加厚朴枳

實黃芩甘草入生薑燈草煎。名茵陳將軍湯。前症爲陽黃。如身黃而色

暗者爲陰黃。宜此湯。大抵治以茵陳爲主。各隨寒熱用藥。諸痘小便黃亦不利。爲裏實宜利小便或下之無

汗。爲表實宜汗之。或吐之。若小便清是無熱也。仲景云。發黃小便自利。當與虛勞宜小建中湯。自利腹滿而喘不可除熱而除之必嘯。小半夏湯主之。王海藏曰。內感傷寒。勞役形體飲食失節。中州變寒。病生黃非外感而得只宜理中。大小建中足矣。不必用茵陳。

八正散局方。治濕熱下注。咽乾口渴。少腹急滿。小便不通。或淋痛尿血。或因熱爲腫。濕熱下注。小腹急滿則小便當行矣。而卒不行者。熱秘之。

鼈甲燒烟辟蚊。蝙蝠矢也。食蚊砂皆

蚊眼故治目疾。淘淨焙用。惡白微白效。

猪水畜鹹寒。心血用作補心藥之嚮導。

益取以心歸心。以血導血之意。

延壽丹書曰：猪

臨殺驚氣入心。絕氣歸肝。皆不可多食。

尾血和龍腦片。

治瘡瘍倒鱉。能發之時珍曰：取其動

良同

肝主藏血。補血藥用之。入肝明目。

雄者

夜明砂作丸。治雀目。雀目者，夜不能覩。濕痰及肝火盛也。一枝入黃連末五兩。枯萎根白梁米各

治肺虛咳嗽。咳血者蘸薏仁末服。肺補肺。

仲景治消渴有黃連猪肚丸。用雄猪肚一枚。入黃連末五兩。枯萎根白梁米各

車前子。水通。瞿麥。扁蓄。滑石。甘草梢。后子。炒大黃。加燈草煎一方。加木香。取其辛能利氣。黑溫能化氣也。

此手足太陽手少陽藥也。木通燈草清肺熱而降心火。肺爲氣化之源。心爲小腸之合也。車前清肝熱而通膀胱。肝脉絡于陰器。膀胱津液之府也。瞿麥扁蓄降火通淋。此皆利濕而兼瀉熱者也。滑石利竅散結。后子大黃。苦寒下行。此皆瀉熱而兼利濕者也。甘草合滑石爲六一散。用稍者取其徑達壅中。甘能緩痛也。雖治下焦而不專于治下。必三焦通利水乃下行也。膀胱藏水。三焦出水。故治小便。

四兩知母三兩。麥冬二兩。縫定蒸熟。丸如梧子大。每服三十九米飲下。直指方治小兒疳熱。黃連五兩入猪肚蒸爛。飯丸米飲下。仍服調血清心藥佐之。且曰小兒之病。非疳即熱。嘗須識此。

腎鹹冷而通腎。治腰

痛耳聾。日華曰。補水藏。煖腰膝。又曰。久食令人少子。孟說曰。久食令人腎虛。李時珍贊之。謂其鹹寒能瀉腎氣也。昇按枸杞元參知母黃柏性皆寒而能補腎。猪腎乃肉食。何獨瀉腎。若斯之酷也。古今補腰腎藥用猪腎者頗多。未見作害。大抵諸家食忌不可盡信。瑣碎錄。猪腎一對童便二分。酒一分瓦罐煨

升茶清肺也。黃柏黃芩瀉膀胱也。蒼朮白朮燥脾健胃也。又曰。小便不通屬氣虛血虛。實熱痰閉皆宜吐之。以升其氣氣升肺水自降。氣虛用參术升麻等先服後吐。或就參耆藥中調理吐之。血虛用四物湯先服後吐。或就芎歸湯擦吐之。痰多二陳湯先服後吐。或加香附木通。實熱當利之。或八正散。蓋大便動則小便自通矣。或問以吐法通小便其理安在。曰。取其氣化而已。經謂三焦者。決瀆之官。水道出焉。膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。三焦之氣一有不化。則不得如決瀆而出矣。豈獨下焦膀胱氣塞而已哉。又曰。譬如滴水之器。上竅開則下竅無自以通必。上竅開而下竅始出也。

草薢分清飲。治陽虛白濁。小便頻數。澁白如油。名曰膏

膾。入大腸。治腸風血痢。奇效方治藏毒。有藏羸連如

膽之火明目殺疳沐髮光澤醋和燉穀

道治大便不通

仲景治陽明症內無熱汗外導之法不欲以苦寒傷胃府也成無已曰仲景治厥逆無脉用白通湯加

豬胆汁益陽氣太虛陰氣內勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬胆汁苦

入心而通脈寒補肝而利陰不致格拒也。昂按此即熱因寒用之義浴初

生小兒永無瘡疥。

猪脬亦作胞治遺溺

疝氣用作引經。猪脂甘寒涼血潤燥

行水散風解毒。

千金方凡中惡及牛肉毒百獸肝毒服猪脂一斤殺蟲故瘡藥最多用之利腸能通大便

佳。膏藥主諸瘡。臘月者佳古方用之

多治咳嗽亦用之。

猪

滲入皆咸淋濁

川草薢

石菖蒲

烏藥

益智仁

等分

甘草稍減

入

鹽食前服一方加茯苓

此手足少陰足厥陰陽明藥也

萆薢能泄陽明厥陰濕

熱去濁而分清

史國信曰若欲興陽先滋筋力若欲便

陰清肝火烏藥能疏邪逆諸氣逐寒而溫腎

益智仁能泄陽明之濁入厥陰清

心腎固腎氣而散結

烏藥益智等分山藥糊丸名縮泉丸鹽湯下治便數

石菖蒲

開九竅而通心甘草稍達壅中而止痛使濕熱去而心

腎通則氣化行而淋濁止矣此以疎泄而爲禁止者也

外臺秘要曰腎水虛則心肺俱熱使小便赤而濁也腎既虛熱膀胱不足加之以渴飲則小便淋濁由藏虛不

蹄煮湯。通乳汁。加通草二兩佳洗敗瘡。懸蹄

能主府也

甲治寒熱癆喘。痘瘡入目。五痔腸癰。

古人有用

左甲者有。猪肉反黃連。烏梅桔梗。犯

之瀉痢。時珍曰。方有藏連丸。黃連豬肚丸。豈忌肉而不忌藏府乎。昇按

別錄云。豬肉閉血脉。弱筋骨。虛人服不可久食。陶弘景曰。猪爲用最多。惟肉不

可食。孫思邈曰。久食令人少子。發宿病筋骨碎痛之氣。孟詵曰。久食殺藥動風發疾。韓悉曰。凡肉皆補。惟豬肉無補。李時珍曰。南猪味厚汁濃。其毒尤甚。若將

爲大禁者。然今人終日食肉。內溢外腴。子孫蕃衍。未見爲害。若斯之甚也。又云。合黃豆、蕎麥、葵菜、生薑、胡荽、吳茱萸、羊肉、龜鵝、鯽魚、雞子。食之皆有忌。然餚饌中合食者多。未見絲毫作害也。大抵肉能補肉。其味雋永。食之潤腸胃。生

琥珀散

治氣淋血淋膏淋砂淋。

心腎氣鬱。清濁相干。熱蓄膀胱。澁澁而痛曰淋。

結成石。勞淋。遇勞即發。冷淋。寒戰後洩。大抵多屬於熱。甚生濕。則水液渾濁而爲淋。若冷氣滯于膀胱。而作淋者十不一二也。

滑石

琥珀

木通

扁蓄

木香

當歸

炒金

錢爲末服

此手足少陰太陽藥也。滑石滑可去着。利竅行水。扁蓄苦能下降。利便通淋。琥珀能降肺氣。通于膀胱。木通能利小腸。心爲火。入于小腸。小腸爲心之府。主熱者也。諸熱應于心者。其水必自小腸。滲入膀胱。經所謂胞移熱于膀胱。血淋由于血亂。當歸能引血歸經。氣

精液豐肌體澤皮膚固其所也。惟多食則助熱生痰動風作濕傷風寒及病初起人爲大忌耳。先王教民畜牧養彘爲先。豈故爲是以厲民歟。明太祖釋家字之義亦曰無豕不成家。諸家之說確之千古則無徵試之于人則不驗徒令食忌不足取信于後世而已。○傷寒忌之者以其補肌固表油膩纏粘風邪不能解散也。病初愈忌之者以腸胃久枯難受肥濃厚味也。又按猪肉生痰惟風痰濕寒痰忌之。如老人燥痰乾咳更須肥濃以滋潤之不可執泥于猪肉生痰之說也。

犬肉 酸而鹹溫。煖脾益胃。脾胃煖則腰
賢受蔭矣。補虛寒助陽事。
兩腎陰
莖尤勝。

黃

者補脾黑者補腎畏杏仁忌蒜。
道家以爲地厭。

防己 木通 檳榔 生地酒
炒川芎 白术 炒蒼朮
炒鹽

也宜潤血清燥。

者名乾脚氣即熱

能涼心散肝下氣而散血也。
大法鬱金琥珀開鬱青皮
木香行氣蒲黃牛膝破血
黃柏生地滋陰東垣用藥凡例
皮疏肝黃柏滋腎蓋小腹小便乃肝腎部位

防己散 治脚氣足腫山嵐雨水或履濕熱之地自內傷得者生冷茶酒油麵濕熱之毒有濕有熱濕又能生熱濕性下流故注于足濕熱分爭濕勝則憎寒。熱勝則壯熱有兼頭痛諸症者狀類傷寒亦有六經傳變但腫脹掣痛爲異耳此症忌用補劑及淋洗以濕熱得補增劇也亦不宜大瀉治之喜通而惡塞若脚氣冲心喘急不止嘔吐不休者死水凌火故也。先痛而後腫者氣傷血也先腫而後痛者血傷氣也筋脉弛長痛腫者名濕脚氣宜利濕疎風勝縮枯細不腫而痛

黃犬血酒服
二碗治腸癰

羊肉甘熱屬火。補虛勞益氣血壯陽道。

開胃健力通氣發瘡

仲景治虛羸蓐勞有當歸羊肉湯。十刺曰。補可去弱。人參羊肉之屬是也。東垣曰。人參補氣。羊肉補形。凡味同羊肉者。皆補血虛陽。

青羊肝苦寒

蘇頌曰溫色

青補肝而明目

肝以瀉爲補。羊肝丸治目疾。加黃連。

膽

苦寒點風淚眼赤障白翳

臘月入蜜胆中紙套籠住。懸簷下。待霜出掃取點眼又入蜜胆中蒸之。候乾研爲膏。每含少許。或點之。名二百味草花膏。以羊食百草。蜂採百花也。時珍曰。肝竅開于目。胆汁減則目暗也。故諸胆皆治目病。

脛骨入腎而當歸拈痛湯

東垣治濕熱相搏。肢節煩痛。肩背沉重。或偏華也。

黃柏酒炒甘草稍星角食前服。熱加黃芩。時令熱加石膏。肥人有痰。加竹瀝薑汁。或南星大便秘。加桃仁紅花。小便赤澁。加牛膝或木瓜薏苡。

此足太陽藥也。防己行水。療風瀉下焦之濕熱。檳榔攻堅利水。墜諸藥使下行。木通降心火。由小腸出。草稍泄脾火。徑達腎莖。黃柏生地滋腎陰而涼血。解熱。蒼白二術燥脾濕而運動中樞。腫由血鬱。川芎行血中之氣。痛由肝實。犀角涼心而清肝。含之以清熱利濕。消腫止痛也。

目者肝之外。候胆之精。也。故諸胆皆治目病。

脛骨入腎而

當歸拈痛湯

東垣治濕熱相搏。肢節煩痛。肩背沉重。或偏華也。

補骨燒灰擦牙良。

時珍曰。羊脛骨灰可以磨鏡。羊頭骨可以

消鐵誤吞銅鐵者。

羊血解金銀丹石

脛骨三錢米飲下。

羊血解金銀丹石

砒硫一切諸毒。

乳甘溫補肺腎。

羊血解金銀丹石

胃脫大腸之燥治反胃消渴口瘡舌腫。

含如蜘蛛咬傷。

有渾身生熱者飲之瘥。

肉肝青羖

羊良胆青羯羊良乳白羖羊良骨燬用

反半夏菖蒲忌銅器。

牡羊曰羖。羊曰羝去勢曰羯子曰羔羊。

五月
日疔

空心服一方加人參。

甘草
炙

黃芩
炒

葛根
酒

升麻
炒

葛根
當歸

白朮
酒

澤瀉
炒

知母
當歸

猪苓
酒

白朮
獨活細辛

川芎青皮太陰蒼朮白芍少陰獨活細辛

陽明升麻白芷葛根少陽柴胡厥陰吳茱萸

此足太陽陽明藥也原文曰。羌活透關節防風散留濕。

爲君升麻味薄引而上行苦以發之白术甘溫和平蒼
术辛溫雄壯健脾燥濕爲臣濕熱相合肢節頑痛苦參
黃芩知母茵陳苦寒以泄之酒炒以爲因用血壅不流
則爲痛當歸辛溫以散之人參甘草甘溫補養正氣使

苦寒不傷脾胃治濕不利小便非其治也猪苓澤瀉甘

淡鹹平導其留飲爲佐上下分消其濕使壅滯得宣通
也。玉機微義曰此方東垣本爲治脚氣濕熱之劑後人用治諸瘡甚驗。

禹功散子治寒濕水疝陰囊腫脹大小便不利囊如水晶陰汗

不絕謂之水疝蓋得之醉後而使內濕熱乘腎虛而流入也大小便不通濕鬱爲熱而脹秘也

黑牽牛四兩茴香一兩

爲末每一錢薑汁調下或加木

通串一兩

此足少陰太陽藥也。牽牛辛烈能達右腎命門走精隧。
行水泄濕兼通大腸風秘氣秘茴香辛熱溫散能緩丹
田祛小腸冷氣同入下焦以泄陰邪也。

升陽除濕防風湯

東垣

治大便閉塞或裏急後重數至圊

而不能便或有白膿或血慎勿利之利之則必至重病
反鬱結而不通矣以此湯升舉其陽則陰自降矣

昂按通大

便有用升麻

者即此意也

蒼术

泔浸

二錢防風

二錢

茯苓

白术

芍藥

一錢

如胃寒泄

瀉腸鳴加益智仁半夏各五分薑棗煎

此足太陰陽明藥也。蒼朮辛溫燥烈。升清陽而開諸鬱。
故以爲君。白朮甘溫。茯苓甘淡。佐之以健脾利濕防風。
辛溫勝濕而升陽。白芍酸寒。斂陰而和脾也。劉宗厚曰。飲食入胃。
輸精心肺。氣必上行。然後下降。若脾胃有傷。不能上升。
反下流肝腎。而成泄利者。法當填補中氣。升之舉之。
不可疎下。此東垣發前人所未發也。
此方見于玉機微義東垣十書不載。

休寧汪 昂訥卷註輯

獸部

牛肉

甘溫屬土安中補脾益氣止渴

倒倉

法。用牡黃牛肉二十斤。洗淨煮爲糜。瀝去滓。熬成琥珀色。前一晚不食。至日空腹坐密室。取汁每飲一鐘。少時又飲。積數十鐘。身體覺痛。如病在上。則吐。在下。則利。在中。則吐而利。利後必渴。即飲己溺。數碗。以滌餘垢。飢倦先與米飲。二日與淡粥。次與厚粥。軟飯。將養一月。而沉疴即安矣。須斷房事半年。牛肉五年。丹溪曰。牛坤土。黃中色。肉胃藥液無形之物也。積聚既久。回薄腸胃曲折之處。宣銖兩丸。散所能竊犯乎。肉液充滿流行。無處不到。如洪水汎漲。一切凝滯皆順。

醫方集解卷四

潤燥之劑

經曰。諸濇枯涸乾勁皴揭皆屬於燥。乃肺與大腸陽明燥金之氣也。金爲生水之源。

寒水生化之源絕不能灌溉周身。

榮養百骸故枯槁而無潤澤也。或因汗下亡津。或因房勞虛竭。或因服

金石。或因濃酒厚味。皆能助狂火而損真陰也。

燥在外。則皮膚皴揭在內。則津少煩渴。在上。則咽焦鼻

乾在下。則腸枯便秘。在手足。則痿弱無力。在脉。則細

澀而微。皆陰血爲火熱所傷也。治宜甘寒滋潤之劑。

甘能生血。寒能勝熱。潤能去燥。使金旺而水生。則火

平而燥退矣。

素問曰。燥乃陽明秋金之化。經曰。金

木者。生成之始終。又曰。木位之下。金氣承之。益物之

化。從于生物之成。從于殺。造化之道。生殺之氣。猶權

衡之不可輕重也。生之重殺之輕。則氣殫散而不收。

殺之重生之輕。則氣欬濁而不通。斂濁則傷。其分布

之政。不惟生氣不得升。而收氣亦不得

降。經曰。逆秋氣則太陰不收。肺氣焦滿。

生先

治乾咳嗽。有聲無痰謂之乾咳。脾中有濕

生先

無痰丸散所能竊犯乎。肉液充滿流行。無處不到。如洪水汎漲。一切凝滯皆順。

流而去矣。此方傳于西域異人。中年後行一二次亦却疾。養壽之一助也。王綸

中有火則咳。病本于肺火盛津枯。故乾咳。

曰。牛肉補中。非吐下藥。備補爲瀉。因瀉

爲補。亦奇方也。丹溪治林德方咳嗽而咯

血。謂肺壅。非吐不可。血耗非補不可。惟

倒倉一法。兼備服之。而愈。又治蕭伯善。

便濁滑精。亦用倒倉法而愈。又治許文

懿公。病心痛。用燥藥靈丹。艾灸。雜治數

年不效。自分爲廢人。丹溪先以防風通

聖散。下其積滯。而病稍起。思食。然兩足

難移。次年行倒倉法。節節應手。復生子。

活十四年。又臨海林兄。久嗽。吐紅。發熱。

消瘦。衆以爲瘵。百方不效。丹溪脉之。兩

手弦數。日輕夜重。計無所出。時冬月也。

以倒倉法而安。次年生子。

牛乳味甘微寒。潤腸胃。

胃稿胃冷。

解熱毒。補虛勞。治反胃。腸噎。

脾不磨食。

故氣逆而成反胃。氣血不足。其本也。曰。

痰飲。曰食積。其標也。胃稿者。滋血。生津。

生津。

地黃四

斤

人參二

兩

白蜜二

斤

先將地黃熬汁去

滓。入蜜煉稠。再將參苓爲末。和入磁罐封。

水煮半日。白

湯化服。臘仙加琥珀沉香各五錢。目云奇妙。

琥珀以降肺寧心。沉

香以升降諸氣。

香以升

降諸氣。

能滲濕熱。濕

熱去。則津生。

炙甘草湯

仲景

治傷寒脉結。心動悸。及肺痿咳唾多心。

胃冷者溫中調氣。東垣曰：上焦吐者由乎氣治在和中而降氣中焦吐者由乎積治在行氣而消積下焦吐者由乎寒治在溫中而散寒。丹溪曰：反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時嚥之兼服四物湯爲上策不可服人乳人乳有五味之毒七情之火也。昂按噎膈不通服香燥藥取快一時破氣而燥血是速其死也。

陳酒爲佳江南臬司多公患噤口痢粒米不進鄭莫一令服牛乳久之亦瘥。白水牛喉治反胃吐食腸結不通除兩頭去脂膜醋浸炙酥酪醍醐皆牛羊乳所作滋潤滑澤宜于血熱枯燥之人牛膽內石灰于

內懸掛風處百日治金瘡良

中溫溫液液者脉動而中正能自還者曰結不能自還者曰代血氣虛衰不能相續也心中動悸真氣內虛也按傷寒脉結代與雜病不同與此湯補氣血而復脉肺氣虛則成痿胃中津液之上供者悉從燥熱化爲涎沫故濁唾多寶鑑用治呃逆

甘草

炙四兩

生薑

桂枝

三兩

人參

阿膠

蛤粉炒二兩

生地黃

一斤麥冬

去心

麻仁

半斤研

大棗

十二枚

水酒各半煎內阿膠

烊化服

此手足太陰藥也。人參麥冬甘草大棗益中氣而復脉生地阿膠助營血而寧心麻仁潤滑以緩脾胃桂辛溫以散餘邪加清酒以助藥力也聖濟經云津液散爲枯五臟瘦弱營衛涸流濕劑所以潤之麻仁麥冬阿膠

牛黃 甘涼牛有病在心肝胆之間凝結

成黃故還以治心肝膽之病。

經疏曰牛食百草其

精華凝結成黃猶人之有內丹故能散火消痰解毒爲世神物或云牛病乃生

黃者清心解熱利痰涼驚通竅辟邪治非也清心解熱利痰涼驚通竅辟邪治

中風入藏驚癇口噤

心熱則火自生燄肝熟則木自生風

風火相搏膠痰上壅遂致中風不語東垣曰中藏宜之風中府及血脉者用之

反能引風入骨如油入麵接中風中藏者重多滯九竅中府稍輕多着四肢若

外無六經形症內無便溺阻隔爲中經絡爲又輕初宜順氣開痰繼宜養血活

血不宜歲用風藥大抵五藏皆有風而犯肝者爲多肝屬風木而主筋肝病不能榮筋故有舌強口噤瘡邪癱瘓不遂不仁等症若口開爲心絕手撒爲脾絕

地黃之甘潤經益血復脉通心也

喻嘉言曰此仲景傷寒門中之聖方也干金翼用治虛勞外臺用治肺痿究竟本方所治亦何止

二病哉外臺所取在于益肺氣之虛潤肺金之燥至于桂枝辛熱似有不宜不知桂枝能通營衛致津液則肺

氣能轉輸涎沫以漸而下尤爲要緊所以云治心中溫溫液液也玉機微義曰肺痿如咳久聲啞聲嘶咯血此

屬陰虛火熱也吐涎沫而不欬不渴必遺尿小便數以上虛不能制下此肺中冷也必眩多涎唾用炙甘草

乾薑湯以溫之肺痿涎唾多心中溫溫液液者用炙甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱不同故肺痿有寒熱之異甘草乾薑湯炙甘草四兩乾薑二兩

麥門冬湯

金治火逆上氣咽喉不利論曰止逆下氣此湯主之

七升半夏一升人参三兩大棗十二枚粳米三合甘草二兩

治火逆上氣咽喉不利論曰止逆下氣此湯主之

麥門冬湯 治火逆上氣咽喉不利論曰止逆下氣此湯主之

眼合爲肝絕遺尿爲腎絕吐沫鼻鼾爲肺絕。髮直頭搖面赤如粧汗綴如珠者皆不治。若止見一

二症猶有可治者。小兒百病皆胎毒癥。

初生時未食乳用三五厘合

皆胎毒癥

黃連甘草末蜜調令啞之良。發瘡墮胎

善通竅

牛有黃必多吼喚以益水承之

同其吐出迫喝即墮水名生黃如雞子

黃大重疊可揭輕虛氣香者良

觀此則非病乃

生黃殺死角中得者名角黃肝胆中者矣。

名肝膽黃心中者名心黃成塊成粒絕

不及生者但磨指甲上黃透甲者爲真

駱駝黃極易得能亂真。得牡丹菖蒲良

明目人參

貝母屢施不應不知胃者肺之母氣也仲景于麥冬人參梗米甘草大棗大補中氣大生津液隊中增入半夏

之辛溫一味用以利咽下氣此非半夏之功實善用半

夏之功擅古今未有之奇矣

按半夏亦脾胃藥能燥能

故潤也仲景治咽痛不眠皆屢用

潤以能行水故燥以味辛

之今人率以爲燥而疑之則誤矣。

活血潤燥生津湯

丹溪

治內燥津液枯少

內燥血液少也火炎水乾津

液枯少

火炎水乾津

當歸 白芍 熟地黃

錢天冬 麥冬

桔梗

八桃仁分桔梗

紅花

五分

此手太陰足厥陰藥也歸芍地黃滋陰可以生血桔梗

駱駝黃極易得能亂真

爲使惡龍骨龍胆地黃當山

白馬湯 辛寒殺蟲破癰積治反胃

祖台之志

怪云昔有人與奴皆患心腹痛病。奴死剖之得一鼈尚吉。與諸藥投口中不死。有人乘白馬觀之馬溺墮鼈而鼈縮遂以灌之即化成水主乃服馬溺而愈。

驢溺 辛寒殺蟲治反胃噎膈須熱飲之

張文仲備

急方云昔患反胃奉敕調治竟不能療一衛士云服驢尿極驗遂服二合只吐一半再服二合食粥便定宮中患反胃者五六人同服之一時俱瘥。

阿膠 甘平清肺養肝滋腎益氣

肺主氣
腎納氣

和血補陰肝主血血屬陰除風化痰潤燥定喘

利大小腸治虛勞咳嗽肺痿吐膿腫逆

有專合能用更互相濟

清燥湯

東垣

治肺金受濕熱之邪癆蹙喘促胸滿少食色

白毛敗頭眩體重身痛肢倦口渴便秘

經曰肺也者傳相之官也治節

出焉火盛剋金則肺熱葉焦氣無所主而炎其治節故肢體或縱或縮而成痿躄也火上逆肺故喘促肺主皮毛故色白毛敗濕熱填于膈中故胸滿壅于陽明則食少上升于頭則眩注于身則體重流于關節則身痛肺受火傷天氣不能下降勝胱絕其化源故口渴便赤

黃耆

錢半
蒼朮
炒

白术 陳皮 澤瀉

五分

人參 茶芩

升麻

三
當歸
酒

生地黃 麥冬 甘草 炙神曲

炒

柏子仁炒猪苓

二分

柴胡 黃連

炒一
分

五味子

九粒

每服五錢

二冬潤燥兼能生津桃仁紅花活血又可潤燥分用各

血淋血痔腸風下痢傷暑伏熱成病者必用之

姪娠血

尤宜腰痠骨痛血痛枯經水不調

胎動或姪娠下血酒調服

癰疽腫毒及一切

病瀉者忌用

大抵補血與液爲肺大

風病瀉者忌用

腸要藥卷宗奭曰

驢皮

煎膠取其發散皮膚之外用烏者取其

屬水以制熱則生風之義故又治風也

陳自明曰補虛用牛皮膠去風用驢皮

膠楊士瀛曰小兒驚風後瞳人不正者

以阿膠倍入參服最良阿膠育神人參

益氣也按阿井乃濟水伏流其性趨下

用攬濁水則清故治

瘡濁及逆上之痰也用黑驢皮阿井

水煎成

蘇頌曰本經阿膠亦用牛皮是

二膠可通用牛皮膠制作不精

故不堪用以黑光帶綠色夏月不軟者真判

此手足大陰陽明藥也肺屬辛金而主氣大腸屬庚金而主津燥金受濕熱之邪則寒水膀胱生化之源絕源絕

則腎水虧

生水

而癰疽諸症作矣金者水之母也氣

則腎水虧

金不能

者水之源也黃耆益元氣而寶皮毛故以爲君二木參

苓甘橘神曲健脾燥濕理氣化滯所以運動其土土者

苓甘橘神曲健脾燥濕理氣化滯所以運動其土土者

參

金之母也麥冬五味保肺以生津當歸生地滋陰而養

血黃柏黃連燥濕而清熱

黃柏合蒼朮名二妙散治

瘧正藥加牛膝名三妙散升

麻柴胡所以升清猪苓澤瀉所以降濁使濕熱從小便

出則燥

金肅清

肺爲肅

清之藏水出高原而諸症平矣

俞嘉言曰燥與

濕相反者也方名清燥而以去濕爲首務非東垣具過

人之識不及此矣○朱丹溪曰今世風病大率與諸痿

藥

炒成珠或麵炒。蛤粉炒。去皮蒲黃炒。止血酒
化水。童便和用得火良。山藥爲便。畏

大黃。

黃明膠即牛皮膠

甘草功與阿膠相近亦可

代用同葱白煮服通大便。

李時珍曰真
阿膠難得半

皮膠亦可。權用其性味皆平補。宜于虛熱之人。張仲景治漏病。阿膠與黃膠黃蠟並用陳藏器曰。諸膠皆能療風補虛。止洩。驢皮主風爲最。經驗方云。癰疽初起。酒頓黃明膠四兩。服盡。毒不內攻。唐氏方加穿山甲四片。燒存性用。昂謂此方若驗。勝于服蠟。

骨味辛微熱虎屬金而制木故嘯則

服蠟者丸也。

症混同論治。古聖論風瘡條目不同。治法亦異。夫風病外感善行數變。其病多實。發表行滯。有何不可。諸瘡起于肺熱。傳入五臟。散爲諸症。其昏惑癲癇。督悶暴病。鬱冒蒙昧。暴瘡。皆屬於火。其四肢不舉。足痿舌強。痰涎有聲。皆屬於土。悉是濕熱之病。當作諸瘡論治。大抵祇宜補養。若以外感風邪治之。寧免實實虛虛之禍乎。或曰。內經治瘡獨取陽明何也。曰。只諸瘡生于肺熱一語。已見大意。金體燥而居上。主氣畏火者也。土性濕而居中。主四肢畏水者也。嗜慾不節。則水失所養。火寡于思而侮所勝。肺得火邪而熱矣。肺受熱邪。則金失所養。木寡于畏。而侮所不勝。脾得木邪而傷矣。肺熱則不能管攝一身。脾傷則四肢不爲人用。而諸瘡之病作矣。鴻臚方大法無過于此。

滋燥養榮湯 治火爍肺金。血虛外燥皮膚皴揭筋急爪枯或大便風秘。肺主皮毛。肝主筋脈。肝血不足。風熱勝而金燥。故外見皮毛枯槁。肌膚燥癢。內

風生追風健骨定痛辟邪治風癱拘攣

疼痛驚悸顛癇大咬骨哽

爲末水服。大交傳患處。

以頭骨腔骨良

虎雖死猶立不朴其氣力皆在前脰時珍

曰凡辟邪症治驚癇瘧瘧頭風當用頭骨治手足風當用腔骨治腰脊風當用脊骨各從其類也

虎肚治反胃

穢勿洗新瓦

固煅存性爲末。入平胃散一兩每服三錢效。昂按虎肚九宜于食膈。若寒膈氣膈血膈痰膈恐難見功。

虎睛爲散竹瀝下治小兒驚癇夜啼

犀角苦酸鹹寒心瀉肝清胃中大熱搜風順氣丸治中風風秘氣秘便溺阻隔偏身虛癓脉祛風利痰辟邪解毒治傷寒時疫發黃來浮數亦治腸風下血中風癱瘓

風秘者風生燥也氣秘者氣滯也故大便

有筋急便利之症。

當歸酒洗

二錢

生地黃

熟地黃

芍藥炒

黃芩酒炒

秦艽一錢

防風

甘草五分

此手太陰足厥陰藥也

前證爲血虛而水涸當歸潤燥養血爲君。二地滋腎水而補肝芍藥瀉肝火而益血爲臣。

黃芩清肺熱能養陰退陽尤防散肝風爲風藥潤劑

風能生燥尤

防味辛能潤文秦艽能養血榮筋防風乃血藥之使

吐血治崩皆用爲使

甘草甘平瀉火入潤劑則補陰血爲佐使也。

發斑傷寒。飛旱熱乘虛入胃。則發斑。
斑下遲熱留胃中亦發斑。吐血。

下畜血譫狂痘瘡黑陷消癰化膿定

驚明日姪婦忌之。

能消胎氣時珍曰。五藏六府皆稟氣于胃。

風邪熱毒必先干之飲食藥物必先入

胃角犀之精華所聚足陽明胃藥也故

能入陽明解一切毒療一切血及驚狂
斑痘之症抱朴子曰犀食百草之毒及
棘故能解毒飲食有毒。

以角攬之則生白沫

烏而光潤者

勝角尖猶勝。

鹿取茸犀取尖其精氣盡在是也。

現成器

物多被蒸煮不堪入藥入湯劑磨汁用

入丸散剉細紙裹納懷中待熱搗之立

碎。歸田錄云。升麻爲使忌鹽

不通燥則血滯津液不行故偏身虛癰脉浮爲
風脈數爲熱風熱流入大腸無所施泄則下血。

大黃九蒸九晒五兩

大麻仁

郁李仁去皮山藥酒蒸

山茱萸肉

車前子

牛膝酒蒸二兩

茺絲子酒洗獨活

防風

檳榔

枳殼炒一兩

蜜丸

此手足陽明藥也大黃苦寒峻猛能下燥結而祛瘀熱
加以蒸晒則性稍和緩故以爲君麻仁滑利李仁甘潤
並能入大腸而潤燥通幽車前利水牛膝下行又能益
肝腎而不走元氣牛膝引藥下行車前子利小便而不走氣燥本于風獨活
破滯而順氣數藥未免攻散故又用山藥益氣固脾山

羚羊角 苦鹹微寒。羊屬火。而羚羊屬木。

入足厥陰

肝

手太陰少陰經

肺

心

目爲肝

嘉言曰藥有偏峻可暫用以搜風潤燥順氣不可久服。

潤腸丸

東垣

治腸胃有伏火。大便祕滯。全不思食。風結血

結。風結即風秘。由風搏肺藏。傳于大腸。或素有風病者。亦多秘。氣秘。由氣不升降。血秘有亡血。血虛津液不足。熱秘。由大腸熱結。冷秘。由冷氣橫于腸胃。凝陰固結。津液不通。非燥糞也。仲景曰。脉浮而數能食。不大便者。此爲實。名曰。陽結。脉沉而遲不能食。身體重。大便反輕。名曰。陰結。李東垣曰。實秘熱秘。即陽結也。宜散之。虛秘。冷秘。即陰結。

也宜溫之。

大黃

歸尾

羌活

五錢

桃仁

研

大麻仁

去殼一兩

蜜九

方有防風風濕加秦艽皂角子

燒存性用

火寄于肝胆。在志爲怒。經曰。大怒則形氣絕而血菀于上。此能下氣降火。故治傷寒伏熱煩懲。此能散血。故治療滯惡血。血瘀腫毒相竅。此能清肝。故明日去障。肝主風。其合在筋。此能祛風舒筋。故治驚癇。搐搦。骨痛。筋攣。肝藏魂。心主神明。此能瀉心肝邪熱。故治狂越僻謬。夢魘驚駭。肝主血。此能散血。故治療滯惡血。血瘀腫毒相

氣逆食噎不通。羚之性靈而精在角。故

又辟邪而解諸毒。昂按痘科多用以清肝火而本草不言治

痘。

出西地似羊而大角有節最堅勁。

能碎金剛石與貘骨。貘音麥能食鐵

夜宿防患。

以角掛樹而棲_{角有掛紋者真一邊有節而疎乃山驢山羊非}

也多兩角一角者勝剉研極細或磨用

鹿茸

甘溫

一云
鹹熱

純陽生精補髓養血助

陽強筋健骨治腰腎虛冷。百一方鹿角屑熬黃爲末酒服主腰脊虛冷刺痛。

四肢酸痛頭眩眼黑崩帶

遺精一切虛損勞傷惟脉沉細相火衰者宜之。鹿角初生長二三寸分岐如

大黃破結通幽。麻仁滑腸利竅。血和風疎。腸胃得潤。則

自然通利矣。

朱丹溪曰。古人通大便皆用降氣品劑蓋肺氣不降則難傳。选用枳殼沉香調子杏仁等是也。又老人虛人風人津液少而秘者宜滑之。用

胡麻麻仁阿膠等是也。如妄以峻藥逐之則津液走氣血耗雖暫通而即

秘矣必變生他症。

本方加防風皂角仁蜜丸名活血潤燥丸治同。皂角得

濕滑則燥

本方去羌活加升麻紅花生熟二地名潤燥

湯俱東垣方治同。加升麻者能升始能降也。

又方大黃煨熟當歸酒浸枳

實炒等分蜜丸亦名潤腸丸治痔病肛門燥澀。

通幽湯東垣

治幽門不通上衝吸門噎塞不開氣不得下

大便艱難名曰下脘不通治在幽門。

下脘即幽門胃之下口也人身上下

鞍紅如瑪瑙破之如朽木者良。

木嫩者血氣未

足無酥塗微炙用。

不塗酥則傷茸

或酒炙不可。

嗅之有蟲恐入鼻竇。

獵人得鹿熟之取首然後斃鹿以血

未散故也。最難得不破未出血者。況存

中筆談云。凡含血之物肉易長筋次之

骨最難長。故人二十歲骨骼方堅麋鹿

角無兩月長至二十餘斤。凡骨之生無

速于此。草木亦不及之。頭爲諸陽之會。

鍾于茸角。豈與凡血比哉。

○鹿陽獸喜

居山麋陰獸喜居澤麋似鹿色青而大

皆性淫一牡輒交十餘北麋補陰鹿補

陽故冬至麋角解夏至鹿角解也。麋鹿

茸角罕能分別雷敦曰鹿角勝麋角孟

蒼蘇恭蘇頌並云麋茸麋膠勝于鹿時

珍曰鹿補右腎精氣麋補左腎血液。

鹿角鹹溫生用則散熱行血消腫磨

醋

鹿角鹹溫生用則散熱行血消腫磨

醋

有七門皆下衝上也幽門上衝吸門吸門即會厭氣喉上掩飲食者也衝其吸門之氣不得下歸肝腎爲陰火相拒故隔噎不通濁陰不得下降而大便乾燥不行胃之濕與陰火俱在其中則腹脹作矣。治在幽門使幽門通利泄其陰火潤其燥血生其新血則幽門通吸門亦不受邪膈噎得開脹滿俱去矣是濁陰得下歸地也。

當歸身 升麻 桃仁 研紅花 甘草 鐵 一 生地黃

熟地黃 五分 或加檳榔末五分本方加大黃麻仁名當

歸潤腸湯治同

此手足陽明藥也當歸二地滋陰以養血桃仁紅花潤

燥而行血橫榔下墜而破氣滯升麻者天地之道能

升而後能降清陽不升則濁陰不降經所謂地氣上爲

雲天氣下爲雨也

李東垣曰腎開竅于二陰經曰大便難者取足少陰大腎主五液津液足

○
擣在吸門食下胃脘疼湧出史吐

塗腫毒。爲末酒服治折傷醫餘曰。有瘀瘡赤腫而痛用黃柏涼藥久不愈者。却當用溫藥加鹿角灰髮灰乳香碎之類。此陰陽寒暑往來之理也。辟邪治夢與鬼交。酒服一撮。鬼精即出。棗霜熬膏則專于滋補。時珍曰。鹿乃仙獸。純陽多毒。能通督脈。又食良草。故其角肉食之有益無損。鹿一名斑龍。西蜀道士嘗貲斑龍丸。歌曰。尾閒不禁滄海竭。光轉靈丹那漫說。惟有斑龍頂上珠。能補王堂闕下穴。蓋用鹿茸與膠霜也。造膠霜法。取新角寸截。河水浸七日刮淨。桑柴火煮七日入醋少許。取角搗成霜用其汁。加無灰酒熬成膏用。

畏大黃

鹿鱗鹿相交之精也。
設法取之。大補虛勞。

則大便如常。若飢飽勞役。損傷胃氣。及食辛熱味厚之物。而助火邪。火伏血中。耗散真陰。津液虧少。故大便燥結。少陰不得大便。以辛潤之。太陰不得大便。以苦泄之。陽結者。散之。陰結者。溫之。傷食者。以苦泄之。血瘀者。以桃仁酒製大黃通之。風燥者。以麻仁加大黃利之。氣滯者。郁李仁枳實皂角仁潤之。不可蒸用牽牛巴豆之類。下之。損其津液燥結愈甚。遂成不救。

韭汁牛乳飲丹

治胃脘有死血。乾燥枯槁。食下作痛。翻

胃便秘。

胃脘有死血者。嘗酒食。老躁是多怒。積久而成

血阻。

碍故食不下。痛翻胃而吐出也。瘀血不去。新血不

生。故腸枯而便秘。

○膈噎。翻胃多因氣血兩虛。胃搗胃

冷而成。

飲可下。而食不可下。搗在吸門。即喉間之厭會

也。食下胃脘痛。須臾吐出。搗在食門。胃之上口也。此上

焦名噎。食下良久。吐出搗在幽門。胃之下口也。此中焦

名膈。朝食暮吐。搗在關門。小腸下口也。此下焦名反胃。又有寒癥。瘀血。食積壅塞胃口者。或補或消或潤。宜隨病論治。

麝香

辛溫香氣開經絡通諸竅透肌骨。

煖水氣治卒中諸風諸氣諸血諸痛癥。

食下良久吐出

厥驚癇嚴用和云中風不醒者以麝香病在骨髓者宜之若在肌肉用之反引

風入骨如油入麵時珍曰嚴氏言風病必先用東垣謂必不可用皆非通論若

經絡壅閉孔竇不利者安得不用爲引導以開通之耶但不可過耳昂拔據李氏之言似仍以嚴說爲長廣利方中惡

客忤垂死麝香一錢醋和灌之癥瘕瘻瘍目

翳陰冷辟邪解毒殺蟲墮胎壞巢敗酒

治巢積酒積黃入肝治筋水片入腎治

骨

研用凡使麝香用當門子尤妙思

本草綱目 麝香

韭菜汁 牛乳 等分時時呷之有痰阻者加薑汁本方去牛乳加陳酒治血膈韭汁耑胃經消瘀血

此足陽明藥也韭汁辛溫益胃消瘀牛乳甘溫潤燥養

胃

消瘀血

血瘀去則胃無阻血潤則大腸通而食得下矣朱丹溪曰反胃

膈噎大便燥結宜牛羊乳時時嗽之兼服四物湯爲上策不可服人乳人乳有五味之毒七情之火故昂拔膈

噎不通眼香燥藥取快一時破氣而燥血是速其死也不如少服藥飲牛乳加韭汁或薑汁或陳酒爲佳丹溪

禁用香燥藥所言補血益陰潤燥和胃調中却無其方可以意會○治膈噎諸藥韭汁散瘀竹瀝薑汁消瘀童

便降火人乳牛乳潤燥補血蘆根汁止嘔茅根汁涼血甘蔗汁和胃等齊消食驅尿殺蟲或加燒酒米醋白蜜

和諸汁頓服亦佳

黃耆湯本

治心中煩燥不生津液不思飲食

蒜不可近鼻。防蟲入腦。麝見人捕之則生香尤難得。其香聚處草木

皆黃市人或攬荔枝核爲之。

熊膽 苦寒。涼心平肝明目。殺蟲治驚癇。

五痔塗之即瘥 通明者佳。性善辟塵撲塵。

水上投膽少許。則豁然而開。

象皮 象肉壅腫。以刀刺之半日即合。治

金瘻不合者。用其皮灰亦可熬膏入散。

象膽能辟塵與熊膽同功。

獺肝 甘鹹而溫。益陰補虛。殺蟲止嗽。治

傳尸鬼疰有神功。戶疰鬼疰乃五疰之一變動有三十三種

黃耆 熟地黃 菖蒲 五味子 麥冬 三天冬 人

參 甘草 三錢 淡竹葉 一兩 每服三錢加烏梅薑棗煎。

此手足太陰藥也。黃耆入參補氣。熟地芍藥補血。烏梅五味斂耗生津。天冬麥冬瀉火補水。淡竹葉以利濕。甘草甘以和中。濕去氣運則脾和而思食。津生而燥退矣。

消渴方

丹溪

治渴症。胃熱善消水穀。渴而多飲爲上消。肺

消胃熱也。渴而小便數有膏爲下消。腎熱也。多食善飢爲中水衰也。經曰。二陽結謂之消。二陽者。陽明也。手陽明大腸主津。病消則目黃口乾。是津不足也。足陽明胃主血熱。則消穀善飢。是血中伏火。血不足也。未傳能食者。必發脣瘡。癰瘡不能食者。必傳中滿。鼓脹皆不治之症。○氣分渴者。喜飲冷水。宜寒涼滲劑。以清其熱。血分渴者。喜飲熱水。宜甘溫酸劑。以滋其陰。上輕中重下危。而上中平。則不傳下。腎消小便酣者。爲重。水生于甘。而死于

乃至九十九種。其症使人寒熱沉沉默然不知病之所苦而無處不惡死後傳入乃至滅門。古方有獺肝丸。獺肝烘乾炙爲末。水服二錢日二以瘥爲度。

小便本鹹而反甘。是生氣泄。脾氣下陷。入腎中爲土魁水也。

乾炙爲末。水服二錢日二以瘥爲度。

諸肝皆有葉數惟獺肝一月一葉其間

又有退葉須于獺身取下不爾多爲吳

鶴

皋曰。獺陰物。晝伏夜出。故治鬼疰。昂謂不然。緣其肝獨異于他獸也。

佳。

猾皮 苦平治腸風瀉血五痔

燒末水調傳水服亦

陰腫脂滴耳中治聾胆點痘後風眼似蠶而圓大褐色攢毛外刺如粟房

煅黑存性用。

鬼屎一名明月砂 殺蟲明目治勞瘵五痔痘

黃連 天花粉 生地汁 鶴汁 牛乳 將黃連花粉爲末。調眼或加薑汁蜂蜜爲膏噙化。

此手足太陰陽明藥也。經曰心移熱于肺。傳爲渴消火

盛火金不能生水。故令燥渴。黃連苦寒以瀉心火。生地

大寒以生腎水。花粉藕汁降火生津牛乳補血潤以去

燥火退燥除津生血旺則渴自止矣。

黃連花粉止渴生津。渴症要藥單用

亦可治之。

地黃飲子

易簡

治渴煩躁咽乾面赤

咽乾腎火上炎也而赤陽明鬱熱也

煩属于心躁属于腎

後生翳。兔肝瀉肝熱故能明目。兔

肉治消渴。海上方。澄汁冷飲。小兒食之稀痘瘡。

陶弘景曰。孕婦食之令兒缺唇保壽堂

兔血丸。令小兒永不出痘。雖出亦稀。臘八日取生兔刺血和蕎麥麵加雄黃四五分和九葉豆大。初生小兒乳汁送下。

二三丸。遍身發出紅點。此其驗也。

獵鼠矢。甘而微寒。治傷寒勞復發熱男

子陰易腹痛。婦人傷寒初愈即與交接。毒中男人名陰易。若女人與傷寒男子交者名

陽易。活人有鼠矢丸。

兩頭尖者爲雄

鼠矢。鼠胆明目。汁滴耳中治三十年

老聾。陶弘景曰。鼠膽隨死輒消不易得也。鼠肉治兒疳

人參 黃耆蜜炙甘草 生地黃 熟地黃 天冬 麥

冬 枇杷葉蜜炙石斛 澤瀉 枳殼炒熟等分每服三錢

此手足太陰陽明藥也。喻嘉言曰。此方生精補血潤燥

止渴。佐以澤瀉枳殼疎導二府。澤瀉瀉膀胱之火。枳殼寬大腸之氣。使小

腑清利則心火下降。心與小腸相表裏。大腑流暢則肺經潤澤。

肺與大腸相表裏。宿熱既除。其渴自止矣。

嘉言又曰。人參白虎湯。耑治渴症。氣分燥熱。此湯耑治血分燥熱。竹葉黃耆湯兼治氣血燥熱。宜

辨症而用之。附竹葉黃耆湯。淡竹葉生地黃各二錢。當歸川芎。芍藥麥冬黃芩炒人參黃耆甘草半夏石膏。煅各一錢。治消渴氣血兩虛。胃火盛而作渴。

白茯苓丸。治腎消兩腿漸細。腰脚無力。此因中消之後。胃熱入腎消燬

之傳變。飲一溲二。溲如膏油。王註曰。肺主氣。肺無病則

鼠瘻 河間曰鼠性善穿，故治瘻瘻，因其性爲用也。

氣能管束津液。其精微者，榮養筋骨血脉。餘者爲溲。病則津液無氣管攝而精微者，亦隨溲下。如膏油也。

茯苓 黃連 花粉 草薢 熟地黃 覆盆子 人

參 玄參一兩 石斛 蛇床子七錢雞生腫三十具，音皮五分雞肉腫鴟即雞肫皮 炒 蜜丸 磁石湯送下

此足少陰藥也。茯苓降心火而交腎。黃連清脾火而瀉心。石斛平胃熱而潤腎。能壯筋骨。療風痺脚弱。熟地玄參生腎水。覆盆蛇床固腎精。人參補氣。花粉生津。萆薢清熱利濕。

膀胱雞之脾也。能消水穀通小腸膀胱而止便數。善治膈消磁石色黑入腎補腎益精。故假之爲使也。喻嘉言曰友人

病消渴後渴少止。反加燥急。足膝痿弱。予主是丸加犀角。有醫曰腎病而以黃連犀角治心。毋乃倒乎。予曰腎

立信要
者胃之關也。胃熱下傳于腎。則關門大開。心之陽火得
以直降于腎。心火灼腎。躁不能需。予用犀角黃連對治
其下。降之陽。若寧為倒乎。服之果效。再
服六味地黃丸。加犀角而肌澤病起矣。

桑白皮等汁十味煎。許仁 治氣嗽經久。將成肺痿。乍寒

則

治氣嗽經久。將成肺痿。乍寒

乍熱。唾涕稠粘。喘息氣上唇口焦乾。亦有唾血者。漸覺
瘦悴。小便亦少。色敗毛聳。此亦成蒸。及久嗽成肺癰。唾
悉成膿。出無多少。

桑白皮

一升地骨皮

三升二味合煎取汁三升

生地汁

五升生麥冬汁

二升

生葛根汁

竹瀝

三升

蜜

棗膏

一升牛酥合三升

以麥冬生地葛根竹瀝薑汁和煎減半。再內桑皮地骨
汁和煎三分減一。再入酥蜜棗膏攪勿停手。煎如飴糖。

夜臥時取一胡桃大含之稍加至雞子大或晝日丸服亦得。

此手太陰藥也。桑皮瀉肺行水。麥冬補肺生津。地骨退熱除蒸。竹瀝清痰養血。能除陰虛之有大熱者。生薑祛寒而溫胃。棗膏補土以生金。地汁葛汁甘寒以除大熱。白蜜牛酥甘潤以止久嗽也。

治久嗽方

千金

白蜜一斤 生薑二斤 取汁 先秤銅鉗知斤兩訖。納蜜薑汁。微火熬令薑汁盡。惟有蜜斤兩在則止。每含如棗大一丸。日三服。

此手太陰藥也。白蜜滑能潤肺。生薑辛能散寒。宋洪邁有瘧疾
晚對上諭以胡桃三枚薑三片臥時嚼服即飲湯復嚼
薑桃如前數靜臥必愈。邁如旨服旦而痰消嗽止亦同
此意。○朱丹溪曰：陰分嗽者多屬陰虛。治用知母止嗽勿用生薑以其辛散故也。

豬膏酒

治過勞四肢筋液耗竭。數數轉筋爪甲皆痛。

不能久立名曰筋極。

肝主筋筋極六極之一也。經曰：陽氣精則養神，柔則養筋。筋骨過勞耗

其津液不能榮養故動急而筋數轉也。爪甲者筋之餘。
筋屬木猶木枯則枝葉皆萎也。不能久立筋衰不能束
骨也。

豬脂 薑汁

各二升熬取三升再入酒酒合五

分三服

此足厥陰藥也。津竭筋枯非草木之藥卒能責效。猪膏
潤能養筋。薑汁辛能潤燥酒和血而性善行取易達于

四肢也

本方除薑汁加亂髮煎髮消藥成名猪膏髮煎。治諸黃令病從小便出。本方除薑汁。加金銀花煮酒飲。治瘡疥最良。

麻仁蘇子粥

本事
方

治產後大便不通。

許叔微曰。婦人產後有三種疾。即冒則多汗。多汗則大便秘。故難于用藥。

及老人風秘。

大麻仁 紫蘇子 等分洗淨合研。再用水研。取汁煮

粥啜。

此手陽明藥也。麻仁陽明正藥。滑腸潤燥。利便除風。蘇子兼走太陰潤肺通腸。和血下氣。行而不峻。緩而能通。

故老人產婦氣血不足者所宜用也。許叔微曰。一婦年八十四忽復痛頭痛惡心不食醫皆議補脾治風清利頭目服藥雖愈全不進食其家憂惶予辨前藥皆誤此是老人風秘藏府壅滯聚于胸中則腹脹惡心不思飲食上至于巔則頭痛不清也令作此粥兩啜而氣泄下結糞如椒者十餘枚漸得通利不藥而愈矣。