

T 7970/2240(15)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

MAR 24 1906

CHINESE - JAPANESE LIBRARY
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 24 1958

神農本草經疏卷之二十二

蟲魚部下品

總八十一種今疏其要者十六種

蝦蟆

蟾酥

牡鼠糞

蛤蜊

蚶殼附

蚶蛇膽

蛇蛻

白頸蚯蚓

蜈蚣

蛤蚧

水蛭

斑貓

田中螺汁

白花蛇

蜚蠊

烏蛇附

哈佛大學
哈佛燕京
圖書館
珍藏印

五靈脂

蝎

鯪鯉甲

蝦蟇味辛寒有毒主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之不患熱病療陰蝕疽癘惡瘡獠犬傷瘡能合玉石一名蟾蜍

疏○蝦蟇蟾蜍本是二物經云一名蟾蜍者蓋古人通稱蟾爲蝦蟇耳經文雖名蝦蟇其用實則蟾蜍也今世所用者皆蟾蜍而非蝦蟇其功益可見矣稟土金之精氣上應月魄

性亦靈異其味辛氣寒毒在眉稜皮汗中其主癰腫陰瘡陰蝕疽癘惡瘡獠犬傷瘡者皆熱毒氣傷肌肉也辛寒能散熱解毒其性急速以毒攻毒則毒易解毒解則肌肉和諸證去矣凡瘟疫邪氣得汗則解其味大辛性善發汗辛主散毒寒主除熱故能使邪氣散而不留邪去則胃氣安而熱病退矣破癥堅血者亦以其辛寒能散血熱壅滯也陶隱居云

其肪塗玉則刻之如蠟故云能合玉石近世
治小兒疳疾多用以其走陽明而能消積滯
也

主治參互

全嬰方五疳保童丸治五疳八痢面黃肌瘦
好食泥土不思乳食用大乾蟾蜍一枚燒存
性皂角去皮弦一錢燒存性蛤粉水飛三錢
麝香一分糊丸粟米大空心米飲下三四十

丸日二服 鄭氏小兒方走馬牙疳侵蝕口

鼻乾蚶蚩黃泥裏固煨過黃連各二錢半青
黛一錢入麝香少許和研傅之 錦囊秘覽

附骨壞瘡久不瘥膿汁不已或骨從瘡孔中
出用大蝦蟆一箇亂髮一雞子大猪油四兩
入二物煎枯去滓待凝如膏先以桑根皮烏
頭煎湯洗拭乾煨龍骨末糝四邊以前膏貼
之 醫林集要發背腫毒初起勢重者以活

蟾一箇破開連肚乘熱合瘡上不久必臭不可聞再易三四次即愈 袖珍方治風犬傷即用蟾蜍後足搗爛水調服之先於頂心拔去血髮三兩根則小便內見沫也

○蟾酥甄權云端午日取眉脂以朱砂麝香為丸如麻子大治小兒疳瘦每日一丸如腦疳以乳汁調滴鼻中日華子云眉酥治蚰牙和牛酥摩傅腰眼并陰囊治腰腎冷并助陽氣

蘇頌云主蚰牙及小兒疳瘦觀諸家所主但言其有消積殺蟲溫煖通行之功然其味辛甘氣溫善能發散一切風火抑鬱大熱癰腫之候為拔疔散毒之神藥第性有毒不宜多用入發汗散毒藥中服者尤不可多

主治參互

同鐵繡桑礪麝香牛黃水片用金鍼鍼入疔根抹入前藥其疔根即爛出 治疔丸同硃

記治
疔瘡

砂水片牛黃明礬白殭蠶麝香黃蠟溶化作
丸麻子大用葱頭白酒吞下取汗不過二三
小丸 青囊雜纂拔取疔黃蟾酥以麵丸梧
子大每用一丸安舌下即黃出也 危氏方
拔取疔毒蟾酥以白麵黃丹搜作劑每丸麥
粒大挑破納入仍以水澄膏貼之 保命集
一切瘡毒蟾酥一錢白麵二錢硃砂少許井
水調成小錠子如麥大每用一錠葱湯服汗

出即愈如瘡勢緊急用三四錠 萬氏家抄
凡癰疽發背無名腫毒初起者急取蟾酥三
五分廣膠一塊米醋一二碗入銚內火化開
用筆蘸乘熱令人不住手周圍潤之以散為
度

簡誤

蟾雖有毒與病無害其眉酥有大毒不宜多
服諸家咸云治小兒疔瘦恐非正治不宜漫

嘗也卽用亦煨過者予親見一人因齒痛以蟾酥納牙根誤吞入頭目俱脹大而斃卽陶注云其皮汁甚有毒犬嚙之口皆腫之驗也惟疔腫服之者取其以毒攻毒之義然其劑亦甚小不能爲害耳外治殊有神效若欲內服勿過三釐慎毋單使必與牛黃明礬乳香沒藥之類同用乃可如瘡已潰欲其生肌長肉之際得之作痛異常不可不知也

牡鼠糞微寒無毒主小兒癇疾大腹時行勞復

兩頭尖者是牡鼠屎

疏○牡鼠糞本經諸家不言味但云微寒無毒然詳其所自應是苦鹹之物蓋鼠屬水而凡糞必苦者也入足陽明足厥陰經其主小兒癇疾大腹及時行勞復者皆熱邪在陽明也苦寒能除是經之熱所以主之古方治男子陰易腹痛婦人吹乳乳癰皆取其除熱軟

堅泄結走肝入胃之功耳

主治參互

同白芷山茨菇山豆根連翹金銀花蒲公英
夏枯草貝母橘葉栝樓根紫花地丁牛旁子
治乳癰乳岩有效 外臺秘要傷寒勞復用
雄鼠屎二十枚豉五合水二升煮一升頓服
活人書加梔子葱白 南陽活人書男子陰
易及勞復殺鼠屎湯用殺鼠屎兩頭尖者十

四枚韭白根一大把水二盞煎一盞溫服得
黏汗爲効未汗再服 集要方婦人吹奶鼠
屎七粒紅棗七枚去核包屎燒存性入麝香
少許溫酒調服并治乳癰初起 普濟方大
小便秘雄鼠屎末傅臍中立効 除傷寒勞
復陰易及乳癰乳岩外他用甚稀故不著簡
誤

蛤蜊冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老

癖能爲寒熱者及婦人血塊煮食之

疏○蛤蜊稟水中之陰氣以生其味鹹氣冷無毒入足陽明經五臟皆屬陰得水氣之陰者其性滋潤而助津液故能潤五臟止消渴開胃也鹹能入血軟堅故主婦人血塊及老癖爲寒熱也煮食更能醒酒

○蛤粉丹溪云味鹹寒無毒主熱痰溼痰老痰頑痰疝氣白濁帶下同香附末姜汁調服主

心痛

疏○此卽蛤殼煨成粉者其味鹹氣寒無毒爲諸痰證之要藥蓋痰未有不由火氣上炎煎熬津液而成鹹能軟堅潤下得之則火自降痰結自消矣疝氣白濁帶下皆腎經爲病也腎屬水鹹爲水化氣類相從故能入腎以除其所苦也心痛者心虛而熱邪客之也五臟苦欲補瀉云心欲軟急食鹹以軟之此之

謂也更有消浮腫利小便散癭核腫毒婦人
血塊湯火傷瘡等用

主治參互

普濟方氣虛水腫用大蒜十箇搗如泥入蛤
粉丸梧子大每食前白湯下二十九服盡小
便下數桶而愈 潔古方治白濁遺精真珠
粉丸用蛤粉煨一斤黃檗蜜炙一斤為末水
跌為丸梧子大每服一百丸空心溫酒下日

水腫

渴 澀

二次蓋蛤粉味鹹而能補腎陰黃檗苦而降
心火堅腎故也

簡誤

肉氣味雖冷乃與丹石人相反食之令腹結
痛殼粉善消痰積血塊然脾胃虛寒者宜少
用或加益脾胃藥同用為宜

蚶溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏健胃令人
能食又云溫中消食起陽益血色 殼燒過以

米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣癥癖

疏○蚘得水中之陽氣故其味甘氣溫性亦無毒經曰裏不足者以甘補之又曰形不足者溫之以氣甘溫能益氣而補中則五臟安胃氣健心腹腰脊風冷俱瘳矣胃健則食自消臟煖則陽自起氣充則血自華也殼味鹹走血而奠堅故能治血氣冷氣癥癖丹溪用

以消血塊化痰積以此也今世糟其肉爲酒之物罕有人藥者殼惟消癥癖之外無他用故並不著主治及簡誤

蚘蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹蠱痛下部蠱瘡日腫痛

疏○蚘蛇稟火土之氣其膽爲甲乙風木之化故其味苦中有甘氣寒有小毒氣薄味厚陰也降也入手少陰足厥陰陽明經心腹蠱

痛者蟲在內攻嚙也下部蠱瘡者蟲在外侵蝕也溼熱則生蟲苦寒能燥溼殺蟲故內外施之皆得也肝開竅於目肝熱則目腫痛入肝泄熱則腫痛除矣今人受杖時用此噙化可得不死其功能護心止痛使惡血不上薄心有神力也

主治參互

同血竭乳香沒藥狗頭骨灰麈蟲天靈蓋象牙末麻皮灰丹砂作丸臨杖服一丸護心止痛多杖無害 聖惠方小兒急疔瘡水調蚘蛇膽傅之 醫方摘要痔瘡腫痛蚘蛇膽研香油調塗立効 真膽絕難得狹長通黑皮膜極薄舐之甜苦剔取粟許着淨水中浮游水上回旋行走者爲真其徑沉者非也勿多着亦沉散也今世惟爲受杖人所需餘甚稀使故不著簡誤

蛇蛻音稅味鹹甘平無毒主小兒百二十種驚癇

瘕癩癩疾寒熱腸痔蟲毒蛇癩弄舌搖頭大人

五邪言語僻越惡瘡嘔欬明日火熬之良

疏○蛇蛻蛇之餘性猶存不以氣味為用者

故蛇之性上竄而主風蛻之用入肝而辟惡

其性一也小兒驚癇瘕癩疾寒熱蛇癩弄

舌搖頭大人五邪言語僻越皆肝經為病邪

惡侵犯也蛇蛻走竄能引諸藥入肝散邪故

主如上等證善能殺蟲故主腸痔蟲毒惡瘡

邪去木平故止嘔欬明日今人亦用以催生

去翳膜者取其善脫之義也

主治參互

肘後方治小兒頭面瘡蛇蛻燒灰臘猪脂和

傅之并治小兒月蝕 周蜜齊東野語云小

兒痘後障翳蛇蛻一條燒焙天花粉五錢為

末以羊肝破開夾藥縛定米泔水煮食屢試

催生

豆豉
炮炙

輒効真奇方也 濟生秘覽治橫生逆生須
 臬不救用蛇蛻一具蟬蛻十四箇髮一握竝
 燒存性分二服酒下仍以小鍼刺兒足心擦
 鹽少許卽順并能下胞衣 產乳方婦人吹
 乳蛇皮一尺七寸燒末酒服 千金方諸漏
 有膿蛇蛻灰傅之卽蟲出 直指方魚臍瘡
 出水四畔浮漿用蛇蛻燒存性雞子清和傅
 醫方摘要耳忽火痛如有蟲在內奔走或

血水流出或乾痛不可忍者蛇蛻皮燒存性
 研細鷲翎吹入立愈

簡誤

小兒驚癇癩疾非外邪客忤而由於肝心虛
 者不効

白頸蚯蚓味鹹寒大寒無毒主蛇痕去三蟲伏

尸鬼疰蠱毒殺長蟲仍自化作水療傷寒伏熱

狂謬大腹黃疸一名土龍 畏葱鹽

蚯蚓

疏○蚯蚓得土中陰水之氣故其味鹹寒無毒大寒能祛熱邪除大熱故主伏尸鬼疰及療傷寒伏熱狂謬鹹主下走利小便故治大腹黃疸諸蟲瘕咸屬溼熱所成得鹹寒之氣則瘕自消蟲自去而蠱毒之熱亦解矣昔一道人治熱病發狂用白頸蚯蚓十數條同荆芥穗搗汁與飲之得臭汗而解其為治傷寒伏熱狂謬之明驗也

主治參互

肘後方傷寒熱結六七日狂亂見鬼欲走以大白頸蚯蚓半斤去泥用人溺煮汁飲或生絞汁亦可 斗門方小便不通因溼而得者用蚯蚓搗爛浸水濾取濃汁半碗服立通 勝金方耳卒聾閉蚯蚓入鹽安葱管內化水點之立効 保命集瘰癧潰爛流串者用荆芥根下段煎湯溫洗良久看瘡破紫黑處以

記

針刺去血再洗三四次用韭菜地上蚯蚓一
把五更時收取炭火上燒紅為末每一匙入
乳香沒藥輕粉各半錢穿山甲九片炙為末
麻油調傅之神効

簡誤

蚯蚓氣大寒能除有餘邪熱故傷寒非陽明
實熱狂躁者不宜用溫病無壯熱及脾胃素
弱者不宜用黃疸緣大勞腹脹屬脾腎虛尸

疰因陰虛成勞瘵者咸在所忌性復有小毒
被其毒者以鹽水解之

蜈蚣味辛溫有毒主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒
殺鬼物老精溫瘧去三蟲療心腹寒熱結聚墮
胎去惡血赤頭足者良

一名螞蚱
一名天龍

疏○蜈蚣稟火金之氣以生故其味辛氣溫
有毒乃屬陽之毒蟲足厥陰經藥也善能制
蛇見大蛇使緣上噉其腦淮南子云騰蛇游

胎

記
瘧

霧而殆於螻蛆正指此也故本經主噉諸蛇
蟲魚毒及去三蟲蠱毒也性復走竄辟邪所
以能療鬼疰溫瘧殺鬼物老精辛主散結溫
主通行故又治心腹寒熱結聚墮胎去惡血
也今世又以之治小兒驚癇風搐臍風口噤
與夫瘰癧便毒痔漏等證皆用之

主治參互

金頭蜈蚣得牛角鰓象牙末猪懸蹄刺蝟皮

蛙竹屑能去通腸漏管 直指方瘰瘡一名

蛇瘴蠻烟瘴雨之鄉多毒蛇氣入有不伏水

土風氣而感觸之者數月以還必發蛇瘴惟

赤足蜈蚣最能伏蛇為上藥白芷次之 聖

濟總錄云嶺南外蛇瘴一名瑣喉瘴項大腫

痛連喉用赤足蜈蚣一二節研細水下即愈

奇効良方天蛇頭瘡生手指頭上用蜈蚣

一條燒烟熏一二次即愈或為末猪膽汁調

塗之 濟生秘覽便毒初起蜈蚣一條瓦上
焙存性為末酒調服 圖經治初生小兒口
噤不開不能乳者用赤足蜈蚣去足炙研末
以猪乳二合調半錢分三四服溫灌之効

簡誤

蜈蚣性有毒善走竄小兒慢驚風口噤不言
大人溫瘧非烟嵐瘴氣所發心腹積聚非蟲
結蛇瘕便毒成膿將潰咸在所忌性畏蜚蠊

不敢過其所行之路能嚙人痛甚以蜚蠊搗
塗之痛立止蜈蚣能制龍蛇而反畏蜚蠊蚺
蛛即莊子所謂物畏其天陰符經所謂禽之
制在氣也凡使勿用干足蟲真相似但蜈蚣
腰中一段無脚所以能掬而彈遠為異又云
頭上有白肉面并嘴尖可別若誤用并把着
腥臭氣入頂能殺人也

蛤蚧味鹹平有小毒主久肺勞傳尸殺鬼物邪

氣療欬嗽下淋瀝通水道生嶺南山谷及城牆
或大樹間身長四五寸尾與身等形如大守宮
一雌一雄常自呼其名曰蛤蚧最護惜其尾或
見人欲取之多自嚙斷其尾人卽不取之凡採
之者須存其尾則用之力全故也

疏○蛤蚧得金水之氣故其味鹹氣平有小
毒入手太陰足少陰經其主久肺勞傳尸鬼
物邪氣欬嗽淋瀝者皆肺腎爲病勞極則肺

腎虛而生熱故外邪易侵內證兼發也蛤蚧
屬陰能補水之上源則肺腎皆得所養而勞
熱咳嗽自除邪物鬼氣自去矣肺朝百脉通
調水道下輸膀胱肺氣清故淋瀝水道自通
也又顧玠海槎錄云廣西橫州甚多蛤蚧牝
牡上下相呼累日情洽乃交兩相抱負自墮
於地人往捕之亦不知覺以手分劈雖死不
開乃用熟稿草細纏蒸過曝乾售之煉爲房

中之藥甚効尋常捕者不論雌雄但可爲雜藥用

主治參互

寇氏衍義治久嗽不愈肺積虛熱成癰欬出膿血曉夕不止喉中氣塞胸膈噎痛用蛤蚧阿膠鹿角膠犀角羚羊角各二錢半用河水三升銀石器內文火熬至半升濾汁時時仰臥細呷日一服

簡談

咳嗽由風寒外邪者不宜用雷公曰其毒在眼須去眼及甲上尾上腹上肉毛以酒浸透隔兩重紙緩焙令乾以斃器成懸屋東角上一夜用之力可十倍勿傷尾

水蛭味鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月閉破血癥積聚無子利水道又墮胎

俗名馬蟻

疏○水蛭生於溪澗陰溼之處其味鹹苦氣

平有大毒其用與蝨蟲相似故仲景方中往往與之竝施鹹入血走血苦泄結鹹苦竝行故治婦人惡血瘀血月閉血癥積聚因而無子者血畜膀胱則水道不通血散而膀胱得氣化之職水道不求其利而自利矣墮胎者以其有毒善破血也

上治參互

人抵當湯治傷寒畜血下焦因而發狂 人

大黃蟬虫丸兼治虛勞骨蒸咳嗽內有乾血

皮膚甲錯 入鼈甲煎丸消瘧母已上皆仲

景方 古今錄驗方墜跌打擊內傷神効水

至一兩燒令烟出爲末入麝香一兩每酒服

一錢當下畜血未止再服其効如神

簡誤

水蛭蝨蟲皆破逐瘀血血瘀發病之惡藥而水蛭入腹煨之若尚存性尚能變爲水蛭嚙

人腸臟非細故也破瘀消血之藥儘多正足
選用奚必用此難制之物戒之可也如犯之
以黃泥作丸吞之必入泥而出

斑猫味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬
惡瘡疽蝕死肌破石瘰血積傷人肌墮胎馬刀為之

使畏也豆丹
參空青甘草

疏○斑猫稟火金相合之氣故其味辛氣寒
扁鵲云有大毒近人肌肉則潰爛毒可致死

胎 胎 胎

入手陽明手太陽經性能傷肌肉蝕死肌故
主鼠瘻疽瘡疥癬辛寒能走散下泄故主破
石瘰血積及墮胎也至於鬼疰蠱毒必非極
辛大毒之藥所能療此本經之誤甄權主療
癰通利水道以其能追逐腸胃垢膩復能破
結走下竅也

主治參互

治瘰癧用肥皂二斤去核每肥皂一莢入斑

癩犬咬

猫四枚線縛蒸取出去斑猫并肥皂皮筋得
 淨肉十兩入貝母二兩枯樓根玄參甘草薄
 荷葉各一兩五錢共為末以肥皂搗如泥為
 丸梧子大每服一錢白湯吞服後腹疼勿慮
 此藥力追毒之故 治癩犬咬方用斑猫七
 箇去頭足并翅洒洗和溼糯米銅杓內炒米
 熟為度隨將二物研成細末加六一散三兩
 分作七服每清晨一服白湯調下本人頭頂
 心必有紅髮二三根要不時尋覓拔去 經

長佑 瀝

驗方內消癰癰不拘大人小兒用斑猫一兩
 去頭足翅以粟米一升同炒米焦去米入薄
 荷四兩為末烏雞子清丸如菉豆大空心臘
 茶下三丸加至五丸却每日減一丸減至一
 丸後復日增一丸以消為度

簡誤

斑猫性有大毒能潰爛人肌肉惟癩癰癩犬

咬或可如法暫施此物若煨之存性猶能嚙
人腸胃發泡潰爛致死卽前二證亦不若用
米同炒取氣而勿用質爲穩餘證必不可餌
切戒切戒

田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴

疏○田螺產於水田中稟水土之陰氣故其
汁大寒味應甘性無毒陶隱居以真珠黃連
末內入良久取汁點目痛神効以其寒能除

熱也解一切有餘之熱故能止渴及醒酒

主治參互

丹溪方治噤口痢疾用活大田螺二枚搗爛
入麝香三分作餅烘熱貼臍間半日熱氣下
行卽思食矣甚効 又方治小便不通腹脹
如鼓用田螺一枚鹽半匕生搗傅臍下一寸
三分卽通 經驗方大腸脫肛墜下三五寸
者用大田螺二三枚將淨水養去泥用雞爪

痔漏

黃連研細末入罈內待化成水以濃茶洗淨
肛門將雞翎蘸水刷之以軟帛托上自然不
再發也 乾坤生意痔漏疼痛用田螺一箇
入龍腦一分在內取水搽之効

簡誤

目病非關風熱者不宜用

白花蛇味甘鹹溫有毒主中風溼痺不仁筋脉
拘急口面喎斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩

及暴風瘙癢脚弱不能久立一名褰鼻蛇白花

者良 出蘄州龍頭虎口黑質白花日
開如生尾有爪甲真蘄產也

疏○白花蛇生於土穴陰霾之處稟幽暗毒

厲之氣故其味雖甘鹹性則有大毒也經曰

風者百病之長善行而數變蛇性走竄亦善

行而無處不到故能引諸風藥至病所自腑

臟而達皮毛也凡癘風疥癬喎僻拘急偏痺

不仁因風所生之證無不藉其力以獲瘥本

經著其功能信非虛矣

主治參互

同苦參何首烏葳靈仙鼈蝨胡麻天門冬百
部豨薟漆葉刺疾藜治癘風并遍身頑痺疥
癬 醫壘元戎驅風膏治風癱癘風遍身疥
癬用白花蛇肉四兩酒潤炙乾天麻七錢半
薄荷荆芥各二錢半爲末好酒二升蜜四合
石器熬成膏每服一盞溫湯服日三服急於

暖處出汗十日効

瑞竹堂經驗方白花蛇

酒治諸風癘癬用白花蛇一條酒潤去皮骨
取肉絹袋盛之蒸糯米一斗安麴於缸底置
蛇於麴上以飯安蛇上用物密蓋三七日取
酒以蛇曬乾爲末每服三五分溫酒下仍以
濁酒并糟作餅食之尤佳 潔古白花蛇散
治大風病白花蛇烏梢蛇各取淨肉二錢酒
炙雄黃二錢大黃五錢爲末每服二錢白湯

下三日一服

○烏蛇即烏梢蛇氣味所主經白花蛇同第性

善無毒耳修事亦同不復載

色黑如漆尾細有劍脊者良

簡誤

白花蛇性走竄有毒癘風疥癬頑痺等證誠

為要藥然而中風口而喎斜半身不遂定緣

陰虛血少內熱而發與得之風溼者殊科非

所宜也醫師宜辨之頭尾并一俱有大毒須

盡去之

蟻娘味鹹寒有毒主小兒驚癇瘈瘲腹脹寒熱

大人癩疾狂易羊音手足端寒支滿黃脉

疏○蟻娘稟陰溼之氣以生故其味鹹氣寒

有毒入足厥陰手足陽明經小兒驚癇瘈瘲

腹脹寒熱大人癩疾狂易皆肝胃大腸三經

風熱壅盛所致鹹寒除三經之邪熱則諸證

自瘳別錄主手足端寒支滿者以脾胃主四

肢而治中焦脾氣結滯則血液不能通行灌
溉於手足胃家熱壅及大腸結實則中焦不
治而氣逆支滿行三與之壅滯則所苦減除
矣鹹能軟堅入腎故又主奔豚也古今方書
以之治一切痔瘻及丁腫疔瘡出箭鏃之用

主治參互

本事方推車散治大小便經月不通欲死者
用推車客七箇男用頭女用身蜈蚣七箇男

用身女用頭新瓦焙研末用虎目樹南向皮

煎汁調服只一服立通 一方大腸脫肛蠅

蜋燒存性為末入冰片研勻搽上托之即入

唐氏方腸漏出水用蠅蜋一枚陰乾入水

片少許為細末紙撚蘸末入孔內漸漸生肉

藥自退出即愈 劉涓子方附骨疽瘡蠅蜋

七枚同大麥搗傅 廣利方無名惡瘡忽得

不識者用蠅蜋杵汁塗之 劉禹錫纂柳州

救三死方云元和十一年得丁瘡凡十四日
 益篤善藥傳之莫救長慶賈方伯教用蠅
 心一夕百苦皆已明年正月食羊肉又大作
 再用如神驗其用蠅心在腹下度取之其
 肉稍白是也貼瘡半日許再易血盡根出卽
 愈蠅娘畏羊肉故食之卽發其法蓋出葛洪
 肘後方 楊氏家藏方箭鏃入骨不可移者
 用巴豆微炒同蠅娘搗塗斯須痛定必微癢
 忍之待極癢不可忍乃撼動拔之立出凡諸
 瘡皆可療也 搗爲丸塞下部引痔蟲出盡
 永差

簡誤

蠅娘有毒外用易臻厥功內服非虛人所宜
 非不得已勿輕試

五靈脂味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五疳
 辟疫治腸風通利氣脉女子月閉出北地此是

寒號蟲糞也

疏○寒號蟲畏寒喜煖故其糞亦溫味甘而無毒氣味俱厚陰中之陰降也入足厥陰手少陰經性專行血故主女子血閉味甘而溫故療心腹冷氣及通利氣脈也其主小兒五疳者以其亦能消化水穀治腸風者取其行腸胃之瘀滯也凡心胃血氣刺痛婦人產後少腹兒枕塊諸痛及痰挾血成窠囊血凝齒痛諸證所必須之藥

主治參互

同澤蘭牛膝益母草延胡索牡丹皮紅花赤芍藥山查生地黃治產後惡露不盡腹中作疼加桃仁其効更速勿過劑 同番降香紅麴川通草紅花延胡索韭菜童便治胃脘瘀血作痛 同木香烏藥治周身血氣刺痛 和濟局方失笑散治男女老少心痛腹痛少

腹痛并少腹疝氣諸藥不効者能行能止婦人妊娠心痛及產後心痛少腹痛血氣痛尤妙用五靈脂蒲黃等分研末先以醋二盃調末熬成膏入水一盞煎至七分連藥熱服未止再服一方以酒代醋一方以醋糊丸童便酒服 楊氏產乳方紫金丸治產後惡露不快腰痛少腹如刺時作寒熱頭痛不思飲食又治久有瘀血月水不調黃瘦不食亦療心

痛功與失笑司以五靈脂水淘淨炒末一兩以好米醋調稀慢火熬膏入真蒲黃末和丸龍眼大每服一丸以水與童便各半盞煎至七八分溫服少頃再服惡露卽下血塊經閉者酒磨服之 圖經產後血暈不知人事用五靈脂二兩半生半炒爲末每服一錢白水調下如口噤者幹開灌之入喉卽愈 丹溪方產後腹痛五靈脂香附桃仁等分研末醋

糊丸服一百丸白朮牛膝陳皮湯下 事林
 廣記卒暴心痛五靈脂炒一錢半乾姜炮三分為末熱酒服立愈 產寶方胎衣不下惡
 血衝心用五靈脂半生半炒研末每服二錢
 溫酒下 百一選方痰血凝結紫芝丸用五
 靈脂水飛半夏湯泡等分為末姜汁浸蒸餅
 丸梧子大每米飲下二十九 夏子益奇疾
 方血潰怪病凡人眼中白珠渾黑視物殊常
 毛髮堅直如鐵條能飲食而不語如醉名曰
 血潰以五靈脂為末湯服二錢即愈

簡誤

五靈脂其功長於破血行血故凡瘀血停滯
 作痛產後血暈惡血衝心少腹兒枕痛留血
 經閉瘀血心胃間作痛血滯經脈氣不得行
 攻刺疼痛等證在所必用然而血虛腹痛血
 虛經閉產婦去血過多發暈心虛有火作痛

病屬血虛無瘀滯者皆所當忌

蝎味甘辛有毒療諸風癱瘓及中風半身不遂
口眼喎斜語滯手足抽掣形緊小者良

疏○蝎稟火金之氣以生本經味甘辛有毒
然察其用應是辛多甘少氣溫入足厥陰經
諸風掉眩屬肝木風客是經非辛溫走散之
性則不能祛風逐邪兼引諸風藥入達病所
也故大人真中風小兒急驚風皆須用之

主治參互

全幼心鑑小兒臍風宣風散治小兒初生斷
臍後傷風昏青口撮出白沫不乳用全蝎二
十一箇無灰酒塗炙爲末入麝香少許每用
金銀煎湯調半字服之 經驗方大人風涎
用蝎一箇頭尾全者以薄荷四葉裹定火上
炙焦同研爲末作一服白湯下小兒驚風分
四服如前服 得胡桃同煨共研黃耆金銀

花湯下治橫痃不收口

簡誤

蝎風藥也似中風及小兒慢脾風病屬於虛法咸忌之

鮫鯉甲微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或水和方寸匕療蟻瘦

疏○鮫鯉甲穿山穴居其性善走味辛平氣微寒有毒入足厥陰經兼入手足陽明經邪魅

着人則驚啼悲傷不已辛主散則邪魅去驚帝悲傷止矣喜食蟻又能入大腸故療蟻瘦蟻瘦者即世人所云漏也性走能行瘀血通經絡故又有消癰毒排膿血下乳和傷發痘等用

主治參互

鮫鯉甲俗名穿山甲土炒同乳香沒藥番降香紅麴山查川通草童便治上部內傷胸膈

間疼痛 同當歸白芷金銀花連翹紫花地
丁夏枯草牛旁子乳香沒藥甘草貝母皂角
刺治癰腫未潰資為引導 佐地榆治便毒

記鼠痔

乳汁石通

保毒便癰

直指方治鼠痔成瘡腫痛用穿山甲尾尖
處一兩煨存性鼈甲酥炙一兩麝香半錢為
末每服一錢空心茶下 又方乳汁不通涌
泉散用穿山甲炮研末酒服方寸七日二服
外以油梳梳乳即通 又方便毒便癰穿山

甲半兩猪苓二錢並以醋炙研末酒服二錢
得紫草生犀角生地黃治痘瘡毒盛不得
起發色帶乾紅枯燥者有功

簡談

癰疽已潰不真服痘瘡元氣不足不能起發
者不宜服

神農本草經疏卷之二十三

果部三品

總五十三種今疏其要者二十種又木部

移入三種

上品藕實藕蓮鬚附

橘柚青皮核葉附大棗

覆盆子

雞頭實中品梅實

木瓜

柿 烏芋

枇杷葉

荔枝子 石蜜

甘蔗

沙糖

下桃核仁

杏核仁

梨

胡桃

海松子

橄欖

龍眼

赤爪木

即山查木部移入

榧實

木部移入

藕實味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百

疾久服輕身耐老不饑延年

疏○藕實得天地清芳之氣稟土中冲和之

味故味甘氣平別錄寒無毒入足太陰陽明

兼入手少陰經土為萬物之母後天之元氣

藉此以生化者也母氣既和則血氣生神得

所養而疾病無由來矣藕實正稟稼穡之化

乃脾家之果故主補中養神益氣力除百疾

及久服輕身耐老不饑延年也孟詵主五臟

不足傷中益十二經脉血氣大明主止渴去

熱安心止痢治腰痛及洩精多食令人喜皆

資其補益心脾之功也

主治參互

得川黃連白芍藥白菹豆乾葛升麻紅麴橘
紅甘草滑石烏梅爲丸治滯下如神 下痢
飲食不食俗名噤口痢此證大危用鮮蓮肉
一兩黃連五錢人參五錢水煎濃細細與呷
服完思食便瘥 同菟絲子五味子山茱萸
山藥車前子肉豆蔻砂仁橘紅芡實人參補
骨脂巴戟天治脾腎俱虛五更溲瀉有肺熱

者去人參肉豆蔻

孟詵食療服食不饑石

蓮肉蒸熟去心爲末煉蜜丸梧子大日服三

十丸此僊家方也

普濟方白濁遺精石蓮

肉龍骨益智仁等分爲末每服二錢空心米

飲下 直指方心虛赤濁蓮子六一湯用石

蓮肉六兩炙甘草一兩爲末每服一錢燈心

湯下 丹溪心法久痢噤口石蓮肉炒爲末

每服二錢陳倉米湯調下便覺思食甚妙

簡誤

藕實脾家果也甘平無毒於諸疾竝無相逆
第生者食之過多微動冷氣脹人石蓮子乃
九月經霜後采堅黑如石者破房得之墮水
入泥者良今肆中一種石蓮子狀如榧子其
味大苦產廣中出樹上木實也不宜入藥

○藕唐本注主熱渴散血生肌久服令人心懽
藥性論云藕汁味甘能消瘀血不散藕節搗

汁主吐血不止或口鼻出血孟詵云生食之
主霍亂後虛渴煩悶不能食其產後忌生冷
物惟藕不同生冷爲能破血故也蒸食甚補
五臟實下焦陳藏器云消食止洩除煩解酒
毒及病後熱渴日華子云止霍亂開胃消食
除煩止悶口乾渴疾止怒令人喜破產後血
悶搗罾金瘡并傷折止暴痛
疏○藕稟土氣以生其味甘生寒熟溫入心

脾胃三經生者甘寒能涼血止血除熱清胃
故主消散瘀血吐血口鼻出血產後血悶
金瘡傷折及止熱渴霍亂煩悶解酒等功
熟者甘溫能健脾開胃益血補心故主補五臟
實下焦消食止洩生肌及久服令人心懽止
怒也本生於污泥之中體至潔白味甚甘
脆孔竅瓊瓏絲綸內隱瘕血止渴補益心脾
真水果中之嘉品也又能解蟹毒

○蓮蓋鬚一名佛座鬚味甘澀氣溫本經不收
而古方固真補益方中往往用之詳其主治
乃是足少陰經藥亦能通手少陰經能清心
入腎固精氣烏鬚髮止吐血療滑泄同黃檗
砂仁沙苑蒺藜魚膠五味子覆盆子生甘草
牡蠣作丸治夢遺精滑最良

橘皮味辛溫無毒主胸中癢熱逆氣利水穀下
氣止嘔欬除膀胱留熱停水五淋利小便主脾

不能消穀氣衝胸中吐逆霍亂止洩去寸白久

服去臭下氣通神輕身長年

按橘柚實兩種本經作一條蓋傳誤

也今改正

疏○橘皮花開於夏實成於秋得火氣少金

氣多故味辛苦氣溫無毒味薄氣厚降多升

少陽中之陰也入手足太陰足陽明經其主

胸中痰熱逆氣氣衝胸中嘔欬者以肺主氣

氣常則順氣變則逆逆則熱聚於胸中而成

痰痰者假也如痞滿鬱悶之類也辛能散苦

能泄溫能通行則逆氣下嘔欬止胸中痰熱

消矣脾為運動磨物之臟氣滯則不能消化

水穀為吐逆霍亂泄瀉等證苦溫能燥脾家

之溼使滯氣運行諸證自瘳矣肺為水之上

源源竭則下流不利熱結膀胱肺得所養而

津液貫輸氣化運動故膀胱留熱停水五淋

皆通也去臭及寸白者辛能散邪苦能殺蟲

也通神輕身長年者利脾肺之極功也

主治參互

橘皮留白補脾胃和中去白消痰理肺氣同
白朮則補脾同甘草則補肺同補氣藥則益
氣同泄氣藥則破氣同消痰藥則能去痰同
消食藥則能化食各從其類以爲用也 同
人參何首烏桂枝當歸薑皮治三日瘧寒多
得白豆蔻生薑藿香半夏治胃家有寒痰

或偶感寒氣傷冷食嘔吐不止 同人參白

朮白茯苓甘草山藥白豆蔻藿香麥芽山查
白菹豆治脾胃虛飲食不化或不欲食食亦
無味 同蘇子貝母枇杷葉麥門冬桑根白
皮沙參栝樓根五味子百部治上氣欬嗽能
消痰下氣 同枳殼烏藥木香草豆蔻檳榔
治氣實人暴氣壅脹 同蒼朮厚朴甘草爲
平胃散治胸中脹滿 入二陳湯治脾胃溼

痰及寒痰飲 仲景方橘皮湯治男女傷寒并一切雜病嘔噦手足逆冷者用橘皮四兩生薑一兩水二升煎一升徐徐呷之即止百一選方霍亂吐瀉但有一點胃氣存者服之即生廣陳皮去白五錢真藿香五錢水二盞煎一盞時時溫服 食療治脚氣衝心或心下結硬腹中虛冷陳皮一斤和杏仁五兩去皮尖熬少 蜜搗和丸如梧桐子大每

日食前米飲下三十丸 普濟方大腸闕塞

陳皮連白酒煮焙乾研末每服二錢米飲下

適用方脚寒諸瘧不拘老少孕婦只兩服

便止真橘皮去白切生薑自然汁浸過一指

銀石器內重湯煮乾焙研末每服三錢用隔

年青州棗十箇去核水一盞煎半盞發前服

以棗下之 張氏方婦人乳癰未成者即散

已成者即潰痛極者不痛神驗不可言用真

橘皮湯浸去白曬乾麩炒微黃爲末每服二錢麝香調酒下初發一服見效

簡誤

橘皮味辛氣溫能耗散真氣中氣虛氣不歸元者忌與耗氣藥同用胃虛有火嘔吐不宜與溫熱香燥藥同用陰虛欬嗽生痰不宜與半夏南星等同用瘧非寒甚者亦勿施

○青橘上氣滯下食破積結及膈氣 卽青皮

疏○青皮古方無用者至宋時醫家始用之其色青其味極苦而辛其氣溫而無毒氣味俱厚沉而降陰也入足厥陰少陽苦泄辛散性復刻削所以主氣滯下食破結積及膈氣也元素破堅癖散滯氣治左脇肝經積氣亦此意耳

主治參互

青皮同人參鼈甲能消瘧母 同枳殼肉桂

川芎治左脇痛 同人參白朮三稜蓬茂阿
魏礬紅山查紅麴木香消痞癖氣塊及一切
肉食堅積

簡誤

青皮性最酷烈削堅破滯是其所長然誤服
之立損人真氣爲害不淺凡欲施用必與人
參朮芍藥等補脾藥同用庶免遺患必不可
單行也肝脾氣虛者概勿施用

○橘核主腰痛膀胱氣腎冷炒去殼酒服良
按橘核出日華子其味苦溫而下氣所以能
入腎與膀胱除因寒所生之病也疝氣方中
多用

○橘葉古今方書不載能散陽明厥陰經滯氣
婦人妬乳內外吹乳巖乳癰用之皆效以諸
證皆二經所生之病也

大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十

二經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足
大驚四肢重和百藥補中益氣強力除煩悶療
心下懸腸澼久服輕身延年不饑神仙

疏○大棗純得土之冲氣兼感天之微陽以
生本經味甘氣平無毒東垣孟詵言溫氣味
俱厚陽也入足太陰陽明經經曰裏不足者
以甘補之又曰形不足者溫之以氣甘能補
中溫能益氣甘溫能補脾胃而生津液則十

二經脉自通九竅利四肢和也正氣足則神
自安故主心腹邪氣及大驚中得緩則煩悶
除故療心下懸急及少氣脾得補則氣力强
腸胃清故主身中不足及腸澼甘能解毒故
主和百藥脾胃足氣血充後天生氣借此而
盈溢故久服輕身長年不饑神仙也然亦指
辟穀修煉者言之非恒人所能耳

主治參互

大棗甘溫能和陰陽調榮衛生津液凡邪在榮衛者辛甘以解之故仲景桂枝湯用薑棗以和榮衛助脾胃生津液令出汗也 仲景治傷寒水飲脇痛咳而乾嘔者有十棗湯取其益土而勝水也 又方發汗後小便利其人臍下悸欲作奔豚者茯苓桂枝甘草大棗湯主之茯苓能伐腎邪桂枝泄奔豚甘草大棗之甘滋助脾土以平腎氣 許叔微本事

方治婦人臟燥悲傷欲哭象若神憑數欠者大棗湯大棗十枚小麥一升甘草二兩每服一兩水煎服之

簡誤

棗雖能補脾胃益氣然而味過於甘中滿者忌之小兒疳病不宜食齒痛及患痰熱者不宜食生者尤不利人多食致寒熱 覆盆子味甘平無毒主益氣輕身令髮不白

疏○覆盆子得木氣而生本經味甘氣平無
毒甄權微熱宗奭酸甘深得其義入足少陰
經其主益氣者言益精氣也腎藏精腎納氣
精氣充足則身自輕髮不白也蘇恭主補虛
續絕強陰建陽悅澤肌膚安和臟腑甄權主
男子腎精虛竭陰痿女子食之有子大明主
安五藏益顏色養精氣長髮強志皆取其益
腎添精甘酸收斂之義耳

主治參五

同黃蘗沙苑蒺藜蓮鬚五味子砂仁魚膠山
茱萸治夢遺洩精 同車前子五味子菟絲
子蒺藜子為五子衍宗丸治男子精氣虧乏
中年無子 加入巴戟天脛肭臍補骨脂鹿
茸白膠山茱萸肉蓯蓉治陽虛陰痿臨房不
舉或精寒精薄

簡誤

蔓藤

臨房不舉

十三
強陽不倒者忌之

雞頭實味甘平無毒主溼痺腰脊膝痛補中除
暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身不饑
耐老神仙一名茨

疏○雞頭實稟水土之氣以生故味甘氣平
無毒入足太陰少陰補脾胃固精氣之藥也
脾主四肢足居於下多爲溼所侵以致腰脊
膝痛而成痺脾氣得補則溼自不容畱前證

皆除矣脾主中州益脾故能補中腎藏精與
志入腎故主益精強志暴病多屬火得水土
之陰者能抑火故主除暴疾也精氣足脾胃
健則久服耳目聰明輕身不饑耐老神仙所
自來矣

主治參互

君山藥白茯苓白朮人參蓮肉薏苡仁白藕
豆爲補脾胃要藥 一味搗末熬金櫻子煎

和丸服之補下元益人謂之永陸丹 經驗
 方雞頭粥法用雞頭實二合煮熟去殼粳米
 一合煮粥日日空心食能益精氣強志意利
 耳目 永類鈐方四精丸治思慮色欲過度
 損傷精氣小便數遺精用秋石白茯苓芡實
 蓮肉各二兩為末蒸棗和丸梧子大每服三
 十九丸空心鹽湯送下

簡誤

芡實生食味澀動風冷氣小兒不宜多食以
 其難消化也

梅實味酸平無毒主下氣除熱煩滿安心肢體
 痛偏枯不仁死肌去青黑痣惡疾上下痢好唾
 口乾

疏○梅實即今之烏梅也梅得木氣之全故
 其味最酸所謂曲直作酸是也經曰熱傷氣
 邪客於胸中則氣上逆而煩滿心為之不安

烏梅味酸能斂浮熱能吸氣歸元故主下氣
 除熱煩滿及安心也下痢者大腸虛脫也好
 唾口乾者虛火上炎津液不足也酸能斂虛
 火化津液固腸脫所以主之也其主肢體痛
 偏枯不仁者蓋因溼氣侵於經絡則筋脉弛
 縱或疼痛不仁肝主筋酸入肝而養筋肝得
 所養則骨正筋柔機關通利而前證除矣其
 主去死肌青黑痣惡肉者白梅之功也白梅

味鹹鹹能軟堅故也又能消痰醒睡止霍亂
 解酒毒弘景云生梅烏梅白梅功用大約相
 似第烏梅較良資用更多

主治參互

烏梅同川黃連白芍藥滑石甘草蓮肉白藕
 豆葛根升麻紅麴橘紅作丸治滯下如神
 一味作湯代茶飲治火炎頭痛 仲景烏梅
 丸治虻厥虻上入膈故煩須臾復止得食而

嘔又煩者虻聞食即出故耳用烏梅三百箇
 細辛附子人參桔梗黃檗各六兩當歸蜀椒
 各四兩黃連一斤乾薑十兩搗烏梅肉和丸
 桐子大先食飲服十九日三服 劉涓子鬼
 遺方蝕惡瘡努肉用烏梅肉燒為灰傅上惡
 肉立盡 聖惠方赤痢腹痛烏梅肉黃連各
 四兩煉蜜丸梧子大每米飲下二十九日三
 服 圖經本草治勞瘧用烏梅十四枚豆豉

毒劑

二合甘草三寸生薑一塊以童便二升煎去
 一半溫服即止 治暑氣霍亂白梅一箇和
 仁搗碎入絲瓜葉一葉或菹豆葉再搗爛用
 新汲水調灌下即解

簡誤

素問云味過於酸肝氣以津又云酸走筋筋
 病無多食酸以肝主筋性喜升發酸味斂束
 是違其性之所喜也梅實過酸不宜多食齒

痛及病當發散者咸忌之

木瓜實味酸溫無毒主溼痺脚氣霍亂大吐下
轉筋不止

疏○木瓜實得春生之氣稟曲直之化故其
味酸氣溫性無毒氣薄味厚降多於升陽中
陰也入足太陰陽明兼入足厥陰經其主溼
痺脚氣者以脾主四肢又主肌肉性惡溼而
喜燥溼侵肌肉則爲溼痺傷足絡則成脚氣

木瓜溫能通肌肉之滯酸能斂濡滿之溼則
脚氣溼痺自除也霍亂大吐下轉筋不止者
脾胃病也夏月暑溼飲食之邪傷於脾胃則
揮霍撩亂上吐下瀉甚則肝木乘脾而筋爲
之轉也酸溫能和脾胃固虛脫兼之入肝而
養筋所以能療肝脾所生之病也藏器治脚
氣衝心強筋骨下冷氣止嘔逆大明主吐瀉
水腫心腹痛好古治腹脹善噫心下煩痞無

非取其去溼和胃滋脾益肺利筋骨調榮衛
通行收斂有竝行不悖之功也

主治參互

得白菴豆藿香白茯苓橘皮白梅人參白朮
甘草砂仁香薷治傷暑霍亂吐瀉不止加入
石斛雞舌香治轉筋 同當歸石斛牛膝續
斷芍藥橘皮治血虛轉筋 同薏苡仁朮茯
苓五加皮石斛草薺黃檗治溼熱脚氣 同

人參白茯苓麥門冬藿香白豆蔻竹茹枇杷

葉治胃虛嘔吐 一味末之白湯吞三錢日

五服治楊梅結毒有效 入六和湯治暑月

霍亂 聖惠方治霍亂轉筋木瓜一兩酒一

升煎服不飲酒者煎湯服仍煎湯浸青布裹

其足 御藥院方四蒸木瓜丸治肝腎脾三

經氣虛為風寒暑溼相搏流注經絡凡遇時

令不和七情怫鬱必至發動或腫滿或頑痺

憎寒壯熱嘔吐自汗霍亂吐利用宣州大木
瓜四箇切蓋剗空聽用一箇入黃耆續斷末
各半兩於內一箇入蒼朮橘皮末各半兩於
內一箇入烏藥黃松節末各半兩於內黃松
節卽茯神心中木也一箇入葳靈仙苦苧藤
末各半兩於內以原蓋蓋好拴定用酒浸透
入甌內蒸熟曬乾再浸蒸如此三度搗末以
榆皮末水和糊丸如梧子大每服五十丸溫

酒鹽湯任下

醫林集要翻花痔瘡木瓜爲

末以鱣魚身上涎調貼之以紙護住

簡誤

下部腰膝無力由於精血虛真陰不足者不
宜用傷食脾胃未虛積滯多者不宜用入藥

忌犯鐵器

柿味甘寒無毒主通鼻耳氣腸澀不足

疏○柿稟地中之陰氣以生故味甘氣寒無

毒入手足太陰經鼻者肺之竅也耳者腎之竅也金水二臟最忌火熱二臟有火上炎則外竅閉而不通得甘寒之氣俾火熱下行竅自清利矣肺與大腸為表裏溼熱傷血分則為腸澀不足甘能益血寒能除熱臟氣清而腑病亦除也 乾柿寒氣稍減能厚腸胃補不足潤肺止渴功同於前 柿霜清心肺潤熱生津止渴化痰寧嗽治喉舌口瘡總之其

功長於清肅上焦火邪兼能益脾開胃故者所主雖不同而其源皆歸於一義也

主治參互

柿霜得桑根白皮百部天麥門冬沙參貝母蘇子枇杷葉橘紅枯樓根作丸噙化治肺經有火咳嗽生痰

簡誤

柿性寒肺經無火因客風寒作嗽者忌之冷

痢滑洩腸胃虛脫者忌之脾家素有寒積及感寒腹痛感寒嘔吐者皆不得服不宜與蟹同食令人腹痛作瀉

烏芋味苦甘微寒無毒主消渴痺熱溫中益氣

一名
勃濟

疏○烏芋稟土金之氣以生本經味苦甘氣微寒無毒然詳其用味應有辛辛能散苦能泄故主痺熱甘寒能除熱而生津故主消渴

熱去則氣自益氣益則中自溫自然之道也孟詵主下丹石消黃疸除胸中實熱氣汪攪主療五種膈氣消宿食治誤吞銅物及今人治腹脹下血等證皆取其辛寒消散除熱之功也

主治參互

烏芋去皮填入雄猪肚內線縫砂器煮糜食之勿入鹽治腹滿脹大善毀銅銅器中煮

之卽焯 誤吞銅物以烏芋合胡桃食一二
斤許卽消 一味曬乾爲末服能辟蠱毒
神秘方大便下血勃臍搗汁大半鍾入酒少
許溫服三日見效

簡誤

孟詵云烏芋性冷先有冷氣人不可食多食
令人患脚氣又孕婦忌之

枇杷葉味苦平無毒主卒嘔不止下氣

疏○枇杷葉稟天地清寒之氣四時不凋其
味苦氣平平卽涼也無毒入手太陰足陽明
經氣薄味厚陽中之陰降也經曰諸逆衝上
皆屬於火火氣上炎則爲卒嘔不止嘔者噦
也其聲濁惡而長經曰樹枯者葉落病深者
聲噦病者見此是爲危證枇杷葉性涼善下
氣氣下則火不上升而胃自安故卒嘔止也
其治嘔吐不止婦人產後口乾男子消渴肺

熱咳嗽喘息氣急脚氣上衝皆取其下氣之
功氣下則火降痰順而嘔者不嘔渴者不渴
咳者不咳衝逆者不衝逆矣又治婦人發熱
咳嗽經事先期佐補陰清熱之藥服之可使
經期正而受孕

主治參互

同生地黃麥門冬白芍藥炙甘草枸杞子桑
根白皮童便茅根天門冬蘇子五味子栝樓

反胃

根治陰虛咳嗽吐血 入喻化丸治肺熱咳

嗽 同竹茹木瓜蘆根汁石斛麥門冬人參

白茯苓治胃熱嘔吐加童便人乳竹瀝蘇子

白芍藥蔗漿治噎膈反胃 同白芍藥生地

黃青蒿子五味子黃檗阿膠枸杞子杜仲牡

丹皮鼈甲作丸治婦人經行先期發熱無孕

同人參白芍藥茯苓竹茹橘紅蘇子麥門

冬木瓜治妊娠惡阻 同栝樓根天門冬枸

杞子五味子石斛白芍藥黃連甘草蘆根汁
童便竹葉治消渴 龐安常方溫病發噦因
飲水多者枇杷葉去毛炙香茅根各半斤水
四升煎二升稍稍飲之 聖惠方衄血不止
枇杷葉去毛焙研末茶服一二錢日二服

簡誤

胃寒嘔吐及肺感風寒咳嗽者法竝忌之

荔枝子味甘平無毒止渴益人顏色

疏○荔枝子南方果也感天之陽氣得地之
甘味本經雖云平而其氣實溫也鮮時味極
甘美多津液故能止渴甘溫益血助榮氣故
能益人顏色也多食令人發熱或衄血齒痛
者以其生於炎方熟於夏月故善助火發熱
耳入藥甚稀無主治簡誤

○核味甘溫主心痛小腸氣痛癩疔婦人血氣
刺痛以一枚煨存性研末酒調服蓋其氣溫

而通行入肝腎散滯氣辟寒邪所以能療如
上諸證也

主治參互

荔枝核同牛膝補骨脂延胡索合歡子茴香
木瓜杜仲橘核草薺治疝氣虛熱者加黃檗
虛寒者加桂 孫氏方治疝氣癰腫荔枝核
炒黑色。大茴香炒。等分爲末。每服一錢。溫酒
下。又方腎腫如斗。荔枝核。青橘皮。茴香。等

分各炒研酒服二錢日三 除疝氣外無他

用故不著簡誤

石蜜乳糖也味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性

冷利

疏○石蜜乃煎甘蔗汁曝之凝如石而體甚
輕今之白沙糖也其味甘其氣寒其用在脾
故主心腹熱脹甘寒能除熱生津液故止口
乾渴及咳嗽生痰也多食亦能害脾以其味

太甘耳

甘蔗味甘平無毒主下氣和中助脾氣利大腸
 疏○甘蔗稟地中之冲氣故味甘氣平無毒
 日華子云冷氣薄味厚陽中之陰降也入手
 足太陰足陽明經甘為稼穡之化其味先入
 脾故能助脾氣脾主中州故主和中甘寒除
 熱潤燥故主下氣利大腸也大明為其消痰
 止渴除心胸煩熱解酒毒今人用以治噎膈
 反胃嘔吐大便燥結皆取其除熱生津潤燥
 之功耳

主治參互

蔗漿一味單服能潤大便下燥結 同蘆根
 汁梨汁藕汁人乳童便竹瀝和勻時時飲之
 治胃腕乾枯噎食嘔吐 梅師方反胃吐食
 蔗漿七升薑汁半升和勻日日細呷

簡誤

甘蔗世人皆以其性熱不敢多食不知乃是
甘寒之物能瀉火熱潤枯燥唐王摩詰櫻桃
詩云飽食不須愁內熱大官還有蔗漿寒可
為證矣惟胃寒嘔吐中滿滑洩者忌之

沙糖味甘寒無毒功用與石蜜同而冷利過之
疏○沙糖蔗汁之清而煎煉至紫黑色者本
經雖云與石蜜同功然而不逮石蜜多矣既
經煎煉之久則未免有溼熱之氣故多食損

齒生蟲發疔脹滿令人心痛等害與鯽魚同
食成疔蟲與葵同食生流澀與笋同食不消
成癥身重不能行今醫家用作湯下小兒丸
散殊為未當

桃仁

桃核仁味苦甘平無毒主瘀血血閉癥邪氣殺
小蟲止欬逆上氣消心下堅除卒暴擊血破癥
瘕通月水止痛

疏○桃核仁稟地二之氣兼得天五之氣以

生故其味苦重甘微氣平無毒思邈言辛孟
詵言溫皆有之矣氣薄味厚陽中之陰降也
入手足厥陰經夫血者陰也有形者也周流
乎一身者也一有凝滯則為癥瘕瘀血血閉
或婦人月水不通或擊撲傷損積血及心下
宿血堅痛皆從足厥陰受病以其為藏血之
臟也苦能泄滯辛能散結甘溫通行而緩肝
故主如上等證也心下宿血去則氣自下欬

託

逆自止桃為五木之精能鎮辟不祥故主邪
氣味苦而辛故又能殺小蟲也。

主治參互

仲景桃仁承氣湯治傷寒溼熱在內小便利
而大便黑為畜血用桃仁五十粒桂枝二兩
大黃四兩朴硝二兩甘草一兩以水七升煮
取二升半去滓內芒硝更上火微沸空心溫
服五合日三當微利 入抵當湯治太陽病

六七日表證仍在脉微而沉反不結胸其人
 如狂者以熱在下焦少腹當硬滿小便自利
 下血乃愈用桃仁二十粒水蛭三十箇熬蟲
 蟲三十箇去翅足熬大黃三兩酒浸以水五
 升煮取三升溫服一升不下再服 同當歸
 芍藥澤蘭延胡索蘇木五靈脂紅花牛膝生
 地黃益母草治產後瘀血結塊作痛并治壯
 盛婦人經閉不通。 同當歸麻仁地黃麥門

記

難產 趙香

冬芍藥黃芩肉蓯蓉甘草治大腸血燥便結
 不通 同番降香川通草山查穿山甲乳香
 沒藥紅花續斷當歸治上部內傷瘀血作痛
 聖濟總錄大便不快裏急後重用桃仁三
 兩去皮以吳茱萸二兩食鹽一兩同炒熟去
 二物每嚼桃仁五七粒效兼可預辟瘴癘
 翻煩方婦人難產數日不出桃仁一箇劈開
 用硃砂書一片可字一片出字吞之即生

用後方婦人陰癢桃仁杵爛綿裹塞之杏仁亦可用

簡誤

桃仁性善破血凡血結血秘血燥瘀血留血畜血血痛血痕等證用之立通第散而不收瀉而無補過用之及用之不得其當能使血下不止損傷真陰爲害非細。故凡經閉不通由於血枯而不由於瘀滯產後腹痛由於血虛而不由於留血結塊大便不通由於津液不足而不由於血燥閉結法竝忌之。

○桃梟味苦微溫主殺百鬼精物療中惡腹痛殺精魅五毒不祥一名桃奴

疏○桃梟是桃實着樹經冬不落者正月采之桃爲五木之精仙木也趙香珍最能辟邪今道家

禁呪鎮魘之術猶有用桃木者本經以桃梟主殺諸精鬼不祥亦此意耳况着於樹上最

久得氣尤全苦溫之性又能通滯散邪者乎
治血之功與桃仁同

主治參互

桃梟煨存性同櫻皮灰蒲黃朱砂京墨爲末
臨臥以童便調服三錢小便解色漸淡爲度
治內傷吐血神效 同番降香辰砂治鬼擊
吐血 聖惠方伏梁結氣在心下不散桃奴
三兩爲末空心溫酒下每服二錢

簡誤同桃仁

杏核仁味甘苦溫冷利有毒主欬逆上氣雷鳴
喉痺下氣產乳金瘡寒心賁豚驚癇心下煩熱
風氣去來時行頭痛解肌消心下急殺狗毒

疏○杏核仁稟春溫之氣而兼火土之化以
生故本經味甘氣溫別錄加苦有毒其言冷
利者以其性潤利下行之故非真冷也氣薄
味厚陰中微陽降也入手太陰經太陰爲清

肅之臟邪客之則欬逆上氣火炎乘金則為
喉痺杏仁潤利而下行苦溫而散滯則欬逆
上氣喉痺俱除矣其主心下煩熱者邪熱客
於心肺之分也風氣去來時行頭痛者肺主
皮毛風邪自外而入也溫能解肌苦能泄熱
故仲景麻黃湯中用之亦取其有發散之功
也主產乳金瘡者亦指為風寒所乘者言之
消心下急者以其潤利而下氣也心寒賁豚

者心虛而腎邪凌之也驚癇者痰熱盛也雷
鳴者大腸不和也總之取其下氣消痰溫散
甘和苦洩潤利之功也

主治參互

同桑根白皮前胡薄荷桔梗蘇子貝母甘草
五味子橘紅紫苑治風寒入肺欬嗽生痰
入麻黃湯治太陽病無汗惡寒喘急 千金
方欬逆上氣以杏仁三升去皮尖炒黃研膏

入蜜一合杵熟每食前含之嚙汁 梅師方
食狗肉不消心下堅脹口乾發熱妄語杏仁
一升去皮尖水三升煎減半取汁分三服效

簡誤

杏仁性溫散肺經風寒滯氣殊效第陰虛欬
嗽肺家有虛熱熱痰者忌之風寒外邪非壅
逆肺分喘急息促者不得用產乳金瘡無風
寒擊襲者不得用驚癩喉痺亦非必須之藥

用者詳之雙仁者能殺人本經言有毒蓋指
此耳

梨味甘微酸寒多食令人寒中金瘡乳婦尤不
可食

疏○梨成於秋花實皆白其得西方之陰氣
者乎味甘微酸氣寒無毒入手太陰兼入足
陽明經別錄著梨止言其害不叙其功陶隱
居言梨不入藥蓋古人論病多主於風寒外

邪以溫熱爲補藥多桂附凡冷利之物輟而不用也不知時運迭降稟受遞殊今時之人火病熱病痰病往往皆是梨能潤肺消痰降火除熱故蘇恭主熱嗽止渴貼湯火傷治客熱中風不語傷寒寒熱解丹石熱氣驚邪利夫小便大明主賊風心煩氣喘熱狂孟詵主胸中痞塞熱結等誠不可闕者也本經言多食令人寒中者以其過於冷利也乳婦金瘡

不可食者以血得寒則凝而成瘀爲病也凡人
人有痛處脉數無力或發渴此癰疽將成之
候惟晝夜食梨可轉重爲輕膏粱之家厚味
醞酒縱恣無節必多痰火卒中癰疽之病數
食梨可變危爲安功難盡述

主治參互

梨汁同霞天膏竹瀝童便治中風痰熱
同
人乳蔗漿蘆根汁童便竹瀝治血液衰少漸

成噎膈 普濟方消渴飲水用香水梨或鵝梨雪梨皆可取汁以蜜和熬成膏瓶收不時白湯調服一二匙 崔元亮海上方卒得咳嗽用上好梨去核搗汁一碗入椒四十粒煎一沸去滓納黑錫一大兩消訖細細含嚥立定 食療本草嗜風失音搗梨汁一盞飲之日再服 聖惠方小兒風熱昏憒躁悶不能食用消梨三枚切破以水二升煮梨汁一升

入粳米一合煮粥食之 治小兒內熱痰壅喉間吐不出或因驚熱生痰或因風熱生痰取梨汁時時與之加牛黃分許神效 圖經赤目弩肉日夜痛者取好梨一顆搗絞汁以黃連切片一錢浸汁內取汁仰臥點之 聖濟總錄反胃轉食藥物不下用大雪梨一箇以丁香十五粒刺入梨內溼紙包四五重煨熟去丁香食之

簡誤

肺寒欬嗽脾家泄瀉腹痛冷積寒痰飲婦人產後小兒痘後胃冷嘔吐及西北真中風證法咸忌之

橄欖味酸甘溫無毒主消酒療鯀鮪毒

疏○橄欖本經味酸甘今嘗之先澀而後甘得土中之陽氣氣溫無毒肺胃家果也能生津液酒後嚼之不渴故主消酒甘能解毒故

療鯀鮪毒也馬志云鯀鮪卽河豚也人誤食此魚肝及子必迷悶至死惟橄欖汁煮服之必解其木作橄撥着魚皆浮出故知物有相畏如此不特味甘解毒之義也

主治參互

食諸魚被鯀用橄欖嚼汁噉之無橄欖時卽覓核研末急流水調服亦效 手抓碎成瘡用橄欖磨濃汁塗之能滅癩痕 直指方腸

風下血橄欖燒存性研末每服二錢陳米飲
調下 乾坤生意耳足凍瘡橄欖核燒研油
調塗之

拔白
鬚髮

胡桃味甘平無毒食之令人肥健潤肌黑髮取
瓢燒令黑末斷煙和松脂研傅瘰癧瘡又和胡
粉為泥拔白鬚髮以內孔中其毛皆黑多食利
小便能脫人眉動風故也去五痔外青皮染髭
疏○胡桃稟火土之氣以生本經雖云甘平

然其氣多熱而性潤益血脈補命門之藥也
血不充則消瘦肌膚不澤及鬚髮易白益血
故令人肥健潤肌黑鬚髮也多食利小便者
以其能入腎固精令水竅常通也傅瘰癧者
甘熱能解毒散結去五痔取其潤腸除溼之
功也能脫人眉者熱極則生風風甚則萬物
搖落之象也青皮性澀故能染髭

主治參互

一味勿去黃皮空腹食之最能固精 同補
 骨脂蒺藜蓮鬚鹿茸麥門冬巴戟天覆盆子
 山茱萸五味子魚膠益命門種子最效 入
 青娥丸能黑鬚髮補右腎方見補骨脂條
 御藥院方胡桃丸益血補髓強筋壯骨延年
 明目悅心潤肌能除百病用胡桃肉四兩搗
 膏入補骨脂杜仲草薢末各四兩杵勻丸梧
 子大每空心溫酒鹽湯任下五十丸 普濟

記

記

方產後氣喘胡桃肉人參各二錢水一盞煎
 七分頓服 李樓方誤吞銅錢多食胡桃自
 化出也 聖惠方揩齒烏鬚胡桃仁燒過貝
 母各等分為散日日用之 聖濟總錄血崩
 不止胡桃肉十五枚燒存性研作一服空心
 溫酒調下神效 子和儒門事親便毒初起
 用胡桃七箇燒研酒服不過三服效 楊試
 經驗方魚口便毒端五日午時取樹上青胡

桃筐內陰乾臨時全燒為末酒服少行一二
次有膿自大便出無膿即消二三服平上二
方應加全蝎穿山甲尤妙 圖經本草壓撲
損傷胡桃仁搗和溫酒頓服便瘥

簡誤

胡桃前人多言其有害不可食孫思邈云多
食動痰飲令人惡心吐水蘇頌云性熱不可
多食馬志云多食動風脫人眉同酒食多令

人咯血汪穎曰多食生痰動腎火然而近世
醫方用治痰氣喘嗽和傷補命門潤血脉大
腸及癘風諸病而酒家往往以之佐酒則多
食吐水咯血脫眉動火之說亦未盡然也但
性本熱惟虛寒者宜之如肺家有痰熱命門
火熾陰虛吐衄等證皆不得施
海松子味甘小溫無毒主骨節風頭眩去死肌
髮白散水氣潤五藏不飢生新羅

疏○海松子氣味香美甘溫甘溫助陽氣而
通經則骨節中風水氣及因風頭眩死肌自
除矣氣溫屬陽味甘補血血氣充足則五臟
自潤髮白不饑所由來矣仙方服食多餌此
物故能延年輕身不老也

龍眼味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蟲
去毒久服強魂聰明輕身不老通神明自木部
移入
疏○龍眼稟稼穡之化故其味甘氣平無毒

入足太陰手少陰經少陰為君主之官藏神
而主血甘能益血補心則君主強神明通五
藏邪氣俱除矣甘味補脾脾得補則食自寡
而飫心得補則火下降而坎離交故能安志
肝藏魂主納血心家血滿則肝有所受而魂
強甘能解毒故主去毒久服聰明耳目輕身
不老總之補益心脾之驗也至於除蟲非其
所能畧之可也

主治參互

同生地黃天麥門冬丹參柏子仁遠志蓮實
五味子茯苓神人參能補心保神益氣強志
巖用和濟生方歸脾湯治思慮過度勞傷心
脾健忘怔忡虛煩不眠自汗驚悸用龍眼肉
酸棗仁炒黃耆炙白朮焙茯苓神各一兩木香
半兩炙甘草二錢半哎明每服五錢薑三片
棗一枚水二鍾煎一鍾溫服

亦爪木實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗

身上瘡痒

自木部移入即今
山查一名棠棣

疏○山查稟木氣而生本經云味酸氣冷然
觀其能消食積行瘀血則其氣非冷矣入足
陽明太陰經二經有積滯則成下痢產後惡
露不盡畜於太陰部分則為兒枕痛山查能
入脾胃消積滯散宿血故治水痢及產婦腹
中塊痛也大抵其功長於化飲食健脾胃行

結氣消瘀血故小兒產婦宜多食之本經誤
認爲冷故有洗瘡癢之用

主治參互

同礬紅黃連紅麴消肉積 同紅麴麥芽橘
皮白朮肉豆蔻厚朴砂仁能消食健脾 同
牛膝生地黃當歸續斷益母草澤蘭牡丹皮
蒲黃芍藥治產後兒枕作痛 衛生易簡方
偏墜疝氣山查肉茴香炒各一兩爲末糊丸

梧子大每服一百丸空心白湯下

簡誤

山查性能尅化飲食若胃家無食積及脾虛
不能運化不思食者多食之反致尅伐脾胃
生氣如脾胃虛兼有積滯者當與補藥同施
亦不宜過用也物類相感志云煮老雞硬肉
入山查數顆卽易爛其消食尅伐之力彰矣
樅實味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰

木部
移入

疏○樞實稟土氣以生本經味甘無毒然嘗其味多帶微澀詳其用應是有苦氣應微寒氣薄味厚陰也降也入手太陰陽明經五痔三蟲皆大腸溼熱所致苦寒能瀉溼熱則大腸清寧而二證愈矣其主蠱毒鬼疰者以其甘能解毒而苦寒能滌除腸胃邪惡氣耳

主治參互

孟詵食療治寸白蟲日食樵子七顆滿七日

蟲皆化為水也 簡便方好食茶葉面黃者

每日食樵子七枚以愈為度





