





唐書  
卷一百一十五

唐書  
卷一百一十五

○瘧

夫瘧之為疾名狀不一有所謂脾瘧寒瘧濕瘧食瘧壯瘧名雖

不同皆由外感風寒暑濕之氣與衛氣相搏而後成之雖經云夏陽

於暑秋必瘧瘧然四時有感積積去情飢飽失時致令脾胃不和痰

留中皖皆成瘧疾其初發也欠伸畏寒戰慄頭暈或先寒後熱或先

熱後寒或單寒單熱或寒多熱少或熱多寒少一日一發者易治

口三日一發者難愈瘧時自眩眩數者多熱眩遲者多寒眩而小緊

者宜下眩遲者宜溫浮大者宜吐治瘧之法當先發散寒邪不可發用

截補之藥若截早則補住邪氣其証變異不能即愈致成瘧疾

之發散之藥熱多宜小柴胡湯寒多宜清脾湯之類寒多者宜香薷

湯四散飲散不退然後以常山飲勝金丸截之截而不愈久則脾

氣虛敗唯宜多進養脾驅胡之藥脾氣一盛自然平復此証既愈亦

當即飲食謹勞慎防其再作如烟瘴之地居人常患瘧疾又當隨其

方土所宜藥性施以治法客旅性來瘴地常宜服平胃散香薷飲先

以治之



赤流

人參湯 和劑方 方見傷寒門治瘧疾寒多熱少者必須先用此藥發散然後用四散飲之類截之則食倍加草菓  
四散 簡易方治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲  
衛氣相持發為瘧疾

人參 去芦

白朮

茯苓 去皮

橘紅

草菓仁

半夏 湯洗

棗子

生薑

烏梅 去核各等分

甘草 炙

右咬咀以煎少許渣食官用厚皮紙裹了以水濕之慢炙炮令香  
熟焙乾每服半碗水一盞煎六分未發前併進數服

柴胡 四刀

桂枝 去皮一兩半

黃芩 一兩半

瓜蒌根 二石

牡蠣 炮碎

甘草 炙

乾姜 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分溫服

果散子

簡易方快脾治瘧

草菓仁

蒼朮 炮浸

厚朴 姜製

陳皮

半夏 曲

甘草 炙

烏梅 去核各等分

右咬咀每服半兩水一盞半姜五片棗二枚同煎七分不拘時寒  
多者加干姜附子執甚者止加柴胡瘧瘧加檳榔

七寶湯

濟生方治五臟氣虛陰陽相勝作為瘧瘧發作無時或寒

多熱少或單寒者

附子 一枚炮裂以鹽水浸再炮如此七次不浸去皮

右咬咀分作二服水一椀姜七片棗七箇煎七分當發日凌晨空

心溫服未及再進一服

果附湯

濟生方治氣虛瘧疾寒多熱少或單寒者

草菓仁

附子 炮去皮各等分

右咬咀每服半兩水一盞姜七片棗二枚同煎服不拘時

小柴胡湯

和劑方 方見傷寒門治瘧疾熱多寒少或單熱頭痛



音滿咽乾

**柴胡加桂湯**

活人方治瘧疾先寒後熱兼治支結

柴胡八兩去苗

人參去芦

甘草炙

半夏炮七次

黃芩

肉桂去皮各二兩

右次咀每服五錢水盞半姜七片棗二箇煎服若渴者去半夏加人參瓜蒌根同煎服之

**白虎加桂湯**

活人方治瘧疾但熱不寒者

知母六兩

甘草炙三兩

肉桂去皮三兩

粳米三撮

石膏一斤

右次咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

**清脾湯**

濟主方治瘧瘧瘧來弦數但熱不寒或熱多寒少口

苦咽乾小便赤澀

青皮去白

厚朴姜製

白朮

半夏湯泡七次

黃芩

草菓仁

柴胡去共

芍藥去皮

甘草炙各等分

右次咀每服四錢水盞半姜五片煎七分去滓溫服不拘時候

**三因方**治因食傷脾胃滯痰飲發為寒熱

厚朴四兩姜製

烏梅去核

半夏湯去滑

青皮

良姜各二兩

草菓去皮一兩

甘草炙半兩

右次咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分未發前併二

服已生冷油膩之物

**參蘇飲**

和劑方 方見傷寒門治發瘧熱多寒少兼咳嗽音

**黃連香薷散**

和劑方 方見暑門治伏暑發瘧煩渴者

**紅圓子**

濟生方專治食瘧

青皮炒三兩

阿魏醋化二錢半

蓬朮

京三棱醋炙各二兩

胡椒一兩

右為末別用陳倉米同阿魏醋煮糊為丸如梧桐子每服五十加

至百丸淡姜湯下或因食生菓成瘧用鹿射干湯吞下

**驚甲散**

濟生方治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘧母

草菓仁

驚甲醋炙

黃芩目去骨

白朮

白芍藥

厚朴姜製炒



檳榔

橘紅

川芎

甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜七片棗一枚烏梅少許煎七分温服不拘時

**老瘡飲**

三因方治久瘡結成癥瘕癰在胃習諸瘡不愈者

蒼朮泔浸

草菓去皮

桔梗

青皮

陳皮

良姜各半兩

白芷

茯苓

半夏湯去湯

枳殼面炒

甘草炙

桂心

乾姜炮各三錢

紫蘇葉

川芎各三錢

**勝金丸**

和劑方治一切寒熱瘧疾胃腸停痰發散不愈者

右咬咀每服四錢水一盞鹽少許煎七分空心服

檳榔四兩

常山酒浸蒸焙一斤

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服三十九粒於發前一日臨卧困冷酒吞下便睡至四更再用冷酒吞下十五丸至午方可食温粥忌食熱物并一切物生冷之方用雞子清為丸

**和劑方治瘧疾發散不愈漸成癆瘵**

知母

川常山

草菓各二斤

良姜二十兩

甘草炙一斤

烏梅去仁一斤

右咬咀每服五錢水一大盞薑五片棗一枚煎七分温服

**軍飲**

澹寮方治寒熱瘧疾作而仆厥手足俱冷民身知人此

雞一特急救之方用之有驗

附子一箇炮去皮

訶子四箇去核

陳皮四箇全者淨洗

甘草四寸炙

右咬咀為四服每服水一盞半姜七片棗七枚煎取一半分熱

灌病者立可甦省

**靈驗方**

澹寮方用生姜四兩和皮搗汁一碗夜露至晚空心冷服

大治脾胃聚痰發為寒熱

**分利順元散**

澹寮方治體虛之人患瘧寒多不可用截瘧者

川烏

附子各二兩

南星二兩

右除木香不見火外三味各將一半去皮生用一半炮熟合和

木香五錢另剉鹽入



咀每服四錢棗七枚生姜十片水一盞煎七分當發前一日及

當發日早晨連進二三服半生半熟飲分解陰陽也  
**七五飲** 簡易方治一切瘧疾無間寒熱多少及山嵐瘴氣寒熱

加瘧等証  
厚朴姜製 陳皮 甘草炙  
草蓂仁 岸山雞骨煮 檳榔

青皮各等分

右咬咀每服五錢水一盞半酒半煮煎取一盞露一宿空心向

東溫服睡少頃時須忘熱物寒多加酒熱多加水  
**治瘧疾良方** 百一選方令人治瘧疾多用常山砒霜之類發吐取

涎縱使得安脾胃不能不損不若此藥最為穩當也

辰砂光明者 阿魏真者各一兩

右研勻和榆糊為丸如皂角子大每服一九空心入參湯化下

**生肌附子湯** 治瘧方分利陰陽止寒熱治瘧疾欲作胃瘧嘔頭眩戰掉

附子二隻生去皮用一盞湯浸去皮炮用

右各取二錢沉香木香各一錢薑七片棗上枚煎一盞當發

日空心服亦宜以此下黑錫丹可以回元氣降痰

**治瘧** 醫方大成 右用柳蓮一雙去翅足以蠶丸之作一丸當發日令酒吞下

**灸法** 諸生方治瘧疾久不愈不問男女於大椎中第一骨節盡

處先斜灸三七壯立效或灸第三骨節亦可

**碧霞散** 古一選方治久瘧不愈者  
東方甲乙木巴豆取肉去油別研細

南方丙丁火官桂去皮

中央戊己土硫黃去砂研細

西方庚辛金白礬別研細

北方壬癸水青黛別研細各等分

右於五月一日修治了用紙各裹以盤盛依前六位排定勿令病

大及婦人已之安傾神佛前至端午日午時用五家粽尖和煎藥

令勿丸如梧桐子大令患者以綿裹一丸塞於鼻竅中男女左女

石於末發前一日安也約度尋常發過少許方除一方塞耳內



**草菓飲** 和劑方治寒熱瘧疾初愈服此進食理謂

子思 草菓仁 良姜炒  
青皮去白炒 甘草炒  
白芷各等分

**對合飲子** 和劑方治寒熱瘧疾愈后調理脾胃

厚朴去皮姜汁炙 蒼朮泔浸去皮 甘草各二兩  
陳皮去白炒赤黃色半斤

右以具每服四升水一盞煎七分熱服  
方以咀每服四升水一盞薑三片棗一個煎服一方加草菓治  
用蒼朮各草菓平胃散

**及則** 宜明方治一切脾胃虛瘧邪熱毒者

信訖 甘草各一錢 珠珀二錢  
大豆四十九粒

右為末滴水和丸每分作四十九服發日日飲出煎桃心湯下  
忌雜物

**醫神冊** 宜明方治諸般瘧疾

信訖一兩 推黃一錢

右以五月五日用粽子尖左右明三千下日未出不令誰大婦人  
見光如桐子大末發前一日面東冷水下一丸

**推黃散** 保命集治久瘧不能食胃中鬱結 欲吐而不吐此藥生  
之必愈

雄黃 瓜蒂 赤小豆各等分

**桂枝石蜜湯** 按粹方治瘧疾先寒后熱 多寒少

桂枝五錢 石膏 知母各一兩半  
黃芩一兩

**桂枝羌活湯** 按粹方治瘧疾熱者前發頭痛煩燥脈浮惡寒有汗

桂枝 羌活 防風  
甘草各半兩

**麻黃羌活湯** 按粹方治瘧疾頭痛煩燥脈浮惡寒無汗者

右為粗末每服半兩水煎如吐者加半夏曲等分



麻黃去節

羌活

防風

甘草各半兩

右為粗末每服五錢水一盞半煎服如吐加半煎等分

**麻黃桂枝湯** 按粹方治瘧疾如前証而夜發者

麻黃 兩去節

炙甘草三錢

黃芩五錢

桂枝二錢

桃仁二十个去皮尖

右為木末煎服桃仁散血緩肝夜發乃陰分而有邪此湯散中風寒也

**桂枝黃芩湯** 按粹方治瘧服藥寒熱轉大者知太陽也明少陽

三陽合病也

甘草

人參

黃芩各四錢半

半夏四錢

柴胡一兩二錢

石膏

知母各三錢

桂枝二錢

右為粗末每服五錢水煎服

**正氣散** 徐目知方退寒瘧止胃寒進飲食

藿香四兩

草菓四兩

半夏

陳皮

厚朴

縮砂

甘草各一兩

右為劉散生薑棗子煎溫服瘧疾候發日早服

**八寶散** 濟生方治一切瘧疾得病之初以其氣壯進此藥以取效

氣虛胃弱及妊婦不宜服之

蒼朮酒浸去皮炒

厚朴姜製炒

陳皮去肉

攪振

常山酒浸

甘草各一錢半

右以咀水一盞半煎至一盞去粗露一宿當發日作二服忌熱

物片時

**柴胡桂枝湯** 按粹院方治瘧疾往來寒熱煩渴引飲

柴胡去苗一兩二錢半

花粉二兩

黃芩去黑心

人參去芦頭

甘草各七錢半

右以咀每服一兩姜五片棗二枚煎至一盞去渣通口服

**瘧疾藥** 和方

常山一兩

甘草一錢

向東桃心柳心各七枚

右以水二盞酒半盞煎至七分去渣末發前半白服

**瘧疾藥** 和方



常山

扶苓

甘草

右等分大人八錢弱人六錢用好酒一鍾浸一宿露當發日早  
溫酒服

**定粉**

和劑方治一切瘧疾發作時先食伸欠乃作寒慄

振振顛顛中外皆寒腰脊俱痛寒戰既已或內外皆熱惡寒如破  
渴飲必水或痰聚胸中須滿欲吐或先熱後寒或先寒後熱或寒  
多熱少或熱多寒少或但熱不寒但寒不熱或一日或隔日或發後  
六七日再發皆治之

麝香

藜蘆

定粉各五錢

荷葉

藜蘆末

甘草燼各五兩

硃砂一兩二錢半

信麝香二兩半

金油二十五斤為衣

石為末煉蜜接和每兩作二十九捏匾金油為衣每服一餅子以  
心汲水磨俟自發者未發前服之間自若不發夜服隔數日發  
者前一日夜服連日夜服

**脾**

右用黃丹不以多少火上炒紫色為度用煨蒜和勻五月五日  
日午為丸桐子大每服七八丸當日發用長流水半面東臨盆藥  
時不令除人雞犬凡三周方難用獨頭者每服桃林枝湯各五合

**斬**

秘方

人言一兩

麵四兩水和作棋子用香油二錢半炒佳地下出火毒用

茶末三兩半

白扁豆末一兩半同研

右每兩分四十貼明日發今晚朝北斗男左手女右手放藥於手  
心乾黍忌熱物

**瘡**

和方

大南星二枚

好信三錢

右先將兩星開孔用信三錢研末裝入孔內兩星相對用泥固濟  
炭火煨有性取出研為細末用茅豆粉打糊為丸如豆大每服一  
二丸前半月溫茶清下白麵湯亦可

**三**

因方

雄黑豆四十斤米諸浸日去皮方并米浸信一錢研



右以端午日午時研勻丸如棗豆大珠砂為衣忌雞犬婦人見  
未發前半日新汲水下一丸者女人病令男子閉目送入口孕婦  
小兒以帛繫一丸於臂男左女右

**又方** 秘方

苦丁香三錢為末細芽茶一兩為末愈埋愈好

細飛羅麵五錢同煎二味拌勻用井花水搜和捏如菓子大餅  
乾用瓦罏油炒至紫黑色為皮紙攤地上出火毒

右為末再用白扁豆一兩半炒為末拌勻每服半錢量虛實加  
至一錢臨癸日五更病人朝東坐男左女右手掌內乾手乾味吃  
隔夜先備茶送下至天明為吐頭重身疼竟身子難過勿慮  
切忌熱物如得止可服冷茶清午前吐盡黃水可用溫粥補之

**不二散** 秘方

人言一兩為末

飛麵四兩與合言用水和軟餅鋪內煨為末

白扁豆末二兩

細茶末二兩

右同和勻每服小半錢已前半日用溫茶調下再用水調下  
酒麵魚等

**○劑**

人之患痢者古方未之辨下是也得病之由多因脾胃不和飲食  
變停積于腸胃之間不得消化而又為風寒暑濕之氣干之故去  
此寒傷熱下痢則赤傷冷則白傷風純下清血傷溫則下如豆羹  
汁冷熱交併赤白兼下又有如魚腦髓者治法當先用通利之藥  
疎滯臟腑積滯然後辨以冷熱風濕之証用藥調治執弄者請之冷  
白者溫之風濕者分利之冷熱相兼者溫涼以調之仍須先調助胃  
氣物不可驟用藥散訶子之藥止瀉之使傳滯不能疎疎未有不  
致危者凡下痢之脈宜微小不宜浮洪且滑大不宜弦急身寒則  
生身熱則死間有產前血作者惟當分利陰陽理脾助胃因毒物  
致痢者宜解之不可一槩而論

**生劑方**

和劑方 方見暑門治伏熱下痢分利陰陽

**黃連香薷散**

和劑方 方見暑門治感暑下痢解血

**敗毒散**

如右蓮肉醫方集成 敗毒散方見傷寒門 治下痢熱毒

**衝心不進飲食**

醫方集成去穢腑有積下痢以和劑方中蘇合香丸等感應



九二藥種勾圓如粟米大每服五十九粒姜湯空心下蘇合香丸方見氣門感惡丸方見宿食門

**胃風湯** 和劑方治大人小兒風冷乘虛客于腸胃水谷不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疔痛及腸胃溫毒下如豆汁或下痢血

白朮

白芍藥

川芎

人參

當歸去苗

肉桂去皮

茯苓去皮各等分

右以咀每服四錢水一盞入粟米百餘粒煎服

**香連丸**

和劑方治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後重

黃連去芦二十兩用長柴草十兩同炒令赤色去柴草不用

木香四兩八錢不見火

右為細末醋糊為丸如梧桐子每服二十粒空心飯後下

**水煎木**

和劑方治一切下痢赤白膿血相雜裏急後重

罌粟殼各二兩八錢

青皮去白

甘草各二兩四錢以當歸洗去芦

訶子炮去核

木香不見火各六兩

右為末一宿寒丸如彈子大每服一丸水一公升或酒化至六分空心食前溫服  
**和劑方** 治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血  
無膿膿急不急在重臍腹疔痛如脫肛像主下酒每使血並治之

罌粟殼去蒂蓋蜜炙三兩六錢

人參去芦

當歸去芦洗各六錢

肉桂去皮一錢

訶子皮去核一兩二錢

木香一兩四錢不見火

肉豆蔻麩裹煨半兩

白朮六錢

白芍藥一兩六錢

甘草一兩八錢不見火

右以咀每服四錢水一盞煎服臍寒者加附子

**大劑丸**

和劑方治臍臍疔痛下利不止

高良姜去芦一兩半

牡蠣火服一兩

附子炮去皮一兩

乾姜炮一兩半

細辛去二葉七錢半

龍骨研一兩半

赤石脂研一兩半

白礬研一兩

肉豆蔻麩裹煨

訶子煨去核各一兩

以石榴皮去核淨米醋浸一宿取多冷用黃色



右為未醋者通刺為丸如梧桐子每服五十丸空心水飲下  
**駐車丸** 和劑方治一切下痢無問冷熱

阿膠搗碎心知珠子為末十二兩以醋四升熬成膏  
黃連去須 干兩當歸布去須十五兩乾姜炮十兩

右為未以阿膠膏丸如梧桐子每服三十丸食前水飲下  
**黃連連心丸** 和劑方 治冷熱不調下痢赤白裏急後重絞腹疼

痛口小便不利便不利  
阿膠炒一兩 黃連去須二兩 茯苓去皮二兩

右黃連浸為細末木熬阿膠膏丁和丸如梧桐子每服三十丸  
溫未飲空心下

**劉宗勳散** 和劑方治脾胃虛弱內挾冷氣心脇刺痛嘔吐惡心腸  
鳴泄利水谷不化新成痢也

青皮去 肉豆蔻二兩半 訶子仁各四兩  
附子炮去皮二兩 肉桂去皮五錢

右為未每服三錢水一盞半姜二片煎七分食前溫服  
**木香散** 和劑方治脾胃虛弱內挾風冷油瀉油下水谷不化

下疳痛腸中雷鳴及積寒久痢腸滑不禁

當歸去須 赤石脂  
附子去皮臍醋炙切焙各一兩 丁香

當歸去須 木香 肉豆蔻仁  
耳草各一兩 訶子皮一兩半

右發咀每服三錢水一盞姜三片棗一個同煎至八分空心溫服  
**戊巳丸** 和劑方治脾令受濕泄利不止米谷不化臍腹刺痛

黃連去須 吳茱萸去梗炒 白芍藥各五兩  
右為末麵糊丸如梧桐子每服三十丸食前飲空心下日三服

**黃連連心丸** 和劑方治丈夫婦人遠年近日赤白下痢  
黃柏皮去粗皮 耳草 枳殼去核

當歸去須 御米即粟粟子各四兩  
乾姜炮各二兩

右發咀每服三錢水一盞半雞白二條擘碎同煎至八分空心服  
**白少或純下鮮血裏急後重小便不利**



地榆炒

乾薑各半斤

乾姜炮二兩

當歸布去苗三兩

茯苓去皮

赤芍藥各六兩

甘草炙四兩

瞿麥殼去穢十二兩

右為末每服二不用溫熱水調下木拍時服若下痢絕白及紫黑

血并腸滑不禁者不可服之

和刺方治大人小兒積氣虛怯冷熱不調積而成疔

或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下痢血或下半里或白相雜

裏急后重日夜頻數無間新舊此能治之

白扁豆炒

人參去骨

木香二兩

茯苓去皮

肉豆蔻殼各四兩

陳皮去白

瞿麥殼去穢各十二兩

右為末每服三大不用溫熱水飲調下不拘時服

白芍藥炒 仰藥院方治脾胃虛弱腸腑積滯下痢赤白

木香

赤石脂

乾姜

縮砂

厚朴姜炙

肉豆蔻殼各四兩

右為末面糊和丸如梧桐子每服六十九空心米飲下

**女九**

御藥院方治臟腑虛寒泄痢不止

烏梅末殺三兩半醋浸布裹蒸

擦成無滓艾二兩半

川椒炒去目

乾姜

赤石脂

黑附子炮各二兩

右除烏梅外同為細末待蒸過烏梅肉研勻更

熟棗肉蜜少

許丸如梧桐子大每服二十九米飲下

**聖藥**

楊氏家藏方治一切下痢脘腹疼痛

木香一錢半

乳香別研

滑石別研各一錢

肉豆蔻二枚麩裹煨

石為末每服一錢大乾棗一枚去核先入一半藥末在內次入水

浸巴豆半粒再入藥末半錢各定用油餅麩裹一指厚火煨乾

熟為度去麩并巴豆不用只細嚼藥末飲空心下

**固腸湯**

三因方治冷熱不調下痢赤白

瞿麥殼三兩醋浸炙

枳殼炒

白芍藥各二兩

陳皮

當歸

甘草各一兩

訶子煨

木香



人參

白姜香炮各半兩

右以咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

**烏梅丸** 濟生方治熱留腸胃脘腹痞痛下痢純四錢過服熱

藥瀉毒于肉滲成血痢並能治之

烏梅肉一兩去核 黃連去須二兩 當歸去芦

枳殼去核麩炒各一兩

右為末醋糊丸如梧桐子每服七十九空心米飲下

**天** 本專方治一切積痢

硃砂 硃砂並研極細各二錢半

古用黃蠟半兩巴豆三七粒去殼皮膜同於良石器內重湯煮

一伏時候巴豆紫色為度去二七粒止將一七粒于煎藥二味同

研極勻再漆蠟圓滾每旋丸盡且大每服三九至五九水瀉生

姜湯下白痢支湯亦白痢烏梅湯服時須空心服畢一時不可喫

食物若瘧痢乳香湯下

**當歸丸** 濟生方治冷留腸胃下痢純白腹痛不止

當歸去須酒浸 芍藥 附子炮

白朮 乾姜炮

阿膠炙粉炒各一兩 厚朴姜製

右為末醋糊丸加梧桐子每服五十九空心米飲下

**赤白痢** 濟生方治血氣衰弱下痢危困

麝香半錢別研點入

鹿茸煨去皮毛酥炙一兩

右鹿茸為細末方入麝香以燈心灰棗田為丸加梧桐子每服

五十九空心米飲下每料添清乳香半兩尤好

**赤白痢** 濟生方治一切毒痢及蠱注下血如雞肝心煩腹痛

茜根洗 川升麻 犀角鎔

地榆洗 當歸去芦洗 黃連去須

枳殼去核麩炒 白芍藥各等分

右為末醋煮米糊為丸如梧桐子每服五十九空心米飲下

**白痢散** 濟生方治血氣衰弱下痢危困

湯參散散加肉豆蔻木香或寒震丹等藥調之恐非其治當以

脈証辨之或脾胃脈不弱問而知其頭疼心煩手足溫熱未嘗多



服涼藥者此乃毒氣上衝心肺所以嘔而不食宜用敗毒散每服  
四錢重陳倉米一百粒姜三片棗一枚水一盞半煎八分溫服若  
其肺微弱或心腹虛喘手足厥冷初病則不嘔因脹則嘔烏梅苦  
澁涼劑大過以致聞食先嘔此乃脾胃虛弱一方用山藥一味對如  
小豆大一半良走銚內炒熟一半生用同為末飯飲調下

**白朮** 百一選方

右用石蓮排碎去殼留心并肉碾為末每服一錢陳米飲調下  
此疾子孟是毒氣上衝心肺借此以通心氣便竟思食

**白朮** 百一選方

昇茱萸換淨 黃連去須及尋分

右為一處以好酒浸透取出各自棟炒或晒乾為末糊丸如梧桐  
子大赤痢用黃連九三十粒甘草湯下白痢用茱萸九三十粒  
乾姜湯下赤白痢冬用十五粒相合併甘草乾姜湯下

**木香** 本事方治隔年痢不止并治血痢尤佳

木香半兩 黃連半兩到同木香炒  
甘草炙一兩 薑粟殼半兩

生薑切九同粟殼炒燥半兩

右為末入麝香少許每服二錢陳米飲下此方佛智和尚傳

**赤芍藥** 張子和方治一切溫熱惡痢瀕併窘痛無脈膿血  
並宜服之

芍藥 黃蘗各二兩 當歸

黃連各半兩

右為末水丸小豆大溫水下三四十九無時煎夜五六服忌油膩

脂肥發熱諸物等

**阿膠** 宣助方治下痢無問久新亦白青黑瘰癧諸証

今并阿膠淨草灰炒透明白利研不細光再炒研細

烏梅肉去核炒 赤芍藥 黃蘗剉炒

黃連去須 乾姜炮 當歸焙

赤茯苓各半兩

右為末入阿膠研勻水丸桐子大溫水飲下十九食前煎夜五六  
服小兒丸如粟豆忌酒膩脂肥諸物也

**三味黃** 經方止諸痢



黃連八兩

枳殼四兩

人黃皮相四兩

**槐花散** 右為細末麵糊為丸空心飯湯下如重者急後重加枳殼湯下  
技料方治血痢久不止腹中不痛不裏急後重

青皮

枳花

制木槵介等分

右為末水煎空心熱服

**桂枝湯** 張子和方

官桂半兩

人參去芦

木香各半兩

茯苓

白朮

甘草

芍藥

澤瀉

石膏

寒水石各二兩

滑石二兩

木香二錢半

右為細末每服三錢白湯送下或生薑亦可

**地榆散** 一百一選方治中暑昏迷不省人事欲死并治血痢

地榆

赤芍藥

黃連去須

青皮去白

右等分為末每服三錢將水調如無只以新水亦得若血痢

**黃連湯** 技料方治痢疾痛甚者

蒼朮三兩

芍藥一兩

黃芩

官桂各五錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食前

**黃連湯** 技料方治大便后下血腹中不痛者謂之白痢每下血

黃連

當歸各五子

甘草各二子半

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食前

**六神黃連湯** 保命集治大便后下血腹中痛者謂之熱毒下血

黃連

黃連

當歸各五子

淡桂半兩

甘草各二子

大黃一子

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食前如痛甚

調木香檳榔末一子服

**地榆方** 技料方治泄痢膿血乃至晚肛

蒼朮八尺

地榆二尺

卷柏

芍藥各三兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食前

**當歸和血散** 一名槐花散 衛生堂鑑治腸癖下血濕毒下血



槐花 升麻各二錢 青皮各六分 當歸身 荆芥穗 熟地黃

白朮各六分 川芎四分

右為末每服三錢米飲調下食前

阿膠湯 按粹方治傷寒熱毒入胃且下痢膿血 阿膠炙

黃連炒二兩 梔子五錢

黃蘗去引各二兩 石父咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服食前

玄青丸 宣明方治下痢勢惡煩併霍亂或久不愈諸藥不能

須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣宣行者宜以逐之

兼宣利積熱酒食積黃瘦中滿水腫脈脹兼癰小兒驚死積

熱乳癖諸証泄瀉者勿服

黃連 黃蘗 大黃

斗遂 羌花醋拌炒 大戟各五錢

牽牛四及取末二及已上同為末 輕粉一錢

青竹葉一兩

右為末水丸小豆大初服十九每服加十九空心日午臨臥三服  
以利為度后常服十五二十九數日右得食以病未痊除者再  
加取利利后却常服以意消息病去為度隨証止之小兒丸  
如粟米大

宋朱自為聖惠方治大便前後下血不止

烏梅肉二斤溫水浸一宿取肉斤 木香

百草霜 絲瓜灰燒存性各二兩

黃連 栝實 黃芩

梔子 當歸各一兩 大黃

半夏製各五錢 枳殼炒一兩 陳皮八錢

右為末用炒麵四兩入前藥一同用杵千余下丸如桐子大

服五十加至七八十九空心米飲下如硬入梅水和之

平湯除痰散 按粹方如大便閉或裏急后重數至間而

不能便或少白膿或少有血慎勿利之卒其王則除氣自降矣

蒼朮四兩米清浸 防風二錢

白朮一錢 茯苓一兩 白芍藥一錢



右咬咀每服一兩除蒼木另作片子水 破半者入至二大盞  
內諸藥同煎至一盞去滓稍熱空心食前服

**白木安胃散** 按粹方治一切瀉痢無間膿血相雜裏急為痛  
日夜無度又治男子小腸氣痛婦人脐下虛冷并產后兒枕塊  
痛亦治產后虛弱寒熱不止

枚苓去皮 白木 車前子各一兩  
五木子 烏梅各半兩 瞿麥殼製三兩

右咬咀每服一兩水二盞要煎至一盞去滓通口服食前  
**大黃湯** 按粹方治泄痢久不愈膿血稠粘裏急后重夜晝  
無度久不愈者

大黃一兩

右用好酒一盞浸半日煎至一盞去入黃將酒分二服如未止  
再服以利為度復服為藥湯和之煎止再服黃苓為藥湯  
以療其毒也

**芍藥湯** 按粹方下血調氣澀而便膿血知氣行而血止行血則  
便自愈調氣則后重除

芍藥一兩

當歸

黃連

黃苓各半兩

性二錢半

檳榔三錢

炙甘草

木香各二錢

大黃三錢

右咬咀每服半兩水一盞半煎至一盞去相溫服如痢不止  
漸加大黃如汗後煎至每加黃蘗半兩依前服

**芍藥黃苓湯** 按粹方治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脈洪  
疾者及下痢膿血稠粘

黃苓

芍藥各一兩

甘草各半兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食前  
**芍藥藥皮石** 按粹方治便膿血

芍藥

黃蘗皮等分

右為末醋糊為丸如梧桐子大米飲送下

**四味阿膠丸**

仁有方治骨熱下痢其色黃煩燥多渴臍腹疼  
痛小便不利

黃連等四兩

茯苓去皮二兩

赤芍藥三兩

阿膠蛤粉炒一兩



右為末醋搗為丸如梧桐子大每服五十九粒空心米飲下食前

**黃連丸** 楊氏家藏方治大腸畜熱或因酒毒下血不已黃連四兩淨內一兩水浸晒乾一及生一及炒一及炮

防風去芦 黃芩各一兩 右為末醋糊為丸如梧桐子大每服七十九粒米泔浸枳殼水下不拘時父月宜八大黃一兩

**地榆湯** 百一選方治卜血遠年不瘥 地榆洗焙 卷栢洗各等分

右吹咀每服一兩水一盞沙瓶煮數十沸通口服不拘時時

**枳實三百丸** 百一選方治腸風攻而下膿血日數十度者 枳實 槐花生各五錢 皂角刺一兩半生用半燒存性

右為末煉蜜為丸梧桐子大約可得三百丸每服三十九粒米飲下酒亦可食前

**道氣湯** 拔粹方治下痢膿血裏急後重日夜無度 芍藥一兩 當歸五錢 大黃二錢半

黃連一錢 黃芩二錢半 木香

檳榔各一錢 右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食前

**防風芍藥湯** 拔粹方治泄痢殮泄身熱脉弦腹痛面渴及頭痛 微汗

防風 芍藥 黃芩各一兩 右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食前

**藥公湯** 經驗方治揚寒下痢亦治久血熱痢 藥皮三兩 黃芩二兩 黃連一兩

右吹咀每服一及水二盞煎至一盞去滓通口服腹痛加山槐子小便不利如赤茯苓阿膠煎服

**三黃湯** 聖惠方治赤白痢多赤少白 黃連 黃芩 黃栢等分

右吹咀每服一及水二盞煎至一盞去滓食前溫服 神效方 一名當歸丸 聖惠方治休息痢膿血不止疼痛困弱 當歸 烏梅肉 黃連等分



右搗羅為細末以生蒜汁和衆手丸如梧桐子大焙乾每服三十丸空心前厚朴湯下如至五十九方加阿膠一方煉蜜丸其者鎔精丸

**倉厚易** 仁存方治下痢赤白或因先是寒邪中臟腑致發熱者敗毒散加陳米姜棗同煎改毒散方見傷寒門

黃連烏梅丸

聖惠方治諸熱痢不瘥

右為末煉蜜為丸桐子大每服二十丸溫米飲下食前

**當歸道氣湯**

接粹方治膿血痢無度小便不通腹中痛

當歸

芍藥各一子

甘草一子半

生地黃酒浸陰乾一子半或二錢

青皮七子

槐花七分

右咬咀水二盞煎至一盞去滓溫服食前如後重加木香檳榔末各三分澤瀉半子如小便利去澤瀉

**槐花散**

本草方治腸風臟毒下血

槐花

柏葉肝杵焙

荆芥穗

枳殼等分

右為末每服二錢空心米飲調下

**枳殼散**

本事方治腸胃不調脹滿下血

蒼朮

厚朴

陳皮

當歸

枳殼各一兩

槐角二兩

甘草

烏梅各五錢

**蒜連丸**

本事方治臟毒下血

黃連不以多少為末用獨蒜煨熟杵爛丸如桐子大每服四十丸空心米飲下

**加盛物易**

危氏方治腸風下血不止

側柏葉

生地黃洗

當歸酒洗

川芎各二兩

枳殼去穢炒

荆芥穗

槐花炒

甘草炙各五錢

右咬咀每服一兩水二盞姜三片烏梅少許煎至一盞去滓

通口食前服一方加防風烏梅各半兩

通口食前服一方加防風烏梅各半兩

通口食前服一方加防風烏梅各半兩



秘方

栗殼去穰蜜炒五錢

甘草五錢

乳香

陳皮去白五錢

沒藥各二錢

右以咀水二盞煎至一盞去滓溫服食前如白痢熱服紅痢冷服如痢不止加青皮四錢煎

紅丸子 秘方治痢

巴豆四十九粒去皮殼心油

木香四錢末

乳香四錢研

槐花一錢半

攪丹一兩

黃蠟半兩

右將蠟石器溶開濾淨再化却入煎藥末勻入丹勻待冷自然成膏油紙包旋丸如粟米大服三五十九丸乾姜湯赤甘草湯水瀉煨姜飲子下

香車丸 秘方

黃連五兩剉

粉草二兩半伴

木香一兩不見火

右先將草連用滾水畧拌濕安在鉢中重湯蒸之良久取出晒焙乾再依上法薰之再晒得九薰九爆九炒二付晒十分乾

與木香一處為末水糊丸桐子大每服五十九食前酒或米飲下

白濁 秘方

酸櫛皮半斤

草菓一个

陳皮三片

烏梅一个

甘草一寸

乾姜二塊

右以咀水一服水二盞煎至一盞去滓溫服食前

白濁 秘方

乾姜末

黃蠟等分

右銀石器化蠟入姜末勻丸如芥子大服七丸二七丸白酒下赤井水下

又方 秘方

烏梅

白梅各七个

右件去梅核搗梅肉爛同乳香末心許丸桐子大以茶末為衣每服二三十丸茶湯下食前

赤白痢 秘方

黃連一兩

木香

甘草各二錢



右咬咀水二盞煎至一盞去滓溫服食前先一日服五苓散  
三貼次日早服即止如神

**又方** 秘方 用連白青韭一大握多研取汁和煮酒一盞溫飲  
之極驗

**又方** 秘方 大七氣湯加延胡索丁香木香煎 杏七氣湯方見梅聚門  
**補遺治赤白痢** 危氏方 續斷末二錢半平胃散一兩拌勻  
每服二錢水煎食前服平胃散方見脾胃門

**治一切痢** 秘方

巴豆一百粒

杏仁一百粒

砂仁末

右二味俱於香油燈上燒存性先將二味研同砂仁勻黃蠟汁  
和煎藥三百粒丸如菴豆大服五士丸水下

**又方** 秘方

黃連多用

枳殼

甘草炙

烏梅去核

右咬咀水煎空心服忌魚猪肉油生冷菓子

**台關** 秘方

木香二寸半末

巴豆四十九粒研

煨豆豉一兩淨研爛

右和炒丸如箇子大服一丸白乾姜湯下赤甘草浸水下赤白  
用二水下聖惠方三味等分名如聖針頭丸

**治痢** 聖惠方

治瀉痢腹痛膿血赤白

明言

明冊各一丸

右研細細溶蠟一兩油五七點為劑旋丸如菴豆大每服二丸  
泄瀉冷水下痢甘草水冷下痢后下血者胃風湯下

**治痢后手足疼痛白痢** 仁存方

敗毒散如攪柳木煎煎服若早不治有成鶴膠風者

**異參** 仁育方

治血痢

右苦參不以多少炒焦為末滴水丸如桐子六服五六十丸  
米飲下

**黃連補瀉** 千金方治太陽虛冷瀉下青白腹中雷鳴相逐

黃連四兩

茯苓

川芎各三兩

酸棗皮五斤

地榆五兩

伏石肝雞子大研末

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食前



華氏... 仁育方

牛乳半斤

華糖三斤

右同煎減半空心服 聖惠方

用百草霜五斤

右為末熟酒調下食前米飲調下亦可

治... 聖驗方

昔曾曾公痢血百餘日國醫无能療者陳應之取若水梅除  
核研一枚合臘茶加醋湯沃服之一服而瘥大丞相莊肅梁公  
亦痢血應之曰此挾水谷當用二物散亦數服而愈三物散用  
胡黃連烏梅肉竈下土等分為末臘茶清調下食前服

治... 聖驗方

黃杞蜜炙令各黃色一兩

右為末每服三升空心溫漿水調下

治... 聖驗方治暴瀉不止及痢赤白

右酸石榴皮燒存性不以多少為末空心米飲調下

全驗方治下痢青血腹中刺痛

右椿根白皮不以多少為末米醋糊丸桐子大空心米飲下三  
四十丸

一名露筋腸 危氏方治風瀉青血下

甘草二斤 草菓各一箇 青皮二箇

杏仁七粒去皮尖

椿根皮二升半

右以咀水二搥姜三片烏梅二箇煎七分去滓露一宿晨服

治... 聖驗方治下痢膿血熱毒

黃連 黃蘗各一升 赤茯苓

白朮 赤芍藥各五升

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服食前如腹痛

加糖子二枚煎 全驗方治下痢久不瘥

厚朴姜製 黃連等分

右以咀水二盞煎至一盞去滓溫服食前



牛乳半斤 仁育方

菓糖三系

右同煎減半空心服

聖惠方

用百草霜五系

右為末熟酒調下食前米飲調下亦可

聖驗方

昔曾曾公痢血百餘日因醫无能療者陳應之取若水梅除核研一枚合臘茶加醋湯沃服之一服而瘥大丞相莊蕭梁亦亦痢血應之因此被水谷當用二物散亦數服而愈三物散用胡黃連烏梅肉薑下土等分為末臘茶清調下食前服

聖驗方

黃杞蜜炙令老黃色一兩

右為末每服三系空心溫漿水調下

聖驗方治暴瀉不止及痢赤白

右酸石榴皮燒存性不以多少為末空心米飲調下

聖驗方治下痢青血腹中利痛

右椿根白皮不以多少為末采醋糊丸桐子大空心米飲下三

四十丸

一名露宿湯 危氏方治風痢青血下

酸榴皮 草菓各一箇 青皮二箇

甘草三寸 杏仁七粒去皮尖

椿根皮二系半

右以咀水二盞姜三片烏梅二箇煎七分去滓露一宿晨服

聖驗方治下痢膿血熱毒

黃連 黃蘗各一升 赤茯苓

黃芩 白朮 赤芍藥各五系

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服食前如腹痛

加糖子二枚煎

聖驗方治下痢久不瘥

厚朴姜製 黃連等分

右以咀水二盞煎至一盞去滓溫服食前



白木黃芩湯

後辨方服前藥痼疾難除更宜調和

白朮一升

黃芩七升

甘草三升

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食前

白木黃芩湯

接辨方服前藥痼疾難除更宜服

白朮一升

黃芩七升

甘草三升

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食前

嘔吐

人身以胃為主賴之以容受五穀但有所傷非不能食且有嘔吐之患故胃虛之人或為寒氣所中或為暑氣所干或為飲食所傷或氣結而痰聚皆能令人嘔吐又有熱血停積胃口嘔吐之間雜以涎血當辨其脉證施以治法中寒則脉沉緊四肢厥冷飲食不下當以溫暖之藥調之按暑則脉弦數煩燥而渴又當清涼之傳食則消化之痰聚則順氣溫胃停積者多由憂思過度損傷經絡其脉實大者難治虛細者易愈嘔吐之證各狀不一至若脚氣內攻婦人懷妊中毒因酒俱有嘔吐又須各投其類以求之此證決不可輕用利藥唯腹滿胃脹視其何部不利然後利之三因詳論又此不可不審

理中湯

和劑方專治胃虛感寒嘔吐不止

丁香白朮散

和劑方治脾胃虛冷嘔吐不食

丁香不見天

紅豆去皮

甘草炙

乾姜炮

青皮去白

川烏炮去片

陳皮去白

良姜炮各四兩

胡椒二兩

益智去皮五兩半



白木黃芩湯 後辨方服前藥痲疾難除更宜調和

白木一升

黃芩七升

甘草三升

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食前

白木一升

黃芩七升

甘草三升

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食前

嘔吐

人身以胃為主賴之以容受五穀但有所傷非不能食且有嘔吐之患故胃虛之人或為寒氣所中或為暑氣所干或為飲食所傷或氣結而痰聚皆能令人嘔吐又有瘀血停積胃口嘔吐之間雜以涎血當辨其脈證施以治法中寒則脈沉緊四肢厥冷飲食不下當以溫暖之藥調之按暑則脈弦數煩燥而渴又當清涼之傳食則消化之痰聚則順氣溫胃停積者多由憂思過度損傷經絡其脈實大者難治虛細者易愈嘔吐之證各狀不一至若脚氣內攻婦人懷妊中毒因酒俱有嘔吐又須各復其類以求之此證決不可輕用利藥唯腹滿胃脹視其何部不利然後利之三因詳論又此不可不審

理中湯 和劑方 治脾胃虛冷嘔吐不食

丁香不見天

紅豆去皮

甘草

乾姜炮

青皮去白

川烏炮去片

陳皮去白

良姜炮各四兩

胡椒二兩

益智去皮五兩半



右咬咀每服三錢姜三片鹽一捻前七分空心煎服

**丁附治中腸**和劑方治胃冷傳熱嘔吐不已

丁香

甘草炙

胃皮炒

陳皮炒

人參各半兩

附子炮

白木煨

乾姜炮各一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分空心煎服

**藿香半夏散**和劑方治胃虛中寒停飲由飲感逆嘔吐

半夏湯洗七次炒黃色二兩

丁香皮半兩

藿香葉一兩

右咬咀每服三錢水一盞姜七片煎七分食前溫服

**丁香半夏升**濟生方治胃寒嘔吐吞酸酸水

丁香不見火一兩

乾姜炮

半夏湯洗七次各二兩

白木一兩半

橘紅二兩

右為末生薑自然汁打糊丸如梧桐子每服五十九姜湯下

**大藿香散**濟生方治土情傷感氣鬱胸中變成嘔吐或作寒熱眩暈

痞滿不進飲食

藿香葉洗

半夏麩

白朮

木香不見火各二兩

白茯苓去皮

桔梗去芦炒

人參去芦

枇杷葉刷去毛

官桂不見火

甘草炙各半兩

右為末每服三錢水一盞姜五片東棗一枚煎七分溫服

**旋覆花湯**濟生方治中脘伏痰吐逆眩暈

旋覆花去梗

半夏湯洗七次

橘紅

乾姜炮各一兩

續斷

人參去芦

甘草炙

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎服不拘時

**香薷散**和劑方方見暑門治伏暑嘔吐

香薷

白朮各半兩

葛根三兩

半夏湯洗七次二兩

甘草炙一兩

右咬咀每服四錢水一盞入竹茹棗許大姜五片煎七分取清汁

冬服不拘時

**吐瀉**痞生方治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐



白僵蠶炒去絲

白木

乾姜炮

橘紅

半夏湯洗七次

肉豆蔻麩裹煨

甘草炙

白豆蔻仁

丁香

南星炮

附子炮

木香

麥蘖炒

檳榔各等分

右為末入生麩一分拌勻用生薑自然汁搜和入百沸湯內煎冷  
浮聖和丸藥如梧桐子每服五十九丸姜湯吞下不拘時病甚者不  
過三服惡熱藥者去附子大便秘者除肉豆蔻

胃腸痞塞或不食而脹滿或已食而不消痰涎惡心嘔吐不已一應  
脾胃虛弱嘔吐將成翻胃之證也皆治之

朱砂大塊不夾石者五十兩

高良姜剉炒

紅豆

草澄茄

胡椒

橘紅

乾姜炮去皮

附子炮

白豆蔻

益智仁

丁香不見火

厚朴姜製

藿香葉

白木

草菓仁

新羅人參

宿砂仁

肉豆蔻煨

五味子

麥門冬去心各四兩

右將人參等二十味各如法修製剉如豆大以銀石鍋用白沙蜜  
玉斤將藥一半同蜜拌勻入銀石鍋內以文火生須袋盛貯懸  
於其內以桑柴火重湯煮四日四夜換蜜五斤入煎藥半和勻  
再煮三日三夜取砂淘淨焙乾入乳鉢內用上棗研十分細以米  
糠為丸如粟豆大陰乾每服十粒如至十五粒空心用人參湯下  
藥湯亦可如或嘔吐用淡姜湯下忌食猪羊等物

高良姜一兩以百年鹿麀土和水煮乾切片

南木香

草菓麩煨

人參去葉

陳皮去白

白木

丁香不見火

胡椒

白茯苓去皮各兩甘草炙一兩半

右為末每服二大茶匙空心米飲大匙點服薑酒亦可

橘皮四兩

甘姜半斤



右以咀每服水七盞煮至三盞去滓遂旋溫服

重舌胃弱嘔吐不止

藿香葉二兩

半夏二兩湯洗焙

陳皮二兩去白

厚朴二兩姜製

蒼朮三兩米泔浸

甘草二兩炙

右為粗末每服五杯水一盞半生薑五片棗二枚同煎去滓溫服

四君子湯 按按方

茯苓

白朮

人參

右以咀每服一兩水三盞生薑五片煎至一盞去滓溫服

養胃湯 治脾胃虛冷不思飲食翻胃嘔吐方見翻胃門

三乙承氣湯 宣明方一方見傷寒門治嘔吐水將不入食則吐大便

或利而不鬆快時齊腹痛滿者或下利赤白而嘔吐食不下者或

大小腸膀胱結而不通上為嘔吐膈食前執或硝細心 噤眼

半百支五兩

茯苓三兩

右以咀每服八分用水一盞半煎至一盞分五服自然汗收

更煎一兩弗煎服死時

○世瀉

世瀉之證經中所謂強強泄瀉四洞泄濡泄溢泄水穀注下是也大腸

為五穀傳送之官脾胃虛弱飲食過度或為風寒暑濕之氣折中皆

能令人泄瀉如傷於風其脈必浮下必帶血當以胃風湯等驅散之

如寒氣折傷脈必沉細腹肚痛下必青黑當以附子理中湯治中

湯等溫暖之若傷於暑則脈沉微煩渴引飲其下如水當以五苓散

來復丹以分利之或夾食則又當以胃本湯下蘇感元若濕氣折中

其脈沉緩腰膝冷痺小便自利不渴其下黃黑色當以滋濕湯藿

香正氣散調之因停食而泄者下必臭類抱環雞子或意氣作酸先

服感應先推其食積而後理脾胃氣體虛弱及年高之人脾胃氣虛敗而

自利者又當後以四柱散寇附元若脾胃氣虛清晨泄下二三次

二神四神丸主之又有時氣虛而泄者又須金鎖正元丹以問之凡

治瀉之法先理其中焦分利水穀然後斷下酸惡之大法如心若脚氣

泄瀉各以類求滑泄一証最忌五虛五虛者脈細皮尺少氣前後泄

利飲食不入者是也右得藥粥入胃世瀉止則可活也



作小便赤澀

縮砂仁

人參去芦

藿香葉全

香薷

半夏炮土次

炙甘草各二兩

白扁豆炒

厚朴姜製各四兩

杏仁去皮尖

赤茯苓去皮

木瓜各二兩

右以咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎服不拘時

**理中湯** 和劑方 方見宋門治臟腑停寒泄瀉不止

**加味五苓散** 濟生方治伏暑發熱及胃濕泄瀉或煩渴小便不利

赤茯苓去皮

澤瀉

木猪苓去皮

肉桂不見火

白朮各二兩

車前子半兩

右以咀每服四錢水一盞薑五片煎至八分溫服不拘時或送下

來復丹亦好

**來復丹** 和劑方 方見暑門治伏暑泄瀉

**大已寒丸** 和劑方 治沉寒痼冷臟腑虛憊心腹疝痛脇肋脹滿泄

瀉腸鳴有利自汗

黃連

肉桂各四兩

辛姜炮

為良姜各六兩

右為末水煮麩糊丸如梧桐子每服三十丸空心米飲下

**和劑方** 方載劑門治脾胃不足濕熱泄瀉不止米穀不化

**人論治** 濟生方治腸胃虛寒心腹冷痛泄瀉不止

乾姜炮

附子炮去皮臍

肉豆蔻麩裹煨各等分

右為末米糊為丸如梧桐子每服五十丸空心米飲下

**禹餘糧丸** 濟生方治腸胃虛寒滑泄不禁

禹餘糧石煨

赤石脂煨

龍骨

犀糞

訶子麩裹煨

乾姜炮

肉豆蔻麩煨

附子炮去皮臍各等分

右為末醋糊丸如梧桐子每服七十丸空心米飲下

**厚腸丸** 百一選方治泄瀉不止

白龍骨

乾姜炮

附子炮去皮臍

厚朴姜製

訶子炮去皮

肉豆蔻麩煨

陳皮各等分



右為末酒糊丸如梧桐子每服五十九丸飲下  
**補脾丸** 百一選方治滑泄不禁

白朮  
川厚朴去皮姜製  
赤石脂  
肉豆蔻麩煨  
神麩  
川白朮炮各兩  
草薢  
麥蘖各炒

附子炮去皮臍各半兩

右為末醋糊丸如梧桐子空心五十九丸米飲下

**大霍亂** 百一選方治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹脹痛如泄瀉  
不已最能取效

藿香葉洗去土兩  
木香  
厚朴姜炒  
青皮去白麩炒  
木香  
入參去土  
肉豆蔻麩煨  
良姜炒  
大參藥炒  
神麩炒  
訶子煨去核  
白茯苓皮

甘草炒各一兩

白乾姜九半兩

右為末每服四錢吐逆泄瀉不下食或嘔酸苦水用水一盞煨  
姜半塊鹽一捻煎服水送下

白痢甘草黑豆湯下脾胃虛冷宿滯酒食痰氣作量入鹽少許  
能消食積

**神丸** 和劑方 方見傷寒問治感濕泄瀉

肉豆蔻生二兩  
破故紙炒四兩  
木香不見火半兩  
茴香炒一兩

右為末生姜煮棗肉為丸如梧桐子鹽湯下一方云木香茴香  
入神麩麥蘖如前作丸

**白濁丸** 和劑方治腸胃虛弱內受風冷水穀不化荆瀉疔下  
肉豆蔻麩煨四兩  
木香不見火二兩  
白茯苓煨四兩去皮  
乾姜炮  
肉桂各二兩  
附子炮去皮臍四兩  
丁香不見火一兩

右為末姜并麩糊丸如梧桐子每服五十九丸至百丸用生薑湯下  
粥飲亦可

**白豆蔻散** 和劑方治脾胃虛弱腹脅脹滿水穀不消臍腹滑泄



蒼朮米附浸切八兩乾姜炮  
厚朴去皮姜製 甘草炙  
肉桂法皮 陳皮去白各四兩  
茴香炒 訶子皮各二兩  
川烏炮去皮脂

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎八分溫服  
**全羅世元丹** 和劑方治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛冷之  
證並浴之

五倍子 茯苓各八兩 龍骨煨利研  
朱砂別研各三兩 紫巴戟去半六兩一補骨脂酒浸炒干切  
肉桂法皮 胡芦巴炒各一斤

右為末入研藥合為酒湖丸如梧桐子每服三十丸空心溫酒送  
湯任下

**御藥院方** 方見痢門治臟腑虛寒泄瀉不已  
**四柱散** 和劑方治元臟氣虛真陽耗散肢體冷痛泄瀉不正  
白茯苓去皮 附子炮去皮 人參  
木香濕帶畏火煨

右等分或咀每服四錢水一盞薑五片鹽少許煎世分空心溫服  
一方加肉豆蔻訶子各六柱散

**神丸** 本事方治脾胃虛弱全不進食  
破故紙炒四兩 肉豆蔻二兩生

右為末以大肥棗四十九枚生薑四兩切同煮棗爛去姜取棗  
肉胡骨入棗和丸如梧桐子每服五十丸地黃湯下

**神效散** 本事方治臟腑受風濕泄瀉不止  
芫荽 神麩炒 白朮

門子炮去皮脂各等分  
右為末糊丸如梧桐子每服五十丸米飲下

**豆附丸** 濟生方治臟腑虛寒泄瀉不止氣血虛困不進飲食  
肉豆蔻炮裂煨 附子炮 良姜炒  
訶子殼煨 乾姜炮 赤石脂煨

陽起石炒 龍骨生用 白礬各二兩  
白茯苓去皮 桂心不見火 細辛洗各一兩

右為末酒煮麩糊丸如梧桐子每服七十丸空心米飲下



訶梨勒瘧瘧 附子炮 肉豆蔻煨

吳茱萸去梗 龍骨生用 車螯

白茯苓去皮 木香不見火各半兩

右為末姜汁煮糊丸如梧桐子每服七十丸空心米飲下

聖藥救急 五月皮 陳皮

木通各一兩一錢 赤茯苓去皮 黃芪微炒

厚朴姜製 粉草 車前子各三錢半

右咬咀每服三錢水一盞煎七分溫服

清腸散直指方治泄瀉不止

肉豆蔻 訶子炮 宿砂

陳皮 蒼朮炒 茯苓各一兩

木香半兩 甘草四錢 川厚朴製一兩半

右咬咀每服三錢姜湯煎服手足冷者加炒乾姜

攪柳不拘多少

右為末每服三錢用蜜湯煎服不拘時

胃氣散 聖惠方治感暑夾食滯瀉煩渴用平田貝五錢散和水煎

入鹽少許未藥湯 亦可平田貝散見脾胃門五錢散方見暑門

升麻除濕湯 接粹方治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度

猪苓 陳皮各三分 升麻

柴胡去苗 神麴炒 防風去芦

羌活 益智 半夏湯洗各半斤

蒼朮一斗泔浸 甘草炙 大麥蘖 各二斤

右咬咀作一服水三盞生薑三斤桑子二枚煎至一盞去滓食前

通口服非腸鳴不用薑桑如胃寒臍鳴者加澤瀉五分

六胃湯 枳方治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰燥物

短氣口不知味腸鳴大便微澹黃色身體昏悶口乾不喜飲冷

黃耆 甘草 柴胡 人參



白木 益智各三分 當歸梢  
升麻各半 陳皮半 蒼朮一各半

右咬咀每服水二盞前至三盞去滓食前通口服  
白木 保命集治大陰解經受濕水世生下胎重微滿困弱  
死力不欲飲食暴洩無數水谷不化宜服此藥

右咬咀每服一兩水二盞前至一盞去滓通口服食前服  
升麻湯 按釋方治一日大便三四次澇而不多有時澇瀉腹中鳴  
小便黃

黃耆各三分 甘草一分 升麻六分  
柴胡三分 橘皮三分 枳實知母

右咬咀分作二服每服水二盞前至三盞去滓食前溫服

人參去芦 白朮 乾姜炮  
訶子去核 茯苓去皮 木香

藿香去皮 甘草炙 肉豆蔻好濃炙三分

右咬咀每服一兩水二盞前至三盞去滓通口服食前服  
又方 秘方 川肉豆蔻一箇麩煨和白朮散米湯調服白發身見霍亂  
又方 秘方 止水瀉并婦人白帶白水極驗

右為末麩糊丸桐子大每服二三十丸米飲下空心絕妙  
神聖藥 存方 一名黃散治晨泄  
宜黃連劉水浸片時生姜四兩切段于塊方用二兩

右用一處掩一宿銀石或同炒姜赤黃色為度去姜不用將  
黃連為末每服一各服茶調下

聖惠方治大人小兒冷熱不調吐瀉不定霍亂煩燥吐瀉不  
止其効如神  
明信 朱砂研多半兩 乾胭脂二分

巴豆七個去油  
右研勻落蠟二斤入油七點旋丸大人三錢且大小兒麻子大每服  
一九濃煎槐花甘草湯冷下食前一服定



五味子散 瑞竹堂方 治五更天明溲泄 一次各醫可泄感陰氣而然  
五味子二兩 吳茱萸五分 細粒綠色者佳  
右同炒香為末 每服二分 陳米飲下





程