

森氏開藏府之記

青山求精堂藏書畫之記

斑瘡證治

夫斑瘡病內經云張仲景皆不載尋撫方論蓋自魏朝方有以白頭赤根者俗呼爲豌豆郎斑瘡也細粟如麻者俗呼爲麻郎瘡疹也又有大者俗呼爲芋爲萍此皆輕重之不齊故命名異耳百問云悔不得轉利以瘡疹發於表利之則毒氣入裏龐安常云身疼壯熱須少解散藏閉毒攻非利不愈必令汗下初虞世亦云瘡疹發於肌肉屬陽明古人治法皆以承氣湯利之諸說子盾不無疑誤今皆存之要當分其未發已發爲治者其始發必作寒熱如傷寒狀方證所載耳冷尻冷疫嗽者皆瘡疹證又小兒初得手足搐搦如風癎者亦瘡疹候便可爲宣熱拔毒必須利之千金治豌豆瘡初發欲發

養安院藏書

者單煮大黃服之即明文也若其已發只須解肌用升麻紫
草葛是也如是勿之諸說自泮又此病多因傷寒失於汗下
或時氣勝復歲主客氣及天行疫病長幼相染者當隨因辨
證治之其間嗌倒厥黑故危宜早爲治

三豆飲子 治天行豆瘡但煮有此證預服則不發

赤小豆 黑豆 菉豆各壹升 甘草半兩

右㳘洵豆入甘草以水煮熟逐日空心任性食豆飲汁
七日瘡自不發

升麻湯 治大人小兒傷風寒瘟疫頭痛寒热体疼班瘡已發
未發並可服

升麻 乾葛 甘草 芍藥各等分

右㕮咀每服秤伍錢重水二盞煎七分去滓热服小兒
量爲一法加紫草茸煎

鼠粘子散 治傷寒班瘡圍毒氣咽喉不利声不出疼痛

鼠粘子炒舟參 甘草炙 乾薄荷炙 升麻等分

右㕮咀每服三錢水一盞半煎七分去滓无時小兒量爲

龍腦膏 治班瘡倒厥黑

猪心血調腦子成膏以紫草茸煎湯解開稀稠得所
服无腦子用辰砂一法白弱葉燒灰爲細末每服二
錢入麝香少許沸湯調下

仙靈散 治班瘡入眼

仙靈脾 蔵靈仙各等分

右爲末每服二錢食後米湯調下

豆皮飲子 治小兒因出瘡毒入眼生翳

真粟豆皮　白菊花　真穀精草去根各等分

右為末每服一大錢乾柿一个粟米泔一盞同煎候泔尽只將乾柿去核日服三次

丹毒叙論

經云諸痛癢瘡皆属心心虛寒則痒心實熱則痛丹毒之病由心實熱也心生血主於脉血熱則肌浮陰滞於陽郎發丹毒方論有云以其色赤如丹砂塗故得丹名然又有水丹白丹五色油丹豈專以赤為名也又有赤疏天火殃火尿竈瘡竈野火等古方以為小兒出入游行觸犯所致此因容或有之若小兒在襁褓中未能出入亦患此者是豈因觸犯耶大率皆血熱之所為也叙例于後

丹毒證治

天火丹者肉中忽赤如丹塗之色痛痒不定甚至遍身白丹者肉中腫起痒痛如吹狀雞冠水丹者徧体熱起黃色如水在皮中五色油丹者亦名油腫赤疏丹腫熱赤色如雞冠丹者亦名茱萸丹肉上粟起流入四肢以上皆不問大小如天火骨火殃火尿竈朱田野火等丹多着少小但自腹内生出四肢者則易愈自四肢生入腹者則難治

香欒皮湯　治諸種丹毒發於四肢腹背頭面或赤或白或痒痒或痛或寒或熱

右香欒皮醍以一大椀水煎半椀用翎毛刷患処神效

伏龍肝散　治火小諸種丹毒

右伏龍肝為末以雞子白和傅之日三次

金花散　治一切丹毒

欝金　黄芩　甘草　山梔
大黄　黄連　糯米
右七味各一兩生爲末蜜和冷水調以鵝毛上患処

料簡

治丹毒方千金外臺甚多无出用至冷物凡至冷物无過藻粟如有患丹毒热腫等取渠中藻采細切熟搗傅丹上厚三分乾則易之最良

癮疹證法

世醫論癮疹无不謂是皮膚間風然既分冷热冷热即寒暑之證又有因浴出湊風冷而得之者豈非温也則知四氣備矣經曰諸痒痛瘡皆属於心心實热則痛虚寒則痒又陽明主肌肉属胃与大腸亦有冷热分痛痒不可不審世人呼白者為婆膜赤者爲血風名義混殽當以理曉内則察其臟腑虚實外則分其寒暑風湿隨證調之无不愈

加味羌活飲　治風寒暑湿外搏肌盧發爲癮疹增寒發热遍身搔痒隨臟氣虚實或赤或白心迷悶乱口苦咽乾

羌活　前胡各壹兩　人參　桔梗
甘草炙　枳殼麸炒　川芎　天麻
茯苓各半兩　蟬蛻去頭足　薄荷叁分

右爲末每服二大錢水一盞姜三片煎七分无時服

加味烏荊圓　治癮疹上攻頭面赤腫搔痒搔之皮便脱落作瘡作痒或痛淫液走注有如虫行

川烏湯洗浸三五次去皮尖焙乾秤　荊芥已上半斤
杜當歸水浸三日焙乾秤半斤　薄荷兩五

右為末醋煮米粉糊為圓梧子大每服五十丸溫酒茶清下

麴术湯 治因浴出湊風冷遍身癮疹搔之隨手腫突及眩暈嘔噦

白术壹兩　神麴二兩炒　甘草壹分

右為末每服二錢米飲調下 一方以土硃研炒冷酒調下二錢不飲人以茶調下

傳薬

景天壹斤細擣取汁傳上熱灸手摩再三度瘥

胡臭漏腋證治

胡臭漏腋雖不害人性命而害人身奉親事君乃至交遊皆非所宜修身之士務為清潔者或得此患不可不思有以去之夫胡臭者多因勞逸汗漬以手摸而嗅之致清氣道中受此宿穢故傳而為病方論有天生臭之說恐未必皆然多見為人相染者蓋其氣吸上元宮遂散百脉多相沾染忌之為得漏腋者亦由腋下挾汗致汚衣數重皆透然未必臭以二證致之其病自別古方共作一病未為至論

蜘蛛散 治胡臭熏人不可嚮迩者

大蜘蛛壹个以黃泥入少赤石脂搗羅極細入鹽少許杵煉為壹窠蜘蛛在內旋以火近燒令通紅候冷剖開

右一味研細臨卧入輕粉一字用醾醋調成膏傳腋下明早登厠必瀉下黑汁臭穢不可聞於遠僻處傾弃埋之免致染人神良

六物散 治漏腋腋下足心手掌陰下股裏常如汗濕汚衣者

乾荊杞根　乾薔薇根　甘草各半兩　胡粉

商陸根　滑石各壹分

右治下節以苦酒少許和塗當微汗出易衣更塗之不過三著便愈或一歲復發又塗之

頭痛證治

頭者諸陽之會上丹產于泥丸宮百神所奪凡頭痛者乃足太陽受病上連風府眉角而痛者皆可藥愈或上穿風府腦入于泥丸宮而痛者是爲真頭疼不可以藥愈夕發旦死旦發夕死責在根氣先絶也原其所因有中風寒暑濕而疼者有氣血食飲厥而疼者有五臟氣鬱厥而疼者治之之法當先審其三因三因既明則所施无不切中

芎辛湯 治傷風寒生冷及氣虛痰厥頭疼如破兼眩暈欲倒嘔吐不定

附子生去皮臍 烏頭生去皮尖 天南星 乾姜 甘草炙 川芎 細辛 各等分

右㕮咀每服四大錢水二盞姜五片茶芽少許煎七分去滓食後

藿香散 治傷風挾涎飲上厥頭疼偏正夾腦諸風

藿香半兩 川烏頭湯洗七次去皮尖一兩 乳香三皂角子大 草烏頭炮製去皮尖半兩 石膏 甘草生 麻黃去節湯各等分

右爲末每服一字薄荷茶清調下食後服

煌煌散 治傷寒發熱頭疼腦痛

右爲末每服貳錢水一小盞茶半錢葱三寸碎擘煎三伍沸先嚼葱白細嚥下去枕仰卧如發熱再投一服出汗即愈

玉屑散 治傷寒發熱涎潮上厥伏留陽經頭疼眩暈不可忍者

石膏 煅

右研細每服二錢葱茶調下小兒量大小加減

芎术湯 治着濕頭重眩暈苦極不知食味暖肌補中益精氣

川芎　白术　附子 生去皮尖 各半兩　甘草　桂心 壹分

右㕮咀每服四大錢水二盞姜七片棗一个煎七分去滓空心服

救生散 治外傷風冷內積憂思氣欝聚涎隨氣上厥伏留陽經頭疼壯熱眩暈或胷膈寒痞兼服寬中圓并攻之

菊花蕊　川芎

石羔 煅各一兩　甘草一分

右曰曬乾爲末每服三錢煎葱湯調下如胷膈痞即調此下寬中元无時

寬中圓 治氣滯不快飲食不消胷膈痞塞凝痰聚飲狀如傷寒頭疼胷痞

大附子 炮去皮臍　木香 炮　青皮　大黃 濕紙裹煨各等分

右爲末醋煮糊元梧子大每服十圓姜湯下頭疼甚則調救生散送下

天南星圓 治腎厥頭疼不可忍

硫黃　石羔

天南星 炮　焰硝 各等分

右爲末糊圓梧子大每服三十圓空心温酒下

硫朱丹 治腎厥痰厥頭疼諸藥不效

川烏 炮去皮　硫黃 各半兩　朱砂 水飛 弍兩　天南星 壹兩 炮製

右爲末姜汁糊圓梧子大每服十五元生姜薄荷湯下

葫芦巴散 治氣攻頭痛如破

葫芦巴 炒 三稜 剉醋浸壹宿各壹兩 乾姜 炮壹分
右爲末每服二錢生姜湯或酒調下

雄黃圓 治八般頭風及眩暈惡心吐逆諸藥不治
通明雄黃壹兩 川烏頭生去皮尖壹兩半
右二味爲末滴水圓梧子大每服十圓煨葱白茶清下
即用後藥搐鼻

搐鼻藥
華撥 良姜各壹分 白芷壹錢 細辛半分
右爲末每服一小字先含水一口分搐鼻內吐水即止

大附圓 治元氣虛憊上攻偏正頭疼不可忍
右大附子一枚炮去皮臍爲末葱汁糊圓菉豆大每服
十圓至十五圓茶清下一法以川烏頭炮去皮尖爲末
用非葉自然汁和圓治風虛痰涎頭疼

如聖餅子 治氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽經偏正頭疼
痛連腦顛吐逆惡心目瞑耳聾常服清頭目消風痰暖胃氣
川烏頭生去皮 南星 乾姜各壹兩 甘草
川芎各弍兩 天麻 防風 半下洗去滑各半兩
右爲末湯浸煮餅和圓雞頭子大捻作餅子曬乾每服
伍餅同京芥二五穗細嚼茶酒任下熟水亦得无時

夫眼者五臟之精明一生之至寶如天之有日月其可不保
護之然皆骨之精爲瞳子屬腎筋之精爲黑眼屬肝血之精爲
絡果屬心氣之精爲白眼屬肺肉之精爲約束屬脾契筋骨
血氣之精爲脉并爲系二上屬於腦後出於項中故六淫外

傷五臟內鬱飲食房室遠視悲泣抄寫雕鏤刺繡博奕不避煙塵刺血發汗皆能病目故方論有五輪八廓內外障等各各不同尤當分其所因及臟腑陰陽不可混濫如目決其面者爲兌眥屬少陽近鼻上爲外眥屬太陽下爲內眥屬陽明赤脉從上下者太陽病從下上陽明病從外走內者少陽病此三陽病不可混也睛色赤病在心色白病在肺色青病在肝色黑病在腎色黃病在脾色不可名者病在胃中此五臟三陽病不可混也仍叙三因于后

三因證

病者喜怒不節憂思兼并致臟氣不平鬱而生涎隨氣上厥逢腦之虛侵淫眼系蔭注於目輕則昏澁重則障翳眵淚努肉白膜漫睛皆內所因或數冒風寒不避暑濕邪中於項乘虛循系以入於腦故生外翳醫論中所謂青風綠風紫風黑風赤風白風白翳黃翳等隨八風所中變生諸證皆外所因或嗜慾不節飲酒无時生食五辛熱啖炙煿馳騁田獵冒涉煙塵勞動外精喪明之本所謂恣一時之游佚爲百歲之固愆皆不內外因治之各有方

千金神麯圓 明目百歲可讀細書常服益眼力

神麯四兩 光明砂壹兩 磁石弍兩煅醋淬去次

右爲末煉蜜元梧子大米飲服五元空心日三服

羌活散 治風毒氣上攻眼目昏澁翳膜生瘡及偏正頭疼目小黑花累二者

羌活 川芎 天麻 全伏花

青皮 南星炮 藁本各壹兩

右爲末每服二錢水一盞姜三片薄荷七葉煎七分食後服一法入牽牛末弍兩以生姜汁煮糊圓如梧子大酒下二三十丸

白蒺藜散治腎臟風毒上攻眼目赤腫熱淚昏澁努肉攀睛

白蒺藜炒去角防風 南星壹兩半黑豆弍合青鹽半兩水煮透取出焙 甘草生 殭蠶直者去系 蝉各一兩 甘菊花三兩生

右爲末每服二錢煎甘草湯調下食後服忌炙煿

洗肝散治肝熱赤脉貫睛澁痛衝風淚下兼治熱血攻心

白蒺藜壹兩半 防風 羌活各半兩 馬牙硝弍兩 甘草一分

右爲末每服二錢白湯調下食後

椒紅丸明目煖水臟補虛力久服駐顏縮小便

川椒取紅四兩 巴戟去心 金鈴子劉炒 茴香炒

附子炮去皮臍各壹兩

右爲末山藥三兩爲末酒煮糊搜為丸梧子大空心鹽湯下三五十丸

煮肝散治眼赤有耳痒證

用四生散方見風門癲每服肆錢匕鹽酒入羊子肝煮空心温服羊子肝即羊肝上小片子者是

驅風散治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍或上下臉眦赤爛翳肉侵睛

五倍子一兩去塵土 曼荆子壹兩半洗

右㕮咀每服三錢水二盞銅石器內煎及一盞澄清熱洗留滓二服再煎

立勝散治風毒攻眼及時眼隱澁羞明腫痛

黃連　黃柏　秦皮去麄皮　甘草等分

右㕮咀每服四錢水一盞棗一枚灯心七莖煎數沸去滓以新羊毫筆蘸刷眼候温即用手沃之一法不用黃柏甘草有黃芩防風

神仙照水膏治瘴翳

蠟壹兩　黃丹壹兩水飛　蛇蛻壹分燭燒　水銀壹分　初生烏雞殼壹个

右用栁木槌研細滴蠟爲餅臨卧用之候天明將水照眼藥墮水中膜尽去

蘗竹瀝膏治一切亦眼障翳

慈竹壹段去兩頭節　黃蘗去麄皮刮細者蒲填竹內

右用磚對立置竹磚上兩頭各安淨椀以乾竹火燒令瀝出尽收之以釵股銅筋點

通利膏治眼赤澁翳膜遮障時多熱淚

杏仁弍拾壹个口去皮尖　乳香皂子大　輕粉壹字

右旋入口中都嚼候津液滿口吐出甕器中置火上令四邊沸以綿濾別盞中入生腦子皂子大研勻再濾過以銅筋點之

通神膏治眼生翳膜赤脉努出澁痒疼痛有淚

沙蜜肆兩　青塩　麝香各壹字　乳香

硇砂滴淋過　枯凡各半字　當歸半錢　黃連壹錢

右件乳鉢內研破同蜜入青竹筒內密封閣定煑半日厚綿濾過點服

蛤粉圓治雀目不拘久近但日落便不見物

上色蛤粉細研　黃蠟等分

右溶蠟搜粉爲元如棗大每用猪肝壹片弍兩許披開
裹藥壹圓麻線纏瓮器内水壹椀煑熟取出乘熱熏眼
至温喫肝以效爲度

鼻病證治

肺爲五臟華蓋百脉取氣於肺鼻爲肺之閶闔吸引五臭衛
養五臟升降陰陽故鼻爲清氣道或七情内鬱六淫外傷飲
食勞佚致清濁不分隨氣壅塞遂爲清涕鼻洞濁膿腦絲衄
血息肉久而爲齆雖種〻不同未始不涉三因致泥丸汨乱
変生諸證

羊肺散 治肺虚壅鼻生息肉不聞香臭

羊肺一具洗 白朮肆兩 蓯蓉 木通
乾姜 川芎各弍兩爲細字

右以水量打稀稠得所灌肺中煑熟細切焙乾爲末食
後米飲服一二錢匕

細辛膏 治鼻塞腦冷清涕出不已

細辛 川椒 乾姜 川芎 吳茱萸
附子去皮臍各叁分 皂角屑半兩 桂心壹兩 猪脂陸兩

右煎猪脂成油先一宿以苦酒浸前捌味取入油煎附
子黄色止以綿惹塞鼻孔

通草散 治鼻齆氣息不通不聞香臭并有息肉

木通 細辛 附子炮去皮臍各等分

右爲末蜜和綿裹少許内鼻中

一法 以瓜蒂爲末綿裹内鼻中或吹入亦可

一法 以枯凡研爲面脂和綿裹少許内鼻中數日息肉

与藥消落

粉黃膏 治肺熱鼻發赤瘰俗謂酒皶

硫黃壹分為末　蘿蔔切去蓋剜作瓮子入硫黃在內以竹針蓋定正安糠火煨壹宿取出研細

輕粉　烏頭尖各少許為末

右研勻以面油調卧時傅早時洗去以酥調尤佳

一法 用乳香硫黃細辛輕粉等分為末水調傅

一法 梔子為末蠟圓小彈子大茶酒任下一圓

凡鼻頭微白者亡血也赤者血熱也酒客多有之若時行衄血不宜斷之或出至一二升不已即以龍骨為末吹入凡九竅出血皆用此法甚良餘衄方見失血門

唇病證治

唇者脾之候也意舍之所榮燥則乾熱則裂風則瞤動寒則揭氣鬱則生瘡血枯則瀋而无色治之之法內則隨證調其脾外則當以藥付之

清脾湯 治意思過度蘊熱於脾口乾唇燥瀋裂无色

黃芪　香白芷　升麻　人參

甘草炙　半夏湯去滑等分

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片棗二个小麥三十粒煎七分去滓无時

羌活散 治風溫入脾致唇口瞤動帬揭頭疼目眩及四肢浮腫如風水狀

羌活叁兩　茯苓　薏苡仁各壹兩

右為末每服二錢水一大盞煎七分入淡竹瀝壹匙許再煎服

菊花圓 治脾肺氣虛憂思過度榮衛枯耗唇裂瀋緊或口吻生瘡容色枯瘁男子失精女子血衰悉主之

甘菊花　枸杞子　肉蓯蓉酒浸洗切　巴戟去心各等分

右爲末蜜圓梧子大每服三五十元米湯下

青灰散 治唇緊燥裂生瘡面无顏色

右青布燒灰研細以猪脂調夜傅睡一法以頭垢傅之

凡瀋唇緊唇二上生瘡唇裂並以甲煎傅之弥效

口病證治

夫口乃一身之都門出入榮養之要道節宣微爽病必生焉故熱則苦寒則鹹宿食則酸煩燥則澁虛則淡疸則甘五味入口藏於胃脾行其精華分布津液於五臟二氣偏勝味必偏應於口或勞鬱則口臭凝滯則生瘡不可失睡夫睡則愈增

龍石散 治上鬲壅毒口舌生瘡咽嗌腫痛

寒水石煅叁兩　辰砂弍錢半別研　腦子半字

右爲末以少許摻患處嚥津日夜數次用小兒瘡疹攻口先以五福化毒丹掃却用此藥摻立效

赴筵散 治口瘡疼痛

五倍子壹兩洗　黃蘗蜜塗炙紫色　滑石各半兩

右研細末每服半錢許摻患處嚥津不妨便可飲食

綠雲膏 治口瘡臭氣瘀爛久而不差

黃蘗半兩　螺青弍錢

右研細臨卧置一字在舌下不妨嚥津遲明差

一法 以銅綠易螺青

兼金散 治蘊毒上攻或下虛邪熱病口生瘡

細辛　黃連各等分

右為末先以熟水搵帛揩淨摻藥患処良久涎出吐之

杏粉膏治口瘡以涼藥傅之不愈者

杏仁拾粒去皮尖　輕粉壹字

右研杏仁細調勻臨卧傅瘡上少頃吐之勿嚥

生香膏治口氣热臭

右甜瓜子去殼一味研細蜜熬少許調成膏食後含化或傅在齒間一方用香附子炒去毛為末每早晚揩少許牙上

齒病證治

齒為関門腎之荣骨之餘也腎衰則齒豁精固則齒堅又大腸支脉在牙齗主灌注於牙大腸壅則齒為之浮大腸虛則宣露挾風則攻目頭面疳䘌則齲脫為痔皆氣欝而生諸證不同治之各有方安腎圓八味圓並治虛壅牙齒疼痛浮腫

安腎圓方見腰疼門　八味圓方見脚氣門

西嶽蓮華峯神傳齒藥方

猪牙皂角及生姜　西国升麻熟地黃　木律旱蓮槐角子

細辛荷葉要相當　青塩等分同燒煅　研細相來使最良

揩齒牢牙髭鬢黑　誰知世上有仙方荷葉剪荷葉心用

常用齒藥牢牙去風冷蚛蝺宣露不問老少用之甚效

槐枝　柳枝各長肆寸壹握切碎　皂角不蚛者柒莖　鹽肆拾文重

右同入甆瓶内黃泥固濟糠火燒一夜候冷取出研細用如常法有石佛庵主年七十餘云祖上多患齒疼脫落得此方效數世用之齒白齊密乃良多也

玉池散治風蚛牙疼腫痒動搖牙齦潰爛宣露出血口氣等疾

地骨皮　白芷　升麻　防風　細辛
川芎　槐花　當歸　藁本　甘草各等分
右爲末每用一字許揩牙或大段痛即取二錢水一盞半黑豆半合姜三片煎至一盞稍温嗽候冷吐之殊效或用金沸草散熏漱亦佳

舌病證候

舌者心之官主嘗五味以榮養於身資於脾以分布津液於五臟故心之本脉係於舌根脾之絡脉係於舌傍肝脉循陰器絡于舌本凡此三經或為風寒濕所中使人舌卷縮而不能言或憂怒思恐所鬱則舌腫滿而不得息心熱則破裂生瘡肝壅則出血如湧脾閉則白胎如雪諸證雖異治之各有方

升麻柴胡湯　治心脾虛熱上攻舌上生瘡舌本強頰兩邊腫痛

柴胡　升麻　芍藥　梔子仁　木通各壹兩
黃芩　大青　杏仁去皮尖各叁分　石羔煅弍兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎七分去滓食後服

金沸草散　治風寒傷於心脾令人增寒發熱齒浮舌腫

荊芥穗肆兩　旋伏花　前胡　麻黃去節各叁兩
甘草炙　赤芍藥　半下湯七次各壹兩

右㕮咀每服四大錢水一盞半姜七片棗二个煎七分去滓嗽口吐一半喫一半　世醫　用此發散傷風傷寒及加杏仁五味子治咳嗽皆效獨未知治舌腫牙疼辛未年有人患舌腫如吹滿塞其中粥藥不入其勢甚危大煎一劑乘熱以紙籠氣熏之遂愈　又　一婦人牙疼治療不差致口頰皆腫亦以此藥熏漱而愈故特記之

烙腫法 凡舌腫舌下必有噤虫狀如蝼蛄卧蚕有頭尾頭小白可燒鐵烙二頭上即消

黒散子 治舌忽然腫破

右釜底烘研細以醋調傳舌上下脫去更傳能先決出血竟傳之弥佳一法用塩等分調傳之良

薄荷蜜 治舌上生白胎乾澁語話不眞

薄荷自然汁 白蜜等分

右先以生姜片蘸水揩洗竟傳之

文蛤散 治熱壅舌上出血如泉

五倍子洗 白膠香 牡砺粉各等分

右為末每用少許摻病処或燒鐵篦熱烙孔上

礬石散 治風濕寒舌強不能語

枯礬 桂心各等分

右為末每壹錢安舌下或用正舌散治之方見中風門

凡失欠頰車蹉但開不能合以酒飲之令大醉睡中吹藥搐其鼻嚏透即自正

咽喉病證治 哽附

夫喉以候氣咽以嚥物咽接三腕以通胃喉通五藏以系肺氣穀攸分皎然明白有為水喉穀之說者謬說也千金復云喉嚨候脾胃咽門候肝膽亦非至論智者當以理推不可強存乎人矣諸臟熱則腫寒則縮皆使喉閉風燥亦然五臟久咳則声嘶二者喉破也非咽門病咽腫則不能吞乾則不能嚥多因飲啖辛熱或復嘔吐咯傷致咽糸乾枯之所為也与喉門自別又有懸癰暴腫閉塞喉嚨亦如喉閉但懸癰在

上腭俗謂鶯翁又謂之鵝聚俗語声訛不可不備識

小續命湯 治卒喉痺不得語方見中風門 加杏仁柒个去皮尖甚效

玉鑰匙 治風熱喉痺及纏喉風

焰消壹兩半 鵬砂半兩 腦子壹字 白姜蚕壹分

右爲末研勻以竹管吹半錢許入喉中立愈

神效散 治喉閉熱腫語声不出

荊芥穗別爲末 萆麻生去皮別研各等分

右入生蜜少許圓如皂子大以綿裹含化急則嚼化

一法 用朴消不用荊芥

蜜附子 治腑寒咽門閉不能嚥

右大附子生去皮臍切作大片 蜜塗炙令 黃含嚥津甘味尽更塗炙用

玉屑無憂散 治纏喉風咽喉疼痛語声不出嚥物有礙或風

涎壅滯口舌生瘡大人酒癥小兒妳癖或誤吞骨屑哽塞不下

玄參 貫衆 滑石 縮砂仁

黃連 甘草 茯苓 山豆根

荊芥穗各半兩 寒水石煅 鵬砂各叁錢

右爲末每服一錢先抄入口以新水嚥下此藥除三尸去八邪殺九虫辟瘟療渴

荊芥湯 治風熱肺壅咽喉腫痛語声不出喉中如有物哽嚥之則痛甚

荊芥穗半兩 桔梗弍兩 甘草壹兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片煎六分去滓温服

一法 去荊芥穗名如聖湯

解毒雄黃圓 治纏風及急喉痺卒然倒仆失音不語或牙関

緊急不省人事或上焦壅熱痰涎不利咽喉腫痛

雄黃飛　礬爵金各一分　巴豆去皮出油弍柒个

右爲末醋糊圓菉豆大熱茶清下七圓吐出頑涎立省未吐再服如未至死心頭尚温灌藥下喉无有不活

乾姜散　治懸癰雞熱卒暴腫大

乾姜　半下　湯洗去滑等分

右爲末以少許着舌上嚥津

一法　用塩抹筋頭張口拄之日五六次

麻仁散　治穀賊尸咽二喉中癢此因誤吞穀芒搶刺痒痛

胎麻炒不以多少

右爲末湯點服凡穀賊屬咽馬喉風屬喉不可不分

馬鞭草散　治馬喉痺洪腫連頰吐氣數

馬鞭草根

右搗自然汁每服嚥一合許一法用馬銜鐵汁服亦妙凡治哽之法皆以類推如鸕鷀治魚哽磁石治針哽髮灰治髮哽狸虎治骨哽亦各隨其類也

蜜綿雞白　通治諸哽

煮雞白令半熟以線繫定手捉線少嚼雞白嚥之度雞至哽處數牽引哽即出矣

玉屑無憂散　治一切物哽方見前治纏喉風下

一法　綿一小塊以蜜煮用如食雞法

耳病證治

腎雖寄竅於耳當知耳為聽會主納五音外則宮商角徵羽內則唏噓呵吹呬內關五臟外合六淫故風寒暑濕使人聾

聾耳鳴憂慮喜怒多生內寒其如勞逸不言而喻復有出血生膿聤耳底耳或耵聹上直庚切下乃頂切不出飛走投入諸證既殊治各有法

菖蒲圓 治耳卒痛及聾聾塞不聞聲

菖蒲　附子炮去皮臍各等分

右爲末以醋圓如杏仁大綿裹內耳中日弐易之

補腎圓 治腎虛耳聾或勞頓傷氣中風虛損腎氣升而不降致耳內虛鳴

山茱萸　乾姜炮　巴戟　芍藥　澤瀉

兎絲子酒浸遠志去心　桂心　菖蒲　石斛

乾地黃　細辛　附子炮　當歸　牡丹皮

蛇床子　甘草　蒺藜酒浸各弐兩　人參各弐兩　菖蒲壹兩

防風壹兩半　茯苓半兩　羊腎弐枚

右爲末以羊腎研細酒煮麵糊爲丸梧子大食前鹽酒任下參拾圓至伍拾圓

蝎彈圓 治耳虛聾

白茯苓弐兩　山藥炒參兩　杏仁去皮尖炒壹兩半　黃蠟弐兩

右以前參味爲末研勻溶蠟爲末如彈子大鹽湯嚼下有人止以黃蠟細切嚼點好建茶送下亦效

乾蝎散 治耳聾因腎虛所致十年內一服效

乾蝎黃色小者并頭尾用伴拾玖个生姜切如蝎大伴拾玖片弐味銀石器內炒至乾爲細末

右向晚勿食初夜以酒調作一服至二更以來徐徐盡飲五更耳中聞百十攢笙響便自此聞聲

解倉飲子 治氣虛熱壅或失飢冒暑風熱上壅耳內聾閉徹

痛膿血流出

赤芍藥　白芍藥各半兩　當歸　甘草炙

大黃蒸　木鱉子去殼各壹兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分食後臨卧服

麝香散治聤耳底耳耳內膿出

桑螵蛸壹个熳火炙及捌分熟存性　麝香壹字別研

右爲末研令勻每用半字摻耳內如有膿先用綿撚紙以藥摻之一法用染坯枯礬等分爲末以葦管吹入耳中即愈或入麝香更佳

諸百虫入耳用麻油灌之即效

諸耳內出血以龍骨末吹入即止

三因極一病證方論卷之十六終

三因極一病證方論卷之十七

婦人論

夫天地造端於夫婦乾坤配合於陰陽雖清濁動靜之不同而成象效法之有類原茲婦人之病与男子不同者亦有數焉古方以婦人病比男子十倍難治不亦言之深乎但三十六病產蓐一門男子无之其如外傷風暑寒濕內積喜怒憂思飲食房勞虛實寒熱悉与丈夫一同也依源治療可得而知之

求子論

夫有夫婦則有父子婚姻之後必求享續故聖人謂不孝有三无後為大者言享續之至重也凡欲求子當先察夫妻有无勞傷痼害之属依方調治使內外和平則婦人樂有子矣

溫胞湯 治婦人立身以来全不產及斷緒久不產三十年者

朴消　牡丹皮　當帰　大黃蒸一飯久　桃仁湯去皮尖熬妙細辛去苗　厚朴去麁皮姜製妙　桂去皮　赤芍藥　桔梗　人參　茯苓　甘草炙　牛膝酒浸　橘皮各叁分壹字　附子炮去皮臍壹兩　虻虫去翅足妙焦　水蛭切妙各四十个

右㕮咀每服四大錢水酒合一盞半煎取陸分去滓空心服日三夜一温覆得少汗必下積血及冷赤膿如小豆汁斛酌下尽若力弱大困不堪者只一二服止然恐惡物不尽不得藥力能尽服侭好不尓着坐導藥

坐導藥 治全不產及斷緒服前溫胞湯惡物不尽用此方

皂角去皮子　吳茱萸　當帰各壹兩　細辛去苗五味子　乾姜炮叁兩　大黃蒸　礬石炮　戎塩　蜀椒各半兩

右為末以絹袋盛大如指長叁寸餘盛藥令滿縛定納婦人陰中坐卧任意勿行走小便時去之更安一日一度易新者必下清黃冷汁二尽止若未見病出可十日安之本為子宮有冷惡物故令无子值天陰冷則發疼痛須候病出尽方已不可中輟每日早晚用苦益菜煎湯熏洗

秦桂貞 治婦人无子昔金城范守進此方　見經驗

秦艽去芦　桂心不見火　杜仲去皮姜制炙絲斷　厚朴去皮姜製　防風各叁分　附子去皮臍生用　茯苓各壹兩　白薇　乾姜炮　牛膝酒浸　沙參　半下湯洗各半兩　人參壹兩　細辛去苗弐兩壹分

右為末煉蜜貞赤豆大每服五十丸食前温酒醋湯任下如未效更加貞数貞有則止神效如彼說不復繁引

探胞湯 斷經三月不知是胎驗之方

右川芎 不拘多少 為末濃煎艾湯調二錢空心微動則有胎

脉例

經云陰搏陽別謂之有子搏者近也陰脉逼近於下陽脉別出於上陰中見陽乃知陽施陰化法當有子又少陰脉動甚者姙子也手少陰屬心主血腎主精二血交會識投于其間則有娠又三部脉浮沉正等无病者有姙也餘並如脉經說

惡阻

婦人中脘宿有風冷痰飲經脉不行飲与血搏多喜病阻其狀顏色如故脉理順時不知病之所在但覺四肢沉重頭目瞤暈惡聞食臭喜嗢鹹酸至三四月則大劇吐逆不自勝持多卧少起此由經血既閉水漬於臟二氣不得宣通頭漬悶經脉秘澁故使四肢沉重挾風則頭目眩暈留飲則嘔吐無時

竹茹湯 治姙娠擇食嘔吐頭疼顛倒疾逆四肢不和煩悶

人參 橘皮

甘草 炙壹分 白茯苓 厚朴 姜制衣各半兩

右㕮咀每服四大錢水一盞半姜五片入竹茹一塊如指大同煎七分去滓空心服

半夏茯苓湯 治姙娠惡阻心中潰悶頭目眩暈四肢怠惰百節煩疼痰逆嘔吐嫌聞食氣好嗢鹹酸多卧少起不進飲食

半夏 湯洗七次三兩 茯苓 熟地黃 各壹兩 捌錢 橘皮 細辛

紫蘇葉 人參 芍藥 川芎 桔梗 甘草 炙各一兩貳錢

右㕮咀每服四大錢水二盞姜七片煎七分去滓空心

服有客熱煩渴口生瘡者去橘皮細辛加前胡知母腹冷下利者去地黃入桂心炒胃中虛熱大便閉小便澁加大黃壹兩八錢去地黃加黃芩六錢

茯苓圓治婦娠阻病心中煩悶頭暈重憎聞飲食氣便嘔逆吐悶顛倒四肢重弱不自勝持服之即効要先服半夏茯苓湯兩劑後可服此方

茯苓　人參　桂心炒　乾姜炮半夏湯洗七次　橘皮各一兩　白朮　葛根　甘草炙　枳實麩炒去穰各二兩

右爲末蜜圓梧子大每服三五十圓米飲下日三服

小地黃圓治婦娠酸心吐清水腹痛不能食

人參　乾姜炮各等分

右爲末用生地黃汁負如梧子大每服五十負米湯下

空心服

養胎大論

夫養胎須分能所母爲能養子爲所養名義既殊致養亦別故謂之重身父母交會之初子假父母精血投識於其間然後成婬元氣質始之謂也一月血聚謂之始胎二月精凝謂之始胚三月成形謂之始胎此亦無次第中次第也道生一生二二生三三生萬物既以三而成故不得不數月而分也成形之後陰陽化施男女始分故隨見外象而有感於內四月始受少陰君火氣以養精五月受大陰濕土氣以養肉六月受少陽相火氣以養氣七月受陽明金氣以養骨八月受太陽水氣以養血九月受厥陰木氣以養筋十月臟腑俱備神明已全俟時而生此皆所養胎息之所成始成終也若能

養者惟在乃母依經所藏而時養之無妄服食針灸勞逸等不特傷胎亦乃自傷不可不愼孝也為保傳母尤宜熟識之謹備列母之能養避忌諸法以繼諸後

避忌法

一月足厥陰脉養內屬於肝三藏血不可縱怒及疲極筋力冒觸邪風亦不可妄針灸其經三月足少陽脉養內屬於膽膽合於肝其榮於血不可驚動及針灸其經三月手心主脉養內屬右腎三焦三焦精府合腎以養精不可縱慾及悲哀觸冒寒冷亦不得針灸其經四月手少陽脉養內屬三焦三焦精府合腎以養精不可勞逸及針灸其經五月足太陰脉養內屬於脾三養肉不可妄思及飢飽觸冒里濕亦不可針灸其經六月足陽明脉養內屬於胃三為臟腑海合於脾以養肉不得雜食及針灸其經七月手太陰脉養內屬於肺三以養皮毛不可憂鬱及叫呼觸冒煩躁亦不得針灸其經八月手陽明脉養內屬於大腸合肺以養氣母食燥物致氣澁及針灸其經九月足少陰脉養內屬於腎以養骨不可懷恐及房勞觸冒生冷亦不得針灸其經十月足太陽脉養內屬於膀胱以合腎太陽為諸陽主氣故使兒脉續緩皆成六府通暢為母分氣神氣各全俟辰而生唯不說手少陰心養者蓋心為五臟大主如帝王不可有為也若將理得宜无傷胎臟更能知轉男胎教之法斯為尽善叙例于后

轉女為男法

論曰陽施陰化所以有娠遇三陰所會多生女子但懷娠三月各曰始胎血脉不流象形而變是時男女未定故令於未

滿三月間服藥方術轉令生男也其法以斧置妊婦床下繫刃向下勿令人知恐不信者令待雞抱卵時依此置窠下一窠尽出雄雞此雖未試亦不可不知凡受胎三月逐物変化故古人立胎教能令生子良善長壽忠孝仁義聰明无疾盖須十月之内常見好境象无近邪僻眞良教也如有觸忤傷胎治各有法據徐之才逐月養胎傷胎等方備則備矣事煩少用故不暇録識者當自閱今出安胎方如后

安胎飲 治妊娠胎寒腹痛或胎热多驚牽重腰痛腹滿胞急卒有所下或頓仆閃肭飲食毒物或感時疾寒热往來致傷胎臟

川芎　枳殼切麸炒去穰各一兩半　熟地黄叁兩　糯米弍合

右㕮咀每服四大錢水一盞半姜五片棗一枚金銀少許同煎七分空心服

白术散 治妊娠宿有風冷胎痿不長或失於將理動傷胎氣多致損墮常服保護胎臟

白术　川芎各四兩　川椒去合口并子炒出汗叁兩　牡礪粉煅弍兩

右爲末每服弍錢温酒米湯任調下腹痛加白芍藥心下毒痛加川芎心煩嘔吐加細辛一兩半夏二十粒湯洗入若渴者以大麥汁調服病雖愈尽服勿置味惡多阻人宜作貟服亦治室女帶下諸疾

罩胎散 治妊娠傷寒大热悶乱燥渴恐傷胎臟

捲荷葉嫩者焙乾一兩　蚌粉花半兩

右爲末每服二錢入蜜少許新汲水調下空心服

漏阻例

懷妊全假經血以養胎忽因事驚奔或從高墜下頓仆失據

或冒涉風寒觸忤邪祟致暴下血胎乾不動奔上搶心腹中急逼或血從口出皆傷胎證也

膠艾湯 治姙娠不問月數深淺因頓仆胎動不安腰腹痛或有所下或胎奔上刺心短氣安胎

熟地黃弍兩 艾葉炒 當歸 甘草炙

芍藥 川芎 阿膠炙 黃芪各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半煎七分去滓空心温服胷中逆冷加生姜五片棗三个同煎

苧根湯 治胎无故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如小豆汁者

野苧根弍兩剉炒 金銀各壹兩

右爲一剤水酒各一盞煎至一盞去滓分二服无時

桂枝茯苓貟 治婦人宿有癥瘕姙娠經斷未及三月即動此癥也經斷三月而得漏下不止胎動在臍上者爲癥痼害當去其癥又論云姙娠六月動者前三月經水利時胎下血者後斷三月不血也所以下血不止者其癥不去故也當下其癥

桂心不焙 茯苓 牡丹皮 桃仁去皮尖麸炒 芍藥各等分

右爲末煉蜜貟如彈子大每服一貟嚼細温酒米湯任下空心服

千金保生元 養胎益血安和子臟治姙娠將理失宜或因勞役胎動不安腰腹痛重胞阻漏胎惡露時下子臟挾疾久不成胎或受姙不能固養痿燥不長過年不産日月雖滿轉動无力或致損墜及臨産節適乖宜驚動太早産時未至惡露先下胎胞枯燥致令産難或横或逆痛極悶乱連日不産子死腹中腹上水冷口唇青黑吐出冷沫新産惡血上充運悶

不省喘促汗出及瘀血未尽腑腹疠痛寒热往來或因產勞損虛羸未復面黃体瘦心怔盜汗飲食不進漸成蓐勞入月常服壯氣養胎正順產理潤胎易產三後常服滋養血氣和調陰陽密腠理實腑臟治風虛除痼冷

甘草炙　貝母　桂心炒　黃芩
糯米炒　大豆卷炒各壹分　當歸酒浸一宿微炒半兩　麻子仁壹兩半別研
右爲末煉蜜貟如彈子大每服一貟温酒棗湯任下細嚼空心服

子煩證治

竹葉湯治婙娠苦煩悶者以四月受少陽相火氣以養氣若母心驚膽寒多好煩悶名子煩

防風去叉　黃芩　麥門冬去心各叁兩　白茯苓四兩
右㕮咀每服四大錢水一盞半竹葉數十片煎七分去滓温服

腹痛下利治法

當歸芍藥散治婙娠腹中絞痛心下急滿及產後血暈內虛氣乏崩中久痢常服通暢血脉不生癰瘍消痰養胃明目益津

白芍藥八兩當歸　茯苓　澤瀉四兩　白朮各弍兩　川芎肆兩一法兩半
右為末每服二錢温酒調下空心服元和紀用經云本六氣經緯圓能祛風補勞養眞陽退邪熱緩中安和神志潤澤容色散邪寒瘟疫時氣安期先生賜李少君久

餌之藥後仲景增減爲婦人懷姙腹痛本方用芍藥四兩
澤瀉茯苓川芎各壹兩當歸白朮弍兩亦可以蜜爲貟服

雞黃散 治懷身下痢赤白絞刺疼痛

雞子壹箇烏者尤妙就頭作一竅傾出青者留黃
黃丹壹錢入前雞子殼內打令黃勻以厚帋裹黃泥固濟煨取焙乾

右爲末每服二錢米飲調下一服愈是男兩服愈是女
凡冷熱斷下門中選无毒者皆可用

小便病證治

凡姙娠胎滿逼胞多致小便不利者或心腎氣不足不能使胞冷清濁相干爲諸淋病或胞系了戾小便不通名曰轉胞又胎滿尿出不知時名遺溺治之各有方

苦參貟 治姙娠小便難飲食如故

當歸 貝母炒 苦參各叁兩 滑石半兩

右爲末蜜貟小豆大米飲下二十貟无時

葵子散 治姙娠小便不利身重惡寒起則眩暈及水腫者

葵子伍兩 伏苓三兩

右爲末米湯調下弍錢匕小水利則愈 [反] 入榆白皮壹兩

八味貟 治婦人病食飲如故煩熱不得卧而反倚息以胞系了戾不得溺故致此病名轉胞但利小便則愈以八味貟中有茯苓故也方見少陰脚氣門

白薇芍藥散 治姙娠遺尿不知出時

白薇 芍藥各等分

右爲末酒服方寸匕日二三

胎水證治

凡婦人宿有風寒冷湿妊娠喜脚腫俗呼為皺脚亦有通身腫滿心腹急脹名曰胎水

鯉魚湯 治妊娠腹大胎間有水氣

白朮伍兩　芍藥　當歸各叁兩　茯苓肆兩

右㕮咀以鯉魚壹頭修事如食法煮取汁去魚不用每服藥肆入魚汁壹盞半姜七片橘皮少許煎七分去滓空心

商陸赤小豆湯 治妊娠手脚腫滿麥急

赤小豆　商陸乾等分

右㕮咀每壹兩水壹椀煎七分盞汁清服

腎着湯 治妊娠腰脚腫痛

茯苓　白朮各肆兩　乾姜炮　甘草炙各貳兩　杏仁去皮尖叁兩

右㕮咀每服四錢水一盞半煎七分去滓空心服

滑胎例

凡懷妊已滿十月形体成就神識咸備分氣趣產宜服滑胎藥

枳殼散 瘦胎易產胡防公主服效

枳殼劉麩炒去瓤黑色肆兩　甘草弐兩炙

右為末每服弐錢空心沸湯點服至七月方可服臨月忌登高厠

榆白皮散 治臨產預服滑胎

榆白皮　槐枝　瞿麥　木通　大麻仁各等分

右㕮咀每服五大錢水弐盞煎七分去滓日二服

產難證治

婦人懷妊无踰妊產頃刻之間便至夭害故以陣面健兒為比不亦危矣凡欲生產切不得喧鬧選一年高性善老娘并

純謹家人扶持不可揮霍致令產婦憂恐如腹中痛甚且令扶行或痛多陣眼中出火方是兒轉至行不得方好上蓐產自有時痛不甚者名曰弄痛須且熟忍時至自產莫妄費力定是難產切忌喪孝穢汙家人來產訖亦不可見恐傷子須依產圖方位无致觸犯禁忌為佳產圖見太醫局方

催生湯 治產婦陣踈難產經三兩日不生或胎死腹中或產母氣乏委頓產道乾澁纔覺陣痛破水便可投之

蒼朮米別浸洗弍兩 桔梗壹兩 陳皮六分 白芷 桂心
甘草炙各叁分 當歸 川烏頭炮去皮尖 乾姜炮 厚朴製
南星炮 附子炮去皮臍 半下湯洗七次 茯苓 芍藥各弍分
杏仁炒去皮尖 阿膠麩炒各弍分半 川芎壹分半 枳殼麩炒四分 南木香壹分

右為末每服一大錢溫酒下覺熱悶用新汲水調白蜜服

鉛丹 催生及難產橫逆

水銀 黑鉛一分銚內鎔投水銀結成沙子

右用熟絹巾紐出水銀細研以汗衫角紐做員子菉豆大臨坐草時香水一二員立效仍須敬仰

產科論序

世傳產書甚多千金外臺會王產宝馬氏王氏崔氏皆有產書巢安世有衛生宝集子母秘録等備則備矣但倉卒之間未易歷試惟李師聖序郭稽中產科經驗保慶集二十一篇凡十八方用之頗效但其間叙論未為至當始用料理簡辨於諸方之下以備識者非敢好辯也

產科二十一論評

第一論曰熱病胎死腹中者何荅曰因母患熱病至六七日

以致臟腑極熱煮其胎是以致死緣兒身死冷不能自出但服黑神散暖其胎須臾胎氣暖即自出何以知其胎之已死但看產婦舌色青者是其候也

黑神散

桂心　當歸　芎藭　甘草炙

乾姜炮　生乾地黃各一兩　黑豆炒去皮弍兩　附子炮去皮臍半兩

右為末每服二錢空心温酒調下一法無附子有蒲黃

評曰夫妊娠謂之重身二命係焉將理失宜皆能損胎不特病薰煮所致或因頓仆驚恐出入觸冒及素有癥瘕積聚壞胎最多候其舌青即知子死養胎論云面青舌赤母死子生唇青吐涎子母俱斃又有双懷二胎或一死一活其候尤難知自非臨歧觀變未易預述不可不備文子也然以黑神散温胎未若補助產母使其氣正免致虛之困頓胎自下矣催生湯殊勝黑神散

催生湯　治胎死腹中或產母氣乏委頓產道乾澁方見產難門第二論曰難產者何答曰胎側有成形塊為兒枕子欲生時枕破未敗血畏其子故難產但服勝金散逐其敗血即自生若橫逆並皆治之

勝金散

麝香一分　鹽豉壹兩研細　青布裹了燒令紅急以乳趁

右為末取秤趁燒紅以酒淬之調下一錢

評曰產難不只胎側有兒枕破未敗血畏凝隨其胎息因緣自有難易其如橫逆多因坐草太早努力過多兒轉未逮或已破水其血必乾致胎難轉若先露脚謂之逆先露手謂之

横法當以微針刺之使自縮入即服神應黒散以固其血必自轉生養生方云倉皇之間兩命所係不可不廣傳蓋贊黒散之功也或以塩塗兒脚底抓搔之

神應黒散 治横生逆生難産

百草霜　香白芷各等分

右爲末每服二錢童子小便好醋各一茶脚許調勺更以沸湯浸四五分服止一服見功甚者再服即分免矣一名烏金散

第三論曰胎衣不下者何荅曰母生子訖血流入衣中衣為血所脹是故不得下治之稍緩脹滿腹中以次上衝心胷疼痛喘急者但服奪命丹以逐去衣中之血二散脹消胎衣自下而无所患更有牛膝湯用之甚效録以附行

奪命丹

附子半兩炮去皮臍　牡丹皮一兩　乾漆一分搗碎炒煙尽

右為末釅醋一升大黄末一兩同熬成膏和藥梧子大温酒下五七員无時

牛膝湯 治産兒已出胞衣不下臍腹堅脹急痛甚及子死腹中不得出

牛膝酒浸　瞿麥各四兩　滑石八兩　當帰酒浸

木通各六兩　葵子五兩

右㕮咀每服三錢水兩盞煎七分去滓无時

第四論曰産後血暈者何荅曰産後氣血暴虚未得安淨血隨氣上迷乱心神故眼前生花極甚者令人悶絶不知人口噤神昏氣冷醫者不識呼為暗風若作此治之病必難愈但

服清鬼散自差

清鬼散

澤蘭葉　人參各一分　荊芥穗一兩　川芎半兩

右為末溫酒熱湯各半盞調一錢急灌之下咽即開眼氣定省人事

評曰產後眩暈須刻害人須量虛实為治若胷中宿有痰飲阻病不除產後多致眩暈又血盛氣弱氣不使血逆而上攻此等皆非清鬼可療瘀暈仍用半下茯苓湯血壅須用牡丹散但駃藥尤難輙用當識輕重所謂擾乎可擾〻亦无擾若氣血平人因去血多致暈者芎藭湯尤佳

半夏茯苓湯 方見惡阻門

牡丹散 治產後血暈悶絕狼狽若口噤則拗開灌之必效

牡丹皮　大黃蒸　芒消各一兩　冬瓜子半合　桃仁叁柒立去皮尖

右㕮咀每服五錢水三盞煎至一盞半去滓入芒消再煎分二服欲產先煎下以備緩急金匱以此治腸癰但分兩少異

芎藭湯 方見眩暈門

第五論曰產後口乾痞悶者何荅曰產後榮衛大虛血氣未定食麪太早胃不能消化麪毒結聚於胃脘上熏胷中是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識認為胷膈壅滯以藥下之万不得一但服見現員

見現員

姜黃　京三稜炮　蓽澄茄　陳皮

人參　良姜　蓬朮炮各叁兩

右為末用蘿蔔慢火煮爛研細將汁煮麪糊貝如梧子大用蘿蔔湯下三十九

評曰產後口乾痞悶未必止因食麪或產毋內積憂煩外傷燥熱飲食甘辛使口乾痞悶當隨其所因調之可也煩心宜四物湯去地黃加人參烏梅煎若外傷燥熱看屬何經當隨經為治雖以偷牟飲食所傷見現貝却能作效

四物湯 方見第六論

第六論曰產後下寒下熱者何荅曰陰陽不和敗血不散能下熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞臟腑血弱不得宣越故令敗血不散入於脾則寒醫人若誤作瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹

又問二者何以別之荅曰時有刺痛者敗血但寒熱无它證者陰陽不和增損四物湯不一皆隨病加減

增損四物湯

當歸 人參 芍藥 川芎 乾姜炮各壹兩 甘草炙四分

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片煎六分去滓熱服无時評曰下寒下熱榮衛不和雖以輕議若其敗血不散豈止入脾肺二臟邪大抵一陰閉一陽即下寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣与衛氣解則休遇再會而復作大調經散五積散入醋煎佳

大調經散 治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯榮衛不調陰陽相乘憎寒發熱或自汗或腫滿皆氣血未平之所為也

大豆妙去皮壹兩半 茯神壹兩 真琥珀壹分

右為末濃煎烏豆紫蘇湯調下

五積散 方見傷寒太陰經入醋煎佳

第七論曰產後四肢浮腫者何荅曰產後敗血乘虛停積於五臟循經流入四肢留淫日深却還不得腐壞如水故令四肢面目浮腫醫人不識便作水氣治之凡治水氣多用導水藥極虛人夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往〻因致夭枉但服調經散血行腫消即愈

調經散

沒藥 別研　琥珀 別研　桂心　赤芍藥

當歸 各等分　細辛　麝香 別研各半分

右為末每服半錢匕生姜汁溫酒各少許調勻服

評曰產後浮腫多端有自壞姙腫至產後不退者亦有產後失於將理外感寒暑風濕內作喜怒驚憂血与氣搏留滯經絡氣分血分不可不辨要當隨所因脉證治之宜得其情調經散治血分固效但力淺難憑不若吳茱萸湯枳朮湯奪魂散大調經散皆要藥也

加減吳茱萸湯 治婦人臟氣本虛宿挾風冷胷鬲滿痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡寒戰慄或泄利不止少氣羸困及因生產臟氣暴虛邪冷內勝宿疾轉甚

吳茱萸 湯洗七次炒壹兩半　桔梗　乾姜 炮　甘草 炙

麥門冬 去心　防風　細辛　當歸 酒浸炒

半下 湯洗七次　茯苓　牡丹皮　桂心 各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半煎七分去滓空心熱服

枳朮湯 治心下堅大如盤边如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實麩炒去穣壹兩半　白朮叁兩

右㕮咀每服四錢水壹盞半煎七分去滓温服腹中軟即散

奪命散　治婦人産後虚腫喘促利小便則愈

生姜取汁　白麪各叁兩半下　七个湯洗去滑破

右以生姜汁搜麪裹半下為七餅子炙焦熟為末熟水調一錢小便為效

大調經散　最治産後腫滿喘急煩渴小便不利　方見第六論

第八論曰産後不見鬼神者何荅曰心主身之血脉因虚傷耗血脉心氣則虚敗血停積上干於心心不受觸遂致心中煩躁卧起不安不見鬼神言語顛倒醫士不識呼為血邪如此治之必不得愈但服調經散每服加龍腦一捻得睡即安

調經散　方見第七論

第九論曰産後不語者何荅曰人心有七孔三毛産後虚弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞舌亦強矣故令不語如此但服七珍散

七珍散

人參　生乾地黄　細辛　壹分　防風　石菖蒲　川芎各壹吉

朱砂　別研各半兩

右為末每服一錢薄荷湯調下无時

第十論曰産後腰痛又瀉痢者何荅曰産後腸胃虚怯寒邪易侵若未滿月飲冷當風乘虚襲留於肓膜散於腹脇故腰痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞泄腸鳴或下赤白胨膿腹脹或走痛不定急服調中湯立愈若醫者以為積滯取之則禍不旋踵謹之謹之

調中湯

高良姜　當歸　桂心　芍藥

附子炮　川芎各壹兩　甘草半兩

右㕮咀每服三錢匕水三盞煎一盞去滓热服

評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之既云飲冷當風何所不至寒热風湿本属外因喜怒憂思還從自性況劳逸飢飽皆能致病若其洞泄可服調中赤白帶下非此能愈各隨門類別有正方今録桃膠散白頭翁湯以備用餘從滯下門中選用之

沉香桃膠散 治產後利下赤白裏急後重疞刺疼痛等證

桃膠瓦上焙乾　沉香　蒲黃紙隔炒各等分

右爲末每服二錢陳米飲調下空心

白頭翁湯 治產後下利虛極

白頭翁　甘草炙　阿膠各弍兩　黃連

蘗皮去麄皮　秦皮去麄皮各叁兩

右㕮咀每服四錢水一盞半煎七分去滓空心服

第十一論曰產後遍身疼痛者何荅曰產後百節開張血脉流走遇氣弱則經絡分肉之間血多留滯累月不散則骨節不利筋脉急引故腰背不得轉側手脚不能動搖身热頭痛也若醫以爲傷寒治之則汗出而筋脉動搖手足厥冷変生它病但服趂痛散以默除之

趂痛散

牛膝酒浸　甘草炙　薤白各壹分　當歸　桂心

白朮　黃芪　獨活　生姜各半方

右叹咀每服半两水五盏煎至三盏去滓食前分二次热服

評曰趣痛散不特治產後氣弱血滯兼能治太陽經感風頭疼腰背痛自汗發热若其感寒傷食憂恐驚怒皆致身疼發热頭痛況有虚勞諸證尤其趣痛散皆不能療不若五積散入醋煎用却不妨

五積散 方見傷寒太陰經

第十二論曰產後大便秘澁者何荅曰產卧水血俱下腸胃虚竭津液不足是以大便秘澁不通也若過五六日腹中悶脹者此有燥糞在臟腑以其乾澁未能出耳宜服麻仁丸以津潤之若誤以有热而投以寒藥則陽消陰長變動百出性命危矣

麻仁丸

麻仁 研 枳殼 麩炒 人參 大黄 各等分

右為末蜜丸如梧子大空心温酒下二十九未通加九数

評曰產後不得利三者百无一生去血過多藏燥大便秘澁則固當滑之大黄似難輕用唯葱涎調臘茶為良復以葱茶下之必通

阿膠枳殼丸 治產後虚羸大便秘澁

阿膠 枳殼 麩炒去穰等分

右為末蜜丸如梧子大別研滑石為衣温水下二十九

第十三論曰產後血崩者何荅曰產卧傷耗經脉未得平復而勞役損動致血暴崩淋瀝不止或因鹹酸不節傷蠹榮衛氣衰血弱亦令崩中若小腹滿痛用經已壞為難治急服固經丸以止之

艾葉　赤石脂煅　補骨脂炒　木賊各半兩　附子壹个炮去皮臍

右為末陳米飲和貟梧子大食前温酒米湯下二十丸

評曰血崩不是輕病況産後有此是謂重傷恐不止鹹酸不節而能致之多因憂驚怒恚藏氣不平或産後服斷血藥早致惡血不消欝滿作堅亦成崩中固經貟似難責效不若大料煮芎藭當歸加芍藥湯候定續次隨證合諸藥治之為得

芎藭當歸加芍藥湯　方見眩暈門加芍藥等分

第十四論曰産後腹脹悶嘔吐不定者何荅曰敗血散於脾胃脾受之不能運化精微而成腹脹胃受之則不得受納水穀而生吐逆醫者不識者以尋常治脹止吐藥療之病与藥不相干轉更傷動止氣疾愈難治但服抵聖湯

抵聖湯

赤芍藥　半夏湯洗七次　澤蘭葉　人參

陳皮各貳分　甘草炙壹分

右㕮咀作一剤水二椀姜半兩煎至兩盞去滓分三次熱服

第十五論曰産後口鼻黑氣起及鼻衄者何荅曰陽明者經脉之海起於鼻交頞中還出俠口交人中左之右二之左産後氣消血散榮衛不理散乱入於諸經却還不得故令口鼻黑起及変鼻衄此縁産後虚熱変生此證其疾不可治名胃絶肺敗此證不可治不出方

第十六論曰産後喉中氣急喘者何荅曰榮者血也衛者氣也榮行脉中衛行脉外相隨上下謂之榮衛因産所下過多榮血暴竭衛氣无主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絶陰為難治若惡露不快敗血停凝上薰於肺亦令喘急但服奪命

丹血去喘息自定

奪命丹 方見第二論

評曰産後喘急固可畏若是敗血上薰於肺猶可責效奪命丹若感風寒或因憂怒飲食鹹冷等奪命丹未可均濟況孤陽絶陰乎若榮血暴絶宜大料煑芎藭湯亦自可救傷風寒宜旋覆花湯性理鬱發宜小調經散用桑白皮杏仁煎湯調下傷食宜見現貟五積散

芎藭湯 方見眩暈門

旋覆花湯 治産後傷風感寒暑湿欬嗽喘滿痰涎壅塞坐卧不寧

旋覆花 赤芍藥 半下麯 前胡 麻黄去根煎

荆芥穗 五味子 甘草炙 茯苓 杏仁各等分

右㕮咀每服四大錢水一盞半姜五片棗一个煎七分去滓空心

大調經散 方見第七論

五積散 方見傷寒太陰經入醋煎

見現貟 方見第五論

第十七論曰産後中風者何荅曰産後五七日内強力下床或一月之内傷於房室或懷憂發怒擾蕩冲和或因着艾傷動臟腑得病之初眼澁口噤肌肉瞤搐漸至腰脊筋急強直者不可治此乃人作非偶尓中風所得也

評曰問産後中風〻是外邪血虚則或有中之者直荅以人作不可治問荅不相領解如何開示後人立論之難有如此者若是中風當以脉辨看在何藏依經調之強力下床月内房室憂怒着炙非中風類蓐勞性氣火邪治各有法非産後病不暇繁引文字者識之

第十八論曰産後心痛者何荅曰心者血之主人有伏宿寒因産大虚寒搏於血〻凝不得消散其氣遂上衝擊於心之絡脉故心痛以大岩蜜湯治之寒去則血脉温而經絡通心痛自止若誤以為所傷治之則虚極寒益甚矣心絡寒甚傳心之正經則変為真心痛朝發夕死夕發朝死藥不可輕用如此

大巖蜜湯

熟乾地黄　當帰　獨活　吳茱萸湯　乾姜炮

芍藥　桂心　甘草炙　小草各壹两　細辛半两

右剉散每服半两水三大盞煎至一盞去滓微热服

評曰産後心痛雖非産蓐常病庸或有之九痛未必便是血痛設是岩蜜湯豈可用熟地黄熟地黄泥血安能去痛此方本出千金用生乾地黄耳茱萸一升合准五两乾姜三两細辛治陳寒在下焦方本一两却減作半两制奇制耦量病淺深自有品数不可妄意加減然以岩蜜湯治血痛不若失笑散用之有效

失笑散　治心腹痛欲死百藥不效服此頓愈

五靈脂　蒲黄微炒各等分

右為末先用醶醋調二錢熬成膏入水一盞煎七分食前热服

第十九論曰産後热悶氣上轉為脚氣者何荅曰産卧血虚生热復因春夏取涼過多地之蒸湿因足履之所以著而為脚氣其状热悶掣瘲驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也可服小續命湯两三剤必愈若醫者誤以逐敗血藥攻之則血去而疾益增劇

小續命湯 方見中風門

評曰脚氣固是常病未聞產後能轉為者往三讀千金見有產婦多此疾之語便出是證文辟害意可槩見矣設是挩悶氣上如何令服續命湯此藥本主少陽經中風非均治諸經脚氣要須依脚氣方論陰陽經絡調之此涉專門未易輕論

既非產後要病更不繁引

第二十論曰產後汗出多而變痙者何荅曰產後血虛肉理不密故多汗因遇風邪搏之則變痙也痙者口噤不開背強而直如發癎狀搖頭馬鳴身反折須臾十發氣息奄奄絶宜速斡口灌小續命湯稍緩即汗出如雨手拭不及者不可治

小續命湯 方見中風門

評曰產後汗出多變痙亦令服續命湯此又難信既汗多如何更服麻黃官桂防已黃芪輩不若大豆紫湯為佳大醫局方大聖散亦良藥也

大豆紫湯 方見眩暈門

第二十一論曰產後所下過多虛極生風者何荅曰婦人以榮血為主因產血下太多氣无所主唇青病冷汗出目瞑神昏命在須臾此但虛極生風也如此則急服濟危上丹若以風藥治之則誤矣

濟危上丹

乳香　太陰玄精石　五靈脂

陳皮　桑上寄生　阿膠炒　硫黃

右將上四味同研勻石器內微火炒勿令焦了再研極細後入餘藥為末用生地黃汁和九梧子大溫酒或當

歸酒下二十丸空心服

評曰所下過多傷損虛竭少氣唇青肉冷汗出神昏此皆虛脫證何以謂之生風〻是外淫必因感目中傷經絡然後發動臟腑豈能自生風也虛之說盖因脉經云浮為風為虛此乃兩病合說在人迎則為風在氣口則為虛後文字无識便謂風虛是一病謬濫之甚文字者當知

右保慶集二十一論人用既多因評其說仍將得效方附行外有產科諸證併叙于后

三因極一病證方論卷之十七

三因極一病證方論卷之十八

蓐勞證治

婦人因產理不順疲極筋力憂勞心慮致虛羸喘乏寒熱如瘧頭痛自汗肢体倦怠欬嗽痰逆腹中刺痛名曰蓐勞

石子湯治蓐勞

猪腎一對去脂膜四破无則以羊腎代之　香豉　葱白

粳米　當歸　芍藥各二兩

右剉散分兩剤每一剤用水叁升煑取一小椀去滓分三服任意服

陰脫證治

婦人趣產勞力努嚥太過致陰下脫若脫肛狀及陰下挺出逼迫腫痛牽重房勞皆能發作清水續〻小便淋露

硫黃散 治產後勞陰脫

硫黃　烏賊魚骨各半兩　五味子壹分

右為末摻患処

當歸散 治陰下脫

當歸　黃芩各二兩　芍藥一兩一分　蜱皮燒存性半兩　牡蒙根二兩半

右為末每服二錢温酒米湯任意調下忌登高牟重

尉法

單炒蛇床子乘热布裹熨患処亦治產後陰痛

桃仁膏 治產後陰腫妨悶

桃仁去皮尖　枯礬　五倍子各等分

右以下二味為末研桃仁膏拌勻傅之

硫黃湯 治產勞玉門開而不閉

硫黃四兩　吳茱萸　兔絲子各一兩半　蛇床子

右剉散每服四錢水一椀煎數沸濾滓洗玉門日再洗

下乳治法

產婦有三種乳脉不行有氣血盛而壅閉不行者有血少氣弱澁而不行者虛當補之盛者當用通草漏芦土瓜根輩虛用當用成煉鍾乳粉猪蹄鯽魚之属槩可見矣

漏芦散 治乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滞乳内脹痛留蓄邪毒或作癰腫此藥服之自然内消乳汁通行

漏芦二兩半　蛇蛻炙一拾條　瓜蔞一十枚急火燒存性

右為末每服二錢温酒調下无時仍嗽棗姜湯助之

成煉鍾乳散 治乳婦氣少血衰脉澁不行乳汁絶少

右成鍊鍾乳粉研細每抄二錢濃煎漏芦湯調下

母猪蹄湯 治如前

母猪蹄壹隻治如食法　通草四兩

右以水一斗浸煮熟得四五升取汁飲不下再作

青桑膏 治乳硬作痛

嫩桑葉生採研細

右米飲調攤紙花貼病処千金云凡患乳癰四十已下可治五十已上不可治二之則死不治自得終其天年

惡露證治

産後兒枕不散乃血瘕堅聚按之攫手日晡增劇疼痛淋露不快上攻心胷困頓狼狽宜服黑龍丹當帰湯奪命丹治之

黑龍丹 治産後一切血疾垂死者但灌藥无有不效者神驗不可言

當帰　五靈脂　高良姜　乾地黄生者　川芎各一兩

並細剉入一椽頭沙合内赤石脂泥縫紙筋塩泥固済封合炭火十斤煅通紅去火候冷開取合子看成黒糟乃取出細研入後藥

百草霜別研五兩　硫黄　乳香各一分半　花乳石　琥珀各一分

右為末米醋煮糊貟如弾子大每服一丸炭火燒通紅生姜自然汁与无灰酒各一合小便半盞研開頓服立效

當帰湯 治産後敗血不散兒枕硬痛或發或止及新産乘虚風寒内搏悪露不快臍腹堅脹

當帰微炒　鬼箭取羽用　紅藍花各一兩

右剉散每服三錢酒一大盞煎七分去滓食前温服

奪命丹 方見前第二論

虛煩證治

產辱最難調理所以忌問男女及不許見穢惡者皆古人預防其妄念也每見婦人以得男則喜得女則憂〻喜太早致心虛煩悶多自此始蓋去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱內熱日煩其證心胷煩滿吸〻短氣頭痛悶乱骨節疼痛晡時輙甚与大病後虛煩相類

人參當歸湯 治產後煩悶不安

人參 當歸 麥門冬去心 乾地黃 桂心各一兩 芍藥二兩

右剉散每服四大匁水二盞先將粳米一合淡竹葉十片煎至一盞去米葉入藥升棗三枚煎七分去滓食前服地黃宜用生乾者虛甚則用熟者

蒲黃散 治產後虛煩必效

蒲黃不拘多少帋上炒 每服一錢匕東流水調下无時

虛渴證治

產後去血過多津液不回腎氣虛弱多使人煩渴引飲无度雖非三消其證頗同治之當養血通氣回津補腎方效

熟地黃湯 治產後虛渴不止少氣脚弱眼昏頭眩飲食无味

熟乾地黃壹兩 人參叁兩 麥門冬弍兩 括樓根四兩 甘草半兩

右㕮咀每服四錢水二盞糯米一撮姜三片棗三枚煎七分去滓食前服

六氣經緯貟 治同前 方見前姙娠腹痛門

淋閉證治

諸治產前後淋閉其法不同產前當安胎產後當去血如其冷熱膏石氣淋等為治則一但量其虛實而用之瞿麥蒲黃

最為產後要藥唯當尋其所因則不失機要矣

茅根湯 治產後諸淋无問冷热膏石結氣悉主之

白茅根捌兩生 瞿麥穗 白茯苓各四兩 蒲黃

桃膠 滑石 甘草炙各壹兩 子貝拾个燒

葵子 人參各弍兩 石首魚腦骨弍拾个燒

右剉散每服四大錢水一盞半姜三片灯心弍拾莖煎七分去滓温服亦可為末煎木通湯調下弍錢如氣壅閉木通橘皮煎湯調下

產後雜病治法

當歸養血貟 治產後惡血不散發渴疼痛及惡露不快臍腹堅脹兼室女經候不勻赤白帶下心腹腰脚疼痛

當歸 赤芍藥 牡丹皮 玄胡索各弍兩炒 桂心壹兩

右爲末蜜貟梧子大温酒米飲下三貟五貟食前温服痛甚細嚼咽下

四神散 治產後留血不消積聚作塊急切疼痛猶如遁尸及心腹絞痛下利

當歸 芍藥 川芎 乾姜炮各等分

右爲末每服方寸匕温酒調下

丁香散 治產後咳逆

石蓮肉十个去心炒 丁香拾枚

右為末水半盞煎數沸服

當歸黃芪湯 治產後腰脚疼痛不可轉側壯热自汗身体強氣短

黃芪 芍藥各弍兩 當歸叁兩

右剉散每服四大錢水一盞半姜五片煎七分去滓食前温服

竹葉湯 治産後傷風發熱面正赤喘而頭痛

乾葛 叁分　防風　人參　甘草 炙各一分　桔梗　桂心　附子 炮去皮臍半兩

右剉散每服四錢水一盞半姜五片棗三个竹葉十片煎七分去滓空心服嘔者加半夏

神授散 治婦人産後一切疾病不問大小以至危篤不能者

牡丹皮　白芍藥　桂心　陳皮　青皮 各半兩　當歸　百合 水浸川芎　甘草 炙　乾姜 炮各壹兩　人參　神麯　麥蘗 各叁錢炒　紅花 壹錢半

右為末每服二錢水一盞半姜三片棗一个煎七分空心

服孕婦勿服

調補法

産後氣血既衰五臟俱損唯得將補不可轉利雖惡血未尽亦不可便服補藥須候七日外臍下塊散方可投之若痛甚切者或崩傷泄利虛羸喘急之別生它疾帶起宿患宜尋閱諸方審詳調理不必拘以日數也如黒神散却不妨

黒神散 治産後諸疾

當歸　白芍藥　甘草 炙　白姜 炮　桂心　熟地黄　黒豆 炒去皮　蒲黄 各等分

右為末温酒或小便任意調下空心服忌如常

一法 去蒲黄加附子

四順理中貞 治新産氣血俱傷五臟暴虛肢体羸乏少氣多

汗纔産直至百晬每日常服壯氣補虛調養臟氣蠲除餘疾消穀嗜食兼治産後臟虛嘔吐不止

甘草炙弍兩　人參　白朮　乾姜炮各等分

右為末蜜圓梧子大每服三十丸米飲下空心食前服

當歸建中湯 治産後勞傷虛羸不足腹中疞痛吸〻少氣小腹拘急痛連腰背時自汗出不思飲食産訖直至滿月每日三服令人下壯殆健

當歸肆兩　桂心叁兩　白芍藥陸兩　甘草炙弍錢

右剉散每服四大錢水一盞半姜三片棗二枚煎七分去滓入飴糖一塊再煎消服崩傷內衄加阿膠地黃煎

濟陰丹 治産後百病百日內常服除宿血養新血方見後

人參養血員 治産後出月羸瘦不復常方見後

羊肉湯 治産後腹中疼痛虛勞不足裏急脇痛并治寒疝

當歸叁錢　生姜壹兩壹分　精羊肉肆兩　橘皮半兩

右剉散水三椀酒少許煎至一椀去滓分弍服或少加葱塩亦佳

婦人女子衆病論證治法

婦人三十六病未論所述名品不同或云七癥八瘕九痛十二帶下共三十六雖有名数不見證狀又論云十二癥者是所下之物不同一如清血二黑血三紫汁四赤肉五膿痂六豆汁七葵羹八凝血九清盃十米泔十一如月浣十二經不應期九痛者熱傷痛冷澁痛淋瀝痛小便時痛經來時痛脇脹痛汁出如虫嚙痛脇下分痛腰胯折痛七害者窮孔不利陰中寒熱小腹急堅臟內不仁子門揭瞤洞泄惡吐五傷者

兩脇支滿心引脇痛氣結不通邪思洩利前後痼寒三痼者羸瘦不生肌斷緒不乳產經水閉塞亦名三十六病名品雖殊无非血病多因經脉失於將理產辱不善調護內作七情外感六淫陰陽勞逸飲食生冷遂致榮衛不輸新陳干忤隨經敗濁淋露凝滯為癥為瘕流溢穢惡痛害傷痼犯時微若秋毫作病重如山岳古人所謂婦人之病十倍男子雖言之太過亦明戒約之切也

白垩丹 治婦人三十六病崩中漏下身瘦手足熱惡風怯寒咳逆煩滿拘急短氣心脇腰背腹肚与子臟相引痛溺下五色心常恐惧遇恚怒憂勞即發皆是內傷所致

白垩煅 白石脂煅 禹餘粮煅醋淬 牡砺煅 烏賊魚骨
龍骨煅 細辛各壹兩 當歸 芍藥 黃連 桂心
白茯苓 乾姜炮 人參 石韋去毛 瞿麥穗
白芷 附子炮去皮脐 甘草炙 白斂各壹兩 川椒炒去汗半兩

右為末蜜貟梧子大空心酒下三十丸至五十丸

濟陰丹 治婦人久冷无子及數經墮胎皆因衝任之脉虛損胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白濁以上疾證皆令孕育不成以至絕嗣此藥治產後百病百日內常服除宿血生新血令人有孕及生子充實亦治男子亡血諸疾

木香炮 茯苓 京墨燒 桃仁炒去皮尖各壹兩 秦艽
甘草炙 人參 桔梗 石斛酒浸 蚕布燒
藁本各弍兩 當歸 桂心 乾姜炮 細辛

牡丹皮　川芎各壹兩半　川椒炒出汗　山藥各叁分　澤蘭
熟地黃　香附炒各半兩　蒼朮捌兩　大豆卷半升　糯米炒壹升
右爲末蜜員每兩作六九每一九嚼細食前温酒醋湯任下

烏雞煎　治婦人百病

吳茱萸醋煮良姜　白芜炮　當歸
延胡索炒　赤芍藥　破故紙炒　川椒
生乾地黃　劉寄奴　蓬莪朮　橘皮
青皮　川芎各壹兩　荷葉灰半兩　白艾用糯米飲調餅二兩
右爲末醋糊員如梧子大每服三五十丸湯使干后
月經不通紅花蘇木酒下　白帶牡礪粉調酒下
子宮久冷白茯苓煎湯下　赤帶建茶清下

血崩豆淋酒調綿灰下　胎不安蜜和酒下
腸風陳米飲調百草霜下　心疼菖蒲煎酒下
漏阻下血烏梅温酒下　耳聾蝸點茶湯下
胎死不動班猫三十个煎酒下　腰脚痛當歸酒下
胞衣不下芸臺研水下　頭風薄荷點茶下
血風眼黑豆甘草湯下　生瘡地黃湯下
身体疼痛黃芪末調酒下　四肢浮腫射香湯下
咳嗽喘痛杏仁桑白皮湯下　腹痛芍藥調酒下
產前後痢白著白芜湯下　赤者甘草湯下雜者二宜
湯下　常服温酒醋湯任下並空心食前服

延齡丹　治婦人衆病无所不治

熟地黃　川芎　防風　檳榔　羌黃炒

蝉退洗　柏子仁研別　馬牙消燒　人參　黃芪
白薇　川椒各半兩　鯉魚鱗燒晚蚕沙炒當歸
木香炮　附子炮去皮臍　石膏煅　澤蘭各壹兩　藁本
厚朴姜製炒　甘草炙　白姜炮各壹兩半　吳茱萸洗　紅花炒各壹分
右為末煉蜜搜和杵數千下貟如彈子大每服一丸具湯使如后

血瘕塊痛綿灰酒下
血勞血虛桔梗酒下
血氣痛炒白姜酒下
血暈悶絶胎死腹中胞衣不下並用生地黃汁童子小便酒各一盞煎三沸調下常服醋湯溫酒化下並空心食前服

催生溫酒細嚼下
血崩櫻櫚灰酒下
血風荆芥酒下

交感地黃煎貟　治婦人產前產後眼見黑花或即發狂如見鬼狀胞衣不下失音不語心腹脹滿水穀不化口乾煩渴寒热往来口内生瘡咽中腫痛心虛忪悸夜不得眠產後中風角弓反張面赤牙關緊急崩中下血如豚肝狀臍腹疙痛血多血少結為癥瘕恍惚昏迷四肢腫滿產前胎不安產後血刺痛

生地黃式斤研以布裂取汁留滓　延胡索糯米内炒赤色去米壹兩
生姜式斤洗研如上法以生姜汁炒地黃滓各至乾堪為末則止
當歸壹兩　蒲黃四兩炒香　南番琥珀壹兩別研

皺血貟　調補衝任溫煖血海治胞絡傷損宿瘀乾血不散受胎不牢多致損墮常服去風冷益血

當歸　牛膝酒浸　延胡索妙　芍藥
茜香　蒲黃紙炒妙　香附去毛　蓬莪朮煨
菊花　熟地黃　桂心各貳兩為末　烏豆壹升醋煮為末

右再入醋二椀煮豆未至一椀留在作糊為貟如梧子大酒飲任下五十九

人參養血貟　治女人稟受怯弱血氣虛損常服補衝任調血脉宣壅破積退邪熱除寒痺緩中下堅脹安神潤顏色通氣散悶兼治婦人懷身腹中絞痛口乾不食崩傷眩暈及產出月羸瘦不復常者

人參　赤芍藥　川芎　蒲黃妙各壹兩
當歸貳兩　熟地黃伍兩　烏梅肉叁兩

右為末蜜搜杵數千下貟如梧子大每服五十九至百九温酒米飲任下食前

四物湯　調益榮衛滋養血氣治衝任虛損月水不調臍腹疼痛崩中漏下血瘕塊硬發歇疼痛姙娠宿冷將理失宜胎動不安血下不止及產後乘虛風寒內搏惡露不下結生瘕聚小腹堅痛時作寒熱又治血藏虛冷崩中去血

熟地黃　當歸酒浸洗　川芎　白芍藥各等分

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓空心服忌葱蘿蔔

温經湯　治衝任虛損月候不勻或來多不斷或過期不來或崩中去血過多不止及治曾經損墮損姙娠瘀血停蓄小腹中痛發熱下利手心煩熱唇口乾燥治小腹有寒久不受胎

半夏湯洗七次去滑　當歸酒浸一宿　川芎　人參
白芍藥　牡丹皮　桂心　阿膠蛤粉炒
甘草炙各弍兩　吳茱萸湯洗炒叁兩　麥門冬去心五兩

右剉散每服三錢水一盞半姜五片煎八分去滓空心熱服

牡丹散治血虛勞倦五心煩熱肢体疼痛頭目昏重悒悒頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相搏月水不利脐腹脹痛寒熱如瘧又治室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肢体羸瘦漸成骨蒸

牡丹皮　芍藥　桂心　甘草一半鹽湯浸炙一半生用
沒藥別研　玄胡索　當歸　紅花
陳皮　蘇木　鬼箭　蓬朮炮各壹分　乾漆炒弍分

右為末每服二錢白水煎七分忌生冷

伏龍肝散治氣血勞傷衝任脉虛經血非時忽然崩下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白相兼腎腹冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢无力虛煩驚悸使人无子

伏龍肝　赤石脂煅醋淬　牡砺煅取粉
烏賊骨取粉　禹餘粮煅醋淬　桂心各等分

右為末空心酒飲任調下二錢白多加牡砺烏賊骨赤多加赤石脂禹餘粮黃多加伏龍肝桂心隨病加之

一法有龍骨

又煎貞治崩傷淋瀝小腹滿痛常服補榮衛固經脉
食茱萸湯洗各七錢半　熟地黃　白芍藥各壹兩半

石菖蒲炒 川芎 人參各壹兩 熟艾肆兩用糯米飲調作餅焙

右為末酒煮糊貟梧子大每服五十丸酒飲任下

滋血湯 治婦人血風血熱血虛經候澁滯經脉不通四肢麻木肌体渾身疼痛倦怠將成勞瘵

馬鞭草取穗 荊芥穗各四兩 桂心 當歸

枳殼湯浸麸炒 赤芍藥 川芎各弍兩 牡丹皮一兩

右㕮咀每服四大錢水一盞半烏梅一枚煎七分去滓空心服

抵當湯 治婦人經水不利

水蛭剉炒 䗪虫去翅足各炒叁拾个 桃仁三十七个炒去皮尖 大黃蒸三錢叁字

右麄末每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服血未利更服又治男子有瘀血膀胱痛

萬病貟 治室女月經不通臍下堅結大如杯升發熱往來下痢羸瘦此為血瘕若生肉癥不可爲也血瘕亦作氣瘕此即石瘕證也

乾漆杵細炒令火煙出煙頭青白一時久 牛膝酒浸一宿各壹兩六錢 生地黃四兩八分取汁

右以地黃汁入下二味為末慢火熬俟可貟即貟如梧子大空心米飲或溫酒下二丸日再勿妄加病去止藥婦人氣血虛經不行若服破血行經藥是殺之也謹之

礬石兌貟 治婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血下白物

礬石叁分燒 杏仁一分去皮尖炒

右研杏仁細入礬灰加少蜜貟如棗大綿裹納陰中未知再作

三稜煎 治婦人血癥血瘕食積痰滯

三稜 蓬茂各四兩 青皮 半下湯洗七次 麥蘖各叁兩

右用好醋六升煑乾焙為末醋糊貟梧子大醋湯下三四十丸痰積姜湯下

烏金散 治婦人血氣血癥血風勞心煩躁筋骨疼痛四肢困瘦

好黑豆拾兩 沒藥 當歸各半兩洗焙乾為末

右先將黑豆不犯水淨拭用沙瓶一隻入豆在內以瓦片盖塩泥固濟晋觜通氣炭火二斤煅煙尽存性以塩泥塞瓶觜退火次日取出豆如鵶翼研細方入後末研勻不以時温酒調下二錢重者不過三五服忌鯉魚毒肉水母之類

烏喙貟 治腸覃病因寒氣客於腸外与胃氣相薄正氣不榮繫瘕內着惡氣乃起其生也始如雞卵久二乃成狀如懷胎按之堅推之即移月事時下故曰腸覃亦治乳餘疾大小便不利并食有伏虫臚脹癰疽毒腫久寒邪热

烏喙炮去皮尖二分 半夏湯洗七次四分 石羔煅 牡蒙 藜芦炒

蓯蓉酒浸各一分 乾姜炮 桂心各一分三字 巴豆六七个別研

右為末蜜貟菉豆大每服三五丸食後酒飲任下治男子疝痛

木香散 治婦人脾氣血氣血蠱氣蠱水蠱石蠱

木香 沉香 乳香研 甘草炙各乙分 川芎

胡椒 陳皮 人參 晋礬各半兩 桂心

乾姜炮 縮砂各一兩 茴香炒一兩半 天茄五兩赤小者日乾秤

右洗焙為末空心日午温米飲調下二分忌羊肉

石莖散 治婦人血結胞門或為癥瘕在腹脇間心腹脹滿腫急如石水狀俗謂之血蠱

石莖一兩　當歸尾　馬鞭草　紅花炒
烏梅肉各半兩　蘇木節　三稜炮　蓬茂炮
沒藥　琥珀別研各一分　甘草炙一分
右末濃煎蘇木酒調下二分不飲酒姜棗煎湯調亦得

大腹皮飲 治婦人血癭單二腹腫
大腹皮　防已　木通　栝樓　黃芪　厚朴姜制
桑白皮炙　枳殼麩炒　陳皮　大黃蒸二　五味子　青皮各等分
右剉散每服秤一兩水一椀煎六分去滓入酒一分溫
服无时

大黃甘遂湯 治婦人小腹滿如敦二狀小便微難而不渴產
後者為水与血并結在血室也
大黃四兩蒸　甘遂炮　阿膠炒各二兩

右剉散每服三分水一盞煎七分去滓溫服其血當下

小柴胡湯 治婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適
斷此為热入血室其血必結故使如瘧狀發作有時
方見少陽經傷風傷寒門云傷風必須有汗宜加桂心

小麥湯 治婦人藏躁喜悲傷欲哭狀若神靈所作數呻欠
小麥一升　甘草三兩
右剉散每服半兩水二盞棗四枚煎六分去滓空心溫
服亦補脾氣

牡丹貟 治婦人月病血刺疼痛方見疝氣門

黃芪五物湯 治婦人血痺方見痺門

竹茹湯 治婦人汗血吐血尿血下血
熟地黃　竹茹各三兩　人參　白芍藥　桔梗

川芎　當歸　甘草炙　桂心各一兩

右剉散每服四分水一大盞煎七分去滓无时服

膏髮煎 治婦人穀氣实胃氣下泄陰吹而正喧

頭髮灰　猪脂

右調匀綿裹如棗核大納陰中

䘌瘡證治

凡婦人少陰脉数而滑者陰中必生瘡名曰䘌瘡或痛或痒如虫行状淋露膿汁陰蝕幾尽皆由心神煩鬱胃氣虛弱致氣血畱滯故經云諸痛痒瘡皆属心又云陽明主肌肉痛痒皆属心治之當補心養胃外以薰洗坐導藥治之乃可

補心湯 方見心臟虛实門

狼牙湯 治婦人陰中蝕瘡爛潰膿水淋漓臭穢

狼牙一味剉濃煎汁以綿纏筋頭大如蛮浸濃汁瀝陰中日数次

雄黃兌散 方見狐惑門凡蝕於肛者单燒雄黃熏之蝕於下部則咽乾苦參湯洗

養胃湯 方見五痿門

小兒論

凡小兒病与大人不殊唯回氣臍風夜啼重舌麥烝客忤積热驚癇解顱魃病疳病不行数證大人无之其如傷風傷寒班瘡下痢用藥則一但多少異耳諸方前已類編可披而得故不重引然養小之書隋唐間猶未甚該博吾　宋則有錢氏要方張氏妙選胡王備録幼幼新書及单行小集方論證狀動計千百不勝備矣今畧取保生要方具前数證以防緩

急之需博雅君子不妨廣覽

小兒初生回氣法

小兒初生氣欲絕不能啼者必是難產或冒寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶且將胞衣置炭火炉中燒之仍撚大紙捻蘸油點灯於臍帶上往来偏帶燎之蓋臍帶連兒臍得火氣由臍入腹更以热醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可浴洗了即斷臍帶

小兒初生所服藥法

小兒初生急以綿裹指拭尽口中惡血若不急拭啼声一出即入腹成百病矣亦未須与乳且先与拍破黃連浸湯取濃汁調朱砂細末抹兒口中打尽腹中舊屎方可与乳兒若多睡聽之勿強与乳則自然長而少病

小兒初生通大小便法

小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以温水先嗽口了吸咂兒前後心并臍下手足心共七処每一処凡三五次嗽口吸咂取紅赤為度須臾自通不尓无生意有此證遇此方可謂再生

小兒臍風撮口証

小兒初生一七日内忽患臍風撮口百无一活坐視其斃者甚是良可憫有一法極験世罕有知者凡患此兒齒齦上有小泡子如粟米狀以温水蘸熟帛裹手指輕三擦破即口開便安不用服藥神效

千金要要論

凡小兒有生三十二日一變再變為一蒸十變而五小蒸又

三大蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成人小兒所以變蒸者是榮其血脉改其五臟變者上氣蒸者体熱其輕者本熱而微驚耳冷尻冷上唇頭白泡起如魚目珠子微汗出其重者体壯熱而脉乱或汗或不汗不欲食食輒吐哯目白睛微赤黒睛微白變蒸畢自明矣此其證也畢變不微兼蒸小劇凡蒸平者五日而衰遠者十日而衰先期五日後之五日為十日之中熱乃除耳或違日數下除切不可妄治及灸刺但少与紫貝微下之熱歇便止若身熱耳熱尻亦熱此乃它病可作別治

紫貝治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒温壯汗後熱不歇及腹中有痰癖哺乳不進乳則吐哯食癊先寒後熱者

代赭石　赤石脂各一分　巴豆三十立去殼出油　杏仁五十立去皮尖

右以上三味為末別研巴豆杏仁為膏相和更擣一二千杵當自相得若硬入少蜜同杵之密器中收三十日兒服如麻子大一粒与少乳汁令下食須後与少乳勿令多至日中當小下熱除若未全除明日更与一粒百日兒服如小豆壹粒以此準定增減耳月多熱喜令發疹二三十日輒一服佳紫貝无所不治雖下不虚人

夜啼四證

小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰重舌口瘡四曰客忤寒則腹痛而啼面青白口有冷氣腹亦冷曲腰而啼此寒證也熱則心躁而啼面赤小便赤口中熱腹暖啼時或有汗俯身而啼此熱證也若重舌口瘡則要乳不得到乳上即啼身額皆微熱急取灯照口若无瘡舌必腫也客忤者見生人氣

忤犯而啼也

蒜貟 治冷證腹痛夜啼

大蒜壹顆慢火煨香熟取出細切爛研日中或火上焙半乾研 乳香半錢別研

右研勻貟如芥子大每服七粒乳空時乳頭以乳汁送下

灯花散 治热證心躁夜啼

燈花三两顆

右研細用灯心煎湯塗口中以乳汁送下日叁服

蒲黃散 治小兒重舌

眞蒲黃微炒紙鋪地上出火氣

右研細每抄些小摻舌下時〻摻之息愈更以温水醮熟帛裹指輕〻按掠之按罷摻藥

牡砺散 治小兒口瘡

牡砺煅通紅取出候冷研細以紙裹了埋一尺土中七日出火氣三錢 甘草炙為末壹分匕

右和勻時〻抄少許摻口中或嚥或吐皆无害

治客忤夜啼法

用本家厨下火柴頭一个火滅者以朱書云吾是天上五雷公將來作神將能收夜啼鬼一縛永不放急急如律令柴頭以火燒焦頭為上書了勿令兒知立在床下倚床前脚裏男左女右

黃土散 治小兒卒客忤

竈中黃土 蚯蚓屎各等分

右研勻和水塗兒頭上及五心良

積热證治

小兒積热者表裏俱热遍身皆热頰赤口乾小便赤大便焦

黃先以四順清涼飲子利動臟腑熱則去或既去復熱者內熱已解而表熱未解也當用惺〻散紅綿散加麻黃微發汗表熱乃去表熱去後又發熱者何也世醫到此尽不能曉或再用涼藥或再解表或以謂不可治誤致夭傷者甚多此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再發熱非熱證也只用六神散入粳米煎和其胃氣則收陽氣歸內身体便涼熱重者用銀白散

四順飲子 治小兒頭昏頰赤口內熱小便赤大便少此裏證也

大黃 湿紙裹煨熟 當歸 洗 赤芍藥 甘草 各等分

右為末三歲以上小兒每服一大錢水一盞煎七分作二服食後服 一法 用芍藥欲利小便則用赤者虛熱者加甘草下利者減大黃胃風邪加麻黃去節中風身体強戴眼者加獨活並於一兩中加減半分

惺又散

桔梗 細辛 人多 甘草 炙

白茯苓 苽蔞根 白朮

右等分為末每服一分匕水一小盞薄荷三葉同煎四分无时溫服

紅綿散

白殭蚕 二兩直者妙 天南星 二兩薄片切油浸黃 蘇木節 二兩半別研 天麻 一兩生用

右為末每服一分水一小盞入紅綿少許煎六分溫服

凡小兒風熱頭目不清並宜服之若傷寒有表証發熱者每服入去節麻黃末半分以下有裏熱心躁渴者入滑石末半分以下仝煎服之

六神散

白茯苓　白扁豆　人參　白朮　山藥　甘草炙

右等分為末每服一大匁水一小盞棗一个姜三片煎至五分通口服此藥用処甚多治胃冷加附子治風証加天麻治痢加罌粟殼

銀白散

山藥　白朮　白茯苓各半兩　人乡

知母　甘草炙　白扁豆　升麻各等分

右細末每服一匁水一小盞棗一个煎七分无时温服

急慢驚風証治

小兒發癇俗云驚風有陰陽二証身热面赤而發搐搦上視牙関緊硬者陽証也因吐瀉或只吐不瀉日漸困面色白脾虛或冷而發驚不甚搐搦微二目上視手足微動者陰証也陽証用涼藥陰証用温藥不可一槩作驚風治也又有一証欲發瘡疹先身热驚跳或發搐搦此非驚風當服發散藥

陽癇

朱砂一分研　膩粉　麝香各半匁　蘆薈

白附子　甘草各二匁　胡黄連一匁　蝎梢七个

白殭蚕十个炒　金泊七片　赤脚蜈蚣一條炙

右為末一歲以上服半錢匕以金銀薄苛湯調下三歲以上一匁匕如口不開灌入鼻中

陰癇

黒附子生去皮臍　生天南星　半下各二匁　白附子一匁半

右研細井花水浸七日每日換水浸訖控乾入朱砂二

分麝一分拌勻每服一字薄荷湯調下量兒加減 一方

用附子生去皮臍為末每服二分以水一盞半姜一片同煎至半盞分三兩服最兒加減吐者入丁香伍立同煎乳空时服或用水浸炊餅為貟如粟米大每服二寸立亦可。餘方見癲癇門

解顱治法

三辛散 治小兒頭骨應合而不合頭骨開解名曰解顱

細辛 桂心各半兩 乾姜七分半

右為末以乳汁和傅顱上乾復傅之兒面赤即愈

又方

蛇蛻炒焦為末

右用猪頰車中髓調傅頂上日三四度曾有人作頭巾裹遮護之久而自合亦良法也

魃病證治 魃音拔

千金論小兒有魃病者是姙婦被惡鬼導其腹中令兒病也魃亦小鬼也其證微〻下利寒热去來毫毛鬢髮鬠寧不悅者是也宜服龍膽湯凡婦人先有小兒未能行而母更有娠使兒飲此乳亦作魃也令兒黃瘦骨立發热髮落

龍膽湯 治嬰兒出腹血脉盛實寒热溫壯四肢驚掣吐哯者若已能進哺中食實不消壯热及変蒸不解中客人鬼氣并諸驚癇

龍膽 柴胡 黃芩 桔梗 鈎藤皮

芍藥 甘草炙 茯苓各二錢半 蜣蜋二枚 大黃一兩湿紙裹煨

右剉散以水一升煑取五合為一劑十歲以下小兒皆

可服若兒生一日至七日分一合為三服八日至十五日分一合半為三服生十六日至二十日至三十日分二合為三服二十日至三十日四十日尽以五合為三服皆以得下即止此劑為出腹嬰兒所作若日月長大者以次依此為例必知客忤及有鬼氣可加人參當歸各弐錢半一百日兒加一錢一字二百日加弐錢半一歲兒加半兩餘藥皆准此

疳病證治

小兒疳病者多因關乳喫食太早所致或因久患臟腑胃虛乘動日漸羸瘦腹大不能行髮竪發热无精神肥兒貟主之

肥兒貟

黃連　神麯各一兩　麥蘗半兩炒　木香二錢　檳榔二个不見火　史君子肉　肉豆寇各半兩　麪裹煨各半兩

右為末麪糊貟如蘿蔔子大每服三二十貟量兒大小加減塾水吞下

六神貟　治如前證

丁香　木香　肉豆寇去殼各半兩三味用麪裹同入慢灰火煨令麪塾為度　訶子半兩煨去核　史君子　莒蕾各一兩細研入

右為末以粟肉和貟如麻子大每服伍七貟温米飲下

乾膽貟　治疳病發热

龍膽草　黃連　史君子肉　青橘皮各等分

右為末猪膽汁和為貟如蘿蔔子大每服三十粒以意加減臨卧時塾水下

不行證治

五加皮散 治小兒三歲不能行者由受氣不足体力虛怯腰脊脚膝筋骨軟躄故不能行

眞五加皮

右爲末粥飲調滴酒少許每服一栗殼許日三服

三因極一病證方論卷之十八

東莞莫伯鎮号天一閣

右宋版三因方七箇曲直瀨正健所令善書者影寫也其後人慶割愛而投于余〻不耐拜讌即錄焉

丙子十一月六日 枳園森立之

冊皮上所題三回方之字聶廣君手書如
冊而榛養安院藏書印南郭錄元秀
之筆論也

此書半尋几半下（八ノ二ウ十ノ十四才 十三ノ五ウ十六ノ十六才）礬石作
凡石（十ノ廿四ウ）石膏作石黑（十六ノ十六才）旋復花作旋
伏花（日上）牡蠣作牡砺（日ウ）之類不遑枚舉
亦是宋板多異字之一證也 立之書