


萬氏家抄濟世良方卷五



目錄

婦人經病

崩漏

帶下

胎前

產後

虛弱諸病

附種子

諸方

小兒諸病

小兒二十四驚灸法

急救諸方

解諸毒

扁鵲華陀察聲色定生死要訣



萬氏家抄濟世良方卷五

提督漕運鎮守淮安地方總兵官都督四明萬表選集
分守廣東廣州等處地方督理海防叅將男達甫校訂
鎮守福建并浙江金温地方總兵官都督孫邦孚增補
婦人經病

趨前為熱退後為虛血滯宜破血枯宜補常時與經前作痛
為血積經後為血虛常時發熱為血虛有積經行發熱為血
虛有熱

加減四物湯 治衝任虛損月水不調臍腹疴痛

當歸

川芎

芍藥

熟地

各等分

右水煎服○經候微少漸漸不通手足酸疼肌瘦潮熱脉
微數去地黃川芎加澤蘭葉三倍甘草半分經水過期者
血少也加陳皮白朮人參升麻未及期先來者血熱也加
黃芩香附黃連肥人亦蕪痰治經色紫黑蕪有塊者血虛
有熱也或作痛加童便製香附芩連或加柴胡有氣血俱
熱者宜涼氣血加柴胡黃芩生地香附經行身熱脉數頭
昏加柴胡黃芩經水臨行小腹連腰作痛者乃鬱滯有瘀
血加香附莪朮玄胡索桃仁紅花木香發熱加黃芩柴胡
陰虛血少經水不通小便澀而身體痛加白朮牛膝牡丹
皮香附陳皮桃仁經水行後作疼者氣血虛也加四君子

湯血枯經閉加桃仁紅花經水適來適斷或有往來寒熱
先宜服小柴胡湯後以此湯和之

六味地黃丸

調經第一方不可易視

方見虛損門

肥白人經水過期者是痰多用二陳湯加南星蒼朮滑石及
川芎當歸香附

肥人痰多占任血海地位因而下多者目必漸昏用南星蒼
朮川芎香附作丸服肥人不及日數而多者痰多血虛有
熱亦用前丸藥中更加黃連白朮

經水不通用馬鞭草取汁熬膏為丸或燒灰存性為丸紅花
當歸煎湯下

肥軀脂滿經閉不行者導痰湯加黃連川芎

經水去多不住者以三補丸加香附龜板金毛狗脊

逍遙散 治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱

甘草

錢五

當歸

去芦

茯苓

去皮

柴胡

去苗各一兩

每服五錢水一盞煨姜一塊薄荷少許煎七分溫服

一方 治經不調而血水淡白宜用參芪歸芍香附白芍腹

痛加膠味艾葉玄胡索

固經丸 治經水過多不止

黃芩

龜板

白芍藥

各一兩

樗根皮 七錢半

黃栢

香附

二錢半童便

為細末酒糊丸服

四製香附丸 治婦人女子經候不調亦治女人久瀉

香附

去毛一斤作四分一分酒浸七日一分童便浸七日一分鹽水浸七日一分米醋浸七日各焙乾

右為末醋糊丸桐子大每服七十九空心食前鹽湯下肥

人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓各二兩

一方 治婦人經血暫閉或來或不來

香附

斤分作四分

蘇木

一兩

紅花

一兩

一分

澤蘭葉一兩

一分

桃仁一兩

煎汁浸

各浸三日取起通用香附水丸桐子大空心米飲下

丹參散 治婦人經脉不調或前或後或多或少產前胎不

安產後惡血不下並治之兼治冷熱勞腰脊痛骨節煩疼
丹參去蘆不拘多少為末

每服二錢酒調下經脉不調食前服冷熱勞服無時

導經丸 治婦人經水不通臍腹連腰腿疼痛

當歸 川芎 白芍藥炒各二錢 甘草炙 官桂兩

桃仁炒一兩 大黃二兩酒蒸 血竭二錢半 紅花少許 地膽二十一箇去翅足

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九空心溫酒下量虛實

加減服

通經丸 治婦人室女經候不通臍腹疼痛或成血瘕

川椒炒去汗 蓬朮炒 當歸去蘆 青皮去穢炒 乾姜炒 紅花

大黃炒 桃仁去皮細研 桂心等分 乾漆炒去烟

為末將一半用米醋熬成膏和餘藥一半成劑白中杵丸

桐子大每服五十九醋湯溫酒空心下

紫金活命丹 治婦人經脉不通通而作痛血瘕等疾

錦紋大黃一兩 苦葶蘆五錢 芫荳去殼七十粒

紅娘子六十個全 木香一錢

右為末紅棗煮爛去皮核和藥丸彈子大重二錢五分用

絲綿如法裹包入陰戶深處當見頭疼暈悶作渴渾身困

倦可食白滾湯粥飯待下有黃水或血水流滴三日其藥

自然脫下肚腹作疼三個時辰惡物纔下有形可驗

補藥方

胡椒三錢 木香一錢 朝腦一錢 砂仁五分

為細末稀糊丸菜豆大硃砂為衣每服十五丸空心白湯
下一鍾茶時食白鷄卵三箇好酒一二鍾如此三服後服
加減四物湯數服此方神妙

血竭膏 治乾血氣

用錦紋大黃酒浸晒乾四兩為末以好醋一升熬成膏丸
如鷄頭大臨卧服一九熱酒化開待溫服大便利一二次
紅脉自下此調經之仙藥也又方加香附若經血逆行或
血暈或吐血或咳血用韭汁服

失笑散 治婦人血氣痛欲死者方見心痛門

紫金錠 治婦人腹內結塊久而不消并月經過期不至腹
內作痛或為邪所交腹中作痞熱酒磨服並愈孕婦不可
服方見痰門

一方 治室女月經不通

紫葳一兩 乾漆二錢半 芍藥 蓬莪朮 當歸稍各一兩半

為末每服二錢空心酒調下

一方 治室女經閉不行

用錦紋大黃一兩切片以好酒浸一日一夜取出晒乾蒸
熟再入酒浸再晒乾仍前蒸熟九桐子大每服三十九空

心酒下

又方 蘇木四錢黑荳一升好酒一斤半入鍋煮至一甌加童便一甌攪勻服出汗効

崩漏

皆由傷損冲任二脉血氣俱虛不能約制經血故忽然暴下奇効四物湯 治血崩

當歸

川芎

芍藥

生地

阿膠炒

艾葉

黃芩

各等分水二鍾姜三片煎一鍾空心服○因勞

氣弱者加人參黃芪升麻○因熱者倍黃芩○因寒者加炒黑乾姜○紫色成塊者血熱之甚加黃連○崩過多者

先用五靈脂半生半炒為末一服後分寒熱用藥

一方用白芷煎湯調百草霜服甚者加棕櫚灰稍止即以四物湯加乾姜調之此急則治其標也四物湯加黃芩黃連人參黃芪香附乾姜此緩則治其本也

又方四物湯加荆芥穗止血甚効

治血崩血淋及產後去宿生新

取黃黑牛胎一個腹中者去身只留四足酒洗淨蹄壳尤要緊新瓦上炭火煨存性不可煨過研末無灰酒送下每服重者七八錢輕者三五錢驗過神効

十全大補湯 治血崩

人參 白茯苓 白芍炒 當歸 黃芪炙

阿膠蛤粉炒 成珠 白朮炒 杜仲姜炒 去絲 各一錢 乾姜炒 七分

熟地三錢 甘草三分 水煎空心服

栢子仁湯 治思慮傷心心不能藏血以致崩漏

栢子仁 川芎 茯神 阿膠炒 小草

香附各一錢 當歸 續斷 熟地各錢半 龍齒

甘草 棕灰各五分

姜三定水煎入鹽少許空心服

治崩漏多因氣所使而下

香附末炒 黑 歸身 白芍藥 地榆 熟地黃各一錢

川芎 黃芪 蒲黃 人參各五分 白朮一錢

升麻三分 水煎服甚者加椶毛灰酒調服

一方 香附炒黑為末每服三錢飲湯調下

治婦人血崩不止

槐花一兩 棕毛灰五錢 水二鍾鹽少許煎七分溫服

一方 治漏下乃熱而虛宜四物湯加黃連

一方 蚕沙為末每服三五錢熱酒調下

鎮宮丸 治崩漏不止或五色如葶汁

代赭石 紫石英 禹餘糧煨醋 碎 香附醋煮 各二兩

白茯苓 川芎 鹿茸炙 阿膠炒

當歸

龍骨

敗龜板

酒炙

蒲黃

各一兩

血竭

五錢

為末艾汁和醋煮米糊丸空心米飲下七十九

如神散 治婦人血崩不止赤白帶下

香附子

赤芍藥

等分為末鹽一撮水二鍾煎一鍾去渣食前溫服

一方 治血崩及月水過多用黑驢屎燒灰存性為末麩糊

丸每服七十九空心酒下

治血山崩

蠟殼

舊紅褐子

陳棕

蓮房

各燒灰存性

右等分共為末每服三錢用酸漿草汁一鍾沖下熱黃酒

一鍾熱服

十灰散 治血崩不止

黃絹灰

馬尾灰

藕節灰

艾葉灰

蒲黃灰

蓮房灰

棕櫚灰

油髮灰

綿灰

松皮灰

各燒存性為末醋煮米糊丸空心米飲下

帶下

赤屬血白屬氣濕熱為病主燥濕為先漏與帶俱是胃中痰積流下糝入膀胱法當升之甚者用吐以提其氣須斷厚味

加味二陳湯 治帶下

陳皮 半夏 茯苓 甘草 蒼朮 白朮

升麻 柴胡各等分 姜三片水煎服

治肥人白帶是濕痰

海石 半夏姜製 南星姜製 黃柏炒 蒼朮淋浸 香附

川芎酒洗 樗皮 乾姜各等分

右為末醋糊丸桐子大每服五六十九空心白湯下暑月

去乾姜

治瘦人帶下多熱

黃柏炒 黃芩 滑石 樗皮 川芎酒洗 海石

青黛 當歸酒洗 芍藥各等分 醋糊丸服

固真湯 治白帶臨行時臍下痛甚

人參五分 黃柏炒 黃芩炒 白葵花各一錢 乾姜

甘草各三分 郁李仁八分 柴胡七分 陳皮五分

水一鍾半煎七分空心服葵花白者治白帶紅者治赤帶

此治氣滯白帶者

固腸丸 治濕勝者用此以燥其濕亦不可單用須看病作

湯使

椿根白皮性涼而燥 須妙用 為末酒糊丸服血虛者加減四物

湯氣虛者參朮陳皮間與之

樗白皮丸 治白帶

樗白皮

山茱萸

苦參

香附各五錢

龜板二兩

梔子二兩

黃栢一兩

乾姜

貝母各二錢

白朮

白芍藥七錢半

為末酒糊丸服

一方 治赤白帶下用黃荊子炒為末酒調下二錢

一方 治崩中白帶

白芷六兩 花椒目四兩

以白芷四兩用石灰半斤淹三宿

漉去灰將白芷炒焦同椒目為末或加茜草少許粥丸服

治婦人上有頭風鼻涕下有白帶

南星

蒼朮

栢皮炒

滑石

半夏

川芎

辛夷

酒茶

牡蠣粉炒各等分

水煎食前服

治赤白帶下用旱蓮草不俱多少陰乾為細末每用一匙入

鷄子清內攪勻蒸熟食之後食棗一枚去腥氣

固真丸

治白帶久不止臍腹冷痛目中溜火視物昏花齒

惡熱飲此皆肝經陰火上溢惡熱飲者陽明經中伏火也

法當大瀉寒濕

黃栢酒炒

白芍各五分

白石脂火煨

柴胡一錢

乾姜

泡四錢

白龍骨酒煮

當歸各二錢

除龍骨石脂水飛另研餘共為細末麩糊丸桐子大每服

七十九空心白湯下少時以飯壓之忌生冷酒麩

胎前

當清熱養血

安胎飲 治孕成之後覺胎氣不安或腹微痛或腰間作疼

或飲食不美者服之或至五六月常服數貼

白木 當歸 芍藥 熟地各一錢 人參 川芎

黃芩須沉水者 陳皮各五分 甘草 砂仁 紫蘇

各三分 姜一片水煎服

又方安胎

白木 黃芩 炒麴為末粥丸服

治妊娠半產或三月墮者於兩月前以杜仲八兩糯米煎湯

浸透炒去絲續斷二兩酒浸焙乾為末以山藥五六兩打

糊丸桐子大每服六十九空心米飲下

固胎飲

當歸身 熟地 人參 白芍藥 白木 川芎

陳皮 甘草 薜荔即桑上羊兒藤 黃連少加 黃柏少加

水二鍾糯米一撮煎八分服血虛不安加阿膠痛加宿砂

芩朮散

黃芩條實者酒浸炒一兩 白木壁土炒去土一兩 砂仁炒三錢

為末米湯調下二三匙

芎歸補中湯 治婦人性急常慣小產

當歸 川芎各一錢半 茯苓八分 黃芪錢一 黃芩酒炒二錢 甘草

陳皮

阿膠蛤粉炒各五分

白朮土炒二分

續斷酒洗二錢

桑寄生七分

香附錢炒一分

砂仁三分按月加至一錢

水二鍾姜三片煎八分空心服如未孕每服十五貼如前

次三月內小產下次亦如期而來必先于兩月半內每日

服一貼保過三月半後方穩

固胎丸 三四月用之以防墮胎

杜仲半斤姜汁煮炒

續斷二兩酒浸炒

為末棗肉丸空心米飲下五十九

東胎丸 懷妊七八箇月服之

黃芩

炒夏一兩春秋七錢半冬五錢

白朮

二兩

陳皮

三兩忌大

白茯苓七錢

為末粥丸桐子大每服三四十九白湯下

達生散 八九箇月服

大腹皮二錢

人參

陳皮

紫蘇莖葉各五分

白芍藥

白朮

當歸各一錢

甘草二錢炙

右作一貼入黃楊頭一箇葱五葉煎服夏加黃芩春加川

芎冬加砂仁氣虛加參朮氣實倍香附陳皮血虛倍當歸

加地黃性急多怒人加柴胡有熱加黃芩食少加宿砂神

麩渴加麥門冬食易饑多加黃楊腦濕痰加黃芩半夏腹

痛加水香胎動加芎根

金匱當歸散 妊娠宜常服之

當歸 川芎 白芍 黃芩 白朮

右為末酒飲調服方寸七日二次或酒糊九桐子大每服

五十九茶湯任下空心食前服日三次此養血清熱之劑

瘦人血少有熱胎動不安素曾半產者皆宜服之

治婦人胎動不安及下血

艾葉 阿膠 川芎 當歸 甘草

水四鍾煎二鍾去渣納膠令化分二服一日用八九箇

月者少加砂仁

治產前因火動胎逆上作喘急者用條芩香附為末調服

一方 治產動出血產門痛用黃連為末酒調一錢日三服

佛手散 治妊娠胎動不安血氣衝心欲絕者又臨產服之

生速產後服之去惡血最効

當歸 芎藭 各一兩

每服四錢酒一鍾煎乾再入水一鍾煎二三沸温服

益母丸

益母草 白芍藥 川芎

當歸 熟地 香附

砂仁 條芩 白朮

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十九白湯下此藥服之

能令小兒無熱毒奶牙之患

治妊娠痰嗽見紅

川芎

熟地

天門冬

去心

紫苑

各五分

桑皮

杏仁

甘草

桔梗

黃芩

五味子

阿膠

炒成珠

痰盛加竹茹

水煎入薊汁同服

治胎痛乃血少四物湯加香附為末紫蘇湯下

當歸散

療妊娠被驚惱胎向下不安小腹連腰痛下血

當歸

川芎

各八分

阿膠

炒

人參

各六分

艾葉

四分

大棗

二枚

茯苓

一錢

姜三片水鍾半煎八分食前溫服

當歸寄生湯

治妊娠胎漏非時下血氣虛血虛有熱

當歸

川芎

艾葉

白朮

各一錢

人參

續斷

桑寄生

熟地黃

各二錢

水二鍾煎一鍾空心服

治胎漏下血

黃芩

五錢

白朮

一兩

砂仁

炒

阿膠

炒

各三錢

為末每服二錢艾湯調下

人參橘皮湯

治妊娠惡心阻食

白朮

麥門冬

去心

橘紅

白茯苓

各一錢

厚朴

姜製

人參

去蘆

一錢

甘草

三錢

每服四錢水盞半淡竹茹彈子大一枚姜三片煎七分去渣澄清空心食前溫服

又方白朮為末水丸隨所好或湯或水下

經驗青竹茹湯 治婦人惡阻多從痰治

竹茹 彈子大一枚 橘皮 半錢 生姜 二錢 白茯苓 一錢半

半夏 二錢湯泡七次

水二鍾煎七分溫服忌食羊肉鰂鮓等物

八味丸 治轉胞妊娠小便不通者是也 方見虛損門

又方 四物湯加入參白朮製半夏陳皮甘草生姜水煎服

全生茯苓散 治妊娠小便不通

赤茯苓 葵子 各等分

水煎加髮灰少許空心服

竹葉湯 治妊娠心驚膽怯終日煩悶名曰子煩

白茯苓 四兩 防風 去蘆麥門冬去心 黃芩 各三兩

每服四錢水一鍾竹葉五片煎服一治子煩大痛者加竹

瀝

葛根湯 治臨月忽發風痙悶亂不省人事吐逆愛睡少寐

醒後復發

貝母 乾葛 丹皮 防已 防風 當歸

川芎 桂心 茯苓 澤瀉各五分 獨活 人參

石羔各一錢 甘草三分

姜水煎服

羚羊角散 治妊娠中風頭項強直筋脉攣急語音塞澀痰涎不利或時發搐不省人事名曰子癇

羚羊角 川獨活 酸棗仁炒 五加皮各五分 薏苡仁

防風 當歸 川芎 茯神 杏仁各四分

木香 甘草各二分半

水一鍾姜五片煎七分不拘時服

治妊娠自哭自笑所言顛鬼如有所見

甘草三兩 大棗十枚 小麥一升

煎不時服或用紅棗燒灰存性米飲調服

治妊娠無故尿血

龍骨一兩 蒲黃五錢

為末每服二錢酒調服日三次

治妊娠無故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如水如薑汁

野苧根 金銀各一兩

酒水各一鍾煎八分作二服

治妊娠遺尿失禁

白薇 白芍 為末酒調服

全生白朮散 治妊娠面目虛浮肢體腫如水氣名曰子腫

白朮 一兩 生姜皮 大腹皮 陳皮 白茯苓皮 各五錢

為末每服二錢米飲調下

又方 山梔子炒一合為細末米飲調下或丸服亦可

仙藤散 治妊娠三月後脚腫漸至膝喘急症若水腫甚至

足指間有黃水出者名曰子氣

青木香 藤 陳皮 香附 甘草 烏藥

木香 蘇葉 姜三片水煎服

紫蘇飲 治子懸胎氣不和湊上心腹脹滿痠痛者是也

大腹皮 川芎 白芍藥 陳皮 紫蘇葉

當歸 去蘆酒浸 各一兩 人參 甘草 各五錢

每服四錢水一鍾姜五片葱白七寸煎七分空心溫服

斬鬼丹 治鬼胎如抱一瓮

吳茱萸 川烏 秦苑 枳胡 白疆蚕

為末煉蜜丸桐子大每服七丸酒下取去惡物即愈

治兒在腹中哭用多年空房下鼠穴中土一塊令孕婦噙

之即止

傷寒熱病護胎法 以竈心土水調塗臍下乾又塗之就服

一錢難產細研一錢酒調服

一方在臨月時用

當歸 川芎 黃芩 陳皮 白朮 香附

各一錢 白芷 五分 甘草 三分 虛加人參

水煎調益元散一錢服

三合濟生湯 以枳殼芎歸達生三方抽其精粹而合成此

湯治臨產艱難雖一二日不下者服此自然轉動下生

枳殼麩炒 川芎各二錢 香附一錢半炒 粉草七分 當歸 三錢

蘇葉八分 大腹皮姜汁洗一錢五分

水二鍾煎一鍾待腰腹痛甚服之即產

花蓋石散 治難產及胎死腹中胎衣不下惡血冲心血暈

血塊疼痛等症乃催生之神藥也

花蓋石二兩為粗末 硫黃八兩為末

二味拌勻入瓦罐內紙筋益泥封固砌一爐將罐置爐上

用炭籠疊周匝自已午時從下着火令漸漸透上直至經

宿火冷炭消取出細研每服一錢童便調服

如神丹 治難產

巴豆三粒去殼 草麻子七粒去殼 麝香 少許

研成一餅貼臍上即產產下即去之

治難產用紅苧菜與馬齒苋同煮熟臨產食之胎即下

治死胎不能下者用新鮮黃牛屎炒布包熨臍少冷再換仍

服達生散數貼即下胞衣不下者亦用此方

牛膝丸 下死胎

土牛膝

三兩

紫金藤

七錢

肉桂

二錢

當歸

四錢

蜀葵根

七錢

為末米糊丸桐子大硃砂為衣每服五十九乳香煎湯下如聖膏 治難產無治胞衣不下及死胎

用草麻子七粒去殼細研成膏塗脚心胞衣即下速洗去之不即去腸出不收却用此膏塗頂上腸即縮入如聖之妙一方用四十九粒

治橫逆生或手足先出者

兔絲子車前子等分為末每服二錢酒下

治盤腸產法臨產腸先出者急以盆裝溫水濕潤其腸令仰卧以好言安其心却用米醋半盞和水七分攪勻忽哭其面或背一驚便縮凡三哭則腸盡收入用參芪芩歸等藥大補加升麻防風之類升提之

開骨丹 治產五七日不下及矮少女子交骨不開死在

龜板

自死者佳占卜者次之煑熟者不用

女人髮

一握生男女者佳

當歸

酒洗

川芎

各一兩

右為末每服三錢水一盞半煎服約人行五里時胎即下

兔腦丸 治產難

乳香

一錢

射香

一分

母丁香

二箇

為極細末臘月上旬酉日用兔腦丸如桐子大辰砂為衣
陰乾每服一九溫水送下立產男左女右手中握出藥神
効

猪肝蜜酒法 治婦人胞水早行胎澁不下

猪肝 白蜜 醇酒各一斤

共煎至二升分作二三服不能飲者隨其多少緩緩服之

催生散

白芷炒 百草霜 滑石 為末芫歸煎湯調下

濟法返魂丹 治難產逆產俱効 方見後

子和曰大凡婦人難產者皆因燥澁緊歛故產戶不得開

通宜先以降誕之月自月之日用長流水誦益元散日三
服產必易產後亦無一切虛熱氣血不和之疾如未入月
則不宜服以滑石滑胎故也

將產時以烏不宿莖葉剉碎一大把加甘草一錢酒水各半
煎一鍾服之易產且產後無病其葉如杏葉而枝梗有刺
烏不可宿故名又名石米刺

婦人橫逆產難危在頃刻者急於本婦右腳小指頭尖灸
三壯艾炷如小麥粒大下火即產如神

產後

產後當大補血氣為先雖有他症以未治之不可用芍藥

主方

白朮 歸身尾 陳皮 川芎 甘草 黃芪

人參 各等分

水煎服大熱加炒黑乾姜熱輕則加茯苓

治產後氣血虛甚發熱惡寒切不可發表

川芎 當歸 熟地 白朮 茯苓 人參

甘草 陳皮 或加黃芪

水煎服如左脉不足補血藥多於補氣右脉不足補氣藥

多於補血

一產下即以佛手散用童便一鍾酒一鍾煎七分服此藥大

能去宿生新無腹痛血暈之患

治產後血往上冲昏暈欲絕者以紅花一大撮好酒半碗煎

數沸入童便二盞乘熱灌下立醒

治產後惡血冲上兩目開者以好米醋煎滾入小口瓶內薰

產婦兩鼻孔將手捏其中唇并眉心如下血多而兩目閉

者人參濃煎湯灌入亦捏其中唇并眉心

治產後惡露不盡腹中刺痛

當歸 川芎 熟地 桃仁 紅花 陳皮

甘草 香附童便浸炒水煎服

一方 產後兒枕痛用羊蹄根子微炒水煎服

又方用五靈脂香附為末醋丸服甚者加留尖桃仁

又方鵝生姜真汁熱酒和服

獨行丸 治婦人產後血衝心動及治男子血氣心腹痛

五靈脂去土半生半炒 為末水丸彈子大每服一九酒或姜湯

加減芎歸湯 治產後去血過多暈煩不省一切去血並治

芎藭 當歸去蘆酒洗焙各等分

每服四錢水一鍾煎七分熱服○腹中刺痛加炒白芍口

乾煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加乾姜炒白芍水停心下

微嘔加茯苓生姜虛煩不得眠加人參竹葉大便秘澀加

生地橘紅杏仁小便不利加車前子腹脇膨脹加厚朴血

崩不止加香附咳嗽痰多加紫苑半夏生姜腰疼膝痛加

牛膝心下疼加玄胡索惡血不下腰腹重痛加丹皮

當歸羊肉湯 治產後發熱自汗肢體疼痛名曰葶勞

當歸去蘆酒浸 人參各七錢 黃芪去蘆一兩 生姜半兩

右用羊肉一斤煮清汁五大盞去肉入前藥煎四盞去渣

作六服早晚頻進

豬腰子粥 治產後葶勞發熱

豬腰子一箇去白膜切作柳葉片用鹽酒拌先用糯米一

合入葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盆底用熱粥蓋之空

心服

一方鹿陰莖焙乾產後虛勞者飯上蒸熟切片酒下極補
人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗

歸身 人參去蘆等分

為末猪腰子一箇去膜切片以米三升糯米半合葱白二
莖煮米熟清汁一盞入藥二錢煎八分不拘時服

小產後下血不止

人參 黃芪炙 當歸 白朮 白芍炒 艾葉

甘草 川芎 阿膠炒成珠 砂仁 香附 水煎服

小產後心腹疼痛

當歸 川芎 熟地 白芍炒各 玄胡索七分

桃仁去皮 紅花各三分 香附 青皮 澤蘭葉

丹皮各五分

水一鍾酒童便各半鍾煎八分熟服

人參當歸散 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱

其證心胃煩滿吸吸短氣頭痛悶亂晡時轉甚與大病後
虛煩相類急宜服之

熟地 人參去蘆 當歸去蘆 肉桂去皮各 白芍二兩

麥門冬去心一兩

每服四錢水二盞先以糯米一合淡竹葉十片煎至一盞
去米葉入藥并棗三枚煎溫服血甚熱者加生地黃

一方鹿陰莖焙乾產後虛勞者飯上蒸熟切片酒下極補
人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗

歸身

人參 去蘆等分

為末猪腰子一箇去膜切片以米三升糯米半合葱白二
莖煮米熟清汁一盞入藥二錢煎八分不拘時服

小產後下血不止

人參

黃芪 炙

當歸

白朮

白芍 炒

艾葉

甘草

川芎

阿膠 炒成珠 砂仁

香附

水煎服

小產後心腹疼痛

當歸

川芎

熟地

白芍 炒各一錢

玄胡索 七分

桃仁

去皮 紅花 各三分

香附

青皮

澤蘭葉

丹皮

各五分

水一鍾酒童便各半鍾煎八分熱服

人參當歸散

治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱

其證心胃煩滿吸吸短氣頭痛悶亂晡時轉甚與大病後

虛煩相類急宜服之

熟地

人參 去蘆

當歸 去蘆

肉桂 去皮各一兩

白芍 二兩

麥門冬

去心一兩

每服四錢水二盞先以糯米一合淡竹葉十片煎至一盞
去米葉入藥并棗三枚煎溫服血甚熱者加生地黃

治產後血暈用韭菜細切盛有甌瓶中以熱醋沃之急封甌口以甌嘴納產婦鼻孔中搐之即甦又法以舊漆器燒烟燻之

又方用鹿角燒灰出火毒為末酒調灌下即醒兼治血崩又方荆芥穗研細末用一分吹鼻中

清寃散 治血迷血暈

人參

澤蘭葉

甘草各二錢 荆芥

川芎各五分

為末溫酒熱湯各半盞調一錢灌之下咽即開眼

奪命丹 治胎衣不下

丹皮

四錢 乾漆

一錢

附子

三錢

大黃

四錢

為末鷄蛋清成丸土牛膝湯下七十九

治胎衣不下以朴硝用童便調一二盞熱飲立下亦治死胎

治產後泄瀉

黃芪

白朮

川芎

茯苓

乾姜

滑石

陳皮

芍藥

炒

甘草

炙

水煎服

治產後瀉用生姜一兩麩一兩共搗丸鷄豆大炒黃色為末

白湯調服

白朮散

治產後霍亂吐瀉腹痛煩渴手足逆冷

白朮

橘皮

麥門冬

人參

乾姜

炮各一兩

甘草

炙半兩

每服八錢水鍾半姜五片煎八分服

豈菟理中丸 產後元氣虛弱臍腹疼痛泄瀉不止又治男

子脾胃虛弱久瀉

人參一兩 白朮煨一兩 乾姜 甘草各五錢 肉苁蓉七錢

右為末煉蜜丸桐子大每服四五十九空心米湯下酒煮

麵糊丸亦可

熟地黃湯 治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

熟地一兩洗淨酒 人參去蘆麥門冬 甘草各一兩

括萎根四兩

水煎服一方用八味地黃丸龍眼湯下

參朮膏 治產後胞損成淋瀝

人參二錢 白朮二錢 桃仁 陳皮一錢 黃芪一錢

茯苓一錢 甘草炙五分

水煎猪羊胞後入藥作一服

猪蹄湯 治妳婦氣少力衰脉澁不行絕乳汁

猪蹄一隻通草五兩將猪蹄洗淨依食法煮治次用水一

斗同通草浸煮得四五升取汁食之

又方用蒿苣嫩頭作羹食之

血風散 治產後諸風攣急或痿弱無力

川芎 芍藥 當歸 熟地 秦艽 羌活

防風 白芷 白朮 茯苓

右為細末一半煉蜜丸桐子大每服五七十九一半末俱

酒送下

產後中風切不可作風治大補血氣為主

治產後經風痛不可忍并痢後風

威靈仙一兩 乳香 沒藥 木香 肉桂各二錢

水酒各一鍾煎八分服如痢要覆被出汗方好不能飲者

水煎臨服少加酒

導散 治婦人產前產後大便不通

當歸 川歸 防風 枳殼製各甘草炙二錢

每服一兩姜三片棗一枚水二盞煎一盞溫服忌動風物

治產後敗血不止生地黃一兩石罌內搗末每服二錢食前

熱酒服連進三服

一方消產後血塊

滑石 三錢 沒藥 血竭 各二錢 為末醋丸服瓦龍子丸亦可

治婦人產後惡物不出上攻心痛

赤伏龍肝研細酒調三五錢瀉出惡物立止

一方琥珀三錢為末酒調下

二妙趁痛散 治婦人產後遍身疼痛及身熱頭痛

當歸 牛膝 桂心 白朮 黃芪 獨活

生薑各半兩 甘草

萆白各三錢 水煎服

治產後腫脹

當歸 白芍炒

茯苓各錢半 猪苓

澤瀉 木通

各二錢

蒼朮

枳殼

車前子各一錢

用鯉魚煎湯作水煎藥服

一方腫脹用枳子皮燒灰存性為末好酒調服二錢立消

產後水腫必用大補氣血為主少佐蒼朮茯苓使水自利

治乳汁不通

通草七分 瞿麥

柴胡

天花粉

桔梗各一錢 青皮

白芷

木通

連翹

赤芍藥

甘草各五分

右作一貼水煎食後細飲更摩乳房如無子食乳者要消乳用麥蘗二兩炒為末四物湯調下

治產後陰腫痛用桃仁去皮尖細研四五次抹之

治產後用力太過陰門突出四物湯煎熟入龍骨末少許空心連進三服用麻油湯薰洗

一方治陰挺先以艾湯洗過次將蛇床子半升炒熱絹包熨之自收入

治產後生腸不收用枳殼二兩去穢煎湯溫浸良久即入

治婦人子宮不收

荊芥穗 藿香葉 臭椿皮 各等分煎湯薰洗

華陀危病丸 治胎衣惡血湊心其證心頭迷悶胎衣上逆

衝心須臾不治

乾漆 五錢為末 大附子 一枚泡去皮臍為末

用大黃末五錢酒醋熬乾即入前二味丸桐子大每服三十丸淡醋湯下須臾又進二服胎衣立下如無前藥以赤小荳一升炒過用水三升煮二升去荳取汁溫服立下又無荳用婦人自己手足指甲燒灰酒調服須臾又進一服更令有力婦人抱起將竹筒於心上趕下

烏金散 治產後一十八證

烏金子 即大烏荳 肉桂 去粗皮 當歸 去蘆洗 真蒲黃 皂莢 不蛀者煨存性

青皮 去白 木香 血餘 洗淨 赤芍藥 紫葳

大薊根 小薊根 蚕退紙 煨存性新綿灰亦可 棕毛 煨存性各半兩

紅花 一兩 川烏 一箇生用 硃砂 少許細研 血竭 少許細研

右一十八味除灰藥等別研外並為細末入研藥一處和勻每服一錢姜湯或芍藥或凌霄花煎酒調下甚者日夜三四服忌鷄猪魚羊一切生冷油膩等物○第一胎死產不下二產難三胎衣不下四產後眼花五產後口乾心悶六產後寒熱似瘧疾七產後敗血四肢浮腫寒熱不定八產後血邪如鬼神顛狂言語無度九產後失音不語十產後腹痛十一產後百節酸疼十二產後敗血似鷄肝十三

產後咳嗽寒熱不定十四產後胸脇氣滿嘔逆十五產後小便澀十六產後舌乾鼻中血出繞頂生斑十七產後腰疼如角弓十八產後喉中如蟬聲以上十八證並治

余嘗合此劑所在劑人積有年矣但古方元有蝨蟲水蛭鯉魚皮余平生不忍用肉藥由是以大薊小薊紫葳代之又去芫花巴豆而入蚕退紙血竭別撰醋煮大黃膏臨證加減妙不可言自得之妙未嘗語人今既集方故盡發此秘

錦紋川大黃不拘多少米泔浸經宿去粗皮為細末用陳年米醋酌量多少先熬稠粘旋入大黃末不住手攪令極

勻以磁器貯之紙封口毋致蒸發臨用量輕重虛實入烏金散內服之人壯病實者半彈子大已下漸少或以膏子圓如小彈子大或如圓子大或如皂子大陰乾收之密器內臨用旋看虛實以一圓令患人嚼破以烏金散送之或以熱醋浸化入藥服之如尋常產後內熱惡露作痛俗名兒枕痛及大便不利秘結者並煎四物湯浸化一圓同服如發寒熱如瘧內熱者煎小柴胡湯浸化一丸服之未効者再進並不損人大能活血蕩穢潤燥清神開胃倍食兼治男女老幼血疾除傷寒大病表未解者一切服之如神無極丸 治婦人血塊痛極重者

錦紋大黃

四兩一兩酒煮七次一兩醋煮七次一兩童便
煮七次一兩鹽水煮七次

右為粗末再蒸七次晒七次然後研極細用當歸熟地各
一兩五錢濃煎汁一碗煮米糊為丸桐子大產後血塊痛
并婦女經水不通俱用紅花酒下心疼氣痛或腰腹疼用
小茴香炒過七分煎湯下三十九即安每日常服有塊者
一月之內下小小血粒自此除根

濟陰返魂丹

治胎前產後一切病症功效甚大

益母草一味此草生二種用紫花者白花者不是於端午
小暑或六月六日花正開時連根收採透風處陰乾用時
不犯銅鐵器以石臼搗羅為細末煉蜜丸彈子大每服一

丸各照後開湯送下若量加水香同當歸赤芍藥尤妙其
藥不限次數以病愈為度丸如桐子大者服五七十九熬
膏尤妙治法于後○熬膏法益母草不拘多少連根葉莖
洗淨石臼內搗爛以麻布濾取濃汁入砂鍋內文火熬成
膏如黑砂糖色為度入磁罐內收貯每服一茶匙○胎前
臍腹刺痛胎動不安下血不止水煎秦艽湯下米湯或當
歸湯亦可○胎前產後臍腹作痛作聲或寒熱往來狀如
瘧疾者溫米湯下○臨產并產後各先用一丸童便酒化
下安魂定魄血氣自然調順諸病不生又能破血養脉息
調經絡功效不能盡述○產後胎衣不下落在胞中及產

前一切產難橫生不順死胎經日不下脹滿腹中心悶心
痛炒鹽湯下○產後中風牙關緊急半身不遂失音不語
童便無灰酒各半下○產後氣喘咳嗽胃隔不利惡心口
吐酸水面目浮腫兩脇疼痛舉動失力溫酒下○產後兩
太陽痛呵吹心忪氣短肌體羸瘦不思飲食血風身熱手
足頑麻百節疼痛溫米湯下○產後眼前黑暗血暈血熱
口渴煩悶如見鬼神狂言不省人事薄荷自然汁如無生
者濃煎乾薄荷湯下及童便酒各半下○產後面垢顏赤
五心煩熱或結成血塊腹臍奔痛時發寒熱有冷汗者童
便酒各半下或溫薄荷湯下○產後餘血惡露不盡結滯
腹臍刺痛惡物上冲心胃滿悶童便溫酒各半下○產後
未經滿月血氣不通咳嗽四肢無力臨睡自汗不止月水
不調久而不治則為骨蒸童便酒下○產後鼻衄口乾舌
黑童便酒下○產後大小便不通煩燥口苦薄荷自然汁
下如無生者濃煎乾薄荷湯○產後痢疾米湯下○產後
瀉血棗湯下○產後赤白帶下膠艾湯下○血崩漏下糯
米湯下○勒奶痛或成癰為末水調塗乳上一宿自瘥或
生搗爛敷上亦可○婦人久無子息溫酒下一丸服至一
月有孕

婦人虛弱諸病 附子嗣

加減四物湯 治婦人諸病

熟地 川芎 芍藥 當歸 各等分

每服六錢水鍾半煎八分不拘時服○骨蒸勞熱加地骨皮知母柴胡黃芩○娠妊胎動不安下血不止加艾葉阿膠黃芩○血臟虛冷崩中去血過多加阿膠艾葉○血崩加生地蒲黃黃芩一方加阿膠艾葉黃芩○風虛眩暈加秦艽羌活○發熱心煩不得卧加黃連梔子○虛寒脉微自汗氣短自利加乾姜○中濕身重無力身涼微汗加白朮茯苓○筋骨肢節疼及頭疼憎寒加羌活防風藁本細辛○臍中虛冷腹疼腰脊間痛加玄胡索川練子○經水

過多加黃芩白朮○經水澁少加葵花紅花○經水暴下加黃芩○赤白帶下加香附白芷○血痢加阿膠黃連○產後血痢腹痛加槐花黃連嬰粟殼○血熱相搏舌乾口渴加天花粉麥門冬○大渴引飲加知母石膏○臍臑秘澁加大黃桃仁○虛煩不眠加竹葉人參酸棗仁○目暴赤作翳疼加防風羌活防已酒浸龍膽草○因熱生風加川芎二錢半柴胡五錢○虛熱口乾加麥門冬半兩黃芩一兩○產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝

當歸建中湯 治婦人一切血氣不足虛損羸乏

當歸去蘆 肉桂去皮 甘草炙 白芍藥

四兩 二兩 二兩 六兩

每服三錢水一鍾姜五片棗一枚同煎空心熱服

六神湯 治婦人血氣不足肌體煩熱四肢倦怠不進飲食

當歸 地黃 芍藥 川芎各二兩 地骨皮

黃芪各一兩

每服四錢水一鍾煎七分空心溫服

滋血湯 治婦人皮聚髮落心肺俱損血脈俱弱月水過期

益氣養血調進飲食

人參 白茯苓去皮 川芎 當歸 白芍

山藥 黃芪 熟地各一兩

每服一兩水二鍾煎一鍾溫服

補中丸 治婦人虛損諸疾宜常服

川芎 白芍 黃芪 當歸 人參 陳皮

各五錢 白朮 地黃各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十九溫水下

滋陰百補丸 專治女人勞傷氣血不足陰陽不和乍寒乍

熱心腹疼痛不思飲食尫羸乏力

益母草半斤端午日採去土 當歸六兩酒浸 川芎四兩 熟地四兩酒洗 人參

茯苓 玄胡索炒各二兩 芍藥三兩炒 白朮四兩 甘草

香附子一斤炒去毛分四製酒浸四兩鹽水浸四兩醋浸

為細末煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心宿砂湯或醋

湯或酒或滾湯任下

烏骨鷄丸 治婦人虛弱咳嗽吐痰骨蒸勞熱帶下經水不

調瘦倦無力口乾舌燥

人參 五錢 當歸 酒洗 白芍 酒炒 熟地 姜汁浸 白茯苓 去皮

香附 童便浸炒 川芎 陳皮 玄胡索

秦艽 貝母 去心 丹皮 各七錢 甘草 五錢

右用黃芪為末拌飯喂鷄至肥眼生眵縊死燥去毛破開取出腸穢好酒洗淨將前藥入肚內縫定用酒醋等分煮鷄爛撈起焙乾為末鷄汁打糊為丸桐子大每服五十九空心米湯下

玉鑰啓榮丸 治女子無他疾經事調勻容顏不損但久無胎孕先師云婦人者衆陰之所集常與溫居今失所養則子宮有陰無陽不能生發用此丸平調氣血漸生微陽生育之要藥也

人參 白朮 甘草 白茯苓 當歸 川芎

白芍藥 熟地 沒藥 藁本 丹皮 白芷

赤石脂 玄胡索 白薇 各一兩除石脂沒藥另研餘藥酒浸三日焙乾為細末

香附子 去皮毛醋浸三日炒乾為末十五兩

共為細末煉蜜丸桐子大置磁器封固每服五十九空心溫酒下或白湯送下以乾物壓之待月事調勻受娠為度

治血虛腰痛白帶不能生育

當歸

酒洗一兩

川芎

兩半

白芍

酒浸炒

懷熟地

酒蒸

白朮

炒各二兩

人參

茯苓

陳皮

貝母

川續斷

酒洗

破故紙

炒

阿膠

鹿角霜

杜仲

姜汁炒去絲各一兩

香附

醋炒二兩

甘草

炙六錢

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸空心白湯下

人參養血丸

治女人稟受素弱血氣虛損常服補衝任調

月候煖下元生血氣令人有子

烏梅

三兩

熟地

五兩

當歸

去蘆

人參

赤芍

川芎

蒲黃

炒各三兩

為末蜜丸桐子大每服八十九溫酒米飲任下

治肥盛婦人稟受甚厚恣於酒食經水不調不能成胎謂之

軀脂滿溢閉塞子宮

南星

半夏

蒼朮

苔芎

防風

羌活

滑石

水煎服或導痰湯亦可

治怯瘦性急婦人經水不調不能成胎謂之子宮乾澀血少

不能攝受精氣宜涼血降火

當歸

川芎

芍藥

熟地

香附

黃芩

柴胡

水煎服

六味地黃丸

能補婦人陰血不足經事不調無子者服之

有奇驗方見虛損門

百子附歸丸 此藥調經養血安胎順氣不問胎前產後月

事參差有餘不足諸證悉皆治之殊益胎嗣

阿膠蛤粉炒成珠 蘄艾去勳梗醋煮乾 當歸肥大者酒浸去蘆 川芎去蘆

熟地去腦取沉水者 白芍肥長者各二兩 香附赤心者十二兩去毛杵成米水醋各浸一宿

共為末用大陳石榴一枚連皮搗碎東流水三升熬去滓

打糊為丸桐子大每服百丸空心陳米醋點沸湯下

神效墨附丸 治婦人久無子經事不調及數墮胎者

香附子一斤去毛作四分一分好酒浸一分米泔浸一分童便浸一分醋浸各浸一日夜

艾綿四兩用醋二大碗同香附一處煮乾石臼內杵以爛為度捻作錢樣厚大餅以新瓦炭火焙乾搗為末

白茯苓去皮淨 當歸去蘆淨酒浸一宿 人參去蘆 川芎大實者去土淨

熟地用淮生地酒浸九蒸九晒 上等徽墨火煨醋淬各一兩 木香五錢

右為末醋糊丸桐子大每服五十丸空心好酒下

加味益母丸

益母草半斤 川芎 赤芍 當歸 廣木香各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸好酒或童便下

加味養榮丸 服之有孕且無小產之患

當歸酒浸 熟地酒浸 白木各二兩 芍藥煨 川芎 黃芩炒

香附炒各兩半 茯苓 麥門冬去心 貝母 陳皮去白各一兩

甘草錢五 阿膠炒七錢 黑豈大者炒去皮四十九粒

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十九空心鹽湯溫酒任下忌食諸血

四製香附丸 調經養血順氣健脾信服有孕

香附米 一斤作四分一分酒浸一分醋浸各三日瀝乾炒 一分鹽水浸一分童便浸

當歸 酒浸 川芎 熟地 姜汁炒 白芍 酒浸炒 白朮

陳皮 澤蘭葉 各二兩 黃栢 酒炒 甘草 各一兩

右為末酒糊丸每服七十九空心白湯下

壬子丸 依方修合此藥服之不過半月有孕

吳茱萸 白芨 白蘞 白茯苓 各一兩 牛膝

細辛 各五錢 菖蒲 白附子 當歸 各少許 厚朴

桂心 人參 各四兩 乳香 三兩 沒藥 四兩

右為末煉蜜丸桐子大每服十丸空心好酒下用壬子日

修合勿令鷄犬婦人見

琥珀調經丸 治婦人無子能令經正

香附子一斤半斤童便浸半斤好醋浸各七日以好艾擇

去枝梗淨者四兩加入香附內攪勻再加好醋五碗入砂

鍋同煮乾為度晒乾為末另加後藥

當歸 酒洗 川芎 熟地 酒蒸另搗 生地 酒浸另搗

芍藥 煨各二兩 琥珀 一兩另研

右為末共一處再搗極細醋糊丸桐子大每服百丸空心

艾錯湯下

濟陰返魂丹 又服亦能令婦人有子即益母丸

如聖丹 治婦人赤白帶下月經不來不能成孕

白礬蛇床子等分為末醋糊丸彈子大胭脂為衣薄綿裹
留綿帶二尺許打一大結長留在後只以綿裹藥丸深入
玉戶中定坐半日熱極再換大抵月水不通赤白帶下多
因子宮不潔服藥難効此藥易痊亦且効速不傷臟腑能
生子嗣

雛鳳丸 服之即孕

用頭窠烏骨鷄雌雄各一隻置放一處不可與群鷄相混
候生卵時初生頭卵記放待生卵數足將初生卵頂巔上
開一竅用辰砂三錢當歸芍藥川芎熟地各二錢細末將
卵黃傾出和藥末仍入殼內以厚紙封之衆卵內覆之待
群鷄生將藥卵出殼窠丸空心好酒服三四十九極効

製附丸 寧波二守龍葵陽傳試驗者

香附 半斤二兩 梔子煎湯浸一宿 二兩酒浸一宿 二兩薑

右晒乾為末米醋糊丸桐子大每服七八十九空心鹽湯
下忌豆腐蘿蔔燒酒

婦人氣血不足子宮虛冷不能成孕者灸子宮三穴各七壯

揣心坎中高骨以墨記之用草心一條從墨記至臍中折
斷摺作七分以四分量臍上灸之補血三分量臍下灸之

補氣仍以臍下三分折半正子宮穴灸之溫暖精氣受孕

婦人如欲不生子者於臍下二寸丹田穴灸二七壯終身不孕

子嗣 男子服

秘傳金鎖思仙丹 治男子嗜慾過多精氣不固澁以去脫之劑也

蓮花蕊 十兩忌地黃蒜 石蓮子 十兩沉水者佳去內青慈取粉 鷄頭實 十兩晒乾

右以金櫻子三斤取霜後半黃者木白中杵却刺擘為兩

片去子水淘淨鴉爛入砂鍋水煎不絕火約水耗半取出

瀝過重煎如稀餲如乾者水浸軟去子煎令如法入前藥

末和丸桐子大每服三十九空心鹽湯下一月不走泄候

女人月信住取車前子一合水煎空心服之一交感即孕

平時忌葵菜車前子

巨勝子丸 治右尺命脉虛微欲脫陽痿不舉陽脫之證

熟地 酒蒸二兩 生地 酒洗二兩 赤白何首烏 刮去皮黑豈蒸勿犯鐵器各四兩

牛膝 去蘆一兩五錢酒洗 天門冬 去心二兩 枸杞子 二兩 木香 五錢酒洗

從容 酒洗去甲膜二兩 巨勝子 一兩 兔絲子 酒煮搗成餅晒乾三兩

楮實 一兩 白茯苓 二兩 栢子仁 一兩 酸棗仁 炒一兩 破故紙 炒二兩

巴戟 去骨二兩 北五味 錢五 覆盆子 二兩 山藥 二兩 續斷 酒洗二兩

鷄頭子 二兩 川椒 炒去汗目五錢 葫蘆巴 二兩 蓮花蕊 二兩

韭子炒一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸空心温酒下

大補陰丸 治左尺腎脉洪大或數遺精活血壯水之要藥

也方見虛損門

補陰丸 治左尺腎脉洪大或數遺精元氣不固補陰制火

之藥也方見虛損門

加味虎潛丸 治左尺腎脉虛數精神短少腰膝無力補腎

養血之劑也方見虛損門

六味丸 滋腎水生肝木補精益血最利子嗣方見虛損門

八味丸 治兩尺脉微弱陰陽俱虛雙補之劑也方見虛損門

補天丸 治六脉虛微氣血衰弱虛勞證

紫河車一具男用女胎女用男胎俱以初胎為佳若不可

黃柏酒炒龜板炙杜仲酥炙牛膝酒浸各二兩陳皮一兩

冬加乾姜五錢夏加五味子一兩共研

右以紫河車水洗淨布絞乾用酒煨熟入諸藥末共搗勻

焙燥再為細末酒糊丸桐子大每服百丸空心温酒或椒

鹽湯下

五子衍宗丸 男服此藥添精補髓疏利腎氣不問下焦虛

實寒熱服之自能平秘舊稱古今第一種子方

甘州枸杞 兔絲子酒蒸搗餅各八兩覆盆子四兩酒洗去

遼五味子

車前子

淨各二兩

右共為細末煉蜜丸桐子大每服空心九十丸上床時五
丁丸白湯或鹽湯下冬月溫酒下修合春取丙丁巳午夏
取戊己辰戌丑未秋取壬癸亥子冬取甲乙寅卯等日忌
師尼鰥寡及鷄犬六畜見之

十精丸 精寒陽痿甚者服此藥紅鉛極熱又有從容官桂

漢椒故也

枸杞子

甘菊花

兔絲子

酒蒸搗成餅各二兩

山茱萸

去核

天門冬

去心白茯苓

各三兩

淮熟地

用生者酒蒸九次四兩

肉從容

酒洗去鱗膜

官桂

漢椒

去目各一兩

右為細末入紅鉛煉蜜丸桐子大每服三十九空心鹽酒
溫臍種子法

五靈脂

香白芷

青鹽

各二錢麝香

右為末以蕎麥麪湯和搓成條圍於臍上以前藥實其中
用艾灸之但臍內微溫即好不過二三度

一方用艾一大團將鹽填滿臍中灸之痛即換鹽艾盡為度
一日不完作二三日灸

鹿角膠丸 精寒陽痿無子者服之

鹿角膠

半斤

鹿角霜

四兩

天門冬

二兩去心

麥門冬

二兩去心

黃栢

鹽酒炒褐色四兩

知母

酒洗去毛二兩

虎胫骨

酥炙二兩

龜板水浸刮去浮殼酥炙二兩 枸杞子四兩 山藥二兩 茯苓三兩去皮

肉苁蓉酒洗去浮甲白膜二兩 山茱萸淨肉四兩 破故紙炒二兩 生地酒蒸九次

當歸酒洗各四兩 兎絲子酒黃搗成餅焙乾六兩 白芍酒炒二兩

牛膝去蘆酒洗 杜仲姜汁炒去絲各三兩 人參去蘆二兩

五味子一兩

共為末酒化鹿角膠丸桐子大每服百九空心鹽湯或酒

延生護寶丹 補元氣壯筋骨固精健陽老年無子宜服

兎絲子酒黃搗焙乾為末二兩 茯苓酒洗去甲膜二兩再用酒四升浸者時取起焙乾酒聽用

韭子四兩用棗二兩煮熱去棗將韭子再用酒浸一宿焙乾用三兩 木香半兩

蛇床子三兩用棗二兩煮熱去棗用二兩 白龍骨一兩用茅香一兩同煮一日去香綿裹酒浸一宿

晚蚕蛾全者二兩炙 鹿茸一兩酥炙黃 桑螵蛸一兩炒 蓮實炒

乾蓮蕊 胡蘆巴各一兩 乳香另研 丁香各半兩

麝香一錢另研

除乳香麝香兎絲子末外十二味同為末將前兎絲子末用前浸藥酒二升文武火熬至一半入蕎麵兩匙攪勻次

下乳香麝香等不住手攪熬如稠糊放冷和藥如硬再入

酒少許搗下丸桐子大每服五十九空心酒下

種子方 寧波龍二守傳試驗者

魚膠八兩陳下者佳切碎蛤粉炒成珠 當歸酒洗一兩 沙苑蒺藜一兩微炒

右為末煉定丸桐子大每服七八十九空心鹽湯下男服

此藥服製附丸各養百日後交會即有子

種子之法必先寡慾靜養使精氣冲實然後擇壯盛女子俟其行經後第一日第三日與之交媾必生男第二日第四日則生女至五六日無用矣縱孕亦女胎此已試之成驗也今醫家往往誇談種子成方若持符券而不知夫人所以艱嗣之故蓋非一端有因自幼斷喪耗其精氣者有因精寒不能成胎者有精滑易洩不足構女之陰者有經久不洩女不能承而不孕者有過服熱藥胎毒盛而子難育者是在內而藥非可執方而論也如一味助長而服熱藥是惟無益而反害之矣若夫至本至要則又在方寸心術之間倘一念善天必予以賢嗣一念惡即有子不肖與無子同可不慎歟此又出於方之外者也

小兒諸病

肝與脾病多肝只有餘腎只不足病因有二曰飽曰暖藥品與大人同只劑料小耳

小兒諸症總訣

察小兒之諸症緣病在於胎中乃保育之失調致百病於孩童稟氣之清且厚者則首脈堅而壽長面氣之濁且薄者則首體弱而病無窮稟受各異厚薄不同入門觀色青必驚而白必冷啓關察脈赤乃熱而黑乃凶寒必傷於肺腑熱則蘊

於心胃寒能作痛熱能生風夜啼不止皆因孕母胎驚哭聲
欠高乃是受胎不足胎中受寒生下則面色青白而啼哭不
乳胎中受熱生下則驚口瘡瘍而重舌赤瘤內傷於寒者不
吐則瀉外傷於熱者有風必驚驚哭夜啼當以鎮心為要多
啼不止還宜煖胃為先面目青紅定是肝心受熱面黃慘淡
乃知脾胃生痰吐而不食清胃口而飲食自進薑茶黃真去
積食而腸胃自通○小兒無脈觀虎口三關可見一為風關
寒在肺腑則紋或青或白熱在心胸則紋或赤或紅二為氣
關青黃定然傷食傷風紋上赤紅乃是驚風發熱三為命關
赤紋在而可醫可救黑色過關難治難攻小兒不語驗五指
寒熱可知中指冷積食痘疹中指熱傷風傷寒五指稍冷驚
風立見○急驚卒然潮熱手足搐掣雙目直視痰涎湧塞治
當退熱行痰○慢驚得于大病之餘吐瀉之後過服寒涼之
藥轉致脾胃虛損風邪乘之眼慢騰騰手足瘳癱面色青白
四肢皆冷必先理氣溫補脾元元氣一盛痰氣自下○慢脾
由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極惟脾所受故曰脾風面青
額汗貶目咬牙身體逆冷手足搐掣急與煖脾回陽十救一
二診大冲脉灸百會穴不醒神氣已脫決無生意○天癩客
忤之疾皆關於心心為怪物異人所觸以致面赤發熱驚搐
不止欲治此疾必求諸心○丁奚肺露之症皆屬於脾外為

風寒暑濕所傷內為飲食不節所損以致肚腹高膨手足細
小寒熱相兼喘急不止頭骨開解翻胃退食治以調胃為先
○病有兒未能行母腹懷孕兒飲此乳而作疾下痢寒熱毛
髮不潤醫者善調脾胃其疾可瘳○口流清水唇紅面白虫
痛也當安其虫而順其氣其痛自止面黃身冷日夜啼號腹
痛也宜調其脾而煖其胃其疾自除○盜汗煩渴不止者心
脾受熱也宜止汗散涼心安神而汗止渴消○暑瀉引飲不
止者膀胱受熱也宜用五苓散利水道而陰陽自分○變蒸
之候變者上氣蒸者體熱其狀似驚上唇有白泡如珠以惺
惺散主之○五臟所因心屬火夏旺節氣合小腸為腑其色
赤性主苦熱則驚搐冷則氣痛治心者先息火而症可安○
肝臟屬木春旺節氣合膽為腑其色青性主辛酸心與肝連
心火熱則生風二臟相搏風火相爭故發搐掣治肝者先瀉
心火則肝自退○脾臟屬土旺於四季辰戌丑未月各十八
日合胃為腑其色黃性好甘美不受苦澁飽則傷脾飢則傷
胃霍亂吐瀉生瘡生痰五疳五疳腹痛疳積飲食不節調和
失期皆傷於脾先培其土則諸疾可治○肺臟屬金秋旺節
氣合大腸為腑其色白性好清淨肺主氣懸於上為五臟之
華蓋諸家之疾皆出於肺寒則生痰作嗽熱則作喘作急先
散其氣則諸疾可醫○腎臟屬水冬旺節氣合膀胱為腑其

色黑性喜鹹腎本虛疝氣竄於上焦生牙疝垂瘡害人最速
諸家之病皆出於腎水生火降百病不生火上水下真元易
竭○痘疹五臟各有一症要識生死須明順逆肝臟水泡肺
臟膿泡心臟發斑赤色而小脾經發疹色黃微赤歸腎變黑
青紫乾陷春夏為順秋冬為逆痘始出時先發驚搐而後發
瘡者生如瘡已出而後發搐或吐或瀉者死先發熱乳食大
便如常其瘡紅活雖不服藥自然無害瘡已發而後泄不止
者死瘡癢而忽瀉膿血痂皮者順腹中有瘡也瀉血而水谷
不消者逆脾胃虛也或瀉血而瘡壞無膿者亦不可救胃爛
也秋冬寒腎水得時其瘡黑色此腎症難治春膿泡金尅木

夏黑陷水尅火秋發斑火尅金冬發疹土尅水俱逆症又癩
疹瘰後發驚搐者死鼻有黑氣風攻頤頷唇項腫硬咳嗽氣
喘停耳心痛四肢虛浮肚高而突已上狀症皆不可治○小
兒之疝皆起於脾失調理病傳各臟症類不同其名有五心
之疝驚疝也面赤唇紅舌上生瘡小便赤澀煩熱盜汗是也
當清熱鎮驚利水為先肝之疝風疝也搖頭側目白膜遮睛
頭焦髮豎痢青多淚面青是也當驅風散邪消熱養血為主
脾之疝食疝也面黃肚大水穀不消減食吃泥瀉下酸臭是
也當行滯消積調理脾胃為安肺之疝氣疝也咳嗽喘急毛
焦皮燥壯熱惡寒鼻流清涕面白是也當清金補脾利水次

之腎之疳急疳也腦熱肌削齒爛泄瀉足冷身多瘡疥面黑是也當補養脾土後治其疳○吐瀉所因寒吐寒瀉煖胃為先熱吐熱瀉清胃理氣積吐積瀉宜用化食風痰驚瀉當先治痰濕吐濕瀉專用腥脾○藥有三不可忽一熱不可下小兒氣弱下則脾胃易虛反生他症當先化食清熱溫平之藥則熱可消二痢不可止初作即止留毒在內反為所害必用化滯通利之劑則痢自止三瘡不可截截之太早反為不美當快脾化痰其瘡自退○傷寒三因一因夾食胃中宿食不化外感風寒面青潮熱口吐酸氣磁煎不乳夾食傷寒也先宜化食而後退熱消食則吐止身涼二因夾驚閉紋紫赤面

紅發熱或時驚跳頭疼煩悶啼哭不乳夾驚傷寒也當解前之則驚自定三因兩感傷寒胸滿氣促咳嗽生痰增寒壯熱嘔吐煩渴頭疼昏悶惡風自汗驚哭不乳兩感傷寒也宜用和解其疾可除○病有四不治眼上赤脉顛腫反陷魚口氣粗嚙齒咬人冷汗如雨痰熱不退臍風撮口鎖肚吊腸皆不治之症也○嗔夫治幼之術不患病之難治惟患識之不真苟識病以施治何藥餌之勿靈

浴初生兒法

初生兒洗浴不可先斷臍帶候浴畢方斷不致水濕浴時當護兒背勿令風入用桃柳槐桑枝煎湯入猪膽汁一枚

候溫洗之

兒初生臍帶剪下即以枯礬一撮摻上臍帶頭上仍用艾灸
三火包裹並無臍風之患

郵倍兒初生下即灸顛門火毒所入令兒不能嘗及生奶牙
鵞口之疾從而挑刺之進風多不可救切勿信倍輕灸戒
之戒之

兒初生先用甘草煎濃汁以綿裹指蘸汁拭口次用黃連煎
濃汁拭口次用硃砂細研水飛煉蜜為丸如豈大乳汁化
三日內進一粒極解胎毒鎮心安神

下胎毒法

初生兒用淡豆豉煎濃汁與三五口隨以硃砂為細末蜜
調與三五口其毒自下

延生第一方

小兒初生臍帶落後取置新瓦上燒烟將盡放地上以盞覆
之存性研末若臍帶有五分重配水飛過硃砂細末二分五
厘生地黃當歸身煎濃汁調抹兒上臍及母乳上使藥下盡
次日大便遺下胎毒穢物可無瘡疹諸疾生一子得一子十
分妙法也

天一丸 治小兒百病

燈心

十斤以米粉漿洗晒乾研末入水澄之浮者為燈心
取出入藥二兩半

茯苓去皮 茯神去皮木各兩半 滑石水飛五兩 猪苓去皮五兩 澤瀉去毛三兩
人參一斤去蘆煎膏一方 人參六兩 白朮六兩 甘草四兩
同煎膏

為細末以人參膏和丸如龍眼核大硃砂為衣外貼金箔
任病換引服大約小兒生理本天乙生水之妙凡治病以
水道通利為要也

初生兒腹脹欲絕大小便不通急令母嗽口吸啞兒背脊心
與手足心臍下共七處以紅赤色為度須臾即通

臍風撮口

歌曰小兒臍風名不一胎風鎖肚腸吊疾更有卵疝共五狀
皆由濕熱風相擊口吐白沫手足冷唇面紫色風投極肚大
筋青啼哭多撮口不乳四肢直藥用宣利使氣通斬關奪命
丹為急

小兒初生七日患臍風撮口者齒齦上有小泡如粟米狀急
以溫水蘸青軟綿裹手指輕輕擦破即安不用服藥

治撮口 小兒斷臍為風濕所乘或尿在抱裙之內遂成臍
風面赤喘急啼聲不出名曰撮口並皆治之

蜈蚣一條赤脚 蠍稍四尾 姜蚕七枚 瞿麥五分

為末先將鷲毛管吹藥入鼻使噴嚏啼哭為可治後用薄
荷湯調下

辰砂姜蚕散 治初生兒口噤

辰砂

五分 姜蚕

去嘴炒

蛇脫

炒

麝香

半分

為末用蜜調敷唇口

斬關奪命丹 治臍風撮口此藥成粒送下不可調化初生

兒痰盛者亦可用以打痰

膽星

明天麻

白附子

炮各 賦粉

四錢

芭荳

去殼研

全蠍

洗炙

滑石

各一錢

蟾酥

三分

右為細末米糊丸麻子大茶湯下

灸法 臍風若成必有青筋一道上行至肚而生兩岔宜灸

筋頭三壯截住若見兩岔即灸兩岔筋頭各三壯十活八

九進則上行攻心而死矣

又法撮口臍風以小艾炷隔蒜灸臍中候口中有艾氣即可

得生

驚風

急驚

慢驚

胎驚

急驚歌曰熱極生風作急驚卒然目霎有痰鳴面青臉赤頻

牽引實執涼驚與利驚金箔鎮心羌活散稀涎更下滾痰輕

搐而不已頻多汗生死還須自曉明

慢驚慢脾歌曰過服寒涼大病餘或因吐瀉久成之脾虛胃

弱虛邪入眼慢騰騰搐四肢面色白青身厥冷痰涎額汗露

睛微或兼下痢終難治並用溫脾與醒脾

胎驚歌曰壯熱腮紅心不寧四肢抽掣有痰生時時嘔吐身

強直半歲中由胎受驚又有項間生大塊此名驚氣積而成
消痰清熱須先理定魄安神要鎮驚

天癆歌曰天癆原由積熱生涎朝心絡又多驚雙眸翻上唇
多燥項強痰鳴手爪青

治驚風大凡先要行痰一見牙關鎖禁先以稀涎散一二匙
用白湯調灌入喉中如口禁不下即從鼻中灌入牙關少
舒即以鷲翎蘸姜汁頻探喉中令吐風痰進滾痰丸先使
其下降然後用四磨湯以行其氣氣行則痰行稍得甦醒
以金箔鎮心丸抱龍丸次第與服如痰盛不得吐用姜汁
竹瀝三四匙灌之又以吹鼻散搥紙蘸藥取嚏依法而行
不得嚏或啼聲不出口噤不醒額汗如珠遺尿噴藥者決
不可治矣

丹溪謂驚風有二慢驚屬脾虛當溫補脾胃次以鎮驚用硃
砂安神丸參朮湯下急驚屬痰熱宜清涼之劑安神退熱
降火下痰丸主之世人以一藥通治之甚妄也

上竅搖頭咬牙額紅是心熱黃連甘草○目連開閉是肝
風柴胡防風甘草○左腮紅是肝熱瀉青散○右腮紅是
肺熱瀉白散○鼻上紅是脾熱瀉黃散○顴上紅是腎熱
知母黃柏炙甘草○無故驚跳忽然大叫必死是火大發
氣虛甚也

稀涎散 治痰壅喉閉牙關緊急

猪牙皂角 明礬 各等分

為末每服二匙白湯調下要吐加瓜蒂

搐鼻散

半夏 細辛 荊芥 各一錢 牙皂 五分 麝香 少許

右為末用紙捲蘸藥入鼻中取嚏

四磨湯 治氣壅痰滯腹脹行氣之藥氣行則痰行

檳榔 木香 枳殼 烏藥 姜湯磨服

治小兒牙關不開用南星末一錢腦子少許研勻以紙捲姜

汁染藥於左右大牙根上擦之立開

人參羌活散 截風定搐豁痰安神

柴胡 天麻 前胡 人參 枳殼 茯神

羌活 桔梗 陳皮 防風 姜蚕 甘草

水煎入姜汁竹瀝服○痰盛加南星○瀉加澤瀉訶子○

大便結加皂角○昏迷加黃連○壯熱加黃芩○嗽加杏

仁○天癩加鈎藤○心跳加當歸○胸悶加枳殼○目連

睚動及肝風加青皮黃連

醒脾飲 治慢驚慢脾風

人參 白朮 橘紅 白附子 甘草 炙 茯苓

石菖蒲 藿香 天麻 木香 乾姜 炙 蓮肉

陳米百粒姜棗水煎服○瀉加訶子○不出聲倍加石菖蒲○搗加全蠍蟬退○渾身厥冷加製附子

錢氏保和錠子 治小兒急慢驚風

辰砂水飛人參 白朮 茯苓去皮 茯神去皮 山藥

赤石脂煨七次醋 乳香各二錢半 礞石硝煨金 牛黃

姜蚕 五靈脂 麝香各五分

右為末糯米糊杵千下成錠量兒大小薄荷湯磨下

抱龍丸 治風痰壅盛驚搐昏睡

雄黃 辰砂水飛 天竺黃各四錢 麝香一錢

膽星八錢以南星為末臘月牛膽汁拌仍入膽中陰乾百日用陳者尤良拌過三次者可當牛黃

右為細末甘草煎濃汁丸芡實大辰砂為衣薄荷湯下

琥珀抱龍丸 治慢驚脾胃虛弱風痰壅盛心竅不利

琥珀三錢 人參去蘆 天竺黃五錢 犀角三錢 膽星一兩二錢

茯神去皮 明天麻各七錢 山藥一兩 雄黃五錢

麝香一錢 辰砂水飛 五錢 甘草炙 三錢

右為細末煉蜜丸芡實大金箔為衣蠟固封薄荷湯下

辟異錠子 治風壅痰熱怖悸煩狂譫妄急驚搐搦

紫河車草用根五錢黑芷煮過 甘草炙 牙硝枯 各錢

人參二錢 白朮五錢 茯苓去皮 膽星二錢 明天麻八錢

防風五錢 麝香一錢 姜蚕三錢 龍腦一錢 辰砂五錢 水

全蠍 十二個洗炙

右為細末山藥糊和作錠子金箔為衣薄荷湯磨下

金箔鎮心丸 鮮熟退驚安神除煩燥止夜啼

全蠍 十筒洗炙去毒 天麻 防風 去蘆 羌活 去蘆 牛黃

赤茯苓 去皮 犀角 甘草 麝香 辰砂 各一錢水飛

金箔 二十片

為細末煉蜜丸艾實大薄荷燈心湯下

安神鎮驚丸 治脾胃虛弱風痰壅塞昏睡不醒驚悸搐搦

人參 去蘆 白朮 炒 白茯苓 去皮 明天麻 膽星 橘紅

麥門冬 各五錢去心 甘草 炙一錢 桔梗 姜蚕 各三錢 木香 半錢

辰砂 二錢水飛 全蠍 十筒洗炙 麝香 一錢 酸棗仁 炒五錢

右為細末煉蜜丸艾實大每服一九隨飲子下○驚風薄

荷湯下○傷風荆芥湯下○夜啼燈心湯下○搐搦防風

湯下○慢驚冬瓜子仁湯下○常服薄荷金銀湯下

保驚丸 治小兒諸驚

明天麻 一兩 白附子 五錢 防風 八錢 蟬脫 八錢 荆芥 一兩

膽星 一兩五錢 半夏 法製者 白朮 一兩 茯苓 去皮 川芎 八錢

粉草 四錢 姜蚕 炒五錢 土硫 五錢 羌活 八錢 當歸 五錢

全蠍 洗炙三錢 牙皂 去皮筋 人參 各四錢 山藥 一兩 雄黃 三錢

麝香 二錢

右為末米糊丸龍眼肉大硃砂為衣量兒大小服○驚風薄荷湯下○冷吐瀉乾姜豈菟湯下○熱吐瀉木瓜湯下○焦燥不寧桃橘葉各七片炒葱姜煎湯下○溫症用一丸遍身擦過燈心薄荷湯服一丸○夜啼燈心柿蒂湯下○受驚糞清薄荷湯下

定心丸 治諸舛驚症

明天麻 人參 桔梗 遠志去骨 姜蚕炒 羌活

蝉退去頭 荆芥 薄荷葉 茯苓 白附子姜汁炒

全蠍去頭 木香各錢 膽星 防風去蘆各二錢半

山藥一錢 甘草三錢

右為細末蜜丸榛子大辰砂為衣薄荷湯下

回天保嬰丹

明天麻三錢糯米炒 膽星三錢 麝香一錢 雄黃三錢

白附子三錢包煨 半夏三錢姜汁製 姜蚕一錢炒去絲

牙皂一錢酒洗炒黃色 枳實一錢酒炒 全蠍一錢洗去塩去頭足焙乾

牛黃五分 芭荳三十粒水浸三日聽用 北棗三十箇

前藥各為細末將棗溫水泡去皮核每棗一箇入芭荳一粒麵包煨熟去芭荳不用以棗肉搗爛為丸如桐子大硃砂一錢水飛過同金箔為衣○急慢驚風先用姜湯下一丸後用燈心湯下一丸○疳積用陳皮山楂湯下○嘔吐

藿香湯下○痰喘薄荷湯下○痰壅四肢不遂姜湯下

珍珠丸 治小兒急慢驚風痰涎壅盛顛狂譫妄等症

天花粉 三錢 姜蚕 炒去絲 珍珠 豆腐內煮 半日三錢 人參 三錢

膽星 四錢 雄黃 二錢 辰砂 五錢水飛 琥珀 二錢

礞石 煨 三錢 犀角 三錢 麝香 五分 牛黃 七分

甘草 一錢 冰片 二分

右為細末竹瀝丸芡實大硃砂為衣薄荷湯下

瑞金丸 治小兒風痰喘急并喘嗽驚悸

膽星 五錢 半夏 一法製 廣陳皮 去白一分 旋伏花 一錢五分

杏仁 去皮尖炒 一錢 紫蘇子 微焙 一錢 甘草 稍 八分

貝母 錢五分 牛黃 七分 人參 一錢 桔梗 一錢

各為淨末合一處皂角煎汁浸蒸餅入姜汁五匙丸如黍

米大一歲兒一分三歲三分淡姜湯空心服○有真羚羊

角入一錢更妙

星石降痰丸 治小兒驚風痰壅喘急

青礞石 煨硝四兩 將礞石槌碎拌勻入磁瓶內以瓦蓋之

南星 掘地坑敲實炭火燒紅將米醋二碗潑下隨下南星

製過礞石 二兩 製過南星 二兩 辰砂 一兩水飛 沉香 一兩

滑石 一兩 甘草 水煮過 猪牙皂角 淨去皮 瓜蒌仁 貝母 各七

黃芩 枯礬 荊芥穗 各五錢

右為末姜汁煉蜜丸龍眼核大白湯化下大人亦可治
寧神丹 治小兒急慢驚風

膽星 一兩 天竺黃 錢八 姜蚕 錢五 全蠍 錢四 鈞藤 四錢

明天麻 錢五 山藥 四錢 琥珀 珍珠 錢各三 牛黃 二錢

雄黃 麝香 各一錢五分

右為細末甘草煎膏丸芡實大辰砂為衣每服一九薄荷
湯下○慢脾風四君子湯下

奪命丹 治急驚不省人事眼定不動牙關不開唇白并黑

南星 姜汁和成餅 半夏 姜汁製 辰砂 水飛各四 金箔 十片

珍珠 二錢 芭荳 去殼去油 輕粉 五分 銀箔 十片

麝香 五分

共為末糊丸黍米大一歲一九燈心湯下

礞石散 治急慢驚風痰壅塞喉命在頃臾

青礞石一兩入砂鍋內同焰硝一兩火煨通紅消盡為灰
候冷如金色研為細末濃煎薄荷湯入蜜調服

青黛丸 治小兒驚風發熱

膽星 五錢 茯神 五錢 天竺黃 三錢 紫胡 二錢 明天麻 二錢

防風 二錢 全蠍 洗炙 錢二 青皮 二錢 硃砂 水飛 錢二 金箔 十片

麝香 一錢

右為細末煉蜜丸芡實大青黛為衣金箔裹之薄荷湯下

治小兒驚風痰嗽時作潮熱

南星半夏各四兩米泔水浸透為度切片晒乾再用姜汁
浸一日夜晒乾濃皂角水浸一日夜洗晒乾礬水浸一日
夜晒乾朴硝水浸一日夜洗晒乾入辰砂五錢麝香三錢
研末滴水丸芡實大○驚風金銀湯下○有熱薄荷湯下
○咳嗽人參五味子湯下○冬加川烏夏加礬砂尤妙

治小兒風痰

南星 一兩用白礬五錢
水泡浸晒乾

白附子 二兩

右為末麵糊丸芡實大每服三九姜蜜薄荷湯下一方用
牛旁子炒研細加痰藥中甚效

封顛法 百日裡外兒可用

麝香 半字 蠍尾 去毒五分 薄荷 半字 青黛 一字

右為末棗肉研成膏新綿上塗勻貼顛上四方出一指許
火上灸

驚風子母俱服

人參 白朮 各一錢 茯苓 陳皮 各五分 甘草

薄荷 各二分 半夏 天麻 各七分 細辛 二分 全蠍 炒去毒五分

姜三片水煎服

治感冒發熱驚搐

人參 羌活 各一錢 獨活 柴胡 天麻 各七分 川芎

茯苓

甘草

枳殼

桔梗

各四分

全蠍

三箇去毒

去

地骨皮

三分

前胡

七分

姜三片棗一枚煎服

錢氏白朮散

治脾虛吐瀉成驚

藿香

白朮

木香

白茯苓

甘草

人參

各一錢

乾葛

二錢

右為末每服一錢至二錢水煎服○頻瀉將成慢驚加山

藥扁荳肉菓各一錢入姜汁一匙煎服○慢驚已成加細

辛天麻各一錢全蠍三箇白附子八分

牛黃清心丸

治小兒狂亂驚癇痰涎壅塞精神昏憤方見痰門

紫金錠

治小兒急慢驚風五疳五痢癰疹瘡瘤并昏憤不

省牙關緊急薄荷湯磨服

方見痰門

灸法 治驚風男左乳女右乳俱黑肉上週歲者三壯二三

歲者七壯又慢驚急於兩脚面陷中動處乃大衝脉也灸

五壯或七壯又灸百會穴五七壯亦有痔生者其穴直取

以兩耳尖折中在頭之中心端正旋毛處是艾炷如麥粒

灸後以醒脾散調補之

治小兒角弓反張雙目直視用南星半夏竹瀝姜汁灌之更

灸印堂又灸法於小兒項頸第一骨節各天柱穴上灸三

艾頭即直艾炷如菘荳大

定志丸 治驚風已退神志不定

琥珀

茯神去皮木

遠志甘草湯泡去骨

人參

明天麻

天門冬心去

白附子

酸棗仁炒

甘草炙各等分

右為末煉蜜丸皂子大辰砂為衣燈心薄荷湯下

鈎藤飲 治小兒天吊壯熱驚怖眼目反張手足抽掣

全蠍炙

蟬脫

姜蚕炒

明天麻

犀角

膽星

青黛

辰砂各等分

右為末猪膽汁丸菴荳大井花水調一丸入鼻令嚏次以

鈎藤湯調六丸服

虎睛丸 治癩症邪氣入心

虎睛一對

遠志肉姜製一錢

犀角一錢

石菖蒲一錢坐

茯神去皮木一錢半

法製半夏二錢

麥門冬去心一錢

人參一錢

膽星三錢

琥珀一錢

麝香五分

右為極細末甘草膏丸芡實大硃砂為衣每服一丸金銀

竹葉燈心湯下

牛黃膏 治小兒風癇

牛膽南星

川黃連姜汁炒

全蠍洗炙

蟬脫去足各二錢半

姜蚕炒

白附子

防風

明天麻煨各一錢半

木香一錢

麝香五分

右為細末蒸棗去皮核取肉研成膏丸如小荳大荊芥生

姜湯研化食遠服

驚風不治歌

驚風精定要推求口禁唇焦脉數憂眼合不開并窺睛面緋
面黑手難收口張吐沫氣粗大髮直搖頭汗不休對喉鳴
兼鼻冷遺尿瀉血總難瘳

慢驚不治歌

大凡陰症少人知睡困唇焦口角垂髮直乾啼牙齒露鼻乾
黑燥最難醫鯽魚口動何須治項軟鴉聲墮四肢張眼看人
睛不轉孩兒魂已入陰司

驚癇慢脾死候歌

驚癇風邪傳在脾遍身虛汗似膠珠眼閉不開常若睡發搐
牽抽總不宜

小兒安神丸 治小兒夜啼驚怖消痰定喘

茯神去皮 山藥各一兩 膽星二錢 天竺黃 酸棗仁炒

陳皮各五錢 山梔仁 姜汁炒三錢 黃連 姜汁炒二錢

桔梗三錢 甘草錢 辰砂四錢 水飛

右為末煉蜜丸芡實大每服一九燈心薄荷湯下

治小兒夜啼

人參 黃連炒 甘草各錢 竹葉二十片

作二貼姜一片水煎服

清神丹 治夜啼

山藥 歸身

遠志甘草湯浸去骨 白茯苓 辰砂各六錢

麥門冬去心五錢

川黃連姜汁炒 貝母去心 人參

白木炒各四錢 酸棗仁炒五錢

甘草炙二錢

右為細末竹瀝丸如芫荳大辰砂為衣米湯化下

又方用燈花三顆辰砂少許細研密調塗乳上與兒吮之

寒胎寒 臟寒 中寒 寒嘔 寒瀉 寒脹 冷痢 胃寒 不食 嘔乳 心腹寒痛 寒積不散 盤腸內癩 育脈疝氣 寒疝 夜啼 以上皆寒症

歌曰百日胎寒與臟寒中寒內癩疝同看俾傷食積留中脘

吐瀉頻啼乳干吐出不消純下白四肢厥冷夜驚煎如斯

已上皆寒症萬勿差醫變病端

理中湯 治胃寒嘔吐心腹絞痛一應內外寒症

人參 白木 乾姜煨 甘草炙

姜三片棗二枚水煎服○凡胎寒臟寒則手足拳曲面青

白腸鳴口冷啼哭身顫或噤口不乳加木香肉桂煨芍藥

○凡中寒腹痛疝氣從小腹引至心胃中口吐清水面青

白手足厥冷加吳茱萸小茴香川棟子青皮枳殼○凡寒

吐乳片不消多吐少吐瀉痢青白小腹作痛加木香半夏

嘔甚加丁香○凡脾胃受寒飲食少進作飽不消加丁香

山查○凡寒脹腹大虛膨筋青內痛喜食熱物加大腹皮

檳榔木香○凡貴豚疝氣狀如筆管并上即痛似小腸有

物胃中積寒也加澤瀉乾姜青皮木香○凡嘔乳口角流涎不消飲食加枳殼藿香○凡寒疝夜啼更盡則伏卧哭多睡少天明則已腰面額汗眼中無淚面色青白漸入盤腸加鹽炒茴香吳茱萸○凡盤腸內癰身躬偃倭氣不舒暢加硝砂吳茱萸木香沒藥葱白

鈎藤膏 治內吊腹痛

乳香 沒藥各三錢 木香 姜黃各四錢 木鱉子十二箇

先將木香等三味為末同乳香沒藥研極細拌勻煉蜜成劑收磁瓶內量兒大小加減煎鈎藤湯化下次服木香散
木香散 治盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼叫尿如米泔

川棟子七箇去皮核用芭豆三十五粒去皮同炒令豆黃去豆 木香 史君子肉炒

玄胡索 茴香炒各一錢

右為末清米飲空心調下量兒大小服

乳頭散 治小兒寒痛夜啼

黃芪 當歸 甘草 赤芍 木香各等分

右為細末塗乳上令兒吮之

吐瀉

歌曰小兒吐瀉何以分傷食冷熱有所因肚熱脚冷不飲食日晡潮熱往來生面黃肚腹餒酸吐瀉而不化兼臭腥急瀕消導香稜劑依方施治能通靈

香椽花 溫脾消積

川棟子炒 茴香炒 蓬木各一兩 木香 三稜各五錢

右為末醋糊丸桐子大每服二十九姜湯下

加減五苓散 分理陰陽

猪苓 澤瀉 白朮 茯苓 肉桂

姜棗水煎服○吐瀉並作加水香蒼朮藿香○腹痛加煨

芍藥○寒吐寒瀉乳片不消下痢腹痛加煨乾姜枳實○

寒甚者加檳榔草菓○熱吐熱瀉則吐黃水瀉下如筒加

炒黃連黃芩去肉桂○脾胃受濕倍加白朮半夏○吐瀉

久而虛弱加人參白朮山藥○久瀉加訶子肉菓○久吐

加丁香○小便不利加滑石○飲食不進加益智大腹

虛脹加蘿蔔子大腹皮○胃膈飽悶加枳殼○胃口作痛

加草薹蔻木香山查○飲食不消加枳實○小便自利去

猪苓○夏月暑瀉甚者倍加黃連白扁荳一方加辰砂人

參為末米湯調服○生痰去肉桂加橘紅○小腹痛加炒

茱萸○胃氣不足加人參炒陳倉米煨芍藥○宿食不消

吐瀉酸腥加山查神麩麥芽枳殼

治小兒久瀉脾虛

人參五錢 白朮二兩 白茯苓一兩 陳皮一兩 甘草五錢

桔梗一兩 黃連一兩 木香三錢 砂仁一兩 肉荳蔻二兩

高天家少方 卷五

訶子煨一兩 乾姜煨五錢 澤瀉一兩白 煨一兩

為末神麴糊丸彈子大每服一九米飲下

治小兒吐瀉黃疸

三稜 莪木 青皮 陳皮 猪苓 澤瀉

神麴炒 麥芽炒 黃連 茵陳 甘草 白朮

為末姜湯調下

溫中和氣飲 治吐瀉不思飲食凡小兒虛冷病先與數服

以正其氣

人參去蘆 白朮各一錢 茯苓去皮 橘紅 藿香各八分

甘草炙去皮五分

水二鍾姜三片棗一枚煎七分溫服

助胃膏 治小兒冷氣入胃嘔吐泄瀉

白芷剉十四箇 木香炮二錢 砂仁四粒 山藥一兩 人參

白朮炒 茯苓去皮各五錢 肉苳蔻四箇麩裹煨 甘草炙二錢

為末煉蜜丸龍眼大米湯下一方有丁香用鈴

金棗兒 治吐嘔不止

木香 半夏麴 南星各三錢 丁香 陳皮各二錢

砂仁五錢 藿香五錢 人參一錢五分

為末姜汁糊成錠辰砂為衣淡姜湯下

和中散 治小兒脾胃不和嘔逆惡心乳食不進

訶子

煨一兩

乾姜

煨五錢

澤瀉

一兩

白

煨一兩

為末神麩糊丸彈子大每服一九米飲下

治小兒吐瀉黃疸

三稜

莪木

青皮

陳皮

猪苓

澤瀉

神麩

炒

麥芽

黃連

茵陳

甘草

白朮

為末姜湯調下

溫中和氣飲 治吐瀉不思飲食凡小兒虛冷病先與數服

以正其氣

人參

去蘆

白朮

各一錢

茯苓

去皮

橘紅

藿香

各八分

甘草

炙去皮五分

水二鍾姜三片棗一枚煎七分溫服

助胃膏 治小兒冷氣入胃嘔吐泄瀉

白芷

炒

十四箇

木香

炮二錢

砂仁

四十分

山藥

一兩

人參

白朮

炒

茯苓

去皮各五錢

肉苳蔻

四箇

麩

煨

甘草

炙二錢

為末煉蜜丸龍眼大米湯下一方有丁香

用鈴

金棗兒 治吐嘔不止

木香

半夏

麩

南星

各三錢

丁香

陳皮

各二錢

砂仁

五錢

藿香

五錢

人參

一錢

五分

為末姜汁糊成錠辰砂為衣淡姜湯下

和中散 治小兒脾胃不和嘔逆惡心乳食不進

厚朴

六兩去粗皮 姜汁炒

乾姜

炮二兩

甘草

炙一兩

白朮

炒三兩

每服二錢水一鍾姜三片水煎空心服

一方小兒瀉不止用鷄蛋一枚去殼米醋一碗煮醋乾為度食之即止大人亦治

小兒吐瀉不止肉荳蔻一枚剉一竅入丁香三分麵包煨熟去麪為末作一服空心米湯下一方入乳香少許

白朮散 治脾胃不和嘔吐泄瀉痢疾惡心發渴等症

木香

二錢

白朮

五錢

人參

三錢

茯苓

藿香

各一兩

甘草

七錢

乾葛

二兩

右為末每服二錢白湯調服

小兒吐瀉腹痛吐乳以平胃散入熟蜜加蘇合香丸名萬安膏米湯化下

治水瀉不止者用川椒三兩醋三碗煮乾慢火焙為末米飲下一錢大人亦治

一方治小兒傷食泄瀉或冷瀉完谷不化等症

平胃散為末煉蜜丸龍眼大五苓散為末煉蜜丸龍眼大各用一丸食前淡姜湯下

七味荳蔻丸

赤石脂

煨一兩

明礬

枯過五錢

木香

煨三錢

砂仁

七錢

肉荳蔻

煨麪包八錢

白龍骨

煨八錢

柯子肉

煨一兩

醋糊丸黍米大空心米飲下○泄瀉不止諸藥不效者以此暫止之後服調補分理之藥兒小不能吞者調化服
水瀉膏藥

大附子一枚 蒼朮 厚朴 陳皮 川椒 枳實

烏藥各五錢 甘草二錢 三稜 莪朮各三錢

蘇油一斤入藥煎枯黑色去渣再煎滴水成珠為度松香三斤姜葱蒜韭艾汁各一碗煎乾灑去渣每松香一斤入藥油四兩飛丹四兩熬成膏入水抽扯黃金色再上火溶化下乳香沒藥各五錢樟腦一兩攪勻收貯用時以後藥為丸納臍中然後以絹攤貼

肉菓麵包 胡椒七粒 訶子肉 砂仁一錢 木香一錢

龍骨一錢 麝香三分 乾姜一錢 車前子三錢

為細末葱汁丸如芡實大納臍中外貼膏藥

治小兒遺尿

鷄脰一具 鷄腸一具 猪胞炙焦

右為末每服一錢酒下男用雌女用雄

益智丸 治遺尿

益智仁 白茯苓各一兩

右為末飯丸榛子大每服一丸米湯下

桂肝丸 治小兒夢中遺尿

官桂為末 雄雞肝等分 搗爛丸如菘荳大溫湯送下日服

脾胃

歌曰脾屬陰兮胃屬陽一身墻壁位中央土生萬物須和暢
一有虧盈雜病成或吐或膨時泄瀉或煩或渴不加飡常宜
助胃溫脾藥生冷休貪便是良

人參養胃湯

蒼朮炒 白朮炒 厚朴姜汁炒 陳皮 甘草炙 半夏

茯苓去皮 白芍炒 人參各等分

姜三片炒陳倉米百粒水煎服○嘔吐加藿香水香○瀉

加肉菓○腹脹加枳實大腹皮○不思飲食加益智仁

加減養胃湯作丸服

白朮二兩炒 茯苓一兩 人參五錢 甘草五錢 陳皮二兩

半夏二兩姜汁製 黃連一兩姜炒 澤瀉八錢 山楂肉二兩 麥芽二兩炒

蘿蔔子一兩炒 山藥二兩 青皮一兩炒 白芍一兩五錢炒

香附一兩炒

右為末神麩糊丸桐子大每服七八十丸米湯下

加減觀音散 調理脾胃宜常服

人參炒 白朮炒 白扁豆炒 茯苓去皮 麥芽炒 山藥

黃芪蜜炙 神麩炒 香附炒各等分

為末每服一錢空心米飲下

啓脾丸 消食消疳補脾助胃最宜小兒可常服

人參 白木炒 茯苓去皮 山藥 蓮肉去心各

山楂去核 神麴炒 陳皮 澤瀉各八錢 麥芽炒淨粉

甘草炙三錢

右為末煉蜜丸彈子大每服一九米湯下

加味保和丸 健脾消食止瀉寬中最効方見傷食門

健胃丸 小兒常服可無疳積之患

白木壁土炒 山藥各一兩半 茯苓去皮 山楂去核 苡仁炒

陳皮各一兩 枳實八錢 木香二錢 神麴炒一兩 人參五錢

黃連五錢姜汁炒

右為末煉蜜丸龍眼大每服一九米湯下

參朮白木散

人參 白木炒 茯苓去皮 甘草炙 山藥 陳皮

蓮肉去心 苡仁炒各等分

右為細末每服二錢棗湯調下

一方

白木一斤炒 陳皮三兩 山查肉四兩 茯苓三兩 甘草一兩

厚朴姜汁炒二兩 麥芽炒淨末高 澤瀉二兩

右為末煉蜜丸米湯下

理脾却涎散 治小兒口涎多

白木

錢炒一

人參

五分

茯苓

八分

陳皮

一錢

黃連

炒五分

藿香

五分

半夏

炒八分

厚朴

姜汁炒八分

山查肉

一錢

甘草

分

姜三片

水煎服

治小兒多痰兼脾胃虛弱

人參

五錢

白木

兩炒二

茯苓

一兩

甘草

五錢

山藥

二兩

陳皮

一兩五錢

法製半夏

一兩五錢

山查肉

二兩

神麴

炒一兩

當歸

一兩

白芍

炒一兩

山梔仁

姜炒一兩

煮糊丸桐子大白湯服

疳

歌曰骨熱唇焦五臟疳胸煩盜汗髮毛乾肚高脚細牙床爛

遍體生瘡瀉痢兼好吃土泥生米穀炭煤茶葉任皆食五疳

消積肥兒劑脫甲同投便見安

五疳消積丸

三稜

蓬朮

陳皮

各六兩

神麴

炒

麥芽

炒

青皮

山查

去核

蘿蔔子

炒各四兩

檳榔

各二兩

為末麵糊丸龍眼大量兒大小白湯調下

肥兒丸

治疳熱

木香

胡黃連

史君子肉

炒各一兩

黃連

檳榔

龍膽草

酒洗

訶子肉

肉菓

麵包

蕪荑

蘆薈

另研

阿魏

銀柴胡

右為末猪膽汁打糊丸羅蔔子大每服四十九燈心湯下
消疳保和丸 重積重疳服一二兩即愈

神麴炒 麥芽炒 半夏麴 史君子肉各五錢 白木炒

陳皮 山查肉各一兩 茯苓六錢 胡黃連

木香各二錢 砂仁五錢 川黃連姜炒六錢 羅蔔子炒三錢

三稜醋浸一宿炒乾一兩

右為末醋糊丸萊子大每服五分或八分量兒大小加減
米飲湯送下

茯苓丸 治心疳因驚而致者

赤茯苓去皮 茯神去皮 蘆薈 琥珀 黃連炒各三錢

鈎藤皮 遠志甘草水浸 蝦蟇煨各一錢 石菖蒲一錢 麝香五分

為末粟米湖九麻子大每服十九薄荷湯下

天麻丸 治肝疳傷目

青黛 黃連炒 天麻 五靈脂 夜明砂炒 川芎

蘆薈各一錢 龍膽草 防風 蟬脫去足嚼各一錢五分

麝香五分 全蠍二枚炙 乾蟾頭二箇炙焦

為末猪膽汁丸麻子大每服十九薄荷湯下

加減肥兒丸 治脾疳面黃肌瘦肚大筋青細腹泄瀉脾胃

虛弱等症

白木五錢米泔浸一宿麩炒 人參三錢 陳皮 神麴 蘆薈

山查肉 黃連姜炒各五錢 史君子肉炒二錢五分 檳榔

三錢 肉苳蔻二錢麵包 木香二錢 龍膽草三錢去蘆

右為末荷葉包老米煮飯搗為丸如龍眼大每服一丸清

米湯下或淡姜湯亦可病深積重者加阿魏五錢醋調藥

清肺飲 治肺疳

桑皮半兩炙 紫蘇 前胡 防風 赤茯苓 黃芩

當歸 天門冬去心 連翹 桔梗 生地 甘草

各二錢 每服二錢食後水煎服如鼻有蝕瘡或生息肉常

山熊膽泡用筆蘸洗

小兒腎疳肢體極瘦遍身瘡疥寒熱時作頭熱脚冷者是也

六味地黃丸主之一方去山茱萸澤瀉茯苓加史君子川

棟子

治小兒疳症肚大筋青極重者用夜明砂微炒為末拌入飯

內與食又用絳紗囊一袋佩胸前神効

小兒疳疾六月間取糞蛆不拘多少水漂淨浸一宿撈起置

缸內將蝦蟇數隻同置缸內俟食蝦蟇盡取蛆再漂極淨務

令不臭新瓦上焙乾炒與兒食或將蛆為末用炒米粉入

砂糖和成餅與食亦可

治疳瀉及休息痢日久不瘥取鷄子一枚打破用指大黃蠟

一塊銚內溶以鷄子拌和炒熟空心食之

驚甲散 治疳勞骨蒸

驚甲

九肋者佳沸湯浸洗童便炙

黃芪

蜜炙

白芍

炒各一兩

生地

酒洗

熟地

酒洗

當歸

酒洗

人參

各五錢

地骨皮

五錢

每服二錢水煎服

脫甲散

治小兒骨蒸晡熱五疳羸瘦大便閉結發熱發渴

當歸

上

柴胡

上

龍膽草

上

茯苓

中

人參

甘草上

川芎

中

麻黃

中

知母

中

加蓮

鬚葱白

水煎服

小兒無辜疳腦後項邊有核如彈子大按之轉動軟而不痛其間有虫如米粉急用竹刀刺破刮去核内虫免致隨氣血流散淫蝕臟腑

小兒疳痼攻下部肛門痒痛女孩陰中腫痒作瘡膿如白帶

枯礬

五倍子

各一錢

為末盞水洗淨摻之

疳症不治歌

疳積丁奚晡露時腹膨臍突面黃羸吐虫瀉臭頭開解鶴膝伶仃總莫醫

積

歌曰積因停滯在胸中乳食虛驚氣所鍾腹痛面黃晡作熱疳羸煩渴瀉流通飲食不化腥酸吐覆卧嗔煎兩目紅急用香稜消積劑莫教日久積成凶

加減流氣飲 治胸膈痞塞氣不升降喘急不安積聚停滯
發熱不思飲食噎氣吞酸或閉或利等症

木香 枳殼 蓬朮 陳皮 青皮 檳榔

三稜 蒼朮 草菓 大腹皮 砂仁

水煎服○大便不通加大黃○身熱加柴胡○內熱加黃
連○嘔吐加藿香半夏○胃口痛加益智仁草薏苡○腹
脹小便不利加水通蘇梗○傷冷積滯加乾姜肉桂

消積丸 治諸積

蘿蔔子炒三錢 紫蘇子三錢 厚朴姜汁炒五錢 陳皮五錢 香附炒三錢

甘草炙二錢 青皮炒二錢 山查肉五錢 白朮炒八錢 茯苓五錢

人參三錢 黃連姜炒三錢 半夏炒三錢 枳實炒三錢 蒼朮米泔炒五錢

為末神麩糊丸米湯下

治小兒食積腹痛

山查肉 神麩炒 砂仁炒 麥芽炒 甘草炙 陳皮

白朮炒 青皮炒

水煎服 寒痛加藿香吳茱萸 有熱加柴胡

加味和中丸 健脾消積最効 方見傷食門

治小兒食積傷肚腹脹痛白酒麩炒同黃連為末水丸服

治小兒食積痛利

蒼朮米泔浸炒 白苳蔻同肉苳蔻包煨各五錢 肉苳蔻七錢 山查肉 陳皮

厚朴姜汁炒神麴炒益智仁 白朮炒各三錢甘草八分
為末米糊丸桐子大米湯下

檳榔丸 治小兒癥其症脇肋刺痛心胸煩悶飲食不下吐
逆惡心又名食結乃傷食得之

檳榔三錢木香麴包三錢青皮五錢陳米炒芭荳二十粒去殼

右青皮芭荳同炒蒼色去芭荳為末蒸餅丸如黍米大米
飲食前服

小兒患疰疾癖積病將水紅花子研末蒸鷄子常服之
小兒癖積膏藥

水紅花炒二錢大黃 朴硝 山梔子 子石灰各一錢

右用酒醱鷄蛋大一塊同藥搗為膏青綿布攤貼再用湯
瓶熱熨手帕勒之三日後揭起肉黑如墨是其驗也

治小兒吐蛔虫以苦練根為君佐以二陳湯煎服冬月吐蛔
多是胃寒胃虛錢氏白朮散加丁香二粒服之

一方治小兒吐蛔及糞內有蛔以史君子肉炒與食之每用
二三枚不可多

化虫散 治小兒蛔厥似慢驚但唇口紫每月初五已前虫
頭向上可取

雷丸三錢史君子去殼十箇鶴虱三錢甘草三錢大黃酒煨三錢
右為末猪肉汁空心服

腫脹

歌曰小兒腫脹脾家濕臟腑氣虛即成疾或因停積于胃中或因瘧痢虛而得瘕虛痞塊成血虛飲食飢飽皆為積醫人審察盛與衰分氣補脾不可失有積當與漸消之固本正標方是的陰囊無縫掌無紋臍突如李面如墨唇焦口燥脉不來有藥莫救徒用力

分氣飲 治四肢浮腫氣喘短急

桔梗 茯苓 陳皮 桑皮 大腹皮 枳殼

草菓 半夏 蘇子 木瓜 木通 木香

姜棗燈心水煎服○小便不利加猪苓澤瀉○瀉加肉菓

○腹痛加肉桂○胸膈不寬加砂仁厚朴

沉香丸 治腫脹

千金子肉去油 五倍子各八錢 木香 沉香各五錢 射香二錢

山慈菇一兩 紅牙大戟七錢

右為細末米糊丸如黍米大淡姜湯下

補脾飲 治脾虛受濕浮腫

白木炒 茯苓 人參 厚朴姜汁炒 陳皮 木通

木瓜 青皮 木香 乾姜 大腹皮 砂仁

姜棗燈心水煎服

治小兒腹脹

蘿蔔子炒 紫蘇梗 乾葛 陳皮 各等分

入甘草少許煎服食少加白木

蘇合香丸 治小兒卒中惡毒心腹脹滿刺痛 方見諸氣門

痢疾 冷白熱赤冷熱不調積下赤白痢黃白下無度驚青休息痢黑若魚腸愈需復作瀉痢停積而又下肚大肌瘦大便筆瀝疫痛盡去痢下紫血

歌曰病因積久多成痢濕熱肥甘滯所為或赤或黃或純白要分氣血屬何之從前道氣湯先用次第香連養臟施林口刮腸當介處平調臟腑治須知

導氣湯 初痢用此推去宿滯後服調理臟腑之劑

枳殼炒 黃連炒 檳榔 甘草 白芍 當歸

厚朴 姜汁炒 木香 山查 木通 神麴炒

體厚者加大黃芒硝水煎服久痢去檳榔加升麻白木剪金丹

白木炒 人參 各二錢 黃芩 一兩二錢 大黃 二兩 沉香 五錢

右為細末井花水丸如榛子大每服一九冷痢乾姜湯服執痢淡姜湯服熱毒死血川歸湯服

香橘餅 治小兒久瀉痢致脾虛脫肛不收冷熱不調赤白

膿血痢疾小腹疼痛或禁口不食日夜無度裡急後重經久不瘥及痔積下痢泄瀉不止大人亦治

橘紅 青皮 厚朴 姜汁炒 青木香 山查肉

茯苓 去皮 神麴炒 麥芽炒 白木 炒各四兩 香附炒

三稜 砂仁二兩各蓬木一兩廣木香五錢甘草二兩炙
人參二兩人虛者用

右為末煉蜜作餅空心米湯下白痢姜飯湯下

加味香連丸 治大人小兒痢疾

黃連二兩一半姜汁炒木香 青皮炒 大黃酒蒸九次

枳殼炒 黃芩炒 香附一炒各白芍二兩甘草五錢

右為末姜汁神麩糊丸桐子大量兒大小白痢姜湯赤痢
苦茶服

一麟丸 治大人小兒痢疾如神

芭荳百粒去油絹袋盛甘草水煮半日江西淡荳豉一合

木香一兩共為細末人乳丸桐子大硃砂為衣每服三九
赤痢淡姜湯下白痢砂糖湯下赤白姜糖湯下五色痢肚
疼者艾葉湯下

養臟湯 平調臟腑去積溫中

白木炒 厚朴姜汁炒 陳皮 甘草 茯苓 升麻

枳殼 木香 黃連姜炒 白芍炒 蓮肉

姜棗水煎服○純血加黃芩生地當歸地榆○紅痢加地

榆當歸○白痢加乾姜○赤白痢加當歸乾姜○腹痛加

乳香沒藥○久痢加粟殼炙○禁口加石蓮冬米○發熱

加紫胡知母○乾嘔加藿香○渴加五味麥門冬天花粉

○裡急後重倍加檳榔枳殼木香○胸膈不寬加砂仁○
元氣下陷加人參柴胡○小便不利加滑石猪苓澤瀉

痢疾不治歌

糞門如筒脉洪數發熱不食渴兼作瀉下渾似爛魚腸豈汁
屋水相交錯汗出如流啼不休肚腹疼痛陰囊縮或如龔鰾
鷄子臭有藥莫救備棺槨

七香丸 治小兒癖症便利無度滑不成屎似痢非痢似虫

非虫肚腹絞痛上築心胸有類痞狀

木香 丁香各一錢半八角茴香炒 枳殼炒 三稜

青皮 莪木各一錢

用芭荳七粒去殼同青皮莪木炒赤色去芭荳為末糊丸
黍米大米飲食遠服

瘧

歌曰小兒瘧疾多因食邪正交攻寒熱逼截之太早反不良
初用青皮飲消息次進截瘧不二湯神功一服如金石

青皮飲 治小兒瘧疾 方見瘧門

瘧疾經驗方

柴胡有汗五分 無汗一錢 白木一錢 無汗五分 茯苓 陳皮 半夏各三分

甘草分半炙腹脹不可用 黃芩熱多二分半寒多人參三分虛五分

草菓三分無食不用 生薑寒多三片熱多一片 薄桂一分

水鍾半煎五分發前空心服

截瘧不二飲 發四五次然後可截

檳榔 草菓 知母 貝母 陳皮 枳殼

半夏 常山 烏梅 蒼朮 柴胡

酒一鍾水一鍾姜三片煎半鍾露一宿五更溫服植隔宿

再煎服之

治乳兒瘧疾痞塊

川芎二錢 生地 白芍炒各錢半 陳皮 半夏

黃芩炒各一錢 甘草三分 鱉甲醋炙為末五分

姜三片水煎臨服入醋炙鱉甲末

瘧疾經久不治歌

從再經旬瘧不除更加瀉痢悶如痴蒸蒸作熱渾身瘦遍體
青筋鼻似煤飲食未嘗沾口腹頂門下陷項常垂生痰喘急
時加嗽縱有良方不可醫

傷寒 夾驚 夾食

歌曰傷寒六脉皆浮緊虎口三關紅紫影發熱惡寒腰脊強
頭疼吐逆煩悶盛夾驚睡卧時驚搐夾食餒酸噎氣逆無汗
必須用解表太陽過經終不吉○藥與大人同特劑料小耳
十神湯 此發散風寒之劑冬月用之春用參蘇飲

川芎 白芷 麻黃 陳皮 紫蘇 香附

升麻 乾葛 芍藥 甘草

姜棗煎服○有汗去麻黃○熱甚加黃芩○咳嗽加半夏
杏仁○喉痛加桔梗前胡○譫語加柴胡黃芩○泄瀉加
訶子木香○吐逆加姜汁半夏○頂癩痛加羌活藁本○
便血加桃仁○便結加枳殼○裡熱甚加大黃
傷寒熱極發狂譫語服藥不効者用鷄子清搭胸前以鏡磨
之煎葦苳湯遍身洗擦良久即定大人亦用此法

傷風咳嗽

傷風歌曰傷風貪睡面青黃呵欠頻頻熱似湯口吐氣來渾
似火鼻流清涕嗽生痰法當解表消痰嗽加減參蘇飲正當

更有抱龍丸可用霎時風散日回光

咳嗽歌曰咳嗽皆因風入肺重則喘急熱不退肺傷於寒嗽
多痰肺傷於熱生壅滯寒則發散熱必消實當瀉腎虛補肺
嗽而不已便成癆痰盛不已驚風至眼眶黑紫如損傷嗽而
有血難醫治踈風豁痰補瀉明欵花膏内生神秘
加減參蘇飲

人參 紫蘇 柴胡 陳皮 甘草 枳殼

前胡 白芷 半夏 乾葛 茯苓 防風

桔梗 姜棗水煎服○病虛及胃寒用人參壯實者不
必用○似欲發痘者加升麻○肺熱咽不下加黃芩去人

參○痰盛加南星竹瀝○壯熱加黃芩○風盛欲發搐加
防風天麻○項背拘急加獨活○頭痛加川芎細辛○鼻
寒加細辛白芷○初嗽加麻黃杏仁○痰壅加葶藶桑皮
○久嗽加杏仁五味子貝母○吐痰加姜汁○初感冒欲
發散加麻黃蒼朮○肺虛唇白嗽不能接氣加人參糯米
阿膠○春冬感冒盛者加羌活○風寒已表惟熱不退者
除去本方用小柴胡湯

潤肺散 治小兒寒熱相交肺氣不利咳嗽喘急聲音不出

痰壅咽喉乾痛

貝母

杏仁

去皮尖炒

麻黃

去節

人參

阿膠

蛤粉炒成

陳皮

桔梗

甘草

水煎食遠服

款花湯

治小兒久嗽

款花

五味子

麻黃

杏仁

去皮尖

甘草

各等分

水煎服

九寶湯

治小兒咳嗽喘急哮吼連綿不已夜不得睡

薄荷

紫蘇

大腹皮

麻黃

官桂

杏仁

去皮尖

桑皮

蜜炙

陳皮

甘草

姜三片烏梅半箇水煎食遠服

辰砂抱龍丸

治小兒傷風咳嗽痰喘煩渴鼻流清涕驚悸

風熱等症

天竺黃 橘紅 茯神去皮 明天麻各一兩 膽星二兩 甘草

雄黃 防風各五錢 麝香一錢 辰砂五錢 枳殼炒五錢

為細末山藥糊丸芡實大燈心薄荷湯下○傷風痰盛紫

蘇姜湯下

豁痰湯 治感冒或驚風痰盛用以驅之

半夏 南星 紫蘇 黃芩 枳殼 桔梗

前胡 杏仁 橘紅

水煎入竹瀝姜汁服○風痰吐涎加防風○結痰加瓜蒌

仁○濕痰加白朮○寒痰嗽喘加麻黃乾姜○食積面黃

少食或多食即飢皆胃熱化為痰吐出黃色有稠粘者加

神麴山查麥芽○熱痰是肺熱不已吐成塊加山查天

花粉

款冬花膏 治嗽如神

款花 紫蘇 杏仁去皮尖炒 桑皮各一兩俱為粗末

烏梅肉 一兩蒸過搗爛入前藥和勻晒乾

共為細末煉蜜調成膏噙化

白虎膏 治小兒熱嗽有痰神効

白石膏火煨研極細水飛過煉蜜丸芡實大

每服一丸臨卧白湯化下如肺受寒邪咳嗽咽隔不利用

麻黃杏仁煎湯下

咳嗽不治歌

全嬰論嗽皆屬肺不治面青飲水忌燥狂顛陷上氣喘此嗽
逢之俱不治

小兒中寒用食鹽同茱萸絹包熨臍腹

辛夷膏 治小兒鼻流清涕不止

辛夷葉 一兩洗淨焙乾 細辛 木通 白芷 木香 各五錢

杏仁 一兩去皮尖研如泥

為細末用杏仁泥羊骨髓猪脂各一兩同諸藥和勻瓦器

中熬成膏赤黃色為度候冷入腦麝各五分拌勻塗顛門

上更用少許塗鼻中

惺惺散 治小兒變蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞身重相似傷

人參 白朮 茯苓 甘草 多 白芍 炒

天花粉 桔梗 各五錢 細辛 根一錢半

為末每服二錢姜一片薄荷葉少許煎湯調服

小兒中暑伏熱煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤少心神恍

惚宜服五苓散

芩黃散 治小兒齒不生

大芩 窮地黃 各五錢 山藥 當歸 芍藥

甘草 各一錢

為末湯調服并搽齒脚

治小兒龜胸

大黃三錢 天門冬法 百合 木通 杏仁去皮尖

枳殼炒 桑皮蜜炙 葶藶隔紙炒 朴硝各五錢

為末煉蜜丸芡實大食後溫湯調下

灸龜胸法兩乳前各一寸半上兩行三骨間六處各三壯春

夏從下灸起秋冬從上灸起

又法灸肺俞在三椎下兩旁各一寸半 心俞在五椎下兩旁各一寸半 膈俞在七椎下兩旁各一寸半 各三壯

小兒兩目忽然視物不見俗名雀盲以羯羊肝一具不用水

洗不犯鐵器以竹刀剖開入谷精草一撮瓦罐內水煮熟

不時食之

熱胎熱胎黃目赤便澀便閉便血丹毒胎毒以上皆熱症

歌曰小兒生下受胎熱目閉泡浮大便結濕熱薰蒸遍體黃

小便淋瀝或見血滿口成疳及赤遊發頤咽痛重木舌胎毒

瘡瘍痛甚多啼不乳呻吟竭諸症皆由擁熱為大連翹飲

不虛設三黃化毒丹可兼頓令慈母生歡悅

大連翹飲 治三焦積熱大小便不利赤目丹毒口瘡重舌

木舌咽痛瘡瘍等症

連翹 瞿麥穗 滑石 牛旁子 車前子 木通

赤芍 山梔 當歸 防風 黃芩 柴胡

甘草 荊芥穗 蟬脫

水煎服○胎熱加生地○胎黃加茵陳○目赤加黃連
活○小便澀加猪苓○大便澀加大黃枳殼○大便血加
地榆槐角枳實○小便血加麥門冬生地石蓮○胎毒瘡
瘍加升麻生地歸尾○丹毒遍身加犀角黃連○發頤加
羌活白芷○咽痛加桔梗薄荷○重舌木舌加黃連朴硝
犀角○美舌加石膏

生犀散 治骨蒸肌熱瘦悴頰赤口乾潮熱夜有盜汗五心
煩熱等症

生犀角二錢地骨皮 赤芍 柴胡 乾葛各一兩

甘草多二兩每服三錢水煎食遠服

治小兒痰熱骨蒸

二陳湯兩半升麻二錢人參一錢葛根一錢白芍一錢半

五味子三十粒

作三貼姜棗煎服

五福化毒丹 治小兒蘊積熱毒驚揚狂燥頰赤咽乾口舌

生瘡夜卧不寧譫渴頭面身體多生瘡癩

玄參 桔梗錢二白茯苓二錢人參 牙硝枯

青黛錢各一甘草錢分各七麝香二厘半

為末煉蜜丸芡實大金銀箔為衣薄荷湯下

鶴頂丹 治小兒積熱及暑月火盛心煩并麻瘡熱症一切
結熱

寒水石煨 石膏各二錢 甘草二錢

為末甘草濃煎汁九芡實大辰砂為衣薄荷湯下

瀉青丸 治小兒肝經風熱目赤腫痛蕪治肝臟實熱尋衣

捨物目直不搐痔心熱則搐身反折強直目連劄或目遍

青或臟腑飧泄諸藥不止脾虛肝盛

當歸 龍膽草 川芎 山梔 大黃煨 羌活

防風各二錢半

為末煉蜜丸芡實大竹葉砂糖湯下

掩臍法 治大小便不通

取連根葱一莖去泥生姜一塊淡苳豉二十一粒鹽一小

匙同搗爛捏作餅烘熱掩臍中扎定良久即通不通再加

一餅

八正散 治小兒心經蘊熱臟腑秘結小便淋澀

車前子 木通 扁蓄 甘草 大黃煨 瞿麥

滑石 梔子 加燈心水煎服

小兒小便閉取大地龍數條去泥蜜少許研敷莖卵仍燒蚕

退紙灰存性硃砂片腦射香同研細末麥門冬去心燈心

同煎湯食前調服

火府散 治小兒心熱小便赤澀多驚

生地 木通各五錢 黃芩 甘草 當歸

山梔仁錢各二水煎食前服

四順清涼膏 治小兒熱結大便不通

芍藥 當歸酒洗 黃連姜炒各五錢

生地酒洗 甘草

大黃酒蒸九次 黃芩炒各三錢

為末蜜丸艾實大每服一九白湯下

大便不通葱白三莖水煎去葱入炒阿膠生蜜溶化食前服
之一方用甘草枳殼水煎服

又方小兒結熱大便不通猪膽汁滴入谷道即通不必服藥

治小兒木舌舌腫硬及重舌

百草霜 芒硝 滑石各等分

為末酒調服

治木舌

牙硝 雄黃 硃砂各三 冰片半分 研勻時時點擦

治重舌青丸子

青黛一兩 天花粉三兩 粉草五錢 寒水石水飛六錢 滑石水飛一兩五錢

為末并花水丸如莞莖大薄荷湯化下

一方小兒重舌用針刺出惡血即愈

治小兒解顛乃母氣虛弱故頭骨開而不合入物湯有熱加

酒炒黃連生甘草子母皆服外用帛束緊以白蘇末傅之

釀乳方 解胎中受熱生下面赤眼閉大小便不通不進食

澤瀉

二兩半

猪苓

赤茯苓

天花粉

茵陳

甘草

生地

各一兩

每服二錢水一鍾煎半鍾食後乳母捏去宿乳服

治小兒生下遍體皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通不進乳食啼叫不止

生地

當歸

赤芍

川芎

天花粉

每服五錢水一鍾煎服

小兒初生不飲乳不小便以葱白一寸四破之加乳汁入磁器內煎灌之立効

蒲黃散 治初生兒大小便下血

生蒲黃

油頭髮

燒灰存性 各一錢

為末用生地黄汁或米飲或乳調服

治小兒溺血

蒲黃

生地

生甘草

赤茯苓 去皮各等分

水煎髮灰調勻食前服

一方小兒尿血以升麻甘草煎湯調益元散服

三黃丸 治小兒諸熱黃疸血便血

黃芩

黃連

去鬚

大黃

炒各一錢半

為末滴水丸茶清下三五十九

地黄湯 治小兒鼻衄

川芎 生地 赤芍 當歸 各等分

蒲黃少許水煎服

治小兒胃氣熱吃泥

軟石膏 黃芩 陳皮 茯苓 白朮 各等分 煎服

退黃丸 治小兒黃病喫泥喫磚瓦生米炭茶等物 方見大人積聚門

雄黃丹 治小兒齁病

硃砂 雄黃 各一錢 乾姜 五分 芭荳 七粒 杏仁 十四粒 去皮尖炒

淡荳豉 二十粒

右將乾姜等四味用醋半盞煮乾研成膏加皂角一寸去皮子蜜炙焦膽星一錢為末雄黃硃砂并前四味膏和勻

再研極細糊丸麻子大每一歲五丸壯者七丸淡姜湯下

消毒犀角飲 治小兒內蘊邪熱咽隔不利痰嗽眼赤臉腫

腮項結核遍身風癩丹癩及瘡疹已出未出不能快透

鼠粘子 錢 微炒 四 荊芥 甘草 各一錢 防風 去蘆五分

一方加黃芩一錢犀角鎊五分如無犀角以升麻代之水

一鍾煎半鍾溫服

解肌湯 治小兒遍身赤腫不能睡卧

川升麻 甘草 生用 乾姜 黃芩 各一錢 赤芍 一錢五分

麻黃 去節五分

右咬咀每服二三錢桃柳枝各七根水一鍾煎六分不拘

時溫服

十種丹

飛灶丹 從頭頂腫起

石灶丹 從頭上紅腫起用赤小

鬼火丹 從面泡腫起心

天火丹 赤點從背起桑皮末羊

天灶丹 從兩臂腫黃色木

水丹 從兩脇臂虛腫生鐵磨水

胡火丹 從兩足赤腫乳香

烟火丹 自兩足起有赤白點猪

明漏丹 自腎上起黃腫屋漏處土羊脂塗

白火丹 從髮際下虛腫以指捺之隨手起者是也以陳羊

治丹毒發作恐其入腹一時無藥急以針於紅點處刺出惡

血即散一方胎衣瓶中土調敷

治走馬火丹用慎火草搗汁塗之

治天火丹臍腹起者蚯蚓泥炒研細水調傳

治小兒赤瘤熱毒鬱結肉間發於皮膚赤如瘤色宜服生地

木通荆芥苦寒帶表之藥外以芒硝濃煎洗芭蕉油塗

金泥膏 治小兒一切無名腫硬嫩赤諸狀丹瘤熱癰濕爛

大人亦治用陰地上蚯蚓糞補硝比蚯蚓糞三分之一

慶研細新汲水濃調厚敷患處乾再上

紅丸子 治鴛口

白茯苓 澤瀉 錢各一 半夏 麩 二錢 滑石 水飛 一兩六錢

大粉草 硃砂 各三錢

為末并花水丸如莞苴大硃砂為衣燈草湯化下○患口
瘡者用一九同青九子一九芍藥燈心湯化下

治小兒口糜滿口生瘡者是亦治大人

黃栢 細辛 青鹽 為末噙之吐涎即愈

小兒白屑滿口狀如鷲口用髮纏指頭蘸井花水拭舌如不
脫濃煎粟米汁以綿纏筋頭拭之用煨過黃丹摻

治咽喉口舌生瘡并心經有熱驚悸不安

琥珀 錢 犀角 一錢 辰砂 一錢 茯神 二錢 人參 五分

杏仁 二錢 炒 麥門冬 去心 一錢

為末煉蜜丸龍眼核大每服一九燈心湯下

小兒口瘡用黃連薄荷礬砂為末水調睡時滴口中

小兒牙疳白礬裝入五倍子內燒過為末傳之

真黃散 治小兒走馬疳

鷄肫黃皮油燈上燒存性研細末入黃栢枯礬麝香一字
用米泔攪口內傳之

治走馬牙疳

孩兒茶 一錢 血竭 一錢 冰片 半分 另研入煨
過棗內

為末南棗十枚去核將藥分十棗內紙包火煨存性用時
研一枚先將口拭淨搽之

小兒走馬牙疳用婦人溺桶中白垢火煨一錢入冰片少許

傳之

一方用夜桶垢刮下和白梅搗爛成丸外用黃泥固濟火煨過取出埋地一日夜出火毒細研搽患處

小兒口疳

人中白煨二錢 黃栢煨五錢 硼砂一錢 銅綠五分 麝香三分

冰片二分 男子髮煨存性一錢

為末青布拭口以蘆管吹入涎出再吹

保命散 治鷺口

枯礬一錢 馬牙硝五錢 辰砂水飛一錢

為細末先以亂髮纏指拭口舌上淨取藥一字用白鷺翼

以水攪取汁調塗舌上頰內

小兒口瘡不能飲食用礬湯浸腳半日以蜜炙黃栢炒姜蚕

為末傳之立進乳而安

一捻金 治口瘡鷺口

雄黃三錢 硼砂一錢 甘草五分 龍腦少許

為末摻患處或用蜜調塗

治小兒頭瘡

臘猪油半生 雄黃半熟 水銀各等分 研勻洗淨傳之

小兒癩頭瘡以五倍子煎湯洗淨煨鶉鴿糞研細傳之

一方用燒酒擦洗最効

一方癩頭瘡以猪毛湯洗過用松香研碎入紙內捲成條麻油內浸一日夜取起燒之滴下油加輕粉雄黃飛礬棟樹子灰調勻敷之

一方用通聖散酒拌除大黃另酒炒共為末再酒拌令乾每服一錢水煎服外用紅炭淬長流水熱洗胡荽子伏龍肝懸龍尾黃連白礬為末油調敷

小兒白禿辣離瘡以石灰窰內燒過紅土塹四兩百草霜一兩膽礬六錢雄黃一兩輕粉二錢榆皮三錢共為末猪膽汁調搽

小兒頭上甜瘡以松香黃丹飛礬各一兩搗勻綿花子油調

小兒黃水瘡癬以紅棗去核銅綠為末入棗內煨存性研細有膿者乾傳無膿者香油調搔破敷之

白芨散 治瘰癧膿汁不乾

貝母去心 白芨各五錢 輕粉三錢

為末用柵樹皮煎湯洗過清油調敷

小兒身面爛瘡

桑油鮮桑木槌碎裝瓶內用一瓶合口 輕粉 雄黃各五錢

猪膽一筒 滑石一兩 硫黃五錢 川山甲十五片炙

鳳凰退燒存性 為末桑油猪膽汁調絹包擦之

小兒乳花疥癢以硫黃火溶化入蒼麥粉拌勻研細香油調敷

小兒面上甜瘡以清明插過柳枝燒存性一錢銀硃七分共研再入飛礬一分傳

小兒面上紫塊如錢大或滿面俱有

川山甲十片 川椒去目五錢 姜汁四兩 野大黃根取汁四兩

和勻絹包擦之

金銀散 治小兒眉間生瘡

傾銀罐一箇用舊者 輕粉五分

為末麻油調敷

小兒天泡瘡用麩皮炒研末一錢青黛八分研勻井花水調傳夏月天泡瘡以絲瓜葉搗汁塗之

小兒耳後蝕瘡以黃連枯礬為末傳之

小兒指月耳後生瘡名月蝕瘡蓋微根四錢地榆皮二錢輕粉五分為末鹽湯洗過搽之一方用炙蝦蟆為末敷

龍骨散 治小兒停耳耳內有膿久不治成聾疾

枯礬一錢 龍骨一錢 黃丹一錢 麝香一字 乾胭脂五分

為末先以綿杖子拭却耳中膿水用藥末一字搽耳內勿令風入

小兒黑斑紅斑瘡痒癢瘡並用防風通聖散為末酒調下

小兒遍身生瘡膿水不乾以黃柏末加枯礬少許搽之

綿繭散 治小兒遍身痒蝕膿水不乾

空蚕繭出蛾者每箇納白礬一分燒過研細乾傳

澤瀉散 治鼻下兩傍濕爛瘡膿流處又生起

澤瀉 鬱金 甘草炙 山梔仁各二錢

為末甘草煎湯調食後服

治吐母痔

何首烏藤上 金銀花上 劉寄奴中 羊蹄根中 野菊花中

煎湯與小兒浴用絹布抹乾以後藥搽之

六黎根五錢 寒水石煨二錢五分 枯礬二錢五分 瘡上

銀硃四分 共為細末以猪油熬化稍冷調入藥末絹包搽

不可見生水隔二日再洗再搽

封臍散 治臍瘡

紅綿燒灰 黃牛屎煨 乾胭脂

為末瘡濕乾後瘡乾清油調敷又方枯礬黃栢末敷不乾

用伏龍肝或枯礬龍骨末敷

鱧疔頭膏藥

乳香去油 沒藥去油 川山甲炙 全蠍炙 姜蚕炒 龍骨各五錢

松香一斤芝蔴油四兩煎好入前藥并銅 水中捏以綠

為度紅布攤貼

牡蠣散 治盜汗

黃芪蜜炙 牡蠣煨 錢 生地一兩 作三服水煎服

止汗散 治睡而多汗

用舊蒲扇燒灰温酒調服又用文蛤為末唾調填臍内即
小兒虛汗不止用桃樹上自乾桃子七枚浮麥一撮煎湯服
國老散 治癩瘡痘疹疔腫癰疽諸般惡毒及中砒毒困毒
傷寒發狂等症

五月五日選大甘草為末用大竹一段兩頭留節鑽一孔
入甘草以木塞之置糞缸内仍縛石墜至底浸四十九日
取出洗淨以甘草晒乾再研極細如小兒出痘見苗及諸
般惡毒並用糖湯調服

治外腎腫大

木通 甘草 黃連炒 當歸 黃芩

水煎服用紫蘇為末乾敷如爛以香油調敷又用青荷葉
包上

小兒二十四驚灸法

第一喘胃驚

小兒喘氣亦如風 潮熱猶同火上烘 謹依灸法分明治 氣散精神舊日同

離臍下一指下火三壯不可即與乳食

第二胎足驚

未經滿月哭呱呱 兩脇脹滿亦如瓜 若依治法隨時灸 靈驗猶如九轉砂

離心下一指灸仍攢臍五點

第三厥驚

小兒原從嚇上來 堪堪潮熱惱心懷 或死醒來猶驚戰 不治之時必死災

男左女右灸手脚心

第四眠厥驚

小兒正睡忽驚手足俱動一身虛汗此飲食受嚇也

左右耳後一指下火餘做前灸

第五走厥驚

小兒正行偶然一跌而死復醒是也

男左女右灸手脚心

第六兔兒驚

小兒乳食不納發熱脹乃飲食受風寒也

乳上心下臍下離一指下火手足心手肘亦灸

第七吐瀉驚

小兒吐瀉不止

乳上心上臍上俱離一指下火

第八痘瘡驚

小兒出痘瘡又過日而熱欲渴不渴肚腹飽脹初熱一時起或坐或走小者或抱料動身軀

離心下一指下火

第九痢疾驚

小兒十五歲以上痢疾紅白不止

用本兒手指分寸男左女右鼻中至頂天門治之又乳上

臍下各離一指下火

第十眠驚

小兒發熱貪眠不省及省又睡者是也

耳垂下離一指下火男左女右名自悟穴

第十一蛇兒驚

小兒舌一伸一縮發熱睛定不轉

人中灸一壯即安

第十二老鴉驚

小兒時常咳嗽啾啾啼哭不眠肚腹飽脹不治轉作眠驚

男左女右乳上離一指下火

第十三夜宿老鴉驚

小兒日安夜哭此被人擲危睡中受驚所致不治轉作猛行驚

眉中分正灸一壯又心中分正一壯

第十四啞驚

小兒不哭不語十指不動遍身不熱十分太重此飲食嘔上起終成啞症不治主死

男左女右項後一壯離三指又一壯手足皆灸

第十五猛行驚

小兒發熱夜睡咬牙睡中言語

兩耳下離指半下火眉宗分正一壯再用雞蛋破頭草麻

子七回去皮大人四小人三八內筆畫一人在上紙封七

屬是熟食之

第十六閉脈驚

小兒遍身冷又出冷汗睡出省不出此為閉脈驚乃中風寒起用銀煎湯洗浴

乳上離一指下火臍傍對指下火共六壯

第十七乳風驚

小兒咳嗽發熱如食飽者此是乳食受風傷肺不治轉作瘦痺

地閣頸項當中下火離心下一指用燈燒五點

第十八肥瘠驚

小兒飲食常用勝倍他人身瘦而黃骨中受熱腹中黃色不治主黃瘦死

攢心灸五點火

第十九班春驚

小兒發熱咳嗽頭仰口素者是也

不論男女二手伸開對中下火攢心用燈心火燒五點攢

臍燈燒四點又背後當心六火

第二十擺驚

小兒發熱不思飲食不語手脚都動者是此症或自床上跌下或是跑跌嚇上起

手脚掌邊高骨處灸

第二十一風寒驚

小兒受風寒腹脹發熱

燈淬手足虎口并臍上下左右手心二處

第二十二腫瀉驚

小兒立秋受暑泄瀉脚腫至心口有驚用此法灸

男左女右食指二節中指頂各一壯心下臍下各三壯
第二十三四足擺驚

兩手兩足高骨處三壯

第二十四急風驚

唇紫厥冷口無氣者是

左右手足虎口四火

諸症灸法

心氣

肋骨盡處三壯男左女右

羊兒風

顛門十指丫前後心後影下各一壯

喉痺

大指甲肉盡處三五壯

小

以草自鼻量至髮際轉向背後担有高骨量之草盡處三五壯又天突穴三壯

便閉

鹽填臍中灸三壯

瘧疾

虎口一壯小指一壯又手案一壯

心脾痛

手肘正堂三壯男左女右

食傷驚

中腕

期門

天泉

男左女右

水分

丹田

天樞 手足合骨

風驚

身軟頭搖手擺

期門

天泉

手足合骨

風府

次窠

輿帶

啞驚

天泉

期門

頰車

吐瀉驚

水分

丹田

天樞

顛會

手足合骨

嚇戰驚

百會

顛會

手少商

足大敦

雙中腕

期門

天泉

急絕驚 印堂 百會 湧泉

老鴉驚 風府 接骨 尾閭

馬鼻驚 鼻動人中 印堂 期門 天泉 男左女右

瘡痧驚 百會 顛會 天泉 期門 水分 丹田

天樞 水足合骨

猪風驚 足沫人中 水分 丹田 天樞 印堂 少商

手足合骨 大敦

顛驚 少商 大敦 手足合骨 人中 期門

天泉 水分

風疾驚 顛會 旋璣 期門 天泉

搐搦驚 期門 天泉 尾閭 顛會 人中

氣急驚 印堂 承漿 期門 天泉 水分

合眼不語驚 水分 尾閭 手足合骨

搖頭哺驚 百會 顛會 人中 期門 左右手大指

滿身青毒驚 顛會 旋璣 期門 天泉

丹田 以上俱分男左女右

右灸法與銅人迥異不知出自何人然用之頗有奇驗故錄之

穴法

顛會 髮際上二寸 大敦二穴 在足大指端去爪甲如韭菜 湧泉二穴 在足底心陷中屈足捲指取之

旋璣結喉下四寸 中腕在臍上四寸 天樞在臍旁各開二寸一云三寸 人中在鼻下三分

頰車在耳珠下五分 水分在臍上一寸 少商在大指內側去爪甲如韭葉 期門乳下一寸半第二肋端

天泉在曲掖下去臂三寸舉掖取之 百會在頂中用線量前去眉心後至頂髮折斷當中是穴

風府項後入髮際五分兩肋間有陷中是 承漿在唇下宛宛中 印堂在眉心陷中是

次窮第二空夾脊陷中 尾間脊骶骨端計三分伏地取之又名長強

丹田臍下二寸 天突在頸結喉下四寸宛宛中

取穴法

凡取穴分寸當用同身寸法以患者男左女右手屈其中指用稻稈心一條量指中間一節兩頭橫紋尖處即是一寸截斷為則寸若多者照此加之橫直寸法皆同惟頭部橫寸以

眼內眥角至外眥角為一寸

今人之艱於嗣者得一子父母不勝其喜每于滿月百日週歲即會親友殺生設席慶賀及稍有疾病輒又殺生祈禱孰知爾子之命固命也畜類獨非命乎爾子惟恐其有痛楚也殺畜類以祈神宴會彼獨無痛楚乎天雖不言必不默祐爾於冥冥之中矣茲小兒方中若疳症用蝦蟆蠶黃蠶稀痘用鬼血兔腦發痘用椎鷄頭天靈蓋等項及為子設席殺生祈禱之類俱宜戒之

急救諸方

自縊死自旦至暮但心下微溫雖一日已上可活急抱起死

者使繩寬解去繩切不可割斷微微撼正喉龍放倒卧用
被蓋急用竹管吹其兩耳一人急牽其髮不放手就用脚
踏其兩肩一人摩其背及屈伸其手足摩持之少活即以
粥飲與之此法救人無不活者

人溺水死先以刀斡開口橫放筋一隻令其牙嚙之使可出
水又急解去死人不帶艾灸臍中即活

冬月墮水凍死四肢冷口不能言只有微氣者不可便以火
炙用布袋盛熱灰放心頭冷即換待眼開用溫酒或米飲
服鹽酒將死者急燒滾水以燈油脚淬在湯內待通口時灌
下滿喉嚨即吐矣吐淨愈

華陀救中忤中惡鬼氣用犀角末五錢麝香辰砂各二錢半
每服二錢井水調下如無前藥用雄黃末服一錢煎桃枝
葉湯調灌又無雄黃用着身上多時又遭汗衣或又着內
襯衣婦用男衣男用婦衣燒存性服二錢百沸湯調下
又方卒中惡不省人事用韭菜研汁入鼻中

華陀急救鬼魘鬼打

凡初到客舍館驛及又無人居冷房睡中覺鬼物魘打但
其人吃吃作聲便令人叫喚如不醒此乃鬼魘不救即死

牛黃

雄黃各一錢辰砂五分

右研為末和勻每桃一錢床下燒次桃一錢酒調灌之如

無前藥用桃柳枝束邊者各折七寸煎湯灌下又無桃柳枝用灶心土槌碎末服一錢并水調灌更桃半指甲許吹入鼻中更用艾灸人中次并灸兩脚大拇指內離甲一韭葉各灸七壯

睡卧中不省用韭菜汁滴入鼻中冬月用韭菜根搗汁灌之華陀治脫陽 大吐大瀉之後四肢逆冷元氣不接不省人事或傷寒新瘥誤與婦人交其證小腹緊痛外腎搐縮面黑氣喘冷汗自出亦是脫陽瀕死不救先以葱白數莖炒令熱熨臍下次用後藥

附子

一枚重一兩對八片

白木

乾姜

各半兩

木香

二錢半

右四味各研末水二碗煎八分放冷灌服瀕死又進一服合滓併服如無前藥用桂枝二兩好酒二升煎一升分作二分灌之又無桂枝用葱白連鬚三七根沙盆內研細用酒五升煮至二升分作二服灌之陽氣即回先用炒鹽熨臍下氣海勿令氣冷又無葱白用生姜二七片依前法服紫金錠 治自縊落水死鬼迷驚死未經隔宿心頭溫者並宜冷水磨灌下良久即甦

治針失嚙下肚不得出者將蚕豆煮熟同韭菜吃下針即同菜大便出

凡壓死縊死溺死魘死及產後暈絕用半夏一味為末如豆

大吹入鼻中須臾即活

治人九竅四肢指岐間皆血濺出此暴驚所致乘患人勿知
忽以井花水猛噴其面即止此法又治衄血如神

解諸毒

解此毒早禾稗燒灰新汲水淋汁絹濾過冷服一碗毒下利
即安又方用白扁豆末新汲水調下華陀又用黑鉛四兩
磨水一碗灌之

中諸毒死只要心間煖不妨乃熱物犯之用防風搗冷水與
解諸藥毒用甘草黑豈淡竹葉等分剉碎水一碗煎服
解芭莖毒者黃連汁飲

解附子川烏天雄班猶毒煮大小黑豈汁飲

紫金錠 治凡中蠱毒狐狸鼠莽惡菌河豚毒死牛馬羊肉

毒諸毒飲食毒草木鳥獸毒一切俱用薄荷湯或涼水服

解毒丸 解世間不測一切毒

山豈根	山茨菰	菘豈粉	各三兩	板藍根	靜即大葉	土馬棕
黃藥草	續隨子	五倍子		紫河車草		木通
盆硝	藿香	薄荷		貫仲		石膏
姜蚕	乾葛	椎黃		百草煎	各二兩	茜草根
大黃	辰砂	各一兩	麝香	五錢	甘草	

右為細末蒸餅為丸彈子大以螺青三兩一半和藥一半

為衣每服半丸用生姜汁和蜜水化下

一覺腹中不快即以生薑試之入口不生薑臭乃中毒也急以升麻濃煎湯連飲一二碗以手探之吐即愈矣若多飲鹽水吐之亦好

解一切毒緊急無藥取香油飲之無傷

祝由科 禁蝎併蝎螫呪法

呪曰 玉女仙傳攝 勅斬伊蚺滅

右如有蝎螫之人來求治者於蝎螫處望而取氣一口默念七遍怒着作法吹蝎處其痛即止用法之人忌五厭肉扁鵲華陀察聲色定死生要訣

病人五臟已奪神明不守聲嘶者死

病人循衣縫謔語者不可治

病人陰陽俱絕掣衣撮空妄言者死

病人妄語錯亂及不能言者不治熱病者可治

病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死

病人兩目皆有黃色起者其病方愈

病人面黃目青者至期而死

病人面黃目赤不死赤如衄血者死

病人面黃目白者不死白如枯骨者死

病人面黃目黑者不死黑如苔者死

病人面黑目青者不死

病人面目俱黃者不死

病人面青目白者死

病人面黑目白者不死

病人面赤目青者六日死

病人面黃目青者九日必死是謂亂經飲酒當風邪入胃

經膽氣妄泄目則為青雖天救亦不可生

病人面赤目白者十日死憂患思慮心氣內索面色反好

者急棺槨

病人面白目黑者死此謂榮華已去血脉空索

病人面黑目白八日死腎氣絕

病人面青目白者五日死

病人耳目鼻口有黑色起入于口者必死

病人目無精光若土色不受飲食者四日死

病人目無精光及牙齒黑色者不治

病人耳目及顴頰赤者死在五日中午

病人黑色出於額上髮際鼻脊兩顴上者亦死在五日中午

病人黑色出天中下至上顴上者死

病人及健人黑色若白色起入目及鼻口者死在三日中午

病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者死

病人面黑直視惡風者死

病人面黑唇青面青唇黑者俱死

病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死

病人目不圓直視者一日死

病人頭目久痛卒視無所見者死

病人陰結陽絕目睛脫恍惚者死

病人陰陽竭絕目眶陷者死 眉絲頽者七日死

病人口如魚口不能復閉而氣出多不反者死

病人卧遺尿不覺者死及尸臭者不可治

萬民家抄濟世良方五卷終