

壽世保元八



新刊醫林狀元壽世保元辛集 八卷

太醫院吏目 金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

小兒科

小兒形色論 論歌脉 症十五條

夫小兒半週兩歲為嬰兒三四歲為孩兒五六歲為小兒七八歲為齠齖九歲為童子十歲為稚子矣小兒半歲之間有病當於額前眉端髮際之間以名中食三指輕手滿額按之兒頭在左用右手在右用左手食指為上中指為中名指為下若三指俱熱主感受風邪鼻塞氣粗發熱咳嗽若三指俱冷主外感內傷發熱吐瀉若食中 指熱主上熱下冷名中指熱主夾驚食指熱主胸膈氣滿乳食不消又要觀形察色假如肝之為病則面青心之為病則面赤脾之為病則面黃肺之為病則面白腎之為病則面黑先要分別五臟形症次看稟受盈虧胎氣虛實明其標本而治之無不可者



觀形察色辨因由陰弱陽強
 鼻冷便知是瘡疹耳冷應知
 髮硬柔若是傷寒雙足冷要知有執
 風熱症渾身皆熱是傷寒上熱下冷傷食定

觀形察色面目圖

眼抱絡屬脾并爛主風熱

眼烏珠屬肝青主肝有驚

眼瞳人屬腎不轉睛腎虧

眼昂伯屬心紅主心有熱

眼白睛屬肺白主肺受冷

觀面部



左腮屬肝

右腮屬肺

額屬心

鼻屬肺

頰屬腎

左腮屬肝其色青者為順白者為逆若色赤主肝經風熱發熱拘急青黑主驚

風腹痛淡赤主潮熱痰嗽

右腮屬肺其色白者為順赤者為逆若赤色甚者主咳嗽喘急悶亂飲水傳於

腎則小便赤澀或淋閉不通



額上屬心其色赤者為順黑者為逆若青黑主驚風腹痛瘕疝啼哭微黃主盜

汗頭髮乾燥驚疳骨熱

鼻屬脾其色黃者為順青者為逆若色赤主脾經虛熱飲食少思深黃主小便

閉而鼻燥衄血

額屬腎其色黑者為順黃者為逆若色赤主腎與膀胱有熱而小便不通

又

而赤心家熱 面黃脾有積

唇黃脾有積 唇白肺虛寒

眼黃脾有積 眼白肺有驚

人中黑腹_痛 風池紅多啼

唇紅面赤_驚 臉青唇黑_驚

驚風面頰紅 涓水唇帶赤

面白多成瀉 傷寒色紫紅

手指脉紋式

面白肺家寒 唇燥脾有熱

鼻青主吐瀉 風池黃吐逆

唇青面白_瘧 熱甚眼朦朧

風池黃吐逆

唇青面白_瘧

熱甚眼朦朧

而青肝有風 眼赤心經熱

人中青感風 人中赤肺_家

人中青感風

山根紫傷_驚

面黃如土_癩

面黃多食積

唇赤心家熱 眼青肝有驚

人中赤肺_家

人中赤肺_家

承漿_黃吐_驚

痢下肩頰_驚

青色是驚風



夫小兒三歲已下有病須看男

左女右手虎口三關紋理兩手食指本節為風

關中節為氣關第三節為命

關其紋曲直不同如紋只在木節病易治過

中節則病重過第三節則難

治驚則紋青淡紅則寒熱在表深紅必在裏

痘疹紋亂則病久紋細則腹

痛多啼乳食不消紋麗直射指甲必主驚風惡

候紋黑如墨必困重難醫此

乃神聖工巧之一端也

虎口三關脈紋圖

虎口又手處是也三關在節

二指久看三節

第一節風關第二節名氣關

第三節名命關

脈指歌

小兒食指辨三關男左女右一

虎口氣紋脈倒指看紋分五

股看皆知初氣中風候未是命門易亦難要知

食氣虛煩青黑之時症候逆

色紅黃安樂五臟和紅紫依稀損益紫青傷

到風閉粒米短長分兩端如

怒然純黑在其間好手醫人心膽寒若也直上

為逆順逆交連順已難又頭

踰衝射驚風至分作紋又有數股弓反裏順外



執便知身體熱相從肚執脚冷傷積定脚執額熱是感風額冷脚執驚所得
瘡疹發來耳後紅孩子無事忽大叫不是驚風是大癩大叫氣促長聲驚風
吃熱毒悶心竅急須吐下却和脾若將驚藥真堪笑痢後努氣眉頭皺不努
不皺腸有風冷熱不調分赤白脫肚因毒熱相攻十二種痢何為惡禁世刊
腸大不同孩兒有病不可下不執白汗兼自瀉神困顛陷四肢冷乾嘔氣虛
神怯怕吐蟲面白毛焦穗府氣潮執食不化鼻塞咳嗽及虛痰脉細腸鳴爛
燥訝方將有積與疎通下了之時必生詫孩兒實熱下無辜面赤睛紅氣壯
強脉大弦洪肚上熱肝腮喉痛尿如湯屎硬腹脹脇助滿四肢浮腫夜啼長
遍體生瘡肚隱痛下之必愈是為良

小兒脉理

小兒一歲變蒸已足方有脉自寸口而生子見小兒初生未滿月手掌高骨之
際亦有脉息吸吸而動脉蒼氣血之波瀾既生乃成人必有氣血焉得無脉
但不有大人察其端的之至意也

小兒脉歌

小兒有病須憑脉一指三關定息數

人迎主外証右手氣口主内疾外

浮是傷寒浮緩傷風有白液浮洪

痛不休弦緊喉間作氣急緊促之

痰癆緊貫風癩發搐搦軟而細者

血虛濡有氣兼驚悸滑主露濕冷

一至為脫二至卒五至為虛四至

至十至病勢急十一二至死無疑

此訣萬中無一失

小兒五臟主病脉歌

心脉

心脉浮數驚與熱

傷暑焦啼明白訣

弔腸瘧氣及盤腸

壅結口瘡小腑澁

心脉沉遲臟腑寒

諸氣有冷痛難當

小便頻數腸中冷

下指端詳仔細看

肝脉

肝脉浮數定主風

目赤翳膜又主筋

流淚出血眼生瘻

或痒或痛怕羞明

肝脉沉遲主有寒

良醫仔細要參詳

肝脉

脾脉浮數熱痰涎

唇紅臉赤胃中熱

脾脉沉遲主風吹

肺脉

滯頤嘔惡醒脾丸

肺脉浮數主便血

瀉痢潮熱大腑滿

腎脉

肺脉沉遲主虛寒

下根不定即無根

面青唇白眼喜張

諸病傳人慢風候

能食胃惡脾臟堅

滯頤口瘡停壅結

更加吐瀉慢脾傳

氣虛胃弱不能食

傷寒咳嗽遍身熱

氣急痰盛或瘡疹

臟腑滑腸或洞泄

仍有咳嗽與痰涎

偏墜膀胱痛又赤

口臭咬牙是腎驚

臟腑停留人腎囊

偏墜膀胱尤不痛



光淨虛大最難當

小兒死症真訣

黑色如懸針眼下盧醫也須怕忽然腹痛

鼻青時不必更求醫青色連目極大

耳此候必知死黑色繞口及連目看看

定不足黑色眉間也不良十日必死

亡人中黑色入口來孩子人泉埋水腫

之病準頭里報君腎氣滅咳嗽切切

白入眉肺絕要君知孩子吐時鼻色白

命斷難再得中風切忌而如粧焉能

得久長目焰無光兼直視必定三朝死

更有腫人不動時死候要君知目似

開如又不開也是死之媒口噤全然不

進乳此病終不起瀉下之物如湯血

孤兒不得活長吐不止止又吐休要勞

心顧病久不食更啖人終與死為隣

瀉痢不歇歇又來指日下泉台小便艱

難又大瀉畢竟難得活大使用樂全

不通扁鵲也無功耳上圭瘡黑斑出醫

人無此術久嗽四肢皆逆冷無由難

得醒體熱多應睡不醒休要費精神痘

疹出後熱不退此候應為害下糞青

黑不止時不覺覓良醫久渴之後加燥

渴命必難得活腹腫脹時氣又麗終

久命不甦



小兒死候形症

大衝無脉滿口枯涎身出黑汗舌縮
又瀉直視看人面黑狂燥驚叫咬
聲啼哭無淚兩眼半開四肢羸瘦
唇反舌縮用手撒人搖頭動項顛
者皆死已上並是死候難以醫療

看兒眼法

小兒諸病但見兩眼無精光黑精無
不治或神藏於內外若昏困者無
眼者五臟六腑神氣之所發神氣
已脫脉雖僅存亦未能保

相兒命短長法

兒初生叫聲連延相屬者壽聲絕而
復揚急者不壽

啼聲散不成人

啼聲深不成人

臍中無血者好

臍小者不壽

通身軟弱

如無骨者不壽



魚白長大者壽

汗血者多死不壽

頭四破不成人

早坐早行早齒早語皆惡性非佳兒

髮稀少者強不聽人一作不聰

兒生枕骨不成者能言而死

掌骨不成者能匍匐而死

膕骨不成者能立而死

魚口者死

頭下破者死

陰囊下白者死

自開目者不成人

汗不流不成人

常搖手足者不成人

目視不正數動者大非佳兒
小便凝如脂膏不成人

頭毛不周匝者不成人

額上有旋毛者早貴妨父母

尻骨不成者能倨而死

跗骨不成者能行而死

身不收者死

股間無生肉者死

陰不起者死

卵縫通達黑者壽

急驚馬

客蒙曰小兒脉促急為虛驚○

直指云浮數洪緊為急驚○沉遲緩為



慢驚○虎口脉紋青紫為驚風○紅者風熱輕○赤者風熱盛○青者驚極
○紫者驚執○青紫相半驚積風熱俱有主急驚風○青而淡紫伸縮未定
主慢驚風○紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出而不出主慢脾風○形勢
人夷者順○出外音逆

夫急驚風者因內有鬱熱外挾風邪心家受熱而積驚肝家主風而發執者木
制在金山火盛則金受剋金衰不能平木木能生火火得風則火焰起故子母
縱橫血亂氣併痰涎壅塞開竅不通風火蓄盛而不得泄暴烈而成急驚也
其症牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦擅動唇口眉眼眨引頻併大脉浮
散洪緊治先搐鼻通關痰涎壅盛以吐風散吐之次用敗毒散保命丹或雄
黃解毒丸下之驚退而神志未定投安神散但噴藥不下通關不噤眼睛眇
輔口中出血兩足擺跳肚腹搐動或神緩而摸床尋衣症篤而晨昏氣促心
中熱痛忽大叫聲者不治

噤驚散

半夏

牙皂

等分

為末用豆許吹入鼻中

○一論小兒急慢驚風發熱口噤不省人事手心伏熱痰涎咳嗽上壅喘急宜湧法

吐風散

全蝎 炒一箇 爪蒂 炒十箇 赤小豆 三十箇

右為末 每一歲兒服一字 溫米飲調下 未吐再服

○一論小兒急驚風初起發熱手足搐搦眼上視等症并一切感冒風寒頭疼

發熱咳嗽鼻塞聲重及豆疹欲搐發搐并時行瘟疫等症宜

加味收毒散

羌活 獨活 前胡

枳殼 去穢 炒 桔梗 天麻

地骨皮 川芎 甘草

右作一劑生薑三片水煎服

○一論小兒急驚搐搦眼番口噤頭天弔痰嗽喘熱服

南極壽星湯



膽星

防風

白附子

蟬退

薄荷

甘草

右剉水煎服

○ 小兒潮熱驚啼

木通

車前

赤茯苓

麥門冬

蟬退

防風

白芍

甘草

燈草

水煎服

○ 小兒驚風咳嗽痰喘

天南星 一箇

大者炮去裂為末每服一分生薑三片水煎溫服

○ 一論小兒胎驚內弔肚腹堅硬目睛上視手足搐搦角弓反張痰嗽喘熱

切急慢驚風並皆治之

至聖保命用

南星

炮去皮用白礬水浸一宿再出酒

半夏

同上製青黛

薄荷

各一兩全蝎去尾尖天麻

白附子

各炒姜蚕姜法炒

防風

鬱金

甘草 各五分麝香 少許

硃砂為末五分

右為細末煉蜜為丸硃砂為衣芡實大每服一九燈心薄荷湯化下



○一論小兒痰喘急慢驚風至死但能開口灌下無不活者用
千金散 內閣秘傳

全蝎炙熟 直姜各三分 硃砂四分 牛黃六厘 冰片

天麻 黃連各四分 膽星 甘草各二分

右為末每服五七釐薄荷燈心金銀煎湯不拘時調下

○一論驚風退後恍惚虛怯安神定志調理之劑

安神散

人參 茯苓去皮 遠志去心 天麻 白附子

麥門冬 全蝎 蓮肉 茯神去皮木 硃砂各等分

右為細末每服燈心湯調下

○一小兒沉困發熱驚搐不乳視其脉紋如亂魚骨此風熱急驚之症也先用

抱龍丸少許祛風化痰後用六君子湯加柴胡壯脾平肝遂熱退而驚定總

○一小兒瘈瘲啼叫額間青黑此驚風肝木乘脾腹中作痛也先用六君子湯

加木香柴胡釣藤釣啼叫漸緩更加當歸又二劑而安



○一小兒目内色青發搐目上視叫哭不已或用牛黃清心丸不愈後咳牙顫
 悶小便自遺此肝經血氣虛甚故耳余用補中益氣湯及六味地黃丸而痊

慢驚

天慢驚風者因外感風寒內傷乳食而作吐瀉或得大病之餘或誤吐下之過
 脾胃而虛脾與肺時子也時虛亦令子虛而生粘痰胃虛則能生風風能動
 能開故其症目偏喜開痰帶因矣和聖金大日身之尾纏面註涎流流口角
 將復瘳瘳是也治宜性風活痰健脾生胃不可妄用腦麝色粉等藥其有眼
 閉四肢厥冷者名曰慢脾風極危篤速用回陽之藥手足漸溫復以醒脾散
 理之其服藥不效太衝脉尚有者灸百會穴但而黯神慘魚口鴉聲脾痛脇
 動身冷粘汗頭搖髮直睛定口瘡喘嗑夫臥唇縮氣籠者不治

加味和中散

治小兒慢驚風

人參

白朮去帶各

白茯苓去皮

陳皮各五分

半夏七分

薄荷三分

甘草各二分

全蝎炒五分

天麻七分

細辛三分

薄荷三分

甘草各二分



右劉一劑生薑藥煎服乳母亦宜服之

○一論小兒吐瀉不止作慢驚風脾困昏沈默默不食宜醒脾散

人參

白朮去苳

白茯苓去皮木香

全蝎

姜蚕

白附子

天麻

甘草

○一方去天麻姜蚕加泡南星半夏麩陳倉米二百粒水煎熟旋服之

○右劉生姜三片棗一枚水煎服

○一論慢驚乃元氣虛損而至昏惰急須已曾少者得丁癆才見而後多之見元氣脫散而不救矣此乃臟腑傳受已極總歸虛處惟脾受之無風可逐無驚可療此因脾虛不能攝涎而作痰也此方專治慢驚涎潮發搐或吐或瀉不思飲食神昏氣弱宜用

紫金錠子

人參

白朮去苳

白茯苓去皮白朮神木皮山藥炒

乳香

赤石脂蠟炒辰砂各二小麝香一



南京中医药大学图书馆藏

右為細末以糕一兩為丸如彈子大金箔為衣每一粒薄荷湯研化服

○一小兒嘔吐不食手足搐搦痰涎上壅手足指冷額黑唇青此腎水勝心火

也用五味異功散加木香炮姜頓安乃去炮姜再劑而愈

○一小兒潮熱發搐痰涎上湧手足指冷左腮至申酉時青中隱白手足時搐

此肝經虛弱肺金所勝而潮搐脾上虛弱而手足冷也用補中益氣湯以調

補脾肺用六味地黃丸以滋補肝腎而愈蓋病氣有餘當認為元氣不足若

用瀉金伐肝清熱伐痰則誤矣

○一小兒慢驚睡多驚啼凡面黃脉細者難治用此藥與乳母服之

釀乳法

木香

沉香

藿香

丁香減半

陳皮

人參

神曲炒

麥芽炒

右剉每服四錢紫蘇十葉生薑十片芫二枚水煎先令乳母食後捏去宿乳

汁服之即便臥霎時令藥入乳之脉次令兒吮不可過飽亦良法也

五味異功散

方見脾胃

補中益氣湯

方見脾胃



六味地黃丸方見諸病

慢脾

慢脾之症面赤額汗舌短頭低眼合不開睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭禁口咬牙沫手足微搐不收或身冷或身温而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二盖由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰慢脾風若逐風則無風可逐療驚則無驚可療但脾間痰涎壅滯而然耳世所謂慢驚難療者慢脾風是也宜服
加味四君子湯

人參 白茯苓 三分 蒼朮 三分 炮乾姜 四分 白朮 炒 六分

製附子 一分 羌活 三分 炙甘草 四分

石劉生薑三片 葱一枚 水煎服

○一論慢驚慢脾危惡之症藥力不到者但看兩脚面中間陷處有太衝脉即灸百會穴三五壯炷如小麥大灸後仍與醒脾之劑調之



○一論小兒慢脾風內虛昏迷不醒宜加味大醒脾散

人參

白朮炒去苗

白茯苓

桂枝

橘紅

丁香

木香

南星炮

全蝎炒去毒

天麻煨

白附子煨

山藥炒

石蓮肉去殼

石菖蒲

肉豆蔻

砂仁

甘草

○一論小兒驚風後聲啞不能言及諸病後不能言

天南星鬱金炮去皮為末每半字五歲兒半錢獾猪胆汁調食前服

○一論治慢驚慢脾之聖藥也一錠即有起死回生之功頃刻奏效故名回生

錠真海上仙方也急驚亦效

回生錠

人參五不

白朮去苗油

白茯苓

桂枝

橘紅

丁香

木香

懷山藥

桔梗各一兩

甘草三不

膽星五不

赤石脂煨五不

辰砂三不

麝香二不

牛黃一不

麝香一不

乳香二不

牛

蒙石煨金色

牛黃一不

麝香一不

右為末五月五日午時取搗勻印作錠子金箔為衣陰乾每服三五湯分薄化下



諸疳

脉訣啓蒙曰小兒脉單細為疳勞○虎口紋白色白色者為疳

夫疳者甘肥無節乳哺不調或稟賦怯弱血氣不足蓋十五歲已前為疳七後

為勞也書載五疳病關五臟要亦脾家有一臟有積失治而傳其餘也脾家

病去餘臟皆已症雖分乎冷熱治當以補為先宜用地黃丸五疳膏肥之類

○一論小兒疳病面黃肌瘦肚大青筋大便色疳白小便濁瀉或澄之如米疳此疳病也

消疳湯

山查

白芍炒

黃連

姜汁炒

白茯苓

白朮去苳

澤瀉各一斗青皮四分

甘草

生三分

右剉一劑

薑棗煎服

○一治小兒疳積發熱肚大青筋骨瘦如柴

消疳退燕飲

山查去子

烏棗

燈心

竹茹

檳榔尖

史君子去殼

燕夷仁

淮木通

黑牽牛

大黃



柴胡

我木煨

枳殼去穢

黃芩

甜葶歷

右剉水前溫服

○一論肝膽經熱毒瘰癧或耳內耳下生瘡發熱潮熱或肝經濕熱下注囊癰便毒腫潰或小腹脇股結核凡肝膽經都分一切瘡瘍發熱並用之

九味柴胡湯

柴胡

黃芩 炒各五入參

山梔

半夏

龍胆草

當歸

芍藥各三分 甘草二分

水煎服

○一論小兒肝疳白膜遮睛肝經虛熱血燥或風客淫氣而患癰癧結核或四肢發搐眼目抽動痰涎上壅凡傷損出血多披搐發熱又治腎疳腦熱消痰手足如水寒熱往來滑泄肚脹口臭乾渴齒齲潰爛爪黑面顰遍身兩耳生瘡或耳內出水或發熱自汗盜汗便血諸血失瘖或小便淋閉咳嗽吐血或咽喉燥痛口舌瘡裂或稟腎不足肢休瘦弱解顛鶴節五遲五軟或畏明下竄或早近女色精血虧耗五臟齊損凡屬腎肝諸虛不足之症皆宜用此以滋化源其功不能盡述



六味地黃丸

懷生地黃

酒浸砂鍋內破碗盛蒸至極黑研碎入

山菜黃酒蒸去核取肉

乾山藥

石口內搗如活成膏入兩

牡丹皮去骨白茯苓去皮澤瀉去手各三兩

右忌鐵器為細末和地黃膏加煉蜜為丸如梧子大每服三五十九白

滾水下

○一治小兒五疳潮熱面黃肌瘦煩渴壯大青筋手足如柴精神困倦歷試有
効無疾預服此藥則諸疾不主元氣虛弱者服半月身體健壯

保嬰五疳膏

青皮麩炒二橘紅五錢

白朮去苦蜜水白茯苓七錢半

麥門冬去心史君子肉剉炒七錢半

山查肉 錢半 麥芽炒五錢

金櫻子肉略芡實仁錢蓮肉隔帶炒甘草 錢半

右為細末和勻重七兩每次用藥末一兩煉蜜四兩調成膏每日中晚間

各服一二茶匙溫水漱口○身熱咳嗽加地骨皮百部○吐復飽服大便秘

水復鳴作聲或蟲出不知加檳榔二錢木香一錢稟受氣弱加人參三錢半



○一論消甘化積磨碎清熱伐肝補脾進食殺虫潤肌膚養元氣真王道也
肥兒丸

人參三錢半 白朮去苦

白茯苓 法皴各

黃連姜炒三錢

胡黃連五錢

史君子去殼四錢 神曲炒

麥芽炒

山查肉各三錢

甘草炙三錢

蘆薈二錢半 中四面 碗盛泥封固置坑 澱糖火煨透用

右為末黃米糊為餅白湯化下或作丸黍米大每服二三十丸看兒大斟酌

癖疾

夫癖塊者嬰兒飲食失調三焦閉格以致停滯腸胃不得宣通初得為積久則氣血與痰裹積塞于腹脇及瘡家縱飲生冷漿水亦能成之其症作痛有時而黃肌瘦倦怠無力或生潮熱寒熱是也治先定去寒熱次用消堅散結和脾益胃之劑理之更用灸法晒藥久之自効

○一論小兒腹中癖塊發熱增寒口乾小便赤或大便秘澇或腹脹腫滿或咳嗽喘執不思飲食面黃肌瘦四肢困倦等症



淨府湯

柴胡一錢 黃芩八分 半夏姜炒 人參三分 白朮去芦炒

白茯苓去鐵 猪苓五分 澤瀉二錢 三稜煨七分 莪朮煨七分

山查肉一錢 胡黃連三分 甘草三分

右剉一劑生薑三片棗二枚水煎溫服

○一論小兒癥積日久不消元氣虛弱脾胃虧損肌肉消削肚大青筋發熱

乾肚腹脹滿

抑肝扶脾散

人參五分 白朮 茯苓八分 陳皮六分 青皮香油炒

龍胆草酒洗 白芥子炒 柴胡三分 山查肉八分 神曲炒六分

黃連姜炒一 胡黃連三分 甘草三分

右剉一劑生薑三片棗二枚水煎溫服

黃龍丸 扶瀉劉小亭傳

雄黃一錢半 蜈蚣二條 沙蠟內炒 去 蘆薈三分 阿魏三分



牛黃一分 天竺黃三分

右為未化黃蠟一兩為丸如菘豆大先服七丸則熱退次服九丸則塊消
服十一丸則病根除每用黃蠟煎雞子清入藥于內黃酒下

肥兒丸方見前疳門 治疳疾如神

○一專貼癖積氣塊身體發熱口內生疔此藥用狗皮攤貼患處每个重七錢
貼三日止熱七日覺腹微痛十日大便下膿血為驗大有神効忌生冷腥膩

發物百曰

神仙化癥膏

真香油二斤 秦艽五錢

穿山甲十四片 當歸三錢

蜈蚣五錢 水蠶字七個

三稜五錢

莪朮五錢

黃丹一斤二兩 水黃柏五錢
飛過炒紫色

大黃三錢

右將藥入油內煎黃色為度瀘去渣搗爛待用油冷時下黃丹用文武火熬
槐柳條不住手攪黑炳起滴水成珠手試軟硬方可離火次下五味細藥並
入搗爛粗渣於內



真阿魏二兩 乳香五錢 沒藥五錢 麝香一錢 皮硝三錢 風化

攪勻以磁器內盛之 如用坐水中鏽開不可火上化 如有馬刀櫃子者加

珀一兩在內無不効驗

○一將軍百戰百勝膏 貼癖如神

大黃 白芷各二兩 三稜 莪朮各一兩 水鱉子十箇

蜈蚣十條 穿山甲片十五 巴豆十箇 五 葶麻子十箇 五箇 梔子五箇

黃連五錢 槐柳條三百十

香油二斤入藥熬黑色去渣濾淨再加黃丹一斤熬點冰成珠再加血竭

蘆薈五錢 天竺黃五錢 輕粉五錢 阿魏五錢 麝香五分 胡黃連二錢 礞砂二

為末下油為妙

○一治小兒癖疾發熱之甚及眼矇方

明目化癖丹

牛黃一分 片腦一分 龍膽二分 麝香三釐 乳香三釐

右共為細末先將乳汁於銅杓中炭火上滾黃色下前藥急取出攪勻煎油



單紙上丸如米粒大男左女右臥時點入大眼角內合眼自化頭上出汗至胸前第二丸汗至劑上第三丸汗至臍下再點三二丸腹痛下膿血即愈外不可言

化癖金丹 內閣秘傳

蟾酥水泡

黃蠟各二錢 羚羊角

牛黃各五分 麝香三分

巴豆肉一錢 硃砂

水片各二分

右為末丸如菜子大每用一粒用補頭針在患處刺破皮入之用膏藥貼之

一伏時揭起其癖化膿血出盡服調理脾胃之藥而愈

○一論小兒患癖年深不愈諸醫以攻剋殺伐之劑屢投不愈以致元氣耗傷脾胃損傷血氣乾涸肢體羸瘦面色痿黃肚大青筋身熱自汗喘急氣促泄瀉腹脹浮腫不思飲食遂以補中益氣湯久服而愈

熱證

小兒之病惟熱居多夫熱有虛有實黃則面紅目赤氣籠口乾燥渴小便赤澀大便堅閉五心煩熱日夜焦啼發壯熱宜大連翹飲主之虛則面白眼青氣



微口中清冷恍惚神緩大便稀而小便頻夜則盜汗發虛熱宜惺惺散主之
其有身體乍冷乍熱熨鬱驚惕上盛下虛此冷熱不調候也如熱在表宜汗
在裏宜下表裏俱熱則宜解散其或表裏已解熱又時來此表裏俱虛氣不
歸元而陽浮於外不可再服涼藥必使陽斂於內身體自涼宜參苓白朮散
主之又有潮熱則發熱有熱驚熱顛叫恍惚夜熱又發且止餘熱寒邪未盡
食熱肚腹先發熱疳熱骨蒸盜汗壯熱一向不止煩熱心燥不安積熱煩赤
口瘡風熱汗出身熱虛熱困倦少力客熱來去不定癍熱涎嗽飲水寒熱發
如瘡狀血熱已午時發熱瘡疹熱耳鼻尖冷十六者大司而小異諸症得之
各有所歸其間或有三兩症交互者宜隨其輕重而處治之蓋小兒氣稟純
陽臟腑生熱陰陽氣變薰蒸於外致令身熱也若肝熱則兩脹赤痛流淚羞
明或生翳疔心熱則口内生瘡小便赤腫淋瀝不連肺熱則鼻衄不止大便
閉結脾熱則多涎沫口內長流心脾熱則生重舌木舌胃熱則作口臭腎熱
則耳聾或出膿汁此五臟所生主熱各不同是不可以槩論也大抵熱則生
風風則悸矣

○一論小兒心經邪熱心與小腸受盛乃水竇之處常宜通利雍則結滑則胞
 執則溢盛則淋平涼心火三焦自順不待疾作而解證成而療者疎待有之
 矣一十五味加湯使用纔覺蘊熱客熱寒邪風邪冒之肺經心將受之不受
 觸傳于小腸或閉或溢或赤或白淋瀝不通榮衛不通壅之作疾其證多端
 以致膈熱眼目赤腫唇口白瘡津液不生涕唾稠盛須在表裏俱得其宜驚
 風悉能散之痰熱亦自消除連翹之功可謂大矣

大連翹飲

連翹

藷麥穗

滑石

車前子

牛旁子

赤芍藥

各八分

山梔子

木通

當歸

防風

各四分

黃芩

一分

柴胡

甘草

各一分


荆芥穗

二錢

蟬退

五分

右剉作一劑竹葉十箇燈草十莖水煎服○風痰熱麥蒸熱加麥門冬○實
 熱丹熱加大黃○胎熱瘡疹餘毒加薄荷葉○癩疽毒熱加大黃芒硝
 ○一論小兒上積熱毒唇口腫破生瘡牙齦出血口臭頰熱咽乾煩燥不寧并
 痘疹餘毒未解或頭而身體多生瘡癩宜



五福化毒丹

犀角 三錢

桔梗 一兩

生地黄

酒浸

赤茯苓

去皮

鼠粘子

微炒各五錢

粉草

朴硝 各三錢

連翹

玄參 各六錢

青黛 三錢

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸薄荷湯研化下兼有驚加硃砂

○一論小兒變蒸一症乃小兒蒸皮長骨變幻精神不須服藥其有兼傷風咳嗽痰涎鼻塞聲重變蒸發熱宜服此方

惺惺散

人參

白木 夫 芹

白茯苓 去皮

甘草 炙

桔梗

白芍 炒

天花粉

細辛

薄荷葉

右剉每服三錢水煎溫服

感冒

○一論小兒感風或胃寒

用老葱三四根春極爛處再偏擦幾遍後處出

以手抹來相擦滿掌烘溫暖向病者遍身擦之通氣汗立愈又不相妨



出痘疹屢驗絕妙

○一治小兒面青身冷默然不語用燈火遍身手足按穴爆之立醒

○一論小兒傷寒頭痛壯熱惡寒咳嗽鼻塞聲重痘疹欲出發搐驚風喘嗽手足搐搦等症宜服

人參敗毒散

羌活

獨活

柴胡

前胡

枳殼

桔梗

白茯苓

川芎

薄荷葉

人參

甘草

右剉姜

葱煎服

○一論小兒風寒外感驚風內積發熱喘促咳嗽痰涎潮熱搐搦并痘疹初作

羌活膏

人參

羌活

獨活

前胡

川芎

桔梗

天麻各

五錢薄荷

地骨皮各

三甘草二錢

右為細末煉蜜為丸如次實大每服一九姜湯研化下

一論小兒四時感冒傷風瘟疫身熱昏睡氣粗喘滿痰實壅嗽及驚風潮搐



蠱毒中暑并瘡疹欲出發搐皆可服之壯實小兒三五日服一九可免驚風痰嗽等疾宜

抱龍丸

南星

為未入臘月黃
百日取出入錢

牛胆中陰乾

天竺黃

雄黃

辰砂

研各四錢

麝香 一錢

右為細末煮甘草膏為丸如皂角子大每服一九薄荷湯研化下百眩內者作三服或用臘雪水煮甘草膏汗和藥丸佳

○按右方若風熱痰嗽或急驚發搐昏睡咬牙形病俱實宜用此方若初冒風寒咳嗽痰盛氣喘者屬客邪內作也先用十一味參蘇飲若邪既解而腹脹吐瀉或發搐咬牙睡而露睛屬脾肺氣虛也用四君子湯加陳皮各異功散切思祛痰表散若過服而致前症者尤宜補溫脾肺

參蘇飲

方見咳嗽

脾胃



北京中醫藥大學圖書館版權所

○一論小兒諸病因藥攻伐元氣虛損脾胃衰憊惡寒發熱肢體倦怠飲食少思或兼飲食勞倦頭痛身熱煩燥作渴脉洪大弦虛或微細軟弱右關寸獨甚洪宜用之大比久病或過服剋伐之劑虧損元氣而諸症悉具之最宜此湯調補若無有前症之兒為患者尤宜用之

補中益氣湯

黃芪

蜜水炒

揀去

各八分

白朮

油炒

當歸

身酒洗各一錢

陳皮

甘草

炙各五

升麻

柴胡各一分

右剉薑棗煎空心溫服

○一論小兒脾胃虛弱或因剋伐之過致飲食少思或食而難化或欲作嘔或大便不實脾胃虛損吐瀉少食宜用

四君子湯

人參

白朮

去芦炒

白茯苓

去皮

甘草

炙各等分

右剉薑棗煎服

六君子湯

治脾胃虛弱

飲食少思

或大便不調

肢體消瘦

面色痿黃

即四君



子湯加陳皮半夏

○一論小兒脾胃虛弱吐瀉不食或驚搐痰盛或睡而露睛手足指冷或脾肺虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母有疾致兒患此者毋亦當服

異功散

人參

右用姜棗煎服

白茯苓

去皮

白朮

法芫炒

甘草炙

陳皮各等分

傷食

經云脈滑者有宿食也

夫小兒傷食皆因乳哺

為風寒所搏或因夜

肚熱喜睡神昏不思

卯臭或氣短痞悶或

○虎口脈紋黃色為脾家有積○小兒脈沉者為脾不

不節過食生冷堅硬之物脾胃不能消化積滯中脘外

臥夫蓋以致頭疼身熱面黃目胞微腫腹痛脇脹注冷

飲食或惡食或惡心或嘔或噦或口噤酸氣或大便敗

胃口作痛或心下痞滿按之則痛此皆為陳積所傷也



宜以萬億九利之若
內停於食或外又感寒邪者則人逆氣口俱緊盛頭疼
惡寒拘急兼前等症
宜以太和散左之葛氏白乳者奶也哺者食也乳後不
可與食食後不可與
乳緣小兒脾胃性弱乳食易傷難以消化初得成積久
則成癥成疳變為百
病可不慎乎

萬億九 方見通治 治傷 食白病

○一論內傷乳食吐腹 脹痛外感風寒頭疼發熱宜服

太和丸

紫蘇

陳皮

香附

羌活

蒼朮

川芎

枳殼

山楂

神曲炒

麥芽炒

甘草

生薑

三片水煎溫服

塔山汪景明傳

○一治小兒食積腹痛

黑丑

生牛

檳榔

各三

木香

五分

右為細末每服五分

黑砂糖調入滾水服立消

○一論小兒時常傷食 皮黃肌瘦肚大腹脹用此焦餅令常食之



消食餅

蓮肉 去皮

山藥

白茯苓 去皮 芡實 去殼炒 神曲 炒

麥芽 炒

扁豆 炒

山楂 去子

石各等分爲末每四兩八白麩一斤水同和烙焦餅用

○一論此藥消食止泄止吐消疳消黃消脹定肚痛益元氣健脾胃

啓脾丸

人參

白朮

去苦炒

白茯苓 去皮

山藥

蓮肉 去心皮各

山查肉

陳皮

澤瀉

甘草 炙各五錢

右爲末煉蜜爲丸如菉豆大每三四十丸空心米湯送下小兒常患傷食諸

疾服之立愈

一論小兒傷客肌大腹脹

用做酒小曲一枚爲末打八雞子一个攪勻八塩少許蒸熟食之每早服一

次可數次而愈

○一論健脾胃進飲食消積滯殺疳虫長肌肉乃保嬰第一方也



保嬰丸

臨川徐培鴻試驗

人參

三錢

白朮

去苦五錢

橘紅

刮淨五錢

白茯苓

去皮四錢 甘草炙二錢

青皮

去穰三錢

砂仁

二錢半

木香

二錢五錢

山藥

五錢

蓮肉

去皮心三錢

史君子

去殼三錢

山查肉

三錢

三奇神曲

炒三錢

右共為

細末用生荷葉包粳

米煮熟去荷葉將米杵爛以淨布扭出再煮成

糊為丸

如麻仁大每二十五

丸或三十五丸至五十九陳米炒熱煎湯不投時服

○一小兒食粽後咬牙欲吐項

問腹脹昏曠鼻青黃赤此脾土傷而心肝所動

食積發厥也先令雞翎探吐

出酸物頓醒節具飲食勿藥而愈

○一小兒好吃粽成腹脹痛用

白酒麩末同黃連末為丸服之愈

○一小兒因停食腹痛服峻利

之藥後患瘡曰哺而作此元氣下陷以補中益

氣湯治之

千金肥兒餅

小兒無病日常食三五餅可防患於未然妙不可言

嬰孩恒闕乳

飲食不消停

脾胃一傷損

吐瀉兩相併

痰嗽加吭喘

執積致疳驚

面黃肌瘦削

腹脹吐青筋



赤子焦啼叫

慈母苦傷情

吾心懷幼切

家蓮子茯苓

芡實乾山藥

扁豆薏苡仁

已上各四兩

神曲麥芽陳

人參史君子

山查國老井

六味每二兩

古糯米二升

藥米均為末

布裹甕內蒸

白糖二斤半

調和餅印成

每食二三餅

諸病即安寧

肥兒王道藥

價可擬千金

吐瀉

夫小兒吐瀉皆因六氣未完六淫易侵兼以調護失常乳食不節遂使脾胃虛

弱清濁相于蘊作而然大槩有冷有熱有食積三者之不同也蓋冷者脾胃

虛寒水穀不化小便白而大便青或如糠粕手足厥冷或吐或瀉宜助脾胃

主之如上之症或兼有外感風寒內傷生冷身熱乍涼乍熱作吐瀉者宜藿

香正氣散主之熱者脾胃有濕大便黃而小便赤口乾煩渴四肢溫暖或吐

或瀉宜甘露散主之如上之候有兼中暑受熱作吐瀉者宜茹苓湯主之或

益夫散亦可食積者因傷食過多積滯脾胃則肚脹發熱若吐如酸醜氣若



瀉如破卵臭宜萬億丸微利即愈利後不愈乃脾胃虛弱仍以助胃膏主之
凡吐瀉初起即服燒針丸錘固之即効大抵吐瀉之症多因乳食胃傷脾胃
乳食傷胃則為嘔吐乳食傷脾則為泄瀉吐瀉不止漸至日深導其胃氣之
虛慢驚之候自此而得可不慎乎

吐瀉不治症

小兒瀉不定精神好者脾敗也○吐瀉唇深紅者內熱故也不退必死○面黑
氣喘者不治○大渴不定止之又渴腎敗也○遺瀉不覺者死

燒針丸

治吐瀉如神

黃丹

水飛過硃砂

白礬

水煨各等分

右為未棗肉為丸如黃豆大每服三四丸戳針尖上放燈焰上燒過存性研
爛涼米泔水調服瀉者食前吐者無時外用菘豆粉以雞子清和佳膏塗兩
脚心如瀉塗顛門上則去之

○一治脾胃虛弱吐瀉不食凡虛寒症先服此以正胃氣

五味異功散



人參

白朮

去芦

茯苓

去皮

陳皮

甘草

右劉散妻棗煎服

○一論小兒吐瀉脾胃虛弱飲食不進腹脇脹滿腸鳴久瀉虛寒等症助胃膏

食不進腹脇脹滿腸鳴久瀉虛寒等症

人參

白朮

白茯苓

去皮

丁香

木香

砂仁

白豆蔻

肉豆蔻

官桂

藿香

甘草

各一錢 陳皮

山藥

四錢

右為細末煉蜜為丸如彈子啼胎寒腹痛

大每服一九米湯化下兼治嘔乳便青或時夜

○一論四時不正之氣寒疫時

氣由風瘴氣兩濕蒸氣或中寒腹痛胃風吐瀉

中濕身重泄瀉脾胃不和或

飲食停滯後感外寒頭疼增寒嘔逆惡心助膈

悶或發寒熱無汗

藿香正氣散

辛夷香一錢

紫蘇八分

陳皮

厚朴

姜炒

半夏姜炒



白朮去芦炒 白茯苓去安 桔梗

大腹皮

白芷

白朮各五分

右剉一劑姜棗煎服

○一論小兒夏秋之月霍亂吐瀉身熱口渴

加上茹苓湯

猪苓

澤瀉七分

白朮去

芦五赤茯苓去皴

黃連五分

香菇

乾葛七分

天花粉

二錢甘草五分

右剉生薑煎服○如熱極加石膏知

母○瀉極加升麻○腹痛加炒白芍二

錢桂三分寒痛亦加

○一論小兒五種泄瀉赤白利疾宜用

鐵門拴

文蛤一兩沙 白礬一錢半生牛粘

黃丹三錢

右為未用黃蠟一兩化開為丸如棗

豆大每服大人十五丸小兒五七丸用

茶一錢姜二錢煎湯下

○一小兒水瀉痢疾用蜜三匙枯礬末

三錢蘿蔔汁調服出微汗忌醋



○一論小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉頻併
木乳食不進羸困失治變成慢驚風
不止津液枯竭發熱煩渴多燥但欲飲
七味白朮散 痢不問陰陽虛實並宜服之

人參

乾葛

甘草

白朮 去芦沙 白茯苓

去皮

藿香

木香

右剉姜棗煎服

○如小兒頗煩瀉利

將成慢驚加山藥扁豆肉豆蔻各一錢

姜汁一錢煎服

○若慢驚已作加細

辛天麻各一錢全蝎二箇白附子八分

○若小兒冬月吐瀉多是胃寒胃虛

所致加丁香二粒○若胃虛不能食而

大渴不止者不可用淡滲之藥但胃

元氣少故也以白朮散補之○如不能

食而渴者倍乾葛加天花粉○如能

食而渴者白虎湯加人參

○一論小兒嘔吐不止宜

金棗

木香

半夏

南星

泡透姜汁

丁香

陳皮各二錢

砂仁

藿香各

各三錢

人參一錢半



北京中医药大学图书馆版

有為細末薑汁打糊和成錠辰砂為衣淡姜湯送下

○一論小兒久瀉久痢不止及滿口生瘡目爛如泥痛哭不已諸一罔効

巴豆去錢 瓜子仁七箇 燒紙錢二箇 其搗一處如泥津調貼在兩胃間

豆中待成泡揭去即愈

○一論小兒泄瀉用巴豆汁末為膏貼在顛門上燒線香一炷末盡即去此

○一論小兒泄瀉不止用山藥炒為末不拘多少入粥同粥食之立止

○一論小兒久瀉兼脫肛小腹重墜四肢浮腫面色痿黃時或兼青諸藥到口即

嘔吐番乳用憂鬱傷脾大便不實先用補中益氣湯後用五味異功散及四

神丸調治其母不兩月而子母俱痊

○一論小兒傷食嘔吐服尅伐之藥嘔中見血用清熱涼血之藥又大便下血唇

色白而或青問其故於余余曰此脾土虧損肝木所乘而然也令空心用補

中益氣湯食遠用異功散以調補中氣使涎血各歸其源而愈

○一論小兒吐瀉不止或取轉過多四肢發厥虛風不省人事用此四肢

回陽散



天南星為末每服三錢入京棗三枚同煎溫服

○一治小兒吐不定

五倍子二箇一生一熟甘草一握用濕紙裹炮過同為末每服半錢水調

痢疾

夫小兒入廡者乃饑飽勞役風寒暑濕因觸冒天地大風之邪而得故以命

也大抵多由脾胃不和飲食過度停積於脾胃不能消化又為風寒暑濕于

之故為此疾傷熱則赤傷冷則白傷風則純下青血傷濕則下如豆汁冷熱

交并赤白兼下若下迫後重裏急窘迫急痛者火性急速而能燥物故也或

夏未秋初忽有暴折於盛熱無所發故客搏肌膚之中發於外則為瘡發於

內則為痢內外俱發則為瘡痢凡痢病久則令腫滿下焦偏冷上焦偏結則

為上實下虛若脾胃濕熱之毒薰蒸清道而上以致胃口閉塞而噤口之症

又有一方一家之內上下傳染長幼相似是疫毒痢也當先推其歲運以平

其外察其上結以調其內審其所傷別其虛實寒熱以治之倏然明白不抄

史按也



痢疾不治症

凡小兒下痢如豆腐色者死○下如屋漏水者死○下痢日久大孔如孔者死
○下痢如竹箇汪水者死○又小兒赤白同下久而不禁小便赤溢腹痛
熱唇紅舌胎氣促心煩坐卧不安狂渴飲水穀道傾陷時復而容似飢飢食
全不進者並不治

清熱化滯湯

治痢主方

黃連 吳茱萸 煎傷 拌炒 白芍 莖

枳殼 去殼炒 黃芩 甘草

陳皮

白茯苓 去皮

右劉生薑一片水煎空心温服○初起積熱正熾加大黃芒硝○血痢加酒

炒黃芩當生地榆○白痢加厚朴枳殼○赤白並下加川芎歸尾桃仁紅花

滑石陳皮乾薑炒黑○白痢久虛加白朮黃芪茯苓去苓連枳殼○赤痢久

虛下後未愈去苓連加用丹白芍白朮川芎阿膠珠○裏急後重加木香枳

榔○腹痛加白芍川芎玄胡索枳殼○小便赤少加木通猪苓澤瀉○下如

豆汁加白朮蒼朮防風○食積加山楂枳實麥芽神曲○久痢氣血兩虛加



人參黃芪當歸川芎升麻肉桂○下後二便流利惟後重不去者氣陷于下也

○一論小兒痢疾屬熱居多用黃連黃芩大黃甘草煎服赤痢加桃仁紅花白痢加滑石末同煎

開板丹

黃丹飛過一兩 黃蠟一兩 乳香一水 沒藥一水 杏仁去破尖

巴豆去油八箇

右將四味爲末未將黃蠟鎔開後將末藥同蠟拌勻攪冷成塊丸如黃豆大每服一丸空心服紅痢冷甘草湯下白痢冷乾薑湯下水瀉冷冰湯下冷油腫

○一治休息痢及症瀉日久不能安

用雞子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內鎔以雞子拌和炒熟空心食之

○一治小兒痢疾方

用雞子一箇冷水下鍋煮二三沸取出去白用黃研碎以生薑汁半小鍾和勻與兒服之不用茶神効



○一治小兒患痢脫肛色赤或痛以補中益氣湯送吞連丸而愈後傷食作瀉復脫肛不入仍以益氣湯服更以葶麻仁研塗頂門

○一治小兒久痢裏急後重欲去不去手足並冷皆胃氣虛寒下陷也以補中益氣湯加木香補骨脂倍加升麻柴胡

○一治紅痢及噤口

用田螺搗爛盒臍中填刺効

○一治痢不拘赤白

白蘿蔔汁蜜各等分攪勻服三四匙効

○一治小兒噤口痢用甜梨一箇空空入蜜填滿紙包火煨熟乾立止

○一治禁口痢湯飲米穀不下者

石蓮子去殼并內紅皮及心爲細末每服量兒大小或五分或一錢三二錢

用陳倉米湯調下如嘔加生薑汁一二匙

○一治血痢用苦參炒爲末每服三分或五分米湯調下

○一治白痢用肉豆蔻麵包煨乳香二粒共爲末每服二三分米湯調服



○一治久痢不止用陳蘿蔔煎湯一服立止○一方用萹菜煎湯服効
○一治湯痢久不止不肯服藥用肉荳蔻煨去油爲末三錢麥麩四兩同和切
麩入葱鹽煮如常食之

瘧疾

大瘧者外因感受風寒暑濕內因飲食飢飽而作也其症不一先寒後熱者名
寒瘧先熱後寒者名溫瘧寒而不熱者名牝瘧熱而不寒者名痺瘧不寒而
熱骨節疼痛身虛腹脹自汗善嘔者名溫瘧噎氣吞酸胸膈不利者名食瘧
一日一發受病一月間曰一發受病半年連發二日間一日者氣面俱病也
起于三阴者多熱而發于日起于三陰者多寒而發于夜發于日者隨症而
治發于夜者加血藥并用升提暫瘧可截久瘧加補經久不愈一兒飲水結
癖中脘名曰瘧母此最難痊一二發開用截夫草必變浮腫疝利之疾然嬰
兒之瘧自飲食得之居多治須以淮導扶胃氣爲本此秘訣也
○一論食瘧嘔吐痰沫及時行瘧瘧不問先寒後熱諸瘧通用



清脾引

青皮

厚朴 姜炒

草果

白朮 去昔

白茯苓 去皮

柴胡

黃芩

半夏 姜炒

甘草

右判棗煎服○小便赤加猪苓澤瀉

○一論停食感寒死瘧及中皖虛寒嘔逆惡心等症

養胃湯

蒼朮 米泔浸

厚朴 姜汁炒 陳皮

半夏 姜炒

白茯苓 去皮

人參

草果

藿香

甘草

右判烏梅一箇生薑水煎服

截瘧飲

白朮 去昔

蒼朮 米泔浸 陳皮

青皮 去穢

柴胡

黃芩

猪苓

澤瀉

常山

甘草

右判薑棗水煎露一宿温服○有汗而熱多者加人參黃芪前胡知母○無汗熱多者加乾葛紫蘇○寒多加乾姜草果○痰多加半夏貝母○食積加



積實山查神曲麥芽○夜發者為陰分加當歸升麻 ○二日三日一發者加
人參黃芪白朮烏梅去蒼朮○單寒加乾姜附子人參去柴苓猪苓澤瀉
腹痛加厚朴檳榔 室女熱入血室加小胡湯

截瘧仙丹

五月五日午時用雄黑豆四十九箇先一日以水泡去皮研爛入人言五分
同搗為丸如黃豆大雄黃一錢為衣陰乾收貯臨發熱早晨面東無根水下
一丸忌熱酒熱物一時仍忌魚腥生冷之物三日黑豆圓者是

○一乳兒瘧疾痞塊

川芎

生地

白芍藥

各一

陳皮

半夏

炒苓各一 甘草

右作一服薑三片煎下幣帛末半錢

○治鬼瘧邪瘧用天靈蓋燒存性為末每服三釐溫酒調下立已

痰喘

痰者風之苗熱生於心痰生於火火者痰之根靜則伏於脾土動則發於肺金



水澄則清水沸則渾小兒痰嗽乃心火剋制肺金或寒邪停留肺膈寒化為熱必生痰喘咳逆上氣肺脹胸滿俗為馬脾風又為喉風若不速治立見危

奪命丹 治小兒風涎灌膈利痰去風

青蒙石煨為末煉蜜為丸如菉豆大每七八九蒲荷湯下

○一小兒風痰吐沫氣喘咳嗽肚腹膨脹不思飲食

小兒肺脹喘嗽 人多看作風喉 大黃樞榔二牽牛 人參分兩等勻

五味研成細末 蜜水調量稀稠 每將一字着咽喉 不用神針法灸

右其證肺脹喘滿胸高氣急兩脇煽動陷下作坑兩鼻竅張悶亂嗽渴舌噴

不鳴痰涎凝塞俗云馬脾風若不急治死子且夕也

定喘湯 治驚喘氣急

麻黃六分 杏仁 半夏六分 甘草七分 黃芩三分 桑白皮蜜炙六分

蘇子 欬冬花分 甘草二分 白果打碎炒黃

右剉水煎溫服不必用生薑

○一論小兒脾胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心肚腹膨脹腰



昔倦痛虛勞冷嗽諸藥無効者服

人參欵花膏

人參八分

紫苑一錢

欵花去梗

桑白皮炒

貝母二錢半

桔梗炒二分

紫蘇五分

檳榔五分

木香五分

杏仁去皮炒

五味子八分

馬兜苓二分

右為末煉蜜為丸如龍眼大每一丸薑湯化服

○一論小兒喉中痰壅喘甚神効方

用巴豆搗爛作一丸以綿花包裹男左女右塞鼻痰即墜下

咳嗽

夫咳嗽者肺為嬌臟外主身之皮毛內為五臟華蓋形寒飲冷燥熱鬱蒸最為傷也而肺實肺虛皆能壅痰而發咳也咳嗽二症難作一塗咳謂無痰有聲肺氣傷而不清嗽謂無聲有痰腫濕動而生痰咳嗽謂有聲有痰因傷肺氣兼動脾濕也其症感風寒者鼻塞聲重停寒者悽慘怯寒夾熱者則焦煩受



濕者為纏滯停水者則怔忡若痰飲則咳有痰聲痰出咳止火極則咳聲不轉面赤痰結肺氣則喘滿氣結息重風痰壅盛則咳至極頻吐乳食與痰俱盡方得少息而或實或虛則視痰之黃白垂之稀稠而可知也以一歲論之春乃上升之氣夏乃火氣痰上秋由濕熱傷肺冬則風寒外束以一日論之清晨本曰痰火午痰皆曰陰虛夜間或有食積其咳而吐膿血者肺熱也久痰不已必傷驚悸頑涎甚至眼眶紫黑如物傷損血珠紅赤如血大可畏人治法風寒宜疎散煩熱宜清利受濕用勝濕之藥停水宜瀉水之劑痰飲即豁痰火極則降火肺脹則養血疎肝風痰壅盛宜養胃而去風痰也况肺生胃門更能溫中與表順助其氣滋潤肺經和順三焦一將兒氣壯則咳漸減胃復則痰不生肺滋則咳不有乳母近飲食慎風寒咳何從而生乎

雄朱丸

牛膽南星

天花粉

薄荷

荆芥

防風

羌活

天麻

硃砂

雄黃

麝香

三分



右為細末粳米飯為丸薄荷湯送下

○一論冬月感寒咳嗽夜不得睡以此發之

九寶飲

薄荷

紫蘇

大腹皮

麻黃

桂枝

桑白皮

杏仁

陳皮

甘草

右剉生薑三片烏梅一箇水煎溫服

○一論小兒四時感冒發熱頭疼咳嗽喘急痰涎壅盛鼻塞聲運涕唾稠粘乃

內傷外感一切發熱等症宜服

紫蘇飲

紫蘇

陳皮

桔梗

前胡

半夏

乾葛

白茯苓去皮

枳殼去穢

人參

木香

甘草

右剉生薑煎服

○一論小兒咳嗽吐痰

用甜梨一箇空小孔入研砂一分燒熟與服或搗汁亦可



○一論小兒一切咳嗽不已用
寧嗽膏

麻黃

杏仁 去皮尖 桔梗 去芦

甘草

知母

貝母

款冬花

黃芩

紫苑 名五錢 黃連

香附

童便炒 三錢

牛膽南星

一兩

一右為細末煉蜜為丸如芡實大每一丸白湯食後化下

○一論小兒身熱感冒鼻流清涕或鼻塞咳嗽吐痰輕者不藥候一二口自愈
重者服此方治痰為主輕輕解之

白朮

去芦 錢

白茯苓

去皮 七分

桑白皮

蜜炙 七分

川芎

五分

桔梗

五分

橘紅

五分

半夏

泡 五分

防風

四分

甘草

三分

薄荷

三分

桔苓

炒 三分

右剉一劑生薑水煎服

○一治小兒傷風咳嗽發熱服解表之劑如喘促出汗此脾肺氣虛以補中益

發沙



小兒發沙有陰有陽陰沙則腹痛而手足冷陽沙則腹痛而手足溫或其症似寒非寒似熱非熱四肢懈怠飲食不思容顏慘起為症不一俗呼為沙病非沙也多由感冒風寒而受水傷濕得之其治之法宜用熱水蘸搭臂膊將麻頻頻刮之候紅色出為度甚者宜以針刺其十指背近爪處一分許仍先將兒兩手自臂將下令血聚指頭方刺或視其身皆有紅點以燈草蘸香油點燈燎之已上諸法使腠理開通寒邪易散氣血通暢而已矣

○一論小兒攪腸沙心腹腰諸痛用

火龍丹

雄黃

煇硝各二錢

共研細末每用簪挑些點眼角大眦男左女右立愈

通治

神仙萬億丸

硃砂

巴豆去殼

寒食麩

右先將硃砂研爛卽將巴豆同研極細却以寒食麪好酒打成糕入藥中仍同研百餘下再揉和爲丸如委米大凡所服不過三五七丸而已看虛實加減照後引下

一感冒風寒薑葱湯下出汗

一心痛艾葉煎湯入醋少許送下

一心虛氣脹淡薑湯送下

一痢疾空心茶清下

一瘧疾薑湯下

一切雜病茶清下

太乙混元丹

紫河車 焙乾三錢

白梅花 三錢

辰砂 一兩甘草 一兩水

滑石 六兩用杜丹皮三兩煎水去

香附米 一兩蜜水煎透

粉草 一兩生薑半兩水乾爲度

菘菘 火裏三錢

砂仁 三錢

益智 去殼六錢

山藥 二錢半

人參 去苦一錢

黃芪 蜜木炒一錢

白茯苓

白伏神 去皮半



遠志甘草水 泡去心

牛黃二分

天竺黃一錢

桔梗

去芦

木香一錢

麝香三分

右共為細末煉蜜為丸如龍眼大

諸病並皆治之

金箔為衣每服量兒大小加減大人婦女

中風痰厥不省人事薑湯研下

傷寒夾驚發熱薑葱湯研下宜出汗

停食嘔吐腹脹大便酸臭姜湯下

泄瀉米湯下

咳嗽喘急麻黃杏仁湯下

蟲痛苦練根湯下

夜啼不止燈草灰湯下

慢驚人參白朮湯下

小便不通車前子湯下

發熱金錢蒲荷湯下

霍亂紫蘇木瓜湯

赤白痢疾陳倉米湯下

積聚腹痛薑湯下

疝氣偏墜大小茴香湯下

急驚搐搦薄荷湯下

大便去血槐花陳倉米湯下

夜出盜汗浮小麥湯下

痘疹不出升麻湯下



一中暑煩渴燈心湯下

一疳熱身瘦肚大手足細或淋或瀉或腫或脹或喘或嗽陳倉米湯下

一論小兒諸病有餘壯盛者宜服萬億丸小兒諸病不足虛弱者宜服濕丸

雄黃解毒丸

雄黃 二錢半 鬱金 三錢半 巴豆 二十四箇去油

右為末醋黃糊為丸如菜豆大每服七丸熱茶清吞下

一 中風卒然倒仆牙關緊急角弓張不省人事茶清吞下

一 小兒急驚風痰熱等症加牛黃五分硼砂一錢水糊丸薄荷湯下

一 纏喉風急喉閉每七丸研化以熱水研白梅花調下或熱茶下即避熱則流

通之意纏喉風卒死心頭猶溫者灌下即避

一 瘧疾中有癖用沉香磨水送下泄下黑血如泥極臭立効

一 諸積下痢煎五苓散送下

一 疔瘡加全蝎一錢皂角一錢麝香少許滴水丸每服二十九茶下若始不覺

是疔瘡不曾發汗過數日方覺則寒熱體痛皆罷毒氣入裏須用利藥使內



中毒氣下泄此藥主之

一療癰瘡加斑猫七箇去翅足糯米炒冷茶下

一切熱毒壅盛又能取積消食下熱茶下

小兒初生

小兒五宜

小兒分挽初離母體口有穢毒啼聲未發急用軟綿裹指拭去口中惡汗倘或不及預煎甘草黃連濃汁灌之待吐出惡沫方與乳吃或用好硃砂水飛過煉白蜜調和成膏如小豆大乳汁化服三日內止進三粒以除胎毒痘疹之患也

初生三五日宜綁縛令臥勿豎頭抱出免致驚癇

乳與食不宜一時混吃兒生疳癖疳積

兒衣宜用年老人舊裙舊袴改作小兒衣衫令兒有壽雖富貴之家切不可製紵絲綾羅氈絨之類與小兒穿不惟生病抑且折福



一兒生四五箇月止與乳吃六箇月以後方與稀粥哺之周歲以前切不可吃
葷腥并生冷之物令兒多疾若待二三歲後臟腑稍壯方與葷腥庶可若到
五歲後食之尤嘉一云小兒永無雜疾大忌只肉絕妙

洗兒法

一初生兒洗浴不可先斷臍帶候洗了方斷不致水濕傷臍可免臍風臍瘡等
症浴兒調和湯水須看冷熱得宜不可久浴久浴則傷風寒夏不可久浴冬
浴則傷熱浴時當護兒背免風邪而久不使發熱成癩疾用五根湯洗以免
瘡疥之患

五根湯

桃根

柳根

梅根

桑根

槐根

加苦參

白芷同前辟諸不祥

右每味一兩洗淨切碎用水煮去渣
則辟諸惡邪之氣

斷臍法

加猪膽汁一枚候水溫洗放金銀銅器



一 小兒初生洗訖斷臍不可用刀割以軟絹裹臍或隔單衣咬斷蓋臍不可長又不可太短只取兒足掌長如長引外風則成臍風之患短則傷臍肉面青啼呼臍帶中有穢蟲宜急撥去不然入腹成疾

變蒸論

夫小兒之初生血氣未定陰陽未和臟腑未實骨格未生有變蒸之候變者畢常也蒸者發熱也所以變生五臟蒸養六腑須要變蒸多遍則骨節臟腑中是而全胎毒亦因變而散氣血方榮性情有異後來出痘亦輕可也白生之日始每三十二日一變凡人有一百六十五骨除手足四十五碎骨外止有三百二十骨自生下骨而上一日十骨三十二日為一變骨氣始全一變生一臟或一腑十變則臟腑始足每變輕則發熱微汗其狀似驚馬重則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩啼燥渴輕者五日解重則八日解凡小兒之病無不由變蒸而得也而不熱不驚無他病候是暗變者多矣此受胎氣壯故也凡變蒸須看兒唇口如土唇微腫有如臥蚕或有珠抱子者是真變蒸之候



也此則決不可妄投針灸藥餌若誤之則為藥引久各經證遂難謹而且纏綿不脫反為藥之所害也如或因傷食因傷風因驚嚇等項夾雜相值而發令人疑惑亦須守候二三日俟其病勢其的是食則消食是風則行痰是驚則安神隨症調治或非變蒸時而得傷寒時行瘟病則口上無白泡其診身相似惟耳及尻通熱此為他病可作餘治業勿利者矣可不詳究耶

小兒初生雜證論方

夫小兒初出腹骨氣未斂肌肉未成猶何是血血凝則堅而盛胎內也書云如水之上泡草頭之露夫初生一臘之內天地八風之邪豈能速至良由在胎之時母失愛護或勞動氣血相干或坐臥飢飽相投飲酒食肉冷熱相制恐怖驚撲血脈相亂蘊毒于內損傷胎元而降生之後故有胎熱胎寒胎肥胎怯胎驚胎黃諸症生焉外因浴洗拭口斷臍象顛之不得法或綁抱驚恐乳哺寒溫之垂其宜致令噤口臍風鎖肚不乳等症病而致此亦難治療良可哀憫小兒雜病諸方悉陳于後



胎熱 胎寒 胎肥 胎怯 胎黃 胎驚 鎖肚 不乳 臍風 撮口

噤風 客忤 不尿 夜啼 中惡 天弔 鵝口 口瘡 重舌 疳積

弄舌 牙疳 吃塊 疳毒 赤遊 喉痺 乳蛾 眼疾 耳膿 疳疔

頭瘡 臍瘡 蟲痛 尾疔 陰腫 疔氣 盤腸 氣痛 脫肛 遺尿

尿濁 便血 下淋 吐血 衄血 齒遲 齒閉 六齋 水腫 黃疸 汗斑

解顛 鶴節 行遲 諸遲 語遲 齒遲 齒閉 龜胸 龜背 滯願 顛陷

顛填 手拳 脚拳 痘瘡 麻疹 齒遲 齒閉 龜胸 龜背 滯願 顛陷

胎熱

○一論胎熱因母孕時食熱毒之物過多令兒生下身熱面赤眼閉口中氣熱焦啼燥渴或大小便不通法當漸次解熱先令乳母服藥兒服乳即解決不可速効以涼藥攻之必致嘔吐而成大患也慎之慎之

釀乳方

生地黃二錢 澤瀉二錢 生豬苓去黑皮赤茯苓去皮 天花粉各一錢半

茵陳

甘草各一錢

右剉散每服三錢水一盞煎七分令乳母捏去宿乳却服藥少頃乳之

胎寒

○一論胎寒乳母孕時受寒生下再感外邪令兒面色青白四肢厥冷大便青黑口冷腹痛身起寒慄等症即宜當歸散服之

當歸散

當歸炒

黃芪蜜炙桂心

黃芩

細辛

龍骨細研

赤芍各二錢

右為末每服一字以乳汁調下日進三服看看兒大小加減

胎肥

○一論胎肥小兒生下肥肉厚遍身血色紅滿月以後漸漸羸瘦目白睛粉紅色五心煩熱大便難時時生涎當浴體更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦生不可肥



胎怯

○一論胎怯小兒面無精光肌肉薄弱大便白水身無血色時時哽氣多歲身無精彩宜以浴體法主之

浴體法

天麻末二小蠋稍去毒 硃砂各半錢 白礬 青黛各二錢

烏蛇肉三小酒浸焙為末

麝香一字

右同研勻每用三錢水三碗桃枝一握并葉五七箇同煎至十沸溫熱浴之浴時勿浴背

胎黃

○一論胎黃者皆因乳母受熱而傳於胎也兒生下遍體面口皆黃狀如黃金色身上壯熱大便不通小便如梔子汁乳食不思啼哭不止宜以

地黃湯主之



生地黃

赤芍

川芎

當歸

天花粉

猪苓

澤瀉

赤茯苓

茵陳

甘草各等分

右到每服五錢水煎食前乳母服并略滴些少與兒口中

胎驚

○一論胎驚者由胎婦調適乘常飲食嗜慾忿怒驚撲母有所觸胎必感之或外挾風邪有傷於胎故子乘母氣生下即病也其候月內溫壯番眼握拳噤口咬牙身腰強直涎潮嘔吐搐搦驚啼腮縮顙開或頰赤或面青眼合其有著禁撮口之類亦此一種之所發也視其眉間氣色紅赤鮮碧者可治若點青黑者不治虎口指紋曲入裏者可治反出外者不治治宜解散風邪利驚化痰順氣青金丸主之慎不可作慢驚而用溫藥也

青金丸

人參

天麻煨

白茯苓去皮

白附子炮

牛膽南星各二錢

甘草炙

青黛一

小

硃砂水飛

麝香一分



右為細末煉蜜為丸如梧桐子大用釣藤皂莢子煎湯研化不拘時服

鎖肚

○一論鎖肚者由肚中受熱毒壅盛結於肚門大小便閉而不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水先漱了口吸唾見前後心并臍下手足心共七處每一處凡三五次漱口吸唾取紅赤為度須臾自通不爾無生意若有此症知此法可得再生

不乳

○一論不乳者謂初出胞胎而不吮乳也嬰兒初出胎時其聲未發急以手拭其口合惡血淨尽不得下咽即無他病若拭口不全惡穢入腹則令腹滿氣短不能吮乳或產母取冷過度胎中受寒致令兒腹痛也宜用

茯苓丸

赤茯苓 去皮 川黃連 去毛 枳殼 去穢 麩炒 各等分



右為末 煉為丸如梧子夫每服一九乳汁化下

撮口

○一論散 口者由胎氣挾熱風邪八疔流毒心脾之經故令舌強唇青撮口啼

聲不出者當視其齒齦之上有小泡子如粟米狀急以溫水醮青熟綿有裹
手指輕 輕擦破即開口便安甚者用牛黃三分竹瀝一蜆殼調勻滴入即愈

噤風

○一論噤 風者眼開口噤啼聲漸小舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫

大小便 皆通白滿月一百二十日見此名曰犯風噤可急看見上膊有點子
先以指 申輕輕刮破次服定命散如口噤不開諸藥不効者生南星去皮臍

研為極 細末龍腦少許和勻指蘸生薑汁於大牙齦上擦之立開凡臍風撮
口噤風 三者雖異其受病之原則一也大抵裏氣鬱結壅閉不通並宜服淡

豆豉汁 與吃取下胎毒千金云小兒初生其氣高盛若有微患即須下之若



不下時 則成大疾 難為療矣 紫霜丸量而與之
定命散 治初生小兒口噤不開

蠅浪

十四個 去毒脚 全蝎 十四個 去毒

右為細末入輕粉少許和勻乳汁調乳前服

臍風

○一論臍風多因斷臍為風濕所乘或者胎元有熱毒則見下胎時視其臍必

硬直定有臍風必自臍發出青一道行至肚却生兩岔行至心者必死於青

筋初發急用燈心蘸香油內燈於青筋頭并岔行處燎之以截住不致攻

心更以艾炙中脘三疔內服萬應丸二三粒以泄其胎毒也

○一治小兒臍風撮口用完全生葱搗汁用直姜蚕三箇研末調塗母乳頭止

令兒吮之或用乳調蚕末灌之兒口即開

一治臍風撮口用田螺搗爛入麝香一分再搗塗臍上立効

經驗五通膏 治小兒臍風撮口

生地黃

生薑

葱白

蘿蔔子

田螺肉 各等分



右共搗爛搭脐四圍一指厚抱住候一時許有屁下泄而愈

○一治脐風用脐蠟一條將尾鬚二根剪斷自然山水滴入脐内少頃即愈其

蟲只在多年墻孔内取人家水缸底亦有

一秘方治脐風撮口

姜蚕末三分牛黃六釐

冰片

麝香各一釐先將姜蚕搽上少將

片麝用蝦蟆膽抹之

一小兒犯撮口風荷包風鵝口風脐風等項并牙齦邊生白點名為馬牙作痛

啼哭不吃乳即看口内堅硬之處或牙齦邊白點將針挑破出血用好墨調

薄荷湯以手指攪過再用其母油髮蘸墨遍口擦之仍用青絹蘸新汲井水

展口即愈

客忤

○一論客忤者初生兒因別房異戶外人來氣息忤之一名中人是為客忤也

及家人或乘馬行得馬汗氣息或衣染穢暴之氣未盥洗易衣便向兒邊皆



令忤也 小兒衣布帛中不得有頭髮履中亦爾白衣青帶青衣白帶皆令中忤亦能驚兒致病欲防之法從外來所忌之物當將避之勿令兒見慎護歲之內方無忌也

不尿

○一論小

兒初生不尿者皆因在胎之時母食糟飯等毒之物熱氣流入胎

中兒因

飲血是以生下肚腹膨脹腎腫如覺臍四傍有青黑色及口撮即不

可救也

如有青黑色不飲乳者服葱乳湯

葱白切

作四散用乳汁半小盞同煎片時分作四次服即通不飲乳者即飲

夜啼

○一論小

兒夜啼者此是邪熱乘心也宜

化火膏

用燈花三顆以乳汁調抹兒口或抹母乳上今兒吮之

○一治小

兒觸犯禁忌而夜啼者宜醋炭薰服蘇合香丸



○一論用火柴頭一箇長四五寸削平一面硃砂寫云撥火杖撥火杖差來捉神將捉着夜啼鬼打殺不要放急急如律令

○又方治夜啼不止用硃砂書甲寅二字貼床頭即止

○一治小兒夜啼用竹園內無葉之竹名爲仙人杖取三只於兒睡處勿使人知即時愈

○一治小兒夜啼不止作心經有熱有虛治

安神散

人參

黃連

姜汁炒各一錢半

甘草剉右剉竹葉二十片生薑二片水煎

服○一方治驚啼用乱毛燒灰酒調服

○一論小兒夜啼狀若鬼祟

蟬退夜固半截爲末初生炒一字薄荷湯入酒少許調下或者不信將上半截爲末依前湯調下復啼如初古人立法莫知其妙

○一治夜啼用硃砂筆寫在小兒臍上

子

卯 酉

午

○一治夜啼用尿潑杓水洗淨莫令入知覆在兒牀下即止



中惡

○一論中惡天吊者胃犯邪氣也小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死等症
辟邪膏 治中惡

隆真香

自膠香

沉香

虎頭骨

鬼白

龍膽草

人參

白茯苓 去皮各五錢

右為細末人雄黃五錢麝香一錢煉蜜為丸乳香湯下

天吊

○一治小兒天吊潮熱

鈎藤散

鈎藤

人參

犀角

錢屑各五錢

全蝎

天麻各二錢半

甘草

右剉作四脰水煎溫服



鵝口

○一論小兒鵝口口瘡者胃中濕熱也小兒口中百病鵝口口瘡重膠不能吮乳及咽喉腫塞一切熱毒

牛黃散

牛黃

冰片

硼砂

辰砂研各

雄黃

青黛各一分

牙硝一分半

黃連末八分

黃柏末八分

右共入乳鉢內研勻每用少許傳人口內

○一治小兒鵝口不能食乳用地龍雷水塗瘡即愈即磨蟲也

口瘡

○一治口瘡

瀉心湯

用川黃連淨為細末每服一字蜜水調下

○一論小兒口舌生瘡乃心脾受熱口瘡亦心臟熱口瘡白肌臍冷口瘡黃脾



臟熱宜用

吳茱萸末醋調傅脚心移夜即愈藥性雖熱能引熱下行其功至良

○一論治小兒白口白爛生瘡口糜

白木 猪苓 澤瀉 木通 生地 赤苓 肉桂 甘草各等分 木煎服

○一論小兒白口瘡 黃丹巴豆仁同炒焦去豆用丹摻瘡上立已

咽喉并口瘡 我也有妙方 白礬二錢許 硃砂一錢強

咽痛用吹入 口瘡蜜調當 一次若不愈 再用保安康

重舌

○一論重舌者脾經實火也小兒心脾有熱舌下有形如舌而小者名曰重舌及唇口兩傍

黃連翹湯 治重舌

歸尾 連翹 白芷各三錢 大黃一錢 甘草各一錢 右剉作二劑水煎食後頻服

○一方治重舌用蒲黃塗之 ○一方用膽礬研細敷之



○一治小兒重舌木舌乃舌下生舌也

用三稜針於舌下紫脉刺之即愈又宜竹瀝調蒲黃末敷之舌上

○一治小兒絆舌用布針舌下針數下以唐雜尿一擦即愈

○一治小兒絆舌不語啼哭用布針蘸桐油燒紅針下頰挨骨邊一針即愈

木舌

○一論木舌乃舌腫硬不柔和脾經有實火也

瀉黃散 治木舌弄舌

藿香 葉七分 山梔一錢 軟石膏五錢 防風四分 甘草七分

右剉一劑水煎不拘時服

○一治木舌 百草霜 苾硝 骨石 爲末酒調傳之

弄舌

○一論小兒舌微露而即收名弄舌屬心脾虧損用補脾散補之舌舒長而收



緩名吐舌乃心脾積熱少用前瀉黃散主之兼口舌生瘡作渴飲冷胃經實熱用瀉黃散作渴畏冷屬脾緩虛熱用四君子湯食少作渴或大便不實脾胃虛弱也用吐瀉門七味白木散若午後甚者脾血虛也四物易多加麥冬茯苓未應用內傷門補中益氣湯大病未已而弄舌者凶弄舌微微露即收得於病後最難瘳出長收緩名舒舌熱在心脾不用夏

補脾散 治弄舌

人參

白朮 去苦各一錢

白芍 酒炒

白茯苓 各八分 陳皮

川芎

各六分

黃芪 蜜炙

當歸 酒洗

甘草 炙各四分

右劉每劑三錢生薑前服

牙疳

○一論牙疳者陽明之熱也小兒齒腫流涎腮腫走馬牙疳等症

清胃升麻湯



升麻

川芎

白芍

半夏湯泡各一分

乾葛

防風

去苦

黃連

酒炒

生甘草

各五分

軟石膏

煨一錢

白朮

七分

白芷

三分

右剉水煎熱服能漱即含漱而吐之漱藥不用白朮半夏

○一治小兒走馬牙疳一時腐爛即死用婦人溺桶白垢火煨一錢研入銀絲

三分麝香一分半敷之立効

立効散 治走馬牙疳

青黛

黃栢

枯礬

五倍子各一錢

右為細末用米泔水先漱口內摻入患處

○一論小兒走馬牙疳牙齦臭爛浸蝕唇鼻先用甘草湯洗皮令血出塗之亦

理身上肥瘡但是疔瘡用之立効

玉蟾散

蚶皮即蝦蟇不鳴不跳者是用黃泥裏火煨焦

二錢半

黃連

二錢半

青黛

麝香少許右為細末濕則乾摻乾則香油調抹之



吃泥土

○一論小兒愛吃泥土乃脾虛胃熱所致面色青黃或是蟲動此藥皆治若不
急療癖症生焉

清脾養胃湯

軟石膏

黃芩

陳皮

白朮去芦

白茯苓去皮

甘草

胡黃連

使君子去壳

右剉等分水煎溫服或為細末放于飲食內令兒服之

黃金餅治好吃泥上

乾黃土為末濃煎黃連汁和為餅麻之立愈

丹毒

○一論小兒丹毒赤腫風熱狂燥睡臥不安胸膈滿悶咽喉腫痛九道有血安
行遍身丹毒及痘瘡已出未出不能快透或已出熱不解急宜服



犀角消毒飲

牛旁子

荆芥穗

防風

黃芩各一錢犀角銹

甘草各五分右剉水煎不拘時服如無犀角以升麻代之

泥金膏 治丹毒赤遊風

陰地上蚯蚓糞熟皮硝蚯蚓糞三分之二共一處研細新汲井水濃調厚敷患處乾則再上

喉痺

○一論小兒喉痺會厭兩傍腫者為雙乳蛾易治一傍腫者為單乳蛾難治乳蛾差小者為喉痺熱結於咽喉且麻且痒腫透於外名纏喉風喉痺暴發暴死者各走馬喉風後方

駐危湯

王方

桔梗二錢

山豆根一錢

牛旁子一錢

荆

芥穗八分

玄參八分

升麻三分

防風八分

生甘草一錢

竹葉五箇



水前頻服外用硼砂一味噙化嚥下降痰消腫

○碧雪 碧雪真靑黛 硼砂與焰硝盆過藉黃甘草末俱生等分摻咽喉治

咽喉腫痛水漿不下或生瘡重舌木舌

○一治喉痺乳蛾氣絕者即時返活

單乳蛾用巴豆一粒去殼打碎入綿罈殼內塞鼻在左塞左在右塞右若

雙乳蛾用二粒塞兩鼻

○一喉痺乳蛾風口舌生瘡用黑犀胆一箇八生白礬末二兩銀硃五錢入胆
內陰乾取出研末每少許吹入喉內神効

眼疾

○一論小兒兩眼腫痛上焦火盛也

吹鼻散 暴病亦痛

乳香

沒藥各五分

雄黃三分

火焰二兩

黃丹火飛一分

右爲細末每少許吹兩鼻孔



○一論小兒未周患兩眼腫痛

扳青膏 用黃連為末水調敷脚心手心自愈如腫痛難開加姜黃牙皂朴硝

為末同敷太陽穴手心足心加葱搗爛敷之尤妙

○一方熟地黃一兩以新汲水浸透搗爛貼兩脚心布裹任効

○一治小兒雀目不計時月

蒼朮二兩為末每服一錢不計時候以好羊子肝一箇以竹刀子批開摻藥
在內麻繩扎定以粟米泔一大盞煮熱為度思人先薰眼溫服

耳疾

○一論小兒耳腫耳痛停耳乃三陽風熱蘊所致宜升陽散火湯加黃栢知

母晚服兼服金花丸

○一論小兒耳熱出汗作痒乃痰也腎火土炎也宜用

清腎湯

防風

天花粉

貝母

黃栢

鹽水炒白茯苓



玄參

白芷

蔓荊子

天麻

半夏五分

生甘草二分半

生薑三片水煎服

○一治小兒耳後月蝕瘡燒蚯蚓糞合猪脂敷之

○一小兒患潰耳出膿水成瘡以蚯蚓糞末吹耳中

○又方治膿耳

羽澤散

枯礬為末少許吹入耳中即已

○一方用五倍子燒存性為末吹入耳亦効

○一方用抱出雞卵殼炒黃色為細末香油調灌耳內即時痛止

鼻癢

○一論小兒鼻癢熱壅傷脾肺主氣通於鼻風濕之氣乘虛客於皮毛入於血

脉故鼻下頭方瘡濕痒爛是名鼻腫其瘡不痛汁所流處又成瘡澤瀉散吐

澤瀉散 治鼻



澤瀉

鬱金

山梔仁

甘草炙各一錢

右為細末用甘草煎湯謂食後臨臥服

○一治久患鼻瘡膿極臭者用百草霜研細每服五分冷水調服

頭瘡

○一論小兒頭生肥瘡或多生武子搔痒成瘡膿水出不止

一掃光

細茶一錢口

水銀人茶研一錢牙皂

花椒各二

為末香油調搽

○一小兒瘡痛經年不瘥者

白礬五錢

胡粉一兩

水銀一兩

黃連一兩半黃芩一兩

大黃一兩半

黃參一兩半

松朮一兩半

蛇床子射入

右為細末以臘月猪脂和研水銀不時敷之

○一小兒頭瘡胎毒諸風熱惡瘡痘瘡

黃栢

黃連

白芷

五倍子各等分



右為細末用井花水調稀稠得所塗開在碗內覆架兩磚上中空處灼艾煙
薰蒸以黑乾為度仍取下前藥再研作末清油調塗如有虫則用煎油調
○一小兒頭生禿瘡用通聖散酒拌除大黃另用酒炒共為末再以酒拌乾
每服一錢水調服外以白炭燒紅滓入水中乘熱洗之更以胡荽子伏龍肝
懸龍尾黃連白礬為末油調敷之

臍瘡

○一論小兒因剪臍外傷於風邪以致臍瘡不乾用

礬龍散

枯礬

龍骨

炒各五分

共為細末每用少許乾搽臍上

○一小兒臍中汁出并痛用枯礬末乾敷○又方黃栢末敷之○又方蚕爾殼
燒灰存性搽之亦可

虫蝨積

○一論小兒蟲積痛凡腹疼口中出清水者蟲積也
追蟲散

使君子二錢 檳榔一錢 作一劑水煎食遠服

使君散

使君子去殼一錢 檳榔一錢 雄黃五分

右為末每服一錢 苦煉根皮煎湯調下

○一治小兒蟲積腹痛用巴豆一枚去殼搥去油以硃砂一粒同研勻用雞子

一箇開頂微去白入藥在內攪勻仍將紙糊口用稗圈坐於鍋內水煮熟令

兒食之或以茶清送下即打下所積蟲効極

○一治小兒吐蚘蟲

蚘蟲出口有三般 口鼻中來大不堪 如或白蟲兼黑色

靈丹縱眼病難安

練陳湯

苦練根皮二錢 陳皮 半夏姜炒 白茯苓去皮各一錢



甘草五分

右剉一劑生薑煎服

○一女子肚大腹脹蟲積瘦弱用馬慈一名地梨食之打下虫來肚腹立消

○一治小兒冬月吐虫蟲多是胃寒胃虛所致

錢氏白米散

人參

白米去苦

白茯苓去皮

藿香

木香

乾葛

甘草各二錢

丁香二粒

每服三錢水煎服

尾骨痛

○一論小兒尾骨痛者乃是陰虛痰火所致也

滋陰化痰湯

當歸酒炒

川芎

白芍酒炒

熟地黄

黃柏酒炒

知母酒炒

陳皮

半夏姜炒

白茯苓去皮

甘草各等分

右剉少用官桂為引或以前胡水香為引如痛不止加乳香沒藥



陰腫疝氣

○論小兒陰腫疝氣者寒邪所鬱也五倍子燒存性為末好酒調服掛汗而

○治疝氣偏墜腫痛不可忍者槐子炒為末勿服一錢入鹽三分黃酒調下

○治小兒疝氣小腹痛引腰脊彎曲身不能直京師傳

青皮

陳皮

三稜

莪米炮

木香

檳榔

川練肉

芫花醋炒

五錢各辣桂

牽牛生取

巴豆肉不去油一錢

右為細末麩糊為丸如麻子大每三九空心一服午前一服薑湯下

治小兒陰囊忽腫或坐地多時或風邪或蟲蟻咬者

蟬退半兩水一大碗煎

湯洗腫處其痛立止若不消再煎再洗內服五苓

散燈草煎服力見中暑

○又方用葱園內蚯蚓糞以甘草汁調塗腫處或薄荷汁調亦可

盤腸氣



○一論小兒盤腸氣者則腰
 閉脚冷或大便青色不實
 也急用葱湯洗其腹揉
 乳香散 治盤腸氣痛
 曲乾啼額上有汗是小兒為冷氣所搏而然其
 上唇乾者是也此多因生下洗遲感受風冷而致
 忽劇臍腹間良久尿且湧出其痛自止

乳香 沒藥 各等分

共為細末以木香煎湯調服

脫肛

○一論小兒脫肛皆因久患
 薰洗令軟送土或以五倍
 ○又方以鱉頭燒存性為末
 ○又以陳壁土泡湯先薰後
 提氣散方見脫肛門 治小兒
 渴痢所致大腸頭自糞門出而不收是也用葱湯
 子未敷而頸托入又以五倍子煎湯洗之亦可
 香油調敷一云以此物燒煙薰之久久自收
 洗亦效
 肚門脫下極效

遺尿



○一論小兒遺尿失禁者膀胱冷弱也

益智仁七個 桑螵蛸七個 為末酒調服用熟白果七箇送下

故紙散 用破故紙炒為末 每服一錢熱湯調下

○一治小兒遺尿六味丸加破故紙益智仁人參肉桂

○一治小兒睡中遺尿不自覺者

官桂為末雄雞肝一具等分搗丸如小豆大溫水送下每日進三服

○一治小兒遺糞用枯礬牡蠣煨等分為末米湯調下

尿濁

○一論小便尿濁澄之如米泔水也

澄清飲

白朮去苦 白茯苓去皮白芍炒 黃連姜汁炒澤瀉

山查去子各一錢 青皮四分 甘草生五分 剉一劑水煎空心服

○一治小兒尿濁如米泔水



江南做酒小麴炒為末 每服五分調酒下三服効

便血

○一論便血者熱傳心肺也 凡初生嬰兒七日之內大小便有血出者此由胎
 氣熱盛之所致也謂用食 酒麴炙博熱毒等物流入心肺見在胎內受之熱
 毒亦傳於心肺且女子熱 入於心故小便有之男子熱入於肺故大便有之
 治法生地黄取自然汁入 蜜少許和勻溫服男女皆効
 ○一方用生蒲黃油頭髮燒 灰各一錢為末生地黄汁或米飲乳汁調同服

下淋

○一論小兒下淋乃膀胱有 熱水道不通淋瀝不出或尿如豆汁或如沙石或
 冷淋如膏如熱淋尿血

五淋散

赤茯苓瓜皮六分 赤放藥 一分 山梔子 二分 條芩 三分 當歸



甘草各五分一方加生地澤瀉木通滑石車前子各二分

右剉一劑燈心一團水煎溫服

吐血

○一論小兒吐血衄血下血宜用

黃金丸

黃芩不拘多少爲末煉蜜爲丸如雞頭實大三歲兒每一丸鹽湯化下

○一治小兒吐血不止

黃連末一錢淡豆豉三十箇水一盞煎六分去渣溫服量兒大小加減

○一治吐血衄血

栝枝散

栝枝晒乾 藕節晒乾 各等分爲末三歲兒服半錢藕汁和蜜一匙白湯下

便閉



○一 小兒初生大小便不通腹脹欲死急令人以溫水漱口淨口吸唾兒胸後心并臍下手足心共七處每一處凡三五次漱口吸唾取紅赤為度須臾自通不爾則無生意

○一 論小兒小便不通者膀胱火盛也
神通散

小便閉澁不堪言 為用兒茶末一錢 蒲黃煎湯來送下

霎時溲便通如泉

○一 治小便不通腹脹欲死野地蒺藜子不拘多少倍黃色為末溫酒調服

○又方用火麻燒灰酒調服

○一 論小兒大便不通者臟腑有毒也小兒風與熱勢留蓄上焦胸膈高起大便不通

沒藥散

沒藥

大黃

枳殼炒

桔梗 各二錢

木香

甘草 各一錢

右剉每二錢 姜三片水煎服

○一 治新生小兒二三日不大小便用葱汁人乳各半調勻抹在口中同乳帶下即通



○一掩臍法治小兒大小便不通

取連根葱白一莖生姜一塊痰豆豉二十粒鹽一小匙同研爛捏作餅子貼臍中烘熱貼之用絹帛扎定良久氣透自通不通再易一餅

二妙散

六七月間尋牛糞中有蛻螂不拘多少用線穿起陰乾收貯用時取一箇要全者放淨碑上四面以灰火烘乾以刀從腰切斷如大便閉用上半截小便閉用下半截二便俱閉全用為細末新汲水調服

腫滿

○一論小兒腫滿土虧水旺也并四肢腫滿湯水陰水皆可服
加味五皮散

五加皮

地骨皮

生姜皮

大腹皮

茯苓皮各一錢

加姜黃

木瓜

各一錢

剉散水煎服

○一方去五加皮加陳皮桑白皮

○一治小兒諸般腫脹



黑牽牛半生半炒取頭細末每服一二匙桑白皮煎湯磨末香汁調服

黃疸

○一論小兒黃疸寒熱嘔吐而渴或飲冷水身體面目俱黃小水不利不得

卧不思飲食

茯苓滲濕湯

茯苓

茵陳

山梔

黃連

黃芩

防已

白朮

蒼朮

陳皮

青皮

枳殼

猪苓

各二錢澤瀉

水煎徐徐溫服○如小便不通加

木通如傷食不思

飲食加神曲麥芽砂仁

汗症

○一論小兒盜汗潮熱往來

胡黃連柴胡各等分爲細末煉蜜爲丸如雞頭子大每一丸至二丸銀器中



用酒少許化開更入水五分重湯煮二三十沸放溫食後和渣服

○一治小兒虛汗或心血液盛亦發為汗此藥收斂心氣

新羅人參

川當歸各三個

右細剉用雄猪心一箇切三片每服二錢猪心一片并水一盞半煎食前作兩次服

○一治小兒盜汗因食生冷之物過多或熱水淘飯大能損土為水之所傷則不能制其津液故成汗自出也

牡蠣煨二個黃芪蜜炙

生地黃各一兩剉散水前服

○一治小兒盜汗用五倍子為末津液調塗臍中一宿即止○又方用何首烏為末津液調塗內効

解顛

○一論小兒解顛者生下顛門不合也長必多愁少笑目白睛多面色眊白肢

體消瘦皆腎虛也

○一治小兒顛開解頭縫不合此乃腎氣不成腎主骨髓而腦髓海腎氣不



盛所以腦髓不足故不能合○丹溪治解顛以八物湯有熟加酒炒黃連生
黃芩甘草水煎服外用布帛緊束及以白芨末傅之
人參地黃丸

人參二錢

懷熟地黃四錢 嫩鹿茸

山藥

白茯苓

牡丹皮

山茱萸 酒蒸去核各二錢

右為細末煉蜜為丸如芩實大用人參煎湯研化食遠服

鶴節

○一論小兒鶴節因血氣不充故肌瘦薄骨節呈露如鶴之膝

當歸地黃丸

懷熟地黃 酒蒸八錢

山茱萸 酒蒸 去核

乾山藥

澤瀉去毛

牡丹皮 去梗

白茯苓 去皮

當歸 酒洗 二錢

一方加鹿茸 酥炙

牛膝 去芦地 洗

右為細末煉蜜丸芩實大每用熱水研化食前服仍以天南星炮去皮臍研



細末入米醋調敷絹帛上烘熱貼之亦良法也

行遲

○一論小兒行遲肝腎虛弱骨髓不充不能行步

加味地黃丸

懷熟地黃 八錢 山藥 四錢

牡丹皮

澤瀉 各三錢

五加皮 三錢

山茱萸 酒蒸去核四錢

白茯苓 去皮

嫩鹿茸 酥炙二錢

懷牛膝 洗去蘆酒二錢

右為細末煉蜜為丸黍米大每服一錢空心鹽湯送下

○一論小兒稟受元氣不足顛顛開解肌肉消瘦腹大面腫語遲行遲手足如筒神色昏慢牙齒生諸遲虛

調元散

乾山藥 五錢

人參

白茯苓 去皮

白茯苓 去皮本各二錢

白朮 去苗二錢

石菖蒲 一錢

白芍藥 炒

熟地黃



當歸

川芎

黃芪蜜炙各二錢半

甘草炙錢半

右劉姜裏煎不拘時服嬰兒乳母同服

語遲

○一論小兒語遲者心氣不足也

菖蒲丸

石菖蒲

人參

麥門冬去心

川芎

遠志甘草水泡去心

當歸

乳香

硃砂另研各一錢

右為末煉蜜為丸黍米大每服十九食遠粳飲送下

齒遲

○一論小兒齒遲者腎不足也

芎窮散

川芎

乾山藥

當歸

白芍炒

甘草

炙各二錢半

右為細末每服二錢白湯調下食後服將此乾藥末擦牙齦

即生



龜胸

○一論小兒龜胸者因肺熱脹滿攻於胸膈即成龜胸也又云緣乳母食麩物五辛轉更胸起高也

龜胸丸

川大黃

煨六分 天門冬 去心

百合

杏仁

去皮尖 麩炒

木通

去節 枳殼 麩炒

桑白皮

麩炒 甜葶 麩炒

軟石膏 各一錢

右為細末煉密為丸菘豆大每服五丸溫水化下食後臨臥服仍宜灸兩耳前各一寸半上兩行三骨鐮間六處各灸三壯春夏從下灸起秋冬從上灸起依法灸之

龜背

○一論小兒龜背者由兒生下風邪客入於脊入於骨髓致成龜背也龜胸龜



背並用龜尿點其骨節自愈取龜尿法用青蓮葉安龜在上用鏡照之能曬龜背丸

枳殼 麸炒

防風 去芦

獨活

大黃 煨

前胡 去芦

當歸

麻黃 去節各三錢

右為細末麩糊為丸如黍米大每服十五六丸看見大小以米湯下食後服仍灸肺俞穴在椎下兩傍各一寸半心俞穴在五椎下各一寸半膈俞穴在七椎下兩傍各一寸各灸三壯以小兒中指節為一寸艾炷以小麥大煨龜平取龜尿法用蓮葉置龜于上尿自出

諸遲

○一論小兒行遲齒遲解顛顛真五軟鶴膝腎疳齒齚睛白多秋疔此皆因稟

受腎氣不足當以六味丸加鹿茸補

之若因精氣未滿而亂女以通多致頭

目眩暈作渴吐痰或發熱作熱腰腿

酸軟或自汗盜汗二便濇痛亦生諸疾



難以名狀余常用六味丸八味二丸
 ○一小兒五歲不能言咸以為廢人矣
 加五味鹿茸及補中益氣湯加五味
 至年許始声音明朗方見補益
 及補中益氣之劑加減用之方見補從無不奏効
 但其形瘦痿乃肺腎不足遂用六味丸
 兩月餘形氣漸健將半載能發言

滯頤

○一論帶頤乃涎流出而潰于頤間也
 涎者脾之液脾胃虛冷故涎自流不能
 收約法當溫脾為主宜服

溫脾丸

半夏姜汁炒 木香 五錢

丁香 一錢 白姜炒 五錢

白朮去苳炒

青皮去白 五錢 陳皮 五錢

右為細末姜汁打稀糊丸麻十大每二三十九丸米飲送下

顛陷



○一論顛陷乃臟腑有熱渴飲水漿致成泄痢久則血氣虛弱不能上交腦骨故顛如坑不得滿平宜用

黃利頭骨灸黃為末鷄蛋清調敷之即合

顛填

○一論顛填者顛門腫也脾土肌肉乳食不常飢飽無度或熱或寒乘于脾家致使臟腑不調其氣上衝為之填脹顛突而高如物堆聚毛髮短黃自汗是也若寒氣上衝則牽鞭熱氣上衝則柔軟寒者溫之熱者涼之劑量輕重

手拳

○一論手拳不展稟受肝氣怯弱致筋脉攣搐兩手伸展無力宜服

當歸

慧政仁

秦朮

米仁

朮仁

防風

羌活各等分

右為末煉蜜為丸如鷄頭實大射香湯化下量兒大小服之



脚拳

○一論脚拳不展所稟腎氣不足榮氣未充脚指拳縮無力不能伸放宜服

川牛膝酒洗

山茱萸肉

人參

當歸身酒洗

牡丹皮

懷生地黃

補骨脂

石為末煉蜜為丸如欠實大空心塩湯送下

○一治富翁子八歲不能步履皆因看得太嬌放不落手兒身未得上氣以致

肌肉軟脆筋骨薄弱用黃土入于夾襖內與穿內服地黃丸加人參鹿茸牛

膝虎脰骨服未半朝兒能行矣

○一治小兒稟賦腎經虛熱耳內生瘡或肌肉消瘦骨節皆露名節疳六味丸

加鹿茸牛膝各一兩五味子四兩若願解不合牙齒不生眼睛不黑腿軟難

行最宜此藥

痘瘡



夫痘瘡者乃胎毒之所致也。嬰兒在胎之時，感其穢毒之氣，藏于臟腑之中。時有近遠之不同耳。若值寒暄不常之候，痘疹由是而發。因其所受淺深，而為稀稠焉。大抵始發之時，有因外感風寒而得者，有因內傷飲食而得者，有因時氣傳染而得者，有因跌撲驚恐而得者。大凡初起未見紅點，與傷寒相類，發熱煩躁，臉赤唇紅，身痛頭疼，乍寒乍熱，噴嚏呵欠，喘嗽痰涎等症，俱熱未明，疑似之間，急須表散，可服敗毒散，以微發其汗，則胎毒隨汗而解，而痘疹亦隨發而出矣。痘苗一見之際，則禁表藥，恐發得表虛故也。雖視痘之稀稠稀者，輕不須用藥，而稠者重，宜以九味神功散，以化其毒，痘自出至齊，宜此加減用之，能除諸病毒，已解盡。又有痘之起脹，何如如痘不起脹，此元氣虛也，宜以保元湯主之。而痘必起脹，又看痘之貫膿，何如如痘不貫膿，此氣血虛也，宜內托散，加入乳好酒，此貫膿之巧法也。貫膿已滿，又看收靨，何如若高靨不靨，灰陷黑陷，咽吐白沫，為表虛，宜木香散治之。若當靨不靨，寒戰咬牙，痒癢泄瀉，為裏虛，宜異功散治之。有過服熱藥，以致熱毒猖狂，血氣壅盛，痘爛不靨者，宜小柴胡湯、豬尾膏解之。收靨已畢，又看痘後有無餘毒。若

餘毒盛必因過服附子執毒夫解聚而不散以致渾身手足赤腫成瘡毒也
宜消毒飲五福化毒丹治之又有毒攻淡爲諸病立隨症而療之大凡瘡
七日以前爲裏實不可投溫燥之藥能助毒也八日以後爲裏虛不可投寒
涼之劑能伐生氣也但世俗不分寒熱但見痘出不快舉手悉用陳氏治虛
寒熱藥殊不知痘瘡屬燥熱者多急以丹溪涼血解毒治之若槩投熱劑豈
無死者今不知致病之因又不求立方之意倉卒之際據症檢方漫爾一試
設有不應并其書而廢之不思之甚也余觀陳氏其意大率歸重于太陰一
經蓋以手太陰屬肺主皮毛足太陰屬脾主肌肉肺金惡寒而易于外感脾
土惡濕而無物不受觀其用丁香姜桂所以治肺之寒用木附半夏所以治
脾之濕使肺果有寒脾果有濕而兼有虛也量而與之中病則已何傷之有
今徒見瘡之出遲者身熱者泄和者驚悸者氣急者渴思飲者不問寒熱虛
熱卒投木香散與功散間有偶中隨手獲効設或誤投禍不旋踵何者古人
用藥製方有嚮導有監制有反佐有因用陳氏之方其時必痘瘡而挾寒者
其用燥熱補之故其宜也今未挾寒而用一偏之方寧不過於執乎余嘗會

諸家之粹求其意而用之實未敢據其成方也若痘瘡虛寒淡白色瘡厚
 虛寒者宜用之若發熱壯盛齊勇紅紫色燥痒此屬熱毒宜涼而白
 盛行後屬虛寒者率得牛屬熱毒者悉不救痘是胎毒古人治法只解
 氣血虛則又送毒氣不出及不能成就故陳氏之法既行而解毒之
 只顧救其虛寒之痘而果能治其燥熱之瘡也予思治法陳氏與丹
 兼用但不可廢如痘瘡陷頂灰白色寒戰亂腹脹泄瀉者屬虛寒只
 功等方治之如熱甚紅紫燥痒屬熱毒者急用涼血之藥消毒等散相
 川之豈有不中其病耶予謂痘疹乃小兒之酷疾生死反掌古人論之
 有見於寒者有見於熱者學者不可執一而誤赤子之生何也蓋痘疹
 毒所致初生小兒失於拭去口中穢毒者一誤也及長失於未用預解
 免痘之方者二誤也初起發熱有當汗而不汗者三誤也將出之際有
 汗而汗者四誤也既出之後有毒盛當解毒而不解者五誤也起脹貫
 膿之時有當補虛而不補虛者六誤也有首尾証平不當下而下者七
 誤也有首尾虛寒當溫補而不溫補者九誤也有

過服熱藥致痘瘡後餘毒當解毒而下解毒者十誤也凡此十誤當預慎之務加通變故曰寒者溫之熱者涼之虛者補之實者瀉之又曰化而裁之神而明之若斯治者庶免小兒天柱之禍耶

視痘顏色輕重之法

空谷而響應形動而影隨夫痘瘡之發也內熱和緩達於外者必輕便開煩燥彰於外者必重有諸中形諸外理勢之自然也大顏色貴潤澤而嫌昏暗貴光彩而嫌枯澁貴淡紅而嫌黑滯貴圓淨而嫌破損貴高聳而嫌平塌貴結實而嫌虛薄貴稀疎而嫌稠密根窠收緊痘分陰陽見點動活更怕臉浮出要參差血宜歸附耳後心喉少於他處爲佳眉稜兩歡額前光潤不泄爲妙一發孰使出者重瘡夾疹者半輕半重裏外微紅者輕外黑裏赤者微重外赤裏黑太重瘡內黑點如針孔者勢極毒乾紫陷昏睡汗出煩燥熱渴腹脹啼喘大小便閉者困也善治者觀其形色而辯之輕者獲安重能取効矣

痘疹辯疑賦

胎毒蓄積發於痘瘡傳染由於外感輕重過於內傷初起太陽壬水克于丙丁



後歸陽明血水化爲膿漿勢若燃眉變若反掌若救焚兮徙薪何如焦額如
落水兮拯溺不及寒裳欲知表裏虛實須明寒熱溫涼證候殊形臟腑易狀
肝火激成水泡肺主涕而膿漿心斑紅紫脾疹赤黃腎經居下不受清濁爲
纏黑而可所觀其內症推乎外臟呵欠煩悶兮肝木之因咳嗽涕噴覺兮肺
令之象目帶赤兮心火延於胸膈手足厥冷而昏睡兮脾土困于中夾且尻
屬腎溫暖如常二處煩熱痘疹乖張先分部位次察災祥陽明從日落鼻太
陽形於頭上心火炎熱則舌乾而赤肺金鬱結則胸膈先傷手足屬乎脾胃
肝膽主脇肋之傍頸項三陽交會腰背統于膀胱外症明分用心想像泄者
邪盛于下吐者邪甚于土氣逆而腹脹隱毒甚而腰痛惶惶心熱甚而驚
搐胃邪實而癩狂口燥咽乾肺受火邪而液渴便閉尿澀腎因火旺而津亡
欲識痘之輕重當觀熱于形狀毒甚分心如炎上毒微兮內外清涼寒熱往
來神氣爽定知痘出必順祥數番漸出兮春回陽谷一齊湧出兮火烈昆岡
蚕蠶蚤斑刻期而歸陰府蛇皮蟬退引日而返泉鄉雖怕紫紅最嫌灰白最
宜淡紅滋潤切忌黑陷乾黃色要明潤兮猶恐薄嫩之易破痘真乾結兮又

愁痒塌之難當
面頰稀而磊落清安可保胸膈密而連串吉凶難量頂要
圓不宜平陷癢宜飽滿切忌空瘡皮喜老而愁嫩膚愛活而怕光結實高聳
始終無慮丹浮皮肉必主刑傷昏面預腫分八九如何可過腰痛胃爛分
切定主災殃瘡堆口舌毒纏頸項咽瘡喉腫飲食難消泄痢膿血毒甚無漿
人力難盡天命匪張痘瘡焦落辯別陰陽人中上下先壓為良足腰先者
醫多凶而少吉祥

神斷秘訣

細嫩無分地

粘連一片紅

七朝虛痒塌

乾燥定無膿

皮膚無光亮

胸前不空閑

一身紅紫泡

九日往西天

痘腫皮不腫

眼開口又開

陰陽俱無縫

六日一場空

滿面皆稠密

仔細看陰陽

天庭藥不足

此兒必有傷

頭身色不潤

膿綠臭難當

此般脾氣絕

不久命須亡

初起瘡貼肉

起後肉難通

寒熱不分別

痒塌七朝中

見點如肝樣

焦枯黑陷傷

心腎二經絕

此痘火中央

頭面方見大

頃刻又尖長

此般形像見

不羨有奇方

十四痂堪落

依然乾燥膿

沉沉睡不食



延日不能生

五經穴痘上

心經冠肺經

黃漿胃先腐

見命待西天

臍凸四肢浮

咽喉前後心

無神死蛇臭

十命九難延

舌上浮血點

學者要精明

第一先預解胎毒免痘門

延生第一方

論小兒初生臍蒂脫落後取置新瓦上用炭火四圍

至烟將盡用地上

目中光射斗

針視腫不分

皮紅胭脂樣

焦裂飲茶終

膿黃色不活

睛黃赤鼻頭

陰陽并腦後

兒命必身進

目定神昏熱

喉瘡熱不清

手足亂搖搖

總然與解毒

半月此兒亡

初見雲中月

乾極脚攤紅

類般顏色異

腎舌頂陰生

見點如肝樣

喉痰膝下水

皮紅豆不起

若逢有此疾

遲日一場空

目白睛紅赤

雲中隱隱丹

牙疳瀉不食

十五命難留

十四痲該落

針苗接一連

飲湯并下瀉

心經冠肺經

不日命須絕

舌尖黃黑

唇紅紫黑

兩朝並用後

半月命須絕

仔細看身疔

膿瘡食不進

乾紅土絕水

頃刻命難存

如神真秘訣

上用丸蓋之類蓋之存性研為末預將硃砂透明者為極細末水飛過膽湯
 若有五分重硃砂用二分五釐生地黄當歸身而濃汁一二蜆殼調利則二
 味抹兒口上腸間及乳母乳頭上一口之內晚至盡次口大便遺下穢汗濁
 垢之物終身永無瘡疹及諸疾生一子得一子十分妙法也
 ○一論小兒未出痘疹者每遇交春分秋分時服一九其痘毒能漸消化者只
 服一二次者亦得減少其毒盡能消化必保無虞此方神秘本不欲輕傳但
 慈幼之心自不能已願與四方君子共之

神効消毒保嬰丹

纏豆藤一兩五錢其藤八月間收取毛豆梗上纏遶黑豆三十粒

赤豆上十粒山查肉一兩新升麻七錢荆芥五錢防風五七

生地黄一兩川獨活五錢甘草五錢當歸酒洗五錢赤芍五小

連翹上錢五黃連五錢桔梗五錢辰砂研飛兩

苦絲瓜二箇長五寸隔年經霜者方妙可燒存性

右為極細末和勻淨砂糖拌丸李核天一服一九濃煎甘草湯化下○其前



項藥須預辨精料遇春分秋分或正月十五日七月十五日修台務在精誠
忌婦人猶狗合時向太陽祝藥曰神仙真藥體合自然嬰兒吞服天地齊年
吾奉 太上老君急急如律令勅一氣七遍
全生保安散

麻黃

羌活

防風

升麻

生地黃

黃柏

酒浸各五分

川芎

藜蘆

乾葛

蒼朮

黃芩

酒浸

生苧

柴胡各二分

紅花

細辛

蘇木

白木

陳皮各一分

甘草

歸身

黃連

各三分

連翹

吳茱萸各五分

右剉一劑立春立夏立秋立冬之日水煎露一宿次早溫服如一年之內依
時服此四服神效永不出痘

滌穢免痘湯

大尹王大中傳自方上異人

十月經霜後取練樹子一升收貯到正月月初一日半夜子時父母只令二人
知將練子入鍋內用水煮湯待溫洗兒全身永不出痘真仙方也



鄉隣出痘預服禁方

一凡鄉隣間有時行痘疹可以預防宜節其飲食謹其起居加減衣服預其藥餌亦制節謹度順天之道也

蘇油擦法

用蘇油每夜臨臥時以手中三指蘸油擦兒頭額項背腰兩手腕兩足腕然後睡即可以便輕此亦暢達流通升脫凝滯之善也

三豆湯

大黑豆 赤小豆 菘豆

各一盞甘草一兩細切每日用四味瓦罐水煨熟爛連豆帶湯與兒食之黑豆解腎經之毒制相火也赤小豆解心經之毒制君火也菘豆解陽明經之毒制胃火也用豆者又以形治以類從也易簡而便里間食治以便童稚其為神巧矣乎

永不出痘三五散 賈蘭峰傳

用有雄雞蛋七枚內取一枚開一孔去清黃淨裝入鮮明好硃砂四錢九分



其孔以紙糊用雞抱出雞雛將硃砂採日精月華各七日夜收貯聽用再磨起頭結絲瓜一個候老成種乾燒灰存性爲末每服硃砂五分絲瓜灰五分爲細末蜂蜜水調服服過三次永不 outbreak 痘疹鄰家 outbreak 痘就宜服之

油飲子
若遇痘疹行時左右隣家有出者可預服之用真香油一斤煎熟逐日與兒飲盡永不 outbreak

看耳後筋紋斷法

凡耳後經文似水紅色爲上杏紅色次之大紅色宜退火紫黑青色皆不治又須條均直上耳尖而無分枝者爲上若分枝纏繞者雖淡紅亦凶其或過髮際者多不可救

紙擦照法

用學書竹紙或燒錢草紙烘乾作燃子如小指大蘸清油于燈上往來薰炙冷紙條無泡不濕咤又飽蘸油又薰炙令油無泡卽點燃子將患者房內牕門閉令黑暗有光處以蔽之看其左額有何色點右額有何色點中庭有何色



點視兩顧宜以撚子在兩耳邊及鼻邊平照視中庭宜以撚子在兩目角
照看其皮中歷歷可指是赤是紫是塊是點曉然明白若是麻疹則浮于皮
外肉內無根若是痘疹根在肉內極深若以撚子當顧及中庭正照則點而
不見撚子有灰眵即指去令明如此照之病情在內可以預見若日開以天
日光觀之則不見矣

初起發熱治法

一論發熱之初急宜表汗使臟腑胎毒及外感不正之氣增寒壯熱頭疼腰痛
腹脹或喘嗽痰涎鼻流清涕或因驚恐跌盪而發搐搦角弓反張土宮天弔
一切內外所感盡從汗散則痘出自然稀少但熱甚者其毒亦甚熱微者其
毒亦微然表藥必在紅點未見之前可服

敗毒散

升麻

乾葛

紫蘇

川芎

羌活

防風

荆芥

前胡

薄荷

桔梗

枳殼

牛蒡子

蟬退

山查肉

地骨皮

甘草



右劉一劑生姜一片水煎臨服加葱白汁五匙熱服○一方無乾葛加紫葍
○如執甚加柴胡黃芩○冬加麻黃○暑月加香薷○瀉加茯苓澤瀉
○一論小兒痘瘡纔覺發熱者服之脹出見苗者服之出稀陷伏者服之起服
妙不可言

神效復生丸 方伯玉如水傳

當歸身

西芎

升麻

乾葛

白芍

人參

黃芪

甘草

辰砂一兩二錢

紫葍茸一兩

右爲末糯米粽爲丸如雞頭子大每服一九河水煎滾八黃酒少許送下
○一論痘初發熱一服卽輕百發百中

預服萬靈丹

紫葍茸一兩 山豆根五錢

升麻小者

葛根

蟬退

淨者

姜蚕炒去絲

白附子

連翹去心各一錢

全蝎去毒十箇

生甘草五分

雄黃一錢

麝香一錢

蟾木一錢好酒
醋燻化如蜜

右十二味爲末用蟾酥丸如皂角子大每服一九紫葍湯下



○一論痘瘡初出先用此藥塗而若用之早則痘瘡不生於面用之遲雖

上顏膏

黃相去皮一兩

茶豆粉四兩

甘草生四兩

紅花二兩

右為末香油調成膏從耳前眼唇面上並塗之日三五度

出痘治法

避穢氣

腋下狐臭氣

房中淫液氣

行遠勞汗氣

溝糞濁惡氣

婦人經候氣

諸瘡腥臭氣

硫黃蚊煙氣

吹滅燈燭氣

誤燒頭髮氣

柴烟魚骨氣

葱蒜韭薤氣

煎炒油烟氣

醉酒葷腥氣

麝香燥穢氣

又禁忌

生人往來

詈罵呼怒

對梳頭

對搔痒

勿掃地

勿對慌言

勿飲食譁樂

勿僧道師巫入房

以上穢氣禁忌諸條謹之則重可變輕不謹則輕變重矣

○一論外解諸方凡被房事經水生產之穢所犯者以大束燒烟解之



凡被五辛厭者以生姜燒烟解之凡被酒厭者以葛根茵陳蒿燒烟解之
凡被死屍之氣及厲氣所犯者以火黃蒼朮燒烟解之

凡被胡臭犬羊厭者燒楓毬解之

凡遇風雨燒蒼朮楓毬碎之

凡一切惡氣通以乳香燒烟薰之仲景曰小兒痘時宜燒乳香辟諸惡氣

菜衛遇香則行遇臭則凝故也

世俗煮醋薰豆謂其能活血然醋主收斂故婦人血崩者用薰之痘毒欲升

發而不欲收斂故不宜耳嘗見用醋薰豆發痒搔破而敗事者慎之

○一論痘疹初出時宜用此酒遍噴四面床壁及與患者服役人皆飲能辟穢

毒又以淨明脂點兩眼角防痘入眼

胡菱酒

胡菱三兩細切以酒二鍾煎沸用紙密封勿令氣出候冷去渣從頂至腹

頰微塗之更噴背膂胸腹及兩脚皆遍再用滿房壁門戶遍酒之九妙

○一論痘瘡欲出已出熱尚未解毒氣太盛稠密成片急進此三四服快透消



毒如神專治內 縕邪熱咽膈不和痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核腫毒丹毒
遍身風疹痺毒 赤痛等症

消毒散

牛旁子

微炒

荆芥

甘草

各一錢

防風

去芦

一方加黃芩

犀角

鎊五分

右剉水煎溫服

○一論痘瘡已出 痘毒太盛以此消毒或出不快皆宜服之一云痘瘡飲出瀉
身壯熱不思飲 食若服此一劑即內消已有一兩顆出即解其半若全出即
當日頭焦只三 服瘥子每用此治壯盛小兒痘出毒盛殊效若虛者散九妙

化毒湯

紫草茸五錢

川升麻

甘草各二錢半

右剉每服二錢

糯米五十粒同煎服

○一論痘出毒氣

大盛血紅一片不分地界如蚊蚕種或諸失血或吐瀉七日

以前諸症可服 解毒神效

九味神功散



黃芪

人參

白芍

紫草

紅花

生地黃

午旁子路等前胡

甘草錢半

右對水煎溫服

○熱甚者加黃連黃芩各一錢未退再加黃芩

有驚加蠶退去

○若頭粒淡黑色者有寒乘之加桂一錢○如大便閉

一痘發渴服神功

散當不渴或有渴者用紅花子一味煎湯飲無子即

亦好加牛旁子

尤妙蓋能散胃已之瘀血故也切不可用荔枝束能助陽

之火大發渴者

用真黃土百沸湯碗蓋泡取出水少加沙糖飲之立止

痘出三口內頂

陷者非虛也用神功散活血退火

四日以前有寒

症其色黑慘保元湯加桂

色白光者寒乘

之神功散加桂

腹痛者毒盛也

神功散主之

面紅不退地界

不分者神功散倍前胡

吐者毒盛乘火

炎而宜也神功散主之

泄瀉者火盛而

奔越也神功散加秋麻以提之



醫學大學圖書館藏

身已涼汗不止者血隨氣溢也用當歸五錢黃芪三錢酸棗仁炒三錢

作一劑水煎服立止

有痰用日附子磨服切不可用二陳湯使燥陽明經使孤陽無陰不能施也

嗽用杏仁煎湯磨白附子服即止

述身疼痛者以木香一味磨服即止

漿行作痒此內熟而外為風寒所乘用荆芥穗紙裹緊米糊粘住紙頭令不

散燈上燒了却于桌上擦去灰快放手指定痒痘頭點痒處一下即放退每

痒痘點之立止

一行漿漿足而發疔認定是黑疔痘或黑而硬或有紅絲或為大紫泡未曾解

毒者仍以神功散加雄黃黃連黃芩大黃煎服却用點法雄黃一錢研胭脂

重浸水令濃調雄黃末點疔頭上立時即紅活亦神法也蓋雄黃能解毒胭脂

脂能活血也

一痘九日十日作瀉先失解毒者宜用

定中湯



真王黃土一大塊碗盛以百沸湯泡卽以碗蓋少頃出用如冷傾於盞內外以熱水盪之加入雄黃二錢硃砂五分二味爲末和勻以黃上湯兩盞少加沙糖溫服二服立止

○一論痘瘡腹脹渴者或瀉渴者或足指冷渴者或驚悸渴者或身溫渴者或身熱面晄白色渴者或寒戰渴不止者或氣急咬牙渴者或飲水轉渴不止者已上九證卽非熱也乃脾胃肌肉虛津液衰少故也木香散主之如不愈更加丁香官桂多煎服丁香攻裏官桂發表其表裏俱實而瘡不致痒揚喘渴而死矣

一痘十一二日當靨不靨發熱蒸蒸者宜用

甘露回天湯

沙糖半酒五

百沸湯調一大碗溫服立時熱退痘靨百發百中真有同天之力也

看痘不治法

初出湧壯者不治 ○出如蚕種者不治 ○隨出隨沒者不治 ○如蚊蟲咬者不治 ○氣血相失者不治 ○倒出者不治 ○飲水如促鼻者不治 疏肺氣不能疏理也

看痘輕重歌

輕者熱輕痘亦稀

飲食如常勿藥宜

根白頂紅并紫黑

起脹治法

小大後先出不齊

重者熱中瘡並出

若逢血活尚堪醫

根窠紅活瘡肥滿

密如蚕種若胭脂

保元湯

人參

去苦二錢 嫩

黃芪 三錢

甘草 一錢

右剉一劑生姜一

二錢酒調服○一

歸二錢川芎一錢

一二口初出圓暈成

然毒尚淺急以保

加當歸五分白芍

一盞煎七分温服

血弱不起根底淡薄以保元湯加丁香三粒肉桂一錢當

水煎温服

形乾紅少潤毒雖犯上其氣血未離以俟其氣血交會也

元湯加桂兼活血勻氣之劑如毒若盛兼解毒之藥治血

一錢勻氣加陳皮五分 解毒加玄參七分 勞子炒七分 水



北京中醫藥大學圖書館藏

二三日根窠雖圓而頂陷者血亦難聚為氣虛弱不能領袖其氣也以保元湯加川芎官桂扶陽抑陰豈有不痊者哉

四五目根窠雖起色不光澤生意猶在為氣弱血盛以保元湯加芍藥官桂糯米助衛制榮斯為調燮之妙也


五六日氣盈血弱色昏紅紫以保元湯加木香當歸川芎助血歸附氣位以全中和之道也

六七日氣交不旺血雖歸附不能成漿為氣血少寒不能制急投保元湯加官桂糯米助其成漿而收濟惠之偉功斯為治矣

七八日毒雖化漿而不滿為氣血有疑不能大振以保元湯加官桂糯米發陽助漿斯可謂保全生命矣

一痘至此專主貫膿膿已滿雖有他症不至壞事若痘無膿灰暗雖無他症亦一痘瘡至八九十日視痘頂心上有一點如水珠見出此痘漏無藥可醫死也

八九日漿不沖滿血附線紅氣弱而險也以保元湯加糯米以助其氣而駕其血斯漿成矣



十一二日氣血冲滿血盡漿足温潤不飲者內虛也以保元湯血亦有力加白
朮茯苓助其收斂而結痂也

十三四日毒雖盡解漿老結痂之際或有雜症相仍以保元湯隨症加減不可

峻用寒涼大熱之劑恐致內損之患故也

十四五六日痂落潮熱辱紅口渴不食以四君子湯加陳皮山查黃連如渴甚

以參苓白朮散如熱不解以大連翹飲去黃芩主之症去之後多有內損或

餘毒未解此則尤為難治也

凡痘瘡發渴者為虛弱而津液枯竭也保元湯加麥門冬五味子即止如不止

以參苓白朮散一二劑即止

凡痘瘡不起發膿漿不厚保元湯加川芎五分丁香脬二分粳米二百粒煎熟

加好酒人乳各半蓋同服

若頭額不起服加川芎六分為引○若面部不起脹加升麻四分為引○若胸

膈不起脹加桔梗四分為引○若兩膝不起脹加牛膝四分為引○若兩手

不起脹加桂枝二分為引

三
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十



○一論痘瘡胃虛不進飲食或口乾發渴或吐瀉等症

麥冬白木散

人參 白木去芦炒 白茯苓 去皮 甘草炙 白扁豆炒

山藥炒各一分 桔梗八分 芫荽仁八分 砂仁七分

右為細末每服五六分或一錢紅棗煎湯調下或姜湯亦可

貴膿治法

○一論痘瘡血氣虛損或風邪穢毒冲觸使瘡毒內陷伏而不出或出參差而不勻快此藥活血勻氣調胃補虛內托瘡毒使之盡出易收易磨

內托散

黃芪 人參 當歸各二錢 川芎 防風 桔梗

厚朴姜汁炒 白芷 甘草各一錢 木香 官桂各三分

右方如紅紫乾燥黑陷屬熱毒者去桂加紫草紅花黃芩用此藥調穿山前

甲炒成珠為末五分同服

若淡白灰黑陷伏屬虛寒者加丁香救裏官桂救表○當貴膿而不貴膿



者倍參芷當歸煎熟臨服入人乳汁好酒同搽服此貫膿之巧法也○泄

瀉加丁香乾姜肉豆蔻

○一論痘瘡已成出齊而難脹或已脹齊而難靨者由內虛故耳蓋痘既出灰

白色及頂平不起或陷伏者氣血太虛也宜此方

歸芷湯

嫩鹿茸酥炙當歸身酒洗每判五錢好酒煎溫服

○一論痘屬虛寒八九日色白如水泡頂陷根白痒塌寒戰咬牙等症

回陽酒

鹿茸酥炙人附子麩包煨嫩黃芪當歸酒洗

右判好酒煎溫服

○一論痘出至貫脹收靨之時倒塌陷伏心慌喘急悶亂死在須臾

好揀參一兩水煎濃汁灌下即甦

○一論灰白黑陷嘔吐白沫為表虛

木香散十一味



木香磨

前胡

甘草炙

赤茯苓皮去

訶子煨去肉

大腹皮

人參五分

陳皮

肉桂各八分

丁香雄者五粒

半夏姜製八分

右剉一劑生姜三片水一鍾煎八分温服

○一論寒戰咬牙痒塌泄瀉為裏虛

○嘔吐甚加白豆蔻去殼

異功散十二味

當歸酒洗

肉豆蔻煨去

陳皮

白朮去芦炒

白茯苓去皮

大附子麪包

煨去皮脐

半夏姜汁炒

厚朴

肉桂各八分

人參五分

小丁香七粒

木香磨八分

右剉一劑生姜三片水一鍾煎至八分温服

○泄瀉甚加訶子肉煨

○一論此方解毒發痘之聖藥也治紅班黑陷項不起痘疔一切惡症危者用

此立見起死回生之功也

小靈丹

雄黃

硃砂各二錢乳香

沒藥各一錢五分

大蟾蜍取心

用九焙

麝香三分



右研細末取猪心血雞冠血丸如皂子大每服一九身無大熱中酒化下熱甚不飲酒者紫草燈心湯下即時紅活而起如服此不効者决無可生之望
○一論痘瘡初出光壯忽然黑陷心中煩燥氣急喘滿狂言妄語如見鬼神急宜治之不然毒氣入臟必死

人牙散

人牙 燒年性

為細末每箇作一服酒調下立効

又秘方用人牙一箇火煨

朱砂三分

雄黃三分

為細末先用甘草為

未熬成膏調人

三味再用無灰好酒調稀灌下治惡症痘疹不發志之甚

無價散

治症同前

人牙

貓牙

猪牙

犬牙

右等分各將炭

火燒留烟瓦碗蓋蔽存性為末每五六歲服三四分好熱酒

調下痒場寒戰

泄瀉者煎異功散調下若無貓牙用前人牙一味亦好但不

如四牙全為妙

○一論疔瘡咬牙

寒戰六七日陷而不發不貫膿陷人黑色氣欲絕者立効有



瀉者不宜服

三仙散 楚黃賓 江傳

穿山甲半斤 用好漿兒酒一斤 以山甲微火炙乾 再浸再炙 以酒煎為度

穿山甲一兩 麝香一分 硃少以麻黃水 石煎過一錢

右為細末每服 五七分或一錢 溫酒調下

○一方治前症單 用穿山甲用炭火炒成珠為末 每服五七分 木香湯調服 效

○一論痘瘡紫黑 乾枯變黑 歸腎身如火炙之 熱不瀉者可服

犀麋散 吳竺陽傳

烏犀角 羚羊角 二味磨涼水服之 有回生之妙

○一論痘瘡不出 黑陷於死者可服

萬金散

人貓猪犬腦晨 麤 許微將死水調 百者救生無一死

黃金萬錠也 難 殆

右將前四物的 不於服日早晨日未出時貯於銀鍋內用炭火燒令烟盡為



度但是瘡發不快倒靨黑陷者及一切惡瘡每用一字蜜水調服其効如神

○一論痘瘡曰出至收靨時理不宜下者用此導之若既靨之後有前症者又

○一論痘瘡中有長大紫黑者為疔毒把住痘不起發急用簪挑破維入後

四聖散

珍珠三五粒鉢盂上

苑豆四十九粒

頭髮燒存性不

右為細末用擦面油 胭脂調成膏子將兒在溫煖處安存忌風寒穢氣先用

簪尖平撥開疔口將藥維入疔內即變紅色餘瘡皆起但挑破出黑血或挑

開用口啞去黑血或用綿裏指搗去黑血即愈蓋破疔而毒氣即散也

○一女子出痘至脹滿將貫膿時忽紫黑抓破流血此痘屬熱毒太盛用皮硝

不拘多少入花椒二撮煎水用青布蘸搭患處頻頻良久即起脹如舊

收靨治法

○一凡痘十日十一二日痘漸收靨自上而下為順自下而上為逆其遍身皆

靨雖數顆不靨尚能殺人猶蛇退皮雖一節被傷不能退者是亦死也

○一十日至十一日當靨不靨其身不壯熱悶亂不寧臥則啞氣煩渴咬牙



功效加木香當歸以救陰陽表裏若以蜜水西瓜紅柿等冷物食之速死

○一凡當醫不醫泄瀉寒戰咬牙抓破此虛寒也宜異功散

○一凡過服熱藥以致熱毒猖狂血氣彌盛痘爛不靨者內服小藥以湯推尾

膏解之外用敗草散付之

○一凡痘不收靨氣急上痰声啞目閉無神者死靨後癍紅者吉白無血色者

毒氣滯內也恐生餘症

一治痘瘡抓搔成膿血淋漓宜

敗草散

用蓋房多年爛草或蓋墻爛草亦可其草經霜露感天地陰陽之氣并解瘡毒其功不能盡述取草不拘多少晒乾或焙乾為末乾貼瘡上若渾身瘡破膿水不絕粘貼衣裳難以坐臥可用二三升攤於席上令兒坐臥其効如神仍服木香散加丁香官桂同煎服

硝膽膏

硝膽膏 日不收

瘡癍臭爛血膿流

宜研諸膽芒硝細



忠處塗之病自瘳

術尾膏

龍腦半字

研細

旋滴猪心血為丸辰砂為衣紫草湯化下

○一治痘疹抓破稀爛

用爾乳內人土蜜新

瓦上焙乾燒灰存性為末如濕乾摻如乾香油調搽効

○一小兒三歲者發熱

不至遇逢一士曰此

疾有藥可起以少許俚服之稜時即紅活如常不吝貨

求方其法用狗蠅七

枚搗細和醋酒少許調服蠅夏月極多易得冬月藏於

耳中不可不知此蠅

夏月狗身上飛者是也

○一痘瘡屬虛寒者直

痘是胎毒自內出外

可延至十數日後方死屬毒盛轉色者不過七八日瘳

表七八九日藏膿而

結痂矣若毒氣盛不能盡出過六日毒反入內臟腑故

須以六日以前毒氣

該出之時急服涼血解毒之藥以驅出之六日以後醫

無及矣故其死最急

若虛弱毒氣少者只是氣血不足不能貫膿成就故綿



延日久而後死此虛實輕重之分也

痘後餘毒

小兒痘疹餘毒輕則肌表津淫瘙癢重則肢節壅腫作痛若發熱而大便閉結者消毒飲發熱而大便調和者清熱消毒散大便調和而渴者麥門冬飲痛發熱而渴者仙方活命飲大凡根赤而作痒者血虛也四物湯加牡丹皮色白而作痒者氣虛也四君加當歸芍藥色赤而作痛者血熱也四物湯加連翹金銀花色白而不嫩痛者血氣虛也托裏散不成膿或不腐血氣俱虛也八珍湯膿既潰而不斂脾氣虛也六君子湯按之隨指復起者內有膿也卽刺之勿使內攻膿出兒安不必服藥如膿稀清或反作痛或倦怠熱湯或作痛等症皆屬氣血虛甚急以參芪犀朮之類補之若虛中見惡症者不可救實中無惡症者多自愈

活命飲

托裏散

方見瘡疽

○一論痘後餘毒或先服附子熱毒失解聚而不散以至頭頂胸背手足腹節赤腫成癩毒者宜消毒飲或五福化毒丹

消毒飲

鼠粘子炒 荆芥穗

甘草

防風各五分 犀角 銹末一分

金銀花 三分 右剉水煎服

○一論痘後餘毒未解頭面身體多生瘡癩上焦熱壅唇口腫破生瘡口糜吐血口臭咽喉腫痛口渴等症

五福化毒丹

犀角 銹三錢 桔梗一兩

生地黄

赤茯苓

牛旁子各五錢

連翹六錢

玄參三錢

青黛二錢

朴硝

粉草各三錢

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸薄荷湯化下兼有驚疎砂為衣

○一論痘後不同痘毒發於何經初起紅毒時却用黑棗赤三豆以酸醋浸在漿時時以鷄翎刷之隨手退去其効如神

○一論一切癰疔陽症腫痛發熱作渴

清熱消毒散

連翹

山梔

黃連

當歸各五分 川芎



芍藥炒 生地黄 絡六 金銀花 二錢 甘草一分

右剉一劑水煎服

○一論痘毒發熱作渴咽痛

麥門冬飲

麥門冬四錢 黃芩三分 甘草五分 人參 玄參各三分

金銀花五分

右剉水煎服○咽痛加桔梗五分

○一論痘後失音不出

天花粉 桔梗 白茯苓去皮 訶子肉 石菖蒲 甘草

右為末水調半匙在碗內外以小竹七莖黃荆七條縛作一束點火在碗內

煎臨臥時服

○一論痘瘡愈後瘡痂雖落其癢猶點或凸或凹用白蜜塗於瘡上其痂易落

且無痘痕亦不臭穢

○一論痘瘡後身體及肢節生疔蝕瘡膿水不乾用出蚕蛾綿鹽不拘多少用



白礬研碎塞於壘內今滿以炭火燒候白礬汁乾取出研入射少許每用乾貼瘡上若不早治則清難治

○一痘瘡人眼成翳用蟬退為細末羊肝煎湯調化食後服

○一痘疹後眼生翳膜○凡痘瘡不可食雞鴨卵即時有瞳子其應如神

撥雲丹

兔糞色花者佳花片花蠟退

木通

白蒺藜各二兩炙甘草一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服八十丸食後白湯下日進三服以愈為度

○一論痘後餘毒眼生翳障

通明散

當歸

川芎

芍藥

生地黄

防風

乾葛

菊花

蟬退

天花粉絡等谷精草益

右剉散水煎服眼赤腫加黃連梔子翳厚加木賊

秘方

黃丹

輕粉各一錢



右為未用鵝管吹如左眼患吹入右耳右眼患吹入左耳一日吹三次兼服
通明散或用雌雄俱脚磨水服之効

一治痘疹傷眼有白翳

用青果核磨水點之立去

○一論痘餘毒在脾肺者則發咳嗽宜服

清金散

陳皮中

半夏製中

貝母上

天花粉上

桔梗上

梔子炒

黃芩各等分

甘草生下

右剉水煎食遠服

○一論小兒痘後咳嗽不拘遠年近日者有此失治乃貽終身患也

白砒一錢

雄黃

枯礬

鵝管石

石黃

寒水石火煨各一錢

右研細末用菘豆粉打糊丸菘豆大每服三丸臨臥井水送下忌熱物無妨

補遺



益府秘傳冲虛至寶丹

治痘初起氣血兩虛倒場黑陷不起不分地界或咳或瀉兼治

紫草茸八兩 荆穗八兩 一當歸四兩

鮮笋一片 紅花

木通 麻黃

白芷

白芫

牡丹皮

赤芍 懷生地

牛旁子

甘草各四兩

右共咀片用水三十碗鍋內煎去二分起來再入水十碗煎至五碗去渣

前汁煎滴水成珠加蜂蜜四兩再熬成珠為度聽用

梅花蕊一個 蟾酥三錢

紫河車

其酒煮

姜蚕炒一兩

全蝎酒洗

穿山甲炒

川黃連酒炒

杏仁

去皮尖黃芩

蜂房炒

連翹炒

地膚子炒

大胡麻

右為細末煎膏一半為丸如龍眼大每用一九鮮雞湯下立起分地而出

奪命象皮丸 益藩傳

治氣不足 空殼無膿 一九即有

象皮 一兩酒炒

穩小鷺

即一鴨蛋掩臨出死於壳內者是箇蜜帛封皮焙黃色為度

大附子 五錢童便者

黃花地丁

洋花二兩

人參 五錢



血竭五錢 沉香二錢 麝香三分 冰片二錢 馬櫛榔五錢

牛黃五分 黃芪蜜炙五錢 細辛五錢 麝子二兩 官桂一錢

鹿茸五錢 辰砂三錢 鎖鎖葡萄核小者無 木香一錢

白附子二錢 仙茅一兩黑 甘草五錢

右為末白酒醉打杵米糊為丸如龍眼大每丸酒化下立起

神仙救苦丹 益藩傳

治痘初起三五日熱不出又瀉又咳嗽喉嚨痛腰痛或痘或驚皆可治如痘初

出慈白湯下驚風泄瀉瀉咳嗽痰喘如神

白附子五錢山 天竺黃二錢 全蝎二錢 膽星一兩 姜蚕炒一兩

肉豆蔻五錢 訶子五錢 雄黃二錢 麝香一分 麝干五錢

蒲公英花五錢 硃砂一錢 川黃連二錢

右為細末煎膏為丸如龍眼大金箔為衣滾水化下

起死回生散

治痘瘡至七八日忽然變黑收八腹內偏身抓破吮喘死在須臾服此從新



另發出立可回生 扶溝趙神仙傳

當歸

川芎

白芍

生地黄

升麻

紅花

上陷加白芷

下陷加牛膝

遍身黑陷加麻黃

象糞微炒如一歲

兒用二錢大則用到三五錢者

右剉一劑坐水半酒煎服從新發出脚心有黑疥至七八日用針挑去以

乙膏貼之即拔去毒連進二三服

麻疹

古謂麻即疹也疹出如麻成瘡痘出如痘成粒皆象其形而名也夫胎毒一也
痘出於五臟臟屬陰陰主血故痘有形而有汁其症寒熱備有也疹出於六
腑腑屬陽陽主氣故疹有形而無漿其形多實熱而無寒也為症既異則治
法亦殊痘宜內實可用補劑疹忌內實只宜解散惟初熱發表略相似耳既
出之後痘則補氣以生血疹宜補陰以制陽何也蓋疹熱甚則陰分受其熬
煎而血多虛耗故治以清火滋陰為主而不可少動其氣所以人參白朮生



夏若燥悍之劑首尾當深忌也世知痘證所繫之重而不知疹之殺人尤甚方書多忽而不備良可太息矣

○一論疹發熱之初多似傷風惟疹子則嗽咳噴嚏鼻流清涕眼胞腫其淚汪

汪面浮腫雙腮赤惡心乾嘔為異耳但見此候卽是疹子便宜謹避風寒戒

葷腥厚味用藥以表散之使皮膚通暢腠理開而疹毒以出也

○一論疹之初起呵欠發熱惡寒咳嗽噴嚏流涕頭眩宜

升麻葛根湯

升麻 乾葛 白芍各一錢 甘草五分

右剉生姜水煎服加紫蘇葱白以解肌切忌大汗斑不紅者亦宜乃麻疹初

起之神方也

○一論麻疹既出一日而又沒者乃為風寒所冲麻毒內攻若不治胃爛而

消毒飲

鼠粘子四錢 荆芥三錢 甘草生一錢 防風去苜五分

右剉水煎服加烏犀角尤妙



○一論麻疹已出而復沒或出不盡心慌哭啼不止十分危急死休須臾或不

痢腹痛可川

二仙湯 馱陵 劉孟門傳

黃芩去朽 白芍藥生用 各等分水煎溫服如神

○一論麻疹已出謾語煩燥作渴者可用

白虎解毒湯

石膏 知母 黃連 黃芩 黃栢

梔子 甘草 石到水煎服

○一論麻疹已出大小便閉可服 防風通聖散方見中未門

○一論麻疹已出讖語小便閉者宜

遵赤散 生地 黃木通 甘草 淡竹葉七井 水煎服

○一論麻疹已出泄瀉不止可服

四苓散 猪苓 澤瀉 白木去芦 白茯苓各等 分水煎服如小便如泔者或

小便不通者加車前木通



○一論麻疹已出寒熱似瘧可服

柴苓湯 柴胡

黃芩 半夏 錢牛

猪苓 澤瀉 白朮 去苳

白茯苓 去皮

甘草 右剉姜枣煎服

○一論麻疹已

出大便下血或小便下血吐血衄血或二便閉澁瘡疹

犀角解毒湯

真犀角 一錢如無 生地 五分 牡丹皮 一錢 赤芍 一錢

黃連

枯黃芩

黃稻

梔子

右剉水煎服

如吐血衄血加炒山梔子童便和服

○一論麻疹前後有熱潮不退等症並為血虛血熱可服

四物湯

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃 血虛用熟

右剉水煎服

○發渴加麥門冬犀角汁 ○嗽加瓜蒌霜 ○有痰加貝母陳皮

○一論麻疹正

出之時雖不進飲食者但得麻疹淡紅潤澤真正不為害也蓋

熱毒未解內

蘊實熱自不必食退後若不食出隨用四物湯加神麴砂仁一

二帖次能食

矣如胃氣虛者忌少下地黃



○一論麻疹既出之時如色紅紫乾燥暗晦乃火盛毒熾宜四物湯用生地黄加紅花酒炒黃芩

○一論麻疹既出已過三日不能沒者乃內有虛熱宜用四物湯進之如失血之症加犀角汁解之

○一論麻疹退後若有牙根腐爛鼻血橫行並為失血之症急用四物湯加茵陳木通生犀角之類以利小便使熱下行如疔瘡色白者為胃爛不治之也

○一論麻退之後須避風寒戒水溫如或不謹遂致終身之咳嗽患瘡無有也
○一論麻疹前後大忌猪肉魚酒雞子之類恐惹終身之咳只宜用七雜精肉煮食小助滋味可也

○一論孕婦出麻當以四物湯倍加白木條芩艾葉安胎清熱為主則胎決無厄而麻疹易出矣如胎氣上中急用芎根艾葉煎湯磨生板柳服之更以四物湯大進之

○一論疹子沒後餘熱內攻循衣摸床讖言妄語神昏喪志者死如熱輕餘毒未除必先見諸氣色雖預防之始終以升麻葛根湯為主或消毒飲解毒湯

醫士宗元
卷八
五



隨症選用仍忌魚腥葱蒜之物

黃連解毒湯

黃連

黃芩

黃柏

梔子

水煎溫服

補遺

十仙湯 序斑

孫雙泉傳 治疹後餘毒

柴胡

葛根

玄參

黃連

黃芩

梔子

陳皮

茯苓

根殼

生地黄

石劉生姜煎服

○一小兒疹後咳嗽腹脹喘急煩燥泄瀉聲啞唇口清黑胃蘭峰傳

黃連

黃芩

連翹

玄參

知母

桔梗

杏仁

白芍

麻黃

牛蒡子

乾葛

陳皮

厚朴

甘草

右劉水煎服

壽世保元辛集

八卷終

