



11-536□



1200501148399

36

梅花無盡藏



始







梅

花無盡藏





天送無親

天

送

無

親

狼

惟

與



六山子之初是

於未卒以前

信山移居初介溪夫

快人少書



梅花無盡藏

目次

第一章	產婦人門	活套	勸	辨
第二章	小兒門	活套	勸	辨
第三章	傷寒門	活套	勸	辨
第四章	感冒門	活套	勸	辨
第五章	瘧病門	活套	勸	辨



第十二章	第十一章	第十章	第九章	第八章	第七章	第六章
脹	水	咳	淋	脚	泄	痢
活	活	活	活	活	活	活
滿	腫	嗽	病	氣	瀉	病
套	套	套	套	套	套	套
門	門	門	門	門	門	門
勸	勸	勸	勸	勸	勸	勸
辨	辨	辨	辨	辨	辨	辨

第十三章	第十四章	第十五章	第十六章	第十七章	第十八章
嘔吐膈噎翻胃門	黃疽門	積聚門	霍亂門	頭痛頭風門	勞瘵門
活	活	活	活	活	活
套	套	套	套	套	套
勸	勸	勸	勸	勸	勸
辨	辨	辨	辨	辨	辨



第十九章 中風門 活套 勘辨

第二十章 心氣門 活套 勘辨

第二十一章 痰飲門 活套 勘辨

第二十二章 喘急門 活套 勘辨

第二十三章 心痛門 活套 勘辨

第二十四章 腰痛門 活套 勘辨

第二十五章 腹痛門 活套 勘辨

第二十六章 脇痛門 勘辨

第二十七章 疝氣門 勘辨

第二十八章 消渴門 勘辨

第二十九章 痔漏門 勘辨

第三十章 衄血門附 勘辨  
吐血、嘔血、咳血、唾血、痰血

第三十一章 吐血 活套 勘辨  
血 勘辨



第三十二章

下

活套

門

活套  
勘辨

第三十三章

汗

活套

門

活套  
勘辨

第三十四章

呃

活套

門

活套  
勘辨

第三十五章

燥

活套

門

活套  
勘辨

第三十六章

眩

活套

門

活套  
勘辨

第三十七章

脫

活套

門

活套  
勘辨

第三十八章

癰

勘辨

門

第三十九章

眼

勘辨

門

第四十章

耳

活套

門

活套  
勘辨

第四十一章

鼻

活套

門

活套  
勘辨

第四十二章

口

活套

門

活套  
勘辨

第四十三章

牙

活套

門

活套  
勘辨

第四十四章

咽

活套

門

活套  
勘辨



第四十五章 癩病門

勘辨

雜病治例

諸證冷熱主屬例

諸病冷熱主藥例

勘辨所載藥方

浮沈遲數脉治

古今得効藥方

脾

胃

諸

瘡

梅花無盡藏

第一章 信濃 小松 帶刀 按定

產婦人門

夫レ婦人ノ病ヲ治スル男子ト同一ナリト雖モ少シ異ナル所  
 アリ凡ソ百人ノ男子九十人マデハ耗氣損精ノ病ナリ凡ソ十  
 人ノ婦人九人マデハ氣鬱經滯ノ病ナリ上古ノ聖人モ深ク此  
 理ニ達シテ婦人ノ病ヲ治スルニハ降氣散氣ヲ專トス故ニ香  
 附子ハ是レ婦人ノ聖藥ナリト云ヘリ此理ヲ能ク會得シテ婦  
 人ノ諸病ヲ治スヘキナリ或ハ憂思久シク釋クルコトナク或  
 ハ戀情遂クルコトナク或ハ疾妬憤懣シテ氣胸中ヨリ逆上シ



テ卒ニ順流スルコトナク如此情思日々月々ニ積重リ氣鬱シ  
テ順流スルコト能ハサレハ經絡漸ク滯リテ月經漸ク減シ或  
ハ白淫ト成テ衰瘦遂ニハ虛熱勞瘵トナル故ニ婦人風寒暑濕  
ノ外邪ノ暴病ヲ治スルハ男子ト同一ナリ七情内因ノ久病ヲ  
治スルニハ降氣散氣ノ藥ヲ少シ加フヘシ其他男子ニナク婦  
人ニ止ルノ病月事不調赤白ノ滯下妊娠難産後ノ諸證ノ類一  
々左ニ記ス

處方

婦人常ニ頭額痛ミ重ク眼眶攣<sup>こむら</sup>リ痛ミ時々上逆シ面熱シ胸中  
支<sup>シツカ</sup>結ヘ不食スルハ是レ氣ノ病ナリ其脉兩ノ寸口洪弦ニシテ  
左ノ關部弦實ナルヘシ加科流氣飲

香附子大 黃芩中 枳殼中 芫胡小 青皮小

右煎用加減ハ別錄ニ見ユ

赤滯久シク止マズ脉洪數ナルニハ

處方

赤芍藥大 香附子大 黃蘗小 甘草小

右ノ類ヲ末ニシ與フベシ或ハ椶櫚毛ヲ燒灰ニシ加フベシ  
若脉虛細ニシテ動數ナキモノニハ

芍藥中 香附子中 乾薑中

右末シ或ハ髮灰ヲ加ヘ與ルモヨシ  
白滯久シク止マス或ハ尿白濁リ陰中白汁アリテ腰痛シ面色  
青ク脉弦數ナルニハ



處方

知母小 羌活中 白芍藥中 右煎シ用テ時々ニ

黃蘗大 知母小 白芍藥中 右丸シ兼用スヘシ

赤白滯下ノ證ニシテ寒熱往來シ或ハ潮熱シ手足煩熱咽中乾

燥脉ニ動數アルニハ前方ノ中ニ芫胡中地黄大芍藥小ヲ加

フヘシ

胸腹ノ間ニ寢聚アツテ痛ムモノニハ莪朮桃人牡丹皮此類ノ

煎藥ニテ紅花牡丹乾漆ノ類ノ丸藥ヲ用ウヘシ

串柿ホドニ塊シ汚血フムチ多ク下ヲハ遽カニ止ムヘカラス

桃人中莪述中當歸尾中牡丹皮小ノ類ニテ誘化シテ其後芍藥

黃蘗各焙中白朮小此類散藥ニテ漸々ニ止ムヘシ

滯下病久シク愈ヘスシテ腰ノ間ニ腫氣生スルニハ 檳榔

牛膝 防已 ノ類ニテ下焦ノ滯氣ヲ流通シテ其後灸スヘ

シ

月事來ラン前ヨリ腹痛シ來ル間モ陣々チヂ痛テ月事止ルト共ニ

痛止ムモノハ血室ノ實セルナリ 芍藥 香附子 枳殼ノ

類

若シ前ニモ痛ミナク來ル間モ痛マスシテ月事止テ後二三日

モ腹痛スルハ血虛スルノ故ナリ

當歸小 地黄中 白芍藥中 肉桂小

此類ヲ用テ血ヲ補フヘシ

月事多シテ十日餘モ來モノハ 白朮小芍藥中黃蘗中 右丸



シ用ヘシ然レモ脉ノ遲數ニ依ルヘシ  
月事良モ少シテ不日シテ頓ニ止ム者ニハ 白朮 陳皮 香

附子 ニテ中焦ヲ調ヘ飲食ヲ進メ營衛ヲ流通スレハ月事  
自ラ能ク來ラン

善食シテ身體モ肥壯ニシテ月事少キ者ハ 當歸尾 紅花  
桃人 香附子 此類ニテ輕ク月事ヲ通ズヘシ

月事ノ色甚濃シテ紫黑ナルハ邪熱經中ニ入シナリ  
黃芩 地黄 芍藥 黃連 此類ヲ用ヘシ

月事ノ色甚タ淡シテ來コト少キモノハ下焦ニ濕邪アルカ或  
ハ血虛ノ爲ナリ 黃蘗 黃芩 ニテ濕邪ヲ除 當歸 地

黃肉桂ノ類ニテ血ヲ補フヘシ

毎月漸々二月水ノ來コト後ルハ虛冷ナリ毎月漸々ニ前ムハ  
血熱ナリト醫書ニ見レドモ猶其上ニ脉證ヲ審ニシ藥ヲ用  
ウヘシ

脉平ニ病モナクシテ妊娠セヌ者アリ是原ヨリウマズ女ナリ  
強テ藥治スヘカラズ

上氣シテ胸膈ニ氣滯リ頭眩ミ眉攣リ痰滯リ月事滯リ減ジテ  
妊娠セザル者ニハ 香附子 枳殼各大 右二味麩ク剉ミ酢

ヲ灌キ濕テ好炒焦シ 黃芩小 ヲ加ヘ三味末シ丸シテ常  
ニ用ベシ五十日百日若クハ半年モ用レハ必孕ム

中焦虛シ脾胃弱シテ食少ク體瘦テ受胎セザルニハ  
陳皮中 白朮中 香附子大 右三味ヲ木湯トシ痰アルニ



ハ 半夏少 加へ虚熱セハ地黄地骨皮ヲ加フ  
元氣弱シテ衝任ノ經脉虚シ營衛泣月事少シテ受胎セザルニ  
ハ 白朮 芍藥 ニテ脾胃ヲ調へ 香附子 陳皮ニテ鬱  
氣ヲ降散シ 當歸 地黄ニテ營血ヲ補益スレハ衝任ノ脉  
盛ニナリ月事多ク來レハ必ス受孕ス  
庸醫曰子宮冷へ經血虚スル故ニ受孕コトナシト而温熱調補  
ノ藥ヲ輯用ユ故ニ邪熱下焦ニ生シ或ハ上逆シ或ハ胸膈鬱結  
シ或ハ寒熱往來シ或ハ不食シ或ハ月事凝滯シテ瘀血腹中ニ  
塊ル皆是醫人ノ罪ナリ

婦人血氣調順ニシテ月事如期脾胃壯ニシテ飲食好進ミテ受  
胎セザルハ或ハ男子ノ腎虚シ元氣弱シテ房事ヲ慎マヌニヨ

リ精汁稀薄ニシテ種トナラザルナリ如此モノハ房事ヲ遠テ  
夫ノ元氣ヲ盛ニシ夫ノ脾胃ヲ調テ飲食ヲ進メハ必ス胃氣調ヒ  
精元充テ妊娠ノ種トナルベシ又臍下四寸中極ニ灸スベシ  
妊娠スト云トモ婦人固怯弱ニシテ數月ニ及テ小産シ終ニ大  
産セザルニハ 香附子ニテ上焦ノ鬱氣ヲ解キ黄芩ニテ虚火  
ノ炎上セルヲ清シ 枳實白朮ニテ中焦ノ濕熱ヲ除キ 知  
母黃蘗ニテ水中ノ邪熱ヲ消シ青皮芫胡ニテ肝氣ノ太過ヲ  
平ゲ 地黄ニテ血虚ヲ補ヒ 如此脉證ヲ辨別シテ藥ヲ與  
ヘテ三焦ヲ流通シ脾胃調和シ月經常ノ如クナラハ小産ス  
ルコトナカラシ

惡阻 夫レ妊娠シテ惡阻スルコト人々ニ依テ幾月ヲ定メズ



輕ク惡阻モアリ甚ク惡阻モアリ其證脉平ニシテ顔色ヨク手足ダルク頭重ク目眩食物ヲ擇ヒ食臭ヲ惡ミ微ニ寒熱シ心悶嘔吐シ不食ス其微ナル者ハ藥治ヲ用ヒザレドモ可ナリ甚シク痰水ヲ嘔吐シ絶テ不食シ米穀ヲ食ヌコト十日ニ餘ルニハ

白朮小 陳皮大 麥門冬大 茯苓中 厚朴小 香附子  
中 甘草少 右生薑ヲ加ヘ煎服ス

妊娠幾月ニ限ラズ胎氣動シ腹痛ミ易キニハ

當歸 黃耆 芍藥焙各中 甘草少 右葱白ヲ加ヘ煎服シ  
其脉證ニ依テ鯉魚ヲ煮食スベシ

衝任ノ經血虛シ胎氣ヲ守護スルコトカイナキニ體ヲ罷シ心ヲ勞シ萬ノ毒物ヲ食シ風寒ニ中ルコトアレバ胎氣必動シ或

ハ胞血漏下ルナリ深ク慎ムベシ或ハ下血セバ其證ノ寒熱ヲ辨ヘ脉ノ遲數ヲ別チテ藥ヲ與ヘシ熱證ニハ

生地黃大 荊芥 竹茹 芍藥各中 黃芩小 右煎用  
冷證ニハ 乾薑 當歸 續斷各中 阿膠小 右煎用

妊娠苦シク胸ツヨク痛ニハ 黃芩 芍藥炒 香附子 陳皮

妊娠咳嗽ニ必ス虛實アリ實證ニハ 桑白皮大 陳皮 香附子  
黃芩各中 紫蘇小 甘草少 右煎用

薑證ニハ 陳皮 人參 桔梗 五味子 生薑各小 欵冬花  
中 甘草少 右煎用

妊娠物ニ驚惕易ク胸中煩悶シ不食シ涎沫ヲ嘔吐スルニハ  
麥門冬大 黃芩小 茯苓中 陳皮中 甘草少 煎用



妊娠中風ニハ 白朮中 獨活中 黑豆百粒 右煎シテ服スル

ニ臨テ 酒少 竹瀝許多ヲ加ヘ服スベシ

妊娠傷寒ノ治法通例ト異ルコトナシ

妊娠虐疾泄痢或ハ浮腫等ノ治法各其疾ヲ療スル藥劑中ノ剛  
キ性力ノ物ヲ除キ和柔ナル物ヲ用ベシト云リ然レトモ如此  
シテハ藥劑ニ功驗有ルカラズ

妊娠既ニ産月ニ至レハ藏府狹窄ナリ關節強剛ル故ニ熟睡臥  
スルコトヲ禁ズ徐々緩歩シテ腸中ヲ寬ゲ關節ノ氣血ヲ流通  
セシムベシ多ク酒ヲ飲コト、妄ニ藥ヲ服スルコト、消シ難キ物  
ヲ食コト、妄ニ鍼灸スルコト、憂思スルコト、高二躋コト、險ヲ履  
コト、大ニ怒コト、打擲スルコト、重物ヲ舉ルコト、風寒ニ中リ手

足ヲ冷コト、房事ヲ犯スコト是等凡テ皆禁ズベシ

既ニ分娩ニ臨テ縱令腹痛スレ腰大ニ痛マザルハ未然ナリ然  
トキハ妊婦ノ兩手ヲ携ヘ室中ヲ徐々歩シムベシ腹痛ニ依テ  
不欲斥強テ歩マシムヘシ如此スレハ腹中寬テ轉回シテ産シ  
易シ若腰腹大ニ痛トモ伏臥ニナリ抛手足或ハ枕ニテ痛處ヲ  
按レハ胎ヲ壓殺スコトアリ其甚痛ムハ是必轉回セントスル  
故ナリ伏臥ニナリコロビ廻レハ兒ノ手足ヲ壓ス故ニ或ハ横  
産逆産ス故ニ大ニ痛ムトキ能堪テ立仰キ腹中ヲ寬レハ轉回  
シ易ク正路ニ由テ生ル、ナリ然レ斥未タ轉回セザル間ハ苟  
モ用力ベカラズ既ニ轉回シテ兒頭産門ニ逼近産髮手ニ觸ル  
時ハ腰ヲ抱アゲテ一迸ニ用力ベシ如此シテ少シ間アルニハ



催生ノ藥ヲ與ヘシ若シ未タ轉回セヌサキニ用力コト久ケレ  
バ胞衣破テ蕩ケ下リ胞血多ク下テ胎内乾ク故ニ難産トナル  
ナリ腰腹久ク痛ミ轉回スルコト遅シテ難産ナラバ

榆白皮大 冬葵子中 甘草少 右剉ミ煎テ與ベシ

若用力コト早クシテ破水多ク下リ轉回セズ産シ難キニハ

白芷 百草霜 二味等分末シテ童便ト米酢ト合セ熱湯

ヲ加ヘ前末二分ヲ攪テ與ヘシ一本云或ハ芎歸湯ニテ送下スベシ

其後 冬葵子 榆白皮 二味等分ノ煎汁ニ 滑石 雲母

右等分毎服一匁ヲマゼ與フヘシ

難産二三日ニ至テ猶未分ク娩冷氣下部ヨリ入り陰戸小腹冷ヘ  
胎血凝滯シテク娩ガタキニハ 肉桂大 當歸尾大 紅花中

桃人中 香附子小 右剉煎ジ酒小許ヲ加ヘ温メ服スベシ

若手足逆冷脈微ナルニハ附子ヲ加フヘシ

難産ノ秘藥 大蛇脫一條 蟬脫一條各燒存性 滑石五匁 冬葵子一匁

右細末シ毎服一匁順流水ノ湯ニ攪キ用ウ

胞衣ノ下ルコト遅キニ二ノ謂アリ兒生下シ惡露胞衣ノ中ニ  
入り胞衣腫テ下ヌノモアリ速ニ治セザレバ腹中脹滿シ心腹  
疼痛ス喘急スルモノハ治シ難シ又孱弱ナル婦人力ヲ竭シ精  
氣ヲ苦メ用力イキツ分ク娩シ大ニ疲極重ネテ胞衣ヲ用力下スヘキ  
勢ヒナシ故ニ産門ヨリ風寒襲入テ胞衣ノ下ル道ノ血乾澁テ  
幾何用力ムトモ下ラズ故ニ分ク娩テ後一息息ヲツガセ休メテ  
即用力一送シテ下スベシ



若胞衣ノ下ルコト遅シテ腹脹ニハ 牡丹皮大 乾漆大各炒 盡烟

附子小炮 右各細末シ大黃末一兩米酢ニテ煎シ煉熬テ膏  
ノ如クナルヲ度トシ冷シテ三味ノ末ヲ加ヘテ丸シ温酒ニ  
テ服スベシ奪命丹ト云フ

難産ノ惡證ハ身重體熱ス或ハ體寒ク舌下ノ筋青黒ク舌掲テ  
冷ルハ必ス死ス唇口青ク痰沫多ハ中焦絶シ營衛竭タルナリ  
子母俱ニ死ス舌赤トモ面色青ク頻ニ痰沫ヲ吐ハ營衛絶シテ  
胎懸衝トス子生キテ母死ス面赤ク舌青キハ子胎中ニ死スト  
ス急ニ治セハ母ハ生クベシ

新タニ産シ脉滑ニシテ緩ナルハ吉實大弦急ナルハ凶沈細ニ  
シテ骨ニ至テ絶セズ力アルハ吉寸口澁數ニシテ大小調ラサ

ルハ凶

新産攝養ノ法ハ新ニ分娩シ胞衣下ラハ小便ヲ茶碗一七分許  
與ヘ目ヲ閉テ産スヘシ即臥シムヘカラス少頃シテ居ナチラ  
セ仰ニ高ク物ニ倚カ、ツテ膝ヲ憲テ足ヲ伸ヘカラス頭ニ厚  
ク綿帽子ヲ被ラセ四向ヨリ風ノ入ヌヤウニ防ヘシ頻々和柔  
ナル物ヲ以テ心ヨリ腹ヘ按摩チロシ如此惡露ノ殘ヌヤウニ  
スルコト三日久ク睡眠シムヘカラス若熟睡セントセハ徐々  
ニ喚覺ヘシ三日ノ間ハ炭火ニ酢ヲ上テ其香ヲ嗅スヘシ或ハ  
乾漆ヲ麝碎テ香爐ニ焚キ嗅スモ佳是惡露氣ニ誘テ上衝リ眩  
暈シ失氣スルコト無ラシメン爲ナリ初メ分娩ハ即白粥一味  
ヲ冷煖ニ適テ食ハスヘシ飽マテニ強ヘカラス小許ツ、頻々



與フヘシ

新産三日ノ間ハ腹痛スルト否ト惡露上衝スルト否トヲ論セ  
ス童便少ツ、湯若クハ藥ニ和シテ與ヘシ三日已後ハ童便ニ  
酒少ツ、和シテ與ヘシ新産七日ノ間ハ必ス童便ヲ飲スヘシ  
三日五日已後ハ少ツ、味噌ヲ食スヘシ鹽ハ減ルヲ佳トス七  
日已後酒ヲ好ハ少シツ、飲スヘシ麪類ハ百日已後ニ與フヘ  
シ若早ク食セハ必ズ腫病ヲ生ス

新産三日ノ後身熱シ頭痛シ胸中支痛ミ乳根將ニ通トスルナ  
リ風寒ノ外邪トシテ治スヘカラス 茯苓中 桔梗大 白芷

大 當歸小 芍藥中 芎藭小 甘草少 右煎用  
産後ノ血量ニ三ノ因アリ目ヲ勞シ氣ヲ勞シテ暈スルニハ

人參中 芍藥中 生芩大 當歸小 黃芩小 甘草少

右煎シテ少ツ、用ヘシ此證ハ治シ易シ清心補血テ良シ  
血多下テ暈スルニハ 人參中 芍藥中 生芩大 當歸小

甘草少 右細末シ少許ツ、白湯ニテ用ウ  
惡露下ルコト少クシテ胸中痞暈スルニハ 澤蘭大 荆芥中

芎藭小 細辛中 紅花大 當歸尾中 右煎シテ小便ヲ  
加ヘ與ヘシ此證ハ治シ難シ破血運血逐血テ良シ

一切産後ノ氣ツケ藥ニ世上ニ用ルハ蒲黃散生氣散ト云ナリ  
蒲黃二分 人參一分 甘草少 右細末シテ耳挖ニ一七ニ七

ツ、白湯ニテ用ユ蒲黃生ハ血ヲ破リ炒ハ血ヲ收ム  
一方 寒中ニ鴨脛ヲ取り黑燒ニシ細末シテ耳挖ニ一七ツ、



白湯ニテ用ウ甚タ奇功アリ

産後風寒ニ中リ惡露頓ニ斷シ寒熱シテ譫語スルハ熱邪ノ血分ニ入シナリ邪崇鬼斃ニアラス活血湯ニ宜シ

芫藥中 生芩大 當歸尾小 人參小 甘草少

右煎シ用エ

産後氣弱ニ依テ血脈經絡ノ間ニ留滯シテ日ヲ累レトモ行ス因テ身痛腰重ク轉側シ難ク手足頑弱ニシテ用ヲ爲シカタク身體煩熱ス外邪ト爲テ治スヘカラス

羌活大 獨活中 肉桂小 白朮中 牛膝中 當歸中

甘草少 右生薑ヲ加ヘ煎服ス

産後ノ頭痛咳嗽喘急四肢浮腫ノ類ノ治法皆常法ト異ナラス

産後ニ惡露盡ス臍腹錐<sup>ツノ</sup>如クニ痛ムチ兒枕痛ト云フ

牡丹養血丸 當歸尾大 赤芍藥大 牡丹皮中 肉桂中

延胡索中炒 右細末シ煉蜜ニテ丸シ米湯ニテ用ウ

少女初産シテ乳房起ルト雖トモ乳汁ノ來ザルハ風熱經脈ニアリトス 薄荷大 麥門冬大 陳皮中 香附子小

甘草少 右煎シ用ユ

多産ノ人乳汁ノ來ラヌハ津液ノ衰少セルナリ 當歸中 芩

中 括樓根 麥門冬各大 甘草少 粳米 右煎用

乳汁通ト雖トモ少キ者ニハ葱白鯉魚ノ類ヲ煮其清汁ヲ與フ

ヘシ或ハ實ヲモ少ツ、食セシムヘシ鮓魚モ亦佳ナリ

産後子宮ノ挺出テ收ラヌニハ 淡竹葉ノ煎湯ヲ好ホドニシ



テ洗ヒ五倍子明礬二味ヲ末シ擦テ輕々内ヘシ

一方 小麥小 葱白大 煎汁ニ芒硝明礬五倍子三味ノ末ヲ

攪テ陰戸ニ内テ輕々洗滌シ推入ヘシ

産後ノ瘧疾霍亂痢泄淋渴秘結遺尿積聚脹滿ノ疾皆常ノ治法  
ト異ルコトナシ但産後ハ氣虚シ血紊ル故ニ外邪ニ感スルト  
モ大ニ發汗スルコト勿レ正氣損耗セシ疾ナリトモ大熱峻補  
ノ劑ヲ用ルコト勿レ下焦結實シ二便不通トモ剛悍通利ノ劑  
ヲ用ルコト勿レ只柔劑ニテ氣ヲ順行セシメ血分ヲ潤シ脾胃  
ヲ調養シテ食ヲ進メ胃氣ヲシテ生セシメ下焦ノ陰ヲ補シテ  
二便ヲシテ秘結セサラシメ下焦ノ陽氣微ニシテ二便共頻數  
ニシテ遺泄シ易ハ下元ヲ温補スヘシ

活套

婦人ノ病ハ皆血氣ト相搏ヨリ發ス夫血ハ即氣ナリ氣ヲ勞シ  
鬱結スレハ血氣ト相搏テ一切ノ疾ヲ生ス故ニ氣ヲ調ヘ血ヲ  
養ヲ可トス

血滯リ眩暈シ頭重ク或ハ痛ミ熱煩シ胸悸シ脚冷脈浮ニシテ  
氣倦怠良ニモ心爽サル者ニハ 枳殼 香附子 石羔 黃連

黃芩 芍藥 芩 芎藭 白芷 甘草 右煎用

婦人藥ヲ服シテ墮胎シ腹中ヲ損シ復カタキ者ニハ

四物湯ニ人參蒲黃甘草茯苓括蕪根ヲ加ヘ與ヘシ

氣結シ脈細ニシテ日中ニ度々寒熱往來シ僅ニ惡シキコトヲ  
聞コトニ氣爽カラサルハ氣分ノ病ナリ



婦人赤白滯下ヲ止ル方 茴香大 當歸中 白朮小 厚朴小  
蒲黃大 芍藥中 芎藭中 右丸シ用或ハ艾葉ノ煎汁ニ  
テ用ヘシ

赤白帶下ヲ止ルハ赤痢或ハ下血ヲ止ル法ニテ治スヘシ方ハ  
赤痢門ニテ求ムヘシ 一云故ニ帶下ノ止ナル者ハ遂ニ痢ノ  
如シ先血ヲ瀉シテ其後ニ調フベシ

勤 辨

婦人ノ病ハ皆血ノ虛冷ナリ若シ病證別ガダキニハ先四物湯或  
ハ芎歸湯ノ煎湯ニテ滑石散ヲ用ヘシ

産前産後ニ諸證アリト雖モ大方皆血ノ虛冷ナリ芎歸湯ノ煎  
湯ニテ滑石散辰砂散ヲ用ヘシ

難産ノ秘藥 椶櫚毛ヲ取り石ニテ搗碎キ藥裏子ニ盛煎シ用

ヘシ驗ヲ得コト毎度ナリ

又方 芎歸湯ニ附子ヲ加ル煎湯ニテ滑石散ヲ用ウヘシ

第一章

小兒門

夫レ小兒生ル、トキハ即時 甘草小 黃連中 二味ヲ煎メ

少ツ、與フヘシ未タ啼聲ヲ發セヌ先ニ與レハ生涯無病ニ

シテ五疳胎毒ノ患ナシ既ニ啼聲ヲ發シテ後ニ與レハ五疳

胎毒出ツトイヘ凡輕シ若シ俄ニ煎シ難クハ豫メ二味ヲ末シ

置キ白湯ニ攪テ與ヘ而後飛過辰砂ヲ研リ生蜜ニ和シテ口

中ニ塗り自然ニ飲下スヘシ生涯痘疹ヲ免ル 一云又疳胎  
毒ノ患ナシ



小兒生レテ不<sub>ズ</sub>發聲氣結ンテ死セントスルハ難産ニ依テ困ミ  
氣悶ヘテ然リ急卒ニ臍帶ヲ斷ツヘカラス急ニ兒ヲ綿ニ包ミ  
紙燭ヲ燃メ胞衣ニ附シ臍帶ノ口ヲ燒クヘシ火氣臍ヨリ腹中  
ニ入テ須臾ニ氣復シテ息出ルナリ即チ湯ヲ<sub>ソビ</sub>洛テ臍帶ヲ斷ス  
ヘシ兒生テ七日ノ内臍帶ノ斷セシ口ヨリ風濕襲ヒ入レハ唇  
青クナリ撮口セシメ或ハ齒斷ニ粟粒ホトノ白點ヲ生シ面赤  
ク喘息シテ啼聲出サラシム其法指ニ軟ナル練絹ヲ纏ヒ冷湯  
ニ浸シ白點ヲ輕々<sub>ソフ</sub>指破リ自彊蠶ヲ微妙シ末シテ蜜ニ調ヘテ  
其痕<sub>下</sub>ヘ塗ルヘシ故ニ七日ノ内ハ臍ヨリ風濕ノ侵シ入サルヤ  
ウニ慎ミ護ルヘシ小便ニ濡シ襁褓ノ上ニ置ク等ヲ忌ム  
小兒ニ乳ヲ與ルニハ先宿乳ヲ去リテ後與フヘシ乳母寢ル時

ハ乳頭ヲ奪ヒ去ルヘシ然セサレハ兒飽滿シテ胸中ニ滯ルナ  
リ乳ヲ與テ直ニ他物ヲ食セシムヘカラス脾胃怯弱ナルニ乳  
ト食ト一齊ニ納レハ尅化シ難シ故ニ嘔シ吐シ或ハ腹痛シ終  
ニ疳トナリ或ハ積トナル皆此境ヨリ始ルナリ  
小兒驚風ニ二證アリ急驚風ハ熱心ニ生シテ甚シキトキハ痰  
生ス痰盛ナルトキハ風ヲ生ス此トキ大聲ヲ聞キ禽獸ノ啼叫  
ヲ聞カハ驚テ急驚風トナル其證面青ク口噤<sub>ヒツ</sub>足逆冷四肢搐搦  
シ須臾ニシテ覺ト雖モ復初ノ如ク發スレハ面赤ク渴シ鼻氣  
熱ク身熱シ二便黃赤ニシテ寢テ露<sub>イテ</sub>晴者ニハ鎮驚丸ニ宜シ

羌活 大黃 芎藭 枝子 當歸 防風<sub>各二分</sub>  
龍腦二銖 右末シ蜜ニテ丸シ竹葉湯ニテ化シ下スヘシ



一方 天竺黃二分 輕粉一分 青黛一分 黑丑末五分 右末シ蜜ニテ  
丸シ薄荷煎汁ニテ食乳ノ後ニ與フヘシ

慢驚風ハ飲食節セサルニヨリ脾胃ヲ損傷シテ吐瀉スルコト  
日久フシテ中焦ノ元氣甚虚ニシテ手走搗搦シ面黄ミ倦レ晴  
ヲ露シ上竄シ身冷ヘ口鼻ノ息冷ヘ筋攣リ二便青白ナリ

附子炮小 木香小 防風中 天南星炮小 黃耆中 芍藥中

右剉ミ生薑ヲ加煎シ用ユ 一有人參中陳皮大白  
朮大甘草小牛夏小

凡急驚風ハ十生一死 慢驚風ハ十死一生

急驚風ハ熱ト痰トニ屬ス故ニ火ヲ降シ痰ヲ消スル丸藥ヲ血  
ヲ養フ藥ノ煎汁ニテ送下スヘシ

慢驚風ハ脾虚胃弱ニ屬ス多クハ死ス治ハ中焦ヲ温ル煎藥ニ

テ神ヲ安ンスル丹藥ヲ送下スヘシ

小兒生レテ未タ日アラヌ内ハ血氣未タ足ラス陰陽未タ和セ  
ス藏府未タ固カラス骨節ノ機關未タ壯ンナラス變蒸満足シ  
テ後各全ク調ヒ藏府ハ變ニ依テ全クナリ胎毒ハ變ニ依テ散  
ス生レテ三十日程シテ少シ發熱シ或ハ吐シ或ハ汗出或ハ呻  
吟不食ス是レ血脈ヲ長シ智慧ヲ全フスルノ候ナリ又三十日  
程シテ此證アリ如此變蒸スルコト十度三百二十日過レハ藏  
府全ク調ヒ智慧漸クニ益ス此ヲ外邪内傷ナト云テ妄リニ發  
散瀉下スヘカラス若シ變蒸ノ節發熱咳嗽痰涎鼻塞ガリ聲重  
キ者ニハ 人參小 白朮中 白芍藥中 甘草少 括樓根小

桔梗小 細辛小 薄荷小 煎服



若シ變蒸ノ節發熱煩燥甚フシテ傷寒ニ似タルトキハ上唇ノ中心ヲ反シテ見ルヘシ白點アルヘシ是必ズ變蒸ノ證ナリ

麻黃節小去 大黃中 杏人大 右三味燒性ヲ存シ末シ少許ツ

、頻々温水ニテ與フヘシ溫暖ノ室ニテ微ニ汗ヲ取ルヘシ小兒ニ虎口ノ紋ヲ看ルコトアリ男ハ左リ女ハ右ノ手ノ食指ノ腹ニ見ハル第一節ヲ風關ト云ヒ筋ナキハ疾ナシ見ハルトモ輕キ疾ナリ第二節ヲ氣關ト云フ筋アルハ重キ疾ナリ藥治スヘシ第三節ヲ命關ト云フ筋アルハ疾重クシテ治スヘカラス

小兒一歲ヨリ六歲マテヲ嬰孩ト云フ虎口三關ノ筋紋ヲ看ルヘシ七八歲ヲ亂ト云フ九十歲ヲ髻ト云フ醫者ノ一指ヲ以テ

掌後ノ三部ヲ候フヘシ一息ノ間ニ七八動至ルヲ平トス十一歲ヨリ十五歲マテヲ童子ト云フ一息ノ間ニ五六至ヲ平トス虎口風關ニ諸色ノ筋見ハル、ハ諸驚ノ候トス氣關ニ筋見ハル、ハ凡テ疳證ノ兆トス其色紫ナルハ驚疳、青紋ハ肝疳、白紋ハ肺疳、黃紋ハ脾疳、赤紋ハ心疳、黑紋ハ腎疳トス治シカタシ命關ニ青黑ノ紋見ハレ三關貫テ斜ニ入ル者ハ治シ難タシ小兒疳ヲ病ムハ乳母乳哺ヲ慎マスシテ脾胃ヲ損傷シ或ハ久シク吐瀉ヲ病ムニ醫妄リニ藥治シテ中焦ヲ損耗シ或ハ外感内傷ニ卒カニ發散ヲ施シ瀉下ヲ行テ終ニ中焦ノ津液ミナ竭亡シテ内虛熱起リ外肌肉消ス一藏虛スル則衆藏皆弱トナル故ニ疳内ニアレハ胞腫腹脹大便ノ色不定シテ或ハ沫ヲシ或



ハ青色ヲナス漸々ニ羸瘦ナリ疳外ニアレハ鼻下赤ク爛レ自  
ラ鼻端ヲ揉ヒ或ハ目ヲ患ヒ揉ヒナトス上部ニ瘡有テ痂ナク  
肉削瘦ヲ環テ浸淫ス凡ソ兒ノ疳疾ハ内津液營血不足シ外肌  
漸々耳シ而シテ虚熱生ス大人勞際ノ病ト同シキ疾ナリ  
五疳ノ中腎疳尤大事ナリ腎虚シテ邪ヲ受ケ熱氣上焦ニ奔ル  
初ハ口中臭氣アリテ漸クニ齒黒ク甚シキハ斷爛熱血ニ侵サ  
レテ牙齒必ス疼痛ス一説ニ疳ハ大病ノ後妄リニ藥治シ胃虚  
シ液亡ヒ是ニ因テ生スト云ヘリ

肝疳ハ白膜瞳子ヲ遮リ暮ニ至レハ目視ヘカラス

地黄大 山藥中 牡丹皮小 白茯苓小

心疳ハ面黄ミ頰赤ク身熱ス

麥門冬大 白茯苓中 辰砂中 甘草小 龍腦小 芒硝小  
脾疳ハ體黄ミ腹大ニ好ンテ土ヲ食フ

陳皮大 青皮中 訶子小 甘草少 丁子小

肺疳ハ氣喘シ口鼻ニ瘡ヲ生ス治ハ脾疳ニ同シ虚セハ其母ヲ  
補フヘシ腎疳ハ極メテ瘦セ身ニ瘡疥ヲ生ス治ハ肝疳ト同シ  
諸疳ヲ治スルニハ 黃連 龍膽 青皮 苦楝根皮 青黛

龍膽 蘆薈 胡黃連 莪朮 鶴虱 史君子 木香 檳榔

椰 丁子 黃蘗 雷丸 縮砂 三稜 乾蝦蟇皮炙焦 右

ノ藥ヲ證ニ照シテ五六味ヲ擇テ末シテ與フヘシ疳蟲ヲ治  
ス 柴胡 前胡 地骨皮 檳榔 地黃 杏仁 當歸

黃芩 桑白皮 連翹 桔梗 黃耆 牡丹皮 厚朴 甘



草 陳皮 青皮 人參 香附子 丁子 白朮 乾薑  
芍藥

右ノ藥ヲ其證其證ニ隨テ五六味ヲ擇ミ各等分ニシテ煎シ  
與フヘシ若シ虛熱アラハ輕ク除クヘシ津液乏キモ營血セ  
ハ漸々津液ヲ生スヘシ瀉シ易キハ脾胃ヲ調フヘシ氣弱キ  
モノハ參者ノ類ニテ補フヘシ

一方 檳榔 莪朮 三稜 青皮 蕪荑人 雷丸 鶴虱

乾漆 縮砂各等分

右九味末シ酢糊ニテ丸シ薑湯ニテ送下スヘシ此類ノ疳ヲ治  
シ蟲ヲ殺スノ藥ハ空腹ニ用ヒ食ヲ消シ津ヲ生シ血ヲ補フノ  
煎藥散藥ハ食後ニ除々ニ用ウヘシ

### 痘 疹

小兒痘疹ハ母ノ腹中ニ在ルトキ胎内ノ血穢ヲ飲ミ分娩ノト  
キ口中ニ含ム處ノ惡血啼聲ノ吸ニツレテ腹中ニ納リ下焦ニ  
伏シアルニ適歲火太過ニシテ熱毒盛ニ行ルトキ痘毒催サレ  
テ發スルナリ心肝脾肺ノ四藏ニ出テ腎ニ痘毒ノ留滯セサル  
ハ順ナリ

若初發ノ時即チ腰痛ミ痘點見レテ紫黑ナル者ハ多ク死ス是  
痘毒腎間ニ留滯シテ發越セサルカ故ナリ

痘疹ハ表裡ノ虛實ヲ別テ治スヘシ或ハ吐シ或ハ瀉シ不食ス  
ルハ裡ノ虛ナリ 陳皮大 白朮中 人參小 甘草少 生薑  
吐セス瀉セスシテ能飲食スルハ裡實ナリ 檳榔中 枳殼小



芍藥中 前胡中 甘草少 犀角小 地黃中

痘疹灰色ニ白ケ頂陷テ汗多ク出ルヲ表虚トス 肉桂小 黃

耆小 白朮中 人參小 白芍藥中 甘草少

痘疹色紅ニ潤ヒ能ク凸ニ脹テ無汗ハ表實トス

升麻小 葛根大 陳皮大 紫蘇中

痘疹ハ妄ニ汗シ下スヘカラス妄ニ汗スル則ハ營衛虚シテ表開キ毒泄レ難ク風邪入易シテ變證多ク生ス妄ニ下ス則ハ内氣虚シテ痘毒出ガタク反テ内攻シテ腎ニ歸シテ黒ク變ス身冷戰慄シ耳尻反テ熱シ腹脹リ目ヲ閉ギ然シテ痘黒ク頂陷ムハ十二一<sup>フ</sup>生ナシ凡瘡疹發熱ノ時牛房子ヲ未シ蜜ニ和シ調ヘ眼ノ胞ヘ豫メ塗ルヘシ毒ヲシテ眼中ニ入レシメス

九痘初テ出ルトキ色白クハ大ニ氣血ヲ補フヘシ

人參中 白朮大 葛根小 當歸尾中 甘草小一有木香小

痘疹甚多ク出テ二便秘澁スル者ニハ犀角地黄湯ヲ用ヘシ

一云消毒スベシ 犀角 地黃 牡丹皮 芍藥 右煎用

治痘疹ノ大法血ヲ活シ氣ヲ調ヘ表ヲ安シ中ヲ和シ輕ク清フシ毒ヲ消スル劑ニ溫涼并セ用ウヘシ溫ハ 當歸 黃耆 木香 白朮 人參 ノ類是ナリ涼ハ 前胡 葛根 升麻 酒製 黃芩 ノ類是ナリ其他 芎藭 當歸 桔梗 羌活 木通 芫胡 ノ類ニテ佐使スヘシ

黑陷ニ二證アリ表氣虚シテ起發スルコト不能シテ黒ク凋ムニハ 黃耆 人參 紫草根 右煎シ用ユ



毒氣出テ盡サス黒陷スルコト甚シキ者ニハ病無キ兒ノ糞ヲ  
 黒燒ニシ蜜水ニ調ヘテ與フシ豫メ臘月ニ製シ置ヘシ  
 痘ニ乾濕ノ異ルアリ痘乾ク者ハ輕揚ノ涼劑ニテ火熱ヲ除ク  
 ヘシ 葛根 升麻 荆芥 薄荷 ノ類是ナリ  
 痘甚タ濕ヒ汁ノ出ル者ニハ 防風 白芷 ノ類ノ風藥ニテ  
 表ノ濕氣ヲ乾カスヘシ  
 痘疹ノ初證ニ由テ外感内傷ノ因ヲ加ルコトアリ痘出ントシ  
 テ未タ出サル時惕々ト驚ク者アリ是外風寒ニ感シ内心熱ヲ  
 發スル故ナリ 葛根中 升麻小 芍藥大 細辛小 陳皮小  
 前胡小 甘草少  
 痘出ントシテ未タ出サル時吐利スルアリ是レ中焦ノ停寒或

ハ宿食ヲ挾ム故ナリ中焦ノ停寒ニハ 人參小 白朮小 茯  
 苓中 陳皮中 甘草少 生薑小 宿食アル者ニハ 厚  
 朴小 枳實小 青皮中 檳榔小 杏人小 右各煎用  
 痘疹ニ必ス形病氣病アリ痘已ニ出テ聲變セサルハ形病トス  
 地骨皮中 芍藥大 牛房子小 黃連小 右煎用  
 痘未タ出サルニ先聲ノ變スルハ氣已ニ病トス 麥門冬中  
 杏人中 黃耆小 肉桂小 桔梗中 陳皮中 甘草少  
 痘出テ聲ノ嘎ル、ハ形氣共ニ病ムナリ身溫カナルニハ  
 防風小 地骨皮中 芍藥大 荆芥中 生牛房小 黃耆  
 小 桔梗小 右煎シ用ユ  
 若シ大便秘結スルニハ 當歸大 大黃中 黃連中 甘草少



右丸シ用ウヘシ

痘疹ニ藥ヲ服セスシテ治スル證アリ 痘出テ足ニ稀ナル者  
 痘ノ根窠紅ニ脹ル、者 瀉セス渴セサル者 乳食常ノ如ク  
 手足平温ナル者 身大熱ナキ者 右ノ證アル者ハ藥ヲ服セ  
 ストモ養生シテ毒ヲ食セス風寒ヲ防カハ治スヘシ  
 不治ノ證アリ 痘疹大ニ痒ク寒戰咬牙者 渴スル者痘紫黑  
 ニシテ喘シ安カラサル者 灰色ニシテ白ケ痘ノ頂陷ム者  
 腹脹ル者 頭ハ温ニシテ足冷へ悶亂シテ水ヲ好ム者 氣息  
 促クシテ泄瀉シ渴スル者 右ノ證ハ不治ナルヤ必セリ  
 痘毒眼ニ入テ病ム者ハ消毒益明散宜シ 草決明子大 芍藥  
 中 括樓根中 甘草少 右末シ茶ノ清水ニテ攪キ交セテ食

後ニ用ウヘシ

一方 羌活中 防風中 紫草根中 薄荷中 甘草少  
 右末シテ菊葉煎湯ニ攪キマセテ用ヘシ魚類鮓膾炙肉麪類  
 五辛ノ類ヲ禁スヘシ

痘疹愈テ後餘毒脾經ニ傳テ手足腕膝ニ固リ腫痛ムニハ

牛房子大微炒 荆芥中 防風中 甘草少 右剉煎シ犀角  
 末ヲ少シ加ヘ攪テ飲マシムヘシ外馬齒莧ヲ研テ猪膏ト白  
 蜜ヲ少シ合セ調ヘテ痛ミ腫ル、處ニ塗ルヘシ善ク愈ユ

夜啼

小兒ノ夜啼スルニハ 蟬退十四箇去瓜末トス 辰砂末一字  
 右二味蜜ニ調テ口中ニ塗り嚙シムヘシ



腹痛シテ夜啼止マヌニハ 黃耆 甘草 芍藥 白朮 木香

右末シ乳頭ニ塗リテ吸ハシムヘシ

小兒四五歳ニ至レトモ舌本運力ネ言語サルニハ

人參 菖蒲 麥門冬 遠志 當歸 乳香 辰砂 右各

等分末シ煉蜜ニ丸シ米飲ニテ與フヘシ

小兒三四歳ニ至レトモ血氣弱ク骨髓充スシテ行歩ザルニハ

當歸中 地黄大 肉桂小 牛膝小 五味子大 木瓜小

酸棗人小 右細末シ米飲ニ攪テ用ウヘシ

小兒二三歳ニ至テ齒ノ生セサルハ髓不足シテ骨中ニ充サル

故ナリ 芎藭小 山藥中 當歸中 地黄大 沈香小 甘草

少 右細末シ鹽湯ニ攪テ與フヘシ又末ニ鹽ヲ和シ斷々

少シツ、擦ヘシ

小兒生レテ物ニモ觸レス壓レザレトモ罌丸硬ク大ナルニハ

桃人ヲ搗キ蘘蕪汁ニ調ヘ頻々塗ルヘシ

小兒藏府ニ熱アルニ由テ湯水ヲ好ミ泄瀉シテ血氣怯弱ナル

者ハ顛會陷テ孔ノ如シ 赤犬頭骨ヲ焙リ末シ雞子白ニ調ヘ

テ顛會ニ塗ルヘシ

小兒頭頂ノ顛門開テ合ハサルハ腎虛シテ腦髓不足ナル故ナ

リ 熟地黄大 山茱萸肉中 牡丹皮中 白茯苓中 山藥中

澤瀉小 右末シテ蜜丸ニシテ鹽湯ニテ用ウヘシ

外天南星ヲ炮シ末シ米酢ニ調ヘ絹ニ敷烘リ煖テ顛門ニ當

ツヘシ



勘 辨

小兒諸病今載スル所ノ他ハ大人ニ異ルコトナシ然レトモ大寒大熱ノ劑ハ斟酌シ中寒中熱ノ劑ヲ證ニ隨テ用ウヘシ

小兒冷證ニハ五香湯熱證ニハ三黃丸辰砂丸蟲證ニハ太乙丸  
豐心丹辰砂丸或ハ華

小兒ノ下利ハ皆熱ナリ利色青キハ大熱ナリ三光丸ニ 芒硝  
黃蘗 ヲ加ヘ用ウヘシ

痘疹初熱ニ白散ニ辰砂少シヲ加ヘ水ニテ用レハ内熱サメ汗  
出テ痘輕シ

若シ冷テ下利スル者ハ肉豆蔻散方見泄瀉門ニ宜シ  
小兒冷ニ中リ痢病トナル者ニハ

菅燒大 輕粉少 加ヘテ丸シ用ウヘシ  
要スルニ兒ノ病ハ大抵熱ナリ寶丹ニテ諸病平愈ス他ニ異ナル工夫ナシ

一云痘疹ニ寶丹ヲ用ヘシ

痘疹腎ニ入テ黑陷スル者ハ輕粉ヲ藜蘂ノ汁ニテ和シ用ウヘシ

小兒乳ヲ吐スニハ天花粉ヲ乳頭ニ塗テ吸ハシムヘシ

百祥丸疳氣疳痢ニヨシ大戟一味未シ丸シ用ユ是ナリ

三聚丸治前ニ同シ 草烏頭 生炒 黑炒 三製ニシ丸シ用ユ

小兒疳ニテ眼見ヘサレトモ血アリテ赤筋サス者ハ治スヘシ

龍膽 黃栢三製各等分末シ小麥ノ大サニ丸シ白湯ニテ歲ノ數ニ一粒増テ用ヘシ

小兒口中ニ瘡生スルニハ 天南星ノ末ヲ糊ニ調ヘテ足心ニ帖ルヘシ或ハ葶  
蘇子ヲ加ルモ佳シ 舌胎ニハ黃丹ヲ舌ニ傳クヘシ妙ナリ



第三章

傷寒門

背惡寒シテ頭痛シ項背強ク腰膝痛ミ漸々ニ發熱シテ汗ナク  
 脉浮緊ニシテ六七動モアルヲ傷寒ノ表熱トス香葛湯ニ宜シ  
 紫蘇中 升麻小 葛根中 陳皮大 香附子大 甘草少  
 右葱白ヲ入レ煎シ藥ヲ熱クシテ頻ニ飲セテ被ヲ厚ク衣テ  
 息ノハヅムホドニシテ汗ヲ出スヘシ  
 風ヲ惡ミ頭痛シ項背強ク腰膝痛ミ發熱シテ汗自ラ出ルハ脉  
 必ス浮緩ナリ是ヲ傷風ノ表證トス解肌湯ニ宜シ

桂枝小 芍藥大 香附子中 甘草少 右煎シテヨキホ

ドニシテ飲セテ好ホトニ被ヲキセ風ニ感セヌヤウニスヘシ

二日三日過テ表證猶殘リ風寒皮膚ニ在テ發熱シナカラ漸々  
 ト寒ク小便黃ニナルハ半表半裏ノ證ナリ又漸々熱裡ニ入テ  
 蒸々ト發熱シ小便黃ニシテ快カラザルハ是亦半表半裡ノ證  
 ナリ和解散宜シ 前胡大 香附子中 芍藥大 黃芩小 甘  
 草少 右ノ藥ヲ濃煎シ好キホトニシテ飲マスヘシ  
 四五日過テ邪氣已ニ漸ク裡ニ入テ惡寒ヤミ反テ惡熱シテ脇  
 ノ下ニ少ツ、汗出テ小便黃ニ大便結セハ裡熱トス柴湖湯ニ  
 宜シ 柴胡中 黃芩中 芍藥中 甘草少 右前ノ法ノ如ク  
 煎シ間ヲ置テ飲マスヘシ此藥ヲ二三日モ與ヘテ裡熱消力ネ



脉モ沈實ニシテ七八動モ鼓休作有テ妄語シ四五日モ大便通セスハ涼膈湯ニ宜シ 大黃大 枳實中 厚朴中 柴胡中 甘草少 右ノ藥ヲ濃煎シツメテ能クサマシニ服ホト飲マセテ身ヲ煖カニシテ二時三時ヲ經バ大便必ス通シテ裡熱消スルモノナリ

活套

傷寒ト云ハ風ヲ感冷テ病フ又ハ寐冷下冷シ冬ハ寒ニ冒レ其外五藏ヲ損セシ病也汗ヲ發シテ日ニ幾度モ起リ頭痛ミ食進マス足冷ヘ夜ハ眠ルコトナクサノミ身モ熱コトナク又時々ニ熱ク身苦ミ大小便固結シ洒々惡寒聲嗄苦シク七日ニ至レハ汗出ツト雖モ熱復解ケス不自知病ハ必ス傷寒ナリ藏腑ノ

強キ人風ニ中リ寒ニ冒サレ熱ニ中リ食ニ傷フレ或ハ舌強ハリ譫語シ人ヲ弁識セサルモ亦傷寒ナリ百日ノ内淫事及灸ヲ忌ム久ク疾メル人ニハ熱ノ藥ヨシ

百解散 風ヲ感テ大便秘結スル者ニ宜シ 香附子大 甘草少 葛根大 紫蘇中 陳皮中 升麻中 黃芩大 大黃中 右煎シ與フ

紫胡湯 一切裡熱ニ宜シ 柴胡大 半夏小 芍藥中 枳殼小 麥門冬小 黃芩大 大黃小 甘草少

右濃ク煎シ用ウ 汗アルニハ升麻ヲ加フ 吐逆セハ藿香白梅花ヲ加フ 熱氣アルニハ大黃柴胡ヲマス 三黃丸 頻々用ヘシ 別方見 大便秘セハ瀉心圓モヨロシ



柴胡大 黃芩大 枳實中 半夏小 芍藥小 大黃少  
右丸シテ用

香蘇散 方見和劑 加減シテ頻々用ヘシ

柴胡湯 往來寒熱シ胸脇痛ミ不食シ咽乾腹鳴脇痛小便澀痛  
咳シ申酉ノ時分ニ起リ吐逆スルハ半表半裡ノ證ナリ 柴

胡大 半夏小 黃芩中 人參大 甘草少 芍藥中 茯苓中 右煎シ用ユ

大柴胡湯 半表半裡ノ證ニシテ脉沈胸窒ガリ大便秘ヘ腹鞭  
ニヨシ 柴胡大 大黃中 芍藥大 黃芩中 半夏小 右

煎シ用ユ

小陷氣湯 大便下ラサルニ用テ必ス下ルヘシ 大黃大 厚

朴中 枳實小 黃芩中 芒硝中 甘草少 煎用  
黃芩湯 黃芩大 葛根中 芍藥小 甘草小 升麻大 右煎  
シ用ユ

勘 辨

浮 傷寒ハ汗ナシ惡寒脉浮緊頭痛項背強ク發熱ス羌活湯ニ  
宜シ 方見別錄下同

浮 傷風ハ汗アリ惡風脉浮緩力ナシ頭痛項強ク發熱ス羌活  
湯ニ柴胡黃芩ヲ加ヘ腹痛セハ肉桂乾薑ヲ加フ

中 脉長ニシテ力アルハ陽明胃ナリ頭痛眼胞痛ミ鼻乾不眠  
發熱汗ナシ鮮肌湯ニ宜シ 方見前

中 脉弦ニシテ數ハ少陽膽ナリ胸脇痛耳聾ス或ハ往來寒熱



シテ嘔ス小柴胡湯ニ宜シ方見前

夫傷寒ト云ハ陽明ト小陽ト合シテ病ムナリ其脉弦ニシテ長柴胡湯ニ葛根芍薬ヲ加ヘ與ヘシ

沈 脉沈數ニシテ力アルハ胃ノ腑ニ入ルナリ陽證ノ傷寒ト

云フ熱裡ニ入テ惡寒頭痛悉ク除キ反テ惡熱シ衣ヲ尋ネ手

ヲアゲ足ヲ抛テ譫語シ發狂シ口燥キ咽乾キ五六日大便通

セスハ大柴胡湯方見活套中 三承氣湯ニ宜シ

大黃大 芒硝中 石膏中 枳實中 甘草少

右濃ク煎シ用ユ

沈 脉沈遲ニシテ力ナシ陰證ノ傷寒ト云フ外證ハ熱ナク渴

セス反テ風寒ヲ惡ム面痛テ刀ニテ削ルカ如ク腹滿泄利尿

スム理中湯カ四逆湯ニ宜シ

理中湯 人參大 白朮大 茯苓中 乾薑小 甘草少

四逆湯 附子大 乾薑大 人參小 肉桂少 甘草少 右並

ニ煎シ用ウ

白散 傷寒ノ始發熱甚キ時用ヘシ又ハ餘熱解キカヌル時用

ヘシ方ハ別錄ニ見ユ

傷寒ノ者ハ脉ノ浮中沈表裡ニ拘ムヘカラス始ヨリ柴胡湯ナ

トニテ裡熱ヲ解ス如々解ヘシ時々寶丹ヲモ用ヘシ又ハ玉

丹ニテ四五日メニ下シテ良シ寶丹玉丹方並見別錄下同

傷風ノ者ハ羌活湯ニテ溫メテ汗ヲ出スヘシ汗出テモ熱尙ホ

解キカネハ柴胡升麻芍薬黃芩ナトヲ加ヘテ解クヘシ



傷寒ニ標證トテ色々様々ノ病アリ其レニ少モ拘ムヘカラス  
大方ハ熱ニ犯サレテ蟲カ指シ出タリト知ルヘシ本病ノ藥  
ニテ華ヲ用ヘシ

一本四逆湯下項云傷寒陽毒ニハ大柴胡湯ニ人中黃ヲ加ヘ又ハ辰砂ヲ加ヘ  
用ヘシ

傷寒陰毒ニハ四逆湯ニ附子乾薑ヲ加ヘ用ヘシ

傷寒陰陽ノ甚シキモノハ人中黃ヲ末トシ白湯ニテ用ユ或燒テ存性ニシ用  
ルモヨシ

傷寒陰陽熱毒ノ深キモノハ烏犀角ヲ末シ本病ノ藥ニ攪セ用ユヘシ辰砂モ  
ヨシ

又傷風病下項云傷寒ノ熱色々ニシテモ解セスハ羌活湯ニ梨ノ實ヲ大ニ加  
テ用ヘシ必解ス又傷風ニモ宜シ

又卒條云傷寒ノ諸證ハ大方ニ苦寒ノ劑ニテ宜シ

## 第四章

### 感冒門

風ヲ引タル感冒ハ清涕出テ頭痛ミ咳シ面赤ク聲ニゴリ咽痛

ム人參湯ニ宜シ 桔梗中 葛根大 陳皮大 紫蘇中 香

附子大 甘草少 右煎シ飲セテ少汗出テ二三日モ大便

通セスハ清心湯ニ宜シ 黃芩少 芍藥中 柴胡大 枳實

小 大黃中 甘草少 煎用

### 勘辨

感冒ト云ハ只輕キ傷寒ナリ皆人ノ風ヲ引テ咳氣ヲスルト云  
也治ハ羌活湯ニテ溫メテ汗ヲ出セハ熱氣解ルモノナリ末



證ハ傷寒ノ如ク加減ノ例ニテ治スヘシ  
白散ヲ用テヨシ一本有熱ノ解カヌル者ハ之字

第五章

瘧病門

瘧ト傷寒トハ紛ハシク皆見誤ル者ナリ傷寒ハ頭痛發熱シテ身痛ミ浙々惡寒脉多數クシテ朝解ルト云ヘトモ脉ノ動數ハ同キモノ也瘧ハ先浙々惡寒漸々ニ發熱シテ後頭痛ミ咽乾キ脉弦ニシテ動數アリ朝蚤ク脉ヲ診ハ動數皆退テ大概沈ムモノ也故ニ頭痛發熱シテ發病セル初ニハ瘧トモ傷寒トモ定ムヘカラス熱退テノ朝落チ就テ病ノ名ヲ定ムヘシ  
左ノ關脉弦ニシテツヨク實強ナルヲハ肝ノ風瘧トス柴胡ヲ

大將トスヘシ清肝湯ニ宜シ 柴胡大 前胡大 香附子小

葛根 芍藥 厚朴各中 甘草少 右煎シ用ユ

右ノ關脉弦ニシテツヨク實強ナルヲ脾ノ食瘧トス芍藥ヲ大將トスヘシ清脾湯ニ宜シ 芍藥大 葛根枳實香附子柴胡厚

朴各中 甘草少葛根以下兩目原本無今以一本補 煎用

汗ノ無キ者ハ汗ヲ出スヘシ陳皮葛根升麻香附子紫蘇ニ宜シ汗ノ多ク出ル者ハ汗ヲ止ムヘシ芍藥黃芩黃耆白朮ニ宜シ他ノ醫者ノ治シテ久ク不愈日夜汗出テ瘦内熱有テ咽乾ク者ハ神麩黃耆桂枝知母麥門冬白朮ニ宜シ汗止テ氣血漸々本復シ内熱解ケテ漸ニ肥咽ノ乾キモ止ヘシ

一本曰久ク截カヌル瘧ニハ梨實大木通小ヲ加煎服ス汗限ナク出テ截ルナリ



又フルイ氣ニモ宜シ

### 活套

瘧ノ病ニ様々アリ先風ト寒トヨリ起ル又食ヨリ出ルアリ又  
霍亂ヨリ起ルアリ物ノ崇ニテモ病ミ氣痞ハ食蟲積ニテモ病  
ム倍其證モ様々アリ日毎ニ起キハ截カヌル故ニ藥ヲキメテ  
用ヘシ一日間セハ截ヤスシ二日隔ツルハ截カヌル是ヲ名ツ  
ケテ風氣ト云風氣ニハ瀉藥ヲ用テ其後又清脾湯ナトニ色々  
ノ補藥ヲ加ヘ用ヨ風氣ハ二三七日モ藥ヲ長々用ヘシ

灸ハ九ノ椎十四十一ヨシ一本有章門

熱多キハ柴胡湯ヲ用ウ方ハ傷寒門ニアリ

汗多キハ麻黄羌活湯ヲ用ウヘシ 麻黄大 黄耆中 桂心中

芍藥中 白朮中 牡蠣中 小麥五十粒 羌活小 生薑小

甘草少 右煎シ用ウ是ハ冬用テヨシ

霍亂ヨリ起ラハ香薷散ヲ用ウ方ハ霍亂門ニアリ  
崇ナラハ呪符ヨシ

人參養胃湯 食瘧ニ宜シ 人參 陳皮 黄蘗 茯苓 麥蘗

縮紗 甘草 桂心 右煎用

清脾湯 二切ノ瘧ノ惣藥ナリ 青皮 厚朴 白朮 草菓

柴胡 茯苓 黄芩 大黃 甘草 防己 麥蘗 人參

陳皮 右煎用

七寶飲 截カヌル瘧ニ用 常山 厚朴 陳皮 青皮 檳榔

草菓 甘草 烏梅



右煎シ用附子乾薑ヲモ加テヨシ

勝金圓 一切ノ瘧ニヨシ 辰砂大 青皮小 常山大 烏梅

小 人參大 澤瀉小 阿魏小 胡榘大

右丸シテ常山ヲ煎シ用又清脾湯ニテモ用

拂瘧散 一切ノ瘧ニヨシ 蚯蚓霜 檳葉霜或生用 爐上煤少

硫黃小 右末ニシテ茶一服ハカリ起ル日ノ朝常山ニ水

二杯ヲ入レ一杯ニ煎シ湯ニテ飲下セ又牛膝根ヲ磨磨テ酒ニ

攪攪テ前ノ藥ヲ用ヒ後ニ酒ヲ多飲スヘシ

勘 辨

所詮瘧ハ大熱ノ病ナリ熱シタル故ニ蟲ガソウト心得ヘシ大

寒ノ藥ニ方見別錄常山ヲ加テ用ヨ

青龍丸 截藥 調體齒牙燒 阿魏 辰砂各等分

右三味ヲ○是大サニ丸シテ常山ノ入タル煎藥ニテ發日ノ  
卯刻ニ東ニ向テ五粒許ツ、飲ヘシ

截藥 靈天蓋生 硫黃各等分 爲末常山ヲモミ出シ其汁ニテ用

ウ

玉丹ニテ下シテ寶丹ヲ用ヒ或玉丹ヲ常山ノ自然汁ニテ用ル

モ佳

丹石丸 丹礬 硫黃各等分 二味ヲ末シ丸シテ丹ヲ衣トス三粒

ヲ水ニテ用ヨ大便必ス下ルナリ

三黃常山ノ煎汁ニテ華ヲ用ヘシ

灸八九椎章門或八十一十四椎モヨシ



一本靈黃散下項云截藥 常山一匁半 檳榔一匁 丁香五分 烏梅一箇 右  
四味ヲ酒一合半ニテ煎シツメ一合ニシテ青龍凡ヲ用ル如クニ用ヨ  
又三黃下項ニ云 繡毬葉ヲ陰乾シ末シテ茶一服許ヲ用ヨ妙ナリ  
又云 狼糞燒 硫黃各等分 二味ヲ末シ丸テ發ノ數ホト發日ノ卯ノ刻ニ白  
湯ニテ用ヨ終日食サスルコト惡シ、  
又云 風氣瘧ニハ太乙丸ノ末ヲ常山ノ自然汁ニテ用ヨ  
又云 稀莖草ヲ曝乾シ末シテ溫酒ニテ用必截ルナリ

## 第六章

### 痢病門

飲食ニ傷レ俄ニ腹中痛ミ赤ク澁滯リ無限シゲク行テスグ大  
便ハ出ズシテ右脉ニ力アリテ少シ動數モアルニハ先備急圓  
ヲ方見別錄三十粒カ五十粒カ茶ニテ飲セテ相續ケ白湯ヲ飲セ  
下皆並同

テ酒然ト快ク三度許瀉シテ度モ遠サカリ痛モ和キ腹中穩カ  
ナラハ養胃湯宜シ 陳皮中 芍藥大 枳殼小 黃連小

甘草少 右煎シ用ユ渴セハ麥門冬葛根香附子各中を加  
へ腹脹ノ氣アラハ厚朴香附子各中ヲ加へ裡急後重ノ氣ア  
ラハ檳榔枳殼ヲ加フ尿澁ハ茯苓木通尿赤キハ木通黃連芍  
藥ヲ加へ嘔吐ノ氣アラハ葛根陳皮ヲ加へ痢黃水ノ如クナ  
ラハ芍藥焙 白朮甘草ヲ加フ

右此分ノカケヒキニテ五日六日モ治テ病ノ勢モ和キ脉モ靜  
ナラハ建脾散ニ宜シ 黃蘗大 芍藥大 陳皮中 甘草少  
右末シ白湯ニテ用ユ丸テ用ルモ佳シ

右ノ丸散ニテ徐々治シテ其マ、止ラハヨシ若シ止テスグ大



便結シテ遠ハ寛腸丸ヲ方見別錄三十粒臨臥ニ飲セテ檳榔枳殼ノ

入タル煎藥ヲ食後ニ少ツ、用ヘシ  
若七情ニ傷レ中焦ニ氣滯テ脉サノミ力ナケレトモ腹少痛澁

不食シテ日夜ニ六七度許リ行カハ調中湯ニ宜シ  
陳皮中 人參小 白朮小 白芍藥小 枳朴少 甘草少

右煎シ用ユ  
右ノ分ニテ徐々服藥シテ漸々ニ驗氣アラハ百中湯ニ宜シ  
人參小 陳皮小 黃蘗中 芍藥焙中 甘草少 煎シ用

若夏秋ノ時節暑濕ニ中リ初ハ瀉シテ渴シ後ニハ白痢ナトニ  
變シ左ノ脉滑大ナラハ益脾湯ニ宜シ 柴胡中 茯苓大 葛

根中 黃連中 芍藥中 陳皮中 右煎シ用ウ

右ノ分ノ藥ニテ五日許治シテ建脾散方見前ナトチ飲スヘシ又  
ハ二聖圓ヲモ用ヘシ 黃連 黃蘗 二味等分末シテ丸スル  
ナリ

老人虚人小兒ナントノ久痢ニテタレ味噌ノ如ナル物ヲ下シ  
サノミ痛モナク不食シテ脉或ハ沈伏或ハ弦急ニシテ大便惡  
臭ク久キ汚泥小便所ノ臭スル物ハ必ス死ス

活套

今ノ痢ヲ患ルノ說ハ脾胃ノ怯弱折リフシ飲食ヲ多ク用ヒ藏  
府ニ溢レテ腸胃ノ間ニ留リ化シカネ心ノ血ヲ傷テ下ル也風  
寒暑濕ニ中リ熱ニ傷レ血ヲ下ス也先備急圓ヲ用テ酒然ト下  
テ赤痢ヲ洩瀉トナシテ止メヨ白痢ハ冷ナリ赤痢ハ大熱ナリ



早ク止ムヘカラス脉沈細ハ生浮滑ハ死ス

惡食ヲシテ腹中痛ミ下リ苦クハ瀉下ノ藥ヲ用テ後ニ茶カ湯  
カチ多ク飲セテ洩瀉ニスルコト口傳ナリ痛退ナリ養胃湯ニ

宜シ 陳皮 枳殼 黃連 甘草 葛根 黃芩 茯苓 檳榔  
白朮 右煎シ用ウ

健脾丸 黃蘗 茯苓 黃芩 檳榔 甘草 厚朴 人參 芍  
藥 柴胡 香附子 右丸シ用ウ

痢ノ色赤ク濁涕或タレ味噲ノ如ク或大豆ヲ煮タル汁ニ似タ  
ルト汚泥ノ水ノ匂シテ惡臭ハ必ス死ス

先サマシテ用テ良シ 方見別錄 下皆並同 口傳ナリ  
是ノ湯ヲ用レハ熱解テ痛退快カルヘシ 黃芩 黃連 大黃

陳皮 茯苓 白朮 葛根 香附子 柴胡 黃蘗 人參

桂心甘草 右煎用

右ノ藥ノ後ニ是ヲ用レハ血止ヘシ 當歸 芎藭 地黃 芍

藥 黃蘗 茯苓 甘草 地榆 莪朮 檳榔 桂心 右

煎シ用ユ

下痢ヲチト止ント欲セハ 訶子 罌粟殼 甘草 杏人 陳

皮 乾薑 桂心 莪朮 葛根 黃蘗 檳榔 楊梅皮

阿膠 艾葉 右是ヲ煎シテ與ヘ其後丸藥ヲ用ヘシ

痢ハ煎藥ニテハ止リ兼ル故丸藥ヨシ然レトモ煎藥ナラテハ

腹中ノ熱解コトナシ神仙カ安蟲丸 方並見別錄 ニ宜シ

杏巴圓 吾家ノ秘藥ナリ 杏人三個 巴豆一個 右胡桃ノ殼



ノ中へ巴豆ヲ入テ燒霜ニシ丸シテ前ノ煎湯ニテ五粒許ツ、  
用ウ妙ニ治ス朱一銖ヲ加ヘシ絶妙ナリ又甘草艾葉罌粟黃藥  
ノ煎湯ニテ用ヘシ

下痢ハ蟲ナリ安蟲丸ニ宜シ

增金散 痢如何シテモ止リカネ痛モ止スハ是ヲ用ヨ若是ニ  
テ驗ヲ得スハ死ト知ヘシ 桂心小 乾薑少 莪朮中 甘草

少 天南星大 黃藥中 葛根小 茯苓小 訶子小 肉  
桂小 右末シ茶一服許ツ、用テ洒然ト止ルヘシ

勘 辨

所詮赤痢ノ澁痛ハ大熱ナリ玉丹ニテ下シテ大寒ノ藥ニ肉桂  
乾薑ヲ加ヘテ其煎汁ニテ寶丹ヲ用ウヘシ痛ノ定ウチハ日ニ

一度ツ、玉丹ヲ少シツ、寶丹ニ加テ用ヨ三黃丸ナトモヨシ

巴豆ノ入タル下劑用ヘカラス怯弱ノ病人ニハアシ、太乙丸

モヨシ丸藥ヲ用ヘキナラハ杏巴圓散藥ハ增金散方並見前ニ宜シ

白龍丸 是ハ巴豆ノ入サル下劑ナリ 大黃大 牽牛中 由

跋小 紅花小 大戟大 右丸シ葛粉ヲ衣トス

小兒ノ痢病ニ澁痛ミ青キ膿ヲ下スコトアリ大熱ナリ三黃ニ

芒硝ヲ加ヘテ丸シ用ヨ大人ノ痢青キモ大熱ナリ中寒ノ藥  
ノ煎湯ニテ此丸藥ヲ用ヘシ

一本活套中卒條云痢ヲ留ル藥罌粟殼包橘花各一匁甘草黃栢各三匁赤痢ニ  
ハ楊梅皮罌粟殼艾葉ヲ煎シテ用フ  
又勘辨中白龍丸下項云赤白痢ニハ黃芩黃連芍藥木香枳殼檳榔甘草右七味  
ヲ煎シ用ユ若澁リ痛テ裏急スルハ當歸縮砂ヲ加ヘヨ



又云寒中ニ取ル鹿肉ヲ乾シ置キ煎テ用ヨ  
又云藜蘆一味生香黑三色ニ製シ丸或葉ヲ用ヒ筋ヲ去リ丸シ丹ヲ衣ト爲シ  
二三丸白湯ニテ用大人小兒共妙一粒藥ト云ハ天南星一芎巴豆二粒ヲ丸シ  
用ユ是也

### 第七章

#### 泄瀉門

俄ニサツト下ラハ調中湯ニ宜シ 茯苓大 木通中 芍  
藥大 陳皮中 甘草少 此類ヲ用ヘシ  
腎虛シ脾胃弱シテ朝トク一二度下リ或ハ夜ニ一度ツ、モ夜  
ヲキシ腹中調ラスハ養中湯ニ宜シ 白芍藥大焙 五味子 白  
朮各中 陳皮中 甘草少 人參小 右煎シ用  
常時ハサノミ不下ラシテ食餌ヲスレハ小腹痛ミヤカテ下ル

ニハ建中湯ニ宜シ 枳殼小炒 陳皮中 白朮中 青皮少 甘  
草小 之ヲ煎シ用テ久シク下利止ストモ訶子罌粟ノ類  
ヲ用ヘカラス

夏月暑熱ニ中リ煩渴シテ泄瀉シ小便澁リ少キハ清暑湯ニ宜  
シ 黃連中 厚朴小 葛根大 茯苓大 木通大 甘草少  
右煎シ用ユ

腹脹ノ氣有テ食餌トロケス其マ、下リ痰アラハ平胃散ヲ用  
ヨ 厚朴中 陳皮大 白朮中 甘草少 枳殼小 ヲ加フ  
此藥ニテ脹ハ治レトモ止リカネ食ハ能ク消スレトモ下ル  
意アラハ 陳皮中 甘草少 白芍藥中 黃蘗小 人參小  
此類ヲ丸藥ニシテ用ヘシ



活套

脾胃ヲ損シ寢ヒヘ下冷テ腹中ヲ損シ晝夜共ニ間斷ナク水瀉  
シ良モ不快ハ先藥ヲ用テ俄ニ止ラヌヤウニ徐々ト止ヘシ急  
ニ止レハ赤痢ニ成ナリ

肉豆蔻散 肉豆蔻 訶子 茯苓 甘草 人參 白朮 乾薑

桂心 葛根 辰砂 陳皮 木香 厚朴 右莪朮黃蘗ヲ

入レテ末シテ茶一服許ツ、水ニテ用ユ妙ニ止ルヘシ或ハ

阿膠罌粟殼ノ煎汁ニテ用ルモ能ク止ルナリ

瀉利何トシテモ止リカネ痛モ止スハ增金散ヲ方見痢門活套用ユ若

モ是ニテ驗氣ヲ得スハ死スルト知ヘシ

勘辨

所詮泄瀉ハ熱ト心得ヘシ其所以ハ先ツ泄瀉ニテ後ニ大方赤

白痢ニナル者ナリ三黃丸又ハ中寒ノ藥方見別錄下同ナトニテ赤白

痢ノ如ク輕々ト治スヘシ又ハ二聖圓太乙丸白龍丸ナトニテ

内熱ヲ解テヨシ

若シ脾胃ノ虛冷ナラハ肉豆蔻散增金散ナトヲ用ヒ或中熱藥

ヲ煎シ用ヘシ

脾胃ノ瀉トテ曉方ニ小腹シクシクト痛ミ二三度下ルコトア

リ大方ハ熱ナリ三黃ノ類ニ黃蘗肉桂乾薑ヲ加ヘテ用ヘシ或

ハ太乙丸ヨシ

霜腹トテ冬ニナリテ酒客ナトノ熱物ヲ食テ箸ヲモ放下セサ

ルニ下ルコトアリ是モ熱ナリ其故ハ水ヲ飲テ治ル者ナリ藥



ハ大乙丸三黄ノ類ヲ用ヘシ  
食物消セスシテ其マ、下ルコトアリ是モ熱ナリ必ス尻痛ミ  
下ル物アツシ寶丹ニ宜シ一云大乙丸モヨシ  
又散ニシテモ用ヘシ  
泄瀉ノ總藥ナリ 黄蘗大香黒  
色ニシテ 神麩大 乾薑小 甘草少  
右細末ニシテ米飲ニテ用ウ

### 第八章

#### 脚氣門

夫脚氣ノ發コト病初ヨリ即チ脚氣トナルコトアリ又他病ヲ患  
内ニ隱然ト因テ脚氣トナルコトアリ其證多端アリ精心ニ診セ  
ヨ膝ヨリ脚ニ至テ不人ミテ或ハ蟲ノ蠢爾ト行カ如シ或ハ足

ノ爪端ヨリ臍膝ニ至テ水ヲ洒ルヤウニ冷然モアリ脚膝屈弱  
シテ不歩腫テ冷ルモアリ脚膝煩熱痛ミ拘攣伸ラレヌモアリ  
食餌ノ臭ヲ厭ヒ不食スルモアリ臍ノヘンチ鍼ニテ刺カ如ク  
ニ覺ハ胸ニ衝上ルモアリ足膝ヲ動カシ役ストキ筋拘急伸ラ  
レヌモアリ胸悸シテ寢ヘ燈ヲ點チ惡モアリ身熱シ頭痛スル  
モアリ腹痛ミ下ルモアリ如此色々ノ病證アル故視識ニクシ  
若視識スシテ療治スルコト遅ケレハ脚氣ノ病腹ニ入り胸脇腫  
滿上氣スレハ治シ難シ大概死ス驅風通氣湯ト名ヲ書ヘシ  
洪腫テ重ニハ 羌活大 牛膝中 木瓜中 枳實大 甚痛ム  
ニハ 防己中 木通大 陳皮中 枳殼中 香附子中 紫蘇葉  
中 筋甚拘攣ニハ 薏苡人大 木瓜中 地黃中 肉桂少



胸痞へテ不食スルニハ 香附子中 陳皮留白 厚朴中 檳榔中  
 煩渴頭痛セハ 麥門冬大 葛根大 香附子中 黃芩大 脚  
 膝屈テ伸スハ 肉桂中 地黄中 當歸小 紅花中 木瓜中  
 桃人中 若脉遲濡微弱ニシテ痛ム處冷ヘハ 肉桂 羌活  
 木瓜 當歸 紫蘇 脉浮弦洪數ニシテ痛ム處熱セハ  
 防己中 枳實中 大黃中 香附子小 前胡中 地黄中  
 芍藥中 黃芩小 牛膝中 總シテ脚氣ハ氣ノ道血ノ道  
 モ塞リ滯ル故ニ病發ナリ血多ク滯レハ腫ル、ナリ 紅花  
 地黄 肉桂 牛膝 當歸 桃人 香附子 太黃 氣多  
 ク塞ハ痛ムナリ 防己 陳皮 檳榔 青皮 枳殼 木通  
 香附子 凡如是療治スレハ脚氣ハ治レトモ藥力ニ困レ

甚瘦セ食事モス、マス胃氣運コト少シ故ニ本復スルコト遅  
 キハ補中養榮湯 當歸小 陳皮小 地黄中 檳榔各 生薑  
 少 右此類ノ藥ヲ小ク合テ時々飲セヨ參耆白朮ノ類ニ  
 テ頓ニ補フヘカラス衰ヘタル經絡ヲ俄ニ氣ヲ補フコトアレ  
 ハ反テ痛ミ生スルコトアリ  
 簡要ナルハ大小便ヲ可ホトニ輕々ト通利スレハ血氣ノ塞ハ  
 治スヘシ

活套

脚氣ト云ハ氣痞テ痛ムト云ヘトモ風寒血分ニ中リ水氣皮肉  
 ノ中ニ滯リテ冷氣筋ニ入り或ハ手足ヲ大ニ勞シテモ脚氣ト  
 成ルナリ 檳蘇散 氣ヲ降シ風ヲ去ルニヨシ 香附子大



陳皮中 蘇葉小 枝子小 檳榔 木瓜 生薑 柴胡  
枳殼 桔梗 人參各小 茯苓 藜各小 右煎用

脚氣腫テ浮血ナト出テ治セスハ五香連翹湯方見ヲ用テ養  
生スヘシ

血筋ヲ和柔ル藥ニハ四物湯方見ノ内へ檳榔、莪朮、木瓜、薏苡根  
ヲ加ヘ用ヘシ

病甚タ重キハ 羌活 獨活 木瓜 枳實 防己 木通 陳  
皮 紫蘇 右煎シ用ウ若シ不食セハ脾胃ヲ補フヘシ

頭痛ニハ 瞿麥 葛根 黃芩 石羔ヲ用ヘシ  
脚膝屈ミ伸スハ 肉桂 地黃 當歸 紅花 木瓜 紫蘇

黃芩 香附子 前胡 牛膝ヲ用ウヘシ拘攣モ治スヘシ

脚氣ト云ハ血ノ道塞リ氣痞ル故ト知ヘシ 紅花 肉桂 牛

膝 當歸 桃人 香附子 大黃 防己 陳皮 檳榔  
青皮 枳實 枳殼 木通 生薑 右煎用

大便秘ヘハ瀉心圓ヲ用方見下藥ヲ飲セ腫ヲ消ヘシ  
灸ハ痛處ヲ炳クヘシ一云痛處ヲアキニ灸ヲ大ニシテ十五壯ツ、灸

ヨ上ヨリ漸々ニ灸シテ下ルヘシ  
熱シ胸フクレ上氣スルヲハ灸スヘカラス

勘 辨

脚氣ハ血虛ノ故ニ氣熱盛ンニナリ痛ミ生スト心得ヘシ氣熱  
ヲ消シテ痛ヲ止ムヘシ辰砂散滑石散ニテ血ヲ冷シテ血ヲ生  
スヘシ

玉丹ニテ下シテ寶丹ヲ用テ内熱ヲ消タラハ氣血流通シテ痛



ハ治スルナリ

秘藥 大黃 人參 茶 百草霜 蛇骨 酸漿草 輕粉

以上七味末ニシテ茶ニテ飲ヘシ

山歸來藥梅瘡藥又可ナリ嗅藥含藥ヨシ方各見本病中

秘藥 靈天蓋中 鹿角大 螻蛄中 蝮蛇小 龜板中各 輕粉

少 以上末シテ茶カ酒ニテ用ヘシ

秘藥 黑頰魚ヲ病人ニ食スレハ大ニ發病是ヲ脚氣ト心得テ

黑鯛魚ノ腸ヲ去テ輕粉ヲ黑頰魚一頭ニ五兩入レ黑燒ニシ

末シテ少ツ、茶ニテ用ヘシ

一本云三黃丸人參輕粉鹽梅燒鹽燒以上末シテ山歸來ノ煎汁ニテ用ウ嗅藥吐藥含藥ヨシ

又云脚氣ノ秘藥色々ノ分別アリト云ヘトモ十人ノ脚氣九人マテ梅瘡ナリ

外ニ出ヌサキニ脚氣トナルナリ金銘丸ヲ用レハ治スル者多シ他ノ療治ハキカス

### 第九章

#### 淋病門

夫レ淋ニハ氣淋、石淋、血淋、膏淋、勞淋ノ五種ノ分別アリト云ヘトモ凡テ腎膀胱ノ疾ナリ腎ハ下焦ノ主ナリ大小便ノ守ヲ主ル今腎ノ守虚スルニ因テ小便頻數トナル膀胱ハ大小腸ヨリ走傳ル水汁ヲ盛テク袋ナリ其膀胱ニ邪熱聚リ氣滯レハ小便澁リテ出カヌル故ニ莖中マデ其熱氣サス故ニ痛甚シキトキハ莖中膿ナリ然ハ頻數ハ腎虚ノ所以ナリ澁リテ痛ムハ膀胱ノ熱スル所以ナリ補腎通氣湯ニヨシ 生芩大 黃栢 麥門



冬 黃芩 木通 瞿麥子各中 知母 枝子 芩苳各小 甘  
草少 右煎シ用 淋ニテ甚ク渴セハ氣分ヲサマセ 葛  
根 麥門冬 黃芩 知母 淋ニテ喉燥カハ血分ヲ治セ  
ヨ 生芩 枝子 芍藥

初ハ小便澁リ痛ミ頻シテ漸ニ小便黃ニ赤ク後ニハ血ヲ出ス  
是ハ三焦ノ熱ナリ清心鎖元湯宜シ 芫胡中 生芩大 芍藥

枝子各中 甘草少 右煎シ用

爰ニ大事ノ秘事アリ其性冷寒ニシテ眞陰ノ水ヲマス藥ヲ補  
腎ノ劑ト號ス其性冷寒ニシテ膀胱邪熱ヲ退ケ小便ヲ通利ス  
ル藥ヲ治淋ノ劑ト稱ス此兩劑ヲ和合シテ正陰ヲ補ヒ邪熱ヲ  
退ケ治スルナリ故ニサノミ痛モナク澁リモセス唯少々ト小

便頻數ニハ邪熱ヲ退ルノ劑ヲ多ク用レハ正陰漸々ニ虛シテ  
小便約カタク直ニ洩モノナリ故ニ藥ノ輕重ヲ分別シテ治ス  
ヘシ 微ニ澁リ痛ハ 黃芩 木通 甘草 芍藥

甚ク澁リ甚ク痛ムハ 猪苓 知母 澤瀉 木通 瞿麥 芩以  
以上如此療治シ漸々ニ痛ミ治セハ生芩ヲ止ヲ熟芩ヲ用ヒ赤  
芍藥ヲ止テ白芍藥ニナシ生黃蘗ヲ止テ酒ヲ塗テ焙タル蘗ヲ  
用ヨ肉桂ヲ少シ加ヘシ

寒冷ノ藥ニテ胃氣虛シ食進ミカネ面ノ色青ク瘦ハ 白朮

人參ヲ少ツ、藥中ニ加ヨ

小便約レス夜中ニ頻ハ龍骨益智ノ丸藥ヲ煎藥ノ間ニ時々飲  
セヨ



血淋ノ痛ハ退キ頻數モ遠サカリテ血止ラヌニハ櫻欄毛灰ヲ  
茶半服ホトツ、瞿麥車前ノ煎藥ニテ飲セヨ或ハ髮灰モヨシ

活套

淋病ト云ハ先心ノ臟ト腎ノ臟ノ疾ナリ小腸ノ府ト膀胱府ニ  
熱氣アレハ必淋病トナルナリ下文與本論同以重復今削之藥ニハ唯血ヲ補フ  
ヘシ脉數ニシテ熱セハ消ヘシ

通氣湯 地黄大 黃蘗中 瞿麥中 茯苓大 知母小  
枝子大 甘草小 車前子中 右煎シ用

血ヲ多ク出サハ四物湯ノ内へ木通ヲ加ヘテ頻々用ヨ止ルヘ  
シ

熱ニハ香蘇散ニ 黃芩 木通 枝子各大 大黃 芫胡各中

右煎用

ツヨク澁リ痛ムニハ 猪苓小 知母小 澤瀉中 木通大

瞿麥子大 車前子中 此等ヲ多ク煎シ用ヨ是ハ小便ノ  
澁リヲ自由ニ下ス藥ナリ一切ノ病ノ小便澁ルモノハ是ヲ

用ヘシ茯苓枝子ヲ加テヨシ腹裡痛ニハ桂心ヲ多ク加ヘシ  
脉微ニシテ心氣ノ方ナラハ降氣湯ヨシ方ハ心氣門ニアリ

羸瘦テ食少クナクハ脾胃門ニテ食ヲス、メヨ平胃散補脾湯  
ヨシ方ハ脾胃門ニアリ

アマリニ冷テ腎ノ約ナラスシテ小便頻數夜モ尿ヲ洩サハ  
龍骨 益智ノ丸藥ヨシ兔絲子圓ヨシ補腎スヘシ

胸熱スレハ竹筍大 燈心沈香各中 香附子大 茯苓小 是ヲ加フ



腎虛シテ足冷ハ 黃耆小 蓮肉大 兔絲子中 茯苓小 車  
 前小 葶中 芍藥小 杜仲小 甘草一 右煎シ用ウ  
 小便ニ白濁ナト通ルニヨシ  
 血ノ多ク下ルニハ八味圓ヨシ  
 右皆腎ノ疾ナレハ藥ノ名ヲハ清腎湯圓丸散心腎湯ナト、書  
 ヘシ

勘 辨

所詮淋病ハ三焦ノ氣血ノ實熱ナルカ故ニ莖中マテ熱氣サシ  
 テ爛尿澁痛ムナリ心肺熱スレハ渴ス腎熱スレハ渴セズト云  
 トモ只三焦ノ熱ト心得テ苦寒甘寒ノ藥ヲ見分テ用ヨ只寶丹  
 チ頻々用テ内熱ヲ消ヘシ又三黃丸太乙丸ヨシ尾草ニ作ル寶丹ヲ鼠  
尾草ノ煎汁ニテ用

鼠尾草能小便ヲ通ス  
ルモノナリ 下同

藥方 黃芩 黃連 大黃各等分 紅花 括蕒根各大 蓖麻子一包ニ  
 右湯丸散何レモヨシ一作若丸散ニ爲サバ鼠  
尾草ノ煎汁ニテ用ベシ  
 又方 三黃ニ 芒硝 黃蘗 肉桂 石羔 ヲ加テ用ウ  
 血淋ヲ治ス 紅花生大 木通 ヲ加テ煎シ用ウ  
 又方 車前燒大 鹿茸小 ヲ加テ末シ酒ニテ用  
 又方 ヘツクサツルニ木通ヲ加テ煎用妙ナリ  
 又方 三黃 紅花各等分 末ニシテ湯ヲ幾度モ沸シ冷シ其湯ニ  
 テ用 ○又方 虛木ノ實ヲ末シテ酒ニテ用ウ  
一本活套卒條云酒ニ酔テ房事スルコト水茶ナトヲ多飲コト思フ結コト莖  
ニイタクアタコト皆々毒ナリ



第十章

咳嗽門

俄ニ風ヲ感寒ニ冒レ強ク咳セハ感冒門ニ屬シテ發散ヲ專ニシ肺中ノ邪氣ヲ退ケ燥熱ヲ潤シ解則ハ治ス痰涎ヲ去ルヘシ發散スル藥ニハ升麻、葛根、陳皮、香附子、紫蘇

肺中ノ邪ヲ退ルニハ桑白皮、黃芩、前胡

燥ヲ潤スニハ麥門冬、括蕒、杏仁

久咳ノ治セズシテ聲喝胸苦シク痰涎多粘ハ肺ノ元氣ヲ補フ

ヘシ上氣ヲ降氣ヲ流通シ表虛ノ人ハ腠裡ヲ補ヒ汗出ハ汗ヲ

止ムヘシ

肺ノ元氣ヲ補フニハ麥門冬大

桔梗中

欵冬中

人參小

甘草少

上氣ヲ降シ胸ノ苦キヲ調フルニハ 枳殼中炒 香附子大 陳

皮中

表虛シテ自汗盜汗セハ白芍藥中 黃耆小 肉桂小

氣滯リ流通セズハ 陳皮中 青皮小 生薑小

痰多ク粘ラハ 薑製半夏小 前胡中

聲喝テ一向ニ出スハ陳皮大木通大竹葉中紫蘇小甘草少

壯實ナルノ人俄ニ強ク咳スルニハ 枳殼 香附子 黃芩

卮子 桑白皮 半夏 柴胡 南星ノ類ヲ五三日ヒイテ

七八日十日許ハ用ヨ此類ヲアマリニ久ク用レハ虛損ノ病

者トナルナシ



諸病ノ咳出來ルコトアリ其本病ヲ治スル藥ノ中へ實病ナラハ桑白皮黃芩前胡ヲ加ヘシ虛證ナラハ桔梗欵冬花杏子ヲ加ヘシ俱ニ生薑二三片ヲ入ヘシ  
持病ニ咳アル人養生ニ灸ヲ請バ肺俞ヨシ背三椎ノ側へ一寸五分ツ、ノケテ點チスヘシ

活套

暴ニ感風冒寒ツヨク咳氣ヲナスハ肺ノ臟へ風ヲ感ガ故ナリ藥ハ肺ノ熱ヲ清シ痰飲ヲサルヘシ發散スヘシ 紫蘇大 香附子大 陳皮小 升麻大 葛根中 是ヲ煎シ用  
肺ノ熱氣ヲ清ニハ 梔子大 黃芩大 瞿麥大 煎用燥ヲ潤ニハ 瞿麥大 杏仁中 括蕪根大 煎シ用ウ

胸苦クハ痰ヲ去ルヘシ 瞿麥大 桔梗中 欵冬花小 人參

小 甘草少 枳殼大 香附子中 陳皮小 煎シ用

汗出ハ 白芍藥小黃耆小 肉桂小 用 又氣ノ方ナラハ

陳皮中 青皮大 生薑中 半夏大 前胡中 杏仁小

又ハ香蘇散ニ色々加減シテ用方見和劑局方又降氣湯モ用ヨ

陳皮大 香附子中 黃芩中 梔子中 桑根白皮大 前

胡中 柴胡中 右煎五三日許用ヨ是ハ氣ヲ降ス藥ナリ

久ク用レハ虛損ノ疾トナルコトアリ枳殼香附子青皮枳實ナトハ胸ヲ豁ル藥ナリ黃芩桑白皮梔子前胡ハ肺ヲ瀉スル藥ナリ升麻麻黃尤用ヨ痰咽ニカラマリ血マシリ痰多ク出ハ後ニ勞瘵トナルナリ半夏柴胡天南星ナトヲ用ヨ



本病ヲ治スル藥ノ中へ桔梗欵冬花杏人桑白皮黃芩前胡ヲ加  
テ專用ヘシ

灰穴ハ胸ニテハ肺ノ藏ノアタリ背ハ三ノ椎ヲ灸スヘシ

### 勘 辨

咳嗽新キハ風寒冷病ナリ舊キハ燥熱ナリ俱ニ蟲ヲ兼ル新病  
ニハ羌活湯或ハ中熱ノ藥ニテ溫メテ汗ヲ出スヘシ華ヲ用ヒ  
ヨ舊病ニハ中寒ノ藥ニ莪朮香ナトノ類ノ虫藥ヲ加フヘシ華  
ヲ用咳嗽ハ新舊トモニ蟲カソウモノト心得テ華ヲ用ヘシ  
虛冷ノ婦人咳スルコト久フシテ赤帶ヲ病ムコトアリ溫藥ニ  
肉豆訶子ヲ加ヘ用ヒテ即チ咳治ス此藥ヲ久シク用テ赤帶數  
日ニシテ治スルコトアリ

秘藥 雄黃二分 丁子一朱 沈香一朱 膽礬一朱 胡椒少

右糊ニ押シ合セ平メテ香ニ焚キ口ヨリ烟ヲ吸ヒ前後醋一  
口ヲ飲ムヘシ

酒ヲ飲ムト咳シテ年久シク治セヌ人アリ華ヲ用ヨ即治ス  
咳ヲ治スル方 硫黃陳皮ヲ粉ニシテ丸シ用ウ

一本云灸ハ先ツ腫中ヲヤ  
キ後ニ神道ヲヤクヘシ

## 第十一章

### 水腫門

水腫初ハ目ノ下ヨリ少シ腫テ漸々ニ手足ハ腫レ後ハ腹脇ニ  
及フ必ス外腎モ腫ルモノナリ脉實弦ニシテ飲食形ノ如ク進  
マスハ禹功湯ニ宜シ 猪苓大 澤瀉中 茯苓大 枳實中



厚朴小 此類ノ藥ニテ小便通シ手足外腎ノ腫モ消ヘハ  
 人參益脾湯ヲ用ウヘシ 人參 白茯苓 白朮 陳皮  
 檳榔 此類ヲ用ヒテ脾胃ヲ補フヘシ通藥マテヲ用レハ中  
 焦必ス虚シテ一旦腫氣ハ消トモ一兩日過テ一倍腫氣サス  
 者ナリ又補藥マテ用レハ中焦ニ氣ツカヘ食中焦ニ其マ、  
 滯テ中下ノ二焦流通ノ氣ナクシテ脹滿ノ氣出來スルナリ  
 故ニ通藥補藥ヲ見量ヒ用ヘキコト簡要也  
 脉沈細ニシテ身冷ヘテ腫氣アルハ水裡ニ入ルト知ヘシ退腫  
 湯ヲ用ウヘジ 知母 枳實 檳榔 厚朴 此類ヲ用ウヘシ  
 腫氣多ク上ニアラハ桑白皮 茯苓 大腹皮 陳皮  
 腫氣多ク下ニアラハ知母 猪苓 茯苓 木通

腫氣腹脇ニ多キハ 厚朴 青皮 枳殼 檳榔 陳皮  
 右カヤウノ加減ニテ水腫ヲ治シ二三日ニ一日ツ、補中  
 ノ藥ヲ闕ヘカラス 人參 白朮 乾薑 茯苓 ノ類是ナリ  
 初メ足ヨリ腫レ膝ニアカリ陰莖腫ルハ腎虚スルニ因テ水ヲ  
 攝約セス亂テ下焦腫ルルナリ此時ハ腎ヲ補ヒ水ヲ流通シ中  
 焦ヲモ補フヘシ 黃蘗 地黃 茯苓 牛膝 木通 防己  
 後ニハ面ト手ノ甲腫レ胸痞吸々苦喘スルハ下焦ノ水氣上テ  
 肺氣ヲ犯ス所以ナリ其時ハ肺氣ヲ順シ上焦ノ濕氣ヲ去ルヘ  
 シ香附子、枳實、紫蘇ノ類ナリ  
 水腫重ク足ノ跗一段ハレ臍突出シテ高ク脊中平ミ唇黑ミ缺  
 盆腫レアガリ強ク喘シ堪ヘ難ク息脉沈細ニシテ應カヌルハ



必死ス

水腫ニハ淫事鹽味、飲食生冷ノ物ヲ忌ムナリ治テ後百日モ慎ミ忌ムヘシ不養生ニテ再發セハ死セズト云フコトナシ

活套

水腫ニ種々ノ因アリ然レトモ唯タ腎水ノ致ス所ナリ水脾ノ土ト戰テ下焦ヘ下リ兼テ居ルヘキ地ナクテ皮肉ヘ出テ疣然ト腫ルルナリ脾胃ヲ補フヘシ小便ヲ通スヘシ腫ヲハ汗ニテ取ルヘシ房事ヲ忌ム脉浮大ハ吉沈細ハ凶

五皮湯 一切ノ水腫ニヨシ 五加皮 地骨皮 大腹皮 茯苓

皮 陳皮 桑白皮 生薑皮各等分

右煎シ用ユ小便頻通シテ腫ハ消スヘシ

商陸散大便ヲ下スニヨシ 檳榔 木通 大腹皮 商陸

澤瀉 赤小豆炒 羌活 椒目 茯苓

右煎シ與ヘヨ或ハ四物湯ヲ與ヘヨ方見三黃丸モ良シ別錄

通氣湯 水腫始マリニ用ウ茯苓 桑白皮 枳殼 通草 甘

草 麥門冬 葛根 陳皮 桔梗 澤瀉 猪苓 赤小豆

車前子 右煎シ用ユ

大便秘セハ商陸骨地皮若澁滯セハ大白散活石茯苓赤小豆是也

蟲ニハ麥門冬、生薑、木通、椒目、濕ニハ白朮、陳皮或ハ神仙散

ヨシ濕本作腫今從一本

加味腎氣圓 腎虛シタルニ良シ 附子大 茯苓 澤瀉 山

茱萸 枝子 車前子 牡丹皮 肉桂 牛膝地黃各等分



右丸シテ飯ノ湯ニテ用ユ

如意圓 水氣上衝シテ吸々不勝息ハ是ヲ用ヒ試ニ下スヘシ

枳殼 檳榔 陳皮 莪朮 三稜 乾薑 黃連 巴豆粒七

右丸シ十粒ツ、茶或ハ生薑ノ煎湯ニテ用

脾胃ヲ補フヘシ平胃散補脾湯ニ宜シ

足ヨリ腫レテ上ヘ及ヘハ惡シ、面ヨリ腫テ下ルハ治スルナリ

一云婦人ハ水腫ニ胃氣ツヨク心モ正シクハ下劑ヲ五日三日ニ是ニ反ス

一度ツ、用テ周身ニ銀鍼ヲスキマモナク刺シ水ヲ取り其間

々ニ補藥ヲ與フレハ治スルナリ

勘 辨

所詮水腫ハ實熱ノ病ナリ其故ハ下焦實熱スルニ因テ閑テ水

谷ヲ二陰ヘ通下セズ故ニ水皮肉ノ間ニ溢流擁滯テ面目四肢

腫ルナリ脾胃ノ虛冷ナト云テ人參白朮ナトヲ用テ脾胃ヲ補

ハハ愈々不食トナリ腫氣サシ二便通セスシテ病重クナルヘ

シ只備急圓三黃丸並方見別錄丹石丸方見瘧疾ナトヲ毎日用ヒ大便ヲ下

シテ内熱ヲサマセハ腫氣モ消ヘ食モススム者ナリ前藥ハ大

寒ノ藥ニ宜シ一有熱サメ腫ヒキ好ク食シテ愈之句

玉丹ニテ下シテ寶丹ヲ用ルコト肝要ナリ苟ニモ補藥ヲ用ウ

ヘカラス一云或ハ大乙丸又ハ寶丹ヲ鼠尾草ノ煎湯ニテ用ルコシ

産後産前ニ腫氣サスコトアリ是ハ血道ノ冷ナリ煎藥ハ芎歸

湯ニ附子ヲ加ヘテヨシ或ハ滑石散辰砂散モ良シ

諸病久シクナレハ必ず腫氣サス皆熱ナリ寶丹玉丹三黃丸ノ



類ヲ辨別シテ用ウヘシ脾胃ノ虚冷ナト云テ必ず補フヘカラス  
一云諸病久クナレハ先不食シテ後必ス腫氣サスモノナリ不食モ腫氣モ皆熱ナリ寶丹ヲ用ウヘシ内熱サムレハ食進腫消

白龍丸良キ下シナリ方ハ痢疾門ニアリ

風腫トテ俄ニ水腫ノ如ク面目周身腫ルコトアリ是ハ血道ニ

風ヲ感タル故ナリ温テヨシ羌活湯若クハ芎歸湯ヲ用ウヘ

シ通身温リテ汗出テ腫消スル者ナリ

臍ニ貼テ小便ヲ通スル藥 白礬更燒石膏中 胡椒少 右三

味ヲ末シテ鹽少 加ヘ糊ニ合セテ臍ニ貼テ小便必ス通ス

小便ヲ通スル藥 白礬大 胡椒小 温石大 右三味末シテ

丸シ温石ヲ衣トシ生胡麻ヲ磨テ其汁ニテ用ウ  
又方 鼠屎ヲ末ニシ玉丹ニ加ヘテ海羅ヲトキ其汁ニテ用

病末證ノ浮腫ハ皆實熱ナリ玉丹ニテ下シテ寶丹ヲ用ウ浮腫

ヲ消スル方 鼠六寸アル者一ツニ巴豆一匁ヲ入レ黑燒ニシ

テ少ツ、茶ニテ用ウヘシ

水腫ノ灸ハ 臍ノ正中正中中ヲ十廿壯灸ス灸ノ痕ヨリ水出ツル也

小便ヲ通スル方 豌豆豆ニ葱白ヲ搗合セ餅ノ如クニシテ温メ

テ臍ニアツル切々温テ取りカヘヨ又葱白ヲ温メテ陰莖ノ口

ニアツヘシ

一本云又方 枝子滑石冬葵子三味ヲ末ニシ田螺ヲ生ニテ搗合セ臍ニ帖ルヘシ

又方 瞿麥子藿香人參知母石羔各末トシ鼠尾草ノ煎汁ニテ用ユ

又云脾胃虚シテ腫或ハ瀉ヲカヌル者ハ尤モ補フヘシ温ムヘシ其無色々アリ此ニ略ス



第十二章

脹滿門

夫人ノ脹滿スル所以ハ胃虚シテ食ヲ消シカネ脾虚スルニ因テ飲食ノ精氣ヲ上下ニ分散流通セズ中焦ニ畜チク故ニ脹滿トナルナリ

胸腹ノ皮強クヒツハリ按ハ大鼓ノ皮ヲ按ガ如ク撓ス底ニハ何モナク空虚ナルハ是ヲ脹ト云或ハ少シツ、大便下ルナリ虚證トス是ヲハ煎藥ニテ輕々汗ヲ出シ小便ヲ通ズベシ

補中快氣湯 香附子大 陳皮大 芍藥小 茯苓中 白朮中  
右煎シ用ユ又其間ニ補藥ヲ丸シテ與フヘシ

寬中丸 白朮大 人參中 檳榔小 木香小 厚朴少

如此煎藥丸藥ヲ油斷ナク用テ且ツ禁忌ヲ慎マセヨ

胸腹ノ皮ハサノミ脹ネトモ腹脇大ニシテ按テミレハ石ノ如ニシテ底堅ク按ハ痛ミ大便結シガチニシテ小便黃ナル是ヲ滿ト云フ實證ナリ是ヲハ煎藥ニテ中焦ノ滿氣ヲ寬クヘシ安胃湯 厚朴中 枳實中 陳皮大 黃芩中 香附子中 檳榔中 黃連中

右ノ分ヲ常ニ用テモ大便秘セハ五六日ニ一度ツ、寬腸丸方見チ五十粒ホトツ、與フヘシ如此療シ少シ滿實ノ意クツロギ快ト云ハ腹補藥ヲ時々飲セヨ 人參中 白朮大

青皮中 檳榔中 白芍藥中 煎ニモ丸ニモシテ用ユ  
脹滿ニ限リテ病ヲ治スル藥ヲ偏ニ用ウヘカラス中焦ノ正氣



虚スルニ因テ脹トフクレ満トミツルナリ故ニ補藥マテニテ  
モ脹満消退セス満實ヲ寛ク爾藥ニテモ脹満消セサルハ中焦  
ノ虚本復セサル故ナリ故ニ五六日ハ病ヲセメ二三日ハ正氣  
ヲ補ヒ驗氣チイソグベカラス脹満ニ限リテ病者胸腹痞テ苦  
キ故ニ少シ通瀉セハ可カラント心得醫者モ病者ニセツツカ  
レテ通瀉セハ可カラント心得通ズル藥ヲ飲マセテ通スル當  
座ハ少シ寛ゲト云ヘトモ一兩日過レハ前ヨリ一倍モ脹満ス  
ルナリ故ニ驗氣チイソガズ表ニアル脹ヲバソロ〜汗シ少  
便ヲ利シテ病ヲ寛ケ其間ニ補藥ヲ用ヒヨ裡ニアル満ヲハ輕  
々腸胃ヲ寛ケ復其間ニ補藥ヲ用ヘシ  
小便澁リ小腹脹ルハ茯苓ヲ專トス木通ヲモ加ヘヨ小便澁ヲ

其マ、置カハ面目手足ニ腫氣サスモノナリ

寒脹ナヲハ木香 厚朴 丁子 縮砂 檳榔 青皮 肉桂

熱脹ナヲハ枝子 黃連 香附子 芍藥 枳實 枳殼 大黃

脹満禁物 魚鳥一切ノ食肉、生冷ノ消シ難キ硬物萬ノ甘キ物  
ヲ忌ム甘草ヲダニモ藥中ヘ入レヌナリ是レ中無テ脹満セシ  
ムル故ナリ

灸ニハ 九俞肝ノ穴ヲ五十壯許ツ、十一脾ノ穴ヲ百壯

三焦ノ穴ヲ百壯許ツ、炳ヘシ

脉ハ浮洪ナルハ治シ易シ虚細ナルハ治シ難シ

丑未ノ年ハ太陰濕土ノ司天ナリ若シ濕土大過ニシテ同類相  
感シテ中焦ヲ干脾胃ニ濕邪甚フシテ脹満ノ病世上ニ流行セ



ハ除濕湯 茯苓中 厚朴中 白朮小 黃連中 陳皮中 青  
皮中 香附子中 此類ニテ濕邪ヲ退ケ尙ホ未退カズバ  
大黃枳殼ヲ加ヘテ一兩日モ用ヒ脹氣寛ガズバ白朮黃連茯  
苓陳皮ノ類ニテ除々ト治スヘシ脹滿禁忌ハ心ヲ勞スルコ  
ト、氣ヲ苦ムルコト、吹物ヲ吹クコト、謠ヲ誦コト、聲ヲ用コト、  
淫事等ヲ專ラ忌ムヘシ

活套

脹滿ハ脾胃怯弱人病フテ後未タ藏府調ハサル時ニ風ヲ感キ  
日ニ干レ或ハ氣ヲ盡シ惡キ物ヲ食シ寢冷下冷テ身腫脹モノ  
ナリ大便下ラズ又婦人血ノ道妄行、蟲積痞テモ脹滿トナルナ  
リ胃氣傷テ食ヲ消シカネ中焦ニ蓄置脹也

先ツ此藥ヲ用ヒヨ汗出テ小便下ルヘシ 香附子 陳皮 芎  
藭

茯苓 白朮 人參 檳榔 厚朴 右煎シテモ丸シテモ  
用ヒヨ或ハ黃連枳殼ヲ加ヘ用ユヘシ

不食セハ脾胃門ニ就テ脾胃ヲ調フヘシ  
卒爾ニ下スハ惡シ、下リテ腫ハ消ケトモ又一倍腫脹ナリ  
小便澁瀝ハ 茯苓 木通 黃連 地黃 當歸 知母

陳皮 甘草ナトヲ用ヒ又枝子ヲモ用ウヘシ

大便ヲ緩々ト下シ熱ヲハ消シ食ヲ進ムレハ腫レ消スヘシ  
寬中湯 枳殼 茯苓 半夏 柴胡 芍藥 麥門冬 檳榔  
前胡 陳皮 甘草 大黃 黃芩 右煎シ用ウ



消脹丸 柴胡 枳殼 檳榔 大黃 陳皮 縮砂

白朮 香附子大 莪朮 右各等分ニシテ丸シ用ユ

又方 牽牛子大 大黃中 檳榔小 羌活小 青皮中 茴香

當歸 木香 芎藭 乾薑各 丸シテ灯心ヲ煎シ用

又方 乾薑 白朮 青皮 陳皮 人參 丁香 大草菓附子少

厚朴 甘草 藿香 半夏 枳殼 木香

右煎シ用ユ

胸喘セハ 咳嗽門ニテ補フヘシ 脾胃門ニテ胃氣ヲ調フヘシ

淋病門ニテ小便ヲ下スヘシ瀉下ノ方ニテ大便ヲ下スヘシ

勘 辨

脹滿ハ大概實熱ノ病ナリ水腫ノ重キ病ト知ルヘシ玉丹ニテ下シ寶丹ヲ用ヒテ内熱ヲサマセバ自然ニ治スルコトモ有ルヘシ又ハ蟲ナリ華ヲ用ヒヨ脾胃ノ虛ト云テ補藥ヲ用ウヘカラズ脾胃ヲ溫補セバ中焦愈實滿シテ不食シ胸苦シクナルベシ大寒ノ藥ニ枳實厚朴ヲ加フヘシ煎汁ニテ三黃丸太乙丸ヲ用ウヘシ如此ノ熱ヲ伏熱ト云ンカ寶丹妙ニ解スナリ蟲積ニテ脹滿セハ蟲下シヨシ方ハ別錄ニアリ暴ニ腹ノ脹ル、ハ冷モア蟲ナリ大熱ノ藥ニ華ヲ加ヒヨ又大熱ノモノアリ大寒ノ藥三黃丸太乙寶丹ヲ用ヒ玉丹ニテ下スヘシ産後特ニ腹腫ルハ冷ナリ蟲ナリ中熱ノ藥又ハ芎歸湯ヨシ



一云鼠尾草ヲ煎シ  
太乙丸ヲ用ウヘシ

第十三章

嘔吐膈噎飜胃門

夫レ三焦ト云フハ水穀ノ道路ナリ故ニ上焦ハ水穀ヲ受納ル  
役ナリ中焦ハ上焦ヨリ納レタル水穀ヲ蕩シ化テ其精華ナル  
物ヲ血氣トシテ五藏六腑ニ分散シ一身ヲ潤養モノ也其糠糟  
ト水汁トヲ大小腸ヘ傳ヘ送ルナリ大小腸ノハテニ糟糠ヲ  
ハ肛門ヘ傳ヘ水汁ヲハ膀胱ヘ送り傳フルナリ此糟ト汁トヲ  
分別シテ大便小便ニ送ル處ヲ下焦トハ云フナリ  
憂愁思慮ニ因テ心ヲ苦シムル化ニ氣胸中ニ滯ホリ順流セス  
シテ上焦ニ痞テアリ然ルニ胃腑ニテ化タル水容ノ華ナル潤

チ一身ノ表裡ニ流通シ養フ之ヲ津液ト云其津液モ獨リハ得  
行ラス三焦ヨリ出テ全身ヲ流行シ元氣散スルト伴テ行ルナ  
リ故ニ氣上焦ニ滯リ胸膈ニ痞ルトキハ夫津液上焦ニ痞テ痰  
ト爲ナリ

然ラハ氣ト痰ト胸ノ上咽ノ下ニ痞ル時ハ食餌入りカネテ吐  
逆ス是ヲ噎ト云噎トハムスルコトナリ

彼氣ト痰ト胸ノ下膈ノ上ニ痞ルトキハ食餌ヲシ終テ暫シテ  
吐逆スルナリ是ヲ膈ノ病ト云

彼痰ト氣ト胸膈ニ痞ネトモ胃氣無力ニシテ内テ置タル食物  
一日半日スレトモ鎔化ズ其マ、有テ大小腸ヘ送クリ出スコ  
トモナシ故ニ朝ニ食シテ暮ニ吐シ暮ニ食シテ朝ニ吐ス是レ



チ反胃ト云ナリ必ス大便燥鞭ナリ故ニ噎病ト膈病トハ胸膈ノ邪火ヲ退テ上焦ノ氣ヲ流通シ痰飲ヲ除クヘシ 快膈湯

檳榔中 枳實中 黃芩中 柴胡中 白朮中 陳皮 大半夏小

生薑 煎用

反胃ヲハ胃氣ヲ補ヒ血ノ燥タルヲ潤シ中焦ノ火ノ消タルヲ温メテ治スヘシ益元補中湯 人參 朮 肉桂 各中 當歸 麥

門冬 各小 生薑 右煎シ用ユ

噎膈ハ邪火アルニヨリ胸膈ニ炎上ノ氣有テ食ヲ衝逆ナリ反胃ハ正火ナキニ因テ食餌納レトモ鎔化セス送り出サス遂ニ色モ變ラスシテ食物ヲ吐逆スルナリ故ニ吐逆ニハ氣ヲ補ヒ邪火ヲ助クル芳香ノ藥又其類ノ美食ヲ忌ム反胃ニハ温藥ヲ

用レトモ肉桂當歸等ノ血液ヲ補フ物ヲ用ルナリ無理ニ邪火ヲ助クル丁子良姜沈香白檀ノ類ヲ用ウヘカラス 禁物ハ餅類、鞭飯、一切魚鳥、殊ニ乾物類、氣ヲ費ス、飽食直ニ寐コト、晚食スルコト、淫事生冷ノ菓子、炭火ニアタルヘカラス 鹽味噌ノ濃物アシ、イカニモ古晚稻ヲ飯ニ柔ニシテ粥ノ如クニ炊テ少ツ、用ヒヨ食後ニ徐々ト歩ミテ食ヲ消セシメヨ

活套

反胃ノ證多塌ナレトモ脾胃ノ虚ナリ三焦ノ虚ナリ氣降ラスシテ胸痞テ反胃スルナリ精液行ヌ故ナリ痰飲多シ朝ニ食シタル飯ヲ時過テ吐逆シ胃氣弱クノ消シ兼ネテ其マ、吐スル疾ナリ氣ヲ降スヘシ降氣湯ニヨシ方ハ心氣門ニアリ 痰ヲ



去ルヘシ藥ハ咳嗽門ニアリ 脾胃ヲ調フヘシ脾胃門ニテ求  
メヨ丁子附子ナト用ヒヨ專ラ脾胃ヲ温ムヘシ括蕪實ヲ飲マ  
セヨ夕ニ食シタル物が朝ニ色モ變ラスシテ吐逆スルヲ反胃  
ト云フナリ嘔吐ハ吐逆セスシテカラエツキスルマテ也必ス  
大便鞭結スル也

快膈湯 於前方中去芩薑半夏加當歸瞿麥子各等分

是也右煎シ用ユ温藥ヨシ冷藥ヲ用レハ愈胃腑冷ル也

禁養如前法

- 又方 茯苓大 木香中 縮砂大 甘草小 丁香大 人參中  
白朮小 桑白皮小 五味子中 檳榔大 青皮中 藿香小  
神麩大 右煎シ用

血ノ方ナラハ四物湯ヲ少シ用テヨシ

勘 辨

嘔吐膈噎反胃ハ執レモ實熱ナリ蟲ナリ痰ナリト爲スヘシ先  
ツ玉丹ヲ用ヒテ下シテ寶丹ニテ内熱ヲ消シ蟲ヲ殺スベシ  
痰ハ玉丹善治スル也蟲ヲハ時々華ヲ用ヒテ治スヘシ煎藥ハ  
中寒ノ藥ヨシ

反胃ヲ脾胃ノ虛冷ト云フ説アリ用ウヘカラス只實熱ナリ其  
故ハ酒ニ酔テ吐逆スルトキハ幾時ヲ過テモ食物ノ色變シテ  
吐スルモノ也  
吐逆ハ冷ナルコトモアリ大凡ハ蟲ナリ中熱ノ藥ヨシ華ヲ用  
ウヘシ舊病ノ吐逆ハ熱ナリ寶丹華ニ宜シ



產前後ノ吐逆ハ冷ナリ芎歸湯華ニ宜シ

一 本云秘藥腸蟲ヲ取ル方蒲公英ノ花ヲ陰乾ニシテ末ニシ蜜ニテ和シ  
舌ノ上ニキキ燕ムヘシ蟲藥ヲ臭テ咽ヨリ出ルヲ調法シテ取ルナリ只傳タ  
ルマテナリ後  
人明ニスベシ

### 第十四章

#### 黃疸門

夫レ黃汗 黃疸 穀疸 酒疸 女勞疸 トテ五疸ノ分別アレトモ病ノ生スルコトハ皆濕ト熱トノ所爲ナリ故ニ濕ヲ除キ熱ヲ消テ本トス然レトモ其中ニ虛證實證アリ  
耳鳴胸悸微寒發熱シ口中ノ津クサク脚痿へ小便白ク濁ハ必ス虛證ノ黃疸ナリ補中除濕湯 茯苓大 人參中 陳皮留白中 白朮中 白芍藥小 以上此類ノ藥ニテ緩々ト療治スヘシ

急ニ大小便ヲ通スルコトアシ、脾胃ニ熱氣有テ食氣鬱蒸シテ又濕熱ニ犯レ暴ニ身體面目ニ黃色生シ大便澁リガチニシテ小便黃ニ赤ハ實ナリ

清心除濕湯 枝子 黃芩 木通各中茵陳大 枳實小 厚朴小

以上此類ノ藥ニテ小便ヲ通シ大便ヲ快クスヘシ若大便澁ラハ三四日ニ一度ツ、一包ノ藥ノ中へ大黃ヲ加ヘテヨシ若シ胸滿チテ喘胸悸セハ急證ト心得テ速ニ治スヘシ  
連々酒ヲ過シ始メ小便黃ニ澁リ其後漸々ニ身體面目黃ナラハ酒疸ト心得テ先ツ陳皮香附子ノ類ニテ表散シテ木通茯苓地骨皮枝子ノ類ニテ小腸膀胱ノ濕熱ヲ瀉スヘシ  
身體黃色ニシテ小便ヨク清通スルハ中焦ノ濕熱ナリ酒疸穀



疸ニアラス必ス血證ノ黄疸ナリ牡丹皮 生芩 芍藥  
寸口ニ脉ナクシテ鼻ヨリ出ツル氣冷ク面體煙ニ薰タル如ク  
目ミハリ甚タ脹リ渴シ口ノ邊リ黯黒油ノ如クナル汗出テ、  
黄疸ヲ病ムモノ死セズト云コトナシ  
身體黃色ニシテ全身痛ムハ濕熱表ニアリ汗スヘシ  
身體黃色ニシテ身不痛ハ濕熱裡ニアリ下スヘシ

活套

五疸ト云テ五ノ分別アリ酒疸女勞疸穀疸ナトアリ黄ナル汗  
出テ衣マテ黄ニ染マルナリ小便モ黄トナル脾藏ノ色黄ナル  
ヲ以テナリ面目黄トナル酒ナト多飲毒物ヲ食シ陰精ヲ頻ニ  
漏シ或ハ風寒暑濕ヲ脾胃ニ引コミ散セスシテ熱氣トナリ大

便秘シテ致ス所ナリ土用ノ中ニ房事ヲ忌ム治方ハ冷藥ヲ用  
ヒ血ヲ調ヘ脾胃ヲ調フヘキナリ

白朮湯 酒疸ニヨシ 肉桂 白朮 枳實 芍藥 杏仁

甘草 葛根 茯苓 大黃 右煎シ用

黄耆湯 黄汗トテ汗出ツルニヨシ 黄耆 芍藥 茵陳 石

羔 麥門冬 豆豉 甘草少 右生姜ヲ加ヘテ煎シ用

黄耆湯 括萎根 石羔 枝子 黄芩 大黃 右煎用

穀疸圓 穀疸トテ食ヨリ起リタルニ宜シ 苦參 龍膽

草菓 右三味ヲ丸シテ生薑ノ煎湯ニテ用ウ

房事ヲ過シテ傷タルニハ 滑石中 白礬小 右末シテ大麥

ノ糊ニテ丸 四物湯ノ内へ白朮肉桂茯苓陳皮人參半夏甘草ヲ



内テ煎シ用ヘシ

一切ノ黄疽ニヨシ 茵陳 黄芩 芫胡 枝子 黄連 人參

茯苓 陳皮 白朮 香附子 木通 黄蘗 枳殼 甘草

右調合シテ煎シ用ウ是ハ皆熱氣ヲ去ル藥ナリ丸テ葛湯

ニテ用ウ五疸トモニ用ウヘシ

血ノ方ヨリ起ラハ 牡丹皮 地黄 芍藥 括蔞根 瞿麥

紅花 石羔 右是等ヲ用ヒヨ必ス良シ

### 勘 辨

所詮黄疽ハ實熱ノ極タル病ナリト心得ヘシ大小便ツマル故ニ周身マテ黄ニナルナリ脾胃ノ實熱ナリ藥ハ大寒ノ藥ニ白朮茯苓ナト加ヘテ用ウ又ハ三黄丸太乙丸ヨシ

玉丹ニテ下シ寶丹ニテ内熱ヲ消セハ黄疽ハ治スヘシ  
丹石丸ヨシ方ハ瘧門ニアリ

### 第十五章

#### 積 聚 門

夫積聚ニ色々ノ分別アリ胸下鳩尾ノアタリニ鞭リ痞タルヲハ心積ト名ク黄連香附子枳殼

左ノ脇ニ鞭リ痛ムヲハ肝積トス青皮芎藭莪朮柴一有

右ノ脇ニ鞭リ痛ムヲハ肺積トス陳皮香附子檳榔

臍ノホトリニ鞭リ食事ヲスレハ痛ミ大食スレハ瀉下シ不食

シテ噎ヲシ口中ニ水タマルハ脾積トス香附子厚朴陳皮莪朮

臍ノ下少腹ニ鞭マリ痛ムトキハ築タテ々ト脉ノ鼓ウツヤウニ築動シ



劇發<sup>ウツレ</sup>リ痛ムトキハ胸下へ逆搶<sup>ウツ</sup>ナドスルハ腎積トス 莪朮三  
稜檳榔苦棟根皮肉桂ノ類ナリ

右此分ニ五藏ノ積ヲ見ワケ此類ノ藥ヲ養生藥ニ平生用ヒテ  
病者胃ノ氣強キ人ナラハ一月ニ一度許ツ、備急圓ヲ用ヒテ  
腹中ヲ瀉シ其後ハ又養生藥ヲ用ウヘシ驅積湯ト名ヅクヘシ  
只積ヲ治スル心持ハ中焦ノ氣虛スルニ因テ一身ノ血氣流通  
シカネテ滯リ脾胃虛スルニ因テ食事消シカネテ終ニ積聚ト  
ナルナリ故ニ食事ヲヒカヘ消過ゴシテ和柔ナル物ヲ少ツ、  
用ヒ晩食夜食必ズ忘ムヘシ消シ難キ生冷ノ物食フヘカラス  
乾物ノ魚鳥鞭<sup>ウツ</sup>ク消シカヌル物用ウルコトナカレ且心ヲ勞シ  
氣ヲ苦ムルコト有ルヘカラス 此等ノ養生ヲナシ其積其積

ノ藥ヲ常ニ用ヒ又備急圓ニテ瀉シ積ハ幸ニ驗氣ヲ得テ其人  
ツヨクヤセ食事モ進マバ人參中 白朮大 陳皮中 乾薑小  
茯苓中 白芍藥中 甘草少 此類ノ補中ノ藥ヲ用ヒ此ク積  
ニモ責ラレ藥ニモ攻サレタル處ヲ調フヘシ  
婦人ノ脇腹ニ物アリ鞭リ痛ミテ漸々ニ大ニナリ腰ノ方ハ連  
リ痛ムハ大既惡血ノ塊ナリ小腹ニアラハ莪朮乾漆枳殼香附  
子桃人牡丹皮 脇ニアラハ 青皮 芎藭 枳實 香附子  
紅花 桃人 牡丹皮 腰ニアラハ 牛膝 獨活 枳實  
紅花 柞桃人檳榔  
右此類ノ藥ヲ與ヘ時々塊<sup>クマ</sup>タル處ニ灸チスヘシ其灸セン前  
後一兩日ハ藥中ニ肉桂當歸尾ヲ加ヘテヨシ



血塊ヲ治スルニモ脉ニ動數アラハ枳殼香附子牡丹皮ヲ大ト  
ス如此療治スルニ十日二十日ニ一度ツ、大黃當歸尾ノ入  
リタル煎藥ニ酒ヲ少シ入レテ飲マセヨ是ハトロケタル惡  
血ヲ下サン爲ナリ退癥湯ト名ツクヘシ

總テ積聚ノ灸ハ心積ニハ膏盲ヲ灸セヨ 肝積ニハ九兪ノ肝  
ノ穴ヲ灸セヨ 脾積ニハ十一ノ脾ノ穴ヲ灸セヨ 肺兪ニ  
ハ三兪ノ肺ノ穴ヲ灸セヨ又十六兪大腸ノ穴モヨシ  
腎積ニハ十四兪ノ腎ノ穴ヲ灸セヨ一穴各五十壯百壯ツ、  
灸シテヨシ背ハ以上此分ナリ扱腹ハ積ノ有テ堅ク痛ム處  
ヲ能々按テ其徹ル處ヲ艾ヲ大ニシテ五十壯ツ、灸セヨ是  
灸聚ノ灸ノ秘訣ナリ

大戸ノ不斷酒ヲ飲ミ腹中ニ酒積アリテ痛ム者ハ 半夏小  
香附子中 丁子中 青皮大 莪朮小 此類ニテ治スヘ  
シ若シ痰アリテ胸中苦シカラハ白朮枳殼ヲ加ヘヨ

活套

五積六聚トハ五藏六腑ニ鞭リ痛ヲ云フ其塊リナルコト種々  
ノ思ヲ胸ニ蓄ヘ結氣ヲ結ヒ惡物ヲ食シテ腹中ニ消シ兼ネ後  
ニハ蟲積トナルト知ルヘシ皆相剋シテ相生セヌ故ナリ

原本此下有五積之治與前條所見大同小異今削其同者獨舉異者從簡云肝積、  
方中 有柴胡肺積、方中陳皮香附子作沈香附子脾積、方中無香附子厚朴有白  
朮腎積、方後備急圓、下作脾積圓ナトヲ飲セテ下ラハ藥ヲ用蟲積ノ藥食ヲ進  
ル藥ナトヲ用堅硬ノ食物ヲ用ヘカラス  
一本云心積ハ胸ニアリ茯苓厚朴人參  
枳殼白朮半夏三稜少右丸シテ用ユ  
肝積ハ左ニアリ 青皮、當歸、白朮、  
三稜、蛇含石、芎藭 右丸シテ用ユ



肺積ハ右ニアリ 半夏吳茱萸桂心  
人參桑白皮葶藶子 右丸シ用ユ

脾積ハ臍ノホトリニフツリ 烏頭中 乾姜附  
子少 赤石脂山榭肉桂等分 右丸シ用ユ

腎積ハ臍ノ下ニアリ 葛根皮當歸芍藥大  
芍藥中 甘草少黃芩大 右煎シ用ユ

大戸ノ酒ヲ多ク飲ミテ食ヲハ食ズシテ腹中損シタルヲ酒積  
方與前所見同但稱量作各  
等分合白朮枳殼爲方耳

ト云酒積ヲ治ス 丁子 黃連 木香 縮砂 苦辛 桃人  
各等分 莪朮 檳榔 大黃 右煎シ用ウ麥孽神麩ヲ加ヘテヨ  
シ

香薷散 茶癖ト云ハ茶ノコリカタマリタルナリ

陳皮 人參 又米ト巴豆ヲ炒マセテ巴豆ヲハ去テ米ノ  
ミヲ細末シテ前藥ノ末ヲ合テ丸シテ頻々飲セヨ又ハ脾

積圓ヲ用ルモヨシ 下方見

五積散 一切五藏六腑及萬ノ蟲積瘧蟲其外蟲ノ如減ト云フ

ハ此方ノ事ナリ都テ用ウヘシ蟲積ヲ斷藥ナリ

莪朮大 木香大 香附子 枳殼各等分 三稜中 檳榔中

青皮小 乾薑小 桂心小 薏苡人大 厚朴小 杏人小

黃連大 桔梗中 黃蘗大 藜小

右煎丸散ニシテ良シ都ズ用ヘシ何ノ蟲積ニモ奇特ノ功有ル  
ヘシ

散積湯 一切ノ積ニ用 陳皮大 莪朮大 木香大 檳榔中  
柴胡中 人參小 縮砂中 丁子大 肉豆蔻中 黃蘗 茯苓  
益智 苦辛各小 甘草 右煎シテ用



萬病ニ蟲ノ加減ト云フハ是ナリ 莪朮 檳榔 苦辛 黃蘗  
青皮 枳殼 陳皮 薏苡根 三稜 黃連 桔梗 香附  
子 木香 白朮 厚朴 楊梅皮

右此藥ハ皆一切ノ蟲ヲ治スル藥ナリ萬病ニ蟲ノ加減ト云  
フハ是ヲ加減シテ用ナリ安蟲丸トハ是ヲ丸シテ用ユ是也  
脾積圓 丁子 木香 莪朮 青皮 大黃 牽牛 三稜 巴  
豆 枳實 百草霜 皂灰 右丸シ用蟲積下ルヘシ

勘 辨

所詮五積六聚食積、痰積、氣積、酒積、皆熱ヨリ發ル三黃丸ヲ中寒  
大寒ノ煎藥ニテ用テヨシ虛冷ヨリ發リタル積ナト、云テ脾  
胃ヲ溫補スル人參白朮乾薑ナトヲ用テ溫補スルコトアレハ

愈腹痞<sup>ぶ</sup>ヘ積痛ミ不食スルモノナリ一云溫散ノ積ハ二三服用玉丹  
ルコトアリ積聚ハ實熱也  
ニテ下シテ常々寶丹又ハ大乙丸ヲ用テ腹中ノ量ヲ解シタラ  
ハ積ハ自然ニキル、コトアルヘシ是積ノ本ヲ治スルト云フ  
ナルヘシ

婦人血塊ヲ治スル妙藥 芒硝二分 大黃一匁 三稜三分  
右末シテ好醋一盞ヲ用ヒテ半ニ煎シテ一番ニ大黃ヲ入レテ  
煉ツメテ次ニ三稜次ニ芒硝ヲ入レテ丸ニ爲スホトニ煉ツメ  
テ白湯ニ醋ヲ加ヘテ一日ニ三度ツ、用ウヘシ  
血塊ヲ治ス玉丹ヲ用ヒテ先ツ下シ後ニ芎歸湯ニ附子ヲ加テ  
用ヒ五日メニ玉丹ヲ用ヒテ十四度下シテ腹小ニナル者アリ  
此如ク煎藥ヲ廿日間與ヘ其中ニ玉丹ヲ三度與ヘテ下スヘシ



第十六章

霍乱門

臟府虛弱ニシテ氣血衰ヘタル人胃氣乏キ折暴ニ寒冷ノ飲食ヲ用ヒテ胃氣ヲ毀傷ス故ニ頓ニ胃氣斷絶シテ三焦職ヲ失ヒ上吐シ下瀉シ榮衛暴ニ流通セズ津液頓ニ竭ル故ニ一時半時ノ間ニ恐シク羸瘠眼陷リ面色煤黑、脉必ズ微沈ナリ吐瀉甚シク脉伏シテ腹痛セハ熱湯ニ手巾ヲ濡シ臍ノ下元氣在ル處ヲ更番更番煖ムヘシ

溫中既濟湯 乾薑 肉桂 白朮 茯苓各中 陳皮大

生薑 吐甚シキハ 寒邪胃ニアリ陳皮生薑ヲ多ク加ヘ

ヨ瀉甚シキハ寒邪脾ニアリ白朮茯苓ヲ過セ

轉筋ノ甚シキハ血行ス筋ヲ潤サヌ所以ナリ地黄 當歸

木瓜 柴胡 紅花 黃芩ヲ酒ニ浸シテ此類ヲ本トスヘ

シ

吐瀉シテ足手ヨリ冷ヘアカリ腹痛セハ人參中 乾薑中

附子炮小 甘草少 右煎シ用

夫レ霍亂ハ快吐ヲスレハ治シ易シ胃氣ヲ厭ヘ塞食邪自ラ退ク所以ナリ食邪退カハ胃氣微ニ生シ陰陽升降ノ氣デキテ榮衛モ運行スル故ニ療治シ易シ

乾霍亂ト云ハ中焦ノ正氣甚タ虚スルニ消シ難キ生冷ノ飲食ヲ多ク食テ消セス其マ、中焦ニ否テ上下升降ノ政俄ニ絶シテ吐逆セント欲スレトモ吐逆セス頻圍へ行トモ瀉セサレハ



一大事ナリ燒鹽ヲ濃ク入レタル鹽湯ヲ多ク飲マセテ鳥ノ羽  
ニテ咽喉ヲ擦ハ必ス吐逆スルナリ快ク洒然ト吐逆ヲ多クサ  
セテ溫中既濟湯ノ類ヲ與フヘシ若シ病勢甚シクシテ手足逆  
冷シ既ニ絶入ルヤウナラハ臍ノ中へ鹽ヲ押シ入レテ其上ニ  
灸ヲ十壯甘壯スヘシ又臍下一寸五分ヲモ灸セヨ氣海ノ穴ト  
云フ

以上如此療治シテ脉ニモ力生シ吐瀉モ止ミ心モ正ニ成ラハ  
其ヨリ薑桂朮ノ類多ク用ヘカラズ

門冬養胃湯 陳皮 麥門冬各中 茯苓大 人參小 葛根中

甘草少 甚煩渴セハ 竹茹門冬ヲ多ク加ヘヨ

若シ轉筋甚シテ手足ノ指スクミ伸屈ナラスハ足ノ外ノ踝ノ

正中ヲ七壯灸セヨ

霍亂ヲ療治シテ二日三日ノ間ハ食事ヲ多クスヘカラス粥味  
噌雜水ノ類ヲ良モ少ツ、用ウヘシ早く飯ヲ與フレハ病復腹  
痛スルモノナリ

活套

暑ト云ハ霍亂ノ事ナリ

溫中湯 乾薑小 陳皮大 白朮大 茯苓中 甘草少 煎用

筋攣ハ 地黄大 當歸大 木瓜中 柴胡大 紅花小 黃芩中

手足冷テ腹痛ムニハ 人參大 甘草少 附子小 乾薑小

ヲ加ヘヨ香薷散ヨシ 香薷大 厚朴炒小 白扁豆小

黃連小 黃芩小 莪朮小 白朮中 茯苓中 木香中



乾薑小 良薑中 甘草少 加へテ鹽湯ニテ用ユ妙ナリ

勘 辨

霍亂ハ脾胃カ冷ヘタルニ因テ蟲カ起ルナリト心得ヘシ初ハ大熱ノ藥後ハ小熱ノ藥ノ煎湯ニテ華ヲ用ウヘシ吐ハ華ニテ止ム又吐セザル者ハ華ニテ吐スベシ華ヲハ闕クベカラス霍亂ハ冷病ナリ農夫行人ナトノ霍亂ハ熱ナリ中寒ノ藥又ハ黃連香薷散良シ一云又ハ木香莖朮干姜ナト用ヘシ

大人富家ノ暑ハ冷ナリ大熱ノ藥木香丸ナト良シ方ハ別録ニアリ

一方アテノ木ノ葉陰ニシテ末シテ湯ニテ用ウヘシ

一本活套中云吐逆シゲクハ熱湯ニテ臍ノ下ヲ温メ流フヘシ馬蔘或ハ桃葉艾ヲ煎シテ浴セ臍ヲ洗ナリ必ス蟲痛腹堅カルベシ門冬養胃湯一作養胃湯方亦不同養胃湯方茯苓大人參小白朮中芍藥大枳殼小黃芩小肉桂中甘草少

右煎シ用ヨ

又云香薷散ノ内へ人參縮砂茯苓各大肉桂小入レテ煎シ頻々用ヘシ

又云瀉止ズハ平胃散コシ

又勸辨初條ノ末云外ニハ燒石ヲアツヘシ

又云乾霍亂ニハ手ノ十指頭ヨリ血ヲ出ストアリ

第十七章

頭痛頭風門

平生持病ニアラネトモ風ヲ冒寒ニ中リ暑ニ犯サレ暴ニ甚タ頭ノ痛ヲ頭痛トス外邪トナシテ區々ニ邪氣ヲ驅散ハ頭痛ハ止ムナリ芎芷蠲痛湯脉浮緊ニシテ項強ク頭痛シ風寒ヲ惡ムハ太陽ノ經ニアル頭痛ナリ芎藭小 獨活中 香附子大 脉



弦細ニシテ頭痛シ耳ノ邊頤痛ミ寒熱往來セハ少陽ノ經ニア  
ル頭痛ナリ柴胡前胡香附子 脉浮緩ニシテ長ク目痛ミ鼻乾  
キ翕々發熱頭ノ額上痛ムハ陽明ノ頭痛ナリ升麻中 白芷中  
葛根中 香附子大

右如此三陽ノ頭痛ヲ脉ト證トニテ見分ケ其經々ノ藥ヲ本ト  
シテ他ノ經ノ藥ヲ少シ加ヘヨ

宿病ニ頭痛アル人氣ヲ盡シ心ヲ苦メ胸中ニ氣痞ヘテ痰ヲ生  
シ其痰逆上シテ額ノ邊眉稜ノ邊痛ハ痰厥頭痛ムナリ或ハ眩  
暈ノ心モチアリ驅痰降氣湯 枳實小 香附子中 半夏小

黃芩中 茯苓中 陳皮中 甘草少 右煎シ用

天陰或ハ雨風ニ必ズ頭重ク痛ミ氣不快ハ頭風ト云ナリ氣ヲ

順シ血ノ道ヲ通シ痰ヲ退ケ風ヲ除クヘシ加料蠲痛湯 陳皮

黃芩 芩 香附子 羌活 柴胡各中 當歸 半夏各小

右生薑ヲ加ヘ煎シ用 頭痛シテ吐ノ氣アラハ半夏生薑陳

皮ヲ加ヘヨ眩暈ノ意アラハ地骨皮大 柴胡肉桂ヲ加ヘヨ

大便結セハ大黃枳實ヲ加ヘヨ 小便黃ニ赤クハ茯苓木通

ヲ加ヘヨ藥ノ間ニ好茶ヲ飲マセヨ

酒ヲ飲ミ微ク風ヲ感コトニ頭痛セハ眉ノ間ニ墨ヲ點テ其ヨ

リマツスグニ額ノワケメノ所ヘ五寸アゲテ灸スヘシ願會ト

云ナリ

### 活 論

頭痛頭風ハ皆同シキナリ心肺ノ疾ナリト知ルヘシ平生ハ此



疾ヲモタネトモ風ナト感寒ニ傷レ暑氣ニ干レ俄ニ頭痛シ耳  
鳴リ頭痛シ心肺ノ脉浮テ駛ク風ヲ嫌ヒ頭痛セハ大陽ト云フ  
芎藭小 白芷中 香附子小 煎胡中 右煎シ用  
脉浮テ鼻塞リ咽乾胸悸大便痞小便黃ニ眉ノ間痛ミ難堪ハ少  
陽ト云升麻中 葛根中 白芷大 香附子大 半夏小 生薑  
人參 甘草 右煎シ用  
天陰雨ノ日風ナトニ痛ミ夜深ニ病ニハ好茶ヲ飲セヨ血ヲ補  
ヘシ四物湯ニ加減シテ良シ  
香蘇散ニ防風枳殼竹茹生薑半夏ナトヲ加ヘテ類々飲セヨ  
又方 葛根 石羔 芎藭 白芷 香附子 細辛 黃芩  
右丸シ散ニシ湯ニシ用ユヘシ

頭痛ニ色々アリ又梅瘡ヲ病ミタル人輕粉藥ヲ多ク飲ミ下劑  
ナトモ服セスシテ藥力頭ヘ升リ痛ミ筋骨ヘカラマリ脚氣ノ  
ヤウニ病モアリ其ヲハ梅瘡ノ藥ヲ山歸來ノ水カ五香湯ニ用  
ヒヨ  
頭ノ圓ハ天ニ象ル空ハ圓物ナリ大方腎虛ノ人ノ受ル疾ナリ  
上熱下冷ナリ又風ニ中リテカヤウニ爲ナリ大便ヲ寬ロゲ胸  
ノ熱ヲ消シ風ヲ散シ血ヲ溫メ氣ヲハ下シ痰飲ヲ除クヘシ

勘 辨

頭痛風寒ニ因テ痛マハ羌活湯ニテ溫メテ汗ヲ出スヘシ  
頭風ハ虛冷ナリ芎歸湯虛冷一作血道  
血ノ道ニテ頭痛スルモ冷ナリ芎歸湯滑石散一云脉細ナリ



大熱ニ因テ頭痛スルハ必ズ寒熱往來アリ中寒ノ藥ニ石膏  
知母柴胡ヲ加ヘヨ

梅瘡ニ因テ頭痛スルニハ山歸來藥或ハ嗅藥或ハ五八霜其外  
別錄ニアリモ一云寶丹

新病ノ頭痛ハ冷ナリ羌活湯芎歸湯舊病ノ頭痛ハ熱ナリ大寒  
ノ藥寶丹

中風ノ頭痛ハ必ズ熱ナリ玉丹ニテ下シテ寶丹妙ナリ

11  
536



終

