

卷
叁



傅氏眼科審視瑤函卷之二

射集目錄

天行赤熱症

驅風散熱飲子

桑白皮散

暴風客熱症

局方洗心散

洗肝散

火脹大頭症

普濟消毒飲

住痛解毒丸

怕熱羞明症

明目細辛湯

歸葵湯

吹雲膏

驗硬睛疼症

二朮散

煖腫膏

赤痛加邪症

十珍湯

酒調洗肝散

痛如針刺症

加減八正散

大小雷頭風症

清震湯

加味調中益氣湯

將軍定痛丸

藥枕方

左右偏頭風症

羌活芎藭湯

柴芎湯

蒼朮湯

細辛湯

吳茱萸湯

升麻芷葛湯

狀若魚胞症

立參飲

洗眼青皮散

鵲眼凝睛症

瀉瑤湯

摩風膏

旋瞶泛起症

瀉肝散

救睛丸

珠突出眶症

救睛丸

立退丸

水淋法

黃膜上衝症

通脾瀉胃湯

立應散

赤膜下垂症

皂角丸

疑脂翳症

四順清涼飲子

洗眼金絲膏

花翳白陷症

洗肝散

琥珀散

蟹睛症

防風瀉肝散

瀉肝散

冰瑕翳症

開明丸

琥珀煎

陰陽翳症

羌活退翳散

瑪瑙內傷症

陰邪風症

加味柴胡湯

生熟地黃湯

驅風上清散

上清散

陽邪風症

防風羌活湯

子和搜風丸

磁石丸

瘀血灌睛症

分珠散

宣明丸

血灌瞳神症

墜血明目散

摩挲石散

落紅散

色似胭脂症

退赤散

點眼養仁膏

赤絲虬脈症

退熱散

白澀症

桑白皮湯

白珠俱青症

天麻湯

癢如蟲行症

驅風一字散

人參羌活湯

廣大重明湯

腫脹如楮症

散熱消毒飲子

金絲膏

補肝丸

聚星障症

海藏地黃散

垂簾障症

天麻退翳散

捲簾散

逆順障症

羚羊角飲子

混睛障症

地黃散

七寶膏

努肉攀睛症

還睛散

吹霞散

定心丸

雞冠蚬肉症

涼膈清脾飲

魚子石榴症

抽風湯

翠雲錠

化積散

傅氏審視瑤函卷之三

株陵傅仁宇允科纂輯

增張文凱廷獻案閱

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀微珩訂正

公猷 掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁 顓

運氣原證

按內經時行暴熱天氣亢和燥火犯淫邪風所侮民病目赤大
要有三一曰風助火鬱於上經云少陰司天之政初之氣陽
氣佈風乃行寒氣時至氣鬱於上而熱目赤經云少陽司天
之政二曰火勝二之氣候乃大溫其病氣拂於上目赤三日
燥邪傷肝三之氣歲金太過燥氣流行經云陽明司天燥氣
下臨肝氣上從脇痛而目赤雖其間病有不同大要不出此

三候也

目痛

經云有二一謂目黃白眼痛一謂目珠黑眼痛蓋目黃白眼痛屬陽故書則痛甚點善寒藥則効經所謂白眼赤脈法於陽故也曰珠黑眼痛屬陰故夜則痛甚點苦寒藥則反劇經所謂腫子黑眼法於陰故也凡目痛皆屬於熱之所致煩燥者氣隨火升也束垣去元氣虛損而熱輕手潤之熱在皮毛血脈也重手按之筋骨熱甚者熱在筋骨也不輕不重而熱熱在肌肉也又云晝則發熱夜則安靜是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室發熱煩燥是陽氣下陷入陰中也亟瀉其陽峻補其陰也晝夜發熱是重陽無陰也亟瀉其陽峻補其陰也

天行赤熱症

天行赤熱時氣流行三焦浮燥泪澁睛瘡或椒瘡沙擦或怕熱羞明或一目而傳兩目或七日而自清靈往往爾我相感因虛被火薰蒸雖曰淺病亦弗為輕倘犯禁戒變正蜂生要分虛實須辦六經

此症目赤痛或脾腫頭重怕日羞明涕泪交流等病一家之

內一里之中往往老幼相傳然有虛實輕重不同亦因人之
虛實時氣之輕重若何各隨其所受而分經絡以發病有輕
重不可槩言此章專爲天時流行熱邪感染人或素有目疾
及痰火熱病水少元虛者爾我傳染不一若感染輕而本源
清邪不勝正者七日自愈蓋火數七故七日火氣盡而愈七
日不愈而有二七者乃再傳也一七不退者必其觸犯及本
虛之故須防變生他症矣宜服

驅風散熱飲子

連翹

牛旁子

炒研

羌活

蘇薄荷

大黃

酒浸

防風

赤芍藥

甘草

少許

當歸尾

山梔仁

炒

川芎

各等分

右剉劑白水二鐘煎至一鐘去滓食遠熱服

少陽經加柴胡
少陰經加黃連

桑白皮散 治肺氣壅塞熱毒上攻眼目自睛腫脹日夜疼痛心胸煩悶

旋覆花

枳殼

杏仁 去皮尖

桑白皮

玄參

天花粉

甘草

防風

甜葶藶

甘菊花

黃芩 各等分

右為末每服四錢水一鐘半生薑三片煎至八分去滓食後

澀服

瀉熱黃連湯 見二卷按此手少陰太陰足陽明少陽少陰之藥也

暴風客執症

暴風客熱忽然猖脾脹頭疼泪似湯寒熱往來冬鼻寒目中沙

澀痛難當

此症非天行赤熱爾我感染前寒熱似瘡病發則目痛以及

腫脹如慄久債遲遲之比也乃素養不清燥急勞苦客感風熱卒然而發也有腫脹乃風熱夾攻火注血分之故治亦易

退宜服

局方洗心散

熱勝者服治歷壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱氣上衝口苦唇焦咽乾腫痛痰涎壅滯涕唾稠枯心神煩燥眼澀睛疼及寒壅不調鼻塞声重咽乾多渴五心煩熱小便赤澀大便秘澀並宜服之

荆芥穗

甘草

當歸

大黃煨

赤芍藥

麻黃各六錢

白朮五錢

右為末每服二三錢生薑薄荷湯煎服

以白朮合大黃入心故名洗心而從以麻黃荆芥亦是表裏藥

洗肝散

風熱俱勝者服治風赤上攻暴作目赤腫痛難開癰澀淚交流

薄荷葉

當歸

羌活

甘草炙

山梔仁炒

防風

大黃

川芎

右等分爲末每服二三錢食遠沸湯調下

羌活勝風湯 風勝者服 見二卷

火脹大頭症

風火炎炎熾六陽面浮腦腫泪如湯羞明亦澀頭疼痛曉夜無

寧不良當

此症目赤痛而頭面浮腫皮內燥赤也狀若大頭傷寒夏月

多有此患有濕熱風熱濕熱多泪而皮爛風熱多脹痛而憎

寒若失治則血滯於內雖得腫消而目必有變病矣宜服

普濟消毒飲

羅謙甫云先師監濟源稅時四月民多疫疾初覺

利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問梁之多不救

先師曰夫身半已上天之氣也身半以下地之氣也此邪

攻頭目而爲肺盛

黃蓮 黃芩 各五白 殭蚕 炒一

鼠粘子

連翹

橋紅

板藍根

黑玄參

柴胡

桔根

甘草稍用馬屁勃

升麻各二

人參三小

右為末半用沸湯調時時服之半用煉蜜為丸噙化之

右方以黃芩黃連味苦寒瀉心肺間熱為君橋紅味苦平玄

參柴胡苦寒解利前毒生甘草甘寒瀉火人參甘溫補氣為

臣連翹鼠粘子味辛平板藍根味苦寒馬屁勃白殭蚕升麻

味苦平微寒行少陽陽明二經氣不得伸桔根味苦辛溫為

舟楫不令下行

或加防風蘇薄荷川芎當歸身咬咀如麻豆大每服五錢水

二鐘煎至一鐘去滓溫熱食後時時服之如大便硬加酒製

大黃一錢或二錢以利之腫勢甚者宜砭刺之

愚按時行疫疾雖由熱毒所染其氣實之人下之可愈氣虛

者槩下之鮮不危者故東垣先主製爲此方以救氣虛者其
惠博矣

仕痛解毒丸

礪砂 五錢

沒藥 五錢

川芎

荆芥穗

朴硝

白芷

石膏

家菊花

各一錢

麝香

右爲細末米糊爲丸如梧子大每服錢半不拘時溫湯送下

怕熱羞明症

怕日羞明症竇虛兩境施目疼並赤腫絡滯氣行遲火熾兼脾
燥心肝脾辨之但分邪實治病亦不難驅不疼不赤腫單爲血
家虛

此症謂目於明亮之處而痛澀畏避不能開也此病目者十
之七八皆有此患病原在心肝脾三經總而言之不過一火

燥血熱病在陽分是以見明亮而惡泪溼痛也蓋已之精光
既弱則陽光不能敵矣是以陰黑之所則清爽然可虛實之
辨蓋怕熱乃有餘之病羞明乃不足之症若目不赤用而畏
明者乃血分不足膽汁少而給弱故不能運精華以彰陽光
也宜服點

明目細辛湯

治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕火眼睛
組膠糊多癢澀難開眉攢腫悶鼻塞涕睡稠粘

便微
硬

川芎

四分藁本

當歸身

白茯苓

各五分

紅花

細辛

各二分

生地黄

酒製蔓荊子

各六分防風

羌活

荆芥穗

各一錢川花椒

十粒

廣皮

八分

桃仁

泡去皮
尖十箇

右剉劑水二鐘煎至八分去滓臨睡溫服

按此足太陽厥
陰手少陰藥也

歸葵湯

一名連翹飲子治目中溜火惡目與
火癰澀小角爛火視昏花迎風有淚

連翹

紅葵花

當歸

人參

甘草

蔓荆子

生地各五分

升麻八分

黃芪

酒黃苓

防風

羌活各七分

柴胡二分

右剉劑白水二鐘煎至八分食遠温服

按此是三陽少
陰厥陰之藥也

吹雲膏

治視物睛困無力應難開睡覺多眩目中泪下及迎
風寒泣羞明怕日當欲閉日喜在暗室塞其戶牖翳膜

遮睛此藥
多點神効

防風

青皮

連翹

生地黄

細辛

柴胡

甘草

當歸

黃連

蕤仁

升麻

荆芥穗

右剉劑除連翹外用淨水二碗先熬諸藥去半碗入連翹熬

各四分

一錢五分

二分

各六分

三錢

去皮尖

各三分

一錢濃
汁取用

至一大盞去滓入銀盞內文武火熬至滴入水成珠加熟蜜

少許熬勻點之

沃明益陰丸

見二卷

臉硬睛疼症

臉熱睛疼似擦沙血瘀脾熱隱肝家睛疼頭痛臉硬淚澀昏

朦症變他

此症不論有障無障但兩臉堅硬而睛疼若頭痛者尤急乃

風熱在肝肝虛血少不能榮運於目無水以滋火反乘虛而

入會痰燥濕熱或頭如縛血滯於脾內睛因火繫而痛輕則

內生椒瘡重則腫脹如熅瘀血貫睛等症治當敷軟翻脾開

道若堅硬不能軟或頭痛腦脹不退此頭風欲成毒之症也

宜服

二木散 治臉硬睛

蟬退 去頭 龍膽草 酒洗 黃連 酒洗 枸杞子 焙乾

蒼木 米泔 地骨皮 白朮 土炒 牡丹皮 各等

右為細末每服一錢食後荆芥湯調下

熗腫膏

膩粉 炒許 黃蠟 代赭石 各五錢研 細磁末

黃柏 細末 蘇油 各一兩

右為極細末入桐枘內入油蠟同煎為膏塗敷於硬臉處

寒熱 凡患寒熱者由風邪外客於腠理痰飲內積於臟腑致血氣不足陰陽更勝而所作也陽勝則發熱陰勝則發寒

與瘡相似而發寒不致戰慄發熱不致悶亂所異也

赤痛如邪症

赤痛如邪症多招寒熱魔不認風寒瘡炎京勿用過下虛兼上

實裏急外疎多皆因客熱擾宜治要中和

此症專言目病而赤疼頭疼寒熱交作如風寒瘧疾狀凡病發目痛輕則一年數次重則舉發頻頻非比暴風客熱年發之症也此症係肝腎之故肝腎俱虛故熱在內而陰虛火動寒者榮衛虛損外之腠裏不實而覺寒也若作風熱瘧痰若用剛劑治之則血愈虛而病愈深矣宜服

十珍湯 治虛損血枯上攻目痛 滋陰降火養血清肝

生地 酒洗 二錢 當歸 酒洗 錢半 白芍藥 炒 地骨皮 炒 知母 鹽酒拌炒

丹皮 童便浸炒 天門冬 去心 各錢 人參 去蘆 麥門冬 去心 各錢 甘草 稍各五分

右剉劑白水二鐘煎至八分去滓溫服

大陽虛者未有不動火苦寒直泄之藥惟病端初起元氣未虛勢方蘊隆脉鼓而數者暫取治標稍入涉虛便不可服王

大僕曰治熱未已而中寒更起且是大陰傷而絕肺金孕吉
之原矣斯以地黃為君知母為佐壯天一之水以制丙丁不
與之直爭也當歸白芍藥以沃厥陰腎肝同治之法也水衰
則火旺是以牡地二皮為尅制火盛則金衰是以天麥二冬
為屏障人參補金位之母甘草生用所以奉令承使奔走贊
成者也

酒調洗肝湯

治實熱氣攻
眼無時痛甚

黑玄參

大黃

黃芩

山梔仁

炒

知母

生地黃

桔根

當歸尾

玄明粉

各等分

右為細末每服二三錢食遠溫酒調下日進二服

痛如針刺症

痛如針刺屬心經火燥珠疼熾盛行戒酒忌辛休躁怒免教症

變漸相生流火輕微惟一點驀然有處似鍼疼防微花漸宣石
火泄破炎焔榮自盈

此症謂目珠疼始鍼刺也病在心經火實有餘之症若痛驀
然一三處如鍼刺痛目雖不赤亦是心經流火別其痛在何
處部分以見病將犯其經矣按此症多有體虛目勞兼染淋
濁之病榮氣不上潮於目而如鍼刺之痛者宜養其榮若降
火則急矣宜服

加減八正散

治心熱衛眼赤腫澀痛熱淚羞明兼治大小心經
邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴引飲心怯面熱煩

煩不寧唇焦鼻翕口舌生瘡咽候腫痛小便
赤澀或癰閉不通及熱淋血淋並宜治之

骨石

甘草梢

大黃超暴木通

瞿麥

梔子炒

車前子

扁蓄各等分
為末

石為末每服五錢水二鐘燈心三十段煎至八分去滓溫服

經曰膀胱不利為癰理宜入正散以通之滑可去著滑石車
 前皆滑也瀉可去實大黃甘草梔子皆瀉也通可去滯瞿麥
 扁蓄木通燈心皆通也若虛弱輩則大黃不宜用也加生地
 黃桑白皮芒竹葉以清療之

頭痛

子和云頭痛不止乃三陽受病也三陽分部分頭與項
 痛者足太陽經也攢竹痛者足太陽經也眉稜骨痛者是也額
 角上痛俗呼為偏頭痛者是太陽經也如痛久不已則
 令人喪目以三陽受病皆胸膈有宿痰之致然也先以
 茶調散吐之吐訖可服川芎薄荷辛涼
 清上之藥叔和云寸脈急而頭痛是也

大小雷頭風症

雷頭風痰來之最急症類傷寒頭如斧劈目若雉鑽身猶火炙

大便不通小便赤澀痛不可禁禍亦難測痰滯已甚應之爆

善意速醫勿延時刻瀉火為先慎防胃液逼損清純終當一失

此症不論偏正但頭痛挾痰而來痛之極而不可忍身一日

痛便秘結者曰大雷頭風若頭痛大便先潤後燥小便先清後澀曰小雷頭風大者害速小者稍遲雖有大小之說而治則一若失之緩禍變不測自必損攘輕則癩凸重則結毒宜早為之救以免禍成宜服

清震湯兼治發熱惡寒口渴者服

升麻 赤芍藥 甘草 荆芥穗 葛根

黃芩 蘇薄荷 青荷葉 蒼朮水泔水浸一宿炒各等分

右剉劑白水二鐘煎至八分去滓熱服

加味調中益氣湯治氣血俱虛頭痛其効如神

嫩黃芪蜜製二錢 升麻 細辛各三分 廣皮四分 廣木香三分

川芎 人參 甘草炙 當歸 蔓荊子

蒼朮泔水製 柴胡各五分

右剉劑白水二鐘煎至八分去滓熱服

將軍定痛升

治巔頂痛挾痰濕
實者動輒眩暈用

黃芩

酒洗七錢

白殭蠶

陳皮

鹽煮去白

天麻

酒洗

精相

各五錢

青礞石

煨

白芷

各二錢

薄荷

三錢

大黃

酒蒸九次

焙乾二兩

半夏

牙皂角汁煮
焙乾一兩

右爲細末滴水爲丸如棗豆大每服二錢食後臨臥茶清下

藥枕米

治魚風
目眩

通草

防風

石菖蒲

甘草

犀角

剉末

羚羊角

剉

蔓荊子

各三錢

細辛

白芷

藁本

真川芎

白朮

黑豆

一升

陳

半

陳

半

陳

右爲細末相拌均勻以生緝囊盛滿置在盒子內其盒形如枕枕時搗去盒蓋令囊藥透氣又頭不枕即蓋之使藥氣

不散枕之日久漸低再入前藥仍要滿十或添黑豆三五日後藥氣微則換之枕旬日或一月耳中林鳴是藥抽風之驗也

左右偏頭風症

左右偏頭風發則各不同左發則左壞右發則右壞人多不爲慮致使失光明

此症左邊頭痛右不痛者曰左邊風右邊頭痛左不痛者曰右偏風世人往往不以爲慮久則左發損左目右發損右目有損左反攻右右損反攻左而兩目俱損者若外有赤痛泪澀等病則外症生若內有昏渺眩暈等病則內症生凡頭風痛左害左痛右害右此常病易知者若左攻右右攻左痛從內起止於腦則攻害也遲痛從腦起止於內則攻害也速者

痛從中間發及眉稜骨內上星中發者兩目俱壞亦各因其

人之觸犯感受左右偏盛起患不同遲速輕重不等風之害

尤慘宜服

羌活芎藭湯 治太陽經頭風

半夏 姜汁炒 杏仁 去皮尖 川芎 活 藁本 川芎

防風 甘草 白茯苓 白芷 麻黃

廣陳皮 桂枝 各等分

右剉劑白水煎服內熱加酒製黃芩薄荷葉生薑三片煎服

柴芎湯 治少陽經頭風

川芎 白茯苓 柴胡 蘇薄荷 細辛

黃芩 製半夏 陳皮 炙甘草 蔓荊子 各

右剉劑生薑三片白水二鐘煎至八分食後服

蒼木湯

治太陰經頭風頭痛
腹滿不食并腹痛

蒼木製

白芍藥

枳壳

白茯苓

白芷

川芎

廣陳皮

半夏炙

升麻

甘草各等分

右剉劑生薑三片白水二鐘煎至八分食後服

細辛湯

治少陰經頭風頭痛
四肢厥但欲寢者

細辛

廣陳皮

川芎

半夏製

獨活

白芷

白茯苓

炙甘草

各等分

右剉劑生薑三片白水二鐘煎至八分食後服

吳茱萸湯

治厥陰經頭風頭痛
四肢厥嘔吐痰洩

半夏薑製

吳茱萸

川芎

炙甘草

人參

白芷

白茯苓

廣陳皮

各等分

右剉生薑三片白水二鐘煎至八分食後服

升麻芷渴湯

治陽明經頭風頭痛身熱口渴者服

升麻

家乾葛

白芷

蘇薄荷

石膏

川芎

廣陳皮

半夏製

甘草各等分

右剉劑生薑三片白水二鍾煎至八分食後服

眉骨痛

按眉稜骨痛有二眼屬肝有肝虛而痛纔見光明則眉骨痛甚宜服生地黃丸有眉稜骨痛目不能開晝夜劇宜導淡丸湯之類加人芽奈二陳湯吞清用白丸子亦効二甫見眉稜骨痛者多是肝火上炎怒氣甚者多有此病其謂風症亦火之所致熱甚生風是也大抵抑肝火有風痰則兼而治之

陰邪風症

陰邪額角痛多尚熱時來元虛成內障火實外生災此症專言

額角板骨及眉稜骨之病也發則多於六陽用事之時元虛

精弱者則為內症若兼火者則為外症宜服

加味柴胡湯

柴胡

酒苓

荆芥穗

製半夏

甘草

川芎

防風

香白芷

蘇薄荷

五片

前胡

各等分

右剉劑生薑三片白水二鐘煎至八分食後服

生熟地黃湯

治目不光明眉骨痛甚此係肝虛法當養血涼血益血痰火降而風熱除

熟地黃

甘草

生地

五味子

當歸身

地骨皮

酒苓

枳殼

天門冬

人參

川黃連

柴胡

右剉劑白水二鐘煎至八分食遠服

驅風上清散

治風熱上攻眉稜骨痛

酒黃苓

二錢

白芷

錢半

羌活

防風

柴胡稍

各一錢

川芎

一錢二分

荆芥

八分

甘草

五分

右爲細末每服四錢白水二鐘煎至八分食後服

上清散 治因風頭痛眉骨眼

乳香 另研 沒藥 研各一錢 腦子 另研五分 赤芍藥

川芎

薄荷 芒硝 荆芥穗 鬱金 各五分

右為細末每用一字口噙水鼻內搐之甚妙

陽邪風症

枕痛是陽邪寒時痛最奢年來不着意致使眼生花此症專言腦後枕骨痛之病也多發於太陰用事之月發則有虛昏耳

鳴之患矣久而不治內障成耳宜服

防風羌活湯 治眉棱骨痛而風寒在腦或感痰濕及腦昏痛宜此

防風 川羌活 半夏 姜製 黃芩 酒洗 南星 姜製

白朮 土炒 羌細辛 甘草 炙 川芎 各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓熱服

子和搜風丸 治風熱上攻眼昏耳鳴鼻塞頭痛眩暈逆痰涎嗽心腹疼痛大小便滯

人參 茯苓 天南星 姜製 蘇薄荷 各五錢 黃芩

半夏 姜製 乾生薑 寒水石 蛤粉 大黃

生白礬 各一兩 黑牽牛 滑石 各一兩 藿香 一錢

右為細末水盪為丸如桐子大每服二三錢量其體之虛實

酌用生姜湯送下日進三服

按此方名為搜風其實乃下實熱痰症藥也

磁石丸 治已上頭風

磁石 燒成內障服 乾姜 炒 五味子 炒 牡丹皮

立參 各一錢 附子 炮三錢

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服十丸食前茶清送下

目赤 戴復菴云赤眼有數種氣毒赤者熱壅赤者有時眼赤者無非血壅肝經所致蓋肝土血通竅於眼赤血病也

瘀血灌睛症

無端瘀血灌睛丹喪目亡明是禍端變症風生休小視急將開
導用鍼砭

此症爲目病最毒舉世無知若人偏執已見不用開之者其
目必壞初起不過紅赤坎後紫張及白睛脹起甚則脹形如
虬筋蓋其病乃血貫睛中滯塞不通在脾則腫脹如梧桐瘡
之患在珠則輪湧起凝脂黃膜痕爛成窟花翳白陷鵝眼凝
睛等症失治者必有青黃牒出癩凸之禍凡見白珠赤紫脾
腫虬筋紫脹敷點不退必有瘀滯在內可翻脾內視之若脾
肉已發泛浮椒瘡粟瘡者皆用導之之法不然變症生矣宜

分珠散

治眼患瘀血灌
睛惡血不散

槐花

生地黃

白芷

炒梔子

荆芥

龍膽草

黃芩

甘草

赤芍藥

當歸尾

各等

右爲末每服三錢白水二鍾煎至八分去滓熱服春加大黃

瀉肝夏加黃連瀉心秋加桑白皮瀉腫

宣明丸

治眼內瘀血貫睛赤腫涩痛大熱壅上

赤芍藥

當歸尾

黃連

大黃

生地黄

薄荷葉

黃芩

川芎

各等分

右爲末練蜜爲丸如桐子大每服三錢食後米飲送下

血貫腫神症

血灌瞳神病最奇世之患者亦云稀神膏膽汁俱傷損急急醫

時亦是遲

此症調視瞳神不見黑瑩但見一點鮮紅甚則紫濁病者甚

危一二日尙可救蓋腎之真一有傷膽中精汁皆損元陽正

氣皆耗故此一點之神光不見而血之英色來乘腎部十患
九不治者今人但見瘀血灌時便為血灌瞳神不知血灌瞳
神乃清陽純和之氣已損其英華血色乘於腎部命亦不久
豈比火入量分瘀疑有形之急者比平宜服

墜血明目飲

細辛

人參各一錢

赤芍藥

五味子

十粒

川芎

酒洗

牛膝

酒洗

山藥

石決明

醋煨

生地黃

當歸尾

知母

鹽水炒

白蒺藜

便去刺

防風

各八分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓温服

摩挲石散

摩挲石

少許

曾青

龍腦

石膽

各一分

右研極細膩粉每日早晨夜後點眼

落紅散

治貫瞳神
致成紅障

川山甲 炒

桔根 炒

礞砂 研細
另入

人退

焙各
三錢

穀精草

痞

蟬退

去頭
足

蛇退

蟬蛇二
退入甘

草水洗淨焙乾

鵝不食草

紙烘乾
末各一錢

右為細末吹入鼻中次日以筒吸目漸次為之自然障落

造吸筒法或用好銅打成漏卞相似筒上留一竅用猪脂薄

皮札筒竅上如臨用時以筒又安病目上醫者吸氣一口次

看其翳輕重漸吸則漸除矣

色似胭脂症

白珠火滯血難通色似胭脂染抹紅清肺制金頻散血莫教久

滯在輪中

此症白睛不論上下左右但見一片或一點紅血儼似胭脂

者此因血熱妄行不循經絡偶然熱客肺膜之內滯而成

者此因血熱妄行不循經絡偶然熱客肺膜之內滯而成

患常有因嗽起者皆肺氣不清之故須以清肺散血之劑外
點樂逐之宜服

退赤散

桑白皮

蜜製

甘草

牡丹皮

酒洗

黃芩

酒炒

天花粉

赤芍藥

桔根

當歸尾

瓜蒌仁

去殼油爲霜各等分

右爲細末每服二錢麥門冬去心煎湯調下

赤絲虬脈症

赤絲虬脈起白白睛縱橫赤脈連在風輪虬來龐細各有重輕
燥熱濕熱澀急羞明或食或痛或泪如傾或不痛癢只是昏朦
勿視天行赤熱勿視赤脈貫睛久而失治變症蜂生量其虛實
治以安寧

此是謂氣輪有絲脈赤虬常時如是者或因目病初起失養

致血滯於絡而赤者其病生在氣輪白珠有絲脈縱橫或稀
蜜竈細不等但久而不愈非諸赤熱之比若只赤虬昏昧澀
緊不爽或有微泪濕熱者輕因犯傳變者重若脈多赤亂兼
以粘澀而緊痛泪濕而爛腫者看從何部分來或穿連某位
卽別其所患在何經絡或傳或變自病合病等症分其生尅
乘制然後因症分經以治之凡見絲腫亂紫內服外點點時
細縮不點卽脹若激動病變者珠雖不紫脾雖不腫亦有滯
在絡中幽深之所故未脹出耳須揚開上臍深處看之其肉
必有不平之色因其滯而量其輕重各略導之不可大過過
則傷其真血水虧膏澀昏弱之患至矣宜服點並行

退熱散

赤芍藥

黃連炒

木通

生地黃

炒梔仁

黃柏

鹽水炒

黃芩

酒炒

當歸尾

甘草稍

丹皮

各等

右為末每服五錢白水二鍾煎至八分去滓熱服

點眼麩仁膏

治風熱眼飛血赤脈癢痛無定

麩仁

去殼去皮心膜油取霜五錢

好酥

一栗子大

右將麩仁與酥和勻研攤碗內用艾一小團燒烟出將碗覆

烟上薰待艾烟盡即止重研勻每以麻子天點眼兩背頭目

二度

白痛

白眼痛有表裏等症或痛極而痛從外走內者宜溫之散之有不紅腫而澀痛者火伏氣分瀉白散為主有目

珠變青藍色乃鬱血蒸逼走散珠中極宜調氣以養之

白澀症

不腫不赤爽快不得沙澀昏矇名曰白澀氣分伏隱脾肺濕熱

此症南人俗呼白眼其病不腫不赤只是澀痛乃氣分隱伏

之火脾肺絡濕熱秋天多患此俗稱稻芒赤目者非也

桑白皮湯

桑白皮一錢澤瀉各八分黑玄參各八分甘草二分黃芩

麥門冬去心旋覆花各五分菊花五分地骨皮 桔根

白茯苓各七分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓溫服

白珠俱青症

邪攻精液神膏走色變青藍無白珠急訪明醫求妙手免教走

盡悔之遲

此症乃目之白睛而變青藍色也病症尤急蓋氣輪本白板

鬱邪蒸逼走入珠中膏汁遊出入於氣輪之內故色變青藍

瞳神必有大小之患失治者瞳神損而終身疾矣宜服

還陰救苦湯

見

天麻 家菊花 川芎 羌活

白菊花 甘草

錢一分 各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食後熱服

傷寒瘧後白珠青者加柴胡麥門冬 黃芩 天花粉 毒氣

所攻白珠者加黃芩牛旁子 炒研 連翹 黃連

目癢 癢有因風因火因血虛而癢者大約以降火為主然有為血行而癢目將復明火散發癢宜平肝滋榮為主

癢如蟲行病屬肝心無病而癢病始求侵有疾而癢其病愈深

常時小癢又當辨明輕重進退宜審其因

此症非謂常時小癢之輕如蟲行之癢不可忍者須驗目上

有無形症決其病之進退至於有障無障皆有癢極之患病

源非一有風邪之癢有邪退火息氣血得行脈絡通暢而癢

大抵有病之目久不治而住癢者癢一番則病重一番若醫
治用藥後而癢作者病必去速若癢極難當時時頻作目覺
低陷者命亦不久矣有癢極面目脫者死期近矣泪多者血
虛夾火大抵痛屬實癢屬虛雖火乘虛而入非其本病也宜

服

驅風一字散治目癢極難忍

川烏炮 川芎 合荆芥各五錢 羌活 防風各二兩

右為細末每二錢食後蘇薄荷湯調下

人參羌活湯治肝熱濕癢昏朦

赤茯苓 人參 羌活 獨活草 地骨皮

川芎 柴胡 桔梗 枳殼 細甘草

前胡 天麻各等

右甄劑白水三鍾煎至八分去滓熱服癢甚者加防風荆穗

廣大重明湯 治兩目臉赤爛熱腫痛并稍赤及眼臉癢極

防風 川花椒 龍膽草 甘草 細辛 各等分

右剉如麻豆許大內甘草不剉只作一挺先以水一大碗半

煎龍膽草一味乾一半再入餘三味前至小半碗去滓用清

汁帶熱洗以重湯頓令極熱日用五七次洗畢合眼須更癢

亦減矣

腫脹 按腫脹有風熱上攻有燥火客邪或黑珠疼甚或自睛腫痛皆因肝經實熱或眵熱於肺俱宜清火散風治之

腫脹如極症 其本熱也宜

腫脹如極目最疼泪多怕熱與羞明若侵頭腦連眶痛木火為

殃禍不輕勿使睛中灌瘀血管教變症似風生

此症謂目赤痛脾脹如極覆也是邪火有餘肝木受尅而火

不能生故火邪反乘虛而為炙燥之病其珠必痛而脾緊硬
若暴風客熱而作痛者必多熱泪而珠痛猶為稍絞風熱外
感易治若木火內攻則病退遲重則瘀滯塞目血灌睛中而
症變不測須用開導輕則敷治而退重則必須開導若敷渚
不退退而復反開導不消消而復痛連頭腦或腫愈高而脾
愈實此風熱成毒也宜服點

散熱瀉毒飲干

牛旁子 研炒

羌活

黃連

黃芩

蘇薄荷

防風

連翹

各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食後服

金絲膏

治風熱上攻
目赤腫痛

黃連 二兩

龍膽草

大黃

黃柏

去皮
當歸

山梔仁

各一兩

乳香

去油研

礪沙

明者

燈心

各三錢半

青竹葉

一斤

大棗

二十枚
去核

右用水五升不拘冬夏浸一時辰取出於銀石器內慢火熬不令大沸候滓盡汁出下火放冷用絹絞取汁於無風塵處澄一時辰去滓於器內用漫火熬冷減半入白蜜半觔同攪將有蜜者以手挑起有絲則止放冷再以夾絹袋濾過用磁合盛之每取一茶匙許研龍腦一字極細入膏同研一二干遍合勻取少許點之

狀若魚胞症

白睛擎肉起魚胞狀浮腫緣因金火搏致爲目禍苗清涼宜早治依舊復平消

此症氣輪腫起不紫不赤或水紅或白色狀若魚胞乃氣分

之病不用開導惟宜清涼自然消復若頭疼泪熱及內燥而

赤脹多者防有變症宜服

玄參飲 台肺臟積熱白睛腫脹遠蓋
腫神開張不得赤澀疼痛

玄參

漢防風

升麻

羚羊角

剉末

沙參

梔子 炒

車前子

大黃

微炒

桑白皮

火麻子

杏仁

去雙仁皮尖湯浸
麩炒黃各等分

右剉劑白二鍾煎八分去滓熱服

洗眼睛皮湯 治眼白睛腫
起赤翳癢

委蕤

去殼
臨碎 桑白皮

青皮 各錢

玄參

大黃

梔子仁

各五分

青鹽

一分
另人

竹葉

十片

右剉劑水二鍾煎至一鍾濾去滓入鹽微熱淋洗冷即再苑

熱洗

鸚鵡眼凝睛症

眸子起癸轉動不得壅滯不通三焦閑格名鸚鵡眼凝睛防變出之疾

此症有項強頭面臉赤燥之患其狀目如火赤脹於脾聞不能斂運轉動若廟堂凶神之目猶鸚鵡鳥之眼珠赤而定疑故目鸚鵡眼凝睛乃三焦閑格陽邪實盛亢極之害風熱壅阻諸絡澀滯目欲爆出矣先於內迎香太陽兩脾上星等穴要臨之所並鍼而攻治之宜內服外貼

瀉腦湯

防風

車前子

木通

羌蔚子

茯苓

玄參

熟大黃

桔梗

玄明粉

黃芩

酒炒各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食遠熱服

摩風膏

黃芪

細辛

當歸

杏仁

去皮尖
為霜

防風

松脂

各五錢

白芷

以
為末

黃蠟

各一兩

麻油

四兩

先將蠟油溶化前藥共研為細末慢火熬膏絞入退其火性

貼戈陽穴

旋臚泛起症

氣輪官平水輪尚明惟風輪而湧起或赤脈以縱橫肝氣獨盛血液欠清莫使風輪俱突致累損及瞳神

此症目病氣輪自平惟風輪高聳而起也或有從風輪左邊突起亦有右邊突起者乃肝氣獨盛膽液澀而木道滯欠鬱風輪故隨火張起或上或下或在左右各隨火之所致從上脹者多非比旋燥尖起已成症而但凸起頂尖不可醫都類

均宜服

瀉肝散

升麻

木賊草

細辛

甜葶藶

酒炒

黃連

陳皮

五靈脂

黃芩

酒炒

家菊花

赤芍藥

大黃

酒炒

蘇薄荷

防風

梔子仁

炒

甘草

玄明粉

各等分

右爲細末每服二錢食遠白滾湯調下爲劑亦可煎服年老

人加枳殼厚朴

救睛丸

兼治同症
青膏有翳

當歸身

蒼朮

酒炒

荆芥穗

蟬退

去頭
足起

草決明

炒

薄荷

甘草

川芎

酒炒

穀精盡

枳殼

炒

木賊草

各等分

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一九食後茶清化下

珠突出眦症

珠突出眦疼痛難當既離兩臉枉覓仙方虛乃氣血之不足實則暴火之爲殃若然半出猶可復康脈絡既動終是無光

此症專言烏睛暴然突出眦也非比翳眼症因滯而漫漫脹出者不同有真元將散精華衰敗致脈絡俱損癢極揩擦而出者其人不火必死有醉酒怒甚者及嘔吐極而突出者有因患病熱甚致關格亢極而脹出者有因怒甚吼哮而掙出者皆因水衰液少精血虧損故脈絡溼脆邪氣盛極火無從出而竅澀泄之不及故湧脹而出有因打撲而出此亦偶然之禍凡出雖離兩臉而脈絲未斷者乘熱捺入雖入脈絡損動終是無光若雖突而猶舍者易入光不損若離臉脈絲絡俱斷而出者不能救矣宜服

救睛丸

枸杞子

蒼木

山梔仁

炒黑

赤芍

蘇薄荷

各等分

右爲細末酒糊爲丸如桐子大每服三錢并花涼水送下或

冷茶清亦可少年之人可服年老之人可服後方

立退丸

一名定志丸

硃砂

另研爲依

人參

各二錢

天門冬

去心烘乾

石菖蒲

炒

遠志

去心

麥冬

去心

預知子

各一兩

白茯苓

二兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服一錢五分茶清送下或

沸湯亦可

水淋法

治眼睛腫脹突出新淚涼并水沃眼中頻數換水眼睛

外障

凡赤脈醫初從上而下者屬太陽以太陽主表其病必

速之赤脈醫從下而上者或從內皆出外者皆屬陽明以陽明主治其症熱或便實是也治以下之寒之赤

脈弱初從外皆入內者為少陽主半表半裏治宜和解
之弱膜者風熱重則有之或班人眼此肝氣盛而發在
表弱膜已生在表明矣宜發散而去之也若反疎利門
邪氣內搖為弱蓋深邪氣未定謂之熱弱而浮邪氣已
定謂之水弱而沉邪氣牢而深者謂之陷弱當以煖發
之物便其邪氣再動弱膜乃浮佐之以退弱之某而能
自去也病火者不能速效宜以歲月漸除之新弱所生
表散方東垣羌活除弱湯有熱者退雲丸之類煖發陷
弱保命集羚羊角散之類治之在人消
息若陰虛有熱者兼服神仙退雲丸

黃膜上衝症

黃膜上衝病最真風雲膏內起黃雲白際黑雲深處裏直從坎
位灌瞳神只因大便結最惡是頭疼經絡多壅滯火燥溼炎蒸
錯認湧波翳空令目不明

此症於風輪下際坎位之間神膏內初起而色黃者如人指
母與白岩相似若疑脂之症但凝脂翳從輪外生點藥可去
此在膏內點藥所不能及者若慢及瞳神其珠必破不可悞

認爲湧波治之此是經絡塞極三焦關格火上諸邪之盛實者故大便秘而小便塞則膏火蒸作濃若上衝失治昌瘕之患必矣宜服

通脾瀉胃湯

是症最逆非一方可療即究脈之虛實當隨所因置方施藥可也

麥門冬

去心

芫蔚子

各一錢半

知母 玄參 車前子

軟石膏

煨

防風

各一錢

黃芩 天門冬

熟大黃

右剉劑白水一鍾煎至八分食遠服熱甚者加玄明粉一錢

立應散

治內外障翳昏澀多淚及暴赤眼一切目疾並皆治之二次搗鼻

鵝不食草

洗淨晒乾

香白芷

洗

當歸

去鬚洗

羊躑躅花

減半

川附子

泡去皮臍

雄黃

男服後入各等分

右爲細末入麝香少許和勻含水嚙鼻內去盡濁涕淚出爲

度

亦膜下垂症

赤膜下垂腦蘊熱珠若痛時有滯血要求變症不生時上脾瘀血須開決

此症初起甚微次後甚大大者病急其黑有障色赤多赤脹從白輪貫下也而黑珠上邊從白際起障一片仍有赤絲率絆脹大絲麓赤甚泪澀珠疼頭痛者病急而有變絲細少色微赤珠不疼頭不痛者緩而不變亦有珠雖不疼頭不痛者如無他症或只色赤而生薄障障上仍有細絲牽絆或於障邊絲下仍起星數點此星亦是凝脂之微病也此等皆是火在內滯之患其病尚輕治亦當善蓋無形之火潛人膏肉故作是症非比有形血熱之重也若障上有絲及星生於綠稍皆是退遲之病爲接得絲脈中生氣故易生而難退雖然退

遲亦善退爲上至於甚者不得已而開導之大抵白珠上半
 邊有赤脉生起垂下黑珠者不論多寡但有疼痛虬赤便是
 凶症總是絲少赤微或細麓連斷或貫瞳神或翳薄翳厚皆
 是惡症便是可治亦當耐久此症係濕熱在腦幽隱之火深
 潛在絡故有此脉之赤四圍雖無瘀血其深處亦有滯積故
 滯深而火赤甚一旦觸發則患迸發疾亦甚矣內見涩滯外
 無此病輕重消散重者開導此一定之治法也宜服

皂角丸

治內外一切障膜此藥能消膜遮翳如
 十六般內障同生熟地黃丸用之神効

川山甲

炒

蟬退

白朮

土炒

玄精石

生用

穀精草

木賊草

當歸

酒洗

茯苓

赤芍藥

各一兩

龍退

七條炒

刺蝟皮

蛤粉炒

連翹

龍膽草

菊花

各兩

人參

真川芎

各五錢

獷猪爪

三十枚蛤粉炒

右爲細末一半入獐牙皂角二條燒灰和勻煉蜜爲丸如桐
子大每服三十九丸空心杏仁湯送下一半入仙靈脾一兩爲
末和勻每服一錢用豬肝夾藥煮熟細嚼及用原汁湯送下
每日進三服

洗眼金絲膏

治遠年近月翳膜遮睛攀睛努肉昏暗泪多難視
不明或風氣攻注臉生風粟或連睪赤爛怕羞

明癒
澀

難開

黃連

去鬚
五錢

雄黃

研飛
三錢

麝香

另研
五錢

赤芍藥

硃砂

另研

乳香

另研
五錢

硼砂

另研
五錢

當歸尾

各二錢
五分

右爲細末後入研藥拌勻再研煉蜜爲丸如皂角子大每用

一丸安淨盞內沸湯泡開于無風處洗藥冷閉目少時候三

兩時晨再煨熱依前洗十圓可洗三五次勿犯銅鐵器內洗

如暴赤眼腫者不可洗也

凝脂翳症

若問凝脂翳世人皆不識此是禍之端變症不可測血滯神膏傷氣壅經絡澀熱向腦中催膿攻如風急有癩或無癩嫩而帶黃色長大不多時音瞽定可必緩則膏俱傷非枯應是凸若不急早翳當作經身疾

此症爲疾最急昏瞽者十有七八其病非一端起在風輪上
有點初生如星色白中有癩如錢刺傷後漸漸長大變爲黃色
色癩亦漸大爲窟者有初起如星色白無癩後漸大而變色
黃始變出癩者有初起便帶穉黃色或有癩後漸漸變
大者或初起便成一片如障大而厚色白而嫩或色淡黃或
有癩無癩而變者或有障又於障內變出一塊如黃脂者或
先有痕癩後變出疑脂一片者所變不一爲禍則同治之不

問星障但見起時肥浮脆嫩能大而色黃善變而速長者卽此症也初起時微小次後漸大甚則爲窟爲漏爲蟹睛內消睛膏外爲枯凸或氣極有聲爆出稠水而破者皆此鬱迫之極蒸灼肝膽二絡清氣受傷是以枯及神膏潰壞雖遲不過旬日而損及瞳神若四圍見有瘀滯者因血阻滯道路清汁不得升運之故若四圍不見瘀滯之甚者其內絡深處必有阻滯凡見此症必當晝夜醫治若遲待長大而蔽滿黑睛者雖救得珠突亦帶疾矣治後珠上必有白障如魚鱗圓狀等翳終身不能脫若結在當中則視昏渺耳凡目病有此症起但有頭痛珠疼二便燥澀卽是極重之症二便通利禍亦稍緩二有於斯九爲可畏世之治者多不能識其患者爲害甚矣宜服

四順清涼飲子

當歸身

龍膽草

酒洗

黃芩

蜜製

桑白皮

生地黃

枳殼

各八分

炙甘草

熟大黃

防風

川黃連

炒

芎藭

木賊草

羌活

柴胡

各六分

右剉剉白水三鍾煎至八分去滓食遠服

花翳白陷症

疑脂四邊起膏傷目壞矣風輪變白膏低陷如牛糝總是見瞳

神也知難料理

此症因火爍終兩膏液蒸傷疑脂從四圍起而慢神珠故風

輪皆白或微黃魚看之與溫障相似而嫩者其輪白之際四

圍生翳而漸漸厚潤中間尚青未滿者瞳神尚見只是四方

皆起中間低陷此金剋木之禍也或於脂下起黃膜一片此

二症夾攻尤急亦有上下生起各順逆障此症乃火上鬱逼之禍也亦有不從沿際起只自凝脂色黃或不黃初小後大其細條如翳或細顆如星四散而生後終長大牽連混合而害目此是木火之禍也以上三者必有所滯治當尋其源濬其流輕則清涼重則開導若病慢及瞳神不甚厚重者速救可以挽回但終不能如舊雖有瞳子光不全矣宜服點

洗肝散

當歸尾

川芎

防風

蘇薄荷

生地黄

家菊花

紅花

蘇木

白蒺藜

刺去羌活

蟬退

去頭足

木賊草

赤芍藥

各五

甘草

二錢

右爲末每服三錢白水二鍾松絲十餘根煎至八分去滓服

琥珀散

治目積年

魚賊魚骨

五歲先於瓮石磨去其澀用好者一錢

硃砂

白者琥珀

馬牙硝

三珊瑚水二硼砂

各五錢

珍珠

一兩

石研極細膩令勻每日三五次點於目翳處久閉

蟹睛症

蘇丹

蘇木

白芷

蘇合

膏出風輪破欲流蟹睛形狀吐珠眸及時醫治毋遲緩瞳子傾危不可收莫待青黃俱凸出清光今世好難求

此症謂真精膏損凝脂破壞風輪神膏綻出黑顆小如蟹睛

大如黑豆甚則損及瞳神則有杏仁棗核之狀至極則青黃

凸出此症與黑翳如珠相類而治則不同夫黑翳如珠從膏

內生起此症因破而出然有虛實三症虛者軟而不疼來遲

可去實者堅而多痛來速難去令雖急治亦難免癩癩矣宜

服

防風瀉肝散

遠志肉

人參

桔梗

細辛

防風

赤芍藥

黃芩

甘草

羚羊角

均細末
各等分

右為細末每服錢半或二錢食遠沸湯調取

瀉肝湯

治實蟹
睛服

地骨皮

玄參

車前

玄明粉

各一錢

羌蔚子 二錢

大黃

知母

各一錢半

右剉劑白水二鐘煎至八分去滓食後服

水瑕翳症

水瑕翳似水清瞳神在內見分明年月雖多當是此世人盡道

一圓星內有妙人不曉爾看好看他妙光滑清薄又無多陽看

大兮陰看小金水滯氣最難醫點藥整年猶未好若在風輪不

掩瞳視有光明且休惱

此症薄薄隱隱或片或點生於風輪之上其色光白而甚薄如水上之翳若在瞳神傍側或掩及瞳神者人雖不覺目自昏眊大凡風輪有痕癩的點服不久不會補得水清膏足及凝脂聚星等症初發點服不會去得盡絕並點片腦過多障迹不去得盡而金氣水液凝結者皆為此症大抵治雖不能速去然新患者必用堅守確攻久而方退若滑澀深沉及久患者雖極治亦難盡去矣宜服

開明丸

治遠年近日翳障昏育
寂無所見一切目疾

羊肝

須用白羊者只用肝薄切瓦上焙乾子作末或只以肝者爛研為丸庶可久留少則以寂漬之

官桂

五錢

鬼絲子

水淘

草決明

防風

地膚子

地膚子

地膚子

杏仁

炒去皮尖

茺蔚子

麥冬肉

焙乾

葶藶

葶藶

葶藶

五味子

麩仁 去皮

枸杞子

青箱子

黃芩

細辛

便下

濯瀉

車前子

各一兩

熟地黄

兩半酒水煮爛搗膏

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十九丸白滾湯送下日

進三次仍忌生薑糟酒炙煇熱物

琥珀煎

治服生丁翳人治不瘥

明硃砂

另研

貝齒

各五錢

琥珀

另研

龍腦

各二錢五分

馬牙硝

煉過者七錢

右同研極細賦如麩以水一盞別入蜜一兩攪和入有津滋

確中重湯煮以柳木枝前取用一合已來即住以綿濾過於

不津磁確中盛之或銅器亦可每取少許點之一方為細末

點

陰陽翳症

霍亂理四 卷之三
一片如圓翳相連又一圈一虛兼一實兩兩貫相連各號陰陽翳心堅久始痊

此症黑睛上生二翳俱白色一中虛一中實兩翳連環如陰陽之圈若白中略帶焦黃色或純白而光滑沉澀者皆不能去盡若有細細赤絲絆者退尤遲大略此症非心堅耐久不能得其効也宜服

羗活退翳散

羗活

五味子

黃連

當歸

升麻

酒洗 各二錢

黃栢

酒炒

龍膽草

酒洗

甘草

炙

黃芩

赤芍藥

柴胡

黃芪

各三錢

防風

一錢半

煨石膏

二錢半

右剉細末每服五錢水三盞煎至一半入酒少許微煎去滓
臨臥熱眼忌言語

瑪瑙內傷症

一障薄而不厚偏斜略帶焦黃此翳最難除盡名爲瑪瑙內傷膏損精傷之症定知有耗神光若要除根淨絕必須術勝青囊此症薄而圓缺不等其色昏白而帶焦黃或帶微紅俱如瑪瑙之狀者是此雖是生在輪上實是內傷肝膽真氣精液損壞結成此翳最不能治盡或先有重病過後結成者久久耐心醫治方可得減薄但要除盡必不能矣宜服

補肝丸

蒼朮

米泔水製

熟地黃

焙乾

蟬退

車前子

川芎

連翹

當歸身

羌活

夜明砂

龍膽草

酒洗

菊花

各等分

右爲細末米泔水煮豬肝搗爛入末爲丸如桐子大每服五

十九薄荷湯送下

聚星障症

障症異他翳團圓不放開分明星數點怕熱眼多穴四圍有瘀滯變出聚星來

此症黑睛上有細顆或白或微黃色但微黃者急而變重或連綴或團聚或散漫或齊起或先後逐漸相生初起者易治生定者退遲能大者有變團聚生大而作一塊者有凝脂之變連輟四散旁風輪自際起變大而接連者花翳白陷也若兼赤脈疤絆者退遲若星翳生於絲盡頭者不惟退遲亦且變重此症大抵多病於痰火之患能保養者庶幾斷喪犯戒者變症生焉宜服

海藏地黃散

治大小男婦心肝壅熱目赤腫痛生赤翳或日膜遮睛四邊散漫者尤易治若氣滯遮黑睛者多失調

宜速用此方亦
治痘瘡入目

大黃煨 熟地黄

玄參

沙苑蒺藜

防風

黃連酒洗

穀精草

犀角銼末

白蒺藜刺 杵去

木通

蟬退去頭

生地黄

甘草

木賊草

川羌活

當歸身各等分

右為細末每服二錢用羊肝煮湯調下

垂簾障症

垂簾明逆障其障從上生嗟咤年月久混障始漫睛有犯遭痰
滯方纔變赤睛數般相似症辨別要分明

此症生於風輪從上邊而下不論厚薄但在外色薄者方是
若紅赤乃變症非本病也有初起水膏不清而便成此症者
有起先色赤退後膏澀結為此症者因其自上而下如簾垂

下故得其名有症數般相似緩急不同治亦各異不可誤認
 又努肉初生亦在風輪上起但色如肉且橫厚不同一偃月
 侵睛俱風輪起乃氣輪膜內垂下白色而薄與此在外有形
 者不同一赤膜下垂與瘀滯火竇之急者不同此症只是白
 障慢慢生下來不為混障者間有紅赤或微紅而已因其觸
 犯搏動其火方有變症其病從上而下本稱為順何以稱逆
 此指火而言蓋火性本上炎今下垂是逆其道矣故稱曰逆
 焉宜服點

天麻退翳散 治昏暗
失明

白殭蚕 熱水泡去
絲姜汁炒

熟地黄 酒炒
焙乾

白蒺藜 杵去
刺炒

當歸身 酒洗
炒

木賊草

荆芥穗

防風

白芷

黃芩 炒

石決明 醋煨

麥門冬 去心
焙乾

蔓荊子

赤芍藥

蠟退去頭足

羌活

川芎

天麻炒

枳殼

菊花

蜜蒙花各等分

右為細末每服二三錢

捲簾散

治新舊病根昏澀難開翳障遮睛或成努肉連眼赤爛常多冷泪或暴發赤眼腫痛

蘆甘石

四兩 玄明粉五錢入黃連內同煮

川黃連

七錢 搥碎以水一大碗煮數沸濾去滓用

右先將蘆甘石末入煬銅罐內開口煨紅令外有霞色為度

次將黃連玄明粉水中浸飛石候乾又入黃連五分水飛過

再候乾次入

銅青

一兩 白丁香另研 乳香另研 青鹽另研 膽礬另研

膩粉

另研 鉛白霜研合 礪砂另研 白礬半生 川黃連研為末

各五錢

右共研極細膩末同前藥再研勻每用少許點於眼翳處每日點二三次宜久閉爲妙

逆順障症

有障各逆順泪出且睛疼上下圍將至中間末掩睛若不乘時治遮滿失光明

此症色赤而障及絲脈赤虬縱橫上下兩邊生來若是色白不變者乃治後凝定非本症生來如是治之亦不同若色浮嫩能大或微黃色者又非此症乃花翳自陷也凡是風輪際處由白睛而來麤細不等赤脈周圍圈圓侵人黑睛上障起昏澀者卽此症必有痰滯在內蓋滯於左則從左而來右則從右而來諸脈絡皆有所滯則四圍而來脾雖不赤腫珠雖不障疼亦有痰滯在內不可以爲輕視若傷於膏水者則有

翳嫩白大而變為花翳白陷若燥澀甚者則下起一片變為黃膜上衝之病若頭疼珠痛脹急其症又重而急矣宜服

羚羊角飲子

羚羊角

銼末

犀角

銼末

防風

桔梗

玄參

羌蔚子

知母

大黃

炮

甘草

減半

黃芩

草決明

車前

各等分

石剉劑白水二鍾煎至八分去滓食後溫服

混睛障症

混障却分紅白有餘不足之灾紅速白遲皆退久而點服丸開

紅畏紫筋爬定白嫌光滑如苦帶此兩般症候必然難退易來

此症謂漫珠皆一色之障世之患者最多有赤白二症赤者

嫌其多赤脈白者畏其光滑若遇此症必食發物或用藥發

如轉覺昏腫紅赤再用點服愈矣宜服

地黃散

生地黄

當歸

熟地黄

焙乾

大黃

各七錢

黃連

穀精草

木通

白蒺藜

剉去刺

玄參

木賊草

烏犀角

剉細木

羌活

炙甘草

去頭足各五錢

右為細末每服二錢煮猪肝或羊肝汁食遠調下

七寶膏

梅花片

研細三錢

珍珠

研細

水晶

研飛

貝齒

研飛各一兩

石決明

洗淨研飛

琥珀

末各七錢

空青

研飛

瑪瑙

研飛各五錢

石為一處用水五升入砂鍋內煎至一升再加淨川蜜一兩

復煎至一半為膏後入水片未攪勻後退七日火氣每日臨

睡點之早晨不宜點

努肉攀睛症

努肉之病肺實肝虛其努如肉或赤如朱經絡瘀滯氣血難舒
嗜燥恣慾暴者多之先生上匝後障神珠必須峻伐外治方除
此症多起氣輪有脹如肉或如黃油至後漸漸厚而長積赤
瘀努起於肉故曰努肉凡性燥暴悖恣嗜辛熱之人患此者
多从則漫珠積肉視亦不見治宜峻伐久則自愈積而無瘀
之症甚惡及珠尚露皆不必用鉤割之治宜服點

還睛散

並治眼生翳膜昏澀
淚出瘀血努肉攀睛

龍膽草

酒洗

川芎

甘草

草決明

菊花

川花椒

去目炒

木賊

荆芥

石決明

楮實子

野麻子

茯苓

白蒺藜

剉去刺
各等分

無米羗

共為細末每服二錢食後茶清調下日進三服忌一切雞魚

原味及蕎麥麩等物

吹霞散專點努肉攀睛外障

白丁香一錢 白芫

白牽牛各三錢

右研細膩無聲放舌上試過無滓方收貯每日點三次重者
不出一月全愈輕者朝點暮好

定心丸

石菖蒲

枸杞子

家菊花

各五錢

麥門冬

去心烘乾一兩

遠智肉

二錢五分

明辰砂

研細二錢另入

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三十九丸食後白滾湯送

下

雞冠蜆肉症

蜆肉與雞冠形容總一般多生於脾背後及氣輪間禍中火上

燥癢滯行血難久則漫昧結無光病漸添

此二症謂形色相類經絡相同治亦同法故總而言之非二病之同生也其狀色紫如肉形類雞冠蜆肉者即是多生脾胃之間後害及氣輪而盡掩於目治者須宜早割不然恐病人徒費藥力即欲割亦無益矣蓋目大眥內有一塊紅肉如雞冠蜆肉之狀此乃心經血部之英華不可悞認割之若悞割輕則損目重則喪命矣慎之慎之宜

涼膈清脾飯

治脾經蘊熱疑結而成其患眼胞内生如菌頭蜆肉根小頭漸長垂出甚者眼翻流泪亦致昏朦

荆芥穗

石膏

防風

赤芍藥

佐地黃

山梔仁

黃芩

連翹

蘇薄荷

甘草

減半餘各

右劑白水二鍾燈心三十段煎至八分去滓食遠熱服

翠雲吐治眼胞內生菌毒用左手大指平佃於患根右手以披針尖頭齊根切下血出不妨隨用此錠磨濃塗之其血

正自

銅綠一錢
研末

賦粉五錢

輕粉一分

右研極細末用黃連一錢同川米百粒水一盞煎去半再熬折去二分和藥作錠陰乾臨用清水磨搽兼治爛弦風或暴赤腫痛者縑搽更妙

魚子石榴症

魚子石榴之症世人罕見斯災魚子一宗而起石榴四角而來俱是脾肺積毒必須剗割方開

此二症經絡治法相同總而言之亦非之病同生血子障非聚星之比又非玉粒之患此其狀一片外面纍顆聚萃而生或淡紅或淡白色狀如橘子錠露於房其病紅肉顆或四或

六或八四角生來障滿睛眵視亦不見以上二症俱是障部
瘀實之病目疾之惡症治須用割割後見三光者方可若
黑者必瞳神有損不必治之如畏刺割者以散服點之
抽風湯

防風

立明粉

柴胡

大黃

黃芩

桔梗

車前子

細辛

各等分

右剉劑白水二鍾煎至一鍾去滓食後溫服

化積散

白丁香

五粒

淨朴硝

少許

礪砂

一分

冰片

許

右研極細膩無聲者點之

四

中... 卷...

白... 卷...



册...

... 卷...

... 卷...

... 卷...

... 卷...