

類傷寒與此同治法

茯苓

半夏

南星

枳實

黃芩

爪姜仁

白术

陳皮

甘草

桔梗

人參

黃連

年力壯盛先用吐痰法後服此湯

水二鍾姜三片枣二枚槌法臨服入竹瀝姜汁

溫服

加減調中飲 治食積類傷寒頭疼發熱惡寒氣  
口脉緊盛但身不痛此為異耳經云飲食自倍  
腸胃乃傷輕則消化重即吐下此良法也

蒼术 厚朴 陳皮 甘艸 白术 山查  
神曲 枳實 草菓 黃連 乾姜

腹中疼加茺朮 痛甚大便實熱加大黃下之  
去山楂草菓神曲干姜

心中元々欲吐者與乾霍亂同吐法用滾水丁  
碗入鹽一撮皂角末五分探吐

水二鍾姜一片臨服入本香磨汁調服即効

加減續命湯 治脚氣類傷寒頭疼身熱惡寒肢  
節痛便秘嘔逆腳軟屈弱不能轉動但起於脚

膝耳禁用補劑及淋洗

防風 茜草 白朮 川芎 防已

桂枝 甘草 麻黃 蒼朮 羌活

暑中三陽所患必熱脉來數去附子桂枝麻黃  
加黃柏黃芩柴胡 寒中三陰所患必冷脉來  
遲加附子 起于溫者脈來弱加牛膝木瓜

起於風者脈來浮加獨活 元氣虛加人參少  
許 大便實者加大黃

水二鍾姜一片東二枚灯心二十莖桃核臨服

入姜汁調服

芩連消毒飲 時天行大頭病發熱惡寒頭項腫  
痛脉洪取作瘀症治之其喉痺者亦照此方治

柴胡

甘草

桔梗

黃芩

川芎

荆芥

黃連

防風

羌活

枳壳

連翹

射干

白芷

先加大黃

利去

一二次

後依本方去大黃加

人參當歸

水二鍾姜三片煎一鍾加鼠粘子一撮再煎一

沸搥法入竹瀝姜汁調服  
初起不可用大黃末後不減方可量加  
加味六神通解散 治時行三月後謂之晚發頭  
痛身熱惡寒脉洪數先用冲和湯不愈後服此  
湯  
麻黃 甘草 石膏 黃芩 滑石  
蒼朮 川芎 卷活 細辛  
水二鍾姜三片搥法入早豉一撮葱白二莖煎  
之熱服取汗中病即止 太官詹少吳叔閔校終



寒  
夾陰傷寒  
寒疫  
大頭傷寒

食積  
中濕類傷寒  
痰證類傷寒

瘀血類傷寒  
嗽水不欲嚥  
晝夜偏劇

心下滿  
遺尿  
大便自利  
驚惕

呃逆  
譫語  
鄭聲  
瘡癰不言

陰症似陽  
冷結  
蛇厥  
鬱冒不仁

肉瞯筋惕  
肉苛  
百合  
瘧癰

循衣摸床  
舌捲囊縮  
瘡後發腫

瘡後遺毒  
瘡後發碗頭瘡  
瘡後發腫

瘡後勞復  
瘡後虛弱

瘡後陰陽易

瘡後虛弱

女勞復

瘡後陰陽易

瘡後昏沉

不可水

再三汗下熱不退

產後傷寒

附四肢沉重四肢不收

結陽

四肢冷

太陽傳經用藥

內傷似外感始為

熱中病

內傷似外感未傳寒中病

內傷似外感溫熱病

似外感陽明中熱病

內傷似外感溫熱病

內傷似傷寒

房室傷風

房室傷寒

瘡瘍發熱類傷寒

赤膈傷寒

黃耳傷

寒

解体類傷寒

砂病類傷寒

搖頭

身痒

未交接而作易病治

人迎氣口脉

衝陽脉

太谿脉

結脉

促脉

代脉

目錄終

赤水玄珠第二十四卷

新安生生子孫一奎著輯

藥誤傷人

凡應用小柴胡湯和解誤用承氣湯致身發黃者死中暑作熱病誤用燥劑者死腎虛受寒內逼浮陽之火泛上面赤煩躁身有微熱渴欲飲水不能下咽大便閉或自利小水淡黃或嘔逆或氣短或鄭聲或呴痛狀似陽證醫見面赤煩渴便閉認作陽證誤投寒涼立死陰證身熱面赤

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

足冷煩躁揭去衣被脉來數大無力不急用加減五積散冷服誤用涼藥者死傷寒汗多用利小便藥者死陽明病潮熱汗多小便因少若利乏加喘渴者死濕病若發其汗使之耳聾不知痛處者死病人煩躁自覺甚熱他人以手按其肌膚殊無太熱此為無根失守之火用涼藥者死

○病人應死證

頭重視身此天柱骨倒元氣已敗死人便濁氣極

臭者死目精正圓者死卵縮入腹脹見離經者死瘡後小便澁有血名曰内外瘡皆黑膿不出膿者死水陰下利止頭眩時自冒者死熱盛躁急不得汗出是阳脉極死舌上黑胎生芒刺刮不去易生者死夏月可治真効自汗者死胃寒發呃丁香香柿蒂良姜湯調服脉不出加膽汁合生脉散其脉又不出或暴出者皆死

○望色

晉肥令瘦主瘀肉脫去主不治人消瘦主脾

者死。環白黧黑者死。口張氣直出者死。齒燥無津液者是陽明熱極前板齒燥兼脉虛者是中暑齒如熟者。難治。耳色黑枯燥者是腎憊。目赤唇焦舌黑者屬陽毒。目熏黃色暗者屬濕毒。目黃兼小便利大便黑。小腹滿痛者屬畜血。目瞑者將欲衄血目之白睛黃兼冷無熱不渴。脉沉細者屬陰黃。兩皆黃者病欲愈。凡閉目見人者屬陽閉目不欲見人者屬陰。睛昏不識人目反上視睛小瞪目直視目邪。視目睛正圓戴眼反折眼胞陷下此八者皆

熱眼眶黑主內有瘀。黑色青主腹中痛苦冷者死。鼻色微黑者有水氣。鼻色黃主小便难。鼻色白者屬氣虛。鼻色赤者屬肺熱。鼻色鮮明者有留飲。鼻孔乾燥者必衄血。鼻色燥如烟煤者是陽毒熱極。鼻乳冷滑色黑者是阴毒冷極。鼻流濁涕者屬風熱。鼻流清涕者是肺寒。鼻癧脹者屬肺熱有風。唇白焦紅者吉。唇口焦黑者凶。唇白俱腫赤者是熱極。唇白俱青黑者是寒熱。唇白舌胎斷紋者難治。唇白燥裂者是脾熱。唇青舌捲者死。唇吻色青

死證目睛微定暫時稍轉動者屬瘀目中不了了者睛不知不明白者此因邪熱結實在內不了了者謂見一半天目不見一半天目是也舌腫者難治舌出者死面額頰赤在午後此虛火上升不可作傷寒治面赤脉數無方此伏陰病其證煩躁引飲虛阳上升面赤脉沉細此少阴病外熱內寒阴盛格阳宜溫誤用寒涼者死面赤脉弦數此少阳病宜小柴胡和解綠面赤乃陽氣怫鬱在表汗不徹之故宜發汗面部通赤色此陽明表證未解不可攻

裏宜解肌高唇青是阴寒極面青兼舌捲囊縮亦是阴寒面青兼小腹絞痛是夾阴傷寒面自身黃兼小水短澁是濕熱面目身黃兼小腹滿硬痛小便利是畜血傷寒面白為無神或汗多或脫血而致面白人不宜大汗黑氣在魚尾相牽入太陽者死黑氣自口入者死黑氣自入耳目鼻舌者死面黑人在傷寒內涉虛不宜參水大補

○聞聲

聲清聲濁 痘邪在表其聲清而響亮病邪入裏

其聲濁而不曉

聲輕聲重 痘在陽分其聲前輕後重病在陰分其聲前重後輕

聲斷聲續 痘邪表淺併有餘陽證其聲續病邪入深併內傷不足其聲斷

言壯言怯 外感陽病有餘出言壯厲則寒熱交作內傷陰證不足出言懶怯則寒

熟間作

嘆 嘆是心變動之聲

欠 腎主欠陰氣積下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠也

噫 噫是心變動之聲是胸中氣不交通寒氣客于胃厥逆從上下復出于胃故為噫

嚏 噗是腎變動之聲有病發嚏是傷風或傷熱無病發嚏是陽氣和滿於心

呞 吞是脾變動之聲

呃 其聲皆從胃中至胸嗌間而為呃有胃中實熱失下者有胃中痰飲者有服寒涼藥過多

者有胃中虛冷者

咳

咳是肺變動之聲俗呼為嗽肺為邪干氣逆不下也有肺寒咳者有停食咳者有邪在半

表半裏咳者

唏

陰氣實陽氣虛陰氣速陽氣遲陽氣盛陰氣絕故為唏

噦

怒是肝變動之聲

歌

歌是脾變動之聲

哭是肺變動之聲

笑是心變動之聲

太息

憂思則心系急則氣約氣約則不利故

太息以伸屈之

錯譖

意錯言亂自知言錯邪氣尚輕自不知竟

此熱甚正氣衰

呃嘯

病邪入輕則睡中發此聲也

聲嘶

肺有風熱

聲啞

聲啞唇亡見生瘡是狐惑病有風熱傷心

肺而聲啞者少陰病咽中生瘡者有瘡病

口禁

口禁者有熱病三四日不得汗出者死。口禁難言見手足牽搐是風壅口噤不言。難治陽明病渴欲飲水口噤舌乾白虎加人參湯咽乾不可汗。

口噤咬牙

是風瘡

喉中有聲

喉中嘔有聲者是痰也

卒然無音

寒氣客於厭會則厭不能發不能下至其開闔不便故無音。

聲如鼻鈍

聲如鼻鈍者難治

冬病耳聾

屬氣虛

咽喉不得息

寸脉微浮或沉伏胃中痞鞭氣上衝此胃中有寒宜吐之

鼻息如鼾睡

屬風溫

耳聾兼脇痛

宜和解寒熱咽而口苦屬少陽

耳聾兼手腫耳痛

是少陽風熱

○問因

口苦口甜

口苦是膽熱口甜是肝熱

朱水玄珠

二十四卷

舌乾口燥

是胃家熱極

心下滿

回下早致滿為痞氣手按拍之有聲又

更此停水手按則散此虛氣手按鞭痛

此宿食

喜明喜暗喜明屬陽元氣實喜暗屬陰元氣虛  
睡向壁向外向壁屬陰元氣虛向外屬陽元氣

實

病起覺不舒快少情緒否有此證是夾氣傷寒

病起覺慄卧骨腿酸疼脇痛否有此證是勞力傷

寒要知病在肝經問婦人乳頭縮不縮耳聾耳聾邪氣入深難治或兼虛證有少陽證不可不知

切生死形状六經六絶脉

雀啄連來三五啄屋漏半日一點落彈石鞭來尋即散搭指散亂真解索魚翔似有亦似無鯨遊靜中跳一躍寄語醫家仔細看六脉一見休下藥一動一止兩日死兩動一止四日通三動一止亦日止四動一止八日事五動一止只十日十動一

止一年去春草生時即死期二十一年動二年住清  
明節後始傾亡三十動一丁止三年次立秋節後病  
則危四十動一丁止四年往小麥一熟是死期五十  
一動一丁止五年試草枯水寒時死矣此為太素脉  
玄秘

左右手脉俱急緊盛是夾食傷寒

右手脉來空虛左手脉來緊盛是勞力傷寒  
左手脉來緊盛右手洪滑或寸脉沉身熱惡寒隱  
隱頭痛喘咳煩悶胸脇体痛是夾痰傷寒

左手脉來緊濡布手脉沉數心胸脇下小腹有痕  
處是血鬱內傷外感

鬼脉

得病之初便譫語或發狂六部無脉太指

之下寸口之上有脉動者是

反關脉

如病人六部無脉便不可言其無要在

掌後切看脉來動者是

○傷寒不可發汗

口燥舌乾者口苦咽喉痛者吐血下血者  
淋血者小便淋瀝者大便濁利者內傷勞勦者不

脉微弱者房勞，陰虛者多遺泄精者，風溫者濕溫，者中暑者瘡漏者。

○傷寒發汗不出，熏法

用發表藥汗不出，將蘇葉燒湯以器盛之，至於被內兩膝下熏之。又法用姜粗綿裹周身擦之，其汗自出，此良法也。

○傷寒汗出不往止法

將病人髮披在水盆中，足冷干外，用炒麸皮糯米粉龍骨牡蠣殼為末，和勻周身撲之，其汗自止。此

良法也

○傷寒可吐

胸中懊惱者，喉中有痰聲者，胸滿齶微煩者，中風寒，癥瘕擁塞者，乾霍亂心腹刺痛欲死者，傷寒三四日邪在胃中者，脉大胃滿多痰者，下利日數行寸口脉滑者，寸口脉沉伏或浮滑有痰者。

○傷寒不可吐

病人元氣虛羸者，房勞，陰虛者，勞倦內傷者，胎產崩漏者，寸脈虛細弱無力者，經水適斷適來者少。

陽胆病者

○傷寒吐不出探法

用梔子豉湯大瓜蒂散不得吐隨用三山丸合解毒散煎服再不吐將鶴羽在喉中探吐

○傷寒吐不住止法

用炒糯米一撮生姜少許水煎服凡嘔吐止者亦用此二味入各藥中同煎服嘔吐自止如胃實嘔吐不可用

○傷寒不可下

六脉虛細者嘔吐者腹中時滿時減者不轉戾氣者少陽膽病者腹如雷鳴者陽明面冷赤色者咽中閉塞者血氣兩虛者內傷勞勦者陰虛勞勦者經水適斷適來者胎前崩漏者小便清白者夾明面赤者心下鞭者脉雖大無力者

○傷寒小便不通燒法

一切小便不利先將麝香半夏填患入脐中上用葱白田螺各搗爛成餅封於脐上用布帶縛住良久下角皂莢燒烟熏入月中其水竇自通婦人亦

用皂莢煎湯洗玉戶立通

○傷寒胸膈不寬熨法

下切寒結熱結水結食結痞結血結痰結支結太  
小結胃痞氣結者俱用生姜搗爛如泥去汁取粗  
炒熱絹包漸漸捲心胸脇下其滿痛豁然自愈  
如姜查冷再入姜汁再炒再熨捲之以愈為効惟  
熱結用冷姜查捲之不可炒熱醫當慎之又有傷  
寒衄血將解未尽或熱極及吐血不尽醫不知其  
證遂用涼藥之剤止住其衄血留結於心胸之分

故滿痛而成血結胸也用加味犀角地黃湯

○妊娠傷寒護胎治

用井底泥青黛伏龍肝各為末調勻塗於孕婦脐  
中二寸許如乾再塗上以保胎孕也

○到傷寒家不染病法

凡入病家湏避其邪氣不使染著為上以雄黃末  
塗鼻孔行動從客位而入男子病穢氣出於口女  
子病穢氣出于陰門其相對坐立之間必須識其  
向背

○用藥寒溫合宜論

如麻黃得桂枝則能發汗芍藥得桂枝則能止汗  
黃芪得白朮則止虛汗防風得羌活則治諸風瘡  
木得羌活則止身痛藥胡得黃芩則寒附子得乾  
姜則熱羌活得川芎則止頭疼川芎得天麻則止  
頭眩乾姜得天花粉則止消渴石膏得知母則止  
渴香薷得扁豆則消暑荳蔻得連翹則消毒桑皮  
得蘇子則止喘杏仁得五味則止嗽丁香得柿蒂  
乾姜則止呃乾姜得半夏則止嘔半夏得姜汁則

回癰貝母得瓜萎則開結癰桔梗得升麻開提血  
氣枳實得黃連則消心下痞枳壳得桔梗能使胃  
中寬知母黃柏得山梔則降火豆豉得山梔治懊  
憊辰砂得酸棗則安神白朮得黃芩則安胎陳皮  
得白朮則補脾人參得五味麥門則生腎水蒼朮  
得香附開鬱結厚朴得腹皮開脹草果得山楂  
消肉積神曲得麥芽能消食烏梅得乾葛則消酒  
砂仁得枳壳則竅中木香得姜汁則散氣烏梅得  
香附則順氣芍藥得甘草治腹痛吳茱萸得良姜

亦止腹痛，乳香得沒藥大止諸痛。芥子得青皮治  
腸痛，黃芪得太附子則補陽知母黃柏得當歸則  
補陰，當歸得生地則生血，姜汁磨京墨則止血，紅  
花得當歸則活血，歸尾得桃仁則破血，大黃得芩  
硝，則潤下，皂莢得麝香則通竅，阿魏得肉桂則止  
瀉，木香得枳榔治後重，澤瀉得猪苓則能利水，澤  
瀉得白朮則能收濕，此用藥相得之大端也。

○姪娘傷寒禁忌藥

蛇斑水蛭及蟲蟲

烏頭附子配天雄

野葛水銀并巴豆  
三稜代赭芫花麝  
礞石芒硝牡丹桂  
半夏南星與通草  
硼砂乾漆鱗甲爪  
蒸麝法

牛膝薏苡與蜈蚣  
太戟蛇蛻黃雌雄  
槐花牽牛皂角同  
瞿麥乾姜桃仁通  
地膽茅根都不中

用麝香半夏皂莢末一字，填患者臍中，後用生  
姜薄荷貼于臍上，放大艾火于姜片上蒸二七  
壯灸，灸關元氣海二十壯，熱氣通于內，逼於外，明

自退而陽自復矣

熨麝法

用葱頭縛一把切去葉留白根切餅二寸許連縛四五餅先將麝香硫黃二字填於餅中放葱餅于脐上以熨斗盛火于餅上熨之餅爛再換餅再熨熱氣入腹以通陽氣如大小便不利以利則止

○中寒

中寒邪卒時直中陰經即病如中太阴脾經用

藿香正氣散合理中湯寒甚加附子如寒中少陰腎經用五積散加茱萸寒熱足冷加附子四逆湯寒熱手足甲唇皆青舌卷囊縮脉伏絕者用蒸麝法及大劑姜附溫之不然則死矣

○傷寒合病

三陽若與三陰合病即是兩感所以三阴無併合例也大抵傷寒二阴經合病必用二阴經藥合治三陽經合病必用三阳經藥合治

○陰毒傷寒

咽喉不利致毒氣攻心如傷寒時氣得病一二日便結成阴毒或服藥後三四日或十餘日變成阴毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心之下脹滿硬如石短氣不息嘔逆唇青面黑四肢如冰身如被杖其脉沉細而疾或伏絕用阴毒甘草湯先進一服如入行十里再進一服取汗出乃愈蓋阴毒之氣隨汗而出也五六日可治七日不可治如湯藥不受面唇指甲皆青黑色或時鄭聲舌卷囊縮煩躁冷汗不止腰背眼痛此皆阴寒毒氣入

深急用蒸肺法如手足溫煖即止知人事者生灌入生姜汁照前用藥不可與涼劑悞服必死

○夾陰傷寒

陰極發躁用四逆湯合生脉散入辰砂細茶白蜜冷服陰利用四逆湯加人參茯苓肉桂肉果砂仁木通灯心升麻少許服之虛阳伏阴用加減五積散冷服藥服下鹽冷体既消熱性乃發熱因寒用也

○寒疫

寒疫四時皆有之。若初起病頭疼發熱增寒拘急或吐逆惡心中脘痞滿或飲食停留不化或腹中作痛未發熱者宜藿香正氣散加減治之。若已發熱者十味翦蘇散汗之。若身體痛骨節疼發熱者羌活沖和湯加蘇葱主之。若有汗不得再發汗宜加減冲和湯主之。若邪熱不解傳入裏變證者宜從正傷寒條內治之。

○大頭傷寒

若先發於鼻額紅腫以至兩目盛腫而不開并額

上面部皆赤而腫者此屬陽明也或壯熱氣喘口乾舌燥咽喉腫痛不利脉來數大者用普濟消毒飲主之。內實熱盛者用通聖消毒飲若發於耳之上下前後并頭角紅腫此屬少陽也或肌熱目晡熱潮熱往來寒熱口苦咽乾目疼脇下滿宜小柴胡加天冬粉羌活荆芥連翹芩連主之。若發於頭上并腦後項及目後赤腫者此屬太陽也宜荆芥敗毒散主之。若三陽俱受邪併於頭面耳目鼻者以普濟消毒散外用清涼救苦散敷之治法當

先緩後急則邪伏也。先緩者宜退熱消毒虛人兼扶元氣。胃虛食少者宜助胃氣候其大便內熱甚以大黃下之拔其毒根。此緩之法蓋此毒先腫於鼻額次腫於目。又次腫於耳從耳至頭上絡後腦結塊則止不散必膿也。普濟消毒飲如無板藍根用大青或青黛虛人脉弱加人參引至毒處。加皂角刺胃弱食少加白朮橘紅如大便不通加酒浸大黃服後就卧使藥氣上行內熱用荆芥則毒散加酒炒黃芩熟盛加酒炒黃連口渴加天荳粉凡食積

頭面腫盛目不開。皇塞悶口乾舌燥內外有熱或咽喉腫痛不利或內實大使秘結脉洪數煩渴宜用通聖消毒散不消加牛蒡子玄參或生犀角水姜汁服。凡時毒頭面赤腫咽喉堵塞寒水藥不受若臟腑素有積熱發為腫毒疙瘩一切惡瘡紅腫並宜漏蘆湯大使實加大黃芒硝。凡雷頭風頭面疙瘩腫痛增寒壯熱四肢拘急狀似傷寒用清震湯治咽喉腫病用綠雲散以細竹管吹入喉中病處。

身不痛惡食，嗳氣作嘔，欲吐不出，恶心短氣痞滿，腹脹胃凸，痛按亦痛。

○中濕類傷寒

太陽病關節疼痛脉沉細者，此名溫痺。其人小便不利，大便反快，但當利小便。凡濕病頭汗出，背強，欲得被裹向火，胸滿小便不利，舌上白脂者，此丹田有熱。胸中有寒渴，欲得水而不飲，則口燥煩也。若悞下，則噦為難治。若下之，額上汗出，微喘，小便利者死。若下利不止者亦死也。

○痰證類傷寒

如病人目睛微定，暫時轉動，目如炭煤，昔肥今瘦，喘嗽轉側半難，臂痛皆痰證也。痰在上部寸口脉浮滑，痰在中部右關脉滑，大痰在下部尺脉洪滑，或痰飲發，寒熱胸滿氣粗，語出無倫，此夾痰，如見稟用二陳湯加蘇子枳實芩連瓜萎貝母桔梗，山楂前胡，姜汁調辰砂溫服。

○內傷瘀血證發熱狀類傷寒

或被踢打相撲，明肿一時不消過，至半日或一二

三日而發者有至十數日半月一月而發者胸脇小腹滿痛手不可近者而發寒熱此有瘀血也或一時傷重就發寒熱瘀血上冲則昏迷不省如死之狀良久復甦輕則當歸導滯湯重則杏仁承氣湯加蘇木紅花牛膝桔梗姜汁量其元氣下其瘀血自愈

### 漱水不欲嚥

漱水不欲嚥者此屬陽明胃熱也欲飲不欲嚥是邪熱循經裏無熱也陽明氣血俱多熱逐血妄行

作衄但欲漱水不欲嚥口燥者用犀角地黃湯外無寒熱喜忘如狂小便自利大便黑色口燥舌乾但嗽水不欲嚥者此有瘀血結於下焦宜杏仁承氣湯下尽黑物則愈少陰證脉沉細手足冷或時煩燥渴嗽水不欲嚥者宜四逆湯下利厥逆無脉乾嘔煩渴嗽水不欲嚥下宜白通湯加豬胆汁入人尿煮之厥阴蛇厥煩躁吐衄口燥舌乾但欲涼水浸舌并口唇時不可離不欲嚥下宜理中湯加烏梅花椒主之大抵陰證發躁煩渴不能飲水或

欲勉強飲下良久誠復吐出或飲水而嘔噦者皆內寒也宜四逆湯溫之蓋無根失守之火遊於咽喉之間假作燥渴則不能飲水也

○晝夜偏劇

凡病晝靜夜劇者熱在血分宜四物湯加黃柏知母芩連山梔丹皮萸柴胡主之若夜靜晝劇此熱在氣分宜小柴加山梔連母地骨主之

○心下滿

傷寒心下滿者當心下高起滿硬者是也不經下

後而滿者則有吐下之分若下後心滿者有結膿痞氣之別若發熱者以小柴胡枳實姜炒黃連去黃芩治之若按之拍之有聲而軟者此停水五苓散主之若按之硬痛者有宿食也輕則消導重則用承氣下之寒在胃中心下滿而煩飢不能食宜瓜蒂散吐之陽明病心下滿硬者不可下之利不止者死脉浮大有力心下硬有燥渴譫語太便實者此屬臟病宜攻之此言屬臟者宿屎在臟也故下之若食在胃口未入於胃未可下也木

抵腹中滿心下滿胃中滿俱不可用甘草糖棗甘甜之物蓋甘能補氣填實故也外用姜擦法甚良

遺尿

遺尿者小便自出而不<sub>知</sub>也大抵熱盛神昏遺尿者可治若陰證下寒逆冷遺尿脉沉者多難治宜四逆湯加益智仁主之厥陰囊縮逆冷脉沉遺尿者宜四物加茱萸湯陽不回者死傷寒汗下之後熱不解明虛火動而遺尿者用人參三白湯加黃柏知母麥冬五味歸地主之

○大便自利

下利微熱渴脉弱自愈下利脉數微熱汗出自愈

○驚惕

傷寒八九日胃滿煩驚小便不利譫語一身尽通用柴胡龍骨牡蠣湯主之大抵傷寒汗吐下之後虛極之人或因事驚恐遂生驚惕宜養心血安神之劑

○呃逆

橘皮半夏生姜湯加茯苓枳實陳皮桔梗凡其氣

自腋下直衝於胷嗌間。呃忒者此陰證呃忒也。其病不在胃。因下虛內有伏阴或悞服寒藥遂至冷極於下。迫火上衝。發為呃忒而欲盡也。又病人煩躁自堯甚熱。他人以手按其肌膚則冷。此為無根失守之火散亂為熱非實熱也。乃水極似火。明證似陽。若不識此誤用涼藥。下咽則死。當用羌活附子湯。加官桂。人參。木香。陳皮。半夏。砂仁。急溫其下。真陽回。陰火降。呃忒止也。明證及因胃寒呃忒不止者。外用乳香硫黃散嗅法。內用丁香柿蒂散服。

之則止。再灸期門中脘氣海關元此良法也。但手足溫緩脉重者為有生矣。灸期門穴法以婦人之乳頭向下。盡處骨間。動脈是穴。男女乳小者。以手一指為率。陷中動脈是穴。男左女右灸三五壯。

○談語

諸談語脉浮大者生沉小四逆者死也。太陽本病邪結膀胱其人如狂與五苓散利之。加辰砂末虛甚錯語。柴胡三白酒湯加黃連麥冬五味主之。

○鄭聲

鄭聲者喉中鄭重而不接續如氣息不促手足頗溫其脉沉細者急以白虎湯加入參五味麥冬助其元氣或濃煎獨參湯徐々呷之其脉微細大小便自利手足冷用白通湯

○瘡瘍不言

瘡瘍不言者若少陰病咽中生瘡不能言語者以鷄子苦酒湯若狐惑上唇青瘡者在本條瘡病口噤不能言治在本條熱病瘡瘍不言三日不得汗出者死熱甚大腸肺金不能言者宜清肺

降火則愈風熱擁盛咳嗽聲瘡者以消風熱降痰火則愈又有失於發散風邪伏於肺中者當以發散為主也

○陰證似陽

又云面赤目赤引飲脉來七八个至按之則散者此無根之脉用入參四逆湯治之又夾陰中寒面色青脈沉厥冷囊縮舌卷下利清穀裏寒外熱者身痛脉沉厥冷脉微欲絕者並用四逆湯瀉多加肉果訶子粟殼炒陳壁土熟艾木通燈心二十莖取

土氣嘔吐不止加姜汁半夏陳皮胃氣寒嘔不止  
加丁香咽喉痛不利加桔梗大腹痛加肉桂乾姜  
小腹絞痛加茱萸青皮藿香腹痛甚不止加木香  
乳香沒藥砂仁熟艾玄胡口食寒物身受寒氣加  
砂仁草果藿葉惡寒戰慄加麻黃桂枝骨體疼痛  
甚加桂枝羌活蒼朮胃寒發呃加丁香柿蒂茴香  
良姜為末姜湯調服或入前湯調服立止口吐涎  
沫加鹽炒茱萸名茱萸四逆有寒痰加半夏姜陳  
皮悞服寒涼藥過多胸腹脹滿關格不通嘔逆不

止湯藥不受欲死者加丁沉木香蘇子枳榔枳實  
陳皮姜汁傳送去甘草凡尼姑女冠寡婦室女與  
其有夫妻妾不同患陰寒證者倍加附子不必疑  
乃陰多陽少故也

○冷結

凡人手足厥冷脉沉細無結胸但小腹脹滿按之  
痛者此冷結膀胱湏灸關元穴也宜服茱萸當帰  
四逆湯磨木香溫服外用揉熨法

○耽厥

舌乾口燥常欲冷水不欲嚥。或上煩躁昏亂欲死。兩手脉沉遲足冷至膝甚者連蹠并屎俱出大便不行此證雖出多端可救治也。加味理中安蹠湯主之。又有胃中空虛蟲無所安反食其真臟之血。病人心胸脇下有痛障必撮眉呻吟或時下血如豚肝色或如濕毒膿狀或鮮血下利急迫或昏沉不省人事者一切吐蹠雖身太熱不可與涼劑服之必死。俱用理中安蹠湯加減治之。待蹠定却以小柴胡退熱又有厥陰病消渴氣上冲心飢不能

食。即吐蹠既曰胃寒復有消渴之證蓋熱在上焦而中下焦但寒而無熱若太便實用理中湯加木黃主之。吐蹠未止加黃連苦棟樹皮細辛治蹠不可用甘草。

○鬱冒不仁

四逆湯加人參帰桂枝薑薯天麻主之。凡頭自眩暉非鬱冒也蓋眩暉為輕鬱冒為重。

○肉瞤筋惕

太陽病發汗出不解仍發汗頭身瞤動振之欲擗

地用真武湯合人參卷榮湯倍用歸薯若不因汗過多其人筋脉跳動者此人稟素血少邪熱傳于六脉之中火動惕也用加味人參卷榮湯汗後虛煩不得眠筋惕肉瞞內有熱以加味溫膽湯

○肉苛

肉苛者雖著衣絮猶尚苛也傷寒發汗過多亡其血者乃變此證蓋榮虛而衛實則血氣不得和通肉失所養故頑痺不仁痛痒不知也用羣活冲和湯加桂枝當帰木香主之治肉苛肌肉不仁路龍

吉升麻湯治榮虛衛實肌肉不仁滿身痛痒用肉苛羣活散

○百合

若惡寒嘔者病在上焦二十三日愈若腹滿微喘太便堅三四日一一行微溏者病在中焦六十三日愈若小便淋瀝难者病在下焦三十三日愈並宜百合湯主治百令病也已經發汗後更發者用百合知母湯已經下後更發者用百合代赭湯已經吐後更發者用百合鷄子湯

○癥癰

不因汗所生者當平肝木降心火佐以和血之劑用羌防荆連柴芍歸地川芎天麻參類若兼瘀者必加南星半夏竹瀝姜汁如風邪急搐須兼全蝎姜牽若曾經汗下之後多日傳變得此證者為病劇虛極生風用小續命湯加減凡傷寒汗出露風則汗不流通遂變筋脉挛急手足搐搦用牛蒡根散主之若用小續命湯有汗去麻黃無汗去黃芩須要通变治之

○循衣摸牀

凡循衣摸牀直視譫語脈弦者生脈濇者死小便利者可治不利者不可治謂津液枯竭也太抵阴阳二氣俱絕則妄言撮空也若太便秘結撮空譫語燥渴者此為實熱宜承氣湯下之

○舌卷囊縮

有陽證有陰證其陽證囊縮者因熱極而縮急用大承氣湯下之陰證囊縮者因寒極而縮急用四逆湯加吳茱萸湯溫之婦人無囊縮其乳頭縮者

即是也。凡治此症，先灸關元氣海丹田，及蒸熨法甚効。

### 瘡後發腫

傷寒方愈後浮腫者，此水氣也。用牡蠣澤瀉散，主乏胃虛，食少。五苓散加蒼朮、陳皮、木香砂仁。胃不虛者，以商陸一味煮粥食之，亦妙。傷寒太病瘡後足腫者，不妨但節飲食，戒酒色，胃氣強，腫自消。

### 瘡後遺毒

傷寒汗下不徹，餘邪結在耳後一寸二三分或兩

耳下俱硬腫者，名曰毒宜速消散，緩之必成膿。以連翹敗毒散治之。項腫痛加威靈仙、大便實加木黃川山甲。發腫有膿不消或已破未破者，但用內托消毒散加皂莢升麻金銀花甘草。

### 瘡後發碗頭瘡

碗頭瘡者，亦因汗下後餘毒不盡，瘡後故發。碗頭瘡也，只以黃連甘草歸尾紅花防風苦參荆芥連翹羌活白芷煎服，外用苦硝赤小豆青黛為末，以鷄子清和豬膽汁調敷。瘡上最効，勿動待其脫落。

傷寒瘧後小便澁有血者名曰內外瘧皆有屬不出體者死亦是餘熱毒也用黃連解毒湯加生地歸翹木通滑石牛膝萹蓄琥珀甘草消

瘧後勞復

氣虛煩嘔竹葉石膏湯燥渴去半夏知母倍天花粉虛熱不止者千金麥冬湯

瘧後女勞復

其候頭重不舉目中生花腰背痛小腹裏急絞痛或增寒發熱或時陰火上衝頭面烘熱心胸煩悶

虛弱者用參胡三白湯調赤衣散小腹急痛脉沉足冷用當帰四逆湯加熟附茱萸送下赤衣散若見卵縮入腹脉見離經者死

○瘧後陰陽易

若傷腎經虛損真陽有寒無熱脉虛足冷者以人參四逆湯調下燒棍散若傷肝經以當帰四逆湯加茱萸熟附下燒棍散用分寒熱而治陰易熱氣上衝胸中煩悶手足挛拳搐搦如風狀用瓜萎竹

茹湯婦人病未平復有犯房事小腸急痛連腰膝痛四肢不仁無熱者當歸白朮散陰陽易不瘥大便不通心神昏亂驚惕不安用妙香丸

○瘥後虛弱

瘥後虛熱盜汗不止屬陰虛用當歸六黃湯陽虛自汗無熱惡寒無力下虛用加味黃芪建中湯瘥後心神恍惚不寧夜卧煩躁不安或亂夢虛驚不眠因汗下過多心血虧少用硃砂安神丸加遠志酸棗仁茯神有痰加橘紅

○瘥後昏沉

若用知母麻黃取汗者但慮病後血氣兩虛豈可再大汗之若人元氣壯實脉來有力者乃可行之脉虛人弱者只用十味溫膽湯有寒熱潮熱日晡發熱者參胡溫膽湯加芩連主之

○瘥後飲酒復劇

緣傷寒病熱未解而飲酒者則病增劇轉加熱盛脉弦數者用小柴胡合解毒湯加烏梅乾葛砂仁脈洪者用人参白虎湯合黃連解毒湯加乾葛烏

梅砂仁主之

○妊娠傷寒

若有表證宜汗者用羌活冲和湯加柴胡當帰芍藥蘇葉芍白即四物冲和湯汗之有氣滿喘急加香附砂仁去生地外用護胎法若裏實熱證太便不通燥渴者當用大黃轉藥不必疑矣湏酒制用有病則病當之設患真寒脉伏厥冷用姜桂附子不必慮也附姜桂雖熟炒制無害必加黃連甘草制之沉香墜之

○產後傷寒

產後傷寒不可輕易汗下恐產時傷力其發熱有去血過多有惡露不盡有三日蒸乳發熱或早起勞動或飲食停滯俱有發熱惡寒狀類傷寒不可便用發表攻裏之劑產後惡露不盡亦有發熱惡寒必脇肋脹滿連大小腹有塊作痛產後飲食停滯發熱頭痛必有噫氣作酸惡聞食臭胸膈飽悶右關脈緊用治中湯加山楂神曲砂仁炒黃連川芎當歸佐之若產後蒸乳發熱惡寒者必乳間脹

硬疼痛令產婦揉乳汁通其熱自除不藥而愈矣  
若果產後不謹虛中入風者當以四物湯加防風  
荆芥白芷人參香附烏梅姜桑乾姜產後不謹感  
冒傷寒發熱惡寒頭疼骨疼脉浮緊表證宜汗者  
用四物湯加羌活蒼朮白朮乾姜蘇葉梔子少佐  
用荎白頭水煎取微汗自汗去蒼朮蘇葉加白朮  
熟甚加軟柴胡乾姜少許黃芩佐之炒用熱邪傳  
裏口燥渴大便不通脉沉實或熱甚謾語宜下之  
輕則蜜導法重則用四物加柴胡炒黃芩枳壳熟

太黃徹下就用四物湯加乾姜少許參术大用以  
溫補其血氣若熱邪傳至半表半裏證寒熱嘔吐  
苦脉洪數者四物湯合小柴胡主之

不可水

水停心下微喘

腹滿結胸兼不食

汗吐下而脾胃寒  
縱貪切勿與之餐

傷寒太吐下後外氣怫鬱胃中寒也發汗後尤  
不可水與之則噦嘔喘咳發熱惡寒濡弱相搏  
臟氣裏微胸中苦煩非結也不可水瀆青布冷

貼胸中誤下後寒氣相搏腸鳴得水令汗大出即成鶴陽明病潮熱誤下腹滿不能食或胃中虛冷不能食皆不可水下利脉浮大不可水當溫之傷寒結胸無熱證者宜平和藥若與水益令熱不得出當汗而不汗則煩假令汗出後腹中痛亦服和氣之藥

○再三汗下熱不退

汗下再三熱弗休

長沙公見應心憂

人參白虎加蒼朮

解毒湯和涼膈傳

經云三下而熱不退者即死後人有四五次下加至十數次行而生者此乃偶誤中耳活者未一二死者已千百觀是之言後之學者切不可以為法但當解毒合涼膈多服調之使陽熱徐退陰脉漸生庶不失事是知權變者矣傷寒下後自汗虛熱不已白虎湯加入參朮一服如神汗出身涼此通仙之妙法也汗下之後熱不退不問有汗無汗皆宜白虎加蒼朮湯解之又加入參亦妙仍服涼膈合解毒調之發汗之後

熟不解脉尚浮者，白虎加薑水湯傷寒表解傳裏熱而不退或有汗而未愈調和陰陽湯病在半表半裏熱不退小柴胡湯半表半裏太便不通者除實小柴胡湯加大黃半表半裏太便不通者除膈熱湯裏熱微者宜除胃熱湯熱勢未退宜六一順氣湯兩除表裏之熱病至六七日裏熱已甚表熱漸微脉雖浮數先用大柴胡湯不退宜解東熱湯病在半裏半表熱不退脉尚浮洪者當微表小柴胡合白虎湯和之病在半表半裏

脈沉實當微利除膈熱湯輕下之汗吐下三法之後別無異證但此微熱或無熱並小柴胡和之口舌乾燥合鮮毒湯涼之汗吐下之後別無異證大便硬結不通涼膈散病熱已去微熱者以益元散和之無令再病熱不退發黃班涼膈散加當帰下後熱不退或證未全退雙解散双和表裏大汗前後逆氣熱勢不退雙解散瘥後遺熱不退双解散再解之次用小柴胡和之他人病氣汗毒傳染或食猪羊牛馬酒毒丹復發

熱不退，双解散除膈熱湯。風寒暑濕飢飽勞逸憂愁思慮恚怒悲恐四時中外諸邪所傷意竟身熱頭項拘勦強痛發熱惡寒惡風汗下後熱不退並宜服雙解散。有汗去麻黃無汗加葛根身微熱不退表虛汗出不已或過發汗以致表虛脉不實海藏黃蓍湯。嗚惡寒發熱不退其人大渴飲水者其腹必滿小便不利而自汗出其病欲解此為肝乘肺名曰縱當刺期門發熱不退腹滿譫語寸口脉浮緊此為肝乘脾名曰

橫當刺期門。男女下血發熱不退譫語者此為熱入血室但額上汗出者當刺期門婦人經水適來適斷者為熱入血室。

○四肢冷附四肢沉重四肢不收

下利肢疼屬厥陰

欲眠嘿嘑溫尋

身如被杖施真武

厥利脉沉四逆珍

四肢疼下利厥逆惡寒脉沉弱四逆湯回陽急救湯少陰證四肢沉重疼痛嗽咯小便不利或自下利而咳真武湯溫經益元湯四肢沉重唇

黑有瘡或如傷寒四肢沉重忽喜眠見多眠  
條羌活蒼朮湯風溫証四肢不收嘿欲眠頭  
疼身熱自汗体重而喘萎蕤雜湯羌活蒼朮湯

○結陽

四肢腫滿結陽名

陽脉往停氣不行

八正五苓兼理胃

消風退腫萬全靈

結陽者肢腫也諸陽脈不行陰府留結成熱為  
四肢腫滿也萬全木通散五苓散八正散並加  
蘿蔔枯酒曇根妙

○結陰

血氣無宗添入腸

致成便血可驚惶

三黃補血誠為妙

四物阿膠桂附湯

結陰者便血也陰氣內結不得通行血氣無宗  
添入腸則下血也四物阿膠湯三黃補血湯桂

附六合湯

○寒在皮膚熱在骨髓熱在皮膚寒在骨髓  
病身大熱反欲衣  
寒在皮膚熱骨髓寒在骨髓  
寒在皮膚熱骨髓寒在皮  
寒在骨間熱在皮  
身寒反不用其衣

身熱惡寒而反欲得近衣者先服麻黃湯汗之  
次用柴胡桂枝湯和之身寒惡熱而反不欲近  
衣者先用防風通聖散人參羌活散表之次用  
白虎加人參湯和之蘊要云身熱欲衣桂麻各  
半湯身寒不欲衣白虎加桂枝湯劉全備云身  
熱而常貪納被內虛寒而邪熱淺浮藥辛溫而  
取効宜不換金正氣散八解散並加川芎白芷  
頭疼加細辛羌活葱白藿香正氣散人參養胃  
湯五積散臨証擇用加減得宜最為良法仲寒

而欲撤衣素壯熱而感寒鬱閉飲辛涼而必痊  
宜人參敗毒散防風通聖散升麻葛根湯柴葛  
解肌湯參蘇飲等並加黃芩主之

太陽傳經用藥

傷寒傳病太陽始

依次傳經陽明起

各經引藥加減矣

若越陰經不順傳  
太陽傳陽明而太陽證已罷陽明證已至曰傳  
經餘倣此

太陽傳陽明名巡經傳葛根湯入於裏承氣涼

膈下之

太陽傳少陽名越經傳小柴胡加川芎  
太陽傳少陰名表傳裏小承氣涼膈合小柴胡  
或更合解毒天水

太陽傳太陰名誤下傳桂枝加芍藥湯桂枝加  
大黃湯

太陽傳厥阴名巡經得度傳太承氣湯加川芎  
柴胡六一順氣湯

太陽自入於本名傳本未入本為表麻黃湯自

入本為裏五苓散

○內傷似外感始為熱中病

始為熱中氣難言

頭痛四肢痙攣

鼻息不調聞食惡

補中益氣正當先

頭痛大作四肢痙攣氣高而喘身熱而煩上氣

鼻息不調四肢困倦不收無氣以動無氣以言  
或煩躁悶亂心煩不安或渴不止病久者邪氣  
在血脉中血濁故不渴如病渴是心火炎上剋  
肺金故渴或表虛不任風寒目不欲開口不知

末傳寒中，胃心疼。

足弱肢寒，嗌不通。

脉大濇而腰脊痛。

神聖湯施豆蔻同。

腹脹胃脘當心痛，四肢兩脇膈咽不通。或涎唾或清涕或多，溺足下痛不能任，身僵地骨乏無力，喜唾，兩睾丸冷陰作痛，或妄見鬼狀夢亡人，腰背脾眼腰脊皆痛不渴，不渴脉盛大以濇，名曰寒中，功用神聖復氣湯白朮附子湯草荳蔻。

○內傷似外感，陽明中熱病。

內傷中熱，頰陽明。

脾胃久虛，回熱乘。

味右手氣口脉大於左手人迎三倍其氣口脉急大而數時一停而滯是脉之本脉代者是無氣不相接乃脾胃不足之脉是洪大而數乃心脉刑肺急是弦急乃肝脉挾心火剋肺金也其右關脾脉比五脉獨大而數之中顯緩時一停此不甚勞役是飲食不節寒溫失所則右關胃脉損弱隱而不見惟內顯脾脉如此也治用補中益氣湯。

○內傷似外感末傳寒中病

清暑益氣加減用

誤施白虎恐難禁

有天氣太熱時勞役得病或路途勞役或田野中勞役或身體怯弱食少勞役或長齋久素胃氣又虛勞役其病肌體壯熱躁熱悶亂大惡熱渴飲水漿與陽明傷寒熱白虎湯證相似鼻口中氣短促上喘此乃脾胃又虛元氣不足之證身亦疼痛至日西作必譫語熱渴悶不止脉洪大空虛或微弱白虎湯證其脉洪大有力與此內傷中熱不同治用清暑益氣湯

○內傷似外感溫熱病

溫熱病生長夏間

精神困倦涕垂替

氣高而喘熱煩悶

清暑湯施益氣還

長夏五六月溫熱之時人困倦四肢不收精神短少胸滿短氣肢節疼氣高而喘身熱而煩或大便泄利或黃或白泔色或渴或不渴或不飲食或小便頻數而黃治用清暑益氣湯

○內傷似傷寒

內傷煩躁類傷寒

伏熱蒸之總一般

昏倦不眠脉細數

補中益氣倍參安

凡似傷寒煩躁不絕聲汗後復熱脉細數五七日不睡補中益氣倍人參用竹葉同煎甚者加麥門冬五味知母

似傷寒三戰後勞之煩躁昏倦四君子加當歸黃蓍知母麥門冬五味子

似傷寒至五七日汗後煩躁喫水者補中益氣加附子

有舌黑燥大便滑泄食在大腸煩躁夜不安宜

防風當歸飲子

內傷病退後燥渴不解者有餘熱在肺參芩甘草少加姜汁冷服虛者用入參湯

○房室傷風

房室傷風脉緊浮

頭疼發熱汗如油

解肌羌活湯尤穩

參木芎歸白朮投

脾氣虛弱犯房室而胃傷風頭疼發熱自汗惡風脉浮緩宜羌活湯大白朮湯並加當歸人參黃蓍湯血虛汗不止加桂枝白芍當歸參木芎

歸湯

凡房室傷風挾內傷者補中益氣湯隨六經加減

頭疼惡寒、羌活散身熱石膏湯腹痛合芍藥散、  
寒熱合柴胡散自汗加白朮茯苓無汗荅渠防  
風氣虛合四君子、血虛合四物湯

○房室傷寒

房勞因感冒寒憂

羌活湯兼大白朮

無汗頭疼脉緊浮  
人參敗毒總宜投

夫人體氣虛弱犯房室而感傷寒頭疼發熱無汗惡寒脉浮緊宜羌活湯大白朮當帰人參川芎湯加當帰蒼朮防風參木芎帰湯

頭疼發熱自汗惡風脉浮緊無汗惡寒脉浮緩黃蓍湯合川芎湯汗止外證不解九味羌活湯

加入參當帰

頭疼身體痛發熱惡寒或惡風或胸痛或咳嗽或寒熱人參敗毒散無汗加蒼朮防風當帰自汗加白朮黃蓍當帰參木芎帰湯加減