

衛生寶鑑卷第十四

腹中積聚

真定路惠民司令張君傳硃砂煎丸香棧丸木香

硃砂

煎丸三方多效

硃砂煎丸消磨積塊痞癖一切凝滯老人虛人無妨

黑附子

貳箇各重伍錢半已上正坐
安者炮去皮剝作子

硃砂參錢

木香

參錢

破故紙

紙箱內炒

葶撥真者各壹兩

右先將硃砂用水壹觔續續化開於兌內熬乾為末安在

附子公內却用剝出附子末蓋口用斤成白麪裹約半

指厚慢灰火內燒勻黃色去麪同木香等藥為細末却用

弘前醫書
江氏藏書記

硃砂煎丸香棧丸木香

硃砂



元晷附子熟黃麴爲末醋調煮糊丸桐子大每服拾伍丸
至參拾丸生薑湯送下此藥累有神切

仙方香棧丸破痰癖消癥塊及冷熱積

木香 各伍錢 京三棧 切酒浸壹宿

青皮 去白 枳殼 麩炒 川練子

茴香 炒各壹兩 廣茂 壹兩切酒浸壹宿 三棧廣茂用去皮 巴豆參拾粒同炒巴豆黃

色去巴豆不用

右爲末醋糊丸如桐子大用硃砂爲衣每服二拾丸炒生

薑鹽湯下溫瀉亦得食後日進參服

木香硃砂煎丸治婦人消痞癖積聚血塊刺痛脾胃虛寒宿食

不消久不差者

木香 硃砂 官桂

附子 炮 乾漆 炒去灰 猪牙 角

細墨 乳香 研 京三棧 炮

廣茂 炮 大黃 炒令爲 沒藥 研

乾薑 炮 青皮 各壹兩 巴豆霜 半兩

右除研藥外同爲末以好醋壹升化開硃砂去粗脚銀石
器中慢火熬次下巴豆霜大黃末熬成膏將前藥末膏內

和丸如桐子大每服叁伍拾丸食後溫酒送下

溫白丸治心腹積聚久癥癖塊大如杯掩黃疸宿食朝起嘔吐

支滿上氣時々腹脹心下堅結上采搶 傍攻兩脇下種水
 病八種瘡塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九種心痛積年
 食不消化或瘧疾連年不差及療一切諸風身體頑痺不知
 痛痒或半身不遂或眉鬢墮落及療七十二種風三十六種
 道尸疰忤及癰癩或婦人諸疾斷續不 帶下淋瀝五邪失
 心愁憂思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹中一切諸
 疾有似懷孕連年累月羸瘦用弊或歌 哭如鬼所使但服
 此藥無不除愈

川烏 炮去皮 二兩半

柴胡 去

吳茱萸 湯包七 次揀淨

桔梗

菖蒲

紫苑 去苗葉 及土

黃連 去須

乾薑 炮

肉桂

茯苓 去皮

人參

蜀椒 去目及閉 口炒用

厚朴 去麤皮 薑汁製

皂莢 去皮 于炎

巴豆 去皮心膜出油 炒研各半兩

右烏細末入巴豆勻煉密爲丸如梧桐子大每服參丸生

薑湯下食後或臨卧服漸加至伍丸

雞爪三稜丸治五臟疰癩氣塊年深者一月取效

木香

石三稜

京三稜

青皮

陳皮 去白

雞爪三稜 各伍 錢

檳榔

肉荳蔻 各壹 兩

硃砂 參錢

右玖味烏末薑汁打糊丸如桐子大每服貳拾丸薑湯下

空心臨各壹服忌一切生冷硬粘物

青塩丸治一切冷積作痛無時宿食不消及治一切酒食所傷
神效

青塩

硃砂各壹

細麴末 叁錢

塩豉陸拾

大椒叁拾

巴豆叁拾箇去皮
心曠出油

右入揀棗參拾箇同末入巴豆勻醋糊丸桐子大每服參
拾丸温薑湯下積在上食後

玄胡丸解化傷滯内消飲食治吐利瘕瘕氣結虫煩不安心腹

脹痛順三焦和脾胃

木香

當歸

玄胡索

青皮去白

雄黃飛另

廣茂炮

檳榔各四

京三稜炮陸

右捌味為末入雄黃勻糊丸如桐子大每服參拾丸生薑

湯下不拘時

破積導飲丸治内有積塊堅硬飲食不消心下痞悶

檳榔

陳皮去白

廣木香

青皮去白

枳殼麸炒

枳實麸炒

廣茂炮

半夏泡十

京三稜炮

神麴炒

麥蘖炒

乾生薑

茯苓去皮

甘草炙

澤瀉各伍

牽牛頭末貳錢一方陸錢巴豆去心膜參拾

右烏末入巴豆勻生薑汁打糊九梧桐子大每服參拾九

溫薑湯送下食前

京三棧

木香三棧湯和脾胃進飲食消化生冷物治心腹刺痛霍亂吐

利肖曠脹悶

木香

神麴炒各壹兩

京三棧炮

甘草炙各二兩

陳皮去白

益智各肆兩

廣茂陸兩

右烏末每服二錢入塩壹掬沸湯點服空心食前

乾柿丸取虛實積下膈甚妙

硃砂研烏交

沒藥研

猪牙皂角去皮豉子烏末

乾漆研炒烟盡烏末

京三棧炮烏末

青礬本烏

乾薑炮烏末各一錢

水銀一錢結沙

輕粉二錢

巴豆參拾粒去皮膜醋煮拾沸研

右件各研勻軟飯和丸如棗豆大煎柿蒂湯冷下參伍九

加減用婦人有胎勿用

神效五食湯丸取虛實積食氣蟲脹滿積塊水氣年深癥瘕並

皆治之

大戟剉法

并遂生各半兩

猪牙皂角去皮子每

胡椒生各二兩

荒花未醋浸一宿

每服

巴豆 去心膜煮氣
拾研半兩

右除巴豆外杵為末入巴豆再研勻糊丸如菘豆大每服伍柒丸氣實者拾丸夜卧水壹觔用白米白麵黑豆生菜猪肉各少許煎至半饑去相用湯溫下藥取下病忌油膩粘滑物婦人有胎不可服之

磨積三稜丸治遠年日近諸般積聚癖瘕氣塊或氣積酒積諸

般所傷無間男子婦人老幼並亘服之常服進飲食

木香

麥蘖

京三稜 炮

廣戎

枳殼 麩炒

石三稜 去皮

杏仁 麩炒各半兩

乾漆 炒煙盡
叁錢

雞爪三稜 半兩

葛根 參錢

官桂 二錢半

黑牽牛 半兩半
生半熟

丁香

檳榔

番附子

青皮 去白各二錢

縮砂 參錢

白牽牛 半兩半
生半熟

陳皮 去白參錢

右為末醋糊丸如桐子大每服貳拾丸生薑湯下食後日

二服病大者四拾日消溫水送下亦得

聖散子治遠年積塊及婦人乾血

硃砂

川大黃 各

麥蘖 陸兩

乾漆 叁兩炒
煙盡

篇蓄

茴香 炒

檳榔

血瞿麥 各壹兩

如治婦人乾血氣加川山甲貳兩炮

右為末每服伍錢臨睡溫酒調下仰卧此藥只在心頭至

明大便如爛魚小便赤烏驗取出藥無毒性如君子有神

效小兒用壹錢十五以上伍錢或七錢空心服之更效

荆蓬煎丸破 癖消癥塊及冷熱積聚 疝疔悶通利三焦升

降陰陽順一切氣消化宿食

木香 青皮 去白 川茴香 微炒

枳殼 麸炒 檳榔 各壹 京三稜 二兩酒浸炙

廣茂 二兩醋浸冬參日夏壹日同 以去皮巴豆貳 拾箇 器內同炒令乾黃也 去巴豆不用

右件柒味修事畢為末水糊丸如 豆大每服參拾丸溫

生薑湯送下食後

醋煮三稜丸治一切積聚遠年日近皆 之如神效

川芎 二兩醋 煮微 京三稜 兩醋煮乾竹乃 切作片子 乾

大黃 半兩醋紙 火煨過切

右參味為末水糊丸如桐子大每服參拾丸溫水下無時

病甚者壹月效小者半月效

流氣丸治五積六聚癥瘕塊癖留飲以上之疾皆係寒氣客搏

於腸胃之間久而停留變成諸疾此藥能消導滯氣通和陰

陽消舊飲雖年高氣弱亦宜服之

木香 川茴香 紅橘皮 去白

菖蒲

青皮去白

蘿蔔子炒

廣茂炮

檳榔

補骨脂炒

神麴炒

枳殼炒去穢

葶澄茄

縮砂

麥蘖炒各壹兩

牽牛炒壹兩半

右烏末水糊丸如桐子大每服伍拾丸細嚼白苳蔻仁壹

枚白湯送下食後

廣茂潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐卧不安

半夏炮七

黃連陸分

當歸稍

厚朴

黃芩各伍分

廣茂

麴各三分

甘草生三分

益賀仁

紅花

橘皮去白

升麻各壹分

柴胡

澤瀉

吳茱萸各三分

青皮二分

如虛渴加葛根陸分

右吹咀都作壹服水貳觔先浸藥時煎至壹觔去粗稍

熱服食煎忌酒濕麵

治積要法

許學士云大抵治積或以所患者攻之或以所喜者誘之則易

愈如硃砂水銀治肉積神麴麥蘖治酒積水蛭虫治血積木

香檳榔治氣積牽牛耳遂治水積雄黃膩粉治溼積礞石巴豆

治食積各從其類也若用群隊之藥分其勢則難取效須是認

得分明是何積聚兼見何證然後增減酌量使之藥不示反有所損要在臨時通變也

養生積自除

真定王君用年一十九歲病積臍左連脇如覆杯腹脹如鼓多青絡脉喘不能卧時值暑雨加之自利完日晡潮熱夜有盜汗以危急求治予往視之脉得浮數按之有力謂病家曰凡治積非有毒之劑攻之則不可令脉虛弱如此豈敢以常法治之遂投分滲益胃之劑數服而清便自謂難以升降陰陽進食和氣而腹大減胃氣指平間以劑之不月餘良愈先師嘗曰嚙古老人有云養生積自除譬之滯坐皆君子縱有一小人自無

容地而出今今真氣實胃氣弦積自治矣漢古之言豈欺我哉內經云充積大聚衰其大半而止滿中有積氣大毒之積聚不可過况虛中有積者乎此亦治積之一端也邪正虛實宜審焉

腹中諸蟲

烏梅丸治藏寒蛔蟲動作上入膈中煩悶嘔吐時發時止得食

即嘔常自吐蛔有此證候謂之蛔厥此藥主之又治久痢

烏梅

黃蘗

細辛

肉桂

附子

人參

乾薑

當歸

蜀椒

炒出汗用

微

黃連去須拾陸兩

右異搗篩合治之以醋浸烏梅壹宿去核蒸之五斗米下飯熟搗成泥和棗令相得內曰中與煉蜜抃貳斤下丸如梧椰子大每服拾伍丸溫米飲下食前服

化虫丸

鶴虱去土

檳榔

苦練根去洋皮

胡粉炒各一兩

白礬枯貳錢半

右爲末水糊丸如麻子大小兒疾病多有諸虫或因臟腑虛弱而動或因食甘肥而動其動即腹中疼痛發作積聚往來上下痛有休止亦攻心痛則哭不休合服仰身撲手

心神悶乳嘔噦涎沫或吐清水四肢羸因面色青黃飲食雖進不生肌肉或寒或熱沉默默不的知病之處其

不療則子母相生無有休止常一尺則能害人壹歲兒服伍丸溫漿水入生油一兩點打勻下之溫米飲亦得不拘時候其虫細少者皆化爲水大者自下

木金 治諸般虫

鶴虱生

雷丸

定粉

錫灰各等分

右爲末每服參錢空心食前少油調下又用猪肉壹兩燒熟摻藥在上細嚼亦得每服藥時用雞翎可遂末壹錢與

前藥一處服之其虫自下矣

雷金散治諸虫

雷丸末分

鬱金末分

黑牽牛末壹錢

右參件末和勻以生油調下參兩匙飯壓之

化虫散取寸白虫

黃丹半兩炒

錫灰壹兩

定粉二兩

右同研極細末每服壹錢先燒猪肉伍文吃了後以生油壹許調藥服至晚取下婦人有胎不可服副統女子菊花年十三壹服取虫壹抄終身不發

諸濕腫滿

沉香海

砂丸治一切聚積散脾濕腫脹肚大青筋羸瘦惡

沉香二錢

海金砂

輕粉各壹錢

牽牛頭末一兩

右為末研獨頭蒜如泥丸如桐子大每服伍拾丸煎燈艸湯送下量虛實加減丸數取利為驗大便利止後服

海金砂散治脾濕太過遍身腫滿不得卧及腹脹如鼓

牽牛半生半熟

白木各一兩

耳遂半兩

海金砂三錢

右為末每服貳錢煎倒流水壹巵調下食前待宣利止後服已上二方係太醫劉仲安傳用之累累獲效如神尤速

故錄於此

續隨子丸治通身腫滿喘悶不快

人參

木香

漢防已

赤茯苓麩蒸

大檳榔

海金砂各伍錢另研

續隨子一兩

葶藶肆兩

右為末棗肉丸如桐子大每服二拾丸至三拾丸前桑白

皮湯送下食前

聖靈丹治脾肺有濕喘滿腫盛小便赤澀

人參去蘆

木香

漢防已

茯苓寒食麩煨

檳榔

木通炙二錢半

苦葶藶肆兩炒

右米味為末棗肉和丸桐子大每服二拾丸煎桑白皮湯

送下食前

赤茯苓丸治脾濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宜通小便赤

澹

木香羊兩

赤茯苓

二兩一方一兩防已二兩

苦葶藶四兩炒

右為末棗肉丸如桐子大每服三十九煎桑白皮湯送下

食前

人參葶藶丸治一切水腫及喘不可當者

人參一兩
苦葶藶四兩

右為末末肉花如桐子大每服三十九煎桑白皮湯下食

前

海藻散治男婦人通身虛腫喘滿悶不快

海藻

天戟

銀紋大黃

續隨子去殼各一兩

右剉碎用好酒二觔淨碗內淨一宿取出晒乾後用

白牽牛

頭末一兩生用

桂府滑石

半兩

甘遂

熬炒黃一兩

肉豆蔻

一箇

青皮

去白

陳皮

去白各半兩

右共前藥一處為細末大人每服二錢氣實者三錢平明

冷茶清調下至辰時取下水三二行腫減五七分隔二三

日平明又服腫消忌魚肉百日○小兒腫服一錢五

歲以下者半錢婦人有孕不可服

白丸子治通身腫及草服脹滿喘悶不快小便赤澀神效

輕粉半分

桂府滑石

研炒

粉霜

研細炒

硃砂研炒

白丁香

并如米炒真者

寒水石

火燒研細各三分

右先將輕粉滑石二味研勻用江紙裹了切更和白麵作

餅再裹合藥用桑柴火燒以熟為度取出與前四味一處

研勻水浸餅攤乾為丸如菉豆大第一日每服二丸煎

生姜湯送下食前一日三服第二日三丸三服第三日四

九三服第四日五九亦三服如覺小便多時腫漸減便休
服白丸子如小便未多更服一日至兩服加作六丸做一
服一日亦三服腫消為效如服藥至第三日覺牙縫肉痒
痛口氣時便用漱口藥

黃連去頂

貫衆各等分

右為齧每用一錢水一錢煎至七分入龍腦少許攪勻溫
漱之每日煎一錢漱口如腫消忌塩魚肉冷硬果食只吃
粥百日永差如臟腑秘澁氣實人先服治腫海藻散此藥
親用救人甚多神效

除濕丹治諸濕腫客搏腰膝重痛足胫浮腫

乳香研

沒藥研各一兩

牽牛激末

檳榔生對葳靈仙

赤芍藥

澤瀉丁葶藶

耳遂各二兩

大戟炒三兩

陳皮去白四兩

右為末糊丸如桐子大每服五十九至七十丸溫水送

下食前得更衣止後服如服藥前後忌酒一月濕麵兩三

日食後溫淡粥補胃尤佳

三花神祐丸治中滿腹脹喘嗽淋悶一切水溫腫滿濕熱腸垢
沉積變生疾病久病不已黃瘦困倦血氣壅滯不宜通或風
熱燥鬱肢麻痺走疰瘡痛風痰咳嗽頭目旋運瘧氣不已

瘕癖積聚堅滿痞悶酒積食積一切痰飲吐逆濕熱腹滿實痛並宜服之

乾粉一分

大黃一两

牽牛一两

芫花醋拌

甘遂

大戟各半

右烏末滿水丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水送下無時日三服加至快利後如常服病去為度

半末湯治太陽中風下痢嘔逆短氣不惡寒熱々汗出發作有時頭痛心下痞硬引脇下痛兼下水腫腹脹并酒食積腸垢積滯瘕癖堅積蓄熱暴痛瘧氣久不已或表之正氣與邪熱并甚於裏熱極似陰反寒戟表氣入裏陽氣極深脉微而絕

并風熱煩甚結於下焦大小便不通實熱腰痛

耳聾

芫花

慢火炒紫色付景與俗異炒作熬下丸言熱者同炒各等分

大戟各等分

右為末水壹大觔棗拾枚切開煮取汁半觔調半錢人實更加一錢量虛實加減

葶藶木香丸治水氣通身虛腫

人參

漢防已各一两

苦葶藶四兩

木香

續斷

木通

白茯苓

王皮如棗煨各一两

右為末末酒和丸如桐子大每服三拾丸溫水送下食前

木香通氣丸導滯寬腸塌腫進食

南木香

茴香各一兩

檳榔二兩

海金沙

破故紙炒

陳皮去白各四兩

牽牛生半斤熟半

右為末清醋為丸如桐子大每服三十九丸熟水送下食後

神祕湯治病人不得卧卧則喘水氣逆行上乘於肺肺得水而

浮使氣不通流脉沉大

白茯苓去皮

木香各半兩

桑白皮

紫蘇葉

橘皮炒

人參各七錢

右咬咀水三升入生薑七錢煎至一升半去粗分温作五

服食後

滑痞丸治積濕熱毒甚者身體面目黃腫心脇腹滿嘔吐不能
飲食痿弱難以運動咽嗑不利肢体焦眩悸膈坐卧不寧
心火有餘而妄行上為咯血衄血下為大小便血腸風痔漏
三焦壅滯悶寒熱中消渴傳失常小兒疳積熱

木香

官桂各一兩

香黛

牽牛

黃連

黃芩

大黃

黃蘗

葛根

梔子

薄荷

藿香

茴香炒

厚朴各半兩

右烏末滴水丸如桐子大大每服二十九温水送下食前
無礙丸治脾病橫流四肢腫滿

木香 半兩

蓬莪茂 炮

京三稜 炮

檳榔 生

郁李仁 湯炮去皮 各一兩

大腹皮 二兩

右六味為末炒麥蘖杵為粉為糊丸如桐子大每服二十

九生姜湯送下無時

香蘇散治水氣虛腫小便赤淡

陳皮 去白 一兩 防己

木通

紫蘇葉 各半 兩

右四味為末每服二錢水二椀生姜三斤煎至一椀去粗
溫服食前

五皮散治他病差後或久痢之後身體面目四肢浮腫小便反
利脉虛而大此由脾肺虛弱不能運行諸氣氣虛不理散漫
於皮膚肌腠之間故令腫滿也

大腹皮

生姜皮

赤茯苓皮

桑白皮

陳皮 各等分

右以咀每服五錢水一椀煎八分去粗溫服無時日二至

服 此方異於局方載中藏經

牡蛎澤瀉散治脾胃氣虛不能制約腎水水溢下焦腰已下有

腫也

金匱要略曰腰以下有腫當利小便

牡蛎炒

澤泻

蜀漆洗生

葶藶炒

括萎根

商陸根

海藻以上各等分

葶藶炒

右七味異搗篩為散更入白中制之白飲和服方寸匕小便利止後服

內經云酸味湧泄牡蛎澤泻海藻之鹹以浮水氣濕溢於內平以苦佐以酸辛以苦泻之芎藭葶藶括萎商陸之酸辛与苦以導腫利小便以散水

胃氣為本

至元戊寅五月間霖淫積雨不止魯齋詳平仲先生時年五十有八面目肢体浮腫大便溏多腹脹腸鳴時痛飲食減少命予治之脉得弦細而緩先生曰耳壯時多曾服牽牛大黃藥面目四肢時有浮腫今因臥雨故大發予曰營運之氣出自中焦中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣榮養臟腑經絡皮毛氣行而滲為浮腫大便溏多而腹腸腫鳴皆濕氣勝也四時五藏皆以胃氣為本五藏有胃氣則和平而身安若胃氣虛弱不能運動滋養五臟則五臟脉不和平本臟之氣盛者其脉獨見輕則病甚過則必死故經曰真臟之脉弦無胃氣則死先生之病

幸而未至於甚尚可調補人病服牽牛大黃為一時之快不知其為終身之害也遂用平胃散加白朮茯苓神薏仁數服而腹脹溏瀉腸鳴時痛皆愈飲食進止有肢體浮腫以導滯通經湯主之良愈

導滯通經湯治脾濕有餘及氣不宣通面目手足浮腫

木香

白朮

桑白皮

陳皮各五分

茯苓去皮一兩

右咬咀每服五錢水二椀煎至一椀去粗溫服空心食前內經曰濕淫所勝平以苦熱以苦燥之以淡泄之陳皮苦溫理肺氣去氣滯故以為主桑白皮甘寒去肺中水氣水

腫臃脹利水道故以為佐木香苦辛溫除肺中滯氣白朮苦甘溫能除濕和中以苦燥之白茯苓甘平能止渴除濕利小便以淡泄之故以為使也

黃疸門

寸口脈浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘵熱以行跌臥脈堅而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食即為滿尺脈浮傷腎跌臥脈腎為傷脾風寒相搏食穀則為眩穀氣不消胃中苦濁濁氣不流小便不通臥被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸額上黑微汗出于足中熱薄暮即發膀胱急小便自利名曰玄帝疸腹如水狀不治則心下懊懣而熱

不能食時々欲吐名曰酒疸
臥明病脈遲者食難用飽之則發煩頭眩心煩小便難此欲作
鼓疸雖下之腹滿如故兩以然者脈遲故也
夫病酒黃疸者必小便不利其候心中熱足下熱是其證也
酒黃疸者或無熱精言了之腹滿欲吐鼻燥其脈浮者先吐之
沉強者先下之
酒疸心中熱欲吧者吐之即愈

酒疸下之久久為黑疸目青面黑心中如噉蒜韭狀大便正黑
皮膚凡之不仁其脈浮弱雖黑微黃故知之
師曰病黃疸發熱煩喘背滿口燥者以病發時火劫其汗兩熱

肝得然黃皆從濕得之一身發熱而黃肚熱熱在裏當下之
脈沉渴欲飲水小便不利者皆發黃也
腹脹滿面痿黃躁不得睡屬黃家

師曰黃疸之病當以十八日為期治之十日以上宜差反劇為
難治又曰疸而渴者其疸難治疸而不渴者其疸不可發於臥
部其人必吧發陰臥部其人振寒發熱也

茵陳蒿湯治發疸為病寒熱不食食頭眩心胃不安久發黃

茵陳蒿 六兩 大黃 三兩 梔子 十四

右三味以咀水一斗二升煮茵陳減一半內二味煮至三
升去粗分溫三服小便利溺如皂莢色汁狀正赤一宿腹

減黃從小便去也

消石礬石散治黃家日晡所發熱而反惡寒此女勞疸也得之
膀胱急小腹滿一身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹
如水狀大便必黑或時溇此女勞之為病非水也腹滿者難
治

消石

礬石燒各等分

右二味烏末以大麥麵粥和服方寸匕日三服病隨大小
便去大便正黑小便黃是其候

枳實散治黃疸病一本茵陳湯及五苓散五苓散局方百
之

枳實五枚

枳實五枚

枳實五枚

枳實五枚

右以咀以水六升煮取二升去粗分溫三服無時

茵陳五苓散治黃疸病一本茵陳湯及五苓散五苓散局方百

右用五苓散五分因茵蒿末十分和勻先食飲服方寸匕

日三服

大黃黃連枳子硝石陽治黃病腹滿小便不利而赤自汗出此
表和裏實當下之

大黃

黃連各四

枳子十四

枳子十四

枳子十四

右吹咀水六升煮取二升去粗肉硝石煮一升頓服之

黃連散治黃疸大小便秘澀壅熱累效

川大黃好醋 黃連各二兩 甘州炙黃

黃芩各一兩

右四味為末每服二錢食後溫水調下日三服

啗鼻丸蒂散治黃疸遍身如金也此方累經效

凡蒂拾四箇 母丁香一箇 黍米四十箇

右先將凡蒂為細末次入二味同碾羅為末每於夜卧令病人先含水一口兩鼻孔內啗入半字以下吐了水便睡至半夜或明日取下黃水施用熟帛搵了直候取水定使

服前黃連散病輕五日見效重者半日取效

食勞疴黃

膳礬丸治男子婦人食勞食氣面目黃虛腫疴癖氣塊

膳礬無石者三錢 黃蠟二兩 青州肥東五十箇

右以沙鍋或石器內用頭醋三升先下膳礬共煮子慢火熬半日取出末子去核次下蠟二兩再慢火熬一二時辰如膏入好蠟茶二兩同和為丸桐子大每服二十九茶清下日三服食後如久年腸風痔疾陳米飯下日三服一月見效

寒礬丸治食勞黃目黃身黃者

皂礬

不以多少沙鍋子木炭燒
通赤用米醋內點之赤紅

右為末枣肉凡如桐子大每服二三十丸食後生姜湯下

五疳凡治小兒疳瘦面黃眼淡羞明好喫泥土乳食不消化常

服退黃化虫

碌礬

成塊者燒通赤取出一兩

密陀僧

燒赤取出一兩

夜明沙

燒過秤二兩半

右為末枣肉凡如麻子大每服五七丸温米飲下量大小

加減日三服不計時

茯苓滲湿湯治黃疸寒熱嘔吐渴欲飲冷身体面目俱黃小便

不利全不食不得卧

皂礬不以多少少編子木炭燒
通赤用米醋內點之赤紅

右烏末枣肉丸如桐子大每服二三十九食後生姜湯下

五疳丸治小兒疳瘦面黃眼淚羞明好喫泥土乳食不消化常

服退黃化虫茶一兩同味湯煎取汁五升連服二

礞礬成塊者燒通
赤取出一兩密陀僧燒赤取
出一兩

夜明沙燒過秤
二兩半

右烏末枣肉丸如麻子大每服五七丸温米飲下量大小

加減日三服不計時身瘦面目黃者宜服

茯苓溼湯治黃疸寒熱嘔吐渴欲飲冷身體面目俱黃小便

不利全不食不得卧立見效

茵陳六分 白茯苓五分 木猪苓

澤瀉各三分 黃連各三分 黃芩生

梔子各一分 漢防己各一分 白朮各一分

蒼朮各一分 陳皮各一分 青皮各二分

右十二味咬咀作一服水二觔煎至一觔去粗温服空心

食前此方元二
哥服之效

穀疸治驗

元頰正卿丙寅二月間因官事勞役飲食不節心火乘脾脾氣

虛弱又以恚怒氣逆傷肝心下痞滿四肢困倦身體麻木次傳

身目俱黃微見青色也頰黑心神煩亂怔忡不安兀夕夜吐口生

惡味飲食燻化時不完數小便癃閉而赤黑辰巳間發熱日暮則止至四月尤盛其子以危急求請治之具說其事診其脈浮而緩金匱要略云寸口脈浮為風緩為痺痺非中風四肢苦煩脾也必黃瘵熱以行跌跌脈緊為傷脾風寒相搏食穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通尿被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疽宜一服水二服

茵陳葉一分

茯苓去皮五分

枳實五分

蒼朮去皮炒

白朮各三分

黃芩生六分

黃連去頭

枳實炒

枳實去皮

澤瀉

陳皮

漢防已各二分

青皮去白一分

右十三味以咀作一服用長流水三椀煎至一椀去粗溫服食前一服減半二服良愈

內經云熱淫于內治以鹹寒佐以苦耳又濕化于大熱反勝之治以苦寒以苦泄之以淡滲之以梔子茵陳苦寒能浮濕熱而退其黃故以為君難經云羌生心下滿以黃連枳實苦寒泄心下痞滿肺主氣今熱傷其氣故身麻木以黃芩苦寒瀉火補氣故以為臣二木苦耳溫青皮苦辛溫能除胃中濕熱泄其壅滯養其正氣漢防已苦寒能去

十二經留濕澤瀉鹹平茯苓猪苓甘平導膀胱中濕熱利小便而去瘕閉也

衛生寶鑑第十四卷終

衛生寶鑑卷第十五

諸腰痛筋骨冷疼

木瓜虎骨丸治風寒湿合而成痺脚重不仁疼痛少力足下癢痛不能踏地脚膝筋攣不能屈伸及項背拘急手背無力耳內蟬鳴頭眩目運諸證脚氣行步艱難並皆服之

木瓜

麒麟竭研

虎脰骨 酒炙

沒藥 研

自然銅 醋洗七次

楓香脂

敗兔 醋炙去闌

骨碎補 去毛

甜瓜子

當歸 切焙

桂 已上各一兩

乳香 研半兩

木香 一兩

安息香

重湯酒煮入藥地龍 去土各二兩

右為末入研藥和勻酒糊丸如桐子大每服三十九温酒送下煎木瓜湯送下亦得漸加至五十九空心食前

茗葱丸治寒湿筋骨冷疼不能舉動

川烏玉皮

黑牽牛頭末

鹽豉各三

乳香研

沒藥研各

右為末入研藥勻用肥葱二握洗去生淡醋一升不犯銅

鐵於文武火熬葱醋一半漉去粗慢火再熬成膏滴水中

不散為度將前藥末和丸如桐子大每服一十九加至二

十九温酒送下大便微利則愈

活血應痛丸治風湿烏病血脉凝滯腰腫重疼身体麻木頭面

虛腫下注脚膝重痛行履艱難

狗脊六兩

蒼朮十兩

香附十二

陳皮九分

沒藥一分

藏冥仙二兩

草烏頭二兩

右七味為末酒糊丸梧子大每服二二十九温酒或熱水

任下不以時

左經丸治筋骨諸疾手足不隨不能行步運動但不曾鍼灸傷

筋脉者四五丸必效此藥尤能通行榮衛導經絡專治心腎

肝三經服後小便少淋液乃其驗也

木鱉子去殼

白膠香研

五灵脂各三

別研

兩半

當歸去土 草烏頭生去皮脂

斑猫一百箇去頭足 翅少醋煮熟

右後四味烏末与前二味和停用黑豆去皮生杵粉一斤醋煮為糊和藥丸如雞頭大每服一丸酒磨下

神應丸治一切腰痛

當歸 肉桂各十兩 葳靈仙二十兩

右為末酒煮麵糊為丸梧子大每服十五丸溫酒下

烏灵丸久患風虛麻痛行步艱難正宜服之

川烏炮去皮 五灵脂二兩

右為末酒糊丸如桐子大每服十丸加至五十丸空心溫

酒送下忌一切冷物

尅效餅子治腰痛及腿膝

苧草各一兩 蕎麥炒 蕎麥炒 蕎麥炒 黑牽牛洋四兩半生半熟取頭末二兩半

右為末每服三錢夜卧滴水和成餅慢火燒黃色取出氣

實者作一服爛嚼後煎半生半熟葱白酒送下氣虛人作

兩服先喫一多半至明取動又嚼一小半亦用半生半熟

葱白酒送下微取一行加婦人有胎不可服之

獨活寄生湯治腎氣虛弱冷卧湿地腰背拘倦筋骨掣痛或當

風取涼風邪流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼痛或腰痛牽引

脚重行步艱辛

獨活 寄生 杜仲

牛膝 細辛 秦光

桂心 茯苓 防風

川芎 人參 芍藥 各一兩半

當歸 熟地黃 芍藥 各一兩

右吹咀每服三錢水三錢生姜五片煎至一錢去粗稍熟

服食前

獨活湯治因勞役得腰痛如折沉重如山

羌活 美活 肉桂 大黃 酒燉

防風 獨活 澤瀉 各三

當歸 連翹 各五分 桃仁 各五丁

甘草 二分 黃蘗 酒炙 防已 各一兩

右吹咀每服五錢水一錢半酒半錢煎至一錢去粗熱服

食前立效

薏苡仁湯療病者一身盡痛癢無所劇者此名風温此病傷於

肝汗出當風或久傷取冷所致也

麻黃 六分 薏苡仁 二分 杏仁 六分 桑葉 去節 二分

甘草 二分 杏仁 六分 桑葉 去節 二分

右吹咀作一服水三錢半煎至二錢去粗分温二服

防已黃芪湯療風濕脉浮身重汗出惡風

防已二分

神黃芪二分

甘草一分

白朮

生薑

各二分

大棗一箇

右以咀作一服水三饑煎至一饑半去粗溫分作二服

灸腰痛法

腎俞二穴在十四椎下兩傍各寸半陷中灸五壯主腰痛不可
俛仰轉側難身寒熱食倍多身羸瘦面黃黑目眈々又主丈夫
婦人冷積氣勞病

中膂俞二穴在二十椎下兩傍各寸半灸五壯主腰痛不可俛
仰夾脊脊痛上下按之應手者從項後始至此穴痛皆灸之
立愈也

腰俞一穴在二十一椎筋下間陷中灸五壯主腰疼不能久立
腰已下至足冷不仁起坐難腰脊痛不能立急強不得俛腰
重如石難舉動也

張仲文傳神仙灸法療腰重痛不可轉側起坐難及冷痺脚筋
學急不可轉側屈伸灸曲歎兩文頭左右脚四處各三壯每
灸一脚二火齊下艾炷到肉初覺疼痛用二人兩邊齊吹至
火滅乍時着灸人定已來臟腑自動一兩行或轉動如雷聲
其疾立愈此法神效不可量也

奇效人痛氣痛及腰痛膝無力及控軍證各云云云控引也
至真古醫要脈九也

至真大要論云小腹控掣引腰脊上衝心唾出清水及為噉噉甚則入心善惡善忘甲乙經曰邪在小腸也小腸病者小便痛引腰脊貫肝肺其經虛不足則風冷乘間而入邪氣既入則厥之證上衝肝肺客冷散於背結於臍控引掣丸上而不下痛而入腹甚則衝心背蓋其經絡所屬躬係也

控引掣丸治小腸病結上而不下痛引心臍

苗香炒

練實對炒

食茱萸炒

陳皮炒

馬蘭花各一兩

芫花五分

醋炒

右為末醋糊丸如桐子大每服十九至二十九丸溫酒送下

御命空心食前

陰疝足厥臥之脉環臥器抵少腹或痛腎虛寒水洵竭瀉邪補肝宜以

蒺藜湯治疝疝牽引小腹痛諸厥疝即臥疝也喜怒勞痛不可忍也

蒺藜炒法

附子炮法

梔子去皮各

右為末每服三錢水一飯半煎至七分去粗溫腹食前

茴香練實丸治疝疝痛不可忍及小腸氣痛

主神川練實炒

山茱萸

丁香食茱萸炒吳茱萸炒香皮去白

馬蘭花

芫花醋炒

陳皮去白各

右為末醋糊丸如桐子大每服三十丸温酒送下食前

丁香練實丸治男子七疝痛不可忍婦人癥聚帶下皆任脉所

主脉經也乃腎肝受病治法同

當歸去芦

附子炮去皮

川練劉

茴香炒

右四味各一兩以好酒三升同煮酒盡焙乾為細末每秤

藥末一兩再入下項藥各三

丁香

木香各三

全蝎十三

玄胡索五分

右四味同為末與前項藥去拌和勻酒糊丸如桐子大每

服三十九治一百丸用酒造下空心食前丸疝氣帶下

屬於風全蝎治風之聖藥茴香川練皆入小腸經當歸玄

胡活血止痛疝氣帶下皆積寒邪入於小腸之間故用附

子佐之丁香不香為引導也

沉香鹿茸丸大補益脾胃強壯筋骨辟除一切惡氣令人肉實

五臟外充肌膚補益陰氣和暢榮衛

沉香一兩另

麝香一兩

鹿茸一兩先用草火

右三味同研白水糊丸如桐子大每服三十九至五十九

暖酒送下空心食前

三白散治淋囊腫脹大小便不通

白牽牛二兩 桑白皮三兩 白朮

木通去節 陳皮各半

右為細末每服二錢姜湯調下空心服未覺再進

葫蘆巴丸治小兒疝氣偏墜疝腫小腹有物如卵上下去來痛

不堪忍或絞結陸臍攻刺呃惡悶亂

葫蘆巴一分 吳茱萸十兩 川練子炒一斤

巴戟去心 香川烏頭炮去皮 茴香炒十兩

右為末酒糊丸梧子大每服十五丸空心溫酒下

川苦練散治小腸氣痛

木香一兩另 茴香一兩 鹽炒 川練子一兩 對用巴豆十箇 搗碎子川

練砂黃
去巴豆

右為末每服二錢溫酒一巵調下空心食前許學士云大

抵此疾因虛得之不可以虛驟補經云邪之所湊其氣必

虛留而不去其病則實故必先滌所蓄之熱然後補之是

以諸方多借巴豆氣者蓋謂此也

疝氣治驗

癸丑歲奉詔至六盤山上命治火兒赤細隣久病疝氣復因七

月間飢飽勞役過飲瀆乳所發甚如初面色青黃不澤臍腹

痛搗撮不可忍腰曲不能伸熱物製之稍緩脈得細小而急予

思難經云任之為病男子內經七疝皆積寒於小腸之間所致

也非大熱之劑即不能命遂制一方名之曰小
沉香桂附丸治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不羨氣不調和退休
助臥除臍積冷心腹疼痛腸助膨脹腹中雷鳴面也不津脣
干足厥冷便利無度又治下焦臥虛及療七疝痛引小腹不
可忍腰屈不能伸喜熱熨指方

沉香

附子炮去皮臍

川烏炮去皮臍切作小塊

干姜炮

良姜炒

茴香炒

官桂

吳茱萸各一兩湯浸去苦

右烏末醋糊丸如桐子大每服五十九至七八十九熱米
飲湯送下溫酒吞下亦得空心食前日二服忌冷物間服

天台烏藥散治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥

木香

茴香炒

良姜炒

青皮去白五分

楝子對二箇

川練十箇

巴豆七十箇微打破同川練實用麩炒

備楚黑色去麩不用只用川練

右烏末每服一錢溫酒調下痛甚者炒生薑熱酒調下亦
得服此二藥旬日良愈明秋王征班師遂遠迎拜精神如
故上天悅輒錄於此

陰毒傷寒

玉爆肚

川烏

細辛干

良姜

干姜

天仙子

牡蛎粉

肉桂

胡椒各等分

右為末醋糊調塗臍下綿衣覆之又名溫內玉抱肚

廻陽丹治冰毒傷寒手足厥冷

川烏炮

牡蛎燒

不灰木燒

良姜炒

白芍藥各等分

麝香少許

右為末每用一錢男病女津唾調塗外腎上女病男津唾

調塗乳上

手陽丹治冰毒傷寒手足逆冷指甲青色体冷脉沉細而微神

效方

右用慙慙五枝陳蜂窩四五箇燒存性為末用慙慙搗如
沉和瓦如彈子大手心內握定用糸緊扎定須臾汗出
以綿被覆蓋如手心熱甚休解開如服藥時先服升麻湯
五錢出子慙連須三枝生姜五片水二大觔煎至一觔去
粗温服以被覆之汗出而愈

王海藏已寒死治沉寒痲冷臍腹冷疼廻臥返臥

附子炮

干姜炮

茴香炒各一兩

良姜七分

茯苓五分

桂三分

右為末醋糊丸如桐子大每服三五丸温酒送下食前

白淫諸證

痿論云思想無窮所願不得意淫于外入房太甚宗筋弛縱發
為筋痿及為白淫夫腎臟天一以極為專志意內治則精全而
淫去思外淫於房室太甚則固有淫泆不守隨溲溺而下也然
本於筋痿者以宗筋弛縱也

內補鹿茸丸治勞傷思想臥氣虛益精止白淫

鹿茸酥炙 兔絲酒浸 茯苓炒

紫苑 白茯苓 肉蓯蓉酒浸

官桂 附子炮 陽起石各等

地床酒浸 桑螵蛸 黃芪各等

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九丸温酒送下食前

茯兔丸治小便白濁及夢泄遺精

兔絲子五兩 白茯苓三兩 石蓮子二兩

右為細末酒糊丸如梧子大每服三十九丸空心温湯下

金箔丸治下焦虛小便白淫夜多異夢遺泄

莖子炒 原蚕蛾 破故紙炒各

牛膝酒浸 肉蓯蓉 山茱萸

龍骨 兔絲子 桑螵蛸各一

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九丸温酒送下空心食

前

珍珠粉丸治白淫夢泄遺精及滑出而不收

真蛤粉一斤 黃蘗一斤 炒

右為末滴水丸如桐子大每服一百丸空心温酒送下法

曰秋盛臥虛故精泄也黃蘗降心火蛤粉鹹而補腎臥

補真玉露丸治臥虛秋盛精脫淫樂旺痰

白茯苓去皮 白龍骨火飛 莖子酒浸

兔絲酒浸各等分 火日脩合

右為末醋糊丸如桐子大每服五十九丸温酒送下塩湯亦

得空心食前待少時以飯羹壓之

玉花散治小便自利如汨色此腎虛也

玉花根 桂心各一兩 白石脂

兔絲子酒浸 牡蛎塩泥裹燒赤候 冷去泥各二兩

右為末每服二錢大麦煎粥湯調下一日三服食前

府判補藥方

兔絲子三分 酒浸 肉蓯蓉三分 酒浸 牛膝酒浸

巴戟去心 酒浸 沒藥研各二分 麻黃去節一分半

川山甲酥炙 鹿茸酥炙各二分 乳香研

麝香研各一分 甘艸頭末五分 通草三分

海馬二對 酥炙

右為末煉密丸

衛生寶鑑卷第十六

名方類集

泄痢論

泄痢論并方

論曰臟腑泄痢其證多種大抵從風濕熱論之是知寒少熱多
寒則不能久也故曰暴泄非陰久泄非陽論云春宜緩形形緩
動則肝木乃榮反靜密則是行秋令金能制木風氣內藏夏至
則火盛而金去獨火木旺而脾土損矣輕則飧泄身熱脉浩穀
不能化重則下痢膿血稠粘裏急後重故曰諸泄稠粘皆屬於
火經曰溲而膿血知氣行而血止也宜大黃湯下之是為重便
劑黃芩芍藥湯是為輕劑是實則泄其子木能自虛而脾土實

矣故經曰春傷於風夏爲飧泄此逆四時之氣人所自爲也右
自太阴脾經受濕而爲水泄虛滑身重微滿不知穀味假令春
宜益黃散補之夏宜泄之法云宜補宜泄宜和宜止和則芍藥
湯止則呵子湯久則防變而爲膿血是脾經傳受於腎謂之賊
邪故難愈也若先利而緩滑謂之微邪故易痊也此皆脾土受
濕天之所爲也雖聖智不能逃口食味鼻食氣從鼻而入苗積
於脾而爲水泄也有厥臥經動下痢不止其脉沉而遲手足厥
逆膿血稠粘此爲難治宜麻黃湯小續命湯汗之法云謂有表
邪縮於內當散表邪而自愈有暴下無聲身冷自汗小便清利
大便不禁氣難布息脉微嘔吐急以重藥溫之漿水散是也故

法云後重者宜下腹痛者當和身重者除濕脉弦者去風膿血
稠粘者以重藥竭之身冷自汗者以毒藥溫之風邪內縮者宜
汗之則愈驚澹爲痢當溫之而已又云在外者發之在內者下
之在上者湧之在下者竭之身表熱者內疎之小便澀者分別
之又曰盛者和之去者送之過者止之兵法有云避其來銳擊
其惰歸泄之謂也

右出治
法機要

芍藥黃芩湯治泄痢腹痛後重身熱久不愈脉滿疾者及下痢
膿血稠粘

黃芩

芍藥

各一兩
甘草半兩

右以咀每服半兩水一椀半煎至一椀去粗溫服不拘時

大黃湯治浮痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度

右用大黃一兩剉碎好酒二大觥同浸半日許再同煎至一觥半去粗將酒分作二服頓服之痢之勿服如未止再服取利為度後服芍藥湯和之痢止再服白朮黃芩湯蓋微其毒也

芍藥湯行血調氣經口波而便膿血知氣行而血止行血則便自愈調氣則後重除

芍藥 一兩
當歸 三分
黃連 二分
黃芩 各半
大黃 三分
桂 二分
甘草 炒
枳實 各一
木香 一分

如便後膿毒加黃蘗半兩

右九味㕮咀每服五錢水二觥煎至一觥去粗濕服如痢不減漸加大黃食後

白朮黃芩湯服前藥痢疾雖除宜調和

白朮 一兩
黃芩 七分
耳朮 三分

右三味㕮咀作三服水一觥半煎一觥溫服清

藥水散治暴泄如水周身汗自出一身盡冷脈微而弱氣少不能語甚者加吐此為急病

半夏 二兩
炮
附子 炮
干姜 炮
每服耳朮五分
良姜 二分

右六味為末每服三五錢漿水二錢煎至一錢和粗熟服
甚者三四服微者一二服太臥經動傳太臥下痢為驚傷
澹大腸不能禁固卒然而下下成小油光色其中或有硬
物欲起而又下欲了而不了小便多清此寒也宜服之春
夏宜桂枝湯秋冬宜白朮湯

桂枝湯方

桂枝

白朮

芍藥

各五分

甘草炙二分

右四味以咀每服五錢水一觥煎七分去粗溫服

白朮湯方

白朮

芍藥各三分

干姜五分

甘草炙二分

右四味為散如前煎甚者去干姜加附子三錢謂立能

發散也

溢飲

水漬入胃名為溢飲清泄渴能飲水水下復泄泄而大渴此無

藥證當灸大顛

大推一穴一作顛此第一推下陷中手足三伏督脉之會

鍼五分留三呼泄五吸灸以年為壯

濡泄

內經云濕勝則滯池甲乙經云寒氣客於下焦傳為濡池夫脾為五臟之至秋其性惡寒濕今寒濕之氣內客於脾故不能裨助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間虛莫能制故涸池如水隨氣而下為之濡池法當除濕利小便也

對金飲子主之

平胃散五分

五苓散二分

草豆蔻

麴畏煨五分

右相合作四服水一觥半夏三片冬二箇煎一觥去粗溫

服食前

上都七月間史丞相有此疾三服而愈

飧泄

內經云清氣在下則生飧泄又曰久風入胃中則為腸風飧泄

夫脾胃土也其氣冲和以化為事今清氣下降而不升則風久而干胃是木賊土也故冲和之氣不能化而令物完出謂之飧泄或飲食太過腸胃所傷亦致米穀不化此俗呼水穀利也法當下者舉之而消尅之也以

木香

良姜

升麻

人參

檳榔

神麴

肉苳

吳茱萸

縮砂仁

干姜

陳皮

右十一味為粗米每服四分水一觥半煎至一觥去粗溫

服食前宜加白朮

痢疾

內經曰膿血稠粘皆屬於火夫太陰主瀉少陰主痢是先泄而亡津液火就燥堅惡燥居下焦血分其受邪者故便膿血也然青白為寒黃赤為熱宜瀆兩審治熱以堅中丸蒼朮香連丸治寒以白膠香散或多熱少寒水煮木香膏虛滑類宜止澁宜養臟湯病氣大退正氣未復當補

且如浮痢止脾胃虛難任飲食不可一槩用剋伐之劑若補養其脾胃氣足自然能飲食且錢氏方中異功散設或喜嗜飲食太過有傷脾胃而心腹痞滿嘔逆惡心則不拘此例當權用橘

皮枳朮丸一服得快勿再服若飲食調節無傷則胃氣和平矣堅中丸治脾胃受濕滯泄注下

黃連 去須

黃蘗

赤茯苓 去皮

澤浮

白朮 各一兩

陳皮

肉苳

白芍藥

官桂

半夏 各半

右十一味為末湯浸蒸餾丸如桐子大每服五七十九溫米飲送下食前

純陽真人養臟湯治下痢赤白

人參

當歸

白朮 各六

官桂

其艸各八分

肉荳蔻

木香

一分

诃子

一分

白芍藥

醫粟穀三分

右咬咀每服四分水一錢半煎至八分去粗食前溫服

水煮木香膏治脾胃受濕臟腑清泄腹中疼痛日夜無度腸鳴

水聲不思飲食每欲痢時裏急後重或下赤白或便膿血並

皆治之

日本

煎

米穀

養水浸溼炒黃六兩

乳香

研

肉荳蔻

縮砂

各一兩半

當歸

白芍藥

木香

丁香

诃子皮

藿香

黃連

去頂

青皮

去白各一兩

干姜

炮半兩

甘草

炙

厚朴

陳皮

各一兩

枳實

麸炒

白芍藥

右十七味為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸水一錢寒一投擘開煎至七分和粗稍熱食前服

丁巳年八月從軍過鄂時值霖雨民多痢疾遂得白朮

安胃散聖餅子於高仲寬所傳之用之多效故錄于此

白朮安胃散治一切浮痢無問膿血相雜裏急後重窘痛日夜

無度及治小腸氣痛婦人臍下瘳冷並產後而枕塊痛亦治

產後虛弱寒熱不止者

米穀 三兩去頂 帶殼炒 茯苓 去度

車前子

白朮 各一兩 烏梅肉

五味子

右六味烏粗末每服五錢水三錢煎至一錢去粗空心溫服之

服之

聖餅子治浮痢赤白臍腹撮痛久不愈者

定粉

蜜陀僧

舶上硫黃 各三

黃丹 二分

輕粉 少許

右五味為末入白麵四錢匕滴水丸如指頭大捻成餅塵

乾食前溫漿水磨下大便黑色為效

南白膠香散治脾胃虛寒滑腸久浮臍腹疼痛無休止

米穀 四兩 醋炒

龍骨

南白膠香 各三兩

甘艸 七分 炙

干姜 半兩 炮

右五味烏粗末每服五錢水一錢半煎至一錢去粗溫服

食前忌冷物傷胃

荳蔻燥腸丸治沉寒痼冷泄痢腹痛後重

附子 炮去度

赤石脂 各一兩

舶上硫黃

良姜 切炒

肉荳蔻

改胎干姜 各半兩 炮

右六味烏末醋糊丸如桐子大每服三十九米湯下食前

忌生冷硬物及油膩物

五粉散治冷極泄瀉久作滑腸不禁不思飲食宜服神效

紅豆揀淨

大附子

炮法下皮臍

乾薑

炮各

舶上硫黃

另研

右肆味為末入研藥勻每服二錢空心半稠半稀粟米飲

下至晚又壹服重者拾服必效輕者三伍服安

玉粉丹逐化虛中積止膿血痢撮痛裏急後重並皆治之

定粉半兩

粉霜三錢

延胡三錢

膩粉一錢

石燕子一箇

右先秤石菱延胡為末入乳鉢內共粉霜等一處研如粉雞清丸如豌豆大每服三丸至伍丸溫米飲下食前臨卧不論老弱妊婦產人皆可服之粥飲下伍丸或另丸一某

麻子大量小兒大小夜卧溫米飲下伍柴丸漸服拾丸忌

油膩粘滑冷硬等物

桃花丸治脾胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢赤白

赤石脂

乾薑

炮各

右為末糊九梧子大每服三十九溫米飲下空心食前日

三服一方治禁口痢驗梨一枝去心入好蜜一匙煨爛食

玄青丸治下痢勢患頗併寔痛或久不愈諸藥不止須吐下之

以開除濕勢痞悶積滯而使氣液宣行者宜以逐之兼宜利

積熱酒食積黃瘦中滿水氣腫腹脹兼治小兒驚疳積熱乳

癖等證

黃連 二兩

青黛 二兩

黃連

黃蘗

芫花醋拌炒

大戟各半

赤白乾薑二錢

右取味為末研勻水丸小豆大初服拾丸再服加拾丸空

心日午臨卧三服以快利為度後常服拾伍丸數日後得

食力利病未痊者徐加再取利之後却常服以意消息病

去為度後隨證止之小兒丸如黍米大退驚疳積熱不須

下者常服拾丸

阿膠

連凡治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸證

阿膠

淨草反炒透明白研不細者再炒研細盡

烏梅肉炒

黃連

黃蘗

赤芍藥

當歸炒

赤茯苓

乾薑

右捌味為末入阿膠末和勻水丸如桐子大每服拾丸温

米飲送下食前

四時用藥例

溲而便膿者小腸泄也脉以五至以上洪大者宜以七宣丸脉

平和者立秋至春分宜黃連丸春分至立秋宜芍藥藥皮丸四

時皆宜加減平胃散如有七宣丸證候者亦宜服此藥去其餘

邪養平胃散

芍藥藥皮丸方

黃蘗

芍藥

黃蘗分等

右烏末醋糊丸如桐子大每服伍錢拾丸溫米飲送下食

前

加減平胃散經云四時皆以胃氣為本久下血則脾胃虛損而血不流於四肢却入於胃中而為血痢豆服此滋脾胃

木香

檳榔各三錢

白朮

厚朴製

陳皮各一兩

甘草七錢

人參

黃連

白茯苓

阿膠炒

桃仁各半兩

右十一味烏末每服伍錢水二觔生薑三片枣子二箇煎

至一歲去粗溫服無時

加減法

血多加桃仁

氣不下後重加檳榔木香膿多加阿

膠

腹痛加官桂芍藥甘草

濕多加白朮

大黃

熱泄加黃連

小便澀加茯苓澤瀉

脈洪大加

黃連阿膠丸治痢

阿膠碎砂

黃連三兩

茯苓二兩

右各為末以水調阿膠末為丸梧子大每服二十九溫水

下食前服

阿黎勒丸治休息痢日夜無度腥臭不可近臍腹撮痛諸藥不

效者

呵子去核

母丁香三十

椿根白皮一兩

右為末醋糊丸如桐子大每服伍拾丸陳米飲送下空心食前

鞠藭丸治中風或中風濕臟腑滑瀉

附子

芎藭

白朮

神麴各等分

右肆味為末麵糊丸如桐子大每服三伍拾丸温米飲送下此藥亦治飧泄甚妙素問云春傷於風夏必飧泄米谷不化蓋春木旺肝主風邪淫於脾經夏飲冷當風故多飧泄也

陳麴丸磨積止瀉痢治腹中冷疼

陳麴一兩

官桂

人參

乾薑

白朮

當歸

甘草炙

厚朴各半

右捌味為末煉蜜丸如桐子大每服三伍拾丸温酒或淡

醋湯任下食前日二服

麴朮丸治時暑暴瀉壯脾温胃及治飲食所傷胃膈痞悶

神麴炒

蒼朮油浸一宿

右為細末麴糊丸梧子大每服三拾丸温米飲下不拘為

時

胃風湯治風冷虛氣入客腸胃水鼓不化泄瀉注下腹腸虛滿
腸鳴疝痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血

白朮

川芎

白芍藥

人參

當歸

官桂

茯苓各等分

右柒味剉每服二錢水一椀粟米百粒同煎至七分熟服
空心食前量小兒加減服之

當歸和血散治腸澼下血及濕毒下血

升麻

當歸身

各一錢

槐花

青皮

熟地黄

白朮

各六分

川芎

荆芥各四分

右捌味為末每服二錢清米飲調下空心食前

陰陽皆虛灸之所宜

至元己亥廉臺王千戶年四十有五領兵鎮漣水此地卑濕因
勞役過度飲食失節至秋深癩痢併作日餘不愈飲食全減形
容羸瘦兼馬輻以婦時已仲冬求予治之具陳其由診得脉弦
細而微如蛛絲身體沉重手足寒逆時復麻痺皮膚痂疥如癩
風之狀無力以動心腹痞滿嘔逆不止此皆寒濕為病久淹真
衰弱形氣不足病氣亦不足陰陽皆不足也鍼經云陰陽皆虛
鍼所不為灸之所宜內經曰損者益之勞者溫之十劑云補

可去弱先以理中湯加附子溫養脾胃散寒濕澆可去脫養臟
湯加附子固腸胃止瀉痢仍灸諸穴以併除之經云府會太倉
即中脘也先灸五七壯以溫養脾胃之氣進羹飲食次灸氣海
百壯生灸元氣注榮百脉充實肌肉復灸足三里胃之合也三
七壯引陽氣下交陰分亦助胃氣後灸陽輔二七壯接續陽氣
全足脛溫暖散清濕之邪迨月餘病氣去漸半復今累遷侍衛
親軍都指揮使精神不減壯年

結陰便血治驗

真定總管史侯男十哥年四十有二肢體本瘦弱於至元年已
因收秋租佃人致酒味酸不欲飲勉飲三兩盃少時腹痛次厚

泄瀉無度日十餘行越十日便後見血紅紫之類腸鳴腹痛求
醫治之曰諸見血皆以爲熱用芍藥藥皮丸治之不愈仍不欲
食々則嘔酸形體愈瘦面色青黃不澤心下痞惡冷物口乾時
有煩躁不得安卧請予治之具說其由詠得脉弦細而微遲手
足指冷內經云結陰者便血一升再結二升三結三升經云邪
在五臟則陰脉不和陰脉不和則血留之結陰之病陰氣內結
不得外行無所稟滲入腸間故便血也宜以
平胃地榆湯治之

蒼朮一錢

升麻一錢

黑附子地一錢

地榆七分

陳皮

厚朴

白朮

乾薑

白茯苓

葛根

各半

甘草

炙

益智仁

人參

當歸

麴炒

白芍藥

各三

右拾陸味件作一服水二觥生薑三片枣子二箇煎至一
觥去粗溫服食前此藥溫中散寒除濕和胃服之數服病
減太半仍矣中脘三七壯乃胃募穴引胃上升濕榮百脉
次矣氣海百餘壯生發元氣矣則強食生肉又以還少丹
服之則喜飲食添肌肉至春再矣三里二七壯之脾溫胃
生發元氣此穴乃胃之合穴也改服芳香之劑戒以慎言

語節飲食良愈

葱熨法治驗

元在十三卷尾
今寫在此

真定一秀才年三十有一肌體本弱充腸下有積氣不敢食冷
物得寒則痛或嘔吐清水眩暈欲倒目不敢開惡人煩冗許卧
一二日及服辛熱之劑則病退延至甲戌初秋因勞役及食冷
物其病大作腹痛不止冷汗自出四肢厥冷口鼻氣亦冷面色
青黃不泯全不得卧扶几而坐又兼咳嗽咽膈不利故內經云
寒氣客於小腸膜原之間絡血之中血泣不得注於大經血氣
稽留不得行故宿昔而成積矣又寒氣客於腸胃厥逆上出故
痛而嘔也諸寒在內作痛得吳則痛立止予與藥服之藥不得

入見藥則吐無如之何治之遂以熟艾約半斤白紙一張鋪於腹上紙土攤艾令勻又懸葱數枝批作兩半鋪於熟艾上數以重再用白紙一張覆之以燻火熨斗熨之冷則易之若覺腹中熱腹皮暖不禁以綿三糖多澹帶繫之待冷時方解初熨時得暖則痛減大暖則痛止至夜得睡翌日再與對証藥服之良愈故錄此熨法以救將來之痛也

霍亂吐瀉

活人百問云嘔吐而利者何也此名霍亂也嘔吐而利熱多問而渴者五苓散寒多不飲水者理中丸若夏月中暑霍亂吐瀉下利心腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷汗自出兩脚轉筋宜服

香薷散井中沉冷頓服乃效

香薷散治陰陽不順清濁相干氣射中焦名爲霍亂此皆用飲食或風冷傷於脾胃食結不消陰陽二氣雍而不及陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變成吐利百脉混亂榮衛俱虛冷氣搏筋令轉皆宜服此

香薷 二兩

黃連 二兩

二味入生姜四兩 詳令黃色

香薷 一兩

右三味爲末每服三錢水一椀酒半椀同煎至七分去粗新汲水頻換浸令極冷頓服之藥冷則效速也

增損縮脾飲解熱除渴消暑毒止吐利霍亂後服煎茶寒煩

多者尤宜服之

烏梅 縮砂

寸艸 各二兩 乾葛 二兩

右吹咀每服伍錢水一碗生姜拾片煎至八分水浸令極

冷旋令服之無時

潔古老人云霍亂轉筋吐利不止者其病在中焦也陰陽交而不知矣為疼痛也此病最急不可食分毫粥飲穀氣入胃則死矣治有兩種渴欲飲水者陽氣多也五苓散主之不欲飲水者陰氣多也理中丸主之只待吐尽多時微以粥飲漸之養之以遲為妙也

半夏湯治霍亂轉筋吐利不止

茯苓 白朮 半夏 麴 各十兩

甘草 二錢 淡味桂 一錢

右為末渴者凉水調下不渴者大溫水調下三錢無時

中暑霍亂吐利治驗

提學侍其公年七十九歲至元丙寅六月初四日中暑霍亂

吐利昏冒終日不省人事時夜方半請予治之診其脉洪大而

有力一息七八至頭熱如火足寒如水半身不遂牙關緊急予

思內經五亂篇中云清氣在陰濁氣在陽宮氣順脉胃氣逆行

亂於胃中是謂大悅亂於腸胃則為霍於是霍亂之名自

此而生蓋因年高氣弱不任暑氣陽不維陰則浮陰不維陽則吐陰陽不相維則既吐且浮矣前賢見寒多以理中丸熱多以五苓散為定法治之今暑氣極盛陽明得時况因動而得之中陽明矣非甘草大寒之劑則不鹹浮其暑熱墮浮溜之火而安神明也遂以耳露散甘草大寒浮熱補氣加白茯苓以分陰陽約重一两水調灌漸之省事而諸証悉去後慎言語節飲食三日以三朮調中湯之劑增減服之理正氣逾十日後方平復

內傷霍亂治驗

戊午春攻表陽廻住夏曾州界有蒙古百戶昔良梅因食酒肉飲潼乳得霍亂吐浮從朝至午精神昏債以因急視之

脉得浮數按之無力所傷之物已出矣即以新汲水半碗調桂苓白朮散徐徐服之稱安又於墻陰掘地一穴約二尺許貯以新汲水在內攪動待一時澄定各日地漿用清者一椀再調服之漸令氣調吐利遂止至夜安眠翌日微燥渴却以錢氏白朮散時令服之良愈或向用地漿者何也予曰坤為地之屬陰土平日靜順感至陰之氣又於墻陰貯以新水取重陰之氣也陰中之陰能浮湯中之陽令霍亂因暑熱內傷而得之故痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡又加以暑熱七神迷亂非陰之至氣則不愈予用之者此也或曰內經福方世之書豈不信然桂苓白朮散治胃暑飲食所傷便溲濕熱內盛霍亂吐浮轉筋

射急痛腹滿悶小兒吐瀉聲吼宜服

茯苓去皮 白朮白朮 桂各半

澤瀉石膏 滑石二兩 寒水石二兩

右捌味為末熱湯調下三錢喜冷新水調善湯亦得小兒

服一錢

桂苓耳露飲流濕瀾燥治痰涎止咳嗽調臟腑寒熱嘔吐服之

令人遍身氣溢宜乎及治小腫泄利藥用者昔一疏再歸

官桂 藿香 蘇合 木香 一分

茯苓 白朮 澤瀉 滑石 寒水石 各一兩

葛根 澤瀉 寒水石 各一兩

甘州

澤瀉

葛根

石膏

寒水石

滑石

右拾二味為末每服三錢白湯調下新水或薑湯亦得

宣明益原散又名天水散

滑石陸兩 炙甘草一兩

右為末每服三錢蜜少許溫水調下日三服新水亦得飲

鮮肌癆汗者煎葱白豆豉陽調無時

附祿聖惠治霍亂吐瀉

厚朴生姜汁

右為末新水調下二錢無時如神

癩病脈證并治

師曰癩脈自弦々數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦邊者可溫之弦緊者可發汗及鍼灸也浮大者可吐之弦數者風疾癩也以飲食消息之間曰瘡以目一日癩當十五日愈設不差當目尽日解也如其不差當云何師曰此結為癩癧名曰瘡毋急宜治之可用

鱉甲煎丸

鱉甲 拾二分

赤硝 拾二分

蟾蜍 陸分

廩虫 熬

牡丹皮 去心各五分

蜂窩 熬四分

烏扇 燒

黃芩

柴胡

乾薑 炮

大黃 各三分

芍藥 五分

挂枝

厚朴 炒

紫苑

阿膠 炮各三分

桃仁 去皮尖

瞿麥 一作紫葢

鼠婦 熬

葶藶 炒各二分

石葶 去毛

半夏 洗各一分

人參 去蘆一分

右二拾三味烏末先取鍛竈下灰一斗清酒一斛伍升浸灰候酒浸一半著鱉甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁內諸藥煎烏丸如桐子太空心服七丸日三服十金用鱉甲十二片海藻丸分大戟一分蜜虫五分魚昆婦赤硝以鱉甲煎和烏丸

小柴胡去半夏加芫蓂根湯治瘧疾發渴者外臺經心錄治兩

柴胡八兩

人參

黃芩

甘草炙

生姜各三兩

芫蓂根四兩

大枣十二枚

右六味咬咀以水二斗三升煮取陸升去粗再煎至三升
溫服一升日慘服

柴胡桂姜湯三方

柴胡八兩

桂枝去皮

黃芩各三兩

牡蛎熬

甘草炙

乾姜炮各二兩

芫蓂根四兩

大黃各三兩

芍藥各三兩

右以水一斗二升煎六分去粗再煎三升溫服一升日三

初服微煩汗出愈

師曰陰氣孤絕陽氣獨發則熱而氣煩滿手足熱而欲嘔名

曰瘵瘵者似熱不寒者邪氣內藏於心肺外舍於分肉之間令

人脫肉消燥

溫瘵者其脈如平身無寒但熱骨節疼痛煩時々嘔逆以白虎加

桂枝湯主之方

石膏一斤碎

知母六兩

桂枝三兩

甘草二兩

梗米六合

右咬咀水一斗二升煮米熟去粗煎三升溫服一升日三

汗出而愈

瘰癧多寒者名曰牝瘰癧蜀漆散主之

蜀漆說去

雲母燒三日

龍骨各等分一方雲母作雲漿

右烏末桑作前漿水半饒服一錢溫瘰癧加蜀漆半分臨爇

時服一錢已上

牡蛎湯治牡瘰

牡蛎熬

麻黃去節各

蜀漆說去

耳艸各

右咬咀以水捌升先煮麻黃蜀漆至六升去上沫內諸藥

煮取二升去粗濕服一升吐則勿更服

一剪金治瘰癧疾寒熱乃瘰癧中聖藥

硫黃

信各等

右同研末用緋紅絹子手捻藥一捻放於絹上累如豆大

上用細絲線緊纏繫數遭繫定用剪子剪下切須緊繫如

不緊恐藥有失每服一丸星宿全時新汲水送下空心服

無得人知如驟藥先一日夜服至明正癸日早去淨野處

避不令人知廣宇亦得

尅効餅子治一切瘰癧疾

龍腦

麝香各等

硃砂一分

荷葉

菘豆粉

炙耳艸各五

信醋炙二兩半

定粉半兩

金箔二拾伍九片衣

右細末煉蜜丸每兩作二拾丸捏作餅金箔為衣每服一餅以新汲水磨化每日發者未發前服間日發者不發夜服數日發者一日夜服連日發者凌晨服

溫脾散治瘧疾寒熱發歇多時不差者

甘艸生半兩

黃豆一兩 蘇子一兩 蘇合一兩 蘇合一兩 蘇合一兩

砒一毫半
另研

右先拌紫河車等為末入砒和勻羅為末每服半錢新汲水少許送下如是隔日發須好日夜深服如頻日發只夜深睡服忌薑腥瓜果酒麵魚肉生冷硬物三兩日如受邪

氣深者只一服便定十歲以上服一字十歲以下至三五歲服半字喘急有胎不可服但請於心修合與人服切勿畏砒不敢用予用此藥三五十年救人甚多雖砒二味有菘豆等三味性涼解得新汲水解此藥並不吐人有人亦一種積實瘕瘕每發時自吐食咸涎不曾服藥亦吐非藥力也假令金液丹用硫黃紫霜丸用巴豆杏仁有大毒大熱製了服之皆有效小兒亦可服恐不答此藥故論及此常山飲子治瘧疾

知母

常山

草果各二

甘艸

烏

良姜一兩

右對每服三錢水一錢生薑三片棗二枚煎至八分去粗
熱時溫服

艸果飲子治脾寒瘧疾

艸果

白芷

青皮註白

右等分爲粗末每服二錢水一錢煎至七分去粗溫服留

粗兩服併一服當桑日進三服不以時

治瘧疾辟瘴氣神效方

肉豆蔻

艸豆蔻

各二箇一箇生一箇用
麵煨赤也去殼

厚朴二寸生二寸
姜製一寸

甘草大者三寸生
一牙炙一寸

生薑棗人二塊生一塊
漚紙裹煨一塊

右咬咀勻分二服水一碗水石器內煎至一大觔去粗桑

日空心帶熱服未效再一服必效兩粗併爲一服煎

瘧瘧治驗

燕南河北道提刑按察司書吏高士謙年踰四十至元戊寅七
月間暑氣未退因官事出外勞役又因過飲午後大發熱而渴
冰水不能解其病早辰稍輕減服藥不效召予治之診其脈弦
數金匱要畧云瘧脈自弦々數者多熱瘧論曰瘧瘧脈數素有
熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而外泄因有所用力滕理開
風寒舍於皮膚之內分肉之間而發之則陽氣盛而不衰則病

矣其氣不及於寒故但熱而不寒者邪氣內藏於裏而外舍於分肉之間令人消燂脫肉故名曰瘰癧月令云孟秋行夏令民多瘰癧潔古云動而得之名曰中暍以白虎加梔子湯治之士謙遠行勞役又暑氣有穉酒熱相搏午後時助故大熱而渴如在甕中先以柴胡飲子一兩下之後以白虎湯加梔子每服一兩數服而愈

征南副師大忒木兒已未奉勅立息州其地卑濕軍多病瘰癧予合辰砂丹白朮安胃散多痊效

辰砂丹治瘰癧大有神效

硃砂 一半入菜
一半寫衣

信砒

雄者 各五

右三味件為末入白麵六錢同研勻滴水丸如桐子大硃砂為衣每服一丸星宿全時用無根水送下忌濕麵熱物

山陰縣志卷之六

卷之六

卷之六

卷之六

卷之六

卷之六

卷之六

卷之六

卷之六

卷之六

卷之六

衛生寶鑑卷第十七

名方類集

腸風痔漏門

腸風痔漏論

腸風痔漏總辭也分之則異若破者謂之痔漏大便秘澀必作
大痛此由風熱乘食飲不通氣逼大腸而作也故經曰因而飽
食筋脉滿解腸澀為痔也受病者燥氣也為病者胃熱也胃形
大腸則化燥火以乘燥熱也實勝風附熱而來是濕熱風燥四
氣相合故大腸頭成塊者濕也作大痛者風也大便秘結者主
病兼受火邪熱當也去此四者其西方肺主諸氣其體收下亦
助病為邪須當以破氣藥兼之治法全矣不可作丸以剝子与

之效如神速

秦丸蒼木湯主之

秦丸 一錢 去盡

蒼木 七分

檳榔 一分 爲末

黃蘗 去皮四分 酒洗 若大腸頭沉重 濕勝也 以意加之 天氣或大熱亦以意加之 或病燥熱 喜寒亦加之

澤瀉 二分

防風 半錢

桃仁 湯浸 去皮 一錢 研

皂角仁 燒 存性 去皮

當歸身 酒浸 三分

大黃 少許 顆大 便燥不可加多

右拾味 咬咀 扣勻 都作 一服水 五錢 煎至 一錢二分 去粗

入 桃仁 檳榔 皂角仁 再上火 煎至 一錢 去粗 空 心 溫 服 待

少時 以 羹 饀 壓之 不 犯 胃 也 服 日 忌 生 冷 硬 物 酒 麵 菜 大

料 物 之 類 犯 之 其 藥 無 效 如 有 白 膿 加 白 葵 花 五 朶 去 心

葶 細 剪 青 皮 半 錢 不 去 白 入 正 葉 中 同 煎 又 入 木 香 末 半

錢 同 皂 角 等 末 同 入 依 上 法 服 若 病 大 者 再 服 而 愈

七 聖 丸 治 大 腸 疼 痛 不 可 忍 方在大便中

乳 香 丸 治 諸 痔 下 血 肛 邊 生 肉 或 結 核 腫 疼 或 生 瘡 痒 痛 或 大

便 艱 難 肚 腸 脫 出 又 治 腸 風 下 血 無 問 新 久 及 諸 瘻 根 在 臟

腑 悉 能 治 之 如 神 效 下 血 無 問 新 久 及 諸 瘻 根 在 臟

枳殼 去 穢 炒

大黃 蒸 焙

白丁香 研 合

牡蛎 火 煨

鶴虱 炒

寧澄茄

芫青 去 頭 翅 足 糯 米 焙 朱 黃 也 各 半 兩

右 爲 末 粟 米 糊 丸 如 梧 桐 子 每 服 拾 丸 至 拾 五 丸 如 治 大

腸風臞茶清下諸痔煎薤白湯下諸瘰煎鉄屑湯下並食

前服

神應黑玉膏治丈夫婦人及新腸風痔漏大腸頭疼不可忍服此藥不過三四次便效初得此疾發痒或疼殺道周廻多生硬核此是痔破即成漏只下血腸風皆因酒色風氣食五辛過度即成此疾人多以外科塗治不知病在腸自有藥若不

去根本此病不除此藥的有神效

猪懸蹄二十箇

刺蝟皮一兩

牛角腮到炒一兩二爨

敗授樹錢

亂髮洗洋

槐角各六錢

苦練根五錢

雷丸

脂麻各四錢

右玖味對碎用瓷罐內燒存性細末入乳香二兩麝香八錢研令勻酒麵糊丸如桐子大每服八丸先嚼胡桃一箇以溫酒吞下早晚腹空時是二服甚者三服切忌別藥不過三日除根

釣腸丸治久新諸痔肛邊腫痛二生瘡痒時有膿血又治腸風下血及肛門脫出並宜服之

括蕒二枚燒存性

蝟皮兩箇對碎燒存性

雞冠花對微炒五兩

白礬微炒

綠礬微炒

胡桃取仁一拾五兩不油者入籠內燒存性

枳殼去核炒

附子去皮槌生用

白附子生用

訶子煨去核

半隻

天南星各二兩

右為細末以醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服二拾九空心臨卧溫酒下遠年不差者服拾日見效久服永除根本小可勝風等疾一二年內者只拾服差永不發動淋深葉治腸風痔漏經久不差瘡口膿汁不絕及瘡內有虫痒痛不止宜此淋洗之

商穀 楚妙

藏靈仙 去土

荆芥穗 去皮

乳香 各兩

鳳眼艸 二兩

細辛 去苗二

右陸味為粗末每用三兩水一大碗煎至一升去粗稍熟洗患處冷再溫熱更洗一遍不用洗罷用軟帛指乾上藥如瘡破後不須上藥只淋洗之

淋深地榆散治肛門痒痛或腫

地榆

菟薺

荆芥

苦參

地床子

各等分

右為粗末每用一匙水一碗煎二參沸去避風所通手相熱洗患處

淋深雞冠散治五痔肛邊腫痛或竄乳或穿穴或作瘡久而不愈變成漏瘡

雞冠花

鳳眼草 各一兩

右為粗末每用粗末半兩水碗半煎三五沸熱洗患處結陰丹治腸風臟毒下血諸大便血疾

已下三方便之於諸路醫學提卷忽言南用之甚效

積殼炒

黃芪

藏靈仙

陳皮白

何首烏

荊芥

椿根白皮

右七味為末酒糊丸如桐子大每服五拾丸至七拾丸陳米飲入醋少許再煎一二沸放溫送下平明服之空腹服之亦妙

淋溲藏靈仙散治痔漏犬腸頭瘰癧或腫滿

枳殼炒

藏靈仙等分

右粗末每用一兩水一椀半煎至一椀去粗熏洗冷再暖避風洗三次軟帛拭乾便蒲黃散

蒲黃散治下部痔漏

蒲黃一兩

血竭半兩

右為細末每用少許貼患處

椿皮散專治血痢及賜風下血此方李嶽卿教授使累用有效

椿白皮三兩

槐角子四兩

明白礬二兩

甘草一兩半

右為末每服三錢熟水飲調下神驗不使

大便閉

脾約丸跌陽脉浮而澁浮則胃氣強澁則小便數浮澁相搏大便則難其脾為約麻仁丸主之

芍藥半斤 枳實半斤 麻子仁二斤

大黃一斤 厚朴八分 杏仁一斤 去皮

右六味為末煉蜜為丸桐子大飲服拾丸日二服漸加以知為度

潤腸丸治脾胃中伏火大便秘澀或乾燥不通全不思食此乃

風結秘血結秘皆令閉塞而不通也風以潤之血以和之知

血疎風自然通矣

桃仁湯浸去 羌活 大黃煨

當歸各半 麻子仁半斤

右以桃仁麻仁研如泥入羅末藥勻煉蜜凡如桐子大每

服五拾丸至百丸空心白湯送下以通為度如不通而滋

其榮盛者急加酒洗大黃以利之

如血熱而大便燥者加桃仁酒洗大黃

如風結燥大便不行者加麻仁大黃

如風澀大便不行者加皂角仁大黃秦朮以利之

如脈洪覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃以除

氣澀

當歸潤燥湯

升麻 生地黃各二 麻子仁研如

當歸 熟地黃 生甘草

桃仁泥子研

大黃煨各

紅花半分

右吹咀入研葉都作一服水二觥煎二觥去粗空心宿食

消尽指熱服之

犀角治三焦邪熱一切風氣又治風盛痰實頭目重肢体拘攣

急腸胃燥澀大小便難

犀角兩末

黃連各一兩

文火炙二兩

大黃兩

黑牽牛兩二十

右為末煉蜜丸如桐子大每服十五丸至二十九臨卧温

水下量虛實加減

七宣丸療風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛在腹中及積年腫

脚疼痛冷如冰石脚氣衝心煩憤頭旋暗倒有背重心腹脹

滿背膈痞塞及風毒連頭面腫大便或秘小便時澀脾胃虛

痞不食脚轉筋掣急製痛心神恍惚眠寐不安

桃仁去皮水

紫胡去苗

诃子皮

枳實炒

木香各五兩

甘艸炙四兩

大黃對果煨十五兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九米飲下食前臨卧

各一服以利為度覺病勢退服五補丸此藥不問男女老

幼皆可服量虛實加減丸數

七聖丸治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重洋唾稠粘心煩面熱

咽乾口燥眉背拘急心腹脇肋脹滿腰膈重疼木便扶小便
赤睡卧不安

肉桂 去皮

檳榔

郁李仁 去皮 一兩

右七味為末煉蜜丸如桐子大每服十五丸溫水送下食

後山嵐瘴地最巨服虛實加減之

潤腸橘杏丸此二味降氣潤腸服之大腸自無澁滯久服不燥

胃氣

杏仁 去皮 炒

橘皮 等分

右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸空心溫水下

麻仁凡順三焦和五臟潤腸胃除風氣治冷熱壅結津液耗少

令人大便秘難或閉塞不通若年高氣弱及有風人大便秘

澁尤宜服之

枳殼 去穢 炒

白檳榔 煨 半

兔絲子 酒浸

山藟

防風 去叉

山茱萸

肉桂 去穢

車前子 各一兩 半

木香

羌活 各一兩

郁李仁 去皮 研

大黃 羊莖 半生

麻仁 別搗 研 各四兩

右為細末入別研藥勻煉蜜和丸如梧桐子大每服十五

凡至二十九溫水下臨臥服之

神效凡治三焦氣壅心腹痞悶仁疴風熱大便不通腰腿疼痛

脊背重疼頭昏面熱口苦

乾心胃煩燥睡卧不安及治脚

氣并素有風人大便秘燥

火麻仁另搗如膏人參各二兩

詞黎勒皮

大黃錦紋者麴長

右為細末入麻仁搗研勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二

十丸溫水下溫酒米飲皆可服食後臨卧如大便不通可

倍凡數以利為度

論曰凡臟腑之秘不可一槩治之有虛秘有實秘胃實而秘者

能食而小便赤當以麻仁丸七宣丸之類主之胃虛而秘者不

能食而小便清利宜以

厚朴湯

白朮五兩

厚朴姜製

陳皮去白

甘艸炙各三兩

枳實炒

半夏麴各二兩

右為粗末每服三錢水一椀半薑三片棗二箇煎至八分

去粗大溫服食前

夫胃氣實者秘物也 胃氣虛者秘氣也

蜜導煎陽明病自汗出若發汗小便自利此為津液內竭雖硬

不可攻之當須自欲大便宜蜜導煎而通之及土瓜根与猪

膽汁皆可為導大者豆豉煎而動之土山

蜜一味熬欲凝凡如指大長二寸頭銳內穀道中欲大

便時去之

半硫凡除積冷暖元藏温脾胃進飲食治心腹一切瘕癖冷氣

及年高風秘冷秘或泄瀉等並皆治之

半夏

湯洗七次搗乾為細末

硫黃

明淨好者研令極細用柳木旋子後過

右等分以生姜自然汁同熬入乾蒸饒末攪和勻入臼內

杵數百下丸如梧桐子大每服空心温酒或生姜湯下拾

五丸至二十丸婦人醋湯下

胞瘰

治小便不利並癰疽

瘰論云胞瘰者小腹膀胱按之內痛若汝以湯澆於小便上為

清涕夫膀胱者為州都之官津液藏焉氣化則能出矣今風寒

濕邪氣客於胞中則氣不能化出故胞滿而水道不通其證小

腹膀胱按之內痛若汝以湯澆於小便以足太陽經其直行者

上交巔入絡腦下灌鼻竅則清涕也治胞瘰小便不利腎着湯千金方內同

茯苓丸治胞瘰臍脹痛小便不行

防風

去蘆

細辛

去苗

赤茯苓

去皮

白朮

各半

附子

炮

澤瀉

各半

官桂

各半

紫苑

各半

凡萸根

牛膝

酒浸

黃芪

各半

芍藥

甘艸炙各三分

山芋

生地黄

半复湯泡

獨活

山茱萸

右十八味為末煉蜜丸如桐子大每服十九丸温酒送下食

前

巴戟丸治胞痺臍腹痛小便不利

巴戟去心一两半

遠志去心

桑螵蛸熬炒

山芋

附子炮

生地黄

續斷各一两

杜仲炙

兔絲子酒浸

石斛

鹿茸酥炙

五味子出矣今用蒸

龍骨

官桂

山茱萸

肉苁蓉酒浸一两

右十六味為末煉蜜丸如桐子大每服二十九丸温酒送下

空心食前服之

腎瀝湯治胞痺小腹急小便不利

杜仲絲炒去

桑白皮炒

犀角屑

木通

五加皮

麥門冬去心

桔梗各一两

赤芍藥五錢

右八味粗末每服伍錢水一觥半羊腎一箇切竹瀝少許

同煎温服

八正散治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴引飲

心忪面熱煩躁不寧目赤睛疼唇焦鼻衄口古生瘡咽喉腫痛又治小便赤澀或癃閉不通及熱淋血淋並宜服之

灌麥

菖蓄

車前子

滑石

甘州

山梔子仁

木通

大黃麩裏煨去麩切

右為散每服二錢水一椀入燈心煎至七分去渣溫服食後臨卧小兒量方少與之

石菖散治腎氣不足膀胱右熱水道不通淋瀝不宜出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦即熱或尿如豆汁或便出砂石並皆治之

芍藥

白朮

滑石

葵子

瞿麥各二兩

石菖去毛

木通各二兩

當歸去蘆

甘州夫

王不留行各一兩

右為細末每服二錢煎小麦湯調下食前日二三服

白花散治膀胱右熱小便不通中顯

朴硝

右為末每服二錢用酒香湯調下食前

良法治小便不通諸藥不效或轉胞至危危困此法用之小便

自出而愈用猪尿胞一箇底頭出一小眼子銅筍通過放

在眼內根底以細線繫定翎筒子口細杖子親是上用
黃蠟封尿管口吹滿氣七分繫定了再用手捻定翎筒根
頭放了黃蠟塞其翎筒放在小便出裏頭放開翎筒根頭
手捻其氣透於裏小便即出大有神效
黃芩清肺湯治因肺燥而得之小便不通

黃芩 二錢

枳子 二箇

致二十粒

右作一服水一觥半煎至七分去渣溫服食後不利加塩

滋陰化氣湯治因服熱藥過多小便不利或臍下悶痛不可忍
服諸藥不效者

黃連 炒

黃蘗 炒

甘艸 天各

如晝不通者加知母

右咳嗽每服三錢水二觥煎至一觥去渣溫服食前

論曰問此如何得利害曰無陽者陰無隕生無陰者陽無以化
又云膀胱者津液之府氣化則能出焉因服熱藥過度及亡陰
也二藥助陰穢氣得化故小便得以通也或以滋腎丸服之其
效更速

紅林散治小便不通主喘 張文叔傳大婦

篇蓄 半兩

燈艸 根一百

紅林黍根 二兩

右咳嗽每服五錢用河水二錢煎至七分去渣熱服空心

食前

立效散治下焦結熱小便黃赤淋閉疼痛或有血出及大小便俱出血者亦宜服之

甘艸分三

山桅子去皮炒 瞿麥穗一兩

右烏朮每服五錢至七錢水一碗入蓮須葱根七箇燈心

五拾莖生姜五七片同煎至七分時以溫服不拘時候

海金沙散治小便淋澀及下焦濕熱氣不施化或五種淋疾瘕

閉不通

木通

海金沙研

滑石

通草

膠麥糖各半

杏仁去皮尖

右六味為末每服五錢水一觔半燈草二十莖煎至七分

去粗溫服食前

琥珀散治五癯淋澀疼痛小便有膿血出

琥珀一兩

沒藥研一兩

海金沙研一兩

蒲黃一兩

右四味為末每服三錢食前煎萱艸根湯調下日進二服

葵花散治小便淋澀經驗

右以葵花根一握洗淨剉水煎五七沸服治小便淋澀經

驗如神

灸法

治小便淋澁不通用食塩不以多少炒熟放温填臍中却以艾炙七壯小便自出艾炷如筋頭大

淋痛治驗

參苓琥珀湯中統三年六月中黃明之小便淋莖中痛不可忍相引脇下痛制此服之夫效

人參 五分

茯苓 四分

川練子 去核對 砂一錢

琥珀 三分

生甘草 錢一

玄胡索 七分

好味清澤溼

柴胡 各三期 當歸 稍 三分

右以味吹咀都作一服用長流水三觥煎至一觥去查温服空心食前

水芝丸治下焦真氣虛弱小便頻多日夜無度此方得之於高麗國王

麗國王

蓮實去皮不以多少先以好酒浸一二宿用穉時一箇却將酒

浸蓮實入在內用才煮熟取出將蓮實切開於火上焙

乾秤用

右為末醋糊丸如雞頭大每服五十九丸温酒送下空心食前

小便數而欠

中書右丞相合孫病小便數而欠日夜約去二拾餘行臍腹脹滿脚沉重不得安卧至元癸未李春下旬一奉

聖旨治之遂往診視脉得沉緩時久帶數嘗記小便不利者有

三不可一槩而論邪若津液偏滲於脾胃大便泄溼而小便淡少一也宜分利而已若熱搏下焦津液則熱溼而不行二也必滲泄則愈若脾胃氣澆不能通利水道下輸膀胱而化者三也可順氣今施化而出也今右丞平素膏梁濕熱內畜不得施化膀胱竅澆是以起數而見少也非滲泄分別則不能快利遂虞一方名曰茯苓琥珀湯內經曰耳緩而淡溼熱搏津液內畜膈脹腹滿當須緩之泄之必以某分為主是用茯苓為君滑石甘草寒滑以利竅猪苓琥珀湯內經滲泄而利水道故用三味為君脾患濕々氣內蓄則脾氣不治益脾勝濕必用甘為助故以甘草白朮為佐鹹入腎鹹味下泄為陰澤淳之鹹以淳伏水腎惡

燥急食辛以潤之津液不行以辛散之桂枝味辛散濕潤燥此為因用故以二物為德煎用長流甘爛水使不助其腎氣大作湯劑今直達於下而急速也兩服減半旬日良愈

茯苓琥珀湯方

茯苓

去皮

琥珀

白朮

各半兩

澤瀉

二兩

滑石

七錢

木猪苓

半兩

甘草

炙

桂

去皮各三錢

右八味為末每服伍錢用長流甘爛水煎一饑調下空心食前待少時以美饈壓之