



玉機微義卷之七

瘡門

內經敘瘡

內經云夏傷於暑秋必痲瘡又云先寒後熱者名曰寒瘡先熱而後寒名曰溫瘡其但熱而不寒者名曰痺瘡

按內經論瘡謂陰陽相并之虛實發為寒熱歷敘四時及經五臟與胃之瘡以至連日間日發之早晏最為詳盡必通考全文以熟玩之

瘡脉

畧要云師曰瘡脉自弦弦數者多熱弦遲者多寒之弦弦遲者可溫之弦緊者可發汗針灸也浮大

數者風發也以飲食消息止之

脉經云瘡脉自弦微則為虛代散則死

瘡備三因

陳無擇云夫瘡備三因外則感四氣內則動七情飲食飢飽房室勞逸皆能致之經所謂夏傷暑秋發瘡者此則因時而發耳不可專以此論外所因證有寒瘡有溫瘡有痺瘡並同素問有濕瘡者寒熱身重骨節煩疼脹滿自汗善嘔因汗出復浴濕舍皮膚及日月雨濕有疔瘡者寒多不熱但慘戚悵慄病以時作此則多感陰濕陽不能制陰也五種瘡疾以外感風寒暑濕與衛氣相并而成除瘡瘡獨熱溫瘡先熱此瘡無熱外諸瘡皆先寒後熱內所因證病者以蓄怒傷肝氣鬱所致名曰肝瘡以喜傷心

心氣耗散所致名曰心瘡以思傷脾氣鬱凝結所致名曰脾瘡

以憂傷肺肺氣凝痰所致名曰肺瘡以失志傷腎所致名曰腎

瘡所致之證 同素問此五種瘡疾以感氣不和鬱結痰飲所

致不內外因有疫瘡者一歲之間長幼相似有鬼瘡者夢寐不

祥多生恐怖有瘡瘡者乍熱乍寒乍有乍無南方多病有胃瘡

者飲食饑飽傷胃而成世謂食瘡有勞瘡者經年不差前後復

發微勞不任亦有數年不差結成癥癖在腹脇名曰老瘡亦曰

母瘡已上諸證各有方治宜推而用之

勞瘡名為似瘡非真瘡也此瘡治之法有經年不差似瘡之証宜補不消散

按無擇有七情感動鬱氣成瘡之論可謂發千古之未發但

所集隨證施治之方皆是溫熱脾胃之劑止有四獸飲云治

五臟氣虛結聚延飲夫以各臟君臣之藥補虛瀉實之法各

各不同。豈可以一方通治七情之瘡哉。豈欲學者自求之與。嗟夫。醫之為學。宋三百年。錢仲陽之下一人而已。其集方者。尚如是。欲使人據證檢方。烏可得也。三四款飲不飽。至治者乃割。以之不明也。

論痰能致瘡

嚴用和云。素問謂瘡生於風。又夏傷於暑。此四時之氣也。或乘涼飲冷。當風卧濕。饑飽失時。致脾胃不和。痰積中脘。遂成此疾。所謂無痰不成瘡。一日一發。易治。間日一發。難愈。三日一發者。尤其難愈。

按此謂胃氣不和。痰積中脘。而成瘡。則自內而生病於外也。與素問風暑外傷。雖異。然外既受傷。則內氣必鬱。亦生痰。此自外而生病於內也。瘡而挾痰。誠有之矣。其引以無痰不成。

瘡之一名。則失之偏也。其用藥治法。亦且未詳。

瘡分三陽三陰淺深之異。

病機機安云。經曰。夏傷於暑。秋必痲瘡。傷之淺者。近而暴傷之。重者。遠而為痲。痲者。久瘡也。是知夏傷暑氣。閉而不能發泄於外。邪氣內行。至秋而為瘡也。有中三陽者。有中三陰者。其證各殊。同傷寒也。在太陽經。謂之寒瘡。治多汗之。在陽明經。謂之熱瘡。治多下之。在少陽經。謂之風瘡。治多和之。此三陽受病。謂之暴瘡。發在夏至後。處暑前。此乃傷之淺者。近而暴也。在陰經。則不分三經。總謂之濕瘡。當從太陰經論之。發在處暑後。冬至前。此乃傷之重者。遠而為痲。痲者。老也。居西方。宜毒藥療之。按此分風暑所傷。有陰陽淺深之異。發前人所未論也。

詳見後論中

瘡非脾寒及鬼食辨 後漆論斷

子和云內經既以夏傷於暑而為瘡何世醫皆以脾寒治之用姜附硫黃之類甚者歸之崇恠良可笑耶又或因夏月飲食生冷之類指為食瘡此又非也豈知內經之論則不然皆夏傷於暑遇秋風寒而後作也邪熱淺則連日邪熱深則間日併入於裏則寒併入於表則熱若此論則了不相干於脾也治平之時其民夷靜雖用砒石辰砂有毒之藥以熱治熱亦能取效擾攘之時其民勞苦內火與外火俱動以熱攻熱轉為吐血瀉血瘡瘍嘔吐之疾豈與夷靜之人同治哉余嘗用張長沙汗吐下三法愈瘡病極多大忌錯作脾寒治之

按此云無脾寒及鬼瘡皆是得之於暑又謂治平與擾攘之時治瘡不同皆確論也然食瘡則世亦有之者然觀其用藥以白虎加人參湯小柴胡五苓桂苓甘露之類則調之也甚者臟用承氣大柴胡下之更不愈以常山散吐之悉是寒藥降火之劑蓋以瘡從火之化也又有謂治芻蕘貧賤之人與富貴膏粱不同之論固是然仍用溫脾散辰砂丹劫藥貧賤之人豈與治平時人同藥貧賤者脾胃虛寒其可用劫劑歟此恐非出於子和之筆也學者試思之或問俗以瘡為脾寒何也曰此亦有理天地之間惟吳楚閩廣人患此至多為陽氣之所盛處其地卑濕長夏之時人多患瘡霍亂瀉痢傷濕熱也本暑盛陽極人伏陰在內脾困

體倦腠理開發或因納涼於水閣木陰及泉水澡浴而微寒
容於肌肉之間經所謂遇夏氣淒愴之小寒迫之是也或勞
役飢飽內傷而即病作故指肌肉屬脾發則多惡寒戰慄乃
謂之脾寒爾實由風寒濕暍之邪鬱於腠理夏時毛竅踈通
而不為病至秋氣斂之際表邪不能發越故進退不已往來
寒熱病勢如凌虐人之狀所以名瘧即四時之傷寒故十二
經皆能為病古方治法多兼於理內傷取効脾胃和而精氣
踈通陰陽和解諸邪悉散此實非脾病也但病氣隨經升降
其發早暮日次不等內經具病例已詳季世以發表解肌溫
經散寒等法亦未嘗執於燥脾劫劑也又曰既瘧本夏傷於
暑為病世有不服藥餌或人與符呪厭之亦止何也曰此夏
時天地氣交百物生發濕熱熏蒸禽虫吐毒之際人因暑熱汗
出神氣虛耗感得時間乖戾之氣為病故與厭之亦止若移
精變氣之謂也然古人稱瘧不得為脾寒者正恐人專於溫
脾之說不明造化之源而失病機氣宜之要故也

瘧瘧

丹溪曰內經謂夏傷於暑至秋為瘧又曰瘧瘧皆生於風瘧瘧
老瘧也以其隔兩日一作纏綿未去前賢或用峻劑恐其稟受
怯弱與居暑所移者所宜始悟常山烏梅砒母劫劑或誤投之
輕病為重重者危矣夫三日一作者陰經受病也作於子午卯
酉少陰瘧也作於寅申巳亥厥陰瘧也作於辰戌丑未日太陰
瘧也瘧得於暑當汗而解或因取涼太過汗鬱成痰其初感也

弱者即病胃氣強者伏而不動至於再感復因內傷其病乃作
宜其難差夫感暑與風皆外邪也非汗多不解求治者皆已
經試劫劑胃氣重傷似難速愈必先與參朮等補劑加減以取
汗得汗而虛又行補養下體屬陰最難得汗補藥力得汗出至
是方是佳兆又有感病極深邪氣必自臟傳出至腑其發無時
若發於午之後寅之前者血受病也為難愈須漸漸趨早方是
佳兆故治此病者春夏易秋冬難大忌飽食以汗之難易為優
劣也愈憲詹公春得瘧瘡累試劫藥綿延至冬來求治予知其
久得汗惟胃氣未完非補不可一味白朮末之粥丸與二斤盡
藥大汗而安如此者多但略有加減不必盡述

按內經以瘧從風寒暑而得之乃天之邪氣所傷當以汗解
仲景河間悉用發表之藥但以寒熱多少分經絡而治然亦
有三陰三陽之異也蓋傷在陽者遲而暴傷在陰者遠而深
在氣則發之早在血則發之晏淺則日作深則間之此雖分
在陰在陽是乃淺深之謂皆當後汗而解也機要謂在三陽
經其汗下和解同傷寒治外邪解而內未已者以早晚分氣
血而用大柴胡大承氣桃仁承氣下之久瘧胃中鬱鬱欲吐
而不能吐當以藜蘆散雄黃散吐之此為暴病而氣實者設
也我丹溪先生論邪氣深入陰分血分而成久瘧者必當用
升發之藥自臟而出之於腑然後自表作汗而解若用下藥
則邪氣愈陷下而難出也又久瘧之人正氣虛者不可用劫
藥損其胃氣劫之數次不愈者病若不變必待春來氣升瘧

氣隨升發之氣而出方已遇此者當以補之一婦人久痢一
子亦痢死哭甚數日後痢止瘡作醫與四獸飲之類凡兩月
召予視之一日五六作汗如雨無休歇不能起卧食少懶語
脉微數予以劑後無陰悲哀傷氣又進濕熱之藥助起旺火
正氣愈虛汗既大出無邪可治陰虛陽散將在旦夕豈小劑
之所能補今用人參二兩白朮二兩芍藥一兩黃芪半兩甘
草少許作一服濃煎一鍾日服四五次兩日寒熱止又二婦
同病瘡一者面光澤予以濕在氣分非汗不解兩發汗出而
愈一者面赤黑色予以暑傷血分用四物湯加辛苦寒之劑
二日發瘡瘡而愈臨病處治其可執一乎前論又有食瘡痰
瘡疫瘡瘡瘡者其方皆未備學者又當隨證而思其所以治

之

瘡門

解表之劑

仲景白虎加桂枝湯治濕瘧

知母六兩

甘草二兩

石膏一斤碎

桂枝三兩

粳米六合

右咀以水一斗二升煮米熟去滓煎至三分溫服一升日三服汗出愈

按此太陽陽明經藥也

柴胡桂姜湯治寒多微有熱或但寒不熱名曰牝瘧

柴胡八兩

桂枝

黃芩各二兩

括萎根四兩

牡蠣

甘草炙

乾姜各二兩

右咀水煎服一升日三初煩汗出愈

按此少陽太陽經藥也

機要桂枝羌活湯治瘧處暑以前發頭項痛脉浮惡風有汗

桂枝

羌活

防風

甘草各半兩

右為粗末每服半兩水一觥半煎至一觥溫服清迎發而服之如吐加半夏麴

麻黃羌活湯治證如前惡風無汗

麻黃去節

羌活

防風

甘草各半兩

右如前服加法同

按已上二方太陽經藥也

治瘧病身熱目痛熱多寒少脉長先以大柴胡下之微利為度

後餘熱不盡者當服白芷湯以盡其邪

白芷兩

知母一兩七錢

石膏四兩

右粗末依前服

按此陽明經藥也

桂枝芍藥湯治瘧寒熱大作不論先後此太陽陽明合病也謂之大爭寒熱作則必戰經曰熱勝而動也發熱則必汗泄經曰汗出不愈知內熱也陽盛陰虛之證當內實外虛不治恐久而傳陰經也此湯主之

桂三錢

黃芪半兩

知母

石膏

芍藥各一兩

右粗末每服五錢加至一兩水煎

按此太陽陽明經藥也

桂枝黃芩湯如服前藥轉大者知三陽合病也宜此和之

枳胡二錢

黃芩

人參

甘草各四錢一

半夏一錢

石膏

知母各五錢

桂枝二錢

右為粗末依前服之前服此藥已如外邪已罷內邪未已再服下藥從卯至午發者宜大柴胡下之從午至酉發者知其邪氣在內也宜大承氣下之從酉至子發者或至寅發者知其邪氣在血也宜桃仁承氣下之微利後更以小柴胡徹其邪氣可也

按此太陽陽明少陽經藥也已上諸方並係發風寒暑熱之氣自外而入中於三陽之經者也

桂枝石膏湯治瘧無他證隔日發先寒後熱寒少熱多

桂枝五錢 石膏一兩半 知母一兩半 黃芩一兩

右為粗末分三服水煎服

按此太陽陽明經藥也治隔日發則邪氣所舍深者也

麻黃黃芩湯治瘧發如前證而夜發者

麻黃二兩 黃芩二兩 甘草炙二錢 桃仁三箇去皮 黃芩五錢

桂二錢

右為細末依前服桃仁味苦甘辛肝者血之海血驟則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒之劑按此治風暑深入陰分而夜發乃血受病邪氣所舍尤深者

也麻黃桂枝桃仁等乃太陽經血藥也非三陰經藥也

溫熱燥脾之劑

寶鑑文解飲子治痰瘧辟瘴氣

肉豆蔻 草豆蔻 各三箇麩裏慢熟一箇黃

厚朴一寸半 生薑汁製 大甘草一寸 沙各半

生薑二塊 生一漏宿饑熟

右等分銀石器內水煎發日空心服未愈再服必効

局方常山飲治瘧疾發散不愈漸成勞瘵

知母 川常山 草果各二斤 良姜二兩

甘草炙一斤 烏梅去核一斤

右咀姜五片棗一枚水煎溫服

易簡七寶飲治一切瘧疾或先寒後熱或先熱後寒不問鬼瘧食瘧

常山 厚朴 青皮 陳皮

甘草 檳榔 草果仁 等分

右咀咀服半兩於未發隔夜用水一碗酒一觥煎至一大觥瀘出露一宿再將滓如前煎另放亦露一宿來日當發之早盪温面東先服頭藥少歇再服藥粗大有神効

人參養胃湯治外感風寒內傷生冷四時温疫或飲食傷脾發為瘧瘧

方見局方平胃散加人參茯苓半夏草果藿香生薑烏梅煎

按此平胃散加減法也出太陰厚朴例已上諸方悉是温脾燥烈之藥蓋認此疾為脾寒故也然人用之亦或有効遂指為治瘧之良方殊不知偶值病者陰陽相并脾氣鬱結暫得温散則氣易行濁液凝痰中脘閉塞因得燥熱亦以暫開所以氣通而疾止內經所謂勇者氣行則已是也此古人為病氣淺而厚質者設也若中氣虛弱之人內有鬱火之證復用燥熱愈劫愈虛咎將誰執

嚴氏清脾湯治瘧瘧脉來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽

乾大小赤澁

青皮 厚朴 白朮 草果

柴胡 茯苓 半夏 黃芩

甘草炙等分 右咀姜五片煎

按此小柴胡湯加減也治口苦咽乾大小赤澀則是內熱之證用柴胡黃芩所以瀉少陽之熱乃前方溫脾之一變也方名清脾其義可知然後以草果等藥寒熱兼用則是未能免俗也

三因四獸飲治五臟氣虛七情兼并結聚涎飲與衛氣相轉發為瘡疾兼治瘡瘡

半夏

茯苓

人參

草果

陳皮

甘草

烏梅肉

白朮 各等分

右咀同棗姜等分以鹽少許淹食頃厚皮紙裹煨令香熟焙乾每服半兩水煎未發前併進三服

按此四君子加減也出太陰藥例

七棗湯治五臟氣虛陰陽相勝乍為痰瘡不問寒熱先後並治

附子

一枚炮以薑水浸再炮如此七次去皮臍

右判水一碗姜七片棗七箇煎至八分當發日空心溫服

按陳無擇謂七情感動鬱氣成瘡故此二方以治五臟氣虛結聚涎飲等證未審孰為補虛孰為散結鬱孰為道痰學者宜自詳之

消瘡之劑

仲景蠶甲煎丸治瘡不差結為癥瘕名曰瘡母 方見金匱

嚴氏蠶甲飲子治瘡久不愈腹中結塊名曰瘡母

蠶甲 醋炙

白朮

黃芪

草果

檳榔

芎藭

橘紅

白芍

甘草炙

厚朴等分

右咀生姜七片棗一枚烏梅少許煎

按痰瘧多成癖於左脇之下名曰瘧母乃肝之積也瘧屬少陽病少陽東方之氣故同歸於肝又况久瘧病在血分血亦屬肝所主也當以鱉甲君佐使之藥隨證虛實用之不必泥此也

消食之劑

三因紅丸子專治食瘧

蓬朮

三稜 各二兩醋煮一伏時

胡椒一兩

青皮

三兩炒

阿魏

一分醋化

右為末別研蒼朮末用阿魏醋米糊為丸桐子大炒土硃為衣每服五十至百丸

按此出厥陰南星半夏例消積滯通鬱氣之溫藥也食瘧既因飲食而得亦當隨其所傷而治之吐瘧之劑

子和常山散吐瘧

常山

二兩水煮晷乾

右水煎空心服

機要梨蘆散

雄黃散

方並見吐劑

按瘧因外感病屬上焦又胃膈多結聚痰涎故用吐法以取效然常山砒霜之類發吐取涎縱使獲安脾胃不能不損能用無毒之藥以取效者為佳

截瘡諸丹

寶鑑溫脾散治瘡疾寒熱發歇多時不差

紫河車

菘豆各兩

甘草半兩

生砒

一兩半另研子和作錢

右為末與砒一處研勻每服半錢新汲水少許調下須於發日隔夜夜深服藥忌葷酒瓜果生冷魚腥肉物三日孕婦勿服但至心合此藥與人並不吐此雖有砒一味河車甘草菘豆三味性涼解得新水亦解得

一剪金治瘡疾乃是聖藥也

信豆硫黃各等分

右作一處乳鉢內杵為末用緋絹子捻藥一捻在絹上裹如豆大細絲牢纏定訖剪下每服一九星宿全用新汲水送下

空心服母令人知或先一日夜服之

辰砂丹治瘡

硃砂

一兩五錢入藥中留五錢為衣

信

雄黃

各五錢另研

右為末入白麩六錢研勻滴水丸如菘豆大硃砂為衣星宿全時用無根水吞下

宣明辟邪丹治嵐瘴鬼瘡食瘡

菘豆

雄黑豆各四十九箇

信砒

半錢另研

硃砂

二粒黃丹一錢為衣

右為末同入乳鉢內滴水為丸分作三十粒每服一粒用東辛桃心取七枝研汁將井花水於發日早晨日欲出未出向日吞之醋湯亦得

三因紅散子

黃丹炒色變

右入建茶合和二錢七白湯調下或溫酒調下一方用蒜不以多少杵黃丹丸雞頭大每服一九臨晨面東新水下

按瘡丹多用砒霜大毒之藥本草主諸瘡風痰在胸膈可作吐藥蓋以其性之至燥大能燥痰也黃丹本草能主驚癇癩疾除熱下氣亦是勝痰去積之藥大抵瘡丹雖有燥痰之功大傷胃氣脾胃虛者切宜戒之

謹按治瘡之方風暑外傷者解表之藥機要詳矣痰瘡之治宜從丹溪所論陳無擇論濕瘡有木附湯此不詳載又機要有中三陰經之論而治法用藥雖有痰瘡入血之一方然亦

失於詳悉嚴氏謂瘡生於痰三因疫瘡食瘡瘡瘡七情感動等瘡而諸方未有可取况亦多所缺畧竊觀其意蓋以脾濕燥熱之方可以兼治諸瘡故不詳述此缺畧之所由也學者知其名識其意苟能思之則可得而施治矣又何必待其詳也哉

玉機微義卷之八

欬嗽門

諸經敘欬

內經曰五臟六腑皆令人欬非獨肺也皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也五臟之欬久乃移於六腑。

本文腑臟欬狀見後湯液方下

按欬論五臟六腑千金方又引心主欬然則十二經皆有欬證也。

千金方曰論云有風欬有寒欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有厥陰欬有肢欬十欬之異欲語因欬言不得竟謂之風欬飲冷食寒因之而欬謂之寒欬心下堅滿欬則支

痛其脉反遲謂之肢欬欬則引脅下痛謂之肝欬欬而唾血引
手少陰謂之心欬欬而涎出續續不止引少腹謂之脾欬欬引
頸項而唾涎沫謂之肺欬欬則耳無所聞引腰并臍中謂之腎
欬欬而引頭痛口苦謂之膽欬欬而引舌本謂之厥陰欬風欬
者不下之寒欬肢欬肝欬刺足太衝心欬刺手神門脾欬刺足
太白肺欬刺手太泉腎欬刺足太谿膽欬刺足陽陵泉厥陰欬
刺手太陵

按此論五臟洎風寒肢膽厥陰經為十欬其引現證與經論
臟腑欬證皆稍異詳肢欬即氣與支飲證也經有三焦欬而
無心主此有心主而無三焦然已發其秘矣惜乎胃大小腸
膀胱欬及針治皆畧之不議

脉法

脉經曰關上脉微為欬 肺脉微急為欬而唾血 欬而脉弦
瀦為少血 脉緊者肺寒雙弦者寒浮緊者虛寒 脉浮而緩
傷風 脉細傷濕 數則為熱沉數者為實熱 脉弦為水
偏弦為飲脉沉為留飲 洪滑多痰 欬脉浮直者生浮軟者
生。

欬證死脉

欬而脉緊者 小沉伏匿者 欬而羸瘦脉形堅大者 欬而
脫形發熱脉小堅急者 肌瘦下脫形熱不去欬而嘔腹脹且
洩其脉弦急者皆死不治

論欬與嗽本一證

子和曰內經陰陽應象論云秋傷於濕冬生欬嗽五臟生成篇云欬嗽上氣診要經終篇云春刺秋分環為欬嗽示從容篇云欬嗽煩寃者腎氣之逆也此四篇中連言欬嗽其餘篇中止言欬而不言嗽如生氣通天論云秋傷於濕上逆而欬與大象論文義同而無嗽字乃知欬即嗽明矣

謹按欬與嗽本兩字義內經已作一證連言之愚詳大抵欬者氣動也陽也嗽者兼血也陰也况是證其本雖殊其標則一故世俗不以為疑唯察古發內經微旨其義見下

病機機要云欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也咳嗽謂有聲有痰也因傷肺氣動於濕因欬而有嗽也夏月嗽而發熱者謂之熱痰嗽小柴胡四兩加

石膏一兩知母半兩用之冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍加杏仁服之蜜煎生姜湯蜜煎橘皮湯燒生姜胡桃皆治無痰而嗽者此乃大例更當隨時隨證加減之痰而能食者大承氣微下之痰而不能食者厚朴湯主之

論嗽分六氣母拘於寒

子和曰素問言皮毛者肺之合也邪因而客之則為肺欬後人見是斷嗽為寒更不參較他篇豈知六氣皆能為嗽然可以辨其六者之狀 風乘肺者日夜無度汗出頭痛痰涎不利

熱乘肺者急喘而嗽面赤潮熱手足寒乳子亦多有之

寒乘肺者欬喘上壅涕唾出血甚者七竅血溢 燥乘肺者氣壅不利百節內痛頭面汗出寒熱往來皮膚乾燥細瘡燥痒大

便秘澁涕唾稠粘。寒乘肺者或因形寒飲冷。冬月坐卧濕地。或胃冷風寒。秋夕水中感之。嗽急而喘。此非六氣之云乎。按此只述六氣為病。故其論中集司天勝復為欬之畧。但無濕乘肺。式方治則又有之。式蓋脫簡爾。然丹溪先生論欬有因勞。因痰。因肺脹。因食積。作痰發熱致嗽。或嗽而聲嘶者。此因血虛受熱所致。皆內因病本之不同。如傷寒小青龍湯治例。為水飲與表寒相合而欬。真武湯所主。為水飲與裏寒相合而欬。傷寒中風。往來寒熱。胸滿心煩。喜嘔而欬。加減小柴胡主之。為陽邪傳肺。加味四逆散主陰邪傳裏。而欬者。此皆外因傳變之例。豈可枚舉。但欬證之標一人。故不歷求其本也。觀子和之論。然亦啓其微爾。

論欬分三因

陳無擇云。傷風欬者。憎寒壯熱。自汗惡風。口乾煩燥。傷寒欬者。憎寒發熱。無汗惡寒。煩躁不渴。傷暑欬者。煩熱引飲。口燥或吐涎沫。聲嘶咯血。傷濕欬者。骨節煩疼。四肢重著。洒淅。此屬外因。五臟欬而不已。則六腑受之者。此屬內因。如欬而發作寒熱。引腰痛。或喘滿。此因房勞傷腎。或中滿腹脹。搶心痛。不欲食。此因飢飽傷脾。或欬而左脇偏疼。引小腹并膝腕疼。此因疲極傷肝。或吐白涎。口燥聲嘶。此因呼斗傷肺。或欬而煩熱。自汗咽乾。咯血。此因勞神傷心。並屬不內外因也。假如尺脈浮濡而數。則知傷腎。右關脈濡。則知飲食傷脾。左關脈弦短。則知疲極傷肝。但不應人迎氣口者。即是不內外因也。

嚴氏云欬始關於肺終則聚於胃使人多涕唾而面浮腫氣逆也治法當審脉證三因若外因邪氣止當發散又須原其虛實冷熱若內因七情則隨其部經在與氣口脉相應浮緊為虛寒洪滑為多痰當以順氣為先下痰次之有停飲而欬又須消化之切不可用烏梅粟殼澁酸之藥其寒邪未除亦不可使用補藥尤忌憂思過度房室勞傷遂成瘵疾矣

按此論欬證備三因可謂詳悉但外因現證與前子和論六氣異者此蓋言邪氣外感非乘客于肺之比也惜乎諸用方治未備所論脉證治法極闢其微至禁不可使用澁補甚得大法之要大抵此證其原實多故不可使用澁之補之也然不能忌憂思戒房室而性躁及脫禁之人皆所難療

論濕痰主欬

潔古曰嗽者秋傷於濕積於脾經曰秋傷於濕冬必欬嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣必上衝而為欬嗽甚則動於濕而為痰也是知脾無留濕雖傷肺氣不為痰也有痰者寒少熱多各隨五臟而治之假令濕在肝經謂之風痰濕在心經謂之熱痰濕在脾經謂之濕痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰宜隨證而治之欬而無痰者以辛甘潤其肺欬而嗽者治痰為先故以南星半夏勝其痰而欬嗽自愈枳殼陳皮利其氣而痰自下

按此論欬因濕在於經致痰為欬五臟亦皆有之可謂發內經之秘矣然至氣鬱津液不降或停水飲所致或腎氣虛弱

火炎水涸津液湧而為痰涎於上此氣飲及真臟為病非諸經之留濕致病也故易老云半夏止能洩痰之標而不能治痰之本是矣詳已上所言枳殼等利氣下痰恐非易老語也

論痰飲治欬

詳見痰飲門

論嗽發早晏病本不同

丹溪曰上斗日嗽者屬胃中有火午後嗽者屬陰虛五更嗽多者此胃中有食積至此時滯肺氣不利諸邪或痰皆然春是春升之氣或外感夏是火炎上最重秋是濕熱傷肺冬是風寒外來也

論乾欬治法

原病式曰人瘦者腠理踈通而多汗泄血液衰少而為燥熱故

多為勞嗽之疾也

丹溪曰欬而無痰者此係火鬱之證乃痰鬱火邪在中用苦梗以開之下用補陰降火不已則成勞此證不得志者有之

謹按欬無痰者本肺氣傷而不清欬久則痰鬱於中不能上出故當用藥以開提之實者宣法亦可施也凡嗽久亦有痰中兼血者或帶血絲者燥熱血少者皆當取其化源故曰滋陰降火燥熱勞嗽是宜合而論治

論欬為肺痿

金匱方論曰熱在上焦者因欬為肺痿得之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥下利重亡津液故寸口脈數其人欬口中反有濁唾涎沫者為肺痿之病若口中

辟辟燥效即胸中隱隱痛脉反滑數此為肺癰效唾膿血脉數
虛者為肺痿數實者為肺癰

按此言肺痿屬熱如效久肺癰聲啞聲嘶咯血此屬陰虛火
熱甚是也本論治肺痿吐涎沫而不效者其人不渴必遺尿
小便數以上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多涎唾用
炙甘草乾姜此屬寒也肺痿涎唾多心中溫液溫液者用炙
甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱不同是皆宜分治故
肺痿又有寒熱之異也

欬嗽門

治風之劑

局方消風百解散治欬嗽聲重身熱頭疼

荆芥 薄荷 麻黃 蒼朮 甘草

按此手太陰陽明藥也

金沸草散治欬因感風寒頭痛聲重

方並見傷風門

按此手足太陰藥也

荆芥 薄荷 麻黃 旋覆花 各三錢 炙甘草 赤芍

敗毒散治痰嗽身熱鼻塞

柴胡

前胡

羌活

獨活

桔梗

枳殼

茯苓

甘草

人參

川芎

各等分

右以咀水煎每一兩或半兩

按此是太陽少陽手太陰藥也

表裏氣血之劑

子和搜風丸

方見中風門

人參 茯苓 南星 犀角 各半升 干姜 六兩 生薑 各四兩 附子 黃芩 大黃 各四兩 滑石 一斤 杏仁 各四兩 薄荷 各一升

按此手是太陰陽明是太陽藥也

按已上諸方並出太陽解表例但此丸下濕熱痰之劑也實

亦汗下之異

治寒之劑

小青龍湯治感風寒表不解而欬心下有水氣或喘方見寒濕門

金匱方治欬而脈浮去芍加厚朴杏仁石膏小麥

簡易九寶湯治欬而身熱發喘惡寒

麻黃

薄荷

陳皮

桂心

紫蘇

杏仁

甘草

桑白皮

大腹皮各等分

右咬咀入葱姜煎

按此手太陰是太陽藥也

散風寒下氣之劑

人參香子湯止嗽散風寒逐痰飲

人參

半夏

茯苓

白芍

桂枝

乾姜

細辛

甘草

五味子 半錢

右咬咀入姜煎

按此手是太陰是太陽少陰藥也

半夏溫肺湯止嗽喘治虛寒

方見痰飲門

局方華蓋散治感寒而嗽胸滿聲重

蘇子

陳皮

赤茯苓

桑白皮

麻黃各兩

甘草十兩

右咳咀入姜煎

按此手太陰之本藥也

氣分之劑

金匱射干麻黃湯治欬而上氣喉中水雞聲

射干

細辛

紫苑

款冬花各錢半

麻黃

生姜各錢

半夏二錢半

五味子一錢

大棗二箇

右咳咀水煎作一服

按此是太陽例藥也

按已上諸方並是太陽解表例兼逐飲降痰下氣之法不同

况寒證亦有輕重用者自宜取擇

治暑之劑

人參白虎湯治欬而身熱脉虛發渴

東垣清暑益氣湯治中暑身熱自汗欬而脉虛

局方黃連香薷飲治暑熱乘肺欬而脉洪

方並見暑門

按暑嗽亦自病本不一姑錄此三方可見治例輕重亦殊如

消暑丸亦其法也 方見暑門

治濕之劑

五苓散治欬而煩脉緊而細

按此是太陽藥解表之劑也

十棗湯治欬而脉弦有水氣者

方並見痰飲門

按此是少陰例下劑也

白朮湯治欬而脉細

白朮

白茯苓

半夏各等分

右以咀每服一兩姜煎或為末每半兩煎取清汁調神麩末二錢頓服之一方加黃芩等分

按此是陽明太陰藥也

白朮木香散治喘嗽腫滿欲變水氣者

白朮

猪苓

甘草

澤瀉

茯苓 各半兩

木香

檳榔 二三錢

陳皮 二兩

桂枝

二錢

滑石

三兩

右為末每服五錢入姜煎

按此是太陽乎太陰藥也已上三方並太陽例但加半夏為

治痰加姜桂兼散寒溫胃加木香檳榔為兼下氣爾

機要欬氣丸治欬之痰喘肺氣浮腫

青皮

陳皮

檳榔

木香

杏仁炒

郁李仁

白茯苓

澤瀉

當歸 各兩

馬兜零

苦葶藶

各三兩 人參

防己

各錢

牽牛頭末

一兩半

右為末姜汁糊丸桐子大每三十九至五六十丸煎水下

按此手是太陰氣血之藥也
治燥之劑

千金五味子湯治欬不已皮膚乾燥唾中有血胸脇疼痛

五味子

桔梗

紫苑

甘草

續斷各錢

竹茹三錢

赤小豆一握

生地黄

桑白皮各半兩

右以吐作二服水煎

按此手是太陰藥也

氣血之劑

子和神功丸

大黃煨

訶子

麻子仁研

入參各兩

右為末入麻仁研勻煉蜜丸桐子大每三二下九溫水下

按此手是太陰陽明藥也丹溪曰訶子治肺氣因火傷極深

鬱遏脹滿取其味酸苦有收斂降火之功若佐以海粉香附

瓜蒌青黛半夏麩治嗽非止澁之藥也

治火之劑

黃連解毒湯治欬而脉洪喘急

梔子仁湯治熱躁而欬

麥門冬湯治火熱乘肺欬唾有血

方並見火門

治熱之劑

仲景加減小柴胡湯治欬而寒熱往來

柴胡

半夏

黃芩

甘草

乾姜 五味子

右吹咀水煎

地骨皮散

知母 柴胡 甘草 人參

地骨皮 茯苓 半夏

右吹咀入姜煎

按此二方是少陽例藥也

海藏紫苑散治欬中有血虛勞肺痿

人參 紫苑 知母 貝母

桔梗 甘草 五味子 茯苓

阿膠

右吹咀水煎

人參蛤蚧散治三二年肺氣上喘欬嗽膿血滿面生瘡

蛤蚧 一對全者河水浸五日每換水洗酥炙黃 杏仁 去皮尖

甘草 各五兩 人參 茯苓 貝母

知母 桑白皮 各二兩

右為末磁器內盛每日熱茶清點服

按已上二方手太陰之的藥也或曰欬之病本不同何用藥

往往必本於肺然欬者因聲名病也故多本於肺經云肺象

金堅勁扣之有聲邪擊於肺故為欬也且肺為肺臟之華蓋

主於氣生皮毛朝百脉布化精氣者也或一臟一脉不利或

九氣所動或天之六氣所感或水穀寒熱內因所動則肺亦

病矣故歎證雖曰病本不同是以治例往往相類但病有輕重所兼之殊方亦奇偶溫涼之異爾

宣明知母茯苓湯治欬不已往來寒熱自汗肺痿

甘草 茯苓各兩 知母 五味子

人參 薄荷 半夏 柴胡

白朮 欵冬花 桔梗 麥門冬

黃芩各半兩 川芎二錢 阿膠三錢

右咳咀每一兩入姜煎

按此是少陽例藥也

手足太陰之劑

東垣加減瀉白散治陰氣在下陽氣在上欬嗽嘔吐喘急

桑白皮二兩 地骨皮七錢 甘草 陳皮

青皮 五味子 人參各五錢 白茯苓二錢

右咳咀每服半兩水煎入粳米二十粒

寶鑑加減瀉白散治欬而口乾煩熱胸膈不利氣喘促

桑白皮兩 地骨皮 知母 陳皮

桔梗各五錢 青皮 細黃芩 甘草各三錢

右咳咀每服五錢水煎食後溫服

按此一方手太陰氣分藥也寶鑑曰華陀云盛則為喘減則

為枯活人云發喘者氣有餘也凡看文字消要會得本意盛

而為喘者非肺氣盛也喘為氣有餘者亦非肺氣有餘也氣

盛當認作氣衰有餘當認作不足肺氣果盛為有餘當清肅

下行而不喘以其火入于肺衰與不足而為喘焉故言盛者非言肺氣盛也言肺中之火盛也言有餘者非言肺氣有餘也言肺中之火有餘也故瀉肺以苦寒之劑非瀉肺也瀉肺中之火實補肺也用者不可不知然已上一方畧有加減不同故兩存之

局方欬久花散止嗽祛痰散風熱

知母

桑白皮

欬久花

麻黃

阿膠

貝母

杏仁

甘草

半夏

右吹咀入姜煎

按此乎太陰之藥出是太陽麻黃例無發表也然治風與寒

皆宜解表但亦有可下者如傷風有下證同况欬證多兼痰飲宜後滾痰小胃選用

金匱澤漆湯治欬而脉沉

小柴胡內減柴胡加紫參白朮 各三錢

桂枝 三錢 澤漆 三合另煮

右九味吹咀內澤漆汁中煮取温服

按此出太陽解肌例然未至為肺痿藥也理氣之劑

三因參蘇飲治欬發熱

局方四七湯治欬而痰涎在喉壅閉不下

二陳湯治欬而胸膈不利

蘇子降氣湯治痰嗽喘促氣不升降 方薈痰飲門

東垣加減三奇湯治欬嗽上氣喘促胸膈不利

桔梗 陳皮 甘草 青皮

人參 紫蘇 桑白皮各五錢 半夏七錢

杏仁三錢 五味子四錢

右咳咀母六七錢入姜煎

濟生橘蘇飲

前方減桔梗青皮人參加貝母白木

安鑑人參欬花膏治肺胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶欬嗽痰涎

勞嗽

欬花 人參 五味子各八錢 紫苑

桑白皮各兩 杏仁八錢 木香 檳榔

蘇葉 半夏湯泡數次各五錢

右熬成膏入煉蜜丸如雞頭大每一丸食後細嚼淡姜湯下
按已上三方理氣導痰之劑也皆本手太陰例比之前四方
此則兼有滋補之意又當隨臟氣而用之可也

收斂之劑

局方人參清肺湯治喘嗽胸滿煩熱聲痞自汗

地骨皮 知母 杏仁 人參

甘草 阿膠 桑白皮 烏梅

粟殼 各等分

右咳咀水煎

按此以甘寒降火兼酸收辛金之散涼而澁之也
人參定喘湯治欬而上喘

人參

麻黃

半夏

阿膠

甘草

桑白皮

五味子各半 栗殼 二兩

右咬咀入姜煎每半兩或一兩

按此以辛散之甘緩之酸收之本於寒邪者可用
宣明寧神散治欬嗽多年不已常自汗服藥不効者

栗殼 一兩 醋炒 烏梅 半兩

右為末每二三錢沸湯調下

按此劫劑也非虛脫者勿用故止澁之藥似難例使
滋陰之劑

金匱腎氣丸治腎陰虛弱津液不降敗濁為痰致欬逆者

方見補虛門

按此論見痰飲門

良方補肺湯治勞嗽

桑白皮

熟地黃 各兩 人參

紫苑

黃芪

川五味子 各兩

右為末每二錢水煎入蜜少許服

按此二方少陰例藥也然勞嗽諸方如前治熱之劑皆可選
用但因勞而嗽則非嗽為本也良方劫勞散例是矣故補劑
不復具例

治邪注之劑

深師四滿丸治五嗽一上氣嗽二飲嗽三燥嗽四冷嗽五邪嗽

乾姜

桂心

躑躅花

苦蕒

紫苑

芫花根皮各分蜈蚣一條去頭炙

細辛

甘草炙

鬼督郵

人參

半夏各一分

右為末煉蜜丸如大豆許每五丸米飲下日三未效加至七八九忌羊肉饒葱生菜

按此太陽例藥邪謂邪惡鬼注之疾故立是方如千金方謂
夢與鬼交及飲食者用通氣丸全以蜈蚣是也蓋曾有如是
而治愈者矣姑存之以備其旨但今人罕能識矧治療乎且
云通療五噉恐未必然也如鰥噉以臭而名之病體豈無熱
與濕熱乎
治痰諸方

青州白丸子

水煮金花丸治嗽而脉弦面青四肢滿便溺秘多怒

按此治風痰之劑也

王隱君滾痰丸

機要小黃丸治嗽而脉洪面赤煩熱心痛口乾

按此治熱痰之劑也

局方溫中丸

機要姜桂丸治嗽而脉沉面色黧黑小便急痛足寒而逆

按此治寒痰之劑也

已上并見痰飲門

白朮丸治嗽而脉緩面黃肢體沉重嗜卧不收腹脹食不消

南星

半夏各製兩 白朮 一兩半

為細末湯浸蒸餅為丸桐子大每五六十九姜湯下
按此治濕痰之劑也

玉粉丸治欬而脉澁面白氣上喘促涎澁寒熱悲愁不樂

南星 半夏各製兩 陳皮一兩

右末浸蒸餅丸桐子大每三四十丸人參姜湯下

按此治氣痰之劑也

瑞竹堂化痰丸順氣快脾化痰消食

半夏 南星 白礬 皂角切

生薑各斤

右用水煮至南星無白點為度去皂筴不用姜切同晒乾

陳皮 青皮去穢 紫蘇子炒 羅白子炒別研

杏仁 麥炭炒研 葛根 神麩炒 麥蘖炒

唐菟子 香附子 各兩合前四味處碾為末

右浸蒸餅為丸如桐子大每服五七十九臨卧食後茶酒任

下

按此治食痰之劑也

丹溪小胃丹治膈上熱痰濕痰肩膊疼痛

甘遂 水濕麩裹再浸半日 大戟 長流水煮一時再水洗

芫花 醋拌勻過宿在土微炒各半兩 黃柏 三兩炒

大黃 紙裹濕灰內煨再切酒浸炒二兩半

右為末粥丸麻子大每二三十丸津唾下

按此治濕熱之劑也

千縉湯

大半夏^{七箇}泡切 皂莢^{去皮}甘草^炙

右咬咀入姜三大片煎服

按此治風濕之劑也

導痰湯

半夏^{四兩}

南星

枳實

赤茯苓

陳皮^{各兩}

甘草^{半兩}

右咬咀每服一兩入姜煎

按此理氣道痰之劑也然諸飲致效導痰治積諸方詳見痰

飲門茲不備錄

腑臟湯液諸方

小柴胡湯治肝臟發欬兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩脚下

滿

方見執明

黃芩加半夏生姜湯治膽腑發欬嘔苦水若膽汁

黃芩

生姜^{各錢}

甘草^炙

芍藥^{各二錢}

大棗^{二箇}

半夏^{半合}

右咬咀水煎

桔梗湯治心臟發欬欬而喉中如梗狀甚則咽腫喉痺

苦梗^{三錢}

甘草^{六錢}

右咬咀水煎

芍藥甘草湯治小腸腑發欬欬而失氣

芍藥

甘草^{炙各四錢}

右呔咀水煎

升麻湯治脾臟發欬欬而右脚下痛痛引肩背甚則不可以動

升麻

白芍

甘草各錢

葛根三錢

右呔咀水煎

烏梅丸治胃腑發欬欬而嘔嘔甚則長虫出

烏梅三箇

細辛

附子

桂枝

人參

黃柏各錢

乾姜二兩

黃連一兩半

當歸

蜀椒各四錢

右酒浸烏梅一宿去核蒸之與米飯搗如泥和諸藥末相得

加蜜丸桐子大每三十九丸白湯下

麻黃湯治肺臟發欬欬而喘息有聲甚則唾血

麻黃三錢

桂枝二錢

甘草一錢

杏仁二箇

右呔咀水煎

赤石脂禹餘糧湯治大腸腑發欬欬而遺矢

赤石脂

禹餘糧

各二兩並打碎

右水煎服

麻黃附子細辛湯治腎臟發欬欬則腰背相引而痛甚則欬涎

麻黃

細辛各錢

附子一錢

右呔咀水煎

茯苓甘草湯治膀胱腑發欬欬而遺溺

茯苓二錢

桂枝二錢半

生姜五片

甘草炙一錢

右呔咀水煎

異攻散治久欬不已三焦受之其狀欬而腹滿不欲飲食此皆聚于胃闕于肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也

人參

茯苓

白朮

甘草

陳皮等分

右吹咀或為末每服二三錢入姜棗煎服

謹按已上諸方並傷寒例藥也故存之以備其旨然欬證以三因論之則一臟一腑病機亦非止於寒也

熏法

治久嗽風入肺者用鴉管石雄黃鬱金欬冬花碾末和艾中以生姜一片留舌上灸之以煙入喉中為度如作筒子捲藥燒煙吸之亦妙

灸法

千金方云欬者灸兩乳下黑白際各數十壯即差 又以蒲當乳頭周圍身令前後正中當脊骨灸十壯 上氣欬嗽短氣氣滿食不下灸肺募五十壯 上氣欬逆短氣風勞百病灸肩井二百壯 上氣欬逆短氣胸滿多唾唾惡冷痰灸肺俞五十壯

