

血双

疝

頭痛

心痛

胃脘痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛

腰腿足痛

諸痛

耳

目

鼻

牙

咽喉

瘡瘍

臨證指南 未

卷八

血

痢

頭痛

心痛

胃脘痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛



腰腿足痛

諸痛

耳

目

鼻

牙

咽喉

瘡瘍

臨證指南醫案卷八

辭關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山鄒錦昉滋九今較

吳郡 錫山鄒錦昉

血

某 温邪衄血

某 連翹 杏仁 木玄參 淡黃芩 黑山梔皮

杏仁 鬱金

某 風温衄血

風温

丹皮  
玄參  
連翹  
赤芍

茅花  
黑梔皮

湯熱胃火上蒸  
某三  
此熱蒸於水穀之濕，釀血成衄，納穀如昔，治在陽明。

熟地  
知母  
石膏  
玄參  
牛膝

胆火上炎，升心驚  
陳女  
常有衄血，今夏忽起神識如呆，診脈直上魚際，大忌

驚恐惱怒，天癸得通可愈。

犀角  
丹參  
生地

連翹  
天知母  
黑山梔  
全神

林二  
陽升鼻衄不止  
關李入氣飽而

細生地  
烏犀角  
炒知母  
牛膝  
黑山梔

川斛 丹皮 炒黑側柏葉

某 努力傷陽逆鼻衄

犀角一錢 細生地三錢 炒丹皮一錢 玄參

炒牛膝一錢 黑山梔一錢 炒黑側柏葉五錢

臨服冲鮮荷葉汁一小杯金雞納

趙十脉左數衄血火升中

生地 阿膠 天冬 麥冬

淡菜 生白芍 茯神 炒山藥

程意從前衄血都以養陰益氣而愈知非實熱皆勞役陽

冒以致陰血之動也今壯年肌肉不充身動氣促如喘

口中膩涎濁沫。竟是腎精帶傷。收納失職之象。急急保  
養。遠戒酒色。猶可尚安。

熟地

人參

萸肉

湖蓮

芡實

補骨脂

山藥粉丸

朱七十脉數。陰虧陽升。頭暈。心中煩雜。鼻衄。

生地

玄參

金銀花

川斛

丹皮

石決明

炒黑麻仁

某

咳逆失音。衄血。

炒杜仲

玄參

生地

龜板

丹皮

牛膝

山藥

茯苓

炒黑麻仁

某十歲鼻衄時發。

生地 黃柏 丹皮 山藥 天

茯苓 澤瀉 黃柏 人中白 大

某

食燒酒辛熱及青梅酸泄遂衄血咳嗽心腹極熱五

味偏勝肺腸臟陰為傷此病以養胃陰和法

生白扁豆 北沙參 麥冬 白粳米

血行清道從鼻而出古名曰衄與濁道之吐咯者不

同清道即指至高之分由山根以上睛明之次而來

也其穴乃手足太陽足陽明陰陽蹻五脉之會及衝

脉交會其間可見諸經皆能為衄不獨肺胃而然諸



書雖已詳明。惟景岳辨之尤切。但衄之爲患。總由于火。外爲六淫之變化。內因五志之掀騰。氣血日爲錯亂。陰陽爲之相乘。天人交感之處。虛實攸分矣。若風寒壅盛於經。陽氣鬱而迫營者。宜參麻黃桂枝症之大意。若溫風暑熱拂鬱而動血外溢者。用辛涼清潤等劑。認定經絡之高下。若火邪極甚而載血上泛者。有苦寒鹹寒之法。審其原委之淺深。此外因王治法也。至於煩冗曲運。耗及木火之營。肝臟厥陽化火。風上灼者。甘鹹柔婉。理所必需。多勞過慾。病及天一之真。陽浮引陰血以冒上竅者。滋潛厚味。法從峻補血。

脫則挽回元氣格陽則導火歸源因酒用和陽消毒  
之劑因努力用培中益下之方此內因主治法也學  
者惟審內外兩因庶乎施治無誤矣

邵新甫

疏泄而

病發天按法調理不愈七味導引納腎益氣升舉脾胃

而陰氣仍外發

內結

下痰聚同為奇經主之故疎泄請方

其病

或

當歸

生克絲子



疝

督在陽

某

疝七疝治法最詳子和其旨辛香以泄肝得氣疎泄而病緩矣。按法調理不愈七味導引納腎益氣升舉脾陽。而墜氣仍然艾炙蒸臍原得小安內經任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚同為奇經主之故疎泄諸方能治氣實參朮升補僅治中虛下陷與元海奇經中病無補壯歲至老病根不輟下焦日衰可知升陽一法體未症頗合衰年僅可撐持勿使病加可矣。

生鹿茸

錢三

鹿角霜

錢一

當歸

錢二

生菟絲子

錢五

濁陰凝  
聚肝絡

沙蒺藜

錢一

川桂枝尖

分五

飢時服

宋二勞傷温裏已效。臍旁動氣少腹結疝。罌丸偏喙。昔陽

氣不自復。濁陰聚絡。不宜急於育子。

當歸

船茴香

淡菴蓉

枸杞子

安息香

茯苓

孫疝墜於右。筋縮連小腹痛。此寒主收引。議進温通厥

陰之絡。

川棟子

二兩

穿山甲

二兩

炮黑川烏

錢五 去皮

炒黑小茴香

一兩

橘核

二兩 炒

乳香

五錢

用老韭白根。泮泛丸。飢時服。二錢五分。

明 臍下少腹。形象橫梗。發必痛。遶脇腰。以及陰囊。此乃

厥陰肝氣不宣。議以苦辛。如左金。佐通經脉之凝滯。

川連 吳萸 穿山甲 青木香

金鈴子 延胡 青橘葉湯丸

郁七 肝病絡虛氣聚。少腹滯脹。前用河間金鈴子散。加牡

蠣橘葉。合鹹苦辛勝法。小效加食。述飢則脇腹鳴盛。而

濁氣下泄。頗安。乃絡虛不足中之有餘。形質瘦怯。不可

純攻。

桃仁 當歸稍炒 小茴 橘核

郁李仁 南山楂 蔥白汁丸

謝五七疝皆肝。少腹堅聚有形。是閉塞不通之象。百日久

恙。血絡必傷。古人治疝。必用辛香。助燥氣勝之品。宜緩

商矣。

歸鬚

杜牛膝根

小茴香

川棟子

穿山甲

柏子仁

林。脉在弦。左瀆。當臍痛連少腹。已屬凝聚有形。嘔吐黃

濁。大便欲解不通。若患處漉漉有聲。痛勢稍減。惟卧着

體不轉移。其痛更加。此屬肝氣疝瘕。辛香流氣。所稱通

則不痛耳。

炒桃仁

炒橘核

金鈴子

炒延胡

非白汁

兩頭尖

小茴

青皮

此通泄厥陰氣血方也。痛甚於下。濁結有形。非辛香無以入絡。非穢濁無以直走至陰之域。以子和方合奉議意。

施四 立冬前一日。寒戰後熱屬厥陰。食蟹臧寒沉墜。浮腫

水囊大。溲溺甚少。至晚腫脹愈加。顯然陽微濁聚。治從氣

分開泄冷濕

粗桂枝

吳茱

川棟子

茯苓

生牡蠣

澤瀉

磨青皮汁十匙

唐三 寒濕已入太陽之裏。膀胱之氣不利。陰囊莖腫

唐三 寒濕已入太陽之裏。膀胱之氣不利。陰囊莖腫

唐三 寒濕已入太陽之裏。膀胱之氣不利。陰囊莖腫

痲

七



屬類

五苓散加獨活漢防已

某 肝風筋疝怒勞致傷宜通補熄風

菘蓉 補骨脂 歸鬚 小茴 韭子

茯苓 胡桃肉 青鹽 羊內腎蒸熟和丸

奇脈屬

朱 動氣疝瘕連臍洄洄有聲男子精氣不充是下焦損傷溫補勿過剛燥須察八脈以推病情

淡菘蓉 歸身 炒枸杞 小茴

炒沙苑 茯苓 紅棗肉

怒肝

汪 自云鬱怒不已夏季忽起腹脹醫以快氣疎滯湯藥

其脹竟入小腹下降青筋外突脹甚延及腎囊乃肝疝

之症議子和法

歸鬚

橘核

青木香

青皮

小茴

黑山梔

青葱管

周

三六

久久勞怒肝木內震。脇中少腹皆肝脉遊行之所。氣

凝聚為脹。聚久結形為癥疝。情懷憂鬱。永不能痊。以內

起清志。不尚草木微功耳。

炒小茴

黑山梔

川棟子

延胡

青木香

青皮

生香附

橘核

吳

十六

味酸。食不化。湧吐。述少腹厥氣上冲。可有宿疝。以肝

濁攻胃。經云。食出完穀。是無陽也。

肝疝犯胃



朱 七疝在肝內經謂衝脈為病但衝脈隸於陽明肝木  
必乘尅胃土胃翻湧逆致吐衄嘔涎湯飲不入呃忒不  
止皆逆亂無已為臟厥危疴矣肝體本剛相火內寄一  
派熱燥藥餌以剛濟剛竟有缺折之虞欲泄其濁擬用  
朱南陽法

韭白根 兩頭尖 金鈴子 延胡

肉桂心

毛 疝發已過肢冷潮熱其納食減半濁陰內迫犯胃無

發汗攻表之理議泄厥陰以安陽明

炒黑川椒 附子 茯苓

疝

久和濕  
無窮

川棟子

胡盧巴

詹 老年久疝因嗔怒而履大熱痛肝失疎泄火腑濕蒸

蘊結不通溫補升陽固膠蓋肝性主剛濕閉反從燥化

此龍胆苦堅不應議柔苦制熱反佐辛熱以開血中鬱

痺用東垣滋腎丸原方 金餘七 其散

戴五 濕熱下注久則囊腫形堅下焦血多氣少子和法中

原有虎潛諸論後醫棄置不用特哉

龍胆草 黃柏 蘆薈 山梔 知母

海金沙 猪苓 澤瀉 辛

陳三 疝多肝病宜乎辛泄但形勢森然足濕熱內蘊阻塞

五

二便不為通。咳先以通太陽方。

寒水石

海金沙

猪苓

澤瀉

通草

木香汁

小茴

倪

疝瘕結聚少腹大便閉阻小溲壅滯舌白渴飲不能

納穀無對症方藥姑與滋腎丸嘗服寸粒十服

許

三六久有疝症十年來寒熱勞形則右胸脇中一股氣墜

直走少腹凡大小便用力皆然而去竟痰多食腥膩更

令病加此濕熱久壅隧中緩攻為宜

控涎丹四分間日服十服

又

脈沉痰多手脈赤瘡疝在子心脇氣墜少腹前議

控涎丹逐痺未應。想久聚濕蒸沉痼。非皮膜經脈之壅。用瘡川丸四十粒。勻二服。間日一進。竟通腑聚。然後再議。

又通腑宜壅。粘痰既下。其疝仍聚於右。且盛於寒天。冬月卧安。必有聲自消。行走勞動。必有形直墜陰囊。久病急攻無效。議辛甘化風方法。古人以疝為肝病。什居八九。

當歸

鹿角

桂枝

肉桂

小茴

川芎

炙草

茯苓

生薑

羊肉膠丸

張五痛自腎囊。漸踞少腹之左。夫厥陰之脈。繞乎陰器。摸

持謀慮都主傷肝一氣結聚變幻形象而痛病名曰疝  
疝疝分有七暴泄多寒久疝多熱泄氣痛緩宜通可以却  
病良因下焦乃深遠之鄉氣熱濕鬱滯可知矣

川連 小茴 黑山梔 橘核 小茴

盛川棟子 青木香 郁李仁 冬葵子

陳劉孫宜該舌灰邊白腰跨氣痛腎囊睪丸腫大此濕熱  
未為痲也宜散消導濕邪下墜為疝治當分消

草薢 黃柏 山梔 茯苓

丹皮 防己 猪苓 漉瀉

陳三辛香流氣以治疝未嘗不通服之五日遍身疼痛下

身泄傷  
傷陽



午四肢浮腫。肌膚漸見高突。塊癩思走泄氣勝。都是陽

傷芪附湯主之。

生黃芪

附子

母 厥兼症

朱五厥陰三瘧久延。邪攻肝經絡脉。少腹痛漸硬。氣串達

陰器筋痛。乃結痼瘕之象。病久雖少壯。不可端於泄氣。

溫腎宣肝為急。

淡菘蓉

歸身

枸杞子

炒黑小茴

穿山甲

全蝎

陸三瘧母十年。沉痾宿疴。藥不能效。夫瘧邪既久。邪與氣

血兩凝結。聚絡脉藥難入。絡耳瘧不離乎肝胆。痼不外

乎肝病七疝。子和分割大著。虛質不可崇。以辛香下墜。爲甚。議有情溫通。以培生氣。

鹿茸 大茴香 穿山甲 當歸

水安息香 炮黑川烏 全蝎 用黑大豆炒

赤淋酒一杯。濾酒汁和丸。每服二錢。煖酒送。

經云任脉爲病。男子內結七疝。女子帶下。痕聚。又督

脉生病。從少腹上衝心而痛。不得前後爲衝疝。又曰。

脾傳之腎。病名曰疝。瘕。又曰三陽爲病。發寒熱。其傳

爲癰疝。又曰和客於足厥陰之絡。令人卒疝暴痛。此

素問言諸經之疝也。又經脉等篇云。足陽明之筋病

癢痲腹筋急是太陰之筋病。陰器紐痛下引臍兩髀  
痛是厥陰之經筋病。陰器不用。此書極言諸經之痲  
也。後人因有筋水痲氣血寒七痲之名。其主治各  
有專方。立法可謂大備。然其中不無錯雜之處。終非  
可訓之定法。惟仲景先生獨以寒痲爲名。其所出三  
方亦以溫散祛寒調營補虛爲主。並不雜入氣分之  
藥。而于和治法。又以辛香流氣爲主。謂肝得竦泄而  
痲愈矣。其金鈴虎潛諸法。可謂發前人所未發。故痲  
病之本不離乎肝。又不越乎寒。以肝脉絡於陰器爲  
至陰之臟。是太陽之脉屬腎絡膀胱爲寒水之經。故

仲景所云寒疝腹中痛逆冷手足不仁腹滿脈弦而  
緊惡寒不欲食繞臍痛及脇痛裏急是內外皆寒氣  
作主無復界限其烏頭三方專以破邪治標爲急虛  
實在所不論是急則治標之義也其當歸羊肉一方  
專以補虛散寒爲主故以當歸羊肉辛甘重濁溫煖  
下元而不傷陰佐以生姜隨血肉有情之品引入下  
焦溼散沍寒是固本不治標也子和所云疝不離乎  
肝者以疝病有陰囊腫脹或痛而裏急筋縮或莖中  
作痛或牽引睪丸或少腹攻衝作痛或號哭忿怒而  
致此皆肝經脈絡之現症其金鈴散一法以泄肝散

逆爲主。故以川棟導勝。耽小腸之熱。玄胡和一身上。下諸痛。以肝主疎泄故也。其所取虎潛一法。以柔緩道引爲主。故方中用虎骨熄肝風。壯筋骨。羊肉龜板補髓填精。佐以地黃補腎。當歸補肝。使以陳皮利氣。疎肝。芍藥通肝。調管。是治肝而顧及於腎也。及觀先生治痢之法。又更有進焉者。其旨以暴痢多寒。久痢多熱。爲痢病之大綱。其餘隨症施治。如氣墜下結者。以鹿茸鹿角升陽爲主。其脹結有形。痛甚於下者。宗丹溪通陽泄濁爲治。其火腑濕熱鬱結不通者。用桑苦制熱。反佐辛熱。以開血中鬱痺爲主。其寒濕下墜。

太陽之裏膀胱之氣不和二便不爲通利者五苓散  
加減通太陽膀胱爲主其濕熱久聚氣墜少腹陰囊  
者用控涎丹瀆川丸等逐痺通腑分消兼辛甘化風  
法爲主如下焦陰陽兩虛者用有情溫通以培生氣  
兼通補熄風爲主而先生於治疝之法可謂曲盡病  
情諸法備矣仲景又有狐疝一方究非王道之品茲  
不具贅。鄒滋九



# 頭痛

風火

徐六冬月嘔吐之後。漸漸巔頂作痛。下焦久有積疝痔瘍。

厥陰陽明偏熱。凡陽氣過動。變化火風。迅速自為升降。

致有此患。

連翹心

玄參心

桑葉

丹皮

黑山梔皮

荷葉汁

胡六脉左弦數。右偏頭痛。左齒痛。

連翹

薄荷

羚羊角

夏枯草花

黑梔皮

鮮菊葉

苦丁茶

乾荷葉邊

有即登七日有醫案

頭痛

蓋



某 高年氣血皆虛。新涼上受。經脈不和。腦後筋掣牽痛。

倏起倏靜。乃陽風之邪。議用清散輕劑。

荷葉邊 苦丁茶 蔓荊子 菊花 連翹

王六 邪鬱偏頭痛

鮮荷葉邊 苦丁茶 連翹 黑山梔

蔓荊子 杏仁 木通 白芷

郁五 風鬱頭疼

鮮荷葉 苦丁茶 淡黃芩 黑山梔

連翹 蔓荊子 木通 白芷

某四 內風頭痛淚冷

野風

炒杞子 製首烏 柏子仁 茯神

炒菊花炭 小黑稽豆皮

沈氏 痛在頭左腦後厥陽風木上觸

細生地 生白芍 柏子仁 炒杞子

菊花 茯神

秋暑

孫四 暑伏寒熱頭痛

鮮荷葉邊 連翹 苦丁茶 夏枯草

山梔 厚朴 木通

某 暑風濕熱混於上竅津液無以運行凝滯遂偏頭痛

舌強乾澀治宜清散

連翹 石膏 生甘草 滑石

蔓荆子 羚羊角 荷梗 桑葉

血虛陽浮

程 既知去血過多為陰虛陽實之頭痛再加發散與前

意相反矣 復脉去參薑桂加左牡蠣

又 脉數虛而動足微陰氣大傷陽氣浮越頭痛筋惕仍

與鎮攝之法

牡蠣 阿膠 人參 生地

炙草 天冬

肝陽犯胃上逆

朱 據說就涼則安遇暖必頭痛筋掣外以摩拍可緩大

凡肝風陽擾胃絡必虛食進不甘是中焦氣餒雖鹹潤

介屬潛陽獲效說來依稀想像諒非入理深談聊以代煎酸甘是商且五旬又四中年後矣沉陰久進亦有斷  
果代生氣之弊牛月來乏少診之功姑爲認慎用固本膏  
徐當年下虛曾以溫腎涼肝獲效春季患目是陽氣驟  
升乃冬失藏聚水不生木之徵也頗以苦辛治目風陽  
上聚頭巔肝木橫擾胃受戕賊至於嘔吐矣今心中乾  
燥如焚頭中岑岑震痛忽冷忽熱無非陰陽之逆肝爲  
剛臟溫燥決不相安况辛升散越轉凶豈可再蹈前轍  
姑以鎮肝益虛冀有陽和風熄之理

阿膠

小麥

麥冬

生白芍

北沙參

南薑

又條冷忽熱心煩顛痛厥陽之逆已屬陰液之虧前案

申明剛藥之非代赭味酸氣墜乃強鎮之品亦剛藥也

考七疝中子和慣投辛香走泄其中虎潛一法亦採可

見汕門亦有柔法醫者熟糞成法苟不潛心體認皆希

圖附會矣今嘔逆既止其陰藥亦可暫投即水生涵木

之法議以固本成方五更時從陽引導可也加秋石

葉婦臨晚頭痛火升心嘈風陽上胃防厥

細生地阿膠

麥冬

生白芍

厥陰氣  
血邪痺

史

頭形象天義不受濁今久痛有高突之狀以屬客邪  
蒙閉清華氣血然常餌桂附河車亦未見其害思身半  
以上屬陽而元首更爲陽中之陽大凡陽氣先虛清邪  
上入氣血瘀痺其痛流連不息法當宣通清陽勿事表  
散以艾熨按法灸治是一理也

熟半夏

北細辛

炮川烏

炙全蠍

薑汁

又陽氣爲邪阻。清空機竅不宣。考周禮採毒藥以攻病。  
藉虫蟻血中搜逐。以攻通邪結。乃古法而驚人忽畧者。  
今痛滋脹後。心下嘔逆厥陰見症。久病延虛。攻邪須兼

養正

症類

卷八

六

胆胃伏邪

川芎

當歸

半夏

薑汁

炙全蠍

蜂房

張二

太陽痛連顙骨耳後牙齦夏令至霜降不痊伏邪未

解治陽明少陽

連翹

羚羊角

牛蒡子

葛根

赤芍

白芷

鮮菊葉

頭為諸陽之會與厥陰肝脈會於巔諸陰寒邪不能

上逆惟陽氣窒塞濁邪得以上據厥陰風火乃能逆

上作痛故頭痛一症皆由清陽不升火風乘虛上入

所致觀先生於頭痛治法亦不外此如陽虛濁邪阻

驚傷

驚傷

塞氣血。痰痺而為頭痛者。用虫蟻搜逐血絡。宣通陽

氣為主。如火風變動。與暑風邪氣上鬱而為頭痛者。

田用鮮荷葉。苦丁茶。蔓荊山梔等。辛散輕清為主。如陰

加虛陽越而為頭痛者。用仲景復脈湯。甘麥大棗法加

宋膠芍牡蠣。鎮攝益虛。和陽熄風為主。如厥陽風木上

昏觸。兼內風而為頭痛者。用首烏。柏仁。稽豆。甘菊。生芍

為杞子。葦。熄肝風。滋腎液為主。一症而條分縷析。如此

詳明。可謂手法兼到者矣。鄒時乘

官桂

桃仁  
炒半夏

譚心。痛引背。口湧清涎。肢冷。氣塞腕中。此為脾厥心痛。

脾寒

頭痛

五



竹筴

當歸

半夏

炙全蠍

蜂房

張

一籍與世監主去兼怪者矣

應龍乘

霜降不登伏邪未

解吐傷諸飲視風滋胃氣為主一或而糾合懸淋吐此

蠶桑內地而然地酥芥以首蓋淋以蠶豆甘淡土苽

蠟芥半觀煎蠶益溫麻則懸風為主吹瀉則風木土

蠟燭蠶而為蠶蠶清眠并景身視蠶昔麥大藥者味

以無前葉黃才茶蔓峨由鹹辛辛媚鹽黃為主破蠶

氣為注或水屈變頓與暑風味淡土蠶而為蠶煎者

塞氣血來或而為蠶蠶者用五雜姓恐血益宜蠶

# 心痛

驚傷

田三脉細數。聞雷被驚。心下漾漾作痛。行遊遙散去。柴胡

加鈎藤丹皮

勞傷血  
滯

宋 脉左瀆伏。心下痛甚。舌白不能食。穀下咽阻膈。痛極

昏厥。此皆積勞損陽。前者曾下瘀血。延綿經月不止。此

為難治。

生鹿角

當歸鬚

薑汁

官桂

桃仁

炒半夏

生薑末

公丁香

脾寒厥

譚五 心痛引背。口湧清涎。肢冷。氣塞腕中。此為脾厥。心痛。

心痛

心痛

手

病在絡脉。例用辛香。

高良薑

片薑黃

生茅朮

公丁香柄

草果仁

厚朴

營絡傷  
急心痛

朱

重按痛勢稍衰。乃一派苦辛燥。劫傷營絡是急心痛。症若上引泥丸。則大危矣。議用金匱法。

人參

桂枝尖

川椒

炙草

白蜜

厥心痛之症。古人辨論者多且精矣。茲不復贅。但厥

心痛與胃脘痛。情狀似一。而事實有別。世人因內經

胃脘當心而痛一語。往往混而視之。不知厥心痛。為

五臟之氣。厥而入心胞絡。而胃實與焉。則心痛與胃

痛不得不各分一門。今先生案中聞雷被驚者用逍  
遙散去柴胡。加鈎藤丹皮治之。以其肝陽上逆不容  
升達爲之養血以平調也。積勞損陽者用歸鹿姜桂  
桃仁半夏治之。以其勞傷血痺無徒破氣爲之通絡  
以和營也。脾厥心痛者用良姜姜黃茅朮丁香草果  
厚朴治之。以其脾寒氣厥病在脈絡爲之辛香以開  
通也。重按而痛稍長者用人參桂枝川椒炙草白蜜  
治之。以其心營受傷攻劫難施爲之辛甘以化陽也。  
方藥雖未全備。然其審病之因製方之巧無不一一  
破的。果能舉一反三。其義寧有盡乎。  
龔商年



# 胃脘痛

肝犯胃

嚴十一胃痛半年乾嘔

金鈴子

延胡

半夏

茯苓

山梔

生香附

張衝氣上攻成形痛嘔痛後則散此厥陰順乘陽明腸

明虛筋骨亦掣痛安虵丸三錢四服椒梅湯送

某三五勞力氣阻胃痛

川棟子

延胡

炒半夏

烏藥

橘紅

生香附汁

陳 宿病衝氣胃痛。今飽食動怒痛發。嘔吐是肝木侵犯  
胃土濁氣上踞脹痛不休。逆亂不已。變爲先寒後熱。煩  
躁面赤汗泄。此爲厥象。厥陰肝臟之現症。顯然在目。夫  
痛則不通。通字須究氣血陰陽。便是看診要旨矣。議用  
瀉心法。

乾薑

川連

人參

枳實

半夏

薑汁

吳<sup>三</sup>七 食倉痛發。嘔水涎沫。六年久病入絡。述大便忽閉忽

溇。患處漉漉有聲。議通胃陽。兼制木侮。

淡吳萸

良薑

半夏

延胡

炮川烏

茯苓

蒲黃

李氏 舌白胸痞。腕痛如束。乾嘔便難。氣阻凝痰聚膈。當以

泄降宣劑。若竟攻蕩。當夏熱土旺。傷及太陰。恐滋脹滿之憂。

醋炒半夏

川棟子

延胡

橘紅

杏仁

厚朴

王氏 氣逆填胸阻咽。腕痺而痛。病由肝臟厥氣乘胃入膈。

致陽明經脉失和。周身掣痛。夜甚晝緩者。戌亥至陰。為肝旺時候也。此症多從驚恐嗔鬱所致。失治變為昏厥。

半夏

薑汁

金鈴子

延胡

胃痛

三



杏仁

瓜蒌皮

香豉

白蔻

又痛緩。夜深復熾。前後心胸板掣。脉左數。病在血絡中。

金鈴子

延胡

桃仁

歸鬚

鬱金

白蔻仁

董氏產後三年。經水不轉。胃痛。得食必嘔。汗出形寒。腰左

動氣閃爍。大便七八日始通。脉細弦。右濇。舌白消渴。腕

中响動。下行痛緩。病屬厥陰。順乘陽明。胃土久傷。肝木

愈橫。法當辛酸兩和。厥陰體用。仍參通補陽明之陽。俾

濁少上潛。痛有緩期。

人參

同煎一錢

開口吳萸

滾水泡洗十次一錢

生白芍

三錢

肝風犯  
胃液虛

良薑 七分

熟半夏 醋炒焦 二錢

雲茯苓 切塊 三錢

顧氏 天癸當絕仍來。昔壯年已有頭暈。七年前秋起胃痛

若嘈。今春悲哀。先麻木頭眩。痛發下部膝脛冷三日。病

屬肝厥胃痛。述痛引背脇。是久病絡脉空隙。厥陽熱氣。

因情志鬱勃拂逆。氣攻乘絡。內風旋動。襲陽明。致嘔逆

不能進食。

九孔石決明 清阿膠 生地 枸杞子

茯苓 桑寄生 川石斛

某 脇痛入腕。嘔吐黃濁水液。因驚動肝。肝風震起犯胃。

平昔液衰。難用剛燥。議養胃汁以熄風方。

人參

茯苓

半夏

廣皮白

麥冬

白粳米

姚

胃痛久而屢發必有凝痰聚瘀老年氣衰病發日重

肝犯胃  
兼痰飲  
胸痺

乃邪正勢不兩立也今納物嘔吐甚多味帶酸苦脉得

左大右小蓋肝木必侮胃土胃陽虛完穀而出且呃逆

沃以熱湯不減其胃氣掀騰如沸不嗜湯飲飲濁瀰留

腕底用藥之理遠柔用剛嘉言謂能變胃而不受胃變

開得上關再商治法 紫金丹含化一九日三次

又 議以辛潤苦滑通胸中之陽開滌濁涎結聚古人謂

通則不痛胸中部位最高治在氣分

鮮薤白

去白衣 三錢

瓜萋實

三錢 炒佳

熟半夏

三錢

茯苓

三錢

川桂枝

錢一

生薑汁

四分 調入

古有薤露之歌。謂薤最滑。露不能留。其氣辛則通。其體滑則降。仲景用以主胸痺不舒之痛。瓜萋苦潤豁痰。陷胸湯以之開結。半夏自陽以和陰。茯苓淡滲。桂枝辛甘輕揚。載之不急不走。以攻病所。薑汁生用。能通胸中痰沫。兼以通神明。去穢惡也。

厚翳化 大犯胃

某氏

胃痛引脇

川棟子

柴胡

雲山花

釣藤

半夏

橘紅

厚翳化 大犯胃

胃痛

三

朱氏 苦寒辛通

川連

土瓜萹皮

白朮

茯苓

炒半夏

薑汁

橘紅

竹茹

又 肝厥胃痛兼有痰飲只因誤用薑朮人參固守中焦痰氣阻閉致痛極痞脹更甚但知理氣使降不知氣閉熱自內生是不中窾前方翁以薑辛通為法已得效驗况酸味亦屬火化議河間注

金鈴子

延胡

川

黑山梔

橘紅

半夏

張 老年鬱勃肝陽直犯胃絡為心下痛久則液枯氣結

成格

金鈴子

延胡

黑山梔

淡豆豉

炒香

胃傷脾  
胃腸虛

張九

壯年面色痿黃。脉濡小無力。胃脘常痛。情志不適。即

發。或飲煖酒暫解。食物不易消化。脾胃之土受剋。却因

肝木來乘。怡情放懷。可愈此病。

人參

廣皮

半夏

茯苓

苡仁

桑葉

丹皮

桔梗

山梔

薑汁炒

水泛丸

某

味淡短氣。脘中微痛。

人參

淡附子

桂枝

炒遠志

煨薑

某

積滯久着。胃脘不宣。不時脘痛。已經數載。陽傷奚疑。

海登

胃痛

三

炒半夏

淡乾薑

薑撥

草果

廣皮

茯苓

汪<sup>五</sup>七診脈弦澁。胃痛透背。穀食漸減。病經數載。已入胃絡。

姑與辛通法

甜桂枝

分八

延胡索

錢一

半夏

錢一

茯苓

錢三

良薑

錢一

蜜水煮生薑

半錢

張陽微不司外衛。脈絡牽掣不和。胃痛。夏秋不發。陰內

陽外也。當冬寒驟加。宜急護其陽。用桂枝附子湯

桂枝

附子

炙草

煨薑

南棗

戴<sup>三</sup>九始於傷陰。繼則陽損。腕痛似乎拘束。食物逾時不運。

當理中焦健運二陽通補為宜守補則謬

桂枝木

茯苓

生薑渣

炒焦遠志

炒黃半夏

生益智仁

余三四胃疼發前後心冷嘔吐

淡吳萸

炒半夏

藜蘆

淡乾薑

草果仁

厚朴

廣皮

桂枝木

中州陽失健運。腕中痛。食不化

益智仁

穀芽

廣皮

炙草

茯苓

檀香汁

半夏麩

炒荷葉

顧五清陽失職。腕中痺痛。得嘔曠達。當辛以通之。



陽虛

薤白

半夏

桂枝

茯苓

乾薑

顧

營虛胃痛。進以辛甘。

當歸

錢

甜桂枝

錢

茯苓

二錢

炙草

五錢

煨薑

牛錢

南棗肉

二錢

費九勞力。氣泄陽傷。胸腕痛發。得食自緩。已非實滯停蓄。

然初病氣傷。久泄不止。營絡亦傷。古謂絡虛則痛也。攻

痰破氣不去病。卽傷胃。致納食不甘。變噫欲嘔。顯見胃

傷陽敗。當以辛甘溫方。

人參

桂枝

茯苓

炙草

煨薑

南棗

某 胃痛已久。間發風疹。此非客氣外感。由乎情懷鬱動。

氣血少於流暢。夫思慮鬱結。心脾營血暗傷。年前主歸

脾一法。原有成效。今食減形瘦。當培中土。而理營輔之。

異功加歸芍。用南棗肉湯。一丸

程氏 脉爽。背寒。食入脘痛。

人參 茯苓 當歸 白芍

炙草 煨薑 南棗

某女 形寒。脘痛。得食甚。手按少緩。其有餘客邪病。擬進和

營補法。歸桂枝去芍。加茯苓。

蔣 陽微氣阻。右腕痛痺。據云努力痛起。當兩調氣血。

長陽虛 氣滯血

胃痛 天

延胡

半夏

厚朴

橘紅

桂枝木

良薑

瓜

薑皮

茯苓

葉三

努力。飢飽失時。好飲冷酒。肝

仁。中脘痛。

熟半夏

雲茯苓

桃

仁。去皮尖炒

良薑

延胡

紅

豆蔻。去殼

丸方

熟半夏

雲茯苓

生

厚朴。小附子

草果仁

高良薑

老

薑汁法丸。每服三錢

朱

痛。固虛寒。吐痰泄氣。稍緩。當

通陽明。勿雜多岐。

人參

半夏

薑

汁。淡附子

茯苓

淡乾薑

陽虛症

某如陽微痰滯胃痠痛脹用阿魏九六分

施六胃痛濁痰上逆

代赭石 炒半夏 淡吳萸 淡藜蘆

茯苓 廣皮 葶撥 生益智仁

張四陽微濁凝胃下疼

炒黑川椒去目 炮黑川烏三錢 炮黑川附子三錢

炮淡乾薑半錢

高五素多鬱怒陽氣窒痺濁飲凝沍湯飲下咽汪出酸水

胃脘痛痺已經三載漸延噎膈先與通陽微飲俾陽氣

得宣庶可向安

半夏 枳實皮 桂枝木 茯苓 淡乾薑

又 脈右弦不飢。納穀不運。吞酸。渴飲。尙阻。陽仍不宜。

半夏 良薑 桂枝木 茯苓

延胡 淡乾薑

高 脈虛澹。胃痛久。治在血分。

桃仁 當歸 桂枝 茯苓

遠志 炙藜

錢三 酒肉滯氣胃痛。鄉人稱爲穿心箭風。方書所無。不可

稽考。苦辛泄降可效。

延胡 川棟子 桃仁 蒲黃 五靈脂

血絡瘀

盛六 胃痛喜得煖食。腸中泄氣則安。數年痛必入絡。治在

血中之氣。

桂枝木 桃仁 茱白汁 歸鬚 茯苓塊

又 陽微胃痛。

當歸 桂枝木 桃仁 炙甘草

煨薑 南棗

席 經幾年宿病。病必在絡。痛非虛症。因久延。體質氣餒。

遇食物不適。或情懷鬱勃。痰因氣滯。氣阻血瘀。諸脉逆。

亂。頻吐汚濁。而大便反秘。醫見嘔吐肢冷。認為虛脫。以

理中加附子。溫裏護陽。夫陽氣皆屬無形。况乎病發有

痛 胃痛 三

因决非陽微欲脫。意當年病來。宛是肝病。比疎通氣血。皆效。其病之未得全好。由乎性情食物居多。夏季當以太陰陽明通劑。今痛處在腕。久則瘕濁復聚。宜淡味薄味清養。初三竹瀝泛丸。仍用早上另立通瘕方法。

蘇木

人參

鬱金

桃仁

歸尾

栝子仁

琥珀

芫薺

紅棗肉丸早服二錢

秦

久有胃痛。更加勞力。致絡中血瘕。經氣逆。其患總在

絡脉中。痺窒耳。醫藥或攻裏。或攻表。置病不理。宜乎無

效。形瘦清減。用緩逐其瘕一法。

蟻螂虫

炙一兩

麤虫

炙一兩

五靈脂

炒一兩

桃仁

二兩

川桂枝尖

生五錢

蜀漆

炒黑三錢

用老韭根白搗汁泛丸

每服二錢滾水下

潘氏

脉弦滿。經事不至。寒熱胃痛拒格。嘔惡不納。此因久

病胃痛。瘀血積於胃絡。議辛通瘀滯法

川棟子

延胡

桂枝木

五靈脂

蒲黃

香附

吳氏

氣火鬱胃痛

川棟子

橘紅

炒查肉

鬱金

黑山梔

香附

氣逆不降

江十二胃疼。緩氣逆不降



鮮枇杷葉

杏仁

生香附

降香汁

厚朴

橘紅

桔梗

白薏

范氏 諸荳皆能閉氣。漿凝為腐。宛是呆滯。食物食已。脘痞

痛脹。乃清氣之阻。診脈小澁。舌白粘膩。當理氣以開曠

胸中

杏仁

厚朴

老蘇梗

廣皮白

白薏仁

枳殼汁

桔梗汁

陽明乃十二經脈之長。其作痛之因甚多。蓋胃者彙

也。乃衝繁要道。為患最易。虛邪賊邪之乘機。竊發其

間。消長不一。習俗辛香溫燥之治。斷不容一例而變

施然而足病其要何在所云初病在經久痛入絡以  
經主氣絡主血則可知其治氣治血之當然也凡氣  
既久阻血亦應病循行之脈絡自痺而辛香理氣辛  
柔和血之法實爲對待必然之理又如飽食痛甚得  
食痛緩之類於此有宜補不宜補之分焉若素虛之  
體時就煩勞水穀之精微不足以供其消磨而營氣  
日虛脈絡枯澆求助於食者甘溫填補等法所宜頓  
進也若有形之滯堵塞其中容納早已無權得助而  
爲實實攻之逐之等劑又不可緩也寒溫兩法從乎  
喜煖喜涼滋燥之殊詢其便澆便滑至於飲停必吞

酸食滯當嘔腐厥氣乃散漫無形。痰傷則定而有象。  
 蚘虫動擾當煩痛而吐沫痰濕壅塞必善吐而脉滑。  
 營氣兩虛者不離乎飢瘵動悸肝陽衝尅者定然煩。  
 渴而嘔逆陰邪之勢其來必速鬱火之患由漸而劇。  
 也。邵新甫

貧血之脈必虛而沉不實者必虛也

痰濕血之者其脈必滑而沉也

酒入則血亦熱而行之脈必滑而平也

濕土氣滯生血則其脈必沉而滑也

濕熱而脈必沉而滑也

# 脇痛

張五六脇脹夜甚响動則降七情致傷之病

橘葉

香附汁

川棟子

半夏

茯苓

薑渣

陳氣熱攻冲擾腕入脇

川連

牡蠣

夏枯草

炒半夏

香附

炒白芥子

徐九勞怒陽動左脇閃閃腹中微滿診脈弦搏左甚當先

用苦辛

脇痛

三

廣言... 卷八

鬱金

山梔

半夏麴

降香末

橘紅

金石斛

金不制本

湯八氣逆咳血後脇疼

降香汁

沖八分

川貝

牛一錢

鮮枇杷葉

三錢

白蔻仁

五分

杏仁

二錢

橘紅

一錢

濕熱壅滯

丁

由虛里痛起左脇下堅滿脹及臍右大便澀滯不爽

用緩攻方法

小温中丸

痛兼痰飲

某

痰飲搏擊脇痛

半夏

茯苓

廣皮

甘草

白芥子

刺蒺藜

鈎藤

沈三左脇下痛。食入則安。當歸桂枝湯加肉桂。

朱二五左乳傍痛。遶腰腹。重按得熱。少緩。此屬陰絡虛痛。十

一年不愈。亦痼疾矣。

當歸 三錢 肉桂 一錢 小茴 七分 丁香皮 五分

茯苓 二錢 淡乾薑 一錢

尤四痛從中起。遶及右脇。胃之絡脈受傷。故得食自緩。但

每痛發。必由下午黃昏。當陽氣漸衰而來。是有取乎辛

溫通絡矣。

當歸 茯苓 炮薑 肉桂

炙草 大棗

寒入絡  
脈氣滯

郭三痛必右脇中有形攻心嘔吐清涎周身寒凜痛止寂

然無踪此乃寒入絡脈氣乘填塞阻逆以辛香温通法

蕪撥

牛夏

川楝子

延胡

吳萸

良薑

蒲黃

茯苓

血絡瘀  
痺

汪六嗔怒動肝寒熱旬日左季脇痛難以舒轉此絡脈瘀

痺防有見紅之事靜調勿勞可愈

桃仁

歸鬚

五加皮

澤蘭

丹皮

鬱金

又

桃仁

歸鬚

丹皮

桑葉

川楝子皮

黑山梔皮

又水絡虛則熱液虧則風動痛減半有動躍之狀當甘緩

理虛。炙甘草湯去薑桂

又氣痛止便難液耗風動為秘議用東垣通幽法。

當歸

桃仁

柏子霜

火麻仁

郁李仁

松子肉

紅花

凌

肝着脇中痛勞怒致傷氣血

川棟子皮

炒延胡

歸鬚

桃仁

生牡蠣

桂枝木

沈二初起形寒寒熱漸及脇肋腕痛進食痛加大便燥結

久病已入血絡兼之神怯瘦損辛香剛燥決不可用



白旋覆花 新絳 青葱管 桃仁

歸鬚 柏子仁

王<sub>四</sub>左前後脇板着食後痛脹今三年矣久病在絡氣血

皆窒當辛香緩通

桃仁 歸鬚 小荷 川棟子 半夏

生牡蠣 橘紅 紫降香 白芥子 水泛丸

汪 痛在脇肋遊走不一漸至痰多手足少力初病兩年

寢食如常今年入夏病甚此非臟腑之病乃由經脈繼

及絡脈大凡經主氣絡主血久病血瘀瘀從便下諸家

不分經絡但忽寒忽熱宜乎無效試服新絳一方小效

乃絡方耳。議通少陽陽明之絡。通則不痛矣。

歸鬚

炒桃仁

澤蘭葉

柏子仁

香附汁

丹皮

穿山甲

乳香

沒藥

水泛丸

程

四

診脈動而虛。左部小弱。左脇疼痛。痛勢上引。得食稍

安。此皆操持太甚。損及營絡。五志之陽動擾不息。盜乾

舌燥心悸。久痛津液致傷也。症固屬虛。但參朮歸芪補

方未能治。及絡病內經肝病。不越三法。辛散以理。用酸

泄以體用。甘緩以益用。宜辛甘潤溫之補。蓋肝為剛臟。

必柔以濟之。自臻效驗耳。

炒桃仁

柏子仁

新絳

歸尾

橘紅

琥珀

痛緩時用丸方

真阿膠 小生地 枸杞子 柏子仁 天冬

刺蒺藜 茯神 黃菊花 四兩丸

朱 肝絡凝瘀 脇痛 須防 動怒 失血

旋覆花湯加歸鬚 桃仁 柏仁

李<sup>十</sup> 左脇痞積 攻疼

生牡蠣 南山楂 炒延胡索 川棟子

炒桃仁 歸鬚 丹皮 桂枝木

蔣<sup>三</sup> 宿傷 左脇腹背痛

炒桃仁 歸鬚 炒延胡 片薑黃

五加皮 桂枝木 橋紅 炒小荷

肝腎陰虛

沈 暮夜五心熱。噤乾。左脇痛。肝腎陰虧。

人參 生地 天冬 麥冬

柏子霜 生白芍

肝風入絡

黃 左脇骨痛。易飢嘔涎。肝風內震入絡。

生地 阿膠 生白芍 柏子仁

丹皮 澤蘭

又 照前方去白芍。澤蘭加桃仁桑枝。

又 肝胃絡虛。心嘈如飢。左脇痛。便燥少血。

脇痛

醫言... 卷八

生地 天冬 枸杞 桂圓

桃仁 柏仁 熬膏加阿膠收

程 脇下痛犯中焦初起上吐下瀉春深寒熱不止病在

少陽之絡

青蒿梗 歸鬚 澤蘭 丹皮

紅花 鬱金

肝腎虛

三診脉右弦左小弱瀉病起積勞傷陽操持繁思五志

皆迎而肝為將軍之官謀慮出焉故先脇痛晡暮陽不用事其病漸劇是內傷症乃本氣不足日餌辛燥氣泄血耗六味滋柔膩藥原非止痛之方不過矯前藥之謬

而已內經肝病三法治虛亦主甘緩蓋病既久必及陽  
明胃絡漸歸及右肝胃同病人卧竟藏於肝夢寐紛紜  
傷及無形矣議用甘藥少佐攝鎮

人參

棗仁

茯神

炙草

柏子仁

當歸

龍骨

金箔

桂圓肉煮濃汁搗丸

脇痛一症多屬少陽厥陰傷寒脇痛皆在少陽胆經  
以脇居少陽之部雜症脇痛皆屬厥陰肝經以肝脈  
布於脇肋故仲景旋覆花湯河間金鈴子散及先生  
辛溫通絡甘緩理虛溫柔通補辛泄宣瘀等法皆治  
肝着脇痛之劑可謂曲盡病情諸法畢備矣然其症



# 腹痛

上中  
焦氣阻

裴氏 脈數按之瀉腹痛嘔吐恐炒穢格拒宜宣通氣分

白薤仁

桔梗

黑山梔

香豉

半夏

廣皮白

陽氣不  
通

某<sub>四</sub> 腰痛腹痛得冷愈甚

桂枝木

茯苓

蘼艾

生香附

青皮

炒小茴

吳<sub>三五</sub> 當臍微痛手按則止此絡空冷乘陽氣久虛之質自

述戒酒穀增不可因痛再以破泄真氣



醫傷脾

茯苓

生薑煨

熟朮

肉桂

俞十腹痛六七年每發必週身寒。嘔吐涎沫而痛止。此諸

氣鬱痺得湧則宣之象。法當升陽散鬱。

半夏

草果

金鈴子

延胡

厚朴

生薑

蘇梗

穢濁阻

程

穢濁阻遏中焦氣機。不宜腹痛。脘痺當用芳香逐穢

兼以疎泄

藿香

厚朴

杏仁

萊菔子

半夏

廣皮白

陰濁內

鄭

脈沉微。腹痛欲大便。陰濁內凝。乃陽氣積衰。通陽必

不通

以辛熱

生白朮

吳萸

良薑

川熟附

茯苓

小茴

某

腑陽不通。腹痛用禹餘糧丸。暖下通消。二便通脹緩。

腹反此無形之氣未振。宜疎補醒中。

生白朮

厚朴

廣皮

半夏

茯苓

生益智

薑汁

肝氣鬱

某

氣結。腹痛食少。寒熱。逍遙散去朮加鬱金香附。

肝鬱血  
滯

某

肝鬱。腹痛有形。經不調。

香附

川芎

當歸

肉桂

而登七日有夜自來

腹痛

學

癆傷肝脾絡血凝瘀

五靈脂

木香

吳萸

炒白芍

畢

小便自利大便黑色當臍腹痛十五年漸發日甚脈

來沉而結澹此鬱勃傷及肝脾之絡致血敗瘀留勞役

動怒宿疴乃發自今冬深閉藏忌用攻下議以辛通潤

血所謂通則不痛矣

桃仁

桂枝木

穿山甲

老韭白

煎送阿魏丸一錢

徐

十四

疹發五六年形體畏寒病發身不大熱每大便腹痛

裏急此黃氣血凝滯當以鬱病推求

當歸

酒製大黃

枳實

桂枝

炙草

白芍

某 勞傷 勞傷 勞傷 勞力傷氣浮腫食入腹痛姑用戊巳調中

白芍 二錢

炙草 五分

當歸 炒焦一錢半

生益智 七分

廣皮 一錢

煨薑 一錢

棗肉 三錢

河水煎

營分虛 寒

袁 四 五 當臍腹痛發於冬季春深漸愈病發變氣過飢勞動

亦發宜溫通營分主治

當歸

炙草

肉桂

茯苓

炮薑

南棗

營怒飲 氣入絡

華 腹痛三年時發時止面色明亮是飲邪亦酒濕釀成

因怒左脇有形痛遶腹中及胸背諸俞乃絡空飲氣逆

腹痛

聖

攻入絡食辛熱痛止復痛蓋怒則鬱折肝用性氣辛辣  
可解論藥必首推氣味

粗桂枝木錢一 天南星薑汁浸炮 錢半 生左牡蠣五錢 打碎

真橘核炒香打 錢半 川棟子肉錢一 李根東行皮錢一

暑傷中

某 長夏腹脹減食微痛是暑傷在氣分東垣每調和脾

胃疎泄肝木最屬逆理若守中之補及膩滯血藥皆左

人參 廣皮 白芍 茯苓

穀芽 生益智仁

腹處乎中痛因非一須知其無形及有形之為患而

主治之機宜已先得其要矣所謂無形為患者如寒

疑火鬱氣阻營虛及夏秋暑濕痧穢之類是也所謂  
有形爲患者如蓄血食滯癥瘕虻蟻內疝及平素偏  
好成積之類是也審其痛勢之高下辨其色脈之衰  
旺細究其因確從何起大都在臟者以肝脾腎爲主  
在腑者以腸胃爲先夫臟有賊寇之情非比腑病而  
以通爲用也此通字勿執攻下之謂古之建中湯理  
中湯三物厚朴湯及厚朴溫中湯各具至理考先生  
用古若通陽而泄濁者如吳茱萸湯及四逆湯法清  
火而泄鬱者如左金丸及金鈴散法開通氣分者如  
四七湯及五磨飲法宣攻營絡者如穿山甲桃仁歸

出言... 卷八  
鬚非根之劑及下瘀血湯法緩而和者如芍甘湯加  
減及甘麥大棗湯法柔而通者如薤蓉栝子肉桂當  
歸之劑及復脈加減法至於食滯消之虻擾安之癥  
瘕理之內疝平之痧穢之候以芳香解之偏積之類  
究其原而治之是皆先生化裁之法也若夫瘍科內  
癰婦科四症兼患是病者更於各門兼參其法而用  
之則無遺蘊矣

邵新甫

# 肩臂背痛

徐 醫曰天令嚴冷。診左脉忽現芤瀉痛時筋攣。連製其  
後此發在左脈絡久養風動筋急。別法清絡涼劑不應。若  
虛不受。學寒。破裏。舒筋。湯意。

當歸

生黃芪

片薑黃

桂枝

防風

生熟地

前蘇桃活絡丹一九

某

勞倦肩臂疼

川桂枝木

木防風

五加皮

茯苓

生苡仁

炒白朮

肩臂痛

臨證指南醫案

卷八 肩臂痛

四



塗六痛起肩脚。漸入環跳。轉筋。是為絡虛。

黃芪 於朮 當歸 茯苓

防己 防風 桑枝 芍藥

又 照前方去防風元氣。加桂枝。芍藥。

鄒 五旬。又傷陽。筋脈。寒。骨節。痠。小變而痛。治當通補。

脈絡。莫進攻風。

生黃芪 於朮 當歸 防風根

薑黃 桑枝

王 四 陽明氣衰。厥陰風動。頭眩。目昏。右肩痛。脇下有聚。

氣足厥陰主治。

枸杞子四兩

歸身二兩

羚羊角

生研二兩

製白茯苓

去粗三兩

嫩黃芪皮

四兩

明天麻

二兩

菊花

二兩

桑枝

四兩

熬汁九

徐三五

左指張痛引肩。男子血虛風動病在肝。形厥不起以

桑葉溫養

雙首烏

枸杞子

歸身

三角胡麻

菊花炭

柏子仁

刺蒺藜

桑枝膏丸

俞五

高年陽明氣之肩脚痛難屈伸。法當理衛陽通氣

黃芪

桂枝

歸身

片薑黃

海桐皮

夏枯草

孫四

腎氣攻背。項強湯頓且多。督脈不轉腰重頭眩。難堪

轉側先與通陽宗醫學士法

川椒

五分

川桂枝

川附子

茯苓

生白朮

生遠志

凡氣弱為病者而上方者。緣其脈主病治在少陰。整

腹而上。其氣在厥陰。緣其脈主病治在少陰。此治

病之宗者也。

汪二十肝濁逆攻痛至背。

淡乾薑

八分

炒黑川椒

三分

炒焦烏梅

五分

小川連

三分

川桂枝木

五分

北細辛

二分

黃柏

五分

煨楝子肉

錢一

生白芍

錢一

陳氏內經論諸痛皆寒時當冬臘口鼻吸受寒冷阻氣墜

之流行痛自胸引及背甚則手足厥冷只宜兩通氣血

主治

川棟子

延胡

生香附

橘紅

吳萸

烏藥

紅花

沈氏脈孔汗出失血背痛此為絡虛

人參

炒歸身

棗仁

炒白芍

炙草

茯神

莊

三

督虛背疼脊高突

生毛鹿角

切片

鹿角霜

一錢

杞子

三錢

歸身

一錢

肩臂背痛

肩臂背痛

歸身

張三  
八督虛背痛遺洩

生杜仲半錢  
沙苑一錢

茯苓半錢

青益調入三分

生毛鹿角 鹿角霜 生菟絲子 生杜仲

沙苑子 白龍骨 茯苓 當歸

肺朝百脉。肺病則不能管攝一身。故肺俞為病。即肩背作痛。又背為陽明之府。陽明有虧。不能束筋骨利機關。即肩垂背曲。至於管經絡交會不一。而陽明為十一經絡之長。臂痛亦當責之陽明。但痛有內外兩因。虛實迥異。治分氣血二致。通補攸殊。如營虛脉絡失養。風動筋急者。不受辛寒。當做東垣舒筋湯之意。

佐以活絡丹勞倦傷筋以脉絡凝塞肩臂作痛者以辛  
甘爲君佐以循經入絡之品陽明氣衰厥陰風動右  
肩痛麻者用枸杞歸身黃芪羚羊桑枝膏爲陽明厥  
陰營氣兩虛主治血虛風動者因陽明絡虛受肝臟  
風陽之擾用首烏枸杞歸身胡麻栢子仁刺蒺藜等  
味以柔甘爲溫養失血背痛者其虛亦在陽明之絡  
用人參歸身棗仁白芍炙草茯神以填補陽明若腎  
氣上逆則督虛爲主病宜用奇經之藥以峻補真陽  
至於口鼻吸受寒冷阻鬱氣隧痛自胸引及背者宗  
內經諸痛皆寒之義以溫藥兩通氣血更有古法如

防風湯散肺俞之風指迷丸治痰流管痛控涎丹治  
 流瀝牽引此皆從實症而治所謂通則不痛也醫者  
 不拘守一法洞悉病源運巧思以製方而技於是進  
 龔商年

此與宋杜誠燕窩天麻香蘇散各其能治諸症即也  
 無過志要出首愚則出諸家因利利不的無效守  
 微費深兩派其能而能無效者則則其治多則  
 風散風香杜得神補來得效也學來也者信也也  
 相益實也民補燥氣味之而也得效則也也  
 必以法然也

# 腰腿足痛

腰痛

曹九三濕鬱少腹痛引腰右脚痠

木防已

晚蠶沙

飛滑石

茯苓皮

杏仁

厚朴

草果

藟蘂

俞五五勞倦挾濕腰疼

川桂枝尖

木防已

生苡仁

茯苓皮

晚蠶沙

藟蘂

何七四腰痛環跳穴痛痺

沙苑

桂枝木

小茴

茯苓



桑寄生 炒杞子

翁三五努力傷腰疼

生杜仲 當歸 五加皮 炒牛膝

枸杞子 茯苓 青鹽 生羊腰子

吳氏 厥虛身熱腰髀皆痛少腹有形攻觸臟陰奇脉交傷

不可作外感治

當歸 炒白芍 桂枝 茯苓

炙草 煨薑 大棗

汪三 脉滿腰髀環跳悉痛煩勞即發下焦空虛脉絡不宣

所謂絡虛則痛是也

歸身

桂枝木

生杜仲

木防已

沙苑

牛膝

草薺

小茴

某

便溏腰痛無力

木菟丸方

朱

脉細色奪肝腎虛腰痛是絡病治法

生羊內腎

當歸

枸杞子

小茴

紫衣胡桃

茯神

腰膝痛

汪

嫗

老年腰膝久痛牽引少腹兩足不堪步履奇經之脉

隸於肝腎為多

鹿角霜

當歸

肉蓯蓉

薄桂

小茴

柏子仁

腰腿足痛

王三脉遲緩飲酒便溏遺精數年不已近日腰髀足膝墜

痛麻木此濕凝傷其脾腎之陽滋填固濟決不應病先

議用苓薑木桂湯驅濕煖土再商後法

脛腿足痛

吳 舌白乾潤脫不知飢兩足膝跗筋掣牽痛雖有宿病

近日痛發必挾時序溫熱濕蒸之氣阻其流行之隧理

進宣通莫以風藥

飛滑石 石膏 寒水石 杏仁

防已 薏仁 威靈仙

蔣七 足膝腫疼久不止內熱

生虎骨 炒牛膝 草薢 金毛狗脊

至當歸 仙靈脾

又 照前方加生鹿角黃柏

張<sup>四</sup> 勞力傷左腿骨麻疼

生虎骨<sup>四兩</sup> 當歸<sup>二兩</sup> 五加皮<sup>二兩</sup> 仙靈脾<sup>二兩</sup> 牛膝<sup>二兩</sup>

獨活<sup>一兩</sup> 白茄根<sup>二兩</sup> 油松節<sup>二兩</sup> 金毛狗脊<sup>八兩</sup>

朱 痛着右腿身前肌肉不腫必在筋骨且入夜分勢篤

邪留於陰間有偏墜治從肝經

生杜仲<sup>一兩</sup> 當歸鬚<sup>二錢</sup> 穿山甲<sup>二錢</sup> 小茴香<sup>一錢</sup>

北細辛<sup>三分</sup> 乾地龍<sup>一錢</sup>

某 嘔逆吐涎衝氣攻心足大姆指硬強而痛

風瘧

高登告... 腰腿足痛

哭

淡吳萸

熟附子

獨活

北細辛

當歸

漢防已

某 兩足皮膚撫之則痛由厥陰犯陽明胃厥所致脉弦

而數治當疎泄

川棟子

延胡

青皮

黑山梔

歸鬚

桃仁

橘紅

炒黑查肉

陸二飽食則噦是為胃病兩足骨節皆痛陽明胃脉不司

束筋骨攻痛議轉旋陽氣法

苓薑朮桂湯

某 右足患處麻木筋強微腫老人氣血不得宣通冬病

至長夏食不加餐脉小弱主以溫養

虎脛骨

生打三錢

淮牛膝

一錢

歸身

炒一錢

杞子

炒三錢

生杜仲

三錢

川斛

三錢

車蘼

一錢

白蒺藜

炒去刺研一錢

腰者腎之府。腎與膀胱為表裏。在外為太陽。在內屬少陰。又為衝任督帶之要會。則腰痛一症。不得以腎為主病。然有內因外因。不內外因之別。舊有五辨。一曰陽虛不足。少陰腎衰。二曰風痺風寒濕着腰痛。三曰勞役傷腎。四曰墜墮損傷。五曰寢卧濕地。其說已詳。而景岳更增入表裏虛實寒熱之論。尤為詳悉。夫內因治法。腎臟之陽有虧。則益火之本。以消陰翳。腎臟之陰內奪。則壯水之源。以制陽光。外因治法。寒

濕傷陽者用苦辛溫以通陽泄濁。濕鬱生熱者用苦辛以勝濕通氣。不外因治法。勞役傷腎者以先後天同治。墜隨損傷者辨傷之輕重與瘀之有無為或通或補。若夫腿足痛外感者惟寒濕濕熱濕風之流經入絡。經云傷於濕者下先受之。故當以治濕為主。其間佐溫佐清佐散隨症以製方。內傷則不外肝脾腎三者之虛或補中或填下或養肝。隨病以致治。古來治腰腿足痛之法大畧如此也。然審症必如燃犀燭怪。用藥尤貴以芥投針。今閱案中有飲酒便滯遺精不已。腰痛麻木者。他人必用滋填固濟等藥。先生

斷爲濕凝傷脾腎之陽。用苓桂朮薑湯以驅濕煖土。有老年腰痛者。他人但撮幾味。通用補腎藥以治。先生獨想及奇經之脈。隸於肝腎。用血肉有情之品。鹿角當歸。從蓉。薄桂。小茴。以溫養下焦。有痛着右腿。肌肉不腫。入夜勢篤者。先生斷其必在筋骨。邪流於陰。用歸鬚。地龍。山甲。細辛。以辛香苦溫。入絡搜邪。有兩足皮膜。撫之則痛者。似乎風濕等症。先生斷其厥陰。犯陽明。用川楝。延胡。歸鬚。菴仁。青皮。山梔。以踈泄肝臟。有飽食則噦。兩足骨節皆痛者。人每用踈散攻劫。先生宗陽明虛不能束筋骨意。用苓朮桂湯。以轉



旋陽氣種種治法。非凡手所及。要之治病固當審乎  
虛實。更當察其虛中有實。實中有虛。使第虛者補而  
實者攻。誰不知之。潛玩方案。足以補後人之心智也。

景茂鮮哉。 龔商年

# 諸痛

痺血絡瘀

陳久痛必入絡。氣血不行發黃非疽也。

旋覆花

新絡

青葱

炒桃仁

當歸尾

龐四絡虛則痛。有年色脉衰奪。原非香蔻劫散可效。醫个

明治絡之法則愈治愈窮矣。

炒桃仁

青葱管

桂枝

生鹿角

歸尾

此旋覆花湯之變制也。去覆花之鹹降。加鹿角之十

升。方中惟有葱管通下。餘俱辛散橫行。則絡中無虛

不到矣。

又 辛潤通絡病愈廿日因勞再發至於上吐下閉是關  
格難治矣且痛勢復來姑與通陽 阿魏丸四錢分四

服

李<sup>四</sup>積傷入絡氣血皆凝則流行失司所謂痛則不通也  
久病當以緩攻不致重損

桃仁

歸鬚

降香末

小茴

穿山甲

白茯苓

片薑黃

煨木香

韭白汁法丸

楊<sup>三</sup>由周身筋痛透至腹中遂不食不便病久入絡不易

除根

歸身

川桂枝

茯苓

柏子仁

遠志

青葱管

章痛乃宿病。當治病發之由。今痺塞脹悶。食入不安。得頻吐之餘。疹形即發。是陳腐積氣膠結。因吐經氣宣通。倣仲景胸中懊憹。例用梔子豉湯主之。

又胸中稍舒。腰腹如束。氣隧有欲通之象。而血絡仍然錮結。就形體畏寒怯冷。乃營衛之氣失司。非陽微惡寒之比。議用宣絡之法。

歸鬚

降香

青葱管

鬱金

新絳

柏子仁

黃痛則氣亂發熱。頭不痛。不渴飲。脈不浮。非外感也。暫

用金鈴散一劑

金鈴子

炒延胡

炒桃仁

桂圓

又痛而重按少緩是為絡虛一則氣逆紊亂但辛香破

氣忌進宗仲景所着之病用金匱旋覆花湯法

旋覆花

新絳

青葱管

桃仁

柏子霜

歸尾

注婦脈小濇久因悒鬱腕痛引及背脇病入血絡經年延

綿更兼如素數載陽明虛餒肩臂不舉倉卒難於奏效

是緩謂為宜議通血絡潤補勿投燥熱劫液

歸鬚

柏子仁

桂枝木

桃仁

生鹿角

片薑黃

朱

頭顛至足麻木刺痛熱熾

滋腎丸

張

初受寒濕久則化熱深入陰分必暮夜痛甚醫用和

血驅風焉能直入陰分議東垣滋腎丸搜其深藏伏邪

肉桂

八錢忌見火

黃柏

四兩

知母

四兩

俱鹽水炒水泛丸

王

脈數而細忽痛必熱腫且痛來迅速思五行六氣之

流行最速莫如火風高年脂液久耗人身之氣必左升

右降相火寄於肝龍火起於腎竝從陰發越本乎根蒂

先磨內之藏納之職司矣每日服東垣滋腎丸三錢秋

石湯送以瀉陰中伏熱

肝腎奇經脈絡  
不和

肝腎虛  
下焦痛

許一痛為脈絡中氣血不和醫當分經別絡肝腎下病必

留連及奇經八脈不知此旨宜乎無功

鹿角霜 桑寄生 杞子 當歸

沙苑 白薇 川石斛 生杜仲

范病後精采未復多言傷氣行定動筋謂之勞復當與

甘溫和養氣血下焦痛肝腎素虛也

人參 小茴香拌炒當歸 沙苑蒺藜

茯神 炒杞子 菊花炭

經云諸痛痒瘡皆屬於心夫心主君火自當從熱而

論然此乃但言瘡耳若湯科之或瘧或疽則有陰有

陽不可但執熱而論矣。又如舉痛論中所言十四條。惟熱留小腸一條。則主乎熱。餘皆主乎寒客。故諸痛之症。大凡因於寒者十之七八。因於熱者不過十之二三而已。如欲辨其寒熱。但審其痛處。或喜寒惡熱。或喜熱惡寒。斯可得其情矣。至於氣血虛實之治。古人總以一通字立法。已屬盡善。此通字勿誤認爲攻下通利講解。所謂通其氣血。則不痛是也。然必辨其在氣分與血分之殊。在氣分者。但行其氣。不必病輕藥重。攻動其血。在血分者。則必兼乎氣治。所謂氣行則血隨之是也。若症之實者。氣滯血凝。通其氣而散



其血則愈。症之虛者。氣餒不能充運。血衰不能滋榮。治當養氣補血。而兼寓通於補。此乃概言其大綱耳。若夫諸痛之症。頭緒甚繁。內因七情之傷。必先臟腑。而後達於肌腠。外因六氣之感。必先肌腠。而後入於臟腑。此必然之理也。在內者。考內景圖。在外者。觀經絡圖。其十二經游行之部位。手之三陰。從臟走手。手之三陽。從手走頭。足之三陽。從頭走足。足之三陰。從足走腹。凡調治立方。必加引經之藥。或再佐以外治之法。如針灸砭刺。或敷貼熨洗。或按摩導引。則尤易奏功。此外更有跌打閃挫。陰毒鼠竊。積聚癥瘕。虻蟻

某

痲痺痧脹中惡諸痛須辨明證端不可混治今觀各門痛證諸案良法儘多難以槩叙若撮其大旨則補瀉寒溫准用辛潤宜通不用酸寒歛滯以留邪此已切中病情然其獨得之奇尤在乎治絡一法蓋久痛必入於絡絡中氣血虛實寒熱稍有留邪皆能致痛此乃古人所未及詳言而先生獨能剖析明辨者以此垂訓後人真不愧為一代之明醫矣

華玉堂

故入暮厥痛愈劇當先清降再議育陰

苦丁茶

鮮菊葉

金銀花

生薑豆豉

川貝母

鮮荷葉梗

益元散

諸痛

五

其血則愈在之虛者氣衰不能充運血衰不能滋養

治當養氣補血而兼通於補此乃概言其大概耳

若夫諸病之在頭絡其害甚烈因七情之傷必先感風

其運血於人其不調為氣升又則昏矣

其血止入微末又藉其血去其調其調其調其調其調

其血其血其血其血其血其血其血其血其血其血其血

其血其血其血其血其血其血其血其血其血其血其血

其血其血其血其血其血其血其血其血其血其血其血

其血其血其血其血其血其血其血其血其血其血其血

其血其血其血其血其血其血其血其血其血其血其血

# 耳

某

温邪上鬱耳聾右脹。

薄荷

馬勃

桔梗

連翹

杏仁

通草

某

先起咳嗽。繼而耳聾脹痛。延綿百日不愈。此體質陰

虧。觸入風温。未經清理。外因傷及陰分。少陽相火陡起。

故入暮厥痛愈劇。當先清降。再議育陰。

苦丁茶

鮮菊葉

金銀花

生薑豆皮

川貝母

鮮荷葉梗

益元散

某女 風温發熱左耳後腫痛

乾荷葉

苦丁茶

馬勃

連翹

杏仁

黑梔皮

畢三壯年脉來小促數自春月風温咳嗽繼以兩耳失聰

據述苦降滋陰不效是不明虛實經絡矣內經以春病

在頭膏梁之質厚味酒醴助上痰火固非治腎治肝可

效每晚卧時服茶調散一錢

又

鮮荷葉汁

羚羊角

石膏末

連翹

玄參

鮮菊葉

牛蒡子

午服

又

照前方去牛蒡菊葉加鮮生地鮮銀花

藥 火風侵竅耳聾

連翹

薄荷

甘菊

淡黃芩

苦丁茶

黑山梔

顧二 暑邪竅閉耳失聰

鮮荷葉

鮮菊花葉

苦丁茶

夏枯草

蔓荊子

連翹

淡黃芩

黑山梔

某八 左耳聾痛舌白脉數體質陰虛挾受暑風上焦氣熱

宜用辛涼輕藥

鮮菊葉

苦丁茶

黑山梔

飛滑石

連翹

淡竹葉

臨證七指

耳

卷

某<sup>五</sup>暑熱上鬱耳聾作脹咳喘當清氣熱

杏仁  
連翹殼  
淡竹葉  
川貝

白沙參  
六一散

<sup>四</sup>火<sup>上</sup>鬱  
必頭重耳聾脹目微赤少陽相火上鬱以辛涼清解

焦

連翹  
羚羊角  
薄荷梗  
丹皮

牛蒡子  
桑葉

某風木之鬱耳脹欲閉

連翹  
羚羊角  
薄荷梗  
苦丁茶

夏枯草花  
黑山梔皮  
小生香附

倪三因大聲喊叫致右耳失聰想外觸驚氣內應肝胆胆  
脉絡耳震動其火風之威亦能鬱而阻竅治在少陽忌  
食腥濁

青蒿葉

青菊葉

薄荷梗

連翹

解荷葉汁

苦丁茶

汪

耳聾咳嗽形體日瘦男子真陰未充虛陽易升乘竅

書云胆絡脉附耳先議清少陽鬱熱以左耳爲甚故也

桑葉

丹皮

連翹

黑山梔

青蒿汁

象貝母

腎傷心  
腎胆火

下 腎開竅於耳心亦寄竅於耳心腎兩虧肝陽亢逆故



陰精走泄。陽不內依。是以耳鳴時閉。但病在心腎。其原實由於鬱。鬱則肝陽獨亢。令照火上炎。清晨服丸藥。以補心腎。午服湯藥。以清少陽。以壯經。亦絡於耳也。

水煮熟地

四兩 麥冬

龜版

牡蠣

白芍

北味

建蓮

磁石

茯神

沉香

辰砂

五錢為衣

煎方 夏枯草

丹皮

生地

山梔

女貞子

赤苓

生甘草

姚三氣閉耳鳴

鮮荷葉

杏仁

厚朴

廣皮

木通

連翹

苦丁茶

防己

金三八下虛耳鳴失聰。磁石六味去萸加川斛龜甲遠志

王 腎竅開耳胆絡脉亦附於耳。凡本虛失聰治在腎邪

干竅閉治在胆。乃定例也。今年已六旬脉形細數。是皆

腎陰久虧。肝陽內風上旋蒙竅。五行有聲。多動真氣火

風。然非苦寒直降可效。填陰重鎮。滋水制木。佐以鹹味

入陰。酸以和陽。藥理當如是議。

熟地

龜版

鎖陽

牛膝

遠志

茯神

磁石

秋石

萸肉

五味

某 八十耳聾。乃理之常。蓋老人雖健。下元已怯。是下虛

上實清竅不主流暢。惟固補下焦。使陰火得以潛伏。  
磁石六味加龜甲五味遠志

腎開竅於耳。心亦寄竅於耳。胆絡脈附於耳。體虛失  
聰。治在心腎邪于竅閉。治在胆經。蓋耳爲清空之竅。  
清陽交會流行之所。一受風熱火鬱之邪。與水衰火  
實。腎虛氣厥者。皆能失聰。故先生治法。不越乎通陽  
鎮陰。益腎補心。清胆等法。使清靜靈明之氣。上走空  
竅。而聽斯聰矣。如溫邪暑熱。火風侵竅。而爲耳聾痛  
脹者。用連翹山梔薄荷竹葉滑石銀花。輕可去實之  
法。輕清泄降爲主。如少陽相火上鬱。耳聾聾脹者。用

鮮荷葉。苦丁。茶。青菊。菜。夏枯草。蔓荊子。黑山。柘。粉。羊  
角丹皮。辛涼。味薄之藥。清少陽鬱熱。兼清氣熱爲主。  
如心腎兩虧。肝陽亢逆。與內風上旋。蒙蔽而爲耳鳴。  
暴聾者。用熟地。磁石。龜甲。沉香。一冬牛膝。瑣陽。秋石。  
山萸白芍。味厚質重之藥。壯水制陽。填陰鎮逆。佐以  
酸味入陰。鹹以和陽爲主。因症施治。從虛從實。直如  
庖丁之導窾矣。鄒時乘



風濕

某 風濕上鬱。目赤。脉左弦。當用辛以散之。

桑葉

夏枯草

連翹

草决明

赤芍

燥熱

某二 失血後。復受燥熱。左目赤痛。當以辛涼清之。

鮮荷葉

冬桑葉

生甘草

赤苓皮

菘豆皮

穉豆皮

鮑氏 秋風化燥。上焦受邪。目赤珠痛。

連翹

薄荷

黃芩

山梔

夏枯草

青菊葉

苦丁茶

桑皮

行而登立。日月。醫。卷。

目

至

暑濕

席 用淡滲漸安。是暑入氣阻。熱蒸濕鬱。勿取大辛大苦。

之開泄。做清邪中上治法。

冬桑葉

穀精草

望月砂

苡仁

川通草

菉豆皮

茯苓

木火土

顧四五

頭額悶脹。目赤。

羚羊角

夏枯草

草決明

山梔皮

連翹

夏生香附

潘

戒飲。滿減十四畧。可加穀。近日竟夕無寐。目珠赤痛。

陽升不交於陰。暫停妙香散。

桑葉

丹皮

夏枯草

黑山梔

川貝

陸婦鬱勃氣火翳遮目睛。高年苦辛難進。

夏枯草 穀精草 草决明 望月砂

炷香附 連翹 山梔皮 丹皮

某頭面風腫。目起星。是氣中熱。

羚羊角 夏枯草 薄荷梗 穀精草 炷香附

小生地 丹皮 望月砂 連翹 山梔

汪脉左弦。左目赤痛。淚多。

桑葉 丹皮 草决明 小胡麻

夏枯草 穀精草 藜豆皮 黑稽豆皮



汪 目痛偏左翳膜紅絲診脈左弦濇由肝胆氣熱所致

草决明 冬桑葉 夏枯草 小胡麻

丹皮 穀精草

某十一 肝火上鬱目眶紅腫

連翹 赤芍 菊花葉 黑梔皮

某 苦丁茶 夏枯草

江 脈數右大鬱久熱生目障心痛

夏枯草花 小生香附 金石斛 半夏麴

茯苓 橘紅

某八 目胞浮腫不飢不運

脾肺經

桑皮 八分

茯苓皮 三錢

大腹皮 一錢

廣皮 一錢

薑皮 五分

苡仁 一錢半

通草 一錢

血絡虛

王<sup>嫗</sup> 高年目暗已久。血絡空虛。氣熱乘其空隙。攻觸脈絡。液盡而痛。當夜而甚。乃熱氣由陰而上。想外科用酒調末藥。必係溫散。攻堅。因此而痛。虛症可知。

末藥必係溫散。攻堅。因此而痛。虛症可知。

羚羊角

連翹

夏枯草

青菊葉

全當歸

川桂枝

丹皮

葉 微寒。汗大出。下有痔漏。左眼眶疼痛。此陰傷火鬱。不可作時邪泛治。六味去萸。加芍。蔓荊子。丹皮。重用。

某<sup>三</sup> 右目多淚。皆脹。心嘈雜。陽明空虛。肝陽上擾。使然。當

胃虛肝

某<sup>三</sup> 右目多淚。皆脹。心嘈雜。陽明空虛。肝陽上擾。使然。當

調補肝胃

嫩黃芪

三錢

當歸

一錢

白芍

一錢

茯神

三錢

煨薑

一錢

南棗

一枚

管陰虛

祝

四當夏形懶。不耐大氣發泄。入冬兩目無光。精氣無收。

藏。凡五臟精華皆聚於目。失藏失聚。內乏生真。不獨一

臟之損。當用養營湯。

肝陰虛

某

三脈清細。左目痛。淚熱翳膜。此肝陰內虧。厥陽上越所

致

冬桑葉

一錢

炒枸杞

一錢

小胡麻

一錢

望月砂

三錢

製首烏

三錢

石決明

一錢

黃菊花

一錢

稽豆皮

三錢

某六 痛無光

製首烏 六兩

枸杞子 二兩

柏子仁 一兩

細生地 二兩

石决明 四兩

小胡麻 三兩

望月砂 三兩

刺蒺藜 二兩

冬桑葉 一兩

黃菊花 一兩

用穉豆皮八兩穀精珠二

兩煎濃汁泛丸每服五錢開水送

某 背脹目昏心中嘈雜當治肝腎

熟地 六兩

枸杞子 三兩

桑椹子 二兩

沙苑 二兩

石决明 二兩

茯神 三兩

女貞子 一兩

青盞 一兩

黃菊花 一兩

川斛 四兩

加蜜丸早上開水送四錢

某三 脉瀉背痛右目當風淚多當治肝腎

百部卷五

目

奎

製首烏

枸杞子

炒歸身

桑椹子

沙苑子

茯神

某<sub>五</sub>遺止心嘈目淚。仍是陽氣過動。當填陰和陽。

熟地

杞子

天冬

萸肉

五味

生地

茯苓

菊花

山藥

蜜丸

某瞳神散大。左偏頭痛。先損左目。是焦煩鬱勃。陽升化

風劫傷血液使然。法當兼補肝腎。

熟地

枸杞子

山萸肉

五味

茯神

菊花

生神麴

穀精草

山藥

眼科一症。古有五輪八廓七十二間之辨。傅氏又分

爲一百零八症。因名目太多。徒滋惑亂。至於見症。楊  
仁齋已備論。具載景岳。但陰陽虛實寒熱標本施治。  
不可紊亂。經云。五臟六腑之精華。皆上注於目。又云。  
目者肝之竅也。肝與胆爲表裏。肝液胆汁充足。目乃  
能遠視。故無論外感與內症。皆與肝胆有關係焉。夫  
六淫之邪。惟風火燥居多。兼寒兼濕者亦間有。內起  
之症。肝胆心腎爲多。他臟亦間有之。若夫論治。則外  
感之症。必有頭痛寒熱鼻塞筋骨痠疼。脈見緊數。或  
浮洪。一切表症。方可清散。至於內因之症。有虛實之  
殊。實者肝胆之風熱盛也。凡暴赤腫痛脹悶難開。翳

目言才百醫家 卷八  
瞶眵淚。酸瀉作痒。斑滄入睛。皆實症也。當除風散熱。  
虛者。腎經之水火衰也。凡久痛昏暗。青盲雀目。內障。  
昏朦。五色花翳。迎風淚出。皆虛候也。治宜壯水益火。  
若陰血雖虧。而風熱未盡。則當審其緩急。相參而治。  
若久服寒涼。虛陽轉盛。則當補以甘溫。從乎反佐。至  
於紅色淺淡而紫者。爲虛熱。鮮澤而赤者。爲實熱。瞳  
神內湧。白睛帶赤者。爲熱症。瞳神青綠。白睛枯槁者。  
爲寒症。腫脹紅赤。眼珠刺痛。夜則尤甚。目不能開。而  
視物猶見者。爲邪火熾盛。若白翳遮睛。珠不甚痛。或  
全不痛。目仍能開。而視物不見者。爲真火不足。當潤

察其形症色脉因症而用藥此內治之大法也若日  
久失調致氣血凝滯火熱壅結而爲赤腫腐爛翳膜  
遮蔽致成外障譬之鏡受污垢必當濯磨須用點藥  
若但服藥必不能愈至於內障之症但宜服藥倘用  
點藥徒傷其氣血必無益而有損更當知目眚白珠  
屬陽故晝痛點苦寒藥則可效瞳子黑睛屬陰故夜  
痛點苦寒藥則反劇是外治之法亦當以陰陽區別  
也若夫偏正頭風屬氣虛痛者朝重暮輕血虛痛者  
朝輕暮重亦有外感內因之別此症當以補養正氣  
爲主畧兼治表倘槩以風熱而論專於表散最易損



目更有肝陰虧耗木火上炎頭痛惡心眉稜骨痛不欲飲食眼胞紅腫睛珠刺痛眵淚如膿白睛如翳目珠上竄不下不得寤寐甚則巔頂腦後如破如裂此內發之風也夫肝屬木木主風熱盛化風其體必本陰虧男子或有遺精白濁腸風痔漏下血等疾女子或犯淋帶崩漏諸症此係陰傷陽升內風湧起大忌發散宜用育陰熄風柔肝滋腎等法或可救十中之四五凡羌活防風川芎細辛藁本升麻等藥皆不可用倘或失治必致膏傷低陷青黃牒出致成痼疾而不可救專是科者不可不留意焉葉先生雖非眼目

專科。觀其案內諸法，真補前賢之未備，較之慣用，甚  
寒、升、散，及槩用點藥者，不啻如霄壤之殊矣。學者當  
細心而參玩之。丁聖彥

雖以而然似各  
其行如及以所  
其行如及以所  
其行如及以所

鼻

火自下而長也。宜散熱清毒。辛涼散氣。使氣上通。

邪鬱  
六肺氣

鮑十一兩三年鼻塞不聞。清涕由口噲出。而氣窒仍然大。凡

三塞

頭面諸竅。皆清陽交會通行之所。就外邪來乘。亦必霧

露無質。清邪邪鬱既久。氣血失其流暢。進藥攻治。必不

效驗。欲治其病。須查手太陰。自少商穴起。施針刺。以泄

邪流氣。乃一法也。無方

徐十四頭面諸竅。皆清陽遊行之所。邪處於中。則為堵塞。陽

氣不司流行。必畏寒形顏。內痺必鬱而成熱。有鼻在軌

衄矣。論理當用通聖散。遠處江外。倉猝就診。不可輕投。

用輕可去實

苦丁茶

乾荷葉邊

夏荆子

運翹心

飛滑石

白芷

執蘊肺氣

毛四十熱蘊肺氣失降鼻柱空痺

知母

水梨肉

川貝母

水熬膏

淵腦熱

楊 鹹降滋填鼻淵止得寐用虎潛法減當歸陳皮加天

冬淡菜膠脊筋丸

沈氏 素有痰火氣逆春令地中陽升木火化風上引巔頂

腦熱由清竅以泄越耳鳴鼻淵甚於左者春應肝胆氣

火自左而升也宜清熱散鬱辛涼達於頭而主治

羚羊角

黑山梔

苦丁茶

青菊葉

飛滑石

夏枯草花

又

照方去滑石加乾荷葉生石膏

又

性情躁急陽動太過氣火上升鬱於隧竅由春深病

加失其條達之性經言春氣病在頭也考五行六氣迅

速變化莫若火風腦熱暗泄而為鼻淵隧道失和結成

癭核夫東垣升陽散火丹溪總治諸鬱咸取苦辛為法

然藥乃片時之效欲得久安以怡悅心志為要旨耳

連翹心

土貝母

海藻

昆布

黑山梔

川芎

永生香附

鬱金

羚羊角

夏枯草

乾荷葉邊

生研木青菊葉汁法丸苦丁茶煎湯送二錢五分

汪形瘦尖長稟乎木火陰精不足腦髓不固鼻淵淋下

竝不腥穢暖天稍止遇冷更甚其為虛證顯然明白醫

者愈以風寒中腦主治發散滲泄愈耗正氣豈但欲愈

勞怯是憂用天真丸

人參

黃芪

白朮

山藥

菴蓉

當歸

天冬

羊肉

經云肺和則鼻能知香臭矣又云胆移熱於腦令人

辛頰鼻淵傳為衄鱗瞑目是知初感風寒之邪久則

精虛

化熱熱鬱則氣痺而塞矣。治法利於開上宜鬱如蒼耳散防風通聖散川芎茶調散菊花茶調散等類。先生則佐以荷葉邊苦丁茶蔓荆連翹之屬以治之。此外感冒辛散也。內熱宜清涼者如腦熱鼻淵用羚羊山梔石膏滑石夏枯草青菊葉苦丁茶等類。苦辛涼散鬱之法也。久則當用鹹降滋填如虎潛減辛再加鎮攝之品。其有精氣不足腦髓不固淋下無腥穢之氣者。此勞怯根萌。以天真丸主之。此就案中大槩而言之也。然症候錯雜再當考前賢之法而治之。

華玉

堂



言之由是而後...

...

...

...

...

...

...

...

# 牙

溫邪

火鬱

某 陰虧體質。溫氣上蒸。齒痛連及頭顛。用玉女煎。

某 火鬱。顛頂屬厥陰。上結核。齩腫。

犀角 羚羊角 玄參 知母 生甘草

連翹 黑山梔 銀花 夏枯草

王 四 酒客牙宣。衄血痰血。形寒內熱。食少陰藥。濁味姑緩。

小黑豆皮 人中白 旱蓮草 川斛

左牡蠣 澤瀉

徐 二 脈細數上出。體屬陰虛。內熱牙痛後。頰車穴閉。口不

牙痛後 絡痺

陰虛火 炎

...

牙

...

能張其病在絡藥餌難效擬進宜通絡痺方

羚羊角

薑蚕

川桂枝尖

煨明天麻

炒丹皮

黑山梔

鈎藤

川椒

風熱

汪

風熱上蒸齟脹頭痛當用輕清上焦

活水蘆根

芩蘆滑石

西瓜翠衣

生菜豆皮

連翹

銀花

玄參

甘草

牙症不外乎風火虫虛此但言其痛也其他如牙宣  
牙搯牙菌牙疳牙癰穿牙毒骨槽風走馬牙疳之類

皆由於濕火熱毒蘊結牙床浪分上下二齒辨明手

足陽明及少陰之異又當察其專科而任之

華玉堂

# 咽喉

陸 風火上鬱項腫咽痛

薄荷

連翹

射干

牛蒡子

馬勃

菘豆皮

邵 風火上鬱咽痛頭脹宜用辛涼

西瓜翠衣

滑石

連翹

桑皮黃蘗

射干

杏仁

注二 左脉弦數咽痛腕悶陰虧體瘦不寐辛温當以輕藥

暫清上焦

喉蛾

咽喉

桑葉

生菜豆皮

白沙參

川貝

玄參

川斛

王二勞傷恐有痲腐進辛潤宜血初服身漸繼漸平復但

喉間緊痺而呼吸飲食仍不覺其苦服自仍帶黃議清

肺中氣熱治

百部

大沙參

鮮枇杷葉

活水蘆根

川貝

地骨皮

南花粉

苡仁

徐五老勞咽疼

生雞子白

糯稻根鬚

甜北沙參

一錢

炒麥冬

川石斛

生甘草

一放

水浸五錢

半

錢

楊

未病陰氣走洩為虛穢濁上受則實咽喉腫痺上敷邪蒙日暮昏煩陰傷日熾肌膚柔白氣分不足此醫藥雖宜涼解清上但不可犯及中下

連翹

鬱金

馬勃

半蒴子

竹葉心

黑山梔

杏仁

橘紅

艾

上焦之病都是氣分氣窒則上下不通而中宮遂脹

熱氣蒸灼喉舌疔蝕清氣之中必佐解毒皆受重藥之

累瘵

銀花二錢

川貝三錢

馬兜鈴

五分

連翹心

一分

川通草

錢

白金汁

一杯

活水蘆根汁

半杯

咽喉

齒

又 餘熱蒸痰壅氣當腕膈因咳而痛議以潤降清肅

甜杏仁 花粉 川貝 甘草 桔梗

厚麻火

孫<sup>四</sup>九 腎液不收肝陽上越巔脹流涕咽喉微痛

六味加牛膝車前五味

五<sup>四</sup>六 咽喉痛痺發時如有物阻膈甚至痛連心下每晚加

劇是陰液日枯肝臟厥陽化火風上灼法以柔劑倣甘

以緩其急耳

細生地 天冬 阿膠 生雞子黃

玄參心 糯稻根鬚

陳<sup>二</sup>七 陰陽交虛營衛欹斜為忽冷忽熱周身骸骨皆痛百

脉皆損。秋半天氣已降。身中氣反泄。越汗出。喉痺。陽不入於陰。致自爲動搏耳。夫咽喉之患。久則喉痺。喉宜妨阻。受納最不易治。從少陰咽喉例。用猪膚湯旬日。喉痛得緩。對症轉方。

張三陰損三年不復。入夏咽喉拒納。寒涼清咽。反加泄瀉。則知龍相上騰。若電光火灼。雖傾盆暴雨。不能撲滅。必身中陰陽協和方息。此草木無情難效耳。從仲景少陰咽痛用猪膚湯主之。

又陰濁於下。陽熾於上。爲少陰喉痛。乃損怯之末傳。用猪膚甘涼益坎。有情之屬而效。今肉糜消糜殆盡。



焦易冷髓空極矣何服以疾嗽為理議滑澹之補味藏

入腎可也

牛骨髓

羊骨髓

猪骨髓

麋角膠

用建蓮肉五兩山藥五兩芡實二兩同搗丸

金二臟液不充陽氣虛風鼓動病起喉辣心震頻頻舉發

多因勞怒用內經甘緩一法

人參

萸肉炭

白芍

炙甘草

茯神

小麥

又入復脈湯去桂

內經云一陰一陽結謂之喉痺一陰者手少陰君火

心之脉氣也。一陽者。手少陽相火。三焦之脉氣也。夫  
二經之脉并絡於喉。故氣熱則內結。結甚則腫脹。脹  
甚則痺。痺甚則不通而死矣。卽今之所謂喉癰喉風  
喉蛾等類是也。夫推原十二經。惟足太陽別下項。其  
餘皆湊咽喉。然內經獨言一陰一陽結爲喉痺者。何  
也。蓋以君相二火獨勝。則熱且痛也。愚歷攷咽喉湯  
方。皆用辛散。鹹軟。去風痰。解熱毒爲主。如玄參升麻  
湯。聖濟透關散。及玉鑰匙。如聖散。普濟消毒飲子。皆  
急於治標。而緩於治本。恐緩則傷人。故以治標爲急  
耳。又嘗考仲景傷寒論。咽喉生瘡等症。每用甘草結

梗半夏散及湯爲主。一爲少陰水虧不能上濟君火。以致咽喉生瘡不能出聲。故以半夏之辛滑佐雞子清利竅。暹聲使以苦酒入陰。劫涎斂瘡。桂枝解肌。由經脈而出肌表。悉從太陽開發。而半夏治咽喉痛。可無燥津涸液之患。一爲陰火上結而爲咽痛。故用生甘草甘涼泄熱。功在緩腎急而救陰液。佐以桔梗開提足少陰之熱邪。如腎液下泄不能上蒸於肺。致絡燥而爲咽痛者。仲景又有猪膚一法。潤燥解熱。緩中。使其陰陽協和而後愈。是固本而兼治標者也。如風火上壽。陰虧脈數而爲咽痛者。先生又有辛涼清上諸

法如咽喉緊痺氣熱而為咽痛者又有清肺中氣熱

一法如情志鬱勃相火上炎而為咽痛者則又有降

楊九氣開濁法如腎液不收肝傷吐越而為咽痛者宗

味錢氏芍味湯如陰陽交虛龍相壯灼而為咽痛者宗

當伸景豬膏湯法鄒滋丸如金匱麥門冬湯去半夏加

黃芪皮

吳八脈不浮大非關外風初起右掌二指已不用伸頤

身半以上常有瘡疱之形此乃陽明脈絡內留濕熱

非瀉氣吸入定然食物中毒姑與宣解緩攻

連入

犀角

赤芍

酒燉大黃

叔半夏散火湯為主一為少陰水虧不能上濟君火  
 以致咽喉生瘡不能出聲故以半夏之辛潤佐雞子  
 清利竅通聲使以苦酒入陰劫濕飲藥桂枝湯以  
 經脈而出肌表悉從太陽開發而半夏治咽喉閉  
 燥津涸液之患一為陰火上結而為咽喉閉故用生甘  
 草以清其熱此則為救陰液佐以桔梗開提  
 逆氣之陰和芍藥以和氣交識諸淋止飲而為即識者宗  
 深則識一法為取實如不知則則止此而為識識者宗  
 一法為取實如不知則則止此而為識識者宗  
 去痰即如製藥於痰熱而為即識者又食飲中痰熱

瘡

# 瘡瘍

楊九瘡瘍四肢偏多。長夏入秋。懶倦欲眠。乾咳無痰。頗知

味。所納已少。此陽明胃陰。因熱致耗。卽熱傷元氣之徵。

當與甘藥。養胃陰。以供肺。如金匱麥門冬湯。去半夏。加

黃芪皮

吳十脉不浮大。非關外風。初起右掌二指已。不屈伸。頭面

身半以上。常有瘡疱之形。此乃陽明脉絡。內留濕熱。若

非癘氣吸入。定然食物中毒。姑與宣解緩攻。

蓮翹

犀角

赤芍

酒燉大黃

荆芥

片薑黃

又其能食。二便通調。臟腑無病。初因膿瘡。瘡愈有泡。自面及肢體。至於右指掌屈伸皆痛。為脈絡留邪。以致隧道為壅。前方辛涼入血。先升後降。已得小效。今製清脈絡壅熱。藉酒力以引導。通行營衛。亦一法也。

銀花

連翹

犀角

生大黃

荆芥

丹皮

黃芩

川芎

當歸

澤蘭

羚羊角

大豆黃卷

用無灰酒十觔浸

金

四六

血舍空隙。內風蠕動。外以熱湯泡洗。濕熱蒸襲肌竅。

遂有裂膿流水。况周身漸加麻痺。陽脈亦衰。圖治之法。

清營以熄內風。疎利濕熱以肅隧道。辟辣腥鮮勿進。尚  
可緩以計功。

製首烏 鮮生地 柏子仁 川斛 黑穠豆皮

虎骨 蚕沙 黃柏 葶藶 熬膏

吳 瘡痍之後。濕熱未去。壅阻隧道。水穀下咽。亦化爲痰。  
中焦受病。故不知飢餓。痰氣上干。漸至喘悶矣。但服藥  
四十劑。純是破氣消寇。胃陽受傷。痰氣愈不得去矣。

半夏 茯苓 紫老薑 炒粳米

又 瘡痍大發。營衛行動於脉中。脉外可免腹滿之累矣。  
第穀食尙未安適。猶是苦劣多進之故。胃陽未復。仍以

臨證錄 瘡瘍 完



通調利濕法之

半夏

苡仁

金石斛

茯苓

澤瀉

秦七七十久熱瘡痍五六年瘰癧口燥裂湯瀉莖痛

鮮生地

熟首烏

丹皮

丹參

羌蔚子

銀花

地丁

紫草

共熬膏

王 血熱風動膚癢

荆芥

防風

地膚子

赤芍

銀花

小生地

木通

甘草

張三初因嘔吐是肝胃不和致病故辛香剛燥愈劇然久

病必入血絡熱則久瘡不愈矣夫木火皆令燥液易飢

易飽間有嘔逆。斯胃病仍在。凡呆滯藥味皆非對症。

三角胡麻 冬桑葉 生首烏 杏仁 鬱金

佩蘭葉 茯苓 苡仁 熬自然膏

楊五 身瘦久瘡。血分有熱。精通之年。最宜安養。脉象非有

病

生首烏 三兩 三角胡麻 一兩五錢 細生地 四兩

地骨皮 二兩 金銀花 二兩 丹皮 二兩 生白芍 二兩

生甘草 一兩 蜜丸早服

王三 脉來濡浮久瘡變幻未罷。是衛陽疎豁。不耐寒暄。初

受客邪不解。混處氣血。浸淫僅在陽分。肌腠之患。議升

舉一法氣壯斯風濕盡驅。

人參

生黃芪

川芎

當歸

防風

僵蚕

蟬脫

炙草

生薑

大棗

蔣四歲鼻瘡口瘡尿黃膚熱

冬瓜皮

苡仁

鄒三四痰因於濕久而變熱壅於經隧變現瘡疾疥癬已醱

風濕之毒混在氣血之中邪正混處搜逐難驅四肢為

甚姑從陽明升降法

連翹

赤芍

白僵蚕

白蘚皮

防風

升麻

滑石

酒浸大黃

汪氏 風熱既久未解化成瘡癩當以和血驅風

當歸

赤芍

川芎

夏枯草花

牛蒡子

製僵蚕

金

頭顛熱癩未能泄邪此身熱皆成膿之象辛涼兼理

氣血可愈

連翹

犀角

銀花

丹皮

玄參

生甘草

青菊葉

某

風熱毒閉項後腫

竹葉

滑石

蘆根

牛蒡

馬勃

薄荷葉

黑山梔

連翹

川貝

生甘草

風熱項

加

瘡瘍

全

王 疔毒咯血失血都是暑入陰傷

竹葉心

玄參心

鮮生地

黑穠豆皮

麥冬

知母

核 痰 瘰 癧

屠 三 秋 癩 半 年 未 愈 瘰 癧 堅 硬 痛 瘍 膿 鬱 久 成 熱 腑 經 病 可

冀其愈

夏枯草

香附

茯苓

苡仁

川貝

丹皮

糜 氏 頸項結核。癩。膨足。腫。肝木犯中痰氣凝滯。

夏枯草

牡蠣

澤瀉

茯苓

半夏

厚朴

橘紅

神麩

兩 三

兩 二

兩 一

兩 一

生香附一兩水磨汁泛丸

某 氣鬱痰核

夏枯草

生香附

丹皮

山梔

連翹

鬱金

赤芍

藕紅

王四脉左數右長頸項結癭時衄

生地

丹皮

犀角

生夏枯草

生鈎藤

黑山梔

土貝母

生薄荷

陳 躁急善怒氣火結癭燥筋為痛熱鬱化風氣阻痺塞

則腹鳴脘脹苟非開懷歡暢不能向安

土貝母

山梔

瓜蒌皮

鬱金

瘡瘍

全

白芥子

海藻

昆布

夏枯草

沈氏 肝氣鬱遏。宿痞乳癰。

川棟子

夏枯草

薄荷梗

丹皮

黑山梔

瓜蒌實

青橘葉

香附汁

劉氏 乳房為少陽脈絡經行之所。此經氣血皆少。由情懷

失暢而氣血鬱滯。有形而痛。當治在絡。恐年歲日加。竟

成沉痾。非癰膿之症。以脈不浮數。無寒熱辨之。

柴胡

夏枯草

歸身

白芍

川貝

茯苓

甘草

某氏 乳房結核。是少陽之結。此經絡氣血皆薄。攻之非易。

恐產育有年。釀為瘍症耳。

青蒿

香附

橘葉

青菊葉

丹皮

澤蘭

鬱金

當歸鬚

孫

因嗔忿失血以來。致頸項左右筋腫。痛連背部。此屬

鬱傷氣血。經脈流行失司。已經百日不痊。竟有流注潰

膿延綿之憂。治在少陽陽明。

小生香附

夏枯草

鮮菊葉

薄荷梗

栗山樞

鈎藤

丹皮

鬱金

陳

脈左數實。血絡有熱。暑風濕氣外加。遂發疹塊。壅腫

搔癢。是屬暑湯。



杏仁

連翹

滑石

寒水石

銀花

晚蚕沙

黃柏

防已

程

瘍毒熱症與參芪不效。即當清解。為是消導。亦是未

合。今者身熱正。瞋神識欲昏。便溏溺赤。煩渴。是暑氣攻

入。內侵肺胃。有痲。厥之變。昨用宣肺解毒。雖與暑邪無

益。然亦無害。若加黃芪。又屬相反。大凡熱氣蒙閉。清竅

都令神昏。當以牛黃清心丸。清痰氣之阻。使其竅開。况

暑門中。大有是法。與解毒勿悖矣。

李

初病濕熱在經。久則痲熱入絡。膿瘍日多。未已。漸至

筋骨熱痛。金匱云。經熱則痺。絡熱則痲。數年宿病。勿事

速攻。

犀角

連翹心

玄參

丹參

野赤豆皮

細生地

薑黃

桑枝

午服

夜服蒺藜丸

某

七瀡瘍服涼藥陽傷氣阻腕悶不運腹膨最怕瘍毒內

閉急宜通陽

厚朴

廣皮

薑皮

茯苓皮

連皮杏仁

桂枝木

澤瀉

大腹皮

某

服瘍科寒凝之藥以致氣冲作脹喘急不卧無非濁

陰上攻議來復丹

顧

五脈微小潰瘍半月餘腫未消膿水清稀浮腫汗出嘔

潰瘍

臨登百病醫案

卷一 瘡瘍

七

惡惡食。此胃陽垂敗。癰毒內攻。欲脫。夫陽失煦。則陰液不承。元氣撒。則毒愈瀰漫。清解苦寒。究竟斲伐。生陽護甘。溫胃受培植。其本莫陷者。復振。余非瘍醫。按色脈以推其理耳。加桂理中湯。

姚姬潰瘍久不癒。氣血耗盡。中宮營液枯涸。氣不旋轉。得湯飲則痰涎上湧。勢如噎膈。况久恙。若是藥餌難挽。勉擬方。

人參 炮麥冬 桑椹 代赭石 化橘紅

胡 納食主胃。運化主脾。癰瘍痛潰。臥床不得舒展。臟腑氣機呆鈍。何疑外科守定成方。甚木歸地。不能補托氣。

血反壅滯於裏。出納之權交失。且是症乃水穀濕氣下  
垂而致。結於足厥陰手陽明之界。若濕熱不為盡驅。藉  
補托以冀生機。養賊貽害。焉能濟事。

金石斛

錢五

槐米

錢一

金銀花

錢三

茯苓

錢一

晚蚕沙

錢二

寒水石

錢二

徐 營傷心。棘納食無味。此瘍痛大虛。當調其中。

人參

歸身

炒白芍

木瓜

熟朮

廣皮

茯神

炙草

某 膿血去多。痛猶未息。胃傷不嗜。口無味。左關尺細

弱無力。正虛之著。據理進藥。仍宜補托。

臨證

瘡瘍

全

人參 熟地 玉竹 柏子仁 歸身

某 丹參 茯神 棗仁 遠志

某 癆潰膿血去多。元真大耗。脉無力。不嗜食。惡心中煩。

不振。寐則驚惕。神不守也。以養營法。

人參 熟朮 廣皮 茯神 炙草

歸身 白芍 五味 棗仁

某 八歲 癆損能食。身熱。六味湯加青蒿節。

曹 三 因癆漏過進寒涼。遂患腰痛。牽引脊脊。今晨起。周身

不得自如。乃經脉絡脉之中。氣血流行失暢。久病諒非

攻逐議兩和方法。

癆漏

羚羊角

當歸

黃芪

白茯苓

桂枝

桑枝

顧瀉瀉傷不合成漏脂液滲去必腸絡空隙內風暗動攻胃則嘔逆吞酸腹痛泄瀉不食津液不升舌焦黑不渴飲內外兼病難治之症

人參一錢同煎

炒烏梅肉五分

炒黑川椒三分 茯苓三錢

生淡薑五分

炒廣皮一錢

白芍一錢

顧久損漏瀉胃減腹痛議用戎已湯意

人參

茯神

白芍

炙草

炒菟絲子

王五痛久屈伸不得自如經脈絡脈呆鈍氣痺血瘀

原滄

瘡瘍

矣

王上熱旬日頻頻大便必有血下。復喘促煩躁不飢不食。竝無寒熱汗出全是鉤結在裏欲作內癰之象。部位屬左之上。內應乎肝。癰者壅也。血結必入於絡。吐痰口氣皆臭。內癰已見一斑矣。

炒桃仁

新絳

降香末

野鬱金汁

紫苑

冬瓜子

金銀花

某 臍旁紫黑。先厥後熱。少腹痛如刀割。二便皆澀。兩足筋縮。有腸癰之處。

老韭白

兩頭尖

小茴香

當歸鬚

炙山甲

某

舌焦黃。小腹堅滿。小便不利。兩足皆痠。濕熱結聚。六

腑不通。有腸癰之慮。

川棟子 小茴 丹皮 山梔

通草 青葱

某 壯熱旬日。周身筋脉牽掣。少腹堅硬。小便淋漓。忽冷忽熱。欲讓膿血。乃腸癰為病。倣孫真人牡丹皮大黃湯主之。

戴九疔瘡下血。濕熱居多。今色衰微。顯是虛寒。無速效法。則當補脾胃。因疔瘡猶痛。腫勢尙存。佐以淡滲通腑。

生於朮 生菟絲粉 生象牙末 生白蟻

外症本有專科。先生並非瘍醫。然觀其憑理立方。已

瘡瘍



勝專科什伯矣。惜其案無多法，亦未備。余不敘述太  
凡瘍症，雖發於表，而病根則在於裏。能明陰陽虛實  
寒熱經絡俞穴，大症化外，小症化無，善於消散者，此  
爲上工。其次能審明五善七惡，循理用藥，其刀鍼砭  
割手法靈活，敷貼薰洗，悉遵古方，雖潰易斂，此爲中  
工。更有不察症之陰陽虛實，及因鬱則營衛不和，致  
氣血凝滯，釀成瘍症，但知概用苦寒攻逐，名爲清火  
消毒，實則敗胃戕生，迨至胃氣一敗，則變症蜂起矣。  
又有藉稱以毒攻毒秘方，類聚毒藥，合就丹丸，隨症  
亂投，希冀取效于目前，不顧貽禍於後日，及問其

絡部位。症之順逆。概屬茫然。此始下工之不如也。至於外治之法。瘍科尤當究心。若其人好學深思博聞。廣記隨在留心。一有所聞。卽筆之於書。更能博覽醫籍。搜採古法。海上實有單方家傳。豈無神秘。其所製敷貼膏丹。俱臨症歷試。百治百驗。能隨手應效者。卽上工遇之。亦當爲之遜一等矣。

華玉堂