

本經逢原

本經逢原目錄

卷之一

水部

諸水

火部

諸火

土部

諸土

金部

金

赤銅

鈎青

自然銅

古文錢

鉛

鉛粉

鉛丹

密陀僧

錫

鐵落

鐵砂

鐵精

鐵繡

石部

玉

雲母

白石英

紫石英

丹砂

銀硃

水銀

輕粉

靈砂

雄黃

雌黃

石膏

粗理黃石

滑石

石脂

爐甘石

無名異

石鍾乳

附孔公孽

石灰

浮石

陽起石

慈石

代赭石

禹餘糧

空青

曾青

綠青

扁青

石膽

礬石

砒石

礞石

花蕊石

河沙

石燕

石蟹

蛇黃

附蛇
舍石

霹靂礮

鹵石部

食鹽

戎鹽 卽青
鹽

鹵鹼

凝水石

立精石

朴消

立明粉

風化消

硝石

礪砂

蓬砂

石硫黃

礬石

綠礬

山草部

甘草

黃耆

人參

沙參

桔梗

黃精

葳蕤

知母

肉蓯蓉

天麻

白朮

蒼朮

狗脊

貫眾

巴戟天

遠志

淫羊藿

仙茅

玄參

地榆

丹參

紫參

紫草

白頭翁

白芨

三七

黃連

胡黃連

黃芩

秦艽

柴胡

銀柴胡

前胡

防風

獨活

羌活

升麻

苦參

白蘚皮

延胡索

貝母

山慈姑

白茅根

草龍膽

細辛

杜衡

白微

白前

卷之二

芳草部

當歸

芎藭

撫芎

蛇牀

藁本

白芷

白芍藥

赤芍藥

牡丹皮

木香

甘松香

山柰

高良薑

草豆蔻

草果

白豆蔻

縮砂密

益智子

萹芡

蒟葉

肉豆蔻

補骨脂

薑黃

鬱金

蓬莪茂

荊三稜

香附

茉莉

排草

藿香

薰香

蘭香

澤蘭

本草綱目卷之六

亥醫國字初階

馬蘭

香薷

爵牀

荊芥

紫蘇

蘇子

水蘇

薄荷

隰草部

菊

艾

茵陳蒿

青蒿

茺蔚

薇銜

夏枯草

劉寄奴

旋覆花

青葙子

紅藍花

臙脂

大薊小薊

續斷

漏蘆

芋根黃麻

胡蘆巴

惡實

蒼耳

天名精

鶴蝨

豨薟

箬

蘆根

甘蕉

蘘荷

麻黃

木賊

石龍芻

燈心

生地黃

乾地黃

熟地黃

牛膝

紫苑

麥門冬

本草綱目卷之九
刻醫學初階

萱草

淡竹葉

冬葵子

蜀葵花

秋葵子

龍葵

酸漿

敗醬草

款冬花

鼠麴草

決明子

地膚子

瞿麥

王不留行

葶藶

車前子

馬鞭草

光明草

鱧腸草

連翹

陸英

藍實

大青
小青

青黛

蓼子

篇蓄

白蒺藜

沙苑蒺藜

穀精草

海金沙

地椒

半邊蓮

地丁

見腫消

毒草部

大黃

商陸

狼毒

狼牙

防葵

藺茹

大戟

澤漆

甘遂

續隨子

葇菑子

蓖麻子

常山

蜀漆

藜蘆

附子

川烏

天雄

側子

草烏

射罔

白附子

天南星

半夏

蚤休

鬼臼

射干

玉簪根

鳳仙子

曼陀羅花

羊躑躅

芫花

蕘花

莽草

茵芋

鈎吻

蔓草部

兔絲子

五味子

覆盆子

使君子

木鼈子

馬兜鈴

青木香

預知子

牽牛

紫葳

施花

薔薇
營實

月季花

栝萋實

栝萋根

土瓜根

葛根

天門冬

百部

何首烏

華薜

之絲...

刻醫學初階

土茯苓

白蘂

山豆根

黃藥子

白藥子

葳靈儂

茜草

防己

木通

通草

鈎藤

木蓮

紫葛

葎草

忍冬

清風藤

藤黃

水草部

澤瀉

羊蹄根

石菖蒲

蒲黃

苦草

水萍

蓴

海藻

昆布

石草部

石斛

骨碎補

石葦

景天

石胡荽

地錦

苔草部

陟釐

石蘘

卷栢

馬勃

倒掛草

苔

卷之三

穀部

諸米

諸麥

諸豆

胡麻

亞麻

麻子仁

薏苡仁

嬰粟殼

阿芙蓉

蒸餅

神麴

紅酒麴

飴糖

醋

酒

菜部

本草綱目卷之九

本草綱目卷之九

韭

薤

葱

蒜

薑

白芥子

蕪青

萊菔

生薑

乾薑

胡荽

藜香

蕪菜

波菜

蕪菜

同蒿

芥菜子

莧子

馬齒莧

翻白草根

蒲公英

落葵

蕪菜

蕪

黃獨

薯蕷

百合

茄

苦瓠

冬瓜子

越瓜

胡瓜

南瓜

絲瓜

苦瓜

紫菜

石花菜

木耳

桑耳

香蕈

麻姑
雞蹏

土蕈

果部

李根白皮

杏仁

梅

本草綱目卷之九

刻醫學初階

桃仁白

栗

棗

梨

木瓜

山楂

柰

林檎

柿蒂

安石榴

橘皮

青皮

橘核

橘葉

柑

橙

柚

柑櫞

金橘

枇杷葉

楊梅

櫻桃

銀杏

胡桃

長生果

貧貧葡萄

橡實

槲皮

荔枝

龍眼

橄欖

榧子

松子

刺馬檳榔

大腹子

大腹皮

檳榔

無花果

枳椇

水果部

西瓜

瓜子仁

甜瓜蒂

甜瓜仁

葡萄

甘蔗

之糸...
一刻醫學初階

沙糖

石蜜

蓮藕

蓮實

石蓮子

蓮鬚

蓮房

荷葉

芡實

芡實

烏芋

慈姑

味部

蜀椒

秦椒

椒目

豬椒根

胡椒

畢澄茄

吳茱萸

食茱萸

茗

香木部

栢子仁

栢葉節油

松脂

松節

杉

肉桂

桂心

牡桂

筒桂

桂枝

辛荑

沈香蜜香

丁香丁皮

旃檀

紫檀

降真香

烏藥

茴香

楓香脂

薰陸香

沒藥

麒麟竭

安息香

蘇合香

龍腦香

樟腦

阿魏

蘆薈

喬木部

黃蘗 小蘗

厚朴

杜仲

椿樗根皮

乾漆

梓白皮

梧葉皮

桐實

海桐皮

川棟子

槐實

槐花

本草綱目卷之九 木部 藥部

秦皮

合歡皮

皂莢

皂角刺

肥皂莢

無患子

沒石子

訶黎勒

柳華

檉柳

水楊

榆根白皮

蕪荑

蘇方木

樺木皮

櫻櫚

烏柏根

巴豆

大風子

相思子

灌木部

本草綱目卷之...
刻醫學初階

桑根白皮

桑椹

桑葉

桑枝

柘根白皮

楮實

枳殼

枳實

枸橘

梔子

酸棗仁

白棘

蕤仁

山茱萸

金櫻子

郁李仁

鼠李子

女貞實

枸骨

衛矛

南燭

五加皮

枸杞

地骨皮

溲疏

石南

牡荆

蔓荆子

紫荆皮

木槿皮

芙蓉

山茶

密蒙

木棉

柞木

黃楊

放杖水

接骨木

寓木部

茯苓

茯神

琥珀

豬苓

雷丸

桑寄生

松蘿

苞木部

竹葉

竹茹

竹瀝

笋

竹黃

震燒木

藏器部

錦

袴褶

裏脚布

鑿柄

弓弩弦

敗蒲扇

蒲蓆

漆器

燈盞油

炊單布

敗鼓皮

卷之四

蟲部

蜂蜜

蜜蠟

露蜂房

蠟螞

蟲白蠟

紫鈔

五倍子

桑螵蛸

雀甕

原蠶蛾

白殭蠶

蠶繭

蠶退

蠶沙

九香蟲

雪蠶

蜻蛉

樗雞

芫青

蟹螯

葛上亭長

地膽

蜘蛛

壁錢

蝥

水蛭

蛆

狗蠅

蟻螯

桑蠹蟲

桃蠹蟲

蚱蟬

蟬蛻

蜚蠊

天牛

螻蛄

螢火

衣魚

鼠婦

麤蟲

蜚蠊

即蠹蟲

蟾蜍

蟾酥

蟹墓

蛙

蚪蚪

蜈蚣

蚯蚓

蝸牛

龍蛇部

龍骨

龍齒

龍角

鼈甲

鯪鯉甲

石龍子

守宮

蛤蚧

蛇蛻

蝮蛇膽

白花蛇

烏蛇

蝮蛇

魚部

鯉魚

鱣魚

青魚

鱧魚

濶口魚

鰻魚

白魚

石首魚

白鯊

鱈膠

勒魚

鱒魚

嘉魚

鮠魚

鯽魚

石斑魚

鱠殘魚

海粉

燕窩

鱸魚

鰕魚

鱧魚

鰻鱺

鱒魚

甲魚

鱒魚

鱖魚

黃頰魚

江鱗

河豚

江豚

比目魚

鮫魚

烏賊骨

鮑魚

海馬

蝦

介部

本草綱目卷一

二刻醫學初階

龜板膽汁

玳瑁

鼈甲

鼈甲

蟹

鱉

牡蠣

蚌

眞珠

石決明

文蛤

蛤蜊

蛭

魁蛤殼卽瓦楞子

車螯

貝子

石蠅

淡菜

海蠃甲煎

田蠃

寄居蟲

卽君子

禽部

鶴頂

鶴骨

鵝鵝

鶻鶻

鵝

雁

鳴

鳥

雞

雉

烏鴉

鵲

鷓鴣

鶻

鴿

鶯

雀卵

伏翼

五靈脂

斑鳩

伯勞

鸚鵡

啄木鳥

鷓鴣

鷹屎白

鷓鴣

鷓鴣

鴉

鴉

鴉

獸部

豬

狗

羊

羖羊角

牛

馬

驢

駝

酪

酥

阿膠

黃明膠

牛黃

狗寶

獅油

虎骨

象皮

犀角

熊脂

熊膽

麝羊角

山羊血

鹿茸

鹿角膠

鹿胎

麋茸

麋鹿肉

麝

麝香

貓

狸

獐

兔

狐

水獺肝

山獺莖

臙胸臙

鼠

刺蝟皮

人部

髮

頭垢

乳汁

爪甲

人牙

人中黃

金汁

乾糞灰

溺

溺白塗

秋石

紅鉛

天靈蓋

人胞

胞衣水

初生臙

胎元

本經逢原卷二

清 長洲石頑張 璐路玉父纂述

男 以柔安世 參訂

訥遜言

日本 大泉長菴前田安宅子仁

再訂

男 典子守

芳草部

當歸 甘辛温無毒蜀產者力剛可攻秦產者力柔

可補凡治本病酒製有痰薑汁製白者爲粉歸性劣
不入補劑

本經主欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏
下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之

發明 當歸氣味俱厚可升可降入手少陰足太陰
厥陰血分凡血受病及諸病夜甚必須用之本經主
欬逆上氣溫瘧寒熱洒洒婦人漏下絕子皆取辛溫
潤血之功產後惡血上衝亦必用之別錄溫中止痛

甄權治下利腹痛女人瀝血腰痛好古治衝脈爲病
逆氣裏急帶脈爲病腹痛腰溶溶若坐水中其功專
於破惡血養新血潤腸胃榮筋骨澤皮膚理癰疽排
膿止痛蓋血壅而不流則痛當歸甘溫能和營血辛
溫能散內寒使氣血各有所歸入手少陰心主血也
入足太陰脾裏血也入足厥陰肝藏血也身能養血
尾能行血同人參黃耆則補氣而生血同牽牛大黃
則行氣而瀉血同桂附吳萸則熱同大黃芒硝則寒

血虛以人參赤脂爲佐血熱以生地條芩爲佐仲景
治陽邪陷陰手足厥寒脈細欲絕用當歸四逆湯於
桂枝湯加當歸細辛通草以通其血脈卽下痢脈大
氣不歸附亦用此湯以歸附之凡血虛發熱者宜當
歸補血湯方用當歸三錢黃耆一兩作三服心下刺
痛者一味當歸酒煎服專主血分諸病海藏言當歸
血藥何本經治欬逆上氣按當歸辛散乃血中氣藥
故欬逆上氣有陰虛陽無所附者用血藥補陰則血

和而氣降矣凡衝任督帶病皆不可少惟泄瀉家痰飲家禁用

芎藭

綱目名
川芎

辛溫無毒蜀產者味辛而甘爲上他

處產者氣味辛烈爲下反藜蘆葉名薜蘿

本經主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子

發明 芎藭辛溫上升入肝經行衝脈血中理氣藥

也故本經治中風入腦頭痛等證取其辛散血分諸

邪也好古言搜肝氣補肝血潤肝燥補風虛又治一切風氣血氣及面上遊風目疾多淚上行頭目下行血海故四物湯用之者皆搜肝經之風治少陽厥陰頭痛及血虛頭痛之聖藥助清陽之氣去溼氣在頭頭痛必用之藥血痢已通而痛不止乃陰虧氣鬱藥中加芎藭氣行血調其痛立止靈苑方驗胎法以生芎藭末艾湯服一錢七腹中微動者爲胎千金方治子死腹中以芎藭末酒調方寸匙須臾二三服立出

凡骨蒸盜汗陰虛火炎欬吐逆及氣弱之人不可服其性辛散令真氣走洩而陰愈虛也

撫芎 辛溫無毒產江左撫州中心有孔者是

發明 撫芎升散專於開鬱寬胸通行經絡鬱在中焦則胸膈痞滿作痛須撫芎開提其氣以升之氣升則鬱自降故撫芎總解諸鬱直達三焦爲通陰陽氣血之使然久服耗氣令人暴亡

蛇牀 苦辛溫無毒

本經主男子陰痿溼癢婦人陰中腫痛除痺氣利關節癩癧惡瘡

發明 蛇牀辛香性溫專入右腎命門少陽三焦氣分本經列之上品不獨助男子壯火且能散婦人鬱抑非妙達本經精義不能得從治之法也但腎火易動陽強精不固者勿服

藁本 辛苦溫無毒香而燥者良臭而潤者勿用
本經主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長

肌肉悅顏色

發明 藁本性升屬陽爲足太陽寒鬱經中頭項顛

頂痛及大寒犯腦連齒頰痛之專藥女人陰腫疝疼
督脈爲病脊強而厥亦多用之霧露之邪中於上焦
須兼木香風客於胃泄瀉脾胃藥中宜加用之今人
只知藁本爲治巔頂頭腦之藥而本經治婦人疝瘕
腹中急陰中寒等證皆太陽經寒溼爲病亦屬客邪
內犯之候故用藁本去風除溼則中外之疾皆瘳豈

特除風頭痛而已哉云長肌肉悅顏色者外用作面
脂之類是也但頭痛挾內熱春夏溫病熱病頭痛口
渴及產後血虛火炎頭痛皆不可服

白芷

卽都梁香

辛苦溫無毒

本經主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱頭風侵目淚
出長肌膚潤澤顏色可作面脂

發明 白芷辛香升發行手陽明性溫氣厚行足陽
明芳香上達入手太陰爲解利陽明風熱頭痛及寒

熱頭風侵目淚出之要藥其所主之病不離三經如
寒熱頭風眉稜骨痛頭目齒痛三經之風熱也漏下
赤白癰疽頭面皮膚風痺燥癢三經之溼熱也風熱
者辛以散之溼熱者溫以除之都梁丸治崩漏赤白
深得本經之旨性善祛風女人漏下赤白皆風入胞
門所致辛香入脾故又能溫散血閉陰腫及寒熱頭
風侵目淚出總取辛散利竅之功其長肌膚潤澤顏
色者則有排膿長肉之力所以外科用之痘疹起脹

連皮腫者於解毒藥內用之預杜將來發癢之患今
人用治腸癰有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂致臍腹
冷痛須此排膿膿盡乃以他藥補之燒煙辟蟲蛇爲
末新汲水調頻灌解蛇毒內攻和膽礬麝香摻蛇傷
潰爛但性溫而升味苦而散故嘔吐因於熱者漏下
赤白因於火者勿用癰疽潰後亦宜漸減以其能耗
胃氣也

白芍藥

酸苦平微寒無毒入補脾藥酒炒入止血

藥醋炒入和營藥及下利後重血熱癰毒並酒洗生
用入血虛水腫腹脹藥桂酒製用反藜蘆

本經主邪氣腹痛除血痺利小便益氣

發明 白芍藥酸寒斂津液而護營血收陰氣而瀉

熱邪蓋瀉肝之邪熱所以補脾之陰卽本經主邪氣
腹痛益氣之謂故仲景以爲補營首藥入肝脾血分
及陽維寒熱帶脈腹痛補中下二焦能於土中瀉木
爲血痢必用之藥然須兼桂用之方得斂中寓散之

義建中湯之妙用人所不知蓋瀉痢皆太陰之病建
中專主太陰腹痛也其治血痺黃者桂枝五物湯中
用之非深達本經妙理者不能也又得炙甘草治腹
中急痛同白朮補脾同芎藭瀉肝從人參補血虛從
黃連止瀉痢同薑棗溫經散溼在用者各得其宜耳
凡人陽氣虛衰陰氣散漫患腹脹滿急於補中益氣
藥中加白芍藥一味以收陰則陽虛不受陰制之脹
得陽藥便消矣然氣虛內寒者不可用古云減芍藥

以避中寒誠不可忽產後不可用以其酸寒瀉肝伐
生發之氣也小便不利者禁用以膀胱得酸收斂愈
祕也而真武湯中又用以利小便者深得本經之旨
蓋真武湯本治少陰精傷而證見虛寒非太陽膀胱
癱閉之候以其能益陰滋血培養津液小便自行非
通利也至於桂枝湯中用以護營血使邪不得內犯
建中湯中用以培土藏而治陽邪內陷腹痛此皆仲
景用藥之微妙端不外本經之義其除血痺破堅積

治寒熱疝瘕止痛利小便皆指赤者而言與白芍無
預因本經未分赤白故一貫例之

赤芍藥 酸苦微寒無毒酒洗用

本經除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便

發明 赤芍藥性專下氣故止痛不減當歸蘇恭以

爲赤者利小便下氣白者止痛和血端不出本經除
血痺破堅積止痛利小便之旨其主寒熱疝瘕者善
行血中之滯也故有瘀血畱著作痛者宜之非若白

者酸寒收斂也其治血痺利小便之功赤白皆得應用要在配合之神乃著奇勩耳

牡丹皮 苦辛平無毒酒洗去鹼土曝乾勿見火

本經主寒熱中風癰瘰驚癇邪氣除癥堅瘀血畱舍腸胃五臟療癰瘡

發明 牡丹皮入手足少陰厥陰治血中伏火故相火勝腎無汗骨蒸爲專藥本經主寒熱中風癰瘰驚癇等證以其味辛氣竄能開發陷伏之邪外散惟自

汗多者勿用爲能走泄津液也痘疹初起勿用爲其
性專散血不無根脚散闊之慮王安道云志不足者
足少陰病也故仲景腎氣丸用之後人惟知黃蘗治
相火不知丹皮之功更勝也又癥堅瘀血畱舍腸胃
五藏及陰虛吐血衄血必用之藥以能行瘀血而又
能安好血有破積生新引血歸經之功故犀角地黃
湯用之凡婦人血崩及經行過期不淨屬虛寒者禁
用又赤者利血白兼補氣亦如赤白芍藥之義諸家

言其性寒安有辛香而寒者乎

木香 辛苦温無毒形如枯骨味苦色淡黃者良味
鹹色黑勿用生用理氣煨熟止瀉

本經主邪氣辟毒疫強志主淋露

發明 木香氣香味厚不獨沈而下降蓋能理胃以
下氣滯乃三焦氣分之藥兼入肺脾肝三經能升降
諸氣故上焦氣滯臆鬱宜之者金鬱則泄之也然雖
入肺而肺燥氣上者良非所宜其中焦氣滯不運宜

之者以脾胃喜芳香也下焦氣滯後重宜之者塞者
通之也若治中脘氣滯不運心腹疼痛以檳榔佐之
使氣下則結痛下散矣本經辟疫毒邪氣強志主淋
露以其辛燥助陽善開陰經伏匿之邪大明治心腹
一切氣膀胱冷痛嘔逆反胃霍亂瀉痢健脾消食安
胎甄權治九種心痛積年冷氣疝癖癥塊脹痛壅氣
上衝煩悶羸劣女人血氣刺痛不可忍然香燥而偏
於陽肺經有熱血枯而燥及陰火衝上者勿服

甘松香 甘温無毒

發明 甘松芳香升竄能開脾鬱少加脾胃藥中甚醒脾氣主惡氣卒心腹痛滿風疝齒齩得白芷白附子良脚氣膝腫煎湯淋洗効

山柰 辛温無毒

發明 山柰芳香入陽明煖胃辟瘴癘惡氣治心腹冷氣痛寒溼霍亂風蟲牙痛皆芳香正氣之力也

高良薑 辛大温無毒煨熟用子名紅荳蔻

發明 良薑辛熱純陽上升入足陽明太陰二經爲
客寒所犯則逆冷霍亂腹痛諸病生焉辛溫暖脾胃
而逐寒邪則胃中冷逆自除霍亂腹痛自愈甄權治
腹內久冷氣痛去風冷痺弱大明主轉筋瀉利反胃
解酒毒消食蘇頌治惡心嘔清水皆取暖胃溫中散
寒之功也而寒疝小腹掣痛須同茴香用之產後下
焦虛寒瘀血不行小腹結痛者加用之若胃火作嘔
傷暑霍亂禁用爲其溫燥也○紅苳蔻辛溫主水瀉

霍亂心腹絞痛止嘔進食大補命門相火故正元丹
中用之然能動火傷日致衄不宜久服

草豆蔻

辛瀋溫無毒麪裏煨熟去麪用

發明 草豆蔻性溫入脾胃二經東垣曰風寒客邪
在胃口之上當心疼痛者宜之丹溪曰草豆蔻性溫
能散滯氣若明知口食寒物胃腕作疼或溼鬱成病
者用之神効若熱鬱者不可用恐積溫成熱也然多
用能助脾熱傷肺損目故陰虛血燥者忌之

本草綱目卷二 草果 白荳蔻 刻醫學初階

草果 亦名 豆蔻 辛溫 瀉無毒 去殼生用

發明 草果與草豆蔻總是一類其草果治病取其辛熱浮散能入太陰陽明除寒燥溼開鬱化食利膈上痰解麪食魚肉諸毒與知母同用治瘴瘧寒熱取其一陰一陽無偏勝之害蓋草果治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火也然瘧亦有不由於嵐瘴氣而實邪不盛者忌服凡溼熱瘀滯傷暑暴注洩赤口乾者禁用

白豆蔻

俗名
殼蔻

辛溫無毒忌見火去淨隔膜不爾令

人膈滿凡草果草豆蔻縮砂皆然不獨白蔻也

發明 白豆蔻辛香上升入脾肺二經散肺中滯氣

治脾虛瘧疾嘔吐寒熱能消能磨流行三焦營衛一

轉諸證自平古方治胃冷積氣嘔逆反胃消穀下氣

寬膈進食解酒毒皆相宜也若火升作嘔蘊熱作痛

者勿服

縮砂蔻

俗名
砂仁

辛溫瀦無毒

發明 縮砂屬土醒脾調胃爲脾胃肺腎大小腸膀胱七經之氣藥能引諸藥歸宿丹田治脾虛泄瀉宿食不消瀉痢白沫腹中虛痛寒飲脹痞噎膈嘔吐和中行氣止痛安胎用之悉效同熟地茯苓納氣歸腎同檀香豆蔻下氣安肺得陳皮白朮和氣益脾惟新產婦忌之恐氣驟行動血也今人治血痢亦多用之若積欲盡時良非所宜又血虛火炎欬嗽禁用妊婦氣滯者宜服若氣虛者多服反耗其氣多致難產南

人性喜條暢食品每多用之北人性喜潛藏藥中亦罕用者

益智子 辛溫無毒去殼鹽水炒用

發明 益智行陽退陰三焦命門氣弱者宜之脾主智此物能益脾胃理元氣補腎虛滑精胃虛多唾女人崩漏治心氣不足夢泄夜多小便及冷氣腹痛於土中益火也集驗方縮泉丸治脬氣不足方用益智子鹽炒去鹽與烏藥等分爲末酒煮山藥粉爲糊丸

如梧子大空心鹽湯下七十九丸丹方治夜多小便取
二十四枚入鹽同煎服之有驗按益智功專補火如
血燥有火溼熱暴注及因熱而遺濁色黃乾結者不
可誤用也

葦芡 辛大溫無毒醋浸刮去皮子免傷肺上氣

發明 葦芡辛熱浮散爲頭疼鼻淵要藥取其能入
陽明經散浮熱也性能溫中下氣治霍亂水瀉心腹
滿者宜之然辛熱耗散能動脾胃之火多用令人喘

欬目昏腸虛下重以其走泄真氣也

蒟葉

子名蒟醬

辛温無毒

發明

蒟葉辛熱能下氣温中破痰散結氣解瘴癘

嶺南人以葉合檳榔食取其辛香能破瘴癘之氣也

其子可以調羹故謂之醬葦茭之類也

肉豆蔻

俗名肉果

辛温無毒糯米粉裹煨熟用勿犯鐵

發明

肉豆蔻辛香入手足陽明温中補脾寬膨脹

固大腸爲小兒傷乳吐逆泄瀉之要藥二神丸合補

骨脂治腎瀉蓋取補脾以治腎邪也按脾土性喜芳香故肉果與脾胃最為相宜以其能下氣者脾胃得補則健運非若厚樸枳實之峻削也熱鬱暴注禁用以其辛溫性滯也

補骨脂

俗名破故紙字音相近之誤也

苦辛大溫無毒鹽酒浸焙

乾用與胡麻同炒良忌蕪薑羊肉諸血

發明 補骨脂屬火收斂神明能使心胞之火與命

門之火相通使元陽堅固骨髓充實瀦以固脫也胡

桃屬水潤燥養血血屬陰惡燥故油以潤之佐補骨
脂有水火相生之妙故局方青娥丸用之孫思邈言
補腎不若補脾許學士言補脾不若補腎腎氣虛弱
則陽氣衰劣不能薰蒸脾胃令人痞滿少食譬如釜
底無火雖終日不熟陽衰則飲食亦不能消化濟生
二神丸治脾腎虛寒泄瀉用補骨脂補腎肉豆蔻補
脾加吳茱萸以平其肝加木香以順其氣使之斡旋
若精傷溺赤瀉痛者去木香易五味子腰膝痠疼腎

冷精流者用之屢效凡陰虛有火夢泄溺血大便閉
結者勿施

薑黃 辛苦溫無毒藏器曰辛少苦多性熱不冷或
云大寒誤矣有二種蜀川生者色黃質嫩有鬚折之
中空有眼切之分爲兩片者爲片子薑黃江廣生者
質粗形扁如乾薑僅可染色不入湯藥今藥肆混市
誤人徒有耗氣之患而無治療之功也

發明 薑黃鬱金蓬朮三物形狀功用皆相近但鬱

金入心專治心胞之血薑黃入脾兼治血中之氣蓬
朮入肝兼治氣中之血爲不同耳古方三痺湯用片
子薑黃治風寒溼氣手臂痛戴元禮曰片子薑黃能
入手臂治痛其兼理血中之氣可知能治癥瘕癰疽
通經消腫毒功力烈於鬱金但血虛臂痛者服之病
必增劇

鬱金 辛苦平無毒本草以爲性寒誤矣安有辛香
而寒之理蜀產者體圓尾銳如蟬腹狀發苗處有小

本草經卷二 芳草部 鬱金 渭南嚴氏彙

孔皮黃而帶黑通身粗皺如梧桐子紋每枚約重半錢折開質堅色黃中帶紫黑嗅之微香不烈者真若大小不等色黃皮起細橫紋有鬚如線折之中空質柔內外皆黃其氣烈者卽片子薑黃也體圓首尾相似通身橫紋發苗處無小孔折開氣烈觸鼻者染色薑黃中之小者也蓬朮則大塊色青黑最大者爲廣茂與此不類蘇恭不能分別乃爲一物謬矣

發明

鬱金辛香不烈先升後降入心及包絡治吐

血衄血唾血血腥破惡血血淋尿血婦人經脈逆行
產後敗血衝心及宿血心痛並宜鬱金末加薑汁童
便同服其血自清痰中帶血者加竹瀝又鼻血上行
者加入四物湯一婦患失心風癩十年用鬱金四兩
佐明礬一兩爲丸硃砂爲衣纔服五十丸心閒如有
物脫去再服而蘇以鬱金入心去惡血明礬化頑痰
硃砂安神故也又能化癥瘕爲水嶺南蠱毒爲害初
覺胸腹痛卽用升麻或膽礬吐之若膈下急痛以米

湯調鬱金末三錢服之即瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐則下此李巽岩為雷州司理鞠獄得此方活人甚多按以上諸治其功皆在破血生新今世誤以為諸血聖藥病者不惜重費醫者藉為射利咸以薑黃代之為害非淺凡屬陰虛失血及陰火迫血上逆咸為切禁

蓬莪茂

即蓬莪

苦辛溫無毒入肝經藥醋炒入心脾

藥麩裏煨熟入四物湯調經羊血或雞血拌炒

發明 蓬莪茂入肝破血治婦人血氣結積痛痰癖
冷氣跌撲損痛下血及內損惡血通肝經聚血蓋此
藥專破氣中之血也按蓬莪誠爲磨積之藥但虛人
得之積不去而眞已竭更可虞也須得參朮健運補
中寓瀉乃得力耳

荆三稜 苦平無毒生荆楚地故名荆三稜眞者絕
少今世所用皆草三稜也醋炒用之

發明 三稜肝經氣分藥也能破血中之氣散血結

通肝經積血主寒癖結塊破產後惡血血結腹痛通
 月水墮胎以其力峻故難久服有人病癥瘕腹脹用
 三稜莪朮酒煨煎服下一黑物如魚而愈按潔古云
 三稜能瀉真氣虛者勿用東垣破積諸方皆與人參
 贊助如專用剋削脾胃愈虛不能運行其積亢逆益
 甚矣

香附卽莎草根

辛微苦甘平無毒產金華光細者佳入

血分補虛童便浸炒調氣鹽水浸炒行經絡酒浸炒

消積聚醋浸炒氣血不調胸膈不利則四者兼製肥
盛多痰薑汁浸炒止崩漏童便製炒黑走表藥中則
生用之

發明 香附之氣平而不寒香而能竄乃足厥陰肝
手少陽三焦氣分主藥兼入衝脈開鬱氣消痰食散
風寒行血氣止諸痛月候不調胎產崩漏多怒多憂
者之要藥治兩脇氣妨心忪少氣是血中之氣藥也
蓋血不自行隨氣而行氣逆而鬱則血亦凝滯氣順

則血亦隨之而和暢矣生則上行胸膈外達皮毛故能散風寒熱則下走肝腎外徹腰足故能調血氣得參朮則益氣得歸地則調血得木香則流滯和中得沈香則升降諸氣得芎藭蒼朮則總解諸鬱得山梔黃連則降火清熱得茯苓則交心腎得茴香補骨脂則引氣歸元得厚樸半夏則決壅消脹得紫蘇蔥白則解散邪氣得三稜莪茂則消磨積塊得艾葉則治血氣煖子宮乃氣病之總司女科之主帥也惟經水

先期而淡及失氣無聲無臭者勿用血氣本虛更與利氣則行之愈速矣

茉莉花 辛熱無毒根熱有毒

發明 茉莉花古方罕用近世白痢藥中用之取其芳香散陳氣也其根性熱有大毒以酒磨一寸服卽昏迷一日乃醒服二三寸二三日醒惟接骨脫臼用以傅之則不知痛也

排草香 辛溫無毒

發明 芳香之氣皆可辟臭去邪惡氣鬼魅邪精天
行時氣並宜燒之水煮洗水腫浮氣與生薑芥子煎
湯浴風痺效

藿香 辛微溫無毒廣產者良但葉甚少土人每以
排草葉僞充最難辨別須於莖上擇取色綠未經黴
壞者方效

發明 藿香入手足太陰芳香之氣助脾醒胃故能
止嘔逆開胃進食溫中快氣去瘴氣止霍亂治心腹

痛凡時行疫癘山嵐瘴癘用此醒脾健胃則邪氣自無容而愈矣但陰虛火旺胃虛作嘔內無留滯者不可用恐反傷正氣引邪內入江浙土產者伐胃消食其莖能耗氣用者審之

薰香

卽零陵香

甘平無毒廣產者良雲陽產者氣濁不

堪入藥

發明 薰香辛散上達故心痛惡氣齒痛鼻塞皆用之單用治鼻中瘰肉鼻鼈香以養鼻也多服作喘爲

能耗散真氣也

蘭香 辛温無毒菜部移此瀕湖綱目芳草部有蘭
草菜部有蘭香名曰羅勒種類不同因攷正之按蘭
有三種一種曰蘭草其氣濃濁卽今之省頭草也一
種曰蘭香植之庭砌二十步內卽聞香俗名香草以
子能去目翳故又名翳子草一種名羅勒莖葉較蘭
香稍粗大形雖極類而氣葷濁以嫩時可食僅入菜
部不堪入藥

本經利水道殺蟲毒辟不祥久服益氣輕身不老通神明

發明 蘭氣芳香能辟疫毒惡氣楚人以此爲佩又能辟汗溼之氣故又名辟汗香入手足太陰陽明力能調中消食去惡氣治嘔嘔脾痺口中時時溢出甜水者非此不除按蘭性芳香辛溫專走氣道故能利水調肝和脾其功倍於藿香善調嘔逆散積久陳鬱之氣素問云五味入口藏於胃以行其津氣津液在

脾令人口甘此肥美所發也其氣上溢轉爲消渴治
之以蘭除陳氣也東垣治消渴生津飲用蘭葉蓋本
於此又治牙疼口臭有神功丸亦用蘭香云如無以
藿香代之近世誤認以幽蘭爲蘭香者大可噴飯觀
本經利水殺蟲毒辟不祥之治豈幽蘭能之乎古方
治癘風蘭香散取其散肺胃中之溼熱蟲毒也普濟
方治反胃蘭香和甘蔗汁服之錢氏治小兒鼻疳赤
爛蘭葉燒灰二錢銅綠半錢輕粉二錢爲末日傅三

次卽愈○子治目瞽及塵物入目以三五顆內目中
少頃其子溼脹與物俱出又主暴得赤眼後生瞽膜
用蘭香子一粒入眥內閉目少頃連膜俱出蓋此子
得溼卽脹故能染惹眵淚浮膜爾然目中不可著一
塵而此可內三五顆亦不妨礙又小兒食肥甘口臭
齒黑名曰崩砂漸至齲爛名曰潰槽又或出血名曰
息露重則齒落名曰腐根用蘭香子末輕粉各一錢
蜜陀僧煨赤醋淬研末半兩和勻每以少許傅齒及

齧上內服甘露飲立效。○時珍曰蘭香須三月棗葉生時種之乃生否則不生常以魚腥水泥溝水冷泥水澆之則香而茂不宜糞水著糞則萎其子大如蚤而褐色不光七月收之種時妨蟻溼則有脂浮脹須以桴炭末掩之

澤蘭 苦甘微溫無毒取葉酒洗之

本經主金瘡癰腫瘡膿

發明 澤蘭入足太陰厥陰血分專治產後血敗流

於腰股拘攣疼痛破宿血消癥瘕除水腫身面四肢
浮腫本經主金瘡癰腫瘡膿皆取散血之功爲產科
要藥也更以芎歸童便佐之功效勝於益母

馬蘭 辛平無毒赤莖者良

發明 馬蘭入陽明血分與澤蘭功用相近故能破
宿生新丹方治婦人淋濁痔漏有效喉痺腫痛以馬
蘭根葉搗汁入米醋滴鼻孔或灌喉中取痰自開絞
腸痧腹痛以馬蘭細嚼嚙汁立安水腫溺瀝馬蘭一

握黑豆小麥各一撮酒水煎服效蛇傷搗汁和醋搽之皆取散血解毒也

香薷 辛微溫無毒江西白花者良

發明 香薷辛溫先升後降故熱服能發散暑邪冷飲則解熱利小便治水甚捷世醫治暑病以香薷飲爲首藥然暑有乘涼飲冷致陽氣爲陰邪所遏遂病發熱惡寒頭痛煩躁口渴或吐或瀉或霍亂者宜用此發越陽氣散水和脾若飲食不節勞役力作之人

傷暑發熱大渴煩渴喘促者乃勞倦內傷之證必用
清暑益氣如大熱大渴又宜人參白虎之類以瀉火
益元更有汗出如雨吐瀉脫元四肢清冷脈微欲脫
者又須大順漿水散等方救之若用香薷飲是重虛
其表頃刻脫亡矣今人不知概用沈冷代茶若元氣
虛人服之往往致病蓋香薷乃夏月解表之藥如冬
月之用麻黃氣虛者豈可漫用深師香薷丸治通身
水腫以香薷熬膏丸白朮末日三夜一服米飲下之

效

爵牀

俗名赤眼
老母草

鹹寒無毒

本經主腰脊痛不得著牀俛仰艱難除熱可作湯浴

發明 爵牀善通血脈蘇恭言療血脹下氣杖瘡搗

汁塗之立瘥觀本經諸品不出活血舒筋之用也

荆芥

又名
假蘇

辛微温無毒產後止血童便制黑用凡

食河豚及一切無鱗魚與驢肉俱忌之食黃鱔魚後

服之令人吐血惟地漿可解與蟹同食動風

本經主寒熱鼠瘻癰癰生瘡破結聚氣下瘀血除溼
疽

發明 荆芥穗入手太陰足厥陰氣分其功長於祛
經絡中之風熱觀本經所主皆是搜經中風熱瘀血
之病又能清頭目去瘀血破結氣消瘡毒故風病血
病瘡病產後爲要藥治風兼治血者以其入風木之
藏卽是藏血之地故並主之華元化治產後中風口
噤發瘧及血暈不醒荆芥末三錢豆淋酒調服神效

本草部 荆芥

渭南嚴氏彙

產後血暈熱童便調服而表虛自汗陰虛面赤者禁用今人但遇風證概用荆芥此流氣飲之相沿耳

紫蘇 辛溫無毒葉紫者能散血脈之邪最良

發明 蘇葉味辛入氣分色紫入血分升中有降同

橘皮砂仁則行氣安胎同藿香烏藥則快氣止痛同

麻黃葛根則發汗解肌同芎藭當歸則和營散血同

木瓜厚樸則散溼解暑同桔梗枳殼則利膈寬中同

杏仁葶子則消痰定喘然不宜久服泄人真氣單用

煮汁解蟹毒若脾胃虛寒人過服多致滑泄往往不覺也其梗能行氣安胎但力淺薄難於奏效亡血家大虛及妊婦產婦發散用苞最佳本乎天者親上取其包含子氣且氣味皆薄而無過汗傷中之患也

蘇子 辛溫無毒粗而色深紫者真細而色淡者假

發明 諸香皆燥惟蘇子獨潤爲虛勞欬嗽之專藥性能下氣故胸膈不利者宜之與橘紅同爲除喘定嗽消痰順氣之良劑但性主疏泄氣虛久嗽陰虛喘

水蘇
薄荷
刻醫學初階

逆脾虛便滑者皆不可用

水蘇

一名雞蘇

辛温無毒子名荏子

本經下氣殺穀除飲食辟口臭去邪毒辟惡氣

發明

水蘇即蘇之野生色青者其氣芳香故本經

所主一皆胃病專取芳香正氣之義局方用治血病

者取以解散血中之氣也氣散則血亦散矣

薄荷

辛平無毒蘇產者良去梗用

發明

薄荷辛涼上升入肝肺二經辛能發散專於

消風散熱涼能清利故治欬嗽失音頭痛頭風眼目
口齒諸病利咽喉去舌胎小兒驚熱及癩癧瘡疥爲
要藥其性浮而上升爲藥中春升之令能開鬱散氣
故逍遙散用之然所用不過二三分以其辛香伐氣
多服久服令人虛冷瘦弱人多服動消渴病陰虛發
熱欬嗽自汗者勿施

隰草部

菊 黃者苦甘平白者苦辛平皆無毒野生者名苦

薏可搗塗癰腫疔毒服之傷人腦

本經主諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風
溼痺久服利血氣輕身耐老延年

發明 菊得金水之精英補水以制火益金以平木
爲去風熱之要藥故本經專主頭目風熱諸病取其
味甘氣清有補陰養目之功蓋益金則肝木平而風
自息補水則心火制而熱自除矣其治惡風溼痺者
以其能清利血脈之邪而痺溼得以開泄也又黃者

入金水陰分白者入金水陽分紫者入婦人血分觀
金匱侯氏黑散千金秦艽散俱用菊花爲君時珍所
謂治諸頭目其旨深矣近有一種從番舶來六月開
花但有正黃而無閒色豈特黃州獨瓣爲異哉

艾 苦辛溫無毒蘄州者爲勝

發明 艾性純陽故可以取太陽真火可以回垂絕
元陽服之則走肝脾腎三陰而逐一切寒溼轉肅殺
之氣爲融和生用則性溫炒熟則大熱用以灸火則

透諸經而治百病蘇頌言其有毒誤矣夫用藥以治
病中病則止若素有虛寒痼冷婦人溼鬱帶漏之病
以艾和歸附諸藥治之夫何不可艾附丸調經而溫
子宮兼主心腹諸痛膠艾湯治虛痢及胎妊產後下
血雷火鍼同丁香麝臍熨寒痺攣痛若老人臍腹畏
冷及寒溼脚氣以熟艾入布兜之惟陰虛火旺血燥
生熱及宿有失血病者爲禁有人患風瘙癢疹不時
燠發以絹裏擦之卽消亦取其辛散開發之力

茵陳蒿 苦平微寒無毒

本經主風溼寒熱邪氣熱結黃疸

發明 茵陳有二種一種葉細如青蒿者名綿茵陳
專於利水爲溼熱黃瘧要藥一種生子如鈴者名山
茵陳又名角蒿其味辛苦小毒專於殺蟲治口齒瘡
絕勝並入足太陽本經主風溼寒熱熱結黃瘧溼伏
陽明所生之病皆指綿茵陳而言仲景茵陳蒿湯以
之爲君治溼熱發黃梔子蘗皮湯以之爲佐治燥熱

發黃如苗澇則溼黃旱則燥黃其麻黃連軹赤小豆湯以之爲使治痰熱在裏而身黃此三方分治陽黃也其治陰黃則有茵陳附子湯各隨燥溼寒熱而爲主治按茵陳專走氣分而利溼熱若畜血發黃非此能治也外臺治齒齲宣露千金治口瘡齒蝕並用燒灰塗之有汁吐去一宿卽效而殺蟲方中一味煎湯內服外洗皆用角蒿專取逐溼化熱之功也

青蒿 苦寒無毒莖紫者眞根莖子葉不可並用恐

成痼疾葉主溼熱子治骨蒸俱宜童便製用

本經主疥瘙痂痒惡瘡殺蟲留熱在骨節閒明目

發明 青蒿亦有二種一種發於早春葉青如綿茵

陳專瀉丙丁之火能利水道與綿茵陳之性不甚相

遠一種盛於夏秋微黃如地膚子專司甲乙之令爲

少陽厥陰血分之藥故莖紫者爲良其治骨蒸勞熱

有殺蟲之功而不傷伐骨節中陽和之氣者以其得

春升之令最早也此與角蒿之性大都相類又能明

本草綱目卷二
三刻醫學初階
目善清在上之虛熱燒灰淋汁和石灰點治惡瘡息
肉廩癩蘇恭生搗敷金瘡經驗方和桂心治寒癰但
性偏苦寒脾虛虛寒泄瀉者勿服

芫蔚

俗名益母

辛甘微溫無毒忌犯鐵器其子微炒香

蒸熟烈日曝燥杵去殼用

本經芫蔚子明目益精除水氣莖治癰疹可作浴湯
發明 芫蔚入手少陰足厥陰血分活血行氣有補
陰之功凡胎前產後所恃者血氣也胎前無滯產後

無虛以其行中有補也然所謂補者是散其瘀而營
血受蔭非補養血氣之謂丹方以益母之葉陰乾拌
童便陳酒九蒸九晒入四物湯料爲丸治產後諸證
但功專行血故崩漏下血若脾胃不實大腸不固者
勿用爲其性下行也近世治番痧腹痛嘔逆用以濃
煎少加生蜜放溫恣飲有效取其能散惡血也其子
能明目功專益精利水水虧而瞳子收小者宜之若
火盛瞳子散大者切忌爲其辛散能助火邪也白花

者名藜菜嫩苗可食故謂之菜藏器主產後腹痛今人治白帶用一味爲末服之大效

薇銜 苦瀋温無毒素問謂之麋銜唐本曰鹿銜干金曰鹿藥草言鹿有疾銜此草卽瘥也其葉大而面綠背紫者爲真蘇恭言有大小二種保昇言葉似莞蔚叢生有毛者吳風草也

本經主風溼痺歷節痛驚癩吐血悸氣賊風鼠瘦癰腫

發明 鹿銜本經專主風溼痺歷節痛素問同澤朮

治酒風身熱懈惰汗出如浴惡風少氣之病亦取其
能除痺著血脈之風溼也又治驚癇悸氣吐咯諸血
以其能走胃與腎肝血分專理血中邪溼而無留滯
之患近世治吐血咯血用之以其能溫補衝督之精
血也陝人名爲鹿胞草言鹿食此卽能成胎其性溫
補下元可知今吳興山中閒亦產此每於初夏羣鹿
引子銜食乃去洵爲確真無疑采得曬乾一味浸酒

最爲有益但性專助陽力能走散陰精故藏器云婦人服之絕產無子良有見乎此也其子名延壽果味微澁而甘惟秦地有之不特有益於老人而嬰兒先天不足者尤爲上藥惜乎南方罕得也

夏枯草 苦辛温無毒

本經主寒熱瘰癧鼠瘦頭瘡破癥散癭結氣脚腫溼痺輕身

發明 夏枯草本經專治寒熱瘰癧有補養厥陰血

脈之功以辛能散結苦能除熱而癥結瘦氣散矣言
輕身者脚腫溼痺愈而無重著之患也佐以香附甘草
治目珠疼夜甚者以其稟純陽之氣而散陰中結滯之
熱也又能解內熱緩肝火從治之法並治痘後餘毒
及肝熱目赤者效久服亦防傷胃以善走厥陰助肝
木之氣耳

劉寄奴 苦温無毒

發明 劉寄奴破血下脹又能止血故產後餘疾及

本草部 劉寄奴旋覆花
渭南嚴氏彙

金瘡血大小便血皆用之千金方治折傷瘀血用劉

寄奴骨碎補延胡索水煎加童便服集簡方治大小

便血劉寄奴末空心茶清調服衛生易簡方治血氣

脹滿劉寄奴紅酒煎服時珍治小兒尿血取劉寄奴

研末服效丹方治大便血用劉寄奴半兩臘茶一錢

烏梅半枚煎服即效但性走散不可過服令人吐利

旋復花

本經名
金沸草

鹹甘温小毒

本經主結氣脇下滿驚悸除水去五藏閒寒熱補中

下氣

發明 旋覆花升而能降肺與大腸藥也其功在於

開結下氣行水消痰治驚悸祛痞堅除寒熱散風溼

開胃氣止嘔逆除噫氣故肺中伏飲寒嗽宜之仲景

治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有旋覆代赭石

湯金匱半產漏下有旋覆花湯胡洽治痰飲在兩脇

脹滿有旋覆花湯皆取其能下氣也但性專溫散故

陰虛勞嗽風熱燥欬不可誤用用之嗽必愈甚本經

言補中下氣者甘能緩中鹹能潤下痰氣下而中氣安脇下滿結寒熱驚悸水氣皆除矣

青葙

卽雞冠花

苦微寒無毒

本經主邪氣皮膚中熱風瘙身癢殺三蟲子治脣口

青

發明 青葙子治風熱目疾與決明子同功本經雖

不言治目疾而主脣口青爲足厥陰經藥其明目之

功可推其治風瘙身癢皮膚中熱以能散厥陰經中

血脈之風熱也

紅藍花

卽紅花

辛溫無毒

發明 血生於心包藏於肝屬於衝任紅花汁與之
同類故能行男子血脈通婦人經水活血解痘毒散
赤腫產後血暈及胎死腹中並宜和童便服之少則
養血多則行血過用使人血行不止且性兼上行不
可不知亦主蠱毒下血堪作臙脂治小兒聾耳解痘
疔毒腫產後血悶以紅花十筋煮湯盛桶置於橫格

之下昇婦寢上熏之湯冷再加半日乃穌

臘脂 甘平無毒臘脂有四種一種以紅藍花汁染胡粉而成一種以山燕脂花汁染粉而成一種以山榴花汁作成者一種以紫鉚汁染綿而成皆可入血病藥用又落葵子亦可取汁和粉而成可作面脂不入藥用紫鉚查名火漆匠工補水用之

發明 臘脂色紅竝可爲活血之藥其治痘瘡肌肉結硬用綿胭脂同紫草煎湯乘熱頻將臘脂擦之漸

軟卽能發出又痘瘡護眼黃蘗膏用油胭脂調塗則
痘無入眼之患

大薊小薊 花甘溫根微涼無毒

發明 大薊小薊皆能破血大薊根主女子赤白沃
下止吐血鼻衄涼而能行行而帶補兼療癰腫小薊
根專於破血不能消腫有破宿生新之功吐血血崩
之用但其力微只可退熱不似大薊能破瘀散毒也
丹方治吐血不止用小薊山檀生地一服卽止止中

中補不足等病總取和血通經之義又能止小便多
治遺泄古方血痢用平胃散一兩續斷三錢爲末每
服三錢水煎服卽愈甯無顧名思義之實乎

漏蘆

本經名
野蘭

苦鹹寒有毒

本經主皮膚熱毒惡瘡疽痔漏瘕下乳汁

發明 漏蘆苦寒解毒乃足陽明經藥本經治熱毒

惡瘡下乳汁以其能利竅也爲消毒排膿殺蟲要藥
古方治癰疽發背以漏蘆湯爲首稱蓋鹹能軟堅寒

六經原卷二 隰草部 漏蘆 苧麻 黃麻 三 渭南嚴氏彙

能解毒故服之必大便作瀉使邪從下而出也昔人
治癭兒瘡毒令母服此使藥性從乳中過之每致乳
子利下白沫大損元氣故氣虛及瘡瘍不起發者咸
非所宜而妊婦尤爲切禁

苧蘇黃蘇 廿寒無毒

發明 苧蘇耑行滯血產婦枕之治血暈產後腹痛
以苧安腹上卽止漬苧水療熱渴苧根治小兒赤丹
○其黃蘇苦溫專散陳久瘀血取陳年者燒灰存性

酒調服之絡蔴根燒灰治鎖喉風神効

胡蘆巴 苦大溫無毒

發明 胡蘆巴乃海外胡蘿蔔子聲音相近之譌耳
右腎命門藥也元陽不足冷氣潛伏不得歸元者宜
之小腸奔豚偏墜及小腹有形如卵上下走痛不可
忍者用胡蘆巴丸腎氣不歸上熱下寒厥逆嘔吐者
用黑錫丹皆與金鈴子一寒一熱同用其導火歸元
之功可知

惡實

又名鼠粘子牛蒡子大力子皆別名也

辛平無毒

發明

鼠粘子肺經藥也治風溼癩疹咽喉風熱散

諸腫瘡瘍之毒痘疹之仙藥也痘不起發用此為末

刺雄雞冠血和酒釀調胡荽湯下神効瘡瘍毒盛生

研用之即出瘡頭酒炒上行能通十二經去皮膚風

消癩疹毒惟氣虛色白大便利者不宜

蒼耳

古名泉耳

實甘溫葉苦辛小毒酒浸炒用忌豬肉

發明

蒼耳治頭風腦痛風溼周痹四肢拘攣惡肉

死肌皮膚瘙癢腳膝寒痛久服亦能益氣其葉久服去風溼有効照蒼耳人最忌豬肉及風邪觸犯則遍身發出赤丹也婦人血風攻腦頭旋悶絕忽倒不知人事者用蒼耳草嫩心陰乾爲末酒服甚効此味善通頂門連腦能走督脈也

天名精

本經名蝦蟇藍一名地蒜子名鶴蝨

甘寒無毒

本經主瘀血血瘕欲死下血止血利小便

發明 天名精功專散血有破宿生新之功故本經

言下血止血又能涌吐風痰殺蟲解毒搗汁服之能
止痰瘧漱之止牙疼搗之敷蛇傷煎服除淫穢邪毒
從小便泄出凡乳蛾喉嚨腫痛及小兒急慢驚風牙
關緊急不省人事者搗絞和酒灌之咽喉腫塞痰涎
壅滯搗汁鵝翎掃入去痰立効亦治豬溫

鶴蝨 苦平無毒

發明 鶴蝨入厥陰肝經善調逆氣能治一身痰凝
氣滯殺蟲方中最要藥錄驗方療虬攻心痛一味丸

服小兒蟲痛亦單用鶴蝮研末肥肉汁服其蟲自下
藥肆每以胡蘿蔔子代充不可不辯

豨薟 辛苦寒小毒採葉陰乾入甌中層層洒酒與
蜜九蒸九晒用

發明 豨薟苦寒畧兼微辛故有小毒爲祛風除溼
而兼活血之要藥豨薟丸治風濕四肢麻痺骨節冷
痛腰膝無力甚効但脾腎兩虛陰血不足而腰膝無
力骨痛麻痺者大非所宜時珍曰生搗汁服則令人

吐故云有小毒九蒸九晒則去風痺故云無毒或云甚益元氣不稽之言也生者搗服能吐風痰其能傷胃可知

箬 甘寒無毒

發明 箬生小竹而葉最大故可以之爲笠燒灰治吐衄嘔咯及便溺諸血又能通小便利肺氣散喉痺消癰腫每服不過一錢七又治痘瘡倒靨以箬葉灰一錢七入麝香酒調服之乾箬蒂煎湯治胃熱呃逆

其性較柿蒂稍平取灰以香油調塗湯火傷甚良

蘆根

笋名蘆蘆莖名
蘆莖花名蓬蘽

甘寒無毒

發明

蘆根甘寒主消渴胃中客熱利小便治噎噦

反胃嘔逆不下食妊娠心熱時疫寒熱煩悶解河豚

諸魚毒其笋尤良○蘆蘆治臍下堅癖小便不利○

葦莖中空專於利竅善治肺癰吐膿血臭痰千金葦

莖湯以之為君服之熱毒從小便泄去最捷蘆花煮

汁治乾霍亂心腹脹痛若燒存性治吐衄諸血

甘蕉即巴蕉

甘大寒無毒

發明 甘蕉性寒治天行狂熱解消渴煩悶利小便

治溼熱黃痺和酒服療癰腫并以滓塗腫處良小兒

遊風臥蕉葉上即愈治火燙以筋插入出筋瓶盛取

油塗之別錄治癰疽結熱肘後治發背腫毒聖惠治

血淋瀝痛蘇頌治風癩欲倒飲之取吐効惟陰疽不

赤腫者禁用

蘘荷即芭蕉之色白者

辛溫有小毒忌鐵

發明 蘘荷有毒而能攻毒爲主蠱之最中蠱者服
蘘荷汁并卧葉上卽能呼出蠱主姓名其治喉舌瘡
爛婦人月閉及傷寒時氣壯熱頭痛口瘡用之皆取
其辛散也

麻黃 苦溫無毒去根節湯泡去沫曬乾用若連根
節用令人汗不絕其根專能止汗

本經主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止
欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚

發明 麻黃微苦而溫中空而浮陽也升也入足太陽其經循背下行本屬寒水而又受外寒故宜發汗去皮毛氣分寒邪以泄寒實若過發則汗多亡陽或飲食勞倦及雜病自汗表虛之證用之則脫人元氣禍患莫測麻黃治衛實之藥桂枝治衛虛之藥二物雖爲太陽經藥其實榮衛藥也心主榮血肺主衛氣故麻黃爲手太陰肺經之劑桂枝爲手少陰心經之劑傷寒傷風而欬嗽用麻黃湯桂枝湯卽湯液之源

也麻黃乃肺經之專藥故治肺病多用之仲景治傷寒無汗用麻黃湯有汗用桂枝湯夫津液爲汗汗卽血也在榮卽爲血在衛卽爲汗寒傷營營血不能外通於衛衛氣閉固故無汗發熱而惡寒風傷衛衛氣不能內護於營營氣不固故有汗發熱而惡風是證雖屬太陽而肺實受邪氣蓋皮毛外閉邪熱內攻肺氣怫鬱故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪達之助表佐以杏仁泄肺而利氣是麻黃湯雖太陽發汗

重劑實爲發散肺經邪鬱之藥也腠理不密則津液外泄而肺氣自虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以救表內伐肝木以防脾佐以芍藥泄木而固脾皆是脾肺之藥是則桂枝雖太陽解肌輕劑實爲理脾救肺之藥也又少陰證發熱脈沈有麻黃附子細辛湯少陰與太陽爲表裏所謂熟附配麻黃補中有發也本經治中風是主緩風癱瘓而言云溫瘧係溼瘧乃傳寫之誤破癥堅積聚者表裏兼治非神

而明之難效其法也

木賊 甘微苦無毒去節用

發明 木賊與麻黃同形同性故能發汗解肌升散
火鬱風溼專主眼目風熱暴瞖止淚取發散肝肺風
邪也多用令人目腫若久瞖及血虛者非所宜傷暑
或暴怒赤腫亦勿用之

石龍芻

一名龍鬚
卽席草

苦微寒無毒

本經主心腹邪氣小便不利淋閉風溼鬼疰

發明 龍芻生水中性專利水本經所主心腹邪氣
亦是因水溼瀦積所致其敗席治淋及小便不通昔
人用以煮服莫若燒灰酒服更良

燈心草 甘寒無毒欲入丸劑粳米粉漿磨之

發明 燈心輕虛甘淡故能瀉肺利水治急喉痺燒
灰吹之又燒灰塗乳上飼小兒止夜啼燒灰入輕粉

麝香治陰疳

生地黃

本經名地髓
又名芒音戶

甘苦寒無毒禁犯鐵忌萊菔

諸血採得鮮者卽用爲生地黃炙焙乾收者爲乾地黃以法制過者爲熟地黃

本經主傷中逐血癩填骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚療折跌傷筋久服輕身不老生者尤良

發明 生地黃性稟至陰功專散血入手足少陰厥陰兼行足太陰手太陽錢仲陽導赤散與木通同用瀉丙丁之火別錄治婦人崩中血不止及產後血上薄心胎動下血鼻衄吐血皆擣汁飲之以其能散血

消瘀解煩也其治跌撲損傷面目青腫以生地黄搗爛罨之卽消此卽本經治傷中血痺折跌筋傷等證之義蓋肝藏血而主筋肝無留滯則營血調而傷中自愈筋無邪著則三氣通而血痺自除作湯除寒熱積聚者血和則結散而諸證平矣其曰填骨髓長肌肉者邪無著而形神自復也昔人治心痛以生地黄汁作冷淘食之取吐不吐則利出長蟲如辟宮而安此卽本經除寒熱積聚之驗其於服食方中用之取

以輔助諸藥辟除三蟲使從幽門化出也因思千金
靈飛散中生地黃急不可得鮮者咸取乾者應用乃
知本經末後續出生者尤良一語見古聖之苦心無
所不用其極也愚按生地黃與乾地黃功用不同豈
可混論按徐之才別錄云生地黃乃新掘之鮮者爲
散血之專藥觀本經主治皆指鮮者而言祇緣諸家
本草從未明言且產處遼遠藥肆僅有乾者鮮者絕
不可得是不能無混用之失曷知乾地黃旣經炙焙

力能止血安有傷中血痺折跌筋傷等治乎至於傷
中日久積聚內形寒熱外顯竝宜鮮者作湯統領他
藥共襄破宿生新之功設混用乾者則瘀傷愈結安
望其有髓充肉長之勩乎予嘗綜覽諸方凡藥之未
經火者性皆行散已經炙焙性皆守中不獨地黃爲
然也

乾地黃

苦微甘寒無毒產懷慶者丁頭鼠尾皮粗

質堅每株重七八錢者力優產亳州者頭尾俱粗皮

細質柔形雖長大而力薄產江浙者細軟無力僅可
清熱不入補劑無問產於何地但枯槁質輕者謂之
天黃不堪入湯藥

發明 乾地黃心紫通心中黃入脾皮黑歸腎味厚
氣薄內專涼血滋陰外潤皮膚榮澤病人虛而有熱
者宜加用之戴元禮曰陰微陽盛相火熾強來乘陰
位日漸煎熬陰虛火旺之證宜生地黃以滋陰退陽
同人參茯苓石蜜名瑤玉膏治虛勞欬唾血同天

麥門冬熟地人參名固本丸治老人精血枯槁於固本丸中加枸杞熬膏名集靈膏治虛羸喘嗽乏力其瑤玉膏雖用鮮者搗汁桑火熬膏散中寓止與乾者無異固本丸集靈膏竝用乾者而集靈變丸作膏較之固本差勝易簡方曰男子多陰虛宜熟地黃女子多血熱宜生地黃虞搏云生地黃涼血而胃氣弱者恐妨食熟地黃補血而痰飲多者恐泥膈或言生地黃酒炒則不妨胃熟地黃薑制則不泥膈然須詳病

人元氣病氣之淺深而用之若產後惡食泄瀉小腹
結痛虛勞脾胃薄弱大便不實胸腹多痰氣道不利
升降窒塞者咸須遠之浙產者專於涼血潤燥病人
元氣本虧因熱邪閉結而舌乾焦黑大小便秘不勝
攻下者用此於清熱藥中通其祕結最妙以其有潤
燥之功而無滋潤之患也愚按本經地黃雖列上品
而實性稟陰柔與鄉愿不異譬諸宵人內藏隱隙外
示優容是以舉世名家靡不藉爲滋陰上藥止血神

丹雖或用非其宜得以稍清旺氣服之仍得暫安非
若人參之性稟陽明象類君子苟有過人皆知之是
以師家歛手不敢用病家緘口不敢嘗直至濱危不
得已而用之每至下咽卽斃是以左右之人靡不交
口歸咎於人參曷知其爲從前誤藥所致夫藥之遺
患於病比比有之莫如地黃門冬之屬陰柔最甚至
死不覺其非故不憚貧屑特表而出之

熟地黃 甘溫無毒製地黃法擇取原株重六七錢

者以好酒浸入縮砂仁末拌木甌瓦鍋九蒸九晒得
太陽真火入劑方始得力蓋地黃性泥得砂仁之香
竄而通調五藏冲和之氣歸宿丹田也

發明 熟地黃假火力蒸晒轉苦爲甘爲陰中之陽
故能補腎中元氣必須蒸晒多次得太陽真火確有
坎離交濟之妙用若但煮熟不加蒸曝雖服奚益好
古曰生地黃治心熱手心熱益腎水涼心血其脈洪
實者宜之若脈虛者則宜熟地黃錢氏六味丸以之

爲君天一所生之源也若命門眞火素弱者必須崔氏八味丸得桂附共襄之力方得陰陽兼濟之功湯液四物湯以之爲主乙癸同源之治也其功專於填骨髓長肌肉生精血補五藏內傷不足通血脈利耳目黑鬚髮男子五勞七傷女子傷中胞漏下血經候不調胎產百病滋腎水眞陰療臍腹急痛病後脛股痠痛坐而欲起目眈眈如無所見蓋臍下痛屬腎藏精傷脛股痠痛係下元不足目眈眈如無所見乃水虧

不能鑿物皆腎所主之病非熟地黃不除今人治目
腎內障往往用六味丸配磁硃丸服良非所宜地黃
禁鐵磁爲鐵之母安得不可予嘗用當歸代地黃借
其辛溫以助炊發之勢火盛則用芍藥代山茱萸借
其酸寒以收耗散之陰藥雖異而功不殊也愚按地
黃本手少陰經藥功專清熱散血非經蒸曝不能入
足少陰經得水火既濟之功轉苦成甘變紫爲黑故
直入腎藏填補眞陰兼培黃庭后土土厚戴物諸藏

皆受其蔭是以崔氏八味錢氏六味爲培養眞陰眞陽之總司後人藉此各隨所稟之偏而爲增減無往非受其益如陰氣不固則加鱉膠蒺藜陽氣不充則加鹿茸河車中氣不舒則加沈香縮砂下氣不吸則加牛膝車前上氣不津則加門冬五味肝氣內盛則減萸倍澤精氣下脫則減澤倍萸各得補偏救弊之妙用其陰火旺者加知蘘於六味方中此與鳩酒止渴無異他如四物湯中之芎歸卽六味丸中山萸之

義十全大補中之者桂則八味丸中桂附之義方得
陰陽相濟之妙用須知八味十全平調血氣且湯液
性味易過地黃與參竝用略無妨礙六味丸中切不
可雜一味中焦藥如人參白朮甘草之類咸非所宜
昔人有以六味丸加參而服下咽少頃輒作迷迷不
爽或令增麥冬五味功力倍常深得金水相生之妙
用非專工藥性者之可與討論也

牛膝

本經名
百倍

苦酸平無毒懷產者長而無傍鬚水

道濇滲者宜之川產者細而微黑精氣不固者宜之
忌牛肉

本經主寒溼痿痹四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣
傷熱火爛墮胎

發明 牛膝氣薄味厚性沈降泄乃足厥陰之藥本
經專主寒溼痿痹四肢拘攣等病不及補養下元之
功豈聖法有所未盡歟丹溪言牛膝能引諸藥下行
筋骨痛風在下者宜加用之其性雖下行走筋然滑

利之品精氣不固者終非所宜得酒蒸則能養筋生
用則去惡血其治腰膝痛不可屈伸足痿之病非取
其養血營筋之力歟其治癰腫惡瘡金瘡折傷尿血
淋痛婦人經祕不通非取其活血破瘀之力歟外臺
以生牛膝一味濃煎治積久勞瘧肘後以二觔浸酒
治卒暴癥疾延年以之同葵子煎服下胞衣衛生以
之搗罨折傷梅師以之搗塗金瘡千金以之搗敷毒
腫集驗以之通利溺閉皆取其性滑利竅消血解毒

之功雖強陰強筋而氣虛下陷大便易泄夢泄遺精
妊娠崩漏俱禁用惟川產者氣味形質與續斷彷彿庶
無精滑之虞蓋腎司閉藏肝司疎泄此味專司疎泄
而無固熱之功世俗妄謂益腎而培養下元藥中往
往用之與延盜入室何異 其土牛膝亦能解毒利
竅專治血鼓一味濃煎恣意服之又鎖喉風諸治不
效以上牛膝和醋搗絞取汁蘸雞翎探吐稠痰不過
二三次神驗

紫苑

白者名女苑

苦辛微溫無毒或酒洗或蜜水炒用

本經主欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痿躄安五

藏女苑治風寒洗洗霍亂泄利腸鳴上下無常處

驚癇寒熱百病

發明紫苑肺經血分之藥本經止欬逆上氣胸中

寒熱結氣取性疏利肺經血氣也去蠱毒痿躄者以

其辛苦微溫能散結降氣蠱毒自不能留痿躄由肺

熱葉焦紫苑專通肺氣使熱從溲便去耳別錄療欬

唾膿血大明消痰止渴皆滋肺經血氣之効金匱澤
漆湯用以治欬而脈沈者欬屬肺脈沈則血分之病
也亦治下痢肺痛與紫參同功其性辛而不燥潤而
不寒補而不滯善調五勞體虛止嗽定喘療驚悸吐
衄諸血又能通調水道故溺澀便血單服一兩卽効
然大泄肺氣陰虛肺熱乾欬禁用以其性專溫散而
無培養之力也 白者曰女苑大泄肺氣本經主風
寒洗洗霍亂洩利腸鳴上下無常處驚癩寒熱百病

一皆氣分受傷之病肘後方治人面黑令白方用女
苑三分鉛丹一分爲末醋漿服一刃圭日進三服十
日大便黑二十一日面白便止過用則太白矣千金
方用酒服男十日女二十日黑色皆從大便去三十
歲後不可服以肺氣漸減不可復洩也

麥門冬

本作
蔓冬

甘寒無毒去心用卽不煩心

本經主心腹結氣傷中傷飽胃絡脈絕羸瘦短氣久
服輕身不老不饑

發明 麥門冬陽中微陰入心肺腎及足陽明之經
定心熱驚煩療肺痿吐膿蓋專泄而不專收寒多人
禁服肺中伏火脈氣欲絕者加五味子人參爲生脈
散專補脈中元氣不足東垣云六七月閒溼熱方盛
人病骨乏無力身重氣短頭旋眼黑甚則痿軟故孫
真人以生脈散補其天元眞氣脈者人之元氣也人
參之甘溫瀉陰火而益元氣麥門冬甘寒滋燥金而
清水源五味子之酸鹹瀉丙火而補庚金兼益五藏

之氣也時珍曰麥門冬以地黃爲使服之令人頭不
白添精補髓通腎氣定喘促令人肌體滑澤本經主
心腹結氣傷中傷飽胃絡脈絕羸瘦短氣一氣貫下
言因過飽傷胃而致心腹氣結脈絕不通羸瘦短氣
故宜以此滋其津液通其肺胃殊非開豁痰氣消尅
飲食之謂其陰虛羸瘦喘欬上氣失音失血及風熱
暴嗽咸非所宜恐寒鬱熱邪牢不可破多成虛損之
疾痲疹欬嗽不可誤用以其性寒助陰固斂陽邪不

能發越也凡脾胃虛寒泄瀉及痘瘡虛寒作瀉產後血虛瀉渴皆非所宜

萱草

一名宜男
一名忘憂

甘平無毒

發明 萱性下走入陰故根治砂石淋下水氣及酒

痺大熱衄血搗酒服治吹乳腫痛○花治酒痺利溼

熱其花起層者有毒勿食

淡竹葉

甘寒無毒

發明 淡竹隰生嫩苗葉綠花碧根鬚結子與竹絕

然不同性專淡滲下降故能去煩熱清心利小便根
能墮胎催生

冬葵子

向日葵子也

甘寒滑無毒

本經主五藏六府寒熱羸瘦破五癰利小便

發明 向日葵質堅耐寒入冬不凋故名冬葵性滑

利竅能治藏府寒熱羸瘦破五淋利小便婦人乳房
脹痛同砂仁等分爲末熱酒服三錢其腫卽消孕婦
難產不下專取一味炒香爲末芎歸湯下三錢則易

生取晨暮轉動靈活耳夏子益奇疾方云有人手足
忽長倒生肉刺如錐痛不可忍但食葵菜卽愈亦取
其寒滑利竅之用也

蜀葵 甘寒滑無毒

發明 葵以蜀中最勝種類最多其子入藥皆性滑
利竅能潤氣血之燥千金稱其除客熱利腸胃是言
其槩也東垣取其花之白者治白帶赤者治赤帶隨
其色而爲所用被狗齧者食之瘡永不瘥

秋葵子 甘寒滑無毒

發明 葵色種種惟花於秋者獨稟金氣而色黃其子性專潤下治小便淋及催生用之與向日葵不殊其花消癰腫浸油塗湯火傷其痛卽止

龍葵

卽老鴉眼睛草

苦微甘滑寒無毒

發明 龍葵性滑如葵言苗葉也消熱散血壓丹石毒去婦人敗血老鴉眼睛言其子也善能續筋消疔腫與苗葉不異根利小便與木通煎服効

酸漿

一名燈籠草 俗名掛金燈

苦寒無毒

本經主熱煩滿定志益氣利水道

發明

酸漿利溼除熱清肺治欬化痰痰熱去而志

定氣和矣又主咽喉腫痛蓋此草治熱痰欬嗽佛耳

草治寒痰欬嗽故其主治各有專司也

敗醬草

一名苦菜又名鹿腸 根作敗醬氣故名

苦平無毒

本經主暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣

發明

敗醬乃手陽明厥陰藥善除暴熱火瘡皆取

苦寒散毒之用其治疽疔馬鞍熱氣以其性專下泄也金匱蕙苳附子敗醬散治腸癰固結未潰故取蕙苳下達敗醬苦降附子開結而爲熱因熱用之嚮導深得本經之旨若膿成熱毒勢脹不可用也而婦人下部疽蝕方中亦恆用之近世醫師罕有識者惟徽人採取筴乾曰苦筴菜惜乎不知治療之功用也

欵冬花 辛溫無毒紫色有白絲者眞蜜水拌微炒本經主欵逆上氣善喘喉痺諸驚癘寒熱邪氣

本草綱目卷二 隰草部 欵冬花 鼠麴草 渭南嚴氏彙

發明 欵冬味辛入氣分色紫歸血分雖其性溫卻不燥血故能輕揚上達觀本經主治一皆氣升火炎之病古方用爲溫肺治嗽之要藥潤肺消痰止嗽定喘喉痹喉瘖肺痿肺癰咸宜用之有人病欵多日或令燃欵冬花三兩放無風處以管吸其煙嚙之數日果愈癆寡失合陰虛勞嗽禁用以其性溫也

鼠麴草

卽鼠耳草又名佛耳草

甘平無毒

發明

別錄鼠耳主寒痹寒熱欵嗽東垣佛耳治寒

嗽及痰除肺中寒大升肺氣日華云大抵寒嗽多是
火鬱於內寒覆於外故佛耳欵冬爲之必用宣明透
膈散治寒鬱肺絡之嗽用佛耳欵冬鍾乳雄黃爲末
竝於爐中燒以筒吸煙嚙下有涎卽吐去屢効

決明子 鹹平無毒別錄云苦甘微寒無毒炒研用
本經主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出久服益精
光輕身

發明 相感志言園中種決明蛇不敢入丹溪言決

明解蛇毒本此入藥明目本經治青盲目淫眼赤淚
出取其苦寒清熱也以水調末塗腫毒貼心止鼻衄
貼太陽穴治頭疼作枕治頭風別錄療口青是主肝
經畜熱之驗也不宜久服久服令人患風伐肝搜風
太過反招風熱也本經言久服益精光輕身是指目
疾人肝熱內滯者而言若肝虛血弱者過用虛風內
擾在所必致耳

地膚子

一名落帚
又名黃蒿

甘寒無毒

本草綱目卷二

三刻醫學初階

本經主膀胱熱利小便補中益氣久服耳目聰明輕身不老

發明 眾病皆起於虛虛而多熱則小便不利精氣日燔故本經主以清利膀胱邪熱中氣自復耳目聰明矣其能祛熱利小便去陰火治客熱丹腫葉主老人夏秋閒熱淋用此搗自然汁服之卽通男子白濁用地膚子白斂爲丸滾湯下婦人白帶地膚子爲末熱酒服之屢効○苗葉燒灰煎霜制砒石粉霜水銀

硫黃雄黃礪砂毒

瞿麥

家種者
曰洛陽

苦寒無毒

本經主關格諸癰結小便不通出刺決癰腫明目去
醫破胎墮子下閉血

發明 瞿麥利小便爲君主之用故本經專主關格
諸癰結小便不通金匱方治小便利不利有水氣其人
苦渴者用栝萸瞿麥丸古方通心經利小腸爲最要
藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而

小腸別作病矣以其降泄太過也本經又言出刺取
鮮者搗塗竹木刺也破胎墮子下閉血皆利竅所致
故妊娠產後小水不利及脾虛水腫禁用以性專泄
氣也

王不留行

卽剪金花俗
名金蓋銀臺

苦甘平無毒

發明 王不留行專行血分乃陽明厥陰衝任之藥
能通乳利竅其性走而不守故妊婦禁服一婦患淋
卧久用此煎服再劑而愈其利小便出竹木刺與瞿

本草逢原卷二 隰草部 王不留行 葶藶

渭南嚴氏彙

麥同功

葶藶 辛苦寒小毒酒洗淨焙用療實水滿急生用

本經主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道

發明 葶藶苦寒不減硝黃專泄肺中之氣亦入手陽明足太陽故仲景瀉肺湯用之肺氣壅塞則膀胱之氣化不通譬之水注上竅閉則下竅不通水溼泛溢爲喘滿爲腫脹爲積聚種種諸病生矣辛能散苦

能泄大寒沈降能下行逐水故能療本經諸病亦能
泄大便爲其體輕性沈降引領肺氣下走大腸又主
肺癰喘逆痰氣結聚通身水氣脾胃虛者宜遠之大
戟去水葶藶愈脹用之不節反乃成病葶藶有甘苦
二種緩急不同大抵甜者下泄性緩雖泄肺而不傷
胃苦者下泄之性急既泄肺而復傷胃故以大棗輔
之然肺之水氣贖滿急者非此不能除但水去則止
不可過劑金匱方云葶藶傅頭瘡藥氣入腦殺人

本草綱目卷二
車前子 甘鹹寒無毒酒浸焙用

本經主氣癰止痛利水道除溼痹久服輕身耐老

發明 車前子入足太陽少陰能利小便而不走氣

與茯苓同功本經治氣癰止痛通腎氣也小便利則

溼去溼去則痹除別錄治女子淋瀝等病專取清熱

利竅之功也男女陰中有二竅一竅通精一竅通水

二竅不兼開水竅得氣化乃出精竅得火動乃泄車

前專通氣化行水道疏利膀胱溼熱不致擾動真火

而精氣甯謐矣故凡瀉利暴下病小便不利而痛者
用車前子爲末米飲服二錢利水道分清濁而穀藏
止矣又治目疾水輪不清取其降火而不傷腎也時
珍用以導小腸熱止暑溼瀉取甘平潤下之用耳陽
氣下陷腎氣虛脫人勿服 其葉搗汁溫服療火盛
泄精甚驗若虛滑精氣不固者禁用

馬鞭草

一名龍
牙草

苦微寒無毒

發明 馬鞭草色赤入肝經血分故治婦人血氣腹

脹月經不勻通經散痕治金瘡行血活血生搗汁飲
治喉痺癰腫又搗敷治下部匿瘡及蠅螻尿男子陰
腫惟陰血虛而胃弱者勿服

光明草 即狗尾草

發明 眼赤拳毛倒睫者翻轉目驗以一二莖醮水

戛去惡血甚良

鱧腸草 一名金陵草 即旱蓮草

甘酸平無毒

發明 鱧腸草腎經血分藥灸瘡發洪血不可止者

傅之立已汁塗眉髮生速而繁皆益腎養血之驗故
烏鬚髮方用之千金方有金陵煎能益髭鬚變白爲
黑也單用熬膏治大便下血腎主二便但脾胃虛大
便易瀉者勿服

連翹 苦平無毒根名連軹甘寒平小毒

本經主寒熱鼠瘻癰癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒

發明 連翹輕清而浮本手少陰厥陰氣分藥瀉心

經客熱破血結散氣聚消腫毒利小便諸痛癢瘡皆

屬心火連翹瀉心爲瘡家之聖藥十二經瘡藥中不可無此乃結者散之之義本經專主寒熱鼠瘦癭瘰癭瘤結熱等病皆由足少陽膽經氣鬱而成此藥正清膽經鬱熱癭疽惡瘡無非營衛壅遏得清涼以散之蠱毒所結得辛香以解之然苦寒之性僅可以治熱腫故癰疽潰後膿清色淡及胃弱食少者禁用○根寒降專下熱氣治溼熱發黃溼熱去而面悅好眼目明矣仲景治瘰熱在裏發黃麻黃連軹赤小豆湯

主之奈何世鮮知此如無根以實代之

陸英

一名蒴藿又
名接骨草

苦寒無毒

本經主骨閒諸痹四肢拘攣疼痠膝寒痛陰痿短氣
不足腳腫

發明 陶蘇本草甄權藥性皆言陸英卽蒴藿田野
村墟甚多人家所植高大色赤者是陸英田野所出
不紅葉上有粉者是蒴藿二味所主大率相類外臺
千金方多用之世以其賤而全置不講也

藍實 大青 小青 苦寒無毒 有二種大者曰

大青苗高如蓼小者曰小青葉光如景天 向編在麻後今併此

本經解諸毒殺蠱魅疰鬼螫毒

發明 本經取用藍實乃大青之子是即所謂蓼藍

也性稟至陰其味苦寒故能入肝本經取治蠱疰諸

毒專於清解溫熱諸邪也陽毒發斑咽痛必用之藥

而莖葉性味不異主治皆同日華子治天行熱狂疔

腫風疹朱肱治發斑咽痛有犀角大青湯大青四物

湯皆取其葉以治溫熱毒盛發斑之藥非正傷寒藥也蓋大青瀉肝膽之實火正以祛心胃之邪熱所以小兒疳熱丹毒爲要藥○小青搗敷腫癰甚效治血痢腹痛殺百藥毒解狼毒射罔斑蝥砒石等毒千金以藍葉搗汁治腹中鼈痕夏子益奇疾方用板藍汁治腹內應聲蟲陳實功以藍同貝母搗敷人面瘡皆取苦寒以散蘊結之熱毒也○藍澱以藍浸地坑一宿入石灰攪澄去水爲澱其解諸毒傳熱瘡之用則

一而殺蟲之功更効蟲為下膈非此不除今人以染缸水治噎膈皆取其殺蟲也

青黛

藍一名

鹹寒無毒

發明 青黛乃藍澱浮沫攪澄掠出收乾瀉肝膽散鬱火治溫毒發斑及產後熱痢下重千金藍青丸用之天行寒熱頭痛水研服之與藍同類而止血拔毒殺蟲之功似勝於藍又治噎膈之疾取其化蟲之力也和溺白垢冰片吹口疳最効

蓼子

生水旁者曰水蓼俗名葑草

鹹微溫無毒

本經明目溫中耐風寒下水氣療面浮腫癰瘍

發明

蓼實治消渴去熱及瘰癧瘡痞腹脹皆取其

散熱消積之功即本經下水氣面浮腫癰瘍之用其

葑草子專治痞積躄跲丸用之蓼葉治大小腸邪氣

黃帝云蓼食過多毒發心痛婦人月事來不可食蓼

及蒜善為血淋帶下扁鵲云蓼食之令人寒熱損骨

髓殺丈夫陰氣

篇蓄 苦平無毒

本經主浸淫疥瘙疽痔殺三蟲

發明 篇蓄利水散溼熱治黃痺霍亂療小兒魘病

女子陰蝕本經專主浸淫疥瘙疽痔所主皆溼熱之

病三蟲亦溼熱所化也

白蒺藜 苦辛溫無毒酒浸焙焦去刺研用

本經主惡血破癥結積聚喉痺乳難久服長肌肉明

目輕身

發明 白蒺藜性升而散入肝腎經爲治風明目要

藥風入少陰厥陰經者爲嚮導目病爲風木之邪風
盛則目病風去則目明矣本經專破惡血積聚治喉
痺乳難以苦能泄溫能宣辛能潤也此言刺蒺藜之
功用耳久服長肌肉明目輕身以其入腎益精氣也
此則專主沙苑蒺藜而言其治痰消癰腫搜腎藏風
氣又須刺者爲破敵之先鋒千金方治白癩風以一
味爲末湯服二錢日二服服至半月白處見紅點至

一月效

沙苑蒺藜 甘溫無毒產沙苑者色微黑而形似羊
腎若色微綠雖產秦中非沙苑也酒蒸搗用藥肆中
以一種野田開紅花之土蒺藜偽充咬之亦生豆氣
但缺處有尖鈎稍異耳

發明 沙苑蒺藜產於潼關得漠北之氣性降而補
益腎治腰痛爲泄精虛勞要藥最能固精故聚精丸
用此佐鰾膠大有殊功以之點湯代茶亦甚甘美益

人但腎與膀胱偏熱者禁用以其性溫助火也

穀精草 辛溫無毒

發明 穀精草性體輕浮能入陽明分野治目中諸痛甚良而去腎尤爲專藥明目退腎之功在菊花之上痘後生醫亦用之此草兔性喜食故目疾家專用與望月砂功用不殊

海金沙 甘寒無毒市鋪每以沙土雜入須淘淨取浮者曝乾燃之不沾指者真

發明 海金沙生於葉上小腸膀胱血分藥也熱伏
 二經血分者宜之故小便熱淋莖痛為要藥腎藏真
 陽不足者忌用

地椒

一名水楊梅生水邊條葉叢生似菊莖端開黃花實類椒而不赤

辛溫無毒

發明 地椒制丹砂粉霜見庚辛玉冊綱目名水楊
 梅時珍主治疔瘡腫毒

半邊蓮

辛平無毒

發明 半邊蓮小草也生陰溼塍塹邊就地細梗引

蔓節節生細葉秋開小花淡紅紫色止有半邊如蓮
花狀故名專治蛇傷搗汁飲以滓圍之

地丁 苦辛寒無毒

發明 地丁有紫花白花二種治疔腫惡瘡兼療癰
疽發背無名腫毒其花紫者莖白白者莖紫故可通
治疔腫或云隨疔腫之色而用之但漫腫無頭不赤
不腫者禁用以其性寒不利陰疽也

見腫消 酸瀉微毒

本草綱目卷二 毒草部地丁見腫消

三 渭南嚴氏彙

發明 見腫消專消癰腫及狗咬搗葉貼之傷寒餘
 毒發於耳前後用此一握同白及白斂大黃大薊苧
 根共搗成餅入芒硝一錢白蜜少許和貼留頭乾卽
 易之

毒草部

大黃

本經名黃良一名將軍

苦寒無毒產川中者色如綿紋

而潤者良若峻用攻下生用邪氣在上必用酒浸上
 引而驅熱下行破瘀血韭汁製虛勞吐血內有瘀積

韭汁拌炒黑用之大腸風祕燥結皂莢綠礬酒製又
尿桶中浸過能散瘀血兼行滲道妊娠產後慎勿輕
用實熱內結勢不可緩酒蒸用之凡服大黃下藥須
與穀氣相遠得穀氣則不行矣

本經下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌
腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五藏

發明 大黃氣味俱厚沈降純陰乃脾胃大腸肝與

三焦血分之藥凡病在五經血分者宜之若在氣分

者用之是誅伐無過矣其功專於行瘀血導血閉通
積滯破癥瘕消實熱瀉痞滿潤燥結敷腫毒總賴推
陳致新之功本經與元素皆謂去留飲宿食者以宿
食留滯中宮久而發熱故用苦寒化熱宿食亦乘勢
而下後世不察以爲大黃槩能消食謬矣蓋胃性喜
溫惡溼溫之則宿食融化寒之則堅滯不消以其能
蕩滌腸胃食積得以推蕩然後穀氣通利中氣調暢
飲食輸化五藏安和矣若食在上脘雖經發熱只須

枳實黃連以消痞熱宿食自通若誤用大黃推蕩不
下反致結滯不消爲害不淺如瀉心湯治心氣不足
吐血衄血者乃包絡肝脾之邪火有餘也雖曰瀉心
實瀉四經血中伏火也仲景治心下痞滿按之濡者
用大黃黃連瀉心湯此亦瀉脾胃之溼熱非瀉心也
若心下痞而復惡寒汗出者其人陽氣本虛加附子
以溫散之病發於陰而反下之因作痞乃痰實與邪
氣乘虛結於心下故曰瀉心實瀉脾也病發於陽而

反下之則成結胸以陽邪陷入陰分而結於膈上伸
景大陷胸湯丸皆用大黃芒硝以瀉血分之邪而降
其濁氣也若結胸在氣分則用小陷胸湯痞滿在氣
分則用半夏瀉心湯矣若病本陽邪或兼停食而攻
發太過正氣消乏實結不解擬欲攻之而正氣不能
行其藥力則加人參於桃核承氣申以助硝黃之勢
如陶氏黃龍湯之製乃先輩之成則也蓋大黃芒硝
瀉腸胃之燥熱牽牛甘遂瀉腸胃之溼熱巴豆硫黃

瀉腸胃之寒結各有定例至於老人血枯便秘氣虛
便難脾虛腹脹少食婦人血枯經閉陰虛寒熱脾氣
痞積腎虛動氣及陰疽色白不起等證不可妄用以
取虛虛之禍

商陸

一名當陸赤者性劣色白者良

辛寒有毒銅刀刮去皮水浸

一宿或醋炒或黑豆拌蒸用其赤者服之傷人令人
見鬼同生水服殺人

本經主水腫疝瘕痺躄除癰腫殺鬼精物

發明 商陸苦寒傷脾其性下行利水本經專主水腫疝瘕等疾與大戟甘遂異性同功胃氣虛弱者不可用腫滿小便不利者以赤根搗爛入麝香三分貼於臍心以帛束之得小便利卽腫消或以大蒜同白商陸煮汁服亦治腫疾仲景治大病後腰以下腫牡蠣澤瀉散用之以其病後不堪受邪故用急迫以散之也然水腫因脾虛者若誤用之一時雖効未幾再發決不可救

狼毒 苦辛寒大毒陳者良醋炒用出東魯泰山與防葵相類置水沈者爲狼毒浮者卽防葵也

本經主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸

發明 狼毒大毒非恆用之品本經治欬逆上氣惟質實氣壯暴欬者宜之又能破積聚飲食寒熱水氣以其迅利也性能殺飛鳥走獸其治惡瘡疽蝕蠱毒所不待言肘後方以狼毒二兩附子半兩治心腹連

痛脹急加旋復蜜丸日服三丸治腹中冷痛及兩脇
 氣結又為散擦惡瘡疥癬○愚按狼毒與防葵同根
 但質有輕重之別雖本經主治不同一皆瞑眩之品
 功用亦不甚相遠今狼毒內有輕浮者即係防葵無
 疑但本經條下有堅骨髓益氣輕身之說其性善走
 散力能攻逐三蟲故有益氣輕身之功本經不言攻
 蟲而攻蟲之用與狼牙無異

狼牙 本經名牙子

苦辛寒有毒以其形似獸牙故名白

者良○中涇糜爛生衣者殺人

本經主邪氣熱氣疥瘙惡瘍瘡痔去白蟲

發明 狼牙較狼毒之性稍緩而所治亦相類金匱

九痛丸用狼牙局方用狼毒方用附子三兩狼牙人

參吳茱萸乾薑各一兩巴霜一錢蜜丸梧子大日服

二三丸治九種心痛并卒中惡腹脹滿又連年積冷

流注心胸痛及冷衝上氣落馬墜車血疾皆主之本

經治邪氣熱氣去白蟲蓋心痛多有屬蟲積者故前

方用之亦治惡瘍瘡痔金匱外臺千金竝以煎洗陰
瘡蝕癢搗汁治射工溪毒肘後以之搗貼金瘡外臺
以之蜜丸漿水服一丸治寸白蟲皆取殺蟲解毒之
功也

防葵 辛寒有毒

本經主疝瘕腸泄膀胱熱結溺不下欬逆溼瘡癩
驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身

發明 防葵辛寒性善走散能治疝瘕腸泄膀胱熱

結等證而別錄又言療五藏虛氣小腹支滿臚脹口
乾除腎邪強志中有火者不可久服令人恍惚見鬼
二說各有主見一以治濁邪支塞驚邪狂走故須久
服開除積垢自然髓充骨堅正氣自復一以療五藏
虛氣腎邪逆滿故不可久服久服恐正氣愈虛不能
制五志之火引領痰溼上侮君主令人恍惚見鬼同
一防葵而有治驚邪狂走與久服見鬼之不同也嘗
攷千金方防葵爲治風虛通血脈之上藥每與參朮

鍾乳石英竝用取其祛逐風虛通利血脈而正氣得復腎志自強當無助火爲虐之慮矣

藺茹 辛寒有小毒折之汁出凝黑如漆故名漆頭藺茹色白者名草藺茹

本經主疽蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不寐

發明 藺茹本經治惡肉敗瘡等病而素問四烏鯁一蘆茹丸當非此藺茹可知也聖惠治頭風旋眩干

金治小兒癰疽竝用漆頭藺茹姚僧坦治癰疽去惡
血有白藺茹丸二者皆能散血其治善忘不寐亦是
因風熱侵犯心包膽府所致散其風熱則無不寐善
忘之患矣

大戟 苦辛大寒有毒反甘草入藥惟用正根誤服
傍株令人冷瀉棗煮則不損脾乘軟去骨用

本經主蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛
吐逆

發明 大戟性稟陰毒峻利首推苦寒下走腎陰辛散上瀉肺氣兼橫行經脈故本經專治蠱毒十二水腹滿急痛等證皆濁陰填塞所致然惟暴脹爲宜云中風者是指風水膚脹而言否則傳寫之誤耳夫大戟甘遂之苦以泄水者腎所主也痰涎之爲物隨氣升降無處不到入於心則迷竅而成癩癩妄言妄見入於肺則塞竅而成欬唾稠粘喘急背冷入於肝則留伏蓄聚而成脇痛乾嘔寒熱往來入於經絡則麻

痺疼痛入於筋骨則頸項胸背腰脇手足牽引隱痛
三因方竝以控涎丹主之大戟能泄藏府之水溼甘
遂能行經隧之水溼白芥子能散皮裏膜外之痰氣
惟善用者能收奇功也痘瘡變黑歸腎棗變百祥丸
用大戟製棗去戟用棗以瀉肝邪非瀉腎也實則瀉
其子因腎邪實而瀉其肝也仲景云心下痞滿引脇
下痛乾嘔短氣者十棗湯主之其中亦有大戟夫乾
嘔脇痛豈非肝膽之病乎百祥丸之瀉肝明矣至玉

樞丹同續隨子山茨菇等解蠱毒藥則又不獨肝膽
矣其脾胃肝腎虛寒陰水泛濫犯之立斃不可不察
澤漆 本經名
漆莖 苦寒小毒別錄日華陶氏皆言是大
戟苗綱目名貓兒眼睛草時珍云江湖源澤多有之
搯莖有白汁粘人故名

本經主皮膚大熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰
氣不足

發明 澤漆利水功類大戟遂誤以爲大戟苗本經

言利丈夫陰氣則與大戟不相侔也其治皮膚大熱面浮腹大等證兼挾表熱而言其性與大戟亦相類也金匱澤漆湯方用澤漆半夏紫參白前甘草人參桂心生薑以治肺欬上氣脈沈大明言止瘧疾消痰退熱肘後聖惠易簡伏瘕水腫腳氣皆用之

甘遂 苦甘大寒有毒麩裏煨熟用反甘草其根皮赤肉色白作連珠大如指頭質重不蛀者良赤皮者其性尤烈

本經主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥堅
積聚利水穀道

發明 甘遂色白味苦先升後降乃瀉水之峻藥本
經治大腹疝瘕面目浮腫留飲宿食等病取其苦寒
迅利疏通十二經攻堅破結直達水氣所結之處仲
景大陷胸湯金匱甘草半夏湯用之但大瀉元氣且
有毒不可輕用腎主水凝則爲痰飲溢則爲腫脹甘
遂能泄腎經溼氣治痰之本也不可過服中病則止

仲景治心下留飲與甘草同用取其相反而立功也
肘後方治身面浮腫甘遂末二錢以雄猪腎一枚分
七片入末拌勻溼紙裹煨令熟每日服一片至四五
服當腹鳴小便利是其効也然水腫鼓脹類多脾陰
不足土虛不能制水法當辛溫補脾實土兼利小便
若誤用甘遂大戟商陸牽牛等味禍不旋踵而癩癩
心風血邪甘遂二錢爲末以猪心管血和藥入心內
縛定溼紙裏煨熟取藥入辰砂末一錢分四圓每服

一圓以猪心煎湯下大便利下惡物為効未下更服
 一圓凡水腫未全消者以甘遂末塗腹遠臍令滿內
 服甘草湯其腫便去二物相反而感應如此塗腫毒
 如上法亦得散又治肥人卒然耳聾甘遂一枚綿裹
 塞耳中口嚼甘草耳卒然自通也

續隨子

即干金子

辛溫有毒去殼取色白者以紙包壓

去油取霜用

發明

續隨子下氣最速然有毒損人與大戟澤漆

甘遂莖葉相似主療亦相似其功長於利水解毒故
玉樞丹用之服後瀉多以醋同粥食卽止若脾虛便
滑之人誤服必死黑子疣贅續隨子搗爛時塗之自
落或以煮線繫瘤根時時繫之漸脫

葇荳

一名天
仙子

子苦寒根苦辛有毒

本經主齒痛出蟲肉痺拘急多食令人狂走

發明 葇荳入癩狂方用然皆用其子耳故言勿令
子破破則令人發狂本經治肉痺蟲蠹用其毒以攻

治也千金治石癰堅硬不作膿者葇蓉子爲末醋和
傅瘡頭根卽拔出打撲折傷羊脂調葇蓉子末傅之
○葇蓉根主治與子不殊瘡疾不止葇蓉根燒灰水
服一錢匕卽止惡癬有蟲葇蓉根搗爛和蜜傅之惡
刺傷人葇蓉根水煮汁浸冷卽易之箭頭不出此亦
主之皆千金神方也狂犬咬人葇蓉根和鹽日三傅
之此外臺祕要方也今人用根治噎膈反胃取其性
走以祛胃中留滯之邪噎膈得以暫開虛者誤服爲

害不測時珍云葇蓉之功未見如所說而其毒有甚焉煮一二日尙能生芽其爲物可知矣服葇蓉雲實防葵赤商陸皆令人狂惑見鬼者蓋此類皆稟陰毒能使痰迷心竅閉其神明以亂視聽故耳

蓖麻子 甘辛溫有毒去殼取仁白者良禁食炒豆犯之必脹

發明 蓖麻屬陰其性善收能追膿取毒拔邪外出爲外科要藥能出有形之滯物故取胎產胞衣剩骨

膠血者用之時珍云薺麻甘辛有熱毒氣味頗近巴
豆亦能利人故下水氣其性善走能開通諸竅經絡
治偏風失音口噤口目喎斜頭風七竅諸病不止於
出有形之物也蓋鵝鵝油能引藥氣入內薺麻油能
拔病氣出外故諸膏多用之偏風手足不舉同羊脂
穿山甲麝香煎膏日摩漸正研塗瘰癧痘毒癰腫卽
消蓋能引毒外出耳一人病手臂結塊腫痛用薺麻
仁搗膏貼之卽愈一人病氣鬱而偏頭痛用此同乳

香食鹽搗敷太陽其痛立止一婦產後子腸不收搗貼丹田卽上此藥外用屢奏奇勛但不宜內服耳

常山

一名恆山

苦辛溫有毒川產淡黃細實如雞骨者

良醋炒則不吐人

本經主傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆

發明 夫瘧有六經五藏痰溼食積風邪瘴疫須分

陰陽虛實不可一槩論也常山治瘧有劫痰截病之

功須在發散表邪及提出陽分之後服之得宜生用

多用則上行必吐若酒浸炒透則氣少緩稍用錢許亦不致吐也得甘草則吐得大黃則利蓋無痰不作瘧常山專在驅逐痰水楊士羸云常山治瘧人皆薄之瘧家多畜痰涎黃水或停瀦心下或結癖脇間乃生寒熱法當吐涎逐水常山豈容不用所以本經專主寒熱溫瘧痰結吐逆以瘧病多由傷寒寒熱或時氣溫疫而致痰水蓄聚心下也夫水在上焦則常山能吐之水在脇下則常山能破其癖而下其水但須

行血藥佐之如桃仁蓬朮穿山甲之類其有純熱發
瘡或蘊熱內實之證投以常山大便點滴而下似泄
非泄須用大黃爲佐瀉利數行然後獲愈常山陰毒
之草其性暴悍雖有破瘡逐飲之能然善損真氣所
以仲景治瘡方中從無及此而夏傷於暑秋必痲痺
及瘡在三陰元氣虛寒人則常山穿山甲輩皆爲戈
戟

蜀漆 苦辛溫有毒

本草經原卷二 毒草部 蜀漆 藜蘆

渭南嚴氏彙

本經主癰及欬逆寒熱腹中癢堅積聚邪氣蠱毒鬼
疰

發明 蜀漆即常山之苗故本經治癰及欬逆寒熱
積聚蠱毒功效與之相類金匱治牝癰獨寒不熱者
有蜀漆散用蜀漆雲母龍骨酢漿水服之溫癰加蜀
漆一錢用酸漿者取酸收以斂蜀漆之辛散也

藜蘆 辛苦寒有毒反五參服之吐不止者飲蔥湯
卽止

本經主蠱毒欬逆泄痢腸澼頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲
毒去死肌

發明 藜蘆服錢匙則惡吐而本經治蠱毒欬逆泄
利腸澼是指積氣內盛者而言積去則欬與利止矣
又通頂令人噫按常山吐瘧痰瓜蒂吐熱痰烏附尖
吐溼痰萊菔子吐氣痰藜蘆則吐風痰者也凡胸中
有老痰或中蠱毒止可借其宣吐切勿沾口大損胃
中津液也若欬逆泄利腸澼等證苟非實邪壅滯慎

勿輕試不可因本經之言而致惑也別錄治喉痹不通鼻中瘰肉竝爲散吹鼻孔效

附子 辛熱大毒反半夏瓜萆貝母白薇古方以一兩一枚者爲力全近時專取大者爲勝用鹽過多雖一兩五六錢製熟不及七八錢且容易腐爛若欲久藏須同竈灰入礮中置近火處庶可經久其性熱有毒必正節角少頂細臍正者爲上頂粗有節多鼠乳者次之傷缺偏縐者爲下有兩岐者名烏喙此稟氣

不正耑主大風頑痺附子生用則散陰寒熟用則助
眞元生用去皮臍熟用甘草童便製若欲久藏一味
甘草濃煎汁煮汁盡爲度入陽虛補劑用黃連甘草
製凡中其毒生萊菔汁及黃連解之近時烏附多產
陝西其質粗其皮厚其色白其肉鬆其味易行易過
非若川附之色黑皮薄肉理緊細性味之辛而不烈
久而愈辣峻補命門眞火也

本經主風寒欬逆邪氣寒溼踈躄拘攣膝痛不能行

步破癥堅積聚血痕金瘡

發明 附子氣味俱厚而辛烈能通行十二經無所
不至煖脾胃而通噎膈補命門而救陽虛除心腹腰
膝冷痛開肢體痺溼痿弱療傷寒呃逆不止主督脈
脊強而厥救寒疝引痛欲死斂癰疽久潰不收及小
兒脾弱慢驚竝須製熟用之附子爲陰證要藥凡傷
寒陰證厥逆直中三陰及中寒夾陰雖身熱而脈沈
細或浮虛無力者非此不治或厥冷腹痛脈沈細甚

則脣青囊縮者急須生附以峻溫散之本經治風寒
欬逆當是陰寒呃逆亥豕之謬詳本經所主諸證皆
陰寒之邪乘虛客犯所致其主金瘡者是傷久氣血
虛寒不能收斂非血出不止之金瘡也別錄又主腰
脊風寒腳氣痿弱心腹冷痛等病總取溫經散寒之
力耳附子稟雄壯之質有斬關奪將之能能引補氣
藥行十二經以追復散失之元陽引補血藥入血分
以培養不足之眞陰引發散藥開腠理以驅逐在表

之風寒引溫暖藥達下焦以祛除在裡之冷溼附子
以白朮爲佐乃除寒溼之聖藥然須竝用生者方得
開通經絡若氣虛熱甚宜少用熟附以行參耆之力
肥人多溼亦宜少加烏附行經附子得乾薑炙甘草
名四逆湯主少陰經寒證得桂枝甘草薑棗名桂枝
附子湯治風溼相搏身體疼煩不能轉側得白朮甘
草薑棗名朮附湯治風虛頭重眩極得麻黃細辛名
麻黃附子細辛湯治少陰病發熱脈沈得大黃芩連

名附子瀉心湯治心下痞而惡寒汗出得大黃細辛
名大黃附子湯治脇下偏痛發熱脈弦緊得參朮苓
芍名附子湯治少陰病始得之背惡寒得茯苓白朮
芍藥生薑名眞武湯治少陰病腹痛小便不利四肢
疼痛自利得乾薑蔥白名白通湯治少陰病利下脈
微若厥逆無脈乾嘔而煩面色赤加蔥白以通陽氣
此皆得配合之神妙能起死回生於反掌間生熟各
隨本方趙嗣眞云生附配乾薑補中有發熟附配麻

黃發中有補宜生宜熟不出此中妙用也至於崔氏
八味丸用爲少陰嚮導後世認爲補藥誤矣東垣治
陰盛格陽面赤目赤煩渴引飲脈來七八至但按之
卽散者用乾薑附子湯加人參半筋服之得汗而愈
時珍云陰寒在下虛陽在上治之以寒則陰氣愈盛
治之以熱則拒而不納熱藥冷服下咽之後冷性旣
消熱性便發病氣隨愈此熱因寒用之法也附子性
沈著溫脾逐寒烏頭性升發溫脾去風若寒疾卽用

附子風疾卽用烏頭二藥俱走而不守故墮胎爲百藥長然妊娠脈弦發熱胎脹惡寒小腹如扇金匱用附子湯以安其胎此神聖之妙用也若傷寒發熱頭痛皆除熱傳三陰而見厥逆脈沈此厥深熱深之候證必先發熱頭痛七八日或十餘日後而見厥冷脈沈此爲陽厥大便必不瀉而閉及溫疫熱伏厥逆與陰虛內熱火鬱於內而惡寒者誤用不旋踵告變矣附子乃退陰回陽必用之藥近世疑而不用直待陰

極陽竭而用已遲矣且夾陰頭痛足冷上熱下寒陰
邪內盛陽氣外衰急需人參健脈以益其原佐以附
子溫經散寒捨此不用將何救之

川烏頭 辛熱有毒入祛風藥同細辛黑豆煮入活
絡藥同甘草炮製按烏頭乃附子之母春生新附卽
採其母諸家本草未嘗發明但云春採者爲烏頭故
舉世誤認烏頭爲春時取附子之小者往往以側子
代用誤人多矣反半夏

發明 烏頭得春升之氣故治風爲嚮導主中風惡
風半身不遂風寒溼痺心腹冷痛肩髀痛不可俛仰
及陰疽久不潰者潰久瘡寒歹肉不斂者竝宜少加
以通血脈惟在用之得宜小兒慢驚搐搦涎壅厥逆
生川烏全蠍加生薑煎服効其烏頭之尖爲末茶清
服半錢吐癩癩風痰取其銳氣從下焦直達病所借
茶清涌之而出也夫藥之相反者以烏頭半夏爲最
而金匱赤丸及普濟方俱二味同用非妙達聖義者

難以語此

天雄 辛溫大毒卽附子之獨顆無附大倍附子者
製法與附子同

本經主大風寒溼痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣
金瘡強骨髓輕身健行

發明 天雄稟純陽之性補命門三焦壯陽精強腎
氣過於附子故本經用以治大風寒開溼痺歷節拘
攣諸病陽氣衰痿者佐人參用之天雄附子性皆下

行若上焦陽虛者當用參耆不當用此也且烏附之尖皆是向下生者其臍乃向上生苗處宗奭元素皆誤認尖爲上惟震亨以爲下部之佐者得之肘後三建湯治元陽素虛寒邪外入厥冷脈沈及傷寒陰毒川烏附子天雄炮製等分每服四錢加生薑十五片溫服金匱治男子失精用天雄龍骨桂枝白朮爲散酒服半錢淮南用天雄一枚納雄雞腹中煮爛搗食之令人勇取壯肝腎之氣也

側子即煎子

辛熱大毒

發明 側子乃散生烏附之旁側體無定在其氣輕揚宜其發散四肢充達皮毛爲治風之藥唐元希聲治癱瘓有側子湯見外臺秘要○又附子之初生瑣細未成者曰漏籃言其小而籃不能盛漏出籃下也專治冷漏惡瘡

草烏頭

一名毒公

辛熱大毒即烏頭

之野生者或生用

或炮用各隨本方有兩岐相合如烏之喙者名烏喙

本經主中風惡風洗洗出汗除寒溼痺欬逆上氣破積聚寒熱其汁煎之名射罔殺禽獸

發明 草烏頭射罔乃至毒之物非若川烏頭附子

之比自非風頑急疾不可輕投此藥止能搜風勝溼開頑痰治頑瘡以毒攻毒而已本經治惡風洗洗汗出但能去惡風而不能回陽散寒可知昔人病風癰服草烏頭木鼈子藥過多甫入腹遂麻痺不救烏附五種主治攸分附子大壯元陽雖偏下焦而周身內

外無所不至天雄峻補不減於附而無頃刻回陽之
功川烏耑搜風溼痛痺卻少溫經之力側子善行四
末不入藏府草烏悍烈僅堪外治此烏附之同類異
性者至於烏喙稟氣不純服食遠之可也

射罔 苦溫大毒人中射罔毒以甘草藍汁小豆葉
浮萍冷水薺芫皆可一味禦之

發明 烏喙射罔至毒之藥雖有治尸疰癥堅瘦瘡
毒腫及蛇咬先取塗肉四畔漸漸近瘡習習逐病至

骨瘡有熱膿及黃水者可塗之若無膿水有生血及新傷破卽不可塗立能殺人

白附子 甘辛溫小毒

發明 白附子純陽引藥勢上行乃陽明經藥治肝腎風癱陰癢洗肝黑入面脂用其性燥血耗氣是以類中風證雖有痰壅禁用小兒慢驚勿服

天南星 本經名虎掌

苦辛溫有毒治風痰生用須以礬

湯浸若熟用以溼紙包於塘火中炮製用造膽星法

以南星磨末篩去皮臘月入黃牛膽中懸當風處乾
之年久多拌者良或兼蜂蜜以潤其燥但色易黑不
能久藏

本經主心痛寒熱結氣積聚伏梁筋痿拘緩利水道
發明 天南星之名始自開寶卽本經之虎掌也以
葉取象則名虎掌根類取名故曰南星雖具二名實
係一物爲開滌風痰之耑藥本經治心痛寒熱結氣
卽開寶之下氣利胸膈也本經之治積聚伏梁卽開

寶之破堅積也本經之治筋痿拘緩卽開寶之治中
風除麻痺也本經之利水道卽開寶之散血墮胎也
夫水由血不歸經所化蘊積於經而爲溼熱則風從
內發津液凝聚爲腫脹爲麻痺爲眩暈爲顛仆爲口
噤身強爲筋脈拘緩爲口眼喎斜各隨身之所偏而
留著不散內爲積聚外爲癰腫上爲心痛下爲墮胎
種種變端總由溼熱所致蓋緣一物二名後世各執
一例是不能無兩岐之說卽仲淳之明尙以開寶之

文衍之爲疏而本經主治置之罔聞何怪諸家採集藥性一皆舍本逐末乎按天南星味辛而麻故能治風散血氣溫而燥故能勝溼除痰性緊而毒故能攻積拔腫而治口喎舌糜諸風口禁更以石菖蒲人參佐之南星半夏皆治痰藥也然南星專走經絡故中風麻痺以之爲嚮導半夏專走腸胃故嘔逆泄瀉以之爲嚮導千金治婦人頭風攻目作痛掘地作坑燒赤入南星於中以醋沃之葢定候冷爲末酒服半錢

易簡治面生瘡于醋調南星末塗之其新生之芽曰
由跋本經治毒腫結氣千金方用之取其開結熱之
用耳

半夏 辛溫有毒湯浸同皂莢白礬煮熟薑汁拌焙
乾用或皂莢白礬薑汁竹瀝四製尤妙咽痛醋炒用
小兒驚痰發搐及膽虛不得眠猪膽汁炒入脾胃丸
劑爲細末薑汁拌和作麴候陳炒用反烏附者以辛
燥鼓激悍烈之性也忌羊血海藻飴糖者以甘膩凝

滯開發之力也

本經主傷寒寒熱心下堅胸脹欬逆頭眩咽喉腫痛
腸鳴下氣止汗

發明 半夏爲足少陽本藥兼入足陽明太陰虛而
有痰氣宜加用之胃冷嘔噦方藥之最要止嘔爲足
陽明除痰爲足太陰柴胡爲之使故小柴胡湯用之
雖爲止嘔亦助柴胡黃芩主往來寒熱也本經治傷
寒寒熱非取其辛溫散結之力歟治心下堅胸脹非

取其攻堅消痞之力歟治欬逆頭眩非取其滌痰散
邪之力歟治咽喉腫痛非取其分解陰火之力歟治
腸鳴下氣止汗非取其利水開痰之力歟同蒼朮茯
苓治溼痰同括蕞黃芩治熱痰同南星前胡治風痰
同芥子薑汁治寒痰惟燥痰宜括蕞貝母非半夏所
能治也半夏性燥能去溼豁痰健脾今人惟知半夏
去痰不言益脾利水脾無留溼則不生痰故脾爲生
痰之源肺爲貯痰之器半夏能主痰飲及腹脹者爲

其體滑而味辛性溫也二陳湯能使大便潤而小便
長世俗皆以半夏南星爲性燥誤矣溼去則土燥痰
涎不生非二物之性燥也古方治咽痛喉痹吐血下
血多用二物非禁劑也按靈樞云陽氣滿則陽蹻盛
不得入於陰陰虛則目不瞑飲以半夏湯一劑通其
陰陽其臥立至半夏得括蕞實黃連名小陷胸湯治
傷寒小結胸得雞子清苦酒名苦酒湯治少陰咽痛
生瘡語聲不出得生薑名小半夏湯治支飲作嘔得

人參白蜜名大半夏湯治嘔吐反胃得麻黃蜜丸名
半夏麻黃丸治心下悸忪得茯苓甘草以醋煮半夏
共爲末薑汁麩糊丸名消暑丸治伏暑引飲脾胃不
和此皆得半夏之妙用惟陰虛羸瘦骨蒸汗泄火鬱
頭痛熱傷欬嗽及消渴肺痿欬逆失血肢體羸瘦禁
用以非溼熱之邪而用利竅行溼之藥重竭其津醫
之罪也豈藥之咎哉

蚤休

卽草紫河車金線重樓俗名七葉一枝花

苦微寒有毒

本草綱目卷二

毒草部

蚤休

鬼臼

七

渭南嚴氏彙

本經主驚癩搖頭弄舌熱氣在腹中

發明 蚤休足厥陰經藥能治驚癩瘧疾癩癰腫

詳本經主治總取開結導熱而驚癩搖頭弄舌之熱

邪自除陽氣虛者禁用醋磨敷癰腫蛇毒有效

鬼曰 本經名九曰一名天曰一名馬目毒公又有尤律草害母草獨腳蓮羞天花瑤田片山荷葉入

角盤唐婆鏡鬼藥

節犀解毒等名

辛溫有毒

本經殺蟲毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒

發明 鬼曰辛溫以毒攻毒之猛藥本經殺鬼疰蟲

毒辟惡逐邪甯無顧名思實之意其治邪癰陰疽蛇
毒用之良方一字神散治子死腹中無灰酒下一錢
立効射工中人寒熱發瘡鬼曰葉一握苦酒搗汁服
一升日二次効

射干

本經名烏扇其葉叢生橫鋪一面如烏翅及扇
之狀故有烏髮烏吹烏蒲鳳翼鬼扇扁竹仙人

掌等
名

苦辛微溫有毒米泔浸煮熟炒用

本經主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中

邪逆食飲大熱

發明 苦能下泄辛能上散本經治欬逆上氣喉痺
咽痛不得消息專取散結氣之功爲喉痺咽痛要藥
痘中咽痛隨手取効以其力能解散毒鬱也治腹中
邪逆食飲大熱是指宿血在內發熱而言卽別錄療
老血在心脾間之謂金匱治欬而上氣喉中水鷄聲
有射干麻黃湯又治瘧母驚甲煎丸用烏扇燒過取
其降厥陰之相火也火降則血散腫消而痰結自解
千金治喉痺有烏扇膏中射工毒生瘡烏扇升麻煎

服以滓敷瘡上効治便毒射干同生薑煎服利兩三
行卽効以其性善降服之必瀉虛人禁用苗名鳶尾
根名鳶頭又名東海鳶頭千金治蠱毒方用之

玉簪根

卽白
鶴花

苦辛溫有毒

發明

玉簪入骨奕堅故能下骨鯁以根搗自然汁

於竹筒灌入喉不可著牙齒刮骨取牙玉簪根乾者
一錢白砒三分白礪七分蓬砂三分威靈仙三分草
烏頭一分半爲末點少許疼處自落

鳳仙子 又名急
性子

苦溫小毒

發明 鳳仙子性最急速故能透骨軟堅通竅搜頑
痰下死胎積塊噎膈骨鯁治狂癡勝金丹用之取其
性急領砒藥吐泄也庖人煮肉硬者投子數粒即易
爛是其驗也性與玉簪根同不可著齒多食戟人咽
入砒點疼牙即落同獨辦蒜搗塗痞塊即消加麝香
阿魏尤捷花治蛇傷搗酒服之即解

曼陀羅花 實名
風茄

辛溫有毒

發明 此花浸酒治風少頃昏昏如醉動火之患也
故麻藥爲之首推八月採此花七月採麻子花陰乾
等分爲末熱酒調服三錢少頃昏昏如醉剗瘡炙火
宜先敷此則不覺苦也寒溼腳氣煎湯洗之

羊躑躅

卽開
羊花

辛溫大毒惡諸石及麩不入湯劑

本經主賊風在皮膚中淫淫痛溫瘡惡毒諸瘰

發明 羊躑躅治中風癱瘓性祛風寒溼邪故可以

治諸瘰惡毒正與本經之治相符用其毒以攻毒也

然須諒病人虛實而用和劑局方伏虎丹中用之南方治蠱毒有躑躅花散其性之猛烈可知此物有大毒曾有人以根入酒飲遂致於斃不可近眼令人昏翳同天南星川烏草烏助虐尤甚中其毒者以菜豆解之

芫花 苦辛溫有毒陳者良水浸一宿晒乾醋炒以去其毒弘景曰用者微熬不可近眼反甘草

本經主欬逆上氣喉鳴咽腫短氣蠱毒鬼瘡疔瘰癧

腫殺蟲魚

發明 芫花消痰飲水腫故本經治欬逆咽腫疝瘕

癰毒皆是痰溼內壅之象仲景治傷寒表不解心下

有水氣乾嘔發熱而欬或喘或利者小青龍湯主之

若表已解有時頭痛汗出惡寒心下有水氣乾嘔痛

引兩脇或喘或欬者十棗湯主之蓋小青龍湯驅逐

表邪使水氣從毛竅而出內經開鬼門法也十棗湯

驅逐裏邪使水氣從大小便而泄內經潔淨府去菑

陳莖法也芫花大戟甘遂之性逐水瀉溼能直達水
飲窠囊隱僻處取効甚捷不可過劑泄人眞元

蕘花 苦寒有毒熬黃用芫花葉尖如柳花紫似荆
蕘花苗莖無刺花細色黃與芫花絕不相似或言無
蕘花以芫花代之性相近耳

本經主傷寒溫瘧下十二經水破積聚大堅癥瘕蕩
滌胸中留癖飲食寒熱邪氣利水道

發明 蕘花苦辛能破積聚癥瘕治痰飲欬逆去咽

喉腫閉本經治傷寒溫瘧者取苦寒以攻蘊積伏匿
之邪也言下十二經水又治飲食寒熱邪氣者以其
苦寒峻利飲食之邪亦得蕩滌而寒熱自除也仲景
用此止利以行水水去則利止矣又小青龍湯云若
微利者去麻黃加薏花蓋亦取其利水也愚按芫花
薏花雖有辛溫開表苦寒走滲之不同而破結逐水
之功用彷彿本經雖無芫花利水之說而仲景十棗
湯耑行利水是以藥肆皆不辨混收醫家亦不辨混

用猶夫食穀得以療饑食黍亦可療饑混用可無妨
礙若礬石礬石字形相類藥狀亦相類可不辨而混
用耶

莽草

一名蒺卽鼠莽本作蒺字此物有毒食之令人
迷罔故名山人以之毒鼠漁人以之毒魚與醉

魚草總
一類

辛溫有毒

本經主頭風癰腫疝瘕除結氣疥瘙殺蟲魚

發明 莽草大毒善殺魚鼠其性可知本經治疝瘕

結氣蕩滌在內之宿積也療癰腫頭風搜逐在外之

邪毒也但性最猛烈服之令人瞑眩千金方每與茵
芋同爲搜風滌惡之峻劑近世罕能用之惟毒魚之
外僅以浴頑癩溼風及煎嗽蟲牙然沐時勿令入眼
中其毒者惟草紫河車磨水服之可解黑豆煮汁服
之亦解以豆汁澆莽根則爛物類之相制如此至於
茵芋人所未識母怪近世醫術之卑也

茵芋 苦辛溫有毒生泰山川谷春生苗高三四尺
莖赤葉似石榴而短厚又似石南四月開緋白花五

月結實今彭城海鹽杭州雍州絳州華州皆有四月採葉七月採莖陰乾用之

本經主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如瘡狀發作有時諸關節風溼痺痛

發明茵芋大毒世亦罕用本經雖有治羸瘦如瘡狀一語皆是五藏有邪氣心腹寒熱所致非能療虛羸寒熱也其治關節風溼痺痛是其正治時珍曰千金外臺諸方治風癩有茵芋丸治風癩有茵芋酒治

婦人產後中風有茵芋膏風溼諸方多用之茵芋石
南莽草皆古人治風妙品近世罕知

鈎吻

本經名野葛紅花者名火把草
黃花者名黃藤千金名黃野葛

辛溫大毒

本經主金瘡乳痃中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱
毒

發明 野葛之毒甚於戈戟故有鈎吻之名而風毒

蠱疰用之以毒攻毒苟非大劇亦難輕用紫者破血
結青者破痰積其葉與黃精葉相似但鈎吻葉有毛

之系... 蔓草部 菟絲子 訓方 刻醫學初階

鈎二箇黃精葉似竹葉而無毛鈎可以明辨誤食鈎
吻葉飲冷水卽死以死尸懸樹上汁滴在地卽生菌
子收之名菌藥毒於野葛薤菜搗汁解之取薤菜汁
滴野葛苗卽萎死中野葛毒急不可得薤菜多飲甘
草汁人屎汁或白鴨血白鵝血羊血灌之亦解

蔓草部

菟絲子

本經名
菟蘿

辛甘平無毒酒煮搗爛作餅焙乾

用雷公曰凡使勿用天碧草子真相似只是味酸澆

并粘也菟絲最難得真有人以子種出皆水犀草今藥肆所賣俱係此類然服亦有微功不似假石蓮子之大苦大寒大傷胃氣伐人天元也至賤之物尙爾若此況珍貴之品能無僞乎

本經續絕傷補不足益氣力肥健人

發明 菟絲子去風明目肝腎氣分藥也其性味辛溫質粘與杜仲之壯筋暖腰膝無異五味之中惟辛通四氣復兼四味經曰腎苦燥急食辛以潤之菟絲

子五味子之屬是也與辛香燥熱之辛迥乎不同此
補脾腎肝三經要藥本經言續絕傷補不足益氣力
肥健人者三經俱實而絕傷續不足補氣力長令人
肥健矣其功專於益精髓堅筋骨止遺泄主莖寒精
出溺有餘瀝去膝脛痠軟老人肝腎氣虛腰痛膝冷
合補骨脂杜仲用之諸經膜皆屬於肝也氣虛瞳子
無神者以麥門冬佐之蜜丸服効凡陽強不痿大便
燥結小水赤澇者勿用以其性偏助陽也

五味子 酸溫無毒產遼東者佳微焙搗碎用

本經主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精

發明 五味子右腎命門本藥本經主欬逆上氣強陰益男子精心腎不交者宜之兼入肺腎二經味酸而斂耗散之金性溫而滋不足之水生津止渴益氣強陰壯水鎮陽收瞳子散大定喘斂汗加乾薑治冬月肺寒欬嗽同人參門冬治夏月精神困乏而虛熱

久嗽不可誤用表散須以此去核之辛溫助火但用
皮肉之酸鹹以滋化之不宜多用恐酸收太過反致
閉遏而成虛熱也黃昏嗽乃火浮於肺不宜涼藥宜
五味子斂而降之但風邪在表痘疹初發一切停飲
肺家有實熱者皆當禁之

覆盆子

本經名
蓬蘽

甘平微溫無毒酒浸一宿炒用

本經安五藏益精氣長陰令人堅強志倍力有子久
服輕身不老

發明 覆盆子乃蓬蘽之實本經言蓬蘽者蘽卽實也或云蓬蘽是覆盆苗分之爲二殊爲未當宗奭云覆盆益腎藏縮小便服之當覆其溺器故名本經專於煖子藏服之令人多子別錄言益氣輕身令髮不白甘溫補血與桑椹同功惟秦地山中有之近世眞者絕罕藥肆每以樹莓代充欲驗眞僞以酒浸之色紅者是眞否卽是假

使君子 甘溫無毒微煨去殼

發明 凡殺蟲藥都是苦辛惟使君子甘而殺蟲不傷脾胃大人小兒有蟲病者每月上旬清晨空腹食數枚或爲散肥湯服之次日蟲從大便出忌飲熱茶犯之卽瀉凡蟲皆脾胃虛弱飲食停滯而生此物甘溫旣能殺蟲又益脾胃所以能斂虛熱而止瀉爲小兒蟲積上藥

木鱉子 土木鱉苦溫小毒番木鱉苦寒大毒又附子之初生未成者曰漏籃子炮炙論名木鱉子與此

不同

發明

木鱉有二種有殼者曰土鱉去殼搗爛帛裏
塞鼻起倒睫拳毛又爲末唾調貼痔痛七日卽消一
切癰腫醋磨塗之一種無殼者曰番鱉治熱病喉癰
作痛和山豆根青木香磨汁點之癩瘡入眼番木鱉
半箇同輕粉冰片麝香爲末左目吹右耳右目吹左
耳日三次癩瘡自退又能毒狗狗性大熱此性大寒
寒熱相反激之使然

馬兜鈴 苦辛微寒無毒去殼微焙用

發明 諸藥之性輕浮者皆能入肺散氣燈心馬勃之屬皆然諸家言其性寒專於劫痰定喘不知其苦中帶辛寒中帶散是以肺熱痰喘聲音不清者宜之錢氏補肺阿膠散用之取其清熱降氣邪去則肺安矣性善湧泄故纂要治蛇蠱毒一味濃煎服之探吐其毒卽解嬰兒麻疹內陷喘滿聲瘖者宜加用之若肺冷金寒喘嗽失音者禁用

青木香

即馬兜鈴根

辛苦微寒無毒

發明

青木香苦寒香細入足少陰善降陰氣上逆

故治風溫葳蕤湯用之并治癰腫痰結氣凝諸痛唐

本治熱腫蛇毒水磨傅之肘後治蠱毒酒水和煎服

之毒從小便出昔人言多服令人吐利肺寒欬嗽寒

痰作喘胃虛畏食人勿服以其辛香走竄也

預知子

苦寒無毒大明日溫

發明

預知子專殺蟲療蠱其治疰癖蛇毒總是殺

蟲之功相傳取子二枚綴衣領上遇有蠱毒則聞其
子有聲故名預知蜀人極貴重之

牽牛 苦辛溫有毒東垣云辛熱有毒有黑白二種
名黑丑白丑凡用生磨取頭末

發明 牽牛專一行水峻下之劑白者屬金利肺治
上焦痰飲除壅滯氣逆通大腸風祕除氣分溼熱黑
者屬水瀉腎而兼瀉脾胃之溼消腫滿腳氣利大小
便秘但病在血分或病人稍弱而痞滿者不可用東

垣云牽牛非神農藥也名醫續注云味寒能除溼氣
利小便治下注腳氣此說氣味主治俱誤凡用牽牛
少則動大便多則泄下如水乃瀉氣之藥其味辛辣
久嚼猛烈雄壯所謂苦寒安在哉夫溼者水之別稱
有形者也若受溼氣不得施化致大小便不通宜暫
用之况牽牛止能泄氣中之溼熱不能除血中之溼
熱每見酒食過傷病痞者多服牽牛散取快一時藥
過仍痞以致久服脫人元氣猶不知悔也東垣治下

焦虛腫天真丹用牽牛以鹽水炒黑佐沉香杜仲補
骨脂官桂諸藥深得補瀉兼施之妙用方見醫學發
明

紫葳

一名
凌霄

酸微寒無毒

本經主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養

胎

發明 凌霄花手足厥陰血分藥也能去血中伏火

本經主婦人崩中癥瘕又治血閉寒熱羸瘦云養胎

者以有積瘀在內瘀散則胎自安也與金匱桂心茯苓丸中用桃仁丹皮治妊娠癥瘕害無異癥瘕血閉血氣刺痛癘風惡瘡多用之皆取其散惡血之功也若無瘀血而胎息不安者禁用

旋花

一名纏枝牡丹

甘辛溫無毒制雄黃

本經主面肝墨色媚好益氣根主腹中寒熱邪氣發明 凡藤蔓之屬象人之筋所以多治筋病旋花根細如筋可啖本經言主腹中寒熱邪氣別錄言其

久服不饑時珍自京師還見北地車夫每載之云暮
歸煎湯飲可補損傷則益氣續筋之說尤可徵矣筋
被斫斷者用旋花根搗汁瀝斷處仍以滓敷日二易
半月卽續

薔薇

子名
營實

酸温無毒

本經營實主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不
瘳利關節

發明 薔薇乃野生之白花者性專解毒其實兼能

散結結肉跌筋敗瘡陰蝕皆得療之本經所主皆言
其實根能入陽明經除風殺蟲故癰疽瘡癬常用之
千金治消渴尿多以根煮飲又治口瘡之神藥聖惠
治小兒遺尿酒煮服之皆取其溫足陽明而足太陽
受蔭矣

月季花

俗名月
月紅

甘溫無毒

發明

月季花爲活血之良藥搗敷腫瘍用之痘瘡

觸犯經月之氣而伏陷者用以加入湯藥卽起以其

月之開放不失經行常度雖云取義亦活血之力也
栝萇實 甘寒無毒去熬紙包壓去油用反烏附
發明 栝萇實甘寒潤燥宜其爲治嗽消痰止渴之
要藥以能洗滌胸膈中垢膩鬱熱耳仲景治喉痹痛
引心腎欬唾喘息及結胸滿痛皆用栝萇實取其甘
寒不犯胃氣能降上焦之火使痰氣下降也其性較
栝萇根稍平而無寒鬱之患但脾胃虛及嘔吐自利
者不可用

栝萇根

卽天花粉

苦寒無毒反烏附

本經主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷

發明 栝萇根性寒降膈上熱痰潤心中煩渴除時

疾狂熱祛酒痺溼黃治癰瘍解毒排膿本經有安中

補虛續絕傷之稱以其有清胃祛熱之功火去則中

氣安津液復則血氣和而絕傷續矣其性寒降凡胃

虛吐逆陰虛勞嗽誤用反傷胃氣久必泄瀉喘欬病

根愈固矣凡痰飲色白清稀者皆當忌用

土瓜根

卽王瓜根

苦寒無毒藏器云有小毒

木經主消渴內疸瘀血月閉寒熱痠疼益氣愈聾

發明王瓜產南方者稟溼熱之氣最盛患瘡腫癰

毒者食之爲患轉甚產北地者得春升之氣最先患

消渴內疸者用之其効頗捷其根治黃疸消渴與枯

萋之性不甚相遠但不能安中補虛續絕傷調和經

絡諸血也金匱治婦人經水不調帶下少腹滿一月

再見者土瓜根散主之深得本經主瘀血月閉之旨

方用土瓜根芍藥桂心麤蟲等分爲末酒服方寸七
日三服蘇頌治小兒發黃土瓜根生搗汁服三合不
過三次効又治黃疸變黑土瓜根汁平旦溫服一小
升午刻黃水從小便出其治寒熱痠疼皆祛溼熱之
驗南陽治陽明經熱大便不通用之爲導以下溼熱
其子治肺痿吐血腸風瀉血赤白痢及反胃吐食惜
乎世醫未知用也

葛根 甘平無毒色白者良入陽明表藥生用胃熱

本經送月卷二
三刻醫學初階
煩渴煨熟用

本經主消渴身大熱嘔吐諸痺起陽氣解諸毒

發明 葛根性升屬陽能鼓舞胃中清陽之氣故本
經主消渴身熱嘔吐使胃氣敷布諸痺自開其言起
陽氣解諸毒者胃氣升發諸邪毒自不能留而解散
矣葛根乃陽明經之耑藥治頭額痛眉稜骨痛天行
熱氣嘔逆發散解肌開胃止渴宣斑發痘若太陽經
初病頭腦痛而不渴者邪尚未入陽明不可使用恐

引邪內入也仲景治太陽陽明合病自利反不利但嘔者俱用葛根湯太陽病下之遂利不止喘汗脈促者葛根黃芩黃連湯此皆隨二經表裡寒熱輕重而爲處方按證施治靡不應手神効又葛根葱白湯爲陽明頭痛仙藥斑疹已見點不可用葛根升麻恐表虛反增斑爛也又葛根輕浮生用則升陽生津熟用則鼓舞胃氣故治胃虛作渴七味白朮散用之又清暑益氣湯兼黃蘗用者以暑傷陽明額顙必脹非此

不能開發也○花能解酒毒葛花解醒湯用之必兼
人參但無酒毒者不可服用之損人天元以大開肌
肉而發泄傷津也

天門冬

即天
棘根

甘寒無毒焙熱去心用肥白者良忌

鯉魚

本經主諸暴風溼偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸久服
輕身益氣延年不饑

發明 天門冬手太陰肺經氣分藥兼通腎氣欬逆

喘促肺痿肺癰吐血衄血乾欬痰結其性寒潤能滋
肺肺氣熱而燥者宜之肺爲清虛之藏涼則氣甯熱
則氣騰天門冬能保肺使氣不受火擾合地黃麥門
冬主心肺虛熱欬吐膿血又能治熱淋同參耆定虛
喘蓋肺肅則氣化乃能出若脾虛而泄瀉惡食者雖
有前證亦莫輕投以其降泄太過也時珍云天門冬
清金降火益水之上源故能下通腎氣入滋補方用
之有效若脾胃虛寒人久服必致滑腸反成痼疾以

性寒能利大腸故也本經治諸暴風溼偏痺蓋熱則生風暴則屬火偏痺者溼熱所致故治風先清火清火在養陰也其三蟲伏尸皆脾腎溼熱所化清二經溼熱則無三蟲伏尸之患矣又能延年不饑故辟穀方多用之

百部 苦微甘小毒肥白者良抽去心用則不煩悶本經主欬嗽上氣火灸酒漬飲之

發明 百部爲殺蟲要藥故肺熱勞瘵喘嗽有寸白

蟲宜之蟻蟲痢及傳尸骨蒸多用之時珍云天麥門冬之類皆主肺痰但百部氣溫肺胃寒者宜之二冬性寒肺胃熱者宜之脾胃虛人勿用以其味苦傷胃也又濃煎洗牛馬蝨樹木蟲蛀用填孔中更削杉木塞之其蟲卽死殺蟲之功於此可知

何首烏

一名夜交藤

苦澆微溫無毒其形圓大者佳須

赤白並用製法以竹刀刮去皮拌黑豆九蒸九晒候用禁犯鐵器忌萊菔諸血勿與天雄烏附薑辛仙茅

等同用爲其性斂味濇也

發明 何首烏足厥陰少陰藥也性稟陰中之陽產南方者最勝北地所生雖極大者殊不足珍以地偏屬陰而無陽生之力也白者屬氣分赤者屬血分腎主閉藏肝主疏泄以此氣溫味苦濇苦走腎溫補肝能收斂精氣所以養血益肝固精益腎健筋骨烏鬚髮爲滋補良藥不寒不燥功在地黃天門冬諸藥之上氣血大和則風虛斑腫癩癧之疾可愈生則性兼

發散主寒熱瘧及癰疽背瘡皆用之今人治津血
枯燥及大腸風祕用鮮者數錢煎服卽通以其滋水
之性最速不及封藏卽隨之而下洩也與菴蓉之潤
燥通大便無異而無助火之虞腸風藏毒用乾者爲
末米飲日服二三錢有效蓋其內溫肝腎外祛少陰
風熱之驗也丹方治久瘧用生乾何首烏一兩柴胡
三錢黑豆隨年數加減煎成露一宿清晨熱服若夜
瘧尤効乃散中寓收補中寓散之法

本草 苦甘平無毒產川中大塊色白而鬆脆者爲
草薺若色黃赤者卽菝葜也一種小塊質堅硬者爲
土草薺不堪入藥忌茗醋

本經主腰脊痛強骨節除風寒溼周痺惡瘡不瘳熱
氣

發明 草薺苦平胃與肝家藥也入肝搜風本經主
腰脊痛強骨節入肝祛風人胃祛溼故本經主寒溼
周痺惡瘡熱氣等病昔人稱其攝精之功或稱逐水

之効何兩說相懸耶不知胃氣健旺則溼濁去而腎
無邪溼之擾腎藏自能收攝也楊氏葶藶分清飲專
主濁病正得此意又主陰痿失溺老人五緩者總取
行陽之力以利關節助健運也若陰虛精滑及元氣
下陷不能攝精小便頻數大便引急者誤用病必轉
劇以其溫散不利於陰也菝葜與葶藶相類別錄主
腰背寒痛風痺皆取祛溼熱利水堅筋骨之義

土茯苓

俗名冷飯團

甘淡平無毒忌鐵器

發明 土茯苓古名山牛入胃與肝腎清溼熱利關節止拘攣除骨痛主楊梅瘡解汞粉毒時珍云楊梅瘡起於嶺南風土炎熱嵐瘴薰蒸挾淫穢溼熱之邪發爲此瘡今則遍行海宇類有數種治之則一屬厥陰陽明如兼少陰太陽陽明發於咽喉兼太陽少陽發於頭角蓋相火寄在厥陰肌肉屬於陽明若用輕粉刮劑毒氣竄入經絡筋骨莫之能出變爲筋骨攣痛發爲結毒遂成痼疾方用土茯苓一兩薏苡忍冬

防風木瓜木通白蘚皮各五分皂莢子四分人參當
歸各七分日服三次忌飲茶燒酒及牛羊雞鵝魚肉
麩麩鹽醬并戒房勞百日渴飲土茯苓湯半月全愈
白蘚 苦甘辛微寒小毒反烏附解狼毒毒

本經主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚
癇溫瘧女子陰中腫痛帶下赤白

發明 白蘚性寒解毒敷腫瘍瘡有解散之功以其
味辛也但陰疽色淡不起胃氣弱者非其所宜本經

治目赤驚癩溫瘧非取其解熱毒之力歟治陰腫帶
下非取其去溼熱之力歟金匱薯蕷丸用之專取其
辛涼散結以解風氣百疾之蘊蓄也世醫僅知癰腫
解毒之用陋哉同地膚子治淋濁失精同白芨治金
瘡失血同甘草解狼毒之毒其辛散之功可知而癰
疽已潰者不宜用

山豆根 苦寒無毒

發明 山豆根大苦大寒故能治咽喉諸疾蘇頌言

含之嚙汁解咽喉腫痛極妙或水浸含漱或煎湯細
呷又解痘疹熱毒及喉痺藥皆驗蓋咽證皆屬陰氣
上逆故用苦寒以降之開寶言解諸藥毒止痛消瘡
腫毒發熱欬嗽善治人馬急黃殺小蟲時珍云腹脹
喘滿研末湯服血氣腹脹酒服三錢卒患熱厥心痛
磨汁服總賴苦寒以散之但脾胃虛寒作瀉者禁用
黃藥子 苦平無毒

發明 黃藥子治諸惡腫瘡癭喉痺及蛇犬咬毒研

水服之并用外塗千金治瘦疾以黃藥子半筋無灰
酒二升浸藥固濟瓶口糠火煨候香瓶頭有津即止
時飲一杯不令絕三五日即消勿飲不爾令人項細
也又專治馬牛心脾熱病

白藥子

葉名
剪草

辛涼無毒

發明 白藥子辛涼解毒故能治金瘡出血太多發
熱用以涼血清熱則痛自止肌自生又主喉中熱塞
不通時常痛腫醋煎細呷治諸骨鯁在上即吐出在

下卽便出解野葛生金巴豆藥毒又治馬脾肺熱病
威靈仙 苦辛溫小毒

發明 威靈仙性善下走通十二經故能宣通五藏
治胃脘積痛腳脛痺溼痛風之要藥消水破堅積朝
食暮効辛能散邪故主諸風溫能泄水故主諸溼而
痘疹毒壅於上不能下達腰下脛膝起灌遲者用爲
下引立効其性利下病人壯實者誠有殊効氣虛者
服之必虛瀉而成痼疾以其耗血走氣也血虛而痛

不因風溼者勿服

茜草

素問名蘆茹又名茹蘆俗名血見愁

苦辛微溫無毒

本經主寒溼風痺黃痺補中

發明 茜根色赤而性溫味苦而帶辛色赤入營性

溫行滯味辛入肝手足厥陰血分藥也本經又以治

寒溼風痺黃痺者是溼熱之邪痺著營分用以清理

邪溼則脾胃健運寒溼風痺無所留著而黃痺自除

矣其治女子經水不通甚効詳素問四烏鯁一蘆茹

丸治婦人脫血血枯千金翼治內崩下血皆取以散
經中瘀積也病人雖見血證若泄瀉飲食不進者勿
服

防己 辛苦寒有毒

本經主風寒溫瘧熱氣諸病除邪利大小便

發明 防己辛寒純陰主下焦血分之病性劣不純

善走下行長於除溼以辛能走散兼之氣悍故主風
寒溫瘧熱氣諸病除邪利大小便此本經主治也別

錄療水腫膀胱熱通腠理利九竅皆除溼之功也弘
景曰防己是療風水要藥漢防己是根入膀胱去身
半以下溼熱木防己是苗走陽蹻治中風攣急風痺
溼熱金匱防己黃耆湯防己地黃湯木防己湯五物
防己湯皆治痰飲溼熱之要藥而千金治遺尿小便
瀉有三物木防己湯水腫亦有三物木防己湯總取
其通行經脈之力也能瀉血中溼熱通經絡中滯塞
壯健之類用之不得其宜下喉令人心煩飲食減少

至於去溼熱腫痛下注腳氣膀胱積熱誠通行十二
經之仙藥也如飲食勞倦陰虛內熱以防已泄大便
則重亡其血其不可用一也大渴引飲及久病津液
不行上焦溼熱等證防已乃下焦血藥其不可用二
也外感邪傳肺經氣分溼熱而小便黃赤此上焦氣
病其不可用三也大抵上焦溼熱皆不可用卽下焦
溼熱又當審其二便不通利者方可用之

木通

原名
通草

平淡無毒色淡黃細香者佳

本經除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘去
惡蟲

發明 木通萹萹根也入手足太陽手少陰厥陰瀉
氣分溼熱防已瀉血分溼熱脾胃不和則水道不利
乃致鬱爲寒熱爲腫脹爲淋祕爲癰痺俱宜木通淡
滲之劑分利陰陽則水行火降脾胃和而心腎平矣
本經除脾胃寒熱者以其通利溼熱也曰通利九竅
血脈關節者以其味淡滲也曰令人不忘及去惡蟲

者竅利則神識清溼散則惡蟲去以其通達九竅行
十二經故又能催生下乳散癰腫結熱惟胃虛腎冷
及傷寒大便結燥表虛多汗者禁服恐重傷津液耗
散胃汁也時珍曰木通上能通心清肺達九竅下能
泄溼祛熱豈止利小便而已哉蓋能泄丙丁則肺不
受邪能通水道水源既清而諸經之溼熱皆從小便
泄去故導赤散用之

通草

原名通脫木

平淡無毒

發明 通草輕虛色白專入太陰肺經引熱下降而
利小便入陽明胃經通氣上達而下乳汁東垣言瀉
肺利小便治五淋水腫癰閉取氣寒降味淡而升仲
景當歸四逆湯用以通在裡之溼熱也妊婦勿服以
其通竅也

鈎藤

一名鈎藤

甘微苦寒無毒取鈎用良

發明 鈎藤手足厥陰藥也足厥陰主風手厥陰主
火小兒急慢驚癇癰瘰內鈎腹痛客忤胎風大人肝

風頭旋目眩婦人帶下赤白皆肝風相火之病肝木
風靜火息則諸證自除矣

木蓮

俗名鬼
饅頭

實甘平瀋葉酸平無毒

發明 木蓮薜荔實也性耐風霜嚴冬不凋故能治

一切風癰惡瘡爲利水治血通乳要藥古方以木蓮

二枚用豬前蹄煎湯飲汁盡一日乳汁卽通無子婦

人食之亦能有乳其葉主背瘡取葉搗絞汁和蜜飲

數升以渣敷之後利卽愈煎湯主賊風疼痛乘熱熏

洗日三次痛止爲度取藤搗絞汁治白癜風癩癧惡
瘡疥癬消腫散毒療腸痔心痛陰癩但南方有瘴氣
人不可用

紫葛 甘寒苦無毒生山谷中苗似葡萄長丈許根
紫色今所在皆有之

發明 紫葛和血解毒治癰腫惡瘡取根皮搗爲末
醋和封之千金紫葛丸用之爲君以其能散寒熱結
氣也

葎草

一名勒草一名葛勒蔓俗名割人藤

甘苦寒無毒

發明

葎草蔓生道傍多刺勒人故又名葛勒蔓專

主五淋利小便散瘀血並搗汁服千金專主膏淋以

醋和服之

忍冬

即金銀花

甘溫無毒

發明

金銀花芳香而甘入脾通肺主下痢膿血為

內外癰腫之要藥解毒祛膿瀉中有補癰疽潰後之

聖藥今世但知其消腫之功昧其能利風虛也但氣

胃有痰飲氏氣

虛膿清食少便瀉者勿用痘瘡倒陷不起用此根長
流水煎浴以痘光壯爲効此卽水楊湯變法

清風藤 辛溫小毒

發明 清風藤入肝經氣分治風溼流注歷節鶴膝
麻痺瘙癢同防已浸酒治風溼痺痛一切風病熬膏
酒服一匙將患人身上拍一掌其後遍身發癢不可
當急以梳梳之欲癢止飲冷水一口卽解風病皆愈
避風數日自安

藤黃 酸澆有毒

發明 藤黃性毒而能攻毒故治蟲牙蛀齒點之卽落毒能損骨傷腎可知

水草部

澤瀉 甘鹹微寒無毒白者良利小便生用入補劑鹽酒炒油者伐胃傷脾不可用

本經主風寒溼痺乳難養五藏益氣力肥健消水久服耳目聰明不饑延年

發明 澤瀉甘鹹沉降陰中之陽入足太陽氣分素
問治酒風身熱汗出用澤瀉生朮麋銜以其能利膀
胱溼熱也金匱治支飲冒眩用澤瀉湯以逐心下痰
氣也治水畜煩渴小便不利或吐或瀉用五苓散以
泄太陽邪熱也其功長於行水本經主風寒溼痺言
風寒溼邪痺著不得去則爲腫脹爲癰閉用此疏利
水道則諸證自除蓋邪干空竅則爲乳難爲水閉澤
瀉性專利竅竅利則邪熱自通內無熱鬱則藏氣安

和而形體肥健矣所以素多溼熱之人久服耳目聰
明然亦不可過用若水道過利則腎氣虛故扁鵲云
多服病人眼今人治泄精多不敢用蓋爲腎與膀胱
虛寒而失閉藏之令得澤瀉降之而精愈滑矣當知
腎虛精滑虛陽上乘面目時赤者誠爲禁劑若溼熱
上盛而目腫相火妄動而遺泄得澤瀉清之則目腫
退而精自藏矣何禁之有仲景八味丸用之者乃取
以瀉膀胱之邪非接引也古人用補藥必兼瀉邪邪

去則補藥得力矣

羊蹄根

俗名秃菜

辛苦寒小毒傍莖有鈎如波稜菜狀

夏末結子便枯者是也

本經主頭秃疥癢除熱女子陰蝕

發明 羊蹄根屬水走血分爲除溼殺蟲要藥故本

經治頭秃疥癢女子陰蝕之患新採者醋搗塗癬殺

蟲加輕粉尤効

菖蒲 辛溫無毒解巴豆大戟毒

本經主風寒溼痺欬逆上氣開心孔補五藏通九竅
明耳目出音聲主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利久服
輕身不忘不惑延年益心智高志不老

發明 菖蒲乃手少陰厥陰之藥心氣不足者宜之

本經言補五藏者心爲君主五藏係焉首言治風寒
溼痺是取其辛溫開發脾氣之力治欬逆上氣者痰
溼壅滯之喘欬故宜搜滌若肺胃虛燥之喘欬非菖
蒲可治也其開心孔通九竅明耳目出音聲總取辛

溫利竅之力心孔開九竅利則癰瘡之毒可解腸胃
喜溫惡寒腸胃既溫則膀胱之虛寒小便不禁自止
久服輕身者除溼之驗也不忘不惑延年益智高志
不老皆補五藏通九竅之力也又主肝虛心腹痛霍
亂轉筋消伏梁癰癩善通心脾痰濕可知千金治胎
動不安半產漏下或搶心下血及產後崩中不止並
以菖蒲一味煎服凡陽亢陰虛婺寡失合者禁用以
其性溫善鼓心包之火與遠志之助相火不殊觀本

經之止小便利其助陽之力可知

蒲黃 甘微寒無毒筋能行血羅去粗筋取粉用

本經主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血

發明 蒲黃手足厥陰血分藥也故能治血治痛本

經主心腹膀胱寒熱良由血結其處營衛不和故也

又言止血消瘀血者以生則能行熟則能止與五靈

脂同用名失笑散治一切心腹疼痛能破瘀積消癰

腫去產婦兒枕痛然胃氣虛者入口必吐下咽則利

以五靈脂性味濁惡也宋度宗一夜忽舌脹滿口用
蒲黃乾薑末乾摻而愈以蒲黃之涼血活血乾薑之
引火外散深得逆從兼濟之妙用然舌根脹痛亦有
屬陰虛火旺者誤用前法轉傷津液每致燥瀉愈甚
不可不審

苦草 苦溫無毒

發明 苦草香竄入足厥陰肝經理氣中之血產後
煎服能逐惡露但味苦伐胃氣竄傷腦膏梁柔脆者

服之減食作瀉過服則晚年多患頭風昔人畏多產
育以苗子三錢經行後麴淋酒服則不受妊傷血之
性可知煎湯主婦人白帶又治嗜食乾茶面黃無力
爲末和炒芝蔴不時嚼之

水萍 辛寒無毒浮水面小而背紫者是

本經主暴熱身癢下水氣勝酒長鬚髮止消渴

發明 浮萍發汗勝於麻黃下水捷於通草惡疾癘

風遍身者濃煎浴半日多効其性輕浮入肺經達皮

膚故能發揚。邪汗本經主暴熱身癢者。專疎肌表風熱也。下水氣者。兼通陽明肉理也。勝酒者。陽明通達而能去酒毒也。長鬚髮者。毛竅利而血脈榮也。止消渴者。經氣和而津液復也。浮萍爲祛風專藥。去風丹用紫背浮萍爲末。蜜丸。彈子大豆淋酒下一丸。治大風癩風。一切有餘風濕腳氣。及三十六種風。皆驗。而元氣本虛人服之。未有不轉增劇者。至於表虛自汗者。尤爲弋戟。

蓴 甘寒無毒

發明 蓴性味滑常食發氣令關節急患痔漏腳氣積聚皆不可食爲其寒滑傷津也千金方治熱瀉嘔逆漏氣澤瀉湯麥門冬湯並用之取其清胃脘之熱逆也又能壓丹石解百藥毒

海藻 苦鹹寒小毒反甘草

本經主癭瘤結氣散頸硬核療癰腫癥瘕堅氣腹中上下雷鳴下十二種水腫

發明 海藻鹹能潤下寒能泄熱利水故本經主癭
瘤結核癰腫癥瘕散十二經水及除浮腫腳氣留飲
痰氣之溼熱使邪從小便而出經云鹹能軟堅營氣
不從外爲浮腫隨各引經藥治之凡海中諸藥性味
相近主療一致雖有不同亦無大異

昆布 鹹寒滑小毒

發明 鹹能軟堅故癭堅如石者非此不除能破陽
邪水腫與海藻同功然此物下氣久服瘦人海島人

常食之水土不同故耳凡海中菜皆損人不獨昆布
海藻爲然

石草部

石斛 甘淡微苦鹹平無毒酒浸用種類最多惟川
者味甘淡色黃無歧可無傷胃之虞古稱金釵者爲
最以其色黃如金旁枝如釵故有是名近世絕無此
種川者差堪代用其餘雜產味苦色晦中虛多歧者
味皆極苦誤用損人凡入湯藥酒浸晒乾入丸劑薄

切米飲漿晒乾磨之

本經主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸瘦強陰益精
久服厚腸胃

發明 石斛足太陰少陰脾腎之藥甘可悅脾故厚
腸胃而治傷中鹹能益腎故益精氣而補虛羸爲治
胃中虛熱之專藥又能堅筋骨強腰膝骨痿痺弱囊
溼精少小便餘瀝者宜之

骨碎補

俗名
猴薑

苦溫無毒蜜水焙用

發明 骨碎補足少陰藥也骨傷碎者能療之故名
主骨中毒氣風氣耳鳴牙疼骨痛破血止血折傷接
骨又治腎虛久瀉以之爲末入豬腎中煨熟食之戴
元禮治痢後骨痠入虎骨四筋丸用之有效但其性
降收不可與風燥藥同用

石韋 苦微寒無毒凡用去黃毛不爾射人肺令欬
不已去梗微炙用

本經主勞熱邪氣五癰閉不通利小便水道

發明 石韋蔓延石上生葉如皮其性寒利故本經
治勞熱邪氣指勞力傷津癰閉不通之熱邪而言非
虛勞之謂治妊娠轉胞同車前煎服

景天

一名慎火草
俗名火丹草

苦寒無毒

本經主大熱火瘡身熱諸邪惡氣

發明 慎火草性能涼血解毒故本經治大熱火瘡
日華治熱狂赤眼頭痛寒熱遊風女子帶下千金慎
火散以之爲君專主血熱崩中帶下之病搗汁塗小

兒丹毒發熱及遊風熱瘡外用並效一切病得之寒溼惡寒喜熱者勿投

石胡荽

即天胡荽俗名鷺不食草又名雞腸草

辛溫無毒汁製砒石

雄黃

發明 鷺不食草氣溫而升味辛而散故能透達巔

頂人但知其搐鼻通而落癰肉不知其治頭痛之功

最捷而除醫之功更奇按塞鼻中醫膜自落故碧雲

散用以取嚏則濁氣宣通而醫自除是昔人以開鍋

蓋法喻之

地錦一名地朕

苦平無毒

發明 地朕多生庭除磚縫莖赤葉青繁絲如錦故

有是名能通流血脈治崩中痢下功專散血止血通

利小便千金治淋方用之

苔草部

陟釐 甘溫無毒生於水底石上者蒙茸如髮謂之

陟釐

發明 陟釐與水苔同生水中但浮於水者謂之水
苔千金治協熱下利嘔逆溫食則吐有陟釐丸爲痢
證之首方曰華搗汁治天行心悶別錄主心腹大寒
溫中消穀強胃氣止泄痢竝取其性溫而能利水也
石蕊一名蒙頂茶甘溫無毒生蒙山頂石面及枯株上
與木耳無異

發明 石蘂明目益精氣潤咽解熱化痰同生薑能
解陽明頭額眉骨痛本乎天者親上也

卷栢 辛平無毒桐君雷公云甘寒無毒鹽水煮半
日再以井水煮半日生用破血炙用止血

本經主五藏邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子
久服輕身和顏色

發明 卷栢足厥陰經血分藥也詳本經諸治一皆
女子經癸之病總厥陰與衝脈之患也千金大澤蘭
丸紫石英天門冬等丸皆用之經疏言妊婦禁用以
其能寒子藏中血氣也

馬勃 辛平無毒多生竹園溼地腐脹而成凡用以
生布張開將馬勃於上摩擦下以盤承取末用之

發明 馬勃輕虛上浮力能散肺中邪熱故治欬嗽
喉痺衄血失音諸病東垣治大頭病咽喉不利普濟
消毒飲用之然須生蜜拌揆入水調散不浮方可煎
服

倒掛草 甘苦無毒

發明 倒掛草生井口邊千金斷酒方於端午午時

取燒研水服勿令知卽惡酒不飲其樹孔中生者干
金用治癭瘤取其倒垂而根不著也

苔 甘寒無毒

發明 井中蒼苔得至陰之氣而生火瘡傷爛脫皮
者以苔炙末每錢入冰片二分杵極細摻上痛卽止
不過三度愈如無井中者墻陰地上者亦可用之

本經逢原卷二終

渭南嚴式誨校字
成都劉彝銘覆校
山陰祝宗懷覆校