

新藥百品考

後篇

下


特279-205



1200501132099

社 279

05



始





特 279  
205

新藥百品考二編卷之下

侍醫法眼 坪井良信良譯述

炭室素酸利篤亞斯 第二百九十二品

炭室素酸 酸 苦ト、炭酸利篤亞スト、飽合ニ成ル、

黄色四面不透明光彩アル長針ナリ、味極テ苦

シ、

冷水ニハ頗ル溶ケ難シ、沸湯ニハ易ク、亞爾箇

兒ニハ溶ケス、

間歇熱ニ用フ、其功硫酸規尼ニ同シ、

每服二匹、至五匹、散丸、或ハ溶劑トス、



醋酸滿俺 第三百十九品

炭酸滿俺溶液ヲ、嚴醋酸ニ溶カシ、水氣ヲ蒸散スルナリ、

透明無色柱狀ナリ、收斂ノ鑛味アリ、外氣ニ觸テ變セス、

水、及ヒ亞爾筒兒ニ溶ケ易シ、

滿俺諸製劑中ノ緩品ナリ、

分量 每服五匁、至十匁、

炭酸滿俺 第三百二十品

塩酸滿俺ヲ炭酸曹達ニテ沉殿セシムルナリ、

雪白、無味無臭ノ粉末ナリ、水ニ溶ケス、

其功用未タ詳ナラス、分量每服十匁、十五匁、二十匁、

磷酸滿俺 第三百二十二品

酸化滿俺ヲ、磷酸曹達ニテ沉殿セシムルナリ、

白色粉末ニシテ、酸類ノミニ溶和ス、

緩性ノ滿俺劑ナリ、每服半匁、

硫酸滿俺 第三百二十三品

炭酸滿俺ヲ、稀硫酸ニ溶シ、水氣ヲ蒸散シテ、結晶セシム、



收斂苦味アリ、外氣ニ觸レテ消奪ス、  
 水ニ溶ケ易ク、亞爾菌兒ニハ溶ケス、  
 功能 衝動強壯、通利、一二莖ヲ服スレハ、胆汁性嘔吐ヲ發ス、胆汁  
 分泌ヲ催進ス、  
 主治 往時ハ、外用ニ供スルノ之、疥癬、微毒性  
 近年肝脾ノ慢性諸患、浸淫性虚性閉塞ヨリ生スル者、  
 黄疸等ニ用フ、胆汁分泌藥トス、又痛風、肝病ニ  
 用フ、服シ易ク、刺痛懊惱ヲ發セス、長服スレハ、  
 消化機ヲ感ニシ、通利ヲ宜シクス、  
 用法 每服五分、至一刃、一日三四回、下劑ニハ、

一莖至一莖半ヲ、分服ス、溶劑或ハ軟膏一莖ヲ、  
指ハ莖  
 和ニ調トス、

砒酸曹達 第三百四十六品

白砒石ヲ、消酸ニ和シ、曹達ト飽合セシム、  
 砒製諸劑中、確ニノ且ツ緩ナル品トス、最モ後  
 方ヲ佳トス、  
 方 砒酸曹達 一ム、蒸餾水 八莖、溶和ス、此液一  
 酸曹達 二十四分、  
 勞瘵患者、喘息ハ、砒酸曹達ヲ浸セル紙ニテ、  
 拾子ヲ造リ、之ヲ薰シテ、其煙ヲ嗅カシメ、兼テ



砒石ノ内用セシム、  
次亞呵囉酸曹達液 第三百四十七品

炭酸曹達溶液ト、呵囉尾斯トヲ飽和セシム、又

炭酸曹達溶液ト呵囉加爾基ニテ製ス、

功能 塩酸加爾基ノ如クニノ緩ナリ、

主治 内用室扶斯、初期、若クハ第殊ニ腹部室

扶斯、血斑熱、間歇熱、肺癆、腺病、古剌刺、外用ニハ

腫瘍、殊ニ壞疽、癌腫、乳頭剝脱、湯火傷、流涎、頑毒

流涎、腺腫、慢性皮膚疹、疥癬、頑癬、頭瘡、痘後癩痕、預防

水癌、氣息惡臭、齒齦腐爛、惡液漏泄、膿瘻等

用法 五滴至十五滴、蒸餾水ニテ稀ノ用ス、一

日二回至四回、含嗽劑、又湯火傷塗劑、注入劑等、

呵囉酸曹達水一分水、灌腸ニハ二十四滴ヲ、水

十五分、二十分調和

半彬篤ニ和ス、浴法ニハ半斤至一斤半

呵囉酸曹達舍利別方、呵囉酸曹達乾ケル者

餽水或ハ芳香水三十分糖六十分右調和ス、則チ舍

利別八莖中、呵囉酸曹達一莖ヲ含ム、每用一匙

呵囉酸曹達 第三百四十八品

呵囉酸利篤亞斯ト重酒石酸曹達トノ複親和

ニ成リ、又曹達溶液ト呵囉酸トノ飽和ニ成ル、



白色結晶ナリ、其味稍苦ニノ刺衝ス、  
水、及ヒ亞爾箇兒ニ溶ケ易シ、

功能 解凝、衝動、消嗽、大ニ呵囉酸剝篤亞斯ニ  
同シ、然レヒ稍緩ナリ

主治 微毒、但シ此品固ト驅微ノ効アルニ非  
ス、唯有力ノ解凝劑ナルヲ以テ嗽衝症原發、  
續發、ヲ  
治スルノミ、他ニ異効ナシ、

用法 一日一錢、二錢、至三錢、水ニ溶キ、或ハ散  
トナス、

膽汁酸曹達 第三百四十九品

膽汁中ニ存ス、新鮮牛膽ヲ煮テ、水氣ヲ蒸散セ  
シメ、半ニ至リ、粘液、及ヒ色分ヲ、亞爾箇兒ニテ  
沉澱セシメ、瀘過メ、之ヲ放靜シ、更ニ亞的兒ニ  
テ蒸餾スルナリ、

白色、極テ粘氣アリ、全ク乾ケル者ハ、脆ニノ碎  
ケ易シ、竅透ノ臭氣アリ、其味固有ノ甘味ニシ、  
後純苦ナリ、

水ニ溶ケ易シ、  
但シ是レ舍密法ニテ精製スルノ膽汁酸曹達  
トナスコト勿レ、



功能 解凝、強壯、少量ニテハ食機ヲ増シ、大量ニテハ多分ノ滑便ヲ通ス、

主治 凡ソ膽汁製造分泌ヲ誤ルノ諸患ニ用フ、腺病、神經熱後ノ衰弱、腸間膜腺閉塞等、牛膽ヲ用フヘキ諸症、

用法 毎用五、十、十五、二十、一日三四回、丸散或ハ溶劑トス、

次亞硫酸曹達 第三百五十品

覽典埜曹達稀溶液ト、硫黃トヲ煮、硫酸瓦斯ヲ誘導シテ、之ヲ通過セシメ、瀘シ、水氣ヲ蒸散シ

テ舍利別ノ稠トナシ、亞爾菌兒ニテ硫曹實誤ヲ分チ、水中ニ溶和セル塩分ヲ結晶セシムルナリ、

白色透明ナル結晶ナリ、多クハ透明水ノ如ク、正角扁平柱狀ナリ、

無臭、清涼ニシテ、後苦ク、稍亞爾加里様、硫黃様ノ味アリ、酸類ニ逢テ分解ス、

水ニ溶ケ易ク、亞爾菌兒ニハ難シ、

功能 解凝、強壯、利尿、

主治 天生硫水ノ代用トス、又發汗ノ功ナリ、慢性皮膚疹、皮膚内陷、内蔵閉塞、變形微毒ニ内外



施用ス、又痛風、痺麻質、經閉諸患ニ功アリ、又鑛毒ヲ消除ス、又結石ヲ碎ク、故ニ膽石ニ内外施用ス、

用法 一日二乃至一乃至九、或ハ溶劑トス、浴法ニハ、八乃至三十二、但シ患者浴中ニ在ル時ニ、徐クニ稀硫酸、或ハ醋酸ヲ注キ加フレハ、硫酸及ヒ硫黃游離シ、大ニ其力ヲ感ニス、

沃實涅曹達 第三百五十一品

諸般ノ礫水ノ最要分ナリ、結晶、六面片狀、外氣ニ觸レテ、溶流ス、

水及ヒ亞爾箇兒ニ溶ケ易シ、

抑モ沃實涅曹達ノ功幾許、沃實涅利篤亞斯ノ功幾許ナルヤ、未タ之ヲ詳ニセス、但シ曹達ヲ勝レリトス、何トナレハ、沃實涅ヲ含ムノ量、利篤亞斯ニ於ルヨリハ、多クレハナリ、凡ソ沃實涅利篤亞斯ヲ用フヘキ諸症、皆之ヲ用フヘシ、又便毒ニ擦劑トナスヘシ、

用法 沃實涅利篤亞斯ノ如シ、

尼箇質涅 第三百五十七品

揮發ノル亞爾加里塩ナリ、煙草中ニ存ス、



無色ノ油質液ナリ、弱臭アリ、煙草ニ似タリ、而  
ノ酷勵灼クカ如キ味アリ、焚燒シ易シ、  
諸水液ニ溶化ス、

功能 極テ毒アリ、麻醉ス、然レモ瞳子散大セ  
ス、其功用未ク詳ナラス、

阿芙蓉越幾斯

去麻酔分者  
第三百六十五品

製法數般アリ、尋常阿芙蓉ト華爾ストノ溶劑  
ニテ製ス、此劑ハ阿芙蓉ノ害分ヲ有セヌノ、能  
ク痙攣諸症、諸般ノ疼痛、肺癆衝、神經熱後不眠、  
關節疼痛等ニ鎮靜ノ功アリ、

分量 每服四分ハノ一、半ハ、一日二三回、

阿芙蓉丁幾

第三百六十六品  
カルヒツタ産者

酒石容水ニテ、牢達扭謨法ノ如ク製ス、  
功能 此丁幾劑ハ、普子ク世ノ用ナル所ナリ、  
神經機能ノ亢起ヲ鎮靜シ、脈管系ヲ刺戟スル  
トナク、動化機能ヲ害スルトナク、血液ヲ鬱  
積ヒシメヌ、熱ヲ起ストナシ、而シテ能ク疼痛ヲ  
鎮靜ス、

主治 印度ニテモ、我地方ニテモ、皆其偉功アリ  
ルヲ知ル、固ヨリ根治スルニ非サレモ、能ク鎮



定ノ功アリテ、骨痛、關節痛、知覺甚シキ皮膚、  
疹ヲ治ス、又胃瘧、咳嗽、不眠、腸瘍、百日咳、腺病等  
ニ賞用ス、

分量 毎用十滴、二十滴、三十滴、或ハ四錢ニ至  
ル、

越幾斯莫爾比涅 第三百七十一品

阿芙蓉ヲ煮テ製スル越幾斯中ニ存ス、又阿芙  
蓉中諸般ノ亞爾加里ヲ除キ去ル後ニ遺ル  
所ナリ、或ハ曰ク、莫爾比涅ト、酸化セル越幾斯  
分トノ集合カリト、  
更ニノロニハ  
塩アルモノニシ、

褐色ノ越幾斯ナリ、水及ヒ亞爾箇兒ニ溶化ス、  
或ハ曰ク、此製劑ハ阿芙蓉ノ固有力ヲ具スル  
者ニテ、其莫爾比涅トノ比例ハ、規尼乙實涅ト、  
規尼トノ如シ、

用法 毎服四分ハノ一、至一ハ、或ハ亞爾箇兒  
ニ和シ、又莫爾比涅塩ニ和用ス、

箇鳩留尼謨 第三百八十四品

一種ノ中和物ニ、箇鳩留斯實ノ軟部中ノ最  
有力分ナリ、  
白色結晶、或ハ各ニ光彩アル針狀ナリ、臭氣



ナシ、苦味堪、難シ、

冷水百五十分、沸湯二十五分、冷亞爾筒兒十分、

温亞爾筒兒同量、亞的兒七分半ニ溶和ス、

功能 斯篤里規尼ニ同シ、殊ニ脊髓ノ下部、及

ヒ神經叢ニ功アリ、此ノ毒ニ中ル者ハ、舞踏病

ノ如キ諸症ヲ發ス、之ヲ局部ニ用フルニ、刺戟

シテ皮膚層ノ機能ヲ一變ス、

主治 外用ニ試ルルニ、無熱ノ皮疹、頭瘡、慢性

腫瘍、又虱ヲ驅ル、

用法 軟膏一ハ二ハ脂或ハ油一ハ

比百里涅 第三百八十七品

黑白又長胡椒ノ窒素ヲ含メル結晶ナリ、

無色、或ハ淡黄色ノ柱狀ナリ、無臭、無味ナリ、

冷水ニハ溶ケス、温湯ニハ少シク溶ク、冷亞爾

筒兒三十分温亞爾筒兒三十分亞的兒百分又醋酸

ニ溶化ス、

功能 衝動、強壯、驅熱、健胃、而ノ脈管ヲ刺戟ス

ルヲナシ、

主治 間歇熱、神經熱、

用法 每服、二ハ、至十ハ、一日四五回、散又丸ト



ナス、間歇熱ニハ、大畧四十ハ、至六十ハ、  
比百魯乙埵 第三百九十品

姜根ヲ硫黄亞的兒ニ浸出スル所ノ胡椒様酷  
厲軟華爾斯ニ有力分ナリ、  
黄色臭氣ナシ、芳香灼クカ如キ胡椒様ノ味ア  
リ、糖ニ和スレハ美味トナル、  
亞的兒、又亞爾箇兒、又油ニ溶ク、  
口内腐爛ヲ治シ、口及ヒ咽喉ノ粘液膜ヲ刺戟  
ス、

比百魯乙埵丁幾方 百比魯乙埵 八錢 亞爾箇

兒<sup>四十度ノ者ニ</sup>溶化ス、其功姜根ニ同シ、每服  
十滴、二十滴、

比百魯乙埵糖方 比百魯乙埵 二刀 亞爾箇兒

十刀ニ溶カシ、糖<sup>九十</sup>ヲ和シ、微火ニテ亞爾箇

兒ヲ飛散セシムレハ、糖量八錢中、比百魯乙埵

四刀ヲ含ム、每服一錢、至四錢、

比百魯乙埵錠方 比百魯乙埵糖<sup>四十</sup>ニ蓮謨

漿<sup>四錢</sup>ヲ和シ、十八刀宛ノ錠ヲ造ル、每錠比百

六分ハノ姜一刀ニ同シ、

比百魯乙埵舍利別 比百魯乙埵丁幾 八刀



常用舍利別 六十 綿襪ニ調和シ、一日夜ニノ瀝過ス、

塩酸白金曹達 第三百九十四品

塩酸白金ト、塩酸曹達トノ混合ナリ、

紫紅色融解セス、

水及ヒ亞爾筒兒ニ溶ケ易ク、

功能 總テ塩酸白金ニ同シ、然レモ稍緩ナリ、

外用スルニ刺戟少ナシ、但シ内用ノ功ハ却テ

優レリ、輕量 八分ハノ一、四分ハノ一、ハ、原發續發ノ顯症ナ

シ、半ハヲ用フルト一日二三回ナレハ、少シク

食機ヲ害シ、胃部窘迫ヲ覺フ、但シ終ニ自ラ治

ス、

主治 微毒淋疾、胃硬結 性假ニ内外施用ス、

用法 毎用八分ハノ一、至半ハ、散或ハ丸トナ

ス、又蒸餾水、薤藎漿ニ和用ス、一日三四回

淋疾注入方ニハ、塩酸白金曹達半莖ヲ、バ、フ

ル實煎六十四莖ニ和ス、擦劑 半ハヲ阿列襪油

又脂八莖ニ和ス、

塩酸鉛 第三百九十五品

鉛ト塩酸トニ成ル、

白色粉末、細微針狀、又片狀、甘様收斂ノ味アリ、



冷水分三十温湯分二十ニ溶ク、強亞爾箇兒ニハ溶

ケス。

功能 衝動、解凝、消焮、兼テ酸化鉛劑ノ功アリ、

之ヲ外用スレバ、神經機能ヲ麻痺セシメ以テ

疼痛ヲ鎮靜ス、

主治 癌腫ヲ治スルノ功ハ、塩酸亞鉛ニ勝レ

リ、又疼痛ヲ鎮止シ、病機運營ヲ一變シ、或ハ全

ク之ヲ壓止ス、

用法 塩酸鉛一克ヲ、水一麻葛ニ溶シ、蒸劑ト

ナス、軟膏塩酸鉛十八至三十ハ、脂八克ニ調和ス、

沃實涅鉛 第三百九一六品

鉛糖ト沃實涅刺篤亞斯、或ハ鍍沃實涅トノ配

合ニ成ル、

光彩アル金黄色ノ六面片狀ナリ、

冷水ニハ殆ント溶ケス、沸湯、亞爾箇兒、釐典埵

刺篤亞斯ニハ、容易ニ溶ク、

功能 頗ル緩ナリ、中量ハ少シク刺戟ス、腫

起セル部ニ貼スレモ、嫩衝ヲ發スルヲオク、又

腐蝕スルヲナシ、解凝、珠ニ腺ニ功アリ、或ハ曰

ク、輕量ニテハ鉛塩ノ如シ、沃實涅劑ノ如クナ



ラズ、内用スレハ血行ヲ緩ニス、  
 至治 往時腺病ニ用ヒタレト、近時ハ唯外用  
 三供ス、凡ソ沃實溼ヲ用フヘキ諸症アレト、皮  
 膚感覺鋭敏ニシテ之ヲ施シ難キ者ニ賞用ス、腺  
 病性疼痛ナキ腫瘍、微毒、粘液膜水腫、慢性腫瘍  
 便毒初期ニ之ヲ塗擦シ、兼テ夫鳩塔等ヲ内服  
 シ、食餌ヲ嚴節ニス、  
 用法 二八四八、一日二三回、或ハ三十  
 九トナス、軟膏、半錢一錢、二錢、暗入、調和ス、  
 硝酸鉛 第三、百九十七品

鉛ヲ硝酸ニ溶シ、水氣ヲ蒸散スルナリ、  
 無色、或ハ淡白色ノ結晶ナリ、温ニ觸テ分解ス、  
 水ニ溶ケ易ク、亞爾崗兒ニ溶ケス、  
 功能 其必然局處ノ功ハ、塩酸鉛ニ同シ、清血、  
 防腐劑ナリ、粘液膜及ヒ創口ヲ刺戟セズ、機能  
 ヲ一變スルヲ以テ、腫瘍ヲ清潔ニシ、治愈ヲ促  
 カシ、愈創ノ功アリ、  
 主治 五十年前ハ、癩癩ヲ治スル効アリトス、  
 近世外用トナシ、創傷、腫瘍、癌腫、瘰癧、皮膚、浸淫  
 性皮膚疹等ニ賞用ス、又乳頭剝脫等ノ創傷ニ用



フ、消酸鉛十ハノ偉効アリ、又動物ノ腐敗ヲ防  
水ハ八ニ和ス、和人屍ヲ永久腐敗スルヲ防  
ク、故ニバルセノンラレノシカ為ニ、バルサム  
ヲ塗ル法アリ、此用ニ供スル藥品數種アレモ、  
バルサムヲ用フルニ、通法トナリタル故ニ、之  
ヲ稱シテ、バルセノント云フ蓋シバルサニ用  
ムヲ塗ルト云フノ意ヨリ出ル所ナリ、  
フヘシ、

用法 毎服四分ハノ一、一ハ、丸或ハ溶劑トス、  
一日二回、外用ニハ十ハ、至一ハヲ水ハ八ニ和  
ス、乳頭剥脱ニハ塗ル一一日三四回、哺乳スル  
ナリ、此稀溶液ヲ塗り、薄キ鉛着帽ヲ掩フ、哺乳  
乳スルニ臨テ、必ス綿密ニ微温湯ニテ洗フヘ

硝酸鉛杆ハ、用法刺必斯印歇兒那里斯ノ如シ、  
但シ此製ハ、温ニ逢ヘハ少シク溶ク、清淨酸化  
鉛ナリ、

修酸鉛 第三百九十八品

修酸若クハ糖酸ト酸化鉛トノ集合ナリ、  
白色ニシテ、溶解セザル粉末ナリ、  
此製劑ニ、硝酸ヲ加フル一法アリ、之ヲ硝酸修  
酸鉛ト稱ス、磷酸加爾基ヨリ成ル所ノ結石ヲ  
碎クノ有力品ナリ、膀胱ニ注入ス、此塩一ハヲ  
蒸餾水ハ八ニ和シ用フ、則緩ニ刺戟セス、之



ノ膀胱ニ注入スルモ害ナシ、蓋シ試驗未  
タ多カラズ、

治癩散 第四百二品

此秘藥ハ、プレストヨリ販商スル所ニテ、從來  
舍密法ニテ之ヲ檢査スレバ未タ其實ヲ知ル  
トナシ、  
褐色ノ粉末ナリ、水ニ融解スレハ絮ノ如キ纖  
維ヲ混ス、其臭氣肝油ニ似タリ  
固ヨリ試驗ニ依テ、其功ヲ稱スル者ナレモ、  
ンセン諸醫、病院ニテ專ラ治癩ノ偉効アリト  
メ、之ヲ賞用ス、

用法 毎月望前三日、望後三日、又新月前三日、  
新月後三日ノ間、毎朝空心ニ一錢ヲ取り、白酒  
一盞ニテ嚥下ス、

煤液 第四百三品

布片、紙屑、木綿等、總テ植物ノ纖維ニ、火ヲ點シ、  
徐クニ燒キ、器ノ外面ハ、水ニテ之ヲ冷マヌナ  
リ、此ノ如クノ器内ニ殘レル粘質物又瀝過シ、  
水氣ヲ蒸散シテ、越幾斯ノ稠トナスナリ、  
濃稠、褐色、一箇ノ臭氣味アリ、臭性華爾斯、臭性  
油、水、塩類ヲ含ム、



是レ往時已ニ皮膚ヲ滑澤艶麗ナラシムルノ  
 塗料トナシ、又皮膚ニ水ヲ和シ稀ク用フル所  
 ナリ、近世佛蘭西諸家、其溶液濃厚、稀薄、、眼嗽衝、凍  
 瘡、微毒性諸患ニ用ヒテ其功ヲ賞ス、又或ハ紙  
 ノ燒キ、其臭性溶液ヲ少許ノ綿ニ浸シ、之ヲ齧  
 齒間ニ挿ムニ、齒痛ヲ即治ス、  
 列矢阿尼 第四百十品  
 帝列并、帝兒、加埵油、加爾基分等ヲ脫スル松脂  
 ヲ餹シテ取ル所ノ帝兒ヲ百四十八度ノ温ニ  
 テ、再ヒ餹スルナリ、

無色、稀薄、亞的兒ノ氣味アリ、其功亞的兒ニ同  
 シ、  
 亞的兒、亞爾箇兒、亞的兒油、脂油ニ溶和ス、  
 功能 強壯、刺戟、血行ヲ増進シ、粘液膜分泌ヲ  
 增多シ、速ニ解疑スルノ功アリ、  
 主治 胸部聖京屈、慢性肺病、氣管及ヒ肺ノ粘  
 液過多、慢性腸嗽衝、膀胱嗽衝、淋毒輸尿管嗽衝、  
 虛性弛緩、入菲沃斯油ヲ和シテ擦劑トスレハ、  
 神經痛、慢性諸患、皮膚ニ偉効アリ、凡テ瀝青、帝  
 兒ノ臭氣ヲ嫌フ者ニ用フヘシ、



用法 列矢阿尼精 列矢阿尼五分、亞爾箇兒百分、每瓶一骨菲匙、適宜ノ丁發劑、又茶ニ和シ用フ、

列矢阿尼油劑 列矢阿尼五分、扁桃油九百分ニ和ス、内用ス、

列矢阿尼舍利別 列矢阿尼一分、糖二十五分、

列矢阿尼漿 列矢阿尼五分、糖九百分、量四茶匙、

外用ニハ、列矢阿尼一錢、二錢、脂、單蠟膏、菲沃斯油等ハ、錢ニ和ス、

瀕驗 第四百二十品

製法 水銀 百二十分、消酸 百二十分ニ溶和シ、攪牛脂 五百三十分ヲ烱化拌攪シ、硬膏ノ稠ニ至リ、其

百五十分ニ、醫典埵曹達六十分ヲ和シ、大理石版上ニテ煉和ス、

面部、手足ノ慢性皮膚疹ニ用フ、

此驗ハ、水ニ溶ケ易ク、以テ洗劑トナスヘク、又他ノ膏ト和シ、塗劑トナスヘシ、

旃那葉華爾斯 第四百二十七品

旃那葉ヲ、適宜ノ温亞爾箇兒ニテ浸出シ、三時

ニ、温ニ乘シテ、搾リ瀝シ、水ヲ和シ製ス、

黑色光彩アリ、固有ノ拔爾撒謨臭アリテ、苦甘ノ味アル華爾斯ナリ、



亞爾箇兒ニ溶化ス、

此華爾斯ハ、小兒ニ用フルニ便ナリ、

方例 梅那葉華爾斯半錢或一錢 亞刺比亞越謨二錢

或一善提花水一錢或二錢 右調勻、更ニ滿那舍利別

六錢或八錢 加フ、每一時一茶匙、

大人ニハ梅那葉華爾斯二錢 亞刺比亞越謨一錢

肉豆蔻水一錢 右調勻、更ニ滿那舍利別、矢箇列

舍利別各八錢 加フ、每半時一匙、

黑芥子亞的兒油 第四百三十品

黑芥子ヲ水ニテ餽スル所ノ芥子ノ功分ナリ、

帶黃、新鮮ノ者ハ、無色、酷厲刺戟ノ芥子臭味ヲ  
リテ烈ナリ、

水五十分ニ溶ク、亞爾箇兒、亞的兒ニ溶ケ易シ、

功能 大ニ局部ヲ刺戟ス、皮膚ノ表面ヨリ吸

ヲ排泄ス、收シテ、肺及ヒ皮膚

烈ナリ、

主治 芥子ノ強カヲ要スル諸症ニ、内外施用

ス、殊ニ外用スレハ、誘導法トナルヲ以テ、劇シ

キ神經痛、神經性胯痛ニ用テ、又麻痺ニ用テ、此

油、二十滴、至三十滴ヲ、亞爾箇兒、或ハ扁桃油四



或至八錢ニ和シ之ヲ布片或ハ紙片ニ浸シ貼  
スルヲ二三分時ナレハ皮膚赤色トナル此方  
簡易ニシ其力峻烈ナルカ故ニ大ニ尋常芥子  
泥ニ勝レリトス

用法 内用、二滴、至四滴水四五錢ニ和シ、亞

刺比亞越謨糖ヲ調勻シ每服一食匙外用ハ上

ニ記スル諸法ノ外更ニ擦劑トナシ又之ヲ大

ニ稀ノテ蒸劑トナス

亞的兒舍利別 第四百四十六品

硫黃亞的兒舍利別

醋酸亞的兒舍利別

各種舍利別八錢中大器亞的兒半錢ヲ含ム

亞的兒ヲ内用スルニ最好ノ品ナリ流行性古

列刺ニ硫黃亞的兒舍利別ヲ一時毎ニ一匙ヲ

與ヘ兼テ冰片薄荷茶ヲ服シ効ノ得ルニ至ル

塩酸鈹舍利別 第四百四十七品

酸化鈹二百八十六海塩酸異重一、一六ノ水十六

溶和シ糖舍利別百二十ヲ和スルナリ

總テ出血ニ用フ就中子宮出血ニ賞用ス塩酸

鈹ヲ與フルニ最好美味ノ劑ナリ舍利別八錢



中大畧塩酸鉄十二人ヲ含ム

鉄塩酸舍利別 第四百四十八品

鉄屑二百人海塩酸異重一、六ノ者水二十ニ溶

以濃シテ、糖舍利別二百二十ヲ加ス

弛緩ヨリ發スル下利、腹部窒扶斯、腺病、萎黃病

等ニ大ニ賞用ス、此方前劑ト同シク、小兒ニ用フルニ最佳方ナリ

毎服、一茶匙、單用、或ハ粘滑煎汁、又芳香水ニ和

用ス、

清血舍利別 第四百四十九品

方 山午莠根、羊蹄根、濱瞿麥葉各四分、刺楸福烏

萬八分、蜀羊泉莖六分、梅那葉一分、白糖、蜂蜜各

十分、水六十分、右前ノ六味、水煎スルヲ二回煎汁透

明トナルニ至リ、糖蜜ヲ和シ、舍利別ノ稠トナ

ス、毎用一食匙、

塩酸鉄沃實涅舍利別 第四百五十品

鉄沃實涅溶液ト、鉄塩酸溶液トヲ混和シ、之ニ

糖ヲ和シ、舍利別ノ稠トナスナリ、

舍利別一匁中、沃實涅三匁、鉄四匁ヲ含ム、

用法 毎服半匁、一日二三回、

方例 塩酸鉄沃實涅舍利別二匁、橙皮舍利別



四 癸 加斯加栗刺浸 三十 此劑四分ノ一ヲ服ス  
ニ劑ヲ二日間  
ル、一日二回、ニ用盡スヘク

莎爾莎沃實涅舍利別 第四百五十五品

莎爾莎巴里兒刺舍利別 五十分 沃度刺篤亞斯 一分

ニ成ル、微毒ニ用ノ、一日三食匙、至五食匙、瀉瞿

麥葉、土茯苓浸劑等ニ、和用シテ、大ニ功アリ、

發泡布 第四百五十七品

膠一分 亞爾箇兒製菴菁越幾斯 四分 ニテ製ス、

之ヲ毛筆ニテ、布片ニ攤シ貼ス、四時間ニ必ス

發泡ス、

答麻林度越幾斯 第四百五十九品

答麻林度ヲ浸出シ、水氣ヲ蒸散シテ、越幾斯ノ

稠トナシ、少許ノ糖ヲ和ス、夫レ答麻林度ハ損

敗シ易ク、變性シ易ク、又其氣味不佳ナルカ故

ニ人多クハ之ヲ嫌惡スレド、此劑ハ、此等ノ弊

ナク、其功確實ニシテ、大ニ勝レリトス、又水ニ溶

解シテ、透明ナルヲ以テ、外見大ニ美ナリ、用量

答麻林度ノ如シ、

菘若越幾斯鎮痛膏 第四百六十七品

方 菘若越幾斯 六癸 阿芙蓉 一癸 右調和ス、



指頭ニテ徐々ニ痛所ニ塗入ス、又布片ニ攤シ之ヲ貼ス、

硝酸銀膏 第四百六十八品

二等ノ方アリ、焮衝強弱ノ度ニ應シテ換用ス、

硝酸銀 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百 脂 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百 調和ス、

皮膚焮衝、流行性、傳染性、羅斯性、慢性、骨膜蜂巢性、關節焮衝、慢性、皮膚疹、焮衝感ナル者

體焮衝、關節水腫、白腫、慢性皮膚疹、焮衝感ナル者

強方、硝酸銀 焮衝微ナル者ニハ、弱方、硝酸銀

ヲ處ス、之ヲ患所ニ貼スル、一日二三回、而

ノ其全部ヲ指頭ニテ、徐々ニ摩擦ス、皮膚忽チ

黒色トナリ剥脱ス、則チ沃度剥落、亞斯溶劑ニテ、之ヲ洗フヘシ、

發泡芫菁膏 第四百六十九品

方 芫菁末、猪脂、各等分、煮テ 水少許ヲ和シ、以テ焦熏スルヲ防

ク、適宜 蠟ヲ和シ、膏ノ稠トナルニ及テ、少時間微

火ニテ温メ、之ヲ瀘過ス、

其色汚鮮緑、其臭芫菁ニ似タリ、

之ヲ布片、若クハ紙ニ攤入、紙ニテハ、滲出セス、皮上ニ貼

シ、壓定ス、五時或ハ九時ニ、泡ヲ發ス、蠟ヲ和

スレハ、膏半、至一、蠟八、和ス、最佳ノ打膿膏トナル、且



利尿系ヲ刺戟スルコト少ナシ、  
吐根膏 第四百七十一品

方 猪脂 <sup>十五分</sup> 阿列襪油 <sup>八分</sup> 吐根 <sup>八分</sup> 精細ニ  
研和ス、

其功、吐酒石膏ニ同シ、布片ニ攤シ、皮上ニ貼ス、  
三十六時ニノ、泡ヲ發ス、痒ケレド痛ナシ、

水銀莨菪膏 第四百七十四品

方 水銀膏 <sup>十六</sup> 莨菪越幾斯、阿芙蓉 <sup>各八</sup> 右調  
和シ、布片、或ハ織絲ニ攤シ、指ノ痛所ヲ纏フ、其  
未タ膿化セサル者ハ、必ス消散ス、

尿素 第四百七十五品

尿ノ一成分ナリ、尿中大畧百分ノ三ヲ含ム、尿  
ヨリ製シ、又青酸剝篤亞斯溶液ト硫酸諸母尼  
亞溶液トヲ合シ、水氣ヲ蒸散シ、乾固スルニ至  
ル、

無色、大ナル扁平柱狀ナリ、清涼ニシ、兼テ稍苦  
キ味アリ、無臭、外氣ニ觸テ融化セス、

水及ヒ亞爾箇兒ニ溶ケ易シ、

功能 利尿、此品直チニ血中ニ入ルヲ以テ、功  
ヲ奏スルコト速カナリ、



主治 水腫、胸脇滲漏、尿管、或ハ曰ク、尿量ヲ増

多スレトモ、尿質ヲ變スルヲナシ、  
用法 五分、十分、或ハ半錢、一錢、亞爾箇兒、或ハ

水ニ和シ、又糖ヲ和シ、甘味トナシ用フ、  
硝酸尿素 第四百七十六品

尿素濃液ニ、硝酸ヲ和シ、其沉澱ヲ結晶セシム、  
廣キ珊瑚光アル白色透明ナラサル片狀ナリ、

美甘味アリ、  
冷水八分ニ溶ケ、温湯ニ溶ケ易シ、硝酸ニハ溶  
ケ難クメ分拆ス、

功能 單純尿素ニ同シ、

主治 水腫、皮腫、腹水、心、肝、腎病ニ續發スル者、  
又膀胱結石ニ用フ、

用法 毎用一分、二分、十分、一日二三回、溶劑又  
丸トナス、

依刺篤里涅 撒拔室里涅  
第四百七十八品

是レ依刺篤留謨根、又撒拔實爾列子中ニ存ス、  
ル亞爾加里ナリ、藥舖販賣スル者ハ、單純亞爾

加里ニ非ス、則チ亞爾加里ト、撒拔實里涅、又其  
華爾斯分トノ集合ナリ



製法 數様アリ、隨テ其成分同一ナラス、  
白色或ハ帶褐色、白粉狀、結晶酷厲苦味アリ、劇  
シク嘔ノ發ス、

亞爾箇兒、帝列并油ニ溶ケ易ク、亞的爾ニ溶ケ  
難ク、水ニハ全ク溶ケス、

功能 衝動麻醉ノ強力アリ、衝動利尿、皮膚ヲ  
刺戟シ、熱ヲ覺ユ、連施スレハ赤色焮衝ヲ發ス、  
鼻膜ニ觸レハ、嘔ヲ發ス、直腸ニ觸レハ、重墜努  
責シ、眼膜ニ觸レハ、大ニ刺戟シテ、焮衝ヲ生ス、  
内用スレハ、速カニ血中ニ吸入シ、十分分ノ一、

四分ノ一ニテハ、咽喉感覺ヲ變シ胃中溫暖  
刺戟ヲ起シ、次テ腹部、胸部ニ蔓延スルカ如シ、  
四分ノ一ニテハ、夥シク大便ヲ通利ス、大量  
ニテハ、惡心、嘔吐、疝痛ヲ發シ、諸神經機能ヲ一  
變シ、皮膚、腎ノ分泌ヲ增多シ、唾腺、淚腺ノ刺戟  
シ、而シテ心動脈動ヲ遲徐ニス、一ハ至三ハニテ  
ハ嘔吐、下利、胃痛、搐掣、角弓狀痙攣、呼吸困難、大  
痙、鎮痛、解凝、利尿ノ功アリ、是レ膜狀組織ヲ刺  
戟スルニ由ル所ナリ、



主治 上ニ記スル所ノ功カヲ以テ之ヲ察ス  
 レハ疼痛及ヒ痙攣諸症麻痺喘息百日咳心病  
 癩癩依利昆垓兒歌私的里水腫痛風痿麻質胃  
 弱便秘腺腫老人ノ便秘速カニ通泄ヲ要スル  
 者ニ用フヘレ外用痙攣疼痛尿管刺戟性脊髓  
 神經諸患偏頭痛神經性膀胱痛喘息百日咳尿道  
 ヨリ尿石ヲ漏スニ由テ發スル所ノ疼痛痙攣  
 陰萎痿麻質諸患顏筋半部不遂常習掛泄閉止  
 痔血閉月經痛尿閉膀胱麻痺寒性腫瘍腺腫等  
 フ分解ス

又諸般ノ眼病ニ擦劑トナス

方例 依刺篤里涅十八至三十分脂或ハ亞爾箇兒八

右調和ス但シ之ヲ用フルニハ極テ精意ナル

ベシ少レク其量ヲ過セハ刺戟過劇ナルナリ

眼瞼ニ種入スルヲ良法トス

内用詳ナラス舍密法ニテ精製スル品ハ更ニ

猛劇ナルハ最モ注意シ用フヘシ二十四分

分ノ一十六分分ノ一十二分分ノ一四分分ノ

一散丸又亞爾箇兒ニ溶和ス

外用軟膏ハ十八至三十分ヲ少許ノ亞爾箇兒



ニ溶カシ、脂八錢ニ和ス、賢埜爾麻質法ニハ、半  
匁、一匁、二匁、極テ高價ナ  
ル品ナリ、

青酸亞鉛 第四百八十七品

醋酸亞鉛溶液ニ、青酸ヲ加ヘ、沉澱セシム、  
白色純銀ノ如キ、無臭無味ノ粉末ナリ、  
水及ヒ亞爾箇兒ニ溶ケス、

功能 強毒アリ、青酸ノ如シ、此劑分拆シ易シ、  
胃ニ入テ、青酸游  
離ス、故ニ青酸固有ノ諸力ヲ存スル者ナリト知  
ルヘシ、

主治 神經病、神經變調、虛性疼痛、例之胃瘰、頭

痛、鬱憂、痙攣、癲癩、百日咳、急性癲癩、喘息、殊ニ瘰  
癧性ノ者、

用法 八分匁ノ一、四分匁ノ一、半匁、漸ク増加  
ス、一日二三回、散或ハ丸トナス、外用眼水五匁  
十匁  
ニ二十水一錢至二十四錢、眼膏三匁  
四錢脂

沃實涅亞鉛 第四百八十八品

沃實涅ト、粒狀亞鉛トヲ、温湯ニ浸シ、瀝シ、水氣  
ヲ蒸散ス、

外氣ニ觸テ、速カニ融解スル白色塩ナリ、鏡様  
味アリ、



極テ溶ケ易シ、

功能 猛烈ノ腐蝕性毒アリ、青酸亞鉛ニ同シ、  
腐蝕、收斂、

主治 外用ニ供スルノミ、扁桃腺腫ニハ、強液  
十八至三十度、海綿又ハ毛筆ニ浸シ、之ヲ塗  
ル、慢性腺腫ヲ分解スルノ奇品トス、沃實涅亞  
八度ニ和シ、其一度ヲ取リ、腺毒眼焮衝ニハ次  
塗上スル、一日一二回、  
ノ眼水ヲ點ス、

方 沃實涅亞鉛五分、蒸餾水  
四十八度ニ溶和シ用フ、軟膏  
五分至三十  
シ、癩癬  
ニ用フ、

纈草酸亞鉛 第四百九十品

纈草酸ト、酸化亞鉛トノ飽合ナリ、

光彩アル珊瑚狀鮮白極テ輕キ鱗屑ニテ、纈草  
ノ強臭アリ、

冷水六十分ニ殆ント溶ク難シ、温湯ニハ溶ク  
易シ、亞爾箇兒、亞的兒油類ニハ、溶ケ易シ、

功能 衝動、強神、鎮痙、收斂、之ヲ健康體ニ用フ  
ルニ少許ノ頭痛、一時ノ謔妄ヲ發シ、耳覺稍變  
スルノミ、但シ溶化シ難シト雖、其成分固ヨリ  
二箇ノ鎮痙力アルニ由テ、偉効アルヲ知ルベ



レ、或ハ曰ク催吐スト、

主治 神經痛、單純ニノ間歇性 痙攣、顔面痛、頭

痛、不眠、虚弱ノ人、偏頭痛、胃瘕、凡ノ諸神經疾患、衰弱

ヲ兼ル者、但シ血液逼進、焮衝アル者ハ之ヲ禁ス、

外用ハ、眼瞼諸患、角膜腫瘍、斑翳等ハ、速カニ分

解ス、

用法 每服一匁、至六匁、丸、散、或ハ溶液トナス、

點眼水 纈草酸亞鉛二匁、至四匁、蒸餾水十六匁ニ溶化ス、

新藥百品考二編卷之下 大尾

存誠林先生藏板

泰西醫方二十四脈表

一枚摺

侍醫法眼信長坪井先生譯

侃斯達篤氏內科書

全一百八卷

侍醫法眼信長坪井先生譯

新藥百品考

初編二冊  
二編二冊

全四冊

大博士佐藤舜海先生譯

斯篤魯默兒砲痰論

全二冊

大博士佐藤舜海先生譯

外科醫法

內編十五冊  
外編廿二冊

全三十七冊



越中佐渡三良先生著

和蘭藥性歌

全二冊

東京坪井芳洲先生譯

醫療新書

全三十冊

倉次元意先生譯

眼科摘要

全部九冊

近刻

時醫法眼松本先生藏板

解剖羅旬語加類多 骨部

全二百卷

西洋風画入

山内氏藏板

漢字和譯附 英語可苗多

全四冊

洞海林健卿譯補

穴衣篤兒藥性論

全部十八冊

侍醫首々學教頭北蘭晴松本良順誌

隱士 樂齊山内豐城技閱補註 養生法全三冊

玄端杉田先生譯

健全學

全部六冊

作樂戶知常先生譯編

西洋英傑傳

全六冊

河津孫四郎先生校正

大學東校恒太郎石黒先生譯

寶藥鑒法

全一冊



大學東校 橋本素田先生譯補  
**袖珍藥說** 全三冊

大學東校 恒太郎石黒先生譯  
**藥品溶解表** 一枚摺

大學東校 石黒先生譯述  
官版 **化學訓蒙** 全十冊

大坂醫學校 北獨養氏  
官版 **日講記聞** 全冊數不定

大學東校  
官版 **日講記聞** 全冊數不定

大學東校 田代先生譯述  
**切斷要法** 全一冊

百太郎佐藤先生譯  
**大平海新報** 冊數不定

基五十川先生譯  
**林戰要錄** 全三冊

菱湖卷先生書  
**三體千字文** 四帖

其作少博士譯  
**英語手引草**



滿野敬兒氏口授  
官板病理畧論

全三冊

大學東校學會用鑄  
官版痘龜鑑

全一冊

中助教久我克明先生述  
石黑忠惠先生譯述  
虎烈刺論

全一冊

銅鑄萬國地圖

大學東校  
官版御用所

西洋醫書  
東京馬喰町二丁目  
發兌書林 英蘭堂 嶋村屋利助



終