

東臯握靈本草目錄卷之二

草部 計三十一種

甘草

黃芪

人參

沙參

桔梗

黃精

菱藪

知母

肉蓯蓉

鎖陽

天麻

白朮

蒼朮

巴戟天

狗脊

遠志

浮羊藿

仙茅

玄參

地榆

丹參

白及

紫草

黃連

胡黃連

黃芩

秦艽

前胡

柴胡

防風

握靈本草卷之二

嘉定王翊編輯

草部

甘草

秦蜀河東西有之大而結緊者佳凡用須去頭尾或酒炙或酥炙或長流水炙補中宜炙用瀉火宜生用

丁焦藥中勿用

治土甘草甘平無毒主五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌

肉倍氣力解毒溫中下氣煩滿短氣止嗽止渴除腹脹

滿解百藥毒虛而多熱者加用之

發明

甘草氣薄味厚升而浮陽也入足太陰厥陰又云通

入手足十二經

甘草反大戟芫花甘遂海藻而胡洽十棗湯加甘草大
黃乃是痰在膈上欲令涌泄以拔去病根也東垣治項
下結核消腫潰堅湯加海藻丹溪治勞瘵蓮心飲用芫
花皆本此意古方有相惡相使而不相害者非妙達精
微者不能知此理

甘草氣薄味厚可升可降陰中陽也陽不足者補之以
甘溫能除大熱故生用則氣平補脾胃不足而瀉心
久炙之則氣溫補三焦元氣而散表寒除邪熱去咽痛
緩正氣養陰血凡心火乘脾腹中急痛腹皮急縮者宜
倍用之其性能緩急而又協和諸藥故熱藥用之緩其

參藥用之緩其寒寒熱相雜者用之得其平

草甘味主中仲景附子理中湯用甘草恐其僭上也
胃承氣湯用甘草恐其速下也小柴胡有柴胡黃芩
寒人參半夏之溫用甘草有調和之意建中用甘草
補中而緩脾急風髓用甘草以緩腎急而生元氣也
曰甘者令人中滿凡不滿而用炙甘草爲之補若中
而用生甘草爲之瀉能引諸藥直至滿所甘味入脾
其所喜經云以甘補之以甘瀉之以甘緩之是矣
草解百藥毒有中烏頭巴豆毒甘草入腹卽定方稱
八豆解百藥毒不效入甘草爲甘豆湯其驗乃奇嶺南

人解蠱毒凡飲食時先取炙甘草一寸嚼之若中毒隨卽吐出

選方傷寒少陰證咽痛仲景甘草湯主之用蜜炙甘草二

兩煎分二服

肺熱喉痛有熱痰者炙甘草二兩米泔浸桔梗一兩每

服五錢入阿膠半片煎服

舊製阿膠每片約重二三兩

肺痿多痰涎頭眩小便數而不效者肺中冷也甘草乾

薑湯温之甘草炙四兩乾薑炮二兩煎分二服

舌腫滿口不治殺人甘草煎濃湯熱嗽頻吐頻嗽

發背癰疽李北海傳神授方用甘草三大兩生擣篩末

大麥麩九兩和勻取好酥少許入內下沸水搜和如餅方圓大下瘡一分熱傅腫上以紬片及故紙隔之通風冷卽換之已成者膿水自出未成者腫便內消仍當喫黃耆粥爲妙

國老膏諸發預期服之能消腫逐毒使毒不內攻粉甘草二斤搥碎河水浸一宿採取濃汁再以蜜絹濾過

銀石器內熬成膏磁瓶收貯每服一二匙無灰酒或白湯下或微利無妨

諸般癰疽灸甘草三兩以酒一斗浸瓶中用黑鉛一片溶投九度醉寢卽愈

治陰下懸癰初起用生粉甘草一兩截作四寸以長流

小一盃醮炙自早至午水盡潤透為度細剉無灰酒

一二小盃煎至一盃溫服次日再服便保無虞此不即

酒過二十日即消盡

五便秘生甘草二錢井水煎服能疎導下惡物

一切時行災病粉甘草五兩細剉微炒量病人喫得

多少酒取無灰酒一處研去滓溫服須臾大瀉毒亦

隨出不可飲水

出沁州綿上直如箭幹者佳健脾用蜜
次補腎及崩帶用鹽水炒治癰疽生用

黃芪甘微溫無毒主癰疽久收瘡排膿止痛大風癩

或五痔鼠瘻補虛小兒百病逐五臟間惡血補丈夫虛
損百勞羸瘦止渴腹痛泄利益氣利陰氣虛喘腎衰耳
聾助氣長肌肉補血治虛勞自汗補肺氣瀉肺火實皮
毛益腎氣去肌熱督脈爲病逆氣裏急

黃芪甘溫純陽氣薄味厚可升可降陰中陽也其用
五補諸虛不足一也益元氣二也壯脾胃三也去肌
熱四也排癰止痛活血生肌肉托陰疽爲瘡家聖藥五
也又曰補五臟諸虛止脈弦自汗瀉陰火去虛熱無汗
則發之有汗則止之又曰治氣虛盜汗自汗及膚痛是
皮表之藥治咯血柔脾胃是中州之藥治傷寒尺脈不

三補腎臟元氣是裏藥乃上中下內外三焦之藥也
靈樞云衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠裏而司開
闔脾胃一虛肺氣先絕必用黃芪溫分肉益皮毛實腠
裏不令汗出以益元氣而補三焦

黃芪惟主益氣甄權謂其補腎者氣爲水母也日華謂
其止崩帶者氣旺則無下陷之憂也

黃芪補元氣肥白而多汗者爲宜若面黑形實而瘦者
服之胸滿宜以三拗湯瀉之

黃芪與人參甘草爲除燥熱肌熱之聖藥
防風能制黃芪黃芪得防風其功愈大

參芪甘溫俱能補氣但患內傷脾胃衰弱飲食少進
情嗜臥發熱惡寒嘔吐洩瀉及脹滿痞塞力乏形羸
息虛微精神短少之證宜于補中湯中以人參爲君
芪爲臣若係表虛腠裏不固自汗盜汗併諸瘧癘不
痘疹未灌全漿及一切陰毒不起須讓黃芪爲主少
人參爲輔焉

選方小兒胃虛而成慢驚者不可用黃連安神丸

散理中丸當於心經中以甘溫補土之源更

中以甘寒瀉火以酸涼補金使金旺火衰肝木

矣用炙黃芪二錢人參一錢炙甘草五分白芍

分煎服

保元湯治痘証初出乾紅少潤將長頂陷不起既出
色不明漿行色灰不榮漿定光潤不消漿老濕潤不
斂結痂而內弱胃虛痂落而口渴不食痂後而生癰
腫癰腫潰而斂遲用黃芪炙二錢人參一錢炙甘草
五分生薑五分或加芎藭加官桂加糯米以助之
氣虛白濁黃芪鹽炒半兩茯苓一兩末服

男婦諸虛不足煩悸焦渴萎黃不能飲食或先渴而發

瘡癩或先癰疽而發渴用綿黃芪六兩一半生焙一

半鹽水潤蒸三次焙粉甘草一兩半生半熟爲末每

服二錢日再名黃芪六一湯

老人虛悶不可用利藥黃芪陳皮各半兩每服二錢用
大麻子一合研爛以水濾漿煎至乳起入白蜜一匙
再煎沸調藥空心服

尿血沙淋痛不可忍黃芪人參等分爲末以大蘿蔔一
箇切一指厚大四五片蜜二兩淹炙不令焦蜜盡爲
度醮藥末食無時鹽湯下

肺癰得吐膿血黃芪爲末每服二錢煎服日三

欬嗽膿血咽乾乃虛中有熱不可服涼藥以黃芪四兩

甘草一兩末服二錢

胎動不安黃耆川芎各一兩糯米一合煎服

腸風瀉血黃耆黃連等分糊丸服

痒疽氣不固也人參黃耆各一兩爲末入龍腦

藕汁和丸服

治渾身麻木不仁又兩目緊急縮小及隱澁難

黃耆湯黃耆二兩人參八錢白芍藥一兩甘草

橘紅五分蔓荊子一錢每服五錢

小便不通綿黃芪二錢水煎服

吐血不止黃耆二錢半紫背浮萍五錢爲末每服

薑蜜水下

人參

生上黨山谷及遼東又云多出高麗百濟今所用者皆是遼參金井玉欄者佳

主治人參甘微寒無毒補五臟安精神定魂魄止

邪氣明目開心益智五勞七傷一切氣血虛證

發明人參氣味俱薄浮而升陽中之陽微陰入

人參得升麻補上焦之元氣瀉肺中之火得茯苓

焦之元氣瀉腎中之火得麥門冬則生脈得乾薑

氣得黃耆甘草乃甘溫除大熱瀉陰火補元氣

家聖藥

東垣理脾胃交泰丸用人參阜莖是惡而不惡也

療月閉四物加人參五靈脂是畏而不畏也又療痰

胸膈以人參藜蘆同用而取其涌越是激其怒性也此皆精微奧妙非達權衡者不能知

人參甘溫能補肺中元氣肺氣旺則四臟之氣皆聚精自生而形自盛肺主氣故也仲景云病人汗後身熱亡血脈沉遲者下痢身涼脈微血虛者並加人參古人血脫者益氣蓋血不自生須得生陽氣之藥乃生陽生則陰長血乃旺也故補氣須用人參血虛者亦須用之

人參生用氣涼熱用氣溫如土虛火旺之病宜生參以瀉火而補土脾虛肺怯之證宜熟參以補土而生金

王海藏言人參補陽瀉陰肺寒宜用肺熱不宜用玉節

齋因而和之謂參者能補肺火陰虛火動失血諸病多服必死二家之說皆偏矣夫人參補元氣生陰血而瀉陰火東垣李氏之說明矣仲景言亡血血虛者並加人參又言肺寒者去人參加乾薑無令氣壅丹溪亦言虛火可補參耆之屬實火可瀉苓連之屬二家不察三氏之精微而謂人參補火謬哉夫火與元氣不兩立元氣勝則邪火退人參既補元氣而又補邪火是反復之小人矣何以與甘草苓朮謂之四君子耶雖然三家之言不可盡廢也凡人面白面黃面青鰲者皆脾肺腎不足可用也面赤面黑氣壯神強者不可用也脈浮而芤濡

虛大遲緩無力沉而遲瀋弱細結代無力者皆虛而不足可用也若絃長緊實滑數有力者皆火鬱內實不可用也潔古謂喘嗽勿用者痰實氣壅之喘也若腎虛短喘促者必用也仲景謂肺寒而咳勿用者寒不熱壅遏在肺之欬也若自汗惡寒而欬者必用也久病鬱熱在肺勿用者乃火鬱于內宜發不宜肺虛火旺氣短自汗者必用也丹溪言諸痛不可弱者乃邪氣方銳宜散不宜補也若裏虛吐利不久病弱虛痛喜按者必用也節齋謂陰虛火旺勿用虛火亢能食脈絃而數涼之則傷胃溫之則傷

補者也若自汗氣短肢寒脈虛者必用也如此
人參之可用不可用思過半矣
節齋輩言不用人參惟肺寒肺熱中滿血虛四症
散寒消熱消脹補營不用人參殊不知古方治
溫肺湯肺熱以清肺湯中滿以分消湯血虛以養
皆有人參所謂邪之所媵其氣必虛又曰着
除陽旺則生陰血貴在配合得宜耳

丹溪言虛火可補須用參者又云陰虛潮熱喘

盜汗等症四物加人參黃檗知母又云好色之人

受傷欬嗽不愈瓊玉膏主之又云肺腎虛極者

主之是知陰虛勞瘵之症未嘗不用人參也古今治勞
莫過于葛可久其獨參湯保真湯並用人參節齋之說
誠未深思也

選方人參膏主治好色之人腎氣衰憊欬嗽不止用生薑

橘皮煎湯化服患痢犯色忽發昏運自汗遺尿痰鳴

如鋸脈大無倫者陰虧陽絕之症也急與膏服多至

數斤而後安若作風治則悞矣背疽內托藥已多膿

出作嘔發熱脈沉數有力此潰瘍所忌也遂與大料

人參膏入竹瀝飲之以愈為度若癰疽潰後氣血俱

虛嘔逆不食變症不一者以參耆歸朮等分煎膏服

之

仲景治胸痺心下痞堅留氣結胸胸滿脅下逆氣搶心

治中湯主之卽人參白朮乾薑甘草四味各三兩隨
證加減凡治心腹病者後人無不用之或湯或丸或
散皆有奇效

四順湯治霍亂諸病用人參甘草乾薑附子各二兩水

煎分四服此中暑伏陰在內用此溫散若動而得之爲中暍宜以涼解不宜此方

四君子湯脾胃氣虛不思飲食人參一錢白朮二錢白

茯苓一錢炙甘草五分加薑棗煎服

食入卽吐人參一兩半夏薑製焙一兩五錢生薑十片

水煎揚之二百四十徧取三升入白蜜三合煮一升
半分服

胃寒氣滿不能傳化易肌不能食人參二錢生附末半
錢生薑二錢雞子清一枚煎服

胃寒嘔惡不能腐熟水穀人參丁香藿香各二錢五分
橘皮五錢生薑三片煎服

胃虛反胃垂死者人參三兩水煮頓服日再兼人參
雞子白薤白煮粥啜之

霍亂吐瀉煩躁人參二兩橘皮三兩生薑一兩水
三服

妊娠吐水腹痛不能食人參炮薑等分生地汁丸服

陽虛氣喘自汗盜汗氣短頭暈人參五錢熟附子一兩
作四服加生薑十片煎服

難產橫生乳香丹砂雞子白人參各一錢當歸一兩加
薑汁三匙煎服卽順

產後血入肺竅發喘人參末一兩蘇木二兩煎汁調參
末服

產後血暈蘇木當歸人參童便煎服

產後不語人參石菖蒲石蓮肉等分每服五錢

離魂異疾用人參龍齒赤茯苓各一錢同煎入硃砂末

一錢一夜一服三服效

房勞脫陽人參附子肉桂麥門冬五味子煎服亦效

部虛冷

房勞困倦人參七錢陳皮一錢煎服千金不傳

肺熱聲啞人參二兩訶子一兩為末噙嚥

肺虛久嗽人參二兩鹿角膠炙一兩每服三錢

湯加葱煎

久嗽化痰人參末一兩明礬二兩以礮醋二升

膏入參末煉蜜和丸每以豌豆大一粒放直

止咳自消

喘急嗽血人參末三錢雞子清調五更初服去

只一服愈年深者再服

欬嗽吐血人參黃芪飛羅麩各一兩百合五錢為

公丸茅根湯下

虛勞吐血甚者先以十灰散止之其人當困倦法

陽生陰獨參湯主之好人參一兩肥棗五枚煎服

睡即減繼服調理藥

吐血下血如涌泉須臾不救人參焙側栢葉蒸焙

穗燒存性各五錢為末用二錢入飛羅麩二錢以

汲水調如稀糊少頃再啜一服立止

陰虛尿血人參焙黃芪鹽水炙等分用紅皮大蘿蔔一枚切作四片以蜜二兩將蘿蔔逐片蘸炙食之鹽湯送下以瘥爲度并治沙石淋症

消渴引飲人參栝樓根等分爲丸麥門冬湯下

老瘡久不愈用人參一兩生薑一兩擣汁同煎于發日

早服貧家以白朮代人參亦効

冷痢厥逆六脈沉細人參大附子各一兩半每服半兩

生薑十片丁香十五粒粳米一撮水煎空心服

下痢禁口人參蓮肉各三錢并華水煎細細呷之或加

薑汁炒黃連三錢

老人虛痢不止不能飲食人參一兩鹿角屑炒研五錢

為末每服方寸七米湯調下日三

傷寒時疫壞症悞服藥餌身困脈沉不省人事七日以

後皆可服之人參一兩水二鍾緊火煎一鍾以井水

浸冷服之少頃鼻梁有汗出脈復立瘥名奪命丹又

名復脈湯此湯聖而奇凡西人參散大

傷寒厥逆煩燥脈沉此陰極發躁也無憂散人參半兩

水煎調牛膽南星末二錢熱服立甦此末以散

夾陰傷寒先因慾事後感寒邪陽衰陰盛六脈沉伏小

腹絞痛四肢逆冷嘔吐清水不假此藥無以回陽

參乾薑炮各一兩生附子一枚破作八片水煎

大脈出身温即愈

脈暴出者亦不愈

小兒風癩癰瘰用人參蛤粉辰砂等分爲末以豬

丸棗豆大每服五十九金銀湯下日再服人參半兩

酒毒胸上生疽脈緊而濇用酒炒人參酒炒大

薑湯服一錢得睡汗出而愈

治元臟氣虛真陽耗散臍腹冷痛泄瀉不止人參

苓附子木香等分煎服名四柱散

人參蘆能吐虛勞痰飲不傷元氣吐後以參

生理

沙參

今出近道形如葵根白而實者佳反藜蘆

主治沙參苦微寒無毒主血結驚氣除寒熱補中

清肺火肺痿

發明沙參厥陰本經之藥又為脾經氣分之藥

參代人參蓋人參性溫補五臟之陽沙參性寒

之陰

人參甘苦溫其體重實專補脾胃元氣因而益

故內傷元氣者宜之沙參甘淡而寒其體輕虛

氣因而益脾與腎故金受火剋者宜之一補陽

一補陰而制陽不可不辨之也

選方肺熱欬嗽沙參半兩水煎服

婦人白帶七情所傷或下元虛冷沙參為末每服二錢

米飲下

桔梗

處處有之其根有心空心者為薺苞去蘆及皮以米泔水浸一宿剉微焙

主治桔梗辛微溫有小毒一云甘無毒一云大寒主胸脅

痛如刀刺除寒熱療咽喉治下痢去肺熱氣促嗽逆

發明桔梗味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰肺經氣分

及足少陰經

桔梗清肺氣利咽喉與甘草同行為舟楫之劑如大黃

苦泄峻下之藥欲引至胸中至高之分成功須用辛甘

之劑升之譬如鐵石入江非舟楫不能載所以諸藥有
此一味不能下沉也

朱肱治胸中痞滿不痛用桔梗枳殼取其通肺利膈下
氣也仲景治寒實結胸用桔梗貝母巴豆取其溫中消
穀破積也又治肺癰吐膿用桔梗甘草取其苦辛清肺
甘溫瀉火又能排膿血補內漏也其治少陰證二三日
咽痛亦用桔梗甘草取其苦辛散寒甘平除熱合而用
之能調寒熱也後人易名甘桔湯通治咽喉口齒諸疔
失音加訶子聲不出加半夏上氣加陳皮涎嗽加知母
貝母欬渴加五味子酒毒加葛根少氣加人參嘔加半

夏生薑唾膿血加紫苑肺痿加阿膠胸膈不利加枳殼
心胸痞滿加枳實目赤加卮子大黃面腫加茯苓膏痛
加黃芪發斑加防風荆芥疫毒加鼠粘子大黃不得
加卮子

乾欬嗽乃痰火之邪鬱在肺中宜苦梗以開之痢疾
痛乃肺金之氣鬱在大腸亦宜苦梗開之後用痢藥
藥能開提氣血故氣藥中宜用之

選傷寒腹脹陰陽不和也桔梗半夏湯桔梗半夏

各三錢薑五片煎服

咳嗽胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥

膿如粳米粥肺癰也桔梗湯主之桔梗

兩水煮分再服吐膿血則瘥

痰嗽喘急童便煎桔梗服

黃精

生山谷處處有之

主黃精甘平無毒主補中益氣除風濕安五臟九

晒服之駐顏斷穀

選方有服食法而無治療

萎蕤

處處有之形類黃精毛莖斑葉水浸半日飯上蒸焙乾用

主萎蕤甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋結

不足時疫寒熱虛勞客熱補中益氣除煩止渴潤心肺

補五勞七傷

發明萎蕤能升能降陽中陰也其用有四主風淫四末兩目淚爛男子濕注腰痛女子面生黑黥

治風溫自汗身重語言難出用萎蕤湯以之爲君每治虛勞寒熱痞瘧及一切不足之證用代參芪不寒不燥大有殊功不止于去風熱濕毒而已

選方赤眼瀉痛萎蕤赤芍藥當歸黃連煎湯薰洗

小便赤淋萎蕤一兩芭蕉根四兩水二大碗煎一碗半

入滑石末二錢分二服

知母

出河南諸郡凡用使肥潤裏白者上行酒浸焙下行鹽水炒

主知母苦寒無毒主消渴熱中除邪氣敗毒厚皮
益氣消痰止嗽潤心肺涼心瀉肺火滋腎水治湯
熱命門相火有餘安胎止子煩

發

明知母氣味俱厚沉而降陰也乃腎經平藥人

手太陰經氣分其用有四瀉無根之腎火滋有
蒸止虛勞之熱滋化源之陰仲景用之入曰虎骨
得眠者煩躁也煩出于肺躁出于腎君以石官

母之苦寒以清腎之源緩以甘草粳米使不遂下

凡病小便悶塞而渴者熱在上焦氣分肺中伏熱不

生水膀胱絕其化源宜用茯苓澤瀉氣味淡滲之藥以

瀉肺火清肺金而滋水之化源若熱在下焦血分而
渴者乃真水不足膀胱乾涸乃無陰則陽無以化當用
黃檗知母大苦寒之藥以補腎與膀胱使陰氣行而陽
自化小便自通

腎苦燥宜食辛以潤之肺苦逆宜食辛以瀉之知母之
辛苦寒涼下則潤腎燥而滋陰上則清肺金而瀉火乃
二經氣分藥也黃檗則是腎經血分藥二藥必相須而

行

選方

久嗽氣急知母五錢杏仁薑水泡去皮尖五錢水煎
溫服再以蘿蔔子杏仁等分爲末糊丸每服五十九

薑湯下以絕其根

妊娠子煩因服藥致胎氣不安煩不得臥知母一兩洗

焙為末棗肉丸彈子大每服一丸人參湯下大驗月

未足胎不安者蜜丸服

肉蓯蓉

出陝西諸郡馬精落地所生今人多以嫩松梢鹽潤偽之堅而不腐者佳酒洗去甲破中心去白膜

蒸三四時

炙乾用

主治肉蓯蓉甘微溫主五勞七傷補中除莖中寒熱痛

五臟強陰益精男子絕陽不興婦人絕陰不產長肌肉

暖腰膝止遺泄及女子帶下陰痛

發命門相火不足者以此補之入腎經血分藥也峻補

精血驟用反動大便

選方勞傷病精敗面黑者用肉蓯蓉四兩水煮令爛薄切

細研精羊肉分為四度下五味以米煮粥空

老人虛人便悶者肉蓯蓉二兩沉香末一兩為末麻

仁汁打糊无梧子大每服七八无白湯下

腎虛白濁肉蓯蓉鹿茸山藥白茯苓等分糊煎湯下

消中易飢肉蓯蓉山茱萸五味子為末蜜丸梧子

鹽酒下二十九

鎖陽 出肅州野馬遺精入地所生

治主鎖陽甘温無毒大補陰氣益精血利大便

其功百倍從蓉

選方大便虛燥煮粥彌佳

天麻

今汴東西湖南淮南皆有之一名赤箭或云赤箭是苗天麻是根凡用洗淨以濕紙包于糠火中煨熟取出切片酒浸

一宿焙乾用

主治天麻辛溫無毒主殺蠱毒惡氣益氣力長陰肥健諸

風濕痺風虛眩暈頭痛助陽氣補勞傷

發明天麻肝經氣分之藥肝虛不足者宜天麻川芎以補

之其用有四療大人風熱頭痛小兒風癇驚悸諸風

痺不仁風熱語言不遂

選方眼黑頭旋風虛內作非天麻不能治天麻丸用天麻

半兩芎藭二兩為末蜜丸如芡子大每食後服一丸

茶酒任下 論中四種病皆治

白朮

處處有之出茅山嵩山者佳米泔浸治脾病重者蒸或炒如惡其燥蜜水炙嫌其滯薑汁炒或炒水漬炒

治白朮甘溫無毒主風寒濕痺死肌痲痺止汗除

食大風在身皮間水腫心下急滿利便閉面黃

穀嗜食除濕益氣和中補陽消痰逐水生津止渴

安胎理胃益脾

發白朮味厚氣薄陽中陰也可升可降在氣主氣在

主血無汗則發有汗則止與黃芪同功

白朮功專補土土旺則能健運土旺則能勝濕土
清氣升而精微上奉濁氣降而糟粕下輸

白朮之用有九溫中一也去脾胃中濕二也除胃
三也強脾胃進飲食四也和胃生津液五也止
也四肢困倦嗜臥目不能開不思飲食七也止瀉八也
安胎九也凡中焦不受濕不能下利必須白朮
益脾非白朮不能去濕非枳實不能消痞故枳朮
之爲君

人但知朮能燥濕濕去則脾健寧知脾虛無濕邪
之反致燥竭脾津是損陰也此最易誤故表而出之

選方 枳朮丸消痞強胃久服令人食自不停枳實白朮各

一兩為末荷葉包飯燒熟搗和丸氣滯加橘皮一兩

有火加黃連一兩有痰加半夏一兩有寒加乾薑五

錢木香三錢有食加神麩麥蘖各五錢

白朮膏水煎汁熬成膏服食滋補止久泄痢

參朮膏治一切脾胃虛損益元氣白朮一斤人參四兩

煎膏蜜收湯點服

脾虛脹滿白朮二兩橘皮四兩酒糊丸煎木香湯下

脾虛洩瀉白朮五錢白芍一兩丸服冬月加肉果

心下有水白朮三兩澤瀉五兩煎分三服

五飲酒癖一留飲水停心下
水在胃中四溢飲水在五臟
傷飲所致倍木丸用白木一斤乾薑炮桂心各半
蜜丸梧子大溫水下

老小滑洩白朮炒半斤山藥炒四兩人參三兩

參亦可

中風口噤不知人事白朮四兩酒煎頓服

婦人肌熱血虛者喫力迦散白朮白茯苓白芍藥

兩甘草半兩為散薑棗煎服小兒熬蒸同上

同法

自汗盜汗白朮一兩牡蠣炒石斛炒各一兩共爲末

服三錢米湯下日三服

瀉血萎黃白朮一斤生地黄半斤蒸乾和丸

孕婦縮胎白朮枳殼等分丸服

蒼朮 茅山者佳米泔浸二日亦有以芝麻拌蒸者

主 治 蒼朮苦温無毒主風寒濕痺死肌煖胃消穀嗜食除

惡氣弭災疹除濕發汗健胃安脾治痿總解諸鬱濕痰

留飲脾濕濁瀝

發 明 蒼朮温而燥陰中陽也可升可降入足太陰陽明手

太陰陽明太陽之經

本草但言朮不分蒼白而蒼朮別有雄壯上行之氣能除濕下安太陰使邪氣不傳入脾也以其經泄浸火炒故能出汗與白朮止汗特異用者不可以此代彼也

蒼朮治濕上中下皆有可用又能總解痰火濕食氣血六鬱皆因傳化失常不得升降病在中焦故藥必兼升降蒼朮爲足陽明經藥氣味辛烈發穀之氣能徑入諸經疎洩陽明之濕通行斂瀋香附乃陰中快氣之藥下氣最速一升一降故鬱散而平

脾精不禁小便漏濁淋不止腰背酸疼宜用蒼朮以發脾精精生于穀故也

選經驗方用製木末一斤入茯苓末半斤煉蜜

能烏鬚髮駐顏色壯筋骨明耳目除風氣

鄧才筆峰雜興方用木揉汁熬膏每膏一斤

半斤白蜜四兩其功亦同

瑞竹堂方用木將酒醋米泔童尿四製同黑

為末酒丸治內外障眼

永類方用木一斤將酒醋米泔水四製又以椒紅

香補骨脂黑牽牛末各一兩同炒去四

丸疎風順氣養腎治腹漆濕氣痛

高司法方用木一斤一分同小茴香食鹽各一

炒一分同川烏川棟肉各一兩同炒一分同椒補骨
脂各一兩同炒一分同酒醋各半斤同煑乾合前諸
藥共爲末酒煑糊丸治元臟虛冷遺精白濁五淋疝
氣婦人赤白崩帶便血等症

元戎不老丹用木四斤一分酒一斤浸炒一分醋一斤
浸炒一分鹽四兩同炒一分椒四兩同炒再將赤白

何首烏各二斤將黑豆紅棗各五升同蒸再

皮去骨一斤各取淨末以桑椹汁和成劑

高三指日晒夜露取日月精華候乾煉蜜和丸

百丸服之補脾益腎變白不老

交加丸蒼朮一斤米泔鹽水川椒破故紙分炒黃葉

斤酒童尿小茴香浸炒三分生用一分只炒木藥

丸服服之升水烽火

少陽丹蒼朮泔浸半日刮洗為末一斤地骨皮血水

淨去心晒研一斤熟桑椹二斤採爛

糊入盤內日晒夜露采日精月華待乾研小

赤小豆大每服二十丸酒下三服一年變髮

三年面如童子

久痢食泄蒼朮二斤炒為末醋糊丸

桂

脾濕下血色黧黑痛蒼朮二兩地榆一兩

服久者以此湯一花丸即乾薑赤石脂三味為

也

男婦食少嗜臥面無血色蒼朮一斤熟黃半斤炮

薑一兩糊丸湯下五十丸

男婦食生熟物留滯遂生蟲好食生米久則

而傷其生蒼朮浸一夜焙為末蒸餅丸服

腹中虛冷飲食不消蒼朮二斤神麴一斤乾薑三兩

歸三兩甘草二兩蜜丸服

痰飲留脅有聲頻嘔酸水久而不瘥蒼朮一斤滑浸

芝麻半兩水二盞研漉漿大棗五十枚煮爛

搗和丸盡劑而愈亦能生精強骨真仙方也

巴戟天

川產紫色者良多有醋煑紫色假充者以色鮮厚者為真酒浸一宿去心焙急用以溫水浸軟去心

主治巴戟天辛甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不起強筋

骨安五臟補中增志益氣治脚氣補血海男子夢洩益

精

發明巴戟天腎中血分藥也男子補陽種子方中多用之

選方有人嗜酒後患脚氣甚危或教以巴戟半兩糯米同

炒去米大黃一兩炒同為末蜜丸溫水服五七十九

仍禁酒遂愈

狗脊

生常山酒浸晒

治主狗脊苦平無毒主腰背強機關緩急周痺寒濕脚

膝痛頗利老人療失溺流肝腎治風虛健骨

選方男子諸風金毛狗脊鹽泥固濟煨紅去毛蘇木

川烏頭生用等分醋丸服鹽湯

室女白帶鹿茸九狗脊製去毛白斂鹿茸酒

兩艾煎醋汁打糯米飯為丸空心溫酒下

固精強骨狗脊遠志茯苓當歸身等分蜜丸酒

遠志

一名小草出兗州濟陰郡凡用須去心甘草湯浸焙用

治主遠志苦溫無毒主欬逆傷中補不足除邪氣利

益聰明不忘強志倍力堅壯陽道一切癰疽

發明遠志腎經本分藥也其功專於強志益精腎經不足

則喜忘其前言腰脊不可以俛仰毛悴色天三因方遠

志酒治癰疽蓋亦補腎之力爾

選方胸痺心痛飲食不下小草丸用小草桂心乾薑細辛

蜀椒出汗各三兩附子五錢炮為末蜜丸梧子大先

食米汁下三九日三服不知稍增

一切癰疽遠志酒用遠志不以多少米泔浸洗槌去心

為末每服三錢温酒一盞調澄清服以滓敷患處最

治吹乳

小便赤濁遠志半斤茯神益智仁各二兩爲末酒糊丸

空心服

淫羊藿

所在皆有上郡陽山者佳一名仙靈脾凡使時剪去四畔尖邊每一斤用羊脂四兩拌炒脂盡爲度

主治淫羊藿辛寒無毒一云性温主陰痿絕陽莖中痛利

小便益氣力強志補腰膝強心力令男女有子

發明

淫羊藿味甘性温能益精氣乃手足陽明三焦命門

藥也真陽不足者宜之

弘景云服之使人好爲陰陽

選方

仙靈脾酒治丈夫絕陽女人絕陰及偏風不遂不仁

服仙靈脾酒常令醺然不得大醉用仙靈脾一斤無

灰酒一斗浸三日逐時飲之能興陽道理腰膝冷

三焦欬嗽腹滿少食氣逆仙靈脾覆盆子五味子炒

一兩蜜丸薑茶湯下五十九

仙茅

今川蜀江湖兩浙皆有之其根粗細有節或如重者有節文理黃色黑豆汁浸一宿酒拌蒸

忌鐵器

主治仙茅辛温有毒主心腹冷氣腰脚風冷痺丈夫

勞老人失溺陽痿無子助筋骨益肌膏續精明目

無倦

發明西域婆羅門僧傳仙茅方云

云十斤乳石不及一斤仙茅表其功方也明皇服之

效當時禁方不傳其方盡流散僧不空

得此方諸公服之皆得力八九月採得也

切如豆粒米泔浸兩宿陰乾為末蜜丸每服五粒或

二十丸忌牛乳及黑牛肉

仙茅久服長生甘能養肉辛能養肺

骨滑能養膚酸能養筋但性熱補命門二焦

者宜之壯盛者服之反動火一人中仙茅每云

以大黃朴硝摻之始愈張弼梅嶺仙茅詩云健

纔持去今日人來乞墓銘皆服藥縱恣以速其

茅何尤

選方仙茅丸壯筋骨益精神明目烏鬚仙茅一斤者

五日銅刀刮剉乾取一斤蒼朮二斤枸杞一斤車

子十二兩白茯苓舶茴香栝子仁各八兩生熟地各

四兩製各如法酒煮糊丸食前溫酒下五十九

定喘下氣乃元陽不守之故白仙茅半兩製人參二錢

半阿膠一兩雞胗脰一兩煨共爲末每服二錢糯米

飲下日三服

玄參

今出近道忌銅器
悞餌噎喉喪目

主治玄參苦微寒無毒主腹中寒熱積聚補腎明目滋陰

降火解斑毒利咽喉通小便中風傷寒身熱狂邪溫瘧

酒酒

發明 玄參足少陰腎經君藥也為樞機之劑管領諸氣

下清肅而不濁風藥中多用之故治傷寒陽毒汗下
毒不散及心下懊懺煩不得眠心神顛倒欲絕者俱用

玄參

腎水受傷真陰失守孤陽無根發為火病法宜壯水以
制陽光故玄參與地黃同功其消瘰癧解斑毒亦是散

火

選方 發斑咽痛玄參升麻湯用玄參升麻甘草各半兩

服

急喉痺風不拘大人小兒玄參鼠粘子半生坐

兩為末新水服一盞立愈

地榆

處處有之取上截切片炒用稍行血不可用

治地榆苦微寒無毒主婦人乳產崩帶止冷

極效吐衄腸風月經不止

發地榆氣味俱薄陰中陽也專主下焦血

地榆其性沉寒治熱血痢則可用若虛寒

痢未可輕使

諸瘡痛者加地榆養者加黃芩

東垣云地榆酸苦而壞胃須當食消

選久病腸風痛癢不止地榆五錢酒

結陰下血腹痛不已地榆四兩炙甘草三兩

入縮砂四七粒煎分二服

湯法見傷寒下

潔古治血痢地榆丸用地榆當歸阿膠黃連訶子

烏梅丸服

又熱痢不止地榆七錢半生地半兩川草炙二錢五分

煎服

丹參

近地處處有之

主治丹參苦微寒無毒陶弘景云多服眼赤微寒

血去心腹疾養神定志調經安胎排膿

心包絡

發明丹參氣平而降陰中之陽入手少陰厥陰心之包絡
血分藥也能破宿血補新血安生胎落死胎止崩中帶
下調經脈

選方婦人乳癰用丹參白芷芍藥各二兩以醋淹一宿猪
脂半斤熬膏傅之

丹參散一味洗晒爲末每服二錢温酒下治產前產後
諸病及熱勞冷勞諸煩疼

脚軟風疾服一味丹參可逐奔馬故一名奔馬草有效

白及

處處有之

主治白及苦平無毒主癰疽惡瘡生肌止痛止肺血

發凡吐血不止藥中宜加白及一服即止

選方打跌損傷嘔血只用白及末二錢米飲服其效如神

紫草

今出襄陽亦所在皆有苗似蘭香莖赤節青根有白毛如茸用蠟溶水拌蒸

主治紫草苦寒無毒主心腹邪氣五疳傷寒時疾斑疹

發紫草入心包絡及厥陰經血分其功長于涼血活血

而利大小腸故痘疹欲出未出血熱毒盛大便閉瀉者

宜用之已出而紫黑便閉者亦可用若已出而紅者

白陷大便利者切宜忌之古方惟用茸取其初得陽氣

以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理一槩用之非

矣故直指方云紫草治痘能導大便使痘發亦輕須白

木木香佐之

選方消解瘧毒紫草一錢陳皮五分葱白三十煎服

未出色赤便閉者紫草二兩百沸湯泡去泄氣溫服

半合

痘毒黑疔紫草三錢雄黃一錢為末以胭脂汁調銀錢

挑破點之極妙

癰疽便閉不宜峻下者紫草括樓實等分新水

黃連

生蜀道者粗大味濃苦療渴為最江東者如連珠療痢大善澧州者更勝製法見下

主治黃連苦寒無毒主治詳見下

發明黃連氣味俱厚可汗可降陰中陽出入乎

用有六瀉心臟火一也去中藥之毒以安其心則瀉

也去風濕四也赤眼暴發五也寒以擊心平之虛熱也

治九種心下痞五等瀉心湯皆

火分之病皆以黃連為主不但

也如目疾以人乳浸蒸砂為餅或入眼以黃土炒蒸

許入蜜服之如夢遺即入山參滑石之類以散其

薑汁水蜜四製以四君之君芍藥為佐則以散其

痢則以茱萸同炒木香等分大黃倍之之入散其

也

五臟六腑皆有火火平則治動則病故

說其實一氣而已黃連入手少陰心經戶

治本臟之火則生引之治肝膽之實火則以豬膽

炒治肝膽之虛火則以醋浸炒治上焦之火則以

治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則以鹽水

朴硝炒治氣分濕熱之火則以茱萸湯浸炒治血分

中伏火則以乾漆水炒治食積之火則以黃上炒諸

不獨爲之引導蓋辛熱能制其苦寒鹹寒能制其

在用者詳酌之

苦入心寒勝熱黃連大黃之苦寒以導心下之虛熱虻

得甘則動得苦則安黃連黃蘗之苦以安虻也

黃連苦燥苦入心火就燥瀉心者其實瀉脾也實則瀉其子也

今人多用黃連治痢微似有血便卽用之不顧寒熱多少多致危殆若氣實初病熱多血痢服之必止虛而

者慎勿輕用

古方以黃連爲治痢之最蓋治痢惟宜辛苦寒藥苦能發散開通鬱結苦能燥濕寒能勝熱諸苦寒藥多也黃連黃檗性冷而燥能降火去濕而止瀉痢故治

之爲君

五味入胃各歸所喜久而增氣物化之常

參黃連反熱從火化也

諸痛癢瘡瘍皆屬心火凡諸瘡宜以黃連

草黃芩為佐凡眼暴發赤腫痛不可忍者

宿食不消心下痞滿者須用黃連枳實

黃連治目方多羊肝丸為奇洗眼以苦

分用雪水或甜水煎湯乘熱薰洗冷

是血脈凝滯故以行血藥合黃連

乘熱洗也

選方心經實熱瀉心湯單用

伏暑發熱作渴嘔吐并

肝火爲病丹溪左金丸用黃連六兩茱萸一兩同炒爲末神麴糊丸服

陽毒發狂黃連寒水石等分爲末每服三錢濃煎甘草湯下

三消骨蒸黃連末以冬瓜自然汁浸晒七次仍以冬瓜汁爲丸每服三四十大麥湯下尋常渴只一服日

效

消渴小便滑數如油黃連五兩栝樓根五兩爲末生地

汁丸服

小便白淫心腎不足思想無窮所致黃連白茯苓

為末酒糊丸每服三十丸補骨脂湯下日三

毒痢禁口人參黃連同煎終日細呷如吐強飲之

即生或與烏梅同搗丸服

熱毒赤痢黃連二兩焙焦當歸一兩焙為末

每服三錢陳米飲下

赤白休息諸痢久下用黃連一兩半

木一枚乾薑一兩半阿膠一兩半以

水再九沸度得一升頓服即愈六兩茶葉一兩同炒為

下痢赤白狀如魚腦

苓二兩阿膠水調爲丸

香連丸黃連木香等分蜜丸

連用茱萸煎汁炒過四兩木香麩炒兩

兒冷熱痢加煨熟訶子肉一方加煨熟肉二

加龍骨禁口痢加石蓮肉渴加烏梅

濕痢腸風變通丸黃連大茱萸湯泡過各二

各揀出爲末以粟米飯丸各收每服二十九

草湯下黃連丸白痢薑湯下茱萸丸赤白痢

五丸米湯下腹痛加白芍藥

水泄脾泄宣連一兩生薑四兩同以文火炒

自揀出爲末水泄用薑末脾泄用連末每服一
心白湯下亦治痢疾

臟毒下血黃連爲末獨頭蒜煨研和左空心陳米

酒痔下血酒煮黃連爲末泔糊

羊肝丸治男女肝經不足風熱上攻目赤暗羞明

障翳青盲用黃連末一兩羊子肝一只去膜切爛

丸如梧子每食後煖漿水吞十四丸酒作五劑

暴赤眼痛黃連末以雞子清浸罨地下一夜欠早濾清

雞羽蘸滴目內一方用黃連乾薑杏仁等分爲末綿

包浸湯閉目乘熱淋洗之

口舌生瘡黃連乾薑等

小兒口疳鼻齩月蝕並

胡黃連

南海秦隴皆有之形如樹根心黑外黃折之雪出如樹管

主治胡黃連苦平無毒主補

五心煩熱泄痢五痔去果子積

選方傷寒勞復身熱大小便如血用胡黃連

兩蜜炒猪膽丸每服十九生薑二片烏梅

三合浸半日温服臥時再服

五心煩熱胡黃連末米飲調服一錢

小兒潮熱往來或盜汗自汗胡黃連柴胡等分煎服

小兒疳熱膨脹潮熱髮焦不可用大黃黃芩傷胃之藥
反生別證以胡黃連五錢五靈脂一兩雄豬膽汁充
米飲服若脾熱者同黃連硃砂

小兒疳瀉冷熱不調胡黃連半兩綿薑一兩炮爲末每
服半錢甘草湯下

嬰兒赤目胡黃連末茶調塗手足心卽愈

黃芩

秦蜀近地皆有之中枯而飄者瀉肺
火上行細實而堅者瀉大腸火下行

主治黃芩苦平無毒主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉

惡瘡疽蝕療痰熱胃中熱熱毒骨蒸往來寒熱安胎養

陰退陽

發明黃芩氣厚味薄浮而升陽中陰也入手少陽陽明經
一云人手太陰血分

黃芩得酒上行得豬膽汁除肝膽火得柴胡退寒熱得
芍藥治下痢得桑白皮瀉肺火得白朮安胎得厚朴黃
連止腹痛得五味子牡蠣令人有子得黃芪白斂赤小
豆療鼠瘦

肺主氣熱傷氣故身體麻木又五臭入肺爲腥故黃芩
之苦寒能瀉火補氣而利肺治喉中腥臭仲景治傷寒
心下痞滿瀉心湯四方皆用黃芩以其主諸熱利小湯
故也又太陽病下之利不止喘而汗出者有葛根黃芩

黃連湯又妊娠安胎用黃芩白朮蓋胎孕宜清熱涼血
血不妄行乃能養胎黃芩能降火下行白朮能補
潔古言黃芩瀉肺火治脾濕東垣言芩治肺
治大腸火丹溪言黃芩治上中二焦火仲景
小柴胡湯太陽少陽合病下利黃芩湯少湯

下滿而不痛瀉心湯並用黃芩成無已言
心泄痞熱是黃芩能入手少陰陽明
經矣蓋黃芩氣寒味苦色黃帶綠
火治脾熱木則金不受刑一則
救肺也肺虛不宜

救肺也肺虛不宜

直指方云柴胡退熱不及黃芩蓋
發之散火之標也黃芩之退熱乃寒

也

仲景云少陽證腹中痛者去黃芩芍藥

不利者去黃芩加茯苓似與別錄以黃芩

小便不利之文不合蓋亦不然若因飲

及飲水心下悸小便不利而脈不數者是

黃芩不可用也若熱厥腹痛肺熱而小便不利者

其可不用乎昔人有素多酒色而致少腹痛小便淋瀝

用黃芩木通甘草三味遂止有服附子藥多小便闕服

苓連而愈此皆熱厥之痛學者其可拘乎

選方三補丸治上焦積熱瀉五臟火黃芩黃連黃蘗等分

為丸每服二三十丸有以黃蘗易大黃者亦瀉五臟

火名三黃丸每服止五丸增至七丸止

肺中有火片苓炒為末水丸梧子大每服二三十丸

崩中下血黃芩末一錢用霹靂酒下許學士云崩中多

用止血及補血藥此方乃治陽乘于陰所謂天暑地

熱經水沸溢者也婦人天癸絕後每月却行不止黃

芩醋製醋丸服亦此意霹靂酒以秤錘燒
赤滓入酒中也

安胎清熱條芩白朮等分丸服或加神麩凡妊娠調理

以四物去地黃加白朮黃芩爲末常服甚良

產後血渴黃芩麥門冬等分水煎溫服無時

余芎

河陝皆有之長大黃白色者佳須于脚文處認取左文者右文者發脚氣

上治秦芎苦平無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水

利小便療酒疸去頭風治胃熱虛勞發熱

發明秦芎陰中微陽可升可降入手陽明經

秦芎手足陽明兼入肝經故手足不遂黃疸煩渴之病

須之取其去陽明之濕熱也陽明有濕則身體酸疼煩

熱有熱則口晡潮熱骨蒸所以治急勞身體酸疼煩熱

用秦芎柴胡各一兩甘草五錢爲末每服三錢白湯下

亦治小兒骨蒸潮熱減食秦艽炙甘草等分水煎

方選五種黃疸用秦艽一大兩剉作二服每服酒半

絞汁空腹服或利便止酒疸更效

傷寒煩渴秦艽一兩牛乳一大盞煎分二服

胎動不安秦艽甘草炙鹿角膠炒各半兩每

米五十粒煎服秦艽能除熱養血故也養血文

一切瘡口不合秦艽末摻之

前胡

近道皆有以根皮黑肉白有香氣味粗酸者為野蒿誤用令人反胃

主治前胡苦微寒無毒云甘

化痰熱散風邪

太陰陽明之藥同半夏

升入少陽厥陰者不同也

喘嗽痞滿嘔逆諸疾氣下則

陳致新之績為痰氣要藥

氣戶外俱熱散風邪

胡蘆者長尺餘白且軟者用以治勞熱骨蒸

者解表發散忌火上用根下降用梢

平無毒一云微寒主心腹腸胃中結氣飲食

寒煩熱勞熱痰熱潮熱寒熱往來

氣味俱薄陽也升也少陽經藥引胃氣上升苦
散表熱一云手足少陽厥陰四經引經藥在臟

主血在經主氣行手足少陽以黃芩爲佐行手足厥陰以黃連爲佐

仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒硝

湯故後人治寒熱此爲最要之藥

婦人經水適來適斷及傷寒雜病易老小柴胡加以四物秦艽牡丹皮葦爲調經之劑又爲婦人產後血熱必用之藥也柴胡能引清氣而行陽道故傷寒外感有熱者俱加之又能引胃氣上行升騰而行春令者宜加之又諸瘡以柴胡爲君隨所發時所在經分佐以引經之藥又十二經瘡疽中用芫胡以散諸經血結氣聚功與

連翹同也

柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者
以此誤世甚多有一種五臟虛損復受邪熱因虛而致
勞當斟酌用之如治勞熱青蒿丸之用柴胡正合宜爾
勞有五勞病分五臟若勞在肝膽以及包絡有熱或少
陽溼寒熱則柴胡乃手足厥陰少陽必用之藥勞在脾
胃有熱或陽氣下陷則柴胡乃引清氣退熱必用之藥
惟在肺腎者不可用爾然東垣言諸有熱者宜加之又
言諸經之瘡皆以柴胡爲君十二經瘡疽須用柴胡則
是肺腎之瘡十二經之瘡有熱者皆可用之矣但要精

尋病原加減佐使可也如孫琳診張知閣病瘧年餘骨

立醫用耳附諸藥益甚投小柴胡湯一劑熱減三服脫

然時此名勞瘧熱從髓出加以剛劑氣血愈虧安得

平法然有在皮膚在臟腑此在骨髓非柴胡不可觀

此則藥之妙的矣

傷寒熱邪入經絡體瘦肌熱柴胡四兩甘草一兩

傷寒酒後受邪此方全不用補要看邪入經絡四字

傷寒身熱下利如子如火盜汗欬嗽煩渴柴胡四兩

柴胡一兩和飯上蒸熟九菘豆大

與同也經瘧用中用花胡

每服三錢薑棗同水煎

無毒主大風頭眩痛惡風周身骨節疼痛

氣味俱薄浮而升陽也手足太陽經本藥又行

太陰二經為肝經氣分藥

風通用身半以上用身半以下用稍治風去

藥也風能勝濕故爾能瀉肺實悞用損人上焦

得葱白能行周身得澤瀉藁本療風得當歸芍藥

石禹餘糧療婦人子臟風防風能制黃芪黃芪得

風其功愈大

防風治一身盡痛乃卒伍卑賤之職隨所引而至乃風藥中潤劑也若補脾胃非此引用不能行凡脊痛項強不可回顧腰似折項似拔者乃手足太陽證正當用防風凡病在胸膈以上雖無太陽證亦當用之為能散結去上部風也錢氏瀉黃散倍用防風者乃于土中瀉木也

選方大腸風悶氣悶防風枳殼各一兩甘草半兩為末每

食前服二錢

防風能解烏頭附子天雄羌花及諸藥毒插冷水灌之

偏正頭風防風白芷丸如

東臯握靈本草卷之二終