

外科集成

六

庫文閣内			
九	二		和
五	七		
函	六		書
一	五		
架	冊	號	類

内閣文庫		
番號	和 20761	
冊數	50 ( 6 )	
函號	195	230





外科集成卷之六目錄

癰疽第六

蓮子發證治論




蜂巢發證治論

兩頭發證治論

龜形發證治論

竟體發證治論

連珠發證治論





流注發證治論  
痰注發證治論  
癭瘤發證治論  
酒毒發證治論  
丹毒發證治論  
燥發證治論  
痼發證治論  
瘡發證治論

石發證治論  
緩疽證治論  
瘳癰證治論  
黃瓜癰證治論  
陰陽疽證治論  
禽疽證治論  
瘡疽證治論  
串疽證治論



九疽證治論

行疽證治論

水疽證治論

脫疽證治論

附骨疽證治論

多骨疽證治論

肥疽證治論

風疽證治論

骨癭疽證治論

蜈蚣串證治論

石瘤疽證治論

人面瘡證治論

失榮症證治論



大業遠發論  
 八面靈驗論  
 水眼靈驗論  
 眼疾靈驗論  
 骨痛靈驗論

外科集成卷之六

官醫瘍科 栗崎道樞正弘編輯

癰疽第六

蓮子發證治論

蓮子發形如蓮子頭多突  
 起者是也腫高潰膿者生  
 平場陰陷者灰正●蓮子疽發于  
 右解中熱其毒氣奔入心天要用藥  
 散之付圍藥點截住不令攻心如在  
 甲道通于背皆腫不可救也消者可  
 療諸瘡痛痒皆屬毒恐以心生血而  
 行氣之痛諸瘡皆在敷藥就上下打

外科集成卷之六

蓮子發證治論

修澤舍



大針三四針為妙用化毒消腫散千  
 金內托散多加參芪護心散蠟凡丸  
 時刻不可缺全備●蓮子發一名太  
 陰疽生於脊背及兩脇屬膽與膀胱  
 經火毒合化凝結而成若形斜平塌  
 頭侵督脉尾站肋骨諸屬毒重若形  
 長高腫偏於半背中不過督脉旁不  
 過肋骨屬毒輕遇氣實之人初宜蟾  
 酥丸或麥靈丹汗之次宜一粒金丹  
 下之遇氣屈之人初宜仙方活命飲  
 宜解之次宜內托黃芪散托補之共  
 餘內外治法俱宜按攤疽連發癰  
 金鑑●蓮子發突如蓮子蜂窠發孔  
 似蜂房二症生於肩髃髀骨或脊或  
 心俞心包等處輕者形長而高腫或  
 偏半背重者形斜而平塌兩脇俱傷

又名半身發甚形長勢大腫潰半  
 身則名竟體發也大成●蓮子發生  
 于右脇中外如蓮蓬內有子孔恐其  
 毒奔入心大要用托裏散加苓連黃  
 栢荷蓋散之不令攻心漸消始通  
 背腫者危入門●此瘡名蓮子者以  
 蜂窩頭少之稱也不過一二頭故  
 名之又足太陽經督脉之部位大要  
 去心火敷藥截之不令毒攻  
 心如通背腫者不救皆去



蜂窠發證治論

蜂窠形如蜂窠頭含螺子  
 者生黑瘡者死正家●蜂疽發解背  
 起心俞及心包絡俞者肩髃二十日  
 不允死十日可刺其色赤黑膿清者  
 可治●或問一人年六十才背患  
 疽狀如蜂房十日而平塌寒熱痛楚  
 殊甚飲食少進膨脹淋瀝何如日此  
 蜂窠發也診其脈微而遲四肢厥冷  
 為不足詢其先前過服耗氣之劑又  
 得恭怒用治命飲加參芪歸朮兼以  
 烏藥青皮木香間與紫金丹服之起  
 發膿潰服十全大補湯而愈準規○  
 蜂窠發若肉黑色青色中大陷四圍  
 硬肉亦紫色風毒氣傷于腠理可發  
 出卽注不發出卽以此毒因膏梁之

此症之起由於膏粱之毒因入於血脈而發於皮膚其初起之時不過紅腫微痛繼則紅腫漸大痛楚難忍或起膿或起血或起腐肉其形如蜂窠故曰蜂窠發也此症之起由於血熱毒盛故曰血熱毒盛也其治法宜用清血解毒之劑如犀角散或解毒散等藥服之其毒自消膿自潰而愈矣



味溫床厚被醉飽房事以致五藏積  
 毒不流積而為癰則心神恍惚夜夢  
 不安小便頻數大便澀泄此疾生干  
 背串于左脇即死急服內托十宜散  
 虛甚者加附子心神恍惚夜夢不安  
 如遠志辰砂酸棗仁大便秘澀泄加黃  
 連木香白朮土炒蒼朮肉陷不發加  
 穿山甲羚羊角燒灰小使頻數加蒼  
 苡仁益知膿不透加歸須地蜈蚣炙  
 赤芍藥連服蠟礬丸日進五服膿將  
 透便服排膿內補十宜散加木香穿  
 山甲仍貼金絲膏全書●蜂窠發多  
 生肩後及脊旁形似蜂房由脾經積  
 熱更兼心火凝結成毒初起高腫如  
 龜形胖脹半背者輕瘡勢橫斜漫大  
 者重宜服內疎黃連湯若頭尖向

屬心火熱極防毒火內攻藏於亦有  
 瘡形長若人許根橫滿背名為虎體  
 疽屬毒甚險初覺宜急服黃連消毒  
 飲消心解毒度免內攻其餘內外疔  
 法俱按癰疽腫瘍潰瘍金●蜂窠  
 發正當春心形如蜂窠有孔在上者  
 不宜毒為反症宜托裏散加菊花生  
 肌定痛防毒攻心入門●蜂窠發頭  
 在上發最不宜治乃是反證御製仔  
 細用藥此名蜂窠發全在喫藥托裏  
 生肌定痛散血毒氣攻心入膜必  
 難治療因心火未散故也●蜂窠  
 ●頭後蜂窠散注發於頭後如蜂窠  
 者急宜救之若脈赤腫痛起者得療  
 痰發者必難治矣急用調治之若或  
 流於兩肩者決不可療也治法與發



背者同全背●生于頸後者瘡頭向  
 上瘡尾向下形如蜂窠乃火症也嫩  
 腫者急空托裏散加升麻赤芍桔梗  
 防毒攻心如痰發或流入兩眉者不  
 治入月●蜂窠疽生于肩前一二寸  
 先熱後寒皮赤潰有四十九竅形如  
 蜂窠灸三間九二七壯按症與腫瘍  
 潰瘍總治例同法大成●蜂窠疽生  
 於胃側乳上亦有偏身而發者由心  
 火毒盛而或色紫漫腫疼痛身發寒  
 熱初起六七孔漸及延開有三五寸  
 亦有六七寸者形似蜂房即有數十  
 竅每竅出黃白膿宜腫瘡面塗腐腐  
 脫有新肉色紅鮮潤者順若出黑水  
 氣穢平塌者逆始終內外治法俱按  
 癰疽腫瘍潰瘍遇氣寒之人至八九

日不潰以神燈照每日照之應期即  
 潰全愈●蜂窠發于胃乳間乃心火  
 熱盛須用疎導心火之藥稍治之遲  
 則熱必攻心必然冰全吉●蜂窠發  
 於或中神藏靈墟等穴是足陰腎  
 經之穴其經多氣少血如蜂窠發在  
 胃乳間或左或右或雙發者因心熱  
 甚急用內疎心火之藥治之其症亦  
 應若飢飢不飲食舌乾咽腫如不早  
 治毒歸于心不能生矣●蜂窠●蓮子  
 言其頭少不過一二寸也蜂窠言其  
 頭多不止五六寸也此等癰瘍陽症  
 少而陰症多總貴擁護心君不可使  
 火毒內攻與●蜂窠蓮子二發多  
 生于背與心相近與脊中平輕者形  
 長高腫或偏半背重者形斜平塌兩



脇俱傷孔似蜂窠突如蓮子瘡形雖  
畏常能多險多注老弱不堪反取常  
安常穩大規只相不純陽治法何妨  
瘡勢惡護心護膜丸丹須要調停執  
藥執方治法在乎醫意機  
未總論法決存正宗

兩頭發證治論

或問背疽兩頭小四邊散

滿天星一名廣瀨背發因積怒畜熱  
所致治命加羌治紫金丹勝金丹  
壯實者人陣散一粒金丹下之腫高  
紅潤者生低陷黑暗者此準經●此  
症兩頭小者四邊散攻乃因飲酒體  
虛之所致也而氣食相聞合陰虛而  
成之氣虛而散所以開口而瀾急服  
內消藥亦宜補陽也治法與發背肩  
癰同全書●瘡頭上下開發者最急  
是督脉足太陽經毒發脊中兩頭小  
四邊散腫因厚味所致也氣食相關  
合陰虛以成瘡口瀾大展  
不止也凡瘡口瀾大展  
開者急托補之皆主



外科集卷之八  
龜形發證治論  
備澤

兩頭發證治論  
龜形發頭尾俱尖四邊散  
而氣食潮開春陰濕而成之氣虛而  
散者所以開口而濶急服托裏補藥  
大如龜之形因飲食所致  
龜形發頭尾俱尖四邊散  
而氣食潮開春陰濕而成之氣虛而  
散者所以開口而濶急服托裏補藥  
大如龜之形因飲食所致

龜形發證治論

而氣食潮開春陰濕而成之氣虛而  
散者所以開口而濶急服托裏補藥  
大如龜之形因飲食所致  
龜形發頭尾俱尖四邊散  
而氣食潮開春陰濕而成之氣虛而  
散者所以開口而濶急服托裏補藥  
大如龜之形因飲食所致

外科集卷之八  
龜形發證治論  
修澤















走於四肢急宜疎風定熱則氣自然  
 而息若元氣盛初發者速以艾灸七  
 壯四圍敷藥內服二十四味流氣飲  
 無不愈者若流注于手脚腿者死無  
 疑矣全書●血潰流注疽生于背多  
 生膏梁形重之人有此症者好食煎  
 燂糖蜜之類其疽大者如雞子形像  
 猶如紫李只腫不紅內連經絡之間  
 流串骨節之內遍身發疼百節疼痛  
 用內托散加木瓜白芍連翹再服乳  
 香護心散黃礬丸外用圍藥敷之不  
 可遲也同上●走散流注因受寒  
 凍凝滯血脈而成一名流注傷寒又  
 名瓜藤發背患生於背遍身皆有之  
 經云傷寒流注尚猶可流注傷寒急  
 如火醫者當察其寒熱虛實治之大

### 痰注發證治論

痰注發者由溼痰七情鬱  
 滯凝結於肌肉之分日積  
 深久而成也此症發於脊背長形如  
 布袋短形如瓜按之木硬微覺疼痛  
 不熱不紅皮色如常初起宜服瘡科  
 流氣飲外貼金鳳化痰膏消之如此  
 證久遠瘦弱治之不消有屈期要潰  
 治法俱按癰疽潰瘍全書●所謂痰  
 注者何來六氣七情所感痰不能流  
 行結于一處伏于經絡之間而背為  
 明堂月深日久結成囊內連于藏  
 府外隔于皮毛宜早治之其形或圓  
 或不正或如米袋堅硬如石外用圍  
 藥次服人參內托散四五劑元氣  
 充足方可行下劑大便  
 痰積數升而愈全書



癭瘤發生于脊之正中近  
 於大椎陶道身柱三穴之  
 端俱督脉所絡之處甚利害  
 急早托之是陽維之海督  
 領百脉若生癭疽乃督脉  
 不能統督之憲故也

癭瘤發證治論

癭瘤發生于脊之正中近  
 於大椎陶道身柱三穴之  
 端俱督脉所絡之處甚利害  
 急早托之是陽維之海督  
 領百脉若生癭疽乃督脉  
 不能統督之憲故也

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)



酒毒發證治論

或問背當心而痛麻木不  
常累如彈如拳堅硬如  
石痛徹五內遍身拘急何如日此名  
酒毒發疽由飢飽勞傷炙燂厚味所  
致宜服黃連解毒湯加羌活乾葛或  
神效消毒散內疎黃連湯紫金丹勝  
金丹選用神昏厥亂大渴在言有妨  
飲食者死二便閉結者死有因寒變  
而內陷者用枕裏溫中湯淨細酒  
毒發生消脊皮色不變累如彈如  
拳堅硬如石時麻時木痛徹五內二  
便澀滯周身拘急數日後頭面手足  
虛腫泄瀉似痢總由過飲藥酒更無  
厚味鬱毒所致初起宜服連翹消毒  
飲次服內疎黃連湯或消或潰須近  
速治為煩若遷延日久不消不潰必

外科集方卷六

酒毒發證治論

外科集方卷六

不背不心而痛麻木不  
常累如彈如拳堅硬如  
石痛徹五內遍身拘急何如日此名  
酒毒發疽由飢飽勞傷炙燂厚味所  
致宜服黃連解毒湯加羌活乾葛或  
神效消毒散內疎黃連湯紫金丹勝  
金丹選用神昏厥亂大渴在言有妨  
飲食者死二便閉結者死有因寒變  
而內陷者用枕裏溫中湯淨細酒  
毒發生消脊皮色不變累如彈如  
拳堅硬如石時麻時木痛徹五內二  
便澀滯周身拘急數日後頭面手足  
虛腫泄瀉似痢總由過飲藥酒更無  
厚味鬱毒所致初起宜服連翹消毒  
飲次服內疎黃連湯或消或潰須近  
速治為煩若遷延日久不消不潰必







此處有非常模糊的印刷文字，內容難以辨認，可能是另一篇醫文的殘存或重印。

### 燥發證治論

燥疽之狀肉生小點點小者  
 如粟豆大者如梅李或赤或  
 黑乍青乍白有實核燥痛應心或着  
 身體其著手指者似代指人不別者  
 呼為代指不急治毒逐脉上入藏則  
 殺人南方人得此疾皆截去指恐其  
 毒上攻藏故也病原●十指端忽策  
 心痛人心不可忍向明望之見人黃  
 赤或黧存青黑是燥疽直截後節十  
 有一生員止●風疹痛不可忍者燥  
 疽發五藏餘節解相應通洞燥疽也  
 諸是燥疽皆灰又齒間臭熱血出不  
 止燥疽也七日死治所不痊以灰掩  
 覆其血不齧著人諸是燥疽皆灰唯  
 痛取利才有一指耳此皆毒氣客於  
 經絡氣血否澀毒變所生也同上●

外科集卷六

燥發証治論

參詳



胃中痛少氣急入閉中以手掩左眼  
 竟視右眼現光者胃中結癰也若不  
 見光瘰癧疽內發若吐膿血此不瘰之  
 疾宜以灰掩膿血上不爾者傍人也  
 瘰癧疽著指頭者其先作黧疱然後腫  
 赤黑黧疹痛入心是也集驗●瘰癧  
 者肉中忽生點子如豆粒小者癰黍  
 栗劇者如梅李或赤黑青白不定一  
 種其狀有根不浮腫癢痛應心根深  
 至肌少久便四面悉腫飽黧心根深  
 色能爛壞筋骨也毒散逐脈入藏殺  
 人南方人名為楊著毒著肉厚處即  
 割去之亦燒鈇烙疱上令焦如炭亦  
 胞上灸百壯為佳單搗酸草葉傳腫  
 四面防其長大飲葵根汁及藍青汁  
 若犀角汁升麻汁竹瀝汁黃龍湯諸

單瘰折其勢耳于金●瘰癧發生于  
 背之兩旁屬足大陽經多血少氣發  
 于脊中屬督府經初發如豆如梅李  
 黑白色不定慘痛應心四畔如牛唇  
 四十歲以前可治已後者難  
 瘰癧在左右又相同也啓●瘰癧  
 名瘰癧疽訓疽者肺經受熱發于兩手  
 五指頭上一人則不瀉必成四日可  
 刺如發黑離不甚過節猶可治也黑  
 甚過節者灰雖過節猶可治者藥入  
 及之也全書●瘰癧一名蛇瘰瘰癧  
 地面多有之死作點而後露肉四畔  
 若牛唇黑硬小者如粟如豆劇者如  
 海如李發無定處或臂或口齒或肚  
 臍多見手足泥滑間赤黑青白色變不  
 常根深入肌走臂遊腫毒血流注貫



外科集原卷

備用

串筋脉爛肉見骨出血極多令人串痛在言痛入于心即久突出於外腎者亦久入門此瘡原因感受惡風入於脉理或烟瘴地面傷寒瘧後及感觸蛇毒所致二十已後四十以前者皆積傷之毒入胃壅聚而成四十已後六十以前乃血閉不行壅熱積血得之治宜毒行血用瓜蔓根酒煎人乳香沒藥五靈脂皂刺等分以下其毒次用清心行血之劑如係蛇毒赤足蜈蚣最妙雄黃白芷次之或蠟丸丸冷酒入麝香送下外用荊芥白芷川椒葱白煎湯入鹽俟湯溫自手臂上盪下日三次療疽毒氣走腫所至處宜緊繫之自手發者毒走至心自足發者毒走至腎不救各有

紅筋尋其筋之盡處灸三炷即瘳經云在指則截在肉則割恐毒氣入心入腹令人煩燥嘔噦昏悶其瘡出清如水穢汁者腎虛極也久人至速此流極慮引風凡癰疽開一寸則引風非必風入於其中風邪襲虛則肉爛透骨惡血橫流宜南星半隻白芷稍最能去風可頻敷其諸瘡理惟廣癰疽法度行之入門字書凡字從票皆有疾轉之義瘰癧為病毒發疾轉不旋踵而害人故其字從票音同於飄風之飄治之不可稍緩也古人謂人受惡風入於肌脉變成斯病蓋厲氣蘊伏初未知覺毒鬱既發則若火之熾烈不可嚮邇是以其狀隱小而深實黯黑而不明其痛應於心毒氣已

外科集原卷

瘰癧証治論

備用



深故其證如此頓飲藍青升麻葵根  
竹瀝之類以沃其熱毒甚則斷指刮  
肉灼肌以除之凡以毒氣疾轉稍緩  
則入藏故也聖濟●標疽心火熱毒  
也見於五心痛不可忍其狀如泡瘡  
而赤外形雖小內有熱毒在心臑者  
難治在手足心者可療然治之須早  
稍遲或在心臑則腐肉粉碎神仙莫  
醫凡有此疾在手心則用洪寶丹於  
手心環圍敷之或以截其血卻用冲和  
膏於手心留只收功在脚心則用洪  
寶丹敷在脚脛交骨四圍一二寸長  
以冲和膏收功如前仙傳外科●俗  
以癰癤療附於癰疽之類以是為五  
發豈知癰與癰疽不過癰疽之一物  
在書僅有所謂癰疽則癰亦同出而

異名也若癰與癰前所未聞合是為  
五發其可乎外●瘰癧屬表  
易治疽癰癰癰癰癰癰癰癰癰癰  
頤上最為難治得効●瘰癧初出  
作紅點次變黑色腐爛筋骨小者如  
粟如豆大者如梅如李發無定處初  
用蟾酥餅膏貼患上寒熱交作者黍  
米寸金丹或飛龍奪命丹亦可近腫  
遊走不定者真君妙貼散加雄黃敷  
之自然截住破後脾胃虛弱食少乾  
嘔者補中益氣湯加黃連麥冬補而  
不應腫高疹甚惟出清水穢汁者俱  
為不治之症正氣●瘰癧疽與脫疽  
同法或灸百壯內飲青藍汁等以去  
其熱紅絲遊走者於盡處灸三壯自  
愈或用蠟凡丸加射冷酒下多服取







赤黑甚難療宜按大方非單方所及

上日夜勿止若發疽於十指端及色

同赤黑甚難療宜按大方非單方所及

此疽發於手足心者最為難治

此疽發於手足心者最為難治

此疽發於手足心者最為難治

此疽發於手足心者最為難治

此疽發於手足心者最為難治

癰發證治論

癰發乃天時不正之氣感而

於手足掌心或腰腿臂下伸縮之處

漫腫無頭憎寒發熱四肢沈重煩渴

為甚初起宜服萬靈丹發汗解毒散腫

仍不消者必欲作膿淋裏消毒散兼

蠟礬丸服後俱照癰疽潰瘍法

兼漫腫無頭其色淡紅金壘●癰發

生於手足及陽三焦經多氣少血在耳

後下一寸三分乃致命之所如赤腫

痛急內托之膿出腫散則安不然連

耳聾渾身焯喉啞內腫痛汗出連

背癰及肩肘大痛若不早治必死矣



不痒無力之人二十日始作紅腫有  
力人一月方作紅腫內先潰爛皮面  
上紫黑色破後成其漏則難治矣急服  
出臭膿水必成其漏則難治矣急服  
非膿水必成其漏則難治矣急服  
潰之先用鐵磁散敷之能消其一面  
全書●凡瘡氣血相搏有頭有面風  
邪內作無頭無面無頭有面風  
瘡低貼肌肉或徒注牽連生於手足  
掌心或腰腿或臂下伸縮之處初起  
渾身壯熱手足不遂憎寒頭痛虛渴  
多汗嘔逆四肢沉重較之諸發煩渴  
甚或腫毒已平數月後復發於足  
發但作肉色微帶淡紅終不能救大  
要培養內氣以防滑瀉外用神異膏  
貼之如瘡出米泔汁者必死入門

癰疽證治論

癰疽發利發之時不寒不熱腫  
爛二十以前者積熱所生四十以後  
者血氣衰也須早為治可公一  
也皮黑難治得効方●未潰色紫黑  
堅硬日潰深陷如岩為癰多生乳脇  
腰跨全宜大補氣血脾胃及蠟蓉丸  
護膜生肌其萬一癰瘰瘰俱多難  
治入門●癰發男則多發於腹女則  
多發於乳東醫寶鑑●婦人憂怒柳  
鬱時日積累脾氣消阻肝氣橫逆遂  
成隱核如蠶碁子不痛不痒十數年  
後方為瘡陷名曰蛇岩以其瘡形巖  
凹似岩也不可治矣若於始作便  
能消釋病根使心清神安然後施之  
治法亦有可安之理力心●瘰人鬱



怒有傷肝脾結核如蠶若子大不痛  
 不痒五七年後外腫紫黑內漸潰爛  
 名乳岩者滴盡氣血方死急用十六味  
 流氣飲及單青皮湯兼服瀝者只用  
 清肝解鬱湯或十全大補湯夏加清  
 心靜養庶可苟延歲月經年以後必  
 於乳下潰一穴出膿及中年無夫婦  
 人死尤速故曰夫者妻之天惟初起  
 不分屬何經絡急用葱白寸許生半  
 隻一枚搗爛為丸芫蕪大以綿裹之  
 如患左塞右鼻患右塞左鼻一宿而  
 消入門●婦人已嫁未嫁皆生乳岩  
 此毒陰極陽衰奈虛陽積而與此  
 陽安能散故此血滲于心經即生此  
 疾苦未破可療已破即難治捻之內  
 如山岩故名之早治得生若不治內

潰內爛見五藏而厥全書●始發為  
 瘡破陷空洞名曰乳癌以其深凹有  
 似岩穴也多難為治得此證者雖曰  
 天命若能清心遠慮薄滋味戒  
 仍服肉托治血順氣之藥庶幾有可  
 生之理也●外科集驗●憂鬱傷肝思  
 慮傷脾積想在心所願不得志者致  
 經絡痞澀聚結成核初如豆大漸若  
 棋子半年一年二年三載不疼不痒  
 漸及而大如生疼痛則無解日後  
 腫如推栗或如覆碗紫色氣穢漸及  
 潰爛深者如岩者危凸者若沒蓮疼痛  
 連心出血作臭其時五藏俱衰四大  
 不救名曰乳岩凡犯此者百人必百  
 成如此症知覺若早只可服清肝解  
 鬱湯或益氣養榮湯患者再加清心



靜養無掛無碍服藥調理只可苟延  
 歲月若中罕已後無夫之婦得此死  
 夏尤速故曰夫乃歸之天也惟和生  
 之時急用艾灸核頂待次日起泡挑  
 破用搜針針入四分用水蠟散條插  
 入核內糊紙封蓋至十三日其核自  
 落用玉紅膏庄肌飲口再當保養不  
 發正宗 ● 大抵鬱悶則脾氣傷肝氣  
 逆遂成隱核不痛不痒人多忽之最  
 難治療若一有此宜戒七情遠厚味  
 解鬱結更以養氣血之藥治之庶可  
 保全否則不治亦有數載方潰而陷  
 下者皆曰乳岩蓋其形似岩穴而陷  
 毒也慎之則可保寸中之一二立齊  
 ● 無故雙乳堅硬如石數月不潰時  
 常疼痛名曰乳岩臭如石數月不潰時

肝脾兩傷氣鬱凝結而成自乳中結  
 核起初如棗栗漸如棋子無紅無熱  
 有時隱痛速宜外用灸法內服養血  
 之劑以免內攻若年深日久則  
 惡寒始覺大痛牽引胃脘腫如覆盆  
 堅硬如堆粟高凸如岩頂透紫色光  
 亮肉含血絲朱腐後潰污水時津有  
 時湧冒鼻血腐爛深如岩壑翻花突  
 如泛蓮疼痛連心若復因急怒暴流  
 鮮血根腫愈堅斯時五臟俱衰即成  
 敗證百無一收若患者果能清心滌  
 慮靜養調理庶可施治初宜服神效  
 姑蘘散次宜清肝解鬱湯外貼季芝  
 鯽魚膏其核或可望消若反覆不應  
 者瘡勢已成不可過用尅伐峻劑致  
 損胃氣即用香貝養榮湯或心煩不



寐者宜服歸脾湯潮熱惡寒者宜服  
道遙散箱可荀延歲月如得此證者  
於腫核初起即加醫治宜用豆粒大  
艾壯當頂灸七壯次日起飽挑破用  
三稜針刺入五六分挿入水螺散燃  
子外用紙封糊至十餘日其核自落  
外貼絳珠膏生肌王紅膏內服舒肝  
養血理脾之劑生肌飲口自愈金鑑  
●乳岩初宜多服疎氣行血之藥頃  
情思如意則可愈此疾多生於憂鬱  
積念中爭婦人未破者尚可治成瘡  
者終不可治正傳●一婦年六十性  
急多妒忽左乳結一核大如芡子不  
痛即以人參湯調青皮甘艸末入薑  
汁細切押一日夜五六次至六七  
消天又一婦性躁難於後姑乳生

核以單煮青皮湯間以加減四物湯  
加行經絡之劑治兩月而安此皆乳  
岩始起之證故易愈丹●一婦久  
鬱右乳內結三核年餘不消車寒  
熱飲食不甘此乳岩也乃七情所傷  
肝經血氣枯槁之證宜補氣血解鬱  
結藥治之遂以益氣養榮湯百餘劑  
血氣漸復夏以木香餅灸之喜其謹  
疾年餘而消若用剋伐之劑必復傷  
血氣則一無可保者立齊●一婦左  
乳結核三年方生腫痛盼之脈緊數  
而有力此陽有餘而陰不足也况結  
腫如石皮肉紫色不澤此乳岩症也  
又一婦左乳結腫或小或大或軟或  
硬俱不為痛已半年餘方發腫如覆  
碗堅硬木痛近乳頭壘及遍生疔瘡



外科集方卷一

傷寒

時痛時痒疹之脉弦而數腫皮慘黑  
不澤此氣血已成辭不可治又一婦  
已潰腫如沒運流血不禁辭後果俱  
死正宗

此由寒氣客於肌肉  
折於血氣結聚所成其結腫  
痛熱時自歇此寒多熱少  
謂之石癰久入熱氣乘之乃有膿也  
石疽亦是寒氣客於經絡與血氣相  
搏血澀結而成疽也其寒毒偏多則  
氣結聚而皮厚米如瘰癧如石故  
謂之石癰也  
惟石疽深寒客于經絡血氣結聚不  
散隱于皮內腫按之如石此毒連頸  
項之間內先潰爛方出皮膚恐膿出  
頸項者即先用排膿內補十宜散待  
膿盡內補散戀心乳香護心散仍貼  
金絲骨渴甚加五味天花粉乾葛麥  
冬烏梅初起須用艾火灸患上三四

### 石癰證治論

確實至牢有根核皮相親不甚熱微  
痛熱時自歇此寒多熱少  
謂之石癰久入熱氣乘之乃有膿也  
石疽亦是寒氣客於經絡與血氣相  
搏血澀結而成疽也其寒毒偏多則  
氣結聚而皮厚米如瘰癧如石故  
謂之石癰也  
惟石疽深寒客于經絡血氣結聚不  
散隱于皮內腫按之如石此毒連頸  
項之間內先潰爛方出皮膚恐膿出  
頸項者即先用排膿內補十宜散待  
膿盡內補散戀心乳香護心散仍貼  
金絲骨渴甚加五味天花粉乾葛麥  
冬烏梅初起須用艾火灸患上三四

外科集方卷一

石癰證治論

冬



十壯發于額面者不可灸矣  
 石癰石疽謂難疽腫鞭如石久不作  
 膿者是也準繩●石癰者始發皮核  
 相親著不赤頭不甚堅微痛熱熱漸  
 自歇便堅如石故謂之石癰難消又  
 不可得自熟縱愈皆百餘日也  
 ●石癰石疽腫堅如石癰則微紅而  
 疽則皮色不變久不作膿由深寒客  
 於經絡者宜服黃芪丸初宜灸灸三  
 五壯若生於面頰者則不宜灸用  
 麥飯石膏敷之由脾氣鬱結榮氣不  
 從所致者宜致和丸服之久服全消  
 大成●上石疽生於項兩傍形如  
 桃李皮色如常堅硬如石響痛不熱  
 由肝經鬱結以致氣血凝滯經絡而  
 成此證初起氣實者宜服舒肝潰堅

湯氣虛者宜服香貝養榮湯外用蔥  
 白蜂蜜搗泥敷貼日久不消者以陽  
 燧錠每日灸之或以消或軟或將潰  
 為度既潰法同瘰癧金鑑●中石疽  
 生於腰膀之間纏綿難收功其疽  
 時覺木痛難消難潰堅硬如石皮色  
 不變由寒氣凝滯血凝結而成初宜  
 服沒藥丸外用鮮商陸搗爛貼於患  
 處隨用艾壯當頂灸之以軟為度潰  
 後按飛疽潰瘍治法同上●下石疽  
 生于膝間無論膝蓋及左右俱可以  
 生堅硬如石疼痛腫如雞卵皮色不  
 變並無焮熱難消難潰既潰難斂最  
 屬疲頑由身虛寒邪深襲致冷血凝  
 凝結而成腫潰內外治法俱與中石  
 疽參考但此證腫潰俱涼若涼化為







外科集原卷一

外科集原卷一

緩疽證治論

或問患疽於小腹之左數月  
 少漸至羸羸何如石寒熱問作飲食減  
 大陰經積熱所致由醫不得法邪正  
 相持耳投以紫金丹活命飲問服十  
 全大補湯半月而愈●緩疽者  
 由寒氣客於經絡致榮衛滯澀氣血  
 壅滯所成其寒盛者則腫結痛澀而  
 回女無頭尾大者如拳小者如桃李  
 冰々與皮肉相親著熱氣反其腫與  
 肉相似不甚赤積日不潰久乃變紫  
 黯色皮肉俱爛如牛頭瘡漸至通體  
 青黯不作頭而穿潰膜出是也以其  
 結腫積久肉腐壞遲故名緩疽亦名  
 肉色疽也緩疽原●其勢緩漫故名緩  
 數年乃成

外科集原卷一

緩疽證治論

外科集原卷一



疽其以腫色與肉色相似故名肉色  
 疽聖消●緩疽者初結腫形似癰回  
 及無頭尾其色不異但痛深有根核  
 入與皮肉相親著外耳一名內癰初  
 作服五香連莞湯灸去血以薄之取  
 塗之其間數針鏹去血又薄之取消  
 也若不消色未變青點者以鍊石薄  
 之若失時不得療已爛者猶服五香  
 連莞湯及漏蘆湯下之隨熱多以投  
 方也外以升麻湯湯洗之薄升麻膏  
 若生臭惡肉者可以單行一物白蘭  
 茹散傳之青肉去盡覆停也好肉既  
 生但傳升麻膏良肉不生單傳一物  
 黃芪散也若白蘭茹散積日青惡肉  
 不盡者可以漆頭赤皮蘭茹散中合和傳  
 七和三大錢七白蘭茹散中合和傳

之惡肉去盡還以淨用白蘭茹散也  
 視奸肉欲生可傳黃芪散也外臺●  
 緩疽生於腹之等田太陰脾經氣  
 滯寒積而成堅硬如石不紅不熱痛  
 引腰腿數月不潰若兼食少削瘦者  
 終屬敗證不可乘而不治初宜服山  
 甲內消散不應不可強消徒損胃氣  
 以十全大補湯加烏藥附子胡蘆已  
 溫補之用木香餅熨之兼用獨頭蒜  
 搗爛鋪於患上艾壯灸之以知熱為  
 止次日再灸以或消或潰為效若滑  
 後即按潰瘍治法全愈●緩疽生於  
 兩膝上或生於膝兩傍由外寒深襲  
 血瘀凝滯而成腫硬如餛木痛日增  
 其色紫黯積日不潰證之情形與下  
 石疽相似惟多微熱腫久則腐爛肌



外科集腋卷一

肉皮膚初服當歸拍痛湯以宜通澤  
熟次按中石疔治法內宜溫補外宜  
灸法虛甚者十全大  
補湯相兼治之師上

### 癩癰證治論

日名癩癰兩項腋兩乳旁結核或  
發緩慢是冷證非熱證也宜用回陽  
王龍膏熱藥敷貼服內種十宜散何  
首烏散勝金丹選用準●癩癰  
生干乳房初腫堅硬形類結核發長  
緩慢漸增嫩腫色紅疼痛由包絡寒  
痰脾氣鬱結而成係寒證非熱證也  
治宜溫和舒鬱化堅以內補十宜散  
服之外敷回陽王龍膏消之如不消  
膿勢將成也●內外治法即癰癰腫  
癩癰二經發之生干期門者名曰腋  
癩女子患之走諸處名曰結癩皆玄  
●夏有一頭未已再生四五頭子母

外科集腋卷一

癩癰證治論

參



外科集方卷之六

癰疽論

大小等又名歷瘡其勢雖輕其毒更  
重生至死者死倘有白膿赤腫瘡不  
黑陷飲食知味者生不外補以化毒  
也  
核於頸項臂膊背之處亦發證也  
但宜熱藥敷貼  
...

黃瓜癰證治論

何如日此名黃瓜癰一名肉龜癰  
引心四肢麻木是也此證多不可治  
急服紫金丹勝金丹活命飲加羌活  
柴胡及奪命丹神仙追毒丸選用所  
微自汗譫語者以平場黑色者獨薑  
散主之服臺閣紫微丸  
癰生於背旁由脾火積毒而成皮色  
紅狀若黃瓜腫高寸餘長可尺許四  
肢麻木疼痛引心紅治速潰者須紫  
陷脈微自汗譫語堅硬潰遲者逆初  
起宜服仙方活命飲加羌活柴胡或  
奪命丹治之其餘內外治法俱按癰  
疽腫瘍潰

外科集方卷之六

黃瓜癰證治論

癰疽論







仙方活命飲其餘內外科治法俱按癰疽腫瘍潰瘍金鑿●陰陽二氣疽其形只在一處非若串疽之攻擊也大成也出七情內鬱所致也大成也

日飲不見效不可飲也

六耳小不常飲則大

十日不效則不可飲也

命此藥立效

下飲立效

則不收日也

### 禽疽證治論

十四日此十日可刺導引膿出即愈

鬼遺●或問背忽麻木拘急不痛十

數處肉紫色如拳觸狀何如曰此名

禽疽七日內寒熱口禁者外急服治

命飲加羌活獨活勝金丹奪命丹得

汗可治無汗不治神清脉和可治神

昏脉躁或微或代者死漫腫不潰宜

服臺閣紫微丸●代者死漫腫不潰宜

者數十處其得四日腫合牢核痛其

狀若變十日可刺其初發身戰寒齒

如禁欲坐如是者十五日後也此是

寒溼之氣客於肌肉所生也病原●

禽疽之毒由時氣風熱而成始發數

塊如疹其色紫紅在背而生初宜急











外集卷六

上生疽串於右者可治右肩骨上生  
疽串於左者難治古有此說愚謂不  
然或注左者氣血不調陰陽交錯  
也七惡證少何慮難痊元氣虛憊治  
之何補哉華經●兩肩左右齊發名  
雙串肩搭疽皆玄●左搭屬肝右搭  
屬肺俱生于左右肩骨移動之處為  
可治古云左搭串右右搭串左俱為  
難治今治不然予每醫左右相串者  
未嘗見其效惟在治法得宜有此症  
者先用萬靈丹發汗踈通因外次以  
清肝解毒湯柴胡清肝湯氣用西君  
子湯血用四物湯瀉後入珍湯俱兼  
六鬱湯參而調治誠為妥當但此症  
原起于痰凝氣滯火鬱氣血不調所  
生正謂鬱者悶之滯者行之如誤用

瘡科解毒世氣悞補悞攻之藥必致  
多危正崇●三串毒上下生之其形  
雖一而中間皮好但肉潰爛初起  
紅色亦不大痛日漸潰爛此症之來  
六氣七情所感嚴寒酷暑所遇積毒  
于穢府或年老男婦性度怡然而亦  
患此者想平居坐臥濕地而然也若  
無外症得生若飲食日減泄瀉發熱  
勢難生矣治法與發背諸癰同因中  
●風毒通身串生於反背諸癰之間因  
暑毒或食災牛災馬瘟猪等物以生  
此疽雖見勢兇亦易治忌食生冷毒  
入藏府難治先服流氣飲天服人參  
敗毒散加猪苓澤瀉當歸防風外生  
團藥次服蠟卷丸目土●鼠攢瘡生  
於脇背之間此乃自幼受其胎毒或

外集卷六

串疽証治論

修畢







行疽證治論  
行疽候者發瘡小者如豆大  
者如錢往來而身及生面上  
謂之行疽此亦寒熱客于腠理與血  
氣相搏所生也瘡原●行疽發如腫  
或後合相從往來不可要其所在刺  
之即愈

行疽證治論

行疽候者發瘡小者如豆大  
者如錢往來而身及生面上  
謂之行疽此亦寒熱客于腠理與血  
氣相搏所生也瘡原●行疽發如腫  
或後合相從往來不可要其所在刺  
之即愈

行疽證治論



水疽證治論

水疽者由寒濕之氣客於皮膚... 津液使血氣不流... 腫狀如物覆水... 氣偏多則發水疽其腫狀如物覆水... 多發於手足此是隨肌膚虛處而發... 也亦有發身體數處而壯熱遂至死... 瘡原●水疽所發多在手足數年猶... 可療

水疽證治論

水疽者由寒濕之氣客於皮膚... 津液使血氣不流... 腫狀如物覆水... 氣偏多則發水疽其腫狀如物覆水... 多發於手足此是隨肌膚虛處而發... 也亦有發身體數處而壯熱遂至死... 瘡原●水疽所發多在手足數年猶... 可療



外科集方卷之六

脫疽論

# 脫疽證治論

發於足指名曰脫癰其狀赤  
 黑者死不治不赤黑者不死  
 消之不衰急斬之否則久矣靈柩  
 蘆敷疽發兩足指五日不愈  
 可刺其色發黑癰者不堪過節者  
 可治見遺 ●足指生疔重者潰而自  
 脫故曰脫疽或曰惟足大指患之為  
 脫疽其餘足指患之曰敦疽易治惟  
 脫疽難治 ●脫疽以疔患於足  
 或足趾重者潰脫故名之亦有患於  
 手指者名曰節疔疔重者癰去本節  
 輕者筋攣此證因膏粱厚味酒麵炙  
 燻積毒所致或不慎房勞腎水枯竭  
 或服丹石補藥致有先渴而後患者  
 有先患而後渴者皆腎水虧涸不能  
 制火也此證形勢雖小其惡甚大不

外科集方卷之六

脫疽證治論

參詳



問脾潰皆須隔蒜灸之不痛者宜明  
 灸之庶得少殺其毒凡初發而色黑  
 不潰者不治毒延入腹者不治色黑  
 不痛者亦不治色赤作痛自潰者可  
 治者失解其毒以致肉灰色黑者急  
 斬去之亦有因修手足口咬等傷而  
 致者若元氣虛弱或犯房事或外塗  
 寒涼肉服剋伐損傷脾胃致患處  
 不潰或黑延上足亦多致成重者須  
 當用腳刀轉解周骨輕拽去之使筋  
 隨骨出而毒得洩亦不痛否則毒筋  
 內斷雖去而仍潰且偏僻之處氣血  
 罕到藥難導達况攻毒之劑必先傷  
 脾胃反損元氣不若灸法為良重者  
 須解去為善故孫真人曰在肉則割  
 在指則截使不知此則外致大歿而

善尤甚矣况患處已壞雖解不痛又  
 何憚而不為乎患者當知之立膏  
 腳背發以名脫疽亦以其能潰脫也  
 亦有患於手背及手指者原因膏梁  
 房室損傷腰腎或先渴而後發或先  
 發而後渴輕者色赤作漏自潰可治  
 先用隔蒜灸內服活命飲或敗毒散  
 加金銀花白芷大黃痛止乃與托裏  
 散或內托十宣散去桂加天花粉金  
 銀花挾氣者十六味流氣飲下虛或  
 十全大補湯八味丸大苦參丸重者  
 色黯不痛先用隔蒜灸桑枝灸更服  
 補藥固內則惡肉不致上侵或可保  
 生又有內修手足口咬等傷或外塗  
 生肌藥內服剋伐兼犯房室患處  
 不潰色黯上延亦多致頰重諸須用



利刀解去其筋則筋骨出而得泄又甚在指則斬去其指在肉則割去其肉外治用桐油及無名異煎一沸入花椒一勺看膽大小剪葉葉在內同煎浸一七後單以此葉貼瘡上即安入門發于足指者名曰脫疽其狀赤黑者死不赤黑者可治宜服苦參丸手指發者同前治之全書夫脫疽者外腐而內壞也此因平昔厚味膏梁熏蒸藏府丹石補藥消燦腎冰房勞過度氣竭精傷或兼房行澀精霸道藥噎舌下化水直至丹田取納臍中使熱徑投內腎為丸掌握作香鼻息塗抹陰鼎或搽陽器圖使堅鋼希求常濟多致陽精煽惑淫火疔在

毒積於骨髓者終為疽毒陰毒誠為巧人行拙誰防起蕭牆智者多愚自謂喜從天降不顧後日也骨枯髓涸藏敗府亡方知今日罹殃有故解脫無方凡患此者多生於手足故手足乃五藏枝幹瘡之初生形如粟米頭便一點黃泡其皮猶如煮熟紅棗黑氣侵漫相傳五指傳遍上至脚面其疼如湯滌火燃其形則骨枯筋羸其穢異香難解其奈仙方難活故血灰心敗筋死肝敗肉死脾敗皮灰肺敗骨灰腎敗此五敗者雖有靈丹竟喪命而已是生此疾者死生付於度外孫真人曰在肉則割在指則切即此病也治之得早乘其未及延散時用頭髮十餘根纏患處不節盡處造九

脫疽証治論



十餘轉漸及緊之必得毒氣攻延良  
肉隨用蟾酥餅放原起粟米頭上加  
艾灸至肉枯瘡成爲度次日本指盡  
黑方用利刀尋至本節縫中將患指  
徐順取下血流不住用金刀如聖散  
止之餘腫以妙貼散敷之次日倘有  
黑氣未盡單用蟾酥餅研末搽之膏  
蓋黑氣自退患上生膿照常法用王  
紅膏等藥生肉護骨完口此爲吉兆  
內服滋腎水養氣血健脾安神之劑  
若內無變症外無混雜此十中可保  
其三四矣若割取之後黑色仍漫痛  
腫尤甚敗惡無膿口乾舌硬精神不  
爽食不知味者終死凡治此不可一  
日醫治必與高明衆議聽患者願  
割取况此症肯尾齒凶變駭難定故

不可輕易用之又有形似而實非宛  
真而受異詳註在後空參觀之正崇  
●脫疽看法起瘡不渴口潤舌和性  
志尋常毋妄暴急循禮爲吉初出形  
如麻子焮熱作痛一指皆腫根脚收  
束者吉已成頭便作腐肉不紫黑疼  
痛有時膿出腫消者吉已潰先膿後  
腐肉色紅活毒不走散氣不醒瘻者  
吉未瘡先渴喜冷無度昏睡舌乾小  
便頻數陽痿者逆初起形如粟米肉  
便紫黑色不腫刺疼黑氣延散者逆已  
成瘡形枯縈肉黑皮焦痛如刀刺毒  
傳好指者逆日潰肉枯筋腐血水臭  
汚疼苦應心伶仃撥骨者逆同上●  
脫疽治法脫疽多生足指及生手指  
初起水窠黃泡者即灸之初生如粟



裏河容谷皮色紫赤不作爛腫髮孔  
仍灸已灸之後瘡受火氣發洩作膿  
外藥施之內兼補托毒勢已成瘡形  
稍陷但紫色未攻脚面者訝議割取  
既割取之後血水淋漓疼痛不減和  
氣血補脾胃已成飲食減少身體倦  
怠便數口乾滋津液壯腎水破後氣  
血受傷腸胃虛弱自汗盜汗惡心乾  
嘔睡臥不寧日晡發熱疼痛苦楚煩  
悶譫妄俱宜大補氣血富貴及膏粱  
素饗色慾每於房術縱恣日久禁行  
割法同上●手足指生瘡有生于指  
尖之傍也名曰敦疽有生于手足指  
上了者名曰伏鼠疽大約高腫而痛  
乃陽症高腫而痒乃陰症也陽症必  
有膿陰症必無膿也有膿者刺之而

愈無膿者刺之轉重也無膿而色紅  
者生無膿而黑色者灰正不必黑過  
節也有一種黑過節者生在手足之  
指上名曰脫疽言必須去其指也此  
症多得之膏粱之客而又用丹石房  
術之藥或噙舌下或納臍中或塗陰  
戶或搽陽器滌火疔狂燥乾骨髓日  
積月累乃發為此疽夫脚乃四餘之  
末宜毒之所不至誰知毒所不到之  
處而毒聚不散出于指甲之間其毒  
更出較尋常之處尤甚十倍也然則  
治之法必以割去其指為上乎而亦  
不盡然也人身氣血周流于上下則  
毒氣斷不聚結于一處火毒聚于一  
處者亦乘氣血之變也脫疽之生正  
四餘之末氣血不週到也非虛而



何大補氣血益之瀉毒之品往及矣  
 功如响何必割指始能存活乎諸方  
 既無痛楚之傷而又獲生全之妙願  
 人信於心用之耳與肯●諸書論脫疽  
 單生於足大指而別指生者俱名敦  
 疽此非確論然脫疽偏生於屬陰經  
 之指者居多屢經如此後之學者宜  
 詳審焉可也此證初起不痛者宜雌  
 雄霹靂火灸之其餘滋補湯洗等法  
 俱按癰疽腫瘍潰瘍治法全鑿●脫  
 疽有肉則割在指則截蓋親之遺體  
 雖不忍傷而遂至夭殛則尤傷矣况  
 解法無痛患者知之立●大抵此  
 症皆由膏粱厚味或房勞太過丹石  
 補藥所致其發于指微赤而痛可治  
 潰之不忍急斬去之庶可保否則不

治色紫黑或發于胸背亦不治或先  
 渴而後發或先發而後渴色紫赤不  
 痛此精氣竭決不可治●脫疽  
 腳指頭忽大發痒已而作痛指甲現  
 黑第二三日連脚俱青黑者黑至脚  
 上過脛即死急服顧步湯可救服藥  
 一劑而黑色解二劑而疼痛止三劑  
 全愈若已潰爛多服數劑亦可救誤  
 ●脫疽形如粟米色如紅棗者是也  
 生此百人百不救正宗●脫疽初發  
 結毒赤腫痛者以五神散及以紫  
 河車金線釣葫蘆金雞舌金腦香搗  
 爛敷及以汁塗傳又以萬病解毒丸  
 磨醋煖塗之未成焮痛者除溼攻毒  
 更以隔蒜灸之至不痛用十二經消  
 毒散加引經藥履腫勢盛未得緊急



者宜作蛇傷治之及作瘡氣治之効  
未成焮痛或不痛或大痛者宜隔蒜  
灸更用解毒以消毒萬全湯臨證加  
減未成若色黑急割去速服補劑庶  
可救若黑延上不可治未成若色赤  
焮痛者托裏消毒更無灸以人參敗  
毒散去桔梗加赤牛膝銀花白芷大  
黃痛止次以十宣散加天花粉金銀  
花赤牛膝未成欲成若色紫不痛隔  
蒜灸五十壯尙不知痛又明灸之活  
命飲天以托裏散潰脫而愈未成欲  
成大痛色赤而腫隔蒜灸至痛止以  
加味荊防敗毒散加牛膝銀花白芷  
大黃次以活命飲連親●若女人患  
脫疽多因托縛血脈不通遂成死肉  
惟當壯其脾胃行其經絡生其血氣

則愈又治法日色赤作痛者元氣虛  
而濕毒壅盛也先用隔蒜灸更用解  
毒藥如活命飲托裏散之屬仍速用  
補劑如十全大補湯加減八味丸則  
毒氣不致上侵元氣不致虧損庶可  
保生若作渴者宜滋陰降火色黑者  
不治●一入羊近五旬右足小  
指初生如粟米漸成白泡三日始痛  
請用頭已腐爛一指紫腫此脫疽也  
隨用艾火明灸十壯始大痛乃止  
又用針刺灸頂以嚼餅貼灸上膏  
蓋木指腫上用披針擊刺七八處發  
泄毒血用蟾酥釵磨濃塗之腫外以  
真君妙貼散敷護良肉庶不外侵其  
時患者脈數身發寒熱惡心體倦先  
用人參敗毒散解其表症欠用黃連

脫疽証治論

參



內疎湯通其大發而惡心煩熱亦止  
 又以并葉消毒散加金銀花牛膝數  
 服早以八天丸晚用蠟丸相兼服  
 之毒其火疎毒氣隨又針并泄其  
 毒故不變作解毒為膿腫亦不散後  
 用上全大補湯加山萸五味麥冬等  
 藥調理月餘而愈此疽若不針灸發  
 泄毒氣專假藥力數圍再加峻藥攻  
 利必致傷其元氣豈能保固毒不侵  
 犯得安之理正氣●一保固毒不侵  
 縫中初生一點黃粟泡皮肉隨變紫  
 色陰疼不腫常如刀刺視其形色真  
 脫疽也診其脈又得細數無力此腎  
 經傷敗症也但患者生平大飲肉有  
 正副三人此必精力已竭縱治無功  
 予強辭之後必延至脚面足底皆穿

痛微不已又飲食日少氣血日衰形  
 體日削兩月後百苦而終同上



外手集方卷之二

附骨疽證治論

附骨疽證治論

附骨疽者由當風入骨解

秋隻露臥為冷折風濕伏結壅遏  
 附骨成疽喜著大節解間丈夫及產  
 婦女人喜著鼠膝膝頭膝間嬰孩  
 嫩兒亦著膊肘背脊也其大人老人  
 著急者則先覺痛不得轉動按之應  
 骨痛經則便覺皮肉生急洪如肥  
 狀則是也其小兒不知字名抱之纒  
 近其便略喚則身支節有痛處便是  
 其候也大入老入著緩者則死覺如  
 肥洪也耳經日便覺痺痛不隨也其  
 小兒則覺四支偏有不動不動搖者  
 如不隨狀看支節解中則有肥洪  
 處其名不知是隨骨疽乃至合身成  
 膿不潰至死皆覺身體變青黑也其

外手集方卷之二

附骨疽證治論

外手集方卷之二



夕禾...

大人老人皆不惜是疽乃至于死也  
亦有謂風腫而已者原夫貼骨痛  
緩者即附骨癰也皆附骨之發盛暑身熱  
雖殊而病則一此症之發盛暑身熱  
賊風入于骨節與熱相搏復遇濕所  
折或居勞太過兩足下水或坐臥濕  
地身體虛弱而受寒邪然風熱伏結  
壅遏附骨成疽者大骨節間其急者  
身不得轉動按之應骨痛經日覆皮  
肉生急洪及如肥狀其緩者一點酸  
疼漸覺長大行步艱澀以致骨肉不  
相續若失治合身成膿不潰至死身  
變青黯但痛按之至骨久則結膿或  
結瘰癧其附骨疽久而即腫結膿以  
此為異若治附骨疽作賊風中之則

病深膿多凡偏枯癱曲之生乃附骨  
疽之漸也四肢困倦乍寒乍熱小便  
赤大瘦澀無行須用紫蘇蘆艾鳳仙  
艸煎湯熱發之使腠理開發以布拭  
乾再用乾被覆之燒乳香薰之如肅  
甚隨服人參膏略加附子以助其氣  
復以艾火攻之萬無不愈者全量  
附骨疽用筋頭按患處極痛是尤以  
墨點定艾灸百壯為期忽爾艾壯爆  
起不拘壯數乃其驗也必灸矣獨  
活寄生湯加人參二錢一服月上相  
附骨疽之肉已先內潰骨肉已不相  
連日輕夜重僧寒發熱至百有膿  
亦可用火針刺之不若初起之際艾  
灸百壯方可保命若待其出膿百八  
之中能生幾何急服蠟凡丸目上●

外科...

附骨疽証治論

參...



凡人身體患熱當風取涼風入骨解  
 中風熱相搏便成痲痺又秋夏露臥為冷所  
 沈重忽如耳鳴又秋夏露臥為冷所  
 折風熱伏結而作此疾急者熱多風冷  
 何意血有折之即膝理疑結故凡初  
 為風冷折之即膝理疑結故凡初  
 弱附骨疽即須服漏蘆湯下之傳小  
 豆散將消可服五香連虎湯于全●  
 凡體盛熱不可當風冷之氣入於  
 肌肉則熱搏狀不出故附著於骨  
 而成癰也其狀無頭但腫而爛皮膚  
 薄澤者以毒氣伏留內故也法宜  
 外散其寒內達蘊結之熱聖濟●附  
 骨疽喜發於大節解間按之應骨反  
 肉微急隱在肌而不外見是也治之

宜急稍緩則股不得潰而肢體變青  
 黯者不可治也同上●附骨疽一證  
 近俗呼為助骨癰凡疽毒最深而結  
 聚於骨際者皆可謂之附骨疽然惟  
 兩股間肉厚處乃多此證蓋此證之  
 因有勞傷筋骨而殘損其脈者有特  
 酒力房而困燥其陰者有憂思鬱怒  
 而雷結其氣者有風邪寒溼而滯  
 其經者凡人於環跳尤處無故酸痛  
 久而不愈者便是此證之兆速當因  
 證調治不可遲也蓋其初起不過少  
 陽經一點滯逆而不散則以漸而壅  
 壅則經腫則潰至其延漫則三陰三  
 陽無不連及而全腿俱潰然此證無  
 非元氣大虧不能運行故致雷滯不  
 散而後至快裂誠危證也若潰後脈



和雖見因弱之甚只以大補氣血為  
 主者司保全若潰後脈反洪而煩  
 躁不寧發熱口渴則必不可治至若  
 治此之法凡以勞傷筋骨致者宜大  
 營煎兼大防風湯治之若酒色傷陰  
 者宜八味丸六味丸或當歸丸兼大  
 防風湯主之若憂思鬱結氣者宜  
 瘡科流氣飲或五香連芫湯兼大防  
 風湯王之若風寒外襲者宜五積散  
 兼大防風湯主之抵此證初起即  
 宜用大營煎溫補氣血或兼仙方治  
 命飲通行毒氣有火者宜速用連芫  
 歸尾煎以解散其毒仍宜速用隔蔬  
 灸及豆豉餅尋頭灸之以速散其毒  
 最為捷法其有濕熱痰飲等證當速  
 求後法以治之庶免大害也若環跳

久痛不已或見臀股微腫度其已成  
 勢不能散只宜速用托補專固根本  
 使其速起速潰則根本既實雖因亦  
 無大害必用托補易潰易斂而易愈  
 也若脈見滑數按之軟熟膿已成也  
 速宜針之無使久留以防深蝕之患  
 其有不明利害苟圖目前或用剋伐  
 消散再傷元氣或用寒涼敷藥以遏  
 其毒氣必致日延甚而元氣日敗  
 則一潰不可收拾甚而元氣日敗  
 因露臥風寒深襲於骨者有因形氣  
 損傷不能起發者有因剋伐之劑虧  
 損元氣不能發出者有因外敷寒藥  
 血凝結于內者凡此皆宜灸熨患處  
 解散毒氣補接陽氣溫補脾胃為主  
 若飲食如常先用仙方治命飲解毒



散鬱隨用六君子湯補氣若體  
 倦食少但用前湯培養諸氣使邪不  
 得勝正若膿已成即針之使毒不得  
 內侵膿生用針亦無妨如用火針亦  
 不痛且使易飲其隔蔬灸能解毒行  
 氣蔥熨法能助陽氣行壅滯此雖不  
 見于方晝余常用之大効其功不能  
 盡述惟氣血虛脫者不應極要●大  
 抵此證雖云腫有淺深感有輕重其  
 物受皆因真氣虛弱邪氣得以深襲  
 若真氣壯實邪氣焉能為患也故附  
 骨腫疽及鶴膝風證唯腎虛者多患  
 之前人用附子者以溫補腎氣而又  
 能行藥勢散寒邪也亦有體虛之人  
 夏秋露臥為冷氣所襲寒邪伏結多  
 成此證不能轉動乍寒乍熱而無汗

按之痛應骨者是也若經久不消極  
 陰生陽寒化為熱而潰也若被賊風  
 所傷患處不甚熱用酒減惡寒不時  
 汗出裂之痛止灰者須大防風湯及  
 以龍膏治之若失治則為攣曲偏枯  
 有堅硬如石者謂之石疽若熱緩積  
 日不潰肉色赤紫皮肉俱爛名緩疽  
 其始末皆宜服前湯欲其驅散寒邪  
 以補虛托裏也立齊●此證亦有產  
 後惡血未盡臍腹刺痛或流於四肢  
 或注於股內疼痛如錐或兩股腫痛  
 此由冷熱不調或思慮動作氣所壅  
 遏血蓄經絡而然宜沒藥丸治之亦  
 有經血不行流注四皮或股內疼痛  
 如錐或因水淫所觸經水不行而腫  
 痛者宜當歸丸治之凡惡血停滯為



患非輕治之稍緩則流注為骨疽多致不救同上●附骨疽痛深按之無益著骨而生膿水腐潰碎骨出盡力愈治之宜熱去毒又當溫腎未可涼劑更在針烙其病勢詳淺深刺拔其根則易愈不爾則順脈流走偏躄洪腫卒致不救得効●或問附骨疽何以別之日凡患流注表未盡則餘毒附骨而為疽在股外屬足太陽陽明經在股內屬足厥陰足少陰經又云風淫折熱熱結而附骨成疽蓋骨者腎之餘腎虛則骨冷而遂附著於骨也骨冷則氣愈滯而血愈積但能為腫不能為膿流注者傷寒之餘毒骨疽者流注之壞證也流注非傷寒之罪乃醫者表之未盡也骨疽非流注

之過乃庸醫涼藥之誤也又云火得厚味及醉後涉水或履冰霜雪寒入骨無時乍寒乍熱而無汗久則痛深入骨而不移處熱之痛不止者是也初覺即隔蒜灸之以多為上宜勝金丹烏金散汗之壯實者一粒金丹下之或八陣散久則極陰生陽寒化為熱肉腐成膿膿成則宜烙十全大補湯加牛膝木瓜補之有久潰毒結雷連展轉經歲不已腐出朽骨者骨雖出而不愈有終身之骨者骨雖稀者碎骨初脫肉深難取膿白而稠者碎骨將出肉淺可取大抵久腐出骨不論強弱老幼必須補益使氣血和暢正氣漸復邪氣漸退自然收斂







者即針之膿稠而黃體質者才全大  
補湯膿清色白體虛者保元大成湯  
食取體倦者香砂六君子湯脾虛寒  
熱者補中益氣湯以証調理可也又  
有風濕相乘之症初起寒熱交作次  
傳腿腫作痛其形光亮微紅發熱腫  
痛按之如泥不使起者宜當歸拈痛  
湯或茯苓左經湯間服萬靈丹和之  
以上之症皆由元氣不足中來不可  
誤用損脾泄氣敗毒等藥外禁寒涼  
等法如慢用之必致氣血凝滯肉  
腐日久化為汚水敗膿流而不禁者  
終必久有房慾勞傷寒熱互變氣血  
爭違經脈橫解受病且澀以成斯疾  
者其患大股漸及腫如冬瓜上過膝  
腹下連足底牽連漫腫皮色不紅日

久潰膿色白腥穢腫仍不消痛仍不  
減元氣且衰身體縮小唇舌乾焦三  
瘦枯秘諸藥不効飲食不進者終為  
不治又有鸛膝風乃足三陰虧損之  
症初起寒熱交作時亦宜五續散加  
牛膝紅花或萬靈丹發汗俱可如汗  
後腫痛仍不消滅此陰寒凝伏以大  
防風湯溫後經絡重者兼灸膝眼二  
先敷以琥珀膏亦可勒專取效如用  
以上之法俱不効者終成痼疾不必  
強藥消之只宜先天大造丸更國公  
酒藥每常服之終年亦可轉重就輕  
移步行履尚可向圖也  
●附骨疽  
看法初起身微寒熱飲食如常結腫  
微紅疼不附骨者順已成舉動自便  
結腫成囊疼癢有時膿易成者為奇



類相風賊與疽骨附

已清膿稠腫痛減身輕便醒與睡  
穩不熟者吉清後元氣易復飲食易  
進肉肉易實膿水易乾者吉初起身  
發寒熱漫腫色白肢體強疼痛附  
骨者險已成者動不侵通腿漫腫不  
熱不紅不作膿者為險已潰膿水清  
稀氣穢腥臭腫痛不消形體日削者  
灰潰後脾胃虛弱飲食無味口渴不  
止唇白皮枯者成上●附骨疽治  
法初起發熱惡寒身腫拘急腿脚腫  
痛脈浮緊者散之已成腿脚腫痛皮  
色不變上通腫者散寒溫經絡寒  
熱作腫色白光亮按之如泥不起者  
互健脾滲濕身無熱惡寒脈遲而  
瀋腿腫不熱者養血溫經終暑中三  
陰脈洪而數腿脚腫口乾便燥者

外科彙考卷六

附骨疽証治論

參

外科彙考卷六

參



肥狀者是也其賊風皮膚不甚熱而  
索及惡寒時復汗出當欲熱熨痛處  
即得少寬若賊風不治久而變為癰  
曲偏枯所以不同也認是賊風則服  
引越勝治風之劑即得差精義凡  
賊風證但夜痛骨不可按抑不得回  
轉痛處不壯熱亦不乍寒乍熱多覺  
身體索然冷欲得熱熨痛處即小  
寬時復有汗出此為賊風證也宜針  
灸熨燂服治風則增益病深膿多若治  
附骨作賊風則加風冷遂成癰癧偏  
枯變曲之疾也療之之效皆在善始  
耳此非天下至精其孰能與於此若  
腫但痛而已其賊風為異者附骨之始未

則其上壯熱四體乍寒乍熱外便赤  
大便溼而無汗若得下卻熱並開發  
膝理便得消也縱不消盡亦得浮淺  
近外骨上●附骨疽與白虎飛尸歷  
節風皆相類歷節則走注不定白虎  
飛尸痛淺按之則便附骨疽漏深按  
之無益又一說曰虎飛尸亦能作膿  
著骨而生及其腐潰碎骨出盡方愈  
如是則附骨疽與白虎飛尸是一病  
但淺淺不附骨疽與白虎飛尸又俗名風  
熱然病附骨疽少骨出者宜拔毒  
熱不可一向泥五香連兜漏蘆之屬  
當先溫腎如靈寶膏乃神藥唯在針  
烙淺深刺拔其毒根則易愈不爾則  
● 頰脈流走遍體洪腫卒致不救三因  
● 緩疽石疽與附骨疽亦相類異者

外科雜考卷八

附骨疽証治論

參詳論

外科雜考卷八

參詳論



蓋緩疽石疽皆寒氣所作深伏於骨  
 髓之間有腫與皮肉相似若疾而堅  
 硬如石故謂之石疽緩疽其熱緩慢  
 積日不潰久乃亦紫黯色皮肉俱爛  
 故名曰緩疽此二者其治初覺便宜  
 補虛托裏溫熱之劑以取消矣其次  
 調治腦疾制宜故不復具載  
 附骨疽毒深著骨賊風石緩不可忽  
 賊風得熱痛少寬緩慢色黯石硬  
 附疽內痒真如錐外肉全無赤腫突  
 粗人多因谷露侵濕  
 熱痰火濕家登入門

多骨疽證治論

多骨疽一名刺滑一名朽

在腮腮牙床眼胞頰下手足腿膊等  
 處有因腎虛之人坐倉久潰腫硬不  
 退口不收飲外被寒邪襲入與膿毒  
 凝結借入之氣血化成多骨者又有  
 初生落艸身肉之中按之有如脆滑  
 由胎元受之精血交錯而致迨其人  
 長大後必於脆管所生之處突然發  
 腫生疽及潰破後多骨脫出其口方  
 收有多瘡出之不沐者名曰骨脹難  
 愈以上二因治法皆同俱宜隔附子  
 餅艾炙以宜寒凝令骨速脫蓋骨屬  
 腎遇寒則凝故從熱治也若朽骨內  
 含或出臭膿或出涎泡宜搽黃靈藥  
 陀僧膏蓋貼令朽骨出盡其口始易



飲也腎虛微寒者服六味地黃丸虛  
 而寒甚者桂附地黃丸常服可愈由  
 胎元結成者稟賦身虛不可強取多  
 骨候自破則取之金龜●凡骨疽者  
 久瘡不差差而復發骨從孔中出名  
 為骨疽以猪膽和楸葉搗封之又方  
 擣白湯葉末篩傳之千金●黑疽發  
 腫居脊天骨上八日可刺也過時不  
 刺為骨疽骨疽膿出不可止者出碎  
 骨六十日死病源●多骨疽者油瘡  
 瘍久潰氣血不能營於患處邪氣陷  
 襲久則爛筋腐骨而脫出屬足三陰  
 野摸之症也用補甲益氣湯以固根  
 本若陰火發熱者佐以六味丸壯水  
 之主以鎮陽光陽氣虛寒者佐以八  
 味丸益火之源以消陰翳外以附子

骨灸之卻散寒邪接補榮氣則腐骨  
 自脫瘡口自斂矣如骨已出腫仍不  
 消者膏未出盡也仍內用大補外以  
 神燈照之蠟餅灸之則朽骨自出盡  
 方愈再膿白而清稀者朽骨初脫肉  
 淺難取膿白而稠者朽骨將出肉淺  
 可取出之骨煨而存性加入生肌散  
 內以還其原則收口甚速大成●腿  
 患流注年餘出腐骨少許午前畏寒  
 午後發熱口乾唾痰小便頻數余以  
 馬足三陰虧損朝用補中益氣湯夕  
 用六味丸料加黃芪當歸五味子各  
 三十餘劑外用豆豉餅諸症漸愈又  
 ●患附骨疽失於調補瘡口不斂日  
 出清膿反評已而常出三腐骨其脉

多骨疽証治論



但數而無邪此氣血虛瘡結膿管而  
 不能愈繼以烏金膏日服寸許大補  
 湯而愈○上膠腫痛月餘以散  
 風清熱藥俱已不効又兩月破流血  
 水百月外方出細骨大小三寸餘塊  
 以汁全大補湯併吹生肌散而月餘  
 而飲中存一小孔替脚大通鼻透氣  
 致難全飲為愈而不愈也○左  
 手生腫餘亦出爛班破流稀  
 膿延至半年方出多骨一條如鵝鴨  
 骨一長約四寸內服養血健脾藥  
 外搽王紅膏蓋又月餘而飲同藥  
 小腿正面膝骨腫痛二年諸藥不應  
 多骨瘡也後破出骨一塊肌肉腐爛  
 元氣虛弱以十全大補湯加山茱萸  
 牛膝木皮服至兩月餘不飲每日以

神燈照法將火氣助之又出朽骨一  
 塊上有姓眼數十孔以二骨炭火煨  
 紅為末入生肌藥中用之收斂問日  
 用骨者何骨原稟氣血結成故用之  
 復還元氣也後入聞之知理合天然  
 之數矣○目上右口上牙根突腫如  
 栗堅硬如石不痛此多骨也藥亦不  
 効後三年始痛破流臭膿後出多骨  
 形如小蟹腫仍不退此骨未盡稍久  
 又出小骨二塊枯色稜確其腫亦退  
 以四君子湯加升麻陳皮外以甘州  
 煎湯漱口生肌散日搽三次而收斂  
 骨粉○久瘡敗壞成骨疽用末龍  
 二易子○骨疽熏法穿地作坑口  
 小裏大添三寸取乾雞屎二升以艾

多骨疽証治論

修釋論



及荊葉搗碎和雞屎令可燃火坑中  
燒之令烟出內疽於坑中薰之乃衣  
攤坑口勿洩氣半日當有蟲出甚效  
同上●骨疽百方療不差者可瘡上  
以艾灸之三日三夜無不愈外●  
骨疽積毒每一年一發汁出不差者  
取膠熬搗末粉勃瘡上及破生鱧魚  
以搗之如食頃刮視其小蟲出受傳  
蟲出盡止補急方●癰疽敗壞成骨  
疽用自死蝦蟇一枚頭髮一把以猪  
膏一升內二物煎之消盡下之欲  
冷內鹽一合攪和以膏著瘡中月一  
易蟲出如髮蟲盡愈●  
骨疽搗蕪菁子傳之目上●

胎疽證治論

胎疽腫高而硬俗言此疽堅  
硬無膿殊不知其因成膿在  
內一時不能出皮層須用內托發出  
方可用針刺破治法同附骨疽全書  
●胎疽者一胎上生癰疽者如近大  
小便處難治也臣於實處即安柳柳



風疽證治論

風疽由風濕之氣入于腠理  
 流注血脉不利攣曲腫起  
 痛經久不瘥蓋風勝則動故其疽留  
 止無當得之醉臥當風汗出宜用  
 六味流氣飲並服黃芪丸再用麥冬  
 陽調服護心散時用膳凡乳香末付  
 之大小凡此症須別去甲方愈金書末付  
 腫起流之血脉而攣曲疾痛所以發  
 瘡歷年謂之風疽此由風濕之氣客  
 於經絡與氣相搏所成也養生方云  
 大解汗當以絲粉身若令自乾者成  
 風疽也病原●風疽生脛骨及曲凹  
 之處癢搔皮損津黃汗極其黏濃由  
 風邪留於血脉相搏而成因其根淺  
 故有疽名甚則身體煩熱昏冒而肌  
 肉透紅更增腫疼宜服防風湯外抹

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*



青竹大豆油即效金墨凡脚腫及  
 曲脚中痒搔則黃汁出是風疽也  
 以青竹筒一枚徑一寸半長三尺當  
 中燒一升以糠馬屎二物燒為火  
 以泔清和鹽熱洗瘡了即塗豆汁  
 過三度極效又方嚼胡麻傳王  
 以綿裹之日易神良十途  
 風疽癭疽合論

### 骨癭疽證治論

骨癭疽生于午陽明之間  
 初如粟漸長如赤豆其  
 不可忍漸長如楊梅之狀血不出  
 亦不生膿毒從經絡流于遍身有  
 疾者宜當謹防不可視為輕疾昔  
 山東唐世民感此醫者云此疽生  
 奇相恐是惡毒世民笑而言曰昔  
 識字人天賜與吾為擎架後及一  
 遍身攻申其疽良肉出臭黃血水  
 三五碗出水不至十日其肉後待  
 洗滌俛屍象人持起遍體俱爛皮  
 盡落今有此疾各宜仔細推情施  
 之宜用治瘡之法加減行之全  
 或問牛骨陽明經分生癭初如粟  
 漸大如赤豆痛不可忍旬日大如  
 桃枯紫色何如日此名骨癭疽若



遊遍身拘急發搐嘔噦不食冷汗自  
 出滑泄煩躁脉亂者死犯勞怒氣  
 者死一人患此證一月之後遍身攻  
 串口吐黃水穢氣滿室既而嘔吐膿  
 血旬日而亡其人三四日前尚進飲  
 食人與沐浴扶起皮肉俱爛患者不  
 信醫者不識以致阻身此由七情不  
 和積怒積憂積熱所致眞元虛敗不  
 能勝邪故也縱有丸丹天命而已惟  
 智者防患于未然急服黃連消毒散  
 勝金丹烏金散活命飲加羌活選用  
 治之稍緩七惡證多者必死也按此  
 證發之暴死之速乃陰虛極而火獨  
 光之故前藥不滋化源而揚湯止沸  
 其能濟乎準●骨癭疽生手臂外  
 側前廉大骨之後屬手陽明經由憂

鬱暴怒疑結而成初如粟豆旬日大  
 如桃李腫硬疼痛瘡根收束多見五  
 善之證者煩若紫暈開大腐爛斑點  
 串通肌肉抽搐拘急多見七惡之證  
 者逆始終內外治法俱  
 按癭疽腫瘍潰瘍金鑿



螺蛄串證治論

血澆薄者多蓋四肢屬脾土其患多  
 生於兩手初起骨中作疼漸生漫腫  
 堅硬不熱不和手背及內關前後連  
 腫數塊不能轉側日久出如豆腐漿  
 汨串通諸竅日漸相流腫痛仍在患  
 者面黃肌瘦飲食減少久則寒熱交  
 作因疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔  
 加味逍遙散調和氣血扶肌脾胃其  
 中可生者十有三二三四補而不應氣  
 血瀝盡而人者多正宗●螺蛄串生  
 掌後橫紋上二寸生臂內中廉屬包  
 絡經由思慮傷脾脾傷則運化遲故  
 生濁液流于肌肉脾氣滯鬱不舒凝  
 結而成此患初起筋骨如中流矢疼



痛漸增漫腫堅硬不紅不熱連腫數塊疔疔不能轉動日久其腫塊漸次潰破孔多時流白漿內清淨通諸孔外熱腫硬不消膿水淋漓如湯虛證悉添如面黃食少削瘦甚則午後寒熱交作而成敗證也初起宜服逍遙散外敷太乙紫金錠次服人參養榮湯調和氣血扶助脾胃寸中可保二三壅後按癰疽治法若投藥不效者屬逆全鑿蠟蝕三串生于手臂上腎怒傷心而瘀血滯氣相搏故成此串毒也用流氣飲三香內托散定痛降氣飲內外治法俱同諸癰疽全

### 石瘤疽證治論

石瘤疽生於肘尖上寸餘粟小胞根脚便覺開大色紅嫩腫堅硬疼痛腫如覆盃破翻如榴寒熱如癰由三焦相火與外溼相搏而成初起宜蟾酥丸汗之外以艾炙九壯助蟾酥餅用萬應膏蓋之炊腫處敷冲和膏服菊花清燥湯煩躁熱甚者服護心散九日後作稠膿痛減甚者服裏證俱退者順反此者逆破後用菊加輕粉灰許兌勻敷之神效至透膿脫腐生肌時內外治法俱按癰疽潰瘍金鑿



# 人面瘡證治論

則不動飢則口眼俱動俗呼為冤業  
 瘡膝蓋之間然膝者筋之府屈伸不  
 能而行則僕附筋將憊矣此係皮肉  
 堅硬之作且注疰毒則裏先潰後爛  
 皮膚攻作故成此形互作毒事解之  
 須要真誠懺悔然後方可用藥初用  
 流氣飲久不愈者服苦參丸補腎水  
 再用猪蹄湯洗之以生肌定痛散搽  
 之後用膏藥貼上全書●天面瘡自  
 古傳來乃奇病也多注兩膝或生兩  
 肘腫類人形肩目口鼻皆具本事方  
 云瘡口能飲食施治諸藥絕無所苦  
 惟敷貝母其瘡皺眉閉口自此日用  
 貝母末和水敷灌數日瘡消結痂而

人面瘡生于兩膝之上形  
 如人面口眼俱全患人飽

外科集方卷六

人面瘡証治論

參詳



愈又諸書皆以爲素積寃。譴須自清  
 心。饑。梅。初。宜。服。流。氣。飲。日。久。宜。用。大  
 苦。參。丸。今。據。所。用。之。藥。俱。係。辛。熱。陳  
 散。之。品。其。證。或。因。風。寒。溼。三。氣。凝。合  
 之。所。化。亦。未。必。盡。由。寃。譴。所。致。也。依  
 古。施。治。諒。可。奏。效。金。鑑。●。人。面。瘡。非  
 生。膝。上。卽。生。于。肘。上。也。瘡。形。頗。象。人  
 而。重。者。有。口。有。鼻。有。眼。多。是。鬼。物。憑  
 之。然。口。鼻。眼。雖。具。多。不。能。言。未。嘗。不  
 能。動。也。動。者。狀。似。然。苦。口。中。與。之。以  
 肉。食。則。實。能。化。古。人。謂。其。能。食。信。不  
 誣。也。有。一。種。口。眼。皆。不。能。動。似。非。鬼  
 物。憑。之。但。旣。非。鬼。物。何。瘡。中。生。有。口  
 眼。乎。不。知。人。面。之。瘡。原。有。生。疾。二。種  
 生。者。能。食。能。動。死。者。則。不。能。動。不。能  
 食。也。其。實。二。種。皆。有。祟。也。非。天。譴。之

罰。自。寃。孽。自。到。耳。必。須。省。察。禱。謝。而  
 後。用。藥。治。之。始。能。愈。也。真。古。●。人。身  
 有。瘡。如。人。面。面。目。口。鼻。皆。具。昔。有。一  
 人。左。膊。上。生。瘡。以。物。食。之。皆。能。食。灌  
 以。酒。則。面。亦。赤。色。醫。者。教。以。歷。試。諸  
 藥。皆。無。苦。至。貝。母。其。瘡。乃。聚。眉。閉。口  
 其人。喜。日。可。治。卽。取。貝。母。末。和。水。灌  
 入口。中。數。日。成。痂。而。愈。不。薄。仿。







失榮

肉削瘦氣潰愈硬色現紫斑腐爛浸  
淫滲流血水瘡口開大肉高突形  
似翻花瘤證古今雖有治法終屬敗  
證但不可棄而不治初宜服和榮散  
堅丸外貼阿魏化堅膏然亦不過苟  
延歲三月而巳金鑑●一婦中年肥胖  
生渴三載右手食指麻痺月餘後節  
間生一小泡隨後本指漸腫疼脹不  
堪視之原泡處已生黑班半指已變  
紫黑此兀陽之極乃成脫疽之脈  
洪大數而有力此肥人相反如再黑  
色上延壞人有迅速詢問此瘡先居富  
室無嗣每縱膏梁架烘爐灰又兼多  
服種子熱藥甲筆喪夫家業盡被嗣  
人侵賈致久懷憂鬱與寡母同棲身  
耽寂寞貧此先富後貧所願不得又為

失榮症也辭  
不可治正宗

外科集成卷之六終

外科集成卷之六

失榮症証治論

參畢



外和集方卷六

伏林集方卷之六

Faint, mostly illegible text within a rectangular border, likely bleed-through from the reverse side of the page.



伏林集



