

又用滑石末水和塗臍下

又方

車前草汁調滑石末塗臍周圍四寸熱易之

又方

杏仁

滑石末

等分

飯丸豆大每白湯下廿九

又方

紫苑為末井花水調下二錢

葵子散

妊娠小便不利身重惡寒眩暈水腫

葵子

赤茯苓

各五兩

為末每服二錢米飲下

生生子曰予嘗以補中益氣湯加桔梗治數婦皆
効但用滲利藥而不得通者必須升提氣升則
水自降氣虛者非大補則提亦無功

子淋

妊娠小便淋者乃腎與膀胱虛熱不能制水然妊
婦胞繫于腎之間虛熱而成斯症甚者心煩悶
乱名曰子淋也

薛氏曰前症若頸項筋挛語瀯痰甚用羚羊角散
若小便澁少淋瀝用安榮散若肝經濕熱用龍

胆瀉肝湯若肝經虛熱用加味道遙散腿足轉筋而小便不利急用八味丸緩則不救若服燥劑而小便頻數或不利用生地茯苓牛膝黃柏知母五味麥冬玄參若肺氣虛而短少用補中益氣加山藥麥冬若陰挺痿痺而頻數用六味丸若熱結膀胱而不利用五淋散若脾肺燥不能化生宜黃芩清肺飲若膀胱陰虛用無所生用滋腎丸若膀胱陽虛用無所化用六味丸地膚大黃湯 治子淋

大黃炒

地膚草各三兩

三

知母

黃芩炒

猪苓

通草

赤芍藥

枳實炒

升麻

甘草

各二兩

每服五錢水煎服

安榮散

治子淋甚妙

麥冬

通草

滑石

川歸

灯心

甘草

人參

細辛

各五分

水煎服

治小便淋痛心煩悶乱

藿麥穗

赤茯苓

桑白皮

木通

葵子

各一錢

黃芩炒

車前子炒

芍藥

枳壳

各五分

右水煎服

治子淋小便澀痛

冬葵子

滑石

木通

各等分

每服六錢葱白七寸水煎服

猪苓散 方見大小便不通卷

妊娠遺尿

良方曰妊娠尿出不知用白薇芍藥為末酒調下
或白礬牡蠣為末酒調下二錢或鷄毛灰末酒
服一七或灸桑螵蛸益智仁為末米飲下

薛氏曰若脬中有熱宜加味逍遙散若脾肺氣虛
宜補中益氣加益智若肝腎陰虛宜六味丸
一妊婦遺尿內熱肝脉洪數按之微弱或兩太陽
作痛脇肋作脹以為肝火血虛用加味逍遙散
六味地黃丸尋愈后又寒熱或發熱或恚怒前
症仍作用八珍散逍遙散兼服以清肝火養肝
血而痊

妊娠尿血

妊娠尿血良方謂內熱乘於血分以致血熱流滲

於脬名曰血淋用葵子一升研水五升煮二升
分三服或生艾葉一斤酒五升煮二升分三服
或生地一斤酒四升煮二升分三服亦治墮胎
後下血

薛氏曰因怒動火者宜小柴胡加山梔因勞動火
者補中益氣湯因厚味積熱宜加味清胃散若
因肝經血熱宜加味道遙散因脾氣下陷補中
益氣湯若因脾虛血熱宜加味道遙散
一妊婦因怒尿血內熱作渴寒熱往來胸乳間作

脹飲食少思肝脉弦弱此肝經血虛而熱也用
加味道遙散六味九兼服漸愈又用八珍湯加
柴胡丹皮山梔而痊

續斷湯 治妊娠下血及尿血

當歸

生地各一兩

續斷半兩

赤芍半兩

為末每服二錢空心蔥白湯調下

治妊娠尿血

阿膠

炒

熟地

各四兩

同搗為丸每服八十九空

心米飲下

又方

四苓散 加炒阿膠車前子茅草根水煎服
又方

白茅根 濃煎湯吞酒蒸黃連丸

加味清胃散 方見

妊娠胎水腫滿

產乳集云妊娠三月足腫至腿出水飲食不甘似水腫謂之子氣至分娩方消者此脾胃氣虛或衝經有血風亦有脾虛水氣流溢或因瀉痢臟

府虛寒或因瘧疾飲水脾虛濕漬或因水漬於胞不能分利皆致腿足腫肚腹腫也

薛氏曰若胸滿腹脹小便不通遍身浮腫用鯉魚湯脾胃虛弱佐以四君子若面目虛浮肢体如水氣用全生白朮散如未應用六君子湯脾虛濕熱下部作腫補中益氣湯加茯苓若飲食失宜嘔吐泄瀉六君子湯腿足發腫喘悶不安或指縫出水天仙藤散脾胃虛弱兼四君子湯如未應補中益氣湯若脾肺氣滯加味歸脾湯佐

以加味道遙散

一妊婦每至五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身後及頭面此脾肺氣虛朝用補中益氣夕用六君子加蘇梗而愈○凡治妊婦母泥月數但見其經症即用本藥為善

天仙藤散

婦人有水氣而成胎以致兩腿足

浮腫

天仙藤

畧洗

香附子

炒

陳皮

烏藥

軟

白辣者

甘草

各五分

右每服五錢生姜木瓜蘓葉各三

片水煎日三服

澤瀉散

妊婦遍身浮腫上氣喘急大便不通小

便赤澁

澤瀉

桑皮

炒

木通

枳壳

炒

赤茯苓

枳郎

各五分

右姜水煎服

防已散

脾虛遍身浮腫腹脹喘促小便不利

防已

三錢

桑皮

炒

紫蘓莖葉

赤茯苓

各五分

木香

二分

右姜水煎服

千金鯉魚湯

妊婦腹大胎間有水氣

白朮

五兩

茯苓

四兩

當歸

芍藥

各三兩

右咬咀先以小鯉魚一尾如食法煮取汁二
盞入藥五錢姜七片橘皮少許煎七分空心
服

腎著湯 治妊娠腰脚腫

茯苓 白木各八分 干姜炮 甘草各一錢

杏仁五分 右水煎服

五皮散 治胎水腫滿

大腹皮 桑白皮炒 生姜皮 茯苓皮

橘皮各一錢 木香一分 右水煎服

全生白朮散 妊娠面目浮腫四肢腫如水氣名

曰胎氣又名胎腫

白朮一兩 生姜皮 大腹皮 陳皮 白茯苓

各五錢為末每服二錢米飲下

治妊娠脚浮腫因脾衰血化成水以生料平胃散

姜棗水煎服或為末紫蘓葉湯調下二錢日二

服以腫退為度

腹內鐘鳴

良方曰孕婦腹內鳴用鼠穴中土為末入射香酒

調服二錢立愈或黃連煎濃汁常飲之

薛氏曰兒在腹中哭產寶方亦用空房中鼠穴土或黃連煎濃汁飲之即止又云臍帶上疙瘡兒含口中因產婦登高舉臂脫出兒口以此作聲令姪婦曲腰就地如拾物狀仍復原入兒口即止然黃連性寒麝香開竅當斟酌用之

龔彥德孕癩方

治孕癩用烏藥五錢水一鍾煎七分入牛皮膠一兩煎化溫服或薏苡仁煮汁飲之

薛氏曰按孕癩即是腹內患癩如前法治之倘不應宜用牡丹皮散或薏苡仁湯

薏苡仁湯 又名瓜子仁湯

治腸癩腹中疴痛煩毒不安或脹滿不食小便澀婦人產后虛熱多有此病縱非癩但疑似間便可服

薤仁 二錢 一方用冬瓜子仁無冬瓜子以括

萎代之姚氏去薤仁用杏仁崔氏加芒硝

薏苡仁 括萎仁 各三錢 牡丹皮 二錢

右作一劑水煎服

牡丹皮散 治腸癰冷症腹濡而痛時利膿

丹皮 人參 天麻 白茯苓 黃芪炒 白芷

苡仁 薏仁去皮 當歸洗 川芎各一錢

炙甘草 官桂各五分 木香三分 右水煎服

臟躁悲傷

許學士云一婦無故數次悲泣是為臟躁用大棗湯而愈又程虎卿內姪娘五月慘感悲傷亦投大棗湯而痊

薛氏曰或因寒水攻心或肺有風邪者治當審察一婦無故自悲用大棗湯二劑而痊後又復患用前湯佐以四君子加山梔而安

一姪婦悲哀煩躁其夫詢之云我無故但自歎悲耳用淡竹茹湯為主佐以八珍湯而安

大棗湯

甘草三兩 小麥三兩 大棗十枚

淡竹茹湯 姪娘心虛驚悸臟躁悲傷或作虛煩

麥冬 小麥 半夏湯炮各一錢半 人參 白茯苓各一錢

甘草五分 加姜朶竹茹水煎服

又方 治臟躁悲哭

紅朶燒存性為末米飲調下二錢

妊娠十月宜服滑胎湯藥

滑胎枳壳散 八月服之令胎瘦易產昔湖陽公

主每產累日不下南山道人進此方

枳壳二兩 麩炒 炙甘草 一兩

右為末每服二錢空心沸湯調下日三服

凡孕六七月宜服之温隱居加當歸木香分

又方 治同上 兼治諸疾下氣寬膈

枳壳五兩 麩炒 甘草一兩 半 香附子兩 炒 三

右為末每服二錢白湯調下

又方 易產滑胎

車前子為末或酒或米飲調下一錢

神寢丸 臨月服之神効

通明乳香半兩 另末 枳壳麩炒 一兩 為末

右蜜丸梧子大每空心酒服三十九

榆白皮散 滑胎易生

榆白皮 甘草各二兩 葵子一兩

右為末每以五錢水煎服

保氣散 寃氣進食瘦胎易產或居處失宜頓仆

胎動若胎痛胎漏兼服佛手散

香附 木香各四兩 山藥二兩 砂仁 粉草各一兩

益智 蘇葉各半兩 為末每服二錢白湯調下

薛氏云神寢丸枳壳散併此方入月宜常服

保產無憂散 妊娠身居安逸口厭甘肥憂樂不

常食物不節致胞胎肥厚根蒂堅牢入月服

之易生

當歸 川芎 白芍 枳壳炒 乳香各三錢

木香 甘草 血餘即髮灰以鑽猪心血和之各一錢半

右為末每服三錢水煎日二服神効

妊娠臨月以猪肚一具煮爛徐食令易產

一產論

一曰正產 懷胎十月滿足忽腰腹作陣疼痛相

次胎氣頓陷至於脐腹痛極乃至腰間重痛谷

道挺併繼之漿破血出兒乃遂生此名正產

二曰傷產 懷胎未產一月已前忽然臍腹疼痛
有似欲產仍却無事是名試月非正產也又名
曰弄痛凡產母未有正產之候切不可令人抱
腰亦不可令產母妄亂用力若兒身未順終方
轉動便教產母空亂用力使子錯路忽橫忽倒
不能正生皆由產母用力於未當用力之所致
也直待兒身順適遍臨產戶始可用力一送令
兒趨力生下
經目曰右傷產一法最為切要勿輕忽也凡十

月未足臨產腹痛或作或止或痛不甚者名曰
弄痛非正產之候或腹痛甚而腰不甚者非
正產之候胎高未臨下者非正產之候穀道未
挺併者非正產之候水漿未破血未出者非正
產之候漿血雖出而腹不痛非正產之候凡未
有正產之候且令扶行耐忍如不能行或凭物
坐之或安臨之或且服安胎藥一二帖即安得
安即止慎勿妄服催生藥又勿愴惶致令產母
憂恐而挫其志務要產母寬心存養調停令老

誠練達穩母先說諭之如養心中煩悶可取白
蜜一匙新汲水調下切勿妄亂用力先困乏其
母直待子逼門戶腰重痛極眼中如火穀道挺
逆方是正產候也此時始可用力并服催生藥
也予男婦于未產一月已前腰腹俱痛全似將
產其痛至甚但遇已時稍止如此十餘日計無
所出因閱此條遂與安胎藥加參朮數服間與
肉味養之由是平復不痛又二十餘日始產一
男設若此際亂動亂用力并服催生等藥則立

見其危矣

三曰催產 若婦欲產漿破血下已見是為正產
之候但却未生即可服催生藥催之忽有經及
數日產母困苦亦可服藥以助產母之正氣令
兒速生也

四曰凍產 凡冬月天冷產母經血得冷則凝以
致兒子不能生下此害最深但冬月產者下身
不可脫去綿衣尤不可坐卧寒處當滿房著火
常有煖氣令產母背身向火令臍下腿膝間常
煖血得熱則流動使兒易生此名凍產

五曰熱產 凡盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎氣亦不令房中人多恐熱逼襲產母使產母血沸而有發熱頭痛面赤昏：如醉乃至不知人事此名熱產

六曰橫產 凡兒先或露手或先露臂此乃產母未當用力而用之過也兒身未順用力一逼遂至身橫不能生下當令產母安然仰卧後令看生之人先推其手令入直上漸：逼身以中指摩其肩推上而正之或以指攀其耳而正之須是產母仰卧然後推兒徐：正之候其身正煎催生藥一盞飲之方可用力令送兒下此名橫產

七曰倒產 凡產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能迴轉便直下先露其足當令產母仰卧令看生之人推其足入不可令產母用分毫力亦不得驚恐使兒自順去

八曰偏產 兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏柱左腿或偏柱右腿故頭雖露偏柱一畔不

能生下當令產母仰卧次令看生之人輕：推
兒近上以手正其頭令兒頭頂端正然後令產
母用力一送即便生下若是小兒頭腦後骨偏
推穀道只露其額當令看生之人以綿衣灸温
裹手於穀道外方輕：推兒頭令正便令產母
用力送兒生也此名偏產

九曰礙產 兒身已順而露正頂不能生下盖因
兒身廻轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生
下當令產母仰卧次令看生之人輕：推兒近上

徐：引手以中指按兒肩下撥其肚帶仍須候
兒身正順方令產母用力一送使兒生下此名
礙產

右橫產倒產偏產礙產四法若看生之人非
精良妙手不可依用此法恐恣其愚以誤人
命也按倒產者今時往：隨其倒足生下並
無後患子母双全不必依推足復上之法亦
可又礙產者往：有肚帶纏在兒頂上而兒
頭自出在產門外看生之人以手撥其肚帶

從兒頭頂過而下之者又有肚帶纏在頂上一匝而兒與胞衣自然同下者皆無妨不必以此礙產法復入產門內撥下也

十曰坐產 臨產時高處繫一手巾令產母以手攀之輕屈足坐身令兒生下非坐在物上也此名坐產

十一曰盤腸產 趙都運恭人每產則大腸先出然後產子既產之後其腸不收甚以為苦名曰盤腸產醫不能料偶在建昌得一坐婆施一法

而收之其法以醋半盞新汲水七分和勻喫產母面每喫一縮三喫收尽此良法也

丹溪治產後腸不收香油五斤煎熱盆盛俟溫令產母坐油盆中約一頓食時以皂角末吹入鼻中嚏作立上

又方 葶麻子十四粒去壳研如膏貼產母頭頂心上其腸上即揩去

又方 腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之即收

催生

催生柞木飲子 難產或胎爛腹中腹悶神効

生柞木

一尺對

甘草

大者五寸

右水三鍾封罐口煎一鍾半候胎順產門徐

溫服即時分娩更無諸苦

催生如神散 治橫生逆產其功甚大

百草霜

白芷

不見火等分

右為末每服三錢至胎順產門以童便米醋和

為膏加沸湯調下或童便酒煎進二服然血

得黑即止此藥大能固血而免血氣甚妙

如聖散 黃蜀葵花焙為末熱酒調下二錢○若

漏血胎乾胞澁難產併進三服即產如無花

用子半合末之溫酒服尤妙○若打撲胎死

紅花酒調下

順生丹 治同上

兔腦髓

去皮膜研膏

明乳香

一兩另末

母丁香

二兩

麝香

一錢

右以兔腦子丸鷄頭子大陰乾每服一丸溫水

下

又方 透明乳香一塊如皂子大為末腰痛時用

冷水醋少許調服扶立令兩手握大石熯二

枚口念醫靈藥聖三遍行數步用坐產法便

生更無痛楚神效薛氏曰其法士人視之似迂然用之者稱驗甚

治逆產

蛇退一條順下 蚕退帛一

右共入新瓦罐內鹽泥固濟煨存性為末煎

榆白皮湯下一錢三服竟痛便生

又方 伏龍肝研末每服一錢酒調下兒戴土而下

又方 魚膠一尺許新瓦上煨灰陳醋調服立下

胞漿先乾胎澁不下急服大料四物湯滋其血氣

并濃煎葱湯薰洗產戶更用油燭塗產戶內却

服前藥

神妙乳砂丹 明乳香為末以猪心血丸梧桐

子大硃砂為衣陰乾每服二丸嚼碎冷酒下良

久未生再服或以蓮葉蒂七個水煎化服二丸

尤妙良久未生再服

交骨不開產門不開

交骨不開產門不開皆由元氣素弱胎前失於調

攝以致血氣不能運達而然交骨不開陰氣虛也
用加味芎歸湯補中益氣湯產門不開氣血俱虛也
用十全大補湯

一婦交骨不開兩日未生服加味芎歸湯一劑即時而產
彼後以此方傳與人服應手而効

一婦生平分媿最易至四十歲妊娠下血甚多產門不開
與前湯一劑又以無憂散斤許煎熟時時飲之以助其血而生

一產婦玉門不開發熱惡寒十全大補加五味子數劑而寒熱退
又以補中益氣加五味子數劑而玉門歛○若初產腫脹或
焮痛而不閉者用加味道遙散若腫既消而不閉者用補中益氣湯
切忌寒涼之劑

一婦脾胃素弱兼有肝火產後玉戶腫痛寒熱作渴嘔吐不食
敷大黃芩藥服驅利之劑腫及於臀虛症蜂起此真氣虛也
先用六君子以固脾胃乃以補中益氣湯升舉而消

一產婦失治腫潰不已形体消瘦飲食少思朝寒

暮熱自汗盜汗半年矣予用補中益氣加茯苓
半夏以健脾胃膿水漸少飲食漸進用歸脾湯
以解脾鬱共五十餘劑元氣復而瘡亦愈矣
一產婦玉門不閉小便淋瀝腹中一物攻動脇下
或脹或痛用加味道遙散加車前子而安
一產婦子宮腫大二日方收損落一片殊顛猪肝
面黃体倦飲食無味內熱晡熱自汗盜汗用十
全大補湯二十餘劑諸症悉愈仍復生育
加味芎歸湯 治交骨不開不能生產

川芎

川歸

各一兩

龜板

一個

婦人頭髮

燒存性

一握

右為散每服一兩水煎服約人行五里即生縱
死胎亦下

產難方論

郭稽中曰產難者因兒轉身將兒枕血塊破碎與
胞中敗血壅滯兒身不能便利是以難產急以
勝金散消敗其血使兒易生陳無擇云多因兒
未轉順坐草太早或努力太過以致胞衣破而
血水乾產路澁而難下宜先服催生如神散以

固其血設或逆生橫產當按法施治

勝金散 催生如神

麝香錢一

豆豉兩一

為末秤鎚燒赤淬酒下

下死胎方

一 穩婆之女勤苦負重妊娘腹中陰冷重墜口中甚穢子意其胎已死令視其舌青黑與朴硝一兩許服之化下穢水而安

一 婦胎死腹中服朴硝下穢水肢体倦怠氣息奄奄用四君子為主佐以四物姜桂調補而安

又方 以利斧燒紅置酒中待溫飲之其胎便下

又方 錫粉 水銀各錢一 枣肉為丸豆許大水吞

立下

又方 平胃散錢五 酒水各一盞煎至一盞投朴硝

五錢再煎三五沸溫服其胎即化水而去

寶慶方云凡欲斷臍帶先以繫物墜下後可斷之

否則胞衣上即冲心而死

產難生死脉訣

欲產之婦脉離經沉細而滑也同名夜半竟痛應

分誕來日下午定知生身重體熱寒又頻舌
之脉黑復青反舌上冷定知死腹中須遣子歸
面赤舌青細尋者母活子死定應難唇口俱青沫
又出子母俱死總高判面青舌青沫出頻母死
子活是知真不信若能看應驗尋之賢哲不虛
新產之脉緩活吉實大弦急死來侵若得沉重小
者吉忽若堅牢命不停
寸口澁疾不調死沉細附骨不絕生審看此候分
明記長須念此向心經

胞衣不出

郭稽中曰胎衣不下者因氣疲憊不能努出或血
入衣中脹大而不能下以致心胸脹痛喘急速
服奪命丹血散脹消其衣自下牛膝散亦効
一婦胎衣不出胸腹脹痛手不敢近用滾酒下失
笑散一帖惡露胞衣並下
一婦胞衣不出腹痛手按之稍緩此氣虛不能送
出也用無憂散而下○前症常詢諸穩婆云宜
服益母丸或就以產婦頭髮入口作嘔其衣自

出不出者必死然前法甚効

奪命丹

大附子

炮半兩

牡丹皮

一兩

乾漆

炒相一錢

大黃

一兩

為末醋煎大黃成膏九梧子大温酒

吞七丸

花蓋石散

治產后敗血不尽血迷血暈胎衣不

下至死心頭煖者急用一服即化水而出其効

如神

花蓋石

上色硫黃

四兩

右和勻以紙泥封固瓦罐內炭火煨赤次日取出細研每服一錢童便熱酒下

牛膝散

治胎衣不出腹中脹痛急服此藥腐化

而下緩則不救

川芎

朴硝

牛膝

蒲黃

各三兩

川芎

一兩

桂心

五錢

右每服五錢姜三片生地

一錢

水煎服

又方

紅花一兩酒煮濃汁服

又方

鹿角鎊三錢為末葱湯調服

又方

取產母鞋底烘熱熨小腹上下二七次

產後血暈

良方曰產後血暈乃血入肝經甚至眼花昏悶用

黑神散主之下血過多用清魂散補之或以醋
湯細飲或預燒秤鎚以醋沃之或醃醋塗口鼻
或燒漆器薰之使產母鼻吸其氣庶無此患
薛氏曰若惡露上行用失笑散血下過多芎歸湯
若過勞所傷補中益氣湯血虛極用清魂散大
凡產後口眼喎斜等症當大補氣血為主而兼
以治痰若脾胃虛弱用六君子湯苟於七月之
前服安胎飲至八九月間加大腹皮黃楊頭元
氣虛弱八珍湯臨產用無憂散則無前患

一婦八月胎下墜或動面黃躄倦飲食少思此脾
氣虛弱用補中益氣湯倍白朮加蘇梗三十餘
劑而安產後眩暈胸滿咳嗽用四物加茯苓半
夏桔梗而愈

一婦因飲酒惡露甚多患血暈口出酒氣此血得
酒熱而妄行虛而作暈也以佛手散加煨甘葛
二錢一劑而痊酒性慄悍入月及產後不宜飲
恐致前症

奪命丹 治血暈腹痛 沒藥 血竭 為末等

分每服二錢熱童便冲酒下

清魂散 產後氣血暴損虛火妄動血隨火上以

致心神昏亂口噤眼花甚至悶絕而甦

澤蘭葉 人參各一錢 荊芥三錢 川芎一錢 右各

另為末每服一二錢熱湯和酒調灌之

一方 五靈脂半生半炒 為末每服二錢温酒灌入

即甦

一方 荊芥為末童便調服

一方 神麴末每服二錢熱水調服

一方 韭菜切入瓶內注熱醋以瓶口對鼻薰之

一方 半夏為末丸豈大入鼻中即醒亦治五絕

佛手散 治產後去血眩暈欲絕又治血崩不止

又能治胎痛安生胎而落死胎神効

川芎酒洗 當歸酒浸各五錢

酒水各一鍾煎至一鍾服

產後顛狂

產後顛狂乃敗血上冲用大聖澤蘭散加砂仁末

三分煎酸棗仁湯調下或硃砂為末二錢乳汁

調和入紫項活地龍一條滾二三沸去之入酒
再用重湯煮溫分五服

薛氏曰乃血虛神不守舍非補養元氣不可

一產婦患前症或用大聖澤蘭湯而愈後又怔忡
妄言其痰甚多用茯苓散補其心虛頓愈又用
八珍湯加遠志茯苓神養其氣血而瘥

一產婦亦患此用化痰安神等藥病益甚神思消
燦余以為心脾血氣不足用大劑參朮芎歸茯
神酸棗仁四斤餘而安乃以歸脾湯五十餘劑

而愈

茯苓散 治產後心虛忪悸言語錯亂健忘少睡

或自汗盜汗

人參 炙甘草 芍藥炒 當歸 生姜各八分

遠志 茯苓各一錢 桂心六分 麥冬五分 大棗二枚

水煎溫服

抱膽丸 治產後遇驚發狂或遇經行發狂

水銀二兩 黑鉛一兩 硃砂 乳香各一兩

右將黑鉛入銚內火熔化俟稍冷下水銀擾成

砂子再入乳香硃砂乘熱用柳木槌研勻丸
鷄頭子大每服一九薄荷湯下得睡勿驚竟
來即安○妙香散亦善

此症屬火者多不可驟視為瘀血及虛治也童
便極好或冲入涼血藥中用之屢見効
產後狂言譫語

產後狂言譫語乃心血虛也用硃砂末酒調下龍
虎丹參九琥珀地黄丸亦可如驚悸歌哭顛狂
等症當參治之

一產婦形体甚倦時發譫語用栝子仁散稍愈又
用加味歸脾湯而愈又因怒仍狂言脇痛小便
下血用加味逍遙散以清肝火養肝血頓瘥又
佐以加味歸脾湯而安

治敗血上衝發熱狂走脉虛大者

乾荷葉 生地 丹皮 各半 濃煎湯調生蒲

黃二錢服之即止

妙香散 治產後語言錯乱用生地當歸煎湯調
服立効

炙甘草 人參 桔梗各五錢 茯苓 茯神

山藥姜汁炒 黃芪 遠志各一兩 辰砂三錢 射香二錢

木香二錢半 右為末每服二錢溫酒調服

○又能治心氣不足精神恍惚虛煩少睡盜汗

夢與鬼交等症

產後不語

產後不語因心氣虛而不能通津於舌則舌強不能言語者宜服七珍散餘當推其所因而治之可也

七珍散

人參 石菖蒲 生地 川芎各兩 細辛 一錢

防風 辰砂另研各五錢

為末每一錢薄芎湯調服

胡氏孤鳳散 治產後閉目不語用之即効

生白礬為末每服一錢熱酒調下

產後不語

人參 石蓮肉 石菖蒲等分

每以五錢水煎服



十二卷

赤水玄珠婦人門第二十一

三卷目錄

產後乍見鬼神

心神驚悸

中風恍惚

虛極生風

虛汗不止

汗多變瘕

口噤腰背反張

產後中風

四肢筋挛

遍身疼痛

產後腰痛

產後腹痛兒枕痛

產後寒疝腹痛

產後兩脇脹痛

產後血癥

虛煩發熱

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

產後血渴

產後乍寒乍熱

產後瘡疾

嘔吐腹脹

氣急喘促

口鼻黑鼻衄

月水不通

四肢浮腫

腹痛泄瀉

赤白痢

大便秘澀

大小便不通

產後遺糞

產後諸淋

小便不禁

小便出血

玉門不閉

乳少或止

婦人繭唇

赤水玄珠婦人門第二十三卷

新安生生子孫一奎著輯

產後乍見鬼神

產後如見鬼神或言語謔妄皆由血氣虧損陰虛發熱或瘀血停滯以致心神煩躁而然也宜以

調經散治之

薛氏曰若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八珍加炮姜若心血虛損用栝子仁散大抵此証皆由心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神

自安矣若果係鬼祟所附即灸鬼哭穴可愈其
或不起者多因豁痰降火攻伐之過也

一產婦患前症或用調經散愈而復作仍服前散
益甚痰涎上湧朝寒暮熱乃早用八珍散多用
加味歸脾湯各五十餘劑而愈

調經散 治血虛經閉心神煩躁渾身疼痛或時

見怪 沒藥 琥珀 桂心 白芍各一錢 炒

當歸各七分 細辛五分 麝香少許 右為末每服半錢

姜湯酒各少許調服

栝子仁散 治產後元氣虛弱瘀血停滯狂言亂語

栝子仁 遠志 人參 桑寄生 防風

當歸炒 生地 甘草炙 各等分用白羊心壹

個水三盞煮清汁七分入藥五錢煎服

產後心神驚悸

薛氏曰人之所主者心之所主者血心血一虛
神氣不守此驚悸所由作也當補血氣為主

一產婦患前症二度服琥珀地黃丸局方妙香散
隨效再患服之其症益甚而脉浮大按之如無

發熱惡寒此血氣俱虛乃以十全大補加味歸脾二湯各百餘劑而愈後遇驚恐勞怒復作仍服前藥而安

琥珀地黄丸 治產婦惡露未盡胸腹作痛或小

便不利 琥珀 延胡索 糯米同炒去米 川歸 各一兩

蒲黃 四兩 生地 研取汁 生姜 各二斤研取汁留

內炒地黃滓以地黃汁炒生薑滓各乾為度 右為末蜜丸如彈子大

每服一九當歸煎湯化下

治血虛驚悸少寐及產後敗血停留少腹作痛

辰砂 琥珀 沒藥 當歸 分等 右為末每服

二錢空心日午臨卧白湯調下

治產後驚悸亂語精神不定用好硃砂為細末每

以酒調下一錢

產後中風恍惚

產後恍惚因元氣俱虛心經血少或外邪所侵以致心神恍惚怔忡不寧

薛氏曰當大補氣血為主而佐以後方為善蓋風乃虛極之假象也固其本元諸病自退若專治

其風則速其危矣

一產後患前症盜汗自汗發熱晡熱面色黃白四肢畏冷此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾二湯始應後因勞怒發厥昏憤左目牽緊兩唇抽動小便自遺作肝火熾盛用十全大補加釣藤山梔而安再用辰砂遠志丸而愈

辰砂遠志丸 產後中風驚狂起卧不安或痰涎

上湧 石菖蒲 遠志 去心芦用甘草湯煮 人參 茯神

辰砂 各三錢 川芎 山藥 鉄粉 麥冬 細辛

天麻 半夏 南星 白附子 各一兩 為末

姜汁糊為丸菘荳大別以硃砂為衣每服三十

丸姜湯送下

產後極虛生風

產後生風因去血過多氣無所主以致唇青肉冷汗出目眩神昏急服濟危上丹若投以風藥則悞甚矣

薛氏曰若心脾氣血虛用十全大補湯如不應加

附子釣藤鈎若肝經血虛用逍遙散加釣藤經云脾之榮在唇心之液為汗乃心脾二臟虛極急用參附湯救之

一婦患前症或用諸補劑四肢逆冷自汗泄瀉腸鳴腹疼以為陽氣虛寒用六君子姜附各加至五錢不應以參附加至一兩始應良久不服仍前腸鳴腹痛後灸關元穴百餘壯及服十全大補湯方効

濟危上丹 乳香 五靈脂 硫黃 玄精石

阿膠 卷栢 桑寄生 陳皮各等分 將上四味入石器微火炒再研入餘末用生地黄汁丸梧子大每服二十九食前溫酒或當歸酒下

當歸建中湯 治產後腹痛拘急痛連腰背自汗少食 當歸 桂心各三兩 白芍六兩 炙甘草二兩 每服五錢姜枣水煎入飴糖一匙以効為止

獨參湯 一切失血惡寒發熱作渴煩躁或口噤痰鳴自汗盜汗氣虛脉脫手足逆冷蓋血生於氣補氣者乃陽生而陰長也

產後虛汗不止

產後汗不止者皆陽氣頓虛腠理不密而津液妄洩也若遇風則變痙縱虛之短氣則身體消瘦唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

薛氏曰若血氣俱虛急用十全大補湯如不應參附著附湯恐汗多亡陽發痙尤當用之王好古曰頭汗出至頸而還額上偏多蓋額為六陽之所會也由虛熱薰蒸而出竊謂前症當以部位分之額左屬肝額右屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬

心治者審之

一產婦略聞音响其汗如水而昏瞶諸藥到口即嘔作脾氣虛憊用參附末為細丸時含三五粒液下乃漸加至錢許却服參附湯而痊

一產婦盜汗不止遂致癡寐神思疲甚口乾引飲乃血虛有熱用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩黃柏炒黑倍加人參五味子二劑而愈

麻黃根湯 產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安