大便不通

安康郡太守苦風秘陳為處二仁丸杏仁去皮尖麩炒黃麻仁另研枳殼去穰麩炒為末訶子炒去核為末右用煉蜜為丸桐子大每服二三十丸溫水下未利增之乃愈

薛立齋治一老婦大便欲去而難去又不堅實腹內或如故或作脹兩關尺脉浮大薛以為腸胃氣虛血弱每服十全大補湯加肉蓯蓉去後始快若間二三日不服腹內仍脹大便仍難

一婦人大便秘濇諸藥不應苦不可言令飲人乳而安

張子和曰頃有老人年八十歲臟腑澁滯數日不便每臨後時頭目昏眩鼻塞腰痛積漸食減縱得食便結燥如彈一日友人命食血臟葵羹油潠菠菱菜逐頓食之日日不乏前後皆利食進神清年九十歲無疾而終圖經云菠菱寒利腸胃芝蔴油炒而食之利大便葵寬腸利小便年老之人大小便不利最為急切此亦偶得瀉法耳

子和表兄病大便燥澁無他症常不敢飽食飽則大便極難結實如鐵石或三五日一如圊日前星飛鼻中

血出肛門連廣腸痛痛極則發昏服藥則病轉劇巴豆芫花甘遂之類皆用之過多則困渴止則腹燥如此數年遂畏藥性暴急不服但卧病待盡兩手脉息俱滑實有力以大承氣湯下之繼服神功丸麻仁丸等藥使食菠薐菜及猪羊血作羹百餘日克肥親知駭之粗工不知燥分四種燥於外則皮膚皺揭燥於中則精血枯涸燥於上則咽鼻焦乾燥於下則便溺結秘夫燥之為病是陽明化也水液寒少故如此然可下之當擇之巴豆可以下寒甘遂芫花可以下濕大黄朴硝可以下燥内經曰辛以潤之鹹以軟之周禮曰以滑養竅

糞子才治一男子年六十七曰怒左邊上中下有三塊時動而脹痛捺之即散去心痞作嘈食胃口覺澁夜卧不寧小便八日不通一醫以大承氣湯一醫以化滯丸一用猪膽導法一用蜜導俱不效診之六脉弦數有力此血不足氣有餘積滯壅實與大黄末三錢皮硝五錢熱燒酒調服下黑糞如石數十枚如前再進下糞彈盆許遂安後以四物湯加桃仁紅花酒蒸大黄黄連厄子三枝栽术枳殼青皮木通甘艸十數劑而愈

李時珍治一宗室年幾六十孕生苦腸結病旬日一行甚于生產服養血潤燥藥則泥膈不快服硝黃通利藥則苦悶知如此三十餘年矣診其人體肥膏粱而多憂鬱日吐酸痰椀餘乃寬又多火病此乃三焦之氣壅滯有升無降津液皆化為痰飲不能下滋腸腑非血燥比也潤劑留滯硝黃徒入血分不能通氣俱為痰阻故無效也乃用犀牛末皁角膏丸與服即便通利自是但覺腸結一服就順亦不妨食且復精爽益犀牛能走氣分通三焦氣順則痰逐飲消上下通快矣 本草綱目

外甥柳喬素多酒色病下極脹痛二便不通不能坐臥立笑呻吟者七晝夜醫用通利藥不效遣人叩李李思此乃濕熱之邪在精道壅脹隧路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也乃用楝實茴香穿山甲諸藥入犀牛加倍水煎服一服而減三服而平 全上

張景岳治一壯年素好火酒適夏月醉則露臥不畏風寒此其食性臟氣皆有大過人者曰致熱結三焦二便俱閉先以大承氣湯用大黃五七錢如石投水又用神祐丸又導法俱不能通且前後俱閉危益甚遂

仍以大承氣湯加生黃二兩芒硝三錢又加牙皁二錢煎服黃昏進藥四劑始通大便通而小便後漸利此所謂盤根錯節有非斧斤不可者若優柔不斷鮮不害矣（症與李案同治較李案劣）

朱翰林太夫人年近七旬偶因一跌即致寒熱醫與滋陰清火勢轉甚診之六脈無力雖頭面上身有熱而口不渴且足冷過股曰此陰虛受邪非跌之為病實陰症也（陰虛陰症四字模糊）遂以理煎（陰）加人參柴胡二劑而熱退日進粥二三椀已而大便半月不通腹且漸脹咸以燥結為火欲復用涼劑張不可謂若再用清火其

原必敗不可為矣經曰腎惡燥急食辛以潤之正此謂也乃以前藥更加薑附倍用人參當歸數劑而便通脹即退日就痊（此四字模糊）未可歸功薑附按此症乃陰虛陽越亦類中之輕者一跌而病良有以也不知陰症二字何以揷入其生平見解大可知矣

李士材治蔣少宰服五加皮酒遂患大便秘結四日以來腹中脹悶服大黃一錢通後復結李曰腎氣衰少津液不充誤行疎利（疎字不妥）是助其火矣以六味丸料煎成加人乳一鍾白蜜五錢二劑後即通十日而愈

顧文學素有風痰大便秘治風須治血乃大法也用十全大補湯加秦艽麻仁杏仁防風煨皁角仁半月而效三月以後永不再發此亦風秘之候

馮楚瞻治崔姓人六脈沈澈身熱四肢厥冷發狂譫語連夜不寐口渴浩飲二便俱秘絶似陽明熱症而斷從脈之治此陰伏於內逼陽於外曰津液不行故小便秘為陰伏逼陽乃舍症而陽不通大便秘結不行曰登厠三錢胡深以為不可戒之曰老年脫後幸參附救全

胡念菴治陳鹽商年七十六矣春時患中風脫症重劑參附二百餘帖獲痊至十月大便秘結不行曰登厠數十次冷汗大出面青肢厥醫用滋補劑入生大黃三錢胡深以為不可戒之曰老年脫後幸參附救全

不三劑狂定神清思食而愈

按此亦陰虛陽越之病甚則為顛中其治法亦大醇而小疵耳至云陰伏于內逼陽于外亦與景岳案中謂為陰症同一模餬也此二案不入類中門者以世俗惟以二便為急且風秘一條人多不講也

不能安養過于思慮以致津液枯竭傳送失宜何事
性急以速其變若一投大黃往而不返恐難收功矣
姑忍二三日勢當自解病者怪其遲緩口出怨咨之
辭次日不得已用人參二兩蒸蒼一兩當歸五錢松
柏仁各五錢附子三錢升麻四錢煎服外用綠礬一
斤入鼎煅以滾水沖入扶坐其上一刻而通（醫林指月）
按傷寒瘡利之後患秘結者皆由攻下散表失宜
所致究其由則皆血燥為病至若風秘一條其病
本由燥火生風醫者昧于風字動用風藥死者已
矣其存者亦必貽後患然此尚其輕者也

張路玉治楊松齡夏月感冒服發散十餘劑二便俱閉
一醫用硝黃下之少腹左畔遂脹起如塊不赤不熱
有時嗶嗶作聲瘍醫以敷藥治其內藥未進而躁擾不寧診之六脈緊細而駛此
過汗津液大傷又與苦寒攻裡致陰邪內結膀胱不
化溺積不通法在不救幸胃氣有權形神未槁尚能
少進粥糜姑許以治回與濟生腎氣大劑煎成入有
嘴壺托起其項徐徐仰灌升許頃令轉側以鵝翎探
吐即時溲便如注少腹頓平更與十全大補調理而
安此症前後患者四五人或小便淋瀝或遺溺不止

或形瀛氣脫皆力辭不治

按此由感症混表混攻而成秘結收入此門以備

參酌

孫文垣治溫南溪內人居常大便秘結面赤不思飲食頭時眩暈診之右關尺滑大有力此痰火症也用瓜蔞四錢為君滑石三錢枳實二錢半夏一錢半為臣蘿蔔子薑黃各一錢為佐兩帖愈矣又教以或遇大便秘結每服當歸龍薈丸加牛膽南星一錢立應

一人大小便秘數日不通用商陸搗爛敷臍上立通本草詳細日

一人大便秘久用烏梅木方停一寸劈破以水煎取半盞服之立通今上

陸養愚治闕望亭年近古稀常患脇痛用行氣藥及當歸龍薈丸即愈後患便秘服潤腸丸便雖通而飲食減胸膈不舒有時溫溫作痛若數日不服又秘結矣或以高年血不足所致投以四物湯數劑并小便亦不通三日脹急殊甚審視臍百計不解脈之沈遲而弱詢其平日大便有欲解不解之狀又解又潤而不燥曰此非血秘乃氣虛不能傳送所致也用補中益氣湯少以木香白豆蔻佐之二劑而便俱通此後

常服一劑不惟無秘結之患且飲食倍增脇痛亦不作矣此勦聶久吾治乃父之按

陸祖愚治邱念招稟賦薄弱常有夢遺症爰食燥炒飯大便二三日一度忽受風寒仍喫燥飯且日進四餐旬日間飲食如舊而大便竟不行後復寒熱頭痛發黃發斑黃退而斑色純紅仍以涼解之劑煎送潤字丸二錢五分薑湯服少頃去大便又八塊而胸中如故令以前口尚不可按再服涼解六劑便不行而小腹微滿或謂病已月餘可以議下弗之聽仍用潤字丸二錢五方日服一劑間三日投潤字丸二錢病至七十餘日服潤字丸計五兩胸脇猶未清然病久肌肉削盡況常有遺症不宜再行消導矣與枳實二錢山查二錢人參六分附子四分連進三劑遂大便日行一次人參漸加枳實漸減數劑後食進病起服參至半斤始得復元

丹溪治一婦人脾疼後患二便不通此是痰隔中焦氣聚上焦二陳加木通先服後吐渣再煎燒皁角灰為末粥清調下一尼體厚病吐逆忽小便不利頭汗出立斃

薛立齋治儒者王録之素痰甚導吐之後大便躁結頭暈眼花等症尺脉浮大按之則濇此腎氣虛而兼血虛也四物送六味丸四劑諸症悉退仍用前丸月餘而康

僉憲高如齋素嗽痰服下痰藥痰去甚多大便秘結小便頻數頭暈眼花尺脉浮大按之如無謂腎家不能納氣歸源前藥復耗金水而甚用加減八味丸料煎服而愈

陳三農治中州王太學素多酒食病下極脹痛二便不通坐卧不能沈吟又曰矣百般通利不應此濕熱之邪逼塞二陰壅脹隧脫也乃用韭菜子以山甲茴香楝實各一錢五分入牽牛頭末三錢水煎一服即減三服即愈乃知牽牛能達石腎命門走精隧故東垣用天真丸以牽牛鹽水炒黑入佐沈香官桂杜仲破故紙治下焦陽虛也

此即時斅治柳喬案三農勦之增入韭菜子足乃知以下数語

陳良甫曰一男子病風淫末疾或用快藥利之患肺痿咯膿血至大便不通而死惜哉

易思蘭治一儒官患便秘症初曰小便時秘服五苓散大便不通八正散益元散俱不效一醫診得二尺俱無作陰虛

水煎用八味丸日一服三日大便亦秘口渴咽乾煩滿不睡用脾約丸潤腸丸小便日數十次惟點滴而已大便連秘十日腹滿難禁衆議急用三一承氣湯下之服後微利隨秘又加小腹繞臍滿痛復用舟車丸遇仙丹每空心一服日利三五次裡急後重下皆赤白如此半月日夜呻吟惟進米飲及茶盂許診得兩寸沈伏有力兩關洪緩無力兩尺不見曰關尺無恙病在膈上此思慮勞神氣秘病也以越鞠湯投之服一盂嗳氣連出再一盂大小便若傾所下皆沈積之物渾身稠汗曰進薑湯一盂熟睡覺粥進二盞

復診脈平調理氣血而愈

立齋診職方陳我齋年逾六旬先曰大便不通服內疏等劑後飲食少思胸腹作脹兩脇作痛形體倦怠兩尺浮大左關短澁右關弦澁時五月此乃命門火衰不能生脾土而肺金又尅肝木決其金旺之際不起後果然

萬密齋治汪玉虹大便不通服通幽湯潤腸丸俱不效診其言微氣弱乃內傷症也氣口脈浮大而軟此氣不運而血不潤氣血兩虛故也宜亟補之曰其如腹脹何曰無慮但服補中益氣湯倍加當歸五日而愈

許學士治一人母年八十四忽爾腹痛頭疼惡心不食召醫數十議皆用補脾進食治風清利頭目等藥數日雖愈全不入食其家憂惶許辨說前藥皆誤矣此症正是老人風秘臟腑壅滯聚于胸中則腹脹惡心不思飲食又上至于巔則頭痛神不清也若臟腑流暢諸疾悉去矣乃用蜜蘇子大麻子各半合洗淨研細取汁一盞分二次煮粥兩啜而氣泄先下結糞如胡椒者十餘枚後漸得通利不用藥而愈矣

文潞公在北門日盛夏問苦大腑不調公隨行醫官李琥本衢州市戶公不獨終始涌容之又教以醫事公病泄利琥以言動搔之又求速效卽以赤石脂龍骨乾薑等藥饋公公服之累日不大便其勢甚苦初雲世共城來見公未坐定語及此事公又不喜服大黃藥雲世告曰此燥糞在直腸藥所不及請以蜜兌導之公以為然時七月中苦熱虜世冒汗為公作蜜兌是夕三用下結糞四五十枚大如胡桃色黑如橡栗公二三日間飲食已如故良方

攢宮有一老人患風秘八九日不通有木匠授以此方只一服見效用不蛀皁角當中取一寸許去黑皮以沸湯半盞泡上用盞蓋定候通口服之先辦少粥通

後卽愈（是齋方）

繆仲淳治唐震山年七十餘大便燥結胸中作悶曰此血液枯槁之候用大肉蓯蓉三兩（白酒浸洗去鱗甲切片）白湯三椀煎一椀頓飲飲竟大便通胸中快然偶一醫問疾曰此劫藥也當調補脾胃為主易以白朮厚朴茯苓陳皮病如故唐翁曰誤矣仍飲前藥立解高存之聞而叩其故繆曰肉蓯蓉峻補精血驟用之反動大便藥性載甚明也（庵筆記）

張選卿治大便不通屢驗方硃砂（研如飛）麵五錢（研細）真蠶蛰七錢（去）滴好酒少許和丸每服一錢二分好酒吞下朝服暮服通暮朝通須天晴時脩合為妙（全上）

劉雲峯治一老人因冒雨感寒未經發汗至春初內熱煩燥胸膈緊滿十日不大便用清解二劑入口卽吐其半加熟大黃利之下咽卽吐去殆盡蓋因痰熱凝結胸膈以治血分者反拒而不受也回用犀牛大黃丸緩緩服之而大便通後乃服清熱化痰藥十餘劑而漸安則較瀕湖所說老婦腸結症又進一解矣

吳橋治張邦達謝邑歸年踰艾矣其貌壯碩如厠率易行偶以信宿夢遺早呼吉酒進人膏二（七）既而大溲稍實無他端張所善者巴深以為誤飲而釀內熱不

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

急下且寘有他既飲大黃湯不為動猶以為熱甚至
于再三腹脹膨脖駸駸石矣旬日尸寢如縛昏瞑不
食不言橋診之脉隱隱將絕橋曰腎司啟閉主二溲
脾居中制之必關脾而後轉運長者故中枵而下濡
誤以悍劑伐之脉有死徵不可為矣衆曰否即中氣
乏遇下且如建瓴何不為動橋曰公等信知脾虛不
任寒涼不知脾斃則寒涼無所用矣諸子愬曰誠得
一劑藉手庶毋恝乎人子之心曰第進獨參湯當下
其下亦薄于治無神既得劑則腸鳴而溲腹脹者虧
三之一張乃張目問狀人人以為更生諸子問曰大

黃不行而人參行何說橋曰否中權廢矣即前茅安
所受命哉補中而建招搖摧堅者始為之用此亦人
參用大黃爾非自用而能下之顧病少間而脈不歸
終于不治深且復至將攘為已功大詬諸子曰爾曹
以不治治家丈人魚無人子禮茲更一下而起復何待
乎橋故避溷度復爭之無益遣諸子問可否乃徐應
曰等死爾下則死疾不下則死遲公等自裁橋何敢
與深詬愈急卒復下之不旋踵死矣

王生病發熱頭痛腹脹甚醫為之解散熱退而痛如故
且不得前後溲又以大黃通之大溲稍行小溲赤澁

脹痛特甚仍以為熱結將復下之橋診曰病得之三勞倦且內復食冷爾內則損腎勞倦食冷則損脾腎主大小溲腎損則不能轉輸故作濕熱而為脹滿藉令亟下則將亡陰脹滿有加矣危之道也王俯首叩枕曰誠如公言三者皆如見遂投人參五苓散一服得前溲再乃大通痛亦尋減病者求通後溲急橋曰公六脈沈微且數必假信宿脾氣始回脾得主則濕熱將自行毋欲速明日大溲自下調理月餘而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷二十七

錢塘魏之琇玉橫撰

驚

張子和治衛德新之妻旅中宿於樓上夜值盜劫人燒舍驚墮牀下自後每聞有響則驚倒不知人家人輩躡足而行莫敢冒觸有聲歲餘不痊諸醫作心病治之人參珍珠及定志丸皆無效張見而斷之曰驚者為陽從外入也恐者為陰從內出也驚者為自不知

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

故也恐者自知也足少陽膽經屬肝木膽者敢也驚怕則膽傷矣乃命二侍女執其兩手按高椅之上當面前置一小几張曰娘子當視此一木猛擊之其婦大驚張曰我以木擊几何以驚乎伺少定擊之驚也緩又斯須連擊三五次又以杖擊門又遣人畫背後之窗徐徐驚定而笑曰是何治法張曰內經云驚者平之平者常也平常見之必無驚是夜使人擊其門窗自夕達曙夫驚者神上越從下擊几使其下視所以收神也一二日雖聞雷亦不驚德新素不喜張至是終身厭服如有人言張不知醫者執戈以逐之

卜氏子年二十八病身弱四肢無力面色蒼黃左脇下小便微黃已二三載矣諸醫計窮求張治之視其部分乃足厥陰肝經兼足少陽膽經也曰甲膽乙肝故青其黃者脾也診膽脈小此因驚也驚則膽受邪腹中當有驚涎綠水病人曰昔曾屯軍被火自是而疾作乃夜以舟車一百五十丸瀉川散四五錢加生薑自然汁平旦果下綠水四五行或問大加生薑何也曰辛能伐木也下後覺微痛令再下之比前藥減三之一又下綠水三四行痛止思食反有力張謂卜曰

汝妻亦當病卜曰太醫未見吾妻何以知之曰爾感此驚幾年矣卜曰當被火時我正在草堂中熟寐人驚喚我睡中驚不能言火已塞門我父拽出我火中今五年矣張曰汝膽伏火驚甲木乘脾土是少陽相火乘脾脾中有熱故能食而殼穀熱雖能化穀其精氣不完汝必無子蓋敗經反損婦人汝妻必手足熱四肢無力經血不時卜曰吾妻實如此亦已五年矣他日門人因觀內經言先瀉所不勝次瀉所勝之論其法何如以問張張曰且如膽木乘胃土此土不勝木也不勝之氣尋救于子已土能生庚金庚為大腸味辛者為金故大加生薑使伐木然不開脾土無由行也遂用舟車丸先通其閉塞之路是先瀉其所不勝後用薑汁調瀉心湯瀉其所勝也大抵陽干尅陽干腑尅腑臟尅臟

張路玉治吳昭如室年壯體豐而素有嘔血腹脹脾約便難之恙兩遭回祿憂恚頻仍近於失血之後忽然神氣憒亂口噤目瞠診其氣口數盛而促人迎弦大而芤形神不能自主似有撮空之狀或謂症犯條款不出五日當斃張謂不然若是撮空必然手勢散漫今拈著衣被儘力扑摘定為挾驚挾怒無疑爪者筋之

餘非驚怒而何況脈來見促當是痰氣中結殊非代
脈之比詢其病因驚怒俱有遂用鉤籐一兩煎成入
竹瀝半盞薑汁五匙連夜製服服後即得安寐六脈
亦稍平但促未退仍用前方減半調牛黃末一分其
夕大解三度去結糞五六十枚腹脹頓減脈靜人安
數日平復如常

老僧悟菴心悸善恐遍服補心養血之藥不應天王補
心丹服過數斤驚悸轉增面目四肢微有浮腫之狀
求張治察其形肥白不堅診其脈濡弱而滑此氣盛
痰飲浸漬於膈上也以導痰湯稍加參桂通其陽氣
數服而悸恐悉除更以六君子加桂水泛作丸調補
中氣而安

吳孚先治王兵憲患驚悸時或煩躁夜更靡寧右關盛
弱左寸尤甚與加味歸脾二十劑全愈

龔子才治一童子因用心過度少寐驚悸怔忡惡寒先
用補中益氣湯祛荅桑仁遠志惡寒漸止又用加味
歸脾湯驚悸稍安再用養心湯而安

杜壬治林學士子居常喜食海蛤飲食之頃未嘗不設
至十八年忽面色頓青形體瘦削夜多驚悸皆謂勞
瘵之疾百療不瘳杜脈之曰非病何以知之雖瘦削

面青精神不減問學院子秀才好食甚物曰多食南海中味杜曰但多服生津液藥病當自愈如是經兩月面色漸有紅潤意夜亦無驚悸林問所以然杜曰王氷素問云鹽發渴乃勝血之症海味皆鹹物既多食使心血漸衰則夜驚悸今既去鹹用生津液之藥人且少壯血津易生故疾去乃安矣

薛立齋治一婦人勞則心跳怔忡寒熱往來用歸脾湯為主佐以八珍湯諸症漸愈又用加味逍遙散寧志丸而安後復作服歸脾寧志藥即愈

一婦人患驚悸怔忡日晡發熱月經過期飲食少思用八珍湯加遠志山藥棗仁三十餘劑漸愈佐以歸脾湯全愈後因勞發熱食少體倦用補中益氣湯又因怒適月經去血不止前症復作先以加味逍遙散熱退經止又用養心湯治之而痊

一婦人驚悸怔忡自汗盜汗飲食不甘怠惰嗜卧用歸脾湯而愈至年餘懷抱鬱結患前症煮畀血便血仍用前湯而愈

許紳者京師人嘉靖初供事御藥房受知於世宗累遷太醫院使歷加工部尚書領院事二十年宮婢楊金英等謀逆以帛縊帝氣已絕紳急調峻藥下之辰時

下藥未時忽作聲去紫血數升遂能言又數劑而愈
帝德紳加太子太保禮部尚書賜賚甚厚未幾紳得
疾曰吾不起矣曩者宮變吾自分不效必殺身因此
驚悸非藥石所能療也已而果卒賜謚恭僖官其一
子邺典有加明世醫者官最顯止紳一人（明史。金陵瑣事亦載此則其藥乃大黃桃仁紅花等）症

馬元儀治一人患心悸證肢體倦怠或以陰虛治之不
效診其脈浮虛無力蓋得之焦勞思慮傷心也內經
云心痺者脈不通煩則心下鼓又原病式云水衰火
旺心胸躁動（據此則是陰虛矣且後面于二句又無發明又何必勉強闌入其言脈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

不通者正以焦勞太過心藏之脈鬱而不通也鬱則
傷血而動君火故悸動不寧也心之下脾位脾受心
病鬱而生涎精液不生清陽不布故四肢無氣以動
而倦怠也法宜大補心脾乃與歸脾湯二十劑即以
此方作丸服之全愈

章氏婦因失恃于歸勞心操持鬱形志倍傷遂心悸恍惚
身體如在舟車雲霧中或與降氣理痰之劑不應診
之兩脈虛微尺脈倍弱曰憂勞過度則脾損脾虛必
盜母氣以自救故心虛而悸心藏神為十二官之主
虛則無所聽命而恍惚不安也宜大培土氣則脾自

復不仰給于心而心亦安神亦守矣與人參附子理中湯一劑而安四劑神氣大復脈和而愈

仲氏女因驚恐即發熱神昏語言錯妄脈之右結濇左浮弦此雖驚恐而得實先因悒鬱所傷也凡鬱則肺金必虧肝木因之寡畏而妄行腎水因之失養而不足加以驚恐則腎益傷而肝愈擾其發熱者風木內甚也神昏者火熱上騰也宜舒通肺氣以制肝生腎用萋仁紫菀枳殼桔梗杏仁蘇子秦艽膽星二劑右脈透神氣清加生首烏黃連二劑熱亦退再以生地三錢首烏五錢遠志一錢牛膝知母膽星貝母橘紅茯神各一錢甘草五分而愈蓋金氣治則木受制而水得養所謂一舉而三善備也若泥驚恐所致而用金石腦麝之品不幾延寇入室乎

高逢辰表姪嘗遊惠山暮歸過一巨人醉臥寺門驚悸不解自是便溺日五六十次李氏云心小腸受盛腑也因驚而心火散心虛腎冷而然其傷心傷腎之驗歟（醫說續編○按經云驚則心無所倚恐則傷腎是得乎此受盛職廢運化權而滲泄不禁矣○原注）

長山徐嫗遘驚疾初發手足顫掉祴去裳衣羸而奔或歌或哭或聲曳如舞木偶羸工見之吐舌走以為鬼

魅所惑周漢鄉獨刺其十指端出血巳而安宜入顛狂門

繆仲淳治顧太學叔夏內人舟中為火所驚身熱贏弱幾成瘵症醫誤投麥煮藥勢危甚以清肌安神之劑與之戒以勿求速效凡十數劑而安麥冬青蒿子銀柴胡桑皮枇杷葉各二錢炙鼈甲炙仁各三錢五味白芍生地各一錢

施沛然治呂孝廉沈僕患驚悸三月聞響則甚遇夜則恐恐甚則上屋踰垣旋食旋飢日啖飯無算咸謂心偏失神用補心湯益甚脈之右關洪數無倫兩尺浮大按之極濡病得于酒且內腎水枯竭客熱犯胃經云腎主恐又曰胃熱亦令人恐又曰胃熱則消穀易飢又曰足陽明病聞木音則惕然而驚甚則踰垣上屋此病在胃與腎脾合胃心屬火是脾之母補心則胃益實火盛則水益涸故藥之而病反甚也但病本在腎而標在胃先治其標用瀉黃散後治其本用腎氣丸一病而寒熱竝用補瀉無施第服瀉黃散三日當不飢矣服腎氣丸十日當不恐矣已而果然

一儒者苦學久困場屋得疾吐衄盈盆胠贏骨立夜卧交睫即夢鬬敗爭貿恐怖之狀不可形容如是十載

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

每勞則發用鎮心安神不效一日讀藏氣法時論乃知人魂藏于肝肝又藏血作文既苦劒血又傷則魂失養故交睫若此知非峻補不奏功乃以酒鎔鹿角膠空腹飲之五日而睡卧安半月而肌肉生一月而神氣復始能出戶（來氏選）

張景岳治一强壯少年遭酷吏之恐病似脹非脹似熱非熱絕食而困衆謂疾火宜清中焦診之曰此恐懼內傷少陽氣索而病及心腎大虧之症也遂加温補兼治心脾一月而起愈後雖形氣健如初而陽寂不舉告之曰根蒂若斯腎傷已極非少壯所宜之兆速宜培養心腎庶免他虞彼反以恐嚇為疑全不之信未及半載竟復病而歿惜哉（來選）

顛狂

孫兆治相國寺僧克惠顛疾經半年遍服名醫藥不效僧俗兄潘氏家富召孫療之孫曰今夜睡著明後日便愈也潘曰且告投藥報恩不忘孫曰有鹹物但與師噢待渴却來道至夜僧果渴孫至遂求温酒一角調藥一服與之有頃再索酒與之半角其僧遂睡兩晝夜乃覺人事如故潘謝孫問其治法曰衆人能安

神矣而不能使神昏得睡此乃靈苑方中硃砂棗仁乳香散也人不能用耳辰砂一兩光明有墻壁者棗仁半兩微炒乳香半兩光瑩者右量所患人飲酒幾何先令恣飲沉醉但勿令吐至靜室中以前藥都作一服温酒調下作一盞調之令頓飲如飲酒素少人但以隨量取醉服藥訖便安置牀枕令卧病淺者半日至一日病深者三兩日令家人潛伺之鼻息勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺待其自醒即神魂定矣萬一驚悟不可復治正肅吴公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥 醫藥綱目

浙江一婦人顛狂不止醫以瓜蒂半兩為末每一錢重井花水調滿一盞投之隨得大吐吐後熟睡勿令驚動自此無恙 全上

實材治一人得風狂已五年時發時止百法不效實為灌睡聖散三錢先灸巨闕五十壯醒時再服又灸心俞五十壯服鎮心丹一料實曰病患已久須大發一回方愈後果大發一日全好又一婦人產後得此症亦如前灸服薑附湯而愈

張子和治一叟年六十值徭役煩擾而暴發狂口鼻覺如蟲行兩手爬搔數年不已兩手脈皆洪大如絙繩

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

斷之曰口為飛門胃為賁門口者胃之上源也鼻者
足陽明經起於鼻交頞之中旁納太陽下循鼻柱交
人中環唇下交承漿故其病如是夫徭役煩擾便屬
火化火乘陽明經故經言陽明之病登高而歌棄衣
而走罵言不避親疎又況肝主謀膽主決徭役迫邊
則財不能支則肝屢謀而膽不能決屈無所伸怒無
所洩心火礙磚遂乘陽明金然胃本屬土而肝屬木
膽屬相火火隨木氣而入胃故暴發狂(論症如觀大猶當退舍餘子紛紛盡足語此)乃命置燠室中(涌雖劉李朱羅)漏而汗出如此三次
內經曰木鬱則達之火鬱則發之良謂此也又以調

胃承氣半湯斤用水五升煎半沸分作三服大下二
十行血與瘀血相雜而下數升取之乃康以通聖散
調其後(大下則是土鬱奪之也)是土
一男子落馬發狂起則目瞪狂言不識親疏棄衣而走
罵言涌出氣力加倍三人不能執縛燒符作醮問鬼
跳巫殊不知顧丹砂牛黃犀珠腦麝資財散去室中
蕭然張以車輪埋之地中約高二丈許上安中等車
輪其輞上鑿一穴如作盆之狀縛病人于其上使之
伏卧以軟褥襯之令一人於下坐機一枚以棒攪之
轉千百遭病人吐出青黃涎沫一斗二許繞車輪數

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

恒其病人曰我不能堪可解我下從其言而解之索涼水與之冰水飲數升狂乃罷矣此其治法豈庸庸所能辨哉

范純佑女喪夫發狂閉之室中夜衣斷窗櫺登桃樹上食桃花幾盡及旦家人接下自是遂愈按此亦驚怒傷肝痰挾敗血遂致發狂偶得桃花利痰飲散滯血之功與張仲景治積熱發狂用桃仁承氣湯之意相同

蘇鶚杜陽編

本草綱目

一婦人顛狂十年至人授以真鬱金七兩明礬三兩為末薄糊丸梧子大每服五十丸白湯下初服心胸間有物脫去神氣灑然再服而甦此驚憂痰血絡聚心竅所致鬱金入心去惡血明礬化頑痰故也

本草綱目

龔子才治一人顛狂亂打走叫上屋用瓜蒂散吐出其痰數升又以承氣湯下之而愈

一人氣心風即是痰迷心竅發狂用真花蘂石煅黃酒淬一次為細末每服一錢黃酒下

一婦人發狂棄衣而走踰屋上垣不識親疎狂言妄語人拏不住諸醫束手龔令家人將涼水亂潑不計其數須臾倒仆脈之六部俱弦數有力此熱極生風也用防風通聖散加生地黃連桃仁紅花丹皮三劑而安後服祛風至寶丹全愈

凌漢章治金華富家婦少寡得狂疾至裸形野立凌視曰是謂喪心吾針其心正必知恥蔽之帳中慰以好言釋其愧晝可不發乃令二人堅持用涼水噴而針之果愈明史

孫文垣治吳其以績學勞心有星士決其發解適以瘧作不能終場遂抑鬱而成顛狂或悲或歌或鼓掌或頓足甚則罵詈不避親疎診之面白而青兩寸短澁左關絃右關滑兩尺平此心肺之神不足志願高而不遂鬱結不舒津液生痰而不生血又攻痰尅伐太過已作痰治心神愈不得養故昏亂無所攝持經云主不明則十二官危按此宜補養收斂心神兼之清痰可萬全也用棗仁人參茯神小草丹參當歸以補心安神黃連竹茹以清肝膽之火元參佐之外以龍齒珍珠羚羊角牛黃膽星天麻青黛辰砂全蝎冰片黃連甘草膏為丸金箔為衣理調而愈

張路玉治黃文學讞妄顛仆數月來或六七日一發或一日二三發發則大吐涎水血沫或一日半日而甦狀同癇症晝夜恆見亡婢僕婦二鬼纏綿或時昏憒不省或時妄言妄見精氣不時下脫不能收攝服二冬二地連柏金櫻石蓮之屬反作瀉不食診之寸盛尺微

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

前大後小按之忽無舉之忽有知為神氣浮散之候
因與六君子加龍齒菖蒲遠志送養正丹間續而進
前後共六七服是後讞妄顛仆絕不復發邪祟亦不
復見惟夢泄為平時痼疾更與平補鎮心丹兩月而
安此與前孫案症治大同

王宥堂曰一婦人狂言叫罵歌笑不常似祟憑依一邊
婦科鄭青山因治病不順沉思徹夜蕪受他醫諷言心
甚懷憤天明病者霍然憤喜交集病家設酌酬之而
諷者已遁憤無從洩忽然大叫發狂同道治之罔效
一日王道來往候索已服未服等方視之一併毀棄
曰此神不守舍之虛症豈豁痰理氣清火藥所克效
哉遂令覓上好人參二兩一味煎湯服之頃安三啜
而病如失更與歸脾湯調理而愈醫通

李士材治張少椿女以喪子悲傷忽當雷雨交作大恐
苦無所避旦日或泣或笑或自語或罵詈如中鬼祟
診其心脈浮滑餘皆沉細此氣血兩虧憂恐傷心心
傷則熱熱積生風也以滾痰丸用桔梗延胡索陳皮
杏仁煎湯送下出痰積甚多而愈醫通

此等證即是觀之業醫者亦可悔我有志之士慎勿為此彼云不可不知醫者非聖人之言也

龔子才治一女子年二十歲未婚患每見男子咬住不放後昏倒陰戶流出涎沫精頃間即醒其厥陰肝脈弦出寸口乃陰盛思男子不可得也令其父母用棍痛責使之思痛而失慾也後服抑青丸而愈

韓貽豐治永和一少年患風狂百治不效其父凡縛送求治為針百會二十一針升堂公坐呼少年前來命去其縛予杖者十杖畢而醒問以前事茫然不知也

神針心法

一婦因夫病垂危心患之乃夫病愈婦即病風狂晝夜不思眠食白日裸身狂走或登高阜或上屋房莫能禁也乞韓治將至其家其婦正在袒裼狂跳中忽自覺衣覆體斂容屏息若有所俟者鄰媼訝之初不解其何意俄而韓至令之跪則跪因跪而受針時韓為本邑宰為針其百會一穴鬼眼二穴各二十一針針畢即叩頭謝曰吾今不敢為祟矣願乞饒命吾去矣言畢而醒

柴嶼青治少京兆傅嘉言夫人忽患顛症診之胸有鬱結投以逍遙散加鬱金香附兩劑而癡象頓愈惟神氣尚呆不語即用前方為散服三兩用靈苑方服之而瘥靈苑方見孫兆素

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

薛立齋治一婦人素清苦因驚而癲或用風痰等藥愈甚薛用參耆歸朮濃煎佐以薑汁竹瀝三斤餘方愈

王海藏治許氏陽厥狂怒罵詈親疎或哭或歌六脈舉按無力身表如冰石發則叫呼聲高聲高則知其脈伏身冷皆為實症潔古云奪其食即已因不與之食乃以大承氣湯下之得臟腑積穢數升狂稍寧數日後發復下如此五七次行大便數斗疾緩身温脈生良愈此易老奪食之法也大還丿細目亦收

陳良甫治一女人眼見鬼物言語失常循衣直視衆醫多用心藥治之無效乃投養正丹二貼煎乳香湯送下以三生飲佐之立愈又一男子亦嘗病此症亦用此藥收效養正丹與百乙方抱膽丸無異抱膽丸內無硫黄有乳香也自合方見效良方

又一人病顛脈喘且搏承氣湯數下而安病機沙篆

王執中治一士人妄語異常且欲打人病數日矣意其是心疾為灸百會百會治心疾故也又疑是鬼邪用秦承祖灸鬼邪法併兩手大拇指用軟帛繩急縛定當肉甲相接處灸七壯四處皆著火而後愈更有二貴人子亦有此患醫僧亦為灸此穴而愈

張子和治一狂人陰不勝其陽則脈流薄疾陽并乃狂

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

難經曰陽極則狂陰極則顛陽為腑陰為臟非陽熱而陰寒也熱幷于陽則狂狂則生寒幷于陰則顛顛則死內經曰足陽明有實則狂故登高而歌棄衣而走無所不為是熱之極也以調胃承氣大作湯下數十行三五日復上涌一二升三五日又復下之凡五六十日下百餘行吐亦七八度如吐時暖室置火以助其熱兩汗少解數汗方平醫說續編

廣筆記風顛病神方好生犀角四兩剉末每用一兩加清水十碗入砂鍋內熬至一碗濾淨再加水十碗熬至二酒杯加淡竹葉四兩水六碗煎二碗去查加犀角汁同服盡四劑即愈

汪石山治一人縣差拿犯人以鐵索項所犯行至中途投河而死犯家告所差人索騙威逼致死所差脫罪未免費財憂憤成病如醉如痴謬言妄語無復知識診之曰此以費財而憂必得喜乃愈藥豈能治哉令其鎔錫作銀數錠置其側病者見之果喜握視不置後病遂愈此以喜勝憂也

劉宏璧治一富室女正梳洗間忽見二婦相拘方奔逸復擠之遂大叫叫後乃大哭笑已則發狂寒熱相繼目眩不眠以為鬼祟召巫符咒而病益困診之肺脈

直上魚際肝亦雙弦知所見者即本身之魂魄也蓋肺藏魄肝藏魂因以小柴胡湯去甘草之戀加羚羊龍角牡蠣清肺肝鎮驚祛一服而安

癇

竇材治一人病癇三年餘灸中脘五十壯即愈又一婦人病癇已十年灸中脘五十壯愈凡人有此疾惟灸法取效最速藥不及也

張子和云一婦病風癇自六七歲因驚風得之後每三二年間一二作至五七年五七作逮三十歲至四十歲則日作甚至一日十餘作遂昏癡健忘求死而已值歲大饑采百草而食於水濱見草若葱狀采歸蒸熟食之至五更忽覺心中不安吐涎如膠連日不止約一斗二汗出如洗甚昏困三日後遂輕健病去食進百脈皆和以所食葱訪人乃憨葱苗也即本草蔡蘆是也

龔子才治王大參子年十八患癇每發即仆地吐涎不省人事少頃復甦或一月一發或兩月發四五次已七年遍醫不效診之六脈滑數人迎緊盛此氣血虛而有風痰壅併也以追風祛痰丸加人參當歸黃連

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

各一兩安神丸二藥無服未及半年而痊後有數人俱如此治而愈

馮楚瞻治金氏子年十四患癎病群醫不效針灸繼之消濁痰鎮墜其發更甚且頻診之脈洪弦有力惟兩尺俱弱此陰虧之極孤陽無斂火性上炎僵仆諸候乃發理所然也消痰鎮墜不更耗陰分乎乃令空心淡鹽湯吞加味八味丸四五錢以使真陽藏納然陽無陰斂何能久藏火無水制難免浮越隨以重濁大料壯水之劑繼之以助其封蟄之勢則水火得其所矣下午乃服調補氣血養心清肺和肝之膏滋一丸如

一兩月精神補長癎症不治而愈

楊乘六治翁姓人病癎症每日至子時必僵仆手足勁硬兩目直視不能出聲其狀若死必至午後方甦甦則言動依然飲食如故別無他病如是者三年醫無盧日偏治不痊楊視其氣色晦滯口眼呆瞪面若失神上下眼胞黑暈舌壯如無皮脈則右關虛大而滑右寸若有散意曰此非癎症乃痰厥也必因驚而得蓋心為君主驚則心包氣散君火受傷致脾土不生中州虧損不能攝水因而生痰夫痰隨氣為升降者也天地之氣升于子而降于午人身亦然當子時一

各一兩安神丸二藥無服未及半年而痊後有數人俱如此治而愈

馮楚瞻治金氏子年十四患癇病群醫不效針灸繼之消渴痰鎮墜其發更甚且頻診之脈洪弦有力惟兩尺俱弱此陰虧之極孤陽無斂火性上炎僵仆諸候乃發理所然也消痰鎮墜不更耗陰分乎乃令空心淡鹽湯吞加味八味丸四五錢以使真陽藏納然陽無陰斂何能久藏火無水制難免浮越隨以重濁大劑壯水之劑繼之以助其封蟄之勢則水火得其所矣下午乃服調補氣血養心清肺和肝之膏滋一丸如是調理兩月精神補長癇症不治而愈

楊乘六治翁姓人病癇症每日至子時必僵仆手足勁硬兩目直視不能出聲其狀若死必至午後方甦甦則言動依然飲食如故別無他病如是者三年罔無虛日偏治不痊楊視其氣色晦滯口眼呆瞪面若失神上下眼胞黑暈舌壯如無皮脈則右關虛大而滑右寸若有散意曰此非癇症乃痰厥也必因驚而得蓋心為君主驚則心包氣散君火受傷致脾土不生中州虧損不能攝水因而生痰夫痰隨氣為升降者也天地之氣升于子而降于午人身亦然當子時一

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

陽生其氣上升痰亦與之俱升逢虛則入迷于包絡之中故不省人事僵仆若死也至午時一陰生其氣下降痰亦隨之同降色絡得以清虛而天君泰然百體從令矣詢之數年前果受驚幾死今因驚致損因損致痰然鎮驚消痰皆無益也惟有補其君火籠其包絡俾其氣不散則痰不能侵擾而為害且君火漸旺則能生土以攝水其痰不消而自消矣養榮湯去遠志倍棗仁五味白芍一劑是晚即不發五日連服十劑皆貼然安卧至曉留方而別

薛立齋診鴻臚王繼之室人素有癇症遇勞役怒氣則發良久自省一日因飲食勞役失宜發而半日方省不能言語或以為風中於臟用祛風化痰順氣之劑及牛黃清心丸病益甚六脈浮大兩寸虛而不及本部且進飲食曰此脾胃之氣傷也若風中於臟禍在反掌彼不信仍用風藥後果卒

劉宏壁治一女年方及笄忽染怪疾醫莫能識邀視牙關緊閉手足抽搐目睛上瞪晝夜兩發非癇而何甦後腹內攪痛欲吐不得冷汗淋漓皆肝木為祟察其邪不在表裡在上下上部有熱下部有寒胸胃互異寒熱交戰投以黃連湯勢漸殺再數劑輒頌更生蓋連以治熱

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

薑以治寒桂枝半夏祛風化痰參棗甘草輔正和中使正氣建立邪氣分散而得心應手矣

琇按癇症多由肝病兼挾痰火方中薑夏以豁痰連桂以平肝甘草緩肝而和脾參棗補脾而壯肺肺盛則木亦自平劉用此獲愈當矣然目之為怪疾而曰上熱下寒迫知其然而未知其所以然者也

笑哭

張子和次子自出妻之後日瘦語如氛中此病在中也常撚第三指失笑此心火也約半載日飲冰雪更服涼劑張曰惡雪則愈矣其母懼其大寒張罵曰吾用藥如鼓之應桴尚惡涼藥宜乎世俗之謗我也至七日日月疑厭水不飲病日解矣

邱汝誠治一女子恒笑不止求診問生平所愛何衣令著之母與對飲故滴酒沾其帬女大怒病遂瘥揮麈新譚

先達李其姓歸德府鹿邑人也世為農家矣卯獲雋于鄉伊父以喜故失聲大笑及春舉進士其笑彌甚歷十年擢諫垣遂成痼疾初猶間發後宵旦不能休大諫甚憂之從容語太醫院某因得所授命家人紿乃

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

父云大諫已歿乃父慟絕幾殞如是者十日病漸瘳
伴為郵語云大諫治以趙大夫絕而復甦李因不悲
而笑症永不作矣蓋醫者意也喜則傷心濟以悲而
乃和技進乎道矣（醫雲樓雜記○見說鈴）

戴原禮治姑蘇朱子明之婦病長號數十聲暫止復如
前人以為厲所憑莫能療戴曰此鬱病也痰閉於上
火鬱于下故長號則氣少舒經云火鬱發之是已遂
用重劑涌之吐痰如膠者數升乃愈（兩浙名賢錄）

吳孚先治宋小泉發熱自汗肢體搖振或時自利嘔噦
間作倏爾喜笑倏爾悲哭語言錯亂六脈沉濇微弱
此陰盛陽虛四君子加炮薑茯苓一劑知二劑已

管先生治一婦妊娠四五箇月臟燥悲傷遇晝則慘戚
淚下數欠象若神靈如有所憑醫與巫皆無益與仲
景大棗湯一投而愈（查舊案即所用方同不必去之○醫學綱目）

孫文垣表嫂孀居二十年矣右癱不能舉動不出戶者
三年今則神情恍惚口亂言常悲泣詰之答曰自亦
不知為何故也兩寸脈短澁以石菖蒲遠志當歸茯
苓人參黃耆白朮附子晚蠶沙陳皮甘草服四帖稍
愈但悲泣如舊夜更泣因思仲景大棗小麥湯正與
此對與兩帖而瘳方用大棗十二枚小麥一合大甘

草炙三寸水煎飲此憂傷肺肺臟寒故多泣也憂傷肺二語本經文第參者术附實温肺藥服之更泣大棗小麥甘草實心脾藥服之而瘳何也喻嘉言謂為肺臟燥而然似較肺臟寒有理（錢仲陽治小兒哭叫又謂金木相擊亦有見解）

馬元儀治吳氏婦兩寸浮數餘脈虛澁時悲哀不能自禁喉間窒塞火升痰喘此怛鬱過多肺金受病也金病則火動痰生火痰相搏氣湊于上故喘促不寧而氣道不利也法當舒通肺鬱則火降痰清而悲哀喘促諸症自已用紫苑乾葛枳殼桔梗半麴橘紅杏仁蘇子一劑而神氣清再劑而悲哀息繼以人參白朮炙甘草補其正氣遠志茯神寧其神志半麴廣皮導其痰涎肉桂黃連以交心腎數劑而神復脈和再以歸脾湯調理全愈

王執中母氏久病忽泣涕不可禁知是心病也灸百會穴而愈執中凡遇憂愁悽愴亦必灸此有此疾者不可不知信也

吳橋治胡有濡母中年親酒而疎穀倏忽心亂恍惚日夜啼泣如不欲生橋始診之曰脈無他但此病非歲月可已假令用藥即積寒涼而他病生但勿藥而聽其自愈顧語不入徧謁諸醫治踰年病益深逆橋復診橋曰脈雖稍損於前然不為害第勿藥而聽其自

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

愈耳毋敬詣每月必逆橋一視之橋持議如初勿藥踰年而愈太函集

不眠

張子和治一富家婦人傷思慮過甚二年不寐無藥可療其夫求張治之張曰兩手脈俱緩此脾受之脾主思故也乃與其夫以怒而激之多取其財飲酒數日不處一法而去其婦大怒汗出是夜困眠如此者八九日不寤自是食進脈平

王思中治周氏患發熱咳嗽以陰虛內傷治之愈劇經月不得眠王診之曰此謂懸飲乃鬱氣所致氣不升降則湯液停積漸成飲囊法當開鬱行氣每劑用荷葉蒂七枚一服而鼾睡數日平復（與水停心下則悸之理同心屬火逼於水則畏而不能安其神也。吳江縣志）

張濂水名康忠嘗治董尚書淳陽不眠用百部一兩半夏一兩即得美睡酬之百金董既睡夢為役夫牽船行赤日中甚疲勞忽見涼樹美蔭甚樂大叫而寤人謂張君二味藥即得百金董公百金乃得役夫一息（按素問秫米湯治不眠半夏秫米用千里長流水煎之識小錄）

孫文垣治潘景宇內人後半夜不睡不眠（肝火浮入包絡）兩太陽及

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

眉棱骨痛肝火上逆支絡面黃肌瘦大便溏稍勞則體熱四肢無力皆肝陽盛而脾陰虛其脈左寸洪滑肝脈上溢自春至秋皆然此由脾虛肝心二經火盛然也當云肝盛脾虛先用四君子加酒連柴胡扁豆澤瀉滑石調理夜與錢仲陽安神丸燈心湯下服八日得睡兩太陽亦不痛黃連之功居多繼用六君子加黃耆秦艽柴胡澤瀉當歸白芍黃柏全安

盧不遠治聞子將母冬月心忽然如散而沈下便不得睡幾三月矣脈之獨左關弱不能應指以為肝虛須補其母當立春始安用熟地為若茯苓棗仁當歸人參防風遠志佐之防風遠志宜酌服二十帖至期愈子將問心散不寐似屬心經何反以肝腎藥效而立春日應曰此得之脈也經曰肝不足則恐恐則氣下故先其令而疾作補水生木待時而元氣復也其沈下若散乃肝氣不得腎養認為心病者誤矣

李士材治張侗初善怒善鬱且酬應煩劇病膈中痛甚夜不成寐醫用菖蒲枳朴木香荳蔻殊不知此症屬虛虛則濁陰不降神氣失守故痛且寤也遂以歸脾湯倍用人參當歸不十劑而胸次快然安寢醫通

張路玉治一少年因恐慮兩月不卧服安神補心藥無

算與以温膽湯倍半夏柴胡一劑頓卧兩晝夜竟爾
霍然
一人遺精煩擾不得卧與六味丸料加棗仁數服而安
寢如常
一人瘡瘍久不收斂而不得卧瘍醫不能療令與大劑
十全大補而安
陸養愚治沈翰撰虹臺年近五旬體肥善酒而厚味常
露卧致病之由秋末冬初忽酒後煩躁不得寐或以安神
神養血不效惟服清火清痰稍應後每易一方間瘥
數日即復如故惟大醉後得吐始熟寐一二時然日

間則倦不能起且飲食無味延至仲夏偶煩躁身痒
深浴是夜睡至天明由是卧必浴即不能長
睡而或一二更安寢若間日浴即不寐至立秋浴亦
不應八月間竟全不睡矣診之六脈沈濇兩寸尤甚
自言平日天氣稍暖即畏熱多汗自病後但煩悶而
不畏熱暑月竟無汗因思内經每有論而無方獨不
寐一條兼有其方何今人不知用及用亦無效也經
言不寐之因則曰衛氣行于陽不得入于陰行于陽
則陽氣盛不得入于陰則陰氣虚故目不瞑又曰陽
明逆不得從其道故不得卧又曰胃不和則卧不安

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

算與以温膽湯倍半夏柴胡一劑頓卧兩晝夜竟爾霍然

一人遺精煩擾不得卧與六味丸料加棗仁數服而安寢如常

一人瘡瘍久不收斂而不得卧瘍醫不能療令與大劑十全大補而安

陸養愚治沈翰撰虹臺年近五旬體肥善酒而厚味常露卧致病之由秋末忽酒後煩躁不得寐或以安神養血不效惟服清火清痰稍應後每易一方間瘥數日即復如故惟大醉後得吐始熟寐一二時然日間則倦不能起且飲食無味延至仲夏偶煩躁身痒以熱湯澡浴是夜睡至天明由是卧必浴即不能長睡而或一二更安寢若間日浴即不寐至立秋浴亦不應八月間竟全不睡矣診之六脈沈濇兩寸尤甚自言平日天氣稍暖即畏熱多汗自病後但煩悶而不畏熱暑月竟無汗因思内經每有論而無方獨不寐一條兼有其方何今人不知用及用亦無效也經言不寐之因則曰衛氣行于陽不得入于陰行于陽則陽氣盛不得入于陰則陰氣虛故目不瞑又曰陽明逆不得從其道故不得卧又曰胃不和則卧不安

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

其言治療之法調其虛實以通其道而去其邪又曰決瀆壅塞經絡大通陰陽和得其方則以千里水揚之萬遍炊以葦薪用秫米半夏煎飲其汁病新發者覆杯則卧汗出則已久者三飲而已今得吐則睡是內之壅塞須決也澡浴則睡是外之經絡須通也因用子和法以獨聖散三日約涌其涎飲盆許是夜身雖困倦然已得睡禁其厚味酒醴惟進稀粥五日後中置沸湯數鍋使熱氣薰蒸中設一桶深湯澡浴之拭乾就寢用麻黃蘇葉乾葛防風威靈仙半夏各一兩照內經煎法熱服厚覆之汗微微而來是夜睡始沈又將息二日再以此法大汗之自此睡卧如常身體輕快精神清爽六脈皆起且流利而病去矣

一人煩躁發熱肌體骨立目不能瞑已三年矣醫與清熱養陰化痰安神之藥及千劑勿效一刻不得安卧診肝脈獨沈而數此怒火久伏木鬱宜達用柴胡四錢白芍二錢丹皮卮子各二錢五分甘草五分桂枝四分藥進熟寐至一晝夜後用逍遥散加人參丸服而愈大還

李季卅庶母因兒痘驚苦頓勞虛煩不得卧心膽虛怯

其言治療之法調其虛實以通其道而去其邪又曰決瀆壅塞經絡大通陰陽和得其方則以千里水揚之萬遍炊以葦薪用秫米半夏煎飲其汁病新發者覆杯則臥汗出則已久者三飲而已今得吐則睡是內之壅塞須決也澡浴則睡是外之經絡須通也因用子和法以獨聖散三日約涌其涎飲盆許是夜身雖困倦然已得睡禁其厚味酒醴惟進稀粥五日後令密室中置沸湯數鍋使熱氣薰蒸中設一桶深湯澡浴之拭乾就寢用麻黃蘇葉乾葛防風威靈仙半夏各一兩照內經煎法熱服厚覆之汗微微而來是夜睡始沈又將息二日再以此法大汗之自此睡臥如常身體輕快精神清爽六脈皆起且流利而病去矣

一人煩躁發熱肌體骨立目不能瞑已三年矣醫與清熱養陰化痰安神之藥及千劑勿效一刻不得安臥診肝脈獨沈而數此怒火久伏木鬱宜達用柴胡四錢白芍二錢丹皮卮子各二錢五分甘草五分桂枝四分藥進熟寐至一晝夜後用逍遙散加人參九服而愈大還

李季蚪庶母因兒痘驚苦頓勞虛煩不得臥心膽虛怯

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

觸事驚悸百藥不效家弟長文偶于友人許聞興化陳丹崖療一女人甚奇其症與母類叩其方乃温膽湯也試之數劑而效半夏七錢竹茹枳實各三錢陳皮四錢半茯苓炙草各二錢二分半分二劑薑棗煎服外加棗仁五錢後因虛極加人參二錢質之仲淳曰此必有痰而善飯者也果然廣筆記

顧太學叔夏内人患陰虛火症徹夜不眠者兩月飲食俱廢形體日削中外疑其必無救矣李為之診視決其必無大害第要多需時日耳用大劑人參棗仁茯神遠志生地當歸五味麥冬因虛甚氣怯佐以琥珀辰砂金銀器之類約百餘劑而瘳後友人詢其故李謂此病雖屬虛幸藏府無損心經雖有火幸不至燥肺多服補陰收斂之劑則水火自然升降所云壯水制陽光正此謂耳至於久病脈調身不發熱豈有他虞哉仝上

錢國賓治陝西俞少川久以開壇店居杭體厚剖健偏嗜炙煿性燥多動肝氣年逾五旬終夜不寐者六年用痰火氣血之藥多矣早晨診候寸關洪浮有力若堅實之筋惟兩尺脈大熟思之以脈論肥人當沈今六脈洪浮有力以症論上身怕熱足反畏冷以藥論

清補俱已盡服難經曰人之安睡神歸心魄歸肺魂
歸肝意歸脾志藏腎五臟各安其位而寢且夜屬陰
主靜日屬陽主動陰陽和平安然寤寐此六年不睡
乃陽亢症也當大泄其陽使陰氣漸復則寐矣用大
承氣湯加大黃二兩泄十餘行其人昏倦睡二日方
醒進以粥食愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷二十八

錢塘魏之琇玉横撰

跌撲

陸養愚治沈華南原有濕熱痰積五旬時因乘馬墜地傷其左脇痛不可忍外科以膏散敷治之而愈然每疾走脇間一點微痛少息半時痛即止矣周甲偶患滯下小腹痛引左脇手不可按裹急後重或與香連檳榔痢止而痛不止發熱便時後重尤劇飲食全不

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

思脈之沉弦有力左關尤甚曰痛者積瘀也治法云瘀血臟腐下焦令人不食則飲食不思者亦瘀也當急下之痛隨病減矣用潤字丸加桃仁泥合丸之紅花湯送下二錢出稠痰碗許而腹脇抽痛更甚此瘀積動而未出故也再投二錢半日許又出稠痰碗許內有黑色如泥者一二塊痛仍不減脈尚沉弦而堅又投三錢半日許出泥色塊幷稠痰數椀而痛頓減腹脇即可按漸思飲食其脈亦和後以達氣養榮湯加人參數劑而安

陸肖愚治甯見源年近古稀偶登舟失足墮水足大股拌氣作痛左脇亦引痛服藥已愈三月矣忽左股內髀樞作痛或謂此乃肝經所絡之地高年肝血不足虛而作痛或謂濕痰流注或謂肝經久鬱或謂崑崙氣逆偏治疼腫日甚憎寒作熱脈之六部洪數而左關尺帶弦因詢其曾有所傷否乃述前墮水之由曰此必瘀血未盡留而成毒也視痛處已有濃在內令延外科教以針破之出膿血數椀服大料參着托理散數十劑而痊

一人因墜馬腰痛不止日輕夜重瘀血諦矣與四物去地加肉桂桃仁泥紅花蘇木四服大便下黑而痊大還

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

湖廣有胡氏子小兒五六歲時因升高為戲墜地拗其頭骨稍長竟不能伸朱守貞者同里也一日相見戲挈其頭有聲戛然置地溘然死矣朱懼而逸胡氏子頃許復甦頭項復直歸家家人驚喜謀尋朱謝之頗說

張子和治張仲温因登露臺高四尺許下臺肭一足外踝腫起熱痛如火一醫欲以鍼針刺腫出血張急止之曰肭已痛矣更加針二痛俱作何以忍也乃與神祐丸八九十丸下二十餘行禁食熱物夜半腫處發痒痛止行步如常張曰吾之此法十治十愈不誑後人

一小兒七八歲膝被肭行行則痛數月矣張曰小病耳以舟車丸通經散温酒調而下之夜半涌泄齊行上床其小兒謂母曰膝臗痒不可任來日使服烏金丸壯其筋骨一月疾愈而走矣

德宗時有朝士墜馬傷足國醫為針腨去針去字有脫悞有氣如煙出朝士困憊將至不救國醫惶懼有道士詣門云我合治得視針處責國醫曰公何容易生死之穴乃在分毫人血脈相通如江河針灸在思其要津公亦好手但誤中孔穴乃令畀床就前于左腨氣滿處下針曰此針下彼針跳出當至檐板言訖遂針入

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

寸餘舊穴之針沸然躍出果至檐板氣出之霎泯然而合疾者當時平愈朝士與國醫拜謝以金帛贈貽道士不受啜茶一甌而去逸史

石城尉戴尭臣試馬損大指血出淋漓用葱新折者搕火煨熱剝皮其間有涕便將罨損處仍多煨續續易熱者或搗爛傅之而痛止翌日洗面不見痕跡又有擊球杖傷指亦用此法宋稚官鮑縣尹皆得此法每有殺傷氣未絕者急令用此活人甚衆本草綱目

龔子才治一男子墜馬腹有瘀血服藥下之遂發熱益汗自汗脈浮濇此重劑過傷氣血所致也投以十全大補湯益甚時或譫語此藥力未及而然以前藥加炮附子五分服之即睡覺來頓安再劑而愈

張三錫云曾見一人因踢門用力遂小腹痛不止湯藥亂投臨死小腹腫青方寤往日受病之因也

張文垣治一人梅瘡後偶遭一跌環跳脫出不能復入科曰疼痛殊甚兩足長短不齊此蓋瘀血流入科曰占滿故竅致骨不得復入也今但消去瘀血以行氣活血之藥主之佐以下行嚮導之劑庶可復元用陳年窖中磚瓦洗淨煅過四兩生地杜牛膝骨碎補丹參赤芍各一兩五錢自然銅三兩蒲黃車前子蘇木

各一兩鹿角二兩元明粉五錢各為末以茅草根一斤紅花四兩煎膏拌麗前藥煉蜜為丸梧子大每空心及食前酒送下八九十丸初足長出二寸餘服藥後只差半寸設再製久服必能全愈惜素畏藥中道而止

李克齋家一鶴飛來馴熟不去以為祥瑞未幾鶴折其脛私心殊不喜因問有能接其脛骨者乎一人對曰家藏接骨秘方想人禽一理或可接也急命脩製之方用土鱉新瓦焙乾半兩錢醋淬七次自然銅乳香沒藥菜瓜子仁各等分為細末每服一分半酒調灌之鶴脛如故但人上體傷食後服之下體傷空心服之李公乃以其方傳于人

續金陵瑣事

兢

當作競 卜極驗遠近患損傷者兢覓之要皆不外土鼈自然銅第製法精耳

四川提督總兵官吳英說昔得秘方治撲打跌損傷極效雖重傷瀕死但一絲未絕灌下立甦往在福建為副將時軍中有二弁相鬥皆重傷其一則死矣吳聞馳往視之惟心頭氣尚微煖亟命以藥灌入覺胸間喀喀有聲不移食張目索食翌日遂能起行自後屢

著神效云其方以十一月采野菊花連枝葉陰乾用
時每野菊花一兩加童便無灰酒各一椀同煎熱服
又一方未退胎毛小雞一隻和骨生搗作餅如泥入
五加皮傅傷處接骨如神居易録
馮楚瞻五十歲由樂城回都適有鄉人伐一大樹時風
沙蔽目騎至樹撲人騎俱為壓倒正在腰脊間脊骨
脫縫疼如腰斬胸骨刺骨扇動腰膚青紫下體冷頭汗如
雨因憶跌撲傷損門中有一絲血入心即死之語以
酒冲童便服之頓覺臍下極冷氣逆上奔乃思急固
陽氣為主以人參一兩炒白朮六錢製附子三錢煎

服日二劑有外科老醫勸用破血行瘀之藥馮曰傷
在上者宜消瘀滯傷在下者宜補氣血此正法也遂
早晚用八味丸之加牛膝杜仲五味者各五錢隨進
參朮附湯各一劑緣右腎連脊受傷腎經祖氣無根
故不能寐併不能言一言一寐即逆氣上奔欲絕憑
仗藥力之猛得以接納藥後必進乾餅以壓之腸中
如火乾餅多進亦易消化八日始便並無點瘀外以
豬油熬化頭髮入十全大補加減煎膏以乳末收之
遍貼傷處七日後氣逆少緩半月後漸可寐言月餘
始能憑几而坐兩月餘始能扶立而脊骨突起半寸

終成痼疾自是精力大衰膝踝筋脈之間時有痠痛
然幸知破格為治得以全生

李南公知長沙縣有鬥者甲強乙弱各有青赤南公召
使自以指捏之乙真甲偽也詰之果服蓋方有櫸柳
以葉塗膚則青赤如敲傷者剝其皮橫置膚上以熨
之則如倍傷者以水洗不落南公曰敲傷者血聚而
硬閱偽者不然故知之（司馬涑水紀聞）

葉南巖剌蒲時有羣鬨者訴于州一人流血被面經重
創腦幾裂命懸旦夕公見之惻然時家有刀創藥公
即起入內自搗藥令舁至幕廳委一謹厚廳子及幕
官曰宜善視之勿令傷風此人死汝輩責也其家人
不令前乃畧加審覈呈狀收其仇家于獄餘皆釋之
友人問其故凡人爭鬧無好氣此人不救死矣則償
命者一人寡人之妻孤人之子者幾人干証連係者
幾人破家者幾人此人愈特一鬬敲罪耳且人情欲
訟勝雖于骨肉亦甘心焉馬無所恡忿懥故也未幾傷者
平復而二家之訟遂息乃瘡藥方端午取韮菜搗汁
和石灰杵熟為餅陰乾用以治諸傷敷創處即止雖
骨破亦合有奇效（韭能行瘀灰能止血。澈石閒談）

韓貽豐攝永寧篆有部民被敲死已逾夕即單騎往驗

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

則遍身傷重僵挺無生氣矣因念死者父母年老貧病惟此子死則二老必不能生不得已因取針針其百會亦冀萬一非謂其必活也時天氣甚寒令邨人各解衣輪熨屍身又熬水令極熱探湯搽屍手足無何屍得人氣體頓柔針至十四針忽喉中作響口鼻微有氣診其脈脈忽動乃喜曰有救矣針至二十一針則喉間大出聲痛哭手足能屈伸口稱遍體痛不可忍則皆其被毆處也乃呼酒來以藥飲之傷處糝之以藥痛處以針針之責令兇首保辜調養如限內死仍抵償後傷者全愈求和息乃杖兇首而遣之

薛立齋治一男墜子馬傷頭幷臂令葱搗爛炒熱罨患處以熱手熨之服末藥降聖丹而愈本草云葱大治傷損

小兒 誤吞諸物

張子和治一小兒約五六歲同隊小兒以蜀黍稭相擊逆芒倒刺於咽中數日不下粥藥腫大發其家告張張命取水以道經咒法以左手屈中指及無名指作三山印坐水盞於其上右手搕印文是金鎗印脚踏字立望太陽或燈火取氣一口次在淨水盞中咒曰

吾取老君東流順老君奉勅攝去毒水五托大帝尊所到稱吾者各各現帝身急急如律令攝七遍次在盞中虛攪卓三次為定其兒嚥水下咽曰我可也三五日腫散乃知法亦有不可侮者

夷堅志云小兒誤吞稻芒著咽喉中不能出者名曰穀賊惟以鵝涎灌之即愈蓋鵝涎化穀相制耳

一兒誤吞一錢在咽中不下諸醫不能取亦不能下戴人熟思之忽得一策以淨白表紙令卷實如箸以刀縱橫亂割其端作鬍鬚之狀又別取一箸縛針鉤於其端令不可脫先下咽中輕提輕抑一探之覺鉤入錢竅然後以紙卷納之咽中與鉤尖相抵覺鉤尖入紙卷之端不礙肌肉提之而出

方雪齋偶在鮑綠飲處談及本草經目中以羊踯躅骨炙炭煮白米粥治誤吞金法極神驗座客有言麵筋灰治誤吞銅錢甚異方默識之歸適鄰家小兒誤吞銅錢哽喉間不能上下危急之際方即以法教之纔下咽錢自口中出其巧值如斯殆有鬼神使之耶因附記之其法以生麵筋置新瓦上炙作炭研末用蘆管吹藥末入喉錢即嗆口而出　又蘇沈良方用炭皮研末調粥治誤吞鐵釘近有試之者亦立效近又傳

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

以生大蒜塞鼻中其錢立出尤簡便第未之試耳

張子和曰昔過株林見一童子誤吞銅鐵之物成疾而羸足不勝身會六七月淫雨不止無薪作食過饑數日一旦隣牛死聞作葵羹粳飯病人乘饑頓食之良久注瀉如傾覺腸中痛遂下所吞之物余因悟內經中肝苦急急食甘以緩之牛肉大棗葵菜皆甘物也故能寬緩腸胃且腸中久空又遇甘滑之物此銅鐵所以下也

近有稚子戲以線墜置口中誤吞之有胡僧啖以餳糖半斤即於穀道中隨穢而下僧云凡誤吞五金者皆可啖也（近舉聞略○僧用餳糖出眼中簡頭甚捷○續醫說○舊案有張景岳治王氏子甫周歲其母以一鐵釘與之玩弄吞入喉間往視之見其母倒提兒足以冀其出口鼻皆血因曉之曰此豈倒懸可出者乎速令抱正遂聞啼聲蓋釘已下咽不在喉矣因閱本草鐵畏朴硝遂得一法用慈石一錢朴硝二錢竝研為末令以熬熟豬油加末和調藥末與服下午吞之至三鼓時解下一物瑩如蓴菜潤滑無稜蘁護其外撥視之則釘在其中矣乃京中釘鞋所用蘑菇釘也立方之意以硝非慈石則不能使藥附釘慈石非硝則不能逐釘速出

非油則無以潤非蜜則未必肯吞合是四者則著者
著逐者逐潤者潤同功合力裹護而出矣
按物理小識亦載小兒誤吞鐵針以乳香茄枝朴
硝為末以犬豕脂入鹽和之吞下自愈若碎鐵則
用皂莢硇砂雷敩曰鐵遇神砂如泥似粉神砂應
即硇砂也又小說一銀工于鐵砧上杵皁莢其砧
立碎則鐵畏皁莢可知矣
一吏部無子妻極妒妾方坐蓐乃盥腸生妻暗將針刺
於上妾後覺腸有時刺痛難忍穩婆私告于妾妾與
吏部言之諸醫束手一全真曰我能治之用磁石大
塊從痛處引之引之於臍針從臍出妾竟無恙黃蠟

南公談續金陵瑣事
劉浴德號壺隱知醫洞庭葉雅南之細君五七日前偶
因事不順意欲自斃遂吞布針十餘根因請箕仙
降筆云吾乃碧雲仙使始問曾吞針否又曰果則果
矣事則無事仙方不書凡方可治復問明書凡方良
久乃書問壺隱子因造劉問方劉教以櫟炭末三錢
用井水調服可下如未下可再服之乃曰愚意欲餌
磁石未審何如對曰臣臣臣猶言不可不可也宜取磁石一
大塊置肛門外或庶幾焉如法治之針果出續金陵瑣事

百一選方以淨器盛新汲水一盞捧之面東默念云謹請太上東流順水急急如南方大帝律令勅一氣念七遍即吹一口氣入水中如此七吹以水飲患人立下或用此咒水可以食針併竹針（刺較子和案中咒頗簡易）諸骨哽喉用清水一椀以手指向水面虛寫天上金雞叫地下草雞啼兩雞併一鷄九龍下海喉嚨化如滄海二十五字口誦七七遍飲之立愈　又一法以清水一椀用手指向水面虛寫鳥飛龍下魚化丹邱八字飲之立效（竝酉陽雜俎）

劉涇隣人馬湘生兒數月偶遺金網巾圈子案上兒誤吞之哀泣不已湘求救於醫醫遣出湘伺於門坐立不定或詢其子何疾驚惶如是湘以前事告或教以急買韭數莖熟而不斷與蠶豆同嚥之不過二次從大便出矣此法方書所不載故表之（北墚紀言○數月兒如何能啖韭豆）

李奎治一人誤吞指爪喉哽幾殆奎令剪人指爪煅服之立愈疑其古方奎曰不然此內經所謂哀之以屬者也聞者歎服（寧波府志）

張子克治當塗郭祥正子患咳嗽肌骨如削醫多以為勞張曰是不足憂就坐飲以藥忽大吐使視涎沫中

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

當有物也視之得魚骨宿疾皆愈新安志

一富家子被雞骨哽百方莫治家人驚惶忽一叟至自云我有巧術但行手法取之不勞藥餌也許以千緡厚謝叟乃以絲棉裹白糖如梅大令其嚥下入喉間留一半於外時時以手牽掣俾喉中作痒忽然痰涎涌出其骨黏於棉上遂如約酬之續醫說

孫文垣治查良本內人怒後偶食魚頭骨哽於喉中即以饅頭梭肉等壓之骨雖下隨覺胸膈不快又服銷骨藥二帖已七日矣胸膈脹痛殊甚飲食悉從背下惡寒發熱脈之兩手弦數蓋骨哽之後用硬物壓之傷其胃脘必有瘀血停蓄膈間將食管逼向後故飲食覺從背下也但消去瘀血使食管復原胸膈之痛可瘳矣以五靈脂為君山查元胡索桃仁枳殼為臣赤芍丹皮香附山甲為佐柴胡石菖蒲為使臨服入韭汁一酒杯服後胸膈寬快大便瀉一次痛減大半飲食乃從右下右邊胸喉畧痛吞物甚艱吐出痰皆血腥氣改以山甲赤芍歸尾桃仁劉寄奴五靈脂丹皮穿山甲入韭汁服之二帖全瘳

張景岳曰凡諸物哽於喉中或刺或骨必有鋒芒之逆所以棘而不下凡下而逆者反而上之則順矣故治

此者當借飲食之勢湧而吐之使之上出則如拔刺之捷也若芒刺既深必欲推下非唯理勢不能必且遲延或食飲既消無可推送以致漸腫為害非細矣又曰凡諸骨哽或以餳糖一大塊滿口吞而嚥之或用韭菜煮略熟勿切吞下一束即裹而下亦妙

高坡纂異載洪洞韓肅即忠定公之父也三歲時誤吞一釘家人皆驚哭待盡其祖以神醫名視之曰無恙必待三年釘乃得出人莫之信遂定時日書壁間以俟但每作腹痛必絕而復甦久漸黃瘦骨立及期謂家人曰兒將瘳勢必大作雖絕勿懼宜先煮粥飲以

俟之既而腹果大痛一叫而絕良久吐出釘銳盡刓又復絕逾時始甦歲餘獲安壽七十一卒

金陵秣陵鄉中一人姓李號守泉符水絕妙遠近求無不立效其法命哽者坐自己佛堂中佛前放一盂淨水令親屬往求燒符用法訖徐以小箕卜之云已愈矣其人歸看淨水中所哽之物在內隨愈乃親見者

治法彙

景德鎮湖田市張婆女名婆兒因喫糍糕被噎而死氣尚未絕須明日方斂守屍悲哭忽聞擊戶聲問為誰曰我是河裡住人陳曹二也張曰何故夜深相過曰

知道婆兒不幸但扶策起坐將莒蒂拍打背三下極便落腹可活矣張啟門稱謝了無所見試用其法不食頃女腹如雷鳴即時安好迨曉尋訪陳曾二蓋七年前溺河而死者鬼未受生猶懷惻隱存心如是張乃命僧為薦拔之夷堅志

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷二十九

錢塘魏之琇玉橫撰

蠱

有人行毒以病人若欲知其姓名者以敗鼓皮燒作末
欲服方寸匕須臾自呼蠱家姓名可語之令呼喚將
去則愈治之亦有方（醫學綱目）
千寶外姊夫蔣士先得疾下血言中蠱家人密以蓑荷
置其席下士先忽大笑曰蠱我者張小也乃收小小

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

走奸令解之士先獲瘳世以此物為治蠱之良方蘘穰蘘荷草名本草所收也。通志畧出閩牆。自此解蠱毒藥多用之周禮蔆氏以嘉草除蠱毒宗懔謂嘉草即蘘荷是也搜神記

梅師方云凡中蠱毒或下血如鵝肝或吐血或心腹切痛如有物咬不即治之食人五臟即死欲知是蠱但令病人吐水沈者是浮者非也用敗鼓皮燒灰服方寸匕須臾自呼蠱主姓名本草綱目

夷方有蠱毒之害須袖中嘗帶當歸遇飲食訖即咀嚼少許若有毒則即時嘔吐無不安然矣漱石閒譚

生甘草五錢煎汁半温飲之入咽即吐初中蠱毒入腹未久其蟲未生得吐即出矣如恐未盡再煎五錢服之加蘇油半盞更妙

食不斀醋蠱不入肚又肘後方云馬兜鈴藤能逐蠱從小便出用至十兩水一斗酒二升煮三升分三服不瘥更服土人呼為三百兩銀藥

大蜘蛛一箇研爛生蜂蜜半杯和服蠱畏蜘蛛故用蜘蛛治蠱而蜘蛛有毒又用蜂蜜製之此方獨治金蠶蠱

蠱毒在上則服升麻吐之在腹則服鬱金下之或合升麻鬱金服之不吐即下李侍郎肅初為雷郡推官鞫

獄得此方 范石湖集。卅卷外集多活人甚多句

新州郡境有藥人呼為吉財解諸毒及蠱神用無比昔人有嘗至雷州途中遇毒而貌頗異自謂即斃得吉財數寸飲之一吐而愈俗云昔有遇毒者其奴吉財得是藥因以奴名名之實草根也類芍藥凡人遇毒夜中潛取二三寸或剉或磨少加甘草詰旦煎飲之得吐即愈俗傳將服是藥不欲顯言故云潛取或云昔有里嫗病蠱其子為小胥邑宰命以吉財飲之暮乃具藥及旦其母謂曰吾夢人告我若飲是即死亟去之即仆于地其子又告縣尹縣尹固令飲之果愈

豈中蠱者亦有神若二豎哉 投荒雜錄

吉利草類石斛根類芍藥吳黃武中孛侯以罪徙合浦入境遇蠱其奴吉利取此草解之遂以為名 即前之吉財也

常撫軍安已酉歲秉鉞西臬讞案有為蠱斃命者獄已定因檢卷閱之緣養蠱婦女覘富室貿易遠歸知其必攜財物倩鄰媼詣其家初作問候狀後乘機藏蠱于指彈之立斃事主疑而執之送諸官究得其實掬供婦女初嫁時已隨附十九蠱嫁後與伊夫又害六人復增至二十五蠱矣其所害六人旋察出確証者三抉土得屍骸二其一即犯事之家予怪之而未信

次日提婦女復親鞫之歷歷不諱因令呈所養蠱蟲
視之初出一竹筒空然無所有女稟法堂聽政之所
邪祟不敢入必咒祭司户而後可如之則果現乃蠕
蠕赤蟲耳遂令以足踐踏之如泥水吏曰却未滅令
婦女呼之蟲仍在筒中依然如前數於是訪所以絕
之之法用石函入蠱蟲封以印紙投於江蟲乃滅蓋
蠱之為害甚毒有謂刺蝟能捕蠱蟲使無遺匿殊不
知蠱之為類不一其最毒者雖刀斷石碎火焚土埋
而蠱依然不滅多依附婦女中人立死死後財物為
蠱搬運以利養蠱者每害一人則增一蠱或云其人

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

被害魄即附而為蠱
陳自明云兩廣山谷間有草曰胡蔓又曰斷腸亦有感
蛇毒致生惡菌名為定年藥有淫婦與北人交好者
別時因以藥置飲食中仍戒之曰子必某時來若依
期而至彼復以藥解之若過期不往必死故謂之定
年藥如服神仙追毒丸一粒其病即瘥五倍子三兩
山茨菰二兩麝香三錢千金子去油一兩紅牙大戟
一兩半各為末用糯米煮濃飲為丸分為四十粒每
服一粒用井花水或薄荷湯磨服利一二次用粥止
之此丸能解一切毒一名太乙丹紫金丹一名神仙

太乙丹一名玉樞丹一名神仙解毒萬病丹宜于端午重陽七夕合之須潔淨之所尤忌一切沖犯

諸蟲

賈誼新書云楚惠王食寒葅得蛭恐監食當死遂吞之腹有疾而不能食令尹曰天道無親唯德是輔王有仁德病不為傷王病果愈王克論衡云蛭乃食血之蟲楚王殆有積血之病故食蛭而病愈也陶弘景曰楚王食寒葅見蛭吞之果能去結積雖曰陰祐亦是物性兼然本草綱目

京感 徐仪

一醫人吳元禎治一婦人從夫南中還曾誤食一蟲常疑之由是致疾頻治不減請吳醫之吳揣知所患乃擇主人姨妳中謹密一人預戒之曰今以藥探吐以盆盂藏之當吐時但言有一小蝦蟇走去然切不可令病人知之是誑紿也妳僕如約此疾頓除

北夢瑣言

元載不飲酒人強之辭以鼻聞酒氣即醉人謂可治取針挑載鼻尖出一小青蟲曰此酒魔也聞酒即畏之去此無患是日載飲一斗五日倍之

清賞錄

孫兆治向大王宮中有一宮人七太尉所寵也忽患一

太乙丹一名玉樞丹一名神仙解毒萬病丹宜于端午
重陽七夕合之須潔淨之所尤忌一切沖犯

諸蟲

賈誼新書云楚惠王食寒葅得蛭恐監食當死遂吞之
腹有疾而不能食令尹曰天道無親唯德是輔王有
仁德病不為傷王病果愈王克論衡云蛭乃食血之
蟲楚王殆有積血之病故食蛭而病愈也陶弘景曰
楚王食寒葅見蛭吞之果能去結積雖曰陰祐亦是
物性兼然本草綱目

唐時京盛醫人吳元禎治一婦人從夫南中還曾誤食
一蟲常疑之由是致疾頻治不減請吳醫之吳揣知
所患乃擇主人姨妳中謹密一人預戒之曰今以藥
探吐以盆盂藏之當吐時但言有一小蝦蟇走去然
切不可令病人知之是誑紿也妳僕如約此疾頓除
北夢瑣言

元載不飲酒人強之辭以鼻聞酒氣即醉人謂可治取
針挑載鼻尖出一小青蟲曰此酒魔也聞酒即畏之
去此無患是日載飲一斗五日倍之清賞錄
孫兆治向大王宮中有一宮人七太尉所寵也忽患一

疾凡惡心則吐蟲數條後乃頻作七太尉甚愍之累
治不瘥每用殺蟲藥則吐蟲愈多召孫診之孫曰六
脈皆細非蟲脈也今雖吐蟲乃臟寒而蟲不安失居
上膈因而吐出復用殺蟲藥蟲為藥所苦不能自安
所以吐蟲愈多也孫遂用藥不三五服皆一邑丸子
蟲遂不吐明日再召孫至六脈漸大進前藥其病不
作後求方乃硫黃附子各一兩丞末糯米糊為丸每
三十丸米飲下 綱目
寶材治一婦人病腹脹諸藥不效令解腹示之其皮黃
色光如鏡面乃蟯瘕也先灸牛肉一斤令食後用生
麻油調輕粉五分服之取下蟯蟲一合如線如鬚狀
後服安蟲散而愈
張子和曰汴梁諸匠氏有木匠趙作頭鐵匠杜作頭行
次失路迷至大宅乞宿主人不納曰家中有人重病
不敢納君杜作頭紿曰此趙公乃汴梁大醫之家今
蒙工司見召迷路至此蓋病者當愈而遇此公也主
人默而入良久復出將邀二人入室與之食已主人
起請曰煩太醫看病何如趙見而笑曰一藥可愈二
人竊議曰來時所攜熟藥寄他車上此中實無奈何
杜曰此甚易耳潛出門得牛糞一塊作三十粒下以

温水少頃病人竟胸中如蟲行一涌而出狀若小蜣
蜋一二升以手探之又約一升頓覺病去明日主人
出謝曰百歲老人未嘗見此神效之藥也禮餞二人
遂歸嗚呼此二子小人也欲苟一時之宿遂以穢物
治人亦偶得吐法耳
酒官楊仲臣病心氣痛此人常好飲酒初飲三二杯必
奔走跛懶兩足三五十次其酒稍散方能復席飲至
前量一醉必五七次至明嘔青黃水數日後變魚腥
臭六七日始安張曰宜涌乃吐蟲一條赤黃色長六
七寸口目鼻皆全兩目瞑瞞狀如蛇類以鹽淹乾示
人
余昔過夏邑西有婦人病脹如鼓飲食乍進乍退寒熱
更作而時嘔吐且三年矣師巫覡符咒無所不至惟
俟一死會十月農隙田夫聚獵一犬役死磔於大樹
根盤遺腥在其上病婦偶至樹根頓覺昏憒眩瞀不
知人枕於根側口中蟲出其狀如蛇口眼皆具以舌
舐其遺腥其人驚見長蟲兩袖裹其手按蟲頭極力
出之且二尺許重幾斤剖而視之以示諸人其婦遂
愈蟲亦無名此正與華元化治法同蓋偶得吐法耳
周漢卿治武城人病胃痛奮擲乞死漢卿納藥于鼻俄

噴赤蟲寸許口眼悉具痛旋止明史

鍾大延治一僧嗜鹽每食斤許衆醫雖知為蟲然服藥輒痛悶欲絕大延曰是蟲不受藥也當有以餌之以鹽笥乾用藥煮仍加以鹽令服越數日果嘔蟲數升許而愈寧波府志

李明甫東陽人善醫尤妙針法義烏令病心痛垂死明甫視之曰有蟲在肺下藥所不及惟砭乃可然非易也謬謂於背上點穴密取水以噀之令方驚而針已入曰蟲已死矣既而腹大痛下黑水數升蟲亦去遂愈兩浙名賢録

尹蓬頭者傳稱騎鐵鸛仙去蓋異人也一貴人閨女弱病形容俱變醫人束手無藥可愈母鍾愛不能捨偶邀視之曰有癆蟲尚可醫請用何藥曰藥力不能治只消與我同宿一夜便好也母信其仙術決無戲言白之於父父大怒云胡說豈有公侯家女與一風道士同宿之理後見女殊無生意母又哭泣言之懇切不已從之尹令紙糊一小室不許留孔設一榻不用障令女去其袒衣用手摩足心極熱如火抵女陰戶東西而睡戒女云哽中有蟲出可急叫我女不能合眼而尹鼻息如雷天將明女報蟲從口中飛出尹四

顧覓之不見曰從何處鑽去不能除根定要害一人
也蓋乳母不放心因開一孔窺之蟲出女口已入乳
母之腹也天明父母視之女之顏色已變尹大笑而
去後數月女方擇壻而乳母死矣（續金陵瑣事）

馮益齋給諫每發言腹中輒有聲應之此應聲蟲病也
遂告病卜居南京楊守極用小藍煎飲之即吐出其
蟲（續金陵瑣事）

郭茂倩嫂金華君產七日不食始言頭痛頭痛已又心
痛作既而目睛痛如割如剌更作更止相去無瞬息
間每頭痛甚欲取大石壓良久漸定心痛作則以十
指抓壁血流滿掌痛定目復痛又以兩手自挖取之
如是十日不已衆醫無計進黑龍丹半粒疾少間中
夜再服下瞑目寢如平昔至平旦下一行約三升許
如蝗蟲子三疾減半已刻又行如前則頓愈矣（疑綱是
孫文垣治一婦人心痛唇紅痛則大發熱頭疼少頃出
汗脈大小不一（蟲脈）曰此蟲痛之症痛吐白沫可徵也
分石菖蒲一錢烏梅七箇炙炮薑草豆仁陳皮各五
分山卮一錢一帖痛減半再服痛全愈

閩蜜樓乃政體肥性躁患痛風手不能櫛沐足不能步

履痛處畧腫呻吟喊叫此風木也凡治七越月不減孫診之曰濕痰凝滯經絡作痛也猜錯也醫作血虛投以補劑宜其不愈乃用二陳湯加烏藥葉蒼朮僵蠶海桐皮南星服至六帖遂不宵藥強之曰醫以療痛今反加痛吾何藥焉時已申刻知其驕蹇性成亦不再強改以芫花醋炒過三分海金沙一錢為末白湯調下仿吏隱丸意至晚瀉一次下稠痰半盆足痛減大半稍能動止初更後忽腹中大痛促進診行至後堂家人出曰病者卒矣曰此必痛厥非竟死也臨症者不可不知且視之至則泠汗淋漓兀坐溺器面青息斷診之手冷如冰六脈俱在但沈伏耳知為痛極使然用薑湯灌之乃甦徐語侍女適來腹中痛甚火氣迸出肛門如焚大响一聲不知瀉下何物視之乃血鰍一條長六寸闊半寸餘鱗目悉具尚能遊動衆問如何曰此尤物也得下幸耳但下劑實為行痰初不知其有蟲如是蓋芫花乃殺蟲之品故偶中亦病人之福也次日手足皆能動仍以二陳湯加苡仁紅花五加皮四帖脫然痛痺門有宋青龍中顏奮女痺亦有長蟲熏出宜在一處

葉潤齋年近四十心膈嘈雜好啖肉尤好雞一日不可缺缺即身浮力倦神魂無錯必急得乃已與陸肖愚治陳曙先

案同大噤入腹腹又大痛痛極則吐酸水稠涎然後稍定少頃又思啖矣其痛苦之態喊叫之聲聞見酸鼻而彼則甘心焉或勸其勿啖肉謂久病脾虛肉入難化故作楚也曰吾豈不知蓋痛雖苦尚能嗷若嘈囃則遍身淫淫蘇蘇左無可奈何手足無所把捉頃刻不能自存有逾于死也孫診之六脈大小不等觀其色唇紅面黃曰據色脈乃蟲病也先與雄黃丸一服攻以臘粉五分史君子末一錢用鷄子打餅五更空心飼之錄方可長刻下長蟯十條內有二大者長尺有咫自首貫尾皆紅下午又下小蟲百餘自此不嗜肉而嘈囃良愈

龔子才治一婦年四旬心胃刺痛時痛時止蟲痛不思飲食食即吐手足厥冷胸中痞悶口乾作渴曰此胃中有蟲也以二陳湯加檳榔枳實烏梅花椒黑薑苦楝根皮生薑煎一服下蟲一大椀而愈

孫一奎在吳下時有吳生諱震者博雅士也一日偶談乃鼓脹吳乃詰予曰鼓有蟲否乎余卒不敢應俛思久之對曰或有之本事方云臍腹四肢悉腫者為水只腹脹而四肢不腫者為蠱注曰蠱即鼓脹也由是參之古人曾以鼓蠱同名矣且蠱以三虫為首豈無

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

旨哉蓋鼓脹即今云氣虛中滿是也以其外堅中空有似於鼓故以名之彼盡症者中實有物積聚既久理或有之吳曰子誠敏也予堂嫂病鼓三載腹大如箕時或脹痛四肢瘦削三吳名劑歷嘗不瘳吳俗死者多用火葵燒至腹忽響聲如炮人皆駭然乃見蟲從腹中爆出高二三大許燒所之天為昏俄而墜地細視之皆蚘也不下千萬數大者長尺餘蟲腹中復生小蟲多者十五六條蟲在人腹中蕃息如此曷不令人脹而死哉惜諸書未有言及者予後至淮陰有王鄉官者其子年十六新娶後腹脹大按之有塊形

稍 疑誤或作削 攻熱晝夜不退已年半矣醫惟以發熱消脹之劑投之其脹愈甚(脹病因蟲者極多)瘡診其脈滑數望其唇(張生不讀書耳)喉中兩耳俱腹痛而唇紅好吠者皆屬蟲 因思凡腹痛者唇色必淡不嗜飲食今其若此得非蟲乎遂與阿魏積氣丸服之下蟲數十大者數條小者亦三四條蟲下則熱漸減脹漸消三下而愈益信前聞之不虛也(景岳全書)

李士材治侯給諫腹中嘈痛按其左脇手不可近凡飲食到口喉間若有一物接之者然曰脈大而數腹痛嘔涎面色痿黃此虛而有濕濕熱相蒸蟲乃生焉當

旨哉蓋鼓脹即今云氣虛中滿是也以其外堅中空有似於鼓故以名之彼蠱症者中實有物積聚既久理或有之吳曰子誠敏也予堂嫂病鼓三載腹大如箕時或脹痛四肢瘦削三吳名劑歷嘗不瘳吳俗死者多用火葵燒至腹忽響聲如炮人皆駭然乃見蟲從腹中爆出高二三大許燒所之天為昏俄而墜地細視之皆蚘也不下千萬數大者長尺餘蟲腹中復生小蟲多者十五六條蟲在人腹中蕃息如此曷不令人脹而死哉惜諸書未有言及者予後至淮陰有王鄉官者其子年十六新娶後腹脹大按之有塊形如稍瓜發熱晝夜不退已年半矣醫惟以發熱消脹之劑投之其脹愈甚愈不退矣予診其脈滑數望其唇色紅好腹痛而唇紅好啖者皆屬蟲病因蟲者極多脹生不讀書耳喉中兩耳俱痛脹甚張生不讀書耳因思凡腹痛者唇色必淡不嗜飲食今其若此得非蟲乎遂與阿魏積氣丸服之下蟲數十大者數條小者亦三四條蟲下則熱漸減脹漸消三下而愈益信前聞之不虛也景岳全書

李士材治侯給諫腹中嘈痛按其左脇手不可近凡飲食到口喉間若有一物接之者然曰脈大而數腹痛嘔涎面色痿黃此虛而有濕濕熱相蒸蟲乃生焉當

煎人參湯送檳黃丸以下蟲積蟲若不出雖服補湯竟何益乎病家畏謹之甚不敢輕投終莫能起（何氏改用平吾殺蟲之劑）

張遠公三年久嗽服藥無功委命待盡姑乞診之問曰飢時胸中痛否曰大痛視其上唇白點如粳者十餘處此蟲嚼其肺也用百部膏一味加烏梅楲柳與服不十日而痛若失咳頓止令其家人從淨桶中覓之寸有白蟲四十餘條自此永不復發（立齋案云上唇白點蟲蝕上齦下唇白點蟲蝕下部）

王海藏云有楊時者因患風氣衝心飲食吐逆遍身枯瘦日服萬病紫菀丸至二十日瀉出肉塊（桂蝦蟇五六枚白膿二升愈又趙侍郎先食後吐目無所見耳無所聞亦無萬病紫菀丸瀉出青蛇五七條下惡膿三升方愈紫菀丸即厚朴丸加羌活獨活防風是也厚朴丸厚朴朴蜀椒川烏頭紫菀吳茱萸菖蒲栄胡桔梗茯苓官桂皁角乾薑人參黃連巴豆霜

益昌伶人劉清嘯一媚（媚）名曰花翠年逾笄病好食生米否則終日不樂至憔悴萎黃不思飲食惠民局監趙尹用蒼朮米泔水浸一夜剉焙為末蒸餅丸梧子大每服五十丸食前米飲下日三服兩旬而愈蓋生米

留滯腸胃受濕則穀不磨至生蟲蒼朮能去濕溫胃
消穀也（楊氏家藏經驗方。本草綱目）

戴元禮奉太祖命往治燕王患瘕見他醫所用藥良是
念何以不效乃問王何嗜曰嗜生芹元禮曰得之矣
投一劑夜暴下皆細蝗也（明史）

葛可久治一人患腹疼脈之謂其家曰腹有肉龜視熟
寐吾針之勿令患者知知則龜藏矣患者問故家人
誑曰醫云寒氣凝結多飲醑酒自散矣患者喜引暢
劇飲沈酣而臥家人亟報葛以針刺其患處病者驚
寤俾以藥餌須臾有物下儼如龜形厥首有穴蓋針
所中也病遂愈（黃白升窗類記）

杭州府通判王某河間人病腹脹服藥不效夢人語云
鬼蒺藜可治王尋取煎液飲之痛不可忍俄頃洞泄
迸出一蟲長大餘尋愈（覽餘漫抄）

山野人有嚙虱在腹生長為虱癥用敗梳敗篦各一枚
各破作兩分以一分燒研以一分用水五升煮取一
升調服即下出

張路玉曰近有女子欲逆腹痛後忽喜呼叫初是呀呷
連聲漸至咿唔不已變易不常或如母雞聲或如水
蛙鳴或如舟人打號每作數十聲日發十數次忽之（餘）

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

則胸中悶悶不安此為叶蟲即應聲蟲之類也復有一人忽發熱瘡滿後常兀兀欲吐吐中必有蟲數枚狀如蝦形跳躍不已諸治不應或令服銅綠涌之不過二三度遂絕不復見矣

黃履素曰人陰毛中生蟲名八角子貼伏毛根最癢惱人相傳此蟲不醫延及頭髮眉毛其人當死治法以生銀杏搗爛敷合毛上隔宿其蟲盡死余少年曾患此法神效有友為予言生此蟲者運會將否之兆余患此之後抱病十餘年備嘗苦楚其言果驗

蟲之類能入耳者不獨蚰蜒凡蟲皆然有人患腦痛為蟲所食或教桃葉作枕一夕蟲自鼻出形如麥嘴人識其名（脛齋閒覽）

有人患脚瘡冬月頓然無事夏月臭爛痛不可言遇一道人云爾因行草上惹蛇交遺瀝瘡中有蛇兜冬伏夏出故也以生蝦蟇搗傅之日三換凡三日一小蛇自瘡中出以鐵鉗取之其病遂愈（撫青雜說醫說）

至順辛未上埰一婦人就山林中采筍歸覺手粘如飴一時不暇洗盥既剝筍殼又以齒嚙之由是成癥產蛇而死蓋受蛇遺之毒也（靜齋至正直記。孔行素）

小校舉聯元偃師人得奇疾左股痛不可忍呻吟累月

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

則胸中悶悶不安此為叫蟲即應聲蟲之類也復有一人忽發熱瘡滿後常不死欲吐吐中必有蟲數枚狀如蝦形跳躍不已諸治不應或令服銅綠涌之不過二三度遂絕不復見矣

黃履素曰人陰毛中生蟲名八角子貼伏毛根最癢惱人相傳此蟲不醫延及頭髮眉毛其人當死治法以生銀杏搗爛敷合毛上隔宿其蟲盡死余少年曾患此法神效有友為予言生此蟲者運會將否之兆余患此之後抱病十餘年備嘗苦楚其言果驗

蟲之類能入耳者不獨蚰蜒凡蟲皆然有人患腦痛為蟲所食或教桃葉作枕一夕蟲自鼻出形如麹嘴人莫能識其名（脛齋閒覽）

有人患腳瘡冬月頓然無事夏月臭爛痛不可言遇一道人云爾因行草上惹蛇交遺瀝瘡中有蛇兒冬伏夏出故也以生蝦蟇搗傅之日三換凡三日一小蛇自瘡中出以鐵鉗取之其病遂愈（撫青雜說、醫說）

至順辛未上巳一婦人就山林中采筍歸覺手粘如飴一時不暇洗盥既剝筍殼又以齒嚙之由是成癩產蛇而死蓋受蛇遺之毒也（靜齋至正直記。孔行素）

小校畢聯元偃師人得奇疾左股痛不可忍呻吟累月

有僧詣門丐食問其所苦曰此肉鰻也早治可活今病深矣因刺其膝出小蛇十餘條僧持之去逾數日蛇復涌出竟死爲宜與顏奮女及孫文垣治閔氏婦同一所。三則識畧

陸肖愚治陳曙光患飢必食肉方解否則遍腹淫走身體如在空中每食肉初一臠必滿心如箭鑽作痛至數臠方定少則頻飢多則不能剋化而作瀉醫治半年肌削骨立脈之六部皆弱而浮沈大小遲數不等面黃而帶青紋曰此患蟲耳可立挺之令購史君子肉半斤精豬肉半斤同煮候肉極爛去史君子入賦粉一錢令連汁頓食之初食亦如箭攢食後半日不飢至五更下盆許皆蟲者有全者有半爛者問有活動者宿疾頓除乃以參苓白朮等調理禁其一年勿食肉遂全安

浦南一人少時每向谿邊食蚌三旬外患腸痛痛時幾不欲生發必三四日偶一僧過其門聞其叫號出藥七丸大如菜子用白湯送下少頃下蟲二三十作紅白色其形如蚌旋愈後二年死。雲間穉志無名氏

薛立齋治一男子患腹痛熱則痛甚諸藥不應半年後腹加腫脹面色痿黃診其脉不洪滑非癰也詢之云始于渴甚俯飲澗水意其誤吞水蛭而然令取河泥

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

為丸空心用水送下百丸果下水蛭而愈又一子因
跌溝中腹作痛服積聚等藥不應亦依前症療之而
愈
一婦人于壁上取雞餌卷耳遣蜈蚣生子在餌上帶入
耳中生小蜈蚣穿腦內且痛且痒百藥莫效夢神人
傳一方令炒雞肉熱置一器內留一小孔蓋上令病
者以耳受之雞氣熏入蜈蚣悉鑽雞肉上其病立愈
三齋父及百戶在耳門并逐蟲入耳宜抄一處○廣筆記
錢國賓治周氏子業儒年二十脚掌常腫生黃泡數十
水出即愈及昏厥之症不時常發偶家宴忽然仆地
延診按諸經脈動獨腎濡數或亂或靜因思濡主濕
也數主熱也亂主蟲動也靜主蟲伏也脚掌生瘡屬
腎也是腎經濕熱生蟲蟲氣上攻昏厥以雄黃丸巴
霜鬱金各五分大黃煉蜜為丸菜豆大雄黃為衣薑
湯送十五丸以薑湯再催蟲化如膠黑汁解於露地
數堆後用冷米湯補之恐防再舉又食柹子一二升
遂不復發
濟寧店主女年十八勞病三載體瘦神昏疾日重矣視
其形神憔悴眼露光芒六脈襍亂細問起居女曰腹
中常隱隱痛喜食糖菓及看面生白點方知是蟲也

非勞也與雄黃丸十九粒檳榔湯下至午不動又催五丸腹中大响下蟲百餘形如土鼈上有魚鱗下有黑嘴四足能動此女昏暈半日方醒飲以薄粥用人參當歸檳榔蘇赤茯苓各一錢丁香五箇烏梅一箇數服除蟲之根又與調理方而別錢案

苔中唐國學子年十八骨立修長而乏肌肉面白筋青小腹近脇微痛已經多醫莫知其症脈乍長乍短蟲之候也筋青暴露肝之病也小腹近脇微痛肝之地也遂知肝內濕熱生蟲薄蝕久矣而以煅存性肥皁子一兩麄奮一錢共末每日糖湯調下一錢餌蟲受

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

厚

疑誤

地日日一堆蟲化膠厚者二十五日蟲盡服參蓍歸朮收功兩月身體大壯同上

指

疑誤

軼指婦年二十餘骨蒸潮熱乾咳口乾百治不效遇一方士曰肺中有蟲今當盛夏正可引出即用童子雞一隻去毛穤煮熟貯漆盤中以盤蓋半開半閉俟病睡著以半開處置病人鼻邊覺來即將盤蓋蓋緊侵晨用水一大桶置盤水底揭開視其雞上小蟲有翅無翅者二三百即傾在長流水中第二夜用雞引之又去蟲七八十蟲盡而病愈至今無恙予意雞喜食蟲故蟲亦喜食雞正如蜈蚣與雞相仇

非勞也與雄黃丸十九粒梹榔湯下至午不動又催
五丸腹中大响下蟲百餘形如土鼈上有魚麟下有
黑嘴四足能動此女昏暈半日方醒飲以薄粥用人
參當歸檳榔蘇赤茯苓各一錢丁香五箇烏梅一
箇數服除蟲之根又與調理方而別錢案
苔中唐國學子年十八骨立修長而乏肌肉面白筋青
小腹近脇微痛已經多醫莫知其症脈乍長乍短蟲
之候也筋青暴露肝之病也小腹近脇微痛肝之地
也遂知肝內濕熱生蟲薄蝕久矣而以煅存性肥皂
子一兩蘆薈一錢共末每日糖湯調下一錢餌蟲受
藥便于露地日日一堆蟲化膠厚青苔二十五日蟲
盡服參著歸朮收功兩月身體大壯同上
蔣仲芳曰姚軼指婦年二十餘骨蒸潮熱乾咳口乾百
治不效遇一方士曰肺中有蟲今當盛夏正可引出
即用童子雞一隻去毛穤煮熟貯漆盤中以盤蓋半
開半閉俟病睡著以半開處置病人鼻邊覺來即將
盤蓋蓋緊侵晨用水一大桶置盤水底揭開視其雞
上小蟲有翅無翅者二三百即傾在長流水中第二
夜用雞引之又去蟲七八十蟲盡而病愈至今無恙
于意雞喜食蟲故蟲亦喜食雞正如蜈蚣與雞相仇

之意煮熟者取其香盛夏則蟲四散睡著不動則蟲聞香易出付之長流水者欲其去而永不來也後試他人亦驗然其要處不可令病人先知恐蟲亦知而避去耳

王宇泰曰汪仲嘉謂余曰公知王節齋所以死乎曰不知也汪曰節齋為四川參政時得心腹痛疾醫療之百方不衰日益甚閒戟嘗有道者善醫然不可致也節齋親至山屏輿從徒步詣之道者望見即驚曰病深矣既坐問公於服餌有生用氣血之物焙製未徹者乎曰有之常服補陰丸數十年矣中用龜甲酒炙而入之曰是矣宜亟歸屏其指曰猶可將及家也節齋遽投檄歸至吳閶輒大下赤色小蠶無數是夕卒于舟中王曰本草稱龜甲所主大率破癥瘕痕已瘡痔陰蝕漏下赤白不言補心腎自丹溪有補陰之說而後世煎膠製丸服之無纖毫之益且有害若是可不戒乎（醫暇危言○程雲來）

蚘症

孫文垣治馬迪菴內人原以飲食過傷又為風寒外襲或以內傷外感治之致五更發熱盛于陽分唇燥胸中衝

跳不已手足皆冷熱厥脈兩寸俱滑數寸盛是尺上衝曰此奇痰症也擬吐以小陷胸湯加白芍蘿蔔子前胡酒芩二帖次早大便行下蚘蟲八條却不見有奇痰胸中即不衝跳但覺力怯再診之兩寸減半尺脈稍起以二陳湯加白朮白芍酒芩調理後四帖加當歸全愈李長蘅有甘庶均蚘

一條宜查抄入此門

琇按此由發散過劑擾動其火上衝胸跳蚘亦不安而欲出以小陷胸湯投之則黃連之苦寒能降火萎仁之甘寒能清火枳實之峻削能攻下病去厥止蚘亦從而下行其力怯良由攻之猛耳非真有奇痰為病也孫君平生喜以痰揣病其不經處類多如此

張景岳治王氏少婦年未二旬素喜瓜果生冷常病心腹痛每發必數日不食後數年發必吐蚘初吐尚少既而日多每吐必一二十條每發必旬日不食醫者但知攻蟲旋去旋有百藥不瘳察其脈症因知其傷于生冷致脾胃虛寒陰濕氣聚故為是症使不溫胃養脾以杜寒濕生化之源蟲去復生終無濟也乃製溫臟丸與之藥未完而病愈後仍耽生果舊病復作與前而安原注凡治蟲之法但察其別無痛熱等症者悉以溫補脾胃為主

中毒

唐崔鉉鎮渚宮有富商船居中夜暴亡待曉氣猶未絕
隣房有武陵醫工梁新聞之乃與診視曰此乃食毒
也三兩日非外食耶僕夫曰主翁少出舫亦不食於
他人梁曰尋常嗜食何物僕夫曰好食竹雞曰竹雞
喫半夏半必夏毒也命搗薑挾汁折齒而灌由是而
甦崔聞而異之召至安慰稱獎資以僕馬錢帛入京
致書於朝士聲名大振仕至尚藥奉御有一朝士詣
之梁曰何不早見示風疾已深矣請速歸處置家事

委順而已朝士聞而遑遽告退策馬而歸時有鄜州
醫徒此朝士下馬告之趙亦言疾危與梁生之說同
謂曰即有一法請官人剩喫消梨不限多少咀齕不
及挾而汁飲或希萬一此朝士又策馬而歸以書筒
貿消梨馬上旋齕行到家旬日惟喫消梨頓覺爽朗
其恙不作郎訪趙生感謝又訪梁奉御且言得趙生
所教梁驚異且曰大國必有一人相繼者遂召趙生
資以僕馬錢帛廣延譽官至太僕卿（北夢瑣言。見筠齋漫録。）

紹興十九年三月有客船自番禺至舟中士人攜一僕

中毒

唐崔鉉鎮渚宮有富商船居中夜暴亡待曉氣猶未絕
隣房有武陵醫工梁新聞之乃與診視曰此乃食毒
也三兩日非外食耶僕夫曰主翁少出舫亦不食於
他人梁曰尋常嗜食何物僕夫曰好食竹雞曰竹雞
喫半夏半(必)夏毒也命搗薑捩汁折齒而灌由是而
甦崔聞而異之召至安慰稱奬資以僕馬錢帛入京
致書於朝士聲名大振仕至尚藥奉御有一朝士詣
之梁曰何不早見示風疾已深矣請速歸處置家事
委順而已朝士聞而遑遽告退策馬而歸時有酈州
酈疑 馬醫趙鄂者新到京都於通衢自牓姓名云攻
醫術此朝士下馬告之趙亦言疾危與梁生之說同
謂曰即有一法請官人剩喫消梨不限多少咀齕不
及捩而汁飲或希萬一此朝士又策馬而歸以書筒
貯消梨馬上旋齕行到家旬日惟喫消梨頓覺爽朗
其恙不作卻訪趙生感謝又訪梁奉御且言得趙生
所教梁驚異且曰大國必有一人相繼者遂召趙生
資以僕馬錢帛廣延譽官至太僕卿(北夢瑣言。見筠齋漫録)
紹興十九年三月有客船自嵩曁至舟中士人攜一僕

僕病腳弱不能行舟師憫之曰吾有一藥治此病如神餌之而差者不可勝計當以相與既賽廟畢飲酣頗醉乃入山求得藥漬酒授病者令天未明服之如其言藥入口即呻吟云腸胃極痛如刀割截遲明而死士人以咎舟師舟師恚曰何有此即取昨夕所餘藥自漬酒服之不逾時亦死蓋山多斷腸草人食之輒死師而舟師所取藥為根蔓所纏結醉不暇擇徑投酒中是以及於禍則知草藥不可妄服也洗冤録。出甲志。見

醫說

黃啟東治分巡僉事戚公過縣晨興欲發忽疾作不語呼黃視之黃曰脈與症不應乃詢其左右云夜食烹雞黃曰此必食後就寢有蜈蚣過其口鼻中毒耳為處劑投之立甦戚猶未信乃更烹雞置寢處果有蜈蚣三枚自榻頂下湖廣通志。宜入蟲門

盛啟東明初為御醫晨值御藥房忽昏眩欲死募人療之莫能應一草澤醫人應之一服而愈問其狀其人曰盛空心入藥房猝中藥毒能和解諸藥者甘草也

帝問盛果空腹入乃厚賜草澤醫人明史

張鄖西言某巡按過山中見木下有大木耳一叢甚嫩好以為天花菜也取歸煮食之盡一盤即入卧房明

日巳牌尚未起書吏倒門而入止見骨頭一副其肉盡化為水流滿床下跡至山中木耳處掘之得一蛇大如桶殺之戒菴漫筆○李詡

陸放翁老學菴筆記云族子子相少服兔絲子十數年所服至多飲食倍常血氣充盛覺背腫赤熯乃大疽也適四五月金銀花開乃取花依良方所載法服之計已數斤背腫盡消以是知非獨金石之藥不可妄服即兔絲亦能致疾也按是人或過於酒色或傷於鬱怒遂致此疾未必由服兔絲也多致偏勝之患

辛未冬德興西南磨石窑民居避兵其中兵人來攻窑中五百人悉為煙人熏死內一李師迷悶中摸索得一凍蘆菔嚼之汁一咽而甦更與其兄兄亦活五百人者因此皆得命蘆菔細物治人之功乃如此中流失船一壺千金真不虛語河中人趙才卿又言炭煙熏人往往致死臨卧削蘆菔一片著火中即煙氣不能毒人如無蘆菔時預暴乾為末備急用亦可墜續志異

嘉靖四十三年陝西遊僧武如香挾妖術至昌黎縣民張柱家見其妻美設飯間呼其全家同坐將紅散入飯內食之少頃舉家昏迷任其姦污復將魘法吹入柱耳中柱發狂惑見舉家皆是妖鬼盡行殺死凡一

十六人並無血証官司執柱囚之十餘日柱吐痰二
椀許問其故乃知所殺者皆其父母兄嫂妻子姊姪
也柱與如香皆論死世宗命榜示天下觀此妖藥亦
是莨菪之流耳唐安祿山誘奚契丹飲以莨菪酒醉
而坑之本草綱目。可移太祖制下
王思中治海鹽彭氏巨室也其媳方婚而病煩懵欲絕
諸醫莫知所為思中診視令盡去帷幔窗櫺幷房中
什器密求蟹臍炙脆研入藥中服之頓痊吳江縣志此中漆毒也。
姚福庵已編云太倉民家得三足鱉命婦烹食畢入卧
少頃形化為血水止存髮耳隣人疑其婦謀害訟之
官時知縣黃庭宣鞫問不決乃別取三足鱉令婦如
前烹治取死囚食之入獄亦化如前人遂辨其獄按
爾雅鱉三足名能又山海經云從水多三足鱉食之
無盡近亦有人誤食而無恙者何哉本草綱目
吉安朱氏有為子腹痛人教以取楝樹東南根煎湯者
其子初不肯服其父撻之既入口少頃而絕蓋出土
面之根能殺人朱氏不攷古之誤也今醫家用桑白
皮本草云出土者亦能殺人不可慎哉靜齋至正直記。孔行素
邛傑年十四遭母喪以熟菜有味不嘗於口歲餘忽夢

母曰汝啖生菜遇蝦蟇毒靈牀前有三丸藥可取服
之傑驚起果得瓶中藥服之下科斗子數升（駿棗暇筆）
姚應鳳治一人患身痛左臂似有係之者應鳳曰君食
肉中鼠毒右臂生鼠用刀決之有鼠墜地而逸（錢唐縣志）
龔子才治一男子倏然低頭往暗處藏身不言問亦不
答飲食俱背人竊啖人見之則食不下諸人以為中
邪用三牲祭之其物經宿乃妻食之病亦如是諸醫
莫識龔知必中鼠涎有大毒也以吳茱萸塞入貓口
貓涎自出將茱萸令夫婦服之悉愈
一藥室家人正剉藥忽仆地不省人事諸人以為中風
痰厥龔曰此非病也必藥氣熏蒸中於藥毒令以甘
草煎湯灌之立甦（與症盛歐東治同）
一婦人以燒酒貯錫壺內經旬取服止飲一小鍾即醉
悶不省人事衆莫能識其症龔曰此中鉛毒也令以
陳土攪水澄清入甘草煎湯灌之即醒
吳孚先治一人長夏無故四肢厥冷神昏不語或作陰
症或作熱厥或作中風或作痰治俱不效吳診之消
息再四問前者曾食何物其家人曰前日晚間曾食
豬肺乃恍然令以忍冬花二兩煎湯灌之旋瘳蓋所
食乃瘟豬肺也

有人好食豆腐中毒不能治更醫至中途遇作腐人家
菜（疑誤應改菜字）誤將菜菔湯置鍋中腐便不成醫得其說
以菜菔湯下藥而愈（醫說續編）
唐李寶臣為奴人置董（音靳即烏頭也）于液寶臣飲之即瘖三
日死又唐武后置董于食賀蘭氏服之暴死（上仝）
劉立之治一婦人病腰痛已歷年諸藥不效劉診之云
病雖危殆然一夕可安主人訝焉乃請其藥答曰不
須藥但用鉛粉二三十兩壯士五人大鈴五七枚足
矣于是主家悉備劉命撤床帳慢移置屋中以米飲
和粉置病婦腰週迴令其舒卧壯士一人負鈴遶床
急走使其聲不絕人倦即易之至夜半後其婦稍能
自起立既而腰痛頓釋舉家拜云師神醫也願聞其
意劉云此病因服水銀所致然水銀客腰節間不能
出故疼不已今用鉛粉粉乃水銀所化為金之母取
金音以母呼子母子合德出投粉中則病愈矣（醫史○醫說續編）

明太祖制曰醫人王允堅賣藥為生錦衣衛監犯廚子
王宗自知罪不可逃慮恐刃加于頸令家人買毒藥
王允堅即時賣與隱飯中入外監門力士楊受財放
入內監門力士郭觀保驗出外監者慌忙反說內監

有人好食豆腐中毒不能治更醫至中途遇作腐人家相爭因妻誤將菜菔湯置鍋中腐便不成醫得其說以菜菔湯下藥而愈（醫說續編）

唐李寶臣為妓人置堇（音靳即烏頭也）于液寶臣飲之即瘖三日死又唐武后置堇于食賀蘭氏服之暴死（坿）

劉立之治一婦人病腰痛已歷年諸藥不效劉診之云病雖危殆然一夕可安主人訝焉乃請其藥答曰不須藥但用鉛粉二三十兩壯士五人大鈴五七枚足矣于是主家悉備劉命撤床帳幔移置屋中以米飲和粉置病婦腰週迴令其舒卧壯士一人負鈴遶床急走使其聲不絕人倦即易之至夜半後其婦稍能自起立既而腰痛頓釋舉家拜云師神醫也願聞其意劉云此病因服水銀所致然水銀客腰節間不能出故疼不已今用鉛粉粉乃水銀所化為金之母取金音以母呼子母子合德出投粉中則病愈矣（醫史○醫說續編）

明太祖制曰醫人王允堅賣藥為生錦衣衛監犯厨子王宗自知罪不可逃慮恐加（刃）于頸令家人買毒藥王允堅即時賣與隱飯中入外監門力士楊受財放入內監門力士郭觀保驗出外監者慌忙反說內監

者易其藥朕諭之郭觀保曰彼往賣藥王允堅家買
者朕令王允堅拿至乃黑藥一丸因授與王允堅自
吞服之久毒不作朕知易藥矣謂允堅曰前賣此藥
何顏色允堅曰紅丸曰幾枚對曰三枚噫毒本三丸
色赤今且一丸色且黑何也于是急遣人取至果赤
色隨令王允堅吞服本人持藥在手顏色為之變其
態憂驚猶豫未吞督之乃服既服後隨謂之曰此藥
以何料成曰砒霜巴豆飯粘為丸硃砂為衣曰服後
何時人喪曰半晝語既允堅淚墮朕謂曰爾所以凄
疑俟 九如此乎曰一子見軍一子在外故悲烏嗚

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

呼其王允堅初賣毒藥毒人及其自服也藥方入腹
眷戀之情畏死之狀一時發見嗚呼愚哉至此而若
此亦何哉然終不以此藥致本人之死何故若督令
服此藥而死是藥之也解而後刑之法也隨問允堅
此毒還可解乎曰可曰何物可曰涼水生豆汁熱豆
湯可朕謂曰此解不速餘何速解曰糞清插涼水糞
清用多少曰一雞子於是遣人取至候毒作方與解
之少頃允堅身不自寧手搔上下摩腹四顧張皇朕
謂曰毒何爾患曰五臟不寧心熱氣升曰此毒身死
傷何經絡允堅對曰五臟先壞命絕矣身墨黑謂曰

者易其藥朕謝之郭觀保曰彼往賣藥王允堅家買
者朕令王允堅拿至乃黑藥一丸因授與王允堅自
吞服之久毒不作朕知易藥矣謂允堅曰前賣此藥
何顏邑允堅曰紅丸曰幾枚對曰三枚噫毒本三丸
色赤今且一丸色且黑何也于是急遣人取至果赤
邑隨令王允堅吞服本人持藥在手顏邑為之變其
態憂驚猶豫未吞督之乃服既服後隨謂之曰此藥
以何料成曰砒霜巴豆飯粘為丸硃砂為衣曰服後
何時人喪曰半晝語既允堅淚墮朕謂曰爾所以凄
涼者畏死如此乎曰一子見軍一子在外故悲烏嗚

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

呼其王允堅初賣毒藥毒人及其自服也藥方入腹
眷戀之情畏死之狀一時發見嗚呼愚哉至此而若
此亦何哉然終不以此藥致本人之死何故若督令
服此藥而死是藥之也解而後刑之法也隨問允堅
此毒還可解乎曰可曰何物可曰凉水生豆汁熱豆
湯可朕謂曰此解不速餘何速解曰糞清插涼水糞
清用多少曰一雞子於是遣人取至候毒作方與解
之少頃允堅身不自寧手搔上下摩腹四顧張皇朕
謂曰毒何爾患曰五臟不寧心熱氣升曰此毒身死
傷何經絡允堅對曰五臟先壞命絕矣身墨黑謂曰

幾時可解何時不解曰三時候不解朕見毒作令人與之解本人痛利數番其毒潔然入復如初明日梟令以至其罪嗚呼昔者古人制藥惟積陰隲以生人今之貨藥者惟務生理不施陰隲少有逆其意者沽名恐詐者有之即時毒害者有之圖利而賣與人傷生者有之噫如此不才者犯法遭刑而殺身亡家者非止一人而已京市貨藥者往往不戒蹈襲前非將奈之何此誥一出所在貨藥之人聽朕言者推己以及人永為多福不然此刑此犯有不可逃者 三編

周櫟園曰癸未冬親串有從余遊都門者其人謹愿生平絕跡北里突生天泡不解所自余忽悟其故解之曰君質弱常服紫河車京師四方襍集患天泡瘡者甚夥所服藥中安知無天疱衣胞此瘡能延子孫氣味所衝尚能中人生子多無皮膚衣胞尤為毒氣所歸君之患必緣于此衆皆以為然夫忍于殤人之子以自裨益仁者尚不為況未必有功而遽以滋害如此可不知所戒哉原注江南皆以胞衣為人所食者多不育惟京師不甚論○書影

陳自明治二男子剥自死牛即日遍身患紫疱不計其數已而俱愦各灌神仙追毒丸一錠吐瀉而甦一藥不下者而死方見蠱門

吳內翰備急方云全椒醫高照一子無賴父笞之遂服
砒霜自毒大渴利腹脹欲裂余教令服此藥以水調
隨所欲飲與之不數椀即利而安其方用白扁豆曬
錢七 按二字似當衍去其一 新汲水調下二三錢七

凡中毒及隔子烏頭河豚之類一切藥毒皆可治用多
年壁土熱湯泡攪之令濁少頃乘熱去脚取飲不省
人事者灌之甚妙
北夢瑣言有人為野菌所毒而笑者煎魚椹汁服之即
愈或云楓樹菌食之令人多笑
來安縣李主簿紘元度云白塔寨丁未春有二卒一候

兵同食河豚既醉燒子併食之遂皆中毒人急以告
巡檢二卒已困殆倉卒無藥用或人之說獨以蘇油
灌候兵者油既多大吐毒物盡出腹間頓寬以此竟
無恙蘇集
朱丹溪解中藥毒方用五倍子二兩重研細用無灰酒
温調服毒在上即吐在下即瀉續醫說編
一人喫水銀僵死微有喘息肢體如氷聞葛可久治奇
疾往候之可久視之曰得白金二百兩可治病家謝
以貧故不能重酬可久笑曰欲得白金煮湯治耳已
而扣富者乃得之且囑之曰熱浴體時如手足動當

吳內翰備急方云全椒醫高照一子無賴父笞之逐服
砒霜自毒大渴利腹脹欲裂余教令服此藥以水調
隨所欲飲與之不數椀即利而安其方用白扁豆曬
乾為細末新汲水調下二三錢匕
凡中毒及附子烏頭河豚之類一切藥毒皆可治用多
年壁土熱湯泡攪之令濁少頃乘熱去脚取飲不省
人事者灌之甚妙
北夢瑣言有人為野菌所毒而笑者煎魚椹汁服之即
愈或云楓樹菌食之令人多笑
來安縣李主簿紘元度云白塔寨丁未春有二卒一候
兵同食河豚既醉燒豕併食之遂皆中毒人急以告
巡檢二卒已困殆倉卒無藥用或人之說獨以麻油
灌候兵者油既多大吐毒物盡出腹間頓寬以此竟
無恙焉
朱丹溪解中藥毒方用五倍子二兩重研細用無灰酒
温調服毒在上即吐在下即瀉
一人喫水銀僵死微有喘息肢體如氷聞葛可久治奇
疾往候之可久視之曰得白金二百兩可治病家謝
以貧故不能重酬可久笑曰欲得白金煮湯治耳已
而扣富者乃得之且囑之曰熱浴體時如手足動當

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

來告我有項手足引動往告之復謂曰眼動及能起坐悉来告我一如其言乃取川椒二斤置溲桶中坐病人其上久之病脫去其水銀已入椒矣簋銀湯能動水銀而不滯川椒能来水銀而聚之吁人謂可久之術良惜乎不多傳也酉陽穉俎云椒可以來水銀

繆仲淳曰莊斂之平日素壯實善啖丁巳四月忽患泄于此可徵矣（醫說續編○可與劉某治案同參）

鴻凡藥粥蔬菜入喉覺如針刺下咽即辣因而滿腹絞辣隨覺腹中有氣先從左升次即右升氤氳遍腹即欲如厠彈響大泄糞門恍如火灼一陣甫畢一陣繼之更番逾時方得離厠諦視所下皆清水盈器白脂上浮所飲食俱不化而出甚至夢中大遺了不收攝諸醫或云停滯或云收受暑或云中寒百藥穉投竟如沃石約月餘大肉盡脫束手待斃余仲夏末偶過金壇診其脉洪大而數知為火熱所生病為疏一方用川連三錢白芍五錢橘紅二錢車前扁豆茯苓石

祝

（不如改囑為了當）

一錢祝其煎成將井水澄泠加童便一杯始服臨別囑其此方勿以示人恐時師見之大笑不已也若為軀命計須堅信服之耳彼却衆醫恪服藥方入喉恍如飲薄荷汁隱隱沁入心脾腹中

來告我有頃手足引動往告之復謂曰眼動及能起
坐悉来告我一如其言乃取川椒二斤置溲桶中坐
病人其上久之病脱去其水銀已入椒矣盖銀湯能
動水銀而不滯川椒能来水銀而聚之吁人謂可久
之術良惜乎不多傳也酉陽穉俎云椒可以來水銀
繆仲淳曰莊歛之平日素壯實善啖丁巳四月忽患泄
瀉凡藥粥蔬菜入喉覺如針刺下咽即辣因而滿腹
絞辣隨覺腹中有氣先從左升次即右升氤氳遍腹
即欲如厠彈響大泄糞門恍如火灼一陣甫畢一陣

繼之更番逾時方得離厠諦視所下皆清水盈器白
脂上浮所飲食俱不化而出甚至夢中大遺了不收
攝諸醫或云停滯或云收受暑或云中寒百藥襍投竟
如沃石約月餘大肉盡脱束手待斃余仲夏末偶過
金壇診其脉洪大而數知為火熱所生病為疏一方
用川連三錢白芍五錢橘紅二錢車前扁豆茯苓石
斛各三錢炙甘草一錢祝其煎成將井水澄泠加童
便一杯始服臨別囑其此方勿以示人恐時師見之
大笑不已也若為軀命計須堅信服之耳彼却衆醫
恪服藥方入喉恍如飲薄荷汁隱隱沁入心脾腹中

似別成一清涼世界甫一劑夜卧達旦洞瀉頓止連
服三劑大便已寔前泄時凡飲食温者下噤遂覺氣
升即欲大解一切俱以冷進為快至是覺惡心畏冷
得温乃安曰此火退之徵也前方加人參二錢半蓮
肉四十粒紅麴一錢五分黄耆三錢升麻五分黄連
減半五六劑後去升麻又三十餘劑瀉久止而脾氣
困頓不知饑飽且少飲茶湯覺腸滿急脹如欲寸裂
曰此大瀉之後下多亡陰也法宜用補倘用香燥取
快暫時元氣受傷必成鼓脹不可為矣為疏丸方用
人參五兩白芍六兩炙甘草一兩五味六兩黄耆五

兩萸肉五兩山藥五兩熟地八兩牛膝六兩煮河車
二具蜜丸空心飢時各一服並日進前湯方或時去
黄連幾三年始知饑而嗜食體亦漸豐矣其病初平
勸其絕慾因出妾得盡發家人秘謀乃知向之暴泄
由中巴豆毒本草中巴豆毒者黄連冷水解之余用
大劑黄連冷服正為對治時師即信為火用連不過
七八分至錢許止矣況一月之瀉敢用連至三錢乎
應改作曬

害山其字度越古今歟

余治歛之泄止後恐其元氣下陷急宜升舉用升麻以
出以示人之故也 廣筆記○維繆公深知香燥之

似別成一清涼世界甫一劑夜卧達旦洞瀉頓止連
服三劑大便已寔前泄時凡飲食温者下噤遂覺氣
升即欲大解一切俱以冷進為快至是覺惡心畏冷
得温乃安曰此火退之徵也前方加人參二錢半蓮
肉四十粒紅麴一錢五分黄耆三錢升麻五分黄連
減半五六劑後去升麻又三十餘劑瀉久止而脾氣
困頓不知饑飽且少飲茶湯覺腸滿急脹如欲寸裂
曰此大瀉之後下多亡陰也法宜用補倘用香燥取
快暫時元氣受傷必成鼓脹不可為矣為疏丸方用
人參五兩白芍六兩炙甘草一兩五味六兩黄耆五
兩薤肉五兩山藥五兩熟地八兩牛膝六兩紫河車
二具蜜丸空心飢時各一服並日進前湯方或時去
黄連幾三年始知饑而嗜食體亦漸豐矣其病初平
勸其絕慾因出妾得盡發家人秘謀乃知向之暴泄
由中巴豆毒本草中巴豆毒者黄連冷水解之余用
大劑黄連冷服正為對治時師即信為火用連不過
七八分至錢許止矣況一月之瀉敢用連至三錢乎
此余所以祝其勿出以示人之故也（廣筆記○維繆公深知香燥之害所以度越古今歟）
余治歛之泄止後恐其元氣下陷急宜升舉用升麻以

丹石毒

提之初不知其為中毒也乃因用升麻太早致濁氣混于上焦（以此知上盛之病補中益氣不可漫服也）胸中時覺似辣非辣似嘈非嘈迷悶不可名狀有時滴酒入腹或啖一切辛温者更寃苦不勝莊一生知其故曰此病在上焦湯液入口即下注恐未易奏功宜以噙化丸治之用貝母五錢苦參一兩真龍腦薄荷葉二錢沈香四錢人參五錢為極細末蜜丸彈子大午食後臨卧時各噙化一丸甫四丸胸中恍如有物推下三年所苦一朝若失（同上）

劉表在荆州與王粲登障山見一岡不生百草粲曰此必古塚其人在世服生礬石熱蒸出外故草木焦滅礬看果墓礬石滿塋（容齋四筆○按仲宣元識若此之信耶事舊案第文太畧）

洪容齋云予仲兄文安公鎮金陵因秋暑減食當塗醫湯三益教以服礬石圓已而飲啖日進遂加意服之越十月而毒作鼻衄血斗餘自是數數不止竟至津液皆竭迫於捐館偶見前語使人追痛因書之以戒來者（全上○按陰虛大盛之人初服桂附薑萸等燥熱剛藥始則甚得其力所謂却治也昧不知止久而決裂莫可挽回余目擊其斃者數十人矣此亦與初服礬石圓而飲啖日進同也）

毛公弼守泗州病泄痢久不愈及罷官歸遂謁龐安常
求治安常診之曰此丹石毒作非痢也乃煮葵菜一
釜令公弼食之且云當有所下明日安常視之曰毒
未去問食幾何才進兩盂安常曰某煮此藥銖兩升
合自有制度不盡不可於是再煮強令進之已乃洞
泄爛斑五色安常視之曰此丹毒也疾去矣但年高
人久痢又乍去丹毒腳當弱不可復餌他藥因贈牛
膝酒兩瓶飲盡遂強如初獨醒襍志
虞都巡者曾達臣先人同僚也自言常服石燕其法取
雄者十枚煅以火透紅則出而漬酒中候冷復煅既
煅復漬如是者無算度乾酒一升乃取屑之每作早
以二錢匕擦齒上漱嚥以酒虞時年五十服此藥二
年膚髮甚澤才如三十許人自謂服藥之功一日忽
覺熱氣貫兩目睛突出痛不可忍而死因思人服金
石藥鮮有不為其所毒者全上
臨川周推官平生孱弱多服丹砂烏附藥晚年發背疽
醫悉歸罪丹石服解毒藥不效瘍醫老祝脈之曰此
乃極症正當多服伏火丹砂及三建湯乃用小劑試
之復作大劑三日後用膏敷貼半月而瘡平凡服三
建湯一百五十服齊東野語○見本草綱目○意其
人必詖陰之體故耐大熱之劑

張路玉治孫古修誤服伏火丹砂中毒察其本元素虧近因虛火上炎舌下腫脹延及兩頤醫用苦寒清熱太過神思不寧藥中每服加丹砂五錢甫進一劑覺胸中有物觸者數次請政於醫復出丹砂視之色黑而晦醫令易砂更服四劑日夜煩躁不寧背時灑淅惡寒頭面烘熱大汗脛膝逆冷如水忽忽氣逆欲絕張診之六脈澁數糢糊次驗唇舌俱色如汙泥而腫厚溼滑若係熱極似陰必無溼滑之理若係寒犯三陰必無反厚之理惟酒食內蘊穢翳色現有之審其二便調適胸腹柔和決無食停胃腑之理以脈合證

詢其陰受熱鬱最急者恐其喘汗欲脫乃以生脈六味合劑以救肺腎一服神稍安汗稍斂再進人事稍知稀糜稍進猶未言及伏火砂也見其舌沿稍轉微紅而氣微足冷如故前方入桂心五分五味數粒服後足稍溫和氣稍接續語稍有次方詳述伏火砂之誤前方減去地黃桂心五味入棗仁秋石人中黃尚解丹砂之毒三服舌轉微紅雖未鮮潔而伏毒漸解緣兩尺弦細乃去人中黃仍用地黃以填補下元而愈

羅謙甫曰僧鬮仲章服火煉丹砂二粒項出小瘡腫痛

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

不任牙痒不能嚼物服凉膈散半斤始緩後飲酒輒發藥以寒凉之劑則緩終身不愈

何橫涇好邑平居進熱劑偶與方靈谷對奕呼小童取一釐散童誤聽為七釐也何時仰子布笑不及觀遽服之是夕卒于書齋後十餘年孫理庵倩居其室偶至書齋見一人仰卧榻上問之答曰我何橫涇也孫大駭疾走不十日卒雲間雜志○無名氏

秀州張生本郡中虞侯其妻遇神人自稱皮場大王授以癩疽異方一冊且誨以手法遂用醫著俗呼張小章 待攷

入吳縣張縣丞祖母章子厚妾也年七十疽發于背邀治之張先潰其瘡以盡貯所泄膿穢澄滓視之其凝處紅如丹砂謂丞曰此服丹藥毒所致也丞怒曰老人平生尚不服一暖藥況于丹乎何妄言若是病人聞之亟呼曰其說是也我少在汝家時每相公餌服大丹必使我輩伴服一粒積久數多故貯畜毒根今不可悔矣張謝去母竟以是終

李日華六硯齋筆記

陳良甫治一富室男子鼻血不止六脈洪數宛竟云服丹藥太過遂用黃連黃芩大黃為末水煎服愈調服亦可良方

不任牙痒不能嚼物服凉膈散半斤始緩後飲酒輒發藥以寒凉之劑則緩終身不愈

何橫涇好邑平居進熱劑偶與方靈谷對奕呼小童取一釐散童誤聽為七釐也何時仰子布笑不及觀遽服之是夕卒于書齋後十餘年孫理庵倩居其室偶至書齋見一人仰卧榻上問之答曰我何橫涇也孫大駭疾走不十日卒（雲間雜志○無名氏）

秀州張生本郡中虞侯其妻遇神人自稱皮場大王授以癩疽異方一冊且誨以手法遂用醫著俗呼張小娘子又轉以教厥夫吳縣張縣丞祖母章子厚妾也年七十疽發于背邀治之張先潰其瘡以盡貯所泄膿穢澄滓視之其凝處紅如丹砂謂丞曰此服丹藥毒所致也丞怒曰老人平生尚不服一暖藥況于丹乎何妄言若是病人聞之亟呼曰其說是也我少在汝家時每相公餌服大丹必使我輩伴服一粒積久數多故貯畜毒根今不可悔矣張謝去母竟以是終（李日華六硯齋筆記）

陳良甫治一富室男子鼻血不止六脈洪數究竟云服丹藥太過遂用黃連黃芩大黃為末水煎服愈調服亦可良方

無錫華氏年六十患背瘡潰發大如旋盤而色赤想是平日多服金石藥毒發所致問之果然因令侵晨飲羊血三五升始用退熱解毒生氣血之劑燔以生肌膏半月後肌生膿少予因歸令服此藥百餘帖方可全安一月後復來招往視其瘡皮肉已堅厚如常但食少無力因問前日之藥服幾何曰瘡將平遂止不服脈之沈微甚因知其氣血只可供給瘡平而已于真氣則已竭不可治即古人所謂死于瘡結痂之後果不出半月而死此膿出後之虛若因虛而發癰疽者亦然藥要或問

張忠定公安道居南都煉丹千爐養火數十年丹成不敢服時張芻聖民守南都贏瘠殊甚聞有此丹堅求疑誤或當作伏

服

必有大毒不可遽服聖民求之甚力乃以一粒如粟大以與之且戒宜韜藏慎勿輕餌聖民得之即吞爲不數日便血不止五臟皆糜潰而下竟死云張邦基墨莊漫錄

士大夫服丹砂死者前此固不一余所目擊林彥振平日充實飲啖魚人居吳下每以強自誇有醫周公輔言得宋道方煉丹砂秘術可延年而後無害道方拱

無錫華氏年六十患背瘡潰發大如旋盤而邑赤想是
平日多服金石藥毒發所致問之果然因令侵晨飲
羊血三五升始用退熱解毒生氣血之劑燔以生肌
膏半月後肌生膿少予因歸令服此藥百餘帖方可
全安一月後復來招往視其瘡皮肉已堅厚如常但
食少無力因問前日之藥服幾何曰瘡將平遂止不
服脈之沈微甚因知其氣血只可供給瘡平而已于
真氣則已竭不可治即古人所謂死于瘡結痂之後
果不出半月而死此膿出後之虛若因虛而發癰疽
者亦然藥要或問

張忠定公安道居南都煉丹千爐養火數十年丹成不
敢服時張芻聖民守南都羸瘠殊甚聞有此丹堅求
餌之安道云不敢吝也但此丹服火之久不有大功
必有大毒不可遽服聖民求之甚力乃以一粒如粟
大以與之且戒宜韜藏慎勿輕餌聖民得之即吞爲
不數日便血不止五臟皆糜潰而下竟死云張邦基墨莊漫
錄

士大夫服丹砂死者前此固不一余所目擊林彥振平
日充實飲啖魚人居吳下每以强自誇有醫周公輔
言得宋道方煉丹砂秘術可延年而後無害道方拱

州良醫也彥振信之服三年疽發于腦始見髮際如
栗越兩日項領與胸背畧平十月死方疾亟時醫使
人以帛漬所潰膿血濯之水中澄其下略有丹砂蓋
積于中與毒俱出也謝任伯平日聞人畜伏火丹砂
不問其方必求之服唯恐盡去歲亦發腦疽有人與
之語見其疾將作俄頃覺形神頓異而任伯猶未之
覺既覺如風雨經夕死十年間親見此兩人可以為
戒矣避暑錄○葉夢得少蘊

吳興吳景淵刑部服硫黃人罕有知者其後二十年子
棠為華亭市易官發背而卒乃知流毒傳氣尚及其
子可不戒哉泊宅編

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



續名醫類案卷三十

錢塘魏之琇玉橫撰

邪祟

舒氏子為素衣女子所憑掩捕不得意緒恍惚如癡家人具狀請符於朱彥誠法師朱讀狀大駭曰必鱗介之精邪毒入脾肝裡病深矣非符水可療當躬往治之乃假巨鑊煎油二十斤焚符檄拘之乃大白鱉也鑊油正沸自投其中糜爛而死朱戒其家俟油冷以

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

斧破鑿剖骨并肉曝日中須極乾入人參茯苓龍骨末成丸託為補藥命病者晨夕餌之勿使知之如其言丸盡病愈 豔異編

宋人王鑾精針石元嘉中縣人張方女日暮宿廣陵廟門下夜有物假作其壻來女因被魅惑而病鑾為治之下一針有獺從女被內走出病因而愈 劉頴叔異苑

顧歡隱於會稽素有道風有病邪者以問歡歡曰君家有書乎曰唯有孝經而已歡曰可取仲尼居置病人枕邊恭敬之當自差如言果愈問其故曰善禳惡正勝邪此病者所以差也 吳均齊春秋○北史

黃帝灸法療神邪鬼魅及癲狂病語不擇尊卑灸上唇裏面中央肉弦上一壯如小麥大又用鑷刀將唇裡面弦上割令其斷更佳也在也

秦承祖灸狐鬼神邪及顛狂諸般醫治不瘥者以并手兩大拇指用軟絲繩急縛之灸三壯其炷著四處半在甲上半在肉上四處盡一處不燒其病不能得愈神效不可量小兒胎癇孀癇一依此法灸一壯炷如小麥大 東垣十書

李士材治章氏女在閨時昏暈不知人蘇合丸灌醒後狂言妄語喃喃不休左脈七至大而無論右脈三至

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

微而難見兩手如出兩人此祟憑之脈也綫帶繫定
二大拇指以艾炷灸兩甲界鬼哭穴至七壯鬼即哀詞
求去服調氣平胃散加桃奴數日而祟絶
喻嘉言治楊季登次女病多汗食減肌削診時手閒筋
掣肉顫身倦氣怯曰此大驚大虛之候宜從温補劑
中多加茯神棗仁十餘劑全不應因思症非外感也
内傷也禍症也虛汗振掉不寧能受補藥而病無增
減且閨中處子素無家難其神情渾似喪敗之餘此
曷故耶忽悟曰此必邪祟之病而其父何不言往診
其面色曰時赤時黃因謂此症必有邪祟吾有神藥

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

可以驅之季登繞回此女每夕睡去口流白沫戰慄
而絶以薑湯灌至良久方甦挑鐙侍寢防之亦不能
止因見用安神藥甚當蕪恐堉家傳聞故不敢明告
也曰何不早言吾一劑可愈乃以犀角羚羊角龍齒
虎威骨牡蠣粉鹿角霜人參黃嗜等藥合末令以羊
肉半斤煎取濃汁三盞盡調其末一次服之果得安
寢竟不再發相傳以為神異蓋以祟附於身與人之
神氣交持亦通處不安無隙可出故用諸多靈物之
遺形引以羊肉之羶俾邪祟轉附骨角移從大便而
出仿上古遺精變氣祝由遺事而克其義耳又熊去

疾髫齡患一奇症食飲如常但脈細神呆氣奪色夭
乃翁曰此何病也喻曰病名殗殜左傳所謂近女室
晦即是此病彼因近女又遭室晦故不可為令郎受
室晦而未近女是可為也即前方少加牛黃丸服旬
日而安今壬午去疾已舉孝廉矣

狐之迷人先用口向女子陰戶一展其人即昏迷不省
或男子則向陽物一展亦令昏迷方用真桐油抹於
陰戶陽物上其狐即大嘔而去妙不可言秘之（本艸綱目）

朱丹溪治一婦人如癲或作或輟恍惚不省人事一日
畧蘇醒診視忽聞床上有香氣纔又無所知識朱曰
氣回血虛亦從而虛邪因虛入理或有之遂以秦艽承
祖灸鬼法灸治病者哀告曰我自去我自去即愈（此案舊在癎門又原案極長）

徐秋夫療鬼穴凡有病著鬼邪須針鬼穴鬼去病除其
應如神

一鍼名鬼宮（人中是也針入三分）
二鍼名鬼信（少商是也針入三分）
三鍼名鬼節（隱白是也針入三分）
四鍼名鬼心（太陵是也針入三分）
五鍼名鬼路（行間是也針入三分）
六鍼名鬼枕（風府是也針入三分）
七鍼名鬼關（頰車是也針入三分）
八鍼名鬼門（承漿是也針入三分）
九鍼名鬼臂（間使是也針入五分）
十鍼名鬼額（正髮際也針入二分）

十一鍼名鬼會正乳是也針入一分十二鍼名鬼腰陽陵是也針入三分
十三鍼名鬼身異名舌縫是也針入舌縫中間一分出紫血舌身腫難言心經邪熱微出血便效

陳氏明治一女子為邪所交腹作痞與太乙丹一錠服之隨下惡物其邪仍至又服半錠每夜更換二三錠使烟氣盈屋遂不再至方見蟲門

金傚峰之子患妖症吐舌數寸許每以足居上首居下顛倒而行傚峰偶送一道士出門復入中堂目見一婦人在戶內走入屏風中乃碎屏風火之魅不復見而其子亦瘥雲閒襍誌

蔡石戶抱病三年耳中日聞鬼嘯凡有所往鬼必相隨初甚怖久之習聞殊不為怪病愈鬼嘯亦息仝上

臨海章安鎮有蔡木匠者一夕手持斧斤自外道遊東山東山衆所殯葬之處蔡沈醉中將謂抵家捫其棺曰是我牖也寢其上夜半酒醒天且昏黑不可前未免坐以待旦忽聞一人高叫棺中應云喚我何事彼云某家女病瘧蓋其後園葛大哥淫之耳卻請法師捉鬼我與你同行一看如何棺中云我有客至不可去蔡明日詣主人曰娘子之疾我能愈之主人驚喜許以厚謝因問屋後曾種葛否曰然蔡遍地翻掘

內一根甚巨且有血煑啖女子病即瘥輟耕錄

唐同州刺史孟詵云婦人夢與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出鬼精又古今録驗療妖魅猫鬼病人不宵言鬼方鹿角屑擣散以水服方寸匕即言實也本州

王教授云有婦人患赤白帶淋得予針灸經初為灸氣海穴未效次日為灸帶脈穴有鬼附患身云昨日灸亦好只灸我未著今灸著我我今去矣可為酒食祭我其家如其言祭之其病如失此實事也余初怪其事曰思晉景公膏肓之病蓋有二鬼焉以其虛勞甚矣鬼得乘虛而居之今此婦人之疾亦有鬼者豈其用心而虛損故有此疾鬼亦乘虛而居之歟灸既著穴其鬼不得不去雖不祭之可也自此有來覓灸者必為按此穴莫不應手瘥疼余知是正穴也令歸灸之無有不愈其穴在兩脇季肋之下一寸八分有此疾者速宜灸之婦人患此疾而喪生者甚多切不可忽若更灸百會尤佳此疾多因用心使然故也資生經

何百庸診西山道者素無疾病寢不能興曰六脈純陰為鬼所盜當午刻死竟如其言又嘗為劉某診曰尺脈有怪徵後嗣其有厄乎是夕其孫果溺水死雲南志

錢國寶治土橋張林巡司書役也其妻勞怯已三年服藥無效臥床不起美脈沈大至骨數十至中一鼓或隱或現形色蒼脫所居暗室曰此非勞怯乃陰邪之症但不知名非藥可治先當移房再禳解之更語其

葉

疑誤

或作物

何葉家婦只不答及移室褥上有毛數莖長寸半許迹露狐交即延道士及挂天師符印禳退至夜多人圍繞邪來反更頻煩因追問婦曰但覺冷風吹面身即寒禁胸如石壓則昏不知人矣因再求救為思久之猛悟人交陽交也狐交舌交也密語其夫少製毒藥無聞六耳淬之陰戶四圍狐來果中毒而死乃元狐閒生白毛肥壯多肉林乃剝其皮而剮之其婦服藥經年乃可

奇疾

穆吏部深者山東濟南人壬辰進士罷官里居忽患異疾耳中聞車馬之聲則疾大作一日閒內議曰今日且遨遊郊坰即有騶馭驢馬鱗次而出其恙頓除至晚復聞遊者回馱馬盡返耳中則所苦如故屢治不瘥一日忽灑然若失蔵帚軒剩語

一人臥於床四肢不能動只進得食好大言說喫物謂

錢國賓治土橋張林巡司書役也其妻勞怯已三年服藥無效臥床不起美脈沈大至骨數十至中一鼓或隱或現形色蒼脫所居暗室曰此非勞怯乃陰邪之症但不知名非藥可治先當移房再禳解之更語其母以好言相問見何棄祟婦只不答及移室褥上有毛數莖長寸半許迹露狐交即延道士及挂天師符印禳退至夜多人圍繞邪來反更頻煩因迫問婦曰但覺冷風吹面身即寒禁胸如石壓則昏不知人矣因再求救為思久之猛悟人交陽交也狐交舌交也密語其夫少製毒藥無聞六耳淫陰戶四圍狐來巢中毒而死乃元狐閒生白毛肥壯多肉林乃剝其皮而剮之其婦服藥經年乃可

奇疾

穆吏部深者山東濟南人壬辰進士罷官里居忽患異疾耳中聞車馬之聲則疾大作一日聞內議曰今日且遨遊郊坰即有裝馱驢馬鱗次而出其恙頓除至晚復聞遊者回馱馬盡返耳中則所苦如故屢治不

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY

掃葉山房藏本

歸軒剩語

痊一日忽灑然若失歟帚軒剩語

一人臥於床四肢不能動只進得食好大言說喫物謂

之失說物望病治法如說食猪肉時便云爾噎猪肉一頓病者聞之即喜遽置肉令病人見臨要却不與噎此乃失他物望也當自瞻涎出便愈萬病回春有富家子年十七八病遍體肌肉折裂名黃子厚治子厚偕門生四五輩往診視各以所見陳論皆未當子厚乃屏人詰病者曰童幼時曾近女色犯天真乎曰當十三四曾近之已子厚曰得其說矣褚澄云精未通而御女則四體有不滿之處後日有難狀之疾在法為不可療後果惡汁淋漓痛楚而死其論抑或未然

江南逆旅中一老婦啖物不知飽余德占以炊餅啖之盡一竹簀猶稱饑不已日飯一石米郁滄浪吳擂

醴泉主簿蔡繩子友也亦得饑疾食稍遲則頓仆悶絕繩有美行博學有文為時聞人竟以饑死無能知其疾者每為哀傷（眩上○瘍按此恐即中消病也）

予當至侯潮門外觀潮見一人丐食者一手掌倍大五指各長尺餘但伸而不能屈嘆其賦形之奇其人曰予病也曩業織繻足以餬口客夏病傷寒當發汗時予病也曩業織繻足以餬口客夏病傷寒當發汗時此手在被外獨不汗病愈而此手痛不已漸痛漸長以至于此今手不能作故乞食耳（金上）

邱汝誠治一女子欠伸臂不下邱命其母裸女上身以

單帶著之曰侯吾揭簾即去下裳毋如命邱揚聲而入女羞縮臂即復故揮麈新譚

陸道光治一兒染奇症四肢堅不屈光曰此非藥可療舉傘覆之遶床焚安息沈檀兒即平復少間又發屑沈香飲之遂瘳平湖縣志

高陽民家子方十餘歲忽臂上生宿瘤痛痒不可忍醫皆不辨何症一日忽自潰中有圓卵墜出尋化為石

劉工部霖以一金售之治腸病如神池北偶談

江寧有蕭生者食香薷則死又有王生者飲茶則死必二三日始甦醫無能識其故者誌於此俟明醫或知之居易錄

桐城友人姚文燮字經三順治己亥進士詩畫皆有名年六十餘忽病不識字即其姓名亦不自知醫不知為何症也竟以是終按夢溪筆談記松滋令姜愚者忽不識字者數年後稍稍復舊信奇疾也

劉進士祖向言潁州一少年為邪所侵疾入膏肓家人謂不可活置之路傍忽一道士過之自言善醫命取鐵鎚重數十斤鎚病者頭面父母泣謂病已至此鎚鎚下首立碎夫道士笑曰無傷也鎚下病者若無所知輒有一美婦人長二寸許自口中躍出而滅凡百

鎚口出百婦人大小形狀如一少年立愈道士亦不
復見池北偶談

宋元嘉末有長廣人病瘥即能食却不得臥每飯輒覺
其身增長數日頭遂出屋時段究為刺史令人度之
已長三丈後復漸縮如舊乃死異苑

醫書言瘦人驟肥肥人驟瘦皆不久同年薛為學登進
士時體甚肥及為御史忽爾瘦削未幾公幹鄖陽一
夕而歿聞歿時身軀縮小如十餘歲小兒此尤可異
也覽餘漫抄

陶九成云都下一兒患頭痛不可忍有回回醫官用刀
割開額上取一小蟹堅硬如石尚能活動頃焉方死
疼亦遄止當求得蟹至今藏之輟耕錄

宋史載呂夏卿舉進士歷知制誥典滁州年五十二得
奇疾身體縮小卒時纔如小兒敕園禊記載御史薛
惟覽餘漫抄作學身體甚肥忽爾瘦削一疾而歿歿時縮
小如十餘歲兒自得語

廣陵有田婦患泄瀉下惡如油鄰童以紙撚蘸然與油
無異醫不能療孫茲九先生聞而往視令買補中益
氣湯十劑天王補心九服訖而愈
又四兩以煎劑下九服訖而愈

衆醫問之曰人驚恐則氣下大腸脹損所致此婦必

受驚後得此疾也問之果力作于場見幼子匍匐赴
火驚而急救得此疾此方書所未載奇疾方
錢國寶治鎮江錢青藜中年無病一日足跟偶响聽之
有聲自覺怪異數月漸响至頭竟如雷聲醫者症名
不一七年懷生死之憂求錢過京口甘露寺尋蒼耳
草治毒會于涼亭偶言此症以骨雷告之邀至家候
其脈五部皆和獨腎乳大舉之始見按之似無乃腎
敗也自下响者足少陰腎經之脈起于小指之下斜
走足心出然谷之下循內踝後別入跟中以上腨內
出腘內膕上股入後膕貫脊且腎主骨堅虛則髓空
髓空則鳴所以骨响自脚之頭即雷從地起响于天
上也以六味丸加紫河車膏虎骨膠猪髓枸杞杜仲
方示之彼謝曰公論破七年之迷良方起終身之病
美哉揖而別至次年終歲錢復之京口問已全愈錢錢塘人
萬曆時人有壽世堂醫案四十則多奇疾乃刻本由杭太史董浦處借得

癸亥冬山洪天行時疫病者頭疼發熱惡心口渴神昏
欲寐四肢不舉其肉推之則一堆平之則如故醫有
作傷寒者有作時氣者投以發散藥無不加重死者
數百時督師閣部豫及贊畫各傷一僕至乙丑春錢
之閶門謁太師談次問及曰此症天行時役名肉行

也人肉屬土土燥則崩土濕則流其邪感于血脈肌肉不比傷寒同治也古今醫集不載止于宦邸便方見此異症一疑曰人血枯而感天時不正之氣當大補血用首烏枸杞歸地等味少加羌活風藥足以應病矣若經發散立死無疑

湖州鄔阿二織絲人也偶然兩膊紅十數條其紅條頭粗尾尖腹大長尺許濶寸許此青蛇氣異毒也急治之不然蛇形入腹而死或生大小腿如頭向上攻入腹者亦死以針挑破頭尾使其不走流出惡血又研查殿元當作楂

內服清涼敗毒散防風荊芥白芷羌活黃連黃芩連翹金銀花梔子甘艸當歸生地各一錢二三帖瘥

吳橋治呂廷克年二十五得奇疾作則衆竅氣坌出瞑而垂絕家人為之閉口鼻塞兩耳握小溲抵大溲乃稍回氣蒸蒸出毛孔中良久始定逆橋治橋曰病得之內而受驚陰陽兩脫橋不能往第以大溫補劑投之持方藥歸三月而愈遺面赬而欬血醫而少間金節年如廷克始病潮熱夢遺面赬而欬血醫而少間已腹愈奇疾作作則如東薪熱湧泉由脛及股直連如貫槊傾耳而聽轆轤有聲至則堅彊不仁膚革一

也人肉屬土燥則崩土濕則流其邪感于血脈肌
肉不比傷寒同治也古今醫集不載止于官邸便方
見此異症一疑曰人血枯而感天時不正之氣當大
補血用首烏枸杞歸地等味少加羌活風藥足以應
病矣若經發散立死無疑
湖州鄔阿二織絲人也偶然兩膊紅十數條其紅條頭
粗尾尖腹大長尺許潤寸許此青蛇氣異毒也急治
之不然蛇形入腹而死或生大小腿如頭向上攻入
腹者亦死以針挑破頭尾使其不走流出惡血又研
明雄黃噀調查患處內服清涼敗毒散防風荊芥白
芷羌活黃連黃芩連翹金銀花槐子甘艸當歸生地
各一錢二三帖瘥
吳橋治呂廷克年二十五得奇疾作則衆竅氣塞出瞑
而垂絕家人為之閉口鼻塞兩耳握小溲抵大溲乃
稍回氣蒸蒸出毛孔中良久始定逆橋治橋曰病得
之內而受驚陰陽兩脫橋不能往第以大溫補劑投
之持方藥歸三月而愈太
集
金節年如廷克始病潮熱夢遺面赭而欬血醫而少間
已腹愈奇疾作作則如束薪藝涌泉由脛及股直連
如貫槃傾耳而聽轆轤有聲至則堅殭不仁膚革一

如木石噴噎不通水漿不內良久忽發一歎身柔緩
如常以日計之凡六七作諸醫斂手橋視之脈數而
浮不任按病得之荒淫不節以故陰虛火炎此其甚
也為之正治則以一杯而熄與薪無已則從治之主
以甘温佐以清涼可也日一劑皆有驗迄于旬日而
新疾平其父以故疾未除則挾一方士自九華至乃
悉屏前藥日烹一鼎餉之頓以人參和以大棗無何
大症復作中高膨脹乃腹逆橋診之則六脈浮取加
弦弦為木旺蓋以啖鴨而傷脾氣故肝木乘虛而克
之將變而為中滿矣急以温補為劑治之兩月乃安

全上○此即前錢國寶所云骨雷之症也

飛尸 即鬼疰

薛立齋治錦衣楊永興舉家避害有僕沈醉失避者既
而神思昏昧遍身青傷令煎金銀藤湯灌之即愈（本卅謂此藥大治五種飛尸此其驗也）

一婦人忽昏憒發譫語自云為前謀賴某人銀兩某神
責我將你起解到城隍理問兩脚踝膝髀處皆青腫
痛不可忍口稱苦楚次日方甦痛尚不止用金銀藤
兩許水煎服即愈

一婦人入古墓患前症以縈金鎚灌之即甦通政余子華太常汪用之皆同往弔而卒死喪家想即是症

謝士泰刪繁方治尸疰或見尸或聞哭聲者取死人席斬棺內餘棄路上者一虎口長三寸水三升煮一升服立效按此即用死人枕之遺意也本艸綱目

庚申予家一婦人夢中見二蒼頭一前一後手中持一物前者云到也未後應云到也擊下爆然有聲遂覺覺後心一點痛不可忍昏悶一時許予忽憶神精丹有此一症取三粒令服之少頃已無病矣云服藥覺痛止神醒今如常矣日後相識稍有邪氣與一二服

無不應驗方在千金中治中風之要藥但近世少曾曾青磁石 疑有誤字 學綱目

寶材治一婦人曰心氣不足夜夜有少年人附著其體診之六脈皆無病令灸上脘穴五十壯至夜鬼來離床五尺不能近服薑附湯鎮心丹五日而愈

一貴人妻為鬼所著百法不效有一法師書天醫符奏玉帝亦不效寶令服睡聖散三錢灸巨闕穴五十壯又灸石門穴三百壯至二百壯病人開眼如故服薑

附湯鎮心丹而愈

一婦人病虛勞真氣將脫為鬼所著寶用大艾火灸關

一婦人入古墓患前症以縈金鋌攤之即甦通政余子華太常汪用之皆同往弔而卒死喪家想即是症

謝士泰刪繁方治尸疰或見尸或聞哭聲者取死人席斬棺內餘棄路上者一虎口長三寸水三升煮一升服立效按此即用死人枕之遺意也本艸綱目

庚申予家一婦人夢中見二蒼頭一前一後手中持一物前者云到也未後應云到也擊下爆然有聲遂覺覺後心一點痛不可忍昏悶一時許予忽憶神精丹有此一症取三粒令服之少頃已無病矣云服藥覺痛止神醒今如常矣日後相識稍有邪氣與一二服無不應驗方在千金中治中風之要藥但近世少曾

青磁石為鞋合耳醫學綱目

賣材治一婦人曰心氣不足夜夜有少年人附著其體診之六脈皆無病令灸上脘穴五十壯至夜鬼來離床五尺不能近服薑附湯鎮心丹五日而愈

一貴人妻為鬼所著百法不效有一法師書天醫符奏玉帝亦不效賣令服曬瞿散三錢灸巨闕穴五十壯又灸石門穴三百壯至二百壯病人開眼如故服薑附湯鎮心丹而愈

一婦人病虛勞真氣將脫為鬼所著賣用大艾火灸關

元彼難忍痛乃令服睡聖散三錢復灸至一百五十壯而醒又服又灸至三百壯鬼邪去勞病亦瘥

越民高十二歲無食挈妻兒至德清雇妻於秀州倉官李深家為乳媪高得錢還越而死李僕許八隨直在秀以幹歸德清及再來之日媪患恍惚譫語作厭夫聲責罵故妻不為資薦李問何以得至此曰我隨許僕船便是以得來李命巫逐未至謾燒蒼木烟熏燎鬼遽云我怕烟氣不敢更留遂無語媪病亦差今人衝惡者必藝術蓋邪鬼所畏也 類編○出醫說

李行簡外甥女適葛氏而寡次嫁朱訓忽得疾如中風狀山人曹居白視之曰此邪疾也乃出針刺其足踝上二寸許至一茶久婦人醒曰疾平矣始言每疾作時夢故夫引行山林中今早夢如前而故夫為棘刺刺足脛間不可脫惶懼宛轉乘間乃得歸曹笑曰適所刺者八邪穴也 脞說

詐病

張景岳向寓榆關客邸一友忽黃昏叩戶張皇甚問之則所狎之妓忽得急症勢在垂危倘遭其厄禍不可解因求救隨往視之見其口吐白沫僵仆于地口鼻

四肢俱冷氣息如絕狀殊駭人及診之則氣口和平與症不應沈思久之復診脈如故始悟其詐也乃以仲景法試之遂大聲言曰此病危矣使非火攻必不可活非用如粟如粟之艾亦不可活又非灸人中着心小腹數處亦不可活吾寓有艾可速取來然火灸尚遲姑先與一藥倘能嚥嚥後稍有聲息則生意已復即不灸亦可若口不嚥或嚥後無聲速灸可也即與一藥囑其服後即來報我彼聞言已驚惟恐大艾著體藥到即嚥少頃即哼聲出而徐動徐起矣次日問其由乃知為喫醋而然也曲中奸狡有如此者

景岳在都時有金吾畜二妾其一則燕姬也有母隨之一日二妾相競燕姬理屈若母助其跳踉遂致氣厥若死乃令一婢抱持而坐自暮達晨絕無甦意延治初入室見其肉厚色黑面青目瞑手撒息微診其脈則伏渺若脫亦意其真危也而治法難施溫補則慮其氣逆未散開導則慮其脈絕難勝蹱躇間乃請復診則以十指交叉抱腹仰坦婢慷曰疑其前已撒手今能又手豈他人之所為乎及診之似有嫌拒意拽之不能動乃出其不意猛拽之則頓脫有聲力強且勁此非欲脫真病明矣因思其脈若此或以肉厚氣

滯此非人稟賦多有之也或以兩腕縣夾此奸人狡
詐亦有之也若其面青色微則怒氣使然自不足怪
識見既定因聲言其危使聞灸法遂先投一劑下咽
即活金吾曰詢其病真耶假耶若假何以竟夕如是
且形症畢肖若真何以藥下即瘳抑果藥之元秘乎
曰元秘乃在言耳不過借藥為名但使彼懼病即去
矣經曰憂可勝怒正此謂也然其狡詐一至于此使
非再診亦幾為所誑可不審哉

一士子為官家所毆遂臥病旬日吐血盈盆曰喧傳人
命連及多人延醫數輩見其危劇之狀皆束手遠避
防為所累也最後張視之察其色則絕無窘苦之況
診其脈則皆和緩如常始而疑繼而悟乃潛語之曰
他可欺也余亦可欺耶此爾之血抑家禽之血耶其
人愕然魄予勿言遂與調和銜感而罷

一隣婦以妒妻詬辱與夫反目因而病劇咬牙瞪眼僵
厥不蘇若命在呼吸間者其夫驚惶無措其妾幾遭
不堪求張救之則脈非其病遂用前法治之愈後其
夫感謝而不知為其所愚也若此二人則又人事中
之常態使不有以鑑別則此中變幻有以假病而延
成真病者有以小忿延成大禍者故并記之以資聞

見

九鍼形

鑱鍼 平半寸長一寸六分其頭大末銳其病熱在頭身宜此

員鍼 其身員鋒如卵形長一寸六分肉分氣滿宜此

鍉鍼 鋒如黍粟之銳長三寸五分脈氣虛少宜此

鋒鍼 兩三隅長一寸六分瀉熱出血發泄癰病宜此

鈹鍼 一名鈹針末如劒鋒廣二寸半長四寸破癰腫出膿血

圓利鍼 尖如毫且圓且利中身微夫長一寸六分調陰陽去暴痺

毫鍼 法象毫尖如蚊甚長三寸六長調經絡去疾病

長鍼 鋒如刺長七寸痺深居骨解腠肉節腠之間者宜此

燔鍼 一名焠針長四寸風虛合于骨解皮膚之間者宜此

禁刺

病與相逆者皆不可刺

大渴　大飽　大饑　新內　大怒　大勞　大醉

大驚　大風　大雨　大寒　大熱　大虛　大困

大竭　濃雲　色脉不順　大患危疾　漉漉之汗

熇熇之熱　渾渾之脉　身熱甚陰陽交爭　五行

刑制（如心病遇癸日餘倣此）　望不補　晦不瀉　弦不奪

胡不濟

禁針穴

腦戶　顱會　神庭　絡卻　玉枕　角孫　顱顱

承泣　承靈　神道　靈臺　膻中　水分　神闕

會陰　橫骨　氣衝　箕門（箕疑期）　承筋　青靈　三

陽絡　手五里（九二十二穴）　合谷　三陰交（二穴孕婦不宜針）　石

門（女子忌之如針之令無子）　雲門　鳩尾　缺盆　客主人（四穴不宜針深肩井此穴針深令人悶倒三里補之）

禁灸穴

承光　瘂門　風府　天柱　素窌　臨泣　睛明

攢竹　迎香　禾窌　顧窌　絲竹空　白環俞

脊中　肩貞　心俞　天牖　人迎

頭維　下關　天府　中衝　陽關　陽池　隱白

乳中　周榮　天

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

漏谷　地五會　陰陵泉　條口　犢鼻　陰市
伏兔　髀關　委中　殷門　申脈　承扶　九四十五六

傷寒灸之可否

內經云脈之所見邪之所在脈沈者邪氣在內脈浮者邪氣在表世醫只知脈之說不知病症之禁忌若表見寒症身汗出身常清數慄而寒不渴欲覆厚衣常惡寒手足厥皮膚乾枯其脈必沈細而遲但有一二症皆宜灸之陽氣下陷故也若身熱惡熱時見躁作或面赤面黃咽乾嗌乾口乾舌上黃赤時渴咽嗌痛皆熱在外也但有一二症皆不宜灸其脈必浮數或

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

但數亦不可灸灸之災害立生若有鼻不聞香臭臭流清涕眼瞼時癢或欠或噦惡寒其脈必沈是脈症相應也或輕手得按瞥者是陰伏其陽也雖面赤宜灸之不可拘于面色赤而禁之也　劉純

辨傷寒五十九刺

五十九刺者為頭上五行以尅越諸陽之熱也

大杼　膺俞　缺盆　背俞（此八者以瀉胸中之熱也）
氣衝　三里　巨虛上下廉（此八者以瀉中之熱也）胃
雲門、髃骨　委中　髓空（此八者以瀉四夫之熱也）

用鍼八法

用鍼八法者迎隨一也轉鍼二也手指三也轉鍼頭四也虛實五也陰陽六也提按七也呼吸八也補瀉損益虛實在此八法

鍼用五門分主客

鍼用五門者井滎俞經合也春刺井夏刺滎秋刺經冬刺合季月刺俞以有五門一月亦同一日亦有五門同年實客為邪氣主人乃正氣知者刺之無不效也

定刺象木

鍼刺可曲可斜可直可正故定刺以象木性之曲直也

口藏比火

凡用鍼先以鍼含口內令温調補滎衛以火性炎上即升降旋轉左右而下也

常山閻氏曰口温鍼暖不惟滑利而少痛亦借巳之和氣與患人榮衛無寒温之爭便得相從若不先温鍼暖與血氣相逆寒温交爭而成瘡者多矣

灸刺分午前卯後離左酉南

午前卯後者乃卯辰巳三時也陽中之老陽可灸刺萬病之虛寒離左酉南者乃午未申三時也陽中之少陰可灸刺萬病之煩躁熏蒸之勞熱而瀉之灸以吹

之炙時丈夫用室女婦人用童男吹之呵之反作清涼之氣也呵吹者炙之瀉法也

接氣通經法

凡欲取偏枯久患榮衛諸疾多是愈而復作者由氣不接而其經不通流雖有暫時之快客氣勝真病當未愈也當此乃令上接而下引呼吸多少經脈長短各有定數立法手三陽接而九呼過經四寸手三陰接而七呼過經五寸足之三陽接而一十四呼過經四寸足之三陰接而一十二呼過經五寸重者倍之吸亦同數此接氣通經呼吸長短之法也 閻廣明

灸分陰陽上下多少

凡灸當先陽後陰言從頭向左而漸下次後從頭向右而漸下先上後下明堂云先灸于上後灸于下先灸于少後灸于多皆宜審之 王執中○料即叔權

鍼灸須藥

千金云病有須鍼者即鍼刺以補瀉之不宜鍼者直爾灸之然灸之大法其孔穴與鍼無忌即向針或溫針訖乃灸之此為良醫其脚氣一病最宜針灸並施若針而不灸灸而不針非良醫也針灸而藥藥而不針灸亦非良醫也但恨下里間知針者鮮爾所以學者

須解用針燔針白針皆須妙解知針知藥固是良醫此言針灸與藥之相須也今人或但知針而不灸知灸而不針或惟用藥而不知針灸者皆犯孫真人所戒也今世所謂醫者則但知有藥而已鍼灸則未嘗過而問焉人或告之則曰是外科也業貴精不貴褓也否則曰富貴之家未必宵針灸也皆自文其過耳吾故詳著千金之說以示人云

避人神說

千金云欲行針灸先知行年宜忌及人神所在不與禁忌相應即可故男忌除女忌破男忌戊女忌己有日神忌有每月忌有十二時忌有四季人神有十二部人神又有所謂血支血忌之類凡醫者不能知此避忌若逢病人厄會男女氣怯下手至困通神達士豈拘此哉若遇急卒暴患不拘此法許希亦云若病卒暴宜急灸療亦不拘此二日之間止忌一時是也又云癰疽疔腫喉痺客忤尤為急凡作湯藥不可避之日覺病須臾即宜便治　又云凡人卒暴得風或中時氣凡百所苦須急灸療漸久後皆難愈此論甚當夫急難之際命在須臾若必待吉日後治已淪于鬼錄矣此所以不可拘避忌也惟平居治病于未形選

天德月德等日服藥針灸可也

論灸

灸有補瀉不可輕議大率沈結寒冷之度施之為宜蓋陰寒濕氣凝留血脈湯劑熨引不能獨治方是時唯火艾足以爍其勢豈非火能運行陽氣驅逐陰邪其效有速于藥石者耶老壯不同強弱異禀灼治之法夫豈一端故多有(適)遍于數百壯少或止于三五七九之數要皆詳審而行之若夫陽病灸之則為大逆是以論傷寒者謂微數之脈既汗之後脈浮熱甚三者悉不可灸惟少陰背惡寒吐利脈不足與夫脈從手足厥之類三者為可灸焉通明申此觸類以往又安有灸燸之妄也故曰不須灸而強與之灸者令人火邪入腹千錯五藏重其煩躁須灸而不與之灸者使冷結重凝久而彌固氣上衝心無地消散可不鑒哉

論刺

其病攣痺其治宜微針形樂志苦病生于脈治以灸刺明九針之用經絡補瀉之法也故榮衛異刺以分血氣之虛實并榮異刺以分五行之子母募俞異刺以分背腹之陰陽春夏異刺以分人氣之淺深大抵虛補實瀉無過不及之傷以輔其平者刺法之大要也

然有病勢未深可刺而即愈者所謂病之始起可刺而已或痺不仁腫痛可灸刺而去之是也有病傳諸經必上下俱刺者所謂刺熱刺癉病甚為五十九刺是也然刺之為言同于擊刺之刺以為利也害在其中黃帝謂徐人安靜手巧而心審諦者可使行針艾張機謂針能殺生人不能起死人凡以用之不可不慎也況九針異體取病有殊十二節異法用有輕重必明日月星辰四時八正之在天寒暑燥濕經水盈虛之在地肥瘠壯弱虛實盛衰之在人然後呼吸補瀉出入迎隨惟意之從豈特知募俞部分皮肉筋骸飢飽勞逸而已哉故曰見微得過用之不殆

論砭石

上古針法垂布于天下制砭石有小大者乃隨病所宜用石代針一曰針石二曰砭石三曰鑱石其實一也破堅決肉砭射腫熱者則決之以砭石良由邪氣暴戾則微針不能及況又病有氣血盛甚逆于肉裡畜結癰腫之類非砭石則不能射之此所謂血實宜決之又形樂志樂病生于內者治之以砭石東方之民多病癰瘍其治宜砭石砭石之來始自于此扁鵲有云病在血脈者治之砭石是故一切腫疾悉宜鑱割

足小指下橫紋間腫在左則割左在右則割右血少出則差以至疔腫癰瘍丹毒癤疽伐指痛病氣痛流腫之類皆須出血者急以砭石砭之大抵砭石之用其法必瀉若在冬時人氣閉塞則用藥而少針石所謂少針石者非癰疽之謂也癰疽不得頃時回苟緩于針石則毒氣內攻腐壞筋骨穿通腑臟矣治石疔瘡則忌瓦礫礪石之類治刀鐮疔瘡則忌鍼及傷割若是者可以藥治也素問又曰人病頸癰或石治之或針灸治之而皆已此蓋同病異治也夫癰疽之氣盛血聚者宜石而瀉之若然則砭石九針之用各有所利善治血脈之變癰腫之病者當審輕重而制之 並聖濟總録○自王執中下

色診

洛陽孫伯英曰誣獄妻子被繫逃於故人是夜覺胃脘痛託故人求藥故人曰有名醫張戴人在焉當與公同往時戴人酒未醒強呼之故人曰吾有一親人病欲求診戴人隔窗望見伯英曰此公伏大驚恐故人曰何以知之戴人曰面青脫色膽受怖也後會赦乃出方告戴人 儒門事親

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

華佗傳鹽瀆嚴昕與數人共候佗遶至佗謂昕曰君身中佳否昕曰自如常佗曰君有急病見于面莫多飲酒坐畢歸行數里昕卒頭眩墮車人扶將還載歸家中宿死 三國志

有士人病顏面青而光其氣哽哽戞乙曰肝乘肺此逆候也若秋得之可治今春不可治其家祈哀強之與藥明日曰吾樂再瀉肝而不少却三補肺而益虛又如屑白法當三日死然安穀者過期不安穀者不及期今尚能粥五日而絕 宋史○亦倉公傳

汪石山曰伏經脈最難求如積熱之久脈反沈細而外症又寒苟非熟望聞問切何可得也世俗諱言試醫錯

醫復諱情妄臆而豪貴婦女往往不得望聞豈不大

續名醫類案卷三十

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

錢塘魏之琇玉橫撰

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

經水

王氏云一婦人有女年十五請診言女年十四時經水自下乃忽斷其母甚恐怖師曰此女為是夫人親女非也若親女者當為說之婦人曰荅言是自女爾師曰所以問者無他夫人年十四時亦以經水下所以女至此而斷是為避年勿怪後當自下惠垣十書

張子和曰一婦人年二十餘歲病經閉不行寒熱往來
咳嗽潮熱庸醫禁切無物可食一日當暑出門忽見
賣涼粉者以冰水和飲大為一食頃覺神清骨健數
月經水自下

滑伯仁治龍君澤室人暑月中病經事沈滯寒熱自汗
咳嗽有痰體瘦瘁臍腹刺痛脉弦數六至有餘曰此
二陽病也素問云二陽之病發心脾女子得之則不
月二陽一明也陽明為金為燥化適遭於暑一火也
以火燥金則愈燥夫血者水類金為化源宜月事沈
滯不來也他醫方制歸茸桂附丸以温經而未進滑
曰夫血得寒則止得温則行得熱則搏一則燥復加
燥藥血益乾則病必甚亟令却之更以當歸柴胡飲
子為之清陽瀉火流濕潤燥三五進而經事通餘病
悉除龍君曰微生幾為人所誤矣

薛立齋診一室女年十七癥久不愈天癸未通發熱咳
嗽飲食少思欲用通經丸薛曰此蓋貝稟氣不足陰
血未充故耳但養氣血益津液其經自行彼惑於速
効仍用之薛曰非其治也此乃慓悍之劑大助陽火
陰血得之則妄行脾胃得之則愈虛後果經血妄行
飲食愈少遂致不救

一婦人經行腹痛食則嘔吐肢體倦怠發熱作渴此乃素稟氣血不足用八珍湯二十餘劑而愈後生二子二年而經不行前症仍作服八珍湯逍遥散百餘劑方愈

一婦經行臍腹痛甚用桂枝桃仁湯而愈

一婦人素有胃火或用清胃散而安後因勞役躁渴內熱肌肉消瘦月經不行薛謂此胃火消鑠陰血用逍遥散加丹皮炒庶以清胃熱用八珍湯加茯苓遠志以養脾血而經自行矣或入火症門

一癉婦少寐經水兩月餘一至誤服通經丸展轉無寐

午前惡寒午後發熱薛以為思慮虧損脾血用歸脾湯作凡午前以六君子送下午後以逍遥散送下兩月餘得寐半載經行如期年餘而瘡愈或入不眠

龔子才治魏憲副妻患逆經吐血不止六脈微濇有力此血虛火盛也以四物去熱地用生地共一兩加酒蒸大黃一錢錢刻本作兩疑悞同煎入童便服之服後血止而經通

徐憲副妻患經閉人皆擬有孕七八月來漸覺黃瘦腹中左右有塊如鼓發熱面赤不思飲食診之六脉微濇此血枯氣欝也以四物湯加香附丹皮白朮之類

白术何以加入十数服又加桃仁紅花數服下血塊多許乃愈

孫文垣治吳北海內人每月經期之前四肢纍纍發塊紅紫脹痛不思飲食胃脘亦常痛（肝火上逆）經水多不及期而至（肝火迫）脉之兩手皆駛以症參觀肝脾二經鬱火也蓋肝主怒脾主思多思多怒隱而不發滯於中故臨經纍纍發塊紅腫於四肢也（脾主四肢）以青皮香附柴胡川芎烏藥白芍丹參元胡索鬱金酒炒黃連炮乾薑治之而愈（青皮烏藥宜酌用）

潘氏媳曰經水不行醫投安胎之劑越七月經忽暴至內有血塊筋膜如手大者一二桶昏冒困憊其脉右關洪滑左寸洪數兩尺皆洪大夜分咬牙亂語（狀如熱入血室）手心熱口噤時手足皆冷心胸脹悶不快面色青孫曰此濁痰流滯血海以誤服安胎之劑益加其滯由血去多故神魂無依痰迷心竅故神昏亂語急為調氣開痰安神養血可生也即以溫膽湯加石菖蒲酒芩天麻棗仁丹參與服其夜子丑時咬牙亂語加減半仍與前藥每帖加竹茹五錢臨睡又與黑虎丹數粒諸症悉愈或問病勢滿每盛於夜半何也曰此心包絡與膽經有痰熱故也當治此兩經痰既消神魂自

安矣

程好吾子婦腹中微疼經行不暢喉痛四肢麻木作戰不知飢餓孫診之右脉洪大如豌豆以川芎香附麥芽山查烏梅甘艸桔梗酒芩防風荆芥白朮茯苓四劑而安次月經水大行十日不止以黃耆阿膠蒲黃各一錢白芍二錢甘艸三分一帖而安此後但覺濁氣下墜屁從子戶中出即陰吹病以補中益氣湯加酒炒黃連調養而平

胡氏女及笄後患吐血呃惡不食便秘時師謂陰虛火動投滋陰之劑反加飽悶背心脹痛脉之兩寸洪大兩尺弱知其有瘀血凝滯致新血不得歸經故滿而倒溢也俗名倒經又名逆經先以龍蕎九通之更以石膏三錢橘紅半夏麴黃連苗根竹茹枳殼各一錢茯苓八分甘艸三分服後大便行三次吐止食進後用二陳湯加滑石丹參丹皮苗根白芍香附二十帖經調而愈此吐血亦經逆也當

此字宜夾註

與龔子才治魏憲副妾案未閱

喻嘉言治楊季登長女及笄經閉年餘發熱食少肌削多汗而成勞怯醫見汗多誤謂虛也投以參朮愈錮喻診時見汗出如蒸籠氣水謂曰此症可療處全在

此字是註宜夫寫

有汗蓋經血內閉止有從皮毛透出一路以汗亦血也設無汗而血不流則皮毛乾槁而死矣當玄府癖閼宜用極苦之藥以斂其血入內俾下通於衝脈則熱退經行而汗自止非補藥所能效也以龍荟丸日進三次月餘經畧至汗熱稍輕令前丸日進一次又一月經大至淋漓五日諸症全瘳矣

王宵堂治一婦寡居鬱結成疾經事不行體熱如炙忽吐血若泉涌或用止血藥不効令以前花根搗汁濃磨沈香服至五錢許日以釀醋貯瓶內火上炙熱氣熏兩鼻孔血始得降下吐血不復作經事乃行 此亦逆經

呂東莊治曹遠思內人月水不至四月矣腹痛不止飲食少進醫作胎火治呂曰此鬱血也然氣稟怯弱當補而行之用八珍湯三大劑果下血塊升許腹痛猶未除也以大劑養榮等藥調理而痛除食進 與立齋素有胃火一案畧同

黃履素曰予媳申氏多鬱怒忽患不月腹漸大疑有妊醫者視之亦以為妊也十餘月弗產諸症漸見乃治疑之醫者亦以為畜血之症時有欲下之者衆議以為體弱不能勝止可暫消于是久用行血調血之劑

而不敢用下血之藥竟勿効厥後醫藥襍投遂致不起一日偶閱震澤紀聞載盛啟東沿東宮妃一案大為悔悼案載江篁南名醫類案門

南山婦人年三十八于九月廿三日月經行比前過後十日得卅藥以敗血為下胎之謀有數滴血下曰此腹痛在小腹下有塊如椀大不可按湯熨則痛稍定大小便抽痛小便澁大便畧下少赤積垢食不進口畧渴發熱此胃氣為卅藥所敗加以受傷之血妄行而不得洩所以為病砂仁甘卅川芎黃連各三分滑石一錢五分牛膝二錢桃仁七粒水酒煎服醫學綱目

黃師文治子才婢子得面熱病旬一面熱至赤且痒悶絕曰此經候時嘗為火所逼也問之曰無之已而思曰昨者經候来遽為孺人黏衣服傴僂曝日中其昏如烈火久以孺人趣其物不敢已由是面遂熱黃曰是也以四物湯加防風獲差北窗炙輠可入面熱門

孫文垣治一婦經不行者三月大便瀉腹脹嘈囉吐酸時下白帶常惡心自謂有孕脉之曰此肝經有濕熱心經有瘀血也與二陳湯加白术澤瀉猪苓酒連茱萸滑石麥芽山查瀉止腹寬經行腰腹作痛以川芎三錢當歸五錢香附丹參桃仁各一錢服之口中吐

黑血甚多且有如膿者改用四物湯加丹皮丹參桃
仁紅花滑石調理而痊
從孫婦程氏年甫三旬產五次今則經閉不行者八年
肉則豐肥于昔飲食又倍于昔精采則豔美于昔膚
柔不堅畧無所謂病者或用四物湯元胡丹皮之劑
千餘服矣至三棱莪朮乾漆桃仁蘇木之類遍嘗不
應診之六脉緩大有力曰此脾濕生痰膈滿于宮徒
行血活血破血無益也以平胃散加滑石桃仁黃連
薑黃丹參南星半夏作丸服之半年而經行次年生
子後又連生一子一女

薛立齋治一婦人性善怒發熱經水非過期則不及肢
體倦怠飲食少思而顴赤此脾氣不足肝經血少而
火盛也午前以調中益氣湯加茯苓貝母送六味丸
午後以逍遙散送六味丸兩月餘而愈
一婦人年五十內熱晡熱經水兩三月一至此血虛有
熱用逍遙散加山茱萸治之而愈後有痰作渴或小
便不利或頭暈白帶用六味丸而愈

琇按五十之年經宜止矣此不當在經水血氣之
門或五字乃四字之訛耳
一婦人月經不調晡熱內熱飲食少思肌體消瘦小便

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

頻數或用清熱生血之劑月經不行四肢浮腫小便淋瀝朝用金匱加減腎氣丸夕用歸脾湯漸愈又用八珍湯兩月全愈

陸養愚治董龍山夫人胸膈不舒大便不實或時去血或時去積經期或先或後或多或少恭差作痛養血健脾俱不効飲食既少肌肉亦瘦晚不能食食則飽脹不能安卧脉之沈弦而滑右關尤甚曰沈為氣滞弦為留飲滑為痰凝經之不調便之不實腹之脹痛皆痰積為之也乃合清氣化痰丸二陳湯送下數劑大便去痰積若干遂不脹不痛改用六君子湯數劑而大便堅後以調氣養榮湯間服經調而孕

施鳳岡室人素嗜五辛三孕皆不育年三十即月事不行將及二載胸腹作痛行走無定或數日一發或一日二三發服養血行血之藥身體時熱肌膚漸瘦或謂補血不補氣無陽則獨陰不生用參耆白朮肉桂芎歸數劑痰中見紅便燥煎血脉之兩手舉按皆數左關散而弦右關數而實兩尺數沈澁曰此血虛不待言然脉症皆火象也惟請其熱則血得所養而經自行矣或謂寒則凝熱則行今以清火療血閉何也曰寒凝熱行者蓋謂無大病者言之也經不云乎二

陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消
傳為息賁者死王太僕曰二陽胃與大腸也二經有
熱心脾受之以致消肌爍肉上氣喘逆今病者素嗜
辛辣豈非腸胃有熱乎令已移之心脾月久不行肌
肉消削是傳為風消辛不喘咳未至息賁耳復投溫
熱是抱薪救火經所謂賛其復翼其勝也法當先清
腸胃積熱使心氣下降續以養血滋陰濟之則水泉
通而流不絕也用三黃湯加山庶丹皮生地白芍十
劑痰紅便血俱減更以前方加芍歸十劑而月事通
矣後以六味丸料加知柏鱉河車一具服之即孕

陸祖愚治吳君采室平日血虛有火生一女已七歲不
再孕忽經候兩月不行以為孕也偶胸膜不快投安
胎養血之劑反少腹作痛經行如崩去血多而痛不
止足膝逆冷氣短奄奄或以為小產用芎歸元胡薑
桂等血不止而痛愈甚咽喉燥痛吞吐有妨脉之沈
細而實按之有力用炒連白芍丹皮花粉當歸炒庶
查肉阿膠煎令徐徐吞下次早喉膜之痛俱愈足膝
反温暖後用歸芍參苓地黃丹皮之類調理而安

韓延年夫人患少腹痛繞篡前後痛尤甚晡時身熱如
火內科治之不効疑癰腫症延外科診治謂脉細澁

且不時昏暈宜用人參培補元氣未必成毒陸脈之左弦濇而弱右弦數而微月事數次不行此似阻而欲大行之候所以作痛然脈微弱如此不可攻宜預益氣以攝血而于補養之中稍佐行瘀之品庶免其排山倒海之勢用熟四物合參耆丹皮紅花查肉二劑病勢少減數日後血果大下昏暈片時即醒血去後身涼熱退復以養榮湯調理數月遂孕

吳清源女善文詞性聰慧以嫁壻不如意憂思悒悒居常反目三年後患經閉不行飲數月矣或與行血不効又投養血亦不効近則飲食入口即心腹作痛不可忍必吐盡方止平時亦嘔酸水數十日間飲食出多入少或投二陳正氣等湯嘔吐遂無已時脈之六部沈數按之則駛氣喘汗微曰此元氣不足虛陽浮越之候也用生脈散濃煎徐徐呷之一二日吐始止後與調氣養榮湯二劑半年後經始行遂孕

陳三農治一婦經行後作痛用八珍湯加杜仲一錢元胡索香附各五分煎服愈

一婦經行作脹作痛行後又痛又脹如是二三年矣大便燥小便微痛微餽肝脈弦滑餘皆沈細而緩弦乃脾土不足滑乃脾有濕痰乃脾虛濕不流也用參苓

白朮散加松花木香以行其滯而漸愈

一婦經後凝血成塊在左泄瀉不止完穀不化血塊暴下如注臭穢難堪經候不調脾胃日而下損且經漏不止前陰之氣血已脫泄瀉不止後陰之氣血下陷總是熱症而下焦久脫亦化于寒矣瀉寒以熱瀉濕以燥宜大升大舉以助肝木生發升長遂以柴胡升麻各五分炙艸陳皮歸身黃耆各一錢人參神麴各少許每二錢水煎熱服而愈

木 鎖當作朮

一婦經水不調未來先痛行後又痛用人參炙艸川芎肉桂丹皮酒洗各五錢白朮茯苓各一兩半當歸酒洗白芍酒炒益母艸酒洗窯拌各一兩白芷木香各三錢糊丸

一婦經前作痛且有白帶每經行必先作瀉（張路玉治薛氏婦每經行必先作瀉十三日其脈左關尺弦細如絲右關上小駛而滑服薑桂茸附則大渴泄瀉轉劇服參澤車前則目暗如盲此肝血虛寒而脾胃有伏火也俟經將行作瀉時朝用理中加黃連作湯服五六劑暮與加減八味丸加縮石英作丸常服不終劑而數年之疾頓除

立齋治一婦人脯熱肢體瘦倦食少無味月經不行或臭衄或血崩半載矣或用順氣清熱止血等劑不應

用十全大補湯加元胡索益母艸木香而安（立齋歸脾湯加減本）

白朮散加松花木香以行其滯而漸愈

一婦經後凝血成塊在左泄瀉不止完穀不化血塊暴下如注臭穢難堪經候不調脾胃日而下損且經漏不止前陰之氣血已脫泄瀉不止後陰之氣血下陷總是熱症而下焦久脫亦化于寒矣瀉寒以熱瀉濕以燥宜大升大舉以奉以助肝木生發升長遂以榮胡升麻各五分炙艸陳皮歸身黃耆各一錢人參神麴各錢半白朮二錢黃耆少許每二錢水煎熱服而愈

一婦經水不調未來先痛行後又痛用人參炙艸川芎肉桂丹皮酒洗各五錢白朮茯苓各一兩半當歸酒洗白芍酒炒益母艸酒洗炙拌各一兩白芷木香各三錢糊丸

一婦經前作痛且有白帶每經行必先作瀉（張路玉治薛氏婦每經行必先作瀉十三日其脈左關尺弦細如絲右關上小駛而滑服薑桂黃附則大渴泄瀉轉劇服參澤車前則目暗如盲此肝血虛寒而脾胃有伏火也俟經將行作瀉時朝用理中加黃連作湯服五六劑暮與加減八味丸加縮石英作丸常服不終劑而數年之疾頓除

立齋治一婦人晡熱肢體瘦倦食少無味月經不行或鼻衄或血崩半載矣或用順氣清熱止血等劑不應

用十全大補湯加元胡索三再加木香而安以上俱大還

更加寒熱且時欲作嘔此為鬱怒虧損脾胃虛火錯經妄行而然耳遂朝用補中益氣湯夕用六味地黃丸各數劑半載而瘥

一婦人素沈靜晡熱內熱月經不調後每一二月或齒縫或舌下或咽間出血椀許此亦逆經也如此年餘服清熱涼血調理之藥益甚此肝脾氣鬱血熱上行先用加味歸脾湯後用加味逍遙散攝血歸源而經自調前症頓愈

陳自明治一婦人月經過期不至腹內作痛服破血行氣之劑不効神仙追毒丸一粒服之而瘥 方見蠱門

立齋治一婦人曰經水多服澁藥止之致腹作痛以失笑散二服而瘳五靈脂蒲黃俱炒等分每服二三錢醋一合熬成膏入水一盞煎七分食前熱服又用加味逍遙散數劑而經調

一婦人經水不調兩月一至或三月一至四肢微腫飲食少思日晡發熱此脾土氣血皆虛也須先用壯脾胃養氣血之劑飲食進則浮腫自消氣血充則經自調矣彼以為緩乃用峻劑先通月經果腹疼瀉不止致遍身浮腫飲食全廢于木旺之月褚氏云月水不通久則血結于內生塊變為血瘕亦作血癥血水

相併壅塞不通脾胃虛弱變為水腫所以然者脾候身之肌肉象于土土主剋于水水血既併脾氣衰弱不能剋消致水氣流溢浸漬肌肉故腫滿也觀此豈可用剋伐之劑

有女人月事退出皆作禽獸之形欲來傷人先將綿塞陰戶乃頓服沒藥末一兩白湯調下即愈奇疾方

朱丹溪治一婦人積痰傷經不行夜則譫妄以瓜蔞子一錢黃連五分吳茱萸十粒桃仁五个紅麴末些少砂仁三錢山查一錢右末之以生薑研炊餅丸治法一婦人陰虛經脉久不通小便短濇身體疼痛以四物湯加蒼朮牛膝陳皮生甘艸又用蒼莎丸加蒼耳酒為丸煎前湯送下仝上

一婦人兩月經不行腹痛發熱但行血涼血經行自愈用四物湯加黃芩紅花桃仁香附元胡索之類仝上

一婦人寡居經事久不行腹滿少食小腹時痛形弱身熱當歸酒浸熟地薑炒香附各七錢白芍川芎陳皮各七分半黃柏炒知母炒厚朴薑製元胡索半錢白朮二錢生甘艸大腹皮各三錢紅花豆大酒浸桃仁九个右㕮咀水煎仝上

陳良甫治羅安人每遇經行時則臍與小腹下痛不可忍服藥無效以桂枝桃仁湯愈自後再發一投而差

桂枝白芍生地黃各二錢桃仁七枚去皮尖甘艸一錢薑水煎大全良方

立齋治一婦人性況多慮月經不行胸滿少食或作脹或吞酸以為中氣虛寒用補中益氣加砂仁香附煨薑二劑胸膈和而飲食進更以六君加芎歸貝母桔梗一婦人因怒傷不思飲食發熱倦怠骨肉痠痛羸瘦面黃經水積漸不通頸間結核以逍遙散八珍湯治之少可彼自誤服水蛭等藥血氣愈虛遂致不起良甫云憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭則神色

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

火疑汨閉水閉火既受病不能榮養其孚故不嗜食于

氣不充又云經候微少漸不行飲食發咳咳既作水氣絶故四肢乾木漸羸瘦潮熱其脉微數此由氣虛血弱陽往乘之少水不能滅盛火故火逼水涸亡津液當養血益陰用柏子九澤蘭湯為主勿遽通之

錢國寶曰吳江黃啟元妻劉氏生平潔淨自十七行經每年一度生二子一女又武林陳氏媳每季行經一

婦科類術 胎生二子二女皆嘗診治之婦此稟賦之異非行也

桂枝白芍生地黃各二錢桃仁七枚去皮尖甘艸一錢薑水煎大全良方

立齋治一婦人性況多慮月經不行胸滿少食或作脹或吞酸以為中氣虛寒用補中益氣加砂仁香附煨薑二劑胸膈和而飲食進更以六君加芎歸貝母桔梗生薑大棗數劑脾胃健而經自調矣

一婦人因怒傷不思飲食發熱倦怠骨肉痠痛羸瘦面黃經水積漸不通頸間結核以逍遙散八珍湯治之少可彼自誤服水蛭等藥血氣愈虛遂致不起良甫云憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭則神色先散而月水閉火既受病不能榮養其子故不嗜食子虛則金氣虧故發咳咳既作水氣絶故四肢乾木氣不克又云經候微少漸不通手足骨肉煩痛日漸羸瘦潮熱其脉微數此由氣虛血弱陽往乘之少水不能滅盛火故火逼水涸亡津液當養血益陰用柏子九澤蘭湯為主勿遽通之

錢國賓曰吳江黃啟元妻劉氏生平潔淨自十七行經每年一度生二子一女又武林陳氏媳每季行經一次七年方受一胎生二子二女皆嘗診治之婦此稟賦之異非按月而行也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R

徐孟陽女葉氏八九經仍不斷體厚無病然甚憂之以問錢曰經云陰生于陽上之數七故婦人七七經斷無子汝母稟厚之極經出理之外矣後壽至九九而終

錢國寶云余游蘭谿時逢端陽友人宴于花園談及邑中醫匠孫二之妻年三十生四子一女自來無經余以戲言未信遣婦僕籃至客皆笑曰此婦是也余即問之婦云不知經為何物夫婦人經候經者常也候者候一月之陰陽也若潮候應乎時天真氣與流通所以女子二七天癸至月水如期凡女人受孕經止者平日所生氣血以養體積而為經血熱則經早血少則經遲血盛則大仍經血衰則五七外經止受孕所生氣血以養胎胎生血上為乳仍止血下為經元門採真返經為乳兩說則經乳一耳經本于腎旺于衝任二脉衝為血海任為胞胎此婦無經者乃衝脉血海與人稟賦不同任脉與人同故乳子生子則一樣素問曰人之心偏則作事不定人之下眼胞窄則胆小五臟各有稟賦外候以此理推明矣

蔣仲芳治姚生婦年二十五其月事或年半或三月方得一至温經補益調治二載轉劇診之脉來微澁外

症口乾唇燥手足心熱曰後期古法主寒然其熏症
熱也曰熱耗血ㄧ少故後期耳遂用大劑生地當歸
為主佐以條芩山庀白芍川芎丹皮澤蘭知母鱉甲
六劑後則經准一月後而孕矣

徐德滋女年近二十素有脇痛肝病常時月事先期而
至近忽逾數日脉之兩關躁疾兩寸上溢簽其面有
如疹者數十點其色或青或紫詢其身亦有至舌上
亦有數點絶類陽明窠熱症然並無頭痛寒熱且能
進飯二甌良由肝火內熾上乘肺胃而然與生地杞
子麥冬丹皮山庀當歸生芍甘艸元參令服一劑次
日晡後始至見其便卧上半俯著床沿嘔血盆許詢
之則自已脾血出如涌既而心下若有一塊上攻故
必便伏以牀沿抵住稍可否則上頂悶絶脉之若有
若無意其經水過期乘肝火上逆而出即俗名倒經
是也然其急暴如此蕙之地氣上攻其症危矣非大
劑純陰何以挽回與熱地二兩杞子一兩令連進二
服服下即能仰卧血止脉回次日忽咳嗽無痰此肺
金燥而肝火未平也前方減半加麥冬沙參菱仁生
地八劑而愈ㄧ後面上之疹乃消舌上之疹褪下如
瘡靨云又顧卜周內人失血奄ㄧ垂斃亦以前藥數

劑而愈

范氏女年及笄矣忽夜病臥小便自遺晨起昏々如醉神氣與人了不相當晡後漸清爽皮膚癮瘰胸膈迷悶食亦少初起覺咽痛頭暈已十餘日矣診之脉弦小而數此屬血虛火盛詢其天癸云何則自前月大行去血甚多至七日乃已謂為肝木過盛剋脾侮胃乘肺而然剋脾則脾不攝血故經水去多侮胃則胃之絡溢故脹悶食減乘肺則肺熱故癮瘰咽痛又肝藏魂肺藏魄二臟不和是以小便自遺而神氣昏昧也與生地杞子羚羊角黑山梔麥冬姜仁黃連丹皮

沙參牛蒡之屬出入加減六帖而安後經水數月不行則以前者去血過多也仍用生地杞子當歸白芍丹皮麥冬少加紅花八劑而月事下

熱入血室

孫文垣治李氏婦胸脇大腹作痛譫語如狂寅卯辰三時稍輕午後及夜痛甚病在血分原有瘀火頭疼牙疼之疾又曰經行三日後頭痛發寒熱醫以瘧治因大惡熱三四人交扇之以兩手浸冷水中口含水而不嚥鼻有微衄熱在經絡又常自悲自哭如狂痛時欲奔竄劇則

咬人蚘厥小水直下不固肝熱喉哽吞藥不下脉之左弦數右関洪滑曰此熱入血室也誤服治瘧劉燥之劑擾動痰火以致標本交作其胸脇痛者病屬少陽也劇則咬人者虫行求食而不得故候中哽亡然也以小柴胡湯加桃仁丹皮而譫狂減次日與安蚘湯痛止飲食進而愈矣

元素姪婦春温後經水遠止餘熱不退口中甚渴胸脇痛而耳重陽脉左弦數右滑大而數小柴胡加石膏知母桔梗枳殻葛根瓜蒌半夏麴服下熱渴如舊改用柴胡二錢人參甘艸天花粉黄芩小柴胡湯去半夏加天花粉以血家忌半夏也白芍紅花當歸丹皮知母各八分調理而瘳此証無譫妄發狂然以凉解不應必用諸血藥乃應則仍是熱入血室矣

朱氏婦經行一月不止每黄昏先寒後熱遍身疼痛胸膈脹悶必得大喊叫嘶用手探吐痰涎乃寛且渴甚此瘀飲壅疾今飲食不進夜如見鬼者乃熱入血室也用小柴胡加生地丹皮桃仁兩帖後以白朮三錢首烏二錢陳皮麥芽各一錢烏梅一个薑三片水煎服之寒熱止諸症皆安

繆仲淳治張璇浦内人患熱入血室發狂欲殺人醫以傷寒治之煎藥未服邀繆往繆曰誤矣覆其藥投一

劑而安先與童便心主血熱邪從血分上乘于心故發狂先與童便引熱下行最為元解繼與涼血行血安心神藥遂定

陸養愚治滅堯山夫人向有頭風症八月間患腹痛日輕夜重痛作昏憒語言不倫唇口燥裂而不欲湯飲已十日或投香燥行氣益甚身熱如火飢不能食脉之沈數而弦詢之遘經行時感冒身發寒熱頭大痛平日服川芎茶調散令服之頭痛稍止而身熱更甚

佳 疑誤

此必熱入血室也或謂此傷寒症乎曰豈必傷寒而後熱入血室哉凡病未有無客熱者況初得之感胃因頭痛而以茶調散遏之熱無從洩遇經行血室空虛熱乘虛而入曰以成瘀血瘀下焦飲食不進而作痛亦勢使然也用小柴胡以清其熱丹皮紅花桃仁以去瘀人參麥冬生津止渴二劑神清痛減能食日服二劑兩日後送化字丸一錢大便去硬血數枚痛全愈減桃仁紅花加歸芍調理而安

薛立齋治一婦人多怒手背患瘡出血至夜發熱妄語服清心涼血藥不應乃熱入血室而然也遂以加味小柴胡湯二劑血止而熱亦清矣

劑而安先與童便心主血熱那從血分上乘于心故發狂先與童便引熱下行最為元解繼與涼血行血安心神藥遂定

陸養愚治臧堯山夫人向有頭風症八月間患腹痛日輕夜重痛作昏憒語言不倫唇口燥裂而不欲湯飲已十日或投香燥行氣益甚身熱如火飢不能食脉之沈數而弦詢之遘經行時感冒身發寒熱頭大痛平日服川芎茶調散令服之頭痛稍止而身熱更甚遂變為腹痛再問經行如常否謂比平素覺住快回此必熱入血室也或謂此傷寒症乎曰豈必傷寒而後熱入血室哉凡病未有無客熱者況初得之感胃

因頭痛而以茶調散遏之熱無從洩遇經行血室空虛熱乘虛而入曰以成瘀血瘀下焦飲食不進而作痛亦勢使然也用小柴胡以清其熱丹皮紅花桃仁以去瘀人參麥冬生津止渴二劑神清痛減能食日服二劑兩日後送化字丸一錢大便去硬血數枚痛全愈減桃仁紅花加歸芍調理而安

薛立齋治一婦人多怒手背患瘡出血至夜發熱妄語服清心涼血藥不應乃熱入血室而然也遂以加味小柴胡湯二劑血止而熱亦清矣

續名醫類案卷三十一

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷三十二

錢塘魏之琇玉橫撰

崩漏

薛立齋治一婦人性急每怒非太陽耳項喉齒胸乳作痛則胸滿吞酸吐瀉少食經行不止此肝火之症肝自病則外症見土受剋則內症作先以四物加白朮茯苓柴胡炒芪龍膽清肝養血次用四君加柴胡白芍神麯吳茱黃炒黃連以培土制肝漸愈惟月經

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

不止是血分有熱脾氣尚虛以逍遙散倍用白朮茯苓陳皮又以補中益氣加酒芍煎服而安

一婦人懷抱不舒腹脹少寐飲食素少痰涎上涌月經頻數薛曰脾統血而主涎此鬱悶傷脾不能攝血歸源耳用補中益氣濟生歸脾而愈

一婦人血崩煎心痛三年矣諸藥不應安痛甚虛症惡具面色痿黃薛曰心主血蓋由去血過多心無所養以致作痛宜用十全大補湯參朮倍之三十餘劑稍愈百餘劑乃全愈

大尹王天成之內人患崩自服四物涼血之劑或作或輟曰怒發熱其血不止服前藥不應乃主降火更加脇腹大痛手足俱冷薛曰此肝胃虛寒所致先用附子理中湯體熱痛止又用濟生歸脾補中益氣二湯崩血頓愈若泥痛無補法則誤矣

錦衣楊永興之內患血崩過服寒涼之劑其症益甚更加肚腹痞悶飲食不入發熱煩躁脉洪大而虛薛曰此脾經氣血虛而發躁也當急用八珍湯加炮薑以溫補之暖則不救不信仍服止血降火之劑虛症蜂起始信其言緩不及治矣

一婦人曰怒崩血久不已面青黃而或赤此肝木制脾

土而血虛用小柴胡合四物清肝火生肝血又用歸
脾補中二湯益脾氣生肝血而瘥此症若曰肝經風
熱而血不寧者防風為九以熏症之藥煎送或肝經
火動而血不寧者炒條芩為九以熏症之藥煎送若
瘀血為患用五靈脂為末燒鍼器焠酒調服無不効
者

山 侍查 以下醫皆危之劉春齋用當歸一兩
荆芥一兩酒一鍾煎服立止如神續金陵瑣事
易思蘭治一婦患崩晝夜十餘次每次去血升許用止
血藥愈甚臥牀月餘羸瘦食少面青口黑氣促痰喘

三字是注宜夾寫

十六字是注宜夾寫

診之心脉平和肝脉弦大時一結肺脉沈而大且有
力脾胃脉沈濇兩尺沈而無力曰此氣欝病也詢之
果因午餐小婢忤意發怒搆疾隨以四神散與之服
藥半盃未及一時頓覺神爽易曰未也明日子時分
指甲變桃紅色方可救至期甲色果紅血活也復診
之左三部如前肺脉微起脾胃雖沈緩而不濇二尺
仍鬱謂其家曰午時血當大崩毋得驚惶以駭病者
至期果然下紫黑血數枚乙木生于午午時肝氣得
令邪不能容也自此遂止後用壯真五和丸調理月
餘全愈次年生子方用四神散以香附行氣為君烏

土而血虛用小柴胡合四物清肝火生肝血又用歸脾補中二湯益脾氣生肝血而瘥此症若因肝經風熱而血不寧者防風為九以薰症之藥煎送或肝經火動而血不寧者炒條芩為九以薰症之藥煎送若瘀血為患用五靈脂為末燒鍊器焠酒調服無不効者

周暉內人病血山崩諸醫皆危之劉春齋用當歸一兩荊芥一兩酒一鍾煎服立止如神（續金陵瑣事）

易思蘭治一婦患崩晝夜十餘次每次去血升許用止血藥愈甚臥牀月餘羸瘦食少面青爪黑氣促痰喘

三字是注宜夾寫

十六字是注宜夾寫

診之心脉平和肝脉弦大時一結肺脉沈而大且有力脾胃脉沈濇兩尺沈而無力曰此氣鬱病也詢之果因午餐小婢忤意發怒搆疾隨以四神散與之服藥半盂未及一時頓覺神爽易曰未也明日子時分指甲變桃紅色方可救至期甲色果紅血活也復診之左三部如前肺脉微起脾胃雖沈緩而不濇二尺仍鞕謂其家曰午時血當大崩毋得驚惶以駭病者至期果然下紫黑血數枚乙木生于午午時肝氣得令邪不能容也自此遂止後用壯真五和丸調理月餘全愈次年生子方用四神散以香附行氣為君烏

藥為臣蘇梗通十二經之閔竅白芷化腐血生新血為佐加當歸引氣入心而生新血撫芎引氣入肝舒肝之鬱而去舊納新神麴引氣入脾暢脾結而統新血白朮健脾胃而和中氣為使以行氣為主活血輔之此治血先調氣之法也

吳景宇先治俞氏婦血淋念載已成痼疾因幼孫出痘危險忽下血兩晝夜不止汗瀉交作暈數次（思慮恐懼三陰並傷也）脉向弦大而草者忽變而數疾欲脫奄奄一息用人參黃耆各一兩製附炮薑棗仁各三錢五味龍骨各一錢或疑附子太熱且謂何不用血藥曰血脫補氣古人精義謂有形之血不能速生幾微之氣所當急固又脾胃氣血俱喜溫而惡寒薑附宜服也二劑脉漸轉前方加歸芍等血藥症已除然脉氣不強非三年調攝未易復也自後參耆不輟計服補劑六百餘帖膏丸數料而起并宿疾亦瘳

一婦人半月前小產繼以血崩舌梗心搖汗出髮潤目夜俱熱耳閉不聞目視不見身浮如在舟車六脉細數欲脫用人參二兩黃耆二兩白朮一兩熟地二兩當歸五錢炮薑製附棗仁各三錢龍骨一錢五分一劑頓減二劑精神爽慧

陸肖愚治王笠雲母年四十九經事已止半年一日忽暴至不止昏暈厥逆脉之兩手沈微如絲急以八物湯加炭灰疑佢發十之七八至十劑六脉方止後數月復崩亦昏暈或以犀角地黃湯加藕節阿膠之屬不止脉仍沈弱以附子乾薑鹿茸俱燒存性同釜底墨酒調服之即止後以六味加四物料服之約二斤一年不作次年八月間又暴至昏暈更久脉之如舊仍以八物湯加附子連進二劑昏暈自晡至晚未甦咸謂必死診之決其必甦蓋氣血暴脫一時補劑未能與胃氣相迎耳

或投以牛黃丸至半夜人事稍省而血尚未止明早陸診後仍剉八物湯少加薑附二劑或遲至云昨夜之甦乃牛黃丸之功公實不知也向因屢服參附致屢崩今人事既省斷宜順氣行瘀去其病本豈可復蹈前轍曰昨早投大補之藥即不服牛黃丸亦甦此等脉症急宜續投參者少緩恐成不救況可更以他藥平或乃怫然而去曰讀父書而坑趙卒天下每多此人陸令先服煎劑隨制存性附子等灰午後入事更爽進粥晚投末藥一服夜間血少止明日又湯散並投血遂止再服前湯十劑而瘳

陸肖愚治王笠雲母年四十九經事已止半年一日忽暴至不止昏暈厥逆脉之兩手沈微如絲急以八物湯加附子薑厥不止脉仍沈弱以十之七八至十劑六日方止後數月後崩亦昏暈或以犀角地黃湯加藕節阿膠之屬不止脉仍沈弱以附子乾薑鹿茸俱燒存性同釜底墨酒調服之即止後以六味加四物料服之約二斤一年不作次年八月間又暴至昏暈更久脉之如舊仍以八物湯加附子連進二劑昏暈自晡至晚未甦咸謂必死診之決其必甦蓋氣血暴脫一時補劑未能與胃氣相迎耳

或投以牛黃丸至半夜人事稍省而血尚未止明早陸診後仍對八物湯少加薑附二劑或遠至云昨夜之甦乃牛黃丸之功公實不知也向因屢服參附致屢崩今人事既省斷宜順氣行瘀去其病本豈可復蹈前轍曰昨早投大補之藥即不服牛黃丸亦甦此等脉症急宜續投參者少緩恐成不救況可更以他藥平或乃怫然而去曰讀父書而坑趙卒天下每多此人陸令先服煎劑隨制存性附子等灰午後人事更爽進粥晚投末藥一服夜間血少止明日又湯散並投血遂止再服前湯十劑而瘳

立齋治一婦人飲食後即怒怨患血崩四肢逆冷抽搐口禁如發痙然吐痰如湧灌以二陳柴胡山梔殼吐出酸味神思稍醒藥止次日進薄粥少許但乳脇脹痛此悉屬肝火熾盛致脾氣不能運化先用六君柴胡山梔鉤藤諸症頓退惟四肢不遂血崩如初或又以為肝火未息欲投清肝涼血之劑此脾肝氣血俱弱先用補中益氣湯培其脾土而血氣歸經又用四物參术柴胡養肝筋而四肢便利（餘見異症名要）

一婦人月經淋瀝無期作欝怒傷肝脾虛火動而血不歸經乃肝不能藏脾不能攝也當清肝火補脾氣與歸脾湯逍遥散二藥而愈

一婦人因怒經事淋瀝半月方遇遇怒其經即止甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰痙抽搦上視作肝火熾盛以小柴胡加鉤藤黃連熟地山梔而愈

王熟中治皮匠妻患血崩兩月飲食不進與鎮靈丹服少減而未斷因檢得耆域方如聖散用棱棚烏梅乾薑各一兩並燒存五分性為末每服二錢食前烏梅湯調下合一劑與服而疾平患甚者不過三服（資生經）

鋪

寫誤

目傷寒而血崩膠艾四物湯一服漸愈後曰勞復大作與鎮靈丹十五丸而止或無

立齋治一婦人飲食後即怒忽患血崩四肢逆冷抽搐口禁如發痙然吐痰如湧潅以二陳柴胡山甲枳殼吐出酸味神思稍醒藥止次日進薄粥少許但乳脇脹痛此悉屬肝火熾盛致脾氣不能運化先用六君柴胡山甲鉤藤諸症頓退惟四肢不遂血崩如初或又以為肝火未息欲投清肝涼血之劑此脾肝氣血俱弱先用補中益氣湯培其脾土而血氣歸經又用四物參术柴胡養肝筋而四肢便利（餘見異症名要）

一婦人月經淋瀝無期作鬱怒傷肝脾虛火動而血不歸經乃肝不能藏脾不能攝也當清肝火補脾氣與歸脾湯逍遥散二藥四劑而愈

一婦人因怒經事淋瀝半月方竭遇怒其經即止甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰痙抽搦上視作肝火熾盛以小柴胡加鉤藤黃連熟地山甲而愈

王熟中治皮匠妻患血崩兩月飲食不進與鎮靈丹服少減而未斷因檢得耆域方如聖散用棱棡烏梅乾薑各一兩並燒存五分性為末每服二錢食前烏梅湯調下合一劑與服而疾平患甚者不過三服（資生經）

有巡鋪之妻年踰五十因傷寒而血崩膠艾四物湯一服漸愈後因勞復大作與鎮靈丹十五丸而止或無

此丹燒鹿角存性為末酒調服亦佳屢驗全上

陳良甫治一婦人崩漏暴下諸醫投薑附桂等藥服之愈甚診之六脉躁數遂用金華散煎局方龍腦雞蘇丸數服即安本事方單用黃芩者亦此意也良方

一親戚婦人年四十五經年病崩漏不止面黃肌瘦髮黃枯槁語言聲嘶服諸藥無効診之六脉微濡問服何藥云凡是當歸川芎澁血諸品丹藥服之皆不作効遂合博濟方伏龍肝散煎白礬丸服之愈全上

繆仲淳治董龍山夫人患血崩由于中年鬱怒百藥不効用大劑參耆令看胎髮百餘丸火煅調入藥服久之漸愈煅髮用小砂鑵鹽泥煉極熱將髮入鑵中封固陰乾以炭火圍之俟黑烟將盡即起若青烟出髮枯不可用美非細心人不可任蓋火候不可過也

王肯堂曰徐朝奉傳其內人有血崩症服諸藥不効用香附炒為末每服二錢米飲調下服後遂痊來選入

一親戚黃正卿內子淩夫人忽苦血崩百藥不効用五靈脂一味不拘多少炒令烟盡研末每服一錢溫酒調下旋服遂安

婦氏 疑當上下另

一婦來淋瀝不斷已經三月涼血止血之藥服至五六十劑不効而口乾唇燥愈甚脉來微

澁詢其大便必瀉果然即以四君子湯加熟附炮薑熟地血餘二劑而止蓋寒客于中火浮于上脾虛而不攝血故淋瀝不已也

聶久吾婦年三十九生子月內調養未善次年春其經兩月餘不行一日忽暴至不止一二飯久即昏暈不省人事急用十全大補湯去桂倍加參耆又加熟附子炒乾薑各一錢灌之甦省後連服二大劑遂止十之七八又十餘日共服二十餘劑乃得全止次年春崩又大作比前尤甚昏暈更久又服前方三十餘劑尚未全安後用鹿茸炒燒存性研末酒調二錢服數次而血止繼服峻補丸藥幸年餘不發然病根未除次年中秋忽又暴至前方連服二大劑血流如水涌吐冷痰至日晡昏暈初更而氣絕惟胸次微温至三更用竈心土研細水調灌一二酒杯冷痰少開遂飲滾湯一錢甦省漸安豈初發時服大補二劑能令生意不絕耶後又服峻補之劑而血止因思三年之內嘗服峻補丸藥而病仍大作者何也或謂補血太過是以積而成崩或謂不宜用附子等熱藥推動其血送至於崩此說極是惜聶君未及明抑知土虛不固然後山崩今既血崩則是血大虛且血氣相依附氣虛甚則降令

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

多升令少是以不能攝血致血不歸經而妄下不惟大補血而尤當大補氣也前丸方雖峻補不合攙入香附益母砂仁元胡等損氣之品乃令病根不除而屢作也因純用補氣血藥一料而神氣爽健二料而病根除次年遂孕而生第八兒矣

劉氏媼年七十病血行如壯年月事久之淋瀝不斷兩月餘耳鳴心跳頭暈目眩惡食罕眠奄奄就斃醫者不一有與歸脾補中者六味四物者十余八珍者諸治未為無見然服歸脾補中則上焦脹而面腫似不宜于補氣服六味四物則少腹脹而足腫似不宜于補血脹八珍十余則中脘脹而氣急似氣血無補又不宜延診先告以不宜用補以症皆緣補而增也脈之沈小而澁兩關尤甚且無神曰此肝脾兩傷之候也以七旬之年兩月之病非補何以能瘳第余之補異乎人之補無慮也熟地二兩以一兩炒炭杞子一兩白芍炒棗仁炒各五錢酒連三分四劑而淋瀝止去連四劑而腫脹消諸症亦愈

姚氏婦早寡年三十餘因月事暴至遂崩漏不止勢甚猛脉之兩寸上溢兩尺甚弱據脉不可與補中益氣據症又不可暫升提以挽其下陷先與熟地杞子白

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

芍棗仁重劑服之果不應急以蕁麻仁十數粒去殼研入麝一分揑作餅于用緣雲膏貼臍上再服前藥血去漸緩少頃再服藥覺血不行即令揭去之又服數劑全愈

白帶

朱丹溪治陶遵外姑年七十形瘦善痰白帶食前薑湯吞大補九五十丸一二次午膳後及臨臥時各與小胃丹十五丸愈

胡安人白帶下月經甚多食少倦怠面黃經中如有血塊者有如筋膜者與參朮等補血氣調脾胃後諸症皆退惟帶未止以椿皮丸主之

薛立齋治一婦人帶下四肢無力薛曰四肢者土也此脾胃虛弱濕痰下注以補中益氣湯送生歸脾二藥治之而愈

孫文垣治吳涌瀾母年六十餘久患白帶歷治不効變為白崩診得右寸滑左寸弱兩關濡兩尺輭弱據脉心腎俱不足中焦有濕古云崩中日久為淋帶漏下多時骨亦枯今白物下多氣血日敗法當燥脾兼補心腎以既濟丹補其心腎以斷下元燥中宮之濕則

萬金矣果末終劑而愈

一僧治蔡大尹內人崩中赤白帶下用墓頭回一把酒水各半盞童便半盞新紅花一撮煎七分卧時温服日近者一服久則三服愈董炳集驗方

一婦人小腹瘕脹小便時下白帶小水淋瀝此肝經濕熱下注用龍胆瀉肝湯而愈薛案

一女人赤帶腰痛以四君子加乾薑肉桂地榆而愈男子腰痛亦効全上

一婦人赤白濁腰痛以四君子加當歸杜仲續斷乾薑地榆而愈

王海藏云李知府妻梅氏帶下病七年血崩不止骨瘦著床日服紫菀丸五丸至十丸十五丸取下膿血五升黃水一升肉塊如鷄子狀始愈方見瘡風門

王教授云有来覓赤白帶藥者予以鎮靈丹與之鎮靈丹能活血温中故也以其神効故書于此但有孕不可服耳若灸帶脉穴尤奇于此丹也資生經

一婦人白帶羔病痛風半夏茯苓川芎陳皮甘艸蒼术

脉沈遲無力此內真寒而外假熱症也用四物二陳
加炮薑肉桂木香少佐艾麻丸服月餘而愈
一寡婦年三旬時或增寒發熱通宵不寐時或經晝昏
聵喃喃獨語遇勞肢體厥冷每用薑葱解表遂致停
熱脾胃乘虛下注而患赤帶脉沈伏重按搏指以為
相火鬱結外假寒而內真熱也用四物加黃連龍胆
炒庇知母茯苓木通投二劑諸症悉平
來天培治一婦年四旬外苦于白帶朝夕常流不止已
十餘日夫外症頭暈腰痛診其脉細澁此肝腎陰虧
氣虛下陷所致法宜以十劑中澁可去脫之劑治之
否則因循慮成弱症矣以六味飲去萸肉澤瀉加牡
蠣龍骨川斷肉杜仲白芍庶角膠不數劑而瘳
一閨女年十五歲夏間患白帶月餘更兼腹痛診之六
脉俱弦細而數按之中指下時一沈此屬脾氣下陷
肝藏濕熱為患用升麻柴胡蒼术白术茯苓半夏廣
皮甘艸黃柏黃芩二劑而霍然
一男子亦有

交腸

交腸症男子亦有

張路玉治詹石匠婦產後五六日惡露不行腹脹喘滿
大便從前陰而出省其故乎日酷嗜烟酒所產之兒

身軟無骨曰而驚駭遂患此症以芎歸湯加茯术肉桂炒黑山查一服悪露通而二便如常

陸聖祥之女方四歲新秋患血痢而稀糞出于前陰作冷熱不調食積治與五苓散服香連丸二劑而愈

錢吉甫女年十三體肥痰盛因隣家被盜發熱頭痛嘔逆面青六脉弦促從而便溺易位此因驚而氣亂痰襲竅端所致也與四七湯下礞石滾痰丸開通痰氣而安

喻嘉言治萋宜人得奇症簡本卅經疏治交腸用五苓散之說以為神秘喻曰交腸一症大小二便易位而出若交易然古用五苓治之專為通前陰而設也若此症閉在後陰二便俱從前陰而出擬之交腸誠有似是而非者況交腸乃暴病驟然而氣亂於中此症乃久病以漸而血枯於內有毫厘千里之別原夫疾之所始始於憂思傷脾脾傷則不能統血而錯出下行有若崩漏寔名脫營宜大補急固乃誤以凉血清火為治脫出轉多於是手陽明之血亦漸消亡令乃大腸枯槁幽門驟閉飲食至此無庸泌別遂清濁并走前陰勢必大腸復通令渣滓率由故道斯為得耳與五苓一方有何干涉況五苓一方又為亡血所深

戒乎向診時嘗問病中多哭泣否答曰時時泣下乃知臟燥者多泣大腸方廢而不用也交腸云乎哉今大腸之脉纍纍而現於指可虞之時其來春棄葉生乎棄葉生而言果驗（按此仍是交腸症惟與驟然氣亂者不同耳）

愚擬治之之法宜集靈膏重用人參以補其肺而潤之蓋肺與大腸相表裏而生氣又肺者相傳之官治節出焉肺得養斯大腸之燥可清又得枸杞二冬以滋其失血之槁然後故道可復而清濁自分矣

薛立齋治一產婦小便出糞名大小腸交乃氣血俱虛失行常道先用六君子湯二劑又用五苓散二劑而（婦人良方作先用五苓散二劑而愈又用補中益氣湯而安）

沈明生治葉惟和室月夜探親其母嘗之食時春寒猶峭歸遂即覺肌粟凜慄次早復當窗梳櫛重感于邪無熱惡寒胸隔真悶一醫見其肌表無熱竟作食傷黃下之不特不更衣反致水道閉行如膏淋之狀從大腸來綿綿不絕漸致肌體萎弱骨立難支診之脉沈而澁虛寒可知計惟有溫中益元之法然慮大便尚結小水未行或增滿之患遂先用五苓散倍加肉桂一服而水

戒乎向診時嘗問病中多哭泣否答曰時時泣下乃知臟燥者多泣大腸方廢而不用也交腸云乎哉今大腸之脉纍纍而現於指可虞之時其來春棄葉生乎棄葉生而言果驗按此仍是交腸症惟與愚擬治之之法宜集靈膏重用人參以補其肺而潤之蓋肺與大腸相表裏而生氣又肺者相傳之官治節出焉肺得養斯大腸之燥可清又得枸杞二冬以滋其失血之樵然後故道可復而清濁自分矣

薛立齋治一產婦小便出糞名大小腸交乃氣血俱虛失行常道先用六君子湯二劑又用五苓散二劑而產婦人良方作先用五苓散二劑而愈又用補中益氣湯而安

沈明生治葉惟和室月夜探親其母嘗之食時春寒猶峭歸遂即覺肌粟凜慄次早復當窗梳櫛重感于邪無熱惡寒胸膈膜悶一醫見其肌表無熱竟作食傷太陰主治遠用大黃下之不特不更衣反致水道閉澁尤可異者白物腥穢如膏淋之狀從大腸來綿亦不絕漸致肌體萎弱骨立難支診之脉沈而澁虛寒可知討惟有溫中益元之法然慮大便尚結小水未行或增滿之患遂先用五苓散倍加肉桂一服而水

道果通再服而宿垢并下嗣用附子理中湯三四劑
後白物漸止更以十全大補調理一月而安夫白淫
白沃載在靈蘭之典皆指前竅中來今乃轉移于後
何也蓋此病始終是一寒症初因食在胃脘之上火
衰不能熟腐而反下之太早則有形之物不能即降
而無形之寒抑遏于闌門之際遂致清濁混清涓不
不息似乎淋帶而實非淋帶也今先以五苓分利陰
陽而倍肉桂使寒隨溺洩上下宣通繼以理中之劑
撤其餘邪鼓其陽氣令脾土温燥而濁流有制宜其
效如桴鼓也夫始用行大便之藥大便不行并致小
便亦澁今用利小便之藥小便即利并致大便亦通
其得失為何如哉

求子

建平孝王妃姬侍皆麗無子擇良家未笄女入御又無
子問尚書褚澄曰求男有道乎澄對曰合男女必當
其年男雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天
癸至必二十而嫁皆欲陰陽完實然後交合則交而
孕孕而育育而為子堅壯強壽今未笄之女天癸始
至已近男色陰氣早泄未完而傷未實而動是以交

而不孕孕而不育育而子脆不壽此王之所以無子也然婦人有所產皆女者有所產皆男者大王誠能訪求多男婦人媒至宮府有男子之道也王曰善未再期生六男夫老陽遇少陰老陰遇少陽亦有子之道也 褚氏遺書

朱丹溪曰肥盛婦人不能孕有者以其身中脂膜閉塞子宮而致經事不行可用導痰湯之類瘦怯婦人不能孕育者以子宮無血精氣不聚故也可用四物湯養血養陰等藥余姪女形氣俱實以得子之遲服神仙聚寶丹背上發癰疽症候甚危予診其脈散大而濇急以加減四物湯百餘帖補其陰血幸其質厚易于收救質之薄者恐將何及

龔子才治劉小亭年四十無子陽事痿弱精如冰冷求診兩寸脈洪兩尺脈沈微無力此真元虛憊乃斲喪過度所致以固本健陽丹加人參附子枸杞覆盆子各二兩製一料服盡覺下元溫暖如前又製一料服至半料而乃正果孕生一子後傳之於劉柏亭劉敏菴服之俱得子

汪石山治一婦人形肥色淡紫年幾三十艱於育子脈之兩尺皆沈微法當補血以形言之肥人氣虛亦當

補氣遂令多服八物湯仍以補陰丸加參耆空腹吞之三月餘有孕復為診之兩尺如舊以理論之孕不當有昔人云脈難盡憑殆此類歟

薛立齋治儒者錢思習子室年三十餘無嗣月經淋瀝無期夫婦異處幾年矣思習欲為娶妾以謀諸薛薛意此鬱怒傷肝脾虛火動而血不歸經乃肝不能藏脾不能攝也當清肝火補脾氣遂與加味歸脾逍遙二藥四劑送至其家仍告其姑曰服此病自愈而當受胎妾可無娶也果病愈次年生子

石妃不妒忌而百斯男獨中山靖王飲酒好內生子百十二人世稱全鹿丸為周文王所定常服之故生子衆多豈中山靖王亦常服是丸者耶何生子之多于文王也 張氏庖言

馮楚瞻治金紹老晨瀉不已就診按其脈兩寸關俱沈弱無力兩尺沈微更甚曰少年得此不惟難愈更恐嗣育之間多女少男矣遷許某至亦索診其脈亦然各道連生數女而無子令以八味去丹皮澤瀉加補骨脂三兩兔絲子四兩五味子二兩早晚食前各服五錢後各生子矣精要云久服令人肥健多子信然哉孚先治蔡孝廉年已五旬苦乏嗣徧求種子方備嘗

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

十載無一驗診得右尺神旺真火本自不衰惟左尺虛弱乃真水乾涸也宜補陰配陽與六味地黃丸加元武膠越二載果得一子

萬密齋曰嘗見男子陰痿者多致無子不可不慮也惟其求嗣之急易為庸醫之惑或以附子石床腦為內補或以蟾酥呵芙蓉為外助陽事未興內熱已作玉莖雖勁頑木無用以致終身無子或有夭殘者吾見此輩無辜而受醫藥之害遍訪諸方無越此者出以示人名曰壯陽丹熟地黃四兩巴戟去心破故紙炒各二兩仙靈脾一兩桑螵蛸真者鹽焙陽起石煅研水飛各半兩上六味合陰之藥研末煉蜜丸如桐子大每三十丸空心只一服溫酒下不可恃此自恣也戒之

生地四兩熟地四兩天冬四兩麥冬四兩當歸二兩枸杞一兩仙靈脾八兩剉碎絹袋盛浸大罈酒內隔湯煮從卯至酉取出埋地下七日夫婦日共飲五六杯

婦人經水不准者即准而受孕此方刻鄒南皐仁文疑當作復

銀臺徐光祿俱云往往得驗因腹記而華之李日華六硯齋筆記

吳橋治胡巨卿胡喜諛諧故與橋習則以久不宜子請壯陽方橋診曰公寸脈浮洪尺中沈澁火炎而不降

十載無一驗診得右尺神旺真火本自不衰惟左尺
虛弱乃真水乾涸也宜補陰配陽與六味地黃丸加
元武膠越二載果得一子
萬密齋曰嘗見男子陰痿者多致無子不可不慮也惟
其求嗣之急易為庸醫之惑或以附子石床腦為內
補或以蟾酥呵芙蓉為外助陽事未興內熱已作玉
莖雖勁頑木無用以致終身無子或有夭殘者吾見
此輩無辜而受醫藥之害遍訪諸方無越此者出以
示人名曰壯陽丹熟地黃四兩巴戟去心破故紙炒
各二兩仙靈脾一兩桑螵蛸真者鹽炒陽起石煅研水

飛各
為末兩上六味合陰之數研末煉蜜丸如桐子大每三
十丸空心只一服溫酒下不可恃此自恣也戒之
生地四兩熟地四兩天冬四兩麥冬四兩當歸二兩枸
杞一兩仙靈脾八兩剉碎絹袋盛浸大罈酒內隔湯
煮從卯至酉取出埋地下七日夫婦日共飲五六杯
婦人經水不准者即准而受孕此方刻鄒南皐仁文
書院集驗方中扶銀臺徐光祿俱云往往得驗因題
記而藏之李日華六研齋筆記

吳橋治胡巨卿胡喜訛諧故與橋習則以久不宜子請
壯陽方橋診曰公寸脈浮洪尺中沈澁火炎而不降

水涸而不升水火不交是曰未濟法宜滋陰補腎庶幾相濟相生使復壯陽則火益炎而水益涸欲血嘔血將不可謀殆矣胡大笑曰吾五十而善飲彊飯不異丁年何病徒以陽痿精滑願得方藥壯之且吾聞滋陰藥如奉漏卮無益橋曰技止此爾胡後遇邑人老而舉于者得壯陽方至蜀都亟服之欲而失聲已復欲血久之肉削大溲浸劇則遣使逆橋橋謝不暇召病深請告歸即危橋歎曰不用公言至此矣幸脉不數聲不嗆骨不蒸血不欲獨大溲日三四行爾橋曰否夫數者嗆者蒸者欲者則陽太未熄猶可鼓而行之今熄矣即爐鞴無及也無何而絕太平廣記

妊娠

文昭皇后之懷世宗也夢為日所逐化為龍而逮后后寤而驚悸遂成心疾文昭太后勅名徐謇及王顯等為后診脉徐謇言是徵風入臟宜進湯藥及加鍼灸顯診云按三部非有心疾將是懷孕生男之象後果如顯言 魏書

汪石山診一婦形長色紫妊五月矣求脉之以別男女汪曰脉右大於左脉訣云左大為男右大為女今脉

右大當是女耶彼則喜曰我男胎矣往歲有妊時尊甫先生診之亦謂右脉浮大當是女孕後生男今妊又得是脉可知為男矣後果生男汪曰脉書但道其常莫能盡其變此醫所以貴乎望聞問切也

張子和診一婦人年四十餘得孕自以為年衰多病故疾復作醫亦不察加燔針於兩膞旁又以毒藥攻磨轉轉腹痛食減形羸已在牀枕張診其脉曰六脉皆平惟右尺洪大有力此孕脉也盖擇食為孕無疑左右皆笑之不數月生一女兩目下各有燔針痕幾喪其明凡治病婦當先問孕不可倉卒

翿王之妻病臍下積塊嘔食面黃肌瘦而不月或謂之乾血氣治之無效張視之曰孕也其人不信再三求治乃與之平藥以應其意（妙否則別求人治或致誤事）終不宵下（毒藥凡攻病之藥皆曰毒）後月到果胎也問何以別之曰尺脉洪大也（亦有尺脉微弱而孕者見素問陰陽別論）所謂陰搏陽別之脉

崑山周知縣景星家一婦病腹中塊痛喘科診之曰氣積投以流氣破積之劑又命人以湯餅軸戛之不効聞有巫峰神廟頗靈往問之云此胎氣也勿用藥信之後果生一男

南京戶部主事韓文光妻病腹中作痛按之若有物在
臍左右者遷浙中一名醫至京請診之云是癥瘕服
三稜蓬朮之劑旬餘覺愈長亦以其不効乃止後數
月生二男此皆有命而然可不慎哉客中閒集

程世光治一有胎婦兒腹啼皆不治乃傾豆於地令婦
低頭拾之兒啼止 江西通志

萬密齋曰兒啼腹中此症臨月將產婦人有之師婦錢
氏嘉靖戊子有娠九个月兒在腹中哭錢大驚令作
男子拜而止之過二十日生師兄邦孝也 師母以下似萬門人

語邦孝似萬之子

李有懷妾高氏懷妊二十七月舉子後亦長成 雲間襍誌

朱丹溪曰懷孕愛物乃一臟之虛假如肝臟虛其肝氣
止能養胎無餘用也不能榮肝肝虛故愛酸物治法

邢氏忘其名朱勝非婦偶小疾命視之曰小疾爾不藥
亦愈然不宜孕孕必死其家以為狂言後一歲朱婦
得男其家方有抱孫之喜未彌月婦疾作忽忽之堅
不宵來曰去歲已言之無可療之理越宿而婦卒人
共奇之 錢唐縣志

妊娠

胎不長

薛立齋治一妊婦胎六月體倦嬾食面黃晡熱而胎不長曰勞欲墜此脾氣不足也用八珍湯倍參朮茯苓三十餘劑胃漸健胎安而長矣

一妊婦曰怒寒熱往來內熱晡熱脇痛嘔吐胎至八月而不長此曰肝脾鬱怒所致用六君加柴胡山梔枳殼鬱蘇桔梗病愈而胎亦長矣

妊娠胎動

薛立齋治鴻臚張淑人病疾後胎動心神不安肢體殊倦用八珍散二十餘劑漸愈曰勞加煩熱頭痛以大劑補中益氣湯加蔓荊子治之熱痛頓止仍用前散又五十餘劑而安其後生產甚易

一妊婦八月胎欲墜如產臥久稍安日晡益甚此氣血虛弱朝用補中益氣湯加茯苓半夏隨愈更以八珍湯調理而愈

一妊婦小腹作痛其胎不安氣攻左右或時逆上小便不利用小柴胡湯加青皮山梔清肝火而愈後曰怒小腹脹滿小便不利水道重墜胎仍不安此亦肝木熾盛所致用龍膽瀉肝湯一劑諸症頓愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安

孫文垣治張溪亭子室妊已七月夢見亡過祖母揮拳
脊打一下即覺胎動不安血已下大小便皆急墜與
小腹脹痛者五日診之兩寸俱短弱此上焦元氣大
虛當驟補之人參阿膠黃耆白朮各二錢當歸白芍
條芩杜仲各一錢砂仁香附各五分苧根嫩皮三錢
蔥白六錢一劑而血止再劑諸症悉除四帖後減去
蔥白苧根調理旬日足月產一女

吳孚先治孫氏婦妊六月作瀉欲小產診之曰此水胎
也四君子加炮薑製附子十餘劑而安

陳三農治一孕婦腰痛甚如欲小產用杜仲一兩薑汁
拌炒續斷一兩二味為丸白湯送下遂安

薛立齋治一婦八月胎下墜或動面黃體倦飲食少思
此脾氣虛弱用補中益氣湯倍白朮加蘇梗三十餘
劑而安產後眩暈胸滿咳嗽用四物加茯苓桔梗半
夏而愈

一妊婦內熱晡熱或蒸寒熱飲食少思其胎或下墜或
上攻此肝經血虛而火動耳先用加味逍遙數劑次
用六君子加柴胡枳殼各數劑而愈

一婦人每胎三四月作痛欲墮此為痛胎用當歸二錢
熟地黃三錢而愈

妊娠 于懸即胎上逼也附于滿

薛立齋治一妊婦每因恚怒其胎上逼左關脉弦洪乃肝火內動用小柴胡加茯苓枳殼山梔而愈但體倦不食用六君子調養脾土加柴胡枳殼調和肝氣乃

瘧

一妊婦胎上逼胸滿噯氣飲食少思此脾氣鬱滯用紫蘇飲頓安又用四君子加枳殼柴胡山梔而瘧孫文垣治費少垣乃眷妊已九月痰多喘嗽胎氣上逆眼撐不起兩太陽微疼此子懸症兼痰火也以大紫蘇飲為主纔服一帖即不上逆胸膈頓寬唯喘嗽不止與七製化痰丸而安

陸祖愚治梅養中子婦孕七月暮夫出外經商患胎上衝心不時昏暈或與紫蘇安胎飲數劑不効脉之寸大於關關大于尺俱帶弦數此血虛極而火上炎之故也用清氣養榮湯磨沈香四分牛黃二分煎就徐徐灌之不終劑而甦矣

蔡元度罷人有孕夫人怒欲逐之遂病心腹間氣刺滿痛腸鳴嘔吐減食醫官王師復處香木散用莪术煨二錢丁香一錢甘艸三分共為細末分作三服空心

鹽湯調覺胸中如物推下之狀而愈萬密齋廣嗣紀要 ● 推下者其藏未之力歟

萬密齋治徐太和之妻娠八月得于滿病或作于懸治不効腹滿轉甚胎墜下迫玉門大張胞形外露但仰卧不能坐其脉兩手俱大堅搏指謂曰病無害乃孿胎也胎肥氣弱不能束約故下墜耳用束胎和氣主之加人參一錢艾麻炒三分服三劑胎復上而安後生一男一女

楊乘六治我修妊婦妊八月一日胎忽上搶塞至心口喘滿不食自汗悶絶僵卧口噤目直視面色不赤舌色不清按其兩手脉息尚有急取丸子兩許滾湯研化灌之灌至兩酒杯胸口鬆動口開睛轉手足運動而甦問何藥乃爾神曰八味丸也又問此何病而用此丸曰此子懸也由下虛冷腹中無火以養嬰兒故上湊以就心火之温如入睡被中足冷則上縮也後用耆朮芎歸煎送前丸服至兩月而産來選入

薛立齋治一妊婦每胎至五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身後及遍頭面此脾肺氣虛朝用補中益氣湯夕用六君加蘇梗而愈

元豐中淮南陳景初名醫也獨有方論治妊婦子腫

其方初謂之香附散李伯時易名曰天仙藤散王荊公居金陵舉家病以詩贈景初曰舉族貧無病煩君藥石功到家何所寄一一問征鴻曰此見方得于李伯時家傳方錄于臨川張右丞宅醫說續編薛立齋治一婦子腫用紫蘇飲三服而愈大還當入下子腫

妊娠 子腫

一孕婦遍身皆腫或以為白火疽或以為鼓脹治俱不効產科鄭大生曰此名琉璃胎至將產一月前必飲食大進產即腫消矣已而果然彼蓋閱歷多故耳然病之所以然究未之知也沈效曾抄本

一婦人孕七月先下體發腫漸及面目閱數日忽于戶內突出一水泡皮薄而光亮于是身腫悉消矣然起卧不便困苦非常後復皮破出水恒不得乾偶一內親自言昔嘗患此有醫教用王不留行及明礬等藥煎洗而痊如言試之甚于蜇痛如此月餘比前稍愈而終不除詢產科亦罕知者但云此似不妨必所謂琉璃胎也產時自消後果然仝上

一孕婦遍身發腫既產仍不消只向裡床卧終日昏迷不省人事有時少醒即又狂躁不寧如此二十餘日

絕口不食諸醫束手偶有村媪聞而告曰無憂我兒
媳亦曾若此不餓死也但用陳年白鬻向病人前炙
熱以米醋沃之彼聞香自然欲食如言果驗腫亦遂
消仝上

轉脬

鍾大延治一貴家孕婦小便秘腫脹面赤發喘衆醫莫
効大延診之曰是可弗藥乃胎壓膀胱耳令其周身
轉運而瘳（寧波府志）

孫卓三浮梁人精岐黃正德間邑令以宸濠之寠先輿
送其夫人避山中病前秘五日腹膨如鼓仰而張目
息已微急召孫孫曰此盛暑急驅飲水過度羞溺而
轉脬也法以猪尿脬吹氣貫滿令女婢投入衝之而
溺淋瀝下遂起（江西通志）

孫文垣治一富家婦大小便秘者三日市師以巴豆丸
二帖大便瀉而小便愈秘脹悶臍突二寸餘前陰脹
裂不能坐臥啼泣呻吟欲求自盡孫曰此轉脬病也
柏樹東行根皮一寸滑石三錢元胡索桃仁當歸瞿
麥各一錢臨服入韭菜汁半杯服後食頃小便稍行
玉戶痛甚非極用力努之則不能出改用艾麻桔梗

枳殼元胡索煎成調元明粉二錢乃提清降濁之意服後大小便俱行始不脹急次日報云每便時腹先痛有淡血水小便短再以丹參丹皮當歸白芍甘艸青皮香附元胡茯苓山庵山查兩帖而安

孫君又有四卷七十七頁一案亦轉脬病治法大略同高其下體良久其尿自通殊不費力

脚膝彎架肩上將下體虛空提起搖擺數四則尿脬倒上徐徐放下患者去夜不及小便箭射而出熱如湯黑如墨頃刻盈盆一段按轉脬病古人但令患者橫卧榻上

黃履素曰予窗友賀立菴方伯常言其伯父賀岳精於醫曾治一孕婦將坐艸患小便不通百藥不効愈飲愈飽束手待斃賀君診之曰此乃脾氣虛弱不能勝胞故胞下墜壓塞膀胱以致水道不通大健其脾則胞舉而小便自通以白术二兩土炒加炒砂仁數錢別加一二輔佐之藥服一劑小便立通其神如此予常記此言于慷中壬寅歲內人有妊臨月竟同此病醫藥無功危甚余以此法告醫者喜醫虛心如法治之立効遂舉長子寅錫余若不聞此言母子均殆矣

李時珍嘗治數人小便不通及轉脬危急者令將葱管吹鹽入莖內極有捷効又小兒不尿乃胎熱也用大

葱白切四片乳汁半盞同煎片時分作四服即通不
飲乳者服之即飲乳若臍四旁有青黑色皮口撮者
不可救也本艸綱目

薛立齋治司徒李杏岡仲子室孕五月小便不利諸藥
不應薛曰非八味丸不能救不信別用分利之藥肚
腹腫脹以致不起

儒者王文遠室患小便不通小腹腫脹幾至於殆用八
味丸一服小便滴瀝再以前丸之料加車前子一劑
即利肚腹頓寬而安

陸養愚治方思桂女年十四患大小便不通已三日村
醫與丸藥數十粒如芝麻大服之大便立通而瀉小
便仍秘又二日脹悶臍突少腹時時抽痛不能坐臥
啼泣呻吟欲求自盡脉之沈數而兩尺甚曰此轉
脬病也時尚炎熱以六一散井水調服之小便稍行
努責而無積 未詳 以仍點滴不暢大便努責而無積腹
痛時作痛則如刀刺再診脉仍沈數乃用艾麻三錢
紫菊甘桔各一錢以提清降濁服後二便俱行小便
純血大便亦帶血水其家甚危之曰今無患矣向者
丸藥必巴豆也病本熱鬱而以極熱之藥攻之向之
刺痛今之溺血皆巴毒使然也以犀角地黃湯加黃

葱白切四片乳汁半盞同煎片時分作四服即通不
飲乳者服之即飲乳若臍四旁有青黑色皮口撮者
不可救也本艸綱目

薛立齋治司徒李杏岡仲子室孕五月小便不利諸藥
不應薛曰非八味丸不能救不信別用分利之藥肚
腹腫脹以致不起

儒者王文遠室患小便不通小腹腫脹幾至於殆用八
味丸一服小便滴瀝再以前丸之料加車前子一劑
即利肚腹頓寬而安

陸養愚治方思桂女年十四患大小便不通已三日村
醫與丸藥數十粒如芝麻大服之大便立通而瀉小
便仍秘又二日脹悶臍突少腹時時抽痛不能坐臥
啼泣呻吟欲求自盡脉之沈數而兩尺甚曰此轉
脬病也時尚炎熱以六一散井水調服之小便稍行
行時陰中極痛後仍點滴不暢大便努責而無積腹
痛時作痛則如刀刺再診脉仍沈數乃用艾麻三錢
紫菊甘桔各一錢以提清降濁服後二便俱行小便
純血大便亦帶血水其家甚危之曰今無患矣向者
丸藥必巴豆也病本熱鬱而以極熱之藥攻之向之
刺痛今之溺血皆巴毒使然也以犀角地黃湯加黃

連山庖數劑而愈

萬密齋治一娠婦淋瀝小便不通醫作轉胞治之不愈乃用檳榔赤芍二味研末順取長流水煎湯調服效此方治男婦一切血淋及淋澁水道疼痛用之無不神驗

馬元儀治沈氏妾妊娠八月下利二十餘日利後患小便淋閉渴而引飲飲畢方去滴許澁痛異常已三晝夜診得肺脉獨大餘脉虛濇曰下利經久脾陰必耗燥火自強今見肺脉獨大是火據肺位金被火制氣化不及州都便溺何由而出經曰病在下者治上令上竅越則下竅自行矣且妊娠之體脉見虛澁氣血不能養胎可知若再行趨下不惟病不除且有胎動之患曰與紫菀五錢尚達肺氣下及膀胱乾葛一錢升發胃氣敷布津液火鬱則燥勝則風生以薄荷清之加枳殼桔梗開提三焦之氣一劑小便如泉再劑利下亦止

吳橋治趙氏婦故孱弱有身七月病不得大小溲醫者遽以四苓利之卒不利久則小腹前後脹急痛楚燥亂昏憒殆將不勝橋診之則以補中益氣湯加黃連為劑一服小溲稍行明日為湯液五斗呼挈壺者口

授之扶病者坐臨盤遮引湯沃病者腹沃已口授產婦舉手奉其胎大小溲即行病愈矣病得之食砒而唾未盡其遺毒觸胎病者故內虛胎氣下墮而壓脬矣或曰胎壓脬而不得小溲誠是也大溲何為橋曰小溲塞則鼓膀胱是將壅大腸其氣亦為不利故爾

聞者曰善太函集

妊娠胎墮

薛立齋治一婦人墮胎每懷慣不時吐痰自用養血化痰之劑昏憒不省自汗發搐痰涎湧出彼以為中風欲用祛風化痰之劑薛曰此屬脾氣虛寒所致遂用十全大補湯加炮薑二十餘劑尋愈

一婦人年二十餘痰疾墮胎時咳服清肺解表喘急不寐薛謂脾土虛不能生肺金藥損益甚先與補中益氣加茯苓半夏五味炮薑四劑漸愈又與八珍加五味及十全大補湯全愈

龔子才治一婦人每懷孕至三个月必墮不肯服藥教以四五年老母雞煮湯入紅穀小黃米煮粥食之不數服而胎固至足月生男

方節菴之夫人朱屢受產難曰就醫乞墮胎方服之無

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

効復求方於薛醫産鄭氏鄭云墮胎不下必貴兒也
今後宜服安胎藥矣一日方閉步阡陌閒見一道人
手攜竹筐坐於橋下與之語遣氣益然曰設齋留之
到家問筐中何物曰此濟瘵病人丹藥也曰投一方
名曰回生救産丹并勸修合普施朱夫人誕彌厥月
時服一丸則果如建矣遂連生二子長名鵬宇矯亭
次名鳳宇改亭後一為宮詹一為御史云張氏庖言

薛立齋治一婦甚于生育孕及三月以面粉燒酒調服
墮胎胎去下血不止嘔吐湯藥不納六脉細小欲絶
作委藥傷胃氣胃虛不能司納以人參二錢甘艸五
分水煎徐徐與服嘔止用八珍湯調理而安

又治一孕婦用前藥患前症胸膈飽滿嘔吐不止用蒸
豆甘艸湯飲之而安

一婦懷孕三月而墮墮後發熱自汗四肢軟弱曰氣血
虛不能榮養其胎故墮墮後益虛陰虛則發熱陽虛
則自汗以十全大補湯去桂加五味子而安

吳橋治程應兆妻故多病三月不月已忽微行諸醫以
為積血而力導之惡乃大至舉身汗溢垂絶而甦則
又以為虛極而重劑補之上視反驚搐昏冒髣帀
待盡橋診之脉雖離絃按之不絶曰此妊脉也誤謂

積血迫之大行胎離經而欲下則血竭而逆窮陽氣無陰血可依則浮騰而上越胎隨陽上逆而觸心故上視反張驚搐昏瞀法不當死乃予順胎散始進甚艱既及半而藥力行嗒焉而寐諸醫目橋曰死矣橋曰藥中病乃寐諸公待之頃之呻吟始云頭痛諸醫以為餘燼也夜分乃終橋曰中夜陽生比當來復時至而圉圉乃少舒詰朝爽然俄仆卧內諸醫目攝橋曰真死矣橋曰胎欲下而血垂盡壅閼不得行尋以順胎散下之則血塊大如拱諸醫攝橋曰吾儕固以為積血果然橋徐應曰非積血也胎也立引水激而

濯之外紫而中白具人形病者漸安諸醫乃服

妊娠胎死

許裕卿治部涵貞內子孕十七月不產不敢執意憑脉問諸情況果孕非病但云孕五月以後不動心竊訝之為主丹參一味令日服七錢兩旬餘胎下已死而枯其胎之死料在五月不動時經十三月在腹不腐而枯如果實在樹敗者必腐亦有不腐者則枯胎之理可推也張路玉治馬雲生婦孕十三月不產脈來微結為處十全大補湯服至二十餘劑而下胎枯色

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, WWW.NCL.EDU.TW

白治雖異而胎枯則一也

喻嘉言治顧季掖乃室仲夏時孕已五月偶爾下血臀以人參阿膠勉固其胎又經一月身腫氣脹血逆上奔結聚於會厭胸膈閒食飲纔入觸之痛楚轉下甚艱稍急即嘔出全似噎症數更醫咸謂胎氣上逼延至秋計孕已八月病已亟呼吸將絕診之不云病狀其脉尺部微濇難推獨肺部洪大無倫其喘聲如曳鋸其手臂青紫腫亮如歐傷色乃駭曰似此凶症何不早離然不必明言以滋驚恐姑以善藥投之通其不閉上壅可也必求病名曰上壅者以肺脉之洪大合於會厭之結塞知其肺當生癰也下閉者以尺脉之微濇合於肉色之青腫知其胎已久壞也善藥者瀉白散加苓桔之苦以開之不用硝黃等厲藥也服一大劑腹即努痛如欲產狀問欲產乎曰肺氣開而下行多時閉拒惡穢得出可也奚產之云再進一劑身腫稍退上氣稍平下白污如膿者數斗裹朽胎而出旬餘尚去白污並無點血相間可知胎朽腹中已近百日蔭胎之血和胎俱化為膿也病人當時胸膈即開連連進粥神思清爽然朽胎雖去而穢氣充斥周身為青腫者未去也胸厥雖寬而肺氣壅遏為寒

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

熱咳嗽者未除也乃一以清肺為主旬餘獲痊然則肺癰未成乃穢濁之氣上攻而然耳

立齋治一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜口中甚穢意其胎必死令視其舌果青黑與朴硝半兩許服之隨下穢水肢體傴僂怠氣息淹淹用四一婦胎死服朴硝而下 本上 亦薛案

君子為主佐以四物薑桂調補而愈 濟陰綱目

李將軍妻病甚呼華佗視脈曰傷娠而胎不去將軍言閒實傷娠胎已去矣佗曰按脈胎未去也將軍以為不然佗舍去婦稍小差百餘日復動更呼佗佗曰此

事

疑似

胎當生兩兒一兒先出血出甚多後兒不及生母不自覺旁人亦不悟不復迎遂不得生胎死血脈不復歸必燥著母脊故使多脊痛令當與湯并針一處此死胎必出湯針既加痛急如欲生者佗曰此死胎久枯不能自出宜使人探之果得一死男尺所佗之絕枝凡此類也 三國志

所

疑當作許

甘陵相夫人有娠六月腹痛不安華佗視脈曰胎已死矣使人手摸知所在在左則男在右則女人云在左于是為湯下之果下男形即愈 三國志

陳斗巖治一婦孕四月而墮墮後腹腫發熱氣喘脈洪

熱咳嗽者未除也乃一以清肺為主旬餘獲痊然則肺癰未成乃穢濁之氣上攻而然耳

立齋治一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜口中甚穢意其胎必死令視其舌果青黑與朴硝半兩許服之隨下穢水而愈 濟陰綱目

一婦胎死服朴硝而下穢水肢體傀怠氣息淹淹用四君子為主佐以四物薑桂調補而愈 古今 亦薛案

李將軍妻病甚呼華佗視脈曰傷娠而胎不去將軍言閒實傷娠胎已去矣佗曰按脈胎未去也將軍以為不然佗舍去婦稍小差百餘日復動更呼佗佗曰此脈故事有胎前當生兩兒一兒先出血出甚多後兒不及生母不自覺旁人亦不悟不復迎遂不得生胎死血脈不復歸必燥著母脊故使多脊痛令當與湯并針一處此死胎必出湯針既加痛急如欲生者佗曰此死胎久枯不能自出宜使人探之果得一死男手足完具黑長可尺所佗之絕技凡此類也 三國志

甘陵相夫人有娠六月腹痛不安華佗視脈曰胎已死夫使人手摸知所在在左則男在右則女人云在左于是為湯下之果下男形即愈 三國志

陳斗巖治一婦孕四月而墮墮後腹腫發熱氣喘脈洪

盛面赤口鼻舌青黑陳曰脉洪盛者胎未墮也面赤者心火盛而血乾也口鼻舌青黑肝氣絶而胎死也以蛇蛻煎湯調平胃散加芒硝歸尾服之下死胎而安

胎衣

胎衣不下

儒人杜氏生產不下坐婆魂童救療皆無効名診之曰產前脉不可考但當察色而知之遂揭帳明燭以察之其面色赤舌色青見此色者知胎已死母却無憂矣或問曰何以知之荅曰面赤舌青者子死母活明矣躬自合至寶丹二粒服之胎即落美以此見古人處方神速良方

妊娠

異胎

莊氏婦懷妊三年不產有醫者診之曰脉象頗異疑必異物當以藥下之服畢覺腹中奇痛產一胞墮地而裂中有小蛇五蜿蜒盤屈以次而出急撲殺之沈布衣麟親見其事 三笘識畧

張路玉治一婦懷孕六月曰喪子悲哭動胎醫用黃荃白朮等二服不應改用香附紫蘇枳殼砂仁一服胎遂上逼心下脹悶喘急口鼻出血第三日薄暮往診其脉急疾如狂風驟雨十餘至則不至頃之復至如

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

盛面赤口鼻舌青黑陳曰脉洪盛者胎未墮也面赤者心火盛而血乾也口鼻舌青黑肝氣絶而胎死也以蛇蛻煎湯調平胃散加芒硝歸尾服之下死胎而安

陳良甫治繆宅厥媳孺人杜氏生產不下坐婆魂童救療皆無効名診之曰產前脉不可考但當察色而知之遂揭帳明燭以察之其面色赤舌色青見此色者知胎已死母却無憂矣或問曰何以知之荅曰面赤舌青者子死母活明矣躬自合至寶丹二粒服之胎即落矣以此見古人處方神速良方

妊娠異胎

莊氏婦懷妊三年不產有醫者診之曰脉象頗異疑必異物當以藥下之服畢覺腹中奇痛產一胞墮地而裂中有小蛇五蜿蜒盤屈以次而出急撲殺之沈布衣麟親見其事三當識異

張路玉治一婦懷孕六月曰喪子悲哭動胎醫用黃荅白朮等二服不應改用香附紫蘇枳殼砂仁一服胎遂上逼心下脹悶喘急口鼻出血第三日薄暮往診其脉急疾如狂風驟雨十餘至則不至頃之復至如

此九字是小注

前日喻之曰此孕本非好胎安之無益不若去之以存母命曰思此胎必感震氣所結震屬木惟金可制令以銕斧燒紅醋淬乘熱調芒硝一兩灌之夜半果下異胎下後脉息微和神思恍惚所去惡露甚多又與安神調血之劑數服而安

孫文垣治張氏婦年二十一診之左寸關短弱尺滑右寸亦滑左寸尺皆滑是孕脉也關濡弱尺沈微診畢其夫問曰脉何如病原不告曰心神脾志皆大不足(國圖得妙)孫君平生多病肺經有痰以一痰揣病曰不然乃有身也曰左寸短弱如此安得有孕云已七十日矣問曾經孕育否曰已二次今乃三也問二產皆足月否男耶女耶曰始產僅九月手足面目俱全第無啼聲抱起已身冷矣細檢之乃知其無水火也(水火前後陰也)次亦九月而產亦無啼聲驗之口中無舌二胎之異如此乃為制方以補心脾為主令多服以百帖為率棗仁茯神遠志各一錢白朮二錢白當歸枸杞各一錢五分甘艸五分生地八分艾炭二分龍眼肉五个水煎服足月產一子次年又有身不以前事為意至九月產下形體具備外有脂膜一片包其面不能去即殞曰思上年所產獲全棄之力也乃以前方黏壁間縵覽有身即照

方服之後生子女皆無恙凡小兒有不足之症皆緣父母有虛損處觀此當舉

河南開封府有丹客之婦懷妊甚巨動躍閒似雙胎也丹客語婦曰若生二男當名虎四兒虎五兒一日欲出而天若雨狀謂妻曰晴履可耶抑雨具去可耶妻未荅則腹中朗應無雨丹客驚懼曰汝何人則曰虎四兒也言未竟又聞聲曰雖不落也有幾點丹客曰汝又何人則曰虎五兒也自後凡有言無不驗一日謂丹客曰汝所為竟煉不成必須爐如何置火如何候藥如何辨又曰如何如何乃毛也如何如何小點化如何如何大點化待吾母為之可也丹客遂如言行之火然硫黃偶客至閉室既不深廣而客又不行其婦與二兒俱曰黃氣迫人柰何柰何至夜薰蒸死世冷有小點化之術謂其傳也予則以為豈非天怒其泄故欲滅其口耶然亦不知何妖也七修類藁

錢國賓云山西大同軍人朱劉祿娶妻孔氏七年始孕其腹極大六月不能行八月不能動仰卧于床延診右寸及兩尺脉王別部一倍經斷當生雙女其懷胎之狀主難產令服易產湯劑以救其母至十月期足腹痛產下一女其腹不減至三日腹陣痛再產一女

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

其腹仍大咸謂怪異必傷其母矣次日腹又陣痛又
產一女腹始如故初生二女存三生之女斃

鬼胎

滑伯仁治仁孝廟廟祝楊天成一女溥暮遊廟廡見黃
衣神覺心動是夕夢與之交腹漸大而若孕邀伯仁
治診之曰此鬼胎也其母道其由與破血墮胎之藥
下如蝌斗魚目者二升許遂安（此條醫說續編作呂滄洲）

薛立齋治一婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃
用胎症之藥不應診之曰面青脉濇寒熱往來肝經
血病也面黃腹大少食體倦脾經血病也此鬱傷脾
脾之症非胎也不信仍用治胎散之類不驗薛用加
味歸脾逍遙二藥各二十餘劑諸症稍愈彼欲速効
別服通經丸一服下血昏憒自汗惡寒手足俱冷嘔
吐不食薛用人參炮薑二劑漸愈又用十全大補湯
五十餘劑而安（此條依婦人良方鬼胎選入）

東白馬氏婦有妊歷十四月不產形瘠且黑松陽周
漢卿脉之曰非孕也乃為妖之所乘耳以藥下一物
如金魚疾旋已（醫說續編）

立齋治一婦人虛羸有鬼胎癥塊經候不通診之曰此

病也非胎也令服四物湯加芫花根而愧漸消又令
用莫葉莫川芎葉秦僵蚕巴戟巴豆不去油芫花醋製
為末煉蜜丸梧子大每服七丸蜜酒下即出惡物而
愈後以八珍湯調理而安

錢國寶云余之太倉有長年吳山其妻懷孕十有八月
胎形漸大山以貧人難娶日懷生死之憂求便道一
診其脉浮沈長短去來至止上下不一知痰非胎矣
曾見痰火當門書中一款凡婦人當經愛驚其痰由
心包絡流入血海如懷胎狀經閉漸大活動身安此
假胎也以清痰活血輕劑用芎歸地芎貝母天冬半
夏香附白芥子茯苓陳皮枳殼各一錢煎服數月乃
愈

六和塔農夫朱言之妻生平無病為人寡言凡有氣惱
不發肝火鬱可知夫于天啟二年經後懷胎漸大起
居飲食如常至十月不生又十月不生家人憂甚醫
二故字似宜衍一故錢亦曾診見六部浮鼓亦未敢斷又
過五月終日撒屁如此兩月胎消曰當經著氣傷肝
火鬱冲于血海似懷胎而無形此名氣胎表出以識

病也非胎也令服四物湯加芫花根而塊漸消又令
用莫吳莫川芎柴秦僵蚕巴戟巴豆不去油芫花醋製
為末煉蜜丸梧子大每服七九蜜酒下即出惡物而
愈後以八珍湯調理而安

錢國寶云余之太倉有長年吳山其妻慞孕十有八月
胎形漸大山以貧人難娶日懊生死之憂求便道一
診其脉浮沈長短去來至止上下不一知痰非胎矣
曾見痰火當門書中一款凡婦人當經愛驚其痰由
心包絡流入血海如懊胎狀經閉漸大活動身安此
假胎也以清痰活血輕劑用芎歸地芍貝母天冬半
夏香附白芥子茯苓陳皮枳殼各一錢煎服數月乃
愈

六和塔農夫朱言之妻生平無病為人寡言凡有氣惱
不發肝火鬱可知夫于天啟二年經後懷胎漸大起
居飲食如常至十月不生又十月不生家人憂甚醫
皆莫知其故故錢亦曾診見六部浮鼓亦未敢斷又
過五月終日撒屁如此兩月胎消因當經著氣傷肝
火鬱沖于血海似懷胎而無形此名氣胎表出以識

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

續名醫類案卷三十二

錢塘魏之琇玉橫撰

妊娠

傷寒

繆仲淳治于潤父人娠九月患傷寒陽明症頭疼壯熱渴甚舌上黑胎有刺勢甚危繆投竹葉石膏湯索白藥子醫馬病者不得即以井底泥塗臍上乾則易之一日夜盡石膏十五兩五錢病瘳產一女母子無恙

治妊娠傷寒護胎為要否則胎墮多死以白藥子

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

為細末鷄子清調攤綿紙上如椀大自臍貼至臍下胎存生處乾即以濕水潤之臨症者慎勿忘此

妊娠

感寒

馮楚瞻治一孕婦勞役受寒忽四肢厥冷喘急大作額汗如雨六脉沈微欲絶令以人參五錢桂附共三錢煎服病家曰已孕三四月服桂附保勿墮乎曰此時重母不重子未有母忘而子能活者服下少頃吐出清白水藥入腸胃其聲汩汩直達而下作噯數聲喘減汗收脉漸起乃平和調理以漸而安十月足舉一子

張路玉治一婦人素稟氣虛多痰懷妊三月因臘月舉不愼誤 不呷逆清血血字疑水字之誤腹痛下墜脉得弦細如絲按之欲絶與生料乾薑人參半夏九二服不應更與附子理中加苓半肉桂調理而康大抵懷孕母氣多火得苓連則安多寒得桂附則安多痰得苓半則安務在調其偏勝適其寒溫未有母氣逆而胎得安亦未有母氣安而胎反墮者較馬說自然所以金匱有懷妊六七月胎脹腹痛惡寒少腹如扇用附子湯温其臟者然認症不果不得妄行是法一有差

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

為細末鷄子清調攤綿紙于如椀大自臍貼至臍下胎存生處乾即以濕水潤之臨症者慎勿忘此

妊娠

感寒

馮楚瞻治一孕婦勞役受寒忽四肢厥冷喘急大作額汗如雨六脉沈微欲絶令以人參五錢桂附共三錢煎服病家曰已孕三四月服桂附保勿墮乎曰此時重母不重子未有母忘而子能活者服下少頃吐出清白水藥入腸胃其聲汩汩直達而下作噯數聲喘減汗收脉漸起乃平和調理以漸而安十月足舉

子

張路玉治一婦人素稟氣虛多痰懷妊三月因臘月舉喪受寒遂惡寒不嘔逆清血（血字疑水字之誤）腹痛下墜脉得弦細如絲按之欲絶與生料乾薑人參半夏丸二服不應更與附子理中加苓半肉桂調理而康大抵懷孕母氣多火得苓連則安多寒得桂附則安多痰得苓半則安務在調其偏勝適其寒溫未有母氣安而胎不安亦未有母氣安而胎反墮者（較馬說自然）所以金匱有懷妊六七月胎脹腹痛惡寒少腹如扇用附子湯溫其臟者然認症不果不得妄行是法一有差

誤禍有旋踵非比芩連之誤猶可引延時日也

妊娠 傷暑

孫文垣治竹匠婦孕五月患心痛究所由為失足墮樓也教飲韭菜汁一盞痛隨止又服他醫藥二貼心復痛吐鮮血盈盆胸閒沖沖上抵痛不可言危在頃刻再診六脉皆洪大汗出如雨喘息不相續亟令移居樓下與益元散五錢用紫蘇湯調服戒之曰今夜若睡聽其自醒切勿驚動汗止即甦也服後果睡至曉汗斂胸膈不痛喘息亦定再與固胎飲一帖全安先是鄰醫診之謂吐血脉宜沈細今反洪大又汗出喘息不休危在今夜見病起來詢曰孕婦不得汗下及利小便謂之三禁昨劑悉犯之而反獲効何也曰醫貴審症益婦之汗非由病以樓居低小當酷暑熱逼故也汗血去而胎失養故上抵喘息不續移居下避暑氣益元散為解暑聖藥紫蘇又為安胎下氣妙品氣下則血歸元而病痊矣法出醫壘元戎中四血飲是也乃唯唯而退

妊娠 喘逆

張子和治胡產祥之妻臨蓐難月病喘以涼膈散二兩四物湯二兩朴硝一兩作二服煎令冷服之一服病減大半次又服之病痊効矣張曰孕婦有病當十月九月內朴硝無碍八月者忌之七月者已成形矣

周仁齋治一孕婦痰喘用生半夏錢半肉桂乾薑各五分五味子三分麻黃二分先以水煎後下藥勿令太熟乘熱服之其喘即止（半夏肉桂皆孕婦所忌宜酌用）

薛立齋治吳江庠史萬湖仲子室年二十餘疫疾墮胎時咳服清肺解表之藥喘急不寐此脾土虛而不能生肺金藥復損而益甚也先與補中益氣加茯苓半夏五味炮薑四劑漸愈後往視之用八珍湯加五味十全大補湯而愈（證治大還）

妊娠 咳嗽

薛立齋治一妊婦嗽則小便自出此肺氣不足腎氣虧損不能司攝用補中益氣湯以培土金六味丸加五味以生腎氣而愈

一妊婦咳嗽其痰上涌日五六椀許諸藥不應此水泛為痰用六味丸料及四君子湯各一劑稍愈數劑而

安

一妊婦因怒咳嗽吐痰兩脇作痛此肝火傷肺金以小柴胡湯加山梔枳殼白朮茯苓治之而愈但欲作嘔此肝侮脾也用六君子加柴胡升麻而痊

妊娠 煩熱

薛立齋治一妊婦煩熱吐痰惡食惡心頭暈此脾虛風痰為患用半夏白朮天麻湯以補元氣祛風邪漸愈惟頭暈未痊乃用補中益氣湯加蔓荊子以升補陽氣而愈

一妊婦煩熱兼咽閒作痛用知母(炒)貝母(去心)冬花(蜜炙)黃耆(蜜炙)山梔竹瀝以清肺金而愈後內熱咳嗽小便自遺用補中益氣加麥冬山梔以補肺氣滋腎水而痊

妊娠 嘔吐

薛立齋治一妊婦停食滿腹嘔吐吞酸作瀉不食以為飲食停滯蓋肝木傷脾土用六君子湯以健脾胃加蒼朮厚朴以消飲食吳茱萸所製黃連以清肝火諸症悉愈又以六君加砂仁調理而脾土乃安

一妊娠嘔吐脇脹或寒熱往來面色青黃此木旺而剋

脾土用六君子加柴胡桔梗枳殼而安

一妊婦滿腹脹痛吐痰不食此脾胃虛而飲食為痰用半夏茯苓湯漸愈又用六君子加枳殼蘇梗桔梗而飲食如常後因恚怒脇脹不食吐痰惡心用半夏茯苓湯加柴胡山屘而愈（立齋治妊婦亦時用半夏）

一妊婦因怒寒熱胸脇脹痛嘔吐不食狀如傷寒此怒動肝火脾氣受傷也用六君子加柴胡山屘枳殼丹皮而愈但內熱口乾用四君子加芎歸升麻而安

一妊婦霍亂已止但不進飲食口內味酸泛行消導寬中薛曰此胃氣傷而虛熱也當用四君子湯彼不信乃服人參養胃湯嘔吐酸水其胎不安是藥復傷也仍與四君子湯俾煎熟令患者先襲藥氣不作嘔則呷少許恐復嘔則胎為釣動也如是旬餘而愈

妊娠 瀉

陳三農治一婦有孕常作瀉久瀉屬腎用白朮四兩煮熟山藥二兩炒甘草一兩炙杜仲薑汁炒松花炒各七錢米糊為丸服愈

薛立齋治邊太常側室妊娠泄瀉自用枳朮黃連之類腹悶吐痰發熱惡寒飲食到口即欲嘔作強進是許

吞酸不快欲用祛痰理氣薛曰此因脾胃傷而痰滯中脘若治痰氣復傷脾胃矣遂以參朮炮薑為末丸如黍粒不時含嚥三五丸漸加至三日後日進六君子湯尋愈

進士王繳徵之內懷妊泄瀉惡食作嘔此脾氣傷也其火君憂之強進米飲醉謂飲亦能傷胃且不必強別用人參養胃湯飲之吐水酸苦又欲投降火寒藥曰若然則胃氣益傷也經云損其脾胃者調其飲食適其寒溫後不藥果愈

一妊婦因怒胸膈不利飲食少思服消導順氣之劑脾胃愈弱飲食愈少大便不實且無度久而便黃水或帶白視其面色黃中隱白曰黃色脾虛也白色肺虛也朝以補中益氣湯升補胃氣夕以六君子湯培補脾氣而愈

妊娠遺尿

薛立齋治一妊婦遺尿內熱肝脈洪數按之微弱或兩太陽作痛脇肋作脹此肝火血虛用加味逍遙散六味地黃丸尋愈後又寒熱或發熱或恚怒前症仍作用八珍散逍遙散兼服以清肝火養肝血而痊

妊娠

秘結

張子和治一婦人病大便燥結小便淋瀝半生不孕常服疎導之藥則大便通利暫止則結滯忽得孕至四五月間醫者禁疎導之藥大便仍難臨蓐則力弩為之胎墜凡如此胎墜者三又孕已經三四月前後結瀝甘分胎隕張診之兩手脉雖滑不敢陡攻遂以食療之用花臧煮菠薐菜以車前苗作茹葅猪羊血作羹食之半載居然生子燥病亦愈屢見孕婦利膿血下迫極努損胎但同前法治之愈者莫知其數

薛立齋治李蒲汀側室妊娠大小便不利或用降火理氣之劑元氣反虛肝脉弦急脾脉遲滯視其面色青黃不澤薛曰此鬱怒所致也用加味歸脾湯為主佐以加味逍遥散而安

主政王天成之內妊娠痢疾愈後二便不通其家世醫自用清熱之劑未効診其脉浮大而濇此氣血虛也朝用八珍湯加桃仁杏仁夕用加味逍遥散加車前子而瘳

陸養愚治一婦孕九月大小便不通已三日忽胎上衝心昏暈數次診之脉沈洪而實謂當下之與大承氣

湯一劑少加木香豆仁村醫見用大黃兩許搖頭伸舌其良人有難色乃謂之曰余坐汝家待其得生始去始安心煎服一二時許二便俱行去黑矢極多胎亦無恙乃留調氣養榮湯二劑而不服數日後小水不利乃煎服之而愈月餘產生一男子 此勸聶案

陳三農治一婦人有妊娠五月患大便不通小便不行胸腹痞滿腿足刺痛連小腹亦痛極甚難忍初用芎歸赤芍枳殼梹榔木通滑石杏仁蔥白童便水各一鍾煎減八分加入大黃末二錢車前子末二錢再沸入蜜四五匙溫服大小便俱皆通利而安愈

聶久吾曰一醫來問云我治一婦懷孕八九月忽然大小便不通腹中脹甚乃用氷氣湯下之仍然不通今已危矣予曰此非煎藥所能下教用牽牛大黃丸下之服至一兩許而大小便方始俱通次日其夫來謝因云諸病皆除唯小便時要人將手緊按小腹方可便出否則不能便矣因思此是氣尚閉與青皮香附等行氣藥一劑而愈逾月生男母子無恙 方見喉門陸案勸此

妊娠 癰疾

薛立齋治一妊婦癰久不已噯氣下氣胸腹膨脹飲食少

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

欲嘔便血少寐此屬肝脾鬱怒用歸脾湯加柴胡山
梔漸愈又用六君子湯加柴胡山梔升麻而痊愈
一妊婦患瘧已愈但寒熱少食頭痛晡熱內熱此脾虛
血弱所致也用補中益氣湯加蔓荊子頭痛頓止又
用六君子湯加芎歸飲食頓進再用逍遙散加參朮
六脉浮緊衆醫皆用柴胡桂枝治之無効陳言此疾
非用常山莫能冀愈衆醫不肯信乃因循數日病甚
無計咀劑聽治之遂用大寶散一服而即愈良方

立齋治一妊婦三月飲食後因怒患瘧連吐三次用藿
香正氣散二劑隨用安胎飲一劑而愈後因怒痰甚
狂言發熱胸脹手按少得此肝脾氣滯用加味逍遙
散加用川芎服及二劑疾已頓退至四劑而全安
蔣仲芳治一孕婦陡患瘧疾大作脉得弦數乃用知母
四錢柴胡三錢陳皮二錢甘草一錢井水一碗又河
水一碗煎至一碗露一夜明早隔湯頓服而愈倘有
不愈再加生首烏五錢自盜汗甚加黑豆三錢食多
加枳殼二錢此方熱多者宜服之耳
一孕婦瘧疾右脉微滑左脉微弦曰脾虛生痰也以白

水五錢生薑三錢共計二味頻用井水河水煎露一夜次早隔湯微頻溫服而愈此方係寒多者宜用之

妊娠 下痢

薛立齋治地官胡成甫之內妊娠久痢自用消導理氣之劑腹內重墜胎氣不安又用阿膠艾葉之類胎不能見効薛曰腹重墜下元虛也胎動不安內熱盛也遂用補中益氣而始安又用六君子湯全痊盛用敬治陳傑妻有胎而患痢數月昏厥六日矣所下若屋漏水棺斂已俱備候適延盛至診之曰無慮藥之痢止而胎動越數日娩產生子吳江縣志

孫文垣表姪女孕已七月患赤痢腹痛後重體素弱以白芍三錢條芩一錢五分白朮八分地榆八分甘艸三分以上五味共煎服及二劑而即占愈後因稍勞痢瘧復作以當歸三錢川芎一錢五分真阿膠二錢艾葉三分四味共煎一帖全愈此非積滯為痢故治法如此耳

朱丹溪治八嬸將產患痢脈細弦而稍數後重裡急乃用滑石三錢白芍二錢枳殼炒一錢五分木通二錢甘草五分白朮二錢茯苓一錢桃仁九枚研碎同煎

馬元儀治張氏婦孕八月患痢晝夜四五十行腹痛胎

氣攻逆不思飲食診之兩關尺沈微下半徹冷曰據
症亦濕熱成利但脉沈則為寒微則為虛又下半徹
冷乃火衰于下土困于中五陽之數布之道則水穀
之氣順趨而下津液血脉不克胎元失養而攻逆為
患便膿脉沈腹痛脉微均屬危險之至當舍症從脉
可以母子保全無害乃用人參一兩合附子理中湯
二劑服之脉和四劑症平調理而全愈
友人虞元靜房中人於孕五月患滯下腹痛日不下數
次為定此方甫服一鍾覺行至腹即解一次痛亦隨
已滯下全愈用川連四錢黃連四錢白芍黃芩枳殼
各用三錢蓮等肉四十粒橘紅乾葛各錢半扁豆紅
麴各二錢升麻五分炙艸一錢烏梅肉一个 廣筆記

孕產痢

汪陛堂隣居也其室人病痢已久未嘗藥初下紅白後
單下紅每甚于夜腹痛後重渠岳翁乃儒而醫與歸
脾合補中益氣持方問余余曰此古人成法也第慮
服之轉劇耳不信服二劑果下益頻乃延診脉沈弦
且駛乃與棗仁山藥杞子地黃當歸白芍甘艸黃芩
等共計八味煎服至六劑全愈因問曰君向謂歸脾

補中之劑服之必宜增劇已而果然此何故也余曰
久利忘陰者求升柴令陽愈升則陰必愈降理所必
然又問腹尚痛而後重未除乃不用香砂此又何說
余答曰若用香砂以治原本無大害第不能速愈耳
唐赤城內人年二十餘孕數月喜瓜果夏悶常腹痛下
利以為胎氣冬盡已分娩而痛利不減一老醫謂產
後虛寒且久利與白朮炮薑建連扁豆香附砂仁木
香遠志諸溫燥健脾利轉甚又加補骨脂肉豆蔻利
益頻每粥食纔下咽糞穢即下出不及至圊視之乃
完穀不化余謂腸胃已直瀉若竹筒病必不起將治

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

木診之脈細數而促顴頰嬌紅舌胎燥黑曰此痢疾
也第服藥二劑必見紅白因告以向醫謂為虛寒將
敗之症今以為痢再下紅白寧望生乎曰病緣過傷
生冷滯于迴腸久從熱化產後腹空其積將下乃為
燥熱所劫致積反留而真陰愈傷內熱益熾今之頭
併急速乃協熱下利之利非虛寒滑脫之利也試觀
其面紅陰虛可知舌黑內熱可知但先助其陰則其
下必緩而積滯見矣與熟地杞子各一兩棗仁五錢
服下面紅頰赤舌黑漸退食入遂不下迫再服則裡
急後重紅白兼行仍與前方入參連歸芍甘艸出入

加減十餘劑已愈八九矣以歲除停藥新正邀診已飲食如常起居復故唯便後微有淡血水此胃絡受傷之餘症也前方去芩連加烏梅二劑可愈乃云舍親謂先生用補藥太早致成休息劑蓋前醫是其至戚特令其邀予一次以相嘲耳予因謂曰與其為頁腸瀉毋寧為休息痢孰愈一笑而別

凌表姪婦素怯弱孕數月幾成損症以重劑滋養而愈已十月因時感發瘡崇科投荊防枳桔等二劑其師黃澹翁力止之乃但服頭煎已而乾咳咽痛面赤口燥夜熱盜汗因食生梨數片遂泄瀉如痢腹痛後重日夜十餘行或曰立齋云梨者利也凡病後及孕產皆不可食今腹痛下利非傷生冷而何診之脉洪數左寸鼓指曰錢仲陽謂疹子無他症者但用平藥今病人陰虛多火滋養猶恐不及乃用香竄以鼓之致三陰之火乘虛上冲于肺肺既熱甚勢必下迫大腸而為痢于梨何與蓋立齋之言言其常耳合脉與症猶當以涼潤取效也詢其小便熱短而口苦用生地杞子沙參麥冬川連蒌仁元參牛蒡二劑利止後重除忽肛門腫痛謂欲作痔曰非也此肺火下傳病將愈耳去黃連加黃芩服數劑諸症悉退而腫然全安

妊娠

瘧痢

趙養葵治一孕婦瘧痢瘧發他醫治兩月餘瘧止而痢愈甚又加腹痛飲食少進趙診之曰虛寒也以補中益氣加薑桂一服痢止大半再一服而反加瘧病大作主人驚恐趙曰此吉兆也向者瘧之止乃陰盛之極陽不敢與之爭今服補陽之劑陽氣有權敢與陰戰再能助陽之力陰自退聽方中加附子五分瘧痢齊愈大進補劑越三月產一子產後甚健

張路玉治鄭太學夫人懷孕七月先瘧後痢而多鮮血與補中益氣湯加用吳茱萸製川連而愈每見孕婦病瘧胎隕而致不能救者多矣

郝氏婦懷孕九月患瘧三四發後即嘔惡畏食診其脈氣口滑數不調右關尺弦數微滑此中脘有冷物阻滯之候以小柴胡去黃芩加炮薑山查四服稍安思食但性不嗜粥連食肺鴨之類遂瘧痢並胎氣下墜不安以補中益氣去黃耆加香砂烏梅五服而產產後瘧痢俱不復作吳茱萸僕婦產後數日亦忽下痢膿血至夜微發寒熱小腹脹痛與千金三物膠艾湯去榴皮加炮黑山查六服而瘳

萬密齋治曲史熊鏡妻有娠先于五月病熱或治之變瘧更醫加痢至八月瘧痢並行脉左沈實有力右浮大而虛此男娠內傷病也用補中益氣湯加條芩倍白朮十餘劑瘧痢俱止後以胡連丸調理而安後生一男子大小俱無恙

妊娠 內傷

高鼓峰治吳餐霞室人妊娠患胃口膜脹不思飲食口渴下利醫以消導寒涼與之病轉甚而胎不安高曰此得於飲食後服涼水所致耳脉必沈而遲濇投以大劑理中湯數劑服下諸疾悉退盡而安愈如故

婦患內傷症孕已八月身體壯熱口渴舌胎焦黑醫用寒涼治之高曰無論內傷即麻黃桂枝症也須先安胎後攻邪今兩手脉微大無論虛熱盛極乃復用寒涼陽受陰逼其能久乎投以滋腎生肝飲一劑熱退繼用補中益氣湯治之而痊愈

薛立齋治一妊婦因停食服枳朮丸胸腹不利飲食益少服消導寬中之劑其胎下墜此脾氣虛而不能收載也用補中益氣及六君子湯中氣漸健其胎漸安又用八珍湯加柴胡升麻工味調理而痊愈

一妊婦飲食停滯心腹脹痛或用人參養胃湯加青皮
山查枳殼其脹益甚其胎上攻惡心不食右關脉滑
大按之則弦此脾土不足肝木所侮為用六君子再
加柴胡升麻二味治之而愈後因小腹痞悶又用補
中益氣湯調治升舉脾氣乃瘳

妊娠 虛損

姚葭田室人年三十餘頎而肥白前二子皆殤後孕而
胎墜今又惡阻甚逆脉之虛軟而大與杞子地黃沙
參麥冬川連等漸向安又腰腹腿足時痛或加當歸
白芍或加山藥棗仁熟地用至兩許或下墜則與補
中益氣一二劑以熟地山藥代參朮或時胸腹脹痛
稍用香砂橘木則中氣便覺沖惕良由久虛營弱香
燥毫不相宜彼執方遏病者可與言治法乎哉後服
藥幾百帖是月生男

胡乾若室人年二十餘婚數年無生育因診翁便求診
曰孕也然三陰俱不足曰孕或未然今所患夜熱咳
嗽腹痛便溏左足不良于步詢其腹痛必內外牽引
腰亦必痛足之筋則短而不舒又下午則腫否曰皆
如所言然則三陰虛損無疑矣與杞子歸芍沙參麥

冬等令服五十劑臨月再服二十劑乃無後患服至十餘劑病已痊遂不藥後臨產暈厥產後復厥崇科以其寒熱往來則投柴胡桂枝腹痛便溏乃與炮薑白朮致身發白痱細者如芝麻粗者如菉豆腹痛甚則偃卧以蒲團著腹左右旋轉稍可脉之弦急而數舌黑而燥此肝火乘三陰大傷為患耳今以前方加熟地川連白芍甘草數劑而愈次年患痢醫以痢藥愈之又明年腹痛便溏與前年初孕症同名前醫則仍以為痢也恪與攻伐遂胎墜而殞又張氏姊妹三人每孕皆腹痛泄利產後乃止此雖胎氣求由肝木乘脾所致

妊娠 悲傷

薛立齋治一孕婦無故悲泣乃用大棗湯治之而愈後復患以四君子加麥冬山屐而愈

陳良甫曰鄉先生鄭虎卿內人黃氏妊娠四五个月遇晝則慘慼悲傷淚下數次如有所憑醫與巫者無治皆無益良甫時年十四正在齋中習業見說此症而虎卿皇皇無計良甫遂告之管先生伯同說先人曾說此症名曰臟燥悲傷非用大棗湯治之不能愈虎

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

卷三十三

卿借方看之甚喜對症笑而治藥一投而愈矣良方

妊娠 心腹痛

薛立齋治一妊婦心痛非真心痛也煩熱作渴用白朮散治之即愈後因停食其痛仍作胸腹膨滿按之則痛此因飲食停滯乃用人參養胃湯調治按之不痛乃脾胃受傷所致以六君子補之而痊愈

一妊婦心腹作痛胸脇作脹吞酸不食此肝脾氣滯用二陳山查山梔青皮木香而愈又因怒而仍痛胎動不食面色青黃肝脉弦緊脾脉弦長此係肝乘其土故用六君子湯加升麻柴胡木香治之而愈

一妊婦心腹作痛胎氣上攻吐痰惡心飲食少進此脾虛氣滯而為痰乃用六君子加入柴胡枳殼諸症漸退飲食漸進又用四君子加枳殼山梔桔梗而安後又因怒兩脇氣脹中脘作痛惡寒嘔吐用六君加柴胡升麻木香服一劑而症惡愈

朱丹溪治孫院君因近喪胃惡氣傷胎肚痛手不可近口中疑係或下有脫字

青皮三錢黃芩二錢白芍二錢歸尾一錢五五木香分甘艸炙少分二帖水三盞先煎苧根二大片至

二盞去芋根入前藥同煎煎至一盞乘熱服之
吳洋治汪伯玉從叔母吳病小腹急痛而痒痒惡寒醫
路萬先至曰妊婦轉胞洋曰不然此陰虛也叔曰諾
病得之內誠如公言萬拂衣行厲聲曰吳生殺而相
吳洋即為灸氣海一所進理中湯服之頃之疾即平
俄萬醫乃語塞而汗顏（洋別號池上係嘉靖中歙人太
汪道昆並其子橋立傳）

函集

妊娠 腸

喻嘉言治李思萱室人有孕冬月感寒至春而發因連
食鷄子雞麪遂成痎食傷寒一月纔愈又傷食吐瀉
交作前後七十日共五次遂成腸痛症診時其脉上
涌而亂重按全無嘔噦連綿不絕聲細如虫鳴久久
方大嘔一聲曰病人胃中全無水穀已翻空向外此
不可救之症也無已必多用人參但纔入胃中即從
腸出奈何李曰儘十兩之內尚可勉備喻曰足矣乃
煎人參湯調赤石脂末以墜安其翻出之胃氣乃少
回少頃大便氣即脫去凡三日服過人參五兩赤石
脂末一觔俱從大腸瀉出得食仍嘔但不嘔藥耳因
思必以藥之查滓如麵粥之類與服方可望其稍停

中頃之傳下又可望其少停腸中遂以人參陳皮二味煎如芥子大和粟米同煎作粥與半盞不嘔良久又與半盞如是再三日始得胃舍稍安稍安但大腸之空尚未填實復以赤石脂為丸每用人參湯吞兩許如是再三日大便亦稀此三日參橘粥內已加入陳倉米每進一盞日十餘次人事遂大安矣仍用四君子湯丸調理共用人參九兩全愈然此亦因其胎尚未墮有一綫生氣可續不然用參雖多安能回元氣于無何有之鄉哉後生一子小甚緣母病百日失蔭故也

按下稍安二字宜衍去

黃厥旭乃室病膈氣二十餘日飲粒全不入口診之尺脉已全不至矣詢其二便自病起至今從未一行止是痰涕上涌厥厥待盡或謂其脉已離根頃刻當壞喻曰不然脉經上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死是吐則未必死也但得天氣下降則地道自通此症以氣高不返中無開闔因成危候宜緩法以治其中自然見効遂變旋覆代赭成法用其意不用其方緣尺脉全無莫可驗其孕否若有而不求以赭石乾薑輩傷之呼吸立斷矣姑闕疑以赤石脂易赭石煨薑易乾薑用六君子湯加旋覆花煎調服下嘔即

稍定三日後漸漸不嘔又三日粥飲漸加但不大便已月餘矣日以通利為囑曰臟氣久結食飲入胃每日止能透下一二節積之既久自然通透蓋以歸地潤腸恐滯萬而作嘔喻君于肝腎病治法終身未曉硝黃通腸恐傷胎而殞命姑拂其請堅持三五日果氣下腸通月餘之日不溲溺衆以為必死矣診其脉俱沈滑而數曰此痰因火搏凝結中脘脫陰陽失次氣苞血聚是謂關格靡孓有攸處治之則生不治則死矣曰雖有九仙之木精石髓其如不內何曰姑試之乃用鷄胵胵沈丁海石等末之若塵用甘瀾水濃煎枇杷葉取湯調服始吐漸留旋進香砂湯一飲而溲通再飲而糜進然喉中有物哽哽不能上下曰此病根也仍用前湯探吐吐出結痰如麥冬蓮實者三四枚其病遂瘳妊亦無恙　筆仗精工可法

妊娠 癥

博陵醫之神者曰郝翁有妊娠癥不能言郝曰兒大經壅故不能言兒生經通自能言矣　葉杏林女科

薷膚六曰內經大哥論以胞精不足善言為死不言為生此可驗九月而瘡非胞精不足故當十月而復上

妊娠

乳病

孫文垣治程玉吾內人妊已八月乳忽紅腫而痛洒淅惡寒發熱將成內吹以火瓜蔞四錢為君當歸尾二錢為臣甘草節蒲公英貝母連翹各一錢二分為佐青皮柴胡各八分橘葉五片為使二劑而瘳此方治驗不可勝數婦女怒鬱肝經為多瓜蔞甘草為緩肝之劑貝母開鬱連翹蒲公英解毒柴胡青皮調氣橘

葉引經當歸活血此必待血活而後氣可調毒又解熱疎散而腫痛亦漸即消釋也若將成膿可加白芷醫學綱目治婦人吹乳之症必用皁角散有謂曰婦人吹乳治如何皁角燒灰蛤粉和熱酒一杯調一字頃間搽散笑呵呵此謂真治吹乳之成法也

妊娠

惡阻

龔子才治劉尚書妾有孕患惡阻嘔吐不止飲食不下心中煩燥頭目眩暈咸以二陳湯藿香正氣散保生湯之類遍投不効診之左脉微數氣口又數此血虛

氣盛有火也若不養血則火不降火不降則嘔不止故以茯苓補心湯加薑汁炒黃連竹茹二服全愈

盧不遠治史氏婦嘔吐之聲遠聞百步脉之左關鼓指不連於寸兩尺滑搏於左獨加水飲不入唇已七日矣乃與透肝之劑斷其必孕男藥進而嘔吐即定至月分滿足果然產生男子是症之初寒熱大作嘔吐不食人皆以為傷寒獨盧不然因以尺中脉搏知其為妊其關不連寸者蓋肝鬱善怒而不善發也順其性而伸之調之肝舒氣平惡自無阻而嘔自定耳

馮楚瞻治一婦妊娠三月而大吐兩月有餘藥食俱不能受六脉沈微已極竟依脉立方以人參五錢炙甘草一錢炮薑製附各一錢五分服數劑而即愈胎亦安然經曰有故無殞亦無殞也

柴嶼青治翁氏家人沈泰女懷娠三月患惡阻醫以感冒治之方中用半夏二錢連投二劑腹痛異常身熱盜汗歷有二旬求診柴謂半夏乃孕婦所禁如何可用二錢無怪乎腹痛之甚也其胎不墮幸矣遂與養陰之劑半月而瘥并令其八月後服達生散十餘劑至臨產之際生理甚順而速得舉一子

張路玉治錢氏婦去秋瘧久大虛飲食大減經水不調

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

季冬畧行一度今春時發寒熱腹滿不食服寬脹利水藥不應擬進破血通經之劑張診之其脉左手厥厥動搖右關與兩尺雖微弦而重按久按却滑實流利惟右寸左關虛濡而數尋之濇濇少力此陰中伏陽之象詢為胎脉無疑良由中氣虛乏不能轉運其胎故作脹耳前醫曰自結褵至今距十二載從未受孕病後元氣大虛安有懷孕之理張曰向之不孕必有其故今病後餘熱留於血室因而得孕亦恒有之理細推病機每粥食到口輒欲作嘔惟向晚寒熱之際得熱飲入胃其寒熱頓減豈非胃氣虛寒水精不能四布留為涎液汪洋心下乎俗名惡阻是也其腹滿便難之虛實尤當明辨金匱云跌陽脉微弦法當腹滿不滿必便難乃虛寒從下上也當以溫藥服之況大便之後每加脹急以裡氣下通濁陰乘之上擾與得下暫時寬快迴殊其治雖當安胎為主但濁陰之氣非藉辛溫不能開導其結遂疏六君子湯益入歸芍以收營血之散稍借肉桂為濁陰之嚮導使毋氣得溫中健運之力胎息無濁陰侵犯之虞桂不傷胎龐安常先有明試余嘗屢驗之矣服後寒熱漸止腹脹漸寬飲食漸進胎息亦漸形著至仲夏因起居

不慎而胎漏下血前醫猶認石癰欲進破積喻以左
寸動滑斷屬乾象與扶脾藥治之得安後產一子
陳三農治惡阻諸藥不納以蘇梗三錢砂仁一錢二味
煎服或烏藥為君沈香次之人參廿艸又次之研為
細末以薑切片粘藥末咬嚼咽津液極至井田過一
時許又復如此咬嚼而瘥即見瘥愈
薛立齋治一妊婦停食腹滿嘔吐吞酸作瀉不食此飲
食停滯蒸肝木傷脾土用六君子湯以健脾胃加蒼
朮厚朴以消飲食吳萸所製黃連以清肝火諸症
悉退又以六君子加砂仁二味令服而健脾土就

古今圖書集成醫部全錄 卷三十三 婦女部 妊娠惡阻 共

古今圖書集成 凡內傷門○立齋紮種類既多每紮數處皆有

一孕婦嘔吐酸水胸滿不食此脾土虛為肝木所侮用
六君子加白芍而瘥愈又用四君子加枳桔而安
萬密齋治徽商吳儼妻年三十餘少子二歲尚食乳經
水未行因反目激怒得嘔逆病食即隨吐凡所食物
鼻中即作其臭象醫俱作反胃病治之不効其脉左
三部沈實搏手右三部平和曰此有孕也當生二男
汪曰前生三子皆三歲而後孕今兒方二歲經又未
動宜非孕也曰身自有孕且不知之況醫人乎宜其
治之不効益怒傷肝肝傳心諸臭皆屬于心心傳脾

故隨所食物即作其氣而出也嘔逆食臭皆肝心二臟之火炎上也以黃芩一兩黃連白朮陳皮香附茯苓各用五錢炒砂仁二錢為末神麴糊為丸如菉豆大每服五十丸白湯送下未五日而安後生一男

妊娠下血 即與胎漏同

薛立齋治一妊婦下血服涼血之藥下血益甚食少體倦此脾氣虛而不能攝血用補中益氣湯而愈後因怒而寒熱其血仍下此肝火旺而血沸騰用加味逍遙散治之其血方止又用補中益氣湯服之而安

一妊婦下血發熱作渴食少體倦屬脾氣虛而肝火所侮為用四君子加柴胡山梔升麻而愈

一妊婦六月每怒下血甚至寒熱頭痛脇脹腹疼作嘔少食薛謂寒熱頭痛乃肝火上衝此語無人解道脇脹腹痛乃肝氣不行作嘔少食乃肝侮脾胃小便下血乃肝火血熱用小柴胡加白芍炒山梔茯苓白朮而愈

一妊婦胎及六月形體倦怠飲食少思勞役下血胎動不安乃用六君加當歸熟地升麻柴胡而愈

張子和治一婦娠半年因傷損下血張診之以三和湯

一名玉燭散承氣湯四物湯對停加朴硝煎之下數行痛如手拈下血亦止此法可與智識高明者言嘗梁之家慎勿舉似非徒駭之抑又謗之嗚呼正道難行正法難用古今皆然潔所嗟哉

地數語勝士材人情論

孫文垣治姪孫婦三孕而三小產六脉滑數過氣虛血熱也因血頻下勢甚恐怖終日偃卧稍起血即大下與生地白芍白朮地榆桑寄生續斷甘草升麻椿根白皮黃柏條芩服之血三日不來惟白帶綿綿下因起身稍勞血又復行謂血滑已久若不澁必不能止又血海甚熱亦肝風所致防風予芩丸正與病對宜製與之又製白芍六兩側柏葉條芩各用三兩防風椿根白皮各計二兩以蜜丸服之遂血止胎安足月產子此後絕無胎漏之患後遇此症弟用此法皆驗

張路玉治鄭墨林夫人素有便紅症妊七月正肺氣養胎時患冬溫咳嗽咽痛如刺下血如崩脉較平時反覺小弱而數此熱傷手太陰血分也與黃連阿膠湯二劑血止後去黃連加萎蕤桔梗人中黃四劑而安

葉嶼青治其妾妊懷孕五月與女伴爭競致傷腹痛見紅穩婆驗云昨夜子已在產門定死腹中診其六脉如常驗其舌色紅活斷以決無此理為用安胎養血

之藥令服二劑而起至十月滿足產生一子

葉杏林曰一婦人妊娠月信不斷而胎不損產科熊宗古曰婦人血甚氣衰其體必肥是以月信來而胎不漏若作漏胎治之則胎必墮無疑若不作漏胎治之則胎未必墮也

立齋治一妊婦尿血內熱作渴寒熱往來胸乳作脹飲食少思肝脉弦弱此肝經血虛而有熱也乃用加味逍遙六味煎令服之其症漸卽痊愈後又用八珍湯增入柴胡山巵丹皮三味共為煎服調理數時前症悉退而全安矣 來選入

妊娠 下血

許竹溪室人妊娠七月偶以舉重跌磕遂胎動下血甚多乃與熟地一兩杞子五錢白芍三錢甘州五分棗仁三錢共煎令服數劑前症悉退而安

胡書田室人先嘗妊娠以胎漏衆醫治之罔效延至二十四月而始產近有孕在腹仍漏血不止乃因胃痛求醫診治脉之兩關弦數與生地杞子沙參麥冬川楝治之胃痛卽愈而胎亦不漏矣故醫者臨診務宜認真治之所謂對症用藥方能取効耳

妊娠

癒癖

薛立齋治一婦人素口苦月經不調或寒熱妊娠五月兩臂或拘急或緩縱此肝火傷血所致也乃用四物加柴胡山巵丹皮鉤藤令服治之而安愈

一妊婦因怒寒熱頸項動掉四肢抽搐此肝火血虛風熱為用加味逍遙加鉤藤數劑而痊愈

一妊婦頸項強直腰背作痛此膀胱經風邪所致也用拔萃羌活湯一劑服之即止痊愈後又用獨活寄生湯及八珍湯以祛邪固本而痊安

一妊婦憑四肢不能伸服祛風燥血之劑遺屎瀉甚四肢抽搐此肝火血燥故用八珍湯加炒黑黃芩為主再佐以鉤藤湯治之而始安後又因怒前症重作小便下血寒熱少寐飲食少思又用鉤藤散加山巵柴胡而血即止又用加味逍遙散寒熱亦退而得安寐再用六君子湯加白朮鉤藤飲食進而病亦漸安

萬密齋治一婢臨月病口眼喎邪腰背反張手足攣曲不省人事乃用黃連解毒湯加硃砂幹開口灌之稍定神色其夜生一男子產後猶昏迷不醒人事再以七珍湯與之服下即安痊矣

妊娠

子癎　與痙病畧同

薛立齋治一妊婦出汗口噤腰背反張時作時止此怒動肝火也用加味逍遙散治之漸即痊愈又用鈎藤散（南北）以四君加鈎藤山巵柴胡病皆盡退而安

一妊婦因怒仆地良久而甦吐痰發搐口噤項強用羚羊角散漸愈更用鈎藤散始痊又用歸脾湯而安

孫文垣治黃氏婦青年初妊已及彌月忽午夜口中呶呶目作上視角弓反張裸裎不知羞恥口眼偏邪昏憒不知人事問之不能言此風痰為怒所動而成子癎當從雲箕子葛根湯加大腹皮服一兩劑即可愈也用葛根貝母丹皮防風川芎當歸茯苓桂心澤瀉甘艸各用二錢獨活四錢人參四錢用水同煎（嚴氏令服之）服下而即甦清（原注按貝母令人易產如未臨月者宜用升麻以代之耳）

陸肖愚治謝四府女與夫俱在青年妊將七月日間因責婢大怒又與夫反目號哭半日夜即不能寐至夜半忽口中譫語不已眼目上視竟于牀褥裸形而出其夫力抱之遂昏憒不知人事問之不語醫不識何病咸以為崇謝公夜起著紅袍執劒壓之而號叫笑詈千端萬狀名診悉其症源乃令數婦執而脉之六

部洪數有力曰此子癇症非祟也症亦時見但此殊甚耳需用真正霞天麴貝母黃連山甲天麻青皮白芍龍胆草青黛加燈心竹瀝服一劑而和二劑減半服至四劑已全瘳矣乃問其病狀毫不知也

吳橋治程鈞妻孕月四月矣著屐而履橋版偶失足仆地扶起則目上視而瞑憎惜而為鬼言逆橋視之寸口脉動而微尺脉按之不絕石差勝曰非真病易去也胎月安主生男聞者愕然乃以大劑參耆加安神寧志僅服過半舒氣一聲而目微開問之則歷歷所遇皆亡者言畢復瞑復進前藥乃甦日漸得安七日而愈或問向者揄柁程氏婦與此全而彼七日死何也橋曰往者吾不及見無敢以口給臆之今病者故中氣虛妊子食母且盡母失所養而震驚出其不虞氣下陷而火上炎痰壅心絡故憒憒欲死非真死也又謂見鬼物者何經云脫陽者見鬼此無足怪

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷三十二

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷三十四

錢塘魏之琇玉橫撰

産難

薛立齋云荊婦孟冬分娩艱難勞傷元氣産子已死用油紙撚燒斷臍帶藉其氣以暖之俄頃忽作聲此兒後無傷食作瀉之症可見前法之功不誣世用刀器斷臍帶子母致危者竟不知其由矣且穩婆又喜平日常施小惠得其用心煎以安慰母懷故無虞耳一

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

穩婆云我止有一女正分娩時適當巡街御史行牌取我視其室分娩女因驚嚇未產而死後見御史更以威顏分付迨視產母胎雖順而頭偏在一邊若以手入推正可保順生因畏其威不敢施手但回稟云此是天生天化非人力所能立俟其母子俱死

張子和治一婦人年二十餘臨產名穩婆三人其二媪極洩婦之臂其一媪頭抵婦之腹更以兩手扳其腰極力為之胎死於腹良久乃下兒亦如血乃穩媪殺之也豈知瓜熟自落何必如此乎其婦因之經脉斷閉腹如刀剜大渴不止小便閟絶主病者禁水不與飲口舌枯燥牙齒黧黑臭不可聞食飲不下昏憒欲死張先以氷雪水恣意飲之約二升許痛緩渴止時近

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.

中醫藥學館藏善本

嵩科及庸手遇產後一以燥熱溫補為事殺人如麻閱此宜稍知變通矣次以舟車丸通經散前後五六服下數十行食大進仍以桂苓甘露飲子等調之半月獲安

一婦人臨產名村嫗數人侍焉先產一臂出嫗不測輕重拽之臂為之斷子死于腹其母面青身冷汗漿漿不絶時微喘張曰命在須臾針藥無及急取秤鉤續以壯繩以膏塗其鉤令其母分兩足向外偃坐左右各一人脚上立足次以鉤其死胎命一壯力婦倒身

拽出死胎下敗血五七升其母昏困不省待少頃以氷水灌之漸囌二日大醒食進次日四物湯調血數日方愈張常曰產後無他事因侍嫗非其人轉為害耳

按此案與宋史龐安時一案彷彿大抵醫既有名人益附會如近時吳門有享盛名者俚人時向余道其神驗皆古人案中所載若以蟹治漆毒以土坑治香氣不一而足所謂俗語不實流為丹青是也

涵齋治前太僕卿張君季媳年輕體壯孕必八个月而產產必數日百苦而下兜生必週而殀再孕再產再殀皆同乃謂後當生宜相聞明年又八个月坐草三日不下忽憶前言飛輿相召中途逢驅車者云迎其父母作永決計比至已夜分矣診之脉未離經人餘殘喘穩婆在旁問之曰兜頭已抵產門不得出耳乃急令安卧且戒勿擾與安胎藥明晨主人出笑而不言問之曰好矣曰昨言兜頭已抵產門今若何曰不見了大笑而別後過百二十日計十二足月生男今八歲矣始知前此皆生生取出以體壯年輕幸保母命耳達生編

太學戴時濟弟媳一產三男母子俱隕一猶在腹今又
婢孕其腹膨脝頗患之比產先令安卧與加味芎歸
湯每隔半日而產積日半生三子俱無恙 全上
陳氏婦產九日夜不下一息僅存聞有兎腦丸踵門求
藥問之亦曰頭逼產門不得出乃令安卧再來取藥
強而後去繼與芎歸湯明日生下母子兩全按此皆
產母用力逼令橫在腹中耳豈有人倒懸十日而尚
得生者乎 全上
一婦產兒手出不得入穩婆礪及以須急令安卧與大
劑芎歸湯徐徐托之手入明早生下母子皆安右臂

紫黑數月而後消 全上
孫文垣治姪元素內人難產夜半叩門起問何狀曰產
已及户不能下用力則胸膈悶有物上衝痛不可忍
思項之曰此必雙胎胞已分而一上一下也及户者
在下欲產在上者以用力而上衝故胸膈痛也勢亦
險矣治法必安上而下者乃可用力以產也即取益
元散一兩與之令以紫蘇湯送下藥甫進胸膈痛止
不逾時產二女母亦無恙或問曰益元散非產科急
劑何能取效如此曰紫蘇安胎下氣滑石滑以利竅
亦催生良品益醫者意也茲亦以意裁取之耳此法

方書無載記之以備采用（妊娠紫申治竹匠婦嘗以此方安胎）

馮楚瞻之媳向患吐血夜熱之症自受娠以來八味丸加牛膝五味日服勿間（此其孫所以百日內生癩症之由也嘗見小兒胎毒門）及臨盆肥水已下而數日未產脈之洪數而帶堅象此陰道枯槁已極何能流通生育乎投以補養氣血催生之藥脉候如故（羣）故知為郡藥功力不專乃單以熟地三兩濃煎日進三次脉始洪緩而軟但坐蓐數日子母俱困胎氣毫無運動下達之意衆疑胎死矣再以人參五錢煎湯一鍾細刮肉桂之最佳者錢許調服之連進三劑乃生

一婦難產五日後精神已竭六脉沈微噦噦一息腹中毫不覺動下部腫極馮曰母子俱困何能健運以出乃與參耆歸芍薑桂白朮牛膝溫暖調補氣血之劑下咽少頃腹中運動疼痛而產母子俱活

歙有神醫嘗路遇舁櫬者櫬中血流出醫曰此尚活可治也開視則彌月婦人顏色未改以針針其心遂產一男手有針孔母子俱無恙其子至今尚存（張氏庖言）

凌漢章治吳江婦臨產胎不下者三日呼號求死凌針刺其心針出兒應手下主人大喜問故曰此抱心生也手針痛則舒即取兒掌視之有針痕（明史）

張所望治婦人產一子忽叫痛欲絕舉家驚愕莫措所
望診之曰腹內尚存一子未下投一丹而子下母遂
甦 錢唐縣志

張文仲治一婦人橫產先出手諸般符藥不揆乃即灸
其婦人右脚小指頭大頭三壯灸如小麥大下火
立產 醫說

高道者不知何許人得長桑君禁方當明初之際挾技
而遊至銀陽一日值柩於途諮之乃孕婦喪也道者
驗其遺衣血曰此婦猶未死也啟棺視之一針遂甦
俗驚傳道者能起死人之法以北秦越人云爾 江西通志

陸祖愚治高濟亭室胎前惡阻或以清涼調治既而內
傷飲食消導太過元氣甚弱胎動欲產臨盆三日夜
方得分娩疲憊昏冒不知人事診之遍身冷汗口鼻
之氣有出無入寸關無脉兩尺如絲不及服藥令壯
盛婦女對口接其出入之氣俟其氣之入而呵之次
用人參歸身熟地各一兩熟附四錢加童便一酒杯
於煎好臨服之際徐徐灌下四肢溫和人事清爽連
服三劑便能飲食此時若不先用接氣之法必俟藥
熟與飲不幾氣絕無及耶宜以隨機應變耳

萬密齋治朱宅一婦女孕苦難產形體頗壯性情

急躁食飲少進此氣滯也為與一方枳殼甘草香附
為主當歸川芎白朮陳皮佐之至八九个月內每月
當服三帖以後連生三子甚為快擬
葉杏林治一婦人分娩甚易至四十外下血去多玉門
不開與加味芎歸湯一劑更以活水無憂散勉許煎
熟時時飲之以助其血而產
產婦坐草時取路傍舊草鞋一隻用鼻絡小耳繩燒灰
溫酒調服如得左足者男右足者女覆者兒死側者
有驚自然理也似非切要之藥催生極驗得効方
王執中云有貴人內子產後暴卒急呼其母為辦後事
母至為炙會陰及三陰交各數壯而蘇母益名醫女
也資生經
余素不信陰陽家言因名工舉屋或謂年月不利不聽
時荊婦娠身已九月及產一穩婆甚青年見勢不順
乃託故亟歸易其姑至視之曰此非可望生下欲全
母命非斃而出不可余亟令安卧勿怖以熟地四兩
把子二兩當歸一兩煎百餘沸先飲一鍾再煎再飲
不及時許產生一女下地已死乃臍帶綰于項間所
致母命幸而無恙穩婆詫異而去婦人良方云凡有
孕婦之家不宜造作修治良有以也

凌表姪婦年二十餘暑月臨蓐自旦及暮不得產下體素弱屢發暈迷悶時師診之以為挾疹不可服參漸危漸急余視無他乃腎虛不能作強肝虛不能疎洩又血液枯涸致胎不易下耳與熟地二兩杞子一兩當歸五錢曰服下即產矣已而果然次日覺惡露(露)路行少飲沙糖老薑湯遂血行甚涌崙科以炮薑白朮棗仁茯神當歸白芍等不効反加白汗口苦小便熱澁煩躁不眠再延診曰但以余前方加棗仁去當歸愈矣服一劑而安余此方催生則用當歸止崩則用棗仁甚者杞地俱倍之凡治百餘婦人無不神驗無力之家可代人參且無後患古今諸方無出其右者

產後

胞衣不下

辞立齋治一產婦胞衣不出胸腹脹痛手不敢近用滾酒下失笑散一劑惡露胞衣並下

立齋治一婦產後面赤五心煩熱敗血入胞胞衣不下有冷汗思但去其敗血其衣自下遂用黑豆二合炒透煙後用鍼秤錘燒紅同豆淬酒將豆淋酒化下益母二丸胞衣從血而出餘症亦旋即盡平

一產婦胎衣不出腹肉作痛以手按之稍減此氣虛而

不能送出户也用無憂散而下前症常詢諸穩婆云宜服益母草丸或就以產婦頭髮入口作嘔胎衣自出其胎衣不出者必死授與前法甚效

呂東莊治陳氏婦半產胎衣不下連服行血催衣之藥四劑點血不行胸痛昏亂視之曰此脾失職也先與黃耆一兩當歸一兩下咽而昏亂頓減時有以準繩女科中惡阻血不下及脫衣不下方書一本進者上注某方經驗某方試效以示曰中有可用否曰一無可用遂用大劑人參白朮白芍黃耆當歸茯苓甘艸等藥一服而惡露漸至皆驚歎曰古方數十一無

可用準繩一書真可廢也呂曰惡是何言王損庵醫之海岱也顧讀書者自不察耳若唯以惡阻（惡阻二字豈兩用耶）及脫衣不下止條中求之吾方可見矣蓋此病本氣血大虧而致半產脾失統血之職水濕土崩衝決將至故生昏亂不為之修築而反加穿鑿是虛虛也吾正憂血之下不止其不合也又何怪焉曰今從子法可遂得免乎曰不能也穿鑿過當所決之水已離故道狂瀾壅積勢無所歸故必崩急服吾藥第可固其隄使不致蕩沒耳至第三日診尺內動甚曰今夜子時

以前必崩矣因留方戒之曰血至即服至黃昏時分果發如言治之幸而無恙方即補中益氣加參耆各二兩也次用調補脾腎之藥而愈（脫衣二字却不重醒）

陳良甫云有一親戚婦人產後脫衣不下血脹迷悶不記人事告之曰死矣僕曰某收得趙大觀文局中真陀益石敬在笥中證以一貼贈之以童便調灌藥下結轎詢其惡露已一日不行謂為瘀也宜通之乃可施介鯀室人年三十餘忽有孕又孿生產後頗健能食（兇惡露旋即隨下乘輿無恙良方）

雖啖飯數日來漸發熱脹懣診之脉浮按滑疾沈按與生地牛膝益母紅花桃仁泥當歸尾丹參瓦楞子畏不敢服延崇科曰此年過壯而初產胄氣血俱傷屬虛也與焦朮炮薑歸芍茯神棗仁等一劑熱益甚再劑遂譫讝更一崇科其說同其藥仍又二劑日夜不眠昏狂不省時忽高聲歌唱與傷寒陽明失下無異再延診曰產數日惡露即停雖執塗人而語之亦必知為瘀滯若欲其生亟進前方可耳不得已乃服黃昏進藥至夜分惡露始行黎明復下一物已焦黑乃脫衣也益產時穩婆只收其一謂二人同脫不知其一猶在腹也遂貽患乃爾脫去血行其病頓然如

以前必崩矣因留方戒之曰血至即服至黃昏時分果發如言治之幸而無恙方即補中益氣加參耆各二兩也次用調補脾腎之藥而愈（脫衣二字却不重醒）

陳良甫云有一親戚婦人產後脫衣不下血脹迷悶不記人事告之曰死矣僕曰某收得趙大觀文局中真花蓋石散在笥中謾以一貼贈之以童便調灌藥下即甦脫衣與惡露旋即隨下乘輿無恙（良方）

施介軒室人年三十餘忽有孕又孿生產後頗健能食雖啖飯數日來漸發熱脹懣診之脉浮按滑疾沈按結轖詢其惡露已一日不行謂為瘀也宜通之乃可與生地牛膝益母紅花桃仁泥當歸尾丹參乳楞子畏不敢服延崇科曰此年過壯而初產育氣血俱傷屬虛也與焦朮炮薑歸芍茯神棗仁等一劑熱益甚再劑遂譫讝更一崇科其說同其藥仍又二劑日夜不眠昏狂不省時忽高聲歌唱與傷寒陽明失下無異再延診曰產數日惡露即停雖執塗人而語之亦必知為瘀滯若欲其生亟進前方可耳不得已乃服黃昏進藥至夜分惡露始行黎明復下一物已焦黑乃脫衣也蓋產時穩婆只收其一謂二人同脫不知其一猶在腹也遂貽患乃爾脫去血行其病頓然如

失然予初亦不謂為胞衣未下也醫誠難哉

產後

隱疾　即脫陰

薛立齋治一產婦陰脫便閉下墜形氣俱甚用十全大補湯而上因怒仍脫重墜寒熱小便淋漓用補中益氣湯加山巵龍膽草一劑重墜減而小便利仍用前湯去二味倍加參耆升麻而愈

一產婦陰脫腫痛小便淋漓此因元氣甚虛而肝火旺也用補中益氣湯加山巵車前子四劑而肝症悉退仍用前藥去二味加茯苓而小便利又用十全大補湯而腫痛遂漸消

一產婦元氣亢實初產玉門不閉腫煩作痛小便不利薛謂肝經濕熱壅滯欲以加味逍遙散加車前子牛膝治之不信乃服十全大補湯腫痛益甚仍用前藥更加澤瀉一劑而安

一產婦陰脫痛腫脉又滑數欲作膿也薛用十全大補湯三四劑而膿成又數劑而膿始潰但小便頻數而患處重墜痛甚此因元氣虛弱而致下陷也又用補中益氣湯數劑而愈

一產婦素有肝火患陰蝕瘡瘡內潰癢痛如虫行狀食

少熱渴小水淋瀝用加味逍遙散加味歸脾湯兼服
間以蘆薈丸外以鶴虱草煎洗而愈

龔子才治一產婦陰門痛極不可忍教用桃仁去皮尖
研如泥塗之即已（散其瘀也）一婦人產後陰戶極痒（令以散之也）
其以食鹽一兩塗之即瘳（去風熱也）又一婦女產後陰戶
腫大用吳茱萸煎湯洗之立愈（辛以散也）

薛立齋治一婦胞衣不下努力太過致令子宮脫出如
豬肫（肚）狀乃用溫湯浴之即以手捺子宮去其惡露仰
卧於床以手徐徐推入而後痊安

一婦人脫肛用補中益氣加味歸脾各百餘劑而愈後
因分娩復脫仍以前藥各服二百餘劑始愈（拙哉）

李時珍治一婦產後子腸不收用蓖蘇仁搗膏貼其丹
田一夜而上收但此膏病愈即宜揭去蓋其提拔之
力最猛也又有用催生下胞用塗腳底亦宜即（時）洗去

孫文垣治一僕婦因產難子宮墜出戶外半月不收蹇
艱於坐卧有醫者令其服補中益氣一百帖需用太（乃）參二觔乃可收愈病者聽之孫謂此疾必因產時受
寒血脉凝滯不能收斂雖名陰脫未必盡由氣虛下
陷也觀其善飯大小便如常即可知矣授以一法僧
庸功省三五日立可見愈用未經水石灰幹一塊重

二三劑者又以韭菜二三觔煎湯置盆中將灰斡投入灰開湯沸俟沸聲盡乃濾去灰乘熱坐盆上先熏後洗即以熱韭於患處揉挪蓋石灰能散寒消瘀韭菜亦行氣消瘀一日洗一次三日果消軟收入按子宮子腸有墜下損傷者有終身不能收上如帶綬者要皆初時治之不得其法耳

產後 瘀滯

南濠陳鰲妻新產四五日患腹痛惡寒發熱醫曰此元氣大虛正合丹溪云產後當大補氣血遂用人參大劑入口痛劇面黑發喘而死殊不知丹溪以產後當以大補氣血為主治雖有襍症以末治之今陳氏之妻因瘀血未盡而惡寒發熱不先去其惡血驟施大補是失丹溪主末二字之本意矣主末者即標本之謂也 續醫說

吳孚先治楊氏婦產後一月半身以下忽腫脹臍突小便不通或以五皮飲加車前牛膝治之不效吳曰先經斷而後腫脹名曰血分 分平聲 且按少腹有塊如拳知敗血尚結於胞門非溫劑無以化之乃以薑桂佐行瘀之劑下血如黑漆數升便利腫消

孫文垣治溫氏婦產後五十餘日右脇脹痛手不可近（非虛痛可知也）赤白帶下多如膿發熱便秘診之曰此惡露未盡血化為膿宜急治也嘗見數婦病此治不善積久為毒有成腸癰者有內成毒從腰俞出者皆瘀血為患也用澤蘭葉山查五靈脂消惡露為君川芎當歸茯苓白芷為臣益母為佐香附青皮為使外與當歸龍薈丸潤大便使熱從之去服後次日腹脇皆寬痛亦止又食葷與鷄子復然作疼但不如前之甚（急）與保和丸用山查煎湯送下服三錢遂愈

潘印川子室年二十五因難產傷力繼以生女拂意後又女死悲戚即時暈厥洎醒神思眯昧手足瘛瘲目上視孫至因瘛瘲不能診脉細詢之自產後惡露絕無時有女醫在旁與人參大噙及獨參湯并粥糝進盞參與粥皆壅腦上故神昏瘛瘲不已也教以手探喉中乃隨手吐出痰飲粥食盈盆瘛瘲方定以川芎山查澤蘭葉陳皮半夏茯苓香附進之稍得睡不虞女醫又私與補藥予丑時陡然狂亂如降神狀人皆異之因為神附禱禳無已曰此惡露不盡乃畜血如見鬼之症非真有神物相附也（此時何不明言女醫之失）徐以正言叱之即緘默繼以清魂散加滑石童便與之天明

小水乃行狂亂皆定既而女醫欲要功又以藥進則
狂亂如前再與川芎一錢五分當歸四錢澤蘭益母
各一錢臨服加童便連進二帖不効此必胸中有痰
作滯故藥力不行即用前劑大加山查惡露一行神
思即靜睡卧片時手足微動或以掌扑其面或以手
搥其胸昏亂不息診其脉近虛早間面紅而光申酉
時面色白此血行火退宜當補矣乃與人參川芎澤
蘭各用一錢當歸山查各用二錢茯苓陳皮各用八
分荷葉一片煎熟調琥珀末五分服下半時許嗳
氣二聲此即清陽上升而濁陰下降矣自是惡露微
行大便亦利飲食漸進諸症全去而安

細閱是案其得宜察處全在知惡露未行及誤服
人參兩著至其用藥亦只見症治症而已

高鼓峯治一婦人產後惡露不盡至六七日鮮血奔注
發熱口渴脇痛狂叫飲食不進或用四物湯調理或
用山查青皮延胡黃芩等藥卒無一効脉之洪大而
數此惡露未盡留泊血海凡新化之血皆迷失故道
不去畜利瘀則以妄為常曷以禦之遂以醋製大黃
一兩生地黃一兩桃仁泥五錢乾漆三錢濃煎飲之
或曰產後大虛藥毋過峻否曰生者自生去者自去

何虛之有第急飲之果熟寐竟夜次早下黑血塊數升諸病如失矣復用補中益氣治之而安

薛立齋治一產婦患惡露不下服峻懵之劑惡露隨下久而昏憒以手護其腹薛曰此脾氣復傷作痛故用手護也（虛痛喜按）以人參理中湯加肉桂二劑補之而愈

按產後惡露不下有二一則瘀滯宜行一則血虛宜補予常治數人皆二三日而止察其人果虛一以大劑養營治之而愈

陸肖愚治謝四府如夫人分娩旬餘忽臀下微微作痛或謂血虛用大料芎歸十劑而痛不減又謂補血當

補氣陽生則陰長加參耆五六劑而痛益劇脉之六部沈弦而左關尺更緊詢之止左邊近肛門一點痛耳問痛處熱否曰極熱曰此非氣血不足而痛也乃產後敗血凝滯於肝經臀乃肝經所絡之地流而注之不急治久必成毒當行血海之瘀滯解經絡之鬱結庶可消耳不信更醫仍以八物湯投之一日痛處頰腫又過服寒涼解毒之品致瘡口不收大便作泄飲食不進肌肉半削再診脉微細如蛛絲按之猶覺有神曰今宜大補矣乃用四君加耆桂附數劑瀉止食進又加當歸熟地約服十劑成痂而愈

一產婦惡露不行瘀塞溺道小便不利遍身浮腫喘急不得卧用牛膝膏治之愈丹皮大黃當歸桂心桃仁蒲黃元胡香附瞿麥川芎麝香先用杜牛膝三兩水五椀煎至減半再入上藥共煎 大還

孫文垣治程達庵之媳產半月而腿疼嵗科曰虛與八珍湯十日疼益甚疼處甚熱非虛可知謂曰慎勿認虛認風此產後敗血凝滯血海流于經絡不急治則瘀無從出久必化膿成毒或為腸癰今腿疼是其候也不信復延嵗科曰風也但丹溪云產後當大補氣血雖有它症從末治投十全大補痛劇大發寒熱且小腹近

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

胯紅腫出膿外科又與收口太早腰俞復發一毒腫痛寒熱如初十日後大潰膿而不收口精神委頓肌肉陷削飲食不進惡心惡寒奄奄一息診之六脉濡大無力清水無膿曰勢亟矣速為保脾與人參白朮各用五錢甘草乾薑附子各用一錢黃耆三錢白芷桂心各用五分外科曰白朮作膿恐不可服曰膿不死人飲食不進則死人也四帖神氣回飲食進症減膿成改用參苓白朮散調理一月而安

朱丹溪治一婦人年十八難產七日後產大便洩口渴氣喘面紅有紫班小腹脹痛小便不通用牛膝桃仁

當歸紅花木通滑石甘草白朮陳皮茯苓煎湯調益
母膏不減後以杜牛膝煎濃膏一椀飲之至一更許
大利下血一桶小便亦通而愈心法

繆仲淳治莊欽之次女產後惡露未淨至夜發熱脾胃
卻弱腰腹大痛時師謂產後氣血俱虛投以人參當
歸諸補劑轉劇咸慮其成蓐勞也診之謂不數帖即
痊矣用白芍扁豆杜仲各三錢紅麴蘇子車前子各
二錢薏肉麥冬青蒿各四錢橘紅乾葛各錢半炙艸
八分牛膝五錢黑豆八錢澤蘭一錢十劑而惡露淨
發熱已腹痛亦止但腰痛未盡除脾胃尚未健改用
白芍山查橘紅麥芽石斛扁豆沙參各三錢砂仁杜
仲薏肉各二錢五味一錢炙草五分牛膝五錢蓮肉
四十粒服十餘劑脾胃亦佳症悉退而全愈

來天培治王正權室人產後十餘日患寒熱腹痛目赤
而澁羞明疼痛診之脉沈而澁詢其惡露未盡知停
瘀為患以當歸川芎桃仁紅花甘菊生地丹皮銀花
連翹蟬脫清火行瘀驅風等劑六帖而痊

立齋治一婦產後四肢浮腫寒熱往來蓋因敗血流入
經絡滲入四肢氣喘咳嗽胸膈不利口吐酸水兩脇
疼痛遂用旋覆花湯微汗漸解頻服小調經散用澤

蘭梗煎湯調下腫氣漸消來選入

一產婦腹脹或用抵當湯敗血已下前症益甚小腹重墜似欲去後此脾氣虛而下陷也乃用補中益氣再加炮薑溫補脾氣重墜如失又用六君子湯而安後進歸脾湯與其調理而安愈全上

產後 癥瘕

薛立齋治一產婦腹中似有一塊或時作痛而轉動按之不痛便非實積面色萎黃痛則皎白脈浮而澁此肝氣虛而血弱也不信乃服破血行氣痛益甚轉動無常又認為血鬱專以破血祛逐之藥痛攻兩脇肚腹尤甚益信為鬱礙服下虫等藥去血甚多形氣虛甚肢節間各結小核隱隱於內裡以為鬱子畏藥而走於外薛云肝藏血而養諸筋此因肝血復損筋涸而攣結耳蓋肢節朐項皆屬肝胆部分養其脾土補金水以滋肝血則筋自舒遂用八珍湯逍遙散歸脾湯加減兼為治之調理數時諸症悉去而愈

一產婦小腹作痛有塊脉乱而濇乃以四物加用元胡索紅花桃仁牛膝木香治之而愈是須對症用藥庶無他患宜於臨診慎之

產後

血崩

薛立齋治一產婦血崩小腹脹痛乃用破氣行血之劑其崩如涌四肢不收惡寒嘔吐大便頻瀉須用六君加炮薑服四劑稍愈又用十全大補服卅餘劑而安

一產婦血崩因怒其血如涌仆地口噤目斜手足抽搐此肝經血耗生風用六味丸料一劑諸症悉退但食少晡熱佐以四君加柴胡丹皮而愈

孫文垣治黃氏婦產未彌月醉犯房事血來如崩發熱頭暈大小便俱熱六脈洪大以竹茹蒲黃白芍各一錢香附茯苓側柏葉各二分甘草炮薑艾葉各三分血止大半腰猶脹痛下午胸膈飽悶改以川芎五分當歸茯苓補骨脂蒲黃香附各八分薑炭甘草各一分陳皮七分人參一錢而愈

呂東莊治從子在公婦半產惡露稀少胸腹脹甚脉之濡數當重用參耆不然必崩因力艱未服已而果崩潰不止下血塊如拳如椀者無數神氣昏憒兩足厥冷至少腹兩手厥冷至肩額鼻俱如冰頭上汗如油旋拭旋出按其脉至骨不得見乃投大劑補中益氣湯加人參一兩未効（如無壹兩之參單服補中益氣則立脫矣不可不知）急用

人參一兩附子一兩（何必如許）炮薑二錢濃煎灌之至暮漸減戒曰俟其手足溫即停藥至三鼓手足盡溫崩症亦止家人忘戒又煎前方進之比及曉視之脉已出而無倫痰忽上涌點水不能飲入口即吐嘔并獨參湯不能下曰此過劑所致也即投生地黃五錢熟地黃一兩當歸白芍枸杞各三錢甘草一錢濃煎與飲病者意參飲尚吐況藥乎不肯服乃强之曰試少飲必不吐進半甌殊安遂全與之盡藥而痰無半點神氣頓清矣午後體發熱曰此血虛熱恒理也復用十全大補調理而安

張飛疇治陳子厚媳八月間因產不順去血過多產後惡露稀少服益母湯不行身熱汗出產科用發散行血更劇自用焦糖酒一椀遂周身絡脉筆楚難堪惡露大下昏沈戴眼汗出如浴但言心痛不可名狀（即血心痛也）此去血過多心失其養故痛肝主筋為藏血之地肝失其榮故脉絡筆楚不堪且汗為產後之大禁非急用人參恐難挽也用四君合保元湯加白芍五味一劑汗止因其語言如祟疑為瘀血未盡更欲通利曰音怯無神此屬鄭聲且腹不疼痛瘀何從有此乃神氣散亂不收之故到即將前方加入棗仁龍齒與

其服之諸症漸平後又服獨參湯至彌月而安

薛立齋治一產婦月經不調內熱燥渴服寒涼之劑其血如崩腹痛寒熱作嘔少食用六君子二十餘劑諸病悉愈以加味逍遥散令其調理而安

一產婦月經半餘不通內熱晡熱服分氣丸經行不止惡寒作渴食少倦怠胸滿氣壅朝用加味逍遥散夕用四君子湯治之調理月許諸症稍愈再佐以八珍湯兼服至兩月而愈

馬元儀治金氏婦產後一月血來不已厥逆自汗不止或與養血補陰不効診之兩脉空大無神曰褚氏有云血雖陰類運之者其陽和乎今厥逆自汗脉大無根為脾腎之真陽內弱故血無所附而溢所謂陽虛陰必走也法當大補真陽以攝虛陰若養血補陰恐血未必生而轉傷陽氣則陰血愈不守矣以人參三兩白朮一兩附子三錢茯苓炙艸各一錢一劑知二劑已數劑精神勝常矣

繆仲淳治賀函伯乃正小產後陰血暴崩作暈惡心牙齦浮腫喉嚨作痛日夜叫號不絕曰此因失血過多陰氣暴虛陽無所附火空則發炎上胸中覺煩熱所謂上盛下虛之候也法當降氣氣降則火自降矣

火降則氣歸元而上焦不煩熱齒齦腫消喉嚨痛止陽交於陰而諸病自已耳鳴用蘇子研青葛子各計二錢半五分麥冬白芍鱉甲牛膝生地枸杞各計四錢五味五分棗仁炒五錢續斷橘紅各計二錢枇杷葉用三片以河水煎之加童便一大杯又斟金汁十二時是待空心時服之再進童便一杯

許竹溪夫人年三十餘產後自已至酉血暴下如注呵欠連連遂目閉口張面色青慘白悴汗出不流髮根盡濕六脉全無勢欲脫矣其初亦以童便灌之非醋熏之殊不應乃用熟地二兩杞子棗仁各一兩令煎湯候藥至投入不待稠濃即徐徐灌之才盡一鍾汗止目開口閉漸知人事再與之血止而睡醒後進粥次日仍以前方令日服一劑四日全瘳當其垂危余診也時方與人會飲擲杯而往疏方而返座有業醫者數人詢其症咸曰猶與藥乎用何方曰與某某咸詫笑曰君真會乾魚放生也咎將誰任余笑而不言

宋申甫室人妊數月時長夏歸寧母家名醫診之以為經阻也投以破瘀辛熱之劑四帖遂半產血行如瀉亟余診之至則大汗淋漓脉將脫矣伏几上去牀數步不能就寢以血行之猛也時唯親戚朱某在乃屬

其母煮水待藥煎百餘沸即與服再煎再與不及稠濃也急偕朱就近鋪買熟地四兩杞子棗仁炒各二兩如法服下立瘥

張建東室人年三十餘妊娠五月素有肝病偶不快隣醫與荊防廣半香砂鬱金元胡之類五劑遂見紅腰腹疼墜氣促面紅診之脉不接續曰胎已難保第與滋養三陰以防其崩耳其產必在於夜若待崩而延診服藥恐緩不及事先疏方與之熟地二兩杞子一兩棗仁一兩令察其面若加赤氣若加喘血必暴下宜亟飲之至時一如言果獲無事次日就前方減半入人參一錢二劑而痊後數年復孕因肝虛發厥余用生地杞子之劑不敢服遂至變症百出產後上咳下利余與生地杞子沙參麥冬病少退次日仍前方告以必用蘘仁乃可以服參朮薑附既多熱鬱甚非此莫能解也遂不復邀後聞其日進參耆朮附卒致不起人之生死豈皆命乎

產後 血迷

張子和治一婦產後第六日血迷用涼膈散二兩四物湯三兩朴硝一兩都作一服大下紫黑水其人至今

肥健（即末句推之則其人素常肥健可知矣故可用如此之藥也）柴嶼青治侍御李符千大令媳半產大汗發暈昏不知人（即血迷也）他醫立方俱不敢服符千乃徒步邀視先令以韭葉斤許搗爛用好醋炒之乘熱熏鼻少甦用清魂散加童便黃酒服之調理旬日而安

薛立齋治一婦因產後飲酒惡露甚多患血暈口出酒氣此血得酒熱而妄行虛而作暈也以佛手散加煨甘葛二錢一劑而痊酒性慓悍入月及產後不宜飲恐致前症產室人衆氣熱喧嚷亦致此症

梅師治產後餘血不盡上沖心脹悶腹痛以藕汁二升飲之而即瘥愈

薛立齋治一產婦患惡露上攻昏憒口禁冷汗不止手足厥逆乃用六君子加附子一錢以迴其陽服二劑頓甦又以十全大補湯養其血氣而安

一產婦患前症手不敢近腹用失笑散一服下瘀血而愈次日腹痛下利用十全大補而安

一產婦患前症用大黃等藥其血雖下復患頭痛發熱惡寒次日昏憒自以兩手堅護其腹不得診脈視其面色青白此脾氣虛寒而痛也乃用六君子加薑桂服之而痛即止又用八珍加薑桂調理而安

王執中曰產後血暈寒熱往來或血搶心惡疾也予閱
食療本草見有用鹿角燒為末酒調服日夜數服驗
者偶家有婦人患此令服此神效因教他人婦服皆
驗但以產後未可飲酒以童子小便調服爾最忌服
利藥資生經

產後 血虛

楊乘六治許氏婦產後動怒寒熱往來脇痛口苦（肝火病其狀如瘧蓋膽為肝府肝病則膽亦病也）漸次發熱晡熱醫用風藥混加表散腹左忽增一塊圓大如掌日夜作痛或疑寒疑

或疑食滯或疑瘀畜或疑痞積攻治之痛益甚食減肌瘦脉之右關弦洪左關弦數面色黑瘦舌色淡黃而乾症乃怒氣傷肝肝經血少而燥痛也蓋肝居胃左本藏血者也血足則其葉軟而下垂血虧則其葉硬而橫舉內與胃相磨外與肌相逼能不隱隱而痛乎凡性燥（躁）躁多怒者往往患此而婦女尤多庸妄不知誤用香躁銷剋之劑枉殺者不知凡幾良可歎也（司命者宜細玩熟記此病極多不獨於產後也）以滋水清肝飲四劑服下腹塊消痛止繼用歸脾湯去木香加白芍丹皮山梔間服十餘劑而諸症悉痊（此必用歸脾之劑收場者吾恐其知伊尚守而未能化也耶）

許氏婦産後發熱或時作寒頭痛體倦醫與疎邪降火煩渴不食楊診之其脉浮取似數重按則乱左手尤甚唇舌皆白面無血色用十全大補湯加炮薑或曰如此大熱而用薑桂何也曰陽在外為陰之衛陰在內為陽之守兩相依附者也今産後陰血大虧虚陽無附浮散於外而為熱非引浮散之陽歸於柔陰其熱不退（却不盡然）故用温補血氣之劑欲其補以收之也又曰薑桂味辛而散何云補以收之也曰桂逢　藥固能汗散若逢血藥即為温行薑之為用生則開肌發汗熟則温中散寒至炮黑則入血且能引氣藥以以入血分而生新血故以大補之法為主治以之為佐使陰得陽生則熱自除耳服及四劑果然熱退身涼至十餘劑諸症悉除而愈

凡産後症多屬陰虚血少第以二地二冬杞子一切養營之劑無不立愈若氣血兼補襍以薑附剛劑非擔延時日即貽病者後患臨症者宜審之

柴嶼青治錢璵沙官侍御時其夫人産後三日惡露甚少而色白唇燥口乾身熱（與前紫唇舌皆白面無血色全）擬用參璵沙以産後不宜用補為疑柴曰果有外感自別有治法今症屬不足舍此必致貽患不可用參之說此不

許氏婦産後發熱或時作寒頭痛體倦醫與疎邪降火煩渴不食楊診之其脉浮取似數重按則乳左手尤甚唇舌皆白面無血色用十全大補湯加炮薑或曰如此大熱而用薑桂何也曰陽在外為陰之衛陰在內為陽之守兩相依附者也今産後陰血大虧虛陽無附浮散於外而為熱非引浮散之陽歸於黍陰其熱不退故用温補血氣之劑欲其補以收之也

雲露云氣字平聲

固能汗散若逢血藥即為温行薑之為用生則開肌發汗熟則温中散寒至炮黑則入血且能引氣藥以

以入血分而生新血故以大補之法為主治以之為佐使陰得陽生則熱自除耳服及四劑果然熱退身涼至十餘劑諸症悉除而愈

凡産後症多屬陰虛血少第以二地二冬杞子一切養營之劑無不立愈若氣血兼補襯以薑附剛劑非擔延時日即貽病者後患臨症者宜審之

柴嶼青治錢璵沙宮侍御時其夫人産後三日惡露甚少而色白唇燥口乾身熱與前紫唇舌皆白面無血色全擬用參璵沙以産後不宜用補為疑柴曰果有外感自別有治法今症屬不足舍此必致貽患不可用參之說此不

知醫者及女流之見也遂投人參當歸散加好桂一錢次日口即滋潤生津調理半月而痊

陸祖愚治贔巡司子婦產後百餘日大腸燥結虛火上衝便血腸鳴腹滿短氣內外皆熱半月不能進飲食或與養血清火愈甚診得兩手浮洪而數按之無神脾腎兩脉更覺空虛乃產後元氣耗散真陰不足而非實熱也用八味丸清晨淡鹽湯下三錢再用四君加歸芍麥冬知母蓮肉作煎劑數服諸症少緩後以補中益氣加白芍麥冬一月而廖

馬元儀治陸氏婦產未一月因起居微觸便血三日遂

徹夜不寐此新產去血過多虛而益虛也凡有所觸必傷其肝肝傷而血溢則氣亦不守矣氣虛血弱心神無養故目為之不瞑欲與大補不信後數月益甚乃用附子理中湯二劑又與歸脾大劑用參至一兩加鹿茸三錢兩月而愈

許竹溪室人產後數日發熱自汗面赤頭痛惡食不眠惡露極少而淡腹時脹痛脉之洪大而數曰此血虛也腹脹面赤其勢欲崩宜用峻補或問故曰面赤者陽上越也腹脹者陰下陷也陽上飛則陰下走勢所必然與熟地一兩杞子棗仁各五錢一劑次日少腹

之右忽有塊如槃且硬按之痛甚於是疑為瘀而誤補欲更張幸病人素服予藥姑再延診曰其塊驟起即大如槃雖瘀滯亦無如是之甚也此正肝脾失血燥而怒張得補猶然否則厥而崩矣今脉大漸斂面赤漸退非藥之誤乃藥之輕耳令前方加倍再入炒白芍五錢炙甘草一錢一服塊漸平再服塊如失前方減半數劑諸症全安此症若作瘀治斷無幸矣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

錢塘魏之琇玉璜撰

產後 感症

陸肖愚治吳敬之室年二十餘產前已有感冒分娩三日後因責婢離牀時正冬月覺身上憟慄遂身熱頭痛或用參蘇飲發其汗頭痛止而身熱不除遂以產後當大補氣血數劑而煩熱日甚又擬用補中益氣湯脉之兩手雖弱而左猶帶浮右已見數曰脉虛正

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

產後之平脉但左手猶浮知表邪未散右手見數欲
傳裡之候也宜急解其表微通其裡少緩便有承氣
之患矣用柴葛枳桔黃芩花粉甘草山查服一劑而
煩熱即減二劑而身涼以清氣養營湯調之
馬元儀治陸氏婦產後惡寒雖重茵厚被不除屢補不
効將行桂附矣診之兩脉沈伏面赤口燥胸滿此非
產後新虛乃胎前伏邪也屢用參朮則邪愈結而正
愈阻肌表惡寒者邪熱內欝逼陰于外也口乾面赤
胸滿者邪氣挾火挾食上凌清道也仍宜一表一裡
治之用葛根防風蘇梗枳殼桔梗杏仁蘇子薄荷一
服而表症已右關尺轉見滑實隨用大黃五錢元明
粉三錢甘草一錢一服下積穢甚多復發疹發顧此
表裡兩和餘邪畢達之徵也再與辛涼解透之劑而
安此症邪伏于內久而不宣用清陽泄表苦寒達下
兩泄之猶發疹發顧而乃妄行溫補將謂脉伏惡寒
為陽虛之候耶其亦不審病機甚矣
王氏婦產後一月神昏氣倦上氣喘促胸滿中痛咳嗽
發熱百治無効診之兩脉沈澁煎結此胎前已有伏
邪煎產後氣血兩虛邪益內結法宜表裡兩和使邪
從外達氣從內泄病自愈矣以柱枝柴胡蘇梗枳殼

半麻蔔子杏仁廣皮透邪達滯之劑頓安脉已稍舒或投參地歸芍飲滯之品遂徹夜靡寧如喪神守此邪結于中補之生變也乃用桂枝炮薑黃連枳實厚朴廣皮等一劑而胸滿中痛除復用瓜蒌實柴胡桂枝半夏枳實杏仁蘇子桔梗再劑而表熱喘咳平但大便不行此久病津液失養也加生首烏一兩便行餘邪盡去然正氣大虧再與滋補氣血之劑而安

李季虬治魏季嘗正產後飲食不節復感風寒遂致發熱譫語喘咳氣逆惡露不至勢甚急迫謂此症皆係外來客邪尚屬可救設正氣虛脫現諸症者必無幸矣何以見之為以脉氣浮大有力故也須用大劑疎風消食之藥與服二劑便霍然愈矣先是有用白朮芍歸等藥補之者幾為所誤耳廣筆記

張意田治一婦人產後患病已及半載咸作勞損治且云陰虧已極勢難痊愈張連診五次確知此症服小柴胡湯法必當應奈群議紛紜以參柴非治陰虧之藥又言肺熱咳嗽大忌人參因立案正之幸病家見信一服而寒熱大作三服之後寒熱即退而咳嗽亦平十服全愈案云診得六脉皆數右寸大而軟關尺兩部沈候弦急左寸洪數關部三候皆虛數尺中

空大夫右寸軟大肺氣虛也關尺沈候弦急關主中州尺司火位沈裡也弦肝木也此因中氣虛而木邪犯位木氣動而火從之也左寸洪數心經虛火也關中虛數肝無血養也尺中空大腎水虛也是脉本屬陰虛而寒邪乘之留連不已以至於此今所見症五更發熱者係寅卯木旺之時肝木挾邪隨時而動也上午寒熱者因邪稍泄而勢稍緩也咳嗽之聲結而不暢此久咳傷肺肺氣虛而邪不得越也胸腹時脹而微鳴此肝木犯脾肝主脹也合脉與症是為虛中挾實不得樞轉外出之候也大全曰產後血氣虛弱

于於

產後感症 四

宜行一

產後感症四

滿百日將養失所風冷客于於氣血頗難消感於肺故咳嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛受邪氣通于肝流注臟腑須臾頻發咳嗽寒熱勢全瘧疾亦無汗水蓐勞之候往往如此景岳云虛弱之人外邪初感不為解散而作內傷或用清涼或用滋補以致寒邪欝伏久留不解而寒熱往來或為咳嗽其症全似勞損欲辨之者察其表裡病情或身有疼痛而微汗則熱退無汗則復熱或大聲欬嗽脉雖弦緊而不甚數即病至一兩月而邪猶未解此似損非損之症毋再悞也今此症實類此當用

空大夫右寸軟大肺氣虛也關尺沈候弦急關主中州尺司火位沈裡也弦肝木也此因中氣虛而木邪犯位水氣動而火從之也左寸洪數心經虛火也關中虛數肝無血養也尺中空大腎水虛也是脉本屬陰虛而寒邪乘之留連不已以至於此今所見症五更發熱者係寅卯水旺之時肝木挾邪隨時而動也上午寒熱者因邪稍泄而勢稍緩也咳嗽之聲結而不暢此久咳傷肺肺氣虛而邪不得越也胸腹時脹而微鳴此肝水犯脾肝主脹也合脉與症是為虛中挾實不得樞轉外出之候也大全曰產後血氣虛弱飲食未平不滿百日將養失所風冷客于於氣血顏容憔悴飲食難消感於肺故咳嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛受邪氣通于肝流注臟腑須臾頻發咳嗽寒熱勢全瘧疾(寒熱如瘧)亳無汗水(汗水)尊勞之候往往如此景岳云虛弱之人外邪初感不為解散而作內傷或用清涼或用滋補以致寒邪欝伏久留不解而寒熱往來或為咳嗽其症全似勞損欲辨之者察其表裡病情或身有疼痛而微汗則熱退無汗則復熱或大聲欲嗽脉雖弦緊而不甚數即病至一兩月而邪猶未解此似損非損之症毋再悞也今此症實類此當用

小柴胡湯轉動樞機藉少陽之生氣從內而外自下而上則陰陽和而伏邪解散矣半夏生當夏半能啟陰氣產後陰虧而燕口燥故去之胸腹時脹脾陰多鬱宜加牛膝以導之藥病相當自應如桴鼓也

來天培治潘氏婦季夏產後二十餘日患寒熱便血惡露未淨崇科與香薷飲四劑服後反嘔吐頭眩腹痛自汗惡心發熱氣促發班色微紅兩頰淡紅診之左脉如絲右脉沈細此虛而燕感嘔吐傷胃肝木乘相火刑金肺氣受傷上下拒格之症也治宜活血滋陰行氣舒脾散滯降逆託裡化斑之劑乃用牛膝茯苓杞子當歸紅花黃耆川芎木香香附廣皮夏麴生薑一劑諸症悉減六脉和緩但微咳眩運心跳胸膈不舒此邪氣去而正氣虛所致也前方去川芎木香牛膝加茯神丹參杏仁貝母二劑前症盡除惟心跳頭暈改用歸脾湯去人參木香加防風黨參杞子白芍調理而愈

產後 暑

孫文垣治一婦人年十六初產女艱苦二日偶感暑邪繼食麪餅時師不察竟以參朮投之即大熱譫語口渴汗出如洗暑症多汗氣喘暑傷氣泄瀉黃水無糞熱協

四字多作小注

下利日夜無度小水短少飲食不進症甚危惡時六月初旬女科見熱不退乃投黃連黃芩白芍之劑諸症更甚又以參朮大劑肉果乾薑等止瀉一日計用參二兩四錢瀉益頻熱益劇喘汗轉加譫語不徹口醫各束手謝曰汗出如油喘而不休死症也又汗出而熱不退瀉而熱不止譫語神昏産後脉洪大法皆犯逆無生路矣說亦近是惟附子理中湯庶徼倖萬一孫診之六脉亂而無緒七八至獨右關堅硬（食積）因思暑月汗出乃常事但暑邪麪食瘀血皆未銷鎔補劑太驟致斃血如見鬼若消瘀去積解暑猶可生也用

益元散六錢解暑清熱止瀉利水為君糖球子（即山查）三錢為臣紅麴澤蘭各一錢五分消瘀安魂為佐橘紅半夏麴茯苓理脾為使三稜五分消前參朮決其壅滯為先鋒飲下即畧睡譫語竟止連進二劑瀉減半次日仍用前劑其夜熱大減便只二次有黃糞矣惡露行黑血數枚次日診之脉始有緒神亦收飲進粥一盞前方去三稜紅麴加扁豆大便一次所下皆黑糞熱盡退改用四君子加益元散并青蒿扁豆香附酒芍炮薑數味令其調理而安

易思蘭治石城王福歎之妃癸酉六月受孕偶患泄瀉

醫用淡滲之藥止之自後每月瀉三五日有作脾瀉者用參苓白朮散之類二三服亦止然每月必瀉五七次至次年三月生產後連泄半月日夜八九次諸藥不見効病家驚惶無措名易醫至治之診得兩寸尺俱平和惟兩關洪大有力曰此必暑病也乃以黃連香薷飲治之一劑即減其半再劑悉皆全愈惟肝脉未退又用通元二八丹調理半月後平復如故

陸祖愚治李丹山子室自來元氣不足產後六七日正當酷暑而卧房在樓忽頭疼氣喘昏悶體若燔炭沈黑去或以為傷寒令門窗盡閉帳幔重幛用二陳羌防芎蘇一劑口乾唇裂喘急欲絕診之六脉浮洪而散乃冒暑而非感寒宜凉解而不宜温散令取井水灑地鋪以蘆席移病人卧其上飲以香薷飲遂微汗而甦再用清暑益氣湯四劑而起

沈明生治劉舜泉孫媳夏月產後暈厥不知人事或謂惡露上攻所致投去瘀清魂等劑瘀不行暈厥益甚又作痰治食治皆不効沈至回翔諦審笑曰吾得之矣此暑熱乘虛而入急宜清暑非黃連不可或謂血得冷則凝今惡露未去若投寒凉是速其斃也沈笑曰有不諱吾任之藥甫入口厥甦暈止再進而惡露

行蓋產時樓小人多炎歗之際益助其熱乍虛之體觸之豈能不病經云暑傷心又云心主血心為熱胃而暈厥此中暑而非惡露明矣或曰舍症從時理固然矣然血熱則行冷則凝亦古人之訓言也今用寒涼之劑而惡露反得去何也曰熱行冷凝以血喻水道其常耳子獨不觀失血者有用溫暖藥而得止則瘀血者豈無用苦寒而得行此造化之微權逆從之妙理也安可執乎 未能透徹

產後 火熱

易思蘭治一婦產後半月餘胃有清水作逆而吐以為胃寒令煮雞倍用椒薑初覺相宜（凡內熱虛火之人初服辛熱之藥亦有小効）至三五日清水愈多以椒薑煎湯時時飲之近一月口氣漸冷四肢發厥晝夜作逆腹中冷氣難堪有時戰慄用四物湯人參一錢至二錢初服少安久則不應又加炮薑亦不効衆議用附子理中湯（庸俗必趨之道）易診之六脉俱無以食指復按尺部中指無名指按尺之後（診法妙）脉來實數有力左右皆同發言壯厲一氣可說三五句唇焦煩赤大便五六日一次小便赤少此實熱症也詢之其俗產後以食胡椒炒雞為

補此婦日食三次半月後遂得疾乃用三黃湯治之連進四盞六脉俱現薑椒湯不欲食矣又進四盞身不戰慄清水減半服四日口中熱氣上升滿口舌尖俱發黃小粟瘡大便八日不通以四苓合涼膈散空心一服至午不動又以甘艸煎湯調元明粉五錢熟服一時許腹中微鳴吐出酸水一二椀大便連去二次又服元明粉五錢下燥矢十餘枚後以四苓三黃山巵枳殼調理而愈

按此為火極似水乃物極必反之候凡患此為燥熱溫補所殺者多矣哀哉

蔣仲芳治一新產發熱服藥不止教以益母艸煎湯加童便與之熱遂退蓋診其脉平和惟少數故也

許學士云記一婦人產後護密閤內更生火睡久及醒則昏昏如醉不省人事其家驚惶許至乃用荊芥佐以交加散云服之即睡睡中必以左右掻頭覺必醒

產後 火

沈協蘭室人善病自頗知醫最重景岳全書數年來所服多溫補之劑約桂附幾各半斤近以產後惡露淋

潮赤白時下咳嗽日甚小便自遺脉之右寸鼓指兩關弦數右尺弱面有紅光舌當中無胎胸多冷氣喜熱飲稍涼則不快所服乃壽煎加薑桂等乃列肇與之曰病本三陰不足又服溫補則氣分偏勝遂致綿延不已其誤在便溏氣冷又喜熱飲認為脾胃虛寒不知火盛下迫則作瀉上沖則反冷欝于中則得辛熱而暫散此理方書多未論及今以產後去血血虛則火益盛面有紅光火炎上也惡露赤白肝脾熟也咳嗽便遺肺虛肝盛腎不秘密也辛溫燥烈宜亟遠之方用生熟地杞子沙參麥冬釵斛初猶畏麥冬之寒以二錢太重只用六分數劑後覺相宜漸加至一錢五分十餘劑每日大便下青黑褐色而辛氣滿房戶蓋桂薑之熱久泊廻腸因營氣漸充乃勢不能容而下出也若再投溫補之味其害可勝言哉書此以為偏服溫補者戒之云爾

楊氏二婦妯娌也其娣新產發寒熱頭暈不能起坐坐則欲撲惡露紅白兩乳壅腫子戶旁腫如鷄卵痛甚勢將成癰崇科與炮薑白朮荊芥桂枝等更嘔惡不寐脉之弦數六至有餘乃與生地杞子蒂丁麥冬當

歸銀花甘艸黃連蕎仁六劑全愈其婦產彌月耳聾頭及乳腹常痛帶下綿綿每浴湯中搖漾如綫子户亦腫痛醫與香燥轉甚亦用前方加減而愈又朱朗齋令妹產後赤白淋瀝口乾咽痛前方去蒂丁當歸加白芍四帖全安其初楊姒所生兒食乳即吐自母服藥後兒亦不嘔矣凡此皆少厥二陰陰虛火盛之病若謂產後而用辛溫是殺之也

產後 惡寒

吳洋治汪伯玉嬸杜冬舉仲子會病瘡且瘧四肢汗溢而甚惡寒歷春夏滋深挾纊擁絮猶慄慄曰物極則反吾且極之病由逸產而虛勢重不可亟反激而後反其易為力哉于是補以參耆斂以桂枝固以龍骨牡蠣經年寒猶故也汪以為言洋曰毋謂徐徐及瓜而後可治又明年夏先期一月而診之曰藥力告盈其可已至日則以盤水沃青巾者二以石水浮瓜者三謂汪曰洋無戲言通言語徹衣衾其在今日乃命女僕奉盤水進杜難之手語曰吾病產後宜不可水洋曰無害第以兩手按青巾試之病者曰宜然後乃沃兩履尋漱以盂水已復飲之既削瓜而華啖其半于

是汗乃止聲始出即單衣亦如常日先是溪南吳千
婦病與杜同痊洋治之亦以鬱法取效 太函集

產後 喘

浦江吳輝妻孕時足腫七月初旬產後二日洗浴即氣
喘但坐不得臥者已五日惡風得暖稍寬兩關脉動
尺寸俱虛百藥不効用壯丹皮桃仁桂枝茯苓乾薑
枳朴桑白皮紫蘇五味子萎仁服之即寬至二三服
不即臥其病如失蓋作汗血感寒治之也 治法彙

薛立齋治一產婦喘促自汗手足俱冷常以手護腹此
陽氣虛脫之故乃用人參附子湯服四劑而愈

繆仲淳曰己丑予婦產後五日食冷物怒傷脾作泄乃
用微嗽又三日泄不止手足冷發喘床亦動搖神魂
飛揚不能主守一醫投以人參五錢附子五錢療之
如故復加參附仍又不効漸加參至三兩附子三錢
服下一劑霍然而起 廣筆記

繆仲淳治于中甫夫人產後氣喘投以人參五錢蘇木
麥冬各用三錢服下一劑而即瘥愈 來選入

產後 咳嗽

薛立齋治一產婦咳嗽見風則喘急惡寒頭痛自汗口禁痰盛薛謂脾肺氣虛腠理不密乃用補中益氣湯加肉桂服至數劑而即安愈

一產婦患咳而腹滿不食涕唾面腫氣逆此病在胃而關於肺乃用異功散服之而愈

孫文垣治贊皇令堂產後左脇痛甚（此脇痛緣肺實而氣機不利也）咳嗽痰不易出內熱氣壅不能伏枕與以瓜蔞仁六錢桑白皮蘇子杏仁半夏桔梗枳殼各用一錢以水煎服之氣定嗽除外與保和丸及七製化痰丸而安

繆仲淳治施靈修乃正產後發寒熱咳嗽不止因本元虛弱誤用薑桂熱甚（二向宜細玩之）用鱉甲白芍牛膝生地各用四錢山查炒麥冬益母炒各用五錢橘皮當歸各用二錢青蒿杜仲各用二錢半棗仁八錢遠志五味各用一錢茯神三錢竹葉三十片數劑輒定（方亦太襍）

聶久吾治一婦年四十餘因產過多身熱日夜不止午後益甚肌肉瘦削經水不行諸醫無效與花粉山藥百合香附麥冬各用八分天冬五分地骨皮當歸二生地生炒各四分（疑有誤字）地生炒四分白芍生炒三分前胡四分茯苓七分生甘草三分薑一薄片龍眼三个服下十餘劑而身熱已漸退去又加桔梗四分酒炒芩連

薛立齋治一產婦咳嗽見風則喘急惡寒頭痛自汗口禁痰盛薛謂脾肺氣虛腠理不密乃用補中益氣再加肉桂服至數劑而即安愈

一產婦患咳而腹滿不食涕唾面腫氣逆此病在胃而關於肺乃用異功散服之而愈

孫文垣治賛皇令堂產後左脇痛甚此脇痛緣肺實而氣機不利也咳嗽痰不易出內熱氣壅不能伏枕與以瓜蔞仁六錢桑白皮蘇子杏仁半夏桔梗枳殼各用一錢以水煎服之氣定嗽除外與保和丸及七製化痰丸而安

繆仲淳治施靈修乃正產後發寒熱咳嗽不止因本元虛弱誤用薑桂數劑二向宜用鱉甲白芍牛膝生地各用四錢山查麥冬益母炒各用五錢橘皮當歸各用二錢青蒿杜仲各用二錢半棗仁八錢遠志五味各用一錢茯神三錢竹葉三十片數劑輒定方亦太襍聶久吾治一婦年四十餘因產過多身熱日夜不止午後益甚肌肉瘦削經水不行諸醫無効與花粉山藥百合香附麥冬各用八分天冬五分地骨皮當歸二母各用六分生地生炒四分白芍生炒三分前胡四分茯苓七分生甘炒三分薑一薄片龍眼三个服下十餘劑而身熱已退去又加桔梗四分酒炒芩連各

六分續服二十餘劑而諸症悉安

產後 嘔附霍亂

陳霞山治一婦產後傷食致胃虛不納穀四十餘日聞穀氣藥氣俱嘔以參苓白朮炒麴各用一錢陳皮藿香各用五分炙甘艸三分砂仁五分陳米一合用沸湯二椀泡伏龍肝末澄清汁煎藥服之而安

薛立齋治一產婦患腹脹滿悶嘔吐因敗血已下前症不能運化所致或用抵當湯敗血已下前症腹重墜似欲去後薛謂此脾氣虛而致下陷也宜用補中益氣湯加用炮薑溫補脾氣其重墜如失復又續進用六君子湯治之而安

一產婦停食霍亂用霍香正氣散之類已愈後因胸腹膨脹飲食稍過即為嘔吐或作泄瀉此脾胃俱虛故用六君子湯加木香治之漸愈後又因飲食失調恚怒復患霍亂胸腹大痛手足逆冷乃用附子散又用八味丸以補土母而康設泥痛無補法而用辛散或用平補之劑必致不起

產後 泄瀉

陸養愚治臧舜田內人脾胃素常不實產後因怒大便泄瀉或以胃苓湯加歸芍投之勢日甚且汗出氣喘脉氣散大或謂此非產後泄瀉所宜宜勿藥予陸曰脉雖大而按之不甚空尚有一二分生意乃用人參理中湯加訶子肉果已煎矣忽傳人事已不省再診之浮按虛數沈按如絲手足厥逆或謂今夜決不能延乃辭去陸令急以前藥加附子一錢一劑汗止瀉減再劑病減七八分去附子加歸芍數劑而起

王懋如治一產婦彌年不愈六脉沈遲此元氣下陷寒濕太甚致成泄瀉之症然湯藥猶濕也以濕治濕可乎遂用參耆苓朮肉蔻升麻防風甘艸用豬肚一枚入蓮肉一觔好酒煮爛搗和為丸日進而安

陳三農治一婦人因產後滑泄勺水粒米不容存脏即時瀉下已半月餘矣診之六脉濡而弱此皆產間勞傷脾也若用湯藥恐滋胃濕遂以參苓白朮散加肉蔻生薑棗肉為丸服之即愈

薛立齋治一產婦患大便不實食飲食少思五更或侵晨必數遺尿此因中氣虛寒脾腎不足宜用補中益氣送四神丸服之而痊

張子和治李德卿妻因產後病泄年餘四肢瘦乏皆斷

為必死之症張曰兩手脉皆微小乃利病之生脉況洞泄屬肝經肝木剋土而成此疾亦是腸澼澼者腸中有積水也先以丹車丸四五十粒又以無憂散三四錢下四五行又進導飲丸渴則調以五苓散再與胃風湯調之半月而能行一月而安健

產後 附不禁

薛立齋治一產婦小便頻數時忽寒戰乃屬脾肺虛弱須用補中益氣加增山茱山藥為主佐以桑螵蛸散而愈後患發熱晡熱盜汗自汗月水不調又用加味逍遥散治之而全安

一產婦患前症吐痰發熱日晡作渴此膀胱陰虛又用補中益氣湯佐以六味丸而愈後又患痢小便頻數手足俱冷此屬陽氣虛寒再用前湯及八味丸而瘳

一產婦小便不禁二年（一作旬）不愈面色或青赤或黃白此肝脾氣血虛熱用加味逍遥散為主漸愈佐以六味丸而痊後因怒小便自遺大便不實左目頓緊面色頓赤仍用前散佐六君子湯以清肝火生肝血培脾土而瘳

一產婦小水淋瀝或時自出用分利降火之劑二年不

愈以為肺腎氣虛用補中益氣及六味丸而痊

產後

秘結附淋

薛立齋治一產婦因患大便秘結小腹脹痛為用大黃等藥致吐瀉不食腹痛胸痞薛至酌用六君子再加木香炮薑二味與其治之而愈

孫文垣治沈三石夫人產三日腹不暢女科為下之大瀉五六次遂發熱惡心又用溫膽湯止吐小柴胡退熱數劑熱吐不止粒米不進又用八珍湯加童便昏憒耳聾眼合口渴腸鳴發熱惡心目聾口渴多似感症然此實誤下虛虛所致所

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

謂變症蜂起也眼胞上下及手足背皆浮腫診之六脉皆數曰脉數所主其邪為熱其症為虛與十全大補湯加炮薑夜半稍清爽進粥一盂始開目語言次日午以藥不接且言語過多復昏昧不知人事翌日以人參白朮各三錢炮薑茯苓陳皮各一錢甘艸五分服訖體微汗遍身痈瘇熱退神爽下午藥又不接且動怒昏昧如前六脉散亂無倫狀如解索痈瘇亦沒亟以人參白朮各五錢炙甘艸炮薑製附各一錢連進二帖是夜熟睡唯呼吸之氣尚促屢進皆效後之腫毒自非實症次日脉轉數下午發熱不退環跳穴邊發一毒如椀大紅

腫微痛女科復譜曰向之發熱惡心皆此所致薑附溫補誤也須急進寒凉解毒之劑孫曰此乃胃中虛火遊行無制大虛之症非毒也若用寒凉速其死耳經云壯者氣行則愈怯者著而成痛惟大補庶可萬全三石然之仍與前劑日夕二帖參朮皆用七錢服後瘇痤復出毒散無踪熱亦退除再以參苓白朮散調理而安是症皆由誤下致變百出可不慎哉

按是症多由產後血津虛耗及平素多火內熱之人常有之雖日數過多亦無所害即欲通之唯大劑二冬二地歸杞蘇蓉不過一二服即行矣彼桃杏麻柏及膽蜜之治猶下乘也若硝黃肆用誠矢醫哉

薛立齋治一產婦因患大小便不通諸藥不應勢將危矣令飲牛乳一日稍通三日而瘥人乳尤善

產後瘧

陸肯愚治陳振宇女年二十七歲產後因患間日之瘧已月餘矣寒熱雖不甚重而身體倦怠飲食少減脉之右手弱而無力其左手平和乃與補中益氣湯二劑服之覺胸膈飽悶遂歸咎于人參更醫而治仍用

皮飲二陳湯等寒熱反甚用截藥或止數日復作延至數月肉削骨立再診之其脉微弱已甚曰前服人參兩許可愈今非至劑不能奏效矣用十全大補湯二劑仍覺飽悶疑之曰直服至不飽悶自愈矣更倍从參投之遂飲食日增服數十劑方起

產後 下痢

薛立齋治一產婦食鷄子腹中作痛面色青黃服平胃二陳更下痢腹脹用流氣飲子又小腹一塊不時上攻飲食愈少此脾胃虛寒肝木剋侮所致用補中益氣加木香吳茱萸漸愈又用八珍大補兼服調理而安

一產婦糞後下血諸藥不應飲食少思肢體倦怠此中氣虛弱用補中益氣湯加吳茱萸炒黃連五分四劑頓止但怔忡少寐盜汗用歸脾湯治之而愈

龔子才治一產婦血痢小便不通臍腹疼痛以生馬齒莧搗爛取汁三大合煎沸下蜜一合調頓服即愈

孫文垣治族女小產後二十日吳患赤痢一日十餘次怯寒惡食小腹脹痛診之右寸滑大知其虛中有熱蓋緣惡露未盡故小腹脹痛耑科泥丹溪產後大補氣血之語概施之因而作痢乃翁曰病尚怯寒何云

有熱曰惡寒非寒反是熱症蓋火極似水也時師多昧此旨
飲藥後當知之以白芍當歸滑石為君桃仁酒芩酒
連為臣木香桂皮檳榔為佐青皮為使服下果去黑
瘀血甚多小腹頓寬惟口乾小水少惡心怕飲食體
倦仍裡急後重人參川芎白芍各一錢當歸一錢五
分酒連陳皮各六分木香二分外與清六丸服下熱
除痢減十之八矣但大便不實惡心虛弱以四君子
湯加酒芍陳皮木香肉果酒連當歸養之而平

陸養愚治李尚田乃正產後患痢延及年餘肢肌羸瘦
面色黧黑咸以不可為矣脉之兩手皆微小而右關
尺之間尚覺有力如珠舌中常起黑胎曰微小乃久
痢生脉脉滑胎黑必沈積在腸久而未去也若大下
之病當愈李謂初病亦常服通利今飲食不進者已
數月安所得積乎因檢前方大都細於產後大補氣
血為主即用消導多襍參耆歸芍補不成補消不成
消致元氣日衰積滯日固至用收斂溫澁宜其劇也
乃以潤字丸一兩分三服令一日夜服盡下紫黑如
膏數缶許口渴甚煎生脉散作茶飲之胃漸開又以
潤字丸日服一錢每日下稠積缶許十日後方用補
養之味調治一月而痊

張路玉診大兵船上一婦胎前下痢產後三日不止惡露不行發熱喘脹法在不救服藥一劑反加呃逆診之其脉三至一代欲辭不治因前醫被罵不與排解必致大傷體面乃曰此症雖危尚有一綫生機必從長計議庶可圖治彼聞言始放前醫而求藥遂與盡一枚錢數文令買砂糖熬枯白湯調服既可治痢又能下瘀且不傷元氣急與之服彼欣然而去醫得脫而遁避他處待至大兵去後乃歸

立齋治一產婦痢未至滿月因食冷物及酒冷熱與血攻擊滯下純血纏墜極痛其脉大無力口乾多用黃芩芍藥湯治之令服三劑而安 來選入

痘

孕產婦

徐仲光曰一孕婦正痘養漿時墮胎血去多昏憒乃伏牖而死

一孕婦症同前以黃耆一兩五錢人參當歸各一兩阿膠五錢甘州艾黑薑各三錢附子一錢治之而愈

一婦漿期正產痘順以保元湯加川芎當歸荊芥山查益母草而愈

一孕婦豆漿足不易痂面赤晡熱此脾虛血少也以安

蘭臺草堂鈔本

胎飲加用人參治之而愈

一孕婦痘匀朗灰白熱甚墮胎昏憒冷嘔此胃氣虛寒也以保元湯加用炮薑白朮肉桂治之而愈

一產婦痘不易透疲倦血去不止此氣血兩虧也治以芎歸參薑益母升麻血止痘起又以補中益氣而愈

一孕婦出痘以安胎飲調理而愈又有胎痛甚者以砂仁炒黑研末酒下一錢即愈

一產婦出痘漿不足灰白身熱肢冷寒戰咬牙煩躁渴泄此脾胃氣虛也以異功散治之而愈亦有去血不止藥不效者倒靨而死

一婦產後痘順而痰盛清解之益甚此陰虛不能制陽也以六味地黃丸料加當歸麥冬而愈

一婦痘甫愈而強以房事疤變色成瘡而死

一產婦痘不易發煩躁譫狂此毒重壅遏也以芎歸連柴升蔓甘芍蟬退治之而愈

萬密齋治程氏女年二十出痘時娠五月矣診其脉男胎也惟以清熱解毒和中安胎為主用黃芩白朮為君人參甘草當歸生地為佐自初出至成漿皆無他苦乃聞家中被盜遄歸醫者與藥一服胎墮果男也再延診痘變灰白平塌成倒陷乃裡虛故

耳詢所用方乃獨聖散曰山甲麝香皆墮胎藥胎去氣血益虛瘡毒內陷不可為矣三日卒

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷第三十六

錢塘魏之琇玉橫撰

產後類風

薛立齋治一產婦患虛極生風或用諸補劑四肢逆冷自汗泄瀉腸鳴腹痛薛以陽氣虛寒用六君子薑附各加至五錢不應以參附各一兩始應良久不服仍腸鳴腹痛後灸關元百餘壯及服十全大補湯方効一產婦患中風盜汗發熱晡熱面色黃白四肢畏

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

冷此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味
歸朮二陽治驚之門勞怒發厥昏憒左目羣緊兩唇
不如作謂較明
為 厄唇二字疑差 肝火熾盛用十全大補加鉤藤
山虎而要再用十全大補湯唇砂遠志丸而愈

一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事用荊芥
穗微焙為末每服三錢豆淋酒調服或童便服此華
佗愈風散也又名舉卿古拜散醫用此及交解散當歸
荊芥穗等分每服三錢水酒煎云服後當睡必以左手搔頭用之果
然門說見產後火熱許學士案此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱
或坐草受風而成急宜服此愈可立待 本草綱目

玉肯堂治一婦人產後七日為將息失宜腠理不密偶
因風寒所侵身熱頭痛兩眼反視手足瘛瘲名曰痙
風用前方其疾即愈古人珍秘此方隱括其名曰舉
卿古拜散蓋用韻之切語舉卿為荊古拜為芥曽公
談錄謂之再生丹亦神之也 薛氏謂前症用此如不應者急用大補氣血為主 續醫說

吳茭山治一婦人產後因虛牙關緊急半身不遂失音
以續命湯煮飲數服而安 醫宗粹言

薛立齋治一產婦中風不省人事言語妄甚惡風寒喜
熱飲形氣俱急脈虛浮無力薛謂氣血虛寒用十全

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

冷此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾二湯始應後因勞怒發厥昏憒左目羣緊兩唇抽動小便自遺薛為肝火熾盛用十全大補加鉤籐山皂而安再用十全大補湯唇砂遠志丸而愈

一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事用荊芥穗微焙為末每服三錢豆淋酒調服或童便服此華佗愈風散也又名舉卿古拜散醫用此及交解散當歸荊芥穗等分每服三錢水酒煎云服後當睡必以左手搔頭用之果然門說見產後火熱此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱許學士案

或坐草受風而成急宜服此愈可立待本草綱目

王肯堂治一婦人產後七日為將息失宜膝理不密偶因風寒所侵身熱頭痛兩眼反視手足瘛瘲名曰蓐風用前方其疾即愈古人珍秘此方隱括其名曰舉卿古拜散蓋用韻之切語舉卿為荊古拜為芥曾公談錄謂之再生丹亦神之也薛氏謂前症用此如不應者急用大補氣血為主醫說續

吳菱山治一婦人產後因虛牙關緊急半身不遂失音以續命湯煮飲數服而安醫宗粹言

薛立齋治一產婦中風不省人事言語妄甚惡風寒喜熱飲形氣俱急脈虛浮無力薛謂氣血虛寒用十全

大補湯二十餘劑不應又二十餘劑稍緩乃漸加附子至一錢服數劑諸症減一二又二十餘劑十退三四乃去附子五分數劑諸症頓退而安後又發仍服

百疑

一產婦不語用七珍散而愈後復不語內熱晡熱肢體倦怠飲食不進用加味歸脾湯為主佐以七珍散而愈後因怒不語口禁腰背反張手足發搐或小便見血面色或青或黃或時兼赤白面青肝之本色也黃者脾氣虛也赤者心血虛也用八珍湯加鉤藤鉤茯苓遠志漸愈又用加味歸脾湯而痊

一產婦狀如腳氣發熱昏悶搐搦驚悸或用獨活寄生湯而痊後復作服之其汗如水更加口噤吐痰乃用十全大補湯培養血氣漸愈後飲食日少肌體日瘦吐痰如湧此命門火衰脾土虛寒用八味丸及歸脾湯諸症漸退肌肉漸生

蕭萬輿治陳昌之內首胎恃壯當風澡體即病發熱如燎口眼喎邪喘嘔有沫面目青黃心腹膨脹揚手舞足脈見弦數不鼓曰此肝虛自招風也非表病也急以薑附丸灌下仍用當歸四逆湯加人參吳萸兩劑而諸症失

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

大補湯二十餘劑不應又二十餘劑稍緩乃漸加附子至一錢服數劑諸症減一二又二十餘劑十退三四乃去附子五分數劑諸症頓退而安後又發仍服前藥加附子三百分而愈

一產婦不語用七珍散而愈後復不語內熱晡熱肢體倦怠飲食不進用加味歸脾湯為主佐以七珍散而愈後因怒不語口禁腰背反張手足發搐或小便見血面色或青或黃或時兼赤白面青肝之本色也黃者脾氣虛也赤者心血虛也用八珍湯加鉤藤鉤茯苓遠志漸愈又用加味歸脾湯而痊

一產婦狀如腳氣發熱昏悶搐掣驚悸或用獨活寄生湯而痊後復作服之其汗如水更加口噤吐痰乃用十全大補湯培養血氣漸愈後飲食日少肌體日瘦吐痰如湧此命門火衰脾土虛寒用八味丸及歸脾湯諸症漸退肌肉漸生

蕭萬輿治陳昌之內首胎恃壯當風澡體即病發熱如燎口眼喎邪喘嘔有沫面目青黃心腹膨脹揚手舞足脈見弦數不鼓曰此肝虛自招風也非表病也急以薑附丸灌下仍用當歸四逆湯加人參吳萸兩劑而諸症失

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

來天培治馬氏婦二十餘歲產後九日患腹痛筋攣抽掣不可忍惡露不絕脈沈細而緊視其面色青黃不澤此肝經血少而兼寒也與歸芍六君加炮薑一劑腹痛雖未止而筋攣稍緩另延喬科以廣半鉤藤木香威靈仙等腹痛益甚且血崩不止更加發熱神昏再求治以耆朮歸地山藥苓艸艾葉阿膠薑附內耆朮地俱至兩外一劑而腹痛抽掣止再劑而崩亦痊用歸脾調理而愈

產後瘛

薛立齋治一產婦勤于女工忽仆地牙關緊急痰喘氣粗四肢不遂此氣血虛而發瘛朝用補中益氣湯加茯苓半夏夕用八珍湯加半夏各三十餘劑不應此氣血之未復藥之未及也仍用前二湯又五十餘劑尋愈

一婦產後惡寒發熱他治以小柴胡湯致汗出譫語煩熱作渴四肢抽搐用十全大補湯二劑益甚其脈洪大重按則無此藥力未及也遂加附子服四劑愈

一產婦筋攣臂軟肌肉掣動此氣血俱虛而自熱也用十全大補湯而安

一產婦因勞兩臂不能屈服蘇合香丸肢體軟瘓汗出如水薛謂前藥辛香耗散真氣滕理虛而津液妄泄也先用十全大補湯加五味子補實滕理收斂真氣汗頓止又佐以四君子調補元氣漸愈用逍遥散大補湯調理而瘥

一產婦先胸脇乳內脹痛後因怒口噤吐痰臂不能伸小便自遺左三部脈弦此肝經血虛而風火所致不能養筋先用加味逍遥散治之臂能屈伸又以補肝散六味丸諸症悉愈

一產婦患兜枕腹痛或用驅逐之劑昏憒口噤手足發搐此血氣虛極之變症也用八珍湯加炮薑二錢四劑未應又以十全大補湯加炮薑一錢二劑而甦

產後痛痺

張三錫治一婦月中著惱素體厚多痰臂痛移走兩足且腫以為虛治服參歸痛益甚惡心迷悶作鬱痰治二陳越鞠秦艽丹皮二服稍減大便四五日不去矣投搜風丸後用化痰舒氣二陳二朮酒芩柏木通澤瀉香附調理而安

陸養愚治凌繹泉夫人妊將七月忽兩足軟瘓不能履

地分娩後頓愈一月後仍作且胸脇痛夜分發熱或以四物入牛膝木瓜虎骨鹿膠或作或止後以脾主四肢與參朮脹痛悶絕仍用養血之品無進退纔年餘診之詢其飲食如常肌肉如故足脛浮腫胸脇按則微痛否則瘀悶其脈沉緩而滑此瀉痰積在胸脇流于四肢故痛而軟宜乎滋陰不減而補氣增劇也用二陳湯加蒼朮威靈仙黃柏白芥子數劑痛定熱除去白芥子加故仁十劑步履如故

薛立齋治一產婦身熱不食煩躁不寐盜汗時昏憒六脈洪大如無用疑證或有脫之如無

宜入感症注

補中益氣加炮薑半夏一劑頓退二三又劑寢食甘美但背強而痛用八珍散大補湯調理而安

一產婦遍身頭項作痛惡寒拘急脈浮緊此風寒之症也用五積散一劑汗出而愈但倦怠發熱此邪氣去而真氣虛也用八珍湯調補而痊

周慎齋治一婦產後受溼遍身疼痛衆以風藥治之遂致臥牀不起手足漸細此產後氣血虛而風藥愈損其氣故也治宜大補氣血用參耆各錢半炙甘艸肉桂各一錢當歸三錢防己五分煎服愈大還

一產婦遍身痛坐不得臥已經二月痰多食減衆治不

地分娩後頓愈一月後仍作且胸脇痛夜分發熱或
以四物入牛膝木瓜虎骨鹿膠或作或止後以脾主
四肢與參朮脹痛悶絕仍用養血之品無進退纔年
餘診之詢其飲食如常肌肉如故足脛浮腫胸脇揉
按則微痛否則瘖悶其脈沉緩而滑此瀉痰積在胸
脇流于四肢故痛而軟宜乎滋陰不減而補氣增劇
也用二陳湯加蒼朮威靈仙黃柏白芥子數劑痛定
熱除去白芥子加茯仁十劑步履如故

薛立齋治一產婦身腹作痛發熱不食煩躁不寐盜汗
脇痛服解散祛血之藥不時昏憒六脈洪大如無用
宜入感症注

補中益氣加炮薑半夏一劑頓退二三又劑寢食甘
美但背強而痛用八珍散大補湯調理而安

一產婦遍身頭項作痛惡寒拘急脈浮緊此風寒之症
也用五積散一劑汗出而愈但倦怠發熱此邪氣去
而真氣虛也用八珍湯調補而痊

周慎齋治一婦產後受瀉遍身疼痛衆以風藥治之遂
致臥牀不起手足漸細此產後氣血虛而風藥愈損
其氣故也治宜大補氣血用參耆各錢半炙甘艸肉
桂各一錢當歸三錢防己五分煎服愈大還

一產婦遍身痛坐不得臥已經二月痰多食減衆治不

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

或入心胃痛注

效以參歸各一兩木香一錢為末酒煎分為九次服之愈

馬元儀治卜氏妾產後胸中作痛痛甚則迫切不能支至欲求死諸治不効延至五月病轉危急診其脈兩手弦澁少神不能轉側不得言語曰胸中者陽氣所治之部今為陰邪所入陰與陽搏所以作痛前醫破氣不應轉而和血又轉而溫補又轉而鎮逆諸治次第補出不知陰陽相結補之則無益攻之則愈結若鎮墜之益足以抑遏生陽而阻滯邪氣惟交通一法足盡開陽入陰通上徹下之妙使陰歸于下陽治于上太虛之府曠然何胸痛之有哉用人參三錢肉桂一錢合仲景黃連湯一劑痛減二三劑頓釋次進加桂理中湯數劑全愈按是症即胸痺是也故入痛痺門

繆仲淳治王善長夫人產後腿疼不能行立久之飲食不進困憊之極診之曰此脾陰不足之候脾主四肢陰不足故病下體向所飲藥雖多皆苦燥之劑不能益陰用石斛木瓜牛膝白芍棗仁為主生地枸杞茯苓黃柏為臣甘艸車前為使一劑輒効四劑而起

來天培治潘復端內年約四旬患頭身手足麻木疼痛步履艱難發熱胸滿不食脈之沈細而澁曰此屬產

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

後感風不能節勞致風入經絡而成痛風之症也詢之果以前歲產後而起以歸身紅花養血風藤鉤藤秦艽通經絡黃芩銀花清火羌活走百節川芎理頭痛葛蒲利膈消滿甘草緩痛薑皮達肌膚通腠理服二劑而頭痛愈腹脹減惟發熱身痛未除更心神恍惚不寐脈稍和此表症稍退裏熱未清改用生地歸芍柴胡地骨皮續斷鉤藤夏麴枳殼神麯建蓮二劑而諸症痊惟兩膝內腫痛扶杖而行此風入三陰而將愈矣前方減柴胡地骨夏麴枳殼加丹皮赤芍紅花威靈仙風藤防己牛膝五加皮生甘艸又三四劑

全愈

立齋治一產婦六月多汗身倦不敢袒被故汗出被裡冷則浸漬得風溼身疼痛遂以羌活續斷湯數服而愈來選入

產後頭痛

薛立齋治一產婦頭痛日用補中益氣湯不缺已三年矣稍勞則惡寒內熱為陽氣虛以前湯加附子一錢數劑遂不發

一婦人產後頭痛面青二年矣日服四物等藥薛謂腎

水不能生肝木而血虛用六味丸加五味子兩月而
痊
繆仲淳治黃桂峯乃正產後頭疼大便秘用生料五積
散一劑不効令加歸身一兩一服大便通頭疼立止

產後癖

沈明生治袁令默女素稟不足分娩後體倦發熱醫者
以其弱齡瘦質且遭丹溪產后當大補之法遂以參
耆進之病益甚診之脈浮而澁此不惟有餘血且有
風寒在內夫瘀血未盡外邪初感均有用參之誠是
以補之無功耳遂用解表散瘀之劑三四服後熱除
胸爽然倦怠如故曰參耆之用此其時矣而衰懲噎
廢食因循弗與越四五日忽舌瘡不語或用茯神棗
仁或用南半薑橘或用芩連皆不効復延治察其神
情雖不能語然每對食物輒注目以視得食則神稍
旺更衣則神即疲且脈空而大經云脾之脈連舌本
散舌下心之別脈系舌本今火土兩虛醫藥襍亂經
又云言而微終日乃復言者此奪氣也況經月不語
乎不惟用參且應用附矣服五六日諸症悉愈夫病
機者閫不容髮有昨宜用攻而今宜用補旦宜用熱

而夕宜用涼惟視其機之所在以法合病耳故是症也不用補之害與驟補之害同失其機甚矣醫之難也

產後乳病

薛立齋治一產婦勞役忽乳汁如湧昏昧吐痰此陽氣虛而厥也灌以獨參湯而甦更以十全大補湯數劑而安若婦人氣血方盛乳房作脹或無兒飲脹痛增寒發熱用麥芽二三兩炒熟水煎服立消其耗散氣血如此何脾胃虛弱飲食不消方中多用之耶

張隱庵治一婦產後乳上發壅腫脹將半月周身如針刺飲食不進診之六脈沈緊有力左乳則腫連胸脇用麻黃葛根荊芥防風杏仁甘草石膏温服取汗遂愈金匱云產後婦人喜中風經曰開闔不得寒氣從之榮氣不從逆于肉理乃生癰腫此係風寒外壅火熱內閉榮衛不調所致衆以涼藥治熱不知開闔故甚今毛竅一開氣機旋轉榮衛流行而腫痛解矣經云食氣入胃散精于肝病屬陽明厥陰二經是以飲食不進今經氣疎通自能食矣孰謂瘍醫可不知經乎

薛立齋治一婦人產次子而無乳服下乳藥但作脹曰人乳皆氣血所化今脹而無乳是氣血竭而津液亡也當補其氣血自然有乳乃與八珍湯倍參朮少加肉桂二十餘劑乳遂生後因勞役復竭夫其初產有乳再產而無其氣血衹給一產耳其衰可知

王肯堂治一娠婦患乳腫痛不散八月用火針取膿服十全大補湯外敷鍼箍散不効反加喘悶九月產一女潰勢愈大兩乳房爛盡延及胸脇膿水稠粘出膿六七升略無斂勢十一月乃用解毒和中平劑外糝生肌散龍骨寒水石等膿出不止流濈所及即腫泡潰膿兩旁紫黑瘡口十數胸前脇下皆腫潰不可動側其勢可畏此產後毒氣乘虛而熾令服黃耆解毒補血生肌醫不敢用十二月中旬後益甚始改用王藥時膿穢粘滯煎楮葉豬蹄湯沃之頓爽乃制一方名黃耆托裡湯黃耆之甘温以排膿益氣生肌為君甘草補胃解毒歸身和血生血為臣升麻葛根漏盧為足陽明本經藥連翹防風散結疏經蓽仁蘡子解毒去腫角刺引膿白芷敗膿長肌川芎桂炒黃柏為引用每劑入酒一杯送白玉霜丸疎膿解毒時膿水稠粘不可遽用收澁之藥理宜追之乃制青霞散外

黎明日膿水頓稀痛定穢解始有向安之勢至正月皆生新肉有紫腫處俱用葱熨法隨手消散但近脇足少陽分尚未斂乃加柴胡一錢青皮三分及倍川芎膿水將淨即用搜膿散黎之元宵後遂全安凡治癰疽須審經絡部分今所患正在足陽明之分少使足少陽經分俗醫不復省別一概用藥藥無向導終歸罔功甚可歎也是疽得生全在膿水稠人必能食故可治

琇按乳病全是肝火上逆入胃大絡不降而成即肝木侮胃之病近治鮑漱飲夫人素有血虛肝病忽一日增寒壯熱頭痛口苦乳腫痛不任熨吮俱無予用生地杞子當歸各五錢麥冬蒌仁各二錢丹皮赤芍各錢五分蒂丁銀花各三錢二劑即愈凡以四方取効者不可枚舉矣

朱丹溪治一婦人產後患乳癰用香白芷連翹甘草節當歸鬚赤芍青皮荊芥穗各半兩半兩疑是半錢見母花粉桔梗各一錢瓜蒌半枚作一貼水煎半飢半飽服細細呷之有熱加柴胡黃芩忌酒肉椒料敷藥用南星寒水石皁角貝母白芷草烏大黃七味為膏醋調鷄翎掃敷腫痛効治法

陳良甫曰余荊布固產前食素得疾羸弱產後乳脈不

行已七十日服諸藥無効嬰兒甚苦偶有人送赤豆一斗遂如常煮赤豆粥食之當夜乳脈通行因閱本草赤小豆能通妳乳謹載之良方

產後腰脇痛

宜入嘔門元注 薛立齋治一產婦腰痛腹脹善噫諸藥皆嘔薛以為脾虛血弱用白朮一味炒黃每劑一兩米泔煎時飲是許四劑後漸安服百餘劑而愈

吐血元注 一產婦因怒兩脇脹痛吐血甚多發熱惡寒胸腹脹痛此氣血俱虛用八珍湯加柴胡丹皮炮薑而血頓止又用十全大補湯而寒熱漸退此症苟非用薑桂辛溫助脾肺以行藥勢不惟無以施其功而反助其脹耳

入瘧元注 王時亨室產後腰間腫痛兩腿尤甚此由瘀血滯于經絡而然也不早治必作骨疽遂與桃仁湯二劑稍愈更以沒藥丸數服而痊亦有惡血未盡臍腹刺痛或流注于四肢或注股內疼痛如錐或兩股腫痛此由冷熱不調或思慮動作氣所擁逆血畜經絡而然宜沒藥丸治之亦有經血不行流注四肢或股內疼痛如錐或因水溼所觸經水不行而腫痛者宜當歸丸

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

治之凡惡血停滯為患腫硬軽治之稍則緩流注而為骨疽多致不救

產後腹痛

衍義治一婦（其仲景方本）產當寒月臍腹脹滿痛不可拊百治不効或作瘀血將用抵當湯曰非其治也此脾虛寒邪客于子門也以羊肉四兩（一作羊肉四兩熟地二兩生薑一兩）當歸川芎陳皮各五錢薑一兩煎服二三次而安（大還）

周慎齋治一產婦腹脹痛服敗血去瘀之藥致小腹脹痛硬入大腹用薑桂吳茱萸葷撥數劑而愈（全上）

薛立齋治一產婦患小腹痛或作嘔或昏瞶此脾氣虛寒用人參理中湯漸愈又以補中益氣湯加茯苓半夏全愈後復作痛而兼喘仍用補中益氣湯培補脾肺而瘥（良方）

一產婦小腹作痛小便不利內熱瞞熱形體倦怠總用加味逍遥散以清肝火生肝血用補中益氣湯補脾胃升陽氣而瘥

一產婦小腹作痛有塊脈芤而澁以四物加延胡紅花桃仁牛膝木香治之而愈

朱丹溪治馮宅婦產後發熱腹中痛有塊自汗惡寒曾

服黑神散用白术白芍各三錢滑石五錢黃芩丹皮各二錢五分人參川芎歸尾陳皮荊芥甘薑各一錢甘草些

周于文母產後月餘腹中作痛不已甚至惡心不食惡寒流涎穉症不一有人教用荔枝四兩連殼核敲碎加以老薑四兩好酒煎服或作幾次服下亦可果効此温州平陽事也其地產後每食老薑湯七八觔為準蓋山水寒冷故也如少飲則為患不淺（沈效曾抄本）

產後浮腫

薛立齋治一產婦飲食少思服消導之劑四肢浮腫薛謂中氣不足朝用補中益氣湯夕用六君子湯而愈後因怒腹脹誤服沈香化氣丸吐瀉不止飲食不進小便不利肚腹四肢浮腫用金匱加減腎氣丸而愈

一產婦泄瀉四肢面目浮腫喘促惡寒此脾氣虛寒用六君加薑而泄瀉愈又補中益氣而脾胃健

杜壬治一婦產後忽患浮腫衆作水氣治不効曰水氣必咳嗽小便不利（辯得）今便利而不作嗽獨手足寒（冒榮）乃血臟虛寒氣塞不通故生浮腫也治宜益血和氣用靈苑牡丹皮散愈

張子和治曹典史妻產後憂恚抱氣渾身腫繞陰器皆腫肝經絡大小便如常其脈浮而大此風水腫也先以蘆水撩其瘀以火助之發汗次以舟車丸濟川散瀉數行後四五日方用苦劑涌訖用舟車丸通經散過十餘行又六日舟車濟川復下之末後用水煮桃紅丸四十餘丸不一月如故前後涌者二瀉凡四通約百餘行當時議者以為倒布袋法耳病再來求則必死不知此乃內經治鬱之玄但愈後慎房室等事況風水不同水無復來之理

此公置身千仞俯視一切以學力言之南宋以還無其偶矣即丹溪砦議亦謂其出麻知幾非子和之作然其博大淵深豈他人所能造詣要之河南山陝之人稟賦多厚非峻法不効故讀書者宜知仲景之方亦不可行于今世也

產後虛汗

薛立齋治一產婦客聞音響其汗如水而昏憒諸藥到口即嘔薛以為脾氣虛敗用參附末為細丸時嚼三五粒隨液嚥下乃漸加之至錢許卻服參附湯而安

一產婦盜汗不止遂致廢寢神思疲甚口乾引飲薛謂

薛前有案不過換頭耳注元

血虛有熱用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯
內黃連黃柏炒黑倍加人參五味子二劑而愈
繆仲淳治于中甫夫人產後氣喘投以人參蘇木麥冬
各五錢一劑愈五日後患自汗無問晝夜聞響聲及
飲熱茶湯即汗遍體投以人參黃耆各五錢加歸身
生地二劑不効即令停藥金壇俗忌未彌月不得診
視乃遍檢方書至證治要訣治汗門內有凡服固表
藥不効者法當補心汗者心之液也洒然曰是矣病
人素稟有火氣非不足也產後陰血暴亡故心無所
養而病汗亟以棗仁一兩炒為君生地白芍麥冬五
味枸杞牛膝杜仲歸身阿膠牡蠣龍眼肉大劑與之
至三十二劑罔効于懼曰得無不起乎或藥應更改
乎曰非也前投參者不應而遽止之者以參耆為氣
分藥劑且大其不應者必與症不合也茲得其情復
何惑乎蓋陰血者難成易虧者也不可責効旦夕仍
投前劑至四十二帖忽得睡汗漸收睡愈熟至四日
夜醒而霍然顏色逾常血足則色華也

琇謂能于方中加炒焦黃連三五分則數劑可愈
也

馮楚瞻治一產婦因頭汗甚多延診餘無他苦脈之雖

洪而緩曰頭汗過多諸症謂之亡陽然產後陰氣大虛正喜其亡陽與陰齊等此薛氏之論可勿藥而愈也馮君一身生專用八味故過此等症當于大劑加芩連者遂束手矣惜哉病家疑另延一醫峻用參耆溫補遂綦注下瀉完穀不化益認陽虛重用參附炮薑其瀉愈甚不數日肌肉盡削精神困頓復延診六脈洪弦甚數此真陰竭矣何能挽救其生乎缺盆和盤託出則知其遺憾多矣蓋產後頭汗乃陰虛火上蒸孤陽上迫津液不能閉藏誤作陽虛重加溫補燥熱之氣暴注下趨而為完穀不化乃火性急速不及變化而出也重以溫熱焚灼勢必窮竭尚何藥之可救哉

案中正喜亡陽與陰齊等薛氏謂可勿藥而愈此正薛氏生平不能峻用養陰之缺處也（按立齋生味丸其失多矣予嘗過此症以重劑生熟地白芍杞子麥冬棗仁察其有火則少加芩連不過二三劑愈矣馮君論此症雖甚了了而不與藥致病家屬之庸手而敗亦守而未化之過也

產後虛損

薛立齋治大尹俞君之內產後發熱晡熱吐血便血兼

盜汗小便頻數胸脇脹痛肚腹痞悶此諸臟虛損也
症當固本為善自恃知醫立齋案中凡云自知醫者不一而足無不自致狼狽者要知此道如立齋生平不能無失手處古謂人臣人子不可不知醫古人或可今人談何容易用
降火之劑更加瀉利腸鳴嘔吐不食腹痛足冷始信薛言診其脈或浮洪或沈細或如無大虛之脈多如此其面或青黃或赤白此虛寒假熱之狀時雖仲夏當捨時從症先用六君子加炮薑肉桂數劑胃氣漸復諸症漸退更佐以十全大補湯半載全愈（余強解之曰知醫者謂當平日稔知某醫某醫也然亦不然）
儒者楊敬之內人患症同前但唾痰涎或用溫補化痰之劑不應面色黧黑兩尺浮大按之微細此固命門火衰不能生脾土脾土不能生諸臟而為患也用八味丸補土之母而痊

渴

疑誤或當作竭以為血氣俱虛（肚腹作脹而痛按之不痛之類）治之彼反行逐血更加發熱煩躁乃用當歸補血湯熱躁漸止用八珍麥冬五味子氣血漸復

一產婦朝寒夕熱或不時寒熱久不愈用六君補中益氣兼服百餘劑而瘥

盜汗小便頻數胸脇脹痛肚腹痞悶此諸臟虛損也症當固本為善自恃知醫立齋案中凡云自知醫者不一而足無不自致狼狽者要知此道如立齋生平不能無失手處古謂人臣人子不可不知醫古人或可今人談何容易用降火之劑更加瀉利腸鳴嘔吐不食腹痛足冷始信薛言診其脈或浮洪或沈細或如無大虛之脈或如多如此其面或青黃或赤白此虛寒假熱之狀時雖仲夏當捨時從症先用六君子加炮薑肉桂數劑胃氣漸復諸症漸退更佐以十全大補湯半載全愈余強解之曰知醫者謂當平日稔知某醫某醫也然亦不然

儒者楊敬之內人患症同前但嗽疾涎或用溫補化痰之劑不應面色黧黑兩尺浮大按之微細此因命門火衰不能生脾土脾土不能生諸臟而為患也用八味丸補土之母而痊

一婦人產後血渴朝寒暮熱肚腹作脹而痛按之不痛以為血氣俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更加發熱煩躁乃用當歸補血湯熱躁漸止用八珍麥冬五味子氣血漸復

一產婦朝寒夕熱或不時寒熱久不愈用六君補中益氣兼服百餘劑而痊

產後驚悸

薛立齋治一產婦患驚悸二度服琥珀地黃丸茵芎妙香散隨効再服患服之其症益甚而脈浮大按之如無發熱惡寒此血氣俱虛薛用十全大補加味歸脾二湯各百餘劑而愈後過驚恐勞怒復作仍服前藥而安

吳孚先治汪氏婦產數日惡露已盡身體虛弱過回祿舁出神驚散亂身翩翩如在雲端尚科用元胡紅花等味反增煩劇汗漓交作六脈虛弱如無用六君子加黃耆炮薑製附桑仁鉤藤龍骨川斷五味始服疙減繼則神清每日參或一兩或二兩二十劑而安

高鼓峰治用晦室人患產後驚悸初起時見筐中綿絮念將所生兒入綿絮中不幾悶死即作驚恐憂患之狀後凡有所觸意中以為不耐即憂患不止或一端執想數日纔已飲食不進面少精采服諸補心養血藥無一効高脈之曰孩時得毋因齒病致大驚否用晦向室人問之曰十歲時果曾病齒治齒者用刀鉗之幾受驚而死子何以能識之也解曰脈法當如是耳不精於象數鈐法之學者不能也此語不必少時以驚

受損傷其君火心包氣散疾得留之今產後大虛疾因虛動病端見矣夫心為君主主明則下安國乃大昌故凡七情皆由心起今心氣虛甚疾邪侵擾思慮亦因之多變況喜樂氣之陽也憂患驚恐氣之陰也陽虛則陰得乘之又兜為其所愛氣虛疾入則愛不得其正因愛而過為防護之惟恐不至遂因而生憂耳今先用歸脾養榮八味等類五十大劑待其氣血完備然後攻之疾可得而去而病不再發矣先補後攻法

如言治之果愈

張路玉治汪督學媳產後病虛無氣洒洒然如驚時欲青黑結疾欲欬則心中悸悸大動渾身麻木心神不知所之偶聞聲響則頭向鬧熱微汗神魂如飛越狀

劑 疑誤或當作劇

而羌獨左寸厥厥動搖此必胎前先傷風熱坐草時逆力過甚疾血隨氣上逆衝過膜膈而流入心包也朝用異功散加童便煅淬蛤粉以清理疾氣夕用大劑獨參湯下來復丹以蒐滌疾積蓋疾在膈膜之上非五靈脂無以濟非鹼硝無以透之血在膈膜之上非五靈脂無以濟之然非藉人參相反之性不能激之使出也服數日神識漸寧形神漸旺改用歸脾湯加龍齒沈香調理

受損傷其君火心包氣散痰得留之今產後大虛痰因虛動病端見矣夫心為君主主明則下安國乃大昌故凡七情皆由心起今心氣虛甚痰邪侵擾思慮亦因之多變況喜樂氣之陽也憂患驚恐氣之陰也陽虛則陰得乘之又兒為其所愛氣虛痰入則愛不得其正因愛而過為防護之惟恐不至遂因而生憂耳今先用歸脾養榮八味等類五十大劑待其氣血完備然後攻之痰可得而去而病不再發矣先補後攻法

如言治之果愈

張路玉治汪督學媳產後病虛無氣洒洒然如驚時欲

青黑結痰欲欬則心中憺憺大動渾身麻木心神不知所之偶聞聲響則頭面鬨熱微汗神魂如飛越狀屢用補養心血之劑罔効虛羸轉劇診之脈浮微弦而芤獨左寸厥厥動搖此必胎前先傷風熱坐草時迸力過甚痰血隨氣上逆衝過膜膈而流入心包也朝用異功散加童便煅淬蛤粉以清理痰氣夕用大劑獨參湯下來復丹以蒐滌痰積蓋痰在膈膜之上非五靈脂無以滑非鉄硝無以透之血在膈膜之上非五靈脂無以滑之然非藉人參相反之性不能激之使出也服數日神識漸寧形神漸旺改用歸脾湯加龍齒沈香調理

而愈

薛立齋治一產婦惡露淋瀝體倦面黃食少惡寒晝夜不寐驚悸汗出此脾經虛熱用加味歸脾湯而痊後因怒脇脹作嘔少食用六君加柴胡治之而痊

繆仲淳治王六息乃正產後驚悸聞聲輒死非用力抱持則虛煩欲絕如是累月曰此心脾肝三經俱虛也用人參棗仁茯神遠志白芍石斛甘草麥冬五味丹砂為丸以龍眼湯吞彌月而愈

產後顛狂

薛立齋治一產婦患顛狂或用大澤蘭湯而愈後又怔忡妄言其疾甚多用茯苓散補其心虛頓愈又用八珍散加遠志茯神養其氣血而瘥

一產婦亦患此用化疾安神等藥病益甚神思消鑠薛以為心脾血氣不足用大劑參朮芎歸茯神棗仁四劑餘而安乃以歸脾湯五十劑而愈

一產婦形體甚倦時發譫語用柏子仁散稍愈又用加味歸脾湯而愈又因怒狂言脇痛小便下血用加味逍遙散以清肝火養肝血頓瘥又佐以加味歸脾湯而安

愚治一產後數日日晡壯熱大汗狂言妄語不可禁制晨則了了診之六脈弦長不便不食此臨盆去血過多肝失其養燥而生火遂入胃之大絡非如敗血上衝之候也若屬敗血則畫夜熱狂矣與生熟地甘杞子各一兩麥冬五錢一劑減二劑三劑瘥

丁潤兄室素有吞酸症孕八九月心脇大痛時時眩暈欲絶與大劑一炁湯十餘劑全愈臨盆脬水先去三日而後產自汗譫妄當科與炮薑附子數劑遂發狂耳聾更醫與茯苓車前半夏浮麥等多劑無効診時已彌月脈弦急如蛇行此精血皆奪之候亟與地黃杞子麥冬一劑脈稍和症稍減仍名前醫謂不必服湯劑矣與丸子令服二三日發厥而終此與前症大同一生一死謂非誤治可乎

繆仲淳治張璇浦乃正產六朝發狂持刀殺人陰血暴崩肝火炎故也令先飲童便一甌少止再服龍齒澤蘭生地當歸牛膝茯神遠志棗仁大劑仍加童便頓服而止

施笠澤治庠友唐仲宣乃正產後驚悸恍惚語言錯亂此產後心虛敗血停積上干包絡致病若此先用佛手散加石菖蒲五靈脂劉寄奴薑黃等藥以除敗血

後以歸脾調理而痊至明年五月復產復病前症遍
延諸醫施仍書前方一醫訝曰寄奴薑黃等藥從何
來耶仲宣疑不復用至是冬施偶同李士材過大洪
橋忽遇仲宣喜而迎曰內人自乳子後或歌哭嗔笑
狂妄不常向服安神清心之劑不効夜來幾自縊矣
今偶值二子豈天賜耶幸為診之遂偕往診之六脈
沈澁曰瘀血挾痰久而益堅非前藥所能療也用歸
尾桃仁煎濃湯下滾痰丸二服每服三錢下去惡物
後用鎮驚鎮肝丸調理而愈

馮楚瞻治一婦產後兩月忽患癲疾久不愈或連日不
食或一食倍進或數日不寐或閒宿一寐脈乍洪乍
小左寸兩尺常弱消痰鎮心俱不効夫諸燥狂擾火
之病也二陰一陽火之原也主智閉藏腎之用也產
後未久少陰虛也以八味加牛膝五味大劑冷服其
所食鴨肉猪肘入肉桂同煮調治數日乃一日稍輕
一日如故此心脾亦不足主信而為病也朝服加味
八味湯夕服歸脾湯去黃芪木香加白芍麥冬五味
肉桂服後漸安月餘全愈 來選入

薛立齋治一產婦乍見鬼神或用調經散愈後復作仍服前散益甚痰涎上涌朝寒暮熱乃朝用八珍散夕用加味歸脾湯各五十餘劑而愈

盛用敬治金棠妻半產病數月日厥去者數四見鬼自頂而出自口而入盛曰脈濡而弦血少有痰鬼自頂門出此元神出也出而不進者死出而復入可活也藥之去痰梳許尋愈 吳江縣志

陳良甫治五羊洪運使夫錫子舍孺人產後語言顛倒譫語不已如有神靈服諸藥無効召診之六脈和平以奪命散兩服而愈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷三十六

介叟覆校

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷第三十七

錢塘魏之琇玉橫撰

論錢氏陳氏痘瘡方

讀前人之書當知其立言之意苟讀其書而不知其意求通于用不可得也痘瘡之論錢氏為詳歷舉源流經絡明分表裡虛實閒陳其施治之法而又證以論辨之言深得著書垂教之體學者讀而用之如求方圓于規矩較平直于準繩引而伸之觸類而長之可

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

為無窮之應用也今人不知致病之因不求立方之意倉卒之際據症檢方漫爾一試設有不應并其書而廢之不思之甚也近因句方之教久行素問之學不講抱疾談醫者類皆喜熱而惡寒喜補而惡解利忽得陳氏方論皆燥熱補劑其辭確其文簡歡然用之翕然信之遂以為錢氏不及陳氏遠矣或曰子以陳氏方為不足與曰陳氏方誠一偏之論然亦可謂善求病情者矣其意大率歸重太陰一經益以手太陰屬肺主皮毛足太陰屬脾主肌肉肺金惡寒而易于感脾土惡濕而無物不受觀其用丁香官桂所以

治肺之寒也用附术半夏所以治脾之濕也使其肺果有寒脾果有濕而無有虛量而與之中病則止何傷之有哉今也不然徒見其瘡之出遲者身熱者泄瀉者驚悸者氣急者渴而思飲者不問寒熱虛實率投木香異攻等散間有偶中隨手獲效設或誤投禍不旋踵何者古人用藥製方有向導有監制有反佐有回用錢氏方固未嘗廢細辛丁香白术參耆等率有監制輔佐之藥不專務乎温補耳然其用寒涼者多而于輔助一法畧開端緒未曾深及癥人之前不可說夢錢氏之慮至矣亦將以候達者擴充推廣而

用之雖渴者用溫藥瘁塌者用補藥自陳氏發之迥出前輩然其多用桂附丁香等燥熱恐未為邊中也何者桂附丁香輩當有寒而虛者固是的當虛而未必寒者其為害當何如陳氏立方之時必有挾寒而瘡瘡者其用燥熱補之固其宜也今未挾寒而用一偏之方寧不過于熱乎予嘗會諸家之粹求其意而用之實未敢擾其成方也醫說續編

王節齋曰近時小兒瘡瘡止宗陳文中木香異攻散殊不知彼時立方之時為運氣在寒水司天時令又值嚴冬大寒為因寒攣渴瘡瘡不紅綻故用辛熱之劑發之今人不分時令寒熱一槩施治誤人多矣時值溫熱山野農家貧賤之人其或偶中也

又曰丹溪瘡瘡治法最為明備近世通用陳文中異攻等方乃一偏之術若瘡瘡虛怯淡白色瘁塌此屬虛寒宜用陳文中方若發熱壯盛齊湧紅紫色躁瘁此屬熱毒宜涼血解毒自陳文中方盛行後屬虛寒者率得生屬熱毒者悉不救瘡是胎毒古人治法只解毒然氣血虛則逆毒氣不出及不能成就故陳文中之法亦千載妙訣補前人之未備者但溫補之法既行而解毒之旨遂隱故救得一邊又害了一邊今必

詳究丹溪二法通用斯無弊也

小兒瘡

魏直曰瘡漿數日陷頂漿滯不行或風寒所阻者宜用水楊枝葉無葉用枝五斤流水一大釜煎湯溫浴之如冷添湯良久照見纍起有暈絲者漿行也如不滿再浴之力弱者只洗頭面手足如屢浴不起者氣血敗矣不可再浴始出及痒塌氣皆不可浴瘡不行漿乃氣滯血滯膿固窖或風寒外阻而然浴令暖氣透達和暢鬱蒸氣血通徹漿自貫滿功非淺也若內服助血氣藥藉此發之其效尤速直見一嫗用此有驗叩得其方行之百發百中慎毋忽也古無此法故詳著之（水楊乃草也非楊柳之楊○人家有兒未出瘡者宜先收取否則一時難見）

安慶張氏傳種瘡法云已三世其法先收稀瘡漿貯小甕瓶遇欲種者錄小兒生辰焚香置几上隨將黃豆一粒傳以藥按方位埋土中取所貯漿染衣衣小兒黃豆三日萌芽小兒頭痛發熱五日豆長兒瘡亦發十日而萎兒病隨愈自言必驗（三岡識畧）

福山戍卒遇一醉虎縛獻王大將軍轅門將軍剖肉分贈郡紳云小兒食之可以稀瘡（全上）

李提用頭生雞子三五枚浸厠坑內五七日取出煮熟與食數日再食一枚永不出痘徐都司得於浙人之

方本草綱目

朱丹溪治一叟發熱而昏倦其脈大而似數與參耆歸

術陳皮大料二十劑而痘出又二十劑而膿泡成身

無完膚又六十劑而安見明醫禜著

痘之為症嬰兒之大劫也自漢以前無有元朔中武帝

使使至回鶻回傳染入中國其氣腥穢難近惟大貴

而賢者則間出墨豆此絕無而僅有者也崑山朱恭

靖公名希周幼時出痘顆顆皆黑若束一帶於腰間

者諸醫皆謂不治有一醫能識之謂朱翁曰令嗣之

症無妨也然願與翁約我有弱女痘痊得後欲得令

嗣入贅翁許之後遂贅焉醫固富凡膏火之費悉以

資之公後中弘治丙辰狀元官至禮部尚書為理學

名臣卒九十四謚恭靖張氏邑言

張達泉治顏銓部為兒時中痘已死達泉視之曰未死

也急掘地作坑置兒其中取新水數桶用紙蘸之重

貼身上少頃有細烟起兒手微動達泉喜曰生矣復

以水沃之氣蓬蓬上蒸大啼數聲取起再進以藥不

數日愈江南通志

王敏治千户申志年二十忽瞑眩譫語體熱而咳衆醫以傷寒治敏曰痘也與升均湯而瘡出姑蘇志

葛茂林診汪比部子年二十五矣忽患痘汪故知醫以為無恙也葛視怫然迨五日而足七日而靨亦怫然至十四日而痂落汪信其無虞葛曰灾其在彌月乎至期而其子晏然汪置酒高會若以誚葛者葛視其子之足底有泡結瘢膚內曰吁其殆哉迨是日而暴没汪以為神問其故葛曰夫痘搆形之餘穢也苟有纖芒未盡亦無生理是疾初發自腎而我知其不能暢是以必死既而流著於足底焉以故發之緩而必至是日也汪歎服杭州府志

沈好問治沈勤雲義女年十歲幼子痘女抱兒出診沈曰兒無傷女即出惡痘矣若呼頭及骨痛宜服糞清如其言而愈錢塘縣志

關家女阿觀年八歲出痘甚惡沈曰諸醫云何對曰死症不必藥矣沈曰兒一身死痘然有一生痘尚可生令取五年抱雞母雞用藥入雞腹外以糯蒸雞令食盡視之右手關脈痘二粒明豔如珠女果生仝上

江魯陶子一歲痘止三顆見額上耳後唇傍沈曰兒痘部位心腎脾三經逆傳土剋水水剋火宜攻不宜補

攻則毒散補則臟腑相戕治至十四日痘明潤將成
吳沈曰以石膏治之恐胃土傷腎水也俗醫憐兒小
謬投以參沈見之驚曰服參耶不能過二十一日矣
兒卒死同上

許季明幼子痘沈曰順症也不必補小陽純陽陽盛必
剋陰許不從痘愈讒沈為妄沈曰兒且死許益不悅
至十二日兒熟睡視之絕矣同上

唐守元治園花祝氏兒患痘遍身血迸無罅唐搗藥塗
其身糝藥補菌蓉上搽起倒豎床前合家啼駭唐叱
曰若輩勿驚此名蛇殼痘必用逆乃得脫已而皮膚
解裂如蛇蛻然遂愈平湖縣志

潘氏云一女病發熱腰痛手足厥逆目如昏悶形症極
惡疑是痘候時暑月急取屠家敗血倍用龍腦冰片也
和服得睡須臾一身瘡出而安若非此方則橫夭吳
本草綱目

括蒼陳坡云分教三山日其孫方三歲發熱七日痘出
而倒黯色黑唇口冰冷一士人教以用狗蠅七枚擂
細和醅酒少許調服移時紅潤如常又其次女痘後
毒上攻遂成內障一老醫用蛇蛻一具洗淨焙燥天
花粉等分細末之入羊肝內麻皮縛定用米泔熟煮

切食之旬日而愈居易録○狗蝇夏月極多冬月則藏于耳中

扶溝趙神仙傳起死回生散治瘡瘡至七八日忽然變黑收入腹内徧身抓破吭喘死在須臾服此從新另發出立可回生方用四物湯加升麻紅花上腦加白芷下腦加牛膝遍身黑腦加麻黄象糞微炒如一歲用二錢大則用至三五錢右剉一劑半水半酒煎服從新發出脚下有黑疔至七八日用針挑去以太乙膏貼之即拔去毒連進二三服壽世保元

朱丹溪治一子七歲瘡將出未出之際腹泄數行其泄色黑不發根窠三日後痒抓即黑色口渴其根窠如水瘡狀不紅澤不起發食少脉浮數有力按之虚遂用參耆歸朮陳皮肉豆蔻為君炙甘草訶子桂為使水煎熟好酒些少咽下痒立止食立進根窠紅澤而起發二服全愈

龔子才治一女瘡出至腹滿將實膿時忽紫黑抓破流血此屬熱毒太盛乃用皮硝不拘多少入花椒一撮煎水用青布蘸搭患處頻頻良久即起脹如舊

孫文垣治鄭都諫長君四歲患瘡稠密煩躁醫皆謂熱盛不退形枯色紫頂有焦勢症逆不可為孫至細審之見兩太陽圓淨神氣蒼厚可在此生謂當急為涼血解

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

毒用赤芍生地各三錢紫草二錢連翹黃芩貝母山
查木通各一錢蟬退甘草各五分藥成劑而衆止之
曰麻要清涼痘要温今乃獨主寒涼保元之謂何孫
曰用藥貴對症保元湯良矣必血活熱清而後可用
今血熱毒盛而用温劑是火熾漆油也衆曰若慮毒
未解吾苔酵法甚佳用桑蟲雞冠血酒調服之痘即
立起孫曰此法亦可用於清解後火未退而用是以
毒攻毒其勢愈熾鄭遂命煎服其減去山查貝母從
衆議也次日痘色明潤焦頂盡退血亦漸活惟嘔噦
搶喉衆謂藥寒所致孫曰此火毒未盡也宜進竹茹
湯乃大譁鄭弟檢痘疹全書用竹茹以證乃已藥進
而噦止至八日泄瀉發痒乃以保元湯加白术大加
何首烏一帖瀉痒止至十四日天庭兩顴皆回漿作
膿惟兩頤未回洩瀉不止逾半日忽口開項軟四肢
盡癱腹又脹已成内攻舉家啼泣孫亦茫然不遑為
計太息出門鄭弟把袂相送揖別頃聞衣間痘臭語
之曰君聞臭乎曰聞孫曰似有生意亟還起之因思
兩頤乃腎經部位獨不回漿者腎元虛也峻補乃可
使活先以紫河車一錢用酒調服服後即睡纔以人
參一兩黃耆兎絲各三錢作大劑服之一日夜服人

參一兩八錢再視之其結靨之下復灌一錢綫黃漿益贈痘也遂調理而愈此痘如不收功則向之指斥寒涼及戒用竹茹者皆可藉口矣

喻嘉言診顧諟明子種痘即請視其痘苗淡紅磊落中含水色明閨可愛踈他醫已先誇為狀元昌 春洋

頸軟神躁心煩便泄青白全是一團時氣外感兼帶內虛若用痘門通套藥必危之道也必得一二劑先退其外感則痘不治自痊若遲二三日緩無及矣彼不聽而以鰕魚雞筍發痘之物襍投誤上加誤遠所以促其亡耳纔至六日而壞正應感症壞期若痘出既美即有意外變症亦在半月一月矣越二日次男即發熱布痘仍挾時氣外感仍用前醫仍六日而壞

馮楚瞻治蔣總憲之孫痘不甚密但先天甚弱壯熱潰汗不止四五日來痘反退縮平陷昏睡驚惕馮曰壯熱者陽在外也潰汗者陰外洩陽不斂也宜滋陰養陽補中則痘不發而自起矣以熟地八錢乳炒白朮三錢牛膝二錢麥冬二錢五味四分上肉桂六分煎服不逾時熟睡身涼汗收神爽痘起思食而愈

胡氏子患痘初起甚危一老醫斷其必死延馮同治見

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

參一兩八錢再視之其結靨之下復灌一錢綫黃漿益贈瘡也遂調理而愈此瘡如不收功則向之指斥寒涼及戒用竹茹者皆可藉口矣

喻嘉言診顧諟明子種瘡即請視其瘡苗淡紅磊落中含水色明潤可愛且顆粒稀踈他醫已先誇為狀元瘡昌未知也躊躇良久明告曰此瘡熱尚未退頭重頸軟神躁心煩便泄青白全是一團時氣外感兼帶內虛若用瘡門通套藥必危之道也必得一二劑先退其外感則瘡不治自痊若遲二三日緩無及矣彼不聽而以鰕魚雞筍發瘡之物襍投誤上加誤遠所以促其亡耳纔至六日而壞正應感症壞期若瘡出既美即有意外變症亦在半月一月矣越二日次男即發熱布瘡仍挾時氣外感仍用前醫仍六日而壞馮楚瞻治蔣總憲之孫瘡不甚密但先天甚弱壯熱潰汗不止四五日來瘡反退縮平陷昏睡驚惕馮曰壯熱者陽在外也潰汗者陰外洩陽不斂也宜滋陰養陽補中則瘡不發而自起矣以熟地八錢乳炒白朮三錢牛膝二錢麥冬二錢五味四分上肉桂六分煎服不逾時熟睡身涼汗收神爽瘡起思食而愈

胡氏子患瘡初起甚危一老醫斷其必死延馮同治見

其方寒涼大甚所以氷伏不出有喘急腹脹諸症也先以酒釀雞兒血調下獨勝散一服解其氷伏之勢喘熱俱減痘有出勢其醫以必不救為事馮曰毋若是以重主人之憂望為同事吉則君之功凶則某之過彼猶不然其父惟日夜痛哭勉番調治十愈八九主人仍不樂葢渠每日診視諄諄斷以時日凶變此直至結痂全愈主人乃喜形於色悔聽蠱惑幾至敗事

馮楚瞻五兒稟賦素弱年四歲出痘發熱一二日便神氣困倦汗出如雨已見痘曰汗多陽虛一切疎解屏不用三日外汗出不止清利甚頻所見之痘反隱隱退縮未出者則窅如也以人參炒白朮各三錢炙甘草八分固中為君天蟲三錢角刺一錢炒甲片六分攻托為臣川芎八分升提而兼辛發肉桂六分温經而兼外達為佐四日汗瀉少減出見少長未出者見形仍用前方加當歸大棗煎服五日起脹者少有膿色後出者亦有起脹之勢但面上之痘淡紅無光彩身背之痘紫陷不潤澤知由氣血兩虛兼血滯而然

圓

疑誤

用六日痘色紅活次日亮膿色清稀四肢水泡

其方寒涼大甚所以氷伏不出有喘急腹脹諸症也先以酒釀雞冠血調下獨勝散一服解其氷伏之勢喘熱俱減痘有出勢其醫以必不救為事馮曰毋若是以重主人之憂望為同事吉則君之功凶則某之過彼猶不然其父惟日夜痛哭勉留調治十愈八九主人仍不樂益渠每日診視諄諄斷以時日凶變此直至結痂全愈主人乃喜形於色悔聽蠱惑幾至敗事

馮楚瞻五兜稟賦素弱年四歲出痘發熱一二日便神氣困倦汗出如雨已見痘曰汗多陽虛一切跌解屏不用三日外汗出不止清利甚頻所見之痘反隱隱退縮未出者則窅如也以人參炒白朮各三錢炙甘草八分固中為君天蟲三錢角刺一錢炒甲片六分攻托為臣川芎八分升提而兼辛發肉桂六分温經而兼外達為佐四日汗瀉少減出見少長未出者見形仍用前方加當歸大棗煎服五日起脹者少有膿色後出者亦有起脹之勢但面上之痘淡紅無光彩身背之痘紫陷不潤澤知由氣血兩虛無血滯而然只以温補氣血為主前方加黄耆山藥黏米圓肉煎服六日痘色紅活但皮薄而亮膿色清稀四肢水泡

知氣血弱而脾土更虛也乃用保元湯加桂人參五錢滋補元氣為君生耆二錢克補衛氣為臣炙草六分緩中補上黏米一撮內壯胃氣外釀膿漿為佐肉桂宣通血脈補托為使七日膿色大長以和平養漿之劑而痂

吳孚先治一兒患瘡至出齊後忽變灰白七八日毫無漿路更兼便溏不思飲食勢極危用人參鹿茸製附肉桂木香桑蟲人牙穿甲角刺防風桔梗糯米以黃耆二兩煎湯煮藥攻托一帖有漿脚二帖起脹三帖漿足矣

一兒十三歲瘡出稠密至八九日將貫膿時粒粒隔入成窩或與木香異功散隔伏愈甚視其瘡色紅紫而體氣不弱曰此血氣欲行漿為毒氣壅遏故瘡頂隔伏宜速清毒血氣自行緩則有變用當歸生地白芍紫草牛蒡連翹桔梗甘草山查黃耆加酒炒芩連人參三分一劑而隔立起再劑而漿充滿矣

一兒年十四瘡出身熱三四日後出纔隱隱數點忽發譫狂或以涼藥解毒診之六脈緩弱瘡色淡白曰此至虛似實也緣氣血弱送毒不出故發譫狂與實熱發譫狂者迥別投以溫中補氣之藥瘡出遍身譫狂

頊止

黃履素曰余孫孟溥出痘起發貫漿俱如法惟回漿太早九朝左臂發一痘毒醫通用清熱解毒之藥不四劑而寒戰咬牙之症作矣皆泥於痘毒不敢用參朮止用歸耆而兼解毒余謂痘後氣血俱虛復以寒藥傷脾故見斯症陽氣已虛甚即有歸耆亦何能濟況尚兼清解乎必無幸矣保嬰撮要寒戰咬牙門用十全大補湯即痘毒門初發時只用仙方活命飲一二劑旋用托裡散助其元氣則未成可消已成可潰設使氣血不克則不膿不潰難以收拾於是斷以己意

服十全湯三劑而寒戰止再數劑而咬牙定乃延瘍醫妙手外治其毒內服參耆歸芍不輟凡匝月而愈當寒戰症作臂腫方熾用藥頗多疑慮人參且不敢多用而況白朮至於桂更不敢用至三分者余歎曰立齋斷不誤遂決意用大劑參朮加桂至五六分而諸症皆瘳矣

周懷幼第四兒生四十餘日即出痘其初頭上并身上不過三四點身不甚熱飲乳如常醫謂痘極少當不滿百粒周未然之即令禁風調理再二日遂多甚頭上胸腹腰背手足俱稠密至頦上面上及陰囊俱一

片純紅不分顆粒臍內甚多因腫大突出舌上亦多形如白粟膿漿布滿醫又謂兒小痘多且有不順諸症此必不可為矣因視其痘色紅活頗能飲乳宜可調治第慮其氣血不支以參耆灸草煎濃汁時與乳相間飲之五六日後頭上多有膿漿間有水泡身上及手足則水泡大半膿泡僅小半耳謂其氣血有限理所宜然所慮頰上面上一片純紅者必得皮下有膿而後毒氣可散仍與前藥以助漿汁至第七日一更時分頰上純紅者忽有一二處變黑因大驚以為逆候也然察兒精神及飲乳畧無困憊至三更陰囊下亦轉黑結痂回悟其非惡候乃兒小血氣易于周洽七日後即收靨耳至八日寅卯時自上至下俱結痂至晚結完九日自上至下俱落痂至晚落完既而遍身發大熱此毒未盡發是以速收速落將發癮也急宜解毒以大連翹飲濃煎汁每用半酒杯以茶匙緩緩挑服一日夜服三酒杯而熱退可無癮患矣其鼻上為痂封閉以審潤之用銀耳究挑開以出其氣純紅處膿水未乾以黃柏黃連甘草地骨皮五倍子為細末糝之陰囊流清水用綿繭散糝之皆愈

周次女六歲出痘發熱甚緩至二日面與手微有痘影

數點熱至第四日其點仍舊且帶白色困倦嗜卧不思飲食醫視之謂痘輕少不滿百粒周心疑之謂痘既少兒當精神清爽飲食如常今困倦嗜卧不思飲食痘影淡白此必氣血虛弱送痘不出故也乃以温中益氣湯托之一劑而皮下隱隱欲出者甚多二劑而痘出大半一日夜盡四劑而遍身出齊稠密特甚緣數日前曾患發熱嘔吐稍傷胃氣故必待温中托裡而痘始出也若不察其虛不逐毒出外必致内攻之患矣

此案非小兒似誤入

周妹年二十三妊三四月偶受驚恐時歸寧不數日而半產又不數日而發熱二日而痘出頗多至四五日出齊甚稠密色淡白而嘔吐醫見其稟氣怯弱半產後痘出又多皆不敢施治周曰豈有坐而待斃者乎遂以參朮陳皮等安和胃氣止其嘔吐而痘色亦稍紅活因喜曰此可温補而愈也以參耆歸芍炙草丁桂木香等大劑投之覺痘色轉紅活若半日不藥則又轉淡白于是一日夜必盡兩大劑至貫膿時惡露尚未盡乃曰此注漏疱也即于前方中去官桂木香入炒黑乾薑蜜炒升麻柴胡各一錢二分阿膠艾葉各八分二劑而惡露止前方除此五味頻與之膿漿

克滿至二十餘日乃收靨計服藥四十餘劑每劑用參耆各三錢丁桂各一錢他藥稱是是豈區區常格所能盡哉瘡後又患眼腫醫頗盛服清毒撥翳湯數十劑而愈

周表姪孫十歲出瘡極稠密頸項尤多俗名鎖頭又有暴脹賊瘡數粒在各處其瘡初出帶紫黑色醫謂斷不可治周視之已餘六日矣尚無些少膿漿或者猶欲解毒周曰此但得膿漿克滿便可生且至此時尚何毒之可解也兜素驕不肯服藥而喜飲酒（尚能飲酒非逆知可）周曰此時正宜飲酒遂與參歸鹿茸湯一大劑令濃煎汁以好酒相半和勻頻飲之自申至戌服完一劑其頭面各處已膿漿大半矣至午刻忽溏泄二次知其內虛脾弱也以參朮散投稀粥內服二三錢泄止再服參歸鹿茸湯一劑遂克滿矣痂後餘毒頗盛大便秘澁用大連翹飲加酒炒大黃一錢二分數劑而安

一幼兒三歲出瘡將靨時泄不止諸藥不效周以七味豆蔻丸數十粒與之亦不能止其丸從大便而出知其虛滑甚也仍以前丸教以米飲浸軟研如泥和粥少許食之泄止瘡靨而安

一幼女年六歲出痘其症虛弱先服補藥已多結痂後忽泄不止服異功散加訶蔻不效醫將以七味豆蔻丸與之周謂此女一向服補藥何以一旦虛滑若是因審其大便時多努力且所下又少而色黃此必毒氣流注而然也遂以加味四苓散與之一服泄止後因大便燥結復入檳榔青皮炒枳殼等味數劑而安

周尚有表弟妻弟二則症治皆與吳孚先第二案同故省之

小兒報痘

徐仲光治一兒痘出二三點于左右目脫主五朝復煩躁發熱腫卧不寧其痘頂平濶大根紅有神乃感受痘之癘氣先發於外也若是正痘既少必尖突而無前症吳用升麻葛根湯二劑痘果復出勻朗紅綻前症悉平

一兒未熱先數一點于唇上又一兒未熱先數一點于左頰一點於右額頂平濶大俱五日身熱而復出痘勻朗而順漿足收痂但報痘潰而不斂延至四七日而愈

一女孟夏先數一點于承漿頂平濶大四日發熱痘復

出稀朗紅綻而順但報痘腫連頦下膿成毒化而愈
一兒先見一點于眉心至六日漸平塌如圍碁子大灰
白無神痒破煩熱痘復出匀朗紅綻為順但眉心扁
命門相火毒先于此相火受傷諸處雖順恐為獨陰
不化也漿行倒靨肢冷喘脹搐搦九日死
一兒未熱先標點于腰間又一兒未熱先見點于頭項
又有先見點于心窩或先見點于喉中者俱五日而
復出痘匀朗紅綻惟毋痘平塌灰白無神痘漿雖滿
忽倒靨喘脹而卒
一兒初標於山根粗肥咸謂稀踈可必至三朝壯熱狂
亂毋痘塌陷顧頰隱隱徐謂山根屬脾雖粗肥形似
饅餒乃毒乘脾胃以人牙散又羌活散鬱湯治之痘
齊出稠密陷痘復起用補中益氣湯漿足結痂痘色
乾紅少潤唇口裂血腹脹便秘溺澁用滋養清解之
劑便通安枕又口齦發疳用清胃解毒湯加連翹
萬密齋治朱大尹公子九歲發熱嘔吐曰痘也謂已出
過痘迹故在曰此水痘癜非正痘癜也又謂為傷食
曰痘疹發熱與傷寒傷食相似傷寒發熱則面紅手
足微溫傷食發熱則面黃手足壯熱痘疹發熱男則
面黃體涼女則面赤腮燥其足俱涼今公子身熱面

黃足涼乃瘄也經云瘄乃胎毒五臟各具一症發熱
呵欠驚悸心也項急煩悶肝也咳嗽噴嚏肺也吐瀉
昏睡脾也耳涼散涼足涼腎也今脾胃素弱毒乘虛
故發在脾今但見嘔吐一症熱纔三日姑俟明日再
議次日以燈視之皮下隱隱紅點而唇邊已報瘄矣
然順症也問服何藥曰瘄無病不宜服藥但遠其寒
温調其飲食期十三日安後果然

索希文子年十三發熱腹痛煩渴或作傷食治轉甚曰
此瘄也腹痛者毒氣內攻也煩渴者神不得安津液
乾也法當解毒托裡不可緩也不信五日後瘄齊涌
出未及起發乾枯內陷而卒

胡元溪子未瘄問萬萬曰兒五嶽端正三關明潤骨堅
肉實神俊氣清出瘄必踈驗小兒瘄疹法後發熱作搐曰此
佳兆也以辰砂散投之搐止瘄出曰凡瘄起脹未有
頭面不腫者此症顆粒緊小必不大腫期十二日而
安果然

萬子邦孝四歲發熱卒驚而絕其母大哭曰此瘄疹也
乃摘合谷得甦與導赤散瀉青丸一服搐止瘄出甚
密幸無他病十三日而靨後又出疹而愈

李氏子瘄三四粒未起發而隱身亦無熱氣色昏黯精

神倦急謂此瘡必重曰已出二三粒收矣曰不然瘡出雖有輕重未有不成膿結痂者前者試瘡其症為逆身無熱伏在內也數日作大熱齊湧出身無空屬用參耆芎歸甘草節以養氣血荊防木通青皮牛蒡連翹銀花酒芩山皂桔梗以解毒作大劑日一服至十三日後遍身潰爛不即收靨改用十全大補去桂加白芷防風外用敗草散貼襯前後十餘日而安

王氏子二歲發熱出紅點一二粒額紋青氣年上赤光此險症也先出者名試瘡中氣不足毒氣隱伏故出不快也以調元湯加防風木香服後其瘡旋出喜無他症十三日而安

陳文中云淮東趙制幹子年十五歲身壯熱哽氣醫謂傷食感應九一服瀉二行仍壯熱又一醫言傷寒小柴胡湯加枳殼其身不壯熱口乾足冷予曰始初身壯熱哽氣便是瘡之症口乾足冷者感應丸瀉得裡虛也身不熱者柴胡解得表虛也若加喘渴則脾肺虛而不救矣以木香散加丁香官桂各半錢二日進五服第三日瘡出第七日成膿疱子微渴人參白术散一服又木香散一服十三日痂落而愈

費建中治韓太史孫周歲忽身熱如烙昏迷不醒似驚

非驚而有瘡象卻屬火裡苗瘡非輕緩之劑所能治者以大黃錢許石羔黃連佐以清透達表之劑連二服瘡見勢亦減半至三日頗稀朗自起至終無甚風波而愈向非早為之計有不可知之變也

黑瘡

房玄齡瘡俱黑色如龍眼大老僧見之驚歎曰萬丈龍含珠見今得見矣

即瓊山七歲出瘡亦遍身俱黑父憂哭漁父燭之躍然曰紫垣中輔弼宿落此田舍翁家取筆書輔弼二字於子背上而去

昔有一兒瘡形俱黑色在日中視之則黑以燈照之真紅映內偶遇一僧不服藥以洗元湯浴之即轉紅活後至台輔

一黑豆圓朗光澤至漿時色如紫葡萄根圍血暈微黃色名為紫袍金帶（以上仁端○俱見瘡疹徐仲光）

萬密齋治王氏子出瘡起發時漸變黑已蔓延一身矣或謂瘡變黑歸腎不治曰黑瘡有二症一則乾枯變黑者此名倒陷乃邪火大熾真水已竭故曰歸腎不治一則瘡色變黑不至乾塌此疫毒之氣所謂大發

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

而熏昧者也今正此類乃用當歸梢生地赤芍紅花以涼血黃耆人參甘草以瀉火補元氣酒炒芩連牛蒡連翹升麻以解毒荊防以疎表每劑入燒人屎一錢連進十三劑色轉紅膿成而靡

李氏子瘡起發時變黑而乾自發熱至今未大便曰此熱盛于內宜急解之制一方麻黃酒蠶拌炒黑紅花子紫草人中黃連翹酒蒸大黃燒人屎煎服外用膽導法取下燥矢瘡轉紅活後以四物湯去川芎加紫艸木通枳殼生甘草調理而痊黑瘡多由疔毒今入此門者恐人悞認也

徐氏子十三歲瘡成膿將靡或謂變黑歸腎不可治視其瘡舡落膿漿飽滿神識清爽言語清亮惟大便五日未通此裏實熱蒸故潰爛其色蒼黑亦正色也但解其裡即靡矣與四順清涼飲一帖下燥矢二十餘枚隨靡而安

白瘡

徐仲光治一小兒初標於右太陽乍涼乍熱色白腳塌瑣碎細密初時發表即用桂枝白芍以斂其根腳平塌不起用震蟄丹酒漿桑蟲以發之五朝吐尚不止用藿香薑炒黃連以安之六朝嘔吐雖止猶然乾枯

少潤用白芷黃耆山甲以酵之七朝瘡漿不行仍用
前藥加人參八分別飲蒸薤汁酒漿連用二日瘡漿
始灌正面而胸背四肢猶是生瘡唉嗽聲啞時值八
朝勢急矣幸飲食宵進大便不瀉用人參黃耆麥冬
陳皮甘草川芎當歸紅花白芍前胡桔梗兼調燒人
屎催藝丹三四分顛作良久而漿行遍身矣彼時頭
面俱已平乾至此復能根生紅暈旁發贈瘡塌者竦
而枯者潤矣後回瘡嗽特甚聲啞未開改用山豆根
知母貝母麥冬黃耆牛蒡連翹陳皮歸芍甘草日用
柳條纏綿攪口去盡喉中白糝別用燒人屎山豆根
硼砂牙硝硃砂冰片膽星青黛為末與服三四日嗽
止聲出而愈

萬密齋治汪氏子瘡將靨灰白潰爛神昏不醒曰無傷
但守三日收靨矣問不藥何以能痊曰瘡白者乃熱
太過而白如果熟潰爛之狀非虛也神昏者乃邪盡
正回否極泰來之兆非昏瞀也再俟三日則正氣復
而痊矣果然

嬌紅

徐仲光治一兒患瘡五朝勻朗綻突但嬌紅嫩豔乃脾

胃氣弱也至漿滿而不蒼老猶防泄瀉瘁塌之患治以黃土水煎保元湯下參苓白朮散浮脾土固可免下陷奈俗醫因期在發漿之始恐參苓滲瀉濕但以保元調理至八朝溏瀉四五次漿滿而縮倒靨煩躁二六而逝常驗此痘多至十二日而卒亦有於四日而卒者

一兒痘症類前以前法治之九朝漿清而靨結如麩韋能食便調發癮毒而愈

一兒患痘五朝嬌紅嫩豔或謂晁痘不能蒼老結痂視之見其肌色白嫩則皮薄嬌紅可謂無虞以保元加官桂白朮調理而愈

一女周歲患痘嬌紅初時嘔吐溏泄人靜諸處匀朗天豔惟繞口四白稠密一片初朝用前胡桔梗僵蠶陳皮甘草川芎木通山查羌活二朝用前方去羌活陳皮加防風紅花連翹乾葛三朝用桔梗川芎僵蠶當歸陳皮甘草山查前胡紅花丹皮連翹生地四朝用山藥茯苓歸身川芎甘草白芷蜂房僵蠶桔梗陳皮

人參四分五月日　參六分六朝黃耆當歸

疑當作梗　陳甘草人參六分夜服

桑蟲酒漿七朝人參九分黃耆白芷當歸川芎甘草

胃氣弱也至漿滿而不蒼老猶防泄瀉瘁塌之患治以黃土水煎保元湯下參苓白朮散浮脾土固可免下陷奈俗醫因期在發漿之始恐參苓滲瀉濕但以保元調理至八朝溏瀉四五次漿滿而縮倒靨煩躁二六而逝常驗此痘多至十二日而卒亦有於四日而卒者

一兒痘症類前以前法治之九朝漿清而靨結如麩幸能食便調發癮毒而愈

一兒患痘五朝嬌紅嫩豔或謂晃痘不能蒼老結痂視之見其肌色白嫩則皮薄嬌紅可謂無虞以保元加官桂白朮調理而愈

一女周歲患痘嬌紅初時嘔吐溏泄人靜諸處匀朗天豔惟繞口四白稠密一片初朝用前胡桔梗僵蠶陳皮甘草川芎木通山查羌活二朝用前方去羌活陳皮加防風紅花連翹乾葛三朝用桔梗川芎僵蠶當歸陳皮甘草山查前胡紅花丹皮連翹生地四朝用山藥茯苓歸身川芎甘草白芷蜂房僵蠶桔梗陳皮人參四分五朝如前方只加參六分六朝黃耆當歸茯苓白朮白芷川芎蜂房桔陳甘草人參六分夜服桑蟲酒漿七朝人參九分黃耆白芷當歸川芎甘草

山甲官桂二分至夜作瀉眼開喉嗌嘔先吐白沫喘脹交作隨用前方加人參一錢肉果五分砂仁三粒附子三分白朮黃耆各一錢煎服昏沉痰鋸顛作良久約二三箇時辰大汗周身聲音始出即與乳喫痘轉明亮平塌頃起行漿八朝用參耆芷朮紅花僵蠶歸芎陳皮甘草官桂肉果附子二分漿足瀉止九朝用人參錢二分耆朮山藥芷桂僵蠶甘草肉果白芍附子二分頭面胸腹脹滿惟兩小腿半漿血靨十朝參耆當歸白朮陳皮甘草五味茯仁山藥茯苓以後用平補之劑加銀花連翹調理而愈

萬密齋治胡氏子未痘先兩頰赤燥曰傷寒論云面色緣緣赤者陽明熱也若不預解至出痘時此處必甚稠密而赤貫串難靨以升麻葛根湯加防風牛蒡連翹三服而紅色盡去痘出亦疎

汪氏子五歲痘甚密且紅豔此險痘氣實血熱可治也用當歸梢赤芍生地荊防甘桔連翹牛蒡以解其毒三劑紅色盡退猶未發透再以黃耆防風赤芍牛蒡青皮桔梗查肉連翹調理十五日而靨

費建中治臧氏子痘甚密而克肥色不乾滯但紅豔身太熱以清熱解毒湯日二劑五日便行一次未思飲

食次日漿即老紅暈煽赤又三日便不行慮成大褐
症急宜潤之使毒鬆利前方加生地滑石兩許更加
黃芩藥未成而燥痒急進之更餘去宿垢極臭硬即
清爽熟睡紅盤漸淡漸收飲食大進以忍冬解毒湯
而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷第三十八

錢塘魏之琇玉橫撰

痘順症

萬密齋治羅野松年十六出痘或曰凡出痘者春夏為順秋冬為逆今冬出時逆也痘起發頭面腰腫今被寒氣逼抑毒不得出故頭面不腫症逆也曰不然春夏為順秋冬為逆非以時言以症言也蓋春夏者發生長養之令也秋冬者收斂閉藏之令也痘本陽毒

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

自出現而起發自起發而成膿如苗而秀秀而實故曰春夏為順如應出不出應發不發謂之陷伏故曰秋冬為逆頭面不腫順瘡也頭浮腫者險瘡也頭面預腫者逆瘡也今瘡本磊落尖圓堅實其毒輕微故不腫若頂平根濶肌肉鮮紅此為毒甚不待起發而頭面先腫矣或又曰起發太遲宜服溫補曰瘡無病不須服藥此瘡紅潤鮮明表氣足也大小便調理氣充也無熱無渴無他病也若補之謂之實實此症不過十數日必收靨矣果不藥而安

胡氏子五歲出瘡起發時頂平而陷曰順瘡也凡出瘡以氣血和平為主尖圓堅實者氣也紅活明潤者血也紅活平陷者血至而氣不足也圓實而色白者氣至而血不足也平塌灰白者氣血俱不足也掀腫紅縱氣血俱有熱也今瘡出即密時日未到氣血未周以漸起發得其常也故曰順瘡不須服藥已果然

小兒瘡氣虛

徐仲光治一兒瘡初標于下頰腎部也形平陷氣不足也少神血不足也六脈沈弱五朝尚暗色不起兩腿作痛便溏有氣凝血滯之象此乃氣虛脾弱之症治

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

宜大補中氣以補中益氣湯加蟬蛻肉桂羌活二劑而起脹纔以保元湯加肉桂陳皮調理八朝瀉泄不已加木香訶蔻治之而愈

一兒瘡起脹頂平而色淡白渴瀉肢冷喜熱飲經曰陰盛者飲沸湯而不知熱又曰大寒而盛熱之不熱是無火也治宜益火之原以消陰翳用陳氏異攻散又八味丸治之而愈

一兒瘡六日稠密形平塌色黑滯有擬雲掩天庭者有擬鎖項鎖胸者然形色雖逆而四肢紅活綻突唇口紅潤起止安寧飲食如常二便調適雖毒盛氣血不足幸脾胃尚強宜補養而無保固以補中益氣加蟬草蝉退牛蒡等劑其逆瘡俱平漿破漏結痂發疔癰數處而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

費養恒建中之父治一兒因內傷而吐次日見瘡甚密一日絕無起勢鬆肌透表二劑不應次日以保元湯加薑桂少許二劑亦不應三日加參耆至三錢至四五日畧起終頂陷囊薄七日加參耆五錢鹿茸膏半盞仍無沛然之勢或謂邪得補而愈盛曰果爾則煩熱躁渴色蒼老攀紅矣今皮薄色白頭溫足冷症可知也乃以參耆各一兩鹿膏大半盞一劑即綻突如珠根

紅頂白不一日漉即肥膿其後收功不假餘力是以補為瀉之一驗也今無是症矣二句乃建中之言

梁毒

費建中治故友孫貞老子四歲庚寅暮春瘡甚匀朗稀疎而綻突其熱宜和其神宜爽乃躁亂乾熱頭汗如雨蓋梁毒內擾邪火外爍也頭為諸陽之首先賢謂毒恭陽位者死幸初見勢雖騰涌而毒尚未有定位耳大黃二錢黃連六分石膏生地各三錢佐以蒂丁青皮荊芥蟬脫木通山查三劑頭汗收熱勢減減石

羔應改作膏 皮滑石牛蒡四劑五朝仍壯熱紅暈如

三四次前方復用石羔黃連倍加生地至九朝發甚老而乏滋潤紅暈未淡胃氣不開熱亦未減寢亦未安再服至十二朝漸愈 救偏瑣言

嚴氏子一周瘡稀朗且紅潤乃身熱如炮愁楚不堪魚顆粒不鬆此內有伏毒也以大黃六分石羔生地各錢半荊芥丹皮山查蟬退葛根青皮二劑大便三四次又二劑熱和神定根窠亦鬆宛然順症矣有沮之者遂弗藥至八朝仍熱叫哭失音頭面擦破身上紫

紅頂白不一日潦即肥膿其後收功不假餘力是以補為瀉之一驗也今無是症矣 二句乃建中之言

梟毒

費建中治故友孫貞老子四歲庚寅暮春痘甚匀朗稀疎而綻突其熱宜和其神宜爽乃躁亂乾熱頭汗如雨蓋梟毒內擾邪火外爍也頭為諸陽之首先賢謂毒忝陽位者死幸初見勢雖騰涌而毒尚未有定位耳大黃二錢黃連六分石膏生地各三錢佐以蒂丁青皮荊芥蟬脫木通山查三劑頭汗收熱勢減減石羔黃連加丹皮滑石牛蒡四劑五朝仍壯熱紅暈如硃此痘起齊毒火盡外發也躁亂如前而更渴大便三四次前方復用石羔黃連倍加生地至九朝發甚老而乏滋潤紅暈未淡胃氣不開熱亦未減寢亦未安再服至十二朝漸愈 救偏瑣言

嚴氏子一周痘稀朗且紅潤乃身熱如炮愁楚不堪煮顆粒不鬆此內有伏毒也以大黃六分石羔生地各錢半荊芥丹皮山查蟬退葛根青皮二劑大便三四次又二劑熱和神定根窠亦鬆宛然順症矣有沮之者遂弗藥至八朝仍熱吐哭失音頭面擦破身上紫

滯幸未焦隱前方倍大黃生地黃連減葛根入大桑
蟲日二劑以化毒丹調油胭脂如膏藥貼之次日瘁
止紅活又二劑瘥足熱和十二朝用銀花地丁生地
牛蒡荊芥木通甘草連翹山查漸愈夫瘡初似順一
有伏毒便至如此餘可知矣

臧氏子八歲患痘僅存皮骨庚寅仲春見瘡贏憊如此
似宜培補矣乃身熱如炮目紅如火躁渴不已溺血
如膏椒紅黯滯此梟毒挾烈火發即內攻若不通變
七日當內潰也以大黃四錢石膏七錢生地兩許佐
以桃仁赤芍荊芥牛蒡木通臨服和豬尾血一盞日

二劑或三劑六日加黃連自始至終一方而已約用
大黃斤餘生地石羔二十餘兩豬尾血十餘椀良以
毒火猛熾苟不滌除淨盡功虧一簣矣瘡後精神煥
發飲食大進肌肉生長是以鴻為補之一驗也

張仲文子癸未仲冬忽身熱如火神即昏憒舌刺如煤
啓口焦黑血瘢無數溺血紅鮮肉瞤筋惕有如驚悸
宛然悶瘖斷非輕劑可挽即用石羔一兩大黃五錢
黃連三錢生地一兩佐以青皮荊芥地丁丹皮天寒
稍配蜜炒麻黃三分薑一片以行之灌下即嘔費曰
毒火上衝水火搏激兩不相下故耳任其嘔逆再灌

當必受矣二劑覺少差至八劑乃全受十餘劑方見
瘡及見則可以數紀唇猶黑溺血依然至九日後黑
退津生神氣漸省十二日溺血始淡胃氣日開十六
日全愈服過大黃十餘兩石膏生地約二斤是早圖
之驗也

小兒瘡毒癰○附穢觸

徐仲光治一兒瘡紫色而不起脹乃毒盛擁遏也以紫
草紅花蟬退煎酒調獨聖散服之又以犀角地黃治
之紅潤起脹而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

一兒瘡六日稠密紫滯平陷不起脹煩躁悶亂亦毒盛
擁遏也但分珠腳斂可治以人中黃每服三分酒調
漿連進二服色漸紅活又犀角地黃湯加牛蒡蟬退
瘡綻突起脹而愈

一兒瘡血熱毒重初時純與涼血解毒犀角服過二兩
石膏五錢一劑者服過五劑至十朝暑用參三分托
漿十二朝外漿清痂薄用助托藥加綿黽帶蛾者七
枚糯米一合渴時即以麥冬糯米綿繭煎湯飲之又
發水泡數箇漿疱暗長灌爛遍身復用茯苓苡仁白
芍黃連銀花甘草生地骨皮山藥蓮肉木通連翹牛

蓩莉芥而愈

萬世用云庚申春家有頑童僅十歲患痘瘡疹遠僕寓鄉之故廬舍報亟歸視其疾不為不緊且旁有煎炒油膩欲避莫能荷育溪曾世榮也療之恰七日瘡脹而光澤偶同舍又有動劇穢觸覺色黯而神昏大為驚惧育溪曰毋慮吾有除穢藥投之必安不數日果如其言遂拜更生因扣其所用何劑曰中和湯即十奇散何劇之劑本作藥加已餘無他巧幼幼心書

心衣氏新

小兒痘血熱

施季泉治臧玉涵次郎年十六因新婚兼酒食忽感以為不可治至八日漿清寒戰咬牙譫語神思恍惚咸欲進保元湯大補之施季泉以為不然改用犀角地黃湯得脫痂後忽嘔吐大便燥結淹延一年繆仲淳視其舌多裂紋曰必當時未曾解陽明之毒故有是症以石膏一兩人參一兩麥冬五錢枇杷葉橘紅竹瀝童便為佐一劑即安再劑膈中如冷物隔定只以人參湯投之服兩許即索粥食晚得大便夙疾頓愈

廣筆記

孫生東治鄭黃門子痘血熱毒盛初起即以犀角地黃

蓼莉苓而愈

萬世用云庚申春家有頑童僅十歲患痘瘡疮遠僕寓鄉之故廬舍弟亟歸視其疾不為不緊且旁有煎炒油膩欲避莫能荷育溪曾世榮也療之恰七日瘡脹而光澤偶同舍又有動劇穢觸覺色黯而神昏大為驚惧育溪曰毋慮吾有除穢藥投之必安不數日果如其言遂拜更生因扣其所用何劑曰中和湯即十奇散加沈檀等劑而已餘無他巧幼幼心書

小兒痘血熱

施季泉治臧玉涵次郎年十六因新婚兼酒食忽感以為不可治至八日漿清寒戰咬牙譫語神思恍惚咸欲進保元湯大補之施季泉以為不然改用犀角地黃湯得脫痂後忽嘔吐大便燥結淹延一年繆仲淳視其舌多裂紋曰必當時未曾解陽明之毒故有是症以石膏一兩人參一兩麥冬五錢枇杷葉橘紅竹瀝童便為佐一劑即安再劑膈中如冷物隔定只以人參湯投之服兩許即索粥食晚得大便夙疾頓愈

廣筆記

孫生東治鄭黃門子痘血熱毒盛初起即以犀角地黃

湯治之不效至用白芍八錢一泄毒解徐補收功全上

家第元箸一發熱即譫語唇腫齒黑痘欲出不出醫者以為發斑傷寒也延仲淳季泉不至予曰事急矣以生地八錢白芍五錢芩連各二錢稍加發藥日三劑勢稍定痘漸次而出又減地黃白芍之半復於助漿藥中兼清涼之劑九十朝漿始足卒傷一目靨後方大便此真血熱也若用解毒輕于補劑則目亦可以不眇矣全上

黃綺雲治一兒痘初血熱甚用生地三兩煎濃汁頻飲其痘紫立轉紅色全上

一兒痘毒盛又遇火令用白花蒂丁汁和淡白酒少許服之立解

一兒痘稠密綻突但色紫暗壯熱煩渴譫語目赤便秘乃毒火亢極也以四順清涼飲加大黃六錢微利二度其勢稍減再劑服之又利二次病去其半再以前方加人參三錢前症悉平色見淡白精神疲倦邪雖去而正氣不足宜大補之又以保元湯加芍歸芍朮而愈

一兒痘出夏月起脹而乾紅壯熱煩渴舌燥不眠溺赤此內外熱極也以黃連解毒湯合化斑湯而愈

一兒痘值六月六朝痘痛煩渴氣急便秘乃心肺實熱也恣與涼水梨汁飲之前症悉平

一兒痘出勻朗綻突但枯燥而不肥澤皮膚皴揭皆屬于燥經曰燥勝則乾治以養血清金潤燥之劑又保元合四物加麥冬治之而愈

萬密齋治鄒氏子五歲出痘或與保元湯熱益甚或以為險曰此順痘也期十八日安不須服藥蓋痘不可以日期箕出已盡發已透膿已滿而後收靨可期也今痘出而熱轉甚者出未盡也由服保元湯犯實實之戒故令出遲靨亦遲也夫善攻不如善守無他病何以藥為已而果愈

此案非小兒似誤入

萬子婦患痘大熱大渴眼紅唇裂自利清水妄見妄語循衣摸床遍身紅斑如蚊迹皆逆症也此毒在三焦表裡俱熱非大發大下之劑不可救也乃以通聖散全料大劑與之一服而前症悉去痘出甚密復用十全大補湯去桂加防風銀花連翹桔梗調理而愈其痘自下收起亦奇事也

一小兒痘後發熱大小便難瘡瘢帶赤或言虛欲用保元湯曰不可此實熱也曰食辛熱之物得之果因食雞而得以三黃丸而愈

瘟諸熱

徐仲光治一兒瘟後午餘發熱臉赤色譫妄狂顛乃火從虛發也以保元湯加歸芍川連而愈

一兒瘟後身熱減食面黃肌瘦右脈沈滑雖係內傷而脾胃則虛宜先調而後消之六君子加山查青皮而愈

一兒痂後能食便秘身熱口渴乃胃有蘊熱也遲則變生三黃丸清胃湯利之而愈

一兒瘟後夏令痞滿燥熱用巴豆下之心痞少解燥渴腹痛利下如爛魚腦強食即嘔痞噯不已足胕痛舌赤溺澁此暑傷元氣熱藥又傷之陰亡而陽獨存也

一兒瘟後身熱頭疼惡寒拘急腹脹內外俱傷感也以參蘇丸香砂丸而愈

一瘟後大熱無汗乃時行疫症也截瘟丹五瘟丹而愈

一瘟後身熱頭疼過用發散二劑其熱愈甚乃內虛症用補中益氣湯而愈

一瘟後傷食過用剋伐致面黃少食午後潮熱用清熱劑更加泄瀉此中氣不足用六君子補中益氣即愈

一瘟後身熱煩躁面紅唇赤驚掣此熱傷風也由于衣

被太暖或近火氣積温成熱極生風以犀角地黄湯
合導赤散而愈
一瘡後傷于風寒筋骨疼痛鼻流清涕川歸散加羌防
而愈
一瘡後身熱惡風右脈浮弱由飲食勞役内傷脾胃無
陽以外護但見風寒即惡發熱頭微疼補中益氣湯
而愈
萬密齋治徐氏子瘡後發熱或用小柴胡湯竹葉湯黄
連解毒湯皆不效乃與保元湯加當歸炒黑乾薑一
服熱去

費建中治沈氏女周歲身熱如焚汗出如雨兩目傍徨
如畏刀鋸以大黄四分黄連三分石膏二錢佐以丹
皮木通山查青皮蟬退連二劑次日神色定放標數
點磊落分明又二劑熱和神爽稀疎頗潤更以中和
之劑八日愈
吳橋治汪一龍幼而患瘡方七日瘡多而不起四肢皆
涼瘡色如浮萍乾紅枯紫渴甚啜茶水日數十升水
瀉不禁諸醫皆以為寒也遞以木香異功散獨參湯
温補之既而下結血數枚諸醫辭去橋至則以為火
症衆皆不然比日身涼飲水多且水瀉不止即有熱

無傷矣橘曰水瀉者挾熱也身涼者熱厥也視其口則舌有紅斑一黑斑三語衆曰此非熱而何遂用大補寒涼之劑投之一服得寐而瀉止詰朝四服瘡色微紅活有神九日而起太函集

瘡汗

徐仲光一瘡漿足盜汗此陰虛也保元湯加浮小麥治之愈

一瘡后盜汗肌瘦煩躁此陽虛也補中益氣湯倍芪加麥冬而愈

瘡渴

徐仲光治一瘡漿足漸蒼老宜靜以養之有謂脾主結痂用異攻散加山藥白芍喘渴身熱此實症而用補劑內外皆熱也治以寬中湯又口齦發泔以清胃解毒湯而愈

一瘡八朝漿滿身熱而渴咳有痰涎大盛津液涸也用白虎湯而愈

一瘡起脹煩渴不已寒之不寒是無水也宜壯水之主以制陽光六味地黃丸料加麥冬五味多服而愈

一人十九歲痘六朝匀朗綻突淡白少神渴甚不已此虛弱而津液竭以人參二兩枸杞二兩麥冬五錢水煎漸服又以補中益氣湯加枸杞二劑保元湯加冬芍歸杞九朝漿足渴止用人參一斤而愈

一痘起脹乾紅焦紫根窠堅實便結煩渴黃連解毒湯愈

一痘六日起脹形色順不食引飲此胃弱也調脾肉托散治之即愈亦有毒壅而不食引飲者不可不辨

一痘八日漿半足熱甚引飲有用保元湯而煩渴益甚余謂當加倍人參用人參二兩麥冬兩半煎成頻飲而渴止此渴甚藥輕不能生津以自救也

一痘九日空亮無漿根血乾紅壯熱口渴與保元湯而渴愈甚此腎水枯涸不能生火宜壯水之主六味地黃丸料加人參當歸知母麥冬枸杞子兔絲子而愈

一新婚後出痘躁熱而渴與冷飲即睡醒則復索飲不已時大冷大寒此亦腎水涸不能制火乃孤陽絕陰後雖行漿二三日而卒無陰則陽無以化正謂此也

一新婚後出痘蹤熱引飲亦宜壯水制火用八味地黃丸料加人參麥冬五味子又用補中益氣湯而渴止熱減

一瘡七朝潮熱口渴自利下臭穢陳積此脾胃熱蒸而下也雖虛而無寒以保元固中之劑而愈若用燥熱之劑如木香散禍不旋踵

一瘡漿期壯熱煩渴舌乾口燥或疑津液不足與保元湯加麥冬而熱渴愈甚瘡色焦紫此症本熱而衣被火爐過煖用補反助其熱宜清涼以黃連解毒湯加牛蒡而愈

一瘡後熱渴能食便秘赤咽乾口燥此心胃二經受邪也用白虎湯而愈

一瘡後口乾舌燥咽乾食少便調此脾胃虛津液不足也用參苓白朮散及參冬甘朮升葛麥冬花粉五味粳米而愈

一瘡後口渴食少小便數此食傷胃氣津液不足故渴而溺數也數補中益氣湯加麥冬五味而愈

一瘡黑陷黃色不食性好飲酒順其性與飲紅綻而愈

一冬月出瘡頂陷紫黑飲食藥餌俱不用以當歸浸酒與之而瘡起脹收功

一瘡火毒閉而形若死移棄外庭過暴雨而甦解此以水制其火故也

一險瘡熱擁索飲不已連與井水數升渴止而瘡起

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

萬密齋治鄒氏子痘養膿時大渴不止議用人參麥冬
散彼即依本方修合曰此瘡出太甚津液不足之症
白朮燥津液茯苓滲津液皆所禁也乃以本方去苓
朮加升麻生地花粉知母淡竹葉一服渴止
萬氏子痘養膿時大渴不止即用前加減方作大劑代
湯飲之一帖而止

中暑出痘

曾世榮治衡陽侯自牧次子五歲盛夏泄瀉面垢煩渴
耳凡冷驚悸診其心肝脈浮而洪大脾肺脈虛而細
數曰面垢渴瀉脈虛細者此中暑也驚悸發熱耳
凡俱冷肝心脈洪大者此痘瘡欲出也先服黃連香
薷散解利暑毒續投陳氏異功散再加附子與之實
脾二日瀉止三日瘡見不旬餘而全功此隆暑用附
子之效也幼幼心書
費建中治鍾氏小女痘值炎天受暑煩擾非常壯熱如
焚痘色乾紅累日不起渴思井水僅與椀許便覺爽
朗求之不止竟飲及一斗通身微汗神情始快痘頓
起色亦紅活終以清火解毒收功

瘡

痛

徐仲光仁端録一瘡半出遍身作痛乃熱毒壅滞未盡外出故也活命飲加蝉蜕而愈

一瘡漿足而痛不已此諸痛為實也白芷陳皮甘草牛蒡連翹山查

一瘡六七日痛不已此毒未化正鬱而作痛也非虚非實不須治之俟毒從膿化其痛自止

痒

一瘡初起作痒風寒外滞也升麻葛根湯焙荆芥穗熨而愈

一瘡起脹淡白少神泄瀉口渴而痒此脾胃氣虚也補中益氣湯去歸加桂附糯米而愈

一瘡成漿痒破是衛氣暴泄津液不榮幸能食便調四君子湯加芎芍橘復腫灌成痂而愈

一瘡成漿痒破潰爛乃濕火并至也調脾滲濕而愈

一瘡九日漿清作痒大補氣血而愈

一瘡見七日至十三日痒塌木香散加丁桂固表裡而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

萬密齋治鄭氏子瘡將見形作癢不能禁曰起發時作癢者逆也貫膿時作癢者逆也將斂時作癢者險也險者可治逆者不可治纔見便癢書無此症因思仲景傷寒正理論云病身癢此邪在表欲出而不得出也桂枝麻黃各半湯陽明經病皮中如蟲行者此肌肉虛也建中湯今此身癢正是瘡欲出不得出與太陽症同非陽明肌肉虛也乃以各半湯去桂杏加升麻葛根牛蒡一服癢止瘡出甚密調治半月而安

屠家子出瘡正貫膿時請一巫誦咒噀水解厭後忽加瘙癢瘡形平塌其色青白而氣腥臭曰此犯房室穢氣也急令買膠棗一斤燒烟熏之瘡轉紅活而癢亦止問其故老巫他往而子代之有房事宜入穢觸門

胡氏女七歲瘡初發熱兩手如撚物狀曰此肝病也經云其為病也握宜平其肝以瀉青丸去大黃加甘草柴胡青皮一帖而握止欲再進一帖不聽曰凡肝病者多水泡而作癢宜止之未發之前既不信七日後再議至六日盡抓破矣乃用保元湯加防風白芷一帖癢止再服著痂而安

施季泉治臧玉涵幼兒甫半周身熱一日即見瘡當門云樹小花多頂平腳塌根窠薄百死一生之症也五

施案已入泄門元注

朝固辭去藥以保元湯為主擬六朝多用人參加附子疑慮間施至曰此險症且戒云必發痒異常須看守嚴密藥用涼劑與前治大別七朝大發痒作瀉一日夜二十餘行或藥水或乳或湯飲俱傾注不變色或謂必無幸矣施怡然自若曰強之用參必不許乃加炒黑黃連瀉止十三朝復發痒口渴唇燥舌生白胎又加炒黃連白胎去到底不用參十九朝而別又戒曰慎防痘疔口瘡疔之發也必在腦後枕骨間當以收口膏貼之禁用糝藥口瘡惟君家人中白散為妙不數日發疔口生瘡如其言治之輒效廣筆記

痘後齊癬

徐仲光一痘感暑毒靨後頭發珠子火丹香薷飲合犀角地黃湯加荊芩荷而愈

一痘後遍身生肥瘡失于清解致于毒內攻而死

一痘後遍身生瘡忽自愈而喘脹搐搦此同倒陷論先用升發使再作後用犀角解毒湯加人參而愈亦有用升發使再作後用犀角解毒湯加人參而愈亦有用百解散發為丹腫者

一痘遍身膿瘡久而肌瘦潮熱此毒已外泄宜固正氣為主補中益氣湯加茯苓防銀花石斛外治水銀

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

膏

一女十七瘡後膿疥逢時即發苦參四兩歸芍芍防荊芥白芷牛蒡枸杞連翹蔓荊薄荷蒺藜丹胡麻首烏各一兩黃米糊丸盡劑而愈

一女瘡順十二朝成膿疥身熱煩燥此毒擁失解也幸正不客邪以歸芍喬蒡芷防茲銀花治愈若失于解散多有損其肢目者矣

瘡疔

徐仲光治一瘡清漿結疙四肢發疔數處能食便調見其脾胃實强以內托解毒散治之潰出疔根用生肌散數愈

一瘡清漿結疙便泄減食疔發二十餘處因脾胃虛弱正不勝邪毒反內攻解毒無效十四日干嘔而死按還解毒中兼補托藥未必無效

一瘡漿足發疔數處壯熱煩渴便秘能食此有餘之毒未盡以四順清涼飲治之而愈

萬密齋治朱大尹子瘡至起發時項後手背有二瘡變黑者摸之則痛此瘡疔也急取胭脂數帖水浸取汁塗之盡汁而止次日紅潤起發

汪氏子瘡起發時有變黑者以朱公子事語之教取臍脂汁塗不聽後一身盡成黑瘡而塌復出一層又塌如此者三而卒

汪氏子八歲瘡起發時有黑枯者此瘡疔也用四聖散臍脂汁調銀針撥開瘡頭塗之即轉紅活亦不蔓延數日後應收不收問之不更衣七日矣知其腸內燥結取猪肉爛煮和汁與食腸潤便通旋收靨○鄭氏子症同以前法治之而愈此症皮肉不活根腳不腫者死若起發有水頂平而黑內服涼血解毒加燒人矢外用胭脂塗法若便秘得之裡熱內服四物三黃湯外用膽導法若泄瀉此虛寒也用保元湯加木香桂如盡乾枯煩躁悶亂者不治

瘡水泡附膿泡

萬密齋治李氏子一歲出瘡起發時都似水瘡曰瘡乃胎瘡五臟各具一症肝為水疱肺為膿疱心為斑脾為疹腎為黑隔此乃肝臟之症喜皮肉厚堅而色蒼臟若皮薄色嬌不可治也乃以四君子湯加黃耆防風牛蒡母子同服十三日安

梁大尹公子出瘡起發時多成膿泡曰此險症也治晚

矣越二日瘡瘁作而殞

鄭氏子九歲出痘起發時額上兩頰皆成膿疱曰逆痘不可治也痘症自有次序初出一點血化為水水化為膿膿成而毒解矣如苗而秀秀而實今方苗而秀恐早發還先萎也七日後更論未及期大瘁而死

痘夾斑痘

徐仲光治一兒發斑身熱口燥舌干化斑湯及小柴胡湯加黃連而愈

一兒發斑嘔吐利下目赤口瘡黃連橘皮湯治愈

一兒發斑狂煩面赤咽痛梔子仁湯治愈

一痘後發斑紫色身熱便秘過于温補也四順清涼飲及解毒化斑之劑而愈

一夏月發斑咽痛升麻葛根元參甘草桔梗牛蒡子治愈

一發斑因于胎毒治以犀角地黃湯砭去其惡血而愈有用犀角大青湯犀角解毒湯

一發斑紫色煩燥便秘溺赤此毒盛也用黑奴丸而愈

一發斑赤色腹脹便秘此內傷也調胃承氣湯下之反肢厥脈沉附子理中湯六君子湯治愈

一夏月發斑由於暑毒毋用化斑湯合香薷飲而愈
一夏月發斑熱盛狂煩此瘟毒也用五瘟丹黄連陳皮
湯治之而愈
一發斑身熱頭疼咳嗽由于風熱芎藭散葛根湯愈
一症出渾如錦紋而間有顆粒色赤壯熱煩躁舌胎便
秘此斑疹並出調胃承氣湯又用白虎湯合葛根湯
而愈
萬容齋治羅氏婦年二十七出瘟遍身紅斑如蚊迹咸
謂不治視其神識精明語言清亮診其六脈調匀問
其飲食如常大小便調不煩不渴但遍身紅斑稠密
無縫色且豔曰此夾斑瘟也解去其斑則瘟自見以
荆防敗毒散加元參升麻作大劑一服次早斑退瘟
顯再一服瘟起發調理半月而安
本邑各衙出瘟先二衙一子一女出長子後發熱見紅
斑疑是夾斑症三四日後其斑盡收熱退身涼瘟不
出又四衙衆出瘟一子發熱亦出紅斑亦已恙乃信
人有不出瘟者或發斑或發疹或發水瘟皆可折過
也必在正出瘟時方論

瘟夾疹

徐仲光治一疹後報痘不易長大干咳連聲不續此過于發散也保元湯加貝味甘吉橘紅而愈

一疹後出痘失于解散咽喉腫痛聲啞水喰飲食不進倒靨而死

一疹後痘出三日痰嗽喘急亦失于解散甘吉蒡喬陳枳殼蟬蛻蘇子疎邪解毒清金而愈

一兒身熱咳嗽疹出隱隱以藥發之而不見不設此風寒鬱而不散乃癮疹也非正疹論芎藭散治愈

一兒痘出數顆而夾疹遍身圓朗紅活兩日盡沒有識者曰痘沒者必悶亂煩躁此却安靜且正痘宛在乃疹沒非痘伏也以平劑調之而愈

一痘報點粗肥有紅盤間有細密隱隱者此水痘夾疹也內症安寧但表邪宜散葛根湯加荊防翹芷二劑而愈

一水痘不膿而乾枯身熱煩躁此失解同于倒陷也治以葛根湯加荊芥防風連翹牛蒡木通蟬蛻遍身發紅點此餘毒散也又用荊防解毒湯而愈

萬密齋治一女二歲出痘遍身紅點大小相襍無空處此夾疹夾斑痘也以升麻葛根湯加荊防元參翹蒡淡竹葉木通一服減再服再減三服痘顯而愈

瘡夾丹

徐仲光治一瘡匀朗不易肥大淡白少神煩躁不寧因頭上素患肥瘡太甚耗洩真氣故也先用白芨膏紙封頭瘡後用保元湯而愈

一瘡正面匀朗綻突少神身肢平塌色暗因手足膿疥腫痛洩氣故也恐漿雖滿不能收功用保元湯加芎蘇耆芍歸甘陳防桂术調理而愈此症雖補而不保脾則必致泄瀉而不能收功

一瘡靨後手搔瘙痒遂發血風瘡用苦參卮翹防風獨活茨仁黃芩蜜丸服并灸風池三里二穴各五七壯愈

一瘡出膿疥後見其疤痕黑大有似疽疔須審頭面瘡顆明初起疎散涼血七八日後根窠紅黑不消亦宜涼血解毒十一二日根窠淡紅宜生血補劑愈

一兜瘡三日耳前紅腫如桃用葛根湯加荊芥防風桔梗牛蒡而愈

一瘡匀朗紅潤左腮腫塊青紫熱甚煩躁此瘡先塊後名鬼揑真惡候也急與紫金救焚散而愈此症若治遲必攻毒于心發驚竄而死

瘡失血

徐仲光治一瘡發熱時衄血宜發之升麻葛根湯加荊芩而愈

一瘡四朝吐血瘡腦淡白煩躁譫語妄言肢冷身涼此本血熱毒壅未盡而服涼藥攻伐之故令血脫毒解而虛矣宜先益氣保元湯加薑附芎歸蟬芍糯米而愈

一瘡正起發而便血急隋減食作渴肢冷此皆脾虛也四君子湯加升橘炮薑而愈

一瘡八日根窠赤腫脹痛煩渴飲冷便下黑血此熱毒內蘊也犀角地黃湯治愈

一瘡收靨便下紫血此脾弱而熱傷陰絡也歸芍六君子湯加炒黑荊芥又獨參湯治愈

一瘡收靨身熱咳嗽聲啞鼻衄此火刑肺金黃連解毒湯加麥冬犀角丹皮知母牛蒡而愈

一瘡靨後咳血不已此毒鬱于肺清金開鬱解毒而愈

一瘡靨后便下紫血此毒鬱滯下鬱金五錢牛黃一錢每服五分燈心湯下

一瘡后瀉泄糞後下血此脾弱也小異攻散加升麻地

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

榆黃連小柴胡湯而愈

一瘡後血淋乃熱結下焦也知柏通地小薊根藕節歸滑甘草梢竹葉服愈

一女六歲標點吐紫黑血甚多然而唇舌滋潤形色俱順神寧氣旺竟無羔因女之父素有血症乃遺稟非毒也故不解毒不補脾而收全疤雖險而症與神自順未可以見點吐紫黑而死也

萬密齋曰里中林霄年二十餘染瘡初發熱小便血予聞之曰不可為矣或問故曰乙未春薪水桃村坳徐氏出瘡死者十八人皆小便血也霄越三月殞

瘡傷食

萬密齋治李氏女瘡膿成將靨忽腹脹痛且氣喘呻吟曰瘡既胖壯膿又飽滿其脈弦滑此非瘡毒乃傷食也脾詢之因食雞肉糯米飯曰宜急下之或謂瘡瘡首尾不可下恐虛其裡不靨也曰病不執方藥貴對症有是病則投是藥下之無妨遂以原物作湯吞丁香脾積丸得利而安

金氏子瘡成膿時忽腹脹作痛氣喘煩悶其瘡光壯飽滿非毒也必曾傷食果因麵食過飽亦用前方法得

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

利病稍定再用錢氏異攻散加青皮山查一服愈

費建中治嚴孝廉子六歲丙戌仲夏見痘乾紅色滯頂
隔不鬆身熱如烙煩躁不寧按其胸膈愁痛口噯腐
氣此毒火內伏中宮停滯也以大黃二錢青皮錢許
蟬退荊芥赤芍紅花地丁用山查一兩煎湯代水連
二劑下宿物甚多痘頓起色燄赤前方加黃連生地
漸放白成漿第熱未和前方服至十二朝始收效

費建中子二歲孟夏見痘壯熱昏迷乾紅稠密然得分
珠亦不腳塌至三日絕無起勢氣粗頓悶轉矢氣極
臭曰痘前食一苧頭圓子重以枳實山查桔梗前胡
廣皮麥芽赤芍蟬退牛蒡去結囊甚多即起發紅潤
後雖甚密幸獲收功

施氏子痘始事者極其升發四日不起狂煩叫喊至啞
目時上竄視其根窠尚在但稠密磨紅頂陷乾滯身
反涼按其胸膈手足皆起診其右手寸關洪滑而實
此內積重而閉塞也以枳實五錢青皮前胡各三錢
桔梗五分佐以荊芥蟬蛻用山查二兩煎湯代水連
夜進兩頭汁次午又進一劑下午去宿垢極多猶有
雞肉未化者將晚又行一次仍多即頓然起發神安
身大熱色未轉以得通達火毒發見于外也改用涼

血清解色漸紅活潑漸肥濃而收效

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷三十九

錢塘魏之琇玉橫撰

痙 寒戰咬牙

徐仲光治一痙六七日不起脹寒戰咬牙腹脹氣急用奇攻散補中益氣湯而愈

一痙初發熱時惡寒身振動此邪正交爭欲出不出也用升麻葛根湯加人參防風桂枝山甲及補中益氣湯調理而愈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一瘄未出齊而手足搖動以異攻散投之而更甚此假寒實熱木氣太過而薰火化也宜平肝制火升麻葛根湯加川芎柴胡防風而愈

一瘄發熱時咬牙此肝熱風也羌活湯加葛芎服合導赤散服之而愈

一瘄發熱時悶瞀咬牙此肝熱風也羌活湯加葛芎服之而愈

萬密齋長孫二歲染瘄發熱三日內忽寒戰似瘧其父泣曰死矣乃笑曰爾為醫救病如箇工然忽遇風浪手足自亂何以濟人此兒元氣充盛毒氣微少邪不勝正故作寒戰而退試觀其瘄必少也果止五七粒七日愈

一兒瘄初發熱便咬牙戛戛有聲精神昏憒此逆瘄也乃腎虛症蓋腎主骨齒者骨之餘腎水不足則毒火無制火氣扇動故上下相戛有聲陳氏所謂齒槁者是也果卒

一兒瘄甚密曰此兒脾胃素弱當用補胃之劑使血氣旺而瘄易成就也不聽至成膿後過期不靨遍身潰爛寒戰咬牙失音煞異曰此戰乃遍身潰爛坐臥艱難不能自任非鼓領寒戰也咬牙者齦瘡痒相戛而

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

嗚非神昏門齒也失音者故得肉食不與之日夜啼哭得之非咽爛噤水也用調元湯加白芷防風暗入熟附一片三劑而安

瘟 寒析

徐仲光治一瘟五日形色少神腹脹喘急腸鳴肢冷或擬內傷者或擬陷伏者殊不知內傷者按必痛陷伏者必煩悶今若便利安寧而虛鳴者乃陰陽二氣不和傷冷之症或服涼藥也經曰中虛不足則腹滿腸鳴以理中湯加木香陳皮官桂等疏逐冷氣諸症悉平又以補中益氣湯調理而愈

一瘟因春夏久雨為寒濕之氣所侵不能起者五苓散加蒼朮防風多服之佳或平胃快斑湯

松江黃綺雲療徐氏兒瘟兒幼遇冬月瘟不起爐炭圍爐抱兒火邊以酒漿抱火火氣熏兒瘟立起廣筆記

費建中治朱氏子稠密乾紅或以色滯便以清火蕪升發累日不起見其鼻流清涕身涼且靜時在春初寒風凜凜此熱毒輕而感寒重毒火為外邪所閉也以溫肌透毒散陳皮換荊芥連二劑身漸暖頭起發次日鼻塞眼封而瘟發煌身漸熱清解治毒調理收功

一兒稠密不鬆着愁腹痛不寐毒盛也蒼白乾滯渴吐稠黏頭溫足冷邪閉也急疏風攻毒四朝體漸熱瘡漸起色漸紅活但筋脈時惕以活血驅毒而愈

一兒三日目紅鼻塞欬渴甚濃氣粗熱壯瘡甚稀色滯乾紅無甚內症以荊芥穗葛根前胡黃芩牛蒡木通丹皮蟬蛻青皮赤芍三劑起發沛然六日肥綻順叙收功

瘡 厥逆

徐仲光治一兒瘡四日瀉泄無度四肢厥冷瘡點隱隱其瀉已旬日脾虛以附子理中湯數劑瀉減肢溫又以補中益氣湯加肉果官桂瀉止後竟用補中益氣湯調理而愈

一兒瘡九日色灰白瀉泄厥逆氣憶陰陽不相順接而四肢為之厥冷也用陳氏異功散而愈

一兒瘡過期不斂便瀉安靜四肢少溫但脾氣不足用參附荅陳甘芍山藥木香肉果治之破損不成痂而愈

一兒瘡七日肢厥減食乃血熱而過服冷劑以致米伏也保元湯加丁桂炮薑而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一兒瘡六朝綻突焦紫煩躁悶亂喘促厥逆乃陽毒陷伏厥深熱亦深也以四順飲行二次諸症悉平又清解之而愈

一兒瘡四五日毒已出盡形色無神二便自利四肢厥冷腹脹發噦裡氣虛弱也稍遲則胃氣脫矣急以理中湯連進二服內氣一暖瘡即發光紅活四肢溫暖又以補中益氣湯加丁香噦止而愈

一兒醫後自言手足冷及按之反熱夜卧不安經曰外熱而內冷者脾弱也內熱而外冷者胃弱也夜卧不寧脾陰不足也用歸脾湯而愈

一兒瘡後手足厥冷乃脾弱不能夢達四肢用保元湯加當歸白朮附子炮薑而愈

瘡 昏冒

萬密齋治汪氏子瘡靨後忽然悶絕目開口合令作調元湯加麥冬濃煎灌之又與粥湯遂愈此正氣素弱邪氣方盛壯火食氣氣益弱矣今邪氣既退正氣將生乃否極泰來之兆所以戒勿擾亂待其自蘇人不知此卒見悶絕或呼喚抱持神氣一散不救者多矣或謂恐有餘毒曰餘毒有三一者瘡二者癰三者目

赤未聞有昏瞀也凡痘疹或出不盡發不透或空殼無水或清水非膿則有餘毒今起發胖肚膿漿飽滿何餘毒之有哉

痘驚搐

徐仲光治一兒卒仆驚搐甦而復作此風寒壅毒紅綿散治愈

一兒驚搐誤以驚藥涼其心痘不得出而死

一兒初熱發搐以升麻葛根湯加天麻鉤藤木通蟬蛻枳殼痘出而愈

一痘見點發搐此心無虛而客邪以四物湯加茯苓遠志菖蒲棗仁蟬蛻而愈

一痘初點驚搐不止此心脾虛而血少失治十六朝卒

一痘出二三日驚搐此毒不透心經有邪導赤散加蟬蛻黃連紅花天麻鉤藤石菖蒲而愈

一痘出未盡驚搐且瀉泄肢冷異攻散四劑愈

一痘漿期驚搐不止安神養血凡而愈

一痘后驚搐吐瀉肢厥目直痰鳴此中氣不足補中益氣湯為主煎醒脾散附子理中湯下至聖保命丹而愈

一瘄后驚搐氣促痰喘口開目直二便開澁此類急驚乃風邪有餘症宜清涼解散瀉氣以天麻抱龍瀉青丸治愈

一瘄後過食白果驚搐痰壅目直腹脹喘急此氣滯生痰甘草湯薑湯漸與服得吐瀉而愈不可以風治之也

瘄 煩躁

徐仲光治一瘄未齊色赤壯熱煩躁清解之而益重此反水其毒也宜升解之升麻葛根湯加桂枝牛蒡檀

卅而愈

一四朝順瘄煩躁不食毒未盡也升麻葛根湯補中益氣湯而愈

一順瘄日夜啼哭不止此不勝火熾刑金也瀉清散導赤散加黃連而愈

一瘄少淡白不易肥而煩躁真氣弱也綿紙搓軟白芨膏封瘄服保元湯而愈

一瘄后夜卧不寧此胃不和而衛氣不得入于陰也四物湯加遠志棗仁龍眼肉及歸脾湯而愈

一瘄后身熱午前煩躁解毒清熱而愈

一瘡六朝不起乾紅煩躁此毒壅也過用保元湯而反悶亂焦燥乃以枳殼湯先解參芪之滯辰角地黃湯加蟬蓼紫草清其壅滯之熱七朝瘡色正後以保元湯調理而愈

萬密齋治邱氏子瘡正作膿瘙痒煩哭其面磊落紅綻膿漿未熟兩頰先乾皮肉木硬曰左頰屬木肝也肝主血藏魄右頰屬金肺也主氣藏魄兩頰木硬氣血不榮魂魄不靖所以煩哭也請藥曰欲解其毒則中氣反傷欲補其中則邪火正盛不可為也是夕加煩而死

瘡 譫妄

徐仲光治一瘡起脹色焦枯譫語此火亢極也以退火回生丹無比散治之而愈

一瘡潰漿期白色昏睡瞻語此血虛也保元湯加歸地芍冬茯神棗仁

一瘡后午餘發睡面赤譫語此火從虛發也保元湯加歸芍川連

萬密齋治胡三溪子瘡時常以手自掩面身下縮頻呼曰我怕若有所見者曰逆症也經曰腎敗者失志目

中見鬼死不治錢氏云腎病則下竅此瘡發于腎不可為也果然

一婦人年二十餘發熱五日瘡不出常起摸床壁昏不知人口喃喃不休曰死症也果然

周璜子年十三染瘡發熱五日瘡不出發狂譫語已進保元湯三劑矣曰誤矣犯實實之戒也凡瘡發熱之初驚者平之渴者潤之吐利者和之便秘者利之熱甚者解之如無他症不須藥令此子元氣素厚飲食風強乃以保元湯助火為邪毒氣鬱遏至于狂妄熱已劇矣宜急下之與三黃湯得利狂止瘡出至十七日

汪沙溪婢染瘡發熱顛狂曰熱極矣當速解之乃作三黃湯與服得利熱減神清瘡出而安

徐氏子年十七出瘡至膿成將醫忽發狂妄語起舞或毆人罵人皆平日仇恨者一身之瘡盡迸破祈禳不效乃用安神丸百粒作二次服良久始省問其所為

瘡喘急

徐仲光治一瘡稀嫩少神起脹時泄瀉而喘此氣虛也

補中益氣湯加肉果而愈
一瘖聲足痰喘便實此肺熱過于補也枳殼湯加連翹
牛蒡腹皮瓜蔞而愈
一瘖收鬱痺痂喘急腹脹因能食非倒鬱也保和湯愈
一瘖聲灌喘急用荊防桔枳杏冬貝橘紅紗鹽竹葉而
愈
一瘖喘急用白花地丁水煎服即止如神
一瘖後齁喘久不愈蜜炒麻黃半夏桑皮款冬花各一
錢白果肉五箇煎服數劑愈一云有甘杏蓊蘇子更
妥

一瘖後喘嘔不已用長流水揚百遍煎清上藥服愈
一瘖后喘急聲重寒客水侵肺也蜜炒麻黃桂杏車蓼
立甘艸而愈
一瘖后痰嗽喘嘔用阿膠糯米各一兩牛蒡兜鈴各三
錢杏仁三粒甘艸五分丸服愈
一瘖後泄瀉喘急此肺虛也人參一錢五味三錢煎服
而愈
一瘖后痰喘不已火侵肺也用芩連枳杏甘桔花粉紫
胡煎服而愈
一瘖八朝俱充灌因暑月汗多解衣熱為風抑忽咬牙

喘瀉一晝夜頰上有倒靨先用蘇防杏枳青陳芪术
葶貝前蠶得微汗喘緩次用震蟄丹三分隨以大青
丸三丸小青丸五丸大靈丸三分連進二服而愈
萬密齋治程氏子未一歲多笑知其心火有餘令以黃
連山庶辰砂為丸服之三日後笑漸少隨染瘟發熱
忽作喘候中涎響汩汩有聲此肺熱瘟率不肩息足
冷乃作清金散火湯一劑而減半再劑而喘定

瘟 欬嗽

徐仲光治一瘟五朝勻澤紅潤稀朗頂平悶痰嗽甚此
傷風失表邪客肺經但膿期患此難于補托用甘桔
前苓桑杏橘蒌而愈
一瘟六七朝不易起脹喘嗽吐食此毒壅也清解散而
愈
一瘟八朝順瘟但頂平痰嗽重此由失清解治以清補
兼行因不信藥十一朝聲啞喘脹倒靨而死
一瘟收靨厚而乾黑身熱咳嗽風寒客肺也麻黃湯愈
一瘟收疱咳嗽咽膈不利用甘吉翹旁陳皮射干元參
輩愈
一瘟後傷風咳嗽發熱用解表藥反汗喘用二陳湯加

桑杏查反加擂滑此脾胃虛弱也補中益氣湯加麥
牙五味鉤藤而愈
一瘡痰嗽諸藥不效用黑散子而愈
一瘡痰咳嗽連聲不續痰鳴欲絕嗽罷吐白沫面唇白
飲食少不得眠此虛而攻肺下痰過劑也小異攻散
加蘆半夏粉冬又用人參清肺飲而愈此救子益母
之法也
一瘡后咳嗽吐膿腥臭胸中隱隱作痛右脈數滑乃餘
毒在胸作內癰也用橘貝甘桔芩合翹旁知萎防已
并蒸百合服愈

一瘡後風寒痰嗽頻吐和食俱出以清金散治而愈
一瘡后咳嗽吐痾此脾傳胃也以六君子湯治而愈
一瘡後久咳不已腰背痛此腎咳也地黃丸加麥冬五
味子而愈
一瘡十二朝咳嗽旬餘不止服發表化痰藥多反吐膿
血此脾肺虛重傷真氣成肺癰也用桔梗湯而愈
萬密齋治陶氏子瘡將靨咳嗽喘急用甘桔湯加麥冬
牛蒡未效此肺有火邪火鬱宜發之乃去麥冬加紫
蘇地骨皮一服而安

瘖

嘔吐噦

徐仲光治一兒年十五血熱毒重而無顆粒正額畧見分珠而又稠密唇焦口腫舌有黑刺大渴先渴先羌活湯調下催瘡丹退火丹雖起發嘔噦特甚用芩連荆防翹蓼查蟬犀角鼈甲石膏大黃二劑瘖乃稍潤又加芍歸冬知甘桔生地丹皮紅花元參瘖漸滋長嘔噦漸止八九朝復嘔背瘖平塌仍用芍歸芩連蟬蠶翹防羌蓼陳藿石膏黃土澄水煎服隨以桑蟲漿雞腦各二箇入催瘡丹震熱丹各五分至夜狂跳作渴以陳冬米麥冬前湯頻飲至天明熟睡瘖轉而起灌米但大便溏數加芡术查橘炮薑人參三四分調理而愈

一兒成漿倒陷吐噦不止急用攻發藥以起其瘖于安胃藥中加參芡黑薑炒陳米白术黃泥澄水煎治愈

一兒標點噦吐面色枯口唇焦胃氣已脫毒不出三日死

一瘖六朝勻朗光澤外瘖順而胃氣損聞食則噦漿雖滿不能收拾蒼老變倒靨而死吐蛔者更重

一瘖後喘嘔以長流水揚百遍煎清上之藥服愈

一瘖後吐蛔氣血弱無穀氣以養蛔故出也二陳湯加生薑白芍川連連翹大黃治之而愈

一瘖後煩渴乳多則吐身熱喜涼此餘毒在胃竹葉石膏湯治之愈

一瘖后噦腐有用香砂丸刻伐太過遂變泄瀉而死

萬密齋治一兒瘖本輕因傷食腹痛而嘔用平胃散加砂仁藿香葉煨薑而嘔瘖變灰白用錢氏異功散加砂仁丁香柱而嘔止

一小兒因食生冷傷脾胃而嘔瘖變灰白用錢氏異功散加砂仁丁香柱而嘔止

一小兒瘖甚候舌都是將閉時嗆水嘔食雜膿血痂皮痰涎而出用甘桔湯加牛蒡頓呷之調理而安

一小兒膿成將靨忽作乾嘔雖飲食常自嘔噦其瘖不作膿不滿頂曰此逆瘖也乃誦木陳葉落弦絕聲嘶之言以告之後失驚悶亂死

庠生余光庭年十九出瘖膿成將靨忽作欬逆即噦也又名餲逆脈促而代或謂欬逆者惡症也促代者怪脉也瘖瘡順正飽壯明潤何以得此曰欬逆三症一曰胃寒二曰水逆三曰胃敗皆不相合經曰諸逆衝上皆屬于火此火氣炎上之象乃問其大便何如則自出瘖至今七日未更衣曰此燥矢壅塞下竅不通火炎上

竅故欬逆耳促代之脈得之氣逆脈亦逆也以猪脬導之燥矢欬逆即止而脈亦調匀而起

瘖

泄瀉

施季泉治一兒甫半歲身熱即見瘖皆以樹小花多頂平脚埔根窠燒薄為十死一生之症擬以六朝多用參芪附子施季泉曰此險症發痒必甚頃肴守嚴密竟用涼藥與前論迥別七朝果發痒作瀉一日夜二十餘行乳藥湯飲傾注而不變色季泉加炒黑黃連而瀉止十三朝復發痒口渴唇燥舌生白胎仍用炒黑黃連而斷確治效如神豈其先得訣于身一熱即見瘖而多且橋故預決其為險瘖發痒乎 廣筆記

一兒瘖瀉投以艸澁藥不效黃綺雲用白芍藥酒炒三兩煎服一劑即止此脾虛有熱也 廣筆記

一瘖虛寒將行驟時作瀉用炒蓮肉去心一兩雲南真鴉片五分共末白湯下兒小者三分大者五分瀉立止虛痒或虛煩躁不止亦如之若係火熱泄者不可

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

用也廣筆記

一血熱瘡蕪氣虛先用解毒藥毒清矣忽瀉日數行不止瘡漸平塌縻仲淳以炒蓮肉五分真鵝片半分米湯下立止王宇泰復用人參二兩黃芪三兩鹿茸三錢煎服補其元氣漿頓足而愈蓋因其先解毒盡故可補而無他症起也廣筆記

一瘡后脾虛作渴用蓮肉六兩參芪五味山萸扁豆各四兩白朮三兩棗肉為丸薑湯下此方移治老年腎虛脾泄瀉更效

一瘡寒毒重起發亦透八朝但頭面胸背膿漿手足止有清泡有用參芪米桔翹連蠶蛻薯即痰鳴不食身熱而嘔大便頻頻失屁意加歸芍查陳砂冬防朮元參石膏山豆根及便製人參蕪用牛黃抱龍丸八寶丹連進二三劑四肢漿足以後去人參止用清解藥而愈

一瘡起脹時忽瀉瘡色赤而稠根窠堅突便秘六日矣此血熱毒壅正宜瀉去其毒治以宣清解主人恐瀉耗其元氣用豆豉九保元湯加肉果官桂等劑雖收而目種赤四肢發癰始悔而用清解病根已深竟損一目廢一肢此症有同是熱瀉而用羼角地黃湯加

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

木通桔梗川芎提之而順愈

一瘡早起泄瀉飲食不化此脾腎不足四君子湯加補骨脂肉果又朝服四神丸夜服參苓白朮散而愈

一瘡隱隱不見面白神疲微熱飧泄此脾虛不能送毒也與攻散加通芎升蟬陳米瀉止瘡發補中益氣湯調理愈

一瘡六朝不起脹灰白昏睡四牙散木香散發之數劑愈

一瘡后瀉藥食俱不化此脾虛也參苓白朮散訶附九而漸愈

一瘡後泄瀉不已此脾虛也四君子湯加升防肉果又肉豆九而愈

一瘡后癰瘦枯槁溏泄不已咸謂脾弱理中湯小與攻散六君子湯皆不效知其乳母弱乳薄故也令易乳而安

一瘡後飧泄此邪熱不殺六君子湯而愈

一瘡后溺赤溏泄如糜腸中熱則瀉黃如糜此煎煉積熱也以五苓散加車前黃連神麯麥芽山查而愈

一瘡後傷食傷暑而瀉四苓散合香蘇飲加神麯麥芽山查而愈

醫學叢刻本

一瘄后夏月泄瀉腹如雷鳴服調脾藥不效此腸風殮泄葛根湯加防桂煨薑得微汗而愈

一瘄出未發盡利下赤白此血熱瘄壅有積熱也以葛根升麻湯加芍歸查麥蟬蛻稍減而目赤溺數聲角地黃湯補中益氣湯治愈

一瘄暑月六朝而利下黃赤膿血壯熱煩渴此毒盛大腸三黃丸薰補中益氣湯而愈

一瘄同而不治痢久漸倒腦二七而死故曰險者治之一歷期而利水穀不分完穀不化參苓白朮散芍藥獨參湯治愈

一瘄后利下蛔蟲此熱迫之也芩甘半芍烏梅川椒薑桂

食而不知節慎遂致莫救

一瘡后暑痢保和丸香茹飲間服而愈

一瘡後噤口痢用人參一兩陳皮黃連石蓮肉各五錢桔梗三錢胃風湯調理愈

一瘡后痢久不止積未盡而中氣不足用人參白朮白芍甘艸麻陳米大固中氣而愈

一瘡后毒入大腸而便膿血者牛黃散三黃丸犀角地黃湯黃連解毒湯而愈

一瘡臘月先瀉數日而後標點患痢無度用艸發藥不效瘡色淡白少神脈浮大無根大虛症也附子理中湯日進二劑積少減瘡點紅潤脈始有根然飲食不進用補中益氣湯加桂枝炮薑遂能食安寢漿雖充而完穀不化點不易結痂小異攻散加芍藥木香參苓白朮散調理而愈

萬密齋治胡氏子染瘡自利三日不止或欲進理中湯加訶子肉豆蔻曰不可此協熱利也宜用黃芩芍藥湯但觀其形色利當自止不必服藥次日瘡出利止一小兒發熱時自利大孔如竹筒狀清水流出逆症也此乃火盛于內肺金不行收令也以黃芩芍藥湯加烏梅一服而利止

萬之子三歲出痘至膿成將靨時忽泄瀉痘變灰白先
君曰此虛寒症命作木香散服之未盡劑泄止瘡復
紅活時隣人曾氏子痘出密甚將靨亦作瀉痘變灰
白且作痒來請藥先君即以前未盡劑與之瀉止痘
紅活不痒矣

蕭別駕女七歲出痘連服保元湯痘密甚曰表裏俱實
雖密順痘也不必服藥蕭江西永豐人彼處出專食
雞戒以不可食不聽日飲雞汁至膿將成忽大瀉日
夜五六次所下皆清水欲止之曰裏氣太實正須瀉
耳次日瀉益甚視其痘飽滿紅潤不與藥乃怒甚曰
保無他或欲進肉豆蔻凡力止之至第三日大泄水
一行曰瀉止矣問故曰此坐飲雞汁太多水雷薄腸
胃之間令瀉者名畜水瀉也水盡瀉自止與四君子
加陳皮調理而安

一痘將靨忽作泄瀉口渴飲水小便短少其痘胖壯紅
潤此內熱也用五苓散加黃芩白芍煎調益元散而
愈

一痘起膿成脓食一向溏泄未止用錢氏異攻散加木
香訶子肉服之愈

一痘成膿面部將靨曰渴引飲過多以致自利用白术

散服之渴瀉俱止愈

一瘡成膿少食忽作泄瀉不止變灰白用木香散豆蔻九膿之愈

一潸泄不止食少腹脹足冷瘡灰白色脈細無力此犯五虛不治必死

陳三農治一小兒瘡後泄瀉二年體瘦腹大善食此久瀉傷腎腎不納氣肝木火起脾無正火不殺穀故作瀉瘦削成疳耳用紅麴丸加艸果三錢服之愈

李季虬曰長兒瘡初熱即泄日十數行見瘡泄不止時醫以脾胃藥止之愈甚施季泉曰是在不治予強之曰止泄不難發藥中黃連二錢黃芩一錢一劑泄止予喜甚施曰非也毒火太熾故泄初泄時即以解利藥乘熱導之或可望生今遲矣過四日即欲解毒無及矣坐視七日死（廣筆記）

瘡吐瀉及蛔

徐仲光治一瘡不見出吐瀉不已服升發益甚此虛症宜溫補藥升發以透肌散六君子湯加升蟬薑桂陳米粟而愈以其熱靜瘡嬌也若執瘡未齊而不補真元反致伏陷矣

一瘡后吐瀉類霍亂此外感兼内傷也藿香正氣散藿香五苓散因兼晨食加味二陳湯治愈

一瘡后吐蛔乃氣血虛無穀氣以養蛔求食而出也二陳湯加麴連棗薑芍而愈

一瘡起脹肚蛔乃胃熱而久不能食蟲為熱迫但聞食漿半足若久不食而眼耕不止者土虛而木乘之必至腫消目開倒陷而死

費養恒治馮憲副孫兩目稠密無縫皮薄色淡身涼而氣則上湧出安蛔湯而愈然多有不治者雖瘡勻朗靜睡不合目而困倦面皖白吐蛔數條俱已死此虛寒而隣于逆者也以保元湯加芍歸肉桂山甲數劑絶無起勢乃加參三錢耆五錢熟附五分日二劑六日漸起色漸紅囊漸蒼老肢體亦暖參耆更加重附至七分幸不瀉又加熟地膏半盞鹿茸膏數匙十日漿肥濃神爽寢食俱安十四日收功因痂乾燥防餘毒以參歸化毒湯重入忍冬膏調理而安

費建中治姚氏子秋夜忽吐瀉三十餘次口不能合兩目失神身不熱瘡瘠涌出甚細密僅得分珠顆粒固滿却如水泡有頂無盤乃劇虛劇寒之症形象固逆辈氣血未離疏通之劑斷不宜用即與保元湯加白

木木香當歸熟地訶子等服至六日如常乃倍參耆
加鹿茸肉桂至八九日身得温暖窠囊覺厚漿水及
半而不蒼老前方去鹿茸肉桂訶子加白芍茯苓銀
花神麯食進而瘥夫虛劇之症補之不足尚可散孚
但今無是症矣

瘡 痢

萬密齋治張氏子瘡醫時面瘡潰腫膿水浸淫泄膿
血後重不食或作噤口痢治不效視其症乃倒醫非
痢也在瘡科中利下膿血痂皮者生水穀不化者死
在傷寒太陰經病論則曰熱畜于裡當便膿血勿治
利盡膿血自愈因思此疾不可急治乃故製藥延緩
以待之數日後度其膿血將盡乃用四君子湯加白
芍枳穀黃連木香一服後重除利稍止再服能食三
服瘡靡

瘡 大小便秘

徐仲光治一瘡十九歲標點時便秘至十二朝不行口
渴煩躁在尺脈浮大此陰不足而津液竭也參冬歸
地知杞枳殼兔絲子而便利

一瘡后食粽便結痛不可按手足搐搦大柴胡湯加酒麴二錢而行

一瘡後身熱便秘此餘毒結大腸也解毒湯利之而愈

一瘡后身熱便烯此辛熱耗液潤燥湯而愈

一十五歲血熱毒重瘡十八朝忽小便不利欲解不能起倒竟夕聞其大便已阻而不行者四日矣此有燥屎結于幽門後竅不通故前竅亦閉進以湯藥知小便益甚而不能出痛苦極矣且藥力未能達于至陰之下因用膽導法須臾二便皆通

一瘡正出而小便秘此氣為火食也導赤散疎解藥而愈

一瘡泄瀉溺澁此陰陽不分五苓散加車通而愈

一瘡陰陽分而小便少此肺脾虛也補中益氣湯加麥冬五味愈

一瘡溺澁為陰虛火炎爍肺六味地黃丸加冬味而愈

一瘡后小便赤澁知熱在膀胱導赤散加梔苓車前竹葉燈心而愈

一瘡后小便不利用五苓而愈甚陰囊漸腫此虛陰而滲利之復損其陰也六味地黃丸加肉桂半前又補中益氣湯調理愈

一老醫有孫痘既脫痂少腹脹小便不通衆謂痘後毒用利水解毒藥愈脹老醫忽悟曰此脾虛下陷也痘後無實症土堅則水清人參一兩大棗五枚生薑五片煎服愈廣筆記

萬密齋治庠生余光庭年十九染痘發熱五日不出三日未更衣脈細而數雖有下症元氣怯弱不可下也以膽導之不得通病者頁炕躁因思發熱日久毒流其中燥糞閉塞肛腸乾枯氣不得行血不得潤膽導力小不能通也自立一法取猪尿脬一枚以猪膽汁半杯密半盃三物和勻入脬中如作膽導法取下燥屎二十餘枚氣通熱解神清痘出此法外意也廣天民亦有此法

胡氏子出痘作熱作退足冷數日不大便先出者猶是紅點亦不起發此逆痘也或曰熱微毒亦微熱甚毒亦甚今熱不甚順痘也曰不然痘本火毒待熱而發如發熱而不煩不渴大小便如常精神清爽者此熱在表無邪毒火發越而痘易出易靨也若煩躁不安大小便艱昏昏喜睡此毒火內蘊不得發越表熱雖微內熱則甚今作熱作退者毒火往來也大便不通者毒火鬱遏也見紅點而不起發者毒火陷伏也足

冷者火極薰水化謂之逆冷也彼不以為然次日紅點俱沒煩躁轉甚猶謂此內收也翌日死

瘟 疫癘

徐仲光治一兒季春出痘感疫氣亢極便秘用十神解毒湯次以升發藥治之而愈

一兒季春出痘七朝順朗亢極便秘狂煩舌有黑胎芒刺痘空處隱隱有黑點此感疫失解也先用大承氣湯治之次以理氣血而愈

萬密齋云嘉靖甲午春痘毒流行死者十八九乃一厄也時有預服三豆子湯終不罹砂散者凡方書所載預解痘毒之法用之無效予思痘疹疫癘之毒因歲運災青之變難以藥解而人事未盡又不可諉之天數也于是檢閱古方于韓氏醫通得五瘟丹以五運為主喜曰此解毒神藥也依方修合施售與人但服之者莫不輕疎人皆神之因命之曰代天宣化丸

甘艸甲己年為君土　黃芩乙庚年為君金　黃柏丙辛年為君水　黃連戊癸年為君火　牛蒡子佐

山豆根佐

先視其年所屬者為君次四味為臣君藥倍用臣藥

減半佐視臣又減半共為細末于冬至日脩合取雪
水煮艾麻汁打麵糊為丸辰砂為衣竹葉煎湯下
萬密齋曰胡松山子出痘在黃氏懷半夜後此兒却在
地下蕭楚梧子出痘日中時聞蒜氣過胡三溪子出
痘有鴉日日聒噪胡淑卿子出痘近夜時樓上忽聞
桌倒聲視之無他王東樓子出痘有蝙蝠飛入室後
皆亦醫者病家亦
不可不知

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷四十

錢塘魏之琇玉橫撰

小兒瘖目

徐仲光治一兒瘖後目黑睛初起細白點大便順而目睛潮熱有用雞胜肝花粉威靈仙煮食其瞳神即高腫突出白睛紅腫徐用瀉青丸煎服兼用羽皇散五六劑而愈

一兒白睛生翳漸掩黑睛連用去風去翳涼血清熱等

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

藥不效即用瀉青丸及羽皇散間服數劑而安

註酒疑誤

花蟬蛻川芎膽艸各五錢 白蒺藜各一兩 谷精艸決明各二兩 旋覆一酒一乾下羽皇散 羊膽二箇 窯乃每服二錢鹽湯

萬密齋治蕭別駕女瘡後不戒厚味其俗有病者必服附子食雄鷄炙鬬元戒之不聽後兩目出淚爛弦此毒發于肝肝火旺也或曰目上下肥屬脾脾亦熱乎曰此目淚出不止浸淫潰爛也乃用瀉青丸去大黃加柴胡黃芩密蒙花密乃服半年而愈

雷邑丞孫瘡七日倒陷已與發出毒猶甚欲解其毒中氣素虛又致倒陷欲補其中恐助毒火又傷其目不如節飲食遷寒溫以待自安不聽乃服參耆溫補之劑後兩目果俱盲

王司訓子瘡後兩目畏明此肝火太旺宜服瀉肝散加柴胡蟬退黃芩初一劑用酒浸大黃乃畏苦不肯服果成內障目盲

蕭氏子瘡後目有白翳曰此瘡癥也治之無功果盲

徐淑道瘡不厭用陳氏木香散一服曰誤也必損目矣果首其一

周氏女瘡後目閉不開曰瘡順無餘毒必羞明症也乃

藥不效即用瀉青丸及羽皇散間服數劑而安

鷺不食炒鹽酒焙乾白蒺藜各一兩谷精炒決明各二兩旋覆花蟬蛻川芎膽炒各五錢羊膽二箇窓九每服二錢鹽湯下羽皇散

萬密齋治蕭別駕女瘡後不戒厚味其俗有病者必服附子食雄鷄炙閉元戒之不聽後兩目出淚爛弦此毒發于肝肝火旺也或曰目上下胞屬脾脾亦熱乎曰此目淚出不止浸淫潰爛也乃用瀉青丸去大黃加柴胡黃芩窓蒙花窓九服半年而愈

雷邑丞孫瘡七日倒陷已與發出毒猶甚欲解其毒中氣素虛又致倒陷欲補其中恐助毒火又傷其目不如節飲食遷寒溫以待自安不聽乃服參耆溫補之劑後兩目果俱盲

王司訓子瘡後兩目畏明此肝火太旺宜服瀉肝散加柴胡蟬退黃芩初一劑用酒浸大黃乃畏苦不肯服果成內障目盲

蕭氏子瘡後目有白翳曰此瘡癥也治之無功果盲

徐淑道瘡不靨用陳氏木香散一服曰誤也必損目矣果首其一

周氏女瘡後目閉不開曰瘡順無餘毒必羞明症也乃

試之向暗則開向明則閉不流淚此肝經火邪未除
耳用羌防歸尾川芎柴胡蔓荊密蒙花生甘艸淡竹
葉一服目開遍身痘癥腫凸再用四物湯加荊防人
參連翹甘艸而愈

周氏子九歲痘後出外忽頭腫兩目不開此非毒乃風
熱也用羌防艸柴芎峭蒿本蔓荊細辛甘菊黃芩治
之愈

王宵堂治從子懋銘痘後兩目生翳羞明特甚窗牖皆
以衣被覆蔽就明展兩眸視之則白膜已遍覆黑睛
淚如泉涌嬰科眼科投藥不效束手告技窮矣乃閉
戶而思目者清陽之竅也濁陰之所越也忽焉而翳膜是濁陰犯
陽之氣為君生地當歸養目中真血為臣羌獨防芎
並甘菊薄荷艸清陽黃芩猪膽汁車前茯苓降濁陰
為佐仍間服瀉青丸八劑而目開翳已去矣凡眼科
點洗之藥概屏不用止用檄欖核磨汁數上皮而已
蓋嬰幼柔腕點洗之藥必有所傷故也

費建中治一女三歲痘稀而綻突紅潤似可弗藥但烈
熱如炮叫喊不絕左目撅腫如桃以大黃生地荊芥
甘菊赤芍黃連木通地丁青皮自三朝及十四朝始

身涼回好目亦無恙

唇口瘡

徐仲光治一兒瘡稠密未起發而唇先黃熟目先虛開咽喉腫痛不能飲食徧身瘡俱平暗幸正額勻朗眼胞口唇雖腫而紅活以甘桔湯加牛蒡連翹山查荊芥陳皮人中黃等清利咽膈解其脾毒而愈

一兒瘡四朝稠密未起脹而口唇先黃熟乃內潰之惡候必為唇刺幸餘瘡光澤腳斂脾雖受毒根本猶固以補中益氣湯去白朮加牛蒡連翹山查繼以保元湯理中湯而愈

一兒瘡稠如綴粟平塌嬌紅血散不附唇口腫硬剝落一層又一層皮薄空漿破如血汁滴瀝煩渴皆為逆候但能食安靜有胃氣也用參朮連各二錢日進三服十四朝肢厥脈沈靜如死狀瘡皆倒靨心胸尚溫收日漸甦而愈

瘡 口疳

徐仲光曰一兒患血熱瘡後身發熱口臭成疳潰脫上齦門牙左顋盤牙唇紅乾裂左頰下亦紅腫如發毒

狀湖州沈三春方在後瘡集附外用抑陽散加葱汁酒漿調敷腫處若面腫而帶青紫色為實熱必成馬疽潰類不治矣令雖腫而紅活知為易發癰也內服犀角羚羊角黃連黃芩元參生地牛蒡桔梗甘草白芍花粉木通紫花地丁及牛黃散一二服或煎銀花一兩入廣膠一錢間搗甘菊花根葉汁沖入服之面腫漸平身熱漸退外吹牛黃一分珍珠三分黃柏青黛人中白硼砂猪膽製各四分不易斂加烏梅灰三分血竭二分龍骨一分因體虛又加人參象皮灰三黃製蘆甘石各四分又常以醋調雄黃末軟筆點入潰竅中

延至月餘而愈

咽痛

徐仲光治一兒患血熱瘡先用寒涼芩連犀角起發灌漿頭面身背俱濃但兩腿面凹陷不起用參耆托之反見熱渴煩躁大便溏泄多次咽喉腫痛改用清咽利膈山豆根麥冬川貝桔梗元參防風僵蠶山甲當歸白芍紅花生地山查陳皮蚯蚓牛蒡川連黃芩甘草而愈

一兒瘡後咽痛壅塞不通此餘毒留于心肺邪熱不泄

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

風痰壅盛先以桐油探吐服駝原散甘桔湯連翹牛蒡射干元參而愈

一兜瘖後真陰不足二火上行咽喉腫痛有以寒涼治者愈而復腫原其火為寒鬱先以附子理中湯驅其寒次宜壯水之主六味地黃丸加知母麥冬元參治其本外吹葛橿散而愈

一兜瘖後脾胃不足陰火上炎咽喉腫痛以四君加甘梗知柏川連牛蒡而愈

一兜瘖後咽喉成疔以紫萬地蜈蚣等分煎成加犀角磨汁和服而愈

萬密齋治馬氏子五歲瘖不起發曰此順瘖也毒甚者則頭面腫毒微者則頭面不腫非不起發也又呼咽痛曰此瘖家常病喜喉舌無瘡頸項間瘖稀不足怪也以甘桔湯加牛蒡煎細細咽之咽痛即止

瘖 瘡

萬密齋總李氏年十八瘖成膿時經水忽行下血塊且多未踰日瘖失音問之但搖頭垂淚凡瘖變黑歸腎宜有瘖失音之症今已成膿飽滿紅潤何以有此逆症思之良久乃得之經云婦人重身九月而瘡者少

陰之脈不榮于舌也手少陰者心也心主血諸瘡皆
[illegible] 疑即萎宮 之火內起于心迫血下行故經血來也
萎

血去則心虛不能上榮于舌故舌萎縮而猝失音也乃以生血散去五味子加當歸生地服之頃之愈後以十全大補湯調理而起

蕭氏子三歲出痘將醫時忽失音啼哭有聲但言語重濁不清亮曰此肺熱也以甘桔清金散服之而安

瘡 發核

徐仲光治一兒痘十朝外左上齦潰爛外頰紅腫外治用仰蜀文司愈汁酒漿搗敷每日一換不用紙封內疑菇之誤 化粉生地丹皮元參山慈菇貝母翹蓼芎桔連苓歸芍先以銀花一兩煎汁煎之頰腫口瘡漸平月餘忽發夜熱左腮下生一核大如李色白按之而疼外治硼砂一錢五分膽礬五分麝半分燒酒薄薄調勻新筆醮塗內服荅羌翹蓼甘芍元參前胡貝母膽艸山庀亦以夏枯艸二兩煎汁煎之連進四五劑而愈

瘡 腹痛

陰之脈不榮于舌也手少陰者心也心主血諸瘡皆屬于心瘡毒之火內起于心迫血下行故經血來也舌者心之苗血去則心虛不能上榮于舌故舌萎縮而瘖失音也乃以生血散去五味子加當歸生地服之頃之愈後以十全大補湯調理而起

蕭氏于三歲出痘將醫時忽失音啼哭有聲但言語重濁不清亮曰此肺熱也以甘桔清金散服之而安

瘡 發核

徐仲光治一兒瘡十朝外左上齦潰爛外頰紅腫外治用抑陽散同葱汁酒漿搗敷每日一換不用紙封內服紫花地丁花粉生地丹皮元參山慈菇貝母翹蒡芎桔連苓歸芍先以銀花一兩煎汁煎之頰腫口瘡漸平月餘忽發夜熱左腮下生一核大如李色白按之而疼外治硼砂一錢五分膽礬五分麝半分燒酒薄薄調勻新筆醮塗內服荅羌翹蒡甘芍元參前胡貝母膽艸山庶亦以夏枯艸二兩煎汁煎之連進四五劑而愈

瘡 腹痛

徐仲光仁端錄治一瘡未盡出而腹痛噯腐吞酸大便
酸臭乃飲食停滯也保和丸二服而愈
一瘡起脹時不易行發肢冷腹痛乃血熱瘡而過服冷
劑理中湯加肉桂木香炮薑一劑而愈
一瘡后傷食腹痛本中氣不足宜補瀉兼施香砂保脾
丸又補中益氣湯調理而愈
一瘡後能食易化腹痛此胃熱易飢脾弱不能消磨釀
積而痛也補中益氣湯加芍藥木香黃連治之而愈
一瘡發足不易靨腹脹發熱面赤午後益甚按之腹不
痛乃脾虛血少也歸芍六君子湯加陳皮薑棗數服
而愈
費建中治錢銓部女平時內熱素瘦仲夏瘡而熾熱腹
痛異常不能轉側口極穢榮滯稠溶但不細碎幸初
起毒雖盛未有定位以大黃四錢石膏七錢生地六
錢黃連一錢佐以山查荊芥葛根赤芍桃仁地丁紅
花地龍臨服和豬尾膏盞許服至六日色漸肥紅放
白腹痛少緩餘未減仍前方至九日發甚充而腹痛
熾熱尤甚眼封而角流血譫語不寐不食前方加犀
角倍大黃生地石膏減豬尾血臨服以化毒丹調入
牛黃一分珠末二分十二日頭面發臭方日進粥三

次皆椀許而腹痛與熱依然至十八日始大轉自始至終一方收效如此治驗多矣聊舉此以堅其餘

瘡 腰痛

疼 或當作痒

八年十八初熱腰痛點發在額角紅綻光澤心經順症非腎逆候亦宜滋腎六味地黃丸料加杞子杜仲與升發之藥間服痛止瘡出至八朝煩渴譫妄唇燥舌黑睡卧不寧此乃腎水不足以制火也保元湯加歸芍冬杞棗仁龍眼肉間服八味地黃丸加麥冬枸杞漸愈有一症同但補陽而不滋陰

竟枯涸疱粘不脫而死

一兒初熱腰痛如折此折腰瘡也強以荆防敗毒散發出點如蚕斑口鼻出血而死

一兒初熱腰痛連背脊不能轉側點見左耳側及腰左一點如筯頭大平而紫又舌中心一點辣而黑此腎毒逆候也急以四牙散發出紫黑點五日死

一兒孟夏發熱腰痛甚見點稠密紫黑幸有神而胃氣強元氣實雖逆尚有生理四朝以四牙散一服又化毒散送下地黃丸二服次日瘡起但色未轉以黃連解毒湯加葉蔓歸芍地黃而愈

次皆椀許而膜痛與熱俱依然至十八日始大轉自始至終一方收效如此治驗多矣聊舉此以堅其餘

瘡

腰痛

徐仲光治一痒友年十八初熱腰痛點發在額角紅綻光澤心經順症非腎逆候亦宜滋腎六味地黃丸料加杞子杜仲與升發之藥間服痛止瘡出至八朝煩渴譫妄唇燥舌黑睡卧不寧此乃腎水不足以制火也保元湯加歸芍冬杞棗仁龍眼肉間服八味地黃丸加麥冬枸杞漸愈有一症同但補陽而不滋陰

竟枯涸疤粘不脫而死

一兒初熱腰痛如折此折腰瘡也強以荆防敗毒散發出點如蔘斑口鼻出血而死

一兒初熱腰痛連背脊不能轉側點見左耳側及腰左一點如節頭大平而紫又舌中心一點紺而黑此腎毒逆候也急以四牙散發出紫黑點五日死

一兒孟夏發熱腰痛甚見點稠密紫黑幸有神而胃氣強元氣實雖逆尚有生理四朝以四牙散一服又化毒散送下地黃丸二服次日瘡起但色未轉以黃連解毒湯加柴葛歸芍地黃而愈

一女年十四瘡正潰足忽腰痛不能轉側此經血去多之故六味地黃丸加歸芪續斷杜仲治之而愈

一男子年十八瘡后四十日外忽腰痛極兩手撒目開無光汗出遺尿喉聲如鼾六脈浮大此恣慾房勞而陰陽離決也以艾灸氣海穴二十壯四肢活動又以獨聖湯頻服及八味地黃丸而愈

一男子年二十瘡後腰痛左尺脈弱房勞所致也以八味地黃丸補中益氣湯相間服而愈

一瘡不起而腰痛繆仲淳用人參蓋三兩煎服一吐而瘡起痛止毒在下吐以牀之吐有發散之義也廣筆記

一好瘡綻朗而色淡紅兩腿痛甚腿亦屬腎此陰虛而毒乘之也活命飲二劑痛稍止十全大補湯六味地黃丸間服而愈此症不早治及四肢厥冷則變黑變黯而死與腰痛之逆相仿不可輕視之也

一兒瘡后足脛痛甚不紅腫氣血虛不能榮養筋骨也歸芍四君子湯加牛膝獨活汝仁桔枝連數服而愈

一兒年十四瘡后腰脊痛不能俯仰午後潮熱此骨髓枯少水不勝火腎氣熱也炙崑崙穴中脈穴各三壯又以六味地黃丸加獨活及補中益氣湯間服而愈

萬密齋治一富家子年十六患瘡發熱腰疼問曾婚否

曰未也連進人參敗毒散二劑痛止瘡出而安若曾有房室不可治也

李季虬曰顧叔夏次郎出瘡而先腰痛予斷以不治果殤施季泉曰凡成婚或破陽後出瘡而腰痛者可療童子而腰痛是先天之水不足也不治 廣筆記

費建中治童(繼美)年近三旬季冬忽腰如杖昏憒如迷問之不答身體振振肉瞤筋惕瘡之象也但腰如被杖其症必逆用大黃山查各六錢青皮羌活桃仁各二錢佐以荊芥乾葛元參乘初起預攻庶望轉機于萬一若見瘡腎已受傷無及矣自申至卯連服二頭煎次早發出如疹如砂色焦紫上下無容針之隙形色既逆神情又惡辭弗治曰苦懇乃用大黃八錢石膏一兩黃連二錢生地兩半佐以荊芥羌活葛根牛蒡紅花桃仁蟬蛻等加頸地龍每劑十條又以猪尾膏半盞和入連進二劑次日如茶如砂并焦紫色即退顆粒分明紅活但窈而神昏熱熾前方服至九朝雖圓綻如珠漿黃如蠟而不暢水米不沾議者謂寒涼大過曰如果蕩滌傷胃既則氣血之本漿何由得至十日正面有回意仍不思食乃用大黃石膏各一兩生地兩半黃連山查

四錢佐以牛蒡荊芥甘草十二日胃忽開神爽熱和十五日諸症悉愈痂如松皮後又口疳齒牙幾落又服牛黃珠末并黃連解毒湯十餘劑漸愈月外又發血風瘡身無完膚此腎傳脾故為輕症將百日始霍然是症當危疑之際旁議紛紛幸病家有識故得收效云

瘡 手足

徐仲光治一兒瘡後瀉泄腿腫睡臥不寧足三陰虛也四君子湯加陳皮歸芍枸杞薄鴻石斛川牛膝繼以八味丸而愈

一兒瘡後勞役痢雖愈而脛膝結核成鶴膝風此足三陰虛邪襲之也驅風散閒八味丸茲仁牛膝兔絲當歸

一兒瘡先從足底出起逆上至頭面回至心窩內攻而死此症早治使其頭面出齊重用艾提保元湯加川芎護之謂以黃連解毒湯一劑使其起灌收痂自獲上而下可俏無事

四錢佐以牛蒡荊芥甘草卅十二日胃忽開神爽熱和十五日諸症悉愈痂如松皮後又口疳齒牙幾落又服牛黃珠末并黃連解毒湯十餘劑漸愈月外又發血風瘡身無完膚此腎傳脾故為輕症將百日始霍然是症當危疑之際旁議紛紛幸病家有識故得收效云

瘡手足

徐仲光治一兒瘡後溏泄腿腫睡臥不寧足三陰虛也四君子湯加陳皮歸芍枸杞澤瀉石斛川牛膝繼以八味丸而愈

一兒瘡後勞役痢雖愈而脛膝結核成鶴膝風此足三陰虛邪襲之也驅風散閒八味丸玆仁牛膝兔絲當歸

一兒瘡先從足底出起逆上至頭面回至心窩內攻而死此症早治俟其頭面出齊重用艽提保元湯加川芎及先獲心以黃連解毒湯一劑使其起灌收痂自上而下可保無事

續名醫類案卷四十

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷四十一

錢塘魏之琇玉橫撰

瘡 膿期

徐仲光曰一瘡養漿而內却無水乾涸空虛此氣虛伏陷也若得人事清爽飲食如常瘡無損處宜補中益氣湯歸茸湯主之若喘脹嘔泄煩悶外剥者不治

一瘡漿充滿根血淡紅痰涎涌盛日晡潮熱皆謂氣血不足以保元加苓歸貝母陳皮治之不愈不知此乃

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

陰虛火盛生痰也以六味地黃丸料內加參附肉桂
温之而痰絶熱去又與補中益氣湯而愈
一瘡漿克滿痰盛少食便溏此乃脾胃虛弱不能運化
精微津液凝滯所致以六君子湯加炮薑
一瘡漿足忽泄瀉身冷自汗此乃脾胃氣虛也以保元
合附子理中湯愈或加肉果
一瘡漿不易充足而色淡白亦脾胃氣虛也以大保元
保元加白朮白芍陳皮官桂蓮肉收厚斂而愈若收
湯主之又歸茸湯益之
一瘡漿足而色不易蒼蠟乃脾弱之故脾主結痂也用
如麩薄只以參苓白朮散主之
一瘡七日無漿倒靨獨根窠斂束以保元加山甲官桂
又以水楊浴洗頭面手足良久復起成膿而愈
一瘡九日正面平塌無漿自足以下俱紅綻能食便溏
乃元氣不足不能上升于面以保元加白朮白芍官
桂肉果升麻十一朝空地補出贈瘡諸瘡俱行漿又
與異攻散而愈
一瘡正面漿足結痂身肢無漿能食便溏完穀不化乃
脾陰不足不能以充灌用參苓白朮散加附子兎絲
肉果又與河車散而愈

一瘡八日空殼無漿回氣血不足不能振作以制其毒用補中益湯治之發疔四五處而愈經曰發癰發疔者生也

一瘡八日倒靨灰白色泄瀉煩渴咬牙寒戰此乃氣血虛寒也以異攻散治愈若治之不止反加昏悶者死

一瘡八日頂陷漿滯不行色見焦紫乃風寒壅塞腠理氣滯血凝之故宜升提發散之劑內服紫蘇飲外浴水楊湯使藥氣藉湯氣上升毒隨煖氣而發若兒弱只浴頭面手足瘡即光潤隨服補中益氣湯調理凡用此湯須量氣血充足的為風寒所閉則可若浴後不起又加悶亂者死

一瘡養漿時昏睡不甦便溏能食乃脾主困困便而脾虛倦怠而昏睡也歸脾湯加白芍山藥米仁蓮肉愈

一瘡漿充足忽爾一齊結痂而收之太急乃倒靨也投以補益攻發之劑十四日四肢腫痛成癰膿成毒化若不食便溏噦噫則為內虛倒靨毒歸于內喘脹而卒

一瘡漿不易充足根血赤色煩渴溺澁舌燥便秘皆云氣虛而津液不足以保元加麥冬治之愈甚漿滯不行此乃血熱未解温補反助其邪乃火盛水涸之義

一痘一日全交無漿曰氣血不足不能振作以制其毒
益下証當有氣字以之發疔四五處而愈經曰發癰發疔
者生也

一痘八日倒靨灰白色泄瀉煩渴咬牙寒戰此乃氣血
虛寒也以異攻散治愈若治之不止反加昏悶者死

一痘八日頂陷漿滯不行色見焦紫乃風寒壅塞腠理
氣滯血凝之故宜升提發散之劑內服紫蘇飲外浴
水楊湯使藥氣藉湯氣上升毒隨煖氣而發若兒弱
只浴頭面手足痘即光潤隨服補中益氣湯調理几
用此湯須量氣血充足的為風寒所閉則可若浴後

不起又加悶亂者死

一痘養漿時昏睡不甦便溏能食乃脾主困困便而脾
虛倦怠而昏睡也歸脾湯加白芍山藥米仁蓮肉愈

一痘漿充足忽爾一齊收結痂乾紫能食便調此是火炟
而收之太急乃倒靨也投以補益攻發之劑十四日
四肢腫痛成癰膿成毒化若不食便溏噦噫則為內
虛倒靨毒歸于內喘脹而卒

一痘漿不易充足根血赤色煩渴溺澁舌燥便秘皆云
氣虛而津液不足以保元加麥冬治之愈甚漿滯不
行此乃血熱未解溫補反助其邪乃火盛水涸之義

更以辟角地黃湯又四順清涼飲利之前症悉平漿
滿而愈經曰毒未盡解而温補則毒蘊盛而不能化
漿也
一瘡九朝而死棄之沙灘視其手足動掣色雖焦紫形
尚綻突乃毒火閉脅一時而死得水氣而火滅故復
甦也抱回治以辟角地黃湯而愈亦有得土氣而解者
一瘡七日根窠赤痛便秘溺濇煩躁飲水或用清解之
劑未應乃熱毒內鬱也以大黃當歸赤芍甘州之類
一劑又與辟角地黃湯而愈
一瘡養漿時大便下血或尿血或神昏不醒或多睡蓋
心主血血虛邪乘而入心神昏亂之故宜辟角地黃
湯安神丸若治而不已者至二十日而卒若毒盡外
出當以補中益氣湯加麥冬棗仁
一瘡漿足膿俱紫黑熱盛便秘乃血熱毒壅也以黃連
解毒湯加翹蒡愈
一女季春患瘡妄言卓立日夜不得眠睡至七朝尚未
安寧視其形色俱順而妄言卓立者心膽火熾也以
辟角地黃加柴胡龍膽治愈
萬密齋治汪氏子瘡出膿成時頭面腹背皆飽滿惟手
足自肘膝至掌指猶未起發曰脾主四肢此子脾胃

何甚弱也乃由出胎失乳故用建中湯加黃耆防風一服盡起脹作膿矣其家信奉魯湖黑神此子寄名于神未出痘神先降壇云吾保老黑痘出必少至是痘出甚密乃以計逐之使去

痘

麻期附痂後

徐仲光治一痘漿足結痂忽爾紫黑稜氣觸也以十全大補加木香治之而愈

一痘收痂厚而乾黑身熱咳嗽乃風寒客肺也麻黃湯得微汗而愈

一痘痂如麩薄粘皮不脫昏睡內熱乃脾虛血少之故以調脾養榮湯治之

一痘收靨乾黑粘皮不脫身熱煩渴睡卧不寧有冷氣血不足大補之四七日枯槁而卒

一痘如前以犀角地黃湯加翹蓼治之火漸減而諸症悉平痂疕漸脫而愈此乃毒火彌熾之故經曰大盛則水涸此之謂也

一痘痂厚而乾黑粘皮不脫身熱煩渴譫語妄言睡卧不寧乃陰虛火盛也以四物湯合生脈散加棗仁

一痘清漿結疕如麩乃正氣不足不能化毒盡解以補

中益氣湯加山藥治之兩曲池發癰成膿而愈

一瘡膿淡白如麪便溏減食乃中氣不足用參苓白朮散加肉果陳倉米愈

一兒九歲出瘡匀朗綻突九日漿足能食便調乃恃其順而恣與之食以致肚腹脹痛停漿色滯用消化藥而便行安和瘡漿不長乃食物雖消正氣受傷當與調脾益氣助漿收斂竟不從治延至十四日漸內虛倒膿漿復化為水而始行補氣不效喘脹而卒

一瘡至十日十一日頭面將結痂膿漿尚未充足只是氣虛不能托毒于外急以木香散加黃耆蟬蛻而愈

一瘡十二三日上身已結痂下身尚灰白不充滿頭溫足冷以木香散加附子酒煮而愈

一瘡至十四五日徧身結痂將充但是足下未焦寒戰咬牙以十全大補湯加附子愈

一瘡至十五六日膿疱充足是當痂不痂又作寒戰咬牙只是不足治以補

一瘡如前頂突根綻此是陽火有餘胃氣大熱也服白虎湯一劑而愈 附

一瘡痂脫盡正額一瘡潰而不斂四九日作痒破出臭膿而聲啞悶亂而死

一瘡痂盡脫頭上一瘡不斂廿八朝忽痒甚出蛆盞許
亦聲啞悶亂而死

萬密齋治胡氏長女瘡甚密膿成過期不靨此女平日
脾虛食少性不服湯劑以錢氏異攻散加木香青皮
密丸來飲下調理而愈

胡氏子瘡甚密膿成不靨漸至潰爛自起發以來未得
大便此裡熱鬱蒸故不成痂欲下之彼謂此子素弱
不可下時有術士符水甚驗乃書一符焚而服之少
頃腹中鳴而利下清水衆皆稱妙因思久未更衣豈
無燥矢至次日瘡益潰爛乃用膽導法下燥矢三十
餘枚如彈子大衆又笑曰此法更妙瘡即收靨至腰
又不收益大便下後又未行也再用膽導去燥矢十
四枚後皆溏糞瘡盡收而安

一小兒因渴飲水過多濕傷脾胃不靨以四君子湯人
參補中白朮燥濕茯苓滲水甘艸解毒加防風以勝
皮毛之濕白芷以逐肌肉之水桂以利關節而去寒
水之邪砂仁以溫胃止渴調理而安

一小兒大便不通熱蒸于內而生濕致浸淫不能成痂
用當歸梢生地以涼血麻仁以潤燥酒大黃以瀉熱
開結生甘艸以和中得利而安

一小兜泄瀉不止食少此裡虛不能成痂用陳氏異攻散合肉豆蔻丸而愈

蔡氏子瘡甚密膿成過期不靨面瘡潰腫起止呻吟嗆水吐食語音不清或謂不治視其面瘡腫起正在貫膿遍身皆然非倒靨也嗆水嘔食者口唇腫硬吞嚥不便非咽喉潰爛也語音不清者鼻中壅塞氣不得通非失音也瘡毒盡出表病裡和可治也用苦參酒浸牛蒡白蘞蔥何首烏荊芥穗等分為末酒糊為丸淡竹葉煎湯下調理而安時隣居一兒症同謂不可治或問故曰彼過期宜靨此未成膿不宜靨一也彼腫脹猶實膿血此則面平目開皮脫肉乾二也彼喉舌無瘡此則咽舌潰爛嗆水失聲三也彼私與蔡氏求藥服之無效死

胡氏女十三歲瘡甚密或與參耆大補之二十日後過期不靨已潰爛幸非倒靨乃溫補過多裡邪盡出表毒不解慈宜解表勿使皮肉腐爛不信又踰五日不收乃用荊防升麻以解表白芷以蝕膿逐水連翹牛蒡甘艸以解鬱蒸之毒肺主皮毛因參耆之補肺熱已甚時值夏火正旺用黃芩以瀉肺中之火解時令之熱調理一月而安

盧文學妻李氏痘甚密未及成膿面瘡自破皮腫膿聚氣多腥臭過期不靨飲食漸少鑽候嗆水曰形症俱惡恐不得痊二十餘日殞

一小兒靨後復出一層小痘其家驚憂曰佳兆也痘科云輕者作三四次出大小不一等重者一齊湧出此痘最輕且無餘毒發已盡矣果然

吳氏子三歲出痘毒氣有餘穀氣不足食少故不靨也問服何藥曰無藥可解能食則生不能食則死次日思食所食且多曰死急矣問故曰謂能食者久不食而今思食自少加多胃氣復也今忽多食乃胃敗火盛邪火殺穀名曰除中出傷寒論猶膏之將滅必大明而後熄死在旦夕也果然

一小兒靨後痂皮不脫曰此脾肺二經不足也蓋肺主皮毛脾主肌肉其氣不足故痂難脫用錢氏異攻散加黃耆桂而愈

一小兒痘後一身盡靨痂皮盡脫惟頭與足不靨曰此常候也不必治蓋諸陽皆聚于頭乃陽中之陽謂之張陽諸陰皆會于足乃陰中之陰謂之寡陰孤陽生寡陰不育所以頭瘡不收者孤陽無陰也足瘡不汉者寡陰無陽也久當自痊但遲遲耳說文明允

一小兒痂落後其癜白色曰此氣虛也肺為氣之主其

此宜分兩行大字

色白當用參耆大補之劑否則有變不信謂瘡已收
完何變之有一月後大喘而死
雷邑丞孫瘡落痂月餘面瘢凸腫今始發洩也凡毒自
內而外者吉乃用當歸梢赤芍荊防連翹牛蒡元參
蟬退甘麻作散淡竹葉煎湯調服安
一小兒落痂後瘢內凸起作癰此風熱也用人參敗毒
散加減安後有患此者用荊芥敗毒散加人
楊湯未詳楊湯皆效
一小兒落痂後瘢毒不平曰瘡家戒食薑恐靨不齊瘢
不平也問之果然

一小兒落痂後瘢腫復成瘡久不愈此瘡毒瘡也由犯
手摋惱不得自脫故皮肉受傷而復作瘡以苦參丸
與服效
王氏女痂落遍身盡白色不紅日夜啼哭遍身潮熱不
思乳食曰此症若不急治或一二月或二三年必致
成疳而死不信後果歿後其子亦患此令服十全大
補湯數劑又與三合湯治之其熱即退哭亦止痂肉
色盡紅方止藥又服加減八寶湯全愈
一小兒已脫痂初無他苦一醫視其目睛無神帶白曰
不可為矣逾日竟亡 廣筆記

色白當用參耆大補之劑否則有變不信謂瘡已收
完何變之有一月後大喘而死
雷邑丞孫瘥落痂月餘面瘢凸腫今始發洩也凡毒自
內而外者吉乃用當歸楮赤芍荊防連翹牛蒡元參
蟬退艸麻作散淡竹葉煎湯調服安
一小兒落痂後瘢內凸起作痒此風熱也用人參敗毒
散加荊防一服安後有患此者用荊芥敗毒散加人
參服之外冷水揚湯皆效
一小兒落痂後瘢毒不平曰瘡家戒食薑恐靨不齊瘢
不平也問之果然

一小兒落痂後瘢腫復成瘡久不愈此瘡毒瘡也由犯
手撓搔不得自脫故皮肉受傷而復作瘡以苦參丸
與服效
王氏女痂落遍身盡白色不紅日夜啼哭遍身潮熱不
思乳食曰此症若不急治或一二月或二三年必致
成疳而死不信後果歿其子亦患此令服十全大
補湯數劑又與三合湯治之其熱即退哭亦止痂肉
色盡紅方止藥又服加減八寶湯全愈
一小兒已脫痂初無他苦一醫視其目睛無神帶白曰
不可為矣逾日亡 廣筆記

瘡 附伏倒 隔靨瘡

徐仲光治一血熱瘡初失涼解至五六日方服芩連歸地喬紅纔起脹灌漿至半漿又不服藥九朝變黑歸腎面唇腰脚皮肉俱黑仍用前藥加金汁及人牙散勢少緩又用黃連生地紅麴各一錢木香三分燈心一錢次日加犀角連翹黑色俱散唇眼俱清前方連進四劑而愈

萬密齋治吳氏子磊落紅活順瘡也其兜脾胃素弱起發畏避或謂其氣虛妄投陳氏木香散一劑瘡轉平不起又投陳氏異攻散一劑再延視不可為矣

李氏子四歲出瘡十日後瘡頂平隔根窠紅紫昏睡不食不可救也次日死

吳氏女瘡將養膿面上有乾靨者犯倒隔逆症乃用參耆甘艸節歸地赤芍銀花牛蒡連翹麻黃蜜酒拌炒黑紅花子水煎服山甲末宜告之曰服後若先乾者復起作膿未乾者胖壯飽滿空處再出小瘡上也不作膿不補空或發癮腫次也否則不可為矣連進三服已乾者不腫未乾者飽膿空中補出不多手足發癮後以十全大補湯加銀花連翹調理而安

國立國會圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

雷邑丞孫五歲出痘衣以厚綿圍以厚被日夜向火任其飲酒未七日而靨面目至腰潰爛平塌無作痂者曰此非正是倒靨也亟用疎裡解毒之藥減去衣被勿近火飲酒方保無事以黃耆白芷排膿托裡防風蟬退以疎表青皮桔梗以疎裡牛蒡甘艸以解毒一服潰瘡復脹大便膿涎此毒氣中外無留美戒勿再藥恐生他病也

董氏女年十九臘月半出痘至歲終不得收靨精神已昏飲食俱廢視之僵卧如死人其脈洪實調勻此本倒靨逆症幸脈洪實不疾不徐今棄症從脈治之若得壞瘡復起新痘復出人事清爽飲食如常則無事矣乃用升陽散火湯加黃耆當歸木香青皮連進三劑初三日復出一新痘舊者盡乾初五日出盡周匝一身乃漸甦省能言求飲食依期起發至十三日靨後以十全大補湯調理調理謂痘倒靨必歸腎今幸愈尤當防目疾宜預解之不聽半月後左目痛不能開果

柴氏婦廿七歲痘甚密膿成時鼻準先乾曰此逆症也不可治問故曰起發未透膿漿未熟不當靨也況收靨自有次第形色亦殊先自口唇兩傍收起漏漿堆

膿面瘡皆然自項而下則成疣贅今瘡未熟而靨乃倒陷也自鼻先收失其序也不漏漿者乾枯也後三日死

瘡毒

徐仲光治一兒漿足為屍穢氣觸倒靨焦黑四肢腫痛幸其能食便調正不留邪必發癰也內托解毒之劑而愈

一兒七朝瘡順而有行漿之勢兩臂膊腫大如瓜幸能食便調此少陽經虛毒滯不散也補其陽而腫自愈用參芪甘桂歸芍陳芷羌活人中黃治之漿足腫漸消而愈

一兒瘡瘥相同不補漿雖滿痂腫處成膿竟損一目

一瘡五朝兩臂腫痛用解散藥而漿不充毒不退反寒戰作痒危甚此忌治其表而失于補托也保元湯加丁桂木橘治之漿足而痂後以托解藥其毒成膿而愈

一瘡窠而內強過于補益而生癰腫煩燥口渴便秘以三黃丸利之再用請解之劑調理腫消而愈

一兒患瘡癰于小腿歲餘尚潰腐不能收口此至陰之

下無陽氣充拓膿血既久氣寒虛弱宜補助元氣千金內托散加牛膝楔椰土茯苓首烏潰出一嫩骨漸収口而愈蓋毒久不散凝結骨與地四生金之義同

一兇瘡毒流注四五箇于肩臂痂如麩薄少神粘着不脫此氣血不足也十宣托裡散外用針刺破又玉龍膏鐵箍散圍吸筒吸膿而愈

一瘡毒出清水六脈微弱元氣虛寒保元湯加桂附白朮調理而愈

一瘡大腿腫痛此毒火鬱于肉分丹腫也用歸芍丹地翹芷木瓜大黃

一耳後赤腫結核寒熱頭疼體痛此感冒不正之氣所結乃時毒也十神解毒湯治之而愈

一瘡漿雖滿而四肢清水亦痂薄如麩十二朝兩肩臂腫痛有謂餘毒而用養血解毒而倦怠毒亦不退此陰虛而毒滯不化也宜大補氣血而兼解毒得氣血調暢則毒歸一處成膿而化矣四君子湯加陳芍歸芷羌翹銀花大劑加減調理而愈　此症若專用解毒致傷脾胃而瀉嘔厥冷耗散真元者附子理中湯加肉果木香得肢熱疼腫又四君子湯加金銀花黃芪白芷而愈若專解毒而不固元氣只以圍藥敷塗腫

雖退而毒內蘊非損手足必腹脹喘急而死矣

萬密齋曰周氏女出痘發熱五日餘未見痘出但背上發一腫毒曰不可治也非癩乃痘毋也三日後果卒

張氏女痘起發止空殼此氣有餘而血不足也責在肝經用四物湯小柴胡湯雖作膿亦未飽滿而收回允痘瘡不成膿或膿少者皆發癩毒此足厥陰肝病必發頂疽果然

施季泉口授一家傳秘方治痘後毒如神人參茯苓金銀花犀角各三錢甘州一錢五分羚羊角一錢珍珠八分窓九每服一錢日一服 廣筆記

萬密齋治胡氏女痘不甚密亦不十分光壯飽滿素畏藥不肯服收靨時一片薄殼逆症也足膝發癩毒與一藥一飲而盡回病不可為也問故曰脾主味開竅于口經云口和則知五味其平素不肯服藥今一飲而盡是不知味而脾敗矣況瞼膝乃脾所主脾敗則不能成膿或針之果皆清水次日死

夏氏子痘後手足發癩面色黎黑精神疲困飲食且少曰兒痘未得起壯收靨太急今發癩毒乃倒陷歸腎也必不能成膿而死果然

一小兒痘後發癩用十全大補湯加連翹金銀花治之

愈蓋其癰已潰故用是方允潰癰以是治之無不愈
者

一小兒瘡後發癰用解毒內托散調理而愈

蔡氏子瘡後卵腫曰此厥陰肝病用小柴胡湯加青皮
木通查肉調理愈

費建中曰一兒瘡止八十三粒或以輕緩之劑按日期
則投之十六日咸謂收效矣延至廿六日邀視則則
兩目張皇如臨白刃乾嘔不止愁楚非常陰囊兩旁
有小棗桃核大隱于肌肉色且黑黮此餘毒閉焉者
也辭弗治是晚即斃

一兒半周瘡甚稀頗紅活惟身熱如火數後躁亂霎時
收斂紅暈燄赤痂甚焦燥腰及環跳發兩癰如掌大
硬如石腫如拳又小疔甚夥以必勝湯日二劑胭脂
調化毒丹貼之疔漸退癰亦膿潰以忍冬解毒湯加
地丁當歸收效

瘡
腫脹

徐仲光治一瘡後痂未盡脫遍身黃腫壯熱腹飽溺赤
者乃脾胃素有濕熱而兼餘毒不盡也宜消積滲濕
解毒以五補散加米仁連翹山甲竹葉防風白朮蒼

愈蓋其癰已潰故用是方凡潰癰以是治之無不愈
者
一小兒瘡後發癰用解毒內托散調理而愈
蔡氏子瘡後卵腫曰此厥陰肝病用小柴胡湯加青皮
木通查肉調理愈
瘡止八十三粒或以輕緩之劑按日期
則投之上當缺一字咸謂收效夫延至廿六日邀視則則
兩目張皇如臨白刃乾嘔不止愁楚非常陰囊兩旁
有小毒桃核大隱于肌肉色且黑黯此餘毒閉焉者
也辭弗治是晚即斃

一兒半周瘡甚稀頗紅活惟身熱如火漿後躁亂霎時
收斂紅暈燃赤痂甚焦燥腰及環跳發兩癰如掌大
硬如石腫如拳又小疔甚夥以必勝湯日二劑胭脂
調化毒丹貼之疔漸退癰亦膿潰以忍冬解毒湯加
地丁當歸收效

瘡
腫脹

徐仲光治一瘡後痂未盡脫遍身黃腫壯熱腹飽溺赤
者乃脾胃素有濕熱而兼餘毒不盡也宜消積滲濕
解毒以五補散加米仁連翹山庀竹葉防風白朮蒼

术厚朴茯苓

一瘡後浮腫皮薄而光手按成窟咳渴便澁仍瘡後飲食傷脾脾虛不能制水水潰妄行浸清脾土滲透皮膚故腫耳其喘咳者水妄行不能制火火盛形金也又曰水氣上行侵肺最為難治其小便澁者由金為火剋失其降下之令不能輸化也治宜補中行濕清熱利便之藥以實脾飲五補散石千散治之

一瘡後遍身發腫餘毒攻沖也以湍天星艸同水楊根金銀花馬蘭頭各搗汁和勻服湍天星葉如芜荽多生墻下陰濕之處

一瘡後小便不利腰已下腫乃脾胃氣虛不能制腎水水溢下焦故也當利小便以五苓散間服壯蠣澤瀉散又六君加澤瀉

一瘡後遍身赤腫發為赤遊風者乃餘毒不盡解而又恣食煎炒辛熱之物重蒸腸胃熱與血搏而然宜犀角解毒湯

一瘡后腮頰赤腫為遶毒風者乃客風畜于皮膚流注而為頑核赤色也內服解毒湯外敷玉龍散附

一夏月瘡漿足收斂溺赤短澁外腎膚囊赤腫通明乃膀胱熱甚毒氣流結于小腸以八正散又化毒湯治

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

水厚朴茯苓
仍疑乃字之誤
溥而光手按成窟咳渴便澁仍瘖後飲
食傷脾脾虛不能制水水潰妄行浸漬脾土滲透皮
膚故腫耳其喘咳者水妄行不能制火火盛形金也
又曰水氣上行侵肺最為難治其小便澁者由金為
火剋失其降下之令不能輸化也治宜補中行濕清
熱利便之藥以實脾飲五補散石千散治之
一瘖後遍身發腫餘毒攻沖也以滿天星艸同水楊根
金銀花馬蘭頭各搗汁和勻服滿天星葉如芫荽多
生墻下陰濕之處

一瘖後小便不利腰已下腫乃脾胃氣虛不能制腎水
水溢下焦故也當利小便以五苓散間服壯蠣澤瀉
散又六君加澤瀉
一瘖後遍身赤腫發為赤遊風者乃餘毒不盡解而又
恣食煎炒辛熱之物熏蒸腸胃熱與血搏而然宜犀
角解毒湯
一瘖后腮頰赤腫為遶毒風者乃客風畜于皮膚流注
而為頑核赤色也內服解毒湯外敷玉龍散附
一夏月瘖發足收鬱溽赤短濇外腎膚叢赤腫通明乃
膀胱熱甚毒氣流結于小腸以八正散又化毒湯治

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

之

萬密齋治一男子年二十餘瘡甚密起發時腫異常面如錫餅形狀可畏喜其飲食如常大小便調安靜而睡或欲投木香散色白者瘡疼無疾不須服藥出太多氣血不能周遍也數日後自收斂矣果然

一小兒瘡甚密不甚起發面如錫餅食少而渴或欲投木香散曰兒無吐瀉裡虛之症不可用也乃以保元湯加當歸赤芍防風桔梗牛蒡調理而安

一婦人二十四五瘡甚密面腫甚身無完膚七八日後着心唇上有成血漿者或謂正當作膿之時曰未也面瘡帶赤猶是血色未曾化水遽爾成膿此惡候也後必潰爛而死果然

唐大尹子年十二瘡膿後右肩發紅腫非毒也或以針刺之其手遂不能舉視之其手不痛但軟弱無力不能自舉必用左手持之乃能舉此血熱氣虛也蓋肝主筋資血以養寒則縮熱則張惟補氣養血則愈用參耆朮艸芍歸芍川斷朮香桔梗芡仁防風為末山藥糊丸服半月而痊

一小兒瘡後洗浴面目一身盡腫此水氣也用四君子湯以補脾去濕加黃耆以實表防風以勝肌表之濕

麻黃以逐皮間之水一服腫減半再以錢氏異攻散加猪苓澤瀉而安

瘖 倦怠

徐仲光治一瘖后煩熱喘脹便溏溺赤嗜卧此暑傷氣分清暑益氣湯愈

一瘖便溏食少嗜卧亦脾胃虛也六君子湯加木香棗仁而愈

瘖 嗜卧

徐仲光治一瘖後嗜卧煩熱喘滿溺赤便溏時值長夏脾胃不足之故用清暑益氣湯治之

一瘖後倦怠嗜卧便溏減食皆由胃虛不能生氣脾虛不能生血運令不行化工失職宜六君子湯加棗仁木香

一瘖後嗜卧呼之不醒晝夜皆然乃氣虛脾弱清氣不能上升也以五味異攻散加歸芍又與歸脾湯愈

一瘖後炎暑嗜卧怠惰食少口燥咽乾肌膚枯瘁乃脾胃虛元氣弱不能實四肢充肌膚而潤皮毛也況值長夏熱傷元氣以補中益氣湯合生脈散治之

萬密齋治一小兒瘡瘢後發熱不止食少喜睡瘡又黑黯乃瘡毒內陷也因問其膿水必清痂皮必薄果然不成膿不結疤但水出皮脫而乾曰凡瘡初出壯熱昏睡常候也今既収則當邪盡正復熱退食加神爽乃俱不然不可治也後忽昏胃死

瘡 羸瘦

徐仲光治一瘡煩熱口渴能食易化不作肌肉此氣血虛乏心火亢甚而乘也經曰火炎則土燥多食亦飢虛治宜氣血兼補單日服五味異攻散加黃連麥冬知母雙日服四物湯亦有治之不應為毒火爍陰津液枯涸而死

一能食枯渴肌肉不長精神憔悴脈來沈緩此乃脾胃不足東垣曰胃伏火邪干氣分則能食脾虛則肌肉削又曰脾胃虛寒則元氣不足以補中益氣湯加黃連

一能食易飢不長肌肉此因胃陽有餘脾陰不足故胃熱善消肉經曰二陽結謂之消二陽者胃與大腸也以小異攻散加黃連白芷治之以瀉二陽之熱也

一瘡后面白唇赤肌肉羸瘦皮毛枯槁潮熱往來雖食

易化乃瘏勞之候皆由瘧后飲食不節脾胃過傷東垣曰脾胃虛弱則元氣下流陰火乘其土位治宜健脾為主而兼以清熱之劑則脾土固氣血滋生諸症自平以歸芍四君湯加石斛麥冬地骨皮銀柴胡等劑又六味地黃丸加參朮當歸枸杞于五味子間服

一瘧後面白無精光口氣冷少食羸瘦乃胃氣虛寒之候以六君子湯治之

一瘧如前兼以便溏腸漏即用六君加炮薑木香

一命門火衰不能生土而成是症者用六味地黃丸

一瘧後漸黃瘦面腫身熱肚大喘泥喫米此由瘧后飲食傷脾愈而復傷乃脾瘅也瘅之候也治宜養正而積自除以肥兒丸治之



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

錢塘魏之琇玉橫撰

小兒疹

孫文垣治僕子孫守以中麻即瘡咳嗽無痰上唇厚腫體熱大便燥聲啞燥火為患以麥冬知母瓜蒌甘州白芍桑皮是症宜去白芍桑皮入牛蒡桔梗地骨皮石斛枳殼服後嗽減其七乃去瓜蒌枳殼以其大便已瀉加生地當歸玫仁調理而安

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

程氏子七歲中麻西吳呼為瘡子姑蘇呼為沙子一月餘矣發熱如故咳嗽聲啞肌削骨立頭髮盡禿衆醫束手孫見之曰若謂此兒不治耶此麻後虛熱成痨以大蘆薈丸治之可萬全也病家初不余問者謂非幼科專門也不知此特大方家餘事耳可改韓詩曰餘事作兒科然方脈不知兒科者必非良手

呂東莊治錢氏子五歲病瘡不復顧忌以清火為急寒涼縱進著眼在縱字病勢殊劇呂視之面色兩顴嫩紅虛陽上浮時咬牙喘急吐口渴甚飲水不絕陰虛液燥脈洪緩如平壯人曰脾急矣速投人參白朮當歸黃耆陳皮甘州茯苓木香以救之一劑覺安或阻之曰誤矣小兒有喘瘡以發散清涼解毒為主今半身瘡潮未退而用溫補必不救矣無真知而參末議最能誤人知者慎之其家懼遂不敢再服間三日其父復來見曰諸症復如故如何呂曰豈有是理哉君戲我耳曰日來實不服君藥乃速其故呂曰君試急歸兒天柱骨倒矣別去頃之馳至曰果如公言柰何急服前方何如呂曰前方救虛也今加寒矣非桂附不能挽也曰顴紅喘急口渴飲水俱是熱症而公獨云虛寒何也曰陰竭于內以何

不入熟地生陽散於外而寒涼復逼之陽無所歸內真寒而外假熱此立齋所發內經微旨非深究精蘊者不能信也乃歸而違衆服之一劑而天柱直二劑而喘渴止三劑起行嬉戲戶外此由甚寒過劑故處方如是非一切小兒皆可桂附也

馮楚瞻治沈氏兒發熱數日見麻疹纔一日面上盡沒神氣困極蚊從口出不一而足數日不食下瀉上喘唇口焦裂五心壯熱手足指尖皆冷脈細數無倫兩尺更弱咸謂疹毒歸臟胃熱故蚊連出也不知神氣欲脫五臟俱困脾虛不能納穀蟲無所食又兼虛火熏蒸臟腑燥熱蟲不安而出耳況諸斑疹多由內傷失調脾胃不足是以榮氣逆行陰霾於外血盛氣壯則紅而燄發血虛氣弱則色白而隱伏有何毒之輕重乎面上退縮者陽虛不能升發也喘促者氣短難續也唇焦者脾津耗竭也五心壯熱者陰虧火鑠也泄瀉不食者真火衰而脾不運也寸關細數尺弱者氣虛血虛虛火上浮而不藏也急則治標緩則治本今者之急本氣欲脫也倘謂麻疹餘毒解利清托恐神氣先盡矣乃以熟地六錢丹皮一錢麥冬三錢牛膝二錢製附六分一劑假熱全消真虛畢露神氣更

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

倦此陰已少復當補氣以助其發生前方另煎人參二錢沖服神氣漸爽喘促全安飲粥微嘔乃胃氣久虛之故也再用前方加炒黃白朮二錢去丹皮參湯沖服三四劑全愈

愚按此與呂案症大同小異要是百中一二未可以生地杞子地骨冬蔘仁沙參等味三四劑必嗽止熱退而安

高士宗長男六歲次男三歲于元旦次日俱發熱見疹即用清透發之劑次日畧增十數點究不暢達心以長男七月而生先天怯弱問其胸腹寬否曰飢甚口味何如曰淡甚因知其虛遂投耆朮參甘桂枝紅花一二劑次日疹發遍身熱稍退而神情猶煩躁夜發熱頻咳嗽至一月而安由見點之初過服表劑虛其經脈故也（由此成痨者多矣）次男幼稚致問不能以上冬疹喘服麻杏桂枝石膏一劑而愈謂其稟賦畧強其疹不透必寒凝毒甚曰與蘇麻前杏苗芩石膏藥大錯紅點不增又與紫蘇葱薑芫荽等熏之熨之疹總不出所謂不知經候混攻混表是也同道俱云舍透法並無別法（此等藥豈透發）

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

而已耶 至五日吐蚘或曰此熱極生蟲可服牛黃散牛黃散即大黃末也一服而痰喘止神氣稍平却自是不能言実計無所施針百會穴開其瘖門服西黃分許及諸單方（忽則亂投藥餌）觀其形症實不能生友人張衛生曰此大虛大寒症也今既無言又不能食恐無濟出廿餘點不能再增心胸煩悶乞高診高曰若再攻發即敗矣忽與芎歸耆朮桂苓紅花等服一劑而熱退身安凡治瘵調其氣血和其經絡寒涼攻發緊置不用則屢治屢效也（亦非定論蓋鑒前車而矯枉過正也）吳題先子甫二歲出瘖兜醫攻發不透高視之知其虛也（其虛亦由攻發過甚）曰若但發瘖瘖斷不出必至不保惟有温補之劑益其臟腑安其腸胃助其氣血方可（語無筋節）胸無卷軸可知遂與耆朮薑桂歸芍甘銀花紅花諸味一劑而安次日仍用原方加人參一錢又連服獨參湯而愈

夏氏子出瘖色紫黯神氣不寧高曰此症大凶治須得法連肴二次皆用温散藥次早其家人走告曰口吐

虻蟲另有藥否曰昨二劑俱服否曰尚存一劑因與附子八分令加入煎服自此遂無音耗心竊惑之越三載至其家猶懷鬼胎見其子長大因問昔年出瘡吐虻何由得愈曰服藥後目無力相延丈夫天覆庇得以漸愈語亦虛活○以上皆醫學真傳高案

徐仲光治一兒身熱喘脹以內傷外感治之不效視其脊隱隱赤色乃疹也以麻黃湯表發雖出而頭面不出隨沒而死

一兒疹身熱似瘡候編身報點沈虛明黃錦雲皆以為瘡也時黃綺雲年十二歲未知醫往視獨以為疹其父諾之綺雲曰兒聞父言疹為肺胃風熱今兩鼻流涕豈非疹乎已而果然後長遂為名醫是以鼻涕決疹者則早得其要領也

一兒疹出紫色喘嗽噦瀉不食用解毒飲挑痧法治之而後愈

一兒疹出紫色便秘溺澀煩躁悶亂意以大柴胡湯利之而愈

一兒疹不易透知為風寒所遏用桂枝湯加葛根麻黃前胡升發之又用厚被裹之再以大劑防風湯熏于床下而愈此症亦可用芫荽防風湯淋頭面手足又芫荽煎芫荽酒熨之

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一兒身熱頭疼骨痛咳嗽氣急嘔噦不食乃傷寒而兼出疹也以百祥散十神解毒湯治之而愈此症治之少緩疹雖透火變噤黑悶亂喘脹而死

一兒疹出腹飽便秘乃內傷所發也以承氣湯下之而愈

一兒疹正出而忽食停滯腹飽便秘壯熱譫語急以大黃瓜蔞枳實厚朴黃連甘艸等藥利之而尚喘嗽脈遲肢冷以附子理中湯又歸芍六君湯治之而愈

一兒表散後疹出隱隱肌肉間成片又為風寒所襲渾身變青紫煩躁悶亂喘脹欲出不出急用麻黃桂枝湯加葛根以升發之得冷汗微出而愈

一兒疹半出壯熱煩躁喘脹悶亂乃出不透而內攻也急以麻黃甘艸桔梗前胡葛根荊芥牛蒡枳殼升發之疹出二三番得盡透而愈

一兒疹隱不振頭面不出面色青白喘脹悶亂右寸脈微此正氣虛也不能升舉急用麻黃桂枝湯加人參一錢防風芫荽湯洽法治之而愈

一兒疹盡出而壯熱秘結喘脹譫語此毒壅猶不盡透也急以黃連括蔞枳殼石膏桑皮知母人中黃等藥治之而愈

一兒汗出疹透猶喘不止亦邪壅也意以炒黑麻黃加
石膏杏仁甘艸治之而愈

一兒疹時咳嗽喘急用大小無比散五分至一錢即喘
定而睡醒後神安此熱毒從小便而解也

一兒仲春出疹用涼藥食生梨寒鬱而致喘悶面青肢
冷聲啞昏暈意以麻黃湯加葛根柴胡甘艸桔梗紫
蘇生薑艾發之再覆以被取汗而愈

一兒疹發不出喘嗽煩躁悶亂繆仲淳用西河柳五錢
麥冬三錢五分牛蒡三錢五分蟬退荊芥薄荷知母
各一錢竹葉三十片甚者加石膏五錢冬米或三黃

治之而愈

一兒疹雖出而喘反甚乃驟用麻黃燥烈之藥火甚而
肺火熱也宜清金潤肺以甘艸桔梗前胡牛蒡杏仁
元參知母黃芩花粉治之而愈

賀知忍子疹不透極重其家不知尚以肉飯與之仲淳
意以西河柳兩許麥冬兩許石膏一兩五錢知母五
錢元參貝母各三錢竹葉七十片作二劑服而疹盡
現徧身皆赤連服四服疹雖盡出而煩躁猶不止再
以石膏三兩知母西河柳各二兩麥冬三兩黃芩黃
柏黃連各五錢竹葉二百片濃煎與服遂定而瘥廣筆

一兒寒月出疹不透喘脹悶亂煩躁用去節麻黃蜜酒拌炒一錢葛根麥冬貝母前胡知母荊芥元參甘草升麻各一錢水煎服而疹立透隨愈

一新婚出疹痰嗽不已咸謂餘毒用清解而疾愈多午後咳甚此陰虛火熾而潮熱也用六味地黃丸料加知母麥冬治之而愈

一婦新婚出疹其症如前用六味地黃丸料加當歸治之而愈

一孕婦疹不出熱極悶亂喘脹用清熱安胎藥而熱愈甚危劇子母難全此懷胎內實故也法當下其胎則疹熱解而母命可保矣以表散藥治之而愈

一孕婦出疹觸動其胎胎墮而去血過多疹雖沒而煩躁喘悶昏絕乃血脫故也當益氣用理中湯而甦又用人參一兩當歸阿膠炮薑荊芥艾葉治之而愈

一孕婦出疹小腹痛而漏血此熱甚動胎也以升麻葛根湯加荊芥紫蘇黃芩白朮當歸川芎砂仁橘紅阿膠治之血止而愈

一孕婦出疹熱極墮胎而難產用魚膠三寸燒存性射香一分共酒服立產過此症最為難治更有橫生者

用魚膠一尺如前法雖產而子不活

一產婦疹不易出熱甚而未去血不止乃氣血不足不能逐毒出外也用麻黃葛根湯加人參荊芥白芷當歸阿膠治之而愈

一婦疹後輕咳朝涼暮熱面色少神肌瘦唇赤咸以氣血不足用八珍湯不效細詢其夫知不慎房幃用六味地黃丸合生麥散與服又囑其絕慾百日而瘳

柴嶼青治候補汪某年二十餘因感時氣出疹過服石膏等劑身熱泄瀉兩耳皆聾絕不思食脈之兩尺微弱舌上乾燥毫無津液本屬陰虧況大寒之劑不但傷陽亦且傷陰用麥冬五錢滋陰以清虛熱陳皮以和胃氣加西河柳一錢以清疹毒次日熱微瀉止舌亦覺潤惟左寸脈微洪加小生地二錢木通一錢菊葉一錢三日熱退思食因是月應選身軟耳聾慮不能過堂掣籤謂已平復十九日當投補劑定可全愈後果如言竟得赴選

萬密齋治胡道松四肢病疹或治之三日疹不出煩躁甚欲用荊防敗毒散曰此皆發熱之藥無解毒之用況天大熱又無時令之藥一二味在內則陽愈勝陰愈虧陰陽不和此疹之所以不出也以東垣涼膈散

加元參升麻一服疹出三日起
甘氏子發熱疹三日不出身涼神倦坐卧不寧此毒不
外透毒火內伏故煩而坐卧不安也用升麻葛根湯
加麻黃石膏以發之一服疹盡出色白不紅此血虛
也用四物湯加防風一服色紅而愈
楊氏子疹後痢下鮮血用當歸梢生地白芍條芩炒黃
連炒人參生甘艸枳殼烏梅而愈凡出疹利血者此
方皆效
錢乙診睦親宮中十大王瘡疹云曰瘡疹始終出未有
他症不可下但當用平和藥頻與乳食不受風冷可
也如瘡疹三日不出或出不快即微發之（氣粘子湯之類）如
瘡發後不多出即加藥（如一日一帖即加至二帖）加藥不出即大
發之（升麻葛根羌活防風獨活麻黃桂枝之類）如發後不多及脈平無症
即瘡本稀不可更發也有大熱者當利小便小熱者
當解毒（利小便四聖散之類）若不快勿發勿下攻止用抱龍丸
治之瘡若起能食者大黃丸下一二行即止有大熱
者當利小便有小熱者宜解毒若黑紫乾陷者百祥
丸下之不黑者慎勿下身熱煩躁腹滿而喘大小便
澁面赤悶亂大吐此當利小便不瘥者宣風散下之
也若五七日痂不焦是內發熱氣蒸于皮中故瘡不

得焦痂也宜宣風散導之用生犀角磨汁解之使熱不生必著痂矣

睦親宮十太尉瘡疹衆醫治之王曰疹未出屬何臟腑一醫言胃氣熱一醫言傷寒不退一醫言在母腹中有毒錢氏曰若言胃氣熱何以作涼作熱若言母腹中有毒屬何臟也醫曰在脾胃錢氏曰在脾胃何以驚悸腎無對錢氏曰夫胎在腹月至六七則已成形食母腹中穢液入兒五臟食至十月即穢液滿胃至生時兒口中猶有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連汞粉下其邪穢之穢此亦母之不潔餘氣入兒臟中本先因微寒又遇風寒邪氣相搏而成瘡疹也未出欲作之時熱動五臟則五臟之症先見初欲病時先呵欠頓悶驚悸作涼作熱手足冷面頤頰赤燥咳嗽嘖噎者此五臟症俱見也呵欠頓悶者肝也時發驚悸者心也作涼作熱手足冷者脾也面赤頤頰赤咳嗽嘖噎者肺也惟腎無候以在腑下不能食穢故也凡瘡疹乃五臟毒若出歸一症肝水泡肺膿泡心為斑脾為疹腎雖無症其候惡者瘡變倒靨而黑陷則歸腎也此由不慎風冷而不能食內虛所致也今太尉疹子無他症當用平和藥為治因用抱龍

九數服愈海藏云本先因微寒入一向并由不慎風
寒而不能食內虛一向勿認作寒症用抱
龍丸即知斑
疹多熱也

吳橋治姪孫始孩累日發熱蒸蒸驚搐悸憒衆醫不知
所以橋曰麻也寒邪外乘開而不出是亦亦爾飲藥
已數中氣乃傷藥不足恃也當置沸湯一瓶撤其蓋
令保母抱子坐湯側稍遠擁被圍之湯氣自遠熏蒸
少飲藥內托麻出而解後汪氏子病如之亦用嚮法
並效太函集

薛立齋治一小兒患疹作痛發熱煩渴欲服清涼飲下
之診其脈不實舉指不數此邪在經絡也不可下遂
用解毒防風湯二劑而愈此症小兒多患之須審在
表在裡及邪之微甚而治之王海藏曰前人云首尾
俱不可下者何也曰首不可下者為斑未見于表下
則邪氣不得伸越此脈症有表而無裡故禁首不可
下也尾不可下者為斑毒已顯于外內無根蒂大便
不實無一切裡症下則斑氣逆惱故禁尾不可下也
一兒作痒發熱以消毒犀角飲一劑作吐瀉此邪氣上
下俱出也毒自解少頃吐瀉俱止其疹果消吐瀉後
脈見七至此小兒和平之脈也邪已盡矣不須治果
愈潔古云癍疹之病其為症各異發癍腫子外者屬

少陽三焦相火也謂之斑小紅屬行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹凡顯斑症若自吐瀉者慎勿亂治而多吉謂邪氣上下皆出也斑疹並出小兒難禁是以別生他症也首尾不可下大抵安裡之藥多發表之藥少秘則微疎之令邪氣不壅併令其次第出使兒易禁也身温暖者順身涼者逆

沈明生治沈翰臣婦咳嗽發熱或認為不足遽用六味地黃湯以滋陰分既而咳逆更劇診之脈浮且數風熱干乎肺家宜用疎表之劑服下遍身發出紅疹二劑嗽差緩而疹猶未透更用辛涼等味以清表熱忽復作瀉不已咸歸咎寒涼沈笑曰非也肺受風邪邪變為熱經云邪并于陽則陽實而陰虛治則疹在欲出未出之際火上炎于手太陰而作嗽令則疹在欲收未收之時熱下移于手陽明而作瀉是皆斑疹家常候曷足怪乎行且止矣果越兩日而嗽寧瀉止身涼疹退按斑疹之候雖異斑疹之治略同是歲丁未濕土司天而春夏之交燥旱殊甚蓋猶襲夫昨歲燥金在泉之餘氣耳是以初當涼解而不利乎温散次當寒潤而不宜于温補六味地黃之屬雖若相宜然質濁味厚不惟不能達表抑且錮蔽外邪施諸疹退

而餘熱未清之時稍為近理今初熱始嗽輒爾用之是非滋陰乃滋害矣況以九為湯已非古人本意而專投之用尤乖病變之機自来善用六味者無如薛立齋假使九原可作視近日之湯法盛行能無掩口胡盧者哉但能愈疾則湯丸亦不必定拘若不審病機聚訟技為可笑耳

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷四十三

錢塘魏之琇玉橫撰

小兒 初生

程世光治憲王誕長子初出胎不知吮乳程曰此因難產兒傷氣也持人參煎湯灌半匙即吮（江西通志）

一舟工生子胞而無皮程令取土數升糝其體即成肌

太原王相公始生冷無氣毋驚謂已死有鄰嫗徐氏者

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

反覆諦視良久笑曰此俗名卧胞生吾能治之當活
活則當貴但不免多病累阿母耳趣（使）治之其法用
左手摟兒右手摑其背百餘遍時噦下而醒後六歲
種痘公母嘗下樓謁巫見一白衣人長大餘閑立凝
視若有所言母驚仆樓下以為不祥然竟無恙（眉公見聞
録）

兒生墮地不啼擊水瓢趙貓令叫即啼又俗稱不啼兒
為悶寂生旁人呼其父名父應兒即啼（物理小識）
有舟人生子身全無皮人莫能曉適吳門葛可久出醫
衆告之可久就岸畔令作一坑置兒其中以細土隔
衾覆之且戒勿動久之可久回啟衾視之已生膚矣
蓋其母懷娠舟中久不登岸失受土氣故也（與程世光案同）
按危氏得効方云宜速用白早米粉乾撲候生皮
方止

小兒初生不飲乳及不小便用葱白一寸四破之以乳
汁銀石器煎灌之立効（得効方）
小兒初生下遍身如魚泡又如水晶碎即成水流滲用
蜜陀僧研絹羅内羅過乾糝仍服蘇合香丸全
上

小兒 走馬牙疳

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

萬密齋孫周歲生走馬疳用尿桶底白垩刮下新瓦上火焙乾五分五倍子內蟲灰三分鼠婦焙乾三分枯白礬一錢共研末先用臘茶葉浸米泔水洗淨以藥傅之神効名曰不二散

朱丹溪治走馬牙疳垂退紙燒灰存性入麝香少許蜜和敷患處加白礬尤妙治法

小兒臍風

萬密齋治斗門子初生五日不乳噴噫昏睡萬視之曰此臍風病也一名馬牙疳小兒一臍一當是一句之內尤急乃視其口中上腭有白泡如珠大者三四箇用銀針挑去之斗門憐惜之情見於面去之未盡次日猶不乳有老嫗語以臍風之害乃速萬再治且問臍風之病云何萬曰其病不可治者三臍腹腫脹大小便不通者名曰鎖肚口緊不開不乳不啼時作搐者名曰禁風環口青色口唇緊撮名曰撮口冷郎初病未至困也復以手法去其白泡而安又曰當用何藥萬曰數日之兒安能任藥雖有古方不敢用也曰然則奈何萬曰無害矣此病蓋初生時洗浴之臍乾未落不謹視之為兒尿所浸及為風寒溫熱所侵之故宜急

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

治之但見噴嚏多啼少乳即視其口中上腭有白泡子成聚是其候也隨以手法刮去之以軟帛拭淨其血則臍風不發矣若不知此則其泡流入腹中或為鎖肚為禁風為撮口雖有神丹不能救也鄭請詳記之以為育嬰之訓

小兒赤丹 即遊風

薛立齋治一小兒腿如霞遊走不定先以蘇油塗患處砭出惡血其毒即散用九味解毒散一劑而愈

一小兒患之外勢雖輕內苦便秘此患在臟也服大連翹飲數劑神功散而瘥

萬密齋曰一小兒丹發于臉眼中紅腫手不可近三日死

一小兒遍身皆赤砭之投解毒藥即愈○一小兒遍身亦赤不從砭治致毒氣入腹遂不救此症乃惡毒熱血蘊畜于命門遇相火而合起也如霞片者須砭去惡血為善如腫起赤色邪遊走不定者宜先以生麻油塗患處砭之以洩其毒凡從四肢起入腹者不治雖云丹有數種治有數法無如砭之為善常見患稍重者不用砭法俱不救也

莊歛之子未及三月乳母不善撫養盛暑中擁卿令卧忽患丹毒遍遊四肢漸延腹背倉皇來告予曰兒方數月奈何苦之以藥急以犀角絞鮮梨汁磨服問故曰犀角能解心熱而梨汁更能豁痰且味甘則兒易服別疏方用荊芥穗牛蒡生地丹皮元參花粉薄荷竹葉麥冬生甘草連翹貝母生蒲黄令煎與乳母服之乳汁即湯液矣依法治一日夜赤漸淡越日丹盡退後卒以乳母不戒患驚風而殤廣筆記

馬銘鞠傳治下部火丹用蠶砂山甲黄連黄芩黄柏大黄石膏共末水調敷上立効切勿用芭蕉根又方用黄連末蜜和雞子清調敷馬云若遇抱頭火丹必砭去惡血方効每用此法治人其不肖砭者多致誤事

仝上

立齋治吳刑部靜之子甫周歲患丹毒延及遍身如血染用磁鋒擊刺遍身出黑血以神功散塗之查春田用大連翹飲而愈王國咸子未彌月陰囊患此如前治之而愈金氏子不欲刺毒入腹而死河間云丹從四肢起入腹者不治余嘗刺毒未入腹者無不効

一小兒患赤遊風先用羌活白芷散二劑又用加味逍遥散而愈後傷風熱起疙瘩搔破出水或用大麻風

藥十指拳攣膿水津淫先用秦艽地黃湯手指如常
又用易老祛風丸而瘡亦愈

小兒胎毒

萬密齋長孫生下遍身生瘡痂因製一方用烏梢蛇酒浸去皮骨取淨肉焙乾一錢苦參酒浸切片晒乾取末一錢半白蒺藜炒去刺一錢半三味為末酒糊丸如粟米大每服十五丸竹葉煎湯下蟲痂滅迹不再發矣

一小兒身生蟲痂醫用藥搽之瘡盡沒腹脹而喘求藥於萬曰幸未發搐尚可治也乃與雄黃解毒丸竹葉燈心煎湯下利黃涎瘡復出而安或問曰虫痂不可搽乎曰蟲痂者胎毒也宜用解毒之藥使毒散于外不可妄用搽藥逼之使反于內也搽瘡之藥必用砒硫水銀以殺蟲藥毒之氣乘虛入裏誤兒性命切宜慎之

一彌月小兒先於口內生瘡後延於身年餘不愈以土茯苓為末乳汁調服母以白湯調服月餘而愈

馮楚瞻治其孫因母久患陰虛夜熱之症生下百餘日遍體癩瘡未必非其母妊時久服時人所見產難門以生地當歸丹皮

赤芍藥辭首烏銀花連翹土貝甘草鼈蟲胡麻土茯苓木通節大劑乳母日夜進服數十劑後濕熱下趨兩足潰爛清水淋漓指甲皆脫乳母旁人近者莫不傳染此先天熱毒之氣已盡出外矣後於耳後結一大毒此陰虛無根之火凝聚也以八味畢竟六味為是加牛膝煎湯五味數劑高腫潰膿而愈自後津液衰涸瘡靨乾枯或愈或發防其內攻乃以半月四兩煎湯入生黃耆四錢當歸二錢銀花三錢炒升麻四分薑三片棗二枚煎與服不及十劑兩瘡全愈升於頭項再服頭瘡亦痊

劉禹錫傳信方云頃在武陵生于蓐內便有熱瘡塗諸藥無益而日益劇蔓延半身號啼不乳不睡用雞子五枚煮熟去白取黃亂髮如雞子大相和於鐵銚內炭火熬之初甚乾少頃髮焦乃有液出旋取置椀中以液盡為度取塗瘡上即以苦參末糝之果神效本草

綱目

孫文垣治一兒耳後生一毒腫痛遍身生大疱瘡增寒發熱與銀花當歸尾甘草赤芍連翹僵蠶牛旁元參再劑而消

薛立齋治一小兒自脫胎時兩目赤腫或作痒或作翳

此胎內之肝火也用薑蒼六味二丸而愈

萬密齋至一兒五歲每至晝時則遍身生膿泡瘡此胎毒也或勿搽藥恐粉砒之毒乘虛入腹以胡麻服之而愈

黃州李四守生子五月遍身溼瘡一旦盡乾萬曰瘡出驚止始無憂也連更數醫不能治

竺齋治梁閣老孫甫周歲項患胎毒俟其有膿刺之膿出椀許乳食如常用托裡藥月餘而愈蘄閻老子亦患此待膿自出幾至不救吾鄉徐內翰子患瘡毒及時針刺毒不內侵數日而愈小兒氣血弱膿成不針鮮不斃矣

小兒 乳病

孫子和治一小兒寐而不寤諸醫作睡驚治之或欵以艾灸以或大驚丸及水銀餅子治之其父曰此子平日無疾何驟有驚乎以問張張診其兩手脈皆平和曰若驚風之脈當洪大而弦今則平和非驚風也乃竊詢其乳母爾三日前曾飲醉酒否遽然笑曰夫人以煮酒見餉酒味甚美三飲一嬰而睡陳酒味甘而戀腸酒氣滿乳兒亦醉也乃劑甘草葛花砂仁貫

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

仲煎汁飲之立醒

萬密齋治本縣胡正卿子二月發熱不乳萬視之雖似變蒸非變蒸也時乳母皆肥健者必因傷乳發熱也令損之次日熱退而安

一兒九疑誤歲吐乳便黃身有微熱萬曰此傷熱乳也吐作腥氣今已成積母曰未食熱物乃密語其父曰必傷交妳得之問何為交妳曰父母交感之後以乳哺兒此淫火之邪忤兒脾胃正氣也不治之必成癖矣蓋淫火者肝火也病則發搐癖者脾病也積不消則為癖矣宜瀉肝補脾乃與瀉火胃苓丸服之而愈

王三峰子二歲多病萬視之曰此乳少病也王曰兒乳極多萬不應遂行既而其母驗其乳媪果無乳也詢之晝則嚼飯以哺之或啖以粑果在則貼水以飲之復求治欲使即換乳母則兒認慣不可換也若不使有乳婦人哺之則病終難治也不若仍與舊母養之擇一少壯有乳者夜則相伴以乳補之久而慣熟自相親也王曰有乳無乳治法異乎曰有乳之痂得之傷乳乃飽病也宜集勝乃無乳之痂得之失乳乃饑病也宜肥兒丸調理一月而安

李立之治一嬰兒忽患瘡求治立之令以衾裹小兒乘

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

高投之地下以一衾承之兒不覺大驚遂發聲能言問之曰此乳擣心也非藥石所能療其術之高大率類此（杭州府志）

御史陳公忽小兒閉目口不出聲手足俱輭急延醫治之獨孟友荊一見便云公子無病乃飲酒乳過多沈醉耳濃煎六安茶飲數甌是便醒御史撫掌大笑曰得之矣可謂良醫（續金陵瑣事）

陸養愚治姚明水兒甫一歲其母無乳乃以糕餅棗柿哺之遂患疳積痢上則口舌腐爛下則膿血相襍治療半載肉削如柴飲食少進醫謂上疳下痢睡不閉目肛門如竹筒指紋已過命關不可為矣診之形脫而神在以一指按其脈上浮數而微下沈微而數其肛似外脫而非竹筒也此上越者不降下陷者不升若升其元陽降其邪火猶可生也先以補中益氣湯二錢以提其不足之陽又濃煎生脈散俟冷時時以匙挑灌之間以孩兒茶冰片青黛人中白吹之二日而減旬日全安

薛立齋治一小兒目睛緩視大便臭穢乃飲交感時乳所致用四君子加木香藿香治之而安

小兒 變蒸

萬密齋治楚臬之子九月發熱恐是痘疹召萬往視之非痘乃變蒸也曰何以辨之萬曰以日計之又當有變蒸之期以症察之亦無痘疹之候曰痘症云何萬曰痘者五臟之液毒也故每臟各見一症呵欠驚悸心也項急頓悶肝也咳嗽噴嚏肺也吐瀉昏睡脾也身體皆涼腎也今公子無之知非痘乃變蒸將退也次日果安

小兒 喉舌滯頤

吳孚先治一小兒咽喉忽腫脹痛甚米飲湯水不下危甚吳曰此名鎖喉風以銀針刺少商然口二穴出血其喉即寬與之茶即下咽無苦飲食遂進

一小兒不時舌出以清涼藥治之不愈吳曰此名弄舌與吐舌不同薛新甫云吐舌者脾經實熱而舌長出也弄舌者脾經虛熱時舒時斂也照新甫成方用異功散加鉤藤鉤而愈

巢氏云小兒滯頤者涎流出而漬於頤間也此由脾冷涎多故也脾之液為涎脾胃虛冷不能收制其津液故流出于頤也張氏溫脾丹主之一法百藥煎含嚥其涎自不出亦截法也益黃散亦治此症溫脾散亦

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

可東垣十書

萬密齋外孫滿口生瘡咽喉唇舌皆是為製方用藥連一錢朱砂白礬五分鼠婦焙乾三分共研細敷之立効乃奇方也

一兒患口舌生瘡所搽所服皆苓連知柏之類無効曰心熱所作苦入心反助其熱宜無効乃作洗心散與之一服而安大黃麻黃白朮當歸白芍荊芥薄荷甘草等分煎服水更用柏連散搽之仍用苦矣

一小兒舌上生瘡口唇破裂吮乳不得日夜啼哭求治用洗心散入竹葉煎服以解其裏熱外用柏連散搽

之効

小兒舌

蔣仲芳治一小兒初患舌碎既而遍身發熱或謂傷風停食與發散消導曰無益也服後果熱愈而湯水難入乃以黃連五錢疑是分煎湯徐徐與之終劑而愈問故曰若先身熱而後舌碎則因風食發熱所致今先舌碎知其心火亢甚加之身熱是內熱極而火外行耳

小兒瘡

蔣仲芳治一小兒二三歲身熱驚悸易醫六七俱無寸
効一日忽作鴉聲少頃其音已啞魚口開張視之欲
哭狀惟眉頭稍皺終無音出因以指探其口中唇乾
舌燥曰心熱欲言而不能果有之乎即以黃連黃芩
石羔麥冬五味山庶元參花粉知母甘草薄荷燈心
竹葉等剉一大劑煎成薄膏頻頻與之一晝夜而鴉
聲復出又一日而音始全而愈自後此法活人無數
大便三四日不行者加元明粉二三錢尤驗驚悸者
加金子同煎嗟乎世遇啞驚風俱棄之而不治孰知
唇乾舌燥終屬陽症此法甚善故記之

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

錢塘魏之琇玉橫撰

小兒 傷寒

喻嘉言治袁仲卿子因捉彭蜞仆水中家人救出少頃大熱呻吟或與鎮驚清熱丸散二日遂昏迷不醒胸高三寸頸軟頭傾氣垂絕無生理矣診其脈止存蛛絲過指全無以湯二匙入口微有吞意曰外診之重不懼但脈已無根不可救也一醫曰鼻如煙煤肺氣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

已絕縱有神丹亦將奈何因思此兒受症何至此極請主人及客稍遠待某一人獨坐靜籌其故病危之家親屬滿座議論紛紜徒亂人意不可不知良久曰得之矣凡驚風一症乃前人鑿空妄談後之小兒受其害者不知凡幾昔與幼科爭論殊無証據後見方中行傷寒條辨後附瘉書一册專言其事始知昔賢先得我心如此症因驚而得其實跌仆水中感冷溼之氣為外感發熱之病其食物在胃中者因而不化當比夾食傷寒例用五積散治之醫者不明以金石冷藥鎮墜外邪深入臟腑神識因而不清其食停胃中者得寒涼而不運所進之藥皆在胃口之上不能透入何以上云鎮墜深入臟腑轉積轉多以致胸高而突宜以理中藥運轉前藥倘得症減脈出再用傷寒藥尚有生理或誚鼻如煙煤肺氣已絕而用理中得毋重其絕乎曰所以獨坐沈思者正為此耳蓋煙煤不過大腸燥結之徵若果肺絕當汗出大喘何得身熱無汗又何得胸高而氣不逼且鼻準有微潤耶此所以望其生也遂以理中湯一盞灌入喉中大爆一口前藥一齊俱出胸突頓平頸亦稍硬但脈仍不出人亦不甦此食尚未動關竅阻塞之故再灌前藥些少熱漸退症漸減乃從傷寒下例以

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

元明粉一味化水連灌三次是夜下黑矢甚多次早
忽言一聲云我要酒喫此後尚不知人事以生津藥
頻灌一日而甦
龔子才治一小兒八歲患傷寒頭痛身疼發熱口乾面
赤無汗或以傷寒治之不効已旬日與龍腦安神丸
一服其汗如雨即安
一小兒沈默昏倦肢冷驚悸而紋如弓之向裡此屬胃
氣虛而外感寒邪也先用惺惺散以解外邪諸症悉
愈但手足逆冷又用六君子調補元氣而安
一小兒傷寒嘔吐發熱面赤服消導清熱之劑飲食已
消熱未退用六君升麻柴胡四劑而痊
高鼓峰治吳維師子甫十歲發熱口渴胸腹悶痛曰少
陽陽明症也用加味小柴胡湯是夜發暈逾一二時
吳驚甚曰無傷也但此病不傳瘧必傳痢逾三日熱
退果少腹痛先解黑矢無數隨後便膿血而痢矣連
用當歸解毒湯五六劑而痢除繼以六君子湯調理
而安
馬元儀治張伯卿子年二歲患傷寒譫語發熱不知人
事已五六日幼科屢治不應漸至目直神昏診之兩
脈弦急拒指固驚後飲食與痰留結不解壅遏為病

胃氣生熱津液內亡而譫語陽明之脈絡于目經盛則絡亦盛故目直視也實熱在胃惟用承氣以調之使壅滯之氣悉反沖和則津液得存而病自去矣加服抱龍丸以豁痰治驚服後便行二三次熱勢大減明日全愈

蔣仲芳治陳受伯弟年十一歲傷寒病起幾至二百日粒米不入食即脹滿諸藥不愈惟日以人參三錢煎飲而已視之骨瘦如柴六脈沈細似宜參朮然按其心胸小腹硬塊已滿著手即痛曰憑脈則難用下藥不下亦無生理遂用當歸元明粉各三錢酒蒸大黃二錢杏仁麻仁蘇子桃仁俱炒為末各一錢白芍川芎桔梗各七分水煎服服後即去黑塊二三十中脫硬處下有寸許然已虛極明日去大黃元明粉加人參二錢服一劑後日復用前方又去黑塊一二十二方間服半月黑塊始盡而愈

小兒感證

陳三農治總制石公子年甫十齡丁丑六月患感冒風暑寒熱頭疼幼科已用葛根加羌防解表矣後復寒熱不減氣喘腹脹醫者用小導加小柴胡湯不應神

昏喘急時或泄瀉似痢腹痛不知名為何疾也診之已二十餘日脈數無力神氣昏亂按其腹時痛時脹觀其神時靜時躁手足或冷或熱虛汗不已此外邪初感者為藥而解久積者未曾清理加之飲食失調元氣欲脫致外邪內陷今以救本為急用理中湯加桂附痛瀉頓減手足亦温然熱不退小便赤澁用金匱順氣湯二服小便方利而寒熱愈加此元氣漸回症候復現也朝用六君子湯加柴葛神麯乾薑夜用六味湯加參桂旬日後冷寒拘攣目上竄咬牙呻吟咸以為無救矣陳曰此名寒戰正氣將回積邪欲出乃吉兆也自未至酉始大汗如雨手足軟怠不語熟睡天明方能言然虛症日出潮熱汗多則用補中湯合建中加附子不寐則用歸脾湯元氣弱則用十全大補湯腹痛滑瀉則用理中六君湯如是調理三月方瘳

蔣仲芳治一小兒在水閣風雨卒至又驚又寒後四肢厥冷漸至遍身惟心口稍暖此冷風入骨症也冷至心窩則死用理中湯加附子一錢數服而寒始退

聶久吾治司理毛具次子年十一夜間忽發大熱頭痛身痛咸以為病暑也及問其致病之由細察其脈乃

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

感寒耳謂必須發汗其家以現在多汗為疑曰此汗不當數必用藥發汗方可除病遂與一大劑令其熱服出汗至天明諸症盡退再與清解數服而安羌防各六分陳草各三分芎芷各四分赤芍五分香薷乾葛各一錢二分蒼朮蘇葉香附各八分薑三片

小兒傷風

薛立齋治一小兒傷風咳嗽發熱服解表之劑更加喘促出汗以為脾肺氣虛欲用補中益氣湯加五味子補之不信乃服二陳桑皮杏仁枳桔之劑前症益甚又加發搐痰壅仍用前方加鉤藤鉤而痊

陳文中治太師賈平章子宣機三歲頭熱目赤痰鼾不已一醫言風痰熱甚淫作陳曰因脾肺虛而風冷寒痰所作又一醫言熱即生風冷即生氣陳曰不然三冬盛寒冷則生風九夏炎熱熱則生氣蓋風者百病之長也若寒得之而謂之風寒若熱得之而謂之風熱若燥得之而謂之風燥若温得之而謂之風温此非獨熱而生風也如暗風破傷風臍風慢驚風急驚風及風癇驚癇食癇等症而皆作搐非但熱而生風也宣機病始于頭熱目赤便以凉藥餌之致寒凉氣

客于喉厥之間與津液相搏又生痰鬲症其喉厥寒痰冷氣壅塞不通故頭熱目赤無由得愈治法當幹去喉間厥寒痰令氣得通其病可愈遂投芎蝎散一服用手幹去寒痰冷涎四五口次以油珠膏一服而愈（病源方論）

曾世榮治衡州萬户張侯寓屯田日長子三歲六月得患不語手足攣縮已經二旬曾至諸醫議論不一觀外形面垢有熱氣促流涎口眼喎斜不省人事次則手足俱冷而瘛縮身背反張診六脉沈按緊而獨心肝脉虛而細數餘脉緩弱曰面垢邑脉細數此因中暑感風前賢所謂暑風者是也手足冷縮而不伸或服涼劑太過寒之使然若手足温其効自速乃以治暑法分陰陽順中氣五苓散加寬氣飲薑汁沸湯調下三服其症稍慢次疎風和榮衛百解散加荆芥人參當歸水薑煎投隨以温灰湯澆洗手足藥一服洗一次至八九次手足温則血活活則筋舒則舒手足運動如常餘熱未除消暑清心飲主之聲音不全二聖散取効調理惟用萬安飲恰九日前症俱減張侯曰此子更生端藉藥力不敢忘也因筆漫記後有是症仿此活人亦方便心矣

亖齋治一小兒鼻塞傷風流涕服藥過重發搐呵欠頓悶汗出氣喘久不愈其母因勞役發熱用補中益氣湯時以五七滴與兒飲之母子皆愈

一小兒傷風發搐痰盛喘急謂此脾肺氣盛腠理不密而外邪所乘用六君加柴胡升麻桑皮杏仁一劑痰喘悉退又一劑去桑杏加鉤藤而安乃用異功散數劑不復發此症若不補脾胃實湊理耑治痰邪鮮有不誤

小兒 暑

繆仲淳治高存之次子童時夏月身熱十晝夜止飲白湯諸醫汗之不解以麻仁九下之熱如故繆診曰此傷暑也白虎湯是其本方因誤汗下虛甚加人參三錢一劑微汗瞑眩少頃熱解更疏一方防其瘧痢仍用人參二錢煮健脾清暑導滯之劑未幾瘧作如方飲之瘧止痢又作存之不得已于生脈散中加益元散飲之兒厭羸甚諸醫曰數日後死矣仲淳復至語之故曰生脈益元散得之矣不診而諦視兒問廩甘否曰甘大呼曰病去矣存之問故曰視兒目光炯炯且飲食味甘是精神已王胃氣轉矣尋果脫然起

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

臧玉涵子歲半盛夏咳嗽七日因浴受驚又傷食大熱
倦頓三日不敢與藥目翳唇黵舌乾仲淳曰此暑病
也當與白虎湯曰腹瀉石羔無害乎曰先以天水散
探之服二錢少頃藥炙痰而吐微汗身涼黃昏復熱
又以天水散二錢不効仲淳曰其為暑症無疑當以
白虎湯加人參因兒患肺熱且止再診之曰暑邪客
于皮膚分肉有熱無寒是為癉瘧斷當用白虎湯連
服二劑不効鼻露眼開口不納氣勢甚危曰此正氣
不足勝邪也刺瘧論云凡瘧先時一食頃乃可治過
時則失之也又云無刺熇熇之熱無刺渾渾之脈無
刺漉漉之汗意者服藥不得時耶將前藥并劑煎露
一宿雞鳴温服之病頓失不須調補精神漸復以此
知察病望氣及服藥之貴及時也廣筆記

蔣子宮第五子一歲傷暑發熱服此藥驚風之劑十餘日驚
搐幾殆又進蠟丸等死去矣余察其悞中于藥以補
脾湯加減治之立愈慈幼篇

小兒 傷食

陸道光治一兒多食果腹脹醫罔効光取桂麝瑞香三
味為丸服之立愈平湖縣志

龔子才治一小兒食粽後咬牙欲吐頃間腹脹昏憒鼻青黃赤此脾土傷而心肝二動食積發厥也先令雞翎探吐出酸物頓醒節其飲食勿藥而愈

一小兒好喫粽成腹脹痛用白酒麴末同黃連末為丸服之而愈

一小兒因停食脹痛服峻利藥後患瘧日晡而作此元氣下陷以補中益氣湯治之愈

高鼓峰治吳章成弟八歲發熱悶亂大便不通醫作感冒治高曰此得之傷食因發散太過遂成虛熱煎風藥燥血故不便耳名言當玩先以六味飲加肉蓯蓉三錢飲之下黑矢數十枚繼以補中益氣湯數劑而諸症悉除

薛立齋治一小兒傷食發熱面赤或用養胃湯枳實黃連山查治之更加腹脹午後發熱按其腹不痛此飲食雖化脾胃復傷用六君子湯數劑而愈

一小兒傷食發熱嘔吐面赤服消導清熱之劑飲食已消熱赤如故曰此胃經虛熱耳用四君子湯加升麻柴胡各二分四劑而痊

一小兒傷食發熱面赤抽搐嘔吐氣喘吐痰以飲食傷脾發熱肺氣虛弱所致耳用六君子湯加炒黑黃連

山扈各二分一劑頓安

一小兒飲食停滯服消導之劑曰此脾胃氣虛不能剋化也法當調補為善若數用剋伐之劑脾氣益傷飲食愈停矣已而腹內又結一塊寒熱潮熱食少作渴大便不實用四君子湯飲食漸增又用補中益氣湯而愈

萬密齋治孫監司女病後誤食菱角傷脾面腫而喘用錢氏異功散加藿香葉已去脾經之溼紫蘇葉以去肺經之風一劑而安

外甥女有食積脾虛病瘧後又傷食甚瘦腹脹不喜食用胃苓丸方加枳實炒神麴麥牙青皮作丸服之一兒因傷食腹痛脹醫下之而愈又傷食腹脹醫再下之曰非其治也誤殺此兒果半年而死或問故曰凡飽食傷胃而脹宜消導之脾虛不能消食而脹宜補之以助其傳化醫者不察乃一下再下致腹大無紋臍突背平脾腎皆傷不死何待

王開一子周歲因食豬肉受傷肢體瘦削使人求藥問其詳乃食積疳此有餘病也與脾積丸五粒教以豬肉湯吞之果下一塊如小指大泥沫裹之而出頓安

馬銘鞠治華氏子連食冷鴨子二枚午間又縱恣飲食

更餘病發上不吐下不瀉胸腹脹滿目閉氣喘身熱
按其胸腹則雙手來護曰食也鴨子黃閉氣得水則
化今尚在胃口急索大棗數枚煎湯入砂仁錢許以
通其氣兒渴頓飲椀許氣漸通目開手足亦漸流動
再煎飲之夜半吐瀉交作次日勿藥而愈廣筆記

立齋治楊錦衣子十歲腹脹痛服消導藥不應彼以為
毒請診其脈右關沉伏此食積也河間云食入即吐
胃脫痛更兼身體痛難移腹脹善噫舌本強得後與
氣快然衰皆脾病也審之果因食粽得此以白酒麴
熱酒服而愈

張子和曰舞水一富家有二子長者年十三幼者年十
一好頓食紫櫻一二斤每歲須食半月後一二年幼
者發肺癰長者發肺痿相繼而死張常歎曰人之死
生命耶天耶古人有詩爽口味多終作疾真格言也
天生百果所以養人非欲害人然富貴之家失教縱
欲遂至於是

吳振公次女四歲傷食吐瀉發熱發顫予謂此女多食
瓜果致藏氣不行釀成溼熱既經吐瀉溼去熱留藏
府之中無陰相養故變成風象為定參朮半夏砂仁
乾薑厚朴歸苓一方某醫謂弱齡女子豈得服參朮

遂易他藥服至五日人事皆沈頭偏睛露復延治以
温中補脾救之立甦蔥幼
筏

小兒 受驚

竇士材治一小兒因觀神戲受驚時時悲啼火尅金也
如醉痰客包絡也不食痰滯膈間也已九十日危甚
令灸巨闕穴五十壯即知人事曰適間心上有如火
滾下即好服鎮心丸而愈
萬密齋治一小兒年五歲夢中驚哭抱其母叫怕叫因
被驚嚇得之為製一方用人參麥冬茯神黄連棗仁
柏子仁炙甘草珠砂各等分一半水煎一半入地黄
加炙甘草為末山藥粉糊丸黍米大每服二十五丸
燈草湯下未盡劑而安

龔子才治一小兒五歲因看會見裝鬼臉被驚嚇兩眼
黑睛翻向裡白睛翻向外視物微覺一綫諸醫束手
龔視之曰此兒曾出痘疹否對曰未曰俟出痘疹可
治逾月痘疹盛行其兒似有將出之機因延治以綿
臙脂水泡出水汁慢火熬成膏塗兒兩眼胞上下一日
塗兩次直至痘疹靨後其眼復舊未曾發明其故

吳孚先治一小兒先天薄弱胆氣甚小六歲時在塾中

見師以戒方在渠背後責同學生驚而受病不時驚叫必左腳提起震地一聲五六年矣百治不効吳曰肝喜驚呼肝氣虧損極矣然腎為肝母心為肝子用補肝腎并鎮心安神之藥五十餘劑丸藥三料而愈

楊士瀛云小兒口噤不開猪乳飲之良月內胎驚同硃砂牛乳少許抹口中甚妙此法諸家方書未知用予傳之東宮吳觀察子病此用之有効

本草綱目

馮楚瞻治張氏兒周歲臥低坑睡中墜下毫無傷損嬉笑如故但自後右手足攤軟不舉手不能握足不能立脈則洪大久按無力知為先天不足復於睡中驚

觸氣血不周行之故與熟地四錢麥冬一錢五分炒白朮二錢四分牛膝二錢五味子四分製附子五分煎小半鍾入人參汁二三分冲服六劑手足輕強精神更倍

陸養愚治陳雲谷子年十四四月終自館中歸偶戲水旁一人在後曰師來也因驚撲水頭面俱濕回家夜間身熱頭痛至晨煩躁不安胡言亂語及問之欲言而不能出聲或謂六脈浮緊此傷寒也表氣鬱冒致裡氣不舒故煩亂宜大汗之用五積散合密室重覆汗出透衾明日手足搐搦項背強直氣出不納自汗不

語又投抱龍丸鉤藤散不効脈之兩寸浮數而散關尺沈弱而濇此因驚恐肝腎受傷經曰驚則氣亂胡言亂語氣亂故也語不能出者氣下故也初時以平肝鎮心之中少佐以壯氣血之品病當自愈乃誤為傷寒大發其汗汗多則亡陽變而為痙強直搐搦蓋痙症也經曰陽氣者精則養神柔則養筋今陽氣竭血無所附以養筋故不柔和也陽氣盡浮于外故氣不納而自汗不語急用大料參耆為君以救垂絕之陽四物為臣入天麻以養肝經之血棗仁五味為佐以收耗散之神甘草麥冬為使以徹浮游之火二劑頓減復以硃砂安神丸間服旬日而安（與喻嘉言治水中一葉相反見傷寒門）

萬密齋治胡鳳厓子痘後傷食成疳肌瘦髮穗一醫治之已効別生一病似癇非癇晝則安靜夜則夢寐間抱其乳母叫云我怕我怕如人捕之狀詢其由兜性畏藥醫來灌服必將針火恐嚇之蓋恐則傷腎又腎藏志虛則神志不寧而生驚寤則神栖于心寐則神栖于腎脾為往來出入之門戶以補脾為主安神次之補脾肥兜丸安神錢氏安神丸調理半年而安（與喻嘉言治英山大尹吳清溪子病驚風皆作風治之不効曰非風

語又投抱龍丸鉤藤散不効脈之兩寸浮數而散關尺沈弱而濇此因驚恐肝腎受傷經曰驚則氣亂胡言亂語氣亂故也語不能出者氣下故也初時以平肝鎮心之中少佐以壯氣血之品病當自愈乃誤為傷寒大發其汗汗多則亡陽變而為瘛強直搐搦蓋瘛症也經曰陽氣者精則養神柔則養筋今陽氣竭血無所附以養筋故不柔和也陽氣盡浮于外故氣不納而自汗不語急用大料參耆為君以救垂絕之陽四物為臣入天麻以養肝經之血棗仁五味為佐以收耗散之神甘草麥冬為使以徹浮游之火二劑頓減復以硃砂安神丸間服旬日而安 與喻嘉言治水中一案相反見傷寒門

萬密齋治胡鳳厓子瘧後傷食成疳肌瘦髮穗一醫治之已効別生一病似癇非癇晝則安靜夜則夢寐間抱其乳母叫云我怕我怕如人捕之之狀詢其由兜性畏藥醫來灌服必將針火恐嚇之蓋恐則傷腎又腎藏志虛則神志不寧而生驚癎則神栖于心寐則神栖于腎脾為往來出入之門戶以補脾為主安神上安神二字似衍之丸安神錢氏安神丸調理半年而安

葉山大手兵清漢子病驚風皆作風治之不効曰非風

也乃因驚得之風從肝治驚從心治不識病原如何有効乃取至聖保命丹治之搐止矣

馬元儀治一童子讀書見其師因恐致病從朝日起昏憒不知人事七日乃甦羣作驚治延久不瘥曰此恐也非驚也或問驚恐何以別之曰驚從外來恐從內生驚則傷心恐則傷腎腎傷于恐真水受虧龍火泛越擾亂神明復遇朔日謂之重陽真陰更為之困至七日而陰氣來復然後龍歸窟宅如風雲散而天氣清明也治宜壯水之主以鎮陽光以六味地黃湯補其真陰加遠志以通神明肉桂導龍火歸源二味皆宜少許服此後竟不作

小兒驚風

萬密齋治徐道淑子病驚風先請張醫治之不効萬至病已七日發搐無時痰鳴氣急勢甚危按治驚之法先降其痰次止其搐後補其虛一言以蔽之惟治其火而已乃用河間涼膈散改朴硝為牙硝煎成湯入青礞石末調服之痰下喘止隨用瀉青丸導赤散二方相合作湯服之而搐止餘熱未除張主小柴胡湯竹葉湯涼驚丸皆不然之乃用四君子湯加炒黑乾

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

薑一服身凉徐問故曰大凡小兒肝常有餘脾常不足肝主風搐搦氣逆皆屬于肝經曰太過則乘其所勝而侮所不勝故肝木旺則乘脾土侮肺金夫肝火名曰龍雷水不能制寒不能勝故以炒乾薑合參朮甘草之甘温以補為瀉而愈也

按治法仍以寒凉折其標以甘温固其本若據後半云云豈不打成兩橛

汪元津子年五歲傷食成瘧瘧後發搐乃脾虛病也萬曰凡治驚風必用瀉青丸導赤散雖良工不能療其繩墨也今此症不可瀉宜用調元湯琥珀抱龍丸如言服之而搐止但目不能開昏昏喜睡蓋脾虛極矣脾主困故喜睡目之上下胞屬脾脾虛故不能開也仍以調元湯補其虛珀抱龍丸安其神脾喜樂命平日所與作伴嬉戲者環列床前取鼓鈸諸器擊之或鼓或舞以引之設法善病兒之目作開作閉以漸而甦不喜睡矣

羅田令朱女未周歲病驚風萬用瀉青丸是丸治驚風之秘方也服之不効而搐轉甚蓋喉間有痰藥末頗粗為頑痰裹住黏滯不行之故乃煎作湯用薄綿紙濾去滓一服而愈

羅田曾教諭子病驚風先請一醫繼召萬同治醫主小續命湯萬曰不可用也肝主風心主火風火相搏乃發搐也續命湯多辛燥之藥必反助火邪而病益甚不如通聖散為愈服未盡劑而安（治風病者宜三復此）

張世魯子病驚風已十七日矣目右視而眩（音劄目動也）口右張而動手足向右掣引舌上黑胎勢甚危急今急取薄荷濃煎湯洗其舌（洗胎法）謂之曰若黑胎去而舌紅則病可治否則不可治也洗之黑胎盡去以瀉青湯作大劑服之口眼俱定手口不掣以涼驚丸至聖保命丹調理十日而安

聞氏子六歲病驚風延萬至則悶死治必具矣視其形色未變手足尚温謂其父母曰吾能活之與之針涌泉二穴（足心）良久而甦喜而稱謝萬曰此病得之傷食宿食成痰痰壅作搐今病雖愈宿痰未去恐他日再作當制丸藥以除其根不然神氣漸昏必成癇也乃謂為年利不信次年八月果成痰迷之病二便不知水火不避復求治因制一方以黄連山梔瀉其浮越之火胆星白附子炮以去其壅積之痰茯神遠志石菖蒲硃砂以安其神麝香以利其心竅用獖猪心中血和神麴糊為丸如黍米大燈心湯下調理半年不

復發矣又與之灸風池腦後風府兩旁曲池兩肘外曲處三里曲池之下六穴而安（因驚風成癇）

龔子才治一兒痰瘧啼叫額間青黑此驚風肝木乘脾腹中作痛也先用六君子湯加木香柴胡鉤藤鉤啼叫漸緩更加當歸二劑而安

一小兒沈困發熱驚搐不乳視其脈紋如亂魚骨此風熱急驚之症也先用抱龍丸少許祛風化痰後用六君子湯加柴胡牡蠣平肝遂熱退驚定而愈

周必大二老堂禊志云開元錢最治小兒急驚以水磨服少許神効余意小兒心受熱而發驚肝生風而發搐蓋木邪侮土用金制木之義耳似亦有理（續醫說）

高鼓峰治呂坦人子生甫數月忽急驚風抽搐直視發熱不乳醫以抱龍丸及羌活防風薄荷僵蚕等作煎調坦服人商于高高曰誤矣此脾土虚而肝木盛也急用五味異功散（補脾）加煨薑（制肝）進之少頃熟睡微汗熱退而乳

王叔權云澧陽有士人之子驚風後頂腫醫以半夏南星為細末新水調傅而愈若灸則宜灸前頂等穴云（資生經）

薛立齋治舉人杜克宏子發熱抽搐口噤痰湧此肝胆

經實火之症即急驚風也先用瀉青丸一服又用六味丸二服諸症頓退乃以小柴胡湯加芎歸山庶鉤藤而安却用補中益氣湯而愈

冬官朱小溪子項間結核面色痿黃肌體消瘦咬牙抽搐頭搖目劄此肝木剋脾土也用六君子湯九味蘆薈丸治之而愈

儒者王文遠子患瘧瘧痰盛發搐服金石香燥之藥手足筋攣此肝血復傷而致急驚風也遂用加味小柴胡加鉤藤山庶芎歸一劑又以六味丸料加五味麥冬煎服而安

吳氏女六歲忽然發驚馬目動咬牙或睡中驚搐痰涎湧盛乃肝木剋制脾土不能攝涎而上湧也當滋腎水生肝血則風自息而痰自消矣遂用六味丸而愈

薛鎧立齋治一小兒七歲患急驚將愈而發熱驚悸或用祛風化痰之劑更加驚搐吐痰喘嗽腹膨少食惡寒又用抱龍等丸更加大便似痢寒熱往來殊類風症視之以為脾氣虧損諸經無所資養而然用四君子湯少用升麻柴胡以升補陽氣而愈

萬密齋曰一小兒驚風後右手強硬五指拳曲不能舉物兼口角流涎語言蹇澁此脾有濕痰脾不足而肝

乘之不可治也

陳自明治一小兒昏憒六日不省一小兒驚風發搐諸藥不効與神仙太乙丹半粒究口灌之並甦（方見蠱門）

番都金二守女患驚風甚危諸醫皆勿救自有活絡丹一丸即愈（外科發揮）

陳三農治一小兒急驚雙眸突出舌吐三寸角弓反張兒科望而却走曰此風火相搏風痰上湧而然用稀涎散薑汁調服吐痰涎數椀目舌俱收後三日復如前症以腸胃膠痰尚在下也以神効九薑湯化下去膠痰二三升愈

曾世榮治總管楊侯幼子四歲臘月得患驚風搐掣諸醫調治前症俱解但神昏不食四肢微冷已五日矣前醫用醒脾治陽之藥不一而召曾診六脈獨脾脈沈滑餘脈微緩脾脈沈而滑者此積蘊在脾乃為脾約當主大便不利非陰厥也彼曰然遂用瀉黃散加大黃水煎併三服大腑一通神氣清而飲食進隨獲安可此隆冬用大黃之功也用藥如用兵當用豈容自已如五月渡瀘雪夜平蔡何待秋高馬肥而後為之若拘以四時取用則兵藥無成功矣（幼幼心書）

大德戊戌夏曾因幹出郭至五里外有夫婦二人抱子

乘之不可治也

陳自明治一小兒昏憒六日不省一小兒驚風發搐諸藥不効與神仙太乙丹半粒研口灌之並甦（方見蠱門）

番都金二守女患驚風甚危諸醫皆勿救自有活絡丹一丸即愈（外科發揮）

似步字之誤或當作小兒急驚雙睛突出舌吐三寸角弓反張却土曰此風火相搏風痰上涌而然用稀涎散薑汁調服吐痰涎數椀目舌俱收後三日復如前症以腸胃膠痰尚在下也以神効丸薑湯化下去膠痰二三升愈

曾世榮治總管楊侯幼子四歲膺月得患驚風搐掣諸醫調治前症俱解但神昏不食四肢微冷已五日矣前醫用醒脾治陽之藥不一而召曾診六脈獨脾脈沈滑餘脈微緩脾脈沈而滑者此積蘊在脾乃為脾約當主大便不利非陰厥也彼曰然遂用瀉黃散加大黃水煎併三服大腑一通神氣清而飲食進隨獲安可此隆冬用大黃之功也用藥如用兵當用豈容自已如五月渡瀘雪夜平蔡何待秋高馬肥而後為之若拘以四時取用則兵藥無成功矣（幼幼心書）

大德戊戌夏曾因幹出郭至五里外有夫婦二人抱子

而哭于道旁問之答曰入城探親三歲孩兒忽得驚風不省人事觀其面色青黯目閉神昏診之六脈全無按太衝脈沈而微有曾顧謂曰毋慮此子可救且左右竟無人家遂于路側拾得破椀半邊有薑小塊細嚼捻汁椀中用五苓散蘇合香丸竟氣飲澆水調和灌下十數次漸覺氣回聲出目開自此蘇矣

衡州同知胡省齋因其子驚風曾治之愈問曰五苓散何以愈斯疾乎曰此劑內用茯苓可以安此心之神用澤瀉導小便小腸利而心氣通水得桂而枯足能抑肝之氣而風自止所以多主驚風施之他症亦皆有說胡深然之此其善用五苓散者歟

汪表聖次子兩歲偶感風邪發熱身顫角弓反張曰服此藥蓋驚風金石風疾之品及羌防胆星全蠍之品昏沈欲絕蓋不知小兒血氣未旺不耐風寒纔犯之即發痙病但助其氣血即風除神爽一用此等藥治則風門大開榮衛無主舊病未去新病益增安望生理予與五味異功散加柴胡二分桂枝一分附子一分連服二劑而瘥

（慈幼筏此與喻嘉言之論同）

小兒慢驚

孫文垣治姪孫女周歲發慢驚眼開手拳目不動移腳
指微動自頤門後遍身如火喉中痰聲口中痰沫腹
脹下氣大便亦行先以牛黃丸蘇合丸進之不効後
與藥皆從痰沫流出通閉散吹鼻無嚏自申至戌不
醒面色素青白氣稟甚弱曰婢女抱之失跌受驚發
熱此驚氣乘虛而入在法不治姑以人參三錢薑汁
拌炒煎湯頻頻用匙挑入口中初三四匙皆不受又
與五六匙得一二匙下咽便覺痰聲少緩因頻頻與
之喉中氣轉目能動（此以上與發熱門張景岳治次兜病大同）再以六君
子湯加天麻石菖蒲僵蠶澤瀉薄荷煎服乃畧啼吮
乳次日咳嗽語聲不出小水短少以辰砂益元散一
錢燈心湯調下熱退聲出改以四君子加陳皮五味
麥冬桑白皮桔梗杏仁薄荷一帖全愈

馮楚瞻治黃氏兜甫五月忽發抽掣黛引角弓反張一
夜五次發則二便俱出額汗如雨勢甚危篤馮視之
亡陽之勢俱備矣詢其由因常生重舌屢服五福化
毒丹服後必瀉數次即愈蓋陽虛肆進苦寒脾陽下
元虧極肝木無養挾火上乘脾土益傷虛風乃發以
人參白朮各一錢熟附四分煎服服後安然靜睡下
午復發隨服隨安數劑而愈

吳孚先治一小兒吐瀉後失于調治忽痰涎上涌面色青白似搐不搐右手脈沈遲而弱關紋隱隱手足尖微冷此慢驚也不速治即成慢脾莫救用白术人參甘草黃耆半夏炒冬瓜仁炮薑製附而安

龔子才治一兒目內邊青發搐目上視叫哭不已或用牛黃清心丸不愈反咬牙頓悶小便自遺此肝經血虛甚故耳用補中益氣湯及六味丸而瘥

一小兒潮熱手足發搐痰涎上涌手足指冷左腮自申酉時青中隱白此肝經虛弱為肺金所勝而潮搐脾土虛弱而足冷也用補中益氣湯以補脾肺六味丸以滋肝腎而愈蓋病氣有餘當認為元氣不足若用瀉金伐肝清熱化痰則誤矣

一小兒嘔吐不食手足搐搦痰涎上涌手足指冷額黑唇青此腎水勝心火也用五味異功散加木香炮薑頓安乃去炮薑再劑而愈

立齋治太平王職坊子患瘧疾恪用化痰之劑虛症悉至殊類驚風曰小便頻數肝經陰虛也兩目連劄肝經風熱也作嘔嫩食胃氣虛弱也泄瀉後重脾氣虛弱也用補中益氣湯六味地黃丸而痊

大尹劉應昌子患瘧恪服化痰之劑又服祛風至寶

丹致與前症同亦用二方而愈

葉弘士之子歲半慢驚服金藥及風痰之劑昏悶七日指紋直抵三關醫辭不治余投以加減補脾湯立愈

慈幼筏

搐搦

陳文中治尚書洪端明子始生未及三箇月腹脹滿足肚冷顱門高急上氣涎潮四肢搐搦同坐衆官皆言死症洪公曰我在前死了七八箇兒子皆是這般症候此兒子足見難醫（仕）廢生受亦不召醫視之或告陳因往視而謂之曰小官人此症候死（不）尚可救治運使曰此兒必死毋勞用計衆官皆喜陳君高明既有救療之心運使從說乃用油珠膏一服次用長生丸一服便下黃稠粘涎約半盞內有白妳塊如小豆大十餘粒是風痰結聚乳妳一併便下後用前胡厚朴散加附子兩片二服而愈（病源方論）

淮西戴運使小娘子始生周歲腹中氣響痰涎壅閉手足抽掣欲與芎蝎散宅去痰涎運使曰兒子小難依此施治陳曰前制參劉菊坡小兒始生五箇月因作搐乃服芎蝎散幹去痰涎次服油珠膏即愈菊坡贈

一跋于卷末今運使小娘子因驚嚇窗冷氣于喉厭
閉傳入肝胆其氣上不能升下不能降血氣不能流
轉故痰涎壅閉而作搐也若不依此施治必不起遂
以芎蝎散一服用手法斡去喉厭寒痰約半盞次用
油珠膏二服後用補脾益真湯三服再用前胡厚朴
散長生丸各二服而愈全
上

小兒 發搐即瘈瘲

萬密齋治一小兒兩歲發搐已死家人痛哭乃阻之曰
此兒面色未脫手足未冷乃氣結痰壅而悶絕非真
死也取艾作小炷灸兩手中衝穴火方及肉而醒大
哭父母皆喜遂用家傳治驚方以雄黃解毒丸十五
丸利其痰涼驚丸二十五丸去其熱合之煎薄荷湯
送下須臾利下黃涎搐止矣
一兒發搐痰壅有醫用白餅子下之不退凡三下病益
深合目昏睡不哭不乳喉中氣鳴上氣喘促大便時
下萬曰五臟氣絕不可治轉下之過也彼醫曰白餅
子錢氏下痰神方也萬曰盡信書不如無書錢氏小
兒皆出于閭人附會之事也（虞天民謂錢乙書出于閭人孝忠所集非錢氏本意也）蓋人之有痰猶木之有津時令大熱草木流津

痰自熱生此明驗也痰猶水也附氣自行過顙在山
豈水之性哉乃搏激使之也今痰隨火上不知降火
而反下之損其胃氣胃氣既敗五臟俱損故目不開
者肝絕也昏睡不語者脾絕也啼聲不出者心絕也
喘促痰響者肺絕也便尿遺失者腎絕也果不可治
而死

邑中有儒醫治病多奇方惟性太執不知變通時有兩
小兒發搐萬謂急驚當用涼瀉導赤散瀉青丸是也
彼謂驚風者肝火鬱遏而成也火鬱則發之論極是小
續命湯是也方大人不能決兩從之萬所治者一日
而安彼治者死悔無及矣

一兒發搐先取善推法推之止向後發病益危甚萬曰
推法者乃針灸按摩之遺意也經曰無刺大虛人推
搐之法壯實者可用之如怯弱者其氣不行推則有
汗反傷元氣也其家不信萬曰不死必成癇半月後
果死

一兒發搐因用推法暫退一月後如期復發又推之或
一月一發或一月再發萬曰病成癇矣推法者乃發
表之意痰聚在心不得出也幸初成癇當可治若久
則為終身錮疾不可治也立方用黃連五錢硃砂二

錢五分白甘遂三分膽星一錢為末米糊為丸獵猪心血杵匀丸芡實大每服一丸燈草煎湯化下夜服三日服一遂安

一兒發搐醫以二陳湯薑汁竹瀝治之不効萬視其外候三關青氣兩頰赤色目常直視指如撚物曰此得之外感未與發散熱入於裏錢氏曰肝有熱則目直視得心熱則發搐又曰兩頰赤而目直視必作驚風小兒肝常有餘又乘木旺之時若與瀉肝若二陳湯陳皮半夏生薑之辛皆助肝之物經曰以辛補之所以無効乃用瀉青丸瀉肝木之有餘導赤散以瀉心之火一服而搐即止因其胎稟素怯脾胃且弱恐後作搐便成癇疾又與琥珀丸常服而安

一小兒周歲發熱而搐以瀉青丸投之不効乃問其發搐之狀其母曰搐過後只好睡以乳與之則飲不與則不思醒時則戲作貓兒聲見人則笑不發搐便是好子萬曰醫要識症藥要對症怪底前藥之不効也以導赤散服之一劑而安其父問故曰心臟屬火其聲為笑火生於寅屬虎貓者虎之類也貓聲而笑知非肝病乃心病也故以導赤散瀉其心火而安

一兒發搐五日不醒藥石難入萬針其三里合谷人中

而醒父母喜曰吾兒未出痘疹願結拜為父乞調養之萬曰曩用針時針下無氣此稟賦不足也如調理數年後出痘可保無事若在近年不敢許次年果以痘疹死

張子和治李一小兒病手足搐搦張曰心火勝也勿持其手當聽之此由乳母保抱太極所致乃令掃淨地以水洒之乾令復洒之令極濕挽卧兒于地上良久渾身轉側泥溷皆滿仍以水洗之少頃而瘥

子和曰小兒風熱驚搐乃常病也當搦時切戒把捉手足握持太急必半身不遂也氣血偏勝必痺其一臂漸成細瘦至老難治當其搐時置一竹簟鋪之涼地使兒寢其上待其搐風力行徧經絡茂極自止不至傷人

予嘗疹一兒見其左掌拳曲詢其由乃小時患驚搐為母抱持太急病愈手遂不能伸舒按此症若初得以大劑肝腎陰劑與之必能伸舒如故惜世無知者

葛茂林治少師楊公子當暑而驚眩已絶且移之木矣葛趨而入曰無傷也亟出之公曰兒已噤矣奈何劑也葛曰予無劑也所恃者天上雲耳雲生而凄凄欲

而陰氣舒而陽鬱消吾以清利物煮水而蒸于下其可瘳乎果如其法而疾愈迨暮兜復戲于庭矣（杭州府志）

薛立齋治一小兒三歲因驚搐搦發熱痰盛久服抱龍丸等藥反致面色或赤或青叫心肝二經血虛風熱生痰不足之象也用六味丸滋腎生肝血用六君柴胡升麻調補脾胃而安

高鼓峰治胡彥為子甫四歲盛夏發熱驚搐不已腰曲目直小便短赤面無神色醫作傷寒治不應高視之曰火燥生風風淫末疾非傷寒也用滋水清肝飲盡一劑而汗解便利熱退高曰瘧至矣立用五味異功散補脾加麥冬五味生脈散清暑十餘劑而愈

陸肯愚治鞠氏子年十一向因水土不便泄瀉瘦弱四月終旬蒸熱淫雨忽患頭面大腫手足身體亦微腫或謂風熱與蘇葉羌防升麻柴葛等汗大洩既而痰涌吐遂語言不倫身強直手足振掉即痙病也又謂急驚風用抱龍鎮心等丸不効脈之浮緩而弱此因脾虛土不勝水值溼氣盛行內濕與外溼相感而作腫治宜健脾滲濕乃反發汗致升動其臟腑之痰涎漏洩其經絡之津液宜其變症若此也因用六君子湯加歸芍投之一劑而吐止數劑而僵直振掉除又

數劑精神復加澤瀉倍茯苓數十劑而腫消瀉止
薛立齋治憲幕顧斐齋元孫二周項結核兩臂反張索
敗毒之藥意其症屬風熱傷肝血燥筋寧未敢付藥
翌早請症果係前症逐與六味丸一服侵晨灌之午
後肢體如常
一兒兩目動劄手足發搐數服天麻防風丸之類以祛
風化症前症不愈其痰益甚得飲食諸症稍愈視其
準頭及左頰色青黃脾主涎此肝木制脾土不能統
攝其涎非痰盛也遂用六君子湯加升麻柴胡鉤藤
二劑飲食漸進諸症漸愈又用補中益氣而安

萬密齋治一小兒痰壅發搐氣促而喘用礞石滾痰丸
桑白皮煎湯磨碎調服之喘定痰下搐亦止矣
一小兒七月發搐無時昏睡不醒不哭不乳搐之劄之
不痛嗆之鼻不嚏灌藥不入曰此真搐也不可治矣
密齋父治一兒滿月後發搐以至聖保命丹治之而安

小兒
慢脾風

喻嘉言治門人王生表兄沙無翼之子縱啖生硬冷物
一夕吐食暴僵不省人事醫以驚風藥治之渾身壯
熱面若裝硃眼弔唇掀下利沾污診畢謂曰此慢脾

風候也脾氣素傷更以金石藥重傷今已將絕故顯若干危症本有法可救但須七日方醒恐信不篤而更醫無識反得諉罪生謗王生堅請監督其家且以代勞且以壯膽於是用烏蝎四君子湯每日灌一大劑每劑用人參一錢渠家雖暗慌然見面赤退而色轉明潤便溲止而動移輕活似有欲言不言之意亦自隱忍至第六晚忽覺手足不寧揭去衣被始極訝人參之害王生先自張皇任其轉請他醫纔用牛黃少許從前危症復出面上一團死氣但大便不溲耳重服理脾藥又五日方甦

楊乘六治孫氏子慢脾症痰涎湧盛咳嗽身熱抽搐自汗嗜卧露睛撮空手振屢請補脾逐風消痰之劑不應楊曰此症風自內出本無可逐痰曰虛動亦不必消只補脾土諸症自退今面白睛散舌滑白天柱已倒虛上加寒非炮薑桂附何以追已去之陽而甦垂絕之氣哉乃寫參附養榮方與之且囑之曰如以稚幼純陽無補陽之法無挽回矣一劑症減三劑全除次用五味異功散加煨薑白芍而痊

薛立齋云一小兒常患傷停滯數服剋伐消導之劑以致脾虛甚患吐瀉慢脾風而卒

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

萬密齋治一兒脾胃素弱病瀉以理丸中服之瀉未止口內生瘡或謂前藥性熱助火復以冷藥投之身微熱睡則揚睛曰此慢脾風矣脾胃本虛瀉則益虛口中生瘡者脾虛熱也誤服冷藥則中氣益損昏睡不乳虛損之極也當急作調元湯倍加人參服之調理半月而愈

馬銘鞠治華叔蟾乃郎慢脾風五六日愈愈甫三四日即過多飲食連浴兩宵復瘓壅沈迷面目俱浮胸腹腫滿嘔吐乳食不進角弓反張二便交秘有欲進以牛黃丸者曰下咽死矣此病後虛症也然參且勿用

用參冬三錢枇杷葉三片貝母二錢半桑皮錢半杏仁一錢藿香一錢鮮橘球一枚蒼朮人乳炒八分橘紅一錢二分加燈心煎入薑汁服逾時小便隨利腹即寬諸症悉退盡劑竟愈廣筆記

小兒風癇

萬密齋治汪前川子年四歲七月病驚搐醫以拏法搐止之八月連發二次仍用搐法九月又發萬曰疾聚成驚驚久成癇幼科拏法即古之按摩法也病在營衛者可用之使營衛之氣行亦發散之意病在臟腑

則不能去矣久則痰塞心竅不亟治必成癇疾古所
謂五癇者自此得之因立方以黃連瀉心中之邪熱
為君枳實半夏去胸中之積痰為臣硃砂寒水石之
墜以安其神為佐甘遂逐上焦之痰飲麝香以利竅
為使神麴作糊丸如龍眼大每服一丸用猬猪心銅
刀批開納丸其中縛煮待心熟取丸和心服之幷飲
其湯名曰斷癇丸服豬心五箇乃愈

陳氏子二歲病驚風失治成癇少月一發來求藥萬用
六一散末分三色（巧於染）一色青黛相和名安魂散青入
肝肝藏魂寅卯時屬木竹葉煎湯下一色硃砂相和名寧神
散赤入心心藏神巳午時屬火燈心煎湯下一色入輕粉少許
名定魄散白入肺肺藏魄申酉時屬金薄荷煎湯下調理半年
而安大凡癇病初得之者十療八九如過二三年後
者不可治矣時醫有用吐法者有用滾痰丸下之者
徒損胃氣百無一効有以毒星丸治者一杯之水豈
能滅車薪之火哉

萬壻李中庵九歲時得癇病常昏仆口眼俱合手足不
動喉無痰聲但僵臥如醉人知其為心病也乃用東
垣安神丸去地黃加茯神遠志石菖蒲以通其心竅
南星珍珠末鍊華粉以墮其痰湯浸蒸餅丸如黍米

大凡用鎮墜藥及治上
焦病者九皆宜細　燈心湯下調治一年而愈

萬之季男七八歲時得癇病發則面先青慘目定口中有痰如嚼物狀昏仆一食頃乃甦因教其母但見面青目定時即以鵝翎探吐其痰亦是一法如法而行前後吐痰二升許癇竟不發如此調理三年而安大抵癇病皆痰也雖有五獸之名貓羊雞犬牛是也藥氏之說後人多非之各隨其臟詳見錢氏方中凡氣實者控涎丹氣虛者斷癇丸愈後以琥珀抱龍丹調之未有不安者但年深者不可治也

薛立齋治一小兒患驚癇吐痰困倦半餉而甦諸藥不效半年至十三而頻發用肥厚紫河車生研爛入人參當歸末搗丸桐子大每服三十五丸日進三五服乳化下一月漸愈又佐以八珍湯全愈

一兒七歲發驚癇令其恣食人乳後發漸疎而輕至十四復發用乳不效亦用河車丸數具而愈常用加減八味丸而安後至二十三歲復發而手足厥冷仍用前方佐以八味丸十全大補湯而痊又治數小兒皆以補中益氣湯六君子湯六味八味等丸相間用之皆得全愈

馮楚瞻治汪氏兒九歲因驚癇屢發抽掣語言不清勢

甚危篤脈之弦堅久按無力詢其由瘡後跣足行走忽脚面浮腫疑為草露之毒服清涼解毒數劑漸腫至腿又服五子五皮飲數劑忽一日僵仆卒倒乃成驚癇之疾絕曰此瘡後氣血大虛所以脚腫誤服清涼乃腫至腿復加滲利削伐致虛火上乘無故卒倒猶大人中風症也惟宜峻補氣血佐以舒經活絡之藥乃用當歸白朮白芍熟天麻熟地茯苓牛膝銀花秦艽熟附子之類三四劑後其勢稍緩以前方沖人參湯調理一月而安

萬密齋治一兒四歲病驚已絕針其涌泉穴而醒自後不發謂曰未服豁痰之藥恐發癇也不信未半年似疾迷飲食便溺皆不知時復昏倒果成癇矣問其發時能自知乎曰欲昏則發乃與錢氏安神丸加胆草服之教其父曰病將發時急指兩手合谷穴如此調理一月而安

一小兒十歲久得癇疾診之兩目渾白無有睛光語言蹇澁舉動痴迷辭不可治另延醫治之竟無成功

黃州守萬魯庵子病癇見其容貌俊偉性格聰明謂曰可治乃與琥珀抱龍丸方使自製服之

續名醫類案卷四十四

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

錢塘魏之琇玉橫撰

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

小兒

發熱

張子和治高巡檢之子八歲病熱醫者皆謂傷冷以熱藥攻矣欲飲水禁而不與內水酒竭煩燥轉生前後皆閉口鼻俱乾寒熱往來咳嗽時作遍身無汗又欲灸之張責其母曰重裀厚被暖炕紅爐兒已不勝其熱矣尚可灸乎先令服人參柴胡飲子連進數服下

浙江圖書館藏善鈔本

爛魚腸之類臭氣異常渴欲飲水聽其所欲冰雪凉水連進數杯節次又下三四十行大熱方去又與牛黃通膈丸復下十數行兒方大痊前復約五十餘行畧無所困冰雪水飲至一斛向炙之當何如哉

呂東莊治吳尹明于十歲患夜熱二年餘頷下忽腫硬如石面黃時時鼻衄如注脈之沉鬱之氣獨見陽關曰病敦阜也右関主脾胃沉鬱乃寔熱症敦阜字義繪示人以易也用石膏藿香葉庖子防風黃連甘草等頷腫漸軟面黃復正繼用黃芩枇杷葉元參枳殼山庖苗陳石斛天麥門冬生熟地黃等甘露飲也重加黃連而衄血夜熱悉除

陸養愚治李邑宰子年一十一于六月夜間忽發熱微汗頭微痛或為傷暑與香薷飲冷服病更甚且增喘嗽吐痰又謂脈氣浮數火熱上炎以芩連知母花粉清之喘咳不絕飲食不思睡卧不安脈之弦緊左倍于右面戴陽此風寒外束宜發散之或謂如此炎天且身常有汗何以宜表曰正因風寒散其衛陽之氣令外之陽氣拒而不得入故汗微微而不止內之陽氣伏而不得出故身翕翕而壯熱若解散其邪則外者得入內者得出自汗止身涼矣用乾葛為君蘇葉防風為臣前胡白芷川芎為佐桔梗杏仁草甘為使熱

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

爛魚腸之類臭氣異常渴欲飲水聽其所欲冰雪凉水連進數杯節次又下三四十行大熱方去又與牛黃通膈丸復下十數行兒方大痊前復約五十餘行畧無所困冰雪水飲至一斛向炙之當何如哉

呂東莊治吳尹明子十歲患夜熱二年餘頷下忽腫硬如石酌黃芩時時鼻衄如注脈之沉鬱之氣獨見陽關用黃芩枇杷葉元參枳殼山庶茵陳石斛天麥門冬香葉庖子防風黃連甘草等頷腫漸軟面黃復正繼生熟地黃等甘露飲也重加黃連而衄血夜熱悉除

續名醫類案卷四

當作猶 右閔主脾胃沉鬱乃定熱症敦阜字校繪示人以知易也

陸養愚治李邑宰子年十一于六月夜間忽發熱微汗頭微痛或為傷暑與香薷飲冷服病更甚且增喘嗽吐痰又謂脈氣浮數火熱上炎以芩連知母花粉清之喘咳不絕飲食不思睡卧不安脈之弦緊左倍于右面戴陽此風寒外束宜發散之或謂如此炎天且身常有汗何以宜表曰正因風寒散其衛陽之氣令外之陽氣拒而不得入故汗微微而不止內之陽氣伏而不得出故身翕翕而壯熱若解散其邪則外者得入內者得出自汗止身涼矣用乾葛為君蘇葉防風為臣前胡白芷川芎為佐桔梗杏仁草甘為使熱

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

服後覆汗大泄少頃喘咳壯熱頓減二劑全愈

薛立齋治儒者薛衡甫子年七歲身羸發熱面黃皆以為肉傷瘀血欲下之謂乃脾臟受傷投以六君子湯加煨薑兩服飲食頓進數服諸症全愈

萬密齋治一兒發熱日晡尤甚或作瘧作潮熱治俱不効曰此胃虛有宿食也謂瘧疾則寒熱有發有止謂潮熱則發有時如水之潮過即退次日依時再發此兒身嘗温熱至申酉時則甚故知是宿食發熱也或曰有所據乎曰出仲景傷寒正理論陽明病證云潮熱者實也宜下之以三化丸下之而愈

一兒驚風時熱不退有議用小柴胡湯者有欲用竹葉湯者有欲用涼驚丸者曰大驚之後脾胃已虛宜温補之三方寒涼不可用也乃與理中湯用炒乾薑一劑熱除

三府張公子初冬三日發熱又二日熱益甚目直上視口多妄言或作風治無効至廿七日診之曰病勢將退但肺熱未除耳問何故曰三關黃潤兩目精明此病當愈也惟正面戴陽喘氣上息此肺虛熱耳與小阿膠散咸阻之幸不聽一劑喘止熱退欲食而安

萬密齋治黃學儀子病熱不退先君治之已八日不効

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

全叩之全齋名曰曰夜發熱小便赤大便難再叩藥曰
先與胃苓丸痛今與涼驚丸全曰不効矣先君曰汝
能已此病乎全對曰此名風熱乃肝病宜用瀉青丸
熱即退矣黃氏相招即令全往如法治之五日而愈
然今之小兒
則宜養青矣

余氏子病熱諸醫汗之下之和解之皆不効以虛熱也
用調元湯加炒乾薑未盡劑而熱除

密齋長男幼多疾一日病瘧後潮熱日益瘦先父母憂
之全曰此府熱也用小柴胡加鼈甲當歸川芎陳皮
青皮為丸服之愈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

馮楚瞻治李氏兒八歲病熱旬餘發散和解苦寒之劑
備嘗無效勢日危篤診之形肉枯槁牙齒堆垢厚而
焦黑唇舌燥裂耳聾目盲遍身疼痛壯熱無汗譫語
煩躁脈之沈微欲脫陰寒之候也此釜底無火鍋蓋
乾燥之象上之假熱由於下之真寒也乃重用人參
熟地少加附子壯水益火服後熱退夜半思食次
其脉更虛但神氣少清爽乃倍進前藥三四劑後漸
瘳不十劑全愈

馮楚瞻治洪氏兒未及一周時當暑月壯熱多日神氣
困倦唇舌焦燥飲乳作嘔五心亦熱如烙脈洪數而

弦醫與發散消導之劑復疑麻疹更為托表馮曰久熱傷陰陰已竭矣復加托表陽外越矣若不急為斂納何以續陰陽於垂絕哉乃用熟地四錢麥冬一錢五分牛膝一錢二分五味子二分製附子四分一劑熱退次日加炒黃白朮一錢六分另煎人參冲服而愈

姜居安治一貴官携家過沛抵沙河稚子病居安告之曰請勿驚但得沙一斗疾即愈官如其指布沙舟中令兒卧其上久之兒手足能動不數時而疾良已貴官問故曰小兒純陽當春月而衣被皆湖綿過於熱故得涼氣而解（江南通志）

張景岳仲男生于五月於本年初秋忽感寒發熱脈微緊然素知其臟氣屬陰不敢清解遂與芎蘇羌芷細辛生薑之屬數月小兒何能堪此冀散其寒一劑熱不退反大漓二日不止繼之喘愈漓則愈喘見其表裡俱劇乃用人參二錢生薑五片煎汁半盞未敢驟進恐加喘也與二三茶匙呼吸仍舊又與三四匙息稍舒遂與半小鍾覺有應遂自午及酉完此劑適一醫至曰誤矣馬有大喘可用參者速宜抱龍丸解之但唯唯仍用人參二錢五分如前煎湯自酉至子盡其劑氣息

遂平酣睡瀉止而熱亦退矣所以知其然者觀其因瀉反喘豈非中虛設有實邪自當喘隨瀉減向使易以清利中氣脫而死矣必反咎用參之誤也孰是孰非何從辨哉此醫之所以難為而易為也因紀此以見溫中散寒之功其妙有如此哉

按是症或是小兒變蒸之熱誤用峻表傷其元氣以致喘利幸伏獨參挽回後之所云亦過後詳籤耳

一兒感冷惡寒大熱用發表藥則汗出熱退過一二日復熱大便秘必裡未解也服四順清涼飲利一行熱退隔日又熱小便赤服導赤飲熱退過三日又熱庸劣者幾無措手矣診其脈已和既發汗又利大小便其兒已虛陽氣無所歸皆見於表所以熱以六神散和其胃氣加烏梅一枚令微有酸味收其陽氣歸內自此愈（無名氏抄本）

又一小兒積熱表裡俱熱頻赤口乾小便赤大便焦黃用四順飲利動藏府熱乃去既而復熱裡解而表未解也發散微汗熱乃去隔日又熱此無他表裡俱虛氣不歸元而陽浮于外所以再熱實非熱症也只以六神散入粳米煎和其胃氣則陽氣歸內身體自涼

（上二案表裡變化）

小兒嘔吐

萬密齋治教諭熊文村子二歲病嘔吐更數醫不効飲食入口即吐出萬視之曰病可治也問用何方曰理中湯曰服多劑矣不効奈何曰此在內經乃陰盛格陽之病寒因熱用熱因寒用伏其所王先其所因則效矣乃作一劑取獖豬胆汁童便各半和藥炒乾煎而服之（即仲景白虎湯入人尿豬胆汁之法）吐立止後稱渴以湯飲之復作吐萬曰凡嘔家多渴者胃脫之津液也當得一二時吐止胃氣立津液生渴自止矣令將前藥查再煎服之仍禁其飲食半日而安熊問同是理中湯前用之不効今用之而効何也曰公子胃寒而吐當以熱藥治之乃寒盛于中投之熱劑兩情不得故不効也今以理中為治寒之主用猪胆汁之苦寒小便之鹹寒為佐以從其格拒之寒藥下於咽而寒相得入于胃陰體漸弱陽性乃發其始則同其終則異故曰伏其所王先其所因也此軒岐之秘旨啟元子之奥義張長沙之良法也後王民肅子半歲嘔吐不納乳昏睡仰卧而努其身有作慢風之候亦以理中末

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

三分用水一杯煎至半杯入膽汁童便各一匙攪匀
徐徐灌之而瘥

鄭氏女患嘔吐萬視其症乃傷食吐乳也家人云無乃
用理中湯去甘草加丁香藿香不効又作胆汁童便
法亦不効四日後吐出飯半椀詢其家人曰此兜數
日不食何能有此始吾言傷食汝固云無故治不見
効遂取脾積丸投之取下惡糞如靛乃五日前所食
雞子黃也所吐之飯即其時所食也壅塞腸胃格拒
飲食所以作吐下之即愈
一兜自滿月後常吐乳父母憂之諸醫不能止一日問

萬萬曰嘔吐者非常有之病也今常吐乳非病也然
小兜賴乳以生頻吐非所宜也其間有母氣壯乳多
縱兜飽足飽則傷胃所食之乳涌而出此名溢乳如
瓶之注水滿而溢也宜損節之更服肥兜丸兜之初
生筋骨軟弱為乳母者常懷抱護持可也不然則左
右傾側其乳流出此名唾乳如瓶之側其水流出也
能緊護持則不吐也有胃弱者不能受乳以變化之
吐出無時所吐不多此名哺露如瓶之漏不能容受
也當補其脾胃助其變化可也亦以肥兜丸主治自
愈

龔子才治一小兒傷食嘔吐服尅伐之藥嘔中見血用清熱凉血之藥又大便下血唇色白而或青問其故龔曰此脾土虧損肝木所乘而然也令空心用補中益氣湯食遠用異功散以調補中氣使涎血各歸其源而愈

薛立齋治一小兒每飲食失節或外驚所侮即吐瀉發搐服鎮驚化痰之藥而愈後發搐益甚飲食不進雖參朮之劑到口即嘔乃用白朮和土炒黃用米泔煎數沸不時灌半是仍嘔次日灌之微嘔再日灌之欲嘔此後每服三二是漸加至半杯不嘔乃濃煎服而愈

一小兒停食服通利之劑作嘔腹脹此脾胃復傷也用補中益氣湯而愈

萬密齋治一兒初生即吐或欲用錢氏木瓜丸曰不可小兒初生胃氣甚微或有乳多過飽而吐者當緩緩與之或因浴時客寒犯胃而吐者當用乳汁一杯用薑葱同煎少與服之或因惡露涉水停在腹中而吐者宜以炙甘草煎湯而吐去之奈何用木瓜丸以銕粉梹榔之重劑犯其胃中初生中和之氣耶故常語人曰錢氏小兒方非先生親筆乃門人附會之說也

大還治一小兒生方九日即嘔吐腹脹作脾氣虛寒用半夏陳皮薑汁蔔子丁香藿香砂仁各少許煎飲半酒盞而安

小兒泄瀉

有小兒病瘧滑食略化大便日十餘次四肢羸瘦腹大食訖又飢此疾正是大腸潰熱于胃善食而瘦又謂之食疳者時五六月間脈洪大按之則絶今六脈皆單洪則夏之氣獨然按之絶則無胃氣也經曰夏脈洪洪多胃氣少曰病但洪無胃氣曰死夏以胃氣為本治療過于失時不逾旬果卒

滑伯仁治胡元望女生於六月病泄瀉不已與灸百會穴即愈

滁州趙使君云其女年甫周歲忽苦臟腑每所下如雞子黃者半盆許數日之間幾至百往漸作驚風症有一士大夫教以鍾乳粉二錢以棗肉和搜令取意食之不然以濃煎棗湯調鍾乳服亦可以小兒只用一錢已平復矣傳方者云他日或作少瘡瘍不足慮兜子清老年三歲過鎮江時病久瀉甚危用此法服至半而遂安亦不生瘡是方

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

萬密齋治孫監司女五歲病瀉諸治不効萬視之曰瀉久傷陰津液不足故熱發而渴也渴飲湯水多則脾受溼而瀉益不止腎益燥而渴轉甚法當專補脾胃則瀉渴止而津液生熱自除矣用白朮散作大劑煎湯戒勿飲水以湯代之未半日進兩劑因思肺為津液之主肺金大燥不能生水故渴不止乃加法製天花粉葛根等分只一服其夜渴減瀉亦少次日仍用前方渴瀉俱止問何不用胡黃連銀柴胡以退其熱曰二藥性苦寒恐傷骨氣故不用仍服白朮散十餘日身涼而愈後誤啖姜菱病喘而面目浮腫以錢氏異

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

散加藿香葉紫蘇一服而腫去喘止

胡三溪子多疾三歲病瀉諸治不効萬視之曰此傷食瀉也夫瀉有三症熱瀉者糞色黃而渴冷瀉者糞色青而不渴食積瀉者糞酸臭而腹痛或瀉或不瀉此子之疾所下酸臭乃積瀉也用丁香脾積丸一服而愈三溪曰巴豆下積而止瀉何也曰本草云巴豆未瀉者能令人止積去瀉止自然之理也

萬石泉子此人亦是兒醫病瀉自作理中訶子豆蔻與之未効延萬治渠書一牛字安檯上蓋治愈當以牛為謝也

即以其字卜之牛下橫一撥乃生字也曰予到今即之病即愈矣與以陳氏肉豆蔻丸合胃苓丸車前草煎湯下一服而瀉止石泉欲再進一服曰腸胃嬌嫩不得已用藥中病即止不可過也越三日身發紅斑狀如錦紋石泉頗究心傷寒謂瀉後發斑與陽明症下之太早熱氣乘虛入胃之症同宜服化斑湯但石膏性寒瀉後脾虛恐不可用萬曰有是病則投是藥何不可者請用之未盡劑而斑沒身涼

胡東郊子一歲六月中病瀉治不効瀉下頻併黃白而後重發熱而渴時天甚暑皮膚燥而無汗髮稀成穗

萬曰此熱瀉成痢矣瀉下頻併後重者裡熱也稟稟者脾熱之邑也白者乳汁不化猶邪熱不殺穀也口渴皮膚乾燥髮成穗者津液枯也乃用四物湯合黃連香薷飲令乳母服之以解其暑毒初用四君子湯不應便用四君調六一散與兒服之解其裡熱次用四君子湯合黃芩芍藥湯以止其瀉三用白朮散以止其渴四用白朮散加升麻以舉其下陷之氣五用白朮散加烏梅肉以收其滑泄之氣皆不効其母託人相問萬曰五法不中病術將窮矣只有一法以黃連木香訶子肉豆蔻乾蟾使君子肉砂仁等分為末粟米糊

九陳倉米炒熟煎湯下服三日滿頭出熱瘡乃小癒身有微汗渴瀉俱止

萬之子甫四歲六月病瀉時萬出外妾凡甘與藥調之不効加以大熱而渴萬聞馳歸問所用何藥曰理中丸因知其犯時禁也用遠熱乃製玉露散澄水調服而愈

徐氏子歲半六月病瀉甘治之不効大熱大渴煩躁不安萬往視問向服何藥甘曰玉露散初服瀉已止因熱未除再與之復泄至今五日病益甚教用理中湯加熟附子治之如服下越加煩躁再進一劑即愈若不煩躁不可治也萬歸半月後甘攜酒來拜問前者甥病泄用理中丸不効師教以玉露散止之今徐氏子病泄用玉露散不効師教以理中湯加熟附止之何也萬曰理中丸之止瀉補中氣之藥也玉露散之止瀉解暑毒之藥也前者甥之病汝用理中丸是也中病即止不可再服因用之太過犯時禁也經曰用熱遠熱故以玉露散解之今徐氏子病汝用玉露散亦是也中病即止不可再服因用之太過犯臟禁也脾喜溫而惡寒故以理中湯加熟附救之甘曰又謂理中湯後加煩躁者可治否則不可治者何也曰夏

至一陰生坤乃六月之卦易曰坤為腹陰內而陽外坤屬土喜暖而惡寒玉露散雖治暑瀉之藥其性寒過劑則脾土反傷陰盛于內陽脫于外吾見其兜面赤目張口開唇燥大渴此陽脫症也故用理中熟附以扶陽抑陰不加煩躁則脾為死陰不可救矣若加煩躁則胃氣猶存但藥不敵病而然再進一服則陽勝陰退而安矣

胡氏子夏月病瀉醫理中以理中氣五苓以利小便豆蔻丸以止瀉皆不效萬視其發熱昏睡腸鳴而利水穀不化曰此傷風泄瀉也經曰春傷于風夏生飧泄飧泄者謂水穀不化也初病時宜黃芩芍藥湯加羌活防風發散之劑今病久中氣弱矣用建中湯加白朮茯苓服三劑而愈

薛立齋治一小兒瀉而大便熱赤便小澁少此熱蘊於內也先以四苓散加炒黃連一劑其熱稍退又用七味白朮散去木香二劑熱渴頓止後以四君升麻調理而痊

一兒九歲食炙煿之物作瀉飲冷諸藥不應肌體消瘦飲食少思用黃連一兩酒炒焦為末入人參末四兩粥丸小豆大每服四五十丸不拘時白湯下服訖漸

愈又用五味異功散加艾麻服月餘而瘥後不禁厚味復作瀉飲冷服肥兒丸異功散而愈

龔子才治一兒久瀉兼脫肛小腹墜重四肢浮腫面色痿黃時或蕪青諸藥到口即吐審乳母憂鬱傷脾大便不實先用補中益氣湯五味異功散及四神丸調治其母不兩月子母俱痊治兒病先察其母極是要著

喻嘉言治沈氏子因瘡後食物不節病瀉瀉久脾虛病瘡遂爾腹痛脹大三年來消導無算脹瀉如初更服參苓白朮稍效然亦勿瘳病本腹脹更兼腸癖腸癖者大腸之氣空洞易走胃中傳下之物總不停畜癖出無度腥水不臭十中五生五死之症也今則病加四逆矣暮熱朝涼一逆也大渴引飲二逆也氣喘不能仰睡三逆也多汗煩躁不寧四逆也蓋初瘡時寒熱交作猶是陰陽互戰迨瀉久亡陰乃為夜熱至引外水以自救醫不清其源重以香燥破氣之藥助火劫陰於是喘汗煩躁並作治亦難矣強求用藥乃以清燥潤肺為主阿膠地黃門冬等類同蜜熬膏三斤此兒三年為藥苦得甘味稱為糖也日爭十餘次服之半月藥盡遂愈另製理脾末藥善後全安

馮楚瞻治一兒滑泄半載肌肉瘦削脾胃之藥備嘗無

效此久利不已脾胃之中氣固虛而腎家之下元更虛閉藏之司失職當不事脾而事腎可也以八味丸用人參炒老米同煎湯化服不一月全愈

張子和曰余嘗告陳敬之若小兒病緩急無藥不如不用庸醫但恐妻妾怪其不醫宜湯浸蒸餅空軟丸作白丸給其妻妾以為真藥使兒服之以聽天命最為上策歲在丙戌群兒皆病泄瀉但有用藥者多死蓋醫者不達溼熱之理以溫燥行之故皆死惟敬之不與藥用余之言病兒獨存

張三錫治一稚子久瀉以參苓白朮散加黃連肉豆蔻少許作丸用燈心湯化下十數丸愈

萬密齋曰一兒病瀉大渴不止醫與五苓散玉露散皆不効病益困腮妍唇紅曰不可治也泄瀉大渴者水去穀少精液不足故也法當用白朮散補其津液乃服五苓玉露滲利之劑重亡津液脾胃轉虛訣云大渴不止止而又渴者死泄瀉不止精神好者死不信三日後發搐而死

汪城南子病瀉十餘日不止或以胃苓丸一粒丹服之不効乃與豆蔻丸五十胃苓丸五十陳倉米煎湯下一劑而止矣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

效此久利不已脾胃之中氣固虛而腎家之下元更虛閉藏之司失職當不事脾而事腎可也以八味丸用人參炒老米同煎湯化服不一月全愈

張子和曰余嘗告陳敬之若小兒病緩急無藥不如不給（疑當作給）（以為真藥使兒服之以聽天命最為上策）

工薪歲在丙戌群兒皆病泄瀉但有用藥者多死蓋醫者不達溼熱之理以燥行之故皆死惟敬之不與藥用余之言病兒獨存

張三錫治一稚子久瀉以參苓白朮散加黃連肉豆蔻少許作丸用燈心湯化下十數丸愈

萬密齋曰一兒病瀉大渴不止醫與五苓散玉露散皆不効病益困腮妍唇紅曰不可治也泄瀉大渴者水去穀少精液不足故也法當用白朮散補其津液乃服五苓玉露滲利之劑重亡津液脾胃轉虛訣云大渴不止止而又渴者死泄瀉不止精神好者死不信三日後發搐而死

汪城南子病瀉十餘日不止或以胃苓丸一粒丹服之不効乃與豆蔻丸五十胃苓丸五十陳倉米煎湯下一劑而止矣

小兒吐瀉

萬密齋治一小兒周歲吐瀉並作時天大寒醫用理中胃苓丸服之不効萬曰此表裡有寒邪未得發散也取益黃散與之其夜得大汗而止

一女歲半亦吐瀉並作此傷食也前有外感風邪故用益黃散温散其表裡之寒此只是傷食用胃苓丸一粒丹陳壁土湯下調其脾胃消其積食而吐瀉俱止

一兒暴吐瀉上下所出皆乳不化用理中丸服之效一兒暴吐瀉上下所出皆黃水中有乳片用二陳湯加黃連薑汁炒煎服效或問二病同而治之異者何也曰所出之乳不化者胃有寒也故以理中丸急温之所出乳片不化者胃有熱邪邪熱不殺穀宜半夏黃連以解之此同病異治法也

張景岳季子生於燕地白露時甫半周偶感寒吐瀉大作即用温胃和脾之藥不効隨用理中等劑亦不効三日後加人參三錢及薑桂吳茱萸肉豆蔻之類亦不効至四五日則隨乳隨吐吐其半而瀉其半腹中毫無所啬矣不得已用人參五六錢製附薑桂各一二錢下咽即吐一滴不存而所下之乳白潔無氣猶

是乳也其形氣之危已萬無生理度其寒氣犯胃舍參薑桂附之屬何以為治既乃悟蓋胃虛已竭藥之氣味畧有不投則隨拒而出且附子味鹹亦能致嘔必其故也必得甘辣可口之藥庶胃氣可安乃用胡桃三錢搗碎煨薑一兩水二鍾煎八分另用人參二兩水二鍾煎一鍾以茶匙挑合二湯以配其味凡用參湯之十加椒薑湯之一其味甘而辣正得可口之宜遂温置熱湯中徐徐挑與之經一時許皆咽下自後乳藥皆安但瀉仍未止計半日已盡二兩之參矣參盡後忽躁擾呻吟煩劇甚家人皆謂熱藥内燒所致因思藥果不對何以初甚相安此必數日不食胃氣新復倉廩空虛飢甚則然也取粥示之果張皇欲得其狀甚急乃與一小盞盡一呷而盡又欲之遂與半椀猶不足又與半椀始寂然安卧次日復加製附得瀉止全愈原其受病之深用藥雖當氣味不投猶艸獲效至其回肌發躁使非詳悟妄用清涼一劑則全功盡棄而仍歸罪于用參薑者矣

續名醫類案卷四十五

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷四十六

錢塘魏之琇玉橫撰

小兒癇疾

萬密齋治一兒歲半病癇二日一發久不愈黃瘦面浮腫腹脹用平癇養脾丸治之愈人參白朮茯苓甘草當歸川芎陳皮夏麴蒼朮厚朴柴胡黃芩猪苓澤瀉草果常山青皮辣桂鱉甲各等分於五日或三元八節天月德要妥普護福生除開破日修合酒煮麴糊

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

九麻子大陳米湯下

一兒病瘧醫用截瘧藥內有砒丹三截之遂成疳瘧其父懊恨前藥之悞萬用平瘧養脾丸治瘧集聖丸治疳調理一月而愈

一兒病瘧一日一發萬用家傳斬鬼丹截之止三日後一發再截之俱三四日又發其父怪而問之時六七月暑熱疑其必吱生暑故止而復發也問之果然乃禁之先用胃苓丸調理三日更以斬鬼丹截之遂愈

五月五日午時用黃丹研獨頭大蒜研如泥同杵衆手為丸隨人大小蒸日五更取長流水面東下

汪氏子七歲病瘧三年諸醫不効萬視其外候面色黃白山根帶青腹大而堅此久瘧成癖癖為潮熱當與補脾消癖瘧熱自除恨無九肋鱉甲耳汪求得之回立一方用人參白朮青皮陳皮三稜莪朮木香砂仁當歸川芎黃連柴胡鱉甲為末神麴糊丸炒朱煎水日三服調理五十餘日而安

李氏女七歲先患外感後變瘧曰用截藥變作痢至冬痢雖止瘧益甚萬視其外候大骨高起大肉陷下髮稀目陷面黃鼻燥不思飲食唯吱蓮肉乃內傷脾虛疳勞症也醫皆謂不可治萬云可治也至春必愈用

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

集聖九一料次年三月果安
王氏子病瘧三日一發用胃苓丸合小柴胡湯作丸服
之初三日一發又間一發後一日一發初發於午後
漸移於辰刻問曰連日服藥瘧發轉頻何也曰此瘧
將退之漸也蓋瘧三日一發者那氣深難已一日一
發者瘧氣淺易愈午後發者那在陰分難已午前發
者那在陽分易愈今自三日移至一日自陰分移至
陽分故云將退之漸也時有丁醫聞其說笑曰那得
許多議論吾有秘方治瘧如神遂求治之不知其所
用何物自此仍三日一發發以酉時至次日巳後始
退萬仍為調理一月而愈
孫文垣治丁氏子纔二歲患瘧母上壅喉嗽每午後發
熱至子丑時乃退終日啼哭不止鶩口白屑神氣大
弱又痘後遍身瘡疥未愈諸醫有灸之者有剌之者
有以膏藥貼之者種種施之不應孫曰乳下嬰孩臟
腑脆薄不可亂攻亂補參者足以增其欵灸剌遶以
驚其神安能取効教以白术鱉甲各一錢五分青蒿
麥芽陳皮各八分烏梅一个貝母知母各六分甘草
三分八帖全愈
水鑑仙人治百日兒瘧歌云瘧是那風寒熱攻直須術

治免成空常山剉作人形狀釘在孩兒生氣宮如金生人金生在巳即釘巳上木生人釘亥上火生人釘寅上水生人釘申上也常山乃截瘧之藥（本草綱目）萬密齋外孫未周歲因傷食發悶日瘧在子丑時發則搐咬牙呻喚大便黃綠勢而出以口吮母口得乳即止瘧後汗出心下跳腹中鳴頂微熱未十日成疳矣面色㿗白顱陷髮疎兒漸羸瘦此先受暑濕暑則為瘧濕則為痰又傷飲食脾土衰而肝木旺瘧曰食瘧疳曰食疳用加減當歸龍薈丸加味參苓白朮散其母服四物湯加柴胡升麻麦冬木通酒芩梔梗各五分薄荷七分燈草水煎服而愈

一兒病瘧醫以柴苓湯投之二三日不効乃用平瘧養脾丸而愈一女先驚後瘧瘧久成疳用集聖丸調理一月而安一兒先瘧後驚用調元湯琥珀抱龍丸而

瘂

一兒久瘧成癖曰癖生熱或三五日一發發則十餘日不止常在申酉時但不寒顫又微惡寒即發熱熱亦不甚發過不渴不頭痛用消癖丸平瘧養脾丸間服半年而愈

馬元儀治金氏子寒熱如瘧兩脉弦虛無力脉弦為風

發脉虛為氣少正虛則外風得襲入乃為寒熱不當與氣實有餘者同治乃用補正散邪一法用人參桂枝乾薑肉桂半夏廣皮炙草等調理數日而安

小兒 痢

萬密齋姪七歲久痢不已為製丸劑治之丸者緩也以治久病也用錢氏異功散合香連丸為主加猪苓澤瀉車前子以利其小便神麯麥芽以消其積滯訶子肉豆蔻炒乾薑以止痢合之曰和中丸約二兩許服之未盡而痢止此為衆秘治久痢不止方也

汪某年六十生一子三歲病痢醫下之太過脾胃受傷中氣下陷又一醫以豆蔻香連合粟殼等止之痢益甚後重而少物萬視之曰老年之子胎稟已弱下之太過而下陷法當舉之陳坐未盡劫澁之劑亦不可用也乃以錢氏異功散加香連歸芍山藥蓮肉神麯糊丸服之旬日痢止元氣未復也令前藥調之遽有人曰吾有阿魏治痢甚效即以五分作丸五粒令兒服之萬至曰阿魏性熱有大毒耗人元氣虛弱之人不可服也汪曰今早服一丸飯後服一丸服後熟睡未醒萬曰痢止矣何必服藥此藥太峻元氣被傷恐

非正睡也試呼之不應推之不知入視白眼張露氣已絶矣詳記之以為輕妄用藥之戒

聶久吾児周歳餘因乳少粥飯成積又多趺食致積痢先水瀉後膿血時已斷乳飲食少進睡不閉目肛如竹筒指紋已通命関症極重乃用清熱消積等藥以茶匙緩緩灌之覺精神極困時另以人参麥冬煎湯少少與之以保元氣如是数日痢漸止但其肉削如柴調養半年始復舊

萬密齋治孫撫軍女五月病痢至七月未愈萬至病亟矣用人参茯苓甘艸當歸白芍黄芩車前陳皮各等分炒乾薑少許煎服畧差五日大安孫問諸醫皆用木香黄連今乃不用所用皆非治痢之藥而効者何也曰此乃河間黄芩芍藥湯方也所謂調其氣則後重除養其血而痢止之法也

祝道士明祖嚴禁火居道士想遂弛長子七歳病痢半年不愈萬與一方用人参白术茯苓甘草陳皮山藥黄耆桔梗木香黄連訶子肉豆蔻車前炒乾薑澤瀉神麹當歸麥芽白芍為末水麵丸米飲下一月而安名和中丸

一女十歳患痢久不止脉洪数或曰下痢脉宜小今脉

洪數恐難治萬曰無妨玉函經曰欲識童男并童女決在寸関并尺裡自然緊數分明都緣未喪精華華氣此童女脉宜如是胃氣尚強不久自愈果數日痢漸止

張縣尹女半歲病赤白痢甚苦萬用黃連一錢木香五分石蓮肉五分陳皮七分炒乾薑二分為末神麴九黍米大陳米湯下而安又其子生九月病紅痢萬曰此傷熱乳也宜子母並療乳母服四物合黃連解毒湯兒服香連丸七日而愈

張景岳治都閫錢旭陽長男年及兩周季夏間以生果傷脾先瀉後痢自著醫知其生冷所傷乃與參朮薑桂溫脾等藥不効漸至脣生瘡乃謀之張曰此兒明為生冷所傷而不利溫藥奈何張曰此曰瀉傷陰蕪之辛辣遽入而虛火上炎耳非易以附子不能令火歸元也曰用二劑而脣口瘡痛咽腫倍甚外見於頭面之間病更劇復詢曰用藥不投如此豈真因濕生熱耶張診之曰上之脉息下之所出皆非真熱本屬陽虛今熱之不効雖在可疑然究其所歸意者藥猶未及乎錢曰尚有一證大喜熱飲人所不能入口者彼安然吞之雖喉中腫痛若此弗顧也此迨真寒之

驗乎張曰是矣是矣遂復增附子一錢五分及薑桂
肉果人參熟地之屬其瀉漸止其喉口等症亦不日
全狀矣疑似之間難辨如此臨症者可不慎哉
喻嘉言治葉氏幼男病痢噤口發熱嘔噦連聲診其尺
脉上涌而無根再診其尺脉亦上涌而無根曰此非
噤口痢症乃胃氣將絕之症也噤口痢者虛熱在胃
壅遏不宣故不思食治宜補虛清熱兩法此日苔寒
之藥所傷不能容食唯有温補一法而已以理中湯
連進二劑不一時下十餘行乃恐誤求更方曰我意
在先救胃氣之絕原不治痢即治痢人之大小腸盤

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

疊腹中甚遠雖神仙不能遽變其糞今藉藥力催之
速下正為美事為可疑之遂與前藥連服二日人事
大轉思食不噦四日後只便糟粕以補中益氣調理
旬日全安此可見小兒之痢縱峽傷胃者多內有積
熱者少尤不宜用痢疾門中通套治法也

陳慶長知縣名祖永云頃守官南康其子年十歲患噤
口痢水漿不入者數日惟能進藥同官家有方書載
一治法試用之一服而痢稍疎三服遂索粥飲損食
半盞許自是痢止而安其法用乾山藥一半炒黃色
一半生用研為細末煮飲調下

人有小女患痢脫肛叔權傳得一方用艸茶葉一撮薑
七片煎令服而愈然不知其方所自来也後閱蘇文
始知生薑呌咀煎茶乃東坡治文潞公痢方也資生經
陳良甫云甲子夏秋間僕處一趙姪畧廳有姪孫年九
歲病痢甚重台小方脉未至遂令僕診之六脉平細
以證觀之是血痢其實非也只是血水而已僕云記
得調中湯治狀云夏月初秋忽有暴寒折于盛熱結
于四肢則壯熱頭痛寒傷于胃則下痢或血或水或
赤壯熱冥悶脉數宜服此遂合之去大黃服之而愈
良方

姚公遠幼子病痢一醫誤下之遂下純血氣喘身熱不
思食仲淳至亟以人參四五錢石蓮子白芍升麻橘
紅草石蚕扁豆滑石炙灿一劑喘平血止又數劑痢
止臨別囑公遠曰兒百日内不出痘則生以下多元
氣未復故也未幾即痘果殤家弟稚端幼病痢甚日
夜數十次服數劑即愈人參三錢吳茱萸泡七次一
錢川黃連薑汁炒一錢後二味飯上蒸水煎至八分
温服如不受以藥一匙間米湯一匙漸漸飲之胃氣
漸復如頭痛發熱加石膏六錢乾葛一錢別調六一
散四錢冷水服廣筆記

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

小兒 瘧痢

陸祖愚治張益之男年十四患瘧截早變成痢疾百滿晡熱眼脫紅腫而痛所下紅白相間日夜三四十次或與消積温補斂澁俱不効而轉劇脉之左手弦數右関沈實右寸浮滑此瘧疾失表又内傷飲食風熱洎于腸胃而為病也先用山查枳實芩連木通澤瀉小柴胡甘灬并下香連九服九藥兩許煎藥四劑遂積減胃開調理旬日但下淡白積一二次又數日大便實矣忽一日仍不思食日行二三次十餘日粒米不進計大便數十行蓋連日粥食過多而復傷也今積滯已行腸中潤滑無所慮矣仍用小柴胡歸芍知芩查橘之類宿垢盡行胃氣仍復乃加減前方入參术調理而安

萬密齋治李氏女初病瘧又病痢溲發熱少食日晚蓮肉五六枚乃與集聖九而愈

小兒 嗽

張子和曰鹿子春一小兒八歲夏月病嗽羸甚余欲涌之子春以為兒幼弱懼其不勝少難之一日因飲酒

家人與之酒傷多大吐吐定而嗽止蓋酒味苦苦屬
通劑乃大悟余之言也
萬密齋治胡元溪子五歲春病嗽醫用導痰丸乍止乍
作至夏轉作又一醫用五拗湯不効或以導痰或以
五拗發表攻裏其嗽益加至百十聲不止面青氣促
口鼻出血勢急矣曰自春至秋病已半年治之不易
乃用二冬二母甜苓甘桔蘇子茯苓陳皮去白連進
三劑嗽只二三十聲一醫以二陳加防風百部杏仁
紫菀桑皮萬曰肺氣已逆吾方降之其咳稍罷防風
百部升發之品似不可用彼云防風百部乃咳嗽聖

藥也服之氣上逆而咳百十聲不止口鼻血復來再
求治仍用前方取生茅根搗自然汁和藥與之五日
而血止去茅根或加款冬杏仁以止其咳或去黃芩
甜子加人參白朮以補其脾或加阿膠以補其肺調
理二旬而安蓋方春時多上升之氣肺感風寒當與
發散等藥乃攻裏之劑肺金本虛而反瀉之此一
逆也夏天火旺肺金受剋當用清金瀉火之劑五拗
湯乃發散藥也用熱犯熱此二逆也一汗一下肺金
大虛矣方秋時氣應降而不降反用升發之劑此三
逆也今用收斂清降之藥以平其浮游之火火衰

屬陽明胃
屬太陰肺 監注

于戌時值九月故病易已

許氏子病嗽痰中帶血或用茅根湯治之不効延萬治
日問先生治胡元溪子用茅根此亦用茅根然不愈
何也曰彼病于秋肺旺肝燥此病于冬血衰時也且
彼乃口鼻出血屬陽明胃此是痰中有血屬太陰肺
病既不同治亦有別乃用阿膠為君杏霜瓜蔞霜貝
母為臣蘇葉桔梗甘草為佐煉蜜為丸薄荷煎湯化
服而愈

萬石泉女病久嗽不止胸高氣急曰此龜胸病也胸者
肺之腑也肺脹則胸骨起起狀如龜殼吾聞其病未
曾治之故無方也或者不可治乎石泉曰氣脹者肺
實也當服葶藶丸曰病有新久症有虛實知為虛何
再服葶藶瀉肺之劑恐有虛虛之禍不聽竟以是卒
吳孚先治一小兒咳嗽動便作痰聲喉如曳鋸脈數
洪滑紋如魚刺用加減二陳湯煎服神仙玉露散而
痊

萬密齋治舉人蔡沙江子病咳久不止其咳連聲不絕
咳時面青右手常自擺動曰不可治也問何故曰咳
者肺病也肺屬金而青者肝之色也肝屬木手擺者
肝風欲發之狀木來侮金篡乎畏也今十月金病木

生之時四時之序將來者進成功者退木生而進金
病而退必發擂甲乙日劇果甲乙日擂而死
魯芸塘子九歲病咳半夜甚乃胎稟不足腎虛嗽也用
人參固本丸加阿膠桑皮盡劑而安又汪元津子病
腎虛嗽與上症同亦用人參固本丸加茯苓知母貝
母山藥各等分為丸服之而安
蔣仲芳治盛氏女十餘歲患內熱乾咳特甚醫與清火
滋陰麥冬黃芩之品服之不効脉得弦數脉症湯藥
甚相合也因何不愈沈思聞忽聞女衣有炯火氣詢
其曾卧火箱中乎曰然即以前方與之令其遷卧床
上遂不終劑而愈問故曰咳嗽火熱爍金以清火潤
肺之品治之甚當其如新之火乎今離却外火而病自愈耳

小兒喘

萬密齋治一兒四歲忽作喘氣逆痰壅鼻孔翕張萬曰
此馬脾風也以鼻煽如胸高肩聳汗出髮潤皆下脫也則
不可治須急治之以導壅丸去防已加大黃除肺之
熱合小陷胸湯除肺之痰破為細末竹瀝調服作賓治
一兒病兩腮紅上氣喘急脉浮緩而濡此得之傷食食

傷脾脾虛不能養肺母病子亦病也兩腮紅者虛熱也上氣喘急者肺虛也脉浮緩而濡氣虛也時醫咸以驚風為治用抱龍九牛黃丸蘇合香丸不効聞其言皆匿笑乃以阿膠炒成珠煎蘇葉烏梅湯化服三劑而瘳方却妙

一小兒痰壅氣促而喘且於橋萬以礞石滾痰丸桑白皮湯碾碎調服之喘定痰下橘亦止矣

一當室小兒先病瀉醫以藥服之乃作喘歸咎于醫萬曰非醫之誤乃冷傷作瀉瀉脾傳肺作喘脾為母肺為子傳其所生也用陳氏芎蝎散一服喘止而安後用此方治瀉後喘者良驗

一女子素有喘病發則多痰用補腎地黃丸或曰喘者肺病也今補腎何也曰肺主氣腎則納而藏之痰涎者腎之津液所生也哮喘吐痰乃氣不歸元津液無所受也果服此而安

朱丹溪治一女年十二自小喘嗽白朮陳皮青皮各五錢麻黃茯苓木通片芩各三錢蒼朮桔梗各二錢乾薑一錢甘州五分每貼一錢半煎服

錢仲陽治張氏孫九歲喘嗽悶亂飲水不止食不能下或用涼藥月許無効錢曰此涼藥寒胃也以益胃散

補脾土以瀉白散瀉肺金而愈 小兒直訣

龔子才治一小兒外感風邪服表散之劑汗出作喘此邪氣去而脾肺虛也用異功散而汗喘止再劑而乳食進

馮楚瞻治同姓子三歲平時面色㿗白顖門覓大顱骨開解一夕忽發微喘不能睡倒抱起稍可至二三日雖抱起而喘急不減出多入少兩眼逆急（肝腎大虧）理宜用上病療下之法恐不宵輕服乃設詞曰喘已多日肺氣虛矣當以人參錢許配生脈飲作湯化服啟脾丸乃愈也意歸寓以八味丸杵作大丸代之服下喘日減四五日後本症悉平精神倍長屢索啟脾丸方乃笑語之故遂如法服至兩月顖門顱骨俱長滿矣

吳孚先治一小兒氣急而喘喉中聲如水鷄叫用五拗湯而愈

錢國賓治中翰陸登之次子自幼吼喘日夜不絕今八歲莫愈身體無病診右寸浮滑主肺竅有痰喘吼以三白丸煅白礬貝母桔梗各三分飯丸黍米大每睡冷茶送下五丸至五日此子索厭其母嗔之猛然一嗆吐出黑痰一塊如圓眼大其臭滿室剖開內包大黑爪子一枚兴少破從此吼喘即止舉家感激

除此予一生之患矣及問其故曰肺有穴葉兩耳四垂如蓋清虛之臟纖塵不染目乳子誤吞爪子入于肺縫久則痰膠阻凝呼吸之氣作吼喘聲也今藥力攻出肺清而金不鳴則無聲痰出而呼吸利則無吼喘症矣

小兒哮

萬密齋治胡三溪女素有哮病遇天欲雨則發發則多痰服五虎湯九寶湯即止不能斷根曰是蓋痰聚則作喘痰去則止痰者水液之渾濁者也難經云腎主液液者水所化也腎為水臟入心為汗入肝為淚入肺為涕入脾為涎此腎水泛為痰而喘也乃以六味地黃丸服之不復發矣

陳三農治一小兒鹽哮遇陰雨即發聲如拽鋸以白礬一錢入精猪肉四兩內以鹽泥固濟火煅出清烟取出研細入江西豆豉一兩搗和為丸如黍米大白水下二三十丸忌油膩葷腥一月而愈方宜酌用

朱丹溪治一男子年十四歲哮十日則發一遍此疾在上焦不得汗洩正當九月十月之交宜溫散仍與小胃丹佐之溫散加麻黃黃芩每帖用一錢半入薑汁

研細末以水盞半煎去查飲之每夜臨卧時與小胃
十二粒下之
馮楚瞻治朱姓兒三歲哮喘大作數日身熱汗出或以
滾痰丸利之益甚悉脈洪數胸脇扇動扶肚撞肩頭汗
如雨不食不眠曰久喘下元已傷復以峻利傷之故
見諸惡候也以人參麥冬各五分五味三粒肉桂二
分煎服日二三劑喘損減至夜復作此氣少復而陰
未有以配之也以八味之加牛膝麥冬五味者內熱
地六錢桂附各四分水煎冷服午前後各一劑睡醒
食進喘止但勞動則喘聲微有此未復元之故以生

脉飲調理三四日全安

小兒 虛損

竇材治一幼女病咳嗽發熱咯血減食先灸臍下百壯
服延壽丹黃耆建中湯而愈戒其不可出嫁犯房事
必死過四年而適人前病復作竇曰此女稟賦素弱
只宜固守終老不信余言破損天真元氣將脫不可
救矣強余丹服之竟死
李士材治汪氏兒年方舞象又發熱咳嗽羸弱頭眩二
冬二母知柏芩連不啻百劑病勢轉增脈之右虛軟

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

乃脾肺氣虛火不生土之候也用補中益氣加五味子茯仁薑桂至三錢必日苦寒十錢過傷乃可十劑而減兩月乃安

柴嶼青曰六児身熱嬾食脉細而無力屬陰虛血少服逍遥二劑未効內人力請延醫及診視云脉弦為痺瘧余固爭脉並不弦醫不服強令服二劑身熱更甚遂立意服壯水之劑二十帖始愈至乙丑復患身熱服六味湯四十日始霍然曰歎曰幸是自家小児故得自主倘他人延治四五劑未効必更醫矣能保其不誤事哉

馮楚瞻治張氏子年十三忽患腿癰外科云勢難消散出膿得兩月收功視其體浮胖色㿠白知為先天不足矣再診其脉六部沈細而微復視其腫則石腿為甚色白而冰冷經曰血氣不和百病生焉氣和而無留滯結癰何由成與八味湯加牛膝杜仲各二錢食前服之一劑腿温痛減半三四劑全瘳

薛立齋治一小児九歲解顱足軟兩膝漸大不能行履此腎稟不足用六味丸加鹿茸三月而能步履

一小児年十四肢體倦怠發熱晡熱口乾作渴吐痰如涌小便淋瀝或面目赤色身不欲衣此亦稟賦不足

也用補中益氣湯及前丸而愈

一小兒十五歲而御女大小便道牽痛服五苓散之類
虛症蜂起與死為隣用補中益氣湯加減八味丸而
愈

一小兒十三歲內熱晡熱形體倦怠食少作渴或用清
熱等藥治之虛症悉具以為所禀怯弱用六味丸加
厥茸補之不越月而痊

萬密齋治一兒四歲出疽時頸軟頭傾曰此兒胎禀不
足瘡毒正發壯火食氣亟補元氣使疽易發易靨幸
而保全再補其陰不然恐難出二八數也乃大作調
元湯連進之獲安

江蘭峯子七歲頭面汗出如流用人參當歸二味同猪
心煮湯服之安

一女嗜卧發熱項軟頭傾欲作風治持疑未決萬曰此
陽虛病也蓋頭者諸陽之首胃者諸陽之會此女必
乳食傷胃胃氣不足故清陽不升而頸軟不能任元
也可服調元湯一劑而愈

一小兒脫肛半載恪服升補元氣之藥而愈

繆仲淳治里中一童子年十五患寒熱咳嗽面赤鼻塞
夜劇家人以為傷風繆視之曰陰虛也蓋傷風之症

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

面色宜黯今反赤而明偏風發熱必晝夜無間今夜劇鼻塞者曰虛則火上升壅肺故鼻塞以是知其陰虛也投以麥冬五味桑皮貝母百部生地鱉甲黃沙參不四劑而瘳廣筆記

立齋曰一小兒十四歲解顱自覺頭大視物皆大畏日蓋明先兆以為腎稟怯弱用六味丸加五味鹿茸及補中益氣加山藥山萸半載漸愈二載而顱合後畢姻覺顱門開解足心如炙喜其斷色慈戒厚味日服前藥二劑三載而愈

一小兒白晴多黑晴少吐瀉後喉瘡口渴大便不食朝夕悉服地黃丸而瘡後患瀉其喉復瘡仍服前丸遂愈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷四十六

續名醫類案卷四十七

錢塘魏之琇玉橫撰

小兒 疳病

萬密齋治朱氏子年七歲脾胃虛弱食多則傷食少則困形瘦而黑醫者曰其傷食則與枳朮保和丸以消導之曰其困倦則與參苓白朮丸以補之時補時消精神日瘁將成疳矣萬曰脾胃素虛不能消穀故食易傷也傷食而復消導之則脾益虛虛而復補脾未

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

得實而傷者又至矣豈良法哉今專以補脾為主內
兼消導名肥兒丸用四君子加陳皮青皮木香砂仁
山藥蓮肉史君子肉神麴麥芽山查肉共為細末荷
葉包粳米煮爛搗為丸米飲下自此不復傷食肌肉
漸肥

教諭許厚子年十四吐血醫作痰火治不効脉之兩尺
右関皆不足曰年未二八脉當沉緊今反不足當作
胎禀怯弱之病然觀崇師體厚何以有此必夫人有
虛病或乳少得之也（父母臟腑有病兒多禀之臨症之工宜留意也）許曰其
母孕時果病產後無乳問治法曰十六歲後病此者

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

曰勞十五歲前病此者曰疳疳即勞也（數語見醫不可不知）宜
用六味地黃丸以補腎參苓白朮丸以補脾病自安安
矣如言服之一月而愈

一女五歲曰感冒不愈變為瘧瘧止變為痢痢止成疳
肌肉消瘦飲食減少日唉蓮肉十數枚萬視之曰疳
病也形色雖衰幸胃氣尚存可愈也以集聖九調理
三月而安

胡氏子一歲病腦後瘡門穴（在風府穴之下天柱兩穴之中）生一毒如
桃大已潰白膿不乾萬視之曰此無辜疳也法不能
治或問何謂無辜疳曰此全幼心鑑所載也有妖鳥

名曰一名夜行遊女白晝不出夜則出飛此鳥無雄
飛入人家遇襁褓衣晒晾未收者則布毒其上兒著
此則病而死掠取其魂化為己子是名無辜疳亦傳
屍之類也其病頭上有核破之內有白粉況項後之
疽大九不治中之一疰也故云難治後五日果死
龔子才治一小兒四肢消瘦肚腹脹大行步不能頓能
飲食作渴發熱去後具穢此脾臟傷也用異功散肥
兒丸調理而愈
薛立齋治一小兒面色痿黃眼胞微腫作渴腹脹飲食
少思腹中一塊或移動小便澄白大便不實此脾疳
之患用四君子加山扈薥黍肥兒丸而愈
一小兒尿濁如米泔疳之候也以江南做酒小麴炒為末酒
調下三服愈
孝伯有女曰止者病疳發於目啼不可止以問李紹伯
乃取十餅投之未半而瘥錢氏云疳在肝則膜遮睛法當補肝地黃丸主之
又孝若之乳母棄其子乳他姓子其子骨立矣又不

任見曰肝柏腎梔紹伯曰渴乳傷食亟治之必服羊肝散一具活矣某謂紹伯曰某即不知醫是兒於望聞二法俱無生理紹伯曰固也吾藥能生胸突腹凹骨開者此症未見何得勿治乎筆談

宮氣方歌云按兒禁病變成疳不問強羸女與男煩熱毛焦鼻口燥皮膚枯槁四肢癱腹中時時更下利青黃赤白一般般眼濇面黃鼻孔赤穀道開張不可看此方便是青黛散按兒方病服之安本草綱目

萬密齋治一小兒五歲腹大善食初見之謂其父母曰乳多必損胃食壅即傷脾腹大如是久縱其口腹恐腸胃乃傷不成腸癖必成疳也後果成疳肚大青筋以集聖丸調理而愈

胡鳳崖子病疳但多食則腹痛曰人以食為本穀入作痛豈新穀為患乎必有舊穀為積未能消去故新穀相持也乃與養脾消積丸服之而安

一兒八歲形氣甚弱其父責令讀書謂曰此兒稟弱宜懷保之不可一于嚴也嘗養脾丸肥兒丸與之後半年病成疳矣一醫謂傷食以一粒金丹服之病乃劇延治問前藥則未服也曰不可治矣一粒金丹內有草烏巴豆大毒之品此兒素怯弱食少而瘦故與前

凡調理乃舍此而服彼此犯虛虛之戒也後果殺
朱丹溪治一富家子年十四面黃善啖易飢非肉不飽
泄瀉一月脉之兩手皆大怪不甚瘦倭以為濕熱當
脾困而食少令反形健而多食且不渴意其疾必疳
虫作痢也取大便視之果蚘虫所為遷欲他往令児
醫用治虫藥治之禁其勿用去積藥待再診而止痢
也後勿果至次年春夏之交其瀉復作腹不痛而口
乾曰此去年治虫而不治疳故也遂以去疳之藥濃
煎白朮湯下三日而瀉止半月後乃甚瘦赦以白朮
為君白芍為臣川芎陳皮黃連胡黃連入少蘆薈為

凡白朮湯服之半月而止禁其勿食肉與甜物三年
當自愈

馬銘鞠治張守為幼郎患癆疳嗜食易飢腹如蜘蛛過
數日一瀉瀉則無度面目黧黑指節中亦瘦無剩肉
矣其母亦病診脉緊數骨蒸勞熱大渴引飲淋閉腹
若蜘蛛曰児病實母病也用麥冬枇杷葉生地白芍
青蒿鱉甲之屬以治母用乾蟾為君加羚羊角犀角
白芙蓉花牛黃每用分許日入雞肝內飯上蒸服以
治児再用滑石扁豆茯苓車前山查五穀虫等分為
末拌人乳晒乾七次畧入砂仁末陳米湯丸彈子大

日進兩丸不二十日子母俱痊二方絶無藥氣故兒
喜啖之廣筆記

說約云予表姪二三歲間患疳積症頭大身瘦發熱潮
如米泔諸治不効後聞藥氣即吐束手無策偶遇異
人傳此紅蕪丹方嘗考和于糖果粥飯中與之數服
全愈後以此濟人無不効矣沈效曾抄本

俞氏見四歲疳後失調致成疳疾猛咳而頻瀉腹大皮
急夜哭咬牙曰其母病延診藥殊無効遥見醫至見
所用藥則香砂查枳車前扁豆茯苓豆蔻類皆消積
滲利之品兒益困倦其母哭泣至目腫流血乃謂曰
今以母病託予而予病不痊則母病亦進必先愈子
而後母可愈也問嘗奈何曰無已請以母所服分飲
之則兩病俱愈矣其家非素封既艱資費又無寧議
遂如言治之不逾旬母子皆安蓋其母緣產後兒緣
疳後母則寒熱往來面足俱腫惡露逾月不止頭痛
不眠食難下咽與兒之症同為血虛生火木盛剋土
而然彼兒醫者烏能用生熟地黃沙參杞子黃連麥
冬以愈是疾哉

淩表姪孫四齡予常見之曰兒將病疳不以為意也逾
半年則疳已甚天柱傾側臍突筋青毛髮脫落股肉

不消嗜食而泄利極穢多怒多啼似難為矣但其皮
未急目尚有神乃與生地杞子沙參麥冬棗仁米仁
病不減心亦疑之少加木香砂仁則瀉益甚而席黃
澹翁通人也謂泄益甚得毋香砂為害乎予曰然遂
去之益以熟地川連十餘劑乃全愈予女八九歲時
病疳枯瘠如柴矣以六味加減熟地用八錢十劑而
痊向後但以前方治効者不可枚舉

小兒腫脹

孫兆治厩中丞某郎中妹十歲腹痛色不變按之而大
隔心腹痞膈病已月餘按甲乙經云三焦脹者氣滿
于皮膚中敲然石堅遂與仲景方厚朴生薑二兩半
夏七錢甘艸半兩人參一錢每用藥一兩五錢水煎
分三服一日服之至二十日愈
張子和治鄙之營兵秋家小兒病風水醫用銀粉粉霜
之藥小澌反澁飲食不進頭腫如腹四肢皆滿狀若
水晶衆人以為將死勉強求治張曰此症不與壯年
同壯年病水者或因晉飲及房室此兒才七歲乃風
水症也宜出汗乃置燠室以屏障遍遮之不令見火
若內火見外火必昏憒也使大服胃風湯而浴之浴

訖以布單重覆之凡三五重其汗如水腫乃減五分
隔一二日乃依前治之汗出腫減七分乃二汗而全
減尚未能食以枳柳九調之兒已喜笑如常日矣
李時珍隣家一小兒曰食積黃腫腹脹如鼓偶往羊札
樹下取食之至歸而大吐痰水病遂愈羊札乃山查
同類醫家不用而有此効則其功應相同矣本草綱
張景岳在京治一五歲兒遘經藥舖見有晒晾巴豆其
父誤以為松仁以一粒與食之嚼而味辣亟吐出已
半粒下咽矣少頃大瀉十餘次次日肚腹通身悉腫
脹絕口不食或謂宜黃連菉豆以解毒或謂四苓五

物以利水張曰大攻之後豈非大虛之症乎能再堪
苦寒以敗脾否大瀉之後又尚有何水之可利遂單
用獨參湯及溫胃飲以培脾氣不數劑而復元如初
夫既已大瀉而何以反脹若是是可知大虛大寒致
成腫脹者類多如此

馮楚瞻治何氏子九歲肚腹脹極痞塊有形肌削神困
耳中膿潰目紅腫牙齦出血或時腐爛唉嗽氣短腿
膝痠疼夜不能寐日不能食已成壞症詢其病由乃
起於半周之內肚稍腫硬初時消導後用補脾藥消
及清熱化滯六七年來腹脹更加痞硬更大牙疳耳

目腫爛盖甚僅存皮骨脉之或時弦洪有力或時弦而無力知為久服剋伐真氣內亂轉護邪氣為害先天之真陰真陽已竭乃中空外浮之象也先以金匱腎氣丸料加麥冬五味作湯大劑空心温服數劑熱減腹稍軟隨以前劑冲入人參湯三錢食前日二劑十餘日後精神稍長諸症漸退後早晨以生脉飲送下加五味牛膝之八味丸三錢申酉仍以前方服之兩月諸症盡平向之痞脹如失張氏子亦患腹腫消導幾死亦以八味去附子倍熟地麥冬五味牛膝膝而愈弟不能久服丸藥次年夏忽兩脇腫硬如婦人

之乳垂下外科與解毒不効加兩順之下腫亦如之百治不減或議開刀馮曰此肝腎之火上炎耳何毒之有仍以前方加青皮四分土貝二錢食前服之不十劑全愈

萬密齋一兒病腫有庸醫假專門之名不守家傳之法嘗稱得異人之術用牽牛葶藶治腫方之神藥作散服之元氣下陷肚大坐不得卧陰囊腫大垂長而卷萬見之歎曰脾土已敗肝木獨旺乃賊邪也不可治矣果死

一兒病腫腹大欲信庸醫妄談五日消一分乃取繩子

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

圍其腹量之投以牽牛葶藶服之利下數行腫減十分之三又母甚喜約至五日再消三分未三日又大腫較大如前庸醫聞之走去病勢並甚而死

張氏子瘧後病腫求治曰此脾虛腫也與胃苓丸用長流水煎燈心湯送下教以每日午時前後天氣和暖于避風處溏洗之洗畢覆被睡一時令有微汗為度此水漬法也仿子和法經曰漬形以為汗調理半月平復如常

高鼓峰治沈啟廷孫三歲脾虛發腫兩足更甚乳食不思午後發熱頭面羸瘦俗醫云此病如用官料藥須發黃鼓脹而死但當服草頭藥并以針挑其指出黃水自愈浙西人言出自醫家藥籠中者謂之官料藥俗傳單方一二味謂之草頭藥婦人酷信此說不讀書者從而和之往往以此誤事啟廷力排此說延治曰此脾虛也非參朮不能收功病已發黃鼓脹將死矣草頭藥何以治之且官料藥皆草根樹皮也何出自醫家便為官料信而服之漸有回色未幾又發瀉又頭上生毒爛至見骨又出瘡皆極重病纏綿不休乃一味補正他病見則隨症稍加減之如是者自夏迄冬盡用參幾斤餘纔得脫體次年始長肌肉設惑

衆說寧有救否

按腫症多濕熱為患雖云脾虛必審其小便長短清濁及大便溏燥濃淡以施治法若概云脾虛參朮蠻補必致綿延不已今自夏迄冬誠何故哉至用參芎餘即今時富家亦有委命而已

孫文垣治張後溪之孫遍身腫脛浮腫腫自足背起漸上大腿今且至腹大便泄瀉發熱少眠此風濕症當令與時違之候治從開鬼門潔淨府二法使清陽升則瀉可止小水利則腫可消上下分去其濕之意也蒼朮一錢茯仁桑皮各三錢青蒿防風升麻柴胡各五錢錢當是分大腹皮五加皮各六分八帖全安

薛立齋治一小兒肚腹膨脹飲食即瀉手足逆冷以為脾氣虛寒先用人參理中丸後用六君子湯而愈

萬密齋孫先病瘧傷食成疳又傷食甚瘦腹脹大而堅見人則哭用參苓朮草半夏麴枳實炒厚朴黃連木香莪朮砂仁史君子神麴麥芽鱉甲夜明砂芎歸等藥

一小兒瀉後腹脹用加減塌氣丸服之愈一兒瘧久不退腹大而堅用化癖丸服之愈一兒善飯腹大用保和胃苓二方服之調理而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

蔣仲芳曰山中居仲子年十歲患水腫月餘候予不至
遇一方士與之草汁大便逐行數次腹寬腫退予遵
到喜曰兜病久候不至今服艸藥半已愈矣然須服
調理之劑即喚出診之脉来沈細尚微喘按心下則
痛甚予曰此非予可能療矣草汁性烈已下數次痛
宜愈喘宜定今若此病雖去而藏府真氣受傷必不
久也猶未信至明日腹大痛而死

小兜 癖積

龔子才治一小兜患痞癖服枳榔蓬术枳實黃連之類
痞益甚曰此脾經血虛痞也不剋伐逐用六君子加
當歸數劑胃氣漸復諸症漸愈乃朝用五味異功散
加升麻柴胡夕用異功散加當歸白芍而愈

一小兜患癖積年深不愈醫用攻剋削伐之劑屢投不
愈以致元氣耗憊脾胃損傷血氣乾涸肢體羸瘦面
色萎黃肚大青筋見熱自汗喘急氣促泄瀉腹脹浮
腫不思飲食與補中益氣湯久服而愈

萬密齋治一小兜周歲曰食鷄肉太早自此成積日漸
羸瘦不思乳食其父詳告取藥治之與養脾去積丸
白术陳皮蒼术厚朴枳殼半夏麴青皮神麴麥芽山

盞甘草先服三日後服丁香脾積丸鷄肉湯下取下鷄肉一片猶未化也再進養脾丸而愈

王氏子一日胃脘當心而痛萬治之七日不止以手摸其胸腹惟心下手不可近曰悞矣無怪其不効也凡手可按者虛痛也手不可按者實痛也實痛非食即痰另立方以枳實導滯丸控涎丹二方內摘取枳實黃連半夏各二錢木香黑牽牛頭末白芥子炒甘草等分搗羅為末用生薑自然汁和神麴作丸麻子大以沈香木香檳榔磨水下或薑湯亦可初服二十一丸少頃痛移下中脘又服七丸至臍下又服五丸利下清水而止乃知是脾痛也復作枳术丸加青皮陳皮木香砂仁神麴麥芽山查調理而安

李時珍治宗室當順王孫嗜燈花但聞其氣即哭索不已診之曰此癖也以殺虫治癖之藥丸服一料而愈

本草綱目

陸養愚治潘司寇子年十四初因感冒服藥已愈後復夜熱便黃日中亦微熱或謂表散之後氣血不足與補養氣血熱益甚遂以為童子勞陰虛夜熱也與滋陰降火肚腹漸脹肌肉漸瘦飲食漸減其熱日夜不止矣脉之人迎頗和氣口緊盛兩尺洪滑此食積也

宜消導之與枳實黃連梹榔神麴麥芽山查茯苓澤瀉甘草數劑脹減熱除精神漸復去梹榔澤瀉麥芽加人參白朮薑數劑全愈

陸祖愚治費表姪垂髫患瘧後痢初愈復傷食蒸熱大便砍行不行數至圊而未嘗便醫不細審以久病初愈復日數行其為脾虛消泄無疑投以參朮補劑經所謂益其勝而贅其復病寧不劇乎服後月熱益甚煩躁咽乾大以六脈浮洪久痢月熱脈大均非吉候診之果六脈洪盛有力而胸腹手不可按曰脈症俱實且又相應毋張皇也但久痢之後津液枯槁耳用生地當歸白芍黃連倍枳實山查一劑覺腹中運動二劑即轉天氣少頃去燥矢十餘枚遂連去三四次脈靜身涼神清氣爽再用生津(補)脾調理半月而愈

薛立齋治一小兒腹內結塊或作痛上攻小便不調用龍膽瀉肝湯盧薈丸而愈後形氣消鑠發熱作渴此肝木制伏脾土用補中益氣湯及盧薈丸而愈

湯　治尸部張侍郎小娘子患痞蘊積結聚已經年矣其候腹滿壯熱大小便閉不食諸醫皆作虛熱潮熱或作胃寒不食治愈既不食大小便自然少又欲

作湯熱治百藥俱試而無一中勢已窘迫招湯視之問曰合服何藥答曰當服甘遂大黃張驚駭曰前諸醫者皆用補劑此女不進食久矣不宜利動腸胃荅曰信我者生逆我者死張曰更有無甘遂而次于此藥方者可否乃令即服大承氣湯二服而愈次日診之尚有餘滯積實其症必過數日而復閉須服前藥始可除根數日後果再閉腹滿痞結再投此藥一服而痊

朱丹溪治賈福六舅子十餘歲左脇有塊能飲食青皮醋炒三棱柴胡三分桂枝川芎防風各二錢白术二錢半木通一錢半海藻一錢甘艸五分分七帖煎服

半蓋下保和丸十五粒忌一切

蔣仲芳治一兒七歲食後受驚遂發寒熱右脇有塊重則脹痛輕則硬滿已二年忽患三瘧又年餘以丸藥截之瘧雖愈而朝涼暮熱唉嗽骨立痞塊痛甚用者朮鱉甲當歸各四兩參芍知母丹皮麥芽神麴山查各二兩青陳皮梹榔木香官桂各一兩棱莪柴胡桃仁各七錢煎成膏入飴糖四兩和勻不拘時服未終劑而愈

小兒 蟲

萬密齋治王氏子善食嘗病腹痛乃虫痛也用安虫丸服之三日後取下一虫甚異約長一尺身赤色大如鱔令持兩頭牽之長可丈餘其形如綫放下依舊短縮此虫母也以火焚之而愈

胡氏子嘗腹痛萬診之曰虫痛也問何以辨之曰凡腹痛一向不止乃積痛也乍發乍止腹中成聚口吐涎水者虫痛也先嘗服雄黃解毒丸屢進不効回思此虫有靈當設法取之擇定除破日在月初旬取之勿令

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

兒知也令隔夜煎下苦練根湯次日五更用清油煎雞子餅一個令兒聞其香味遂急欲食故遲不與而以少許啖之覺腹中如有物涌上心口乃取藥與服之少頃心口之物墜下以蛋食之不食矣已時腹中大鳴而瀉下一虫甚異如指長有頭手足狀如嬰兒萬曰此三傳癆虫也初起於父再傳其母三傳其子幸去之矣令一婢用鐵鉗夾送河中焚之其婢受烟氣一口亦病癆死此兒至今無恙

閻姓子有虫病黃瘦腹中時痛口饞如有肉食則痛不發一日無肉則痛甚萬視其體甚弱不敢下只用苦

練根皮放肉汁中煮食之單服三日下虫如蝌斗者
一盆色黃黑後以養脾丸調理而安
一兒七歲善食肉常病腹痛其父問積痛虫痛何如萬
曰積痛發有常處手不可按惡食而口乾虫痛無常
處喜手按摩口饒而吐清水此兒乃虫痛也以藥取
之下虫大者十餘條而痛止未一月又痛萬曰不可
再取矣恐傷胃氣乃立一方用黃連木香槟榔去積
為主陳皮青皮三稜莪朮枳實山查專去其積使君
子白蕪夷川練子若練根皮專去其虫等分為末神
麴糊丸麻子大米飲下常服之時下小虫及下大蟲
如指大約長一尺乃虫母也自後痛漸減
吳孚先治一婢面黃身瘦嗜油甚至燈盞垢膩都盡與
藁下虫如鰍者數枚遂不嗜矣尋肥健本艸綱目載
食油至五升
一小兒將自身布衣渾身遍嗍兩袖嗍至肩上吳用剪
虫丸下虫如蠶者數枚而愈
錢仲陽治辛氏女五歲病虫痛醫以巴豆乾漆硇砂之
屬治之不効至五日外多哭而俛仰睡卧不安自按
心腹時大叫面無正色或青或黃或白或黃目無光
面慢唇白吐沫至六日胸高而卧轉不安錢視之用

無喪散三服見目不除青色大驚曰此病大困若更加瀉則為逆矣至三更果瀉如藥汁以杖攪之見有元藥錢曰此兒肌厚當氣實今症反虛不可治也辛曰何以然錢曰脾虛胃冷則虫動今反目青此肝乘脾又更加瀉知其氣虛極也而元藥隨糞下脾胃已脫魚形病不相應故知死病後五日昏篤七日而死

龔子才治一兒腹中作痛者至死腹中揣摩似有大小塊諸醫不効乃令人慢以手搓揉痛處半日其出自大便出而愈

四明顧氏女十餘歲足蹶骨立百治不瘥奄奄待斃偶端午家人調雄黃酒女竊飲之不覺大醉嘔穢狼藉視之中有物如鱉蠕蠕動色純紅兩眼正碧家人驚怪以足踹之頭伸甚長以鉗夾之掉頭嚙鉄格格有聲箝之不死亟搗椒至爛埋之土中明日發視僅血塊耳自後女長成無恙矣新按方懋德說

宋肇能著圍碁生一女腹多虫偶在何矩所坐談及一醫云食榧子當愈果食榧子下虫曝乾尚有八尺長

鄉間一大姓有子方周歲值熱天遍身疼痛啼哭不休延請諸醫束手無策王起雲後至云能以十金酬我

一刻即愈主人唯唯乃濃煎甘草湯浴兒未幾兒即睡去半日方醒已不作痛矣主人大喜出銀酬之特問小兒何病王云此乳母抱之納涼為刺毛所著耳疑即毛虫俗呼為羊棘子故以甘草湯浴之若豫說明豈肯以十金酬我哉衆大笑而別雲間穆志

張子和治一兒悲哭亦以浴愈謂心火乘肺浴之汗出則肺熱散也

小兒吐蚘

張景岳治胡氏兒三歲曰飲食不調幼科與清火化痰等劑損其胃氣反致嘔吐溏泄復與清利遂致吐蚘初止數條漸至數十條細如燈草甚至成團攪結而出早晚不絕所下者亦如之羸困已極曰與温胃飲二三劑其虫如故不知其何所從來而生化之速一至于此其家請先逐出謂出不盡則病日甚其能生乎弗聽但以前藥倍人參加附子二三劑而嘔吐漸稀瀉亦隨止乃以理陰煎温胃飲出入間用十餘日虫漸少月餘而飲食進肌肉生復元如故大凡逐出之藥多傷胃氣向使胃氣再傷非惟虫不能逐病必不起今使胃氣日強則扶去化出之源而愈矣

世俗以甘蔗宜小兒雖痘食之無禁群醫相爭一曰性

熱所以發疹一曰性寒所以解毒一曰性温平所以無害及退余檢方書則曰蔗能節蚘虫多者減之少者益之蚘遷其中則兒無病所以宜兒也豈在寒熱温平間哉胖醫不學漫猜殊可哂也李曰華紫桃軒又緻

小兒 心腹痛

月坪張氏兒十歲自幼心痛得于母氣不時發者發時飲食不進呻吟反覆三四日仲淳詢方藥入口即止檳榔黑丑各一錢木香五分史君子橘紅白芍旋覆花各二錢茯苓三錢猪苓錢半廣筆記

蔣仲芳治魏交讓子年十歲患小腹痛三四年矣諸治不効診之脉來沉遲二便如常按之無塊此必腎家虛寒也六味地黃先加炮薑肉桂青皮香附車前子牛膝而愈

小兒 黃疸

萬密齋治一義子年十五歲病疸面目俱黃問之對曰傷食起腹中大熱又痛乃立一方用黃柏扈子等大黃減可以退其熱猪苓澤瀉茯苓蒼朮等分以去其濕枳實厚朴神麯以去其食積茵蔯蒿倍用以去其

黃共為細末酒糊丸車前子煎湯下三日後吐去黃水二椀許胃中不熱又二日泄三行腹中不痛十日以後小便漸清黃亦減矣

孫文垣治王文川子原傷飲食又傷冷菱等物遍身發黃眼如金色夜發熱天明則退腹痛手不可近拜叫通宵市醫曰其黃而曰胡荽真矣三字未詳或是未審衆議以草頭藥進孫至急止之曰向以草藥幾誤其母復欲誤其子耶夫脾胃喜溫惡寒此症乃食積釀成黃為濕熱所致法當健脾用溫暖之劑下之溢熱去而黃自退草頭藥性多寒用之是損脾土而益其疾也即以保和丸一錢入備急丸五分作一次服之少頃瀉一次又少頃連瀉三次去積甚多腹痛盡止再與調中丸一月黃盡退

張子和治一童子年十五病疸一年面黃如金遍身浮腫之力惟食益與焦物張以茶調散吐之涌涎一盂臨晚又以丹車丸七十粒通經散三錢下四五行待六七日又以丹車丸濃川散下四五行益與焦物見而惡之面色變紅再與茶調散涌之出痰二升方能愈矣

陸養愚治孫奎者其婦患面黃腹脹人多以為胡臼用

草頭藥療之不半月而祖或咎之彼謂草頭服遲故也後其子偶傷冷食腹脹痛手不可近煖熱眼脫又有黃氣乃曰又是胡白矣急採草澤醫其主人大叱之乃止延診曰不必按脉當温行之脾胃喜温而惡冷既傷冷食而服草頭寒藥爲得不敗曰以炮薑附子草果陳皮木香爲煎劑送潤字丸二錢下數行而痛脹俱減又以煎劑送大安丸數服而愈

湖郡黃疸稱爲胡白此與前孫業器同

薛立齋治一小兒旬日內先兩目發黃漸及遍身用瀉黃散服之瘥

一小兒因母食鼈飽脹嘔酸而患遍身皆黃以越鞠丸治其母以瀉黃散治其子並愈

錢仲陽治曹宣德子三歲面黃時發寒熱不食飲水或用牛黃麝香(二丸)不愈用止渴乾葛散及吐錢謂食伏于胃脘先以白餅子下之又以消積丸磨之而愈

小兒啼哭

張子和治一小兒悲哭彌日不休兩手脉弦而緊此心火甚而乘肺肺不受其屈故哭肺主悲王太僕云心燥則痛甚故燥甚悲亦甚令浴以温湯漬形以爲汗

也肺主皮毛汗出則肺熱散矣浴止而啼亦止仍命服涼膈散加當歸桔梗以竹葉生薑朴硝同煎湯膈中之邪熱瀉

萬密齋治縣尹張之子未周啼哭晝夜不止醫謂腹痛用理中先不効又謂傷食用益黃散不止萬視之曰公子聰頴目赤乃心煩而哭也若腹痛當面青傷食當面黃也乃用導赤散加黃連麥冬燈心煎服之次日早即促入告曰昨夜哭更多何也萬曰病安矣曰病安何以哭不止萬曰公子啼哭三日夜不乳昨夜熟退心涼欲得乳而乳母在外蓋往夜之哭病哭也昨夜之哭飢哭也乃笑曰果然乳母五更到哭即止矣

江某生子三日啼不止萬視之曰此必斷臍失謹風冷之氣入臍腹痛而哭也乃用薤艾搗如綿再烘令熱以封其臍冷則易之凡三易而哭止

一兒生二月啼不止萬曰此肝熱也以瀉青丸竹葉湯入砂糖少許調服而安

一小兒夜啼不止狀若罡祟用蟬蛻下半截為末一字薄荷湯入酒少許調下或者不信將上半截為末前湯調下即復啼也古人立方莫知其妙 本草綱目出普濟

徐仲光治一兒觸忤夜啼用本家竈下火柴頭一段以

硃書云我是上天五雷公將你作神將能擒夜啼鬼一縛永不放急急如律令柴頭以火燒焦為主書了勿使人知立在床下倚床前脚裡面男左女右

孝應楊回山止一子方歲周著月旦暮啼不乳亟召王起雲視之王曰從我則生否則不可救也然須以百金酬我楊謹奉教王乃於堂中畫石灰一圈置兒其中屏去乳母兒啼甚移時睡去王索香薰飲俟其覺以藥一丸投之隨瘥蔡寧訝問曰子何術而神若是王曰乳母甚肥天又暑兒愈哭則乳母愈摟抱不忍釋中熱太甚所以啼不乳我俾以哭散熱氣即愈矣

石灰畫圈醒後投劑不過假以索謝耳此所謂術也蔡為之鼓掌雲間祿志

馬銘鞠治華虛舟五郎侄甚善哭周歲中每哭即氣絕絕而甦一飯時許矣至三歲其病日深哭而絕絕而甦甚至經時初或一月或半月一發後則頻發有日再發者投以琥珀丸人參圓眼湯下數丸遂瘥琥珀人參甘草蓮肉各三錢山藥一兩天竺黃茯神胆星各二錢密丸硃砂錢半為衣每服一錢廣筆記

小兒語遲行遲

龔子才治一小兒五歲不能言咸以為廢人矣視其形瘦瘁乃肺腎不足遂用六味丸加五味麥門冬及補中益氣湯加五味兩月(餘)形氣漸健將半載始能發一二言至年許始聲音明亮

一富翁子八歲不能步履緣過惜不令得土氣致肌肉軟脆筋骨柔弱用黃土入於夾襖內與穿內服地黃丸加人參鹿茸牛膝虎脛骨末半料已能行矣

薛立齋治一小兒言遲患泄瀉聲音不亮稟用清熱等劑聲音如口飲食少思去後多在侵晨朝用地黃丸加五味夕用補中益氣湯其泄頓止却當服前丸不

兩月其言漸亮而飲食愈

一小兒三歲言步未能牙髮稀少體瘦骨立發熱作渴目睛黑少服肥兒丸不應此腎虛疳症也前丸乃脾胃經之藥久服則腎益虛而疳益甚不信果牙髮漸落用六味丸加鹿茸五味子半載而痊

一小兒體瘦腿不能行步齒不堅固髮稀短少屬足三陰虛用六味丸補中益氣半年諸症悉愈形體充實

一小兒七歲左腿細短寸許不良于行目睛白多或有盜汗髮黃成穗用地黃丸加鹿茸五味為主佐以補中益氣湯半載行履如故

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

小兒 胎疾

萬密齋曰一兒頸細其父嘗問于予可養何如予曰頸者頭之莖也頸細則不能任元在父母調養之八歲後再議至五歲死

一兒解顱未一歲認字念書父母甚愛之予曰此兒胎稟不足腎虛顱解真陽弱矣聰明早發真陽洩矣恐遺父母憂未一歲而發搐死

一兒周歲後多笑予曰此兒難養父問故曰腎為水心為火水陰火陽陰常不足陽常有餘笑者火之聲也水不勝火故知難養曰諸兒笑者皆不可養予曰待人引之而笑者此有情也見人自笑者此無情也後以瘡症死

一兒頭縫四破皮光而急兩眼甚小萬曰腦者髓之海也腎主骨髓中有伏火故髓熱而頭破額顱大而眼楞小也宜服地黃丸不信至十四歲而死

一兒生下便有目赤口瘡之症自是頭常熱山根青筋橫截幼疾甚多曰此胎熱也其治在肝小兒者純陽之體頭者諸陽之會肝為乙木旺于春乃少陽發生之氣經云春氣者病在頭故頭常熱也肝之色青故

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

青筋浮露也肝常有餘不治恐發驚風乃用瀉青丸去大黃加黃芩為末蜜丸服之遂頭涼筋隱病亦少矣

小兒 魘病

萬密齋治一小兒二歲常利下綠水形瘦如罥醫作疳病治之不効萬曰此非疳也乃胎氣所害名曰魘病者是也凡人家小兒勿與懷孕婦人抱之如胎禀強者則無礙怯弱者犯之即成魘病如客忤之類治之但補其脾胃待彼兒生自然安矣肥兒丸主之

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

醫學叢書 金本

簫氏云小兒被魘病者婦人懷胎孕有鬼神尊其腹中胎嫉妒小兒致令此病其狀微微下利寒熱往來毛髮髣髴情思不悅也千金論魘者小兒鬼也凡婦人先有小兒未能行而母繼有胎妊令兒漸漸羸瘦骨立毛髮稀黃不長時作壯熱大便不勻乃魘病也又曰繼病法當用紫霜丸下魘乳以益散補之令小兒斷乳即安消乳凡異功散亦妙劑也其或他婦人有妊而抱他人嬰孩者亦有此症同此治法有熱者龍胆湯

小兒 相思

蔣東明治王生子周歲忽不乳食肌肉消盡醫疑為疳蔣曰此相思症也衆皆哄笑之蔣命取平時玩弄之物悉陳於前有小木魚兒一見喜笑疾遂已（江南通志）

萬密齋治胡三溪子歲半日入後忽啼不止時七夕也三溪招萬飲已而報兒啼甚請入視之無病也飲未竟其室人以兒故語稍侵三溪強再視細察之實無病無病而哭必心有所欲不能言也乃問曰此兒今日所喜弄者何物乳母曰馬鞭子即令取至乃笑而持之擊其乳母不復哭矣于是暢飲而罷明日有問者曰此小兒害相思病也可以為案

一兒半歲忽日悽然不樂昏睡不乳萬曰形色無病將謂外感則無風寒之症將謂內傷則無乳食之症此兒莫有所思思則傷脾乃昏睡不乳也其父母悟云有一小廝相伴者吾使他往今三日矣乳母亦云自小廝去後便不欣喜不喫乳父急命呼之歸兒見其童嬉笑父曰非翁莫妙術不能知也

續名醫類案卷四十七

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷四十八

錢塘魏之琇玉橫撰

小兜 跌撲損傷

薛立齋治少參王陽湖孫八歲傷胶骨正體科續之視其面青而蕪黃口角微動此肝木侮脾土症也且氣血筋骨皆資脾土而生但壯脾氣則所傷自愈遂用六君子湯加鉤藤當歸三十餘劑諸病悉愈

義興楊純父幼兒病寒熱勢甚棘諸醫以為傷寒也藥

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

之不効仲淳曰此必內傷純父不信徧詢乳媪及左右並不知所以傷故仲淳固問不已偶一負薪者自外至聞而訝曰襄見即君攀竹梢為戲梢折墜地傷或坐此乎仲淳曰信矣投以活血導滯之劑數服而起仲淳嘗言古先望聞問而後切良有深意世人以多問嘲醫者舍糊診脉以致兩誤悲夫廣筆記

一小兒五歲日戲劇以盲入搗藥臼中不復出舉家驚呼無計或教之使執兒兩足以新汲水急澆之兒驚嘷嘔體縮遂得出

醫說沈效曾抄本

小兜 癸背

張景岳長男甫二周而患背疽初起時背中忽見微腫數日後按之則根深漸濶其大如棬皮色不變亦不甚痛至十餘日身有微熱其勢滋甚乃謀之瘍醫或云背疽或云痰氣或曰肇腥温補毫不可入口乃以解毒之藥投之而身反大熱神氣愈困飲食不進曰思卅溪有云癰疽曰積毒在臟腑當先助胃氣為主使根本堅固而以行經活血佐之又曰但見腫痛恭之脉症虛弱便與滋補氣血無虞可保終吉是誠確

論也全書中何以曰却前醫而專固元氣以內托其毒遂用人參三錢製附子一錢佐以當歸熟地炙艸肉桂之屬一劑而飲食損進再劑而神采如舊抑何神也由是施其口腹藥食並進十劑而膿成以其根深皮厚復用針出膿甚多調理月餘而愈大凡腫瘍潰瘍虛症未見但無實熱壅滯可攝者便宜托補如此

張子和治一富家女子十餘歲好食紫櫻每食即二三斤歲一如此至十餘年一日潮熱如勞診其兩尺脈皆洪大而有力謂之曰他日必作惡瘡腫毒熱上攻目陽盛陰脫之症其家大怒不肯服解毒之藥不二三年背患一疽如盤痛不可忍其女忽思張曾有是言再三悔過請張張以錐針繞疽暈刺數百針去血一斗如此三次漸漸痛減腫消微出膿而愈將作疤時使服十劑內托散乃痊痊後終身忌口然目亦昏終身無子

小兒結核

萬密齋治朱震三子結喉上生一核如李原病式云結核者熱也又攻本草消結核之藥立一方芩連庖貝

昆布海藻桔梗麥芽薄荷各一錢五分紫背天葵元參連翹瞿麥各二錢為末溫湯調服即効後病者服之無不應驗名之曰神應丹

帥碧泉公子項下生一結核或作癮治用藥破爛轉加腫大此任脉所過之路元氣受傷致成疳症遂不救

王思泉女四歲耳後側有結核曰非癮癖乃疾核也不必治亦不為害他醫作癮治之用蟄蟄內消之藥過多脾胃受傷致成疳勞而死

朱氏子五歲病結喉下生一核大如李兩旁有小核相連者二三方用東垣涼膈散去甘艸加龍胆艸元參貝母海藻麥芽為丸彈子大每服一丸研細温酒調服七日而安後用此方全活小兒甚衆

薛立齋治一小兒七歲頸結二核時發寒熱日久不愈以連翹丸治之而消若患在面臂等處尤當用此藥若潰而不斂宜服托裡之劑

小兒 下疳 附線縛陽

薛立齋治一小兒二歲莖瘙濕痒後陰囊瘍腫莖中作痛時出白津以為肝火用龍胆瀉肝湯六味地黄丸而愈

一小兒下疳潰爛發熱作痛一小兒莖中作痒不時搔
捻一小兒莖中潰痛小便秘澁日晡尤甚一小兒目
痒出水或項間結核或兩眼連瞤或陰囊搔痒俱屬
肝火皆用九味蘆薈丸並愈
萬密齋以三府小女溺出如青水著肉處潰爛成瘡問
曰豈女之臟腑壞耶答曰膀胱受五臟之液以藏之
化為溺也各隨本臟之色青者肝之色也著處成瘡
肝火盛也火之所灼則潰爛矣以導赤散加山梔條
芩胆艸甘草稍黃柏為丸調理五日而愈
立齋治魏户部邦寧子年十六鼻目蝕爛肝脉弦長憲
怒不息三年不愈諸藥不應服蘆薈丸半劑頓退一
劑而痊
一小兒下疳潰爛斗黑高鼻遍身生疥此腎經內外疳
症用地黃丸為主佐以四味肥兒丸而痊
即汝誠治一嬰孩以綫縛其陽莖腫脹不得脫歸呼欲
絶令汲水擲之于器驚啼復故揮塵新譚

小兜 疝

薛立齋治一小兜睾丸作痛小便赤澁寒熱作嘔乃肝
脾之症用小柴胡湯加山梔車前茯苓而愈

一小兒睪丸腫硬小便黃澁用小柴胡湯加山甲車前
并蘆薈丸而消
萬密齋治梁大尹子病疝右睪丸腫大如鷄卵長約五
寸絡臍旁下抵陰囊硬痛大小便不通用當歸川芎
木香青皮山甲仁山查子小茴香川楝子澤瀉二劑
而安
一小兒腸痛即小腸疝也用諸症辨疑內一方五苓散加川
練子小茴香入鹽一撮神效
張子和治霍秀才之子年十二歲睪丸一旁腫脛張見
之曰此因驚恐得之驚之為病上行則為嘔血下則
腎傷而為水腫以琥珀丸通經散一瀉而消散

小兒便血

高存之幼兒病內傷大小便俱血諸醫競用紅花桃仁
病愈甚仲淳曰桃仁之類疏其瘀也血且行奈何又
重傷之傷則補之而已以生地四錢續斷及杜仲牛
膝等飲之稍平而腹痛不已仲淳曰是在內經強者
氣盛則愈弱者著而成病加人參二錢一劑而愈廣
筆記
湯某治鄭都丞子患七年搖頭三年下血已服百餘方方

前後所服治搖頭者無非風藥止血者或作腸風俱不効湯視之亦不明其標本退而思之乃肝血液盛外有風熱乘之（謂肝病則得之矣謂血液風熱外乘則未必然）肝屬木盛而脾土為木所剋脾與肺是子母俱為肝所勝而血遂漬于大便故便血不止逐處一方但損肝祛風益脾初亦一時之見只數服而愈十餘日後血止而下白膿遂安用犀角甘草各一錢升麻一錢羌活白芍各半兩為末棗肉丸食後薄荷湯下只二服作効頭搖即止便血隨愈次間服胃風湯數日頓

除沈舍人子服之亦効（醫學綱目）

蔣仲芳治周忠介公孫女年七八歲大便下血不止有用黃連犀角者有用人參阿膠者俱不効診得氣口沈緊令服末子三進而血止問故曰人但知脾虛不能攝血不知飲食傷脾亦不攝血今用消導之劑食去則脾氣復而血自攝為得不愈其末子即沈香末也

小兒 痔瘡

薛立齋治一小兒頭患白瘡皮光且急諸藥不應名曰

腦疳瘡乃胎毒挾風熱而成也服以龍胆丸及吹蘆
薈末于鼻內兼搽解毒散而愈若重者髮結如穗膿
熱如火遍身出汗腮腫胸高尤當服此藥
一小兒唉嗽喘逆壯熱惡寒皮膚如粟鼻痒流涕咽喉
不利順爛吐紅氣脹毛焦名曰肺疳以地黃清肺飲
及化蠶丸治之而愈
一小兒眉皺多啼喔吐清沫腹中作痛肚脹筋青唇口
紫黑肛門作痒名曰蛔疳以大蘆薈丸治之而愈有
虫食脊骨熱黃瘦煩渴下痢拍背如鼓鳴脊骨如
鋸齒十指生瘡常嚼此脊疳也當以前丸治之

一小兒鼻外生瘡不時搔擦延及兩耳諸藥不効以蘆
薈丸及搽松香蒸豆末而愈
一小兒十歲患瘡疥久不愈肌体羸瘦寒熱作時膿熱
足冷滑瀉肚痛齦爛口臭乾渴爪黑面黧此腎疳也
服六味地黃丸更搽解毒散而愈
一小兒十五歲遍身似疥非疥膿水淋漓晡熱口乾形
體骨立四年矣此腎疳之症用六味丸而痊後陰莖
作痒小便澄白患疥瘡如大風用蘆薈四味肥兒丸
諸症漸愈又用大蕪荑湯而全安
一小兒項結一核堅硬如栗面色痿黃飲食不甘服托

裡藥不應此無辜疳毒也以蟾蜍丸治之而愈若數
服不消按之轉動軟而不痛者內有虫如粉宜急針
去之若不速去則虫隨氣走內蝕臟腑不治丸用蟾
蜍一枚夏月溝渠中取腹大不跳不鳴者先取棗蛆
一杓置桶中以尿浸之桶近上令乾使蛆不得出將
蟾蜍撲死投在蛆中任與蛆食一晝夜次以新布袋
包繫定置水急處浸一宿取出尾上焙為末入麝香
五分軟飯丸如麻子大每服二三十丸空心米飲下
一小兒遍身生瘡頭髮成穗眉毛脫落肌肉消瘦大便
酸臭小便不調頸間結核肚大青筋先用五味異功
散月餘後用四味肥兒丸又用大無黃湯異功散而
愈

疳

一小兒面黃頰赤作渴驚悸盜手心發熱遍身如疥此
心經內外俱症用肥兒丸為主佐以秘旨安神丸而
愈

史少谷幼子二歲項後結核不時仰首或以為熱瘡內
潰用針決之服消毒之藥後曲腰啼哭謂此無辜疳
外平症也曲腰而啼內平症也果殁

一小兒數歲臍後並結二核肉色如故而不覺腫正屬
膀胱經觀其形狀審其囊色重屬肝脾腎三經用九

味蘆薈丸以清肝脾地黃丸以補腎水形體漸健不
兩月而消

一小兒遍身如瘡或痒或痛肌體消瘦日夜發熱口乾
作渴大便不調年餘不愈用蘆薈丸以治肝熏五味
異功散以補脾而愈

小兒瘍症

薛立齋治一三歲小兒臂患毒瘀痛服解毒丸及搽神
功散而消嘗治便秘或煩躁服五福化毒丹亦効若
膿成者急刺去用紙撚蘸麻油紮瘡內以膏藥貼之
若兒安靜不必服藥候有膿取去仍用紙貼有小兒
瘡毒不愈或愈而復發皆因其母食炙煿辛辣或有
熱症宜先治母熱就于母藥中加減蘆薈服兒瘡亦
愈若小兒自患前症不能飲藥者將藥加減蘆令母
服之其瘡亦愈

一周歲小兒先于頭患瘡疥漸至遍身久而不愈飲四
物湯加防風黃芩升麻外搽解毒散月餘而愈

一小兒頭面患瘡數枚作痒出水水到處皆潰成瘡名
曰黃水瘡也用蒺藜粉松香為末香油調傳飲以荊
防敗毒散而愈

一小兒頭面生瘡數枚作痒瘡加積累名曰粘瘡也以枯白礬黃丹末等分麻油調搽更飲敗毒散而愈

一小兒癮疹瘙痒發熱不安以消風散治之又一小兒亦患此唉嗽時嘔以葛根橘皮湯並愈

一小兒頸面胸腹患水泡數枚潰而成瘡此風邪乘于皮膚而然也名曰藻瘡飲荊防敗毒散更以牛糞燒存性為末傅之而愈有藻疱一症為患最毒形如粟許大者如粟患無常處多在手指潰而出血用南星半夏白芷末傅之重見骨或狂言煩悶

一小兒遍患疥如癩或痒或痛肢體消瘦發熱口乾作渴大便不實年餘矣此肝脾食積鬱熱服蠲薈丸不月而愈

一小兒因有食積服剋滯之劑肢體生瘡似疥服消毒之藥發疙瘩赤色作痒膿水津淫先用五味異功散加柴胡山甸以補脾胃平肝木赤痒漸消又用四味肥兒丸五味異功散治之而食積愈

一女子赤暈作痒寒熱羨癗服風藥身發疙瘩搔破出水此肝血風熱之症先用加味小柴胡湯後用四味肥兒丸而愈後傷風咳嗽頭面搔痒微腫先用消風散一劑又用甸子清肝散而痊

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一小兒遍身生瘡小便不調頸間結核兩目連瞤服祛風之劑眉毛脫落謂肝經風熱之症先用大黃蕎丸後用四味肥兒丸漸愈後回飲食停滯發熱其瘡復譬用大蕪荑湯四味肥兒丸即愈

一小兒面部浮腫遍身如癬半年後變疙瘩色紫作痒敷巴豆等藥皮破出水痛痒寒熱大便堅硬脾肺脉洪數而實先用防風通聖散便利調和又用四物湯加荊防黃芩柴胡角刺甘艸節諸症漸愈更以八珍湯加白朮荊防角刺五加皮而愈後但勞則上體發赤暈日晡益甚此氣血虛而有火也先用四物湯加丹皮參朮柴胡治之知相月餘全愈

一小兒遍身生瘡大便下血發熱作渴腹大青筋眉毛漸落用大黃蕎丸五味異功散其瘡漸愈佐以補中益氣湯熟渴漸止又用異功散為主佐以補中益氣湯加吳茱萸附製黃連治之血止瘡愈

一女子素有肝火曰於頸項結核寒熱晡熱遍身起赤暈作痒服祛風之藥搔痒出水唇口搐動以為脾經血虛內熱生風用庇子清肝散加鉤藤而寒熱頓減又用當歸川芎散而漸愈乃用加味逍遙散而痊

一小兒遍身瘙癢或如虫行內服胡麻散外敷解毒藥患處皆潰誠如麻風症視其唇或掣動或兩目連劄此肝木乘脾土用升麻湯煎送瀉青丸而漸愈又用槐皮散而痊

一小兒遍身瘙癢起赤暈後膿水不止先用歸脾飲二劑又用胡麻散而愈後目驚挾食發熱起赤暈用越鞠丸一錢枳术蓬术各五分葱湯調服二次又用消風散一服赤暈頓消又用越鞠丸而痊

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷之四十九

錢塘魏之琇玉横撰

癰疽

李東垣治通父家翟稗于尻臀上足太陽經生癰堅硬腫痛大作左右尺脈俱緊按之無力羌活黄柏各二錢防風藁本連翹各一錢甘草蒼术陳皮各五分當歸一錢黄耆一錢五分酒二大盞水一大盞煎至一盞去查熱服空心以夾被蓋覆其癰使藥

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

疑丹溪案

行罷去之一服愈

予族叔父平生多慮質弱神勞年近五十忽右膊外側
廉上生結核身微寒熱而易怒食味頗厚脈之俱弦
大浮數而重似澁曰此多慮而憂傷血時在初秋勿
輕視之宜急補以防變症以人參一斤作膏下以竹
瀝病者吝費招一外科以十宣五香散閒與服旬日
後一日大風拔木病者發熱神思不佳急召視之核
稍高大似有膿于中起一紅線延過肩後斜走遶背
脊過入右脇下不痛覺肩背重而急迫食有嘔意脈
同前但弦多耳作人參膏入苓朮生薑汁飲之用人
參三斤瘡潰膿乾又與四物湯加參朮陳皮甘草半
夏生薑百餘帖而安此等若在春令雖神仙不治也
幸而在秋金之令不幸因時下暴風激起木中相火
而致此自非參膏驟補何由得免

朱郎年四十餘惡寒發熱右腿內廉厥陰分生一腫毒
此是冷折熱在肺經血分與此方萎仁黃藥子赤芍
歸頭條芩各三錢青皮角刺桂枝各二錢甘草節一
錢分四帖煎取一盞入忍冬藤汁二蛤殼食前飲以

忍冬藤查傳腫上

呂孺人惡寒發熱腹上有小疽此血少有熱與此方白

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

术川芎各三錢赤芍連翹各二錢半陳皮防風黃芩各二錢木通錢半甘草五分分五帖煎服

鄭經歷性嗜酒與煎燇年五十餘忽春末夏初患額絲竹空涌出一角長寸餘大小如雞距稍堅求治曰此非膏粱所致而何宜斷厚味先解食毒針灸以開泄壅滯未易治也此少陽經所過氣多血少者鄭以憚煩召他醫以大黃朴硝膠子等冷藥罨之一夕豁開如醬蚶徑三寸一二日後血自蚶中濺出高數尺而死此冷藥外逼熱鬱不得發宜其發之暴如此也

徐南父病瘡甚劇公徒跣風露中覓醫藥不得向天大泣禱神語曰八角井有金絲草可為膏治之得果立愈雲間襍誌　無名氏

陳自明外科精要云神仙截法治癰疽發背一切惡瘡預服則毒氣不入內真蘇油一斤銀石器中熬十數沸候冷用酒兩椀入油五盞通口熱服一日用盡緩則數日服之吳安世云吾家三世用之無有不驗又聞獵者云凡中藥箭急飲蘇油藥毒即消鄭學諭德甫屢用之甚驗

薛立齋治一男子患癰腫硬疼痛發熱煩躁飲冷脉沈實大便秘乃邪在臟也用內疎黃連湯疎通之以絕

其源先投一劑候行一次勢退一二再進一劑諸症悉退乃用黃連消毒散四劑而愈

一男子膿熟不潰欲針之補以托裡不信乃服攻毒藥反致惡心少食始悟而用鍼更以六君子湯加霍香當歸四劑少可再以加味十全大補湯數劑而斂凡瘡膿熟不行針刺膿毒侵蝕輕者難療重者不治老弱之人或偏僻之處及緊要之所若一有膿宜急針之更以托裡庶幾無變

一男子患毒作痛服寒涼藥痛雖止而食愈少瘡亦不潰以六君子湯而食進再以托裡藥潰之而愈大抵

瘡疽之症寒熱虛實皆能作痛熱毒之痛者以寒涼之劑折之寒邪之痛者以温熱之劑散之因風而痛者除其風因濕而痛者導其濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之膿聚而閉者開之惡肉侵蝕者去之陰陽不和者調之經絡閉塞者利之慎勿緊用寒涼之藥況血脈喜温而惡寒若冷氣入裡血即凝滯反為難療矣

馮楚瞻治趙翁年七十二右頰腫硬連及頤項耳後一片堅實不熱不疼已兩月餘諸治不效漸至口内出膿牙噤不開飲食少進精神日衰脉則洪大而空知

為氣大虧虛陰寒所聚所謂石疽是也不得陽和何以外解若內潰日久穿喉破頰不可療矣乃用猪脂搗爛入肉桂細末葱頭食鹽杵勻厚敷患處敷藥以法

脂膏治血肉同氣相應也葱能透竅鹽能軟堅桂能行血油能浸潤皮膚內則空心生脉飲送八味丸食遠以參耆歸芍苓朮薄桂銀花角刺之類使陽回則陰寒自解血氣冲和自能逐毒三五日後氷硬者熱軟漫腫者高聳木者疼痛紫者紅活飲食日進血氣漸長毒既外出久凝久瘀之血肉消者消膿者膿不再旬而愈

張景岳治一儒者年近三旬素病耳發必潰膿至夏益甚自耳根下連頸項上連頭角耳前後莫不腫痛或與散風降火一月後稠膿鮮血自耳迭出每二三日必出鍾許而腫痛全不消枕不可近察其形色已大不足而腫痛則若有餘脉之或急或緩弱此非實熱可知遂先與六味湯二三劑元氣稍振繼與一陰煎加牛蒡茯苓澤瀉倍加白蒺藜為君服五十餘劑外用降癰散晝夜敷治兩月而後愈蓋此症雖似潰瘍有餘而實以肝腎不足上實下虛一奇症也何之有

張通府耳後髮際患腫一塊無頭肉色不變按之微痛

彼以為痰結診其脉軟而時見數經云脉數不時見則生瘡也非痰結仲景云微弱之脉主血氣俱虛形精不足又云沈遲軟弱皆宜托裡遂以人參白朮黃耆當歸川芎炙艸以托裡少加金銀花白芷桔梗以消毒彼謂不然內飲降火化痰外貼涼藥覺寒徹腦患處大熱頭愈重飲食愈少復請治以四君子湯加藿香炮乾薑數劑飲食漸進膿成刺之更以十全大補湯去桂及炙以豆豉餅又月餘而愈

胡生耳後寸餘發一毒名曰銳疽燃痛寒熱煩躁喜冷此膽經蘊熱而然先用神仙活命飲一劑勢減二三時值仲冬彼惑于藥有用寒遠寒之禁故不再服自用十宣散托裡之藥勢漸熾耳內膿潰復請治視其喉腫閉藥不能下而殁

一婦人年逾四十近環跳穴生一毒尺脉沈緊腿不能伸經曰脾寒移於肝癰腫筋攣夫脾主肉肝主筋肉溫則筋舒肉冷則筋急遂以乳香定痛丸治之少愈更以助胃壯血氣藥二十餘劑而消

一婦人脩傷次指成膿不潰燃痛至手誤數涼藥以致通燃(微)嘔少食彼以為毒氣內攻診其脉沈細此痛傷胃氣而然也遂刺之服六君子湯加藿香當歸食進

更服八珍湯加黃耆白芷桔梗月餘而愈

一後生亦患此色黑不痛其指已死欲令斬去速服補劑恐黑上臂不治彼不信另服敗毒藥手竟黑遂不救

一男子亦傷姆指色紫不痛服托裡藥及灸五十餘壯作痛潰膿而愈

吳舉人幼女因凍傷兩足至春發潰指俱壞遂去之服以大補藥而愈

藍上舍女患嵌甲傷指年餘不愈日出膿數滴謂足大指乃肝脾二經發源之所宜灸患處使瘡肉去陽氣至瘡口自合否則不治彼忽之不早治後變勞症而歿蓋至陰之下血氣難到若女人患此又多因紮縛致血脉不通或被風邪所襲則無氣血榮養遂成死肉惟當壯其脾胃行其經絡生其血氣則愈其有成破傷風以致牙關緊急口眼喎邪者先以玉真散一二服然後投以通經生血之劑

于侍御髀胛患毒痛甚服消毒藥其勢未減即以槐花酒一服勢隨大退再以托裡消毒之藥而愈

立齋曰余丙子年忽惡心大椎骨甚痒須臾臂不能舉神思甚倦此天疱危症也急隔蒜灸之痒愈甚又明

灸五十餘壯瘥遠止旬日而愈精要云灸法有回生之功信矣大凡蒸灸若未潰則拔引鬱毒已潰則接補陽氣祛散寒邪瘡口自合其功甚大其法用大獨蒜切片如三錢厚貼疽頂上以艾炷安蒜片上灸之每三壯一易蒜片若灸時作痛要灸至不痛不痛要灸至痛方止大槩以百壯為度膿潰則以神異膏貼之不日而安一能使瘡不開大二肉肉不壞三瘡口易合見効甚神丹溪云惟頭為諸陽所聚艾壯宜小而宜少

王大廣年逾六十素厚味頰顋患毒未潰而肉先死脈數無力此胃經積毒所致顋頰正屬胃經未潰肉死則胃氣虛極老人豈宜患此辭不治果殁內經云膏粱之變足生大疔受如持虛

黃履素曰予座師茅五芝先生長公子子京偶于腎間患一毒地非要害直易視之子京素知醫恐痛傷元氣輒服人參其毒愈甚發寒熱乃始延醫又過粗工潰後胸滿應服參耆反不能多服竟致不能收口而殁蓋癰疽初起先宜瀉毒而後議補若補之太早遂有此禍可鑒也

邱汝誠面生疽即買藥鋪肆所合神芎散丸子之曰以

此療其人怒不宿服歸而告人曰未必非良法也服之即瘥蓋其人嗜酒此丸實去酒病云揮塵新談

彭羌門少宰傳治腫毒初起方取鷄子用銀簪挿一孔用明透雄黃三錢研極細末入之仍以簪攪極勻封孔入飯內蒸熟食之日三枚神効居易録

前寧都令李聘說麥粉不拘多少用陳醋熬膏貼無名腫毒神効公上

腦疽

薛立齋治一男子患腦疽其頭數多痛不可忍先服黃連消毒散不應更以忍冬酒服之即酣睡覺而勢去六七再四劑而消又一男子所患尤甚亦令服之腫痛頓退但不能平加以黃耆當歸瓜蒌白芷甘艸節桔梗數劑而愈

舉人潘光甫年四十患腦疽爛腫診其脉沈靜謂陽症陰脉斷不起已而果然蓋瘡瘍之症雖屬心火尤當分表裡虛實果元氣充實內有實火者寒劑或可責効若寒凉過度使胃寒脾弱症變陰或結而不潰潰而不斂陰陽乖戾水火交爭死無日矣

一老婦患腦疽稟壯實潰而痛不止脉實便秘與清凉

飲二劑而痛止更以消毒托裡藥而愈

一老人患此色赤腫痛脉數而有力與黃連消毒散二劑少退更以清心蓮子飲四劑而愈

一男子患之腫痛脉數以黃連消毒散二劑少退以仙方活命飲二劑而止再以芎歸白芍銀花知柏而潰又以托裡藥而愈

一男子頭項俱腫雖大潰腫痛益甚兼作瀉煩躁不睡飲食少思其勢可畏診其脉毒尚在與仙方活命飲二劑腫痛退半與二神丸及六君子湯加五味麥冬棗仁四劑諸症少退飲食少進睡亦少得及與芩芩白朮散數服飲食頓進又與十全大補湯加銀花白芷桔梗月餘而瘥

一老人色赤腫痛脉數而有力與黃連消毒散二劑少退更以清心蓮子飲四劑而消

一婦人膿熟不潰脹痛欲嘔飲食少思急針之與托裡藥而愈

一婦人患之不甚痛不作膿以托裡消毒散膿成針之補以托裡藥而愈

一老人膿清兼作渴脉軟而濇以為氣血俱虛用八珍湯加黃耆五味子彼不信乃服降火之劑果反作嘔

少食始信服香砂六君子湯四劑嘔止食進仍投前湯月餘而愈

一男子未潰兼作渴尺脉大而無力以四物湯加知柏麥冬黃耆四劑而渴減又與加味八味丸渴止瘡潰更用托裡藥兼前丸而愈

一男子腫痛脉数以荊防敗毒散二劑而痛止更以托裡消毒藥而消

一男子熾腫疼痛發熱飲冷脉洪数與涼膈散二劑而止以金銀花散四劑而潰更以托裡藥而愈

一老婦稟實潰而痛不止脉實便秘以清涼飲二劑而止更以托裡消毒藥而愈

一男子腫硬不作膿惟瘡頭出水痛甚以仙方活命飲二劑痛止而膿成針之更以托裡藥而愈常治膿清補而不應及不痛或木悶堅硬者俱不治

一男子膿將成微痛兼渴尺脉大而無力此陰虛火動之症彼謂心經熱毒自服清涼降火藥愈熾復求治乃以四物湯加知柏五味麥冬黃耆及加減八味丸渴止瘡潰更以托裡藥兼前丸而愈中藏經云癰疽瘡腫之作皆五臟六腑畜毒不流非獨榮衛壅塞而發其行也有處其主也有歸假令發于喉舌者心之

毒皮毛者肺之毒肌肉者脾之毒骨髓者腎之毒發于下者陰中之毒發于上者陽中之毒外者六腑之毒內者五臟之毒故內曰壞外曰潰上曰從下曰逆發于上者得之速發于下者得之緩感于六腑者易治感于五臟者則難治也觀此則疽發于膺者乃膀胱督脉陰氣不足陽火熾甚而出也豈可尚泥于心火而不滋益陰氣耶

一男子耳後漫腫作痛肉色不變脉微數以小柴胡湯加芎歸桔梗四劑腫少起更以托裡消毒散數劑脉滑數此膿已成矣宜針之彼畏而不肯用因痛極始針之出膿椀許以托裡藥兩月餘始愈凡瘡不起者托而起之不成膿者補而成之使不內攻膿成而及時針之不數日即愈矣常見患者皆畏針痛而不肯用又有恐傷良肉而不肯用殊不知瘡雖發于肉薄之所若膿成其腫亦高寸餘瘡皮又厚分許用針深不過二分若發于背腫高必有三四寸入針止于寸許況患處肉已壞矣何痛之有何傷之慮怯弱之人及患附骨疽待膿自通以致大潰不能收斂氣血憊盡而亡者多矣用針之法

一男子素不慎起居飲食燄赤腫痛尺脉洪數以黃連

消毒散二帖濕熱頓退惟腫硬作痛以仙方活命飲二帖腫痛悉退但瘡頭不消投十宣去桂加銀花薑本白朮茯苓陳皮以托裡排膿彼欲全消自製黃連消毒散二帖反腫硬不作膿始悟仍用十宣加白朮茯苓半夏腫少退乃去桂又四劑而膿成腫勢亦退繼以八珍散加黃耆五味麥冬月餘膿潰而愈夫苦寒之藥雖治陽症尤當分表裡虛實次第時宜豈可始末悉用之然癰腫赤痛尺脉數按之則濡乃膀胱濕熱壅盛也故用黃連消毒散以解毒除濕腫硬作痛乃氣血凝滯不行而作也遂用仙方活命飲以散結消毒破血其瘡頭不消蓋因熱毒熏蒸氣血凝滯而然也宜用甘溫之劑補益陽氣托裡以腐之況此症原屬督脉經陰虛火盛而出若不審其因專用苦寒之劑使胃寒氣弱何以腐化收斂幾何不致于敗耶凡瘡之易消散易腐潰易收斂皆氣血壯盛之故也

汪太常太夫人年逾八十腦疽已潰發背纍生頭如栗許脉大無力此膀胱經濕熱所致夫脉無力乃血氣衰也遂以托裡消毒藥數服稍可更加參耆之劑雖起而作渴此氣血虛甚以人參黃耆各一兩當歸熟

地各五錢麥冬五味各一錢數服渴止而不潰以前藥加肉桂十餘劑膿成針之瘡肉漸腐徐徐取去而膿猶清不斂投以大劑十全大補湯加白斂貝母遠志三十餘劑膿稠而愈凡患者氣質素實或有瘀不服補劑不知膿血出多氣血並虛豈不宜補嘗治瘡陰用參耆大補之劑陽書敗毒之名與服之俱不中滿瘡亦有効虛甚者尚加薑桂及附子也

一男子患腦疽腫高作痛腫處數藥痛雖止而色變黯腫外作痛仍數之肉色亦黯喉內作痛不悟此為涼藥所誤反盡頸數之其頸皆潰而死

朱丹溪治元杜清碧學道武夷至婺源病腦疽自治不愈朱往視之曰何不服防風通聖散清碧曰服數四矣朱曰盡以酒製之清碧乃悟服不盡劑而愈自此心服丹溪續醫說

實材治一人病腦疽六日危篤不進飲食實曰年高腎虛邪氣滯經也令服救生湯即刻減半夜間再進一服全安

一老婦腦後作痛憎寒拘急實曰此欲發腦疽也急服救生湯三服全愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

鬢疽

薛立齋治一男子患鬢疽瘍腫作痛發熱以小柴胡湯加連翹金銀花桔梗甘草各四劑而消

一男子曰怒後鬢疽腫痛發熱以小柴胡湯加連翹銀花花粉桔梗甘草各四劑根畔俱消惟瘡頭作痛以仙方活命飲二劑痛止膿成針之更以托裡消毒藥而愈

一男子頭面瘍腫作痛時仲冬脉弦緊以托裡溫經湯汗之而愈

一男子腫痛寒熱拘急脉浮數以荊防敗毒散二劑表症悉退更以托裡消毒散潰之而安

一男子膿熟不潰脹痛針之而止更以托裡消毒散而愈凡瘡膿熟而不潰屬氣血虛也若不托裡必致難瘡

一男子作膿瘍痛發嘔少食以仙方活命飲一劑而止以六君子湯加當歸桔梗甘草刺潰而愈

一男子膿清不斂以托裡散加五味麥冬而斂

一老人腫痛發熱膿清作渴脉輭而濇此血氣俱虛也欲補之彼見作渴發熱乃服降火之劑果作嘔少食復求治投六君子湯四劑嘔止食進仍用補藥月餘

而愈夫患者臟腑氣血上下各有虛實況陰症似陽
陽症似陰豈可以發熱作渴而堅用寒凉之劑常治
患者正氣虛邪氣實以托裡為主消毒佐之正氣實
邪氣虛以攻毒為主托裡佐之正氣虛邪氣實而專
用攻毒則先損胃氣宜先用仙方活命飲托裡消毒
散或用灸法俟邪氣退正氣復更酌量治之大抵正
氣奪則虛邪氣勝則實蓋邪正不並立一勝則一負
其虛不待損而自虛矣若發背腦疽疔毒及患在四
肢必用灸法拔引鬱毒以行瘀滯尤不可專于攻毒
診其脉而辨之庶不有悞

一男子腫煩痛甚發寒熱服十宣散愈熾診之脉數而
實此表裡俱有邪也以荊防敗毒散加芩連大黃二
劑少愈更以荊防敗毒散四劑而消大抵瘡瘍之症
腫煩痛甚寒熱往來或大便秘結小便淋瀝心神憒
悶恍惚不寧皆邪熱之實也豈可補哉東垣云瘡疽
之發其受之有內外之別治之有寒溫之異受之外
者法當托裡以溫劑反用寒劑則是皮毛始受之邪
引入骨髓受之內者法當疎利以寒劑反用溫劑托
裡則是骨髓之病上徹皮毛表裡通潰共為一瘡助
羣疽則危治重則死矣

趙宜人年逾七十患鬚疽已潰熾腫痛甚喜冷脉實大便秘澁東垣云煩躁飲冷身熱脉大精神昏悶者皆臟腑之實也遂以清涼飲一劑腫痛悉退更以托裡消毒藥三十餘劑而平若謂年高潰後投以補劑實實之禍不免矣

維揚俞黃門年逾三十冬月鬻患毒腫熾煩躁便秘脉實此膀胱經風熱壅上而然也馬氏云瘡瘍之症熱壅而不利者大黃湯下之遂以一劑便通瘡退更以荊防敗毒散二劑再以十宣散去桂加花粉銀花數劑而愈大宗伯羅公耳後髮際患此熾痛脉數以小柴胡湯加桔梗牛蒡銀花四劑而愈

顧毒

薛立齋治高舉人年逾三十夏月熱病後患顧毒積日不消氣息奄奄脉診如無飲食少思大便不禁脉經云脉息如無似有細而微者陽氣衰也齊氏云飲食不入大便滑利腸胃虛也遂以六君子湯加炮薑肉豆蔻破故脂數劑瀉止食稍進更加以黃耆當歸肉桂漬而膿水清稀就于前藥每服加熟附子一錢數劑食進膿亦漸稠再以十全大補湯用酒芍加白斂

月餘而瘥

項癰

薛立齋治二守施希禄項患毒膿已成曰畏針欲延至
胸色赤如霞其脉滑數飲食不進月餘不寐肢體甚
倦此氣血虛而不能潰也乃針之膿出即睡覺而思
食用托裡藥兩月而愈劉璽素虛患此不針潰透頷
頰氣血愈虛竟不救

一婦人項患癰煩痛發寒熱以荊防敗毒散二劑少愈
以小柴胡湯加連翹牛蒡桔梗四劑而消

一男子項患毒潰而作痛以參耆地黃芎歸補之而止
更以八珍湯加黃耆桔梗三十餘劑而愈

馬元儀治沈氏婦頸項間患瘍痛甚躁煩發熱晝夜不
眠多方不愈診之兩脉浮大沈小此陽明氣血交虧
之候也陽明之氣一日一夜五十周于身而血隨之
氣虛血澁則病生焉況所現皆血虛氣衰之症較之
熱毒有餘者殊矣用黃耆一兩當歸五錢人參三錢
炙艸七分紅花五分調補氣血四劑而安

張子和在西華寄食於夏官人宅忽項上病一瘡狀如
白頭瘡腫根紅硬以其微小不慮也忽故人見邀以

羊羔酒飲鷄魚醢蒜皆在禁忌是夜瘡大痛不可忍項腫及頭口開發狂目見鬼神夏君甚懼欲報其家張笑曰請無慮來日當平乃以酒調通經散六七錢下舟車丸百餘粒次以熱麪羹投之上涌下泄一時齊作各去半盞明日日中瘡腫已平一二日膿出而愈夏君見大奇之

朱丹溪治王姑丈七十餘患項疽脈實而稍大此因憂悶而生太陽經治之歸頭二錢黃柏一錢五分黃耆羌活地黃酒芩桔梗各一錢酒連連翹防風生甘艸人參陳皮防己澤瀉各五分白水煎服

柴嶼青治夏同司廂黃旗覺羅諱瑪德患對口人皆謂之落頭疽難治柴以為無害服藥五十日而愈後某公亦患前症亦服藥五十日而安此案有疵無藥可不存

姚應鳳診一人項生瘡求治應鳳曰是天斫頭瘡宿因也三年頭當自落而斃竟如其言仁和縣志

肩癱

薛立齋治一男子肩患毒瘍痛飲冷煩躁便秘脈數而實以清涼飲二劑少愈以金銀花散四帖悉退又以十宣散去桂加天花粉銀花數帖瘡潰而痊此脈與

症皆有餘也

一婦人癸卯冬失物發怒缺盆內微腫甲辰春大如覆椀左肩胛亦腫肉色如故或針出鮮血三椀許腹痛如錐泄瀉不止四肢逆冷嘔吐惡寒或時發熱絶食已七日矣其脉洪大時或微細此陽氣脫陷也用六君加炮薑三錢附子二錢早服至午不應再劑加附子五錢熟睡覺來諸症頓退六七少進稀粥再四劑諸症悉退飲食如故缺盆始痛針出清膿兩椀許諸症復至此虛極也以十全大補加薑桂附各一錢三劑而安後減薑桂附各五分與歸脾湯兼服五十餘劑而愈

上舍陳履學之內先從左肩下一點寒三日後右肩下發一白腫如甌中紅如酒盞自用消解凉藥一劑不散次投十宣散四劑加痛略紅次連投參耆丁桂防芷之劑膿潰後惡心嘔吐頭暈不止厥逆寒戰鼓牙虛汗頂平膿清此投解散凉劑之咎急洗去圍藥投以參耆歸朮地黃薑附大劑一服原從左肩下舊寒一點先熱起又進一服遍腫浮熱腫高膿稠兼維烏金膏數日出腐筋如腊膜大小数片日進前藥二服參耆投至八錢踰兩月始安愈後時以勞厥即投參

耆歸朮薑附大劑乃甦

一男子肩患毒煩痛飲冷煩躁便秘脉數而實以清涼飲二劑少愈以金銀花散四劑悉退又以十宣散去桂加天花粉金銀花數劑瘡頭潰而瘉

一婦人肩下患毒脉弦緊以白芷升麻湯二劑表症已退更以托裡藥潰之而愈

一男子素弱肩患腫欲內消服凉藥反致作瀉少食以二神丸及香砂六君子湯加肉豆蔻而瀉止食進又以托裡藥而腫亦消

一男子肩下患疽已數日漫腫微痛頭甚多皆如粟許色不變不起發此氣血虛也診其脉果然先以仙方活命飲二劑殺其大勢更以托裡藥而起發瘡頭雖潰但流血水氣血尚虛不能為膿也彼欲服太乙錠子謂此藥止能攻毒不能托裡不信仍服之至四次飲食不進瘡色黑陷呃逆不絕胃氣虛極也不治強投温中健脾之劑不應而死

一男子肩患毒腫硬作痛惡症迭見用白礬末三錢糊丸以蔥頭七莖煎湯調下腫痛悉去再服諸症亦退更以仙方活命飲二劑出水而消此秘方名千金化毒湯本礬末蔥湯調服因末難嚥故易為丸一方

士治瘡疽不問腫潰先用此藥三二服後用消毒藥甚效常治芻蕘之人用此即退不用托裡藥亦愈蓋止熱毒為患血氣不虧故也若因金石毒藥發疽者尤効蓋礬又能解金石之毒也一方用礬末五錢硃砂五分熱酒下亦效此藥托裡固內止瀉解毒排膿不動臟腑不傷氣血有益無損其藥易得其功甚大偏僻之處不可不知此方或蟲犬所傷鎔化熱塗患處更以熱酒調末服皆效

福泉黃吏部肩患毒發熱惡寒大渴煩躁似有餘之症其脉雖大而無力却屬不足用當歸補血湯治之而

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

愈

王喬年逾三十肩患毒以人參敗毒散一劑更以十宣散去參桂加銀花花粉四劑而潰因怒動肝火風熱上壅頭面赤腫煩痛飲冷以荊防敗毒散加芩連薄荷二劑不應急砭患處出黑血盞許仍以一劑勢退大半再進人參敗毒散四劑而愈夫病有表裡上下之殊治有緩急攻補之異若不砭刺毒氣結于肉裡藥不能及煩腫日甚使投峻利之藥則上熱未除中寒已作必傷命矣

一上舍肩患疽脉数以槐花酒一服勢頓退再與金銀

勢

疑當作熱

遠著塵寒之人不可過服而平槐花治濕勢之功最為神

王洪緒治姚氏女年二十九小產月餘左肩手搭處先發一毒周尺有五寸半月背添一毒上下長一尺三寸上潤下尖皆白膿十日後始延治勢甚篤連服陽和湯三劑能起坐五劑自能便溺十二劑其續發者全消先發之搭手亦消剩瘡頂如碁子大不痛而潰四日收功後云背上如負一版轉舒不快以小金丹十丸每日二進全愈

臂癰

薛立齋治進士申天益臂患癰寒熱頭痛形氣虛弱此手足陽明經風邪之症用桔梗升麻湯二劑外邪頓散用托裡消毒散二劑腫痛頓退乃用補中益氣湯調理形氣漸復而愈

一婦人臂患腫惡寒不作膿以十宣散六劑而潰以托裡散數劑而瘳

一婦人臂腫未成膿飲食少思過勞作痛發熱以補中益氣湯二劑痛少止以補氣血健脾胃藥而消

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

花黃耆甘艸十餘服而平梔花治濕勢之功最為神速若虛寒之人不可過劑

王洪緒治姚氏女年二十九小產月餘左肩手搭處先發一毒周尺有五寸半月背添一毒上下長一尺三寸上潤下尖皆白膿十日後始延治勢甚篤連服陽和湯三劑能起坐五劑自能便溺十二劑其續發者全消先發之搭手亦消剩瘡頂如碁子大不痛而潰四日收功後云背上如負一版轉舒不快以小金丹十丸每日二進全愈

臂癰

薛立齋治進士申天益臂患癰寒熱頭痛形氣虛弱此手足陽明經風邪之症用桔梗升麻湯二劑外邪頓散用托裡消毒散二劑腫痛頓退乃用補中益氣湯調理形氣漸復而愈

一婦人患腫惡寒不作膿以十宣散六劑而潰以托裡散數劑而瘳

一婦人臂腫未成膿飲食少思過勞作痛發熱以補中益氣湯二劑痛少止以補氣血健脾胃藥而消

一婦人臂患毒腫硬咽喉壅塞四肢逆冷發寒熱以五香連翹湯二劑頓愈以瘡科流氣飲四劑而消

一男子臂患癰脉弦緊有力以白芷升麻湯二劑頓退又二劑而消

一男子患臂癰不作膿灸以豆豉餅及飲托裡藥三十餘劑而潰又月餘而瘳

一婦人患臂癰瘡口紫陷膿清不斂彼以為毒未盡欲服攻毒之劑謂瘡癒之症腫起堅硬膿稠者實也腫下軟慢膿稀者虛也遂用附子餅灸之及飲十全大補湯百劑始愈

西蜀彭黃門太安人臂痛數年服活絡丹二丸而瘥可入痺

朱丹溪治從叔平生多慮質弱神勞年近五十忽左膊外側廉上起一小紅腫大約如栗曰慎勿輕視且先與人參大料作湯二三斤為好彼未之信慢進小貼數服未解而止旬餘值大風拔木瘡上起一道紅綫繞至背胛直抵右胛助曰必大料人參少加川芎陳皮白术等補劑與之後與此方閱兩月而安

東垣曰尹老家素貧己酉歲十月初寒形志皆苦於手陽明大腸經分出癰初有癮疹其臂外皆腫痛先腫

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

在陽明左右寸脉皆短中得之俱弦按之洪緩有力此癰得自八風之變以脉斷之邪氣在表其症大小便如故飲食如常腹中和口知味知不在裡也不惡風寒止熱躁脉不浮知不在表也表裡既和邪氣止在經脉之中內經曰凝于經絡為瘡癰其癰出身半已上風從上受之故知是八風之變為瘡者也宜治其寒邪調其經脉中血氣使無凝而已以白芷升麻湯療之一服而愈炙甘草升麻桔梗白芷當歸稍生地黃生黃芩酒黃芩連翹黃耆中桂紅花右㕮咀水酒各大盞半同煎服愈

薛治王揮使臂腫一塊不痛不赤惟脉弱嬾食時嘔以六君子加藿香酒芩嘔止食進再以八珍湯二十餘劑成膿刺之又以十全大補而愈次年傷寒後此臂仍腫微痛乃傷寒餘毒也無表症但虛弱先用十宣散四劑取參耆芎歸扶助元氣防風桔梗白芷厚朴行散腫結肉柱引經破血腫退三四再以八珍湯膿潰而愈至冬腎復作痛因服祛風藥反筋攣痛甚此血虛不能養筋筋虛不能束骨遂以加味十全大補百貼而愈

一室女臂患腫潰久不斂寒熱交作五心煩熱飲食少

思月水不通與逍遥散八珍湯經行瘡愈一婦人月水不行潮熱咳嗽肌體日瘦胸膈不利頸腫一塊日久不消亦服前藥熱退腫消經行而愈

宋玻年逾三十臂患癰潰而不痛膿稀脉弱丹溪云疽潰深而不痛者胃氣大虛而不知痛也東垣云膿水清稀瘡口不合氣血俱虛也當以大補藥治彼不聽服消毒藥氣血虛甚遂不救丹溪云纔見腫痛癸之脉症虛弱便與滋補氣血無虧不可保終吉又云潰瘍内外皆虛宜接補為主

王時亨年逾四十臂患毒煩痛作嘔服托裡消毒藥愈甚以凉膈散二劑頓退更以四物湯加芩連四劑而消

王文遠臂患毒作痛服寒凉藥遂致食少大便不實以理中丸二服更以六君子湯加砂仁藿香治之再以托裡藥膿潰而愈大凡瘡痛甚者如稟厚有火則宜苦寒之劑若稟薄者則宜補中益氣湯加芩連之類在下加黄柏人肥而瘡作痛者用荆防羌獨之類蓋取其風能勝濕也

方云起臂生一疽膿潰百日方愈中有惡肉突起如蠶豆大月餘不消醫治不效因閱本草得劉涓子鬼遺

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷四十九

方用烏梅肉燒存性研傳試之一日夜去其大半再上一日而平乃知世有奇方如此遂留心搜刻諸方始基于此方也本草綱目劉涓子又有神仙遺論一書此方不見於鬼遺方當於遺論中求之

三月初二日記

鬼遺方之驗見於此案真可寶也因刻入叢書以廣其傳

嘉慶壬申清明記 介畏

續名醫類案卷之五十

錢塘魏之琇玉橫撰

乳

薛立齋治一婦人因怒兩乳腫兼頭痛寒熱此肝經症也用人參敗毒散二劑表症已退用小柴胡加芎歸枳殼桔梗四劑而愈

一婦人因怒左乳作痛胸膈不利此屬肝脾氣滯以方脈流氣飲加木香青皮四劑而安

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一婦人久鬱左乳內結核如杏三月不消心脉澁脾脉
大按之無力此肝脾氣血虧損以八珍加貝母遠志
香附柴胡青皮桔梗五十餘劑而消
一婦人乳內結核年餘晡熱少食此氣血不足欲用益
氣養榮湯彼反服行氣之劑潰出清膿而歿又一婦
乳內結核如栗亦服前藥大如覆椀堅硬如石出血
水而歿又郭氏妾乃放出宮人乳內結一核如栗亦
以前湯彼不信乃服瘡科流氣飲及敗毒散三年後
大如覆椀堅硬如石出水不潰而歿大抵鬱悶則脾
氣阻肝氣逆遂成核隱核不痛不痒人多忽之最難治
療若一有此宜戒七情遠厚味解鬱結更以養氣血
之藥治之庶可保全否則不救亦有二三載或五六
載方潰惱下者皆曰乳岩以其形岩凸似岩穴也最
毒慎之可保十中一二也
一婦人腫而不作膿以益氣養榮湯加香附青皮數劑
而膿成針之自日而愈
一婦人右乳腫發熱怠惰嗜臥無氣以動至夜熱亦甚
以補中益氣湯兼逍遙散治之而痊
一男子左乳腫硬痛甚以仙方活命飲二劑而止更以
十宣散加青皮四劑膿成針之而愈若膿成未破瘡

頭有薄皮剥起者用代針之劑點起皮處以膏藥覆之膿亦自出不若及時針之不致大潰如出不利更縱搜膿化毒之藥若膿血未盡輒用生肌之劑反助邪氣縱早合必再發不可不慎也

一男子年踰五十患子不立事左乳腫痛左脇脹腫肝脉弦數而澁先以龍薈丸二服諸症頓退又以小柴胡對四物加青皮貝母遠志數劑而膿成欲針之仍以養氣血解鬱結彼不從仍襍用流氣敗毒之劑到便秘發熱作渴復請治謂膿成不潰陽氣虛不能鼓舞也便秘發熱陰血竭不能濡潤也辭不治果死

一男子因怒左乳腫痛肝脉弦數以復元通氣散二服少愈以小柴胡湯加青皮芎歸數劑而消復元通氣散木香茴香青皮甲炒片陳皮白芷甘草滿盧貝母各等分每服三錢溫酒調下

孫文垣婬婦素有瘀涎胸膈痞脹近因乳腫大發寒熱欲成癰以加味神効瓜蒌散二帖寒熱退而腫不消用貝母白芷為臣瓜蒌為君赤芍當歸連翹為佐青皮甘草柴胡為使痛減腫仍不消脉之近數知已成膿乃與內托十宣散加銀花蒂丁二帖而膿潰因脚上生瘡且有浮氣前方去蒂丁銀花加茯仁蒼耳子

調理全安

薛立齋治王汝道室年踰三十每怒後乳內作痛或腫此肝火所致用小柴胡合四物加青皮桔梗香附枳殼而愈彼欲絕去病根自服流氣飲遂致朝寒暮熱益加腫毒此氣血被損而然與八珍三十餘劑喜其年壯元氣易復得愈

一婦人乳內腫一塊如雞子大勞而作痛久而不消服托裡藥不應此乳勞症也屬肝經血少所致先與神效瓜蒌散四劑更隔蒜灸之腫稍退再以八珍湯倍加香附夏枯草蒂丁仍間服前散月餘而消亦有乳

此宜小注上一行之下

疽一症其狀腫硬木悶雖破而不潰腫亦不消尤當急服此散及隔蒜灸斯二症氣血為七情所傷亦勞症也宜戒惱怒節飲食慎起居否則不治

一婦人患乳癰氣血頗實但瘡口不合百治不應與神效瓜蒌散四劑少可更與數劑及豆豉餅灸之而愈

一婦人患此未潰亦與前藥三劑而消

陳良甫曰婦人乳勞便服此藥可杜絕病根妻已成能化膿為水未成者則從大小便散之

一人抱疾小愈左乳復生癰繼又胸膈間結核其堅如石荏苒半載百藥不能施已而韋掣于肩痛楚特甚禱于張王祠夢間語曰但用生薑自然汁製香附服之

可也比覺簡本草視之二物治症相符訪醫者張禄亦云有理用香附去毛薑汁浸之一宿為末二錢米飲調纔數服瘡膿流出腫硬漸消而愈樣菴小乘

朱丹溪治一婦人年六十厚味鬱氣而形實多妬夏無汗而性急忽忽左乳結一小梗大如棋子不痛自覺神思不佳不知食味絕半月以人參湯調青皮甘艸末入生薑汁細細呷之一日夜五六次至五七日消矣

此乃妳岩之始不早治隱至五年十年已後發不痛不癢必于乳下潰一竅如岩穴出膿又或五七年十年雖飲食如故洞見五內乃死惟不得于夫者有之婦人于夫為天失于所天乃能生此謂之岩者以其如穴之嵌岈空洞而外無所見故名曰岩患此者必經久淹延惟此婦治之早正消患于未形餘者皆死

凡十餘人又治一初嫁之婦只以青皮甘草與之安二孺人但經將行而乳腫先兩日發口乾而不渴食少減脉左弦帶數右却平治用四物湯加陳皮白朮茯苓帶熱下與點丸三十粒

義二孺人平時乳內有結梗不為痛忽乳邊有又一腫梗頗却有些痛黃芩川芎木通陳皮各四錢人參二錢白芍一錢大腹皮三錢炙甘草生甘艸各一錢當

歸頭一錢分二帖煎服

楊孺人乳腫痛青皮石膏連翹角刺黃藥子當歸頭木通各一錢生甘艸三分入好酒些少同煎飲又別藥洗腫處

李東垣治一婦人乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子其脉弦洪按之細小升麻連翹葛根各一錢半肉桂三分黃耆歸身甘草炙各一錢牛蒡五分黃柏二錢水一盞酒半盞煎至一盞二服愈

立齋治一婦人患乳癰寒熱頭痛與荊防敗毒散一劑更與蒲公英一握搗爛入酒二三盞再搗取汁熱服查熱罨患處而消丹溪云此艸散熱毒消腫梗又散滯氣解金石毒之聖藥

陳良甫云開慶間淦川嘉林曾都運恭人年已五十而病妳癰後果不起以此知聖賢不安說也　癸亥年僕處五羊趙經畧夫人年七十一歲隔一二年前左乳房上有一塊如鷄卵大今忽然作楚召予議藥僕云據孫真人云婦人年五十歲以上乳房不宜見癰見則不可治矣幸而未破恐是氣瘤漫以五香連翹湯去大黃煎服服後稍減則已過六七年後每遇再腫脹時再合服必消滅矣良方

立齋曰一婦人乳內結核年餘不消口乾倦怠脉澁少食此肝脾二經血氣虧損之症宜培養為主乃用草藥數貼遂不救

繆仲淳治顧文學又善內人患左乳岩用夏枯艸蒲公英為君銀花漏蘆為臣蚯蚓糞桑葉甘菊雄鼠糞連翹白芷紫花地丁即蒲公英山茨菰灸草瓜蒌茜根陳皮乳香沒藥為佐使另用夏枯草煎濃汁丸之服勿許而消三年後右乳復患用舊存餘藥服之亦消後以此方治數人俱効廣筆記

馬銘鞠治沈姓婦患乳癰潰爛經年不見藏府者一膜耳用鼠糞土楝樹子經霜者佳川楝不用露蜂房各三錢俱煅存性各取淨末和勻每服三錢酒下間兩日一服痛即止不數日膿盡收斂此方傳自江西販糖客因治祝氏喉症得之廣筆記

張王屋屠後江孟修兄驗過乳癖方白芷一錢雄鼠糞一錢二種晒乾為末用好酒調服飲取一醺睡而愈雄鼠糞是又一神驗方用活鯽魚一个山藥一段如魚長同搗汁敷乳上以紙蓋之立愈廣筆記

薛治一婦人乳癰愈後發熱服養氣血藥不應與八珍湯加炮薑四劑而止仍以前湯加黃耆香附三十餘

劑氣血平復

一婦人年逾二十稟弱乳內作痛頭疼脉浮與人參敗毒散倍加人參一劑表症悉退但飲食少思日晡微熱更以小柴胡湯合六君子湯二劑熱退食進方以托裡藥加柴胡十餘劑針出膿而愈又一婦患此症膿成畏針病勢漸盛乃強針之膿出三椀許脉數發渴以大補藥三十餘劑而愈丹溪云乳房為陽明所經乳頭為厥陰肝屬厥陰者肝也乃女子致命之地宜筋之所且各有囊橐其始煩腫雖盛受患止于一二囊若膿成不針攻潰諸囊矣壯者猶可弱者多致不救所以必針而後愈也

張意田治一婦人左乳作痛硬塊不散治數年不愈後乳頭流出紅漿脉之沈弦而濇乳為婦人生氣之所鬱滯不解則肝不調達而逆于經絡脾失體用而不為胃行其津液乃營氣不從之候也早服歸脾丸加麥芽細麴飴糖晚服逍遥散作湯吞六味丸不兩月而瘥

錢國賓治一婦人年五十六左乳患已七年爛過半矣中間一孔如桃時流血水亢貼膏藥痛反增劇以布圈繫護防其摩擦夫乳頭屬足厥陰肝乳房屬足陽

明胃乃肝胃二經之症非單方不足以治其外非峻補不足以養其內以形色氣味治之用陳香橼一个其穰之瓣如乳內之房其色先青而後黃青屬肝黃屬胃其味先酸而後甘酸屬肝甘屬胃其氣香能通肝胃之氣煅黑止血酒服和經此治其乳也製一枚為末作二次服又用酒炒黃耆二兩益氣實表土炒白朮二兩山藥五錢健脾收濕芍歸地芍各一錢養血以水六椀煎三椀作四次服調至一月而瘥

胸癰

薛立齋治一男子胸患癰腫高煖痛脉浮而緊以內托復煎散二劑表症悉減以托裡消毒解四劑而消

一男子素弱胸患癰飲食少而倦以六君子湯加芍歸黃耆膿成針之更以托裡藥而愈

一男子胸患癰煖痛躁發熱作渴脉數而實時季冬謂此熱毒內畜也須捨時從症欲治以內疎黃連湯彼以時當隆寒乃襍用敗毒藥愈熾仍求治投前湯二劑後去二次諸症悉退以金銀花散加連翹山甲四劑出水而消大抵症有主末治有權宜治其主則末自退用其權則不拘于時泥于守常必致病勢危

甚況襟用攻劑動損各經故丹溪云凡瘡發于一經只當求責本經不可干擾餘經羅謙甫云守常者衆人之見知變者智者之事知常而不知變細事因而取敗者多矣

一男子胸患毒煩痛喜冷脉洪數以黄連解毒湯二劑頓退更以金銀花散六劑而消

一少婦胸膺間潰一竅膿血與口中咳相應而出以參耆當歸加退熱排膿等藥而愈余按此因肺癆咳致原注

張都憲夫人性剉多怒胸前作痛肉色不變脉數惡寒經云洪數之脉應發熱而反惡寒瘡疽之謂也今脉洪數則膿已成但體豐厚故色不變似乎無膿以痛極始宜用針入數寸膿出數椀遂以清肝消毒藥治之而愈設泥其色而不用針無可救之理矣

楊百户胸患毒腫高煩赤發熱脉數大小便澁飲食如常齊氏曰腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱頭目昏重氣血之實也又云大便硬小便澁飲食如故腸滿膨脹胸膈痞悶肢節疼痛身熱脉大精神昏塞臟腑之實也遂以黄連内疎湯二劑諸症漸退更以荆防敗

毒散加芩連山皂四劑少愈再以四物加芩連白芷
桔梗甘草銀花數劑而消
一男子胸腫一塊半載不消令明炙百壯方潰與大補
藥不斂復灸以附子餅而愈
張路玉治談仲安體肥善飲初夏患壯熱嘔逆胸膈左
畔隱痛手不可捫便溺澁數舌上滑胎食後痛嘔稠
痰漸見血水脉來澁澁不調與凉膈散加石斛連翹
下稠膩極多先是醫作肺癰治不効張曰肺癰必咳
嗽吐腥穢痰此但嘔不嗽洵為胃病無疑下後四五
日復嘔如前再以小劑調之三下而勢甫平後以保
元芩橘平調二十日而痊先時有李姓者患此專以
清熱豁痰解毒為務直至膈畔潰腐膿水淋漓纏綿
匝月而斃良因見機不早悔無及矣
瘡疡是症最難別白即內經所謂內有畏大膿血
之症也吾鄉一名醫自患此同道診之不知為癰
也襍進參附丁桂之劑久之吐出臭膿乃省已無
及矣

脇癰

薛立齋治一婦人脇患癰未成膿惡寒脉緊以十宣散

加柴胡二劑表症悉退更以托裡散數劑膿潰而愈

一男子近脇患疽腫而不潰投大補之劑潰而已愈後患弱疝而歿

一上舍年逾四十因怒脇內作痛不止數日後外結一塊三寸許漫腫色不赤按之微痛此怒氣傷肝致血傷氣鬱為患以小柴胡湯對四物倍用芎歸黃耆貝母肉桂治之彼謂丹溪云腫瘍內外皆壅宜托裏表散為主又云凡瘡未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不可用況此症為氣血凝滯乃服流氣飲愈虛始信而復求治視之虛症併臻診之胃氣更虛彼欲服薛前藥

曰急者先治遂以四君子湯加酒芍炮薑四劑少得更加當歸又四劑胃氣漸醒乃去薑又加黃耆芎歸肉桂數劑瘡色少赤并微作痛又二十餘劑膿成針之却與大全大補湯喜其謹疾又兩月餘而瘳夫氣血凝滯多因營衛之氣弱不能運散豈可復用流氣飲以益其虛況各經氣血多寡不同心包絡膀胱小腸肝經多血少氣三焦胆腎心脾肺少血多氣然前症正屬胆經少血之臟人年四十以上陰血日衰且肝症俱屬不足腫瘍內外皆壅宜托裡表散為主乃補氣血藥而加以行散之劑非專攻之謂也若腫煩

痛甚煩躁脉大辛熱之劑不但腫瘍不可用雖潰瘍亦不可用也凡患者須分経絡氣血地部遠近年歲老幼稟氣虛實及七情所感時令所宜而治之常見以流氣十宣二藥緊治結腫之症以致取敗者多矣

此案與舊案東侍御一則正同而此之發明最為緊要而舊案節之故重録于此

馬元儀治沈氏婦左脇患腫瘍長五寸許治已兩月發表托裡劑多功少診其兩脉弦數無澁腫處低陷作痛寒熱経行不止口躁艱食此症頗危必得之勞鬱且怒邪熱結聚厥陰之位營衛不行周身火邪獨徹上下表歛俱所不宜用生首烏一兩滋其內燥柴胡一錢疎其氣鬱枳殼桔梗各一錢舒通肺氣以制肝木杏仁蘇子各二錢調氣化痰以清上焦丹皮一錢清其血半麴一錢和其中兩劑寒熱減而経止患處煩腫潰出稠膿飲食少進瘡醫以潰後當行大補投者术之屬復致瘡口內陷食少曰癰疽已潰當補此其常耳今兩脉遲澁遲則氣阻澁則血滯鬱而得補其鬱彌甚始猶肝木自傷既乃轉戕脾胃以致榮衛之氣不循常度分肉不溫経隧不行而欲瘡之斂也其可得乎夫營衛不通須以血藥和之當歸桃仁紅

花延胡索是也白朮枳殼一補一瀉所以推陳氣而致新氣乾薑煖胃而和血查肉消滯而和中服二劑復大潰出稠膿梳許食進神旺而安

朱丹溪診李兄年四十餘而面稍白神甚勞忽脇下生一細腫如桃一人教用補劑衆笑且排于是流氣飲十宣散襍而進之旬餘召視之曰非惟不與補藥抑且多得解利血氣俱憊不可為矣已而果然

立齋曰一男子因怒左脇腫一塊不作痛脉澁而浮此肝經邪火熾甚而真氣不足為患宜培養氣血為主乃用草藥數貼遂致不救

一男子因勞發熱脇下腫痛脉雖大而按之無力此氣血虛勝理不密邪氣襲于肉裡而然也河間云若人飲食疎精神衰氣血弱肌肉消薄榮衛之氣短促而澁滯故寒薄腠理而癰腫也當補之以接虛怯之氣遂以補中益氣湯加羌活四劑少可去羌活又十餘劑而愈又一男子年二十遍身微痛腰間作腫痛甚以前藥加茯苓半夏並愈

一朝士腹脇間病疽經歲或以地骨皮煎湯淋洗出血一二升家人懼欠止之病者曰疽似少快更淋之用五升許血漸淡乃止以細穰貼之次日結痂愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

馬刀

張子和治襄陵馬國卿左乳二肋間期門穴中發瘡硬而不潰痛不可忍瘍醫皆曰乳癰或曰紅絲漏或曰覩心瘡使服內托散百日又服五香連翹湯數月皆無驗張曰此馬刀也足少陽膽經之病出靈樞十二經以示之其狀如馬刀故曰馬刀堅而不潰乃邀之于食肆中使食水浸湯餅稍覺緩次日先以滄鹽上涌又以涼劑滌去熱勢約十數行腫已消矣

朱葛黃家妾左脇病馬刀憎寒發痛已四五日矣張曰此足少陽膽經病也少血多氣堅而不潰不可急攻當以苦劑涌之以五香連翹湯托之既而痛止然瘡根未散有一盜醫過見之曰我有妙藥可潰而為膿不如此何時而愈既維毒藥不可忍外寒內嘔血不止大便黑色食飲不下號呼悶亂幾至于死再求治張曰脇間皮薄肉淺豈可輕用毒藥復令洗去以涼劑下之痛立止腫亦消

腋癰

薛立齋治一童子腋下患癰久不斂膿清脉大倦怠嫩

瘍醫會通卷之五下　腋疽　五

食少寐自汗口乾以內補黃耆湯及豆豉餅灸之兩月而愈凡瘡膿潰而清或瘡口不合或聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫者皆氣血俱虛也非補不可

一男子腋下患毒欬逆不食腸鳴切痛四肢厥冷脉細以托裡溫中湯二劑頓愈更以香砂六君子湯二神丸而飲食頓進以十全大補湯二十餘劑而斂

里中有周七者少年曾患毒在腋下得一異方用糯米炊飯乘熱入塩塊夾蔥管少許搗極爛如膏貼患處輒消至中年腰間忽生一毒熱如火板硬痛不可忍偃僂跼蹐自分必死屢藥不効急思前方如法貼之未幾大便去糞如宿垢甚多硬者漸軟數日而起痛

薛立齋治舉人邊雲衢心法作河南張承祖年逾二十腋下患毒十餘日腫硬不潰脉弱時嘔謂腫硬不潰脉弱乃陽氣虛嘔吐少食乃胃氣弱先以六君子湯加藿香砂仁治之彼謂腫瘍時嘔當作毒氣攻心治之潰瘍時嘔當作陰虛補之曰此丹溪大槩之言也即諸痛痒瘡皆屬心火之意假如赤腫痛甚煩躁脉實而嘔為有餘法當下之腫硬不痛不潰脉弱而嘔為不足法當補之亦有痛傷胃氣或感寒邪穢氣而

作嘔者雖腫瘍尤當助胃壯氣彼執不信用攻伐之藥病愈甚復請診其脉微細而發熱（謂熱）實汗後脉躁者皆難治後果然夫腫瘍毒氣內侵作嘔十有一二潰瘍濕氣內侵作嘔十有八九豈可混為一途

朱丈鼎母因忿欝腋下結一核二十餘年因怒加腫痛完穀不化飲食少思東垣云瀉利不止飲食不入此腸胃虛也遂以六君子湯加砂仁肉桂乾薑肉豆蔻瀉雖止而膿清瘡口不合氣血俱虛也以十全大補湯月餘而愈

一男子年逾五十腋下患（毒）瘡口不合右關脉數而渴此胃火所致用竹葉黃耆湯遂止再用補氣藥而愈嘗治午後發渴或發熱用地骨皮散亦効

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷五十

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷之五十一

錢塘魏之琇玉橫撰

發背

精要論背疽其源有五一天行二瘦弱三怒氣四腎氣虛五飲冷酒食炙煿服丹藥此二行原本注發背二字下須改正

元末嘉興桐鄉縣後朱村徐通判素慕洞賓朝夕供禮一日疽發於背勢垂死猶扶起禮之如昔偶見淨水盂下白紙一幅視之有詩云紛紛墓土黃金屑片片

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

花飛白玉芝君主一劑臣四兩調和服下即平衷意
其仙方然不知何物為黃金白玉乃召仙以大黃白
並為問仙曰然服之果驗後以之醫人無不効徐無
子方竟傳壻沈氏至今沈以此治生數百里來貨藥
者無虛日族大而分數十家惟嫡枝居大椿樹下者
藥乃驗沈子當從吾友俞院判學嘗聞其藥今加川
山甲當歸鼷金銀花矣然大黃既多以下為主不問
陰陽之毒而投之恐亦有害者然源源往醫又獨於
椿樹者驗豈非天固與之乎 七修類稿

京師萬勝門剩員王超忽覺背上如有瘡隱起倩人看
之已如盞大其頭無數或教往梁門裡外科金龜兒
張家買藥張視嘬眉曰此瘡甚惡非藥所能治又有
灼艾一法庶可冀望萬分然恐費力乃撮艾與之曰
且歸試灸瘡上只怕不疼直待灸疼方可療耳灼火
十餘殊不知痛妻守之而哭至第十三壯始大痛四
旁惡肉捲爛隨手墮地即似稍愈再詣張謝張付藥
敷貼日安則知癩疽發于背脇其捷法莫如灸也 類編

王敏診一人發背不起醫言起則治矣敏曰是擊指脈
即起亦不治衆却以艾疽起如栗衆曰無傷矣竟三

日死姑蘇志

治發背腦疽一切惡瘡初覺時採獨科蒼耳一根連葉帶子細剉不犯鐵器用砂鍋熬水二大椀熬及一半瘡在上徐徐飯後服之吐出候吐定再服以盡為度瘡在下空心服瘡自破出膿更不潰引瘡上別以膏藥傳之此方京兆張伯玉家牓示傳人後昆仲皆登第人謂善報 元遺山續夷堅志

大凡石類多主癰疽世傳麥飯石膏治發背瘡甚効乃中岳山人呂子華秘方裴員外啖之以名第河南尹呂寧絕榮望守死不傳其方取此石碎

此石待考

如碁子炭火燒赤投米醋中浸之如此十次研末篩細入乳鉢內用數人更碾五七日要細膩如麪四兩鹿角一具要生取連腦骨者其自脫者不堪用每二三寸截之炭火燒令烟盡即止為末研細二兩白歛生研末二兩用三年米醋入銀石器內煎令魚目沸旋旋入藥在內竹杖子不住攪熬一二時久稀稠得所傾在盆內待冷以紙蓋收勿令塵入用時以鵝翎拂膏于腫上四圍赤處盡塗之中留錢大洩氣如未有膿即內消已作頭即撮小已潰即排膿如湍水如病久肌肉爛落見出筋骨者即塗細布上貼之乾即

日死姑蘇志

治發背腦疽一切惡瘡初覺時採獨科蒼耳一根連葉帶子細剉不犯鐵器用砂鍋熬水二大椀熬及一半瘡在上徐徐飯後服之吐出候吐定再服以盡為度瘡在下空心服瘡自破出膿更不潰引瘡上別以膏藥傳之此方裴員外啖之以名第河南尹第人謂善報 元遺山續夷堅志

大凡石類多主癰疽世傳麥飯石膏治發背瘡甚効乃中岳山人呂子華秘方裴員外啖之以名第河南尹膾之以重刑呂寧絕榮望守死不傳其方取此石碎如碁子炭火燒赤投米醋中浸之如此十次研末篩細入乳缽內用數人更碾五七日要細膩如麪四兩鹿角一具要生取連腦骨者其自脫者不堪用每二三寸截之炭火燒令烟盡即止為末研細二兩白飲生研末二兩用三年米醋入銀石器內煎令魚目沸旋旋入藥在內竹杖子不住攪熬一二時久稀稠得所傾在盆內待冷以紙蓋收勿令塵入用時以鵝翎拂膏于腫上四圍赤處盡塗之中留錢大洩氣如未有膿即內消已作頭即撮小已潰即排膿如端水如病久肌肉爛落見出筋骨者即塗細布上貼之乾即

易逐日瘡口收斂但中隔不穴者即無不瘥已潰者用時先以猪蹄湯洗去膿血故帛挹乾乃用藥其瘡切忌手觸動嫩肉仍不可以口氣吹風及腋氣月經有孕人見之合藥亦忌此等初時一日一洗一換十日後二日一換此藥要極細方有効若不細塗之即極痛也此方千金月令已有之但不及此詳悉耳 本草綱目

馮楚瞻治蔣司農向来脉氣寸强尺弱故服八味丸已有年矣此等脉多陰虛火上炎之候元火服八味丸者多貽後患然過勞藥力不能勝其妄動之火鼻衄大作調理雖愈而口渴殊甚飲湯水如甘露然即數十杯不足滿其欲也此即消渴久成癰疽勸服大劑壯水佐以引火歸原之餌則水升火降消渴自除變症可弭乃忽之雖服數劑渴暑減藥即停至初夏背上忽隱隱痛痛漸甚而肉硬半月餘疼極重極診之當脊少偏半寸外不腫肉分堅實如椀治陰水日虧陰火日熾書有腦疽背疽之兆也亟為托出陽分使毒氣勿致逼遍內陷為要乃外用大黃二兩芙蓉葉赤芍各一兩白及白斂

書疑誤

空格內 疑是蟲字 鷄子清調敷毒四圍內則重滋陰水如見角刺天 甲片生甘草連翹金銀花

易逐日瘡口收斂但中隔不穴者即無不瘥已潰者用時先以猪蹄湯洗去膿血故帛挹乾乃用藥其瘡切忌手觸動嫩肉仍不可以口氣吹風及腋氣月經有孕人見之合藥亦忌此等初時一日一洗一換十日後二日一換此藥要極細方有効若不細塗之即極痛也此方千金月令已有之但不及此詳悉耳 本草綱目

馮楚瞻治蔣司農向来脉氣寸強尺弱故服八味丸已有年矣（此等脉多陰虛火上炎之候凡久服八味丸者多貽後患）然過勞藥力不能勝其妄動之大鼻衄大作調理雖愈而口渴殊甚

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

飲湯水如甘露然即數十杯不足滿其欲也（此即消渴久成癰疽）勸服大劑壯水佐以引火歸原之餌則水升火降消渴自除變症可弭乃忽之雖服數劑渴罌減藥即停至初夏背上忽隱隱痛痛漸甚而肉硬半月餘疼極重極診之當脊少偏半寸外不腫肉分堅實如椀大矣曰久渴不治陰水日虧陰火日熾書有腦疽背疽之兆也亟為托出陽分使毒氣勿致逼遍內陷為要乃外用大黃二兩芙蓉葉赤芍各一兩白及白斂各五錢為末鷄子清調敷毒四圍內則重滋陰水如熟地山藥土貝角刺天　甲片生甘草連翹金銀花

之類及腫既成乃早吞八味丸五六錢以培先天之水火食遠服參耆歸芍术草銀花甲片天蟲角刺白芷之類以助後天之氣血外以太乙膏加男髮革麻子乳香没藥煎膏貼之以呼毒氣外出不旬日紅腫消痛重減瘡已斂高已有膿勢乃一外科改弦易轍幾至內潰再亟治仍用前法煎藥加肉桂錢許仍高腫紅活竟如此小之毒潰膿而愈

高鼓峰治一鄉人患發背上距風府下連腎俞通塊腫起肌肉青冷堅硬如鍼飲食俱廢不省人事醫猶用解毒藥脉之六部細數氣血大虧毒將內陷矣急用養榮湯加附子炮薑三大劑而胃氣開十劑而堅硬者散去十之八九只左邊如茶鍾大熯紅作痛戒之曰切莫箍藥及刀針氣血温和毒當自出箍則反遲非時而刺收口難矣彼以不任痛竟受刺出血曰當倍前藥急服以收口為度仍戒以節嗜慾慎飲食煞服還少丹八味丸而愈

朱丹溪曰予見吳兄厚味氣鬱而形實性重年近六十患背疽醫與他藥皆不行惟香附末飲之甚快始終止此一味腫潰恃此以安此等體實而又病實乃瘧千百而一見者也名獨勝散惟氣滯血凝實疽宜之

樓氏婦早寡善飲啖形肥偉性沈毒年六十六七月間生背疽近正脊醫遂橫直裂開取血雜以五香十宣散與酒飲之月餘未嘗議其寡居之鬻酒肉之毒執著之滯時令之熱卒至于平陽淹延兩三月而不救

江陵府紫極觀掘得石碑載此凡人發背欲結未結赤熱腫痛先以濕紙覆其上立視候之其紙先乾處則是結癰頭也取大蒜切成片如當三錢厚安頭上用大艾炷灸之三壯即換一蒜片痛者灸至不痛時住不痛者灸至痛時方住最要早覺早灸為上（如有頭似麻豆大者不須用濕紙覆法）若有十數頭作一處生者即用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾于餅上燒之（一二日十灸六七活五六日三四活）

王遽發背方序云元祐三年夏四月官京師疽發于背名國醫治之逾月勢益甚得徐州蕭縣人張生以艾火加瘡上自旦及暮凡一百五十壯知痛乃已明日鑷去黑痂膿盡潰肉理皆紅亦不復痛始別以膏藥貼之日一易焉易時旋剪去黑爛月許瘡乃平是歲夏秋間京師士大夫病疽者七人余獨生此雖司命自然固有料理不知其方遂至不幸者以人意論之可為慨然於是撰次前從所得方模版以施庶幾古

人濟衆之意 此即當頭灸法 但不用蒜耳

史源毋氏背髀間微瘁視之有赤半寸許方有白粒如粟黍乃急著艾灸其赤隨消二七壯而止信宿復覺微痛視之有赤下流長二寸濶如韭葉舉家皆以前灸為悔或云等慈寺尼智全者前病瘡甚大得灸而愈奔問之全曰劇時昏不知但小師輩言范八奉議守定灸八百餘壯方甦約艾一篩耳亟歸白之見從始以艾作炷如銀杏大灸其上十數殊不覺痛乃截四旁赤引其炷減四之三皆覺痛七壯後覺瘁每一壯燼則赤隨縮入灸至二十餘壯赤暈收退病者不

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN.GOV.TW

憚遂以艾作圍大灸其上漸加至雞黃大約四十團方覺痛視之焦處已寸餘蓋灸之遲而初發處肉已壞壞肉成隔直至好肉方痛四旁知痛肉未壞也病者六夜不寐至是食粥安寢至晚視之瘡如覆一甑突高三四寸上有百數小竅色正黑突然高者毒氣出外而聚也百數小竅者毒未聚而浮攻肌膚也色正黑者皮與肉俱壞也非灸火出其毒于壞肉之裡則五臟逼矣

甲戌年瘍醫常器之診太學史氏之母云內有蓄熱防其作疽至辛巳六月果背胛微瘁瘡粒如黍灼艾即

消隔宿復用膏藥覆之暈開六寸許痛不可勝歸咎于艾遼遇一僧自云痈瘡甚危嘗灸八百餘壯方甦遂用大艾壯如銀杏者灸瘡頭及四旁各數壯痛止至三十餘壯赤暈悉退又以艾作團如梅杏大者四十壯乃食粥安寢瘡突四寸小竅百許患肉俱壞而愈

薛按灼艾之法必使痛者不痛不痛者痛則其毒隨火而散否則非徒無益而又害之精要

薛立齋治王通府患發背十餘日勢危脉大先與槐花酒二服殺退其勢更以敗毒散二劑再以托裡藥數劑漸潰又用桑柴燃灸患處每日灸良久仍以膏藥貼之灸至數次膿潰腐脫以托裡藥加白朮陳皮月餘而愈

劉大尹發背六七日滿背腫痛勢甚危與隔蒜灸百壯飲槐花酒二椀即睡覺與托裡消毒藥十去五六令以桑枝灸患處而潰數日愈凡灸及飲槐花酒則托裡之効甚速（槐花酒方　槐花四五兩炒微黃乘熱入酒二鍾煎十餘滾去查熱服未成者二三服已成者一二服胃寒者勿服）

一園丁患發背甚危令取金銀藤五六兩搗爛入熱酒一鍾絞取酒汁温服渣罨患處四五服而平彼用此藥治瘡足以養家遂棄園業諸書云金銀花治瘡瘍

未成者即散已成者即潰有同生之功

太監劉閑患發背腫痛色紫診其脉息沈數陳良甫云脉數發熱而痛者發于陽也且瘡瘍赤甚則紫即火極似水也詢之嘗服丹石藥半載乃積温成熱所致遂以内疎黄連湯再服稍平更以排膿消毒藥及猪蹄湯太乙膏而愈經曰色與脉當相參應治之者在明亢害承制之理陰陽變化之機焉耳

一男子年逾五十患發背色紫腫痛外皮將潰寢食不安神思甚疲用桑柴炙患處出黑血即鼾睡覺而諸症如失服仙方活命飲二劑又炙一次膿血皆出更進二劑腫痛大退又服托裡消毒散數劑而斂夫瘡毒熾甚未宜峻劑攻之但年老血氣衰弱況又發在肌表若專于攻毒則胃氣先損必反誤事

吴江申僉憲患背疽堅硬脉沈實乃毒在内用宣毒散大黄五錢煨白芷五錢水煎食前服一劑大小便下污物再服而消此方乃宣通攻毒之劑脉沈實便秘者其功甚大

琇按即首條黄金白玉之方薛用之而不詳其出處

大尹陳國信素陰虚背患疽用參耆大補而不斂内勢

發熱舌燥唇裂小便頻數口乾飲湯嘔吐瀉利耳閉目盲仰首睦暈脉浮大而數薛曰瘡口不斂脾土敗也舌燥唇裂腎水枯也小便頻數肺氣衰也內熱發熱虛火上炎也口乾飲湯真寒之象也嘔吐瀉利真火衰敗也耳閉目盲肝木枯敗也仰首睦暈腎氣絕也

用二地二冬杞子歸芍之輩若可挽也

吳孽史邦直之內仲夏患背疽死肉不潰發熱痛甚作嘔少食口乾飲湯脉洪大按之如無此內真寒而外假熱當捨時從症先用六君加炮薑肉桂四劑飲食頓進諸症頓退復用十全大補湯仍加薑桂之類五十餘劑而死肉潰又五十餘劑而新肉生斯人氣血充盛而瘡易起易斂使醫者逆知預為托裡必無此患

南儀部賀朝卿陞山西少參別時見其唇鼻青黑且時搔背問其故曰有小瘡耳與視之果疽也此脾胃敗壞為不治之症薛素與善悲其途次不便殯殮遂托其僚友張東沙輩強留之勉與大補但出紫血虛極

也或謂毒熾不能為膿乃服攻毒藥一鍾以致嘔逆

脉脫果卒于南都

京兆柴蒲菴仲夏患之色黯微腫發熱煩躁痰涎自出小腹陰實手足逆冷右關浮澁兩尺微細曰此虛寒之症也王太僕云大熱而不熱是無火也決不能起懇求治之用大温補藥一劑流涎雖止患處不起終不能救

憲副屠九峰孟春患此色黯漫腫作渴便數尺脉洪數此腎水乾涸當沒于火旺之際不信更用苦寒之藥復傷元氣以促其歿

一男子不慎房勞背胛腫高三寸許濶徑尺餘自汗盜汗内熱發熱口乾飲湯脉浮大按之弱澁此陰虛氣節為患用十全大補加五味麥冬山萸山藥四劑諸症悉退後乃別用流氣飲一劑虛症悉具腫硬如石仍以前藥六劑始得全愈

一儒者背腫一塊按之則軟肉色如故飲食如常勞則吐痰體倦此脾氣虛而痰滯用補中益氣加茯苓半夏少加羌活外用陰陽散以薑汁調搽而消後因勞頭暈作嘔仍以前藥去羌活加生薑蔓荊子而愈

節推王器之背患疽瘡頭如黍煽痛背重脉沈而實此

毒在內服黃連內疎湯二劑少退更與仙方活命飲而愈

舉人劉華甫煽腫作痛脉浮而數此毒蓄于經絡用內托復煎散二劑而煽腫減用仙方活命飲四劑而腫痛止更用托裡藥而痊

一儒者患背疽腫煽痛甚此熱毒蘊結而熾盛用隔蒜灸而痛止服仙方活命飲而腫消更與托裡藥而潰愈

一男子背患疽腐肉雖潰而新肉不生此毒氣解而脾胃之氣虛也用六君子加芎歸五味黃耆漸愈用十全大補湯全愈

一男子背患疽腫痛赤暈尺餘背如負石其勢當峻攻其脉又不宜遂用遂砭赤處出紫血椀許腫痛頓退更用神功散及仙方活命飲二劑瘡口及砭處出血水而消

一男子背患疽肉腐膿清肌肉不生此邪去而氣血俱虛也用十全大補湯月餘而斂

通府張廷儀背患疽作嘔煽痛大便秘結口乾作渴此內蘊熱毒用竹葉石膏湯二劑諸症悉退用托裡消毒散四畔腫消用仙方活命飲瘡亦尋愈

一男子背瘡潰而瘡血不散此陽氣虛弱也用參耆歸朮峻補更以桑枝灸又用托裡散加肉桂瘡口自斂此補陽氣之法也

一男子背瘡漫腫微痛食少體倦此症屬形病俱虛法當補元氣為主彼不信乃用攻毒之劑中央寒肉黯五寸許惡症悉具復求治曰此胃氣虛寒而變症作矣當急温補脾胃則惡症自退黯肉自生仍不信乃割死肉祛惡症遂不起

水部曹文兆背胛患之半月餘瘡頭如栗且多肉痛如刺其脉歇止此元氣虛而疽蓄于肉非灸不可遂灼

二三十壯飲以六君加藿香當歸數劑瘡勢漸退肉痛頓去胃脉漸至但瘡色紫瘡肉不潰此陽氣虛也燃桑枝灸患處以解散其毒補接陽氣仍以前藥加參耆歸桂色赤膿稠瘡肉漸腐兩月而愈夫邪氣沈伏真氣怯弱不能起發須灸而兼大補若投以常藥待其自潰鮮有不誤者

黃汝耘患發背用生肌藥太早益潰大便泄瀉其脉微緩此脾胃虛先用二神丸以止其瀉次用大補藥以固其本更用猪蹄湯洗患處用黃耆末以塗其外喜其初起曾用艾灸毒不內攻兩月而愈東垣云毒氣

未盡不可用生肌藥縱得平復必再發若毒氣入腹十死八九大抵毒氣盡脾氣壯則肌肉自生生肌藥可弗用矣

許鴻臚發背十餘日腫硬木悶肉色不變脉沈而實此毒在內先以黃連內疎湯更以消毒托裡藥其毒始發奈欲速愈急用生肌藥患處如負石身如火燃遂致不起李氏云近有數人病背疽或先寒後熱或先熱後寒或連日或間日必嘔痰大汗而止皆用柴胡山恒不應余謂此因脾氣不正復感寒邪痰盛而作遂先用不換金正氣散次用排膿內補散木香湯三日即愈

李氏云龍游有患背疽者大潰五臟僅隔膜耳自謂必死用鯽魚去腸實以羯羊囊烘焦為末乾糍之瘡口自收此出洪氏方屢用有効故附于此須候膿少欲生肌肉時用之耳陳自明外科精要

江陰舉人陳鳴岐寓京患背疽用大補之劑而愈翌日欲回先期設席作謝對談如常是晚得家信大拂其意惱怒發熱作渴食梨子少許至夜連瀉數次早促薛視脉已脫矣竟至不起夫梨者利也疏利下行之物凡脾胃虛寒產婦金瘡者皆當忌之

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

未盡不可用生肌藥縱得平復必再發若毒氣入腹十死八九大抵毒氣盡脾氣壯則肌肉自生生肌藥可弗用矣

許鴻臚發背十餘日腫硬木悶肉色不變脈沈而實此毒在內先以黃連內疎湯更以消毒托裡藥其毒始發余欲速愈急用生肌藥患處如負石身如火燃遂致不起李氏云近有數人病背疽或先寒後熱或先熱後寒或連日或間日必嘔痰大汗而止皆用柴胡遂先用不換金正氣散次用排膿內補散木香湯三

恒山仰詳

下行不換金正氣湯治此因脾氣不正復感寒邪痰盛而作

日即愈

李氏云龍游有患背疽者大潰五臟僅隔膜耳自謂必死用鯽魚去腸實以羯羊囊烘焦為末乾糝之瘡口自收此出洪氏方屢用有効故附于此須候膿少欲生肌肉時用之耳陳自明外科精要

江陰舉人陳鳴岐寓京患背疽用大補之劑而愈翌日欲回先期設席作謝對談如常是晚得家信大拂其意惱怒發熱作渴食梨子少許至夜連瀉數次早促薛視脉已脫矣竟至不起夫梨者利也疏利下行之物凡脾胃虛寒產婦金瘡者皆當忌之

琇按其人瘍初愈元氣未復曰怒而動厥陰之火致發熱作渴其肝木之躁張不待言矣木盛剋土非嘔則瀉少許梨子何遽爾爾

陳自明治一男子患發背瘡頭如栗重如員石以神仙太乙丹內服外塗後去三四次每去肛門如灸不日而瘳方見蠱門

一婦人腫痛發熱譫語脈大用清心湯一劑而安以金銀花甘草天花粉當歸瓜蒌黃耆數劑漸潰更以托裡藥愈

一男子已愈惟一眼翻出努肉如菌即名翻花瘡三月不愈乃傷風寒也以生豬脂調藜蘆末塗之即愈亦有努出五寸許者尤宜用此藥也烏梅塗之亦效但緩硫黃亦可

一男子背患毒煩痛飲冷發熱多汗便秘譫語以破棺丹二丸而寧以金銀花散四劑膿成開之更用托裡藥而愈

一婦膿成脹痛不安針之投托裡消毒藥即愈大抵發背之症雖發熱疼痛形勢高大煩渴不寧脈若有力飲食頗進可保無虞其膿一潰諸症悉退多有因膿不得外泄以致疼痛若用敗毒寒凉攻之反致誤事

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

若有膿急針之膿一出苦楚即止膿未成而熱毒作痛者用解毒之藥亦有腐潰尺餘者若無惡症投以大補之劑肉最易生亦無所妨惟忌腫不高色不赤不燃痛脉無力不飲食腫不潰腐不爛膿水清或多而不止肌肉不生屬元氣虛也皆難治宜峻補之其或膿血既泄腫痛尤甚膿水敗臭煩躁時嗽腹痛渴甚瀉利無度小便如淋乃惡症也皆不治

一弱婦外皮雖腐內膿不潰脹痛煩熱不安謂宜急開之膿一出毒即解痛即止諸症自退待其自潰不惟疼痛潰爛愈深彼不從待將旬日膿尚未出人已痛疲矣雖針之終不能收斂竟致不起

一男子潰而瘡肉不腐欲取之更以峻補一婦素弱未成膿大痛發熱謂須隔蒜灸以拔其毒令自消皆不從俱致不救常治不問日期陰陽腫痛或不痛或痛甚但不潰者即與灸之隨手取効勢未定者先用箍藥圍之若用烏金膏或援生膏貼患處數點尤好若頭痛拘急乃表症先服人參敗毒散一二劑如燃痛發熱脉數者用金銀花散或槐花酒神効托裡散如疼痛腫硬脉實者以清涼飲仙方活命飲若參丸腫硬木悶疼痛發熱煩躁飲冷便秘脉沈實者內疎黃

連湯或清涼飲大便已利欲其作膿用仙方活命飲
托裡散蠟礬丸外用神異膏如飲食少思或不甘美
用六君子湯加藿香連進三五劑更用雄黃解毒散
洗患處每日用烏金膏塗瘡口處俟有瘡口即用紙
作撚蘸烏金膏紮入瘡內若有膿為腊膜間隔不出
或作脹痛者宜用針引之腐肉堵塞者去之若瘀肉
腐動用猪蹄湯洗如膿稠或痛飲食如常瘀肉自腐
用消毒與托裡藥相兼服之仍用前二膏塗貼若腐
肉已離好肉宜速去之如膿不稠不稀微有疼痛飲
食不甘瘀肉腐遲更用桑柴灸之亦用托裡藥若瘀
肉不腐或膿清稀不燬痛者急服大補之劑亦用桑
木灸之以補接陽氣解散欝毒常觀患疽稍重未成
膿者不用蒜灸之法及毒熟不開或待腐肉自去多
致不救大抵氣血壯實或毒少輕者可假藥力或自
腐潰怯弱之人熱毒中隔內外不通不行針灸藥無
全功矣然此症若膿已成宜急開之否則重者潰通
臟腑腐爛筋骨輕者延潰良肉難于收功因而不斂
者多矣

一男子年逾五十患已五日燬腫大痛赤暈尺餘重如
負石勢熾甚當峻攻察其脈又不宜遂先砭赤處出

黑血椀許腫痛頓退背重頓去更敷神功散及服仙方活命飲二劑瘡口及砭處出血水而消大抵瘡毒勢甚若用攻劑怯弱之人必耗損元氣因而變症者衆矣

一婦人半月餘尚不起發不作膿痛甚脉弱隔蒜灸二十餘壯而止更服托裡藥漸潰膿清而瘡肉不腐以大補藥及桑柴灸之漸腐取之而尋愈常治一日至四五日未成膿而痛者灸至不痛不痛者灸至痛若灸而不痛或麻木者明灸之毒氣自然引火而散腫硬不作膿煽痛或不痛或微痛瘡頭如黍者灸之尤

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

效亦有數日色尚微赤腫尚不起痛不甚膿不作者尤宜多灸勿拘日期更服甘溫托裡藥切忌寒涼之劑或瘡肉不腐亦用桑木灸之若脉數發　而痛者發于陽也可治脉不數不發痛者發于陰也難治不痛最惡不可視為常疾此症不可不痛不可大痛煩悶者不治大抵發背腦疽大疔懸癰脫疽腳發之類皆由膏粱厚味盡力房勞七情六淫或丹石補藥精虛氣節所致非獨因營衛凝滯而生也必灸之以拔其毒更辨其因及察邪在臟腑之異虛實之殊而治之庶無悞也

黑血椀許腫痛頓退背重頓去更敷神功散及服仙
方活命飲二劑瘡口及砭處出血水而消大抵瘡毒
勢甚若用攻劑怯弱之人必耗損元氣因而變症者
衆矣
一婦人半月餘尚不起發不作膿痛甚脉弱隔蒜灸二
十餘壯而止更服托裡藥漸潰膿清而瘀肉不腐以
大補藥及桑柴灸之漸腐取之而尋愈常治一日至
[illegible]而痛者灸至不痛不痛者灸至痛若
疑是隨字 不者明灸之毒氣自然卩火而散腫
硬不作膿煽痛或不痛或微痛瘡頭如黍者灸之尤

效亦有數日色尚微赤腫尚不起痛不甚膿不作者
尤宜多灸勿拘日期更服甘温托裡藥切忌寒凉之

發不經灸熱

亦用桑木灸之若脉数發 而痛者
發于陽也可治脉不数不發痛者發于陰也難治不
痛最惡不可視為常疾此症不可不痛不可大痛煩
悶者不治大抵發背腦疽大疔懸癰脱疽脚發之類
皆由膏粱厚味盡力房勞七情六淫或丹石補藥精
虚氣節所致非獨因營衛凝滞而生也必灸之以拔
其毒更辨其因及察邪在臟腑之異虚實之殊而治
之庶無悞也

一男子初生如粟悶痛煩渴便秘脉數實此毒在臟也謂宜急疎去之以絶其源使毒不致外侵彼以為小恙乃服尋常之藥後大潰而歿

一老婦患之初生三頭皆如粟腫硬木悶煩躁至六日其頭甚多脉大按之沈細為隔蒜灸及托裡漸起發尚不潰又數劑內外雖腐惟筋所隔膿不得出致脹痛不安謂須開之彼不從後雖自穿毒已攻深矣亦歿大抵發背之患其名雖多惟陰陽二症為要若發一頭或二頭煽赤腫高頭起疼痛發熱為癰屬陽易治若初起一頭如黍不腫不赤悶痛煩躁大渴便秘

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

睡語咬牙四五日間其頭不計數其瘡口各含如一粟形似蓮蓬故名蓮蓬發積日不潰按之流血至八九日或數日其頭成片所含之物俱出通結一衣揭去又結其口共爛為一瘡其膿內攻色紫黯為疽屬陰難治脉洪滑者尚可沈細尤難如此惡症惟隔蒜灸及塗烏金膏有効凡人背近脊并胛皮裡有筋一層患此處者外皮雖破其筋難潰以致內膿不出令人脹痛苦楚氣血轉虛變症百出若待自潰多致不救必須開之兼以托裡常治此症以利刀剪之尚不能去似此堅物待其自潰不亦反傷非血氣壯實者

未見其能自潰也

一男子年逾五十患此色紫腫痛外皮將潰寢食不安神思甚疲用桑柴灸患處出黑血即鼾睡覺而諸症如失服仙方活命飲二劑又灸一次膿血皆出更二劑腫痛大退又服托裡消毒散數劑而斂夫瘡勢熾甚宜用峻劑攻之但年老血氣衰弱況又發在肌表若專于攻毒則胃氣先損反致誤事

一婦人發熱作痛專服降火敗毒藥潰後尤甚煩躁時嗽小便如淋皆惡症辭不治果死大抵瘡瘍之症五善之中見一二善症者可治七惡之內見一二惡症者難治若虛中見惡症者不救實中無惡者自愈此症雖云屬火未有不由陰虛而致者故經云督脈經虛從背而出豈可尚泥于火

趙太守患此腫堅不潰瘡頭如栗脈洪大按之則澁經云骨髓不枯臟腑不敗者可治然腫硬色夭堅如牛領之皮脈更澁此精氣已絕矣不治亦死

圖經云薜荔治背癰頃年寓興宜懸張鎮有一老舉人教村學年七十餘忽一日患發背村中無醫藥急取薜荔研爛絞汁和蜜飲數升以其滓傅瘡上後以他藥傅貼遂愈醫者云其本蓋得薜荔之力乃知圖經

所載不妄本艸

郭户為予言鄉里有善治發背癰疽者于瘡上灸之多至二三百壯無有不愈但作艾炷小則人人不畏灸多則効矣蓋得此法也然亦不必泥此近有一醫以治外科得名有人發背瘡大如椀有數孔醫亦無藥可治只以艾遍敷在瘡上灸之久而方疼以瘡上皆死肉故初不覺疼也旋以藥調治之愈蓋出于意表也百乙方

治發背初作取水蛭置腫上飲血腹脹自落別換新者腹蛭以新水養之即活吳吳內翰備急方云其姪祖仁一日忽覺背瘡赤腫如椀大急用此治之至晚遂安百乙方

普嚴州一通判忘其名母病發背祈禱備至夜夢吕真人服青衣告之曰公極孝故來相告以方更遲一日不可療矣通判公急市藥治之即愈用瓜蒌五个取子細研乳香五塊如棗子大亦細研以白沙蜜一斤同煎成膏每服三二錢温酒化下大治發背諸惡瘡日進二服無不立効楊王得此方家人凡百瘡毒依此治之皆効遂合以施人無不驗者漏瘡惡核並皆治之此即鄭府朱保義所說神妙方是也醫說續編

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

立齋治張錦衣年踰四十患發背心脉洪數勢危劇經云心脉洪數乃心火熾甚諸痛痒瘡瘍皆屬心火心主血心氣滯則血不行故生癰也騎竹馬灸穴是心脉所由之地急灸之以瀉心火隔蒜灸以拔其毒再以托裡消毒果愈

鄭大理伯興髀骨患疽背左右各一竟背重如負石兩臂如墜瘡頭皆大如豆許其隱于皮膚如粟者不計其數瘡色黯而不起已七日口乾作渴診之脾胃脉甚虛彼云昨日所進粥食今尚不消作酸意此難治之症因與素善者籌其治法以隔蒜灸二十餘壯其背與臂動覺少便隨用六君子湯加薑汁炒山巵及吳茱萸連服數劑吞酸遂止飲食少進但口乾瘡仍不起色亦不赤亦無膿復如前法灸二十餘壯背臂頓便瘡遂發其時遷秋又投大補之劑及生脉散以代茶飲

留都鄭中翰仲夏患發背已半月瘡頭十餘枚皆如粟許漫腫堅硬根如大盤背重如負石即隔蒜灸五十餘壯其背頓輕彼因輕愈不守禁忌三日後大作瘡不起發喜得痛用活命飲四劑勢少退用香砂六君子湯四劑飲食少進彼恃知醫自用敗毒藥二劑飲

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

食益少口流涎沫若不自知此脾虛之甚也每用托裡藥內參耆各三錢彼密自揀去大半後雖用大補藥加薑桂亦不應遂令其子以參耆各一斤歸朮各半斤乾薑桂附各一兩煎膏一罐三日飲盡涎頓止腐頓潰食頓進再用托裡健脾藥腐肉自脫而愈

張侍御背患瘡三枚皆如粟彼以為小毒服清熱化痰之藥外用凉藥敷貼數日尚不起色黯不燄胸中氣不得出入其勢甚可畏連用活命飲二劑氣雖利膿清稀瘡不起欲用補劑彼泥于素有痰火不受參朮之補因其固執陽以敗毒之劑與視之而陰以參耆歸朮各五錢薑桂各二錢服二劑背覺熱腫起腐肉得潰方信余言始明用大補藥乃愈

南都聘士葉公玉表兄矗姓者患發背時六月腐肉已去瘡口尺許色赤而燄發熱不食欲嘔不嘔服十宣散等藥自謂不起請決之其脉輕診則浮而數重診則弱而澁此潰後之正脉然瘡口開張血氣虛也欲嘔而不嘔脾胃虛也色赤燄腫虛火之象也尚可治遂與十全大補湯加酒炒知柏五味麥冬及飲童便飲食頓進肌肉頓生服至八劑瘡口收如粟許又感于人言又服消毒藥二劑以為消餘毒反發熱昏憒

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

急進前藥又二十餘劑乃愈後兩月因作善事一晝夜不睡致勞發熱似睡不睡與前藥二劑愈加發熱飲食不進惟飲熱湯後以前藥加附子一錢二劑而愈

石武選廉伯患發背肉服防風通聖散外敷涼藥汗出不止飲食不進且不寐瘡盈尺色黯而堅硬按之不痛氣息奄奄此陽氣已脫脈息如無急隔蒜灸時許背頓輕四圍高不知痛中央肉六寸許一塊已死服香砂六君子湯一劑翌日復灸一次痛處死肉得解令砭去薛歸後又為他醫所惑未砭其血復凝又數

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

辛温活血藥翌日依言砭之出黑血二盞許背强頓去以前藥加薑桂服一鍾即鼾睡覺來肢體少健但飲食仍不思吞酸仍有瘡仍不痛彼以為陰毒乃如此赤曰此氣血虛極寒邪淫于內無陽營于患處故肌肉死也非陰毒若陽氣一回胃氣即省死肉即潰可保無慮矣以前藥二劑各加薑桂附子二錢服之畧進米飲精神復舊患處覺熱脈畧有力此陽氣畧回矣是日他醫謂瘡瘍屬火症況今暑令乃數芙蓉根等涼藥即進粥二椀服消毒藥死肉即潰意芙蓉乃寒涼之藥與脾胃何益飲食即時而進消毒乃辛

散之劑與陽氣何補死肉即時而潰此蓋前桂附之功至而脾胃之氣省故飲食進陽氣旺死肉腐也苟虛寒之人若內無辛熱回陽之藥輒用寒涼攻毒之劑豈可得而生耶若以為火令屬陽之症內有熱而施辛溫補益之劑豈不致死而反生耶殊不知此乃捨時從症之治法也

一男子發背膿始潰腫未消已十七日脈微而靜曰膿毒未盡脈先弱此元氣虛宜補之否則後必生變彼惑于人言乃服敗毒藥腐肉雖潰瘡口不完忽腹中似痛後去白垢肛門裡急復求治曰此裡虛然也非癤非毒當溫補脾胃為善因諸瘍醫皆以為毒未盡仍服敗毒藥而死

賀少參朝儀背胛患疽大如豆粒根畔木閟不腫肉色如常曰此氣虛毒甚之症雖用補劑亦不能收斂先用活命飲二劑背強少和又二劑疽少赤用大補劑瘡出黑血杯許繼有鮮血微有清膿曰可見氣血虛極矣他醫以為屬氣血有餘之症密用攻毒藥一鍾即嘔逆腹內陰冷而死

少司寇周玉岩背患疽在胛已四日瘡頭如粟重如負石堅硬不起自以為小恙外敷涼藥內服連翹消毒

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

散去後四次形體倦怠自汗盜汗口乾無寐曰瘡不宜硬色不宜黯周曰初起時赤而軟自用前二藥以致如此曰凡瘡外如麻內如瓜毒結于內非小患也脉輕診似數按之則微未潰脉先弱主後難斂因與鄉雅不能辭遂隔蒜炙二十餘壯乃知痛又十餘壯背覺少和服六君子湯加黃耆藿香當歸麻黃根浮麥二劑渴止汗少斂瘡色仍黯堅硬又服辛溫活血之藥瘡始起渴止汗斂而結死血得散良久汗復出口復乾又服數劑外皮雖潰清膿尚未潰通於內膿欲走別處彼用藥圍之曰裡虛而膿不能潰于外圍

藥逼毒入內至十二日脉浮按之如無再用前藥一劑加薑桂服之即安寐又二日脉忽脫再于前藥加附子七分服二劑乃曰背今日始屬吾也形體亦健頗有生意因先日有言難以收斂屢更醫雜用清熱解毒及敷涼藥遂致裡虛元氣下陷去後如痢用治痢消毒藥而死

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

姜舉人發背十日正腐潰作渴喜熱湯飲此中氣虛不能生津液而口乾宜預補之否則不能收斂後瘡口果不收猶以毒為未盡用敗毒藥兩月瘡口不完清利腹痛又服清涼之藥而死

王序班發背元氣虛弱用托裡藥而始潰彼惑他議敷涼藥致腹內不和裏急後重去後如痢大孔作痛曰此裡虛非痢仍用敗毒治痢藥而（補）死

一男子年四十餘歲發背未潰即作渴脈數腫高色紫面赤小便如膏以加減八味丸料加酒炒知柏為丸每日空心并食前以童便送下百丸用八珍湯加五味麥冬黃耆酒炒知母赤小豆食遠（煎）服逐日又以童便代茶飲之渴止瘡潰而愈吾治得生者此人耳

汪夫人患發背用敷藥冷氣胞內欲嘔急令洗去用托裡藥尋愈

劉太宰紫岩太夫人發背元氣不足用托裡藥而起

劉安人發背正潰時欲速效俱數草藥即日而死

劉大尹年將五十陸路赴京無恙子患發背盈尺中六寸許不痛發熱口乾惡寒自汗少食大便不禁且氣促脈浮大按之空虛用補中益氣湯加半夏茯苓四劑又隔蒜灸之彼云背重已去形氣少健但吞酸前日所進飲食覺仍在腹又以前藥加薑桂服二劑飲食少進吞酸已止始得睡瘡且不痛不潰疑為陰症曰此陽氣虛不能營于患處故所患肉死而不痛不

潰也若胃氣回飲食進死肉即潰矣仍服前藥六劑飲食漸進患處漸潰脉有力曰此陽氣回矣後感于他醫云必服飛龍奪命丹出汗為善遂進一服汗大出三日不止復請治曰汗多亡陽無能為也強曰諸書云汗之則瘡已豈能為患後果死東垣曰瘡瘍因風熱鬱于下其人多怒其瘡色赤腫高結硬而痛左關脉洪緩而強是邪客于血脉之上皮膚之間故發其汗而通其榮衛則邪氣去矣譙甫治瘡瘍冬月脉浮緊按之洪緩乃寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫蓋冬月乃因寒氣收斂皮膚緻密腠理汗不得出而設也況發汗乃陰盛陽虛邪不能自出必得陽氣泄汗乃出是助陽退陰之意也且前症未潰其氣血既虛潰後氣血愈虛凡瘡雖宜汗然元氣虛者不宜況呼見之症俱屬不足豈可汗耶

留都機房紀姓者背瘡胃氣虛用温補藥而飲食進大補藥而瘡膚愈後患腿痛用養血化痰之劑少止彼嫌功緩他醫以為濕熱服麻黄左經湯一劑汗出不止曰必發瘡而死已而果然

王德之患發背脉浮數按之則澁大便五六日不行腹不加脹曰邪在表不在裡但因氣血虛飲食少故大

便不行非熱結也宜生氣血為主彼泥積毒在內用大黃之藥下之遂連瀉三四次更加發熱來日又服一劑瀉遂不止飲食不化呃逆不絕手足皆冷診之脉已脫離不治其子曰瀉之能為害乎曰服利藥而利不止者死不當瀉而瀉令人開腸洞泄不禁者死下多亡陰者死曰瘡癤雖積毒在藏若不驅逐其毒何以得解曰瘡癤乃積毒在藏府治法當先助胃氣使根本堅固恭以行經活血時宜之藥非專用大黃也今病在表而反以峻利之劑重奪其陰可乎哉故曰表病裡和而反下之則中氣虛表邪乘虛而入由

托

下當有裹字

煎散其間黃芩蒼朮亦不敢用脉沈實邪在裡屬內因當用內疎黃連湯其中大黃梹榔亦不敢用況浮數澁三脉皆主血氣俱虛邪既在表而反用峻利之劑重瀉其裡誅伐無過不死何俟

一縣尹背瘡竟背腐潰色黯重若負石甚危喜飲食頗進用紅桃散色漸赤負漸輕再用而肌生更服托裡藥而愈蓋此大毒症非峻藥莫能治內用砒故用攻毒有効

平氏室患發背以托裡消毒藥二十餘劑而潰因怒頓

便不行非熱結也宜生氣血為主彼泥積毒在內用大黃之藥下之遂連瀉三四次更加發熱來日又服一劑瀉遂不止飲食不化呃逆不絕手足皆冷診之脉已脫辭不治其子曰瀉之能為害乎曰服利藥而利不止者死不當瀉而瀉令人開腸洞泄不禁者死下多亡陰者死曰瘡癰乃積毒在藏若不驅逐其毒何以得解曰瘡癰雖積毒在藏府治法當先助胃氣使根本堅固恭以行經活血時宜之藥非專用大黃也今病在表而反以峻利之劑重奪其陰可乎哉故曰表病裡和而反下之則中氣虛表邪乘虛而入由是變症百出雖云脉浮數邪在表屬外因當用托復煎散其間黃芩蒼朮亦不敢用脉沈實邪在裡屬內因當用內疎黃連湯其中大黃梹榔亦不敢用況浮數澁三脉皆主血氣俱虛邪既在表而反用峻利之劑重瀉其裡誅伐無過不死何俟

一縣尹背瘡竟背腐潰色黯重若負石甚危喜飲食頗進用紅桃散色漸赤負漸輕再用而肌生更服托裡藥而愈蓋此大毒症非峻藥莫能治內用砒故用攻毒有効

平氏室患發背以托裡消毒藥二十餘劑而潰因怒頓

吐血五六椀許氣弱脉細此氣血虛極也遂令服獨參膏斤許稍緩更以參耆歸朮陳皮炙甘艸三十餘劑瘡口漸合設投以犀角地黃湯沈寒之藥鮮有不誤

徐符卿年逾四十患發背五日不起肉色不變脉弱少食大便不實以凡疽未潰脉先弱難于收斂用托裡消毒二劑方起發彼惑一嫗言貼膏藥服攻毒劑反盛背如負石復請治遂以隔蒜灸三十餘壯云背不覺重但痒痛未知更以托裡藥知痛痒膿清仍以前藥倍加參耆佐以薑桂膿稍稠又為人惑外用猪腰子貼抽膿血內服硝黃劑遂流血五六椀許連瀉十餘行腹內如氷飲食不進不得已速診之脉遽脫已不可為矣蓋其症屬大虛不足之甚雖一於溫補猶恐不救況用攻伐之劑不死何俟

顧浩室年逾四十患發背治以托裏藥而潰忽嘔而瘡痛胃脉弦緊彼以為餘毒內攻東垣云嘔吐無時手足厥冷臟腑之虛也丹溪云潰後發嘔不食者濕氣侵于內也又云膿出而反痛者虛也今胃脉弦緊木乘土位其虛明矣欲以六君子湯加酒芍砂仁藿香治之彼自服護心散嘔愈甚仍用前藥更以補氣血

藥兩月而愈大抵濕氣內侵或感穢氣而作嘔必喜温而脉弱熱毒內攻者必喜凉而脉數必須辨認明白

鄭揮使年逾五十患發背形症俱虛用托裡藥而潰但有腐肉當去彼懼不肯延至旬日則好肉皆敗矣雖投大劑毒甚竟不救古人謂壞肉惡于狼虎毒于蜂蠆緩去之則戕賊性命哉

張宜人年逾六十患發背三日肉色不變頭如栗許肩背如重寒熱飲冷脉洪數陳良甫云外如麻裡如瓜齊氏云增寒壯熱而患必深又云肉色不變發于內也以人參敗毒散一劑乃隔蒜炙五十餘壯毒始發地等藥濁亦止彼欲速自用草藥罨患處毒氣復入遂不救嘗見老弱者患此瘡頭不起或堅如牛領之皮多不待潰而死有潰後氣血不能培養者亦死凡瘡初潰毒正發越宜用膏藥吸之參耆等藥托之若反以藥遏之使毒氣內攻者必不救

王太守宜人患發背膿熟不開昏悶不食此毒入內也斷不治強之針膿椀許稍蘇須臾竟亡大抵血氣壯實膿自涌出老弱之人血氣枯槁必須迎而奪之順

而取之若毒結四肢砭刺少緩腐潰深大亦難收斂
痛結于頰項胸腹緊要之地不問壯弱急宜針刺否
則難治
郭職坊名璉背瘡潰膿色紫舌卷謂下陷色紫主陽氣
脫舌卷囊縮肝氣絕遂辭之經曰舌卷囊縮此筋先
死庚日篤辛日死果至立秋日而歿
姚應鳳治撫軍喻思恂駐師溫州拒海賊劉香受降有
日毒發背悶劇甚應鳳至刲腐肉二大器洞見五臟
隨傳以丹藥越二日癰平開轅門坐受降撫軍喜深
德之仁和縣志

王洪緒治木瀆談姓婦患背瘡如椀大初起色白近已
轉紅痛甚時值三伏與陽和湯或曰暑天何用麻桂
熱劑曰此陰症也又云患色轉紅陰已回陽乃立令
煎服不一時痛止連進四服症減其七餘三分有膿
不痛而潰五日收功
錢國寶治湖州三官廟僧大乘發背長二尺濶八寸深
寸許中間如蜂窩二百餘頭流膿痛極欲死乃半身
發也此僧素喜煙多動肝氣其脈浮洪可救以新
槐子一合生㊀礬一錢盛錫壺內沖滾水二三椀再以
壺炖水內煮十數滾令味盡出陸續飲之至五七壺

痛止外用綠膏藥取松香一斤五兩燒酒五斤微火
煮乾為度傾冷水內以手捻松子百次去水酒濕氣
用全蝎二十一个蜈蚣二十一條真蟾酥五錢乳香
沒藥各三錢銅綠八錢各另研方以松香化開入香
油少許試老嫩成膏待松香冷定方入細藥攪勻盛
磁罐內隔水炖攤一日一換每次下腐肉一層生肌
如石榴子甘日收口此膏妙在一長齊平不比別膏
自周圍長至豆大難收口也凡完業大毒一切通治

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

錢塘魏之琇玉橫撰

肺

薛立齋治一婦人素血虛發熱咳嗽服痰火之劑後吐膿血面赤脉數其勢甚危此膿成而氣血虛也用八珍湯補元氣桔梗湯治肺癰而愈

一婦人感冒風寒或用發表之劑反咳嗽喘急飲食少思胸膈不利大便不通右寸關脉浮數欲用疎通之

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

劑薛曰此因脾土虧損不能生肺金若更利之復耗津液必患肺癰矣不信仍利之虛症悉至後果吐膿乃朝用補中益氣湯夕用桔梗湯各數劑吐膿漸止又朝仍用前湯夕用十全大補湯各五十劑喜其善調理獲愈

一婦人咳嗽吐痰胸膈作痛右寸關浮滑項下牽強此脾胃積熱之痰非癰患也以二陳山屐白朮桔梗治之而痊

一婦人素血虛內熱時咳甲辰孟冬兩尺浮洪以脾胃不健請治曰當防患肺症丙午孟春果咳嗽左右寸脉洪數肺癰也膿已成左寸脉仍洪數乃心火剋肺金夏令可憂用壯水健脾之劑稍愈彼遽自忽不事調攝果殁於夏令

喻嘉言治施眉蒼肺痿喘嗽吐清痰肢體軟痿不能舉動脉來虛數以蛤蚧二十枚酒浸酥炙人參黑參各十兩蒸九時時嚼化不終劑而痊 出張氏醫通

張路玉治陸去非肺痿聲颯吐痰午後發熱自汗左脉弦細右脉虛濡平昔勞心耽色所致先與生脉散合保元湯次與異功散加黃耆並薑棗與都氣丸晨夕煎進調補半月熱除痰止月餘方得聲清

孫起柏肺脹服耗氣藥過多脉浮大而重按豁然飲食不入幸得溺清便堅金匱未備與局方七氣丸每劑用人參三錢肉桂半夏麴炙甘草各一錢生薑四片四劑霍然蓋肺脹實症若多此脉虛大不當以尋常論也

一尼肺脹喘鳴肩息服下氣止嗽藥不應漸至胸腹脹滿脉得氣口弦細而濇此必勞力氣上悞飲冷水傷肺之氣不能收斂所致也遂與越脾湯減麻黃加細辛葶藶大瀉肺氣而安

一酒客嚴冬醉卧渴飲冷茶肺脹喘咳脉得氣口沈緊搏指與小青龍去白芍加葶藶半夏一劑而痊則知肺脹喘滿當以葶藶為向導也非實症未可輕投

孫文垣治初陽姪婦先時咳嗽諸治無功嗽急則吐用碧玉散二錢白湯調下立止後半年復咳嗽胸背隱隱疼痛常內熱咳出桃紅膿甚多且腥穢右脇并乳脹痛診之脉洪数大便燥肌瘦骨立此肺癰症也用貝母茜根白芍各一錢知母麥冬山庶緊菀各八分桑皮當歸丹皮杏仁各七分次仁一錢五分甘草葶藶各五分服之甚安但稍停即發或云肺竅中痰積瘀血尚多未能即去宜緩圖之俟膿盡當愈孫謂丹溪雖有此言亦不可執設不以藥消化之必俟其自

已恐歲月深而有他變且中年之人何能當此莫若
清熱潤肺消痰化瘀久服或早愈也或人謂久嗽傷
肺宜補每補必增熱加痛加咳而膿轉多仍依法治
之二年良愈

喻嘉言治陸令儀母平日持齋腸胃素槁天癸已絕復
淋瀝不止治之久痊值秋月燥金太過濕蟲不生人
多病咳而血虛津槁之軀受傷獨猛胸脇緊脹上氣
喘急臥寐不寧咳動則大痛痰中帶血而腥食不易
入聲不易出寒熱交作申酉二時燥金用事諸苦倍
增脉時大時小時牢伏時弦緊服清肺藥無進退告

以肺癰將成高年難任以享慈大棗瀉肺湯先通肺
氣之壅即覺氣稍平食稍入痰稍易出身稍可側大
有生機乃曰未也因見來勢太急不得已取快一時
暫開者易至復閉治復閉則前法不可再用矣今乘
其暫開多方以圖必在六十日後交立冬節方是愈
期蓋身中之燥與時令之燥膠結不解必俟燥金退
六十日間屢危屢安大率皆用活法
斡旋緣肺病不可補而脾虛又不能生肺肺燥喜潤
而脾滯又艱於運食今日脾虛不思飲食則於清肺
中稍加參朮以補脾明日肺燥熱盛咳嗽則於清肺

中少加阿膠以潤燥日續一日扶至立冬之午刻病者忽自云內中光芒大覺清爽可得生矣奇哉天時之燥去人肺金之燥遂下傳大腸五六日不一大便略一潤腸旋即解散正以客邪易去耳至小雪節廉健加餐倍於曩昔蓋胃中空虛已久勢必復其容受之常分為全愈也

立齋治一男子神勞冬月患咳嗽服解散之劑自以為便曰此因肺氣虛弱腠理不密而外邪所感也當急補其母是治本也始服六君子湯內去參朮加紫蘇枳殼之類以致元氣益虛生肺癰而歿

時仲夏左尺洪數而無力胸滿面赤唾痰腥臭自汗曰腎虛水泛為痰而反重亡津液得肺癰乎不信仍服前藥翌日吐膿脈數右寸為甚用桔梗湯一劑數脈與膿頓減又二劑將愈佐以六味丸而痊

一男子咳嗽喘急發熱煩躁面赤咽痛脈洪大用黃連解毒湯二劑少退更以庖子湯四劑而安此肺癰將成未成之候

一男子患肺痿咳嗽喘急吐痰腥臭胸滿咽乾脈洪數用人參平肺散六劑及飲童便諸症悉退更以紫菀

中少加阿膠以潤燥日續一日扶至立冬之午刻病者忽自云內中光景大覺清爽可得生矣奇哉天時之燥去人肺金之燥遂下傳大腸五六日不一大便略一潤腸旋即解散正以客邪易去耳至小雪節廉健加餐倍於曩昔蓋胃中空虛已久勢必復其容受之常方為全愈也

立齋治一男子神勞冬月患咳嗽服解散之劑自以為便曰此因肺氣虛弱腠理不密而外邪所感也當急補其母是治本也始服六君子湯內去參术加紫蘇枳殼之類以致元氣益虛生肺癰而歿

一武職目飲食起居失宜咳嗽吐痰用化痰止嗽之藥時仲夏左尺洪數而無力胸滿面赤嗌痰腥臭自汗曰腎虛水泛為痰而反重亡津液得肺癰乎不信仍服前藥翌日吐膿脈數右寸為甚用桔梗湯一劑數脈與膿頓減又二劑將愈佐以六味丸而痊

一男子咳嗽喘急發熱煩躁面赤咽痛脈洪大用黃連解毒湯二劑少退更以庶子湯四劑而安此肺癰將成未成之候

一男子患肺痿咳嗽喘急吐痰腥臭胸滿咽乾脈洪數用人參平肺散六劑及飲童便諸症悉退更以紫菀

葦湯而愈童便雖云治虛火常治癆瘍癰腫疼痛發熱作渴及肺痿肺癰發熱口渴者尤効

一僕年逾三十嗽久不愈病久故可用瀋氣壅不利睡卧不寧咯吐膿血甚虛可畏其主已棄之矣與寧肺散一服少愈又服而止大半乃以寧肺湯數劑而痊所謂有是病必用是藥若泥前散性濇而不用何以得愈

上舍毛體仁素陰虛春初咳嗽胸中隱痛腎脉洪數肺脉数而時不見曰内當結癰先用六味地黄丸料一劑服之翌早來謂曰昨得良劑嗽愈六七務求一方到監調理曰陰上炎患癰之症第因元氣虛弱未能

月餘復請診之脉洪滑而數曰膿已成矣當請常治者同議針之且免内潰之患仍不決又月餘請視他醫已先開瘡孔偏上兜膿不出仍内潰脉愈洪大曰脉洪滑而數其舌青黯内臟已壞無能為矣後果然

一男子咳嗽兩脇脹滿咽乾口燥咳嗽腥臭以桔梗湯四劑而唾膿以排膿散數服而止乃以補膿排膿之劑而瘳

一男子咳而膿不止脉不退諸藥不應甚危用柏黄丸一服少愈再服頓退數服而痊柏黄一兩為末百齒

心痰等劑愈甚

茸湯而愈童便雖云治虛火常治瘡瘍熾腫疼痛發熱作渴及肺痿肺癰發熱口渴者尤効

一僕年逾三十嗽久不愈病久故可用濃氣壅不利睡卧不寧咯吐膿血甚虛可畏其主已棄之矣與寧肺散一服少愈又服而止大半乃以寧肺湯數劑而瘥所謂有是病必用是藥若泥前散性濃而不用何以得愈

上舍毛體仁素陰虛春初咳嗽胸中隱痛腎脉洪數肺脉数而時不見曰內當結癰先用六味地黃丸料一劑服之翌早來謂曰昨得良劑嗽愈六七務求一方到豎調理曰陰上焱患癰之症第因元氣虛弱未能發出因其易忽薛不能乃別用降火化痰等劑愈甚月餘復請診之脉洪滑而数曰膿已成矣當請常治者同議針之且免內潰之患仍不決又月餘請視他醫已先開瘡孔偏上兜膿不出仍內潰脉愈洪大曰脉洪滑而数其舌青黯內臟已壞無能為矣後果然

一男子咳嗽兩脇脹滿咽乾口燥咳嗽腥臭以桔梗湯四劑而唾膿以排膿散數服而止乃以補膿排膿之劑而瘳

一男子咳而膿不止脉不退諸藥不應甚危用柘黃丸一服少愈再服頓退數服而痊柘黃一兩為末百齒

霜即栝蒌 二錢用糊為丸如梧子大每服三五丸米飲下柘黃乃柘樹所生者其色黃狀靈芝江南最多北方鮮有

一婦人吐膿五心煩熱口乾胸悶以四順散三劑少止以排濃散數服而安排濃散黃耆白芷五味人參四順散貝母紫菀桔梗各一錢半甘草七分作一劑水煎食遠服

一男子因勞咳嗽不止項强而痛脉微緊而數此肺癰也尚未成膿欲托裡益氣藥彼不信仍服發散藥致血氣愈虛吐濃不止竟不救經云肺內主氣外司皮毛若肺氣虛則腠理不密皮毛不澤肺受傷則皮毛錯縱故患肺癰腸癰者必致皮毛如此以其氣不能榮養而然也亦有服表藥見邪不解仍又發表殊不知邪不解者非邪不能解多因腠理不密而邪復入也專用發表則腠理愈虛邪愈易入反為敗症矣宜診其脉邪在表者止當和解而實腠理乘虛復入者亦當和解兼實腠理故用托裡益氣之藥若小便赤澁為肺熱所傳短少為肺氣虛蓋肺為母腎為子母虛不能生子故也亦有小便頻數者亦為肺虛不能約制耳

一男子面白神勞咳而胸臆隱痛其脉滑數以為肺癰欲用桔梗湯不信仍服表藥致咳嗽愈甚唾痰腥臭始悟乃服前湯四劑咳嗽少定又以四順散四劑而脉靜更以托裡藥數劑而愈大抵勞傷血氣則腠理不密風邪乘肺風熱相搏蘊結不散必致喘咳若悞汗下過度則津液重亡遂成斯症若寸脉數而虛者為肺疽脉微緊而數者亦有膿也緊甚而數者已有膿也唾膿自止脉短而面白者易治濃不止脉洪大而面色赤者不治使其治早可救膿成則無及矣金匱方論熱在上焦者因咳為肺痿得之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被下藥快利重亡津液故寸口脉數其人燥咳胸中隱隱時痛脉反為滑數此為肺癰咳唾膿血脉數虛者為肺痿數實者為肺癰

一童子氣稟不足患肺癰唾膿腥臭皮毛枯槁脉浮按之濇更無力用鍾乳粉湯治之

一男子患之形症皆同唯咽喉時或作痒痰多脇痛難於睡臥用紫菀湯治之而並愈

一弱人咳膿日晡發熱夜間盜汗脉浮數而緊用人參五味子湯數劑頓退以紫菀湯月餘而痊

一男子患肺痿咳嗽喘急吐痰腥臭胸滿咽乾脉洪数用人參平肺散六劑及飲童便諸症悉退更以紫菀湯而愈童便雖云專治虛火常治瘡瘍腫燬疼痛發熱作渴及肺痿肺癰發熱口渴者尤効

一婦人患肺痿咳嗽吐痰腥臭日晡發熱脉數無力用地骨皮散治之熱止更用人參養肺湯月餘而安

一男子年前病肺癰後又患咳嗽頭眩唾沫飲食少思小便頻数服解散化痰藥不應診之脾肺二脉虛甚謂眩暈唾涎屬皮氣不能上升小便無度乃肺氣不得下制尚未成癰耳投以加味理中湯四劑諸症已退大半更用鍾乳粉湯而安河間曰金匱云肺痿屬熱如咳又肺癰聲啞聲嘶咯血此屬陰虛熱甚然也本論治肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺尿小便数以上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多涎唾用炙甘草乾薑此屬寒也肺痿涎唾多心中溫液者用炙甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱不同是皆宜分治故肺痿又有寒熱之異也

趙以德治一婦人年二十餘患肺癰胸膺間患一竅于口中所咳膿血與竅相應而出以人參黃耆當歸補氣血劑加退熱排膿等藥服之不一日而愈藥要或問

治肺癰目擊神効其法用百年芥菜滷久瘞地中者數
是立起此滷嘉興府城中多藏之廣筆記
廣筆記魚腥艸水煮不住口食之治肺癰吐膿血神方
也正名蕺草煮治魚口
立齋治陸司廳子仁春間咳嗽唾痰腥穢胸滿氣促皮
膚項強脉數此肺疽也蓋肺系在項肺傷則系傷故
牽引不能轉側肺者氣之本其華在毛其充在皮肺
傷不能攝氣故脇脹氣促而皮膚縱東垣云肺瘡之
脉微緊而數者未有濃也緊甚而數者已有膿也其
脉來緊數則濃已成遂以人參黃耆當歸川芎白芷
貝母知母麥冬蒌仁桔梗防風甘草煮以蟾酥丸及
太乙膏治之膿盡脉澁而愈至冬脉復數經云飲食
勞倦則傷脾脾傷不能生肺金形寒飲冷則傷肺肺
傷不能生腎水腎水不足則心火熾盛故脉來洪數
經云冬見心脉而不治果殁于火旺之月凡肺疽愈
不治余常治三人一年兩閒一年皆復作而殁多
周國用年逾三十患咳嗽項強氣促右寸脉數此肺疽
也東垣云風中于胃呼氣不入熱攻於榮吸氣不出
風傷皮毛熱傷血脉風熱相搏血氣稽留于肺變成
瘡疽診其寸脉數而虛者肺痿也数而實者肺疽也

今診脉滑此疽膿已成以排膿托裡之藥及蟾蜍丸治之脉漸澁而愈錦衣李大器亦患此吐膿而赤脉大謂肺病脉宜澁而宜白今肺大而赤火剋金也不可治果然

一男子年逾四十喘咳脇痛胸滿氣促右寸脉大此風熱鬱於肺也尚未成瘡層有餘之症欲以瀉白散治之彼謂肺氣素怯不然之乃服補藥喘嗽愈甚兩月後復請治之汗出如油喘而不休此肺氣已絶安用治後果歿夫肺氣克實邪何從襲邪氣既入則宜去之故用瀉白散所以瀉肺中之邪氣也邪氣既去則真氣自實矣

姚應鳳治某嬖患脹滿諸醫多云陽症應鳳曰此肺癰耳令病者閉目取一大盆水向病者頂上傾之病者陡大驚亟舉刀直刺心坎瀉膿血數椀而愈人問之應鳳曰心尖下垂水潑而驚驚則心系提吾刀可入也（仁和縣志此說可疑）

沈夫人患嗽血晝夜不休應鳳曰肺虛瘵不慮潰今潰至第二葉尚可生也先投洗肺湯已令食猪肺數十觔遂愈（同上）

錦衣李大用素不慎起居吐痰自汗咳嗽發熱服二陳

芩連枳殼山梔之類前症不減飲食少思用四物二陳芩連元參知柏之類前症愈甚更加胸腹不利飲食益少內熱晡熱加桑皮紫蘇杏仁紫菀桔梗之類胸膈膨脹小便短少用猪苓澤瀉白朮茯苓枳殼青皮羊夏黃連蘇子胸膈痞滿脇肋膨脹小便不通加茵陳葶藶喘促不卧飲食不進診之六脉洪數肺腎二部尤甚曰脾土既不能生肺金而心火又乘之此肺癰之作也當滋化源緩則不救不信後嗽痰膿痰復求治曰胸膈痞滿脾土敗也喘促不卧肺金敗也小便不通腎水敗也脇肋膨脹肝木敗也飲食不化心火敗也此化源既絶五臟已敗藥豈能生已而果然

絲客姚荃者素鬱怒年近六十脾胃不健服香燥行氣飲食少思兩脇脹悶服行氣破血飲食不入右脇脹痛喜用手按彼疑為膈氣痰飲內傷曰此肝木尅脾土而脾土不能生肺金也若內有瘀血雖單衣亦不敢著肉用滋化源之藥四劑諸症頓退彼以為愈曰火令在邇當補脾土以保肺金彼不信後復作另用痰火之劑益甚求治左關右寸滑數此肺內潰矣仍不信服前藥果吐穢膿而歿

腹癰

薛立齋治上舍周一元腹患癰三月不愈膿水清稀朝寒暮熱服四物知柏之類食少作瀉痰涎上涌服二陳枳實之類痰涎愈甚胸膈痞悶故曰朝寒暮熱氣血虛也食少作瀉脾腎虛也悉因真氣虛而邪氣實也當先壯其胃氣使諸臟有所稟而邪自退矣遂用六君加黃耆當歸數劑諸症漸退又用十全大補湯肌肉漸飲更用補中益氣湯調理而痊

從姪孫年十四而畢姻乙巳春年二十四腹中作痛用大黃等藥二劑下血甚多胸腹脹滿痰喘發熱又服破氣降火藥一劑汗出如水手足如冰薛歸診之左關洪數右關尤甚乃腹癰也雖能收斂至夏必變而成瘵症用參耆各一兩歸朮各五錢陳皮茯苓各三錢炙草炮薑各一錢二劑諸症少退腹始微赤按之覺痛又二劑作痛又二劑腫痛脉滑數針出膿瘀更用大補湯精神飲食如故因遺精患處色黯用前藥加五味山茱山藥骨脂吳萊等劑瘡口漸斂瘵症悉具其脉非洪大而數即微細如無惟專服獨參湯人乳汁少復良久仍脫曰當備後事以俟火旺乃禱鬼

神巫者歷言往事如見更示以方藥皆峻利之劑且言保其必生敬信服之後果歿經曰拘於鬼神者不可與言至德而況又輕信方藥於邪妄之人即書此以警後患

一男子腹患癰腫硬不潰乃陽氣虛弱嘔吐少食乃胃氣虛寒法當温補脾胃假如腫赤痛甚煩躁脉實而嘔為有餘當下之腫硬不潰脉弱而嘔為不足當補之若痛傷胃氣或感寒邪穢氣而嘔者雖腫瘍猶當助胃壯氣彼不信仍服攻伐藥而嘔愈甚復請治脉微弱而發熱曰熱而脉反靜脫血脉反實汗後脉反躁者皆為逆也辭不治果歿

秋官錢可容腹患癰煩腫作痛煩渴飲冷大便不通脉沈數實此熱毒蘊於內用清熱消毒散加大黄二錢一劑諸症悉退但形氣頓虛用托裡消毒散去銀花白芷倍加參耆歸朮而安

毛礪菴側室肚患癰月餘矣色黯不腫内痛作嘔飲食不入四肢逆冷其脉或脫絶或浮大雜用定痛敗毒之藥曰此氣血俱虛而作痛内決無膿不治之症也强用大温補之藥二劑痛止色赤飲食少進謂但可延日而已人皆以為有膿復强針之又用大補之劑

始出清膿少許衆仍以為毒結于內用攻膿保其必生殊不知乃速其死耳惜哉

一男子腹患癰腫硬木悶煩熱便秘脉數而實以黃連內疎湯一劑少愈以銀花散四劑瘡頭出水而消

一男子年逾三十腹患癰腫脉數喜冷齊氏云瘡瘍腫起堅硬瘡疽之實也河間云腫硬木悶　飲冷邪氣在內也遂用清涼飲倍用大黃三劑稍緩次以四物湯加荅連山甲通四劑而遂潰更以十宣散去參耆肉桂加金銀花天花粉漸愈彼欲速効自服溫補藥遂致肚腹俱腫小便不利仍以清涼飲治之膿潰數碗再以托裡藥治之而愈東垣云瘡疽之法其受之有內外之別治之有寒溫之異受之外者法當托裡以溫劑反用寒藥則是皮毛始受之邪引入骨體受之內者法當疎利以寒劑反用溫劑托裡則是骨髓之病上徹皮毛表裡通潰共為一瘡助邪為毒苦楚百倍輕則幾殆重則死矣

一男子素好酒色小腹患毒脉弱微痛欲求內消謂當助胃壯氣無行經活血藥佐之可消不宜用敗毒等藥彼欲速効自用之病勢果盛瘡亦不潰飲食少思

迨二月餘復請治診其脉愈弱盜汗不止聚腫不潰肌寒肉冷自汗色脫此氣血俱虛也故不能發腫成膿以十全大補湯三十餘劑遂成膿刺之反加煩躁脉大此亡陽也以聖愈湯二劑仍以前藥百貼而愈

劉貴患腹癰煩痛煩躁作嘔脉實河間云瘡瘍者火之屬須分內外以治其本若脉沈實者先當疎其內以絕其源又云嘔噦心煩脉沉而實腫硬木悶或皮肉不變邪氣在內宜用疎黃連湯治之然作嘔脉實毒在內也遂以前湯通利二三行諸症悉去更以連翹消毒散而愈

一人患腸癰膿熟開遲脉微細膿出後瘡口微膿如蟹吐沫此內潰透膜也凡瘡瘍透膜十無一生雖以大補藥治之亦不能救此可為待膿自出之戒也

黃師文云男子服建中湯煩人服四物湯往往十七八得但時為之損益耳有男子病小腹一大癰其諸弟侮之曰今日用建中湯否師文曰服建中湯俄而癰潰蓋小腹癰本虛其熱毒乘虛而入建中湯既補虛而黃者且潰膿也

北窓欠錄

腰疽

薛立齋治府庠彭碧溪患腰疽服寒凉敗毒之藥色黯不痛瘡頭如鋪桑背重不能安寢毋瞶目白面色無神小便頻澁作渴迷悶氣粗短促脉浮數重按如無先用滋水之藥一劑少頃便利渴止背即輕爽乃砭出瘀血以艾半斛許明矣患處外敷烏金膏內服參耆歸朮肉桂等藥至數劑元氣稍復自疑肉桂辛熱一日不用手足竝冷大便不禁仍用肉桂及補骨脂二錢肉豆蔻一錢大便復常其肉漸潰更用當歸膏以生肌肉八珍湯以補血氣而愈

錦衣傅允承母年踰七十腰生一癰作庠異常脉浮數反惡寒曰此瘡疽也未潰而先弱何以收斂況大便不通則真氣已竭治之無功因懇請不得已用六君加藿香神麴數劑飲食漸進大便始通更用峻補之劑潰而膿清作渴再用參耆歸地麥冬五味渴止彼喜曰可無虞矣曰尚難收斂先日之言也彼疑遂速他醫卒致不起

舉人顧東溪久作渴六月初腰患疽不靜起居瘡潰尺許色黯敗臭小便如淋唇裂口刺七月終瀹治左尺洪數左關浮澁謂先渴而患疽者乃腎水乾涸虛火上炎多致不起今膿水敗臭色黯不痛瘡口張大乃

脾氣敗而肌肉死也小便如淋痰壅喘促口乾舌裂乃脾肺敗而腎水絶也左尺洪數腎無所生也左関浮濇肺剋肝也況當金旺之際危殆速矣二日後果歿蓋此症既發於兩月方歿者乃元氣虛不能收斂也若豫為調補使氣血無虧亦有得生者

一男子腰患毒膿熟不潰針之膿大泄反加煩躁以墜愈湯四劑而寧更以人參養榮湯加麥冬五味兩月而愈此人後患濕氣遂為痼疾凡瘡膿血去多瘡口雖合尤當補益務使氣血平復否則更患他症必難治療慎之

一男子腰中患疽發而不潰其氣血止能發起不能培養為膿也投大補藥數劑而潰又數劑膿出尚清乃服參耆歸朮膏劑餘膿少稠數劑膿漸稠肌肉頓生凡大癰疽藉氣血為主若患而不起或潰而不腐或不收斂及膿少或清皆氣血之虛也宜大補之最忌攻伐之劑亦有膿反多者乃氣血虛而不能禁止也若潰後發熱作渴脉大而膿愈多屬真氣虛而邪氣實也俱不治常見氣血克實之人患瘡皆腫高色赤易腐潰而膿且稠又易於收斂怯弱之人多不起發不腐潰及難於收斂若不審察而妄投攻劑虛虛之

禍不免矣若患後當調養若瘰癧流注之症尤當補益也否則更患他症必難措治慎之

有人腰間生一毒癰紅腫未破皮痛不可忍俯躬而行一人取新殺牡猪肝切片如瘡大貼上外以布纏定一對晝其病良已肝色變黑臭不可近棄之地犬不食下有小指大一點尚硬乃肝小未貼滿所致竟亦無他（奇疾方。張在談）

立齋治崑山張舉人元忠孟秋患腰疽瘡頭如大豆粒根大三寸許微腫略赤虛症悉具用桑枝灸患處服活命飲一劑腫起色赤飲食仍少用香砂六君子湯四劑食漸進後用大補藥膿雖成而不潰乃每劑加附子一片二劑後膿自涌出旬日而愈

陸氏女初嫁患腰痛不腫脈沈滑神思倦怠此為內發七情之火飲食之毒所致以托裡藥一劑下瘀膿升許陳良甫曰瘡未潰內陷面青唇黑者不治果歿

明萬曆刻本

續名醫類案卷五十二

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷五十三

錢塘魏之琇玉橫撰

腸癰

華佗傳軍吏李成苦咳嗽晝夜不寐時吐膿血以問佗佗言君病腸癰欬之所吐非從肺來也與君散兩錢當吐二升餘膿血訖快自養一月可小起好自將愛一年便健十八歲當一小發服此散亦行復差若不得此藥故當死復與兩錢散成得藥去五六歲親中

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

人有病如成者謂成曰卿今强健我欲死何忍無急去藥（松之按古語以藏為去）以待不祥先持貸我我差為卿從華佗更索成與之已故到譙遭值佗見收忽忽不忍從求後十八歲成病竟發無藥可服以至於死（三國志）

薛立齋治金臺院僉憲年逾五十腹內隱痛小便如淋皮膚錯縱而脈滑數此腸癰也脈滑數則膿已成遂以廣東牛皮膠酒溶化送太乙膏下膿升許更以排膿托裏藥及蠟礬丸而愈

孫文垣治染匠婦腹痛兩月矣或以為寒為熱為氣為血為蟲為積治之不效或與膏藥大如斗貼之痛益劇欲去之則牢粘不可揭臥舟中數人扶之不起往診見其面色蒼黑兩手枯燥如柴六脈皆洪數（腹痛脈洪數可知其得生亦賴此）問其痛之所在解衣指示（痛有定處）始知膏藥牢粘叩其不能起步之由乃左腳不可動動則痛應於心察其色脈皆非死候此必腸癰左腳不能舉是其徵也（俗名縮腳腸癰）與營衛返魂湯加金銀花為君四帖酒水各半煎服一帖痛稍減二帖下臭膿半桶病全減膏藥亦不揭自落四帖完其父與匠來謝并求善後之方

龔子才治一婦人腹痛如錐每痛欲死不可著手六脈

洪数此腸癰也用穿山甲炒白芷貝母殭蠶大黄合一大劑水煎服膿血從小便出而愈

李士材治吳光禄夫人患腹滿而痛喘急異常不進飲食或用理氣利水之劑二十日不効診之脉大而数右尺為甚令人按腹手不可近曰此大腸癰也脉数為膿已成用黄耆皁刺白芷之類加葵根一兩煎一碗頓服之未申痛甚至夜半膿血大下昏暈不支即與獨參湯稍安更與十全大補兩月而愈

周漢卿治義烏陳氏子腹有堀押之如罌漢卿曰此腸癰也用大針灼而刺之入三寸許膿隨針迸出有聲

薛立齋診秀水卜封君善飲腹痛便泄服分利化痰等劑不應其脉滑数皮膚甲錯謂此酒毒致腸癰而潰敗也辭不治仍服前劑果便膿而歿

孫某治一女子腹痛百方不治脉滑数時作熱腹微急孫曰痛病脉當沈細今滑数此腸癰也以雲母膏一兩為丸如梧桐子大以牛皮膠溶入酒中并水吞之餉時服盡下膿血愈

立齋治通府張廷用患腸癰兩月餘矣時出白膿體倦惡寒此邪氣去而中氣虚也用託裡散煎益氣湯徐

徐呷之又令以猪肚肺煮爛取其湯調米粉煮時呷半盞後漸調理而瘥

一男子小腹痛而堅硬小便數汗時出脉遲緊以大黃湯一劑下瘀血合許以薏苡仁湯四劑而安（苡仁瓜蒌各三錢丹皮桃仁各二錢）

一男子膿已成用雲母膏一服下膿升許更以排膿托裡藥而愈後因不守禁忌以致不救

一人患腸癰偃僂痛不能伸有道人教以飲純黃犬血二椀和白酒服其人遂飲至四椀次日下膿血盡而瘳廣筆記

腸風臟毒

孫文垣治淄大司馬嘗有腸風之症八月丁祭學博餽鹿血食之血暴下用槐角子五錢黃連枳殼地榆貫衆各三錢一服而止淄善其方書之粘壁間遇有便血者依方服之無不立効

陳鹿塘原有腸風臟毒之症大便燥急數日不能一行痛苦殊甚此胃寒腸熱也其脈兩寸皆數兩關弦而無力兩尺洪滑而左尤甚久治不効因憶東垣有云大腸喜清而惡熱脾胃喜温而惡寒以胃屬土腸屬

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

金也乃制一方專以腸風臟毒藥為君外以養血之藥裹之使不傷胃氣蓋藥先入胃後入大腸入胃時裹藥未化及入大腸則裹藥化而君藥始見庶幾兩不相妨因以久製大黃二兩槐花三兩木耳二兩郁李仁皁角子豕牙屑條苓各一兩血餘升蘇荊芥穗各五錢為末煉蜜為丸赤豆大外以四物加蒲黃各一兩為衣米湯送下空心及下午各二錢血果止大便不燥飲食日加而愈

王祖泉大便裡急後重復痛日夜下紫稠粘二四十度作痢治三月不効肌瘦嬾食眼合嬾開悉以為不治脈之六部濡弱所下之色甚晦狀如芋苗汁曰此非痢乃臟毒下血也醫說中人參椶皮散正與此對即製與之其夜果減半終劑全愈方以人參椶根白皮各二兩為末空心米飲調二錢忌肉汁生菜魚腥湯封君簡庵血分熱甚以善飲致腸風且心腎不交以四物湯加棗仁側柏葉槐花連翹密為丸服之而愈

吳孚先治張東銘素患痔疾兼後重之症似痢非痢登圊窘迫行步如跨馬狀坐亦作楚六脈偏盛稍覺無神知為氣血虛而挾濕熱用歸芍荅連生地槐角查肉升麻加人參二兩為丸彼不用參服之不効復入

參服半料已全愈

汝南節度副使完顏君寶病臟毒下衄血發渴寒熱往來延及六載日漸瘦弱無力面黃如染張診其兩手脈沈而身涼內經寒以為營氣在故生可治先以七宣丸下五七行次以黃連解毒湯加當歸赤芍與地榆散同煎服之一月而愈

方勺泊宅編云外兄劉掾病臟毒下血凡半月自分必死得一方只以乾柿燒灰飯服二錢遂愈又王瓊百一方云曾通判子病下血十年亦用此方一服而愈為散為丸皆可

薛立齋治一男子臟毒下血服涼血敗毒藥不惟血不能止且飲食少思肢體愈倦脈數按之則濇先以補中益氣湯數劑少止更以六君子湯加升麻炮薑四劑而止乃去炮薑加芍歸月餘脾腎亦愈嘗治積熱或風熱下血者先以敗毒散散之胃寒氣弱者用四君子湯或參苓白朮散補之並效

一男子臟毒下血脾氣素弱用六君子湯加芍歸枳殼地榆槐花治之而愈後因謀事血復下諸藥不應意思慮傷脾所致投歸脾湯四劑而痊大抵此症所致之由不一當究其因而治之丹溪云芍歸湯一劑又

調血之上品熱加茯苓梔花冷加茯苓木香此則自
根自本之論也雖然精氣血出於穀氣惟大腸下血
以胃藥收功以四君子湯參者白朮散以枳殼散小
烏沈湯和之胃氣一回血自循經絡矣腸風者邪氣
外入隨感隨見臟毒者蘊積毒久而始見又云人惟
坐卧風濕酒飽房勞生冷停寒酒麪積熱以致榮血
失道滲入大腸此腸風臟毒之作作也挾熱下血清
而色鮮腹中有痛挾冷下血濁而色黯腹內畧痛清
則為腸風濁則為臟毒有先便而後血者其來也遠
有先血而後便者其來也近世俗糞前糞後之說非
也治法大要先當解散腸胃風邪熱則敗毒散冷則
不換金正氣散加芎歸後隨其冷熱治之河間云起
居不節用力過度則絡脈傷陽絡傷則血外溢血外
溢則血陰絡傷則血內溢血內溢則便血腸胃之
絡傷則血溢腸外有寒汁沫與血相搏則併合凝聚
不得散而成積矣又內經云腸癖下膿血脈弦絶者
死滑大者生血溢身熱者死身涼者生諸方皆謂風
熱侵於大腸而然若飲食有節起居有時腸胃不虛
邪氣何從而入
王執中云何教授湯簿有腸風疾積年不愈取脊端窮

骨名龜尾當中一灸除根湯簿因傳此方後觀灸經此穴療小兒脫肛瀉血耳蓋大人小兒之病初不異之以灸大人腸風瀉血蓋歧伯灸小兒法也後人因故也五痔便血失屎迴氣灸百壯在脊窮骨上赤下白處

痔脫肛

孫文垣治周文川肛上生一腫毒月餘膿潰矣但少動則出鮮血不止大便燥結胸膈滿悶飲食不思脈之兩寸短弱關弦尺洪滑此氣虛血熱陷於下部宜補而升提不然痔漏將作可慮也黃耆二錢歸身地榆槐花枳殼各一錢升麻秦艽各七分荊芥穗五分甘灶三分服後胸膈寬慢惟口苦甚前方加酒連連翹各五分而愈

高仰山內人痔血裡急後重飲食入腹大便即行晝夜五六度五更咳嗽痰鼾肌肉脫口作渴由服涼血之劑過多致脾霊不能統血也脈之六部皆軟弱無力以四君子湯加荊芥穗秦艽陳皮炮薑四帖而飲食進血全止嗽亦定減炮薑倍加何首烏又四帖遂數年不發

徐檢老發寒熱臀近肛硬處生一毒紅腫而痛坐卧為艱外科以鏡針點開挿藥綫於內塗以爛藥使膿血急潰又與敷生肌藥使易收口受謝而去未半月硬處之旁又紅腫痛寒熱交作召前醫治法如前受謝以去遞醫遞患幾半年矣診之面色青慘脈皆濡弱手足如氷飲食減半究所服則槐角生地黃柏之屬曰此痔癰非痔漏也痔漏當用挂綫以五灰膏點之可愈今腫硬無定處離肛門且遠其初只可大補氣血即有毒亦宜托出一膿而愈此王道之治不勝於針刀萬萬哉乃內用寒凉外用收口動輒挂綫致凝滯流注愈而屡發非稟厚氣强六旬餘安能當此與十全大補四帖飲食加手足煖大便艱澁向潤之而不行者今亦通利再以首烏四兩人參枸杞當歸黃耆熟地各二兩槐角秦艽各一兩密丸服之腫處出少膿全瘳徐喜而謔曰予非孫君諸外科視此醫為金穴矣呵呵

醫學博士齊德之云予讀養生必効方見乾義傳僧覺海少年患痔疾其行業比冰霜緣此飽食久坐知痔疾者不必酒色過度矣故素問云因而飽食筋脈橫解腸癖為痔治之故不同也三神丸枳殼皁角五倍

密丸每服二三十丸精義

黃履素曰予中年患痔點洗都不効惟白蘿蔔煎湯頻洗差佳近讀口環集中載冬瓜皮同朴硝煎洗翻花痔立愈又法以白蘿蔔代冬瓜亦効冬瓜未之試蘿蔔已驗矣

薛立齋治儒者楊舉元素陰虛勞則肢體倦怠兩足發熱服清熱等藥熱至腰膝大便溏滯飲食過多則瀉至年餘作喝吐痰患痔出膿仍不節勞則惡寒忽發熱復患癰膿水不止氣血虛甚乃用六味丸補中益氣湯滋養化源喜其慎疾年餘而瘳

陳自明治一男子患痔未成膿苦痛大便難與神仙太乙丹一錠去後二次痛即止不日而消方見蟲門

立齋治一男子患痔大便燥結煩痛作渴脈數按之則實以秦艽蒼朮二劑少愈更以四物湯加苓連槐花枳殼四劑愈

一男子素不慎酒色患痔煩腫肛門墜痛兼下血大便乾燥脈洪大按之則澁以當歸郁李仁湯加桃仁四劑少愈更以四物湯加紅花桃仁條芩槐花數劑而愈大抵醉飽入房則經脈橫解或精氣脫泄脈絡一虛酒食之毒乘虛流注或淫極強固精氣遂傳大腸

以致水乘火勢而毀金或食厚味過多必成斯疾夫
受病者燥氣也為病者濕熱也宜以瀉火和血潤燥
疎風之劑治之若破而不愈即成漏矣有串臀者有
串陰者有穿腸者有穢從瘡口而出者形雖不同治
法頗似其腸頭腫成塊者濕熱也作痛者風也大便
燥結者火也潰而膿者熱勝血也當各推其所因而
治之

一男子患痔成漏每登廁則痛以秦艽防風湯加條芩
枳殼四劑而愈以四物加升麻芩連荊防不復作

一男子患痔漏每登廁則肛門下脫作痛良久方收以
秦艽防風湯數劑少愈乃去大黃加黃耆川芎白芍
而痛止更以補中益氣湯二十餘劑後再不脫

一婦人患痔腫煩痛甚以四物湯加芩連紅花桃仁丹
皮四劑少止又數劑而愈

一婦人素患痔漏每因熱則下血數滴以四物湯加黃
連治之即愈後為大勞瘡腫痛經水不止脈洪大按
之無力此勞傷血氣火動而然也用八珍湯加芩連
蒲黃二劑而止後去蒲黃芩連加地骨皮數劑而安

丹溪云婦人崩中者由臟腑傷損衝任二脈血氣俱
虛故也二脈為脈經之海血氣之行外循經絡內營

臟腑若氣血調適經下依時若勞動過極臟腑俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中暴下治宜大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自正矣

一男子有痔漏每發如廁肛脫良久方上診其脈細而微用補中益氣湯三十餘劑遂不再作丹溪云脫肛屬氣熱氣虛血熱。氣虛者補氣參耆芎歸升麻。血虛者四物湯血熱者涼血四物湯加黃柏肺與大腸為表裡故肺臟蘊熱則肛閉結肺臟虛寒則肛門脫出。有婦人產育用力小兒久痢亦致此治之必須溫補肺腑腸胃久則自然收矣

臨安曾五方黃院鳳引為高宗取痔得効後封曾官至察使用好信石色黃明者三錢打如豆大明白礬一兩為末好黃丹水飛炒紫色五錢蝎梢七个淨洗瓦上焙乾研末草烏醫石光滑者去皮生研末一錢右用紫泥罐先將炭火煆紅放冷拭淨先下明礬燒令沸次下信入礬內拌勻文武火煆候沸再攪勻看罐通紅烟起為度將罐撥下待冷取研末方入草烏黃丹蝎稍三味再同研極細入磁罐內收貯如欲敷藥先煎甘草湯或蔥椒煎湯洗淨患處然後用生麻油

調前藥以鷄毛掃藥痔上每日敷藥三次必去黃水如膠汁然痔頭漸消看痔病年深淺年遠者不出十日可取盡年近者俱化為黃水連根去淨更搽生好肉藥應是五痔皆去之名如神方

李防禦五痔方原痔者資富男女皆有之富者酒色財氣貧者擔輕負重飢露早行皆心肝二血喜則傷心怒則傷肝喜怒無常風血侵於大腸到谷道無出路結積成塊出血生乳各有形相婦人因經後傷冷月事傷風餘血在心經血流于大腸小兒因利後或母腹中受熱也先用水澄膏護其肉欒金白芨各一兩

或加黃連右二味為細末如內痔候登厠翻出在外用溫湯洗淨不須坐側卧於牀即出用蜜水調令得中箆蔑塗谷道四邊好肉上留痔在外以紙蓋藥上良久方用枯藥搽痔上用筆醮溫水于紙上不令藥乾及四散枯藥用好白礬四兩生信石二錢半硃砂一錢生研極細右各研為細末先用砒入紫泥罐次用白礬末蓋之用火煆令烟斷其砒盡隨炬去止借砒氣於礬中耳用礬為極細末看痔頭大小取礬末在掌中更入硃砂少許以嘶調稀用箆頭塗痔上周遍一日三上候看痔頭顏色焦黑為効至夜有黃水

出切勿他疑水盡為妙至中夜上藥一遍来日依然
藥三次有小痛不妨換藥時以椀盛新水或温湯在
痔邊用筆輕洗去痔上舊藥更上新藥仍用護肉藥
次用荆芥湯洗之三兩日之後黄水出將盡却於藥
中增硃砂減白礬則藥力即緩三兩日方可增減漸
漸取之庶不驚人全在用藥人看痔頭轉色增減厚
薄傳藥方是活法此藥只是借砒信耳又有硃砂解
之一方士將此二方在京治人多効致富一富商因
驗以百金求得之錄示予予雖未用傳人無不言効
但枯藥趙宜真煉師已刊於青囊集纂如神千金方
未見刊傳大抵今人言能取痔者皆此方也恐氣血
虚或内邪者還當兼治其内庶不有失（二條俱外科發揮）

立齋治一男子痔瘡腫痛便血尤甚脉洪且濇經云因
而飽筋脉横解脹僻為痔蓋血氣通於肝肝生風風
生熱風客則淫氣傷精而成斯疾遂與黄連當歸黄
耆生地防風枳殻白芷柴胡槐花地榆甘草治之漸
愈次以黄連丸而瘥

一男子患痔脉浮鼓午後發熱作痛以八珍湯加黄耆
柴胡地骨皮治之稍可彼欲速効用刼藥蝕之痛甚
絶食而歿（此用枯藥者宜先治其内愈而後治其外也）夫瘡之潰斂氣血

使然也脉浮鼓日晡痛此氣血虛也丹溪云瘡口不合用大劑參耆术歸芎補之外以附子餅灸之更以補藥作膏貼之

一男子年踰四十有痔漏大便不實服五苓散愈加泄瀉飲食少思此非濕毒乃胃腸虛也當以理中湯治之不信仍服五苓散愈甚乃以理中湯及二神丸月餘而平

李達因痔瘡怯弱以補中益氣湯少加苓連枳殼治之稍愈後因怒加甚時仲冬脉得洪大謂脉不應病此乃腎水不足火來乘之藥不能治果殁於火旺之月

常見患痔者腎脉不足劉商有痔肛門脫出此濕熱下注真氣不能升舉診其脉果虛遂以四君子湯加黃耆芎歸蒼术黃柏升麻柴胡服之更以五倍子煎湯熏洗彼以為緩乃用砒霜等毒藥蝕之而殁夫劫藥特治其末且能伐其元鮮不害人慎之

徐生因痔氣血俱虛飲食不甘小便不禁夜或遺精此氣虛無濕熱而然非瘡故也以補中益氣湯加山萸山藥五味無還少丹治之而愈

一男子患痔漏膿出大便諸藥不應診其脉頗實令用

猪腰一个切開入黑牽牛末五分線扎以荷葉包煨熟空心細嚼温塩酒送下數服頓退更以託裡藥而愈（即煨腎散）

朱丹溪治一人肛門生癰後不收口有鍼竅三孔穴邊有濃用黄耆條芩連翹秦艽右末之神麴丸服治法予庚戌除夕痔作時官舍合肥龔得醫者取官局釣腸丸一百二十粒分為二服熱酒併服之中夜腹間微痛下少結糞旦起已安治證具載本方所以作効速者以服多故耳（一方）

葱青内刮取涎對停入蜜調勻先以木鱉子煎湯熏洗然後傳藥其冷如氷唐仲舉云嘗有一吏人若此渠族弟親合與之早飯前俾午後以榜紙來謝拜於庭下疾已安矣

鄭器先用之親曾得効其法鳩尾骨尖少偃處即是穴麥粒大艾炷七壯或十四壯甚者二十一壯上瘡發即安可除根本（並一方）

立齋治一人患痔漏口乾胃脉弱此中氣不足津液短少不能上潤而然以黄耆六一湯七味白朮散治之或曰諸痛痒瘡皆屬心火遂服苦寒之藥大便不禁而歿夫諸痛痒皆屬心火言其常也始熱終寒則反

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

常矣可泥此而不察乎

許叔微治一人腸風脫肛不收有血下用皁角三莖槌碎水一椀揉令皁角消盡用絹二重濾取清汁數分將脫肛腸浸其在藥中其腸自収不用手托如大腸收了更用湯盪其脫肛上令皁角氣行則不再作三次盪愈

龔子才治小兒脫肛因久患瀉利所致宜用葱湯熏洗令軟送上或以五倍子末敷而頻托入又以倍子煎湯洗亦可又以鱉頭燒存性香油調敷一云此物燒烟熏之久自収又以東壁土泡湯先熏後洗亦効

蘇東坡與程正甫書云凡痔疾宜斷酒肉與鹽酪醬菜厚味及粳米飲唯宜食淡麪一味及以九蒸胡麻即黑芝麻同去皮茯苓入少白蜜為麪食之日久氣力不衰而百病自去而痔漸退此乃長生要訣但易知而難行耳

江夏銕佛寺蔡和尚病肛門痔痛不可忍有人教用木鱉仁帶潤者雌雄各五个乳細作七丸盆覆濕處勿令乾每以一丸唾化開貼痔上其痛即止一夜一丸自消也後用治數人皆効瀕湖集簡方

張子和治趙君玉常病痔鳳眼草刺蝟皮槐根貍首之

類皆用之或以乾薑作末塗猪肉炙食之大便燥結不利且瘤疑瘻後數日因病黃大涌瀉數次不言痔作矣

寺隸祖病心痔用聖惠方治腰痛者鹿茸附子服之月餘病心痔亦愈已志書其事予每與醫言輒云癰疽之法蘊熱之極也烏有翻使熱藥之理福州醫郭晉卿曰脈陷則害漏陷者冷也若氣血温暖則漏自止正用得茸附按內經素問生氣通天論曰陷脈為瘻留連肉腠注云陷脈謂寒氣陷缺其脈也積寒留舍精血稽凝久瘀內攻結於肉裡故發為腸瘻內腠相連此說可謂明白故復記於此庶幾或有助於瘍醫云

容齋四筆○舊案或已采入疑其不詳因錄此壬辰六月九日

漏瘡

薛立齋治一男子醫患漏口乾發熱喜膿不清稀脈來遲緩以豆豉餅灸及服八珍湯加麥冬五味子軟柴胡地骨皮三月餘而愈後因不慎房勞復潰膿清脈大辭不治果歿河間云因病致虛則為輕蓋病熱尚淺元氣未虛也至病初愈而勞復或復飲食勞倦或房勞七情六慾陽瘥陰弱加致羸損此因虛致損則

類皆用之或以乾薑作末塗猪肉炙食之大便燥結不利且瘤疑瘻後數日因病黃大涌瀉數次不言痔作矣

時康祖病心痔用聖惠方治腰痛者鹿茸附子服之月餘而愈夷堅已志書其事予每與醫言輒云癰疽之法蘊熱之極也烏有翻使熱藥之理福州醫郭晉卿曰脈陷則害漏陷者冷也若氣血温暖則漏自止正用得茸附按內經素問生氣通天論曰陷脈為瘻留連肉腠注云陷脈謂寒氣陷缺其脈也積寒留舍精血稽凝久痺內攻結於肉裡故發為腸瘻內腠相連此說可謂明白故復記於此庶幾或有助於瘍醫云

客齋四筆○舊案或已采入疑其不詳因錄此壬辰六月九日

漏瘡

薛立齋治一男子臀患漏口乾發熱喜膿不清稀脈來遲緩以豆豉餅灸及服八珍湯加麥冬五味子軟柴胡地骨皮三月餘而愈後因不慎房勞復潰膿清脈大辭不治果歿河間云因病致虛則為輕蓋病勢尚淺元氣未虛也至病初愈而勞復或復飲食勞倦或房勞七情六慾陽痿陰弱加致羸損此因虛致損則

為重病勢已過元氣已索之故也

一男子年逾二十稟弱左腿外側患毒三月方潰濃水清稀肌肉不生以十全大補湯加牛膝二十餘劑漸愈更以豆豉餅灸之月餘而痊又一媼左臂結核年餘方潰膿清不斂一男子患貼骨癰退細短軟瘡口不合俱飲十全大補湯外用附子餅及貼補藥膏調護得宜百貼而愈大凡不足之症宜大補之兼灸以接補陽氣祛散寒邪為上

京師董賜年逾四十胸患瘡成漏日出濃椀許喜飲食如常以十全大補湯加貝母遠志白斂續斷灸以附子餅膿漸少謹調護歲餘而愈

一男子患漏時值陰寒忽惡寒右手脈有而似無此胃氣虛而不任風寒也以四君子湯加炮薑肉桂二劑少止又四劑而安

姚應鳳治鄭孝廉患流注穿漏垂死應鳳曰氣從下洩難奏巧乃取藥作糜周身封以敗楮隙肩井穴吸之而愈（錢塘縣志）

臀癰

薛立齋治一弱人臀癰膿成不潰以十全大補湯數劑

始托起乃針之又二十餘劑而愈此症弱人宜補氣血為要

一人臀癰煽腫痛甚此邪毒壅滯用活命飲隔蒜灸而消後因飲食勞倦腫痛後作寒熱頭痛此元氣虛而未能復也與補中益氣湯頻用葱熨法兩月而愈

一男子臀腫一塊微痛脉弦緊以瘡科流氣飲四劑而消

一婦癰吳輔之父患此內潰腫脹發熱口乾飲食少思此脾胃虛弱也先用六君加芎歸耆數劑而潰又用十全大補湯倍加參耆五十餘劑而愈

一男子硬痛發熱此膀胱氣虛而濕熱壅滯用內托羌活湯二劑熱毒悉退後用托裡消毒散而潰又用托裡散四十餘劑而斂

一男子臀癰腫硬作痛尺脉浮緊按之無力以內托羌活湯一劑痛止以金銀花散四劑膿潰而愈

一男子臀癰腫硬痛甚隔蒜灸之更服仙方活命飲二劑痛止腫消以托裡消毒散加黃柏蒼术羌活瘡頭潰而愈

一男子臀癰作膿而痛以仙方活命飲二劑痛止更以托裡消毒散膿潰而瘥

一男子臀癰不作膿飲食少思先用六君子湯加芎歸黃耆飲食漸進更以托裡消毒散膿潰而愈

一男子潰而膿清不斂以豆豉餅炙之更進十全大補湯兩月餘而瘡凡瘡不作膿或不潰或潰而不斂皆氣血之虛也若膿清稀尤其虛甚也

一男子臀癰膿水不止肌肉漸瘦飲食少思胃脈見弦以六君子湯加藿香當歸數劑飲食遂進以十全大補湯及豆豉餅炙之兩月餘而斂

一弱人臀漫腫色不變脉滑數而無力此臀癰也膿將成尚在內欲治以托裏藥待發出而用針彼欲內消服攻伐藥愈虛復求治仍投前藥托出針之以大補藥而愈凡瘡毒氣已結不起者但可補其血氣使膿速成而針去不可用內消之法膿成又當辨其生熟淺深而針之若大按之痛者膿深也小按之便痛者膿淺也按之不甚痛者未成膿也按之即復起者有膿也按之不復起者無膿也若腫高而軟者發於血脈腫下而堅者發於筋骨色不相變者發於骨髓也

一男子臀癰腐潰肌肉不生用藥敷之四沿反硬診之脉澁而弱此氣血虛不能營於患處故敷涼藥反硬

此條舊本已收因無後段發明故錄之

乃氣血受寒凝結而非毒也用大補藥愈矣

一人患臀癰用五瓜龍連枝搗汁酒濾服日進四五次膿從大便出未成膿者內消如有頭以查敷上立散治魚口極效廣筆記

曹水部文兆年逾四十脾胃患毒已半月餘頭甚多狀如粟許內痛如刺飲食不思怯甚脉歇至此元氣虛疽畜于內也非灸不可遂灸二十餘壯以六君子湯加藿香當歸數劑瘡勢漸起內痛頓去胃脉漸至但瘡色尚紫瘀肉不潰此陽氣尚虛也燃桑柴灸之以補接陽氣解散其毒仍以前藥加參耆歸桂色赤膿稠瘀肉漸腐取去兩月餘而愈夫邪氣沈伏真氣怯弱不能起發須灸而大補投以常藥待其自潰鮮有不誤者

沈侍御患臀腫痛小便不利彼謂闕格症以艾蒸臍大便亦不利以降火分利之藥治之不應診其脉數膿成此癰患也遂針之出膿數椀許大便即利五日陰囊腫脹小便不行仍針之尿膿大泄氣息奄奄脉細汗不止潰處愈張復用大劑參耆歸朮之藥猶緩俾服獨參湯至二觔氣稍復又服獨參膏至十餘觔熟以托裡藥兩月餘而平大抵瘡瘍膿血之泄先補氣

血為主雖有他病當從未治

滕千兵年逾五十臀患癰膿熟不開攻通大肛膿從大便而出辭不能治果斃丹溪云臀居小腹之後陰中之陰也道遠位僻血亦罕周中年後尤慮患此況膿成不刺欲不亡得乎

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷五十四

錢塘魏之琇玉横撰

囊癰

薛立齋治一男子囊癰未作膿而腫痛以加味龍胆瀉肝湯二劑少愈更以四物湯加木通知母黃柏而愈一男子煩腫痛甚小便澁發熱脉数以龍胆瀉肝湯倍用車前子木通茯苓四劑勢去其半仍以前湯止加黃柏金銀花四劑又減二三便利如常惟一處不消

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

此欲成濃也再用前湯加金銀花白芷角刺六劑微腫痛脉滑数乃膿已成令針之腫痛悉退投滋陰托裹藥及紫蘇末敷之愈

一膏粱之客陰囊腫脹小便不利此中焦積熱乘虛下注先用龍胆瀉肝湯加黄柏牛膝四劑漸愈後用補陰八珍湯加柴胡山庇而愈後不守禁忌前症復作仍用補陰八珍湯補中益氣湯六味丸而痊又因勞倦發熱自用四物知柏之類虛症悉具瘡口大開此五臟氣血俱虛也朝用補中益氣夕用六君當歸各五十餘劑瘡口始斂又用六味丸調補而愈

知州王汝道先晡熱發熱肢體倦怠入房則腿足痠軟足心熱至腿膝六脉洪数兩尺為甚此足三陰虛欲滋補化源彼反服苦寒降火之劑後陰囊腫脹用治疝之藥腫脹益甚形氣愈虛服温補之劑腫痛上攻小便不利兩尺脉洪按之虛甚曰此囊癰也因氣血虛而不能潰先用補中益氣湯加山藥山萸車前柴胡山庇一劑腫脹頓消隨用六味丸料加車前牛膝柴胡山庇一劑小便漸通乃用活命飲與前二藥消息無用至二十餘劑囊裂出穢膿甚多乃用托裡消毒散六劑膿穢穢清又用托裏散數劑膿水漸少更

用補陰托裏散及十全大補五十餘劑而瘥

府庠李達卿素腎虛發熱久服知柏之類形體漸瘦遺精白濁晡熱唾痰此腎水虧損虛火內熾用補中益氣之類加五味麥冬前症將愈又別用清熱凉血之劑飲食少思唾痰不止此脾氣復損不能攝涎歸源仍用前湯加茯苓半夏而愈後入房頭暈吐痰腰骨作痛大小便道聲痛此精已耗而復竭所致危殆之症也遂用朝前湯加麥冬五味夕用六味丸料加五味蓴蘑五十餘帖諸症頓退後又入房陰囊陰莖作痛別用泛滲之劑陰囊內潰乃用補陰托裡之劑出膿甚多喜腫消痛止竟不善調養致大便不通小便如淋痰涎上涌此腎虛之症復作矣誠為可慮有保其可生者用礞石滾痰丸牛黃清心丸之類吐痰愈加曰非惟無以保其生而反促其危矣辭不治果歿

一男子患此腫痛發熱以小柴胡湯加黃連青皮四劑少愈更以加減龍膽瀉肝湯而消

一男子膿熟作脹致小便不利令急針之以小柴胡湯加黃柏白芷銀花四劑少愈更以托裡散消毒數劑而瘥

一男子囊腫狀如水晶時痛時痒出水小腹按之作水

聲小便頻數脉遲緩此醉後飲水入房汗出遇風寒濕毒乘聚於囊為患名水疝也先以導水丸二服腹水已去小便如常再飲胃苓散倍苓术更用氣針引去聚水而痊

一男子患久而不斂以十全大補湯加五味子麥冬炙以豆豉餅月餘而平

一弱人腫痛未成膿小便赤澁以襲甘草青皮木通黃柏當歸麥冬四劑少愈以清心連子飲而消

一男子病勢已甚脉洪大可畏用前湯二劑腫少退以仙方活命飲二劑痛少止脉之滑數乃膿已成須針之否則囊皆潰不信遂更他醫果大潰罨丸挂懸復求治診之脉將靜以八珍湯加黃耆知柏山庖更敷紫蘇未數日而痊此症勢雖可畏多得保全患者勿懼

一弱人膿熟脹痛大小便秘急針之膿出三椀許即鼾睡覺而神思少健但針遲雖敷解毒藥亦潰盡矣故用托裡藥三十餘劑始痊大抵此症屬陰道虧濕熱不利所致故滋陰除濕為要常治腫痛小便秘澁者用除濕為主滋陰佐之腫痛退便利和者除濕滋陰相兼治之欲其成膿用托裡主滋陰佐膿成即針之

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

仍用托裡滋陰濕毒已盡者專用托裡如膿清或多或歛遲者用大補之劑及豆豉餅或附子餅灸之如虛武選封君年逾五十患此瘡口年餘不歛診之微有濕熱以龍胆瀉肝湯治之濕熱悉退乃以托裡藥及豆豉餅灸之而愈次年復患濕熱頗盛仍用前湯四劑而退又以滋陰藥而消若潰後虛而不補少壯者成漏老弱者不治膿清作渴脈大者亦不治

外科心法

朱丹溪曰癰疽入囊者予嘗治數人悉以濕熱入肺經施治而用補陰佐之雖膿潰皮脫睪丸挂懸皆不死

立齋治胡同知年踰五十陰囊腫痛得熱愈甚服蟠葱散等藥不應肝脈數此囊癰也乃肝經濕熱所致膿已成急針之以龍胆瀉肝湯脈症悉退更以托裡藥滋陰藥外搽杉木灰紫蘇末月餘而愈此症雖潰盡而無害患者審之

柏道官年六十餘陰囊已潰痛不可忍腎丸露出與龍胆瀉肝湯服之及敷前末不應意此濕氣熾盛先以槐花酒一椀仍以前藥少愈更以托裡加滋陰藥月餘而平設以前藥不應加之峻利未有不損中氣以致敗者也聘士陳時用沈汝和患此悉用前藥而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

實材治一人忽遍身拘急來日陰囊連莖腫大如斗六脈沈緊此陰疽也幸未服解毒涼藥若服之則莖與睾丸必皆爛去而死急令服救生湯五錢又一服全安

懸癰

薛立齋治一弱人穀道前結核如大豆許勞則腫痛先以十全大補湯去桂加車前麥冬酒炒黃柏知母少愈更服製甘艸漸愈即國老膏仍以四物車前之類而消一男子患此煩腫發熱以龍胆瀉肝湯二劑及製甘艸

四劑而潰再用滋陰之劑而愈若膿未成以葱炒熱敷上冷即易之隔蒜灸之亦可數日不消或不潰或潰而不斂以十全大補湯加柴胡梢為主間服製甘艸並効若不保守必成漏矣

一男子患懸癰服坎離丸及四物知柏之類不應脈浮洪按之微細以為足三陰之虛用托裡散及補陰八珍湯漸愈又用六味丸補中益氣湯調補化源年半而痊大凡瘡瘍等症若腎經火氣亢盛致陰水不能生化而患陰虛發熱者宜用坎離丸取其苦寒能化水中之火令火氣衰而水自生若陽氣衰弱致陰水

不能生化而患陰虛發熱者宜用六味丸取其酸溫能生火中之水使陽氣旺而陰自生況此症屬腎經精氣虧損者十有八九屬腎經陽氣亢盛者十無一二然江南之人患此者多屬脾經陰虛虧損元氣下陷須用補中益氣湯升補陽氣使陽生而陰長若嗜慾過多虧損真陰者宜用六味丸補腎經元氣以生精血仍用補中益氣湯以培脾肺之生氣而滋腎水經云陰虛者脾虛也但多認為腎經火症用黃柏知母之類復傷脾肺絕其化源反致不起惜哉

通府張敬之患懸癰久不愈日晡熱甚作渴煩而喘或

用四物湯知柏之類病益甚肢體倦少食大便不實小便頻數問何故曰此脾虛之症前藥復傷而然遂用補中益氣加茯苓半夏數劑飲食漸進症漸愈更加麥冬五味調理乃痊經曰脾屬太陰為陰土而主生血故東垣云脾虛元氣下陷發熱煩渴肢體倦怠等症用補中益氣湯以升補陽氣而生陰血若誤認為腎虛火盛而用四物知柏之類反傷脾胃生氣是虛其虛矣況知柏乃瀉陽損陰之劑若非膀胱陽火盛而不能生陰水以致發熱者不可用也

魏玉橫治江雲溪兄初春患痔即令服一炁湯加減不

信致卧牀月餘遂成管冬月復患懸癰初時如大豆半月來大如雞卵按之甚痛行動有妨幸未服藥脈之惟左関尺畧大而微數此膿尚未成也仍與一氣湯加減大生地麥冬北沙參甘杞子生米仁蔞仁丹皮蒂丁等令服八劑二劑知四劑消其半八劑完而全愈

立齋治尚寶鮑希傳足發熱服四物黃柏知母之類年餘患懸癰唾痰作渴飲湯其熱至膝更加芩連二陳熱痰益甚問故曰此足三陰虧損水泛為痰寒涼之劑傷胃而甚耳遂朝用補中益氣夕用六味丸間佐以當歸補血湯半載而愈

上舍劉克新潰後作痛發熱口乾小便赤澁自用清熱消毒之藥不應左尺洪數此陽氣盛而陰氣虛也先用四物湯加知柏等諸劑瀉其陽氣使陰自生數劑諸症漸愈後用益氣湯地黃丸補脾肺滋腎水而愈

一儒者小便赤澁勞則足軟腫痛發熱口乾舌燥食少體倦日晡益甚此氣血虛而未能潰也遂用八珍加麥冬山藥倍用製甘草數劑諸症悉退但患處腫痛此膿內熾也又五劑膿自涌出又五十餘劑而瘡口將完又因勞役且停藥寒熱作渴腫痛膿多用補中

益氣湯加炒卮二劑少愈又以八珍湯加麥冬五味百餘劑腫痛悉去喜其慎氣居節飲食常服補劑而安但勞則出膿一二滴後感於他言內用降火外用追蝕必其收斂致患處大潰幾至不起仍補而愈

一男子腫痛小便赤澁以加減龍胆瀉肝湯加製甘草二劑少愈以參耆歸朮知柏製甘艸四劑而潰以四物湯加知柏參耆製甘艸而痊

一男子膿清不斂內有一核以十全大補湯加青皮柴胡製甘草更以豆豉餅灸之核消而斂

一男子久而不斂脈大而無力以十全大補湯加五味麥冬灸以豆豉餅灸之而愈

一老人年餘不斂診其脈尚有濕熱以龍胆瀉肝湯二劑濕退乃以托裡藥及豆豉餅灸之而愈

一男子腫痛發熱以小柴胡湯加黃連青皮四劑少愈更以加減龍胆瀉肝湯而消

一男子膿熟不潰脹痛小便不利急針之尿膿皆利更以小柴胡湯加黃柏白芷金銀花四劑痛止以托裡消毒四劑而愈常見患者多不肯用針待其自破殊不知緊要之地若一有膿宜急針之使毒外發不致內潰故前人云凡瘡若不針烙毒結無從而解膿瘀

無從而泄又云宜開戶以遂之今之患者反謂地部緊要而不用針何其悖哉

一男子膿熟不潰脉數無力此氣血俱虛也欲治以滋陰益血之劑更針之使膿外泄彼不從仍用降火敗毒藥致元氣愈虛瘡勢愈盛後潰不斂竟至不救夫懸癰之症原係肝腎二經陰虛雖一於補猶多不治況膿成而又剋伐不死何俟常治初起腫痛或小便赤澁先以製甘艸一二劑及隔蒜灸更飲龍胆瀉肝湯若發熱腫痛者以小柴胡湯加車前黃柏芎歸膿已成即針之已潰者用八珍湯加製甘艸柴胡梢酒炒知柏小便澁而脉有力者仍用龍胆瀉肝湯加甘艸小便澁而脉無力者用清心蓮子飲加製甘艸膿清不斂者用大補之劑閒以豆餅灸之久而不斂者用附子餅灸之並效

一男子患此煩痛發寒熱以小柴胡湯加製甘艸二劑少退又製甘艸四劑而消大抵此症屬陰虛故不足人多患之寒涼之劑不可過用恐傷胃氣惟製甘艸一藥不損氣血不動臟腑其功甚捷最宜用之不可忽也

馬銘鞠治詵公武患跨馬癰外勢不腫毒內攻膿多瘡

口甚小突出於指大一塊觸之痛不可忍多飲寒劑外敷涼藥毒內攻胃氣俱損令盡去圍藥洗淨瘡口但用一膏藥以護其風用大劑黃耆山藥生地白芷牛膝米仁銀花襍以健脾藥十餘劑膿盡再數劑肉長突出者平矣後服六味丸加許精神始復廣筆記

立齋治黃吏部穀道前患毒燉痛寒熱此肝經濕熱所致名曰懸癰屬陰虛症先以製甘艸二服頓退再以四物加車前子青皮甘艸節酒製知柏數服而消

一男子年逾五十患懸癰膿清肝腎脈弱此不慎酒色濕熱壅滯也然膿清脈弱老年值此何以收斂況穀道前為任脉發源之地肝經宗筋之所辭不治後果死嘗治此癰惟潤水製甘草有効已破者兼以十全大補湯為要法

柴嶼青以省覲舟行舟子患騎馬癰哀號痛楚憐而治之先用大歸湯十餘劑外貼回生膏日令其以藥水勤洗繼服十全大補湯因貧人無力購參攙有扁黨參結以半斤始備藥又用玉蟾生肌散人參末敷患處調理月餘而愈

疝癖

一名便毒一名便毒一名瘡子

一名血疝又俗名一石米瘡

薛立齋治一婦人拗中腫赤脹痛此膿內作用托裡消毒散加柴胡數劑潰而膿清寒熱乃氣血復虛用托裏散而寒熱止用十全大補百餘劑而瘥

一婦人腹拗腫痛寒熱口苦或時帶下此肝經濕熱不利也用龍胆瀉肝湯而腫痛消用加味逍遙散而寒熱退

一婦人腹拗腫痛小水不利時或胸乳作痛脇腹作脹此肝火氣滯四物加柴胡青皮元胡索木香而愈

一婦人拗中作痛小腹痞悶小便不利內熱體倦飲食少思此肝火內動脾胃受傷也用加味歸脾湯柴胡清肝散而安

一婦人拗中腫脹小腹作痛服下血之劑其痛益甚更吐瀉少食此肝脾復傷用六君子湯加升麻柴胡而愈

一婦人兩拗腫痛腹內一塊不時上攻月經不調小便不利此肝脾氣滯而血傷以四君加芎歸柴胡山梔而愈後因鬱怒前症復作兼胸滿腹脹盜汗此肝水甚而傷脾土也用加味歸脾湯下蘆薈丸而瘥

一婦人小腹內或作痛或痞悶兩拗腫痛內熱寒熱胸膈不利飲食不甘形體日瘦此肝氣滯而脾氣傷也

朝用補中益氣湯夕用蘆薈丸漸愈更用六味丸全愈

一婦人兩拗腫痛小腹痞脹白帶時下寒熱往來小水淋瀝此肝氣滯而血病用龍胆瀉肝湯漸愈又用加味逍遙散六味地黃丸全愈

一婦人患前症胸脇脹悶或小水不利或時腹痛此肝火氣病先用龍胆瀉肝湯以清肝熱又用加味逍遙散以生肝血六味地黃丸以滋腎水而愈

一婦人患前症以為肝脾鬱怒不信另服化痰利氣之劑胸腹愈脹又服峻利疎導之劑變脾虛發腫而歿

一婦人患前症內熱作渴飲食不甘肢體倦怠陰中作梗小便赤澁此脾經鬱結肝經濕熱用加味歸脾湯而愈後因怒復作小腹脹痛用小柴胡加山庖芎歸痛止又用加味逍遙散而愈

一婦人小腹痞悶溺澁內熱體倦懶食此肝火動而脾血傷也用八珍加柴胡山庖胆草而安

一婦人陰中如梗兩拗腫痛寒熱不食小便頻數小腹重墜此肝脾鬱怒所致先以補中益氣加茯苓山庖車前子青皮以清肝火卅脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱而愈

一婦人小腹內如有所結兩拗並人門俱腫小便淋澁經候不調內熱作渴飲食少思腹內初如雞卵而漸大脈洪數而虛左關尤甚屬肝胆鬱結之症也用加味歸脾湯肝火退而脾土健間以逍遥散下蘆薈丸而愈

一男子患便毒煽腫作痛大小便秘脈有力以玉燭散二劑頓退更以龍胆瀉肝湯四劑而愈

一男子已潰而痛不止小便秘澁此肝火未解也以小柴胡加黃柏知母當歸湯而瘡斂若毒未解而痛不止者須用活命飲

春元凌待之虛而服剋伐藥幾致危殆用托裡健脾藥而愈秀才王文遠因勞苦服之服小柴胡湯而表症散後用托裡藥膿成針之而自日愈又胡判官膿清脉弱以大補藥而已愈因新婚復發自用連翹消毒散致瀉利不止竟致不救可見此症屬不足者多矣非補不可大抵便毒屬肝經初起堅硬肝主筋故也五七日後當赤軟腫成故也若尚堅硬乃元氣不能腐化往往人見堅硬只欲內消反服攻散藥多致虛虛之禍前此治者即其驗也

魏玉橫治宋復華兄因勞頓患左拗腫硬漸如鵝卵或

與發散轉甚已半月足冷過膝面赤手亦冷惡寒夜熱口苦食懈脉之弦數曰此肝虛火盛也與生地杞子沙參麥冬丹皮蔞仁歸身紅花間入川楝川連羚羊牛蒡數劑寒熱退又十劑其腫硬及諸症全愈惟餘小塊如豆大未消彼以要務奔走勞碌復腫數日大如李其色赤而軟已成膿再與前藥即自潰而愈此症俗名一石米瘡言百日後可愈也即遇先輩如立齋其治法或未能如是雖然余非有過古人第知為肝腎病則不襍入他藥耳

立齋治一婦人素清苦因鬱怒患前症或用敗毒寒凉之藥反晡熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥此鬱氣傷脾因藥復損先以當歸湯數劑後兼逍遙散五十餘劑而愈

陳自明治一男子患便毒堅硬與神仙太乙丹一粒服之去後二次痛即止不日而消方見蠱門

立齋治一男子患此未作膿小便秘澁以八正散三劑少愈以小柴胡湯加澤瀉山卮木通二劑而消

一男子腫痛發寒熱以荆防敗毒散二劑而止以雙解散二劑而消

一男子膿未成大痛服消毒托裏內疎藥不應診之脈

洪大毒尚在以仙方活命飲一劑痛止又劑而消

一男子腫痛日晡發熱以小柴胡湯加青皮花粉四劑痛止熱退以神效瓜蔞散四劑而削

一男子腫而不潰以參耆歸朮白芷皁角刺柴胡甘草節數劑而潰以八珍湯加柴胡數劑而愈

一男子潰而腫而腫不消且不斂診之脈浮而濇以豆豉餅灸之更以十全大補湯月餘而愈

一男子潰而痛不止諸藥不應診之脈大按之則數乃毒未解也以仙方活命飲而止又二劑而斂

一男子服剋伐之藥以求內消致瀉利少食以二神丸先止其瀉以十全大補湯倍加白朮茯苓數劑而消大抵此症多患于勞役之人亦有內蘊熱毒而生者須辨虛實及成膿不可妄投藥餌常見治此症者概用大黃之類下之求內消或膿成令膿從大便出鮮有見其瘥也人多欲內消者蓋恐收口之難也若補養血氣不旬日而收矣何難之有若膿已成豈有可消之理如再用剋伐之劑反為難治

一男子不慎房勞患此腫痛以雙解散一服通之其痛即止更以補中益氣湯數劑而膿成針之以八珍湯加五味子麥冬柴胡三十餘劑而愈大便秘癰者血

疝也俗呼為便毒言於不便處腫毒故為便癰也乃足厥陰肝之經絡及衝任督脉亦屬肝之傍絡是氣血流通之道路今壅而腫痛此則熱毒所致宜先疎導其滯更以托裡之劑此臨症制宜之發法也

一老婦腫痛膿未作小便澁肝脉數以加減龍胆瀉肝湯加山卮黄柏四劑而消

張德俊灸便毒親曾取效云屢以灸他人皆驗以細草或軟筯一莖隨所患左右手量中指自手掌量中指自手掌盡處橫紋量起通三節至指盡處為則不量指甲截斷卻將此艸于手腕橫紋量起引艸向臂當中艸盡處即是穴也灸艾炷大如麥粒大灸三壯腫散痛止即時安

方百乙

繆仲淳親試治便毒甚驗綿地榆四兩白酒三椀煎一椀空心服雖有膿者亦愈如同穿山甲同患處者三片土炒引經更妙廣筆記

黄履素曰余家有女流患便癰兩坳腫痛不能起瘍醫

用敗毒藥十餘帖以圍藥逼之出腫痛愈甚予查薛氏外科樞要此症皆因鬱怒傷肝得之不三劑而腫痛減半六劑而愈孫文垣治吳翁年七十有三偶墜馬左脇作通隨治而愈後半年忽左胯腫痛增寒作熱諸治罔効或作疝氣投荔核大小茴香川楝橘核之類痛不可忍至欲引繩自絕診之六脉浮而洪數左尺尤甚驗其痛處紅腫如匏按之烙手此便毒也非因近色而得蓋胯屬厥陰肝經肝為血海乃昔時墜馬惡血消之未盡畜於經絡化而為膿年高氣虛又為香燥剋伐故痛且劇今其色青中隱黑膿成久矣乃令外科針之出青黑膿五六椀此俗名石米瘡也乃用內托十宣散加參耆三錢後加至五錢一日兩進兩月而愈

腿癱

薛立齋治一男子年逾二十稟弱左腿外側患毒三月方潰膿水清稀肌肉不生以十全大補湯加牛膝二十餘劑漸愈更以豆豉餅灸之月餘而痊

滁州於侍御髀甲患毒痛甚服消毒藥其勢未減即以梔花酒一服勢隨大去再以托裡消毒而愈

丁蘭年二十餘股內患毒日久欲求內消診其脉滑數
知膿已成曰氣血虛不潰遂刺之膿出作痛以八珍
湯治之少可但膿水清稀更以十全大補湯加炮附
子五分數劑漸愈仍服十全大補湯三十餘劑而瘥
一僧患股內腫一塊不痛不潰治以托藥二十餘劑膿
成刺之作痛謂腫而不潰潰而反痛此氣血虛甚也
宜峻補之彼云痛無補法曰正氣不足不可不補補
之則氣化而痛邪自除遂以參耆歸地白朮治之兩
月餘而平
一男子腿內患癰漫腫作痛四肢厥逆咽喉閉塞發寒

熱諸治不効乃邪鬱經絡而然也用五香連翹湯一
劑諸症少退又服之大便行二次諸症悉退而愈
一男子先腿痛後四肢皆痛遊走不定至夜益甚服除
濕敗毒之劑不應其脉滑濕痰而濇濁血為患以二陳湯
加蒼朮羌活桃仁紅花牛膝草烏治之而愈凡濕痰
濕熱及死血流注關節非辛温之劑開發腠理流通
壅道使氣行血和焉能得愈
上舍李通甫腿患癰作痛少食作嘔惡寒此痛傷胃氣
用六君子湯加當歸四劑疼痛少止飲食加進又以
十宣散加白朮茯苓陳皮數劑膿成針而出之又以

前散去防風白芷數劑而痊

一老人腿患癰自潰忽發昏瞀脉細而微此氣血虛極也以大補之劑而瘥

一男子患腿痛而不腫內亦便利調和用托裡榮衛湯數劑而消

一男子內股患毒腫硬痛甚而不作膿陽蒜灸五十餘壯勢退七八以仙方活命飲四劑而膿成用十宣散六劑膿潰而愈凡瘡大痛或不痛麻木灸之最良

一男子腿內側患癰未作膿而膿痛以托裡黃耆柴胡湯二劑少愈又二劑而消

一男腿外側患癰漫腫大痛以內托黃耆酒煎湯二劑少可更以托裡散數劑潰之而愈

一婦人腿癰久而不愈瘡口紫陷膿水清稀以為虛彼不信乃服攻毒之劑虛症蜂起復求治令灸以附子餅服十全大補湯百餘帖而愈凡瘡膿清及不飲者或陷下皆氣血虛極也最宜大補否則成敗症若更患他症尤難治療

一男子腿癰內潰針之膿出四五椀惡寒畏食脉診如絲此陽氣微也以四君子湯加炮附子一錢服之寒少止又四劑而止以六君子湯加桂數劑飲食頓進

乃以十全大補湯及附子餅兩月而愈

一男子患腿癱兼筋攣痛脉弦緊用五積散加黃柏柴胡蒼朮治之而全

一男子腿痛兼筋攣骨痛脉弦緊以大防風湯二劑攣少愈又二劑而腫消但內一處尚作痛脉不強緊此寒邪已去乃所滯瘀濁之物欲作膿故痛不止用托裡藥數劑腫發起脉滑數乃膿已成矣針之用十全大補湯月餘而安

一男子右腿赤腫燉痛脉沈數用當歸拈用痛湯四肢反痛乃濕毒壅遏又況下部藥難達非藥不對症遂砭患處去毒血仍用前藥一劑頃減又四劑而消

朱丹溪診東陽李兄子年逾三十形瘦膚厚連得憂患又因作勞且過於色忽足腿外側廉上紅腫其大如栗一醫問其大府堅實與承氣湯兩貼不効又一醫教以大黃硃砂生粉草麒麟竭又二三貼半月後名視之曰脉大實事去矣後果死

馬銘鞠治江都尹子九歲患腿癱治彌月勢漸盛按之堅如石幸兒氣厚可內消用牛膝米仁地榆生地牛蒡銀花連翹甘艸初劑加微藥利之即稍寬過兩劑加汗藥微汗之勢益寬至數劑取川山甲末五錢半

入煎半調藥送下兒善飲令兒一醉自此頓消半月地下行矣初一醫欲開刀為戒廣筆記

薛立齋治一男子患腿癰膿已成針之出二椀許飲以托裏藥一劑大發熱更以聖愈湯二劑而止翌日惡寒不食脉細如絲以人參一兩熟附子三片薑棗煎再服而愈但少食不寐更與內補黃耆湯而平

一男子腿腫發熱畏寒以補中益氣湯治之彼以為緩乃服芩連等藥熱愈甚復請治與人參養榮湯二十餘劑而潰更以參耆歸朮炙草肉桂又月餘而斂夫

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

火之為病當分虛實芩連苦寒能瀉心肺有餘之火若老弱或飲食勞倦而發者此為不足當以甘溫之劑治之未嘗有實熱而畏寒虛熱而喜寒者（琇按二語却未然此其驗

臁瘡　爛腿

薛立齋治一婦人患臁瘡因步履勞復惡寒發熱倦怠懶食而瘡出血此元氣虛而不能攝血歸經也用補中益氣湯而愈

周公謹曰辛酉夏余足瘍發於外臁初甚微其後浸淫

涉秋徂冬不良於行凡敷膏濯之劑嘗試畧盡痛痒
祲作大妨應酬一日友人俞和父見過怪其蹣跚舉
以告之和父笑曰吾能三日已此疾法當先以淡籠
水滌瘡口浥乾次用局方駐車丸研極細加乳香少
許乾糝之無不立効如其說用之數日良愈蓋駐車
丸本治血痢滯下而此瘡亦由氣血凝滯所成也東齊
野語

張子和治小渠索三因强人忽入家傷其兩脛外臁作
瘡數年不已膿血常涓涓然但飲冷則瘡閒冷水浸
淫而出延為濕瘡張曰爾中焦當有緑水二三升涎
數掬索曰何也曰當被盜時感驚氣入腹驚則胆傷
足少陽經也薰兩外臁皆少陽之部此胆之甲木受
邪甲木色青當有緑水少陽在中焦如滬既伏驚涎
在中焦飲冷水咽為驚涎所阻水隨經而旁入瘡中
故飲水則瘡中水出乃上涌寒痰汗如流水次下緑
水果二三升一夕而瘡痂乾矣

立齋治一室女年十七腿外臁忽腫起一紅點作痒搔
破日出鮮血如注及飛小蟲甚多審其由每先寒熱
兩耳下或結核蓋外臁耳下俱屬胆經胆為肝之腑
肝主風熱生蟲血得風而妄行肝火旺而血出其肝

肝陰陽俱虛矣凡病虛則補其母用六味丸滋腎水以生肝木四物柴胡山甲鉤藤生肝血以抑風熱而

瘡

陳湖陸樅忽誠素因陰虛過飲入房發熱腿痛似臁瘡用發表之劑兩腿腫黯熱氣如霧欲發瘡脉皆洪數兩尺尤大此屬足三陰虛酒濕所乘元氣損而邪益甚耳用十全大補加山藥山萸附子一劑脉症頓退去附子又二劑全愈

李絳記武元衡相國在西川且苦脛瘡煩痛不可堪百醫無効及到京城呼供奉石濛等數人療治無益有厭吏上此方用之便差其方云療多年惡瘡百方不差或痛煩走不已者並爛搗馬齒莧傅上不過三兩度愈（李絳兵部手集）

章宇泰傳治臁瘡方六即乳母試之神効松香一兩輕粉三錢乳香五錢細茶五錢四味共打成膏先將葱頭花椒煎湯熏洗淨用布攤膏厚貼患處以絹縛定（臁瘡筆記）

黃水流盡爛肉生肌廣立齋治陳儀部年逾五十兩臁生瘡日久不愈飲食失節或勞若或服滲利消毒之劑愈甚脾脉大而無力此脾虛而無濕熱也以補中益氣湯數劑少愈更以

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

六君子湯加蒼朮升麻神麴治之而愈嘗治下部生瘡燄痛或發寒熱或脚氣腫痛以人參敗毒散加楔柳紫蘇蒼朮黃柏並効久不愈者以回生散治之愈後以補腎丸補之庶不再發矣

搽菴小乘云臁瘡以淡鹽水滌瘡口浥乾次用局方駐車研極細加乳香少許乾糝之無不立効

王洪緒治馮悠也右足背連小腿轉彎處初因湯毒而成爛腿三十餘年其腫如斗孔可容拳有時出血以布圍填塞否則空痛時年七十有四令以老蟾破腹身刺數孔以肚襟填患孔蟾身覆之早晚煎葱椒湯温洗一次以蟾易貼用醒消丸早晚二服三日後取地丁大力鮮艸搗爛填孔外貼烏金膏日服醒消丸其四圍硬塊出水處以嫩膏加五美散敷其發痒者以白花膏貼內有硬塊如石者以生商陸搗爛塗孔內出血時先以參三七末糝之然後填藥如此二十餘日腫退痒止塊平黑肉漸紅活孔亦收淺以止草填日以五寶散糝仍貼烏金膏因老人精神不衰飲食不減始終不用補而收功

蔣仲芳治胡明甫年五十餘患臁瘡三載沿皮瘙癢微腫色紫黑用膏藥蓋之則流水鞋襪盡濕去膏藥即

又燥烈痒痛難忍此濕熱下流也人但知燥濕清熱解毒而不知濕熱之原從脾家下陷耳遂用補中益氣湯升舉其氣更加黃柏清熱蒼朮燥濕茯苓澤瀉利水蓋治濕不利小便非其治也外用陳石灰調側柏汁以燥濕散瘀清熱稍加火酒為從治敷之明日瘡乾數日而愈外法妙治

脫疽

謂疔生于手指者名蛀節疔重者腐去本節輕者筋攣

一男子足指患脫疽燄痛色赤發熱隔蒜灸之更以人參敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黃痛止又十宣散去桔梗官桂加花粉銀花數劑而瘥

一男子足指患之色紫不痛隔蒜灸五十餘壯尚不知痛又明灸百壯始痛更投仙方活命飲四劑乃以托裡藥潰脫而愈心法中韓判官症同灸同乃以敗毒散加銀花白芷而愈

一男子足指患之大痛色赤而腫令隔蒜灸至痛止以人參敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黃而潰更以仙方活命飲而瘥此症形勢雖小其惡甚大須隔蒜灸之不痛者宜明灸之庶得少殺其毒蓋因膏粱厚味酒麪灸煿積毒所致或不慎房勞腎水枯竭或服丹石補藥致有先渴而後患者有先患而後渴者皆

腎水涸不能制火故也初發而色黑者不治赤者水未涸尚可若失解其毒以致肉死色黑者急斬去之緩則黑延上足必死此患不問腫潰惟隔蒜灸有効亦有色作痛而自潰者元氣未脫易治夫至陰之下血氣難到毒易腐肉藥力又不易達況所用皆攻痛之藥未免先於腸胃又不能攻敵其毒不若隔蒜灸并割去最為良法故孫真人云在指則截在肉則割即此意也

一男子脚背患此赤腫作痛令隔蒜灸三十餘壯痛止以仙方活命飲四劑而潰更以托裡消毒藥而愈

一男子足指患之色赤燉痛作渴隔蒜灸數壯服仙方活命飲三劑而潰更服托裡藥及加減八味丸潰脫而愈

一男子足指患之色黑不痛令明灸三十餘壯而痛喜飲食如常謂急割去之速服補劑彼不信果延上遂致不救

一男子脚背患之色黯而不腫痛煩躁大渴尺脉大而澁此精氣已絕不治後果然

楊太僕年逾四十左足大指赤腫燉痛此脾經積毒下注而然乃脫疽也喜色赤而痛以人參敗毒散去人

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

參桔梗加銀花白芷大黃二劑更以瓜蔞銀花甘艸節四劑頓退再以十宣散去桔桂加銀花防已數劑而愈

一膏粱人年逾五十患此色紫黑脚煩痛孫真人云脫疽之症急斬去之毒延腹必不治色黑不痛者亦不治喜其飲食如故動息自寧為瘡瘍善症也尚可治遂以連翹消毒散六劑更以銀花甘艸節瓜蔞二十餘劑患指潰脫再以芎歸地連翹銀花白芷二十餘劑而愈

一匐蒭左足指患一泡麻木色赤次日指黑五日足黑冷不知疼痛脉沈細此脾胃受毒所致以飛龍奪命丹一服翌日令割去足上死黑肉割後骨始痛可救遂以十全大補湯治之而愈蓋死肉乃毒氣盛而拒截營氣所致況至陰之下氣血難達經云風溼未疾即此是也向若攻伐之則邪氣愈盛乘虛上侵必不救

多骨疽

薛立齋治舉人于廷器腿患流注年餘出腐骨少許午前畏寒午後發熱口乾唾痰小便頻數以為足三陰

虧損朝用補中益氣湯夕用六味地黃丸料加歸耆
五味各三十餘劑外用豆豉餅諸症漸愈又以十全
大補之類喜其慎疾而愈
一儒者患附骨疽失於調補瘡口不斂日出清膿少許
已而長出三附骨其脉但數而無邪此氣血虛瘡結
膿管而不能愈紙以烏金膏日服十全大補湯而愈
上舍王廷璋患前症三年未愈肢體消瘦飲食難化手
足並冷大便不通手足陰冷此陽氣虛寒用補中益
氣湯八味丸及灸其患處而痊
一男子臂患流注出腐骨三塊尚不斂發熱作渴脉浮
大而濇乃氣血俱損須多服生氣血之劑庶可保全
彼惑於火尚未盡仍用凉藥內服外敷幾危始求治
其形甚瘁其脉愈虛先以六君子湯加芎歸月餘飲
食漸進以八珍湯加肉桂三十餘劑瘡色乃赤更以
十全大補湯外以附子餅灸之僅年而痊醫林集要
云骨疽乃流注之敗症也如用凉藥則內傷其脾外
氷其血脾主肌肉脾氣受傷飲食必減肌肉不生血
為脉絡血受氷則氣血不旺而愈滯宜用理脾健脾
則肉自生而氣自運行矣又有白虎飛　留連周期
或展轉數歲冷毒朽骨出盡自愈若附骨腐者可痊

正骨腐則為終身廢疾矣有毒自手足或頭面腫起或無疼痛上至頸項骨節去處如瘍癤貫珠此風濕流氣之症也宜以加減小續命湯及獨活寄生湯治之有兩膝腫痛起或至遍身骨節疼痛者此風濕痺又名歷節風宜用附子八物湯治之又有結核在項腋或兩乳傍或兩脇軟肉處名曰瘭癤癰屬冷症也又有小兒宿痰失道致結核于頸項臂膊胸背之處亦冷症也俱用熱藥敷貼已上諸症皆緣於腎腎主骨堅虛則骨冷而為患也所謂骨疽皆起于腎亦以其根於此也故用大附子以補腎氣腎實則骨有生氣而疽不附骨矣

附骨疽

王宵堂治一人患附骨疽膿熟不能洩潰而入腹精神昏憒粥藥不入醫無所措診之脉細如蛛絲氣息奄奄曰無傷也用針刺其腹膿大洩然皆清稀若蟹吐沫在法為透膜不治用參耆附子加厥陰行經之藥大劑飲之又服八味丸食大進升餘肉數斛旬日而平所可治者潰瘍之脉洪實者死微細者生病脉相合故可治也刺腹者膿不洩必內攻按之知其瘡深

即刺無害所以不透膜八味補腎腎氣旺而上升胃口開而納食凡洩膿既多刀圭之藥其何能濟遷延遲久且有他患故進開胃之藥多食肉以補之肌乃速生此治潰瘍之大法

薛立齋治一男子腿根環跳穴患痛徹骨外皮如故脉數而滑滑此附骨疽膿將成也用托裡藥六劑腫起作痛脉滑數其膿已成針之出椀許更加補劑月餘而瘳

一男子患附骨疽腫硬發熱骨痛筋攣脉數而沈用當歸拈痛湯而愈

張景岳治一人年三十餘素多勞忽患環跳疼痛數月後大股漸腫曰此附骨疽也當速治與活命飲二帖未効而腫益甚因混投清火解毒遂致嘔惡發熱飲食不進勢甚危後求治與參耆內托散大加炮薑數劑而嘔止食進其腫軟熟知其膿成針之膿不多復與九味異功煎遂大潰且瓣瓣出膿潰者五六處腿肉盡去止存皮骨矣潰後復嘔發熱不食以十全大補湯九味異功散相間與之熱漸退食漸進然足筋短縮但可豎膝仰卧左右挨緊毫不能動二則痛極自分已成廢人凡用十全大補八十餘劑人參三觔

乃肉生筋舒如故

一人年近三旬素不節慾忽患環跳穴瘡痛月餘張曰此最可畏恐生癩毒不信或謂筋骨痛常事耳不過風熱使然與散風清火藥至半年後果微腫復求治曰速用托補以救根本尚不遵也又不信謀之瘍醫曰豈有腫瘍未潰遽可温補耶復用清火清毒之劑及大潰而危再延視則脉症俱敗悔無及矣

一膏粱子年三旬素眈酒色亦患前症令早服藥孰拗不從及腫而膿成令速針之不肯偏信庸流敷以苦寒解毒之藥不知膿已成猶何毒之可解但有愈久愈深直待自潰元氣盡去不可收拾耳

立齋治地官李孟卿環跳穴患疽內服外敷皆敗毒寒劑因痛極刺之膿瘀大瀉瘡口開張其色紫黯右關脉浮大此胃氣復傷不能榮於患處也以豆豉餅六君子加藿香砂仁炮薑數劑由是胃氣醒而飲食進患處暖而肌肉漸生再以十全大補湯而愈

大尹都承慶患附骨疽內痛如錐外色不變勢不可消喜其未用寒劑止因痛傷胃氣而不思飲食用六君子湯治之飲食少進更以十全大補二十餘劑而膿成針去仍以大補湯倍用參耆歸朮加麥冬五味遠

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

志貝母數服膿漸止而瘡亦愈

一儒者左腿微腫肉色如故飲食少思此真氣虛而濕邪內襲也蓋諸氣皆稟於胃法當助胃壯氣遂用六君加藿香木香當歸數劑飲食漸進更以十全大補元氣復而愈

一儒者兩腿腫痛肉色不變惡寒發熱飲食少思肢體倦怠胖氣不足濕痰下注也以補中益氣加半夏茯苓白芍二劑寒熱退而腫痛消又十餘劑脾胃壯而形體健

一男子因貿重飲食失節胸悶作痛誤認為瘡毒服大黃等藥右腿股腫肉色如故頭痛惡寒喘渴發熱脈洪大而無力此勞傷元氣藥損胃氣而然耳用補中益氣湯四劑又用十全大補湯數劑喜其年少而愈

一婦人患附骨疽久而不斂致腿細短軟脈來遲緩以十全大補湯加牛膝杜仲及附子餅灸之兩月餘而愈凡膿潰之後脈澁遲緩者易愈以其有胃氣故也脈來細而沈時直者裏虛欲變症也若煩痛尚未痊也洪實粗散者難療以其正氣虛而邪氣實也

一婦人環跳穴作痛肉色不變脈緊數此附骨疽也膿未成用內托黃耆酒煎湯加青皮龍胆草山甲數劑

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

而消

一婦人患附骨疽久不愈膿水不絕皮膚瘙痒四肢痿軟以為虛欲補之彼惑為風疾遂服祛風藥竟致不起陳無擇云人身有皮毛血脉筋膜肌肉骨髓以成其形內則有心肝脾肺腎以主之若隨情妄用喜怒勞佚致內藏精血虛耗使皮血筋骨肉痿弱無力以運動故致痿躄狀與柔風脚氣相類柔風脚氣皆外所因痿則內藏不足所致也

山西曹主簿年逾四十夏間患附骨癰服托裡藥而愈至秋飲食少思痰氣壅盛口舌生瘡用八味丸治之而愈

一老人腿患附骨疽腫硬大按方痛口乾脉弱腫聚不潰飲食少思謂腫下而堅者發於筋骨皮色不變者發於骨髓遂以參耆等藥托之三十餘劑膿雖熟不穿謂藥力難達必須針刺不聽至旬日方刺之涌出清膿五六椀許然衰老之人氣血不足養毒又久竟不治大抵瘡疽旬日不退宜托之有膿刺之有腐肉取之虛則補之此十全之功也

王上舍患附骨疽畏針不開臀膝通潰脉數發渴煩躁時嗽飲食少思齊氏曰瘡瘍煩躁時嗽腹痛渴甚或

瀉利無度此惡症也膿出之後若脉洪数難治微濇遲緩易治遂刺之膿出四五椀許即服大劑參朮歸朮翌日脉稍斂更以八珍湯加五味麥冬肉桂白斂三十餘劑脉緩膿稠三月而愈

補遺

補脫疽案後

海山驕淫益無度强并民居田宅婦女竟占山亖東之半陸宣子者山東名醫也有富室妾足小指生瘡狀類細米瘡頭早白垠如熟棗臟腑挈挈欲墮聞平湖名延之視曰此粟米瘡也與人同瘡等七日毒上升遍體腐爛成黑水死矣君欲生之當急斷其指斷之愈海山亦生是瘡屬宣子視宣子仍前言海山大怒欲殺之楚人丁緒章以外科有名出入禁內海山遜之至告以宣子諸且曰丁公視我瘡無恙吾必殺之緒章熟視曰嘻殺我可也何尤宣子為今已過三日毒上升矣公欲活即斷郤尚可海山瞋目曰其然三問應聲如響海山喟然曰我命在公矣顧左右取截刀伸足曰斬左右戰慄海山怒罵使斬遂斷一腿緒章手提海山髮倚柱坐海山面黃氣絕緒章亦如木偶人僵立既定緒章曰可速召前醫者宣子至視其

地一腿尚自起跳躍黑血淋漓命取人參一觔濃煎灌其口少頃海山甦顧其足曰嗟乎刖足刑已重矣余何辜而刖至郝幸公活我我今庶幾其無患閱四十九日而右郝毒發復生人面瘡醫曰不可再活矣海山不數日死所奪民家產皆散去其兄乃乞食如初

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷五十五

錢塘魏之琇玉橫撰

時毒

此症感四時邪毒之氣其候發于鼻面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根寒熱頭痛狀如傷寒

少宰李蒲汀患時毒用發散之藥耗損元氣患處不消體倦惡寒食少口乾用益氣湯加桔梗及托裡消毒散而愈

秋官陳同野患時毒元氣素弱脈微細而伏此形病俱虛也用參朮芎歸陳皮柴胡升麻炙草以升舉陽氣

用牛蒡元參連翹桔梗以解熱毒二劑腫損消而脉亦復矣苟以脉微細為屬陰以腫赤為屬陽而藥之祥旨不英个

濃青　青當作清

後腫赤不消食少體倦膿青色白乃脾肺氣虛也先用六君加桔梗芎歸後用益氣湯加桔梗以解熱毒二劑腫損消而脉

春官袁谷虛之妹表散過度腫硬不食脉浮大按之而短此真氣絶也辭不治後果殁

一男子患此腫痛發熱作渴脉實便秘以五利大黄湯下之諸症悉退以葛根牛蒡子湯四劑而愈

一男子表裡俱解腫痛尚不退以葛根升麻湯二劑而消

一男子腫痛發寒熱脉浮數以荆防敗毒散二劑少愈以人參敗毒散二劑勢減半又二劑而痊

一男子耳面赤腫作痛咽乾發熱脉浮數先以荆防敗毒散二劑勢退大半又以葛根牛蒡子湯四劑而痊

一婦人表邪已解腫尚不消診之脉滑而數乃瘀血欲作膿也以托裡消毒散潰之而愈

一男子煩腫脹痛作渴煩熱便秘脉數按之尤實用防風通聖散一劑諸症頓退以荆防敗毒散加元參牛

用牛蒡元參連翹桔梗以解熱毒二劑腫損消而脉亦復矣苟以脉微細為屬陰以腫亦為屬陽而藥之鮮有不誤者

一婦人時毒潰後腫赤不消食少體倦膿青色白乃脾肺氣虛也先用六君加桔梗芎歸後用益氣湯加桔梗而斂

春官袁谷虛之妹表散過度腫硬不食脉浮大按之而短此真氣絕也醉不治後果歿

一男子患此腫痛發熱作渴脉實便秘以五利大黃湯下之諸症悉退以葛根牛蒡子湯四劑而愈

一男子表裡俱解腫痛尚不退以葛根升麻湯二劑而消

一男子腫痛發寒熱脉浮數以荊防敗毒散二劑少愈以人參敗毒散二劑勢減半又二劑而痊

一男子耳面赤腫作痛咽乾發熱脉浮數先以荊防敗毒散二劑勢退大半又以葛根牛蒡子湯四劑而痊

一婦人表邪已解腫尚不消診之脉滑而數乃瘀血欲作膿也以托裡消毒散潰之而愈

一男子煩渴煩熱便秘脉數按之尤實用防風通聖散一劑諸症頓退以荊防敗毒散加元參牛

蒡黃各二劑而愈

一老人冬月頭面耳項俱腫痛甚便秘脈實此表裡俱實病也飲防風通聖散不應遂起患處出黑血仍投前藥即應又以荊防敗毒散而瘳蓋前藥不應者毒血凝聚上部經絡藥力難達故也惡血既去其藥自效或拘用寒遠寒及年高畏用硝黃而用托裡與夫尋常之劑或不起泄其毒專假藥力鮮不危矣

一男子表裡俱解惟腫不消以托裡消毒散四劑膿成針之而愈

一婦人腫痛用硝黃之劑攻之稍緩翌日復痛診之外邪已退此瘀血欲作膿也用托裡消毒散潰之而愈

一男子頭面腫痛服硝黃敗毒之劑愈甚診之脈浮數邪在表尚未解用荊防敗毒散二劑勢退大半更以葛根牛蒡子湯四劑而痊內經曰月半以上腫天之氣也月半以下腫地之氣也乃邪客心肺之間上攻頭目而爲腫此感四時不正之氣為患與夫膏粱積熱之症不同硝黃之劑非大便秘實不可用若不審其因不辨其虛實表裡緊用攻之必致有誤常見饑饉之際芻莞之人多患之乃是胃氣有損邪氣從之為患不可不察常治邪在表者用葛根牛蒡子湯人

參敗毒散或普濟消毒飲子邪在裡者五利大黃湯
屑子仁湯表裡俱不解者防風通聖散表裡俱解而
腫不退者犀角升麻湯如腫甚者砭患處出惡血以
泄其毒或用通氣散取嚏以泄其毒十日外自愈若
嚏出膿血即愈欲其作膿者用托裡消毒散欲其收
裡也以大黃湯下之裡症悉退以葛根牛蒡子湯浮
腫亦消惟赤腫尚存更以托裡藥潰之而愈齊氏云

時毒者為四時邪毒之氣而感之於人也其候發于
鼻面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根令人壯寒發
熱頭痛或肢體痛甚者恍惚不寧咽喉閉塞昧者將
謂傷寒便服解藥一二日腫氣增益方悟始求瘍醫
原夫此疾古無方論世俗通為丹瘤病家惡言時毒
切恐傳染考之于經曰人身忽經變赤狀如塗丹謂
之丹毒此風熱惡毒所為與夫時毒特不同耳益時
毒初狀如傷寒五七日間乃能殺人治者宜精辨之
先診其脈滑數浮洪沈緊弦濇皆其候也益浮數者
邪氣在表也沈濇者邪氣深也氣實之人忌服化毒

丹以攻之熱實不利大黃湯下之其有表症者解毒升麻湯以發之或年高氣輭者五香連翹湯主之又于鼻內嗑通氣散取十餘噦作效若嗑藥不噦者不可治如噦出膿血者治之必愈左右看病之人每日用嗑藥噦之必不傳染其病人每日亦用噦藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也經三四日不解者不可大下猶宜和解之眼犀角連翹散之類至七八日大小便不通利頭面腫起高赤者可服托裡散黃者散宜針鏃砭割出血泄其毒氣十日外不治自愈也此病若五日以前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭不腫食不知味者必死治之無功矣然而此疾有陰有陽有可汗有可下常見粗工但云熱毒就用寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審也

徐考功年踰三十耳面俶腫寒熱拘急脈浮洪此時毒症也邪在表以荊防敗毒散加牛蒡元參治之漸愈更以升麻葛根連翹桔梗川芎銀花牛蒡而平復

疔

羅謙甫云丙午歲予居藁城人多患疔瘡縣尹董公謂予曰今歲患疔瘡者極多貧民無力醫治近于史侯

處得數方用之者無不效官給藥錢君當捨手治之
遂諾其語董公牓示通衢命余施藥如此一年全活
甚衆其用保生錠子千金托裡散神聖膏藥破棺丹
凡四方保生錠金脚信二錢雄黃三錢輕粉二錢研
砂三錢麝香錢半巴豆四十九粒蟾酥一錢為細末
用黃蠟五錢溶開將藥和成錠子冷水浸少時取出
捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開每用一餅次用神
聖膏藥當歸藁本各半
兩乳香沒藥各二錢白芨琥珀各二錢半黃丹二兩
白膠香三兩黃蠟二兩粉霜一錢木鱉子五十箇去皮
巴豆十五粒去油清油槐柳枝各百廿枝膽礬一錢先
將槐柳枝下在油內熬焦取出復下餘藥熬勿至焦
濾出待油澄清下黃丹再熬成膏用絹帛攤之立有神效
托裏散一兩五錢耆朴芎防各二兩桔梗一兩翹芍
二兩二錢桂草各一兩參歸木香乳香沒藥各半兩
細末每服三錢酒一大盞煎二三沸和渣溫服破棺
丹大黃二兩半生半熟甘草芒硝各一兩細末蜜丸
彈子大每服半丸食後溫酒化下或童便半盞研化
之忌冷水

薛立齋治上林陳靜湎面患疔脈洪數有力屬邪氣蘊結用清熱消毒散二劑未應或用黃耆肉桂等藥二劑而目啓口俱腫閉頭面如斗由邪氣似誤補之致耳目昏聾按之無力由元氣內虛也連進托裡消毒之藥及數砭患處出黑血梳許已而膿與腐肉併潰而出復用托裡之藥瘡勢漸愈七日後復因調護失宜以致煩渴不食兩尺脈如絲欲絕急用八味丸料煎服其脈損復手足自温使非砭以泄其外托裡散以補其內八味丸以回其陽則治之失宜必致不救慎之慎之

前

長洲岸蘋子忠鼻梁患之症屬表邪但氣血俱虛不勝發散遂用補中益氣為主佐以防風白芷而愈

張所望治理安寺一僧患水疔走黃絕水穀者已三日衆莫能治延所望入視曰毒已入內柰何須下一針方可因向瘡頂刺入寸餘始聞痛聲曰生矣隨以膏塗之復投丹藥數粒拔其疔根錢許堅黑如鐵遂愈

錢塘縣志

薛立齋治一男子足患疔作痒惡心嘔吐時發昏亂脈數明炎二十餘壯始痛以奪命丹一服腫起更以荊防敗毒散而愈

薛立齋治上林陳靜滴面患疔脈洪數有力屬邪氣蘊結用清熱消毒散二劑未應或用黃耆肉桂等藥二劑反益其勢致耳目唇口俱腫閉頭面如斗由邪氣外實也前脉按之無力由元氣內虛也連進托裡消毒之藥及數砭患處出黑血椀許已而膿與腐肉併潰而出復用托裡之藥瘡勢漸愈七日後復因調護失宜以致煩渴不食兩尺脉如絲欲絕急用八味丸料煎服其脉頓復手足自温使非砭以泄其外托裡散以補其內八味丸以回其陽則治之失宜必致不救慎之慎之

長洲庠禟子忠鼻梁患之症屬表邪但氣血俱虛不勝發散遂用補中益氣為主佐以防風白芷而愈

張所望治理安寺一僧患水疔走黃絕水穀者已三日衆莫能治延所望入視曰毒已入內柰何須下一針方可因向瘡頂刺入寸餘始聞痛聲曰生矣隨以膏塗之復投丹藥數粒拔其疔根錢許堅黑如鐵遂愈

錢塘縣志

薛立齋治一男子足患疔作痒惡心嘔吐時發昏亂脈數明炎二十餘壯始痛以奪命丹一服腫起更以荊防敗毒散而愈

國立中醫藥研究所圖書館藏鈔本
國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

一男子患疔發熱煩躁脈實以清涼飲下之而愈

一男子胸患疔遍身麻木脈數而實意針出惡血更明炎數壯始痛服防風通聖散得利而愈

一男子左手背患之是日一臂麻木次日半體皆然神思昏憒遂明炎至二十餘壯尚不知痛又三十餘壯始不麻至百壯始痛以奪命丹一服腫始起更用神異膏及荊防敗毒散而愈

一老婦足大指患之甚痛令炎之彼不從專服敗毒藥致真氣虛而邪氣愈實竟至不救蓋敗毒散雖能表散瘡毒然而感有表裡所發有輕重體段有上下所稟有虛實豈可一概而用之即且至陰之下藥力所難到苟假藥力則緩不及事不若炎之為良故下部患瘡皆宜隔蒜炎之痛則炎至不痛不痛則炎至痛若炎之而不痛者宜明炎之及針疔四畔去惡血以奪命丹一粒入瘡頭孔內仍以膏藥貼之若針之不痛或無血者以針燒赤頻烙患處以痛為度或不痛眼黑如見火光者此毒氣入臟腑也不治若患在手足紅腫攻心腹者就于腫盡處刺去惡血宜服荊防敗毒散若腫近心腹者宜挑破瘡頭去惡水亦以膏藥貼之如麻木者服奪命丹如牙關緊急或唉內患

者並空嗡一二九凡人暴死多是疔毒用燈照看遍
身若有小瘡即是宜急灸之俟醒更服敗毒藥或奪
命丹人汗入肉食之則生疔瘡不可不慎
劉禹錫纂柳州救三死方云元和十一年得疔瘡凡十
四日益篤善藥傅之皆莫知長樂賈方伯教用蜣蜋
肉一夕而百苦皆已明年正月食羊肉又大作再用
亦如神效其法一味貼瘡半日許可再易血盡根出
遂愈蜣蜋心腹下度取之其肉稍白是也所以云食
羊肉又大作者蓋蜣蜋食羊肉故耳用時便禁食羊
肉其法蓋出葛洪肘後方也本草

韓光治疔腫人也正觀初衛州徐使君訪得此方用艾
蒿一撚燒作灰于竹筒中淋取汁一二合和石灰如
麵漿以針刺瘡中至痛即點之點三遍其根自拔亦
大神驗正觀中用治三十餘人得差故錄之千金方
繆仲淳治顧博士伯欽內人左耳患疔時方孕令先以
白藥子末雞子清調塗腹上護胎次以夏枯草甘菊
貝母忍冬地丁之屬大劑飲之一服痛止疔立拔胎
亦無恙白藥子療馬病者也廣筆記
馬銘鞠治顧聖符幼弟患髭疔醫者先用火針圍藥腫
脹至目與鼻俱隱入肉牙關緊急用患者耳垢鹽垢

刮手足指甲屑和勻如豆大放茶匙內燈火上炙少許取作丸令洗淨圍藥將銀簪挑開疔頭抹入外用綿紙一層津濕覆之痛立止半日腫半消目可開次日服仙方活命飲二劑愈此法甚可治紅絲疔長洲華承溪指節間患之得此而痊又云可治面白疔未破毒處一孔納鉞鏽求于內仍將皮蓋好少頃黑水流盡中有白絲如細線慢慢抽盡此疔根也盡即立愈又方用甘菊花并根葉搗汁以酒下之立消

廣筆記云用陳年露天錢繡猴如飛廻將金銀簪腳挑

薛立齋治劉貫卿脚面生疔形雖如粟其毒甚大宜峻利之藥攻之因其法弱以隔蒜灸五十餘壯痒遂止再灸片時乃知痛更用膏藥封貼再以人參敗毒散一服漸愈夫至陰之下道遠位僻且怯弱之人用峻利之藥則藥力未到胃氣先傷虛虛之禍有所不免不如灸之為宜

松江諸大尹唇生一疔已五日腫硬脈數煩燥喜冷此胃經積熱所致先以涼膈散一服熱去五六更與奪命丹二粒腫退二三再與荊防敗毒散四劑而愈

楊錦衣唇下生疔脈症俱實而不下反用托裡致口鼻

流膿而死是謂實實之禍

馬氏室忽惡寒作嘔肩臂麻木手心搔痒遂昏悶不自知其故與卒然暴發者不同但手有一泡此乃患疔毒也令急灸患處至五十餘壯而蘇又五十餘壯知痛投以荊防敗毒散而愈古人謂暴死多是疔毒急用燈照遍身若有小瘡即是此毒宜急灸其瘡但是胸腹温者可灸先君云有人因剥死牛脊問令看遍身俱有紫泡使急灸泡處良久遂甦更以敗毒藥而愈

張都憲夫人面生疔腫燉痛甚數日不潰脈症俱實以荊防敗毒散加芩連治之稍愈彼以為緩乃服托裡

一劑其勢愈甚痛極始悟再用涼膈散二劑痛減腫潰又與連翹消毒散十餘劑而愈

鄭氏舉家生疔多在四肢由皆食死牛肉所致刺去黑血更以紫金丹服之惡愈

王檢討汝和感疽毒面生疔十餘枚腫痛脈數以荊防敗毒散治之雖小愈尚可畏更以奪命丹一服而痊

陸宣子山東名醫也言京師李公子某指甲中生肉管赤色頃刻長三尺餘垂至地能動動則血眯欲死諸醫束手公子乃取酒痛飲引刀自斷之出血數斗良久復生如初自分死矣有乞兒自言能治台之肩大

蛇至顧罵諸醫者曰公子蛇頭疔也其管通四肢百骸絶則又出若輩何能為益乞兎初饒于財嘗患此破家求醫不可得遇一丐命其妻納大蛇袴中穴袴出蛇首握之與肉管相向蛇以氣吸之不移時而消蛇則紅然百道僵死矣乃如其法治之公子亦愈竟分其產之半與乞兒云 蔣湘帆

疣 附瘿

周漢卿治山陰楊翁項有疣如瓜大醉仆階下潰血不能止疣潰者必死漢卿以藥糝其穴血即止 明史

薛立齋治長洲庠王天爵辛丑春左腿近環跳穴患瘤狀如大桃按之濡軟恪服除濕流氣化痰之劑惡寒發熱食少體倦形氣俱虛脈洪大而虛氣溜也肺主之益肝屬木肺屬金肅發于膻經部分乃肺金侮肝木元氣虧損而其膿已內潰矣遂用十全大補湯數劑出青白稀膿甚多頓加寒熱煩渴頭痛殊類傷寒狀此因膿泄而血氣益虛耳仍用前湯其勢益甚脈洪數大按之如無乃加附子一錢其勢愈甚而脈復如初前此虛甚而藥不能及也更加附子二錢三劑諸症頓退乃朝用補中益氣湯夕用十全大補湯各

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

三十餘劑出腐骨五塊瘡口將完後因不慎起居患
處復潰諸症更劇咽間如焚口舌無皮用十全大補
加附子一錢服之諸症即愈二日不服內病悉至患
處復潰二年後又患服前藥不應診其尺脈微細如
絲此屬命門火衰用八味丸為主佐以十全大補湯
稍愈至乙巳仍患虛寒之症而歿

一男子左腿外側近臀腫一塊上有赤縷三年矣飲食
起居如常觸破涌出血膿發熱惡寒此膽經受症故
發于腿外側診其脈左尺洪數左關弦洪此腎水不
能生肝木用補中益氣湯六味地黃丸而痊

一老嫗石脛下生一瘤漸長至尺許其狀如長瓠子久
而潰爛一方士以長柄茶壺盧燒存性研末撚之水
出消盡而愈奇疾
方

繫瘤法芜花(根)淨洗帶温不得犯鐵器於水石罌中搗取
汁用線一條浸半日或一宿以綫繫瘤經宿即落如
未落再換綫不過兩次自落後以龍骨并訶子末傅
瘡口即合依上法繫妳痔累用得效繫瘤法禮沈良
方亦有用蜘蛛者然費力不如此徑捷如無根只用
花泡濃水浸綫亦得趙氏家妙嘗用以繫腰間一瘤
不半日即落亦不痛
方百乙

琇按芜花用之繫疣即落雄猛可知蟲門中孫文垣嘗用三分以治　氏婦立下其瘤苟非實積未可輕試

孫真人治癭一二年者以萬州黃藥子半斤須緊實者若虛而輕即他處產者用一斤取無灰酒一斗浸固劑器口以糖火燒一伏時停待酒冷卻開令患者日飲之不令酒氣絕經三五日後以綫圍頸覺消即停飲否則令項細也用火時不可多惟燒酒氣出瓶頭有津即止火不待經宿也已驗如神忌毒食

黃履素曰予年三十時臀生一小瘤根細如綫而頭如豆大越十年漸大如荔有妨跨馬予有鑒于決瘤之說不敢醫常歎曰吾年若六七十此瘤當如桅大必妨行坐矣柰何既而歎曰吾若得至六七十即礙行坐亦何妨遂安意養之及四十七歲時偶搽傷瘤皮水滲出不止懼其成漏乃延潘惠峰問之云欲去此瘤甚易欲塞此漏甚難瘤去則漏自滿矣不得已聽其治潘以藥塗瘤甚痛其肉盡黑少頃血出津津予甚懼且悔不復求治但求止血之藥越宿則黑肉已堅如石片數日脫去其根尚存如豆水出仍不止復商之潘潘曰不去其根漏仍不可塞也又以前藥點

之痛甚肉黑如初次日復點凡三次內服托裡散每劑用黃耆五錢凡旬日堅肉脫芯則根已平仍服托裡散外用長肌收口藥絕慾息勞以漸收滿肌肉完好予之服藥守禁固勤且慎而潘君亦可謂妙手矣

張子和在西華衆人皆訕以為吐瀉一日魏壽之與張入食肆中見一夫病一癤正當目之上紲內皆色如灰李下垂覆目之睛不能視物乃謂壽之曰吾不待食熟立取此癤魏未之信也語其人其人曰人皆不敢割曰吾非用刀割別有一術焉其人從之乃引入一小室中令俛卧一牀以繩束其腑刺乳中大出血先令以手採其目癤上亦刺出雀糞立平壽之大驚張曰人之有技可盡窺乎

一女子未嫁年十八兩手背皆有癤一類雞距一類角凡脫不能釗向明望之如桃膠然夫家欲棄之張見之曰在手背為膠癤在面者為粉癤此膠癤也以鈹針十字刺破按出黃膠三兩匙立平更不再作非素明者不敢用此法

一婦人年四十餘有癤三瓣張令以鹹吐之三涌三汗三下癤已半消次服化癤之藥遂大消去夫病在上皆宜吐亦自有消息之法耳

張景岳三旬外忽臀下肛門前骨際皮裡生一小粒初如菉豆許不以為意及半年大如黃豆又一年如皁核頂如栗矣乘馬坐榻皆有所礙且漸痛痒此非數藥可散又非煎藥可及若漸長大如升如斗懸挂腰股間行動不便將奈何謀之識者皆云不可割刺恐為害初亦未敢然熟計此時乘小不敢則日久愈大愈難矣遂決意去之乃飲酒乘醉以柳葉針刺之所出如豆腐白皮之類蓋粉瘤也刺後損消兩日後則腫如熱癰以會通膏貼之日膿潰而愈不兩日又腫起更熱更大始悔其刺之誤再以會通膏貼之又三日而大潰潰出一囊如魚脬者然後收口全愈使開之再遲則難療矣

一人眼皮下疙生一小瘤初如米粒漸大如豆外科用攢針三四枚翻轉眼皮刺其內膜少少出血如此二三次其瘤日縮竟得盡消

一人臂上生一瘤漸大如龍眼其人用小艾於瘤上灸七壯竟爾漸消亦善法也或用隔蒜灸之亦無不可

一人腹上生一瘤大如胡桃治者以蛛絲拽成粗線紮其根數日其絲漸緊瘤根漸細屢易屢細不十日竟脫落誠奇法也可見他線日鬆唯蛛絲日緊物理之

妙有當知者如此然纏之亦宜早若形勢既大恐不宜也方出焦氏筆乘舊業已載其器

沈樞文幼嗜指甲及長不能自禁此肝火血燥也又頸側常生小疣子屢散屢發又臂生一塊如菉豆大若觸碎則如斷束縷扯之則長縱之則縮後兩臂發白點求治曰子素肝病此部亦屬肝膽經也夫爪為筋之餘但行人身之側正與嚙爪生瘃等症相應須滋補腎水以生肝膽則諸病自愈與六味地黃丸服之二年白點自退疣亦不生

一男子小腹中一塊不時攻痛或用行氣化痰等藥不應猶以為血鬱服行氣逐血之劑後手背結一痧子漸長寸許形如鱉狀肢體間如豆大者甚多彼疑鱉生子今發于外亦用行血虛症悉至左尺洪數關脈洪數而弦謂腎水不能生肝木以致肝火血燥而筋攣用六味丸滋水生肝三月而愈

陶氏佃民有病癭者嘗與陶僕輸穀如市道遠勞極癭攣其頸氣幾不接陶僕素愚奴遽間削竹為銛銛刺之癭穿氣溢頸復完復荷擔而起一無所苦說順余兄奇峰生兩癟大如拳僧傳一方用竹刺將癟頂上稍稍撥開油皮勿令見血細研銅綠少許放于撥開

處以膏藥貼之數日即潰出粉而愈（續金陵瑣事）

錢國賓治山西神池百長張龍女年十七自八歲左手背生癭日大已如鍾許看係粉癭可治與一方用巴豆天麻子肉各四兩大杏仁一兩香油一斤二兩血丹八兩熬膏藥貼之一日一換其皮漸薄旬日皮紅半月皮破出膿椀許癭消口平龍之石衛酬謝

辛酉夏廣陵各鹽場天行時疫人多濕熱病若傷寒頭疼發熱不惡寒身體痛舌紅昏睡不食思涼飲肌黃大便結小便紅醫用發散清涼劑罔效錢亦臨症治復不投病勢數日如故前後胸背漸長數十癭如核桃大其皮甚薄以針挑破每癭出蟲數千遍抓四處人人寒禁莫敢近視癭破蟲出調復後人倣此俱愈氣頭之症乃人項下墜如長癭也山東多有此症雖風水所致亦卧熱炕過食辛辣而然他方間有此根由足厥陰肝經之脈循喉嚨之後上入頏顙屬肝絡于足陽明胃經此蓋起于肝胃二經癭長挂下雖非致命大不美觀古今並無治法錢訪海上仙方遇異人傳授用青皮六錢跋肝梗梗六錢引導木饅頭一名鬼饅頭煅存性二兩消癭散肝胃二經結氣共末酒下一錢元氣頸小者三四月消大者七八月或一年

消其功雖緩其方百發百中即錢已治蘭溪王元直
兗州趙瑚連二人矣不惜良方普利於世
會稽黃元亮文士也年五旬頸生氣癭候其穴脈衝旺
榮衛俱足精神元氣亦厚止肝部沈滯氣結成癭錢
告之曰公無病人也氣癭結于頸下不過不美觀耳
終無大害書云凡粉瘤痰瘤蟲瘤石瘤腱瘤蝨瘤癸
疽瘤可治凡氣癭筋癭肉瘤肩癭癮癭血癭肋瘤乳
瘤肘臂瘤不可治治之破膜泄氣不救宜絕此念勿
信庸愚以輕性命也黃拜謝而去

結核

薛立齋治一婦人經事不調肢體結核如榛如豆不計
其數隱於肉裡其色不變三年餘矣大按則痛或投
以降火消毒乃不按自痛發熱作渴日晡益甚經水
過期左關脈數此肝火血燥也用清肝益榮湯六十
餘劑諸症已愈惟項核未消又以當歸龍薈丸數服
及八珍湯加柴胡山梔三十餘劑而痊
一婦人久鬱怒胸脇內股外腫各結核寒熱往來經候
不調胸膈不利飲食少思大便不調左關弦洪右寸

此云右寸弦數下又云右寸弦浮疑有誤

緊曰右關弦緊肝火也右關弦洪肝經熱也左寸弦數木當生肝血遂用加味四物湯而諸症退用加味逍遙散而經候調用加味歸脾湯而全愈

一婦人因怒肢體結核睡中發擂左關弦洪此肝火血燥筋攣當清肝火養元氣遂用加味小柴胡湯加味逍遙散漸愈又用八珍湯加丹皮柴胡山屐鉤藤而愈

一婦人肢體結核胸腹痞悶氣泄稍寬此肝脾鬱滯不信服降火行氣化痰病愈甚而氣愈虛用加味逍遙加味歸脾湯而愈

一婦人項間結核不時寒熱左目緊小頭項振掉四肢抽搐此肝火血虛風熱也用加味逍遙加鉤藤數劑諸症漸愈又用八珍湯調理而痊

一婦人耳內耳後項側結核作痛寒熱口苦月經不調此肝膽經火而傷脾胃也用四君柴胡丹皮及六味丸而愈

一婦人因怒結核經行不止發熱晝安靜而夜譫語此血分有熱也用小柴胡加生地牡蠣其核尚在經候先期肝脈弦數此肝火血涸而筋攣也用加味逍遙

弦數右關弦緊曰左關弦洪肝經熱也左寸弦數木生火也右關弦緊肝剋脾也右寸弦浮木侮金也法當生肝血遂用加味四物湯而諸症退用加味逍遙散而經候調用加味歸脾湯而全愈

一婦人因怒肢體結核睡中發擂左關弦洪此肝火血燥筋攣當清肝火養元氣遂用加味小柴胡湯加味逍遙散漸愈又用八珍湯加丹皮柴胡山屐鉤藤而愈

一婦人肢體結核胸腹痞悶氣泄稍寬此肝脾鬱滯不信服降火行氣化痰病愈甚而氣愈虛用加味逍遙加味歸脾湯而全愈

一婦人項間結核不時寒熱左目緊小頭項振掉四肢抽搐此肝火血虛風熱也用加味逍遙加鉤藤數劑諸症漸愈又用八珍湯調理而痊

一婦人耳內耳後項側結核作痛寒熱口苦月經不調此肝膽經火而傷脾胃也用四君柴胡丹皮及六味九而愈

一婦人因怒結核經行不止發熱晝安靜而夜譫語此血分有熱也用小柴胡加生地牡蠣其核尚在經候先期肝脈弦數此肝火血涸而筋攣也用加味逍遙

加生地月經如期而核消

一婦人項臂結核頭痛寒熱乳內時疼兩脇煩痛此肝脾鬱火而血燥先以加味逍遥散再用加味歸脾湯而愈

一婦人素鬱怒患結核內熱晡熱久而不愈若面色痿黃則月經過期而少若面色赤則月經先期而多曰面黃過期脾經虛弱也面赤先期脾虛火動也朝用補中益氣升舉脾土以益氣血夕用加味逍遥滋養肝血以息陰火復以歸脾湯解鬱結半載元氣復而痊又有患前症因脾虛下陷而發熱乃專治其瘡變瘵而歿

一女子耳下結核煩痛寒熱此屬肝經風熱用疕子清肝散一劑諸症悉愈後因怒耳後并額兩角作痛寒熱此熏少陽經症仍以前藥加羌活二劑而瘥

一婦人項患五核時常寒熱肝脈弦長而出寸口此血盛無耦之症也用小柴胡湯加生地烏梅治之而愈

施二守項右患一核用涼藥敷貼頸皆腫大敷之腫連胸脇冷應腹內不悟涼藥所致尚以為毒盛形體困憊自分不起見其數藥處熱氣如霧意令去藥良久瘡色變赤刺出膿血用托裡藥而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

舉人江節夫兩耳下兩臂兩肋結核恪服祛痰降火軟
堅之劑益甚薛曰此膽經血虛火燥也益膽經行人
身之側前藥必致虧損至明年七月復請視各核皆
潰脈浮大而澁時金旺于秋木受金剋必不治果卒
周上舍兩耳下項間筋牽壅腫堅硬唉嗽氣喘內熱盜
汗所服皆化痰散堅行氣之劑勢益甚診之左關弦
澁左尺洪數此怒氣傷肝房勞損腎須滋腎水生肝
血慎調攝至水旺之際庶可愈矣彼欲速效乃外敷
商陸石灰等藥內服海藻蓬术之類至秋金旺之際
元氣愈虛腫甚而歿

一上舍素膏粱善怒耳下結一核後潰而瘡口翻張如
菌煩連頭痛或胸脇作脹或內熱寒熱或用清熱消
毒之藥年餘未瘥用補中益氣湯六味地黃丸而尋
愈瘡口翻出亦名翻花瘡

邵黃門子手合骨處患一核半年後潰一小孔如粟又
年餘不合日出清膿數滴或止三四滴面上赤脈數
口乾夜則發熱晝則惡寒行履如故此氣血俱虛也
醫不治月餘後他處相會彼云小兒有不藥之功矣
薛曰過火令方為喜也已而果斃

繆仲淳治一女子頸下發一硬塊而不痛有以石膏用

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

貝母首烏各三錢連翹白芨花粉各二錢牛蒡蒼耳青木香各錢半銀花鮮菊地丁各五錢先用夏枯草五兩河水五椀煎三椀去渣納前藥煎至一椀服十劑全消 廣筆記

薛立齋治一男子神勞多愁頸腫一塊久而不消諸藥不應以八珍湯加柴胡香附每日更隔蒜炙數壯及日飲遠志酒二三盞而漸消

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷五十六

錢塘魏之琇玉橫撰

瘰癧

薛立齋治一男子患瘰癧腫痛發寒熱大便秘以射干連翹散六帖熱退大半以仙方活命飲四帖而消

一男子腫硬不作膿脈弦而數以小柴胡湯薰神效仍蓌散各數劑及隔蒜灸數次月餘而消

一婦人頸腫不消與神效瓜蒌散六劑少退更以小柴

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

胡湯加青皮枳殼貝母數劑消大半再以四物對小柴胡數劑而平

一男子因怒項下腫痛結核痞悶面發熱用方脈流氣二帖胸膈利以荊防敗毒散二帖而熱退肝脈尚弦濇以下小柴胡加芎歸白芍四劑脈症頓退以散腫潰堅丸一料將平惟一核不消乃服遇仙無比丸二兩而痊

一婦人久鬱患而不潰既潰不斂發熱口乾月水短少飲食無味日晡尤倦以益氣養榮湯二十餘帖少健謂須服百帖庶保無虞彼欲求速效反服斑貓之劑及數用追蝕毒藥去而復結致不能收斂出水不止遂不救此症屬虛勞氣鬱所致宜補形氣調經脈未成者自消已成自潰若投慓悍之劑則氣血愈虛多變為瘵症然堅而不潰潰而不合氣血不足明矣況二經之血原自不足不可不察

一男子久而不斂神思困倦脈虛欲投以托裡彼以為毒反散腫潰堅湯半月餘果發熱飲食愈少復求救齊氏云三月喜其謹守得以收救齊氏云結核瘰癧初覺宜內消之如經久不除氣血漸衰肌寒肉冷或膿汁清稀毒氣不出瘡口不合聚腫不赤

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

胡湯加青皮枳殼貝母數劑消大半再以四物對小柴胡數劑而平

一男子因怒項下腫痛結核痞悶熱發熱用方脈流氣二帖胸膈利以荊防敗毒散二帖而熱退肝脈尚弦濇以下小柴胡加芍歸白芍四劑脈症頓退以散腫潰堅九一料將平惟一核不消乃服遇仙無比九二兩而痊

一婦人久鬱患而不潰既潰不斂發熱口乾月水短少飲食無味日晡尤倦以益氣養榮湯二十餘帖少健謂須服百帖庶保無虞彼欲求速效反服斑貓之劑及數用蝕毒藥去而復結致不能收斂出水不止遂不救此症屬虛勞氣鬱所致宜補形氣調經脈未成者自消已成自潰若投慓悍之劑則氣血愈虛多變為瘵症然堅而不潰潰而不合氣血不足明矣況二經之血原自不足不可不察

一男子久而不斂神思困倦脈虛欲投以托裡彼以為迂乃服散腫潰堅湯半月餘果發熱飲食愈少復求治投益氣養榮湯三月喜其謹守得以收救齊氏云結核漂瘧初覺宜內消之如經久不除氣血漸衰肌寒肉冷或膿汁清稀毒氣不出瘡口不合聚腫不赤

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

結核無膿外症不明者並宜托裡膿未成者使膿早成已潰者使新肉早生血氣虛者托裡補之陰陽不和托裏調之大抵托裡之法使瘡無變壞之症所以宜用也

一男子久不斂膿出更清而黃羸瘦每侵晨作瀉與二神丸數服瀉止更以六君子湯加芍歸月餘肌體漸復灸以豆豉餅及用補劑作膏藥貼之三月餘而愈

一婦人潰後核不腐以益氣養榮湯三十餘劑更敷針頭散腐之再與前湯三十餘劑而斂

一男子未潰倦怠發熱以補中益氣湯治之少愈以益氣養榮湯月餘而潰又一月而痊

一婦人肝經積熱患而作痛脈沈數以羚干連翹湯四帖少愈更用散腫潰堅丸月餘而消丹溪云瘰癧必起于足少陽一經不守禁忌延及足陽明經食味之厚鬱氣之久曰毒曰風曰熱皆二端拓引變換須分虛實實者易治虛者可慮此經主決斷有相火且氣多血少婦人見此若月水不調寒熱變生稍久轉為潮熱自非斷慾食淡神醫不能療也

一室女年十七項下時或作痛作寒作熱如瘧狀肝脈弦長此血盛之症也先以小柴胡湯二劑少愈更以

生地黃丸治之而痊婦人良方云寡婦之病自古未有言者惟倉公傳與褚澄畧而論及言寡者孟子所謂無夫曰寡是也如師尼喪夫之婦獨陰無陽欲男子而不可得是以鬱悒而成病也易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生孤陽獨陰可乎丈夫閨門慾心萌而不遂致陰陽交爭乍寒乍熱有類瘧疾久而為癆又有經閉白淫痰逆頭風膈氣痞悶面黯瘦瘠等症皆寡婦之病診其脈獨肝弦脈出寸口而上魚際究其病原其疾皆血盛而得經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣

一男子耳下患五枚如貫珠年許尚硬面色痿黃飲食不甘勞而發熱脈數軟而濇以益氣養榮湯六十餘劑元氣已復患處已消一核尚存以必效散二服而平

一男子因勞而患怠惰發熱脈洪大按之無力謂須服抵此症原屬虛損若不審虛實而犯病禁經禁鮮有不悞常治先以調經解鬱更以隔蒜灸之多自消如不消即以琥珀膏貼之俟有膿即針之否則變生他處設若兼痰魚陰等症只宜加魚症之劑不可干擾

釜下柊當有氣空

生地黃丸治之而痊婦人良方云寡婦之病自古未有言者惟倉公傳與褚澄畧而論及言寡者孟子所謂無夫曰寡是也如師尼喪夫之婦獨陰無陽欲男子而不可得是以鬱悒而成病也易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生孤陽獨陰可乎夫處閨門慈心萌而不遂致陰陽交爭乍寒乍熱有類瘧疾久而為癆又有經閉白淫痰逆頭風膈氣痞悶面黯瘦瘠等症皆寡婦之病診其脈獨肝弦脈出寸口而上魚際究其病原其疾皆血盛而得經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣

一男子耳下患五枚如貫珠年許尚硬面色痿黃飲食不甘勞而發熱脈數軟而濇以益氣養榮湯六十餘劑元氣已復患處已消一核尚存以必效散二服而平

一男子因勞而患怠惰發熱脈洪大按之無力謂須服補中益湯彼不信乃服攻伐之劑吐瀉不食而死大抵此症原屬虛損若不審虛實而犯病禁經禁鮮有不悞常治先以調經解鬱更以隔蒜灸之多自消如不消即以琥珀膏貼之俟有膿即針之否則變生他處設若兼痰盧陰等症只宜加魚症之劑不可干擾

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

攄餘經若氣血已復而
至月許不應氣血亦不
比九其毒一下即止二
調理若瘡口不斂宜用
氣血俱虛或不慎飲食
氣血為主氣血壯實不
使易收斂若氣血虛不
遽足取敗耳

一男子素弱潰後肉不
氣血將復檢尚在以
次不旬日而愈

一男子患之痰盛胸膈
乘之也當以實脾土伐
苦寒化痰藥不應又加
子湯加芩歸數劑飲食
术月餘中氣少健又以
氣亦復矣夫石關脈弦
賊邪也虛而用苦寒之
因不一主治之法不同

一男子氣血已復檢尚
次不旬日而愈

一男子患之痰盛胸膈痞悶脾胃脈弦此脾土虛肝木
乘之也當以實脾土伐肝木為主彼以治痰為先乃服
苦寒化痰藥不應又加以破氣藥病愈甚始用六君
子湯加芩歸數劑飲食少思以補中益氣湯倍加白
术月餘中氣少健又以益氣養榮湯兩月腫消而血
氣亦復矣夫石關脈弦弦屬水迺水盛而剋脾土為
賊邪也虛而用苦寒之劑是虛虛也況痰之為病其
因不一主治之法不同凡治痰利藥過多則脾氣愈

氣血俱虛不腐此氣血皆虛用托裡養榮湯
氣血將復檢尚在以舊挺撥去又服前藥月餘而愈

一男子素弱潰後肉不腐此氣血皆虛用托裡養榮湯
氣血為主氣血壯實不用追蝕之劑亦自腐但取去
使易收斂若氣血虛不先用補劑而數用追蝕之藥
遽足取敗耳

一男子素弱潰後肉不腐此氣血皆虛用托裡養榮湯
氣血將復檢尚在以舊挺撥去又服前藥月餘而愈

一男子氣血已復而檢不消有疵(病)却服散堅之劑
至月許不應氣血亦不覺損方進必效散或遇仙無
比九其毒一下即止二藥更服益氣養榮湯數劑以
調理若瘡口不斂宜用豆豉餅灸之用琥珀膏貼之
氣血俱虛或不慎飲食起居七情者俱不治此症以

虛疾愈易生如中氣不足必用參朮之類為主佐以疾藥

一婦人因愁項腫後月經不通四肢浮腫小便如淋此血分症也先以桃仁丸數服經行腫消更以六君子湯加柴胡枳殼數劑項腫亦消矣亦有先因小便不利後月發腫致經水不通名曰水分宜服椒仁丸若先因小便不利後身浮腫致經水不通名曰血分宜服葶藶丸

一室女年十九頸腫一塊硬而色不變肌肉日削筋攣不信乃服風藥後果不起盧砥鏡曰經云神傷于思慮則肉脫意傷于憂愁則肢廢魂傷于悲哀則筋攣目眩傷于喜樂則皮槁志傷于盛怒則腰脊難以俛仰也何待即有女遽人夫早逝女患十指攣拳垂莫能舉膚體瘡瘍粟粟然湯劑雜進飲食損減幾于半載遽與診之則非風也正乃憂愁悲哀所致耳病屬內因藥乃以鹿角膠輩多用麝香熬膏貼瘍處攣能舉指能伸滿漸安

一瘧婦四肢倦怠類痿症以養氣血健脾胃藥而愈

一室女性意好怒耳下常腫痛發寒熱肝脈弦意投以小柴胡湯加青皮牛蒡荊防而寒熱退更以小柴胡對四物數劑而腫消其父欲除去病根勿令再發謂肝內主藏血外主榮筋若患怒氣逆則傷肝肝主筋故筋畜結而腫須病者自能調攝庶可免患否則肝逆受傷則不能藏血血虛則為難瘳之症矣後不戒果結三核屢用追蝕藥而歿

一少婦耳下患腫素勤苦發熱口乾月水每過期而至且少一老媪以為經閉用水蛭之類通之以致愈虛而歿夫月水之為物乃手太陽手少陰二經主之此二經相為表裡主上為乳汁下為月水為經絡之餘氣苟外無淫所侵內無七情所傷脾胃之氣壯則衝任之氣盛故為月水遵時而至若面色痿黃四肢消瘦發熱口乾月水過期且少乃陰血不足也非有餘瘀閉之症宜以滋養血氣之劑徐而培之則經氣盛而經水自依時而下

一放出宮女年逾三十兩脅作腫（痛）不腫色不變大小便作痛如淋登厠尤痛此瘀血潰入隧道為患乃男女失合之症也難治後潰不斂又患瘭瘰而歿此婦為

湯氏妾湯為尚常在外可見此婦在內久懷幽鬱及在外又不能如願是以發致生此疾愈見流注瘰癧乃七情氣血皆已損傷不可用攻伐之劑皎然矣故精血篇云精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已萎而思色以降其精則精不出而內敗小便道塞而為淋精已耗而復竭之則大小便道擎疼愈欲便則愈疼女人天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或潰而入骨或變而為腫或雖合而難子合男子多則澀枯虛人產乳衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

一室女年十七患瘰癧久不愈月水尚未通發熱唉嗽飲食少思有老嫗欲用巴豆肉桂之類先通其經謂此症潮熱經候不調者不治但喜脈不濇且不潮熱尚可治須養氣血益津液其經自行彼惑于速效之說仍用之薛曰非其治也此類乃慓悍之劑大助陽火陰血得之則妄行脾胃得之則愈虛經果通而不止飲食愈少更加潮熱遂致不救經云女子七歲腎氣盛齒更髮長二七天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下然過期而不至是為失常必有所因夫人之

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

生以血氣為本人之病未有不先傷氣血者婦女得之多患于七情寇宗奭曰世有室女童男積想在心思慮過當多致勞損男子則神色先喪女子則月水先閉何以致然蓋憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭則神色先散而月水先閉也大既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發嗽嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不克故多怒鬢髮焦筋骨痿俠五臟傳遍故舉不能死者然終死矣此一種于勞中最難治蓋病起于五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得

九死一生舉此為例其餘諸方可按脈與症而治之

一男子先于耳前耳下患之將愈次年延及項側缺盆三年遂胸液不愈診之肝脈弦數以龍膽散堅二九治之將愈肝脈尚數四年後小腹陰囊內股皆患毒年餘不斂脈診如前以清肝養血及前丸而愈

薛云一富商項有瘰癧一片頗大云因怒而致困苦二年百法不應忽方士與藥一服即退二三再服損退四服而平以重禮求之乃必效散又一媪治此乃用中品錠子紝瘡內以膏藥貼之其根自腐未盡再用更捺生肌藥數日即愈又一道人治此用雞子七箇

每箇入班猫一枚飯上蒸熟每日空心食一枚求者甚多各書瘰癧門及本草亦云合前二法觀之惟氣血不虛者有驗虛者恐不能治也 凡患此赤脉貫瞳子有數條則幾年死無則可治

薛立齋治一癧婦面黃體倦嗜酸噯氣此中氣虛弱欲用補中益氣湯加茯苓半夏不信反降火利氣胸膈痞滿癧瘡腫痛又散堅利氣噯氣不絕大便不實四肢時冷曰今變中氣虛寒矣用六君子湯加薑桂少用升麻柴胡漸愈更佐以補中湯全愈

一婦人患此噯氣用降火清胃食少吞酸胸膈痞悶用利氣消導吐痰氣促飲食日少用清熱化痰大便堅澁內熱身瘦曰吞酸噯氣脾胃氣虛也胸痞痰喘脾肺氣虛也大便堅澁內熱曰瘦脾肺血虛也遂以補中益氣加炒黑吳茱萸三分數劑佐以六味丸諸症頓退乃用歸脾湯逍遙散間服而愈

一男子患瘰癧腫硬久不消亦不作膿服散堅敗毒藥不應令灸肩井二穴更服益氣養榮湯月餘而愈

一婦人瘰癧久潰發熱月經每過期且少用逍遙為前湯兩月餘氣血復而瘡亦愈但一口不收數針頭散

灸前穴而瘥常治二三年不愈者連灸三次兼用托裡藥必愈

田氏婦年踰三十瘰癧已潰不愈與八珍湯加柴胡地骨皮夏枯草香附貝母五十餘劑形氣漸轉更與必效散二服瘡口遂合惟氣血未平再與前藥三十餘劑而愈後田生執此方不問虛實概以治人殊不知散中斑貓性毒雖瘰癧多服則損元氣若氣血實者先用此下之而投補劑或可愈或虛而用下藥或用追蝕藥瘀肉雖去而瘡口不合反致難治

一儒者瘰癧愈後體瘦發熱晝夜無定此足三陰氣血俱虛用八珍加麥冬五味二十餘劑又用補中益氣加麥冬五味及六味丸而愈

儒者張子容素善怒患此久而不愈瘡出鮮血左關弦洪重按如無此肝火動而血妄行症屬氣血俱虛用補中益氣湯以補脾肺六味丸以滋腎肝而愈

陸子溫兩耳下腫硬用伐肝軟堅之劑益甚其脈左關弦緊左尺洪數此腎水虧損而筋攣也當生肺金滋腎水則肝得血而筋自舒矣彼不悟仍服前藥竟致不起

楊乘六治俞某患瘰癧左右大小十餘枚俱堅硬如石

頭項腫大不能轉側吐血咳嗽憂遺半年皆服滋陰降火固精伐肝之劑脉之弦勁中取見躁動左關尺獨緊細如刀口舌青撮而胖滑知其肝膽用事肝膽先病延及心脾其證嗽不絕者肝氣盛逆痰隨氣上也其證泄不止者肝血虧損疎泄失職也其瘰癧腫大肝火鬱結不舒也乃以養營湯倍肉桂月餘已有痊意更以前方佐歸脾養心二方消息守服三月而愈

周漢卿治錢塘王氏女生瘰癧環頭及腋凡十九竅竅破白濃出將死矣漢卿為剔竅去深二寸其餘烙以火炎之數日結痂愈明史

張子和治一婦人病瘰癧延及胸膺皆成大瘡相連無好皮肉張曰火淫所勝治以鹹寒命以滄鹽吐之一吐而著痂再用涼膈散解毒湯等劑皮肉仍復如初瘰癧以手仰置肩上微舉肘取肘骨尖上是穴隨所患處左即灸左右即灸左右艾炷如小筋頭許三壯即愈復作即再灸如前不過三次永絕根本先俾湯壽資宰鍾離有一小鬟病瘡已破傳此法于本州一漕官早灸晚間膿水已乾凡兩灸遂無恙後屢以治人皆驗駱安之妻患四五年瘡痂如田螺靨不退辰時

蓍艾申後即落盼感頗渡元三作三灸遂除根矣百方

薛立齋治一男子素嗜慾且勞神惡熱喜冷仲冬始衣綿乃患瘰癧脈洪大無力曰此陰氣耗散陽無所附陽氣浮散于外而惡熱也敗毒散加參連山屁四劑少愈再以四物湯加參連白芷桔梗甘草金銀花數劑而愈

繆仲淳治朱文學鎮患癧為灸肩井肘尖兩穴各數壯而愈（廣筆記）

薛立齋治一婦人患瘰癧延至胸腹膿水淋漓日久五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口乾咽燥發熱盜汗食少嗜卧月水不調臍腹作疼謂非瘡故乃血虛而然也服逍遙散月餘少可更服八珍湯加丹皮香附久月餘而經通再加黃耆白斂兩月餘而愈

沈氏室患瘰癧久而不消自汗惡寒此氣血俱虛也遂以十全大補湯月餘而潰然堅梭雖取而瘡口不斂更灸以豆豉餅仍與前藥加烏藥香附兩月而愈大抵堅而不潰潰而不斂皆由氣血不足也嘗見患此者瘡口雖合而不加補治往變為瘵症

一婦人因怒耳下腫痛以荊防敗毒散加連翹黃芩四

貼而愈嘗治此旬日不消者以益氣血藥及飲遠志
酒遠志一味末之酒一盞調澄清飲之以渣敷患處
治女人乳疽尤效○先宜泊淡
其腫自消若無膿者亦自潰不戒忽者難治
一婦人亦因怒耳下瘍腫頭痛寒熱與荊防敗毒散加
黃芩治表症悉退但飲食少思日晡發熱東垣云雖
有虛熱不可太攻熱去則寒生也遂以小柴胡湯加
地骨皮川芎當歸茯苓白朮陳皮十餘帖而愈次年
春復腫堅不潰來索方與八珍湯加香附柴胡地骨
皮桔梗自製服之至六七劑以為延緩仍服人參敗
毒散勢愈甚又服流氣飲則益汗發熱口乾少食至
秋復求治診視氣血虛極辭不治果歿今人有瘡瘍
不審元氣虛實病在表裡便服敗毒流氣藥殊不知
敗毒散乃發表之劑果有表症亦只宜一二服多則
元氣反損其毒愈甚雖有人參莫補流氣飲乃耗血
之劑果氣結脇滿亦只宜二三服多則血氣愈傷反
為敗症雖有芳歸莫救丹溪云此不因膏粱丹毒之
變因虛勞氣鬱所致也
一婦人患瘰癧不消膿清不斂以八珍湯治之少愈忽
肩背痛不能回顧此膀胱經氣鬱所致當以防風通
氣湯治之益膀胱之脈始于目內眥上頂顛下耳角

項上巔至膞後過風府下項走肩膊一支下腋脅是經氣動則眷痛項強腰似折按此非膀胱經症而何彼乃云瘰癧膽經病也其脈主行項側即是經火動而然遂自服清肝降火之藥反致不食痛盛復求治診其脈胃氣愈弱先以四君子湯加陳皮炒芍半夏羌活葛荊子四劑食進痛止繼以防風通氣湯二劑而愈又一婦流注潰久忽發熱乃虛也與補藥二劑不用另用人參敗毒散大熱而斃夫老弱之人雖有風邪亦宜以補中益氣湯治之況又非表症而峻表不死何俟

一男子因怒耳下及缺盆患瘰癧潰延腋下形氣頗實瘡口不合以散腫潰堅丸治之而愈一婦患此氣血不弱亦服此丸其核頓消而瘡口不斂更以十全大補湯及灸以豆豉餅始瘥

江中翰姪年及二十耳下患瘰癧痛左關脈數此肝經風熱所致以荊防敗毒散三帖表症悉退再與散腫潰堅丸月餘而平復

一婦年二十耳下結核經水每過期午後頭痛服頭風藥愈甚以八珍湯加柴胡地骨皮二十餘劑而愈

流注

薛立齋治一婦人因暴怒而腰腫一塊或胸膈不利或走氣作痛此營氣鬱滯與分脈流氣飲數劑而止更以小柴胡對四物加香附貝母月餘而愈

一婦人患流注遇勞必痛衆手按之痛乃止屬氣血俱虛用十全大補湯六味丸逍遥散而痊

一婦人先肢體作痛後患流注發熱惡寒食少脇脹月經不調痰盛喘嗽五心煩熱健忘驚悸盜汗無寐悉屬肝脾虧損氣血不足用十全大補加味歸脾薰服

諸症悉痊

一婦人素頭暈患流注月經遲少此屬中氣虛弱用補中益氣湯而愈後因勞什地月經如涌此勞傷火動用前湯加五味子一劑而愈

一婦人患前症用行氣化痰等藥胸膈不利飲食少思用疎利之藥大便作泄中滿不食此脾胃復傷用補中益氣湯加炮薑脾胃健飲食進又用六君子加芎歸百餘劑始全愈

一婦人素鬱結肩臂各腫如覆杯此肝脾虧損用加味逍遥散百餘劑元氣復而腫消後因勞役怒氣經行

不止服涼血之劑其血如崩此因脾氣復傷下陷而血從之朝用補中益氣湯夕用歸脾湯而愈

一婦人稟弱性躁脇臂腫痛胸膈痞悶服流氣敗毒藥反發熱以四七湯數劑胸寬氣利以小柴胡湯對四物加陳皮香附腫痛亦退大抵婦人性執著不能寬解多被七情所傷遂致遍身作痛或肢節腫痛或氣填胸滿或如梅核塞喉嚥吐不出或痰涎涌盛上氣喘急或嘔逆惡心甚者渴悶欲絕產婦多有此症宜服四七湯先調滯氣更以養血之藥若因憂思致小便白濁者用此湯吞青州白丸子屢效

一婦人腿患筋攣骨痛諸藥不應脈遲緊用大防風湯二劑頓退又二劑而安又一婦人亦然先用前湯二服更服黑丸子而痊此二患若失治必潰成敗症

一老人傷寒表邪未盡胶內患腫發熱以人參敗毒散二劑熱止炎以香附餅又小柴胡加二陳羌活川芎歸身白朮枳殼數劑而散

一男子肩胛患之微腫形勞氣弱以益氣養榮湯服黑丸子及木香生地作餅覆患處熨之月餘膿成針之仍服前藥而愈

一男子臂腫筋攣骨痛半餘方潰不斂診其脈更虛以

內塞散一料少愈以十全大補湯及附子餅灸之而
痊精要云留積經久極陰生陽寒化為熱以此潰多
成瘻宜早服內塞散排之
一男子腿患潰而不斂用人參養榮湯及附子餅更以
補劑煎膏貼之兩月餘而愈
通府李廷儀患流注嗽痰氣促自恃知醫用化痰理氣
等劑半載而潰用托裡等劑膿水淋漓腫硬不消寒
熱往來飲食少思肌肉消瘦大便不實手足時冷兩
尺脈浮大按之微細曰此屬命門火衰當用八味丸
不信乃服參耆歸朮之類更加痰喘泄瀉服八味丸
益氣湯半餘而痊
一婦人背患流注內潰脹痛服流氣化痰之劑自汗盜
汗脈大而弱此元氣虧損之症也與參耆各一兩歸
朮各五錢肉桂二錢服而針之至夜半始出稀膿二
椀許翌日大汗倦甚煩熱作渴揚手氣促脈洪大而
數仍用前藥加附子一錢炙甘草二錢二劑脈症悉
退又以六君加薑桂二十餘劑始離床褥後因勞復
寒熱作渴汗出時仲冬寢悍氣出如霧用十全大補
加桂附二劑而痊
賈學士年十六患此二載矣脈洪大而數膿清熱渴食

少體倦夜間盜汗午前畏寒曰真氣不足邪氣有餘治之無功矣午前以四君子加芍歸炙草午後以四君子加五味麥冬參耆兩月諸症蓮可一二又有用滲利之劑保其必生者三月後形體骨立後竟不救

一弱人患流注內潰出敗膿五六椀是時口眼歪斜以獨參湯加附子二錢二劑少愈更以十全大補之劑月餘而痊大抵瘡膿血既泄當大補氣血為先雖有他症當以末治之凡癰大潰發熱惡寒皆屬氣血虛甚若左手脈不足者補血藥當多于補氣藥右手脈不足者補氣藥當多于補血藥切不可發表

一男子腿患腫肉色不變不痛脈浮而滑以補中益氣湯加半夏茯苓枳殼木香飲之以香附餅熨之彼謂氣無補法乃服方脈流氣飲愈虛復求治以六君子湯加芍歸數劑飲食稍進再用補劑月餘而消夫氣無補法俗論也以其為病痞悶壅塞似難于補殊不知正氣虛而不能運行則邪氣滯而為病經云壯者氣行則愈弱者則著而為病苟不用補法氣何由而行乎（經語在流注門尤為肖縈）

一婦人潰後發熱以為虛彼不信仍服敗毒藥果發大熱竟至不救夫潰瘍雖有表症發熱宜以托裡藥為

主佐以表散之劑何況瘰癧流注乎若氣血充實經絡通暢決無患者此症之因皆由氣血素虧或七情所傷經絡鬱結或腠理不密穴淫外侵壅塞若不審其所因辨其虛實鮮不誤人

一男子腿患久而不斂飲大補藥及附子餅更用針頭湯及附子餅灸之兩月餘膿成針之更服人參養榮加柴胡地骨皮丹皮月餘寒熱少止繼以益氣養榮湯半載而瘥

一男子臂患年餘尚硬飲食少思朝寒暮熱以八珍湯散經之而愈

一婦人膿潰清稀脈弱惡寒久而不愈服內塞散灸以附子餅而瘥

一婦人腰間患一小塊肉色如常不潰發熱謂當以益氣養榮解鬱之藥治之不信別服流氣飲後針破出水半餘而歿

一婦人久不斂忽發寒熱決其氣血俱虛彼反服表散之劑果大熱亦死大抵流注之症多因鬱結或暴怒或脾氣虛濕氣逆于肉理或湊理不密寒邪客于經絡或閃撲或產後瘀血流注關節或傷寒餘邪未盡為患皆因真氣不足邪得以乘之常治鬱者開之怒

者平之閉撲及產後瘀血者散之脾虛及胰理不密者除而補之傷寒餘邪者調而解之大要以固元氣為主佐以見症之藥如久而瘡口寒者更用豆豉餅或附子餅灸之有膿管或瘀肉者用針頭散腐之自愈錠子尤效若不補血氣及不慎飲食起居七情俱不治

一男子元氣素弱將欲患此胸膈不利飲食少思欲治以健脾胃解鬱結養氣血彼不從乃服辛香流氣之劑致腹脹又服三棱蓬朮摩朴之類飲食愈少四肢微腫面腰腫一塊不潰而歿蓋此症本虛痞今用剋伐之劑何以衰死況辛香燥熱之劑但能劫滯氣取快于一時若不佐制過服益增鬱火煎熬氣液為痰日久三焦成流注之症

飲當作少

但肌肉消瘦發熱作渴惡寒飲食以六君子加歸耆附子服數劑患處遂紅活又十全大補三十餘劑膿漸稠而愈後惑于人言謂盛暑不宜用附子彼又肉場屋不遂意復患前症專服敗毒流氣之劑元氣消爍肌肉日瘦醫以為不治自分不起其師滕洗馬云向者病危得附子藥而起今藥不應以致危篤何不仍服附子藥遂復求治其脈微細症屬

者平之閃撲及產後瘀血者散之脾虛及腠理不密者除而補之傷寒餘邪者調而解之大要以固元氣為主佐以見症之藥如久而瘡口寒者更用豆豉餅或附子餅灸之有膿管或瘀肉者用針頭散腐之自愈錠子尤效若不補血氣及不慎飲食起居七情俱不治

一男子元氣素弱將欲患此胸膈不利飲食少思欲治以健脾胃解鬱結養氣血彼不從乃服辛香流氣之劑致腹脹又服三棱蓬朮厚朴之類飲食愈少四肢微腫面腰腫一塊不潰而歿蓋此症本虛痞今用剋伐之劑何以來死況辛香燥熱之劑但能劫滯氣取快于一時若不佐制過服益增鬱火煎熬氣液為痰日久不散成流注之症

一聘士流注久潰肌肉消瘦發熱作渴惡寒飲食以六君子加歸耆附子服數劑患處遂紅活又十全大補三十餘劑膿漸稠而愈後感于人言謂盛暑不宜用附子彼又肉場屋不遂意復患前症專服敗毒流氣之劑元氣消爍肌肉日瘦醫以為不治自分不起其師滕洗馬云向者病危得附子藥而起今藥不應以致危篤何不仍服附子藥遂復求治其脈微細症屬

虛寒並無邪毒仍用附子藥乃得愈

賈閣老子患流注脈數作渴不喜飲冷膿水清稀面帶赤色曰此氣血虛而虛火也治難奏功彼以為迂別服燥濕分利之劑兩月餘反加煩渴寒熱往來頃遽治亦無功矣後果不起

陳進士遂初年逾三十患腹腫硬逾年而瘡頭破時出血水此七情所傷榮氣絕于肉理而然名曰流注診之肝脈濇蓋肝病脈不宜濇小腹正屬肝經須濇脈退乃可愈欲以甘溫之劑補其氣血令自消潰不信仍服攻伐之藥致氣血愈虛果歿于金旺之月丹溪云諸經惟少陽厥陰之生癰疽宜預防之以其多氣少血也少血而肌肉難長瘡久不合必成敗症苟不知此輒用峻利毒藥以伐其陰分之血則其禍不旋踵矣

一室女背胛結一塊如錢大而不熾但倦怠少食日晡發熱脈軟而濇此虛勞氣鬱所致也用益氣養血開鬱之藥又令飲人乳精神稍健彼不深信又服流氣飲飲食遂少四肢痿軟乃悔之復求治以為決不可起矣後果斃

一男子年三十餘素肌寒患右肋腫如覆甌轉側作水

聲脈數經曰陰虛陽氣湊襲寒化為熱熱甚則肉腐
為膿即此症也及按其腫處即起是膿已成矣遂以
濃煎黃耆六一湯黃耆六令先飲二鍾然後針之膿出
數椀許虛症並至遂以大補藥治之三月餘而愈大
抵膿血大泄氣血必虛當峻補之雖有他病皆宜緩
治蓋元氣一復諸病自退若老弱之人不問腫潰尤
當補也

一子年十九腋間腫一塊無頭色不變三月不潰飲食
少思肌肉日瘦此寒搏腠理榮氣不行鬱而為腫也
名曰濕毒流注元戎云若人飲食疎精神衰氣血弱
肌肉消薄榮衛之氣短促而澁滯故寒搏腠理閉鬱
而為癰腫當補之以接虛怯之氣遂以十全大補加
香附陳皮三十餘劑始針之出白膿二椀仍用前藥
倍參耆及以豆豉餅炙之漸愈彼欲速效內服敗毒
外貼寒涼反致食少膿稀色紫喜得精氣未喪仍以
前藥加遠志貝母自斂百劑而愈

劉文通室年逾二十腰間突腫寸許肉色不變微痛不
潰發熱脈大此七情所傷氣血凝滯澁于隧道而然
也當益氣血開鬱結更以香附餅熨之使氣血克暢
內自消散不消雖潰亦無虞不聽乃服十宣流氣之

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

藥氣血愈虛破出清膿不斂而斃

續名醫類案卷五十七

錢塘魏之琇玉橫撰

膿疥

蘇頌曰黔人治疥癬遍體諸藥不效者生取白花蛇剖斷以磚燒紅沃醋令氣蒸置蛇于上以盆覆一夜如此三次去骨取肉炙以五味令爛損食之瞑睡一晝夜乃醒瘡死隨皮便退其疾便愈本草綱目

張子和曰貧生藥焦百善云有菟夫來買苓參欲治疥

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

不識藥性緩急但聞人言可治濃煎一椀服之須臾大吐涎一盆三二日疥作痂矣

潘埙曰予孌孫患膿疥三年身無完膚下體尤甚內治外治百無一效乃自製一方名和中固氣湯以蒼术一錢燥濕白术一錢固脾黃耆一錢實腠理升麻八分柴胡一錢引清氣元參八分制遊火防風七分散一錢燥濕白术一錢固脾黃耆一錢實腠理升麻八分柴胡一錢引清氣元參八分制遊火防風七分散姚應鳳診一人遍體發小疥如粟應鳳曰是名淨海瘡歸月一錢養心血甘草陳皮人參各五分調中氣煎服存渣加白蔻藜金銀花煎洗十數貼全愈（楮記室）

狀疑誤　谷七分清中焦火黃柏七分伏下焦火

不治生治死其人不信治之死（錢唐縣志）

元希聲侍郎治辛癸疥秘驗方石灰隨多少和醋漿水調塗隨手即滅一法用石灰炒紅出火氣香油調傳

薛立齋治禧默李龍岡患疥腿足為甚日晡益燃口乾作渴小便頻赤此腎經虛熱用補中益氣湯六味丸而痊

一儒者善噫患疥以為內有濕熱腠理不密外邪所搏也與補中益氣湯加白芷川芎治之不從自服荊防敗毒散毒散益汗發熱作渴燃痛膿水淋漓仍用前湯倍加參耆五味而痊

不識藥性緩急但聞人言可治濃煎一椀服之須臾大吐涎一盆三二日疥作痂矣

潘埙曰予孌孫患膿疥三年身無完膚下體尤甚內治外治百無一效乃自製一方名和中固氣湯以蒼术一錢燥濕白术一錢固脾黃耆一錢實腠理升麻八分柴胡一錢引清氣元參八分制遊火防風七分散上焦火芩連各七分清中焦火黃柏七分伏下焦火歸身一錢養心血甘草陳皮人參各五分調中氣煎服存渣加白蒺藜金銀花煎洗十數貼全愈（楮記室）

姚應鳳診一人遍體發小疥如粟應鳳曰是名淨海瘡不治生治死其人不信治之死（錢唐縣志）

元希聲侍郎治卒癸矣秘驗方石灰隨多少和醋漿水調塗隨手即滅一法用石灰炒紅出火氣香油調傳

薛立齋治禡黜李龍岡患疥腿足為甚日晡益燃口乾作渴小便頻赤此腎經虛熱用補中益氣湯六味丸而痊

一儒者善噫患疥以為內有濕熱腠理不密外邪所搏也與補中益氣湯加白芷川芎治之不從自服荊防敗毒散毒散益汗發熱作渴燃痛膿水淋漓仍用前湯倍加參耆五味而痊

一儒者臂脚患疥日晡或痒或脹形體倦怠自服敗毒散痛處發腫小便赤澁此肺腎陰虛用補中益氣湯加五味麥冬而愈

一儒者患疥誤用攻伐之劑元氣虛而不能愈用補中益氣湯加茯苓其瘡頓愈久因調養失宜日晡益甚用八珍湯加五味麥冬五十餘劑而愈

一男子患疥色黯作痒出黑血日晡益甚其腿日腫夜消以為氣血虛而有熱朝用補中益氣夕用加味逍遥而愈

一男子時疫愈後所患如前用前藥補養而愈有同患用起法出血而死此因陰虛血熱色黑作痒也何乃反傷陰血哉

一婦人疥久不愈食少體倦此肝脾虧損而虛熱先用補中益氣湯加川芎炒扈元氣漸復更以逍遥散而漸愈若夜間譫語此熱入血分用小柴胡湯加生地治之血虛者四物合小柴胡湯熱退却用逍遥散以補脾胃生陰血或有寒熱如瘧亦治以前藥

一婦人患疥作痒膿水不止脈浮無力以消風散四劑少愈更以四生丸月餘而平

一男子痒少痛多無膿水以荅連荊防山扈薄荷白芍

歸梢治之而愈

一男子煩痛發熱脈浮數以人參敗毒散四劑少愈更以當歸飲子數劑而愈

一男子煩痛寒熱便秘脈數有力以防風通聖散二劑少愈更以荊防敗毒散加黃芩山梔四劑而愈

一婦人作痒午後尤甚以當歸飲子數劑少愈更以人參荊芥散數劑而安

一男子久不愈搔起白屑耳作蟬聲以四生散（白附子黃耆獨活蒺藜）數服痒止更以當歸飲子數劑而瘥

一男子下體居多煩痛日晡尤甚腿腕筋紫而脹脈洪大此血熱而然也乃以荊芥連翹飲子紫處刺去瘀血以四物湯加荊芥連翹飲子數劑而安患在上體若臂腕筋紫脹亦宜刺去其血以前湯加柴胡黃芩即愈

一男子搔痒成瘡日晡痛甚以四物加荊連防數劑而止更以四物加蒺藜首烏黃耆二十劑而愈

智化寺一僧患瘡矯自用雄黃艾葉等藥燃于被中熏之翌日遍身煩腫皮破水出飲食不入投以解藥不應而死蓋藥毒熏入腹內而散真氣其禍如此

丁丑余舉家生瘡家人亦用此方熏之瘡不愈未幾兒出疹症極兩藥不能下咽而歿迨亦受其

毒耳

一男子患瘡疥搔破出膿水面赤作渴大便堅實脈洪數在關寸為甚此木火相搏也先用瀉青丸料煎服熱勢頓減又用鹿子柴胡散加味逍遙散而瘡愈

一儒者遍身生瘡蝕瘙痒濃水淋漓自知醫服八珍荊防之類益甚脈洪大按之無力謂此氣血虛熱也用八珍湯加丹皮治之而愈繼娶後兩足生瘡久不愈尺脈數而無力用地黃丸八珍湯而痊

一男子時疫愈後遍身發瘡作痒服補中益氣湯而愈有同患不信乃用砭法出血而死此因陰虛血熱色黑作痒也

一男子患瘡乾痒作痛以苓連荊防山甲薄荷白芍歸梢治之而愈

蔣仲芳治一僧初患疥自以水銀薰艾薰之遂喘急胸滿遍身浮腫或投五皮飲不效復投橄目大黃等喘腫愈甚曰疥在皮膚肺氣熱也復以火薰火毒傷肺遂失降下之令氣道塞水道閉喘急溺澁浮腫之所由來也今復推蕩陰血又傷若非童真難免于死矣以麥冬黃芩山甲桑皮花粉滑石木通燈草與之四劑而愈（薛按有一僧亦用熏法致死）

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

胡氏子年二十餘生膿窠已一年服藥無算長臥床席二三日間番轉側兩手皆瘡不能診候問其飲食惡心吞大半二十劑而全愈

姚氏婦有子而自乳肥瘡如桃背及下半身俱滿異痛異痒膿血淋漓已經三月不時寒熱漸作惡心蔣曰病意矣但喜其日未久因乳子而血氣驟虛因多卧而飲食不運也亦以前方加黃柏連翹陳皮香附外以大黃朴硝松香東丹為末少加飛鹽麻油調敷亦不久而愈此二人者胡子日久而不痒故純用補藥姚氏痒則為火惡心為食故加清熱消運之品俱為日久虛弱者設也若初起壯實者粒如小粟而多痒曰疥瘡風熱為勝理以苦參黃柏荊芥防風為君膿泡如豆而多痛曰膿窠濕熱居多理宜蒼术秦艽銀花連翹為主俱加天麥門冬酒炒黃芩以清肺益肺主皮毛肺熱則皮毛有是疾也若日久則肺虛又宜補肺而不宜清肺矣此意先哲未及故附之

癬

張子和治一女子年十五雨肢間濕癬長三四寸下至膝發痒時爬搔湯火俱不解痒定黃赤水流大痛不可忍炙燖熏漬硫黃礬如僵蠶羊蹄跟之藥皆不效其父母來求療張曰能從予言則瘥父母諾之以鈚針磨尖快當其痒時于癬上各刺百餘針其血出盡煎鹽湯洗之如此四次大病方除此方不盡以告後人恐為癬藥所誤濕淫于血不可不治者矣

薛立齋治一人生風癬似癬三年不愈五心煩熱脈洪

按之則澀此血虛之症也當以生血為主風藥佐之若專攻風毒則血愈虛而熱愈熾血被煎熬則發瘡瘍或為怯症遂以消導散數劑及人參荊芥散二十餘劑而愈

劉禹錫傳信方云余少年曾患癬初在頸項間後延上左耳遂成濕瘡浸淫用斑蝥狗膽桃根諸藥徒令蝥蘸其瘡轉盛偶于楚州賣藥人教用蘆薈一兩研甘炊炙半兩相和令勻先以温漿水洗癬乃用麝乾帛子拭乾便以二味合和傅立乾差神效本草

薛立齋治一男善怒面青腿內臟患癬類色赤作痒或

為砭刺出血發熱煩痛服消風散而益甚服通仙丹愈加發熱作渴仍服之膿水淋漓其脈洪數左關為甚此肝經血虛火內動復傷其血而瘡甚先用柴胡清肝散數劑又用四物山梔治之諸症漸退用八珍湯地黃丸兩月餘而痊

張子和治一童子三歲病滿胸腹濕癬每爬搔則黃水出已年餘先以苦末作丸上涌次以舟車丸瀉川散下三五行次服涼膈加朴硝煎成時時呷之不數日而愈

疣瘡

翟立之素善飲遍身疣瘡搔起白屑上體為甚面目煩腫成瘡結痂承漿潰膿眼赤出淚左關脈洪數有力或作癮風治之膿潰淋漓此肝火濕毒以四物湯加乾葛連翹山梔柴胡一劑諸症悉退四劑全退兩睛各顯青白翳一片亦屬肝火再劑翳去乃用六味丸而愈

一儒者身發疣瘡時起赤暈憎寒發熱服癮風之藥着落筋攣後疣瘡漸潰日晡熱甚肝脈弦洪餘脈數而

國立國會圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

無力此肝經血虛風熱也先以小柴胡合四物湯加丹皮酒炒黑知柏肝脈漸和晡熱漸退又用八珍湯加山屘寒熱頓去再與加味逍遙散加參朮鉤藤服兩月瘡瘧愈而着漸生後因怒復作用小柴胡湯加芎歸鉤藤木賊而愈後勞役發熱誤用寒劑不時身痒日晡赤暈早與補中益氣湯加五味麥冬山藥午後與加減八味丸尋愈後食炙煿等物仍發疙瘩小便白濁右關脈滑大有力用補中益氣湯加山屘諸症悉退

一男子秋間發疙瘩兩月餘漸高有赤暈月餘出黑血此風熱血虛所致先用九味羌活湯風熱將愈再用補中益氣湯而愈後不慎房慾復作盜汗晡熱口乾嗽痰體倦嬾言用補中益氣湯加減八味丸頓愈

一婦人遍身疙瘩搔痒數(服)毒之藥成瘡出水寒熱脇痛小便不利月經不調去風之劑形體消瘦飲食少思此肝火血燥生風也前藥益傷脾血先用歸脾湯二十餘劑又用加味逍遙散二十餘劑諸症漸愈乃用六味地黃丸調理而瘥此等症候服風藥而死者多矣

一男子不時患疙瘩搔痒成瘡膿水淋漓惡寒發熱先

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

用羌活當歸散而痒止又用易老祛風九而不發後
飲燒酒起赤暈二便不通口吞生瘡熱渴不受用防
風通聖散二便通利但口乾體倦飲食不入用七味
白术散去木香四劑而愈
一男子遍身患疙瘩作痒勞而益甚用參耆歸术為君
佐以柴胡炒芩桔梗川芎炙草而痊更用補中益氣
之劑後不再發
一男子患疙瘩瘙痒發熱形氣虛弱口鼻氣熱且喜飲
冷屬外邪也以消風散二劑外邪悉解但倦怠少食
更以參耆陳皮炙草五味而愈又以補中益氣湯去
柴胡升麻加茯苓白芍乃痊
一男子患疙瘩多在臀脚勞役則痒甚小便色黃眼眵
毒散芩連之劑患處痒痛夜不得寐此脾氣下陷用
補中益氣湯加五味麥冬少用炒黑黃柏治之而痊
凡病日間如故日晡倦怠成勞愈加晨起如故皆元
氣虛也宜用前藥補而治之
一男子患疙瘩色黯作痒出黑血日晡至夜益甚其腿
日腫夜消以為氣血虛而有熱朝用補中益氣湯夕
用加味逍遥散而愈
一儒者應試後遍身瘙痒後成疙瘩此勞傷元氣陰火

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

內熾秋寒收斂腠理鬱熱內作補中益氣湯加茯苓
川芎白芷而愈後復勞仍作惑于人言服祛風敗毒
藥如大風之狀又發熱作渴倦怠懶食用補中益氣
湯倍加參耆歸朮半夏茯苓五味麥冬而愈

一婦人遍身患疙瘩發熱作痒內服敗毒祛風外搽攻
毒追蝕各潰成瘡膿水津淫形氣消瘦飲食日減惡
寒發熱作渴飲冷脈浮數按之則澀此元氣復傷也
先用七味白朮散數劑其渴漸止飲食稍加乃用八
珍湯加柴胡丹皮膿水漸乾又用六君芎歸丹皮山
庶瘡漸收斂仍用八珍山庶丹皮而愈

一婦人因怒寒熱發赤暈服祛風之藥發疙瘩或起出
血患處瘀腫發熱頭痛內服外敷俱係風藥膿水淋
漓服花蛇酒之類前症益甚更加晡熱煩渴不寐脈
洪大按之如無此血脫煩躁先用補血當歸湯稍緩
用四君當歸數劑得睡但倦怠頭暈少食用補中益
氣湯加蔓荊子稍可又用八珍湯少用芎芍倍用參
朮三十餘劑而能步履又服月餘而痊

一婦人性急善怒月經不調內熱口苦患疙瘩作痒服
敗毒之藥膿水淋漓熱渴頭眩日晡益甚用加味逍
遥散漸愈後因大怒月經如湧眼赤出淚用四物湯

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

加山庀柴胡連翹數劑而愈年餘左足臂腕起白點漸大搔起白屑內熱盜汗月經兩月餘一至每怒或惡寒頭痛或不食作嘔或胸乳作脹或腹內作痛或小便見血或小水不利或白帶下注此皆肝木制伏脾土元氣虛而變症也用補中益氣湯加炒黑山庀及加味歸脾湯服半年而愈後每怒惱患赤暈或以風疾治之發疙瘩又服胡麻草烏之藥遍身瘙痒舊毛脫落膿水淋漓咳嗽發熱月經兩月一行用四君當歸丹皮月餘熱渴稍止飲食少進又服月餘咳嗽少可却用八珍湯加丹皮二十餘劑患處漸乾經水如期後因傷食作瀉不食用六君子湯飲食漸進又因怒發熱作渴患處作痛經行不止用加味逍遙散漸可仍用四君子湯而全愈

一女子二十歲月經先期或過期或怒則身發赤暈或患疙瘩六七日方退服祛風藥瘙痒作渴搔破成瘡膿水津淫曰此肝火生風再服是藥必致筋攣不悟後兩手果攣始信先用地黃丸四物湯月餘熱渴頓減乃佐以加味逍遙散又月餘患處膿少又用四君山庀丹皮二十餘劑指能伸屈因怒發熱經水不止睡中筋脈抽動不安以加味逍遙散加鉤藤治之而

瘍仍用四物山庪鈎藤丹皮而瘡結靨乃去鈎藤調理元氣復而瘡靨乾

一女子常患癮疹作痒因怒發熱變為疙瘩聲甚用庪子清肝散治之而愈後又怒患痕起赤暈遊走不定自砭出紫血甚痒徹骨其熱如炎如大麻風欲用風藥治之曰怒乃以當歸補血湯四劑其熱悉止又用聖愈湯加味逍遥散而瘥

一婦人身發疙瘩或如丹毒痒痛不常搔碎成瘡膿水淋漓發熱煩渴頭目眩暈日晡益甚此血虛內熱之症以當歸飲加柴胡山庪治之愈

一婦人患前症肢體疼痛頭目不清自汗盜汗月水不調肚腹作痛食少倦怠先用人參荊芥散後用逍遥散治之而瘥

一婦人因怨怒身發疙瘩憎寒發熱此肝火用小柴胡湯加山庪黃連治之而愈後口苦脇痛小便淋漏復用前藥遂全愈

一婦人患前症發熱夜間譫語此血分有熱以小柴胡湯加生地治之而安後用四物湯加柴胡山庪丹皮而熱退又用逍遥散全愈

一女子常患疙瘩時或作痒服消風之類搔破成瘡其

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

痒不止延及頭面先用羌活當歸散其痒頓止用加味逍遥散其熱頓痊又用當歸飲而瘡亦愈用八珍柴胡山庶而不再作

血風癮疹

薛立齋治一男子面赤作渴面常患小瘡作痒服祛風藥遍身發赤瘾服花蛇酒更發赤暈遍行砭刺又服消風散發熱口渴飲水不止謂肝經血虛而風熱也用庶子清肝散及地黄丸料煎服熱渴漸止瘡漸結靡又用八珍湯地黄丸瘡靡漸脱又服月餘瘡漸愈

一男子面生粉刺或生小瘾服消風散瘡益甚服遇仙丹加遍身赤痒仍服前藥發熱燃腫又服旬餘潰而出水形體骨立先用四君子當歸桔梗數劑飲食稍進又用八珍湯數劑而痊

一男子嗜膏粱炙煿醇酒辛辣之物遍身生瘡瘾甚痒服消風散之類更起赤暈又砭出血其痒益甚數敗毒之劑遂各成瘡膿水津淫着毛漸脱赤痒益甚此脾經積熱傷血所致先用犀角地黄湯諸症稍退乃用濟生犀角地黄湯加黄連治之膿水漸止乃以八珍湯加山庶丹皮着毛漸生因飲食失宜胸腹作脹

飲食少思或大便下血用五味異攻散加升麻飲食漸進又用補中益氣湯而血止仍用異攻散加當歸丹皮而瘥

一女子性急多怒月經先期患瘡癗色赤作痒搔破膿水不止服祛風藥其瘡益甚服花蛇酒四肢瘡癤着毛脫落先用柴胡清肝散加鉤藤數劑又用加味逍遥散加鉤藤諸症漸愈又用易老祛風丸而安

一女年十四腕軟處生物如黃豆大半在肉中紅紫色痛甚諸藥不效一方士以水銀四兩白紙二張揉熟蘸水銀擦之三日自落而愈李樓怪症○本草綱目

宋丹溪治宋院君三十餘久患癮疹身痒而紫色可與防風通聖散加牛蒡為極細末每二錢水盞半入薑汁令辣煎食前熱飲之

汪石山治一人年逾六十形瘦蒼紫夜常身痒搔之熱蒸皮肉磊如豆粒痒止熱散肉磊亦消醫用烏藥順氣升麻和氣等不效診之脈皆細濡近駛曰此血虛血熱也而為順氣和血所謂誅罰無過治非所宜遂以生地元參白蒺藜歸芎黃芩甘草陳皮煎服月餘而愈

一老人患疹色微赤作痒發熱以人參敗毒散二劑少

愈以補中益氣湯加黃芩山庶而愈

一婦遍身瘙痒秋冬則劇脈浮數此風邪客于皮膚而
甚也名曰血風瘚飲以消風散及搽蛇床子散少可
更以四物湯加荊防數劑而愈

一婦患此夏月尤甚脈洪大以何首烏散一婦人患赤
斑瘙痒搔破成瘡出水久而不愈內服當歸飲外搽
蛇牀子散益愈

一婦患此諸藥不應以四生散數服而愈大抵婦人體
虛風邪客于皮膚則成白瘭寒濕客於肌肉鬱熱而
為赤瘭色雖有異治法頗同凡人汗出不可露卧及
浴經云汗出見濕乃生痙痹雷公云遍身風瘭酒調
生側用之屢驗

瘙痒

薛立齋治一男子遍身瘙痒後成瘡出水灑淅惡寒皮
膚發起眉毛漸落大便秘結小便赤少此屬肺火為
患用補氣瀉榮湯四劑諸症漸退但倦怠惡寒小便
清少此邪氣去而真氣虛也用補中益氣湯兼換肌
散半載元氣復而諸症退時仲秋忽大便不實小便
頻數體倦食少灑淅體重此濕邪乘虛而作用東垣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, WWW.NCL.EDU.TW

益胃湯二劑頓安仍用前藥調理三月餘全愈

一男子兩目俱赤遍身痒痛搔起白皮此肝肺陰虛誤服祛風燥劑鼻赤面紫身發疙瘩搔出血水用升麻湯下瀉青丸數服又用加味逍遥散數劑身鼻漸白疙瘩漸消又用四物湯加參耆柴胡山甲并換肌散各百餘服喜其年少謹疾全愈

一婦人日晡身痒內外用追毒祛風之劑膿水淋漓午前畏寒午後發熱殊類癮風用補中益氣湯加山甲鉤藤又以加味逍遥散加川芎而愈

一婦人手心赤瘡痒發熱頭暈作渴晡甚服祛風清熱之藥膚見赤痕月經過期用加味逍遥散倍熟地止痒退更以四物湯加柴胡參耆炙草茯苓頭清渴止再用四物湯加參朮茯苓山甸赤暈亦消

一男子患瘡痒破而成瘡如大麻風服遇仙丹發熱作渴大便秘結脈沈實右關為甚此熱畜于內也先用黃連內疏湯而大便通利又用防風通聖散去硝黃而熱渴止却用八珍湯而瘡愈

一男子脾腎氣血虛熱後遍瘡痒時喜熱水浴之後患瘡癩破而出水用風藥益甚或赤或白眼作花痒先用胡麻散六味丸痒漸愈用六味丸消風散瘡漸愈

用八珍湯六味丸而瘡次年兩股小腹頸項復作痒
用四生散六味丸而飲食倍加
一婦人經水先期勞役或氣惱則寒熱瘡痒服祛風降
火等藥不勞怒而自痒發熱更加痰喘氣促服化痰
清氣之藥形氣俱倦怠食少胸膈身發瘡疹服消毒之
類膿水淋漓服大麻風藥口乾作渴欲水而不敢飲
經水久過期着間若動又服月餘着毛脫落經水淋
漓此心肝二經風熱相搏制金不能平木木剋脾土
而不能統血肝火旺而不能藏血也着間屬甲木而
主風風動血燥而着毛脫落又若動也經云水生木

遂朝用地黃丸以滋腎水生肝血月餘諸症漸愈又
佐以四君芎歸丹皮月餘經水旬日而止又兩月餘
經水五十餘日而至乃夕用五味異攻散加當歸服
兩月經水四十餘日而至因怒寒熱經水如崩着棱
覺動脈洪數按肝脾二脈為甚用柴胡逍遙散一劑
以平肝火用五味異功散二劑以補脾氣發熱頓退
經水頓止更以八珍湯加參朮及地黃丸兩月餘經
水如期着毛漸生因飲食停滯腹脹作痛另服祛逐
之劑泄瀉不止小腹重墜飲食甚少先用六君子湯
送四神丸數劑瀉漸止飲食少進又用補中益氣湯

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

倍用升麻數劑重墜漸愈後因勞心發熱飲食難化
嘔吐涎水其熱自臍上起覺飢熱頻作乃用六君子
湯加炮薑治之熱時飲稠米湯稍安兩月餘又常服
加味歸脾補中益氣二湯而痊

一婦人秋間肢體作癢時發寒熱日晡熱甚口苦喜酸
月水先期而色常青熱甚則赤恪服清熱涼血後發
疙瘩赤癢益甚乃清熱敗毒破而膿水淋漓謂此肝
脾血燥虛不信仍治瘡毒其瘡益甚形氣俱怠飲食
減少先用補中益氣湯間佐以六君當歸元氣稍復
乃以八珍湯倍用參朮少用川芎白芍間佐以補中
益氣湯諸症漸愈又以四君子湯佐以加味逍遙散
兩月餘膿水漸少又服月餘瘡漸結靨因怒寒熱腹
脹飲食少思患處復甚用四君子湯為主而瘡漸愈又因怒月經甚多發熱
用四君子湯為主而瘡漸愈又因怒月經甚多發熱
作渴瘡痛出血用柴胡清肝散熱退痛止仍用四君
子湯而結靨又以八珍山甲丹皮而瘡愈

一婦人遍身瘙癢膿水淋漓發勢身如蟲行月經不調
先用升麻湯送瀉青丸熱癢頓退又用加味逍遙散
經行如期用換肌丸而瘡愈後因怒經行不止筋骨
作痛用秦艽地黃湯易老祛風丸而愈

倍用升麻數劑重墜漸愈後因勞心發熱飲食難化
嘔吐涎水其熱自臍上起覺飢熱頻作乃用六君子
湯加炮薑治之熱時飲稠米湯稍安兩月餘又常服
加味歸脾補中益氣二湯而痊

一婦人秋間肢體作痒時發寒熱日晡熱甚口苦喜酸
月水先期而色常青熱甚則赤恪服清熱涼血後發
疙瘩赤痒益甚乃清熱敗毒破而膿水淋漓謂此肝
脾血燥虛不信仍治瘡毒其瘡益甚形氣俟怠飲食
減少先用補中益氣湯間佐以六君當歸元氣稍復
乃以八珍湯倍用參朮少用川芎白芍間佐以補中

益氣湯諸症漸愈又以四君子湯佐以加味逍遙散
兩月餘膿水漸少又服月餘瘡漸結靨因愁寒熱腹
脹飲食少思患處復甚用六君子湯加山庪柴胡乃
用四君子湯為主而瘡漸愈又因愁月經甚多發熱
作渴瘡痛出血用柴胡清肝散熱退痛止仍用四君
子湯而結靨又以八珍山庪丹皮而瘡愈

發勢 當作發熱 六膿水淋漓發勢身如蟲行月經不調

先用升麻湯送鴻青丸熱痒頓退又用加味逍遙散
經行如期用換肌丸而瘡愈後因愁經行不止筋骨
作痛用秦艽地黃湯易老祛風丸而愈

一婦人性沈靜懷抱不樂月經過期遍身作痒服祛風清火之劑搽破成瘡出水不止其痒益甚或用消風散之類眉稜跳動眥毛折落又服遇仙丹患處俱潰咳嗽發熱飲食日少月經先期作肝脾鬱怒而血燥前藥復傷而益甚先用四君子芎歸山庖丹皮飲食漸進服月餘而嗽止又以加味逍遥散加釣籐二十餘劑而眥不動乃去釣籐倍加參朮當歸月餘瘡結靡又以八珍湯加山庖丹皮而痊

一婦人患前症膿水淋漓發熱作渴體倦惡寒經水不調久而不愈此肝脾虧損而虛熱也先用補中益氣湯加川芎山庖而元氣漸復又用逍遥散而瘡漸愈又產後患疥遍身作痒搽起疙瘩破而出膿或出血水誤服醉仙散殊類風症用八珍湯數劑而安又用十全大補湯患處漸乾矣

一婦人日晡身痒素清苦因于鬱怒遍身疙瘩晡熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥用歸脾湯數劑諸症稍退後無加味逍遥散五十餘劑而痊

一婦人瘙痒發熱日晡益甚皮膚赤暈月經過期此血虛而有熱也以逍遥散倍加熟地熟止痒退更以四物加柴胡參耆炙草茯苓調理而愈

醫學叢鈔本

一婦人懷抱久鬱患前症膿水淋漓服連翹消毒散食少胞痞服清氣化痰丸作嘔吐痰服清熱化痰丸煩熱畏寒四肢煖熱面目赤色脈大而無力此脾胃虧損而虛寒隔陽氣于外遂用六君子湯加炮薑治之諸症少愈飲食頓進又佐以四物湯諸症漸愈又以四君子每味各一錢四物湯每味各五分諸症全愈一婦人每秋間兩手心作痒搔起白屑因勞役惱怒則發寒熱遍身作痒起疙瘩或以為風症內服花蛇等藥外敷硫黃之類患處煖潰又服遇仙丹熱渴益甚月水不通謂脾肝二經血燥生風先用加味逍遙散

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

熱渴漸減又用八珍柴胡山屐患處少可後因怒氣發熱脇痛患處煖腫用加味逍遙散四劑而安又用四君子湯加炮薑至半載而痊

一男子遍身瘙痒諸藥不應脈浮按之而澀以生血藥為主間以益氣百貼而愈

宋生遍身作痒搔破成瘡出水脈浮數此手足陽明經風熱所致以人參敗毒散對四物湯加荅連服之外以松香一兩枯礬五錢輕粉三錢為末麻油調敷月餘而愈又一人患此但脈沈實以前藥加大黃治之漸愈再服人參敗毒散而平

續名醫類案卷五十七

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷之五十八

錢塘魏之琇玉横撰

瘡瘍

陸肖愚沿徐邑宰秋末冬初遍身生癰大小不一紅痛燃痒黃水漓淋或謂風熱用防風通聖數劑不減或謂諸痛痒瘡瘍皆屬心火用芩連山卮生地等十劑益甚且飲食漸減脉之浮按微數沈按中按皆緩而弱曰凡風熱大都為癮疹未必為瘡癰至瘡瘍之為

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

心火經固言之第脉微弱為多此元氣不足也緩者濕也數雖為熱而微數不可純責之火據今日之症火為標濕為本原得病之由又濕為標元氣不足為本此必乘虛汗出澡浴濕漬肉腠久而熱蝕為膿水發為痛痒也用蒼朮茯苓燥濕為君人參白朮黃耆甘艸補氣為臣連翹蟬退清熱為佐葛根白芷入陽明肌肉為使二劑痛減頓減胃少開十劑全愈

張子和治頭皐韓吉卿自髀至足生濕蟲大者如錢小者如豆痒則搔破水到則浸淫類蟲行袴穢愈而復生瘢痕成凹十餘年不瘥張哂之曰此濕蟲瘡也由水濕而得故多在足下以舟車滲川犬下十餘行一去如埽

一省掾背項常有痤瘡愈而復生張曰太陽血有餘也先令通泄之次于委中鈹針出紫血病根不復作也

張男衮常喜熱火烘灼其背及兩足又食自死肉久而兩足常生癰毒愈而復生半年餘以清涼飲子下之得紫黑血積于便中去者月餘其癰毒頓除是知積熱毒致癰腫者如此

薛立齋治春元沈霓川之內暑月面生痤瘡乘涼入風面目浮腫越二日左臂腫痛癮疹如丹背脇髀股等

處發腫塊三四肉色不紅痛甚晝夜號呼寒熱往來飲食不思服活命飲及行氣敗毒之劑其勢愈熾肝脉浮濇脾脉弦弱此屬二經榮氣不從風邪乘虛流注經絡為患先以八珍加黃耆柴胡青皮數劑腫處漸漸紅暈又以十全大補加銀花白芷龍膽草貝母十餘劑脇腿二處潰膿椀許餘塊漸平仍服十全大補湯調理月餘而安向使專于祛風攻毒鮮不敗事矣

張仲安治凍瘡用黃柏燒存性研細以雞子清調傅破者乾糝上神妙

治暑肌膚瘡爛或因搔成瘡多是大暑汗出坐卧濕地致肌膚多瘡爛汁出有一乳母曰此易差也取乾壁細土末傅之隨手即差

治一切惡瘡遍用藥不效者陳米飯緊作團火煅存性麻油臘粉調傅蘇韜光丁亥年耳上病碎瘡或痛或痒兩月餘百藥不効季倅子長傅此方初不之信試用之次日即愈辛丑年再作呂仲發顥謨云此症夏以痰飲治之故只用肥皂燒存性生油臘粉調傅尤佳 並集成 三條

薛立齋治一男子年四十三歲自四十已來每至夏發

熱而倦日午益甚晚凉少可面生瘡瘺耳下筋微腫
更結小核三四枚附筋上曰此火令不慎房勞虧損
腎水不能制火然也名曰注夏彼不信服降火敗毒
藥加口乾倦怠夜間熱甚午後腿軟足心熱筋攣痛
復來問治曰口乾倦怠此中氣惱下也夜間發熱陽
氣惱于陰分也午後腿疲足熱陰虛火甚也耳下筋
攣痛血虛不能潤筋也先以補中益氣湯少用柴胡
升麻加五味麥冬熟地治之諸症頓退更服滋腎丸
而瘥若以每至火令而然用敗毒凉藥鮮不危矣凡
春末夏初患頭痛腳軟食少體熱此仲景云春夏劇
秋冬差而脉弦大者正世俗所謂注夏病也

趙州守北方人年踰四十頭面生瘡瘍數枚燬痛飲冷
積日不潰服清熱消毒藥不應診其脉數按之則實
以防風通聖散二劑頓退又以荊防敗毒散而愈又
一男子患在四肢審其脉症亦屬有餘以黄連解毒
湯治之亦愈

繆仲淳治一婦人生瘡臂上用連翹白芷白芨花粉各
二錢甘菊一兩紫花地丁金銀花各五錢甘艸生地
茜艸各三錢地榆四錢角刺牛蒡各一錢服之半日
立出膿血而愈廣筆記又治一男子生瘡膝下加牛膝

三錢立破出鮮血愈又以此方治陸封翁腿癰三四劑而愈

丁右武親驗坐板瘡方松香五錢細研雄黃一錢細研如濕痒加蒼朮三錢各末和勻以綿紙包裹撚成紙撚二條臘月猪油浸透點火燒著取滴下油搽上立效

立齋治一男子年逾四十胃氣素弱面常生瘡盜汗發熱用黃耆建中湯少愈更以補中益氣湯而平東垣云氣虛則腠理不密邪氣從之逆于肉理故多生瘡若以甘温之劑實其根本則腠理自固即無他疾

張生患漆瘡作嘔由中氣弱漆毒侵之以六君子湯加砂仁藿香酒芍治之彼不信另服連翹消毒散嘔果盛復求治仍以前藥外以麻油調錢鏞末塗之而愈

趙千兵患兩腿生瘡每服敗毒藥則飲食無味反增腫脹此脾虛濕熱下注也以六君子湯加蒼朮升麻酒芍服之以黃蠟麻油各一兩輕粉三錢為膏貼之而愈大凡下部生瘡雖屬濕熱未有不因脾腎虛而得者

一男子濕熱下注兩腿生瘡以人參敗毒散加蒼朮黃柏服之以金黃散敷貼又一人患此久而不愈以船

板灰存性一兩輕粉三錢為散麻油調貼更以黃柏知母防己龍胆草茯苓當歸川芎黃耆白朮服之並愈若人兩腿生瘡作痛或遍身作痛以當歸拈痛湯治之

一婦人兩腿腕紫黯寸許搔破出水或用祛風砭血年餘漸徧如掌許乃服草烏等劑遍身搔痒時出血水內熱體倦飲食無味月經三月一至脉洪而數按之則澁此燥劑愈傷脾血也先以補中益氣湯加白芍川芎五味十餘劑乃與加味逍遥散加熟地釣藤二十餘劑再用歸脾湯加川芎熟地治之而不發

一婦人素清苦四肢似癬疥作痒出水怒則起赤暈服祛風敗毒等劑赤暈成瘡膿水淋漓晡熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥此鬱傷脾血也用歸脾湯逍遥散兩月而瘳

一儒者素食膏粱發熱作渴飲冷患瘡如大麻風大便出黑血服清熱祛風等寒藥益甚謂血分有熱火也故寒之不寒用四物二連湯以清熱凉血用六味丸以補腎生水而熱退又用柴胡芭子散調理而瘳

一婦人性急善怒月經不調內熱口苦患時瘡服敗毒藥膿水淋漓熱渴頭眩日晡益甚用加味逍遥散服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

之漸愈因大怒月經如涌眼赤出淚用四物湯加山
色柴胡連苓數劑而愈年餘手足臂腕起白點漸大
搔起白屑內熱盜汗月經兩月餘一至忽怒或惡寒
頭痛或不食作嘔或胸乳作脹或腹內作痛或小便
見血或小水不利或白帶下注此皆肝木制伏脾土
元氣虛而變症也用補中益氣湯加黑山色及加味
歸脾湯間服半年而愈

一婦人久鬱患在四肢腿腕尤甚誤用敗毒寒涼之劑
晡熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥此鬱火傷
脾也用歸脾湯數劑後兼服逍遙散五十餘劑而瘳

劉松窗經驗方云會水灣陳玉田妻病天蛇毒瘡一老
翁用水蛇一條去頭尾取中截如手指長刮去骨肉
勿令病者以見以蛇皮包手指自然束緊以紙外裹之
頃覺遍身皆涼其病即愈數日後解視手指有一溝
如小繩蛇皮內宛然有一小蛇頭目俱全也本艸綱目

孫思邈以貞觀五年七月十五日夜以左手中指觸著
庭木至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大
色如熟小豆色嘗聞長者論有此方遂用治之手下
即愈痛亦除瘡亦即瘥未十日而平復如故方用蒲
公英搗爛取汁塗之同上

張子和曰麻先生妻病伐指痛不可忍酒調通經散一錢半夜先吐吐畢而痛減余因嘆曰向見陳五曾病此醫以為小蟲傷或以草上有毒物觸之遷延數月膿盡方已以今日觀之可以大笑

王思中治一人患瘡疹陰囊腫脹如升不能跬步王曰此瘡蠱也就外科中加麥稈四十九莖遂消（吳江縣志）

戊申之水乃二百餘年創見之變人足浸水中數日即皮破生瘡痛不可忍一法取水荊條煎水浴之立愈（續金陵瑣事）

瘍症

吳性全忽患症如癮風眉毛脫落面額褪皮皮去肉色又如白癜風耳前後目上下多生小癩乳及腿上亦有頗去膿血往時久病喘予以養肝之劑愈之自是足趾縫及兩旁常作痒出稠水及面瘍既發足疾頓失有指為風者有指為濕者有指為牛皮癬大麻風者聿渠素不輕藥守至數月不愈乃就診余曰前所指皆非也此即往時喘之變症耳良由肝火熾盛火極似風上淫于肺蓋火就燥也前在經絡則為喘今

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

在皮毛則為瘍薛立齋謂之癘瘍類症治之必五十劑乃瘳與生地杞子萎仁赤芍甘草麥冬淨銀花鮮首烏之屬出入加減果五十劑而愈夫肝木為龍龍之變化莫測其于病也亦然明者遇內傷症但求得其本則其標可按籍而稽矣此天地古今未洩之秘內經微露一言曰肝為萬病之賊六字而止似聖人亦不欲竟其端委迫以生殺之柄不可全操之人耳余臨症數十年乃始獲之實千慮之一得也世之君子其毋忽諸

患瘍便秘

薛立齋治一男子患癰未作膿熾痛煩躁便閉脈實用內疎黃連湯二劑諸症悉退以四物加芩連四劑而消

一男子潰後便牆脈浮按之則濇以八珍湯加紅花桃仁陳皮杏仁治之而愈

一弱人潰後便秘而脈濇以四物湯加紅花桃仁黃耆治之而愈

一男子潰後便秘而脈浮以四君子湯加陳皮杏仁當

歸治之而愈

一老人潰後大便秘小便赤澁診之脉浮數而澁以八珍湯加知柏治之而已愈後小便復數而赤大便秘口乾目花以加減八味丸滋腎丸治之而愈此症乃陰血虛陽火盛故用前藥有効向投苦寒之劑必致有悞矣

一男子潰後便漕肌膚作痒胃氣血虛不能營于腠理用補劑治之不信乃服風藥致不救大抵瘡瘍始作便秘脉數而漕者宜降火凉血為主潰後便秘脉漕者宜補血氣為主若投風藥禍在反掌

鄭心法伯會上舍進士患癰將痊大便秘結服大黃等葯反廢飲食乃用補氣血之劑加桃仁麻仁求効更以猪胆汁深納穀道續以養氣血而愈原病式云諸澁枯涸皆屬于燥燥者火之氣病後血衰故大便秘澁宜以辛甘潤之如用苦寒則胃氣伐矣凡老弱產後便難皆氣血虛也胆汁最效

腎臟風

薛立齋治一男子患腎臟風飲燒酒發赤暈砭出血數追毒之藥成瘡出水日晡益甚類大麻風服遇仙丹

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

眉毛折落大便下血虛羸內熱飲食甚少勢誠可畏先用聖濟犀角地黃湯其血漸止又用五味異功散加當歸升麻飲食漸進用四物參朮丹皮內熱漸減用易老祛風丸膿水漸少又八珍丹皮之類漸結靨因思慮發熱盜汗作痒赤暈用加味歸脾湯數劑熱漸止用加味逍遙散六味丸而瘥

一男子遍身生瘡膿水淋漓晡熱口乾兩足發熱形體消瘦襟服風藥六年未愈尺脉洪數而無力此腎經瘡也如小兒腎瘡之症用加減八味丸不半載而瘥

一男子遍身生瘡似疥非疥膿水淋漓兩腿為甚作痒煩熱肢體倦怠年餘不愈以為腎經虛火用加減八味丸瘥

一男子素嗜粱醇酒患腎臟風延及遍身服癩藥益甚又用撚藥于被中熏之嘔吐腹脹遍身浮腫潰爛膿水淋漓如無皮而死

一男子患足三陰虛患血風瘡症誤服祛風散毒之藥外敷斑毛巴豆等藥肌肉潰爛嘔吐腹膨或泄瀉虛冷或煩熱作渴此藥復傷脾胃虛敗也辭不治不越月而歿

一男子患遍身小瘡或時作痒口乾作渴服消風散起

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

赤瘁益甚服過仙丹膿水淋漓飲食無度肌肉消瘦尺脉洪数左尺尤甚謂腎水不足虛火上炎為患先用加減八味丸其渴漸止用補中益氣湯加五味肌肉漸生佐以八珍湯加丹皮麥冬百餘帖而瘥二年後不節房勞其瘡復作惑于人言又服消風散之類其瘡復患仍用前藥而瘥

一男子内腠作瘁色黯搔起白皮各砭刺出血其瘁益甚更起赤暈延及外臚津淫不已服祛風之藥肢體亦然作渴引飲左尺脉洪大数而無力謂此腎經虛火復傷其血火益甚而患耳先以八珍湯加五味子丹皮三十餘劑諸症漸退乃佐以加減八味丸料又百餘劑而瘥

劉鴻腿生濕瘡数年不愈尺脉軽診似大重按無力此腎氣虛風邪襲之而然名曰腎臟風瘡以四生散治之不信自服芩連等藥遂致氣血日弱膿水愈多形症愈憊迨二年復求治仍以前藥治之而愈夫肢體有上下藏府有虛實世之患者但知苦寒之藥能消瘡毒殊不知腎臟風因腎氣不足所致當以蒺藜為君黄耆為臣白附子獨活為佐使若再服敗毒等藥則愈耗原氣速其死矣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

癘風

實材治一人病癘症鬚眉盡落面目赤腫手足悉成瘡瘍令灸肺俞心俞四穴各十壯服換骨丹一料二月全愈鬚眉更生

一人徧身赤腫如錐刺實曰汝病易治令灸心俞肺俞四穴各一百壯服胡麻散二料而愈但手足微不隨復灸前穴五十壯又服胡麻散二料全愈

一人面上黑腫左耳下起雲紫如盤蛇肌肉中如刀刺手足不知痛詢其所以因同僚邀遊醉卧三日覺左臂黑腫如蛇形服風藥漸減今又發實曰非風也乃濕氣客五臟之俞穴前服風藥乃風勝濕故當瞤好然毒根未去令灸腎俞二穴各百壯服換骨丹一料全愈面色光潤如故

張子和治桑惠民病面風黑色畏風不敢出爬搔不已眉毛脫落作癩醫三年張曰非癩也乃出素問風論曰腎風之狀多汗惡風脊痛不能正立其色炲面癘然浮腫今公之病腎風也宜先刺其面大出血其血當如墨色三刺血變色矣于是下針自額上下鍼針直至頤頂皆出血果如墨色徧腫處皆針之惟不針

目銳眥外兩旁盖少陽経此少血多氣也隔日又針之血色乃紫二日外又刺其血色變赤初針時痒再刺則覺痛三刺其痛不可任盖邪退而然也待二十餘日又軽刺一遍方已每刺必以氷水洗其面血十日黑色退一月面稍赤三月乃紅白但不服除根下熱之藥病再作張在東方無能治者

吳恕字如心錢唐人博極羣書少貧貨烏蛇丸治瘋疾時采風使遼有患此疾者召恕與談驚服其議論遂委托治之疾果愈杭州府志

秘韞治大風用大烏蛇一條打死盛之待爛以水二椀浸七日去皮骨入糯米一升浸一日晒乾用白雞一隻餓一日以米飼之待毛羽脫去殺雞煮熟食以酒下之喫盡以熱湯一盆浸洗大半日其病自愈本草綱目

王海藏云王氏患大風病眉鬚墮落掌內生瘡服紫菀丸半月瀉出癩蟲二升如馬尾長寸許後愈紫菀吳茱萸菖蒲柴胡厚朴各一兩桔梗茯苓阜莢桂枝乾薑黃連蜀椒巴豆去皮膜炒人參各五錢川烏三錢加羌活獨活防風各一兩蜜丸桐子大每服三丸漸加至五丸七丸生薑湯送下食後臨卧服孕婦忌之此方治病甚多不能悉錄

周子固治王君海子病癩衆醫莫能療周授七藥漱之
牙齦出穢血數斗既而形盡瘦骨立後第以美味補
之數月瘥 九靈山房集

薛立齋治一男子冬間口苦耳鳴陰囊濕癢來春面發
紫塊微腫麻木至冬遍身色紫不知痛癢至春紫處
俱大至夏漸潰又至春眉落指潰此患在肝胆二經
令刺手指縫并臂腿脫出黑血先與再造散二服下
毒穢更以小柴胡合四物湯加白芷防風天麻角刺
漸愈又與換肌散但遍體微赤此血虛有火因家貧
未得調理秋間發熱至春面仍發塊用前散并養血
藥喜年少謹疾而愈

一膏粱之人鼻壞眉落指脫體潰熱渴晡甚四物湯加
酒炒黑知柏五味麥冬白芷天麻角刺三十餘劑熱
渴少止時仲夏精神倦怠氣喘身熱小便黃數大便
稀溏此元氣虛而時熱勝也用補中益氣湯頓安乃
與換肌散及益氣湯兼服兩月更以生肌散代茶飲
瘡少退至仲秋眩暈少食自汗體重大便溏數此亦
時濕之症用清燥湯調理而愈又用補中益氣湯少
加酒炒黑知柏角刺天麻兩月餘而痊又因勞倦耳
聵熱渴誤服祛風藥病氣益劇身發赤疹與益氣聰

明湯月許而愈

一男子赤痛熱渴膿水淋漓心煩掌熱目昧語澁怔忡不寧此心經受症也用安神丸兼八珍湯少加木通炒黑黃連遠志元氣漸復却行砭刺外邪漸退但便燥作渴用柴胡飲并八珍湯而愈再用換肌散而瘥

一男子肚見青筋面起紫泡發熱作渴寅卯時甚脉弦數腿轉筋小便澁此肝經火症先用柴胡飲熱退便利却用小柴胡合四物湯加龍胆草炒山卮三十餘劑及八珍湯加柴胡山卮養其氣血乃用換肌散去其內毒而安年餘因勞役飲食失宜寒熱頭痛遍身赤疹自用醉仙散而殁

一男子面發紫疙瘩膿水淋漓睡中搐搦遍身麻木漸發赤塊勞怒則痒肝脉洪大砭刺臂腿腕各出血用清胃湯加大黃角刺四劑煎下瀉青丸肝脉少退以升麻湯數劑下前丸諸症少愈却用寶鑑換肌散加許又用小柴胡合四物湯加參朮天麻角刺百餘劑及六味地黃丸半載而愈後因勞遍身麻痒脉微而進此氣血俱虛不能榮于腠理用十全大補湯加五味麥冬調理年餘而安

一男子面赤發紫泡下體痒痛午後發熱大便燥黑此

火盛而血虛也用再造散及四物湯加防己胆艸及
刺腿指縫出毒血而便和仍以前藥加白朮白芷茯
苓羌獨活而便黃仍以四物去胆艸防己少用獨活
加元參蔔薢五十餘劑而瘡退却用補中益氣湯加
天麻麥冬而氣血漸克時仲秋霖雨遍身瘙痛用清
燥湯而安隨用換肌散胡麻散八珍湯兼服而愈
一上舍面發腫肌如癬後變疣瘡色紫搔之出水此脾
肺之症也先用清胃湯以清胃熱解表毒又用四物
湯加山皀黃芩柴胡角刺甘草節以養陰血祛風熱
及砭臂腿腕手足指縫并患處以去毒血疎通隧道

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

乃與八珍湯加白芷角刺五加皮全蝎及二聖散兼
服月餘以養陰血治瘡毒又與補氣瀉濕湯少愈再
與換肌散而全愈後因勞倦遂發赤暈日晡尤甚以
四物湯加丹皮柴胡山皀并用補中益氣湯年餘雖
勞而不發
一男子遍身如癬搔癢成瘡色紫麻木痛之則痛小便
數而少此脾胃受症邪多在表用清胃散更砭刺患
處并臂腿腕出黑血神思漸爽但惡寒體倦口乾此
邪氣去而真氣虛也以大劑參耆芎歸蒺藜桔梗數
劑元氣頓復却用八珍湯加黃耆白芷蒺藜天麻軟

柴胡及二聖散治之其瘡漸愈後用換肌散八珍湯等藥調理半載而瘡後仍發誤用刻伐攻毒患兩感傷寒而死

一男子遍身疙瘩搔則痒撓則痛便閉作渴此邪在內也治以再造散二服微下三次用桃仁承氣湯加當歸四劑及砭出黑血漸知痛痒但形體倦怠用培養之劑復其元氣又用二聖散其瘡頓愈更用大補年餘而康後患痰涎壅盛舌強語澁用二陳蒼朮知柏澤瀉四劑而愈再用補中益氣湯調理而安

一男子素清苦眉盡落病在肝胆二經也乃刺臂腿腕及患處出黑血空心服八珍湯加五味胡麻首烏威靈食後服換肌散喜其無兼變之症又能篤守禁忌不半年而瘳

一儒者腳心或痒痛或麻痒或腫脹二年後身體作痒漸變疙瘩發熱耳鳴日晡益甚此屬腎虛也乃砭刺臂腿腕及手足指縫去其瘀血用六味地黄丸料加五味柴胡五十餘劑以補腎又用換肌散祛風丸以治瘡各斤許瘡漸愈得滋補守禁而瘳

一上舍遍身患之形病俱虛謂須用調補元氣完復方治其瘡不信恪服蛇酒以攻內毒更數砒霜等藥以

蝕外毒頓加嘔吐清水體痛如錐或以為毒氣外發不知脾主肌肉此因毒藥脾傷而然也反服祛毒之劑吐瀉不止而歿

一男子用藥湯熏洗汗出不止喘嗽不食腹鳴足冷肢體抽搐謂此因熱傷元氣膝理不密汗出亡陽耳是日果卒

下疳 此症與梅瘡無甚差別

丹溪治一隣人年三十餘性狡而躁素患下疳瘡或作或止夏初患白痢腸上微悶醫與理中湯四帖昏悶若死片時而甦脈之兩手皆澀重取畧弦似數曰此下疳瘡之深重者與當歸龍薈丸去麝四帖而利減與小柴胡去半夏加黃連白芍川芎生薑煎五六帖而安

薛立齋治一男子下疳腫痛不消一男子潰而腫痛發熱小便秘澀日晡或熱一小兒腫痛諸藥不應俱以小柴胡湯吞蘆薈丸數服而愈

一小兒十五歲患前症禀用消毒之藥虛症悉具二年餘矣詢之乃禀受所致用革薢湯月餘諸症漸愈又用補陰八珍湯補中益氣湯而痊

一男子陽事腫痛小便如淋自汗甚苦時或尿血少許尺脉洪数按之則澁先用清心蓮子飲加牛膝山卮黄柏知母柴胡数劑更以滋腎丸一劑而痊玉機微義曰如自汗小便少不可以藥利之既已自汗則津液外亡小便自少若再利之則營衛枯竭無以制火而煩熱愈甚當俟熱退汗止小便自行也兼此症乃陽明經病大忌利小便

張景岳治一少年因偶觸穢毒遽患下疳始潰龜莖數治不効旋從馬口延入尿管以漸而深直至肛門逐節腫痛形如魚口每過夜則膿結馬口脹不得出潤而痛之則先膿後尿數洗皆不能及張嘗遇一山叟傳得槐花藥方因以治之不十日莖根漸愈半月後自内達外退止馬口而瘥後現些微廣瘡復與五加皮飲十餘劑而愈向傳方者曰此方善治淫瘡熱毒悉從小便泄去且服此者可免終身瘡毒後患然猶有解毒奇驗則在發瘡之時但見通身忽有雲片紅斑数日而没者即皆瘡毒應發之處瘡毒已解瘡形猶見是其驗也張初未之信及此人瘡發之時瘡固不多而通身紅斑果見凡兩日而消

立齋治州守姜節甫患下疳膿水淋漓作渴吐痰午前

惡寒午後發熱曰午前惡寒屬陽氣虛弱午後發熱屬陰血不足不信反服二陳知柏之類飲食益少大便不實又曰晡熱渴小腹重墜患虛煩腫脹用四物知柏之類飲食不思此脾氣虛而下陷先用補中益氣湯調養脾胃以升陽氣諸症漸愈又用六味丸滋補腎水以生肝血而瘥

一男子患此腫硬煩痛寒熱先以人參敗毒散二劑而止更以小柴胡湯加黃連青皮治之而愈

一男子潰而腫痛小便赤澁以加減龍胆瀉肝湯加青皮黃連二劑少愈又以小柴胡湯加知柏當歸茯苓數劑愈

一男子因勞瘵竅作瘡時出白物發熱口乾以清心蓮子飲治之而安

一男子潰而腫痛發熱日晡尤甚以小柴胡湯加黃連知母當歸而愈

一男子已愈惟瘵中一塊不散以小柴胡湯加青皮荊防服之更以荊防牛膝首烏滑石甘草各五錢煎湯熏洗各數劑而消

一男子陰瘵或腫或作痛挺縱不收○一男子瘵中作痛白物如精隨溺而下此筋疝也並

用龍胆瀉肝湯治之皆愈張子和曰遺溺閉癃陰痿浮痹精滑白淫皆男子之疝也不可妄歸之腎冷若血涸不月月罷腰膝上熱足躽嗌乾癃閉少腹有塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕可入瘕門

一男子下部生疳諸藥不應延及遍身突腫狀似翻花筋聳骨痛至夜尤甚此肝腎二經濕熱所致先以導水丸五服次以龍胆瀉肝湯數劑再與除濕健脾之藥外貼神異膏吸其膿隔蒜灸拔其毒而愈若表實者以荊防敗毒散裡實者以內疎黃連湯表裡俱實者防風通聖散表裡俱虛者八珍湯氣虛者四君子湯血虛者四物湯俱加兼症之藥治之並愈瘍科大法器具于此

若服輕粉等藥反收毒于內以致迭發槩服防風通聖散氣血愈虛困而不治者多矣

繆仲淳治數友下疳用黃柏官粉臘粉杏仁珠末水片敷之無不愈者後去臘粉杏仁加黃芩更以小大薊地骨皮湯洗淨敷之効更良廣筆記

仲淳治下疳極秘神方鮮小薊鮮地骨皮各五兩煎濃汁浸之不三四日即愈一切極痛者屢用神効同上

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

立齋治一老人患疳小便淋瀝脉細體倦此氣虛兼濕熱也用清心蓮子飲及補中益氣湯治之而愈又一弱人拘中作痛小便淋瀝此因火燥下焦無血氣不能降而滲泄之令不行用四物湯加黃柏知母茯苓牛膝木通十餘帖痛止便利先君氣短拘中苦瘡小便不通製四物湯加參耆煎吞滋腎丸而愈蓋前症以虛為本以病為末益其本則末自去設若不固元氣專攻其病害滋深矣

王錦衣年逾四十素有淋患疳瘡煩痛倦怠用小柴胡湯加黃連黃柏青皮當歸而愈

梅瘡

李時珍曰今醫家有搜風解毒湯治楊梅瘡不犯輕粉病深者月餘淺者半月即愈服輕粉藥筋骨攣痛癱瘓不能動履者服之亦効其方用土茯苓一兩苡仁金銀花防風木瓜木通白蘚皮各五分阜莢子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分水二大椀煎飲一日三服忌飲茶及牛羊鷄鵝魚肉燒酒法麵房勞蓋秘方也

縣中陳某家有使女生廣瘡求醫于方上道人其方只

用乾荷葉一味煎濃湯當茶日逐飲之盡量而止不過六七日即愈親試驗甚又一當縣甲首者生廣瘡傳方上人方用麥門冬子草根搗汁和好酒同服即愈其草頂取竹中無露水者為上 李翊成蓉漫筆

馮楚瞻治張姓人曾患梅瘡清涼解毒而愈未幾忽頭顱面頰鼻柱牙床疼痛不堪飲食難進謂餘毒為害復用清涼解毒漸至飲食俱廢坐卧不能精神疲困六脉微弱馮曰果屬陽毒脉宜洪大此為寒涼久服致陰陽失職耳即惡瘡初發亦由精血元陽虧損斯陰寒凝泣之氣得以乘之乃與大劑熟地麥冬白术牛膝五味附子兼八味丸並服半月全愈

孫文垣治吳東星瘡止腰痛白濁唉嗽肌肉大消百治不應痛劇欲死脉之左弦細右滑大俱六至口渴眼赤知其昔患梅瘡餘毒尚伏經絡因瘡後氣血不足舊毒感動故痛而暴也以當歸白芍甘艸牛膝鈎藤苡仁木通白蘚皮用土茯苓四兩煎湯煎藥服下痛止嗽除脉緩其半數帖大效精神漸復冬至日乘酒縱慾次日腰如束縛足面疼右眼赤小水短足底有火從兩胯冲上痛不可言再以歸芍鈎藤甘草牛膝苡仁紅花生地黃柏三日症畧減遠大雪寒甚有女

醫因其大便燥結一日夜進元明粉一兩五錢後大
去其腰痛愈猛兩足攣縮氣息奄奄面青慘六脉俱
伏痛使然也知服元明粉所致曰症雖熱但病在經
絡筋骨間徒瀉腸胃無益也足攣腰痛者由天氣寒
極經絡凝澁法當散寒邪之標使痛定然後治本乃
用桂心杜仲炙草蒼朮破故紙五加皮二劑痛定四
肢柔和飲食始進囑曰疾在經絡候春和始可除之
勿亟也不信更服滋陰降火之劑兩月無功再求治
乃以煨腎散進大瀉五六度仍是瀉其腸胃矣四肢皆冷咸
以為瀉之非也曰病從此減矣夫何憂再進理脾藥
數帖神氣遂轉腰膝柔和漸能步履乃以威靈仙末
二錢入豬腰內煨食之又瀉一二度審其梅毒濕熱
已清改用苡仁當歸生熟地白芍牛膝黃柏丹參龜
版調理全安

朱懷竹壯年容外不謹患楊梅瘡恐人知之欲歸乃求
速愈用藥熏洗不瘳又用藥末點之日服煎藥三帖
治兩月毒且入內下則肛脫瘡滿如蕈上則肺壅喘
盛胸脹不能仰臥內熱惡寒譫語陰囊疼瘡腫痛兩
足瘡延腫大脉之俱洪大而數曰病甚重幸壯年猶
可治第胸中有瘀血毒物俟出後乃可與藥否則反

用致疑另延醫果大發喘嗽吐紫黑血塊如膿者碗許腥穢不可近此熏藥迫毒入肺瘀壅肺竅故喘嗽必俟吐盡從而消之斯易為力也乃用丹皮桑白皮白蘚皮木通前胡枳殼桔梗甘草杏仁苡仁葶藶服後大便急重二十餘次所下黑紫膿血甚多喘咳稍定紅痰稍淡二三劑能卧改用白芍當歸白蘚皮貝母黃連銀花阜角苡仁麥冬木通二帖足瘡腫漸消陰竅出膿血二椀許兩尺已不洪大前方加丹參又二帖竅結疤三日後落下厚可半寸洞見兩丸系一光薄白泡用紅粉霜加生肌藥敷之日三次膿水乾再以人參歸芍白芷甘草白蘚皮阜角苡仁首烏調理一月悉愈令日用土茯苓猪肉各半觔同煮爛入醬鹽如常食之湯當茶飲遂瘳次年生女

潭公亮患結毒醫用五寶丹餌之三年不効仲淳云五寶丹非完方也無紅鉛靈柴不能奏功時無紅鉛姑以松脂鉛粉麻油調敷應手而滅公亮先用喬伯珪所贈乳香膏止痛生肌甚捷及用此二味功効彌良乃知方藥中不在珍貴之劑也 廣筆記

陸養愚治朱少川因感胃寒熱咳嗽筋骨疼痛服發散藥寒熱已除而疼痛咳嗽不止或以羌活治痛前杏

治嗽不効又以其濕色必陰虛投六味丸餘反口渴異常身熱疼痛益甚脉之沈細弦數而有力因問其曾患梅瘡否荅曰已過矣曰此症正其遺毒也疼痛者毒在經絡骨髓也咳嗽口渴者毒火上炎也用養血解毒之劑倍土茯苓數劑而減十劑全愈

薛立齋治一男子遍身皆患梅瘡左手脉浮而數以荊防敗毒散治之表症乃退以仙方活命飲六劑瘡漸愈兼飲萆薢湯月餘而愈

一男子患下疳諸藥不應延及遍身突腫狀如翻花筋攣骨痛至夜尤甚此肝腎二經濕熱所致先以導水丸五服次以龍胆瀉肝湯數劑再與除濕健脾之藥外貼神異膏吸其膿隔蒜灸拔其毒而愈

一童子外腎患之延及小腹數枚作痛發熱以小柴胡湯吞蘆薈丸更貼神異膏月餘而安

一儒者患前症先外腎作痒出水後陰囊股內小腹脇臂發小瘰或乾或膿窠誤服祛風等藥肢體倦怠惡寒發熱飲食漸減大便不實脉見浮弦兩尺浮數此腎水虛熱肝木乘脾土也用六味地黃丸補中益氣湯為主佐以換肌消毒散而愈

一人患此服攻毒等藥患處凸而色赤作痛肢體倦怠

原標
漓當是瀝

惡寒發熱脉浮而虛此元氣復傷而邪氣實也用補中益氣湯二劑而愈

進士劉華甫患之數月用輕粉硃砂等藥頭面背臀各結一塊二寸許潰而形氣消弱寒熱口乾舌燥唇裂小便淋漓疾涎上涌飲食少思此脾胃傷諸藏弱而虛火動也先用六君子湯二十餘劑又用補中益氣湯加山藥山萸麥冬五味服之胃氣復而諸症愈惟小便未清疾涎未止用加減八味丸而痊

一男子患楊梅瘡後兩腿一臂各潰二寸許一穴膿水淋漓少食無睡久而不愈以八珍湯加棗仁茯神服之每日以蒜搗塗患處灸良久隨貼膏藥數日稍可却用豆豉餅灸之更服十全大補湯而愈

一婦人患之皆愈惟兩腿兩膞各爛一塊如掌盖筋攣骨痛三年不愈諸藥無効日晡熱甚飲食少思以薯蘿湯兼逍遥散倍用茯苓白朮數劑熱止食進貼神異膏更服八珍湯加牛膝杜仲木瓜三十餘劑而痊

一婦人患此燃輕粉藥于被中熏之致遍身皮塌膿水淋漓不能起居以滑石黃柏蒿豆粉末等藥鋪席上令可卧更服神功托裡散月餘而痊（一云飲金銀花散）

一彌月小兒先于口內患之後延于身上年餘不愈以

草藨為末乳汁調服母以白湯調服月餘而愈

青浦四十二堡一大家娶妾生楊梅瘡遍身潰爛臨終棄之于野一乞丐收養之數日不死女急思食肉遶有數盜在孟婆墩祭賽丐者乞肉即與一肩懷歸食婦食未盡者懸之樹枝為蜈蚣所食毒侵肉中婦食之瘡為毒發向日全愈其色更黑於前丐欲送歸婦不許曰我當終身從君矣遂為伉儷生一子丐者日操舟乞食龍潭其婦言笑不苟亦云賢矣（雪間雜誌）

立齋治一男子咽間先患又于身服輕粉之劑稍愈已而復發仍服之亦稍愈後大發上腭潰蝕與鼻相通臂腿數枚其狀如桃大潰年餘不斂神思倦怠飲食少思虛症悉具投以萆薢湯為主以健脾胃之劑兼服之月餘而安蠲去濕熱和血脈所以凡諸瘡毒皆宜用之其效剌善未可盡述

一婦人患之臉鼻俱蝕筋骨作痛脚面與跟各腫一塊三月而潰膿水淋漓半載不斂治以前藥亦愈

一男子陰莖患之腫痛先以導水丸龍胆瀉肝湯各四服少愈再以小柴胡湯加黃柏蒼朮五十餘劑而平

一男子陰莖腫潰小便赤色肝脉弦數以小柴胡湯加

本通青皮龍胆草四帖又龍胆瀉肝湯数帖而瘥

一婦人煩痛便秘作渴脉沈實以内疎黄連湯二劑裡症已退以龍胆瀉肝湯数劑頓退間服草薢湯月餘而愈

一男子患之發寒熱便秘作渴兩手脉實以防風通聖散治之而退以荆防敗毒散兼龍胆瀉肝湯而瘥

一男子愈後腿腫一塊久而潰爛不斂以蒜搗爛敷患處用艾隔蒜灸之更貼神異膏及服黑丸子并托裡藥兩月而愈

一男子皆愈但背腫一塊甚硬肉色不變年餘方潰出水三載不愈氣血俱虚飲食少思以六君子湯加當歸藿香三十劑餘少愈更飲草薢湯兩月餘而愈○

一男子患之勢熾兼脾胃氣血皆虚亦服前藥而瘥

馬銘鞠治李行甫患徽瘡（俗呼廣瘡）誤用水銀畨硇等藥搽五心三日間舌爛齒脱喉潰穢氣滿室吐出腐肉如猪肝色湯水不入腹脹二便不通醫皆謝去獨用治喉藥吹喉疾壅愈甚痛難忍幾死按其腹不痛雖脹滿未堅猶未及心知水銀毒入腹未深法宜以鉛收之急用黑鉛劘餘分作百餘塊加大劑甘桔湯料銀花甘草各用四五兩水二三十椀鍋内濃煎先取三

四椀入湯注中徐灌之任其自流逾時舌漸轉動口亦漱淨即令恣飲數盞易取渣再煎連前濃汁頻灌手足次日二便去黑水無算始安方用吹口藥及敗毒托裡藥數劑而愈後賈僕有顏孝者亦患黴瘡誤用水銀熏條其症如一行甫即以前法治之次日立起廣筆記

白癜風 附紫癜風

薛立齋治一男子常吹嘬腿患白癜風皮膚搔起白屑服消風散之類痒益甚赤暈各砭出血赤暈開脩而痒愈甚服遇仙丹之類成瘡出水殊類大麻風吹嘬吐痰面色皎白時或瘙黃此脾肺二經虛熱之症先用五味異功散治之虛熱稍退又用地黃清肺飲肺氣漸清又用八珍湯六味丸而尋愈後又吹嘬痰喘患處作痒用參蘇飲二劑散其風邪又用五味異功散加桔梗補其肺氣而痊二年後吹嘬作渴飲水脉洪大左尺為甚用加減八味丸補腎水而痊

一男子素不慎房勞嘗患足三陰虧損治愈後兩腿腕患紫癜風延于兩股作痒各砭出血痒處日甚服消風等藥患處微腫延及上體兩眼昏澁謂腎臟風先

用四生散四服後用易老祛風丸月餘而瘡後飲食起居失宜肢體色赤服二丸隨愈

一男子患白癜風過飲或勞役患處色赤作癢服消風散之類頓起赤暈遍身皆癢砑出血服祛風藥患處出血恪服遇仙丹患處愈熾元氣日虛先用九味蘆薈丸九味羌活湯諸症頓愈用加味逍遥散加味四物湯乃瘳

一婦人患白癜風誤以為大麻風服蛇酒等藥患處熾腫經水二三月一行曰此肝血傷而內風也誤服風藥必筋脉拘急不信乃作風治果身起白屑四肢拳攣始信先用八珍湯四劑又用四君子湯二劑月餘乃以四君子湯又用八珍湯二劑又月餘諸症漸退元氣漸復又以四君子湯為主以逍遥散為佐將兩月瘡靨脱落又月餘而愈

乃以四君子湯云：似有誤。原標

斑瘡

唐王玻云比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿水隨決隨生不治數日必死治後瘡癜黯一歲方滅此惡毒之氣所為以水煮升麻綿沾洗之苦酒煮彌佳但躁痛不可忍也又云建

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

武中南陽擊虜初呼為虜瘡諸醫參詳療之方取好
蜜摩瘡上以蜜煎升麻數拭之（外臺秘要）
繆仲淳治顧奉常女臂患蒙雲風用稀簽蒼耳雄黃末
之醇漆為丸或疑漆有毒競沮之然竟以此藥收功
（製漆用生蟹黃攪和可化作水入藥）（廣筆記）
薛立齋治一婦人患斑症作痒脉浮數以人參敗毒散
二劑少愈更以消風散四劑而安又用柴胡清肝散
而愈
一婦人患斑（一作疹）痒痛大便秘結脉沈實以四物湯加芩連
大黃槐花治之而便利周四物二連湯而瘡愈

一婦人患斑作痒脉浮以消風散四劑而愈
一婦人患斑作痒脉浮數以人參敗毒散二劑少愈更
以消風散四劑而安
一男子患斑色赤紫煩痛發熱喜冷脉沈實以防風通
聖散一劑頓退又以荊防敗毒散加芩連四劑而愈
舉人陸世明會試途中勞役胸患斑煩赤作痛頭痛發
熱形倦少食大便或溏或結小便赤澁此勞傷元氣
而虛火內動投補中益氣湯一劑頓退再劑而瘥又
數劑而平復
一室女年十四天癸未至身發赤斑痒痛左關脉弦數

此因肝火血熱以小柴胡湯加山巵生地丹皮治之而愈若因怒而致者亦宜治以前藥

一男子面起赤暈時或發腫臂手亦然搔起白屑服癮風藥內熱體倦脉大而虛此因元氣虛而陰血復傷用六味丸補中益氣湯而愈

一婦人身如丹毒搔破如癮熱渴頭暈日晡益甚此屬肝經風熱血燥用加味逍遥散而愈

一婦人身如丹毒搔破淋漓熱渴頭暈日晡益甚用逍遥散加炒山巵陳皮而愈又用八珍柴胡山巵丹皮而瘥

一婦人患前症誤服大麻風藥破而出水煩渴頭暈誠類風症六脉洪數心肝脾為甚曰風自火出此因怒動肝火血燥而生風耳非真風症也與逍遥散六味丸以清肝火滋脾血生腎水而瘥

一婦人患前症搔破久不愈食少體倦此肝脾虧損陰虛發熱也先用補中益氣湯加川芎炒山巵元氣漸復更以逍遥散而瘡愈

一婦人患赤遊風晡熱痒甚用清肝養血之劑不信乃服大麻風藥臂痛筋攣又服化疾順氣之劑四肢痿弱又一婦患前症數服風藥煎湯泡洗以致腹脹並

疫

一女子月經先期先發赤暈微腫作痒若遇氣惱赤痒益甚服祛風之藥患處更腫砭出紫血甚多其痒愈作謂肝火血燥風藥復傷而為患也先用加味逍遙散清肝火益肝血赤痒少止用地黃丸滋腎水生肝木各五十餘帖而痊後因惱怒經水不止發熱作渴患處赤痒先用加味逍遙散而安加味逍遙散而安

天泡瘡

其症屬元氣不足邪氣所乘亦有傳染而患主在肝腎二經故多在下體發起楊梅下疳暑同薛立齋治一儒者患天泡色煽赤作痛大便秘而不實服祛風敗毒藥等舌痛口乾脉浮而數此邪氣去而陰虛所致用六味丸料加山梔當歸四劑脉症頓退又用八珍湯加山茄丹皮瘡色漸白後用四君加歸耆而愈

一儒者患之誤服祛風消毒之藥復傷元氣因勞役過度內熱口乾齒齦作痛右關脉洪數而虛此脾胃受傷而火動用清胃散之類而愈

中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一儒者患之或成粒或成片或出水脾肺脉俱洪数此風邪所傷先用荊防敗毒散加草薢鈎藤數劑漸愈但口乾內熱用四物加山巵鈎藤銀花甘草節而愈後遍身搔痒內熱口乾依以六味丸而瘥

一商人每勞役飲酒後則遍身生瘡服祛風敗毒之劑面目胸背臂脇結一塊如桃栗四五痒痛膿水淋漓氣血虛甚寒熱往來作渴痰涌此濕熱壅盛元氣虛而不能愈也外敷當歸膏內服補陰八珍加草薢五錢并換肌消毒散加乾葛鈎藤各一錢二十餘劑諸症漸退仍以前藥為主佐以調理之劑兩月餘氣血復而瘡愈

一男子瘍腫痛發熱服祛風清熱藥愈熾診其脉沈實乃邪在內也用防風通聖散一劑頓愈又荊防敗毒散二劑而安夫此症雖屬風熱當審在表裡治無誤矣

一小兒患此瘍痛發熱脉浮數挑去毒水以黃柏滑石末敷之更飲荊防敗毒散二劑而愈

一小兒瘍赤發熱以黃柏滑石末敷之飲大連翹湯二劑少愈更以金銀花散而瘥

毛閣老孫年十餘歲背側患水泡數顆發熱脉數此肺

胃經風熱所致名曰天疱瘡遂以荆防敗毒散加芩連服之外去毒水以金黄散敷之又四劑而愈

楊文魁腹患此延及腰背煩痛飲冷脉數按之愈大乃表裡俱實也以防風通聖散一劑更敷金黄散勢減大半再以荆防敗毒散二劑而痊

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷之五十九

錢塘魏之琇玉橫撰

跌撲

一字散治一切打撲傷損筋傷骨折宗子趙叔恭名公寅以善鍊鎚著名其父宰嵊縣日因與族人聚飲趙化寺醉酒墜懸崖之下昏不醒人手臂已折舁歸得此二藥治之遂愈其後運鎚如故叔恭嘗知大寧監云韓希道知府傳五靈脂沒藥別研川烏頭炒

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

烏頭俱去皮臍生用各四兩　地龍乳香各半兩別研　麝香半錢別研　白膠香一兩後四味加減些不妨　右為細末每服一字溫酒調下丸如梧桐子大加減自少至多服之亦可若腰已上損食後服腰已下損食前服覺麻為驗未麻加藥麻甚即減百乙方

福州張樂縣一盜因被笞搥身無全膚以情告獄吏求買胡孫薑爛研取汁以酒煎或調服留滓以傅瘡不數日平復如故同上

濠梁靈泉寺僧傳治打撲傷損用半兩古文錢不拘多少以銕綫貫之用銕匣盛以炭火煆通紅盤盛好酒米醋各半升銕鉗開匣取錢于酒醋中淬再煆再淬候蘇落盡如酒醋少再添候錢淬盡澄去酒醋以溫水淘洗如此三次淘洗數多尤妙火毒不盡令人患啞喉服金石藥而患啞者氣也既盡焙乾研極細入乳香沒藥水蛭等分同為細末每服半字或一字生薑自然汁先調藥次用溫酒浸平服若不傷折即時嘔出若傷折則藥徑下纏繳如金絲如弓上之筋神驗初服忌酒三日劉諒縣尉傳王丞相在東府時施一接膏藥云用半兩錢極有効驗恐即是此方也同上

治打撲損腫痛不止用生薑自然汁米醋牛皮膠同熬

溶入馬屁勃末不以多少攪勻如膏藥以紙花攤傳
腫處痛即止以多傳為妙紹興倅廳二吏人用之得
効

南臺椽梁彥思使閩而足不能復臂以風論或以腳氣
治經年不瘳項彥章診之六脉僅微數而他無所病
即探患處乃骨出不入肖窠耳施以按摩即愈九靈山房
集

迷失公 疑撰 一失公足失履而傷腕骨掌反于後者
六閱月矣衆醫不能治公知抱一翁精按摩曰幸予

中國國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

治也翁令壯士更相摩從辰至申而筋肉盡腐遂引
其掌以揉之覺喉喉然有聲藥以兩月其足時常時

瘀血腹痛 上

立齋曰予于壬申年被重車碾傷悶瞀良久復甦胸滿
如築氣息不通隨飲熱童便一椀胸寬氣利惟小腹
作痛吾鄉徐銀臺東濠先生與復元活血湯一劑便
血數升許痛腫悉退更服養氣血藥而痊大凡損傷
不問壯弱及有無瘀血停積俱宜服熱童便以酒佐
之推陳致新其功甚大若脇脹或作痛或發熱煩躁

溶入馬屁勃末不以多少攪勻如膏藥以紙花攤傳
腫處痛即止以多傳為妙紹興倅廳二吏人用之得
効

南臺椽梁彥思使閩而足不能復醫以風論或以腳氣
治經年不瘳項彥章診之六脉僅微數而他無所病
即探患處乃骨出不入宵窶耳施以按摩即愈九靈山房
集

南臺治書迭里迷失公足失履而傷脛骨掌反于後者
六閱月矣衆醫不能治公知抱一翁精按摩曰幸予
治也翁令壯士更相摩從辰至申而筋肉盡麌遂引
其掌以探之覺隤隤然有聲藥以兩月其足時常時
如全上

瘀血腹痛

立齋曰予于壬申年被重車碾傷悶瞀良久復甦胸滿
如築氣息不通隨飲熱童便一椀胸寬氣利惟小腹
作痛吾鄉徐銀臺東濠先生與復元活血湯一劑便
血數升許痛腫悉退更服養氣血藥而瘥大凡損傷
不問壯弱及有無瘀血停積俱宜服熱童便以酒佐
之推陳致新其功甚大若脇脹或作痛或發熱煩躁

口乾喜冷惟飲熱童便一甌勝服他藥不動臟腑不
傷氣血萬無一失當詢諸營操軍常有墜馬傷者何
以愈之俱曰惟服熱童便即愈此其屢試之驗亦明
矣

平公事居庸關見覆車被傷者七人仆地呻
吟一人未蘇俱令以熱童便灌之皆得無事又凡腫
或傷損者以蔥搗爛熱罨之尤妙

治一人仲秋夜歸墜馬腹內作痛飲酒數杯翌早大便
自下瘀血即安此元氣充實挾酒勢而行散也

一男子跌傷腹痛作渴食梨子二枚益甚大便不通血
欲逆上用當歸承氣湯加桃仁瘀血下而瘥此因元
氣不足瘀血得寒而凝聚也故產婦金瘡不宜食此

加胸隔脹痛喘促短氣用肉桂木香末各二錢溫酒
調服即下黑血及前所服之藥而蘇此因寒藥凝滯
而不行故用辛溫之劑散之

一老人墜馬腹作痛以復元通氣散用童便調進二服
少愈更以四物湯加柴胡桃仁紅花四劑而安

一男子墜馬腹作痛以桃仁承氣湯加蘇木紅花下之
頃愈更以四物湯加花粉柴胡二劑而愈

口乾喜冷惟飲熱童便一甌勝服他藥不動臟腑不
傷氣血萬無一失嘗詢諸營操軍常有墜馬傷者何
以愈之俱曰惟服熱童便即愈此其屢試之驗亦明
矣戊辰年公事居庸關見覆車被傷者七人仆地呻
吟一人未蘇俱令以熱童便灌之皆得無事又凡腫
或傷損者以葱搗爛熱罨之尤妙
治一人仲秋夜歸墜馬腹肉作痛飲酒數杯翌早大便
自下瘀血即安此元氣充實挾酒勢而行散也
一男子跌傷腹痛作渴食梨子二枚益甚大便不通血
欲逆上用當歸承氣湯加桃仁瘀血下而瘥此因元
氣不足瘀血得寒而凝聚也故產婦金瘡不宜食此
一男子孟仲墜梯腹停瘀血用大黃等藥其血不下更
加胸隔脹痛喘促短氣用肉桂木香末各二錢溫酒
調服即下黑血及前所服之藥而蘇此因寒藥凝滯
而不行故用辛溫之劑散之
一老人墜馬腹作痛以復元通氣散用童便調進二服
少愈更以四物湯加柴胡桃仁紅花四劑而安
一男子墜馬腹作痛以桃仁承氣湯加蘇木紅花下之
頃愈更以四物湯加花粉柴胡二劑而愈

脾傷腹痛

陳侍御墜馬腿痛作嘔服下藥一劑胸腹脹痛按之即止惟倦怠少氣診其脉細而濇曰非瘀血也乃痛傷氣血復固藥損脾氣而然耳投養脾胃生氣血之藥而愈

血虛脇脹

李進士季夏傷手出血不止發熱作渴兩脇作脹按之即止此血虛也用八珍加軟柴胡花粉治之而愈更用養氣血之藥調理而瘥

血瘀脇脹

孫文垣治桂亭兄壯年原有濕熱疾積年逾艾偶墜轎跌傷背脇外數肉攻而愈越十五年左脇痛手不可近左脉弦數堅勁搏指小腹亦痛知為舊瘀及疾積作祟以青皮赤芍黃連當歸尾各一錢桃仁錢半大黃二錢滑石三錢臨服調元明粉一錢服下吐痰椀餘大便僅行一次左脇及腿膝皆痛卧不安小腹痛甚此瘀血欲行而未能也再與前方加減便三次皆

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

沈香色稠黏瘀物腹痛除胯痛仍在再與加減便行四次所下紫黑如筋膜者甚夥諸症悉減因食鷄湯牛肉腹痛後重此餘積未盡欲再下之恐年高不任曰藥力已到積已動行而後補庶無反顧之憂仍以前藥去大黃調元明粉二次瘀物如前之半諸痛俱平用人參白芍甘草陳皮山查桂心當歸半夏調理半月而愈

一男子跌仆皮膚不破兩脇作脹發熱口乾自汗類風症令先飲童便一甌煩渴頓止隨進復元活血湯倍用柴胡青皮一劑脹痛悉愈再劑而安發明經云夫從高墜下惡血流于內不分十二經絡聖人俱作風中肝經留于脇下以中風療之血者皆肝之所主惡血必歸于肝不問何經之傷必留于脇下蓋肝主血故也痛甚則必有自汗但人汗出皆為風症諸痛皆屬于肝木況敗血凝滯從其所屬入于肝也從高墜下逆其所行之血氣非肝而何以破血行經藥治之一男子墜馬兩脇作痛以復元活血湯二劑頓止更以小柴胡加當歸桃仁二劑而安

血虛煩躁

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

吳給事隆馬傷首出血過多發熱煩躁肉瞤筋惕或欲
投破傷風藥曰此血虛火動所致當峻補其血為善
遂用聖愈湯二劑即安又養氣血而瘥
一男子損臂出血過多又下之致煩熱不止瘈肉不腐
以聖愈湯四劑少安以八珍湯加五味麥冬而安更
以六君子湯加芎歸黃耆數劑而潰又二十餘劑而
斂大抵此症須分所患輕重有無瘀血及元氣虛實
不可槩下蓋恐有傷氣血難以潰斂常治先以童便
和酒飲之或加紅花蘇木其功甚捷若槩用攻利之
劑鮮不有誤凡瘡愈之遲速在血氣之虛實故也

亾血出汗

張進士季秋隧馬亾血過多出汗煩躁翌日其汗自止
熱躁益甚口噤手顫此陰血虛陽火乘之而汗出為
寒氣收斂腠理故汗不得出火不得泄怫鬱內甚而
益增他症也（凡一切病火盛而汗出者若驟斂之反增他症）乃用四物加柴
胡黃芩山卮四劑少止又用四物參耆軟柴胡五味
麥冬治之而瘥

亾血昏憒

一婦人孟冬傷足出血頭汗肉熱作渴短氣煩躁不時昏憒其脉洪大按之微弱此陰血虛于下孤陽炎于上故發厥而頭出汗也以四物合小柴胡湯一劑汗即止以四物去川芎加參耆麥冬五味炙草少用肉桂四劑諸症悉去又三十餘劑血氣復而愈

一男子孟夏折腿出血過多其初眩暈眼花後則昏憒此陰血傷損陽火熾甚制金不能平木木旺生風所致急灌童便更用人參當歸各五錢荊芥川芎柴胡白芍白朮各二錢山卮黃芩桔梗各一錢甘草五分服之隨爽又用四物參耆各三錢生地柴胡各一錢

四劑煩躁悉去

濕痰作痛

大宗伯沈立齋孟冬閃腰作痛胸膈痰起不利以枳殼青皮柴胡升麻木香茴香當歸川芎赤芍神麯紅花四劑而瘥但飲食不甘微有潮熱以參耆白朮陳皮白芍各一錢歸身二錢川芎八分軟柴胡地骨皮炙甘草各五分十餘劑而康

劉尚寶體微臂閃作痛服透骨丹反致肢節俱痛下體益甚以二陳南星羌活防風牛膝木瓜蒼朮黃芩黃

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

柏治之身痛遂安以前藥再加歸尾赤芍桔梗治之而痊

鄭吏部素有濕痰孟冬墜馬服辛熱破血之藥遍身作痛發熱口乾脉大而滑此熱劑激動痰火為患耳治以清燥湯去人參當歸黃耆加黃芩山卮半夏黃柏熱痛頓去患處少飲更用二陳羌活桔梗蒼朮黃柏薑製生地當歸遂痊

肝火作痛

楊司天骨已入骱患處仍痛服藥不應肝脉洪大而急此肝火盛而作痛也用小柴胡湯加山卮黃連二劑痛止用四物山卮知柏調理而康

血虛作痛

一婦人磕臂出血骨痛熱渴煩悶頭暈日晡益甚此陰虛內熱之症用八珍加丹皮麥冬五味骨碎補肉桂及地黃丸治之悉愈卻去桂加牛膝續斷二十餘劑而瘳愈

骨傷作痛

一小兒足傷作痛肉色不變傷在骨也頻用炒葱熨之五更用和血定痛丸日間用健脾胃生氣血之劑數日後服地黃丸三月餘而瘥

一小兒臂骨出骱接入腫痛發熱服流氣等藥益甚飲食少思以葱熨之其痛即止以六君黃耆柴胡桔梗續斷骨碎補治之飲食進而腫痛消又用補中益氣加麥冬五味治之氣血和而熱退愈矣

氣虛血滯

戴給事瑩馬腿腫痛而色黯食少倦怠此元氣虛弱不能運散瘀血而然耳遂用補中益氣去升麻柴胡加木瓜茯苓白芍白朮治之而瘥

氣虛不潰

少宗伯劉五清臚傷一塊微痛少食用六君子湯倍加當歸黃耆其痛漸止月餘瘀血內痼而不潰彼以為瘡此陽氣虛極須用調補不從至來春頭暈痰涎壅塞服清氣化痰病勢愈盛脉洪大而微細此或輕取重取之分欲以參耆歸朮附子之類補之不信至秋初因怒昏憒而厥

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

氣虛壅腫

一婦人腫臂脫腫大已三月手臂日細肌瘦惡寒食少短氣脉息微細屬形病俱虛也遂投補中益氣加肉桂引諸藥以行至臂再加貝母香附以解久病之鬱悶服和血定痛丸以葱熨之腫消二三因怒患處仍脹胸隔兩脇微痛以前湯更加木香山庖半夏枯梗服之旬可復因驚不寐少食盜汗以歸脾湯加五味麥冬二十餘劑而安腫消三四手臂漸肥但經水過期而少此心脾之血尚未充足而然也乃用八珍加五味麥冬丹皮遠志香附貝母枯梗四十餘劑諸症悉愈後因怒發熱譫語經水如涌此怒動肝火以小柴胡湯加生地二錢一劑遂止以四物加柴胡調理而康

州守陳克明子閃右臂腕腫痛肉色不變久服流氣等藥加寒熱少食舌乾作渴曰傷損等症腫不消色不變此運氣虛而不能愈當助脾胃壯氣血為主遂如法治之不二月形氣漸充腫熱漸消半載諸症悉退體臂如常

一小兒閃腿腕壅腫形氣怯弱欲治以補氣血為主佐

以行散之劑不信乃內服流氣飲外敷寒凉藥加寒熱體倦曰惡發熱脉息洪大氣血虛極也治之無功後肉潰瀝盡氣血而亡

瘀血腫痛

一男子閃傷右腿壅腫作痛謂急砭去滯血以補元氣庶無有患不信乃外敷大黃等藥內服流氣飲後涌出穢膿桅許其膿不止乃復請治視其腿細而脉大作渴發熱辭不治後果歿

窗友王汝道環跳穴處閃傷瘀血腫痛發熱作渴遂砭去瘀血知其下焦素有虛火用八珍加知柏牛膝骨碎補四劑頓止又十全大補少加知柏麥冬五味三十餘劑而愈

筋傷壅腫

李考公子十四歲脚脫閃傷腫而色天日出清膿少許肝脉微澁此肝經受傷氣血虛而不能潰難消之症也急止剋伐之劑不信乃襍用流氣等藥後果出爛筋而死

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

肺火衄血

張地官墜馬傷腿服草烏等藥致衄血唉嗽臂痛目黃口渴齒痛小便短少此因燥劑傷肺與大腸而致用生地黃芩黃連知柏山卮山藥甘草以潤肺燥而生腎水小便頓長諸症並止以山藥五味麥冬參耆芍歸知柏黃芩炙艸以滋陰血養元氣而瘡斂

肝火出血

俞進士折腿骨已接三月尚發熱出血不止正體醫治不應左關脉洪數此肝火熾甚血得熱而妄行也遂投小柴胡湯加山卮白芍生地防風血止熱退又用八珍五味麥冬治之瘡口即愈

田宗伯姪仲秋因怒跌仆遍身作痛發熱衄血肝脉弦洪曰久衄脉弦洪乃肝火盛而制金也至春則肝木茂盛而自焚或戕賊脾土非易治之症當滋腎水以生肝木益脾土以生肺金乃雜用瀉肝火等劑歿于仲春之月

一婦人因怒仆地傷面出血疾盛昏憒牙關緊急曰此怒動肝火氣逆拂鬱神明昏冒而卒倒也兩手脉洪

大而無倫次以小柴胡湯加黃連山巵芎歸橘紅茯苓薑汁而甦

胃火作嘔

一膏粱之人跌腿青腫作痛服辛熱之藥反發熱作喘患處益痛口乾唇揭此膏粱之人內多積熱更服辛熱之劑益其胃火而使然也頻飲童便以清胃散加山巵黃芩甘草治之頓止患處以蔥熨之腫即消散

陰虛作喘

舉人杜克宏墜馬服下血藥反作喘日晡益甚此血虛所致耳非瘀血為患遂以四物加參耆五味麥冬治之其喘頓止又用補中益氣加五味麥冬而愈此症果係瘀血蒸熏于肺而喘宜活命行血亦不可下若面黑胸脹或膈痛作喘當用人參一兩蘇木二兩作一劑水煎急服緩則不治產婦多有此疾

陰虛發熱

楊進士傷手指瘀痛發熱服寒涼之藥致飲食頓減患處不潰用托裡養血之藥食進而潰後因勞每日晡

發熱此陰虛而內熱也以四物軟柴胡地骨皮乃退更用養血氣之藥而瘥

氣血虛熱

一男子墜馬腹有瘀血服藥下之致發熱盜汗自汗脉浮濇以為重劑過傷氣血所致投以十全大補湯益甚時或譫語此藥力未及而然也以前藥加炮附子五分服之即睡覺來頃安再劑而痊

陽氣脫陷

梁閣老婭跌傷腿外敷大黃等藥內服破血之劑遂致內潰為針出穢膿三椀許虛症悉具用大補之劑兩月餘稍能步履因勞心手撒眼閉汗出如水或欲用祛風之劑曰此氣血尚未充足而然也急以艾炒熱頻熨肚臍此法羅謙父嘗用之并氣海穴處以人參四兩炮附子五錢煎灌良久臂少動又灌一劑眼開能言但氣不能接續乃以參耆歸朮四味共一劑附子五錢水煎徐徐服之元氣漸復飲食已進乃去附子服之而瘥愈

膀經血少

一女子年十七閉右臂微腫作痛寅申時發熱次其胆經血虛火盛經水屢先期而至先以四物合小柴胡湯四劑熱退更以加味四物湯加香附地骨皮山庶各五分芩連炙草各二分二十餘劑其腫亦消乃去黃連山庶又五十餘劑經水調而元氣克矣

腎經虛怯

儒者王清之跌腰作痛用定痛等藥不愈氣血日衰面

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

耳黧色曰腰為腎之府雖曰閃傷實腎經虛弱所致遂用杜仲補骨脂五味山萸蓯蓉山藥空心服又以六君當歸白朮神麴各二錢食遠服不月而瘥

一三歲兒閃腰作痛服流氣等藥半載不愈此稟腎氣不足不治之症也後果殁

痛傷胃嘔

一婦人傷指手背俱腫微嘔少食彼以為毒氣內攻診其脉沈細此痛傷胃氣所致也遂刺出膿梳許先以六君子藿香當歸而食進總以八珍黃耆白芷桔梗

月餘而愈

氣遏肉死

一男子修傷足指色黑不痛而欲脫此因陽氣虛不能運達于患處也急去之速服補劑以壯元氣否則死肉延足必不救矣不信果黑爛上脛而死

一女子數歲嚴寒上京兩足受凍不仁用湯泡漬至春十指俱爛牽連未落先用托裡之劑助其陽氣自潰脫得保其生此因寒邪遏絶運氣不至又加熱湯泡漬故死而不痛也當見人之嚴寒而出凍傷其耳不知痛痒若以手觸之其耳即落當以暖處良久或熱手熨之無恙若以火烘湯泡其耳即死至春必潰脫落矣北方寒氣損人若此可不察之

涼藥遏經

雲閒曾子容為室人中風灌藥誤咬去指半節煅痛寒熱外敷大黃等藥內服清熱敗毒患處不痛不潰膿清寒熱愈甚此因涼藥遏絶隧道而然也遂敷玉龍膏以散寒氣更服六君子湯以壯脾胃數日後患處微痛腫處漸消此陽氣運達患處也果出稠膿不數

日半指潰脫更服托裡藥而斂

上舍王天爵傷足煩腫內熱作渴外敷內服皆寒涼敗毒患處益腫而不潰且惡寒少食欲作嘔吐此氣血俱虛又因寒藥凝結隧道損傷胃氣以致前症耳遂用香砂六君子芎歸炮薑外症悉退惟體倦脯熱飲食不甘以補中益氣湯加地骨皮五味麥冬治之而愈

州守王廷用傷指即用帛裹之瘀血內潰煩腫至手謂宜解患處以出瘀血更用推陳致新之劑不信乃數涼藥痛雖少止次日復作又數之數日後手心背俱潰出瘀穢膿水尚服敗毒之劑氣血益虛色黯膿清飲食少思仍請治投以壯脾胃生氣血之劑由是膿水漸稠而愈

錢國寶曰甲子春余舟泊清江浦時征遼官兵沙船兩岸打閘水急索斷頭目王元跌倒頭向地腳朝天正對石擣腦蓋骨圓圓如鍾大竟離頭墜地去人丈許衆兵圍看余見而呼曰某知接骨令病者破腦魂魄驚散怕人不敢歸竅汝等在此此人立死矣且瞽散診其脉洪浮腦骨雖墜腦膜未破可救先安腦骨急取舟中接骨藥散于周圍內用四物湯加桃仁大黃

各一錢紅花五分恐血攻心移病者于無風之室令倚勿瞌睡則血上至半日始甦醒次日飲食日日與接骨藥一服十日而瘡接骨神方用土鱉蟲四十九个酒炙黃蠶死人骨一兩螃蟹煅黃五錢象皮十个半兩錢十个煅紅醋淬取末自然銅三錢煅紅醋淬乳香沒藥各三錢木香二錢射香五分為末每服七分熱酒調下照量加酒以行藥力服後骨中自響輕者數服重者十餘服接骨如故

續名醫類案卷五十九

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷之六十

錢塘魏之琇玉橫撰

杖瘡

張子和治一男子被杖瘡痛煩發毒氣入裡驚涎堵塞牙噤不開粥藥不下前後月餘百治無功甘分于死先以三聖散吐青蒼驚涎約半大盆次以利膈丸百餘粒下臭惡燥糞又一大盆復煎通聖散數錢熱服之更以酸辣葱醋湯發其汗斯須汗吐交出其人活

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

矣此法可以救寃人

鄭金臞有杖丹一方用水蛭為末和朴硝少許以水調傳瘡上屢施于人良驗（志雅堂雜抄）

崇禎庚辰黃公石齋解公石帆葉公潤山被杖士夫皆謀蚺蛇胆愚謂此大寒令人絶嗣不如三七無名異地龍蠟丸酒服則杖不知痛如則白蠟丸一兩（蠶室）

山姜公卿墅中高琪柄國士夫被箠辱醫家以酒下地龍散投以蠟丸則受杖失痛范中歌曰嚼蠟誰知味最長一杯

THE RARE BOOK COLLECTION OF NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

卯酒地龍香年來紙價長安貴不重新詩重藥方偶書及此為之一歎（痕瘡青腫用菜菔爛搗之即消或用蓖豆粉調敷（閻集）

薛立齋治文刑部用晦伏閤諫南巡受杖瘀血已散壞肉不潰用托裡之藥稍潰而膿清此血氣虛也非大劑參耆不能補之君亦善醫以為恐腹滿強之飲食稍思遂加大（補）劑飲食之日進肉潰膿稠而愈當治江翰林姚王鄭三吏部李姜陳三禮部南吳二刑部皆與文同事者先散其瘀血漸用排膿托裡之藥俱愈夫叫號則傷氣痛忍則傷血此氣血之虛明矣況脾

矣此法可以救寃人

鄭金臞有杖丹一方用水蛭為末和朴硝少許以水調傳瘡上屢施于人良驗（志雅堂雜抄）

崇禎庚辰黃公石齋解公石帆葉公潤山被杖士夫皆謀蚺蛇胆愚謂此大寒令人絶嗣不如三七無名異地龍蠟丸酒服則杖不知痛如不即得則白蠟丸一兩蟲蟲一枚酒服亦妙壬午則熊公魚山姜公卿墅復以直言拜杖矣智急白如須用之中州集曰貞祐中高琪柄國士夫被箠辱醫家以酒下地龍散投以蠟丸則受杖失痛范中歌曰嚼蠟誰知味最長一杯

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

卵酒地龍香年來紙價長安貴不重新詩重藥方偶書及此為之一歎痕痛青腫用菜菔豆粉調敷客中閒集

薛立齋治文刑部用晦伏閹諫南巡受杖瘀血已散壞肉不潰用托裡之藥稍潰而膿清此血氣虛也非大劑參耆不能補之君亦善醫以為恐腹滿強之飲食稍思遂加大劑（補）飲食之日進肉潰膿稠而愈嘗治江翰林姚王鄭三吏部李姜陳三禮部南吳二刑部皆與文同事者先散其瘀血漸用排膿托裡之藥俱愈夫吐號則傷氣痛忍則傷血此氣血之虛明矣況脾

主肌肉脾氣受傷飲食必減血一永則肌肉不旺故
必理脾脾健肉自生若非參朮歸耆之類培養脾土
則肌肉何由而生然又須分病人虛實及有無瘀血
停積盖打撲墜墮皮肉不破肚腹作痛者必有瘀血
在內宜以復元活血湯攻之老弱者四物湯加紅花
桃仁川山甲補而行之若血去多而煩躁此血虛也
名曰亡血以獨參湯補之有損傷稍輕別無瘀血等
症但疼痛不止者惟和血氣調經脉其痛自止更以
養氣血健脾胃無有不効亦有痛傷胃氣作嘔或不
飲食者以四君子湯加藿香砂仁當歸治之若有瘀

血不先消散而加補劑則成實實之禍設無瘀血而
妄行攻利則致虛虛之禍

夏鳳北京人因杖瘡臀膝通潰膿瘀未出時發昏憒此
膿毒肉作而然也急與開之昏憒愈盛此虛也以八
珍湯一服少可數服死肉自腐頓取之令用豬蹄湯
洗淨以神効當歸膏塗貼再以十全大補湯兩月而
愈若更投破血之劑則危矣大抵杖瘡一症皆瘀血
為患治療淺者砭之深者針之更以活血流氣藥和
之內潰者開之有腐肉取之以壯胃生血藥托之可
保無虞有傷筋骨而作痛者以沒藥降聖丹治之若

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

牙關緊急或腰背反張者以玉真散治之並効

血脫煩躁

薛立齋治一人兩脇脹悶欲欬不欬口覺血腥遍身臂腿脹痛倦怠不食煩渴脈大此血脫煩躁也與童便酒及砭患處出死血糜肉甚多忽發熱煩躁汗出投以獨參湯三劑少止又用補氣血清肝火之藥數劑飲食少進後用獨參湯間服諸症悉退飲食頓加但不能多寐以歸脾湯加山巵竹茹四劑而熟睡因勞心遂煩渴自汗脈大無力以當歸補血湯二劑而安又以十全大補去川芎加麥冬五味牡丹地骨麻黃根炒浮麥數劑而汗止死肉且潰又二十餘劑而新肉生

血虛發躁

一人煩躁面赤口乾作渴脈洪大按之如無此血虛發躁也以當歸補血湯二劑即止後日晡發熱更以四物加柴胡牡丹地骨知柏治之熱退而瘡斂東垣云發熱惡寒大渴不止其脈大而無力者非白虎湯症此血虛發躁宜用當歸補血湯治裘先生云肌熱躁

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

熱目赤面紅其脉洪大而虛此血虛也若誤服白虎湯輕則危重則斃

氣虛血熱

一人頭額出汗熱渴氣短煩躁骨痛瘧肉不潰遂割去之出鮮血服芩連之藥益甚其脉洪大而微此氣血俱虛邪火熾盛所致以四物加參耆朮草少用柴胡炒芩二劑頭汗頓止又加麥冬五味肉桂二劑諸症悉退後用參耆歸朮炒芍熟地麥冬五味十餘劑瘥血潰而膿水稠矣但新肉不生以前藥信用白朮而

斂

瘀血流注

一人瘀血流注腰臀兩足黑隨飲童便酒砭出瘀血糜肉投以小柴胡湯去半夏加山梔芩連骨碎補以清肝火用八珍依芩以壯脾胃死肉潰而新肉生後瘡復潰得靜調治年餘而痊

一人瘀血攻注陰囊潰而成漏膿水清稀所服皆寒涼之劑診其肝脉短澁餘脉浮而無力此肝木受肺金剋制又元氣虛不能收斂遂用壯脾胃生氣之血方

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

元氣少復後終歿于金旺之日

瘀血作痛

一人腫痛發熱作渴汗出此陰血受傷也先砭去惡穢以通壅塞後用四物柴苓山甲丹皮骨碎補以清肝火而愈

一人傷處採散惟腫不消此瘀血在內宜急砭之不從乃以蘿蔔自然汁調山甲末敷之破處以當歸膏貼之更服活血之劑而瘥數年後但遇天陰仍作痒痛始知不從之失

一人臀腿黑腫而皮不破但脹痛重墜皆以為內無瘀血惟裹涼藥可以止痛診其尺脈濇而結此因體肥肉厚瘀血畜深刺去即愈否則內潰有爛筋傷骨之患乃入針四寸漂黑血數升腫痛遂止是日發熱惡寒煩渴頭痛此氣血俱虛而然也以十全大補之劑遂痊

肝火作痛

一人瘀血內脹煩痛發熱口乾作渴飲食不甘四肢倦怠此肝火熾盛脾土受制故患前症喜其稟實年壯

第用降火清肝活血之劑而愈

肝火忿怒

一人患處脹痛悲哀忿怒此厥陽之火為七情激之而然耳遂砭去瘀血以小柴胡湯加山梔黃連桔梗而安後用生肝血養脾氣之藥瘡潰而愈

肝火脇脹

一人患處脹痛發熱欲嘔兩脇熱脹肝脉洪大此肝火之症也但令飲童便并小柴胡湯加黃連山梔歸尾紅花諸症果退此症若左關脉浮而無力以手按其腹反不脹者此血虛而肝脹也當以四物參苓青皮甘草之類治之若左關脉洪而有力胸脇脹痛者按之亦痛此怒氣傷肝之症也以小柴胡芎歸青皮白芍桔梗枳殼主之蓋此症不必論其受責之輕重問其患處去血之曾否但被人扭按甚重怒力惠怒以傷其氣血瘀血歸肝多致前症甚則胸脇脹滿氣逆不通或血溢口鼻多致不救

肝胆虛症

一人愈後口苦腰脇脹痛服補腎行氣等藥不効按其肝脉浮而無力此屬肝胆氣虛而然耳用參耆芎歸地黃白朮麥冬五味治之而愈

血虛腹痛

一人杖後四物服桃仁紅花大黃等劑以逐瘀血腹反痛更服一劑痛盛甚按其腹不痛此血虛也故喜按而不痛宜温補之劑遂以歸身白朮參耆炙草二劑痛即止

氣虛不潰

一人瘀血已去飲食少思死肉不潰又用托裡之藥膿稍潰而清此氣血虛也非大補不可彼不從乃强與大補之劑飲食進而死肉潰但少寐以歸脾湯加山肉二劑而寐因勞心煩躁作渴脉浮洪大以當歸補血湯二劑而安

寒凝不潰

一人受刑太重外皮傷破瘀血如注內肉糜爛黯腫上

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

脾虛不斂

一人潰而不斂以內有熱毒欲寒涼藥此氣血俱虛而不能斂耳非歸朮參耆之類培養脾土則肌肉何由

脊胸背下至足指昏憒不食隨以黑羊皮熱貼患處灌以童便酒薄粥更以清肝活血調氣健脾之劑神思稍甦始言遍身強痛又用大劑養血補氣之藥腫消食進時仲冬瘀血凝結不能潰膿又用大補之劑壯其陽氣其膿方熟遂砭去洞見其骨塗以當歸膏及服前藥百餘劑肌肉漸生

而生豈可復用寒涼剋伐寒涼之藥重損氣血耶遂用前藥而愈

血虛筋攣手

一人腹脹嘔吐眩暈用柴胡黃芩山屘紫蘇杏仁枳殼桔梗川芎當歸赤芍紅花桃仁四劑而定又有出血過多昏憒目黑用十全大補等藥而蘇時肌肉潰爛膿水淋漓筋攣骨痛切其脉浮而濇沈而弱此因氣血耗損不能養筋筋虛不能束骨遂用養氣血之藥治之而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

腎虛氣逆

一人杖瘡愈後失于調理頭目不清服祛風化痰藥反眩暈服牛黃清心丸又肚腹疼痛杖痕腫痒發熱作渴飲食不思痰氣上升以為杖瘡餘毒復作診之左尺洪大按之如無此腎經不足不能攝氣歸源遂用人參黃耆於苓陳皮當歸川芎熟地山藥山萸五味麥冬炙草服之尋愈後因勞熱渴頭痛倦怠少食用補中益氣加麥冬五味而痊

濕熱乘肝

一人愈後腿作痛意膿血過多瘡雖愈肝經血尚未克而濕熱乘虛也遂以八珍加牛膝木瓜蒼朮黃柏防已炙草以祛濕毒養陰和血痛漸止乃去防已黃柏服之遂瘳

肝經鬱火

一人瘀血失砭脹痛煩渴縱飲涼童便脹頓止以藠薤細搗塗之血漸散已而患處作痒仍塗之痒止後口

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

乾作渴小腹引陰莖作痛小便如淋時出白津此肝經鬱火也遂以小柴胡湯加大黃黃連山屐飲之諸症悉退再用養血藥而安夫小腹引陰莖作痛等症往往誤認為寒症投以熱劑則諸竅出血或二便不通以及危殆輕亦損其目矣凡肝鬱病誤用熱藥皆貽大患

痛傷胃嘔

一人痛甚發熱嘔吐水食胸膈痞滿用行氣破血之劑益甚口乾作渴大便不調患處色黯此痛傷胃氣所致遂以四君當歸炒苓軟柴胡藿香二劑諸症漸愈又用大補之劑潰爛而瘳

藥傷胃嘔

一人發熱煩痛服寒涼藥更加口乾作渴肚腹亦痛自以為瘀血欲下之按其肚腹不痛脉微細而遲飲食惡寒此涼藥傷胃而然也急用六君加白芍當歸炮附子各一錢服之前症益甚反加譫語面赤意其藥力未至耳前藥再加附子五分非明眼不能服之即睡覺來諸病頓退而安

氣血不損

一人瘧血雖去飲食形氣如故但熱渴煩痛膈間有痰以小柴胡湯加花粉貝母桔梗山庖二劑少愈又加生地歸尾黃芩柴胡山庖花粉而愈凡治百餘人其杖後血氣不虛者惟此一人耳治者審之

行氣之非

一人服行氣之劑胸痞氣促食少體倦色黯膿清此形氣俱虛之症也先用六君桔梗二劑胸膈氣和後用補中益氣去升麻加茯苓半夏五味麥冬治之元氣漸復而愈若用前劑戕伐元氣多致不救

下血之非

一人去其患處瘀血用四物柴胡紅花治之痛頓止但寒熱口乾飲食少思用四物白朮茯苓柴胡黃芩花粉四劑寒熱即退用六君芎歸藿香而飲食進厥以前藥倍用參耆歸朮茯苓二十肉雖潰膿水清稀以前藥倍用參耆歸朮茯苓二十餘劑腐肉復潰膿水漸稠悞服下藥一鍾連瀉四次患處色黯喜其脈不洪數乃以十全大補倍加肉桂

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

麥冬五味數劑肉色紅活新肉漸生喜其壯年易于調理又月餘而愈否則不救凡杖瘡跌撲之症患處如有瘀血止宜砭去服壯元氣之藥益其氣血已損切不可再用行氣下血之藥復傷脾胃則運氣愈難營達于下而反為敗症怯弱者多致夭枉

寒藥之非

一人腫痛數寒凉之藥欲內消瘀血反致臀腿俱冷瘀血併胸腹痞悶急去所敷之藥以熱童便洗患處服六君木香當歸數田陽膏臀腿漸温又以前藥去木香加川芎蘆香肉桂四劑瘀血解乃刺之更以壯脾胃氣養血得痊蓋氣血得温則行得寒則凝寒極生熱變化為膿腐潰深大血氣既敗肌肉無由而生欲望其生難矣

不砭之非

一人發熱煩躁用四物黄芩紅花軟柴山甲花粉煩熱已清瘀血深畜欲針出之不從忽牙關緊急患處作痛始針去膿血即安用托裡養血新肉漸長忽患處瘙痒此風熱也用祛風消毒之劑而痊

不補之非症

一人臀腿脹痛發熱煩躁刺去死血脹痛少寬熱躁愈甚此血脫即火旺而然也急用獨參湯補之少愈又以健脾養氣血藥治之腐漸潰遂愈大抵此症宜預調補以顧收斂初弗伐其氣血不行補益致不能收斂也

破傷風表症

一人仲夏誤傷手腰背反張牙關緊急脉浮而散此表症也遂用羌活防風湯一劑即解此症若在秋冬腠理緻密之時須用麻黃之類以發汗此乃暴傷氣血不損治法也

破傷風裡症

一人杖處畧破而患此脉洪大而實此裡症也用大黃湯一劑大便微行一次悉退若投表藥必死宜急分表裡虛實而治之庶無誤也

膿內炊類破傷風

一人寒熱口乾用四物參耆白朮軟柴炒芩麥冬五味四劑少退欲砭去瘀血不從後怔忡不寐飲食少思牙關牽緊頭目疼痛惡寒發熱此膿內燉也遂砭去之即安以八珍棗仁麥冬五味二十劑前症漸愈又用前藥及獨參湯瘥肉漸潰後因勞又少寐盜汗以歸脾湯麥冬五味遠志而痊後牙關脹悶面目燉赤又似破傷風仍以為虛用八珍等藥亦安

膿潰類破傷風

一人腹脹喘促作渴寒熱臀腿糜爛與死血相和如皮

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

廩盛糊用童便煎四物粉服之頓退彼用黑羊皮貼之盈甚後砭去膿血甚多氣息奄奄唇口微動牙關緊急惡處色黯或欲用破傷風藥曰此氣血虛而變症也用參耆芎歸白朮并獨參湯人乳元氣復而諸症愈乃用十全大補調理而安此症若膿瘀內燉者宜針之若潰後口噤遺尿類破傷風等症者乃氣血虛極也急用大補之劑若素多痰患處症者宜清痰降火若因怒而見風症者宜清肝降火若不慎房勞忽患前症此由腎水不足心火熾甚宜滋陰補氣血為主若誤作風症治之

即死

內虛變症

一人內潰針出膿三五椀遂用大補之劑翌日熱甚汗出足冷口噤腰背反張眾欲投發散之劑曰此氣血虛極而變症也若作風治悞矣用十全大補等藥而愈此症或傷寒汗下過度與產婦潰瘍氣血虧損所致但當調補氣血為善若服剋伐之劑多致不救

一人兩月餘瘡口未完因怒發痙瘡口出血此怒動肝火而為患耳用柴胡芩連山危防風桔梗天麻釣藤甘草治之頓愈劉宗厚云痙有屬風火之熱內作者又因七情怒氣而作者惟宜補虛降火敦土平木痰清去濕絡而作者亦有濕熱內盛痰涎壅遏經脾藥而斂

一男子杖瘡瘀肉不腐以大補之劑漸腐更以托裡健

一男子風入杖瘡牙關緊急以玉真散一服少愈再服而安

小渠袁三因強勉入家傷其兩肘外臑作瘡數年不已膿汁常涓涓然但飲冷則瘡間冷水浸淫而出延為濕瘡求治張曰爾中焦當有綠水二三升涎數掬袁

曰何也張曰當被盜時感驚氣入腹驚則膽傷足少陽經也兼兩外腿皆少陽之部此用之甲木受邪甲木色青當有綠水少陽在中焦如漚既伏驚涎在中焦飲冷水咽為驚涎所阻水隨經而旁入瘡中故飲水則瘡中水出乃上涌寒痰汗如流水次下綠水果二三升一夕而痂乾真可怪也

王涇以高宗疾奉御無狀鞭背都市流速方後歸自言元不曾受杖嘗徂而示某以背完瑩無疵初不解其如何也後見他醫言杖皆有瘢唯噬膚之初傳以金箔則瘢立消意金木之性相制耳程史 岳珂 程史

金瘡

蜀志關雲長常為流矢所中貫其左臂創雖愈每至陰雨骨常疼痛醫曰矢簇有毒入骨當破臂刮骨去毒乃除雲長便伸臂令臂時方請諸將飲食相對臂血流離盈于盤器而割炙飲酒言笑自若隋末高開道被箭鏃入骨命一工拔之不得開道問之云畏王痛開道斬之更命一醫云我能拔之以一小斧子當刺下瘡際用小棒打入骨一寸以鉗拔之開道飲啖自若賜醫工絹三百匹 楼菴 小乘

劉涓子於丹陽郊外較射忽有一物高二丈許因射而中之走如電激聲若風雨夜不敢進明日率數十人尋其踪迹至山下見一小兒問曰何往答曰主人昨夜為劉涓子所射取水以洗瘡因問主人是誰答曰是父黃鬼乃將小兒還未至聞搗藥聲遥見三人一人卧一人閱書一人搗藥即齊聲吐突而前三人並走遺一帙囊疽方一凹藥時涓子得之從宋武帝北征有被創者以藥塗之隨手而愈涓子用方為治千無一失演為十卷號鬼遺方 龔慶先鬼遺方叙

宋元泰中青州劉慮射一鹿剖五臟以此草塞之蹶然而起慮怪而拔草複倒如此三度慮錄此草種之多主傷折俗呼劉慮草亦曰天名精此草亦寄奴之類 槎庵小乘

琇按前劉涓子及此則皆脫胎宋祖荻洲事要其藥皆寄奴也

裴旻山行有山蜘蛛垂絲如疋布將及旻旻引弓射殺之大如車輪因斷其絲數尺收之部下有金瘡者剪方寸貼之血立止 南部新書

夏侯鄴為閬州有人額上有箭痕問之云從馬侍中征田悦中箭侍中與一藥乃用巴豆微炒同蜣螂搗塗

斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍乃撼動拔之立出後以生肌膏傅之乃愈因以方付鄆去凡諸瘡皆可療後鄆至洪州逆旅主人妻患瘡呻吟用此立愈

本草綱目

蜣螂巴豆同塗痒不可當以雄慈石挾之即出象牙灶鼠肝腦栗眉烏雞尾灰白梅人爪人齒並和黑蟲皆能出箭頭及針鍼在肉者張子和儒門事親方端午取首蒼作丸黃丹衣之置臍而箭頭自出劉薦叔曰近日行伍惟以乾莧菜與沙糖塗之能出箭頭與鉛砲子此常驗者則古方所未載也失名

續醫說

昔有人肩髀中創血如湧出醫用原蚕沙為細末傳之血立止一云用真降香煅存性為末貼之尤効吹劒錄

布智兒從太祖征回田身中數矢血流滿體鬪仆幾絕太祖命取一牛剖其腹納之牛腹中浸熱血中移時遂甦又李庭從伯顏攻郢州砲傷左脇矢貫于胸幾絕伯顏命取剖水牛腹納其中良久而甦何孟春云予在職方問各邊將無知此術者非讀元史弗知也故書于此以備緩急

本草綱目

孫法宗苦頭創夜有女人至曰我天使也事不關善人

使者誤及耳但取牛糞煮敷之即愈如其言果瘥宋書

本草綱目

張禧身中十八矢一矢貫腹悶絕世祖即取血竭遣人往療之元史

蒙古中有墨爾根綽爾濟者精歧黃有正白蘓先鋒鄂碩與蒙古戰中流矢殆甚濟為拔鏃傳以藥遂愈又都統吳拜交戰時身被三十餘矢已昏絕濟令剖白橐駝腹置拜其中遂甦又黃冠苗君稷之徒臂屈不伸濟先以熱鐺熏蒸次用斧推其骨手捏有聲使骨穴對好即愈餘文俱○常撫軍宦迹筆記

薛衣道人祝篥夫名堯民洛陽諸生也少以文名明亡遂棄制舉藝為醫自號薛衣道人得仙傳瘍醫凡諸惡瘡傳其藥少許即愈人或有斷脛折臂者請治之無不完若刳腹沈腸破腦濯髓則如華陀之神里有被賊斷頭者頭已殊其子知其神謂家人曰祝篥夫仙人也速為我請來家人曰即君何妄也頸不連項矣即有返魂丹烏能合既離之形骸哉其子固強之既至祝撫其胸曰頭雖斷身尚有煖氣者生氣也有生氣則尚可以治急以銀針紉其頭于項既合塗以末藥一刀圭熨以炭火少頃煎人參湯雜他藥啟其

齒薑之須臾則鼻微有息矣復以熱酒灌之逾一晝夜則出聲矣又一晝夜則呼其子而語矣乃以進糜粥又一晝夜則可舉手足矣七日而創合半月而如故舉家作謝顧產之半酬之竟民不受後入終南山修道不知所終無子其術不傳

薛立齋治大尹劉國信金瘡出血發熱煩躁屬陰虛為患用聖愈湯治之虛火熄而血歸經矣

梁閣老婭金瘡腫痛出血不止寒熱口乾此氣虛血無所附而血不歸經也用補中益氣五味麥冬主之陽氣復而愈

舉人余時正金瘡灼痛出血不止惡寒發熱用敗毒等藥愈甚此亡血過多氣無所附而然耳遂以四物加柴胡元參五味麥冬治之即愈

江白父患頷癤名癆殿巖密之子云取箭簇法仇防禦方張循王屢求不得因奏知德壽宣取以賜之有一個獨角者尤緊以小瓶盛之用碉砂一錢細研水少許化浸天水半日自然成水右以藥水滴箭簇處當自出也是齋方

凡刀仆傷用石灰不以多少端午日午時取百草搗汁濾過和作餅子入韭菜汁尤妙陰乾遇有傷即以末

齒灌之須臾則鼻微有息矣復以熱酒灌之逾一晝夜則出聲矣又一晝夜則呼其子而語矣乃以進糜粥又一晝夜則可舉手足矣七日而創合半月而如故舉家作謝顧產之半酬之竟民不受後入終南山修道不知所終無子其術不傳

薛立齋治大尹劉國信金瘡出血發熱煩躁屬陰虛為患用聖愈湯治之虛火熄而血歸經矣

梁閣老婬金瘡腫痛出血不止寒熱口乾此氣虛血無所附而血不歸經也用補中益氣五味麥冬主之陽氣復而愈

舉人余時正金瘡炽痛出血不止惡寒發熱用敗毒等藥愈甚此亡血過多氣無所附而然耳遂以四物加知柏軟柴胡元參五味麥冬治之即愈

淮西總管趙領嶺名瘍殿巖密之子云取箭簇法仇阿禦方張循王屢求不得因奏知德壽宣取以賜之有奇効以天水牛一个獨角者尤緊以小瓶盛之用碉砂一錢細研水少許化浸天水牛自然成水右以藥水滴箭簇處當自出也是齊方

凡刀仆傷用石灰不以多少端午日午時取百草搗汁濾過和作餅子入韭菜汁尤妙陰乾遇有傷即以末

糝之如腸胃出桑白皮縫卷之帛繫吳內翰丈少保
守南雄州有刀傷人腸潰者以此藥治之全二人之
命一方只用韭汁和石灰端午日合又治刀斧傷用
五倍子為末乾貼神效亦名小血竭 同上
田田地有年七八十歲老人自願捨身濟衆者絕不
飲食惟澡身啖蜜經月便溺皆蜜既死國人殮以石
棺仍滿用蜜浸鵝忘歲月于棺蓋瘞之俟百年後啟
封則蜜劑下凡人損折肢體食少許立愈雖彼中亦
不多得俗曰蜜人番言木乃伊 轂畊錄
杭州赤山之陰曰箕泉黃大癡所嘗結廬處其徒弟
沈生狎近側一女道姑同門有欲白之于師沈懼引
廚刀自割其勢幾死衆救得活而瘡口流血經月餘
不合偶問諸閣奴教以燔所割勢搗粉酒服如其言
不數日而差全上
閻萬夫長陳君臨陣為刀砟其面瘡已愈而痕與鼻不
能合甚惡時時仰泣曰吾面無完膚生何以見妻子
死何以見父母乎乃拜項彥章求治項命壯士按其
面膚肉盡熟腐施之以法即面赤如赬盤左右賀曰
復故也 九靈山房集

湯火傷

薛立齋治一男子孟冬火傷臂作痛喘咳發熱此火毒刑肺金之症用人參平肺散治之喘咳乃止因勞又惡寒發熱此氣血虛也以八珍湯加桔梗白芷治之而退再加薄桂分三以助藥勢溫氣血壞肉潰之而愈若初起燬赤作痛用神効當歸膏敷之輕者自愈重者自腐生肌神効。或用側柏葉末蠟油調敷亦効若發熱作渴小便赤色其脉洪數而虛者用八珍若患處不潰而色黯者四君芎歸黃耆之類若肉死已潰而不生肌者用四君黃耆當歸炮薑若愈後而惡寒陽氣未復急以十全大補湯切勿用寒涼反傷脾胃

一男子因醉被湯傷腿潰爛發熱作渴飲水脉洪數而有力此火毒為患用生地當歸芩連木通葛根甘草十餘劑諸症漸退却用參耆木草芎歸芍藥白芷木瓜新肉將完因勞忽寒熱此氣血虛而然也仍用參耆之藥加五味棗仁而安又月餘而瘡斂

一男子火傷兩臂燬痛大小便不利此火毒傳于下焦用生地當歸白芍黃連木通山巵赤芩甘草一劑二

便清利其痛亦止乃以四物參耆白芷甘草而壞肉去又數劑而新肉生

一婦人湯傷胸大潰兩月不斂脉大而無力口乾發熱日晡益甚此陰血虛火毒乘之而為患耳用四物湯加柴胡丹皮熱退身涼更用逍遥散加陳皮以養陰血壯脾胃腐肉去而新肉生

凡湯盪火燒痛不可忍或潰爛成惡瘡用松樹皮剥下陰乾為細末入輕粉少許生油調稀傅如傅不住紗絹帛縛定即生痂神効不可言然宜預先合下以備急自剥落而薄者尤妙李莫安撫方用牛皮膠入少湯于火上溶稠狗毛煎碎以膠和毛攤軟帛封之直至痂脱不痛矣內翰家婢夜炊米釜翻傷腿膝以夜不敢白比曉已潰爛用此治之而愈百乙方

馮氏子患火瘡驟用涼藥數貼更加腹脹不食以人參敗毒散加木通山甲治之外以柏葉炒為末麻油調搽漸愈嘗用煮大汁止浮脂調銀硃塗之更効若用涼藥逼火毒入內多致不救

王洪緒治一婦小腿經燙醫用冰片研雪數之不一刻腿腫如斗痛極難忍曰幸在腿小若腰腹間逼毒入內難挽回矣以地榆研細調油拂上半刻痛止再拂

数次全愈

一使女炭火燙足背爛一孔以伏龍肝散乳調敷不三日而愈

一孩被滾湯澆腹因痛抓破腹皮油拂上一次痛止以地榆末乾糝破處次日肌生未破者全愈

錢國賓曰余欲之遂昌宿旅次聞隔房人呼痛夜不安枕次日問店主對曰小价提滾水一桶上樓與客洗面其子拿盆後上蓄桶底脫滾水灌子之頭今腫如斗面目皆平七日不食矣余即往視滿室皆臭用夏枯草一斛為末以香油調腫處厚厚敷上即時止痛止臭三日消腫八日痂落切忌食醬面有黑斑店主如言藥治而愈後余回其子叩謝

竹木刺傷

曾世榮曰元貞乙未春有王千戶來自廣西安船河下一子僅二周患頭疼服藥針灸不効召曾診視色脉俱好惟額上微紅以手法驗之大哭淚下其母恕而見紿曾亦置之勿論但究心以病為事再問當時得病之因千戶云初在靜江時大風吹蓬撲著便不快曾曰此疾若令細揣頭上便知其症彼諾之遂遣家

人出外探親其父自抱兒曾揣之果有小瘕簽刺在顖上皮下即蓬簽也以酥油潤透用鎮鑷取出痛定即安若以匹婦饒舌而退則及幼之心不溥矣後之醫流倘見嬰兒色脉好而病者用藥不應必有他故宜推心推原切勿拘泥可也幼幼心書

富次律云治竹木刺出聖惠方曾用救一庄僕極妙其人有一脚心刺痛楚頗死黃昏傳藥痛尤甚至四更視之刺已出遂用烏羊糞爛搗水和罨傷處厚傳之為佳百乙方

蟲獸傷

張簿員外住劒南張延賞判官忽被蚯蚓咬頭上一宿咬處有二道赤色細如筋繞頭上從胸前下至心經兩宿頭腫疼大如數升椀肚漸腫幾至不救張公出錢五百千并簿家財有數百千募能療者忽一人應召云可治張公甚不信之欲驗其方其人云不語方但療人性命耳遂取大藍汁一椀以蜘蛛投之至汁而死又取藍汁加麝香雄黃更以一蛛投入隨化為水張公因甚異之遂令點于咬處兩日悉平作小瘡

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

而愈 本草綱目

字林云䘏聽形如蜥蜴出蜀興居樹上見人則跳來嚙之嚙已還樹垂頭聽哭聲乃去即千載蝮也其狀頭尾一般大如揚衣粘俗名合木蛇長一二尺談野翁方名斫木蛇又名望板歸救之用嫩黃荊葉搗爛敷之仝上

處士劉易隱居王屋山嘗于齋中見一蜂胃于蛛網蛛搏之為蜂所螫墜地俄頃蜘蛛斃腹欲裂徐行入草嚙芋根微破以瘡就嚙處磨之良久腹漸漸消輕躁如故自後人有被蜂螫者芋梗傅之則愈筆談

蚯蚓糞能治蜂螫余少時摘黃柑為蜂所毒忽以井泉調蚯蚓糞塗之立止聞之昔人納涼檐際見石蜂為蜘蛛所胃蛛出取蜂受螫而墮少甦爬沙墻角以後足抵蚯蚓糞掩其傷須臾健行卒啖其蜂于網信乎物亦有知也沈存中筆談亦記一事與此相類但謂以芋梗耳姑識之客中閒集

麻知幾村行為犬所嚙毘至家脛腫如臞堅若鍛石毒氣入裡嘔不下食頭痛而重往問戴人女僮曰痛隨利減以柳枝柳丸下之見兩行不瘥還戴人自舞陽田謂麻曰脛腫如此足之二陰三陽可行乎麻曰俱不

可行如是何不大下之乃命夜臨卧服舟車丸百五十粒通經散三四錢比至夜半去十四行腫立消作胡桃紋及細于不傷之脛屬其慎勿貼膏紙當令毒氣出流膿血水常行又一日恐毒氣未盡又服舟車凡百餘粒瀉川散三四錢見六行病人曰十四行易當六行反難何也曰病盛則勝藥病衰則不勝其藥也六日其腫水盡又囑其腫水行時不畏風盡後畏風也乃以龕風餅子日三服之又二日方與生肌散一傳之而成痂嗚呼用藥有多寡使差別相懸向使不見戴人則利減之言非也以此知醫之難用醫尤難

戴人即張子和

凡風狗毒蛇咬傷者只以人糞塗傷處新糞尤佳諸藥不及此出檐曝偶談 楮記室

江懷禪師為臚所咬下鼻一僧用髮入礶子蓋泥固濟煅過為末急以鼻蘸灰綴定以軟絹縛定效用此擦落耳鼻亦効 醫學綱目

薛立齋治一男子被犬傷痛甚惡心令急吮去毒血隔蒜灸患處數壯痛即止更貼太乙膏服玉真散而愈

一男子風犬所傷牙關緊急不省人事急針患處出毒血更隔蒜灸良久而醒用太乙膏封貼用玉真散二

服少愈更以解散散二服而瘥若患重者須先以蘇合香丸灌之後進湯藥

針灸經云外邱穴治猘犬即風犬所傷發寒熱速灸三壯更灸患處立愈春末夏初狂犬咬人狂過百日得安終身禁犬肉蚤蝨食此則發不可救也宜先去蚤

血灸咬處十壯明日以後灸一壯百日乃止忌酒七日搗蒜汁韭飲一二盞又方治狂犬傷令人吮去毒血灸百壯神効

治蛇入七竅急以艾灸蛇尾又法以刀破蛇尾少許入花椒解○山居人被蛇傷急用溺洗咬處拭乾以艾灸之立効○又方用獨頭大蒜切片置患處以艾于蒜上灸之每三壯換蒜多灸為妙

陳鑑居庸關人蝎螫手疼痛徹心頃刻腫痛至夜寒熱拘急頭痛惡心此邪正二氣相搏而然以飛龍奪命丹塗患處及服止痛之藥俱不應乃以隔蒜灸法灸之遂愈薛母及薛嘗被螫如前灸之痛即止薛母又嘗為蜈蚣傷指亦用前法而愈凡蛇毒之類所傷依此療之並効本草謂蒜療瘡毒有回生之功

一獵戶腿被狼咬痛甚治以乳香定痛散不應思至陰之下血氣凝結藥力難達令隔蒜灸之五十餘壯疼

痛悉去仍以托裡藥及膏藥貼之而愈

王生被鬧犬傷腿頃間燃痛至股翌日牙關緊急以玉真散治之不應亦隔蒜炙三十餘壯而蘇仍以玉真散及托裡消毒藥而愈

立齋父嘗睡間有蟲入耳痛聲將生薑擦貓鼻尿自出取尿滴耳果出一臭蟲而愈○又百戶張錦自謂耳內生瘡不時作痛痛而欲死痛止如故診其脉皆安靜謂非瘡也話間忽痛作度其有蟲入耳令回急取貓尿滴耳果出一臭蟲遂不復痛或用麻油滴之則蟲死難出或用炒芝麻枕之則蟲亦出但俱不及貓尿之速也此案耳門亦收之重出也恐患此者不知是蟲便藉閱耳

華陀傳彭城夫人夜之廁螫其手呻吟無賴陀令溫湯近熱漬手其中卒可得箴但旁人數為易湯湯冷煖之其旦即愈

一僧為蛇傷一脚潰爛百藥不愈一遊僧以新水數洗淨腐敗見白筋挹乾以白芷末入胆礬麝香少許糝之惡水涌出日日如此一日平復奇疾方

蘇韜光寓婺女城外魁星館有人書一方于壁間曰此方治諸蟲咬神妙韜光屢以救人皆驗其方用貝母為末酒調令病者量飲之飲不得即止頃止酒自傷

處為水流出水盡為度却以貝母塞瘡口即愈雖傷已死但有微氣可以下藥者即活神不可書也集成

崇寧末者隴西兵士暑月中在倅廳前跣立廳下為蛆蜘所中遂不救後數日又有人被其毒博識者教以先飲鹽湯一盃次以鹽湯浸足乃愈

譚氏方治蜘蛛蛛咬遍身瘡子以葱一枝去尖頭作孔將蚯蚓入葱葉中緊捻兩頭勿泄氣頻搖動即化為水點咬處差本草

孫真人以武德中六月得蠼螋尿疾經五六日覺心悶不佳以他法治不愈又有人教畫地作蠼螋形以刀于細細盡取蠼螋腹中土就以唾和成泥塗之再塗即愈方知天下萬物相感莫曉其由矣千金方

立齋治一男子犬傷清腫作痛以蘿蔔汁調庖子末敷之以四物湯加柴胡黃芩花粉川芎山甲二劑少愈更以托裡散加生地柴胡紅花數劑而潰再以托裡健脾藥而愈

馬銘翊傳治蜈蚣傷處蜒蝑塗上其痛立止屢試神効

又一法舊竹筋火中將頭上燒黑取下少許研細敷患處立愈廣筆記

破傷風

官使明先祖向任統制官被重傷患破傷牙關緊急口噤不開口面喎邪肢體弛緩用土虺蛇一條去頭尾腸皮骨醋炙地龍五條去泥醋炙天南星八錢重一枚炮右為末醋煮麪糊丸菜豆大每服三丸至五丸生薑酒下仍食稀葱白粥取汗即瘥 普濟方

萬密齋治一婦人年四十餘形黑而瘠性躁忽先患左腿發內癰潰後起生萬口未合當禁風其婦自恃強健不聽忽一日眩仆目眥口喎身反張手足攣曲亟求治曰此破傷風也痙病也用桂枝湯加熟附子黃耆防風一劑而病減再服十全大補湯三劑而安

胡念菴曰一人因枕髭一並忽然腫起不食有友人詢余余曰此破傷風也速灸為妙瘍醫認作髭疔治以寒涼不數日而死 醫林指月

有男子年六十一脚腫生瘡忽食猪肉不安醫以藥利之少愈時出外中風汗出頭面暴腫起紫黑色多睡耳輪上有浮泡小瘡黃汁出乃與小續命湯加羌活一倍服之遂愈 醫說續編

薛立齋云一男子背瘡未斂以膏藥剪孔貼之患破傷風症而歿此先失于內補外邪襲其虛耳余見此症貼膏藥剪孔欲其通氣而反患破傷風揩斂藥生肌欲其收口而反助其餘毒以致歿者多矣可不慎哉

一男子風襲瘡口牙關緊急腰背反張以玉真散一服而愈仍以托藥裡而愈

薛立齋治一婦人臀癰將愈忽破傷風發熱搐搦脈浮數以當歸地黃湯治之不信乃服發散毒藥果甚始信服數劑而痊是症須分表裡別虛實不可槩治原病式云破傷風因瘡熱甚鬱結榮衛不得宜通佛熱遍身故多白痂是時瘡口閉塞氣難通泄熱甚則生風也不已則表傳于裡但有風熱微甚蕩化故殊異矣大法風熱燥甚佛鬱在表而裡氣尚平者善伸數欠筋脈拘急時或惡寒或筋惕而搐脈浮數而弦者宜以辛熱發散者同也凡用辛熱宜以寒藥佐之則免致藥中病而風熱轉甚也如治傷寒發熱用麻黃桂枝加黃芩石膏知母之類是也或以甘草滑石葱豉寒藥發散甚妙若表不已漸入裡裡又未甚而脈在肌肉者宜以退風熱開結滯之寒藥調之或微加治風辛熱亦猶得傷寒半表半裡以小柴胡和解之

意也若裡熱已甚舌强口噤項背反張驚搐惕搦涎
唾稠粘胸腹滿塞或便溏便閉結或時汗出脉洪數
而弦此由風鬱甚于裡而表熱稍罷則腠理疎泄而
而心火熱甚故汗出也法宜除風散結寒藥下之後
以退風熱開鬱滯之寒藥調之熱退結散則風自愈
矣凡治此亦宜按摩導引及以藥斡開牙關勿令口
噤使粥藥不得下也

治破傷風及金瘡傷打撲損傷方名玉真散事本必用
兩方皆有但人不知張叔潛知府云此方極奇居官
不可闕是齋宰清流日以授直廳醫救欲死者數人
奇甚用天南星防風二味等分為末破傷風以藥敷
貼瘡口然後以溫酒調下一錢如牙關急角弓反張
用藥二錢童子小便調下或因鬪毆相打內有傷損
以藥二錢溫酒調下打傷至死但心頭微温以童子
小便灌下二錢併進三服天南星為防風所製服之
不麻是齋方

按衛生寶鑑以此方煮治狂犬所傷并猪犬咬神効
刑曹案牘多被毆後以傷風死者如在保辜限內於律
不能不擬抵太常合暉常刊秘方以荊芥黃蠟魚鰾
三味魚鰾炒黃色各五錢艾葉二片入無灰酒一碗重湯

煮一炷香熱飲之立愈惟日日以內不得食雞肉後
其子墓堂登庚午賢書人以為刊才之報也閱微軒
介叟
增附
筆記

續名醫類案卷六十

嘉慶壬申重三日校完 介叟

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.