

醫方類聚卷之二百四

十三

小兒門五

目錄

鼻

論

千金方

聖惠方

治小兒鼻塞諸方

細辛膏 白芷膏 木香膏

治小兒鼻齕諸方

龍腦散

治小兒鼻多涕諸方

前胡散 甘菊花散 人參散

治小兒腦熱鼻無涕諸方

木通散 牛黃散 天門冬散 射干散

犀角散 貼頂散 吹鼻散

小兒藥證直訣

大黃丸

保童秘要

得效方

貼額藥

王氏集驗方

犀角消毒飲

省翁活幼口議

通關散

壽域神方

衛生易簡方

金匱鈎玄

餘藥無名者散見本方

鼻

巢氏病源

蠶鼻候

蠶鼻之狀鼻下兩邊赤發時微有瘡而痒是也亦名赤鼻亦名疔鼻然鼻是肺氣所通肺候皮毛其氣不和風邪客於皮毛次於血氣夫邪在血氣隨虛處而入停之其停於鼻兩邊與血氣相搏成瘡者謂之蠶鼻也

千金方

治小兒鼻塞生息肉方

通草 細辛 各壹兩

右二味搗末取藥如豆著絲纏頭內鼻中

日二

治小兒鼻塞不通足涕出方

杏人 半兩 蜀椒 附子 千金翼方炮去皮 細辛 各陸

翼方已上二味各一分半

右四味咬咀以醋五合漬藥壹宿明日以

猪脂五合煎令附子色黃膏成去滓待冷

以塗絮導鼻孔中日再兼摩頂

聖惠方

治小兒鼻塞諸方

夫小兒鼻塞者此由肺氣通於鼻氣為陽諸陽之氣上榮頭而其氣不宜利受風冷之氣入於頭腦停滯鼻間則氣不宜利結聚不通故鼻塞也

治小兒鼻塞不通細辛骨方

細辛 半兩 木通 兩半 辛夷 兩半 杏人 三分湯浸去皮尖雙入

右件藥判碎以羊髓猪脂各三合兼藥相和入於銚子內慢火上熬候藥色黃赤絞去滓入瓷器中貯之日三四度以少許塗於鼻內

治小兒顛氣虛腫鼻塞不通白芷膏方

白芷細辛 木通當歸已上各半兩

右件藥細剉以羊髓四兩與藥同人銚子內慢火上熬候白芷赤黃色膏成絞去滓貯於瓷器內日三四度傅兒顛上及內鼻

中

治小兒鼻塞不通喫乳不得木香膏方

木香半兩 零陸香半兩 細辛三分

右件藥搗羅爲末用醴醐三合與藥相和入銚子內慢火煎令極香絞去滓收令中日三四度取少許塗頭上及鼻中

治小兒鼻塞及生瘰肉方

木通半兩 細辛半兩

右件藥搗細羅爲散以絲裏少許內鼻中

日三易之

治小兒頭熱鼻塞不通方右取濕地龍糞捻作餅子貼顙門上日三二易之

又方

羊髓三兩薰草壹兩

剉

右件藥於銚子中慢火上熬成膏去滓入瓷器內貯之日三四上以膏摩背

治小兒鼻乾塞身熱方右用韭根擣取汁澄清每取少許滴於兩鼻中日二用之

治小兒鼻鼾諸方

夫小兒鼻鼾者由肺主氣而通於鼻而氣為陽諸陽之氣上榮頭面皆上膈壅滯風冷客於頭腦則氣不通冷氣停滯搏於津液膿涕結聚則鼻不聞香臭謂之鼻鼾也

治小兒鼻鼾不聞香臭龍腦散方

龍腦半錢瓜蒂十四枚赤小豆叁十粒黃連叁

草去

右件藥擣細羅為散入龍腦研令勻每夜

臨卧時以菉豆大吹入鼻中每用有少許
清水出爲効

又方木通剉細辛 附子去皮臍生用 甘草生用各一分

右件藥擣羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大
絲裏壹丸內鼻中日再用之

治鼻鼈生瘰肉方

瓜蒂參十枚 細辛壹分

右件藥搗細羅爲散以絲裏如小豆大內

鼻中日二易之

治小兒鼻多涕諸方

夫肺氣通於鼻若其藏爲風冷所傷冷隨氣
乘於鼻故使液涕不收也夫津液涕唾得熱
則乾燥得冷則流溢也

治小兒肺藏傷冷鼻流清涕前朝散方

前胡半兩去蘆頭 白茯苓一分 陳橘皮半兩湯浸去白瓢焙

桂心一分 白朮壹分 人參一分去蘆頭 細辛一分 甘草一分

一分
微清判

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小
煮煎至五分去滓溫服日三四服隨兒大
小以意加減

治小兒腦戶傷於風冷鼻內多涕精神昏悶
甘菊花散方

甘菊花 白朮 防風 去蘆頭 人參 去蘆頭 細

辛 白茯苓 甘草 炙微赤剉 各一分

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小
盞入生薑少許煎至五分去滓不計時候

量兒大小以意分減溫服

治小兒肺寒鼻多清涕精神不爽少欲乳食

人參散方

人參 去蘆頭 前胡 去蘆頭 細辛 杏仁 湯浸去皮尖雙

人送炒 桂心 甘草 炙微赤剉已 各一分

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞入生薑少許煎至五分去滓不

計時候量兒大小加減溫服

治小兒冷風拍着顙門致鼻塞不通宜以此

方塗之

麻油合二細辛木壹兩

右件藥以油煎令微黑色入蠟半兩消後令凝每日三四薄塗於額上

治小兒腦熱鼻無涕諸方

夫小兒肺藏雍滯內有積熱上攻於腦則令腦熱也又肺氣通於鼻主於涕若其藏有熱則津液乾燥故令無涕也

治小兒腦熱無涕口乾心躁眠卧不安宜服

木通散方

木通剉川升麻 麥門冬半兩去心 知母

犀角屑 杏仁湯浸去皮尖雙 甘草炙微

已上各梔子人二 木通半兩 升麻一分 知母一分

右件藥搗羅為散每服壹錢以水盪小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小以意加減溫服

治小兒心肺壅熱腦乾無涕時有煩躁牛黃散方

牛黃豆分 真連半兩 茯苓半兩 犀角屑半兩

鈎霜半兩 麥門冬壹兩 朱砂半兩 馬牙

消兩半兩 龍腦半分 甘草一分 川升麻兩 子

苓兩

右件藥搗細羅為散入研了藥都研令勻

不計時候川溫蜜水調下半錢量兒大小

以意加減

治小兒肺壅腦熱鼻乾無涕大腸秘澀眠卧

心躁天門冬散方

天門冬半兩 緊根白皮剉 川升麻 枳

殼麩炒 甘草炙微赤 川大黃剉

炒

右件藥搗籠羅為散每服二錢以水一小

盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減溫服

治小兒肺心壅熱鼻乾無涕咽喉不利小欲

乳食射干散方

射干剉 川升麻 麥門冬半兩 黃連去

治小兒心脾氣滯熱鼻乾心神煩躁大小
腸不利犀角散方

犀角屑 子芩 甘草炙微赤剉已 柴胡

半兩
去苗

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓量兒大小不計時候加

減溫服

治小兒心脾氣滯熱鼻乾心神煩躁大小

腸不利犀角散方

犀角屑 黃耆剉 麥門冬半兩去心 川大黃

赤芍藥 枳殼麤炒微黃去瓢 木通剉 甘草炙微赤剉

已上各
壹分 川大黃半兩剉
微炒

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓量兒大小不計時候加

減溫服

治小兒腦熱鼻乾宜用貼頂散方

地膽草半兩 花消壹分 地龍糞半兩 黃藥一分

右件藥搗細羅為散以猪膽汁和捏作餅

子兩枚更牙貼於顙門上

治小兒腦熱無涕吹鼻散方

類聚

十一

蚬蛇膽壹分 蟾酥壹分 消石壹分

右細研如粉每取少許吹入鼻中尤良

小兒藥證直訣

大黃元治鼻塞顛開

大黃 黃芩 各壹兩

右為末煉蜜丸菘豆大每服五元至十元

溫蜜水化下量大小以意無時服

保童秘要

腦乾無涕方

升麻 梔子 防風 各三分

右為末取青羊腦髓和為丸如梧子大每

一歲兒一服五丸溫水研化下日再服

多涕方

甘草 一分 菊花 半兩 防風 二分 山茱萸 七枚

右以水四大合煎取一合去滓壹歲兒壹

日令服盡

鼻塞及齶衄諸方夫鼻塞者緣客熱風吹着

腦所以塞也齶者擁也久而不通是謂齶

本草綱目卷之五

十一

也更有鼻中有肉鈴如黍米鼻斬長如皂
莢子撥客卽有鮮血出此可速去之有衄
艷者患艷少清涕屢有衄血也可依後方
辛黃法細辛各青杏仁生通草各二
右四味以蘇羊牝髓各三大合用煖火煎
候藥色焦黃濾取每日三四度腦上塗之

又鼻衄衄血方

黃連五分艾葉 升麻 防風 大黃各三分
朴消八分 煎

右爲末蜜和爲丸如梧子大每日三歲已
下以溫水研化七丸服之

鼻痒諸方

龍腦香皂子大細辛三分朴消一分

右爲細末蜜和爲丸如黃米大內鼻中

又方蜀椒一百粒麻油合

右以油煎椒令黑色濾去滓下少黃蠟候
凝每日三度塗之

得効方

貼額藥治出胎時被風吹鼻塞服藥不退右
川天南星爲末生薑自然汁調或膏貼額
上病去除之

王氏集驗方

犀角消毒飲治大人小兒內蘊邪熱咽膈不
利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮頂結核癰腫毒聚
遍身風疹瘡毒赤癩及瘡疹已出未出不能
快透並皆治之

鼠粘子四斤 防風半斤 去蘆艾 荆芥穗二斤 甘草

膏斤

右粗末每服三錢水壹盞煎七分食後溫
服小兒疹豆欲出及已出熱未解急進此
藥三四服透肌消毒應手神効

省翁活幼口議

治乳幼被母鼻息吹着兒額令兒鼻塞不能
吮乳通關散良方

香附子炒三分 川芎七分 荆芥四分 白殭蠶炒三分
細辛莖二分 猪牙皂角一分

右爲末取生葱白去須搗調藥塗顙門上
壽域神方

治鼻下赤名曰蟹亦名赤鼻以米泔洗傅黃
連末日三四度

治齁用一二月童子小便一鍾服之効
衛生易簡方

治鼻衄用生蘿蔔去葉搗汁仰頭滴入鼻中
或血妄行取汁飲之立効

金匱鈎玄

小兒鼻赤

雄黃 黃丹

右研細末付之

卷之三

十一

目錄

齒

論

千金方

聖惠方

治小兒齒痛風齲諸方

蝦蟆散

治小兒齒不生諸方

大全本草

得効方

齒不生

芎黃散

澹軒方

退齒不出

山居四要

衛生易簡方

餘藥無名者散見本方

鍼灸

齒

巢氏病源

齒根血出候

手陽明足太陽之脈並入於齒小兒風氣入其經脈與血相搏血氣虛熱即齒根血出也治病百法

牙疳

夫小兒牙疳牙疳者齒齲也齲者是牙斷腐爛也上下牙者是手足陽明二經也或積熱

於內或服銀粉巴豆人毒之藥入於腸胃乳食不能勝其毒毒氣循經而上至於齒斷齒口牙縫爲嫩薄之分反爲害也可以射香玉線子治之乳母臨卧常服黃連解毒湯壹服疳病則愈

千金方

治小兒齒落久不生方以牛屎中大豆二七枚小開豆頭以注齒根處數度卽生又方取雄鼠屎二七枚以一屎拭一齒根處

盡此上二十一日卽生雄鼠屎頭尖

聖惠方

治小兒齒痛風齲諸方

夫小兒齒痛風齲者由手陽明足太陽之脈並入於齒風氣入其經脈與血氣相搏齒則腫痛膿汁出謂之風齲也

治小兒齒痛風齲連腮微腫蝦蟆散方

乾蝦蟆

一枚

青黛

細研

柑子皮

細辛

白

雞糞

薰黃

已上各壹分

麝香

半分

乾薑

半分

劉

右件藥搗細羅為散都研令勻以薄絲裹
少許內齩齒孔中日一易之

又方白附子 藁本 細辛 芎藭 莽草

已上各
壹分

右件藥搗細羅為散以薄絲裹少許着齩
齒上

治小兒齩齒風疼及蟲食疼痛黑爛方

乾蝦蟆壹枚 青黛一分 盧會半

燒灰

右件藥同研令細以生地黃汁熬作膏塗

於齒上

治小兒風齩齒痛及蟲食疼痛黑爛方

青黛細研 鷄糞白燒 藁本 細辛

雄黃細研各壹分 麝香少許

右件藥搗羅令細同研令勻旋取少許傅
於齒上

又方 右以地龍糞水和作團燒之令赤細
研以臘月猪脂調傅齒斷上日三用之

又方 右以白馬夜眼少許塞孔中日一二
度效

又方 右以郁李根白皮五兩剉以水一大
盞半煎取一盞熟含冷吐之當吐蟲出

又方 右以皂莢炙去皮子搗末取少許著
齒痛上差

又方 右以松脂捏銳如錐柱齧孔內須更
齧蟲緣松脂出即差

又方 右以鷄舌香半兩細剉以水一中盞

煎至六分大泮熟含冷吐

治小兒齒不生諸方

夫小兒齒不生者由骨之所終而為髓之所
養也小兒有稟氣不足者則隨不能充於齒
骨故齒久不生也

治小兒齒不生或因落不生方

右取牛糞中黑豆二七粒小開去頭上皮
以此豆頭開處注齒根上時時用之當效

又方 雄鼠糞 三七枚

右件藥每日用鼠糞一枚齒根上拭至二十一日當生

又方 右取路傍遺却稻粒於齒落處點二十七下其齒自生神效

大全本草

得效方

齒不生

芎黃散治齒不生齒者由骨之所終髓之所養稟氣不足則髓不能育於骨故齒久不生

川芎

乾地黄

醫方大成經驗良方各半兩

當歸

山

藥

白芍藥

各一兩

沉香

半兩○大成醫方集成南北經驗方

袖珍方良方不用

粉草

三錢○大成已上四味各一分袖珍方良方已上四

味各壹錢

右為末温塩湯調服 大成熱湯調服寒成
經驗方袖珍方良方
 與大半錢用少許揩齒脚亦佳○衛生易
 簡方治小兒并大人多年牙齒不生用人
 芎乾地黃各半兩山薯蕷當歸芍藥甘草
 炙各壹分為末熱湯調稠搽齒脚

澹軒方

退齒不出

烏雞收糞各雌雄鞋底秤半分兩同燒作細
 灰加小射齒根頻付久能通

山居四要

牙疳齒香桔梗燒灰存性傅乾油調

衛生易簡方

治小兒并大人多年牙齒不生用黑豆三十
 粒牛糞火內燒令烟盡為末入麝少許研
 勻先以針挑不生齒處令血出用末少許
 揩不得見風忌酸鹹物

齒針灸

瑣碎錄

灸牙痛以肩尖骨隙間灸三蘸左則灸右右則灸左

咽喉

目錄

論

千金方

升麻湯

食醫心鑑

聖惠方

治小兒喉痺諸方

犀角散 射干散 升麻散 馬牙消散

保童秘要

御藥院方

木香通氣飲子

得效方

射干湯

醫方大成

喉痺

甘桔湯

餘藥無名者散見本方

咽喉

巢氏病源

卒失音不能語候

喉嚨者氣之道路喉厭者音聲之門戶有暴寒氣客於喉厭喉厭得寒即不能發聲故卒然失音也不能語者語聲不出非牙關噤也

馬痺候

馬痺與喉痺相似亦是風熱毒氣於於咽喉頰之間與血氣相搏結聚腫痛其狀從頰

下腫連頰下應喉內痛腫塞水漿不下甚者
膿潰毒若攻心則心煩懊悶至死
十形三療

咽中刺塞

戴人過隱陽强家壽小兒約五六歲同隊小
兒以蜀黍楷相擊逆皆倒刺於咽中數日不
下粥藥腫大發其家告戴人戴人命取水依
道經中呪水法以左手屈中指及無名指作
三山卯坐水盞于其上右手掐卯文是金鎗

卯脚踏丁字立望太陽或燈火取氣壹口吹
在淨水盞中呪曰吾取老君東流順老君奉
勅攝去毒水吾托大帝尊所到稱吾者各各
現帝身急急如律令攝念七遍吹在盞中虛
攪卓三次爲定其兒嚙水下咽曰我可也三
五日腫散乃知法亦有不可侮者
千金方

小兒卒毒腫著喉頸肚熱妨乳方

升麻

射干

大黃

各壹兩

右三味咬咀以水壹升五合煮收八合壹
 歲兒分三服以滓薄腫上冷更暖以薄大
 兒以意加之○聖惠方川升麻射干川大
 黃到微炒右件藥都細剉以水壹大盞煎
 至五分去滓不計時候溫服半合兒稍大
 者以意加之

升麻湯治小兒喉痛若毒氣盛便咽塞并治
 大人咽喉不利方

升麻 生薑 射干各二兩 橘皮一兩

右四味咬咀以水六升煮收二升去滓分
 三服千金翼方同

治小兒喉痺腫方魚膽二七枚以和竈底土
 塗之千金翼方同○聖惠方治小兒咽喉
 痺腫乳食難下鮫魚膽膏方鮫魚膽二枚竈
 底土壹分右件藥相和調塗咽喉上乾即
 易之

治小兒喉痺方

桂心 杏仁各半兩

右二味爲末以絲裹如棗大含咽汁

食醫心鑑

治小兒喉痺腫痛方右取蛇脫皮燒作灰乳

汁和壹匕服之肘後方備預百要方同○得効方蛇

退燒存性爲末右每服用半錢乳汁調下或用

蜂房燒存性爲末每用半錢乳汁調服直指

小兒聖惠方治小兒卒毒腫着咽喉壯熱

妨乳方右以蛇蛻皮燒灰細研爲散不計

時候用乳汁調下一字

又方取露蜂房燒作灰乳汁和壹匕服之肘後

方同備預百要方塗乳哺○聖惠方治小兒卒毒腫著

咽喉壯熱妨乳方右以露蜂房燒灰細研

爲散不計時候用乳汁調下半錢看兒大

小以意加減

聖惠方

治小兒喉痺諸方

夫小兒喉痺者是風熱之氣客於喉咽之間
與血氣相搏而結腫痛甚者腫寒飲粥不下

乃成膿血若毒入於心心煩悶懊懣不可堪
忍此者死也

治小兒喉痺腫塞不通壯熱煩悶宜服犀角
散方

犀角屑

桔梗

去蘆頭

絡石葉

梔子人

川升麻

甘草

炙微赤到已

馬牙消

兩半射

干兩半

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水壹小
盞煎至五分去滓不計時候量兒大小以

意加減溫服

治小兒脾肺壅熱咽喉腫痛痺射干散方

射干

川升麻

百合

木通

剉

桔梗去蘆

頭甘草

炙微赤到已

馬牙消

兩半

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小
盞煎至五分去滓不計時候量兒大小以

意加減溫服

治小兒咽喉腫塞疼痛升麻散方

川升麻

木通

剉

川大黃

剉微炒

絡石葉

犀角屑 甘草炙微赤剉已 石膏三川朴
消三分

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一小
盞煎至五分去滓不計時候量兒大小以
意加減溫服

治小兒喉痺疼痛水漿不入馬牙消散方

馬牙消 馬勃 牛黃細 川大黃剉微 甘
草炙微赤剉已
上各壹分

右件藥搗細羅為散不計時候以新汲水

調下半錢更量兒大小以意加減

治小兒卒毒腫著咽喉壯熱妨乳方○保童
秘要喉閉腫下水不得

馬蘭子兩半

右以水壹中盞煎至半盞去滓不計時候
量兒大小分減溫服

又方右取牛蒡根細剉搗汁漸漸服之驗保童
秘要搗取汁壹
盞服之立効

治小兒咽喉腫痛塞悶方

桑樹上蟪蜋窠壹兩馬勃半兩

右件藥同研令勻鍊蜜和如梧桐子大

三歲已下每服前犀角湯研下三丸三歲

已上漸漸加之

保童秘要

喉閉諸方

升麻 通草 大黃 麻黃去節 犀角 甘

草各壹分石膏二分朴消四分湯成下

右以水六大合煎取三大合去滓下朴消

一歲兒一日及夜與兩合服之

又方麻黃二分桂心半夜干壹杏仁三枚

右以水五大合煎取二大合去滓壹歲兒

壹日及夜令服盡

又方紅雪 紫雪各等分

右同細研壹歲兒每用壹皂子大冷水調

服之

御藥院方

木香通氣飲子治壹切氣病噎塞痰飲不下

青皮去木香 檳榔 陳皮去白各香白

芷二錢 蘿蔔子半兩 藿香葉一兩 甘草炒半兩

人參半兩 枳殼炒去

右為細末每服三錢水壹大盞煎至八分

去滓溫服不拘時候

得効方

射干湯治風熱腫痛

射干 川升麻各壹兩 馬牙消 馬勃各半兩

右為末每服一錢水壹盞煎食後溫服

醫方大成

喉痺

和劑方甘桔湯治風痰壅盛咽喉腫閉方見

門醫方集成南北
經驗方袖珍方同

卷之三

三

目錄

龜背

附龜背

論

聖惠方

治小兒龜背諸方

麻黃丸

治小兒龜背諸方

大黃丸

保童秘要

龜背方

龜背方

三

直指小兒方

龜背證治

得效方

龜背

松蘿丹

永類鈴方

龜背龜背

龜背散

餘藥無名者散見本方

龜背

附龜背

小兒藥證直訣

龜背龜背肺熱脹滿攻於胸膈即成龜背又
乳母多食五辛亦成也 兒生下客風入
脊逐於骨體即成龜背治之以龜尿點骨
節取尿之法當蓮葉安龜在上後用鏡照
之自尿出以物盛之

聖惠方

治小兒龜背諸方

夫小兒龜背者由坐而稍早為客風吹著脊骨風氣達於髓使背高如龜之狀也

治小兒龜背宜服麻黃丸方

麻黃 三分去根節 桂心 獨活 防風 去蘆頭 赤

芍藥 川大黃 剉微炒 枳殼 麩炒微黃去瓢 松花 已

各半兩

右件藥擣羅為末鍊蜜和丸如棗豆大每服以粥飲下五丸 神巧萬全方同 日三服量兒大小以意加減

又方 檳榔 半兩 川大黃 半兩剉微炒 桂心 前胡 去蘆頭

防風 去蘆頭 赤芍藥 獨活 訶梨勒皮

枳殼 麩炒去瓢 麻黃 去根節已已上一分

右件藥擣羅為末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小以意加減

治小兒龜背諸方

夫小兒龜背者緣肺熱脹滿致使背高如龜又云多食熱物亦能致此也

治小兒龜背肺熱壅滯心膈滿悶大黃丸方

川大黃三分剉 天門冬去心 百合 杏仁

湯浸上皮尖雙 木通剉 桑根白皮剉 甜葶

塵紙炒 川朴消已上各

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大不

計時候以溫水研破五丸服量兒大小加

減服之神巧萬

又方甜葶塵隔紙炒 杏仁湯浸去皮尖雙 麻

黃去根 川大黃剉破炒已 桂心一分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大不

計時候以溫水研下五丸量兒大小臨時

加減

治小兒龜背方右取龜尿隨多少摩背骨上

即差

保童秘要

龜背方

夫小兒龜背者為生時被客風吹拍著背風
達於骨髓使兒背高如龜伏宜服此方

麻黃

去節

枳殼

炙

芍藥

各一分

桂心

獨活

防風

大黃

各二分

右為末蜜和為丸如梧子大每服十九米

飲下

龜胃方

葶藶

熬

大黃

各二分

桂心

壹分

麻黃

二分

去節

右為末一如前治

直指小兒方

龜胃證法

胃高脹滿其狀如龜此肺經受熱所致也乳母酒麪無度或夏月熱煩熱乳與兒得之或乳母多食五辛亦成此候

川大黃

參分焙

天門冬

去心焙

杏仁

微炒

百合

各

木通

桑白皮

炒

甘葶藶

紙上炒

爛石膏

各

兩

半

右末鍊蜜圓錄豆大每五圓食後臨卧熟

水化下

得効方

龜背

松藥丹治嬰兒生下不能護背客風吹脊入於骨致之或坐太早亦致偃僂背高如龜多成痼疾

松茸 枳殼 防風 獨活 各壹兩 麻黃

川大黃 前胡 桂心 各半兩

右為末蜜圓黍米大每服十粒粥飲下量

兒加減

永類鈴方

龜背龜胃

兒生不能護背客風入脊或早坐偃僂背高放龜於荷葉上候龜頭四顧急以鏡照之其尿自出以此調紅肉消點其背上骨節積久自安有灸肺俞穴第三椎骨下兩旁各乙寸半膈俞穴第二椎骨下兩旁各乙寸半以卜兒中指中節為乙寸艾炷小麥大三五壯止龜胃乃肺受熱氣脹滿而成或乳母食五辛飲熱傷肺而成

龜背散

大黃三分 天門冬焙去心 百合 杏仁去尖炒

木通 桑白皮蜜炙 甜葶藶隔紙炒 朴消 制

枳殼等分

右為末蜜元食後溫湯化下

手脚

附鶴節

目錄

論

聖惠方

治小兒手拳不展諸方

薏苡人散 羚羊角散

治小兒脚拳不展諸方

當歸散 山茱萸散 生乾地黄丸

保童秘要

直指小兒方

鶴節證治

得効方

手拳不展

薏苡圓

脚拳不展

海桐皮散

禾類鈴方

鶴節證治

餘藥無名者散見本方

手脚

附鶴節

巢氏病源

鶴節候

小兒稟生血氣不足卽肌肉不充肢體柴瘦
骨節皆露如鶴之脚節也

聖惠方

治小兒手拳不展諸方

夫小兒手拳者由在胞之時其母藏腑氣虛
爲風冷所乘兒生之後肝氣不足致筋脉攣

縮不得伸展故令手拳不展也

治小兒手拳不展是肝氣不足內傷風邪宜

服薏苡人散方

薏苡人三分當歸壹分判秦艽半兩防風半兩

去蘆頭酸棗人半兩桂心壹分甘草半兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小

盞煎至五分神巧萬全方同去滓量兒大小分減

不計時候服之

治小兒手不展是風邪滯氣所客令榮衛不

通宜服羚羊角散方

羚羊角屑 羌活 五加皮 白鮮皮

桂心已上各一分麻黃半兩去根節 甘草半分

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小

盞煎至五分去滓量兒大小分減不計時

候溫服

又方麻黃半兩去根節 桂心 赤芍藥 羌活

細辛 甘草各壹分

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

蓋煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫服

治小兒脚拳不展諸方

夫小兒脚拳者由在胞之時其母藏腑內有積冷為風邪所乘兒生之後腎氣不足氣而未榮故令脚指拳縮不展也

治小兒脚不展指拳縮宜服當歸散方

當歸剉微炒 麻黃去根節 羌活 酸棗人散炒
人參去蘆頭 杜仲去蘇皮 桂心已上各

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小盞入生薑少許煎至五分去滓量兒大小乳食前分減服之

治小兒脚拳不展筋急乾細山茱萸散方

山茱萸 羌活 薏苡人 桂心 羚羊
角屑 當歸剉微炒 甘草炙微赤剉 黑豆炒 白茯苓
芩 防風去蘆頭已 生乾地黄半兩 麻黃半兩
去根節

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

蒸煎至五分去滓每於乳食前量兒大小分減溫服

治小兒脚指拳縮宜服生乾地黄丸方

生乾地黄

兩半

郁李人

半兩湯浸去皮尖微炒

防風

去蘆頭

桂心

海桐皮

羌活

白茯苓

芩

薏苡人

已上各壹分

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如菘豆大每於乳食前以溫酒下七丸量兒大小加減服之

保童秘要

手拳不展方

犀角

大黃

各一分

朴消

三分

甘草

六分

常山

半杏仁大

右以水五大合煎取二合半一錢兒每服

一合

脚拳不展諸方

大黃

人參

杜仲

各一分

生薑

桂心

各半

分朴消

四分

右切以水六大合煎取三合壹歲兒一服
一合

又方

郁李仁別大黃 訶梨勒皮 桂心各二分

茯苓 人參 牡丹 當歸 各壹分 鱉甲六分

炙

右為末鍊蜜為丸如梧子大每日壹歲兒
壹服五丸以溫水研服之

直指小兒方

鶴節證治

小兒稟受不足血氣不充故肌內瘦薄骨節
呈露如鶴之膝抑亦腎虛得之腎虛則精
髓內耗膚革不榮易為邪氣所襲日就枯
悴其殆鶴脚之節乎前項錢氏地黃圓本
方加鹿茸酥炙川牛膝各貳錢修合服餌
壹同三歲以下與十圓三歲以上與十五

圓得同方効

得効方

手拳不展

薏苡圓治所受肝氣怯弱致兩脉攣縮兩手伸展無力

當歸焙乾秦艽 薏苡仁 酸棗仁 防風

羌活各一兩

右為末煉蜜圓雞頭大每一粒至二粒麝香京芥湯化下

脚拳不展

海桐皮散治稟受腎氣不足血氣未榮脚指

拳縮無力不能伸展

海桐皮 牡丹皮 當歸 熟地黃 牛

膝各一兩山茱萸 補骨脂各半兩

右為末每服一錢葱白二寸煎食前服

豕類鈴方

鶴節證治

小兒稟受不足腎虛髓竭膝如鶴節地黃元加鹿茸牛膝與服

行遲

附語遲

目錄

論

千金方

食醫心鑑

聖惠方

治小兒行遲諸方

生乾地黄丸 羚羊角丸

治小兒語遲諸方

芍藥散 鷄頭丸 菖蒲丸

三因方

不行證治

五加皮散

是齋醫方

直指小兒方

行遲證治

地黃元 虎骨元 五加皮散

語遲證治

菖蒲元

澹軒方

骨弱

澹察方

永類鈴方

語遲證治

菖蒲元

經驗良方

地黃圓

保童秘要

衛生易簡方

餘藥無名者散見本方

鍼灸

行遲

附語遲

巢氏病源

數歲不能行候

小兒生自變蒸至於能語隨日數血脉骨節
漸成其臏骨成即能行骨是髓之所養若稟
生血氣不足者即髓不充強故其骨不即成
而數歲不能行也

千金方

治小兒四五歲

聖惠方五六歲

不語方末赤小豆酒

和傳舌下 聖惠方 舌上

治小兒數歲 聖惠方 四五歲 不能行方取犇家 聖惠方 犇

豕 未開戶盜食來以哺之日三便起行 食

心鑑同千金翼方 聖惠方勿令人知

食醫心鑑

治小兒末行毋有孕飲膠姊羸瘦方右取伏

翼熟炙噉之日三四度

聖惠方

治小兒行遲諸方

夫小兒行遲者是肝腎氣不足致骨氣虛弱筋脉無力故行遲也

治小兒十歲已來血脉不流筋脉緩弱脚膝無力不能行步宜服生乾地黄丸方

生乾地黄 當歸 剉微炒 防風 去蘆頭 酸棗人

微炒 赤茯苓 黃耆 剉 芎藭 羚羊角屑

羌活 甘草 炙微赤剉 桂心 已上各半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大食前以溫酒下十丸更量兒大小加減服之

治小兒五六歲不能行者骨氣虛筋脉弱宜服益肝腎二藏羚羊角丸方

羚羊角屑 虛脛骨 塗醋炙令黃 生乾地黄

酸棗人 微炒 白茯苓 已上各半兩 桂心 防風 去蘆

頭。南北經驗方 當歸 剉微炒 黃耆 已上各壹分

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如小豆大每

於食前以溫酒研破五丸服之 醫方大成集成經驗

方袖珍方三五丸服之 ○藥證直訣治小

兒腎虛或病後筋骨弱五六歲不能行宜

補益肝腎羚羊角 尖細而節密者錯取末 虎脛骨 破

塗醋炙 生乾地黄 焙 酸棗人 去皮 白茯苓 各

兩 桂 去皮取有味 防風 去蘆頭 當歸 同黃

耆 切焙各壹兩 右同為細末煉蜜和成劑每服

壹皂子大兒次者加之食前溫水化下日

三四服取効

治小兒語遲諸方

夫小兒四五歲不能語者凡人之五藏有五聲心之聲為言由在胎之時其母卒有驚怖

內動於兒藏邪氣乘其心使心氣不和故也
治小兒心氣不足舌本無力令兒語遲芍藥
散方

赤芍藥壹兩黃耆三分犀角屑半兩檳榔半兩甘

草半兩炙微未剉

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一小
盞煎至五分去滓量兒大小不計時候分

減溫服

治小兒諸病後六七歲不能語雞頭丸方

雄雞頭一枚燒天鳴蟬三枚甘草半兩川大

黃一分剉麥門冬一分當歸三分黃

耆三分芍藥三分遠志一分木通一分人參

壹兩去盧頭

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大每
服以粥飲下五丸量兒大小加減不計時
候服之○藥證直訣治小兒諸病後不能

語雞頭壹分鳴蟬二個大黃壹兩取實

煨甘草壹兩當歸一分木通一分黃耆

切川芎遠志法麥門冬 法心焙 法三分 法人參 法半兩
 焙右同為細末煉蜜圓小豆汰平旦服
 下五丸空心日三四兒人者加之久服取
 効雞蟬二物宜求死者用之不河旋殺蘇
 真人所謂殺生求生法在更遠不可不知
 治小兒五六歲不語者為心氣不悅舌本無
 力發轉不得功既風冷傷於少陰之經是則
 舌難發於五音故運時不語蒲瀉丸方川大

菖蒲半兩 ○藥證直訣 三人參 半兩 去黃
 連半兩 去鬚 丹參 三分 ○直訣 麥門冬 壹
 去心天門冬 一兩 去 赤石脂 三分 ○直
 焙心 焙 赤石脂 三分 ○直
 右件藥搗羅為末鍊蜜和如菜豆大每
 服以溫水研下五丸量兒大小不計時候
 加減服之○直訣右同為細末煉蜜丸菜
 豆大或麻子大溫水下五七丸至一二十
 丸不計時日三四服久服取効院方又有
 病後腎虛不語者宜兼服錢氏地黃丸

三因方

不行證治三四

五加皮散治小兒三歲不能行者由受氣

足體力虛怯腰脊脚膝筋骨軟足故不能行

真五加皮

右為末粥飲調用酒少許每服一粟殼許

日三服

是齋醫方

治小兒骨弱至七八歲不能行立者只服八

味元一料自愈功在澤瀉耳

直指小兒方

行遲證治

骨者髓之所養小兒氣血不充則髓不滿骨

故軟弱而不能行抑亦肝腎俱虛得之肝主

筋筋弱而不能束也承類鈴方見白變蒸是

乃髓之所養云云下同

地黃圓方見加牛膝五加皮酒炙鹿茸得効

又方虎骨圓

虎脛骨酒炙 生乾地黄 酸棗仁酒浸去

白茯苓去水 桂去粗 防風去當歸

芎等分 牛膝等分

右煉蜜圓麻子大每五圓酒調下得効

下或煎木瓜湯下鈐方此下云或

五加皮散治小兒三歲不能行加細末

真五加皮分一 牛膝 酸木瓜乾各半

右為末每服壹錢半以粥飲調次入好酒

二點再調食前服日二劑得効

前語遲證治命以六效眼淚不流

言心聲也小兒受胎其母憂有驚怖邪氣乘

心故兒感受母氣心官不守舌本不通四五

歲長夫而不能言也菖蒲圓主之

菖蒲圓水浸 石菖蒲去心 麥門冬去心 遠志取肉薑

人參製炒 川芎各錢 當歸各錢 海乳香各錢 朱砂各錢

右末煉蜜圓麻子大每服十圓粳米飲下

得効方承

類鈐方同

澹軒方

骨弱

未立未行三歲兒細研新採五加皮和調粥

飲兼些酒每日之間三服之

小兒骨弱未支撐十歲依人未學行服八味

元終一劑自然脚力日彌生

澹察方

小兒因患泄瀉或疳氣服藥瀉疳却患咳嗽

治得咳嗽少愈以五六歲脚弱不能行師

曰脾傳肺故咳嗽肺傳腎故不能行脾屬

土土生金金生水故傳之腎腎主腰脚故

不能行因用猪腰子煎汁服五疳保童丸

半月遂能行

小兒未會行能坐不可常常抱在手中可以

一入坐車能獨坐春夏坐於地上寒則以薦

蓆襯之人得地氣方能行惜之過常常抱

持之所以常行而不能行也萬物非土不

生故小兒亦欲得地氣也

永類鈴方

林語遲證治

苜蓿元方見直補

一方石苜蓿附乙丹參夏赤石脂各二錢天門冬

小麥附各各附法出不常常附治中風以

右蜜先大食後溫水下

經驗良方

錢氏地黃圓治數歲不能行由稟受血氣不

足則髓不滿骨故軟弱腎主髓小兒治小兒

鶴節亦由腎虛腎者精神之所含元氣之所

繫若其氣強則骨髓滿溢肌體充盛若氣不

足真氣不守邪氣所侵骨髓枯竭不榮令骨

痿羸瘦

熟地黃錢山茱萸錢乾州藥各四澤瀉

二牡丹皮錢白茯苓各三牛膝四

右爲末煉蜜丸如麻子大空心溫湯送下

五參歲以下十圓以上倍之 又小兒骨弱

至七八歲腰脚軟不能行立服八味圓

保童秘要

五六歲不語諸方

丹蔘 人蔘 黃連 各三分 吳麥門冬 去蜀

天門冬 各五分 昌蒲 二分 赤石脂 壹分

右為末蜜和為丸如梧子大每服五丸以

溫水研化下

又方黃連 五分 以竹瀝 二合 淋之 不燥 令骨

右為末蜜和為丸如梧子大每服五丸以

溫水研化下

五六歲不行方

石解 牛膝 鹿茸 炙 茯苓 兔絲子 各壹分

黃耆二分

右為末蜜和為丸如梧子大每服四九至

五九並溫熱水下不計時候

衛生易簡方

治小兒不能言用社日祭餘酒內兒口中飲

則速語 不燥 各三分

語遲鍼灸

千金方

治小兒四五歲不語灸足兩踝各三壯

常小兒不語者以燻日常灸兩內鼠口中

治小兒驚風

治小兒驚風水不不情却類

治小兒驚風用蘇合散研勻大粒連四其

治小兒驚風

治小兒驚風用蘇合散研勻大粒連四其

治小兒驚風

難乳

附斷乳

目錄

論

論藥難乳香劑見本式

千金方要式

聖惠方

治小兒不與乳諸方

龍膽散 摩頂膏 人參丸 朱砂丸

朱砂散

直指兒兒方

初生不乳證治

伏苓圓半不厚編計

得効友國衣

米極斷乳

畫眉膏 率而膏 人參武 米極武

澹軒方良不與屏端武

堅斷乳

備預百要方

儲

餘藥無名者散見本方

藥

用

目錄

難乳 附斷乳 人良良出益以手餅洲良

巢氏病源以不與屏端武

難乳候

兒在胎之時母取冷過度冷氣入胞令兒者

冷至兒生出則喜腹痛不肯飲乳此則胎寒

亦名難乳也

小兒藥證直訣 川 滋養藥武

急欲乳不能食由客風熱入兒臍流人心脾

經自舌厚唇燥口不能乘乳當涼心脾

管見大全良方
如小兒吐乳者只令乳母服藥更有小兒潮熱似瘧者不可用瘧藥治之

千金方

治小兒不能乳方雀屎四枚為末著乳頭飲
見兒大十枚聖惠方入乳介鼠香

凡小兒初生看產人見兒出急以手掩拭兒

口無令惡血得入兒喉則兒腹內調和無有

疾病若擦拭不及時則惡血穢露兒咽入腹
令心腹痞滿藥氏病源故兒不喫乳也
治小兒壯熱肚脹不飲乳龍膽散方

龍膽兩法犀角一分川升麻半檳榔一分
川大黃一分碎微炒甘菊微末龍甲一分

黃去微炒裙補微炒

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小
盞煎至五分去滓放溫分減漸漸與服之

治小兒鼻寒腦悶喉痛不得摩頂膏方

羊髓三分當歸三分細辛三分白芷三分木通

參野豬脂兩

右件藥剉碎先下脂髓於鑊中入諸藥以

慢火煎候白芷色焦黃藥成以綿濾去滓

於瓷合內盛令凝筋用少許塗頂門上摩

命之兼以少許入鼻內立効

治小兒腹痛不食乳人參丸方

人參半兩去蘆頭黃連半兩去鬚龍膽半兩去馬牙

消半兩甘草半兩微赤剉

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每服以乳汁研二丸灌口中日四五服差

治小兒三歲已下胃口閉不與乳朱砂丸方

朱砂一分丁香壹分麝香壹分人參壹分去

犀角屑半兩黃耆半兩石膏半兩細研五靈

脂半兩牛黃壹分甘草壹分微赤剉

右件藥搗羅為末入研子藥都研令勻鍊

蜜和丸如菉豆大每服以熱水下三九日

四五服

治小兒不喫乳眼目不開手足牽挽此是驚

風朱砂散方

朱砂一分 龍齒一分 消石一分

右件藥都細研為散每服煎竹葉湯放溫

命調下壹字如二歲已上兒每服半錢

治小兒腹脹不喫乳方

赤茯苓半兩 黃連半兩 枳殼半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

嬰三歲已下兒以乳汁化三丸灌之日四三服

治初生兒不飲乳及不小便方

煎汁二合 葱白壹寸切

右二味煎取一合去滓分溫五服即小便

通及飲乳也○得効方用葱白壹寸四破

之以乳汁銀石器煎灌之立効

治初生兒不飲乳吐不止方

蓬萊薺許 藍兩黃

右以煎汁一合煎三五沸去滓即加牛黃

末兩粟米大分減服之立效
治小兒腹痛不肯哺乳方

赤茯苓 壹分 甘草 壹分 黃連 一分

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如梧椰子大
每用丹丸研破著妳頭上令兒吮妳或研
點口中亦得一合法戰公攝正迎明小野

直指小兒方

初生不乳證治小兒方

嬰兒初出胞胎其聲未發急以手拭掠其口

令惡血淨盡茶得下咽則無他病若拭口不
前惡穢入腹則腹滿氣短不能飲乳或產婦
取冷過度胎兒受寒則令兒腹痛不肯飲乳
惡穢入腹常用茯苓圓不吐式

赤茯苓 得劫方 川黃連 去鬚 枳殼 炒

右等分爲末煉蜜圓桐子大每一圓乳沖

調灌下一益木煎以雜藥與之○掛效式

治胎寒腹痛方○得效方川白薑散治產婦
取冷大過胎中受寒令兒腹痛不飲乳以白

川朱香 歸棟 橘皮 火橫 椰 各一 梓 桂 吳川 白

薑 生 甘 蔗 各 餘 效 文 川 白 薑 精 命 煎 散

右未取一捻水煎以蒜齏與之○得效方

右到每取木捺水一合煎以蒜齏與之咽

加木瓜丁香川胡椒 胡椒 胡椒 胡椒

治惡穢久腹冷兒嘔吐不止方

川朱香 乾薑 生 伏 苓 甘 藷 各 酸 木 瓜

丁香 香 各 對 以 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎

右麝末一捻水煎以絲與之煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎

得効方煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎

治初生口噤不開不狀乳者用赤尾蜈蚣草

漸條去足炙令焦細研如粉每用半錢以猪

乳汁二合和勻分三回灌之

山斷乳煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎 煎

畫眉膏王氏集驗方為小兒斷乳經驗良方

斷神式治小兒年至四五歲當斷乳而不肯

梔子三介燒 存性 雌黃良方 雄黃 朱砂各少 許

右為末入生清油輕粉少許調勻候乾

着濃抹於兩眉離來自不噴乳未効再用

即驗

清察方同效

黃

米

各

少

方

清軒方

斷乳男左女右傳亦得用乳保而不肯

山梔三外燒末之雄黃朱砂各一厘麻油輕

粉調和著兒臍濃與竹雙麻文

備預百要方今熟睡時吸飲我出半匙以茶

小兒初生不哺乳以絲拭舌上清泥灌抽草

料林成惡汁令兒智

心腹痛諸方

目錄

論

聖惠方

婦科治小兒心痛諸方

芍藥散 薏米香散 桃人散 合蓮我茂散

桂心散

治小兒腹痛諸方

龍甲丸 當歸散 人參散 青橘皮散

大全本草

直指小兒方

腹中腹痛證治法 人參湯 青汁散

得效方 引引引引

小腹痛

四順清涼飲 香七氣湯 人蘇合香圓 枳

殼桔梗湯 小兒驚風

肘後方

保童秘要

小腹痛諸方

目錄

聖濟總錄

小兒心痛

桃人湯 檳榔散 草撥散 麝香丸

紫沉消積丸 硃砂丸 沉香煎丸 胡

椒丸 薑黃散 棟根湯 人參湯

事林黃記

金匱鈎玄

餘藥無名者散見本方

針灸

檢定

藥性論云香州良本也

金匱論云

非林黃芩

淋瀝 薑黃芩 林林 人參 蘇

紫玉 商陸 山 蘇 蘇 蘇 蘇

射人 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇

小兒心腹

聖藥

心腹痛良小蘇黃芩

藥氏病源

心腹痛候 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇 蘇

小兒心腹痛者腸胃宿積冷食及暴為寒氣所

加前後冷氣重者動與藏氣相搏隨氣上下

衝擊心腹之間故冷心腹痛也此蘇蘇蘇蘇

玉機微義小兒蘇口小蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇

宜蘇論腹痛所因白蘇子才文蘇味胃即也

錢氏曰積痛口中氣溫面黃身重且無精光或

白睛多及多睡畏食或大便酸臭者當磨積
宜消積丸甚者當白餅子下之後和胃 虫
痛而眇自心腹痛口中沫及清水出發痛有
時安虫散主之小兒本懷者多此病積痛食
痛虛痛大同小異惟虫痛當用淡而沫自出
小按小兒腹痛亦有傷冷食乳物及濕熱欲
作痢而痛或發痧疹痛者皆宜詳悉

聖惠方

小治小兒心痛諸方

夫小兒心痛者未非起於心即邪氣客於心
主之脉夫少陰者心也五藏六府之所主也
精神之所舍其藏堅固邪不能干干之即傷
心傷心即神去神去即死矣故諸邪在於心
者皆在於心包絡脉包絡脉者心之別脉也
故少陰不病夫心痛者厥氣上逆痰而不散
或傷寒氣邪令搏於經絡故發心痛也
治小兒心痛但覺兒將手數數摩心腹即啼
是痛不可忍宜服芍藥散方

赤芍藥 人參去蘆 白朮 黃芩 川大

黃到微炒 當歸已上各 白朮各 黃芩各

右件藥搗籠羅為散每服壹錢以水壹小

坊蒸煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減溫服神方同 木香散 方服散

治小兒心痛手足不和木香散方服散

木香分 高良薑分 白朮分 桔梗壹分 去

茯苓壹分 少分 白朮分 桔梗壹分 去

右件藥搗籠羅為散每服一錢以水一小

盡煎至五分去滓稍熱類服量兒大小以

意增減○聖濟總錄治小兒心痛木香高

良薑壹分 白朮壹分 桔梗壹分 白茯苓壹分 去黑皮右

和味籠搗篩壹二歲兒每壹錢匕水壹盞

煎至五分去滓分溫二服發時併喫更量

兒大小加減物 聖濟總錄水壹盞煎

治小兒心痛不可忍桃人散方聖濟總錄

桃人陽穀去殼 赤芍藥去蘆 桔梗去蘆

桂心已上各 聖濟總錄半兩 壹小

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小
 盞煎至五分去滓不計時候溫服量兒大
 小以意加減○總錄右五味搗羅四味為
 末與桃人同研勻每服青錢七水壹盞煎
 至半盞去滓溫服量兒大小加減不拘時
 候

治小兒心痛發歇不定蓬莪散方

蓬莪茂○人參去蘆桂心黃茶小生乾
 地黃木香甘草各分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以稀
 皮湯調下半錢量兒大小以意加減

治小兒心痛不止桂心散方

桂心半分當歸半分炒梔子人半

右件藥搗細羅為散每服不計時候以稀
 皮湯調下半錢量兒大小以意加減

治小兒腹痛諸方

夫小兒腹痛者多由於熱不調冷熱之氣與
 藏氣相擊故為痛也其熱痛者則面赤或壯

熱四肢煩手足心熱是也冷而痛者面色或青或白甚者乃至而黑唇口爪甲皆青是也

治小兒腹痛不可忍鼈甲丸方

鼈甲塗醋炙令黃去裙襖防葵大訶梨勒煨用川大

黃炒人參去蘆郁李入湯浸去皮尖當

歸上各半兩微炒已研干入

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大不計時候以粥飲下五丸得微利差量兒大小以意加減

治小兒冷熱不調腹內多痛當歸散方

當歸剉微枳殼麩炒微赤芍藥以川大黃

剉微炒已衣去不指量良大小

在竹藥搗羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓放溫量兒大小分減服

之

治小兒卒吐下腹痛不止人參散方

人參半兩法常歸甘草一分乾

薑一分炮黃耆到份細辛壹錢以水壹小

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小
盞煎至五分去滓稍熱服量兒大小以意
加減頻服下氣散不吐人參散

治小兒傷令腹痛青橘皮散方

青橘皮湯浸去桔梗去蘆赤芍藥細切

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓不計時候量兒大小分

減溫服味苦黃去蘆衣衣藥川川黃

又方本香高良薑白木高良薑人參去蘆頭

一厚朴半兩去皮塗塗至至四四賦賦青青文文刺刺文

右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調

下半錢量兒大小以意加減心冰冰射射麻麻煎

大命本草藥性論四四賦賦青青文文刺刺文

子母秘錄治小兒心腹胃腸煩滿欲死燒鷄

子殼末酒服方亦以面面白白青青良

子母秘錄治小兒腹脹圭根搗汁和猪脂煎

煎服一日五文文身身黃黃出出神神而而計計出出少

直指小兒方

腹痛證治

腹痛多因邪正交爭與臟氣相擊而作也
 熱作痛者以面赤或壯熱四肢煩躁心
 熱見之扶冷作痛者以面色或白或青見
 之冷甚而證變則面色黯黑唇爪爪青
 大青矣熱證四順清涼飲加青皮枳殼方見諸熱
 冷證精迷七氣湯方見諸氣門加粹桂調蘇
 合香圓方見諸氣門若乃邪正交爭冷熱不
 調則桔梗枳殼湯方見諸氣門加青皮陳皮

木香當歸為妙

得効方

腹痛

四順清涼飲治挾熱作痛面赤壯熱四肢煩
 手足俱熱加青皮枳殼去穢切片入方見

科諸熱門

甚 七氣湯治挾冷作痛面色或白或青四肢冷

青皮 陳皮 桔梗 蓬莪朮 枳殼

藿香 益智仁 各壹兩 香附子 一兩 甘草 參

分加半夏 湯洗參分

右剉散每服參錢水壹盞薑五片棗二枚煎不拘時候

蘇合香圓與七氣湯兼服治證同上 方見大

氣積穀桔梗湯治邪正交爭冷熱不調作為

腹痛嘔吐

枳殼 去瓢 炒 桔梗 去蘆 青皮 去瓢 陳皮 去白 各木

香 錢 當歸 錢 粉草 各五錢

右剉散每服二錢水一盞生薑二片煎溫

眼 下 新 日 通 二 合 別 之 候 煎 藥 不

肘後方水 法 合煎 三 合 法 煎 不 休 留 三 盞

小兒卒心痛腹脹堅如石滿氣喘息好揅如

雞子大漿水三升煮取三沸內攪消取半

分為三服神驗大良

未滿百 日 兒患腹痛豚卵 一 枚 背 歸 壹 分

水三升煮取七合塗之乳頭令小兒飲以

意量之作

保童秘要

小腹痛諸方
夫小兒腹痛者數數努脹多啼不喫妳是也
不問冷熱悉宜服此方

升麻 人參 各壹分
當歸 三菝 各三分
大黃

小半芍藥 各四分
朴消 各四分

右以水七合煎取三合去滓下朴消三歲

已下每日與二合服之如成痢即減藥不

成痢即加藥亦宜服
斗黃丸

又方乾漆

壹胡象膽 桃大 研

右以水四大合煎取二合去滓人象膽三

歲已下壹日連夜與服盡

心痛諸方

白朮 人參 大黃 芍藥 朴消 各一分

右以水五大合煎取三合服之

又方以熱湯磨青木香入朴消少許每服半

合

聖濟總錄

又小兒心痛青木香人參

經言心無正痛真心痛即難治小兒心痛者

心包絡脉受邪也包絡者心之別脉邪氣客

之則厥氣上逆痞而不散故發為心痛

治小兒冷邪氣攻心痛不欲飲食桃人湯方

桃人參七枚湯浸去厚朴去蘆皮生薑人

參兩半陳橘皮湯浸去白麥藥微炒檳榔剉

兩附子炮裂法桂去當歸切焙各

右九味搗篩之一二歲兒每服半錢匕水

半盞煎至三分去滓不計時候溫服更量

大小加減

治小兒冷氣心痛不思飲食檳榔散方

檳榔剉當歸切焙蓬萊剉吳茱萸剉

湯洗焙乾阿魏一分木香一分

右六味搗羅為細散一二歲兒每服半錢

匕溫酒調下不計時候

治小兒心疼不可忍葦撥散方

藥類彙編

華撥壹分胡椒一分桂去蘊皮壹分桃人湯浸去皮尖雙入炒

黃半斤木香半斤常歸壹分

右六味搗羅為細散三三歲兒每服半錢

七溫酒調下不計時候

治小兒心痛面色青黃不欲飲食麝香丸法

麝香細研壹分檳榔李陳橘皮湯浸去肉豆蔻

去去柴壹兩葉黃湯洗焙木香各壹兩

右六味先將柴葉以米醋煮廿三沸後

搗六地坑平可安得柴葉以炭火燒研燒

坑平令通赤以米醋半盞及柴葉入在坑

內用瓷碗蓋之四面以灰確定勿令泄氣

候冷取出與前藥竟處搗羅為末入麝香

和勻醋煮麪糊和丸如黃米大一二歲兒

每服五丸三四歲七丸溫酒下不拘時候

治小兒心痛紫沉消積丸法

沉香判阿魏各四巴豆霜各壹兩

研別為末用酒化蒸成膏丹砂研丁香乾薑

兩貳硫磺研青蘗皮湯浸去商良薑檳榔

木香 去麩皮 桂 去麩皮 胡椒 去 桂 各四兩

右壹十五味除前膏外一千香味搗研為

細末入前膏和傳丸如茶豆大以湯合服

蜜封每服二丸食前橘皮湯下更量度加

減 減正此三四歲十式歲四不

治小兒積氣冷氣心痛疳積方 一二歲良

桐油 乾漆 靈脂 胡椒 木桂 去麩皮

京三稜 炮 蓬莪 茂 巴豆 心皮 麩醋煮

令出 班貓 去麩皮 是妙 半蓋 公 米 莫 入 介 於

右九味搗羅為末研令勻醋煮麵糊和丸

如黃米大壹二歲兒每服五丸三四歲兒

每服七丸橘皮湯下餘以意加減

治小兒嘔逆心腹疼痛化水袋消積聚沉香

煎丸方

沉香 剉 丁香 木香 胡椒 小沒藥 研丹

砂 研水 高良薑 檳榔 麩裏煨熟 硃砂 淨

水飛 漫 青橘皮 易浸去 硫黃 研水飛 縮沙

火熬乾 阿魏 醋浸研澄去沙和麩

去與菜葉焙乾 阿魏 作餅子炙焦各半兩

巴豆

去皮心膜研

出油盡宜分

右壹十五味各搗研為末和勻鍊蜜洗如

茶豆大以瓷合收密封每服二丸食前聽

師香丁香 木量虛實大小加減

治小兒心痛胡椒丸方

胡椒四粒 檳榔一枚 斑猫七枚 法法 桑香

右三味搗羅為細末燒粟米飯為丸黃米

大壹二歲兒每服三丸三歲已上五丸煎

苜蒲湯下蘇合末 勿交白醋 酸味 吐其

治小兒心痛薑黃散方

薑黃 檳榔剉 蘇合末 大小服

右二味等分搗羅為散溫酒調下壹二歲

兒每服半錢匕已下餘以意加減

治小兒蚊蟲攻心腹痛棟根湯方

棟根皮有子 酸石榴根 槐根各壹握切

者

右三味以水三盞煎取壹盞去滓空心頓

服以藥煮合之即瀉蟲出仰之即吐蟲出

神驗兒小分減服或出山時之...
治小兒疳蟲咬心痛不時日夜不睡人參湯
方

人參去麩挑柳枝焙狼牙焙乳香研

青橘皮去白吳茱萸湯洗煨炒古老錢四

火燒醋煎以意瓜匙

右八味搗篩每服錢七以水六分煎至
四分去滓溫服量兒大小加減

事林廣記

男子小兒卒心痛用荔枝核燒灰存性為末
蚌粉湯下亦有效

金匱鈎玄

一小兒好吃粽成腹痛疾用黃連白酒藥為
丸服之愈

心痛鍼灸

瑣碎錄

灸心脾疼男左女右脚大姆指背甲盡處際
肉止灸三壯

肉上於三根

余言眼疾之症宜先明大辨自許以總綱

頭輪症

小兒疳積

代進之愈

一小兒眼出絲虫眼睛赤黃眼白所藥

全即除之

和餅食之亦宜

眼目小兒卒小眼出絲虫眼睛赤黃眼白所藥

育脾胃

八卷國醫雜考

卷內目錄白

論

中州 賦賦賦賦

賦賦賦

賦

小兒藥證

小兒五臟胃口閉

五臟胃口閉詠

聖惠方

治小兒胃中有熱諸方

麥門冬散 菝菝散 蘆根散 梔子人

散 三黃丸

治小兒脾胃氣不和不能飲食諸方
人參散 前胡散 高良薑散 白芷散
散 訶梨散 溫脾散 五香煎

治小兒羸瘦諸方

訶梨勒散 丁香散 黃耆丸 秦芫丸
麥門冬丸 燒黃瓜丸 甘草丸

和劑局方

和中散 加減四君子湯 換積圓 觀
音散 人參圓 溫脾散 益黃散 白

木散 金媽觀音散

小兒藥證直訣

益黃散 利驚丸 括囊湯 五色丸
調中丸 異攻散 霍香散 和中散
半粟散 附子理中圓

是齋醫方

脾胃

真方木香散 雙金飲 藿香散 補元
子厚朴散 銀白散 溫脾丹 溫脾膏

朱氏集驗方

金宋丹 肥兒元 百粒元 沈香煎

元 當歸元 掌骨膏 薑香煎 蘇子

小兒門 六

脾胃 二

簡易方 附于中圖

凝神散 吳州 雷竹煎 味中煎

直指小兒方 蘇州 江四水

小胃氣 虛實證治

木州 驚傷 吐瀉 證治

朱氏集驗方 香州 附于中圖 蘇州 蘇州

蘇州 脾胃 附于中圖 蘇州 蘇州

六君子湯 長生丸 醒脾散

御藥院方

羌活膏 加減益黃散 固腸丸 黃連

阿膠丸 温白丸

得効方

脾胃

白朮散 阿膠散 史君子圓 六神湯

金宋丹 肥兒元 百粒元 沉香夏葛

元寸當歸元 掌骨膏 薑香餅 蘇天

小兒門 六

脾胃二心

簡易方 附于喉中圓

凝神散 吳江州 露香餅 味中餅

益直痛小兒方 附雙餅 正白此

小胃氣 虛實橙汁

朱消驚傷不續齋餅

蘇朱氏集驗方 香餅 附白餅 附雙餅

慈夢脾胃餅 四保子餅 蘇餅餅 賦

六君子湯 長生丸 醒脾散

御藥院方

羌活膏 加減益黃散 固腸丸 黃連

阿膠丸 溫白丸

丁得効蘇餅

三脾胃餅

白木散 阿膠散 史慈子圓 麟六神湯

益黃散 醒脾散 勻氣散 觀音散

三法六門

丁香化癥散

阿澹察方 蘇白朮

四君子湯 和衷散 固本丸 黃連

醫方大成

六味調理脾胃主丸 醒脾散

參苓白朮散 四君子湯 溫脾散 加

減觀音散 寸香散 調中散 醒脾散

白朮散 平脾散 瑞蓮散 快膈消食

圓

南北經驗方

調理脾胃

瀉黃散 省翁活幼口議

四聖湯

小兒經驗良方 益脾散 瀉黃散

補虛丸 中氣丸 不思食

益衛生易簡方選

醫理脾胃

四聖散 餘藥無名者散見本方

竹葉瀉心散 口瘡

黃芩

馬兜鈴

南星 蘇合香

圓

白木蜡

平風蜡

蘇合香

升麻 茯苓

反脾胃 五瀉夫而對對對誠誠誠誠非非非非

巢氏病源 野全瀉發發發發夫夫夫夫胃胃胃胃

蘇帶虛羸 喉味味味味味味味味味味味味味味

此謂小兒經諸大病或驚癇或傷寒或濕壯

而服藥或吐或發瀉痛瘥之後血氣尚虛脾

胃猶弱未能傳化穀氣以榮身體故氣力虛

而羸也 主治 下瀉 瀉 瀉 瀉 瀉 瀉 瀉 瀉

小兒藥證直訣 胃氣不和而皖自無精光口中氣冷不思食

胃氣不和而皖自無精光口中氣冷不思食

吐水當補脾益黃散主之口中流今不思食胃冷虛面眺白色瘦弱腹痛不思食當補脾益黃散主之

下利者調中丸主之

小兒藥證 諸般外感風以藥少調治最宜

且小兒五藏多寒胃口閉難脈假往來彰其擁滯固斯常和氣本每順通微致乃不慎所

食多乖正理全虧養護有失差寧胃口閉而氣多喘五藏失而情恍惚如茲病狀任保實

難年月漸增便為擁咽今為方例以備救全

五藏胃口閉詠

仁參通暢要丁香各半青木先須作棟樑

黃耆口符隨甘草各壹分烏煉微助五靈

方各分石膏添得升麻用各壹分竹茹亦籍

夫漢時廣濟朱砂麝香和肉桂朱砂各半

豆蔻兩分元來望乾薑

右件已上一十六味搗為散蜜和為丸

如小豆大每服熱水下三九于如未解喫

調服之入海羅熟水三式于味未積與
聖惠坊曰此一十六種味酸味鹹火
益可治小兒胃寒有熱諸方主之

夫新兒血氣俱盛者則腑藏皆實故胃中
熱其狀大便則黃四肢溫壯翁然體熱者
也治小兒胃中熱心腹煩悶不欲乳食麥
冬散方
麥門冬去心 赤茯苓 黃芩 茅根剉 廿
冬散方
麥門冬去心 赤茯苓 黃芩 茅根剉 廿
冬散方
麥門冬去心 赤茯苓 黃芩 茅根剉 廿

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一小
盞入竹葉七片煎至五分去滓不計時候
量兒大小分減溫服

治小兒胃中熱煩悶不欲乳食身體黃多渴

菝葜散方

菝葜 蘆根剉 柴胡去 黃芩三 上各川大

黃剉 甘草炙 川芎剉 石膏 麥門

冬去 心焙 已 上各半兩

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一小

蓋煎至五分去滓溫服更量兒大小以意
加減

治小兒胃中熱煩悶不食盧根散方

盧根剉 茅根剉 赤茯苓 黃芩 麥門冬

去心 焙 上各半兩

右件藥搗麝羅為散每服一錢以水一小

盞入小麥五十粒糯米五十粒生薑少許

煎至五分去滓量兒大小以意加減溫服

治小兒胃中熱日漸肌瘦梔子人散方

梔子人 甘草炙 黃連去 黃芩剉 各

六右件藥搗麝羅為散每服壹錢以水一小

盞煎至五分去滓量兒大小以意加減溫

服

又方甘草半兩 天麻剉 大黃半兩 到 藜蘆剉

右件藥搗麝羅為散每服一錢以水一小

盞煎至五分去滓溫服量兒大小以意加

減

治小兒諸熱三時丸方

黃芩小兒藥經直黃連去川大黃到微炒

直訣去皮
濕紙裏煨各壹分

右件藥搗羅為末以水浸蒸餅和如菜

豆大每服以熱水下五丸量兒大小以意

又加減直訣麩糊丸或麻子送

下

治小兒脾胃氣不和不能飲食諸方

夫脾者藏也胃者腑也脾胃二氣合為表裏

胃受穀而脾磨之二氣平調則穀化而能食

若虛實不等水穀不消故令腹脹或泄利不

能飲食所以謂之脾胃氣不和不能飲食也

治小兒脾胃氣不和腹脇妨悶不能飲食如

皮羸弱人參散方以水壹小

人參壹分去壹分陳橘皮壹分湯浸

者壹分甘草壹分訶梨勒皮壹分

右件藥搗羅為散物壹錢以水

煮入生薑少許棗壹枚煎至五分去滓不

計時候溫服量兒大小以意加減

治小兒脾胃氣不和見食欲嘔心胃壅悶前

胡蘇方半兩小荷葉一分沙魚生正公去乾不

而胡蘇頭三分法法功茯苓兩桂心一分人參半兩

頭白木半兩枇杷葉兩試去去盧根三分厚

朴半兩去蟲皮生刺草半兩微未到到

右各藥搗為散每服一錢以水壹小

器入生薑少許煎至五分去滓不計時候

看兒大小分減溫服和劑局方

治小兒冷傷脾胃氣不和心腹痛和劑局方

腹脹氣悶

不欲飲食高良薑散方

高良薑壹分陳橘皮壹分易壹分人參半兩

頭草荳蔻壹分去皮去當歸壹分炒炒桂心壹分

桂去去麝皮壹分右件藥搗為散局方每服壹錢以

水壹小盞煎至五分去滓不計時候看兒

大小分減溫服

治小兒脾胃氣不和增寒壯熱和劑局方

腹痛嘔吐不

納乳食白荳蔻散方

白荳蔻壹分黃耆半兩甘草壹分陳橘壹分

皮壹分湯浸乾木瓜兩半葶藶壹分人參半兩

頭枇杷葉壹分拭去微黃

右件藥搗羅為散每服壹錢以水一小

盞入生薑少許棗壹枚煎至五分去滓不

許時候量兒人小分減溫服○局方右為

養散三歲小兒每服壹錢水壹小盞生薑

錢子三片棗壹枚同煎七枚去滓溫服不

許時候量兒大小加減

治小兒脾胃氣不和時時腹脇虛脹不欲乳

食訶梨散方

訶梨勒皮壹分京三稜半兩煨人參半兩去

陳橘皮半兩湯浸厚朴半兩去生

乾薑一分枳實壹分甘草一分赤到

右件藥搗細羅為散不許時候以溫棗湯

調下半錢量兒大小以意加減

治小兒脾氣不和食少無力溫脾散方

人參三分去白朴兩訶梨勒皮三分木香兩

黃耆半兩 白茯苓半兩 藿香半兩 陳橘皮半兩

去白桔梗半兩 去甘草一分 煎方

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水壹小

盞入生薑少許棗壹枚煎至五分去滓不

計時候量兒大小增減溫服

治小兒脾胃久虛喫食減少四肢羸瘦五香

煎方

丁香兩 沉香兩 麝香研入 木香兩 藿香兩

白朮兩 訶梨勒皮兩 陳橘皮兩 白麵兩

白茯苓兩 甘草兩 黃耆兩 水一斗

右件藥搗篩為散以水五升慢火煎至壹

升以布絞取汁却入鍋內入麝香蜜三合

生薑汁半合棗肉二十枚慢火熬減煎每

服以粥飲調下半茶匙量兒大小以意加

減

治小兒羸瘦諸方

夫小兒羸瘦不生肌肉者皆為脾胃不和

不能飲食故血氣衰弱不能榮於肌膚也凡少

兒在胎而遇寒冷或生出時挾伏熱皆令兒不能飲食故羸瘦也挾熱者則身體壯熱肌肉微黃其挾冷者時時下利唇口青葩也

治小兒羸瘦脾胃氣弱挾於宿食不欲乳食四肢不和訶梨勒散方

訶梨勒皮兩黃耆一分人參一分去蘆頭

無白木一分陳橘皮一分白朮一分桂心一分

白茯苓一分甘草一分微赤到大煎至

右件藥持龠羅為散每服一錢以水一小

蒸入生薑少許棗膏枚煎至五分去滓瀰

服院方日三四服量兒大小以意加減

治小兒羸瘦脾胃虛冷四肢不和抄欲乳食

丁香散方

丁香一分桂心一分白朮一分人參一分去蘆頭

芩半兩高良薑一分陳橘皮一分去白朮一分甘草一分

炙微厚朴一分薑汁一分香熱

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小

煮入棗膏枚煎至五分去滓量兒大小分

減溫服日三四服

治小兒羸瘦體熱面色萎黃不欲乳食黃者

丸方

黃耆半兩 赤芍藥半兩 麥門冬一兩 去人參

半兩去 柴胡三分 胡黃連兩 龍甲壹兩 醋

慮頭去苗 黃耆半兩 炙甘草半兩 炙赤芍

右件藥搗雜為末鍊蜜和丸如麻子大不

計時候以粥飲下五丸量兒大小以意加

減

治小兒羸瘦體熱心神煩悶小便赤黃宜服

秦芄丸方

秦芄半兩 龍膽壹分 去桑根白皮 枳

殼半兩 地骨皮兩 黃耆半兩 人參半

去柴胡 赤茯苓兩 犀角兩 甘草

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗葉大不

計時候用粥飲下五丸更隨兒大小增減

治小兒雖食不著肌膚羸瘦骨熱小便赤黃

治小兒雖食不著肌膚羸瘦骨熱小便赤黃

麥門冬丸方

麥門冬青兩去心焙人參半兩去頭黃耆半兩

蒿子兩黃連半兩去鬚桑根白皮半兩柴胡三分

枳殼半兩麩炒微黃去穰乾骨皮兩半

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大不

計時候以熱水研五丸服量兒大小以意

加減

治小兒羸瘦體熱乳食全少宜服燒黃瓜丸

方

黃瓜大者一枚黃連半兩去鬚胡黃一連陳橘皮兩

湯浸去龍甲一兩童子小便浸柴胡兩

白龍甲宿炙微黃去裙襴

右件藥搗細羅為散以黃瓜切開頭去瓢

內藥末令滿以切下蓋子煮之用蕎麥麵

和凌固濟可厚三分於糖灰火內燒令麩

焦黃為度出取去麩放冷入麝香一錢都

研和丸如菉豆大每服食前米飲下七丸

更量兒大小以意加減

治小兒羸瘦氣憒甘草丸方

甘草二兩炙

右搗羅為末鍊蜜和丸如菜豆大每服以

溫水下五九日二服量兒大小加減服之

和劑局方

和中散治小兒脾胃不和嘔逆惡心冷熱不

調減食泄瀉腹痛腸鳴少力嗜卧

白朮參兩

乾薑炮

甘草炙各二兩

厚朴去皮薑製六兩

右為末每服壹錢水八分盞生薑二片煎

六分去滓稍熱服乳食前服○醫方大成

右吹咀每服二錢水小盞姜二片煎空心

熱服

醫方集成神珍方同人

加減四君子湯

簡易方云李參調理小兒諸政名加四神湯

疾和胃調心怡神養氣

白朮去

人參去

白朮各壹兩

甘草炙半兩

右為末每服壹錢

王氏集驗方二錢

煎湯調服或

吹咀薑棗煎尤妙常服調氣加山藥吐瀉

腹痛煩渴加黃耆白朮豆蔻香薷葛和氣

加生薑心神不定加辰砂棗子心忪心煩
心神不定加茯神驚啼手足瘳凝睡臥不
安加全蝎釣藤白附子脾虛胃弱生風多
困加半夏麩沒食子冬瓜仁發渴加乾葛
木瓜枇杷葉去毛煩渴加黃耆胃冷嘔吐涎
沫加丁香嘔逆加藿香脾胃不和倍加白
朮藿棗脾困加人參木香縮砂仁脾弱腹
脹不思飲食加菟豆粟米傷食加炒神麩
宵滿喘急加白豆蔻涎嗽加杏仁桑白皮

半夏麩風壅邪熱加生薑荆芥經絡纏熱
頭面生瘡加瓜根桔梗有寒及遇天寒發
熱去瓜根桔梗瘡疹已出未出大便閉滯
發渴加瓜桔勞熱往來加川芎盜汗加陳
浮麥盧汗多夜喘加犀角麥門冬小腑赤
澁加麥門冬大腑閉去白朮加陳皮溫中
和氣止瀉加陳皮棗子吐逆四肢厥逆腦
門低陷加藿香丁香吐利過多脾胃虛乏
欲生風候加白附子泄瀉加陳皮製朴薑

棗大腑瀉痢加炒罌粟赤痢加赤芍藥當歸粟米白痢加炮薑粟米藏腑滑泄加煨呵子肉○簡易方又云人以胃氣為上六脉無胃氣則不能生和緩而平者胃氣也嬰孩尤為至要用藥必取至和而平有君子之性者是以四君子湯為全嬰門諸方之冠

換積圓治小兒脾胃不和宿滯不化腹脹腸鳴嘔逆惡心便利不調乳食減少或疳瀉積

瀉大便酸臭亦治丈夫婦人胃膈不快酒積

食積嘔逆惡心吐瀉脾疼

丁香皮不見京三稜地各三兩青皮去白丁香各

兩巴豆夫火乾薑煨各三錢半

右件為細末入巴豆拌勻麵醋糊為圓如

粟米大每服五十元至六十圓二歲兒可

服七圓至十圓生薑湯吞下熟水亦得不

拘時候更量薑歲數加減與之此藥不用

大黃硃砂汞粉之類並是性溫之藥常服

消積滯進乳食退黃長肌

消積滯進乳食退黃長肌王氏集驗方同

觀音散治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐

瀉不進乳食久則漸漸羸弱大抵脾虛則瀉

胃虛則吐脾胃俱虛吐瀉不已此藥大能溫

養脾胃進美飲食○朱氏集驗方進食神效

石蓮肉炒去心人參去蘆壹兩○集神麩

炒二茯苓半錢甘草炙木香炮○集綿者

集驗方搗碎白藕豆去皮炒令焦黃去火

蜜水拌炙白芷各壹

右為劑末每服一錢水一小盞棗壹枚薑

香三葉煎四分去滓溫服量兒大小加減

集驗方右為木每服嬰孩壹字二三歲半

錢四五歲壹錢用水膏藥汁或半銀盞棗

子半筒煎十數沸服

人參圓治小兒乳哺飲冷過度傷冷脾胃腸

鳴脹滿多吐痰涎

人參去蘆陳皮去白乾薑炮丁香白木各壹

半夏湯洗七

半夏次半兩

右為細末煉蜜圓如麻子大每三歲兒服
十圓溫湯下不拘時日二服量兒大小加
減

溫脾散治脾胃氣不和腹脇虛脹不欲乳食
困倦無力壯熱增寒並皆療之

茯苓去木香 藿香去梗 桔梗 陳皮 黃

耆 白朮各半兩 甘草炙壹分 訶梨勒皮炮人

參去蘆冬叁分 右為散三歲兒每服壹錢水壹盞生薑錢

子大牛淮棗壹枚同煎至五分去滓溫服

不計時候量兒大小加減

益黃散治小兒脾胃虛弱腹痛泄痢不思乳

食嘔吐不止困乏神懶心脇膨脹顏色青黃

慳慳不醒○經驗良方脾虛不食能補脾

丁香四錢不見火 陳皮去白 青皮去核 訶子炮去

甘草各壹兩

右為細末每服一大錢水七分盞煎至五

六分良方每服壹錢水 食前進量大小加

藥珠

方同

減與服此藥極有神効方同

錢氏白朮散治小兒脾弱久虛嘔吐泄瀉頻

併不生津液枯竭煩渴多躁但欲飲水乳食

不進羸困少功因而失治變成風癩不問陰

陽虛實並宜服之白朮兒藥證直訣治積痛

和胃生津液滯寮物生小兒脾弱諸疾治亦

兒久虛不進飲食等證則此藥誠不思

茯苓白者去皮人參去蘆白朮不見火藿香去土

木香不見火甘草炙乾薑炮葛根兩芍藥兩

右為麤末每服一錢簡易方玉氏集驗方

藥證直訣水壹小錢煎至半盞去滓通口

服不拘時更量兒大小加減渴甚者併煎

任意飲之簡易方又云張氏方理嘔吐消

寒痰用藿香兩人參壹茯苓兩木香兩丁香兩皮

青皮各半兩甘草壹分咬咀每壹錢水壹小

盞姜二片煎取五分溫服名參香湯

全蝎觀音散治諸與前觀音散同

全蝎 甘草 防風 黃耆 白芷

木香

兩

天麻

去苗

羌活

去蘆

神麴

炒

貳錢

茯苓

苓

去皮

人參

去苗

石蓮肉

炒

白菟豆

炒

各

貳錢

右為細末

嬰兒壹字二三歲半錢四五歲

壹錢用水壹觥或半錢棗子半箇或二箇

同煎七分去滓服不拘時

小兒藥譜直訣

益黃散

又名補脾散

治脾胃虛冷

陳橘皮

壹兩

青橘皮

半兩

呵子肉

半兩

甘草

半兩

丁香

貳錢

右為細末每服二錢水壹盞煎至六分食

前溫服又有食後服三四次煎至盡

和驚丸治脾胃虛冷

輕粉

壹錢

天竺黃

壹錢

青黛

壹錢

黑牽牛末

半兩

生

右同研勻蜜為丸豌豆大壹歲一丸溫薄

荷水下食後服

括婁湯治脾胃虛冷

藥錄

括婁根末錢貳白付遂末錢壹

右同於慢火土炒焦黃研勻每服壹字煎
射香薄荷湯調下無時大效

五色丸治脾胃虛冷

朱砂壹分水銀壹分雄黃兩一真珠兩一

末研一兩鈆三兩水銀熬

右煉蜜丸麻子大每服三四丸煎金銀薄

荷湯下治脾胃虛冷

調中丸四味等分治脾胃虛冷

白朮半兩人參半兩甘草半兩乾薑炮一

錢貳

右為細末蜜為丸如棗仁大每服三丸

五七丸至三二十丸食前溫水送下

異攻散溫中和氣治吐瀉不思食凡治小兒

虛冷病先與數服以正其氣

人參切去頂茯苓去皮白朮炒陳橘皮

各等

右為細末每服二錢水壹盞生薑五片南

實錄 二片 東二介同煎七分食前溫熱服量多
少與之 御藥院方 袖珍方同

藿香散治脾胃虛有熱面赤嘔噦涎嗽及轉
過度者宜服

麥門冬 去心焙 半夏 麴炒 甘草 各炙 藿香 一分

用石膏兩三 右同細末每服半錢至一錢水壹盞煎

七分食前溫服

和中散和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食

人參 切去須焙 白茯苓 白朮 甘草 剉乾葛

黃耆 切焙 白朮豆 炒 藿香葉 各等分

右為細末每服二錢水壹盞乾棗二個去
核姜五片煎八分食前溫服

半粟散治小兒脾胃虛寒吐瀉等病及治冷痰

齊州半夏 一兩湯浸七次切火焙 陳粟米 三分陳粳米亦得

右咬咀每服三錢水壹大盞半生薑十片
同煎至八分食前溫熱服

附子理中圓治脾胃寒弱風冷相乘心痛霍

亂吐利轉筋

人參

去蘆

白朮

剉

乾薑

剉

甘草

剉

始去皮臍

右為細末鍊蜜和壹兩作十元每服壹元

水啻中蒸化開煎及七分稍熱服食前小

兒分作三二服大小以意加減

是齋醫方

脾胃

真方木香散治小兒脾胃虛弱泄瀉氣滯飲

食不進錢都廂方

木香

剉

藿香葉

剉

青皮

剉

甘松

剉

香附子

剉

益智仁

剉

杜仲

剉

草履

剉

各壹

錢壹

錢壹

錢壹

錢壹

錢壹

錢壹

錢壹

右為末每服一錢紫蘇薑湯調下食前大

人增至三錢

雙金飲治小兒吐瀉實脾進飲食

丁香

剉

人參

剉

甘草

剉

白朮

剉

各半

半夏

剉

薑製

錢壹

錢壹

錢壹

錢壹

右爲末每服二錢水七分盞薑二片棗三箇同煎至四分去滓溫服白木
治小兒脾胃虛弱乳食不化時作身熱或吐或瀉不定藿香散

藿香葉 人參 白茯苓 丁香 香薷 前大
右爲細末每服一大錢水半盞煎至三分去滓溫服不拘時候若傷風熱入生薑膏片作加羌活防風各半中有痰逆加湯洗半夏壹片生薑三片煎如前

治小兒傷食腹脹渴元子

蘿蔔子炒 蓬莪朮各壹兩 胡椒半兩
右爲細末麪糊爲元如黃米大不拘時候蘿蔔湯下每服十五至二十元

治小兒脾胃厚朴散

厚朴薑汁製 白朮各壹兩 神麪炒 麥蘖炒各兩 香 甘草各壹分

右爲細末棗湯調下三錢

治小兒諸疾銀白散慢驚搐搦麝香飯飲調

下日進六服急驚定後陳米飲調下驚吐不止
 止陳米飲調下天柱倒脚軟濃米飲調下火
 驚傷寒發搐薄芎葱白湯調下疝氣脹急多
 渴百合湯調下發熱面赤渾身熱壯忽然驚
 叫金銀薄荷湯下赤白痢不思乳食生薑三
 片棗五箇陳米壹合煎飲調下喫食不知飢
 飽不生肌肉麥麩一撮同炒薑湯調下暴瀉
 紫蘇木瓜湯調下形神脫改語言不正及大
 人吐瀉霍香湯調下二錢海上方甚妙

白朮 細剉以茱萸一合炒香去豆 黃耆 拍開微炙 人參

乾山藥 白扁豆 微炒黃香勿 白茯苓 壹兩

白附子 文武火炒微黃 天麻 判如菖子

各半 白僵蠶 洗去灰微 木香 濕紙 川升麻

水浸過 甘草 判炙勿令 真糯米 炒 藿香 土

生用各半兩

右為細末患依湯使服常服米飲調下小兒半錢或壹字婦人產後亦可服治小兒涎多留在兩口角此由脾胃有冷流

出漬於願下乃名帶頤之疾温脾丹方俗謂
之惶被涎瀉兒者葛丞相云此方甚奇張漢
三方

丁香兩一木香兩一夏壹兩用生薑陸青皮

半兩白朮兩半乾薑兩半微炒兩真蘇兩黃連兩香兩

右為細末煉蜜和丸如黍米大每服十元

米飲下量大小加減服之天

又方温胃散白豆豆黃香白朮兩人乾

可香兩一肉豆蔻兩半夏白煨水白朮人乾

薑 甘草 人參 各半

右為細末每服壹錢水八分盞入生薑二

片煎至五分去滓空心温服

又有涎多乳食不下涎流不出口者乃名脾

熱金朱丹方

金箔拾片朱砂細研牛膽天南星半夏

湯洗七次石膏 白茯苓各半兩

不為細末拌勻用牛薑自然汁和元如黍

米大每服十元煎人參湯下乳後服

肥兒元馬敏叔傳

川黃連兩 蕪荑仁兩 壹麥藥炒半 神麴炒半

右為細末生豬膽汁煮麴糊為元如麻豆大每服五元米飲吞下食前服

百粒元錢季華方

川黃連 厚朴 吳茱萸各壹兩用生薑壹兩擦碎同淹

壹宿燭令香熟

右為細末麴糊元如梧桐子大陳米飲下

百粒粟米飲尤妙小兒即小元如黍米大

如瀉甚者加肉豆蔻一箇沒石子兩箇

沉香豆蔻元治小兒乳哺失宜冷熱不調熱衝上鬲冷歸下焦致虛實不等水穀不化遂傷脾胃氣虛則嘔吐脾氣虛則泄利夾積則變為下痢膿血蓋居嘗脾胃最在調適也
廬州郭羽方

當歸 木香各半 沉香 白芍藥 人參

蓬莪茂 縮砂仁各二錢半 白朮半

右爲細末麩糊元如黍米大每服十元至
二十元米飲送下量兒大小加減 人參
治小兒積滯腸脹食傷等疾常歸元滁州丁
醫芫花未開者乃時採取眼瞻乾摘去枝
梗用和淡米醋或康醋浸藥面止醋高藥
指隔宿取出控起帶醋於鐵銚內以慢火
炒之不住手攪拌水脉斷卽以盥器盪之
候冷傾出著底焦者不用洗過銚子指淨
再炒香熟焙乾爲粗末却以先浸藥醋打

硬糊爲元如粟米大每服三二十元米飲
下不拘時候一時許再進臟腑必動不過
利壹兩行卽止甚快而無所損若去脾胃
停滯見效欲速卽用砂塘水或紫蘇湯下
打糊醋須澄清者用或少却添別醋不妨
元時更作壹等如茶豆大者治大人酒食
所傷元數斟量所患隨虛實服之廬州郭
醫云芫花海藻甘遂大戟四者皆反甘草
服此藥了類忌它藥壹日臟腑旣動當以

白粥補之

掌胃膏治小兒脾胃虛弱嘔吐泄瀉

人參 白朮 白茯苓 去皮 黑甘草 炙肉豆

蔻 去麩 白豆蔻 去殼 陳皮 去白 草豆蔻 去皮 枇

杷葉 去毛 青皮 去白 丁香 沉香 木香 藿

香葉 縮砂仁

右各等分爲細末煉蜜元如竜眼大每服

一茶空心食前米湯化下日進二服

醫方類聚卷之二百四十三