



08056

精選集驗良方卷下

武林關梓向春參訂

外科

治喉內廣瘡



用弓店樺皮不拘多少水煎頻頻漱口嚥下立愈

喉珠神方

凡人口內腦門前生一紅線如髮懸一黑泡大如櫻桃掛至咽門名為喉珠如醫人不知治法候用刀點破必死須用土牛膝活根搗汁以好醋二三滴和勻滴入鼻中三四次絲斷珠破吐出紫血即愈

萬金散 治乳蛾喉閉神效真萬金不傳之秘方

集驗良方

卷下 外科

猪膽

五六個

黃連

青黛

薄荷

殭蠶

白礬

朴硝

各五錢

臘月初一日取膽將藥裝入膽內青紙

包固挖地方深各一尺以竹棒橫懸此膽在內蓋好候至立春日取出待風吹乾去膽皮青紙研末密收每吹少許神效

治鬢髮頭瘡

俟剃頭後以葶薺擦之即愈

或于剃後以倒吊烟塵灰摻擦之亦愈

治發背神方

哺胎鷄子

一枚炙枯要將出未出時變完全者已出頭者不用如變未全者須多加一枚

生半夏 一兩

槽坊大酒藥元 一兩

南星 一兩

四味合研極細末糯米飯煮正好勿爛勿硬調敷患處即有熱氣出乾則易之重者一晝夜換十餘次則瘡漸收小高腫毒盡可保無虞

又方

全黑牘牛糞同巨勝子各等分同搗至極細無滓以雞翅掃上畱出瘡頭未潰者漸消已潰者即效既腐者生新極危者立效實神驗奇方
牘牛即公牛巨勝即胡麻黑皮無雙層

治搭背方

集驗良方

卷下 外科

二

用生蒜切片貼患處蒜略大些灸三壯自愈

婦人吹乳

腫痛不可忍用葱連根搗爛鋪乳上患處用瓦罐盛

火蓋葱上蒸熱汗出立愈

治婦人乳痛

發熱或有塊或梗初起三日內可用潰後不宜服

皂角末 三分

鹿角尖末 三分

牛膠

六分打碎以麩炒成珠研

末 三味和冲陳酒服盡醉為度神妙

治男婦乳癰

大瓜萸 一個

搗爛

當歸 五錢

甘草 五錢

用白酒煎數滾再用乳香沒藥

各一錢去油淨研末

冲藥內服

之渣再服

乳癰初起方

乳中結塊作脹紅腫用鹿角磨冲酒服之卽愈

蠶豈殼福珍酒煎服立效

乳巖未潰方

鹿角尖 鎊生用

鬼饅頭 炙灰存性

右二味等分爲末每服三錢黃砂糖拌陳酒下若治

乳癰更效

治漏管神效方

用大蜒蚰一條將甘草研末摻蜒蚰身上俟沿過留

集驗良方

卷下 外科

二

光似皮者取起燃成紙條條端蘸冰片少許入管聽

其自脫

治多年漏管

用小兒口中吐出蛔蟲新瓦炙黃搗爛敷之管卽拔

退管單方

楊牛一個陰陽瓦上炙研末入磁瓶內用時做紙管

入末放偷糞鼠管內五日換一次換至四五次卽能

全愈

或以白頸蚯蚓一條炙研加冰片少許敷管口卽退出

又方取蜒蚰數

條放于瓦上火煨爲末以磁杯受之再以甘草研細

末和水打如緩線香條插入管內其管漸無

又方

用貓頭炙灰存性為末以麻油調敷如有狗咬死貓頭更妙此方專治偷糞老鼠無論新舊皆效

洗痔極效方

葱白 十根

瓦松 一兩

馬齒莧 五錢

皮硝 五錢

槐花 五錢

花椒 五錢

五倍子 去蟲 五錢

茄根 五個

絹袋盛藥煮水每日薰洗七八次即愈

治外痔奇效方

大五倍子 一個

檢完好無損者鑽一小孔去淨內垢

用好川連切碎塞滿外用淨泥一團和食鹽一小酒

集驗良方

卷下 外科

四

杯拌入搗爛將五倍子裏好如糲入灶內文火燒紅取出冷透去泥研極細末再加好冰片少許研勻小磁瓶收貯待痔發疼痛用溫水洗後以此藥每日敷

搽二三次數日即愈

永不復發

治痔方

用帶漿豆腐渣晒乾微火炒焦研末每日清晨以黃酒調服二三錢如不能飲酒即以紅糖水調下服至

三月便可除根

治痔漏

名蜒蚰出洞

甘草 一兩

研末 蜒蚰 十條

同甘草放在碗內蓋好聽

其自化將肥皂子內白肉泡脹全甘草末爲條再用
火硝研末沾條上插入管內其管自脫

又方

蠅螂 十對

花結蛛 五個五色者佳

共搗爛香油浸透臨用爲丸卽多年老漏管用一丸
捺入口內便愈

痔漏丸

治一切內外痔漏及諸般頑漏等症

魚鱧 四兩極明淨者

黃蠟 四兩

明礬 一兩研末

珍珠 五錢研末

象牙 五錢研末

先將魚鱧酒煮極爛杵如膏入黃蠟化盡離火入礬

集驗良方

卷下 外科

五

並硃砂象牙珍珠等末和勻爲丸如梧桐子大每服
三十丸空心酒送下

痔瘡初起方

用馬齒莧不拘乾鮮煮熟多食之以湯燻洗

治楊梅瘡酒方

用無灰酒一大鍾上好小磨麻油一茶杯每日清晨
隔湯燉熱飲下身體強壯者七日卽疴再三四日卽
愈

楊梅瘡神方 第一方 患毒輕者三劑卽愈

生地 二錢

土茯苓 三錢

金銀花 一錢五分

元參 一錢五分

土貝母 一錢

川山甲 二錢

花粉 二錢

甘菊 一錢

防風 一錢五分

甘草 六分

續斷 一錢五分

連翹 一錢五分

桔梗 一錢

蟬退 一錢五分

殭蠶 一錢五分

羌活 一錢

當歸 一錢五分

牛蒡子 一錢

如下部加牛膝 一錢 水煎服

第二方 受毒深者

威靈仙 一錢

蟬退 一錢

生大黃 三錢

麻黃 三分

甘草 五分

精羊肉 一斤

水五碗將肉煮爛病人食肉將肉湯煎藥溫服蓋被

集驗良方

卷下 外科

六

出臭汗大便如痢毒即消也七日不出房門忌風

又煎方

五靈脂 五錢 炒

穿山甲 八錢 土炒

殭蠶 二錢 酒炒

生軍 五錢

右藥分量如法煎好磨生礬冲服渣再煎服之即出

恭而愈不可登毛廁恐貽害別人輕者一服重者二

三服無不愈也

又敷藥方 楊梅結毒下疳邪瘡皆效

川連 一錢 切薄片 微焙研細

蘆薈 三錢 研細

冰片 五分 另研

真阿魏 一錢 如無真者不可用

鳳凰衣 三錢 即初出小雞蛋殼內皮略焙研末

龍骨三錢
研細

甲魚頭一個用泥裹封炭
火煨過去泥研細

鷹糞一錢五
分研細

杏仁約二三兩泡去皮尖
壓淨油晒乾研細末

右藥俱研極細然後入冰片再研勻每藥一兩用杏仁末二兩配之入瓶內聽用時將雄猪苦胆調搽患處不過三次即愈

以上各方隨毒之輕重酌用之總以瀉出毒物爲要
大凡患此症者非因血氣未定一時溺於情欲罔顧利害即係稟氣柔弱或於清晨空心對受毒人說話或同床室或同器飲饌或先後登廁或爲友人招飲令瘡毒尸癆之妓侑酒神迷意亂吃其烟筒酒杯皆易於沾染而不自知雖屬无妄之災亦不敢輕易告人既恐父兄督責又慮親友恥笑不得已與庸醫密商暗服輕粉等沉藥以圖速效無非掩飾目前不知生死之關已爭於此旋見毒留臟腑日積月深每至再發而不可復治輕者亦致殘缺耳鼻墮落鬚眉以父母之遺體爲旁觀所厭惡一時不謹禍及終身悔之何及即艱于子嗣及貽害子女者亦半由於此嗣後奉勸患此症者無論得之自取或染人氣息所致萬不可仍蹈前轍即爲父兄者知之惟有揀擇良方妥爲醫治使之痛自改悔知所做戒知所保攝姑勿

責其既往徒乖天性庶幾無諱疾忌醫之弊矣

七帖散 治楊梅毒瘡

細葉野艾根二兩洗去泥晾乾

土茯苓四兩

殭蠶七條炙斷絲

蟬退七個

猪板油生者一兩

用水七杯煎至三杯早晚各服一劑温下未發消已

發愈且永不復患

紫金丹 治楊梅結毒年久不愈百藥無效者

血龜板二兩酒炙

石決明二錢童便淬

硃砂二錢飛

共研細末土茯苓湯下每服一錢

楊梅瘡 初起即治即愈免致毒氣染人共食醋碟共

集驗良方

卷下 外科

八

處小便即能傳染

羊角 核桃殼 俱燒灰存性等分研細末每用錢

半好酒調早晚各一服四日後毒從大便出如血如

膿漸減每日一服半月毒盡後量人虛實服八珍湯

以補之虛則多服數劑

治瘰癧方

鱧魚一個約重二斤

川山甲四兩研碎

將魚破開肚以川山甲末塞入肚內用稻麥柴穩火

慢慢煨至黑脆存性取出為末以夏枯草煎濃和為

丸如彈子大每服一丸食後酒送下不過十二丸即

愈

治癰串方

玄參

川貝去心

牡蠣醋煨各八兩

右共研細末煉白密爲丸每服三錢槐米湯送下

療癰神方

肥皂子

蜀囊者七粒

煨存性爲末

雄黃七分

將沙糖調和陳酒乘熱冲服卽消重者三服

取癰核法

水銀

礞砂

火硝

明礬

皂礬

食鹽

各一兩 硃砂一錢

集驗良方

卷下 外科

九

用粗瓦盆盛前藥上合粗碗一隻鹽泥封固炭火煉三炷香先文後武冷定取出升碗上藥白米飯搗丸葉荳大硃砂爲衣每用一丸放瘡上綿紙封二三層一日夜急揭起則核隨紙帶出丸可再用

內服方

夏枯草

六兩

水二碗煎至八分食遠温服

如虛甚者煎汁熬膏服并塗患處兼以十全大補湯

加香附貝母遠志服

又方

好胡桃一枚劈做兩半將一半挖去肉以蟬蛻塞實

對合用山泥包好煨存性研細陳酒下每日服一枚

一月愈

蛇頭疔

鷄子

一個依指大敲一孔去黃留白

蜈蚣

一條去頭足炙研末一錢

雄黃一錢

和勻套指上封固一宿愈

拔疔神效方

水蛭蚰

五錢

銀硃

雄黃

冰片

烏梅

各等分

共搗爛搽患處立消

壁疔散治諸疔

以銀硃磁石等分爲末於陰濕處取壁釘蟲連壳搗

集驗良方

卷下 外科

十

爛和勻陰乾爲末用荔枝肉少許搗如泥和入前藥

貼患處外以膏藥貼之立時止痛疔卽拔出百發百

中藥須收貯磁瓶勿走氣壁釘蟲似海蝨瘦而光滑

雨後多着牆上

治鼻疔方

活鮑魚腦不拘多少加射香少許塗之立愈真神方

也

治廉瘡極效方

松香

一兩火上化開傾入水中取起

乳香

三錢

血竭

三錢

共爲末香油調攤隔紙膏貼上針刺數十孔在膏上

三日一換貼時先用米泔水洗淨

太白膏 治腿瘡腐爛年久膿水淋漓臭穢不堪者

胞衣瓶內石灰五錢陳久者佳 雄桑白皮二錢桑之不寔者為雄

石膏三錢生熟各半 冰片二三分不拘

共研細末以香油調攤夾紙膏依瘡大小貼之先煎甘草湯洗既貼之後不可開視痒則隔紙撫摩及愈方揭不須再用

白玉膏 治久遠賺瘡神效

乳香 沒藥 象皮 白蠟各五錢

蜜陀僧 鉛粉 黃蠟各二兩 輕粉四錢

集驗良方 卷下 外科 十一

右除二蠟六味俱為極細末各自包開先用真桐油一斤放鍋內火上滾透去沫澄清先入蜜陀僧末攪勻取起入二蠟鎔盡攪勻待油稍温方入五味藥末攪三百餘遍以大棉紙攤上陰乾隨瘡大小圓長剪貼初貼時瘡中毒水流出藥變黑色再換新者貼之多年賺瘡方

獸醫鏟下驢蹄甲片不拘多少鍋內炒黑存性研末以脂油麻油調塗患處如瘡濕者不必加油乾敷之

即愈

治腿腳紅腫發燒名曰火疽

大黃 滑石 扁柏葉 共爲末以鷄蛋清調敷之
卽退

治霉腳爛

用蚌蛤殼燒灰滲之卽愈

治男婦腳上鷄眼

蕎麥粉 一錢

葶薺 一個

共搗爛照鷄眼大小貼上老硬者貼一日夜嫩軟者

一日連藥齊落

遠行腳腫

草鞋浸尿缸內半日以磚一塊燒紅置鞋於上將足

集驗良方

卷下 外科

三

踏之令熱氣入皮內卽消

治腳底板紅腫熱痛名爲腳隱

大蒜頭量用和鹽搗爛敷過一夜次日卽愈

圍癬

穀樹皮剪如瘡樣大小以毛背一面用唾貼以手不

時撲之卽愈

治癬初起

海螵蛸 一塊 常向患處時時擦之卽愈

陰癬方

土槿皮

兩文

檳榔

兩文

切片用滴花燒酒

五文

將二藥浸三四日候酒色變赤而膩醮塗患處痛癢立止癰方卽愈

面上風癰

白芷三錢 黃丹三錢 黃連二錢 黃柏二錢 茯苓一錢五分

輕粉一錢 末之香油調搽 或加兒茶二錢 尤妙麝香一分

治癬瘡方

鷄蛋一個 浸在真好米醋內七日七夜其蛋自軟用

時先以穿山甲刮破患處卽將蛋絞汁搽之三四次

自愈

治癩方

集驗良方

卷下 外科

三

紫甘蔗皮炙灰存性研末 加銅綠少許 白糖一撮

麻油調搽立效

治赤白癩瘋

蝙蝠一個 石灰五錢 入瓶內扎口埋土中七日化血

水筆醮搽立愈

治癩子豎肉方

用天南星研極細末用滴醋每日調敷數次數日後

自然脫落絕無痕迹亦不痛癢

治汗斑雀斑

硫黃 陀僧等分 研細末燒酒調搽立愈

治對口瘡方

用苦蕒菜搗汁一鍾入姜汁一匙和酒服以渣敷一

二次即愈

治耳爛流膿

陳皮燈心燒灰各一錢冰片一分研勻吹耳

消橫痃堅核如神

山羊角洗淨火上炙嫩黃色刮下再炙再刮每服一

錢黃酒送下重者不過二服即消

橫痃神方

鷄蛋一個白痰藜一合好酒煮蛋熟去殼服之立愈

集驗良方

卷下 外科

齒

治鱧瘻頭敷藥方

哺胎鷄子壳燒灰為末香油調敷

治鱧瘻頭

胞衣瓶內陳石灰 蜜陀僧 先用花椒水洗淨膿

將藥二味研細末陳香油調厚敷綿紙上貼緊聽其

自乾自落即愈

天蛇頭

楓楊樹枝嫩青皮纏在指頭患處拔出清水即毒出

而愈

治鷲掌風方

大五倍子一個將頭磨穿去淨虫屎以雄黃末塞滿再將蘄艾四兩放磁酒瓶內用火將艾燒着以倍子放艾上手向瓶口薰之即愈

化毒桂枝湯 治縮腳腸癰神效

桂枝 全蝎 甲片各二錢

長流水煎服或用三味研末酒冲服之

治肺癰方

虎耳草汁半斤 白酒釀一斤冲服即愈

懸癰

由於三陰虧損濕熱結聚而成在穀道之前陰器之

集驗良方

卷下 外科

五

後即海底穴也初生狀如蓮子小癢多痛日久漸成如桃李赤腫掀痛潰後輕則成漏重則瀝盡氣血變為癆瘵而不起者多矣

粉甘草四兩長流水浸透炭火上炙乾再浸再炙如此三度切片淨三兩 當歸三兩

右二味以水三碗慢火煎濃去渣再煎稠厚為度每

服三錢無灰熱酒一大杯空心化服未成者即消已成

者即潰既潰者即斂不問寒熱乃治懸癰之良藥也

肚內無名腫毒 鼈甲煨存性為末酒服

腹内生瘡

此症生於腸胃取皂角刺不拘多少酒一碗煎七分

溫服其膿血俱從大便中出

治肚臍內潰爛方 赤石脂 研末敷上自愈

治膿窠等濕瘡方

以硫黃五錢要成一塊者取豆腐見方一塊約半斤多切去邊中剝一孔恰容硫黃仍以剝下之腐掩口放小鍋內令剝處向上注水齊腐而止勿使水浸入孔放炭火上煮千百滾水耗則添開水不論時候煮至豆腐四面發黃為度取起去腐再將硫黃入猪臟內兩頭紮緊水煮極透其硫黃即着手如粉用香油調鷄毛醮塗無不愈

集驗良方

卷下 外科

去

治熱毒濕瘡方

有人遍身瘡痛而不痒手足尤甚並粘着衣被不得睡覺即用菖蒲二三斤曬乾為末摻布席上臥之仍以

被蓋臥且不粘衣又能得睡五六日即愈

治陰中生毒

名曰陰痔患者下身麻木小便不通疼痛難忍

淡竹葉草嫩頭

半斤此草葉如竹葉花色天藍最易採

洗淨搗爛用麻布絞汁將冷白酒冲和汁內每次空

心吃酒汁一盃多則三次已成者出膿初起者即散

奇方也 出膿後再要小心忌吃毒物須以參藥補

之便可收功長肉當耐心安睡半月俟患處新肉結

實方可下床倘出膿後走傷患處生管必成通腸痔
漏終身帶疾矣戒之慎之

紅腫翻頭痛不可忍

大螺螄

一個

入冰片

五分

久之化爲水以鷄翎掃上

止痛消腫惟終身戒食螺螄

治凍瘡死血成塊方

雄野鷄腦子全白蠟各等分研末和杵如泥入陳香
油調如稀糊隔水燉熟用毛青布蘸抹瘡上冷則再
抹常令溫潤無不立效且下年不復發

治寒天手足開折

鹿角膠

酒化塗之妙

集驗良方

卷下 外科

七

治凍瘡方

山藥

一節

磨泥敷之或以貂鼠皮煨灰敷之卽愈或

以鴿子糞煎湯洗三四日如凍瘡未潰爛者以陳土

基於灶內燒紅取置木盆中撒食鹽少許卽傾入溫

湯將患處頻頻浸洗再以白蘿蔔切片烘乾用口涎

潤軟貼之不過四五次卽愈永不再發以上四方俱

效聽便揀用

第一祛毒百病萬靈膏

專貼諸般疼痛一切瘡毒只用一個全好

真麻油

五斤

入大鍋內加木鱉子肉

一個一百

大山甲

十五

片蝦蟆皮

三十個

大蜈蚣

二十條

血餘

三兩

開羊花根皮

四兩 慢火熬藥枯髮化用麻布濾去渣秤準淨油

四兩 用宮粉二斤炒黃色徐徐下入油內槐柳棍攪之待

滴水成珠不散為度方下川烏草烏二味用滾水泡炭火煨去皮為

極細末皂角大者去皮弦子為細末三兩五倍子醋煮黑色為末三兩白膠

香八兩松香黃蠟四兩二味共化一處入水內以手扯拔千次攪勻樟腦四兩共

入攪勻再下乳香沒藥血竭兒茶各一兩為細末又攪勻貯

磁器內封口坐冷水中浸三日去火毒凡貼久漏頑

瘡上篩紅粉霜先用葱椒湯洗淨貼上紮緊任他血

水作痒不可開看待他自己長肉如故方可揭開如

開早要貼二個

集驗良方

卷下 外科

六

加味紫金錠方

千金子三兩去壳去油山慈姑一兩八錢去毛紅芽大戟一兩

雄精六錢明亮犀角二錢川連二錢防風二錢荆芥二錢

丁香二錢兒茶二錢硼砂二錢五分蟬酥二錢冰片一錢二分

射香二錢珍珠二錢二分沉香二錢勾籐三錢琥珀三錢

五倍子四兩好細茶煮焙乾用山豆根二錢

右藥各為細末和勻糯米糊為錠硃砂為衣做好用

紙蓋晒乾收貯

此方能治一切無名腫毒諸瘡等症口嚼含化最能解暑化痰生津止渴安神開鬱 中暑昏迷跌打毆

傷吐血及鼻血常出

將藥嚼碎用京水或童便過下

嵐瘴瘟疫

含化

癰疽無名腫毒諸瘡

金銀花薄荷湯下外用燒酒磨敷

瘰癧

金銀花夏枯草

湯下惡虫及顛狗蛇傷

研末調敷燒酒下外敷留口

痢疾初染

陳茶湯下

腸風下血

槐花湯下

眼紅腫痛久年爛腳

陳茶調敷

喉風雙蛾

起泡臭爛粒水不進

金銀花湯洗童便磨服

小兒口内生瘡

燒酒

摩

四時感冒頭眩熱甚發斑口乾舌燥顛狂亂語

燈心

麥冬湯和童便服

胎毒湯火傷

研末調生桐油搽

絞腸痧氣肚脹冲

心痛如刀刺

白湯磨服

牙痛出血虛癆痰嗽夜眠不寐

瘧疾臨發

常山板榔湯下

用藥須各依引服服後忌食魚腥

生令孕婦忌服

集驗良方

卷下

外科

九

治疔瘡

凡手心口背及面上有瘡起疱發癢或寒熱或麻木不痛此極惡之疔瘡急用巴豆一粒米飯一粒粘貼瘡上立時拔疔神效野菊花葉搗汁服一碗死可回生

三煎方

治無名腫毒未成形者可以輕鬆出毒收功

輕者一服見效重者二服極重者三服無不奏功

第一煎

金銀花 一兩

紫地丁 一兩

用河水井水各二碗煎成二飯碗聽用

第二煎

當歸二錢 白芷一錢 甘草八分 陳皮一錢

將前藥汁二碗入此藥煎成一碗聽用

第三煎

乳香一錢 沒藥一錢 七貝一錢 川山甲三片

將前藥煎汁一碗加無灰酒一碗煎成一碗服之

秘傳萬應靈膏方

凡瘡癰初發紅腫焮痛者貼之神驗已潰亦可用

當歸 甘草 全蝎 陳皮 川芎 殭蠶

柴胡 生地 天麻 蘇葉 赤芍 厚朴

集驗良方

卷下 外科

三

秦艽 荆芥 羌活 麻黃 桔梗 白朮

獨活 枳殼 黃芩 防風 川椒 黃柏

白芷 連翹 薄荷 花粉 蒼朮 升麻

黃連 牛膝 皂角 青皮 山梔 木瓜

三稜 虎骨 丹皮 莪朮 木通 大楓子肉

馬前子 小胡麻 大胡麻 生半夏 北細辛

紫地丁 五加皮 蓖麻子 蜈蚣二十條

白花蛇一條

以上五十味各一兩再用

桃枝 柳枝 桑枝 槐枝 葱頭 大蒜

生薑 金銀籐

以上八味各四兩先用好麻油十斤同煎藥其六
味熬枯撈去渣再熬至滴水成珠入飛淨黃丹五斤

再加

沒藥 一兩 冰片 五錢 朝腦 五錢 射香 五錢

銀硃 二兩 雄黃 二兩 乳香 二兩炒

去油

以上七味研極細末候膏冷定入末調勻收貯攤貼
治一切瘡瘍初起方 凡疔不掀赤但白肉而痛者

用花椒葉貼之即散屢驗

陽和解凝膏方 治一切瘡癰無名有各腫毒以及凍瘡
皆可貼可消者即消潰爛者收口如患

集驗良方

卷下 外科

三

瘡者貼背
心俱效 每用香油十斤取新鮮大力子根葉梗三

斤活鳳仙梗四兩入油煎枯去渣次日以

川附 桂枝 大黃 當歸 肉桂 官桂

草烏 川烏 地龍 殭蠶 赤芍 白芷

白蘇 白芨 各二兩 川芎 四兩 續斷 防風

荆芥 木香 香圓 陳皮 五靈脂 各一兩

以上二十二味再入油內煎枯去渣隔宿油冷見過

斤兩每油一斤加炒透桃丹七兩攪和文火熬成膏

至滴水成珠不粘指為度即以油鍋移安冷灶上取

乳香沒藥為末各二兩蘇合油四兩射香一兩入膏

攪勻半日後攤貼

專治瘡癤至重者

白蠶蠶

紅棗 各四兩

先用水煮紅棗一二碗取紅棗水洗蠶蠶棄湯以棗去皮核搗爛蠶蠶晒乾為末二兩用棗肉打和為丸仍用紅棗湯送服服完即愈如瘡毒攻心急不待藥先覓大螃蟹四五隻白湯煮熟飲酒食蟹蓋煖一二時身上發瘡更狠于前而癢全消仍以前治即愈

回陽玉龍膏

治發背陰疽不腫高不掀痛不發熱不作膿及寒

集驗良方

卷下 外科

三五

濕流注冷痛風痺諸濕腳氣手足頑麻筋骨疼痛及一切皮色不變漫腫無頭鶴膝風等症但無皮紅肌熱者一概用之皆效

草烏

三兩炒

軍薑

三兩煨

南星

一兩煨

赤芍

一兩炒

白芷

一兩

肉桂

五錢

右藥共為細末稍加飛麵使其易粘熱酒調敷

玉紅膏

治癰疽發背對口大毒腐去孔深洞見膈膜者用此填塞瘡口能生肌長肉收口誠外科之聖藥也

當歸 二兩

白芷 五錢

紫草 二錢

甘草 一兩二錢

右以麻油一斤將前藥浸七日然後入鍋煎至藥枯
濾去渣將油再熬至滴水成珠下白蠟二兩攪勻再
下研細血竭四錢待冷再下輕粉四錢攪勻益好聽
用愈宿愈佳凡瘡口深陷以新棉花醮塗此膏塞之
不得加減恐反不效

活命飲

耑治紅腫癰瘍發背對口腦疽瘰癧痰核疔瘡惡毒
濕痰流注一切無名紅腫大小瘡癤內癰等症俱可
服未成者即消已成者即潰亦能散風行瘀活血解
毒消腫定痛其藥性和平疎通臟腑功效甚速藥力
集驗良方 卷下 外科 三五
之妙不能盡述

當歸尾

一錢五分 紅花 一錢

皂角刺 一錢

沉香 一錢

石決明

一錢 羌活 一錢

穿山甲 一錢

連翹 一錢

威靈仙

一錢 花粉 一錢

滴乳香 一錢

沒藥 一錢

金銀花

二錢 白芷 一錢

甘草節 一錢

防風 一錢

右加蘇木

一錢 陳酒 一杯 水煎服

雷火針灸法

風寒濕毒留滯經絡痛腫不散者用

羌活

獨活

草烏

澤瀉

黑附子

茯苓

豬苓

白芷

肉桂

大茴香

丁香

麝香

廣木香

川山甲

土炒各一錢

乳香

沒藥

蒼耳肉

去油
各三錢

共研細末和勻先將斬艾去筋梗揉軟用紙一層鋪於上捍薄以藥末摻上捍極緊用時以指捺患處用墨點記將炒鹽熨少頃后用青布三四層放患處將鍼燃着灸之太熟則提起若灸腫毒先在四圍灸旋至頂上并治土箭

砭法

丹毒疔瘡紅絲走散或時毒瘀血壅盛用細磁器擊碎取有鋒鋸者以筋一根劈開夾之縛定用兩手指輕拈令磁鋸正對患處離分許另用一筋輕輕頻擊

集驗良方

卷下 外科

五

令毒遇刺出血毒自滅宜早用庶無入腹之患

葱熨法

治虛怯人肢體患腫塊或作痛或不痛或風襲經絡肢體疼痛或四肢筋攣骨痛又治流注及婦人乳吹乳癰及便毒初起 葱白搗爛炒熟布包熨患處冷則易之再熨再易之數次腫痛即止而愈永戒食龜肉

桑木灸法

治一切癰疽疔癤并治癩癧流注腫瘡頑瘡久不愈者俱有神效 乾桑木 劈碎紮作小把燒燃一頭

吹熄持近患處灸之每灸片時日三五次以瘀肉腐
動爲度大抵未潰則解熱毒止痛消瘀腫已潰則補
陽氣散餘毒生肌肉若陽症腫痛或重負如山用此
法出毒水卽內消日久者用之雖潰亦淺且無苦楚
陰瘡不起者一灸卽起

神燈照法

治一切大毒不拘已成未成已潰未潰始終俱可用
也 雄黃 沒藥 硃砂 血竭 各一錢 麝香 二分 共爲

細末用綿紙作撚每撚用藥三分醮香油點燃離患
處寸餘自外而內週圍徐徐照之毒大者連用撚三

集驗良方

卷下 外科

五

根日照二次毒小者用一根日照一次重者不過五
六日已成者卽消已潰者卽斂陰瘡不起發者一照
卽起紅暈毒隨火散百試百驗

治瘡毒收口方

驚甲 陰陽瓦焙炙存性研極細末過篩敷填患處
數日愈

摘金丹 耑治濕痰流注

剛炭灰 四兩 火硝 一兩 白碱 五錢

其爲細末臨用之時以冷水將藥調敷患處卽消春
秋敷五寸香時夏季敷三寸香時冬季敷八寸香時

香完即將藥洗去

五聖散 治鶴膝神方 有患此症者患五年敷藥三日即愈

乳香 沒藥 各一錢五分 地骨皮 伍錢

無名異 伍錢 麝香 一分

為末車前草搗汁入煮酒調敷患處

一跌打傷或風溼腫痛以葱當歸同搗炒熟熨痛傷處

神效

集驗良方

卷下 外科

美

傷科

中砒霜毒 急取熱鴨血灌之立解

又方 用防風一兩研末清水調服

又方 用糞清灌之亦解

解輕粉毒

用黑鉛五斤打壺 把盛燒酒十五斤納土茯苓半

斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每

日早晚任飲數杯粥時以瓦盆接之當有粉出服至

筋骨不痛乃已

解中水銀毒

集驗良方

卷下 傷科

三

在背陰處掘地一二尺取泥爲丸如梧子大冷茶清

送下四五錢卽瀉水銀隨出

解鹽鹵毒

豆腐漿灌下抹棹布水或肥皂水皆能令吐切不可

用熱水

治服鹽鹵 急將白洋糖四兩調湯灌下

救服鹵 以活鵝鴨殺取熱血吃下吐出卽解

解鳩酒毒 用犀角磨水飲之

解燒酒毒 用鍋蓋上氣流水半盞灌下卽醒

又方 用菘豆粉盪皮多食卽解

凡醉極如死者先宜解散其髮以冷豆腐攤于髮根卽以溫茶入鹽少許灌之漸醒方用樟樹子和乳香研汁滴入口中或用白芥子二杯細研并花水調灌之若但傷酒輕病用蔓菁茶入米少許全煮去渣取汁待冷飲之又或傷酒頭痛嘔吐懶食宜服葛花白朮茯苓猪苓澤瀉白薏砂仁神麩乾薑木香青皮陳皮服後取汗立愈

解蒙汗藥毒 飲冷水卽安

解麻蒙迷藥 用冷水入鹽灌吞卽醒

解葶毒藤茹毒諸草藥毒及閉口花椒毒啖金銀花卽

集驗良方

卷下 傷科

三

愈 又方地漿亦可

治中鮮菌毒吐泄者

用鮮藕一枝連藕上泥不可洗去放石臼內搗爛絞汁飲之立愈

解野菰菌子毒 飲糞汁一杯令吐其毒盡出

又方隨卽飲尿一碗亦解

解斷腸草毒 用鷄一生吞二三個卽消

解飲饌毒

凡中飲饌不知何物卽煎甘草薺泥湯飲之便救

解誤食六畜肉毒

用向東壁上陳土以水調服一錢

解自死各肉毒 用黃柏末一匙入肉食之便解

解牛馬肉毒

用甘草煎水飲一二大碗或煎酒服亦可取吐或下
倘口渴決不可飲水飲之卽死

解河豚魚毒

此魚毒在肝血脂子并眼其肝入口爛舌入腹爛腸
脂令舌麻子令腹脹眼令目花中其毒急以糞汁解
之或飲麻油吐之

又方 用槐花炒黃與乾胭脂等分水調灌之

集驗良方

卷下 傷科

无

解食鱧魚毒

用生蠟食卽解 又食毒鱉飲靛水卽解 又鱉與
莧菜同食腹生小鱉飲白馬尿卽化

解食沙蟲水毒 用萵苣菜搗汁飲之立解
解百蠱毒 用麻油多飲取吐

又方 用黑豆爲末入酒絞汁服半碗亦效

又方 用白鴨血熱飲之效

誤吞金銀 胸膈痛甚者以羊脛骨燒灰米飲下三錢
從大便出

凡中黃金毒者食鷓鴣肉中白銀毒者以黃連甘草解

之又洗金以鹽駱駝驢馬脂餘甘子皆能柔金羊脂
獲子皆能柔銀吞金銀入腹中服食前品柔則易出
又方 用水粉和猪油調服卽消化

解金銀毒 用葱白煮汁飲之

誤吞銅錢 食葶薺核桃化

凡誤吞銅錢者 用葶薺多食之錢卽消化成水

又方 用煉熟密服一二杯亦能化出

誤吞針方 蠶豆同韭菜食之針自大便出

又方

用活蟾一隻取出眼珠連睛兩隻勿令破損以温水

集驗良方

卷下 傷科

三

囟圖吞下其針兩頭俱扞入蟾眼從大便出

又方 磁石

爲細末

將黃蠟和搥如針涼水下裹針從

大便出

救服鋤子

鋤音右卽瀉銀之物及塗磁器者均有毒

用黃泥調水啜一碗卽解

誤吞鐵釘

剝新炭皮研爲末調粥三碗食之其釘自下

誤吞碗鋒 多食熟韭菜卽愈

治百蟲入耳 用菹菜汁滴入耳內其蟲自出

又百蟲入耳不可驚動如在左耳以手緊閉右耳及兩

鼻孔努氣至左耳蟲自出右耳亦然

治飛絲入目

石菖蒲搥碎左目塞右鼻右目反是卽出屢試極效

又方 先以乳汁點目內後用壁蟻窠研細點目卽愈

又方 用車前草搗爛爲丸塞鼻內淚出卽好

烟渣入目 切勿將湯洗愈洗愈痛恐至眼瞎

用亂頭髮或絲纓緩緩揉之卽愈

治黃蜂刺人甚至腫痛不堪者

用瓦松汁塗上無不立愈

治毒蜂螫傷 用麻油搽之

集驗良方

卷下 傷科

三

又方 用熱酒淋洗患處數次卽愈

治獬犬咬傷方

用人糞填滿臍內艾團炙之七次卽惡物盡下屢試

屢驗 又方用香椿樹頭嫩葉食之卽愈

治瘋犬齧傷

人爲瘋犬所齧不治則鮮有能生也緣春間蛇虺出

穴吐其蟄時所含塊土若未經日晒雨淋腥而大毒

犬誤吞之過一兩月輒成瘋犬其狀拖尾垂舌不吠

而動卽齧人人不虞而被其傷毒氣必日攻心腹治

之不早一發而煩燥風狂痛苦跳號甚有仿作犬形

而死依古今治驗方法大槩皆用班蝥執以毒攻毒
之言服下多從小便中打出血塊等物愈不愈尚在
未定其人腸胃實已大傷更戒百日內勿聽銅聲犯
則陡然復發竊思如果毒已盡去因何尚忌銅聲卽
物理有相感之機何復發時勢無少殺可見攻劫于
一時之藥適足貽害將來生死攸關勸人勿服爲妙
此方治無不愈愈後未有復發者元氣不傷保無後
患救人已經無數故不憚瑣瑣以廣其傳

三月三薺菜 每年三月三日採薺菜連根帶葉不
拘多少懸風處陰乾用時以一握瓦上炙脆焦爲末

集驗良方

卷下 傷科

三

當歸 三錢

荆芥 三錢

防風 三錢

桃仁 七粒 去皮尖

炆米屑 二合 炒

右將當歸等五味入水二碗煎至一碗以薺菜末冲
入服之輕者一劑重者二劑卽愈且未發之時均可
照方製服也

治瘋犬咬傷

用白果肉嚼爛塗之 又方用白礬末納入裹之

又方被咬後卽立溪河將傷處擠洗血盡多飲薑汁則
毒可解宜封扎瘡口勿使受風

蛇咬方

用生鷄蛋尖頭略掐碎放咬處蛋大頭用艾灸至熱
連換數蛋其毒方出

毒蛇咬方

半邊蓮搗爛塗患處其毒卽消

按其草極細小二莖一葉生於蔓草中三四月開花
似蓮之半朶故名半邊蓮語云有人識得半邊蓮毒
蛇窠內任君眠

治蛇咬傷

方用好醋先飲一二盃以繩扎傷處兩頭再用五靈

指五錢雄黃二錢五分其爲末酒調二錢灌之少時

集驗良方

卷下 傷科

三五

咬處出黃水水盡則腫消後以雄黃末慘之口合自

愈

又方 用生薑搗爛敷之乾再換

又方 用燒酒淋洗去毒用人糞厚封卽消

蛇蟲傷

毒蛇嚙死用香白芷一味爲末麥冬煎湯調服雖死

亦活 又方 五靈脂一兩雄黃五錢爲末酒調灌服

二錢並敷傷處 俱洗冤錄詳註

虎傷

雷公眞君曰世人被虎咬傷血必大出其傷口立時

潰爛其痛不可當急用猪肉貼之隨貼隨化隨化隨
易速用地榆一斤爲細末加入三七根末三兩苦參

四兩和勻摻之隨濕隨摻血卽止而痛卽定蓋地榆

京血苦參止痛三七根末止血合三者之長故奏效

實神

虎咬傷

用薤白搗汁飲之渣并塗之

又虎爪傷用地蠶搗爛塗之

蜈蚣咬傷 嚼小蒜塗之 又方用頭髮燒烟燻之

蝎子咬傷 用鷄蛋一個輕敲小孔合之立止痛

集驗良方

卷下 傷科

論

蚯蚓咬傷 用石灰水浸之

蛇咬指傷

急用人尿入瓶將指浸之一夕卽愈如爛以剋蛇烏

龜殼燒灰敷之

人口咬傷

牙黃入肉不出重則喪命輕則亦爛成錮疾速用人

尿洗淨又浸一二時待其牙黃出後以鱉甲龜板炙

灰麻油調敷效腫潰者人中黃熬水時時洗之

又方 用漉鷄屎塗咬處立刻止痛不作膿

又方 用栗子嚼爛敷之 又咬傷手指用甌盛熱尿

金浸一夜卽愈 又方用鰲甲燒灰敷之立效
救自勿斷喉方

又自勿者乃迅速之症須救在早遲則額冷氣絕必難
救矣初刎時氣未絕身未冷急用熟鷄皮貼患處穩
枕臥或用絲線縫合刀口滲上桃花散多搗爲要急
以綿紙四五層蓋刀口上以女人舊裏腳布周圍纏
繞五六轉扎之頭向前勿仰刀口不開三日後急手
解去前藥再用桃花散滲刀口仍急纏扎過數日再
用紅玉膏敷患處外用生肌長肉大膏藥貼之再用
絹帛圍裹針線縫緊候其長肉收功 桃花散用陳
集驗良方 卷下 傷科 五

年石灰半升同大黃一兩五錢切片炒石灰變紅色
爲度去大黃篩極細末治一切金瘡出血不止并效

治金刃傷血流不止

用好鷄骨炭擲地有聲者不拘多少與好松香各等
分搗成一塊用老韭菜汁拌入陰乾如此搗拌三四
次後爲細末收貯每遇金瘡敷之立效切不可飲冷
水及稀粥只食乾飯

又方 千年石灰或生半夏研末敷上卽止痛且易收

口

金瘡鐵扇散

象皮

五錢切薄片用鍋焙黃色以乾為度勿焦龍骨 五錢用上白者生研老材香 一兩

山陝等省無漆民間樞驗俱用松香黃蠟塗棺內數十年後有遷葬者棺朽另易新棺其朽棺內之香蠟

卽謂之老材香東南各省無老材香卽以數百年陳石灰一兩代之其效驗與老材香同寸柏香

一兩卽松香中之黑色者松香 一兩與寸柏香一同鎔化飛礬 一兩

將白礬入鍋內熬透便是以上六味共為細末貯磁罐中遇有刀

石破傷者用藥敷傷口以扇向傷處搨之立愈傷處

喜涼惡熱夏月宜臥涼地冬月忌臥熱處傷口不必

用布包裹以致過煖難於結痂並忌飲酒以致血熱

忘行設遇傷處發腫以鷄鵝翎毛蘸黃連水塗之至

於敷藥時若血流乃用扇倘不流血卽不必搨矣若

集驗良方

卷下 傷科

美

受傷日久潰爛有膿血用黃連煎湯洗敷藥 此方蓋明大中

承德得於山右盧醫刊以傳世者也後文制軍殺重刊之有沈兩蒼者如其方以行藥於杭越間無不奇

驗

治刀斧砍傷

韭菜同陳石灰搗成餅貼牆上乾透研極細末血流

不止摻上立愈宜預備施送

第一金瘡神效方

凡刀斧損傷跌扑打碎敷上卽時止痛止血更不作

膿勝他藥多矣其傷處不可着水

真麝香 六分 上冰片 六分 明乳香 去油 杭州粉 炒篩 四兩

雄猪肉

一斤

明松香

六兩

真黃蠟

六兩

孩兒茶

一兩

樟腦

研極細

血竭

一兩

沒藥

去油

以上研極細先

將猪肉松香黃蠟三味熬化濾去渣待將冷再入藥未攪勻磁瓶收貯封固不可洩氣

自刎

凡刎頸氣喉已斷者不治如止血喉斷可用鮮桑樹

皮內白作線縫斷處外用活鷄乾拔去毛取胸前皮

一塊帶熱貼上勿令透氣七日後自長好 如不能

動手縫只以鷄皮貼之亦佳遲則風入血乾不治矣

凡自縊牆壁壓溺水屢甦凍死皆以半夏爲末冷水

集驗良方

卷下

傷科

毛

爲丸如豆大納鼻中卽愈心溫者壹日可治

凡溺縊斃死急取韭搗汁灌鼻中得皂角末麝香同

灌更快捷

救刀鎗傷

凡殺傷不透膜者乳香沒藥各一皂角子大研爛以

小便半盞好酒半盞同煎溫服然後用花蕊石散乳

香沒藥羌活紫蘇蛇含石童便煨三次草烏厚朴白

芷細辛降香當歸南星輕粉蘇木檀香龍骨

各三錢

香三花蕊石

五錢

童便煨七次右藥共十八味研極細

確收聽用葱湯洗淨用此摻之綿軟紙蓋一日一換

神效 或烏賊魚骨或龍骨爲末敷瘡口上血卽止
殺出腸者用小麥煎濃汁待冷令患人覆卧將汁噴
其背則腸漸入

又一方

被刀傷血出不止用紫藤香卽降香 堯瓦鎌刮下石

礮礮細敷之血卽止又無癩痕卽用大礮礮

救刃傷

昔推官宋瑑定驗兩處殺傷氣偶未絕亟令保甲取
葱白炒熱敷傷處繼而呻哈再易葱白傷者無痛矣

治箭鏃入肉不能出

集驗良方

卷下 傷科

美

用陳醃肉去皮取紅活美者用其肥細切剉濃將象
牙及人所退爪甲爲末極細拌入醃肉內再合搗極
勻厚敷箭鏃週圍一飯頃其鏃卽自爲逆脫

又方

用艾絨攤成餅子將火硝細末鋪上再用大蟻螂搗
成末鋪火硝上包傷處一日夜卽出並治竹木器亦
效

綴耳鼻法

用人髮入煬城罐以鹽泥固濟煨過爲末急以所傷
耳鼻蘸藥安綴故處以軟絹縛定效 昔江懷禪師

被驢咬落其鼻一僧用此綴之如舊

救壓死

凡壓死及墜跌死心頭溫者急扶坐起將手提其髮用半夏末吹入鼻內少甦以生薑汁同香油打勻灌之次取散血藥服如無藥以便灌之一取東向桃柳枝各七寸煎湯灌下

治打撲損傷神效方

小桃紅瓦上炙灰存性或烘乾研末收貯不令洩氣臨時用黃酒調服不能飲酒者開水亦可重者三錢一服輕則一二錢俱可小桃紅係初夏生在大麥田

集驗良方

卷下

傷科

五

內宜小暑節十五日內撿紅色未開口者爲佳內有小蟲一個開口則蟲已飛去不甚見功昔年曾配合送人實爲奇效卽打撲內傷吐血者服之亦效後因所傷蟲命實多未忍再製今姑錄此方以備好生者之採擇

又方

卽以哺胎鷄子已哺完全而未出頭破損者炙灰用黃酒隨量調服亦能立愈哺鷄時可預爲檢收炙灰用磁瓶存貯黃蠟封口以備不虞前外科發背方內尤重在哺胎鷄子亦可預用炙灰封好待用惟一年

之後藥力便減宜另換新者爲要前方未載故并及
治一切跌撲損傷 及諸瘡在腳上遠年不愈者

凡馬桶砂瓦上炙碎再以陳柏油化開調敷患處數
次自愈

治損傷方

凡跌打破損及刀傷流血不止用桂圓核去壳並去
盡貼核光皮將核生研細末敷于患處立時止痛裏
好過三日勿令見風即可全愈

跌仆攣筋

集驗良方

卷下 傷科

單

三四年不愈者楊梅樹皮焙燥研末以滴花燒酒隔
水燉熱調塗患處以絹紮好每日一換不過三五次
卽愈

跌壓昏暈

令一人坐地抱懷中踰其兩足束其兩手緊塞糞門
熱童便煎紅花或酒調山羊血灌之候腹中响聲方
去其塞解出瘀血卽甦

跌打外傷內瘀

五月五日收苧蔴葉和石灰搗作團晒乾收貯遇金
瘡折損研末敷之卽時血止且易痂也或同蔴葉搗

爛敷之如瘀血在腹內順流水絞苧蔴葉汁服之卽
通血皆化水以生豬血試之便知秋冬用乾葉

凡跌死打死之人只要身體綿軟皆可救活但不可入
多嘈雜喧鬧以致驚魂不復急要親人呼而扶之坐
于地上先灣曲其兩手兩足再輕移靠親人懷中緊
緊抱定坐在一隻腿膝上抵住糞門不要洩氣急取
童便乘熱灌之馬尿更妙如皆一時不得卽人尿亦
可但要去兩頭取中間的灌下一二碗隨卽用後藥
當歸三錢 川芎二錢 白芍一錢 熟地黃七錢
桃仁去皮尖 紅花一兩 南山查一兩 生大黃一兩

集驗良方

卷下 傷科

單

童便一大鍾夏月加黃連五分用水煎乘熱灌之若
不能吞用竹管吹入待胸中藥行有聲更要抵住糞
門恐其氣從下洩以致不救也如此一頓飯久方可
聽其解出大便多是瘀紫未盡不妨再服前藥至解
出如常糞卽停止

又方救墜馬血瘀胸腹唾血用藕根爲末酒服一杯一

日二服

又方救閃拗手足用生薑葱白搗爛和麵炒熱敷之

又方救腦破骨損用蜂蜜和葱白搗勻厚封立效

太醫院刊行無論打傷跌墜磕撞一切通用調治神效

服方 正骨紫金丹 凡止疼痛散瘀血先以
此方服之百試百效

丁香 木香 瓜兒血竭 兒茶 熟大黃

紅花 各一兩 當歸頭 白茯苓 白芍 蓮肉 各二兩

丹皮 五錢 甘草 三錢 以上十二味共為細末每服黃

酒調下三錢不飲酒者用滾水加酒為引若平時備

用煉蜜為丸更妙

服方 復元通氣散 凡瘀血散去再
以此方服之

木香 茴香 青皮 穿山甲 陳皮

白芷 甘草 貝母 漏蘆 各等分

集驗良方 卷下 傷科 聖

以上九味共為末每服二錢酒調同前

敷方 定痛散 凡皮肉未破止痛
消腫以此方敷之

當歸 川芎 白芍 官桂 升麻

防風 各一錢 紅花 紫丁香根 各五錢 山柰 三錢

麝香 三分 以上十味共為末用老葱搗爛和藥調敷

敷方 定痛膏 若前藥不能應急
即以此方敷之

芙蓉葉 二兩無葉 紫荆皮 天南星 白芷

獨活 各五錢 以上五味共為末用葱汁老酒調炒熱敷

外加馬齒莧一兩搗和更妙

洗方 八仙逍遙湯 凡皮肉未破腫硬
疼痛以此方洗之

防風 荆芥 川芎 甘草各一錢 當歸

黃柏各二錢 蒼朮 丹皮 川椒各三錢 苦參五錢

以上十味水煎熱薰洗之

方 糝 止血定痛生肌散凡皮肉破者以此方糝之

乳香 沒藥 龍骨各三錢 血竭二錢 白芷一錢五分

飛過黃丹 五錢 熟石膏 一兩

以上七味共為細末合勻糝于患處

貼 太乙膏凡皮肉破用前糝藥再以此膏貼之收傷口

生麻油 四兩 當歸 生地黃 生甘草各一兩

飛過黃丹 三兩 白蠟 黃蠟各八錢 乳香 三錢

集驗良方 卷下 傷科 墨

沒藥 三錢 以上九味先以當歸生地甘草切片入滾

麻油內煎汁去渣瀘極淨再入淨鍋熬至滴水不散

將黃丹炒過和入又用緩火熬至滴水成珠取起加

入黃白蠟又用微火再熬取起少定入乳香沒藥攪

勻收磁罐內退火氣用此神方也

內治補損接骨仙丹凡肉破骨碎筋斷者通用方

當歸 川芎 白芍 熟地 防風

骨碎補 五靈脂 廣木香 地骨皮各五錢

瓜兒血竭 乳香 沒藥各一錢 以上十二味用夜合

花樹根皮五錢同藥入壺內水煮加燒酒隨多少入

藥同煮一炷香久取汁溫服神效

螻蛄酒 治渾身打傷并治接骨

生螻蛄 大者一隻 小者三隻

石臼內搗碎滾黃酒冲服其渣

翳傷處骨內谷谷有聲其骨自接只打傷者一夜即愈

土熬酒接骨神方

地熬蟲

十餘個 生搗

絞汁用滾黃酒冲服效

打傷眼睛

如突出急揉入

用生猪肉一片將當歸赤石脂末少許摻肉上貼之

去毒血即愈

集驗良方

卷下 傷科

醫

救破傷風

用糞堆內蟻螞蟲一二個草房上多有之將蟲脊背

捉住捏之口吐黃水抹於瘡上覺麻身上汗出即愈

如病勢危急滴黃水於熱酒內飲之取汗而愈

破傷風神效方

刑曹案牘多被毆後以傷風死者在保辜限內於律

不能不擬抵呂太常含暉常刊秘方以濟世其效如

神

荆芥

黃蠟

魚鱧炒黃

各五錢

右加艾葉

三片

入無灰酒

一碗

隔水煮一炷香熱飲

醫治調養勿臥熱炕定有奇效寶之

打撲耳聾導氣通瘀錠

治跌撲損傷撞破頭腦愈後耳聾奇方

用不去油巴豆 一個 斑蝥 三個 麝香 少許 以葱涎蜂

蜜和捻如麥粒形絲棉裹置耳中響聲如雷勿得驚

懼待二十一日耳中有膿水流出方可去錠奇妙無

比

竹絲梗喉

不拘黑白芝麻炒熟泡湯飲再以乾芝麻嚼服幾口

或以生芝麻搗爛嚼食之

集驗良方

卷下 傷科

畢

又方

不論竹木絲魚骨麥芒螺厝等物梗於喉中用絲綿

扯長拌白糖或砂糖徐徐嚥下約下喉一二寸待糖

烱盡漸將綿拖出則所梗之物亦帶出矣

治竹木刺入肉內不出方

螳螂蟲搗爛敷患處次日其刺自出

治湯火傷

切不可用冷物及井泥冷水淋搨之熱氣得冷深入

筋脉後多有手足攣縮之患且恐火毒攻心難治也

先服玄妙飲

川黃連

天花粉

黑玄參

各二錢

陳皮

木桔梗

白山梔

各一錢五分

淡竹葉

片二十

水煎服如藥不便蘿蔔汁二碗或童便皆可服以護其心使火不能內攻隨取大黃末真桐油調敷立刻清涼止痛且無痕即垂危者皆可無恙

又方

麻油 倍用

白蠟

白蜜

先用麻油熬數滾入蠟溶

化熬數滾再加入白蜜熬勻候冷刷塗傷處即能止痛速愈後並無斑點若疼急傷重外敷內服即可護心不致火氣內攻

集驗良方

卷下

傷科

吳

凡遇火燒傷急以宿小便澆之神驗次取蚌殼灰鷄蛋青調塗或蜜糖麻油調塗此方亦治滾湯傷至為奇妙

火燙潰爛不堪

并治水燙效

地榆磨細末如麪香油調敷破損者先敷再加乾末摻上如爛潰不斂已有三四月者取竈心土入炭火煨紅水飛晒乾研細人乳調敷立刻止痛多則二三

次全愈功效無比誠火燙聖藥也

水火燙 白蘇大黃等分研末麻油調搽

又方

天汁 黑玄參 刺史

蚰子殼或蚌殼煨研細末加水片少許如濕處燥敷
乾處麻油調敷塗數次收功真仙方也

又方

用尿桶中宿尿或澆或浸一時之久再以蜂蜜麻油
調敷此二方取之至便火燒湯潑遍身垂危者皆能

治之

凡被鳥鎗打傷鉛子在內命危且夕方

天竹黃三錢如無真者以真膽星代之雄黃二錢劉寄奴 麒麟竭

紅芽大戟各三錢歸尾一錢五分硃砂 兒茶各一錢

乳香三錢琥珀 麝香各三分輕粉 水銀同研三分

集驗良方

卷下 傷科

兪

以上十三味共為末調服一錢吃酒數杯睡一時汗
出即愈忌涼水生冷燒酒三日

烏銃傷

蜂蜜八兩煎沸入好燒酒一斤隨量熱飲被遮取汗

安臥一夜鐵砂自出粘被上

解煤薰毒

飲冷水可解或蘿蔔汁灌口鼻移向風吹便能醒

解煤炭毒

凡受煤烟氣一時昏倒急用清涼水灌之即醒

烟火薰至死

白蘿蔔搗汁灌之立醒無則用葉乾者水泡搗亦可

解硫磺毒

烏梅肉焙一兩砂糖五錢用水一茶杯煎七分呷之
解桐油毒 用乾柿餅食之即解

治漆瘡

殺鷄退下毛湯溫熱洗二三次即愈或以蠟黃搽之亦愈

治手搔傷方

蘆甘石煨存性去火氣加冰片少許搗細猪板油蒸化調敷甚效

集驗良方

卷下 傷科

五

救自縊死

凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得絕斷上下安被放倒微微攮正喉嚨以手掩其口鼻勿令透氣一人以腳踏其兩肩以手挽其頂髮常令弦急勿使緩一人以手摩將其胸臆屈伸其手足若已僵直漸漸屈之一人以膝裹衣抵糞門勿令瀉氣又以竹管吹其兩耳候氣從口出須臾以少姜湯或清粥灌令喉潤漸漸能動乃止此法自旦至暮雖已冷可活自暮至旦陰氣盛為難救心下微溫者雖一日以上亦可活

百發百中

自縊

用皂角細辛等分爲末如豆大吹耳鼻孔可活

又方

用真野山羊血二三分研極細以好酒灌下立活

救溺水

凡水溺一宿者尙可救搗皂角以綿裹納下部內須

臽水出卽活或屈死人兩足擱人肩土以死人背貼

生人背擔走吐出水卽活

一冬月急將溺人濕衣解去爲之更換一面炒鹽用布

包裏臍一面厚鋪被褥取竈內不熱草灰多多鋪於

集驗良方

卷下

傷科

至

被褥之上令溺人覆臥於上臍上墊以綿枕一個仍

以草灰將渾身厚蓋之灰上再加被褥不可使灰暍

於眼內再撬口啣筋吹耳鼻穀道使口中並大小便

水俱流出再用生薑湯化蘇合丸灌之或生薑汁灌

之以竹管吹其兩耳碾生半夏末吹其鼻孔皂角末

置管中吹其穀道

又方初救起時尙有微氣或胸前尙煖速令生人脫貼

身裏衣爲之更換抱擔身上將屍微微倒側之令其

腹內水流若水往外流卽生機一面用粗紙燎灼

取烟薰其鼻竅稍薰片時卽用皂角研細吹入鼻竅

但得微有一噴嚏即可得生

暴死六法

凡人涎潮於心卒然倒仆急扶入煖室正坐用火炭

沃醋使氣衝入病人鼻中良久自甦

或搗韭菜汁灌于鼻中乃醒

或皂角末吹入鼻中得嚏則醒

或倉卒無藥急于人中穴及兩足大拇指離指甲一

韭菜許艾灸三五次即活

凡人卒倒身冷無痰名曰氣厥亦名中氣若身温有

痰名中風但扶正坐以皂角末吹鼻氣順即安

集驗良方

卷下

傷科

五

或冬月中寒卒倒身強口噤手足厥冷如無醫藥當

濃煎薑湯灌之

救五絕二方

一曰白縊
三曰魘魅

二曰墻壁壓
四曰溺水

五日凍死

凡五絕皆以半夏研細末冷水為丸如黃豆大納鼻

孔中即愈心温者一日可治若產後暈死者照此法

可治

凡五絕又法男用雄鷄女用雌鷄刺鷄冠血滴入口

中又法即取韭菜搗汁灌鼻中若加皂角麝香同

灌更快捷切不可用茶水

救凍死

凡凍死冬月落水微有氣者脫去濕衣隨解活人熱衣包暖用米炒熱囊熨心上冷卽換之或炒竈灰亦可候身溫煖目開氣回後以溫酒或薑湯粥飲灌之若先將火灸冷反入心必死

又一切冬月溺水之人及被凍極之人雖人事不知但胸前有微溫皆可救倘或微笑必爲急掩其口鼻切不可驟令近火但一見火則必大笑不可救矣方用大氈子或藁荐捲之以索繫定放在平穩處以二人相對令滾轉往來如扞氈法候四肢溫卽活後用生薑帶皮同陳皮搗碎其一兩用水三碗熬一碗服之

集驗良方

卷下 傷科

五

自活

救魘魅死

凡中惡魘死者不得近前呼叫但唾其面不醒卽咬脚跟及拇指略移動臥處徐徐喚之原無燈不可用燈照待少甦以皂角末吹鼻取嚏

救驚嚇死 以醇酒灌之

杖傷

杖後卽飲童便一碗以免血攻心再用熟豆腐鋪傷處其熱如蒸其腐卽紫復易之令紫色散盡轉淡血色爲度內服白芨末米飲下神效

夾棍傷

急用熱童便一盆浸足如冷燒紅磚淬之即熱直浸至童便面上浮起白油其傷盡出矣再用肥皂搗如泥入鷄子清和勻罨患處以草紙裹腳縛緊一夜不可動即效內服末藥用人中白煨一兩乳香善炙二錢沒藥二錢牛膝三錢木耳燒灰存性五錢自然銅煨五錢共為末再用牛膝煎酒調服三五錢愈

櫻傷

指上櫻過有凹痕用銀硃濃磨依痕圈之自復

08056

集驗良方

卷下 傷科

五



