

木

山

相

日

本草綱目草部目錄第十八卷

草之七

蔓草類七十三種

附十九種

菟絲子

本經

難火蘭附

五味子

本經

蓬蘽

本經

覆盆子

別錄

懸鉤子

拾遺

蛇莓

別錄

使君子

開寶

木鼈子

開寶

番木鼈

綱目

馬兜鈴

開寶

青木香卽土

檻藤子

開寶合

子草附

預知子

開寶

牽牛子

別錄

旋花

本經

太乙金鎖

卽鼓子花

紫葳

本經

卽凌霄花

骨路支附原落附後諸藤末

營實

蘚蘚

本經

王瓜

本經

月季花

綱目

枯樓

本經

卽天花粉

王瓜

本經

葛

本經
鐵葛附

黃環

本經
卽狼跋子

天蠶冬

本經

百部

別錄
白并附

何首烏

開寶

草薢

別錄

菝葜

別錄

土茯苓

綱目

白芨

本經

女萎

李當之
拾遺

赭魁

本經

鴛抱

圖經

伏雞子根

綱目

拾遺

仰盆

千金藤

開寶
陳思及附

九仙子

綱目

人肝

藤附

山豆根

開寶

黃藥子

開寶

解毒子

唐本
會子海藥
卽苦藥子
奴

根附

會州白藥

白藥子

唐本
衝洞根
陳甘白藥
會州白藥

白附

威靈仙

開寶

茜草

本經
血藤附

翦草

日華

防己

本經

通草

本經

通脫木

法象天
壽根附

釣藤

別錄
倒挂藤附

黃藤

綱目

白蕘藿

本經

白花藤

唐本
倒挂藤附

白英

本經
即鬼子

蘿摩

唐本

赤地利

唐本

紫葛

唐本

絡石

本經

木蓮

拾遺

扶芳藤

拾遺

常春藤

拾遺

千歲蘂

別錄

忍冬

別錄

甘藤

嘉祐
甜藤

甘露藤

附

含水藤

海藥

鼠籠附

天仙藤 圖經

紫金藤 圖經

南藤 開寶

清風藤 圖經

百棱藤 圖經

省藤 拾遺

紫藤 開寶

落鴈木 海藥

折傷木 每始王木附

千里及 拾遺卽
千里光

藤黃 拾遺

右附方舊一百三十七新三百二十八
附錄諸藤一十九種新增一種

本草綱目草部第十八卷上

草之七

蔓草類七十三種附一十九種

蕘絲子

本經上品

釋名

蕘縷

別錄

蕘蘿

別經

蕘丘

別錄

玉女

雅爾唐蒙

雅爾

火燄草

別綱

野狐絲

別綱

金線草

別禹錫

赤綱

別錄

王女

云或謂蕘絲無根也其根不屬地茯苓是也抱朴子云蕘絲之草下有伏蕘之根無此蕘則絲不得生于上然實不屬也伏蕘抽則蕘絲死又云蕘絲初生之根其形似兔掘取割其血以和丹服立能變化則蕘絲之名因此也○宏景曰舊言下有茯苓上有蕘絲不必爾也頌曰抱朴所說今未見豈別一類乎孫炎釋爾雅云唐也蒙也女蘿也蕘絲也一物四名而本草唐蒙爲一名詩云蕘與女蘿

毛萐云女蘿菟絲也而本草菟絲無女蘿之名惟松蘿一名女蘿菟絲二物皆是寄生同名而本草脫漏乎

震亨曰

菟絲未嘗與茯苓共類

女蘿附松而

生不相關涉皆承訛而言也

時珍曰

毛詩注女蘿

卽菟絲吳普本草

菟絲一名松蘿

陸佃言在木爲

女蘿在草爲菟絲

二物殊別皆由爾雅釋詩誤以

爲一物故也

張揖廣雅云

菟巨菟絲也

女蘿松蘿

也陸機詩疏言菟絲蔓草上黃赤如金

松蘿蔓松

上生枝正青無雜蔓者皆得之詳見木

部松蘿下又菟絲茯苓說見茯苓下

集解別錄曰菟絲子生朝鮮川澤田野蔓延草木

之上九月采實暴乾色黃而細者爲赤綢色

黃纖其實仙經俗方並以爲

淺而大者爲菟蘿功用並同

宏景曰田野墟落中

甚多皆浮生藍紺麻蒿上

其實仙經俗方並以爲

補藥須酒浸一宿用宜丸不宜煮

大明曰苗莖似

黃絲無根株多附田中草被纏死或生

一葉開花

頌曰今近道亦有之以冤句者爲勝夏生苗初

如黍米粒八月九月以前采之

細絲遍地不能自起得他草梗則纏繞而生其根漸絕於地而寄空中或云無根假氣而生信然時珍曰按蠹獻王庚辛玉冊云火燄草卽菟絲子陽草也多生荒園古道其子入地初生有根及長延草物其根自斷無葉有花白色微紅香亦襲人結實如糲豆而細色黃生于梗上尤佳惟懷孟林中多有之入藥更良

子脩治

敷酸濇曰凡使勿用天碧草子真相似只是味并黏也菟絲采得去殼了用苦酒浸

二日漉出以黃精自然汁相對浸一宿至明用微火煎至乾入臼中燒熱鐵杵一丟三千餘杵成粉用之時珍曰凡用以溫水淘去沙泥酒浸一宿曝乾搗之不盡者再浸曝搗須臾悉細又法酒浸四五日蒸曝四五次研作餅焙乾再研末或云曝乾時入紙條數枚同搗卽刻成粉且省力也

氣味

辛甘平無毒

之才曰得酒良薯蕷松脂爲之使惡蘿菌

主治續絕

傷補不足益氣力肥健人經本養肌強陰堅筋骨主

莖中寒精自出渴有餘懸口苦燥渴寒血爲積久

服明日輕身延年錄治男女虛冷添精益髓去腰

疼膝冷消渴熱中久服去面黑悅顏色

別

大補肝臟風虛

甄

補五勞

七傷治鬼交泄精尿血潤心肺

明

大補肝臟風虛

教曰蕘絲子稟中和凝正陽之氣一莖從樹

感枝

而成從中春上陽結實故偏補人衛氣

助人筋脈頌曰抱朴子仙方單服法取實一斗酒

一斗

浸曝乾再浸又曝令酒盡乃止搗篩每酒服

二錢日二服

此藥治腰膝去風兼能明日久服

令人光澤老變爲少

十日外飲啖如湯沃雪也

附方新六消渴不止舊蕘絲子煎汁任意飲之

以止爲度

事林廣記

陽氣

虛損

梧子大每服五十丸氣虛人參湯下氣逆沈

香湯下○經驗

方用菟絲子酒浸十日水淘杜仲

焙研蜜炙一兩以薯蕷末酒煮糊丸

梧子大每空心酒下

五十丸

白濁遺精

茯菟丸治思慮太過心腎虛損

夢寐頻泄

菟絲子五兩白茯苓三兩石蓮肉二兩

爲末酒糊丸梧子大每服

三十五丸空心鹽湯下

局方和劑

小便淋瀝

菟絲子煮汁飲

范汪方

小便赤濁

心腎不足精少

血燥口乾煩熱頭運怔忡

菟絲子麥麿冬

等分爲末蜜丸

梧子大鹽湯每下七十丸

或頑麻無力

菟絲子洗一兩牛膝二兩同入銀

痛器內酒浸一寸五分暴爲末

將原酒煮糊丸梧

子大每空心酒服

三肝傷目暗

菟絲子三兩酒浸

二十丸

經驗方

身面卒腫

洪大用菟絲子一升酒五

子白和丸

梧子大空心溫

酒下二十丸

聖惠方

升漬二三宿每飲一升日服二錢一加

不消再造

肘後方

婦人橫生

菟絲子末酒

車前子

等分

聖惠方

熬黃黑爲末

雞

傳之山居四要

研油調

一加

痛

菟絲子

熬黃黑爲末

和塗之

肘後方

瘡

菟絲子

炒研油調

同

眉鍊癩瘡

菟絲子

炒研油調

車前子等分

聖惠方

眉鍊瘡

菟絲子

炒研油調

同

苗氣味

甘平無毒

玉冊云

伏三

主治

研汁塗面

黃硫汞結草砂

伏三

主治

研汁塗面

黃硫汞結草砂

伏三

主治

研汁塗面

黃硫汞結草砂

伏三

主治

研汁塗面

去面黓

本經

接碎煎湯浴

小兒療熱癆

景宏

附方

舊二

一面瘡粉刺

菟絲子苗絞汁塗之

不過三上

肘後方

小兒頭

瘡之

新一

一面瘡粉刺

菟絲子苗煮湯頻洗

不過三上

肘後方

小兒頭

附錄難火蘭

拾遺藏器曰

味酸溫無毒

主冷氣風

病開胃下食

久服明目生

巴

中胡國狀似菟

絲子而微長

絲子

中胡國狀似菟

絲子而微長

五味子

本經上品

釋名

爾雅音

莖蕷

別錄

玄及

別錄

會及

恭曰

酸味此則五味具也本經但云
味酸當以木爲五行之先也

集解

別錄

實陰

乾宏

景曰

今第一

出高麗

多肉而酸甜

次出青州

冀州

味過酸

其核並似

豬腎又有建平

者少肉核形不相似

味苦亦良此藥多膏潤烈日

暴之乃可搗篩

恭曰蔓生木上

其葉似杏而大子

作房如落葵

大如蓼子

出蒲州

及藍田山中

今河

中府歲貢之保

昇曰蔓生莖赤色

花黃白子生青

熟紫亦具五色

味甘者佳

頌曰今河東陝西州郡

尤多杭越間亦有之

春初生苗引赤蔓

於高木其

長六七尺葉尖圓似杏葉

三四月開黃白花類蓮

花狀七月成實叢生莖

端如豌豆許大生青熟紅

紫入藥蒸曝不去子

今有數種大抵相

近雷斂言

本草圖

目錄

卷二十八

五味子

六

小顆皮皺泡者有白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛
甘皆全者爲眞也時珍曰五味今有南北之分南
產者色紅北產者色黑入滋補藥必用北產者乃
良亦可取根種之當年就旺若二月種子次年乃
旺須以架引之

脩治

數日凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從巳
至申卻以漿浸一宿焙乾用時珍曰入補藥

熟用入嗽藥生用

氣味

酸溫無毒

好古曰味酸微苦鹹味厚氣輕陰

分時珍曰酸鹹入肝而補腎辛苦入心而補肺甘

入中宮益脾胃之才曰蕤蕤爲之使惡萎蕤勝烏

頭主治

益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益

男子精

本經

養五臟除熱生陰中肌

別錄

治中下氣止

嘔逆補虛勞令人體悅澤氣明目暖水臟壯筋骨

權

治風消食反胃霍亂轉筋痃癖奔豚冷氣消水腫
心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒大明生津止渴治瀉
痢補元氣不足收耗散之氣瞳子散大李果治喘嗽

燥嗽壯水鎮陽

好古

發明

成無己曰肺欲收急食酸以收之

以酸補之芍藥五味之酸以收逆氣而安肺杲曰收肺

氣補氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆則宜此

與乾薑同治之又五味子收肺氣乃火熱必用之

藥故治嗽以之爲君但有外邪者不可驟用恐閉

其邪氣必先發散而後用之乃良有痰者以半夏

爲佐喘者阿膠爲佐但分兩少不同耳宗奭曰今

華州以西至秦多產之方紅熟時彼人采得蒸爛

研瀝汁熬成稀膏量酸甘入蜜煉勻待冷收器中
肺虛寒人作湯時時飲之作果可以寄遠本經言
其性溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論謂其
除熱氣日華子謂其暖水藏除煩熱後學至此多
惑今既用治肺虛寒則更不取其除熱之說震亨
曰五味大能收肺氣宜其有補腎之功收肺氣非
除熱乎補腎非暖水藏乎乃火熱嗽必用之藥寇
氏所謂食之多致虛熱者蓋收補之藥也何惑之
有又黃昏嗽乃火氣浮入肺中不宜用涼藥宜五之
味五倍子斂而降之思邈曰五六月宜常服五味
子湯以益肺金之氣在上則補腎在下則滋源
法以五味子一大合木臼搗細薑瓶中以百沸湯
投之入少蜜封置火邊良久湯成任飲元素曰
真人干金月令言五月常服五味以補五臟之
遇夏月季夏之間困乏無力無氣以動與黃芪麥
筋力涌出也蓋五味子之酸輔人參能瀉丙火而
補庚金收斂耗散之氣好古曰張仲景八味丸用

此補腎亦兼述類象形也機曰五味治喘嗽須分南北生津止渴潤肺補腎勞嗽宜用北者風寒在肺宜用南者○慎微曰抱朴子云五味者五行之精其子有五味淮南公羨門子服之十六年面色如玉女入水不霑入火不灼

附方

新一

久嗽肺脹

五味二兩粟殼白餳炒過半兩爲末白餳丸彈子大每服

衛生家寶方

一丸水煎服

久嗽不止

丹溪方用五味子五錢甘草一錢半五倍子風

化消各

二錢爲末乾噙○攝生方

真茶四錢曬研爲末以甘草五錢煎膏丸綠豆大

每服三十丸

沸湯

痰嗽并喘

五味子白礬等分爲末每服三錢以生豬

下數日卽愈也

肺炙熟蘸末細嚼

白湯下漢陽庫兵黃六病此百

藥不效於岳陽遇一道人傳此兩服病遂不發

普濟

陽事不起

新五味子一斤爲末酒服方寸匕

日三服忌豬魚蒜醋盡一劑卽得

方

南北生津止渴潤肺補腎勞嗽宜用北者風寒在

肺宜用南者○慎微曰抱朴子云五味者五行之

精其子有五味淮南公羨門子服之十六年面色

如玉女入水不霑入火不灼

力百日以上可御

十女四時

腎虛遺精

北五味子
一斤洗淨

勿絕藥功能知

千金方

水浸拔去核再以水洗核取盡餘味通置砂鍋中

布瀘過入好冬蜜二斤炭火慢熬成膏瓶收五日

出火性每空心服一二茶匙

百腎虛白濁

及兩脅

並背脊

穿痛五味子一兩炒赤爲末

醋糊丸梧

經驗良方

五更腎泄

子大每醋湯下三十丸

經年不止者名曰

腎泄蓋陰盛而然脾惡溼溼則濡而困困則不能

治水性下流則腎水不足用五味子以強腎水

養五臟吳茱萸以除脾溼則泄自止矣五味去核

三兩茱萸湯泡七次五錢同炒香爲末

許叔微本事方

女人陰冷

每日陳米飲服二錢

一日中玉泉和丸

近效方

爛弦風眼五味

五味子四兩爲末以口

免矢大頻納陰中取效

一子蔓荆子煎湯頻洗

漸漸腫大五味子

一子

之

談野翁種子方

赤遊風丹

焙研熱酒頓服

本草綱目草部

錢自消神效

保幼大全

蓬虆

音累○本經上品

校正

自果部移入此

釋名

覆盆別錄

陵虆別錄

陰虆別錄

寒莓

會編

割田虆

音苞時珍

曰蓬

虆與覆盆同類故別錄謂一

名覆盆此種生

于丘陵之間藤葉繁衍蓬蓬纍纍

異於覆盆故曰

蓬虆

陵虆卽藤也其實八

月始熟俚人名割田虆

集解

別錄曰蓬虆是根名方家不用乃昌容所服以易顏者

也覆盆是實名李當之云是人所食莓子以津汁

爲味其核微細今藥中用覆盆小異未詳孰是恭

曰覆盆蓬虆乃一物異名本謂實非根也李云苺

子者近之矣然生處不同沃地則子大而甘瘠地

則子細而酸此乃子有酸味根無酸味陶以根酸

子甘列入果部重出二條殊爲孟浪志曰蓬虆乃

覆盆之苗莖覆盆乃蓬蘽之子也按切韻莓音茂其子覆盆也蘿者藤也則蓬蘽明是藤蔓矣陶言蓬蘿是根蘇言是子一物異名皆非矣頌曰蓬蘿皆有刺花白子赤黃如半彈丸大而下有蒂承之如柿蒂小兒多食之五月采實其苗葉采無時江南謂之莓然其地所生差晚三月始有苗八九月花開十月實用則同士良曰今觀采取之家說蓬蘿似蠶莓子紅色而大其味酸甘葉似野薔薇有刺覆盆子小其苗各別諸家本草不識故皆說蓬蘿是覆盆子之根大明曰莓子是蓬蘿子也樹莓是覆盆子也宗奭曰蓬蘿非覆盆也別是一種雖有枯敗而枝梗不散今人不見用此藏器曰其類三種惟四月熟狀如覆盆而味甘美者爲是覆盆子餘不堪入藥機曰蓬蘿徽人謂之寒莓沿塹作叢蔓生莖小葉密多刺其實四五十顆作一朵大如盞面霜後始紅蘇恭圖經以此註覆盆莖粗矣江南覆盆亦四五月熟何當差晚耶覆盆莖粗誤

葉疎結實大而疎散不似寒苺莖細葉密結實小而成朵一則夏熟一則秋熟豈得同哉時珍曰此類凡五種予嘗親采不以爾雅所列者校之始得其的諸家所說皆未可信也一種蔓藤繁衍莖有倒刺逐節生葉葉大如掌狀類小葵葉面青背白厚而有毛六七月開小白花就蒂結實三十顆成簇生則青黃熟則紫黯微有黑毛狀如熟椹而扁冬月苗葉不凋者俗名割田藨卽本草所謂蓬蘽也一種蔓小於蓬蘽亦有鈎刺一枝五葉葉小而面背皆青光薄而無毛開白花四五月實成子亦小於蓬蘽而疎稀生則青黃熟則烏赤冬月苗凋者俗名插田藨卽本草所謂覆盆子爾雅所謂荳缺益也此二者俱可入藥一種蔓小於蓬蘽一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃者俗名薅田藨卽爾雅所謂藨者也故郭璞註云藨卽莓也子似覆盆而大赤色醉甜可食此種不入藥用一種樹生者樹高四五尺葉似櫻桃葉而狹長四月開小白花結實與覆

益子一樣但色紅爲異俗亦名藨卽爾雅所謂山
莓陳藏器木草所謂懸鈎子者也詳見本條一種
就地生蔓長數寸開黃花結實如覆盆而鮮紅不
可食者本草所謂蛇莓也見本條如此辨析則蓬
蘆覆盆自定矣李當之陳士良陳藏器寇宗奭汪
機五說近是而欠明悉陶宏景以蓬蘽爲根覆盆
爲子馬志蘇頌以蓬蘽爲苗覆盆爲子蘇恭以
爲一物大明以樹生者爲覆盆皆臆說不可據

氣味酸平無毒別錄曰甘酸微熱

主治安五臟益精

氣長陰令人堅強志倍力有子久服輕身不老

療暴中風身熱大驚別錄曰益顏色長髮耐寒溼

本經

發明

見覆盆子下

附方

新長髮不落蓬蘽子榨油日塗之聖惠方

苗葉同盆
覆

覆盆子別上品錄

校正自果部移入此

釋名圭爾音

雅

缺蓋爾音

雅

西國草圖經

畢楞伽圖經

大麥毒圖經

澆音

插田藨音苞

烏藨子

故名之當之

宗奭曰

子似覆盆之形

便服之當覆

其溺器如此

取名也時珍曰

五月子

熟其色烏赤故俗名烏藨

大麥莓

插田藨亦曰栽

秧藨甄權本草一名馬

瘦一名陸荆殊無意義

集解別錄曰

五月采藏器曰佛說蘇密那花點燈

正言此花也

此花有三種以四月熟狀如覆

盆味甘美者爲是餘不堪入藥今人取茅莓當覆

盆誤矣宗奭曰

處處有之秦州永興華州尤多長

條四五五月紅熟山中人及時采來賣其味酸甘外

如荔枝大如櫻桃軟紅可愛失時則就枝生蛆食

之多熱收時五六分熟便可采烈日曝乾今人取汁作煎爲果采時著水則不堪煎時珍曰蓬蘽子以八九月熟故謂之割田蘿覆盆以四五月熟故謂之插田蘿正與別錄五月采相合二蘿熟時色皆烏赤故能補腎其四五月熟而色紅者乃耨田蘿也不入藥用陳氏所謂以茅莓當蘿盆者蓋指此也

正誤

說曰覆盆江東名懸鉤子大小形狀氣味功力同北土無懸鉤南地無覆盆是土地有前

後生

非兩種物也時珍曰南土覆盆極多懸鉤是樹生覆盆是藤生子狀雖同而覆盆色烏赤懸鉤

色紅赤功亦

不同今正之

脩治

說曰覆盆子五月采之烈日曬乾不爾易爛雷曰凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂取子

以酒拌蒸一宿以東流水淘兩遍又曬乾方用時

珍曰采得搗作薄餅曬乾密貯臨時以酒拌蒸尤

氣味甘平無毒

權曰甘辛微熱

主治益氣輕身令髮不白

別錄

補虛續絕強陰健陽

悅澤肌膚安和五臟溫中益力療癆損風虛補肝

明目並宜擣篩每日水服三錢

馬志

男子腎精虛竭

陰痿能令堅長女子食之有子

權

食之令人好顏

色榨汁塗髮不白

藏器

益腎臟縮小便取汁同少蜜

煎爲稀膏點服治肺氣虛寒

黃宗

發明

時珍曰覆盆蓬蘽功用大抵相近雖是二物其實一類而二種也一早熟一晚熟兼用無

妨其補益與桑椹同功若樹莓則不可混采者也

附方

新陽事不起

覆盆子

酒浸焙

研爲末

每

日酒服三錢

集簡方

葉氣味微酸鹹平無毒

主治

接絞

取汁滴

目中去

膚亦出蟲如絲線

藏器

明目止淚收溼氣

時珍

發明

頌曰

按崔元亮海

上集驗方治目

暗不見物

冷淚浸淫

不止及青盲

天行目暗等疾

取西

國草

一名畢楞伽

一名覆盆子

日曝乾

搗極細以

薄綿裹之用飲男乳汁

浸淫如人行八九里

久用點

眼中

卽仰臥

不過三四日

視物如少年

禁酒麪油點

以

物時珍曰

按洪邁夷堅志

云潭州趙太尉

母病爛

弦痕眼

二十年有老嫗

云此中有蟲

吾當除之

入

山取草蔓葉咀嚼留汁

入筒中還以阜

紗蒙眼

滴入數日

下弦乾復如

法滴上弦

又得蟲數十而愈

後以治人多驗

乃覆如

弦轉盼間蟲從紗上出

數日下弦乾復如

法滴上弦

又得蟲數十而愈

後以治人多驗

乃覆如

弦轉盼間蟲從紗上出

數日下弦乾復如

法滴上弦

又得蟲數十而愈

後以治人多驗

乃覆如

益子葉也蓋治眼妙品

附方

新二

牙疼點眼

用

覆盆子嫩葉搗汁

點目皆三

四次有蟲隨眵淚出成塊也無

新葉乾者煎濃汁亦可

覆盆子爲末用

即大麥芽也

摘玄方

酸漿水洗後摻

之日一次以愈

爲度

直指方

根主治痘後目翳取根洗擣澄粉日乾蜜和少許點於醫丁上日二三次自散百日內治之久卽難

療

時珍○活幼口議

懸鉤子

拾遺

校正

自果部移入此

釋名沿鉤子

日荊爾用箭音

山莓

雅爾雅木莓璞樹莓郭璞

樹莓

日華藏器

曰莖上
有刺
如縣鈎
故名

集解

藏器曰
生江淮林澤間
莖上有刺
其子如梅

子酸美人多食之
機曰樹莓枝梗柔軟有刺

頗類金櫻四五
月結實如覆盆子
采之擎蒂而中

味酸覆盆則蒂脫而中虛味甘爲異時珍曰懸

鈎樹生高四五尺
其莖白色有倒刺
其葉有細齒

青色無毛背後淡青頗似櫻桃葉而狹長又似地

棠花葉四月開小白花結實色紅今人亦通呼爲

蕷子爾雅云荊山莓也郭璞注云今之木莓也實

似蕷莓而大可食孟說大

明並以此爲覆盆誤矣

氣味酸平無毒

主治醒酒止渴除痰去酒毒

藏器

搗汁服解射工沙

蟲毒時珍

葉主治燒研水服主喉中塞藏

器

根皮氣味苦平無毒主治子死腹中不下破血婦

人赤帶下久患赤白痢膿血腹痛殺蟲毒卒下血

並濃煮汁飲之

器藏

附方

新

血崩不止

木莓根四兩酒一盃煎七分空心溫服

驪仙乾坤生意崩

中痢下

治婦人崩中及下痢日夜數十起欲死者以此入腹卽活懸鉤根薔薇根楠根菝葜

各一斛剉入釜中水淹上四五寸煮減三之一去滓取汁煎至可丸丸梧子大每溫酒服十丸日三

服

千

金翼

別錄
下品

蛇莓

別錄
下品

釋名蛇藨

音包

地莓

會編
蠶莓

機曰近地而生故曰地

莓瑞曰蠶老時熟紅者

地其中空者爲蠶莓人不噉之恐有蛇殘也

集解

宏景曰蛇莓園野多有之子赤色極似莓子

似敗醬四月五月采子二月八月采根

宗奭曰田

野道旁處處有之附地生葉如覆盆子但光潔而

之生下溼地莖頭三葉花黃子赤儼若覆盆子根

小微有皺紋花黃比蒺藜花差大春末夏初結紅

子如荔枝色機曰蛇莓莖長不盈尺莖端惟結實

一顆小而光潔誤食脹人非若覆盆苗長大而結實

實數顆微有黑毛也時珍曰此物就地引細蔓節

生根每枝三葉葉有齒刻四五開小黃花五

出結實鮮紅狀似覆盆而面與蒂則不同也其根

甚細本草用汁當是取其莖葉并根也仇遠稗史

訛作蛇繆草言有五葉七葉者又言俗傳食之能殺人亦不然止發冷涎耳

蛇殘莓人不噉之恐有蛇殘也

汁氣味甘酸大寒有毒主治胸腹大熱不止錄傷別

寒大熱及溪毒射工毒甚良宏景通月經燭瘡腫傅

蛇傷大明主孩子口噤以汁灌之孟詭傳湯火傷痛卽

止時

珍

附方

舊二新一

口中生瘡

天行熱甚者蛇莓自然汁半升稍稍嚥之傷寒類要

傷寒下蠶

生瘡漬烏梅

以蛇莓汁

濃入崖蜜

服二合日三服

仍水

肘后方水

中毒病

蛇莓

根搗末

服之并導下部亦可飲汁一

升夏月欲入水先以少

未投中流更無

所畏又辟射工家中水浴身亦宜投少許

家中以器貯

使君子

宋開寶

釋名留求子

志曰俗傳潘州郭使君療小兒多是獨用此物後醫家因號爲使君子也

時珍曰按嵇含南方草木狀謂之留求子

療嬰孺之疾則自魏晉已用但名異耳

集解

志曰生交廣等州

形如巵子棱瓣深而兩頭尖似訶梨勒而輕

頌曰今嶺南州郡皆有之

生山野中及水岸

其莖作藤

如手指大其葉如兩頭指頭長二寸三月生花淡紅色久乃深紅有五瓣

七八月結子如拇指

大長一寸許

大類巵子而有五棱其殼青黑色內有仁白色七月采之

宗奭曰

其仁味如椰子

醫家亦兼用殼時珍曰原出海南

交趾今閩之紹

武蜀之眉州

皆栽種之亦易生其藤葛繞樹而上葉青如五加葉五月開花一簇

一二十莖紅色輕盈如海棠其實長寸許五瓣合

成有棱先時半黃老則紫黑其中仁長

如榧仁色味如栗久則油黑不可用

氣味

甘溫無毒主治

小兒五疳小便白濁殺蟲療

鴻痢寶健脾胃除虛熱治小兒百病瘡癬

時珍

發明

時珍曰凡殺蟲藥多是苦辛惟使君子榧子甘而殺蟲亦異也凡大人小兒有蟲病但每

月上旬侵晨空腹食

使君子仁數枚或以殼煎湯嚥下次日蟲皆死而出也或云七生七熯食亦良

忌飲熱茶犯之卽鴻

此物味甘氣溫既能殺蟲又益脾胃所以能斂虛熱而止鴻痢爲小兒諸病要

藥俗醫乃謂殺蟲至盡無以消食鄙俚之言也樹

有蠹屋有蟻國有盜福耶禍耶脩養者先去三戶

可類推矣

附方

新

小兒脾疳

使君子蘆薈等分爲末米

六

飲

每服一錢

儒門事親

小兒

痞塊

腹大肌瘦而黃漸成疳疾使君子仁三錢木

籠子仁五錢爲末水丸

龍眼大

每以一丸用

雞子熟空心服之

楊起簡便單方入藥在內飯上蒸

小兒蛔痛

口流涎未

使君子仁爲末米飲五更小兒虛腫頭面陰囊俱浮用使君子
調服一錢全幼心鑑

一兩去殼蜜五錢炙盡爲末每頭皺面瘡使君子
食後米湯服一錢簡便方

香油少許浸三五個臨臥時細嚼仁以香子
油送下久久自愈普濟方

蟲牙疼痛煎湯頻

漱方集

木鼈子

宋開寶

校正

自木部移入此

釋名

木蟹

志曰其核似鼈蟹狀故以爲名

集解

廣諸州及杭越全岳州皆有之春生苗作藤

生葉有五棱狀如山藥青色面光四月生黃花六
月結實似栝樓而極大生青熟紅黃色肉上有軟
刺每一實有核三四十枚其狀扁而如鼈八九月
采之嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食宗奭曰木

鼈子蔓歲一枯但根不死春旋生苗葉如蒲萄其子一頭尖者爲雄凡植時須雌雄相合麻纏定及
其生也則去雄者方結實時珍曰木鼈核形扁
礪石大如圍碁子其仁青綠色入藥去油者

仁氣味

甘溫無毒

時珍曰苦微甘有小毒

主治折傷消結腫

惡瘡

生肌止腰痛除粉刺黑黯婦人乳癰肛門腫

痛

開醋磨消腫毒

大明治疳積痞塊利大腸瀉痢痔

癰癩癰

時珍

發明

機曰按劉續霏雪錄云木鼈子有毒不可食

以木鼈子煮豬肉食之

其幼子當夜長子明日死

友人馬文誠方書亦載此方因著此爲戒

時珍曰

南人取其苗及嫩實食之無恙則其毒未應至此

或者與豬肉不相得或犯他物而然不可盡咎木

鼈也

附方

舊一新酒疸脾黃

木鼈子磨醋服一二盞見利效

劉長春濟急方

腳氣腫痛

木鼈子仁每個作兩邊炒過切碎再

炒去油盡爲度每兩入厚桂半兩爲末

熱酒服二錢令醉得汗愈

夢祕授方也

永類方

溼瘡腳腫

木鼈子四兩去膜切片用藥

皮甘遂半兩爲末以豬腰子一個去膜切片用藥

四錢在中溼紙包煨熟空心米飲送下服後便伸

兩腳如大便行者只吃白粥二

痛甚者木鼈子穿山甲炮等分爲末

三日爲妙

楊拱醫方摘要

陰疝偏墜

木鼈子穿山甲炮等分爲末

傅之卽愈

一個磨醋調黃藥芙蓉末

久瘧有母

木鼈子穿山甲炮等分爲末

末每服三錢空心溫

酒下

醫方摘要

木鼈子仁五兩用批

餅和丸綠豆大每白湯下三十丸

同搗爛入黃連三錢末蒸

小

醫方集成

兒疳疾

木鼈子仁使君子仁等分搗泥米飲丸芥子大每服五分米飲下一日二服

孫天

仁效方

疳病目矇

不見物用木鼈子仁二錢胡黃連一錢爲末米糊丸龍眼大入雞子

內蒸熟

連雞子食

倒睫拳毛

因風入脾經致使風癢不住手擦日久赤

爛拳毛入內

將木鼈子仁槌爛

以絲帛包作條左

患塞右鼻右患塞

左鼻其毛自分上

下次服蟬蛻

藥爲妙

孫天仁集效方

肺虛久嗽

木鼈子款冬花各一兩爲未每用三錢焚之吸烟良

久吐涎以茶潤喉

如此五六次後服補肺藥

小兒

一方用木鼈子

一個雄黃一錢

聖濟錄

鹹鼻

大木鼈子三四個磨水飲

以雪糕壓

摘玄方

水瀉不

止

木鼈子五個母丁香五個麝香一分研末

米湯

調作膏納臍中貼之外

以膏藥護住

吳旻扶

壽精

痢疾禁口

木鼈仁六個研泥分作二分用麵

燒餅一個切作兩半只用半餅作

方

木鼈子大每服五分米飲下一日二服

孫天

不見物用木鼈子仁二錢胡黃連一錢爲末米糊丸龍眼大入雞子

吳旻扶

一竅納藥在內乘熱覆在病人臍上一時再換半個熱餅其病卽止遂思飲食邵真人經驗方

腸風瀉血

木鼈子

以桑柴燒存性候冷爲末每服

肛門痔痛

孫用祕寶方

用木鼈仁三枚砂盆

後洗日用三次仍塗少許○瀕湖集簡方用木鼈

仁帶潤者雌雄各五個乳細作七丸盃覆溼處勿

令乾每以一丸唾化開貼痔上其痛卽止一夜

丸自消也江夏鐵佛寺蔡和尙病此痛不可忍有一

人傳此而愈用

瘰癧經年

木鼈仁二個去油研以

治數人皆有效

中蒸熟食後食之

小兒丹瘤

木鼈子仁研如泥醋

每日一服半月效

耳卒熱腫

木鼈子仁一兩赤小豆大黃各

半兩爲末每以少許生油調塗

科精義外

小兒丹瘤

木鼈子仁研如泥醋

調傅之一日三五上

惠方

聖風牙腫痛

木鼈子

仁磨醋

普濟方

番木鼈

綱目

釋名 馬錢子

綱目

苦實把豆

綱目

火失刻把都

時珍曰
狀似馬

之連錢故
名馬錢

集解

時珍曰 番木鼈生回國今西土邛州諸處皆有之蔓生夏開黃花七八月結實如栝樓

生青熟赤亦如木鼈其核小於木鼈而色白彼人言治一百二十種病每證各有湯引或云以豆腐

制過用之良或

云能毒狗至死

仁氣味苦寒無毒主治傷寒熱病咽喉痹痛消痞塊並含之蘸汁或磨水噙嚥

時珍

附方

新

喉痹作痛

番木鼈

青木香山豆根等分爲末吹之

楊拱醫方摘要纏

喉風腫

番木

鼈仁

一個木

香三

分同磨水

調熊膽

三分膽礬

五分以雞毛掃

患處取效

唐

瑤經驗方

瘡瘍入目

少許爲末

左耳日二次

水田日華

花銀硃各

五分片腦麝香

枯礬

右耳右目吹

病欲去胎

苦實把

膏納入牝戶

四寸

集簡方

馬兜鈴

宋開寶

校正

併入唐本草獨行根

釋名

都淋藤

肘後

獨行根

唐本

土青木香

唐本

雲南根

目綱

三百兩銀藥

宗奭

曰蔓生附木

而上葉脫時

其實

尚垂狀如馬項

之鈴故得名也

時珍

時其

實

曰其根吐利人微

有香氣故有獨行木香之名

嶺

南人用治

蠱隱其名爲

三百兩銀藥

肘后方作都

淋蓋誤

傳也

集解

志曰獨行根生古堤城旁所在平澤叢林中皆有之山南名爲土青木香一名兜鈴根蔓

生葉似蘿藦而圓且澀花青白色其子大如桃李而長十月以後枯則頭開四系若囊其中實薄扁似榆莢其根扁而長尺許作葛根氣亦似漢防己

二月八月采根頌曰馬兜鈴今關中河東河北江

淮夔湖州郡皆有之春生苗作蔓繞樹而生葉如山蕷葉而厚大背白六月開黃紫花頗類枸杞花

七月結實如大棗狀似鈴作四五瓣其根名雲南根微似木香大如小指赤黃色七八月采實暴乾

實脩治

數曰凡采得實去葉及蔓以生絹袋盛於東屋角畔待乾劈開去革膜取淨子焙用

氣味苦寒無毒

權曰平時珍曰微苦辛杲曰味主厚氣薄陰中微陽入手太陰經

治肺熱咳嗽痰結喘促血痔瘻瘍

甄寶肺氣補肺去肺中溼

息不得欬逆連連不止

權甄清肺氣補肺去肺中溼

大草經 卷一百一十一
熱素

發明

時珍曰馬兜鈴體輕而虛熟則懸而四開有

熱苦辛能降肺氣錢乙補肺阿膠散用之非取其
補肺乃取其清熱降氣也邪去則肺安矣其中所
用阿膠糲米則正補肺之藥也湯劑中用多亦作
吐故崔氏方用以吐蠱其不能補肺又可推矣

附方

舊三

水腫腹大

喘急馬兜鈴煎湯

干金方

肺氣喘急

馬兜鈴二兩去殼及膜酥半兩入盃內拌勻慢火

炒乾甘草炙一兩爲末每服一錢水一盞煎六分

溫呷或噙之一切心痛不拘大小男女大馬兜鈴

簡要濟眾

一個燈上燒存性爲末溫中如有物嚥

酒服立效

蛇蠱毒

飲食中得之咽中如

有物嚥

摘玄方解蛇蠱毒不下吐不出心下熱悶兜鈴

一兩煎水服卽吐出

痔瘻腫痛

以馬兜鈴於瓶中

崔行功纂要方

燒烟熏病處良

日華草

獨行根氣味辛苦冷有毒

大明曰無毒志曰有毒不可多服吐利不止

主治鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水磨爲泥封之日

三四次立瘥水煮一二兩取汁服吐蠱毒又搗末

水調塗疔腫大效

唐本

治血氣

大明

利大腸治頭風瘡

癰癩瘡

時珍出精義○

附方

舊新四

五種蠱毒

肘後方云席辨刺史言嶺南

都淋藤十兩水一斗酒

都淋

藤十兩水一斗酒

都淋

都淋

都淋

食胸背漸脹先寒似瘴用都淋藤十兩水一斗酒

都淋

不瘥更服土人呼爲三百兩銀藥○又支太醫云

或爲末水 中草鹽毒

此術在西良之西及嶺南人中此毒入咽欲死者用兜鈴調服亦驗

苗

一兩爲末

溫水調服一錢

腸風漏血

馬兜鈴藤

草荆

卽

消化鹽

出神效

聖惠方

疔風漏血

馬兜鈴

三棱

川烏頭

炒過三味各等分

分

疗腫復發

馬兜鈴

煎水

先熏後洗之

普濟方

根

搗爛

用蜘蛛網

裏傅少時根出

方

惡蛇所傷

青木香半兩

煎湯

校

正

自木部移入此

檻藤子

宋開寶

釋名象豆

開寶

檻子

日華

合子

拾遺

時珍曰其子

集解

藏器曰按廣州記云檻藤子生廣南山林間

作藤著樹如通草藤

其實三年方熟角如弓

袋子若雞卵其外紫黑色其殼用貯丹藥經年不

壞取其中仁入藥炙用時珍曰子紫黑色微光大

一二寸圓而扁人多剔去肉作藥瓢垂于腰間也

仁氣味濤甘平無毒主治五痔蠱毒飛尸喉痹以

仁爲粉微熬水服一二匕亦和大豆澡面去點黯

藏器

治小兒脫肛血痢瀉血並燒灰服或以一枚割

瓤熬研空腹熱酒服二錢不過三服必效開寶解諸

藥毒

時珍草木狀○

附方

舊三新一

喉痹腫痛

檳榔子燒存性米飲服一錢

聖惠方

五痔下血

華陀中藏經用檳榔子二個不

檳榔子

燒存性米飲服二錢有功

寇氏衍義

腸風下血

華陀中藏經用檳榔子二個不

蛤蜊子四十九個燒存性爲末

下少頃再飲酒一盞趁口服極效○聖惠方用檳

榔子三枚厚重者溼紙七重包煨熟去殼取

肉爲末每服一錢食前黃芪湯下日一服

本草綱目草部

卷十八上 檳榔子附合子草

生根子一錢

附合子草生根子一錢

附合子草生根子一錢

附合子草生根子一錢

附錄合子草

拾遺藏器曰子及葉有小毒主蠶毒及蛇咬搗傅瘡上蔓生岸傍葉尖花

白子中有兩

片如合子

預知子

宋開寶

釋名聖知子

日華

聖先子

日華

盍合子

日華

仙沼子

日華

志

集解

志曰預知子

有皮殼

其實如阜莢子

頌曰舊

不著所出州土

今惟蜀黔

壁諸州皆有之

作

舊

蔓生

依大木上葉綠

有三角面深

背淺七月八月

有實作房生青熟深紅色

每房有子五七枚如阜

莢子

斑褐色光潤如飛蛾

今蜀人極貴重之云亦

難得采無時其根冬月采之陰乾治蠶其功勝于

爲聖也山民目

子仁氣味苦寒無毒

大明日溫雙仁者可帶

主治殺蟲療蠱

治諸毒去皮研服有效

開寶治

一切風補五勞七傷

其功不可備述治痃癖氣塊消宿食止煩悶利小

便催生中惡失音髮落天行溫疾塗一切蛇蟲蠶

咬治一切病每日吞二七粒不過三十粒永瘥

大明

附方新預知子丸

治心氣不足精神恍惚語言錯妄忪悸煩鬱憂愁慘懨喜怒多

恐健忘少睡夜多異夢寐卽驚魘或發狂眩暴不知人並宜服此

預知子去皮白茯苓枸杞子石菖蒲

蒲蒼神柏子仁人參地骨皮遠志山藥黃精蒸熟朱砂水飛等分爲末煉蜜丸芡子大每嚼一丸人

參湯下和劑局方入米醋滿中蓋定麪裹塘火

耳卒聾閉

八九月取石榴開一孔留蓋入米醋滿中蓋定麪裹塘火

中煖熟取出出入少仙沼子黑李子末取水滴耳癘
中腦痛勿驚如此二夜又點一耳 聖惠方 痘

風有蟲眉落聲變預知子膏用預知子雄黃各二
兩爲末以乳香三兩同水一斗銀鍋煮至五升入
二末熬成膏瓶盛之每服一匙溫 酒調下有蟲如
毛隨大便而出 聖惠方

根氣味苦冷無毒主治解蠱毒石臼搗篩每用三

錢溫水服立已

蘇頌

牽牛子

別錄下品

釋名黑丑

綱目

草金鈴

炮炙論

盆餓草

綱目

狗耳草

救荒

宏景

曰此藥始出田野人牽牛謝藥故以名之時珍曰
近人隱其名爲黑丑白者爲白丑蓋以丑屬牛也
金鈴象子形盆餓狗耳象葉形段成式酉陽雜俎
云盆餓草蔓如薯蕷結實後斷之狀如盆餓是矣

集解

宏景曰牽牛作藤生花狀如蘿豆黃色子作小房實黑色形如桺子核恭曰此花似旋花

子作碧色不黃亦不似蘿豆頌曰處處有之二月種三月生苗作藤蔓繞籬牆高者或二丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裏作毬每毬內有子四五枚大如蕎麥有三棱有黑白二種九月後收之宗頤曰花朵如鼓子花但碧色日出開日西萎其核如木猴梨子而色黑謂子似蕎麥非也時珍曰牽牛有黑白二種黑者處處野生尤多其蔓有白毛斷之有白汁葉有三尖如楓葉花不作瓣如旋花而大其實有蒂裏之生青枯白色其核與棠棣子核一樣但色深黑爾白者人多種之其蔓微紅無毛有柔刺斷之有濃汁葉團有斜尖竝如山藥莖葉其花小於黑牽牛花淺碧帶紅色其實蒂長寸許生青枯白其核白色稍粗人亦采嫩實蜜煎爲果食呼爲天茄因其蒂似茄也

子修治

敷曰凡采得子曬乾水淘去浮者再曬拌酒蒸從巳至未曬乾收之臨用春去黑皮

時珍曰今多只碾取頭末去皮

麩

不用亦有半生半熟用者

氣味苦寒有毒

權曰甘有小毒

說曰多食稍冷

杲辛熱雄烈泄人元氣

大明日

味

蘇得青木薑良

主治下氣療腳滿水腫除風毒利小便

別錄治痃癖

氣塊利大小便除虛腫落胎

權取腰痛下冷膿瀉

蠱毒藥并一切氣壅滯

大明和山茱萸服去水病

除氣分溼熱三焦壅結

李果逐痰消飲通大腸氣祕

風祕殺蟲達命門

時珍

發明

宗奭曰牽牛丸服治大腸風祕壅結不可久

服亦行脾胃氣故也好古曰牽牛以氣藥引

則入氣以大黃引則入血利大腸下水積色白者屬火善走黑者屬金若非病形與證俱

滯氣分溼熱上攻喘滿破血利中之氣震亨曰牽牛

實屬火不脹滿不大便祕者不可輕用驅逐致虛先哲

深戒杲曰牽牛非神農藥也名醫續注云味苦寒能除溼氣利小便治下注腳氣此說氣味主治俱誤矣何也凡用牽牛少則動大便多則泄下如水乃瀉氣之藥其味辛 辛烈雄壯所謂苦寒安在哉夫溼者水之別稱有形者也若肺先受溼

感南方熱火之化所生火能平金而泄肺溼去則

氣得周流所謂五臟有邪更相平也今不問有溼無溼但傷食或有熱證俱用牽牛尅化之藥豈不

誤哉況牽牛止能泄氣中之溼熱不能除血中之

溼熱從下受之下焦主血血中之溼宜苦寒之

味反以辛藥泄之傷人元氣且牽牛辛烈比之諸

本草綱目卷四十一牽牛子

辛藥泄氣尤甚其傷人必矣經云辛泄氣辛走氣
是胃氣不行心火乘之腸胃受火邪名曰熱中脾
胃主血當血中泄火以黃芩之苦寒泄火當歸身
之辛溫和血生地黃之苦寒涼血益血少加紅花
專用須于補中益氣泄陰火之藥內加而用之何
則上焦元氣已自虛弱若反用牽牛大辛熱氣味
俱陽之藥以泄水泄元氣利其小便竭其津液是
謂重虛重則必死輕則天人故張文懿云牽牛不
可耽嗜脫人元氣見人有酒食病痞者多服牽牛
丸散取快一時藥過仍痞隨服隨效效後復痞以
致久服脫人元氣猶不知悔也張仲景治七種溼
熱小便不利無一藥犯牽牛者仲景豈不知牽牛
能泄溼利小便乎爲溼病之根在下焦是血分中
生瀉氣使氣血俱損也經云毋盛盛毋虛虛毋絕人
命此之謂也用者戒之白牽牛亦同時珍曰牽牛

牛自宋以後北人常用取快及劉守真張子和出力闢之然東漢時此藥未入本草故仲景不知假使知之必有用法不應捐棄況仲景未用之藥亦多矣執此而論蓋矯枉過正矣牽牛治水氣在肺喘滿腫脹下焦鬱遏腰背脹腫及大腸風祕氣祕卓有殊功但病在血分及脾胃虛弱而痞滿者則不可取快一時及常服暗傷元氣也一宗室夫人年幾六十平生苦腸結病旬日一行甚于生產服養血潤燥藥則泥膈不快服消黃通利藥則若罔知如此三十餘年矣時珍診其人體肥膏梁而多憂鬱日吐酸痰盈許乃寬又多火病此乃三焦之氣壅滯有升無降津液皆化爲痰飲不能下滋腸腑非血燥比也潤劑留滯消黃徒入血分不能通氣氣俱爲痰阻故無效也乃用牽牛末阜莢膏丸與衣服卽便通利自是但覺腸結一服就順亦不妨食且復精爽蓋牽牛能走氣分通三焦氣順則痰逐消上通快矣外甥柳喬素多酒色病下極脹

痛二便不通不能坐臥立哭呻吟者七晝夜醫用通利藥不效遣人叩子子思此乃溼熱之邪在精便道壅脹隧路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也乃用棟實茴香穿山甲諸藥入牽牛加倍水煎服一服而減三服而平牽牛能達右腎命門走精隧人所不知惟東垣李明之知之故明之治下焦陽虛天眞丹用牽牛以鹽水炒黑入佐沈香杜仲破故紙官桂諸藥深得補瀉兼施之妙方見醫學發明又東垣治脾溼太過通身浮腫喘不得臥腹如鼓海金沙散亦以牽牛爲君則東垣未盡棄牽牛不用但貴施之得道耳

附方

舊八新

搜風通滯

風氣所攻臟腑積滯用牽牛子以童尿浸一宿長流

水上洗半日生絹袋盛

三十粒極能搜風亦消虛腫久服令人體清瘦

掛風處令乾每日鹽湯下流

斗門

三焦壅塞神不爽利膈丸用牽牛子四兩半精

生半炒不蛀阜熒酥炙二兩爲末生薑自然汁煮糊丸梧子大每服二十九丸荆芥湯下 王袞博濟方

一切積氣

宿食不消黑牽牛頭爲末四兩用蘿蔔剜空安未蓋定紙封蒸熟取出入

白豆蔻

末一錢搗丸梧子大每服

一男婦五積

普濟方

一般

二十丸

白湯下名順氣丸

普濟方

三十丸

積氣成聚用黑

牽牛一斤生搗末八兩餘滓以新

瓦炒香再搗取四兩煉蜜丸梧子大至重者三十

丸陳橘皮生薑煎湯臥時服半夜未動再服三十

十五丸

當下積聚之物尋常行氣每服十丸甚妙

十九丸

所傷湯下氣築奔衝不可忍牛郎丸用黑牽牛半

方

博濟胸膈食積

牽牛末一兩巴豆霜三個研末水

丸梧子大每服三十九食後隨

儒門事親

氣築奔衝兩炒檳榔二錢半爲末每服

一錢紫蘇湯

方同上用酒

下

曹濟方追蟲取積

下亦消水腫

腎氣作痛白

牽牛

等分炒爲末每服三錢用豬腰子切縫入茴

百粒川椒五十粒摻牽牛末入內紮定紙包煨

糊丸

梧子大每服二十九丸荆芥湯下

王袞博濟方

二十丸

黑

半炒不蛀阜熒酥炙二兩爲末

生薑自然汁煮梧子

糊丸

大每服二十九丸荆芥湯下

黑

熟空心食之酒下取出惡

傷寒結胸

心腹硬痛用

牽牛頭末一

物效楊仁齋直指方

錢白糖化湯調下

大便不通簡要方

生半熟爲末每服二

鄭氏家傳方

大黃等分○一方加生檳榔等分

大便不通簡要方

生半熟爲末每服二

錢薑湯下未通再以茶服

一方加生檳榔等分

大腸風祕結

生半熟爲末每服二

牽牛子微炒搗頭末一兩桃仁去皮尖麩炒半兩

牽牛子大每湯服三十丸寇氏衍義

水鹽脹滿白牽牛黑牽牛各取頭末二錢大麥麴

水鹽脹滿白牽牛黑牽牛各取頭末二錢大麥麴

川泛溢非盃杓可取必以

陰水陽水黑牽牛頭末三兩陳米飯鍋大然末

水腫尿滯

末每服方寸匕以小溼氣中滿足脛微腫小便不便利爲度干金方溼氣中滿利氣急欬嗽黑牽牛末一兩厚朴制半兩爲末每服二錢薑湯

下或臨時水丸每棗湯下三十丸普濟方水氣

浮腫氣促坐臥不得用牽牛子二兩微炒搗末以烏牛屎浸一宿平旦入葱白一握煎十餘沸

空心分二服水從小便中出聖惠方脾溼腫滿金沙下風毒腳氣按

沒指者牽牛子搗末蜜丸小豆大每服五丸生薑湯下取小便利乃止亦可吞之其子黑色正如核

子核肘後方小兒腫病大小便不利黑牽牛白牽牛各二兩炒取頭末井華水和丸綠

豆大每服二十丸蘿蔔子煎湯下聖濟總錄小兒腹脹水氣流腫膀胱

牽牛生研一錢青皮湯空心下一加木香減半丸服鄭氏小兒方痞氣浮腫常服

黑牽牛白牽牛各半生半炒取末陳皮青皮等分爲末糊丸綠豆大每服三歲兒服二十丸米湯下

小兒方

鄭氏疳氣耳聾膏

疳氣攻腎耳聾陰腫牽牛末一錢豬腰子半個去膜薄切摻入

內加少鹽

涇紙包煨

牽牛子末每以一

空心服

鄭氏方

麵作角子

二個炙熟

食米飲下

普濟方

風熱赤眼

白牽牛末以葱白

服五丸

葱湯下

服訖睡

時

面後用藥

宿爲末先以薑

塗之

摘玄方

面上粉刺

痛子如米粉

黑牽牛酒浸三

惠方

聖面

雀斑

黑牽牛末雞子清調

夜傅日洗

摘玄方

馬脾風病

小兒急驚

肺脹喘滿胸高氣急

鼻張悶亂

名馬脾風

不急治死在旦夕

白牽牛半生半炒

黑牽牛半生半炒

大黃煨檳榔一

錢水調

傅

各取末一錢每用五分蜜湯調下

痰盛加輕粉

一

散字名

牛黃奪命

全幼心鑑

小兒夜啼

臍上即止

生生繩

臨月滑胎

牽牛子一兩赤土少許研末覺胎轉痛時白榆皮煎湯下一錢王袞博濟方

小便血淋

牽牛子二兩半生半炒爲末每服二錢薑湯下良久熱茶服之經驗良方

腸風瀉血

牽牛五兩牙阜三兩水浸三日去阜以酒一升煮乾焙研末蜜丸梧子大每服

病減後日服

五丸米飲下本事方

痔漏有蟲

黑白色牽牛各一兩炒爲末以豬肉四兩切碎炒熟

蘸末食盡以白米飯三匙壓之取下白蟲爲效○

又方白牽牛頭末四兩沒藥一錢爲細末欲服藥

時先日勿夜飲次早空心將豬肉四兩炙切片蘸

末細嚼食取下膿血爲效量人加

減用忌酒色油膩三日儒門事親

漏瘡水溢

腎

虛也牽牛末二錢半入切開豬腎中竹葉包定煨

熟空心食溫酒送下借腎入腎一縱一橫兩得其

便惡水既泄不復

直指方

一切癰疽

發背無名腫毒年少氣壯者用黑白牽牛

各一合布包搗碎以好醋一盃熬至八分露一宿次日五更溫服以大便出膿血爲妙名濟世散

張三丰
仙方 溼熱頭痛 黑牽牛七粒砂仁一粒研末井

愈
濟總錄 聖氣滯腰痛 牽牛不拘多少以新瓦燒赤安

撥動取末一兩入硫黃末二錢半同研勻分作三分每分用白麵三匙水和捍開切作碩子五更初以水一盞煮熟連湯溫下痛卽已未住隔日再作予以水一盞煮熟連湯溫下痛卽止

許學士本事方

旋花

本經上品

釋名

旋蓄

蘇

筋根

本

續筋根

圖

鼓子花

圖

狃

繆枝

牡丹

恭曰

圖

美草

別

天劍草

綱

纏枝牡丹

恭曰

旋蓄

也

其根似筋

人

故一
藥別有

一名筋根
旋覆音璇伏用花入藥今云旋蓄誤矣

根人

當作蓄

旋音福鍛用根人

當作蓄

誤矣

頌

曰別錄言其根生續筋故南人呼爲續筋根一名
獨腸草象形也
卷一百一十五
荀爽曰世俗謂之鼓子花言其花形肖也時珍曰其花不作瓣狀如軍中所吹鼓子故有旋花鼓子之名一種千葉者色似粉紅牡丹俗呼爲纏枝牡丹

集解

別錄曰

旋花生豫州平澤五月采陰乾

保昇

蘋而狹長花紅色根無毛節蒸熟堪啖味甘美名

筋根二八月采根日乾

宗奭曰今河北汴西關陝

田野中甚多最難鋤艾治之又生四五月開花其

根寸截置土灌漑涉旬苗生韓保昇說是矣時珍

曰旋花田野塉壠皆生逐節延蔓葉如波菜葉而

小至秋開花如白牽牛子花粉紅色亦有千葉者

其根色白大如筋不結子○

頌曰黔南施州出一

種旋花粗莖大葉無花不作蔓恐別是一物也

正誤

別錄曰

山薑一名金沸

宏景曰

旋花東人呼爲

山薑南人呼爲美草根似杜若亦似高良薑

本草綱目草部

卷一百一十五

旋花

三

腹中冷痛煮服甚效作丸散服辟穀止飢近有人從江南還用此術與人斷穀皆得半百日不飢不瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉似薑花赤色味辛狀如荳蔻此旋花卽其花也今山東甚多又註旋覆花曰別有旋蓄根出河南來北國亦有形似芎藭惟合旋蓄膏用之餘無所入○恭曰旋花乃因旋覆花名金沸遂作此花別名皆誤矣又云從北國來者根似芎藭與高良薑全無彷彿亦誤也

氣味花甘根辛溫無毒時珍曰花根莖葉並甘潤微苦能制雄黃主治面酐黑色媚好益氣根主腹中寒熱邪氣本經利小便久服不飢輕身續筋骨合金瘡別錄搗汁服主丹毒

毒熱藏器補勞損益精氣時珍

發明

時珍曰凡藤蔓之屬象人之筋所以多治筋

煎

時病旋花根細如筋可啖故別錄言其久服不

歸

附方

舊一

被研斷筋

旋蓄根搗汁瀝瘡中仍以滓

續此

新一

出蘇景中療奴有祕精益髓

太乙金鎖丹

效者

王燾

外臺祕要

用五色龍骨子

五兩

覆盆子

五兩蓮花蕊

四兩未開者陰乾鼓子仁一百顆並爲末

花三兩

五月

采之雞頭子仁一百顆並爲末

以金櫻子

二百枚去皮

木臼搗爛水七升煎濃汁

酒一升

去渣和藥杵

二千下丸梧子大每空心溫鹽

調車前

末半合

服之至百日永不泄

如要泄以冷水

本品

經

校正

自木部

移入此

本品

經

女歲

權

甄蕤華

本

武威

經

釋名

凌霄

蘇

陵苕

經

陵時

郭

女歲

權

甄蕤華

本

武威

經

甄蕤華

本

吳瞿陵

吳氏時珍曰此花亦豔故名

附木而上高數丈

普鬼目此花亦豔故名

故曰凌霄

正誤

宏景曰是瞿麥根方用至少博物志云郝晦行太行山北得紫葳華必當奇異今瞿麥處

處有之不應乃在太行山

恭曰紫葳瞿麥皆本經藥體性既乖生處亦不相關爾雅云苕一名陵苕

郭璞注云一名陵時又名凌霄此爲眞也

穎達詩疏亦云苕一名陵時今本草無陵時之名

惟鼠尾草有之豈所傳不同抑陶蘇之誤耶

時珍曰按吳氏本草紫葳一名瞿陵陶宏景誤作瞿麥

字爾鼠尾止名陵翹無陵

時蘇頌亦誤矣並正之

集解別錄曰紫葳生西海川谷及山陽

恭曰此凌霄花也連莖葉用詩云有苕之華云其黃矣

爾雅云陵苕黃華蕡白華芨山中亦有白花者

頌曰今處處皆有多生山中人家園圃亦或叢之初

作

蔓

生依大木久延至巔

其花黃赤夏中乃盛

金

醫家多采花乾之入女科藥用

時珍曰

凌霄野生

蔓纏數尺得木而上卽高數丈年久者藤大如杯

春初生

枝一枝數葉尖長有齒深青色自夏至秋

色有細點秋深更赤八月結莢

如豆莢長三寸許

其子輕薄如榆

仁馬兜鈴仁其根

長亦如

兜鈴根狀秋後采之陰乾

花

同氣味酸微寒無毒

普曰神農雷公岐伯辛扁

畏齒齦傷腦花

時珍曰花不可近鼻聞

令人昏曇

主治婦人產乳餘

疾崩中癥瘕

血閉寒熱羸瘦養胎

本經產後奔血不

定淋瀝

主熱風風癆大小便不利

腸中結實

經權曰甄酒

龜熱毒風刺

風婦人血膈遊風崩中帶下

明大

莖葉氣味苦平無毒主治瘧癇益氣錄熱風身癢

遊風風癰瘀血帶下花及根功同明治喉痹熱痛

涼血生肌

時珍

發明

時珍曰凌霄花及根甘酸而寒莖葉帶苦手足厥陰經藥也行血分能去血中伏火故主

產乳崩漏諸疾及

血熱生風之證也

附方

舊十
一新

婦人血崩

凌霄花爲末每酒服二錢後服四物湯丹溪纂要

糞後下血

凌霄花浸酒頻飲之

嬰兒不乳

百日內小兒無故口青搗碎水一盞

半煎

一盞分二服

聖濟總錄

大黃等分爲末以羊髓和丸梧子大每研

葉芒消大黃

丸以乳送下便可喫乳熱者可服

寒者勿服昔

有人休官後雲遊

湖湘脩合

久近風癟

凌霄花根葉爲末

每服三錢溫酒下

普濟方

溫則吐去再噙

再梳至二十日乃止如此四十九

日絕根百無所忌

○方賢奇效方

通身風癟

凌霄花爲末酒服

風癟疾

潔古家珍

地龍焙殼炒各七個爲末每服二錢溫酒下

先以藥湯浴過服此出臭汗爲效

○門事親加蟬蛻五品各九個作一服

○儒

鼻上酒皺

王謬

百一選方用凌霄花

山巵子等分爲末每茶服二

氏家藏方用凌霄花半兩硫黃一兩

仁川曾子仁用之有效

錢日二服數日除根

○楊

臨川曾子仁用之有效

胡桃四個膩粉一錢研膏生絹包揩

走皮趨瘡

楊

野名悲羊瘡用凌霄花并葉煎湯日洗之

○楊

滿項浸淫溼爛延及兩耳癢而出水發歇不定

田

仁齋直指方

婦人陰瘡

或膽調搽紫葳爲末用鯉魚腦

摘玄方耳卒聾閉

楊

本草綱目直證

卷六

三

凌霄葉杵取自然汁滴之斗門方女經不行錢食前溫酒下徐氏胎

產方

營實牆靡

音眉○本經上品

釋名薔薇

別錄

山棘

別錄

牛棘

本經

牛勒

別錄

刺花

綱目

時珍曰此

草蔓柔靡依牆援而生故名牆靡其莖多棘刺勒人牛喜食之故有山刺牛勒諸名其子成簇而生如營星然故

謂之營實

集解

別錄

曰營實生零陵川谷及蜀郡八月九月

采陰乾宏景曰營實卽薔薇子也以白花者

爲良莖葉可煮作飲其根亦可煮釀酒保昇曰所

在有之蔓生莖閒多刺其花有百葉出入六出或

赤或白子若杜棠子時珍曰薔薇野生林塹閒

抽嫩蕻小兒掐去皮刺食之既長則成叢似蔓

而春

抽嫩蕻小兒掐去皮刺食之既長則成叢似蔓而春

莖硬多刺小葉尖薄有細齒四五月開花四出黃心有白色粉紅二者結子成簇生青熟紅其核有白毛如金櫻子核八月采之根采無時人家栽玩者莖粗葉大延長數丈花亦厚大有白黃紅紫數色花最大者名佛見笑小者名木香皆香豔可人不入藥用南番有薔薇露云是此花之露水香馥常異

營實氣味酸溫無毒別錄曰主治癰疽惡瘡結肉微寒

主治癰疽惡瘡結肉

跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節本經久服輕身益

氣錄治上焦有熱好瞑

珍時

附方

新眼熱昏暗營實枸杞子地膚子各二

末每服三錢溫酒下

聖惠方

根氣味苦濶冷無毒主治止洩痢腹痛五臟客熱

除邪逆氣疽癰諸惡瘡金瘡傷捷生肉復肌錄治

熱毒風除邪氣止赤白痢腸風瀉血通結血治牙

齒痛小兒疳蟲肚痛癰疽疥癬明頭瘡白禿權除

風熱溼熱縮小便止消渴

時珍

發明

時珍曰營實薔薇根能入陽明經除風熱溼熱生肌殺蟲故癰疽瘡癰古方常用而洩痢

消渴遺尿好瞑
亦皆陽明病也

附方

舊新五

消渴尿多

薔薇根

一把水煎

日服之

千金方

小便失禁

薔薇

根煮汁飲或爲末酒服

野生白花者更良

飲外

聖惠方

少小尿牀

薔薇根

錢煎酒

夜

臺祕要

頻數用生薔薇根洗切前濃

口

飲

外

小兒疳痢

頻數用生薔薇根洗切前濃

口

細飲以愈爲度

千金方

咽痛癢

語聲不出 薔薇根皮射干一兩甘草炙口半兩每服二錢水煎服之

舌糜爛

薔薇根避風打去土煮濃汁溫含令吐冬用根皮夏用枝葉口瘡日久延及胸中生者皆效

過傅之全幼心鑑

癰腫節毒 漬爛疼痛用薔薇皮筋骨毒更炙熨之

痛因患楊梅瘡服輕粉

藥成者野薔薇根白皮洗三斤水酒十斤煮一炷香每日任飲以愈爲

度○鄧筆峯雜興方

用刺薔薇根三錢五加皮木瓜當歸茯苓各二錢以酒二盞煎一盞日服一次

金瘡腫痛

薔薇根燒灰每白湯服方抱朴子箭刺入肉膿寸匕一日三服

不出以薔薇

根末摻之服鼠撲外臺祕要骨哽不出末水服十日卽穿皮出也

尺寸匕日同上

葉主治下疳瘡痏研洗傳之黃花者更良

方攝生

月季花

綱目

釋名月月紅

見勝春

瘦客

鬪雪紅

集解

時珍曰處處人家多栽插之亦薔薇類也青

莖長蔓硬刺葉小於薔薇而花深紅千葉厚

瓣逐月開放

不結子也

氣味

甘溫無毒

主治

活血消腫傳毒

時珍

附方

新一療癰未破

用月季花

頭二錢沈香

五錢

莞安糞水內遊

封固酒水各一盞煮熟食之卽愈魚須

就以魚腸封固酒水各一盞煮熟食之卽愈魚須

安糞水內遊

死者方效此是家傳方活人多矣

試驗方

談楚翁

栝樓

本經中品

校正

併入圖經
天花粉

釋名

果羸

音裸

瓜蔞

目綱

天瓜

錄別

黃瓜

別經

地樓

本經

錄別

根名

白藥

圖經

天花粉

圖經

瑞雪

時珍

曰羸與蓏同

地

下曰蓏

此物蔓生附木故得兼名詩云果羸之

實亦施于字是矣

栝樓卽果羸

二字音轉也

亦作

瓠

後人又轉爲瓜

蔞愈轉愈失其真矣古者瓜

姑同音故有澤姑之名齊人謂之天瓜

象形也雷

電炮炙論以圓者爲栝

長者爲樓亦出牽強但分

雌雄可也

其根作粉潔白如雪故謂之

天花粉蘇

頌圖經重出天花

粉謬矣今削之

集解

別錄

曰栝

樓生

弘農川谷及山陰地

根入土

深者良生鹵地

者有毒二月八月采根曝乾

三十日成宏景曰出近道

藤生狀如土瓜而葉有

叉入土六七尺大二三圍者服食亦用之實入摩

又入土六七尺大二三圍者服食亦用之實入摩

三十日成宏景曰出近道

藤生狀如土瓜而葉有

叉入土六七尺大二三圍者服食亦用之實入摩

三十日成宏景曰出近道

藤生狀如土瓜而葉有

叉入土六七尺大二三圍者服食亦用之實入摩

三十日成宏景曰出近道

藤生狀如土瓜而葉有

膏用恭曰出陝州者白實最佳頌曰所在有之三四月生苗引藤蔓葉如甜瓜葉而窄作叉有細毛七月開花似壺盧花淺黃色結實在花下大如拳生青至九月熟赤黃色其形有正圓者有銳而長直下生年久者長數尺秋後掘者結實有粉夏月掘者有筋無粉不堪用其實圓長青時如瓜黃時如熟柿山家小兒亦食之內有扁子大如絲瓜子殼色褐仁色綠多脂作青氣炒乾搗爛水熬取油可點燈

實脩治

敷曰凡使皮子莖根其效各別其栝圓黃皮厚蒂小樓則形長赤皮蒂粗陰人服樓

陽人服栝並去殼皮革膜及油用根亦取大二三圍者去皮搗爛以水澄粉用時珍曰栝樓古方全用後世乃分子瓤各用

氣味苦寒無毒

時珍曰味甘不苦

主治胸痹悅澤人面

錄別

潤肺燥降火治欬嗽滌痰結利咽喉止消渴利大

腸消癰腫瘡毒時珍子炒用補虛勞口乾潤心肺治

吐血腸風瀉血赤白痢手面皺大明

發明

震亨曰栝樓實治胸痹者以其性味甘潤甘能補肺潤能降氣胸中有痰者乃肺受火逼

失其降下之令今得甘緩潤下之助則痰自降宜其爲治嗽之要藥也且又能洗滌胸膈中垢膩鬱熱爲治消渴之神藥時珍曰張仲景治胸痹痛引心背欬唾喘息及結胸滿痛皆用栝樓實乃取其甘寒不犯胃氣能降上焦之火使痰氣下降也成無已不知此意乃云苦寒以瀉熱蓋不嘗其味原不苦而隨

附方

舊十二

痰欬不止

瓜蔞仁一兩文蛤七分爲末以薑汁澄濃腳丸彈子

文傳會爾

飲酒發熱

卽上方研膏日食數匙一男子年

飲酒

二十病此服之而愈 摘玄方

痰澼

兩脇脹滿時復嘔吐

腹中如水聲

栝樓實去

殼焙一兩

神麴炒半兩爲末

每服二錢葱白

湯下

聖惠方

小兒痰喘

欬嗽膈熱久不瘥

瓜蔓實一枚

子爲末以寒食麵和作餅子

日三服研末每服一錢溫水化下

月經

灸黃

再研末每服一錢溫水化下

劉河間宣明方

婦人夜熱

痰嗽

丹溪心法

浸胸

不調

形瘦者用瓜蔓仁一兩青黛香附童尿浸

曬一兩五錢爲末蜜調

丹溪心法

化之

不得通及治痰嗽

短氣寸脈沈遲

痹痰嗽

胸痛徹背心腹痛滿氣不得通及治痰嗽

大瓜蔓去瓢取子炒熟和殼研末

米糊丸

梧子大每米飲下二三身背喘息欬唾

短氣寸脈沈遲

身背喘息欬唾

十丸

日二服杜王方

胸中痹痛

身背喘息欬唾

短氣寸脈沈遲

身背喘息欬唾

關上緊數

用大栝樓實一枚切薤白半斤以白酒

七斤煮二升分

再服加半夏四兩更善

仲景金

方

清痰利膈

治欬嗽用肥大栝樓洗取子切焙半

分爲

未用洗枯樓水并瓢同熬成膏和丸梧子中風喝
大每薑湯下三五十丸良

楊文蔚方

中風喝

斜熨用瓜蔓絞汁和大麥麪作餅炙熟

熱方

熱病頭痛

發

進退用大枯樓一枚取瓢細剉置盞盤中用熱湯一盞沐之蓋定良久去滓服

聖惠方

時疾

發黃狂憶煩熱不識人者大瓜蔓實黃者一枚以新汲水九合浸淘取汁入蜜半合朴消八分

盡

分再服便瘥

小兒黃疸

眼黃脾熱用青瓜蔓焙研每服一錢水半

蘇頌圖經本草小兒黃疸

眼黃脾熱用青瓜蔓焙研每服一錢水半

上同

小

便不通腹脹用瓜蔓焙研每服二錢熱酒下頻服

用此方治之得消渴煩亂黃枯樓一個酒一盞洗

聖惠方

得

消渴煩亂

黃枯樓一個酒一盞洗

去皮子取瓢煎成膏入

入

白礬末一兩爲丸梧子大燥渴腸祕九月十月熟
每米飲下十丸

聖惠方

得

消渴煩亂

黃枯樓一個酒一盞洗

拌乾葛粉銀石器中慢火炒熟爲末食後吐血不夜臥各以沸湯點服二錢寇宗頤衍義

吐血

栝樓泥固煅存性研三錢糯

腸風下血

栝樓一個燒灰

止栝樓泥固煅存性研三錢米飲服日再服

聖惠錄

久痢五色

大熟瓜蔓一個

心酒服一錢曾濟方半年杭州一道人傳此而愈

本事方

大腸脫

葛洪肘後方小兒脫肛唇

半爲末作一服溫酒服之胡大卿一僕患痢

大熟瓜蔓一個入

煅存性出火毒

肛手接之令暖自入葛洪肘後方

小兒脫肛唇

白礬五錢在內固濟煅存性爲末糊丸梧子大每

米飲下二十丸摘玄方

瓜蔓皮露蜂房燒灰擦牙

以烏柏根荆柴根葱根煎梧子大每

湯嗽之危

喉瘡皮白殭蠶炒甘草炒各二

個燒灰經進方用栝樓各二

氏得效方

語聲不出經進方用栝樓各二

個燒灰經進方用栝樓各二

錢半爲末每服三錢半薑湯下或以綿裹半

個燒灰經進方用栝樓各二

個燒灰經進方用栝樓各二

含嚥一日二服名發聲散

御藥院方

半堅齒

烏鬚

大栝樓一個開頂入青鹽二兩杏仁去皮尖

三七粒原頂合紮定蚯蚓泥和鹽固濟炭火

煅

存性研末每日揩牙三次令熱百日有驗如先

有白鬚拔去以藥投之卽生黑者其治口齒之功

未

易具陳人光潤曾濟方面黑令白

栝樓瓢三兩杏仁一兩豬肚

皺

聖濟錄人光潤冬月不胞衣不下

栝樓實一個取子細研

盞煎

七分溫服無實用根亦可

以酒與童子小便各半

亦可

陳良甫婦人良方乳汁不下

瓜蔞子淘洗

臥

一翕令白色酒服一錢七合面臥一夜流出

控乾炒香瓦

熟搗

以白酒一斗煮取四升去滓

栝樓一枚

溫服

一升日三服

初起

栝樓

搗末井花水服

微赤

寸匕

梅師方

便毒初發

黃瓜

蕷一個

黃連

永

類方

李仲南

風瘡疥癩

生栝樓

一二個

打碎酒浸

一

熱遊丹腫

桔樓子仁末二大兩
調塗楊氏產乳集驗方

楊梅瘡痘

小如

指頂遍身者先服敗毒散後用此解皮膚風熱不

過十服愈用桔樓皮爲末每服三錢燒酒下日三

服簡方集

根脩治

天花粉

周憲王曰秋冬采根去皮寸切水浸逐日換水四五日取出搗泥以

絹衣瀝汁澄

粉曬乾用

氣味苦寒無毒

時珍曰甘微苦酸微寒之才曰枸杞爲之使惡乾薑畏牛膝乾漆反

烏頭主治消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷

本經除腸胃中痼熱八疸身面黃唇乾口燥短氣止小

便利通月水

別錄

治熱狂時疾通小腸消腫毒乳癰

發背痔瘻瘍排膿生肌長肉消撲損瘀血

大明

發明

恭曰用根作粉潔白美好食之大宜虛熱人

者非此不能除與辛酸同用導腫氣成無已曰津涸

液不足則爲渴栝樓根味苦微寒潤枯燥而通行

津液是爲渴所宜也時珍曰栝樓根味甘微苦酸

其莖葉味酸酸能生津感召之理故能止渴潤枯

微苦降火甘不傷胃昔人

只言其苦寒似未深察

附方

舊十二新十二

消渴飲水

千金方作粉法取大栝樓根去皮寸切水浸五日逐

日易水取出搗研瀝過澄粉曬乾每服方寸匕水逐

化下日三服亦可入粥及乳酪中食之○肘後方

用栝樓根薄切炙取玉兩水五升煮四升隨意飲

之○外臺祕要用生栝樓根三十斤以水一石煮

取一斗半去滓以牛脂五合煎至水盡用煖酒先

食服如雞子大日三服最妙○聖惠方用栝樓根先

黃連三兩爲末蜜丸梧子大每服三十丸日二服
又玉壺丸用栝樓根人參等分爲末蜜丸梧子大
每服三十丸水五升
麥蘆冬湯下傷寒煩渴思飲栝樓根三兩水五升
瀝一斗水二升煮好銀二兩半
冷飲汁然後服此外臺祕要
等分爲散飲服方
寸匕水永類方
小便出如不出再合頓服隨有黃水從生
服楊起簡便方
蜜一大匙和勻暖服
日一大匙和勻暖服
錢廣利方
惠方聖
瘡痛極劫之立住用綿袋包暖陰囊取天花粉一兩人參三錢爲末
錢以醋酒一盃浸之自卯至午微煎滾露五
一夜次早低凳坐定兩手按膝飲
下卽愈未上再一服本草蒙筌
小兒囊腫天花粉一

兩炙甘草一錢半水煎入酒服全幼心鑑

桔樓根削尖以脂煎三沸

取塞耳三日卽愈

耳後方

耳聾未久水煮汁如常釀酒久服

肘後方甚良

耳聾未溫酒每服二

錢爲末

李仲南永類方

產後吹乳

腫硬疼痛輕則爲

垢樓根末

兩乳香

重則爲

垢樓根燒存性研

以五錢酒水煎服

孟诜食療用

桔樓根

苦酒和

楊氏產乳癰腫初起

酒熬燥搗篩以苦酒和

塗紙上貼之○楊文蔚方用

桔樓根赤小豆等分爲末醋調塗之

石等分爲末水調

桔樓普濟方

天泡溼瘡粉

擦之大每空心淡薑

楊梅天泡川芎薑各四

米滑花粉

糊丸梧子大每空心淡薑

湯下七八十丸

便方

折傷腫痛

桔樓根搗塗

葛洪肘後方除痛卽止

箭鏃不出自出

栝樓根搗傅之日三易

鍼

刺入肉

方同

痘後目障

天花粉蛇蛻洗焙等分爲

末羊子肝批開入藥在內

此服

米泔汁煮熟切食次女病之旬餘而愈

周密齊東野語

莖葉氣味

酸寒無毒

主治中熱傷暑

別錄

王瓜

本經中品

釋名土瓜

本經鉤鱅

郭璞注

老鴉瓜

圖經

馬兜瓜

胞音霍

赤霍

子

義衍

野甜瓜

綱目

師姑草

宿土

公公鬚

頌曰月令四月

王瓜生卽此也

均房

閒人呼爲

老鴉瓜

亦曰

蕘瓜

按爾雅云蕘

蕘則蕘瓜

別是一物也又曰

荔菲

亦謂之土瓜別

是一物

非此土瓜也異類

同名甚多不可不辨時

時

珍曰土瓜其根作土氣其實似瓜也

或云根味如

瓜故名土瓜王字不知何義瓜似雹子熟則色赤

鴉喜食之故俗名赤鴉老鴉瓜一葉之下一鬚人呼爲公公鬚與地黃苗名婆婆嫋可爲屬對

集解

別錄曰

生魯地

平澤田野及人家垣牆間

時赤如彈子其根不入大方止單行小方爾

鄭玄注月令四月王瓜生以爲菝葜殊謬矣

恭曰四月開

時赤如彈子其根不入大方止單行小方爾

宏景曰今土瓜生籬院閒

澤平澤田野及人家垣牆間

時赤如彈子其根不入大方止單行小方爾

鄭玄注月令四月王瓜生以爲菝葜殊謬矣

恭曰四月開

生苗延蔓葉似栝樓葉但無叉缺有毛刺五月開

黃花花下結子如彈丸生青熟赤根似葛而細多

黃肉白苗葉相似根狀不同若療黃疸破血南者

謂之土瓜根北閒者其實纍纍相連大如棗皮

大勝也宗奭曰王瓜其殼徑寸長二寸許上微圓

下尖長七八月熟紅赤色殼中子如蟬蠅頭者今

人又謂之赤雹子其根卽土瓜根也于細根上又

生淡黃根三五相連如大指許根與子兩用時珍又

曰王瓜三月生苗其蔓多鬚嫩時可茹其葉圓如

馬蹄而有尖面青背淡澀而不光六七月開五出

澀根不似葛但如栝樓根之小者澄粉甚白膩須粗

澀根成簇結子纍纍熟時有紅黃二色皮亦粗

澀根不似葛但如栝樓根之小者澄粉甚白膩須粗

深掘二三尺乃得正根江西人栽
之沃土取根作蔬食味如山藥

根氣味苦寒無毒

權曰平藏器能吐下人取汁制雄汞

主治消

經本療諸邪

渴內痹瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾

經本利大小便

氣熱結鼠瘦散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁

止小便數不禁逐四肢骨節中水治馬骨刺人瘡

別錄

天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶熱勞排膿消撲

損瘀血破癥癧落胎

大明主蠱毒

小兒閃癖痞滿痰

瘡并取根及葉搗汁少少服當吐下

藏器

利大小便

治面黑面瘡

珍時

附方

舊五新七

小兒發黃

土瓜根生搗汁三合與服

不過三次

蘇頌圖經

黃

痘變黑

醫所不能治用土瓜根汁平旦溫服一小升午刻黃水當從小便出不出再服

便如泄

乃腎虛也王瓜散用王瓜根一兩白石脂

一兩爲末每服二錢大

麥粥飲下衛生寶鑑

小便不通

土瓜根搗汁入少水解之筒吹

入下部○肘後方

大便不通

上方吹入肛門內二便不通前後吹之取通

乳汁不下

土瓜根爲末酒服一錢一日二服

楊氏產乳方

經水不利

帶下

少腹滿或經一月再見者

土瓜根散主之土瓜根

芍藥桂枝廑蟲各三兩爲末酒服方寸匕日三服

仲景婦人陰癩方同

一切漏疾

土瓜根搗傅之燥則易千金

金匱方

婦人陰癩方同

升漬一宿服當吐下外臺祕要面

方中諸藥毒

土瓜根大如指長三寸切以酒半

升漬一宿服當吐下外臺祕要面

上痱瘡

土瓜根搗末漿水和勻入夜別以漿水洗面塗藥旦復洗之百日光彩射人夫妻不相識也

效也

肘後方

耳聾灸法

溼土瓜根削半寸塞耳內以艾灸七壯每旬一

灸愈乃止

聖濟總錄

子氣味酸苦平無毒主治生用潤心肺治黃病炒用治肺痿吐血腸風瀉血赤白痢大主鹽毒明主蠱毒甄權反胃吐食時珍

附方

新八

消渴飲水

兩五

七度

痘瘡去皮每食後嚼二三度瘥

聖惠方

傳尸

勞瘵

赤霍兒俗名王瓜

焙爲末

十

藥神書

丹溪纂要

馬霍兒

燈上燒

反胃吐食

馬霍兒

燈上燒

痰熱

丹溪纂要

痰熱

頭風

懸枯樓一個赤雹兒七個焙大力子卽牛蒡子焙四兩爲末每食後茶或酒服三錢忌動

風發熱之物

筋骨痛攀服馬雹兒子炒開口爲末酒一錢日二服

集簡方

赤目

痛澑

不可忍小圓瓜瓢籬上大如彈丸紅色皮上有刺者九月十月采日乾槐花炒赤芍藥等分爲末每服二錢臨臥

溫酒下

衛生家寶方研末無灰酒空心服二錢

大腸下血

王瓜一兩燒存性地黃二兩集簡方

米飲下三十丸

指南方

葛

本經中品

校正

併入開寶葛粉

釋名雞齊

本經鹿藿別錄

黃斤

別錄時珍曰葛從曷謂聲也鹿食九草此其一

種故曰鹿藿

斤未詳

集解

別錄曰葛根生汶山山谷五月采根曝乾宏景曰卽今之葛根人皆蒸食之當取入土深

大者破而日乾之南康廬陵間最勝多肉而少筋甘美但爲藥不及耳恭曰葛雖除毒其根入土五

六寸已上者名葛脰脰者頸也服之令人吐以有微毒也本經葛穀卽是其實也頌曰今處處有之

江浙猶多春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉頗似

葛葉而小色青七月著花粉紫色似豌豆花不結實根形大如手臂紫黑色五月五日午時采根曝

乾以入土深者爲佳今人多作粉食宗奭曰澧鼎

之閒冬月取生葛搗爛入水中揉出粉澄成垛入

沸湯中良久色如膠其體甚韌以蜜拌食擦入生

葛少許尤妙又切入茶中待賓雖甘而無益又將

葛

生葛根煮熟作果實賣吉州南安亦然時珍曰葛

有野生有家種其蔓延長取治可作繩絡其根外

紫內白長者七八尺其葉有三尖如楓葉而長面

青背淡其花成穗纍纍相綴紅紫色其莢如小黃

豆莢亦有毛其子綠色扁扁如鹽梅子核生嚼腥

氣八九月采之本經所謂葛穀是也唐蘇恭亦言
葛穀是實而宋蘇頌謂葛花不結實誤矣其花曬
乾亦可
煤食

葛根氣味甘辛平無毒

別錄曰生根汁大寒好古
曰氣平味甘升也陽也陽

明經行經
的藥也

主治消渴身大熱嘔吐諸痹起陰氣解諸毒

本療
經

傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止

脇風痛

別錄治天行上氣嘔逆開胃下食解酒毒

甄權

治胸膈煩熱發狂止血痢通小腸辨膿破血傅蛇

蠱嚙置毒箭傷

大殺野葛巴豆百藥毒之生者墮

胎蒸食消酒毒可斷穀不饑作粉猶妙器作粉止

藏

渴利大小便解酒去煩熱壓丹石傅小兒熱瘡搗
汁飲治小兒熱痞開竇獮狗傷搗汁飲并末傅之

蘇恭

散鬱火

時珍

發明

宏景曰生葛搗汁飲解溫病發熱五月五日中時取根爲屑療金瘡斷血爲要藥亦療瘡

及瘡

至良頌曰張仲景治傷寒有葛根湯以其主大熱解肌發腠理故也元素曰升陽生津脾虛作

渴者非此不除勿多用恐傷胃氣張仲景治太陽

陽明合病桂枝湯內加麻黃葛根又有葛根黃芩

黃連解肌湯是用此以斷太陽入陽明之路非卽

太陽藥也頭顱痛如破乃陽明中風可用葛根葱

白湯爲陽明仙藥若太陽初病未入陽明而頭痛

者不可便服升麻葛根發之是反引邪氣入陽明

爲引賊破家也震亨曰凡癰痘已見紅點不可用葛根升麻湯恐表虛反增斑爛也杲曰乾葛其氣輕浮鼓舞胃氣上行生津液又解肌熱治脾胃虛弱泄瀉聖藥也徐用誠曰葛根氣味俱薄輕而上行浮而微降陽中陰也其用有四止渴一也解酒二也發散表邪三也發瘡疹難出四也時珍曰本草十劑云輕可去實麻黃葛根之屬蓋麻黃乃太陽經藥兼入肺經肺主皮毛葛根乃陽明經藥兼入脾經脾主肌肉所以二味藥皆輕揚發散而所入迥然不同也

附方

舊十五新八

數種傷寒

庸人不能分別今取一藥兼治天行時氣初覺頭痛

內熱脈洪者葛根四兩水二升入豉一升時氣頭煮取半升服生薑汁尤佳

傷寒類要

痛

壯熱生葛根洗淨搗汁一大盞豉一合煎六分去滓分服汗出卽瘥未汗再服若心熱加巵子仁十枚

傷寒頭痛

二升

以童子小便八升煎

聖惠方

取二升分三服食葱粥取汗

梅師方

妊娠熱病

葛根汁

二升分三服

傷寒類要

預防熱病

急黃

葛粉

二升

生地

黃一升

香豉

七日三

服有病五服

半升

爲散

每食後

米飲服

方寸

匕日三

煩躁熱渴

葛粉

四兩先以水

浸粟米半升

一小盞

服去

葛根搗汁

葛根搗汁

去

小兒熱渴

久不

葛根半兩

乾嘔不息

葛根搗汁

葛根搗汁

葛根搗汁

葛根搗汁

葛根搗汁

後方

小兒嘔吐

壯熱

食癟

葛粉

二錢水

二合

調勻

葛根搗汁

食醫

首殷

心熱吐血

不止

生葛

搗汁

半升

頓服

立瘥

廣利方

衄血

衄血

衄血

止生葛

搗汁

服三

葛根搗汁

因食熱物發者

生

葛根搗汁

葛根二斤搗汁

一日一

葛根搗汁

葛根搗汁

葛根搗汁

葛根搗汁

葛根搗汁

葛根搗汁

葛根搗汁

葛根搗汁

升入藕

半升

和

傷筋出血

葛根搗汁

仍熬屑傳之

乾者煎服

外臺祕

本草綱目卷之三

要臂腰疼痛

生葛根嚼之蘸汁取效乃止

金創中風

痉強欲死

生葛根

四大兩以水三升煮取一升去滓分服口

噤者灌之若乾者搗末調三指撮仍以此及竹瀝

多服

取效

貞元廣利方

服藥過劑

苦煩生葛

汁飲之乾

酒醉

不醒

生葛根便愈

飲二升千金方

諸藥中毒

發狂煩悶吐下欲

葛根煮汁服

葛根煮汁服

葛根煮汁服

葛根煮汁服

葛根煮汁服

葛根煮汁服

肘後方

解中鳩毒

氣欲絕者葛粉

三合水三盞

聖惠方

虎傷

人瘡

生葛根濃汁洗之

仍搗末水服

梅師方

葛穀氣味

甘平無毒主治

下痢十歲已上

本經解酒

毒時珍

葛花氣味

同穀主治

消酒

別錄

宏景曰同小豆花

乾末酒服飲酒不醉也

腸

風下血

珍時

葉主治金瘡止血接傅之錄

別

蔓主治卒喉痹燒研水服方寸匕

恭蘇

消癰腫

時珍

附方新婦人吹乳

藤蔓燒灰酒服二錢

衛生易簡方

三癩子初

起

葛蔓燒灰水調傅

千金方

小兒口噤

病在咽中如麻豆

乳食葛蔓燒灰一字和乳

汁點之卽瘥

聖惠方

附錄

鐵葛

拾遺藏器曰根味甘溫無毒主一切風

血氣羸弱令人壯健久服治風緩偏風

生山南峽中葉似

枸杞根

如葛黑色

黃環

本經下品

狼跋子

別錄下品

釋名凌泉

本經大就

本經就葛

唐生芻

吳根韭

普根韭

吳實名

狼跋子

別錄

度穀

唐本

時珍曰

此物葉黃而圓故名

黃環如蘿藦呼白環之義亦是葛

類故名就葛跋乃狼足名
其莢似之故曰狼跋子

集解

別錄

曰黃環

生蜀郡山

谷三月采根陰乾

晉

葉黃圓端

大經日

葉有汁

黃白

五月實圓

三月采

根黃色從理

如車輻解

宏景曰

似防己

亦作車輻

理解蜀都賦云

青珠黃環卽此

或云是大戟花定

非矣用甚稀市人

妙有識者又曰

狼跋子出交廣

形扁扁制搗以雜木投水中

魚無大小皆浮出而

死

參曰

黃環惟襄陽大有餘處雖有亦稀

巴西人

謂之就葛今園庭亦種之作藤生

大者莖徑六七

寸根亦葛類陶云似防己者近之取葛根誤食之

吐利不止土漿解之此眞黃環也今太常收劍南

來者乃雞屎葛根非黃環也其花紫色其子名狼

跋子角生似阜莢交廣送入太常者正是黃環子也花實與葛同時時珍曰吳普所說甚詳而唐宋本草不收何也范子計然云黃環出魏郡以黃色者爲善

黃環根氣味苦平無毒

曹曰神農黃帝有毒桐君扁鵲苦權曰大寒有小毒

之才曰鳶尾爲之使惡蒺藜防己乾薑

主治蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在

臟中除欬逆寒熱

本經

治上氣急及百邪

甄

治痰嗽

消水腫利小便

時珍

附方

新

水腫

黃環根曬乾每服五錢水煎

服小便利爲效

儒門事親

狼跋子氣味苦寒有小毒主治惡瘡蝎疥殺蟲魚

別景

錄苦酒磨塗瘡疥效

宏

天蠶冬

本經上品

釋名

音

顛勒

本經

顛棘

爾雅

天棘

綱目

萬歲藤

禹錫曰按

爾雅云

牆蘿

蠶冬

注云

門冬也

一名滿冬

抱朴子

云

一名顛棘

或名地

蠶冬

或名筵

蠶冬在東岳

名

在西岳

名

在北岳

淫羊藿

在中岳

名天蠶

冬在

南岳

名百部

在京

陸山

阜名

顛棘

在

東岳

名

在西岳

名

在北岳

名無

不愈

在南岳

名百部

在京

陸山

阜名

顛棘

在

東岳

名

在西岳

名

在北岳

越人

名浣草

雖處處有之

其名不同

其實一也

有百部草

其根有百許

如一而苗小異

其苗似

葵

不中服食須

分別之時

珍曰草之

茂拔

故曰天

茂拔

者爲

蠶俗作

門此草

蔓茂而功同

麥

蠶冬故曰

天棘

爾雅云

髦

顛棘也

因其細葉如

髦

歲藤

又名細棘

也顛

天音相近

也按救荒

本草云俗名

萬

歲藤

亦名百部

也牆蘿

樹其形與治肺

之功頗同

百部

故指爲

蠶冬

蓋

古書錯

簡也

集解

別錄曰

天蘡冬生奉高山谷二月三月七月

處處有之以

高地大根味甘者爲好桐君藥錄

華博物志云

天蘡冬莖閒有逆刺若葉滑者名繩

體一名顛棘

接根入湯可以浣縑素白如絨紅類

也今越人名爲浣草

勝於用灰此非蘡冬乃相似

爾按此說與桐君之說相亂

今人所采皆是有刺

蘡冬恐

勒亦粗相似用此浣衣則淨不復更有刺

亦相類但苗異

爾恭曰此有二種一種苗有刺而

澣

一種無刺而滑皆是蘡冬俗云顛棘浣草者形

貌詔之雖作數名終是一物

二根浣垢俱淨蘡冬

浣草互名也

詔音命目之也頌曰處處有之春生

藤蔓大如釵股高至丈餘葉如苘

香極尖細而疎滑有逆刺亦有澀而無刺者其葉如絲杉而細散

皆名天蘡冬夏生細白花亦有黃色及紫色者秋

結黑子在其根枝旁入伏後無花暗結子其根白

或黃紫色大如手指圓實而長二三寸大者爲勝
一科二十枚同撮頗與百部根相類洛中出者
大葉粗榦殊不相類嶺南者無花餘無他異禹錫
曰抱朴子言生高地根短味甜氣香者爲上生水
側下地葉似細蘿而微黃根長而味多苦氣臭者
次之若以服食令人下氣爲益又遲也入山便可
蒸煮啖之斷穀或爲散仍取汁作酒服散猶佳時
珍曰生苗時亦可以沃地栽種子亦堪種但晚成
根脩治宏景曰虧冬采得蒸剝去皮食之甚甘美
止飢雖曝乾猶脂潤難搗必須曝於日中
或火烘之今人呼苗爲棘刺煮作飲宜人而終非
眞棘刺也頌曰二三七八月采根蒸剝去皮四破
去心曝乾用數日采得去皮心用柳木甑及柳木
柴蒸一伏時灑酒令遍更添火蒸作小架去地二
尺攤于上曝乾用

氣味苦平無毒

別錄曰甘大寒好古曰氣寒味微苦而辛氣薄味厚陽中之陰入手

太陰足少陰經氣分之藥之才曰垣衣地黃貝母爲之使畏曾青損之曰服天蠶冬禁食鯉魚誤食中
毒者浮萍汁解之搗汁制雄黃硇砂

主治諸暴風溼偏痹強骨髓殺三蟲去伏尸久服輕身益氣延年不饑

經本保定

肺氣去寒熱養肌膚利小便冷而能補別錄肺氣欬

逆喘息促急肺痿生癰吐膿除熱通腎氣止消渴

去熱中風治溼疥宜久服煮食之令人肌體滑澤

白淨除身上一切惡氣不潔之疾權甄鎮心潤五臟

補五勞七傷吐血治嗽消痰去風熱煩悶大明主心

病嗌乾心痛渴而欲飲瘦歷嗜臥足下熱而痛好古

本草綱目草部

潤燥滋陰清金降火時陽事不起宜常服之邈

時珍思邈曰此藥性平無大寒大熱能調和臟腑

發明

權曰天薑冬冷而能補患人五虛而熱者宜加用之

人禁服之

元素曰苦以泄滯血甘以助元氣及治

血妄行

此天薑冬之功也保定肺氣治血熱侵肺

上氣喘促

宜加入參黃芪爲主用之神效嘉謨曰

天麥薑冬並入手太陰祐煩解渴止欬消痰而麥

薑冬兼行手少陰

清心降火使肺不犯邪故止欬消痰而麥

立效天薑冬行足少陰滋腎助元全其母氣故清

痰殊功蓋腎主津液燥則凝而爲痰得潤劑則化

所謂治痰之本也好古曰手太陰足少陰經營衛

同化清欬故潤劑則生津潤之天薑冬人參五味枸杞子同化

枯涸宜以溼劑潤之

天薑冬人參五味枸杞子同化清欬故潤劑則生津潤之

君地黃車前爲生脈之劑此上焦獨取寸口之意趙繼宗曰

使五同化清欬故潤劑則生津潤之

藥雖爲生脈之劑然生地黃貝母爲天薑冬之使

獨行無功也故張三丰與胡濶尙書同化清欬故潤劑則生津潤之

君地黃車前爲生脈之劑然生地黃貝母爲天薑冬之使

獨行無功也故張三丰與胡濶尙書同化清欬故潤劑則生津潤之

生不老方用天薑冬三斤地黃一斤乃有君而有使也禹錫曰抱朴子言入山便可以天薑冬蒸煮啖之取足以斷穀若有力可餌之或作散酒服或搗汁作液膏服至百日丁壯兼倍駛于虎及黃精也二百日強筋髓駐顏色與煉成松脂同蜜丸服尤善杜子微服之御八十妾一百四十歲日行三百里慎微曰列仙傳云赤松子服天薑冬齒落更生細髮復出太原甘始服天薑冬在人間三百餘年聖化經云以天薑冬茯苓等分爲末日服方寸匕則不畏寒大寒時單衣汗出也時珍曰天薑冬清金降火益水之上源故能下通腎氣入滋補方合羣藥用之有效若脾胃虛寒人單餌既久必病腸滑反成痼疾此物性寒而潤能利大腸故也

附方

舊三新十四 服食法

孫真人枕中記云八九月采天薑冬根曝乾爲末每服方

寸匕日三服無問山中人間久服補中益氣治虛勞絕傷年老衰損偏枯不隨風溼不仁冷痹惡瘡

癰疽癩疾鼻柱敗爛者服之皮脫蟲出釀酒服去
癥病積聚風痰顛狂三蟲伏尸除溼痹輕身益氣
令人不饑百日還年耐老釀酒初熟微微酸久停則
香美諸酒不及也忌鯉魚○臘仙神隱云用乾天
蠶冬十斤杏仁一斤搗末蜜辟穀不饑天蠶冬二
漬每服方寸匕名仙人糧一斤爲末煉蜜丸彈子大
居山遠行辟穀良服至十日身輕目明二十日百
病愈顏色如花三十日髮白更黑齒落重生五十
日行及奔馬百日延年○又法天蠶冬搗汁微火
煎取五斗入白蜜一斗胡麻炒末二升合煎至可
丸卽止火下大豆黃末和作餅徑三寸厚半寸一
服一餅一日三服百日已上有益○又法天蠶冬
末一升松脂末一升蠟蜜一升和煎丸如梧子大
每日早晚各服三十丸天蠶冬酒補五臟調六腑令人無病
各服三十丸天蠶冬三十五斤去心搗碎
以水二石煮汁一石糯米一斗細麴十斤如常炊釀酒熟日飲三盃

痰補肺療欬嗽失血潤五臟殺三蟲伏尸除瘧疫
輕身益氣令人不飢以天蓼冬流水泡過去皮心
搗爛取汁砂鍋文武炭火煮勿令大沸以十斤爲
率熬至三斤卻入蜜四兩熬至滴水不散瓶盛埋

土中一七去火毒

每日早晚白湯調服

醫方摘要

肺痿欬嗽

吐涎沫心中溫溫咽燥而不渴

生天蓼冬搗汁一升紫苑四合銅器煎至可丸每服

一丸茶下

杏仁大一丸

日有痰不堪用燥劑者天蓼冬搗汁一升石臼搗爛

一斤水浸洗去核取肉四十丸茶下

取肉十二兩

石臼搗爛五味子水洗去核取肉四十丸茶下

兩曬乾不見火共搗丸梧子大每服二兩

味用柳枝水洗去核取肉四十丸茶下

日三服

○滋陰養血溫補下元三才丸用天蓼冬

簡便方

○滋陰養血去心生地黃二兩味用柳

甑算以酒灑之九蒸九曬待乾秤之

人參一兩爲末蒸棗肉搗和丸梧子大每服三十丸食前溫酒

下日三服

潔虛勞體痛天蓼冬末酒服方寸七

古活法機要

潔虛勞體痛天蓼冬末酒服方寸七

千金方

肺勞風熱

止渴去熱天蠶冬去皮心煮食或曝乾爲末蜜丸服尤佳亦可洗面孟詵食

療

婦人骨蒸

煩熱寢汗口乾引飲氣喘天蠶冬十兩麥蠶冬八兩並去心爲末以生地

黃

三斤取汁熬膏和丸梧子大每服五十

丸以逍遙散去甘草煎湯下活法機要

作

則吐耳如蟬鳴引脇牽痛天蠶冬去心皮曝搗

爲末酒服方寸七日三服久服良外臺祕要

小腸偏墜

天蠶冬三錢烏藥五錢以

水煎服吳球活人心統

冬

曝乾同蜜搗作丸

日用洗面聖濟總錄

口瘡連年

不愈者天蠶冬麥蠶冬並去心

玄參等分

爲末煉蜜丸

彈子大每噙一丸

乃僧居寮所傳方也齊德之外科精義諸般癰

腫

新掘天蠶冬三五兩洗淨沙盆擂細

以好酒濾汁頓服未效再服必愈此祖傳經驗方也

虞

百部

別錄
中品

釋名

婆婦草

綱目時珍曰其根多者

華野天蠻冬

百十連屬如部伍然故

以名之

集解

宏景曰山野處處有之其根數十相連似天蠻冬而苦強但苗異爾博物志云九真一種

草似百部但長大爾懸火上令乾夜取四五寸切

短含嚥汁主暴嗽甚良名爲嗽藥疑此卽百部也

其土肥潤是以長大也藏器曰天蠻冬根有十餘

莖圓短實潤味甘百部多者五六十莖長尖內虛

味苦不同苗蔓亦別今人以蠻冬當百部說不明

也頌曰今江湖淮陝齊魯州郡皆有之春生苗作

藤蔓葉大而尖長頗似竹葉而青色面光根下一

撮十五六枚黃白色二三八月采曝乾用時珍曰

百部亦有細葉如茴香者其莖青肥嫩時亦可煮

食其根長者近尺新時亦肥實但乾則虛瘦無脂

潤爾生時擘開去心曝之鄭樵通志言葉如薯蕷者謬矣

根脩治

穀曰凡采得以竹刀劈去心皮花作數十條懸簷下風乾卻用酒浸一宿漉出焙乾

剉用或一

一窠八十三條者號曰仙苗若脩事餌之可千歲也

氣味

甘微溫無毒

權曰甘無毒大明曰苦無毒恭微寒有小毒時珍曰苦微甘

無主

治欬嗽上氣火炙酒漬飲之

別錄治肺熱潤肺

甄權

治傳尸骨蒸勞治疳殺蛇蟲寸白蟯蟲及一切

樹木蛀蟲燼之卽死殺蟲及蠅蠂

大明宏景曰作湯洗牛犬去蟲

火炙酒浸空腹飲治疥癬去蟲蠶咬毒

藏器

發明

時珍曰百部亦天蠶冬之類故皆治肺病殺蟲但百部氣溫而不寒寒嗽宜之天蠶冬性

寒而不熱嗽耳

附方

舊五新五

暴欬嗽

張文仲方用百部根漬酒每溫服一升日三服○葛洪方用百

部藤生薑各

搗自然汁等分煎服二合○續十全方用百

濟方治卒欬不

止用百部根懸

火上灸乾每含薰汁勿令人知

小兒寒嗽

用百部丸

炒麻黃去節各

七錢半爲末杏仁去皮尖炒仍以

水畧煮三五沸研泥入熟蜜和丸

阜子大每服二

三丸溫水下○三十

年嗽百部根二十斤搗取汁

服深師加蜜

二斤外臺千金方

遍身黃腫

掘新鮮百條根洗搗罨臍上以

加餡一斤

糲米飯半升拌水酒半合揉軟蓋在藥上以

住待一二日後

日內作酒氣則水從小便中出腫

自消也百條根

一名野天薑冬一名百嫋狀如葱

頭其苗葉柔細一根下有百餘個數

楊氏經驗

方誤吞銅錢

百部根四兩酒一升漬一宿溫

百蟲

入耳

百部炒研生油調一服

再服

外臺祕要

聖濟總錄

熏衣去蟲

百部秦艽

末入竹

籠燒烟薰之

煮湯洗之

自落亦可

經驗方

附錄白并

別錄曰味苦無毒主肺欬上氣行五臟
令百病不起

一名王富

一名箭筈

生山

陵葉如小竹根黃白

三月四月采根曝乾

時珍曰此物氣味主治俱近百部故附之

何首烏

宋開寶

釋名交藤

本傳

夜合

本傳

地精

本傳

陳知白

開寶

馬肝石

目綱

桃柳藤

日華

九真藤

目綱

赤葛

斗門

瘡毒

目綱

紅內消

大明

藥本草無名因

何首烏見藤夜交何卽采食有功

因以采人爲名爾時

珍曰漢武時

有馬肝石能治

人髮故後人隱此名亦曰馬肝石赤者能消腫毒
外科呼爲瘡弔紅內消斗門方云取根若獲九數
者服之乃仙故名九真藤

集解

頌曰何首烏本出順州南河縣今在處有之

城縣者爲勝春生苗蔓延竹木牆壁閒莖紫色葉
葉相對如薯蕷而不光澤夏秋開黃白花如葛勒
花結子有棱似蕎麥而細小纏如粟大秋冬取根
大者如拳各有五棱瓣似小甜瓜有赤白二種赤
者雄白者雌一云春采根秋采花九蒸九曝乃可
服此藥本名交藤因何首烏服而得名也唐元和
七年僧文象遇茅山老人遂傳此事李翹乃著何
首烏傳云何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父
名延秀能嗣本名田兒生而閼弱年五十八無妻
子常慕道術隨師在山一日醉臥山野忽見有藤
二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解解了又交
田兒驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者

後有山老忽來示之答曰子旣無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥何不服之遂杵爲末空心酒服一錢七日而思人道數月似強健因此常服又加至二錢經年舊疾皆痊髮烏容少十年之內卽生數男乃改名能嗣又與其子延秀服皆壽百六十歲猶黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其延秀生首烏服藥亦生數子年百三十歲髮壽亦長遂敘其事傳之云何首烏味甘性溫無毒茯苓爲使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞痰癬風虛敗劣長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦人惡血癰黃產後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三名地精五名何首烏本出處州江南諸道皆有苗如木槿葉有光澤形如桃柳其背偏單生不相對有雌雄者苗色黃白雌者黃赤遠不過三尺夜則苗蔓相交或隱化不見春末夏根皆拭去泥土勿損皮烈日曝乾密器貯之乘潤以布帛中秋初三時候晴日兼雌雄采之每月再曝

用時去皮爲末酒下最良遇有疾卽用茯苓湯下
爲使凡服用偶日二四六八日服訖以衣覆汗出
導引尤良忌豬肉血羊血無鱗魚觸藥無力其根
形大如拳連珠其有形如鳥獸山岳之狀者珍也
掘得去皮生喫得味甘甜可休糧讚曰神效助道
諸著返老還少變安病軀有緣者遇蕞爾自如○明
州恩州刺史李遠附錄云何首烏以出南河縣及嶺南
州桂州韶州潮州賀州廣州潘州四會縣者爲上邕
之眞仙草也五十年者如拳大號山奴服之一年
髮髭青黑一百年者如盜大號山哥服之一年
色紅悅一五十年者如盜大號山伯服之一年
齒落更生二百年者如斗栲栳大號山翁服之一年
年顏如童子行及奔馬三百年者如三斗栲栳大
號山深山產者卽大而佳也

根脩治

志曰春夏秋采其根雌雄共用乘溼以布拭去土曝乾臨時以苦竹刀切米泔浸經

宿曝乾

木杵臼搗之忌鐵器慎微曰方用新采者

從上淋去皮

銅刀切薄片入甑內以蓋鍋蒸之旋以熱水

下勿令滿溢直候無氣息乃取出曝乾用

時珍曰近時治法用何首烏赤白各一斤竹刀刮

去粗皮米泔浸一夜切片用黑豆三斗每次用三

升三合三勺以水泡過砂鍋內鋪豆一層首烏一

層重重鋪盡蒸之豆熟取出去豆將何首

烏曬乾再以豆蒸如此九蒸九曬乃用

氣味

苦澀微溫無毒

時珍曰茯苓爲之使忌諸血無鱗魚蘿蔔蒜葱鐵器同于

地黃能伏硃砂

主治癩癰消癰腫療頭面風瘡治五痔止

心痛益血氣黑髭髮悅顏色久服長筋骨益精髓

延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾

寶開

久服令

人有子治腹臟一切宿疾冷氣腸風

大瀉肝風古好

發明

時珍曰何首烏足厥陰少陰藥也白者入氣分赤者入血分腎主閉藏肝主疏泄此物氣

溫味

苦澀苦補腎溫補肝能收斂精氣所以能養血益肝固精益腎健筋骨烏鬚髮爲滋補良藥不

寒不燥功在地黃天蓼冬諸藥之上氣血太和則

風虛癱腫瘰癧諸疾可知矣此藥流傳雖久服者

尙寡嘉靖初邵應節真人以七寶美髯丹方上進

世宗肅皇帝服餌有效連生皇嗣於是何首烏之

方天下大行矣宋懷州知州李治與一武臣同官

怪其年七十餘而輕健面如渥丹能飲食叩其術

則服何首烏丸也乃傳其方後治得病盛暑中半

體無汗已二年竊自憂之造丸服至年餘汗遂淡

體其活血治風之功大有補益其方用赤白何首

烏各半斤米泔浸三夜竹刀刮去皮切焙石臼爲

末煉蜜丸梧子大每空心

溫酒下五十丸亦可末服

本草綱目草部 卷六
附方

舊四新十二 繢嗣延年用赤白何首

七寶美鬚丹

烏鬚髮壯筋骨固精氣

續嗣

延年

用

赤白

何首

烏各一斤米泔水浸三四日瓮片刮去皮用淘淨
黑豆二升以砂鍋木甑鋪豆及首烏重重鋪蓋蒸
之豆熟取出去豆暴乾換豆再蒸如此九次暴乾
爲末赤白茯苓各一斤去皮研末以水淘去筋膜
及浮者取沈者捻塊以入乳十盃浸勻曬乾研末
牛膝八兩去苗酒浸一日同何首烏第七次蒸之
至第九次止曬乾當歸八兩酒浸曬枸杞子八兩
酒浸曬菟絲子八兩酒浸生芽研爛曬補骨脂四
兩以黑脂麻炒香並忌鐵器石臼爲末煉蜜和丸
彈子大一百五十丸每日三丸清晨溫酒下午時
薑湯下臥時鹽湯下其餘竝丸梧子大每日空服
心酒服一百丸久服極驗忌見前 積善堂方服

食滋補

和劑局方何首烏丸

專壯筋骨長精髓補

血氣久服黑鬚髮堅

陽道令人多子輕身

延年月計不足歲計有餘用何首烏三斤銅刀切

片乾者以米泔水浸軟切之牛膝去苗一斤切以

黑豆一斗淘淨用木甑鋪豆一層重重鋪盡瓦鍋蒸至豆熟取出豆曝乾換豆又蒸如此三次爲末蒸棗肉和丸梧子大每服三五十丸空心溫酒下忌見前○鄭巖山中丞方只用赤白酒服一錢○積善堂方用赤白何首烏各半極大者八月采以竹刀削去皮切片用米泔水浸一宿曬乾以壯婦男兒乳汁拌曬三度候乾木白春爲每十日加十丸至百丸止空心溫酒鹽湯任下一丸方不用人乳○筆峯雜興方用何首烏雌雄各半斤分作四分一分用當歸汁浸一分生地黃汁浸一分旱蓮汁浸一分人乳浸三日取出各曝乾瓦焙石臼爲末蒸棗肉和丸梧子大每服四十丸空心百沸湯下骨軟風疾腰膝疼用何首烏大而有花紋者同牛膝各一斤以好酒一服浸七宿曝乾木白杵末棗肉和丸梧子大每一升浸五十丸空心酒

下 經 寬筋治損

何首烏十斤生黑豆半斤同煎熟阜莢一斤燒存性牽牛十兩

炒取頭末薄荷十兩木香牛膝各五兩川烏頭炮二兩爲末酒糊丸梧子大每服三十丸茶湯下

永類方

不知何處用何首烏末薑汁調成膏塗之以帛裹住火炙鞋底熨之

驗方

經自汗不止

何首烏末津調封

臍中

下血

何首烏二兩爲末食前米飲服二錢

聖惠方

小兒聾

龜尿調紅內消

久安自破傷血出

何首烏神效

末傅之卽上

筆峯雜興方

癩癰結核

或不破下至胸前者皆治之用九真藤

一名赤葛

卽何首烏其葉如杏其根如雞卵亦類癩子取根

洗淨日日生嚼并取葉搗塗之數服卽止癩

或破用之神效

斗門方

癩疽毒

其藥久服延年黑髮用之神效

文武火熬煎

臨熱入好

炮

瘡無灰酒相等再煎數沸時時飲之其滓焙研爲好

少瓶中

中武火熬煎

入好

末酒煮麪糊丸梧子大空心溫酒下三十丸疾退
宜常服之卽赤何首烏也建昌產者良

陳自明

外科精義大風癆疾何首烏大而有花文者一斤米泔

浸一七九蒸九曬胡麻四兩九蒸

九曬爲末每酒服二錢日二

聖惠方

疥癬滿身不可治者何首烏

艾葉等分水煎濃

湯洗浴甚能解痛生
肌肉王袞博濟方

莖葉主治風瘡疥癬作癢煎湯洗浴甚效

時珍

本草綱目草部卷十八上終