

戊

儒門事親論方目錄

卷之一

七方十劑繩墨訂一

立諸時氣解利禁忌三

小兒瘡疤丹嫖癰疹舊散記五

霍亂吐瀉死生如反掌說七

過愛小兒反害小兒說九

卷之二

偶有所遇厥疾獲瘳記十一

汗下吐三法該盡治病誼十三

凡在表者皆可汗式十五

推原補法利害非輕說十七

疝本肝經宜通勿塞狀十九

卷之三

喉舌緩急砭藥不同解二十一 五積五聚治同鬱斷二十二

斥十膈五噎浪分支派疏二十三 飲當去水溫補轉劇論二十四

指風痺痿厥近世差互說二

瘡非脾寒及鬼神辯四

婦人赤白帶下錯分寒熱解六

目疾頭風出血最急說八

服藥一差轉成他病說十

攻裏發表寒熱殊塗箋十二

凡在上者皆可吐式十四

凡在下者皆可下式十六

口眼喎斜是經非竅辨十八

五虛五實攻補懸絕法二十

卷之四

嗽分六氣母拘以寒述二十五
三消之說當從火斷二十七

蟲蟲之生濕熱為主訣二十八
九氣感疾更相為治衍二十六

補論二十九

水解三十

風一

濕三

燥五

解利傷寒七

痺九

厥十一

瘧十三

疳病十五

下痢膿血十七

痔漏腫痛十九

大便滯滯二十一

酒食不消散二十三

暑二

火四

寒六

中風八

瘧十

癰十二

泄痢十四

臟毒下血十六

水泄不止十八

霍亂吐瀉二十

五腫淋瀝二十二

酒食所傷二十四

沉積水氣二十五

諸積不化二十六

骨蒸熱勞二十七

虛積二十八

上喘中滿二十九

一切涎漱三十

咳嗽三十一

咳逆三十二

風痰三十三

咯血衄血嗽血三十四

消渴三十五

雷頭風三十六

頭痛不止三十七

兩目暴赤三十八

目腫三十九

病目經年四十

風衝泣下四十一

風疰牙疼四十二

口瘡四十三

喉閉四十四

癰四五十五

背疽四十六

瘰疬四十七

便癰四十八

惡瘡四十九

下疳五十

卷之五

瘡瘍瘤腫五十一

瘡腫丹毒五十二

凍瘡五十三

金瘡五十四

誤吞銅鐵五十五

蛇蟲所傷五十七

禁蝎五十九

婦人月事沉滯六十一

腰胯疼痛六十三

經血暴下六十五

月事不來六十七

小產六十九

產後心風七十一

產後潮熱七十三

妊娠大小便下利七十五

雙身傷寒七十七

懷身入難七十九

牙疳八十一

丹瘤八十三

身瘦肌熱八十五

魚刺麥芒五十六

杖瘡五十八

落馬墜井六十

血崩六十二

頭風眩運六十四

赤白帶下六十六

婦人無子六十八

大產七十

乳汁不下七十二

乳癰七十四

雙身病瘻七十六

雙身瘡痘七十八

眉煉八十

夜啼八十二

疳眼八十四

大小便不利八十六

久瀉不止八十七

發驚潮搐八十九

通身浮腫八十八
拗哭不止九十一

風熱涎嗽九十二

身熱吐下九十一
水瀉不止九十三

甜瘡九十五

瘡疾不愈七十七

赤瘤丹腫九十九

腰痛氣刺九十八

瘡泡癰疹一百

卷之六

十形三療目錄

風形

因驚風搐一

飧泄三

風痰五

手足風裂七

搐搦九

驚風十一

風搐反張二

因風鼻塞四

癩六

胃腕痛八

面腫風十

風溫十二

風水十三

腎風十五

中風十七

小兒風水十四

勞風十六

暑形

中暑十八

瘡瘍十九

火形

馬刀二十

伐指痛二十二

咽喉腫塞二十四

腰胯痛二十六

痰厥二十八

笑不止三十

目盲三十二

小兒手足搐搦三十四

熱形

沙石淋三十六

膏淋三十七

二陽病三十八

頭熱痛四十

勞嗽咯血四十二

嘔血四十四

肺癰四十六

口瘡四十八

心痛五十

失笑五十二

目暎五十四

熱厥頭痛五十六

血崩五十八

月閉寒熱六十

遇寒手熱六十二

痙癇六十四

淋六十六

牙痛六十五

口臭六十七

小兒面上赤腫三十九

勞嗽四十一

吐血四十三

因藥燥熱四十五

瘻四十七

虛勞四十九

傷寒極熱五十一

赤目五十三

胞後嘔吐五十五

產前喘五十七

婦人二陽病五十九

惡寒實熱六十一

嘔逆不食六十三

濕形

痘六十八

留飲七十

黃病七十二

水腫七十四

停飲腫滿七十六

屈膝有聲七十八

濕嗽八十 燥兒八十一

濕瘡瘍八十三

洞泄八十五

暑泄八十七

水痘六十九

黃疸七十一

病發黃七十三

涌水七十五

濕痺七十七

白帶七十九

濕癬八十二

泄瀉八十四

大便少而頻八十六

腹滿面腫八十八

卷之七

燥形

臂麻不便八十九

孕婦便結九十一

腰脅痛九十三

大便燥結九十

偏頭痛九十二

寒形

因寒腰強九十四

感風寒九十六

寒痰九十八

寒疝九十五
凍瘡九十七

瀉痢惡寒九十九

內傷形

因憂結塊一百

不寐一百二

兒寐不寤一百四

收產傷胎一百六

背疽一百八

咽中刺塞一百十

腸澼下血百十二

伏驚一百十四

外傷形

孕作病治一百十五

落馬發狂一百十七

足門脢痛一百十九

杖瘡一百十六

太陽脛腫一百十八

膝脢跛行一百二十

病怒不食一百一

驚一百三

孕婦下血一百五

懷恐脇痛一百七

肺癰一百九

誤吞物咽中一百十一

水腫羘丸一百十三

杖瘡入水一百二十一

卷之八

內積形

傷冷酒一百二十二

茶癖一百二十四

痰氣一百二十六

冷積一百二十八

肥氣積一百三十一

停飲一百三十二

沉積疑胎一百三十四

外積形

瘤一百三十六

癰一百三十八

膠瘤一百三十七

痔一百三十九

心下沉積一百二十三

腹脹水氣一百二十五

胸膈不利一百二十七

積塊一百一百二十九

伏瘕一百三十一

積氣一百三十三

是胎非積一百三十五

卷之九

雜記九門

誤中涌法

嗽

濟

赤目

感風寒

誤中寒涼

經閉

下血

痢

臨變不惑

涌法

涌嗽

當禁不禁

病愈犯禁而死

不忌反思

不忌口得愈

不可忌口

高技常孤

羣言難正

謗吐

謗三法

謗峻藥

病人負德愈後吝財

同類妬才

羣口誣戴人

撮要圖

四因氣動

卷之十

五鬱風暑濕燥寒主病

六氣主治

五氣主治濕燥寒主治

大寒初氣至終氣小雪為病

十二經是動為病

風暑濕火燥寒六淫為病并治

六門病治諸方

內經濕變五法

金櫃十全之法

金櫃十全五泄後論已上之圖改校為篇法

卷之十一

治法雜論

風論

論火熱二門

濕熱門

風門

濕門

寒門

內傷

外傷治法

婦人風門

火類門

濕門

寒門

半產

小兒風門

二火類

卷之十二

三法六門

吐劑

三聖散

瓜蒂散

獨聖散

稀涎散

蔚金散

茶調散

獨仙散

碧雲散

常山散

汗劑

通聖散

雙解散

浮萍散

麻黃散

升麻湯

桂枝湯

下劑

導水丸

禹功散

通經散

神祐丸

琥珀丸

益胃散

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃仁承氣湯

無憂散

玉井散

牛黃通膈丸

水煮桃仁丸

內托丸

泄水散

牛黃化癬散

丁香化癢散

四生丸

玉燭散

三和湯

神芎丸

進食丸

牛黃白朮散

十棗湯

除濕丹

利膈丸

三一承氣湯

抵當丸

大陷胸湯

小陷胸湯

握宣丸

風門

防風通聖散

防風天麻散

防風湯

祛風丸

排風湯

小續命湯

消風散

搜風丸

川芎散

當歸川芎散

疎風丸

愈風餅子

通頂散

胃風湯

香芎散

鐵彈丸

暑門

瘡附

白虎湯

化痰玉壺丸

桂苓甘露散

益元散

玉露散

石膏散

辰砂丹

溫脾丸

溫脾散

桂苓白朮丸

濕門

嗽病附

五苓散

葶藶木香散

白朮木香散

大橘皮湯

神助散

桂苓白朮丸

桂苓白朮散

白朮調中湯

甯神散

人參補肺散

薏苡仁湯

香連丸

甯肺散

白朮散

益黃散

火門

涼膈散

瀉心湯

調胃散

芍藥蘖皮丸

清涼飲子

犀角散

黃連解毒湯

八正散

三黃丸

大金花丸

黃連清心湯

黃連木通丸

燥門

神功丸

麻仁丸

脾約丸
潤體丸

寒門

薑附湯

四逆湯

二薑湯

末附湯

大已寒丸

附子理中丸

平胃散

養脾丸

兼治於內者

大柴胡湯

小柴胡湯

柴胡飲子

防風當歸飲子

白朮湯

兼治於外者

桂枝湯

麻黃湯

升麻湯

五積散

青金散

獨治於內者

陷胸湯

大黃丸

備急丸

枳殼丸

蓮殼散

木香檳榔丸

導飲丸

五香連翹散

四物湯

又方

定志丸

小檳榔丸

獨治於外者

青金散

水澄膏

金絲膏

赴筵散

化癰丹

又方

煮肝散

小黃膏

木香檳榔散

又方

鉛白霜散

當歸散

葛根散

檳榔丸

瞿麥散治氣積方

拔毒散

魚膽丸

生肌散

麝香玉線子

通氣丸

消毒散

枯瘤方

箭刀藥

陽起石散

雄黃散

化斑湯

調治

無比山藥丸

香薷湯

妙功丸

茴香丸

人參調中湯

沉香降氣丹

當歸丸

石葦散

人參散

七宣丸

烏金散

卷之十三

劉河間先生三消論

神白散

胡粉散

三黃丸

經驗方

豬肚丸

葛根丸

人參白朮散

人參散

卷之十四

扁鵲華陀察聲色定死生訣要

診百病死生訣

病機

標本運氣歌

斷病人生死

辨十二經水火分治法
六陣十八反

運氣歌

治病
四因
五苦六年

卷之十五

世傳神效諸方目錄

瘡瘍癰腫第一

眼目疾證第三

解利傷寒第五

婦人雜病第七

心氣疼痛第九

腸風下血第十一

破傷風邪第十三

陰毒傷寒帶附

諸風疾證第十四

下痢泄瀉第十六

辟穀絕食第十八

水腫黃疸第十五
諸雜方藥第十七

太醫先生辭世詩仍附於後

儒門事親卷之十二

吐劑

三聖散

防風

去蘆三兩

瓜蒂

羅三兩

搏淨研破以繩卷定連紙剉細去紙用

蘆子遇另放末將滓炒微黃次入末一處同煎黃用

藜蘆

去苗

及心加減用之或一兩或半兩或一分

右各為簾末每服約半兩。以釐汁三茶盞先用二盞煎三五沸去釐汁次入一盞煎至三沸却將原二盞同一處熬二沸去滓澄清放溫徐徐服之不必盡劑以吐為度。

瓜蒂散

瓜蒂

七十箇

赤小豆

五箇

人參

半兩

甘草

半兩

錢五分

右為細末

每服一錢

或半錢

或二錢

量虛實加減用之

空心釐汁調下服之。

稀涎散

猪牙皂角

不蛀者去皮莖一兩灸用之

碌礪

藜蘆

半兩

右為細末每服半錢或一二錢幹開牙關漿水調下嚥之。

蔚金散

蔚金

滑石

川芎
兩半

右為細末。每服一二錢。量虛實加減。以蜜汁調下。空心服之。

茶調散
亦一名二仙散

瓜蒂不以多少。好茶中停。

右為細末。每服二錢。蜜汁調下。空心用之。

獨聖散

瓜蒂不以多少。

右為細末。每服一錢。或二錢。蜜汁調服之。腸痛加全蝎。頭痛加蔚金。

碧雲散

治小兒驚風有涎。

膽礬
半兩

銅青
一分

粉霜
一錢

輕粉
一分

右研為細末。每服一字。薄荷湯調下用之。如中風。用漿水調服。

常山散

常山
二兩

甘草
半兩

右為細末。水煎空心服之。

青黛散

猪牙皂角
箇玄胡索

青黛
少許

右為細末。鼻內灌之。其涎自出。

汗劑

防風通聖散

防風 川芎 當歸 茄藥 大黃 薄荷 麻黃去根不
石膏 黃芩 桔梗各一兩 滑石錢三甘草二兩 荆芥 白朮 山梔子各一兩
右為麞末。每服五七錢水一大盞。生薑三片。煎至七分去滓熱服。如涎嗽加半夏五
錢。生薑製過。

雙解散

通聖散與益元散相合中停。水一鍾。生薑豆豉葱白同煎。

浮萍散 治癩風

浮萍一兩 荆芥 川芎 甘草 麻黃根 已上各一兩。或加當歸芍藥
右為麞末。每服一兩水二盞。煎至七分。去滓溫服。汗出則愈。

升麻湯

升麻去土 葛根 芍藥 甘草炒 已上各一兩

右為麞末。每服三錢。水一盞半。煎至七分。去滓溫服。不拘時候。

麻黃湯

麻黃去根
兩

官桂鐵
兩

甘草乾錢
三錢

杏仁尖炒
二箇去皮
兩

右為釐末。每服三錢水一鍾煎至七分去滓溫服。

汗出自解

桂枝湯

桂枝一枝。芍藥一兩。甘草鐵
兩

右為釐末。每服三錢水一盞。生薑棗一同煎溫服。

下劑

導水丸

大黃一兩。黃芩一兩。滑石四兩。黑牽牛四兩。易取頭末。

甘遂一兩。去濕熱腰痛。泄水濕腫滿。久病則加。

白芥子一兩。去遍身走注疼痛。

加。朴硝一兩。退熱散腫毒止痛。久毒宜加。

郁李仁一兩。散結滯通關節。潤腸胃行滯氣。通血脈。

樟柳根一兩。去腰腿沉重。

右為細末。滴水丸梧桐子大。每服五十丸。或加至百丸。臨卧溫水下。

禹功散

黑牽牛頭末四兩。茴香炒一兩。

或加木香一兩。

右為細末。以生薑自然汁調一二錢。臨卧服。

通經散

陳皮去白

當歸一兩

甘遂

以麵包冷水浸過去麵培乾

右為細末。每服三錢。溫湯調下。臨卧服。

神祐丸

甘遂依前製過用

大戟培浸煮
醋乾用

芫花醋浸煮
各半兩

黑牽牛一兩

大黃一兩

右為細末。滴水丸。小豆大。每服五七十九。臨卧温水下。

琥珀丸

右以前神祐丸加琥珀一兩是也。

益胃散

甘遂依前製過用

右為細末。每服三兩。以獐猪腰子細批破。以鹽椒等物淹透爛切。摻藥在內。以荷葉裹燒熟。溫淡酒調服。

大承氣湯

大黃半兩

厚朴一兩

枳實一兩

芒硝一兩

右為麩末。每服三五錢。水一盞。煎至七分。去滓服。以意加減。

小承氣湯

大黃 厚朴 已上各

枳實 校

右為麩末同前煎服。

調胃承氣湯

大黃 甘草

朴硝 半兩

半兩

右為粗末每服五七錢水一盞煎三五沸去滓溫服食後。

桃仁承氣湯

桃仁一升去皮味

二箇

官桂

甘草

芒硝

已上各半兩

右剗如麻豆大每服三五錢水一大盞煎至七分去滓溫服。

玉井散

荅蓼根

兩

甘遂

製用

右為細末以射香湯調下二錢臨卧服。

水煮桃仁丸

黑牽牛頭末 醉瓜蒂末

二錢

雄黃

一錢水飛過用之

乾胭脂少許

右以黃水調麪為丸以水煮令浮熟取出冷水拔過射香湯水下。

無憂散

黃耆 木香 桑白皮 陳皮各半兩 胡椒 白术 木香各半兩

白牽牛頭末四兩

右為細末。每服三五錢。以生薑自然汗調下。食後。

泄水丸又方 陸半兩 藏用丸一料加芒硝半兩

大戟 芫花 甘遂 海帶 海藻 郁李仁 繢隨子各半兩

右為細末。水煮棗肉為丸。如小豆大。每服五七十丸。水下。

牛黃通膈丸

黑牽牛 大黃 木通各上各半兩

右為細末。水丸如黍粒。大量兒大小三五十丸。或百丸水下。

四生丸一名潤腸丸

黑牽牛 大黃 朴硝 皂角去皮弦 已上各等分

右為細末。水丸如梧桐子大。每服七八十九丸。食後溫水下。

內托散

大黃

牡蠣殼各半兩

甘草 鐵

瓜蔞節

右為末。水一大盞。煎三五沸。去滓露冷服。

藏用丸

大黃 黃芩二兩 各 滑石 黑牽牛四兩

右為末。水丸。桐子大。每服五十九。食後溫水下。

神芎丸

藏用丸一料。內加黃連薄荷川芎各半兩。水丸。桐子大。水下。

進食丸

牽牛兩 巴豆油心膜

右為末。水丸。每服二三十丸。食後隨所傷物送下。

牛黃白朮丸

治腰脚濕。

黑牽牛末 大黃二兩 各

白朮一兩

右為末。滴水丸。桐子大。每服三十九。食前生薑湯下。要利加至百丸。

玉燭散

以四物湯承氣湯朴硝各等分。水煎去滓。食前服之。

三和湯

以四物湯涼膈散當歸各中停。水煎服。

丁香化癬散

治小兒脾。

白丁香

蜜陀僧

船上硫黃一錢 各

礪砂半錢

輕粉訥

右研細末。每兒一歲服半錢。男病女乳調。女病男乳調。後用通膈泄。

抵當湯

水蛭十箇

盲蟲十箇足去

大黃兩

桃仁七枚皮尖搘

右剉如麻豆作一服。水二盞。煎至七分。去滓溫服。

抵當丸

盲蟲五箇

桃仁六箇

大黃三分

水蛭五箇

右為細末。只作一丸。水一大盞。煮一丸至七分。頓服之。

十棗湯

紫芫花醋浸者

甘遂各等分

大戟各等分

右為末。每服半錢。水一盞。棗十枚同煎。取半盞服。

除濕丹

檳榔

甘遂

威靈仙

赤芍藥

澤瀉

葶藶

各二兩

乳香另研

沒藥

已上各

黑牽牛末解一兩

大戟三兩

陳皮四兩去白

右為細末。麵糊和丸。如桐子大。每服三五十丸。水送下。

利膈丸

牽牛四兩生

槐角子炒一兩

木香一兩

青皮一兩

皂角去皮一兩

半夏二兩洗各

右為細末。生薑麪糊為丸。桐子大。每服四五十丸。水送下。

三、承氣湯

大黃一錢半。芒硝一錢半。厚朴去皮一錢半。枳實五兩。甘草一兩。

右剉如麻豆大。每服半兩水一大盞。生薑三片。煎至六分。入硝去滓熟服。

大陷胸湯

大黃一錢半。芒硝一錢半。甘遂末一錢半。

右以水一盞煮大黃至八分。去滓入硝。一沸下甘遂末。溫服。

小陷胸湯

半夏一錢五分。黃連一分。瓜蔞實一分。故用四分。

右剉麻豆大水二盞。先煮瓜蔞至一盞半。下諸藥取八分。去滓溫服。末利再服。

握宣丸

檳榔一錢半。肉桂一錢半。乾薑一錢半。附子一錢半。甘遂一錢半。良薑一錢半。薤子一錢半。巴豆半錢。鴆吐各半錢。入硫黃一錢。

右為細末。軟米和丸。桐子大。早辰先椒湯洗手。放溫揩乾。用生油少許。泥手心。男左女右。磨令熱。握一丸。宣一二行。

風門

防風通聖散

方在汗門中附

防風天麻散

防風 天麻

川芎 卷活 白芷

草烏頭 荆芥

當歸
培

甘草 滑石

白附子
半兩 各

右為末。熱酒化蜜少許。調藥半錢。加至一錢。少時覺藥行微麻為度。如作丸。煉蜜和彈子大。熟酒化下一丸。或半丸。

防風湯

防風 麻黃 獨活 秦艽
去蘆

黃芩 石膏

當歸 白朮
半兩 各

右為粗末。入半夏片子。令攪勻。每服四錢。水二中盞。入生薑七片。煎至一盞。去滓取清汁六分。入射香少許。帶熱食後服。

祛風丸

川烏皮
炮去

草烏
炮

天南星

半夏
製

蒸豆粉

甘草

川芎

殭蠶

藿香

荳苓香

地龍
土去

蝎梢
炒已上各一兩

川薑
解

右為細末。藥末一兩。用蒸豆粉一兩。以白麵二兩。滴水和丸如桐子大。陰乾。細嚼茶清下。三五丸。至五七丸。食後初服三丸。以漸加之。

排風湯

當歸
去蘆

杏仁
去皮尖
炒

防風
去蘆

白蘚皮

白朮

芍藥

官桂
皮去粗

川芎

甘草炒各三兩

獨活 麻黃去節各二兩

茯苓去皮各二兩

右為粗末。每用三錢水一盞半入生薑四片同煎至八分。去滓溫服。不拘時候。

小續命湯

麻黃去節各一兩

人參去蘆各一兩

黃芩

芍藥 川芎 甘草炙

杏仁湯泡去皮尖炒

防己

官桂去皮各一兩

防風去蘆各一兩

防子半兩去皮臍

右除附子杏仁外。合搗為粗末。後入二味攪勻。每服三錢。水一盞半。生薑五片。煎至一盞去滓。少熱服食後。

消風散

川芎

羌活去蘆各一兩

人參去蘆各一兩

白茯苓

白僵蠶炒

蟬殼同上各一兩配

陳皮各一兩

厚朴去粗皮薑製各一兩

右為細末。每服二錢。茶清調下。

川芎散

川芎

荆芥 甘菊 薄荷 蟬殼 蔓精子記融各一兩

甘草炙一兩

右為細末。茶酒任下三二錢。食後服。

搜風丸

一名人參半夏丸

人參 茯苓 南星祀吐各半夏

半夏

乾生薑

白礬

生凝水石一兩

蛤粉

薄荷

藿香

右為細末與藏用丸末各中停。水丸如菟豆大。每服三十丸。生薑湯送下。

當歸川芎散

當歸

川芎

以上各半兩

甘草

二兩

黃芩

四兩

薄荷

一兩

硝砂仁

一分

右為細末。溫水調下一二錢。

愈風餅子

川烏

炮裂川芎

甘菊

白芷

防風

細辛

天麻

羌活

荆芥

薄荷

甘草

炙

已上各一兩

疎風丸
右為細末。水浸蒸餅為劑。捏作餅子。每服三五餅子。細嚼茶酒送下。不計時候。

通聖散一料。加天麻羌活獨活細辛甘菊首烏各半兩。

右為細末。煉蜜和丸。彈子大。硃砂為衣。每服一丸。細嚼茶酒下。

通頂丸

石膏

川芎

瓜蒂

已上各等分

藜蘆

右為細末。鼻內噙之。

胃風湯

人參。蘆。茯苓。皮。川芎。官桂。當歸。芍藥。白朮。
右件各等分爲末。每服三錢水一盞。入陳粟米煎。空心服之。

香芎散

香附子。炒費芎。石膏。冰。白芷。甘草。薄荷。已上各一兩。

川烏。兩。解皮。臘法。

右爲細末。每服二錢。溫酒茶清調下無時。

鐵彈丸

地龍。土。防風。白膠香。沒藥。木蠻。皮。草烏頭。泡。浸。
當歸。已上各一兩。細墨。錢射。香研。

乳香。研。升麻。鎔。二。

右爲末。糯粥丸。彈子大。每服一丸。生薑酒下。

暑門。一瘡附。

白虎湯

知母。去皮。半。

甘草。一兩。

糯米。合。

石膏。都。另。飄。末。

右剉如麻豆。大粳米拌勻。另水一盞。煎至六分。去滓。溫服無時。日三四服。或眩暍者。
加半夏半兩。薑汁製過用之。

桂苓甘露散

官桂
人參

藿香

已上各半兩

茯苓

白朮

甘草

葛根

澤瀉

石膏

寒水石 已上各一兩

滑石

木香

右為細末。每服三錢。白湯點下。

新水或生薑湯亦可用之。

化痰玉壺丸

南星

半夏

天麻
生
半兩
祀吐各

白朮
兩
祀

右為細末。滴水丸如桐子大。每服三十九。用水一大盞。先煎令沸。下藥煮候浮即熟。濾出放溫。別用生薑湯下。不拘時服。

益元散

滑石

甘草
兩
兩

右為細末。每服三錢。蜜調新水送下。

玉露散 治暑。

寒水石

滑石

石膏

瓜蔞根

已上各四兩

甘草
兩
兩

右為細末。每服五錢。新水調下。

石膏散

石膏
兩
兩

人參

葛根

甘草
兩
兩

右為細末。新水蜜水調三錢。生薑湯亦可。

辰砂丹 治癰。

信錢一

雄黑豆六
兩箇或重

右為細末。朱砂為衣。端午日合。不令雞犬婦人見。每服一丸。無根水下。

溫脾丸

信錢一

甘草二
錢

紫河車三
錢

豆粉四
錢

右為末。滴水丸。每服半錢。作十九丸。臨卧無根水下。

溫脾散

紫河散

荳豆已上
各一兩

甘草解
砒一錢
另研

右為細末。後入砒研勻。每服半錢。新水盞調下。如是隔日發。直待臨卧服藥。如頻日發。只夜深服。忌葷酒魚兔等。

濕門

五苓散

官桂

澤瀉

猪苓去黑
衣

茯苓皮

白朮各半
兩

右為細末。每服二錢。熱湯或新水調下。

葶藶木香散

苦葶藶

茯苓去皮
皮

猪苓去皮已上
各一分

木香半
錢

澤瀉

木通

甘草 酸半官桂分一錢 滑石三錢

右為細末。每服三錢。生薑湯調下。食前服。

白术木香散

白术

猪苓

澤瀉

赤茯苓

各半兩

木香

柳柏

各三錢

陳皮去白兩 官桂一錢

滑石三兩

右為細末。每服五錢水一盞。生薑三片。同煎至六分。溫服食後。

大橘皮湯

橘皮一兩

木香分一

滑石分一

檳榔三錢

茯苓兩

猪苓皮去黑澤瀉

白术

官桂

已上各半兩

甘草二錢

右為末。每服五錢水一盞。生薑五片煎至六分。去滓溫服食後。

神助散

苦葶藶

黑牽牛

取頭末用之澤瀉

猪苓二兩

去皮

椒目

右為細末。每服葱白三莖漿水一盞。煎至半盞。入酒半盞。調藥三錢。絕早面東服之。

桂苓白术丸

官桂

茯苓

半夏

已上各一兩

白术

乾生薑分一

橘皮去

澤瀉

黃連

各半兩

黃柏二錢

右為末。麪糊為丸。如小豆大。每服三五十丸。薑湯食後服之。

桂苓白朮散

官桂

茯苓

白朮

已上各半兩

甘草

澤瀉

石膏

寒水石一兩

滑石二兩

右為細末。熱湯調三錢。新水生薑湯亦可。食後服。

白朮調中湯

白朮

茯苓

橘皮去白

澤瀉半兩

甘草一兩

乾薑炒

官桂

硝砂仁

藿香

已上各一分

右為末。白湯化蜜少許。調下二錢。無時。煉蜜每兩作十九丸。名曰白朮調中丸。

甯神散治嗽。

御米殼

二兩
蜜炙

人參

苦草莖

已上各一兩

右為末。入烏梅同煎。三五沸。去滓稍熱服食後。

甯肺散

御米蜜去穢炒

甘草

乾薑

當歸

白朮

陳皮

已上各一兩

右為末。煎薑汁調三錢。

人參補肺散

人參

麻黃
葛

白朮

防己

防風

各等分

桑白皮
倍

右剉咬咀以漿水一碗煎至半去滓溫服每用半兩各秤過

白朮湯

白朮

甘草

當歸

陳皮

桔梗

枳殼

各等分

右為粗末水煎去滓溫服三五錢。

薏苡仁湯

桔梗
一兩

甘草
兩

薏苡仁
三兩

右剉如麻豆大每服五錢水煎入糯米為引米軟為度食後服之。

益黃散 治小兒痢

陳皮
兩

青皮

柯子肉

甘草
半兩

丁香
二錢

右為細末每服二錢水煎食前服之。

香連丸

木香

柯子肉
炒黃連

各半兩

龍骨
二錢

右為細末飯丸如黍米大每服二十丸米飲湯下。

火門

涼膈散

大黃兩

連翹四錢

甘草

黃芩

薄荷

朴硝

山梔

已上各二兩

右粗末每服三五錢水一盞入蜜竹葉煎去滓溫服無時。

黃連解毒湯

黃連

黃藥

黃芩

大梔子

已上各等分

右剗為麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服之。

瀉心湯

大黃

甘草

當歸

芍藥

荆芥

麻黃

已上各一兩半

白术二錢

八正散

右為細末每服二錢水二盞生薑薄荷少許同煎至七分去滓溫服。

大黃

瞿麥

木通

扁蓄

車前子

甘草

山梔子

已上各一兩

滑石二錢

加木香一兩尤佳

右為粗末每服三五錢水一盞入燈心煎至七分去滓溫服。

調胃散 治傷寒吐逆四肢厥冷。

水銀

船上硫黃

各半兩

右二味先研硫黃極細次入水銀同研至深黑每服一錢病重者二錢溫米飲調服。

不拘時。

三黃丸

大黃

黃芩

黃柏

已上各等分

右為末水丸每服三十九水下

又方去黃芩用黃連

芍藥蘖皮丸

芍藥白

黃柏皮各一兩

當歸

黃連 各半兩

右為末水丸新水下三十丸加梔子減大黃名梔子名花丸

大金花丸

黃連

黃蘖

黃芩

大黃

各等分

清涼飲子
大黃蒸 赤芍藥 當歸 甘草炒 已上各等分
右為末每服一二錢水一盞煎至七分去滓溫服食後以意加減。

黃連清心湯
涼膈散加黃連半兩是也。

屏角散

黃連

大黃

芍藥

屏角

甘草

各等分

右為粗末。

每服五錢水一盞煎至七分去滓無時溫服之。

黃連木通丸

治心經蓄熱夏至則甚。

黃連
兩

木通
兩

右為末生薑汁打麪糊和丸每服三十九食後燈心湯下日三服。

燥門

神功丸

大黃

麪裹蒸

柯子皮

麻子仁

搗人參去蘆

已上各一兩

右為細末入麻子仁搗研勻煉蜜丸桐子大每服二十九溫水下或酒或米飲下食後臨卧如大便不通加服

脾約丸

麻仁

錢半兩

枳實

炮炒

厚朴

去粗皮炒黃

已上各二兩

大黃

錢四兩

杏仁

去皮炒黃

二錢

右為細末煉蜜桐子大每服二十九臨卧溫水送下。

麻仁丸

郁李仁 去核搗皮

火麻仁 搗二味各二兩

大黃 二兩半生半熟

檳榔 半兩

乾山藥

防風 去蘆

枳殼 七錢炒搗

羌活

木香 一錢半

輕粉

沙門

訥

右為細末。入另搗者三味攪勻。煉蜜丸如桐子大。每服二十丸至三十丸。溫水下。食後牽牛滑石。

潤腸丸

郁李仁

大黃

桂心

黑牽牛當歸

黃蘖

益母草

半兩

輕粉

訥

右為細末。

滴水丸

如桐子大。

每服三十丸

至四十丸

溫酒

或生薑湯

下。

寒門

薑附湯

乾薑

二兩搗爲粗末

附子

一兩生皮臍細切去

右二味攪勻。每服三錢。水一盞半。煎至一盞。去滓溫服。食前。

四逆湯

甘草

三兩

乾薑

二兩搗

附子

一兩生用去皮

右為粗末。每服三五錢。水一盞半。煎至一盞。去滓溫服。無時。

二薑湯

良薑

乾薑

炮

二味各三兩

右為細末。酒煮糊為丸。桐子大。每服三十九。空心米飲湯下。

木附湯

黑附子一兩 煮一白术半兩

甘草七錢半錢

右為細末。每服三五錢水一盞半。生薑五片。棗二枚。劈破同煎至一盞去滓溫服。食後。

大已寒丸

附子炮去皮臍

川烏頭炮去皮臍黃作

乾薑炮

良薑炒

官桂去皮粗

吳茱萸已上一兩

右為細末。醋糊為丸。桐子大。每服五十九。米飲下。食前。

理中丸

人參去盧

白术
乾薑

甘草炙

附子炮去皮臍

已上各一兩

右為細末。煉蜜為丸。每兩作十九。彈子大。每服一丸。以水一盞化破。煎至七分。稍熱空心服之。

平胃散

厚朴一錢

陳皮二味各三兩

蒼朮五錢浸

甘草三兩炒

右為末。每服二錢。水一盞。生薑三片。棗二枚。煎至七分。去滓。食前溫服。

養脾丸

乾薑炮

硝砂各二兩

茯苓皮

人參去蘆

麥蘖炒各一兩

白朮兩

甘草炒兩半

右為細末。煉蜜為丸。每兩作八丸。每服一丸。細嚼生薑湯下。

兼治於內者

大柴胡湯

柴胡四兩

黃芩

赤芍藥各一兩半

半夏錢半兩

枳實二錢

大黃一兩

右為粗末。入半夏片子。每服三錢。水一盞半。入生薑五片。棗一枚。煎至一中盞。濾去

滓溫服。食後

小柴胡湯

柴胡四兩去蘆

黃芩

人參

半夏湯洗次切片

甘草

已上各一兩半

右為粗末。每服三錢。水一盞半。生薑五片。棗一枚。劈破同煎至七分。去滓溫服。不拘時候。

柴胡飲子

柴胡

人參

黃芩

甘草

大黃

當歸

芍藥

卷十一
十三
已上各半兩

右為粗末。每服三錢。水一盞。生薑三片。煎至七分。去滓溫服。

防風當歸飲子

柴胡 人參 黃芩 防風 甘草 茯苓 大黃 當歸

滑石 已上各一兩

右為粗末。每服三五錢。生薑三片。水一盞。煎至七分。去滓溫服。不拘時候。

白朮湯 治孕婦刺嘔吐血。

白朮 黃芩 當歸 各等分

右為末。每服二三錢。水煎食前服。

兼治於外者

桂苓湯

麻黃湯

升麻湯

已上三方在前汗法中附

五積散

蒼朮四錢

桔梗四錢

枳殼燬

陳皮二味各六錢

各

白芷

川芎

當歸

甘草半錢

官桂去粗皮一錢

半夏湯浸

茯苓三錢

麻黃去節一錢

厚朴一錢

乾薑

各四錢

右除官桂。桂芷殼另為末外。以慢火炒令黃色為末。與官桂等攪勻。每服三錢。水一盞。

半人生薑五片。葱白三寸。鹽豉七粒。同煎七分。去滓溫服無時。

青衿散 治咽喉

益元散加薄荷。青黛。生蜜丸如彈子大。噙化。

獨治於內者

陷胸湯

太黃半兩 芒硝錢半兩八 甘遂一錢另

右以水三盞先煮大黃至一盞去滓下芒硝令泄次下甘遂末放溫服之。

大黃丸

大黃

黑牽牛

枳殼

木通

已上各一兩

右為末滴水為丸如桐子大每服三十丸食後以生薑湯下。

備急丸

巴豆

油皮

大黃

乾薑

炮 已上各一兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服三丸溫水下不拘時服。

枳殼丸

商枳殼一兩

炒

牽牛頭末四

兩

右為細末水丸如桐子大每服三十九食前溫酒或生薑湯下。

蓮殼散 治血崩。

機皮燒灰

蓮殼燒灰存性二味兩

香附子炒三兩

右為末米飲調下三四錢食前。

木香檳榔丸

木香 檳榔

青皮

陳皮

廣茂燒

黃連燒

已上各一兩

黃連

大黃三香附子炒

牽牛炒四

右為細末水丸如小豆大。每服三十丸。食後生薑湯送下。

導飲丸

青皮

陳皮

京三棱炮

廣茂炮

黃連

枳殼炒

已上各一兩

大黃

黃藥

已上各三兩

香附子炒

黑牽牛

已上各四兩

右為細末桐子大。用水丸。每服三五十丸。食後生薑湯送下。

五香連翹散

丁香

青木香

沉香

熏陸香

麝香

木通

連翹

桑寄生

獨活

升麻

大黃

已上各等分

右為粗末以竹瀝煎五七錢。未利加大黃去滓稍熱。以利為度。

四物湯

川芎

當歸

熟地黃

芍藥

已上各等分

右為粗末。每服三四錢。水一盞。煎三五沸去滓。空心溫服。加草龍膽防己。名一醉散。
治目暴發。加蒲黃。治婦人漏血。

當歸散 治血崩。

當歸

龍骨

香附子

三錢

棲毛灰鍬

右為末。米飲調三四錢。空心服。

又一方。當歸白芍藥香附炒各等分為末。米飲湯調下。食前服。

又當歸散 行經。

當歸

杜蒺藜

各等分

右為末。米飲湯調服。食前。

葛根散 解酒毒。

甘草

乾葛花

葛根

硝砂仁

貫眾

各等分

右為粗末。水煎三五錢。去滓服之。

定志丸

柏子仁

人參

茯苓

遠志心

茯神

酸棗仁

右為末。酒糊丸。小豆大。每服五十九。生薑湯下。

檳榔丸

檳榔一錢半

陳皮兩一

木香半錢

牽牛
解

右為末醋糊丸桐子大每服三十九生薑湯下

小櫻根丸

枳殼

陳皮

卷之三

已上各等分

右為細末水丸。食後生薑湯下三四十九。

瞿麥散 治酒積

甘遂

半兩

葛根

麥篋

已上各一兩

右為末每服二錢酒調服

治氣積方
香附子為末。生薑湯調下三二錢。

獨治於外者

青金散

芒硝
錢半

青僊
鑑

乳香

沒藥

各少許

右為細末。鼻內噙之。

拔毒散

寒水石不以多少燒令赤

右研為末。以新水調雞翎掃痛處。

水澄膏

雄黃三錢水飛

黃連一兩

蔚金二錢

黃柏半兩

大黃一兩

黃丹半兩水飛

右為細末。量所腫處用藥多少。新汲水半盞炒藥在內。須臾藥沉慢去其澄者。水盡然後用槐柳枝攬藥數百餘轉。如麵糊相似。勻以小紙花子。攤藥塗腫處。更以雞翎擦涼水。不住掃之。

魚膽丸

草龍膽

青鹽

腦子

已上各半兩

黃連去鬚一兩

硼砂

南硼砂

射香

鯉魚膽

已上各二錢

右除草龍膽鯉魚膽外。同為細末。先將草龍膽同微研破。以河水三升浸春秋二宿。夏一宿。冬三宿。將浸者取揉極爛。用絹袋濾去滓。于石器內慢火熬成膏子。點于水內不散。用指頭捏開有絲乃膏子成。然後入魚膽拌勻。將膏和上藥件末作劑丸如粟米。徐徐點可視之。

金絲膏

黃丹

代赭石

玄精石

已上各半兩

爐甘石燒一兩

腦子餅

黃連

蕤仁去皮

二味各三錢

白丁香

南硼砂二味各一錢

硼砂

右除硼砂腦子外。同為細末。以河水一升。白砂蜜三兩。同熬三五沸。然後入藥末。再熬至半茶盞以上。用綿子濾過去。滓次用硼砂腦末攪勻。定磁器內放。徐徐點眼。大有神効。

生肌散

黃連錢三

蜜陀僧兩半

乾胭脂錢一

雄黃錢一

菜豆粉錢二

輕粉錢一

右為細末。以溫漿水洗過。用無垢軟綿搘淨藥貼之。有大效矣。

赴筵散

五倍子

蜜陀僧

已上各等分

右為細末。先入漿水漱過乾貼。

麝香玉線子

豆粉兩半

信錢

枯白礬錢一

右三件同研。入射香半錢。再研為細末。滴水和于手背上。燃作線。如用時。先以漿水嗽了口。用毛翎子縫中淨臨。卧乾貼。或為線子。住于縫中。

化癰丹 治贅

海帶

海藻

海蛤

昆布

已上四味皆焙

澤瀉炒

連翹

已上並各等分

猪膾

羊膾

各十枚

右為細末。蜜丸如雞頭大。臨卧噙化一二丸。

通氣丸同上所治

海藻

海帶

昆布

木通

甘草

已上各一兩

柯子

薄荷

已上各半兩

杏仁少許。皮尖用之。煮浸去

右為細末。煉蜜和丸。每夜噙化一丸。忌油膩物。

又方

海藻

海帶

昆布

澤瀉

木通

豬屬

羊屬

各五枚

海蛤

連翹

右為細末。研麝為丸。如雞頭大。每服一丸。臨卧噙化下効。

消毒散治喉腫

當歸

荆芥

甘草

各等分

右為末。水煎三五錢。去滓熱嗽之。

煮肝散治雀目

青蛤粉

夜明砂

穀精草

各等分

右為細末。每服五七錢。猪肝內煮熟。細嚼茶清下。

枯瘤方

硝砂

粉霜

雄黃

已上各二錢

輕粉

沒藥

乳香

已上各一錢

土黃三錢

射香許

右為細末。以津調塗瘤頂外邊。歌一葉先花紙貼之上。以小黃膏貼之。

小黃膏

黃柏

黃芩

大黃

已上各等分

右為細末。以水調為糊。比前藥大一遭三日。至八九上不取。直候可取。

剪刀藥

石灰年新陳

龍骨四兩

刺薊一小束

右為末。杵作泥為餅子。或為散貼。端午日合。

木香檳榔散

木香

檳榔

黃連

乳香

輕粉

蜜陀僧

已上各等分

右為細末。乾摻之。先以口噙漿水洗之。

又方加黃柏

射香

陽起石散

陽起石燒

右研末。新水調塗腫處。

當歸

香附子炒

杜蒺藜

芍藥

各等分

右為末。酒糊為丸如小豆大。每服三十九丸。米飲送下。

香薷湯

香薷五錢去土

厚朴五錢
薑製

白扁豆二錢半
生炒

右為末。每服三錢。水一盞。入酒煎去滓溫服。

石葦散

石葦毛

木通

各一兩

當歸

甘草

王不留行

以上各一兩

滑石

白术

瞿麥

葵子

芍藥

已上各三兩

右為細末。每服二錢。煎小麥湯調下。

妙功丸

京三棱炮一兩

川烏去皮四錢生

大黃一兩

已上同為細末。好醋半升熬膏。不破積

水丸

神曲

麥蘖

已上各一兩

乾薑二錢炒

巴豆心去皮油

半夏兩
醋
解

茴香一炒
香

官桂

牽牛三兩
揀淨

右為細末。用膏丸小豆大。生薑湯下十九十五丸。溫涼水亦可以。意加減。以利為度。

人參散

石膏

甘草

已上各一兩

滑石

寒水石

人參

右為末。每服二錢。溫水調下。食後。

茴香丸

茴香八兩

川練子炒

川烏皮炮去

威靈仙土洗去

防風蘆

陳皮各三兩

地龍

土微炒烏藥五兩

赤小豆八兩

右為末酒糊為丸。每服三五丸。茶酒下。

七宣丸

大黃

濕紙裹煨六兩

枳實炒

四兩

木香

柴胡蘆

柯子皮

各五兩

桃仁

去皮尖炒六兩

甘草炒四兩

右為末。煉蜜和丸如桐子大。每服三十九。酒下。

人參調中湯

沉香

兩

白豆蔻一兩用仁

甘草分

腦子一錢

射香錢半

人參半兩

右為細末。每服半錢。用沸湯點服。或入生薑鹽少許。食後服。

烏金散

當歸

兩

自然銅末

色者煅為
醋熬一兩

烏金石

鐵炭三
也兩

大黃小一兩童子
便浸用

右為末。每服二錢。紅花酒半盞。童子小便半盞。同調下。食前日二服。

沉香降氣湯

沉香

木香

硝砂仁

白豆蔻仁

青皮去白

陳皮去白

廣茂燥

枳實燒

已上各一兩

羅白子另研一兩

黑牽牛去土二兩

大黃炒二兩

右為末。生薑汁浸蒸餅為丸。如桐子大。每服三十丸。橘皮湯下。

枳术丸

治氣不下降。胸膈滿悶。

枳實燒

白术各半兩

右為細末。燒飯為丸。如桐子大。每服五十丸。諸飲送下。

儒門事親卷之十三

劉河間先生三消論

因在前此書未傳於世恐為沉沒故刊而行之

易言天地自太虛至黃泉有六位。內經言人之身自頭至足亦有六位。今余又言人胸腹之間自肺至腎又有六位。人與天地造化五行同一爐備。知彼則知此矣。故立天之氣曰金與火。立地之氣曰土與水。立人之氣曰風與火。故金與火合則熱而清。水土合則濕而寒。風火合則溫而炎。人胸腹之間亦猶是也。肺最在上為金主燥清。心次為君火主熱。肝又次之為風木主溫。膽又次之為相火主極熱。脾又次之為濕土主涼。腎又次之為黃泉為寒水主寒。故心肺象天。脾腎象地。肝膽象人。不知此者不可與論人之病矣。夫土為萬物之本。水為萬物之元。水土合德以陰居陰同處乎下以立地為氣。萬物根於地。是故水土濕寒。若燥熱陽實則地之氣不立。萬物之根索澤而枝葉枯矣。五常政大論曰。根於中者命曰神機。是為動物根本在於中也。根本者脾胃腎也。食入胃則脾為布化氣味。榮養五藏百骸。故酸入肝而養筋膜。苦入心而養血脈。甘入脾而養肌肉。辛入肺而養皮毛。鹹入腎而養骨髓。五氣亦然。故清養肺。熟養心。溫養肝。濕養脾。寒養腎也。允此五味五氣。太過則病。不及亦病。惟平則常安矣。故六節藏象論曰。五味入口藏於腸胃。味有所藏。以養五氣。氣和而生津液。相成神乃自生。是其理也。又太陰陽明論云。脾病而四肢不用者何也。岐伯曰。四肢皆稟氣于胃。而不得至。經必因于脾胃。

乃稟也。今脾病不能為胃行其津液。不得稟水穀氣。脾日以衰。脈道不利。筋骨肌肉皆無氣以生。故不用焉。帝曰。脾不主時。故也。岐伯曰。脾者土也。治中央。常以四時長四臟。各十八日寄治。不得獨主于時也。脾藏者常着胃土之精也。土者生萬物而法天地。故上下至頭足。不得獨主于時也。帝曰。脾與胃以膜相連爾。而能行其津液何也。岐伯曰。足太陰者三陰也。其脈貫胃屬脾絡嗌。故太陰為之行氣于三陰。足陽明者表也。五臟六腑之海也。亦為之行氣于三陽。臟腑各因其經而受氣以益陽明。故為胃行其津液。四肢不得稟水穀氣。日以衰陰。道不利筋骨肌肉。皆無氣以生。故不用焉。不用者謂不能為之運用也。由是觀之。則五臟六腑。四肢百骸。皆稟受于脾胃。行其津液。相與濡潤滋養矣。後之醫者。欲以燥熱之劑。以養脾胃。滋土之氣。不亦外乎。况消渴之病者。本濕寒之陰氣。極衰燥熱之陽氣。太甚。更服燥熱之藥。則脾胃之氣竭矣。叔世不分五運六氣之虛實。而一概言熱為實。而虛為寒。彼但知心火陽熱一氣之虛實。而非臟腑六氣之虛實也。蓋肺本清虛。則溫心本熱虛。則寒。肝本溫虛。則清。脾本濕虛。則燥。腎本寒虛。則熱。假若胃冷為虛者。乃胃中陰水寒氣實甚。而陽火熱氣衰虛也。非胃土濕氣之本陰水虛也。故當以寒藥瀉胃中之實火。而養其虛水。然此皆補瀉胃中虛熱水火所乘之邪。非胃為濕者之本。其餘例同法。夫補瀉脾胃濕土之水氣者。潤其濕者。是補濕燥。

其濕者是瀉濕。土本濕故也。凡臟腑諸氣不必腎水獨當寒。心火獨當熱。要知每臟每腑諸氣和同。宣而平之可也。故余嘗謂五常之道。陰中有陽。陽中有陰。孤陰不長。獨陽不成。但有一物。皆備五行。遞相濟養。是謂和平。交至克伐。是謂衰興。變亂失常。患者由行。故水少火多。為陽實陰虛而病熱也。水多火少。為陰實陽虛而病寒也。其為治者。瀉實補虛。以平為期而已矣。故治消渴者。補腎水。陰寒之虛。而瀉心火。陽熱之實。除腸胃燥熱之甚。濟身津液之衰。使道路散而不結。津液生而不枯。氣血利而不滯。則病日已矣。况消渴者。本因飲食服餌失宜。腸胃乾涸。而氣液不得宣平。或耗亂精神。過違其度。或因大病陰氣損而血液衰虛。陽氣悍而燥熱鬱甚之所成也。故濟衆云。三消渴者。皆由久嗜鹹物。恣食炙燭。飲酒過度。亦有年少服金石丸散。積久石熱結于胸中。下焦虛熱。血氣不能制。石熱燥甚于胃。故渴而引飲。若飲水多而小便多者。名曰消渴。若飲食多而不甚饑。小便數而漸瘦者。名曰消中。若渴而飲水不絕。腿消瘦而小便有脂液者。名曰腎消。如此三消者。其燥熱一也。但有微甚耳。余聞世之方多一方而通治三消渴者。以其善消水穀而喜渴也。然叔世論消渴者。多不知本。其言消渴者。上實熱而下虛冷。上熱故煩渴多飲。下寒故小便多出。本因下部腎水虛而不能制其上焦心火。故上實熱而下虛冷。又曰水數。一為物之本。五行之先。故腎水者。人之本命之元。不可使之衰弱。根本不堅。則枝葉不茂。元氣不固。則形體不禁。消渴病者。下部腎水極冷。若更服

寒藥則元氣轉虛。而下部腎水轉衰。則上焦心火亢甚。而難治也。但以暖藥補養元氣。若下部腎水得實而勝。退上焦火。則自然渴止。小便如常。而病愈也。若此之言。正與仲景相反。所以巧言似是。于理實違者也。非徒今日之誤。誤已久哉。又如蔣氏藥證病原中論消渴消中消腎病。曰三焦五臟俱虛熱。惟有膀胱冷似水。又曰腰腎虛冷日增重。又曰膀胱腎臟冷如泉。始言三焦五臟俱虛熱。惟有膀胱冷似水。復言五臟亦冷。且腎臟水冷。言為虛。其餘熱者。又皆言其虛實陰陽興衰安有此理。且其言自不相副。其失猶小。至於寒熱差殊。用藥相反。過莫大焉。或又謂腎與膀胱屬水。虛則不能制火。虛既不能制火。故小便多者愈失之遠矣。彼謂水氣實者。必能制火。虛則不能制火。故陽實多者。非謂此也。何哉。蓋燥熱太甚。而三焦腸胃之腠理。怫鬱結滯。致密壅塞。而水液不能滲泄。浸潤于外。榮養百骸。故腸胃之外。燥熱太甚。雖復多飲于中。終不能浸潤于外。故渴不止。小便多出者。如其多飲。不能滲泄于腸胃之外。故數溲也。故余盡言原病式曰皮膚之汗孔者。謂泄汗之孔竅也。一名氣門者。謂泄氣之門戶也。一名腠理者。謂氣液之隧道紋理也。一名鬼門者。謂幽冥之門也。一名玄府者。謂玄微之府也。然玄府者無物。不有人之臟腑皮毛肌肉筋膜骨髓爪牙。至于萬物悉皆有之。乃出入升降道路門戶也。故經曰出入廢。則神機化滅。升降息。則氣立孤危。故非出入。則無以生長壯老。

非升降則無以生長化收藏。是知出入升降無器不有。故知人之眼耳鼻舌身意神識能為用者皆由升降出入之通利也。有所閉塞則不能用也。若目無所見耳無所聞鼻不聞香舌不知味筋痿骨痺爪退齒腐毛髮墮落皮膚不仁腸胃不能滲泄者悉由熱氣怫鬱玄府閉塞而致津液血脈榮衛清氣不能升降出入故也。各隨鬱結微甚而有病之大小焉。病在表則怫鬱腠理閉密陽氣不能散越故燥而無汗而氣液不能出矣。叔世不知其然故見消渴數溲妄言為下部寒爾豈知腸胃燥熱怫鬱使之然也。予之所以舉此世為消渴之證乃腸胃之外燥熱否閉其滲泄之路水雖入腸胃之內不能滲泄於外故小便數出而復渴此數句足以盡其理也。試取內經凡言渴者盡明之矣。有言心肺氣厥而渴者有言肺脾而渴者有言脾熱而渴者有言腎熱而渴者有言胃與大腸熱結而渴者有言脾瘅而渴者有言小腸瘅熱而渴者有因病瘧而渴者有因肥甘不藥而渴者有因醉飽入房而渴者有因遠行勞倦遇大熱而渴者有因傷害胃乾而渴者有因腎熱而渴者有因病風而渴者雖五臟之部分不同而病之所遇各異其歸燥熱一也。

所謂心肺氣厥而渴者厥論曰心移熱于肺傳為膈消注曰心熱入肺久而傳化內為膈熱消渴多飲也。所謂肝脾而渴者脾論曰肝脾者夜卧則驚多飲數小便如脾熱而渴者痿論曰脾氣

熱則胃乾而渴。肌肉不仁發為瘞渴。

所謂腎熱而渴者。刺熱論曰。腎熱病者。先腰痛。脈酸。若渴數飲身熱。熱論曰。少陰脈貫腎。絡於肺。繫舌本。故口燥口乾而渴。叔世惟言腎虛不能制心火。為上實熱而下虛冷。以熱藥溫補腎水。欲令勝退心火者。未明。陰陽虛實之道也。夫腎水屬陰而本寒。虛則為熱。心火屬陽而本熱。虛則為寒。若腎水陰虛。則心火陽實。是謂陽實陰虛。而上下俱熱明矣。故氣厥論曰。腎氣衰。陽氣獨勝。宣明五氣論曰。腎惡燥。由燥腎枯水涸藏。氣發時論曰。腎苦燥。急食辛以潤之。夫寒食屬陰能養水而瀉心。熱物屬陽能養火而耗水。今腎水既不勝心火。則上下俱熱。奈何以熱藥養腎水。欲令勝心火。豈不繆哉。又如胃與大腸熱結而渴者。陰陽別論二陽結為之消。注曰。陽結胃及大腸。俱熱結也。腸胃藏熱。善消水穀。又氣厥論曰。太陽移熱于胃。善食而瘦。脈要精微論曰。痺成為消。中善食而瘦。如腸痺而渴者。數飲而不得中。氣喘而爭。時發飧泄。夫數飲而不得中。其大便必不停留。然則消渴數飲而小便多者。止是三焦燥熱。佛鬱水液不能浸潤于周身故也。或熱甚而膀胱佛鬱。不能滲泄。水液妄行。而面上腫也。如小腸痺熱而渴者。舉痛論曰。熱氣留于小腸。腸中痛。痺熱。焦渴。則便堅。不得出矣。注曰。熱滲津液而小便堅矣。如言病瘞而渴者。瘞論曰。陽實則外熱。陰

虛則內熱。內外皆熱則喘而渴。故欲飲冷也。然陽實陰虛而為病熱。法當用寒藥養陰瀉陽。是謂瀉實補衰之道也。如因肥甘石藥而渴者。奇病論曰。有口甘者病名為何。岐伯曰。此五氣之所溢也。病名脾痺。痺為熱也。脾熱則四臟不稟。故五氣上溢也。先因脾熱。故曰脾痺。又經曰。五味入口藏于胃。脾為之行其精氣。津液在脾。故令人口甘也。此肥美之所發也。此人必數食甘美而多肥也。肥者令人內熱。甘者令人中滿。故其氣上溢轉而為消渴。通乎虛實論曰。消痺仆擊偏枯瘻厥氣滿發逆肥貴之人膏梁之疾也。或言人惟胃氣為本。脾胃合為表裏。脾胃中州。當受溫補。以調飲食。今消渴者。脾胃極虛。益宜溫補。若服寒藥。耗損脾胃本氣。虛乏而難治也。此言乃不明陰陽寒熱虛實補瀉之道。故妄言而無畏也。豈知腹中論云。帝曰。夫子數言熱中消中。不可服芳草石藥。石藥發癲。芳草發狂。言多飲數溲。謂之熱中。多食數溲。謂之消中。多喜曰癲。多怒曰狂。芳美味也。石謂英乳。乃發熱之藥也。經又曰。熱中消中。皆富貴人也。今禁膏粱是不合其心。禁芳草石藥是病不愈。願聞其說。岐伯曰。芳草之味美。石藥之味悍。二者之氣急疾堅勁。故非緩心和人。不可服此二者。帝曰。何以然。岐伯曰。夫熱氣慄悍。藥氣亦然。所謂飲一溲二者。當肺氣從水而出也。其水穀之海竭矣。凡見消渴。便用熱藥。誤人多矣。故內經應言渴者皆如是。豈不昭晰歟。然而猶有惑者。諸氣過極反勝也者。是以人多誤也。如陽極反似陰者是也。若不明標本。認似為是。始終乖矣。故凡見下部覺冷。兩

膝如冰此皆心火不降。狀類寒水。宜加寒藥。下之三五次。則火降水升。寒化自退。然而舉世皆同執迷。至如易素二書。棄如朽壞。良可悲夫。故處其方。必明病之標本。達藥之所能通。氣之所宜。而無加害者。可以制其方也。已所謂標本者。先病而為本。後病而為標。此為病之本末也。標本相傳。先當救其急也。又云。六氣為本。三陰三陽為標。蓋為病臟病最急也。又云。六氣為胃之本。假若胃熱者。胃為標。熱為本也。處其方者。當除胃中之熱。是治其本也。故六氣乃以甚者為邪。衰者為正。法當瀉甚。補衰以平為期。養正除邪。乃天之道也。為政之理。補賤之義也。大凡治病。明知標本。按法治之。何必謀于衆。陰陽別論曰。謹熟陰陽。無與衆謀。標本病傳論曰。知標知本。萬舉萬當。不知標本。是謂妄行。至真要大論曰。知標知本。用之不殆。明知逆順。正行無問。不知是者。不足以言診。適足以亂經。故大要曰。粗工嘻嘻以為可知。言熱未已。寒病復起。同氣異形。迷診亂經。此之謂也。夫標本之道。要而博。小而大。可以言一而知百。言標與本易而弗損。察本與標。氣可令調。明知勝復為萬民式。天之道畢矣。天元紀大論曰。至數極而道不惑。可謂明矣。所謂藥之巧能者。溫涼不同。寒熱相反。燥濕本異。云云前已言之矣。斯言氣也。至于味之巧能。如酸能收。甘能緩。辛能散。苦能堅。鹹能軟。酸屬水也。燥金主于散落而木反之。土濕主於緩而水勝之。故能然也。若能燥濕而堅火者。苦也。易曰。燥萬物者莫燥于火。凡物燥則堅也。甘能緩。苦急而散結。甘者土也。燥能急結。故緩則急。散也。辛能散抑散。

結潤燥辛者金也。金主散落。金生水故也。况抑結散。則氣液宣行。而津液生也。藏氣發時論曰。腎苦燥。急食辛以潤之。開腠理。致津液。通氣也。鹹能軟堅。鹹者水也。水潤而柔。故勝火之堅矣。此五臟之味也。其為五味之本也。淡也。淡胃土之味也。胃土者地也。地為萬物之本。胃為一身之本。天元紀大論曰。在地為化。生五味。故五味之本淡也。以配胃土。淡能滲泄利竅。夫燥能急結。而甘能緩之。淡為剛土。極能潤燥。緩其急結。令氣通行。而致津液滲泄也。故消渴之人。其藥與食皆宜淡劑。至真要大論曰。辛甘發散為陽。酸苦澀泄為陰。鹹味涌泄為陰。淡味滲泄為陽。六者或散或收。或緩或急。或燥或潤。或堅或軟。所以利而行之。調其氣也。本草云。藥有三品。上品為君。主養命。小毒以應天。中品為臣。主養性。常毒以應人。下品為佐使。主治病。大毒以應地。不在三品者。氣毒之物也。凡此君臣佐使者。所以明藥之善惡也。處方之道。主治病者為君。佐君者為臣。應臣之用者為佐使。適其病之所根。有君臣佐使奇偶。小大之制。明其歲政。君臣脈位而有逆順。反正。主療之方。隨病所宜以施用。其治法多端。能備所用者良工也。寒者熱之。熱者寒之。溫者清之。清者溫之。結者散之。散者收之。微者逆而制之。甚者從而去之。燥者潤之。濕者燥之。堅者軟之。軟者堅之。急者緩之。客者除之。留者却之。勞者溫之。逸者行之。驚者平之。衰者補之。甚者瀉之。吐之下之。摩之益之。薄之刦之。開之發之。灸之。制之適足為用。各安其氣。必清必淨。而病氣衰去。臟腑和平。歸其所宗。此治之大體也。陰

陽應象論曰。治不法天之紀。不明地之理。則災害至矣。又六節藏象論曰。不知年之所加氣之所衰。不可以為功也。今集諸經驗方。附于篇末。

神白散 治真陰素被損虛多服金石等藥。或嗜炙燙鹹物。遂成消渴。

桂府滑石丸

甘草一兩
生用

右為細末。每服三錢。溫水調下。或大渴欲飲冷者。新汲水尤妙。

猪肚丸

治消渴消中

猪肚一枚
黃連五兩

括囊四兩

麥門冬四兩
去心

知母四兩如無以
茯苓代之

右四味為末。納豬肚中線縫。安置甑中蒸極爛熟。就熟于木臼中搗可丸。如硬少加蜜丸如桐子大。每服三十丸。漸加至四五十丸。渴則服之。如無木臼。以沙盆中用木杵研。亦可以爛為妙矣。

葛根丸

治消渴消腎。

葛根三兩

括囊三兩

鉛丹二兩

附子一兩
去皮臍用

右四味搗羅為細末。煉蜜為丸。如桐子大。每服十九丸。日進三服。治日飲碩水者。春夏去附子。

胡粉散 治大渴。百方療不瘥者。亦治消腎。

鉛丹

胡粉

各半兩

括囊半兩

甘草二兩
半炙

澤瀉

石膏

赤石脂

白石脂

各半兩

右八味為細末水服方寸七日二服壯者一七半一年病一日愈。二年病二日愈。渴甚者二服腹痛者減之如丸服亦妙每服十九多則腹痛也。

三黃丸

主治男子婦人五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足發寒熱者。

春二月

黃芩

四兩

黃連

四兩

大黃

二兩

為痿痺或停積而濕熱內甚不能傳化者。變水腫腹脹也。凡多飲數瀉為渴。多食數瀉為消中。肌肉消瘦。小便有脂液者為消腎。此世之所傳三消病也。雖無所不載。以內經考之。但燥熱之微甚者也。此藥兼療一切陽實陰虛。風熱燥鬱。頭目昏眩。風中偏枯。酒過積毒。一切腸胃滯塞壅塞。瘡癩痺痺。并傷寒雜病。煩渴氣液不得宣通。并宜服之。

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

山梔子

澤瀉

各半兩

連翹

瓜蔓根

乾葛

茯苓

已上各一兩

藿香

各一分

寒水石

甘草

石膏

滑石

盆硝

各半兩

右為粗末。每服五錢。水一盞。生薑三片。同煎至半盞。絞汁入蜜少許。溫服。漸加十餘錢。無時日三服。或得臟腑疏利。亦不妨取効。更妙。後却常服之。或兼服消痞丸似覺腸胃結滯。或濕熱內甚自利者。去大黃芒硝。

人參散

治身熱頭痛。或積熱黃瘦。或發熱惡寒。畜熱寒戰。或膈痰嘔吐。煩熱煩渴。或燥濕瀉痢。或目疾口瘡。或咽喉腫痛。或風昏眩。或蒸熱虛汗。肺痿勞嗽。一切邪熱變化真陰損虛。並宜服之。

石膏

兩

寒水石

兩

滑石

四

甘草

兩

人參

兩

右為細末。每服二錢。溫水調下。或冷水亦得。

三消之論。劉河間之所作也。因麻徵君寓汴梁。暇日訪先生後裔。或舉教醫學者。即其人矣。徵君親詣其家。求先生平昔所著遺書。乃出三消論。氣宜病機三書。未傳于世者。又多不全。止取三消論于卷首。增寫六位藏象二圖。其餘未遑潤色。即付友人穆子昭。子昭乃河間門人。穆大黃之後也。時覓官于京師。方且告。因徵君欲因是而惠之。由是余從子昭授得一本。後值兵火。遂失其傳。偶于鄉人霍司承君祥處。復見其文。然傳寫甚誤。但依倣而錄之。以待後之學者。詳為刊正云。時甲辰年冬至日。錦溪野老書續方。柏亭東久亭寺僧悟大師傳經驗方。

治飲水百盃。尚猶未足。小便如油。或如杏色。服此藥三五日。小便大出。毒歸于下。十

日永除根本。此方令子和辯過。云是重劑。可用悟公師親驗過矣。

水銀四錢

錫研成砂子
水銀二錢用

牡蠣二兩

蜜陀僧一兩

知母一兩

貝母一兩

紫花苦參一兩

黃丹半兩

瓜蔞根半斤

右為細末。男子用不生兒。猪肚一箇。內藥。婦人用。獐猪肚一箇。麻線縫之。新瓦合蓋一合。繩繫一兩。遭米一升。更用瓜蔞根末半斤。却于新水煮熟。取出放冷。用砂盆納研爛。就和為丸。如猪肚丸法用之。

儒門事親卷之十四

戴人張子和著
新安吳勉學校

扁鵲華陀察聲色定死生訣要
病人五臟已奪神明不守聲嘶者死。

病人循衣縫譖語者不可治。

病人陰陽俱絕掣衣撮空妄言者死。

病人妄語錯亂及不能言者不治熱病者可治。

病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死。

病人兩目皆有黃色起者其病方愈。

病人面黃目青者至期而死重出在下文。

病人面黃目赤不死亦如衄血者死。

病人面黃目白者不死白如枯骨者死。

病人面黃目黑者不死黑如焰死。

病人面目俱黃者不死。

病人面青目白者死。

病人面黑目白者不死。

病人面赤目青者六日死。

病人面黃目青者九日必死。是謂亂經。飲酒當風。邪入胃經。膽氣妄泄。目則為青。雖天救亦不可生。

病人面赤目白者十日死。憂恚思心氣內索。面色反好急棺槨。

病人面白目黑者死。此謂榮華已去。血脉空索。

病人面黑目白八日死。腎氣內傷。病因留損。

病人面青目白五日死。

病人着牀。心痛短氣。脾氣內竭。後百日復愈能起。傍徨因坐于地。其上倚牀。能治此者也。

病人耳目鼻口有黑色。起入于口者必死。

病人目無精光。若土色不受飲食者四日死。

病人目無精光。及牙齒黑色者不治。

病人耳目及顏頰赤者死在五日中。

病人黑色出于額上髮際。直鼻脊兩額上者。亦死在五日中矣。

病人黑色出天中下至上。顧上者死。

病人及健人黑色若白色。起入目及鼻口者。死在三日中矣。

病人及健人面忽如馬。肝色望之如青。近之如黑者必死矣。

病人面黑直視惡風者死。

病人面黑唇青者死。

病人面青唇黑者死。

病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死。

病人目不回直視者一日死。

病人頭目久痛卒視無所見者死。

病人陰結陽絕目睛脫恍惚者死。

病人陰陽竭絕目眶陷者死。

病人眉系傾者七日死。

病人口如魚口不能復閉而氣出多不反者死。

病人卧遺尿不覺者死。

病人屍臭者不可治。

肝病皮白肺之日庚辛死。

心病目黑。腎之日壬癸死。
脾病唇青。肝之日甲乙死。

肺病頰赤。目腫。心之日丙丁死。

腎病面腫。唇黃。脾之日戊己死。

青欲如蒼壁之赤。不欲如藍。

赤欲如帛裹朱。不欲如赭。

白欲如鵝毛。不欲如枯骨。

黑欲如黑漆。不欲如炭。

黃欲如羅裹雄黃。不欲如土。

目赤色者病在心。白在肺。黑在腎。黃在脾。青在肝。黃色不可名者病在胸中。

診目病赤脉從上下者太陽病也。從下上者陽明病也。從外入內者少陽病也。

診寒熱瘰癧。目中有赤脈。從上下至瞳子。見一脈一歲死。見一脈半一歲半死。見二脈

半二歲半死。見三脈三歲死。

診牙齒痛。按其陽明之脈來太過者。獨熱在右。右熱在左。左熱在上。上熱在下。下熱。

診血者。脈多赤多熱。多青多痛。多黑多瘡。多赤多黑多青皆見者。寒熱身痛。面色

微黃齒垢黃爪甲上黃疸也。安卧少黃赤脈小而濶者不嗜食。

診百病死生訣第七

診傷寒熱盛脈浮大者生。沉小者死。傷寒已得汗。脈沉小者生。浮大者死。

溫病三四日已下不得汗。脈大疾者生。脈細小難得者死不治。

溫病穰穰大熱其脈細小者死。千金穰穰作時行

溫病下痢腹中痛甚者死不治。

溫病汗不出出不至足者死。厥逆汗出脈堅彊急者生。虛緩者死。

溫病二三日身體熱。腹滿頭痛。食如故。脉直而疾者八日死。四五日頭痛腹痛而吐。脈來細強十二日死。八九日頭不疼身不痛目不變色不變而反利。脈來喋喋按之不彈手時時心下堅十七日死。

熱病七八日脈不軟。一作喘不散一作數者當有瘡。瘡後三日溫汗不出者死。

熱病七八日其脈微細。小便不利。加暴口燥。脈代舌焦乾黑者死。

熱病未得汗。脈盛躁疾。得汗者生。不得汗者難瘥。

熱病已得汗。脈靜安者生。脈躁者難治。

熱病已得汗。大熱不去者亦死。

熱病已得汗。熱未去。脈微躁者慎不得刺治。

熱病發熱。熱甚者。其脈陰陽皆竭。慎勿刺。不汗出。必下利。

診人被風不仁。瘡疿其脈虛者。生堅急疾者死。

診癲病虛則可治。實則死。

診癲病脉實堅者生。脉沉細者死。

又癲疾脉得大滑者久而自己。其脈沉小急實不可療。小堅急者亦不可療也。診頭痛目痛久視無所見者死。

診人心腹積聚。其脈堅強急者生。虛弱者死。又實强者生。沉者死。其脈大。腹大脹。四肢逆冷。其人脈形長者死。腹脹滿便血。脈大時絕極下血。脈小疾者死。腸澼便血。身熱則死。寒則生。

腸澼下白沫。脉沉則生。浮則死。

腸澼下膿血。脈懸絕則死。滑大則生。

腸澼之屬身熱脈不懸絕滑大者生。懸濇者死。以臟期之。

腸澼下膿血。脈沉小留連者生。數疾且大有熱者死。

腸澼筋攣。其脈小細安靜者生。浮大緊者死。

洞泄食不化。不得留下膿血。脈微小連者緊急者死。洩注脈緩時小結者生。浮大數者死。匿蝕陰注其脈虛小者生。緊急者死。

欬嗽脈沉緊者死。浮直者浮軟者生。小沉伏匿者死。

欬嗽羸瘦脉形堅大者死。

欬脫形發熱脈小堅急者死。肌瘦下脫形熱不去者必死。

欬而嘔腹脹且洩其脈弦急欲絕者死。

吐血衄血脉滑小弱者生實大者死。

汗若衄其脈小滑者生實大者死。

吐血脈緊強者死滑者生。

吐血而欬上氣其脈數有熱不得卧者死。

上氣脈數者死謂損形故也。

上氣喘息低昂其脈滑手足溫者生脈濇四肢寒者必死。

上氣面浮腫肩息其脈大不可治加利必死。

上氣注液其脈虛寧伏匿者生堅强者死。

寒氣上攻脈實而順滑者生實而逆澁者則死。太素云寒氣在上脈滿實何如日實而死何謂順則生逆則死所謂順者手足溫也逆者手足寒也

病癰脈實大病久可治脉弦小堅急病久不可治。

消渴脉數大者生細小浮短者死。

消渴脈沉小者生實堅大者死。

水病脈洪大者可治。微細不可治。

水病脈浮大軟者生沉細虛小者死。

水病腹大如鼓。脉實者生虛則死。

卒中惡咯血數升。脈沉數細者死。浮大疾快者生。

卒中惡腹大。四肢滿脈大而緩者生。緊大而浮者死。緊細而微亦生。

瘡腰脊強急癢癓皆不可治。

寒熱癢癓其脈代絕者死。

金瘡血出太多。其脈虛細者生。數實大者死。

金瘡出血脈沉小者生。浮大者死。

研瘡出血一二升。脈來大二十日死。

研刺俱有病。多少血出不自止者。其脈來大者七日死。滑細者生。

從頭頸仆內有血。腹脹滿。其脈堅强者生。小弱者死。

人為百藥所中傷。脈澁而疾者生。微細者死。洪大而遲者生。千金遲作速。

人病甚而脈不調者難治。脈洪大者易瘥。

人內外俱虛。身體冷而汗出。微嘔而煩擾。手足厥逆。體不得安靜者死。脈實滿手足寒。

頭熱春秋生。冬夏必死矣。

老人脈微。陽羸陰強者。生脈大而加息者。死。陰弱陽強。脈至而代。期月而死。
尺脈濇而堅。為血實氣虛也。其發病。腹痛逆滿。氣上行。此為婦人胞中絕傷。有惡血久成結瘕。得病以冬時。泰當赤而死。

尺脈細而微者。血氣俱不足。細而來有力者。是穀氣不克。病得節。輒動。棗葉生而死。此病秋時得之。左手寸口脈偏動。乍大乍小不齊。從寸至關。關至尺。三部之位。其脈動各異不同。其人病仲夏得之。此脈桃花落而死。

左手寸口脈偏沉伏。乍小乍大。朝浮大而暮沉伏。浮大即太過。上出魚際。沉伏即下不止。關中往來無常時。復來者榆華枯而死。

右手尺部脈三十動一止。有須臾還二十動止。乍動乍疎。連連相因。因不與息數相應。其人雖食穀猶不愈。繁草生而死。

右手尺部脈四十動而一止。止而復來。來逆如循張弓絃。絇絇然如兩人共引一索。至立冬死。

病機

諸風掉眩。皆屬於肝。甲乙木也。木鬱達之。諸寒收引。皆屬於腎。壬癸水也。水鬱泄之。

諸氣膶鬱皆屬於肺庚辛金也。金鬱折之。
諸濕腫滿皆屬於脾戊己土也。土鬱奪之。
諸痛痒瘡瘍皆屬於心丙丁火也。火鬱發之。

諸熱瞀瘞皆屬於火。

諸厥固泄皆屬於下。厥固泄皆屬於下也。厥謂氣逆也。固謂禁固也。滿氣逆上行。反謂固不
憚出入無度。燥濕不
懈。皆由下焦主守也。

諸病喘區皆屬於上。上謂上焦心肺氣也。炎熱薄爛承熱分化。肺之氣也。熱鬱化上。故
病屬上焦。

諸禁鼓栗如喪神守。皆屬於火熱之內作。

諸頸項強皆屬於濕太陽傷濕。

諸逆衝上皆屬於火炎上之性用也。

諸張腹大皆屬於熱。熱鬱于內。肺脹于上。

諸躁狂越皆屬於火。熱盛于胃及四末也。

諸暴強直皆屬於風。陽內鬱而陰行于外。

諸病有聲鼓之如鼓。皆屬於熱。

諸熱腫疼酸驚駭。皆屬於火。

諸轉反戾。水液渾濁皆屬於熱。反戾筋轉也。水液小便也。
諸病水液澄澈。冷。皆屬寒。上下所出及吐出溺出。

諸嘔吐酸。暴注下迫。皆屬於熱。
故大要曰。謹守病機。各司其屬。有者求之。無者求之。盛者責之。虛者責之。必先五勝。疎其氣。令其調達而致和平。此之謂也。五勝謂五行更勝也。

標本運氣歌

少陽從本為相火。本陰從本濕上坐。厥陰從中火是家。陽明從中濕是我。太陽少陰標本從陰陽二氣相包裏。風從火斷汗之宜。燥與濕兼下之可。萬病能將火濕分徹。開軒岐無縫鎖。

辯十二經水火分治法

膽與三焦尋火治。肝和包絡都無異。肺常將濕處求。胃與大腸同濕治。惡寒表熱小膀溫惡熱表寒心腎熾。十二經最端的四經屬火四經濕。四經有熱有寒時。攻裏解表細消息。濕同寒火同熱。寒熱到頭無兩說。六分分來半分寒。寒熱中停真浪舌。休治風休治燥。治得火時風燥了。當解表時莫攻裏。當攻裏時莫解表。表裏如或兩可攻。後先內外分多少。敢謝軒岐萬世恩。爭奈醯雞笑天小。

治病

不讀本草焉知藥性專泥藥性。決不識病假饒識病。未必得法識病得法工中之甲。

六陳

藥有六味陳久為良。狼茱半橘枳實麻黃。

十八反

本草名言十八反。半夏貝殼及攻烏。藻戟遂芫俱戟草。諸參辛芍叛藜蘆。

運氣歌

病如不是當年氣。看與何年運氣同。只向某年求治法。方知都在至真中。

五不及

坎一丁三土五。一七癸九是災宮。勝復都來十一位。誰知臟腑與宮同。

斷病人生死

靈樞經云。人有兩死而無兩生。陽氣前絕陰陽後竭。其人死身色必青。陰氣前絕陽氣後竭。其人死身色必赤。故陰竭則身青而冷。陽竭則身赤而溫。

四因

夫病生之類其有四焉。一者始因氣動而內有所成。二者始因氣動而外有所成。三者不因氣動而病生于內。四者不因氣動而病生于外。因氣動而內成者。謂積聚癰癧瘤氣癰起結核癩癧之類是也。

不因氣動而病生於內者。謂流飲辟食饑飽勞損宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類。
不因氣動而病生於外者。謂瘴氣賊魅蟲蛇蠱毒輩食鬼擊衝薄墮墮風寒暑濕斫射
刺割撻扑之類是也。如此四類有獨治內而愈者。有兼治外而愈者。有獨治外而愈者。
有兼治外而愈者。有先治內後治外而愈者。有兼治內而愈者。有獨治外而愈者。
有須無毒而調引者。凡此之類方法所施或重或輕或緩或急或收或散或潤或
燥或軟或堅方士之用見解不同各擅己心好丹非素故復問之。

五苦六辛

五苦六辛從來無解。蓋史家闕其疑也。一日麻徵君以此質疑于張先生。先生亦無所
應行十五里忽然有所悟欣然迴告于麻徵君以為五苦者五臟為裏屬陰宜用苦劑。
謂苦涌泄為陰。六辛者六腑為表屬陽宜用辛劑。謂辛甘發散為陰此其義也。徵君大
服其識鑒深遠。鑿昔人不傳之妙。故曰知其要者一言而終不知其要者流散無窮。