

欬嗽 痰飲 喘汗 不寐 健忘怔忡

瘧狂 癩癩 痿痺 麻木 厥疝

頭暈 眩暈 目耳 胃胸 心腹 腰脇 痛

大小便 淋濁 腫 腳氣

經帶胎產

吳門花洲顧靖遠松園著

男 元宰叙揆手錄
費 左國楫濟臣校字

症方發明 五

咳嗽 痰飲 喘 汗 不寐 健忘怔忡驚悸
顛狂 癩 痿 痺 麻木 厥 疝

咳嗽 肺 痿 肺癰附

此段論經言形寒飲冷傷肺致嗽持其一端其六氣皆能乘肺致嗽

此論五臟六腑皆令人咳然其實無不關於肺

咳嗽必由於肺。故帝有令人咳之問。而岐伯則曰。五臟六腑皆令人咳。非獨肺也。皮毛者。肺之合也。皮毛先受邪氣。邪氣以從其合也。其寒飲食入胃。從胃脈上至於肺。則肺寒。肺寒則外內合邪。因而客之。則為肺咳。此舉形寒飲冷。傷肺致咳之一端耳。形寒者。外感風寒也。飲冷者。內傷寒冷也。然六氣不獨風寒乘肺致咳。其火暑濕燥皆能乘肺。皆足致咳。各有的症可憑。又曰。五臟各以其時受病。非其時。各傳以與之。乘秋則肺先受之。乘春則肝先受之。乘夏則心先受之。乘季夏則脾先受之。乘冬則腎先受之。言四臟各以其時。先受邪為病。次便及乎肺而為咳。故曰五臟六腑皆令人咳。然其實無有不關於肺。况外必先中於皮毛。而內應於肺也。即內傷之咳。亦無有不關於肺。故以內經於五臟六腑

此論治咳
之因不一
大抵因風
寒勞損二
者居多宜
審因施治

分別咳狀之下。又申之曰。此皆聚於胃。關於肺。故使人多涕唾而面浮腫氣逆也。聚於胃者。胃為臟腑之根本也。關於肺者。肺為臟腑之華蓋也。嘗考無擇有三因。丹溪有六咳。名雖多種。總不出於外感內傷。而治咳之法。亦當知重肺胃二經。然於外感內傷之中。又惟風寒勞損二者。居其八九。景岳云。風寒者責在陽實。治宜辛溫散邪。則肺清而咳愈。最忌寒涼收斂。如經所謂肺欲辛者是也。勞損者。責在陰虛。治宜甘以壯水。潤以養金。則肺寧而咳愈。最忌辛香燥熱。如經所謂心走氣。氣病無多。食辛者是也。至若因火暑因濕因燥。各從本門。以施治。其因痰飲者。滌其飲。因氣逆者。降其氣。因食積者。消之。因積熱者。清之。金虛則崇土。鬱甚則舒肝。隨其所見之症。而理之。金匱論咳有肺痿肺癰肺脹之辨。所當詳究。趙氏云。水冷金寒而咳。當用八味丸。仲淳雖論氣虛陽虛喘咳者絕少。然此等治咳之法。亦宜留心。以盡病變之無窮。則治咳之能事畢矣。

疎邪利金湯

見傷風

如外感風寒。內傷飲冷。咳嗽者。

寒冷入胃。從胃脈上。至於肺。則肺寒。外內合邪。故咳。可加半夏。

此治感風寒咳嗽之劑。果係形寒飲冷致咳。可加薑夏。否則肺熱暈湯。

清金膏

加減清寧膏

噲化丸

瓊玉膏

俱見虛勞

皆治陰虛咳嗽

鳳髓湯

牛髓

一助半助同煎沸以絹濾去渣入下三味

杏仁

去皮尖四兩研如泥

山藥

炒四兩研細

胡桃仁

去皮四兩研如

泥同入瓶內油紙封口隔湯煮一日早晚白湯化服三四匙一方用牛酥

白蜜杏仁名蜜酥煎

煎法同上

八仙玉液

自製治陰虛咳嗽痰血最妙

藕汁

性寒帶滋稀熱止血二杯

梨汁

降火消痰定喘止咳

蔗漿

消痰止咳

蘆根汁

清胃止嘔各一杯

茅根

涼金定喘水煎

取濃汁一杯再同漿汁乳頓滾

人乳

補陰養血童便各一杯

生雞子白

三枚和勻

頻頻服之余嘗

用米仁山藥

保脾麥冬各一兩

白花百合

清肺二兩

枇杷葉

降氣十片

煎濃汁一碗沖入玉

液再加貝母末真柿霜

清痰和勻

頻頻飲之即垂絕者尚可延生

此七方皆甘潤之劑勞損之咳擇而用之一方但用枇杷葉去毛蜜炙煎膏

白蜜錫糖收之亦有效驗

瀉白散

見火

治肺脹實
清金

此治肺熱咳嗽之劑。虛火加甘寒。實火加苦寒。按金匱云。咳而上氣。其人喘。目如脫狀。此為肺脹。仲淳言肺脹乃係肺熱極所致。當清金降氣。本方宜加黃芩石羔知母花粉之屬。

順氣開痰飲

見中風

此治氣逆咳嗽之劑。

二陳湯

見中風

此治痰飲咳嗽之劑。虛者宜用四君子湯。

保和丸

見泄瀉

此治食積咳嗽之劑。加減用之。

百部膏

一味煎膏蜜收

此治蟲嚙肺咳之劑。必胸中饑時則痛。唇上白點如粟者。用之方效。

肺痿

金匱云。其人咳。口中有濁唾涎沫。脈數虛者。此為肺痿。或從汗出。或從嘔吐。或

咳嗽肺痿

潤燥清熱降氣消痰之劑煎膏時時噲化緩以圖之方可挽回於萬一若大驅涎沫欲求速效反速斃也

金匱甘草湯 治肺痿咳嗽唾涎沫不止肺熱而痿清肅失令則上輸之精氣不能收攝進化故吐濁沫

甘草一味水煎頻頻飲之熱自漸化但最難處半月後方得效如二冬百合梨汁貝母蘇子枇杷葉皆可用

此治肺痿獨取陽明之義徐忠可云余妾病肺痿初時痰沫成碗服一味甘

草湯半月始痰少而得愈

肺癰

肺癰症肺

金匱云若口中辟辟燥咳則胸中隱隱痛脈實數者此為肺癰始萌可救膿成

則死又云咳而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭此為肺癰久之吐膿

如米粥者死嘉言云凡見逆咳上氣即宜防癰痿之症肺受火熱薰蒸即血

為之凝血凝即痰為之裏遂成小癰若能初起即識當血結而膿未成之時急

瀉其肺方為恰當迨至血化為膿瀉之無益肺葉朽壞傾囊吐出而死間有癰

初起急宜瀉肺

小。氣壯胃強善食。其膿不從口出。或順趨肛門。或旁穿脇肋。仍可得生。然亦不過十中二三耳。

金匱葶藶大棗瀉肺湯 治肺癰喘不得卧。

甜葶藶 瀉其肺實。下其敗濁。不致腐潰吐膿。二三錢。 大棗 固脾胃之元。數枚。 或合甘桔湯。亦治肺癰之劑。

如連翹 能散血。結氣衰。 牛旁 能散諸癰腫毒。 金銀花 解毒聖藥。 陳年芥酒 肺癰神丹。 貝母 散結消腫。 花粉 清熱

消腫皆可採用。

此治肺癰喫緊之方也。隨症加減治之。

咳嗽之脈浮濡易治。 兼見細軟病將退也。 沈浮而緊者死。 與病相反。病必深矣。 久嗽肺弱者生。實大數者死。上氣喘嗽面腫息肩。浮大者死。

一人經年久嗽藥不絕口。而病反增劇。自謂必成虛勞。士材曰。脈不數不虛。惟寸口浮大而滑。是風痰未解。多服酸收。故久而彌甚。用二陳湯加麻黃前胡。

杏仁蘇子桔梗。五劑知。十劑效。

一人三年久嗽。諸藥不效。士材診之曰。饑時胸中痛否。曰。大痛。視其上唇白點。

為粟者十餘處。此蟲啗其肺。用百部一味煎膏。加烏攸攢榔與服。下寸白蟲。

嗽脈生死

從散效案

久嗽因蟲
齒肺用百

血少津枯
復傷秋燥
肺癰將成
先用葶藶
湯通肺氣
之壅後用
活法治之
得效案

一婦患肺家火實。熱甚咳嗽久而不愈。身如火炎。肌瘦將成勞。用紫苑湯紫苑桑皮

杏仁款冬花枇杷葉木通等分。大黃減半。蜜丸。櫻桃大。夜間噙化三五丸。服之而愈。

一婦平日持齋。腸胃素苦。天癸絕後。經猶不止。似有崩漏之意。嘉言治已痊可。時至秋燥。人多病咳。而血虛津枯之體。受傷獨猛。胸脇緊脹。上氣喘急。臥寐不寧。咳動則大痛。痰中帶血。而腥。食不易入。聲不易出。寒熱交作。申酉二時。燥金用事。諸苦倍增。其脈時大時小。時弦緊。時牢伏。服清肺藥。如以勺水沃焦。無裨。緩急。嘉言告以肺癰將成。高年難任。用葶藶大棗瀉肺湯。先通其肺氣之壅。即覺氣稍平。食少入。痰少易出。身少可側。大有生機。嘉言曰。未也。吾見來時太急。不得已而取快於一時。然暫開者易至復閉。復閉則前方不可再用。今乘其暫開。多方以圖。必在兩月後。交冬至節。方是愈期。蓋身中之燥。與時令之燥。膠結不解。必俟燥金退氣而肺乃得寧。此兩月間。屢危屢安。大率皆用活法。幹旋緣肺病不能用補。而脾虛又不能生肺。肺燥喜於用潤。而脾滯又艱於運食。今日脾虛之極。食飲不思。則於清肺藥中。少加參朮以補

示用清肺
補脾法之
巧

胎朽腹中
肺當生癰
用瀉白散
加苓桔開
上壅通下
閉治效案

脾。明日肺燥之極。熱盛咳頻。則於清肺藥中。少加阿膠以潤燥。扶至立冬之
午刻。病者忽云。內中大覺清爽。可得生矣。奇哉。天時之燥去。而肺金之燥。遂
下傳於大腸。五六日不大便。畧一潤腸即解。正以客邪易去耳。至小雪節。康
健加餐。倍於平日。蓋胃中空虛既久。勢必加食。復其水穀容受之常。方為全愈也。
一婦孕五月。偶下血。以人參阿膠。勉固其胎。又一月。身腫。復血逆上奔。結聚於
會厭胸膈間。食飲纔入。觸之痛處。轉下艱難。稍急則連粒嘔出。皆謂胎氣上
逼。脾虛作腫成膈。用人參之補。五味之收為治。至白露節。孕期已八月。病勢
危篤。呼吸將絕。嘉言診視。其尺脈微澹。難推。獨肺部洪大。無倫。喘聲如曳鋸。
手臂青紫腫亮。如毆傷色。謂曰。胃脈洪大。合於會厭之結塞。知其肺當生癰。
尺脈微澹。合於肉色之青腫。知其胎已久壞。宜瀉白散之善藥。加苓桔之苦。
以開其上之壅。通其下之閉。服一大劑。腹即弩痛。如欲產狀。此肺氣開而下
行。久閉惡穢得出也。再進一劑。身腫稍退。上氣稍平。下白汚如膿者數斗。裹
朽胎而出。旬餘尚去白汚。並無點血相雜。可知胎朽腹中。已近百日。陰胎之

血。和胎具化為膿也。病者當時因隔即開。連進數劑。申思清肺。然治法。

肺為主。旬餘乃瘳。

痰飲

此辨痰與飲之因

此論陰虛痰火治法

此論脾濕生痰治法

此論風寒已熱痰咳治法

痰飲雖為一症。而因則有二。稠濁者為痰。痰因於火。有熱無寒。宜分在肺在脾。稀清者為飲。飲因於濕。有熱無寒。此屬在脾。然脾土寄旺四時。三時主熱。一時主寒。故飲症亦究寒濕釀成者少。濕熱釀成者多。按仲淳云。痰之生也。其由非一。其治不同。如有陰虛火動。上炎燻肺。煎熬津液。凝結為痰。是為陰虛痰火。痰在乎肺。而本乎腎。宜壯水清金。降氣消痰為治。若由脾濕不能運化。積滯生痰。或因酒醪厚味生痰。濃厚膠固。甚至流於經絡。及皮裏膜外。或結為大塊。或不思議飲食。或徹夜不眠。或身重腹脹。不得行走。或卒然眩仆。不知人事。或發為癲癘。或叫呼異常。或昔肥今瘦。或泄瀉不止。及成癰疽種種怪症。皆痰之所為。故昔人云。怪病多屬痰。暴病多屬火。良有以夫。此症在脾胃。無關肺腎。宜燥脾行氣。散結軟堅為治。若有風寒閉熱在肺。而痰嗽喘逆者。亦屬在肺。宜豁痰降氣。除肺熱藥中。加辛溫之劑。以散風寒。故利潤利燥利散。各有攸當。非可混施也。

此論飲症
治法

此論痰分
屬五臟

此論飲症
有四亦分
屬五臟

世以痰飲混稱。而不辨稠粘之為痰。清水之為飲。混同施治。豈中病情要知飲之色狀不同。或青或黃。或綠或黑。或酸或苦。或伏於腸胃。或攻於胸脇。則為心痛。為胃脘痛。為脇肋刺痛。或流於經絡四肢。則關節不利。或憎寒發熱自汗。或胸膈滿悶喘逆。或不思食。或不得眠。皆其候也。此症多因酒後過飲茶湯。與腸胃濕熱之氣凝而為飲。或因懷抱抑鬱。或因脾胃虛弱。飲食之濕。不得消散。亦能成飲。總之。必由脾胃有濕所致。宜健脾燥濕。消飲行水。降氣散鬱為治。效方書論痰。有在肺經者。名為燥痰。其痰溢而難出。在脾經者。名為濕痰。其痰滑而易出。在心經者。名為熱痰。其痰堅而成塊。在肝經者。名為風痰。其痰青而多泡。在腎經者。名為寒痰。其痰有黑點而多稀之別。金匱論飲症。有四。水走腸間。漑漑有聲者。曰痰飲。水流脇下。咳唾卧痛者。曰懸飲。水流行於四肢。汗不出而身重者。曰溢飲。咳逆倚息。氣短不得卧。其形如腫者。曰支飲。亦分在肺在脾。在心在肝在腎。此卷痰飲病變之無窮。有志深造者。所宜詳究焉。

疏邪利金湯

見傷風

清金散 清寧膏 噎化丸 虛勞 救命丹 風

此四方陰虛痰火者。擇而用之。以肺為燥金。喜涼潤而惡溫燥故也。如膠固者。加霞天膏。

順氣開痰飲 見中風 治氣逆火升。痰滯喉間。如有核上。

原方 順氣開痰 加麥冬。知母。黃柏。清白芍。五味。 火清 飲火下降。

此順氣開痰降火之劑。

琥珀丸 治痰症如神。

真琥珀 硃砂 鎮心安神 人參 補氣安神 茯神 蓮肉 各二錢 山藥 一兩 甘草 補心益脾 天竺黃

入心除熱痰 陳膽星 入肝去風痰 可加牛黃 清心涼肺除熱化痰一錢 更妙 蜜丸重三錢 硃砂為衣 小

兒每丸重一錢。

此鎮心安神。除熱化痰之劑。為幼科之聖藥。凡遇慢驚。所投輒應。兼治小兒

一切虛症。

瓜萸橘紅丸 治胃中有痰欲吐。

瓜萋仁 橘紅各四兩 竹瀝姜汁泛為丸。食後服。

此順氣開痰止嘔之劑。

加味瓜萋半夏湯 痰嗽氣逆頻吐。胸膈如有冷物上塞。飲熱湯稍下者。方可

用者。

瓜萋霜蛤粉拌 半夏薑汁炒一錢五分。一潤一燥。 蘇子 橘紅 茯苓皆清

熱之品。 白豆蔻五分 吳茱萸有溫中下氣之能。 加竹瀝一小 薑汁開痰止嘔五匙

此消痰降逆溫中下氣之劑。因熱者大忌之。

二陳湯見中風 治濕痰及一切飲症之要藥。

此燥濕理氣化痰之劑。虛者加人參白朮補氣健脾。以運化其痰。名六君子

湯。先哲云。脾為生痰之原。又曰。治痰不理脾胃。非其治也。若吐涎沫。不甚稠

粘。此脾虛不能約束津液故也。六君子加益智仁治之。益智辛熱。能攝涎唾。

非虛寒勿用。每見勞膈等症。多有吐白涎沫者。此係熱極所致。凡臨症最宜

細審。治始無悞。

當知有脾
胃熱而涎
唾多者非
益智所宜

示金匱治
飲諸方宜
參

厚朴

木香

降氣散鬱
各五錢

因酒濕者加黃連一兩因寒濕者加茅朮二兩白豆蔻五錢

兩

因抑鬱者加紫蘇四兩

薑汁稀米糊為丸如綠豆大淡薑湯下每三四五錢日

三服

此健脾燥濕消飲行水降氣散鬱之劑凡遇飲症投之輒效仲景用桂枝茯苓

苓白朮甘草湯四味通陽化氣滲水健脾勝濕消飲用八味腎氣丸補益真

陽使腎氣不虛水不上泛為痰用葶藶大棗湯以洩肺氣之閉使氣行而飲

自不聚載在金匱痰飲門其方非一所宜參究

神朮丸

治濕痰

肥人多患之

及一切飲症如神

茅朮

一斤黑芝蔴一斤同水
研漿拌之九蒸九曬

棗肉為丸秋月燥令可用天冬錢許煎湯送下

此治濕消飲之神劑並治濕痺及脾濕腫脹極效

茯苓丸

治痰停中脘脾氣壅滯不得下行上攻兩臂抽牽作痛手不能舉脾主

四服服者立效

半夏

二兩茯苓

一只殼

風化硝

引消痰利氣之品同潤
下歸大腸二錢五分

薑汁煮麩糊為丸桐

子大每服三五丸淡姜湯下。

此導痰潤下之緩劑。

礞石滾痰丸

治一切積聚痰結百種怪症。

病而至於變異百出。症不可憑。脈不可按。莫測端倪者。大多屬痰。

青礞石

消積滯。墜痰涎之要藥。火硝等分。煨金色。湯氏治小兒用一錢。宜有君藥反少之理。原方分兩疑誤。製大黃馳逐一切積滯

停痰留飲之神藥。

黃芩

芩之治痰。假以降其火也。各八兩。

真沉香

沉之治痰。惜以降其氣。一兩。木香亦可。

水泛為丸白

湯下一二三錢。

此驅痰除熱泄結之聖劑。若因於脾濕不能運化。積滯生痰。或因酒醪厚味。生痰濃厚膠固。咯唾難出者。此藥但取痰積次第而下。並不大瀉。應如鼓桴。

如陰虛痰火禁用。虛人亦禁。

痰得瀆脈者難治。

腎水虛泛為痰治案

痰狂不食不饑氣厥

治案

一人面赤作渴。痰盛頭暈。立齋曰。此腎虛水泛為痰。用六味而愈。

一閨女患痰症。累月不食。起居如常。每發厥逆。不省人事。良久而甦。諸藥不效。

余曰。中焦有痰。胃氣亦賴以養。方能不食不饑。以琥珀丸服之而愈。廣筆記。

伏痰以崇
用攻下效
崇

示分量宜
照此服丸
屬藥當少
用不應漸
減

寒熱不食
作飲症治
案

飲症嘔不
思食加參

以此藥人參圓肉湯下數丸遂愈

一人患臂抽痛。手不能舉。或左右時復轉移。此由伏痰在內。中脘停滯。四肢屬

脾。脾滯而氣不下。故上行攻臂作痛。以茯苓丸治之。得愈。方書云。累有人為痰

所苦。夜間兩臂如人抽牽。兩手戰掉。不能舉動。服者遂愈。痰藥多。惟此立效。

一人遍體如蟲螫。口舌糜爛。朝起必見二鬼執盤殮以獻。士材診其脈。乍大乍

小。疑其為鬼祟。細察兩關弦滑而大。遂作痰飲治。投滾痰丸三錢。雖微有所

下。而患病如故。更以小胃丹與之。即十棗湯之芫花大戟甘遂各五錢加製
大黃一兩五錢黃柏三兩白朮煎膏丸如

藷子大臨卧白湯送下四五分取
膈上濕熱痰積欲利空心下一錢復下痰積十餘碗。遍體之痛減半。至明早。

鬼亦不見矣。更以人參三錢。白朮二錢。煎湯服小胃丹二錢。大瀉十餘行。約

有二十碗。病若失矣。乃以六君子為丸。服四觔而痊。

一人患寒濕。不食久之。勢甚危。以治寒熱劑投之。不應。仲淳作飲症治之。立愈。

蓋飲症原有作寒熱之條。故治飲。病自去矣。

一婦因作家勞。患飲症。每發嘔吐不已。腸如欲出。所吐俱清水。盈盆。日夜不

此論喘病
當屬何因
處治

止不思飲食。醫以健脾消痰。行氣開鬱藥投之。愈劇。仲淳即以前方加人參三錢。一劑吐止。再劑霍然。隨食粥。脾氣漸復。至後每病作。檢方服之。即平。

喘

喘病無不本於肺。故經曰。諸痿喘嘔。皆屬於上。蓋肺主氣。氣逆則喘。肺為最高。故曰屬上也。巢氏嚴氏本內經。諸逆冲上。皆屬於火之說。止言實熱。獨王海藏辯華陀肺氣盛為喘。活人書。氣有餘則喘。二語云。氣盛則當氣衰。有餘當作不足。若肺氣果盛。果有餘。則清肅之令下行。豈復為喘。所謂盛與有餘者。乃肺中之火。而非肺之真氣也。斯言誠超出前人。然余觀昔賢之論。悉有所本。不可偏廢。審果實熱有餘所致者。則從巢氏之說治之。審果火燥肺金。真氣不足所致者。則從海藏之治。故因風寒者解其邪。因暑濕者滌其煩。火實者清之。氣鬱者疏之。痰壅者開之。食滯者消之。氣虛而火入於肺者。補氣為主。陰虛而火乘金者。壯水為急。腎虛氣不歸原。納氣為根。腎虛水邪泛濫。逐水下流。如上諸竅。皆其大綱。然治喘之因甚多。須一隅三反。方不愧為明通之醫矣。

疏邪利金湯見傷

竹葉石膏湯見傷寒

此治傷暑致喘之劑。

瀉白散見火

加茅根肺氣喘急。一味煎飲如神。

此治肺熱致喘之劑。實火加苦寒。虛火加甘寒。

沉香降氣散

真沉香 砂仁 蘇子 橘紅 玉金 枇杷葉治喘蜜炙。治嘔姜炙。 白茯苓 麥冬

皆降氣下逆之品。 肺壅喘甚者。加甜葶藶。以洩肺氣之壅逆。 挾熱者加茅根。涼金定喘。三五兩。 煎湯

煎藥。

此治氣鬱致喘之劑。

順氣開痰飲見中風

或和二冬沙參之屬。

此治痰壅致喘之劑。按士材云。內經論喘。其因衆多。究不越於火逆上而氣

要言

要言

不降。斯言深得要領。所以仲淳云。喘病屬肺虛有熱。因而痰壅。此方可宗。而加減用之。若果屬痰。因而致喘。方可用二陳六君子等湯治之。

保和丸 見洩瀉

此治傷食致喘之劑。加減用之。

生脈散 暑見

本方加蘇子茅根貝母。氣虛則喘。人參補之。喘則氣耗。五味斂之。肺喜潤。故用麥冬。肺欲利。故用蘇子。肺惡熱。以茅根清火。肺惡

塞。以貝母消痰。

此方喘因氣虛而火入於肺者宜之。

八仙長壽丸 見虛勞

原方加麥冬 合參冬以清肺 牛膝 各六兩 紫河車 峻補其腎一二具 或再加青鉛 色黑導腎鎮

如神。銹內鎔化。 真沉香 砂仁 如氣從臍逆冲而上者。此腎虛不能納。去渣脚。收用二兩。 氣為原。非沉香砂仁引導不濟。各五錢。茅

根湯送下。

此方喘因陰虛而火乘金者宜之。

六味腎氣丸 見腫脹

示真陽欲
脫致喘非
此莫執但
宜細審投
之

示致喘之
因及治法
大要

死症

陰虛喘汗
不得眠食

參附湯 治真陽不足。上氣喘急。氣短頭暈。陽欲汗出肢冷。陽欲

人參一三 附子一三
三兩 五錢

此方果係真陽欲脫致喘者。急用以挽之。否則切勿妄投。

麻杏石甘湯 治哮喘。

麻黃炒三五 杏仁散風 石羔清肺 甘草
七分 合上加瓜蒌消痰 蘇子 桑皮 只

壳下

此降氣消痰清火。而兼散邪之劑。此病禁用熱劑。亦不可純用寒涼。恐外邪難解。蓋哮喘症。良有痰火鬱於內。風寒束於外。而致者居多。或因過食酸醜。或因積火薰蒸。病根深久。難以卒除。宜避風寒。節厚味可也。

喘病之脈。不宜急疾。

喘病汗出。小便利者死。若下利不止者亦死。汗出入油喘而不休者死。久病肉

脫作喘。六脈如平者。燈盡火必死。燭之兆

一人氣喘自汗。晝夜不眠不食。醫以外感治之。益甚。仲淳曰。此腎虛氣不歸原。

故火上浮。喘汗交作。脾虛故不思食。亟以麥冬枸杞五味滋陰。斂肺。蘇子橘紅降氣消痰。茯苓白朮棗仁補脾斂汗。不數劑而愈。

汗

汗症有自汗盜汗之不同。自汗者。無時自出。動則為甚。此由衛氣虧而不能固衛於外。以致津液自滲洩而出。屬氣虛者多。然亦有服參芪而自汗如故者。此為陰虛。水不制火。心液自洩。原病式所云心熱則出是也。盜汗者。睡中盜出。至醒方知。蓋陰虛之人。睡去。自外衛之陽。乘虛蹈入陰中。表液失其固衛而盜出。覺則陽復用事。衛氣復出於表。表實而汗自止。此屬陰虛。丹溪亦曰。自汗屬氣虛。盜汗屬血與陰虛。外有痲症自汗者。所謂痲飲內動。身必有汗也。有濕熱自汗者。譬之土氣濕熱蒸為雨露。故濕無熱不作汗。濕得汗而蒸之。則自汗矣。若止心孔一片。屬真氣不足所致者。則從海藏治之。故因風寒者解其邪。因暑有汗。名曰心汗。良由思慮過度。致傷心血而然。攷內經之論。五熱滌其煩。火實者清之。氣鬱者疏之。痲壅者開之。食滯者消之。五藏皆能令人汗。故士材云。肺虛者固

其皮毛。黃芪六一湯之屬。與此汗。其

天一補心丹之屬。凡虛者禁其疏洩。白朮、桑仁之屬。凡虛者禁其收斂。而此丸之屬。至若因外感六淫所致者。自有本門治法可遵。故致汗之因甚多。宜各隨其兼症而理之。不可膠執。按沈氏云。汗為心之液。凡汗出無有不從心液而來。故治諸汗。皆宜養心液。固表氣為主。亦至要之言也。

黃芪六一湯

黃芪

益衛氣。實皮毛。六兩。甘草一兩。

此治肺虛汗出之劑。

玉屏風散

白朮

補中氣。止汗。二兩。

黃芪

益衛氣。實皮毛。

防風

取其達於表。又芪得防風。其功愈大。各一兩。

加蘇黃根

浮小

麥

止諸汗。必愈。

或再入參。如因濕熱自汗者。本方加芩連柏苓之屬。

此氣虛自汗之方也。如糯米圓肉棗仁白朮芍龍骨牡蠣之屬。皆可採用。若

果氣虛陽衰者。方可參用參附湯。芪附湯。黃芪建中湯。

即桂枝湯加黃芪。倍錫糖。之屬。凡

服固表藥。汗不止者。用炒棗仁一兩。同地冬白芍五味圓肉竹葉。大劑多服

自效。

加味生脈散

生脈散加黃芪

甘草用參參芪補氣實表各三五錢。五味甘草各錢許。

白芍

同五味收陰歛汗。

棗仁

圓

肉

同參冬清心養液。

如肺有熱者。去參芪合六味湯。

此治盜汗之神藥也。一婦幼患此症。仲淳以二劑投之。二十餘年不發。方中

有製香附二錢。

當歸六黃湯

當歸

生地黃

熟地黃

滋陰養血。

黃連

黃芩

黃柏

去火各等分。

黃芪

實表倍用。

此亦治盜汗之方也。予謂陰虛有火。非苦寒之品所宜。按沈氏云。若外感症中盜汗。宜用此方。陰虛盜汗。則宜六味左歸方中。加滋陰收斂之屬。

止汗紅粉

炒糯米

半斤龍骨

牡蠣

麻黃根

赤石脂

各一兩

為末絹包撲之。

此外治之法。汗出不止者。急用此閉塞其汗孔。乃衛外之兵也。

若汗出如膠之粘。如珠之流。或淋漓如雨。拭不逮者。皆難治。

外治止汗法

死症

然亦有因肝經血虛氣滯而不寐者。則當疎肝養血。有因胸膈痰壅氣逆而不寐者。則當滌痰降氣。有因病後血少。或勞症陰虛而不寐者。則當滋陰養血。此尚大畧。然虛實不齊。神而明之。存乎其人耳。

加減補心丹

生地 白芍

丹皮

棗仁

養血麥冬同竹葉以清心

遠志

茯神

石斛

安神加竹

葉 圓肉

調服硃砂末

有痰加竹瀝。心火甚者加犀角黃連。虛者加人

參。

此方養血清心安神。宗仲淳法甚效。隨症加減治之。

一婦患陰虛火症。徹夜不眠者兩月。飲食俱廢。形體日消。謂皆不治。仲淳診視。

許以可救。蓋此病雖屬虛。幸臟腑無損。心經雖有火。不至燥肺。况久病脈調。

身不發熱。豈有他虞。多服補陰收斂之劑。自然水升火降而愈。用生脈散加

茯苓棗仁遠志當歸生地。大劑投之。因虛實氣怯。佐以琥珀辰砂金銀器之

類。約百餘劑而瘳。

陰虛不眠
大劑多服
效案

健忘怔忡驚悸

健忘者。為事有始無終。言語不知首尾。怔忡者。心中惕惕。動而不寧。無時而作。驚悸者。外有所觸。心中跳動。因驚而作。三症皆屬心血不足。通宜天王補心歸脾之屬治之。然亦有挾火挾痰所致。如挾火者。則天王補心加減入犀角黃連之屬。挾痰者。或天王補心加減入竺黃竹瀝之屬。或溫膽湯治之。

天王補心丹

歸脾湯

俱見虛勞

此二方通治健忘怔忡驚悸之劑。加減用之。

六味湯

見虛勞

宜加減蓮心圓肉棗仁麥冬辰砂之屬。

如因心腎不交而健忘者。或加黃

連宮桂。

連桂同用。能使心腎交於頃刻。

或加茯神沉香。

二味名朱萑丸。並治驚悸。

此方因腎虛火旺而致怔忡者宜之。

溫膽湯

即二陳湯。加只實竹茹麥冬。

治痰飲浮於心胞而致健忘怔忡驚悸者。本方倍茯

苓。宜加天竺黃竹瀝。

丹溪曰。驚則神出於舍。舍空而痰涎聚於心胞。各之用。是目昏而驚悸。

驚悸不得
卧用温膽
湯效案

治癩症法

一婦因兒豆驚苦積勞虛煩不得卧心膽虛怯觸事驚悸百藥不效投以温膽湯加棗仁後因虛極加人參數劑而效質之仲淳曰此必有痰而善飲者也詢之果然

癩狂

皆名失心心失其職也 癩 病因間發故字從間

癩者顛倒錯亂之謂語言不分次序處境不辨穢潔時如醉人常作嘆息或歌或笑或悲或哭或不語或不食此因志願不遂或因驚恐所致積年難愈雖有痰有火乃心家不足之症治宜清心安神豁痰為主因鬱者開之因驚者平之狂者狂妄不禁之謂妄言罵詈不避親疏甚則棄衣而走登高而歌逾垣上屋此屬陽明痰熱內實之症宜吐盡胸中之熱痰下盡腸胃中之積垢自愈癩病乃間時而發發久氣虛則日近日密經言二陰腎心即為癩厥故難經謂其脈陰陽俱盛也此屬龍雷之火上乘於心蓋龍興則水附雷發則雨隨故痰涎湧堵塞心竅忽然神昏仆倒搖頭竄目嚼舌吐沫手足搐搦身體偃偻或背反張或作畜聲直待龍雷之火歸原人事方甦如此一番正氣必虛漸成痼疾故斯

症當以清心安神豁痰以治病之標。滋腎壯水導火歸原以治病之本。六味加牛膝車前子。

庶可得愈。有因驚而發者亦宜清心安神豁痰為主。兼平肝鎮墜之劑。羚羊角代赭石。

有因隨風熱上湧而發者。治宜祛風除熱。天麻鉤藤。甘菊薄荷。豁痰。瓜蒌花粉。梨汁竹瀝。昔人論癩

病。專主於痰。因痰涎湧盛。火熱冲動而作。以消痰降火為治。二陳芩連。瓜蒌枳殼。如人強

壯實者可吐。參蘆湯。可下。礞石丸。余謂以上諸法。合宜則用。毋得拘執。

清心安神豁痰飲自製

犀角一方治癩病。單用一兩。加淡竹葉四兩。煎飲四劑即愈。麥冬 鈎藤清遠志 丹參安神 貝母 竹

瀝豁痰 痰多加牛黃調服分許 因鬱加鬱金 因驚加真珠分許 琥珀辰砂各錢許調服 金

銀器羚羊角之屬。火盛可加黃連。

此方癩病癰病。通可治之。仲淳云。癩癰屬心虛。氣虛有熱。總宜清心安神豁

痰為主。

遂心丸 治痰迷心竅發狂如神。

甘遂苦寒有毒。逐痰甚捷。焙研末二錢。猪心血為丸。白湯送下。分作四日服。或吐或下而愈。

如狂甚不能服藥者。用猪心血半末二錢。麗乾量人之強弱。曾或置於食中。

作後自喫食後吐瀉兼作輕者即愈重者再用

此驅痰泄水之峻厲藥也。用以治狂不嫌其峻厲者。以病勢太甚。所謂有病病當之也。然當中病即止。不可過劑。經所云大毒治病。十去其六是也。

六一順氣湯 見傷寒

宜加生鐵落 即爐治間搗落之鐵屑三五錢 或鐵繡或針砂皆可。

此方狂病亦可用之。按經論狂病善怒。故曰怒狂。因肝氣暴升。用生鐵落煎飲。其體重而降。金氣以制之。宜節奪其食。不使胃火復助陽邪。則愈。愈後只只與米飲。若早與飲食飽之。病必再作也。

廣筆記治癩症效方

茯神 四兩 遠志 安神定志二兩 天冬 滋陰降火 白芍 收陰斂逆酒炒各三兩 皂莢 性極尖利。無閉不開。洗滌

痰涎垢膩。則去皮。及絃。與子酥炙。 半夏 同姜汁明礬少許漫炒 旋覆花 消痰去飲 天竺黃 豁痰利竅 真蘇子 炒各

香附 三兩醋浸童便炒 真沉香 利氣除痰一二錢 共為細末。淮山藥粉。作糊丸。綠豆大。硃砂

一兩為衣。每服三錢。竹瀝湯下。

此方大意。亦以治痰為主。癩症頗效。

此裁須知

痿

此論五臟皆令人痿

此論五痿悉因肺熱此自肺而病及他臟

此論心脾肝腎因熱致痿之由此自他臟而病及於

此論五痿之色症

痿者痿弱無力舉動不能也。經言五臟皆能使人痿。以五臟各有所主。如肺主皮毛。心主血脈。脾主肌肉。肝主筋膜。腎主骨髓。所主不同。故有脈痿肉痿筋痿骨痿之異。然經又謂五臟因肺熱葉焦發為痿。能足弱不言行也。五臟之痿皆因於肺氣之熱。致五臟之陰俱不足。而為痿。總曰痿。悉因肺熱。其論肺熱之由。謂有所失。亡所求不得。則肺志不得伸。鬱而生火。發為肺鳴。而喘息有聲。鳴則肺熱葉焦。皮毛虛弱。而為急薄。熱氣留着不去。而及於筋脈骨肉。則生痿。此自肺而病及他臟也。而心脾肝腎亦各有因熱致痿之由。謂大經空虛。發為肌痺。傳為脈痿者。生於心氣之熱。又謂居處濕地。肌肉濡漬。侵發為肉痿者。生於脾氣之熱。又謂入房太甚。宗筋弛從。發為筋痿者。生於肝氣之熱。又謂水不勝火。骨枯髓虛。發為骨痿者。生於腎氣之熱。此自他臟而病及於肺也。其辨五痿之色症。謂肺熱者。色白而毛敗。心熱者。色赤而絡脈溢。脾熱者。色黃而肉蠕動。肝熱者。色蒼而爪枯。腎熱者。色黑而齒槁。夫病而至毛敗爪枯齒槁。

此論痿病
獨重肺經
治痿獨取
陽明之故

示瀉南補
北同一救
肺

示治痿多
端臨症宜
審

五臟六腑之海主潤宗筋宗筋具於兩脚在言其之會人一之之會
主束骨節而利機關故陽明虛則宗筋縱腰間帶脈不能收引故足痿不用此
所以獨取陽明也按士材云痿為重疾經言病本五臟各有而獨重太陰肺經
者以五臟之火熱薰蒸則金必被剋經言治法亦隨五臟見症各調而獨取陽
明胃經者以胃主納水穀化氣血以灌溉於四肢陽明虛則五臟無所稟不能
行血氣濡筋骨利關節故肢體中隨其不得受水穀處即不用而為痿不獨取
陽明而何取哉取陽明者或清胃火以救肺熱或培胃土以生肺金皆是也丹
溪有云瀉南方則肺金清而東方不實何胃傷之有補北方則心火降而西方
不虛何肺熱之有斯言意實相同蓋瀉南則金不受邪而水所有生補北則金
不受竊而火有所制同一救肺也故學者誠能本此施治其於痿症思過半矣
至若方書所論扶有多端如氣虛血虛脾虛腎虛濕熱濕痿死血積食之不一
臨症製方是貴望聞問切之詳明以通其變非筆舌之所能罄也
清燥救肺湯燥見治肺熱葉焦發為痿躄倣此加減用之

原方清肺潤燥降氣和胃參宜加生地 龜甲補北方則牛膝 石斛收筋

羚羊角 舒筋脈。肺熱為本。痿

此一派甘寒之劑。蓋甘則益胃。寒則清熱。乃取陽明。而用清胃火以救胃熱

之法也。若取陽明。而用培胃土以生肺金之法。如黃耆四君子之類。加麥冬

米仁白芍石斛之屬。相其症之所宜而投之可也。

六味加知拍方 火見 治遠行勞倦。逢大熱而渴。陽氣內代。熱舍於腎。水乾火旺。

骨枯髓虛。發為骨痿。 腰脊不舉。足不任身。 又治入房太甚。宗筋弛縱。 精傷之故。 發為筋痿。 精血

枯燥。則筋急拘攣。

原方 六味壯腎水。知拍瀉龍火。加二冬。 清肺熱。 龜甲。 補腎陰。 猪脊髓。 填精。 牛膝。

石斛 杜仲 均治脚軟。 虎骨 強悍皆在於脛。借其氣有餘以補不足。

此補水治火。以救肺熱之劑。骨痿筋痿。同用此方者。以腎肝同一治也。

天王補心丹 見虛 治大經空虛。 血失之故。 發為肌痺。傳為脈痿。 血失無以滲灌。肉而為頑痺。不仁。

無以榮養脈絡。而為足脛縱緩。

此方內有生地。元參。以補北方。黃連。硃砂。以瀉南方。二冬。以救肺熱。人參。合

蜀取陽明之義。愚謂心氣熱而載脈痿者。宜三七口。

全虎骨一
味煎膏治
痿躄如神

愚謂若屬
濕熱者當
與黃柏相
對服

清... 濕... 也。舉動也。

也。舉動也。

原方應加減用。加米仁燥脾胃之濕。而理拘攣。松節燥血中之濕。而療腳弱。牛膝壯筋骨。治腳軟。石斛益脾胃。去濕熱。

木瓜筋急用之則舒。筋緩用之則利。有養筋之功。更有去濕之能。

此清熱燥濕健脾利水之劑。仲淳言痿屬濕熱。若果係居處濕地而得之者

可用。如有肺經燥濕咳嗽痞悶等症不可用。

衛生膏見虛勞虛弱人及老人宜服之久自神效。

此方內有二地龜甲補腎。二地梨汁清肺。參圓牛肉培胃土。牛膝虎骨壯筋

骨。以上數味。治痿甚宜。按陳氏云。痿者猶樹經杲。日葉垂下布。痿弱不振之

意。俗以陽道不舉。謂痿屬寒。甚。故痿症屬熱者多。方內尚有黃耆鹿角等

藥。必內無熱者。方可全用其方。

一人善酒。臥床褥者三年。仲淳診之。知其酒病也。夫酒本濕熱之物。多飲則陽

明濕熱甚。下容於腎而為骨痿。昔人治痿病取陽明。五味子為君。以黃連為

臣。麥冬乾葛白扁豆為佐。服之立起。

須辨

示陽痿不盡屬寒

多飲濕熱致痿治案

腎虛脚軟
治案

此論痺症
無不由風
寒濕三氣
邪之輕重
而命名行
痛着之異

此辨行痛
着三痺之
症

此論風寒
濕痺正治
之法

一少年新娶後得脚軟病。目痛甚。此腎虛也。本經言杜仲益精氣。堅筋骨。用一兩。水酒各半煎服。取速奏效。果三日能行。又三日全愈。

痺

痺症無不由風寒濕三氣雜感而成。故經曰。風寒濕三氣雜至。合而為痺也。其風氣勝者為行痺。寒氣勝者為痛痺。濕氣勝者為着痺。蓋痺者閉也。三氣雜至。則經絡閉塞。血氣不流。而痺斯作矣。三氣之中。但分邪有輕重。經言風勝寒勝。濕勝者。指病之因。行痺痛痺着痺者。言病之狀。其論肺痺心痺脾痺肝痺腎痺者。病之所屬。皮脾脈痺肌痺筋痺骨痺者。病之所在。故昔人云。風寒濕氣。所謂行痺痛痺着痺。又以所遇之時。所容之處。而命其名。非行痛着之外。別有皮脈五痺也。近惟王損菴論痺。最為有見。先以痺字提綱。後復條分。直斷之曰。行痺者。行而不定。世稱走注疼痛之類。俗名流火是也。痛痺者。疼痛苦楚。世稱痛風。白虎歷節是也。着痺者。重着不移。世稱麻木不仁之類是也。至於治痺之要。如李士材云。治行痺者。散風為主。禦寒利濕。仍不可廢。大抵參以補血之劑。蓋

此論邪鬱日久為熱當易輟尋之

此論痺症宜早治若入臟則死

解寒仍不可缺。大抵參以補脾補氣之劑。蓋土強可以勝濕。而氣足自無頑麻也。此其推本內經立說甚善。但痺而果因三氣者。治之宜然。若邪鬱病久。風變為火。寒變為熱。濕變為痛。又當易輟尋之。宜通經活血。疏散邪滯劑中。而參以降火清熱豁痰之品。勿徒泥士材治法。此義丹溪得之。在內經原有熱痺之症。非鑿說也。大抵痺而知痛。知癢者易治。不痛不仁者難醫。又宜圖之於早。遲則必至如經所謂皮痺不已。復感於邪。內舍於肺。而為肺痺。煩滿喘。嘔脈痺不已。復感於邪。內舍於心。而為心痺。煩心上氣。噎乾善噫。肌痺不已。復感於邪。內舍於脾。而為脾痺。四肢懈惰。嘔汁舌塞。筋痺不已。復感於邪。內舍於肝。而為肝痺。夜臥則驚。多飲數溲。骨痺不已。復感於邪。內舍於腎。而為腎痺。足攣不能伸。而尻以代腫。身僂不能直。而脊以代頭。五臟痺顯。而難治矣。故經曰。其入臟者死。其留連筋骨間者疼久。其留皮膚間者易已。治痺者所宜審焉。

行痺主方 治風氣勝者為行痺。不拘肢體。上下左右。骨節走痛。或痛三五日。

又移換一處。風性屬陽。善行數變。日輕夜重。晝交陽分。衛氣行表。故痛緩。夜交陽營。氣易運分。營氣稽留。衛氣歸陰。其脈閉塞。故

或紅或腫。按之極熱。風化為熱。甚而惡寒喜熱。溫則痺氣散而痛緩。寒則凝滯而痛甚。非真內有寒也。

秦艽。祛除風濕。續斷。通宣血脈。當歸。和血止痛。沒藥。破血止痛。威靈仙。其性好走。亦可橫行。痛風上下皆良。各二錢。松

節。搜骨肉之風。晚蠶砂。性燥能勝濕去風。虎骨。入骨而去風。定痛。各四錢。羌活。防風節疼痛。乃

治風去濕之要藥。各一錢。桑枝。通利關節。煮湯煎藥。頭目痛。加甘菊川芎。肩背痛。加桔梗。

倍羌活。手臂痛。加片薑黃。腰膝脚痛。加牛膝杜仲川萆薢。筋脈攣急。加羚羊

角。剉。羊脛骨。煨。紅腫疼痛。加生地黃芩。炒。

痛痺主方。治寒氣勝者為痛痺。不拘肢體。上下左右。只在一處。疼痛異常。

前方加桂枝。倍當歸。宜酒煎服。久則不宜。外用蠶沙炒熱。絹包熨之。或用牛皮膠

同薑汁化貼之。

着痺主方。治濕氣勝者為着痺。肢體重着。不能移動。疼痛麻木。

前方加蒼朮。燥。茯苓。澤瀉。天麻。主治濕痺。麻木。甚者加白蘚皮。清濕熱。療死肌。脚膝腫痛

濕熱為熱也。加黃柏防已。專去下焦濕熱。

此總以通經活血。疏散邪滯之品為主。隨所感三氣邪之輕重。及見症之寒

痛久可補

熨貼久則寒化為熱戒用雖云痛無補法然病久痛傷元氣非補氣血不可
參耆白朮地黃之屬隨宜用之凡治病用藥審明何症即投何藥須活潑潑
地不必拘定本門方藥也

金匱瓜蒞薤白湯

治痺不得卧心痛徹背者

胸中氣閉則前後俱痛

瓜蒞實

開胸中之燥痺半枚

薤白

辛溫通宣陽氣一兩

半夏

胸中如天陽氣用事痺則陽氣虛而不運津液凝而為痰故以半夏同瓜

蒞降痰

白酒煎服

取其宣通榮衛

此仲景治胸痺之神劑按嘉言云胸中如太空其陽氣所過如離照當空曠
然無外設地氣一上則窒塞有加故治胸痺者陽不主事陰氣在上之候也
故以薤白白酒通陽消陰為治不取補也

一婦患痺症右手連臂肩腫痛不能移動余用行痺主方加減治之不愈改用
草烏搜風勝濕祛寒蒼朮白朮燥濕當歸養榮乳香沒藥活血散血止痛消腫
各一兩為末每服五分陳酒調下一日二服如覺麻飲米湯即止盡劑而愈
一人胸中不舒者經年不能自名其狀嘉言投以瓜蒞薤白湯一劑而愈

麻木

寒溫痺症
正治得效
案此方用
之得當如
神
瓜蒞薤白
湯治案

此論麻木之因不一

麻木之症。有但麻而不木者。有麻木兼作者。麻為輕而木為重。木則不知痛癢寒熱。即經所謂不仁也。有因風傷衛氣。氣凝不行而致者。有因寒傷榮血。皮膚不榮。無血以和之。而致者。有因濕傷肌肉。脈理不通而致者。宜參治痺方治之。亦有因氣虛。因血少。因氣滯。因死血。因濕痰之不一。各有的症。可憑詳審投劑。庶不致悞。

養陰清熱潤燥湯

見燥

治血液苦澁。虛火作麻。甚則不仁。

原方宜加甘菊首烏秦艽之屬。手臂麻木。宜桑枝煎湯代水。兩足麻木加牛膝。

補中益氣湯

見泄瀉

果屬氣虛麻木者。主此加減。

順氣開痰飲

見中風

治肺氣鬱滯不行。麻木者。加減用之。

犀角地黄湯

見傷寒

果屬瘀血停留中宮。氣滯不行於四肢。作麻木者用之。

原方宜加桃仁紅花降香之屬。

二陳湯

見中風

果屬濕痰停留。氣滯不行。麻木者用之。

死症

虛入足膝
麻冷發厥
治案

虛火所致

鬱滯。又丹溪曰。麻是氣虛。木屬濕。疲死血。愚謂瘦弱人。麻木多。因血液枯澀。

經曰。榮氣虛則不仁。不知痛癢。衛氣虛則不用。不能舉動。俱虛則不仁且不用。肉如故也。

人身與志不相有。身不與志相有五。曰死。

一人因失意久鬱。又平日勞心。致心血耗散。孟冬晨起。忽左足五指麻冷。脩已至膝。便不省人事。良久而甦。乍醒乍迷。一日夜十餘次。咸謂痠厥。仲淳云。純是虛火。服丸藥一劑。至春覺體稍健。至四月後。丸藥不繼。而房事稍過。至六月。前症復發。良久方醒。過六日。天雨稍感寒氣。又發二次。現今兩足無力。畏寒之甚。自腹以上不畏寒。仲淳云。夫人志意不遂。則心病。房勞不節。則腎病。心腎交病。則陰陽將離。離則大病必作。以二臟不交故也。法當以麥冬。茯神。棗仁。清熱補心。蘇子。貝母。牛黃。竹瀝。降氣豁痰。以治其上。牛膝。石斛。遠志。益精補腎。強志。以治其下。更當清心寡欲。則病本必拔矣。前方中復加人參。霞天膏。各五錢。丸藥用二冬。茯神。遠志。棗仁。生地。牛膝。杜仲。五味。黃柏等藥。以石斛湯加竹瀝送下。

示暴眩仆
絕之厥最
危急

厥

厥者逆也。氣逆則亂。故忽為眩仆脫絕。是名為厥。經曰。暴厥者。不知與人言。謂卒然厥逆而不知人也。又曰。血之於氣。併走於上。則為大厥。厥則暴死。氣復返則生。不返則死。血氣併走於上。則上實下虛。下虛則陰脫。根本離絕。則暴死。若氣極而返。則陰必漸回。而可復甦。故此症最為急候。後人但以手足冷為厥。其說本於仲景傷寒論云。凡厥者。陰陽氣不相順接。便為厥。厥者。手足逆冷者是也。然豈可謂厥症止如此耶。雖內經厥論。亦以手足為言云。陽氣衰於下。則為寒厥。其論寒厥之因。則謂其人自恃質壯。於秋冬陰盛之時。縱慾以奪腎中之精氣。陽氣衰不能滲榮其經絡。陽氣日損。陰氣獨在。故手足為之寒。又云。陰氣衰於下。則為熱厥。其論熱厥之因。則謂其人醉飽入房。脾腎之陰俱傷。熱盛於中。故熱偏於身。內熱而溺赤。腎氣日衰。陽氣獨勝。故手足為之熱。景岳謂此內經辨厥之將發。以手足寒者。是為寒厥。以手足熱者。是為熱厥。註解甚明。寒熱二厥。皆由酒色致傷真元。故寒厥當益火之源。熱厥當壯水之主。與傷寒厥症。

飲食過傷。則為食厥。卒中惡邪。則為尸厥。此皆暴眩仆絕之厥。當有之病。學者詳其症以施治。則寒熱攻補。不致有悞。厥症之名甚多。不能悉數。內經厥逆諸篇。有志深造者。所當究心焉。

獨參湯 ○人參一兩至三兩 一加熟地 責之陰虛孤陽無附而欲脫 一加竹瀝 責之虛而有痰 一加童便

責之虛而有火 一加附子 責之虛而有無火

此治諸虛氣弱。危急之神方。景岳言厥逆者。直因精氣之內奪。丹溪言厥症多屬氣血虛。氣虛脈細。血虛脈大如蔥管。並宜補劑。虞天民云。其人必本體原虛。或老年人。或大病後得之。則可。若實人得此。當急治其標可也。虛實寒熱之間。最當明辨。

五磨飲

見胃脘痛

治暴怒鬱怒傷肝。牙關緊急。手足厥冷。面青身冷。

氣為人身之陽。一有拂鬱。

則陽不能四達。故肢冷身寒。

六脈沉伏

經曰無故而瘡。脈不至者。雖不治自己。謂氣暴逆也。氣復則愈。名曰氣厥。

此治氣厥之方也。經曰。大怒則形勢氣絕。而血鬱於上。使人薄厥。大怒則氣血皆逆。甚至形氣俱絕。血逆妄行。鬱積上焦。相迫曰薄。氣逆曰厥。氣血俱亂。故為薄厥。宜本方加降香三七。鬱金羚羊角之屬。

犀角地黄湯見傷寒

治惡血冲心。令人昏暈。四肢厥冷。名曰血厥。

原方宜加降香

降氣最效。行痰如神。

三七童便

行痰不峻。止血不凝。

羚羊角

去惡血。下逆氣。

甚者加花蕊

石

能使瘀血化為黃水。暇研調服一三五錢。

此方血厥者宜之。方書云。有人平居無疾苦。忽如死人。身不動搖。目閉口噤。

或微知人。眩暈移時方寤。此由出汗過多。榮血衰少。陽氣獨上。氣塞不行。故

身如死。氣過血還。陰陽復通。故移時方寤。亦名血厥。又名鬱冒。婦人尤多此

症。宜白薇湯

白薇一兩為君。當歸人參甘草。

治之。

順氣開痰飲

見中風

治熱痰壅盛昏冒。四肢厥冷。名曰痰厥。

此方熱痰厥逆者宜之。若係肥人濕痰壅盛厥逆者。則宜二陳湯合星香散。

加枳殼竹瀝姜汁之屬。

保和湯

見泄瀉

治飲食醉飽之後。或感風寒。或着氣惱。食填太陰。胃氣不行。須

臈厥逆。昏迷不醒。名曰食厥。晚村云。胃氣不行。陽併於上。其症上半身熱腹

悶。或心煩頭痛。自臍以下。至足冷如冰鐵。擁爐不熱。悞以為陰寒而溫補之。

之隨症加減

驅邪散自製

治卒中邪惡。頭面青黑。口噤眼閉。昏不知人。手足厥冷。肌膚粟起。

或錯言妄語。或直視握拳。或遍身骨節疼痛非常。

犀角

羚羊角

龍齒

虎頭骨

邪崇乘虛附人。與人之神魂相持。亦逼處不安。無隙可出。故用諸靈物之遺形。引以

羊肉之羶。俾邪崇轉附骨角。移從大便而出。俱為末。

木香

沉香

檀香

降香

各淨一錢。麝香則關閉竅。

塞。麝之辛香走竅。引芳香正氣。辟邪諸品。自內達外。則毫髮骨節俱開。邪亦從此而出。二分。

雄黃

牛黃

亦最辟邪之物。一分。硃砂

日服二次。

此方嘉言驅崇之法。加減以治中惡症。大效。

暴怒氣逆
發厥治案

一婦方食時。觸暴怒。仆地氣遂絕。用皂艾灰吹鼻不嚏。湯藥灌之不受。延至

夜半。皆謂不治。莊一生視之。六脈尚全。而獨氣口脈沉伏。細尋之滑甚。曰。此

因暴怒。怒則氣逆。冲入胃中。胃素有痰。夾食壅閉胃口。氣不得行。而暴厥也。

但歷時久。湯藥不入矣。急宜吐之可活。令以鵝翎蘸桐油。探入喉中。吐出痰

與食。纔一口氣遂通。再探吐至兩三口。便覺油臭。以手推翎。但不能言。一生

曰無妨矣。知其體怯，不宜多吐，急煎枳橘推蕩之劑灌之，盡劑而甦，後以平肝和胃藥調理數劑而安。

一閨女病多年，食減肌削，診脈時，手間筋掣肉顫，身倦氣怯。嘉言用茯神棗仁等補藥，數劑不應，因疑處女，素無家難，其神情渾似喪敗之餘，此何故也？問其面色，曰：時赤時黃，每晚睡去，口流白沫，戰慄而絕，以薑湯灌之，良久方甦。嘉言曰：此症確有邪祟附入臟腑，吾有神藥驅之一劑而愈，乃用犀角羚羊角龍齒虎威骨牡蠣粉鹿角霜人參黃芪等為末，以羊肉半斤煎濃汁三盞，盡調其末，一次服之，果得安寢，竟不再發。

疝從山取根深重着之義

疝病初起，未有不因寒受濕，其邪或結少腹，或結陰丸，或結陰丸之上下左右，而筋急絞痛，以寒主收引故也。經言諸寒收引，皆屬於腎，又腎主陰也，故仲淳以疝病責之腎虛寒濕之邪，乘虛客之所致。又按經言足陰風之脈入毛中，過陰器，抵少腹，又言足厥陰病，丈夫癰疝，婦人少腹腫，癰疝者，以其頑腫不仁也。

此論疝初起，悉因寒濕，無有不關肝腎二

丈

此論疝症
由寒包濕
熱治法大
要
此論治疝
亦當分寒
熱三氣多
少處治
此論疝有
七宜審
處治

孤疝以其如狐之出入無常也。又言足厥陰氣逆則畢丸腫卒疝實則掛虛。則暴痒。故昔人論疝病所以皆屬之肝經。要之疝病雖經言五臟膀胱小腸皆有。然無有不關於肝腎二經。秘之丹溪以為疝病皆由肝經有濕熱之邪。又得寒氣外束不得疏散。是以痛甚。宜祛逐肝經之濕熱消導下焦之瘀血。而以寒因熱用之法。立方處治。誠發前人之所未備。景岳謂方書疝症繁多。議論紛紜。難以悉舉。余求其要。大抵此症寒則多痛。熱則多縱。濕則多腫墜。虛者亦然。在血分者不移。在氣分者多動。能察其因熱因寒因濕。又當分三氣孰多孰少。為虛為實。在氣在血。分別治之。自無不效。又考子和大關巢氏七疝之謬。亦自立寒水筋血氣狐癩七疝之名。謂囊冷堅硬陰莖不舉。或連睪丸而痛。曰寒疝。治宜溫散。囊腫光亮。陰汗時出。或按少腹作水聲。曰水疝。治宜除濕。陰莖腫脹。或潰而為膿。裏急筋縮。或莖中作痛。痛極則痒。或挺縱不收。或白物如精隨溺而下。曰筋疝。治宜清火。少腹兩旁。狀如黃瓜。血滲疔囊。留而不去。結成癰腫。膿少血多。曰血疝。治宜行血。上連肩。下極囊。或因怒哭則氣脹。怒哭罷則氣散。曰氣疝。治宜開鬱快氣。卧則入少腹。立則歸囊中。出入上下。與狐相似。曰狐疝。宜用

疏氣之劑。囊大如斗如升。不痛不痒。曰癩疔。亦宜除濕之劑。後人譏其刺謬。與巢氏無異。然自丹溪以來。皆宗其說。亦未可盡非之。當合參以治可也。

茴香烏藥湯自製 治疔病初感寒邪。或寒濕兼感。未鬱為熱者。主此加減。

茴香炒研 烏藥二錢 吳茱萸湯泡三分 破故紙均治寒濕疔氣 川華解除下部濕

木瓜治筋病緩急 木香砂仁止痛 荔枝核甘溫散滯 或加猪胞為引導 研錢許

可浸酒服。○寒甚可加肉桂五分至一錢 虛甚可加人參

此辛溫散寒去濕之劑。如鬱久成熟者。不宜服之。按金匱有大烏頭煎。治寒

疔繞臍絞痛。拘急不得轉側。發則白津出。自汗冷涎皆是 手足厥冷。使人陰筋縮。其

脈沉緊者。用烏頭一味。專驅寒邪。加白蜜以潤其燥烈之性。功效最捷。如因

濕熱者。切勿悞投。

廣筆記方重訂 治疔痛。

七味丸去萸肉。加枸杞四兩 牛膝各二兩 茴香 沉香各一兩 將糯米一升。拌藥

如常造白酒法。俟漿足。用燒酒十五斤。入槽中。封置大罈內。一月用。空心

饒時飲一二枚神驗

此方腎虛人感寒濕成疝作痛者宜之

金鈴黃柏散自製 治諸疝病屬濕熱者主此加減

金鈴子導小腸膀胱濕熱疝氣要藥去核 黃柏苦寒除濕熱 車前 茯苓各二錢 澤瀉利水滲濕川熱錢許

華蘼同熱藥去寒濕同涼藥去濕熱五錢 元胡 查肉行瘀血各二錢 青皮疏滯氣錢許 橘核苦平下氣最止疝痛炒研

五錢如濕熱內縕寒氣外束者加茴香吳茱萸以散外寒錢許 外煎濃紫蘇湯薰

洗如墜逆氣檳榔代赭石散瘀血蒲黃五靈脂清肝火龍膽黑山梔舒筋矜

羊角燥濕蒼朮隨宜採用

此苦寒清熱去濕之劑合丹溪治疝法也

海藏瀉腎湯見火 治疝痛

原方宜加知母黃柏牛膝車前橘核之屬

此方腎虛人濕熱疝痛者宜之

龍膽瀉肝湯見脇痛 治肝經濕熱火旺莖中作痛裏急筋縮或作癢或作挺縱

不收白物如精隨溺而下名曰筋疝主此加減

寒經症
治案

婦人寒症
少腹痛治
案

此方但責之肝經。濕熱火旺。腎不虛者宜之。

一人嗜火酒。能飲五升。五月間。入閩中。溪水驟漲。涉水至七里。覺腹痛之甚。半年後。右丸腫大。漸如斗形。醫者皆與肝經之劑。及濕熱之品。半年無功。士材曰。嗜火酒則濕熱滿中。涉大水則濕寒外束。今病在右。正是脾肺之濕。下注。畢丸。以胃苓湯加黃柏。梔子。枳殼。茴香。十劑而畧減。即以為丸。服至十八斤而安。不再發矣。

趙氏云。余於舟中。悞坐濕布風帆。因感寒濕。忽一日陰丸一枚。患腫痛。發熱。用瀉腎湯。加柴胡。吳萸。散肝經之寒。濕。獨活。桂枝。散腎經之寒。濕。一劑熱退。再劑腫消。後每治偏墜。頗效。

一婦人。冬月生產。寒入子戶。腹下痛不可忍。醫作瘀血下之。寇宗奭非之曰。此寒症也。仲景羊肉湯。治寒疝腹中痛。及脇痛裏急。無不驗者。孫思邈言。羊肉止虛痛。利產婦。遂以羊肉為君。溫補榮衛。臣以生薑。宣散寒邪。佐以當歸。溫中活血。二劑果愈。

顧氏醫鏡卷十四

吳門花洲顧靖遠松園著

培程 簡亦可參校
男 元宰叙揆手錄
費左國揖濟臣校字

症方發明 六

頭痛 眩暈 目病 耳病 胃脘痛
胸痛 心痛 腹痛 疝 腰痛 脇痛

頭痛

此言頭痛 論標本總 宜先治之
此言頭痛 各有不同 治亦不同

頭為天象。六脈清陽之氣。五臟精華之血。皆會於此。故外感六淫之邪。與臟腑上逆之氣。或蔽覆其清明。或瘀塞其經絡。咸能作痛。昔人云。頭者身之元首。一有痛楚。無論標本。宜先治焉。但致痛之因不一。宜各類推求之。如因外感六淫之邪。而頭痛者。當辨明何邪。何經。而從本門以施治。有陰虛頭痛者。必扶腎虛內熱之症。六味湯加減。有血虛頭痛者。痛在日晚。四物湯加減。有氣虛頭痛者。痛在清晨。補中益氣加減。有扶邪熱頭痛者。宜辛寒解散。有扶痰頭痛者。宜豁痰降氣。飲食自倍。胃氣不行。壅逆頭痛者。宜消食下氣。怒氣傷肝。肝氣暴逆。上冲頭痛者。宜平肝降氣。眉稜骨痛。多屬陰虛血少。治宜補血益陰。然亦有扶外邪者。亦當審察。須知淺而暴者。但名頭痛。深而遠者。即為頭風。作止不常。愈後

復發。昔人分偏左痛為血虛。偏右痛為氣熱。仲淳則俱責之血虛。肝家有熱。以養血清熱為主。若治之不急。必致損目。經為東風。生於春。病在肝。目者。肝之竅。肝風動。則邪害空竅矣。察內外之因。分虛實之症。胸中洞然。則手到病除矣。

疏邪利金湯

見傷寒

羌防香蘇散

葛根湯

小柴胡湯

柴胡丹皮湯

柴

胡骨皮湯

竹葉石膏湯

俱見傷寒

羌活勝湯

活人敗毒散

俱見濕

此九方外感六淫之邪。而頭痛者。須審明何邪何經。而分別治之。

清上散

自製

治風熱大熱頭痛。亦治偏頭風痛。有實火者。

石膏

辛能散邪。寒能消熱。

薄荷

辛能發散。涼能清利。

甘菊

養血清熱。

忍冬

黑豆

祛風除濕。

枯黃芩

酒炒

陳松

蘿藦

降上吹

可用土茯苓

祛風祛濁

分煎三四兩

煎湯煎藥

熱極目昏便燥者。可加酒蒸

大黃

此散邪清熱降火之劑。功勝清寧膏。

二陳湯

見中風

治肥人濕痰滿中。氣壅逆上。頭痛眩運。

宜加天麻

痰厥頭痛。非半夏不瘳。風虛眩運。非天麻不除。

枳殼

木香

砂仁

利氣以氣滯

黃芩

瀉火

以氣清則

陰虛有痰
忌二陳湯

此方果係肥人。內有濕痰。以致頭痛眩運者。用之自效。若陰虛內熱有痰者。此方不可與也。

保合丸 見泄瀉 治飲食自倍。胃氣不行。壅逆頭痛。主此加減。

宜加香附紫蘇淡豉 理氣消食。倘兼感風寒。又能散邪。 因傷酒。加葛根 甘菊 松蘿 以解毒

此方總宜消食為主。絕不用風藥者。所謂治病必求其本也。

沉香降氣散 見喘 治怒氣傷肝。肝氣暴逆。上冲頭痛。主此加減。

宜加甘菊 鈎藤 羚羊角 平肝除熱。羚羊角則兼下逆氣。 萊菔 下氣 松蘿 降火

此方總以降氣為主。蓋大怒則氣血俱逆。切忌辛散升提之品。

六味地黃湯 見虛勞 治陰虛火逆。冲上頭痛。 必有腎虛諸症

宜加甘菊 銀花 二冬 補陰益血清熱 牛膝 枸杞 補腎益精填髓 白芍或五味或烏梅。

欬撮虛火下降

此方腎水虛衰。火無所制。上炎頭痛者。用以壯水滋陰清熱。欬撮虛火下降。

則痛自止。若用辛散風藥。是反耗腎中之水。助炎上之火矣。凡平素陰虛人。

患此者。當察果無外邪症候。酸收之品。不必致疑。

陰虛火炎
頭痛無外
邪者不忌
酸收

四物湯 治血虛火炎頭痛。如使血崩淋。產後多有患此者。自眉尖後近髮際上攻而痛。痛在

日晚。血為陰。陰虛故交陰分而痛作。所謂內傷頭痛時作時止者是。亦治偏頭風痛。

地黃。生涼血。熱補血。白芍。飲血。涼血。當歸。和血。川芎。血中氣藥。卒散上。加姜蕤。滋陰益精。枸杞。

益肝養榮。宜參六味。加用諸藥。

此補血之劑。果屬血虛無外邪者。用之自效。若兼挾外邪者。宜去飲攝之品。加荊芥天麻之屬。

補中益氣湯。見泄瀉。治氣虛頭痛。痛在清晨。氣為陽。陽虛故交陽分而痛作。

宜加姜蕤。補中益氣。甘菊 川芎

此責脾胃陽虛衰弱。不能上升。故用升清陽。益中氣。則痛自止。然世人之患氣虛者甚少。必其人面色黃白無神。四肢倦怠。嗜卧食少。體羸溼泄。並無陰虛內熱症候者。方為對症。若誤施陰虛火炎頭痛。為害不淺。此方嘉言論之甚明。用者審之。

真頭痛。頭痛甚。腦盡痛。手足寒至節。死不治。一云火炎水滅。一云元陽敗竭。陰邪直中腦海。總之為火為寒。皆主

陰虛火炎
頭痛忌用
湯中益氣

治血虛火
炎頭痛案

治頭風案

治陰虛頭
痛用六味
加減效

頭風屬鬱
熱

一女子頭痛作嘔米飲不納仲淳云因於血熱血虛火上炎所致用白芷三錢

涼血。斂逆氣。甘菊二錢。益血治頭痛。麥冬三錢。清胃止嘔吐。木瓜和胃制肝
止嘔。蘇子茯苓橘紅各二錢。枇杷葉三大片。竹瀝一杯。降氣消痰止嘔。蘆根
汁一杯。除熱降火止嘔。烏枚二枚。斂攝虛火下降。二劑嘔止。頭尚痛。加天冬
二錢。頭痛少緩。再加土茯苓二兩。黑小豆一撮。全愈。

一婦患頭風痛甚。欲自縊。用金銀花三錢。元參一錢。清熱。防風蔓荊天麻各一
錢。川芎辛夷各五分。散風。加燈心三十莖。松蘿五錢。黑豆一撮。以土茯苓四
兩。煎湯煎藥。二劑而痛止。數年不發。

一儒者酒色過度。頭腦及兩脇作痛。立齋曰。此腎虛而肝病也。用六味丸料。加
柴胡當歸而安。

一人素陰虛夢遺。患頭痛。用風藥不效。余用六味。加甘菊鈎藤二冬白芍黑豆
松蘿。用土茯苓三兩。煎湯代水。三劑全愈。

一人素患頭風。暑月偶感風寒。復作。綿帕包裹。始覺少安。余曰。此症明醫雜著
言屬鬱熱。本熱而標寒。因內有鬱熱。毛孔常疏。故風寒易入。外寒束其內熱。

閉逆而為痛。辛熱之藥。雖能開通閉逆。散其標之寒邪。然以熱濟熱。病本益深。惡寒愈甚矣。當涼血清火為主。而佐以辛溫散表之劑。用清上散。加防風川芎等藥而愈。

附廣筆記治腦滿效方。主此加減。

薄荷 牛旁 桑皮 麥冬清肺 柴胡 甘菊花 白芍藥 羚羊角清肝 生

地 天冬 元參補養腎水 犀角 連翹 硃砂鎮墜心火

腦者。諸陽之會。而為髓之海。其位高。其氣清。忽下濁者。其變也。內經曰。上焦

元氣不足。則腦為之不滿。又云。膽移熱於腦。則為鼻淵。夫髓者。至精之物。為

水之屬。腦者。至陽之物。清氣所居。今為濁氣邪熱所干。遂下臭濁之汁。是火

能消物。腦有所傷也。治之天法。宜清肺肝膽三經之熱。以鼻乃肺竅。而為腦

氣宣通之路。又治乎上焦。而行清肅之令。膽為春升少陽之氣。與厥陰表裏

而上屬於腦。經為肝熱所干。故也。又宜兼補養腎水。鎮墜心火。使水旺制火。

火不上炎。灼肺。而金水得平。則此疾庶可得愈。

眩暈之因
不一

治眩大旨

眩暈者。目花黑暗。旋倒也。其狀頭眩目閉。身轉而聾。如立舟車之上。經曰。諸風掉眩。皆屬於肝。又曰。髓海不足。則腦轉耳鳴。脛痠眩冒。故仲淳以眩暈責之肝血少。兼腎水虛所致。丹溪云。無痰不作眩。痰在上。火在下。火炎上而動其痰。故作眩暈。然致眩之因亦不一。有外感六淫之邪。而眩暈者。宜各從本門以施治。如因血少陰虛者。補其肝腎。因火炎痰動者。治其痰火。有因氣虛眩暈者。宜用異功補中益氣之屬。因失血過多。或上或下皆是眩暈者。選用保陰集靈歸脾之屬。有腎中陽衰。濁陰上逆。眩暈者。最惡之候。急用人參。沉砂。八味之屬。直達陽氣。歸原為主。有產婦眩暈。不省人事。謂之血暈。亦最惡之候。治在本門。大抵人肥白。而作眩者。多宜消痰降火。或兼補氣之藥。人黑瘦。而作眩者。治宜滋陰補腎。而兼養肝之劑。此治眩暈之大旨也。

逍遙散 見虛勞

宜加甘菊 鈎藤 平肝降眩要藥。通可加用。 因肝血虛者。再加棗仁。枸杞。因肝火甚者。用

加味逍遙。再加羚羊。羊角。天麻。

此肝經之要藥。諸風掉眩屬肝。通主此。加減治之。

六味湯

左歸飲

俱見虛勞

宜加甘菊

鉤藤

白芍

丹溪言治眩運藥中宜加制肝藥為佐使。菊藤雖言平木。白芍雖言制肝。然皆不剋伐。

棗仁

補肝養陰。牛膝填髓。

此二方眩運屬腎水虛者。通可採用。

保陰煎

集靈膏

歸脾湯

俱見虛勞

此三方眩運屬血虛者。宜分別用之。如吐衄過多。有肺熱痰嗽者。則宜保陰。加甘菊鉤藤白芍棗仁。無肺熱者。可用集靈膏。加上藥。崩漏便血。及產後失血過多。則宜歸脾。加甘菊鉤藤地芍天冬之屬。亦有不宜者。仍用保陰之屬。

異功散

見中風

補中益氣湯

見泄瀉

此二方眩運屬氣者。可採用之。

二陳湯

見中風

宜加天麻

枳殼

香砂。如挾火者。加芩連。挾虛者加參朮。此治濕痰厥逆。

眩運之劑。

一婦時多暴怒。以致經水復止。入秋以來。漸覺氣逆上厥。如畏舟舡之狀。動輒

運去久久卧於床中時若天翻地覆不能強起百般醫治不效因用人參三
五分。畧寧片刻。最後服至五錢。一劑。病轉凶危。大熱引飲。腦痛如刀劈。食少
溺多。已治棺本無他望矣。嘉言診之。許以可救。蓋怒甚則血鬱於上。而氣不
返於下者。名曰厥巔疾。厥者逆也。巔者高也。氣與血俱逆於高巔。故動輒眩
運也。又以上盛下虛者。過在足少陽膽經。膽之穴皆絡於腦。鬱怒之火。上攻
於腦。得補而熾。其痛如劈。因為厥巔之疾也。風火相煽。故振搖而熱。蒸土木
相凌。故艱食而多瀉也。於是會內經鐵落鎮墜之意。以代赭石龍膽草蘆薈
黃連之屬。降其上逆之氣。以三七丹皮赤芍之屬。行其上腕之血。以龍骨牡
蠣五味之屬。斂其浮遊之神。最要在每劑藥中。生入猪膽汁二枚。蓋以少陽
熱熾。膽汁必乾。亟以同類之物濟之。藥一入口。便覺神返。其舍忘其口苦。連
盡十數劑。服猪膽汁二十餘枚。熱退身涼。飲食有加。便瀉自止。始能起牀。行
動數武。然尚覺身輕如葉。不能久支。恐藥味太苦。不宜多服。減去猪膽龍薈。
加入當歸一錢。人參三分。薑湯為引。平調數日全愈。

一人運忌寒形體倦怠。得食少愈。勞而益甚。立齋曰。此脾肺虛弱。用補中益氣

加蔓荊子而愈。

一人臍下有熱氣上冲。甚則有時眩暈。此腎虛不能納氣歸元也。余以人參二錢。熟地一兩。砂仁二錢。服之而愈。

一人因房勞過度。氣短頭暈吐痰。服辛香之劑。痰甚遺尿。兩尺脈浮大。按之如無。立齋曰。此腎虛不能納氣歸元。而為頭暈。不能攝水。而為痰涎。香燥致甚。耳用八味丸料。三劑而愈。

目病

治目當養
肝血補腎
水清心安
神理脾胃

目者肝之竅。經曰。肝受血而能視。又肝虛則目眈眈無所見。又曰。五十歲肝氣始衰。肝葉始薄。膽汁始減。目視不明。以肝為木臟。木得水則榮。失水則枯也。又曰。腎之精為瞳子。又曰。腎病則目眈眈無所見。蓋目之精明在瞳子。故真水內虧。必目多昏黑。譬之水淺渾濁。則不能照物。故絕無障翳遮睛。是以治目者。當養肝血。補腎水為主。然經又言心者。五臟之轉精也。目者其竅也。又云。目者心使也。心者神之舍也。因事冗心煩。則神勞血虛火旺。而目病。故清心養血安神。

此言大怒
神散因物
擊傷過哀
失明之不
治

失血過多

精氣皆失所司。不能歸明於目也。是則脾胃所宜理也。故仲淳治目病。每用杞菊地黃丸。天王補心丹二方。朝夕並進。藥品甘寒。不傷脾胃。故云久服自效。深合六經東垣之旨。丹溪云。目能遠視不能近視者。腎水虛也。宜地黃丸。目能近視不能遠視者。心血少也。宜補心丹。倪氏云。心為君火。肝為相火。火炎無治。神水受傷。上為內障。又言諸脈皆屬於目。相火者。心胞火。主百脈。上榮於目。火盛則百脈沸騰。上為內障。其症初起。視物微昏。空中常見黑花。神水色變淡綠。急宜杞菊地黃丸。補心丹治之。次則視歧。視一成二。色變淡白。失此不治。久則不能視物。色變純白。水為廢疾。此症亦有因暴怒傷肝。致神水漸散昏花者。急宜滋腎水。養肝血。收其散大之神。瞳鎮其上。沖之逆氣。當宜杞菊地黃丸。合磁硃丸治之。但內障之病。最為難療。服藥須累月經年。又當遠房幃。戒惱怒。釋憂思。免勞碌。庶幾有效。不然必廢。經不可復。或有因大怒氣逆上沖空竅。神水隨散。此屬不治之症。又有因為物所擊。神水隨散者。亦不可治。有因悲哀過度。淚多液竭。漸至喪明者。內經名曰奪精。亦最難治。有因諸失血過多。睛珠作痛。不能視

風熱目痛
暴赤腫諸
病

物羞明。淚溢。眼睫無力者。但宜滋陰養血為主。杞菊地黃丸加減。加白芍胡麻
天冬人乳之屬。若目暴赤腫。多淚痛癢。羞明緊澁者。此屬肝經火盛。血熱宜涼
血清火。或熱亟生風。是為內發。或因熱而召。是為外來。統於涼血清火藥中。加
薄荷荊柴之屬。蓋亟熱則翳生。加之以風則更易。譬之豆漿在鍋下。以火燔之。
上以風揚之。翳即生焉。治之者但熄其風火。復加退翳之藥。其明自復。又如塵
蒙清水之面。拂去之。而仍能照物也。經言熱甚。目冥眼黑。仲景言傷寒病。熱極
則不識人。皆由熱氣拂鬱於目。而致之然也。正理論云。目昏而見黑花者。由熱
氣甚而發之於目。亢則害。承乃制。而反見其象。又衝風而即淚下者。經言火氣
燔目。故見風則淚下。譬之火疾風生。乃能雨也。張子和云。夫目之五輪。乃五臟
之精華。宗脈之所聚。故經以腎之精為瞳子。肝之精為黑珠。肺之精為白珠。心
之精為背絡。脾之精為眼胞。此人皆知之。及有目疾。則不知疾之理。豈知目不
因火則不病。故白輪病赤。火乘肺也。肉輪赤腫。火乘脾也。赤脈貫目。心火自甚
也。黑水神光被翳。火乘肝與腎也。能治火者。一句可了。趙氏云。子和一句可了。

且一未寒涼治火。余用止水。亦一。

杞菊地黄丸煎服亦作煎服通治肝血腎水虛衰。目主此加減。

六味去澤瀉嫌其利小便而昏目故也。枸杞補腎精。益肝血。甘菊養目血。麥冬清心。則

而神水不受傷。清肺則滋不足之腎水。北五味大之。收散。白蒺藜補肝明目。炒。可

合磁硃丸用。磁石四兩。入腎鎮養真精。使腎水不外移。硃砂二兩。入心清鎮。

用最效。如養血白芍胡麻柏仁清腎熱元參女貞龜甲清肝熱羚羊角犀角

兼能退翳槐角兼止熱淚。須用羊肝為引導。退翳決明穀精木賊隨意採用。蜜丸相

子大。空心淡鹽湯下四錢。

此方滋陰固精明目。不寒不熱。和平之劑。久服最效。

天王補心丹見虛勞。因事冗心。煩致神勞。血虛火旺。而目病者用之。

此生精養血。清熱鎮心安神之劑。仲淳云。世醫治目。多補腎。不知補心。予於

目疾久不愈者。令朝服杞菊地黄丸。晚服天王補心丹。久久自效。

廣筆記方。治虛人目疾。下焦有濕熱者。

生地。枸杞補肝腎。麥冬清心火。龍膽草清下焦濕熱。治目赤腫痛。酒炒一錢。如脾氣不佳。加白

菟仁末五六分。

清肝明目飲自製 治目暴赤腫多淚痛癢羞明緊澁等症。

龍膽草酒炒 槐角 黃芩清肝膽之火 連翹仁清心胞 黑山梔 木通利水

生地 元參壯水以 赤芍涼血行滯以血熱 生甘草瀉火緩急以火 甘菊祛

除熱而治 薄荷消風散熱而 熱甚便秘者加酒蒸大黃通泄其熱所謂 火甚

者加黃連瀉心 或胡黃連瀉肝 赤腫痛甚者宜用三稜針刺破眼眶腫處摺

出熱血立解經謂火實宜決之遲 外用人乳浸黃連入冰片少許點之內服

寒以瀉火是釜底去薪之義外點佐辛溫以散邪 火鬱則發之義毋過用寒涼點洗以遏火在內。

此一脈苦寒瀉火之劑宜中病即止久服傷胃蓋暫用之藥也。

決明夜靈散 治日至夜則昏雖有燈月亦不能覩俗名雀盲。

石決明鹹寒入血除 夜明沙辛寒乃蚊蚋之眼夜視光明故主明 豬肝或羊

肝導引 將肝竹刀切作二片以二藥末鋪於一片上以一片合之用麻纏

定勿令藥泄出用米泔水一大碗沙鍋內煮至半碗臨臥連肝藥汁盡食之

鵝不食草

解毒二錢

青黛清熱川芎

散邪各一錢

為細末先噙水滿口以少許搐入鼻內

淚出為度

此方宜常用搐之使邪毒有出路則易愈

仲淳洗眼方

皮硝

治風眼紅爛赤腫作痛一兩

側柏葉

去風濕三錢

甘菊

杏仁

散風熱

桑白皮

瀉火散血各五錢銅

綠

明礬除熱燥濕各三錢

河水五碗煎二大碗置銅盆內頻頻洗眼及眉稜骨兩

太陽淚出即爽然一服冬可半月夏日

飛絲塵垢入目方

磨京墨濃汁點入目中立出

一人病後眼花以枸杞生地各一斤熬膏蜜收服之立愈

一人患風淚眼每出則流淚盈頰仲淳用穀精草為君蒺藜枸杞之屬佐之羊

肝為丸不終劑而愈

一人患目赤流淚或痛或癢用二百味花草膏

羊膽一枚去其中脂入蜜拌勻蒸之候乾研膏方名以蜂採百

杞地膏治病後眼花

二百味花草膏治目

赤淚流

花羊食百
草故也 頻挑噲化三日全愈

黃連羊肝丸治翳盲

夜明沙治血瘀目盲

治過食辛熱腫子散大

治疳積失明效

一人患翳障青盲已逾年矣用黃連一兩羊肝一具煮爛丸服不數月而復明
一人患赤眼而食蟹遂成目盲已五年矣用夜明沙去目中惡血當歸生目中
新血蟬退木賊退目中障翳各一兩羊肝四兩煮爛丸服百日復明

一人冬初同蒜食肉醉卧煖坑次日兩瞳子散大於黃睛視物無的以小為大
卒然見非常之處行走踏空醫藥不效至明春求治於東垣東垣謂曰此由
食辛熱過多辛則主散熱則助火上乘於目瞳神因之散大精散故視物亦
散大也當以芩連苦寒瀉火為君二地二冬白芍骨皮滋陰涼血清熱為臣
五味酸收瞳神散大為佐則自愈矣

一老人忽盲他無所苦丹溪以大虛治之令急煎人參膏二斤服二日一醫與
礞石藥丹溪云今夜必死果然此經所謂氣脫者目不明再加鎮墜則其氣
立斷矣

一童子患疳疾失明余用真蘆薈黃連治疳熱五穀蟲消疳積使君子殺蟲石

久瀉久痢者。再加肉果三錢。

滋陰清肺湯

治目赤痛疼。黑味起薄螺。亦能消退。

金石斛

錢二 只壳 錢二

西歸身

兩 南桑皮 一兩 生用

川芎

錢三 蕤仁 一兩 研

赤芍

兩 新蒙花

六草

錢三 决明 錢三

元參

錢三 女貞子 錢三

夏枯草

錢三 連翹 錢三

棗仁

錢二 燈心 為引。

耳病

此論治耳以補腎為主

此論治耳之因雖不一然皆屬熱

耳為腎之外候。以腎開竅於耳也。經曰。腎氣通於耳。腎和則耳能聞五音矣。又

曰。液脫者腦髓消。脛痠耳數鳴。又曰。精脫者耳聾。故治耳者。當以補腎為主。然

有因外感而耳聾者。如經言手少陽三焦。是動則病耳聾。輝輝焯焯。蓋熱邪感

入少陽。熱氣拂鬱故也。仲景言少陽中風。兩耳無所聞。目赤。蓋言肝經之風熱

上壅故也。宜從本門以施治。有因氣逆而耳聾者。如惱怒則氣上逆。肝膽之火

客於耳也。宜平肝降氣清火。有痰火上升。鬱於耳而為鳴。甚則閉塞者。多緣飲

酒厚味所致。宜消痰降火。有因氣虛因血虛而聾者。以補氣補血為主。各加降

火之品。丹溪言耳聾皆屬於熱。誠哉是言。若人瘦面黑。筋強骨勁而聾者。此精

氣俱足。乃壽考之徵。不須治之。趙氏云。耳鳴以手按之而不鳴。或少減者。虛也。手按之而愈鳴者。實也。不可不察。又嘉言云。人當五十以外。腎水漸衰。真火易露。故腎中之氣。易出難收。况有肝木之子。疏泄母氣。而散於外。是為謀慮鬱怒之火。一動。腎氣從之上逆。耳竅窒塞不清。較之聾病天淵。聾病因竅中另有一膜。遮蔽外氣。不能內入。故以菖蒲麝香等藥。開竅為治。不知腎氣至上竅。亦隔一膜。不能越出竅外。止於竅中。汨汨有聲。如蛙鼓蚊鑼。鼓吹不已。故外入之聲。為其內聲所混。聽之不清。若氣不上逆。則聽清矣。故余悟此理。凡治高年逆上之氣。屢有奇效。立方施治。大意全以磁石為主。以其黑色入腎。重能達下。又能制肝木。復以地黃龜膠。羣陰之藥。補之。更用五味山茱之酸。以收之。令腎氣歸元。聽自清矣。夫收攝腎氣。乃謂治老人之先務。不可不知。又有耳瘡耳腫耳鳴耳癢。薛氏云。皆屬肝經風熱。血虛火盛。或腎經虛火等因。宜審施治。

八仙丸

左歸丸

左歸飲

保陰煎

俱見虛勞

腎虛耳中潮聲蟬聲。無休止時。

妨害聽聞者。選而用之。

耳瘡耳腫耳痛耳癢。屬腎經虛火。亦宜審治。

內五味加花粉肝氣。破石降於腎。則熱自除。石薑黃。膿血少許。

黛黃柏為末吹之。耳膿多。屬肝熱。此皆壯水之劑。

龍膽瀉肝湯見脇痛。治惱怒氣逆。肝火上冲而聾者。

宜加羚羊角平肝火。下逆氣。代赭石性寒質重。降火鎮逆。

此瀉肝火之要劑。其平肝降氣鎮逆之品。在所必加。

消痰降火湯自製。治痰上升而聾者。

貝母 瓜蒌霜 花粉 茯苓清痰蘇子 橘紅 枳殼利氣連翹 黃芩降火加

竹瀝梨汁。甚者加黃連。如醇酒厚味過度。壯實者可用礞石滾痰丸。

此消痰利氣降火之劑。如肥人濕痰。則以二陳加降火之藥。

一婦耳內外腫痛。胸脇不利。寒熱往來。小便不調。立齊曰。此肝火傷血所致。先

用龍膽瀉肝湯四劑。諸症頓退。又用加味道遙散而愈。

一人耳內不時作痛。痛極欲死。痛止如故。立齊診之。六脈皆安。意其有蟲誤入。

令急取貓尿生薑擦鼻自出。滴耳。果出臭蟲而安。

一小兒患耳聾。經年服藥不效。殊不知此腎府也。用六味丸加桑螵蛸。服之而

蟲入耳

肝火耳腫

小兒耳膿

愈。

胃脘痛

胸痛心痛腹痛附

真心痛必
死

心痛胃痛
胸痛之辨

胃痛之因
不一

胃脘痛。俗呼心痛。蓋胃之上口名賁門。與心相近。故經亦言胃脘當心而痛。若真心痛必死。經曰。心者五臟六腑之大主也。精神之所舍也。其臟堅固。邪不能容也。容之則心傷。心傷則神去。神去則死矣。故諸邪之在心者。皆在於心之包絡。其心痛之與包絡痛別者。包絡之痛。在兩乳中間。其與胃脘痛別者。心痛在歧骨陷處。胃脘痛在心之下。其與胸痛別者。胸痛在心之上。橫滿胸間也。但胸痛宜分屬肺屬心屬肝。辨之既明。治之自效。而胃痛之因亦異。有因氣鬱。因血瘀。因食積。因痰飲。因寒。因火。因蟲。因虛之不同。宜分別而治之。胞絡之痛。皆因思慮傷神。涸血所致。須參胃痛之條分治。但無食耳。按丹溪云。治胃痛宜分新久。若明知身受寒氣。口食寒物。於初病之時。當用溫散溫利之劑。若稍久則鬱蒸成熟。再用溫劑。寧不助火添痛乎。故古方多用山梔為君。稍加溫熱。為之向导。則邪易伏。病易起。腹痛之因。亦同胃痛。分治但有應下一法。又須辨其因食積。因瘀血。因痰飲之異。更宜分別。

之火相鬱而成。故初起時。急宜清熱解毒。涼血破瘀之劑。下之。須參外科諸書治之。則善。按景岳云。近世治痛。有以諸痛為實痛。無補法者。有以通則不痛。痛則不通者。有以痛隨利減者。皆為不治之法。不知形實病實。便秘不通者。乃為相宜。若形弱脈弱。食少便泄者。豈容混治。須知拒按者為實。可按者為虛。痛而脈閉者多實。不脈不閉者多虛。喜寒者多實。愛熱者多虛。飽則甚者多實。飢則甚者多虛。脈實氣粗者多實。脈少氣虛者多虛。新病年壯者多實。久病年老者多虛。補而不效者多實。攻而愈劇者多虛。必以望聞問切。四者詳辨。則虛實自明。仲景云。陽明中土。萬物所歸。故世人之患胃痛腹痛者甚多。而其治病之因。亦難以悉數。臨症之際。當潛心會通各門。參究施治。庶不致誤。

芍甘湯 胃脘心腹諸痛。主此隨症加減。

白芍 制肝補脾和血止痛。酒炒三四錢。 甘草 和中緩痛。炙錢許。 可加枳殼 橘紅 香附 製各二錢 木

香 荳蔻 快氣各五分。五七分。 元胡 鬱金 行瘀各一二錢。 山查 麥芽 化食 蘇子 炒 茯苓 清痰各二錢

如挾熱 時作時止。得熱更甚。 本方採加芩連山梔川棟 瀉火則痛自止 羚羊角 能療腹 如挾寒 痛熱滿

本方採加桂附乾薑沉香溫中則吳茱萸能除腹痛冷服扶虛重按之則痛緩本方採加參

朮當歸氣旺脾健血充虛痛自止

此方以芍甘湯為主。乃健脾最勝之劑。能治血虛腹痛。夫邪之所湊。其氣必虛。故須此二味。又凡痛定因氣滯。氣滯則血為之凝。凝為之結。食亦為不消。以上加入諸藥。皆快氣行瘀。消食化瘦之品。常用頗效。至若挾熱挾寒挾虛。各隨其所宜。而加的藥以治之。

四磨湯 胃脘胸腹因氣鬱不舒。否結脹滿。攻刺而痛者宜之。

木香 真沉香調氣開鬱枳實 尖檳榔降氣破結加烏藥名五磨飲。白湯磨服。

此一脈調氣降氣之劑。氣實者宜之。

聚寶丹 凡一切因氣滯血凝作痛者。用俱神效。

木香 沉香 砂仁各三錢麝香快氣八分元胡 乳香 沒藥各三錢真血竭活血一錢

五分。另研入藥。若同藥研。即化為塵。為細末。糯米糊丸。彈子。硃砂為衣。或酒或隨症。用湯化服。

此快氣活血之劑。昔人謂其能治胃脘寒痰結阻。致反胃嘔吐。飲食不進者。

亦甚神驗。乃痰隨氣降之義。

失笑散 治胃脘腹痛因癆血傳留滿痛拒按

蒲黃 涼血 活血 五靈脂 散血 活血 何氏加元胡 山查 赤芍 沒藥 薑黃 行瘀 去寒

檳榔 破滯 氣 木通 通脈 血 臨服入鹽酒 一二匙 血軟 堅 可加犀角 辛寒 破血 蓄 羚羊角 鹹寒 去惡

血。如可下者。宜桃仁承氣加減下之。

此係何氏秘方。稱其能治九種心疼。諸藥不應者。蓋以痛久氣滯血凝。用此

得效者。血行則氣和而痛止也。

保合丸 見泄瀉 治傷食胃脘腹痛 如食在上 胸膈飽悶 愛腐吞酸 如食在中 腹滿硬痛 拒按 如食在下 繞臍硬痛 拒按

主此加減 外用陳糟炒熟 加鹽麝 熨之內已熱甚者忌之 如可下者。宜承氣湯之屬下之。

二陳湯 見中風 治胃脘胸腹。因停痰留飲作痛。或吐清涎。或發眩暈。主此加減。

如可下者。礞石丸微利之。

黃芩湯 竹葉石膏湯 俱見傷寒 治胃脘胸腹。因火熱痛甚者。選而用之。

香蘇散 見傷寒 治外感寒。內食冷。胃脘心腹作痛。宜加草薺菴 生薑 散寒 溫中

香砂 利氣 止痛 甚者加桂心 吳茱萸等 治心腹 冷痛

蓋落湯 言蓋落 痛即止 治胃脘心腹。因虛寒痛者。

胡桃肉

益命門火。則寒可除。利三焦氣。則痛自止。三枚。

大棗

同胡桃肉。補脾胃而兼溫。同生薑。調營衛而兼散。三枚。去核。夾桃肉紙裏煨熟。

生薑

三片煎湯。細嚼。送下。水不再發。

可加辰砂

如果虛寒甚者。可選用理中湯參附湯之

屬。

檳黃丸

胃脘心腹。因蟲作痛。痛有休止。面生白瘡。或吐清水。淡食。而饑則痛。

厚味而飽則安。宜於上半月服之。

蟲頭向上故也。下半月則蟲頭向下。先食雞肉汁。或蜜或糖。引之向上。然後服藥。

雞心檳榔

雄黃

製綠礬

皆主殺蟲。

等分為末。飯丸。米大。空心。每服一錢。至三

錢。量人虛實用之。

萬應膏

下蟲積如神。

雷丸

醋煮。檳榔殺蟲。黑丑下蟲積之逆藥。

大黃

攻積滯之要品。各六兩。

木香

一兩。

沉香

氣芳引蟲食。氣利使積行。五錢。

共為末。用皂莢苦楝根各四兩。煎湯。泛為丸。菴豆大。外用二香末為衣。每服

一錢。至三錢。五更時沙糖湯下。

異功散

見中風。

歸脾湯

見虛勞。

胃脘心腹。因虛而痛者。宜主此。加減治之。

此數方。或因食因瘦。因熱因寒。因蟲因虛。宜各審明而採用之。

余觀薛案
論婦人腸
癰多因經
行產後瘀
血所致每
主此方加
減下血或
膿而愈以
其識早治
故也

或婦人腸癰... 經言熱盛於中。或肌膚甲錯如鱗。血瘀成癰。不脈數者。宜此方急下之。

大黃 芒硝 散瘀毒。治腸癰。五錢。宜加犀角。散邪清熱。涼。 猪懸蹄甲 去腹中伏熱。能治腸癰。酒炙研末。三錢。

苡仁 利腸胃。消腫毒。 鮮金銀藤數兩。煎湯煎藥。再加紫花地丁一二兩。同煎更佳。

此方雖為下藥。實內消藥也。故稍有膿。則從下去。未成膿。即下出瘀熱毒血。

而腫消矣。按立齋云。如脈洪數。以手掩腫上熱極者。血已成膿。下則恐傷腸

胃之氣。宜苡仁湯排之。即本方去硝黃加苡仁。

會膿湯 治腹中腫毒。

大黃 瀉血分之二兩。熱極。 乳香 沒藥 通血氣之壅滯。 五靈脂 散血化痰。 山甲 破血逐瘀。 殭蠶 化癩散結。 白芷

散腫排膿。為末。每酒服五錢。膿從大便出。幼者服二錢。各五錢。

金匱排膿散 諸瘡癰毒。皆可宗用。

生雞子 解熱毒。 枳殼 破結氣。為君。 赤芍 行瘀血。為臣。 桔梗 開提肺氣。 宜加桑皮 清利肺氣。蓋肺主周身之氣。氣

利血行。則膿成毒化。

立齋云。予治胃脘癰。每用前方。加清胃藥亦效。若吐膿血。飲食少思。助胃壯

氣為主。而佐以前藥。不可專治其癱。又言腸癱不可驚之。驚則腸斷而死。故坐卧轉側。務宜徐緩。時少飲薄粥。及服固元氣藥。靜養調理。庶可得生。

痛甚者脈多伏。伏脈有因火者。有因氣鬱血鬱。食滯痰滯。亦有因寒者。陰氣盛陽氣衰。

也故促脈因火亢。亦有因氣血食痰停滯。阻其運行之機。皆致歇止。如止數漸稀。則為病瘥。止數漸增。則為病劇。代脈痛家不忌。滑伯仁曰。無病而瘦羸脈代者。危候也。暴病而氣血乍損。祇為病脈。

大痛而喘。人中黑者死。真心痛手足寒至節。心痛甚。旦發夕死。夕發旦死。

一童子出痘。未成大漿。其殼甚薄。兩月後尚有着肉不脫者。一夕腹痛大叫而

絕。嘉言取梨汁入溫湯灌之。少甦。頃復痛絕。灌之又甦。遂以黃芩二兩煎湯。

和梨汁與服。痛止。令製膏子藥頻服。不聽。其後忽腹大無論。一夕痛叫。小腸

突出臍外五寸。交紐各二寸半。如竹節壺頂狀。莖物絞摺長八九寸。明亮如

燈籠。嘉言云。肺主皮毛。痘不成漿。肺熱而津不行也。胸中甲錯。則生肺癰。癰

者壅也。今殼着於內。全是甲錯。豈非肺氣壅而然歟。腹痛叫絕者。壅之甚也。

腹痛因肺
熱氣壅用
清金潤燥

真火上焚
用知柏六
味湯效

治火症胃
痛

腹痛屬虛
用參芍

進十餘劑。三日後始得小水。五日後水道清利。臍收腫縮而愈。觀此當悟。肺氣不能下行。而臍腹攻痛。小便不利者之治法也。

一男患腹痛。徹夜叫號不絕。小水全無。嘉言以茱連湯加元胡索投之。始安。又因傷食復反。病至二十餘日。肌肉瘦削。眼胞下陷。纔得畧寧。復遭家難。症變壯熱。目紅腮腫。全似外感有餘之症。知其為激動真火上焚。令服六味地黃加知柏。三十餘劑。其火始退。退後遍身瘡痍黃腫。腹中急欲得食。不能少耐片刻。整日哭煩。謂曰。旬日後腹少充。氣稍固。即不哭煩。服二冬膏而全愈。

一女子不時發胃脘痛。已十年矣。仲淳診之。知為火症。用黑山梔。淡豆豉。橘紅。各三錢。枳殼一錢。生姜三片。一劑良已。

一婦忽心痛連下。腹如有物。上下攻撞。痛不可忍。急以手按之。痛稍定。按之少鬆。即叫號。仲淳云。此血虛也。用白芍五錢。甘草七分。橘砂各三錢。炒鹽五分。二劑少止。又用牛黃蘇合丸。疏其氣。果得噉氣數次。而痛除解。

一男子患腹痛。按之則痛緩。仲淳云。此血虛也。用參三錢。歸二錢。補氣血芍三錢。甘一錢。

虛火指臂
腫痛用滋
陰

心痛用參
歸

心腹痛用
歸脾
腹痛用冰
煎理中

和脾胃。麥冬錢三益胃養陰。木瓜錢一和胃制肝。橘紅錢半理氣調中。數劑不愈。但

藥入口則痛止。逾時復發。服二煎又止。如是者月餘。疑不對症。更他醫藥。入

口痛不止矣。因信服之。用前方加減。因時惡心。去當歸。一年後漸安。服之六

百劑始全愈。又時患手指及臂腫痛。不能屈伸。三四日方愈。仲淳曰。此即前

病之餘。虛火移走為害也。用八仙長壽丸。加天冬黃柏甘菊砂仁虎前脛骨

之屬而愈。

王宇泰夫人。病心口痛甚。日夜不眠。手捫之如火。下陳皮及涼藥少須。即脹悶

欲死。以大劑參歸補之。稍定。

一婦懷抱鬱結。不時心腹作痛。年餘不愈。諸藥不應。立齋用歸脾湯。加山梔而愈。

宋徽宗常食冰。因致腹痛。國醫進藥俱不效。楊吉老診之。用理中湯。上曰。服之

屢矣。吉老曰。所進湯使不同。陛下之疾。得之食冰。今臣以冰煎藥。此已其受

病之原也。果一劑而愈。

一婦因鬱怒患腹痛。連少腹上支心。晝夜無間。兩寸關俱伏。獨兩尺實。大按之

胃痛用元胡末

少腹痛因瘀血用活血破血

確論

腸癰將成用大黃丹皮湯

腸癰用黃犬血

一婦食蕎麥麩着怒遂病胃脘當心痛不可忍用吐下行氣化滯諸藥皆入口

即吐不能奏功大便三日不通時珍云心痛欲死速覓元胡遂用元胡末三錢溫酒調下即納入少頃大便秘行而痛遂止

一婦人因經水多服瀋藥止之致腹作痛立齋用失笑散二劑而愈

一婦小腹腫痛而有塊立齋曰此瘀血為患也用四物湯加桃仁紅花元胡牛

膝末香二劑血下而痊

一產婦小腹疼痛小便不利立齋以苡仁湯二劑痛止更以四物湯加桃仁紅

花下瘀血升許而愈凡瘀血停滯宜急治之緩則腐化為膿最難療治若留

住骨節間則患附骨疽矣失治多成敗症

一婦小腹痛疼大便秘澁腹脹轉側作水聲立齋曰脈洪而數膿當內潰急進

大黃丹皮湯加犀角末一劑下瘀血諸症俱退更用苡仁湯四劑而愈

一人患腸癰偃偻不能伸屈有道人教以飲黃犬血二碗和白酒服其人飲四

碗次日下膿血甚多遂愈蓋癰由血壅取以血入血而溫散之義

腰痛

腰痛有腎虛有氣滯有血瘀有痰飲有閃挫有寒濕有濕熱之不同宜分別施治。經曰：腰者腎之府。轉搖不能，腎將憊矣。故腰痛雖多端，其原皆本於腎虛。所謂邪之所湊，其氣必虛是也。然標急先治標，而後治其本，標本不失，此謂良工矣。

保陰煎 六味地黃丸

左歸丸飲俱見虛勞

腰痛攸攸隱隱痛而不甚，無已時

者，屬腎虛，選而用之。

如用六味，宜加牛膝、杜仲、枸杞、玉竹、豬腎、脊髓煎湯煎藥更佳。

此皆壯水之劑，腎水不足者，宜常飲之。

青蛾丸

八味丸 見不能食

腎虛火衰，腰痛小便清利，脈沉小遲者，宜之。

杜仲

醋炙破故紙胡桃油炒

胡桃肉

俱溫補腎臟各四兩

或加鹿茸、羊腎、胡桃肉研膏，蜜丸桐

子大，陳酒下三四錢。

此皆益火之劑，果屬腎中諸陽衰弱者，可用。內有熱者，大忌。

聚寶丹

見胃脘痛

五鹿飲脫痛 治氣滯腰痛脈沉者末塗痛處

宜加當歸 續斷 元胡 砂仁

黑牛續地飲自製 治痰血腰痛痛有定處轉動若錐刀之刺日輕夜重小便利

大便黑脈濇者

黑豆 牛膝用生續斷 生地均主補腎又能行瘀 當歸 元胡索活血利氣 丹皮 赤芍涼血

行如因閃挫跌撲轉舒不便呼吸作痛者可加乳香沒藥如不效鯀沉有力

痛甚者或加桃仁川大黃非菜汁炒

二陳湯見中風 四苓散見濕 治痰飲流入腎經往來走痛或心下悸脈滑者

二方合用宜去甘草當君茯苓參痰利飲安神定悸 加沉香砂仁芳而下達氣利則痰自行 杜仲續

斷補而不滯正旺則邪自除 如人壯實脈有力痛甚者可用礞石丸痰去方以補藥滋陰

腎着湯見濕 治寒濕着腎身重腰冷疼痛外用艾熱熨之或再用草烏末薑汁塗之

可加破故紙 杜仲 續斷

三妙散 治濕熱腰痛或作或止

蒼朮燥濕 黃柏清熱 牛膝最利腰膝 宜加生地 茯苓 杜仲 續斷

此六方皆治標之劑。宜各審明治病之因。而採用之。

一老人久患腰痛。仲淳令日服枸杞一麥冬兩熟地各五錢補腎。人參二錢白朮

陳皮各三錢益氣健脾強腎。再生子。八十未艾。余常以此方治脾腎兩虛之人。

甚效。

一人腰痛甚。仲淳診之曰。此係氣鬱。兼有瘀血停滯。用香附 蘇梗 橘紅各二錢

快氣開鬱。牛膝五錢續斷 當歸 五加皮各二錢和血去瘀。加童便一杯。服

二劑即愈。

一人傷寒後。兩腰僂廢。卧牀徹夜痛叫。百治不效。嘉言診之。其脈亦平順無患。

其痛則比前大減。謂曰。病非死症。但恐成廢人耳。此症之可轉移處。全在痛

如刀刺。尚有邪正互爭之象。若全然不痛。則邪正混為一家。相安於無事矣。

今痛覺大減。實有可慮。諦思良久。謂熱邪深入兩腰。血脈久閉。不能復出。止

有攻散一法。而邪入已久。正氣全虛。攻之必不應。乃以桃仁承氣湯。加附子

肉桂。二大劑與服。服後即強起。再做前意為丸服之。旬餘全安。

傷寒後腰
僂痛因熱
邪深入用
桃仁承氣
加附桂治
案

藥 鬱達之治

濕痰乘虛 流入腎中 腰痛先下 後補法

痰癆之亦不效仲淳曰此非腎虛也如腎虛不能延至今日久矣用白

炙甘草錢一橘紅白芷各二錢製香附錢三肉桂乳香沒藥各一錢一劑腰脫然覺偏

體痛仲淳曰愈矣再煎渣服立起問其故仲淳曰此木鬱則達之早

一人患腰痛至不能坐立以補腎藥治之不效未遠齋用潤字號丸藥下之去

黑糞數升蓋濕痰乘虛流入腎中作苦痰去方以補藥滋腎不逾月起惜其

方不傳。

脇痛

脇為肝膽之區故脇痛昔人多從肝治推其治痛之因亦各不同有因忿怒氣

鬱有因肝膽火盛有因痰飲留住有因瘀血停留有因閃挫跌撲有因食壓肝

氣治亦有異其陰虛火旺而脇肋作痛者宜從虛勞門治之仲淳云胸脇痛屬

肝氣實肝血虛而上逆所致治宜養血和肝生地芍歸甘草續斷除熱下氣羚羊蘇子古

云肝無補法此論肝氣則不可亢而肝血仍當自養也

知味逍遙散見虛勞治鬱怒傷肝胸脇脇肋肚腹等處作痛肝氣喜條達若因忿怒氣鬱沖上則

胸胃痛奔下則少腹痛橫行則脇肋脹痛加減用之

宜加木香香附

開鬱快氣

枳殼

治氣結刺痛

青皮

疏肝膽滯氣

如肺金氣盛而制肝木太過

脇痛者宜瀉白散

金抑

合道遙散

扶木

加減治之

此方辛散酸收甘緩養血而兼寧心扶脾之劑乃肝經之要藥也

龍膽瀉肝湯

治肝膽實火或胸膈肋脇刺痛

以肝木上貫膈中有脅肋也

或兩拗陰囊腫

痛

肝脈循骨內側入中過陰器也

或頭目脹痛

肝脈連目系上出額至巔

或少腹作痛

肝脈抵少腹也或下部

生瘡

如下疳便毒囊癰懸癰婦人陰腫陰瘡陰中突出如挺

或乍寒發熱或大便燥結或大便亦澁等

症

龍膽草

專瀉肝膽之火

黃芩

山梔 君以膽草同入肝膽

生地

白芍 以涼肝血

甘草 以緩火勢

木通

澤瀉

以泄邪火

或加羚羊角

鹹寒入肝下氣

黃連 吳茱萸炒

寒熱加柴胡便秘加大

黃

左金丸

亦可小劑作湯

治肝經實火脇肋作痛一切肝火之症

外用大黃朴硝鴉貼痛處

黃連

瀉心火使肺金清肅得行於左

吳茱萸

獨入厥陰有功引連入肝瀉而肝平猪膽汁炒竟入肝膽六兩

一兩入湯劑可加羚羊角

能治胸脇痛滿

內外並治
功效最易
秦

二陳湯見中... 痰厥... 甚至有形腫色... 痰厥或區

峻藥宜慎
用

脇腫大痛
按拒意脇
內生癰用
大劑除熱
散結涼血
解毒

宜加枳殼青皮白芥子痰在脇下非白芥不能達如黃連浸炒如人強壯實

脈滑有力痛甚者去甘草量加甘遂驅逐胸胃痰飲之峻藥半分至一分須同大棗數枚用

犀角地黃湯見傷寒夫笑散見胃脘痛均治瘀血停留脇肋作痛及閃挫瘀凝脇痛

遂宜採用

保合丸見泄瀉治飲食填塞太陰肝氣被壓莫能舒泄橫行脇肋作痛主此加

減

宜加香砂香附青皮黃連吳英浸炒

此七方或瀉火或驅痰或去瘀或消食皆宗肝無補法之良治也然肝為臟血之海若失血則空虛是仍宜補之慎勿膠執

一童子痘後餘熱未除服滋腎等劑半載無功骨蒸消瘦頸項生核肚腹脹大

午後發寒熱忽左脇大痛手不可按余用左金丸加青皮查肉等藥痛止數日

忽發腫大痛意其脇內生癰用夏枯草五兩煎湯代水連翹貝母各二錢除熱散結生甘

菊二金銀花五錢紫花地丁一兩甘草節一錢除熱解毒地榆五錢涼血洩熱牛蒡二白

芷錢半散結消腫。當歸錢半亦芍錢三活血破瘀。皂刺錢半宣壅通滯。穿山甲錢三破血逐

瘀。二味均能直達瘡所。排毒散腫。服二劑果腫消痛止。寒熱亦不作。諸症亦漸

愈。

吳門花洲顧靖遠松園著

男 塔程 簡亦可參校
元宰叙揆手錄
費 左國揖濟臣校字

症方發明 七

小便不通 大便秘結

關格 大便血

小便不禁 癰 脚氣

淋 濁

小便不通

附交腸關格

小便不通 宜急治

此言正治 及隔二隔 三諸治法

吐法升舉 未可混施

小便不通。匪細故也。少腹急痛。狀如覆碗。奔迫難禁。期朝不通。便令人嘔。數日不通。則斃。一見嘔逆。便不可救。故內經論。二便不通。最急之候。無分標本。宜先治之。經云胞。即子宮。男為精室。女為血海。移熱於膀胱。則癢。屢出而短少也。金匱云。熱在下焦。則淋閉不通。故滋腎水。瀉膀胱。名為正治。經又言膀胱為津液之府。氣化則出。蓋水出高原。肺氣運行。水隨而注。故清金潤燥。名為隔二之治。又言脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。故健脾利水。名為隔三之治。又有因氣滯。因胞轉。因肝熱。因瘀血。致閉不同。治亦各異。丹溪云。余嘗用吐法通小便。譬如滴水之器。必上竅開。而下竅之水乃出。又有用補中益氣湯。升舉其氣。而使之通者。雖皆良法。但未可混施。按趙氏云。益氣四苓二香黃連解毒等劑。皆治有餘。

頭氏醫鏡 卷十五 掃葉山房藏版

不足之症
勿托通利

在氣在血
之辨

陰虛陽虛
治法

之症謂膀胱原有水積。或為熱結。或為氣閉。有水可通而通之也。至於不足之

症。因汗多。五內枯燥。膀胱原無水積。強欲通之。如向乞人而求食。豈能得手。故

東垣分在氣在血。以渴與不渴辨之。如渴而小便閉者。此屬上焦氣分受熱。治

宜清金。二冬。一母。桑皮。茅根之屬。如不渴而小便閉者。此屬下焦血分受熱。治宜滋陰。地冬。知柏。

牛膝。啣前之屬。至於真陰真陽虛者。未之論及。經言腎主二便。又言腎司開闔。又言腎

開竅於二陰。故火盛則水衰。津液乾枯。而為熱閉。宜六味去萸肉。加二冬牛膝

車前滋其陰。而水自來。陽虛則無氣。清濁不化。而為寒閉。宜濟生腎氣去萸肉。

直達膀胱。如凍河得太陽而水自通。然世人之患陰虛者多。陽虛者少。桂附之

藥。必察之明。審之當。而後可以用之。若糝糊混投。幾何不以人命為兒戲耶。

猪苓湯。見傷寒。導赤散。見熱在下焦。小便淋閉者。隨宜採用。或合或分皆可宜。

加知柏。滋腎水瀉陰火。腎熱既除。膀胱之熱自清。麥冬。肺清則氣化下行。心清則肺熱自除。

此皆滋陰潤燥蕩熱利水之劑。滋腎水瀉膀胱。乃正治之法也。

二冬二母散。台柿金燥熱。氣化不行。小便壅閉。

此方清金潤燥。以通小便。乃隔二治法也。

黃連解毒湯

見傷寒

治小便癃閉。因過啖辛熱。傷其肺陰者。

原方

清三焦之熱。解辛熱之毒。

宜加二冬生雞子白

急救肺陰。

茯苓車前木通

通竅利水。

便秘加大

黃

此清熱解毒。急救肺陰。以通小便之方也。

四苓散

見溼

治小便癃閉。因脾溼不運。而精不上升。以致肺不通調者。宜加

米仁

健脾燥溼。補肺清熱。

桑皮

清肺降氣。除熱利水。

生象牙屑

甘寒。滋滑利竅。

此方健脾燥溼。以通小便。乃隔三之治法也。

二香散

治鬱怒氣滯。小便不通。又治強忍房事。或過忍小便。致轉胞不通。

木香

真沉香。宜加滑石為末。等分。以橘紅茯苓車前煎湯。空心調服。四

五錢。以通為度。一方治男婦轉胞。但用寒水石滑石各二兩。冬葵子五錢。煎

服。

此化氣之劑。氣化則胞轉為常。而小便自利。故曰治其氣則愈。愚意仍加利

水清熱之藥。以相助為理更妙。

龍膽瀉肝湯

見腸痛

此瀉肝火以通小便之方也。

琥珀益元散

治小便不通因血結者。

血虛膀胱本小便自利。今反不利。是膀胱氣分亦因熱結。乃氣血交病也。

益元加真琥珀末

均利小便。能逐瘀血。

可加牛膝

莖中痛甚者。生用至兩許。

瞿麥利水鬱金

治血積氣壅。

連翹仁

散血結氣聚。二味皆辛苦寒。

並湯調服

此驅膀胱瘀血以通小便之方也。

敷臍法

溺秘因熱者多。此方最效。

大田螺

性寒而善分清濁。故濁水中置之。便能澄澈。二枚搗爛去殼。

鹽

潤下。

麝香

通竅。各少許。

同螺肉敷臍中及

少腹。軟帛繫之。即通。

一法用猪膽連汁。籠陰頭少頃。汁入亦即通。

蔥熨法

氣閉不通者宜之。

因熱者大忌之。

蔥白

三助切。細鹽一斤同炒熱。

絹包更換熨臍下。或再加紫蘇。皂莢煎湯。坐浸水中。亦效。

交腸

仲淳云。交腸之病。大小便易位而出。或因大怒。或因醉飽。遂致臟氣乖亂。不循

常道。法宜宣吐。以開提其氣。使闌門清利。得司秘別之職。則愈矣。

治交腸大法

屢用如神

法亦妙

澤瀉 木通 車前 滑石炭 以上各藥臨症採用

關格

仲淳曰。不得大小便為關。是熱在丹田也。吐逆水漿不得下為格。是寒反在胸

中也。陰陽易位。故上下俱病。宜先投辛香通竅。丁香。白蔻。龍腦。蘇合香。下降。蘇子。橘紅。沉香。之藥。

以治其上。次用苦寒。知母。黃柏。下泄之藥。車前。木通。滑石。大黃。以通二便。此係急症。法難緩治。

縱有裏虛。後當議補。愚按論關格之脉。盛於平人四倍已上。為真陰敗竭。必死

之症。仲淳宗丹溪立言。而景岳甚闢其非。謂豈有脉盛四倍已上而屬寒之理。

又按仲景曰。關則不得小便。格則吐逆。沈氏註。言溺閉。因丹田有熱。吐逆因火

炎上升。愚甚韙之。亦擬數品處治。大意以甘寒清熱下降為主。臨症合宜。則用

治關格

竹茹二錢 枇杷葉下氣止嘔 麥冬五錢至二兩 梨汁清胃止嘔 蘆根汁一杯 甘蔗漿一杯 茅

根三四兩 菜豆一合 茯苓皆止嘔逆又利 煎濃湯。同諸汁和勻。頻頻飲之。外用大

田螺二三枚 搗爛。入鹽少許。敷臍下。取汁數匙。入藥中。尤效。

辨關格屬上寒下熱之非 治關格大法

一人小便不通。目突臍脹。膝以上堅硬。皮膚欲裂。飲食不下。東垣與以淡滲之

藥。無效。精思半夜始悟其故。夫膀胱為津液之府。必得氣化乃出。無陰則陽無

以化。淡滲氣薄。皆陽藥也。孤陽無陰。欲化得乎。以滋腎丸羣陰之劑投之。即愈。

一老人患小便不利。因服分利之藥太過。遂至秘塞。點滴不出。丹溪曰。此因胃

氣下陷。用補中益氣湯。一劑而通。因先多用利藥。損其腎氣。遂至通後遺尿。

一夜不止。急補其腎。然後已。凡醫之治是症者。未有用泄利之藥。誰能顧其

腎氣之虛哉。特表著之。以為世鑒。

小便不禁

小便不禁。內經有責之膀胱。宜分責之腎者。宜分有責之肺。分氣盛責之肝

者。分實火按趙氏云。天煖衣厚則多汗。天寒衣薄則多溺。多溺者寒也。至於不

禁。虛寒之甚。又戴氏云。睡著遺尿者。此係下元冷所致。又言遺尿皆屬於虛。所

以嬰兒腠氣不固。老人下元不足。多此症。河間獨以為旋溺遺失。此係熱症。明

醫雜著亦云。因腎水不足。膀胱火邪妄動。水不得甯。故不能禁。而小便頻數也。

宜分膀胱
肺腎四
經

此論虛寒

此論屬熱

斯言。

固脬丸

自製亦可煎湯

經曰。膀胱不約為遺溺。又曰。水泉不止者。是膀胱不藏也。宜

此固之。

熟地

枸杞

補腎養陰

山茱

五味

酸以收之

龍骨

牡蠣

濇以固之

覆盆

續斷

益腎縮小便

雞腸

專治溺遺尿

數不禁

猪脬

鹹寒引導入脬

可加紫河車

嘉言云取以脬補脬

而助膀胱之化原。只

宜入藥。人參

栢仁

仲淳云小便不禁屬氣血虛

挾熱加知栢二冬白微

益陰除熱

挾寒加破故

紙益智仁

暖下焦縮小便

糯米糊為丸

桐子大

空心白湯下

此方補腎益陰斂瀆。以助其封藏。固其脬氣為主。當因症寒熱而隨宜加減

之。

左歸丸飲

見虛勞

宜參固脬丸諸藥加之。

此方因腎水衰而火迫遺失不禁

者用之。

八味丸

見不能食

宜去澤瀉

嫌其滲泄

加收滋引導諸藥。及鹿茸鹿角膠。

鹿角補腎脉。經言腎脉生

病為遺溺故也

此方因火衰而陽虛失禁遺尿旋溺者用之。

竹葉石膏湯

見傷寒

治肺熱溺數不禁。

東垣云小便頻數肺氣虛也宜安臥養氣禁勞役以參者補之不愈當責之腎。

宜加黃芪覆盆續斷雞腸或合補。此益氣湯加益智仁。

此方一補一清一斂肺氣虛而有熱者甚宜。按薛氏云若係脾肺虛宜補中

益氣湯加益智之類。

加味道遙散

見虛勞

治肝經熱甚陰挺失職溺數不禁。

虛火加二冬白微實火加膽草黃連。

猪膽俱加雞腸汁炒。

此方宜分別實火虛火加減用之。

遺尿若見諸絕症不治。

一人憂憤經旬忽小便不禁醫皆用補腎固脬之劑投之一月而轉甚士材曰

六脉舉之則軟按之則堅此肝腎之陰有伏熱也。用猪膽炒黃連錢丹皮錢

清肺經之伏熱鹽炒苦參分清腎經之伏熱白茯苓錢甘草稍分調雞腸末

與服六劑而安醫云既愈當大補之數日後仍復不禁士材云肝家素有鬱

不禁因肝
腎伏熱用
清肝腎藥
案

不禁因火
衰用八味
效

淋症有五

治淋大法

一婦患飲食不進小便不禁。士材曰：六脉沉遲，水泉不藏，是無火也。用八味丸料，兼用異功散，加益智肉桂，二劑數日而安。

淋

淋者，欲尿而不能出，脹急痛甚，不欲尿而點滴淋瀝，仲淳云：此屬腎虛，兼有溼熱。丹溪則有五淋之分：氣滯不通，臍下悶痛者，為氣淋；溺血而痛者，為血淋；溺出如麩糊者，為膏淋；溺出如砂石而痛者，為砂淋；此以火灼膀胱，溺陰凝結，煮海為鹽之象也。遇勞即小便澀而痛者，為勞淋，但宜辨其因心勞脾勞腎勞之不同。凡治五淋，總宜壯水滋陰滲溼，分利小便為主。然虛實各異，宜補宜瀉，臨症之頃，所當詳審。

五淋湯自製淋症主此加減

生地

壯水滋陰

二冬

清肺氣化及州都

知母

泄膀胱腎家之

黃蘗

利水

甘草

稍止莖中

牛膝

獨用兩許煎飲治小便不利

車前

開竅

茯苓

滲溼

氣淋加

沉香玉金

血淋加茅根藕汁

膏淋加華蘚石斛

砂淋

加滑石末調服

滑可去者為因房勞傷腎者加枸杞菴容取其滑潤因思勞心者加柏仁丹參因

勞倦傷脾者加人參

此方通治五淋須隨症活法加減用之按方書有冷淋一症言是腎虛丹田

有寒所致余考內經云胞移熱於膀胱則癢溺血又金匱云熱在下焦則尿

血亦令淋秘不通丹溪言淋雖有五皆主於熱此其常耳

海藏瀉腎丸火見治或因懼洩強忍或因思慾不遂致敗精流溢閉塞竅道澁

痛異常者外用吹法或令御女一番使敗精盡行送出宜加牛膝車前火盛加知柏

此方下所列之症即所謂精淋也故宜滋陰通利為主

淋症之脉實大可療精血敗壞之識潛小知亡

一老人患淋醫以五淋等劑投之遂腹中痛如刀割大便如注小便仍點滴不

通六脉肺部獨大余云此肺移熱於大腸之症用桑皮紫苑杏仁蘇子黃芩

橘紅茯苓甘桔一劑腹痛減大便稀但小水仍不通利又用生地枸杞牛膝

補陰藥中加桑皮紫苑茯苓車前二劑全愈

脈之吉凶
肺熱致淋
用清肺滋
陰效

症不治矣

至言宜識

此婦出宮。為商人妾。可見在宮久懷憂鬱。既嫁又不能如願。是以致生此
 疾。愈見流注療癰。乃七情氣血。皆已損傷。不可用攻伐。皎然矣。按精血篇云。
 精未通而御女。以通其精。則五體有不滿之處。異日有難狀之疾。陰已痿而
 思色。以降其精。則精不出而內敗。小便道澀而為淋。精已耗而復竭之。則大
 小便牽痛。愈痛則愈欲。大小便愈便愈痛。女人天癸既至。踰十年無男子合
 子。合男子多則瀝枯。虛人產多則血枯殺人。觀其精血。思過半矣。

濁

濁症有便濁精濁之不同。便濁是便溺渾濁而不痛。赤者溼熱在血分。白者在
 氣分。經所謂水液渾濁。皆屬於熱者是也。譬之天氣熱則水渾濁。寒則澄清。又
 如清水煎湯。則自然白濁耳。吳氏云。便濁乃胃中溼熱。滲入膀胱所致。治宜理
 脾胃。清溼熱。兼補腎水。亦有因色慾傷腎。思慮傷心。勞役傷脾所致者。精濁則
 牽係粘膩。雖不便溺。亦時有之。此是腎水不足。淫火易動。精離其位。故漸漬而

精濁則不
 痛痛則精
 淋治宜滋
 陰通利

出。若多出不禁者。乃因房勞過度。關竅失闔。不戒色慾必死。總宜壯水滋陰為主。佐以酸收固澁之劑。其因思慮傷心者。天王補心歸脾之屬。因勞倦傷脾者。補中益氣之類。可加斂澁之品以治之。仍宜兼補其腎。此治濁大畧也。

便濁效方自製 治赤白濁。

川石斛清胃中 茯苓去膀胱 米仁除溼健 川華薛除溼去 生地腎為胃關

自去亦 天冬金為水源 知母 黃柏瀉陰火 使濁不禁加蓮鬚 赤者再

加白芍。可加水陸二仙膏。艾實生於水。金櫻子生於陸也。

此理脾胃。清溼熱也。兼補腎水之劑。濁症主此加減治之。

六味丸 左歸丸飲俱見 本方宜去滲泄助火諸品。加蓮鬚蓮肉之屬。清心

火不動。固腎 精流不禁。加五味酸以收斂 鱉膠粘以止滑 龍骨牡蠣固脫

此二方皆壯水滋陰。加清心安神。佐以斂澁之劑。精濁者隨宜加減採用。

天王補心丹 歸脾湯俱見 此因思慮傷心而致便濁精濁者。隨宜加減採

用。

致遺之因
不一

治遺大法

遺滑

夢遺者。因夢交而精始出。精滑者。不因夢而精自洩。症狀不同。有小便後出多不禁者。有不小便而自出者。或莖中癢痛。常欲如小便者。皆由腎水虛衰。相火妄動所致。然亦有數者之不同。有因用心過度。不攝腎而致失精者。有因房勞太過。精竅虛滑而致失精者。有中氣虛損下陷。使精不寧而失者。有脾胃濕熱下流。使精擾動而失者。亦有命門火衰。不能涵乎陰精而失者。各宜分別施治。有鯁居獨宿。精滿而失者。此非為病。不須服藥。沈氏云。遺病多端。治法大要。總不越乎補腎水。斂元精。安心神。清相火為主。

六味湯丸

左歸丸飲俱見

原方補腎壯水加蓮鬚五味龍骨牡蠣斂精遠志填髓

蓮肉安心神黃柏清相火

此方因腎虛火旺失精者用之。虛滑甚者。以金櫻子煎膏。代蜜為丸。

天王補心丹

歸脾湯俱見

此二方。前方補心兼腎。後方心脾俱補。用心過

度。心腎不交者。必神志不寧。怔忡驚悸。宜朝服六味丸之屬。晚間擇前方服之。

氏醫鏡 卷十五 七 掃葉山房藏版

補中益氣湯見池 此方因中氣下陷失精者宜之。其人必現四肢倦怠。食少

便泄。余謂仍宜朝服六味諸方。按士材云。因腎病而遺者。獨治其腎。由他臟

而致者。則他臟與腎兩治之。以腎為藏精之臟故也。

清熱滲濕湯見 此方因脾溼下流失精者可宗。加減用之。去其濕熱。則腎安

而精自固。治病必求其本也。

八味丸見不 此方因陽不帥陰而失精者宜之。必見畏寒厥冷。小便清長。大

便澹瀉。食難消化。脈沈小遲者。投之不悞。否則以火濟火矣。

一人患遺精。聞婦人聲即泄。瘡甚欲死。醫告無術。仲淳之門人。以遠志為君。蓮

鬚石蓮子為臣。龍齒茯神沙苑蒺藜牡蠣為佐。使丸服稍止。然終不斷。仲淳

於前方加魚鱉一味。不終劑而愈矣。

一人因肄業勞心太過。患夢遺症。已三四年矣。不數日一發。發過則虛火上炎。

頭面烘熱。手足逆冷。終夜不寐。補心腎及瀦精藥。投之罔效。仲淳疏一丸方。

以黃柏清相火為君。佐以地黃枸杞芡肉天冬補腎。麥冬清心。蓮鬚五味瀦

此症絕少
須審明方
可用

陰虛遺精
用魚鱉藥

陰虛夢遺
用黃柏藥

其人一見
頭面烘熱
手足逆冷

便秘之因

虛人便秘
忌硝黃

秘結當知
補腎潤燥

氣虛熱秘
效方

急食苦以堅之。黃柏是也。腎得堅則心經雖有火而精自固。何夢遺之有哉。向徒用收澇補益而未及此。故難收效。

大便秘結

大便秘結。因熱者多。宜分虛實。然有因氣滯。因風燥。致秘之不同。治亦有異。又間有冷秘一症。亦當審察。至若老人。津液乾枯。產後亡血。及發汗。利小便過多。病後氣血未復。皆致秘結。當滋陰養血。生津潤燥。則便自通。誤用硝黃利藥。多致不救。按東垣云。腎主二便。主五液。津液盛則大便如常。若饑飽勞役。損傷胃氣。及過食辛熱厚味。則火邪伏於血中。耗散真陰。津液不足。故大便秘結。趙氏云。余嘗法東垣之論。而不用其通幽潤腸等。惟用大劑六味。加生津。冬潤燥。人蜜之品。煎服自效。如熱秘而又兼氣虛者。於前方再加參芪三五錢。立應。此因氣虛不能推送。陰虛不能濡潤故也。親試甚驗。故表出之。

六一散氣湯

見傷寒

此方治一切實熱秘結。隨症採用。

麻仁丸

治脾約。

脾土燥熱。將胃中所受三五日之穀。省約為一二彈丸而出。

大便艱難。

腸中津液乾燥。故必胃氣強者方

頗穩

須要連咽方不苦口

屢用如神

可暫用。麻仁三兩杏仁潤燥白芍養陰大黃泄熱枳實散結厚朴各一兩煉蜜為丸
 此洩熱結潤下之劑。

象膽丸 以味苦象膽也

真蘆薈 苦寒清熱。濕潤滋燥。同以硃砂清鎮下。自然熱結開通。研細一兩四錢。硃砂一兩。滴好酒少許。和丸

小豆大。天晴時修合。每服一錢二分或三錢。白湯送下。朝服暮通。暮服朝通。此清熱下通之緩劑。此方亦實熱秘結者宜之。只行一二次。甚為穩當。但味極苦。最難服。胃弱者恐不能勝。

養陰清熱潤燥湯 見燥 治一切虛熱秘結。隨症加減。如內熱甚。可加蔗漿或梨汁。

梨汁。

生地蜜油飲 治老人津液乾枯。及產後大便秘結。

生地 四兩作小塊 芝蔴油 四兩入生地同煎。以浮起油。面為度。去地。將油傾入大碗。 加生白蜜兩許。調滾湯一

碗。同油頓飲。或獨用生地三四兩。煎湯頓飲。亦效。再加松子仁一兩更佳。

此二方一切虛熱秘結可採用。

橘紅利氣二錢杏仁五錢至一兩宜加枳殼錢蘇子炒研三五錢

數匙冲服。麥冬、蔗漿、梨汁皆可用。此利氣而兼潤燥之劑也。

養血祛風潤燥湯自製 治風燥秘結。

秦艽二錢胡麻炒研三錢鮮首烏養血祛風五錢至一兩生地涼血潤燥三五錢松子仁五錢至二兩研

爛調。牛乳補血潤燥一杯梨汁治風熱利一杯此方素患風熱大便秘者甚宜。

不用風藥者。治風先治血。血行風自滅。若用風藥則燥復傷血。而大便愈秘

矣。

八味地黄丸見不能食 治冷秘必畏寒厥冷喜飲大熱小便清白脉沉小遲者方作寒醫 宜加肉蓯蓉一二兩

此方果屬冷氣橫於大腸凝陰固結不通者可用之。然此症甚少。勿概混投。

愚謂當先用肉蓯蓉三兩。性溫入腎為君。潤燥酒煎調服。沉香末三錢。益命

門真火為臣。亦可散其凝陰之氣。如不應。然後投以八味。所謂病宜用熱。必

當先以溫藥探之也。

一人服五加皮酒。遂患大便秘結。四五日來。腹中脹悶。用大黃一錢。通後又結。

士材曰。腎氣衰少。津液不充。悞行疏利。是助其燥矣。以六味加人乳一杯。白

補腎潤燥

用須審明方

蜜一兩。三劑而通。

一老人大便燥結。胸中作悶。仲淳曰。此血液枯槁之候。用肉菴蓉三兩。煎湯頓飲。大便通。胸中快然。

一宗室婦人。年幾六十。平生苦腸結病。旬日一行。甚於生產。服養血潤燥藥。則泥膈不快。服硝黃通利藥。則若罔莫知。如此三十餘年。時珍診之。其人體肥盛。而多憂鬱。時吐酸痰。碗許。乃寬。又多火病。此乃三焦之氣壅滯。有升無降。津液皆化為痰。飲不能下。潤腸間故也。用牽牛末。皂莢煎湯。泛丸。與服。即便通利。自後但覺腸結。一服即順。亦不妨食。且復精爽。蓋牽牛能走氣分。通三焦。氣順則痰遂飲消。上下通快矣。

一人患脾約便艱。嘉言用胡麻首烏菴蓉山藥等。四劑即潤。蓋緣腸中血少多風。與藥適宜。故效敏捷。

一人素多酒色病。下極脹痛。二便不通。不能坐卧。立哭呻吟者七晝夜。用通利藥不效。時珍曰。此乃溼熱之邪在精道。壅滯隧路。病在二陰之間。故前阻小。

腸風臟毒之別

治之大法

大便血

大便下血。血清者。謂之腸風。血濁者。謂之臟毒。蓋此風非外來之風。乃腸中熱極則生風也。毒非癰疽之毒。因大腸積熱。猝難開解。下血不止。故有臟毒之名也。按經言結陰者。便血。蓋氣為陽。陽血為陰。邪熱結於陰分。故當便血。初起宜清熱涼血為主。久遠不愈。陰分大傷。當滋陰二地 龜甲 養血 棗仁 圓芍清熱。銀花 麥冬佐以酸斂收澀。芡味 首烏 引導 槐花 煮爛為如之品。丹溪云。凡治下血。不可純用寒涼。必加辛味升舉藥為佐。虞氏云。人身精血皆生於穀氣。脾胃統血。久病虛弱。必資歸脾補中等湯。脾胃氣旺。則能攝血而不下行矣。雖方書論血。從下流為順。易治。若大下數升。形肉枯槁。面浮肢腫。喘息脾泄諸症。悉至。正所謂症則易治。甚則難痊。

槐榆生地湯白製

治腸風臟毒下血。仲淳云。屬濕熱。

槐花

地榆

黃芩

銀花清熱除濕

生地

白芍

生雞子補陰涼血

甘草調和

諸藥和劑

芥能入血分行。性升上行。炒焦。

荷葉蒂補助脾胃。升發陽氣。

熱甚。加犀角黃連。或用猪臟丸服。另用槐花

填入臟中。煮爛。去槐花搗和丸藥。取其引入大腸。

此方清熱除濕涼血。佐以升舉。便血初起者甚效。廣筆記載一方。治便血。或因酒毒發者。先用黃連酒炒為末。空心白酒調服三錢。忌葷腥。一日服後必腹痛。去血愈多。復用白芍一兩。白朮五錢。甘草三錢。同炒揀開。先以白芍煎服。腹痛自止。後用朮草煎服必愈。補胃氣則陽明調。而便血自止。

廣筆記方 治腸風甚效

人參一二錢 黃芪蜜炙三錢 甘草補氣以攝之。炙一錢 生地錢四 麥冬錢五 地榆涼血以止酒洗 白芍炒酒
各三錢 當歸血去多則補益之 莢肉各二錢 北五味血滑脫則酸歛之。八分 荊芥炒黑一錢 柴胡 白芷
血下滲則升 舉之各五分

此方補氣養血。滋陰清熱。酸歛升舉。諸法盡備。以治便血。自神效也。

八仙長壽丸 見虛勞

宜加首烏益血而滋 白芍涼血而斂 蓮肉補脾止血 女貞子 龜甲膠益陰除熱 ○可用槐花煮猪

臟法同 加黃蠟益能止血 丸服

等方俱可參酌。上藥用之一方。只用北五味熟地等分。為丸。服久必效。如虛

人初起。胃弱難勝。苦寒藥者。用上等方。須去酸澁之品。

歸脾湯

見虛勞

補中益氣湯

見泄瀉

便血過多。脾胃虛弱者。選而加減用之。

宜加蓮肉糯米白芍麥冬五味龜甲之屬。

此二方皆補脾以統血之治法也。均宜加滋陰涼血酸斂之藥。以治之。要之

去血過多。陰分大傷。若但用補氣健脾溫熱等藥。則陽愈旺而陰愈消矣。

一人久患腸風。百藥不效。用人胞一具。煮爛。側柏向東南者二斤。同人脫搗爛。晒乾為末。二味蜜

丸。空心淡鹽湯服五錢。頓愈。治弱症吐血亦效。

一童子病內傷。大小便俱血。用桃仁紅花病甚愈。仲淳曰。血既下行。奈何又重

傷之。傷之則補之而已。以生地牛膝杜仲續斷等藥飲之。稍平而腹痛不已。

因加人參二錢。一劑即止。此經言強者氣行則愈之驗也。

一人大便下血甚多。面色痿黃。發熱倦怠。盜汗遺精。士材診之曰。脾虛不能統

血。腎虛不能閉藏。法當以補中益氣五貼併一而進之。十日汗止。二十日血

止。再以六味地黃丸。間服一月而安。

腸風用河車

血既下行不可重傷營衛氣血

便血遺精用補中六味間服效

瘧

此論瘧雖有屬風寒濕然多內亡血筋無榮養邪因得來不可純用風藥

此論瘧因血燥風自內生

瘧者筋病強勁不柔和也。甚者頭動搖。背反張。脚攣急。口禁齟齬。按經言諸暴強直。皆屬於風。又言瘧筋之病。寒則反折筋急。又言諸瘧項強。皆屬於濕。考金匱論瘧。亦以風寒濕立言。謂太陽病發熱無汗為剛瘧。太陽病發熱汗出為柔瘧。又謂太陽病發熱脉沉而細者。名為瘧。為難治。蓋太陰濕邪。淫於太陽。粘着經筋。故令背項強直。若寒濕相合。則成剛瘧。風濕相合。則成柔瘧。以太陽為病。而見太陰賊刺之脉。故曰難治。徐忠可註云。瘧雖概為風寒濕所中。然原其因。多由亡血。筋無所榮。故邪得以襲之。故仲景復原瘧病之由。而曰太陽病發汗太多。因致瘧。夫風病下之則瘧。復發汗必拘急。瘡家發汗。則瘧。雖汗下後。或有邪乘。總由陰虛液脫。筋燥致瘧。則一也。此丹溪論治瘧。所以有不可純用風藥之戒。景岳註內經。亦言肝主筋。其化風。故諸暴強直。皆屬於風。非外來之風。內風多燥。若與風劑則益燥。宜補陰以制陽。養榮以潤燥。故有治風先治血。血行風自滅之說也。千金謂溫病熱入腎中。亦為瘧。小兒疳熱盛。亦為瘧。俱當養陰。

此論產後血虛冒風所致

此論小兒感冒熱邪似瘧

瘡所傷。癰疽潰後。冒風致瘧者。即所謂破傷風也。當養血疏風。方為善治。產後血舍空虛。外風襲入而成瘧者。即金匱所言。新產血虛多汗出。易中風。故令病瘧是也。宜海藏防風當歸為主治之。嘉言謂庸愚不知此症。昔賢各從血舍驅風。自有成法可遵。輒稱產後驚風。妄用鎮驚之藥。千中千死而不悟。深為可慨。又小兒體脆神怯。不耐外感。壯熱多如瘧病。後世妄以驚風立名。不治外淫之邪。反投金石腦麝等藥。鎮墜外邪。深入臟腑。亦千中千死。此通國所當共禁。沈氏謂此乃少陰少陽客邪所致。為驚為瘧。感冒熱邪所致。實非瘧病。並非瘧病。治者審焉。

養陰清熱潤燥湯見燥 治汗下後。產後。及金瘡折傷。失血過多。癰疽潰後。一切

發瘧可用此方。

宜加牛膝入肝養血。拘攣可解。木瓜入肝養筋。緩急皆宜。猪脂甘寒潤燥養筋。羚羊角入血除熱舒筋。汗多商

加參芪實表。斂汗。棗芍。斂陰。

此養血清熱之劑。須對症加減。活潑潑地用之可也。按嘉言云。瘧病之壞不

出亡陰亡陽兩途。亡陰者。津液精血素虧。不能榮養其筋脈。此宜急救其陰。亦間有亡陽者。陽氣素虛。不能充養。柔和其筋脈。此宜急救其陽。參芪之品。在所必用。以氣主煦之。故益氣則津自生也。

海藏防風當歸湯 治汗下後及產後中傷風病瘧。併一切破傷風發瘧。

防風風藥用之以潤劑。故當歸 地黄養血川芎治一切風宜加荊芥能入血分秦

羌 甘菊 胡麻養血黑豆活血竹瀝逐痰除熱。產後及小兒中

此養血疏風之劑。果有冒風的症。可用此加減治之。

熱而瘧者死。此係熱極生風。大傷陰血。而然。既熱且瘧。乃為死候。瘧病有灸瘡難治。火熱內盛。陰氣太虧。故也。

脚氣

脚氣皆由濕熱所致。經曰。傷於濕者。下先受之。濕鬱成熟。濕熱相搏。其病生矣。然濕有因外而得者。有自內而生者。其致病不同。見症則一。發熱惡寒。或亦頭痛。狀若傷寒。但起於脚脛紅腫。筋攣掣痛。舉步艱難為異耳。輕者止於足痛。重者由足痛入陰器。抵少腹。歷脇肋上頭。又重者。則脚氣冲心。神昏譫語。喘急不

惡者故孫真人云脚氣痛皆由氣實而死終無一人以用藥致身而死何淺計
治脚氣忌用補氣溫燥升提等藥。然又不可大瀉。及純用破氣之劑。按金匱治
脚氣上入少腹。不仁。責之寒濕上逆。痺着少腹。用八味丸以壯真陽。遂寒濕。然
脚氣之屬寒濕者絕少。悞用溫熱。必立致禍。審之慎之。昔人論脚氣之原本於
濕。若因外而得者。如涉水驟雨。居處卑濕。足先受之。濕鬱為熱。故發動為痛。自
內而生者。如飲食之濕。酒水瓜果乳酪。有濕有熱。先入於胃。上輸於脾。脾主四
肢。水性就下。故脾流濕熱。直入於足。總之脚氣病以腫為濕。痛為熱。乃不易之
論也。

防已飲

訂重

治濕熱在足。脚脛紅腫。

亦有紅者。

筋攣掣痛。發熱惡寒。主此加減。

漢防已

通下焦濕熱。壅遏脚氣。非此不除。錢許。

黃柏

治下焦濕熱。腫痛。二錢。

忍冬花

療脚氣筋骨引痛。鮮藤數兩。煎湯代水更。

效。川萆薢

去濁分清。各五錢。

木瓜

去濕舒筋。

白茯苓

各三錢。

澤瀉

木通

利水去濕。各錢許。

米仁

益脾除濕。各五錢。

如紅腫加犀角。冲心煩悶亦用。再加檳榔。羚羊角。逆。

氣治熱悶。如喘嘔加麥冬。枇杷葉。頭痛加甘菊。

此清熱除濕利水之劑。脚氣皆由濕熱通。宜以此方為主。隨兼症而擴充。以

加減之則善。

金匱礬石湯

治脚氣衝心。

濕熱之氣上冲於心。即地氣加天之謂也。

白礬

收濕澄濁。清熱解毒。四兩。

煎湯浸脚。

使濕熱不上冲。

可加苦參四兩。

田螺數股

一人苦脚氣攻注。用田螺數枚。搗敷兩股上。便覺冷氣下趨。至足而安。蓋螺性

善能泌別清濁。故能療脚氣之濕熱。

柳子厚云。余患脚氣疾。不得通泄。夜成痞。

脚氣干脾。

絕干心。

左脇有塊如石。

脚氣干肝。且

死。因大寒不知人。三日。舉家號哭。一人傳杉木湯大劑。飲之大下三次。氣通

塊散而愈。其方用杉木節。質重能達下。氣芳能疏壅。橘紅味苦。而厚過於青

皮。檳榔質實。而重等於鐵石。味厚則泄。質重則降。故能令邪氣大下。童便能

引濕熱下行。從溺而出。經言道之遠者。制大其服。故用大劑頓飲。

此法須知

吳門花洲顧靖遠松園著

增程 簡亦可參校
男 元宰 叙揆手錄
費 左國楫濟臣校字

症方發明 八

調經 胎前 帶下 崩漏 產後

調經

此論調經

調經乃治女病之首重。蓋女子以血為主。一月一行。謂之月經。經者常也。如月之盈虧有常期也。若或前或後。或乍前乍後。或閉或通。此皆失其常候。不可不用藥以調之。調之之法。昔人專以理氣補養心脾為主。以脾為生化之源。心統諸經之血。若心脾和平。則經候自調。然推其不調之因。亦復不一。須審其鬱熱則寒之。虛則補之。滯則行之。留則攻之。滑者固之。陷者舉之。隨症施治。自無不效。丹溪云。先期而至者熱血也。其色鮮紅。若紫黑者為熱之甚。或片或塊者。雖云氣之滯。亦熱極所致。治宜涼血清熱而補肝腎。然有因恚怒傷肝。肝火盛而沸血妄行先期者。有因鬱結腸脾。鬱火發而逼血妄行先期者。有因思慮傷心。虛火動而致血錯行先期者。各隨其所因以施治。後期而至者血虛也。其色淡

先期

後期

乍前乍後
經閉不行

紅若淡白者。為虛之甚。亦有因恚怒傷肝。鬱結傷脾。以致血少而後期。甚至經閉者。有因肥人濕痰壅滯。而經水後期。或致不行者。或補血。或消痰。隨症治之。至若經期乍前乍後。不一其症。氣亂悉從虛治。經閉不行。宜分虛實。有無他病。而經閉不行者。乃屬陰虛。血少火盛。不可以毒藥通經。有病虛勞而經閉不行者。因腎水不足。相火妄動。煎熬真陰。薰蒸血海。血日以枯。俗謂乾血勞是也。有因情慾傷心。勞倦傷脾。以致病及於胃。失生化精血之源。而經閉不行者。此即經所謂二陽胃與大腸之病。發心脾。在女子則為不月者是也。有因心事不遂。致心血虧少。乏血歸肝。而經閉不行者。此皆屬虛之所致。其有因血瘀內積而閉者。有因恚怒鬱結。氣滯血凝而閉者。有因經水過來。形寒飲冷。血凝而閉者。此皆易治。不過一通之而已。若經水過多。但責之熱。亦宜涼血清熱。補肝腎為主。過多而不止者。當加酸澀之藥。或兼升舉之品。若經水來少者。血虛也。肥人或屬之痰壅氣滯所致。凡經將行而腰腹作痛者。責之氣滯血實。行後綿綿作痛者。責之血虛氣滯。此調經大旨之常法。如是復有變常。而古人未言及者。如士

目出謂之倒經者有三月一行而謂之居經者有一年一行

生不行而受胎謂之暗經者有受胎之後月月行經而產子謂之垢胎者有受

胎數月血忽大下而胎仍不墮謂之漏胎者雖以氣血有餘不足為言而亦異

於常矣經言女子二七而天癸至七七而天癸絕其常也有女年二十三而

產子者有婦年五六十而產子者此又異常之尤者也醫者亦不可不知

歸脾湯見虛勞治心脾肝虛經水不調或前或後或乍前乍後或經閉不行或

月事過多淋瀝不斷悉主此方加減

宜加地芍四製香附為血中氣藥氣調則血亦從之而和暢同艾醋浸二宿分作四分一分鹽水浸炒一分酒浸炒一分童便浸炒

一分以乳浸炒如因鬱結傷脾先期者加柴胡取其能引脾胃之氣上行兼賴其升提之力山梔能清鬱火

熱血麥冬益陰除熱鱉甲益陰除熱或再加吳茱萸炒黃連能達心脾之鬱火如因鬱結傷脾後期

或經來血少或經閉不行者加柏仁枸杞麋角人乳皆補血之品日飲人乳一碗能通經水

如過多淋瀝不止加麥冬鱉甲寒以清熱蓮鬚牡蠣滋以固脫五味芡肉酸以收斂髮灰髮為

血之餘同氣相求也

此方乃心脾肝三經之藥也立齋曰心主血肝藏血皆統攝於脾補脾和胃

血自生矣。故調經每多用之。胃弱脾虛者更宜。

按此方宋巖用和所創。以治二陽之病。發心脾。有不得隱曲。女子不月者也。陽明胃與大腸為二陽。蓋人之情慾。本以傷心。母傷則病及其子。勞倦本以傷脾。臟傷則病連於腑。故凡內而傷精。外而傷形。皆能病及於胃。此二陽之病所以發於心脾也。不得隱曲。陽道病也。夫胃為水穀氣血之海。主化營衛而潤宗筋。如經云。前陰者。宗筋之所聚。太陰陽明之所合也。胃病則失生化精血之原。故為陽衰少精。其在女子。則為不月。又云。其傳為風消。其傳為息賁者死。不治。胃家受病。久而傳變。則肝木勝土。風淫而肌體消削。胃病則肺失所養。故氣息奔急。氣竭於上。由精虧於下。敗及五臟。故死不治。所以病纔見端。即為治療。原方無遠志當歸。薛氏加入。以治血虛。又加丹皮山梔。以治血熱。而陽生陰長之理。乃備。隨手變化。通於各症。無不神應。

地芍涼血湯

自製

治血熱經水先期。色鮮紅。或紫黑。或成片成塊。或過多不止。

生地

白芍

涼血 骨皮

鱉甲

清熱 竹葉

或竹 麥冬

清心 山藥

以 甘草

補脾 黃芩

以

此涼血清熱而補肝腎之劑。隨宜加減用之。陰虛內熱人不能服。參朮者甚宜。或用六味地黃湯。參前藥治之。

逍遙散

見虛勞

治肝脾經虛。經水不調。或前或後。或經閉不行。或過多不止。

宜加四製香附。

如因鬱怒傷肝。先期者。參加地芍涼血湯方藥。

如因鬱

怒傷肝。後期或經來血少。或經閉不行者。加柏仁枸杞牛膝熟地。

如過多

不止。加蓮鬚棗仁芡肉之屬。此方辛散酸收。甘緩養血。而兼寧心扶脾之劑。乃

肝經之要藥。女科之神劑。調經者多主此。加減用之。多鬱多怒者。最相宜也。

天王補心丹

見虛勞

治勞心虛火妄動。致血錯行先期。或因心事不遂。致心血

虧少。乏血歸肝。而經閉不行。

經行先期。宜去當歸。

嫌其辛溫活血

遠志。辛溫加白芍龜甲之屬。

如經閉宜去五味

桔梗。加白芍枸杞牛膝人乳之屬。

此生津養血。清熱鎮心安神之劑。勞心之人。宜取加減用之。

四物湯

見頭痛

治肝經血虛。後期不至。

補血藥中
概用歸芍
此通弊也
宜慎

宜加柏仁枸杞牛膝鹿角膠製香附之屬

此方雖云調經之總司。然亦有不宜者。如血熱則忌用歸芍。令人病陰虛血熱者多。故吐衄家。咳喘家。嘔惡家。均忌。歸性滑腸。泄瀉者並忌。

柏仁丸

稍訂亦可煎服

治陰虛血少火盛經閉不行。

柏仁補血二地

二冬

滋陰降火

牛膝

熟補精血。生則通經。各四兩。

續斷

通宣

澤蘭

養榮血。行宿血。各二兩。

煉蜜丸服

此方滋陰養血壯水制火為主。使其血充。則經水不招自至。

失笑散

見胃脫痛

治血瘀內積。經閉不行。少腹時痛。

原方

有何氏加藥宜參用

可加香附降香。

如因恚怒鬱結。氣滯血凝者。再加鬱金香

砂

如少腹滿痛。拒按。可用桃仁承氣加減用之。

此散瘀行血之劑。所謂滯者行之。留者攻之是也。

香蘇散

見復寒

治經水適來。形寒飲冷。血凝停止者。

宜加當歸赤芍桃仁紅花元胡之屬

少。或經閉不行。

宜加香附利氣丹參降香牛膝性皆行血却不滯痰。

扶虛者香砂六君子湯加上藥。

益母草煎湯煎藥凡用通經藥者皆宜湯此煎之。

此方以消痰理氣為主。氣利則痰行。痰去則經通。治病必求其本之法也。須審明施用。勿執肥人而概投之。

附金匱治婦人雜病五方

甘麥大棗湯

治婦人臟燥。

概指五臟陰血為言。悲傷欲哭。象如神靈所作。經言肺在聲為哭。又悲為

肺志。又言肝悲哀動。中則魂傷而邪枉不正。總因臟燥不能榮養心神。魂魄為之不寧也。

數欠伸。呵欠而張口伸腰也。經言胃病善伸數欠。又言肺病腎病皆為欠伸。

甘草。緩瀉火心胞之陳小麥和肝陰。大棗補脾益胃潤肺。

此方以甘潤之劑。調補脾胃為主。以脾胃為生化氣血之原也。血充則燥止。

而病自除矣。

猪膏髮煎。見黃疸。

治胃氣下泄。陰吹而止。喧。此穀氣之實也。

陽胃津液枯燥。穀食壅滯不下。氣不

往後陰。而反從前。陰泄出。聲響如吹。

此方潤燥養血。俾腸間得潤。穀食下而氣轉後陰。此通則彼塞矣。沈氏謂有大便不結。中虛下陷而陰吹者。當補中升提以治之。不可概指為胃實也。

半夏厚朴湯

治婦人咽中

如有火鬱。

氣逆噎塞。吞之不下。吐之不出。如乾肉貼咽中。

半夏

厚朴

消痰散結。下氣。

蘇葉

和血溫中。行氣。

生薑

行陽散氣。

茯苓

理痰壅。導逆氣下行。

嚴冬時當審察

寒痰冷氣乃千百難

逢一二之症

於咽噎。致有此病。而男子因寒痰冷氣上逆。亦間有之。嘗治一人。咽中每噎塞。噎不出。以前湯投之即愈。愚謂陰虛之人。咽中噎塞不出者甚多。勿概混施。

狼牙湯

治陰蝕瘡爛。

濕熱熾盛。流注陰中。即生瘡矣。濕熱蒸化為蟲。侵蝕陰中。以致瘡爛。

狼牙

草名。苦寒有毒。能治惡瘡。除熱殺蟲。如無用。苦參黃柏桃葉等代之亦可耳。

煎濃湯。頻洗之。更以綿裹筋如

繭。浸湯。瀝入陰中。日四五遍。

蛇床子散

治婦人陰中寒冷。

蛇床子

為末。蜜水少許。丸如棗狀。綿裹納入陰中。

如因胞門受寒。少腹畏冷。陰戶掣痛者。亦可用。

用龍膏丸
案

室女陰虛
血少天癸
未至候用
毒藥通經
殺人案

血寒則凝
熱極則瘀
瘀則乾堅
此症甚多

參朮其血愈調。嘉言診視見汗出如蒸籠水氣。謂曰：此症可療處全在有汗。蓋經血內閉，止有從皮毛間透出一路。以汗亦血也。設無汗而血不流，則皮毛乾枯而死矣。宜用極苦之藥，以斂其血入內，而下通於衝脈。則熱退經行，而汗自止。非補藥所能效也。於是以龍膏丸日進三次，月餘，忽覺經水畧至，汗熱稍輕。姑減前丸，只進一次。又一月經水大至，淋漓五日，而諸症全愈。

一室女年十七，患瘰癧，久不愈。天癸未通，發熱咳嗽，飲食少思。醫欲用巴豆肉桂之類，先通其經。立齋曰：此症潮熱，經候不調者不治。今所喜脈不濇，且不潮熱，尚可治之。蓋此症因稟氣不足，陰血未充之故。須養氣血，益津液，其經自行。彼惑於速效，仍用前藥。立齋曰：非其治也。此類乃慄悍之劑，大助陽火，陰血得之則妄行，脾胃得之則愈虛。經果通而不止，食愈少而潮熱，遂致不救。按經云：女子二七而天癸至。若過期不至，是為非常，必有所因。寇宗奭曰：夫人之生，以血氣為本。人之病，未有不先傷其氣血者。世有童男室女，積想在心，思慮過當，多至勞損。在男子則神色先敗，女子則月水先閉。何以致

顧氏醫鏡 卷十六

五 掃葉山房藏版

非大劑涼血寒潤藥
痰必不行
世徒執血
得溫則行
之說輒用
辛熱活血
甚加參朮
其血愈稠
變症蜂起
不可不知

肝經瘀血
臀腿腫痛
候認外科
殺人案

肝經鬱火
頭項結核
兩脇脹痛
治案

肝經血少

然蓋憂愁思慮則傷心。心傷則血竭。故神色先敗。而月水先閉也。火既受病。不能榮養其子。故不嗜食。脾既虛則金氣虧。故發咳嗽。咳既作則水氣絕。故四肢乾木。氣不充。故多怒。鬢髮焦。筋骨痠。俟五臟傳遍。雖卒不死。然終死矣。此種虛勞。最難治療。若能改易心志。用藥扶持。可得九死一生。又張氏云。室女經久不通。切不可用苦寒。以血得冷則凝也。若經候微少。漸漸不通。手足骨肉煩痛。日漸羸瘦。潮熱。其脈微數。此由陰虛血弱。火盛水虧。不可以毒藥通經。宜常服柏子仁丸。澤蘭湯。

一放出宮人。臀腿腫痛。內熱晡熱。惡寒體倦。咳嗽胸痞。月經過期而少。彼以為氣毒流注。服清熱理氣之劑。益甚。立齋曰。此乃肝經瘀血停留所致。治法但當補其所不勝。而制其所勝。宜補者脾也。宜制者肝也。彼不信。仍服前藥而死。一婦早孀居。時年三十有七。患兩腿骨作痛。晡熱體倦。月經不調。或發寒熱。已數年矣。一日頭項兩側作核。兩脇脹痛。立齋曰。此係肝經鬱火所致。用加味逍遙散。加地芍澤蘭等藥。三十餘劑。症漸輕安。再用加味歸脾等藥。年餘而愈。

治案

虛陰內熱
腿痛膝腫

月經不調

治案

脾腎兩虛

內熱汗出

月經頻數

治案

赤帶之因

白帶之因

以歸脾湯兼服二百餘劑而愈。

一婦發熱口乾肢體倦怠腿痛膝腫月經不調立齋曰此足三陰經血虛之症也。用六味丸逍遙散兼服兩月飲食漸進形體漸健膝腫漸消而愈。

一婦因夫經商久出時發寒熱經行旬日方止服涼血降火藥內熱益甚自汗盜汗月經頻數立齋曰內熱汗出腎陰虛也月經頻數脾不統也用六味丸歸脾湯兼服而愈。

帶下

帶下有赤白之分。人有帶脈橫於腰間。如束帶之狀。病生於此。故名為帶。赤帶即赤淋多緣憂思鬱怒。損傷心脾。肝火時發。因之血不歸經。遂下亦矣。治宜補養

心脾。益肝涼血清火。若下久則陰血漸虛。中氣漸損。是當大補氣血為主。白帶是濕熱夾痰。有虛有實。按仲淳云。白帶多屬脾虛。蓋肝氣鬱則脾受傷。脾傷則濕土之氣下陷。而下白滑之物。不止矣。皆由風水鬱於地中使然耳。當開提肝氣。補助脾元為主。佐以清熱除濕之藥。又云。若帶下如濃泔而臭穢者。濕熱甚

辨帶下之清濁以分虛實

也宜清熱除濕為主。而佐以升提之劑。若帶下如雞子清者。脾腎虛極也。面色必不華。足脛必浮。腰腿必痠。宜益氣健脾。兼滋陰補腎二方。分進以治之。陳自明論帶下有五色之異。分屬五臟。東垣治帶下有主寒之說。臨症者並宜精察焉。

加味歸脾湯

加味逍遙散

天王補心丹

俱見虛勞

此三方通治赤帶。臨症合宜加減用之。歸脾逍遙亦並治白帶。

補中益氣湯

見泄瀉

白帶主此加減

原方

補助脾元。開提肝氣。

宜合二妙散。加麥冬。茯苓。車前。

清熱除濕。

棗仁。

收斂。

濃煎不時飲之。

兼用六味地黃。加牛膝。杜仲。牡蠣。海螵蛸。蜜丸空心服。

仲淳云。白帶屬氣虛。補氣健脾。乃治法之大綱。又叔和云。崩中日久為白帶。

漏下多時。腎水枯。故治帶症。當脾腎兼補。

加味二妙散

蒼朮

白朮 燥濕 黃柏

黃芩 清熱 茯苓

消痰 車前

利水 或加白芷

提升

此治濕熱夾痰。帶下如濃泔。臭穢者宜之。

對怒傷損

一痛帶下熱黃。腹脹脇痛。皮體瘦麻。不守土。瘦月經不調。帶下青黃。或白。

生肝血清肝火百餘劑而愈

崩漏

此論崩漏由衝任氣血兩虛或兼有熱所致宜先止血為要

此言當隨其所致之因而治之

崩漏之病由衝任二脈氣血兩虛所致經言衝脈為五臟六腑之海臟腑皆稟焉又言為十二經之血海以其受納諸經之灌注精血於此而蓄藏也又言衝脈任脈皆起於胞中衝脈並足少陰之經挾臍上行至胸中而散任脈上循腹裏上至咽喉面目又言任脈通太衝脈盛月事以時下故二脈陰陽平和外循經絡內榮臟腑何崩漏之有若勞傷不能約束經血則忽然暴下如山崩然故曰崩中崩久則成漏下不止其症有虛有熱有虛熱相兼有房勞致傷虛則滲下熱則流通傷則失職急則治其標宜先止血若因怒動肝火而血沸為崩漏者加味逍遙加減若因腎水虛衰不能鎮守胞中相火而血走為崩漏者保陰左歸加減若因悲哀太甚則心系急而胞絡絕以胞脈屬心而絡於胞絕則中即子宮在女為血室絕則上下不交亢陽內動而逼血下行者天王補心加減若因心事不足鬱結傷脾而血無主統者加味歸脾加減按沈氏云治崩漏宜大補氣血調養脾胃微加

清心火肝火之藥。補陰瀉陽。則血自止。立齋云。若大失血。當急用獨參湯救之。故崩無不由脾胃先損。故能受補者可治。若純用寒涼止血之藥。復傷脾胃。愈不能統血。是速其危也。故金匱用膠艾四物湯。治婦人陷經。漏下黑不解。故東垣有屬寒之說。雖此症屬虛熱者多。然亦不可不察其病變之無窮焉。

廣筆記方亦可服 治崩漏甚效

人參 黃芪 補血以 生地 白芍 涼血以 麥冬 心主血。心清則 棗仁 拘

杞 各三錢 杜仲 二錢 續斷 肝藏血。補肝則 阿膠 血去多則補益之。但真者甚難。或

之以龜通任脉。驚入 芟肉 二錢 五味 血滑脫。則 荊芥 血下滲。則升舉 熟 甚者可

暫加地榆槐花

此補氣益血。滋陰清熱。兼酸飲升舉之劑。立法周備。用故輒效。按嘉言云。若天癸已盡。潮汛已絕。血下有如崩漏。此為脫榮。宜大補。急用涼血清火為治。

加味道遙散 保陰煎 去牛膝 左歸飲 天王補心丹 加味歸脾湯 俱見虛勞

此五方皆可治崩漏。須審其因。加減取用。

調入藥服久之漸愈

胎前

胎前有三禁。禁汗下。利小便。仲淳云。安胎大法。宜補脾胃。參朮壯腰腎。杜仲續斷滋

陰生地冬養血。杞芍棗仁順氣。橘紅砂仁總宜清熱。芩連骨皮銀花為主。忌破氣破血。升散辛熱燥

胎前諸症

劑。然胎前諸症不一。有謂之惡阻者。由胃氣虛弱。惡心而妨阻飲食也。有謂之

子煩者。緣心肺有熱。煩悶而胸膈不安也。有胎動上冲。以致心腹脹滿作痛者。

謂之子懸。責之氣逆所致。有兩足浮大。甚至面目肢體俱腫者。謂之子腫。責之

脾虛所致。上不制水有。小便澀痛淋瀝者。謂之子淋。責之下焦虛熱。有小便不通。或

因胎滿壓胞所致者。則宜升舉之。或別有所因者。隨症治之。有遺尿不禁。或為

頻數。此屬肝火血熱。亦有因陰虛火旺。亦有因胎壓尿胞所致之不同。有懷胎

而點滴下血者。或月月行經者。或猝然大下者。皆由陰虛不足以濟火。氣虛不

足以固血所致。亦有因脾虛不能統血。有因肝火血熱妄行者。若血漏盡則斃。

常見漏胎之兒。生多不育。以無血蔭胎故也。有頻慣墮胎者。因血氣虛損。不能

預防難產之法

榮養胎元而然。立齋云。墮胎因內熱而虛者為多。宜常服安胎飲。凡娠婦腰痛。多致墮胎。不可不知。有娠婦忽然失音。不能言語者。即經所云。人有重身。九月而瘖。此胞之絡脉絕也。胞脉者。係於腎少陰之脉。貫腎。係舌本。故不能言。不必治也。當十月復。謂既產而胞絡通。則能言矣。至若難產之故。多由內熱灼其胞液。以致臨產之際。乾溢而難。或脾胃虛弱。不能運化精微。而令胞液不足。亦致難產。宜於七八月間。常服補氣滋陰。養血清熱流滯之劑。如安胎飲。達生散之類。加減用之。若中年之婦。生育太多。氣血虛弱者。尤宜預服。或有因孕婦形盛氣實。身居安逸。口饜肥甘。致胞胎肥厚。根蒂堅牢。亦令難產。宜預服瘦胎丸飲。胎前調治之大綱如此。然胎產自有專科。所當合參。則備。

竹茹湯

見傷寒

加參苓芍橘木瓜蘇子砂仁

此方補胃清熱。利氣降逆。治惡阻之神劑。如肥人而因中脘停瘦者。可用二

陳湯加枳殼砂仁之類。胃弱加人參。半夏損津液。雖為妊娠所忌。然有是病。

犀角散

犀角涼心麥冬清肺骨皮除熱黃芩瀉火茯苓導赤

此治子煩之劑。

紫蘇飲

紫蘇 橘紅理氣通滯大腹皮降逆白芍欬逆當歸血中人參虛者宜加沉香砂

仁。

此治子懸之劑。仲淳一方。用紫蘇橘紅麥冬竹茹枇杷葉。施於陰虛之人。甚

宜甚效。

茯苓導水湯見腫脹

原方應去澤瀉嫌其利水檳榔嫌其破血虛加人參。

此方理脾制水。清肺利氣。可治子腫。原方內加減藥中有犯胎氣者宜去之。

薛氏載鯉魚湯一方。用白朮茯苓橘紅當歸白芍。以鯉魚一尾。破洗煎濃汁

煎藥。

五淋湯見淋

原方應去牛膝。嫌其通經。宜少用車前。

此方滋陰清熱。分利小便。治子淋宜之。

補中益氣湯見泄瀉

升舉法最要用之得當方穩此方較捷

此升舉之法。若胎滿壓胞。小便不通者。可做此加減煎湯探吐。須審不可吐。諸條用之則穩。或別有所因者。當參小便不通門諸法治之。一法令穩婆手入產戶。托起其胎。則溺出如注。

加味道遙散見虛勞。加減法。宜從小便不禁。 六味丸見虛勞。 宜去澤瀉。加知柏二冬。二方俱

宜加白微。治血淋及胎產遺尿。

此二方皆治小便不禁。肝火血熱。用加味道遙。陰虛火旺。用知柏六味。分別用之。

八仙長壽丸 人參固本丸俱見虛勞。宜作煎飲。

俱加白芍。棗仁。杜仲。續斷之屬。

行。加味道遙散俱加減用之。

安胎飲亦可作丸常服

白朮健脾生榮血。以陰胎元。黃芩瀉火清熱。以安胎。杜仲續斷補腎。使腎氣充足。托住胎元。不致墮。

矣。杜仲八兩。續斷二兩。為末。山藥糊丸。名保胎丸。生地滋陰。二冬滋陰。枸杞白芍養血。人參甘草補氣。砂

仁滯宜加銀花花粉黃連連翹。可預解一切胎毒。服至百劑。神效。黃連一味煎飲。治孕婦腹內鐘鳴及兒哭。

此方補脾胃。壯腰腎。滋陰養血。清熱順氣。諸法盡備。自初孕至產。皆當主此

隨宜加減服之。若頻慣墮胎者。尤宜預服。仲淳云。予閱本草。見治胎將墮欲

死者。用生地二兩。酒炒。砂仁末一兩。水酒各二碗。分作二次服。傳一門人。試

之如神。

達生散

人參或用人黃。黃芪。甘草補氣。白朮健脾。白芍當歸養血。紫蘇陳皮理氣。腹皮降氣。如

臨產時。服宜加白蜜麻油各一杯。若胞漿破早。血水先乾者。不時與以協濟

之。

此法極妙

宜宗用之

此方名達生者。取詩言誕彌厥月。先生如達之義。達小羊也。先生首生也。羊子
先首生而無留難。預服此方。則氣血不虛不滯。兼之滑潤。而其產也。猶之達矣。
瘦胎飲

枳殼炒 甘草炙 為末。每服二錢。白湯調下。日三服。溫隱居加當歸木
香。或煎或丸皆可。

此方名瘦胎者。令欲其胎瘦而易產也。昔湖陽公主體肥。每產累日不下。南
山道人進以此方。而得效。果形盛氣實者。方可用之。否則必致耗氣而難產。
是以藥貴因人而施耳。

保產無虞方 臨月預服數劑。及將產服一劑。自然易產。

當歸酒洗 白芍 川芎利其血 黃芪益其氣 甘草益其氣 枳殼炒 厚朴通其

汁炒各五分 川貝母一味為末。酒服。能治難產。 兔絲子一味為末。酒服。能 荆芥穗

川羌活透關節 蘄艾性通竅 河水煎服。

此治難產之神方。然陰虛內熱。咳逆之人。仍宜滋陰養血。清熱順氣為主。

世人陰虛 內熱者多 方內辛溫 香燥破散 藥大非所 宜難俗尚 此方用者 審之

損當即下

當歸錢五川芎二錢五分水酒各半煎服

此方安生胎下死胎乃王道之劑也一方用牛膝一兩酒煎服文仲用雞子

三四枚鹽三錢調服又有用白蜜麻油各一杯入湯頓服者並可採可用胎

死腹中法當以妊婦舌頭青黑為驗若唇舌俱青子母俱死也

婦人手少陰動甚者妊子心脈流利滑動則血旺而陰搏陽別謂之有子心主

別主子宮言少陰二脈搏手與陽邪有三部脈浮沉正等無他病而不月者孕也腎

尺大而旺亦然經斷病多六脈不病亦為有妊體弱之婦脈雖微細尺脈按之

不絕便是有妊以其體弱脈故難顯尺脈雖小按之滑者妊也尺為腎之外候乃生人之

中為生化之地故血盛而脈形如水氣聚而脈象如珠皆狀其往來利動液滑之體左疾為男右疾為女疾即婦人經斷

有身其脈絃者後必大下不成胎也弦為肝木太過肝主疏泄不能藏血也妊娠七八月脈實牢

強大者吉沉細者難產而死婦人欲生其脈離經夜半覺日中則生也離經者離於經

常之脈蓋胎動於中脈亂於外勢所必至也

一妊婦咳嗽其痰上湧日五六碗諸藥不應立齋以為此水泛為痰用六味丸

六味四君治咳嗽痰

妊婦脈候

顧氏醫鏡卷十六十一掃葉山房藏版

湯

鯉魚湯治腹脹

預服紫蘇飲易產

紫蘇飲催生

治交骨不開

胎死用芒硝

料及四君子湯。一劑稍安。數劑而愈。

一婦懷孕。腹脹滿。用鯉魚湯。白朮茯苓桑皮木瓜秦艽紫蘇橘紅薑皮大鯉魚一尾。破洗煎汁。煎藥數劑而安。

丹溪云。予族妹苦於難產。遇胎則驅之。予甚憫焉。蓋其體肥而勤女工。體肥則氣虛。久坐則氣不運。兒在胞胎。亦不能自運耳。後懷胎至五六月。用紫蘇飲加參。數十劑而產甚快。

一孕婦累日不產。催生藥不驗。此坐草太早。心懷畏懼。氣結不行焉。用紫蘇飲一劑而產。

一婦人年三十餘歲。始生產。交骨不開。用歸芎湯。加龜甲一個。婦人頭髮一握。存性。

連進三四劑。頓開分娩。此方能治交骨不開難產。陳自明云。交骨不開。陰氣虛也。

一婦懷孕。勤苦負重。腹中陰冷重墜。口中甚穢。立齋曰。此必其胎已死。令視其舌青黑。與芒硝五錢服之。化下穢水而安。

此論治產後大法

產後諸症昏暈

寒熱往來

頭痛

腰痛

少腹痛

脇痛
兒枕痛

丹溪云。產後以大補氣血為要。雖有雜症。以末治之。又仲淳曰。治產後大法。宜行敗血。次宜補血清熱。總宜補養心脾肝腎為主。忌破氣升提。燥熱苦寒。汗以下諸藥。稽方書論產後病症甚多。姑舉大畧言之。如昏暈不省人事。或因去血過多。氣血兩虛而致者。清魂散參蘇湯之屬。或因瘀血不行。反逆冲上而致者。黑神散治之。乍寒乍熱如瘧。或由氣血虛損。營衛不和而作者。加味歸脾道遙之屬。或由瘀血停留。相連肝膽經脈而作者。黑神散頭痛或由血虛火炎者。四物加甘菊銀花二冬牛膝之屬。或由敗血入肝。隨經上冲巔頂者。黑神散腰痛若攸攸隱隱。喜人按摩者。血去多而腎虛也。六味加牛膝杜仲續斷之屬。若脹痛如刺時作時止。手不可按者。敗血流入腰腎間也。黑神散少腹痛而按之即止者。為血虛。芍甘湯加歸地牛膝續斷沉砂之屬。按之愈痛者。為瘀凝。腹中有塊時上時下。痛不可忍。此名兒枕塊痛。乃宿血也。黑神散脇痛亦有可按。為肝經血虛氣逆。生地歸芍甘菊續斷羚羊玉金降香之屬。拒按者。為肝經血凝氣滯。黑神散嘔惡有因胃氣虛逆。宜分寒熱。熱者竹茹湯加參苓橘紅木瓜之屬。寒

腹脹

喘急

言語失度

言語含糊

寒澁

脹滿煩燥

澹妄

惡露不下
而不甚痛

者○惡露

不下小腹

脹滿刺痛

惡露不止

示諸病非

敗血即虛

此言金匱

論新產之

病

者異功去朮甘。加豆蔻生薑之屬。腹脹有因脾陰衰弱。異功去朮甘。加白芍棗仁蓮肉扁豆之屬。二症亦有因敗血入脾胃而然者。調榮散去莪朮。加查肉黑豆之屬。氣急喘促。因血脫氣無所依。上逆胸中。名曰孤陽。人參固本湯。加蘇子橘紅瓜蒞仁。枇杷葉童便之屬。最為難治。有因敗血入肺所致者。茅根桑皮藕汁童便之屬。扶虛者合參蘇湯。若心神恍惚。睡卧不安。語言失度。如見鬼狀者。此屬血舍空虛。神魂不寧之故。亦有因血少不能上榮於舌。而言語含糊寒澁者。補心丹。按命丹之類。若心下脹滿。煩燥犯亂。澹語妄語。如見鬼狀者。此原敗血停滯。上干心君所致。亦有因敗血上冲。而神昏舌強不語。以心藏神而舌為心苗故也。犀角地黄湯。加丹參琥珀羚羊之屬。惡露不下。而痛不甚者。陰血素虛。敗血亦少之故。拍仁丸。加丹參黑豆之屬。小腹脹滿刺痛者。此責停滯之咎。黑神散。惡露不止。肝虛不藏。有因脾虛不攝者。有因血熱妄行之不同。宜參調經門諸方以治之。然諸條總不越血氣大虛為病。敗血為殃二端。若別有所因者。又當隨其所因。而各從本門參酌治之。按金匱論。新產婦人有三病。一曰病瘕。因新產血虛多汗出。易中風邪所致。然瘕病多由亡血。筋無所養。不必向定腹

產後諸症
昏暈

寒熱往來

頭痛

腰痛

少腹痛

脇痛
兒枕痛

丹溪云。產後以大補氣血為要。雖有雜症。以末治之。又仲淳曰。治產後大法。宜行敗血。次宜補血清熱。總宜補養心脾肝腎為主。忌破氣升提燥熱苦寒汗以下諸藥。稽方書論產後病症甚多。姑舉大畧言之。如昏暈不省人事。或因去血過多。氣血兩虛而致者。清魂散參蘇湯之屬。或因瘀血不行。反逆冲上而致者。黑神散治之。乍寒乍熱如瘧。或由氣血虛損。營衛不和而作者。加味歸脾道遙之屬。或由瘀血停留。相連肝膽經脈而作者。黑神散頭痛或由血虛火炎者。四物加甘菊銀花二冬牛膝之屬。或由敗血入肝。隨經上冲巔頂者。黑神散腰痛若攸攸隱隱。喜人按摩者。血去多而腎虛也。六味加牛膝杜仲續斷之屬。若脹痛如刺時作時止。手不可按者。敗血流入腰腎間也。黑神散少腹痛而按之即止者。為血虛。芍甘湯加歸地牛膝續斷沉砂之屬。按之愈痛者。為瘀凝。腹中有塊時上時下。痛不可忍。此名兒枕塊痛。乃宿血也。黑神散脇痛亦有可按。為肝經血虛氣逆。生地歸芍甘菊續斷羚羊玉金降香之屬。拒按者。為肝經血凝氣滯。黑神散嘔惡有因胃氣虛逆。宜分寒熱。熱者竹茹湯加參苓橘紅木瓜之屬。寒

腹脹

喘急

言語失度

言語含糊

寒溢

脹滿煩燥

譫妄

惡露不下

而不甚痛

者○惡露

不下小腹

脹滿刺痛

惡露不止

示諸病非

敗血即虛

此言金匱

者異功去朮甘。加豆蔻生薑之屬。腹脹有因脾陰衰弱。異功去朮甘。加白芍棗仁。蓮肉扁豆之屬。二症亦有因敗血入脾胃而然者。調榮散去莖朮。加查肉黑豆之屬。氣急喘促。因血脫氣無所依。上逆胸中。名曰孤陽。人參固本湯。加蘇子橘紅瓜蒌仁。枇杷葉童便之屬。最為難治。有因敗血入肺所致者。茅根桑皮藕汁童便之屬。挾虛者合參蘇湯。若心神恍惚。睡卧不安。語言失度。如見鬼狀者。此屬血舍空虛。神魂不寧之故。亦有因血少不能上榮於舌。而言語含糊寒溢者。補心丹。按命丹之類。若心下脹滿。煩燥犯亂。譫語妄語。如見鬼狀者。此原敗血停滯。上干心君所致。亦有因敗血上冲。而神昏舌強不語。以心藏神而舌為心苗故也。犀角地黃湯。加丹參琥珀羚羊之屬。惡露不下。而痛不甚者。陰血素虛。敗血亦少之故。柏仁丸。加丹參黑豆之屬。小腹脹滿刺痛者。此責停滯之咎。黑神散。惡露不止。肝虛不藏。有因脾虛不攝者。有因血熱妄行之不同。宜參調經門諸方以治之。然諸條總不越血氣大虛為病。敗血為殃二端。若別有所因者。又當隨其所因。而各從本門參酌治之。按金匱論。新產婦人有三病。一曰病癰。

此下論產後或補或攻或攻補兼施施治勿執大補氣血一法溫補法

攻法

攻補兼施之法

如不應可漸加以知為度

內有熱者多宜薑桂

亡而火上熾。但補其血。則神自昌。三日大便難。蓋血與汗。則津液所生。血虛汗出。津液亡而胃燥。燥則熱而乾。大便難於出矣。又沈氏謂產後大虛。外邪易侵。或身表經絡受邪。或從陰戶入於胞宮。則病狀千變。故虛中常帶實症。而實中常有藏虛攻補之法。不可不明。如金匱治產後腹中疝痛。疝痛者。綿綿而痛。是屬虛也。責之氣血兩虛。或有微寒阻滯氣血所致。用羊肉湯。以羊肉補益氣血。當歸養血而行血滯。生薑散寒而行氣滯。溫補之法也。治產後腹中痛。有瘀血着臍下。用下瘀血湯。以大黄桃仁蟅蟲蜜丸酒化調服。峻藥緩治攻之法也。治產婦腹痛煩滿。不得卧。責其脾虛氣滯食停之故。用枳芍散。以只實通氣消食。芍藥補脾養肝。一攻一補。攻補兼施之法也。故或補或攻。或攻補兼施。應做此法。隨宜用藥施治。毋拘丹溪之說。而固執不通。然攻之一法。又必婦人形盛氣實。果有不得不下之症者方可。小劑微下之。否則未有不臨虛虛之禍。而殺人矣。

黑神散 加減

生地

三錢 涼血 當歸 二錢 和血

赤芍 蒲黃 一錢 行血 生用 各

乾薑 炒黑 引血 藥 入 血 分

去惡 養新 三五七分 黑

神

神

者少每見
人用辛熱
活血行瘀
其血愈稠
子氣用大
劑涼血寒
潤藥即下
薑桂可盪
用手

諸法當遵

豆炒一大撮。以上六味。即黑神散原方。有牛膝三錢。續斷酒炒。澤蘭四味。皆

代元胡酒炒各二錢。查肉均行結氣滯。桃仁善破瘀血。炒紅花少用和血。多荆芥

益母草煎湯煎藥。口乾舌縮。加生雞子一枚調服。寒熱往來。加鱉甲。

五錢。頭痛加川芎一錢。腰痛加杜仲三錢。兜枕極痛。加乳香沒藥各六分。虛

汗。加棗仁三錢。驚悸亦如之。汗不止。加參芪各二錢。

此以去惡露為主。乃產後必用之劑。然當隨所見症。而加以的藥治之。如惡

露過多。少腹已顯無塊。按之不痛者。即宜禁用行血破血諸藥。

清魂散

人參虛者議加當歸引諸藥各歸其經澤蘭獨入血海荆芥古方一味。炒黑為末。童便白湯各一

杯。調服三錢。產後即服。不思血。童便產後聖藥。一杯。

此方治產後血暈。不省人事。虛者宜之。房中宜預置炭火。候產下以酸潑之。

使嘗聞醋氣。可免血暈。或燒舊漆器亦可。產婦房中。宜閉戶牖。毋使冒風。設

一犯之。其患最巨。宜本方去參同海藏防風當歸湯。象豹治之。皆盛暑之時。

須要用之
得當

人參能固元氣於垂亡一兩真蘇木少用和血。多破血。二兩加童便一杯頓服。一方加鹿角膠。

益氣補血。五分。生鹿角。隨症加減。難以盡述。

此攻補兼施之法也。施於惡露未行。元氣將脫者甚當。若去血過多。氣血兩

虛而昏暈者。是當以人參為君。鹿角為臣。而以蘇木童便為佐矣。虛人須預

煎湯。俟產下即服。可免血暈。左方加獨參湯。參芪湯。參附湯之類。皆治虛脫

之劑。參酌取用。

加味歸脾湯 逍遙散 六味地黃丸湯 保陰煎 左歸丸飲 人參固本

丸 天王補心丹俱見虛勞集靈膏接命丹俱見中風竹茹湯 犀角地黃湯俱見傷寒柏

仁丸調經加味四物湯見頭痛調榮散 加味異功散俱見腫脹

此數方各隨所宜治法。加減用之。產後應用諸方甚多。不能盡列。臨機應變。

向各門中采取用之可也。

胞衣不下方

益母草三兩。一方單用。煎入童便頓飲。治橫生甚驗。牛膝 當歸各五分芒硝二三錢。或用元明粉代之。

虛人。酒煎入童便一杯。或合失笑散。蒲黃五靈脂同用。勿用。

此方責之血入衣中。脹大難下。腹中脹痛。手不可近。甚至胸滿喘急。速進此藥。血散脹消。其衣自下。緩則不救。一方產婦頭髮入口作嘔。即出。亦有因氣虛無力送出者。本方可合參蘇湯。或因血少乾澀不下者。本方可加麻油生雞子白。各一杯頓服。

子腸不收

有用蓖麻子搗貼丹田。及塗頭頂心者。如已收上。即宜洗去。有用半夏末吹鼻。取嚏而入者。有用驚頭灰。白芨五倍子末。枯礬羊脂等藥。可加冰片敷托而入之者。亦可煎湯頻洗。有用麻油煎熱薰洗者。即用驚頭灰湯調服者。若日久不能收上。宜大補氣血為主。暫加升提。如補中益氣湯之類。如惡露未盡。及喘咳嘔惡等症。仍宜戒投。

玉門不斂

有用八珍湯。加黃芪五味子等藥者。責之氣血大虛也。有用加味逍遙散者。

王不留行

一錢五分

穿山甲

七分

木通

一錢五分

麥冬

五錢

當歸

三錢

瓜蒌仁

濃湯煎藥

此治乳汁不下之方也。參芪隨宜加用。外用木梳於乳房梳下。

免懷湯

歸尾

赤芍

紅花

牛膝

此摘乳之方。婦人之血下為月經。上則為乳。

欲摘乳者。通其月事。則乳汁下行。免乳脹之苦矣。方曰免懷子生三年。然後

免於父母之懷也。

新產脈宜小緩。若數大發熱為凶。

如胞衣未下。惡露未來。腹脹如鼓。嘔吐黃水。多帶腥臭。加喘者。必產後口鼻有

黑氣者。

胃絕肺敗也。

死。或血脫過多。或汗出不止。而致瘦。

乃為不治。

產後汗出手拭不

及者難治。產後發喘。產後痢疾。產後尊勞。皆難治。

生產名曰坐草。尊草尊也。產中虛乏勞倦。寒熱如瘧。百節

疲疼。肢體倦怠。咳嗽痰逆。名曰尊勞。

一婦產後發狂持刀殺人。仲淳曰。此陰血暴崩。肝虛火炎故也。令先飲童便一

陰血暴崩
肝虛火炎

死症

脈之吉凶

發狂案

陰血暴崩

虛火上炎

暈嘔跟腫

喉痛

脾陰不足
腿痛食難
治案

二便不通
用牛乳效

心脾肝虛
煩驚悸治

杯少止。用大劑生地當歸牛膝澤蘭茯神遠志棗仁龍齒。仍加童便頓服而止。

一婦小產後。陰血暴崩作暈惡心牙齦浮腫。喉嚨作痛。日夜叫號不絕。仲淳云。

此症因失血過多。陰血暴虧。陽無所附。火故上炎。胸中煩熱。所謂上盛下虛。

之候也。法當降氣。氣降則火自降。陽交於陰。諸病自已爾。藥用生地麥冬拘。

杞棗仁續斷。滋陰養血。白芍五味。欬火下降。牛膝童便。引火下行。兼能去瘀。

鬱金降氣。蘇子橘紅。枇杷葉降氣。青蒿鱉甲除熱。大劑飲之而愈。

一婦產後腿痛。不能行立。久之飲食不進。困憊之極。仲淳診之曰。此脾陰不足。

之候。脾主四肢。陰不足。故病下體。向所用藥雖多。皆苦燥之劑。不能益陰。用。

白芍棗仁石斛牛膝木瓜為君。生地枸杞茯苓黃檗為臣。甘草車前為使。一。

劑即效。四劑而愈。

一產婦二便不通。諸藥不應。發熱危甚。立齋令飲牛乳。一日稍通。三日而痊。人。

乳尤善。

一婦產後驚悸。聞聲輒死。非用力抱持。則虛煩欲死。如是累月。仲淳曰。此心脾。

陰血暴亡
自汗不止
久服大劑
補陰效

心脾虛熱
用歸脾效

脾氣虛敗
自汗昏憤
用參附效

一婦產後氣喘。仲淳投人參蘇木麥冬各五錢。一劑而愈。三日後忽自汗無間。晝夜聞響聲。及飲熱湯。即汗遍體。投以參芪各五錢。加歸地二劑。不效。徧檢方書。有云汗為心液。凡服固表藥不效。法當補心。恍然曰。是已。此婦素稟有火。氣非不足也。產後陰血暴亡。心主血。故心無所養。而病汗。以棗仁一兩為君。歸芍杞地麥冬圓肉牛膝杜仲五味牡蠣大劑與之。至三十二劑。罔效。病家欲令更方。仲淳曰。吾前所以投參芪不應。而遽止之者。以參芪為氣分藥。劑且大。其不應者。必與症不合也。茲得其情。復何惑乎。蓋陰血難成。易虧。不可責效旦夕。仍投前藥。至四十二貼。汗暫收。忽睡。睡至四日夜。一醒。霍然。顏色通常。血足則氣華也。

一產婦惡露淋漓。體倦面黃。食少惡寒。晝夜不寐。驚悸出汗。此心脾虛熱。用加味歸脾而痊。

一產婦畧聞音響。其汗如水而昏憤。諸藥到口即嘔。立齋以為脾氣虛敗。用參附末為細丸。時含三五丸。隨液咽下。乃漸加之。至錢許。却服參附湯而愈。

作泄厥冷
大劑參附
效

一婦產後五日。食冷物。復動怒傷脾。作泄。乃微嘔。又三日泄不止。手足冷。發喘。床亦動搖。神魂飛蕩。以人參附子各五錢投之。如故。加參附又不効。漸加至參三兩。附子三錢。一劑而愈。

顧氏醫鏡既寫成定本將付印復為校勘一過祇以原錄本過於草率此帙訛舛遂多窮數月之力僅稍稍訂正其意義可通者其辭句文字間有未適意者或為草創之作未經修改既無別本可校自應存其面目使後之學者得窺昔賢著述梯徑去人不遠而免神聖斯業者興博奧淵深不能探涉之歎也至書內徵引方論醫案多與原著不同則為顧氏所剪裁而非鈔錄者之誤矣國楫未嘗學問素不精於板本訓詁之學遂致此書體式行格未能齊一俗書譌字盈篇滿楮所幸方藥理論尚尠謬誤文字小疵或不致貽誤讀者是則國楫所自漸而又堪自慰者也按顧氏此書極為精切世無傳本向頗疑之及見書中多引呂氏晚村之說呂氏著作清初曾經禁錮殆此書不著於世之一大因歟校勘既畢墨有餘瀆故附誌之時甲子六月大雨中左國楫識