

醫宗心領

七之下



	一	二	漢
	四	三	書
	五	九	門
八	六	二	
冊	架	函	號
類			

庫	文	閣	內
函	七	八	九
架	冊	號	類

內閣文庫	
番號	漢 12439
冊數	18 (12)
函號	301 48



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak





瘧疾

黃帝曰瘧瘧皆生于風其畜作有時者何也凡

皆各瘧昔人之解多非也畜者伏也作者發也岐伯對曰瘧之始發也

先起于毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒

去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲起于毫毛者發寒毛

豎也伸欠也陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移

也陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒邪入于陰則陰實陽虛邪入于陽則

陽實陰虛故虛實更陽并于陰則陰實而陽虛

陽明虛則寒慄鼓頷也巨陽虛則腰背頭項痛

三陽俱虛則陰氣勝骨寒而痛寒生于內故寧
 外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱則
 喘而渴故欲冷飲也皆得之夏傷于暑熱氣盛
 藏于皮膚之內腸胃之外此營氣之所舍也令
 入汗空疎腠理開因得秋氣汗出遇風及得之
 以浴水氣舍于皮膚之內與衛氣并居陽暑傷
氣其證
 多汗感而即發邪不能留陰暑無汗故留藏也
 瘧必因于盛暑貪涼不避風寒或浴凉水或食
 生冷壯者邪不能于怯者舍于營衛但外
 感于寒者多為瘧內傷于冷者多為痢也衛氣
 者日行于陽夜行于陰此氣得陽而外出得陰

而內薄內外相薄是以日作其氣之舍深內薄
 于陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是
 以間日而作也其氣之舍深則邪在藏矣在府
者其行速在藏者其行遲故間
 作也邪氣客于風府循脊而下衛氣一日一夜
 大會于風府日下一節故其作也晏此先客于
 脊背也每至于風府則腠理開邪氣入則病作
 以此日作稍益晏也其出于風府日下一節二
 十五日下至骶骨二十六日入於脊內注于伏
 膂之內項骨三節脊骨二十一節共二十四節
邪氣自風府日下一節二十五日下至

尾巖復自後而前故二十六日入于脊內以注伏膂之脈其氣上行九日出于缺盆之中其氣日高故作日益蚤也邪在伏膂循脊而上無關節之阻故九日而出缺盆其氣日高則自陰就陽其邪日退故作漸蚤也邪氣內薄于五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃作也此重文未盡夏傷于暑其汗大出腠理開發因淩滄之義也

水寒藏于皮膚之中秋傷于風則病成矣水者浴水乘涼也因暑受寒汗不得出夫寒者陰寒邪先伏于皮膚得秋風而病發矣


氣也風者陽氣也先傷于寒而後傷于風故先

寒而後熱也病以時作名曰寒瘧先傷于風而後傷于寒故先熱而後寒也亦以時作名曰溫瘧但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧○其間二日者邪氣與衛氣客于六府而有時相失不能相得故休數日乃作也客猶會也邪在六府則氣遠會希故間二日或休數日也

觀此則丹溪所謂子午卯酉日為少陰瘧寅申巳亥為厥陰瘧辰戌丑未為太陰瘧非矣子午雖曰少陰而卯酉則陽明矣巳亥雖曰厥陰而寅申則少陽矣丑未雖曰太陰而辰戌則太陽矣三日發者猶可以此為言四日作者又將何以辨之殊屬牽強按此施治未必無誤不可以

醫宗金鑑卷之七
為訓 帝曰夏傷于暑秋必病瘧今瘧不必應者
也何也岐伯曰此應四時者也其病異形者反四
時也 秋瘧應四時者也春夏冬之瘧病形多異四時皆能為瘧也 秋病者寒
甚冬病者寒不甚 陽氣伏于內也 春病者惡風夏病者
多汗 ○溫瘧者得之冬中于風寒 所以傷寒門有溫瘧 氣
藏于骨髓至春則陽氣大發邪氣不能自出因
遇大暑腦髓燥肌肉消腠理發泄或有所用力
邪氣與汗皆出此病藏于腎其氣先自內出之
于外也如是者陰虛而陽盛陽盛則熱矣衰則

氣復返入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後
寒瘧瘧者肺素有熱氣盛于身厥逆上衝中氣
實而不外泄有所用力腠理開風寒舍於皮膚
之內分肉之間而發發則陽氣盛其氣不及于
陰故但熱而不寒 愚按經言夏傷于暑秋為瘧瘧又言瘧瘧皆生
于風又言風寒之氣不常又言汗出遇風及得
之以浴此皆以風寒暑濕為言也語溫瘧則曰
風寒中腎語瘧瘧則曰肺素有熱夫冬寒既



以中腎則心肝脾肺四藏獨無令氣之邪可入客乎肺熱既可以入瘧則肝脾心腎之氣鬱而爲熱者獨不可以成瘧乎然語六氣者道其常語五藏者盡其變也須知風與暑陽邪也寒與水陰邪也風者陽中之涼氣也暑者熱中之寒邪也由是則四者皆屬於寒夫夏傷於暑汗出腠開當風浴水淒滄之寒伏于皮膚及遇秋風新涼束之表邪不能外越陰欲入而陽拒之陽欲出而陰遏之陰陽相薄而瘧作矣淺者病

在三陽隨衛氣以爲出入而一日一作深者病在三陰邪氣不能與衛氣並出或間日或三四日而作作愈遲者病愈深也經之論瘧無漏義矣而仁齋丹溪又分痰與食飲與血瘴與勞與此此不過瘧之兼證耳非因而成瘧者也故治瘧者察其邪之淺深證之陰陽令其自藏而府散而越之邪去則安古法有汗欲其無汗養正爲先無汗欲其有汗散邪爲急然邪在陽者取汗易邪在陰者取汗難必使由陰而陽由裏而

蚤乃得之也又熱多者涼藥為君寒多者溫藥為主至于痰食血飲瘴勞與牝之七證各隨其甚者而兼理之世俗又有鬼瘧之名此為時行疫氣投平胃散無不截者總之脈實證實者攻邪以治標脈虛證虛者補正以治本久瘧必虛惟人參生薑各一兩連投二服于未發之前莫不應吾取效貧困者白朮可代血虧者當歸可代近世不明表裏虛實輒用知母石膏苓連梔栢若表未解而得此寒涼則寒邪愈固或用常

山草果巴豆砒雄若正已虛而得此尅伐則元氣轉虛故夫綿延不已者皆醫之罪耳豈病之咎耶

發散瘧疾多因風寒暑濕天之邪氣所傷當分經絡而發汗其七情痰食水血皆兼見之候隨證治之

風瘧惡寒自汗煩躁頭疼必先熱後寒宜柴胡蘇葉細辛白芷羌活生薑之類

溫瘧受冬月之寒復因暑風而發亦先熱後寒

如熱多者小柴胡湯寒多者小柴胡湯加桂

寒瘧納涼之風寒沐浴之水寒先受于腠中復

因秋風涼肅而發先寒後熱宜羌活紫蘇生薑

之類散其太陽之邪次用柴胡湯近來不問何

經但用柴胡者非也

瘧瘧肺素有熱陰氣先絕陽氣獨發少氣煩冤

手足熱而嘔此但熱而不寒盛暑發者人參白

秋涼發者小柴胡湯

濕瘧汗出溼浴或具雨或濕襲其證身體重而

痛嘔逆脹滿胃苓湯加羌活紫蘇

疔瘧陽氣素虛當盛暑時乘涼飲冷陰盛陽虛

故但寒而不熱也柴胡薑桂湯

食瘧或肥甘無度或生冷受傷食滯痰生其證

饑而不能食食則脹滿嘔吐腹痛青皮草果荳

蔻砂仁神麴山查之類

瘧瘧嶺南地方天氣炎山氣濕多有嵐瘧之毒

發時迷悶甚則狂妄亦有不能言者皆由血瘀

于心涎聚于脾須疎通大府涼膈散或小柴胡加

大黃木香瘧疾

勞瘧 或素有弱證或因瘧成癆十全大補湯入有熱者去桂

瘧母 治之失宜營衛虧損邪伏肝經膈下有塊

此證當以補虛為主每見急于攻塊者多致不

救六君子湯加木香肉桂蓬朮鼈甲

鬼瘧 俗以夜發者為鬼瘧非也邪入陰分發於

六陰宜四物湯加知母紅花升麻柴胡提起陽分方可截之惟

時行不正之氣真鬼瘧也宜平胃散加雄黃桃仁

瘧法 瘧發四五遍後曾經發散者方可截之

何首烏散常山飲獨蒜丸久瘧大虛者人參一兩生薑二兩連進二服若病

邪初起未經發散遽用酸收劫止之劑必致綿延難愈或變成他證不可不謹也

脈候 瘧脈自弦而弦數多熱弦遲多寒而浮大可吐之微則為虛代散者弦

醫案

太史楊方壺瘧發間日脈見弦緊兩發後苦不

可支且不能息口便懇截之余曰邪未盡而強

截之未必獲效即使截住必變他證不若治法

得所一二劑間令其自止升麻柴胡各二錢提

醫宗必讀 卷之七 瘧疾

陽氣上升使遠于陰而寒可止黃芩知母各一錢五分引陰氣下降使遠于陽而熱自巳以生薑三錢劫邪歸正甘草五分和其陰陽一劑而減半再劑而竟止矣
新安程武修患瘧每自一發自巳午時起直至次日寅卯而熱退不踰一時則又發矣巳及一月因頓哀苦命兩郎君叩首無筭以求速愈余曰頭痛惡寒脈浮而大表證方張此非失汗必誤截也武脩云寒家素有截瘧丸百發百中弟

服之病勢增劇何也余曰邪未解而遽止之邪不能伏請以八劑四日服盡決效耳石膏黃芩各三錢抑陽明之熱使其退就太陰白豆蔻三錢生薑五錢救太陰之寒使其退就陽明脾胃為夫妻使之和合則無陰陽乖亂之愆半夏檳榔各一錢五分去胸中之痰蘇葉二錢發越太陽之邪乾葛一錢斷入陽明之路甫三劑而瘧止改用小柴胡倍人參服四劑補中益氣服十劑而瘧

相國沈銘績丙辰秋患瘧吐酸悶不思食六脉
沉細余曰瘧傷太陰中寒疏動也用理中湯加
身梅三个黃連五分進四劑後胸中豁然寒熱
亦減疏亦不吐去黃連加黃耆二錢生薑五錢
五劑而瘧止以手書謝云蚤年攻苦即有寒中
之患醫者但明疎氣不解扶陽積困于今雖當
盛暑寒冷不敢沾唇此獨不肖自知之耳瘧發
疏動幾為性命之憂幸老年在隔垣之距一七
回春豈第超邁庸儔直當上參和扁嗣此有生

詎非慈造鑄之焦府與日倍長矣

清脾飲

治瘧疾脉來弦數或但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮炒

厚朴薑製

白朮炒黃

黃芩

草果各八分

柴胡

茯苓

半夏各一錢半

甘草五分

水二十鍾生薑五片煎一鍾服

近來不問虛實槩用此湯過矣

白虎加桂枝湯

治但熱不寒及有汗者

知母

一錢二分

桂枝

五分

甘草

五分

粳米

一錢

石膏

五錢

水鍾半煎八分服

參蘇飲方見傷風 小柴胡湯方見傷寒 補中益氣湯方見類中

風涼膈散方見中風 理中湯方見傷寒 十全大補湯 六

君子湯方見虛勞 香薷飲方見中暑

二木柴葛湯 諸瘧必用

白木炒焦 蒼朮炒 柴胡

陳皮各七分 甘草四分 葛根

水鍾半生薑五片煎八分服 一日一發及

午前發邪在陽分加枯苓茯苓半夏熱甚口

渴加石膏知母麥門冬間日或三四日發或

午後及夜發者邪在陰分加四物湯酒炒黃

耆紅花提起陽分方可截之脉虛神倦加人

參黃耆傷食者加神麩麥芽山查黃連痰多

加生薑半夏要截加檳榔常山烏梅

常山飲治瘧痰在胸用此吐之若用砒霜之類

常山一兩 酒炒

水二鍾煎一鍾空心服若酒浸一宿多

露薑飲 治痰瘧寒瘧

生薑四兩連皮搗汁一碗露一宿空心服

交加雙解飲子治瘡瘧神效

肉豆蔻二大枚草豆蔻二枚厚朴五錢

甘草四錢生薑四錢

水二鍾煎一鍾空心服五藥俱一半生一半熟

瘡母丸元氣不甚虛者宜此

青皮 桃仁 紅花

麥芽各二兩鼈甲四兩海粉

香附 三稜 蓬朮各一兩半

十味俱用醋煮神麩糊為丸桐子大每服三錢薑湯送下

祛瘡飲三發後可用因其衰而減之立效

知母去毛酒炒五錢貝母去心九分陳皮去白

山查肉 枳實各一錢五分檳榔八分

柴胡去蘆七分紫蘇一錢甘草去皮炙三分

水二鍾煎一鍾渣用水二鍾煎八分俱露

宿臨發日五更服頭煎未發前一時服二煎

截瘡飲虛人久瘡不止此極極效

黃耆酒炙 人參 白朮炒

茯苓各一錢 砂仁 草果

橘紅各一錢 五味子八分 甘草六分

烏梅三个

水二鍾生薑十大片棗二枚煎一鍾服

何首烏忌鐵為末酒調下三錢臨發先服或前湯服

獨蒜十二枚煨桃仁一百粒去皮尖炒搗爛入黃丹丸

如菘豆大每服九丸發日五更面東酒送

桃仁一味研爛不犯水加黃丹丸五月五日合

常山末二錢酒浸炒透烏梅肉四枚研爛為丸此

截瘧必效之方世俗畏常山發吐不知其有

神功但炒透即不吐耳

生龍甲不見湯煮者醋炙黃為末烏梅肉為丸每服

三錢必效

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

痢疾

經名腸澼
古稱滯下

帝曰腸澼便血何如岐伯曰身熱則死寒則生
陽中下痢曰腸澼便血者赤痢也陽勝陰
 衰則身熱故死營氣未傷則身不熱故生帝曰
 腸澼下白沫何如岐伯曰脉沉則生脉浮則死
白沫者白痢也病屬陰而見陰脉為順故沉則
 生陽脉為逆故浮則死有屬熱者不拘此例帝曰
 帝曰腸澼下膿血何如岐伯曰脉懸絕則死滑
 大則生膿血者赤白兼下也懸絕者脉至如絲
 懸懸欲絕也邪實正虛故死滑因血盛
 氣未傷帝曰身不熱脉不懸絕何如岐伯曰滑
 大者曰生懸澇者曰死以藏期之身不熱脉不
 懸絕皆非死

候也若不滑而濇不大而小仍或證也故滑大
為生濇小為死也以藏期之者肝見庚辛死心
見壬癸死肺見丙丁死脾
見甲乙死腎見戊己死也
愚按痢之為證多本脾腎脾司倉廩土為萬物
之母腎主蟄藏水為萬物之元二藏皆根本之
地投治少差寬沉幽冥究其疵誤皆寒熱未明
虛實不辨也晚近不足論即在前賢頗有偏僻
如局方與復庵例行辛熱河間與丹溪專用苦
寒何其執而不圓相去天壤耶夫痢起夏秋濕
蒸熱鬱本乎天也因熱求涼過吞生冷由于人

也氣壯而傷于天者鬱熱居多氣弱而傷于人
者陰寒為甚濕土寄旺四時或從于火則陽土
有餘而濕熱為病經所謂墩阜是也或從于水
則陰土不足而寒濕為病經所謂卑監是也言
熱者遺寒言寒者廢熱豈非立言之過乎至以
赤為熱白為寒亦非確論果爾則赤白相兼者
豈真寒熱同病乎必以見證與色脉辨之而後
寒熱不淆也須知寒者必虛熱者必實更以虛
實細詳之而寒熱愈明耳脹滿惡食急痛懼按

者實也煩渴引飲喜冷畏熱者熱也脈強而實者實也脈數而滑者熱也外此則靡非虛寒矣而相似之際尤當審察如以口渴爲實熱似矣不知凡係瀉痢必亡津液液亡于下則津涸于上安得不渴更當以喜熱喜冷分虛實也以腹痛爲實熱似矣不知痢出于藏腸胃必傷膿血剝膚安得不痛更當以痛之緩急按之可否藏之陰陽腹之脹與不脹脈之有力無力分虛實也以小便之黃赤短少爲實熱似矣不知水從

痢去溲必不長液以陰亡溺因色變更當以便之熱與不熱液之潤與不潤色之澤與不澤分虛實也以裏急後重爲實熱似矣不知氣陷則倉廩不藏陰亡則門戶不閉更當以病之新久質之強弱脈之盛衰分虛實也至于治法須求何邪所傷何藏受病如因于濕熱者去其濕熱因于積滯者去其積滯因于氣者調之因于血者和之新感而實者可以通因通用久病而虛者可以塞因塞用是皆常法無待言矣獨怪世

之病痢者十有九虛而醫之治痢者百無一補
氣本下陷而再行其氣後重不益甚乎中本虛
衰而復攻其積元氣不愈竭乎濕熱傷血者自
宜調血若過行推蕩血不轉傷乎津亡作渴者
自宜止泄若但與滲利津不轉耗乎世有庸工
專守痛無補法且曰直待痛止方可補耳不知
因虛而痛者愈攻則愈虛愈痛矣此皆本末未
明但據現在者為有形之疾病不思可慮者在
無形之元氣也請以宜補之證悉言之脉來微

弱者可補形色虛薄者可補疾後而痢者可補
因攻而劇者可補然而尤有至要者則在脾腎
兩藏如先瀉而後痢者脾傳腎為賊邪難療先
痢而後瀉者腎傳脾為微邪易醫是知在脾者
病淺在腎者病深腎為胃關開竅于一陰未有
久痢而腎不損者故治痢不知補腎非其治也
凡四君歸脾十全補中皆補脾虛未嘗不善若
病在火衰土位無母設非桂附大補命門以復
腎中之陽以救脾家之母則飲食何由而進門

醫家公論 卷之七 痢疾

戶何由而固真元何由而復耶若畏熱不前僅以參朮補土多致不起大可傷矣

積分新舊 舊積者濕熱食痰也法當下之新積者下後又生者也或調或補不可輕攻若因虛而痢者雖舊積亦不可下但用異功散虛回而痢自止丹溪有先用參朮補完胃氣而後下者亦一妙法也虛者宜之

色黑有二 焦黑者熱極反兼勝已之化芍藥湯 黑如漆之光者瘀血也桃仁承氣湯

裏急 裏急而不得便者火也重者承氣湯 輕者芍藥湯 裏急

頻見汚衣者虛也補中益氣湯去當歸加肉果

後重 邪迫而後重者至圍稍減未幾復甚芍藥湯

虛滑而後重者圍後不減以得解愈虛故也真 養藏下後仍後重者當甘草緩之升麻舉之

虛坐努責 虛坐而不得大便血虛故裏急宜歸

身地黃芍藥陳皮之屬

噤口 食不得入到口即吐有邪在上膈火氣冲

逆者黃連木香桔梗 橘紅茯苓苜蒲 有胃虛嘔逆者治中 有陽

氣不足宿食未消者理中湯加砂仁有肝氣嘔

吐者木香黃連吳茱萸有水飲停聚者輕者五

者加青皮芍藥之類甘遂有積穢在下惡氣薰蒸者承氣石蓮為末

陳米湯調下石蓮即是蓮子之老者丹溪用人

參黃連濃煎加薑汁細細呷之如吐再吃但得

一呷下咽便開

休息痢屢止屢發久不愈者名曰休息多因兜

澁太早積熱未清香連丸加參末有調理失宜

者隨證治之有虛滑甚者椿根白皮東引者水

浸一日去黃皮每兩配人參一兩煨木香二錢

粳米三錢煎湯飲之或大斷

腹痛因肺金之氣鬱在大腸之間宜桔梗開之

白芍藥甘草陳皮木香當歸為主惡寒加乾薑

惡熱加黃連

肛門痛熱留于下宜槐花木香挾寒者理中

蟻垂疔其形極細九蟲之一也胃弱腸虛則蟻

蟲乘之或癢或從穀道中溢出雄黃銳散內服

桃仁槐子蕪黃

死證 下純血者死 如屋漏水者死 大孔如

竹筒者死 唇若塗硃者死 發熱不休者死

色如魚腦或如猪肝者皆半死 半生 脉細皮

寒氣少泄利前後飲食不入是謂五虛死 惟用

參附十可救一

脉候 沉小微細者吉 洪大滑數者凶 仲景云

沉弦者重 脉大者為未止 微弱者為欲自止 雖

發熱不死

醫案

中院孫瀟湘夫人下痢四十日口乾發熱飲食
不進腹中脹悶完穀不化尚有謂其邪熱不殺
穀者計服香連枳殼荳蔻厚朴等三十餘劑絕
穀五日命在須臾迎余診之脉大而數按之豁
然詢得腹痛而喜手按小便清利此火衰不能
生土內真寒而外假熱也亟煎附子理中湯水
冷與服一劑而痛止六劑而熱退食進兼服八
味丸二十餘日霍然起矣

淮安郡侯許同生令愛痢疾腹痛脉微而軟余

曰此氣虛不能運化精微其窘迫後重者乃下
陷耳用升陽散火湯一劑繼用補中益氣湯十
劑即愈
文學顧偉男之內痢疾一月諸藥無功余診之
曰氣血兩虛但當大補痢家藥品一切停廢以
十全大補連投十劑兼進補中益氣加薑桂二
十餘劑而安
兵尊張綱庵秋間患痢凡香連枳朴等劑用之
兩月而病不衰余診之滑而有力失下之故也

用香連歸芍陳皮枳殼加大黃三錢下穢物頗
多診其脉尚有力仍用前方出積滯如魚腸者
約數碗調理十餘日而痊

撫臺毛孺初痢如魚腦腸鳴切痛聞食則嘔所
服皆芩連木香菖蒲藿香橘紅芍藥而已後有
進四君子湯者疑而未果飛艇相招兼夜而往
診得脉雖洪大按之無力候至右尺倍覺濡軟
余曰命門火衰不能生土亟須參附可以回陽
孺翁曰但用參朮可得愈否余曰若無桂附雖

進參朮無益于病且脾土大虛虛則補母非補
次乎遂用人參五錢熟附一錢五分炮薑一錢
白朮三錢連進三劑吐止食粥再以補中益氣
加薑附十四劑後即能視事
大黃湯治膿血稠粘裏急後重腹痛脉實

錦紋大黃 一兩

好酒一鍾浸半日煎至鍾半去渣分二次服

芍藥湯經曰溲而便膿血知氣行而血止也行
芍藥湯血則便膿自愈調氣則後重自除

芍藥 一錢
當歸 五分
黃連 一錢

黃芩 各八分
大黃 一錢
桂 五分

甘草 炒
檳榔 各四分
木香 五分

水一鍾煎一鍾服痢不減漸加大黃

白朮黃芩湯 服前藥痢雖除更宜調和

白朮 三錢
黃芩 二錢
甘草 一錢

水鍾半薑三片煎八分服

承氣湯見傷寒 藿香正氣散見中風 蘇合香丸見中風

黃連丸

乾薑 炮
黃連 炒
砂仁 炒

川芎

阿膠

白朮

黃蘗乳香

枳殼

蛤粉

為末鹽梅三箇取肉少入醋丸如桐子大每

服二錢白湯送下食前服

蒼朮地榆湯 治脾經受濕下血痢

蒼朮

地榆

水二鍾煎一鍾服

鬱金散 治熱毒痢下血不止

真鬱金

槐花

甘草

右為細末每服二錢食前豆豉湯調下

芍藥黃芩湯

黃芩

芍藥

甘草

水鍾半煎八分服

香連丸

黃連

木香

右為細末醋糊丸桐子大每服三錢空心米

湯送下

導氣湯



身... 老之...

木香 檳榔 黃連 各六分

大黃 黃芩 各一錢 枳殼 炒一錢

芍藥 六錢 當歸 三錢

分二服 水二鍾煎一鍾 食前服 木香 四分

真人養藏湯 治虛寒痢疾久而不愈

木人參 煎入 白朮 炒 當歸 各六分

白芍藥 木香 各一錢 甘草 炙

肉桂 各八分 肉果 麵裹煨 粟殼 蜜炙三分

訶子肉 二兩 二錢

水二鍾煎一鍾 食前溫服

理中湯 見傷寒 治中湯 即理中湯加陳皮青皮

補中益氣湯 異功散 四君子湯

十全大補湯 人歸脾湯 俱見虛癆

倉廩湯 治噤口痢乃熱毒冲心

人參 茯苓 甘草 炙

前胡 川芎 羌活

獨活 桔梗 柴胡

木枳殼 陳倉米 各八分

痲疾

水二鍾生薑三片煎下鍾服

訶梨勒丸 治休息痢

檮白皮 二兩 訶子 五錢 母丁香 三十粒

為末糊丸梧子大每服三錢陳米湯入醋少

許送十日三服效

蕪荑丸 治久痢及下部有蟲

蕪荑 兩 黃連 兩 二枚 砒蛇膽 五錢

為末蜜丸梧子大每服二錢食前杏仁湯下

瓜萋散 治五色痢久不愈

瓜萋 一枚 性蓋地上宿出火毒

右研細末作一服溫酒調下

大斷下丸 治藏寒久痢

高良薑 一兩 牡蠣 煨一兩 附子 製一兩

乾薑 炮一兩 細辛 一兩 龍骨 研

赤石脂 枯礬 肉豆蔻 麵煨

訶子肉 各一兩 石榴皮 醋浸炒黃

右為細末醋糊丸桐子大每服三錢米湯下

古為味未細味式味于大母鼎三益米尚下
 隨于肉 各一 不隨文 煎黃 不香
 為赤豆煎 林糖 肉豆豉
 神蓋 正益 神辛 正益 神骨 煎
 高文蓋 正益 神辛 正益 神骨 煎
 大瀾下式 飲燕菜入麻
 古酒味未非下則為酒味不
 心實 神蓋 神辛 神骨 煎

泄瀉

經曰春傷於風夏生飧泄邪氣留連乃為洞泄

肝應于春屬木主風春傷于風肝受邪也木旺則賊土夏令助其濕氣則生飧泄發泄者下利

清穀也邪氣久而不去脾土大虛水來侮之則倉廩不藏而為洞泄洞泄者下利清水也

又曰濕勝則濡泄土強制水濕邪不干腸胃

又曰暴注下迫皆屬於熱暴注者卒暴注泄也腸胃有熱傳化失常火性

疾速故如是也下迫者後重裏急也火性急速而能燥物故也

諸病水液澄澈

清冷皆屬于寒水穀不化澄澈清冷皆得寒水之化如秋冬寒凉水必澄清也

夫火熱之證必以暴至水寒之證必以漸成故曰暴泄非陰久泄非陽也

愚按內經之論泄瀉或言風或言濕或言熱或言寒此明四氣皆能為泄也又言清氣在下則生飧泄此明脾虛下陷之泄也統而論之脾土強者自能勝濕無濕則不泄故曰濕多成五泄若土虛不能制濕則風寒與熱皆得于之而為病治法有九一曰淡滲使濕從小便而去如農人治澇導其下流雖處卑隘不憂巨浸經云治濕不利小便非其治也又云在下者引而竭之

是也一曰升提氣屬于陽性本上升胃氣注迫輒爾下陷升柴羌葛之類鼓舞胃氣上騰則注下自止又如地上淖澤風之即乾故風藥多燥且濕為土病風為木藥木可勝土風亦勝濕所謂下者舉之是也一曰清涼熱淫所至暴注下迫苦寒諸劑用滌燔蒸猶當溽暑伊鬱之時而商飈颯然倏動則炎歎如失矣所謂熱者清之是也一曰疎利痰凝氣滯食積水停皆令人瀉隨證祛逐勿使稽留經云實者瀉之又云通因

通用是也。一曰甘緩瀉利不已急而下趨愈趨愈下泄何由止。甘能緩中善禁急速且稼穡作甘甘為土味所謂急者緩之是也。一曰酸收瀉下有日則氣散而不收無能統攝注泄何時而已酸之一味能助收肅之權經云散者收之是也。一曰燥脾土德無慙水邪不濫故瀉皆成于土濕濕皆本于脾虛倉廩得職水穀善分虛而不培濕淫轉甚經云虛者補之是也。一曰溫腎腎主二便封藏之本况雖屬水真陽寓焉少火

生氣火為土母此火一衰何以運行三焦熟腐五穀乎故積虛者必挾寒脾虛者必補母經云寒者溫之是也。一曰固澁注泄日久幽門道滑雖投溫補未克奏功須行澁劑則變化不愆揆度合節所謂滑者澁之是也。夫是九者治瀉之大法業無遺蘊至如先後緩急之權豈能豫設須臨證之頃圓機靈變可以胥天下于壽域矣

難經五泄

胃泄飲食不化色黃承氣湯脾泄腹脹

滿泄注食即嘔吐建中湯大腸泄食已窘迫太

醫宗必讀 卷之二 泄瀉

便色白腸鳴切痛乾薑附子湯小腸泄洩而便膿血

少腹痛承氣湯太瘦泄裏急後重數至圍而不能

便莖中痛承氣湯

腎泄五更溲洩久而不愈是腎虛失閉藏之職

也五味子散亦有食積者香砂枳木丸寒積理中湯宜酒夜飯前進

積葛花解醒湯

鷲泄中寒糟粕不化色如鴨糞澄澈清冷小便

清白附子理中湯

飧泄水穀不化而完出也史記名風邪于胃木

來賊土清氣在下升陽除濕湯

洞泄一名瀉下多水也胃苓湯水液去多甚而轉

筋血傷故筋急也升陽除濕湯

痰泄痰留于肺大腸不固脉必弦滑以藥探吐

其人神必不瘁色必不衰或二陳湯加蒼朮木香

火泄腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣火也黃芩芍藥

湯張長沙謂之協熱自利

直陽泄食方入口而即下極為難治大斷下丸

脉候胃脉虛則泄脉滑按之虛者必下利

腎脉小甚為洞泄 肺脉小甚為泄 泄脉洪大者逆 下利日十餘行脉反實者死 腹鳴而滿四肢清泄其脉大者十五日死 腹大脹四末清脫形泄甚不及一時死 下則泄瀉上則吐痰皆不已為上下俱脫死

醫案

太宗伯董玄宰夏初水泄完穀不化曾服胃苓湯及四君子湯不效余曰經云春傷于風夏生發泄謂完穀也用升陽除濕湯加入參二十錢三

劑頓止

大司寇姚岱芝吐痰泄瀉見食則惡面色痿黃神情困倦自秋及春無劑弗投經久不愈比余診之口不能言亟以補中益氣去當歸加肉果二錢熟附一錢炮薑一錢半夏二十錢人參四錢日進二劑四日而瀉止但痰不減耳余曰腎虛水泛為痰非八味丸不可應與補中湯並進凡四十日服人參一斤飲食大進痰亦不吐又半月而酬對如常矣

胃苓湯 一名對金飲子即五苓散平胃散二方合用也治暑濕停飲泄瀉小便不利

蒼朮 製一錢 厚朴 製一錢 陳皮 各一錢

甘草 五分 白朮 八分 茯苓 一錢

澤瀉 各一錢 肉桂 三分 猪苓 一錢

水一鍾薑三片棗三枚煎八分服

藳苓湯 治夏月暑瀉欲成痢疾

香薷 一錢 黃連 薑汁炒 厚朴 薑汁炒

扁豆 炒各一錢 猪苓 澤瀉 各一錢

白朮 炒 茯苓 各八分 甘草 五分

水一鍾生薑三片煎八分服

六一散 一名益元散 加紅麴名青六九 治傷暑水瀉 加薑末名温六九

滑石 水飛六兩 甘草末 一兩 新汲水調服

皮已丸

黃連 酒炒四兩 白芍藥 三兩 吳茱萸 泡炒二兩

為末神麴和丸桐子大米飲送二十錢

升陽除濕湯 治受風發泄及虛弱不思食小便黃赤四散困倦

蒼朮 一錢 柴胡 羌活

防風 神麴 澤瀉

猪苓 各六分 陳皮 麥蘖

炙甘草 各三分 升麻 五分

水鍾半薑三片煎七分服

漿水散 治暴瀉如水一身盡冷汗出脉弱氣少不能言甚者嘔吐此為急病

半夏 二兩薑製 良薑 二錢五分 乾薑 炮二兩

肉桂 甘草 炙 附子 炮各五錢

右為細末每服四錢水二鍾煎一鍾服

連理湯 即理中湯加黃連茯苓

人參 白朮 各一錢五分 乾薑 二錢炒

甘草 炙五分 茯苓 一分 黃連 炒一錢

水二杯煎一杯食遠服

茱萸斷下丸 治藏府虛寒腹痛泄瀉大效

吳茱萸 二兩炒 赤石脂 乾薑 各一兩五錢

艾葉 炒 縮砂仁 肉苳蔻

附子 製各一兩

為末麴糊丸每服三錢米飲送下

大斷下丸 方見痢疾

固腸丸

四兩 檮皮 醋炙 滑石 二兩 水飛

入為末 粥丸 此丸性燥 滯氣未盡者 勿服

補中益氣湯 見類 四君子湯 六君子湯

異功散 見虛 承氣湯 理中湯 見傷 寒

金匱腎氣丸 見腫 八味丸 見虛

四神丸 治脾腎虛寒 大便不實 飲食不思

肉果 麵煨 補骨脂 四 五味子 二

吳茱萸 浸炒 一兩

右為末 生薑八兩 紅棗一百枚 煮熟 取棗肉

去皮和丸 如桐子大 每服四錢 空心 米飲下

葛花解醒湯 治酒傷吐瀉

青皮 三錢 木香 五分 橘紅

人參 猪苓 去皮 茯苓 各一錢

神麴 炒 澤瀉 乾薑 炒

白朮 各二 白芷 葛花

砂仁 各五 錢

右為細末 每服三錢 白湯調服 得汗即愈

枳朮丸 消食止瀉

枳實去瓤 白木二兩

右為末 荷葉裹燒飯為丸 如桐子 大每服三

錢 白湯下 用白木者 令胃強 不復傷也 加木

香一兩 砂仁一兩 名香砂枳木丸

