

增補繪圖胎產心法

上海江東書局印行

四

天冬去心各一錢 犀角八分 陳皮 甘草 草各四分

水煎服有喘加瓜蒌仁一錢

加味道遙散觀本卷子懸門

加味歸脾湯觀本卷胎漏下

紫蘇飲

四物湯俱見本卷

補中益氣湯

東垣涼膈散

小柴胡湯

平胃散俱見本卷

子腫子氣子滿論子滿證即俗

娠娘子腫與子氣相類但子氣在下體子腫在頭面若子滿證又名為胎水則在五六月已後

比子氣子腫不同蓋胎大則腹滿過身浮腫凡子氣子腫子滿由氣本弱或因泄瀉下利耗

傷脾胃或寒熱瘧疾煩渴加飲濕清脾胃使頭面手足浮腫也然水漬於胞兒未成形則胎多

損壞故初妊即腫急宜調治水去脹消仍用六君子調補

所謂子腫者娠娘面目虛浮多因脾胃氣虛或久瀉所致宜健脾利水全生白朮散主之或用

健脾利水湯如未應用六君子湯或加腹皮車前又專治肢體如水氣之證亦有用加味五皮

湯治子腫之甚者



所謂子氣者。妊娠自三月成胎之後。兩足面漸腫。至腿膝或腰以下。腫行步艱難。以致喘悶不安。飲食不美。似水氣狀。甚至脚指間有黃水出者。蓋脾主四肢。脾氣虛弱。不能制水。而發腫。肺金少。母氣滋養。而氣促滿。問諸書。名曰子氣。即水氣俗名。皺脚。治此病者。先服加味天仙藤散。如不效。則服茯苓湯。再不效。服補中益氣湯。如茯苓若飲食失節。嘔吐泄瀉。六君子湯。或加炮薑木香。香附。若脾肺氣滯。加味歸脾湯。佐以加味道遙散。或紫蘇飲。至孕婦八九箇月。脛腿俱腫。非水氣比。不可以水氣治之。反傷正氣。凡有此者。必易產。因胞臟中水血俱多。不致胎燥也。所謂子滿者。妊娠至五六箇月。胸腹急脹。腹大異常。或遍身浮腫。胸脇不分。氣逆不安。小便艱澀。名曰子滿。又為胎水不利。若不早治。生子手足軟短。有疾甚。致胎死腹中。宜服千金鯉魚湯。治其水。如脾虛不運。清濁不分。佐以四君五皮。亦有用束胎飲。以治子滿。證甚效。曾有妊娠腹脹。服鯉魚湯三五劑。大小便皆下。惡水腫消。脹去。遂下死胎。此證每因懷孕腹大。終不知胎水之患。即水漬損胎也。

全生白朮散 治妊娠面目虛浮如水腫脹

白朮一兩 生薑皮 大腹皮剉 茯苓皮 陳皮各五

共為細末。每服二錢。不拘時。米飲調下。此方較滄桑五皮散稍善。中間惟白朮易桑皮而功用懸殊。誠點鐵成金手也。全書云。如未應。佐以人參甘草。

健脾利水湯 治孕婦面目虛浮。多因脾胃氣虛。或久瀉所致。

人參 茯苓 苓各一錢 白朮剉 當歸酒洗各二錢 川芎 大腹皮剉 蘇蘇 陳皮各八分 炙甘草三分

747
4
薑皮一片水煎服

加味五皮湯

治孕婦面目身體四肢浮腫者此胎水泛溢謂之子腫

白木有利或無

後浮腫小便不利

大腹皮

製淨

桑白皮

炒

生薑皮

茯苓

白

木

炒

加紫蘇

連薑葉各一錢

棗二枚去核水煎服服時以木香磨濃汁三匙入藥內

加味天仙藤散

治孕婦腰脚腫虛人多此證

天仙藤

脚青味

製香附

紫

蘇

陳

皮

烏

藥

木香

分

薑皮

三片

虛人加人參錢

土炒白木錢

酒洗當歸

或兼服補中益氣湯

茯苓湯

治孕婦六七箇月以來兩足腫大行步艱難脚指間有黃水出此名子氣人多

有之生子之後其腫自消甚者此湯主之

茯苓湯

治孕婦六七箇月以來兩足腫大行步艱難脚指間有黃水出此名子氣人多

有之生子之後其腫自消甚者此湯主之

白茯苓

白

木

炒

陳

皮

製香附

烏

藥

錢

木

瓜

三

生薑皮

引水煎空心服

千金鯉魚湯

治孕婦胸腹脹滿或遍身浮腫小便艱澀名曰子滿又為胎水不利或胸

中清水以致胎死腹中

白

木

五

錢

白

茯苓

四

白

木

五

錢

當

歸

身

酒

洗

白

芍

料魚去鱗腸加橘皮少許或五分薑七片用水和湯煮取汁一盞半去魚入藥四味魚汁內

煎七分空心溫服渣再製如前如脾胃無虛當佐以四君五皮二湯合煎服之



五加皮湯 治風濕客脾面目四肢浮腫兼治胎水

五加皮 地骨皮 大腹皮黑豆水製淨 茯苓皮 生薑皮各等分

水煎服每服三錢

末胎飲 治孕婦至七八箇月其胎長大腹大脹滿逼迫子戶坐卧不安謂之子滿

白朮 土黃 苓 炒 蘇 葉各一分 枳 殼炒 大腹皮黑豆水製淨 砂仁五分 炒

炙草三分

薑三片水煎空心服 予謂蘇葉當易薑妙

六君子湯

補中益氣湯見本卷諸痛門

加味歸脾湯見本卷胎漏小產門附歸脾湯下

加味道遙散見本卷子懸門附道遙散下

紫蘇飲見本卷安胎門

四君子湯見本卷子懸門

子煩並五心煩熱及煩躁口乾論

妊娠心驚膽怯煩悶不安名曰子煩竹葉安胎飲主之大概皆由心肺虛熱是以梅亂心煩或積痰於胸吐涎惡食亦令心煩刺則胎動不安如心肺虛熱或積痰於中干金竹瀝湯若吐甚胎動不安煩悶口乾不得眠又吐涎過多以致外雖不熱而覺五心煩熱或日間不覺而夜覺熱者並宜加味竹葉湯氣虛倍人參氣滯紫蘇飲痰滯二陳加白朮黃芩枳殼膈滿寒熱小柴

胡脾胃虛弱六君子加紫蘇山梔至於妊娠煩躁口乾者緣足太陰脾其氣通於口手少陰心其氣通於舌臟腑氣虛熱乘心脾津液枯燥故心煩口乾與子煩大同小異宜用加減參麥湯又有用知母丸而效者如肝經火動加味逍遙散若腎經火動宜地黃丸隨證加味用之如孕婦口乾不卧一味黃連散或用尊生加味安胎飲查方書有婦人暴渴惟飲五味汁之證蓋血欲凝成胎脉息調和非疾病也因肺腎二經有火火入肺則煩入腎則躁胎繫於腎腎水養其胎元則不足以滋腎中之大火上燥肺變為煩躁者金虧水涸之候法當滋化源清金保肺壯水滋腎為主

竹葉安胎飲 治孕婦心驚膽怯煩悶不安名曰子煩證

人參 生地 棗仁去殼 遠志甘草水製去 當歸酒洗 白朮土炒各二錢

麥冬法 條芩 川芎各八分 陳皮 炙甘草各四分 竹葉十四片

薑一片大棗二枚水煎服 渴加竹茹分

千金竹瀝湯 治妊娠子煩

竹瀝一錢 茯苓錢四 麥冬法 防風 黃芩各三錢

右藥四味以水四升合竹瀝煮取二升分三服不瘥更作 此乃古方分兩宜易令法用之

加味竹葉湯 治妊娠心煩不解名曰子煩並治五心煩熱 原方竹葉湯無人參梗米

人參 黃芩各一錢 茯苓一錢 麥冬二錢五分 竹葉五片 梗米

水煎空心熱服 肥人加製半夏生薑為引 因血虛煩熱宜原方兼用四物湯 因中氣

虛弱宜原方兼用四君子湯 一方照原方加當歸防風炒梔仁亦名加味竹葉湯

二陳湯 治痰積嘔惡

陳皮錢半 半夏製 茯苓各一分 炙甘草八分

水煎服

加減參麥湯 治孕婦心神煩躁壅熱口乾

人參 知母 麥冬 法 梔子 瓜蒌根 犀角 糖 條 各五分 炙草

各五分

棗一枚 水煎服 夏加竹瀝八 薑汁炒

知母九枚 治妊娠因服藥致胎氣不安有似虛煩不得眠葉氏謂之子煩醫者不知

作虛煩治之損動胎氣宜矣

知母 酒二兩 焙

為細末棗肉丸如彈子大每服一九煎人參湯化服

一味黃連散 治孕婦口乾不臥

黃連錢一

右為末粥飲湯調下或用丹溪安胎飲加麥冬乾葛服之亦妙

尊生加味安胎飲 治孕婦口乾

歸身 酒 白芍 炒 熟地 生 地 砂 仁 阿 膠 珠 珀 各 一 錢 條 各 一 錢

杜仲 鹽 酒 炒 白 木 土 炒 各 川 芎 陳 皮 蘇 梗 各 五 錢 續 斷 炒 各 五 錢 麥 冬

法 乾 葛 知 母 酒 梔 子 炒 花 粉 犀 角 竹 瀝 各 八

水煎服。考曾生安胎飲本方自歸身起至續斷止共藥十三味。今此方名加味。又自來冬至竹瀝連前共二十味。如嫌藥味過多。臨證酌而減之可耳。

紫蘇飲

四物湯

丹溪安胎飲俱見本卷

小柴胡湯

六君子湯俱見本卷

加味道遙散附本卷子懸門

地黃丸見本卷諸痛門對

四君子湯見本卷胎

子淋論

妊娠小便淋瀝。由氣血聚養胎元。不及敷榮滲道。遂使膀胱鬱熱。又云。妊娠胞系於腎。腎間虛熱。移於膀胱。而成斯證。名曰子淋。加減安胎散主之。予按古方安胎散。內有滑石。乃鎮重之劑。恐致墮胎。若臨月猶可。如在七八月之前。宜去此味。加石斛山梔為穩。若日久倦怠。右脈微弱者。此氣虛下陷。而時墜下。氣弱腸虛。而難流通。大劑參朮。補氣滋化源。其便自易。亦有治小便澀少。用生料六味丸。如參冬五味。車前為丸服之。又治孕婦小便澀痛者。加味導赤湯。兼治溺血。全書云。子淋症用安胎散不應。兼服八珍湯。如腿足轉筋。而小便不利。急用八味丸。緩則不效。



子淋論 附方 補氣滋化源 八珍湯 八味丸

急痛乃急欲便而痛得便則止
間有微痛與子淋點滴痛不同

二陳升提飲 治孕婦臍腹作痛小便淋閉不通或微痛與淋有別由氣虛胎壓尿胞

人參錢 白朮炒 生地各錢 當歸錢 川芎八分 半夏 夏六分製 柴

胡升麻 陳皮 炙草各四分

薑一片水煎服 或空心飲鹽湯探吐以升其氣則下自行亦一法也急子謂探吐只可散

長補之藥

補中益氣湯觀本卷痛門

遺尿論

妊娠遺尿不覺胎滿故也。用白薇散主之。若脬中有熱加味道遙散。脾氣虛補中益氣湯。加益

智仁。肝腎陰虛六味丸。曹生云遺尿證虛人有此立加減六味湯治之甚效。有婦人孕後水從

陰戶出不止者千金鯉魚湯加肉桂人參治之。

白薇散 治妊娠尿出不知

白薇 白芍藥各等分

為末每服三錢食前溫酒調服 考本草謂芍藥白補赤瀉蓋金收而火散故子淋方中宜

用赤而遺尿方中則宜用白也

加減六味湯 治遺尿虛人多有此證

熟地錢 丹皮五分 山萸去核 淮山藥炒各 白薇 白芍藥 益智仁各一

不用引水煎服

加味道遙散見本卷子題門

補中益氣湯見本卷諸痛門

六味地黃丸見本卷諸痛門附

千金鯉魚湯見本卷子腫門

子嗽論

妊娠咳嗽屬風寒。蓋肺臟內主氣。外司皮毛。皮毛不密。寒邪乘之。則咳嗽。嗽久亦恐墮胎。安肺止嗽散。加減用之。亦有用蘇桔湯散寒理肺。甚有久嗽不愈者。多因脾土虛而不能生肺氣。以致腠理不密。外邪復感。或因肺虛不能生水。以致陰火上炎。治法當用補中益氣湯以培土。金六味丸加五味以生腎水為善。

安肺止嗽散 治孕婦風寒咳嗽

麥冬二錢 知母一錢 桔梗一錢 紫蘇各五分 杏仁十粒去尖 桑白皮六分 甘草四分

水煎服 有痰加橘紅四分 竹瀝薑汁 火嗽加黃芩八分 虛嗽加紫苑錢 冬花六分 寒甚

加麻黃 虛損加瓜蒌錢 竹瀝薑汁 嗽而心胸不舒加去心貝母百合錢 紫苑八分

若嗽不止胎不安宜服人參錢 甘草五分 去皮尖杏仁十四粒 桑皮錢 紫苑二錢 去心天門冬錢

分桔梗八分 烏梅個 水煎服

蘇桔湯 治孕婦風寒咳嗽

天冬六分 桔梗五分 紫蘇 黃芩 苓 貝母去心各八分 杏仁十粒去尖 陳

皮知母 甘草各四分

水煎服 火動作喘 桔梗宜減

補中益氣湯 觀本卷

六味地黃丸 見本卷諸痛門附

喘急論

妊娠氣喘不得卧有因乍感風寒客邪為害者宜發散自愈參蘇飲主之若脾虛四肢無力肺虛不任風寒腎虛腰痠短氣不能行步猝然氣喘不息此脾肺素虧母虛子亦虛腎氣不歸元而上乘於肺也生脈散補中益氣湯去升柴主之丹溪云火動作喘此胎前最多予謂嗽門蘇桔湯可加減用之獲效至於毒藥傷胎病喘世俗往往有之不可不察昔有一婦胎死於腹病喘不得卧診其脈氣口盛人迎一倍左關弦動而疾兩尺俱短而離經因毒藥動血以致死胎不下奔迫上衝非風寒作喘也大劑芎歸湯加催生藥服之夜半果下死胎而喘止此婦乃為人妾因正室所嫉故用藥去之人所不知也考濟陰綱目內有平安散一方治孕婦喘急錄後以備採用耳

參蘇飲

人參 紫蘇 乾葛 前胡 製半夏 茯苓 陳皮 各等 枳殼 炒

桔梗 木香 甘草 草各

薑棗煎

平安散 治孕婦上氣喘急大便不通嘔吐不食腹脹滿

川芎 木香 熟地 陳皮 炮薑 厚朴 製甘 草各

水二鍾入燒鹽一捻煎至一鍾不拘時服

生脈散 見下卷軍政門計
參麥五味飲下

補中益氣湯

芎歸湯 俱見本卷
諸病門

泄瀉論

妊娠泄瀉有風寒暑濕之外感飲食生冷之內傷病發一時察其所因如胃風加味理中加味治中四苓不換金正氣胃苓等方對證而治之即愈然又有由脾腎二臟虛者不可不知夫血統於脾血擁胎元則脾陰虛而食不運化脾主健運下焦壅滯而清氣難舒於是水穀難消而作瀉或因胎繫於腎胎竊其氣以擁護而腎氣既弱命門火衰不能上蒸脾土此皆妊娠泄瀉之由也如脾虛內傷用加味六君子湯隨所因而加之命門火衰加益智以助之至于妊娠久瀉元氣下陷發熱作渴肢體怠倦用補中益氣湯密齋治妊娠泄瀉以補中安胎為主用加味四君子湯如久瀉大渴者人參白朮散主之其效

胃風湯 治風冷乘虛入客腸胃米穀不下泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血或

下如魚腦日夜無度

人參 白朮 茯苓 當歸 川芎 芍藥 肉桂 枳殼

入粟米一撮水煎服 如腹痛加木香 此方治瀉久氣血兩虛誠妙然肉桂非久虛臟冷

者斷不可用其曰胃風取其益胃而升舉也方中肉桂犯胎忌用如不得已或炒用或易桂

皮如胃苓湯中肉桂亦不可不審用

加味理中湯 治姪妹臍下陰冷洞瀉

人參 白朮 炒 芍藥 茯苓 乾薑 黃連 木香 藿香葉 訶子肉

肉豆蔻煨 甘草炙

生薑三片 大棗二枚 水二鍾煎一鍾 饑時服

加味治中湯 治飲食過多脾胃之氣不足運化而作瀉

人參 白朮 炒 炮薑 甘草炙 陳皮 青皮炙 砂仁分

水煎服

四苓散附五苓散 治伏暑煩渴瀉水

白朮 炒 猪苓 澤瀉 茯苓

各等分為末 米飲調下 此方加肉桂即五苓散

不換金正氣散 治姪婦傷濕泄瀉

蒼朮 製 厚朴 製 陳皮 藿香 製 半夏 炙 甘草分

薑棗為飲 水煎服

胃苓湯 治脾濕太過胃氣不和腹痛泄瀉水穀不化陰陽不分此平胃散與五苓散合

方也

蒼朮 製 厚朴 製 陳皮 白朮 炒 茯苓 猪苓 澤瀉 瀉錢 官

桂枝 炙 草各五分

薑三片 棗二枚 水煎食遠服 方中有桂孕婦忌用或易服不換金正氣散更妥

加味六君子湯

人參隨宜 白朮一錢或一錢五分土炒 茯苓錢一 陳皮八分 製半夏錢一 炙甘草五分

生薑引水煎服 米食所傷加穀芽 麪食所傷加麥芽 肉食所傷加山楂 如肝木侮

土兼寒熱作嘔 加柴胡生薑 若兼嘔吐腹痛手足逆冷乃寒水侮土 加薑桂 若泄瀉黃

色乃脾土本色 加木香煨肉果 若作嘔不食腹痛惡寒乃脾土虛寒 加木香薑桂

密齋加味四君子湯 治妊娠泄瀉補中安胎為主

人參 白朮土炒 茯苓錢一 炙甘草八分

水煎服 妊娠泄瀉加炒白芍錢五分 寒熱治之如發熱而渴者為熱 加條苓錢一 不渴者為

寒加炒黑乾薑五分 並用烏梅一個為引水煎食前服 如瀉瀉日久不止者加酒炒白芍 訶

子肉炒乾薑烏梅去核 水煎食前服或服人參白朮散亦妙

人參 白朮土炒 茯苓錢一 炙甘草八分 丁香 木香 乾薑各五分

水煎頻頻與之以代湯水效

補中益氣湯觀本門

霍亂論

妊娠因甘肥過度腐積成痰或七情鬱結氣盛為火傳善胃中乍因寒熱之感邪正交爭陰陽相混故令心腹絞痛吐利並作暈霍變亂謂之霍亂 如邪在上則當心痛而吐多邪在下則當臍痛而利多邪在中腕則腹中痛吐利俱多吐多傷氣利多傷血血氣受傷不能護養其胎邪

氣鼓擊胎元子母未有不殞者此危證不可不亟治也宜香蘇飲加藿香葉或先服後探吐之
又加味四味紫蘇和胎飲治心腹絞痛上吐下瀉亦效予治孕婦霍亂用六和湯果效又有回
生散七味白朮散錄後以備臨證擇用再考方書單瀉用胃苓湯飲食停滯用平胃散內傷飲
食外感風寒用藿香正氣散皆治霍亂之劑也

香蘇散 此方治霍亂平正之至

香 附炒 紫 蘇 各二 陳 皮 錢一 藿香葉 縮 砂 炙 草 各五

水煎服 如轉筋加木瓜錢一 胎動不安加土炒白朮五錢 如夏月得之加黃芩五錢炒

香蓮錢香紫錢 如冬月得之加人參土炒白朮錢一 炮薑五

加味四味紫蘇和胎飲 治心腹絞痛上吐下瀉

紫 蘇 黃 芩 白 朮 錢五 炙 草 以上四味和 藿香葉 陳 皮 錢一 砂

仁 炒 五分 炙 草 胎前本方

薑棗引水煎服

六和湯 治霍亂吐瀉心煩腹脹

陳 皮 細 製 半 錢 杏 仁 十 粒 去 竹 茹 木 瓜 錢一 扁 豆 錢 茯苓 八

藿 香 砂 仁 研 甘 草 各 五

薑一片棗二枚水煎服如不愈再服四味紫蘇和胎飲

回生散 治中氣不和霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生

陳 皮 去 藿 香 各 五

右對水煎溫服

七味白朮散

治脾胃虛弱吐瀉作渴不食

人參 白朮 芍藥 茯苓 木香 藿香 炙甘草 各五錢 乾薑 兩一

右為末沸湯調服二錢吐甚者加生薑汁頻服

胃苓湯見本卷

平胃散

藿香止氣散俱見本卷

中惡中暑中濕中風論

妊娠忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡即俗謂疔腸沙是也蓋因血氣不和精神衰弱邪毒之氣得以中之孕婦病此亦致損胎薛氏云此證當調補正氣為善用金銀藤一味煎湯飲之或竈心土為末每服二錢井水調服白湯亦可濟陰綱目內用散滯湯治之又藜艾方治真中惡極妙

妊娠或暑時中暑熱之毒其證發熱而渴自汗精神昏憤四肢倦怠少氣清暑和胎飲主之

妊娠中濕或因早行感露露之氣或冒水或久居下濕地或大汗出浴冷水其證發熱骨節煩

痛身體重著頭痛鼻塞黃芩白朮湯主之

妊娠中風因體虛則中之乃四時八方之氣為風自衝方來中人即病中其皮毛經絡者則發

寒熱頭項身體昏痛或肌肉頑痺中其筋骨者則拘攣強直中其臟腑者則卒倒昏悶口眼喎

斜手足瘳瘳口禁不語孕婦得此不可用常治風之法以補虛安胎為本兼用搜風之劑搜風

安胎欲治之。但胎前身中風者少。子癰之證實多。與中風見證無異。醫者當審實是中風方可用搜風安胎。否則子癰證治也。

散滯湯 專治觸惡胃氣傷胎肚痛。手不可近。不思飲食。

青 皮錢 黃 芩 芍 藥 各二錢 歸 尾 一錢 川 芎 錢 木 香 五 錢 炙 草 鈔

右分二貼。水三盞。先煮芩根兩大片。至二盞去芩根。入前藥同煎。至一盞煎服。

煮艾方 治銜娠中惡。心腹絞急切痛。如鬼擊之狀。不可按摩。或吐衄血者。

熟艾如拳大

煮汁頻服

清身和胎飲

黃 耆 錢 人 參 白 朮 炒 黃 芩 黃 連 知 母 麥 冬 法 艾 草 鈔

五 味 樹 二 錢

水煎服

黃芩白朮湯

黃 芩 白 朮 上 炒 各 五 錢 蘇 葉 二 錢 五 分

薑五片。水煎服

搜風安胎飲

歸 身 黃 耆 錢 羌 活 黃 芩 秦 芩 防 風 炙 草 鈔

薑棗引。水煎多服。以平為期。

子癰論

又名風癰 一名子癰 亦名類中風

妊娠子癰乃為惡候若不早治必致墮胎其證或口噤項強手足攣縮與痰言語寒澁痰涎壅盛不省人事或忽然眩暈卒倒口不能言狀如中風實非中風之證不可作中風治即或無痰言語如常但似風狀多因血燥血虛亦不可概以風治而誤也矜羊角散主之馮氏云孕婦忽然僵仆痰涎壅盛不省人事乃是血虛而陰火熾上鼓動其疾左脈微數右脈滑大者名曰子癰宜四物養血酒芩清熱二陳化痰理氣治法仍以安胎為主勿過用中風之藥此由血虛生熱熱盛生風皆內起之風火養血而風自滅若心肝風熱用鉤藤湯肝脾血虛加味道遙散肝脾鬱怒加味歸脾湯氣逆痰滯紫蘇飲脾鬱痰滯二陳加竹瀝薑汁密膏云孕婦氣虛挾痰火證狀如中風卒倒即醒醒而復發清神湯主之兼服壽星丸予謂妊娠子癰至有目昏黑而厥者胎前絕少但一有此證即是兒暈屬氣與痰故目昏黑發厥只服紫蘇飲慎不可服蘇合丸及烏藥順氣散等藥至於破傷失血或吐衄血忽患口噤項強背直類中風證皆因失血所致不可不知用荆防安胎散治之

矜羊角散 治孕婦口噤項強手足攣縮痰壅不省人事

矜羊角 苡仁米 棗 仁各一錢 當歸酒洗 獨活 五加皮 茯 神各八 川

芍藥 杏仁 防風 木香 甘草 加

薑引水煎服 虛加人參 痰加竹瀝 胃弱加白朮

鉤藤湯 治孕婦手少陰足厥陰血虛風熱

人參 當歸 茯神 桑寄生 鉤藤 藤絡 苦桔梗 五錢

水煎服

清神湯

治孕婦忽然眩暈卒倒。口噤不能言。狀如中風。須臾即醒。醒而復發。乃氣虛挾

痰火。

人參 白朮 茯苓 白芍 黃耆 麥冬 歸身 炙甘草

煎藥引。水煎。食遠服。兼服壽星丸。

琥珀壽星丸 安神定志去風化痰

天南星

掘地作坑深二尺。用炭火二十觔。將坑燒紅。去炭掃淨。用好酒五升澆之。將南星趁熱放坑內。用瓦盆急蓋定。以黃泥封固。經一宿取出焙乾為末。入琥珀末兩錢。和勻。以生薑自然汁煮粥熟。再入續指心血三個攪勻。和末為丸。每服五十九。人參湯下。日

三服神效

荆防安胎散

治孕婦或因破傷患類風證

人參 當歸 白朮 生地 天麻 錢二 麥冬 去心 條芩 八

荆芥 防風 絡三 陳皮 甘草 絡四

水煎服

二陳湯

見本卷

加味道遙散

見本卷子懸門

加味歸脾湯

見本卷胎漏小產

四物湯


紫蘇飲俱見本草
安胎用

痢論

妊娠痢下因飲食生冷脾胃不能消化致令心腹疼痛傷血則赤傷氣則白氣血俱傷則赤白相雜蓋血屬陰陰傷則受熱居多然又有陽氣傷不能統陰血而痢赤又不得不從事於辛溫故治血痢尤當以色之顯晦驗其虛實寒熱故凡積之瘀晦不鮮清稀不稠皆虛寒之候即陽不統陰之血急投人參薑艾或可保全倘不審而誤服芩連乃速其危也惟積之稠粘紫赤而光澤者合用苦燥以堅腸胃之滑脫又必當佐以調氣之藥則陰邪解釋非若白痢之不可雜以芩連芍藥等味引頰滯穢裝傷陰血也氣屬陽陽傷則受冷居多即有火注下迫皆陽氣鬱遏本寒標熱之證不可統歸於熱但當驗其積之稠粘如糊色白如脂方可暫與清熱治標若汁沫如水色晦如塵急須溫理其氣即有熱證皆假象無疑其虛實寒熱既分而又有三禁三善五審之不可不知也一禁滌蕩腸胃恐陽氣下陷胎氣愈墜二禁滲利膀胱恐陰津脫亡胎失養三禁燒瀉滯氣恐濁氣愈滯後重轉加故善治妊娠之痢惟以調氣為先使已敗積沫隨氣而下未傷津液統之而安夫調氣有三善一使胃氣有常水穀輸運二使腹滿腹痛後重漸除三使濁氣開發不致侵犯胎元所謂五審者一審飲食之進與不進夫痢乃腸胃受病若痢勢雖甚飲食無妨者易已故痢以禁口為最劇在初起濁邪全盛之時不足為慮但要清理積滯飲食自進矣若七日已後尚不能食脉反數盛此必初時失於清理之故急需調氣理中則積沫漸下飲食漸進矣或初時能食至一旬一氣後反不能食脉息不振此必滌蕩太過胃

氣受傷所致。亦有過用苓連芩朴苦寒破氣而致呃逆嘔噦者。胃氣大敗最危之兆。惟峻與溫補庶可挽回。若脈見數疾無倫。或翕翕虛大。或歇止不前。或弦細搏指者。皆胃氣告匱。百不一生矣。二審澁之通與不通。下痢清濁不分。若痢雖頻而水道順利者。胎必無虞。若月數將滿。胎壓床胞。每多澁便頻數。轉胞脹悶之患。切禁利水傷津。急與開提自通。但須察其脈無過壯過硬之形。便宜補中益氣。稍加澤瀉車前。以升清降濁。投之無不輒應。非特妊娠為然。即平人久痢。津液大傷。而澁瀉不通者。亦宜此治法也。三審腹之痛與不痛。下痢腹痛。必然之理。然間有濁濕下趨。而無鬱滯之火者。則不痛也。但此多見於肥白人之白痢。若血痢與瘦人多火者。罕見也。治宜調氣運積。不用清火明矣。原其腹痛有寒熱之分。痛有止歇。痛則奔迫下墜。至固不及者。火也。痛自下而攻擊於上者。火也。痛而脹滿不勝摩按。熱飲愈甚者。火也。實也。痛無止歇。常時痛而無絞刺者。寒也。痛自上而奔注於下者。寒也。痛而不滿。時喜溫手摩按。飲熱漸緩。彼至固而可忍。須臾者。虛也。寒也。大約初痢脹痛為熱。為實。久痢疔痛為虛。為寒。即初因火注。切痛。痢久傷氣。亦必變為虛寒也。故久痢腹痛之脈。無論大小遲數。但以按之漸漸小者。並屬虛寒。急需溫補。慎勿利氣。惟急痛脈實。久按不衰者。可稍用炮黑薑連和之。四審後之重與不重。下痢後重。濁氣壅滯也。夫開通壅滯。必以調氣為本。在妊娠尤為切要。調氣則後重自除。而胎息自安。但初痢後重。首宜開發其滯。若久痢後重。又當升舉其陽。陽氣升則胃氣運。胃氣運則周身中外之氣皆調達。而無壅滯之患矣。故治孕婦之後重。無問胎之大小。但脈見有餘。則宜調氣。脈見不足。便與升提。雖血痢亦宜陽藥。一切滋膩血藥。總無干預。以氣有統血之功。則血無妄行之慮也。五審身之熱與不熱。下痢為裏氣受病。若見身熱。表裏俱因。元神將何所持。而

得祛邪之力哉。惟人迎之脈浮數可先用和營導氣法分解其勢。然後徐行清理。若初痢不發。或數日半月後發。熱脈來漸小。或虛大少力者。此真陰內亡。虛陽發露於外。在平人或可用辛溫峻補飲之。以導其源。若妊娠則桂附又難輕用。參朮薑芩膠艾之屬。非大劑濃煎峻投。難望其轉日回天之勳也。或有痢久銜虛。起居不慎。而感冒虛風發熱者。但當察其左手三部。必顯浮數之象。又當理中湯加桂枝合表裏而治之。以內氣久虛之邪。不得參朮助其中氣。則客邪不得解散也。又有病後瘧後。或本質虛羸之人。及秋冬天令寒冷。時下痢加以胎孕扼腕。豈可與平人之痢同日而語哉。其圖機活法。因人論證。因證立方。調治之法。在醫之神聖。工巧耳。考之醫通云。當用厚朴去乾薑湯治妊娠能食腹脹後重積穢稠粘之白痢。厚朴生薑甘草羊夏人參湯治妊娠腹脹後重赤白相兼之痢。黃芩芍藥湯送香連丸治妊娠能食後重積穢稠粘之血痢。連理湯合千金三物膠艾湯治妊娠少腹疼痛。痔晦不鮮。或間有鮮血之痢。駐車丸治妊娠發熱後重。陰虛食之血痢。白頭翁加甘草阿膠湯治妊娠熱毒內攻。噤口不食。腹脹後重。膿血稠粘之痢。千金膠艾榴皮湯治妊娠膿血清稀。胎動不安。久泄不止之痢。補中益氣湯治妊娠先瘧後痢。及瘧痢齊作。元氣下陷。胎氣下墜。小便頻數。或轉胞不得溺之痢。以上諸方。並加砂仁以調其氣。烏梅以調其血。未嘗不隨手輒效也。又有用當歸黃芩芍藥湯者。黃連阿膠湯者。俱錄方於後。以備採擇。予每用一味阿膠。飲或阿膠黃連飲。均治孕婦之痢。甚妥獲效。又用加味香連湯。亦屢驗。又按大全治妊娠下痢赤白痢疾絞刺疼痛。鷄子一枚。烏鷄者更良。破孔去清。留黃。用入黃丹一錢。攪勻。厚帛糊好。鹽泥固濟。火焙乾。為細末。米飲服二錢。一服愈者。是男。二服愈者。是女。



國家圖書館



003877416

線

413.62

7473

1

v.4

舊籍